



Catálogo de variedades antiguas de frutales

Variedades para aficionados

2016

www.arboreco.net



Cruïlles, Baix Empordà · info@arboreco.net · tel.650742502



EL VIVERO

Las variedades antiguas o tradicionales son el resultado del proceso de selección del agricultor que durante años ha seleccionado las variedades que mejor se adaptan a las características de su territorio. Esta selección permitió que durante épocas en que no existían medios de transporte ni de conservación, los agricultores pudieran proporcionar fruta a los mercados locales. Estas variedades a menudo se utilizaban para hacer conservas, sidra y muchas otras recetas locales que afortunadamente han permanecido en el tiempo. Las variedades antiguas son rústicas y resistentes a los agentes patógenos externos, por este motivo son ideales para el cultivo en agricultura ecológica.

Desde nuestro vivero situado a los pies del macizo de las Gavarres, recuperamos variedades antiguas de frutales de toda Europa y de viveros de salvaguarda de nuestro territorio. Nuestra colección está formada por más de 140 variedades.

Arboreco está inscrito al registro de operadores del Consejo Catalán de la Producción Ecológica (CT002151P) y al registro de proveedores de material vegetal con el número ES-09-17-0220.

PUNTOS DE VENTA



Al vivero de Cruïlles (Baix Empordà, Gerona)

(Camí de la Palanca s/n)

Los árboles se pueden comprar directamente en el vivero pero aconsejamos llamar (650742502) o enviar un correo electrónico antes (info@arboreco.net) para confirmar las existencias.



Envío por mensajero: También se pueden enviar los frutales por mensajero con gastos de puerto y embalaje a cargo del destinatario.



Ferias o mercados (Lleida, Molins de Rei, Mataró, Salt, Iturriaran, etc.): A menudo vamos a ferias o mercados donde podemos traerles las variedades que deseen, para saber dónde vamos pueden consultar la agenda de la web www.arboreco.net.

PRECIOS ORIENTATIVOS

Plantones de 1 año de injerto, en contenedor de 5 lt. · 12,00 – 17,00 €

Plantones de 2/3 años de injerto, en contenedor de 10 lt. · 18,00 – 23,00 €

Plantones de frutales de hueso de 1 año de injerto, a raíz desnuda · 7,00 – 12,00 €

Los precios varían en función de las unidades que se adquieran. Pueden pedir un presupuesto por correo electrónico o por vía telefónica.

PIES O PORTAINJERTOS

Manzano

M 111 Portainjertos vigoroso, adecuado para suelos francos o poco fértiles, sensible a asfixia radical. Apropiado para baja densidad de plantación (300-500 plantas/ha). Marco de plantación aconsejado 5m x 5m.

M 7 Pie de vigor medio (15-30% respecto al franco), bastante resistente a la asfixia radical, actividad rebrotante media, adecuado para suelos calcáreos y secos. Marco de plantación aconsejado 5m x 5m.

M 9 Pie muy débil (hasta un 70-80% menos respecto al franco), necesita una estructura de soporte, idóneo para densidad de plantación elevada (1000-2000 plantas/ha). Entra en producción de forma rápida. Raíces muy superficiales, sensible a la sequía. Aconsejable para cultivo en pared.

PERAL

Franco Patrón obtenido desde semilla (*Pyrus comunis*), muy vigoroso, lento a la hora de entrar en producción, muy longevo (hasta 80/100 años). Se adapta a suelos encharcados, muy resistente a los hongos de las raíces (*Armillaria mellea*). Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

Membrillo BA 29 Seleccionado desde Membrillo de Provenza (*Cydonia oblonga*), como es el más rústico de los membrillos, tiene más vigor y es más productivo, además entra en producción de forma bastante rápida y sus producciones son cualitativamente constantes. Adecuado para suelos fértiles y resistente a la sequía. Marco de plantación aconsejado 4m x 4m

Membrillo MA Seleccionado desde Membrillo de Anger. Vigor medio (20-30% menos que BA 29), rápido a la hora de entrar en producción y productivo. Sensible al frío y apto para suelos arcillosos. Marco de plantación aconsejado 4m x 4m.

ALBARICOQUERO

Franco Vigoroso, productivo, lento a la hora de entrar en producción. Para suelos poco fértiles, arenosos, no para terrenos encharcados ni compactados, resistente a la sequía y a los suelos calcáreos. Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

Mirabolán 29C Da gran vigor a la planta, buena adaptabilidad a diferentes tipos de suelos, afinidad de injertos heterogénea, tardía a la hora de entrar en producción. Marco de plantación aconsejado 5m x 5m

Mariana 2624 Mirabolán X *Prunus munsoniana*. Buena adaptabilidad a suelos calcáreos y compactos que acostumbran a encharcarse, medio vigoroso, resistente a la asfixia radical y al nematodos. Marco de plantación aconsejado 5m x 5m

GF 305 Clon de melocotonero franco adecuado para terrenos bien estructurados, de buen vigor, poca sensibilidad a la cal. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m

CEREZO

Franco (de semilla) Pie muy vigoroso, tardío a la hora de entrar en producción, adecuado para suelos francos, profundos y compactados. No tolera la sequía ni los terrenos desgastados. Buen anclaje, por lo tanto es aconsejable para cultivos en pendiente. Marco de plantación 6m x 6m o más.

Santa Lucía (*Prunus mahaleb*) Más resistente que el cerezo franco a las temperaturas bajas, a la sequía y a los suelos calcáreos, muestra sensibilidad a la asfixia radical. Prefiere suelos ligeros, francos, pero se

adapta a terrenos pedregosos y pobres. Vigor débil, muy buena afinidad con el cerezo ácido (guindo), aconsejable para cultivo en pared. Marco de plantación 5m x 5m o más.

CAB 6 (Selección de *P. Cerasus*) Obtenido de la Universidad de Boloña. Buena capacidad de adaptación a diferentes tipos de suelos. Medianamente rebrotante. Vigor medio/alto. Anclaje moderado. Adecuado para suelos pesados, compactados y encharcados. Sensibles a la escasez de agua. Marco de plantación 6m x 6m.

MELOCOTONERO

Franco Pie de buen vigor. Adecuado para suelos fértiles, bien drenados. Induce una buena calidad de los frutos (calibre, contenido de azúcares, color, etc.), rápida entrada en producción. Elevada sensibilidad a la clorosis férrica y a la asfixia radical. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

GF 305 Clon de melocotonero franco, da árboles de buen vigor, adecuado para terrenos bien estructurados, poco sensible a suelos calcáreos. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

GF 677 Híbrido natural melocotonero X almendro, seleccionado en Francia. Vigoroso, a veces tarda a la hora de entrar en producción. Adecuado para suelos calcáreos, poco fértiles, sensible a los suelos encharcados y resistente a la clorosis férrica. Marco de plantación aconsejado 4m x 5m.

CIRUELO

Franco (Mirabolan de semilla) Es el pie más usado, apto para cualquier tipo de suelo, da buen vigor a las plantas. Buena afinidad de injerto, no muy homogéneo. Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

Mariana GF 8/1 Patrón obtenido en EUA, hibridación libre entre Mirabolan Y *Prunus munsoniana*. Buena adaptabilidad a diferentes tipos de suelo, vigoroso, resistente a la asfixia radical. Buena productividad y calidad de los frutos. Marco de plantación aconsejado 5m x 6m

MANZANOS

Annurca
Astrakan rojo
Azúcar
Bella de Boskoop
Belleza de Roma
Blanca de España
Calvilla blanca d'inverno
Calvilla gialla
Calvilla rossa
Camuesa
Carabille
Cara sucia
Corazón helado
Coda larga
Coda larga roja
Decio
Del ciri amarillo
Del ciri rojop
De relleno
Eugènia
Gomosa
Gravenstein
Gravenstein roja
Limunet
Magnana
Mañaga
Morro de Liebre
Palacio de obispo
Periquet
Piatlin
Reina de reinetas
Reineta Baumann
Reineta de Inglaterra
Reineta de Canadá
Reineta dorada
Reineta grisa de Saintogne
Reineta terrera
Reineta Champaña
Renetta ananas
Renetta de los Carmelitas
Rosa de Berna
Rosa Mantovana
Santiago
San Juan
San Miguel
Ull de nespre
Verd doncella

PERALES

Agua
Blanquilla
Camosina
Campmanyà
Cañella
Castells
Cocer
Decana de invierno
Duchessa de Angoulême
Duchessa de Bererd
Ercolini
Flor de invierno
Invierno
Limonera
Martín sec
Móscatela
Muslo de dama
Piel de galàpet
Pera de Puigcerdà
Perer de la rectoria
Pereta blanca
Primerenca de Trevoux
Santiago
Sermenya
Chata

MELOCOTONEROS

Amsden
Belga
Benvingut
Escarolita
Gavatx
Gavatx Santiago
Gavatx blando
Melicotó amarillo
Merril Franciscà
Mollar rojo
Melocotón rojo
Resclós
Rondan
Roqueta
Roqueta helado
San Lorenzo
Sudanell
Viña

ALBARICOQUEROS

Canino
Moniqui
Paviot
Pisana
Precoz de Imola

CIRUELOS

Anna Späth
Biricoccolo
Colló de Frare
Frare negro
Fulla d'avellaner
Lágrima de oro
Llevador
Mirabella de Nancy
Monstruosa de Inglaterra
Ciruelo de Agen
Quetsche de Alsacia
Reina Claudia de Althan
Reina Claudia de Oullins
Reina Claudia Tolosa
Reineta o Reina Claudia verde
Reina Claudia violeta
Rogeta de agosto
Rusticano
San Juan
San Miguel
Scagnarda

CEREZOS

Aguardiente
Bigarreau Burlat
Bigarreau Geant d'Hedelfingen
Bigarreau Morreau
Bigarreau tardà de Vignola
Corazón de pichón
Cua llarga
San Isidro
San Pedro
Selrana
Tiritos

HIGUERAS

Brianzolo negre
Cuello de dama blanca
Cuello de dama negra
Tres fan carga

OTROS

Avellano
Azufaifo
Frambuesa
Madrño
Membrillo- "Geant de Varca"
Níspero
Granado
Sauco
Serbal

MANZANOS

ÉPOCA DE MADURACIÓN

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANNURCA								
ASTRAKAN ROJO								
BELLA DE BOSKOOP								
BELLESA DE ROMA								
BLANCA DE ESPAÑA								
CALVILLA BIANCA D'INVERNO								
CALVILLA GIALLA								
CALVILLA ROSSA								
CAMUESA								
CARABILLE								
CARA SUCIA								
CORAZÓN HELADO								
CODA LARGA								
CODA LARGA ROJA								
DECIO								
DEL CIRI AMARILLO								
DEL CIRI ROJO								
DE RELLENO								
EUGENIA								
GOMOSA								
GRAVENSTEIN								
LIMUNET								
MAGNANA								
MANYAGA								
MORRO DE LIEBRE								
PALACIO DE OBISPO								
PERIQUET								
PIATLIN								
REINA DE REINETES								
REINETTA BUMANN								
REINETTA DE INGLATERRA								
REINETA DE CANADA								
REINETA DAURADA								
REINETA GRISA DE SAINTOGNE								
REINETA TERRERA								
REINETA CHAMPAÑA								
RENETTA ANANAS								
RENETTA DE LOS CARMELITAS								
ROSA DE BERNA								
ROSA MANTOVANA								
SANTIAGO								
SAN JUAN								
SAN MIGUEL								
AZÚCAR								
ULL DE NESPRES								
VERDE DONCELLA								

ANNURCA

DESCRIPCIÓN

Era conocida por los romanos con el nombre de "Orcola", tal y como recuerda G.B.Porta en 1583, descrita por Plinio y representada en los frescos de Ercolano (Napoli, Italia). Es muy rústica y productiva, adaptada a las **zonas templadas** y **resistente a todo tipo de transformación**.

FRUTO

Fruto pequeño o mediano, de forma constante, esférica-achatada, piel lisa, espesa, casi completamente roja, con pequeñas manchas y rugosa en la zona del pedúnculo. La pulpa es blanquecina, dura, no mucho jugosa, más bien dulce, acidula. Se recoge en **octubre**.

CONSEJO

Ya que está sometida a la caída precoz, se recoge verde y se **deja enrojecer durante dos meses** en las típicas "Melare" (pequeños porches).



ASTRAKAN ROJO

DESCRIPCIÓN

Probablemente originaria de la Rusia septentrional y más tarde difundida en los Países nórdicos (Suecia, Noruega) por su precocidad. Árbol poco vigoroso de porte erguido, **aguanta el frío intenso, resistente al moteado**.

FRUTO

No se conserva por mucho tiempo. Fruto de tamaño mediano, de forma redonda achatada, piel roja con rayas más oscuras. La pulpa es blanca, fina, tierna, poco jugosa, azucarada, perfumada, sabor de buena calidad. Época de cosecha **julio, agosto**.

CONSEJO

No se conserva por mucho tiempo.

SINÓNIMOS

Astracan Rosso, Astracan Rouge, Astracan Rojo, Roter Astrakan, Roter Ernteapfel, Roter Augustapfel, Roter Jakobsapfel, Roter Sommerapfel.



AZÚCAR

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor medio con ramas erguidas.

FRUTO

La forma del fruto es achatada normal y oblicua, de tamaño mediano, la piel es fina, brillante y muy aromática. Coloración matizada amarilla-verdosa estriada de rojo con herrumbre en la cubeta basilar. El sabor es ácido, aromático, tierna y poco jugosa. Madura a **finales de octubre, principios de noviembre** y se conserva hasta marzo.



BELLA DE BOSKOOP

DESCRIPCIÓN

Variedad tradicional de origen holandés, se cree que deriva de una semilla encontrada en Boskoop el 1856 por K.J.W.Ottolander (Holanda). El árbol es muy vigoroso y productivo, poco sensible al moteado.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano a mediano-grande, de forma variable, redondeado, asimétrico. Piel rugosa, con presencia de herrumbre, a veces manchada de forma irregular con estrías rojizas o anaranjadas. La pulpa es blanca-cremosa, crujiente, compacta, medianamente jugosa, azucarada, ligeramente acidula, poco aromática pero excelente. Época de maduración a partir de la **segunda mitad de octubre**.



BELLESA DE ROMA

DESCRIPCIÓN

Árbol poco vigoroso de porte semi-erguido con ramas delgadas y flexibles. Madera oscura, rojiza con lenticelas. Por su escaso vigor se presta bien a la **formación en espaldera** muy productiva y regular. Es sensible al oídio.

FRUTO

Fruto de tamaño de mediano a grande, tronco de forma cónica, oblonga, de contorno esférico regular. Piel brillante, untosa, aromática, gran parte de la superficie puede estar cubierta de una capa de color rojo intenso o rayada, con punteado blanquecino, regular, abundante. Pulpa blanca crema, harinosa, crujiente, **sabor ligeramente ácido**, aromática. Maduración tardía hacia **octubre – noviembre**.

CONSEJO

Se conserva bien en la cámara frigorífica.

SINÓNIMOS

Rome Beauty (EUA)



BLANCA DE ESPAÑA

DESCRIPCIÓN

Variedad originaria de *l'Aude*.

FRUTO

Piel de color amarillo con pulpa firme y jugosa de sabor muy dulce y particularmente azucarada. Maduración tardía hacia **noviembre-diciembre**.

Imagen no disponible

CALVILLA BIANCA DE INVIERNO

DESCRIPCIÓN

Variedad muy antigua de origen incierto, tuvo un gran renombre en el pasado. Parece ser que su procedencia es de Wurtemberg (Alemania), donde se conocía antes del 1598, de allí se expandió hasta Suiza y más tarde llegó a Francia con el nombre de Calvilla, debido al topónimo de la localidad francesa de Calville (Eure). El árbol es vigoroso y de porte expansivo, **sensible al frío**.

FRUTO

El fruto es grande de forma constante, un poco achatado con surcos y abultamientos evidentes en la parte inferior (característica típica de la calvilla). La piel es de color verde amarillento, a veces con un difuminado rojo-anaranjado. La pulpa es de color blanco crema, delicada, jugosa, fina, compacta, ácida, aromática, muy buena. Madura desde **medios de noviembre hasta principios de diciembre**.



CALVILLA AMARILLA

DESCRIPCIÓN

También se conoce con el nombre de *Modenese*, esta variedad tradicional parece ser originaria de Modena, de hecho el pomólogo Gallesio la recuerda en 1815 con el nombre de "manzana de Módena". El árbol es rústico, con un vigor medio escaso, de porte más bien expansivo, con discreta resistencia al oídio y al moteado, tiende a la alternancia.

FRUTO

El fruto es pequeño (pesa unos 105 gramos) y presenta una forma esférica. La piel es roja sobre un fondo amarillo-verdoso o blanco-crema, ligeramente ácida. Se recoge a **finales de octubre** y se conserva fácilmente hasta diciembre.

CONSEJO

Fructifica sobre todo en las ramas pequeñas que terminan con un botón mixto que se debe respetar cuando se poda.

Discreta para el consumo fresco **es ideal para cocer**. Para su polinización se recomienda la variedad *Abbondanza*.



CALVILLA ROSSA

DESCRIPCIÓN

Se cree que es originaria de Bélgica (principios del 1800), pero Lelectier (procurador del rey en Orleans) la cita en 1628 como la *Calvilla del Rey*. El árbol es fértil, poco vigoroso y poco susceptible al moteado.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano-grande, tronco cónico, oblongo, un poco irregular y a veces asimétrico. Piel verde casi totalmente recubierta de un rojo intenso, lisa, delgada, cerosa, con pequeñas manchas blancas. La pulpa es blanca-cremosa y rosada en la zona central, de textura fina, medianamente jugosa, crujiente, dulce, ligeramente ácida y aromática. Madura a partir de la **segunda mitad de octubre**.

CONSEJO

Buena variedad para los **cultivos de montaña**.



CAMUESA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso escaso de **porte de baja altura**. Tendencia a agotarse por falta de renovación de maderas, es necesario tenerlo en cuenta en época de poda. El manzano Mañaga resulta ser una buena polinizadora.

FRUTO

Fruto de calibre mediano a grande, de forma tronco cónica con tendencia esférica, achatada. Piel mate, si se frota brilla, aromática, de coloración matizada amarilla, , parcialmente teñida de rojo con punteado claro, uniforme. Pulpa ligeramente crujiente, firme, harinosa, dulce y aromática. Madura de **finales de septiembre a principios de octubre**.



CARABILLE

DESCRIPCIÓN

Variedad muy válida, originaria de l'Aude.

FRUTO

Fruto de calibre de pequeño a mediano, piel de color rojo intenso, muy perfumada. Maduración hacia **noviembre** y se conserva bien hasta abril.



CARA SUCIA

DESCRIPCIÓN

Parecida a Manzana o Reineta Terrera.

Árbol de vigor mediano de porte semi-erguido. Se cita en la bibliografía dos variedades: *Cara Bruta Dolça* con pulpa ligeramente acidula y *Cara Bruta Agre* con pulpa ácida.

FRUTO

Fruto de calibre pequeño, achatado, de contorno esférico irregular. El pedúnculo es corto, leñoso con inserción recta. Piel con fondo de color amarillo verdoso, cubierta casi totalmente de ferruginosidad pseudoverdosa, con escaso punteado, claro con aureola. Pulpa de color blanco crema con reflejos verdosos, crujiente, un poco harinosa, de sabor muy dulce. Maduración de los **últimos diez días de septiembre hasta los primeros de octubre**.



CORAZÓN HELADO

DESCRIPCIÓN

Árbol de porte abierto y de vigor mediano.

FRUTO

El fruto es redondo de buenas dimensiones y de coloración amarillenta con poca herrumbre. Durante la maduración el **centro adquiere una textura gelatinosa**, firme y ligeramente dulce y de buen sabor. **Madura en octubre**.



COLA LARGA (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

DESCRIPCIÓN

Árbol con vigor considerable, alto y con el porte bastante abierto.

FRUTO

Fruto de forma aplastada y oblicua de tamaño mediano. Piel de color verde-amarilla y donde le da el sol un poco rojiza. Pulpa de color blanco, ferma dulce-acídula. Se recoge el mes de octubre i se conserva hasta marzo.



COLA LARGA ROJA

DESCRIPCIÓN

Fruto de calibre mediano con forma redonda cónica.

FRUTO

La piel es seca, fina, brillante y aromática de color rojo intenso. La pulpa es de sabor ácido, de consistencia firme, crujiente, de coloración blanca. Madura hacia el mes de **octubre** y se conserva hasta marzo, principios de abril.



DECIO

DESCRIPCIÓN

Árbol rústico, muy vigoroso, poco sensible al moteado.

FRUTO

Fruto de calibre mediano – pequeño, forma tronco-cónica, ligeramente aplanada, piel lisa, pruinosa, de color mate con manchas de color rojo-vino donde le toca el sol. La pulpa es de color blanco-cremosa, soda, azucarada y aromática. **Ideal para cocer al horno o para hacer pasteles.** Se recoge hacia mediados de octubre.



DEL CIRI AMARILLO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor entre escaso y mediano de **porte de poca altura con las ramas erguidas**, muy productivo.

FRUTO

Fruto de forma oblonga-cónica, de calibre entre mediano y grande, piel de coloración amarilla clara con toques rojizos aunque puede presentar diferentes coloraciones, fina, delgada, brillante, untuosa y aromática. La pulpa es de color blanco crema, poco jugosa, dulce y tierna. Se recogen hacia **octubre o noviembre**.



CONSEJO

Cuando se recogen se cubren con hojas de helecho o de maíz, y se dejan así un par de meses sin tocarlas hasta prácticamente Navidad, de esta forma adquieren esta coloración amarilla tan peculiar. Se conservan hasta marzo, inicio de abril.

DEL CIRI ROJO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor medio de porte abierto.

FRUTO

Fruto de calibre mediano a pequeño, alargado, de contorno irregular, pedúnculo de corto a mediano, leñoso, inclinado hacia un lado y muy hundido. Piel de color rojo claro con chapa uniforme (en más del 50%), punteado blanco. Pulpa de color crema fibrada de verdoso a rosado. Su sabor mejora en la madurez fisiológica. Se recoge en el mes de **octubre**.



DE RELLENO

DESCRIPCIÓN

Varietal local del Ampurdán, árbol de poco vigor, piel de color verde cremosa.

FRUTO

Madura hacia finales de septiembre a Serra de Darò (Baix Empordà). Pulpa dulce, jugosa, crujiente, firme incluso cuando se cuece, de hecho es la **típica variedad para cocer con "relleno"**.



EUGENIA

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano, de porte abierto, tendencia a alargarse las ramas en posición horizontal.

FRUTO

Fruto de forma redonda, de coloración matizada amarilla clara, marmolado de rojo, piel fina y brillante sin herrumbre. La pulpa es firme, muy aromática y ligeramente ácida. Madura en **octubre**.



SINÓNIMOS

Santa Eugenia

GOMOSA

DESCRIPCIÓN

Varietal recuperada en Hostalets de Pierola (Anoia, Cataluña).

FRUTO

Con muy buenas cualidades organolépticas, maduración al mes de noviembre y se conserva todo el invierno.



GRAVENSTEIN

DESCRIPCIÓN

Antigua cultivar veraniega. Árbol medianamente resistente al moteado y al oídio, muy resistente al frío.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano a grande y de forma cónica. Piel lisa, untosa, fina, amarilla con numeroso punteado gris, con estrías rojas cuando empieza a estar madura. La pulpa es blanca-marfil, fina, crujiente, poco azucarada, **ligeramente ácida**, aromática y perfumada. Madura en **agosto**.



GRAVENSTEIN ROJA

DESCRIPCIÓN

Árbol medianamente resistente al moteado y al oídio, **muy resistente al frío**.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano a grande y de forma cónica. Piel lisa, untuosa, fina, roja. La pulpa es blanca-marfil, fina, crujiente, poco azucarada, **ligeramente ácida**, aromática y perfumada. Madura en **agosto**.

Imagen no disponible

LIMUNET

DESCRIPCIÓN

Variedad tradicional probablemente originaria de Alemania (encontrada antes del 1850).

FRUTO

Fruto aplastado. Piel lisa, delgada pero dura. Pulpa blanca, ácida, ligeramente dulce, crujiente y muy jugosa. **Óptima para cocer al horno**. Madura la **segunda mitad de octubre**.



MAGNANA

DESCRIPCIÓN

Variedad cultivada en Piemonte (Italia) desde finales del siglo XIX, su nombre proviene de la localidad donde fue encontrada. El árbol es rústico, vigoroso, fértil, alternante, sensible al pulgón, tolerante al moteado y resistente al oídio.

FRUTO

Fruto de calibre mediano, cónico-alargado, irregular; piel verde amarillenta con difuminados rojos o granates, con punteado evidente. La pulpa es de color blanco-verdoso, crujiente, de textura fina, se deshace, jugosa, de gusto dulce ácido, con cierto sabor anisado. Se **recoge a finales de octubre y madura en noviembre**, se conserva hasta marzo-abril.



MAÑAGA

DESCRIPCIÓN

Árbol con vegetación erecta y vigorosa.

FRUTO

Fruto de calibre de mediano a grande con forma cónica alargada, con la anchura máxima hacia el pedúnculo. De contorno irregular en la mayoría de los frutos, acaba en forma de morro en la zona pistilar. Piel lisa, luciente, fuerte y de charol, color amarillo verdoso uniforme con una ligera chapa en la zona de insolación. Pulpa blanca con tendencia a verdosa. Pulpa crujiente, muy jugosa, dulce y con un poco de sabor anisado.

Maduración comercial: **últimos diez de Octubre – primeros diez días de Noviembre.**



MORRO DE LIEBRE

FRUTO

Sabrosa, dulce, crujiente y muy perfumada. Floración tardía y maduración hacia **noviembre.**

CONSEJO

Muy buena cocida.



PALACIO DE OBISPO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano de porte irregular.

FRUTO

El fruto es de tamaño mediano de coloración roja y la pulpa es dulce. Se recoge en **octubre** y no se conserva.



PERIQUET

DESCRIPCIÓN

Antigua variedad. Árbol de vigor mediano a muy vigoroso.

FRUTO

Fruto de forma redondeada, de calibre mediano, piel amarilla con un 30% de la superficie rosada y pulpa dulce. Maduración en el mes de **septiembre.**



PIATLIN

DESCRIPCIÓN

Manzana otoño-invernal originaria de Biellese (Val Elvo) conocida también con el nombre de *Piatarlini*. Árbol rústico con estructura en altura, muy fértil. Resistente al moteado y al oídio.

FRUTO

Fruto mediano, muy achatado. La piel es verdosa-bronce, herrumbrosa, áspera y delgada. La pulpa es blanca, crujiente, jugosa, dulce, ligeramente acidula y perfumada, con un particular regusto a avellana y almendra. Se recoge la tercera semana de **septiembre**.

CONSEJO

Se conserva hasta febrero o marzo.



REINA DE REINETAS

DESCRIPCIÓN

Variedad antigua de origen centroeuropeo.

FRUTO

Árbol vigoroso. Fruto de calibre mediano (110 g), redondo cónico, piel densa, lisa, de color amarillo-dorado, con rayas rojizas y punteado gris oscuras en la parte soleada. Pulpa blanca – amarillenta, crujiente, firme, fina, jugosa, azucarada, ligeramente acidula y muy perfumada. Maduración a **partir de finales de agosto hasta octubre**, dependiendo del lugar de plantación.

SINÓNIMOS

Queen of the pippin, Reine des reinettes, Reinette de la couronne, Reinette rousse, Röthliche Renette, Renetta Rossigna altres de Parmena Dorata d'Inverno, Pearmain Doré, Golden Winter Pearmain



REINETA BAUMANN

DESCRIPCIÓN

Originaria de Bélgica, probablemente obtenida hacia el 1800, por el pomólogo belga Jean-Baptiste Van Mons. Fue descrita por primera vez en el año 1811. Conocida también en toda Europa, fue dedicada a los viveristas y hermanos Baumann de Bollwiller (Francia), los cuales contribuyeron a su difusión. Árbol fértil y productivo, apto para el **cultivo de montaña**.

FRUTO

Fruto de calibre grande, redondo, achatado, piel con fondo de color amarillo, recubierta casi totalmente por franjas rojas oscuras. La pulpa es amarillenta, firme, semifina, dulce-acidula, ligeramente perfumada de buena calidad. Normalmente se **recoge a finales de octubre y madura hacia diciembre**.



REINETA DE INGLATERRA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso.

FRUTO

Fruto de tamaño grande, con la típica forma de las reinetas. Pulpa tierna, azucarada, de agradable acidez y perfume delicado. Maduración hacia **octubre**.

CONSEJO

Excelente también para hacer mermelada.



REINETA DE CANADÁ

DESCRIPCIÓN

Variedad muy antigua de origen francés, citada en 1771 por el francés *Andrieaux*. Árbol vigoroso de porte expansivo, lento a la hora de fructificar, medianamente resistente al moteado.

FRUTO

Fruto grande, achatado, abultado, irregular, con punteado considerable. La piel es amarilla con difuminado rojo-bronce donde le da el sol, con herrumbre más o menos extenso en el peciolo. La pulpa es de color amarillento, bastante jugosa, fina azucarada, ácida, aromática y de óptimas cualidades gustativas. Madura a principios de **septiembre hasta octubre**.

CONSEJO

Se conserva durante poco tiempo.

SINÓNIMOS

Renetta del Canadà, Reinete de Canada, Canada Pippin, Tortezzo, Weisserrenette.



REINETA DORADA

DESCRIPCIÓN

Variedad originaria de los Pirineos Orientales.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano-pequeño (115 gr.) con forma aplanada, bastante irregular, asimétrica con la piel de color amarillo – verde, lisa, cerosa, con un punteado pequeño de color oxidado. Herrumbre en la cavidad del peciolo que forma una mancha continua más o menos extensa. Pulpa de color blanco-amarillo, tierna, un poco harinosa, dulce-ácida, jugosa y con excelentes cualidades gustativas. Madura la **segunda mitad de septiembre**.



REINETA GRISA DE SAINTOGNE

DESCRIPCIÓN

Origen antiguo y desconocido.

FRUTO

Fruto de calibre medio a grande y de forma variable, a veces es alargado y cónico, otras, corto y aplastado. Piel fina y áspera completamente de color bronce pasando de color gris-verde a roja brillante. Pulpa rojiza, firme, de sabor dulce, ácido, ligeramente anisada. Buena para hacer **pasteles**. Se recoge hacia el mes de **octubre**.



REINETA TERRERA

DESCRIPCIÓN

Árbol de porte muy abierto y vigoroso.

FRUTO

El fruto de calibre mediano, redondo achatado es de coloración amarilla-marrón, cuando está madura puede presentar un difuminado rojo en la parte expuesta al sol, piel seca, áspera y lisa. La pulpa es amarillenta, crujiente, firme, dulce, de buen sabor y muy aromática. Se recoge en **octubre** y se conserva hasta marzo.



REINETA CHAMPAÑA

DESCRIPCIÓN

Antigua variedad probablemente originaria de la región francesa de *Champagne*, indicada por primera vez en 1799 y comercializada en 1857. Por sus características de adaptación, no se difundió por toda Europa hasta 1980 como manzana comercial. Árbol vigoroso, de porte expansivo, productividad elevada y constante, resistente al frío invernal y poco sensible al oídio y al moteado.

FRUTO

Fruto de calibre mediano (135 gramos) y de forma achatada, a veces un poco abultado. La piel es bastante delgada, de color amarillento verdoso, a veces con difuminado rojo en la parte donde le da el sol, con herrumbre más o menos evidente en la zona del pecíolo. La pulpa es fina, muy perfumada, jugosa y ácida. Si se recoge antes de tiempo tiene un sabor picante/gaseoso muy sabroso. Se recoge en **octubre** y se puede conservar hasta el mes de febrero.

CONSEJO

Es una variedad autoestéril y se tiene que polinizar con *Abbondanza*, *Belfiore groc*, *Pearmain dorata*.



RENETTA ANANAS

DESCRIPCIÓN

Variedad originaria de Holanda (1820 aproximadamente). Árbol muy vigoroso y productivo, resistente o poco sensible al moteado.

FRUTO

Fruto de calibre entre pequeño y mediano, forma elíptica, oblonga, piel un poco pegajosa, de color amarillo con un punteado evidente. Pulpa blanca-cremosa, crujiente, jugosa, fina, dulce-ácida, gaseosa, perfumada, con regusto de piña de donde le viene el nombre (ananás en italiano, piña). Madura a finales de **agosto**.



RENETTA DE LOS CARMELITAS

DESCRIPCIÓN

De origen francés, citada por *Morlet* en 1667. Variedad tradicional bastante difundida por Francia y Alemania en el 1800. A menudo se confunde con la *Renetta de Kassel pequeña*, y también con la *Reinette Rousse o des Carmes*. Árbol poco vigoroso, fértil, bueno para el **cultivo en altitud**.

FRUTO


Fruto de tamaño mediano, redondeado-alargado, casi siempre con una hinchazón lateral en el pecíolo que la hace caracterizar. La piel es de color amarillo con estrías rojas en el lado expuesto al sol, con punteado rojizo oscuro bastante evidente. La pulpa es sabrosa, blanca, fina, bastante azucarada. Se recoge hacia **octubre-noviembre** y se puede conservar hasta febrero/marzo.

CONSEJO

Es una buena variedad para comer **fresca** y para elaborar **sidra**, también se puede **cocer**.

SINÓNIMOS

Reinette des Carmes, *Limonen Reinette*, *Reneta dei Carmelitani*, *Karmeliter-Reinette*.



ROSA DE BERNA

DESCRIPCIÓN

Variedad apta para el **cultivo de montaña**, rústica y resistente a las enfermedades.

FRUTO

Pulpa fina, jugosa, ácida y refrescante. Maduración en **septiembre** y se conserva hasta noviembre.



ROSA MANTOVANA (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

DESCRIPCIÓN

Variedad tradicional originaria de *Trentino-Alto Adige (Rosa di Caldaro)*, desde donde se difundió hasta la región de Mantova. También es conocida como *Melarosa*. Este manzano es vigoroso, bastante productivo y tiende a la alternancia; medianamente tolerante al moteado y con bastante resistencia al oídio.

FRUTO

Fruto mediano, redondeado, achatado, de piel densa, lisa, cerosa, amarilla clara con difuminados rojos-rosados en la parte expuesta al sol. La pulpa es blanca y tierna, jugosa, ligeramente ácida y poco azucarada.

CONSEJO

Cuando se recoge (**segunda mitad de octubre**) no es muy sabroso pero si se consume desde finales de noviembre hasta Navidad es muy gustoso.



SANTIAGO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano de copa redondeada.

FRUTO

Fruto de calibre mediano, forma redonda cónica, piel delgada, untosa, fina, brillante y aromática de coloración matizada amarilla-verdosa estriada de rojo, con herrumbre marrón claro localizado en la cubeta basilar y con punteado regularmente repartido. La pulpa es amarillenta, firme, crujiente, aromática y de **sabor subácido**. Pedúnculo mediano, leñoso y erguido. Se recoge a finales de **julio**, **principios de agosto**.



SAN JUAN

DESCRIPCIÓN

Árbol de poco vigor.

FRUTO

La forma del fruto es redondeada achatada. Piel de superficie lisa, de coloración roja intensa. Pulpa crujiente, jugosa y dulce. Se puede volver harinosa. Se recoge en **julio**.



SAN MIGUEL

FRUTO

Fruto de calibre muy grande (370 g), piel verde, un poco pegajosa con la pulpa blanca marfil, crujiente, medianamente jugosa y dulce. Se guarda hasta enero/febrero. Se recoge a finales de septiembre.



ULL DE NESPRE

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor medio con ramas muy erguidas con copa de forma cónica.

FRUTO

Piel lisa, untuosa y aromática, de coloración amarillo-verdosa con tonalidades rojizas en la parte expuesta al sol. Forma del fruto redonda achatada con un rosetón muy abierto. Pulpa de sabor ácido, de consistencia firme y crujiente. Se recoge a **finales de septiembre, principios de octubre.**



VERDE DONCELLA

DESCRIPCIÓN

Variedad conocida en España desde hace muchos años, era la variedad más difundida de Aragón y desde hace unos 50 años también se encuentra en Lérida. Crecimiento vertical los primeros años, de porte semi-erguido, parece autofértil.

FRUTO

Fruto de calibre mediano y forma generalmente más ancha que alta, de contorno irregular, oblongo o elíptico, casi siempre rebajado de un lado. Piel lisa, ligeramente untuosa, de color amarillo o blanco cera con difuminados rosados en la zona soleada, con punteado ferruginoso o blanco. Pedúnculo fino, leñoso, la pulpa es blanca verdosa, jugosa, dulce y perfumada, de cualidades gustativas excelentes. Maduración en **octubre,**



CONSEJO

A veces se usa para cocer. De buena conservación en cámara frigorífica.

PERALES

ÉPOCA DE MADURACIÓ

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AGUA								
BLANQUILLA								
CAMOSINA								
CAMPMANYA								
CANYELLA								
CASTELLS								
CHATA								
CO CER								
DECANA DE INVIERNO								
DUCHESSA D'ANGOULÊME								
DUQUESSA DE BERERD								
ERCOLINI								
FLOR DE INVIERNO								
INVIERNO								
LIMONERA								
MARTÍN SEC								
MÓSCATELA								
CUIXA DE DAMA								
PELL DE GALÀPET								
PERA DE PUIGCERDÀ								
PERETA BLANCA								
PRIMARENCA DE TREVoux								
SANTIAGO								
SERMENYA								

AGUA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso de media altura y de entrada en producción tardía.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano, de color amarillento-dorado, suboval, la piel es fina, untuosa y áspera. La pulpa es muy dulce, jugosa, y tierna con sabor a canela. Madura en **octubre**.



BLANQUILLA

DESCRIPCIÓN

Variedad muy difusa y comercializada debido a su buena conservación, árbol muy vigoroso.

FRUTO

Pera de agua, fruto de tamaño mediano, de forma alargada, oblonga y periforme. Piel de color verde claro y pulpa jugosa, blanca, dulce y muy aromática. Recolección de **finales de julio a principios de agosto**.

SINÓNIMOS

Peral de agua de Aranjuez

Imagen no disponible

CAMOSINA

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor medio de porte bastante abierto y muy productivo. Floración a mediados de abril.

FRUTO

Fruto de calibre pequeño, parecido a Castells pero una poco más alargado. De forma sub-oval piriforme a veces ligeramente asimétrica. Pulpa blanca o blanca amarillenta, pedúnculo mediano, rígido con inserción oblicua. La piel es lisa, mate, fina y aromática de color amarillo verdoso o dorado, punteado abundante. Peso medio de unos 38 gramos. La pulpa es muy dulce, firme, crujiente y aromática (sabor a moscatel), agradable. Se puede poner modorra. Recolección de **finales de junio a principios de julio**.



CAMPMANYA

DESCRIPCIÓN

Árbol muy vigoroso, de porte erguido con poca intensidad de ramificación.

FRUTO

Fruto con la forma típica de la pera, simétrica y redondeada con las cavidades basilar y apical superficiales. Pedúnculo largo y fino, de implantación oblicua como prolongación del fruto. Piel lisas y suave, brillante, de color amarillo verdoso o dorado, con punteado repartido de forma irregular. Pulpa blanca o ligeramente verdosa, un poco crujiente, azucarada, firme, ligeramente granulosa y jugosa. El sabor es agradable con ligero sabor a limón. Se recoge durante la **primera mitad de julio**.



CAÑELLA

DESCRIPCIÓN

Variedad encontrada por *Giffard en Fusièrre* (Francia) en el año 1825. Árbol poco vigoroso, productivo aunque a veces alternante, apta para el cultivo en eje. Sensible al moteado y psiles, bastante resistente a carpocapsa.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano, forma típica de pera, redondeada irregularmente, pedúnculo de longitud mediana. La piel es de color verde paja con manchas rojizas en el lado soleado. Pulpa sabrosa, de buena calidad gustativa. El centro del fruto puede volverse modorro, así que debe consumirse pronto aunque en cámara la conservación es superior a las variedades Castells i Moscatella. Se recoge los **últimos días de junio hasta los primeros diez días de julio**.

SINÓNIMOS

Mantecosa Giffard, Cañella.



CASTELLS

DESCRIPCIÓN

El primer lugar donde apareció fue en Can Castells de Sant Boi de Llobregat, procedente de Sur América, el 1850. Es también conocida en la zona como **Pera de San Joan**. Árbol muy vigoroso, porte erecto y con pocas ramificaciones. Fructifica básicamente en lamburdas que se tienen que respetar durante la poda. Es muy productiva cuando se consigue equilibrarla.

FRUTO

Fruto de tamaño pequeño bastante aplastado, pedúnculo fino y carnoso en la base. Piel verdosa, verde-amarilla y amarillo limón cuando es madura. Presenta una mancha roja rosada en la cara donde le toca el sol. Carne blanca, firme y azucarada de un sabor característico que hace que se la considere una pera veraniega de calidad. Se recoge los últimos **diez días de junio**.

CONSEJO

Variedad autoestéril, favorece la polinización de Ercolini, Blanquilla, Moscatella, Cañella y Campmanya.



CHATA

FRUTO

Fruto de forma aplanada con piel de coloración amarillenta, pulpa fina. Maduración hacia **septiembre (Garrotxa)**. En proceso de caracterización.

Imagen no disponible

COCER

DESCRIPCIÓN

Árbol muy vigoroso con porte de forma piramidal.

FRUTO

Fruto grande de coloración verde moteada de marrón. La pulpa es de sabor áspero pero aromático. Madura en **octubre**.

CONSEJO

Variedad de pera **para cocinar**.



DECANA DE INVIERNO

DESCRIPCIÓN

Se cree que el pomólogo belga *Van Mons* la encontró a principios del 1800 en el jardín de los Capuchinos de la Universidad de Lovanio (Bélgica). Planta de vigor mediano, muy fértil, **sensible a les heladas tardías**, prefiere **ambientes templados**.

FRUTO

De calibre grande, globosa-ovoide, piel lisa verde-amarilla, con muchas manchas y oxidada en la cavidad inferior. La pulpa es blanquecina, compacta, azucarada, ligeramente ácida y perfumada, sabor óptimo. Madura en invierno, a partir de **diciembre**.

CONSEJO

Óptima para conservarse.



DUQUESA D'ANGOULÊME

DESCRIPCIÓN

Árbol medianamente vigoroso y muy fértil. Se encontró dentro de la propiedad de los *Eparonnais* en el municipio de *Querrè* (Francia). El 1820 se dedicó a la *Maria Teresa Carlotta* de Francia duquesa de *Angoulême*.

FRUTO

Fruto bastante grande con la piel gruesa, verde clara, que se vuelve amarilla cuando madura y con manchas rojas-oxidadas. La pulpa es blanca-verdosa, se deshace, jugosa, a veces con textura granular, poco dulce, gustosa y ligeramente perfumada. Madura en **octubre**.



DUQUESA DE BERERD

DESCRIPCIÓN

Árbol de buen vigor.

FRUTO

Fruto de calibre grande, de forma más larga que alta, achatada en la parte del pedúnculo. Piel bronceada, oxidada en la insolación. La pulpa es blanca, crujiente, azucarada, jugosa, perfumada y de sabor excelente. Maduración hacia **noviembre-diciembre**.



ERCOLINI

DESCRIPCIÓN

Variedad toscana (Italia), árbol vigoroso y productivo, muy fértil sobre todo si es injertado sobre membrillero, floración medio-precoz y **se puede adaptar bien a zonas cálidas**. Actualmente variedad con un gran potencial comercial.

FRUTO

Fruto medio, alargado, cónico, piel fina, lisa, de color verde claro-amarillento que tiende a amarillo intenso hacia la maduración con mancha rojiza en el lado soleado. Pulpa blanco-crema, fondant, jugosa, azucarada, sabor delicioso y ligeramente perfumada. Fruto **resistente a las manipulaciones post-cosecha**. Maduración entre **finales de julio y principios de agosto**.

SINÓNIMOS

Coscia, San Cristoforo, San Domenico.




FLOR DE INVIERNO

DESCRIPCIÓN

Árbol poco vigoroso de porte semi-erguido pero abierto cuando carga. Buena intensidad de ramificación, de rápida entrada en producción y no es alternante.

FRUTO

Fruto de tamaño muy grande de forma achatada e irregular. Piel gruesa, verde amarillento con mancha rojiza-marrón bastante extensa en la parte soleada. Pulpa blanca, dulce, jugosa, crujiente y de sabor agradable. Recolección a **finales de septiembre – primera mitad de octubre**. Buena conservación incluso fuera de cámara.



INVIERNO

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso de copa en forma de pirámide, ramas largas que forman poco ángulo con el tronco.

FRUTO

Fruto de forma sub-oval piriforme con corona obtusa, de calibre muy grande. La piel es gruesa, seca, poco aromática, de coloración amarilla con pecas marrones repartidas en toda la superficie. Con óxido marmolado extendido desde la base del pedúnculo. Pedúnculo largo, grueso, flexible, carnoso, arqueado y de inserción oblicua. Pulpa amarillenta, firme, de sabor poco azucarado y con aroma a limón, en enero y febrero es más jugosa. Se recoge en **octubre**, pero tradicionalmente se maduraba en paja y no se consumía antes de enero, febrero o marzo.

CONSEJO

Tradicionalmente se incubaba en la paja y no se consumía antes de enero, febrero o marzo.




LIMONERA

DESCRIPCIÓN

Variedad obtenida por *M. Baltet*, horticultor de *Trayes* (Francia) en el 1870. Árbol muy rústico y de rápida entrada en producción, indicada para zonas con **inviernos largos y frío**.

FRUTO

Fruto de calibre grande de forma piriforme. Piel de color verde amarillento con punteado y un poco de carmín en la parte soleada. Pulpa blanca, un poco granulosa, azucarada, ligeramente perfumada y de sabor muy agradable. Se recoge hacia la **tercera semana de julio**.



MARTÍN SEC

DESCRIPCIÓN

El origen de esta variedad, del grupo de "Martine", es incierto pero muy antiguo. Según Leroy (1.870) podría ser procedente de la zona de la *Champagne*, según Gallesio (inicio 800), era originaria de los *Alpes del Piamonte*, pero se cultivaba en toda la llanura Padana (Italia). En Francia se cultivó desde el siglo XVI y ya se llamó por C. Estienne el 1530. Existen varias variedades que tienen pocas diferencias entre ellas.

FRUTO

Fruto de tamaño pequeño - mediano, a veces casi redondo, algo irregular. Oval en la base y se ensancha hasta un tercio de su longitud. Piel fina pero rugosa, cubierta de un rojo empastado de un color de oxidado claro. Pulpa blanca pero que cambia de color en contacto con el aire. Crujiente, granulosa y un poco áspera. Muy jugosa, sabrosa, aromática y perfumada. Cosecha en **noviembre**.

CONSEJOS

Buena tanto cruda como cocida. Se puede conservar hasta el mes de febrero.



MOSCATELA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso, porte con tendencia vertical. Los polinizadores más adecuados son: *castells*, *Ercolini* o *Blanquilla*.

FRUTO

Fruto de tamaño pequeño, redondeado irregular, sin cuello. Piel de coloración verde amarillenta, rojiza en la parte soleada. Pedúnculo largo o mediano, leñoso y bastante erguido. Pulpa casi blanca o amarilla crema claro, de buen sabor que recuerda al moscatel, azucarada, poco jugosa y un poco blanda. Recolección de **finales de junio a principios de julio**.

SINÓNIMOS

Leonardeta, **Magallón**, *Mosqueruela*, *Mosqueruela encarnada*.



MUSLO DE DAMA

DESCRIPCIÓN

Árbol de discreto vigor, productivo con ramas erectas y fuertes. Sensible al moteado.

FRUTO

Fruto grande de forma redonda oblonga, piel gruesa de color verde amarilla con manchas. La pulpa es azucarada, muy aromática de consistencia tierna, jugosa y fina. Madura el mes de agosto.

CONSEJO

Se cocinaba con vino blanco y azúcar.



PIEL DE GALÀPET

DESCRIPCIÓN

Planta de forma irregular de vigor mediano.

FRUTO

Fruto de forma redonda y de tamaño entre pequeño y mediano. Piel de color verde uniforme con pecas marrón claro de superficie con surcos y seca. La pulpa es áspera, firme y crujiente. Se recoge en **octubre**.



PERA DE PUIGCERDÀ

DESCRIPCIÓN

La variedad de pera que se cultiva en Puigcerdà es la *Doyenné de Comice*. Variedad encontrada en Angers en el año 1849, árbol vigoroso y de producción constante.

FRUTO

Fruto **grande** de piel lisa, fina, de color amarillo claro o amarillo verdoso con coloración roja en la parte soleada. Pulpa blanquecina, fondant, azucarada, ácida, jugosa, dulce y perfumada. Maduración alrededor del mes de **octubre**.

SINÓNIMOS

Poire du Comice, Decana del Comizio, Beurré Robert, Roberts Butterbirne etc.



PERAL DE RECTORIA

DESCRIPCIÓN

Pendiente de caracterización



PERETA BLANCA

DESCRIPCIÓN

Fruto pequeño de diámetro de 3 cm con un pedúnculo largo hasta 5 cm, piel de color amarilla clara, pulpa granulosa, dulce, refrescante con sabor a limón. Madura a inicios de julio (Cruïlles).



PRIMARENCA DE TREVOUX

DESCRIPCIÓN

Varietal obtenida por F. Trayve en Trévoux cerca de Lyon (Francia). Árbol de mediano a gran vigor, de rápida entrada en producción, de producción buena y regular.

FRUTO

Fruto de calibre mediano (180 gr), piel de color amarillo pálido con punteado verde, ligeramente rosada en la parte soleada. Pulpa blanca, jugosa, sabor de limón, azucarada y perfumada. Maduración **hacia el mes de agosto** (Cruïlles).

SINÓNIMOS

Précoce de Trévoux, Frühe von Trévoux, Trévoux.



SANTIAGO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano de copa irregular.

FRUTO

Fruto de tamaño mediano de forma sub-oval piriforme con corona obtusa, sin cubetas. Piel gruesa, lisa, muy aromática, de coloración amarillenta verdosa teñida de rojo intenso, con punteado verde abundante regularmente repartido. Pulpa blanca, azucarada, tierna y muy aromática. Se recoge a **finales de julio, principios de agosto**.



SERMENYA

DESCRIPCIÓN

Varietal de pera muy difusa en toda la península donde coge diferentes nombres y a veces con características un poco distintas.

FRUTO

Varietal veraniega, fruto de tamaño muy pequeño, redondeado y con la piel verde. Es una variedad con la pulpa muy dulce. Se recoge a medianos de junio y se guarda poco tiempo.



MELOCOTONEROS

ÉPOCA DE MADURACIÓN

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AMSDEN			■					
BELGA		■	■					
BENVINGUT		■	■	■				
ESCAROLITA			■	■	■			
GAVATX				■	■			
GAVATX SANTIAGO			■	■				
GAVATX TOU			■	■				
MELICOTÓ AMARILLO			■	■				
MERRILL FRANCISCÀ			■	■				
MOLLAR ROJO				■				
MELOCOTÓN ROJO					■	■		
RESCLÓS					■	■		
RONDAN					■			
ROQUETA					■	■		
ROQUETA HELADO					■			
SAN LORENZO				■	■			
SUDANELL				■	■			
VIÑA					■			

AMSDEN (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

FRUTO

Fruto entre mediano y grande, piel de color rojo, pulpa blanca cremosa, fina, jugosa, dulce. Maduración a **principios de julio** (Cruilles).



BELGA

DESCRIPCIÓN

Árbol de mediano vigor con puerto medio abierto.

FRUTO

Fruto de tamaño entre mediano y grande (80-85 mm de diámetro), ligeramente chata, piel de color amarillo-verdoso con manchas estriadas de color rojizo al punto del pistilo. Pulpa de coloración amarillo-crema, fondant, aroma muy peculiar y de aspecto atractivo. Cosecha a **partir de finales de junio**.



BENVINGUT

DESCRIPCIÓN

Variedad catalana, también conocida como Peret en el Camp de Tarragona. Árbol de vigor medio, porte con tendencia erguida de las ramas, variedad que parece exigente en horas de frío. Floración mediana (finales de marzo). Tiende a una caída del fruto prematura.

FRUTO

Fruto redondeado, de tamaño mediano de caras asimétricas, a veces longitudinalmente coloreada de rojo. Piel de color amarillo pálido, manchas rojas poco intensas con aspecto difuminado. Pulpa muy jugosa y dulce. Conserva el color amarillo en preparaciones en almíbar. Se recoge a **finales de junio**.

CONSEJO

Se había utilizado para la obtención de destilados aromáticos.



ESCAROLITA

DESCRIPCIÓN

Variedad catalana. El árbol es medianamente vigoroso, con abundante floración y de producción buena y constante.

FRUTO

Fruto de forma esférica achatada a veces asimétrica. Tamaño de mediano a pequeño y pulpa de color amarillo uniforme, dulce. Maduración a **mediados de julio**.



GAVATX

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor medio con porte medio abierto.

FRUTO

Melocotonero con piel de coloración rojiza en la cara donde le da el sol. Pulpa blanca y jugosa. Maduración hacia el mes de **agosto**.

Imagen no disponible

GAVATX SANTIAGO

DESCRIPCIÓN

Árbol con vigor de medio a vigoroso.

FRUTO

Fruto redondeado con pezón bastante visible (fuerza patente) con piel amarillo verdosa recubierta de color rojizo en la cara soleada. Carne de coloración blanca con buena calidad gustativa. Cosecha hacia la **última decena de julio**.

CONSEJO

Cae cerca de la madurez comercial. Recoger un poco antes.



GAVATX BLANDO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano de porte medio abierto.

FRUTO

Fruto de forma redondeada, piel de color amarillo verdoso a amarillo paja, manchas rojas opuestas elipsoides, a veces con franjas o estrías que pueden cubrir el 50% del fruto. Pulpa blanca, maduración hacia el **15 de julio**.

SINÓNIMOS

También conocido como Mal parit o Gavatz Belga.



MELICOTÓN AMARILLO

DESCRIPCIÓN

Árbol de poco o medio vigor.

FRUTO

Fruto de forma esférica con un surco profundo longitudinal, de tamaño mediano. Piel de color amarillo-blanquecino y amarillo intenso en la parte expuesta al sol, se desprende con dificultad de la pulpa. Pulpa blanca anaranjada, compacta, de sabor dulce, ácido y muy aromático. Maduración **principios de julio** (Cruïlles - Baix Empordà).



MERRILL FRANCISCÀ (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

DESCRIPCIÓN

Variedad de mediano vigor y con puerto semi-erecto.

FRUTO

Fruto muy grande (puede llegar a pesar unos 400 gramos / unidad) con forma ligeramente aplanada. Piel de coloración amarillo-rosado con estrías rojas en la insolación. Pulpa muy jugosa y de sabor agrídulce muy agradable. Maduración a **mediados de julio**.

Imagen no disponible

MOLLAR ROJO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor notable y de altura mediana.

FRUTO

El fruto es de forma ovoide redondeada, de tamaño mediano, con piel de color de fondo amarillo-verdoso marmolado de rojo, fina y aromática. La pulpa es de color blanco, rojiza alrededor del hueso, de sabor dulce, muy jugosa y se desprende del hueso, perfumada. Se recoge hacia **finales de agosto** (Cruïlles - Baix Empordà).



MELOCOTÓN ROJO

FRUTO

Fruto de tamaño grande, con piel de coloración rojiza. La pulpa es firme, jugosa y de coloración amarilla. Se recoge en **septiembre**.



RESCLÓS

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso con tendencia de los ramos con un puerto vertical, muy productivo.

FRUTO

Fruto de forma redonda ligeramente asimétrica. Piel amarilla con franjas estrechas difuminadas y rojizas. La pulpa es amarilla, consistente, y jugosa. Gracias a su intenso aroma es apta tanto para el **consumo fresco como para las conservas**. Recolección **tardía a mediados de septiembre**.



RONDAN

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano.

FRUTO

Fruto ligeramente alargado de piel amarilla uniforme con una línea de sutura bastante marcada. Típica pavía o melocotón de viña con cualidades gustativas de carne y aroma muy apreciables. Maduración a **finales de agosto**.



ROQUETA HELADO (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

DESCRIPCIÓN

Varietal de origen catalana, árbol muy vigoroso. Producción muy elevada y constante.

FRUTO

Pavía de mida entre mediana y pequeña (80/95 gr), pulpa amarilla clara, muy consistente y de textura fina, muy dulce, medianamente aromática, de elevada calidad. Muy adecuada para preparar con almíbar. Piel amarilla con coloración rojiza, punteada en la cara donde le toca el sol. Se recoge hacia medianos de agosto (Cruïlles).



ROQUETA

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano, de regularidad productiva, el fruto no cae en la maduración.

FRUTO

Pavía con piel de color amarillo, con una parte rojiza y virado irregularmente de rojo. Se recoge hacia finales de agosto. La calidad gustativa mejora mucho si se deja llegar a la madurez fisiológica que se produce a **principios de septiembre**.



SAN LORENZO

DESCRIPCIÓN

Melocotón apto para un consumo en fresco y también para conserva.

FRUTO

Fruto de buen calibre, piel por un 50% de coloración amarilla y por el restante 50% de color rojo. Pulpa de buenas cualidades gustativas y soda. Se recoge hacia el **10 de agosto**.

Imagen no disponible

SUDANELL

DESCRIPCIÓN

Excelente para el consumo en fresco y también para conservas y resistente al transporte.

FRUTO

Fruto de tamaño grande, de forma redondeada, piel de coloración enteramente amarilla. La pulpa es amarilla, fina, azucarada, perfumada de buen sabor y de muy buen aspecto por el tamaño del fruto. Maduración hacia **mediados de agosto**.

SINÓNIMO

Groc d'Agost.



VIÑA

DESCRIPCIÓN

Variedad muy resistente a las enfermedades. Melocotón de viña.

FRUTO

Fruto aproximadamente de 200g. Piel amarilla con una parte roja en la parte expuesta al sol. Pulpa amarilla, firme, dulce, aromática y poco jugosa. Maduración a **agosto** (Cruïlles - Baix Empordà).



ALBARICOQUEROS

ÉPOCA DE MADURACIÓ N

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CANINO		■	■					
MONIQUI		■	■					
PRECOCE D'IMOLA		■	■					
PAVIOT			■					
PISANA				■				

CANINO

DESCRIPCIÓN

Variedad de origen española. El árbol es muy vigoroso, resistente a los parásitos y a la caída del fruto. Floración hacia finales de marzo (Cruilles).

FRUTO

Fruto regular, casi redondo, de tamaño grande a muy grande. Color amarillo anaranjado intenso, prácticamente rojo en la parte expuesta al sol. La pulpa es firme, de sabor excelente, medianamente perfumado. Se recoge a **mediados de junio**. Se conserva bien y es **resistente al transporte**.



MONIQUI

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor medio y de porte erguido, con necesidades medianas en las horas de frío durante el invierno. **Autofértil**. Floración hacia finales de marzo (Cruilles).

FRUTO

El fruto es de buen tamaño, de forma redonda-triangular. Piel de color blanco crema, de aspecto transparente. Pulpa blanca y jugosa, aromática, perfumada y azucarada. Hueso semi-adherido. Óptimo para consumir fresco. Floración mediana. Maduración desde **finales de junio hasta principios de julio**.




PAVIOT

DESCRIPCIÓN

Antigua cultivar de origen francés obtenida de una semilla polinizada de *Hatif du Clos de Paviot* (Rhone). Árbol medianamente vigoroso.

FRUTO

Fruto grueso de forma oval, piel anaranjada con zonas verdes claras y con un color rojizo. Pulpa amarilla fina, azucarada, perfumada. Es una de las mejores variedades tardías. Madura la **última semana de julio**.




PISANA

DESCRIPCIÓN

Cultivo de origen italiano obtenida en el DCDSL de Pisa. Árbol de vigor mediano, productividad media-elevada, constante y **autofértil**.

FRUTO

Los frutos tienen buen aspecto, color de fondo amarillo, forma oval de tamaño grande y consistente. El sabor es óptimo, con una jugosidad elevada y un intenso aroma. Época de maduración tardía, **principios de agosto**.



PRECOZ DE IMOLA

DESCRIPCIÓN

Originaria de la Emilia Romagna (Italia). Muy vigorosa.

FRUTO

Fruto mediano-grande con la piel amarilla y con zonas verde claro. Pulpa naranja, bastante compacta, perfumada y sabrosa. Madura a **finales de junio, principios de julio.**



CIRUELOS

ÉPOCA DE MADURACIÓN

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANNA SPÄTH					■	■		
BIRICOCCOLO			■	■				
COLLÓ DE FRARE				■	■			
FRARE NEGRO				■	■			
HOJA DE AVELLANO			■	■				
LÁGRIMA DE ORO					■			
LLEVADOR		■						
MIRABELLA DE NANCY				■	■			
MONSTRUOSA DE INGLATERRA				■	■			
CIURELO DE AGEN					■	■		
QUETSCHÉ ALSACIA					■	■		
REINA CLAUDIA DE ALTHAN			■	■				
REINA CLAUDIA DE OULLINS			■	■				
REINA CLAUDIA TOLOSA					■			
REINETA - REINA CL. VERDA			■	■				
REINA CLAUDIA VIOLETA				■	■			
ROGETA D'AGOST					■	■		
RUSTICANO		■						
SAN JUAN		■						
SAN MIGUEL					■	■		
SCAGNARDA			■					

ANNA SPÄTH

DESCRIPCIÓN

Variedad originaria de Hungría y comercializada en Alemania por el viverista Späth en Berlín hacia el 1870. Árbol de mediano vigor con porte erecto, rústico y de fácil adaptación. Floración tardía (primera década de abril), autocompatible, de productividad constante, entre media y elevada.

FRUTO

Fruto de calibre medio-grande, piel pruinosa de coloración rojo-púrpura hasta azul-violácea. Pulpa amarillo-verdosa, soda, se separa del hueso, poco jugosa, azucarada, dulce y aromática. Maduración entre **finales de agosto y principios de septiembre**.



BIRICOCCOLO

DESCRIPCIÓN

Fruta antigua, probablemente es un **híbrido natural entre la ciruela mirabolano y el albaricoque**, también es conocida como Albaricoque del Papa. Fue descrita por primera vez por Henry Louis Duhamel du Monceau en el libro "*Traité des arbres fruitiers*" (1768) y le dio el nombre de "Abricot noir". Más tarde apareció con el nombre de Abricot violet, en el catálogo de árboles frutales de los abades parisinos Nolin y Blavet (1775). En Italia existen diferentes variedades, posiblemente originarias de la provincia de Boloña y de la zona del Vesubio (fruto más grande) presentes desde principio de 1800. Árbol de vigor medio con una producción buena y constante. Floración hacia finales de marzo (Cruilles).

FRUTO

Fruto atractivo, redondo, mediano-pequeño con la piel lisa, delgada, ligeramente peluda, de color naranja-violeta. Pulpa de color rojo-anaranjado, dulce, poco consistente, de sabor ácido que recuerda al albaricoque con aroma a ciruela. Se recoge en **julio**.



COLLÓ DE FRARE

DESCRIPCIÓN

Árbol común en la zona del Ampurdán. Todavía se encuentran en los márgenes de antiguos cultivos.

FRUTO

Fruto oviforme, grande, piel de color amarillo. Pulpa de color amarillo-verdoso que en plena maduración pasa a ser de color amarillo-dorado. Textura firme, jugosa de sabor azucarado muy intenso. Madura en **agosto**.




FRARE NEGRO

DESCRIPCIÓN

Árbol de altura mediana con forma redondeada y de buena producción.

FRUTO

Fruto oviforme, grande, piel de color violeta oscuro. Pulpa de color amarillo-verdoso que en la maduración pasa a ser amarillo-dorado. Textura firme, jugosa, de sabor azucarado intenso. **Madura en agosto**.



HOJA DE AVELLANO

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso que requiere una poda de formación precisa para favorecer la entrada en producción y evitar desequilibrios innecesarios.

FRUTO

Fruto redondeado con un surco profundo en sentido vertical. La piel es verdosa, amarillenta en su madurez fisiológica. Pulpa amarilla de sabor agradable. Recolección **hacia finales de julio hasta la primera mitad de agosto**.



LÁGRIMA DE ORO

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano, bastante rústico y productivo. Floración hacia mediados de abril.

FRUTO

Fruto de forma original, elipsoide bastante asimétrico y surco longitudinal semi-profundo, promontorio alrededor del pedúnculo.

SINÓNIMO

Piel de color amarillo y pulpa sabrosa. Se recoge los **primeros diez días de septiembre**.

Reineta Francesa.



LLEVADOR

DESCRIPCIÓN

Al ser un árbol de vigor medio permite una buena poda en formación de vaso.

FRUTO

Fruto de calibre pequeño, redondeado con tendencia ligeramente elíptica. Piel amarilla con mancha roja bastante uniforme que puede abarcar más del 50%. Pulpa dulce y aromática para el consumo en fresco. Variedad temprana, **primeros diez días de junio**.



MIRABELLA DE NANCY

DESCRIPCIÓN

Árbol de vigor mediano con ramas muy largas con tendencia a abrirse y colgarse hasta casi llegar al suelo. Autoestéril, resistente al frío pero prefiere climas cálidos. Variedad muy antigua (1420), originaria de la zona entre Nancy y Metz (Francia).

FRUTO

Fruto pequeño, de forma generalmente redondeada-oval, achatada con el peciolo largo. Piel amarillenta-clara con difuminados blancos, con puntos rojos sobre todo cerca del pedúnculo. Pulpa amarillenta-clara, consistente, jugosa, dulce, ligeramente acidula, de sabor excelente y finísimo, se desprende del hueso. Madura la **segunda mitad de agosto**.

CONSEJO

Adecuada para hacer **conservas y mermeladas**.



MONSTRUOSA DE INGLATERRA

DESCRIPCIÓN

Árbol de buen vigor.

FRUTO

Fruto de forma ovalada, de calibre grande, piel de color rojo. La pulpa es amarilla, jugosa y azucarada. Variedad muy apreciada en el mercado por su consumo fresco. Maduración a **mediados de agosto**.



CIRUELO DE AGEN

DESCRIPCIÓN

Buen polinizador y autofértil.

FRUTO

Fruto de forma ovalada, grande, con la piel fina de color violeta. Carne de color amarillo-verde, muy dulce. Gusto excelente, ideal para hacer mermeladas y para comer cruda. Es una de las variedades más utilizadas para hacer pruna secas. Se recoge a **finales de agosto hasta principios de setiembre**.



QUETSCHÉ DE ALSACIA

FRUTO

Fruto de tamaño grande, piel de color rojo-azul oscuro, carne de color amarillo-verdoso, semi-fina, semi-tierna, dulce y no jugosa. **Ideal para pasteles**. Se recoge hacia el mes de **septiembre**.



REINA CLAUDIA DE ALTHAN

DESCRIPCIÓN

Llegó de Hungría en 1860. El árbol es medianamente vigoroso con estructura en altura y de escasa productividad, autoestéril.

FRUTO

El fruto es de tamaño grande y tiene forma esférica. La piel tiene un color de fondo amarillento con un sobrecolor rojo violeta en el 90% de su superficie, revestido de *pruina*. La pulpa es de color amarillo rojizo, discretamente dura, se separa del hueso y tiene un sabor óptimo. Madura a **finales de julio, principios de agosto**.



REINA CLAUDIA DE OULLINS

DESCRIPCIÓN

Antigua variedad francesa encontrada en Coligny (Francia), probablemente originada por una semilla de Reina Claudia Verde y multiplicada por Massot de Oullins, cerca de Lyon. Introducida en España hacia 1860. Árbol poco vigoroso de porte bastante erguido. La producción es buena y regular.

FRUTO

Fruto redondeado, un poco elíptico, ligeramente asimétrico, de tamaño grande (45 gr.). La piel es blanca verdosa y dorada amarillenta cuando madura. Pulpa amarilla, fina, jugosa y dulce. Maduración hacia **mediados de julio**.

SINÓNIMOS

Reina Clàudia amarilla, Falsa Clàudia, Reina Claudia francesa, Francesa Monstruosa, Francesa Verde, Regina Claudia Monstruosa, Regina Claudia Gialla i Golden Cage



REINA CLAUDIA TOLOSA

DESCRIPCIÓN

Variedad obtenida en Bélgica hacia 1841 de una semilla de Reina Claudia Verde. Árbol de vigor medio y de porte semi-erguido que se va abriendo al paso de los años. Floración semi-temprana, con un **porcentaje de autofertilidad muy elevado**.

FRUTO

El fruto es redondeado, ligeramente alargado con un surco medio profundo y poco asimétrico. Piel verdosa o verdosa amarillenta. La pulpa también es verdosa amarillenta. La pulpa es aromática, firme, bastante jugosa, dulce y por lo tanto de gran calidad gustativa. Es una variedad interesante ya que es una Claudia de maduración tardía, **primera mitad de septiembre**.

SINÓNIMOS

Monstruosa de Bavay, Reina Clàudia de Bavay, Sainte Claire, Reine Claude de Monot.



REINETA O REINA CLAUDIA VERDE

DESCRIPCIÓN

Variedad muy antigua, probablemente es la variedad madre de todas las reinas clàudias. Origen dudoso, puede ser italiano y llevada hasta Francia para dedicarla a la Reina Claudia (primera esposa de Francisco I, nacida en 1499) o también es posible que llegara a Francia desde el Oriente Medio. Según Forney, 1863, podría ser originaria de la *Loira*, Francia. Variedad citada por primera vez por *Le Lectier d'Orléans*, el año 1628. Llevada a Inglaterra en el 1724 por W. Gage. Árbol de vigor medio a alto, de porte abierto, medianamente productivo. Necesita polinización por *Falsa Claudia* o *Claudia Tolosa*.

FRUTO

Fruto redondeado casi simétrico, pedúnculo de corto a medio. Calibre de pequeño a mediano, piel de color verde intenso incluso en la maduración. La pulpa es de color amarillento-verdoso, jugosa, dulce, de alta calidad gustativa, quizás es la más aromática y agradable de las claudias. Óptima para el consumo fresco, para la elaboración de mermeladas e incluso para secar. **Maduración de finales de julio a principios de agosto.**



REINA CLAUDIA VIOLETA

DESCRIPCIÓN

Variedad citada por Duhamel en el año 1768, por Leberryais en el 1789, por Noisette en el 1828, según Baldini (n.10) fue obtenida por Galopin de Liège (Bélgica). Árbol vigoroso de porte abierto, la entrada en producción puede ser un poco tardía, muy productivo y constante.

FRUTO

Fruto de calibre mediano, esférico, simétrico con la piel de color azul intenso. La pulpa es amarillenta-verdosa, fina, jugosa, bastante firme, perfumada y de sabor óptimo. Se recoge hacia **finales de agosto, principios de septiembre.**

SINÓNIMOS

Reine-Claude Violette, Violette Reneklode, Reine Claude Alexandre Dumas, Violet Gage, Violet Queen Gage, etc.



ROGETA DE AGOSTO

DESCRIPCIÓN

Parece ser que es originaria de California, de allí llegó a Francia y de Francia a Sant Boi de Llobregat (Cataluña) el año 1955. Árbol vigoroso y de porte semi-erguido.

FRUTO

Fruto de forma elíptica con promontorio muy evidente en la inserción con el pedúnculo, surco de medio profundo a profundo, ligera asimetría. La piel es de color rojo y la pulpa es amarilla. Se recoge **desde finales de agosto hasta principios de septiembre.**

SINÓNIMOS

Roja de agosto, Rogeta, Collo de mico, Collo de Bou, Clàudia Catalana Toscana, Monstruosa de París. També es conocida como "*la del Manelet*" debido a que Manel Perelló fue de los primeros agricultores del Baix Llobregat en cultivarla.



RUSTICANO

DESCRIPCIÓN

Ciruelo europeo de buenas características como **polinizador**. Floración hacia medianos de marzo.

FRUTO

Variedad antigua de fruto esférico, mediano- pequeño. La piel es roja y a medida que va madurando se vuelve negro. La pulpa es dura y crujiente. Se consume verde porque cuando está madura es muy dulce. Madura a **finales de junio**.



SAN JUAN

DESCRIPCIÓN

Típica variedad local (Garrotxa, Cataluña) de ciruelo temprano.

FRUTO

Fruto de calibre pequeño de forma oval-alargada. La piel es verdosa-amarillenta, pulpa verde-amarilla, dulce. Maduración a **finales de junio**.



SAN MIGUEL

DESCRIPCIÓN

Árbol alto, de vigor fuerte y de porte con forma de fuso.

FRUTO

Fruto de forma oval alargada, de tamaño mediano. Piel fina, de color amarillo-dorado cubierta de pruina blanca. La pulpa es de color amarillo-verdoso, firme, su sabor recuerda al albaricoque. Se recoge a **mediados de septiembre**.

CONSEJO

Los frutos se pueden usar para **secar y cocer**.



SCAGNARDA

DESCRIPCIÓN

Variedad tradicional difundida hace tiempo en la zona de los Apeninos italianos. Actualmente todavía se encuentra en *l'Oltrepò pavese*, al oriente de la provincia de *Piacenza* y en *Monferrato*. El 1824 el pomólogo *Giorgio Gallesio* la describió en su "Diario de viaje", cuando hizo un viaje a Milán. El nombre *Scanarda* o *Scagnarda* deriva de una expresión del dialecto de la zona entre *l'Oltrepò pavese* y la zona de *Piacenza*: "da sgagnare" (para morder). **Ciruela de Damasco**. Árbol de vigor mediano de porte expansivo.

FRUTO

Fruto mediano, de forma oval más bien alargada. Piel de color amarillo-dorado, pulpa carnosa, medianamente jugosa, se desprende del hueso. Madura a **finales de julio**.



CEREZOS

ÉPOCA DE MADURACIÓN

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AGUARDIENTE								
BIGARREAU BURLAT								
BIG. GEANT D' HEDELFINGEN								
BIGARREAU MORREAU								
BIGARREAU TARDÀ VIGNOLA								
CORAZÓN DE PICHÓN								
CODA LARGA								
SAN PEDRO								
SANT ISIDRO								
SELRANA								
TIRITOS								

AGUARDIENTE (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

DESCRIPCIÓN


Guindo de vigor notable, de porte con forma de huso, de altura considerable con ramas erguidas. Floración la última semana de marzo en la Garrotxa (Cataluña).

FRUTO

Fruto de forma alargada, de tamaño mediano, piel fina de color rojo intenso. Pulpa de color rojo-granate, tierna y jugosa, de **sabor muy ácido** si no está bien madura. Recolección a **finales de junio**.

CONSEJO

Variedad que se usaba en maceración para la preparación del **aguardiente dulce**.



BIGARREAU BURLAT

DESCRIPCIÓN

Sin duda en Francia es la variedad más extendida de las Bigarreau.

FRUTO

Fruto de tamaño grande, piel de color rojo oscuro y brillante. Pulpa firme, crujiente, azucarada y jugosa. Excelente variedad para el consumo en fresco. Variedad **temprana**, maduración **entre finales de mayo y principios de junio**.



BIGARREAU GEANT D'HEDELFINGEN

DESCRIPCIÓN

Variedad muy productiva y de floración tardía. Se considera una de las **mejores variedades polinizadoras**.

FRUTO

Fruto de calibre grueso con piel de coloración roja brillante que se vuelve púrpura cuando madura. Pulpa firme, jugosa y perfumada. Se recoge a **finales de junio**.



BIGARREAU MORREAU

DESCRIPCIÓN

Árbol muy fértil con floración temprana.

FRUTO

Fruto grueso con piel de color rojo oscuro, pulpa firme, azucarada y no adherente al hueso. Maduración hacia **finales de mayo**.



BIGARREAU TARDÀ DE VIGNOLA

FRUTO

Bigarreau con fruto de color rojo oscuro y de sabor inconfundible. Pulpa roja, firme, bastante jugosa, azucarada y de sabor óptimo. Se recoge a **mediados de junio**.



CORAZÓN DE PICHÓN

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso de forma cónica y de gran altura con ramas que cuelgan.

FRUTO

El fruto tiene forma de corazón, de tamaño mediano. La piel es amarillenta con tonalidades rosadas en la parte expuesta al sol. La pulpa es amarillenta, firme, dulce y de buen sabor. Madura en **mayo-junio**.



COLA LARGA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso de porte erguido. Floración temprana.

FRUTO

Fruto de calibre mediano de forma globular y con pedúnculo largo. La piel es delgada y roja y la pulpa es rosada y muy adherente al hueso. Fruto de buena calidad gustativa y **resistente al transporte**. Recolección a **finales de mayo**.



SAN ISIDRO

DESCRIPCIÓN

Árbol de buen vigor de porte de media altura. Floración, la tercera semana de marzo.

FRUTO

Fruto con forma de corazón redondeado de calibre grande. Piel fina de color púrpura con difuminado rojo. Pulpa tierna, fina con jugo abundante y colorado. Fruto de buena calidad gustativa. Variedad **temprana** que se recoge a **finales de mayo**.



SAN PEDRO

DESCRIPCIÓN

Árbol de medio vigor, hoja con limbo muy serrado, característico de las cerezas conocidas como fuertes.

FRUTO

Fruto de calibre entre mediano y pequeño, de forma alargada, pedúnculo muy largo, piel de color rojo-amarillento en una cara y la otra amarilla. Pulpa consistente y por lo tanto, aparte de un consumo en fresco, se presta para la preparación de **licores**. Se cosecha a **mediados de Junio** (Begues - Barcelona).



SELRANA

DESCRIPCIÓN

Antigua variedad local de Terrades (Alt Empordà).

FRUTO

Fruto con pedúnculo largo, de forma puntiaguda y de pequeño tamaño. La piel es delgada de color amarillenta-rosada con tonalidades rojizas en la parte soleada. Pulpa amarilla, tierna, jugosa, de sabor dulce-acídulo. Cosecha a **finales de mayo - principios de junio** (Cruïlles - Baix Empordà).



TIRITOS

DESCRIPCIÓN

Árbol de medio vigor, fruto de tamaño medio (7 gr.), piel de color rojo uniforme.

FRUTO

Es aconsejable cosechar los frutos muy al punto de su madurez, porque cuando madura pierde jugo por la zona de inserción del pedúnculo. Pulpa de buen sabor, madura hacia la **tercera semana de mayo** (Baix Llobregat).



HIGUERAS

BRIANZOLO NEGRO

DESCRIPCIÓN

Antigua variedad de la "Brianza" (área geográfica entre Milán y los Prealpes) de calibre entre mediano y pequeño, con piel verde, pulpa roja que puede llegar a un color vinoso en plena maduración, dulce y meloso, muy sabroso. Curiosidad: trepaban perforaban los frutos en una rama de espino albar y se dejaban **secar** bajo el tejado de los hogares, así podían llegar hasta Navidad. Cosecha hacia el mes de **septiembre**.



CUELLO DE DAMA BLANCA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso, porte semi-erguido, poco ramificado.

FRUTO

Fruto grande, piriforme, piel amarilla-verdosa, pulpa de color rojo a rojo intenso, fina, azucarada, de excelentes cualidades gustativas. Maduración hacia **septiembre**.



CUELLO DE DAMA NEGRA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso, más ramificado que el Cuello de Dama Blanca.

FRUTO

Fruto grande, piriforme, piel de color morado, pulpa rosa oscura a roja intensa, fina, azucarada. Maduración alrededor del mes **septiembre hasta finales de octubre**.



TRES FAN CARGA

DESCRIPCIÓN

Árbol vigoroso, puerto medio recto y poco ramificado. Producción regular en el caso de las brevas y escasa para los higos.

FRUTO

Breva interesante por el tamaño de la fruta y la resistencia a su manipulación. Color de la epidermis morado verdoso. Pulpa roja oscura con un sabor mejor en la segunda producción. Maduración de breva la segunda mitad de junio y de higo la primera de septiembre.



OTROS

AVELLANO “NEGRETA DE REUS”

DESCRIPCIÓN

Arbusto con poca altura y muy rústico, es una de las variedades más extendidas en España.

FRUTO

Fruto de calibre medio, de forma redonda un poco alargada. Carne blanca de buena calidad, también utilizada en la industria. Maduración en el mes de **septiembre**.



MADROÑO (VARIEDAD AGOTADA CAMPAÑA 2016)

DESCRIPCIÓN

Arbusto o árbol pequeño (entre 5 y 15 m de altura). Autóctono de los bosques mediterráneos.

FRUTO

Los frutos son ricos en vitamina C. Para en consumo en fresco, elaboración de mermeladas y pasteles.



FRAMBUESA

DESCRIPCIÓN

La frambuesa Europea es una planta arbustiva con rebrotes de ciclo bianual que surgen de las raíces. Los vástagos pueden alcanzar una altura de 1,5 / 2m.

FRUTO

Fruto muy jugoso y dulce y si no está bien maduro tiene cierta acidez. Se pueden elaborar jarabes, mermeladas, jaleas, helados y sorbetes. Variedad con dos producciones anuales (bífera) **la primera en junio / julio y la segunda en otoño**.



AZUFAIFO

DESCRIPCIÓN

Árbol espinoso, de crecimiento lento, muy rústico.

FRUTO

Fruto del tamaño de una nuez, dulce y rojizo. Maduración en el mes de **septiembre**.



NÍSPERO

FRUTO

Fruto marrón que se tiene que dejar madurar en la paja para que sea muy dulce y la pulpa se reblandezca y coja un color amarillo-naranja. Se recoge hacia **septiembre-octubre** y se **deja incubar hasta que se aje un poco**.



GRANADO

DESCRIPCIÓN

Árbol de poco vigor, típico de las zonas mediterráneas. Se usa también como valla vegetal defensiva.

FRUTO

Fruto grande, granas rojas, dulce, jugoso, de sabor agridulce. Madura en **octubre**.



SAUCO

DESCRIPCIÓN

Arbusto caducifolio del género *Sambucus*. Este arbusto lo encontramos básicamente en el entorno europeo, especialmente en las concas del Mediterráneo.

FRUTO

El fruto es una drupa redonda de color negro- violeta, carnoso y el glabre de unos 6-8 mm de diámetro. Es un fruto comestible cuando está muy maduro, pero en caso contrario puede tener efectos tóxicos. Para la elaboración de mermeladas, infusiones, zumos.



SERBAL

DESCRIPCIÓN

Árbol rústico de lento crecimiento que sin embargo puede llegar a los 15 m de altura. Floración tardía hacia el mes de mayo.

FRUTO

Fruto globoso con forma de manzana y pera, de 2-3 cm de tamaño, de color amarillento. Los frutos se recogen en **otoño** y, como el nispero, deben guardarse con paja para que acaben de madurar y se vuelvan muy dulces.



Queremos dar las gracias a
todas las familias,
productores de fruta ecológica,
centros educativos,
paisajistas,
coleccionistas,
jardineros,
ayuntamientos,
parques,
apasionados,
ecologistas,
etc.

que creen en nuestro proyecto y que ayudan a
mantener viva la biodiversidad cultivada



www.arboreco.net

NOTA: Algunas de las imágenes y parte del texto del catálogo son los siguientes autores: Guillem Arribas "Variedades viejas de frutales" (Parque natural de la zona de la Garrotxa), Mariagrazia Tibiletti Bruno "I frutti Antichi", Josep Garcia (IRTA), Xavi Perez (Parque Agrario del Baix Llobregat), Morella (Ortells), Eric Dumont (Francia), Catálogo "Vivai Battistini", Bonometti Emanuela, Catálogo "Rocalba", Floracatalana.net.

EL CATÁLOGO ESTÁ SIEMPRE EN EVOLUCIÓN SI NOS QUIEREN HACER LLEGAR IMÁGENES O DESCRIPCIONES DE LAS VARIEDADES, EL IREMOS ACTUALIZANDO. MUCHAS GRACIAS.