


ENUMERATIO
PLANTARUM VASCULARIUM
IN ARIMENSIVM

JOANNE GUSONE

NEAPOLI
MDCCCLV



ENUMERATIO
PLANTARUM VASCULARIUM
INARIMENSIUM



ENUMERATIO
PLANTARUM VASCULARIUM

IN INSULA INARIME

SPONTE PROVENIENTIUM VEL OECONOMICO USU

PASSIM CULTARUM

AUCTORE

JOANNE GUSSONE

—
INSULA INARIME




ISOLA D' ISCHIA

NEAPOLI

EX VANNI TYPOGRAPHEO

MDCCCLIV



FERDINANDO II.

UTRIUSQUE SICILIAE REGI

PIO FELICI AUGUSTO

Insulam **INARIMEM** coeli solique
amoenitate praeclaram, et a remotis
usque temporibus aquarum medici-
narium thermarumque copia celebra-
tam, nunc pollenti TUO patrocínio,
FERDINANDE REX, publicis viis,
balneis aptissimis, novis thermis,
portuque tutissimo instructam, et de-

nique Regio TUO suburbano exornata, ad majorem prosperitatem revocasti. Interea, quum ob Regiae TUAE Domus munera mihi benevole commissa saepe in illa Insula moratus sim, ista arrepta occasione, alacriter animum intendi, ad illius *FLO-
RULAM* concinnandam, eo potissi-

mum consilio, ut vegetationis inarimensis peculiare conditiones botanicis notas redderem. Quam *FLO-
RULAM* TUIS auspiciis ortam, nemini profecto alii quam TIBI, REX AUGUSTISSIME, offerendam ac dicendam existimavi; et dum submitte hoc exequor, oro ac obsecro ut literarium

hocce munusculum in grati atque ob-
servantissimi animi mei argumentum
benigne velis excipere.

Neapoli, IV. Kal. Maji. MDCCCLV.

Humillimus et fidelissimus subditus
JOANNES GUSSONE.

PRAEFATIO

Insula *Inarime*, sic dicta ab Arimis illam olim incolentibus, veteribus etiam sub nomine *Pithecusae* a figulinis dolialiorum, vel *Aenariae* a statione navium Aeneae, aut a vini copia cognita fuit; nunc vero *Ischia* appellatur ob ejus formam coxendici similem, vel, ut alii putant, a robore terrarum. Ad grad. 11, 50' longitudinis orientalis meridiana parisiensis, ad grad. vero 40, 41', 46" latitudinis borealis, sita est: atque a proxima terra continenti Puteolana per milliaria octo geographica distat; interque ipsam et illam aliae minores insulae, Prochyta nempe et Vivara, interponuntur.

Oppida et pagi plures in insula sunt, inter quos incolis frequentiores *Ischia*, urbs episcopalis, ad ortum, *Forio* ad occasum (1), quorum omnium incolae 25,000 numerantur. Arx supra monticulum sita ab Insula brevi tractu sejuncta, et ubi quondam urbs inerat, nunc extat subjectae civitatis munimentum.

(1) Alii minores sunt sequentes: *Casamicciola*, *la Tresta*, *Monte della Misericordia*, *Olivieri*, *Monnello*, *Sperone*, *Pannello*, *Casamonte*, *Mezzavia*, et *Lacco*, inter aquilonem et boream: *Mandria*, *Bagno*, *Pivo*, *Casabona*, *Bosco lo Conte*, *Matarace*, *Caso*, *La Testa*, *Cesa*, *Moluro*, *Crovone*, *Fasolara*, *Campagnano*, *Monte di Campagnano*, *S. Antuono*, *Catauro*, *Casa Mazzella*, *S. Michele*, ad ortum: *Testaccio*, *Barano*, *Moropanz*, *S. Giovanni*, *Ottaviello*, *Serrano*, *Noja*, *Pantano*, *Eschia*, *la Martosa*, *S. Angelo*, *Calimera*, *Fontana*, ad austrum, qui duo posteriores omnium editiores: *Soccio*, *Panza*, *Cuotto*, *Caruso*, *Torre vecchia*, *Casapolito*, *Battaglia*, *Monticchio*, *Monterone*, *Cerriglio*, ad occasum.

Insulae forma fere pyramidalis, nam Epomeus mons (*S. Nicola*) in ipsius medio pene assurgit (1), et totius insulae primaevis habendus est. Alii depressiores aut colles illum proxime circumdant, vel ab eo parum remoti: sic ad orientem vergunt *Monte Vetta*, *Monte Trippiti*, *Monte Vezza*, *Monte di Campagnano*, quorum ultimi magis, quam alii, ab illo remoti; inter aquilonem et orientem *Buceto*, *Rotaro*, *Montagnone*, qui duo posteriores vulcanicorum craterum formam adhuc apprime servant; tandem ad aquilonem *Monte nuovo* et *Marecocco*. Ad hanc ipsam plagam *Monte Vico* et *Zale*; ad occasum *Punta dell'Imperatore*; ad austrum *Punta San' Angelo* (ad cuius vicinia corallium piscatur), ad orientem *Punta di S. Pietro*, praecipua promontoria constituunt.

Insulae circuitus (sinubus comprehensus) per milliaria octodecim geographica extenditur; quinque milliaria latitudinis habet ab oriente ad occasum, ac tria ab austro ad boream; denique ipsius superficies quatuordecim milliaria quadrata occupat.

Angustae planities (2) sabulo feldspatico albo lucidoque obductae litus tantum tenent, quod in reliquo majore ejus ambitu rupes ad perpendicularium fere excisas habet; eaeque fluctuum impetu frequenter percussae ac diffractae cavernas (3) formasque peculiare referunt (4).

Sinus pauci et angusti (5), qui etiam minoribus navibus portum minime fidum praebent. Campi vere pratiferi desiderantur, et inde oves capreaeque paucissimae. Valles apricae ac late patentes inter Epomeum et *Campagnano* (6); sed quae a pluvialibus aquis excavatae saepe a montis vertice ad litus protenduntur (vulgo dictae *Cave*), et istae ut plurimum angustissimae ac profundissimae sunt (7), praec-

(1) Praecipuae altitudines montium aliorumque locorum supra mare in apposita tabula ad hujus opusculi calcem referuntur.

(2) *Mandria*, *Bagno*, *Lacco*, *Forio*, *Maronti*.

(3) *Grotta di terra*, *Grotta del Lacco*.

(4) *Punta Cavallaro*, *Punta della Gnora*.

(5) *Ischia*, *Bagno*, *Casamicciola*, *Forio*, *S. Angelo*, *Maronti*.

(6) *Valle del Crovone*, *Chianole del Testaccio*, *Pico*, *la Starza*, *Chianjano*, *Canniani*, *Chianole di S. Michele*, *di S. Domenico*, *e dell'Annunziata*, *Pianura fra Panza e Forio*.

(7) Inter aquilonem et boream, *Cava di Buceto*, plus inferius dicta *Cava del Carsiello*, inde *di Cerambi*; *Cava di Brasomonte*, inde inferius *dell'Arvaniello*, tandem *di Ombraccio*; *Cava dell'acqua bollente*, *e della Fontana*; ad austrum *Cava di Barano*, *Cava di*

sertim in plaga insulæ australi, ex quibus in altum ascendere difficillimum periculosumque, vel prorsus impossibile est.

Fontes ac rivuli aquæ potabilis pauci ac inopes (1), secus ac plures scriptores tradunt (*Martinière, Dict. geograph. vol. 6, p. 444—Rampaldi. Corogr. d'Italia, vol. 2, p. 234*); qui idcirco omnibus domesticis usibus non sufficiunt, adeo ut incolæ tam urbis, quam totius insulæ, aqua pluviali cisternis collecta ut plurimum utantur. Aquæ vero medicæ sæpiusque ferventes (gr. 100 cent.) copiosæ in omnibus insulæ plagis (2); nec vaporaria naturalia, vulgo *Fumarole* (3).

Morpane, quæ in ima parte conflunt in *Cava dell'Acquaro*; *Cava di Ballarino*, *Cava di Fontana*, *Cava di Noja*, *Cava di Calimera*, quæ etiam in ima parte conflunt *nella Cava oscura*.

(1) In *Cava di Buceto*, *del Carusiello*, *di Ceramhi*, *di Brusomonte*, *dell'Arvaniello*, *di Ombrasco* ad boream; *di Pellaro* ad occasum; *di Cavallaro* ad austrum; *valle sotto al Monte Vetta* ad ortum.

(2) Præcipuæ aquæ minerales ac thermales, quæ in usum veniunt, posthabitis illis minoris momenti, et earum temperies therm. cent., hæc sunt:

AQUÆ THERMALIS

	Guss.	Scacchi.	Cirel. Nap. descr.	Guar.
<i>Bagno fresco</i>	.	.	38	38
<i>Capitello</i>	.	.	.	68
<i>Coppone</i>	38	.	33	31
<i>Citara</i>	52	.	50	50
<i>Castiglione</i>	29	.	.	33
<i>id. al mare</i>	62	.	.	75
<i>Fontana) al Bagno</i>	53	.	58	
<i>Fornello)</i>	52	.	.	
<i>Francesco I.</i>	.	.	43	32
<i>Gurgitello</i>	.	.	.	79
<i>—conserva privata</i>	.	.	70	
<i>—del Monte</i>	70	64	63	80
<i>Nitrol.</i>	29	.	30	30
<i>Olmiteello</i>	.	.	44	44
<i>Pontano</i>	28	.	34	
<i>Regina Isabella</i>	.	.	48	
<i>La Rita</i>	63-68	.	70	61
<i>S. Angelo al mare ai Maronti</i>	100	.	.	
<i>S. Montano</i>	.	.	55	
<i>S. Restituta</i>	.	.	50	60
<i>Spenna pollastri</i>	85	.	.	

(3) *Del Cacciato*, *del Mortito*, *del Castiglione*, *del Rotaro*; *del Fomolillo* e *del vallone delle Petrelle* prope *S. Angelo*, *dell'Arso* prope *Ischia*; *del Fango*, *di Montecito*,

nec arenae calidissimae (1) in ipso litore marinis undis perfuso, desunt; quae omnia cum variis medicis usibus sint valde accommodata, sic aegrotantes magno numero aestivis mensibus Insulam petunt.

Lacus unicus piscosus, qui olim vulcanica ora, in litore boreali prope *al Bagno* situs est, ejusque undae artificialis meatu ope cum marinis mineralibusque aquis commiscebantur; nunc vero REGIS FERDINANDI II jussu beneficio ac gratia ad portum addiditur.

Aer undique saluberrimus ac siccus; temperies mitis, a proxi-

prope *Casamicciolo, de' Frassitelli, e del Bellomo supra Forio: del Fico prope alle Faglione*, quae inter omnes elatior (ped. 1530). Earum temperies therm. cent. sequens est:

VAPORARIA, THERMAE, ac ARENAE.

	Guss.	Scacchi.	Citel. Nap. descr.
<i>Arso. Fumarole</i>	34		
<i>Bellomo F.</i>	100		
<i>Babu F.</i>	50		
— <i>fango.</i>		96	
<i>Cacciato Stuf.</i>	70		71
<i>id. fum. exteriori</i>	60		
<i>id. (ubi Pteris longifolia, et Cyperus polystachyus)</i>	26		
<i>Costiglione S.</i>	21		56
<i>Fasano, o del Fango F.</i>	62	85-91	
<i>Fico F. (ped. 1536)</i>	42		
<i>Frassitelli F.</i>	100		
<i>Fonnoillo F.</i>	60		
<i>Maronti. Arne.</i>	100		
<i>Montecito F.</i>	100	89	
<i>Mortito F. (ubi Cyperus polystachyus)</i>	52		
<i>Petrelle</i>	50-80		
<i>Rotaro a funno d'istoglio</i>	42		
<i>S. Lorenzo S.</i>	52		58
<i>Testaccio S.</i>	46		94

Plantae vero quae ubique ad vaporaria ista proveniunt sunt: *Cyperus polystachyus*, ac *Erythraea pulchella*; at non undique occurrunt *Lotus pilosissimus*, *Linaria cirrhosa*, *Sideritis romano*, *Chrysanthemum segetum*, *Orobanche crinita*, et *pubescens*, *Brixa minor*, *Imperata arundinacea*, *Digitaria gracilis*, *Cyperus aureus*, et *rotundus*, *Pteris longifolia*, *Adiantum Capillus Veneris*, *Bartramia stricta*, et *fontana* var.; at solummodo ad illa dell' *Arso Fissidens taxifolia* occurrit.

(1) *Lacco a S. Restituta* gr. cent. 40 Guss.

Marina de Maronti gr. cent. 100 Guss.

Fango del Babu gr. cent. 96 (Scacchi.)

maque terra vix dissimilis (1); tamen hyems mitior, nam raro nives in monte Epomeo decidunt atque perdurant, minusque frequenter imis locis terra gelu constringitur; ita ut sub diu bene vegetant plantae fere omnes Novae Hollandiae, nec non *Ficus elastica*, *Brugmansia candida*, *Musa discolor*, *Lantana*, *Pelargonium*, *Cereus*, *Opuntia*, *Mesembryanthemum* et *Aloe* species variae, *Portiera hygrometrica*, *Erythrina Coralloedron*, *Euphorbia caput medusae*, *Kleinia anteuophorbium*, et *ficoides*, *Russelia juncea*, *Heliotropium peruvianum* et *grandiflorum*, *Cuphea platycrista*, *Ipomaea Learii*, *Abutylon giganteum* et *striatum*, *Sparmannia africana*, *Echeverria grandifolia*, *Achania mollis*, et *Malcavischus*, etc.

Aestas minus fervens, quandoquidem insula a ventis facile refrigeratur; tamen in nonnullis locis calidior, ubi nigerrimi vulcanici lapides insunt, vel in praeruptis australibus oris. Pluviae aestivis mensibus frequenter desiderantur; non ita rarae reliquis temporibus. Ventī saepe magna vi perflant; inter quos Auster et Africus vernali aut aestivo tempore vitibus summopere noxii.

Insulae, cujus geologia tam a nostris quam ab exteris clarissimis viris (2) fuit optime illustrata, omnino est vulcanica origo. Rupes omnes lapidesque *trachyticae*, ac variae soliditate et colore; ita ut aliquando expoliri possint. Lapillorum, cinerumque vulcanicarum (*Pozzolana*) immania strata, saepe horizonti respondentia, vel di-

(1) Temperies media Neapolis totius anni 16, 17. therm. cent.

— media hyemalis † 8.

— med a aestivalis † 23.

— minima hyemalis — 2.

— maxima aestivalis † 40.

(2) Auctores qui geologicam Insulae naturam descripserunt sunt:

HAMILTON. Campi phlegraei, Naples 1776.

VALENTIANI. Indice spiegativo di tutte le produzioni del Vesuvio, della Solfatara, e d'Ischia. Napoli 1783.

BRISLAK. Topografia fisica della Campania. Firenze 1798.—Voyages physiques, et lithologiques dans la Campanie. Paris 1801.

HALLER. Tableau topographique des Iles d'Ischia, de Ponsa, ecc. Naples 1822.

DUPRENOY. Mémoire sur les terrains volcaniques des environs de Naples. Paris 1838.

ABICH. Geologische Beobachtungen über dies vulcanischen Erscheinungen und Bildungen in unter und Mittel-Italien. Braunschweig. 1841.

SCACCHI. Campi ed Isole flegree, nel secondo tomo dell'opera che ha per titolo — Napoli e sue vicinanze. Napoli 1845.—Memorie geologiche sulla Campania. Napoli 1849-50.

FONSECA. Dissertazione e carta geologica dell'Isola d'Ischia. Napoli 1847.

versimode inclinata; tamen, liquefactis saxis, aut vulcanico topho congeries multae et altissimae marnae, plus minus conchis refoetae, superimpositae aut substratae sunt; quae eo magis notatu dignae propter peculiare plantas quas alunt, nec non quia ad fictilia vasa lateresque effingendos a remotis usque temporibus maximo incolarum emolumento inserviunt.

Iidem vulcanico topho a sulphureis exalationibus decomposito ad Alumen conficiendum olim utebantur; nunc vero ad solam calcaream candidam terram (*Bianchetto*) parandam adhibent. Sulphuris nonnihil cum terra commixto prope *le stufe di S. Lorenzo al Lacco* invenitur, sed usu non venit: at mineralia nobilia, quae veteres aut recentiores auctores commemorant (*Jasolino Rimedii naturalis d'Ischia*, et *Martinière Dict. geograph.* v. 6, p. 444) in insula minime adsunt.

Terrae ab igneis emissionibus provenientes asperae, siccae, tenues, ac aliquando macrae; non ita tamen ut aestivis mensibus vegetatio laevigat; graviores vero, tenaciores ac feraciores, quae marnaceae sunt.

Montium declivitates elatioris, quin etiam colles lapidosi et siccores fruticetis vel dumetis sempervirentibus (1), vel sylvis caeduis ex *Castanea vesca* consitis obducti sunt, de quibus fruticibus arboribusque, nec non de Vitium sarmentis materiam pro domesticis usibus ac fornacibus atendis incolae trahunt. Cerealia et Leguminosa nonnulla in editissimis praeruptisque locis, inconsulte satis, coluntur, interposita etiam in siccis ac resolutis terris sparsim, vel per ordines horizontales *Salice alba* decacuminata, cujus rami quotannis resecti ad vites alligandas inserviunt; quae arbor tamen in argillosis depressioribus humectioribusque magis luxuriat. In declivitatibus demissioribus usque ad litus undique vineas iustituunt; istaeque diligenti solertique cura excoltae, frequentibus fossionibus, opportunisque pampinationibus, praetereaue mace-

(1) Plantae quae fruticeta aut dumeta constituunt sequentes sunt: *Myrtus communis*, *Pistacia Lentiscus*, *Quercus Ilex* et *pubescentis*, *Fraxinus Ornus*, *Phillyrea media* ac *angustifolia*, *Arbutus Unedo*, *Calycotome villosa*, *Cytinus triflorus* ac *candicans*, *Coronilla Emerus*, *Spartium junceum*, *Sarothamnus scoparius* (turus), *Cistus affinis*, *monspeliensis*, *salvifolius*, et *villosus*, *Lonicera implexa*, *Rosa temperierans*, *Erica arborescens*, *Rhamnus Alaternus*, *Daphne Gnidium*, *Smitax mauritanica*, *Clematis Flammula*, et *Vitalba*.

riebus horizontalibus, arcolis aliis aliis accumbentibus ac ad superiores proxime adjacentes gradum facientibus saepius interjectis, terram nimium solutam suffulciunt.

Diffusae atque apertae valles in elatioribus sitae (1) solo feraciori ac pinguiori donatae, arbusto aut arboribus variis fructiferis (2) addictae sunt, ibique *Quercus Cupaniana* ac *pubescens* in amplam molem excrescunt; quae vero magis ad summum veniunt (*Piano de' Muori* ped. 1312 supra mare) *Pruno Ceraso*, et *acerba* solummodo assignatae. Denique planities, quae in demissis aut litori finitimae extant, vel *Citri* speciebus variis (3) vel *Vitis*; aut ubi solum humentius et feracius est, atque putca parum profunda effodi possunt (quamvis earum aqua jugis ac subsalsa sit), oleis diversis conserunt (4).

In lapidosis aridisque collibus *Ceratoniam Siliquam* et frequentius *Oleam sativam* ponunt, cujus cultura quotidie extenditur, sed earum putaudi ratio pessima est. In elatis maritima agris *Reseda luteolam*, *Viciam monanthos*, *Hordeum vulgare* ac *hexastichon*, *Triticum turgidum aestivum compositum* ac *hybernium* serunt; cujus posterioris culmi ad varia opera textilia conficienda, uti capsulas, cistellas, pileos, etc., adhibentur.

Praeterea ob incolarum numerum in dies augescentem agrorum cultura quotidie latius patet, ita ut non solum loca praerupta et sabulosa maritima subacta videas, sed in ipsa liquefacta saxa (*Lava dell'Arso, o Cremate*) ad orientem inter *Urbem* et *Bagno* sita, e terra ejecta an. 1301, quamvis adhuc nigerrima ac adustissima sint,

(1) *Cassiani, Pisto, La Starza, Chianole del Testaccio, Valle del Crovace.*

(2) *Pyrus Malus* et *communis, Prunus Cerasus, austera, domestica, insititia* ac *Armeniaca, Persica vulgaris, Morus alba, Sorbus domestica, Cydonia vulgaris, Juglans regia, etc.*

(3) *Citrus medica, Aurantium* et *Limon*, at praecipue istius *var. Calabra* (*Limon-cello*), cujus succus expressus magno incolarum emolumento ad externos exportatur.

(4) Loca ista sunt: *Ischia alla Mandria, Bagno alle pezze e presso al Lago, Lacco presso S. Restituta; Forio presso al paese, al Purgatorio, ed a Citara*; plantae vero quae coluntur sequentes sunt: *Brassicae oleraceae* plures varietates, *Laetuca sativa, Cichorium Endivium* et *Intybus*; *Capsicum pyramidale, annuum, cerasiforme et grossum; Lycopersicum esculentum, pyriforme, cerasiforme et maerophyllum; Solanum Melongena* ac *tuberosum, Cucumis Melo, sativus et flexuosus, Citrullus vulgaris, Cucurbita maximo, Pepo* et *macrocarpa; Lagenaria vulgaris, Gossypium siamense, Zea Mays, Dolichos melanophthalmus, Phaseoli species variae.* Advertendum polo quod nec *Linum usitatissimum*, nec *Cannabis sativa* in Insula coluntur.

sufficiunt, et a proxima terra transvehuntur. Inter vites praeterea arbores fructiferas plerique plantant (1), quarum fructus, uti uvae, dulcissimi veniunt, indeque potentia vina, quapropter caput plerumque tentant, at nonnulla vetustatem non patiuntur. Praeterea tanta est solis radiorum vis, tamque terrae illae siccae ac solutae umbra indigent, ut etiam sub vitibus arboribusque istis plantas alias plerasque annuas (2) terrae committunt, omnesque bene veniunt. Tandem ad rupes maritimas (*Ischia sotto al Castello, Lacco al Monte Vico*) *Opuntia ficus indica* nunc sponte vegetat, fructusque sapidos, tamen parvos, dat.

Agros passim maceriebus, aut sepibus ex *Agave americana*, vel *Calycotome villosa* constructis, circumdant. Ad hos vero saginandos, praecipue in quibus cerealia coluntur, semina mittunt *Lathyr tenuifolii Dolecha*, *Viciae Fabae minoris (Favella)*, *Viciae monanthos Desf. (Apeci)*, *Lupini Thermis (Lupino)*, minusque frequenter *Brassicae Rapaee*, et *Raphani sativi*, cum seminibus *Hordei vulgaris* commixta, Augusto aut ineunte Septembri, etiamque Decembri in calidioribus, humo spargunt, indeque herbas istas adhuc teneras tempestive convergunt ac obruunt (*soversciare*), ut celeriter putrescant, et cum illa terra soluta ac arida permisceantur. Pro hortis vero et oleribus frustula *Cauliniaee Oceanicae (Alga)* ab undis in litore rejecta colligunt, et ista una cum animalium stercore nec non cum oppidorum purgamentis variis congestis componunt, postque paucos dies vix putrefacta in hortis spargunt.

Hisc de Insulae chorographia breviter relatis, pauca alia de ipsius Flora hic addam.

Inarimensis vegetationis aspectus ab illo proximi continentis Puteolani vix differt: nam geologica indoles in utrisque similis; tamen, ob fere conformem terrarum Insulae, locorumque naturam, minus quam in continenti varia est. Siquidem plantae montium vel paludum desiderantur, paucae sylvarum propriae, numerosiores quae pendices incolere solent, aut locorum apricitate delectantur.

(1) *Ficus Carica*, *Morus alba*, *Prunus Armeniaca*, domestica ac acerba, *Persica vulgaris*, *Crataegus Azarobus*, *Mespilus germanica*, *Sorbus domestica*, *Cydonia vulgaris*, *Punica Granatum*.

(2) *Phaseoli species variae*, *Pisum sativum*, *Vicia Faba*, *Ervum Lens*, *Lathyrus Cicera* ac *sativus*, *Lycopersicum esculentum*, pyriforme et cerasiforme, *Solanum tuberosum*, *Reseda luteola*, *Allium Ampeloprasum*, b. *sativum (Aglione)*.

Si interim ad distributionem plantarum hujus insulae animum intendamus, vix duas distinctas vegetationis regiones assignare possumus, scilicet *Regio Litoraea*, complectens rupes, vel planities mari contiguas, saepiusque sabulo feldspatico refertas, quae per pedes circiter 200 supra mare elevatur, ac per passus circiter 1090 ad interiora loca protenditur. In regione ista *Gossypium siamense* Ten. optime vegetat, nonnullae *Persicae vulgaris* aut *Pruni Armeniae* varietates, ac *Citri* species variae coluntur, ipsiusque limites superiores ab *Erodio Chio*, *Trigonella corniculata*, *Melilotto parviflora*, *Trifolio suffocato*, *Allio commutato*, *ciliato* et *trifoliato*, *Medicagine obscura*, *Artemisia arborescente*, *Avena neglecta*, *Arenaria procumbente*, *Centaurea Calcitrapa*, *Cypero aureo*, *Daphne Gnidio*, *Passerina hirsuta*, *Lycio europeo*, et *Valantia murali* designantur. Huic subsequitur *Regio Collina*, in cujus ambitu valles late patentes inter colles demissos et montuosa loca occurrunt; in qua regione *Pruni Cerasi*, *acerbae ac domesticae*, *Persicae vulgaris ac Pyri mali* varietates, et *Sorbus domestica*, *Mespilus germanica*, *Crataegus Azarotus* et *manogyna*, *Cydonia vulgaris*, *Frazinus Ornus*, *Ostrya vulgaris*, *Corylus Avellana*, *Colutea arborescens*, *Ulmus suberosa*, *Acer campestre*, *Carpinus duinen-sis*, *Castanea vesca* coluntur, aut sponte virent et optime crescunt; ita ut hujus posterioris speciei arbores longevae nonnullae supra *Casamicciola* loco dicto *Ciotaria* adhuc vegetantes truncum diametri octopedalis habent. In hac regione insuper a praecedente ascendunt *Calycotome villosa*, *Erodium Botrys*, *Ornithopus ebracteatus*, *Imperata cylindrica*, *Linaria cirrhosa*, *Veronica cuneata*, *Vitez Agnus castus*, *Aplenium odoratum*, *Allium Chamaemoly*, et *commutatum*, *Lavandula Stoechas*, interque plantas cultas *Ceratonia Siliqua*, *Citrus Aurantium*, et *C. Limon Calabrum*. Coeterum, si cui id magis arridet, *Regio* ista in duas *subregiones* commode distinguui potest; idest *Regio Collina inferior*, quae a pedibus 200 ad pedes 1100 ad orientem, et ad pedes 1085 ad occasum supra mare protrahitur, cujus limites superiores *Pistacia Lentiscus* in primis, *Cistus monspeliensis*, *Helianthemum sumana* et *Tuberaria Malra nicaensis*, ac *parviflora*, *Biserrula Pelecinus* designant; et *Regio Collina superior* quae a ped. 1100 usque ad pedes 2407, idest ad verticem montis *Epomei* assurgit; ejusque limites inferiores non transcendunt *Cerastium luridum*, *Hieracium bra-*

chiatum, *Crepis scariosa*, *Euphorbia coralloides*, *Cephalanthera ensifolia*, *Orchis provincialis*, *Carduus nutans*, *Medicago Cupaniana*. Tamen species nonnullae tantum litus et loca finitima exacte tenent, quia arenas praediligunt (1), et ex adverso paucae editiora solummodo inhabitant, ita ut ipsa *Vitis vinifera*, *Ficus carica*, *Citrus Aurantium*, ac *Olea europaea*, quamvis ultra pedes 1662 (*Ajetola*) supra mare ad austrum, et vites ad ped. 1455 (*Tripiti*) inter aquilonem et orientem, et ad ped. 1563 (*Pietra perciata*) inter aquilonem et occasum fructus perfectos non proferat, tamen usque ad verticem montis Epomei vegetat, ubi non climatis asperitate, sed a ventorum impetu percussa fructus haud maturos dulcesque dat. Potius igitur plantarum hujus insulae distributione non a terrarum natura, aspectu aut cultura varia provenire sedula observatio demonstrat. Sic plurimae species a montis vertice ad litus descendunt (2), dum nulla habita ratione altitudinum pleraeque nonnisi in marnaceis argilloso-calcareis (3), vel in marnaceis

(1) *Medicago marina*, *Eryngium maritimum*, *Pancretium maritimum*, *Polygonum maritimum*, *Silene nicaensis*, *Batatas sinuata*, *Calystegia Soldanella*, *Oenonis diffusa*, *Hypecoum glaucescens*, *Kachile maritima*, *Malicinia parviflora*, *Matthiola trispidata* et *sinuata*, *Polycarpon alsinarfolium*, *Plantago ceratophylla* et *macrorhiza*, *Echinophora spinosa*, *Diotis candidissima*, *Orlaya maritima*, *Ambrosia maritima*, *Centaurea sphaerocephala* b. *caespitosa*, *Salsola Soda* et *Tragus*, *Euphorbia Parolinii*, *Corynephorus articulatus*, *Triticum junceum*, *Sclerochloa maritima*, *Galilea mucronata*, ec.

(2) *Spartium junceum*, *Medicago litoralis*, *Brassica incana* Ten., *Centranthus ruber*, *Helichrysum litoreum*, *Dianthus longicaulis*, *Rhamnus Alaternus*, *Quercus Ilex*, *Centaurea deusta*, *Carlina involucreta*, *Galactites tomentosa*, *Hypochaeris neapolitana*, *Thrinia tuberosa*, *Hieracium crinitum*, *Erica arborea*, *Salvia verbenaca*, *Plantago lagopus*, *Teucrium siculum*, et *flavum*, *Cerastium campanulatum*, *Ruta bracteosa*, *Trifolium Cherleri*, et *nigrescens*, *Astragalus humosus*, *Vicia hybrida*, *lathyroides*, et *pseudo-cracca*, *Myrtus communis*, *Corrigiola litoralis*, *Sedum stellatum*, *Ferula neapolitana*, *Viburnum Tinus*, *Euphorbia pinea*, et *Characias*, *Orchis rubra* ac *pseudo-sambucina*, *Silene Armeria*, *Achillea ligustica*, *Dactylis hispanica*, b. *glaucescens*, *Cistus villosus*, *Euphrasia latifolia*, *Populus alba*, *Poa bulbosa*, *Artemisia variabilis*, *Crepis glandulosa*, *Zacintha verrucosa*, *Melilotus elegans* et *rotundifolia*, *Salix caprea*, b. *inarimensis*, *Daucus scaberrimus*, *Linum strictum* et *angustifolium*, *Hypericum ciliatum*, *Cyperus rotundus*, *Coronilla Emerus*, *Cytisus triflorus*, *Psoralea bituminosa*.

(3) *Oenonis spinosa*, *Leontodon Rosani*, *Dipsacus sylvestris*, *Scorpiurus subtilosa*, *Coronilla scorpioides*, *Anchusa italica*, *Tussilago Farfara*, *Melilotus sulcata*, *Peanella alba*, *Diphloxia tenuifolia*, et *viminea*.

calcareo-argillosis (1), aut in arenosis vegetant (2); aliae in rupibus (3), aliae in sylvis (4), nonnullae inter segetes tantum proveniant (5); ac denique aliae solummodo in asperis aridisque occurrant (6). Notandum quoque est quod inter Insulae plantas aliquae revera uti adventivae habendae sunt, et istae inter segetes fortuito occurrunt (7); ita ut in nonnullis annis frustra quaeruntur, nam earum semina cum cercalium seminibus in insula transeunt.

Animadvertere interea oportet, aliquas species, quae in proximo continenti satis vulgares sunt, in hac insula desiderari (8), quam-

(1) *Barbarea praecox*, *Convolvulus italicus*, *Sinapis incana*, *Rapistrum orientale*, *Neslia paniculata*, *Ajuga Chia*.

(2) *Glaucium flavum* a litore usque ad ped. 1455 supra mare (monte Trippiti), *Oenosis diffusa* ad pedes 309 (monte Vico). *Korleria Barrelieri*, *Corynephorus articulatus*, *Festuca stipoides*, *Malcolmia parviflora*, *Cakile maritima*, *Orlaya maritima*, *Euphorbia peplos*, et *Parlatia*, *Medicago maritima*, *Calystegia Soldanella*, *Statice sinuata*, *Matthiola sinuata*, *Triticum giganteum*, *junceum* et *seirpeum*, *Sclerochloa maritima*, *Ambrosia maritima*.

(3) *Anthyllis Barbaeoris*, *Euphorbia dendroidea*, *Ferula neapolitana*, *Brassica incana*, *Helichrysum litoreum*, *Dianthus longicaulis* ab Epomei vertice ad litus — et ad rupes mare foetissimas vel incumbentes *Capparis rupestris*, *Lotus cytisoides*, *Daucus gummiifer*, *Rubia Boceoni*, *Cineraria bicolor*, *Centaurea elinaria*, *Rosmarinus officinalis*, *Matthiola rupestris*, *Chrythum maritimum*, *Passerina hirsuta*, *Prasium majus*.

(4) *Orchideae* variae, *Triodia decumbens*, *Carex olbiensis*, *sylvatica*, *gynomane* et *praecox*, *Hieracium lactaris*, ac *umbellatum*, *Lathyrus angulatus*, *Oenanthe urbanum*, *Valeriana officinalis*, *Astragalus glycyphyllos*, *Inula salicina*, *Solidago virgaurea*, *Carlina vulgaris*, *Dianthus Armeria*, *Rumex conglomeratus*, *Trifolium Boceoni*, *ligusticum*, et *tenuiflorum*, *Iris foetidissima*, *Alliaria officinalis*, *Silene viridiflora*, *Hypericum hircinum*, *Aspidium aculeatum b. hastulatum*, *Daphne laureola*, *Stachis germanica b.*, et *S. sylvatica*, *Digitalis micrantha*.

(5) *Specularia speculum b. hirta*, et *hybrida*, *Viola gracilescens*, *Asperula arvensis*, *Scandix pecten*, *Ammi majus*, *Delphinium Ajacis*, *Vicia hirsutissima*, *Lolium maximum*, et *temulentum*, *Melilotus infesta*, *Linaria Oxyris*, *Galium tricornis*, *Ranunculus arvensis*, *Neslia paniculata*.

(6) *Linaria cirrhosa*, *Aira Tenorii*, *Galium anglicum* et *marale*, *Criticiarella monspeliaca*, *Lavandula Stoechas*, *Helianthemum fumana* et *Tuberaria*, *Festuca neapolitana*, *Andropogon hirtum*, ac *angustifolium*.

(7) *Melilotus infesta*, *Linaria Oxyris*, *Valerianella Morisonii*, *Lolium robustum*, et *temulentum*, *Silene pendula*, *Torilis heterophylla*, etc.

(8) Species quae prope Neapolim ac Puteolos communes, at in locis ejusdem naturae hujus insulae desiderantur, sequentes sunt: *Armone apennina* — *Adonis Cuspaniana* — *Ranunculus bulbosus* — *Calepina Corvini* — *Scutellaria Coronopus* — *Biscutella ciliata* — *Draba muralis* — *Cardamine graeca*, et *impatiens* — *Sinapis alba* — *Helianthemum obscurum*, et *Barrelieri* — *Silene canescens* — *Cucubalus bacciferus* — *Lychuis Cyrilli* — *Cerastium triviale* — *N. alba nicoidea* — *Hypericum quadrangulare*.

vis momenta cosmica fere omnia, et natura locorum similia extent; dum aliae Insulae ejusdem in illo non degant, sed remotarum regionum, aut dissitorum hujus Regni locorum indigenae sint, vel etiam in terris alienae mineralogicae indolis appareant (1). Iute-

Anagyris neapolitana—*Medicago arborca*—*Melilotus leucantha*—*Trifolium vesiculosum*—*Coronilla lotoides*—*Lathyrus setifolius*, et *sylvestris*—*Orobus variegatus*—*Circaea lutetiana*—*Bryonia dioica*—*Scleranthus annuus*—*Sedum acapolitanum*—*Aegopodium podagraria*—*Ammi glaucifolium*—*Conium maculatum*—*Angelica sylvestris*—*Torilis helvetica*—*Crucianella maritima*—*Valerianella olitoria*, et *carinata*—*Knautia integrifolia*—*Scabiosa Columnae*—*Conyza Tenorii*—*Inula crithmoides*—*Anacyclus valentinus*—*Artemisia vulgaris*—*Gnaphalium luteo-album*—*Cniceraria maritima*—*Centaurea nigrescens, splendens*, et *solstitialis*—*Cirsium pungens*—*Tragopogon crispuspermum*—*Crepis setosa*—*Cyclamen neapolitanum*—*Ligustrum vulgare*—*Vinca minor*—*Echium tuberculatum*—*Verbascum lychnitidis*, et *foccosum*—*Veronica Buzbanmil*—*Lathraea clandestina*—*Mentha Pulgium*—*Salvia glutinosa*—*Glechoma hederacea*—*Lamium flexuosum*—*Tenerium scordioides*—*Ajuga reptans*—*Statice Smithi*, et *Cumana*—*Amaranthus morosus*—*Salzola hyssopifolia*—*Chenopodium ambrosioides*—*Beta maritima*—*Atriplex portulacoides*, et *diffusa*—*Aristolochia rotunda*, et *pallida*—*Euphorbia chamesice*, et *amygdaloides*—*Mercurialis perennis*—*Humulus Lupulus*—*Juniperus macrocarpa*—*Iris tuberosa*—*Crocus pusillus*—*Bomarea ramiflora*—*Narcissus unicolor, praecox*, et *elatus*—*Lilium bulbiferum*—*Muscari botryoides*—*Ornithogalum nutans*—*Allium neapolitanum*, et *pendulinum*—*Hordeum maritimum*—*Bromus racemosus*—*Festuca ligustica*—*Eragrostis pectinoides*—*Chrysurus cynosuroides*—*Cynosurus cristatus*—*Setaria glauca*—*Phalaris subulata*—*Chrypsis alopecuroides*—*Alopecurus agrestis*, et *nrientalis*—*Anthoxanthum odoratum*—*Agrostis pungens*—*Ammophila arenaria*—*Melica uniflora*—*Arvensis puriflora*, et *condensata*—*Andropogon Rarennae*—*Aspidium filix mas*—*Athyrium filix foemina*—*Interea aliae sequentes species in hac insula praeveniunt, et prope Neapolim ac Puteos desiderantur*—*Barbarea praecox*—*Sinapis incana*—*Ruscus lutea*—*Silene Armeria*—*Alsine procumbens*—*Cerastium luridum*—*Noctachia erecta*—*Linum corymbulosum*—*Lupinus pilosus*—*Omonis mollis*—*Melilotus infesta*—*Vicia disperma*, et *Lathyroides*—*Rosa canina b. collina*—*Sedum litoreum*—*Tolpis altissima*—*Cropis glandulosa*—*Linaris acutangula b. inarimensis*—*Phelipaea coerulea*—*Statice inarimensis*—*Kochia saxicola*—*Euphorbia coralloides*—*Allium Gasparrini*, *albescens*, *nigrum var.*—*Scilla maritima*—*Carex obliquis, et sylvatica*—*Festuca bromoides*—*Melica ciliata*, et *pyramidalis*—*Woodsardia radicans*.

(1) *Cyperus polystachyus* ex Africa, et India orientali, ita ut solummodo ad vaporaria naturalia (vide nota n. 14): *Hypochaeris glaucescens* in arenosis graniticis Rhegii et Messanae; *Helianthemum Tuberaria* in calcareis prope Tarantum, aut in arenosis graniticis elatis prope praedictas urbes vegetat: *Echium calycinum*, *Ruta bracteosa*, *Conyza saxatilis*, *Allium subhirsutum* et *trifoliatum*, *Oxyris alba*, *Convulvulus lineatus*, *Tenacium fruticosum*, *Helianthemum sumana*, ex calcareis Capreatum et litoreis Amaliphitani; *Leontodon Bosani* in argillosis arvis elatis aut demissis Samii, Lucaniae, et Ilirpinorum; *Lavandula Stoechas* in calcareis Fondi et Capitis Paliuiri; *Pteris longifolia* ex uliginosis

rim si quis rationem hujus singularis phaenomeni ad botanicam geographiam spectantis postulet, me penitus ignoret, et meo iudicio res est explicatu difficilis.

Silentio quoque praeterire non possum, vegetabilia propria hujus insulae paucissima esse (1), et nonnullas species angustissima ac peculiaris spatia occupare (2); ita ut si Botanicus in illis non reperiat, frustra alibi quaereret; proinde laboriosum arduumque est absolutam Floram Insulae redigere; eo magis quia obstant rupes quamplurimae praeruptae, vel ad perpendicularum excisae, ideoque iuaccessae.

Species plantarum vascularium hujus Insulae adhuc cognitarum, 960 (plantis cultis comprehensis) numerantur. Forsitan dum Insulae cultura intra angustos limites coarcebatur, numerus major erat; siquidem meis etiam temporibus nonnullae species, quas ibi jam collegi, amplius reperire non datur, uti *Scabiosa rutefolia*, *Arundo Phragmites*, *Euphorbia pubescens*, *Statice Limonium* b., *Polypogon ascendens*, etc. Quod verospectat ad numerum Familiarum, Generum, et Specierum cujusque familiae aut generis Florae ipsius inter se comparatarum, vel etiam cum Flora totius Regni, nec non aliarum nonnullarum insularum, ad hujus opusculi calcem tabulam adjiciam.

Pauca denique haec de opellae ratione te, Lector humanissime, praemoneudum censeo. Quamvis Regiae Scientiarum Academiae Neapolitanae studiis ab anno reparatae salutis 1824 tum Iuarimes

Siciliae et Cretae: *Helianthemum juniperinum* ex Hispania; *Hieracium buphthalmum* ex Apenninis Liguriae; *Euphorbia pinea* ex Caprearum insula, et ex Sicilia; *Banunculus Chius* ex Sicilia, et Graecia; *Senecio crassifolius* ex Sicilia et Sardinia, etc.

(1) *Kochia saxicola*, *Veronica cuneata*, *Linaria acutangula* b. *inarimensis*, *Statice inarimensis*, *Mentha ambigua*, et *inarimensis*, *Heliotropium macrocarpum*, *Allium albidum*, *Narcissus canaliculatus*, *Gladiolus inarimensis*, *Digitaria gracilis*.

(2) *Helianthemum Tuberaria*, *juniperinum* et *frumana*, *Mocuchia erecta*, *Acer campestre*, *Ononis mollis* et *spinosa*, *Trifolium strictum*, *Lythrum alatum* et *hysso-pifolium*, *Sedum litoreum* et *rufescens*, *Saxifraga trydaclitites*, *Torilis heterophylla*, *Cornus mascula*, *Achillea Millefolium*, *Senecio crassifolius* et *lycopifolius*, *Tolpis altissimu*, *Botanus sinuata*, *Convolvulus lineatus*, *Anchusa italica*, *Echium anlycinum*, *Linaria Cymbalaria*, *Mentha umbigua* et *inarimensis*, *Stachys murrabii-folia*, *Teucrium fruticosum* et *pseudo hysstopus*, *Ajuga chia*, *Kochia saxicola*, *O yris alba*, *Euphorbia acuminata*, *Curpinus duinensis*, *Juniperus phoenicia*, *Alisma plantago*, *Epipactis microphylla*, *Allium nigrum* var., *Schoenus nigricans* b. *recurvus*, *Helocharis pulstris*, *Carex sylvatica*, *Cynosurus elegans*, *Crypsis aculeata*, *Ampelodes-mos tenax*, *Melica pyramidalis*, *Pteris longifolia*, *Gymnogramme Ceterach*, etc.

Insulae structura, tum aquarum medicinalium natura, et vires fuerint diligentissime exploratae, tamen istius Insulae res herbaria ab eruditis illis meis sociis minime fuit pertractata; proinde hanc mihi spartam, quoad plantas vasculares solummodo spectat, exorandam suscepi, plantarum cellularium descriptionem consulto ommittens, quia fuit jam ab aliis inchoata.

Genera naturali ordine familiarum disposita, ut vegetationis natura facilius cognoscatur; et quoties non *Lin.*, sed alterius auctoris nomen, sub genere signavi, tunc genus istud, uti fuit a citato auctore firmatum, recepi. Speciebus rite cognitis fere semper nulla specifica phrasis, sed brevis descriptio adjuncta: tamen auctoris nomen, qui illam primus descripsit, non praetermisi, nec non citationum nonnullorum, qui iconibus illustrarunt, adjeci. Synonyma nonnisi ea, quae necessaria putavi, relata; nam plura enumerare, uti aliquorum mos est, in hac opella supervacaneum duxi. Habitatio, florescentia, ac tempus quamdiu durant, vires medicinales vulgares, nec non nomina vernacula, quae colligere licuit, sedulo signata. Tandem locorum altitudinem in tabella peculiari ad calcem operis adjuuxi.

I.

DICOTYLEDONEAE.

I. THALAMIFLORAE.

1. RANUNCULACEAE. *Juss.*

1. CLEMATIS.

Dec. syst. 1. p. 131.

1. C. FLAMMULA. *Lin. sp. pl. p. 766* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 475.*

b. foliolis suborbiculatis.

C. fragrans. *Ten. fl. nap. 1. p. 308.*

1c. *Ten. 1. c. t. 48* — *Reich. cent. 14. f. 4666, a.*

Ad sepes, et in fruticetis apricis passim, sola var. b; nec non ai *scogli di S. Anna presso Ischia.*

Julio, Augusto. ♀

Vulgo *Fuoco morto.*

Flores albi, gratissime olentes: *petala* oblongo-lanceolata, obtusa, subtus margine pubescentia: *fructus* in quolibet pedunculo pauci—*Rami* teneri una cum foliis exsiccati ab asinis avide comeduntur.

2. C. VITALBA. *Lin. sp. pl. 766* — *Ten. fl. nap. 1. p. 309* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 474.*

a foliolis integris. *Ten. l. c.*

1c. *Reich. cent. 14. f. 4467* — *Lam. ill. gen. t. 497* — *Vitalba Dod. pempt. 404.*

b. foliolis crenatis. *Ten. l. c.*

Ad sepes, in sylvaticis, et in fruticetis ubique.

Junio, Augusto. ♀

Vulgo *Vitaura.*

Flores minus olentes, quam in praecedente, et sordide albi, non candidi; *petalis* oblongis, obtusis, lineatis, utrinque tomentosis: *fructus* in quolibet pedunculo numerosiores—*Rami* teneri elixi, et oleo ac aliquando etiam aceto conditi ab incolis vescuntur.

2. ANEMONE.

Dec. syst. 1. p. 188.

1. *A. HORTENSIS.* *Lin. p. pl. 761* — *Ten. fl. nap. 4. p. 330* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 157* — *A. stellata. Dec. pr. 1. p. 18.*
lc. Reich. cent. 14. f. 4649 — *A. prima. Dod. pempt. 434.*
 In pascuis, et in fruticetis apricis, nec non ad muros.
 Aprili, Majo. ♀
 Varietas floribus albis in Insula satis rara.

3. RANUNCULUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 953.

1. *Sem. levibus.*

1. *R. CALTHAEFOLIUS.* *Jord. obs. 6. p. 2* — *R. Ficaria. Ten. fl. nap. 1. p. 313,*
 quoad plantam in demissis proveniente — *Bertol. fl. ital. 5. p. 508, ex*
 parte — *R. Ficaria, b. calthaeifolius. Guss. syn. 2. p. 4* — *Ficaria calthae-*
folia. Reich. fl. germ. 2. p. 718, et cent. 13. p. 9.
R. glaberrimus, radice tuberoso fasciculata, caule subdecumbente, foliis
petiolatis obiter crenatis, lobis inferiorum basilaribus incumbentibus, se-
palis 3-5, petalis 8-15 oblongo cuneatis, fructibus ovatis levibus obtuse
breviterque apiculatis hirsutiusculis.
lc. Reich. l. c. f. 4571.
 In apricis cultis humentibus, praescrtim subargillosis, et in vineis.
 Januario, Aprili. ♀
 In hac specie *folia* integerrima et duplo latiora, quam in *R. Ficaria*, ni-
 tide virentia, saepe fusco-maculata et ampliora: *petala* nitide lutea, duplo
 majora, ungue ad basim angustiore. Confer pro reliquis differentiis ac
 characteribus *Jord. l. c.*, et pro bulbillis, qui ex axillis foliorum prodeunt,
l'Institut. 1832. n. 944. p. 38.
 2. *R. NEAPOLITANUS.* *Ten. ind. sem. H. nep. 1825, et fl. nap. 4. p. 349*
 — *Bertol. fl. ital. 5. p. 556* — *R. heucherifolius. Prest. fl. sic. 1. p. 15*
(an. 1826) — *Guss. syn. 2. p. 47.*
R. adpresse hirsuto-pubescent vel glabratus, radice tuberoso-fibrosa, caule
erecto multifloro ad basim bulboso, foliis inferioribus cordato-orbiculatis
tripartito-trilobis, lobis subrhombeis varie incisodentatis, superioribus
subsessilibus 3-5-partitis, laciniis lanceolato-linearibus subintegris, pe-

dunculis striatis adpresse hirsutis, calyce reflexo, seminibus levibus stylo brevissimo recto utrinque convexo terminatis.

lc. *Ten. l. c. f. 148* — *R. bulbosus. Reich. cent. 13. f. 4611*, quia folia radicalia tripartita, non vero ternata.

In sylvaticis apricis tam demissis, quam elatis; *selea dell' Ulicella presso Tripiti, selve del Rotaro, di Catreca, e del Castiglione a Pietra Vona*; nec non in argillosis humentibus; *Monte Vetta alle petrelle, Cava di Brusomonte, di Buceto, di Cerambi, del Carusiello, e dell' Arvaniello sopra Casamicciola.*

Majo, Junio. ☾

Radix collum raro globosum, uti in affini *R. bulboso*, et *radix* asphodeliformis fibræ magis elongatæ ac crassiores: *folia* inferiora semper tripartita, nunquam ternata uti in illo, cum quo a nonnullis male confusus: *semina* glabra, fusca, convexiuscula, tenui et acuto margine circumdata: *receptaculum* setosum.

Cl. Bertol. l. c. p. 545 nescio qua de causa ad *R. lanuginosum* citat *R. neapolitanum. Ten. fl. nap. l. c.*, non vero *Syll.* — *R. heucherifolius. Presl et Guss. syn. l. c.* vix hujus varietas est stylo subuncinato, nam in reliquis convenit.

2. *Scm. tuberculatis, muricatisque.*

3. *R. PHILONOTIS. Retz. obs. 6. p. 31* — *Ten. fl. nap. 4. p. 351* — *Der tof. fl. ital. 5. p. 560.*

lc. *hirsutus. Ait. Reich. cent. 13. f. 4617* — *R. 11. Matth. comm. 1. p. 559.*

b. *parvulus. De syst. 1. p. 297* — *Ten. l. c. var. c. R. parvulus. Lin. mant. p. 79.*

lc. *R. minimus, apulus. Column. Ecp̄r. 1. p. 316.*

c. *lejocarpos: seminibus undique levibus.*

In apricis herbosis siccis aut humentibus, nec non tam in collibus, quam in maritimis obviis; var. b. et c. *Chianole del Testaccio.*

Aprili, Majo. ☉

Species quoad staturam, et habitum polymorpha, uti *semina* undique levia, vel tuberculis prope marginem plus minus numerosis tecta; tamen *radix* semper annua.

4. *R. ARVENSIS. Lin. sp. pl. 780* — *Ten. fl. nap. 4. p. 352* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 564.*

lc. *Reich. cent. 13. f. 3614* — *R. sylvestris 111. Dod. pempt. 427.*

Inter segetes, et in elatis; *seminati di Fontana, di Calimera, della Serra, del Jetto, di Monte Vetta.*

Majo, Junio. ☉

6. *R. MURICATUS*. *Lin. sp. pl.* 780 — *Ten. fl. nap.* 4. p. 352 — *Bertol. fl. ital.* 5. p. 566.

lc. Lam. ill. gen. t. 498, *f.* 2 — *Reich. cent.* 13. *fl.* 4615 — *R. palustris*, *echinatus*. *Bauh. hist.* 3. p. 857.

b. cuneifolius; foliis basi cuneatis.

In herbosis, ad vias, et ad aggeres passim.

Martio, Majo. ☉

Foliis petiolisque glabris, aut sparse pilosis variat; praeterea al *Dagno nelle pezze unicum* tantum plantam varietatis *b.* inter *Zeam Mays* invenit *Cl. Gasparrini*; in qua folia omnia basi cuneata, non inferiora cordata.

6. *R. CHRUS*. *Dec. syst.* 1. p. 299 — *R. incrassatus*. *Gus. syn.* 2. p. 50 — *R. parviflorus*, *c. erectus*. *Ten. fl. nap.* 4. p. 353.

R. molliter villosus, caulibus fistulosis decumbentibus erectisque, foliis orbiculato-cordatis, radicalibus obtuse lobato-crenatis, caulinis acute 3-5-partito-lobatis, pedunculis oppositifoliis fistulosis demum apice incrassatis, calyce demum reflexo petala aequante, seminibus compressis anguste acuteque marginatis stylo brevi apice uncinato terminatis obtuse tuberculatis, tuberculis setigeris.

lc. nostra tab. 1. f. 1. a. b.

In herbosis; *Vigne di Casamicciola al Mortito, nella valle sotto le Croci, ed in quelle del Fonnino di Casa Sperone, salita del Monte della Misericordia a Casamicciola, al principio del Vallone del Bubù, via delle selve di Chiummano presso le case.*

Aprili, Majo. ☉

Pallide virens: pedunculi recti, 3-6-lineares, demum fere bipollicares ac arcuati, fistuloso-clavati: *sepala* virentia, margine albida, obtusiuscula, concava, sub anthesi a basi ad medium erecta, inde reflexa: *petala*, vix lin. lata, 1½ lin. longa, luteola, ovali-lanceolata, obtusiuscula, breviter unguiculata, subtus pallida ac trinervia: *semina* matura fusca, receptaculo glabro arte adhaerentia.

Habui pro specie diversa a *R. chio*, sed ex comparatione facta a *Cl. Boiss.* cum specimine Oliveriano in herb. *Mus. H. Paris*, et ex speciminibus graecis ab amico *Heldreich* communicatis, cum illo associandum esse cognovi.

7. *R. PARVIFLORUS*. *Lin. sp. pl.* 780 — *Ten. fl. nap.* 4. p. 353, *var. a* — *Bertol. fl. ital.* 5. p. 568, ex parte.

lc. Reich. cent. 13. *f.* 4616, et *R. hirsutus*, annuus, flore minimo. *Itaj syn. ed.* 3. p. 248 *t.* 12. *f.* 1, *optimae.*

In herbosis, praesertim humentibus; *Casamicciola all' ingresso della Cava del Bubù*, una cum praecedente, sed rarus; e *nelle vigne umide sotto la stufa del Cacciuto.*

Aprili, Majo. ☉

Praecedente simillimus, a quo plerique non separant; sed in hoc *pubescencia* major; *pedunculi* nunquam *incrassati*; *semina* minus *exquisite tuberculata*; *rostro* utrinque *obsolete carinato*. Confer quoque *syn. 2. p. 50*.

4. HELLEBORUS.

Adans. fam. 458 — Dec. pr. 1. p. 46.

1. *H. FOETIDUS*. *Lin. sp. pl. 784 — Ten. fl. nap. 4. p. 354 — Bertol. fl. ital. 5. p. 592.*

lc. Reich. cent. 14. f. 4415.

In *umbrosis sylvaticis*, et ad *sepes*; *selve di Casamicciola, del Lacco, di Campagnano, della eava delle Nocelle.*

Februario, Martio. ☿

5. NIGELLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 935.

1. *N. DAMASCENA*. *Lin. sp. pl. 753 — Ten. fl. nap. 4. p. 328 — Bertol. fl. ital. 5. p. 434.*

lc. Lam. ill. gen. 1. 488. f. 2.

In *segetes in elatis*; *seminati di Panza, della Serra, di Fontana, in quelli della Cava de' Muori ne' eiglioni erboosi degli argini, Forio presso le fumarole nella contrada del Bell' Omo.*

Majo, Junio. ☉

6. DELPHINIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 927.

1. *D. AJACIS*. *Lin. sp. pl. 748 — Ten. fl. nap. 1. p. 302 — Bertol. fl. ital. 5. p. 400.*

lc. Reich. cent. 14. f. 4670.

b. longepedunculatum; *foliis in laciniis tenuiores dissectis, pedunculis elongatis 1-2-pollicaribus.*

In *segetes*, ad *agrorum margines passim*; *var. b. in vineis elatis; Fontana, Calimera, Monte Vetta.*

Majo, Junio; et var. b. Augusto, Septembri. ☉

Descriptio hujus speciei in Griseb. spic. fl. Rum. et Byth. 1. p. 320

quoad sepala punicea, herban superne velutino-glandulosam, aliasque notas cum nostro non quadrat.

2. *D. HALTERATUM*. *Sibth. et Smith. fl. gr. pr. 1. p. 371* — *Ten. fl. nap. 4. p. 324* — *Bert. fl. ital. 5. p. 403*, an cum syn. omnibus?

1c. *Sibth. fl. gr. t. 507*.

In cultis, ad vias, ad agrorum margines undique obvium.

Junio, Septembri. ☉

2. PAPAVERACEAE. Dec.

7. PAPAVER.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 881.

1. *P. HYBRIDUM*. *Lin. sp. pl. 725* — *Ten. fl. nap. 4. p. 305* — *Bert. fl. ital. 5. p. 316*.

1c. *Reich. cent. 14. f. 4476*.

In vineis, interque segetes passim.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Papagno*, uti sequentes.

Petala parva, sanguinea, basi macula atropurpurea notata, sat raro concoloria: *filamenta* atra, a medio ad apicem compressa, pistillum aequantia: *antherae* violaceo-cinereae, oviales, muticae: *stigma* depressum; lobis angustis, obtusis, non incumbentibus, lineis stigmatiferis 5-6, elevatis, hispidis, viridulis, aut atrocoeruleis: *capsula* oblonga, aut subglobosa, semper tamen setis rigidis flavicantibus lecta: *semina* cinerea, globoso-reniformia, excavato-reticulata.

2. *P. RUBRUM*. *Lin. sp. pl. 726* — *Ten. fl. nap. 4. p. 306* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 322*, excl. variet.

1c. *Reich. cent. 14. f. 4477?*, nam habitus alienus, et potius *P. laevigatum* l. c. f. 4478 b. nostrum refert.

Inter segetes, et praesertim in apricis elatis; *seminati* di *Fontana*, di *Calimera*, della *Serra*, del *Pantano*, di *Panza*, di *Campagnano*, delle *Chianole del Testaccio*, al *Bagno*.

Aprili, Majo. ☉

Petala fere magnitudine praecedentis, pallide coccinea, apice undulata, basi non maculata: *filamenta* teretia, atra, pistillum aequantia: *antherae* oblongae, atrae, muticae: *stigma* peltatum, acute umbonatum; lobis obtusis, invicem incumbentibus, lineis stigmatiferis 5-8, papillois, atropurpureis: *capsula* semper clavata, basi attenuata, 5-9 lin. longa: *semina* rufescentia, globoso-reniformia, utrinque compressiuscula, excavato-reticulata.

3. *P. obtusifolium*. Desf. atl. 1. p. 407 — Guss. syn. 2. p. 7.

lc. *P. Rubiacei*. Vig. diss. de Pap. n. 4. t. 1. f. 1. ex *Moris*; sed inspecta icone citata, ad aliam speciem pertinere videtur, et potius *P. intermedium* refert.

Inter segetes; *Vataliere, Chianole del Tentaccio*.

Aprili, Majo. ☉

Petala fere sequentis: *stigmatis* lobi plani, albi, invicem incumbentes; radiis stigmatiferis villosis, atropurpureis: *capsulae* oblongo-cuneatae, glabrae: *semina* nigra, ut in praecedente.

Cl. *Bert.* uti varietatem *P. dubii* habet, sed *capsulae* omnino alienae.

4. *P. rhoeas*. Lin. sp. pl. 726 — Ten. fl. nap. 4. p. 306 — *Bertol.* fl. ital. 5. p. 324.

lc. *Reich. cent. 14. f. 4470*.

In cultis passim.

Aprili, Majo. ☉

5. *P. intermedium*. *Bech. in Reich. fl. germ. 2. p. 701* — *P. rhoeas, b. Bertol. fl. ital. 5. p. 325*, ac *Ten. fl. nap. 4. p. 306*, et *Guss. syn. 2. p. 7*.

P. caule pedunculisque patenter setosis, foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus decursive pinnatifidis, lacinia impari elongata, omnibus lanceolatis acutis argute serrato-aristatis, calycibus setosis, capsula glabra ovato-cuneata basi acuta, stigmate 10-12 radiato.

lc. *Reich. cent. 14. f. 4478* — *P. erraticum*, alterum. *Fuchs. hist. p. 516* — *P. rhoeas*, minus. *Dalech. hist. 1. p. 439*.

In cultis demissis, sed frequentius in elatis; *seminati della Cava de' Muori presso le Petrelle, di Monte Vetta, del Jetto, di Fontana, della Pietra dell'acqua, di S. Nicola, di S. Montano al Lacco*.

Aprili, Majo. ☉

Foliorum serraturae omnes setula terminatae, et earum lacinia impar aliquando 3 — pollicaris, omnes acutae, apice hispido-ciliatae et setula etiam terminatae: *petala* coccinea, basi non maculata: *stigmatis* lobi incumbentes, uti in *P. rhoeadi*, lineis stigmatiferis puberulis, atropurpureis: *semina* parva, fusco-cinerea, ovali-reniformia, tenue reticulato-foveolata.

Descriptio Cl. *Reich.* recedit a nostro ob petalorum colorem, qui sub-aureantius dicitur, dum in nostra planta coccineus, at ipsius icon in reliquis convenit. A *P. rhoeadi* vero sola foliorum radicalium forma etiam primo intuitu dignoscitur, ob earum lacinias lanceolatas acutas, acuteque dentatas, non vero orbiculato-obovatas, obtusissimas: praeterea hirsutitas major, ac color intensius virens, non glaucescens.

6. *P. setigerum*. *Dec. syst. 2. p. 81* — *Ten. fl. nap. 4. p. 307* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 326*.

P. glaucum glabrum, caule paucifloro, foliis amplexicaulibus argute inciso-serratis lobatisque, serraturis setula terminatis, pedunculis adpresse vel patenter setosis, calycibus glabris, filamentis apice dilatatis, stigmatis radiis 4-6 invicem incumbentibus apice recurvis, capsulis obovato-conicis sessilibus, foraminulis apertis.

lc. Deless. ic. select. 2. t. 7.

In vineis, et in cultis arenosis undique provenit, tam in demissis quam in elatis, ubi vero minus frequens.

Martio, Majo. ☉

Folia in hoc ex viridi-glaucoscentia, tenuia, supra glabriuscula, subtus ad costam, et ad nervos hirsutiuscula, ad margines ciliata, obovato-oblonga, inodora; lobis raro horizontalibus, saepius vero sursum versis, ad apicem uti in dentibus setigeris: petala parva, vix 10—14 lin. longa, crenulato-undulata, pallide lilacina, basi atrocoeruleo-maculata: filamenta compressiuscula, germen aequantia, quoque atrocoerulea: antherae compressae, pedicellatae, in medio luteae, ad latera nigricantes: stigmatis radii 4-6, obtusi, rotundati, apice recurvi, ad latera invicem incumbentes, et surrecti!, ibique purpurascens, caeterum sordide virentes; lineis stigmatiferis furfuraceo-puberulis, atropurpureis: semina ovalia, exquisite reticulato-foveolata, immatura cinerea, demum fusca.

In *P. somnifero* folia magis glaucoscentia, firmiuscula, oblonga, glaberrima, Opium olentia; lobis horizontalibus vel recurvis! irregulariter crenatis, crenis non setigeris!: petala duplo majora: stigmatis radii 10-12, potentes, virentes, approximati, invicem incumbentes, ad margines non surrecti; lineis stigmatiferis obsolete puberulis, virentibus, sat raro atropurpureis: capsula globosa, pedicellata, duplo major: semina ovalia, exquisite foveolata-reticulata, fusco-cinerea, demum ut in praecedente nigra — Haec adnotare volui, nam quamvis species sint probe distinctae, et cultura plurium annorum in eodem loco immutatae permanserint, tamen a nonnullis adhuc simul confusae. Confer cl. Ten. et Bertol. l. c., et ic. Reich. cent. 14. f. 4481.

7. *P. OFFICINALE. Gmel. fl. Bad. 2. p. 479 — P. album. Hussenot. Cat. des pl. de la Lorraine. p. 38 — P. somniferum, c. Lin. sp. pl. 726 — Dec. syst. 2. p. 81, var. b.*

P. glaucum glabrum, caule elato multifloro, foliis oblongi sinuato-lobatis, lobis inciso-serratis, serraturis muticis, superioribus basi cordato-amplexicaulibus, calycibus glabris (petalis amplis candidis), filamentis superne dilatatis, radiis stigmatiferis 10-12 invicem distantibus ascendentibus (crassis), capsulis globosis pedicellatis, foraminibus oblitteratis (seminibus albis).

lc. Reich. cent. 14. f. 4482 — P. sativum, tertium. Dod. pempt. 445. f. 2 — Lob. ic. 772. f. 2.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Papagno de lo suonno*.

Habitus *P. somniferi*: *petala* irregulariter crenato-plicata; *capsulae* in hoc maximae, diametro fere 2-pollicari, aliquando apice subdepressae; se-
ptis a centro remotis, ut in icone *Reich.* optime exhibentur: *semina* sem-
per alba, uti *petala*, ad hilum viridula, fere reniformi-globosa, obsolete
reticulato-foveolata (non exquisite reticulato-foveolata, ut in *P. somnifero*).

Quamvis *Cl. Koch in syn. ed. 2. p. 32.*, aliique hoc varietatem esse putant
P. somniferi; tamen cultura plurium annorum contrarium demonstrat.
Occurrunt equidem, dum utraeque simul coluntur, plantae inter ipsas hy-
bridae, sed hoc nihil in contrarium probat, cum in speciebus recte di-
stinctis aliorum generum, et hoc quoque occurrat.

8. GLAUCIUM.

Tourn. inst. 254. t. 130 — *Gaertn. de fruct. 2. p. 165* —
Juss. gen. 236.

1. *G. FLAVUM.* *Crantz austr. 2. p. 141* — *Dec. pr. 1. p. 122* — *G. luteum, a. Ten. fl. nap. 4. p. 303* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 312* — *Chelidonium Glaucium. Lin. sp. pl. 724.*

1c. *G. luteum. Reich. cent. 14. f. 4468* — *Papaver corniculatum, flavo flore. Clus. hist. 2. p. 9. f. 1.*

In arenosis tam elatis, quam demissis; *da sotto S. Nicola alla marina*;
sat raro in collibus subargillosis occurrit.

Aprili, Octobri. ☿, et basi fere ♀

9. CHELIDONIUM.

Adans. fam. 2. p. 432 — *Gaert. de fruct. 2. p. 164* — *Juss. gen. 236.*

1. *C. MAJUS. Lin. sp. pl. 723* — *Ten. fl. nap. 4. p. 303* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 309.*

1c. *Reich. cent. 14. f. 4467* — *Fuchs. hist. 864, et 865.*

Ad sepes umbrosas; *siepi di Campagnano, di Pico, delle Starsa, di Barano, ne' margini delle selve del Vataliere, e lungo la strada della Molara presso la Cava delle Nocelle.*

Aprili, Junio. ☿

10. HYPECOUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 228.

4. *H. GLAUDESCENS. Guss. pl. rar. p. 79, et syn. 1. p. 204 — Ten. syll. p. 78 — Bertol. fl. ital. 2. p. 219.*

H. lomentis arcuatis compressis articulatis, petalis exterioribus dorso glabris oblongis angustis obsolete trilobis, interioribus tripartitis, lacinia centrali planiuscula ciliata, foliorum glaucescentium laciniiis obovato-cuneiformibus obtusis mucronulatis.

lc. Guss. pl. rar. 1. 15.

In arenosis maritimis; Forio nelle arene della marina di Montevergine presso i muri a secco degli orti sotto la chiesa presso al mare.

Aprili, Majo. ☉

Planta in hac Insula satis rara, et in hoc unico angusto spatio a me observata.

3. FUMARIACEAE. Dec.

11. FUMARIA.

Tourn. inst. p. 422. t. 237 — Gaertn. de fruct. 2. p. 162 — Endl. gen. n. 4848.

1. *F. LEUCANTHA. Viv. fl. Cors. sp. nov. diagn. p. 12 — Guss. syn. 2. p. 240 — F. parviflora. Ten. fl. nap. 2. p. 118, et Bertol. fl. ital. 2. p. 310, non Lam.*

F. glauca, caulibus erectis diffusisque ramosissimis, foliorum laciniiis tenuissimis linearibus sulcatis, racemis brevibus, pedicellis erectis bractea sublongioribus, sepalis (minimis) brevissimis ovatis orbiculatisque acutis subdenticulatis corolla subaequilatis brevioribusque (floribus minutis albis apice atrosanguineis), fructibus globosis rugulosis obtusis ad apicem obsolete foveolatis.

lc. F. minor, Foeniculi tortuosi folio, flore albo, macula rubente. Bocc. mus. p. 144. f. 102.

In apricis inter vineas, et in cultis praesertim subarenosis.

Martio, Majo. ☉

Foliorum laciniae vix 4 lin. latae, obtusae, convexae: racemi saepius 6-lineares, ad summum vix pollicem longi: pedicelli erecti, crassi, aliquando fere obovato-conici, pilis adpressis sparsis tecti: bractea

pedicellis aequilatae, illis adpressae, basi virentes, ad apicem albiae, ad carinam violaceae, oblongae, mucronulatae, et non raro 2-3-denticulatae: *sepala* facile decidua, irregulariter setaeo-serrata, raro sub-integra, albida, et sparse violaceo-lineata: *calcar* saccatum, obtusum: *petalum* superius et inferius ad apicem virentia; lateralibus ibi purpureo-maculata: *fructus* glaberrimi.

Flores duplo minores, quam in aliis specibus hujus Insulae—Icones *F. parviflorae*. Reich. cent. 14. f. 14451, et Babingt. in Trans. Bot. Soc. Edimb. an. 1810 p. 35, sepalis in margine a basi ad apicem undique denticulatis, ac fructibus apice breviter apiculatis a nostra recedunt; tamen in icone *F. parviflorae* Coss. et Germ. atl. fl. paris. t. 13. f. 15, et 16 sepalia similiter dentata, sed fructus minus acuminati exhibentur. Haec adnotare operae praetium duxi, ut Botanici denuo characteres specierum istarum intento animo perpendant; nam uti ipse Cl. Bertol. alio loco monet, in plantis affinis caute incedendum, ne una cum altera confundatur. Confer quae dixi in syn. l. c.

2. *F. OFFICINALIS*. Lin. sp. pl. 984 — Ten. fl. nap. 2. p. 117 — Bertol. fl. ital. 7. p. 310, excl. plur. syn.

In Reich. cent. 14. f. 4454 — Babingt. l. c. p. 32 — Coss. et Germ. atl. fl. Paris t. 7! — Fumaria. Fuchs. hist. 338.

b. densiflora; floribus paulo minoribus, dense approximatis.

c. inarimensis; floribus parvis anguste linearibus laxiuscule racemosis, foliorum superiorum laciniis angustis brevibus divaricatis.

In cultis, et in herbosis apricis ubique; sed var. *b.*, et *c.* satis rariae.

Januario, Majo. ☉

In omnibus varietatibus *fructus* semper transverse latiores, et apice bifoveolati, qui characteres solemnes in hac specie sunt, ut aliquando in sequente—In var. *b. bruceanae* oblongae, virentes, margine et apice albidoro-seae, mucronulatae, pedicello fructifero duplo breviores: *sepala* oblonga, acutiuscula, obsolete denticulata, corolla duplo breviora, illae aequilatae, non angustiora: *petala* rosea; inferius ac superius ad apicem in medio spadicea; duo lateralibus ibi atropurpureo-maculata—In var. *c.*, quae species videtur propria, et quoad habitum sequentem refert, *bracteae* concaviusculae, apice spatulato-mucronulatae, pedunculo fructifero duplo breviores: *sepala* ovali-oblonga, basi subcordata, corollae aequilata, illa 2-3-plo breviora, apice acutiuscula, vel obtusa cum acumine, margine irregulariter dentato-lacera: *petala* rosea, ad apicem intense rubentia.

3. *F. MEDIA*. Loisel. not. p. 101, et fl. gall. ed. 2. v. 2. p. 100 — Dec. pr. 1. p. 130 — Reich. fl. germ. 2. p. 697, et cent. 14 p. 1 — *F. officinalis*, *c.* Bertol. fl. ital. 7. p. 302, excl. syn. *F. Gasparrinii*, et *F. Vaillantii*.

F. viridi-glaucescens, foliorum segmentis tripartito-trifidis, laciniis subdivaricatis anguste lineari-cuneatis obtusiusculis, racemis demum folia superantibus, pedicellis erecto-patentibus recurvisque bractea lineari integerrima duplo longioribus, sepalis ovatis a basi ad apicem acute dentatis corolla latioribus illa duplo brevioribus, fructibus subglobosis vel transverse latioribus obtusis retusisve utrinque foveolatis obsolete rugulosis.

1c. *Reich. cent. 14. f. 4443*, optima—F. major, floribus dilute purpureis. *Vaill. bot. paris. t. 10 f. 4. a Lois.* citata, sed nostrae minime conveniens ob flores majores, et habitum.

In cultis; *Casamicciola nelle vigne, Lacco al Monte Vico presso alla Cassetta.*

Aprili, Junio. ☉

Caules graciles, elongati: *foliorum* lacinae vix lin. latae, invicem distantes, quod minime in praecedente, ut in icone *Reich.* optime exhibentur, et uti in plantis gallicis, *video: pedunculi* 2-3 pollicares in fructu, sub anthesi vix pollicem longi: *pedicelli* 2-3 lin. longi, apice crassiores, erecto-patentes, aliquando demum recurvi, *bracteis* persistentibus acutis albidis angustissimis duplo longiores: *flores* pallide rosei, tenues, uti in *F. serotina*: *sepala* albedo-scariosa, cito decidua: *calcar* ad collum vix constrictum: *fructus* antecedenti fere similes; cum qua tamen a plerisque inmerito associata, nec cum *F. Gasparrini Babign.* notatis characteribus confundenda; nam bractee pedicello semper duplo breviores, et fructus alieni sunt.

1d. F. CONFUSA. *Jord. pl. exsic. — Boiss. pugill. pl. nov. p. 6*, quoad plantam gallicam, excl. *syn. F. Petteri Guss. syn. 2. p. 239* (non *Reich*) — F. major. *Ten. (Vinc.) Bull. dell' Acc. degli Asp. nat. an. 1. p. 24*, quoad plantam prope Neapolim proveniente.

F. viridi-glaucescens, foliorum laciniis planis oblongo-cuneatis obtusiusculis, racemis laxiusculis demum folia superantibus, pedicellis erecto-patulis (non reflexis) bracteis oblongas lineares acutas subintegras duplo excedentibus, sepalis (parvis) orbiculato-ovatis a basi ad medium irregulariter denticulatis corolla subangustioribus eaque 3-4-plo brevioribus (floribus roseis apice maculatis), fructibus globosis obtusis! (non apiculatis) subrugulosis.

In *nostra t. II. f. 1. a. b. c.*

In herbosis cultis, praesertim humentibus nihil communius.

Novembri, Majo. ☉

Caules in nudis diffusi, sed sub florescentia surrecti, in herbosis erecti, sat raro petiolis scandentes, 1½-2-pedales, acute angulato-sulcati, basi saepe una cum foliis inferioribus rubentes: *petioli* supra exquisite sulcati, sub-

tus striato-angulati: *folia* bipinnatifida; segmentis obovato-cuneatis, tripartito-incisis; laciniis 1-1½ lin. latis: *pedunculi* 2-3-pollicares, a medio ad apicem laxiuscule floriferi: *pedicelli* fere ancipites, 2-3 lin longi, reflexos non vidi: *bractee* planiusculae, acuminatae, integrae, aut obsolete denticulatae, virentes, ad apicem demum recurvum albae: *flores* horizontales, inter affines majores, 4-5 lin. longi: *sepala* lin. 1-1½ longa, mucrone brevissimo terminata, dorso virentia, caeterum rosea, non uti in aliis cito decidua: *petalum* superius roseum, apice obtusiusculum, supra medium in dorso viridi-carinatum, lateribus reflexum; basi terminatum calcare concolore, rotundato compresso ad collum vix constricto, pedicello 3-plo latiore, petalis 4-plo brevioribus, glandulam oblongam nitide virentem scabram includente; *duo lateralia* lineari-spathulata, obtusa, apice extus carinata, ibique invicem coalita, atrosanguineo-maculata, caeterum rosea; *inferius* reliquis paullo longius, et ab illis subremotum, anguste lineare, obtusum, versus apicem viridi carinatum ac fere cochleariforme, pallide roseum: *fructus* neque apiculatus, neque foveolatus, sed aliquando apice bimaculatus.

Summa affinitas cum *F. agraria*, ita ut nisi specimina inter se conferantur, facile una cum altera commutatur: tamen, ut de reliquis sileam, in *F. agraria* pedicelli saepius strictiores, fructus grandiores, nam semel majores, immaturi apiculati, jam perfecti vero saepius obtusi. Ideo comparationis causa in ipsa nostra *tab. II. f. 2.* iconem hujus speciei tradidi, siquidem illa *Cl. Reich. cent. 14. f. 4455* medio-cris est.

5. *F. SEROTINA*. *Guss.*—*F. Petteri*. *Guss. syn. 2. p. 239!*, non *Reich.*—*F. serotina*. *Gus.* in *Parlat. Giorn. bot. ital. 1. p. 150.* et in *Walp. rep. 5. p. 30* sub *F. capreolata* var. *c.!*; nec non *F. officinalis, c. Bertol. fl. ital. 7. p. 302*, quoad plantam *F. serotinae* nomine a me missam ex *Portici!*—*F. Gussonii*. *Boiss. pug. pl. nov. p. 6*, quoad synonym. *F. Petteri* meae, quae diversa a *F. confusa* *Jord.*

F. caule foliorum superiorum petiolis subscedente, foliis bipinnatifidis, segmentis palmato-partitis, laciniis oblongo cuneatis obtusis, racemo laxiusculo, pedicellis fructiferis gracilibus erecto-patulis recurvatisque bracteis spathulatas acutas excedentibus, sepalis ovatis ovalibusque irregulariter serratis corolla aequilatis eaque duplo brevioribus (floribus anguste linearibus), fructibus globosis rugulosis ad apicem utrinque foveola notatis brevissime apiculatis obtusisque.

1c. *nostra t. III.*

In cultis ubique, praecipue in herbosis.

Aprili, Augusto ☉

Habitus totius plantae glaberrimus, tenerus, ac laete virens: *folia* inferiora

fere flabelliformia; caulina aliquando fere triternata; omnium laciniis planis, 1½—2 lin. latis, integerrimis, aliquando divaricatis: *pedunculi* 2-3-pollicares, foliis longiores: *pedicelli* graciles, 2-3 lin. longi, saepe in fructu recurvi, aut erecto-patentes, aliquando apice crassiores: *bracteae* albo-scariosae, dorso virentes, concavae, subtus carinatae, interdum a medio ad apicem serrulatae: *sepala* concava, acuminata, sat raro usque ad apicem serrata, dorso virentia, caeterum alba, nec cito decidua: *racemi* fructiferi folia excedentes: *flores* albidi vel pallide rosci, laxiuscule racemosi, ita angusti, ut fere dimidium illorum sequentis aequant: *petala* apice conniventia; inferius, quod longius, et superius ad apicem virentia; duo lateralia breviora, ad apicem vero viridi aut nigro-maculata: *calcar* obtusum, vix saccatum, ejus collo constricto curvo ac subelongato: *fructus* glaberrimus.

6. F. FLABELLATA. *Gasparr. in Rendic. dell' Acc. delle sc. di Nap. v. 1. p. 51—Bertol. fl. ital. 7. p. 308*, et *F. capreolata, b. Walp. rep. 5. p. 30*, excl. ab utrisque syn. *F. alexandrinae*.

F. caule petiolis cirrhescentibus scandente, foliis subbipinnatifidis, segmentis obovatis cuneatis multifido-partitis flabellatis, laciniis oblongo-linearibus cuneatis acutis, racemo densiusculo demum laxo, pedicellis fructiferis (gracilibus) recurvatis bracteae (tunc) duplo longioribus, sepalis ovalibus dentato-serratis corollae aequilatis eaque duplo brevioribus, calcare parabolico, fructibus globosis rugulosis ad apicem utrinque foveola notatis obtusis.

- 1c. *F. capreolata. Babing. in trans. Bot. Soc. Edim. 1840 p. 34*, quoad sepala et calcar.

b. floribus albidis-roseis.

Ad sepes, et in sylvaticis herbosis, vel in cultis pinguibus: *Bagno, Casamicciola, Lacco, Forio*: var. *b. Bagno*.

Octobri, Majo. ☉

Pedunculi demum arcuato-reflexi, glabri, bracteis longiores: *bracteae* oblongae, virentes, ad latera et apicem albidae, acutae, aliquando ad apicem irregulariter 2-3-denticulatae: *sepala* corolla parum angustiora, eaque 2-4-plo breviora, aliquando altero latere integra, vel basi tantum 1-dentata; altero latere a basi ad medium paucidentata, denticulis basim versus longioribus: *petala* candida; inferius lineari-spathulatum, a reliquis remotum, ad apicem viridulum; superius, et duo lateralia apice atrosanguinea, vel nigricantia: *calcar* ad collum non constrictum, ut in praecedente, obtusum: *fructus* rugulosi, quo praesertim caractere a sequente discriminatur, semper obtusi, nec apiculati.

7. F. CAPREOLATA. *Lin. sp. pl. 984—Ten. fl. nap. 2. p. 117—Bertol. fl. ital. 7. p. 306*.

F. caule petiolis cirrhescentibus scandente, foliorum segmentis obovatis inciso-palmatis, laciniis oblongis ovalibusque cuneatis obtusisque, racemo denso evoluto laxiusculo, pedicellis fructiferis recurvis bractea subduplo longioribus, sepatis ovato-orbiculatis breviter acuminatis integris vel basi subdentato-serratis corolla subduplo brevioribus eaque latioribus, calcare brevi ampliato subgloboso, fructibus levibus globosis obtusis ad apicem foveola utrinque notatis.

lc. *Dec. ic. pl. Gall. rar t. 34, et Reich. cent. 14. f. 4456*, sed fructus omnes erecti in utrisque—*Cass., et Germ. atl. fl. paris. t. 3. f. 11, 12.*

Ad sepes herbosas, in fruticetis apricis, et in cultis pinguibus.

Januario, Majo. ☉

Sepala ovato-orbiculata, corolla fere latiora, integra aut basi subdentata: *petala* candida; inferius apice virescens; superius et lateralia apice atrosanguinea: *fructus* non rugulosi — Pedicelli fructiferi in hac et in precedente semper recurvi.

4. CRUCIFERAE. *Juss.*

12. RAPHANUS.

Lin. gen. plen. ed. Schereb. n. 1098.

1. R. FUGAX. *Presl. fl. sic. 1. p. 109 — Ten. fl. nap. 5. p. 46.*

R. fructibus longitudinaliter 4-ocularibus sub-articulatis obsolete striatis 2-6-spermis, articulis non secedentibus, stylo articulo ultimo longiore, calycibus glabriusculis, foliis hispidulis simpliciter lyratis, caulinis supremis lanceolatis.

lc. Raphanistrum Brassicae sylvestris foliis minoribus, flore candido. *Bon. t. 12.*

In cultis; nelle vigne sul piano del monte Tripiti presso alla Casetta. Aprili, Majo. ☉

2. R. SATIVUS. *Lin. sp. pl. p. 935.*

lc. *Lam. ill. gen. t. 566 — Raphanus, sive radícula sativa. Dod. pempt. 676.*

Colitur, et nunc in nonnullis locis fere spontaneus.

Martio, Majo. ☉

Vulgo *Rafaniella*.

Sequentes varietates coluntur:

1. Radice subrotunda, vel ovato-oblonga in caudam attenuata.

a. rubra.

Rafanielli tondi rossi.

- b. alba. []
Rafanielli tondi bianchi.
2. Radice longa cylindracea.
 a. rubra.
Rafanielli lunghi rossi.
 b. alba.
Rafanielli lunghi bianchi.
3. *Napiformis.* Gasp.; radice globoso-conica, magna, alba.
Rapesta.
3. R. LANDRA. Moretti in *Dec. syst.* 2. p. 668 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 46 — *Bertol. fl. ital.* 7. p. 179.
 b. floribus luteis.
 Ic. *Deless. ic. select.* 2. t. 94 — *Poll. fl. ver.* 3 t. 4 — *Reich. cent.* 12. fol. 4173.
 In vineis, et inter segetes passim.
 Februario ad Julium. ☉, et ♂
 Vulgo *Radice selvaggia*, et inter olera locum habet.
Flores omnino lutei: fructus ut plurimum bilocellati; articulis strangula-subglobosis, et nonnisi bene exsiccatis substriatis; stylo semper elongato.
 — Non est certe varietas *R. sativi* uti cl. Koch in *syn. ed.* 2. p. 1019 suspicatur. Confer quae dixi in *syn.* 2. p. 140.

13. CAKILE.

Tourn. inat. p. 49 — *Gaert. de fruct.* 2. p. 281.

1. C. MARITIMA. Scop. carn. ed. 2. vol. 2. p. 35 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 70 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 603 — *Bunias Cakile.* *Lin. sp. pl.* 236.
 Ic. *Reich. cent.* 12. f. 4188 — *Cakile quibusdam.* *Bauh. hist.* 2. p. 867.
 b. *sinuatifolia*; foliis non pinnatis, sed subsinuatis indivisisque crenatis.
 C. *latifolia.* *Bertol. fl. ital.* 6. p. 615.
 Ic. C. sive *Eruca marina.* *Bauh. hist.* 2. p. 868.
 In arenosis maritimis ubique; var. *b. marina* di S. Angelo, *Forio a Citarata.*
 Martio, Junio. ☉
 Varietatem b. a specie dirimere non ausus sum, siquidem in loco natali ab una ad alteram transitus observatur.

14. BUNIAS.

Brown. in H. Kew. ed. 2. v. 4. p. 75.

1. B. ERUCAGO. *Lin. sp. pl. 935 — Ten. fl. nap. 2. p. 68 — Bertol. fl. ital. 6. p. 617, excl. nonn. syn.*
lc. Reich. cent. 12. f. 4159.
 In apricis asperis, vel in herbosis obvia.
 Martio, Majo. ☉
2. B. ASPERA. *Retz. obs. 2. p. 21 — Ten. fl. nap. 2. p. 69.*
b. cristata. Dec. syst. nat. 2. p. 672.
lc. Reich. cent. 12. f. 4160.
 Inter segetes in elatis; *seminati da Fontana al monte Vetta, ed al Jetto.*
 Aprili, Majo. ☉
 Præcedenti proxima, ac ad illam relata a Cl. Bertol. in *fl. ital. 6. p. 617*,
 a qua non tam foliorum incisura, quae equidem variabilis est, quam silicularum cristis latioribus ac incisus diversa.

15. RAPISTRUM.

Dec. syst. nat. 2. p. 430, et pr. 1. p. 227.

1. R. ORIENTALE. *Dec. syst. 2. p. 433 — Ten. fl. nap. 5. p. 45 — Bertol. fl. ital. 6. p. 606.*
lc. Sibth. fl. gr. 1. 612.
 In cultis argillosis ab elatis ad demissa; *seminati di Monte Vetta, del Jetto, di Fontana, della piana de' Muori, Cava di Buceto, Casamicciola nel vollone de' Bagni, Bagno nella strada presso al Lago.*
 Majo, Septembri. ☉, et ♂

16. NESLIA.

Desv. journ. bot. 3. p. 162, et 163 — Dec. syst. nat. 2. p. 519,
et pr. 1. p. 202.

1. N. PANICULATA. *Desv. Journ. de Bot. 3. p. 163 — Bertol. fl. ital. 6. p. 592 — Rapistrum paniculatum. Ten. fl. nap. 2. p. 68 — Myagrum paniculatum. Lin. sp. pl. 894.*
lc. Reich. cent. 12. f. 4291 — Myagro similis, siliqua rotunda. Bauh. pr. p. 51.

Inter segetes in campis elatis marnaceis ; seminati da Fontana a Monte Vetta al Jetto, ed in quelli di Monte Vesza.

Aprili, Majo. ☉

17. CAPSELLA.

Medikus in Dec. syst. nat. 2. p. 383.

1. C. BURSAPASTORIS. *Dec. syst. nat. 2. p. 383—Bertol. fl. ital. 6. p. 533 —*

Tblaspi Bursapastoris. *Lin. sp. pl. 903 — Ten. fl. nap. 5. p. 54.*

1c. *Reich. cent. 12. f. 4229 — Bursa-pastoris. Muth. com 1. p. 521.*

b. *brachycarpa* ; siliculis abbreviatis obcordato-cuneatis, diametro transversali longitudinalem subaequante, floribus viridulis.

In cultis, et ad vias ubique ; var. b. magis rara.

Martio, Octobri. ☉

In var. b. *siliculae* duplo breviores, basi breviter non longe cuneatae, ut in a, et flores minores.

18. LEPIDIUM.

Brown. in H. Kew. ed. 2. v. 4. p. 85.

1. L. GRAMINIFOLIUM. *Lin. sp. pl. 900 — Ten. fl. nap. 5. p. 51 — Bertol. fl. ital. 6. p. 582.*

1c. *Reich. cent. 12. f. 4218 — Iberis. Bauh. hist. 2. p. 918.*

In ruderatis, et ad vias passim.

Martio, Octobri. ☉, et basi fere ♀

Sepala concava, virentia, obtusissima, ad apicem atropurpurea: *petala* candida, obovato-cuneata, obtusissima, parva, calycem parum excedentia, stamina sex aequilonga aequantia: *filamenta* candida; *antheris* luteis: *ovarium* virescens, oblongum, inde fere conicum; *stigmatibus* sessilibus, plano, in apice depresso, inde fere capitato: *silicula* ovata, acutiuscula, utrinque turgida, subcordata, stylo brevissimo terminata: *semina* ovalia rufescentia.

19. DRABA.

Spr. s. veg. 2. p. 847.

1. D. VERNA. *Lin. sp. pl. 896.*

b. *praecox* ; siliculis brevibus orbiculato-ellipticis, pedicellum subaequantibus. *Bertol. fl. ital. 5. p. 470—D. praecox. Ten. fl. nap. 4. in syll. p. 90 — Erophila praecox. Dec. syst. nat. 2. p. 357.*

Ic. Reich. cent. 12. f. 4233 — *Paronychia vulgaris*. Dod. pempt. 112.
 In apricis herbosis passim; Chiajano, da S. Nicola all' Arso verso la som-
 mità del cratero; et ad muros. Bagno, Campagnano.
 Februario, Martio. ☉

20. KONIGA.

Brown. in Clapp. narr. 214. Endl. gen. n. 4870:

1. K. MARITIMA. Smith. fl. gr. 7. p. 19 — Bertol. fl. ital. b. p. 481 — Lobu-
 laria maritima. Desv. journ. de Bot. 3. p. 162 — Alyssum maritimum.
 Ten. fl. nap. 2. p. 71 — *Clypeola maritima*. Lin. sp. pl. 910.
 Ic. Reich. cent. 12. f. 4266 — *Thlaspi Leucoji folio aucuminato*. Bocc.
 mus. t. 130.
 In apricis pascuis, ad muros, ad rupes, ac in tectis ubique.
 Floret per totum annum. ☽
 Flores albi, mellem olentes.

21. CARDAMINE.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1088.

1. C. HIRSUTA. Lin. sp. pl. 915 — Bertol. fl. ital. 7. p. 23 — Ten. fl. nap. 2.
 p. 83, b. minor.
 Ic. Reich. cent. 12. f. 4304. — *C. sylvestris*, minor, italica. Barr. ic. 455.
 In humentibus umbrosis, ad muros, ad rupes, ad sepes in muscosis
 passim.
 Februario, Aprili. ☉

22. ARABIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1094.

1. A. HIRSUTA. Scop. carn. ed. 2. v. 2. p. 30 — Ten. fl. nap. 5. p. 69
 — Bertol. fl. ital. 7. p. 124 — *Turritis hirsuta*. Lin. sp. pl. 930.
 Ic. Reich. cent. 12. f. 4343 — *Turritis minor*. Zannich. hist. t. 170.
 In sylvaticis, et ad muros in umbrosis; Campagnano, Pico, Barano, Fon-
 tana, Serrano, Calimera, Panza, alle Falanghe, alla Pera, a Catreca,
 Casamicciola, Lacco superiore.
 Aprili, Majo, ☽ et ♃.
 Flores parvi albi.
 2. A. TURRITA. Lin. sp. pl. 930 — Ten. fl. nap. 5. p. 70 — Bertol. fl.
 ital. 7. p. 133.

lc. *Reich. cent. 12. f. 4345.* — *Turritis major* Plateau. *Clus. hist. 2. p. 126* — *Brassica sylvestris*, albido flore, nutante siliqua. *Barr. ic. 353.*

In sylvaticis, ad sepes, et ad rupes umbrasas; *Monte Vezza, Campagnana, selve del Testaccio, Pica, Barana, Fantana, Calimera, Falanghe, al Fasano, a Catreca, Casamicciola, Panza.*

Martio, Majo. ♂, vel ♀

Flores parvi, luteoli.

Vulgo *Zecchetella*.

23. MATTHIOLA.

Brown. in H. Kew. ed. 2. v. 4. p. 119. (non Lin.)

1. *M. RUPESTRIS.* *Dec. syst. nat. 2. s. p. 74.* — *Ten. fl. nap. 5. p. 65* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 100* — *Hesperis rupestris.* *Raf. spec. delle sc. n. 2. p. 46.*

M. siliquis subcylindricis tomentosis eglandulosis, valvis nervo elevato notatis, stigmatibus obtusis incrassatis (dorso saepe breviter cornigeris), foliis lanceolatis utrinque acutiusculis subintegrissimis incano-virentibus cauleque erecto ramoso basi suffruticoso subtomentosis.

lc. *Leucojum sylvestre, incanum, flore in purpureo coeruleo.* *Cvp. panph. 2. t. 6.*

Ad rupes maritimas passim, nec non ai scogli di *S. Anna presso Ischia.*

Februario, Aprili. ♀

Vulgo *Viola marina.*

Folia in planta inarimensi magis canescentia, et infima obtusiora quam in plantis siculis.

2. *M. INCANA.* *Dec. syst. nat. 2. p. 168* — *Bertol. fl. pl. 7. p. 98* — *Cheiranthus incanus.* *Lin. sp. ph. 924.*

lc. *Reich. cent. 12. f. 4354* — *Viola alba, et purpurea.* *Lob. ic. 329.*

Ad muros prope oppidos; *Casamicciola, Lacca*; ubi varietas floribus albis quoque occurrit; sed videtur ex hortis egressa.

Februario, Aprili. ♀

Summa cum praeecedente affinitas, a qua foliis glabrioribus, et silicarum valvis nervo elevato destitutis potissimum diversa.

3. *M. SINUATA.* *Dec. syst. nat. 2. p. 267* — *Ten. fl. nap. 5. p. 65, b. glabrata* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 101* — *Cheiranthus sinuatus.* *Lin. sp. pl. 926.*

lc. *Reich. cent. 12. f. 4350* — *Leucojum maritimum, minus.* *Clus. hist. t. p. 298.*

In arenosis maritimis; *arene dell'Arso, marinella del Bagno, Fovio alla marina di Montevergine e di Citara, Lacca alla marina di S. Montana, marina di S. Angelo*, sed satis rara.

Junio, Augusto. ☽

4. *M. TRICUSPIDATA*. *Dec. syst. nat. 2. p. 173* — *Ten. fl. nap. 5. p. 66*
— *Bertol. fl. ital. 7. p. 102* — *Cheiranthus tricuspidatus. Lin. sp. pl. 926.*
1c. *Sibth. fl. gr. t. 639* — *Leucojum crucigerum. Camer. hort. t. 24.*
In arenosis maritimis; *marinella del Bagno, marina da Succellaro a S. Angelo, in quella di Cùara e di Montevergine a Forio, e di S. Montano al Lacco.*

Martio, Junio. ☉

In arenosis maritimis calidioribus, uti a *S. Angelo*, caules ad basin fere fruticulosi aliquando evadunt.

24. BARBAREA.

Brown. in H. Kew. ed. 2. v. 4. p. 109.

1. *B. PRAECOX*. *Brown. in Dec. syst. nat. 2. p. 205* — *Ten. fl. nap. 5. p. 63.*
— *Bertol. fl. ital. 7. p. 79* — *Erysimum praecox. Willd. sp. pl. 3. p. 510.*
1c. *Reich. cent. 12. f. 4358* — *B. foemina. Tabern. ic. 452.*
b. *inarimensis*; floribus minoribus pallidioribus, pedicellis siliqua angustioribus.

In humentibus calcareo-argillosis elatis; *Barano, Serrano, Cavone delle Rose in alto, Valle di Canniani, Pietra Sparaina, da Fontana a Monte Vetta ed a S. Nicola, ne' siti aperti delle selve dell' Ulicella, di Cutrecca, delle Falanghe, e del Fasano.*

Aprili, Majo. ☉

Flores parvi, lutei, senescendo pallidiores; petalis arrectis, integris, non facile ut in aliis deciduis: siliquae jam perfectae 2 vel 2 1/2 pollices longae, crassae, strictae, rectissimae. Differt ab icone a Reich. citata siliquis magis arrectis, pedicellis siliqua angustioribus, non illa aequalibus; stylo parum brevior.

25. ALLIARIA.

Adans. fam. nat. 2. p. 418 — *Dec. syst. nat. 2. p. 488.*

1. *A. OFFICINALIS*. *Dec. syst. nat. 2. p. 489* — *Erysimum Alliaria. Lin. sp. pl. 922* — *Ten. fl. nap. 5. p. 62* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 90.*
1c. *Reich. cent. 12. f. 4379* — *Alliaria. Fuchs. hist. p. 104.*

In sylvis, et ad sepes; *Chianjano, Fontana, Barano, Campagnano a Cauturo, selve delle Falanghe, del Fasano, di Cutrecca, e delle Pera sopra Cusumicciola, e presso questo paese nelle vigne sotto le Croci.*

Martio, Aprili. ☉

26. MALCOLMIA.

Brown. in. H. Kew. ed. 2. v. 4. p. 121.

1. *M. PARVIFLORA. Dec. syst. nat. 2. p. 442 — Ten. fl. nap. 5. p. 66 — Bertol. fl. ital. 7. p. 111.*
 Ic. *Hesperis parviflora. Dec. pl. gall. rar. p. 11. t. 35. — Loisel. fl. gall. ed. 2. v. 2. t. 11.*
 In arenosis maritimis; *Ischia nelle arene dell' Arso sotto alla Chiesa del Purgatorio, marinella del Bagno, e di S. Angelo.*
 Martio, Aprili. ☉

27. SISYMBRIUM.

All. ped. 1. p. 274 — Dec. pr. 1. p. 190.

1. *S. OFFICINALE. Dec. syst. nat. 2. p. 459 — Ten. fl. nap. 5. p. 60 — Bertol. fl. ital. 7. p. 54 — Erysimum officinale. Lin. sp. pl. 922.*
 Ic. *Reich. cent. 12. f. 440f — Erysimum primum. Tabern. ic. 448.*
b. lejocarpum, siliquis glabris.
 In ruderalis, ad vias, et ad muros, ubique utraeque varietates, sed var. *b. magis rara.*
 Martio, Junio. ♂
2. *S. POLYCERATION. Lin. sp. pl. 918 — Ten. fl. nap. 5. p. 60 — Bertol. fl. ital. 7. p. 53.*
 Ic. *Reich. cent. 12. f. 440g — Irio alter. Matth. comm. 1. p. 524.*
 Ad muros, et in ruderalis.
 Junio, Julio. ☉
3. *S. THALIANUM. Gay. et Monn. ann. des scienc. nat. prem. ser. v. 7. p. 383 — Bertol. fl. ital. 1. 7. p. 48 — Arabis Thaliana. Lin. sp. pl. 929 — Ten. fl. nap. 3. p. 70.*
 Ic. *Conringia Thaliana. Reich. cent. 12. f. 4380 — Draba angustifolia, minima et media. Barr. ic. 269.*
 In sylvaticis apricis, in asperis, et ad muros passim.
 Martio, Majo. ☉

28. DIPLTAXIS.

Dec. syst. nat. 2. p. 628, et pr. 1. p. 221.

1. *D. TENUIFOLIA. Dec. syst. nat. 2. p. 632, excl. syn. Lag. — Ten. fl. nap.*

5. p. 73 — Bertol. fl. ital. 7. p. 76, excl. var. c. — *Sisymbrium tenuifolium*. Lin. sp. pl. 917.

lc. Reich. cent. 12. f. 4420 — *Eruca sativa*. Fuchs. hist. p. 262.

Ad muros, et in argilloso-calcareis; Fontana, Forio, Lacco, Casamicciola, Bagno, Costa di S. Pancrazio, e del Pignatiello, di Campagnano, fra S. Angelo e Soccivo.

Floret per totum annum. ♀

Vulgo *Arucola di Montagna*, et inter acetaria locum habet.

2. D. VIMINEA. Dec. l. c. p. 635 — Ten. fl. nap. 5. p. 72 — Bertol. fl. ital. 7. p. 74 — *Sisymbrium vimineum*. Lin. sp. pl. 919.

lc. Reich. cent. 12. f. 4416 — *Eruca sicula*, Bursae pastoris folio. Bocc. sic. p. 19. t. 10.

In cultis argilloso-calcareis; Chianole dal Testaccio, Monte Vetta alle petrelle.

Septembri, Octobri. ☉

29. BRASSICA.

Dec. syst. nat. 2. p. 582.

1. B. FRUTICULOSA. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 2. p. 7 — Ten. fl. nap. 5. p. 74 — Bertol. fl. ital. 7. p. 160 — *Sinapis radicata*. Desf. atl. 2. p. 98.

lc. Cyr l. c. t. 1 — Desf. l. c. t. 167.

In apricis, ad muros, vel ad maceries ubique.

Floret per totum annum. ♀, et basi fere ♀

Vulgo *Rapiciolla*, et oleo cocta, ac saepe leguminum seminibus mixta pasium comeditur et expetitur.

2. B. INCANA. Ten. fl. nap. 5. p. 74 — Bertol. fl. ital. 7. p. 150.

B. frutescens, caule basi suffruticoso, foliis subtus dense villosis-incanis supra villosis, radicalibus lyratis, lobo terminali sinuato-dentato, caulinis sinuato-erosis auriculatis utrinque glabratis, siliquis semipatentibus compresso-teretibus (3-4-pollicaribus) glabris, stylo crassiusculo sub conico acuto subaspermo terminatis.

lc. Ten. l. c. t. 165.

b. *inariamensis*; foliis crassioribus magis glaucis, subtus fere glabratis, floribus majoribus.

In rupibus maritimis, vel elatis: var. a. *Ischia sotto al castello, negli scogli di S. Anna presso la Città, Campagnano, Lacco al Monte Vico, Barano*: var. b. *sotto S. Nicola al S. ed al N.; e nelle rupi delle Falanghe, ed in quelle sopra Panza.*

Martio, Majo. ♀

Vulgo *Cavolo o Vruoccolo selvaggio*.

Caules glabrati, firmi, basi caespitosi; floriferi 3-5-pedales, erecti: *racemorum* axis glaberrimus, uti *pedunculi*, qui filiformes, sparsi, erecto-patentes, 6. lineares: *sepala* lineari-oblonga, concava, basi carinata, sub apice obtuso fornicato externe obtuse calcarata, *petalis* luteis subundulatis obtusissimis duplo breviora: *filamenta* teretia, albida: *stylus* albidus, apice vire-scens; *stigma*te globoso: *siliquarum* rostrum 4-3-lineare, subsulcatum; valvis exquisite nervosis, nervis anastomosantibus: *semina* globosa, levia, ex albido-rufescentia.

Var. *b.* quoad habitum *B. rupestris* Raf. similis, sed siliquae omnino diversae — In hujus Insulae rupibus caules basi caespitosi et lignosi per plures annos durant, quamvis biennes in plantis prope Neapolim provenientibus notet Cl. Ten. l. c.—*Folia* cocta hyemali tempestate suis dari solent.

3. B. OLERACEA. Lin. sp. pl. 932.

1c. *B. sylvestris*. Dod. pemp. 626.

Colitur.

Martio, Aprili. ♀

Sequentes varietates coluntur:

1. *Acephala*; caule elongato, racemis paniculatis, foliis expansis, lobo terminali amplissimo planiusculo. Gasp.

Broccolo nero.

- a. floribus albescentibus.

Broccolo bianco.

- b. floribus luteis.

Broccolo del Vomero.

- c. *lingulata*; foliis parvis pinnatifido-sinuatis, lobo terminali oblongo-lanceolato. Gasp.

Broccolo a spadella.

2. *Bullata*; caule abbreviato; foliis junioribus subcapitatis bullatis vel crispatis, racemis paniculatis. Gasp.

Cavolo verzo.

3. *Capitata*; caule abbreviato, foliis concavis non bullatis in capitulum congestis, racemis paniculatis — Variat capitulo sphaerico vel depresso, foliis exterioribus viridibus, interioribus pallidis vel albis. Gasp.

Cavolo cappuccio.

4. *Caulo-rapa*; caule ad foliorum insertionem tumido subgloboso, carnoso. Gasp.

- a. foliis planiusculis.

Torzelle piane.

- b. foliis fimbriato-crispis.

Torzelle ricce.

3. *Botrytis*; racemis pedunculisque carnosis abbreviatis congestis corymbosis, floribus plerumque abortivis. *Gasp.*
a. alba.
Cavolo fiore bianco.
 Varietas violacea raro in insula colitur.
4. B. RAPA. *Lin. sp. pl. 931.*
lc. Mart. fl. rust. t. 45-50.
 Colitur.
 Martio, Aprili. ☉
 Vulgo *Rapa.*
 Sequentes varietates coluntur.
1. Radice tumida, carnosa, globoso-depressa, interdum ex basi ovata suboblunga. *Gasp.*
a. alba.
Rapa bianca.
b. rubra.
Rapa rossa.
5. B. NAPUS. *Lin. sp. pl. 931.*
lc. Schrank, H. mon. 3. t. 218, ex Dec.
b. radice exili fibrosa. Gasp.
 Passim colitur.
 Februario, Aprili. ☉
 Vulgo *Broccoli di rapa.*

30. ERUCA.

Tourn. inst. p. 227 — Dec. syst. nat. 2. p. 636.

1. *E. SATIVA. Lam. fl. fr. 2. p. 426 — Brassica Eruca. Lin. sp. pl. 932.*
lc. Reich. cent. 12. f. 4421 — Sinapi alterum genus. Fuchs. hist. 539.
 Passim colitur tam culinario usu, quam pro agris saginandis.
 Februario, Aprili. ☉
 Vulgo *Arucola.*

31. SINAPIS.

Lin. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1097.

1. S. NIGRA. *Lin. sp. pl. 933 — Ten. fl. nap. 3. p. 73 — Bertol. fl. ital. 7. p. 166.*
lc. Reich. cent. 12. f. 4427 — S. sativum, prius. Dod. pempt. 706.
 In cultis ad agrorum margines passim.

Februario, Martio. ☉, raro ♂

Vulgo *Senacoli*, et usui oeconomico ac culinario colitur.

2. *S. INCANA*. *Lin. sp. pl.* 934—*Ten. fl. nap.* 5. p. 75 — *Bertol. fl. ital.* 7. p. 166.

Ic. *Reich. cent.* 12. f. 4423—*Erysimum* foliis subincanis, siliquis brevissimis. *Herm. Par. Bat.* p. 155. t. 39.

- b. *heterophylla*; foliorum lobis acutioribus—*S. heterophylla*. *Guss. pr. fl. sic.* 2. p. 293—*Ten. fl. nap.* 5. p. 76.

Ic. nulla.

In cultis subargillosis; ne campi coltivati dal M. Vetta a S. Nicola, di Fontana, di Calimera, e della Bocca della Serra, marina de' Maronti, Forio a Citara, ed alle fumarole nella Contrada del Bellomo; var. b. in elatis dal Monte vetta a S. Nicola magis obvia.

Aprili Julio. ☉, et ♂

Quant plurimis vivis speciminibus inspectis in loco natali certus factus sum varietatem b. ab a. uti speciem non esse disjungendam. Confer quoque cl. *Ten. l. c.*

5. CAPPARIDEAE.

32. CAPPARIS.

Lin. Gen. pl. ed. Schreb. n. 876.

1. *C. RUPESTRIS*. *Sibth. et Smith. fl. gr. pr.* 1 p. 355—*Ten. fl. nap.* 4. p. 302 — *Bertol. fl. ital.* 5. p. 302.

Ic. *Reich. cent.* 14. f. 4488.

In rupibus maritimis, vel mari proximis; Ischia sotto al Castello, Bagno sopra i muri, Pico, Campagnano, Lacco al Monte Vico, Forio a S. Francesco, ed a Zale, Punta di S. Angelo, ec.

Majo, Septembri. ♀

Vulgo *Chiappariello*; et non frequenter alabastra colligunt sale et aceto condienda pro obsoniis.

Etiam in hac insula, uti in Sicilia, aliquando trunci fere 2-pedales, diametro 2-pollicari.

6. RESEDACEAE.

33. RESEDA.

Endl. gen. n. 5011.

1. *R. CRISPATA*. Link. en. alt. 2. p. 8—Ten. fl. nap. 4. p. 256—Bertol. fl. ital. 5. p. 26.

R. glaberrima, caule erecto simplici vel ramoso, foliis lanceolato-linearibus repando-undulatis integris basi tenuè biglandulosis, petalo superiore calycem 3-plo excedente, capsulis transverse verrucosis, dentibus tribus introflexis incrassatis obtusis.

lc. nulla.

In aridis; strada sulla costa meridionale del Cratere del Vataliere, e dal Vataliere al Testaccio presso al trivio; discesa dal monte Vezza al sud verso la costa di Succellaro, Monte Trippiti presso la cascata, Monte Vetta alle petrelle.

Aprili, Majo. ☉

Folia intensius virentia, et crassiora quam in sequente, margine undulata, una cum bracteis ad basim utrinque glandula nitida conica acuta dentiformi glaberrima instructa: bracteae pedunculis triplo longiores, anguste lineares, acutae: calycis lacinae oblongo-lineares, convexae, obtusiusculae; petala alba, duo lateralia tripartita; laciniis omnibus cuneatis, obtusis: superius duplo latius, obovato-cuneatum, varie incisum: semina ovalia, nitidissima, nigra.

2. *R. LUTEOLA*. Lin. sp. pl. 643—Ten. fl. nap. 5. p. 256—Bertol. fl. ital. 5. p. 24.

lc. Reich. cent. 12. f. 4442 — Lutum herba. Dod. pempt. 80.

In arenoso-marneis campis elatis numè spontanea, sed ex cultis egressa, fra Fontana e S. Nicola.

Aprili, Majo. ☉

Volgo appellatur *Erva tenta*; et usu economico colitur.

Folia non undulata, basi utrinque vel altero latere 1-dentata, denticulo fere setaceo: calycis lacinae duae superiores majores: petalum superius 4-5-linearè laciniatum; lateralia 1-3-fida, omnibus albidis: capsula obovata, truncata, depressa, trimucronata: semina globosa, non nitida, fusca.

3. *R. LUTEA*. Lin. pl. 645 — Ten. fl. nap. 4. p. 256 — Bertol. fl. ital. 5. p. 26, excl. syn. *R. mucronulatae*.

lc. Reich. cent. 12. f. 4446 — Daleth. hist. 1199.

b. foliorum laciniis angustis crispulis et magis denticulatis.

lc. nulla.

In aridis rupestribus apricis meridiem spectantibus sola var. *b.*; *Campagnano a Malavia, e nella costa del Pignatiello, e di S. Pancrazio.*

Majo, Julio. \mathcal{Z} , et basi fere \mathcal{Y}

In *b. caules* angulati, verrucis albidis scabri: *calycis* 6-partiti lacinae lineari-spathulatae, obtusiusculae: *petala* straminea, vel albida, obovato-unguiculata, varie incisa aut laciniata, unico indiviso; laciniis inaequalibus, majoribus obtusis, fere obovato-cuneatis, calycem immutatum aequantibus: *antherae* luteae: *capsula* oblongo-elliptica, truncata, verrucis albidis scabra.

Cave ne varietatem *b.* cum *R. mucronulata* Tin., aut cum *R. gracili* Ten. confundas; a quibus aliena.

4. *R. HOOKERI.* Guss. — *R. fruticulosa. b. Guss. syn. 1. p. 530* — *R. fruticulosa. Hook.* in herb. *Lin.* — *R. undata. Ten. fl. nap. 4. p. 527,* ex descriptione!

R. pallide virens glaberrima, caule basi suffruticoso, foliis pinnatis, foliolis decurrentibus undulatis subfalcatis approximatis, in radicalibus alterne minoribus, impari reliquis brevioribus aut vix excedentibus, calycibus patentibus 5-partitis, capsulis oblongo-ellipticis 4-dentatis.

lc. R. suffruticulosa. Reich. cent. 12. f. 4449 — *R. minor, incisus foliis. Barr. ic. 583?*

Inde herbosis rara; *Laceo, Punta S. Angelo.*

Aprili, Octobri. \mathcal{Z}

Caules basi vere frutescentes firmi, elati, longis et densis racemis terminati: *foliola* subcanaliculata, subserrulata: *flores* albi: *capsulae*, ut in sequente, angulatae, levae, 5-6 lin. longae, dentibus erectis; *semina* globoso-reniformia, fusca, levia.

5. *R. ALBA. Lin. sp. pl. 648* — *R. fruticulosa c. Guss. syn. 1. p. 530.*
R. suffruticulosa. Ten. fl. nap. 4. p. 257, ex foliorum descriptione.

R. viridi-glaucescens glaberrima, foliis pinnatis, foliolis anguste linearibus planis vix decurrentibus approximatis subundulatis impari reliquis aequali aut brevioribus, calycibus 5-partitis, capsulis oblongo ellipticis 4-dentatis.

lc. Reich. cent. 12. f. 4448. R. minor alba, dentatis foliis. Barr. ic. 588.

In apricis herbosis passim.

Aprili, Octobri. \mathcal{Z} et basi \mathcal{Y}

Semina nigra, globoso-reniformia, minutissime tuberculata.

Post sedulam inspectionem plurium annorum has duas species inter se differre cognovi, nec unam in alteram transire, et characteres habitus nec non foliorum constantes esse. Interim Cl. Bertol. in *fl. ital. 5. p. 29.* has in unam speciem immerito associat.

Una cum praecedente ab incolis appellatur *Malaparone*, et priusquam caulis altitudinem pedalem acquirat, herba a rusticis elixata ac oleo et sale condita inter olera ab illis expetita usum habet.

7. CISTINEAE.

34. CISTUS.

Tourn. inst. 259—Gaerm. de fruct. 1. p. 370—Dec. fl. fr. 4. p. 811.

1. *C. VILLOSUS*. *Lin. syst. veg. 412—Ten. fl. nap. 4. p. 310—C. incanus. Lin. sp. pl. 737 ex Bertol. in fl. ital. 5. p. 341.*

lc. Reich. cent. 13. f. 4567.

b. *virescens*; pubescentia in caule et pedunculis brevior ac magis adpressa, foliis minus rugosis viridioribus superioribus oblongo-ovalibus, sepalis magis acuminatis minusque villosis. — *Dec. pr. 1. p. 264.—C. incanus b. Bertol. l. c.*

In aridis apricis: *rupi di Suecellaro, costa del Pignatiello e della Scarupata, Punta dell'imperatore alla sommità, e verso Citara, rupi di Zale e di Monte Vico, delle Falanghe, Panza alla Guardiola di S. Gennaro, e nella collina di Campotese*: var. b. *rupi di Campagnano al N. E.*

Aprili, Majo. ♀

Haec, et sequentes species complexo nomine *Rosolania* appellantur.

2. *C. SALVIFOLIUS*. *Lin. sp. pl. 738—Ten. fl. nap. 1. p. 294—Bertol. fl. ital. 5. p. 346, excl. syn. C. corbariensis Reich.*

lc. Reich. cent. 13. f. 4559—C. foemina. Clus. hist. 1. p. 70.

In collibus, et in fruticetis apricis passim.

Aprili, Majo. ♀

Folia rugosa, stellato-hirta: *pedunculi* clongati, superne articulati: *petala* candida, emarginata: *sepala* duo exteriora late cordato-ovata acutiuscula: *capsula* ovata, subangulata, apice depressa, pubescens.

3. *C. AFFINIS*. *Guss. syn. 2. p. 13—Ten. fl. nap. 4. p. 34.*

C. foliis lanceolato-linearibus sessilibus trinerviis supra glabris, subtus reticulatis villosis, subviscosis, racemis terminalibus simplicibus subsecundis, sepalis exterioribus cordato-ovatis (latis) bracteaeformibus villosissimis interiora excedentibus.

lc. C. foemina, folio vario, erectus. Cup. panph. 1. t. 2.

In aridissimis asperis: *costa di Suecellaro, alla Scarupata, Dagno a S. Alessandro ed a S. Pietro, Lava dell' Arso presso S. Michele.*

Aprili, Majo. ♀

Frutex obscure virescens, et ingrati odoris: *racemi* ebracteati, 2-4-pollicares: *pedicelli* erecto-patentes, 3-5-lineares, approximati: *sepala* laete virentia, acuta: *petala* candida, retuso-deltaeidea.

4. *C. MONSPELIENSIS*. *Lin. sp. pl.* 737—*Ten. fl. nap. l. p.* 294—*Bertol. fl. ital. 5. p.* 339, excl. syn. *C. affinis*—*Stephanocarpus monspeliensis*. *Spach. in Griseb. spic. fl. Byth. 1. p.* 131.
- C.* foliis lanceolato-linearibus sessilibus trinerviis supra glabriusculis, subtus pulverulento-glaucis lacunoso-reticulatis glutinosi, racemis terminalibus simplicibus subsecundis, sepalis exterioribus ovato-lanceolatis villosissimis interiora aequantibus.
- l.c. Reieh. cent. 12. f.* 4561 — *Ledon V. Clus. hist. 1. p.* 79.
- In collibus maritimis, praesertim in fruticetis; *Casamicciola al Castiglione, Forio alla Guardiola di Zale, ed alla punta dell'imperatore, Guardiola del Testaccio, Monte di Vieo, ed a Marecoe sul Lacco.*
- Aprili, Majo. ♀
- A praecedente non separat *Cl. Bertol. l.c.*; sed confer quae dixi in *syn. l.c.*

33. HELJANTHEMUM.

Tourn. inst. p. 248—*Gaert. de fruct. 1. p.* 371.—*Dec. fl. fr. 4. p.* 815.

1. *H. TUBERARIA*. *Mill. dict. n. 10* — *Ten. fl. nap. 4. p.* 311.—*Bertol. fl. ital. 5. p.* 365 — *Cistus Tuberaria. Lin. sp. pl.* 741.
- l.c. Reieh. cent. 13. f.* 4528 — *Cistus tuberaria. Cav. ic. 1. t.* 97 — *Burb. cent. 3. t.* 63.
- In aridis apricis submontosis; *nelle falde orientali del Rotaro dirimpetto al Montagnone presso la via che discende alla Cereola.*
- Aprili, Majo. ♀
- Sepala* glaberrima; duo exteriora anguste lanceolata, adpressa; tria interiora duplo longiora, late lanceolata, acuta, in fructu semipatentia, subtrinervia; *petala* pallide sulphurea, basi intensius colorata, integerrima, 5-7-lin. longa; *antherae* globoso-ovatae, non emarginatae, una cum filamentis et germine petalis concolores; *stigma* albidum, globosum, sessile, tuberculatum; *capsula* ovalis, tenue pubescens, sepalis exterioribus aequilonga; *semina* subglobosa, fusca, minute obtuseque tuberculata.
- Planta ista, quae in collibus calcareis Japygiae, nec non in montosis graniticis Calabriae supra Rhegium et Siciliae supra Messanam copiose provenit, in hac insula in angustissimo notato spatio occurrit.
2. *H. GUTTATUM*. *Mill. dict. n. 18* — *Ten. fl. nap. l. p.* 297, var. *a.* — *Bertol. fl. ital. 5. p.* 566, excl. syn. *H. Viviani. Poll.* — *Cistus guttatus. Lin. sp. pl.* 741.
- l.c. Cistus serratus. Cav. ic. 2. p.* 57. *f.* 191, optima, sed petala serrata.
- b. plantagineum*; foliis latis oblongo-ellipticis, pedunculis a basi ad apicem patenter pilosis, pubescentia copiosiore.—*H. plantagineum. Pers. syn. 2. p.* 77 — *Dec. pr. 1. p.* 279

1c. *Taurin. 20. f. 45 ex Moris.*

In herbosis apricis; var. a. *alla sommità del Cratere dell'arso sopra Chiu-jano*: var. b. passim obvia.

Martio, Aprili var. a.: et Aprili, Majo var. b. ☉

In var. a. *folia omnia saepe exstipulata!*: *pedunculi* graciles, fere capillares, pilis glandulosis tecti, in fructu deflexi!: *sepala* duo exteriora lineari-lanceolata, margine revoluta, tria interiora ovata, concava, obtusiuscula, dorso glandulis nigris ad basin conspersa: *petala* integra, vel denticulata!, lutea, et basi macula atropurpurea notata — In b. *sepala* exteriora oblonga, obtusiuscula, subconvexa, subadpressa, eglandulosa; interiora duplo longiora, glandulis nigris a basi ad medium conspersa, raro usque ad apicem. Serius quam var. a. floret, imo caulis profert ista dum illa fructus maturat! proinde species videntur diversae, nec varietates.

3. *H. JUNIPERINUM. Lag. in Dec. pr. 1. p. 275! ex ejusdem specimine!*

H. suffruticosum, caule erecto vel ascendente ramosissimo, ramis pedunculis calycibusque puberulis, foliis oppositis superioribus alternis anguste linearibus margine revolutis subfasciculatis recurvis (lacte virentibus) glabratis vel puberulis pedicellis basi bractea suffultis erectiusculis demum patentibus saepiusque recurvis.

1c. *H. viride. Reich. cent. 13. f. 4542*, quae ic. potius hoc quam *H. viride Ten.* refert ob folia falcata, et ideo haud exactam dixi in *syn. 2. p. 16.*

In aridissimis declivitatibus meridiem spectantibus; *Succellaro alla costa della Scarupata fra i frutici poco distante dal mare nel sito sottoposto e corrispondente a Monte Vezza, e dirimpetto S. Pancrazio.*

Aprili, Majo. ☽

Caulis dense caespitosi, non erecti, sed potius diffusi, et inde surrecti: *folia* obtusiuscula, 4-6 lin. longa, vix 1/2 1. lin. lata: lacte virentia, erecto-patentia, vel patentissima, ad basim ramorum approximata, ibique in axillis fasciculata, supra plana, sulco notata, subtus ad carinam tenue bisulcata, ad margines revoluta, et sparse tenuaeque ciliata, sub lente punctis minutis albis tecta videntur; suprema breviora ac parum latiora, et una cum pedunculis pedicellis, bracteis calycibusque pilis brevibus eglandulosis tecta: *stipulae* foliis similia, sed angustiores, breviores, et setula terminatae: *racemi* 2-5-pollicares, in apice ramorum ut in affinis; laxiflori; *pedicellis* gracilibus sub anthesi erectis, in fructu horizontaliter patentibus, 4-5 lin. longis: *sepala* duo exteriora vix lin. longa, anguste linearia, patentia, obtusa; tria interiora ovata, duplo longiora, nervis tribus viridibus notata, inter istos albida, persistentia, et in fructu una cum capsularum valvis, quibus adhaerent, patentia: *petala* lutea, parva, submarginata, concoloria: *capsulae* ovatae, glabrae, leves; valvis

tenuibus; *semina* pallide rufescentia, fere triquetra, levia, lineolis minutis elevatis sub lente notata videntur, capsularum valvis annexa.

Differt a proximo *H. viride* Ten. foliis recurvis, caulium directione, et habitu, praeter characteres notatos.

4. *H. FUMANA*. Mill. dict. n. 6.—Bertol. fl. ital. 5. p. 355. excl. nonn. syn. b. minus. Dec. pr. 1. p. 275—Ten. fl. nap. 4. p. 312.

lc. Reich. cent. 13. f. 4531 (pro var. a.)—Cistus minor, brevi vermiculatoque folio, hispanicus. Barr. ic. 286, et 446 optima.

In rupestribus aridissimis; *nelle falde aridissime del Montagnone esposte al S. E. presso alla via che mena all' interno del cratere.*

Aprili, Majo. ♀

Caulis irregulariter ramosi, procumbentes; ramis floriferis surrectis: *folia* exstipulata, intense virentia, anguste linearia, obtusa, tenuissime puberula aut glabra, uti rami juniores ac pedunculi: ad margines ciliata, in ramis floriferis erecta, in reliquis patula ac breviora: *pedunculi* supra-axillares, 1-flori, demum patentes ac arcuati, ideoque calycibus fructiferis pendulis: *sepala* duo exteriora oblonga-elliptica, semipatentia, obtusa, ciliata; tria interiora duplo longiora, 3-4 duplo latiora, ovata, ad nervos, virentes aut rubentes hispidula, inter illos albido-scariosa ac glabra; nervis duobus prominulis, tertio oblitterato: *petala* lutea, concoloria, obtusa, calyce duplo longiora: *stamina* rufescentia: *antherae* apice basi que emarginatae: *stylus* elongatus, inclinatus *capsula* glaberrima, virescens: *semina* fusca, levia.

8. VIOLARIEAE. Dec.

26. VIOLA.

Tourn. Inst. p. 419—Dec. pr. 1. p. 291.

1. *V. ODORATA*, Lin. sp. pl. 1324—Ten. fl. nap. 1. p. 102—Bertol. fl. ital. 2. p. 698, an cum syn.?

lc. Reich. cent. 13. f. 4498.—Dod. pempt. 156.

In fruticetis humentibus, et ad sepes in umbrosis herbosis.

Januario, Martio. ♀

Vulgo *Viola* cum sequentibus.

Stipulae ciliato-dentatae; ciliis stipulae latitudinem non aequantibus: *flores* hebetati non solum ad radicis collum, sed etiam ex foliorum axillis in stolonibus proveniunt; et in istis *pedunculi* graciles, albi, 2-pollicares, ad medium bracteolis instructi: *sepala* ut in floribus fertilibus: *capsulae* pubescentes, subtrigono-globosae?, lineolis purpureis no-

latae, fere sub terra absconditae: *semina* glabra, pyriformia, albida, levia, apice appendiculata—Flores hebetati usque ad Majum nascere perdurant.

2. V. DEHNHARDTII. *Ten. fl. nap. 5. p. 332.*

V. acutis stolonifera pubescens, foliis cordatis ovatis orbiculatisve grosse dentatis, sepalis obtusis, petalis late obovato-orbiculatis obtusis integris, inferiore latiore cordato-emarginato, calcar acutiusculo subuncinato.

lc. *Ten. l. c. t. 219. f. 2* — V. hirta, var. lactiflora. *Reich. cent. 13. f. 4493?*

Ad maceriem umbrosas, ad sepes, et in sylvaticis.

Januario, Aprili. ☞

Stolones hinc inde excurrentes: *stipulae* laciniatae, laciniis stipulae latitudinem superantibus: *pubescentia* in petiolis deflexa!: *folia* cordato-ovata, sinu clauso; in stolonibus ovata, aut reniformia, late cordata, idest sinu late patente: *pedunculi* late canaliculati, bracteis ad ipsorum medium insertis, et una cum stipulis piloso-ciliatis: *sepala* oblonga, utrinque obtusa ac puberulo-ciliata, integra, fusco-virentia: *calcar* acutiusculum, vix uncinatum, corollae concolor, vel pallidius: *capsula* ovata, obtusa, subtrigona, pubescens: *semina* albida, nitidiuscula, levia, apice appendiculata.

Variat petiolis foliisque pubescentibus; floribus concoloribus, lacte coeruleis, et coeruleo-lilacinis, vel albidis. Praeterea flores in praecedente violacei! et odori, *petalis* anguste obovato-oblongis, fere cuneatis: in hac, et in sequente *petala* late obovata, basi non cuneata; *flores* fere inodori, ut in V. hirta, in qua sunt intense coerulei, dum in V. Dehnhardtii a coeruleo ad albidum vergentibus. Quoad florum odorem, et foliorum characteres pro typo *Violae* floribus plenis in hortis cultae haberi non potest, uti Cl. Ten. l. c. suspicatur, et potius planta culta pro varietate V. *suavis* habenda mihi videtur.

3. V. HIRTA. *Lin. sp. pl. 1524* — *Ten. fl. nap. 1. p. 106* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 628*, excl. syn. V. Dehnhardtii Ten.

lc. *Reich. cent. 13. f. 4493.*

In fruticetis, et ad sepes; *Campagnano, Schiapparo, Pico.*

Januario, Aprili. ☞

Semina pyriformia, albida, glabra, levia, apice appendiculata.

4. V. SILVESTRIS. *Lam. fl. fr. ed. 1. v. 2. p. 680* — *Ten. fl. nap. 3. p. 205.*

lc. *Reich. cent. 13. f. 4503.*

Martio, Aprili. ☞

Petalum superius, basi interne striatum; duo lateralia barbata: *calcar* concolor, obtusum, apice fere oblique truncatum, calycinas appendices superans: *capsula* exquisite trigona, glaberrima.

A V. canina non separat Cl. Bertol. *fl. ital. 2. p. 701*; tam cum illa,

quam cum *V. Riviniana* associat Cl. Webb. in *phyt. can. v. 3. pars. 2. sect. 1. p. 30*; sed confer optimas icones Reich.

5. *V. GRACILESCENS*. Jord. obs. 2. p. 20—*V. tricolor*, *b. bicolor*. Ten. fl. nap. 1. p. 108.

V. glabruscula, caule erecto, ramis prostratis erectisque, foliis inferioribus suborbiculatis, reliquis ovalibus, omnibus crenulatis, stipulis profunde laciniatis, laciniis (numerosis) subfalcatis, lobo extimo lato ovali-lanceolato, sepalis æutis ciliatis petala (bicoloria) breviter unguiculata integra sequantibus, calcare brevissimo obtuso sepalis aequilongo, capsula globo-ovo-ovali.

lc. Jord. l. c. t. 2. f. B.

In arenosis inter segetes; *Campagnano, Pico, Barano, Testaccio, Chianano, da S. Angelo a Soccivo, Forio, monte di Vico sopra al Lacco.*

Aprili, Majo. ☉

Sepala lanceolata, duo inferiora parum breviora: trium sepalorum superiorum appendices oblongae, latiores, longiores, obtusae, latere exteriori 1-lobatae, oblique truncatae; duorum sepalorum minorum breviores, concavae, orbiculatae, obsolete 1-lobatae: *flores* parvi: *petala* duo superiora coerulea; tria inferiora albida, vel etiam coerulea, basi luteo-maculata, et venis paucis coerulescentibus notata; quorum duo lateralia basi longe barbata, intermedium vero obsolete barbatum aut glabrusculum, omnia integerrima: *calcar* brevissimum, strocoeruleum, *sepala* vix excedens: *flores* effoeti fere omnino albido-luteoli evadunt: *semina* nitide-spadicea, pyriformia, levissima — Floribus aliquando fere omnino luteis variat.

9. CARYOPHYLLEAE. Juss.

37. DIANTHUS.

Lin. Gen. pl. ed. Schreb. n. 770.

1. *D. PROLIFERA*. *Lin. sp. pl. 587*—*Ten. fl. nap. 1. p. 222* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 549.*

lc. *Koktreuschia prolifera*. *Reich. cent. 16. f. 5009*—*Armeria prolifera*. *Lobel. ic. 449.*

In apricis collibus rarus.

Majo, Junio. ☉

2. *D. VELUTINUS*. *Guss. pl. rar. p. 166* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 551*—*D. prolifer, b. minor*. *Ten. syll. p. 207.*

lc. *Guss. l. c. t. 32*—*Koktreuschia velutina*. *Reich cent. 16. f. 5010.*

In collibus, ad vias, et in arvis arenosis ubique.

Martio, Majo. ☉

Sat raro variat caule ramoso, semper tamen basi puberulo-velutino, quod minime in præcedente.

Cl. Webb. in *Phyt. can. vol. 3. pars. 2. sect. 1. p. 155*, denuo speciem hanc cum antecedenti associat, sed habitus, florendi tempus, et semina diversa sunt!

3. *D. LONGICAULIS. Ten. fl. nap. 4. p. 208—Dec. prodr. 1. p. 350—Reich. fl. germ. 2. p. 811.*

D. glaber caespitosus, caulibus annotinis elongatis corymboso-paniculatis multifloris, foliis anguste lineari-lanceolatis elongatis subrecurvis glaucescentibus laxiusculis, floribus solitariis, squamis calycinis sex brevissimis adpressis subrhombicis in apicem triangularem mucronulatum abrupte terminatis, petalorum laminis roseis imberbibus serratis contiguis.

lc. *Ten. l. 1. t. 138—Reich. cent. 16. f. 5052*, optima.

b. *albiflorus*.

In rupibus, et in saxosis elatis vel demissis ubique; var. *b. Punta di S. Angelo*.

Majo, Octobri. ☿

Vulgo *Garofalo salvaggio*.

Caulis basi suffruticosus, dense caespitosus, brevissimi; annotini vero 1-3-pedales, erectiusculi, vel decumbentes, ad nodos valde incrassati: *folia* radicalia numerosa, nunquam erecta, et ita brevia ac canaliculata nec margine serrata, ut in *D. Caryophyllo*, sed vix basi tenuè serulata, sæpius subrecurva, 3-4-pollices longa: *squamæ* calycinæ 3-4-lin. longæ, ad apicem triangularem nervosæ; nervis in mucronem virentem decurrentibus, interiores latiores, et apice magis dilatatae: *calycis* tubus a basi ad apicem! exquisitè nervosus (quod non in *D. Caryophyllo*); dentibus erectis, triangularibus, albidis, ac non scariosis: *petalorum* laminæ irregulariter serratae — Cl. Bertol. in *fl. ital. 4. p. 552* a *D. Caryophyllo* non separat; sed characteres superius notati cultura non mutantur.

4. *D. ARMERIA. Lin. sp. pl. 586—Ten. fl. nap. 1. p. 228—Bertol. fl. ital. 4. p. 547.*

lc. *Reich. cent. 16. f. 5011—Armeria sylvestris, altera. Lobel. ic. 448.*

In sylvis herbosis; *sæpe di Chiummano, del Vataliere, e dello Schiapparo*; magis rarus in illis *del Pozzuolo, e del piano di Pedaura*.

Junio, Julio. ♀, et ♂.

Petalorum laminæ ferè obovata-ellipticæ, planæ, obtusiusculæ, a medio ad apicem dentatae, basi tantum contiguae, roseae, et annulo undulato purpureo prope basim ac punctis albidis notatae, trilineatae.

38. SAPONARIA.

Endl. gen. n. 5246.

1. *S. OFFICINALIS*. *Lin. sp. pl.* 584—*Ten. fl. nap.* 1. p. 224—*Bertol. fl. ital.* 4. p. 533.

1c. *Reich. cent.* 16. f. 4995—*Saponaria. Dod. pempt.* 179.

In sylvaticis bumentibus, et ad sepes; *Cavone del Crovone e delle Noelle, Campagnano, Chianole del Testaccio, Valle di Canniani, presso la sorgente di Buceto, Fontana, da Serrano a Panza, alle Fulunghe, ec.* Junio ad Octobrem. ☞

39. SILENE.

Endl. gen. n. 5248.

§ 1. *FUSILENE*. *Codr.*

Cal. sub anthesi non inflatus, aequaliter 10-nervius. *Pet.* aestivatione contorta.

a. Flor. in racemo secundo ant disticho, simpliciter, spiciformi, solitaria aut geminato dispositi.

1. *Galyx basi non umbilicatus.*

1. *S. GIRALDI*. *Cuss.*—*S. cerastoides*, b. tota glabra. *Bertol. fl. ital.* 4. p. 574, ex loco!

S. glaberrima laete virens, caule erecto, floribus (diurnis) secundis distichisque in racemo solitario vel basi geminato, ad ipsius apicem confertis, calycibus fructiferis ovatis apice subcontractis, inferioribus erecto-patulis (non deflexis), dentibus lanceolatis erectis! capsulam sessilem aequantibus, filamentis glabris!, seminibus reniformibus tenue transverse striato-tuberculatis utraque facie curvato-canaliculatis dorso planis.

1c. *nostra tab.* 1. f. 2. c. d.

In vineis, et ad maceries herbosas; *Dagno sotto S. Alessandro nelle vigne, et copiose in eodem loco sul ciglione de' muri a secco della Schiappa; vigne di Casamicciola superiore, et sat raro nella selva detta di Cardata presso al Vataliere, presso la strada nel discendere nelle selve di detto Cratere, e nelle vigne vicine; provenit quoque prope Neapolim alla Torre del Greco nelle vigne fra i Camaldoli ed il mare; isola di Capri (Giraldi ex Bertol. l. c.).*

Aprili, Majo. ☉

Caules 6-14-pollicares, ad nodos rubentes, saepius basi, quam superne ramosi; ramis ascendentibus: *folia* inferiora obovato-spathulata, obtusissima, in petiolium attenuata; caulina sessilia, basi subconnata, oblongo-spathulata; suprema lanceolata, acutiuscula: *pedunculi* in anthesi vix lin. longi, erecti, inferiores vero in fructu 3-10-lineares, aliquando patentes, nunquam deflexi, superiores semper erecti: *calyces* glaberrimi, inter nervos fere albido-scariosi, sub anthesi cylindracei, in fructu ovati, raro ovals, 10-nervi; nervis quinque usque ad apicem dentium rubentium protractis; aliis quinque minoribus ad sinus dentibus interpositis perveniens: *petalorum* lamina intense vel pallide rosea, subtus intensius colorata, 1-2 lin. lata, obovata, obliqua, concaviuscula, varie crenulata aut integra, sat raro emarginata; *coronae* lamina bipartitis, laciniis acutis: *antherae* exsertae, olivaceae: *stigmata* candida, puberula: *capsula* sessilis, raro ovalis, saepius ovata ac glabra: *semina* parva, rufescentia.

Habitus omnino sequentis; a qua filamentis glabris, ac summa glabritie omnium partium tam ab illa, quam ab affinis recedit.

2. *S. CANDOLLII*. *Jord.* ex ejusdem plantis exsiccatis — *S. lusitanica*. *Dec. herb.* non *Lin.* ex *Jord.* — *S. gallica*. *Ten. fl. nap. 1. p. 208*, et *Sebast. et Maur. fl. Rom. pr. p. 151*, non *Lin.* — *S. gallica*. *Guss. syn. 1. p. 481*, non *Lin.*

S. hirsutiuscula, caule erecto vel ascendente, floribus (diurnis) in racemo solitario vel saepe basi geminato dispositis ad ipsius apicem confertis, calycibus fructiferis ovoideis sub apice contractis, inferioribus erecto-patulis (non deflexis), dentibus calycinis herbaceis lanceolatis apice patulis capsulam sessilem subexcedentibus, coronae lamina obtuse bipartitis, filamentis basi villosis!, seminibus reniformibus transverse striato-tuberculatis, utraque facie curvato-canaliculatis, dorso planiusculis.

- l.* *S. gallica*. *Reich. cent. 16. f. 1054*, hanc exacte refert, sed semina in icone in dorso canaliculata — *Lychnis sylvestris*, hirsuta, annua, flore minore carneo. *Vaill. bot. paris. t. 16. f. 12*, ad *S. gallicam* citata potius ad hanc spectat.

In vincis, inter segetes, in apricis, et etiam ad vias ubique.

Martio, Majo. ☉

Caules et *folia* ut in praecedente, ac in affinis hujus sectionis, et setis albidis patulis sparsis hirsuti, pube brevi inter setas intermixta: *pedunculi* fructiferi superiores semper erecti, inferiores ut in praecedente erecto-patentes, non deflexi: *calyces* ad nervos pilis longis albis glandulosus hirsuti, sat raro versus apicem aliis brevibus glandulosus intermixtis; nervis dentibusque virentibus, aut saepius rubentibus: *dentes* calycini anguste lanceolati, non lineari-setacei, ut in *S. gallica* ex *Godr. et Willem. Sil. del Alg. p. 12*: *petalorum* laminae 2-3 lin. latae ac longae, roseae, vel pallidae, obliquae, obovatae, integrae aut irregulariter

crenulatae, saepe emarginatae: *filamenta* usque ad medium hirsuta: *stigmata* intus barbata: *semina* nigricantia.

- S. *gallica* differt ab hac habitu; caule ramosiore, fere dichotome-divaricato: racemis brevibus; calycibus fructiferis longius pedunculatis, brevioribus, et magis ad figuram ovatam accedentibus; in ista oblongioribus—Icon, *Viscago hirsuta*, lusitanica, stellato flore. *Dill. elth. t. 34 f. 401.* ad S. lusitanicam citata, hanc non male refert; uti alia icon, *Viscago hirta gallica*, flore parvo carneo, petalis integris. *Dill. elth. t. 310. f. 999.* ad S. gallicam jam citata, eum S. gallicae specimine a *Jor.* misso bene quadrat—Denique *Cl. Webb. in Phyt. canar. v. 3. pars. 2. sect. 1. p. 138* S. gallicam, S. anglicam, S. lusitanicam, et S. quinquevulneram in unam speciem associat, quod certe nimis.
3. S. LITORALIS. *Jord. ex pl. exsicc.* — S. glandulosa. *Bertol. fl. ital. 4. p. 626?*—S. micropetala. *Ten. fl. nap. 5. p. 344* ex loco!, non *Dec.*
- S. villosa-hispida, caule divaricate-ramoso, floribus (albis diuixis) in racemo solitario laxè irregulariterque dispositis, calycibus fructiferis ovatis sub apice contractis, inferioribus patentibus, dentibus calycinis herbaceis demum recurvis capsulam subsessilem aequantibus, coronae laminae acute bipartitis!, filamentis basi villosis, seminibus sub-reniformibus transverse striato-tuberculatis utraque facie curvato-canaliculatis dorso planiusculis.

lc. nulla.

b. floribus roseis.

c. floribus atrosanguineis.

d. nana; caule 1-3-pollicari, floribus minutissimis.

In vineis passim, sed praecedente rarior: var. a *Castiglione nelle vigne presso al Bagnitiello*; var. b. *Bagno, Lacco, Testaccio, al Vataliere, Castiglione nel sito indicato*, ubi quoque var. c. rara: var. d. *Bagno, Chiajano ad viarum margines, et ad herbosa murorum supercilia.*

Junio, Julio. ☉

Caules saepe humiles, basi erecti, at statim divaricato-ramosi, sat raro erecti ac simplices: *folia* infima spathulata, obtusa; reliqua lanceolato-oblonga, acutiuscula: *pedunculi* brevissimi, inferiores ad summum 5-lineares, et isti in fructu patentes: *calyces* sub anthesi cylindracei, oblongi, demum ovati, ad nervos virentes setis longis albidis hirsuti, pilis glandulosis, aliis brevissimis intermixtis!, inter nervos albidis ac glabriusculi: *petala* vix explicata; siquidem eorum lamina surrecta, anguste linearis, obtusa, obliqua!, concaviuscula, integra aut vix emarginata, vel varie crenulata, vix lin. longa!, coronae laminae brevissimis: *stamina* exerta; *antheris* fuscis: *semina* cinereo-nigricantia—*Hirsuties* totius plantae ex pilis longis patentibus saepe glandulosis, aliis brevioribus intermixtis.

Descriptio *S. glandulosa* Bertol. l. c. fere in omnibus cum nostra convenit, uti quoque icon *S. anglica* Reich. cent. 16. f. 5056 (quam ad suam speciem citat Cl. Bertol.), quoad habitum et calycis formam; tamen in icone hirsuties minor, calyces omnes erecti, et semina dorso late canaliculata: praeterea in plantis gallicis hirsuties major, et confertior quam in nostra est.

4. *S. ANGLICA*. Lin. sp. pl. 591—*S. cerastoides*. Ten. fl. nap. 1. p. 235?

S. patenter piloso-hirsuta, caule erecto ramoso, floribus (diurnis) in racemo solitario saepe geminato inferne laxissimo secundis distichisque, calycibus fructiferis ovatis (brevibus) apice apertis ad nervos hirsutissimis, superioribus semipatentibus, infimis in pedunculo elongato deflexis, dentibus calycinis herbaceis lanceolatis demum recurvis capsulam sessilem parum excedentibus, petalorum lamina anguste cuneata emarginata integrae, filamentis basi villosis, seminibus subreniformibus tenuissime striato-tuberculatis utraque facie curvato-caniculatis dorso planis.

lc. Reich. cent. 16. f. 5056?, sed pedunculi fructiferi vix patentes, qui tamen reflexi ex ipsius descriptione in fl. germ. 2. p. 813, et semina dorso canaliculata—Viscago Cerastii foliis, vasculis pendulis Dill. elth. t. 309. f. 398!, nam fructus deflexi.

In vineis, in cultis, et in collibus aridis passim.

Aprili, Majo. ☉

Caules in hac a basi saepius ramosi: *pedunculi* fructiferi superiores semipatentes, non axi adpressi, ut in affinis; inferiores vero semper deflexi: *calyces* inter nervos albi, ac praeter setas pilis brevioribus glandulosis intermixtis tecti: *flores* saepius carnei: *petalorum* lamina concolor, aut purpureo-maculata, saepius obliqua; *coronae* laminae acute bidentatis: *semina* nigricantia.

Nostra cum speciminibus anglicis bene convenit, et discrepat solummodo caule ramosiore, calycibus hirsutioribus. Confer Bertol. in fl. ital. 4. p. 574.

5. *S. NEGLECTA*. Ten. fl. nap. 4. p. 216—Willem. et Godr. Sil. de l'Alger. p. 19—*S. nocturna*, b. Bertol. fl. ital. 4. p. 576.

S. semipatenter piloso-hirsuta, caule erecto diffusoque, floribus (albis diurnis) secundis in racemo solitario vel saepius geminato dispositis ad ipsius apicem approximatis, calycibus fructiferis oblongis apice apertis superioribus axi adpressis, infimis in pedunculo demum elongato erecto patulis, dentibus calycinis triangularibus erectis omnino herbaceis acutis capsulam subsessilem aequantibus, petalis late emarginato-bilobis, filamentis inferne villosis, seminibus subreniformibus tenue striato-tuberculatis utraque facie curvato-caniculatis dorso canaliculatis.

b. *rubriflora*; floribus rubris.

lc. Ten. l. c. t. 230. f. 1.

bb. viscosa; caule pedunculis calycibusque viscosis.

In collibus apricis, et in campis aridis; var. *a. marina di S. Angelo*: var. *b. passim* in Insula: var. *bb. marina de Maronti*, quae tamen uti var. *a* satis rara.

Januario, Junio. ☉

Caules saepe rubentes, erecti, vel in aridis aliquando diffusi, ramis floriferis tunc surrectis, inferioribus ascendentibus: *folia* ut in praecedentibus, sed in arenosis crassiuscula: *peduncul* superiores breves, axi approximati; inferiores in fructu elongati, fere pollicares: *flores* per totam diem explicati: *petalorum* lamina obovato-cuneata, nunquam obliqua, basi constricta, ideoque laminae ad basim inter se distantes, non incumbentes: *coronae* laminis connatis, bipartitis; laciniis obtusiusculis: *capsula* glabra: *semina* fusco-cinerea.

6. S. NOCTURNA. *Lin. sp. pl.* 595 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 234, var. *a* — *Bertol. fl. ital. 5. p.* 575, excl. syn. S. neglectae *Ten.* — *Will. et Godr. Sil. de l' Alger. p.* 19.

S. caule erecto diffusoque calycibusque pube brevissima adpressa tenue canescentibus, floribus (nocturnis!) secundis in racemo solitario vel geminato inferne laxissimo dispositis, calycibus fructiferis cylindraceo-oblongis apice apertis, superioribus axi adpressis, infimis in pedunculo elongato erecto-patulis, dentibus calycinis erectis triangularibus acutis margine scariosis capsulam subsessilem parum excedentibus!, petalis bipartitis coronatis, filamentis glabris!, seminibus subreniformibus tenuissime striato-tuberculatis utraque facie curvato-canaliculatis dorso leviter canaliculatis!

- 1c. *Ten. l. c. t. f.* 230. 3 — *Reich. cent. 16. f.* 5099, optima — *Jord. obs. 5. p.* 32. *t. 1. f.* B — *Viscago hirta*, noctiflora, floribus obsolete spicatis. *Dill. elth. t.* 310. *f.* 400, mediocris.

Ad vias, ad muros, in ruderatis, vel in lapidosis passim.

Martio, Majo. ☉

Habitus praecedentis, sed pubescentia omnino aliena, siquidem in ista facta ex pube brevissima adpressa, non vero ut in illa ex pilis vel setis longis fere patulis: *calyces* inter nervos virentes, non albedo-scariosi, versus apicem aliquando reticulati, ad nervos non patenter sed adpresso hirsuti, nec in fructu reflexi: *flores* a vespere ad summum mane tantum explicati, inde clausi: *petalorum* lamina supra candida, vel pallidissime rosea, subtus intensius colorata!, basi constricta, ideoque laminae ad basim distantes, obovato-cuneatae; lobis angustis: *coronae* laminae bipartitae, laciniis acutis: *capsula* glabra: *semina* rufescentia (non plumbea uti dixi in *syn. 1. p.* 482.)

2. *Calycibus basi umbilicatis.*

7. *S. PENDULA*. *Lin. sp. pl.* 599—*Ten. fl. nap. 1. p.* 236 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 582.

S. molliter pubescens decumbens vel erecta, floribus secundis in racemo solitario aut saepe geminato laxè dispositis, calycibus fructiferis pendulis ovoideo-inflatis et obverse pyramidatis apice apertis, dentibus triangularibus brevissimis erectis capsulam subglobosam abrupte apice conico-atenuatam aequantibus, petalorum lamina obcordata profunde biloba, filamentis glabris!, seminibus globoso-reniformibus non compressis undique sulcatis acute tuberculatis.

lc. *Reich. cent. 16. f.* 5070, et *Viscago hirta*, sicula, *Lychnidis aquaticae* facie, supina. *Dill. eth. 1. 312. f.* 402, optimae.

In cultis ad agrorum margines in herbosis; *Pico, ed alla Stursa*, sed satius rara.

Aprili, Majo. ☉

Caulis in sterilibus decumbentes, aut ascendentes, in herbosis erecti: *folia* inferiora oblongo-spathulata, obtusa, superiora lanceolata: *flores* in anthesi erecto-patuli, calyce tunc tubuloso-campanulato, ad nervos prominentes rubentes glanduloso-hirsuto, inter illos albo-scarioso ac glabrato; dentibus obtusis, virentibus: *corollae* amoene roseae, inter omnes alias hujus sectionis duplo fere majores (diametro 5-6-lineari), laminis invicem basi incumbentibus; *coronae* laminis obtuse bifidis: *capsula* glaberrima, brevis: *semina* cinereo-rufescentia, fere globosa, ideoque utraque facie non excavata, sed convexa!

b. *Flores* in racemo composito subsecundo subirregulari dispositi.

8. *S. NICAENSIS*. *All. ped. 2. p.* 81 — *Ten. fl. nap. 4. p.* 210 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 624 — *Willem. et Godr. Sil. de l' Alger. p.* 29 — *S.* viscosissima. *Ten. fl. nap. pr. p.* 24.

S. hirsuto-viscosa, pilis articulatis glandulosis, caule erecto basi ramoso, foliis crassiusculis spathulato-oblongis obtusis, superioribus lanceolato-linearis, floribus in racemo subspectatis sparsisque, calycibus fructiferis clavatis umbilicatis erectis capsulam ovatam pedicellatam subaequantibus, petalorum laminis bipartitis coronatis longe unguiculatis, seminibus tenuè striatis utraque facie plano-compressis dorso canaliculatis.

lc. *All. l. c. t.* 44. *f.* 2 — *Reich. cent. 16. f.* 5065 — *Lychnis hirsuta*, crasso folio. *Bocc. mus. p.* 170. *t.* 118.

In arenosis maritimis; *arenè dell' Arso, Bagno alla marinella del Lago, Lacco a S. Montano, Forio alla marina di Montevergine e di Citara.*

Maio, Julio. ☉

Caulis solitarii vel a basi ramosi, et uti reliquae partes ob viscositatem arenulis conspurcati: *folia* intense virentia, superiora aliquando apice curva: *bractae* anguste lineares, pedunculis breviores: *pedunculi* videntur plures ex eadem bractee axilla irregulariter elongati, sed revera pedunculus solitarius in divisione magis elongatur, et qui videntur breviores ac non adhuc explicati, est racemi ramus bracteis oppositis instructus, inde dividendus ut in affinis, ideoque flores in racemo paniculato alternatim fasciculati videntur: *calyces* non reticulati, ad nervos simplices virentes et hirsutiusculi, inter illos albidii ac glabrati; dentibus triangularibus, obtusiusculis, margine albis: *flores* erecti vel inclinati, ab hora quinta post meridiem usque ad primum mane explicati; *petalorum laminae* supra candidis, subtus plumbeis; earumque lobis obtusis, anguste linearibus, divaricatis; unguibus a calyce exsertis; *coronae laminae* bifidae, laciniis obtusiusculis: *capsula* ovata, pedicellum suum subaequans, valvis demum recurvis: *semina* minutissima, rufescentia.

c. *Inflorescentia* corymboso-paniculata, cum pedunculo alari in dichotomia.

9. *S. ARMERIA*. *Lin. sp. pl.* 601 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 242 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 590.

S. glaberrima glauco-virens, caule erecto, articulis superioribus viscosis, foliis ovalibus oblongisque acutiusculis, caulinis sessilibus subornatis, paniculis terminalibus trichotomis corymboso-fasciculatis, calycibus fructiferis umbilicatis longe clavatis nervosis capsulam pedicellatam ovatam subexcedentibus, petalorum laminae oblongo-cuneatis emarginatis subintegris coronatis, seminibus tenue granulatis utraque facie concaviusculis dorso anguste canaliculatis.

l. Reich. cent. 16. f. 5079 — *Lychnis sylvestris* *l. Clus. hist. 1. f. 288*. In arenosis campis et in vineis, tam elatis quam demissis.

Majo, Octobri. ☉

Folia ima obtusa: *bractae* exiguae, lineares: *pedunculi* graciles, intermedius reliquis duplo longior: *calycis* obscure rosei dentes obtusi, brevissimi, triangulares, ad apicem fusco-membranacei: *corollae* parvae, roseae, uti aliquando ipsi calyces: *petalorum unguibus* inclusis; *coronae laminae* bipartitae, laciniis acutis: *capsula* pedicellum suum subaequans, valvis demum recurvis: *semina* rufescentia, minuta, nec striata nec utraque facie curvato-caniculata, sed plana, vel concaviuscula.

d. Inflorescentia paniculata; ramis omnibus opposite brachiatis, cum unico flore terminali.

10. *S. VIRIDIFLORA*. *Lin. sp. pl.* 537 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 239 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 595.

S. pubescens superne glanduloso-viscosa, caule stricto basi simplici, foliis obscure virentibus utrinque acutis ovali-lanceolatis, inferioribus subspathulatis, paniculae laxae pauciflorae ramis elongatis, floribus nutantibus, calycibus fructiferis erectis ventricoso-ovalibus nervosis non umbilicatis capsulam subsessilem aequantibus, petalis (viridulis!) coronatis longe unguiculatis, lamina anguste bifida, seminibus dorso canaliculatis utraque facie planis minute tuberculatis.

- lc. *Reich. cent. 16. f.* 5104 — *Lychnis Ocyrastris* folio, flore viridi. *Herm. parad. bot. p.* 199.

In sylvis umbrosis tam in elatis, quam in demissis passim.

Junio, Julio. ♀

Caulis 1-3-pedales: *panicula* brachiato-divergens, ramis irregularibus: *calyces* maturi ad nervos virentes hirsuti, inter ipsos glabrati ac albosarrosi, acute 5-dentati; dentibus margine membranaceis: *flores* in hac tantum nostras viriduli!; laminarum lobis angustis; unguibus calyceni superantibus; coronae lamina bipartitis, laciniis oblongis: *semina* fusco-cinerea.

11. *S. ITALICA*. *Pers. syn. 1. p.* 108 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 240 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 599, excl. nonn. synonym. — *Cucubalus italicus*. *Lin. sp. pl.* 593.

S. canescenti-pubescens, caulibus annotinis erectis ascendentibusque superne pedunculisque hinc inde glutinoso-viscosis, foliis radicalibus petiolatis ovali-spathulatis lanceolatisve, superioribus sessilibus anguste-lanceolatis, paniculae erectae brachiatae suborymbosae ramis trichotomis, calycibus fructiferis longe elatis umbilicatis nervosis non reticulatis capsulam ovatam longe pedicellatam aequantibus, petalorum lamina bipartita basi subauriculata, unguibus ad medium ciliatis, corona oblitterata, seminibus dorso planis utraque facie concavis.

- lc. *Reich. cent. 16. f.* 5110.

Ad maceries, ad rupes, et in saxosis ubique ab elatis ad demissa.

Majo, Junio. ♀ et basi ♂

Molliter pubescens: *caules* basi cespitosi, et fere decumbentes; annotini vero erecti aut ascendentes, 1-1-1/2-pedales, superne inter paniculae ramos glutinoso-viscosi: *calyces* ad nervos virentes hirsutiusculi, inter illos glabrati et albi; dentibus erectis, triangularibus, acutiusculis, margine albo-membranaceis: *flores* albi, vix odori, diametro fere polli-

cari : *petalorum lamina* bipartita, supra candida, subtus venis rubentibus aut viridulis notata; *ungues calyrem* per lin. 2 excedentes, vix auriculatae, ab apice ad medium margine pellucidae, ibique retrorsum ciliatae, ut a Cl. Willem. et Godr. *Sil. de l'Alg.* p. 47, et 48 optime notatur : *capsula* parum exerta, pedicello elavato ipsa aequilongo vel breviori suffulta.

S. mellifera, Boiss. et Reut. ab hac nostra penitus diversa est, panicula laxa pauciflora, calyce fructifero duplo fere breviori ac fesso, et vix nervoso. Confer Willem. et Godr. l. c.

§ 2. CONIOMORPHA. Otto.

Calyx inflato-ventricosus, conicus, 30-nervius. *Petala* aestivatione contorta.

12. S. CONICA. *Lin. sp. pl.* 598 — *Ten. fl. nap. 1.* p. 240 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 607.

S. molliter velutino-pubescent, caule erecto simplici aut ramoso, foliis lineari-lanceolatis sessilibus in panicula dichotoma subcorymbosa dispositis, calyce fructifero erecto conico 30-nervio umbilicato non reticulato capsulam conicam sessilem non acuminatam aequante, petalorum limbo parvo obovato emarginato-bilobo coronato, seminibus, utrinque planis dorso vix canaliculatis transverse striato-tuberculatis.

Id. S. conoidea. *Reich. bot. 16. f.* 5061, non *Lin.*, sed certe nominis error in tabula — *Lychnis sylvestris* 11 Clusii. *Barr. ic.* 1027. f. 2 — *L. sylvestris*, angustifolia, calyculis turgidis. *Zannic. hist. p.* 175. t. 118.

In apricis herbosis; *Ischia all'Arso*.

Aprili, Majo. ☉

Calyces exacte ovato-conici, non globosi et longe acuminato-conici, ut in affini *S. conoidea*, ad nervos virentes glanduloso-pubescentes, inter istos albo-scariosi: *flores* rosei, parvi, semper erecti; *petalorum unguibus* coalitis; *coronae laminae* bipartitis, laciniis rotundatis: *semina* cinerea.

§ 3. BENEN. Moench.

Calyx sub anthesi vesiculoso-inflatus, 20-nervius. *Petala* aestivatione imbricata.

13. S. TENOREANA. *Colla herb. ped.* p. 328 — *Willem. et Godr. Sil. de l'Alg.* p. 7 — *Cucubalus angustifolius*. *Ten. fl. nap. 1.* p. 233 — S. inflato b. angustifolia. *Bertol. fl. ital.* 4. p. 630 — *Moris fl. sard. 1.* p. 246! — S. angustifolia. *Guss. pr. 1.* p. 500, non *Marsch.*

S. glaucescens glaberrima, caulibus erectis basi ramosis, foliis sessilibus oblongis vel lanceolato-linearibus, floribus cernuis in racemo dichotomo dispositis, ramis inaequalibus, bracteis scariosis, calyce vesiculoso nervoso-reticulato umbilicato capsulam ovatam apice contractam acuminiatam breviter stipitatam superante, petalorum laminis bipartitis fauce bigibbosis, stylis apice non incrassatis, seminibus globoso-reniformibus acute tuberculatis undique concentrico-striatis vix depressis dorso non canaliculatis.

1c. *Ten. l. c. t. 37.*

In saxosis, ad rupes, in sylvaticis, nec non in campis apricis passim.

Aprili, Octobri. \mathcal{M} , et saepe basi \mathfrak{H}

Folia plana, margine ciliato-serrulata: *calyces* in fructu sub apice parum constricti, non clausi, sed praesertim sub anthesi aperti, ex albido-virentes, et venis viridibus intensioribus reticulati; dentibus triangularibus, acutis, semper erectis: *flores* candidi, raro rosei apud nos: *petalorum* laminae bipartitae, basi auriculatae; lobis obtusis, saepe angustis ac crenulatis: *capsula* levis, glaberrima, tetaphoro sub ipsa statim constricto ac strangulato suffulta: *semina* cinereo-rufescentia, utrisque faciebus concavinscula.

Species ista, uti recte notat *Cl. Colla, Villem.* et *God. l. c.* non foliorum latitudine a *S. inflata Dec.* recedit, nam character iste satis variabilis est, sed stylis apice aequalibus, non vero incrassatis, et capsula ovoideae non globosa. Cum *S. angustifolia Marsch.* alia species sit, ideo hujus nostrae nomen erat mutandum.



De nonnullis speciebus hujus generis Italiae indigenis sequentia adnotanda puto.

I. *S. CERASTOIDES. Lin. sp. pl. 596.*

Cl. Bertol. in fl. ital. 4. p. 574 optime describit *S. cerastoidem*, quae prope *Regio* in Calabria collegi, et quam illi communicavi, quae cum planta herb. *Lin.* exaete quadrat; sed ad ipsius descriptionem, ex inspectione plurium speciminum, haec alia adjungere oportet.

Planta piloso-viscida, pilis glandulosis, et quoad habitum *S. gallicae (Jord.)* similis: *caules* 5-14-pollicares: *folia* aliquando obovato-spathulata: *pedunculi* inferiores in plantis magis explicatis in fructu horizontaliter patentes (sat raro divaricati), capsulam perfectam fere aequantes, aut parum superantes: *flores* in apice racemorum saepe distichii: *calyces* sub apice constricti, tamen uti in icone *Reich. cent. 16. f. 5057* non reticulati (reticulati ex *Willem. et Godr. l. c.*): ejus dentes lanceolati, acuti, denum re-

curvi, capsulam globoso-ovalam intra calycem subsessilem semper excedentes: *filamenta* in nostra a basi ad medium ciliato-hirsuta (etiam in *S. Sardoa* culta, quae ad *S. cerastoidem* citatur), non glabra uti ex *Willem. et Godr. Sil. de l'Alg. p. 14: semina* reniformia, nigrescenti-plumbea, utraque facie vix curvato-canaliculata, dorso non sulcata (sulcata ex icone *Reich.*, et ex *Willem. et Godr. l.c.*), minute acuteque tuberculata. Icon *Reich. l.c.* quoad habitum et folia convenit, sed calyces omnes sessiles, eorum deutes erecti, et semina dorso excavata; at *Willem. et Godr. l. c. p. 15.* iconem istam nulla adjecta observatione ad *S. cerastoidem* citant. In icone *Dill. elth. t. 309 f. 307 caules* erecti, pauciramosi: *flores* fere sessiles: *calyces* fructiferi semper erecti, nec deflexi nec patentes, ideoque quoad habitum icone *Reich.* similes, sed hirsuties insignis, quae in icone *Reich.* fere nulla.

II. *S. VESPERTINA. Retz.*

Cl. *Willem. et Godr. l. c. p. 76 S. bipartitam* Desf. a *S. vespertina* optime distinguunt, quae a me et ab aliis relata sub *S. sericea*. All. (*Bertol. fl. ital. 4. p. 580, Moris fl. sard. 1. p. 253, vel sub S. vespertina Webb. iter. hisp. p. 63, Koch syn. ed. 2. p. 109*): sed ipsi auctores sub *S. bipartita* uti var. *d. S. canescentem* Ten. adducunt, tamen ista nec cum *S. bipartita* nec cum *S. vespertina* est confundenda. Ideo inspectione speciminum aut plantarum viventium, nec non observationibus nonnullorum innixus, species istas affines, earumque synonyma sic disponenda mihi videntur.

S. VESPERTINA. Retz. observ. bot. 3. p. 31 — Willd. sp. pl. 2. p. 699 — Poir. dict. enc. 7. p. 172 — Griseb. spicil. fl. Rum. et Bythin. 1. p. 177, ut videtur ex descriptione.

In hac, ex specimine hispanico a Cl. *Boiss.* accepto, *caules* et *folia* non hirta, uti ex *Retz.*, sed pilis brevibus mollibus tecta: *racemi* simplices, pauciflori: *bracteae* lanceolato-acuminatae: *pedunculi* inferiores illas aequantes, 2-3 lin. longi: *calyces* cylindraceo-clavati, apice non ita dilatati uti in sequente, vix umbilicati, undique pilis albis mollibus approximatis patentibus tecti, nervis virentibus, inter istos albidii; dentibus obtusiusculis, apice parum recurvis: *coronae* laminae connatae: *petalorum* unguis longe exsertae; *laminae* vero cuneatae, bifidae, parvae: *semina* deficiunt, quae ex *Retz.* minuta.

III. *S. PUBESCENS. Loisel. fl. gall. ed. 1. p. 227, et ed. 2. v. 1. p. 314 — Dec. pr. 1. p. 380 — Reich. cent. 16. f. 5067. b.*

In specimine a *Requ.* misso ex Corsica, et ex icone *Reich.* habitus *S. sericeae*, petala vero *S. canescentis*: *caules* ascendentes, alterne ramossissimi: *pedunculi* breves, 2-5 lineares: *flores* in apice ramorum solitarii: *calyces* fructiferi a medio ad apicem valde dilatato-clavati, undique virentes, et uti reliquae partes pube longiusecula molli patente obducti;

dentibus obtusiusculis, triangularibus, rectis, capsula brevioribus; nervis latis: *petalorum* lamina bipartita; unguibus exertis: *capsula* globoso-ovalis, pedicello suo multo brevior!: *semina* in specimine meo deficient; sed ex icone *Reich.* dorso canaliculata, utraque facie curvato-canaliculata, margine undulata non eincta, uti in *S. bipartita*.

- IV. *S. SENICEA*. *All. ped. 2. p. 81. t. 79. f. 3*, mala — *Willd. sp. pl. 2. p. 692* — *Dec. pr. 1. p. 580* — *Loisel. fl. gall. ed. 1. v. 1. p. 314* — *Moris fl. sard. 1. p. 253*, excl. plurim. synonym. — *Reich. fl. germ. 2. p. 814*, et *cent. 16. f. 5065*, sed quoad habitum, et pedunculos mala.

b. *angustifolia*. *Moris. l. c. t. 17. f. 1.*

e. *crassifolia*. *Moris. l. c. t. 17. f. 2.*

In specimine corsico a *Cl. Boiss.* misso *folia* fere lanceolata, canescenti-subsericea: *flores* uti in praecedente saepius in apice ramorum solitarii: *pedunculi* 2-4-lineares, non fere pollicares, uti in icone *Reich.*, erecti et non fere divaricati: *calyces* fructiferi a medio ad apicem parum dilatato-clavati, basi non umbilicati, adpresse canescentes (non villosi!), nervis viridulis, inter illos albidii; dentibus brevibus, triangularibus, acutis, capsulam maturam aequantibus: *petalorum* ungues longe exerti (per lin. 2-3); lamina bifida, parva: *capsula* ovalis, pedicellum suum subaequans!: *semina* non vidi, ista vero ex *Willem.* et *Godr.*, et ex icone *Reich.* utrinque curvato-canaliculata, dorso late sulcata; ala non undulata.

- V. *S. CANESCENS*. *Ten. fl. nap. 1. 236. t. 89* — *Dec. pr. 1. p. 373* — *Reich. fl. germ. 2. p. 814*, excl. syn. *Biv.*, et *cent. 16. f. 5067*, quae quoad petala mala.

In hac specie tota planta pube tenui canescens: *caules* ramosissimi, deumbentes, floriferi ascendentes: *pedunculi* 2-4 lin. longi: *flores* in racemo simplicii sat raro geminato, cum pedunculo in dichotomia plus minus elongato dispositi: *calyces* umbilicati; fructiferi clavati, a medio ad apicem fere dilatato-campanulati, uti in *S. pubescente*, et in sequente, ad nervos latos virentes aut purpurascens, inter illos albidii; dentibus triangularibus, obtusis, capsula brevioribus: *petalorum* laminae basi non constrictae!, ideoque nullo sinu inter illas remanente!, et minus profunde partitae quam in sequente; eorum lobis planis, a se invicem non divaricatis, uti in illa, cui semina quoque similia, tamen in margine ala plana non undulata eincta!

- VI. *S. BIPARTITA*. *Desf. atl. 1. p. 352. t. 100* — *Willem. et Gord. l. c. p. 26*, exclusa var. *d.* — *S. vespertina*. *Dec. pr. 1. p. 374*, non *Retz.* — *Reich. fl. germ. 2. p. 814*, et *cent. 16. f. 5068*, non *Retz.*, sed ala seminum male depicta, quia plana non vero undulata, uti in natura — *S. colorata*. *Poir. dict. enc. 7. p. 761*, non *Schous.*, nec *Dec.* — *S. sericea*, a. *Cuss. syn. 1. p. 483*, et *Sebast. et Maur. fl. rom. pr. p. 151*, non *All.*

- b. decumbens*; caule decumbente, foliis virentibus obovatis. — *S. sericea*, *d. Guss. l. c.* — *S. decumbens. Div. cent. 1. p. 75. t. 6.* — *S. bipartita*, *d. decumbens. Willem. et Godr. l. c. p. 27*, excl. syn. *Moris.*
- c. crassifolia*; caule decumbente, foliis suborbiculatis spathulatisque crassiusculis hirsutis, calycibus tenui canescenti-puberulis. — *S. sericea*, *e. Guss. l. c. excl. syn. Moris*, cujus icon vero quoad habitum et folia hanc varietatem exacte refert, sed non quoad petala, quae emarginato-biloba, et non bipartita.
- cc. omnia ut in c.*, sed folia hirsutiora, flores solitarii in apice ramorum, et calyces patenter villosos-pilosi; quae forma quoad calyces *var. b. lasiocalyceum Willem. et Godr. l. c.* referre videtur.
- d. angustifolia*; caule erectiusculo, foliis lineari-spathulatis calycibusque caescentibus — *S. sericea*, *d. Guss. l. c.*; quae forma ad *S. sericeam* maxime accedit.
- e. glabrata*; caulibus gracilibus, foliisque glabris, petalis in folia conversis. — *S. sericea*, *e. Guss. l. c.* — *S. Mandralisci. Parlat. et Bertol. l. c.*

Omnēs enumeratae varietates, quae in Sicilia proveniunt, excepta *var. a*, quae in Apulia prope *Barletta* invenit *Bruni*, differunt a *S. vespertina Retz.* pubescentia adpressa ac tenui (excl. *var. e. et cc.*); florum inferiorum *pedunculis* 3-5-plo longioribus (fere pollicaribus): *florescentia* diurna; *petalis* bipartitis, non bifidis; *seminibus* majusculis, non minutis — A *S. canescente* vero, cum qua calycis et capsulae forma convenit, *petalorum* laminis basi valde constrictis, ideoque sinu lato inter illas remanente!; earum lobis angustis, concavis, interque se remotis!, qui characteres in iconibus citatis optime exhibentur. — *Semina* fere orbiculata, utraque facie plano-depressa, dorso canaliculato, marginibus alata lata crispato-undulata instructis quae plana in *S. canescenti!*

- VII. Denique *Cl. Willem. et Godr. l. c. p. 37. S. rubellam* *Liu. a mea S. turbinata* non separant, uti jam fecit *Cl. Moris* in *fl. sard. 1. p. 246*; tamen uti monet *Cl. Bertol.* in *fl. ital. 4. p. 588, et 589* inter se egregie differunt. Innumera specimina *S. rubellae*, quae in Apulia in vineis prope *Barletta* collegit *Bruni*, cum illis aegyptiacis a *Cl. Kralichio* missis, et cum icone *Delil. descr. de l'Egypt. t. 29. f. 3.* ex asse quadrant, nec unquam in *S. turbinatam* transeunt; atque haec ab illa prima facie dignoscitur; caule erecto, stricto!, basi simplicissimo, superne tantum in paniculae ramos diviso!: *foliis* caulinis inferioribus superioribusque lanceolatis, acutis!: *floribus* laxè paniculatis, pedunculis in dichotomia usque bipollicaribus; *calycibus* exquisitè viridi-nervosis, in fructu apice dilatatis, ut fere turbinato-campulati dici possant; *capsula* globosa-ovata; *tecapthoro* magis incrassato, vix lin. longo — In *S. rubella*

vero; caules ab ipsa basi ramosi, ramis infimis ascendentibus; folia caulina inferiora et media oblongo-spatulata, obtusissima, et ipsa folia suprema nunquam acuta ut in illa; flores coadunato-fasciculati, pedunculis in dichotomia (dum adsunt) vix pollicaribus; calyces obsolete viriduli-nervosi, etiam in fructu oblongo-clavati! ob figuram ovoideam capsulae; tecaphorum magis tenue, 2 lin. longum; semina in utrisque similia, tamen in *S. turbinata* ad figuram globosam magis accedunt.

Icon Viscago hirsuta, flore rubello vix conspicuo. *Dill. elth. t. 314. f. 406* quoad habitum magis *S. turbinatam*, quam *S. rubellam* refert.

40. LYCHNIS.

Tourn. inst. t. 175 — Endl. gen. n. 5250.

1. *L. DIOICA*. *Lin. sp. pl. 626, var. b. — Ten. fl. nap. 4. p. 241 — Bertol. fl. ital. 4. p. 740 — L. vespertina. Sibth. fl. oxon. p. 145.*

Ic. Reich. cent. 16. f. 5125.

Majo, Octobri. ☿

Flores candidi, vespere aperti et odori: *capsula* oblongo-pyramidata, versus medium constricta: *semina* cinerea, reniformia, tuberculata, dorso convexa, nec canaliculata.

41. SAGINA.

Wimmer in Koch syn. ed. 2. p. 117.

1. *S. MARITIMA*. *Don. Hort. Britt. p. 155 — Bertol. fl. ital. 3. p. 612 — S. stricta. Fries nov. fl. Succ. ed. 2. v. 1. p. 58, var. b — Jord. obs. fus. 3. p. 48 — S. apetalata. Ten. fl. nap. 3. p. 170, ex parte, et quoad plantam prope Neapolim proveniente.*

S. caule a basi ramoso, ramis patulis ascendentibusque, foliis anguste linearibus obtusiusculis exaristatis glabris non ciliatis, pedunculis defloratis semper erectis, sepalis obtusis semipatentibus, floribus apetalis, seminibus opacis levibus ovatis nigris.

Ic. Jord. l. c. t. 3. f. A. 1-12 — Reich. cent. 15. f. 4960.

Ad vias, ad muros, et in herbosis arenosis umbrosis passim.

Martio, Majo. ☺

Folia in hac specie omnino glabra, nec ciliata!, nec apice arista terminata!: *sepala* omnia obtusa: *flores* apetalis. — In *S. apetalata* folia ciliata sunt, et sepala duo exteriora brevissime mucronata; in utrisque vero pedunculi deflorati semper erecti, qui apice incurvi in *S. procumbente*. Aliunde *sepala* in fructu horizontaliter patentia, in *S. apetalata* et in *S. procumbente*; dum in *S. maritima* semipatentia sunt.

Confer *Jord. obs. l. c.*, et in *fasc. 1. p. 26. et 27* quoad *S. apetalam*.
 2. *S. PATULA*. *Jord. obs. fasc. 1. p. 25.*

S. caule basi ramoso, ramis gracilibus numerosis patulis ascendentibusque, foliis glabris non ciliatis anguste linearibus acutis aristatis, pedunculis capillaribus superne calycibusque tenuis piloso-glandulosis, sepalis margine scariosis ovali-oblongis obtusis demum semipatentibus capsulam maturam subaequantibus, petalis minimis obovato-emarginatis.

lc. Jord. l. c. t. 3, f. A. 1-7.

In apricis herbosis; *Ischia all'Arzo, presso il muro nella discesa dalla Cercola al Bagno, ed al Castiglione, Casamicciola, Lacco.*

Martio, Majo ☉

Præcedenti et *S. apetalae* affinis, sed habitu graciliore, foliis apice arista terminatis, pedunculis brevissime piloso-glandulosis, et sepalis ab utriusque diversa.

42. SPERGULA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 798.

1. *S. ARVENSIS*. *Lin. sp. pl. 630* — *Ten. fl. nap. 4. p. 236* — *Reich. fl. germ. 2. p. 567* — *S. sativa. Bonningh. fl. monst. pr. n. 568*; et *Bertol. fl. ital. 4. p. 774* — *S. arvensis, a. sativa. Koch syn. ed. 2. p. 120.*

S. laete virens glabrescens, foliis filiformibus tenuibus, seminibus tumidis lenticulari-subglobosis elevato-punctatis margine angusto carinato circumdatis.

lc. Reich. cent. 6. f. 704 — *Lam. ill. gen. t. 392. f. 1?*

In arenosis campis cultis vel incultis, et in vineis ubique.

Octobri, ad Majum. ☉

Pedunculi fructiferi refracti: *flores* albi: *semina* atra, pilis albis brevibus conspersa — Uti recte monet *Cl. Reich. l. c.* sequentis gracilior, et omnibus partibus glabrior: praeterea folia tenuiora. Confer quoque *Cl. Bertol. l. c.*

2. *S. VULGARIS*. *Bonningh. l. c. n. 569* — *Reich. l. c.* — *S. arvensis, b. vulgaris. Koch l. c.* — *S. arvensis. Bertol. fl. ital. 4. p. 772.*

S. opaca viscidula piloso-glandulosa, foliis filiformibus crassiusculis, seminibus lenticularibus angustissime marginatis papillis clavatis albidis demum brunneis obsessis.

lc. Reich. cent. 6. f. 705.

In vineis arenosis; *Lacco al Monte Vico.*

Aprili, Majo. ☉

Caules firmiores, minus divisi: *folia* crassiora saepius incurva: *capsulae* paullo majores.

43. LEPIGONUM.

Wohlberg fl. gothob. p. 45 — Koch syn. ed. 2. p. 120.

1. *L. HETEROSPERMUM*. *Guss. — Arenaria heterosperma. Guss. syn. 1. p. 501, excl. syn. Bauh. — A. marina, b. Bertol. fl. ital. 4. p. 685, ad quam varietatem nostra spectat, non vero ad var. a. — A. rubra, c. Ten. fl. nap. 4. p. 219, quoad iconem Column., sed vix quoad descriptionem, quae potius ad sequentem spectat — L. salinum. Fries nov. ed. 2. mant. p. 34?, ex quo L. medium Wahl. Goth. p. 46?, sed in nostra folia semiteretia sunt.*
- L.* caulibus diffusis ascendentibusque ramosis, foliis anguste linearibus crassiusculis semiteretibus glabris, stipulis scariosis ovato-orbiculatis obtusiusculis, pedunculis defloratis deflexis, sepalis basi utrinque glandula nigra nitida notatis! glanduloso-pilosis capsula ovata-brevioribus, seminibus obovatis compressis margine tumido cinctis, aliis (paucis) margine lato albedo circumdati.
- le.* Alsine maritima, neapolitana, ac terrestris, altera. *Column. Ecphr. 2. t. 71, ex habitu et pedunculorum descriptione.*
- In arenosis maritimis; *Bagno alle sponde del Lago (rara), marina di Forio nelle arene presso i muri a secco.*
- Aprili, Majo. ☉, ac aliquando ♀, et tunc Januario etiam florere incipit. Habitus *L. marginati* et *L. macrorhizi*, sed etiam in planta perennanti radices tenues et fibrosae sunt, non vero sublignosae ut in isto, et semina diversa. — *Cl. Webb. in Phyt. can. tom. 3. pars. 2. sec. 1. p. 147* sub *Arenaria marina Wahlensb.* tam *A. macrorhizam*, quam hanc nostram, et *A. inediam Lin.*, nec non *A. rubram b. morinae* refert, sed confer quae dixi in *syn. l.c.* — Icon *Spergula marina* nostras. *Bauh. hist. 3. p. 723*, quam ad hanc speciem citavi, ob radicem crassam potius ad *L. macrorhizum* spectare videtur.
2. *L. MEDIUM*. *Wahl. fl. gothob. p. 45, et Koch syn. ed. 2. p. 120 — Arenaria rubra, b. marina. Lin. sp. pl. 608, ex Koch; sed ex Fries nov. fl. svec. 3. p. 83 ad hanc spectat potius A. media Lin. sp. pl. 606 — Alsine marina. Reich. fl. germ. 2. p. 566 ex ipsius specimine, sed semina in hoc deficiunt — A. rubra. Guss. syn. 1. p. 300, excl. noun. synon. — Bertol. fl. ital. 4. p. 683 ex parte.*
- L.* caulibus diffusis ascendentibusque ramosissimis, foliis lineari-filiformibus semiteretibus (teretiuseculis *Koch*) crassiusculis submuticis, stipulis scariosis ovatis acutis aristatisve, pedunculis calycem parum superantibus fructiferis rectangule patentibus effoetis erectis!, sepalis lanceolatis obtusis concavis margine membranaceis basi utrinque glandula pelu-

cida nigra notatis capsulam subaequantibus, semiibus obovatis compressiusculis obsolete rugulosis omnibus apteris margine tumidiusculo cinctis.

1c. *Engl. bot. t. 958, ex Koch.*

In maritimis herbosis humentibus aut siccis, et secus viros aut ruderata, nec non ad vias passim.

Aprili, Junio. ☉

Planta laete virens, superne glanduloso-pubescent, et inde arenulis plus minus conspurcata: folia semiteretia?; internodiis subaequalia: stipulae late ovatae, breves: sepala concava, obtusa, margine vix scariosa, glabra vel glanduloso-pubescentia, petala ovalia coerulea obtusiuscula aequantia: stamina saepius 3, sed etiam 5-8: capsula glabra, vix calycem excedens: semina omnia pyriformia? — Variat floribus pallide vel intense coeruleis, raro albis.

Species hujus generis extricatu difficiles, proinde pauca tantum synonyma retuli. Confer Koch, *Fries, Walr., sch. crit. p. 201 ad 206* et *Webb. l. c.*

41. AISINE.

Wahlenb. fl. lapp. p. 129 — Koch syn. ed. 2. p. 122.

1. *A. PROCUMBENS.* *Webb. it. hisp. p. 62, et phyt. canar. tom. 3. pars. 2. sect. 1. p. 149 — Arenaria procumbens. Vahl symb. 2. p. 5. — Ten. fl. nap. 4. p. 222. — Bertol. fl. ital. 4. p. 665 — A. herniariaefolia. Desf. atl. 1. p. 358, et 2. p. 450 — A. geniculata. Poir. dict. enc. 6. p. 165. — A. Bartolotti. Tin. pug. p. 10., var. fl. albis — A. rosea. Presl fl. sic. 1. p. 165 ex Webb.*

1c. *Vahl. l. c. 33 — A. maritima, longius radicata, Herniariae foliis. Bocc. sic. t. 10.*

In maritimis arenosis, et ad vias; *Ischia nelle arene dell' Arso presso al mare sopra al Molino, Forio nelle arene di Montevergine, e sulla strada che conduce al Lacco presso al Purgatorio, ed in quella che conduce a Mannella.*

Majo, Octobri. ☿.

Radix caespitosa, in arenis alte descendens: caules et folia (vix 2. lin. lata ac virentia) patenter breviterque piloso-pubescentes, sed aliquando glabrati: pedunculi elongati, post anthesim recurvi: sepala virentia, ad margines tenue albo-scariosa: petala ovata, obtusa, rosea, calycem fere duplo superantia, ungue in disci subepigyni glandulis carnosulis nitide virentibus bilobis inserta: capsula calyce brevior, ovata, ad medium usque dehiscens: semina subreniformi-globosa, minutissime ruguloso-punctulata.

2. *A. tenuifolia*. *Wahl. helv. p. 87* — *Arenaria tenuifolia*. *Lin. sp. pl. 607* — *Ten. fl. nap. 4. p. 228* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 674*.
 Ic. *Subulina tenuifolia*. *Reich. cent. 16. p. 4916* — *A. tenuifolia*. *Vaill. bot. paris. t. 3. f. 1*.
 Ad muros non satis obvia. *Chiajano, Pico*.
 Aprili, Majo. ☉

45. MOEHRINGIA.

Endl. gen. n. 5235 — *Koch syn. ed. 2. p. 126*.

1. *M. trinervia*. *Koch syn. l. c. p. 127* — *Arenaria trinervia*. *Lin. sp. pl. 605* — *Ten. fl. nap. 4. p. 221* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 658*.
 Ic. *Reich. cent. 15. f. 4943* — *Alsine Plantaginis folio*. *Bauh. hist. 3. p. 364*.
b. glaberrima; foliis margine non ciliatis — *M. pentandra*. *Gay, et Arenaria trinervia, b. divaricata*. *Salzm. in Bertol. l. c.*
 Ad muros, et ad rupes in umbrosis ubique; sed var. *a.* magis rara, *Valle del Crovone*.
 Aprili, Majo. ☉

Caulis uti *pedunculi*, qui demum deflexi, adpresse pilis reversis albidis puberuli: *folia* uti *petioli* ad *margines* ciliata: *sepala* lanceolata, acuta, concava, subnervia, ad *carinam* ciliata, margine lato albo-scarioso circumdata: *petala* candida, elliptica, integerrima, calyce breviora, saepius nulla: *stamina* ut plurimum 5; *antheris* globosis, una cum *stigmatibus* revolutis candida: *capsularum* *valvae* sex, scariosae, demum apice revolutae: *semina* nitide-nigra, globoso-reniformia, compressiuscula, levissima — *Var. b.* differt *foliis* glaberrimis; *sepatis* tribus exterioribus omnino glabris (non ciliatis), minus acuminatis, non trinerviis, sed exquisite carinatis, *capsulam* fere globosam ac depressam aequantibus.

46. ARENARIA.

Endl. gen. n. 5234 — *Koch syn. ed. 2. p. 127*.

1. *A. leptoclados*. *Guss. syn. 2. p. 824* — *A. serpyllifolia, b. leptoclados*. *Reich. cent. 15. p. 32* — *A. serpyllifolia*. *Ten. fl. nap. 4. p. 221*, non *Lin.* — *Bertol. fl. ital. 4 p. 659*, ex parte.
A. tenue pubescenti-virescens, caulibus ramosissimis decumbentibus erectisque (gracilibus), foliis sessilibus ovatis acutis tuberculato-scabris obsolete 3-nerviis, pedunculis tenuibus folio longioribus fructiferis horizontaliter patentibus, sepalis lanceolatis acutis 3-nerviis hirsutis corolla triplo longioribus, capsulis ovalibus! calycem subexcedentibus!

1c. *Reich. l. c. 4941. b.*

Ad muros, et ad vias in apricis ubique obvia.

Aprili, Junio. ☉

Caules 3-8-pollicares: *folia* margine ciliata, et raro uti caules et pedunculi glabrata: *pedunculi* fructiferi 4-7 lin. longi, filiformes: *sepala* concava, non carinata; tria exteriora concoloria; duo interiora ad margines albo-scariosa: *petala* alba, oblonga, integra: *capsula* nunquam globoso-ovata!, ut in vera *A. serpyllifolia*: *semina* fusca, globoso-reniformia, concentrice tuberculato-striata, ad dorsum obsolete canaliculata. Variat floribus pentandris, et pubescentia aliquando viscidula.

47. STELLARIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 773.

1. *S. MEDIA*. *Vill. delph. 3. p. 615 — Ten. fl. nap. 4. p. 217 — Bertol. fl. ital. 4. p. 645 — Alsine media. Lin. sp. pl. 389.*

a. grandiflora; petalis calycem aequantibus, vel parum excedentibus, floribus decandris *Ten. l. c.* — *S. media, b. major. Koch syn. ed. 2. p. 130 — S. neglecta. Veiche, et S. umbrosa Opiz in Koch l. c.*

1c. *S. neglecta. Reich. cent. 15. p. 4905! — Alsine major. Dod. pempt. 29. f. 1.*

b. intermedia; petalis calyce duplo brevioribus usque ad basim bipartitis, laciniis angustis oblongo-ellipticis a se invicem remotis, linea pilorum per caulem decurrente oblitterata.

1c. *Reich. cent. 15. f. 4904 — Alsine minor. Dod. pempt. 29. f. 2.*

c. apetalas; caule ut in praecedente, petalis abortivis.

In culis pinguibus, et humentibus, nec non ad vias ubique omnes enumeratae varietates; at var. *a.* in pinguioribus, et in apricis frequentior.

À Febuario ad Junium. ☉

Vulgo *Morviglina-Flores albi*.

48. MOENCHIA.

Ehrh. Beitr. 2. p. 277 — Koch syn. ed. 2. p. 131.

1. *M. ERECTA*. *Smith fl. britt. 1. p. 241 — Bertol. fl. ital. 2. p. 245 — M. quaternella. Ten. fl. nap. 3. p. 170 — Sagina erecta. Lin. sp. pl. 185.*

1c. *Reich. cent. 15. f. 4953 — Alsine verna, glabra. Vaill. bot. paris. t. 3. f. 2.*

In herbosis humentibus apricis; verso la metà della strada del Pennino di Campagnano, salendo a dritta, sed satis rara.

Aprili, Majo. ☉

Erecta, glaucescens, glaberrima: *pedunculi* uniflori, axillares et terminales: *petala* candida, parva, calyce triplo breviora: *stamina* quatuor. Confer *M. octandra* in *Reich. pl. rar.*

49. CERASTIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 797.

1. *C. GLOMERATUM*. *Thuil. fl. paris. p. 226* — *C. ovale*. *Pers. syn. 1. p. 521* — *C. vulgatum*. *Lin. sp. pl. 627* — *Ten. fl. nap. 4. p. 229* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 746*, excl. var. *b.* — *C. viscosum*. *Fries nov. ed. 2. p. 128.*
a. eglandulosum; pilis omnibus eglandulosis. *Koch syn. ed. 2. p. p. 132.*
1c. Reich. cent. 3. f. 385, ac 386, et cent. 15. f. 4970—*Myosotis arvensis*, hirsuta, parvo flore. *Vaill. bot. paris. t. 30. f. 3.*
b. glandulosum; sepalis apice purpureo-coloratis, pilisque glanduliferis tectis.
1c. Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 4. 3, 5 — *C. rotundifolium*. *Reich. cent. 3. f. 387?*

Ad muros, ad vias, ac in cultis herbosis obvium.

Januario, Martio. ☉

Paniculae rami sub anthesi semper glomerati, et nonnisi in fructu denique diffusi, nec *pedunculi* unquam elongati vel reflexi: *sepala* virentia, vix albo-marginata, ac a pilis suis superata: *petala* candida, fere linearia, basi ciliata, bipartita, vel bifida; laciniis acutis, calycem vix superantibus: *stamina* 10: *capsula* lineari-oblonga, incurva, calycem et pedunculum superans: *semina* leviuscula.

2. *C. SEMIDECANDRUM*. *Lin. sp. pl. 627* — *Ten. fl. nap. 4. p. 231* — *C. arenarium*, *b. dubium*. *syn. Cuss. 1. p. 507.*
C. pallide-virens subglandulosum pentandrum!, foliis oblongis ovalibusque inferioribus in petiolum attenuatis superioribus sessilibus, paniculae corymbosae ramis approximatis inde divaricatis, bracteis omnibus sepalisque late semiscariosis apice glabris, pedunculis fructiferis deflexis ac elongatis, petalis acute bifidis calyce subbrevioribus, capsulis oblongis curvatis illum duplo superantibus.

- 1c. Reich. cent. 2. f. 315, et 316.* (quas icones in *syn. 1. p. 505* cum dubio sub *C. arenario* citavi), et *cent. 15. f. 4968* multo melior — *C. varians*, var. *pellucidum*. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris t. 5. f. 7, 8, 9* — *C. hirsutum*, minus. *Raj syn. p. 348 t. 15. f. 1.*

In herbosis, ad viarum margines, et in arenosis tam maritimis, quam a mare remotis.

Martio, Junio. ☉

Variat colore plus minus intense virente : *pubescentia* in paniculae ramis pedunculisque eglandulosa vel glandulifera: *caulibus* erectis, simplicibus 1-2-pollicaribus, vel diffusis, ramosis 1-8-pollicaribus, internodiis elongatis, paniculae ramis tunc repetito dichotomis: at constantes characteres sunt *bracteae* et *sepala* fere a medio ad apicem late albo scariosae: *petala* candida, semper acute bifida, *sepalis* aequalia vel breviora: *stamina* 5, sterilibus nullis intormixtis: *pedunculi* deflexi, 5-8 lin. longi, ideoque calycem longe excedentes: *capsulae* incurvae, calyce fere duplo longiores — Specimina Svecica, Anglica, ac Gallica cum nostris ex asse quadrant.

3. *C. obscurum*. *Chaub. in St. Am. fl. agen. p. 181* — *C. glutinosum*, *e. pallens*. *Koch syn. ed. 2. p. 133.*

C. pallide virens superne glanduloso-viscosum pentandrum!, foliis oblongis ovalibusque in petiolum attenuatis superioribus sessilibus, paniculae ramis approximatis inde divaricatis, bracteis inferioribus herbaceis, superioribus sepalisque acutis integris margine scarioso angustissimo terminatis, pedunculis fructiferis deflexis ac elongatis, petalis exacte bifidis sepala subexcedentibus, capsulis oblongis vix curvatis calyce duplo longioribus.

Ic. *C. varians*, var. *obscurum*, *b. parviflorum*. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris t. 5. f. 6.*

In apricis herbosis siccis; *Ischia all'Arzo*, sed satis rarum.

Aprili, Majo. ☉

Planta superne subglanduloso-viscosa, ideoque saepius arenulis conspurcata: *habitus* omnino praecedentis, a quo praecipue bractearum et sepalorum characterem diversum.

4. *C. luridum*. *Guss. syn. 1. p. 510.*

C. patenter ac conferte piloso-hirsutum eglandulosum ac sordide obscureque virescens pentandrum!, caulibus erectiusculis pedunculis fructiferis inclinatis refractisque, inferioribus longioribus, bracteis omnibus herbaceis, floribus laxiuscule dichotomo-paniculatis, sepalis acutis pilis viscido-glandulosis tectis, omnibus ad apicem margine scariosis petala bipartita superantibus, capsulis cernuis calyce parum longioribus.

Ic. *nulla*.

In herbosis montosis; *presso S. Nicola, alle Falanghe, ed al Fasano*.

Aprili, Majo. ☉

Habitus sequentis, cum quo male confusum a *Reich. in cent. 15. p. 38.* sed magis cespitosum; *pedunculi* duplo seu breviores; *flores* confertiores, et habitus alienus; praeterea in eodem loco simul proveniunt nec unum in alterum transit, characteresque immutatos servant. *Semina* rufescentia fere ovalia, compressa dorso granulata ut in sequenti.

5. *C. BRACHYPETALUM*. Desport. in *Pers. syn.* 1. p. 520 — *Ten. fl. nap.* 4. p. 753, excl. syn. *C. alsinoidis* Guss. — *C. strigosum*. Fries. nov. ed. 2. p. 131.
- C. hirsutum* pallide virens subcanescens decandrum non viscosum eglandulosum, caulibus erectis ascendentibusque dichotomis, pedunculis inferioribus elongatis (8-14 lin.) refractis inclinatisve, bracteis omnibus herbaceis calycibusque apice barbatis, floribus laxè dichotomo-paniculatis, sepalis acutis interioribus margine membranaceis petala bipartita basi ciliata subduplo superantibus, capsulis cernuis calyce parum longioribus.
- lc. *Reich. cent.* 3. f. 338, et 15. f. 4971 — *Coss. et Germ. atl. fl. paris.* t. 4. f. 6, 7, 8 — *Dec. pl. Gall. rar.* t. 44.
- In sylvaticis umbrosis; *selve delle Falanghe, del Fasano, di Catreca, e della Pera, Valle del Crovone, Cavone delle Nocelle.*
- Aprili, Junio. ☉
6. *C. CAMPANULATUM*. Vie. ann. bot. 1. p. 171 — *Ten. fl. nap.* 4. p. 234 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 755.
- lc. *Reich. cent.* 15. f. 4979 — *Sebast. et Maur. fl. rom. fase.* 2. t. 3. f. 1 — *C. praecox*. *Ten. l. e. t.* 140. f. 1.
- In campis aridis, in apricis herbosis, in arenosis maritimis, et ad vias ubique.
- Januario, Majo. ☉
- Flores candidi, petalis calyce duplo longioribus; ideoque primo vere campi nive obtekti videntur.*

10. LINEAR. Dec.

80. LINUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 528.

1. *L. GALLICUM*. *Lin. sp. pl.* 401 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 358 — *Bertol. fl. ital.* 3. p. 555.
- lc. *Reich. cent.* 16. f. 5168 — *Gerard. prov. t.* 16. f. 1.
- In collibus aridis apricis elatis, aut demissis.
- Aprili, Majo. ☉
- Folia* margine scabriuscula: *paniculae* laxae ramuli glaberrimi: *pedunculi* calycem subaequantes: *flores* lutei, parvi, sparsi.
2. *L. CORYMBULOSUM*. *Reich. fl. germ.* 2. p. 834.
- L.* caule erecto, foliis alternis anguste lineari-lanceolatis margine subtusque scabris!, floribus in ramulorum apice subglomeratis corymboso-paniculatis, sepalis ex ovata basi acuminatissimis a medio ad apicem scabris capsula duplo longioribus, pedunculis fructiferis calycem aequantibus.

1c. *Reich. cent. 16. f. 5169.*

In aridis apricis elatis, aut demissis; *Monte Vetta alle Petrelle, Pietra dell'acqua sotto S. Nicola, salita da Darano a Moropane, Testaccio alla diocesa de' Maronti, costa di Succellaro alla Searupata, di S. Panerazio, del Pignatiello, Guardiola del Testaccio, Laeco al monte Vico, coste della Cava del Carusiello, e di Cerambi sopra Casamicciola.*

Aprili, Majo. ☉

Caules aliquando usque bipedales (*Monte Vetta alle Petrelle*), saepius basi simplices: *folia* apice valde attenuata: *flores* lutei, parvi—*Habitus* praecedentis, sed *flores* glomerati in apice ramorum, in illo sparsi: quoad vero foliorum scabritiem sequenti valde affine.

3. *L. SPICATUM.* *Lam. diet. enc. 3. p. 523*—*L. strictum, c. spicatum. Ten. fl. nap. 3. p. 359*—*L. strictum. Bertol. fl. ital. 3. p. 551* ex parte, et excl. syn. *L. eorymbulosi. Reich.*

b. *sessiliflorum*; floribus axillaribus spicatis, sepalis inaequalibus. *Reich. fl. germ. 2. p. 835*—*L. inaequale. Presl del. prag. p. 58*—*L. spicatum, b. alternum. Ten. non aliorum, quoad ic. Reich.*

1c. *Reich. cent. 16. f. 5170, c.*

In aridis apricis passim.

Aprili, Majo. ☉

Differt a *L. strieto* sepalis inaequalibus foliisque margine scaberrimis, vix aliquando ad basim glanduloso-ciliatis: *flores* lutei, parvi.

4. *L. ANGUSTIFOLIUM.* *Huds. angl. 134*—*Ten. fl. nap. 3. p. 356*—*Bertol. fl. ital. 3. p. 537.*

1c. *Reich. cent. 16. f. 5158.*

In collibus apricis, et in herbosis maritimis passim.

Aprili, Majo. ☉

Flores pallide coerulei; *petalis* calyce duplo fere longioribus.

L. usitatissimum in Insula pro usu oeconomico non colitur.

41. MALVACEAE. Brown.

51. MALVA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1134.

1. *M. SYLVESTRIS.* *Lin. sp. pl. 969*—*Ten. fl. nap. 2. p. 108*—*Bertol. fl. ital. 7. p. 258*, excl. plurim. syn., et var. b.

1c. *Bull. herb. t. 223*, medioeris—*M. sylvestris, elatior. Fuchs. hist. p. 569.*

In sylvis; *selve del Rotaro, di Casamicciola, e del Castiglione, ed al Bagno nel R. Boschetto.*

Majo, Junio. ☽

Caules, pedunculi, et petioli tuberculis scabri: *sepala* exteriora oblongo-lanceolata: *petala* violacea, profunde biloba, sinu lato inter lobos remanente, ad unguis dense barbata, striis saturatioribus violaceis notata: *pedunculi* fructiferi erecto-patentes: *capsulae* villosae, rugulosae.

2. *M. VULGARIS*. *Ten. fl. nap. 5. p. 86*, et *4. in syl. p. 96*, non *Fries.* — *M. sylvestris, b. Ten. l. c. 2. p. 108* ex ipso — *M. sylvestris, b. glabra. Bertol. fl. ital. 7. p. 289.*

M. caule erecto glabriusculo, ramis deflexis, foliis glabris inferioribus leviter lobatis, superioribus profunde 5-lobatis, lobis omnium crenulatis obtusis, sepalis exterioribus oblongo-ellipticis obtusis, petalis obtuse bilobis, capsulis glabris leviusculis.

lc. *nulla.*

In campis, et ad vias ubique.

Aprili, Junio. ☉, et ☿

Flores, quam in praecedente, pallidiores: *petalorum* sinus obtusus!: *sepala* exteriora basi coalita: *pedunculi* fructiferi erecti: *herba* magis virens ac glabrata. — Differt a descriptione *M. sylvestris. Koch syn. ed. 2. p. 142*, petalis emarginato-bilobis; *capsulis* levissimis, non scrobiculato-rugosis nec marginatis; caeterum *sepala* exteriora oblongo-elliptica, obtusa; *pedunculi* fructiferi erecti, isti et *petioli* hirsuti: *petala* ad unguem dense barbata. Confer pro aliis differentiis *Ten. l. c. 4. p. 96.*

3. *M. NICAENSIS*. *All. ped. 2. p. 40* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 257* — *M. rotundifolia. Ten. fl. nap. 2. p. 107*, ex ipso in *fl. nap. 5. p. 86.*

lc. *Cav. diss. 2. t. 25. f. 1. i.* — *Reich. cent. 15. f. 4838*, sed habitus alienus.

In cultis, ad vias, et in ruderalis magis quam praecedens obvia.

Aprili, Junio. ☉

Flores coerulescentes, duplo triploque praecedentis minores.

4. *M. PARVIFLORA*. *Lin. sp. pl. 969* — *Ten. fl. nap. 2. p. 107* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 256.*

lc. *Cav. diss. 2. t. 26, f. 1*, sed *capsulae* male depictae.

b. *eriocarpa*; *capsulis* villosis. *Guss. syn. 2. p. 222.*

Ad vias, et ad ruderalia in herbosis apricis utraeque varietates.

Aprili, Majo. ☉

Flores albi, petalis vix calycem excedentibus.

Omnes enumeratae species unico nomine vulgari *Malta* appellantur, et promiscue in usum medicum veniunt.

82 LAVATERA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1133.

1. *L. ARBOREA. Lin. sp. pl. 972 — Ten. fl. nap. 2. p. 111 — Bertol. fl. ital. 7. p. 269.*

lc. Rech. cent. 13. f. 4857—Malva arborea, veneta dicta. Moris. hist. 2. s. 5. t. 17. f. 16, mala.

Ad rupes maritimas; Ischia nelle rupi sotto al Castello, ai Maronti, Punta di S. Angelo, rupi della marina di Casamicciola, Lacco al monte Vico, Forio alla Punta dell' Imperatore.

Februario, Martio. ♂

Petala violacea, calycem duplo excedentia, striis saturatioribus notata: capsulae pilis stellatis hirsutae: tota planta molliter pubescens.

2. *L. SYLVESTNIS. Brot. fl. lusit. 1. p. 277 — Bertol. fl. ital. 7. p. 276 — L. neapolitana. Ten. fl. nap. 3. p. 113.*

lc. Ten. l. c. t. 65.

In collibus herbosis, et in ruderatis; Ischia al Castello, Bagno, Guardia del Testaccio, Lacco al Monte Vico, Forio a S. Francesco, ed a Citara.

Aprili, Majo. ♂, et aliquando ♀.

*Caulis 1½-4-pedales, aliquando basi suffruticosi in plagis calidioribus; corollae pallide violaceae, striis intensioribus notatae, calyce 1-2-plo longiores: capsulae leves vel rugulosae, glabrae.—Foliorum superiorum lobi aliquando ita acuti sunt, et hirsuties totius plantae major, ut *L. creticae* habitum assumat.*

3. *L. PUNCTATA. All. auct. p. 26 — Ten. fl. nap. 2. p. 112 — Bertol. fl. ital. 7. p. 279.*

lc. Reich. cent. 15. f. 4853.

Inter segetes in subargillosis: seminati presso Panza, sed unica vice vidi. Julio, Julio. ♂

Flores violacei; petalis calycem duplo superantibus: pedunculij elongati.

83. GOSSYPIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1138.

1. *G. SIAMENSE. Ten. atti dell' Istit. d' Incor. di Nap. v. 6. p. 193, var. a. lana nivea.*

G. frutescens, foliis pubescentibus (obscure virentibus) subtus 4-glandulosis 3-5-lobatis, lobis triangularibus acuminatis, siqu acutissimo in-

ter ipsos remanente, calycis exterioris foliolis multioidis corolla (sulphurea immaculata) duplo brevioribus, capsulis ovalibus cuspidatis, seminibus ovatis lanugine virescente arcte adhaerentibus.

Ic. *Ten. l. c. t. 2.*

Colitur sola varietas lana nivea.

Augusto, Septembri. ☉, sed certe ☿, nam caules in plagis calidis, dum hyems mitis est, perdurant.

Vulgo *Cotone*.

12. AURANTIACAE. Corr.

84. CITRUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1218.

1. *C. VULGARIS*. *Risso ann. mus. 20. p. 190 — Dec. p. 1. p. 539.*

Ic. *Ferr. hesp. t. 409.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Cetrangolo amaro*.

2. *C. AURANTIUM*. *Lin. sp. pl. 1100, excl. var.*

Ic. *Lam. ill. gen. t. 639. f. 2 — Blackw. herb. t. 349 — Ferr. hesp. t. 427, 399, 401, 385.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Portogallo*.

3. *C. MEDICA*. *Lin. sp. pl. 1100, excl. var. b.*

Ic. *Lam. ill. gen. t. 639. f. 2 — Blackw. herb. t. 361 — Ferr. hesp. t. 59, 60, 63.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Cedro*.

4. *C. LIMON*. *Risso ann. mus. 20. p. 201 — Dec. pr. 1. p. 539 — C. medica, b. Limon. Lin. sp. pl. 1100.*

Ic. *Blackw. herb. t. 362 — Ferr. hesp. t. 247, et aliae plures.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☿

Sequentes varietates coluntur.

a. *neapolitana*; fructu oblongo, flavescente, apice saepius acuto.

Vulgo *Limone*.

b. *C. limon calaber, secundus*, fructu globoso parvo obscuro virente. *Targ.*

Tozz. Diz. p. 32.

Vulgo *Limoncello*.

43. HYPERICINEAE. Dec.

55. ANDROSEMUM.

All. pedem. n. 1440 — Dec. pr. 1. p. 543.

1. A. OFFICINALE. *All. l. c.* — *Hypericum Androseum. Lin. sp. pl. 1102 — Ten. fl. nap. 2. p. 158 — Bertol. fl. ital. 8. p. 308.*

l. c. Reich. cent. 16. f. 5192 — Sabb. hort. rom. 4. t. 80 — Androseum. Dod. pempt. 78.

In sylvaticis umbrosis; selve di Campagnano, e di Chiummano, via del Crovone, Cavone delle Nocelle.

Majo, Junio. ♀

Folia saepius ampla: flores parvi; stylis duplo quam stamina brevioribus, non illa aequantibus, ut in A. anglico, quod est Hypericum amplifolium Reich. l. c. non Webb.

56. HYPERICUM.

Chois. pr. Hyp. p. 37 — Dec. pr. 1. p. 543.

1. H. HIRCINUM. *Lin. sp. pl. 1103 — Ten. fl. nap. 2. p. 158 — Bertol. fl. ital. 8. p. 311.*

l. c. Duham. arb. ed. 2. v. 6. t. 28 — Androseum foetidum, capitalis longissimis filamentis donatis. Moris. hist. 2. sect. 5. t. 6. f. 8.

Ad sepes, et in sylvaticis umbrosis; selve di Campagnano, di Monte Vezza, Cavone delle Nocelle, del Crovone, e delle Rose, Vallone di Fontana, e di Calimera, selve di Pietraperciata, delle Falanghe, del Fasano, di Catreca, e della Pera, siepi di Casamicciola.

Junio, Julio. ♀

Petala lutea, staminibus breviora; capsula ovalis, basi attenuata.

2. H. PERFORATUM. *Lin. sp. pl. 1105 — Ten. fl. nap. 2. p. 159 — Bertol. fl. ital. 8. p. 316.*

l. c. Reich. cent. 16. f. 5177 — Sabb. hort. rom. 4. t. 89 — Hypericon. Dod. pempt. 76.

b. veronense, foliis angustioribus. Schrank in Reich. l. c. p. 68 — H. thyrsoideum. Jon.

l. c. Reich. cent. 16. f. 5177, b. — H. frutescens majus, et minus. Dill. Eth. 1. p. 182. t. 151. f. 181, et 182.

In campis et collibus, ad vias ubique.

Aprili, Junio. ♀, et aliquando basi ♀

Vulgo Erba di S. Giovanni.

Variat foliis lineari-oblongis acutiusculis, et angustissime linearibus, semper tamen pellucido-punctatis: calycis lacinae integerrimae: petala aurea, glandulis nigris, uti antherae, conspersa.

3. *H. ciliatum*. *Lam. dict. cent. 3. p. 170* — *Ten. fl. nap. 2. p. 161* — *H. perfoliatum*. *Lin. s. veg. ed. 12. v. 2. p. 510?* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 327.*

a. *angustifolium*; foliis ovato-lanceolatis angustis. *Ten. l. c.* — *H. dentatum*. *Loisel. fl. gall. ed. 1. p. 499*, et *Ten. syll. p. 328.*

1c. *Loisel. l. c. t. 17.*

b. *latifolium*; foliis late-ovatis — *H. ciliatum*, b. *Boceoni*. *Ten. l. c.*

1c. *Desf. coroll. Tourn. p. 70. t. 53* — *Hypericum Sambac perfoliatum folio*. *Bocc. mus. p. 164. t. 127.*

In collibus, et in sylvaticis apricis ubique; sed var. a. in apricis aridis, et var. b. in umbrosis pinguioribus frequentior.

Aprili, Majo. ♀, et basi ♂

Folia coriacea, pellucido-punctata: calycis lacinae serrato-glandulosae, una cum petalis aureis, antheris, foliisque subtus ad marginem, plus minus nigro-punctatis.

14. ACERINEAE. Dec.

87. ACER.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1590.

1. *A. CAMPESTRE*. *Lin. sp. pl. 1497* — *Ten. fl. nap. 2. p. 311* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 355*, excl. nonn. synonym.

1c. *Reich. cent. 15. f. 4825 b.*

In sylvaticis; nella selvetta di Amalfitano nella valle del Crovone presso la cantina, sed satis rarum.

Aprili. ♂

Fruetus non vidi, ideoque num ad varietatem *lejocarpam* spectat, ad quam icon *Reich.* pertinet, definire non potui.

15. AMPELIDEAE. Humb. et Kunt.

88. VITIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 396.

1. *V. VINIFERA*. *Lin. sp. pl. 293* — *Ten. fl. nap. 3. p. 229* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 674.*

b. *sylvestris*.

1c. *Jacq. ic. rar. t. 50 — Matth. comm. 2. p. 655.*

In sylvaticis, ad sepes.

Aprili, Majo. ☿

Priusquam enumerationem istam typis evulgare statuissem, Vites ab *Oidio Tuckeri* ab anno 1851 correptae uvae vel male vel omnino non perfecerunt; ideoque varietates eorum exactae adnotare non licuit. Proinde istarum nomina tantum pro nunc hic subjungam:

1. Acinis ex albo-flaventibus.

1. *Aglianichella*—2. *Bianca verace*—3. *Biancolella*—4. *Campatesa*—5. *Cannamela*—6. *Coda di Cavallo*—7. *Coglionera o Grossa*—8. *Falanghina*—9. *Grecanica*—10. *Latina*—11. *Levanta*—12. *Malvasia*—13. *Mundonica*—14. *Ripala*—15. *Ripolone*—16. *Romana*—17. *Rosa*—18. *Sorvegna bianca*—19. *Verdesca*.

2. Acinis ex coeruleo-atris.

20. *Aglianica*—21. *Aglianica bastarda*—22. *Aitella*—23. *Bologna*—24. *Cannamela nera*—25. *Cerasara*—26. *Castagnara*—27. *Cocozza*—28. *Del Gelso*—29. *Ente*—30. *Guarnaecia*—31. *Latteresca*—32. *Nera verace*—33. *Olivella*—34. *Olivella di Spagna*—35. *Palombina*—36. *Piede palumbo*—37. *Rosella*—38. *S. Francese*—39. *Sorvegna*—40. *Tintora*—41. *Verdesca nera*.

16. GERANIACEAE. Dec.

89. GERANIUM.

Herüh. in Vent. tabl. 3. p. 172—Dec. fl. fr. 4. p. 814, et pr. 3. p. 639.

1. *G. MOLLE. Lin. sp. pl. 955 — Ten. fl. nap. 2. p. 102 — Bertol. fl. ital. 7. p. 231.*

1c. *Reich. cent. 15. f. 4879—Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 6. f. E, optima — Pes columbinus. Dod. pempt. p. 61.*

b. *parvulum*; caule gracili diffuso brevi minus villosa, foliis parvis, pedunculis breviter pubescentibus, pilis longis patulis saepius destitutis. *Ten. syn. p. 334.*

In cultis, et ad vias in herbosis passim; var. b. in apricis ad vias; *Chiajano. Martio, Majo. ☉*

Pili glanduliferi alius longioribus glandulosis intermixti in pedunculis; sepalis mutica, aut arista brevissima glandulifera terminata: petala bifida

da vel emarginata, calycem semel excedentia : *capsulae* glabrae , leves.
In *b.* omnia minora, habitus gracilior, et pubescentia minor : *sepala* saepius versus apicem tuberculata, sed *capsulae* ut in specie. Hiscè characteribus a *G. molle* et *viscidulo* aequè diversum.

2. *G. ROTUNDFOLIUM.* *Lin. sp. pl.* 957?, sed certe *Mant. 2. p. 434—Ten. fl. nap. 2. p. 103—Bertol. fl. ital. 7. p. 229.*
Ic. *Reich. cent. 15. f. 4878—Cav. diss. 4. p. 214. t. 93. f. 3.—Fuchs. hist. 205.*

In herbosis passim.

Aprili, Majo. ☉

Planta viscidula, ac mollis: pili patentes in caule et in pedunculis, at in pedicellis glanduliferi— *Descriptio Fries nov. 2. p. 206* optima, ex quo species ista non est *G. rotundifolium Lin. sp. pl.* ex loco ac traditione, ideoque *G. viscidulum* appellat. *Planta nostra* certe eadem ac illa *Lin. mant., Smithii, ac aliorum; praeterea etiam cum descriptione Koch syn. ed. 2. p. 184* optime quadrat; siquidem *petala* rosea, oblongo-cuneata, indivisa, obtusa, vix retusa, *sepala* breviter aristata parum superantia: *capsulae* patenter pubescentes; *semina* favoso-punctata.

3. *G. COLUMBINUM.* *Lin. sp. pl.* 956—*Ten. fl. nap. 2. p. 102—Bertol. fl. ital. 7. p. 237.*
Ic. *Reich. cent. 15. f. 4875—G. columbinum foliis dissectis, pedicellis florum longissimis. Vaill. bot. paris. t. 15. f. 4.*

Aprili, Majo. ☉

Petala duplo majora quam in aliis speciebus hujus Insulae, basi barbata, rosea, calycem longe aristatum aequantia : *semina* reticulata.

4. *G. DISSECTUM.* *Lin. sp. pl.* 956—*Ten. fl. nap. 2. p. 103—Bertol. fl. ital. 7. p. 328.*
Ic. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 6. f. 13—Reich. cent. 15. f. 4873—Cav. diss. 4. p. 200. t. 82. f. 1—G. columbinum majus, foliis imis longis, ad usque pediculum divisis. Vaill. bot. Paris. p. 79. t. 15. f. 2.*
In sylvaticis herbosis, et ad sepes.

Aprili, Majo. ☉

Pubescentia glandulifera, patens in pedunculis, calycibus et aristis: *sepala* acuminato-aristata, *petala* violaceo-purpurea basi barbata excedentia : *semina* favoso-punctata.

5. *G. LUCIDUM.* *Lin. sp. pl.* 955—*Ten. fl. nap. 2. p. 101—Bertol. fl. ital. 7. p. 235.*
Ic. *Reich. cent. 15. f. 4872—Cav. diss. 4. p. 214. t. 80. f. 2—G. rotundifolium, saxatile, montanum. Column. ceph. 1. p. 138. t. 137.*

In umbrosis, ad muros, ad macerias, et ad rupes ubique.

Aprili, Majo. ☉

Calyces in hac specie pyramidato-angulati, transverse ob laminulas eleva-

tas rugosi, *petalis* roseis obovatis indivisis duplo breviores: *folia* glaberrima, nitida.

6. G. ROBERTIANUM. *Lin. sp. pl.* 955 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 104 — *Bertol. fl. ital.* 7. p. 240.

b. *purpureum*; planta humiliore, foliis tripinnatifidis, calycibus inflatis villosissimis, corollis parvis calycem semel excedentibus, capsulis dorso dense tenuaque rugosis. *Reich. cent.* 15. p. 22 — G. *purpureum*. *Vill. delph.* 3. p. 374 — G. *mediterraneum*. *Jard. pl. exic.* ?

1c. *Reich. l. e. f.* 4871, b. — *Vill. l. e. t.* 40 — G. *Robertianum* primum, viride. *Zannic. hist.* t. 228.

In sylvaticis humentibus, ad sepes, et ad muros in umbris: var. b. passim; et var. a. in sylvis montosis elatis; *selve delle Falanghe, di Catreca, e della Pera* una cum var. b.

Aprili, Majo. ☉

Uti notat Cl. *Bertol. l. c. et Webb. phyt. can. v. 3. pars 2. sect. 1. p. 22* characteres minime firmi sunt ad discrimandam hanc varietatem a specio: nam capsulae in utrisque similes; tamen *corallae* in a. duplo majores, et *sepala* saepius rubentia.

CO. ERODIUM.

Herit. Ger. in. Vent. tab. 3. p. 172 — *Dee. fl. fr. A. p. 838, et pr. 1. p. 644.*

1. E. BOTRYS. *Bertol. am. ital. p. 35, et fl. ital. 7. p. 188* — *Ten. fl. nap. 5. p. 79.*

1c. *Geranium Botrys. Cav. diss. 4. t. 90* — *Geranium supinum*, Botrys folio, acu supra spectante. *Boec. mus. p. 145, et G. Botrys folio. t. 109.*

In arenosis, *Ischia all' Arso, Laeco al mante Vico, Panza a Casapolita e nelle colline di Campotese, sammità della Punta dell' Imperatore presso Forio.*

Aprili, Majo. ☉

Folia nitide virentia: *flores* amoenae coeruleae, et *seminum* rostra duplo quam in sequentibus majora.

2. E. CICUTARIUM. *Herit. in Ait. II. Kew. ed. 1. v. 2. p. 414* — *Ten. fl. nap. 2. p. 93* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 182, excl. non. synonym.* — *Geranium cicutarium. Lin. sp. pl. 951.*

1c. *Reich. cent. 15. f. 8464, b* — *Geranium chaerophyllum. Cav. diss. 4. p. 4. t. 95. f. 1* — G. foetus. *Riv. pent. irr. t. 115, optima.*

In apricis herbosis passim.

Martio, Majo. ☉

Flores albi, vel pallidissime rosei: *stamina* glabra, et fertilia basi rotundato-dilatata: *cotyledones* pinnatifido trilobae!, non integrae: *seminum* ari-

stae pilis adpressis tectae; hinc cum descriptione *Koch syn. ed. 2. p. 155* bene quadrat, nec non cum icone *Cav. l.c.*, a qua tamen recedit petalis oblongis, quae tam in icone, quam ex descriptione orbiculata — Variat pedunculis, petiolis, caulibusque glabris, vel pilis patentibus aut subadpressis pubescentibus: insuper in sterilibus aridis planta est subcaulescens: quae tamen ob cotyledones pinnatifido-trilobas et aristas adpresse pubescentes cum *G. cicutario. Cav. l. e. p. 226. t. 93. f. 1.* non est commutanda. Confer *Koch syn. ed. 2. p. 155.*

3. *E. MOSCHATUM.* Willd. *sp. pl. 3. p. 631* — *Ten. fl. nap. 2. p. 94* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 195* — *Geranium moschatum. Lin. sp. pl. 951.*
 lc. *Reich. cent. 15. f. 4967* — *Geranium moschatum. Cav. diss. 4 p. 227. t. 94. f. 1* — *Riv. pent. irr. t. 112, optima.*

In apricis herbosis ad vias, ad muros ubique.

Martio, Majo. ☉

Flores parvi, rosei: folia saepe nigro-maculata: totius plantae odor moschatus.

4. *E. CHIUM.* Willd. *sp. pl. 3. p. 634* — *Ten. fl. nap. 5. p. 79* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 199* — *Geranium chium. Lin. sp. pl. 951.*
 lc. *E. litoreum. Reich. cent. 15. f. 4869*, hoc bene refert, uti in *syn. 2. p. 209.* notavi — *G. chium. Cav. diss. 4. t. 92. f. 1.*

In apricis lapidosis, et ad maerices; *Ischia sul Castello ed all'Arso, Bagno, Castiglione, Lacco al monte Vico, Forio alle fumarole nella contrada del Bell'omo.*

Martio, Majo. ☉

Caulis diffusi: folia pallide virentia, superne glabrata, subtus hirsutiuscula; inferiora lobata, superiora et media tripartita: sepala exquisite viridi-nervosa, aristata: petala parva, calycem semel excedentia, obovata, obtusa, non emarginata, ac uti filamenta rosea; basi ciliata: pistillum roseo-virescens.

5. *E. MALACHOIDES.* Willd. *sp. pl. 3. p. 639* — *Ten. fl. nap. 2. d. 96* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 197* — *Geranium malachoides. Lin. sp. pl. 952.*
 lc. *Reich. cent. 15. f. 4868* — *Geranium malachoides. Cav. diss. 4. p. 220. t. 91. f. 1* — *Lobel. ic. 662.*

In apricis herbosis, ad vias, et in collibus aridis; *coste di S. Pancrazio, marina de' Maronti, da S. Angelo a Soccivo, Panza, alla sommità della Punta dell'Imperatore presso Forio.*

Martio, Majo. ☉

Flores rosei, parvi — Species praecedenti valde proxima, a qua differt foliis pallide non nitide virentibus, nunquam uti in illa tripartitis et profunde lobatis.

17. OXALIDAEAE. Dec.

61. OXALIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 794.

1. *O. CORNICULATA. Lin. sp. pl. 623 — Ten. fl. nap. 4. p. 243 — Bertol. fl. ital. 4. p. 726.*

Ic. Reich. cent. 15. f. 4896 — Oxys flore flavo. Clus. hist. 2. p. 249.

Ad vias, ad agrorum margines, et in cultis passim.

Martio, Septembri. ☞

Flores flavi: pedicelli fructiferi refracti: stolones nulli.

18. ZIGOPHYLLEAE. Brown.

62. TRIBULUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 732.

1. *T. TERRESTRIS. Lin. sp. pl. 554 — Ten. fl. nap. 4. p. 58 — Bertol. fl. ital. 4. p. 422.*

Ic. Reich. cent. 15. f. 4821 — Dod. pempt. 557.

δ. inarimensis; incano-pubescens, petalis stamina subduplo superantibus. In cultis arenosis, ad vias ubique: var. δ. in arenosis maritimis.

Junio, Septembri. ☉

Sepala ovalia, obtusiuscula, concaviuscula, decidua, petalis luteis obovato-cuneatis planis integris aut irregulariter eroso-crenulatis, uti stamina, duplo breviora: filamenta aurea; antheris luteis, subglobosis: stigma sessile, globosum, non 5-radiatum sicut in Papavero, uti ex Koch, sed 5-angulare, sulcatum, aureum: ovarium virescens: nuces nitide virentes, glabrae, non omnes bicornes, et tubercula, quibus obductae sunt, seta albida rigida deflexa terminata.

19. RUTACEAE. Juss.

63. RUTA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 725.

1. *R. BRACTEOSA. Dec. pr. 1. p. 710 — R. chalepensis. Ten. fl. nap. 1. p. 220, ex ipso in vol. 5. p. 372 in indice — Bertol. fl. ital. 4. p. 414; sub R. chalepensi.*

lc. Reich. cent. 15. f. 4815.

In apricis rupestribus; Ischia ai seogli di S. Anna (rara), Casamicciola nelle rupi del vallone del Larito e presso al ponte, Panza, da sotto alla Bocca della serra alle fumarole nella contrada del Bell' Omo sopra Forio, Testaccio alla Guardiola, coste di S. Pancrazio e del Pignatiello.

Aprili, Maio. ♀

Vulgo Aruta.

Calycis lacinae ovatae, obtusiusculae, irregulariter crenulatae: petala concava, obovata, varie fimbriata, subito in unguem contracta, una cum staminibus pistilloque lutea: capsularum lobi acuminati—A R. graveolenti penitus diversa est.

II. CALYCIFLORAE.

20. RHAMNEAE.

64. ZIZYPHUS.

Tourn. inst. t. 403—Gaertn. de fruct. 1. t. 43.

1. Z. VULGARIS. Lam. ill. gen. 2. p. 330—Dec. pr. 2. p. 13—Rhamnus Zizyphus. Lin. sp. pl. 282.

lc. Lam. l. c. t. 185. f. 1.

Colitur.

Majo, Junio. ♀

Vulgo Jojome.

65. RHAMNUS.

Lam. dict. enc. 4. p. 461.

1. R. ALATERNUS. Lin. sp. pl. 28—Ten. fl. nap. 3. p. 233—Bertol. fl. ital. 2. p. 661.

a. vulgaris, foliis late ovatis. Dec. pr. 2. p. 23—Ten. l. c. var. a. latifolia.

lc. Duham. arb. ed. 2. v. 3. p. 42. t. 14—Alaternus l. Clus. hist. 1. p. 50.

b. maritimus, foliis ellipticis obscure serratis. Jord. pl. exsicc.—Ten. l. c. var. c. angustifolia.

lc. Alaternus 11. Clus. hist. 1. p. 50?

Ad rupes ab elatis usque ad litus in sylvaticis: var. b. in maritimis.

Martio, Aprili. ♀

Vulgo *Motta di sangue*.

Sempervirens, inermis; *folia* coriacea, obscure, sed nitide virentia: *flores* parvi, lutei, saepe dioici, grate odori, in racemis, axillaribus brevissimis: *fructus* rubentes, inde nigri.

21. TEREBINTHACEAE. Juss.

66. PISTACIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1511.

1. *P. LENTISCUS. Lin. sp. pl. 1455 — Ten. fl. nap. 5. p. 271.*

lc. Duham. arb. ed. 2. v. 4. t. 18 — Lentiscus. Clus. hist. 4. p. 14.

In fruticulis demissis; da Chiajano all' interno del Cratere del Rotaro (pied. 725 sul mare), alle falde meridionali del monte Vezza (p. 800), ed all' ultime fumarole della costa della Serra sopra Forio (p. 1080).

Martio, Aprili. ☽

Vulgo *Lentisco*.

Sempervirens, dioica: *folia* abrupte pinnata: *flores* in racemis axillaribus densis brevibus: *odor* terebinthaceus, sed ingratus.

22. LEGUMINOSAE. Juss.

67. LUPINUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1176.

1. *L. THERMIS. Forsk. deser. p. 101 — Ten. fl. nap. 5. p. 99 — Bertol. fl. ital. 7. p. 411.*

lc. nulla.

Colitur, et in sylvaticis herbosis nunc fere sponte provenit.

Vulgo *Lupino* una cum sequente.

2. *L. ALBUS. Lin. sp. pl. 1015 — Ten. fl. nap. 5. p. 99 — Bertol. fl. ital. 7. p. 412.*

lc. Blackw. herb. t. 282 — L. flore albo. Riv. terr. irr. t. 26, optima.

Minus frequenter, quam praecedens, colitur, et spontaneus prope loca culta satis rare occurrit.

Aprili, Majo. ☉

Statura minor quam in praecedente; *flores* quoque minores, omnino albi: non ut in illo cum suffuso coeruleo.

3. *L. ANGUSTIFOLIUS. Lin. sp. pl. 1015 — Ten. fl. nap. 5. p. 99 — Bertol. fl. ital. 7. p. 415.*

lc. *Sibth. fl. gr. t. 685.*

In apricis campis, et in collibus; nec non in apricis herbosis sylvarum.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Lupiniello.*

Calycis labium superius bipartitum; sinu angusto inter dentes remanente; inferius integrum, et longius: *corollae* amoene coeruleae: *semina* in planta inarimensi globosa, albida, maculis viridulis obsolete notata. — *L. reticulatus. Desv. ann. sc. nat. 3. p. 100*, et in *Walp. rep. 1. p. 605* huic valde proximus, quoad specimina gallica a Cl. *Kralichio* missa; tamen seminibus differt, quae in nostra planta globosa, albida, varie viridulo-maculata, non vero reticulatum picta; ita ut quoad semina ad hunc spectare videtur *L. angustifolius Guss. syn. 2. p. 260*, nec non planta prope Neapolim proveniens (*Bagnoli, Astroni, Portici*), in quibus semina re vera reticulata dici possunt, ac eodem seminum caractere ad hanc speciem quoque trahenda est icon *L. flore coeruleo minori. Riv. tetr. irr. 1. 29!* — *L. leucospermus Boiss. pug. pl. nov. Afr. et Hisp. p. 23* nostro *L. angustifolio* affinis; sed semina *Pisi* magnitudine et legumina latiora ac longiora in specie *Boiss.* sunt—Incolae cum hujus plantae decocto Asinos lavant, ad illorum pediculos enecandos.

4. *L. HIRsutus. Lin. sp. pl. 2013 — Ten. fl. nap. 2. p. 142 — Bertol. fl. ital. 7. p. 412.*

lc. *Moris fl. sard. 1. t. 72. f. 1 — L. exoticus, hirsutissimus. Bauh. hist. 2. p. 289.*

In apricis fruticetis herbosis; *Lacco al monte Vico nel luogo detto lo Cantariello.*

Aprili, Majo. ☉

Caulis 2-8-pollicares: *folia* septenata; foliolis supra glabris, laete virentibus, subtus albidis pilosis ac carinatis: *bracteolae* duae anguste lineares ad calycis latera: *bractea* vero anguste linearis, pedunculo longior illo adpressa: *calycis* virentis ac atrocoeruleo-punctati et corolla duplo brevioris labium superius 2-partitum; dentibus elongatis, sinu lato rotundato inter illos remanente; labium inferius longius, profunde tridentatum; dentibus (uti illos labii superioris) lanceolato-linearibus, acutis: *flores* laete coerulei: *vexillum* replicatum, rotundatum, mucronatum, superne carinatum, subtus unisulcatum; sulco utrinque macula alba sub apice evanescente notato; *alae* concolores, versus apicem conniventi-approximatae, vexillo parum breviores, ungue brevissimo albedo instructae; *carina* alis aequilonga, parallele venosa, a basi ad medium alba, a medio ad apicem nitide atrocoerulea ac attenuato-rostrata: *legumen* 2-3-spermum, 12-14 lin. longum, 2-3 lin. latum, pilis albidis adpressis hirsutum, acumine brevi incurvo terminatum: *semina* glabra, fusco-

rufescentia, lentiformi-globosa, maculis sordide albedo-rufis irregularibus conspersa, sat raro concoloria, ad hilum nigra.

68. ONONIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1173.

1. *O. SPINOSA. Lin. sp. pl. 1006? — O. antiquorum. Bertol. fl. ital. 7. p. 369, excl. nonn. syn., et Moris. fl. sard. 2. p. 424, non aliorum.*

lc. Ononis f. Tabern. hist. 913, et Lobel. ic. 2. t. 28, optima.

In argillosis elatis; supra Buceto presso la selvo dell' Ulicella, ed a monte Vetta alla solita delle Petrelle.

Junio, Julio. ♀

Caulis linea lata pilorum brevium utrinque villosi (non unifariam): *spinæ* geminae, foliiferae ac floriferae; *foliolo* glaberrima, elliptica, obiter dentato-serrata, obtusa: *pedunculi* solitarii, axillares, calyce longiores: *calyces* glabri, vel sparse piloso-glandulosi; dentibus lanceolatis, aequalibus, uninerviis: *vevillum* fere orbiculatum, surrectum, planum, roseum, basi albidum, ibique lineis intensioribus notatum; *alae* albidæ, obtusæ, oblongæ, inferne divaricatæ, ideoque a carina apice coerulescente et ipsis longiore remotæ; latere superiore approximatae: *legumen* oblique ovatum, calycem excedens, pilis brevibus articulatis glanduliferis pubescens: *semina* subglobosa, varie nigro-rufescenti-maculata, minutis tuberculis scabra.

Descriptio Cl. Koch syn. ed. 2. p. 173, et aliorum cum hac nostra non in omnibus convenit; ideoque descriptionem prolixam dedi. Confer quoque Reut. fl. di Zante p. 38.

2. *O. DIFFUSA. Ten. fl. nap. 5. p. 97 — O. serrata. Bertol. fl. ital. p. 378, et Moris fl. sard. 2. p. 423, non Forsk.*

O. pubescenti-viscosa, caule erecto vel ascendente, ramis decumbentibus apice-surrectis, foliis ternatis, foliolis suborbiculatis serratis striatis in inferioribus orbiculato in superioribus lineari-cuneatis, stipulis subdenticulatis acutis, floribus conferte spicato-racemosis, calycis subscariosi dentibus nervosis acuminatis legumine pubescente aequalibus, corolla brevioribus seminibus minute tuberculatis.

lc. Ten. l. c. 169. f. 2.

b. Dehnhardtii; caule erecto, foliolis argutius serratis, floribus minoribus, pubescentia glandulose. O. Dehnhardtii. Ten. l. c. p. 98.

lc. Ten. l. c. t. 169. f. 1.

In herbosis arcosis maritimis, Lacco allo marina di S. Montono, ed a monte Vico nel piano arenoso del Contariello e sotto la Torre, utraque varietates.

Majo, Junio. ☉

Planta viscoso-villosa, et arenulis conspurcata. Var. b. vix a specie dirimenda, nam in plantis vivis ab una ad alteram transit observatur: semina parva, ac minute tuberculata; quo caractere ab O. Cossoniana Boiss. et Reut. pug. pl. nov. Afr. et Hisp. p. 33, nec non ab O. serrata Forzk., uti moment laudati auctores, probe dignoscitur; proinde male a Cl. Bertol. l. c., et a cl. Webb. in phyt. can. vol. 3. pars 2. sect. 2. p. 29 cum O. serrata confunditur. Denique Cl. Coss. in not. sur quelq. pl. rar. du midi de l'Espagn. fasc. 2. p. 35 denuo hanc speciem ab O. serrata diversam esse monet, tamen ipse O. diffusam ab O. Dehnhardii seminum caractere praecipue separat, quae granulata in hac posteriore, et ex ipso levia in O. diffusa; tamen in utrisque semper levia vidi apud nos.

3. O. MOLLIS. Savi mem. della Soc. ital. v. 9. p. 351 — Ten. fl. nap. 2. p. 137, et O. Cherleri in add. l. c. p. 395 — Bertol. fl. ital. 7. p. 380.
 b. minor; foliis confertis, foliolis angustioribus, florum racemo abbreviato, calycinis laciniis anguste-linearibus acutis. Guss. syn. 2. p. 259.
 lc. Savi l. c. t. 8 — Anonis arvensis, hirsuta, pusilla, viscosa, multis siliquis cernuis. Bon. t. 17, optima.

In apricis aridissimis elatis, vel demissis; Punta di S. Angelo nel pendio del sud (Gasparr.), e sulle sfabbricine del diruto fortino alla sommità; monte Vetta alla salita delle Petrelle, ubi rara.

Aprili, Majo. ☉

Ob ariditatem locorum istorum, caules ad summum 1-2-pollicares sunt, et flores minuti.

69. SPARTIUM.

Dec. pr. 2. p. 145.

1. S. JUNCEUM. Lin. sp. pl. 995 — Ten. fl. nap. 2. p. 131 — Bertol. fl. ital. 7. p. 327.
 lc. Duham. arb. ed. 2. v. 2. t. 22 — Spartium macrolobium. Renealm. specim. t. 33, optima.

In apricis sylvaticis, et in rupestribus ab elatis ad litus.

Aprili, Octobri. ☽

Vulgo *Jenesta*.

Sempervirens, glaberrimum: rami virgati, teretes, demum aphylli: folia simplicia: flores aurei, majusculi, odori, brevissime pedunculati in racemis terminalibus: legumina compressa, adpressae-sericeo-villosa.

70. CALYCOTOME.

Link in Schrad. Journ. 2. p. 50.

1. *C. VILLOSA*. Link en. alt. H. Berol. 2. p. 225 — *Spartium villosum*.
Vahl symb. 3. p. 80 — Bertol. fl. ital. 7. p. 344 — *Cytisus lanigerus*.
Dec. pr. 2. p. 154 — Ten. fl. nap. 5. p. 94 — *Spartium lanigerum*.
Desf. atl. 2. p. 135.

1c. *Spartium villosum*. Smith fl. gr. t. 673.

Ad sepes, in collibus, nec non ad rupes, et ad maceries in aridis.

Martio, Aprili. ♀

Vulgo *Spalatro*.

Sempervirens, glabra: bractea ovata, carinata, pubescens, acutiuscula, calyci adpressa, sub ipso inserta, integra, aut obsolete triloba, illum subaequans: flores aurei, fragrantés: legumina dorso incrassata, lanato-hirsuta: planta spinis infesta, ideoque ad sepes conficiendas utuntur.

71. CYTISUS.

Koch syn. ed. 2. p. 163.

1. *C. TRIFLORUS*. L'Herit. stirp. nov. fasc. 7. p. 184 — Ten. fl. nap. 2. p. 149 — Bertol. fl. ital. 7. p. 555.

1c. *C. minoribus foliis, ramulis tenellis villosis*. Bon. t. 66 — *Cytisus* 111.
Clus. hist. 1. p. 99 — Tabern. ic. 1099.

In sylvaticis demissis, aut elatis ubique.

Martio, Aprili. ♀

Vulgo *Rutaccio*.

Sempervirens: foliola obscure virentia, et una cum ramis villosa: pedunculis 1-flori, axillares, 4-5, in ramorum apice racemosi: flores aurei: legumina compressa, sericeo-villosa, demum nigra.

2. *C. CANDICANS*. Lam. dict. enc. 2. p. 545 — Bertol. fl. ital. 7. p. 545 —
C. monspessulanus. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 740 — *Genista candicans*.
Lin. sp. pl. ed. 2. p. 997 — Ten. fl. nap. 2. p. 125 — *Teline candicans*. Spack ann. se. nat. 3. ser. v. 3. p. 151.

1c. Gaertn. de fruct. 2. p. 329. t. 151. f. 7.

In fruticetis, et in sylvaticis passim.

Aprili, Majo. ♀

Vulgo *Rutaccio riccio*.

Sempervirens: caules et rami angulato-sulcati, pilis patentibus villosi: foliola subtus piloso-canescientia, supra glabrata: racemi laterales pau-

ciflori : *legumina* compressa, villosa-hirsuta. — *Stigma* in hoc extrorsum declive!, Ideoque quoad characterem istum a Cl. Koch l. c. designatum, et cujus ope genus hoc a *Genista* rite distingui potest, in qua *stigma* introrsum declive!, ad *Cytisos*, et non ad *Genistas* retuli.

72. SAROTHAMNUS.

Vimm. in Endl. gen. 2. 6499.

1. S. SCOPARIUS. Vimm. in Koch syn. ed. 1. p. 152 — *Spartium scoparium*. Lin. sp. pl. 936 — Ten. fl. nap. 2. p. 132 — Bertol. fl. ital. 7. p. 334.
 lc. *Spartium scoparium*. Duham. arb. ed. 2. v. 2. t. 84 — Cyr. de ess. pl. char. p. 47. t. 3. f. 1 — *Genista*. Dod. pempt. 761.
 In sylvaticis asperis ; sulla strada dal Lacco a Forio nelle rupi della valle detta cava di Cavallaro.
 Martio, Aprili. ♀
 Sempervirens, glaberrimus: rami virgati, angulati: flores numerosi, aurei, 1-2 axillares: *legumina* compressa, ad suturas tantum longe albo-pilosa, demum nigra. — Species ista in hac insula satis rara.

73. ANTHYLLIS.

Guss. syn. 2. p. 264 — *Barba jovis*. Tourn. inst. p. 650 t. 419 — Moench. met. p. 258.

1. A. BARBAJOVIS. Lin. sp. pl. 1013 — Ten. fl. nap. 2. p. 141 — Bertol. fl. ital. 7. p. 407.
 lc. Duham. arb. ed. 2. v. 2. t. 67 — *Barbajovis lentifolia*, incana. Barr. ic. 378.
 In rupibus praesertim maritimis ; scogli di S. Anna presso Ischia, e da questo sito alla Punta dell'Imperatore pel sud, nelle rupi della Guardiola di Zale, del monte Vico presso al Lacco, rupi di Casfero presso al Castiglione, ed in quelle della Falanghe sotto S. Nicola!
 Aprili, Majo. ♀
 Fruticosa, sempervirens, argenteo-sericea; flores caespitati, albo-citrini.

74. VULNERARIA.

Tourn. inst. p. 391. t. 211, non Scop. — Moench. met. 146.

1. V. HETEROPHYLLA. Moench. meth. l. c. — *Anthyllis vulneraria*. Lin. sp. pl. 1012 — Ten. fl. nap. 2. p. 139 — Bertol. fl. ital. 7. p. 402.

a. *rubriflora*.

1c. V. supina. *Dill. elth. t. 320. f. 413* — *Anthyllis leguminosa*, montana, flore coerules. *Barr. ic. 553*.

b. *nana*; annua, caulibus gracilibus 1-4-pollicaribus erectis, floribus rubentibus.

In collibus argilloso-calcareis: *colline presso la Punta di Cavallaro, Succellaro*: var. *b. monte Vetta alle Petrelle, ed alle Falanghe*.

Majo, Junio. ☼, et ☉

Herbacea, plus minus villosa-pubescent, procumbens vel ascendens: *capitula terminalia*: geminata, sessilia, involucrio digitato suffulta: *corollae parvae*, sed calyce parum longiores.

75. MEDICAGO.

Endl. gen. n. 6507.

§ 1. RENIFORMES (a).

1. M. LUPULINA. *Lin. sp. pl. 1097* — *Ten. fl. nap. 5. p. 163* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 258* — *Guss. syn. 2. p. 361*.

M. annua pubescens decumbens vel ascendens, foliis obovato-cuneatis apice denticulatis, stipulis dentatis integrisve, floribus in pedunculis elongatis dense spiciformi-racemosis, calycinis dentibus alas et carinam aequantibus, leguminibus (exiguis) arcuato-reticulatis 4-spermis pilis articulatis glandulosisque tectis.

1c. *Melilotus minima*. *Hiv. tetr. irr. t. 8* — *Trifolium agrarium*. *Dod. pempt. 576*.

In apricis herbosis, et in aridis demissis aut sylvaticis passim.

Majo, Junio. ☉

Stipulae latae, acutae: *foliola* subtus villosa, superne glabrata; et ideo videtur esse varietatem, de qua loquitur Cl. *Poir.* in *Dic. enc. supp. 3. p. 521*.

2. M. CUPANIANA. *Guss. syn. 2. p. 362* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 260* — *M. Willdenovii*. *Guss. pr. 1. p. 553*, et *Ten. fl. nap. 5. p. 163*, non aliorum.

M. perennis pubescens decumbens, foliis obovatis cuneatis apice denticulatis, stipulis lanceolatis acutis integris (raro dentatis), floribus in pedunculo elongato dense spicaeformi-racemosis, calycinis dentibus alis

(a) Hujus generis species sic distribuendas esse mihi videtur, siquidem characteres a numero spirarum, vel ab earum nervis vel aculeis adhuc adhibiti, aut infirmi, aut species affines distrahent.

et carina duplo brevioribus, leguminibus (crassiusculis) arcuato-reticulatis, pilis articulatis glandulosisque tectis.

Ic. *Medicago lupulina*, mellina, incano folio molli crasso lanuginoso semicordato. *Bon. t. 62*, optima.

In argilloso-marnaceis elatis; *salita dal monte Vetta alle Petrelle, sotto S. Nicola, ed alla Pietra dell'acqua.*

Majo, Julio. ☿

Habitus omnino praecedentis; sed radices alte descendentes, perennes, imo ad collum sublignosae: color totius plantae intensius virens: flores majores, fere aurei: *legumina* parum majora. Confer *syn. l. c.*

§ II. FALCATAE.

(M. PROSTRATA, M. ARBOREA, etc., sed in hac insula non proveniunt).

§ III. COCHLEATAE.

† *Acutispirae* (spirarum margine exteriori acuto).

a. *Sphaerocarpeae* (spiris concentricis).

(M. SCUTELLATA, quae in hac Insula non provenit.)

b. *Cylindricarpeae* (spiris planis invicem incumbentibus).

3. M. HELIX. Willd. *sp. pl. 3. p. 1409* — *Ten. fl. nap. 5. p. 165* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 266.*

a. *inermis*, leguminibus inermibus; *Guss. pl. rar. p. 314.*

Ic. *Moris fl. sard. 1. p. 438. t. 39. f. A.*

b. *spinulosa*; leguminibus margine spinosis, spinis setaceis rectis aut apice subuncinatis. *Guss. l. c. p. 315* — *Ten. l. c.*

Ic. *Moris l. c. f. B.*

In herbosis; *Ischia al Castello, Guardiola del Testaccio, monte di Bararano, Lacco al monte Vico, a S. Montano, ed alla Guardiola di Zale, Panza nella collina di Campotese, S. Angelo*, utraeque varietates.

Martio, Majo. ☉

Legumina valde depressa, 2-3-cycla, albida, demum fusca; spirarum nervis radiatim ramosis ad marginem exterioriorem anastomosantibus.

4. M. ORBICULARIS. All. *ped. 1. p. 314* — *Ten. fl. nap. 5. p. 165* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 269* — M. polymorpha, *orbicularis*. Lin. *sp. pl. 1037.*

Ic. *Moris fl. sard. 1. p. 434 t. 37* — *Medica orbiculata. Bauh. hist. 2. p. 384.*

In herbosis, ac in cultis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Legumina inermia, demum saepe fusca, anguste marginata, laxe cochleata, utrinque convexiuscula, 2-5-cycla, spiris tenuissimis, et radiatum venoso-ramosis.

† † *Obtusispirae* (spirarum margine exteriori lato obtuso).

a. *Laxispirae* (spiris nec approximatis nec concretis).

1. *Platicarpeae* (leguminibus depressis utrinque planis).

5. M. DENTICULATA. Willd. *sp. pl.* 3. p. 1414—Bertol. *fl. ital.* 8. p. 275, excl. nonn. syn. — Ten. *fl. nap.* 5. p. 166.

b. *longispina*; leguminum spinis dimidium illorum diametrum superantibus.

lc. Medica cochleata, minor, polycarpa, annua, capsula nigra hispidiore. *Moris. hist.* 2. s. 2. t. 15. f. 13, in *syn.* 2. p. 366, cum ? ad var. a. relata.

Inter segetes; *Bagno, Chiajano, Pico ed alla Starza, Chianole del Testaccio, Docea della Serra, Panza ne' seminati di Campotese, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☉

Legumina utrinque plana, demum fusca, 2-3-cycla, spiris exquisite nervoso-reticulatis, earum exteriori margine angusto, utrinque spinoso; spinis hamatis, distiche divergenti-adpressis.

6. M. LAPPAGEA. Lam. *dict. enc.* 3. p. 637 — Ten. *fl. nap.* 5. p. 167.

lc. M. denticulata, b. *lappagea*. *Moris fl. sard.* 1. p. 447. t. 48 — Medica cochleata, polycarpus, capsula spinosa minore nigra hispidiore. *Moris. hist.* 2. s. 2. t. 15. f. 11.

b. *paucigyrosa*; cochleae spiris paucioribus. Lam. l. c. p. 638 — Guss. *syn.* 2. p. 368.

In apricis herbosis; *Bagno, Lacco al monte Vico, Panza a Campotese; var. b, Ischia al Castello, Fontana, monte Vetta, Piano Liguori, Testaccio alla discesa de' Maronti, Lacco, Cusamicciola.*

Aprili, Majo. ☉

Legumina matura saepe nigra; utrinque plana, 3-4-cycla, spiris exquisite et oblique nervoso-reticulatis, earum margine exteriori tenui obtuso, utrinque spinoso; spinis patentibus, hamosis — Hanc a praecedente non separat Cl. Bertol. in *fl. ital.* 8. p. 275.

7. M. MISTRAX. Ten. *fl. nap. pr.* p. 45. (an. 1811), et *fl. nap.* 5. p. 168 — Dec. *pr.* 2. p. 177 — M. pentacycla Dec. l. c.?

M. glabra, stipulis ciliato-dentatis, leguminibus utrinque planis (convexis Tcn.) subcylindricis 5-cyclis exquisito et oblique nervoso-reticulatis, spirarum margine exteriori utrinque spinoso, spinis rectis divergentibus apice hamatis.

Ic. *Ten. l. c. t. 178. f. 2.*

In apricis herbosis; *Chianole del Testaccio, ed alla Guardiola, Lacco al monte Vico, Pico, Bagno.*

Aprili, Junio. ☉

Legumina matura saepe nigra, paullo latiora, ac altiora quam in praecedente, cui valde affinis—A *M. nigra* hanc speciem non separat Cl. *Bertol.* in *fl. ital. 8. p. 279*; et ab ipsa *M. pentacyla* Dec. hanc distinguit Cl. *Ten. l. c.* ob legumina utrinque convexa non plana; sed plana in utrisque video.

2. *Sphaerocarpeae* (leguminibus utrinque exquisite convexis).

8. *M. MOLLISSIMA.* *Roth. cat. bot. 3. p. 74 — Dec. pr. 2. p. 178.*

a. *vulgaris*; leguminibus glabratis.

Ic. Cochleata echinata, minima. *Riv. ter. irr. t. 89?*

b. *graeca*, leguminibus sparse villosis. *M. graeca. Horn. H. Hafn. 2. p. 24 — Dec. l. c. — Ten. fl. nap. 5. p. 169—M. minima. Bertol. fl. ital. 8. p. 303, ex parte.*

Ic. *Medicago echinata, hirsuta. Bauh. hist. 2. p. 386?*

In apricis herbosis, nec non in siccis elatis aut demissis ubique.

Martio, Junio. ☉

In vera *M. minima* spinarum leguminum istorum diametrum vix aequant, aut breviores sunt; praeterea basi latiores, ideoque fere lanceolatae: in *M. mollissima* legumina glabra: in var. b. *graeca* sparse pilosa; at in utrisque varietatibus spinarum leguminis diametrum superant, et basi non tam dilatatae. Denique in una ac in altera specie legumina sunt parva, globosa, laete virentia, sat raro aetate rufescentia; caules erecti, ramis infimis saepius patulis vel diffusis; pubescentia albida, aut virescens — Icones citatae dubiae mihi sunt.

9. *M. MACULATA.* *Willd. sp. pl. 3. p. 1412 — Ten. fl. nap. 5 p. 170 — Bertol. fl. ital. 8. p. 282.*

Ic. *Moris fl. sard. 1. p. 449. t. 50 — M. arabica. Cam. hort. p. 97 e, 27?* nam spinarum nimis crassae videntur, ut in *syn. 2. p. 369* notavi.

In apricis herbosis passim; *Bagno, Campagnano, Chianole del Testaccio, discesa delle selve del Vataliero, Pico, Casamicciola presso al Monte della Misericordia, ne' siti aperti erbosi delle selve di Catreca, e del Fasano.*

Aprili, Majo. ☉

Legumina subglobosa, utrinque planiuscula, 3-5-cyclis, spiris tenue ac oblique nervoso-reticulatis, earum margine exteriori lato, utrinque spinoso; spinis longis, arcuatis, divaricato-intertextis subreflexis.

†. *Concretispirae* (spiris approximatis ac concretis).

1. *Sphaerocarpeae* (leguminibus globosis).

10. *M. MARINA*. *Lin. sp. pl.* 1097 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 169 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 284.

lc. *Cav. ic.* 2. t. 130 — *Medica marina. Clus. hist.* 2. p. 243 — *Camer. hort.* t. 28.

In arenosis maritimis; *Ischia nelle arene della marina sotto all'Arso, Bagno alla marinella del Lago, Lacco a S. Montano, Forio a Citara ed a Montevergine.*

Martio, Majo. ☿

Legumina albo-tomentosa, uti tota planta, demum sub tomento fusca, sub 3-cyclis; spirarum margine exteriori crasso, utrinque spinoso; spinis remotis, patentibus, apice incurvis, lineam longis, aut brevissimis.

3. *Cylindricarpeae* (leguminibus cylindricis, vel cylindraccis).

11. *M. MUREX*. *Willd. sp. pl.* 3. p. 1410 — *Dec. pr.* 2. p. 180.

lc. *M. tribuloidea. Moris fl. sard.* 1. p. 440. t. 41.

In herbosis apricis; *Bagno, Forio alla marina, seminati del monte Vetta, ed alla Serra, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Junio. ☉

Legumina utrinque plana; spirarum margine exteriori lato, carinato, utrinque spinoso; spinis subincurvis, junioribus patentibus ac tenuibus, demum incrassatis, adpressis ac intertextis.

Cl. *Bertol. in fl. ital.* 8. p. 288 sub *M. tribuloide* sua refert meam *M. muricem*, et ex adverso *M. tribuloide* meam et *Moris* pro *M. murice* habet: litem alii componant.

12. *M. LITORALIS*. *Rhod. in Loisel. not.* p. 118, et *fl. gall. ed.* 2. v. 2. p. 125 — *Dec. pr.* 2. p. 187 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 302 — *M. arenaria. Ten. fl. nap.* 5. p. 173.

M. pubescens, caulibus prostratis, foliolis obovatis, stipulis lanceolatis, pedunculis 1-4-floris, leguminibus parvis cylindraccis utrinque planis 3-5-cyclis glabris, spiris crassiusculis approximatis sinistrorsum versis margine externo depresso, nervo carinali tenui, spinis rariusculis brevibus subulatis uncinatis divaricato-reflexis. (*Bert.*).

lc. *Medica hirsuta, echinis rigidioribus. Bauh. hist.* 2. p. 385.

In herbosis apricis passim.

Aprili, Junio. ☉

13. *M. BRAUNII*. *Gren. et Godr. fl. fr. 1. pars. 2. p. 393, ex Bertol. fl. ital. 8. p. 303* — *M. litoralis* *Ten. fl. nap. 5. p. 172* — *M. litoralis, b. breviseta*. *Dec. pr. 2. p. 177.*

M. glabra pilosaque, caulibus prostratis, foliolis obcordatis, stipulis laciniatis, pedunculis 1-8-floris, leguminibus parvis cylindraceis utraque planis 3-4-cyelis, spiris crassiusculis approximatis dextrorsum versis, nervo carinali tenui, spinis brevibus rariusculis subulatis apice plerumque recto divaricato-reflexis (Bert.).

l. M. litoralis, a. longe aculeata. Moris fl. sard. 1. t. 40. f. 1-4.

In apricis herbosis, et praesertim in maritimis.

Aprili, Junio. ☉

Uti recte notat *Cl. Bertol.* l. c. haec et antecedens valde affines inter se, et sola spirarum directione diversae, nam reliqui characteres ludibundi; et etiam *Cl. Coss. in not. sur quel. plant. rares du midi de l'Esp. p. 36* observat characterem istum variabilem esse tam in hac specie, quam in *M. helici*; ideoque mea sententia distrahendae non sunt, tamen uti diversas enumeravi, ut et alii denuo diligenter inquirent.

76. TRIGONELLA.

Gasparr. in Rendic. della R. Acc. delle Scienze di Nap. an. 1852. p. 181.

1. *T. CORNICULATA*. *Lin. sp. pl. 1094* — *Ten. fl. nap. 5. p. 163* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 245.*

l. Sibth. fl. gr. 1. 761 — *Melilotus italica. Fuchs. hist. p. 528.*

Ad muros; *Ischia, Bagno, Casamicciola, Lacco, Panza, Forio.*

Aprili, Majo. ☉

Pedunculi folio longiores: legumina declinata, subfalcata.

77. MELILOTUS.

Tourn. inst. 406. t. 229 — *Juss. gen. 356* — *Pers. syn. 2. p. 347.*

† *Leguminibus lacunoso-rugosis.*

1. *M. ITALICA*. *Desf. dict. enc. 4. p. 67* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 81* — *Trifolium Melilotids, italica. Lin. sp. pl. 1078.*

b. rotundifolia; planta undique virenti, foliolis orbiculatis, argute serrulatis, floribus aureis — *M. rotundifolia. Ten. fl. nap. 5. p. 137.*

1c. *Ten. l. c. t. 176* — *Camer. hort. p. 99. t. 29* — *Riv. tetr. irr. t. 7.*
 In apricis sylvaticis ab elatis ad demissa; *S. Nicola, discesa delle Falanghe, del Fasano, di Catreea, Cava di Brusomonte, dalla Pera al Monte della Misericordia e Casamicciola, e ne' muri di S. Giuseppe, del Lacco, di Panza, di Forio, alla sommità della Punta dell' Imperatore, ed al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Patrilli mascoli.*

In speciei typo color plantae glaucus; foliola orbiculato-oblonga, obiter serrulata; flores pallidiores; sed legumina in utrisque 1-2-spermia. Confer *Cl. Ten. l. c., et ea quae dixi in syn. 2. p. 320.*

2. *M. NEAPOLITANA. Ten. fl. nap. 5. p. 136* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 86* — *M. gracilis. Dec. pr. 2. p. 188.*

1c. *Ten. l. c. t. 176. f. 1.*

In aridis apricis elatis, aut demissis ubique.

Majo, Junio. ☉

Caulis aliquando in hac insula usque sesquipedales: flores parvi, pallidi; legumina erecta!

3. *M. ELEGANS. Salzm. in Dec. pr. 2. p. 188* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 90* — *M. collina. Guss. prod. supp. 2. p. 230* — *Ten. fl. nap. 5. p. 138.*

1c. *Moris fl. sard. 1. p. 162. t. 57.*

In apricis collibus herbosis; *Ischia al Castello, collina del Bagno, Punta S. Angelo, Cava di Brusomonte sopra Casamicciola, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☉

Flores flavi: legumina oblonga, pendula, longiuscule pedicellata quam in aliis.

4. *M. PARVIFLORA. Desf. atl. 2. p. 192* — *Ten. fl. nap. 5. p. 136* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 89.*

1c. *M. indica. Moris fl. sard. 1. p. 459. t. 56.*

b. *maerocarpa*; leguminibus confertioribus, semel quam in a. majoribus, seminibus viridulis levissimis. *Guss.*

In humentibus, vel in siccis: var. a. *Bagno, Lacco, Forio*; var. b. *Ischia al Castello, Forio a Citara.*

Aprili, Majo. ☉

Stipulae integerrimae, triangulares, caudatae: calycis dentes, fere triangulares, tubo calycino aequilongi, dorso obtuse carinati: vexillum calycem duplo longius, alas obtusas parum excedens, apice emarginato-bilobum; lobis obtusis — In var. b. *caules et rami* strictiores: folia et flores similes; sed legumina et habitus parum alieni. Confer *syn. 2. p. 321.*

† † *Leguminibus arcuatim rugosis.*

5. *M. SULCATA*. Desf. atl. 2. p. 193 — Ten. fl. nap. 5. p. 138 — Bertol. fl. ital. 8. p. 92.
 Ic. *M. vulgari nostrati affinis, folio minore et angustiore. Beauh. hist. 2. p. 371.*
b. procerior; caule elato 1-2-pedali stricto, ramis ascendentibus, raemis longioribus, floribus parum majoribus.
 Ic. *Moris fl. sard. 1. p. 463. t. 59. f. A, optima.*
 In apricis cultis subargillosis, interque segetes; *seminati di monte Vetta, delle coste di Succellaro, de' Maronti, Casamicciola, Ischia al Castello: var. b. seminati delle Chianole del Testaccio, della Guardiola, o delle coste di S. Pancrazio.*
 Majo, Junio. ☉
 Planta pro locorum natura variabilis, ita ut si *a.* et *b.* seorsim conferantur species diversae videntur; sed *b.* in speciem transit.
6. *M. INFESTA*. Guss. pr. 2. p. 486, et syn. 2. p. 322 — Ten. fl. nap. 5. p. 137 — Bertol. fl. ital. 8. p. 94.
 Ic. *nulla.*
 In cultis inter segetes; *ne' seminati fra la Pietra dell' acqua, Fontana, S. Nicola, semel collegi.*
 Aprili, Majo. ☉
 Hujus *legumina*, quoad magnitudinem *M. italico* similia sunt!

78. TRIFOLIUM.

Tourn. inst. 404. t. 228 — Juss. gen. 355.

§ 1. *PARAMSES. Presl symb. bot. p. 45.*

Cal. campanulatus; fauce nuda, et aperta; dentibus subaequalibus; tubo 10-nervoso, nervis elatis. Car. demum marcescens, calyptratim secedens; vexillo libero, conduplicato, alis et carina unguibus coalitis, vexillo brevioribus. Stam. 10; vexillare liberum, caetera monadelphica, et unguibus alarum carinaeque coalita, subinde libera. Pollinis granula laevia. Legum. exsertum, 1 2-spermum, subglobosum, stylo recto persistente rostratum, secus suturas indehiscens (vel basi et lateraliter discrepens); latere seminiifero tenui, membranaceo; altero incrassato, Semina ovoidea, oblonga, radii utriusque hilo approximata — Pedunculi axillares: flores pallide rubentes in capitulo globoso sessiles (char. ex Presl, et Gasp. in Rend. 1852. p. 185).

1. *T. STRICTUM*. Lin. sp. pl. 1085 — Bertol. fl. ital. 8. p. 99 — T. lacvigatum. Desf. atl. 2. p. 196 — Ten. fl. nap. 5. p. 148.

1c. *Desf. l. c. t. 208.*

In herbosis sylvaticis apricis elatis; *selva dell' Ulicella presso monte Tripiti, ed in quella della sommità del monte Veza.*

Majo, Junio. ☉

Planta glaberrima, laete virens: folia serrulata, exquisite nervosa: stipulae scariosae, glanduloso-serratae: capitula parva, pedunculata; pedunculis petiolos subaequantibus: flores exteriores bracteolis brevissimis, emarginatis suffulti: calycis glaberrimi dentes triangulari-subulati; inferiore longiore, demum recurvo: corollae parvae, vix calyce longiores. Confer quae dixi in syn. 2. p. 341.

§ 11. AMORIA. Presl l. c. p. 47.

Cal. campanulatus, dentibus subulatis, duobus superioribus longioribus. Pet. post anthesim marrescentia; vexillo libero; alis carinaque tubo stamineo adnatis. Styl. filiformis, oblique insertus. Legum. calycem excedens, lineari-oblongum, compresso-toruloseum, 2-4-spermum, subdehiscens—Flores albi, rosei, vel coerulei capitato-umbellati, pedicellati, post anthesim penduli; pedicellis saepissime basi bracteolatis.

2. T. NIGRESCENS. *Viv. fl. ital. frag. 1. p. 12—Ten. fl. nap. 5. p. 151—Bertol. fl. ital. 8. p. 113.*

1c. *Viv. l. c. t. 13.*

b. *polyanthemum*; caule diffuso, stipulis concoloribus, capitulis numerosissimis. *Ten. l. c.—T. Vaillanti. Ten. fl. nap. pr. p. 44, et T. pallescens fl. partic. di Nap. 2. p. 596.*

1c. *Savi gior. Pis. t. 5—Trifolium pratense, corymbiferum, album, et procumbens. Mich. gen. p. 27. t. 25. f. 6.*

In apricis pascuis, et ad vias ubique.

Martio, Majo. ☉

Flores numerosi, albi, odori: calyces nervosi, uti tota planta glaberrimi, fauce denudata: legumina exerta, 4-sperma, margine superiore continuo, inferiore inter semina contracto.

3. T. REPENS. *Lin. sp. pl. 1080—Ten. fl. nap. 5. p. 150—Bertol. fl. ital. 8. p. 106, an. excl. var. b.?*

1c. *Fl. dan. 990—Trifolium pratense, corymbiferum, majus repens. Mich. gen. t. 25. f. 1. et 4.*

In apricis pratis, et pascuis elatis, vel subdemissis; *da Fontana a S. Nicola, ed alla Pietra dell'acqua, monte Vetta, Barano, Moropane, Serzano, monte Veza, Campgnano, et in apertis sylvarum; selve delle Falanghe, e di Catreca.*

Aprili, Octobri. ☾

Vulgo *Pratilli bianchi.*

Caules prostrati, radicante, et uti folia glabri; calyces nervosi, fauce de-

nudati: *flores* albi, subinde carnei, demum rufescentes: *legumina* to-
sulosa, 3-4-spermia.

§ 111. *MICRANTHEMUM*. Presl l. c. p. 41.

Cal. ovatus, aut tubulosus, nervoso-striatus, fauce aperta; dentibus aequalibus, rigidis,
pungentibus. *Petal.* post anthesim marcescentia; vesillo tenuiter nervoso, libero; alis
carinaeque basi tubo stamineo connatis. *Styl.* terminalis, filiformis. *Legum.* ovale, ca-
lyce indurato inclusum, 1-2-spermium, indehiscens — *Capital.* axillaria, sessilia,
globosa, stipulis dilatatis subinvolucrata: *flores* parvi, rosci, aut albi.

4. *T. GLOMERATUM*. Lin. sp. pl. 1084 — Ten. fl. nap. 5. p. 148 — Bertol.
fl. ital. 8. p. 117.

lc. *T. parvum*, erectum, flore glomerato cum unguiculis. Bauh. hist. 2.
p. 578.

In apricis herbosis, etiam sylvarum ubique.

Aprili, Majo. ☉

Glaberrimum, prostratum: *calycis* dentes ovati, acuminati, demum paten-
ti-recurvi, *corollam* roseam subaequantem.

5. *T. SUFFOCATUM*. Lin. mant. alt. p. 276 — Ten. fl. nap. 5. p. 149 — Ber-
tol. fl. ital. 8. p. 119.

lc. Jacq. hort. t. 60 — Brot. phyt. lusit. 1. p. 458. t. 64.

In aridis apricis, et ad vias; da *Ischia al Bagno sull' Arso, e sulla stra-
da da Casamicciola a Forio.*

Martio, Aprili. ☉

Glaberrimum: *caules* terrae adpressi, brevissimi: *capitula* approximata, ab
ipso radicis collo: *calycis* dentes lanceolati, falcato-recurvi, *corolla* alba
minutissima duplo longiores.

§ IV. *EUTRIFOLIUM* (Trifolia vera Presl l. c. p. 48).

Cal. ut plurimum hirsuti inbus ovatus, campanulatusque, fauce clausus; dente infe-
riore reliquis longiore. *Petal.* cum tubo stamineo usque supra medium connata, post
anthesim decidua. *Styl.* filiformis, terminalis. *Legum.* calyce inclusum, ovato-subro-
tundum, 1-spermium, indehiscens — *Flor.* sessiles, ebracteati, rubri vel rosci, spicali
aut capitati; capitulis spicisque sessilibus, aut pedunculatis.

1. *Spicae oblongo-conicae, terminales, pedunculatae.*

6. *T. ANGUSTIFOLIUM*. Lin. sp. pl. 1083 — Ten. fl. nap. 5. p. 145 — Ber-
tol. fl. ital. 8. p. 172.

lc. *T. alopecurum, angustifolium, elatius*. Barr. ic. 698.

In campis, et in collibus aridis passim.

Majo, Junio. ☉

Undique piloso-hirsutum : *spicae* basi nudae, cylindraceo-conicae, denum elongatae : *calycis* nervosi, setoso-hirsuti laciniae subulatae, plumosae, demum patentes, infima *corollam* roseam subaequans.

7. T. INCARNATUM. *Lin. sp. pl.* 1083 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 140 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 178.

1c. *Sibth. fl. gr.* t. 748 — T. *alopecurum*, latifolium, spica longa. *Barr. ic.* 697.

In sylvis satis rarum, sed ex plantis cultis egressum.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Caporusso* a *Casemicciola*.

Raro in insula oeconomico uso colitur.

Molliter villosum : *spicae* basi nudae : *calycis* nervoso-hirsuti laciniae lanceolato-subulatae, demum patentes, *corolla* amoene sanguinea duplo breviores.

8. T. ARVENSE. *Lin. sp. pl.* 1033 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 141 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 175.

b. *australe* ; foliis emarginatis, lacinis calycinis longioribus, seminibus subglobosis, radícula vix prominula. *Ten. l. c.* — T. *arvense*, a. *Guss. syn.* 2. p. 336.

1c. *Lagopus angustifolia*, minor, erectior. *Barr. ic.* 901.

c. caule procumbente, pedunculis folio triplo longioribus. *Ten. l. c.*

In campis, et in collibus sterilibus passim solae varietates b. et c.

Aprili, Majo. ☉

Subsericeo-canescens : *spicae* villosissimae, oblongo-cylindraceae, basi nudae : *calycis* nervosi laciniae setaceae plumosae, demum patentes, subaequales, *corolla* parva palide rosea duplo longiores. Confer. cl. *Ten. l. c.*

9. T. LIGUSTICUM. *Balb. act. Acc. ital.* 1. p. 192 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 141 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 152 — T. *aristatum*. *Link en.* 2. p. 262 — T. *arrectisetum*. *Brot. phyt. lusit.* p. 152.

1c. *Balb. l. c. t.* 2 — *Brot. l. c. t.* 63.

In sylvaticis apricis herbosis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Caulis laxè patenter hirsuti : *folia* molliter pubescenti-pilosa : *spicae* elliptico-oblongae, saepe geminae ; *calycis* nervosi laciniae subulatae, aequales, plumoso hirtae, erecto-patulae, *corolla* parva rubente longiores.

2. *Spicae* breves ovato-conicae, axillares, vel terminales, sessiles.

10. T. SCABRUM. *Lin. sp. pl.* 1084 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 147 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 124.

lc. *T. minus*, capite subrotundo parvo, albo, et echinato. *Barr. ic.* 870.
In collibus, ad vias, ad muros, et ad maceries passim.

Aprili, Majo. ☉

Pubescenti-villosum: *capitula* parva, numerosa: *calycis* nervosidentes lanceolati, rigidi, *corolla* parva albida longiores, exquisite uninerves, demum recurvi, infimis reliquis longior; faux coarctata.

11. *T. BOCCONI. Savi Trifol. p. 37 — Ten. fl. nap. 5. p. 145 — Bertol. fl. ital. 8. p. 128.*

lc. *T. semiglabrum. Brot. phyt. lusit. 1. p. 156. t. 63. f. 2 — T. nodiflorum, turbinatum. Bocc. mus. p. 142. t. 104.*

In collibus herbosis, et in apricis sylvarum ubique.

Majo, Junio. ☉

Glabratum: *capitula* oblonga, gemina, raro solitaria: *calycis* pubescentis nervosi dentes lanceolato-subulati, rigidi, mucronati, *corollam* rubellam aequantes, illa adpressi; faux clausa.

12. *T. STRIATUM. Lin. sp. pl. 1085 — Ten. fl. nap. 5. p. 412 — Bertol. fl. ital. 8. p. 122, excl. syn. T. tenuiflori Ten.*

lc. *T. minus*, villosum, purpureum, capite parvo echinato. *Barr. ic.* 869.

In sylvaticis cum praecedente.

Aprili, Majo. ☉

Pubescenti-villosum: *capitula* ovata, axillaria et terminalia: *calycis* striati ac in fructu ventricosi dentes lanceolato-subulati, demum patentes, *corollam* carneam parum excedentes; faux annulo coarctata.

13. *T. TENUIFLORUM. Ten. fl. nap. 5. p. 144.*

T. villosum, caulibus erectis ascendentibusque, foliis obcordatis, superioribus obovato-oblongis cuneatis, stipulis caudatis, capitulis oblongo-cylindraceis, calycibus striatis cylindricis, dentibus setaceo-spinoscentibus subaequalibus, tubo ac corollae aequilongis demum erecto-patulis.

lc. *Ten. l. c. t. 177. f. 1.*

b. *rigidum*; habitu robustiore, capitulis crassioribus, calycinis dentibus longius aristatis rigidioribus, infimo parum longiore.

In herbosis apricis etiam sylvarum; monte Vetta, selva delle Fulanghe, del Fasano, di Catrea, della Pera sopra Casamicciola, dell'Ulicella, del Rotaro, di Campagnano, del monte Vecza: var. b. *no'scminati di monte Vetta.*

Majo, Junio. ☉

Stipulae foliorum superiorum *capitula* involuerantes, albo-scariosae, nervis purpureis notatae: *capitula* fere omnia terminalia: *calycis* tubus cylindraceo-subinflatus, ad nervos rubentes hispidus, inter istos albidus ac scariosus; dentibus brevibus, viridibus, rectis, angustis, acutis, rigide spinulosis ac *corolla* pallide carnea brevioribus, carinam subaequantibus: *vexillum* plicatum, angustum, saepe apice denticulatum; *se-*

mina compressiuscula, rufescentia, levia— Var. *b. T. dalmaticum* refert, sed pubescentia aliena, et folia non exquise ae concinne subtus nervosa, ut isto— Colui olim in *H. in Boec.* plantam huic varietati similem nomine *T. conici* acceptam, sed ab isto prorsus aliena. A praecedente non separat *Cl. Bertol.* in *fl. ital.* 8. p. 22; sed confer quae adnotavi in *syn.* 2. 327.

3. *Capitula globosa, terminalia, pedunculata aut sessilia, et tunc stipulis involucrata.*

14. *T. STELLATUM.* *Lin. sp. pl.* 1083 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 142 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 134.

lc. *Lupopus minor*, erectus, capite globoso, stellato flore purpurco. *Barr. ic.* 860.

In apricis collibus, et ad muros.

Aprili, Majo. ☉

Molliter villosum : *capitula* longe pedunculata : *calycis* striati setoso-hirsuti laciniae lanceolato-acuminatae, acutissimae, *corollam* pallide carneam subaequant, demum stellate-patentes; faux annulo calloso pilisque clausa.

15. *T. PRATENSE.* *Lin. sp. pl.* 1082 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 146 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 161.

b. inarimense; floribus minoribus, pallidioribus; *calycis* fauce annulo pilorum obsita.

lc. *nulla.*

In pascuis apricis sylvarum, et ad margines viarum in herbosis sola var. *b.*; *Valle del Crovone, selve di Campagnano, del monte Vetta, di Chiummano, di Pictra Sparaina, delle Falanghe, del Fasano, di Catrecca, via di Barano, di Serrano, e di Fontana a S. Nicola, praeteria del monte Vetta, e dalla sommità della valle di Buccio al Monte della Misericordia presso Casamicciola.*

Aprili, Octobri. ☿

Var. *b.* praeter characteres notatos a speciei typo recedit habitu graciliore; et in hac *calyces* albidii, pilis adpressis tecti, lacinii filiformibus elliptis, rectis, tubo acquilongis; unio caeteris longiore, *corollae* gamopetalae tubum aequante, fauce *calycis* annulo pilorum obsita, non vero annulo tantum coeretata, ut in *T. pratense*: *legumen* operculatum uti in specie, et *T. sativo Reich.*: *scmina* badia, subglobosa, non compressa— *Calycinis* laciniiis erectis, et *calycis* fauce annulo pilorum clausa a *T. pratense* recedit, et hoc ultimo characterem, nec non capitulis sessilibus a *T. sativo* — An species propria? — Confer *Koch. syn. ed.* 2. p. 184, et *Reich. fl. germ.* 2. p. 494.

- Confer Koch. syn. ed. 2. p. 184 — An species propria?*
16. *T. LAPPACEUM. Lin. sp. pl. 1082 — Ten. fl. nap. 5. p. 142 — Bertol. fl. ital. 8. p. 140.*
lc. Moris fl. sard. 1. p. 482. t. 62. f. 1 — T. nemorosum, capite ovato villosa rubescente. Barr. ic. 871.
 In apricis herbosis; *Campagnano, Pico, Cava di Buceto, e del Carusello, Panza, seminati di Fontana, di Calimera, e del monte Vetta, Piano Liguori.*
 Aprili, Majo. ☉
 Pilosum: *capitula terminalia solitaria, basi nuda: calycis tubus nervosus, glaber; dentes subaeuales, patenter piloso-hispidi, corollam rubellam subaequantes: faux annulo pilorum clausa.*
17. *T. CHERLENI. Lin. sp. pl. 1081 — Ten. fl. nap. 5. p. 142. — Bertol. fl. ital. 8. p. 137.*
lc. Moris fl. sard. 1. p. 480. t. 61 — Lagopus minor, supinus, molli et compresso capite. Barr. ic. 859.
 In collibus aridis, et in herbosis elatis vel demissis ubique.
 Aprili, Majo. ☉
 Molliter villosa-canescens: *capitula solitaria, terminalia, basi involucrata, calycis nervosi dentes subaeuales, plumosi, filiformes, corollam albam aequantes: faux pilis densis clausa.*

§ V. *GALEARIA. Presl l. c. p. 49.*

- Cal. bilabiatus, in fructu vesicarius, basi superne valde gibbus; labio superiore longiore, villosa, bidentata, post anthesim exrescente, et labium inferius 5-dentatum immutaturn fornicis modo tegente. Corol. gamopetala, marcescens, decidua, eum tubo stamineo connata. Styl. oblique insertus, filiformis. Legum. obovato-subglobosum, 1-2-spermum, indehiscens, calyce reticulato-venoso multinervio inclusum — Capit. globosa, axillaria, pedunculata. Flor. sessiles, bractea suffulti, rosei, aut albi.*
18. *T. FRAGIFERUM. Lin. sp. pl. 1086 — Ten. fl. nap. 5. p. 152 — Bertol. fl. ital. 8. p. 189.*
lc. Fl. dan. t. 1042 — T. fragiferum, folio oblongo. Vaill. bot. paris. t. 22. f. 2.
 In humentibus: *Ischia nell'orto della Mandria, Bagno presso al Lago, orti di Forio, Casamicciola al Monte della Misericordia.*
 Majo, Junio. ☽
 Glabrum, repens: *capitula longe pedunculata: calycis pilosi dentes corolla rosea breviores.*
19. *T. RESUPINATUM. Lin. sp. pl. 1086 — Ten. fl. nap. 5. p. 152 — Bertol. fl. ital. 8. p. 185.*
lc. Sturm. fl. germ. 1. fasc. 16 — T. pratense, salmanticum. Clus. hist. 2. p. 217.

In apricis aridis, sed in humentibus magis obvium; *Ischia al Castello*, e *sull'Arso*, *Bagno*, *Castiglione*, *Casamicciola nel vallone del Bubù*, *Fòrio*, *Chiajano*, *Pico ed alla Starza*, *Chianole del Testaccio*, *Campagnano*.

Aprili, Majo. ☉

Glabrum, procumbens, non repens: *capitula* in pedunculis folia subaequantibus: *calycis* pilosi dentes *corolla* rosea resupinata 2-3-plo breviores.

§ VI. CALYCOMORPHON. *Presl l. c. p. 50.*

Calyc. exteriores corolliferi, fertiles, in fructu campanulati, aperti, ab interioribus sterilibus linearibus post anthesim excrescentibus deflexisque involuerati; tubo tenuissime striato; dentibus setaceis, ciliatis, patentibus. *Corol.* gamopetala, cum tubo stamineo connata. *Styl.* terminalis, filiformis. *Legum.* subglobosum, 1-spermum. — *Pedunc.* axillares. *Flor.* albi, vexillo elongato.

20. T. SUBTERRANEUM. *Lin. sp. pl. 1080* — *Ten. fl. nap. 5. p. 140* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 132.*

a. vulgare; calycis sterilis dentibus glabris, foliis villosis.

lc. Riv. tetr. irr. t. 14 — T. pratense, supinum, catobleps, seu capite humifuso. *Barr. ic. 881.*

aa. glabratum; foliis glabris, intense virentibus.

b. flagelliforme; calycis sterilis dentibus glabris, caulibus flagelliformibus elongatis (2-3-pedalibus).

Var. a. ubique passim in apricis herbosis, et ad muros: *var. aa. al Castiglione ai lati del viottolo che scende al Bagnetiello*: *var. b.* in herbosis subarenosis elatis; *da Fontana a S. Nicola lungo la salita a dritta sotto al Telegrafo.*

Aprili, Majo; et *var. b.* Majo, Junio. ☉

In *a.* et *aa.* *foliola* aliquando nigro-maculata: *calyces* superne fissi; dentibus aequalibus, anguste-linearibus, ciliato-hirsutis, tubo corollae aequilongis aut brevioribus: *corolla* ex albo-luteola; *vexillo* surrecto, integro, vel saepius emarginato, venis parallelis pallide coerulescentibus picto; *alis* semipatentibus, concoloribus, carina longioribus, earum lamina ovali, integra: *legumen* et *semina*, uti in sequente varietate — In *b.* *calyces* latere superiore fissi; dentibus a tubo corollae ascendente demum inferne dejectis, et ibi invicem approximatis: *corollae* ut in praecedente: *legumen* glabrum, 1-spermum, oblique rhombeum, et saepius in quolibet capitulo unum aut alterum perfectum: *semina* fere globoso-ovata, levissima, nitide nigra, radícula prominula: *odor* totius plantae *Cucumis sativi* similis — Quoad bracteus, et calycis dentes confer *Cl. Savi Trif. in obs. p. 14.*

§ VII. *CHRONOSPNIUM*. Ser. in Dec. pr. 2. p. 204 —
Amareus. Presl l. e. p. 46.

Cal. scariosi tubus brevis; faux aperta; dentes duo superiores ovato-lanceolati, breviores, inferiores subulati. *Petal.* libera, persistentia, longitudinaliter plicato-striata. *Styl.* obliquus, brevis, apice incurvus. *Legum.* stipitatum, obovatum, compressum, 1-spermum — *Pedunc.* axillares. *Flor.* capitato-spicati, lutei, aut purpurei, brevissime pedicellati, post anthesim penduli, et petala tunc ut plurimum badia.

21. *T. AGRARIUM*. *Lin. sp. pl.* 1087! ex observ. *Willem. et Godr. revv. de Treft.* p. 23! — *T. procumbens. Smith britt.* 2. p. 792 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 154 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 198 — *T. campestre. Guss. syn.* 2. p. 346 — *T. procumbens, b. minus. Koch syn. ed.* 2. p. 195.

lc. T. Lupulinum. Riv. tetr. irr. t. 10. f. 1. — Melilotus, qui *T. pratense*, luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium. *Vaill. bot. paris t.* 22. f. 3, optima!

In herbosis apricis, etiam sylvarum ubique.

Aprili, Majo. ☉

Glabrum, procumbens: *capitula* parva in pedunculis folia aequantibus superantibusque: *calycis* dentes inferiores apice sparse pilosi: *corollae* parvae, ex luteo-sulphureae, demum fusco-spadiceae; vexillo sulcato, denticulato. Confer pro hac specie ita controversa *Cl. Willem. et Godr. l. c.*, nec non *Bertol. l. c.*

22. *T. FILIFORME*. *Lin. sp. pl.* 1088 — *Willem. et Godr. l. c. p.* 3, ad 11, et p. 19 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 155 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 206 — *Smith engl. fl. ed.* 2. v. 3. p. 310! — *T. micranthum. Viv. fl. lyb. specim.* p. 45 — *Dec. pr.* 2. p. 207.

lc. Viv. l. c. t. 19. f. 3 — *T. lupulinum, minimum. Raj. syn.* p. 351. t. 14. f. 4! — Trifolium pratense, lupulinum, luteum, erectum, minus! caule tenuissimo vix se sustinente. *Mieh. gen.* p. 26. n. 7. t. 25. f. 8.

In pascuis humentibus; nella prateria presso al lago del Bagno, sed nunc fere destructum.

Aprili, Majo. ☉

Planta gracilis, glabra: *pedunculi* capillares, 5-5-flori: *flores* omnium huius sectionis minores, pedicellati; *pedicellis* calycis tubum superantibus, primo erecti, inde cernui; *vexillo* levi, non sulcato, nec reflexo: *legumen* breviter pedicellatum, calyceem excedens, *stylo* brevi recurvo persistente terminatum — Ex *Koeh, Cass. et Germ. T. minus Smith l. c. p.* 310, est verum *T. filiforme. Lin.* et inde *T. micranthum Viv.* species propria; at potiori jure ex *Willem. et Godr. l. c.* quoad descriptionem *Linnaeanam*, (nec non ex observatione *Hartm. 1851 p.* 287. in *pl. herb. Lin.*

est forma pauciflora *T. filiformis* recentiorum) *T. filiforme* Lin. a *T. micrantho* non differt, et *T. minus* Smith ad *T. procumbentem* est referendum.

79. LOTUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1212.

1. **L. TOMENTOSUS.** *Rhode in Schrad. journ. 1800. p. 42, in notis* — *L. sericeus. Dec. cat. II. Monsp. p. 122, in notis* — *L. intermedius. Ten. fl. partie. di Nap. 1. p. 607* — *Dorychnium hirsutum, b. incanum Ser. in Dec. pr. 2. p. 208* — *Bonjannia hirsuta, b. incana. Koch syn. ed. 2. p. 196.*

L. villis adpressis sericeo-incanus multicaulis suffruticosus, foliis foliorum inferiorum obovato-cuneatis, superiorum oblongo vel lanceolato-cuneatis acutiusculis, stipulis oblique ovatis, pedunculis folio longioribus, bracteis ternatis, foliis lanceolatis acutis calycinos dentes lanceolatos subaequantibus, floribus capitatis, leguminibus turgidis cylindraceo-oblongis calycem excedentibus.

lc. *nulla.*

In rupestribus aridis, nec non in sylvaticis apricis passim.

Majo, Junio. ☿

Caules ramosissimi, caespitosi, 1-2 1/2 pedales: *folia* inferiora valde approximata: *pedunculi* folium subjectum parum excedentes: *capitula* densa, multiflora: *calyces* hirsuti, brevissime pedicellati, tubulosi, obsolete nervosi, a medio ad apicem rubentes, cacterum virentes, 2-labiato-5-dentati; dentibus acutis, tubum aequantibus, saepe rubentibus; duobus superioribus latioribus, brevioribusque: *corollae* vexillum album, canaliculato-concavum, surrectum, emarginatum, ad carinam superne rubescens; *alae* albae, vexillo breviores, latere superiore conniventes, demum *carinam* breviorcm occultantes, bulla transversali convexa instructae, quae subtus villosa, ac bascos dente obtuso cavo donata: *carina* obtusiuscula, a medio ad apicem nitide fusca ac puberula, 2-petala; *petalis* a basi ad medium liberis, inter se distantibus: *stylus* ascendens, virescens, glabriusculum; *stigmatibus* albido, capitato: *legumen* glabrum, virescens, punctis impressis notatum, *stylo* mucronulatum: *semina* viridula, levia.

2. **L. PARVIFLORUS.** *Desf. atl. 2. p. 206* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 231* — *Dorychnium parviflorum. Dec. pr. 2. p. 208* — *Ten. fl. nap. 5. p. 157.*

lc. *Desf. l. c. t. 211* — *Dec. ic. pl. Gall. rar. t. 30.*

In apricis herbosis sylvarum, et aliquando in cultis arenosis inter segetes. Majo, Junio. ○

Planta undique villis mollibus albis tecta, ideoque saepe canescens: flores sulphurei, parvi: *legumen* calycem semel superans, pro quo caractere ad *Dorychnia* relatus.

3. *L. EDULIS*. *Lin. sp. pl.* 1090 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 158 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 215.

1c. *Cav. ic. 2. t. 157* — *Trifolium corniculatum*, creticum. *Alp. exot. t. 268.*

b. *villosus*; undique pilis raris mollibus tectus.

In apricis collibus, et in lapidosis herbosis ubique; da *Pietra Sparaina al mare*: var. b. in herbosis, vel in rupestribus maritimis.

Martio, Majo. ☉

Decumbens; *folia* glabriuscula, virentia; *pedunculi* 1-raro-2-flori, elongati: *flores* lutei: *legumina* turgida, carnosa, teretia, ineurva, rostrata,

4. *L. ORNITHOPODIODES*. *Lin. sp. pl.* 1091 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 161 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 233.

1c. *Cav. ic. 2. t. 163* — *L. siliqua arcuata*. *Riv. tetr. irr. t. 77.*

In aridis, et in arenosis herbosis ubique.

Martio, Majo. ☉

Pubescens, decumbens: *calycis* dens inferior intermedius longior, et angustior; duo laterales brevissimi, fere setacei: *flores* lutei: *vexillum* emarginatum: *carina* apice mucronulata: *legumina* compressa, arcuata.

5. *L. FILIOSISSIMUS*. *Poir. dict. enc. supp.* 3. p. 504 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 159.

1c. *nulla.*

In sylvaticis herbosis, et ad vaporaria in bumentibus; *sclve di Chiummano, del Vataliero, di monte Vetta, Punta dell' Imperatore presso Forio, alla stufa del Cacciuto, ed alle fumarole del Mortito presso Casamiociola, presso quelle elevate delle Falanghe, del Fico e del Fango sopra al Lacco; in quelle nella contrada del Dell' Omo sopra Forio.*

Aprili, Majo. ☉

Semina levia, ovalia, viridula: *habitus* sequentis, sed robustior, et *flores* 3-4 in summitate *pedunculi* — *L. hispido* quoque proximus (pro quo confer *Bertol. fl. ital.* 8. p. 230), sed floribus paneioribus, bracteis lanceolatis; *leguminibus* angustioribus longioribusque recedit; praeter ea *flores* in hoc siccando virescunt, dum in *L. hispido* nigrescunt.

6. *L. ANGSTISSIMUS*. *Lin. sp. pl.* 1090 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 158, au excl. var. b. — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 228.

1c. *L. graeclis*. *Wald. et Kit. pl. var. Hung.* 2. t. 229 — *L. corniculatus*, siliquis singularibus, seu binis, tenuis. *Bauh. hist.* 2. p. 356.

b. *ciliatus*; obscure virens, parca ramesus, caule subpedali prostrato, foliis glabratis ciliatis, *leguminibus* crassiusculis compressis rectis elongatis pollicaribus (4-lin. latis). *Ten. l. e. var. c.* — *L. ciliatus*. *Ten. syl.* p. 370, ex ipso — *Dec. pr.* 2. p. 219.

In apricis herbosis sylvarum ; ad agrorum margines herbosos arenosos ;
*Punta dell'Imperatore presso Forio, Guardiola di S. Gennaro presso
 Panza*; et ad vaporaria, *stufa del Cacciuto presso Casamicciola.*

Majo, Junio. ☉

Pateuter pilosus, decumbens vel ascendens : *pedunculi 1-2-flori*, folio longiores : *flores lutei*, parvi : *legumina teretia*, patentia, gracilia, matura saepius nigra.

7. *L. CYTISOIDES*. *Lin. sp. pl. 1092 — Ten. fl. nap. 5. p. 217 — Bertol. fl. ital. 8. p. 216*, excl. plur. syn.

1c. *L. siliquosa*, maritima, lutea, Cytisi facie. *Barr. ic. 1031.*

In rupestribus, et lapidosis maritimis passim.

Aprili, Majo. ☼ et basi ☿

Diffusus, sempervirens, adpresse sericeo-canescens, demum glabratus glaucescens : *folia crassiuscula* : *pedunculi elongati*, 3-9-flori : *flores aurei*, capitati : *legumina recta*, teretia, patentia, demum saepe fusca.

80. PSORALEA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1210.

1. *P. BITUMINOSA*. *Lin. sp. pl. 1075 — Ten. fl. nap. 5. p. 134 — Bertol. fl. ital. 8. p. 77.*

1c. *Trifolium bituminosum*. *Riv. tetr. irr. t. 15*, optima — *T. asphaltites. Matth. comm. 2. p. 188.*

b. albiflora ; floribus albis, carina tantum coerulescente.

c. angustifolia ; foliolis ex ovata basi sublanceolatis. *Ten. l. c. var. a.*

In rupibus, ad muros, et aliquando in fruticetis lapidosis, tam in elatis, quam in demissis : var. *a.* ubique : var. *b. nelle rupi sotto S. Nicola* rara ; var. *c.* in aridis saxosis demissis.

Aprili, ad Octobrem. ☼, et basi ☿

Sempervirens, suffrutescens, adpresse pubescens, interque pubescentiam glandulosa, ingrante bitumen redolens : *flores in pedunculo elongato capitati*, in *a.*, et *c.* coerulei : *legumen ovale*, calyce brevius, hirsutum.

81. COLUTEA.

Brown. in H. Kew. ed. 2. v. 4. p. 325.

1. *C. ARBORESCENS*. *Lin. sp. pl. 1045 — Ten. fl. nap. 2. p. 151 — Bertol. fl. ital. 7. p. 569.*

1c. *Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 22 — Colutea. Matth. comm. 2. p. 140.*

In sylvaticis demissis vel elatis, umbrosis, aut apertis ; *salita del monte*

Vetta alle Petrelle, discesa da Catreca a Casamicciola, Cavone delle Nocelle, costa del Pignatiello, selve del monte Vezza, di Chiummano, e del Castiglione a Pietra Vona, ubi vero rara.

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Itavajuolo mascolo.*

Frutex erectus, glaber, laete virens: flores lutei, cernui, in pedunculis folio brevioribus racemosi: legumen semielipticum, inflato-ventricosum, demum scariosum.

82. ASTRAGALUS.

Dec. astrag. n. V. ed. maj. p. 22, ac 79, et. pr. 2. p. 281.

1. A. HAMOSUS. *Lin. sp. pl. 1067 — Ten. fl. nap. 5. p. 131 — Bertol. fl. ital. 8. p. 58.*

1c. A. siliqua curva. *Riv. tetr. irr. t. 107, optima — A. monspeliacus. Clus. hist. 2. p. 234.*

In herbosis apricis ubique a summitate montis ad litus.

Aprili, Majo. ☉

Adpresse piloso-canescens, subdiffusus: flores ex albo-ochroleuci, in pedunculis folio brevioribus racemosi: legumina subulata, teretia, demum dependentia, et incurvata.

2. A. GLYCIPHYLLUS. *Lin. sp. pl. 1067 — Ten. fl. nap. 5 p. 132 — Bertol. fl. ital. 8. p. 60.*

b. *setiger*; procumbens lacte virens, foliolis foliorum inferiorum suborbiculatis, reliquorum ovalibus, omnibus obtusis retusisque cauleque glabrisculis, stipulis distinctis oblongo-lanceolatis apice attenuatis, pedunculis folio brevioribus, spicis oblongis, bracteis filiformibus pedicellum superantibus rachide pedunculis calycibusque setis adpressis sparsis nigris obductis, leguminibus glabris crassis acutis semiteretibus ad suturam inferiorem profunde sulcatis rectis demum incurvatis.

1c. *nulla.*

In sylvaticis, et ad sepes umbrasas; *selve di Campagnano, di Chiummano, del monte Vezza, delle Falanghe, di Catreca, e del Fasano, Cavone delle Nocelle, salita dal Rotaro a Buceto ne'siti aperti delle selve.*

Majo, Junio. ♀

Caules flexuosi, elongati: stipulae 4-6 lin. longae, aliquando fere semilanceolatae: folia 4-5-juga; foliolis 1 1/2-2-pollicaribus, poll. latis, subtus pallidis, et ad nervos pubescentibus: pedunculi 2-3-pollicares, tenue striati: spicae densae, pollicem vel sesquipollicem longae: bractee virentes, demum patentes: pedicelli crassi, vix lin. longi: calycis dentes ex triangulari basi attenuato-acuminati; tres inferiores lon-

giores, tubum calycinum basi obliquum subaequantes; duo superiores illis breviores, sinu lato semicirculari inter illos interjecto: *flores* triste virentes; *vexillum* 6-lin. longum, fere explanatum, externe virescens, interne lineis saturatoribus notatum, apice bilobum, lobis obtusis; *alae* apice conniventes, ibique fuscae, carinam (apice quoque fuscam) includentes, basi ungue altero ovali obtuso brevissimo cum carina connexis, altero albido anguste lineari-elongato calyci inserta: *carina* dipetala, basi quoad unguis alis similis: *legumina* pollicem et ultra longa, matura incrassata, diametro nempe 2-lineari, conferta, stylo acuminata, primum recta ac erecta, inde incurva, et apice inter se conniventia.

Varietas ista a vero *A. glycyphyllo* recedit praesertim hirsutiae calycis et bractearum; siquidem partes istae in illo glabrae aut sparsae hirsutiuseculae; in nostro setis nigris adpressis conspersae, praesertim dentes calycini eorumque sinus. An species propria?, et tunc *A. setiger*, appellanda.

83. BISERRULA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1209.

1. *B. PELEGINUS. Lin. sp. pl. 1073—Ten. fl. nap. 5. p. 123—Bertol. fl. ital. 8. p. 75—Guss. pl. rar. p. 305.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 622—Securidaca peregrina. Clus. hist. 2. p. 238.*

In apricis collibus arenosis herbosis, vel ad maceries in herbosis; *sopra i muri a secco nella strada dal Crovone al pennino di Belvedere, ed in quelli da Chiajano al pennino del Cantariello prima di discendere; Testaccio al Vataliero nella strada al sud, e presso la prima casetta a sinistra, presso il Telegrafo di Pietra Sparaina, e sotto S. Nicola, Lacco al monte Vico nel piano dell'arenella.*

Aprili, Majo. ☉

Pubescens, subcanescens, diffusa: *flores* minuti, coerulei, in *pedunculis* folio brevioribus racemoso-capitati: *legumina* depresso-plana, margine elegantè denticulata.

84. SCORPIURUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1201.

1. *S. SUBVILLOSA. Lin. sp. pl. 1050—Ten. fl. nap. 5. p. 126—Bertol. fl. ital. 7. p. 608.*

1c. *Schk. t. 208 e Koch—Campoides hispida. Riv. tetr. irr. t. 97.*

In apricis herbosis, et inter segetes, passim ab elatis ad demissa ubique.

Majo, Junio. ☉

Glabra, decumbens: *folia simplicia: flores parvi, flavi, in pedunculis elongatis umbellati, cernui: lomenta spinis confertis rigidis subuncinatis tecta.*

85. CORONILLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1108.

1. C. EMERUS. *Lin. sp. pl. 1046 — Ten. fl. nap. 5. p. 123 — Bertol. fl. ital. 7. p. 575.*

lc. *Dukam. arb. ed. 2. vol. 4. t. 31 — Colutea scorpioides 1, elatior. Clus. hist. 1. p. 27.*

In silvaticis, et ad sepes ubique.

Februario, Martio. ☽

Vulgo *Ravajuoli*.

Frutex glaberrimus, sempervirens; flores lutei, inodori, in umbellis longo pedunculati: lomenta teretia, striata, mucronata, pendula.

Pastores asserunt lactis copiam valde augeri, dum Capreae ramos teneros et folia hujus plantae, quos avide appetunt, comedunt.

2. C. SCORPIOIDES. *Koch syn. ed. 2. p. 209 — Ornithopus scorpioides. Lin. sp. pl. 1049 — Ten. fl. nap. 5. p. 126 — Astrolobium scorpioides. Bertol. fl. ital. 7. p. 589, excl. var. b.*

lc. *Ornithopus scorpioides. Cav. ic. 1. p. 26. t. 37 — Scorpioides Matthioli. Dod. pempt. p. 71.*

In collibus, et in cultis subargillosis elatis, vel demissis passim.

Aprili, Majo. ☉

Herbacea, glabra, glaucescens: *folia ternata, impari foliolo maximo: flores lutei, parvi, 1-4 in extremitate pedunculi: legumina tetragona, arcuata — Species ista cum C. repanda (Ornithopo repando Viv.) non est confundenda; siquidem, ut de reliquis sileam, folia in C. scorpioide nunquam pinnata ut in illa!*

86. ORNITHOPUS.

Desv. Journ. bot. 3. p. 121 — Dec. pr. 2. p. 311.

1. O. COMPRESSUS. *Lin. sp. pl. 1049 — Ten. fl. nap. 5. p. 125 — Bertol. fl. ital. 7. p. 595.*

lc. *Sibth. fl. gr. t. 714 — Scorpioides leguminosa. Dalech. hist. p. 493.*

In apricis herbosis ubique.

Martio, Aprili. ☉

Villoso-canescens: flores lutei, parvi, 2-3 in apice pedunculi, bractea palmata suffulti: lomenta compressa, longe mucronata, ex apice pedunculi pendula.

87. ASTROLOBIUM.

Desv. journ. bot. 3. p. 121 — Dec. pr. 2. p. 311, excl. nonn. spec.

1. A. EBRACTEATUM. *Dec. l. c. — Bertol. fl. ital. 7. p. 332 — Ornithopus ebracteatus. Brot. fl. lusit. 2. p. 150 — Ten. fl. nap. 5. p. 125.*

lc. Loisel. fl. gall. ed. 2. v. 2. t. 13 — Ornithopodium Pena. Dalech. hist. 1. p. 187. f. 1.

In aridis herbosis, et in apricis herbosis silvarum passim.

Aprili, Majo. ☉

Planta glaberrima; flores exigui, flavi, 1-3 in apice pedunculi, bractea simplici brevissima suffulti: lomenta teretia, arcuata.

88. CICER.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1189.

1. C. ARIETINUM. *Lin. sp. pl. 1040 — Bertol. fl. ital. 7. p. 543.*

lc. Lam. ill. gen. t. 632 — Cicer. Riv. tetr. irr. t. 20 — C. nigrum. Fuchs. hist. 267.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Cecere*.

89. VICIA.

Guss. syn. 2. p. 280.

§ 1. *Pedunculis elongatis.*

1. V. AMBIGUA. *Guss. syn. 2. p. 294.*

V. glabra, foliis 4-8-jugis, foliolis ellipticis oblongisque obtusis mucronulatis, stipulis lanceolato-semisagittatis basi saepe dentatis, suprenis altera lanceolata, pedunculis 6-16-floris folio longioribus, floribus secundis laxiusculis (majusculis, alis apice maculatis) leguminibus compressis oblongo-ovalibus, seminibus globosis atrofuscis subvelutinis.

lc. nulla.

♂. *concolor*; foliolis angustioribus acutioribusque, floribus concoloribus.

In silvaticis boream spectantibus; *selve del Fasano, delle Falanghe, e di*

Catreca, Cava di Buceto, via della Cava della Fontana sopra Casamicciola, Lacco al monte Vico; var. *b.* ibi al Cantariello.

Majo, Junio. ☉

Vulgo *Veza*, una cum sequentibus.

In var. *b.* *calyx* superne uti corolla coeruleus, et glabratus, basi saccatus, inferne adpresse pubescens ac virescens; dentes duo superiores brevissimi, glabri, acuti, ac aristati, conniventes, sinu fere orbiculari inter illos remanente; tres inferiores longiores, tubo aequilongi, virentes, lanceolato-lineares, acuminati, ciliati: *corollae* amoene coeruleae; *vexillo* surrecto, integerrimo, nervoso; *alis* conniventibus, parallelis, oblongis, carinam occultantibus, illam duplo excedentibus, ungue albido: *carina* cum *alis* connexa, marginibus ad apicem maculatis: *legumina* 4—5 lin. lata, 13—17 longa: *semina* hilo brevissimo, albido, vix lin. longo.

A sequente cui valde affinis, et cum qua facile commutatur, dignoscitur; *floribus* majoribus, latioribusque: *vexillo* lato, fere emarginato-bilobo; *alis* ad apicem albo-maculatis (excepta var. *b.*), quae in illa concoloreres: *legumina* in utrisque similia; tamen in hac longiora et latiora sunt. Multo minus cum *V. pseudo-cracca* associari potest, uti facit *Bertol.* in *fl. ital.* 7. p. 484, siquidem leguminum caractere omnino aliena est; et si ipse *Cl.* auctor sequentem a *V. pseudo-cracca* separat, potiori jure et ista nostra ab illa sejungenda est—Var. *b.* ob vexilli latitudinem cum sequente non commutanda.

2. *V. DASYCAMP.* *Ten. fl. nap.* 5. p. 116 — *Bertol. fl. ital.* 7. p. 484.

V. glabra, foliis 6–10-jugis, foliolis oblongo-lanceolatis acutiusculis obtusisque macronulatis, stipulis lanceolato-semisagittatis, supremis altera lanceolata, pedunculis multifloris folio longioribus, floribus approximatis secundis (alis concoloribus), leguminiibus compressis oblongo-ovalibus, seminibus globosis subvelutinis.

lc. *Ten. l. c. l.* 244, sed flores quoad magnitudinem alarum magis praecedentem referunt.

Ad sepes in apricis; monte *Vetta alle Petrelle*, da Barano a S. Nicola, Casamicciola, Lacco, Forio.

Majo, Junio. ☉

Calycis dentes duo superiores triangulares, acuti, sinu semicirculari inter illos remanente; tres inferiores duplo longiores, lanceolato-acuminati, intermedio reliquis longiore: *vexillum* leviter emarginatum: *alae* concolores, et quam in praecedente angustiores, uti *racemi* densiores quam in illa.

3. *V. PSEUDO-CRACCA.* *Bertol. amoen. ital.* p. 90, et *fl. ital.* 7. p. 487 excl. syn. *V. ambiguae* — *Ten. fl. nap.* 5. p. 117.

lc. nulla.

In apricis herbosis, et in arenosis vulgatissima.

Martio, Majo. ☉

Variat *foliis* glabratibus ac virentibus, aut villosis-incanis, obtusis acutisque: *floribus* plus minusque intense coeruleis; tamen varietatem floribus albis in hac insula non vidi—*Leguminibus* duplo fere angustioribus (2-3-lin. latis, 8-12 longis), et utrinque valde convexis a duabus praecedentibus diversissima, et *semina* globosa, nigra, ac velutina fere duplo minora.

4. V. MONANTHOS. *Desf. atl. 2. p. 165*, non *Retz*, nec *Willd.*—*Bertol. fl. ital. 7. p. 503*—*Ervum monanthos. Lin. sp. pl. 1040*—*Ten. fl. nap. 5. p. 123*.

lc. *Sturm. fl. germ. fasc. 32*.

Colitur in arenosis apricis passim, ita ut nunc fere spontanea ad agrorum margines prope *Fontana*.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Apici*.

5. V. BITHYNICA. *Lin. sp. pl. 1038*—*Ten. fl. nap. 5. p. 114*—*Bertol. fl. ital. 7. p. 459*.

lc. *All. pedem. t. 26. f. 2*—*Jacq. H. Vind. 2. t. 147*.

In silvaticis ubique ab elatis ad litus.

Aprili, Majo. ☉

Flores coerulei, carina alba: *semina* globosa, levia, ex viridi-rufescentia, varie fusco vel nigro-maculata; hilo brevi, sordide albido.

6. V. DISPERMA. *Dec. pr. 2. p. 359*—*Ten. fl. nap. 5. p. 115*—*Bertol. fl. ital. 7. p. 501*.

lc. *Ervum parviflorum. Moris fl. sard. 1. p. 570, t. 71*.

Ad sepes in apricis herbosis, et ad muros; *Ischia al Castello, discesa da Campagnano a S. Antonio, da Chiajano a Pico ed al Pennino del Cantariello, Testaccio al Vataliero, sopra i muri della via dal Belvedere al Crovone, stufa del Cacciuto ed al Mortito, muri di Casamicciola, del Lacco, monte Vico, coste basse della Serra scendendo alla contrada del Bell'omo sopra Forio, Punta di S. Angelo*.

Aprili, Majo ☉

Pedunculi in fertilibus saepius multiflori, sed *legumina* perfecta ad summum tria in quolibet racemo: *calycis* dentes duo superiores breviores, sinu lato inter illos remanente: *corollae* parvae: *vexillum* emarginato-bilobum; lobis rotundatis, surrectis: *alae* vexillo breviores, earum marginibus inferne inter se invicem remotis, superne vero inter se approximatæ, et in fornibus formam cohaerentes, sub quibus *carina* brevior apice atropurpureo-maculata reconditur: *legumina* 3-lin. lata, 5-lin. longa: *semina* globosa, rufescentia, varie nigro-maculata; hilo albo.

7. V. BIEBERSTEINI. *Guss. syn. 2. p. 237*—*Ervum Biebersteinii. Guss. pr. 2. p. 445*—*Ten. fl. nap. 5. p. 122*.

V. foliis adpresse pubescentibus, inferioribus cirrhosis 2-3-jugis, folio-

lis ovalibus oblongisque obtusis, superioribus cirrho simplici terminatis 4-6-jugis, foliis oblongis mucronulatis, stipulis integris inferioribus semisagittatis superioribus linearibus, pedunculis folio longioribus, calycinis dentibus lanceolato-acuminatis, leguminibus 4-6-spermis anguste linearibus, seminibus subglobosis.

lc. nulla.

Ad silvarum, et vinearum margines; *Ischia al Castello, Campagnano, Bagno, Casamicciola, Lacco.*

Aprili, Majo. ☉

Cum sequento, vel cum *V. tetrasperma* a plerisque confusa; sed confer quae notavi de istis speciebus in *syn. l. c.*

8. *V. GRACILIS*. *Loisel. fl. gall. ed. 1. p. 460, et ed. 2. v. 2. p. 148*—*Ervum tenuissimum. Pers. syn. 2. p. 309*—*Ten. fl. nap. 5. p. 122*—*E. longifolium. Ten. fl. nap. pr. p. 59, ex ipso.*

lc. *Loisel. l. c. t. 12.*

In silvaticis apricis, et inter segetes in elatis; *monte Vetta, Jetto e Fontana ne' seminati*, sed potius rara.

Aprili, Majo. ☉

A *V. tetrasperma* hanc et praecedentem non separat *Cl. Bertol. in fl. ital. 7. p. 533*; tamen pedunculi in bac et in praecedente folia duplo superant; in *V. tetrasperma* uniflori, et folia subaequant. Confer *Koch syn. ed. 2. p. 219.*

9. *V. HIRSUTA*. *Babigut. mem. p. 78*—*Ervum hirsutum. Lin. sp. pl. 1039*—*Ten. fl. nap. 5. p. 122*—*Bertol. fl. ital. 7. p. 536.*

lc. *Fl. dan. 639*—*Cracca minor. Riv. tetr. irr. t. 54, optima.*

In silvaticis, et ad sepes passim.

Martio, Majo. ☉

Flores inter omnes alias species inarimenses minimi.

§ 11. *Floribus subsessilibus.*

a. luteis.

10. *V. HIRSUTISSIMA*. *Cyr. cat. ined. ex Ten. fl. nap. 5. p. 119, et V. hirta, fl. partie. di Napol. p. 578, ex ipso.*

V. undique pilis rigidis hirta, foliis lineari-lanceolatis elongatis acutis mucronatis, stipulis infimis bipartitis intactis supremis ovatis maculatis, floribus solitariis (luteis), vexillo glabro, leguminibus elliptico-oblongis compressis reticulatis hirsutissimis, seminibus subglobosis nigro-purpureoque variegatis concoloribusque, hilo fusco elliptico.

lc. nulla.

Inter segetes in elatis; *seminati di Fontana, di Calimera, di Serrano, della Pierra dell'acqua, delle Falanghe, del Fasano, di monte Vetta.*

Majo, Junio. ☉

Flores pallide lutei: pili rigidi, ac fulvi leguminum tuberculo insident.

Cl. Bertol. in fl. ital. 7. p. 524 a V. hirta non separat, sed characteres qui ex ipso ludibundi, mihi constantes videntur.

11. *V. HYBRIDA. Lin. sp. pl. 1037 — Ten. fl. nap. 5. p. 120 — Bertol. fl. ital. 7. p. 527.*

lc. Jacq. H. Vind. 2. t. 68 — V. silvestris, lutea, cum galea fusca. Bauh. hist. 2. p. 314.

In silvaticis, et ad sepes in elatis aut demissis; S. Nicola, monte Vetta, Pietra dell'acqua, alle Falanghe, al Fasano, a Catreca, alla Bocca e coste della Serra sopra Forio, Serrano, Moropane, Chiajano al Penino dello Cantariello, Testaccio al Vataliero, Lacco al monte Vico, nella strada di S. Montano, Isehia al Castello.

Majo, Junio. ☉

Folia molliter adpressequ pubescentia: flores pallide lutescentes; vexillo externe villosa, alas angustas subaequante: legumina oblongo-elliptica, rostrata, pilosa; pili rigidi tuberculo insidentibus: semina globosa, omnino atra, vel fusca et maculata; hilo oblongo, cinereo.

b. albido-coeruleis.

12. *V. FABA. Lin. sp. pl. 1039 — Faba vulgaris. Dec. pr. 2. p. 354.*

lc. Blachw. herb. t. 19 — Bona, seu Phaseolus. Dod. pempt. 513 — Fab. Riv. tetr. irr. t. 23.

Colitur.

Februario, Aprili. ☉

Sequentes varietates coluntur.

a. major; seminibus magnis, valde compressis.

Fave ortolane.

b. minor; seminibus parvis, tereti-depressis.

lc. Faba minor. Riv. l. e. t. 24.

Favicelle, o Canzanelle.

13. *V. NARBONENSIS. Lin. sp. pl. 1038 — Ten. fl. nap. 5. 121 — Bertol. fl. ital. 7. p. 508, excl. syn. V. serratifoliae.*

lc. Faba silvestris. Riv. tetr. irr. t. 58, optima — Dod. pempt. 516.

In cultis elatis, vel in herbosis apricis; salita dalle Petrelle al monte Vetta, sed satis rara.

Majo, Junio. ☉

Foliola in hac latiora, quam in reliquis omnibus.

14. *V. MACROCARPA. Bertol. fl. ital. 7. p. 511 — V. sativa, b. macrocarpa.*

Moris fl. sard. 1. p. 554 — Ten. fl. nap. 5. p. 117 — V. sativa.

Guss. syn. 2. p. 284.

V. caule subscedente, foliis pubescentibus, foliolis mucronatis cuneatis, inferiorum obcordatis superiorum obovato-oblongis obtusis (raro emarginato-truncatis), stipulis laciniato-dentatis, supremis semisagittatis notatis, leguminibus glabris late-linearibus teretibus exquisitè nervosis patulis (1-2), seminibus majusculis globosis.

1c. *Vicia*. Riv. tetr. irr. t. 55, optima — V. vulgaris. Bauh. hist. 2. p. 310, ex seminum descriptione.

In herbosis, vel incultis passim; *seminati del monte Vetta, della Pietra dell'acqua, di Calimera, di Fontana, della Bocca della Serra, del monte Veza, alla Guardiola del Testaccio, al monte di Barano, marina de' Maronti, Casamicciola presso la Cava del Larito, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☉

Caules saepius humiles, non alte scandentes: *stipulae* inferiores semicordatae, immacolatae: *foliola* in inferioribus foliis brevia obovato-cuneata; in superioribus oblongo-cuneata, apice truncata vel tantum obtusa, semper mucronulata, margine petiolisque ciliato-pilosis: *calyces* tubulosi; *tubo* nervoso-angulato, piloso; *dentibus* lanceolato-attenuatis, tubo parum brevioribus; *dentes* vero superiores reliquis parum longiores: *corollae* majusculae (omnium hujus sectionis majores, V. *narbonensi* excepta); *vexillum* latum, coeruleescens, prope sulcum subtus albo-maculatum, explanatum, emarginatum, mucronulo interjecto, superne et externe carinatum, calycem superans: *alae* parallelae, intensius coloratae, ungue albido, vexillo fere duplo breviores: *carina* albida, apice coeruleescens, alis duplo brevior, dentes calycinis vix superans: *legumen* subsessile, 3-4 lin. latum, reticulato-nervosum, demum nigrum: *semina* gilva aut rufescentia, maculis intensioribus notata; hilo viridulo.

15. V. SATIVA. Lin. sp. pl. 1037 — Ten. fl. nap. 5. p. 117 — Bertol. fl. ital. 7. p. 512, excl. plur. syn.

V. caule scandente, foliis 3-7-jugis, foliolis glabris mucronatis utrinque exquisite parallele nervosis, in inferioribus mediisque obovato-vel oblongo-cuneatis emarginatis, in superioribus oblongo-lanceolatis, stipulis notatis semisagittatis, superioribus integris dentatisque, leguminibus 1-2 horizontalibus subdeflexisque late linearibus obsolete nervosis tereti-compressis, seminibus (mediocribus) globosis variegatis.

1c. Fl. dan. 522, ex Bertol. — *Vicia*. Fuchs. hist. p. 172.

In apricis herbosis, praesertim inter segetes; *Lacco ne' seminati di monte Vico!*

Majo, Junio. ☉

Semina badia, varie nigro-maculata: *legumina* matura vix nigricantia, sed saepius virentia — A plerisque haec species cum praecedente confunditur; sed caules altius scandentes: *foliola* duplo angustiora, minus nervosa; *flores* minores; sed quod magis interest *legumina* breviter

pedunculata fere duplo angustiora sunt, nempe ad summum 2-lin. lata, nec matura intense nigrescunt. Simul denique proveniunt, nec una in alteram transit.

16. *V. SEGETALIS*. *Thuil. fl. paris. p. 367* — *Ten. fl. nap. 5. p. 117* — *V. angustifolia, a. Bertol. fl. ital. 7. p. 515*.

V. foliis glabriusculis, foliis inferiorum obovatis emarginato-retusis, superiorum lanceolato-linearibus obtusis truncatisve mucronulatis, stipulis semisagittatis dentatis, leguminibus demum glabris patentibus 1-2 (denique viridi-atris) anguste-linearibus, seminibus globosis atris, hilo albo.

Ic. V. angustifolia. Itiv. tetr. irr. t. 56, quae uti recte facit cl. Bertol. l. c. potius ad hanc, quam ad V. angustifoliam, ad quam in syn. 2. p. 286 citavi, spectat.

Inter segetes; Guardiola del Testaccio, monte di Barano, coste di S. Pancrazio.

Aprili, Majo. ☉

A V. angustifolia, cum qua a nonnullis associatur recedit, habitu firmiore, foliis leguminibusque latioribus, ac maturis viridi-bruneis, quae in illa atra sunt.

17. *V. COSENTINI*. *Guss. pr. 2. p. 426, et syn. 2. p. 285* — *Ten. fl. nap. 5. p. 118*.

V. foliis 4-7-jugis pubescentibus, foliis oblongo-vel lineari-cuneatis mucronatis emarginatisve, stipulis infimis latioribus laciniatis immaculatis, superioribus notatis semisagittatis integris dentatisve, leguminibus subtortulosis anguste-linearibus 1-2 subsessilibus erectis glabris, seminibus ellipticis.

Ic. nulla.

In cultis herbosis; Pietra dell'acqua sotto S. Nicola, monte Vetta, Lacco al monte Vico.

Aprili, Majo. ☉

Caulis scandentes: foliola 1 1/2-2 lin. lata, late emarginato-truncata: calycis tubulosi dentes lanceolato-mucronati, duobus superioribus semel reliquos excedentibus: flores gemini, coerulei; vexillo lato, vix emarginato; alis atropurpureis, paullo quam illud brevioribus; carina alis duplo brevior, albida, ad apicem obtusum sordide coerulea: legumina fere bipollicaria, vix 2-lin. lata: semina rufescentia, levia, nigromaculata, hilo albo.

18. *V. MACULATA*. *Presl fl. sic. p. xxiii* — *Bertol. fl. ital. 7. p. 520, excl. var. b.* — *V. nemoralis. Ten. fl. nap. 5. p. 118, excl. syn., praeter Presl et Guss.*

V. foliis pubescentibus, inferiorum foliolis 2-4 orbiculatis vel obovato-cuneatis emarginatis, superiorum 4-6 obcordatis obtusis emarginatisque, omnibus mucronulatis, stipulis semisagittatis dentatis nigro-maculatis,

inferioribus angustioribus integris, leguminibus 1-2 subsessilibus anguste linearibus patulis glabris, seminibus globosis.

lc. *nulla*.

In apricis herbosis passim.

Aprili, Majo. ☉

Caulis aliquando ramosissimi, firmi, vix scandentes: *foliola* utrinque moliter patenterque villosa ac ciliata, supra sulcata, subtus carinata: *calycis* dentes lanceolati, aequales, acuti, ciliati, tubo aequilongi: *flores* gemini, subsessiles, horizontales, magnitudine *V. sativae*: *vexillum* pallide coeruleum, venis intensioribus notatum, emarginatum: *alae* conniventes, purpureae, carinam apice quoque purpuream et dentes calycinis superantem occultantes: *legumina* forma et magnitudine sequentis, ferè teretia, et demum uti in illa nigra — Haec magis quam aliae *V. sativam* refert; tamen recedit leguminibus angustioribus, torulosis, apice incurvis, demum nigris.

19 *V. CORDATA*. *Wulf.* in *Sturm*, et in *Spr. syst.* v. 3. p. 264.

V. foliis 5-6-jugis, foliolis villosiusculis ciliatisque mucronulatis, inferiorum obcordato-cuneatis, superiorum lineari-cuneatis bilobo-emarginatis, stipulis maculatis semisagittato-dentatis, leguminibus solitariis glabris anguste linearibus patentibus subsessilibus, seminibus globosis variegatis.

lc. *nulla*.

In apricis herbosis; *Bagno*, *Selve della Pera sopra Casamicciola*.

Aprili, Majo. ☉

Caulis graciles, ramosissimi, diffusi, vel apice surrecti: *folia* inferiora 1-3-juga; foliolis 2-3 lin. latis, 3-8 lin. longis, saepe sinu lato terminatis; superiora 4-5-juga; foliolis lin. latis: *calycis* villosi dentes lanceolati, inter se subaequales, tubo aequilongi: *flores* parvi: *legumina* 12-15 lin. longa, vix duas lineas lata, apice sursum curvata, stylo inflexo recurvo terminata, matura nigra, non virentia, uti male dixi in *syn.* 2. p. 285: *semina* exacte globosa, badia, varie nigro-maculata — *Cl. Bertol.* in *fl. ital.* 7. p. 512 a *V. sativa* non separat.

20. *V. HETEROPHYLLA*. *Presl del. Prag.* p. 57 — *V. maculata*, *b. Bertol. fl. ital.* 7. p. 520.

V. glabrescens, caule humili gracili, foliis inferioribus 1-3-jugis, foliolis obovatis emarginatis, superioribus 4-6-jugis, foliolis anguste lanceolato-linearibus obtusis retusisque (raro), stipulis semisagittatis supremis notatis, leguminibus anguste linearibus solitariis subsessilibus erectis glabris, seminibus subglobosis submaculatis.

lc. *nulla*.

In herbosis apricis, sed praesertim in cultis inter *segetes*; *S. Nicola, monte Vetta, seminati nell'alto della Scarupata, nella via di S. Pancrazio, Punta S. Angelo, Guardiola del Testaccio*.

Aprili, Majo. ☉

Caules ad summum pedales, basi ramosi: *stipulae* in planta imparimenti integrae: *foliola* in foliis tantum infimis obovata ac emarginata, in reliquis oblongo-lanceolata: *flores* parvi, ut in *V. cordata*, et *calyces* uti in illa, aequae ac *legumina*, quae etiam demum nigra, sed versus apicem non sursum curvata, et *semina* badia!, concoloria, vel obsolete intensius maculata; hilo augustissimo, albido.

21. *V. ANGUSTIFOLIA*. Roth tent. fl. germ. p. 310 — Ten. fl. nap. 5. p. 118 — Bertol. fl. ital. 7. p. 516, var. b.

V. caule gracili, foliis glabriusculis, inferioribus 1-2-jugis, foliolis obovatis retusis vel oblongo-ovalibus, superioribus 3-5-jugis, foliolis anguste linearibus elongatis apice integerrimis mucronatisque, stipulis semisagittatis dentatis, leguminibus subsessilibus solitariis erectiusculis glabris, seminibus globosis (parvis!) atris concoloribus levibus.

lc. Sturm fl. germ. 1. f. 31.

Inter segetes in demissis; *seminati nell'alto della Scarupata sotto monte Vezza.*

Aprili, Majo. ☉

Habitus praecedentis: *semina* parva, atra ac fere velutina, quo caractere ab omnibus aliis hujus sectionis distinctissima.

22. *V. LATHYROIDES*. Lin. sp. pl. 1037 — Ten. fl. nap. 5. p. 118 — Bertol. fl. ital. 7. p. 517.

lc. Jacq. miscell. austr. 2. p. 299. t. 18 — *V. minima*. Riv. tetr. irr. t. 56.

In apricis herbosis ab elatis ad litus; *S. Nicola, salita delle Petrelle a monte Vetta, Fontana, Serrano, sopra gli muri della discesa da Chianano al pennino del Cantariello, ed in quelli del pennino di Belvedere e della strada del Crovone, Vataliere nello scendere alle selve nel cratere, Succellaro, Ischia all' Arso, Bagno.*

Aprili, Majo. ☉

Flores cyanei, et inter alias species hujus sectionis exigui; ideoque ob omnibus facillime dignoscitur: *legumina* anguste linearia, solitaria, patentia, glabra: *semina* cinerea, cubica, tuberculato-scabra.

90. ERVUM.

Guss. syn. 2. p. 299.

1. E. LENS. Lin. sp. pl. 1039 — Ten. fl. nap. 4. in syll. p. 104, et 5. p. 121 — Bertol. fl. ital. 7. p. 511.

lc. Lam. ill. gen. t. 634. f. 1 — Lens. Fuchs. hist. p. 859 — Riv. tetr. irr. t. 36.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Lenticchia*.

Duae varietates coluntur :

a. seminibus albis.

Lenticchie bianche.

b. seminibus fucis.

Lenticchie nere.

91. PISUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1184.

1. P. BIFLORUM. *Raf. carott. p. 71* — P. arvense, b: *variegatum*. *Guss. syn. 2. p. 279* — *Ten. fl. nap. 5. p. 108.*

P. caule subangulato cirrhis scandente, petiolis teretibus, stipulis semicordatis basi serrato-dentatis, foliis 1-3-jugis, foliolis ellipticis oblongisque obtusis retusisve subintegris vel serratis, pedunculis 1-2-floris folia subaequantibus.

1a. Pisi pulchra species, folio anguloso. *Bauh. hist. 2. p. 297?*

In silvaticis, et ad sepes; *siepi del cavone delle Nocelle, della cava della Fontana sopra Casamicciola, costa della Serra scendendo alla contrada del Bell'Omo sopra Forio.*

Majo, Junio. ☉

Vulgo *Rivoli*, et semina uti illa *P. sativi* comeduntur, sed viliora sunt.

Semina viridula, lineolis nigris sparsis notata, glabra, subglobosa, et aliquando utrinque depressiuscula — *Cl. Bertol. in fl. ital. 7. p. 419 a P. arvense* non distinguit, sed pro aliis differentiis confer *Ten. l. c.*

2. P. SATIVUM. *Lin. sp. pl. 1026.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 633* — *Blackw. herb. t. 83* — *Pisum. Fuchs. hist. 626.*

Colitur.

Januario, Aprili. ☉

Sequentes varietates coluntur:

1. caule alte scandenti

a. floribus omnino albis.

Piselli bianchi.

b. florum vexillo coeruleo, altis vero atro-coeruleis.

Piselli neri.

2. caule nano, erecto, non scandente.

Piselli della Regina.

92. LATHYRUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1186.

1. *Folia nulla.*

1. *L. APHACA. Lin. sp. pl. 1029 — Ten. fl. nap. 4. in syll. p. 101 — Bertol. fl. ital. 7. p. 439.*

lc. Engl. bot. t. 1167, ex Dec. — Aphaca. Dod. pempt. 545.

In silvaticis, et in cultis passim.

Aprili, Majo. ☉

Cirrho simplices: stipulae magnae: pedunculi graciles, elongati: corolla lutea, parva — Semel pedunculos bifloros vidi.

2. *Folia 1-2-juga: pedunculi 1-2-flori.*

2. *L. SPHAERICUS. Retz. obs. 3. p. 39 — Ten. fl. nap. 5. p. 104 — L. axillaris. Lam. diet. enc. 2. p. 706?*

lc. Dec. ic pl. Gall. rar. t. 32.

In silvis apricis, et in herbosis satis obvius.

Majo, Junio. ☉

Glaber: *folia 1-juga; foliolis anguste linearibus: pedunculi mutici, aut aristati: corollae parvae, coccineae: legumina subteretia, anguste linearia, elongata — Variat pedunculis 4-12 lin. longis, nunquam vero folia excedunt — A sequente leguminibus nervosis, et seminibus globosis levibus, quae in illo cubica ac tuberculata sunt eximie differt — Cl. Bertol. in fl. ital. 7. p. 453, hunc pro L. angulato Lin. vero habet, et L. angulatus Willd. (non Lin.) L. hexaedrum una cum Cl. Chaub. Moris, et de Notariis appellat.*

3. *L. ANGULATUS. Lin. sp. pl. 1031 — Ten. fl. nap. 5. p. 104 — L. hexaedrus. Bertol. fl. ital. 7. p. 455.*

lc. nulla.

In silvaticis ex *Ten. syll. p. 354*, non ex *Flora l. c.*; tamen non inveni, et forsan typographicus error—Confer praecedentem pro specie Linneana.

4. *L. SATIVUS. Lin. sp. pl. 1030 — Ten. fl. nap. 4. p. 26 — Bertol. fl. ital. 7. p. 446.*

lc. Sibth. fl. gr. t. 695 — Ervum sativum. Fuchs. hist. p. 571.

Colitur passim, et vulgo dicitur *Cicerchia*.

Aprili, Maio. ☉

Corollae coeruleae, calyce duplo majores: legumina late rhombeo-ovata, ad suturam seminiferam alata: semina angulata.

5. *L. CICERA*. *Lin. sp. pl.* 1030.

b. dubius — *L. dubius*. *Ten. cat. sem. H. R. Neap. an. 1825, et fl. nap. 5. p. 105* — *L. purpureus*. *Presl del. pr. p. 39* — et *L. Erythrinus*, idem *fl. sic. 1. p. xxiii*.

L. caulibus diffusis tetragonis, foliis 2-jugis, foliolis foliorum inferiorum lanceolatis, superiorum lineari-elongatis, cirrhis 2-3-fidis infimis oblitteratis, stipulis semisagittato-lanceolatis, pedunculis 4-floris petiolo longioribus, leguminibus oblongo-lanceolatis subcompressis nervosis sutura seminifera vix marginatis, seminibus angulatis levibus !

lc. Ten. fl. nap. 1. 175. f. 2.

In apricis cultis, et ad sepes in elatis ; *Fontana, Calimera, Bocca delle Serra, dal monte Vetta a S. Nicola.*

Majo. Junio. ☉

Glaber : *petioli dilatati : corollae roseae, magnitudine praecedentis : semina glabra, cinerea, vel fusco-rufescentia, et varie maculata* — *Cl. Bertol. in fl. ital. 7. p. 444* nequidem uti varietatem *L. Cicerae* habet ; tamen observante *Cl. Ten. l. c.* differt *L. Cicera* verus ab hoc stipulis duplo angustioribus, leguminibus duplo fere brevioribus.

3. *Folia 1-plurijuga ; pedunculis multiflori.*6. *L. TENUIFOLIUS*. *Desf. atl. 2. p. 160* — *L. tenuifolius*, et *L. alatus*. *Ten. fl. nap. 5. p. 107* — *L. auriculatus*. *Bertol. fl. ital. 7. p. 447* — *L. alatus*. *Sibth. fl. gr. 7. p. 85.*

lc. L. alatus. Ten. l. c. t. 175. f. 1.

In cultis, ad sepes, ac in silvaticis apricis ubique, et ad agros saginandos utillime adhibetur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Doleca*.

Glaber, glaucescens, saepe alte scandens : *petioli infimi aphylli foliacei : folia 2-6-juga ; foliolis lanceolato-linearibus, saepe alternis : flores mediocres, magnitudine L. sativi ; sed vexillum roseum, basi interne utrinque gibba conica notatum ; alae coerulescentes, carina longiores : legumina pendula, late linearia, compressiuscula* — Species quoad foliorum latitudinem, et numerum florum in pedunculo summopere polymorpha — *Semina* tam in planta quae in hac insula, quam in illa quae in Hirplnis colitur sunt nigra, concoloria, velutina, hili albo — *Confer Bertol. l. c., et quae notavi in syn. 2. p. 278.*

93. PHASEOLUS.

Savi osserv. sopra i generi *Phaseolus*, e *Dolichos*.

1. *P. VULGARIS*. *Lin. sp. pl. 1016?* — *Savi l. c. mem. 3. p. 14.*
P. legumine rectiusculo subtoruloso longe mucronato, semine uni-plaricollone ovali obtuso compresso, ventre recto, diametro longitudinali transversali subsesquilongiore, areola umbilicali elliptica marginata, glandula basilari obcordata sulcata, micropilo oblongo, protuberantia obtusa.
lc. Savi l. c. f. 13 a, b, c, d, e.
 Colitur.
 Majo, Junio. ☉
 Sequentes varietates coluntur:
 - I. seminibus unicoloribus. *Savi l. c.*
 - a. *P. vulgaris, niger. Savi l. c. p. 15.*
Fasuli turchi.
 - b. *P. vulgaris, atrofuseus.*
Fasuli turcheschi.
 - c. *P. vulgaris, aureus, minor. Savi l. c.*
Fasuli quarantini.
 - d. *P. vulgaris, helvolus. Savi l. c.*
Fasuli tabacchini.
 - II. seminibus maculis latis curvis notatis. *Savi l. c. f. 13. dod.*
 - a. *P. vulgaris, Zebra albidus. Savi l. c.*
Fasuli scritti.
2. *P. ROMANUS. Savi l. c. p. 17.*
P. legumine compresso subtoruloso mucronato, semine albo ovali obtuso plus minus compresso ventre subrecto vel concavo, areola ovato-oblonga immarginata, glandula basilari obcordata leviter sulcata, micropilo circulari, protuberantia elongata.
b. caule procero, legumine et semine majoro subtorto. Savi l. c.
lc. Savi l. c. f. 20, a, b, c.
 Colitur.
 Majo, Junio. ☉
Fasuli bianchi.
3. *P. OBLONGUS. Savi l. c. p. 17.*
P. legumine recto subcylindrico longe mucronato, semine colorato teretiussculo obtuso vel truncato, diametro longitudinali transversali subduplo longiore, areola umbilicali oblongo-lanceolata marginata, glandula basilari obcordata sulcata, micropilo oblongo, protuberantia obtusa.
lc. Savi l. c. f. 14. a, b, c, d, e, f.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Fasuli matti.

4. *P. SPHAERICUS.* Savi *l. c. p. 20.*

P. legumine rectiusculo toruloso mucronato, semine subgloboso nunquam albo, areola elliptica argute marginata zonata, glandula basilari obovata biloba, micropilo semielliptico, protuberantia nulla.

b. sphaericus pragensis, seminibus intense roseis albido-maculatis.

1c. Savi *l. c. f. 18. a. b. c.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Fasuli Zampognari, o a pallottolelle.

94. DOLICHOS.

Savi *osserv. sopra i Gen. Phaseolus et Dolichos mem. 2. p. 15.*

1. *D. MELANOPHTHALMUS.* Dec. *pr. 2. p. 400.*

1c. nulla.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Fasuli coll'occhitiello, a Fasolilli.

Caulis angulato-sulcati, erecti, firmi, tamen superne attenuati ac subscandentes: *foliola* obscure virentia, obtusiuscula, 4-poll. lata, 3-poll. longa; intermedium ovatum, longius petiolatum, lateralia vero inaequaliter ovata: *petioli* late canaliculati, subtus acute carinato-angulati; *petiolulis* utrinque basi glandula lineari oblonga instructis: *pedunculi* laterales solitarii, erecti, demum elongati, in apice ad florum insertionem callosocrassati: *flores* in apice pedunculorum capitato-spicati, pauci vel plures: *calycis* glabri dentes triangulares, lanceolati, acuti, tubo campanulato breviores, saepe nigro-maculati; inferior longior: *corollae* vexillum obovatum, emarginatum, rectum, conduplicatum, sub anthesi patens, alas et carinam tegens, una cum alis pallide roseum, at aliquando flavescens-albidum, externe vero sordide lutescens, versus basim callis duobus parallelis lineariibus verticalibus alas comprimentibus instructum: *alae* semiovatae, obtusae, patentes: *carina* late falcata, albida: *stylus* ascendens, fere a medio ad apicem antice villosus: *stigma* glabrum, crassiusculum, nitide virescens, postice refracto-calcaratum: *legumina* solitaria, vel gemina, pendula, teretiuscula, subtorulosa, subcurvata, ad suturas elevato-carinata, 4-6-pollicaria, scabriuscula, intense virentia, matura albida, apice terminata rostro brevissimo vel pollicari, obtusiusculo, supra convexo, subtus unisulcato: *semina* reniformi-elliptica, albida; hilo albido, ob-

longo, macula atrorubente, demum nigra circumdato — *D. monachalis*. *Brot. fl. lusit.* 2. p. 125, et *Dec. pr.* 2. p. 399, quoad specimina culta, quae habeo (et in quibus semina tantum paullo minora ac rufescentia), ac quoad descriptionem, ab hoc mihi non videtur differre, quamvis ad aliam sectionem (*Catiang*) relatus; quod si verum, tunc *Broteri* nomen antiquitatis jure servandum.

95. CERATONIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1612.

1. *C. SILIQUA*. *Lin. sp. pl. 1513* — *Ten. fl. nap. 4. p. 187.*
lc. Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 50 — *Ceratonia. Dod. pempt. 787*, mala.
 Colitur passim in rupestribus aridissimis, ubi optime provenit.
 Aprili, vel Septembri ! ♀
 Vulgo *Suscella*.

Arbor sempervirens, comosa; ramis flexuoso-distortis, et saepe grosse tuberculatis: flores ingrate olentes, in racemis laxis erectis 1/2-1 1/2 poll. longis a ramis vel ab ipso trunco prodeuntibus. Fructus altero anno maturant—Confer *Cavol. sulle frutt. del Carr. in Rendic. della R. Accad. delle Scienze di Nap. v. 8. p. 62*, et *Ten. l. c. p. 268.*

23. AMYGDALAEAE.

Juss. et Koch. syn. 2. p. 227.

93. AMYGDALUS.

Koch syn. ed. 2. p. 227.

1. *A. COMMUNIS*. *Lin. sp. pl. 677* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 125.*
lc. Lam. ill. gen. t. 431. f. 2 — *Duham. arb. ed. 2. v. 4. t. 24* —
Amygdalus. Dod. pempt. 798—*Amygdalae. Matth. comm. 1. p. 247.*
 Passim colitur, et sat raro in rupestribus incultis occurrit.
 Februario, Martio. ♀
 Vulgo *Amennola*.

97. PERSICA.

Tourn. inst. t. 400 — *Dec. pr. 1. p. 531* — *Koch syn.*
ed. 2. p. 227.

1. *P. VULGARIS*. *Mill. dict. ed. germ. 3. p. 465*, ex *Koch* — *Amygdalus*
Persica. Lin. sp. pl. 676.

1c. *Lam. ill. gen. t. 431. f. 1* — *Blackw. herb. t. 101.*

Colitur.

Februario, Martio. \mathfrak{y}

Fructus tomentosi; carne albida, sanguinea, aut flavescens.

Sequentes varietates eoluntur:

1. *Diupyrenae*; carne tenera, a nucleo secedente. *Moris*
fl. sard. 2. p. 6.

1. *minor*; drupa parva, subrotunda, ex albido-carnea. *Gasp.*

Persichina bianco.

2. *praecox*; drupa subrotunda vel ovata; epidermide ex albido-carnea; pulpa albida; putamine fragili, in maturitate saepe dehiscente. *Gasp.*

Persica della Maddalena.

3. *albescens*; drupa subrotunda (diam. 2-pollicari); epidermide ex albido-carnea; pulpa albida, tenera, dulei, succosa; maturescit Septembri. *Gasp.*

Persica biancanello.

4. *sanguinea*; drupa subrotunda; epidermide una cum pulpa colore rubro-sanguineo insignita. *Gasp.*

Persica sanguigno.

2. *Sympyrenae*; carne firma, nucleo firmiter adhaerente.

Moris fl. sard. 2. p. 6.

1. *rudis*; drupa subrotunda, parva, obtusa; epidermide flavescens; pulpa firmiuscula; flava. *Gasp.*

Percuoca selvaggia.

b. *zerotina*; epidermide altero latere leviter rosea; pulpa paullo dulciore; maturescit Septembri et Octobri. *Gasp.*

Percochiella a Percuoca verace di vendemia.

bb. eadem; epidermide, et pulpa albida.

Percuoca bianca di vendemia.

2. *vulgaris*; drupa subglobosa, magna, obtusa; epidermide, et pulpa firma flavescens. *Gasp.*

Percuoca comune.

3. *sanguinea*; drupa subglobosa, mediocri (diametro 1 1/2 pollicari); epidermide sordide flavescens, altero latere fusco-rubente; pulpa firmiuscula albida, demum sanguinea; maturescit Octobri, Novembri. *Gasp.*

Percuoca sanguigno di vendemia.

4. *secabilis*; drupa subrotunda (2 1/2 poll. in diametro longit.), utrinque obtusa; epidermide flava; pulpa firmiuscula, flavescens, a putamine subsecedente; maturescit Septembri. *Gasp.*

Pumo spaccariello.

b. eadem; epidermide, et pulpa albida.

Pumo spaccariello bianco di vendemia.

5. *depressa*; drupa subrotunda, depressa (poll. 2 1/2 circiter alta); epidermide albida, putamini adhaerente. *Gasp.*

Percuoco bianco (Pesco o Pumo biancone di Verona Gall.)

6. *papillata*; drupa ovata, apice papilla conica praedita, undique flava, vel altero latere flavo-carnea; pulpa firmiuscula, succosa, dulci. *Gasp.*

Percuoco col pizzo.

2. P. LEVIS. *Dec. pr. 2. p. 531.*

1c. *Noiset. jard. fruit. t. 20. f. 23, et t. 21. f. 3, 4, ex Dec.*

Colitur.

Februario, Martio. \mathfrak{H}

Vulgo *Nocepersico.*

Fruetus glabri, odori, nitidi; carne densa, acido-dulci, flavescens, nucleo adhaerente.

98. PRUNUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 849 — Koch syn. ed. 2. p. 228.

1. ARMENIACA. *Drupa velutina.*

1. P. ARMENIACA. *Lin. sp. pl. 679—Armeniaca vulgaris. Dec. pr. 2. p. 532.*

1c. *Blackw. herb. t. 281.*

Colitur.

Martio, Aprili. \mathfrak{H}

Sequentes varietates coluntur:

1. *alexandrina praecox*; drupa subrotunda, diametro pollicari et ultra, altero latere carnea; pulpa putamine adhaerente. *Gasp.*

Crisomolo ammennoelle.

2. *alexandrina serotina*; drupa subrotundo-ovata, paulo compressa, altero latere rubro-carnea; pulpa a putamine secedente. *Gasp.*

Crisomolo spaccariello.

b. drupa quidquam grandiore, praecociori. *Gasp.*

Crisomolo alessandrino.

e. drupa quidquam grandiore, ac dulciore. *Gasp.*

Crisomolo gelsomino.

3. *deliciosa*; drupa subrotunda, praeceteris maxima (pondere 5-unciarum), diametro longitudinali 2-pollicari, vix compressa, ex flavo-carnea; pulpa leviter odora, tenera, succosa, valde dulci, a putamine secedente. *Gasp.*

Crisomolo peres.

4. *serotina*; drupa subglobosa mediocri, diametro subpollicari; epidermide ex flavo-carnea; pulpa tenera, succosa, a putamine secedente; maturescit Julio. *Gasp.*

Crisomolo lugliese

2. *GENUINAE*. drupa glabra; pruina caesia vel albida tecta.

2. *P. INSITICIA*. *Lin. sp. pl.* 680.

Ic. Blackw. herb. t. 305.

Martio, Aprili. H

Colitur, et observante Cl. Koch *syn. ed. 2. p.* 228 ab hac specie omnes varietates cultae fructibus globosis vel subrotundis praeditae proveniunt, quae sequentes sunt:

A. foliis subtus glabris, glaucis.

1. *gentilis*; drupa subrotunda, diametro pollicari; sulco levi exarata; epidermide ex flavo-rubescente varia; pulpa tenera, molli, succosa; maturescit Septembri. *Gasp.*

Pruno gentile di Francia.

2. *viridis*; drupa pyriformi; epidermide viridi; pulpa flavescens, firmiuscula, dulci. *Gasp.*

Pruno verdone.

3. *saccharata*; drupa parva, rotunda, diametro vix pollicari, sulco obsolete exarata; epidermide tenui, ex albido-carnea. *Gasp.*

Pruno zuccherino.

- b. carneo-violacea; pulpa tenera, molli, succosa, valde dulci. *Gasp.*

Pruno zuccherino nero.

4. *albescens*; drupa parva, pyriformi, ex flavo-coccinea; pulpa dulci, succosa, cito exarata; maturescit decedente vero, et subeunte aestate. *Gasp.*

Pruno biancolillo.

5. *deliciosa*; drupa subrotunda, apice depressa; sulco laterali profundo; epidermide ex viridi-flava, hinc inde rubro-punctata; pulpa viridi, tenera, succosa, dulci. *Gasp.*

Pruno verdone di Francia.

- b. drupa ex flavo-rubra; sulco laterali minus profundo; pulpa magis tenera, sed minus sapida. *Gasp.*

Pruno verdone di Francia giallastro.

- B. *cerasiformis*; arbuscula ramis erectiusculis; foliis subtus pubescentibus; drupa globosa, vel suboblonga; sulco laterali obsolete, aut nullo; pulpa diversimodo colorata, plus minus dulci. *Gasp.*

1. *juliana*; drupa rotunda, parva; epidermide subcarnea; pulpa dulci, valde succosa; maturescit ineunte Julio. *Gasp.*

Pruno majateco.

2. *ouguatino*; drupa majori, subrotunda; epidermide violacea; pulpa parum sapida; maturescit Augusto, Septembri. *Gasp.*

Pruno cacazzaro.

3. *serotina*; drupa rotunda, parva, diametro semipollicari; epidermide viridi-albescente; pulpa dulci, sapida, viridi, sero autumno maturescit. *Gasp.*

Pruno natalino.

3. P. DOMESTICA. *Lin. sp. pl. 680 — Bertol. fl. ital. 5. p. 133.*

Ic. Blackw. herb. t. 309.

In silvis boream spectantibus; *selve del Monte di Campognono sotto alle Torre*, rara.

Martio, Aprili. ♀

Varietates cultae sequentes sunt:

1. *oblongo*; drupa oblonga, grandi, utrinque obtusa, altero latere viridi flavescente, altero leviter carnea; pulpa flava, tenera. *Gasp.*

Pruno poppacone.

- b. drupa altero latere vel undique rubro-coccinea. *Gasp.*

Pruno pozzolano.

2. *polycarpo*; drupa ovato-oblonga; epidermide ex viridi-flavescente, laterum colore carneo suffusa; pulpa firmiuscula. *Gasp.*

Pruno di S. Giovanni. (Pruno d'indio Nap.)

3. *genuensis*; drupa sesquipollicari, oblonga, obtusa, basi constricta, sordide flava; sulco longitudinali obsoleto; pulpa tenera, succosa, valde dulci. *Gasp.*

Pruno genovese.

4. *damascena*; drupa oblonga, obtusa (2 poll. circiter alta), basi constricta; sulco laterali obsoleto; epidermide violacea; pulpa flava, firmiuscula, valde dulci. *Gasp.*

Pruno domascone.

5. *neopolitana*; drupa obovoideo-oblonga, basi plusminus angustata (1-1/2 poll. alta); sulco laterali obsoleto vel nullo; epidermide flavescente; pulpa firmiuscula, sapida, parum succosa; sero autumno maturescit. *Gasp.*

Pruno cascovino (Pruno scaudatiello Nop.)

3. CERASI. *Drupo glabro, pruvina destituta.*

4. P. CERASUS. *Lin. sp. pl. 679*, excl. plur. var. — *Ten. syll. p. 244 —*

Bertol. fl. ital. 5. p. 131 — Cerasus Juliana. Dec. pr. 2. p. 536.

Ic. Duham. orb. ed. 2. v. 5. t. 14.

Colitur.

Martio, Aprili. ♀

Haec omnium varietatum fructu molli (*Visciolo*) praeditarum videtur typus; quae sequentes sunt:

1. *rubra subrotunda*.
 - a. *minor*; parva, 6. lin. in diam., albedo colore carneo, hinc inde leviter suffusa; pulpa molliuscula. *Gasp.*
Cerasa biancolella.
 - b. *major*; drupa duplo, triploque majore, rubra; pulpa firma.
Cerosa tastarella.
vel firmiuscula.
Cerosa imperiale.
aut dulciuscula, molliore. *Gasp.*
Cerosa cannamele.
2. *rubra-ovato*; drupa ovata, intense rubra.
 - a. *neapolitana*; pulpa duriuscula, succosa, dulci. *Gasp.*
Cerasa napolitana.
vel quidquam dulciore. *Gasp.*
Cerasa majateca napoletana.
 - b. *sanguinea*; violaceo-sanguinea, 8-9 lin. alta; pulpa firma, parum succosa.
Cerasa molignana.
3. *melanocarpa*; drupa subrotundo-ovata, nigra.
 - a. *depressa*; subrotundo-depressa, 5 lin. alta, 3 lin. lata; pulpa firmiuscula, parum sapida. *Gasp.*
Cerasa corvinella.
 - b. *minor*: ovato-subrotunda, 5-lin. alta, pulpa tenera, dulci. *Gasp.*
Cerasa cacarella, o selvaggia.
 - c. *major*; drupa quidquam majore, 8-lin. alta; pulpa minus tenera, minusque dulci. *Gasp.*
Cerasa S. Antonio.
 - d. *corvina*; drupa basi profunde cordata, 7-lin. alta, 12 lin. lata; pulpa tenera, succosa, molliuscula, valde dulci. *Gasp.*
Cerasa corvina.
5. *P. AVIUM*. *Lin. sp. pl. 680*—*P. Cerasus, b. Bertol. fl. ital. 5. p. 132.*
lc. Plenk. pl. med. 4. t. 377, ex Bertol.
Colitur.
Aprili, Majo. ♀
Typus varietatum fructu duro praeditarum videtur.
6. *P. AUSTERA*. *Ehrh. Beitr. 7. p. 120* — *P. cerasus, austera. Lin. sp. pl. 679* — *C. caproniana, h. griotta. Dec. pr. 2. p. 537.*
lc. Blackw. herb. t. 449 — *Cerasa acida. Tabern. ic. 985.*
In silvaticis passim nunc occurrit.
Aprili, Majo. ♀

Vulgo *Amarena*, et unica tantum varietas in Insula occurrit drupa subglobosa, diametr. 5-7- lineari, coccinea, pulpa acida.

24. ROSACEAE. *Koch.*

99. GEUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 867.

1. G. URBANUM. *Lin. sp. pl. 716 — Bertol. fl. ital. 5. p. 288.*

b. *australe*; floribus semper erectis, calycibus petala rotundata abrupte in unguem brevissimum attenuata aequantibus, in fructu reflexis, aristis uncinatis glabris, appendicibus pilosis, seminibus compressis ad angulos piloso-hispidis ad facies puberulis. *Guss. syn. 1. p. 371 — Ten. fl. nap. 4. p. 299, var. b.*

lc. *nulla* pro hac varietate.

In silvis; *selve del monte Vezza, e di Campagnano, Cavone del Vataliero, al Crovone nel boschetto di Amalfitano, selve delle Falanghe, del Fasano, di Catreca, e sotto le Croci presso Casamicciola*; nec non *alla salita di Montecito.*

Aprili, Majo. ♀

Aristae purpurascens, incurvae; appendicibus angulo recto ab arista inflexis: *habitus* a speciei typo nonnihil alienus — *G. intermedium*. *Koch* omnino diversum est.

100. RUBUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 864.

1. R. DALMATICUS. *Tratt. Ros. 3. p. 35, ex Dec. pr. 2. p. 561 — Guss. syn. 1. p. 568 — R. fruticosus, b. dalmaticus. Ten. fl. nap. 4. 289 — R. fruticosus. Bertol. fl. ital. 5. p. 217, quoad plantam neapolitanam et siculam.*

R. caule angulato petiolisque aculeato, aculeis validis aduncis petiolisque pilis stellatis brevibus puberulis, foliis 5-raro 3-natis, foliolis ovalibus obovatisque argute irregulariter duplicato-serratis abrupte acuminatis, supra glabris subtus tomento brevissimo adpresso incanis, panicula elongata simplici vel ramosa, calycinis laciniis albo-tomentosis brevissimè acuminatis inermibus demum reflexis.

lc. *nulla.*

Ad sepes, in fruticetis, et ad silvarum margines ubique.

Aprili, Junio. ♂

Vulgo *Rostina*; fructus vero *Morole*.

Species adhuc controversa, et non bene cognita, ideoque denuo phrasim specificam dedi—*R. fruticosus* Germaniae ab hoc certe diversus, uti jam monui in *syn. l. c.*; sed specimen anglicum ab *Alexander* missum a nostra planta vix differt; dum *Cl. Lindl.* in *comp. fl. britt. p. 92 R. fruticosum* inter illos floribus fastigiatis enumerat, et quoad ipsius descriptionem, et nonnulla alia specimina exotica accepta, noster potius ad *R. nitidum* spectare videtur. Interim notandum puto, quod species ista apud nos undique vulgaris faciem non mutat.

R. acheruntinus. Ten., qui in Neapolitanis silvis communis est, in hac insula desideratur.

101. FRAGARIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 865.

1. *F. VESCA. Lin. sp. pl. 708 — Ten. fl. nap. 4. p. 291 — Bertol. fl. ital. 5. p. 236.*
Ic. Lam. ill. gen. t. 442 — Fragaria, et Fraga. Dod. pempt. 672.
 In silvis apricis humentibus ubique.
 Martio, Aprili. ♀
 Vulgo *Fragola*, una cum sequente.
2. *F. COLLINA. Ehrh. beytr. p. 76 — Ten. fl. nap. 4. p. 291 — Bertol. fl. ital. 5. p. 239.*
Ic. Fl. dan. 1389, ex Bertol.
 Cum praecedente simulque floret.

102. POTENTILLA.

Nestl. Potent. diss. 4. in Dec. pr. 2. p. 571.

1. *P. REPTANS. Lin. sp. pl. 714 — Ten. fl. nap. 1. p. 289 — Bertol. fl. ital. 5. p. 271.*
Ic. Fl. dan. 1164 — Quinquefolium majus. Dod. pempt. 116.
 Ad sepes umbrosas, et in humentibus herbosis.
 Majo, Junio. ♀
 Vulgo *Fragola selvaggia*.

103. AGRIMONIA.

Tourn. inst. t. 155 — Nestl. Pot. diss. 4. p. 16, in Dec. pr. 2. p. 587.

1. *A. EUPATORIA. Lin. sp. pl. 642 — Ten. fl. nap. 1. p. 257 — Bertol. fl. ital. 5. p. 16.*

Ic. *Lam. ill. gen. t. 409. f. 1* — *Agrimonia*, seu *Eupatorium*. *Dod. pempt. 28.*

b. foliis elliptico-lanceolatis, acutis.

In silvaticis, et ad sepes utraeque varietates passim occurrunt.

Majo, Junio. ♀

Var. b. cum *A. odorata* non est confundenda.

104. ROSA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 863.

1. *R. SEMPERVIRENS*. *Lin. sp. pl. 704* — *Ten. fl. nap. 4. p. 284* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 213.*

Ic. *Duham. arb. ed. 2. v. 7. t. 13. f. 1* — *R. sempervirens*, *Jungerman. ni. Dill. elth. t. 246. f. 318.*

b. *multiflora*; foliis latis (1-1 1/2 poll.), floribus numerosis, pedunculis calycibusque setis glanduliferis, uti in a. tectis.

Ad sepes, ad silvarum margines, et in fruticetis apricis: var. b. *siepi di Campagnano.*

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Rostinella bianca.*

Flores albi, gratissime odori; petalis obcordatis: styli albi, usque ad apicem connati, patenter pubescentes, stamina candida subaequantes.

2. *R. CANINA*. *Lin. sp. pl. 704* — *Ten. fl. nap. 4. p. 286* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 201.*

a. *vulgaris*; pedunculis germinibusque glabris. *Kock syn. ed. 2. p. 251.*

Ic. *Fl. dan. t. 555.*

b. *collina*; pedunculis petiolisque glanduloso-hispidis, germinibus glabris. *Koch l. c. (non R. collina. Jacq.)*

In silvaticis, et ad sepes: var. a. *fra S. Nicola e la Pietra dell'acqua, siepi della Madonna del Monte sopra Forio, in quelle di S. Giuseppe al ponte della cava del Larito sopra al Laeco, siepi di Panza*: var. b. *salita delle Petrelle sotto monte Vetta, selve delle Falanghe, del Fusano, di Catreca, e della Pera.*

Aprili, Majo. ♀

Stipulae foliorum floralium dilatatae, ellipticae; in reliquis oblongae, auricularis acutis: *foliola* ovalia, plana, aut concaviusecula, ad ramos juniores steriles ovali-lanceolata, acuta, omnia argute biserrata; serraturis, uti petiolis laciniisque calycinis, ad marginem glanduliferis (quod in specio non potatur); supra glaberrima, intense virentia, subtus pallida ac ad nervos sed praecipue ad costam pubescentia, ac ad istam etiam glandulis nonnullis obita: *aculei* basi dilatati, vix uncinati, fusco-rubentes, omnes

aequales: *pedunculi* fructiferi recti, subcorymbosi, glabri, vel pilis glandulosis sparsis obsiti: *lacinae* calycinae reflexae, corolla breviores, fructus vero subexcedentes, pinnatifidae; laciniis argute dentatis, indivisis, vel pinnatipartitis: *flores* pallide rosei; *petalis* obovato-emarginatis: *styli* non coaliti, breves, pubescentes: *fructus* globoso-ovales, cartilaginei: *semina* pedicellata — In a. petioli et foliorum rachis glandulis sparsis tecti, unde folia juniora confricata tenuem odorem, uti illum *R. rubiginosae* dant; a qua tamen diversissima.

3. *R. GALLICA*. *Lin. sp. pl.* 704 — *Ten. fl. nap.* 4. p. 284.

b. *officinalis*; *Ten. l. c.* — *Dec. pr.* 2. p. 603; var. d.

lc. *Red. Ros.* 1. p. 73.

Ad sepes; sotto *S. Nicola al Sud*, sed videtur olim ibi culta.

Majo, Junio. ☿

Foliola supra intense virentia, subtus glaucescentia: *pedunculi* et *calyces* plus minus hispido-glandulosi: *flores* intense rubro-purpurci: *fructus* globosi.

25. SANGUISORBEAE. Lindl.

106 ALCHEMILLA.

Tourn. inst. 1. 289 — *Dec. pr.* 2. p. 589.

1. *A. ARVENSIS*. *Scop. carn. ed.* 2. v. 1. p. 115 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 210 — *A. aphaeus*. *Ten. fl. nap.* 3. p. 164 — *Aphanes arvensis*. *Lin. sp. pl.* 179.

lc. *Lam. ill. gen.* 1. 87 — *A. minima, montana*. *Column. ecphr.* 1. p. 146.

In berbosis humidiusculis apricis, vel umbrosis; nel fondo del Cratere, e nelle falde orientali del Montagnone, Chiajano nel boschetto, Ischia nell'Arso, Bagno nella via di S. Michele.

Martio, Aprili. ☉

Planta pusilla, 4-3-pollicaris: *petioli* et *stipulae* non dilatati: *folia* virentia, pubescentia: *flores* apetalae, axillares, glomerati.

106. POTERIUM.

Spach. ann. Sc. nat. ser. 3. v. 5. p. 31, et in *Walp. ann. bot.* 1. p. 282.

1. *P. MURICATUM*, b. *stenopetalum*. *Spach in Walp. l. c.* p. 284! — *P. polygamum*. *Waldst., et Kit. pl. rar. Hung.* 2. p. 217 — *P. Sanguisorba*, b. *puberulum*. *Ten. fl. nap.* 4. p. 321 — *Sanguisorba minor*. *Bertol. fl. ital.* 2. p. 189?

P. caule erecto angulato, foliis foliorum inferiorum obovatis truncatis acute dentatis, superiorum oblongis inciso-serratis, fructibus glaberrimis tetragono-cristatis foveolato-rugosis muricatis, foveolarum margine angusto subintegerrimo.

1c. *Waldst., et Kit. l. c. t. 198.*

In apricis aridis, vel in herbosis ubique, tam in elatis, quam in demissis. Majo, Octobri. ♀

Lobi limbi calycini obtusi, rotundati, margine scariosi ac ciliati: fructus basi tetraquetri; angulis obtusis, dentatis—In *P. garganico* caules hirsuti, et folia pilosiuscula, uti in icone *Moris. hist. 3. s. 8. t. 18. f. 1.*

26. POMACEAE. *Lindl.*

107. CRATAEGUS.

Lindl. trans. Lin Soc. 13. p. 105 — Dcc. pr. 2. p. 626.

1. *C. MONOGYNA. Jacq. austr. 3. p. 50 — Ten. fl. nap. 1. p. 279 — C. Oxyacantha. Bertol. fl. ital. 5. p. 145, excl. nonn. synonym.*

1c. *Jacq. l. c. t. 292. f. 1 — Acuta spina. Matth. comm. 1. p. 148.*

In silvaticis, ad sepes, et in fruticetis ubique.

Aprili Majo. ♀

Vulgo *Calavrice.*

In planta inarimensi, rami juniores pilis albis crispulis pubescentes: stipulae cito deciduae, semiorbiculatae, latae, dentato-serratae: folia ramorum sterilium obovato-cuneata, inciso-pinnatifida; laciniis inciso-lobatis: pedunculi glabri, aut pilis raris sparsis obsiti: calyces glabri; laciniis ex ovata basi acuminatis, glaberrimis, eglandulosis, sub anthesi et in fructu reflexis: styli recti, non curvati: fructus ovales, non globosi, ut in *C. monogyna* dicuntur, tamen monoppyreni; proinde characteribus istis, nec cum descriptione *C. monogynae*, nec cum illa *C. oxyacanthae* Koch syn. ed. 2. p. 259 in omnibus convenit — Cl. *Bertol. l. c. C. Oxyantham* Jacq. non *Lin. C. oxyacanthoidem* vocat. Confer quoque Cl. *Moris in fl. sard. 2. p. 42*, et *C. monogynae* Finger. observationem in Koch l. c.

2. *C. AZAROLUS. Lin. sp. pl. 683 — Mespilus Azarolus. Ten. fl. nap. 1. p. 281 — M. Azarolus, a. erythrocarpa. Moris fl. sard. 2. p. 44.*

1c. *Lazzarola rossa. Gall. pom. ital. disp. 24 — Mespilus aronia veterum Bauh. hist. 1. p. 67.*

Colitur.

Martio, Aprili. ♀

Vulgo *Lazzarola rossa.*

3. *C. ARONIA*. *Bosc. in Dec. pr. 2. p. 629*—*M. Azarolus, b. chlorocarpa. Moris fl. sard. 2. p. 44.*
 lc. *Lazzerolo bianco. Gall. pom. ital. disp. 20.*
 Colitur.
 Martio, Aprili. ♀
 Vulgo *Lazzerola gialla.*
Fructus in hac ex albo-luteoli, et saepius majores quam in praecedente, in qua semper sanguinei, ac minores.

108. MESPILUS.

Lindl. trans. Lin. soc. 13. p. 99 — Dec. pr. 2. p. 633.

1. *M. GERMANICA*. *Lin. sp. pl. 684 — Ten. fl. nap. 1. p. 282, var. a.— Bertol. fl. ital. 5. p. 155.*
 lc. *Duham. arb. ed. 2. v. 4. t. 38 — Mespilus. Dod. pempt. 801.*
 Ad sepes, et in fruticetis nunc obvia: *sotto S. Nicola; Fontana, Serrano, Barano, Pioe, la Starza, cavone delle Nocelle, siepi di Catauro, e del monte Vezza.*
 Aprili, Majo. ♀
 Vulgo *Nespolo.*

109. PYRUS.

Koch syn. ed. 2. p. 260.

1. *P. COMMUNIS*. *Lin. sp. pl. 689 — Ten. fl. nap. 4. p. 276—Bertol. fl. ital. 5. p. 165.*
 lc. *Lam. ill. gen. t. 433 — Blackw. herb. t. 453.*
 Colitur.
 Aprili, Majo. ♀
 Sequentes varietates coluntur, et quae hoc signo † notatae sunt aestate maturant.
 † *stupea*; pedunculo longiusculo; pomo parvo, pollicari vel sesquipollicari, turbinato; epidermide levi, ex viridi-flavo-sordida; pulpa albida, tenera, si eciosa, fatua. *Gasp.*
Piro stoppa.
 † 2. *xanthocarpa*; pomo turbinato, sordide flavo, hinc inde gibboso; pulpa tenera, dulci (*Pyrorum aestivorum maxima, a 1/2-3-poll. alta*) *Gasp.*
Piro campana.
 b. *serotina*; pomo majori, hyeme maturescente. *Gasp.*
Piro buoncristiano d'inverno.

- † 3. *suavis*; pomo subrotundo-turbinato, aequali; epidermide odora, ex viridi-flava, levi; pulpa albida, plus minus spissa, parum succosa, tandem mitescenti.
Piro mastantuono.
- † 4. *moschata*; pomo parvo, ovato-subrotundo, altero latere intense rubro, altero ex viridi-rubro; pulpa quidquam spissa, odora, succosa, dulci, non mitescenti. (Pyrorum aestivorum minima, saepe nucis Avellanæ magnitudine). *Gasp.*
Piro moscatellino, o moscatello piccolo.
- † *b. major*; pomo triplo majori; epidermide griseo-flava, punctis rubris conspersa; pulpa magis tenera, tandem mitescenti. *Gasp.*
Piro moscarellone.
- † 5. *perlata*; pomo elongato, turbinato, flavido-roseo, inodoro; pulpa teneriuscula, succosa, valde dulci, non mitescenti. *Gasp.*
Piro carmosino.
b. serotina; pomo ineunte hyeme maturescente.
Piro carmosino d'inverno.
- † 6. *nobilis*; pomo obovato (2-4 poll. alto); epidermide levi, flavo-carnea; pulpa albida, tenera, inodora, sapida, cito mitescenti, valde succosa; maturescit aestate. *Gasp.*
Piro spadone.
b. serotina; pomo ineunte hyeme maturescente.
Piro spadone d'inverno.
- † 7. *viridis*; pomo turbinato; epidermide levi, sordide viridi; pulpa flavida, tenera, succosa, valde dulci. *Gasp.*
Piro spino di età.
- † 8. *carendica*; pomo obovato; epidermide levi, altero latere rosea, altero flavida; pulpa tenera, succosa, parum sapida. *Gasp.*
Piro coscia di donna.
- † 9. *oenophora*; pomo oblongo-turbinato, basi plus minus constricto; epidermide levi, altero latere viridi, altero carneo; pulpa succosa, parum sapida, facile mitescenti. *Gasp.*
Piro coscia longa.
10. *bergamotta*; pomo subrotundo (diam. longit. 4 1/2 pollicari), odoro; epidermide ex viridi-flavescente; pulpa albida, tenera, succosa, odora. *Gasp.*
Piro bergamotto.
11. *deliciosa*; pomo turbinato, saepe hinc inde gibboso; epidermide ochracea, colore roseo leviter suffusa; pulpa albida, tenera, succosa, dulci; hyeme maturescit. *Gasp.*
Piro spino del Carpia.
b. butyrosa; pomo turbinato (2-4 poll. longo); epidermide ochracea, pul-

pa albida, molli, succosa, valde dulci; aestate et autumnno maturescit.
Gasp.

Piro butiro.

12. *angelica*; pomo elongato, turbinato (2-3 poll. alto); epidermide leviscula, altero latere flavida, altero rubro-grisea; pulpa albida, tenera, succosa, dulci. *Gasp.*

Piro angelica.

2. P. MALUS. *Lin. sp. pl.* 686 — *Ten. fl. nap.* 4. p. 278 — *Bertol. fl. ital.* 5. p. 169.

a. *syloestris*. *Lin. l. c.*

- 1c. *Duham. arb. ed. 2. v. 6. t. 45. f. 1*—*Malus sylvestris. Dod. pempt. 690.*
Ad sepes, et in fructicis; monte Vezza, Piano Liguari, sotto la Torre di Campagnana, monte di Barano, e presso al paese, Morapane, Fontana, cava di Buceto, del Carusiello, e di Cerambi sopra Casamicciola, Lucca al monte Vico.

Aprili, Majo. ♀

In planta spontanea folia saepius elliptica, acuta, vel acuminata, serrulata, subtus pallide pubescenti-lanata, uti petioli; fructus globosi, parvi, diametro pollicari, luteoli, semper acerbi.

Coluntur sequentes varietates; ac quibus praemittitur signum istud † aestate maturant.

- † 1. *juliana*; pomo albido, subrotundo-depresso, odore; pulpa firmiuscula parum sapida. *Gasp.*

Milo gaetaniello.

- † 2. *augustina*; pomo ovato-subrotundo, vel subrotundo-depresso, flavescence-carneo; pulpa tenera, succosa, sapida. *Gasp.*

Milo agostegna.

- † 3. *solstitialis*; pomo magno (diam. 2-4-pollicari) subgloboso, subdepresso, odore; epidermide albida, altero latere carnea; pulpa sapida; tenera; maturescit Junio, Julio. *Gasp.*

Milo di S. Pietro.

- † 4. *stupea*; pomo magno (3-4-poll. alto), globoso-oblongo, odore, epidermide undique virente; pulpa subdulci, parum sapida, dura; maturescit Junio, Julio. *Gasp.*

Milo stoppa, o capa d' osino.

- † 5. *enumerina*; pomo grandi, oblongo, ex albido-virescente, quandoque colore carneo leviter suffuso; pulpa parum sapida. *Gasp.*

Milo cetrulo.

6. *lentiginosa*; pomo oblongo, albido, lentiginoso; pulpa tenera, succosa, sapida. *Gasp.*

Milo limonciello.

7. *levis*; pomo ovato-oblongo, levi, nitido, ex albido carneo; pulpa tenera, leviter odora. *Gasp.*

Milo lappiolo.

b. *major*; pomo duplo majori.

Milo lappione.

8. *grisea*; pomo ovato; epidermide sordide fusco-grisea; pulpa potius spissa, sapore *Pyri* et *Mali* parum succosa. *Gasp.*

Milo piro.

9. *fatua*; pomo grandi, ovato, vel depresso (diam. 2-3-polilari), odore ex viridi albido, saepius altero latere carneo; pulpa parum sapida, fere fatua, spissa. *Gasp.* (Usque ad Majum perdurant fructus, sed parum sapidus, quamvis odorosus, ita ut saepius coctus comeditur).

Milo tramontana.

10. *genevensis*; pomo ovato, apice interdum depresso, ex viridi-carneo; pulpa odora, spissa, parum sapida. *Gasp.*

Milo genovese.

11. *deliciosa*; pomo ovato vel subrotundo, levi, rubro-carneo; pulpa inodora, tenera, succosa, sapida. *Gasp.*

Milo annurco.

12. *albescens*; pomo mediocri (2 poll. alto), ovato-subrotundo, ex viridi-albo; pulpa spissa, parum succosa, fere fatua. *Gasp.*

Milo biancolillo.

13. *maculata*; pomo parvo, 1-1 1/2 poll. alto, subrotundo-depresso, altero latere viridi, altero macula lata fere coccinea notato; pulpa parum sapida. *Gasp.*

Milo pottanella.

100. SORBUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 855 — Koch syn. ed. 2. p. 261.

1. S. DOMESTICA. *Lin. sp. pl. 684 — Ten. fl. nap. 1. p. 278 — Bertol. fl. ital. 5. p. 152.*

1c. *Duham. arb. ed. 2. v. 3. t. 34 — Matth. comm. 1. p. 237.*

In fruticetis, et in silvaticis apricis; *selve del Castiglione, di Casamiccio-la, di Forio, di Campagnano, di Catauro, del monte Vezza, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ♀

Sequentes varietates coluntur:

1. *augustana*; pomo subrotundo, parvo, nucis *Avellanae* magnitudine, altero latere rubro; maturescit Augusto. *Gasp.*

Suorvo agostegno.

2. *autumnalis*; pomo subrotundo-turbinato, altero latere flavo, altero rubro, praecedentis triplo majore; maturescit Septembri. *Gasp.*

Suorvo a panelle.

3. *serotina*; pomo obovato-turbinato, hyeme maturescenti. *Gasp.*
Suorvo tardivo o di vendemia.

111. CYDONIA.

Tourn. inet. 632. t. 405 — Dec. pr. 2. p. 638

1. *C. VULGARIS. Pers. syn. 2. p. 40 — Ten. fl. nap. 4. p. 280 — Pyrus*
Cydonia. Lin. sp. pl. 687 — Bertol. fl. ital. 5. p. 171.
lc. Jacq. austr. t. 342 — Cotonea Malus — Matth. comm. 1. p. 217.
Ad sepes nunc spontanea.
 Majo, Junio. ♂
 Vulgo *Cotugno*.

27. ONAGRIEAE. *Juss.*

112. EPILOBIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 639.

1. *E. LANCEOLATUM. Sabast. et Maur. fl. rom. pr. p. 138 — Ten. fl. nap.*
4. p. 170 — Bertol. fl. ital. 4. p. 298.
lc. Sebast. et Maur. l. c. t. 1. f. 2.
In umbris humentibus, ad muros, ad sepes, et in silvaticis.
 Majo, Junio. ♂, et ♀
Glabriusculum: folia lanceolata, obiter serrulata; inferiora definite petio-
lata, basi non decurrentia: flores pallide rosei; petalis emarginatis, vix
calycem superantibus: stigma 4-partitum.
2. *E. PARVIFLORUM. Schreb. spieil. p. 146 — Bertol. fl. ital. 4. p. 297 —*
E. molle. Lam. Ten. fl. nap. 4. p. 170 — E. pubescens. Roth. tent.
1. p. 167.
lc. Fl. dant. 347 — Lysimachia siliquosa, hirsuta, flore minore. Bauh.
hist. 2. p. 906 — Tabern. ic. 855.
In humentibus umbris; Rotaro sull' aquedotto di Buceto, Fontana, Mo-
ropane all' acqua de' Nitroli.
 Majo, Junio. ☉
Molliter pubescens: folia lanceolata, obsolete serrulata, sessilia: flores
albi; petalis emarginatis calycem æquantibus: stigma 4-partitum.
3. *E. TETHAGONUM. Lin. sp. pl. 494 — Ten. fl. nap. 1. p. 197 — Bertol.*
fl. ital. 4. p. 300.
lc. Coss. et Germ. atl. de la fl. Paris. t. 12. f. E. — Reich. cent. 2. f. 34
— Lysimachia siliquosa II. Tabern. ic. 855.
In humentibus; Noja presso ad una scaturigine, sed satis rarus.

Junio, Julio. ♂

Glaberrimum : *caules* lineis elevatis a foliorum basi decurrentibus tetragoni : *folia* anguste lanceolata, argute serrulata : *corolla* rosea, parva, tamen calyce major : *stigma* clavatum, indivisum.

28. LYTHRARIEAE. Juss.

113. LYTHRUM.

Juss. gen. 332 — Dec. pr. 3. p. 80.

1. *L. HYSSOPIFOLIA*. Lin. sp. pl. 642 — Ten. fl. nap. 4. p. 254 — Bertol. fl. ital. 4. p. 14.

1c. Jacq. austr. 2. t. 133 — Hyssopifolia, sive Gratiola minor. Bauh. pr. p. 108.

In bumentibus argillosis; *Bagno presso al lago, e ne'fossi degli orti, sed nunc satis rarum et fere destructum; Forio alla marina di Citara nel letto di una abolita salina artificiale presso al diruto fortino.*

Majo, Junio. ☉

Caules in locis istis diffusi, ac frequenter rami terrae arcte adpressi : *flores* confertissimi, solitarii, brevissime pedunculati : *calycis* nervi 12, et uti dentes saepe rubentes; ex quibus sex alterni minimi, triangulares, subscariosi; alii sex duplo longiores, lanceolati, acuti, patentes, in fructu vero conniventes : *petala* sex, parva, integra : *stamina* sex, intra calycis tubum.

2. *L. PRESLI*. Guss. pl. rar. p. 188, et syn. 1. p. 524.

L. caule simplici suberecto quadrangulo, angulis membranaceo-alatis, foliis alternis cordato-oblongis, superioribus lanceolato-linearibus, floribus axillaribus solitariis hexapetalis decandris, staminibus calycinis dentes erectos superantibus.

1c. Polygonum aquaticum, majus. Barr. ic. 773. f. 1?

In humentibus subargillosis; *nella salita della cava di Brusomoute a Buceto nel fondo di Mansi : S. Angelo alla costa del Funnelillo.*

Majo, Junio. ☉

Caules in planta inarimensi vix palmares : *folia* ovalia, aut oblonga; suprema lanceolata : *flores* semel majores, quam in *L. Graefferi*, et duplo quam in praecedente—Cl. Bertol. in fl. ital. 5. p. 13, et Ten. in fl. nap. 4. p. 254 hoc a *L. Graefferi* Ten. non separant; tamen sunt species diversae; siquidem in hoc *flores* minores : *caules* graciliores, et basi fere suffruticosi.

29. MYRTACEAE. *Brown.*

114. MYRTUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 844.

1. *M. COMMUNIS.* *Lin. sp. pl. 673* — *Ten. fl. nap. 4. p. 271* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 117.*

a. italica; ramis rectioribus, foliis ovato-lanceolatis acutis. *Lin. l. c.* — *M. communis, bactica. Ten. fl. nap. 4. pr. in fol. p. 7.*

lc. Lam. ill. gen. t. 419 — *M. vulgaris, nigra et alba. Bauh. hist. 1. p. 510.*

b. lusitanica; foliis anguste lanceolato-ovatis acutis. *Lin. l. c. p. 674.*

lc. M. sylvestris, foliis acutissimis. Clus. hist. 1. p. 66.

In fruticetis apricis, et ad sepes in lapidosis ubique, tam in elatis, quam in demissis utraque varietates: var. *c. Castiglione.*

Januario, Augusto. ♀

Vulgo *Mortella.*

Fructus in utrisque varietatibus in hac Insula semper nigri— Monendum puto quod nonnullae varietates hujus speciei, quae in hortis cultae speciem distinctam videntur, uti *M. communis romana*, et var. *tarentina*, ex earum seminibus plantae provenientes, vel ad speciem vulgarem redeunt, vel alias varietates dant!

30. GRANATEAE. *Don.*

118. PUNICA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 847.

1. *P. GRANATUM.* *Lin. sp. pl. 676* — *Ten. fl. nap. 4. p. 271* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 122.*

lc. Duham. arb. ed. 2. v. 4. t. 11 — *Mala Punica. Matth. comm. 1. p. 205.*

Ad sepes nunc spontanea, et passim culta.

Junio, Julio. ♀

Arbustula ramosissima; ramis demum spinescentibus: folia impunctata, decidua, nitide virentia, lanceolata; flores coccinei, subsessiles, terminales, solitarii, vel aggregati: balaustum globosum, calyce persistente coronatum: seminum arillus nitide rubeus.

Vulgo *Granato*; et coluntur sequentes duae varietates:

a. dulcis.

- Granato lappio.*
b. acida.
Granato agro.

31. CUCURBITACEAE. Juss.

116. LAGENARIA.

Ser. in Dec. pr. 3. p. 299.

1. *L. VULGARIS. Ser. l. c. — Cucurbita Lagenaria. Lin. sp. pl. 1434.*
c. clavata. fructu claviformi, vel tereti-elongato. Ser. l. c. — C. leucantha, b. Lam. Dict. enc. 2. p. 150!
lc. Rumph. herb. amboin. 5. p. 397. t. 144 — Cucurbita longior. Dod. pempt. 669; quae uti recte notat Ser. l. c. mala quoad flores, sed bona quoad fructus — C. oblonga. Fuchs. hist. p. 370.
 Colitur.
 Junio, Augusto. ☉
 Vulgo *Cocozza longa.*
 Moschum fortiter redolet: *flores albi.*

117. CUCURBITA.

Endl. gen. n. 5138.

1. *C. PEPO. Lin. sp. pl. 1435 — Gasparr. in Rend. della R. Acc. delle Sc. di Nap. v. 8. p. 337.*
b. oblonga. Lin. l. c.
C. caule sarmentoso, cirrhis parvis ramosis, foliis novissimis 5-7-lobatis, lobis latis acutis, reliquis palmato 5-fidis, lobis angustis, intermedio longiore, eroso-dentatis sublobatis, corollae campanulatae 5-fido-lobatae lobis ovatis planis integerrimis erectis, fructibus cylindraceo-oblongis angulis vix prominulis.
lc. Pepo oblongus. Lobel. ic. 641. f. 1 — C. indica, longa. Dalech. hist. 1. p. 617. f. 1.
 Ubique colitur.
 Majo, Octobri. ☉
 Vulgo *Cocozzelli.*
2. *C. MACROCARPA. Gasparr. in Rend. l. c. v. 6. p. 447.*
C. caule scandente, foliis omnibus leviter 5-lobatis, lobis subacutis denticulatis, laciniis calycinis linearibus apico subulatis, ovario cylindraceo-clavato apice tantum carpellifero, bacra cylindrico-clavata levi apice cava seminifera, infra solida, seminibus oblongis margine laeviusculo.

lc. *nulla*.

Colitur, sed non ita frequenter.

Junio, Septembri. ☉

Vulgo *Cocozza di Spagna*.

3. *C. MAXIMA*. *Duchs. in Lam. dict. enc. 2. p. 151*, an cum synonym. omn.? — *Dec. pr. 3. p. 316*, an cum var.? — *Gasparr. l. c. v. 8. p. 338*.

e. *leucocarpa*.

C. caulibus longe procurrentibus, cirrhis valde ramosis elongatis, foliis suborbiculatis late et profunde cordatis obsolete 5-lobatis, lobis denticulatis, corollae urceolato-campanulatae quinquefidae lobis rotundato-acuminatis reflexis margine undulato-crispis, fructibus (candidis) globoso-depressis obsolete et obtuse costatis.

lc. *Pepo maximus, indianus. Lobel. ic. 641. f. 2— Dalech. hist. 1. p. 626.*

Colitur passim.

Junio, Octobri. ☉

Vulgo *Cocozza pazza*.

Caules validi, longissime scandentes: fructus maximi, virides, maturi candidi.

118. CITRULLUS.

Nek. elem. n. 389 — Endl. gen. n. 5131.

1. *C. VULGARIS*. *Schrad. in Linnæa XII. p. 412 — C. edulis. Spach — Cucumis Citrullus. Ser. in Dec. pr. 3. p. 301 — Cucurbita Citrullus. Lin. sp. pl. 1435.*

lc. *Blackw. herb. t. 157 — Anguria indica. Rumph. herb. amb. 5. p. 400. t. 146, optima — Cucumer Citrullus. Fuchs. hist. 670.*

Colitur.

Majo, Augusto. ☉

Vulgo *Mellone di acqua*.

119. CUCUMIS.

Endl. gen. n. 5137.

1. *C. SATIVUS*. *Lin. sp. pl. 1437.*

b. *fructibus pallide viridulis. Ser. in Dec. pr. 3. p. 300.*

lc. *Blackw. herb. t. 4 — C. sativus, vulgaris. Fuchs. hist. 697 — Cucumeres sativi, et esculenti. Lobel. ic. 638.*

Colitur.

Majo, Julio. ☉

Vulgo *Cetrulo*.

2. *C. MELO*. *Lin. sp. pl.* 1436.

1c. *Blackw. herb. p.* 329 — *Melo vulgi*, sive *Cucumis antiquorum*. *Loebel. ic.* 639.

Colitur.

Junio, Augusto. ☉

Duae varietates coluntur:

a. *reticulatus*; fructu rotundato vel oblongo, cortice reticulato griseo.

Ser. in Dec. pr. 3. p. 300.

Mellone di pane di Spagna, o a rezza, di età.

b. *maltensis*; fructu cortice levi tenui. *Ser. l. c.*

Mellone di pane liscio.

3. *C. FLEXUOSUS*. *Lin. sp. pl.* 1437.

C. caule humifuso cirrhoso petiolisque tetragono-sulcatis patenter setoso-scabris, foliis cordatis denticulatis, ramorum juniorum ovatis 5-lobatis, lobo intermedio oblongo duplo majore, reliquis orbiculato-ovatis obsolete angulato-lobatis indivisisque, floribus axillaribus fasciculatis, calycibus germinibusque dense albo-pilosis, fructibus teretibus elongatis obsolete sulcatis varie curvatis, junioribus albo-pilosis demum glabratiss.

1c. *C. longus*. *Dalech. hist. 1. p.* 624, optima — *C. anguina*. *Tabern. ic.* 480.

Colitur.

Majo, Julio. ☉

Vulgo *Carota*.

Cirrho simplices, vel ramosi: *folia* supra laete virentia, subtus pallidiora, longe petiolata; caulina intermedia minus profunde lobata, quam in ramis junioribus, lobo intermedio etiam in istis majore; in ramis adultis demum indivisa, vel obiter lobata: *flores* masculi in eadem axilla numerosi, pedunculis gracilibus pollicaribus suffulti, et in istis: *calyx* campanulatus, 5-fidus; laciniis anguste lanceolato-linearibus, tubo aequilongis, corolla duplo brevioribus: *corolla* campanulata, imo calycis adnata, 5-fida; lobis oblongis, obtusis, margine crispato-undulatis, patentirecurvis: *filamenta* intra corollae tubum recondita, conniventia — *Flores* foeminei in eadem axilla solitarii, pedunculo demum incrassato suffulti; vel inter flores masculos ramulus brevis unifolius elongatur, qui in apice 1-4 flores foemineos inter folium et cirrhum gerit, inter quos unicus fertilis, et in istis: *calycis* tubus cylindricus, cum ovario connatus; limbo superno, 5-fido, laciniis lato-lanceolatis: *corollae* petala quinque, calyci inserta, oblongo-lanceolata, acuta, patentirecurva, margine undulata: *fructus* juniores dense albo-molliterque pilosi, inde glabriusculi, utrinque obtusi, attenuati, non apice incrassati ut in *C. anguina*, 1 1/2 — 4-pedales, pallide virentes, demum lutescentes: *sapor*

fructus teneri, et immaturi *C. sativi*, sed magis gratus, et pulpa tenerior; sed jam perfecti saporem, odoremque *C. Melonis* magis referunt. Icon *Dalech.* inter alias veterum auctorum melior, nam fructuum forma xactissime hunc refert, sed illae *C. anguinus Lobel. ic. 639*, et *C. oblongus Dod. pempt. 662* (una ab altera mutuata) fructuum foliorumque forma diversae videntur. Praeterea *C. anguinus Dalch. l. e. f. 2.* verum *C. anguinum* in nostris hortis botanicis cultum refert; quae species male a *Cl. Ser. in Dec. pr. 3. p. 314* ad *Trichosanthen anguinam* auctoritate *Cl. Lam.* trahitur. Haec in nostris hortis quoque colitur, et ejus optima icon extat in *Rumph. herb. amb. 5. p. 407. t. 148*, et in *Mich. gen. 12. t. 9.*

120. ECBALIUM.

Rich. dict. class. d'Hist. nat. v. 46. p. 12 —
Endl. gen. n. 3132.

1. *E. ELATERIUM. Rich. l. c. — Momordica Elaterium. Lin. sp. pl. 1434 —*
Ten. fl. nap. 5. p. 270.
lc. Bull. herb. t. 81 — Cucumis silvestris. Fuchs. hist. p. 705 — Dod.
pempt. 663.
In ruderalis, et in arenosis maritimis; *Ischia al Castello, Barano, Fontana, marina de Maronti e di S. Angelo, Panza, Forio a Citara ed a S. Francesco, marina del Lacco, di Casamicciola, ed al Bagno.*
Floret fere per totum annum. ♀, et in plagis calidioribus basi ♂
Vulgo *Cocozielli selvaggi.*
Planta non cirrhosa, hispido-scabra ac glaucescens: folia cordata, angulato-lobata: flores sordide luteo-virentes: baeae longe pedunculatae, deflexae.

32. PORTULACEAE. *Juss.*

121. PORTULACA.

Juss. gen. 312. — Dec. pr. 3. p. 353.

1. *P. OLERACEA. Lin. sp. pl. 638 — Ten. fl. nap. 1. p. 225, a — Bertol.*
fl. ital. 5. p. 6.
lc. Lam. ill. gen. t. 502. f. 1 — P. silvestris. Fuchs. hist. p. 113.
In cultis, et in hortis.
Majo, Septembri. ☉
Vulgo *Porchiaeae.*
Glaberrima: folia cuneiformia: flores parvi, lutei, sessiles — In acetariis locum habet.

33. PARONICHIEAE. *St. Hil.*

122. CORRIGIOLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 516.

1. *C. LITTORALIS. Lin. sp. pl. 388 — Ten. fl. nap. 3. p. 348 — Bertol. fl. ital. 3. p. 501.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 213 — Anthyllis latifolia, flore albo, polygonoides. Barr. ic. 532?, non habitus C. telephifoliae, uti recte monet Cl. Moris in fl. sard. 2. p. 96.*

In apricis subarenosis; colline del Bagno, Chiajano presso al Cratere dell'Arzo e nella pianura, Vataliere, Chianole del Testaccio; et in submontosis; alle falde orientali di monte Vetta, e nel piano de' Muori. Julio, Octobri. ☉

Herba glaberrima, fenum redolens: flores minuti, albi, in racemo primum corymbo, inde elongato breviter pedicellati.

123. HERNIARIA.

Juss. mem. mus. 1. p. 389 — Dec. pr. 3. p. 367.

1. *H. CINEREA. Dec. fl. fr. suppl. p. 375, et pr. 3. p. 367 — Ten. fl. nap. 3. p. 252 — H. hirsuta, b. Bertol. fl. ital. 3. p. 21.*

1c. *Dec. mem. des Paron. p. 10. t. 3 — H. hirsuta. Bauh. hist. 3. p. 379. f. 1?, nam radix videtur perennis.*

b. *glabrata*; pallide virens, non canescens, glabriuscula — *H. virescens. Salz. in Dec. 1. e.*

In cultis arenosis, et ad vias ubique ab elatis ad demissa: var. b. *Chianole del Testaccio, Coste di S. Pancrazio, Punta dell'Imperatore.*

Martio, Octobri. ☉

In var. b. *caules* tenue pubescentes: *folia* lacte vel pallide virentia, ciliata, ad paginam superiorem glabra, subtus puberula: *sepala* exteriora elliptica, mutica, hirsuta; sed haec ipsa varietas cum *H. glabra*, quae perennis, et solummodo in submontosis apud nos provenit, nullimodo confundenda est.

124. POLYCARPON.

Dec. pr. 3. p. 376.

1. *P. TETRAPHYLLUM. Lin. sp. pl. 131 — Ten. fl. nap. 3. p. 115 — Bertol. fl. ital. 1. p. 834.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 51. f. 5.* — *Anthyllis alsinaefolia*, polygonoides, major. *Barr. ic. 534.*

b. *diphyllum*. *Bertol. t. c.*

1c. *P. diphyllum*. *Cav. ic. 2. t. 151. f. 1.*

Ad vias, in arenosis aridis herbosis, nec non in cultis ubique: var. b. marginis rara.

Glabriusculum, diffusum: *folia tenuia, obovata; flores triandri, parvi; petalis emarginatis, albis.*

2. *P. ALSINAEFOLIUM*. *Dec. pr. 3. p. 376* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 836* — *Mollia alsinaefolia*. *Ten. fl. nap. 3. p. 237.*

1c. *Alsine* facie *Paronychia* secundae *Matthioli*. *Boce, sic. t. 38.*

In arenosis maritimis; *marina de' Maronti, marinella del Bagno, e dell'Arso*, sed nunc satis rarum.

Aprili, Majo. ☉

Glaberrimum, diffusum: *folia crassiuscula, ovalia; flores pentandri, parvi, dense congesti; petalis subintegris, albis.*

34. CRASSULACEAE. *Dec.*

125. TILLAEA.

Mich. gen. 22. t. 20 — *Dec. bull. phil. 1801. n. 49 p. 2,*
et pr. 3. p. 381.

1. *T. MUSCOSA*. *Lin. sp. pl. 186* — *Ten. fl. nap. 3. p. 115* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 338.*

1c. *Reich. eent. 2. f. 350* — *T. muscosa*, annua, perfoliata. *Mich. l. c. t. 20* — *Polygonum muscosum*, minimum. *Bocc. sic. t. 29, et Mus. 2. p. 36. t. 22.*

In apricis humidiusculis; *Ischia all'Arso sulla strada dal Bagno al Crovone, e nell'altra dal Bagno al Purgatorio detta la Campetella, Chiajano nel boschetto, Montagnone nel fondo del Cratere.*

Januario, Martio. ☉

Planta pusilla, 4-12 lin. longa: *flores minuti, herbacci.*

126. UMBILICUS.

Dec. bull. phil. 1801. n. 49, et pr. 3. p. 399.

1. *U. HORIZONTALIS*. *Dec. l. c. p. 400* — *Cotyledon horizontalis*. *Guss. syn. 1. p. 513* — *Ten. fl. nap. 4. p. 244* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 692.*

1c. *Ten. l. c. 234. f. 1.*

Ad muros, et ad rupes in umbrosis, saepius vero in apricis.

Majo, Junio. ☼

Flores breviter pedunculati, erecti, demum horizontales!

Ilic et sequens vulgo *Cuppeticello* appellantur, et ad rachides uberum mulierum sanandas adhibentur.

2. *U. PENDULINUS*. *Dec. pl. grass.*, et *pr. 3. p. 409*—Cotyledon Umbilicus.
Lin. sp. pl. 615—*Ten. fl. nap. 4. p. 244*—*Bertol. fl. ital. 4. p. 651*.
1c. Dec. pl. grass. t. 156—*Ten. l. e. t. 234*—Cotyledon. *Dod. pempt. 131*.
 Cum praecedente, tamen in umbrosis magis frequens.

Aprili, Majo. ☉, vel ☼

Flores magis tubulosi, elongati, longius pedunculati, penduli, ac pallidiores quam in praecedente; et una cum illa variat caule simplici vel ramoso, tamen semper basi indiviso; foliis integris, aut varie dentato-crenatis.

127: SEDUM.

Dec. bull. phil. 1801. n. 49, et pr. 3. p. 401.

1. *S. STELLATUM*. *Lin. sp. pl. 617* — *Ten. fl. nap. 4. p. 245* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 690*.
b. deltoideum; foliis obovato-cuneatis subdeltoideis, integris aut erenato-dentatis, floribus roseo-albis. *Ten. l. e.*
1c. Sempervivum tertium. Column. phyt. ed. neap. p. 42.
 Ad sepes, ac ad muros, et in saxosis ab elatis ad litus.
 Aprili, Majo. ☉
 Planta undique glaberrima, laete virens: *bractae* papillis tenuissimis pel-lucidis ad margines instructae, ita ut nudo oculo ciliatae videntur; *calycis* lacinae in fructu parum elongatae, et inter capsulas patentes erectae, apiceque fere conniventes!: *petala* lanceolata, acuminata, concavo-carinata, alba uti filamenta et pistillum, vel a medio ad apicem pallide rosea, ad carinam subtus virentia aut rubentia: *capsulae* mucronulatae, erectae, demum in eymae ramis recurvis stellato-patentes.
2. *S. GALIODES*. *All. ped. 2. p. 120*—*Griseb. fl. Num. et Byth. 1. p. 323*—*Bertol. fl. ital. 4. p. 700* — *S. Cepaea, b. Ten. fl. nap. 1. p. 246*—*Guss. syn. 1. p. 515, excl. syn. Sibth.*
S. caulibus aggregatis vel basi ramosis ascendentibus puberulis, foliis inferioribus verticillatis 3-5-nis spatulatis obtusis, superioribus sparsis oblanceolatis omnibus integerrimis, cymis paniculatis, floribus pedicellum puberulum subaequantibus, petalis lanceolatis aristatis albo-incarnatis carina purpureis calycem triplo superantibus, antheris purpureis, ovariis glabriuseulis.
1c. All. l. e. t. 65. f. 3.

Ad muros, ad rupes, ad sepes in umbrosis ubique.

Majo, Junio. ☉

Petala persistentia, et una cum capsulis aristata, istis demum adpressa.

Confer Cl. Bertol. l. e., et quae dixi in *syn. l. e.*; tamen cl. Griseb. melius quam alii characteres notavit, quorum ope *S. Cepaea*, et *S. tetraphyllum* ab hoc dignoscuntur.

3. *S. LITOREUM*. Guss. *pl. rar. p. 135* — Ten. *fl. nap. 4. p. 246* — Bertol. *fl. ital. 4. p. 697*.

S. annuum glabrum, caule erecto simplici vel a basi ramoso, ramis ascendentibus, foliis radicalibus rosulatis spatulato-cuneiformibus semiteretibus, reliquis spatulato-linearibus, omnibus adnato-sessilibus, floribus in cymae subtrifidae ramis sessilibus, calycinis laciniis obtusis petala lanceolata subaequantibus, stylo brevi, capsulis demum patulis.

lc. Guss. l. c. t. 37. f. 2.

Ad maceries in umbrosis submuscosis; *ne' muri a secco a diritta della strada, che dalla Chiesa dell' Annunciata di Campagnano conduce al Monte, ed in quelli della strada che mena a Cartaromana dirimpetto al Casino di Monsignore.*

Majo, Junio. ☉

Planta in hac insula ob locorum ariditatem vix pollicaris, gregarie crescens, lacte virens, glaberrima: *folia* infima rosulata, conferta, obtusissima, supra concaviuscula: *calycis* lacinae fere semiteretes, crassiusculae, obtusae, inter petala lutea lanceolato-aristulata profunde sulcata surrectae, illis breviores.

4. *S. NICAENSE*. All. *ped. 2. p. 122* — Moris *fl. sard. 2. p. 129*, excl. plur. *syn.* — *S. rufescens*. Ten. *fl. nap. 1. p. 248* — Guss. *syn. 1. p. 520* — *S. altissimum*. Bertol. *fl. ital. 4. p. 703*, excl. *syn. Jacq.*

S. glaberrimum caespitosum glauco-virens demum rubescens, caulibus basi suffruticulosus, floriferis erectis, foliis semiteretibus basi solutis inferioribus incurvis erecto-patulis spiraliter 5-fariam imbricatis, superius rectis adpressis, floribus (albido-luteolis) ante explicationem angulatis secus cymae ramos demum recurvos subsessilibus, petalis linearispatulatis obtusiusculis patentibus laciniis calycinis 5-4-plo superantibus, filamentis basi puberulis, capsulis longe rostratis.

lc. Ten. l. c. t. 41 — All. l. c. t. 90. *ie. 1*, pessima, uti recte notat Moris l. e. — *S. altissimum*. Reich. *cent. 3. f. 488?*

Ad rupes vulcanicas in fruticetis; *Iachia all' Arso nel boschetto sul Pennino di Mangialisi.*

Junio, Julio. ☿

Pro differentiis de hac specie cum *S. altissimo* confer Cl. Ten. *syll. p. 229*, et *syn. l. e.*; et pro *S. nicaensi* Moris l. c.

S. soluntinum Tin. a me in Insula introductum fuit.

35. FICOIDEAE. Juss.

128. MESEMBRYANTHEMUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 860.

1. *M. NODIFLORUM. Lin. sp. pl. 688 — Ten. fl. nap. 4. p. 281 — Bertol. fl. ital. 5. p. 174.*

lc. *Dec. pl. grass. t. 58 — Kali neapolitanum, aizoides, repens. Column. eephr. 2. p. 72. t. 73.*

In ruderatis, ad pendices arenosas collium, in marnaceis, ac in rupestribus maritimis; *Ischia al Castello, e n'scogli di S. Anna, coste di S. Panerazio alla Scarupata, Succellaro, marina de' Maronti, scala del Testaccio, marina di S. Angelo, rupi di Citara presso Forio, Lacco al monte Vico scendendo a S. Montano.*

Majo, Junio. ☉

Flores parvi, ex albo-luteoli; petalis anguste linearibus.

2. *M. ACINACIFORME. Lin. sp. pl. 695.*

lc. *M. acinaciforme, flore amplissimo purpureo. Dill. Elth. t. 311. f. 270, et 212. f. 271.*

Ad rupes maritimas, *Ischia nelle rupi all'Ovest sotto al Castello*, ubi nunc sponte vegetat, et propagatur.

Aprili, Majo. ☿

Planta ramosissima, et ob ramos radicantes longe lateque procurrens, a rupibus dependens, laete virens, glaberrima: *flores ampli, scire 3-4-pellicares, purpurei, speciosi.*

36. CACTEAE. Dec.

129. OPUNTIA.

Tourn. inst. 239. t. 122 — Mill. dict. — Dec. pr. 3. p. 471.

1. *O. FICUS INDICA. Mill. dict. n. 2 — O. vulgaris. Ten. fl. nap. 4. p. 270.*

lc. *Cactus Ficus indica. Dec. pl. grass. t. 138.*

Ad rupes maritimas; *Ischia sotto al Castello, Lacco al monte Vico, Punta di S. Angelo*, nunc spontanea.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Fico d'india*.

Cum plantae non coluntur hac in insula, sic fructus parvi remanent, tamen saporis sunt.

37. SAXIFRAGEAE. Dec.

130. SAXIFRAGA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 764.

1. *S. TRIDACTYLITES. Lin. sp. pl. 578 — Ten. fl. nap. 4. p. 196 — Bertol. fl. ital. 4. p. 494.*

a. lobata; foliis inferioribus 3-5-lobis, superioribus saepe integriusculis, caule plus minus ramoso. *Dec. pr. 4. p. 35.*

lc. Sternb. Saxif. t. 17. f. media, ex Dec. — Paronychia altera. Dod. pempt. 112.

Ad muros in umbrosis muscosis humentibus; *Ischia nella salita della strada della Puzzolana su de'muri esposti al Nord*, sed rara.

Martio, Aprili. ☉

Planta pusilla, 2-4-pollicaris, glanduloso-pubescentis, et viscidula: flores albi, parvi.

38. UMBELLIFERAE. Juss.

131. ERYNGIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 456 — Dec. pr. 4. p. 87.

1. *E. MARITIMUM. Lin. sp. pl. 337 — Ten. fl. nap. 1. p. 117 — Bertol. fl. ital. 3. p. 108.*

lc. Fl. dan. 875 — E. marinum. Dod. pempt. 730 — Clus. hist. 2. p. 159.
In arenosis maritimis.

Majo, Julio. ☿

Folia coriacea, glaucescentia, dentato-spinosa, undulato-plicata: flores pallide coerulescentes.

132. SANICULA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 458 — Dec. pr. 4. p. 84.

1. *S. EUROPAEA. Lin. sp. pl. 339 — Ten. fl. nap. 1. p. 120 — Bertol. fl. ital. 3. p. 121.*

lc. Bull. herb. t. 267 — Sideritis. Column. phyt. ed. nap. p. 72.

In silvis umbrosis, et ad sepes in humentibus.

Aprili, Majo. ☿

Involveri foliola patenti-recurva: petala alba, non revera desunt in floribus foemineis, uti cum Scopoli dixi in syn. 1, p. 306; sed cito deci-

dunt, et tunc eorum loco margo corollinus albidus remanet: *styli* saepe rubescunt.

132. APIUM.

Hoffm. umb. 1. p. 75 — Dec. pr. 4. p. 100.

1. *A. GRAVEOLENS*. *Lin. sp. pl. 379 — Ten. fl. nap. 3. p. 336 — Bertol. fl. ital. 3. p. 121.*

b. brachyphyllum; foliolis rhombeis, vel rhombeo-ovatis abbreviatis, laciniis obtusis.

lc. A. hortense. Fuchs. hist. 744 — Lobel. ic. 707.

In humentibus; *Ischia nell'Orto della Mandria, Lacco, Forio a Citara. Majo, Septembri.* ♂

In speciminibus neapolitanis, et in illis quae ex Anglia habui, *foliola* fere oblongo-obovata, magis cuneata, et basi producta; earum dentes et lacinae acutiores, lanceolatae, evidentius mucronulatae: in planta inarimensi vero *foliola* fere deltoidea, basi minus cuneata, ac producta; earum dentes aut lacinae latae, obtusiores, fere ovatae, obsolete mucronulatae: *fructus* magis globosi — *Icones citatae nostram varietatem optime exhibent, uti illa Riv. pent. irr. t. 205 plantam neapolitanam ac anglicam exacte repraesentat.*

Sequentes varietates coluntur:

a. radice dulci, alba.

Vulgo *Accio bianco.*

b. radice dulci, rubente.

Vulgo *Accio rosso.*

134. PETROSELINUM.

Hoffm. umb. gen. 1. p. 78 — Dec. pr. 4. p. 102.

1. *P. SATIVUM*. *Hoffm. l. c. — Dec. l. c. — Apium Petroselinum. Lin. sp. pl. 379.*

lc. Blackw. herb. t. 172 — Apium hortense. Dod. pempt. 694.

Colitur passim in hortis.

Majo, Junio. ☉

Vulgo *Petrosino.*

135. AMMI:

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 467 — Dec. pr. 4. p. 112.

1. *A. MAJUS* *Lin. sp. pl. 349 — Ten. fl. nap. 3. p. 286 — Bertol. fl. ital. 3. p. 252, excl. syn. A. glaucifolii.*

1c. Sibth. fl. gr. t. 273 — A. vulgare. Dod. pempt. 639.

Inter segetes in apricis; seminati fra le vigne di Fontana ed Ajetola, rarum.

Majo, Octobri. ☉

Glaberrimum; foliola argute serrulata, margine cartilaginea; in superioribus anguste lanceolato-linearita: flores albi.

136. PIMPINELLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 498 — Dec. pr. 4. p. 49.

1. P. PEREGRINA. Lin. sp. pl. 378 — Bertol. fl. ital. 3. p. 267 — Tragium peregrinum. Ten. fl. nap. 3. p. 335.

1c. Jacq. H. Vind. 2. t. 131 — Daucus Dioscoridis. Column. Ecpfr. 1. p. 109.

Ad sepes, in herbosis, et in silvaticis; salita di Barano, di Serrano, di Fontana a S. Nicola, monte Vetta, selve delle Falanghe, di Catreca, Casamicciola, salita della Pannella, Lacco al monte Vico, Panza.

Majo, Junio. ♂

Tenu pubescens: foliola in foliis radicalibus late-orbiculata, in supremis anguste pinnatifido-lacinata: flores albi.

137. BUPLEURUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 460 — Dec. pr. 4. p. 127.

1. B. PROTRACTUM. Link fl. port. p. 287 — Ten. fl. nap. 3. p. 269 — Bertol. fl. ital. 3. p. 132.

1c. Reich. cent. 9. f. 1112, et 1113.

Inter segetes; seminati fra Fontana e la Pietra dell'acqua, unica tantum vice collegi.

Aprili, Majo. ☉

Glaberrimum, glaucescens: folia oblonga, mucronata: flores lutei.

138. OENANTHE.

Lam. diet. enc. 4. p. 526 — Dec. pr. 4. p. 136.

1. O. PIMPINELLOIDES. Lin. sp. pl. 366 — Ten. fl. nap. 1. p. 127, var. a. et var. b. vol. 3. p. 314 — Bertol. fl. ital. 3. p. 236.

1c. Jacq. austr. 1. 394 — O. angustifolia. Lobel. ic. 729.

In herbosis silvaticis, in fruticetis, et ad sepes passim ab elatis ad litus.

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Gransa di gatta*.

Glaberrima: radices fibrae ad apicem in tubera globosa incrassatae: foliola in foliis radicalibus late obovato-cuneata; in superioribus anguste linearia, elongata; fiores albi: fructus cylindraceo-compressi, multistriati.

Cymae tenerae aqua fervente lixatae, et sale ac oleo conditae, vel leguminosarum seminibus mixtae, in *Fontana, Barano, Moropane*, aliisque oppidis comeduntur.

139. CRITHMUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 473 — Dec. pr. 4. p. 164.

1. *C. MARITIMUM. Lin. sp. pl. 354 — Bertol. fl. ital. 3. p. 333 — Cachrys maritima. Ten. fl. nap. 3. p. 395.*

lc. Jacq. H. Vind. 2. t. 187 — Zannich. hist. t. 9.

Ad rupes maritimas ubique.

Julio, Septembri. ♀

Vulgo *Gransa di quaglia*.

Sempervirens, glaberrimum, glaucescens: folia crassiuscula, *Petroselinum* oleria: flores albo-viriduli, demum viridi-luteoli.

140. FOENICULUM.

Adans. fam. 2. p. 101 — Gaertn. de fruct. 1. p. 105 — Dec. pr. 4. p. 142.

1. *F. PIPERATUM. Dec. pr. 4. 142 — Bertol. fl. ital. 3. p. 342 — Anethum piperatum. Ucria pl. ad Lin. opus add. n. 6 — A. Foeniculum, c. Lin. sp. pl. 378 — Meum piperatum. Ten. fl. nap. 3. p. 291.*

lc. F. asininum, foliis crispis, sive Millefolii, graveolens. Cup. panph. 1. t. 171.

Cum sequente, sed magis quam illud obvium, simulque floret. ♀

Praeter fructuum saporem acerrimum recedit a sequente, foliorum laciniis brevissimis rigidis glaucis. Colitur in hortis, et vulgari nomine *Carozella* appellatur. Ista enim quoad foliorum characterem et habitum potius *F. piperati*, quam *F. graveolentis*, vel *F. dulcis* progenies videtur.

2. *F. VULGARE. Gaertn. de fruct. 1. p. 105 — Dec. l. c. — F. officinale. Bertol. fl. ital. 3. p. 339 — Anethum Foeniculum, b. et d. Lin. sp. pl. 377 — Meum Foeniculum. Ten. fl. nap. 3. p. 290.*

lc. Gaertn. l. c. t. 23 — Riv. pent. irr. t. 61 — Foeniculum. Dod. pempt. 297.

Ad muros, et in cultis lapidosis ubique.

Julio, Septembri. ♀

Vulgo *Finocchio selvatico* una cum praecedente.

3. *F. dulce*. Dec. pr. 4. p. 142—*Anethum Foeniculum*, a. *Lin. sp. pl.* 377.

lc. *F. dulce*, majore et albo semine. *Bauh. hist.* 3. pars. 2. p. 4.

Colitur passim in hortis.

Junio, Julio. ☉

Vulgo *Finocchio*.

141. FERULA.

Koch umb. p. 96 — *Guss. syn.* 1. p. 352.

1. *F. COMMUNIS*. *Lin. sp. pl.* 355—*Guss. syn.* 1. p. 352—*Ten. fl. nap.*

3. p. 337, ex parte, et excl. *syn. Guss. pr.* 1. p. 365, ac *Smith fl. gr. pr.* 1. p. 190—*F. nodiflora. Bertol. fl. ital.* 3. p. 372.

lc. *Ferula. Dod. pempt.* 321. et *Lobel. ic.* 778.

In apricis rupestribus; alle *Falanghe* sotto *S. Nicola*, discesa di *Pietraperciata*, e del *Fasano*, costa della *Serra* scendendo alle fumarole nella contrada del *Bell' Omo* sopra *Forio*.

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Cannaferra*, una cum sequente.

Caules 7-8-pedales, et ultra: *foliorum* radicalium laciniae in hac anguste lineares, sulcatae, non confertae, 1, 1-1/2 poll. longae; *fructus* oblongo-elliptici—*F. nodiflora Griseb. spic. fl. Rum.* 1. p. 533, ad *F. communem* spectare videtur ex descriptione.

2. *F. NODIFLORA*. *Lin. sp. pl.* 356—*Guss. syn.* 1. p. 353—*F. nodiflora, b. Bertol. fl. ital.* 3. p. 372.

lc. *F. Foeniculi* folio, semine latiore et rotundiore. *Bauh. hist.* 3. p. 43.

Ad rupes maritimas; *Ischia* nelle rupi sotto al *Castello*, *Succellaro* alle *Scarupata*, e ne' margini delle selve fra le *Falanghe* ed il *Fasano* alla *Fico*, una cum praecedente 1

Aprili, Majo. ♀

Foliorum radicalium laciniae in hac duplo fere breviores, confertiores, tenuiores quam in praecedente: *semina* orbiculato-elliptica— Pro hac et antecedente confer quae dixi in *syn. l. c.*

3. *F. NEAPOLITANA*. *Ten. fl. nap.* 3. p. 340—*F. nodiflora, c. Bertol. fl. ital.* 3. p. 372.

F. caule glauco tereti gracili, foliis supra pallide viridibus subtus glaucis supradecompositis, foliolis 3-5-partitis, laciniiis planis late linearibus obtusiusculis, umbellis intermediis pedunculatis, lateralibus elongatis masculis, involucri linearis-setaceis caducis, fructibus ellipticis utrinque acutis, costis prominulis.

lc. *Ten. l. c. t.* 132.

Ad rupes maritimas, vel etiam a mare dissitas; *nelle rupi da Ischia a S. Pancrazio, e ne seogli di S. Anna*, ubi vero rara; *rupi di Campagnano, del Castiglione, presso Fontana, Lacco al monte Vico, Forio alla Punta dell'Imperatore.*

Aprili, Majo. ☼

Vulgo *Cannaferla femminina*.

Caulis sesquioriales, tamen graciles, diametro nempe vix 6-8-lineari, stricti, non sulcati: *flores* lutei, parvi: *fructus* immaturus utrinque convexiusculus, 4-5 lin. longus, costis tunc omnino obliteratis: *pedunculi* inferiores longiores, ideoque inflorescentia tota fere ovata—A duabus praecedentibus luce clarius distincta, *caule* graciliore non virente, sed polline coerulescente vel demum rubente tecto: *foliorum* laciniis planis, 2-3 lin. latis, glaucis, non intense virentibus: *fructibus* ellipticis, utrinque angustatis; ideoque *F. glaucae* magis proxima, quam duabus antecedentibus, cum quibus male associata.

142. DAUCUS.

Dec. pr. 4. p. 209.

4. *D. SETULOSUS. Cuss. in Dec. pr. 4. p. 211—Bertol. fl. ital. 3. p. 158—Ten. fl. nap. 5. p. 335; et D. parviflorus ejusdem in fl. nap. 3. p. 284, quoad plantam inarimenscm — D. speciosus. Cesati in Lin. 11. p. 322, et in Walp. rep. 2. p. 419, ex specim. ab amico Heldr. communicato.*

D. caule petiolisque sparse piloso-hispidis, foliis inferioribus circumscriptione oblongis 2-pinnatis, foliolis multitudinis, laciniis anguste linearibus abbreviatis, superiorum conformibus, involucri pinnatifidis umbellam subsuperantibus involucrellisque simplicibus lineari-setaceis ciliato-setosis, floribus breviter radiantibus, centrali sterili, fructus oblongi aculeis elongatis basi dilatatis ac coalitis apice glochidiatis ejusdem latitudinem superantibus.

lc. nostra t. IV. a. b. c. d. e — *Daucus vulgaris. Zannich. hist. t. 190, ex Ten.*, sed folia videntur diversa.

In campis, collibus sterilibus, et ad vias in arenosis nihil communius, nec non ad vaporaria naturalia (*Fumarole*).

Aprili, Junio. ☉

Vulgo *Pastinachella*.

Caulis palmares vel sesquipedales, scabri, tamen semper graciles, erecti, vel ascendentes, et uti petioli setulis retrorsum versis tecti; quae setae ad vaginas, et foliorum basim longiores, confertiores, ac patentes: *folia* radicalia lacte virentia, in orbem supra terram more generis expansa;

laciniis vix $1\frac{1}{2}$ lin. latis, 3-4 lin. longis, adproximatis, illa *Scandicis pecten* aemulantibus, uti recte notat Cl. Bertol. l. c. : involucrium sub anthesi deflexum umbellam aliquando superat, ejusdem laciniis involu-cellisque canaliculatis, subtus carinatis, vix lin. latis, aristatis: involu-cellae foliola valde inaequalia; nam 2-3 elongata, umbellulam excedentia, ac omnino virentia, aut margine angustissimo albo-scarioso prope basin instructa; reliqua duplo fere breviora, late albo-marginata ac ciliata, concava, obtusiuscula: flores candidi, breviter radiantes; centralis unicus aut plures steriles, atropurpurei: fructus 2-3 lin. longi, saepe una cum aculeis rubentes: isti vero basi dilatata coaliti, reliqua sui parte filiformes, graciles, albidi; valleculis fere planis, in mediana linea distiche breviterque setosis: receptaculum parum dilatatum—Flos centralis sterilis atropurpureus sat raro in hac specie deest, qui spiritu vini infuso optimam tincturam praebet.

2. *D. POLYGAMUS*. Jacq. *H. Vind. 3. p. 53* non *Gou. obs. p. 9—Ten. fl. nap. 3. p. 781*.

D. foliis hirsutiusculis, inferioribus circumscriptione oblongis, foliolis late ovatis oblongisque inciso-dentatis lobatisque, laciniis lobisque mucronatis, superiorum auguste linearibus elongatis, involucrio pinnatifido umbella demum breviora, involucriis integris trifidisque umbellula aequilongis, flosculo centrali sterili carnoso, fructus ovalis aculeis basi subdilatatis distinctis, ejusdem latitudinem subaequantibus, apice setis 1-2 subuncinatis terminatis.

l. c. *Jacq. l. c. t. 78*.

In silvaticis herbosis, ad sepes, et in cultis passim.

Majo, Julio. ♂

Vulgo *Pastinaca selvaggia*, uti sequentes.

Caules aliquando 3-4-pedales, erecti, scabri: *foliorum* superiorum laciniis elongatae, ac inter se remotae: *fructus* parvi—Cl. Bertol. in *fl. ital. 3. p. 157* hunc a *D. Carota* non separat, et *D. Carota* cultus a *D. maximo* provenire putat, quod minime verum; nam hujus characteres cum planta culta non conveniunt. Interim specimina *D. Carotae* ab Europa septentrionali et media accepta potius cum *D. polygamo*, quam cum *D. Carota* convenire mihi videntur.

3. *D. MAURITANICUS*. *Lin. sp. pl. 348—Bertol. fl. ital. 3. p. 168—Guss. syn. 1. p. 334!*

D. piloso-hispidus, foliis inferioribus circumscriptione triangulari-acuminatis, pinnis primariis rectangule patentibus, foliolis inferiorum ovato lanceolatis acutis acuteque inciso-dentatis, extimis brevioribus, superiorum subconformibus, involucrio pinnatifido radiis breviora, involucriis anguste albo-marginatis subciliatis trifidis integrisve, floribus (albis parvis) breviter radiantibus, fructus ovalis aculeis basi subdilatatis distinctis apice glochidiatis ejusdem latitudinem aequantibus.

1c. *Pastinaca hirsuta, crispata, tenuifolia*. *Boeck. sic. p. 28. t. 42.*

Ad rupes; *Ischia sotto al Castello, ed ai Scogli di S. Anna, rupi di Campagnano.*

Aprili, Majo. ♂

Caulis 2-3-pedales: *folia* sequenti similia, et etiam nitide virentia, ac planta vulnerata succum resiniferum saepe manant; qui succus ad pedunculorum apicem fervente aestate sponte exsudat: *receptaculum* umbellare subdilatatum: *involucella* mucronata, ad carinam hirsutiuscula: *umbellulae* saepe haemisphaericae: *fructus* inter omnes species inarimenses majores; aculeis sat raro basi coalitis, inter costas in valliculis glabri, aut hirsutiusculi — Hunc quoque specimina a me missa ad Cl. Bertol. ad *D. gummiiferum* refert Cl. Moris in *fl. sard. 2. p. 255.*

4. *D. GUMMIFER*. *Lam. dict. enc. 1. p. 634* — *Guss. syn. 1. p. 332* — *D. gummiifer*. *Ten. fl. nap. 3. p. 283, sed ex ipso in syll. p. 591.* ad *D. hispidum* refertur — *D. Gingidium, b. Bertol. fl. ital. 3. p. 165* ex planta sicula!

D. caule basi hispido superne glabrato scabro, foliis circumscriptione triangularibus 2-3-pinnatis, foliolis supra nitide virentibus subtus hirsutiusculis abbreviatis carnosulis cuneato-ovatis ovalibusque inciso-serratis, superiorum conformibus, involucri pinnatifidis umbella brevioribus, involucrellis trifidis integrisve margine late albo-scariosis ciliatisque ad carinam hirsutis (floribus demum luteis), fructus ovalis aculeis rectis basi subdilatatis apice glochidiatis ejusdem latitudinem aequantibus.

b. floribus semper albis.

1c. *Pastinaca tenuifolia, lucida, gummi manans*. *Boeck. mus. p. 30 t. 20.* planta hirsutior.

Ad rupes praesertim maritimas; *Lacco al monte Vico; Forio a S. Francesco, nelle rupi di Citara, ed alla punta dell'Imperatore; Punta di S. Angelo.*

Junio, Julio. ♀

Caulis pro locorum natura $1\frac{1}{2}$ -1 $1\frac{1}{2}$ pedales: *foliola* in foliis radicalibus semper abbreviata, et supra nitide virentia; in superioribus etiam brevia, non elongata: *flores* praecedentis parum majores, flosculo centrali sterili nullo: planta vulnerata succum resiniferum copiosum manant — Species prae aliis hujus generis extricatu difficillima. Cl. Lam. expressis verbis notat plantam suam a *D. hispanico* Gou. differre, at Cl. Dec. in *pr. 4. p. 212*, nec non Bertol. in *fl. ital. 3. p. 170* illos associant, quod etiam notat Cl. Moris in *fl. sard. 2. p. 205*, quem coufer — *D. hispidus* Bertol. *l. c. p. 163* (non Desf., nec Guss. syn.) ex planta prope Cumam collecta certe ad hunc nostrum spectat!, et a *D. hispido* Desf. quoad istius iconem et specimen herbarii penitus alienus est — Tandem *D. gummiifer* Bertol. *l. c. p. 170*, ex specimine a Cl. de Notariis com-

municato, et lecto in loco ab ipso Cl. Bertol. notato a nostro non differt, sed descriptio Bertol. quoad involucri longitudinem cum spermine isto non quadrat, nam involucri umbella brevius est.

5. *D. nitides*. *Gasparr.*

D. caule basi petiolisque retrorsum hirsutis glabratisque, foliis glabris nitide virentibus, radicalibus circumscriptione ovato-oblongis 2-pinnatis, foliolis ovatis oblongisque (saepe angustatis) basi cuneatis argute inciso-dentatis, superiorum angustioribus vix elongatis inter se remotis, involucri pinnatifidi umbella subbrevioris laciniis involucellisque integris anguste linearibus mucronatis, floribus (albis) vix radiantibus, fructus oblongi aculeis glochidiatis basi vix dilatatis distinctis ipsius latitudinem subsuperantibus.

l.c. nostra t. IV a, b, c, d, e.

In aridis maritimis glareosis, vel in rupibus collibusque aridis mare finitimis meridiem vel occasum spectantibus; *costa di S. Pancrazio, del Lapillo, del Pignatiello, di Succellaro, e della Scarpata, fino alle alte falde meridionali del monte Vezza, monte di Barano, Guardiola del Testaccio, scala di Maronti, Punta di S. Angelo, e dell'Imperatore.*

Junio, Julio. ♂

Caules superne muricato-scabri, 1-3-pedales: *foliola* in foliis radicalibus 1-4 lin. lata, firmiuscula, ita lucida ut fere vernice obliuita videatur, sicuti in duobus praecedentibus, in foliis superioribus anguste linearia, 3-4 lin. longa, inter se remota; *involucri* foliola a basi ad medium margine angusto albo-scarioso instructa, sub anthesi saepe deflexa, et aliquando umbellam parum superantia: *involucella* raro tripartita, saepius integra, umbellulam ut plurimum semiglobosam aequantia, margine late albo-scariosa ac ciliata, praesertim quae breviora sunt: *fructus* longiores et angustiores, quam in sequente; *costis* saepe rubentibus, valleculis fere oblitteratis in linea mediana obsolete setulosis. Planta vulnerata succum resinoseum vix manat.

Confer *D. dentatus*. Bertol. *fl. ital. 3. p. 168*, et *Moris fl. sard. 2. p. 258*, sed praesertim et *D. maritimus* ejusdem *l. c. p. 260*.

6. *D. Bocconi*. *Guss. pr. 1. p. 322*, et *syn. 1. p. 333* — *Ten. syll. p. 531* — *Bertol. fl. ital. 3. p. 161*.

D. foliis radicalibus circumscriptione ovato-oblongis 2-3-pinnatis, supra lucidis subtus petiolisque hirsutiuseculis, foliolis radicalium abbreviatis cuneato-ovatis oblongisque breviter inciso-dentatis, laciniis oblongis mucronatis, superiorum subconformibus, involucri tripartitis latiusculis umbella brevioribus involucellisque subintegris glabris, fructus ovalis aculeis glochidiatis basi subdilatatis subcoactis ipsius latitudinem vix aequantibus.

l.c. Pastinaca Oenanthes foliis. Bocc. sic. 75. t. 40. f. 3.

In arenosis herbosis maritimis, Forio a Citara, ed a Montevergine, Succellara, sed rarus.

Majo, Junio. ♂

Foliorum lacinae in planta inarimensi, nec non in illa quae prope Rhegium collegi, margine glabrae, non setuloso-scabrae, uti in plantis siculis: *faliata* in foliis superioribus parum elongata, ac angustiora; flores albi, breviter radiantes; fructuum valleeulae glabrae.

Foliorum radicalium caractere hujus generis species nonnullae etiam ante anthesim inter se probe dignoscuntur. Sic quoad circumscriptionem folia ista oblonga in *D. polygamo* et in *D. setuloso*; ovato-oblonga in *D. nitido*, et in *D. Bocconi*: fere triangularia in *D. mauritanico* et *gummifero*; sed foliorum lacinae angustissimae in *D. setuloso*, et late ovatae in *D. polygamo*: in *D. nitido* basi cuneatae, et in *D. Bocconi* ovatae; denique in *D. gummifero* folia supra nitide virentia, sed magis quam in *D. mauritanica*. Tandem confer observationes Cl. *Moris* in *fl. surd.* 2. p. 262 quoad specierum hujus generis limites fallaces.

143. ORLAYA.

Hoffm. umb. 1. p. 53 — *Dec. pr.* 4. p. 249.

1. O. MARITIMA. *Dec. pr.* 4. p. 209 — *Daucus muricatus*, b. *Lin. sp. pl.* 349 — *Caucalis maritima*. *Ten. fl. nap.* 3. p. 277 — *C. pumila*. *Bertol. fl. ital.* 3. p. 182.

lc. Cav. ic. 2. p. 1. t. 101 — *Gerd. prov.* p. 237. t. 10 — *Lappula lanaria*, seu *Caucalis maritima*. *Bauh. hist.* 3. pars. 2. p. 81.

In arenosis maritimis; marina del Lucco a S. Montano, ed a S. Restituta, Forio a Citara, ed a Montevergine, Punta di S. Angelo, arene del Bagno, e dell'Arso.

Majo, Junio. ○

144. TORILIS.

Syr. umb. pr. p. 24 — *Dec. pr.* 4. p. 218.

1. T. ANTHRISCUS. *Gaert. de fruct.* 1. p. 83 — *Dec. pr.* 4. p. 218 — *Bertol. fl. ital.* 3. p. 186 — *Caucalis Anthriscus*. *Ten. fl. nap.* 3. p. 278? — *Tordylium Anthriscus*. *Lin. sp. pl.* 346.

lc. Jacq. austr. t. 261 — *Caucalis semine aspero*, flosculis subrubentibus. *Bauh. pin.* p. 80 — *Caucalis rubello flore*. *Clus. hist.* 2. p. 202.

Ad sepes, et in silvaticis; Via dal Crovane a Cutauro per Campagnano,

via di basso di Chimmano, delle Chianole del Testaccio, discesa delle Falanghe, del Fusano, di Catreca, e della Pera.

Majo, Augusto. ☉

Involucrum polyphyllum : *petala* non radiantia : *fructuum* aculei rectiusculi, vel incurvi, apice simplices non glochidiati.

2. *T. PURPUREA*. *Guss. syn. 1. p. 337* — *Caucalis purpurea*. *Ten. fl. nap. 3. p. 279.*

T. caule erecto ramoso, foliis conformibus 1-2-pinnatis, foliolis lanceolatis integris vel pinnatifido-incisus aequalibus (terminali non elongato), involucro subnullo, involucellis polyphyllis (umbellae radiis 2-3), fructuum aculeis scabris apice glochidiatis.

lc. Ten. l. c. t. 131.

Ad sepes, ad muros, et in silvaticis passim.

Aprili, Majo. ☉

Cl. Bertol. in fl. ital. 3. p. 188 a *T. infesta*, a qua prorsus aliena est, non separat; nec *T. heterophylla* varietas est *T. purpureae*, uti ipso

Cl. Bertol. l. c. aliique putant, nam habitus, et character foliorum constantes sunt, et dum haec in Insula ubique obvia, ex adverso *T. heterophyllae* unicum tantum specimen vidi!, quod certo erraticum, nam semina cum illis *Tritici* in Insula advecta videntur. Denique quod pejus *Cl. Webb. in Phyt. canar. vol. 3. pars 2. sect. 2. p. 166 T. purpuream, T. heterophyllum, T. neglectam, et T. helveticam* in unicum speciem associat.

3. *T. HETEROPHYLLA*. *Guss. pr. 1. p. 326, et syn. 1. p. 338* — *Dec. pr. 4. p. 219* — *Koch syn. ed. 2. p. 45* — *T. purpurea, b. Ten. fl. nap. 3. p. 279* — *T. infesta, b. Bertol. fl. ital. 3. p. 188.*

T. caule erecto parum ramoso, foliis inferioribus 1-2-pinnatis, foliolis lanceolatis incisus extimo non elongato, caulinis superioribus ternatis, foliolis linearibus elongatis inciso-serratis, supremis angustissime linearibus integris simplicibus, umbellae radiis 2-3, involucro subnullo, involucellis polyphyllis, fructuum aculeis scabris apice glochidiatis.

lc. nulla.

In dumetis prope segetes rarissima; monte Trippiti scendendo al piano di Muori.

Majo, Junio. ☉

Confer praecedentem.

4. *T. NODOSA*. *Dec. pr. 4. p. 219* — *Bertol. fl. ital. 3. p. 189* — *Caucalis nodosa*. *Ten. fl. nap. 3. p. 280* — *Tortylium nodosum*. *Lin. sp. pl. 346.*

lc. Jacq. austr. 5. p. 40, et app. t. 24 — *Caucalis ad alas florens*. *Riv. pent. irr. t. 158* — *Lobel. ic. 726.*

Ad muros, macteries, ad rupes, et in lapidosis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Umbellae latera les, parvae, oppositi foliae, fere sessiles, densae, subglobo-
sae; *petala* s aepius alba.

145. SCANDIX.

Gaertn. de fruct. 2. p. 33 — Dec. pr. 4. p. 219.

1. S. PECTEN VENERIS. *Lin. sp. pl. 368—Ten. fl. nap. 3. p. 318—Ber-
tol. fl. ital. 3. p. 199.*

lc. *Jacq. austr. t. 263 — Pecten Veneris. Dod. pempt. 701.*

b. *glabrescens*; foliolis confertioribus tenuioribus intensius virentibus gla-
bratis, seminum rostris validis elongatis (2-pollicar.).

lc. *nulla.*

Inter segetes, et in herbosis olim cultis passim: var. b. in cultis elatis;
da Monte Vetta alla Pietra dell'acqua.

Aprili, Junio. ☉

In var. b. *caules* ad summum palmares, ac patuli *folia* radicalia vix supe-
rant, et *flores* minores: in utrisque vero *foliola* numerosa, approximata,
pinnatifida; laciniis anguste linearibus, brevibus: *umbellae* paucira-
diatae, involucre destitutae: *flores* albi: *fructus* in parte seminifera gla-
bri; *rostro* compresso ad suturae margines hispido.

146. CHAEROPHYLLUM.

Hoffm. umb. 1. p. 33 — Dec. pr. 4. p. 224.

1. C. TEMULUM. *Lin. sp. pl. 370 — Myrrhis temula. Ten. fl. nap. 3. p.
321 — Bertol. fl. ital. 3. p. 213.*

a. *lejocarpum*; fructibus glabris.

lc. *Jacq. austr. t. 65—Myrrhis annua, vulgaris, caule fusco. Moris. hist.
3. s. 9. t. 10. f. 7.*

b. *eriocarpum*; fructibus sparse villosis.

Ad sepes, et in silvaticis umbrosis: var. b. *nel cavone del Vataliere.*

Majo, Junio. ♂, et aliquando ♀

Caules basi hispidi, sub genicula tumidiusculi, saepe rubro-maculati: *fo-
liola* lata, hirsutiuscula: *umbellae* nubiles cernuae: *involucella* ciliata,
cuspidata: *flores* albi.

147. ECHINOPIORA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 461 — Dec. pr. 4. p. 234.

1. E. SPINOSA. *Lin. sp. pl. 334 — Ten. fl. nap. 3. p. 265 — Bertol. fl. ital. 3. p. 153.*

lc. Dec. Umbell. p. 64. t. 16, optima — Crithmum spinosum. Dod. pempt. 705.
In sabulosis maritimis; *Bagno alla marinella, Lacco a S. Montano, Forio a Citara ed a Montevergine, Punta di S. Angelo, Maronti, Succellaro.*

Junio, Augusto. ♂

Herba grate olens: *foliorum laciniae rigidae, crassae, trifidae, canaliculato-trigonae, subulatae: umbellae terminales, densae; involucri et involuella spinosa: flores albi.*

148. SMYRNIUM.

Leg. am. nat. 2. p. 101 — Dec. pr. 4. p. 250.

1. S. OLUSATRUM. *Lin. sp. pl. 376 — Ten. fl. nap. 3. p. 330 — Bertol. fl. ital. 3. p. 289.*

lc. Lam. ill. gen. t. 204 — Smyrnum. Riv. pent. irreg. t. 191, optima — Dod. pempt. 686.

Ad sepes in silvaticis, ac in vineis in pinguibus humentibus; *Serrano, Fontana, selve delle Falanghe, di Catreca, e del Caccaviello sopra Casamicciola, Lacco, Forio, siepi di Catauro presso Campagnano.*

Martio, Aprili. ♂

Planta glaberrima: *flores triste virentes, odorem nauseosum spirantes: fructus crassi, demum nigri.*

149. CORNIADRUM.

Hoffm. umb. p. 186 — Dec. pr. 4. p. 250.

1. C. SATTIVUM. *Lin. sp. pl. 367 — Ten. fl. nap. 3. p. 317 — Bertol. fl. ital. 3. p. 250.*

lc. Sibth. fl. gr. t. 283 — Coriandrum. Riv. pent. irr. t. 71 — Fuchs. hist. 345.

In vineis; *Bagno nelle vigne alla salita della Cercola; inter segetes alla Cavieella sotto alla selva dell' Ulicella; at videtur cultum olim, sed nunc sponte provenit, quamvis adhuc satis rarum.*

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Cogliandro*.

Herba glabra, laete virens, odore cimicino nauseoso redolens: umbellae terminales: flores albi, radiantes: semina aromatica.

39. ARALIACEAE. Juss.

180. HEDERA.

Swartz. fl. ind. occ. p. 518 — Dec. pr. 4. p. 261.

1. H. HELIX. *Lin. sp. pl. 292 — Ten. fl. nap. 1. p. 105 — Bertol. fl. ital. 2. p. 685.*

IC. Duham. arb. ed. nov. v. 3. t. 84 — Hedera. Dod. pempt. 413. f. 1. — Lobel. ic. 614.

Ad muros, et ad rupes.

Septembri, Octobri. ☿

Vulgo *Edera*.

Pedunculi pubescentes: calycis dentes minimi, triangulares, fusei: petala et stamina non virentia, uti ex Koch, sed luteola uti germen, quod demum virescens, et punctis scabrum: petala cito revoluta, facie interiore transverse plicata vel corrugata: antherae profunde sulcatae: stylus conicus, albidus.

40. CORNEAE. Dec.

181. CORNUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 194.

1. C. SANGUINEA. *Lin. sp. pl. 171 — Ten. fl. nap. 3. p. 161 — Bertol. fl. ital. 2. p. 196.*

IC. Lam. ill. gen. t. 74. f. 2 — Virga sanguinea. Dod. pempt. 782.

In fructetis; Ischia all' Arso nel boschetto de' sig. Meglio.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Sanguiniello*.

Frutex ramosissimus: folia decidua: cymae pedunculatae: petala alba, angusta lanceolata, patentissima: fructus maturi nigri.

41. CAPRIFOLIACEAE. Rich.

182. SAMBUCUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 506.

1. *S. NIGRA*. *Lin. sp. pl. 383* — *Ten. fl. nap. 1. p. 136* — *Bertol. fl. ital. 3. p. 488.*

Ic. Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 55 — *Sambucus. Dod. pempt. 845.*

Ad sepes, vel in silvaticis; Falanghe presso i fossi della neve, siepi delle Chianole del Testaccio, di Campagnano, dello Schiapparo, del Vata-liere, del Castello sopra Ischia.

Aprili, Majo. ♀

Vulgo Saruco.

2. *S. EBULUS*. *Lin. sp. pl. 383* — *Ten. fl. nap. 1. p. 136* — *Bertol. fl. ital. 3. p. 486.*

Ic. Fl. dan. 1156 — *Ebulus. Dod. pempt. 381.*

Ad agrorum margines in humentibus; Chianole del Testaccio, ubi solum vidi.

Julio, Augusto. ♀

Cymae rami superne sulcati, ad divisiones interne pubescentes: flores candidi, odori: corollae tubus brevissimus, calycem non excedens; limbi laciniis oblongis, patentibus, apice subsaeatis et mucronulatis: stamina et pistillum candida, crassa, invicem approximata, apice parum recurva, ideoque subdivaricata; antheris roseis, inde rufescentibus: herba ingratum, et viosum odorem spargit.

183. VIBURNUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 503.

1. *V. TINUS*. *Lin. sp. pl. 283* — *Ten. fl. nap. 1. p. 135* — *Bertol. fl. ital. 3. p. 481.*

a. hirtum; foliis ovali-oblongis, subtus margineque hirtis.

Ic. Duham. arb. ed. 2. v. 2. t. 37 — *Tinus, sive Laurus sylvestris 1. 11. et 111. Clus. hist. 1. p. 49.*

In fruticetis apricis; fruticeti del Castiglione, del Rotaro, selve del Carusiello, della cava di Bruomonte, di Buceto, e di Cerambi, siepi di Fontana e di Calimera.

Martio, Aprili. ♀

Frutex sempervirens: flores albi, odori: bacca 1-locularis, immatura va-

dua, exsucca, calyce persistente, et stylo pyramidato-conico brevissimo coronata, atrocoerulea.

184. LONICERA.

Desf. atl. 1. p. 183 — Dec. pr. 4. p. 330.

1. *L. IMPLEXA*. *Ait. H. Kew. ed. 2. v. 1. p. 378 — Bertol. fl. ital. 3. p. 559.*

b. balearica; foliis inferioribus subcordatis connatis obovatis. *Dec. pr. 4. p. 331 — L. balearica. Ten. fl. nap. 3. p. 213.*

1c. Sims. bot. mag. t. 640, ex Moris.

In fruticetis, ad sepes, et ad rupes ubique, etiam ai *scogli di S. Anna*, presso *Ischia*.

Majo, Junio. ☿

Vulgo *Rocchiella*.

Frutex sempervirens: folia coriacea, subtus glaucescentia: flores amoene rosei, grate odori, sat raro in umbrosis corollarum tubus albidus, limbus vere pallide roseus: genitalia extra tubum exerta, tamen limbo corollino breviora: stylus pubescens: germen glandulosum: baccae globosae, fere Pisi magnitudine, coccineae, aë glaberrimae.

42. RUBIACEAE. *Juss.*

185. SHERARDIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 156.

1. *S. ARVENSIS*. *Lin. sp. pl. 149 — Ten. fl. nap. 3. p. 128 — Bertol. fl. ital. 2. p. 72.*

1c. Lam. ill. gen. t. 61 — Asperula flore carneo, acuto. Barr. ic. 541. f. 1.

Ad muros, ad vias, et in apricis herbosis ubique.

Martio, Majo. ☉

Caules decumbentes: folia glabra, nitide virentia, mucronulata: flores coerulei, parvi, terminales, fasciculati.

186. ASPERULA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 157.

1. *A. ARVENSIS*. *Lin. sp. pl. 190 — Ten. fl. nap. 1. p. 32 — Bertol. fl. ital. 2. p. 76.*

1c. *A. coerulea*. *Dod. pempt.* 355.

Inter segetes; seminati di monte Vetta, del Fasano, delle Falanghe, di Fontana, di Calimera, di Serrano, di Barano, di Pansa, del valone del Bubù sopra Casamicciola, della Guardiola del Testaccio.

Aprili, Majo. ☉

Erecta, glaberrima: folia superiora anguste lineari-lanceolata: flores terminales, fasciculati, amoene coerulei, a verticillo supremo foliorum superiorum involucrati, et superati; quae folia longe ciliata: fructus glabri.

2. *A. LAEVIGATA*. *Lin. mant. 1. p. 380* — *Ten. fl. nap. 5. p. 38* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 80*.

1c. *Rubia quadrifolia*, minor, semine duplici. *Moris. hist. 3. s. 9. t. 21. f. 4*. In silvaticis, et ad sepes umbrosas, praesertim in insulae plaga septentrionali.

Aprili, Majo. ☿

Glabra, ascendens: folia elliptica: panicula terminalis, trichotoma: flores albi, parvi: fructus glabri, punctato-sabri.

157. CRUCIANELLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 163.

1. *C. MONSPELIACA*. *Lin. sp. pl. 158* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 142* — *C. latifolia*. *Guss. syn. 1. p. 191* — *Ten. fl. nap. 3. p. 144*.

1c. *Sibth. fl. gr. t. 140* — *Rubia spicata*, cretica — *Clus. hist. 2. p. 177*.

In aridissimis asperis, et ad muros; Bagno sul muro a sinistra del principio della strada che sale alla Cercola, stufa del Cacciuto presso Casamicciola, nella parte bassa della cava di Cerambi, muri di Casamicciola, del Lacco, Chiajano sul cratere dell'Arso, e presso la punta del Lapillo, monte Vico scendendo a S. Montano, via della discesa della costa della Serra alle fumarole nella contrada del Bell' Omo sopra Forio.

Aprili, Majo. ☉

Spica tenuis, 2-8-pollicaris: bractea exterior margine albo-scarioso cincta, a medio ad apicem ciliata, uti duae interiores: corollae externe viridi-rubentes; lobi vero interne viridi-luteoli, submarginati, apice pennicillati; sub apice vero appendice luteola anguste lineari. longa instructi, ita ut obtusi videntur, et inappendiculati; tubo tenui, curvulo: semina fusca, obconica, apice truncata, leviuscula — Specimina *C. monspeliacae*, quae a Monspelio habui cum hac nostra ex asse quadrant, idoque recte cl. *Bertol.* l. c. hanc a *C. latifolia* diversam putat.

158. RUBIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 164.

1. *R. ANGUSTIFOLIA. Lin. mant. p. 39 — Ten. fl. nap. 4. p. 22.*

lc. Lam. ill. gen. t. 60. f. 2.

In apricis saxosis; Pietra dell'acqua sotto S. Nicola, Chianano nel cratere dell'Arso, costa della Scarupata a Succellaro.

Aprili, Junio. ♀

Vulgo Arova, una cum sequentibus.

Caules breves, vix 1 1/2 pedales: folia perennantia, anguste linearia, uti caules ad angulos scaberrima: corollarum lobi obtusiusculi, sed apiculati.

2. *R. PEREGRINA. Lin. sp. pl. 158 — Ten. fl. nap. 4. p. 22 — Bertol. fl. ital. 2. p. 147, excl. nonn. syn.*

lc. R. sylvestris, aspera. Moris. hist. 3. s. 9. t. 21. f. 2.

b. australis; foliis senis elliptico-lanceolatis perennantibus firmioribus brevioribusque.

Ad sepes, et in fruticetis passim; var. b. in sepibus mari finitimis.

Majo, Junio. ♀

Corollarum lobi longe apiculato-cuspidati: stamina semper quinque!, raro quatuor vel sex, et tunc totidem lobi corollini: var. b. sequentem quodammodo refert.

3. *R. BOCCONI. Pet. inst. bot. 2. p. 255 — Ten. fl. nap. 1. p. 39.*

R. caule basi suberoso!, foliis perennantibus quaternis ovalibus, supra nitidis margine carina caulinisque angulis scabris, corollae 4-5-fidae lobilis acutis (non apiculatis).

lc. Ten. l. c. t. 10 — R. minor, quadrifolia, atrovirens, saxatilis. Bocc. mus. t. 73 — Barr. ic. 547.

Ad rupes, ad maceries in demissis, nunquam in elatis; Casamicciola ad Mortito, e sopra i muri a secco, Lacco al monte Vico, e nella valle di Cavallaro sulla strada di Forio, Punta di Zale.

Aprili Junio. ♀

Caules et folia adulta saepius leves, ut in praecedente.

Cl. Bertol. in fl. ital. 2. p. 147, sub R. peregrina hanc et R. angustifoliam refert; tamen apud nos non variant, et específicos characteres constantes servant.

139. GALIUM.

Scop. carn. ed. 2. v. 2. p. 94 — Dec. pr. 4. p. 593.

1. *Floribus paniculatis, aut cymosis.*a. *Fructu glabro.*

1. *G. ELATUM. Thuil. fl. poris. ed. 2. v. 1. p. 76 — Jord. obs. fasc. 3. p. 103!*, ex ejus specimine.

lc. nulla.

Ad sepes, et in silvaticis humentibus passim, tam in elatis, quam in demissis.

Junio, Augusto. ☞

Planta glaberrima, ramosissima: flores parvi, albi: fructus minutissimi, nigricantes, leves, tamen tenue foveolati, foveolarum fundo albido — Confer pro G. mollugine. Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 22. f. 6, 7, 8.

2. *G. DIVARICATUM. Lam. dict. enc. 2. p. 580 — Ten. fl. nap. 3. p. 139 — G. parisiense, b. Bertol. fl. ital. 2. p. 135.*

lc. Dec. pl. gall. rar. t. 24 — G. album, minimum, spanospermum. Barr. ic. 57.

In aridis asperis passim; *Ischia all'Arso, colline del Bagno, Chiajano, Casamicciola, Lacco al monte Vico, Punta dell'Imperatore presso Forio, Punta di S. Angelo, Scarupata presso Succellaro, Guardiola del Testaccio.*

Aprili, Majo. ☉

Planta gracilis, obscure virens: folia anguste linearia: foliorum verticilli ascendendo remotiores: folia inferiora latiora, oblongo-elliptica, demum deflexa: pedunculi tenuissimi, elongati, divaricati, apice trifidi; pedicellis saepe deflexis: corollae minutissimae, sordide carneo-virentes; lobis ovatis, ellipticisque, apiculatis, supra convexiusculis: stylus semibifidus, stigmatibus duobus globosis: fructus globosi, tenue tuberculati.

b. *fructu hispido, aut villosa.*

3. *G. PARISENSE. Lin. sp. pl. 157 — Ten. fl. nap. 5. p. 327, et G. anglicum. v. 3. p. 137, ex ipso — Bertol. fl. ital. 2. p. 132, excl. var. b., et nonn. syn.*

G. caule ascendente vel diffuso intricate ramosissimo, foliis subsenis anguste linearibus mucronatis margine cauleque ad angulos retrorsum scaberrimis, pedunculis axillaribus 2-3-floris (subtrichotomis) elongato-divaricatis, corollis muticis, fructibus patenter hispidis.

1c. *Dec. pl. gall. rar. t. 26*—Aparine minima, flore a'bido. *Barr. ic. 58*.
In asperis aridissimis lapidosis; *Chiajano sulle lave dell'Arso, Bagno
nella collina presso al Lago, ed a sinistra della salita che conduce alla
Cercola, Fumarole nella contrada del Bell'omo sopra Forio, ec.*

Aprili, Majo. ☉

*Caules 6-14-pollicares; ramis saepe deflexis, valde intricatis: flores sorli-
de viridi-rubentes, minutissimi: corollarum lobi mutici: fructus non
granulati: habitus plantae junioris praecedentem refert.*

4. G. APARINE. *Lin. sp. pl. 157*—*Ten. fl. nap. 3. p. 142*—*Bertol. fl. ital. 2. p. 127*.

1c. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 23. f. D.*—*Bull. herb. t. 315*—*Aparine. Dod. pempt. 353*.

b. minus; caulibus brevibus non elongatis (vix pedalibus) gracilibus, foliis angustioribus (vix lin. latis).

Ad sepes in herbosis; var. b. in herbosis aridis lapidosis.

Aprili, Majo. ☉

Corollae albae; et in var. b. earum lobi ovati, ac fere mucronulati.

2. Pedunculis omnibus axillaribus subramosis.

5. G. TRICORNE. *With. britt. ed. 2. p. 153*—*Ten. fl. nap. 3. p. 140*—*Bertol. fl. ital. 2. p. 125*.

1c. Aparine semine levi. *Vaill. bot. paris. t. 4. f. 3. aa.*

*Inter segetes; seminati del piano de' Muori, del monte Vetta, di Fontana,
di Calimera, della Pietra dell'acqua, di Serrano, delle coste di S. Panerazio,
delle eave di Buceto, del Carusiello, e di Cerambi; etiam presso al Bagno, sed ibi rarum.*

Martio, Aprili. ☉

Planta undique scaberrima, vestibus adhaerens, uti praecedens: flores albi.

6. G. MURALE. *Dec. fl. fr. 4. p. 264, et pr. 4. p. 610*—*Ten. fl. nap. 3. p. 1111*—*Bertol. fl. ital. 2. p. 135*—*Callipeltis muralis. Moris fl. sard. 2. p. 309*—*Sberardia muralis. Lin. sp. pl. 149, excl. syn. Column.*

1c. *All. ped. t. 72. f. 1.*—*Galium minimum, seminibus oblongis. Burb. cent. 2. p. 31. t. 3. f. 2.*

b. hispidulum; caule foliisque hispido-canescens.

Ad muros, in lapidosis, et ad vias in ruderatis; var. b. *Ischia all'Arso.*

Martio, Aprili. ☉

Laete virens, glabriusculum, ramosissimum, decumbens: caules filiformes: folia margine ciliato-sabra, aristata; flores viriduli: fructus setis uncinatis hispidi, deflexi, demum nigrescentes.

160. VAILLANTIA.

Dec. fl. fr. 4. p. 266, et pr. 4. p. 613.

1. V. MURALIS. *Lin. sp. pl. 1490 — Ten. fl. nap. 3. p. 142 — Bertol. fl. ital. 2. p. 138.*

lc. *Sabb. hort. 3. t. 83 — Cruciatà romana, minima, muralis. Column. Ephr. 2. p. 237 — V. annua, quadrifolia, verticillata, floribus ex viridi-pallescentibus, fructu echinato. Mich. gen. p. 13. t. 7.*

In lapidosis, et in rudertis apricis; *Iachia all' Arso.*

Martio, Majo. ☉

Planta laete virens: caules glabriusculi, 2-5-pollicares; ramis intricatis: folia glaberrima, patentia, vel reflexa, sub lente punctata, obovata, obtusa; superiora proximiora, 1-2 lin. lata ac longa, internodiis longiora vel breviora: pedunculis brevissimi, trifidi ac triflori, in fructu inerrassati: flores parvi, pallide albido-virentes; corollae lobis acutis: fructus albidus, 4-cornes; cornu dorsali apice fimbriato.

43. VALERIANEAE. *Dec.*

161. VALERIANELLA.

Moench. meth. 486 — Dec. pr. 4. p. 625.

1. V. ERIOCARPA. *Desv. Journ. de bot. 2. p. 334 — Fedia eriocarpa. Ten. fl. nap. 3. p. 33 — Bertol. fl. ital. 3. p. 186.*

lc. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 24. f. E. — Reich. cent. 1. f. 132 — Desv. l. c. t. 33 — Loisel. not. t. 3. f. 2, et fl. gall. ed. 2. t. 23.*

In collibus herbosis, et inter segetes passim.

Aprili, Majo. ☉

Flores coerulei, densi: fructus ovati, hispidi, obsolete costati, umbilicati; corona campanulata, oblique truncata, 6-dentata: bracteae ciliato-serratae.

2. V. MORISONII. *Dec. pr. 4. p. 627 — Fedia Morisonii. Ten. fl. nap. 5. p. 335.*

b. *lasiocarpa; fructibus villosis.*

lc. *Fedia dentata, d. dasycarpa. Reich. cent. 1. f. 127.*

In apricis collibus; *Bagno a S. Alessandro, Casamiociola alle stufe del Cacciuto, seminati presso la via di Catauro, del Vataliere, delle Chianole del Testaccio, di Chiajano, del monte Vetta, della valle di Canniani, della costa di Succellaro, e di S. Pancrazio.*

Aprili, Majo. ☉

Flores coerulci, laxiusculi : *fructus* ovato-conici, obsolete costati, umbilicati ; *corona* angustissima, oblique truncata, acute denticulata : *bractee* ciliatae.

3. V. AURICULA. *Dec. fl. fr. supp. p. 492, et pr. 4. p. 627* — Fedia dentata. *Bertol. fl. ital. 3. p. 389.*

1c. Fodia auricula. *Reich. cent. 1. f. 128, 129.*

Inter segetes in elatis ; *seminati del monte Vetta ed alle Petrelle, in quelli del piano de' Muori.*

Aprili, Majo. ☉

Flores coerulei, laxiusculi : *fructus* subgloboso-ovati, obsolete 5-costati, non umbilicati, non sulcati ; *corona* angustissima, oblique truncata, denticulata ; dente unico lanceolato, latiori : *bractee* ciliatae.

162. CENTRANTHUS.

Dec. fl. fr. 4. p. 238, et pr. 4. p. 633.

1. C. RUBER. *Dec. l. c. p. 239, et pr. l. c. p. 632* — Valeriana rubra. *Lin. sp. pl. 44* — *Ten. fl. nap. 3. p. 29* — *Bertol. fl. ital. 3. p. 363.*

1c. *Lam. ill. t. 24. f. 2* — Valeriana rubra. *Dod. pempt. 350.*

b. albiflorus ; floribus albis. *Ten. l. c. var. e.*

bb. foliis lanceolatis.

c. verticillatus ; foliis ternis verticillatis, lato ovato-lanceolatis.

Ad muros, et ad rupes a montis Epomaei summitate ad litus, tamen var.

b. magis rara ; monte S. Nicola, eava di Bueto, muri a secco di Chiajano presso l'aquedotto, Castiglione, Casamicciola al Rostinale, Lacco superiore : var. bb. Casamicciola alla discesa dal Rostinale, monte S. Nicola presso alla Chiesa ; var. c. rarissima ; muri a secco di Chiajano presso all'aquedotto.

Aprili, Octobri. ☿, et basi fere ♀

Vulgo Cannocchiara.

Radices inter murorum fissuras alte descendentes : *folia* radicalia ac caulina media integerrima, petiolata, vel in petiolum attenuata, ovato-lanceolata ; superiora sessilia, subconnata, basi irregulariter dentato-crenata, magis acuminata : *bractee* ex ovata basi lanceolatae, acutae, ovarium aequantes : *flores* in a., et in c. rubentes : *calcar* tubo corollino parum brevius, sed ovario duplo fere longius : *pappus* albidus — Tota planta siccata, et cum ramis teneris folisque Vitium commixta a jumentis expetitur.

2. C. CALCITRATUS. *Dec. pr. 4. p. 632* — Valeriana Calcitrapa. *Lin. sp. pl. 44* — *Ten. fl. nap. 3. p. 29* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 165.*

1c. *Valeriana Calcitrapra*. *Sibth. fl. gr. t. 30* — *Valeriana annua*, sive *nestiva*. *Clus. hist. 2. p. 54*.

Ad muros, et in lapidosis, vel arenosis herbosis etiam mari proximis.

Martio, Majo. ☉

Glaberrima, tenera, laete virens: *folia superiora pinnatifida: flores terminales, corymbosi, rosei, parvi*— Variat *caule vix palmari ac simplicissimo, vel 2-pedali et brachiato-ramoso, tamen semper erecto*.

163. VALERIANA.

Nck. elem. 1. p. 123 — *Dec. pr. 4. p. 632*.

1. *V. OFFICINALIS*. *Lin. sp. pl. 45* — *Ten. fl. nap. 3. p. 30* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 167*.

1c. *Fl. dan. 570* — *Dod. pempt. 349* — *Fuchs. hist. 857*.

In silvis elatis, vel demissis boream spectantibus; *selve di Catreea, delle Falanghe, del Fasano, del cavone del Vataliere, di Campagnano, ubi potius rara*.

Aprili, Majo. ☉

Glabra, elata: *caules sulcati: folia impari-pinnata: flores terminales, corymbosi, albi*.

44. DIPSACEAE. *Dec.*

164. DIPSACUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 148.

1. *D. SYLVESTRIS*. *Mill. dict. n. 2* — *Ten. fl. nap. 3. p. 118* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 14* — *D. fullonum, a. Lin. sp. pl. 140*.

1c. *Jaeq. austr. 5. t. 402* — *D. sylvestris. Dod. pempt. 735*.

In argillosis cultis, aut silvaticis; *monte Vetta alle Petrelle, Fontana, alle Falanghe ed al Fasano, Panza, Luceo, Casamicciola, Crovone, Vataliere*.

Majo, Junio. ♂

Flores coerulecentes: receptaculi paleae flexiles, rectae, cuspidatae, corolla longiores.

165. SCABIOSA.

Roem. et Schult. s. veg. 3. p. 2.

1. *S. GRANDIFLORA*. *Scop. del. fl. Ins. 3. p. 29* — *S. maritima. Bertol. fl.*

ital. 2. p. 54, ac *Moris fl. sard.* 2. p. 327, an et *Linna.*, et excl. *syn.*
— *S. ambigua*, a. *Ten. fl. nap.* 3. p. 126.

lc. *Ten. l. e. t.* 209. f. 1 — *Scop. l. e. t.* 14 — *S. acutiflora. Reich.*
cent. 4. f. 506.

b. *albiflora*; floribus albis, eoncoloribus.

c. *canescens*; caule inferne et foliis radicalibus villosis-canescensibus.

d. *prolifera*; *S. ambigua*, e. *Ten. l. e.*

In collibus, in campis, in lapidosis, in rupestribus, etiamque in arenosis
herbosis maritimis: var. b. in maritimis; var. c. in rupestribus mari-
timis; var. d. *Guardiola del Testaccio* in herbosis.

Junio, Augusto. ☞

Erecta, et folia glaberrima, excepta var. c.: pedunculi elongati: flores
coerulescentes, radiantes: pappus 5-setosus, stipitatus; calyculi margi-
ne non explanato, sed inflexo — Species in maritimis totius Regni
vulgatissima, et synonymis plurimis vexata, vel cum aliis speciebus confu-
sa. Sic Cl. *Webb.* in *Phyt. can.* v. 3. pars 2. sect. 2. p. 199, ad
S. maritima adducit *S. Cupani*, *S. grandifloram*, *S. atropurpuream*,
ac *S. Columbariam*, a. et b. *Bertol.*

2. *S. URCEOLATA. Desf. atl.* 2. p. 122 — *S. rutaeifolia. Vahl symb.* 2. p.
26 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 128 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 63.

lc. *Coult. dips.* t. 2. f. 16 — *S. maritima*, *Rutae caninae folio. Boec.*
sic. p. 74. t. 40, et p. 95. t. 52 — *S. maritima*, *Rutaeifolia. Barr.*
ic. 245.

In arenosis maritimis; *ulla marinella del Dagno fra il Lago ed il Ma-*
re, e nelle arene della marina dell'Arso, sed nunc rarissima, et fere
destructa.

Junio, Julio. ☞

Glaberrima: folia crassiuscula, caulina pinnata: pedunculi elongati: in-
voluceri urceolati foliola usque ad medium coalita: flores albi.

Pro iconibus *Boec.* et *Barr.* confer quae adnotavi in *syn.* 1. p. 175.

43. COMPOSITAE. *Lin.*

166. EUPATORIUM.

Dec. pr. 5. p. 141.

1. *E. CANNABINUM. Lin. sp. pl.* 1173 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 207 — *Ber-*
tol. fl. ital. 9. p. 84.

lc. *Fl. dan.* 795 — *Eupatorium adulterinum. Fuchs. hist.* 265.

In humentibus silvaticis, et ad sepes vel ad muros.

Julio, Augusto. ☞

Vulgo *Cannava selvaggia*.

Flores rosei, anthodio longiores: pappus corollis aequilongus: semina glandulis pellucidis tecta.

167. TUSSILAGO.

Dec. pr. 5. p. 208.

1. T. FARFARA. *Lin. sp. pl.* 1714 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 231 — *Bertol. fl. ital.* 9. p. 203.

lc. *Bull. herb.* 1. 329 — *Tussilago. Fuchs. hist.* 140.

b. *australis*; ligulis anthodium duplo excedentibus.

In argillosis humentibus; monte Vetta alle Petrelle, sorgenti di Bucceto, e nella sottoposta vallata fino a Casamicciola, vigne del Mortito, Laeco nel vallone del Larito, salita di monte Verza, ec. sola var. b.

Februario, Martio. 2

Vulgo *Paparucchio*, e *Zotta di vuoi*, et decocto foliorum hujus plantae in tussi incolae utuntur.

In speciminibus Europae borealis et mediae, *ligulae* angustiores, anthodium vix excedentes; hujus foliola obtusa: in nostra ista acuta sunt, et ligulis fere duplo breviora; praeterea scapi *squamae* apice patentes, non vero adpressae.

168. ASTER.

Dec. pr. 5. p. 226.

1. A. TRIPOLIUM. *Lin. sp. pl.* 1226 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 228 — *Bertol. fl. ital.* 9. p. 253.

lc. *Fl. dan.* 615 — *Tripolium. Dod. pempt.* 379.

b. *australis*; clatus, foliis membranaceis oblongo-lanceolatis. *Ten. l. c.*

In salsis humentibus mari finitimis sola var. b.; *Ischia nell' Orto della Mandria, Bagno presso al Lago, e negli orti alla foce.*

Septembri, Octobri. 2

Planta glaberrima: flores corymbosi, in disco lutei, in radio coerulei: semina adpresse pilosa.

169. ERIGERON.

1. E. CANADENSE. *Lin. sp. pl.* 1210 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 225 — *Bertol. fl. ital.* 9. p. 184.

lc. *Fl. dan.* 292 — *Conyza canadensis*, annua, acris, alba, *Linariae* foliis. *Boec. sic. p.* 85. 4. 46.

In cultis, et ad vias ubique,

Augusto, Septembri. ☉

Folia confricata gratum odorem spirant: *flores* paniculato-pyramidati, al-
bidi: *anthodia* parva, numerosa: *semina* glabra, levia.

170. BELLIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1300.

1. *B. PERENNIS.* *Lin. sp. pl. 1248* — *Ten. fl. nap. 5. p. 233.*

1c. *Lam. ill. t. 677* — *B. sylvestris. Dod. pempt. 265.*

In pratis humentibus elatis; *fra S. Nicola e Fontana.*

Februario, Aprili. ☼

Acaulis, glaberrima: *folia* obscure virentia: *semina* ut in sequente.

2. *B. HYBRIDA.* *Ten. fl. nap. 5. p. 233.*

B. radice fibrosa, caulibus ascendentibus diffusisque ramosis foliosis, fo-
liis obovato-spathulatis erenato-dentatis villosulo-hirsutiuseculis, anthodii
foliolis ciliato-hirsutis obtusiusculis.

1c. *Ten. l. c. t. 194. f. 2.*

b. *micrantha*; caulibus breviter ramosis, foliis tenuioribus parvis, flori-
bus minoribus.

In pascuis herbosis, et ad vias praesertim in humentibus ubique: var.

b. *Ischia alla salita della strada della Pozzolana presso al muro a si-
nistra, e nella via di Cavallaro fra il Lacco e Forio.*

Februario, Martio. ☉, et ☼

In var. b., quae aliquando acaulis, caespites glabri, obscure virentes:
folia obovato-sinuato-dentata, glabrata: *flores* parvi, et fere dimidio mi-
nores: *anthodium* sub anthesi hemisphaericum; foliolis in medio pli-
catis, et inde horizontaliter patentibus, omnibus obtusis, non duplici
sed simplici ordine: *ligulae* tenues, oblongo-lineares, obtusae, vix
4-dentatae: *receptaculum* conicum, glabrum, leve: *semina* compresso-
plana, obovato-oblonga, obtusa, albida, ad facies puberula.

B. annua, quae in pascuis maritimis prope Neapolim ubique provenit, in hac
insula desideratur.

171. SOLIDAGO

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1292.

1. *S. VIRGAUREA.* *Lin. sp. pl. 1235* — *Ten. fl. nap. 5. p. 228.*

b. *latifolia*: caule flexuoso apice ramoso et pubescente, foliis ovatis elli-
pticis et lanceolatis serratis glabris, supremis integris, racemorum

pedunculis puberulis erectis paniculatis. Koch *syn. ed. 2. p. 390*, et *Moris fl. sard. 2. p. 355*.

lc. Virga aurea vulgaris, latifolia. *Dauh. hist. 2. p. 1062?*

In silvis, et ad sepes in umbrosis elatis, aut demissis ubique.

Septembri, Octobri. ☞

Folia lacte virentia, petiolata: flores aurei: pedicelli pubescentes uti *anthodii* foliola, ac semina, bracteolis plurimis instructi.

172. CONYZA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1286.

1. C. AMBIGUA. *Dec. fl. fr. supp. p. 468*, et *pr. 5. p. 381*—*Ten. fl. nap. 5. p. 224*—*Erigeron bonariense. Ten. fl. nap. pr. p. XLIX.*—*E. linifolium. Willd. sp. pl. 3. p. 1955*—*E. ambiguus. Schulz (Bip.) in Webb. phyt. can. v. 3. pars 2. sect. 3. p. 208*—*Dimorphanthus ambigua. Moris fl. sard. 2. p. 372.* *

lc. nulla.

In cultis, et ad vias passim.

Majo, Augusto. ☉

Planta undique hirsuta: folia inferiora rosulata, obovato-lanceolata, reliqua anguste linearia: flores racemosi, in disco flavidi, in radio ex albido-purpurei: semina sparse pilosa, aut scabra—Cl. *Schultz, et Dec. l. c. sub hac specie male referunt E. canadense Ten. pr. ex syll. p. 428*, et plurium auctorum; siquidem in *Ten. l. c.* non *E. canadense*, sed *E. linifolium Willd.*, et *E. bonariense. Ten. pr. l. c.* uti synonyma citantur, quod equidem recte!

2. C. SAXATILIS. *Lin. sp. pl. 1205*—*Ten. fl. nap. 3. p. 212*—*Bertol. fl. ital. 9. p. 179*—*Phagnalon saxatile. Dec. pr. 5. p. 396.*

b. *Bocconi*; anthodii foliolis apice squarrosos-recurvis margine undulatis, a medio ad apicem fusco-rubro-scariosis, intimis rectis non undulatis corollulas tubulosas filiformes aequantibus, foliis integris subundulatis. *Guss. syn. 2. p. 499.*

lc. *Helichrysum saxatile*, singulari capitulo, amplo angusto *Stoechadis* folio. *Doec. mus. p. 142. t. 104*, et *H. sylvestri* similis tota viridis. *Doec. l. t. p. 145, t. 109.*

In saxosis, et ad muros sola var. b.; sopra gli muri di Casamicciola inferiore, del Lacco, di Forio, e di Panza.

Martio, Majo. ☽

Caulis caespitosus, frutescentes: folia lineari-lanceolata, margine revoluta, saepius recurvo-arcuata: flores longe pedunculati, lutescentes: semina obconica, subcompressa, hirsutiuscula.

Phagnalon graecum. *Boiss. et Heldr.*, quod est *P. saxatile b. intermedium*. *Dec. pr. 5. p. 396* ex parte ad hanc spectat.

173. INULA.

Gaertn. de fruct. 2. p. 449 — Dec. pr. 5. p. 463.

1. 1. *CONYZA*. *Dec. pr. 5. p. 464* — *Conyza squarrosa*. *Lin. sp. pl. 1205* — *Ten. fl. nap. 3. p. 209* — *Bertol. fl. ital. 9. p. 175.*

lc. *Lam. ill. t. 697. f. 1* — *Conyza major*, vulgaris. *Zannich. hist. p. 75. t. 245.*

In silvaticis, et ad sepes ubique.

Junio, Julio. ♀, et ♂

Planta undique pubescenti-pilosa, odoris nonnihil ingrati: *flores* corymbosi, lutei: *semina* striata, sparse pilosa.

2. 1. *SALICINA*. *Lin. sp. pl. 1238* — *Ten. fl. nap. 2. p. 227.*

lc. *Fl. dan. 786* — *Aster austriacus* IV. *Clus. hist. 2. p. 15.*

In silvaticis montosis; *selve delle Falanghe, e dell' Ulicella, di Catreca, e del monte Vezza.*

Julio, Augusto. ♀

Folia coriacea, nitida, oblongo-lanceolata: *flores* subcorymbosi; *anthodii* foliolis extimis apice foliaceo-appendiculatis: *semina* striata, glabra.

3. 1. *VISCOSA*. *Ait. H. Kew. ed. 1. v. 3. p. 233* — *Ten. fl. nap. 2. p. 227* — *Erigeron viscosum*. *Lin. sp. pl. 1209* — *Cupularia viscosa*. *Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 181*, et *Bertol. fl. ital. 9. p. 197.*

lc. *Brot. fl. lusit. 2. t. 164* — *Conyza major*. *Dod. pempt. 51* — *Conyza capitata*, seu *globosa*. *Boec. sic. p. 14. t. 7.*

Ad muros, ad rupes, ad sepes, et in silvaticis ubique.

Septembri, Octobri. ♂

Vulgo *Prutecca*.

Planta undique piloso-viscosa, ac graveolens: *folia* oblongo-lanceolata, serrata: *flores* racemoso-paniculati: *semina* pilosa, non striata.

4. 1. *GRAVEOLENS*. *Desf. cat. H. Paris. ed. 2. p. 121* — *Dec. pr. 5. p. 468* — *Erigeron graveolens*. *Lin. sp. pl. 1210* — *Ten. fl. nap. 5. p. 225*

— *Cupularia graveolens*. *Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 180*, et *Bertol. in fl. ital. 9. p. 195.*

lc. *Conyza minor*, vera. *Lobel. ic. 346.*

b. *Barrelieri*; foliis latioribus denticulatis, floribus majoribus sessilibus in racemis brevibus paucifloris dispositis. *Ten. l. c.*

lc. *Conyza minor*, vera. *Barr. ic. 370.*

Ad vias, et in humentibus herbosis maritimis; var. b. minus obvia, et vix distinguenda.

Augusto, Septembri. ☉

Planta viscosa ac gravcolens, uti praecedens: folia anguste lanceolata, subdenticulata, demum deflexa: anthodii foliola anguste linearia, apice non dilatata: flores inter alias species hujus insulae admodum minores, racemosi: semina pilosa, non striata.

174. PULICARIA.

Dec. pr. 5. p. 477.

1. P. DYSENTERICA. *Gaertn. de fruct. 2. p. 460 — Dec. pr. 5. p. 479 — Inula dysenterica. Lin. sp. pl. 1237 — Ten. fl. nap. 2. p. 226.*
 Ic. *Fl. dan. 410 — Conyza media. Dod. pempt. 52 — Calaminthae tertium genus. Fuchs. hist. 436.*
 In humentibus silvaticis, in cultis, et ad vias ad fossorum margines.
 Julio, Septembri. ☞
Caules pubescenti-lanati: folia sessilia, oblongo-lanceolata, subtus tomentosa: flores lutei, corymbosi: semina birsutiuscula — In specimenibus Europae mediae, habitus robustior; folia latiora; flores majores.
2. P. ODORA. *Riech. fl. germ. 1. p. 279 — Inula odora. Lin. sp. pl. 1236 — Ten. fl. nap. 2. p. 226.*
 Ic. *Asteris altera species, apula. Column. Ecphr. 1. p. 251 — Baccharis minor, italica, flore Asteris lateo. Barr. ic. 1145.*
 Ad muros, in collibus herbosis, et in silvaticis apricis ubique, nec non ai *Scogli di S. Anna presso Ischia.*
 Majo, Junio. ☞
 Vulgo *Coda di pecora.*
Herba plus minus dense pilosa-pubescentis: folia inferiora 3-4-plo latiora, subtus villosa-lanata, oblonga: flores corymbosi, praecedentis duplo majores, aurci: semina pilosiuscula.

175. PALLENIS.

Cass. dict. v. 37. p. 275 — Dec. pr. 5. p. 487.

1. P. SPINOSA. *Dec. l. c. — Bupthalmum spinosum. Lin. sp. pl. 1274 — Ten. fl. nap. 2. p. 255.*
 Ic. *Blackw. herb. 1. 272 — Aster legitimus, alter, sive spinosus, luteus. Barr. ic. 551.*
 In collibus lapidosis, et ad muros in apricis.
 Junio, Julio. ☞
 Variat *foliis inferioribus villosa-lanatis, et anthodii foliolis subulatis, aut subinermibus; floribus pallidioribus: semina pilosiuscula.*

176. MARUTA.

Moris fl. sard. 2. p. 413.

1. M. MIXTA. *Moris l. c. p. 416*—*Anthemis mixta. Lin. sp. pl. 1260* —
Ormenis mixta. *Cassin. in Dec. pr. 6. p. 18.*

1c. *Anthemis maritima*, lanuginosa, annua, foliis crispis, Pyrethri sapore, semiflosculis albis, circa discum luteis. *Mich. gen. 32. t. 30. f. 1.*
In herbosis arenosis maritimis, et ad vias in apricis.

Junio, Septembri. ☉

Planta pubescens, parum odora: flores longe pedunculati, sparsi; ligulis albis, basi flavescens: semina obsolete striata, obovata, compressiuscula, glabra.

2. M. COTULA. *Moris l. c. p. 414* — *Dec. pr. 6. p. 13* — *Anthemis Cotula. Lin. sp. pl. 1261* — *Ten. fl. nap. 2. p. 227.*

1c. *Fl. dan. 1179* — *Chamaemelum foetidum, sive Cotula foetida. Bauh. hist. 3. p. 120.*

b. caule ramisque surrectis, foliorum laciniis elongatis virentibus rachide subapproximatis, pedunculis elongatis, corollularum tubo seminibusque saepe glandulosis — *A. psorosperma. Ten. fl. nap. 5. p. 235.*

In cultis inter segetes; *seminati del Crovone, di Catauro, delle Chianole del Testaccio*, sola var. b.

Majo, Junio. ☉

Planta glaberrima, ingrati odoris: flores corymbosi; in radio albi: semina obovata, teretia, 10-costata, glabra — Pro varietate b. confer *syn. 2. p. 871.*

177. ANTHEMIS.

Moris fl. sard. 2. p. 410.

1. A. INCRASSATA. *Loisel. not. p. 179, et fl. gal. ed. 2. p. 256.*—*Dec. pr. 6. p. 6*—*A. arvensis. Ten. fl. nap. 2. p. 248, et Moris fl. sard. 2. p. 410, non Lin.*

1c. *Chamaemelum foetidum, marinum. Bauh. hist. 3. p. 121.*

In arvis, ad vias ubique, et nihil communius.

Martio, Julio. ☉

Planta plus minus pubescens, erecta, aut procumbens: pedunculi demum incrassati, fistulosi: flores in radio albi: semina tetragona, sulcata, adulta suberoso-incrassata, et margine calloso rugoso-crenato coronata, uti optime monet cl. Moris l. c. — Confer pro hac specie, quae dixi in syn. 2. p. 491, 866, et 870.

2. A. MARITIMA. *Lin. sp. pl.* 1259 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 343.
 Ic. *Till. hort. pis. t.* 19. f. 3, mala — *Chamaemelum maritimum*.
Bauh. hist. 3. p. 122.
 In arenosis maritimis; *Forio a Citarà, ed a Montevergine, Lacco a S. Montano*, sed rara.
 Junio, Augusto. ♀
Planta glaberrima: *folia* crassiuscula, subtus punctata: *flores* in radio albi: *semina* tetragona, sulcata, verruculosa, glabra.

178. ACHILLEA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1513.

1. A. LIGUSTICA. *All. ped.* 1. p. 181 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 352.
 Ic. *All. l. c. t.* 53. f. 3 — *Tanacetum album, tenuifolium, flore candido*. *Bocc. mus. p.* 33. t. 25.
 In silvaticis, ad muros, et ad sepes ubique.
 Junio, Julio. ♀
Planta pubescens, grata odora: *anthodii* foliola exteriora nervo valido elevato carinata, ac saepius glandulis aureis conspersa: *flores* albi, corymbosi: *semina* oblongo-cuneata, compressa, glabra, viridula.

179. DIOTIS.

Desf. atl. 2. p. 361 — *Dec. pr.* 6. p. 34.

1. D. CANDIDISSIMA. *Desf. l. c.* — *Bertol. fl. ital.* 9. p. 96 — *Athanasia maritima*. *Lin. sp. pl.* 1182 — *Santolina maritima*. *Willd. sp. pl.* 3. p. 1799 — *Othanthus maritimus*. *Spr. s. veg.* 3. p. 456 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 204.
 Ic. *Gnaphalium legitimum*. *Gaertn. de fruct.* 2. p. 381. t. 163 — *Clus. hist.* 1. p. 329.
 In arenosis maritimis; *Iscchia nella marina dell'Arso, marinella del Bagno, Lacco a S. Montano, Forio a Montevergine ed a Citarà*.
 Majo, Junio. ♀
Herba fragrantissima, et undique tomento candido tecta: *flores* lutei, subcorymbosi: *semina* oblonga, subtetragona.

180. MATRICARIA.

Liu. gen. pl. ed. Schreb. n. 1308.

1. *M. CHAMOMILLA. Lin. sp. pl. 1256—Ten. fl. nap. 2. p. 239—Schultz (Bip.) de Tanac. p. 24!*, et *Vis. oss. sopra alc. spec. di Matricaria p. 10!*

lc. *Curtis Lond. 5. t. 63—Chamaemelum vulgare. Dod. pempt. 257—C. leucanthemum. Fuchs. hist. p. 13, optima.*

In apricis herbosis; *Bagno negli Orti pressa al Lago, Lacco al monte Vica, Casamicciola, Forio, Punta di S. Angelo.*

Aprili, Majo. ☉

Caulis apud nos erecti; ramis infimis aliquando ascendentibus: *flosculorum* tubus teres, non angulatus: *semina* radii plerumque pappo dimidiato scarioso fere auriculæformi coronata; omnia albida curvula, striata; sed striis lateralibus resinosis destituta, uti notat *Schultz l. c.*; dum ex ipso in *M. suarcolenti Smith et Dec. flosculorum* tubus utrinque alatus, et semina in dorso striis resinosis percursa sunt. Tamen *Cl. Vis. in fl. dalm. 2. p. 84*, et in *l. c.* has duas species inter se non differre putat. Confer quoque *syn. 2. p. 485.*

181. CHRYSANTHEMUM.

Dec. pr. 6. pr. 63.

1. *C. SEGETUM. Lin. sp. pl. 1254—Ten. fl. nap. 2. p. 234—Xanthophthalmum segetum, a. vulgare. Schultz (Bip.) de Tanac. p. 17.*

lc. *Fl. dan. 955—C. segetum. Clus. hist. 1. p. 334.*

In arvis cultis passim.

Aprili, Majo. ☉

Glaberrimum, glaucescens: *folia* apice dilatata, serrato-dentata: *anthodii* foliola ad apicem late scariosa, obtusa: *flores* omnino lutei: *semina* levia, costata; in disco tereti-tetragona; in radio triquetra.

2. *C. CORONARIUM. Lin. sp. pl. 1254—Ten. fl. nap. 2. p. 253, var. a.*

lc. *C. ereticum. Clus. hist. 1. p. 335.*

In aridis apricis maritimis, vel in ruderalis; *Lacco salendo da S. Restituta al monte Vico, Forio a S. Francesco; sed rarum.*

Aprili, Majo. ☉

Glabrum, erectum: *flores* omnino lutei, corymbosi: *anthodii* foliola apice obtusa, et late scariosa: *semina* costata, glandulifera; in disco tereti-tetragona: in radio trigono-alata.

182. PYRETHRUM.

Gaertn. de fruct. 2. p. 430 — Dec. pr. 6. p. 53.

1. P. PARTHENIUM. *Smith britt. 3. p. 90 — Ten. fl. nap. 2. p. 237 — Matricaria Parthenium. Lin. sp. pl. 1255 — Tanacetum Parthenium. Schultz. (Bip.) de Tanac. p. 55.*

1c. *Matricaria Parthenium. Bull. herb. t. 203 — Matricaria. Dod. pempt. 35.*

Ad agrorum margines; a *Catauro presso le case*, sed videtur ex plantis culis propagatum.

Majo, Junio. ☼

Pubescens, grate olens: *folia* pellucido-punctata: *flores* corymbosi, in radio albi: *semina* tereti-tetragona, costata, saepe glandulis aureis conspersa, uti corollulae.

2. P. MYCONIS. *Moench. supp. p. 287 — Spr. s. v. 3. p. 587 — Dec. pr. 6. p. 61 — Chrysanthemum Myconis. Lin. sp. pl. 1254 — Ten. fl. nap. 2. p. 234.*

1c. *Jacq. observ. 4. p. 10. t. 94 — Chrysanthemum Myconis. Dalech. hist. 893.*

In apricis herbosis, et ad vaporaria.

Aprili, Majo; sed ad vaporaria Martio. ☉

Planta saepius glabra, inodora: *folia* spatulata, serrata: *flores* omnino aurei, corymbosi: *semina* in disco teretia, striata; in radio triquetro-compressa, sterilia, levia.

183. ARTEMISIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1281.

1. *Artemisia* ARBORESCENS. *Lin. sp. pl. 1188 — Ten. fl. nap. 5. p. 218 — Bertol. fl. ital. 9. p. 121.*

1c. *Sibth. fl. gr. t. 836 — Abrotanum foenina, arborescens. Dod. pempt. 21.*

Ad rupes, et in fruticetis saxosis, vel ad sepes.

Majo, Julio. ☽

Vulgo *Erva janca*.

Fruticosa, erecta, cinereo-sericea, ingrate olens: *flores* racemoso-paniculati, lutei: *anthodia* majuseula, nutantia, demum erecta; foliolis intimis late scariosis: *semina* obverse-pyramidata, glandulosa: *receptaculum* villosum — Saepe usu medio loco *Absynthii* usurpatur, sed ejus vires debiliores, quia vix amara.

2. *A. VARIABILIS*. *Ten. fl. nap. 3. p. 216* — *Bertol. fl. ital. 9. p. 119*.*a. virescens.*

A. frutescens caespitosa erecta glabra, foliis virentibus inferioribus bipinnatifidis, pinnis tripartitis, supremis trifidis, lacinis omnium lineari-filiformibus carnosulis semiteretibus, floribus racemoso-spicatis, racemis in paniculam pyramidalem vel lanceolatam dispositis, anthodii oblongi aut ovoidei obtuse angulati foliolis obtusiusculis margine scarioso, receptaculis glabris.

1c. *A. variabilis, a. neapolitana*. *Bess. in mem. de l'Acc. de S. Peters. v. 1. p. 466. t. 6* — *Absynthium marinum*, *Chamaemeli marini* folio. *Bon. t. 176*.

b. canescens; foliis infimis et in ramis junioribus dense villosis-incanis fere subsericeis, pilis adpressis brevissimis.

In collibus aridis, ad rupes, et ad maceries ubique ab elatis ad litus: var. *b.* in insula magis rara, et in arenosis occurrit.

Septembri, Octobri. ☞

Frutex dense caespitosus, fere pedalis; ramis vero annotinis 1-3-pedibus, paniculatis: foliorum laciniae supra obsolete sulcatae, sub lente punctis prominulis albidis conspersae videntur in *a.*; rudimentis fasciculatis ramorum in axillis: anthodia subsessilia, vel pedicello ipsa aequante suffulta, ovato-conica, aliquando subangulata; foliolis exterioribus ovatis, concavis, dorso gibbis, tenui margine albedo scarioso circumdatis; et uti folia punctis scabra; interioribus duplo longioribus, obtusis, etiamque marginatis: *flosculi masculi* 3-4, tubulosi, 5-dentati, scariosi: *stigmata*, in fl. foemineis 3-4, purpurascens; *germinis* nitido, glaberrimo.

181. HELICHRYSUM.

Dec. pr. G. p. 169.

1. *H. LITOREUM*. *Cuss. syn. 2. p. 468* — *Gnaphalium angustifolium*. *Lam. dict. enc. 2. p. 746* — *Ten. fl. nap. 5. p. 220* — *Moris fl. sard. 2. p. 384*, excl. var. *b.*, non *Dec.* — *Gnaphalium litoreum*. *Bertol. fl. ital. 9. p. 133*.

H. fruticosum caespitosum undique albo-adpresse-tomentosum, foliis imis lanceolatis, reliquis anguste linearibus obtusis, inferioribus confertis, superioribus remotis, corymbo composito plano denso, anthodii tubuloso-campanulati (parvi nitide aurei) foliolis obtusis, exterioribus sparse lanuginosis brevibus ovatis, intimis lineari-oblongis glanduliferis.

1c. *Chrysocome marina*, umbellata. *Barr. ic. 1125*.

A. montis Epomaei summitate ad litus in rupibus.

Majo, Junio. ☼

Vulgo *Jancolella*.

Caulis dense caespitosi, annotini 1/2-2 1/2 pedales: *folia* infima cito pereuntia exacte lanceolata, plana, obtusa, 2-3 lin. lata, fere rosulata: *flores* illis *H. italici* majores, sed duplo fere minores quam in *H. Stoechade*: *semina* teretiuscula, scabra — *H. scrotinum* Boiss. spec. exsicc. ex Hispania meridionali ad hoc spectare videntur — Pro reliquis differentis confer quae dixi in *syn. l. c.*

173. FILAGO.

Tourn. inst. t. 259 — Dec. pr. 6. p. 247.

1. **F. GERMANICA.** *Lin. sp. pl. 1311 — Bertol. fl. ital. 9. p. 157, excl. plur. syn. — Gnaphalium germanicum. Ten. fl. nap. 5. p. 172, excl. var. b.*
F. albo-lanata-canescens, caule erecto apice dichotomo, foliis lineari-lanceolatis acutis subundulatis, capitulis globosis sessilibus multifloris ad medium lanatis terminalibus et in dichotomia basi foliis 1-2 illa non excedentibus involueratis nudisque, anthodii cylindrici foliolis acuminato-cuspidatis, aristas rectiusculis glabris.
lc. Coss. et Germ. atl. fl. Paris t. 26. f. B — F. canescens. Jord. obs. fasc. 3. p. 203. t. 7. f. A! — Gnaphalium. Fuchs. hist. p. 222.
 In herbosis apricis, et in eultis: *Lacco, Forio*.
 Aprili, Majo. ☉
Capitula usque ad dimidium lana involuta, semper globosa: *anthodii* foliola, eorumque cuspides luteola: *folia* saepe margine revoluta: *caules* a basi ramosi; ramis surrectis aut ascendentibus: *tomentum* semper albidum, aut canescens.
2. **F. SPATHULATA.** *Presl del. prag. p. 99 — Jord. obs. fasc. 3. p. 198, 199 — F. pyramidata, b. spathulata. Guss. syn. 2. p. 461, et 884 — F. Jussiaei. Coss. et Germ. in ann. sc. nat. ser. 2. v. 20 p. 284 — F. germanica, b. spathulata. Korb syn. ed. 2. p. 338.*
F. albo-lanata, caule erecto superne dichotome divaricato, foliis oblongo-vel obovato-spathulatis obtusissimis, capitulis globoso-ovatis sessilibus multifloris terminalibus et in dichotomia a basi ad medium lanatis foliis 3-4 illa excedentibus involueratis, anthodii 5-angulato-pyramidati foliolis exterioribus longo mucronato-cuspidatis, cuspidibus demum divaricatis.
lc. Jord. l. c. t. 7. f. C — F. Jussiaei. Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 26. f. A.
b. vireascens; foliis viridi-lanatis — *F. pyramidata, a. Guss. syn. 2. p. 461.*
 In arenosis herbosis, et ad vias; *Bugno, Lacco, Forio, monte di Bura-*

no, *Guardiola del Testaccio*: var. *b. seminati di Monte Vetta, e di Fontana.*

Majo, Junio. ☉

Caules saepe ab ipsa basi divaricato-dichotomi: *folia* semper obtusissima, patentia, et latiora quam in praecedente: *capitula* non exacte globosa, versus apicem una cum cuspidibus (longioribus quam in antecedente) glabra et albo-luteola; intima aliquando nervo excurrente non cuspidata.

Hanc cum praecedente perperam confundit Cl. Bertol. in *fl. ital.* 9. p. 157; sunt equidem diversissimae!, nec una in alteram transit.

3. *F. GALLICA.* Lin. *sp. pl.* 1312—Bertol. *fl. ital.* 9. p. 163, excl. syn. *F. tenuifolia* Presl — *Guaphalium gallicum.* Ten. *fl. nap.* 5. p. 222, var. *a.*

F. albo-lanata, caule versus medium ramoso superne dichotomo, ramis surrectis, foliis angustissime linearibus acuminatis adpressis margine non revolutis, supremis bracteantibus capitula excedentibus, omnibus rectis, capitulis sessilibus paucifloris terminalibus et in dichotomia, anthodii angulati foliolis acutiusculis muticis carinatis arachnoideis.

lc. *Logfia gallica.* Cass. et Germ. *atl. fl. Paris t.* 26. f. E—*Guaphalium gallicum.* Smith *engl. bot. t.* 2369.

In collibus apricis, et in cultis arenosis passim.

Aprili, Junio. ☉

Caules basi simplices, versus medium ramis multis pyramidatis sub dichotomia instructi, 5-12-pollicares: *folia* recta, non recurva.

4. *F. TENUIFOLIA.* Presl *del. prag.* p. 101 — Cass. *syn.* 2. p. 462—*Filago gallica, b.* Ten. *fl. nap.* 5. p. 222.

F. sericeo-albo-lanata, caule erecto basi ramoso superne dichotomo, ramis ascendentibus sub dichotomia nullis, foliis anguste linearibus erecto patentibus, supremis bracteantibus recurvis capitula excedentibus, capitulis paucifloris sessilibus terminalibus et in dichotomia, anthodii angulati foliolis muticis obtusiusculis apice glabris, exterioribus carinatis arachnoideis.

lc. *nulla.*

In aridis una cum praecedente, sed haec in apricis siccis demissis magis obvia.

Martio, Majo. ☉

Caules ad summum 3-pollicares, ad medium simplices: *tomentum* magis adpressum ac sericeum quam in *F. gallica*: *semina* duplo fere minora, minusque cinerea — A praecedente non separat Cl. Bertol. l. c.

186. CINERARIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1294.

1. *C. BRUCOR.* Willd. *sp. pl.* 3. p. 2085 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 227.

lc. *nulla.*

In rupestribus elatis aut maritimis, ac ad muros.

Julio, Augusto. ☿

Frutex sempervirens, 2-4-pedalis: folia lyrato-pinnatifida, supra virentia, glabrata, subtus tomentoso-incana: flores lutei, paniculato-corymbosi: anthodia farinosa: semina striata, glabra.

2. *C. MARITIMA.* *Lin. sp. pl.* 1244 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 227.

lc. *Jacobaea marina, sive Cineraria. Bauh. hist.* 2. p. 1056.

Ad rupes maritimas ex *Ten.*, sed illam non vidi.

187. SENECIO.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1290.

1. *S. VULGARIS.* *Lin. sp. pl.* 1216 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 215 — *Bertol. fl. ital.* 9. p. 212.

lc. *Bull. herb. t.* 197 — *Senecio. Matth. comm.* 2. p. 476.

b. *anthodiis conicis, basi incrassato-dilatatis.*

In hortis, in cultis, ad muros, et ad ruderata ubique: var. b. ad muros.

Octobri, Majo, et var. b. Novembri et Decembri. ☉

Vulgo *Cardillo.*

Planta arachnoideo-villosa, saepius vero glabra: flores subcorymbosi, non radiati, sub anthesi nutantes: semina striata, adpresse pubescentia.

2. *S. FOENICULACEUS.* *Ten. fl. nap.* 2. p. 206 — *S. lividus. Bertol. fl. ital.* 9. p. 216, non *Lin.*

S. foliis cauleque glanduloso-subvillosis, inferioribus obovatis sinuato-dentatis in petiolum attenuatis, superioribus amplexicaulibus sinuato-pinnatifidis, lobis laciniisque dentatis, anthodii glabri foliolis intimis striatis, extimisque sphaecelatis intactisve, corollulis radii anguste linearibus revolutis.

lc. *Ten. l. c. t.* 78 — *S. trilobus. Sibth. fl. gr. t.* 896 — *Till. hort. pis. t.* 28, mala.

In sylvaticis umbrosis humentibus; *selve del Rotaro, di Casamicciola, del Bagno, di Catauro, di Campagnano.*

Aprili, Majo. ☉

Ligulae minutae, anthodii longitudine 3-4-plo breviores semina adpresse

nam ~~ol~~ semina exteriora omnia immarginata, et multa protensa, potius ad var. *b.* sequentis spectat, uti — *C. arvensis. Tabern. ic. 335.*

b. microcephala; floribus duplo fere minoribus, habitu graciliore — C. microcephala. Kralich pl. exsic.

In cultis, et in apricis herbosis passim: var. *b. Lacco al monte Vico fra le vigne, ed all' Arso presso il pennino di Mangialisi.*

Septembri, Majo. ☉

Vulgo *Patrostace*, una cum sequente.

Semina protensa fere nulla, sed dum adsunt brevia; quae vero cymbaeformia vix marginata sunt; margine integro, non dentato: in *b.* habitus gracilior; flores duplo fere minores, magnitudine sequentis; semina pariter omnia incurvata (nulla protensa), in margine alia immarginata, et haec numerosiora; pauca cymbaeformia intermixta, margine integra; omnia ista semina marginalia dorso subulato-muricata, in disco anulata, et dorso obtuse ac transverse corrugato-muricata. An var. *b.* species propria? — Confer quae pro hac specie notavi in *syn. 2. p. 522.*

2. *C. MICRANTHA. Tin. et Guss. syn. 2. p. 874.*

C. herbacea, foliis caulinis lanceolatis remote denticulatis, inferioribus obtusis obovato-cuneatis in petiolum attenuatis, caulinis amplexicaulibus, floribus concoloribus (luteis), radio anthodium parum excedente, seminibus marginalibus omnibus dorso cristatis, multis sigmoideis immarginatis longius cristatis anthodium duplo superantibus, paucis cymbaeformibus margine scarioso integro intus revoluti cinctis, in disco anulatis dorso transverse obtuse corrugato-muricatis.

lc. nostra t. vi.

b. ambigua; floribus semel majoribus, seminibus marginalibus sigmoideis apice valido crasso terminatis.

In apricis herbosis: var. *a. dal monte di Campagnano al Malo passo, Succellaro, Chianole del Testaccio, Buceto al piano delle Zavatte, Schiappe di Garofalo, Casamicciola, Forio; var. b. Ischia al Castello, Bagno, discesa di Succellaro, e de' Maronti, Serrano, da Soeivo a S. Angelo, vigne di Chiummano, seminati di monte Vetta.*

Aprili, Majo. ☉

Semina marginalia sigmoidea apice crassa rostrata sunt in *b.* rostro anthodium duplo superante—Var. ista quoad flores *C. arvensis* *b.* refert, sed quoad fructus *C. aegyptiacae* valde similis est, nisi ejusdem varietas.

189. CARLINA.

Dec. pr. 6. p. 545.

1. *C. VULGARIS. Lin. sp. pl. 1161 — Ten. fl. nap. 2. p. 192 — Bertol. fl. ital. 9. p. 54.*

Ic. *Gaertn. de fruct. 2. t. 163. f. 1* — *Atractylis mitior*. *Fuchs. hist. p. 121* — *C. sylvestris, vulgaris. Clus. hist. 2. p. 156.*

In sylvis, et ad incultos agrorum margines passim.

Augusto, Octobri. ♀, et ♂

Anthodii foliola radiantia albido-luteola.

2. *C. INVOLUCRATA. Desf. atl. 2. p. 251* — *Bertal. fl. ital. 9. p. 58* — *C. corymbosa. Ten. fl. nap. 2. p. 193, quoad locum.*

C. caule glabro bifido vel corymboso-ramoso, foliis oblongis subtus arachnoideo-villosis glabrisque pinnatifidis, laciniis ciliato-et dentato-spinosis, spinis subsquarrosis, anthodii globosi foliolis intimis radiantibus flavis exteriora involucria sinuato-spinosa basi incrassata non excedentibus.

Ic. *nulla.*

In saxosis collibus asperis, et in sylvaticis apricis ad vias ubique.

Augusto, Octobri. ♀

Vulgo *Curdagna.*

Anthodia basi rotundata, non cuneata, ut in C. corymbosa: et foliola interiora radiantia breviora quam in plantis siculis.

190. CENTAUREA.

Less. syn. p. 7 — *Dec. pr. 6. p. 565.*

1. *C. DFUSTA. Ten. fl. nap. 2. p. 266, excl. var. b. — b. tenuilaciniata.*

C. caule erecto subpaniculato-ramoso, foliis radicalibus pinnatifidis summis integris, istis laciniisque inferiorum lineari-lanceolatis angustis planis, anthodii ovati foliolis oblongis albo-scariosis fusco-maculatis setula longa terminatis, seminibus pappo destitutis.

Ic. *Ten. l. c. t. 84, pro speciei typo.*

In saxosis rupestribus apricis sola var. *b.*: *S. Pancrazia, casto del Pignatiella, della Scarupata, e di Funnotillo, Succellara, Testaccio alla scala da' Maronti, da Soccivo alla Punta di S. Angelo, Guardiola di S. Gennaro presso Panza, Punta dell' Imperatore, coste della Serra, e nella contrada del Bell'omo presso Forio, rupi delle Falanghe.*

Majo, Junio. ♀, et basi ♂.

Folia praesertim inferiora saepe villosa-canescientia, uti caules inferne: flores purpurei—C. calva Richter, non Led. ad hanc speciem spectat.

2. *C. CINERARIA. Lin. sp. pl. 1290* — *Ten. fl. nap. 2. p. 261.*

Ic. *Jacobeae maritima, candidissima, Stoebes foliis. Moris. hist. 3. p. 141. s. 7. t. 26. f. 20.*

Ad rupes maritimas passim.

Junio, Julio. \mathcal{Z} , et basi \mathfrak{H}

Caespitosa, niveo-tomentosa: *flores* ut in praecedente purpurascetes, corymbosi: *anthodii* foliola glabra, apice ac margine fusco-maculata, longe ciliata: *semina* albida, tenue nervosa, ac puberula.

3. *C. APOLEPIS*. *Moretti Bot. ital. n. 2. p. 21 — Dec. pr. 6. p. 584.*

lc. *Moretti l. c. t. 3.*

Ad rupes; *al Bagno nella villa del Re*, sed ibi potius cum aliis plantis exportata, quamvis nunc spontanea.

Junio, Augusto. \mathcal{Z}

Elata, stricta, supcrne ramosa, adpresse canescenti-puberula; *flores* pallide coerulei, corymbosi: *anthodii* glaberrimi ac nitide virentis et subbracteati foliola concoloria, non scariosa, apice breviter et tenue ciliata, indivisa, apiculata: *semina* fusco-cinerea, villosiuscula.

4. *C. CALCITRAPA*. *Lin. sp. pl. 1297 — Ten. fl. nap. 2. p. 271.*

lc. *Hippophastrum. Column. phyt. p. 107. t. 24 — Carduus muricatus, vulgo Calcitrapa dictus. Clus. hist. 2. p. 7, bona.*

Ad vias in herbosis demissis, vel elatis.

Julio, Augusto. \odot

Virescens, piloso-hirsuta: *caules* divaricato-ramosi: *folia* radicalia lyrata: *flores* rosei, laterales: *anthodii* foliola glabra, extima in spinam validam terminata: *pappus* nullus.

5. *C. SPHAEROCEPHALA*. *Lin. sp. pl. 1295 — Ten. fl. nap. 2. p. 269.*

b. *caespitosa*; caule ramosissimo procumbente, foliis caulinis lyrato-pinnatifidis. *Ten. l. c.*

lc. *C. caespitosa. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1. p. 24. t. 8 — Jacea maritima, incana, capite purpureo spinoso majore. Barr. ic. 1217.*

In arenosis maritimis sola var. b.; *Forio nelle arene della marina di Montevergine.*

Majo, Junio. \mathcal{Z} , et basi \mathfrak{H}

Herba amara, virens, pilis brevibus rigidulis, et lanugine arachnoidea obsita: *caules* in arenis dense caespitosi: *folia* caulina sessilia, amplexicaulia, non decurrentia, integra: *anthodii* arachnoideo-villosi, vel glabrati foliola palmato-spinosa: *flores* rosei, corollulis neutris majoribus radiantibus: *semina* nitida, glabriuscula, rufescentia, albido-maculata.

191. GALACTITES.

Moench. meth. p. 158 — Dec. pr. 6. p. 616.

1. *G. TOMENTOSA*. *Moench. l. c. — Ten. fl. nap. 2. p. 275 — Centaurea Galactites. Lin. sp. pl. 1300.*

lc. *Centaurea Galactites. Car. ic. 3. t. 231 — Carduus Galactites Bauh. hist. 3. p. 54.*

In collibus, ad muros, et ad sepes ubique.

Aprili, Majo. ☉

Folia pinnatifido, et dentato-spinosa, supra albo-maculata, subtus caulisque erectus albo-tomentosa: flores rubri, aut purpurascens, corymbosi: semina subovalia, compressa, levia, glabra.

192. KENTROPHYLLUM.

Nek. elem. n. 155 — Dec. pr. 6. p. 610.

1. K. LANATUM. *Dec. l. c. — Bertol. fl. ital. 9. p. 66 — Carduncellus lanatus. Moris fl. sard. 2. p. 436 — Carthamus lanatus. Lin. sp. pl. 1163 — Ten. fl. nap. 2. p. 189.*

lc. Atractylis Theophrasti et Dioscoridis succo sanguineo. *Column. cephr. 1. p. 19. t. 23 — Atractylis. Dod. pempt. 724.*

In arenosis herbosis maritimis; nec non in cultis inter segetes.

Julio, Augusto. ☉

Arachnoideo-villosum, erectum: folia dentato-spinosa, inferiora pinnatifida: anthodii foliola intima acuminato-cuspidata: flores saepius corymbosi, glabri, lutei: semina obovato-tetragona, truncata, ruguloso-tuberculata, glabra, albida — Recte notat *Column. l. c.* quod plantae radix, folia, rami, et anthodia avulsa ante florescentiam succum sanguineum emittunt.

193. ONOPORDON.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1256.

1. O. VIRENS. *Dec. fl. fr. 5. p. 456, et pr. 6. p. 618 — Ten. fl. nap. 2. p. 198.*

lc. Onopordon. *Dod. pempt. 726. f. 1 — O. virens, majoribus capitis spinis. Barr. ic. 501.*

In herbosis arenosis maritimis, ad vias, et in ruderalis; *Lacco, Forio, via del Pennino di Belvedere al Crovone, da Chinjano a Buceto, Bagno a S. Alessandro.*

Junio, Julio. ♂

Differt ob *O. Acanthio* foliis glabratibus, fere virentibus: spinis alarum caulibus et foliorum validioribus: anthodii foliolis valido spinosis, infimis patentibus, demum deflexis — An *O. tauricum* Willd. *sp. pl. 3. p. 1687* ab hoc diversum? nam uti istius varietates a *Bertol. in fl. ital. 9. p. 43* habetur.

194. SILYBUM.

Guertn. de fruct. 2. p. 378 — Dec. pr. 6. p. 616.

1. *S. MARIANUM. Guertn. l. c. — Dec. l. c. — Ten. fl. nap. 5. p. 204 — Carduus Marianus. Lin. sp. pl. 1153.*

l. c. Blackw. herb. t. 79 — Spina alba, hortensis. Fuchs. hist. p. 56.

Ad agrorum margines; da Fontana a Serrano, ed a Panza.

Majo, Junio. ☉

Erectum, elatum: folia glabra, sinuato-spinosa, supra albo-maculata: anthodia glabra; foliolis extimis longe spinosis, divaricatis: flores rosei: semina fere ovalia, compressa, glabra.

195. CYNARA.

Dec. pr. 6. p. 620.

1. *C. SCOLYMUS. Lin. sp. pl. 1159, b. hortensis.*

l. c. Scolymos, seu Cynara. Lobel. ic. 2. t. 3 — Scolymus major. Tabern. hist. 695.

Colitur.

Junio, Julio. ☿

Vulgo Carcioffa nera.

2. *C. CARDUNCULUS. Lin. sp. pl. 1159.*

l. c. Scolymus aculeatus. Tabern. hist. 696.

Colitur.

Junio, Julio. ☿

Vulgo Carcioffa bianca.

196. CARDUUS.

Guertn. de fruct. 2. p. 377 — Dec. pr. 6. p. 621.

1. *C. MACROCEPHALUS. Desf. atl. 2. p. 245 — Dec. pr. 6. p. 621 — Ten. fl. nap. 5. p. 206 — C. nutans. Guss. syn. 2. p. 433, non Lin.*

l. c. nulla.

Ad agrorum margines, ad vias, et in herbosis, vel inter segetes praesertim in apricis elatis; Fontana, monte Vetta, Pietra dell'acqua, Barano, alle Falanghe ed a Pietra perciata, Panza.

Majo, Septembri. ☉

Caulis aliquando 4-pedales, semper erecti, et basi simplices: folia interrupte decurrentia, lanuginoso-hirsuta, vel glabrata; laciniis squarro-

sis, ciliato-spinosis: *pedunculi* elongati, nudi (non alati): *anthodia* saepius diametro ultra pollicari, erecta, vel nutantia; foliis arachnoideo-villosis, virentibus, longe acuminato-spinosis, exterioribus ultra basim subcoarctatis, demumque refractis; intermediis longius acuminatis, intimisque erectis: *semina* compressiuscula, nitida, albida, glaberrima, coronula brevissima terminata — Ab affini *C. nutante*, uti notat Cl. Dec. recedit *anthodio* duplo majore, indeque ejusdem foliis latioribus longioribusque (15 lin. longis, 5 lin. latis); tamen individua maeriora, et in locis aridis provenientia *C. nutantem* referunt, a quo Cl. Bertol. in *fl. ital.* 8. p. 618 non separat. Praeterea quoad descriptionem hujus speciei in *Gris. spic. fl. Rum.* 2. p. 248 noster erit potius *C. hamulosus*, in quo uti notat laudatus auctor *anthodia* arachnoidea, et ejus foliola extima lanceolato-acuminata; dum in *C. macrocephalo* *anthodia* glabra, et foliola extima lanceolato-lineararia dicuntur.

2. *C. PYCNOCEPHALUS*. *Lin. sp. pl.* 1151 — *C. peregrinus*. *Ten. fl. nap.* 5. p. 207 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 625, an cum syn. omnibus?

lc. *Jaeg. H. Vind. p.* 17. t. 44.

In ruderalis, ad vias, et in cultis apricis.

Aprili, Majo. ☉

Caulis erecti, alato-spinosi, et uti folia subtus albo-tomentosi: *flores* saepius solitarii, breviter pedunculati, rosei: *anthodii* arachnoideo-villosi foliola exteriora lanceolato-spinosa, apice subpatula: *semina* albida, obovato-compressa, levia, saepe viscidula — In vineis prope *Forio* orgyalem altitudinem acquirit, ibique priusquam floreat excisus et terra obtectus ad vineas ipsas saginandas inservit — Cl. *Sehultz* (Bip.) in *Phyt. can. tom.* 3. pars. 2. sect. 3. p. 377, sub hac specie *C. arabicum*, *C. tenuiflorum*, *C. australem*, *C. crispum*, et *C. peregrinum* uti synonyma perperam citat — Tam species ista, quam aliae hujus generis, nec non *Carlinae* et *Onopordonis* vulgari nomine *Cardogne* incolae designant.

197. CIRSIUM.

Gaertn. de fruct. 2. p. 383 — *Dec. pr.* 6. p. 634.

1. *C. LANCEOLATUM*. *Seop. carn. ed.* 2. v. 2. p. 130 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 293, excl. var. *b.*, ex ipso in *l. c. v.* 3. p. 209 — *Cnicus lanceolatus*. *Willd. sp. pl.* 3. p. 1666 — *Bertol. fl. ital.* 9. p. 8, excl. syn. *C. Rosani* *Ten.*! — *Carduus lanceolatus*. *Lin. sp. pl.* 1149.

lc. *Carduus lanceolatus*. *Tabern. ie.* 699 — *C. lanceolatus*, sive *sylvestris* *Dodonaei*. *Bauh. hist.* 3. p. 38.

In sylvaticis humentibus, ad vias, et in vallibus passim.

Augusto, Octobri. ☾

- Caules firmi, stricti, alato-spinosi: folia supra rigide setosa, sublus arachnoideo-sublanata; laciniis valide spinosis: flores purpurei, sparsi vel aggregati: anthodii ovati basi arachnoidei foliolis exterioribus subulato-spinosis, patenti-recurvus: semina euneata, compressa, levia, glabra, fusco-maculata*—Nescio qua ratione Cl. Dec. in *pr. 6. p. 636*, et Bert. *l. e.* sub hac specie *C. Rosani Ten. syll. p. 414* referant, sunt equidem species diversissimae l, et planta cl. Tenorii *C. eriophoro* magis proxima!
2. *C. ARVENSE.* Scop. *earn. ed. 2. v. 2. p. 126* — Ten. *fl. nap. 2. p. 205* — *Cnicus arvensis. Bertol. fl. ital. 9. p. 31* — *Serratula arvensis. Lin. sp. pl. 1149.*
- lc. *Fl. dan. 1. 644* — *Ceanothus Theophrasti. Column. ceph. 1. p. 45. t. 46.*
- In arvis arenosis, vel argillosis humentibus; *seminati del piano de' Muori, vigne presso la Torre di Campagnano, ed in quelle della cava di Cerambi, pianure di Campotese presso Panza, Chianole del Testaccio, Casamicciola, Lacco nelle vigne.*
- Majo, Junio. ♀
- Radices repentes: flores purpurei, corymbosi: anthodii ovato-conici arachnoidei foliola exteriora adpressa, breviter mucronata.*

198. LAPPA.

Juss. gen. p. 173 — *Dec. pr. 6. p. 661.*

1. *L. MAJOR. Dec. pr. 6. p. 661* — *Arctium Lappa. Lin. sp. pl. 1143* — *Ten. fl. nap. 2. p. 195* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 598.*
- lc. *Lam. ill. gen. t. 665* — *Personata. Fuchs. hist. p. 72.*
- In silvaticis humentibus; *selve del Rotaro, di Catreca, delle Falanghe, del Fasano, di Bueeto, cava di Brusomonte, e di Cerambi, Casamicciola, Chianole del Testaccio, cavone delle Rose, selve e siepi di Campagnano, valloni di Moropane, di Fontana, di Serrano, ec.*
- Julio, Augusto. ♂, vel ♀
- Vulgo *Zecchetielli gruossi.*
- Anthodia virentia, obsolete arachnoideo-villosa; foliolis intimis quoque virentibus nec coloratis: flores rubri.*

199. SCOLYMUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1252.

1. *S. HISPANICUS. Lin. sp. pl. 1143* — *Ten. fl. nap. 2. p. 187* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 594.*

Ic. Scolymus Theophrasti. *Clus. hist. 2. p. 153* — *Carduus Cbrysanthemus. Dod. pempt. 715.*

In herbosis maritimis, et ad vias.

Julio, Augusto. ☿

Vulgo *Cardogna*.

Folia supra glabra, aliquando maculata, decurrentia: *anthodia* sessilia, lateralialia, et terminalialia, glabriuscula; foliolis omnibus acuminato-cuspidatis: *flores* lutei: *semina* obovata, levialia, glabra, 2-3-aristata — *Radices* et foliorum costae adhuc tenerae inter olera usum habent.

200. LAPSANA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1247.

1. L. COMMUNIS. *Lin. sp. pl. 1141* — *Ten. fl. nap. 2. p. 183* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 579.*

Ic. *Fl. dan. 500* — *Lapsana. Dod. pempt. 675.*

In sylvaticis, et ad sepes.

Majo, Junio. ☉

Erecta, pubescens: *flores* lutei, parvi.

201. RHAGADIOLUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1248.

1. R. EDULIS. *Gaertn. de fruct. 2. p. 354* — *Ten. fl. nap. 2. p. 185* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 583.*

Ic. *Sibth. fl. gr. t. 818.*

In herbosis, ad sepes, et ad sylvarum margines passim.

Martio, Majo. ☉

In innumeris speciminibus, quae vidi, *folia* lyrata, et *anthodii* squamae una cum seminibus glaberrimae — Inter olera in usum venit.

202. HEDYPSOIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1243.

1. H. CRETICA. *Willd. sp. pl. 3. p. 1617* — *Ten. fl. nap. 2. p. 173.*

Ic. *Hyoseris cretica. Gaertn. de fruct. 2. p. 372. t. 160. f. 2.*

In apricis herbosis, nec non in arenosis maritimis, ubi rara.

Aprili, Majo. ☉

Species sequenti valde proxima, a qua *foliis* minus profunde incisus, ac pedunculis ad apicem fistuloso-clavatis dignoscitur; tamen cave ne cum

H. tubaeformi Ten. confundas, in qua *anthodia* majuscula ac exacto globosa, et *pedunculi* valde fistuloso-clavati sunt: *foliorum* vero forma ac incisione conveniunt; sed Cl. Bertol. in *fl. ital.* 8. p. 557 a sequente non separat.

2. *H. MAURITANICA*. Willd. *sp. pl.* 3. p. 1616 — *H. monspeliensis*. Ten. *fl. nap.* 2. p. 172.

lc. *H. cretica*. Sibth. *fl. gr.* 9. t. 813, ex *Moris*—*Hieracium* facie *Hedypnois*. Lobel. ic. 239?

In herbosis collibus, et praesertim in campis mare proximis.

Aprili, Majo. ☉

Confer praecedentem.

203. CICHORIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1251.

1. *C. INTYBUS*. *Lin. sp. pl.* 1142 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 186 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 558.

lc. *Fl. dan.* 907 — *Intybus sylvestris*. Fuchs. *hist.* 679 — *Lobel. ic.* 228. f. 2.

b. *latifolium*; foliis inferioribus amplis obovato-runcinatis, reliquis laciniatis.

Cicoria di S. Pasquale.

In pascuis, et ad vias non satis frequens, et colitur.

Majo, Junio. ☿

Vulgo *Cicoria* una cum sequente, et utriusque speciei folia cruda vel cocta, tam inter olera, quam in acetariis in usum veniunt — *Flores* in utrisque coerulei.

2. *C. DIVARICATUM*. Schous. *marocc.* p. 197 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 203 — *C. pumilum*. Bertol. *fl. ital.* 8. p. 590.

lc. *nulla*.

b. *pedunculis gracilibus*.

In herbosis apricis; *Bagno, e Casamicciola*, sola var. b.

Majo, Junio. ♂, et ☿

3. *C. ENDIVIA*. *Lin. sp. pl.* 1142.

lc. *Intybum sativum*. *Ded. pempt.* 634.

Colitur.

Majo, Junio. ☉

Sequentes varietates coluntur:

a. *latifolia*; foliis latis, elongatis, laceris.

Scaroloni.

b. *communis*; foliis oblongis, latis, sinuatis.

Scarola procidana.

c. crispa; foliis elongatis, laceris, crispis — *C. Endivia*, *b. Lin. l. c. p. 1143.*

Scarola riccia.

204. TOLPIS.

Gaertn. de fruct. 2. p. 371 — Div. mon. delle Tol. 1809 — Dec. pr. 7. p. 85.

1. *T. UMBELLATA. Bertol. fl. ital. 8. p. 541, an cum syn. omnibus? — T. barbata. Ten. fl. nap. 5. p. 202.*

lc. Hieracium calyce barbato. *Column. ecphr. 2. p. 28. t. 27. f. 1.*

In apricis herbosis; *Ischia all' Arso, Bagno, Casamicciola presso la stufa del Cacciuto, ed alle fumarole di Pietra Vona, Lacco al monte Vico, Forio alle fumarole nella contrada del Bell'omo, Punta di S. Angelo, coste del Funnelillo presso alle fumarole, marina de' Maroniti, scala del Testaccio.*

Aprili, Majo. ☉

Folia radicalia vel indivisa, vel repando-sinuato-serrata: bracteolae setaceae, anthodium farinoso-puberulum superantes, patulae: corollulae sulphureae, in disco atropurpureae — Sententiae Cl. Bertol. qui in l. c. hanc a vera T. barbata (Crepis barbata Lin.) differre putat, libenter assentio, pro quorum differentiis confer laudatus auctor.

2. *T. ALTISSIMA. Pers. syn. 2. p. 377 — Ten. fl. nap. 5. p. 202 — T. virgata. Bertol. amoen. p. 67, et fl. ital. 8. p. 544 — Crepis ambigua. Balb. mem. dell'Acc. di Tor. p. 77, non Div.*

lc. *T. sexaristata. Div. mon. delle Tolp. p. 11. t. 2 — Triumph. prael. p. 62.*

In apricis argillosis herbosis non satis frequens; *via da Moropane a Fontana alla salita della cava del Ballerino a sinistra salendo.*

Majo, Junio. ☿

Folia radicalia repando-sinuata, glaucescentia: anthodia farinoso-incana; foliolis exterioribus bracteisque brevibus adpressis: flores citrini, colorces, parvi: semina 4-6-aristata.

205. HYPOCHAERIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1216.

1. *H. GLABRA. Lin. sp. pl. 1141 — Ten. fl. nap. 5. p. 201 — Bertol. fl. ital. 8. p. 571.*

b. minima; scapis simplicibus, foliis glabris hirsutiusculis grosse si-

nnato-dentatis, aut sublyratis. *Dec. pr. 7. p. 90* — ll. minima. *Cyr. pl. var. neap. fasc. 1. p. 29* — *Ten. fl. nap. 5. p. 202*, et ll. arachnoides. *Ten. l. c. p. 201*.

lc. *Cyr. l. c. t. 10* — Hieracium minimum. *Column. ecphr. 2. t. 27*.

In apricis herbosis; var. b. in collibus campisque sicciorebus.

Martio, Majo. ☉

Quamplurimis speciminibus inspectis *H. arachnoidem* ab *H. minima* non differre mihi visum est, nec uti species diversae ab *H. glabra* utraeque habendae sunt. Confer *Dec. et Bertol. l. c.*

2. ll. NEAPOLITANA. *Dec. pr. 7. p. 91* — ll. dimorpha. *Ten. fl. nap. 5. p. 201*, non *Brot.*

ll. radice perenni ad collum multiplici, fibris crassis, caulibus nudis erectis ascendentibusque glabris simplicibus ramosisque, foliis oblongo-obovatis dentato-sinuatis lyratisve hirsutis glabratibusque, pedunculis bracteatis, anthodii foliolis flosculis duplo brevioribus, pappo seminum centralium longo stipitato, marginalium (paucorum) sessili, setis ejusdem basi arachnoideo-plumosis.

lc. nulla.

Ad vias, in collibus herbosis, et in cultis ubique.

Majo, Junio. ☌

Vulgo *Musoporcielli*, et inter olera aliquando in usum venit — Male cum *H. radicata* hanc associat *Cl. Bertol. in fl. ital. 8. p. 573*; siquidem radice forma, et seminibus diversa est.

206. SERIOLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1245.

1. S. AETNENSIS. *Lin. sp. pl. 1139* — *Ten. fl. nap. 2. p. 182* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 560*.

lc. *Jacqu. obs. 4. p. 3. t. 79* — *Lam. ill. t. 656. f. 1.*

In tectis, ad muros, et in aridis collibus lapidosis incultis passim.

Martio, Majo. ☉

Virescens: folia radicalia obovata, rosulata, integra, vel sinuato-dentata: pedunculi elongati, una cum anthodiis setosi: flores lutei.

207. THRINZIA.

Roth. cat. bot. 1. p. 99 — *Dec. pr. 7. p. 99*.

1. T. TUBEROSA. *Dec. fl. fr. 4. p. 52*, et *pr. 7. p. 100* — *Ten. fl. nap. 5. p. 187* — *Apargia tuberosa. Willd. sp. pl. 3. p. 1549* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 442* — *Leontodon tuberosum. Lin. sp. pl. 1123*.

1c. *Cbondrilla* altera *Dioscoridis*, *monspeiensium*. *Lobel. ic.* 232.

b. *Oliverii*; foliis una cum scapo et anthodii foliolis piloso-hirtis ac fero canescentibus, floribus majoribus. *Dec. l. c.*

In pascuis herbosis, inter fruticeta in apricis, et ad vias in herbosis ubique: var. b. in pascuis elatis; *praterie del monte Vetta, e sotto S. Nicola.*

Septembri, Octobri. ☞

In var. a. omnia glabriora, et intense virentia: in b. foliorum laciniae aut lobi aliquando obtusissimi: in utrisque *tubera* fusiformia, fasciculata: *scapi* ascendentes, birtuli, vel glabri: *flores* lutei, ligulis subtus rubentibus *semina* disci fusca, a medio attenuato-rostrata; illa radii incurva, albida anthodii foliolis demum patentibus inclusa.

208. LEONTODON.

Juss. gen. 170 — *Dec. pr.* 7. p. 101.

1. *L. ROSANI*. *Dec. pr.* 7. p. 104 — *Apargia Rosani*. *Ten. fl. nap.* 5. p. 186.

L. scapo glabriusculo sub anthodio puberulo folia multo superante, foliis obovato-oblongis obtusis dentato-pinnatifidis sublyratis pilis rigidis subhispidis, anthodii hispiduli foliolis exterioribus lanceolato-linearibus adpressis, seminibus striatis muricatis levibusque.

1c. *Ten. l. c. t.* 180.

In argillosis elatis; *monte Vetta alla salita delle Petrelle, ed al Jetto.*

Augusto, Septembri, sat raro Julio. ☞

Folia virentia, et sero autumnio canescentia, dense rosulata, vix 2-3 lin. lata, 1-2 pollicaria, pilis glochidiatis cum simplicibus intermixtis tecta: *semina* badia, striata, plus minus muricata, sat raro levia—Specimina *L. Villarsii, Loisel.* ex Delphinatu, quae *Cl. Jord.* misit cum hoc nostro quoad habitum exacte conveniunt, et ideo nihil mirum si *Cl. Bertol.* in *fl. ital.* 8. p. 436 simul conjunxerit; sed *folia* profundius secta, ac hispido-canescientia; *anthodia* una cum scapis hirsuta, foliolis exterioribus saepe apice patulis; dum in *L. Rosani folia* uti scapi et anthodia glabrata sunt. An ejusdem speciei lusum uti *Cl. Dec.* suspicatur?

209. UROSPERMUM.

Scop. introd. (1777) — *Dec. pr.* 7. p. 116.

1. *U. DALECHAMPII*. *Desf. cat.* p. 90 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 177 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 352 — *Arnopogon Dalechampii*. *Willd. sp. pl.* 3. p. 1496 — *Tragopogon Dalechampii*. *Lin. sp. pl.* 1110.

1c. Hieracium sulphureum, incisus foliis, montanum. *Barr. ic.* 209.

In apricis herbosis collibus, ab elatis ad litus.

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Cazzabuotti*.

Folia fere omnia radicalia, virentia, aut canescentia; caulina paucissima, saepe terna: *pedunculi* apice fistuloso-incrassati: *flores* magni, sulphurei; *anthodio* sericeo-pubescente.

2. U. PICRIOIDES. *Desf. cat.* p. 90 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 177 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 354 — *Arnopogon picrioides*. *Willd. sp. pl.* 3. p. 1496 — *Tragopogon picrioides*. *Lin. sp. pl.* 1111.

1c. *Lam. ill. gen.* t. 646. f. 3 — *Sonchus asper*, laciniatus, creticus. *Bauh. pr.* p. 60.

In herbosis apricis, ad sepes, ad agrorum margines, et in lapidosis ubique.

Martio, Majo. ☉

Caulis ramosi, foliosi: *folia* margine denticulata: *pedunculi* elongati, apice clavato-incrassati: *anthodia* hispido-aculeata: *flores* lutei.

210. HELMINTHIA.

Juss. gen. 170 — *Dec. pr.* 7. p. 132.

1. H. ECHIOIDES. *Willd. sp. pl.* 3. p. 1607 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 181 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 379 — *Picris echioides*. *Lin. sp. pl.* 1114.

H. hispida, foliis dentatis, anthodii foliolis externis basi cordato-ovatis.

1c. *Lam. ill. gen.* t. 648 — *Buglossum echioides*, luteum, Hieracio cognatum. *Lob. ic.* 577. f. 2.

b. *mollis*; caule et anthodii foliolis subinermibus. *Dec. pr.* 7. p. 132.

In herbosis praesertim humentibus; var. a. *nel vallone di Buceto*; var. b. *salita di Pietra Sparina, Forio alle fumarole di Frasso, ed in quella della contrada del Bell'omo, e nelle terre coltivate presso il diruto Fortino a Citara.*

Junio, Octobri. ♂, et ♀

Cl. *Schultz* (Bip.) in *Webb. Phyt. can. tom.* 3. pars. 2. sect. 3. p. 384 *H. humifusam* ab hac non separat; tamen quamvis affines, habitu certe differunt. Confer Cl. *Bertol.* l. c. pro hac et sequente.

2. H. HUMIFUSA. *Trevir. act. soc. nat. cur. Bonn.* 13. p. 195 — *Dec. pr.* 7. p. 132 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 188 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 381.

H. hispidula, foliis dentatis, anthodii foliolis externis basi rotundatis.

1c. Hieracium capitulis Cardui benedicti, glabrum. *Herm. parad.* p. 185. t. 52.

In pratis argillosis humentibus; *cava del Ballarino sotto Fontana, mon-*

te Vetta alla salita delle Petrelle, al piano de' Muori ne' campi coltivati, Forio nel letto argilloso di un'antica salina presso il diruto fortino di Citara, ne' siti argillosi del bosco e della cava del Carusiello.

Junio, Octobri. ♂, et ♀

Caules saepius decumbentes, vel surrecti, irregulariter ramosi, glabri, vel sparse hispiduli: *anthodii* angulato-pyramidati foliola exteriora erecta, sed ab interioribus parum longioribus parallele remota, ovali-lanceolata, externe concava ob margines revolutos, glabra, sed in marginibus crebre ciliato-spinulosa; interiora exquisite sed obtuse carinata, basi incrassato-gibbosa, utriusque hispidula vel glabrata, tamen semper sub apice acuto inermi spinula ramosa lin. longa instructa: *corollulae* saepe externe rubentes: *semina* rufescentia, levia, obtusa, brevia, pappi stipite filiformi elongato terminata.

211. PICRIS.

Juss. gen. 170 — Dec. pr. 7. p. 128.

1. *P. SPINULOSA*. *Guss. syn. 2. p. 400* — *P. hieracioides*. *Ten. fl. nap. 2. p. 180*, non *Lin.* — *Bertol. fl. ital. 8. p. 374*, excl. *syn. Guss.*

P. pilis furcatis patentibus setisque hirta, caule erecto angulato-sulcato ramoso, foliis oblongo-lanceolatis dentato-sinuatis, superioribus amplexicaulibus integris, floribus subcorymbosis, pedunculis non incrassatis, anthodii villosi foliolis ad carinam incrassato-spinulosis exterioribus semipatentibus apice subsquarrosis, pappo sessili.

1c. *Hieracium altissimum, longifolium, sinuatum, asperum, unicaule, polycephalum. Bon. t. 151, optima.*

In sylvaticis, et ad agrorum margines ubique.

Junio, Octobri. ♂, et ♀

Vulgo *Zecchetielli minutoli*.

Caules aliquando fere orgyales: *folia* tuberculato-hispida: *flores* flavi, axillares, vel in ramorum extremitate glomerati — A vera *P. hieracioides* differt notatis characteribus, qui minime variabiles sunt, proinde male *Cl. Schultz* (Bip.) in *Web. phyt. can. tom. 3. pars. 2. sect. 3. p. 464* *P. grandifloram*. *Ten.* (quae vera *P. hieracioides*, et quae nunc nisi in Aprutii, et Samnii sylvaticis montosis apud nos provenit) *P. scaberrimam* *Guss.* et hanc simul associat, sunt equidem species diversissimae, quae cultura non mutantur, nec ejusdem speciei lusae.

212. LACTUCA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1234.

1. L. MURALIS. *Dec. pr. 7. p. 139 — Bertol. fl. ital. 8. p. 401 — Praenanthès muralis. Lin. sp. pl. 1121 — Ten. fl. nap. 5. p. 182.*
lc. Fl. dan. 509 — Sonchus levis, vulgaris 11. Clus. hist. 2. p. 146.
 Ad muros, et ad rupes in umbrosis.
 Majo, Junio. ☉, et ♂
Flores parvi, lutei in hac et in sequentibus, ac plantae lactescentes.
2. L. SCARIOLO. *Lin. sp. pl. 1119 — Ten. fl. nap. 5. p. 181 — Bertol. fl. ital. 8. p. 407.*
lc. Fl. dan. 1227 — Endivia major, lactucina, spinosa. Barr. ic. 135.
 Ad sepes, et in sylvaticis; da Barano a Fontana, salita del Telegrafo di Pietra Sparaina, da Serrano a Panza, coste della Serra, ed a S. Maria del Monte sopra Forio.
 Julio, Augusto. ♂
Folia runcinato-pinnatifida, mucronato-denticulata: flores paniculato-pyramidati: semina 5-striata, puberula, rostro albo aequilonga; in sequente rostrum bis superat semen, uti recte notat Cl. Koch in syn. ed. 2. p. 495.
3. L. SALIGNA. *Lin. sp. pl. 1119 — Ten. fl. nap. 5. p. 181 — Bertol. fl. ital. 8. p. 409.*
lc. Jacq. austr. t. 250 — Chondrylla viscosa, humilis. Bauh. pr. p. 68 — Endivia minor, lactucina, spinosa. Barr. ic. 136.
b. Wallothriana; foliis caulinis linearibus carina levibus, caule subascendente a basi ramosissimo. Dec. pr. 7. p. 136.
 Ad vias in herbosis, ad agrorum margines et ad nacieries; Ischia all' Arso, Campagnano, Catauro, Chianole del Testaccio, da Barano a Fontana, da Serrano scendendo a Panza, Noja, Calimera, bocca della Serra, S. Maria del Monte, e nella contrada del Bell'omo sopra Forio, Casamicciola alla stufa del Cacciuto, utraeque varietates; sed a. magis rara.
 Julio, Septembri. ♂
Folia infima runcinato-pinnatifida; reliqua linearia, integerrima: flores racemoso-spicati.
4. L. SATIVA. *Lin. sp. pl. 1118, var. a — Dec. pr. 7. p. 138 — L. sativa, c. longifolia. Lam. dict. enc. 3. p. 403.*
lc. Blackw. herb. t. 88. — L. folio obscurius virente, semine nigro. Morris. hist. 3, s. 7. t. 2. f. 9 — L. romana, longa, dulcis. Bauh. hist. 2. p. 998.

Colitur.

Majo, Junio. ☉

a. *atrovirens*; foliis elongatis, adpressis, concavis, atroviridibus.

Lattuca romana.

b. *pallida*; folio albedo-virentibus, brevibus.

Lattuca biancolella.

5. *L. CAPITATA*. Dec. pr. 7. p. 138—*L. sativa, a. capitata*. Lam. dict. enc. 3. p. 403.

1c. *Dod. pempt. 645*—*L. sativa sessilis, sive capitata*. Lobel. ic. 242. f. 2.

Colitur.

Majo, Junio. ☉

a. *viridis*; foliis dense capitatis, albo-viridulis, crassiusculis.

Lattuca mortarella.

b. *albida*; foliis laxiuscule capitatis, albidis, succosis, teneris.

Lattuca incappucciata.

6. *L. CRISPA*. Dec. pr. 7. p. 138—*L. sativa, b. crispa*—*Lin. sp. pl. 148*.
Lam. dict. enc. 3. p. 403.

1c. *Dod. pempt. 644*—*L. crispa, non capitata*. Lobel. ic. 242, male a
Dec. ad *L. laciniatam* citata, nam eadem ac illa *Dod.*

Colitur.

Majo, Junio. ☉

Lattuca riccia.

213. CHONDRILLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1235.

1. *C. JUNCEA*. *Lin. sp. pl. 1120*—*Ten. fl. nap. 5. p. 182*—*Bertol. fl. ital. 8. p. 415*, excl. nonn. syn.

1c. *Jaqu. austr. t. 427*—*C. juncea, viminea, arvensis*. *Tabern. ic. 178*
—*C. prima Dioscoridis*. *Column. phyt. p. 10*.

In campis aridis, et in arenosis ubique.

Julio, Septembri. ☿

In hac folia caulina non sunt rigido ciliata, ut in *C. juncea, b.* Dec. pr. 7.
p. 142, quae est *C. virgata* *Prest del prag. p. 116*.

214. TARAXACUM.

Hall. helv. 1. p. 23—*Dec. pr. 7. p. 145*.

1. *T. OFFICINALE*. *Wigg. prim. fl. hols. p. 56*—*T. Dens Leonis*. *Desf. atl. 2. p. 228*—*Dec. l. c.*—*Leontodon Taraxacum*. *Lin. sp. pl. 1122*—*Ten. fl. nap. 5. p. 183*—*Bertol. fl. ital. 8. p. 425*, var. b.

lc. *Bull. herb. t. 217* — *Hedynois. Fuchs. hist. 680.*

In apricis herbosis; *Dagno nella Real Villa, salita di monte Veza al Nord, Casamicciola nelle vigne sotto alle Croci.*

Martio, Aprili. ☞

Pedunculi floriferi horizontaliter patentes: *anthodii* foliola exteriora reflexo-patentia; interiora erecta, omnia sub apice non corniculata: *semina* spadicea, versus apicem tantum muricata, et supra muricaturam attenuata, ac in stipitem ipsis longiorem producta: *pappus* anthodium excedens — Foliorum laciniis plus minus latis longisque valde variat.

2. *T. CORNICULATUM.* *Kit. in Dec. pr. 7. p. 146* — *Leontodon corniculatus. Ten. fl. nap. 5. p. 183* — *T. officinale, corniculatum. Koch syn. ed. 2. p. 492, sub var. b.*

T. glabrum, foliis runcinato-pinnatipartitis, lobis inaequalibus lanceolatis subdentatis, anthodii foliolis omnibus sub apice calloso-corniculatis, exterioribus patulis, seminibus striatis (rufescentibus) sub apice spinelloso-muricatis rostro suo brevioribus.

lc. *nulla.*

In apricis; *dalle falde meridionali di S. Nicola sopra Fontana alla mc-rina passim, et magis quam praecedens obvium.*

Martio, Majo. ☞

Anthodii foliola exteriora patenti-recurva, non recta, nec reflexa, omnia sub apice corniculata a *T. laevigato* dignoscitur, in quo ex *Dec. in fl. fr. 6. p. 450* in apice, non sub isto vix calloso-mucronulata sunt.

3. *T. PALUSTRE.* *Dec. fl. fr. 4. p. 45, et pr. 7. p. 148* — *Leontodon palustre. Ten. fl. nap. 4. in syll. p. 112.*

T. glabrum, foliis obovato-lanceolatis sinuatis subruncinatisque, anthodii foliolis apice eorniculatis acutis, exterioribus lanceolatis adpressis, seminibus striatis (pallide rufescentibus) apice spinelloso-muricatis rostro suo 3-4-plo brevioribus.

lc. *Engl. bot. t. 553, ex Dec.*

In cultis humentibus; *Casamicciola nelle vigne del Mortito, in quelle del Laeco e di Forio.*

Martio, Majo. ☞

In plantis inarimensibus *anthodii* foliola exteriora duplo angustiora sunt, quam in speciminibus gallicis.

215. CREPIS.

Willd. sp. pl. 3. p. 1592.

1. *C. BULBOSA*. Cass. ann. sc. nat. v. 29. p. 4 — *Aetheorrhiza bulbosa*. Id. in Dec. pr. 7. p. 160 — *Praeanthes bulbosa*. Dec. fl. fr. 4. p. 7 — *Hieracium bulbosum*. Willd. sp. pl. 3. p. 1562 — Bertol. fl. ital. 8. p. 453 — *Leontodon bulbosum*. Lin. sp. pl. 1112 — Ten. fl. nap. 5. p. 185.
 - C. radice fibris tuberiferis, scapo monocephalo aphylo vel inferne monophyllo apice anthodioque basi hirta, stolonibus diffusis radicanibus, foliis rosulatis oblongo-lanceolatis glabris integris subdentatisve.
 - 1c. *Hieracium stoloniferum*. Viv. frag. 1. t. 20 — *Chondrylla altera Dioscoridis*. Column. phyt. p. 13. t. 4 — *C. altera Dioscoridis* putata. Clus. hist. 2. p. 143.

In apricis pascuis arenosis maritimis, ad agrorum margines arenosos, super muros ac maceries.

Martio, Aprili. ♀
2. *C. VESICARIA*. Lin. sp. pl. 1132 — Ten. fl. nap. 2. p. 175 — *Barekausia scariosa*. Bertol. fl. ital. 8. p. 522.
 - 1c. *Cichorium sylvestre, vesicarium, pratense*. Column. cephr. 1. p. 238. t. 237, a Willd., et a Dec. sub *C. scariosa* citata.

In apricis herbosis elatis; fra Fontana, Serrano, e S. Nicola, campi della salita dalle Petrolle a monte Vetta, discesa delle Falanghe.

Aprili, Majo. ♂, et ♀

Folia fere omnia radicalia, glabra, rosulata, runcinata: bractee latae, concavae, scariosae: flores lutei, corymbosi — Aliquando bractee ita angustae sunt, ut *C. taurinensem* referat; a qua tamen satis diversa.
3. *C. LEONTODONTOIDES*. All. auct. ad fl. Ped. p. 13 — Bertol. fl. ital. 8. p. 533 — *Barekausia tenerrima*. Ten. fl. nap. 5. p. 199, ex quo *B. taraxacifolia*, b. syll. p. 404 — *Lagoseris taraxacoides*. Reich. cent. 1. p. 28.
 - 1c. Reich. l. c. f. 63 — *Hieracium minus*, *Dentis Leonis* folio obtuso, caule procumbente exili multifido intricato, flore parvo. Bon. t. 134.
 - b. anthodiis pedunculisque hirsutiusculis.
 - bb. *microcalycina*; pedunculis anthodiisque ut in b., sed istis duplo fere minoribus.

In silvaticis apricis herbosis, ad muros, ad rupes, ac ad agrorum margines umbrosos ubique: var. b. magis obvia: var. bb. in elatis, presso la chiesa di S. Nicola.

Majo, Junio. ♂, et ♀

Lagoseris Leontodontoides. Reich. cent. 1. f. 35, plantam *Allionii* exacto refert ex Ten., sed fig. 63 quoad habitum nostrae magis similis; praeterea observandum est iconem istam a planta exsiccata prope *Paestum* collecta depromptam fuisse, ubi *C. Leontodontoides*, et non *C. taraxacoides* occurrit!

4. *C. NEGLECTA*. Lin. mant. p. 107 — Bertol. fl. ital. 8. p. 535, excl. syn. *C. corymbosae* Tea. — *C. ecrina*. Ten. fl. nap. 5. p. 198.

lc. Ten. l. e. t. 183 — Reich. cent. 4. f. 479.

Io aridis sterilibus; *Dagno nella Real Villa*, nonnisi praeterita aestate vidi. Junio, Julio. ☉

Folia fere omnia radicalia, glabra, runcinato-pinnatifida: pedunculis graciles, aernui, non corymbosi: flores lutei, parvi, anthodiis glabris.

5. *C. GLANDULOSA*. Guss. pl. rar. p. 329 — *C. foetida*. Ten. fl. nap. 2. p. 178, ex parte — *Burkasia glandulosa*. Dec. pr. 7. p. 158 — *B. foetida*. Bertol. fl. ital. 8. p. 523, quoad plantam siculam.

C. erecta hirta ac scabra canescens, foliis runcinato-pinnatifidis superioribus sessilibus lanceolato-sagittatis basi profunde dentato-incisis, floribus (luteis) corymbosis, pedunculis anthodiisque pilis glanduliferis rufescentibus hirtis.

lc. Guss. l. e. t. 56 — *Hieracium Cichoriifolio*, foliis Amygdali amari odore. Bar. t. 119.

Io asperis aridis, vel io herbosis; *Ischia all'Arso, Dagno, Pico, Chiajano*, ec.

Majo, Junio. ☉

C. corymbosa Ten., quae prope Neapolim ubique provenit, in hac insula desideratur.

216. ZACINTHA.

Lin. gen. pl. ed. Sekreb. n. 1249.

1. *Z. VERRUCOSA*. Gaertn. de fruct. 2. p. 358 — Ten. fl. nap. 2. p. 184 — Bertol. fl. ital. 8. p. 577.

lc. Gaertn. l. c. t. 137 — *Cichorium verrucatum*, *Zacintha*. Clus. hist. 2. p. 144.

In cultis argillosis, vel in herbosis apricis; ne' campi seminati di monte *Vetta, Ischia all'Arso, Forio alla marina di Citara*, (rara), e nella *contrada del Bell'omo presso le fumarole*.

Aprili, Majo. ☉

Glabra: caudex irregulariter dichotomi: folia radicalia rosulata, obovata, varie incisa: anthodia parva, sessilia, terminalia vel lateralia, basi demum conica, ac tumentia: flores lutei.

217. PICRIDIMUM.

Desf. atl. 2. p. 220 — Dec. pr. 7. p. 182.

1. *P. VULGARE. Desf. l. c. p. 221 — Pers. syn. 2. p. 362 — Sonchus picrioides. Lam. diet. enc. 3. p. 384 — Ten. fl. nap. 5. p. 181 — Bertol. fl. ital. 8. p. 398 — Scorzonera picrioides. Lin. sp. pl. 1114. Ic. All. ped. t. 16. f. 1 — Jacq. ic. rar. t. 577 — Sonchus asper, laciniatus, creticus. Bauh. pr. p. 60.*

Ad muros, ad rupes, et in cultis ubique.

Martio, Septembri. ☿

Vulgo *Paparastiello*, et inter olera locum habet.

Species quoad habitum, et folia variabilissima; siquidem ista virentia, aut glaucescentia, 2-8 lin. lata, integra vel plus minus serrato-dentata, lyrata, ac lyrato-pinnatifida; laciniis angustis, aut latis, denticulatis, saepe subfalcatis: *pedunculi* aliquando radicales: *anthodia* virentia, vel albo-farinosa: *flores* lutei.

218. SONCHUS.

Dec. pr. 7. p. 184.

1. *S. FALLAX. Wallr. in Dec. pr. 7. p. 185 — S. asper. Spr. s. veg. 3. p. 649 — Ten. fl. nap. 5. p. 180 — Bertol. fl. ital. 8. p. 392. Ic. Fl. Dan. 893 — Sonchus laciniatus, spinosus. Dod. pempt. 643 — Fuchs. hist. 674.*

Aprili, Octobri. ☉

Vulgo *Trunzo*, una cum sequente appellatur, et inter acetaria usurpantur.

Pedunculi subumbellati, et *caules* superne piloso-glandulosi: *anthodia* glabra: *semina* ovalia, compressa, sulcata, levia, submarginata, in disco utrinque longitudinaliter tristriata, non transverse rugosa.

2. *S. CILIATUS. Lam. in Dec. pr. 7. p. 185 — S. oleraceus. Lin. sp. pl. p. 1116, ex parte — Ten. fl. nap. 5. p. 180 — Bertol. fl. ital. 8. p. 390.*

Ic. Fl. dan. 682 — S. levis, latifolius. Dod. pempt. 643.

b. runcinatus; foliis runcinatis.

c. subbipinnatifidus; foliis fere bipinnatifidis.

In cultis, in campis, et ad muros magis quam praecedens obuius.

Octobri, Julio. ☉

Pedunculi subumbellati, subnudi, junioros ad apicem tomentoso-farinosi: *anthodia* glabra: *semina* subcompressa, nam fere cylindrica, non mar-

ginata, in disco utrinque tristriata, ac praeterea transverse rugulosa !; quo praesertim caractere a praecedente dignoscitur.

4. *S. TENERRIMUS*. *Lin. sp. pl.* 1117 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 181 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 395.

lc. *Reich. hort. t.* 139 — Hieracium foliis in tenues lacinias profunde sectis, flore luteo. *Plukn. phyt. t.* 93. f. 3.

b. *italicus*; foliis bipinnatifidis, laciniis anguste linearibus — *S. italicus. Spr. s. veg.* 3. p. 651.

In herbosis super muros; *Casamicciola, Lacco, Forio, Ischia sopra i muri, ed al Castello.*

Octobri, Julio. ☉, et aliquando basi ☿

Species quoad foliorum ineisionem, et anthodii pubescentiam polymorpha; tamen semper glabra, laete virens: *pedunculi* nudi, subumbellati: *flores* aurei: *semina* subtetragona, striata, transverse rugulosa.

219. ANDRYALA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1240.

1. *A. DENTATA*. *Sibth., et Smith fl. gr. pr.* 2. p. 140 — *A. integrifolia, b. Ten. fl. nap.* 2. p. 200.

lc. *Sibth. fl. gr. t.* 811.

In herbosis apricis passim.

Majo, Junio. ☉

Flores intense sulphurei !, et duplo fere majores, quam in sequente — Cl. *Bertol. in fl. ital.* 8. p. 548, cum *A. integrifolia* conjungit; a qua quoad florum colorem aliasque notas prorsus aliena, nec apud nos unquam variat !

2. *A. UNDEULATA*. *Prest del. Prag. p.* 113 — *A. sinuata. Ten. fl. nap.* 5. p. 200 ?

lc. Hieracium marinum, tomentosum, incanum, Cichorii folio, flore candido sulphureo. *Don. t.* 126.

In collibus herbosis, et ad vias.

Majo, Junio. ☉

Anthodia setis purpurascens glanduliferis tomento intermixtis instructa: *receptaculum* pilosum — Potius haec varietas *A. integrifoliae* est, sub qua refertur a cl. *Bertol.*, et a *Dee.*, sed a praecedente diversissima, *habitu*, et *florum* colore, qui in hac albidus vel pallidissime sulphurei !

220. **HIERACIUM.**

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1238.

1. II. **BRACHIATUM.** *Bertol. fl. ital. 8. p. 460, et in Dec. fl. fr. 6. p. 442 in notis, nec non in pr. 7. p. 200* — II. *bifurcum. Ten. fl. nap. 5. p. 191, non Marsch.*

II. *stoloniferum strigoso-pilosum, scapo subaphyllo diviso, pedunculis elongatis unifloris, foliis coriaceis lanceolatis acutis obtusisque integerimis subtus stellato-cano-tomentosis, anthodiis ovato-globosis tomentosis setisque nigris eglanduliferis tectis, anthodiis hirsutis, foliolis demum in fructu patulis.*

1c. *nulla.*

In herbosis apricis elatis subargillosis, vel arenosis; *monte Trippiti presso la casetta, salita dalle Petrelle a monte Vetta, selve delle Falanghe, e del Fasano ne' siti aperti ed arenosi, discesa del Rotaro alla Quercia presso la Nscrtolella.*

Majo, Junio. ☞

Stolones tomentosi, aliquando fere oblitterati, et sat raro floriferi: pedunculi ad apicem, et anthodia arancosa-pubescentia; illi setis sparsis eglandulosis basi nigris, apice in setulam gracilem productis hinc inde vestiti; ista setis crebris biformibus tecta, aliis nempe nigris acutis, aliis uti illae pedunculorum, in setulam gracilem attenuatis, omnibus vero glandulosis: semina cylindrica, levia, striata, nigra — Comparatis speciminibus herbarii Cl. Bertol. et Ten. cognovi plantam caucasicam ab italiana differre; ideoque uti fecit Cl. Dec. speciem Bertol. servavi.

2. II. **PRAEALUM.** *Vill. voyag. p. 62* — *Froel. in Dec. pr. 7. p. 205.*

II. *laete virens, stolonibus nullis, caule glabro inferne uni-paucifolio, foliis viridi-glauciscentibus oblongo-lanceolatis obtusis submembranaceis glabris setis rigidis longis sparsis supra margineque tectis, corymbo denso polycephalo fastigiato demum laxiusculo, pedunculis anthodiisque cano-puberulis setis eglandulosis tectis (floribus parvis).*

1c. *Reich. cent. 1. f. 114* — *Vill. l. c. t. 2. f. 1.*

b. *obcurum; pedunculis anthodiisque pilis nigro-glandulosis instructis, corymbo laxiusculo inordinate ramoso, floribus paulo majoribus. Froel. in Dec. l. c.*

1c. II. *obscurum. Reich. l. c. f. 115.*

In sylvaticis umbrosis herbosis; var. a. *selve del Dagno, di Casamicciola, del Rotaro, delle Falanghe, del Fasano, di Catreca, di Campagnano*: var. b. in apricis elatis; *presso la Pietra dell'acqua, e Pietra perciata sotto S. Nicola, monte Trippiti.*

Majo, Junio. ☞

Anthodia tantum subcanescentia in *a.* ac setis nigris eglandulosis, vel raro glanduliferis tecta; quae setae in pedunculis aliquando deficiunt: in *b.* *pedunculii* pubescentes, pilis viridulis sparsis rarisque glandulosis instructi: *anthodia* cano-pubescentia; foliola ad costam praecipue setis rigidis nigris eglandulosis aliis glandulosis intermixtis tecta: *folia* vero in utrisque similia, et sat raro in *b.* pilis stellatis brevissimis conspersa; in qua varietate aliquando unus aut alter ex stolonibus florifer est.

3. *H. CHRITUM.* *Sibth. et Smith fl. gr. pr. 2. p. 134 — Ten. fl. nap. 5. p. 195 — Dec. pr. 7. p. 223.*

H. caule erecto pilosissimo superne folioso basi aphylo, foliis piloso-ciliatis viridi-glauciscentibus, radicalibus ovato-oblongis acutis basi grosse dentatis longe petiolatis, caulinis ovatis (bracteaformibus parvis) sessilibus integerrimis acuminatis, pedunculis bracteisque villosissimis, floribus racemoso-corymbosis, anthodiis tenue pubescentibus.

1c. *H.* folio ovato acuto leviter sinuato, Pilosellae lanugine. *Bon. t. 144.*

b. glabratum, caule pedunculis bracteisque pilis longis albis destitutis, anthodii foliolis virentibus apice adpressis setulis nigris eglandulosis pilisque brevibus conspersis.

Ad muros. ad rupes, vel ad terram in umbrosis passim; var. *b. salita di Pietra sparaina, cavone delle Rose, selve del Castiglione, di Pietra Vona, del Fasanò, e delle Falanghe, monte Trippiti, salita dalle Petrelle a monte Vetta.*

Septembri, Octobri. ☞

Folia in var. *a.* saepius integerrima, ut in specie, ac intensius virentia uti *anthodia*: ista non puberula, foliolis apice adpressis, setulis nigris eglandulosis et pilis brevibus conspersa: *habitus* parum alienus — *A. H. sylvatico* non disjungit *Cl. Bertol.* in *fl. ital. 8. p. 485*, sed in illud non transit.

4. *H. LACTARIS.* *Bertol. amoen. p. 64, et fl. ital. 8. p. 505 — H. umbellatum, b. lactaris. Dec. pr. 7. p. 224.*

H. glabrum, pallide virens, caule rigido oligocephalo erecto glabro ad apicem umbellato-ramoso, foliis lanceolato-oblongis (tenuibus) sessilibus laxè denticulatis, supremis subito abbreviatis bracteaformibus anguste lanceolatis, anthodii tenue pubescentis ac virentis foliolis squarrosis.

1c. *H. sabaudi* varietas prima, *Erinus* quibusdam *Matthioli* dicta. *Bauh. hist. 2. p. 1030.*

In sylvaticis asperis; *selve del Bagno, di Castiglione, di Casamicciola, di Cavullaro, e di Canniani presso Fontana, cavone delle Nocelle, e delle Rose.*

Septembri, Octobri. ☞

Folia in hoc non rigida, ut in sequente, versus apicem caulis subito abbreviata, 5-7-plo breviora quam alia, et saepe loco in isto rosulata, ut in *Euphorbia amygdaloide* 1, quod non in sequente.

5. H. UMBELLATUM. *Lin. sp. pl.* 1131 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 196 — *Bertol. fl. ital.* 8. p. 506.

H. obscure virens, caule rigido erecto polycephalo glabro vel hirsuto superne ramoso, ramis ultimis umbellatis, foliis (firmis) late-vel anguste lanceolatis dentatis integerrimisque in brevem petiolum attenuatis, supremis subsessilibus, radicalibus nullis, anthodii foliolis apice rectis squarrosisque.

- 1c. *Fl. dan.* 680 — H. tertium genus, angustifolium. *Clus. hist.* 2. p. 140.

b. *latifolium*; caule elato setis longis sparsis tecto, foliis basi sparse setosis 3-polliaribus 1 1/2 poll. latis oblongo-ellipticis remote potenterque dentato-serratis, anthodii foliolis glabratis erectis, habitu H. *sylvatici*.

c. *ambiguum*; caule glabriusculo inordinate ramoso, foliis (tenuibus) oblongis obtusis glabratis integerrimis, floribus non umbellatis, anthodii glaberrimi foliolis virentibus apice squarrosi, pedunculis nudis vel sparse squamosis.

In sylvaticis elatis; monte Trippiti presso la casetta, discesa della costa della Serra alle fumorole nella contrada del Bell'omo sopra Forio; siepi della vigna di Bardino presso la strada al Rotaro; var. b. ad valles in demissis; nel cavone delle Nocelle: var. c. monte Trippiti.

Septembri, Octobri. ♀

Caules 2-4-pedales, firmi!: *folia* radicalia sub anthesi nulla: *pedunculi* pube stellata canescentes, sub anthodio crassiores: *anthodia* sub anthesi cylindracea, demum cylindraco-conica; *foliolis* glabris vel sparse puberulis, laete virentibus, apice viridi-fuscis, obtusiusculis, subcarinatis: *semina* nigra, striata: *receptaculi* glabri alveola ad margines ciliato-lacera — *Foliis* plus minusque latis variat, uti *anthodia* et *pedunculi* setis nonnullis nigris rigidis sparsis eglandulosis aliquando conspersa sunt.

46. AMBROSIACEAE. *Linn.*

221. AMBROSIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1427.

1. A. MARITIMA. *Lin. sp. pl.* 1401 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 346.

1c. *Sehk. t.* 292, ex *Reich.* — *Ambrosia. Dod. pempt.* 35 — A. vulgaris. *Barr. ic.* 1144.

In arenosis maritimis.

Junio, Julio. ☼

Planta canescens ac pubescens, grate aromatica, erecta: folia varie pinnatifido-incisa: flores parvi, luteo-virentes, capitulis masculis in ramis terminalibus; foemineis masculis subjecti.

222. XANTHIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1426.

1. X. SPINOSUM. *Lin. sp. pl. 1400 — Ten. fl. nap. 2. p. 345.*

lc. *Lam. ill. gen. t. 765. f. 4 — X. lusitanicum, spinosum. Herm. parad. t. 246 — X. lusitanicum, laciniatum, validissimis aculeis munitum. Magn. hort. monsp. p. 208. t. 21.*

Ad vias, et in ruderatis passim.

Augusto, Septembri. ☉

Erectum, glabrum: *folia varie sinuato-pinnatifida, albo-maculata: stipulae tripartito-spinosae: fructus villosi, aculeati; aculeis apice uncinatis.*

2. X. STRUMARIUM. *Lin. sp. pl. 1400 — Ten. fl. nap. 2. p. 345.*

lc. *Fl. dan. 970 — Xanthium. Fuchs. hist. 570.*

In cultis humidiusculis; *Chianole del Testaccio, campi coltivati del piano del Crovone presso l'acquedotto, et inter culta Gossypii siamensis; al principio della valle del Crovone verso l'Arso.*

Julio, Septembri. ☉

Inerme, pubescens, erectum: *folia cordata, 3-5-loba: fructus ovales, hirsutiusculi, aculeati; aculeis rectis, apice vtro uncinatis; rostris non hamatis, ut in X. orientale.*

47. CAMPANULACEAE. Dec., et Duby.

223. CAMPANULA.

Alph. Dec. mon. Camp. p. 213 — Endl. gen. n. 385.

1. C. DICHOTOMA. *Lin. sp. pl. 237 — Ten. fl. nap. 1. p. 74 — Bertol. fl. ital. 2. p. 508.*

lc. *Sibth. fl. gr. t. 211 — C. hirsuta, Ocymifolio caulem ambiente, flore pendulo. Bocc. sic. p. 83. t. 45. f. 1.*

Ad muros, ad mœeries, ad sepes, nec non in collibus lapidosis.

Aprili, Majo. ☉

Villoso-hirsuta: *folia elliptico-oblonga, integra: flores amoene coerulesi, penduli, solitarii, majusculi, sat raro albi.*

2. *C. ERINUS*. *Lin. sp. pl.* 240 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 73 — *Bertol. fl. ital. 2. p.* 510.

Ic. *Erini*, sive *Rapunculi minimum* genus. *Column. phyt. 2. p.* 29. t. 27.

Ad muros, ad rupes, et in ruderalis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Planta breviter hispidiuscula: calycis laciniae lanceolatae, corollae parvae amoene sed pallide coeruleae tubuloso-campanulatae aequilongae, demum stellate-patentes: capsulae cernuae.

Nec *C. Trachelium*, nec *C. Rapunculus* in insula proveniunt.

224. SPECULARIA.

Heist. syst. p. 8 — *Alph. Dec. Camp. p.* 44 — *Endl. gen. n.* 3086.

1. *S. FALCATA*. *Alph. Dec. l. c. p.* 345 — *Prismatocarpus falcatus*. *Ten. fl. nap. 1. p.* 77 — *Campanula falcata*. *Bertol. fl. ital. 2. p.* 523.

Ic. *Ten. l. c. t.* 20 — *Campanula arvensis*, flore minimo, capsula grandi. *Buxb. cent. 4. p.* 24. t. 38.

In cultis elatis, et ad agrorum margines in demissis; *Campagnano, Chianjano, Pico, Chianole del Testaccio, Rotaro presso l'aquedotto, seminati nel fondo del cratere del Vataliere, in quelli di monte Vetta, della Pietra dell'acqua, delle Falanghe, e del Fasano.*

Majo, Junio. ☉

Glabriuscula: *calycis laciniae lineari-acuminatae, demum falcatae, corollae coeruleae saepe longiores, capsulam subaequant.*

2. *S. SPECULUM*. *Alph. Dec. l. c. p.* 346 — *C. Speculum*. *Lin. sp. pl.* 238.

b. hirta; foliis undique villosis canescentibus — Prismatocarpus hirtus. Ten. fl. nap. 1. p. 76 — *Campanula Speculum, b. Bertol. fl. ital. 2. p.* 520.

Ic. *Ten. l. c. t.* 19.

In cultis arenosis, sed potissimum inter segetes.

Majo, Junio. ☉

A speciei typo recedit *pubescentia canescente omnium partium; foliis caulinis basi latioribus — Corollae amoene coeruleae, in fundo albidae, calycinas lacinias lineares aequantes, aut parum excedentes.*

3. *S. HYBRIDA*. *Alph. Dec. l. c. p.* 348 — *Prismatocarpus hybridus*. *Ten. fl. nap. 1. p.* 77 — *Campanula hybrida*. *Lin. sp. pl.* 239 — *Bertol. fl. ital. 2. p.* 522.

Ic. *Campanula arvensis, minima, erecta. Moris. hist. 2. s. 5. t. 2. f.* 22. Inter segetes, in herbosis, ad agrorum margines passim.

Majo, Junio. ☉

Hirsutiuscula : *calycis* laciniae foliaceae, lanceolatae, *capsulae* apice coarctatae 2-3-plo breviores, sed corollam parvam pallide coeruleam duplo fere superantes.

48. ERICEAE. Lindl.

228. ARBUTUS.

Gaertn. de fruct. 1. p. 284 — Dec. pr. 7. p. 581.

1. A. UNEDO. *Lin. sp. pl. 566 — Ten. fl. nap. 4. p. 184 — Bertol. fl. ital. 4. p. 432.*

lc. *Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 21 — Arbutus. Dod. pempt. 804.*

In fruticetis elatis, aut demissis, ac ad rupes.

Octobri, Novembri. ☿

Vulgo *Suorvo peluso*, et fructus comeduntur.

Arbuscula sempervirens, vel frutex : *folia* lacte virentia, coriacea : *racemi* compositi, nutantes : *flores* albi : *fructus* globosi, tuberculati, maturi intense coccinei.

226. ERICA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 659.

1. E. ARBOREA. *Lin. sp. pl. 502 — Ten. fl. nap. 4. p. 173 — Bertol. fl. ital. 4. p. 321.*

lc. *Sibth. fl. gr. t. 351 — E. Coris folio 1. Clus. hist. 1. p. 41.*

In fruticetis, et aliquando ad rupes ubique; nec non ai *scogli di S. Anna presso Ischia.*

Februario, Majo. ☿

Vulgo *Ulice.*

Frutex sempervirens; ramis ramulisque breviter hirtocanescentibus: *flores* parvi, albi, odori, nutantes: *antherae* inclusae, purpurascens, basi cristatae: *stigma* peltatum, exsertum.

III. COROLLIFLORE.

49. PRIMULACEAE. Vent.

227. CYCLAMEN.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 262.

1. *C. REPANDUM*. *Sibth. fl. gr. 2. p. 72* — *Ten. fl. nap. syll. app. 5. p. 7*, ex quo *C. hederacifolium*. *Ten. fl. nap. 3. p. 196* — *C. vernum*, et *C. repandum*. *Bertol. fl. ital. 2. p. 405*, et 406.
 Ic. *Sibth. fl. gr. t. 186* — *Cyclaminus verno tempore florens*. *Clus. hist. 1. p. 265*.

Ad sepes, et in fruticetis apricis, nec non in sylvaticis.

Martio, Aprili. ☿

Tubera parva, orbiculata, depressa: *folia* synanthia, unicoloria aut maculata, cordato-ovata, vel orbiculata, margine repanda aut inaequaliter crenata, ac obiter angulata: *flores* intense persicini; ore tubi corollini campanulato-globosi, circulari, nudo—Denuo monendum puto *C. vernum* et *C. repandum* *Bertol. l. c.* non differre, siquidem folia variant; sed radice forma, florum color, et florendi tempus constantes sunt. Confer *Giord. oss. sopra due specie di Ciclam. in Rivista nap. Gen. e Feb. 1842*, et *Ten. syll. l. c.*

C. neapolitanum in Insula non provenit; et plantae quae nunc inveniuntur a me illuc allatae fuerunt.

228. LYSIMACHIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 269.

1. *L. LINUM STELLATUM*. *Lin. sp. pl. 211* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 417* — *Asterolinum stellatum*. *Hoffm. et Link. fl. port. 1. p. 332*.
 Ic. *Sibth. fl. gr. t. 189* — *Linum minimum, stellatum*. *Magn. bot. monsp. p. 163. fig. p. 162*.

In apricis collibus ad saxorum umbram; *Ischia all' Arso*, *Chiajano nel boschetto del Belvedere, coste orientali del Montagnone a Sarzano, Casamicciola*; *Lacco al Monte vico*, ubi rara.

Martio, Aprili. ☉

Planta gracilis, pusilla, 1-2-pollicaris: *flores* pedunculati, axillares, nutantes: *corolla* ex albo-pallide virens, rotata, calycinis laciniis acuminatis duplo fere minor.

229. ANAGALLIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 270.

1. *A. ARVENSIS. Lin. sp. pl. 211 — Ten. fl. nap. 1. p. 86 — Bertol. fl. ital. 2. p. 422.*

lc. Fl. dan. t. 88 — A phoeniceo flore. Zannieh. hist. t. 238.

In herbosis, et in cultis apricis passim.

Aprili, Majo. ☉

Flores coccinei.

2. *A. COERULEA. Schreb. spic. fl. Lips. p. 5 — Ten. fl. nap. 1. p. 87 — Bertol. l. c. p. 424.*

lc. A. arvensis. Fl. dan. 1570 — Sabb. hort. rom. 2. t. 46.

Cum praecedente eodemque tempore floret.

Corollae amoene coeruleae; lobis crenulatis, eglandulosis in hac; in praecedente vero glanduloso-ciliatis, uti notat Koeh syn. ed. 2. p. 668.

230. SAMOLUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 294.

1. *S. VALERANDI. Lin. sp. pl. 243 — Ten. fl. nap. 1. p. 80 — Bertol. fl. ital. 2. p. 551.*

lc. Lam. ill. gen. t. 101 — Anagallis aquatica, tertia. Lobel. ic. 467.

In humentibus; Bagno presso al Lago, Casamicciola, Lacco, acquedotto di Buceto, Moropane alla sorgente di Nitroli, Pantano sulla strada presso alle scaturigini.

Aprili, Julio. ☉, et ☿

Planta glaberrima: racemi terminales: flores parvi, albi.

50. OLEACEAE. *Lindl.*

231. FRAXINUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1597.

1. *F. OXUS. Lin. sp. pl. 1510 — Ten. fl. nap. 5. p. 298 — Bertol. fl. ital. 1. p. 52.*

lc. Sibth. fl. gr. t. 4 — F. minor, foliis oblongis, fructu tenui retuso. Mich. gen. p. 225. t. 107. f. 1.

b. rotundifolia; foliolis subrotundo-ellipticis. Ten. l. c. — F. rotundifolia. Spr. s. veg. 1. p. 96 — Bertol. fl. ital. 1. p. 54.

1c. F. folio rotundo, latiore, cc. *Michel. l. c. f. 2—Danib. hist. 1. p. 177.*

In fruticetis umbrosis; var. *b. cavone delle Nocelle.*

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Orniello* utraeque varietates.

Petala quatuor, anguste linearia, alba, calyce multo longiora, stamina parum superantia: *samarae* lanceolato-lineares, acutae vel obtusae, pendulae—

Var. *b.* ab *a.* non differt, uti notat ipse *Cl. Bertol. in add. l. c. p. 841.*

232. OLEA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 25.

1. O. EUROPAEA. *Lin. sp. pl. 11 — Ten. fl. nap. 3. p. 8 — Bertol. fl. ital. 1. p. 45.*

a. oleaster; ramis spinescentibus—*O. europaea, b. Lin. l. c.—O. euro-saca, sylvestris, Ten. l. c.*

1c. *Du'ham. arb. ed. 2. v. 1. t. 26 — Sylvestris Olea. Matth. comm. 1. p. 181.*

b. sativa; ramis non spinescentibus—*O. europaea, a. Lin. l. c.*

1c. *Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 25 — Olea sativa. Matth. l. c. p. 182.*

Ad rupes, et in fruticetis: var. *a.* spontanea satis rara: var. *b.* passim colitur, et in vulcanicis saxis optime vegetat.

Aprili, Majo. ☿

Var. *u.* vulgo appellatur *Oglyastro*, et var. *b. Oliva.*

Flores albo-luteoli, odori, in racemis axillaribus simplicibus aut ramosis: *drupae* ovals aut subglobosae, maturae violaceae.

233. PHILLYREA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 24.

1. P. ANGUSTIFOLIA. *Lin. sp. pl. 10 — Ten. fl. nap. 3. p. 7 — Bertol. fl. ital. 1. p. 41.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 8. f. 3 — Phillyrea. IV. Clus. hist. 1. p. 52.*

In fruticetis, tamen rara.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Latierno*, una cum sequente; et in utrisque *folia* coriacea, glaberrima, perennantia: *racemi* axillares, folio breviores: *flores* albidii, odori: *drupae* globosae, demum nigrae.

2. P. MEDIA. *Lin. sp. pl. 10 — Ten. fl. nap. 3. p. 6 — Bertol. fl. ital. 1. p. 40.*

- 1c. *Duham. arb. ed. nov. v. 2. t. 27 — Matth. comm. 1. p. 155.*
 b. *ligustrifolia*; foliis oblongo-lanceolatis integris — *Ait. H. Hew. ed. 2. v. 1. p. 19 — P. virgata. Willd. en. H. Ber. p. 12.*
 1c. *Phillyrea 111. Clus. hist. 1. p. 52.*
 In fruticetis nbique utraeque varietates; sed a. magis obvia.
 Aprili, Majo. ♀

51. APOCYNÆÆ. *Lindl.*

234. VINCA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 419.

1. V. MAJOR. *Lin. sp. pl. 304 — Ten. fl. nap. l. p. 113 — Bertol. fl. ital. 2. p. 749.*
 1c. *Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 14 — Clematis daphnoides, major. Dod. pempt. 406.*
 In sylvaticis, et ad sepes umbrosas; *Bagno, Campagnano, Pico, al Crovone, earone delle Nocelle, dello Schiapparo, e del Vataliero, pennino di Piano Liguori al Nord, Barano, Serrano, Fontana, Casamicciola.*
 Martio, Majo. ♀
 Glaberrima, sempervirens, late excurrentes; sed rami floriferi erecti: folia ovata, et una cum laciniis calycinis margine ciliata: flores magni, amoene coerulei.
 V. minor in Insula non provenit, quamvis prope Neapolim frequens.

52. ASCLEPIADEÆ. *Brown.*

235. GOMPHOCARPOS.

Brown. Wern. soc. 1. p. 38, et in Dec. pr. 8. p. 556.

1. G. FRUTICOSUS. *Brown. l. c., et in Dec. pr. 8. p. 557 — Ten. fl. nap. 3. p. 242 — Bertol. fl. ital. 3. p. 14 — Asclepias fruticosa. Lin. sp. pl. 315.*
 1c. *Asclepias fruticosa. Jaeg. misc. 1. p. 25. t. 2 — Apocynum erectum, africanum, salicis folio, folliculis pilosis. Pluk. alm. t. 138. f. 2.*
 In aridis maritimis; *Laeco alla marina di S. Restituta, etiam ex Ten. syll. p. 63, at nunc fere destructa.*
 Aprili, Junio. ♀
 Frutex erectus, sempervirens, lactescens: folia glaberrima, anguste lan-

ceolata : flores albi , in pedunculis extraxillaribus umbellati : folliculi ventricosoinflati, echinati.

53. GENTIANEAE. Lindl.

236. ERYTHRAEA.

Pers. syn. 1. p. 283 — Dec. pr. 9. p. 57.

1. E. MARITIMA. *Pers. syn. 1. p. 283 — Ten. fl. nap. 3. p. 240 — Bertol. fl. ital. 2. p. 646 — Gentiana maritima. Lin. mant. p. 55.*
 Ic. *Sibth. fl. gr. t. 237 — Centaurium luteum, novum. Column. cephrs. 2. p. 78. t. 77.*

In apricis collibus herbosis, nec non ai scogli di S. Anna presso Ischia. Aprili, Majo. ☉

Viridi-glaucescens, erecta ac glaberrima uti sequentes, pasilla, 2-5-pollicaris : flores sessiles vel pedunculati, lutei, parvi.

2. E. CENTAURIUM. *Pers. syn. 1. p. 183 — Ten. fl. nap. 3. p. 238, var. a. — Bertol. fl. ital. 2. p. 642, excl. nonn. var. — Gentiana Centaurium. Lin. sp. pl. 332.*

Ic. *Fl. dan. 617 — Erythraea. Reneal. spec. t. 78, optima.*

b. albiflora. *Ten. l. c.*

In aridis vel herbosis apricis passim tam in demissis, quam in elatis: var. b. *Punta di S. Angelo, ed al Vataliero.*

Majo, Junio. ☉

Vulgo Cimmino.

Virescens : flores subsessiles, rosei, conferte corymbosi; calycinis laciniis subulatis, adpressis, tubo corollino dimidio brevioribus.

Folia, aut tota planta contusa, et cum urina commixta ad uvas conspurcandas ad agrorum margines sitas, ne a viatoribus comedantur, incolae utuntur, et passim quoque uso medico inservit.

3. E. PULCHELLA. *Fries nov. ed. 2. p. 74 — E. ramosissima. Pers. syn. 1. p. 283, excl. var. b. — Ten. fl. nap. 3. p. 239 — E. Centaurium, c. Bertol. fl. ital. 2. p. 643, an cum syn. omnibus?*

Ic. *Fl. dan. 1637 — Centaurium minus, palustre, ramosissimum, flore purpureo. Vaill. bot. paris. t. 6. f. 1.*

In humentibus; *Casamicciola presso la stufa del Cacciuto alle fumarole di Montecito, di Pietra Vona, presso quelle del Fasano, e del Fico sotto le Falanghe, de' Frassitelli, e del Bell'omo sopra Forio, del valone delle petrelle e delle coste del Funnotillo presso S. Angelo.*

Aprili, Majo. ☉

Virescens, 3-6-pollicaris : caules superne dichotomi, tamen rami non diva-

ricati : *flores* laxiuscule corymbosi, rosei, fere omnes sessiles, nam raro alares pedunculati : *calycis* lacinae tubo corollae adpressae, illo fere duplo breviores : *corollae* lobi oblongo-elliptici, obtusi ac rotundati, sub anthesi horizontaliter patentes : *antherae* luteae, exsertae : *stylus* apice bifidus, cruribus crassiusculis : *stigmata* globoso-ovalia, styli cruris paullo breviora — Cum praecedente male confusa ; tamen a descriptione *E. pulchellae* Koch *syn. ed. 2. p. 567* recedit, floribus alaribus fere semper sessilibus, corollae laciniis obtusis non acutis ; caule in ramos patentes non diviso.

337. CHLORA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 653.

1. *C. INTERMEDIA. Ten. fl. nap. 4. p. 173* — *C. perfoliata, b. acuminata. Griseb. in Dec. pr. 9. p. 69.*

C. glaucescens, foliis caulinis ovatis perfoliatis, calyce ad basim usque 8-partito, laciniis angustissime linearibus carinatis basi invicem remotis, corollae lobis oblongis obtusis, stylo bifido.

1c. *Centaurium luteum*, perfoliatum, Aphaco foliis, ramisque et floribus minoribus. *Cup. panph. 1. t. 124.*

Ad rupes, et ad muros in umbrosis, praesertim humentibus.

Augusto, Septembri. ☉

Corollae lobi denticulati, aliquando acutiusculi, aut vix emarginati, patentes : *stylus* luteus ; *stigmatibus* bipartitis, globoso-didymis, granulatis, luteis : *capsulae* ovatae, vel subglobosae.

2. *C. SEROTINA. Koch syn. ed. 1. p. 485, et 2. p. 558* — *Ten. fl. nap. 4. p. 172* — *C. perfoliata, c. sessilifolia. Griseb. in Dec. pr. 9. p. 69.*

C. glaucescens, foliis caulinis ovatis perfoliatis lobisque corollae ovalibus acutis, calyce 8-partito, laciniis lineari-lanceolatis basi latioribus invicemque approximatis connexisve corolla subduplo brevioribus, stylo bifido.

1c. *Reich. cent. 5. f. 351*, sed *stigmata* emarginato-bifida — *Centaurium minus*, perfoliatum. *Darr. ic. 515. f. 516.*

b. inarimensis ; foliis et corollae grandioris lobis obtusis.

In humentibus ; *Bagno presso al lago, Campagnano al Monte, Rotaro* ; var. *b. ai Maronti, ed alla punta di S. Angelo.*

Majo, Junio. ☉

Stylus et *stigma*, ut in praecedente, a qua calycis lacinarum caractere penitus diversa : varietas *b.* ad *C. siculam* Tin. accedit, sed ab ea differre videtur notatis characteribus.

54. CONVULVACEAE. Vent.

238. BATATAS.

Rumph. amb. 5. p. 367 — Chols. in Dec. pr. 9. p. 337.

Sepal. 5. Cor. campanulata, Stam. inclusa. Styl. 1; stigmatē capitato, bilobo. Caps. 4-locularis, aut abortu 2-3-locularis (Chois.).

1. B. SINUATA. — B. littoralis. Chois. l. c., quoad plantam neapolitanam, et Africae borealis. — Convolvulus sinuatus. Petagn. instit. bot. 2. p. 353 (an. 1787) — C. stoloniferus. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1. p. 14. (an. 1788) — C. Imperati. Vahl syn. bot. 1. p. 17 (an. 1790) — Ten. fl. nap. 3. p. 308 — Bertol. fl. ital. 2. p. 453.

B. caule repente stolonifero, foliis nitidis petiolatis basi cordatis oblongis panduriformibus sinuatis vel palmato-partitis emarginatis, pedunculis folio subbrevioribus, sepalis elliptico-oblongis concavis obtusis mucronulatis corolla caudata sesquipollicari 2-3-plo brevioribus, seminibus lanato-tomentosis.

- 1c. Cyr. l. c. t. 5 — Ten. l. c. t. 121 — Convolvolo marino. Imp. hist. nat. p. 754. ic. 767 — Soldanella marina, longo et sinuoso folio. Barr. ic. 856.

In arenosis maritimis; nell'arene dell'Arso presso al mare (rara); copiose vero Lacco alla marina di S. Montano.

Augusto, Septembri. ☞

Planta glaberrima, lactescens, habitu *Calystegiae Soldanellae*: pedunculi solitarii, in medio articulati, ibique bracteolis duabus minimis lauceolatis acutis adpressis instructi, supra medium incrassati, et albido-virentes: *sepala* persistencia, adpressa, integra, obtusa cum brevi mucronulo, ad margines versus apicem saepe rubentia, et versus basim tenuē scariosa, 5-6-lin. longa: *corollae* tubuloso-campanulatae, sesquipollicares, summo mane et vespere explicatae, candidae, a basi ad medium luteolae, fasciis conicis interne ac externe virentibus a medio ad apicem notatae, ac ad istarum apicem mucronulo instructae: *filamenta* basi utrinque villosa, duo reliquis longiora, pistillum aequantia: *stylus* glaber; *stigmatē* globoso, bilobo: *capsula* glabra, albido-cartilaginea, globosa, matura 2-3-sperma, profunde sulcata, ideoque 2-5-coeca videtur, majuscula uti semina, quae fusco-rufescentia, hinc convexa, inde plana, vel omnino globosa.

Flores aliquando Junio incipiunt, et calida tempestate perdurante usque ad Octobris medium explicantur. — Cl. Petagna l. c. notat hanc speciem primum a Cl. Cavolini post Imperati fuisse delineatam, et amicis suis ostensam, dum Cl. Cyr. l. c. observat sequentia « *sed paucē tanti viri*

« sexaginta annis ante Cl. Cavolini, Imperati in catalogo plantarum regni Neapolitani a Patruo meo et Francisco Perrusio confato, et qui a me asservitur, peculiariter adnotatur, atque ab Angelo Fasano nobisque omnibus dignoscebatur ante Cavolinum; suum ideoque cuique tribuendum. » Tamen cum Cl. Petagna ante alios typis evulga- verit, sic prioritatis jure istius nomen servandum, si species ista est revera distincta a *C. litorali* Lin., uti mihi videtur ex characteribus tum a Lin. quam ab aliis auctoribus *C. litorali* tributis; quod si fallor tum *B. litoralis* erit appellanda cum *Chois*.

239. CONVULVULUS.

Chois. in Dec. pr. 9. p. 399.

1. *C. ARVENSIS*. Lin. sp. pl. 218 — Ten. fl. nap. 1. p. 61 — Bertol. fl. ital. 2. p. 434.

lc. Bull. herb. t. 269 — Smilax levis, minor. Dod. pempt. 553.

b. *auriculatus*; foliis lineari-oblongis angustis, auriculato-sagittatis, auriculis longis acutis. Lam. dict. enc. 3. p. 540 — Ten. l. c. — *C. arvensis*, b. Lin. l. c.

lc. *C. minimus*, angusto auriculato folio. Bocc. mus. t. 33. f. 1.

In cultis, et ad vias: var. *b.* praesertim in arenosis.

Junio, Septembri. ☞

Vulgo *Camponielli*.

Radices longe repentes, alte descendentes: caules grailes, volubiles, puberuli; folia glabra, sagittato-hastata: flores parvi, pallide rosei.

2. *C. ITALICUS*. Roem. et Schult. s. veg. 4. p. 266 — *C. hirsutus*. Ten. fl. nap. 1. p. 60 — *C. altheoides*. Bertol. fl. ital. 2. p. 433, ex parte.

lc. Ten. l. c. t. 15 — *C. altheaeifolio*. Clus. hist. 2. p. 49.

In apricis herbosis collibus, aut in marnaceis magis frequens: *Ischia al Castello, Campagnano, coste del Pignatiello, del Lopillo, di S. Pancrazio e della Scarupata, Testaccio, da Barano a Moropane, coste da S. Angelo a Forio, Lacco nella collinetta presso al mare, ed al monte Vico.*

Aprili, Julio. ☞

Virescens, vel hirsuto-canescens: caules volubiles: flores magni, rosei.

In omnibus insulae plagis nunquam faciem mutat, nec in *C. altheoidem* transit, cum quo ideo immerito a plerisque confusus.

3. *C. LINEATUS*. Lin. sp. pl. 224 — Ten. fl. nap. 1. p. 63 — Bertol. fl. ital. 2. p. 444.

lc. *C. marinus*, repens, angusto et oblongo folio, flore purpurecente. Barr. ic. 1132.

In marnaricis calcareo-argillosis; *Guardiola di S. Gennaro verso la punta, e nella costa occidentale.*

Majo, Junio. ☼, et basi fere ♀.

Radices repentes: caules ad basim fere fruticulosi; annotini vero 4-6-polliares: folia spatulata, obtusa, vel anguste lanceolata et acutiuscula, 2-4-lin. lata, lineata, sericeo-candida: corollae pallide carneaе, vel ex albo-carneaе: capsulae ovatae, villosae.

240. CALYSTEGIA.

Brown. pr. p. 438 — Dec. pr. 9. p. 433.

1. C. SOLDANELLA. *Brown. l. c. — Convolvulus Soldanella. Lin. sp. pl. 226 — Ten. fl. nap. 3. p. 208 — Bertol. fl. ital. 2. p. 451.*

lc. Convolvulus, seu Brassica marina. *Lobel. ic. 602. f. 2.*

In arenosis maritimis; *arene dell'Arso presso al mare, Bagno alla marinella del Lago, Forio a Citara, ed a Montevergine.*

Majo, Junio: ☼

Planta glaberrima, procumbens, lactescens: flores rosei.

2. C. SYLVATICA. *Brown. in Dec. pr. 9. p. 433 — Convolvulus sylvaticus. Wald. et Kit. pl. rar. Hung. 3. p. 290 — Ten. fl. nap. 3. p. 209 — C. sylvestris. Bertol. fl. ital. 2. p. 438.*

lc. *Wald., et Kit. l. c. t. 261.*

Ad sepes, et in sylvaticis, sed deest in locis meridiem spectantibus.

Aprilis, Junio. ☼, et basi fere ♀

Vulgo *Verrucchio.*

Glaber, inter sepes vel in fruticetis alte scandens: *folia lata, laete virentia, cordato-ovata, acuta vel obtusa cum mucronulo; auriculis basi saepius rotundatis: bracteae inflato-ventricosae, altera alteram amplectens: flores magni, albi, odori—Folia cruda oleo illinita, ad furunculos jam maturos sanandos, et ad eorum ventriculum (vulgo radica) evellendum incolae frequenter utuntur.*

241. CUSCUTA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 288.

1. C. EPITHYMUM. *Lin. syst. veg. ed. 13. p. 140—Ten. fl. nap. 3. p. 250 — Bertol. fl. ital. 3. p. 69.*

lc. *Lam. ill. gen. t. 88 — Reich. cent. 5. f. 692.*

Parasitica Graminum, Rubiacarum, Compositarum, Leguminosarum, et in apricis collibus, sed non satis frequens.

Majo, Junio. ☉

Calycis lacinae albae, obtusiusculae, corollae tubum subaequantes: *corollae* candidae lobi horizontales, patentes, ovato-lanceolati, acuti, tubo aequilongi: *stigmata* duo, filiformia: *squamae* hypogynae, oblongae, obtusae, apice denticulatae.

55. BORAGINEAE. *Juss.*

242. HELIOTROPIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 239.

1. H. TENUIFLORUM. *Guss.* — H. europaeum, *b. tenuiflorum. Guss. syn. 1. p. 216 — Dec. pr. 9. p. 535.*

H. calycibus persistentibus una cum spicarum rachide patenter setoso-hirsutissimis, laciniis anguste linearibus rectis tubo corollino adpressis demum stellato-patentibus, corollae (parvae) limbi lobis ellipticis obtusis, stigmate pubescente conico subattenuato apice inaequaliter bifido stylum brevem semel superante antherarum apicem non excedente, seminibus glabriusculis perfectis verrucoso-scabris.

lc. nostra t. VII. f. 1. a, b, c, d, e, f.

In cultis praesertim arenosis, elatis, aut demissis ubique.

Septembri, Octobri. ☉

Pubescentia albidior ac densior, quam in sequente: *spicae* ob fructus minores graciliores, saepe demum elongatae, 5-6-pollicares: *flores* parvi, grate *Jasminum* olentes; *corollarum limbo* mill. longo, sero autumno profunde usque ad basin secto, uti aliquando in *H. europaeo*: *antherae* sub medio tubi insertae, ideoque *stigmatibus* 1-1½ mill. longo aequalitae: *stylus* glaber: *semina* saepius glabrata, et magis verrucosa ac excavata quam in sequente, sat raro nonnullis punctis aureis conspersa: *florescentia* usque ad serum autumnum perdurat.

2. H. EUROPAEUM. *Lin. sp. pl. 137 — Ten. fl. nap. 1. p. 112 — Bertol. fl. ital. 2. p. 251.*

H. calycibus persistentibus una cum spicarum rachide villosa-hirsutis, laciniis lanceolatis rectis tubo corollino adpressis, demum stellato-patentibus, corollae limbi lobis ovatis obtusissimis (non acutis), stigmate conico basi tenuissime glanduloso-puberulo apice attenuato elongato stylum brevem in aequaliter bifidum 2-3-plo superante antherarum apicem excedente, seminibus (saepius) hirsutis glabrativae perfectis tenue verruculoso-scabris.

lc. nostra t. VII. i, k — Jacq. austr. 9. t. 207 — Plenk offic. 7. p. 43. t. 74. ex Bertol. — Lam. ill. gen. t. 91. f. 1 — Sabb. H. Rom. 2. t. 33 — H. majus, vulgare. Bocc. sic. p. 91. t. 49 — Clus. hist. 2. p. 46 — Dod. pempt. 70 — Matth. comm. 2. p. 636 — Tabern. ic. 248

— *Moris. hist. 3. s. 11. t. 31. f. 7*—*H. majus*, et herba cancri. *Lobel. ic. 1. p. 260.*

In cultis pinguibus, vel in arenosis ubique.

Junio, Septembri. ☉

Pubescentia tenuis ac magis virescens, quam in praecedente: *spicae* non ita graciles, ac elongatae: *flores* vix aliquando versus vespem vel autumno tenui odori, semel majores, nempe limbi lobis 2. mill. longis: *antherae* supra basim tubi insertae, tamen stigmatis apice depressiores: *stylus* brevis, glaberrimus; *stigma* 2-mill. longum, a medio ad apicem glabrum: *semina* in hoc saepius hirsutiora, subcanescentia, obsolete verrucosa, ac excavata: *florescentia* raro ultra Septembrem protrahitur.

3. II. *BOCCONI. Guss. ind. sem. H. R. in Boec. an. 1825; p. 6. pr. 1. p. 211, et syn. 1. p. 217*—*Bertol. fl. ital. 2. p. 253*—*H. aetnicum. Jan. elench. p. 3.*

H. calycibus persistentibus una cum rachide patenter villosissimo-hirsutissimis, laciniis linearibus tubo corollino adpressis apice vero squarrosis demum stellate-patentibus, corollae (majusculae) lobis orbiculatis obtusissimis, stylo conico brevi apice pubescente ac inaequaliter vix emarginato stylium brevem parum superante antherarum apice aequali, seminibus glabriusculis perfectis verrucoso-scarbis.

- 1c. *nostra t. VII. lit. f. H. siculum, majus, flore amplo odorato. Boec. sic. p. 90, et 91. t. 49. f. A. B. C.*—*Bonn. t. 27.*

In herbosis humentibus calidis (g. 30. ad 40 cent.); *alle fumarole nella contrada del Bell'omo sopra Forio* tantum provenit.

Septembri, Octobri. ☉

Habitus ac *pubescentia* omnino praecedentis; sed *calyces* hirsutiores: *flores* gratissime *Jasminum* olentes, duplo majores, limbi lobis 3. mill. longis; corollae tubo saepe calycem longe excedente: *stylus* brevis; *stigmatibus* conico, apice vix attenuato: *semina* ut in *H. tenuiflora*—Pro differentia cum *H. suaveolenti Marsch.*, et *H. villosa Desf.* confer el. *Bertol. et syn. l. e.*

4. II. *MACROCARPUM. Guss.*

H. calycibus persistentibus una cum spicarum rachide adpresse setoso-hispidis canescentibusque fructiferis globoso-ovatis, laciniis ex ovata basi lanceolatis rectis semina undique tegentibus, demum vix patulis, corollae limbi lobis orbiculatis obtusis, stigmatibus pubescente conico apice inaequaliter bifido stylium brevissimum superante antherarum apice aequali, seminibus glabriusculis perfectis verrucoso-scarbis.

- 1c. *nostra t. VII. f. 2. g, h.*

In argillosis elatis, vel in arenosis aridis cultis; *Chiajano nelle signe presso l'acquedotto dietro alla taverna al trivio, piano di Muori fra gli saliceti cedui, Forio negli orti di Citara.*

Septembri, Octobri. ☉

Habitus quam in praecedentibus robustior, quamvis caules pedalem altitudinem vix superent, dum in illis aliquando 2-pedales et ultra: *folia* crassiora, rigidiora, magis glaucescentia ac lineata, nonnumquam fere orbiculata: *spicae* ob calyces majusculos, ac approximatos densiores, crassioresque, 1-3-polliares: *calycis* lacinae lineam et ultra latae, seminibus jam deciduis vix semipatentes: *flores* odori, magnitudine *H. europaei*; *corollae* tubo calycem aequante: *antherae* basi tubi insertae: *stylus* ita brevis, ut fere obliteratus: *stigmatē* 1-1/2 mill. longo: *semina* *H. tenuiflora* similia; tamen *gynobasis* major, ideoque calyces videntur majores.

Species superius enumeratae conveniunt inter se *duratione* annua: *scabritie* ac *pubescentia* plus minusque cinerea, plus minus adpressa omnium partium: *caule* erecto, ramoso; ramis infimis saepe patulis: *foliis* petiolatis, integerrimis, ovalibus oblongisque, lineatis: *spicis* lateralibus solitariis, terminalibus conjugatis, chaectatis, apicē scorpioideis, fructiferis plus minus elongatis: *calycibus* sessilibus, 5-partitis: *floribus* albis: *corollae* fauce imberbi, plicata, ex viridi-flavescente; tubo virenti, villosa, cylindraceo, calycem parum excedente, denticulo inter limbi 5-fidi lobis explanatis saepe interjecto: *antheris* subsessilibus, semper inclusis, ovato-pyramidatis, subcompressis, glabris: *stilo* quam stigmatē breviorē ac angustiorē, cylindrico: *stigmatē* semper conico: *seminibus* facie interiori non bifoveolatis, ovato-pyriformibus, verrucososcabris; *verruis* plus minus elevatis, acutis aut obtusiusculis.

243. CERINTHE.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 246.

1. *C. ASPERA*. *Roth cat. bot. 3. p. 33* — *Ten. fl. nap. 1. p. 137* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 319*.

b. pallida; floribus pallide ex albo-sulphureis.

It. C. quorundam, major, flavo flore. *Claus. hist. 2. p. 167?*, an ad speciei typum.

In vineis, et ad herbosa murorum fastigia sola var. *b.*; *Casamicciola, Lacco al monte Vico verso S. Montano e sotto la strada di Marecocco, Forio al Cerriglio, nelle vigne di Cavallaro.*

Aprili, Majo. ☉

Folia et *sepala* a basi ad apicem serrulato-ciliata, maculata vel concoloria: *sepala* inaequalia, obtusa, corolla duplo breviora: *corollae* pallide luteae, fere concolores, in medio non sulcato-faveolatae, dentibus triangularibus, acutis, reflexis: *antherae* inclusae!, filamento dilatato aequalēs, brevioresque: *stigma* capitatum, et saepe obsolete bilobum.

2. *C. GYMNANDRA*. *Gasparr. in Rend. della R. Accad. delle Scienze di Nap. v. 1. p. 72, bis.*

C. caulo erecto simplici vel ramoso, ramis inferioribus ascendentibus, foliis scabroso-punctatis a medio ad apicem serrulato-ciliatis, inferioribus spatulatis, superioribus oblongo-lingulatis, corolla cylindracea basi hinc gibbosa supra medium staminifera, limbo 5-dentato, dentibus brevissimis reflexis, antheris apice exsertis ! filamento longioribus.

lc. nulla.

In apricis herbosis ; *Ischia all' Arso*, sed rara, et semel inveni.

Aprili, Majo. ☉

Male *Cl. Bertol.* in *fl. ital. l. c.* a praecedente non separat; nam antherarum exsertarum characterem variare non vidi.

241. ECHIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 251.

1. *E. PLANTAGINEUM*. *Lin. mant. p. 202—Ten. fl. nap. 3. p. 191—Bertol. fl. ital. 2. p. 344.*

lc. E. lato *Plantaginis* folio, italicum. *Barr. ic. 1026*, optima.

In pascuis, ad vias, et in cultis ubique.

Martio, Majo. ☉, et ♂

Vulgo *Sucamele*.

Species ista, quae protracta florescentia habitum saepe alienum assumit, facillime ab aliis dignoscitur foliorum radicalium forma, quae exacte cordato-ovata vel oblonga, lineata, ac rosulata, terrae stricte adpressa: flores magni, coerulei: tota planta hirsuta.

2. *E. CALYGINUM*. *Viv. fl. ital. frag. fasc. 1. p. 2—Bertol. fl. ital. 2. p. 353—E. prostratum. Ten. fl. nap. 1. p. 50.*

lc. Viv. l. c. t. 4—Ten. l. c. t. 12.

In herbosis lapidosis maritimis, et ad vias prope maceries in herbosis; tamen satis rarum; *marina de' Maronti presso la scala del Testaccio, Forio a S. Francesco, e presso i muri a secco lungo la strada che conduce alla Chiesa del Cuotto.*

Aprili, Majo. ☉

Flores pallide coerulei, parvi, calycibus post florescentiam ampliatis, sed sub antesi corolla brevioribus.

245. BORAGO.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 248.

1. *B. OFFICINALIS. Lin. sp. pl. 197 — Ten. fl. nap. 3. p. 189 — Bertol. fl. ital. 2. p. 329.*

Tc. Lam. ill. gen. t. 91. f. 1 — Borago. Dod. pempt. 627.

In herbosis apricis, et ad agrorum margines passim, praesertim in plaga insulae meridionali.

Januario, Aprili. ☉

Vulgo *Vorraccia*, et inter olera adhibetur.

246. ANCHUSA.

Dec. pr. 10. p. 41.

1. *A. HYBRIDA. Ten. fl. nap. 1. p. 45 — Dec. l. c. p. 45.*

A. villosa-hispida, foliis oblongo-lanceolatis sinuato-dentatis subundulatis, ræemis densis demum elongatis, calycibus 5-dentatis adpresse setosis, fructiferis deflexis subinflatis, (corollis intense coeruleis) fornicibus papilloso-villosis, stylo sub anthesi calyceem vix excedente.

lc. Ten. l. c. t. 11 — Buglossum sylvestre. Barr. ic. 326.

In campis arenosis, et ad agrorum margines passim in cultis ab elatis ad litus.

Octobri, Junio. ☉

In *pl. rar. p. 81*, et in *syn. 1. p. 221* rursus notavi quibus certis characteribus haec ab *A. undulata* discrepat, ita ut nonnisi ab illis qui solummodo plantas male exsiccatas observant confundi possunt. Interim *Cl. Bertol. in fl. ital. 2. p. 287* adhuc simul associat.

2. *A. ITALICA. Retz. obs. fasc. 4. p. 12 — Ten. fl. nap. 1. p. 43 — Bertol. fl. ital. 2. p. 289.*

b. humilis; foliis anguste lanceolatis, superioribus utrinque attenuatis, caule pedali et infra parce ramoso. *Ten. syll. p. 82.*

lc. Lam. ill. gen. t. 92, ex Ten.

In argillosis campis elatis; *Buceto ne'siti argillosi alla sommità della valata sotto l'acquedotto*, sola var. *b.*

Majo, Junio. ☿

Strigoso-hispida, erecta: racemi paniculati: calyces 5-partiti, immutati: corolla hypocrateriformis, azurea; squamis in fauce albidis, pennicilliformibus.

247. LYCOPSIS.

Dec. pr. 10. p. 54.

2. *L. VARIEGATA. Lin. sp. pl. 198—Bertol. fl. ital. 2. p. 338—L. bullata. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1. p. 34—Ten. fl. nap. 3. p. 179.*

1c. *Cyr. l. c. t. 11. f. 3—Ten. l. c. t. 115—Buglossum scorpioides, hirsutum, flore coeruleo, italicum. Barr. ic. 403, mediocris.*

In campis herbosis apricis, ad agrorum margines, et etiam ad murorum fastigia herbosa.

Februario, Majo. ☉

Hispida, ascendens: folia callosa-ciliata, saepius albo-bullata: corolla azurea; limbi lobis obtusis, inaequalibus; tubo curvo, calycem immutatum aquante; squamis in fauce albis, pennicilliformibus.

248. SYMPHYTUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 245.

1. *S. ZEYERI. Schimp. in Flora 1829. p. 7—S. tuberosum. Ten. fl. nap. 3. p. 186, quoad plantam prope Neapolim proveniente—Bertol. fl. ital. 2. p. 316, var. b. ex parte—S. brochum. Bory, et Chaub. exped. Mor. p. 65, ex Dec. pr. 10. p. 38.*

S. piloso-hirsutum scabriusculum, radicibus fibrosis in tubera irregulariter hinc inde incrassatis, caule simplici vel superne bifido, foliis inferioribus petiolatis ovato-oblongis basi subcordatis, superioribus angustatis sessilibus subdecurrentibus, corollae (pallide sulphureae) limbi denticulatis tubo 4-plo brevioribus, antheris filamento longioribus, fornicibus pistilloque longe exsertis.

1c. *Bory, et Chaub. l. c. t. 7, ex Dec. l. c.*

In cultis argillosis humentibus, in sylvis, et ad sepes.

Martio, Aprili. ☾

Non est forma australis *S. bulbosi*, nam species ista apud nos quoque provenit, sed in montosis, nunquam in demissis occurrit, et sedulo comparatae una in alteram non transit. Confer quae dixi in *syn. f. p. 226*; tamen a plerisque adhuc sub *S. bulboso* refertur.

249. LITHOSPERMUM.

Dec. pr. 10. p. 73.

1. *L. ARVENSE*. *Lin. sp. pl.* 190 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 173 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 278.

lc. *Fl. dau.* 456 — *Echioides alba*. *Column. ecphr.* 1. p. 184. t. 185. Inter segetes passim.

Aprili, Majo. ☉

Pedunculi brevissimi, etiam in fructu immutati! : *calycis* lacinae post anthesim patentes ac elongatae, non dilatatae: *corollae* albae, externe pubescentes, calycem parum excedentes: *semina* ovoidea, fusco-virentia, glaberrima, varic corrugato-lacunosa, ac tuberculis muricata, ideoque scabra.

2. *L. OFFICINALE*. *Lin. sp. pl.* 189 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 176 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 271.

lc. *Lam. ill. gen. t.* 91 — *L. minus*. *Lobel. ic.* 457. f. 2.

In sylvaticis; *selve del Rotaro, di Catreca, delle Falanghe, del Fusano, di Trippiti, del monte Vezza.*

Majo, Junio. ☽

Corollae ex albo-luteolae lobi patentes, obtusissimi, fere crenulati, ad basim prope apicem tubi gibbis duabus prominulis instructi, ita ut foveola utrinque notati videntur: *faux* tubi pervia, pentagona, luteola: *semina* candida, levissima, durissima.

3. *L. PURPUREO-COERULEUM*. *Lin. sp. pl.* 190 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 176 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 273.

lc. *Jacq. austr.* 1. t. 14 — *L. majus*. *Dod. pempt.* 83.

In sylvis, et ad sepes umbrosas; *cavone del Vataliere, delle Nocelle, e del Crovone, siepi presso la via della Molara, cava di Buceto, e di Cerambi.*

Martio, Majo. ☽

Corollae majusculae, amoene coeruleae; limbi lobis ovatis, obtusis; tubi *faux* pervia, tamen ubi stamina inseruntur linea pilorum glandulosorum instructa est: *stylus* albidus, calyce brevior; *stigmatibus* didymo: *semina* ut in precedente.

250. MYOSOTIS.

Dec. pr. 10. p. 104.

1. *M. HISPIDA*. *Schlecht. mag. nat. Berol.* 8. p. 229 — *Dec. pr.* 10. p. 108 — *M. collina*. *Ten. fl. nap.* 3. p. 174, non Ehrh.

1c. *Coss. et Germ. atl. fl. paria. t. 15. f. 5, 6, 7* — *M. collina. Sturm. fl. germ. fasc. 42.*

In collibus herbosis, et in campis aridis arenosis.

Octobri, Majo. ☉

Planta ramosissima, 2-8-pollicaris: pedicelli aequales, erecto-patentes: calyces basi setis uncinatis, superne setis rectis tecti; laciniis obtusis, in fructu fere conniventibus, ideoque fauce calycina parva: corollae minutae, calycem subaequantes, duplo quam in sequente minores; limbo erectiusculo, fere campanulato, amoene coerulesco, basi albo-maculato, faucis squamis albo-viridulis: semina ovalia, nitida, levissima.

Cl. *Bertol. in fl. ital. 2. p. 262* hanc et sequentem non separat a *M. arvensi* — A *M. versicolore* (pro qua confer optimam iconem *Coss. et Germ. l. c. t. 15. f. 11, 12*) recedit calycibus non exacte clausis, et corollis semper coelestinis, non primo sulphureis, inde coerulescentibus, denique violaceis.

2. *M. INTERMEDIA. Link en. H. Berol. 1. p. 104* — *Dec. pr. 10. p. 108* — *M. arvensis. Ten. fl. nap. 3. p. 174?*

M. caule hirsuto stricto apice ramoso, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis, pedicellis fructiferis semipatentibus calyce 2-3-plo longioribus, calycibus profunde et acute 5-fidis, fructiferis clausis patulo-pilosis, pilis basilaribus uncinatis divaricatis, corollae limbo concavo.

1c. *Sturm fl. germ fasc. 42* — *Bull. herb. t. 355.*

In silvaticis, in cultis, nec non ad agrorum margines passim.

Aprili, Majo. ☉

Pedicelli angulo semirecto patentes, semper calyce longiores: calyces in fructu ovati, non truncati; nam eorum lacinae acutae, et in fructu non conniventes: corollae parvae, tamen duplo quam in praecedente majores, cyanae, annulo in fauce albido, inde luteo; limbo erecto-patente, non explanato, nam tubus calyce brevior.

251. CYNOGLOSSUM.

Dec. pr. 10. p. 116.

1. *C. PICTUM. Ait. H. Kew. ed. 2. v. 1. p. 179* — *Ten. fl. nap. 3. p. 181* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 300.*

1c. *Brot. phyt. lusit. 2. t. 159* — *C. creticum. Clus. hist. 2. p. 162. f. 2.*

In ruderalis, vel in herbosis viarum agrorumque margines.

Aprili, Majo. ☼

Molliter pubescenti-canescens, erectum: flores dilute coerulesci, venis purpurascensibus picti: stamina inclusa: semina virentia, convexiuscula, margine non prominulo, aculeis glochidiatis tecta: pedunculi fructiferi reflexi.

56. SOLANACEAE. *Dun.*

252. DATURA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 332.

1. D. STRAMONIUM. *Lin. sp. pl. 255 — Ten. fl. nap. 1. p. 96 — Bertol. fl. ital. 2. p. 605.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 113 — Stramonia. Best. eist. aut. ord. 2. fol. 4. f. 1 — Solanum maniarum Dioscoridis. Column. phyt. p. 47.*

In cultis pingvibus, etiamque in arenosis, et ad vias.

Junio, Octobri. ☉

Vulgo *Cacapuzza fetente*.

Glaberrima, lacto virens, erecta, foetidissima: flores albi, erecti, odori: capsulae majusculae, erectae, spinis validis brevibus irregularibus tectae.

253. HYOSCIAMUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 333.

1. H. ALBUS. *Lin. sp. pl. 257 — Ten. fl. nap. 1. p. 98 — Bertol. fl. ital. 2. p. 613, ex parte — Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 548.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 117. f. 2 — Blachw. herb. 2. t. 3.*

In ruderalis maritimis satis rarus; *Punta di S. Angelo presso alla marina*, una cum sequente.

Aprili, Majo. ☿, et basi aliquando ☽.

Corollae in hoc concolores, nempe omnino sordide-viridi-luteolae: reliqua ut in sequente, praeter específicos characteres notatos.

2. H. MAJOR. *Mill. dict. n. 2 — Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 548 — H. varians. Vis. Bot. zeit. an. 1829. p. 3 — Tcu. syll. app. 3. p. 588.*

H. villos-viscidus, caulibus basi suffrutescentibus, foliis crassiusculis petiolatis inferioribus subcordatis, reliquis basi acutis sinuato-vel angulato-dentatis, floralibus subintegris, floribus axillaribus pedunculatis subsessilibusque in ramorum apice subspicatis, corollae tubo incurvo intus violaceo, limbi irregularis lobis tribus superioribus majoribus planis.

1c. *Vis. fl. dalm. t. 24. f. 2 — Bull. herb. t. 93 — H. vulgaris. Clus. hist. 2. p. 84.*

In ruderalis, et ad mareries; *Bagno, Punta di S. Angelo, coste di S. Pancrazio, e del Pignaticello, Lacco a S. Restituta, Forio a S. Francesco.*

Aprili, Julio. ☽, vel ☿

Vulgn *tubacco salvatico*.

Caulces aliquando 3-pedales : *folia* praecedentis similia : *calyces* tubulosi, exquisitè nervosi, subreticulati, inferiores aliquando pedunculati, reliqui subsessiles ; *dentibus* latis, ovatis, acutis, erecto-patulis : *corollae* tubus externè sordide violaceus, calycem vix excedens ; limbo 5-lobo, et inter duos lobos inferiores minores profundius fisso ; lobis omnibus obtusis, pallide viridi-lutescentibus ; fauce et tubo interne usque ad medium intense violaceis : *filamenta* inferne villosa aë albida, a medio ad apicem, uti *stylus* glaberrimus, pulchre violacea : *antherae* lutescentes : *semina* albida, compressa, minutis tuberculis exasperata — Cl. Bertol. in *fl. ital.* 2. p. 613, nequidem uti varietatem a praecedente distinguit, quod ipse Cl. Vis. in *fl. Dalm.* 2. p. 234 sub *H. ulbo* notat.

254. CAPSICUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 338.

1. *Fructibus erectis.*

1. C. PYRAMIDALE. *Mill. dict. n. 7—Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 414.*
b. longicorne ; fructu conico acuminato (aliquando) arenato, longo. *Dun. l. c.*
 1c. C. minus, flavum. *Rumph. amb. 5. p. 247. t. 88. f. 3*, sed fructus apud nos nitide rubentes — *Solanum rubens*, minus, erectum. *Wein. phyt. 4. t. 930. f. 6* — *Piper indicum*, minus, erectum. *Besl. eist. aut. ord. 1. fol. 8*, sed *P. indicum*, medium, longum, erectum. *Besl. l. c. fol. 11*, melius hoc refert.

Culitur, et vulgo appellatur *Diavolilli*.

Majo, Septembri. ☉

Fructus 1 1/2-2-pollicares, acuminati, nitide rubentes.

2. C. ANNUM. *Lin. sp. pl. 270*, exel. plur. syn.—*Dun. in Dec. l. c. p. 412.*
b. acuminatum ; fructibus ex ovata basi conico-ovatis obtusiusculis rubris vel flavis. *Dun. l. c.*
 1c. *Blakw. herb. t. 129* — *Piper oblongum*, erectum, pyramidale. *Clus. cur. post. p. 52. ic. p. 51. f. 2* ; sed fructus nimis acutus — *Solanum mordens*, fructu erecto, cordiformi, rubro. *Wein. phyt. 4. t. 929. f. c. f. abbreviatum* ; fructibus ovatis, vel cordiformibus rubris. *Dun. l. c.*
 1c. *Piper* erectum, minus. *Clus. cur. post. p. 52. ic. p. 51. f. 3* ? nam fructus nimis acutus, et inde perperam ad *C. grossum* a *Dunal* citata — *Solanum Capsicum*, fructu erecto, rubro, rotundo. *Wein. phyt. 4. t. 928. f. a*, melior.

Colitur, et var. a. ac b. vulgn *Peperuvli per fricre* dicuntur.

Majo, Septembri. ☉

3. *C. CERASIFORME*. Willd. *H. Ber.* 1. p. 242 — *Dun.* in *Dec.* 1. c. p. 422.
a. macrocarpum; fructu duplo majore (diametro 5-6-lineari), demum nitide rubente. *Dun.* 1. c.
lc. *Solanum Capsicum* dictum, perenne, minus, erectum. *Wein. phyth.* 4. t. 930. f. c.
 Colitur, et appellatur vulgo *Peparuoli tunni, o a Cerasiello*.
 Majo, Septembri. ☉
4. *C. CROSSUM*. *Lin. mant.* p. 47 — *Dun.* in *Dec.* 1. c. p. 422.
b. ovatum; fructu subovato-oblongo obtusissimo, grosse rugoso, rubro vel luteo. *Dun.* 1. c., excl. syn. *Clus.*
lc. *Piper indicum*, maximum, rotundum, erectum. *Besl. eist. aut. ord.* 1. fol. 11.
 Colitur, et dicitur *Peparuolo a Carcioffo*.
 Junio, Septembri. ☉

2. *Fructibus pendulis.*

5. *C. LONGUM*. *Dec. cat. H. Monsp.* 1813. p. 86 — *Dun.* in *Dec.* 1. c. p. 421.
c. incrassatum brevipes; fructu conico, crassiore, rectiusculo, obtuso (viriditate, aut rubente). *Dun.* 1. c.
lc. *Blakw. herb.* 1. c. 129! — *C. oblongioribus siliquis. Dod. pempt.* 716 — *Siliquastrum majus*, et minus. *Fuchs. hist.* 732 — *Piper antiricanum. Clus. cur. post.* p. 54 — *Solanum mordens*, fructu propendente, oblongo, crasso. *Wein. phyth.* 4. t. 927. f. c — *Piper indicum*, medium. *Besl. eist. aut. ord.* 1. fol. 7.
 Colitur, et vulgo appellatur *Calamarielli*.
 Majo, Septembri. ☉

Omnes enumeratae species apud nos cultae annuae sunt; sed in locis calidissimis, et hyemalibus tempestatibus mitissimis suffruticosae evadunt.

233. SOLANUM.

Dun. in *Dec. pr.* 13. pars 1. p. 27.

1. *S. SODOMEUM*. *Lin. sp. pl.* 268, excl. syn. *Plukn. — Ten. fl. nap.* 1. p. 103 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 636.
b. Hermannii. Dun. in *Dec. pr.* 1. c. p. 366 — *S. astrophorum. Jon cat.* p. 4 — *S. Sodomium. Guss. syn.* 1. p. 271.
S. fruticosum erectum aculeatum, aculeis rectis basi dilatatis, ramis nitide purpurascensibus, foliis petiolatis oblongis sinuato-pinnatifidis, lobis angulatis sinuatisve, sinibusque rotundatis, supra glabratis, subtus sparse stellato-pilosiusculis, junioribus utrinque farinoso-pilosis, pilis scl-

latis simplicibusque, corymbis paucifloris, florum fertiliam calycibus aculeatissimis, bacis majusculis (luteis demum spadiceis).

- 1c. *Sibth. fl. gr. t. 253*—*S. pomiferum*, frutescens, africanum, spinosum, nigricans, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Herm. Hort. Lugd p. 573. ic. 575.*

In maritimis ad sepes, ad vias, et in sylvaticis aut lapidosis.

Julio, Octobri. ♀

Vulgo *Pomidoro selvaggio spinoso*.

Folia uti diuretica ab incolis adhibentur.

2. *S. ESCULENTUM*. *Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 355*—*S. Melongena*. *Lin. sp. pl. ed. 1. p. 260.*

a. *aculeatum*; parce *aculeatum*, bacis oblongo-obovatis teretibus violaceis. *Dun. l. c.*

- 1c. *Sub. H. Rom. 3. t. 65*, excl. syn. *Tourn.*—*S. pomiferum*, fructu oblongo violaceo. *Wein. phyt. v. 4. t. 954. f. a.*

In insula passim colitur usu esculento; et dicitur vulgo *Molignane*.

Majo, Augusto. ♀

Tomentoso-canescens: flores coerulei.

3. *S. DULCAMA*. *Lin. sp. pl. 261*—*Ten. fl. nap. 1. p. 102*—*Fertol. fl. ital. 2. p. 631.*

c. *hastifolium*. *Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 78.*

S. fruticosum scandens inermis glabrum, foliis cordato-ovatis, superioribus auriculato-hastatis, corymbis oppositifoliis terminalibusque, corollis amoene violaceis, bacis rubentibus.

- 1c. *Bull. herb. t. 23*—*Amara dulcis*. *Lobel. ic. 266.*

Ad sepes in sylvaticis humentibus; *Casamicciola, Lacco*; sed rarum.

Junio, Septembri. ♀

Inter sepes alte scandens: folia laete virentia: baccae globoso-ovales.

4. *S. TUBEROSUM*. *Lin. sp. pl. 265.*

- 1c. *Blackw. herb. t. 523*—*Papas Peruanorum*. *Best. cist. aut. or. 3. fol. 1*—*S. tuberosum*, esculentum. *Bauh. pr. p. 89.*

Passim in insula colitur.

Majo, Junio. ♂

Vulgo *Patata*, et unica tantum varietas occurrit, nempe tuberibus subglobosis, pulpa albida.

5. *S. NIGRUM*. *Lin. sp. pl. 266*, excl. var.—*Ten. fl. nap. 2. p. 102*—*Bertol. fl. ital. 2. p. 633*, var. a.—*Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 50.*

S. herbaceum vel basi suffrutescens inermis erectum, ramis angulato-alatis, alis integris denticulatisque, foliis mediis rhombico-ovatis, supremis lanceolatis, omnibus integri: aut angulato-dentatis basi in petiolum plus minus decurrentibus, cymis extrafoliaceis subjecto folio brevioribus, ra-

racemiformibus umbelliformibusque, pedicellis demum deflexis, corollae 5-partitae lobis triangularibus acutis patulis ciliatis calycinas laevioas obtusas demum recurvas duplo superantibus, baccis globosis nigris! stylo non mucronatis.

Plurimas hujus proteiformis speciei varietates tam in hac Insula, quam prope Neapolim provenientes sic distribuendas esse censeo:

† *Pubescencia ex pilis, vel setulis raris sparsis.*

- a. *genuinum*; laete virens annuum, ramorum angulis prominulis integris vel denticulatis setulis raris sparsis tectis, foliis glabriusculis deltoideo-ovatis, ovatisque acutiusculis integris vel repando-dentatis, cymis subumbellatis—S. nigrum plurimum auctorum.
- lc. *Reich. cent. 10. f. 1283* — *Curtis fl. Lond. t. 156* — *Bull. herb. t. 67* — S. officinarum, acinis nigricantibus. *Zannich. hist. t. 267* — *Morris. hist. 3. s. 13. t. 1. f. 1* — S. hortense. *Dod. pempt. 454* — S. hortense, Circaeae aut Phaseoli folio. *Lobel. ic. 262*, ic. ex *Dod.* — S. hortense. *Dalech. hist. 1. p. 537* — *Matth. com. 2. p. 415.*
- aa. *villosum*; caule ramis pedunculisque sparse pilosis, pilis patulis, foliis et habitu ut in *f.* obscure virenti.
- lc. *nulla.*
- b. *fruticosum*; laete virens elatum erectum basi fruticosum, ramis subflexuosis angulato-alatis, alis denticulatis, denticulis setula terminatis, foliis ovato-lanceolatis acutis glabris basi non dilatatis subeuneatis integris aut obiter dentatis, summis saepe undulatis, cymis subumbellatis.
- lc. S. procerius, patulum, vulgaris fructu. *Dill. hort. Ehh. t. 275. f. 355*, sed rami in citata icone teretes.
- bb. *pubescens*; omnia ut in *b.*, sed ramis, petiolis, pedunculis, pedicellisque pilis albis mollibus subpatentibus tectis.
- lc. *nulla.*
- c. *Reichenbachii*; laete virens erectum glabrum basi suffrutescens, ramorum angulis subalatis setis incurvis rigidis rarissimis tectis, foliis ovali-lanceolatis utrinque attenuatis acute sinuato-serratis, cymis racemiformibus, pedicellis gracilibus.
- lc. S. oleraceum. *Reich. fl. germ. exc. 1. p. 391*, et *cent. 10. f. 1324*, non *Richard*, nec *Dunal*.
- d. *atriplicifolium*; laete virens erectum, ramis birtulis subangulato-alatis, foliis glabris late rhombico-ovatis varie sinuato-dentatis in petiolum saepe decurrentibus, cymis racemiformibus, pedicellis gracilibus. *Dunal in Dec. 1. c. p. 50* — S. atriplicifolium. *Desportes non Gillies* — S. moschatum. *Presl del. Prag. p. 77* — *Guss. syn. 1. p. 272!* — *Dunal in Dec. pr. 13. pars 1. p. 53* — *Ten. fl. nap. 4. p. 35* — S.

- nigrum, *b. Bertol. fl. ital. 2. p. 633* — *S. suffruticosum. Willd. en. p. 256?*
lc. S. officinarum. Sabb. hort. 2. t. 60 (planta in icone glaberrima, sed flores depicti majores quam in natura) — *S. vulgare. Weinm. phyt. 4. t. 937* — *S. hortense. Fuchs. hist. 686* — *S. sativum. Tabern. hist. 577* — *S. hortense, sive vulgare. Bauh. hist. 3. p. 608*, mala.
e. divaricatum; obscure virens, ramis divaricato-patulis, foliis ut in precedente.
lc. nulla.

‡ ‡ *Pubescentia ex setis rigidis approximatis saepius adpressis, vel pilis mollibus confertis patulis.*

- f. patulum*; pallide virens, caule ramosisque gracilibus patulis glabris angulato-alatis, alis integris, foliis (tenuibus) glabris rhombeo-ovatis, basi subcuneatis in petiolum subdecurrentibus obiter sinuato-dentatis, cymis racemiformibus, pedicellis gracilibus (floribus parvis).
lc. nulla.

- g. Badaroi*; obscure sordideque virescens erectum, caule ramosisque angulato-alatis (alis subdenticulatis) setis rigidis albidis (aliquando glanduliferis) confertis subadpressis hirsutis, foliis (firmis) hirsutiusculis deltoideo-ovatis varie angulato-dentatis basi subcuneatis, cymis subumbellatis, pedicellis firmis (floribus demum decedente autumno, et hyeme albo-violaceis) — *S. parviflorum. Badarò in diar. phys. chim. Ticin. an. 1824* — *Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 51* (nomen mutavimus dum flores non sunt quam in aliis varietatibus minores!).
lc. nulla.

- gg. microphyllum*; humile cinereo-virens, caule ramisque setis patentibus sparsis aliis brevioribus intermixtis tectis, foliis parvis (vix poll. longis, 4-6 lin. latis) ovatis integris vel obiter dentatis, pedunculis ut in *g.*
lc. nulla.

- h. stramonifolium*; obscure virens erectum, caule ramisque angulato-alatis (alis subdenticulatis) setis molliusculis adpressis tectis, foliis ovatis basi subcordatis acute vel obtuse angulato-dentatis, cymis subumbellatis.
lc. S. pterocaulis. Reich. cent. 10. f. 1284, non *Dunal.*

- i. molle*; pallide virens erectum, caule una cum ramis subteretibus pedunculis pedicellisque patenter aut subadpresse molliter pubescentibus, foliis (saepe majusculis) villosis glabrativae exacte ovatis basi vix cuneatis integerrimis, supremis ovato-lanceolatis, cymis racemiformibus (floribus saepe prae aliis majoribus).
lc. nulla.

In cultis praesertim humentibus, in hortis, et in vineis passim: var. *a*, et

aa. Chiajano, Darano, Fontana, Serrano : var. b. Bagno, Casamicciola, Lacco, Forio : var. bb. Napoli a Portici : var. c. presso i mur a secco della strada che dal Vatuliere conduce al Testaccio : var. d. magis quam reliquae varietates passim obvia : var. e. prope Neapolim ai Camaldoli, a S. Croce, et ai Guantai : var. f. Chianole del Testaccio : var. g. in demissis communis; Ischia all'Orto della Mandria, Bagno, Casamicciola, Lacco, Forio : var. gg. in cultis elatis post messem, et in vineis; monte Trippiti, nell'alto della valle di Bucceto, monte Vettu, e fra Fontana e S. Nicola : var. h. et i. al Dagno, sed rarae.

Ab Aprili ad serum autumnum, usque dum terra gelu non consistat, ut in plagis calidioribus : var. b. c. d. et g. saepe basi suffruticosae evadunt, et per aliquot annos perdurant.

Vulgo *Pomadorella selvaggia* una eum sequente.

In omnibus enumeratis varietatibus sequentes characteres, praeter illos in phrasi specifica notatos, constantes ac communes sunt : caules et rami plus minus angulato-alati : folia petiolata, petiolo canaliculato; media et superiora gemina, altero minore : flores albi, nunquam oehroleucos uti Griseb. in *spic. fl. Rum.* 2. p. 53, et 58, et nonnulli dicunt vidi, inodori, diametro 2-3-linearis; corollae limbo explanato, vel raro convexo : filamenta candida; antheris luteolis breviora, plus minus patentibus villosa aut glabra : stylus albus, vix ultra antherarum tubum exsertus, apice saepe curvulo; stigmatibus capitato: baccae semper nigrae l — Sed characteres variabiles sunt, pubescentia, et odor moschatus aut nullus in eadem varietate pro locorum natura et plantarum aetate.

Varietates superius relatae seorsim spectatae species videntur diversae, sed post sedulam inspectionem plurimum plantarum viventium nullum firmum characterem detexi, ejus ope rite dignosci possint, et saepe ab una ad alteram transitus. Hae ratione ductus, uti ejusdem speciei formas peculiarias retuli, et earum characteres habitumque notavi; at si aliquis pro diversis speciebus habere nollet, sic eas enumerandas propono:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. <i>S. nigrum</i> . Lin. | — <i>S. nigrum a. genuinum</i> . |
| 2. <i>S. fruticosum</i> . Guss. | — <i>S. nigrum b.</i> |
| <i>b. pubescens</i> . | — <i>S. nigrum bb.</i> |
| 3. <i>S. Reichembaehii</i> . Guss. | — <i>S. nigrum c.</i> — <i>S. olcraceum</i> . Reich. |
| <i>b. atriplicifolium</i> . | — <i>S. nigrum d.</i> — <i>S. moschatum</i> . Presl, et Guss. |
| <i>c. divaricatum</i> | — <i>S. nigrum e.</i> |
| 4. <i>S. patulum</i> . Guss. | — <i>S. nigrum f.</i> |
| 5. <i>S. parviflorum</i> . Bad. | — <i>S. nigrum g. Badaroi</i> . |
| <i>b. microphyllum</i> . | — <i>S. nigrum gg.</i> |

6. *stramonifolium*. *Cuss.* — *S. nigrum* *h.*
S. pterocaulae *Reich.* non alior.
 7. *S. molle*. *Cuss.* — *S. nigrum* *i.*

5. *S. MINIATUM*. *Bernh.* in *Willd. en. H. Berol. p. 296*—*Ten. fl. nap. 3. p. 223* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 635* — *Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 56.*

S. herbaceum inerme erectum pubescens, ramis angulato-alatis, alis integris vel angulato-dentatis basi in petiolum plus minus decurrentibus, cymis extrafoliaceis subjecto folio brevioribus racemiformibus umbelliformibusque, pedicellis demum deflexis, corollae 5-partitae lobis triangularibus acutis patulis ciliatis calycinas lacinias obtusas demum recurvas duplo superantibus, baccis globosis coccineis! stylo non mucronatis.

Hujus speciei quoque proteiformis (uti praecedens) varietates sic distinguendas puto:

† *Pubescentia undique adpressa.*

a. *angulatum*, erectum, foliis ovato-oblongis acuto angulato-dentatis, cymis umbelliformibus.

lc. *nulla.*

b. *hyosciamifolium*; erectum patule ramosum, ramis demum purpurascens, foliis rhombo-ovatis ovatisve obtuse dentatis, cymis umbelliformibus, corollis demum (autumno) ad carinam violaceis.

lc. *S. miniatum*. *Reich. cent. 10. f. 1327*, magis hanc quam alias varietates refert.

c. *genuinum*; erectum patule ramosum, foliis ovatis ellipticisque obsolete obtuseque dentatis, supremis lanceolatis integris aut obiter dentatis, cymis umbelliformibus.—*S. miniatum* aetorum—*S. officinarum*, acinis purpureis. *Zannich. hist. 248.*

lc. *nulla.*

d. *physalidifolium*; erectum elatum, foliis (grandibus) orbiculato-ovatis integris acutiusculis basi breviter emeatis, cymis racemiformibus.

lc. *S. rubrum*. *Reich. cent. 10. f. 1328*, non *Mill.*

†† *Pubescentia alba patentissima ac mollissima.*

e. *villosissimum*; pilis albis densis mollissimis albo-canescens, caule erecto, ramis patulis vix angulatis, foliis ut in praecedente, cymis racemiformibus, pedicellis saepe distichis, et vix deflexis. *Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 56* — *S. villosum*. *Dec. fl. fr. 3. p. 613*, ex *Dunal*, sed folia a *Dec.* describuntur angulato-dentata, et tunc ad sequentem varietatem potius spectat.

1c. *nulla*.

f. atriplicifolium; erectum subpatule ramosum, ramis angulatis, foliis ovalibus angulato-dentatis, cymis racemiformibus—*S. villosum*. *Dec. fl. fr. 3. p. 613*, quoad foliorum descriptionem, sed confer varietatem praecedentem.

1c. *S. officinarum*, acinis puniceis. *Sabb. hort. Rom. 2. t. 61*, ad *S. villosum* citata a *Poir. in dict. enc. supp. 3. p. 741*, hoc bene refert.

Passim cum praecedente proveniunt var. *c. et d.*; sed var. *a. Bagno, Chianjano, Casamicciola, piano di Muori sotto monte Vetta*: var. *b. prope Neapolim ai Camaldoli, ai Guantai, a Portici, ec.*: var. *e. Bagno, Casamicciola* in locis magis umbrosis: var. *f. Chianole del Testaccio*.

A Julio ad serum autumnum. ☉

Species ista eum praecedente fere in omnibus convenit; tamen nunquam uti nonnullae illius varietates basi perennat!, serius floret, provento autumno saepius lobi corollae ad carinam violacei!, et baccarum color coeruleus cultura etiam plurimum annorum non mutatur! Var. *e.*, quae revera ob habitum et pedicellorum dispositionem magis quam aliae a speciei typo recedit, eum *S. villosum* conveniret, si flores forent duplo majores quam in *S. nigro*, et baccae globoso-oblongae, uti ex *Dunal et Bertol. l. c. diennur*; tamen in *icone Dill. II. Eltham. t. 274. f. 353*, ad *S. villosum* citata, nec flores ita grandes, nec baccae globoso-oblongae: praeterea icon praedieta *S. miniatum b.*, quoad folia, et varietatem *e.* quoad pubescentiam exaete refert: species tamen videtur propria, nam etiam plantae juniores a characteribus habitus ac foliorum primo intuitu dignoscuntur!

Innixus iisdem rationibus in praecedente specie relatis, hujus formas peculiare uti varietates descripsi; at si species diversas aliquis putaverit, tunc sic enumerandae erunt:

1. *S. angulatum. Guss.* — *S. miniatum a.*
b. atriplicifolium. — *S. miniatum f.*
2. *S. hyosciamifolium. Guss.* — *S. miniatum b.*
3. *S. miniatum.* — *S. miniatum c.*
4. *S. physalidifolium. Guss.* — *S. miniatum d.*
5. *S. villosissimum. Guss.* — *S. miniatum e.*

256. LYCOPERSICUM.

Tourn. inst. 23. — Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 23.

1. L. PYRIFORME. *Dun. in Dec. l. c. p. 26.*

1c. *nulla*.

Colitur.

Majo, Augusto. ☉

Vulgo *Pomidori a fiaschella*.

Fructus parvi, pollicem vel sesquipollicem longi, pyriformes, rubentes : *folia* ut in *L. esculento*.

2. *L. CERASIFORME*. *Dun. l. c.* — *S. Lycopersicum. b. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 185.*

l.c. *Solanum pseudo-Lycopersicum. Jacq. H. Vind. v. 1. t. 11* — *S. pomiferum, fructu rubro minore. Weinm. phyt. 4. t. 935. f. d.*

Colitur.

Majo, Augusto. ☉

Vulgo *Pomidori a ceraselle*.

Fructus parvi, globosi, rubentes : *folia* ut in sequente.

3. *L. ESCULENTUM*. *Dun. l. c.* — *Solanum Lycopersicum. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 156.*

l.c. Dun. Sol. p. 113. t. 3. f. 3 — *Solanum pomiferum, seu Pomum amoris fructu rubro, majus. Weinm. phyt. 4. t. 935. f. a. et b.*

Colitur.

Majo, Septembri. ☉

Vulgo *Pomidoro*.

Floribus plenis, aliquando variat; *fructus* magni, rubentes, aequales, vel diversimodo lobati, depressi.

4. *L. MACROPHYLLUM. Guss.*

L. caule elato firmo, foliis inferioribus simpliciter pinnatis, foliolis ovatis amplis (2-4 poll. latis, 4-6 poll. longis) longe petiolatis acutiusculis basi obliquissime cordatis, superioribus subinterrupte pinnatis, foliolis obiter vel profunde angulato-lobatis basi obliquis, calycinis laciniis (5) corollae lobos ex ovata-basi lanceolatos acutos aequantibus, baccis magnis depresso-globosis subsulcato-lobatis aequalibusque.

l.c. *Poma amoris, fructu luteo. Besl. eist. aut. ord. 1. fol. 1, quoad folia hoc fere refert, sed fructus in nostro rubri.*

Colitur.

Majo, Septembri. ☉

Vulgo *Pomidoro a foglie di Patate*.

Planta robusta, quae ob foliola latissima, et in foliis inferioribus saepe lobato acutis, laciniis corollam aequantibus (quae in *L. esculento* lobis corollinis angustioribus magis apice attenuatis duplo fere breviores sunt); fructibus numerosioribus, saepeque aequalibus, aut a basi ad medium leviter obtuseque sulcato-lobatis a praecedente dignoscitur; et a quo habitu, notatisque characteribus magis quam *L. pyriforme* ac *cerasiforme* recedit; ita ut si illae uti species diversae habentur, potiori jure et haec sejungenda est — Ex *Barbaria* in hae Insula paucis ab hinc annis introducta fuit, ita ut a nonnullis *Pomidoro di Barbaria* quoque nuncupatur,

et ob habitum firmiorem, et fructuum copiam in praetium habetur; tamen isti non ita intense rubro-colorati, ut in illo. — Cultura plurium annorum species enumeratae ex seminibus constanter reproducuntur, et hyeme mitissima, ac plagiis calidioribus saepe uti *Capsica* perennant.

257. LYCIUM.

Dun. in Dec. pr. 13. pars 1. p. 508.

1. *L. EUROPAEUM*. *Lin. sp. pl. 268* — *Ten. fl. nap. 5. p. 229*, var. *c.* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 639* — *L. mediterraneum*. *Dun. l. c. p. 523*.
lc. Sibth. fl. gr. t. 236 — *Jasminoides aculeatum*, *Salicis folio*, flore parvo ex albo-purpurascens. *Mich. gen. t. 10. f. 1*, optima.

Ad saepes praesertim mari finitimis; *Forio, Panza, Laeco al monte Vico, ed a S. Montano, Testaccio ai Maronti, siepi presso alla strada di Cartaromana, ec.*

Julio, Augusto. ♂

Rami spinosi, vario curvati: *folia sempervirentia: flores ex albo-purpurascens.*

57. SCROPHULARINEAE. *Benth.*

258. VERBASCUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 331.

1. *V. THAPSUS*. *Lin. sp. pl. 252* — *Ten. fl. nap. 1. p. 88* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 570*, excl. non. syn.
lc. Verbascum. *l. Matth. comm. 2. p. 487* — *V. candidum*, mas. *Fuchs. hist. 846*.
b. albiflorum. *Ten. syll. p. 105*. var. *Cc.*; tamen ex ipso, in *add. et emen. l. c. p. 559* ad *V. phlomoideum* refertur — *Bertol. l. c.*

In campis arenosis, et in sylvaticis passim: var. *b. al Telegrafo di Pietra Sparaina, monte Vetta, presso S. Nicola, da Serrano a Fontana, Laeco all'acqua del Larito, cavone del Panzese sul Bagno, Crovone, Chianole del Testaccio: ec.*

Majo, Augusto. ♂

Corollae nunquam explicato-rotatae, uti sunt in sequente, ac triplo fere minores, externe pubescentes, non aut vix glandulis aureis conspersae: *filamenta* fere erocea; duo longiora omnino glabra; tria breviora e medio ad apicem pilis longis albidis teeta: *stylus* glaber, virescens; *ovarium* lanatum: *capsula* fere ovalis, calyceum parum excedens: *semina*

parva, rufescentia, fere tetragona, truncata, longitudinaliter piecata, ad angulos obtuse tuberculata — *V. thapsiforme*. *Ten. fl. nap. 3. p. 215*, ex loco natali ad hanc speciem spectare videtur, et specimina exotica *V. Thapsus* cum nostro ex asse quadrant.

2. *V. MACRUM*. *Ten. fl. nap. 3. p. 216* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 573*.

V. dense albo-vel luteolo-tomentosum, foliis decurrentibus oblongo-lanceolatis erenatis, inferioribus obtusiusculis in petiolum attenuatis, superioribus acuminatis, racemo simplici densissimo elongato-spicato, corollae lobis rotundatis explanatis calyce 4-plo longioribus, filamentis omnibus piloso-lanatis, antheris difformibus.

lc. Ten. l. c. t. 214.

In apricis sylvaticis, et ad vias praesertim in elatis : *sommità del Cratere dell' Arso a Chiajano, dal Telegrafo di Pietra Sparina a S. Nicola, ed alla Pietra dell'Acqua, Forio a S. Maria del Monte, ai Frassitelli, ed alla Bocca della Serra, cc.*

Junio, Octobri. ♂

Planta robusta, ac saepius 3-4-pedalis: racemi spiciformes, aliquando 1 1/2-pedales, crassissimi, diametro fere 1 1/2 pollicari: bractae ovato-lanceolatae, acuminatae, calycem excedentes: calycis lacinae lanceolatae, acutae, facio interiore virentes, externe albo-lanatae: corollae explicatae diametro subpollicari; interne glabrae, concolores; externe supra medium glabriusculae, et glandulis aureis conspersae, infra medium albo-villosae: filamenta duo longiora curvata, fere crocea, ad medium et versus latus interius pilis longis albis semipatentibus tecta, ad basim et ad apicem glabra, anthera sua decurrente 6-plo longiora; tria duplo breviora, pilis albis undique tecta: stylus clavatus, glaberrimus, calycem vix excedens; ovario tantum albo-lanato, uti capsulae, quae ovatae, calyce longiores, stylo brevi mucronatae: semina fere ut in praecedente.

3. *V. SINUATUM*. *Lin. sp. pl. 254* — *Ten. fl. nap. 1. p. 95* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 583*.

lc. Verbascum aliud. Matth. comm. 2. p. 492.

In campis incultis, et ad vias ubique.

Julio, Septembri. ♀

*Corollae lobi aequales, basi invicem distantes, non approximati: filamenta omnia subaequalia ac barbata, villis patentibus pulchre violaceo-cyaneis apice non clavatis instructa, basi ac apice glabra, fere kernesina a basi ad apicem, caeteram una cum antheris aurantiaca: germen villosum: stylus albidus, glaber: stigma fere aurantiacum — Corolla est concolor, non basi maculata, uti per errorem dixi in *syn. 1. p. 263*.*

4. *V. REPANDUM*. *Willd. en. 1. p. 226* — *V. Blattaria. Ten. fl. nap. 1. p. 95*, ex ipso in *indic. in vol. 5. p. 375* — *V. virgatum. Bertol. fl. ital. 2. p. 585*, excl. *syn. ?*

V. foliis decurrentibus glabriusculis, radicalibus caulinisque inferioribus oblongis obtusis subsinuatis inaequaliter crenatis subciliatis, superioribus amplexicaulibus ovato-oblongis acutis inaequaliter dentato-crenatis, racemis laxis elongatis, pedunculis solitariis superioribus calyce sublongioribus, inferioribus 2-3-plo excedentibus, calycinis laciniis obtusiusculis, filamentis omnino purpureo-barbatis, unico brevioribus.

1c. Blattaria lutea, Brassicae foliis, florum petalis curtis. *Cup. panph. 1. t. 72.*

In herbosis apricis, et ad vias; *nella pianura della Molara presso al cavone delle Nocelle; via dal Vataliero alle selve di Chiummano presso alle casette, Panza, e nella discesa della Madonna del Monte sopra Forio, via vecchia da Casamicciola ai Bagni.*

Julio, Augusto. ♂

Corolla lutea, ad faucem tubi brevissimi atropurpurea; lobis duobus minoribus, et prope illos a basi fere ad medium fasciis duabus pilorum instructa; qui pili violacei ac clavati, uti in filamentis: *filamentum quintum non brevissimum, uti dixi in syn. 1. p. 564, sed tantum paullo caeteris brevius; praeterea pedunculi in hac Insula semper solitarii, inferiores bracteis duplo longiores sunt, tamen superiores aequales: capsula majuscula, globoso-ovata, calyce longior: semina fusco-castanea, praecedentibus similia.*

250. LINARIA.

Juss. gen. 120. — Dec. pr. 10. p. 266

§ 1. CYMBALARIA. *Chav.*

Folia saepissime lobata, longe petiolata: flores axillares, distantes: capsulae pori trivalvulati: semina oblonga, foveolata.

1. L. CYMBALARIA. *Pers. syn. 2. p. 155 — Ten. fl. nap. 2. p. 46 — Anthirrinum Cymbalaria. Lin. sp. pl. 851 — Bertol. fl. ital. 6. p. 337, excl. syn. L. acutangulae. Ten.*

1c. *nostra t. VIII. lit. c. — Bull. herb. t. 305 — Fl. dan. 1220 — Cymbalaria italica, Hederae folio. Lob. ic. 615.*

Ad muros; *Bagno alla salita del cavone delle Pezze a dritta, nec albi usque vidi.*

Aprilii, Julio. ♀

Caules et habitus sequentis: folia praesertim inferiora obtusissima, 5-lobata, et in planta inarimensi saepe obiter 3-5-lobata, subtus demum violacea; superiora multo minora, earum lobis acutiusculis: semina nigra, et ob plicas varie flexas acutas! foveolata. 30

2. *L. ACUTANGULA*. *Ten. fl. nap. sylt. p. 302* — *Benth. in Dec. pr. 10. p. 267. b. inarimensis.*

L. glaberrima, foliis omnibus cordato-orbiculatis, inferioribus obtuse 7-lobatis, superioribus acute 5-lobato-dentatis, pedunculis petiolo sublongioribus vario curvatis, calycinis laciniis ellipticis obtusis capsula brevioribus, calcaro recto corollae tubum subaequante, seminibus (nigris) ob plicas obtusissimas! vario flexas foveolatis.

1c. *nostra t. VIII f. 1. a, b* — *Cymbalaria. Matth. com. 2. p. 468*, potius ad banc nostram varietatem spectat, quam ad speciei typum.

Ad muros, et in umbrosis; *ne' muri a secco sulla strada da S. Michele a Campagnano, ed in quelli sulla strada che conduce dal casino di Monsignore alla spiaggia di Cartaromana.*

Aprilis, Junio. ☼

Planta glaberrima, lacteque virens, ex maceriarum fissuris dependens: caules ramosissimi, intricati, filiformes: petioli sulcati, folio subjecto longiores: folia laete virentia, superiora ascendendo minora; lobo intermedio reliquis latiore: pedunculi graciles, apice parum incrassati, fere cirrhescentes, et uti in praecedente in fructu reflectuntur, vario curvantur, elongantur, et capsulas intra maceriarum fissuras inserunt, ubi semina maturant: calycis lacinae subrubentes, concaviusculae, vix lin. longae: corollae amoene cyanae, magnitudine praecedentis; labio superiore surrecto, bilobo; lobis rotundatis, saepe 2-3-crenulatis, superne lineis intensioribus notatis; labio inferiore plano, 3-loba, lobis omnibus obtusis, intermedio parum angustiore; tubo curvulo, inferne sulco notato, ad cuius sulci latera interne, nec non in fauce lineae duae pilorum luteo-rufescentium adsunt, reliqua tubi parte interiore pilis pallide coeruleis brevibus conspersa; palato bigibboso, gibbis obtusis basi albidis, apice vero luteolis, vel omnino luteis: calcar rectum, lin. longum, obtusiusculum, coeruleum, basi albidum: filamenta una cum antheris ac stylo glabra, pallide coerulescentia; antheris albis: stigma albidum, oblique subcapitatum: capsula globosa, calyce duplolongior, virescens, demum fusca: semina atra, glabra, fere globoso-ovalia, et ob plicas obtusissimas videntur obtuse tuberculata.

A *L. acutangula*, a. recedit caulibus parum firmiteribus; foliis superioribus cordato-orbiculatis, non hastato-trilobis; floribus paullo majoribus, amoene cyaneis — A *L. Cymbalaria* vero colore magis virente; foliorum lobis acutis; floribus parum majoribus, sed quod magis interest seminibus plicis obtusis foveolatis, quae plicae in praecedente acutae sunt, ita ut icon sem. in *Chor. mon. t. 5. f. 16, 17*, ad hoc spectat! — Tamen Cl. *Bertol. in fl. ital. 6. p. 337*, species istas non distinguit nequidem uti varietates.

§ 11. ELATINOIDES. Chav.

Folia hastata vel ovata, saepius integerrima; floribus axillares, distantes: capsula operculis duobus orbicularibus circumscissis, vel valvaeformibus latere dehiscens, et aliquando subindehiscens.

3. *L. CIRRHOSA*. Pers. syn. 2. p. 153 — Ten. fl. nap. 2. p. 49 — Antirrhinum cirrhosum. Lin. mant. p. 249 — Bertol. fl. ital. 6. p. 316.
Ic. Joq. Hort. Vind. t. 82 — Till. hort. Pis. t. 38. f. 3.

In lapideis aridissimis; Ischia all' Arso, Bagno lungo la strada del lago sotto S. Alessandro, collina sul Lago, strada del Costigione, sommità del cratere dell' Arso presso Chiajano nelle scorie; et in humentibus calidis vaporariorum; stufa del Cacciuto presso Casamicciola, fumarole del fango sopra Pannella, in quelle nella contrade del Bell'omo sopra Forio, e del Fonnotillo presso S. Angelo.

Majo, Junio. ☉

Planta glaberrima, laete virens, demum saepe folia radicalia rubescunt: pedunculi gracillimi, horizontaliter patentes: calycis lacinae potius lanceolatae, quam ovato-lanceolatae (Guss.), acutae, breviter hirsutiusculae: corollae albido-coerulescentes, satis parvae, vix lin. 1/2 longae; labio superiore bipartito; lobis surrectis, obtusis; inferiore aequaliter 3-lobo, ad superius adpressum, ideoque faucem claudens: calcar rectum, basi conicum: capsula globosa, parva, glaberrima, diu persistens, et sero indehiscens: semina fusco-rufescentia, tuberculis (non plicis) obtusis crassis obsita ut in *L. Elatine*!

4. *L. PRESTANDRAE*. Tin. in Guss. syn. 2. p. 843 — Benth. in Dec. pr. 10. p. 529.

L. molliter cano-pubescentis, caulibus procumbentibus, foliis imis nigris ovatis oppositis, reliquis hastatis alternis, summis saepe ovatis, floribus axillaribus longe pedunculatis, pedunculis gracilibus glabriusculis patentibus subjecto folio longioribus, laciniis calycinis lanceolatis acutis capsulam debiscentem (majusculam) subaequantibus corolla semel brevioribus, corollae labio inferiore inaequaliter 3-lobo, seminibus ob plicas acutas varie flexas foveolatis.

Ic. nostra t. IX. f. 1. a, b, c.

b. *dentata*; foliis inferioribus tantum glabratis, versus basim Irregulariter pauci-dentatis.

c. *glabrata*; caule glabro, vel patenter piloso, foliis virentibus glabratis — *L. commutata* Bern.?

In arenosis herbosis, in vineis, in salicetis, et ad vias in demissis vel in elatis; var. a. Forio nella contrada del Bell'omo presso alle fumarole,

Lacco, Casamicciola, Buceto, monte Vetta, piano di Muori ne' saliceti, Barano, Moropane: var. *b. Buceto, piano di Muori, Chianole del Testaccio*: var. *c. Ischia all'Arso, Lacco nel vallone del Larito, Casamicciola al Rostinale, ed a Montecito nelle vigne, Bagno, nelle vigne di S. Alessandro ai Caseri*; ec.

Julio, Octobri. ☉

Planta molliter pubescens: caules late excurrentes: pedunculi glabri, vel sparse pilosi: calycis laciniae planae, nervo valido notatae, patenter pilosae: corollae in c. parum minores; labio superiore externe sordide virente, interne atrocoeruleo l, bifido; laciniis obtusis, surrectis; inferiore ad faucem bigibboso, apice trilobo; lobis rotundatis, convexis; intermedio parum angustiore, obtuso bilobo: calcar albidum, corollam subaequans, acutissimum, parum incurvum, pubescens, horizontale, 2-3 lin. longum: aetherae nigrae, villis connexae: filamenta latere interiore barbata: capsula glabra, sub lente tenue punctato-reticulata: semina ovoidea, rufescentia—Var. c. quoad glabritiem L. Elatine refert—L. commutata Bernh. ic. Reich. cent. 9. f. 1101, huic magis similis videtur; sed folia superiora fere spatulato-sagittata; flores majores, et semina plicis obtusis foveolata videntur, ut in sequente.

5. *L. GRAECA. Chav. mon. p. 108, et forsàn L. Elatine var. d. hamosa. Chav. l. c. p. 108, ex loco natali etiam ad hanc spectat—Ten. fl. nap. 5. p. 39—Benth. in Dec. pr. 10. p. 268—Cosson not. fasc. 2. p. 64, excl. syn. L. commutatae Bernh., pro qua confer praecedentem. Antirrhinum graecum. Bory et Chaub. exp. Mor. p. 175.*

b. coerulea.

L. caulibus gracilibus villosopilosis procumbentibus basi vel hinc inde radicanibus, foliis molliter villosis glabratisque, imis ovatis oppositis, reliquis alternis hastatis, floribus coeruleis axillaribus longe pedunculatis, pedunculis capillaribus glabris patentibus subjecto folio longioribus, laciniis calycinis lanceolatis! acutissimis capsulam subindehiscentem (parvam) aequantibus, seminibus ob plicas obtusas varie flexas foveolatis.

ic. nostra t. IX. f. 2, d, e, f—Bory et Chaub. l. c. t. 21, ex Chav.—Elatine. Matth. comm. 2. p. 360?

In apricis herbosis; Ischia sull'Arso, ne' luoghi aperti delle selve di Campagnano, di Piano Liguori, del monte Vezza, di Chiummano, di Trippiti, delle Falanghe, di Catreca.

Aprili, Julio. ☉

Caulis procumbentes, sed non late excurrentes, ut in praecedente: calycis laciniae patenter pilosissimae, semper lanceolatae ac acutae!; corollae duplo triploque breviores: corollae omnium praecedentium duplo majores, laete vel pallide coeruleascentes; labio superiore bipar-

tito; lobulis surrectis, obtusis; inferiore albo, ad margines tantum aliquando coerulescente, aequaliter trilobo; lobis rotundatis; basi gibboso, gibbis punctis coeruleis sparsis notatis: *calcar* gracile, uti corolla externae pubescens; pallidum, incurvum!, acutum: *filamenta* ac *antherae* pilosae, ut in praecedente, pilis tamen longioribus: *capsula* dupl. minor quam in antecedente, aegre dehiscens!: *semina* fusca — Cum *L. Elatine* a Cl. Bertol. in fl. ital. 6. p. 342 perperam confusa; siquidem florendi tempore, florum magnitudine ac colore, sed potissimum seminibus diversa! — Denique optime Cl. Cosson l. c. monet capsulam esse fere indehiscentem, sed male calycinas lacinias lineares dicit, nec recte ad hanc speciem refert *L. commutata* Bernh., siquidem haec *L. Prestandreae* affinis est, uti superius dixi.

§ 111. *LINARIASTRUM*. Chav.

Folia simplicia, alterna vel verticillata, integerrima: flores spicati, aut racemosi: capsula dentibus valvaeformibus 4-10 dehiscens: semina angulosa, vel discoidea.

6. *L. SPECIOSA*. Ten. fl. nap. 5. p. 40 — Anthirrinum speciosum. Bertol. fl. ital. 6. p. 370.

L. glaberrima viridi-glaucescens, caule elato stricto, foliis subcoriaceis lanceolato-linearibus acutis, supra planiusculis subtus nervo elevato subcarinatis, floribus racemoso-spicatis, pedicellis calycibusque glabris, bracteis in fructu pedicello brevioribus, lacinii calycinis ovato-lanceolatis acutis sub anthesi squarrosis, corollae (magnae) fauce ampla elongata, calcaribus rectis corolla brevioribus, capsulis elliptico-oblongis.

lc. Ten. l. e. t. 159.

In agris cultis arenosis, vel subargillosis elatis, aut subdemissis; Pico, Chianole del Testaccio, vigne presso la Torre di Campagnano, valle di Canniani presso Moropane, Pietra sparaina, Piau de' Muori, Bucco, monte Trippiti, monte Vetta, vigne di Barano, di Fontana, di Calimera, di Serrano, e presso Pietra perciata; ne' siti coltivati fra le selve delle Falanghe, del Fasano, e della Pera, vigne di Forio, di Panza, delle cave di Ceramò e di Brusomonte; ec.

Majo, Octobri, et aliquando per totum annum. ♂, et ♀

Planta robusta, simplex aut ramosa, 1-2-pedalis: folia omnia alterna: flores parum majores, et intensius lutei, quam in *L. vulgari*; gibbis ad palatum fere croceis: stamina undique glabra!: semina in utrisque similia; nempe glabra, compresso-tumidula, in centro tenue granulata, et margine lato membranaceo circumdata — Cl. Benth. in Dec. pr. 10. p. 273 a *L. vulgari* non separat.

7. *L. CHALEPENSIS*. *Milf. dict. n. 12* — *Ten. fl. nap. 2. p. 51* — *Antirrhinum chalepense*. *Lin. sp. pl. 859* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 366*.
 Ic. *Antirrhinum Osyris. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 2. p. 21. t. 19* — *L. floribus albis. Triumph. obs. p. 87. f. 2* — *Riv. mon. irr. t. 83. f. 2*.
 Inter segetes; *da Fontana* usque ad loca demissa, sed sporadica, et satis rara.
 Aprili, Majo. ☉
Flores parvi, candidi; calcare gracili elongato.
8. *L. PELESSERIANA*. *Dec. fl. fr. 5. p. 589* — *Ten. fl. nap. 2. p. 51* — *Antirrhinum Pelisserianum*. *Lin. sp. pl. 855* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 364*.
 Ic. *Sabb. H. Rom. 3. t. 4* — *Chamaclinaria violacea, italica. Barr. ic. 1162*.
 In collibus apricis herbosis, ad agrorum margines in arenosis, inter segetes, et in vineis passim.
 Aprili, Majo. ☉
Erecta, glaberrima: folia in sureulis sterilibus procumbentibus verticillata, reliqua alterna: corollae parvae, amoene violaceae; calcare gracillimo, elongato; semina nigra, ciliato-marginata.

260. ANTIRRHINUM.

Desf. atl. 2. p. 49 — *Benth. in Dec. pr. 40. p. 290*.

1. *A. ORONTIUM*. *Lin. sp. pl. 860* — *Ten. fl. nap. 2. p. 54* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 376*.
 Ic. *Lam. ill. gen. t. 531. f. 1* — *A. sylvestre, sive Phythcuma. Dod. pempt. 182* — *A. arvense. Riv. mon. irr. t. 82*.
 In arvis, interque segetes ubique.
 Aprili, Majo. ☉
Erectum: flores albi: capsulae uti pars superior caulis calycesque patenter pubescentes — In plantis inarimensibus corollae calycem parum excedunt; sed planta ista cum *A. Orontio*, *b grandifloro* non est confundenda.

261. SCROPHULARIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1614.

1. *S. PEREGRINA*. *Lin. sp. pl. 866* — *Ten. fl. nap. 2. p. 57* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 389*.
 Ic. *Sibth. fl. gr. t. 597* — *Camer. hort. p. 157. t. 43*.
 In cultis fertilibus passim, et supra murorum supercilia herbosa.

Majo, Junio. ☉

Glaberrima, erecta: *folia* lucide virentia, cordato-ovata: *pedunculi* axillares, ramosi: *flores* atropurpurei.

2. *S. NODOSA*. *Lin. sp. pl.* 863 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 55 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 380.

lc. *Fl. dan.* 1167—*S. nodosa*, foetida. *Zannich. hist.* p. 242. t. 303.

In umbrosis bumentibus sylvarum; *selve di Campagnano, di Chiummano, del Rotaro, delle Falanghe, del Fasano, di Calreca.*

Majo; Junio. ☿

Glaberrima, erecta: *radices* tuberoso-nodosae: *folia* obscure virentia, cordato-ovata: *flores* sordide ex luteo-rubentes, in racemo terminali ramoso.

3. *S. BICOLOR*. *Sibth. et Smith. fl. gr. pr.* 2. p. 437 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 42 — *S. canina*, b. *Bertol. fl. ital.* 6. p. 394.

lc. *Guss. pl. rar.* t. 45.

In aridis lapidosis apricis; *fra Panza e S. Nicola*, nunc vero ob terrarum culturam fere destructa.

Majo, Julio. ♃

Glaberrima, erecta, vel ascendens, dense caespitosa: *folia* lacte virentia, 2-3-pinnatifida, laciniis argute incis; *flores* paniculati, rubentes: *corollae* appendix linearis, in medio labii superioris fauce inserta.

262. DIGITALIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1017.

4. *D. MICRANTHA*. *Roth nov. pl. sp.* p. 284, in *Reich. cent.* 2. p. 45 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 42—*D. lutea*. *Ten. fl. nap.* 2. p. 58, ex ipso in *l. c.* — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 406, ex parte, et quoad plantam neapolitanam.

D. glaberrima stricta, caule simplici angulato-striato, foliis lanceolatis integris vel remote denticulato-serratis, radicalibus in petiolum canaliculatum attenuatis, caulinis sessilibus, racemo denso secundo | simplici (raro ramoso), corollae tubulosae limbo quinquefido, lobis obtusis, intermedio inferiore porrecto laterales 3-plo excedente.

lc. *Reich. cent.* 2. p. 45. f. 282, et 283.

In sylvis passim.

Majo, Junio. ♂, et ☿

Planta glaberrima, lacte virens: *caules* basi semper simplices, sat raro versus apicem ramosi, 1-3-pedales: *folia* acuta, caulina lanceolata, basi non dilatata, concaviuscula, vel subconduplicata, varie flexa, erecto-patentia, vel patenti-reflexa, exquisite subtus nervosa, supra lineata: *bru-*

ctae lanceolatae, acuminatae, integerrimae, pedunculis 2-linearibus 1-2-duplo longiores: calycis 5-partiti lacinae lanceolatae, acutae, ad margines glabrae, vel sub forte lente visae brevissime ciliatae, pedunculos aequantes aut superantes: corolla 4-5-lin. longa, versus medium subtus gibbosa, externe glaberrima, luteolo-virescens, lobis omnibus margine ciliato-glandulosis; superiore acute bilobo; lobulis obtusis, surrectis; inferiore 3-lobo; lobis duobus lateralibus brevibus patentibus, basi interne maculis duabus ferrugineis (aurantiacis Reich.) notatis; intermedio obtuso, longiore, 2-lin. longo, venis ferrugineis interne, sed praecipue ad apicem notato, ac pilis longis albis tecto: filamenta tetretia, una cum antheris glaberrima, ac albida: stylus ex albo-virescens: capsula globoso-ovata, bisulca, acuminata, nervosa, calyce duplo longior: semina glabra, fere triquetra, uno latere convexa, tenuissima foveolata, rufescentia.

Cl. Benth. in Dec. pr. 10. p. 452 *D. luteam* ab hac non separat — Ob racemum secundum!, et non dense sparsum cum icone *D. luteae* Reich. l. c. f. 280 conveniret, sed corollae lobi obtusi, non vero acuti ut in icone citata exhibentur.

263. VERONICA.

1. *ΟΡΥΘΑΛΟΣΠΟΡΑ*. Bess.

Sem. cymbiformia.

1. *V. AGRESTIS*. Lin. sp. pl. 18 — Ten. fl. nap. syll. p. 14 — Bertol. fl. ital. 1. p. 100.

lc. Cosm. et Germ. atl. fl. Paris. t. 16. f. 3 — Reich. cent. 3. f. 440-Guss. fl. sic. t. 5 — Alsine media. Fuchs. hist. p. 22 — V. folio Chamædryos. Riv. mon. irr. t. 99.

In herbosis apricis satis rara; Bagno.

Aprili, Junio. ☉

Folia laete virentia: flores pallide coerulei: capsula turgidiuscula, ad suturam compresso-carinata.

2. *V. DIDYMA*. Ten. fl. nap. 1. p. 6 — Bertol. fl. ital. 1. p. 101.

lc. *V. polita*. Reich. cent. 3. f. 404, et 405.

Ad muros, in apricis saxosis herbosis, et in cultis vulgatissima.

Novembri, Majo. ☉

Folia obscure virentia: flores parvi, amoene coerulei: capsulae globosodidymae, turgidae, ad suturam non compressae — Cl. Benth. in Dec. pr. 10. p. 485 hanc a praecedente non separat, sed earum characteres constantes sunt. Confer quoque Cl. Bertol. l. c.

3. V. HEDERAEPOLIA. *Lin. sp. pl.* 19 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 16 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 104.

1c. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris.* t. 16. f. 1 — *Viv. fl. ital. frag. fasc.* 1. p. 15. t. 16. f. 2 — V. folio Hederæ. *Hiv. mon. irr.* t. 99.

In campis cultis apricis, et ad agrorum margines, interque segetes passim. Februario, Aprili. ☉

Calycis pyramidati laciniæ cordato-ovatae, acutae, semper conniventes: corolla parva, pallide coerulea, basi albida.

4. V. CYMBALARIA. *Bertol. pl. gen. ed. 1. p. 3*, et *fl. ital.* 1. p. 105, ac 2. p. 758 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 16.

1c. *Viv. fl. ital. frag. fasc.* 1. p. 14. t. 16. f. 1 — V. chia, Cymbalaria folio, verna, flore albo, umbilico virescente. *Darb. cent.* 1. p. 25. t. 30. f. 2, rudis.

Ad muros, ad macerics, et in saxosis apricis; *Bagno, ed alla Cercola, Campagnano, Chiummano*; sed non satis obvia.

Decembri, Aprili. ☉

Caules, petioli, pedunculi, calycesque patenter pilosi: folia basi cordata, vel rotundata, nunquam cuneata, obtuse dentato-lobata: calycis laciniæ ovato-ellipticae, in fructu patentes: capsulae hirsutae: semina subglobosa, ore cymbae hiante, circa istud radiatim rugosa, dorso levia.

5. V. PANORMITANA. *Tin. in Guss. syn.* 1. p. 17 — *Bertol. fl. ital.* 2. p. 776.

V. glabrata, caule procumbente, foliis grosse dentato-crenatis obtusiusculis ovatis, inferioribus cordatis, reliquis basi truncatis vel subcuneatis, calycinis laciniis obtusis ovato-ellipticis in fructu patentibus, capsulis didymis pedunculisque glabris vel sparse pilosis, seminibus globosis dorso levibus, circa os cymbae radiatim rugosis.

1c. *Parlat. fl. Pan.* t. 1.

Ad macerics, ad muros; *Bagno, ed alla Cercola, Campagnano*; ec.

Martio, Aprili. ☉

Flores albi: pedunculi tam inferiores, quam superiores folio subjecto longiores, non illis breviores, uti ex *Bertol. l. c.*, cujus descriptio ex parte cum sequente convenit.

6. V. CUNEATA. *Guss.*

V. glabrata, caule procumbente, foliis inferioribus ovatis (non cordatis), superioribus obovato-cuneatis, omnibus a medio ad apicem acute dentato-serratis, laciniis calycinis ellipticis in fructu patentibus, capsulis didymis glabris vel sparse pilosis, seminibus globosis circa os cymbae radiatim rugosis, rugis in dorso subobliteratis.

1c. *nostra tab. VIII. f. 2. d, e, f, g, h, i.*

In umbris ad rupes, ad muros, et ad macerics, ex quibus saepe dependens; *Ischia all'Arso, Bagno a S. Michele, alla Cercola, Casamicciola, Lacco, Serrano, Forio*; ec. magis quam duae praecedentes frequens.

Martio, Aprili. ☉

Haec et duae antecedentes quoad habitum, pedunculos, calycem, corollam albam, ac semina similes sunt, et nonnisi sedula comparatione in siccis plantis rite dignosci possunt—In *V. cymbalaria* habitus robustior, pubescentia major, folia firmiora ac crassiora, corollae paulo majores—*V. panormitana*, et ista nostra, glabritie majore omnium partium, habitu graciliore, colore magis virente, foliis tenuioribus a *V. cymbalaria* recedunt; et inter se differunt foliorum forma, ac incisione — *Capsulae* in utrisque glabrae, aut pilis sparsis tectae, non pilis approximatis ac confertis, ut in *V. Cymbalaria*.

§ II. *VERONICASTRUM*. Koch.

Racemi in caule ramisque terminales: semina plana, peltiformia.

7. *V. ARVENSIS*. *Lin. sp. pl.* 18 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 16 — *Bertol. fl. ital. 1. p.* 92.

1c. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 16. f.* 12 — *Alyssum Dioscoridis. Column. phyt. p.* 27. ic. p. 28.

Ad vias, ad agrorum margines, inter segetes, et in pascuis apricis passim. Februario, Majo. ☉

Pallide virens, pubescens; flores parvi, coerulei, subsessiles.

§ III. *CHAMAEDRYS*. Koch.

Racemi axillares: semina biconvexa; vel convexa, et hinc plana.

8. *V. OFFICINALIS*. *Lin. sp. pl.* 14 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 5. var. a. — *Bertol. fl. ital. 1. p.* 65.

1c. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 17. f.* 1 — *V. vulgatiore, folio rotundiore. Bauh. hist. 3. p.* 272.

In umbrosis sylvarum; selve di Campagnano, del monte Vezza, del Castiglione, del Rotaro, di Catrecca, delle Falanghe, e del Fasano.

Aprili, Majo. ☽

Flores pallide coerulei: capsulae compressae, obtuse emarginatae.

9. *V. ANAGALLIS*. *Lin. sp. pl.* 16 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 12 — *Bertol. fl. ital. 1. p.* 70.

1c. *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 17. f.* 7 — *Becrabunga minor. Riv. mon. irr. t.* 100.

In humentibus, vel ad rivulos; Moropane all'acqua de' Nitroli, Civovone all'acquedotto, Casamicciola nel vallone del Monte della Misericordia, Lucro nel vallone del Larito.

Aprili, Majo. ☉, et aliquando ☿

Mouendum hic puto, quod Cl. Webb in *Phyt. can. v. 3. pars 2. sect. 3. p. 148* putat *V. anagalloidem* formam esse hujus speciei in siccioribus proveniente; sed utraeque saepius simul crescunt, et *V. anagalloides* forma elliptica capsularum a *V. anagallide* semper diversa permanet.

261. EUFRAGIA.

Griseb. spic. fl. Rum. 2. p. 13 — *Benth. in Dec. pr. 10. p. 542.*
(non *Euphrasia* Lin.)

1. *E. LATIFOLIA.* *Griseb. in Dec. pr. 10. p. 542* — *Bartsia latifolia. Ten. fl. nap. 5. p. 33*, ac *Bertol. fl. ital. 6. p. 276*, quoad plantam neapolitanam, non siculam.

E. intense virens pubescens glanduloso-viscosa, caule erecto simplici vel basi ramoso, foliis omnibus oppositis ovatis ellipticisque, inferioribus crenatis, superioribus inciso-serratis, floribus dense spicatis 4-fariam imbricatis, corollae (violaceo-atropurpureae in fauce albae) tubo vix exerto gracili, labio superiore abbreviato, antheris glabris villo connexis.

le. *Sabb. hort. 3. t. 7* — *Column. cephr. 1. t. 202. f. 2.*

In apricis herbosis passim tam demissis, quam elatis.

Martio, Aprili. ☉

Ab *E. atroviolacea Durieu fl. alg. ined. in Blanco cat. pl. hispan. 1849. n. 195* praeter notatos characteres differt, uti notat *Blanco l. c.*, habitu firmiore, foliis obscure virentibus, evolutione seriore — Planta sicula ad speciem *Durieae* spectat ex observatione *Blanco*, sed vix diversa.

2. *E. viscosa.* *Benth. in Dec. pr. 10. p. 543* — *Bartsia viscosa. Lin. sp. pl. 839* — *Ten. fl. nap. 5. p. 33* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 269.*

le. *Alectorolopos italica, luteo-pallida. Barr. ic. 665.*

In humentibus sylvaticis; *Fontana*, ubi rara; at copiose provenit in apricis sylvarum; *sopra la Cava della Fontana fino al Capomanno sopra Casamicciola.*

Aprili, Majo. ☉

Planta undique molliter pubescens, et ob pilos glanduliferos glutinoso-viscosa: calycis lacinae in fructu elongatae, et una cum bracteis squarrosopatentes: corollae luteae tubus calyceum aequans; labii inferioris 5-lobi lobis planis, integerrimis, aequalibus, labium superius excedentibus: antherae hirsutae, basi bicuspidatae: stylus glaber, luteolus: stigma globosum, depressum, viridulum, pubescens: semina minutissima, fluvida, fere semiovata, sed sub lente levia vidi, non striata, uti ex *Benth.*

265. ODONTITES.

Pers. syn. 2. p. 150.

1. *O. LINIFOLIA*. *Don. ex Benth. in Dec. pr. 10. p. 550*, sub *O. lutea* — *Euphrasia linifolia. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 604*, et *s. veg. ed. XII. v. 3. p. 403* — *Ten. fl. nap. 5. p. 31* — *Guss. syn. 2. p. 112.*

lc. nulla.

In collibus apricis vel siccis, in sylvaticis aridis, vel herbosis passim.

Septembri, Octobri. ☉

Vulgo *Fiorilli gialli di bosco.*

Glabra, erecta, brachiato-ramosa: flores amoene lutei, in racemis terminalibus

— Uti recte notat *Cl. Ten. l. c.* species ista calycibus glabris, capsulisque ad apicem tantum longe barbatus ab *O. lutea* dignoscitur, pro qua confer iconem *Coss. et Germ. atl. fl. Paris t. 18. f. 1, 2, 3*; ac ad istam pertinet icon *Column. ceph. 1. p. 203*: illam enim ejusdem auctoris *erph. 2. p. 68. t. 69* ad *O. linifoliam* adductam, ad *Euphrasiam tenuifoliam Pers. syn. 2. p. 150* (quae *E. linifolia Brot. non Lin.*) spectare putat *Cl. Koch in syn. ed. 2. p. 630*; quamvis melius ex *Bertol. in fl. ital. 6. p. 296* ad *E. tricuspidae* varietatem pertinere videtur. Interim iste *Cl. auctor l. c. p. 294*, et *Benth. in Dec. pr. 10. p. 550* hanc nostram plantam ad *E. luteam* trahunt, et sub specie ista tam *E. luteam*, quam *E. linifoliam Ten.* (quae quoque nostra) referunt.

2. *O. SEROTINA*. *Reich. fl. germ. 1. p. 359* — *Euphrasia serotina. Ten. fl. nap. 5. p. 30* — *Bartsia serotina. Bertol. fl. ital. 6. p. 274.*

lc. Euphrasia sylvestris, major, purpurea. Column. ceph. 1. p. 201. t. 202 — *Barr. ic. 276. f. 2.*

In apricis sylvarum, in fruticetis, et ad sepes in herbosis passim.

Septembri, Octobri. ☉

Vulgo *Fiorilli di bosco russi.*

Pubescens, brachiato-ramosa: flores rosei, in racemis terminalibus — Ab *O. rubra* non separat *Cl. Benth. in Dec. pr. 10. p. 552*, tamen ejus forma constans apud nos est.

58. OROBANCHEAE. *Lindl.*

266. OROBANCHE.

Reuter in Dec. pr. 11. p. 15.

1. *O. RAPUM*. *Thuil. fl. Paris. ed. 2. p. 317* — *Reut. in Dec. l. c. p. 16. b. bracteosum. Reut. l. c.*

O. sordide carnea, furfuræ o-villosa, spica florum nubili comosa, sepalis irregulariter bipartitis lanceolato-acuminatis, corolla tubulosa subinflata curvata basi non strumosa, lobis omnibus crispulis (non dentatis), labio superiore emarginato-bilobo fornicato, inferiore 3-lobo, lobis plicato-concavis, lateralibus acutiusculis, intermedio latiore (non longiore) obtusiusculo, filamentis ad basim tubi insertis a basi ad medium glaberrimis, a medio ad apicem sparse breviterque glanduloso-pilosis, antheris defloratis albis, stylo a medio vel a basi ad apicem glanduloso-piloso, stigmate didymo nitide luteo.

1c. *Reich. cent. 7. f. 897* — *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 19. f. A, optima.*

c. *flavescens*; floribus intense et sordide carneo-flavescutibus, stigmate aureo!

Ad radices *Cytisi trifloris*, et *candicantis* utraeque varietates parasiticae in sylvis boreana spectantibus.

Aprili, Junio. ☉

Vulgo *Nea*, una cum sequentibus.

Scapi firmi, saepe usque 2-pedales, et acute angulati, basi crassiores, et inferne squamis magis approximatis tecti: *bracteae*, uti *squamae*, lanceolatae, acuminatae, atrofuscæ, vel atrorubentes, corollas explicatas subaequant, sed in apertis longiores, ideoque spica florum (quæ 5-12-pollicaris) dum nubilis comosa: *sepala* obsolete 1-2-nervia; laciniis corolla duplo brevioribus: *corollae* sordide carneae, ingrate olentes, villis subglandulosis crispis superne tectae, antrorsum parum curvatae, labio superiore inferiore non excedente, lobis in fornicem conniventibus; inferiore trilobo; lobis subaequalibus; tubo corollae brevi conscripto, nec inflato: *filamenta* non coalita, teretiuscula, albida, a medio ad apicem incurvata; *antherae* lobis mucronatis: *stylus* albus: *stigma* nitide luteum in *b*, aureum in *c*; in qua varietate (quæ forsitan alia species) *bracteae* minus acuminatae corollas subaequant, ideoque spica nubilis non comosa; *florum* color diversus; *stamina* et *stylus* glabriora; *stylus* superne albidus, non roseus; *stigma* aureum, profunde bilobum.

Descriptio Cl. *Duby* in *Dot. gall. p. 348* cum nostra satis convenit, uti quoque illa *Dec. fl. fr. 3. p. 488*, nec non icones citatae: tamen planta ista apud nos non flavo-rubens, sed pallide et sordide nudiq; carnea. Praeterea descriptiones Cl. *Reuter* in *Dec. l. c.*, et *Koch syn. ed. 2. p. 613* in multis recedunt; siquidem sepala non sunt pluri-nervia, nec corollae tubum subaequantia, sed breviora: corolla *O. cruentae* minime similis, et sicca non luteo-fusca, sed sordide rubescens; non campanulata, sed potius tubuloso-subinflata, basi nunquam strumoso-ventricosa; labii superioris lobi conniventi-fornicati, non patentes; nec labii inferioris lobus medius lateralibus duplo major, tamen subaequalis: *stigma*^a

emarginato-bilobum, non immarginatum — Cl. Bertol. in fl. ital. 6. p. 427 ad *O. majorem* refert uti sequentem; an recte? — An species propria, et *O. carnea* appellanda?

2. *O. CINITA*. Vie. fl. Corsic. sp. nov. p. 11 — Ten. fl. nap. 5. p. 44 — Bertol. fl. ital. 6. p. 445.

lc. nulla.

Ad radices; *Loti cytisoidis*; *Lacco al monte Vico scendendo a S. Montano, Forio alle fumarole nella contrada del Bell'omo*, ubi copiosa.

Aprili, Majo. ☉

Planta undique atro-sanguinea: *saepi* 1/2-1-pedales, pilis glanduliferis brevibus, uti reliquae partes, pubescentes (floribus exceptis): *squamae* adpressae, concavae, acuminatae, inferiores magis approximatae: *bracteae* squamis conformes, flores inapertos superantes, inde aequantes ac adpressae, basi latae ac concavae: *sepala* basi albida, corollis et bracteis fere duplo breviora, 2-partita; laciniis carinatis, acutis, enerviis; altera saepe breviora: *flores* inodori, densissime spicati: *corolla* 5-6 lin. longa, parum curvata, tubulosa, fauce non dilatata; lobis irregulariter denticulato-crispis; labio superiore concavo, fornicato, dorso carinato, saepe basi transverse plicato, emarginato-bilobo; lobis margine surrectis; labio inferiore ad superiorem subadpresso, ad basin prope faucem gibboso, varie corrugato-plicato, et illam fere claudente, 3-lobo; lobis lateralibus minoribus, intermedio latiore: *stamina* prope basin tubi inserta, inclusa: *filamentis* a basi ad medium albidis ac glaberrimis, vix dilatatis et compressis, a medio ad apicem roseis, teretibus, sparse puberulis; *antheris* luteis, glabris: *stylus* pallide roseus, apice curvatus, sparse puberulus; *stigmatibus* didymo, sanguineo, in corollae fauce prominente; lobis in medio foveola notatis: *germen* basi albo-virescens.

3. *O. VITEXOSA*. Lapeyr. suppl. p. 87 — Ten. fl. nap. 4. pr. in fol. p. 88 — Bertol. fl. ital. 6. p. 437.

lc. *O. Viciae Fabae*. Vauch. mon. Orob. p. 51, t. 5 — Reich. cent. 7. f. 911.

Ad radices *Viciae Fabae*, *Pisi sativi*, nec non aliarum *Leguminosarum* culturarum.

Aprili, Majo. ☉

Bracteae lanceolato-acuminatae, corollam aequantes: *sepala* rosea, irregulariter bijecta; laciniis lineari-atenuatis, altera breviora: *flores* grate *Caryophyllum* olentes: *corolla* sordide alba, venis tamen coculescentibus notata, tubulosa, recta, nec curvata, pilis glanduliferis tecta; lobis omnibus crenulato-denticulatis, undulato-plicatis; labio superiore 2-lobo, subfornicato, lobis surrectis: inferiore subaequaliter 3-lobo, lobis varie plicatis, lateralibus rectangule patentibus: *filamenta* albida, ad basin tubi inserta, inferne villis glandulosis tecta, superne ac *pistillum*

undiqno pilis sparsis glanduliferis vestita : *antherae* apiculatae : *stylus* basi albidus, superne purpureo-roseus, ibique incurvus : *stigma* bilobum, villosiusculum, lateritio-coccineum, vel roseum.

4. O. PUNCTATA. *Schultz* in *Dec. pr. 11. p. 36*, ex sperimine attico ab amico *Heldr.* communicato.

b. glabrata.

O. sepalis 4-vel obsolete plurinerviis ex ovata basi lanceolato-subulatis indivisis bifidisque margine fimbriato-glandulosis corollae tubumaequantibus, corolla campanulata dorso arcuata externae pilis raris glandulosis tecta (punctis venisque violaceo-purpureis longitudinalibus picta), lobis omnibus crenulato-crispis, labio superiore latiore concaviusculo surrecto emarginato-bilobo, inferiore 3-lobo, lobo intermedio lateralibus sublongiore, staminibus prope basim tubi insertis inferne glabris ! a medio ad apicem uti stylo glanduloso-pilosis, stigmatibus bilobo sanguineo.

lc. nulla.

In apricis ; *Dagno*, ad radices *Leguminosarum*.

Aprilii, Majo. ☉

Habitus praecedentis ; *scapi* atrorubentes, et uti bracteae ac sepala hinc inde pilosi : *squamae* ac bracteae lanceolato-acuminatae, sparsae, inferiores approximatae : *bracteae* corollam aequantes : *flores* ut in praecedente olentes : *corolla* alba, ad lobos coeruleseens ; lobis omnibus irregulariter crenulato-crispis ; ad basim labii inferioris gibbae duae, obtusae, prominulae, sulco divisae : *filamenta* candida : *stylus* superne roseus, sordide violaceum ex *Heldr.* — In sperimine attico corollae pilis crebris glandulosis tectae sunt.

5. O. HEDERAE. *Duby bot. gall. p. 350* — *Reut. in Dec. pr. 11 p. 29* — *Ten. fl. nap. app. 5. p. 17.*

O. scapo glabrato laxo squamoso, bracteis ovato-lanceolatis flores aequantibus, sepalis integris bifidisque lanceolato-attenuatis corollae tubum superantibus, corolla tubulosa subincurva compressiuscula, lobis omnibus crispatis integris, labio superiore emarginato-bilobo, lobis conniventibus, inferioris 3-lobi, lobo medio latiore ac longiore, staminibus infra medium tubi insertis styloque glabris vel parce villosis, stigmatibus luteo l depresso globoso.

lc. Vauch. mon. Orb. p. 56. t. 8.

Ad radices *Hederae Helicis* passim in sylvaticis, et ad sepes ; *cavone delle Rose presso Chiajano, cavone delle Nocelle, selve di Campagnano, di Chiummano* ; ee.

Majo, Junio. ☉

Scapi atrorubentes, paluares, ad summum 10-pollicares : *spica* florum non comosa (et flores saepe ab ipsa basi scapi) laxiuscula, floribus inferioribus saepe remotis : *squamae, bracteae, ac sepala* atroviolacea, pilis

sparsis crispulis tecta: *corollae* angustae, magnitudine fere *O. minoris*, sed ex viridi-atroviolaceae, vel albiae: *antherae* basi subbarbatae, una cum *stigmatibus* exsertae in fauce corollae, sed sub labio superiore reconditae — Perperam cum *O. minore* istam associat Cl. Bertol. in *fl. ital. 6. p. 421*, in quam nunquam transit.

6. *O. PUBESCENS*. *Urvill. en. pl. Arch. p. 76* — *Reut. in Dec. pr. 11. p. 27* — *O. villosa*, et *O. Chrysanthemi* *Schultz.* — *O. villiflora* *Koch ms. ex Reut. l. c.* — *O. Salisii*. *Requ. pl. exsicc. ex Corsica.*

O. scapo in globum basi incrassato, spica laxiuscula subcomosa, sepalis obsolete 2-nerviis integris vel inaequaliter bifidis, laciniis attenuato-setaceis tubum corollae superantibus, corolla tubuloso-campanulata externe pilis articulatis tecta, antice subcurvata, lobis irregulariter denticulato-crenulatis, labio superiore concavo vix emarginato, inferioris 3-lobi lobis rotundatis, intermedio majore staminibus infra medium tubi insertis a basi ultra medium styloque superne sparse piloso-glandulosis, stigmatibus sanguinei bilobi lobis divaricatis immarginatis.

lc. *nulla.*

b. *divaricata*; lobis mediis labii inferioris gibbis distantibus (non approximatis ut in a.), *stigmatibus* carneo.

In apricis, et ad vaporaria humentia ad radices *Compositarum*, uti *Anthemidis incrassatae*, *Chrysanthemi segeti* ec., var. b. ad radices *Crepidis bulbosae*.

Aprili, Majo. ☉

Tota planta sanguineo-rubens, sparse pilosa; pilis in parte superiore scapi copiosioribus ac glanduliferis: *scapi* 3-12-pollicares: *squamae* ovato-lanceolatae, acuminatae, infimae imbricatae: *bractae* squamis conformes, enerviae, corollam aequantes, ante anthesim in apice spicae illam superantes, ideoque spica subcomosa: *sepala*, dum bifida, lacinia altera brevissima: *corolla* ad summum 4-7 lin. longa, basi albida, caeterum sordide rubescens, vix curvata, tubulosa, fauce nempe non dilatata; labio superiore non ampliato; inferioris lobis patentibus: *genitalia* in corollae fauce subexserta: *filamenta* alba, ad apicem glaberrima: *antherae* fuscae, mucronulatae, subbarbatae: *stylus* albido-rubens, basi glaber, superne intensius coloratus.

In var. b. *corollae* labium superius fornicato-concavum, lobis omnibus denticulato-crispis; *gibbis* lobi intermedii labii inferioris distantibus, in a. approximatis; *filamenta* a medio ad basim villis glandulosis tecta; *stylus* albidus, glaber; *stigma* subpappulosum — Habitus *O. Hederae*, sed praeter alios characteres, etiam stigmatibus colore diversa — *O. barbata*. *Guss. syn. 2. p. 103*, non aliorum, hujus varietas videtur.

7. *O. MINOR*. *Sutt. in act. Soc. Lin. 4. p. 178* — *Willd. sp. pl. 3. p. 350* — *Ten. fl. nap. 5. p. 43* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 420*, excl. noun. syn.

1c. Reich. cent. 7. f. 876, 877, 879 — *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 19. f. F.*

b. *flavescens*; floribus flavescens-concoloribus laxioribus, corollis minus arcuatis. *Reut. in Dec. pr. 11. p. 29.*

c. *lutescens*; floribus uti parte superiore scapi pallide albido-lutescentibus, corollis vix curvatis, spica densa.

Ad radices *Oenanthes pimpinelloidis*, nec non aliarum plantarum: var. b. ad illas *Hypochaeridis neapolitanæ*; var. c. ad radices *Carlinae involucratae*.

Aprili, Majo. ☉

Bracteae sanguineae, uti calyces et sepala, calyce adpressae, ovato-lanceolatae, acuminatae, corollam aequantes: *sepala* bipartita; laciniis acuminatis, saepe inaequalibus: *corolla* sordide ac pallide rubens, striis sanguineis notata, tubulosa, subcurvata; labio superiore emarginato; lobulis obtusis; inferiore 3-partito; lobis subaequalibus, rotundatis; omnibus vix crispato-denticulatis: *filamenta* prope basim tubi inserta (versus medium *Coss. et Germ.*), basi tantum subciliata, caeterum glaberrima, uti *stigma*, quod divaricato-bilobum, kermesinum.

In var. b. *scapus* basi squamis ovato-lanceolatis acuminatis adpressis rufescentibus tectus, rubens vel sordide flavescens: *bracteae* squamis similes, apice magis attenuatae, corollae arcte adpressae, illam aequantes: *sepala* rubentia, corollae fere aequilonga, aliquando integra, saepius bipartita; laciniis aequalibus, vel altera brevior: *flores* inodori, sessiles, vel aliquando inferiores pedunculati: *corolla* ochroleuco-flavescens, rectiuscula, 5-6 lin. longa, tubulosa, fauce nempe non dilatata; lobis irregulariter denticulato-crispatis, subaequalibus; superiore concaviusculo; inferioris lobis duobus lateralibus cum intermedio fere conduplicato-plicatis; ideoque gibbis duabus inter lobos laterales et medium ad basim prominentibus, ac corollae faucem claudentibus, ut in *Antirrhino*: *filamenta* albida, ad basim tubi inserta, inferne latiora, ibique villis eglanulosis tecta, caeterum glabra: *antherae* inclusae, sub stigmate reconditae, fere globosae, apiculatae: *ovarium* et *stylus* albidum, aut iste rubescens: *stigma* intra corollae faucem prominens, sed labio superiore corollae brevius, didymum, albidum, aut pallidissime roseum, granulosum.

In var. c. *flores* ingrati odoris, et uti pars superior plantae pallide albido-lutescentes: *squamae* sparsae, et simul cum bracteis fuscae ac acutae, vel acuminatae: *bracteae* corollam aequantes aut superantes: *sepala* bipartita; laciniis ex ovata basi acuminato-attenuatis, corolla brevioribus: *corolla* tubulosa, vix curvata; lobis crenato-crispatis; in lobo medio labii inferioris gibbae duae obsoletae: *filamenta* supra basim tubi corollae inserta, albida, basi villosa, apice glabra: *stylus* albidus, vix

ad apicem pubescens et glandulosus: *stigma* distinctum, sordide albidum!

267. PHELIPAEA.

Reut. in Dec. pr. 11. p. 4.

1. P. *CORBULEA*. *Meyer. en. pl. cauc. 1. p. 4 — Dec. l. c. p. 5*— Orobanche cocculca. *Ten. fl. nap. 2. p. 64*—*Bertol. fl. ital. 6. p. 419*, sed confer *O. stricta* ejusdem l. c.
 b. *Millefolii*; humilior, corolla molliter pubescente ciliata lavandulacea, aut coelestina. *Dec. l. c. p. 6.*
 lc. *Reich. cent. 8. f. 1056, et 1057.*

In apricis siccis subarenosis elatis; presso S. Nicola, monte Vetta, nei siti aperti delle selve delle Falanghe, di Catreca, del Rotaro, di Busceto ad radices *Achilleae ligusticæ*, sola var. b.

Majo, Junio. ☉

Squamæ fuscae, sparsae, lanceolato-acuminatae; *bracteae* fuscae, ex ovata basi lanceolatae, concavae, acute carinatae, calyce adpressae, isto breviores; *bracteolae* duae, anguste lineares ad basim calycis; cujus dentes quatuor lanceolato-acuminati, corolla duplo breviores, sed aliquando dens quintus brevissimus adest: *corolla* fere tubulosa, antrorsum subcurvata; tubo albido subconstricto; labio superiore bilobo; lobis obtusiusculis, inferiore trilobo; lobis acutis; omnibus vero subcrenulatis, ciliatis: *filamenta* fere ad basim tubi corollae inserta, albida, glaberrima: *antherae* albidae, aristulatae, rima superiore breviter barbatae: *stylus* pilis brevibus glanduliferis ad apicem crebrioribus tectus: *stigma* albidum, bilobum; lobis patentibus.

2. P. *MUTELI*. *Schultz in Mutel. fl. fr. 2. p. 353 — Reut. in Dec. pr. 11. p. 8*— Orobanche ramosa. *Ten. fl. nap. 2. p. 64*, non Lin. — *Bertol. fl. ital. 6. p. 452*, ex parte?

P. scapo ramoso, spicis densifloris abbreviatis, calycis 4-fidi lobis lanceolatis acutis, corolla antrorsum curvata supra ovarium contracta superne ampliata-inflata, dorso sub apice convexa, lobis corollae ovatis obtusiusculis ciliatis, illis labii interioris subaequalibus inter se plicaturis convexis villosis hirsutis instructis, staminibus glabris vel basi villosiusculis, antheris styloque glabris, stigmatibus retuso bilobo.

lc. *Mutel. atl. 1. 43. f. 314*; et *supp. t. 2. f. 5*, ex *Reut. in Dec. l. c.* In cultis, et in apricis ad radices *Leguminosarum*, et *Compositarum*.

Aprili, Majo. ☉

Scapi 2-5-pollicares; *bracteae* fuscae, ex ovata basi lanceolatae, concavae, calycem subaequant, corollis duplo breviores; *bracteolae* latera-

les lineari-lanceolatae, virentes, carinatae, acuminato-attenuatae, calycinis laciniis subaequilongae: *calyx* albidus, superne fissus, 4-partitus; laciniis carinatis, attenuatis, tubo corollae brevioribus: *corollae* externe glanduloso-pubescentes, ad medium antrorsum curvatae, ac constrictae, basi albae, caeterum amoene cyanae; lobis omnibus integerrimis, obtusiusculis, ciliato-denticulatis; labio superiore concavo-bipartito, lobis surrectis; inferiore subaequaliter 3-lobo, lobis inter se plicaturis gibbosis albis villosis-hirsutis interjectis: *stamina* inclusa, supra basium tubi corollae inserta; *filamentis* basi viridulis ac puberulis; caeterum candidis, glaberrimis, uadique teretibus; *antheris* albidis, glabris: *ovarium* albidum: *stylus* glaber, pallide coeruleus, apice curvatus: *stigma* orbiculare, in medio sulcatum, ideoque bilobum album, sub labio superiore corollae reconditum, et vix ultra faucem prominens—Species *P. remotae* ita proxima, ut cum illa saepe adhuc confusa.

50. ACANTHACEAE. *Brown.*

268. ACANTHUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1065.

1. *A. mollis*. *Lin. sp. pl. 891* — *Ten. fl. nap. 2. p. 59* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 438.*
1a. Lam. ill. t. 550 — *Riv. mon. irr. t. 87* — *A. sativus. Dod. pempt. 707.*
 Ad rupes, et in sylvaticis humentibus; *Bagno, Pico, Testaccia, Casumiciola presso al Cacciuto e nella via che sale a Montecito presso le siepi, cavu di Cerambi, Lacco superiore, Forio, Panza.*
 Aprili, Majo. ☼
 Vulgo *Drancalupo*, et ejus folia tam a pecudibus, quam a capreis expetuntur.
 Acaulis, glaberrimus, inermis, plus minus fontens: *folia* varie sinuato-pinnatifida; dentibus simpliciter mucronatis: *bracteae* latae, spinoso-dentatae: *flores* albi, fere 2-pollicares, spicati.

60. VERBENACEAE. *Juss.*

269. VERBENA.

Seaver. in Dec. pr. 11. p. 535.

1. *V. officinalis*. *Lin. sp. pl. 29* — *Ten. fl. nap. 3. p. 19.* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 266.*

1c. *Bull. herb. t. 215* — V. recta. *Dod. pempt. 150* — Verbena. *Riv. mon. irr. t. 46*, optima.

Ad vias, et in cultis ubique.

Junio, Septembri. ☼

Vulgo *Vervena*.

Erecta, glabra: *folia* lyrato-pinnatifida: *flores* parvi, coerulei, remote spicati.

270. VITEX.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1060.

3. V. AGNUSCASTUS. *Lin. sp. pl. 890* — *Ten. fl. nap. 5. p. 29* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 415*.

1c. *Dukam. arb. ed. 2. v. 6. t. 53* — Vitex. *Matth. comm. 1. p. 177* — *Riv. mon. irr. t. 118*.

In campis arenosis humentibus; *Bagno presso al Lago, ed alle Pezze, sed nunc fere destructus, via del Crovone, e del Testaccio, marina de' Maronti, e di S. Montano.*

Julio, Augusto. ☽

Vulgo *Aino*.

Frutex caespitosus, erectus: *folia* decidua: *spicae* 3-6-pollicares, in apice ramorum solitariae, sed saepius ternae, lineari-pyramidatae: *calyces* et *pedicelli* canescentes ac villosiusculi: *corollae* externe rubescentes et pallidae; *limbi lobis* interne una cum filamentis et stylo coeruleis, obtusis, convexis, replicatis; *tubo* interne in medio villis pallidissime coeruleis obducto: *stamina* et *pistillum* corollam excedentia.

64. LABIATAE. Juss.

271. LAVANDULA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 769.

1. L. STOECHAS. *Lin. sp. pl. 800* — *Ten. fl. nap. 5. p. 7* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 79*.

1c. *Sering. Lavan. t. 3. f. 1* — *Stoechas arabica. Barr. ic. 301* — *Riv. mon. irr. t. 55*.

In aridissimis collibus saxosis vel lapidosis subelatis aut demissis; *sommità del Cratere del Rotaro, e del Montagnone, all'Arso sotto Chiajano, cavone del Panzese ne' margini delle vigne, Punta di S. Angelo, coste di Soceivo, delle Petrolle, e del Funnotillo, Panza nelle colline*

di Campotese, di Citarria ed alla Guardiola di S. Gennaro, Punta dell'Imperatore presso Forio.

Aprili, Majo. ♀

Suffrutex humilis, sempervirens, undique tenuè tomentoso-canescentes: spica dense imbricata, aliquando una cum coma deformata compresso-dilatata: bracteae latae, rhombeo-ovatae: flores parvi, saturate coerulei.

272. MENTHA.

Benth. in Dec. pr. 12. p. 164.

1. *M. MACROSTACHYA*. Ten. fl. nap. 2. p. 30 — Bertol. fl. ital. 6. p. 21, excl. non. syn.

M. foliis sessilibus cordato-ovatis crenato-dentatis obtusis rugosis supra pilosis, subtus villo o-ineanis, spicis cylindraceis basi subinterruptis, staminibus exertis, pedicellis glabris, bracteis lineari-lanceolatis verticillo brevioribus, calycibus breviter hirsutis striatisque in fructu subglobois, dentibus ovato-lanceolatis acutis.

lc. Ten. l. c. t. 56 — *Menthastrum* spicatum, folio crispo rotundiore. Bauh. hist. 3. p. 219.

b. staminibus inclusis.

e. *microcalycina*; pedicellis brevissimis hirsutiusculis, calycibus parvis (semel quam in a. minoribus) obsolete glandulosis, floribus in spicis elongatis 3-6-pollicaribus dispositis, verticillis remotiusculis, staminibus exertis.

In humentibus sylvaticis, et ad vias passim tam in elatis, quam in demissis: var. b. al *Crovone*, ed all' *Arno alla Nsertolella*: var. e. nella strada della valle del *Crovone*, simul cum var. b.

Junio, Septembri. ♀

Vulgo *Mentastro* una cum tribus sequentibus.

Floribus albidis, rubris, vel ex rubro-purpureis variat, uti pedicellis aliquando hirsutiusculis — An var. e. species propria?

2. *M. AMBIGUA*. Guss. — *M. macrostachya*, d. Guss. syn. 2. p. 69 — *M. sylvestris*, d. *pubescens*. Koch syn. ed. 2. p. 633, ex quo *M. balsamea*. Willd. en. 2. p. 602?, sed excl. syn. *M. macrostachyae*. Ten.

M. foliis oblongo-ovalibus sessilibus argute serratis obtusiusculis utrinque rugosis virentibus villosisque, spicis lineari-cylindraceis elongatis basi subinterruptis (floribus coeruleis) staminibus exertis, bracteis ex ovata basi lanceolatis inferioribus calyces excedentibus calycibus, (parvis) spicarum rachide pedunculisque breviter denseque piloso-hirsutis, dentibus brevibus triangularibus acutis demum conniventibus tubum obsolete striatum aequantibus.

Ic. nostra tab. XI. f. 1. a.

In humentibus argillo-arenosis; *Chianole del Testaccio presso al sito ove sboccano le lave, e ne' saliceti presso la Piana de' Muori, una cum precedente, in qua etiam culta, non transit!*

Julio, Augusto. ☞

Caulis erecti, 1-3-pedales, pilis reversis brevibus villosi, basi simplices, superne vero ramosi: *folia* omnia sessilia, 1/2 2 poll. longa, 5-12 lin. lata, forma *M. inarimensis*, rugosa ac scabriuscula, semper acute serrata, supra glabriora et laete virentia, subtus villiosiora ac pallidiora, tamen non canescentia: *spicae* in apice caulis et ramorum semipatentium 2-5-pollicares, tenues, laxiusculae, acuminatae, verticillis 1-3 infimis aliquando remotis: *bracteae* ciliatae!, inferiores latiores, sat raro dentatae: *calyces* canescentes, in fructu subglobosi, nec glandulosi, nec striati, sed exquisite nervosi: *corollae* laete coeruleae: *odor* gratus, ab antecedente omnino alienus.

3. *M. SEROTINA*. Ten. fl. nap. 5. p. 8.

M. foliis elliptico-lanceolatis petiolatis sessilibusque tenues et argute undulato-serratis supra scabris puberulis subtus villosis-canescens, spicis brevibus acutis compactis demum elongatis, verticillis inferioribus remotiusculis, bracteis anguste linearibus verticillos aequantibus, calycibus pedunculisque hirsutis, calycinis dentibus conniventibus, staminibus exsertis.

Ic. Ten. l. c. t. 156.

b. latifolia; foliis oblongo-ellipticis (poll. latis), subtus pallidis ac sparse villosis.

In humentibus; *saliceti del Piano de' Muori*: var. *b. Chianole del Testaccio nella via del corso della lava.*

Augusto, Septembri. ☞

Calycis dentes lanceolati, acuti, sed non aristati, conniventes!: *corollae* parvae, coeruleascentes: in var. *b. folia* 1 1/2 poll. longa, pollicem lata, glabriora ac tenuiora, minusque canescentia, quam in *a.*: *verticilli* multiflori, in spicarum apice approximati: *pedunculi* breves, teretiusculi, hirti, 1-2 lin. longi, bracteolis filiformibus subaequalibus suffulti; *calyces* hirti, eglandulosi, virescentes, tubo obsolete 10-striato; dentibus erectis, ex basi triangulari in apicem fere aristatum attenuatis, tubo sublongioribus: *corollae* roseae, hirtae, calycem duplo excedentes; limbo quadrifido, lacinia suprema latiore, ovato-oblonga, obtusa, tridentata, reliquis oblongis, apice truncato-emarginatis: *stamina* glabra uti *stylus*, qui staminibus longior: *stigma* bifidum, eruribus inaequalibus — Cl. Bertol. sub *M. sylvestri* *b.* hanc refert, uti cl. Benth. in Dec. pr. 12. p. 167 sub *M. sylvestri*, *g. crispa* hanc cum? citat.

4. *M. VIRGATUS*. Lin. sp. pl. 804.

b. neapolitana. *Ten. fl. nap. 5. p. 8.* — *M. laevigata*. *Willd. en. II. Berol. p. 609?* — *M. sylvestris, d. glabra*. *Koch syn. ed. 2. p. 633,* ex synonym. *Linnaei.*

M. laete virens glaberrima, foliis late lanceolatis oblongisque adpresse acuteque serratis, spicis lanceolatis acutis continuis (raro inferne subinterruptis), bracteis carinatis ex ovata basi lanceolatis acutis, inferioribus calyces excedentibus, calycis eglandulosi hirsutiusculi dentibus triangularibus acutis porrectis subconniventibus tubum obsolete striatum subaequantibus, staminibus exsertis.

lc. nostra t. X. f. 2. c, d — *Ten. fl. nap. 4. t. 242. f. 3,* sed folia nimis lata, et calyces videntur glandulosi — *M. Michellii Reich. cent. 10. p. 27. f. 1312,* sed folia omnia exacte lanceolata, quod minime in planta spontanea — *M. romana* officinarum, sive praestantior, angustifolia. *Lobel. ic. 507, optima.*

In humentibus subargillosis; *nella cava di Ceramhi presso alla fontana sopra Casamicciola.*

Augusto, Septembri. ♀

Vulgo *Amenta.*

Caulis 1-3-pedales, ut plurimum simplices, inferne saepe rubentes: *folia* 4-2 1/2 pollicaria, 4-12 lin. lata, acuta, concaviuscula, varie flexa; supra sulcata, rugosiuscula; infima breviter petiolata: *bracteae* uti calycis dentes acuminatae, sparse ciliatae vel glabrae, subquarrosae; *spica* terminalis (nam caulis saepius simplices), anguste lanceolata, densa, verticillo uno aut altero infimo aliquando remoto: *flores* pallide rosei.

Odor gratus: sapor suavis, sed non fervens, uti in *M. piperita* in hortis culta, ideoque inter aromatica et stomachica condimenta frequenter in usum venit, ac undique passim colitur; dum *M. piperita* non nisi a Pharmacopoli, et a Dulciariis adhibetur; ac utraeque per innumerorum annos in nostris hortis cultae characteres servant. Interim *M. viridis Bertol. fl. ital. 6. p. 93,* ad nostram *M. piperitam* cultam spectare videtur, siquidem cl. auctor saporis ferventem, et calyces glanduliferos suae plantae tribuit; quae notae ad nostram *M. piperitam* cultam, et minime ad nostram *M. viridem* exacte conveniunt. An haec sit a *M. viridi* auctorum satis diversa, et inde species propria, speciminum exoticorum defectu affirmare non audeo.

5. *M. INARIMENSIS. Guss.* — *M. viridis, d. hortensis citrata. Ten. fl. nap. 5. p. 9,* ex nomine vernaculo.

M. laete virens, foliis petiolisque glaberrimis, aut villosiusculis patenter serratis, inferioribus mediisque breviter petiolatis oblongo-ellipticis, infimis cordato-suborbiculatis, supremis ovalibus sessilibus, spicis crassiusculis cylindraceis lanceolatis obtusiusculis basi subinterruptis, bracteis ex ovata basi lanceolatis acuminatis calyces subexcedentibus, pe-

dicellis calycibusque glaberrimis exquisite glandulosis! nervosisque, calycinis dentibus lanceolatis acutis porrectis (non conniventibus) tubum subaequantibus, staminibus inclusis.

l. nostra t. X. f. 1. a, b.

b. dasiealycina; pedunculis calycibusque hirsutis.

In arenosis humentibus; *ne' margini della via della lava nelle Chianole del Testaccio verso la fine, e nelle prossime terre sottoposte, quo unico loco vidi.*

Augusto, Octobri. ☼

Caules 2-3-pedales, erecti, inferne simplices vel ramosi: *petioli* 4-12 lin. longi, magis quam aliae partes pubescentes: *folia* laete virentia; radicalia vix pollicaria, cordato-orbiculata, vel cordato-ovata, inferiora et media 1 1/2-1-pollicaria, 8-12 lin. lata, obtusiuscula, plana vel concaviuscula, supra exquisite lineata, uti subtus exquisite nervosa; ascendendo minor, ac brevius petiolata; *suprema* sessilia, deflexa, 8 lin. longa, 4-5 lin. lata: *spicae* aliquando laxiusculae, 1-3-pollicares, centralis reliquis saepe humilior: *bracteae* lanceolatae, multinatae, calyces parum superantes; *infimae* duae latae ovatae, saepius tridentatae: *calyces* exquisite nervosi, et glandulis nitide aureis conspersi, uti in *M. piperita*; *dentibus* subaequalibus, mucronatis: *corollae* laete coerule-scentes, glabrae: *antherae* fuscae: *stylus* albidus, exertus: *odor* gratissimus *Oeymi*.

Diu in nostris hortis testisque culta sub vulgari nomine *Menta garofanata*, sed ejus locus natalis ignotus — *M. gentilis* quoad folia, et glabritiem similis, sed inflorescentia omnino aliena — *M. balsamea*, Willd. en. 608 proxima videtur; sed nec folia ovato-lanceolata, nec spirae vere cylindraceae; praeterea hanc ad *M. sylvestrem* adducit Cl. Koch (confer praecedentem) — Denique *M. Oeymiadora* Opiz ad *M. viridem* spectat ex Benth. in *Dec. pr. 12. p. 168*; et *M. oeymoides* Host, ad *M. arvensem*, e. refertur a Cl. Benth. in *Dec. l. c. p. 172* — Tandem hic monendum est quod icones *M. citratae* Reich. cent. 10. f. 1300, *M. pubescentis* Reich. l. c. f. 1309, et *M. emarginatae* Reich. l. c. 1310, nec cum ista, nec cum duabus praecedentibus conveniunt.

273. SALVIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 50.

1. *S. SCLAREA*. *Lin. sp. pl. 38* — *Ten. fl. nap. 3. p. 260* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 156.*
l. Plenk pl. med. t. 21—*Orvala. Dod. pempt. 292* - *Horminum. Riv. mon. irr. t. 33, optima.*

In hortis, et locis nonnullis incultis nunc spontanea, sed certe culta.

Majo, Junio. ☼

Erecta, odora, villosa-canescens, superne glanduloso-pilosa: *folia* rugosissima: *bracteae* late-ovatae, membranaceae, coloratae, cuspidatae: *flores* in racemis terminalibus brachiatis verticillati.

2. *S. VERBENACA*. *Lin. sp. pl.* 35 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 22 — *Bertol. fl. ital. 1. p.* 146, var. a.

le. Reich. cent. 6. f. 718, optima! — *Horminum* sylvestre, minus, inciso folio, flore azureo. *Hurr. ic.* 208.

In pascuis apricis herbosis; *Bogno, Fontana, Serrano, Panza, Forio a Citara, S. Nicola, monte Vetta.*

Octobri, Majo. ☼

Erecta, vel ascendens: *folia* supra glabra, saturate virentia, varie sinuato-lobata: *bracteae* late-ovatae, acuminatae, parvae, flore breviores: *flores* in racemis terminalibus verticillati; verticillis 6-floris, plus minus remotis: *corollae* calycem semel excedentes, parvae, undique intense coeruleae.

S. elandestina, quae prope Neapolim passim provenit, in hac Insula desideratur.

274. ROSMARINUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 50.

1. *R. OFFICINALIS*. *Lin. sp. pl.* 33 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 22 — *Bertol. fl. ital. 1. p.* 133.

lc. Duham. arb. ed. 2. v. 3. t. 44 — *Riv. mon. irr. t.* 39 — *R. coronarius. Dod. pempt.* 272.

In rupestribus maritimis; *scogli di S. Anna presso Ischia, nelle rupi marittime da Cartaromana a Succellaro, nelle alte coste di S. Panerazio, del Lapillo, del Pignatiello, della Scarupata, Punto di S. Angelo, Panza a Citarria, sommità della Punta dell'Imperatore presso Forio.*

Februario, Aprili. ☽

Vulgo *Rosmarina* — Incolae ad cataplasmata, et balnea tonica utuntur. *Frutex* aromaticus sempervirens, caespitosus; ramis in rupibus saepe diffusis: *folia* in hac insula anguste linearia: *flores* albedo-coerulei, in racemis axillaribus oppositis brevibus subbrachiatis.

275. ORIGANUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 981.

1. *O. VIRENS*. *Hoffm. et Link fl. port. 1. p. 119*—*Guss. syn. 2. p. 85* — *Ten. fl. nap. 5. p. 19* — *O. vulgare*, *b. Bertol. fl. ital. 6. p. 196*, excl. nonn. syn. — *Benth. in Dec. pr. 12. p. 199.*

O. foliis ovatis vel ovato-oblongis obsolete serratis, junioribus cauleque erecto piloso-hirsutis glabrativc, spicis oblongis brevibus dense glomeratis, glomerulis corymboso-paniculatis, bracteis ovalibus acutiusculis glabris (virentibus) subciliatis calyce glanduloso longioribus.

lc. Hoff. et Link l. c. t. 9 — *Brot. fl. lusit. 2. t. 112.*

In sylvaticis, et in fruticetis apricis ubique.

Junio, Augusto. ☞

Vulgo *Regena* una cum sequente, ac folia, bracteae, floresque exsiccati et contriti in obsoniis apud incolae locum habent.

Erectum, basi suffruticosum, pubescenti-hirsutum: folia obscure virentia, punctis resiniferis obsita: flores albi — Etiam corollae saepe externe glandulis aureis conspersae sunt.

2. *O. MACROSTACHYUM*. *Hoff. et Link fl. Port. 1. p. 119* — *Guss. syn. 2. p. 85.*

O. foliis ellipticis subintegris glabriusculis, spicis tetragonis elongatis (policaribus et ultra) pedunculatis oppositis ternisque subaggregatis, bracteis ovalibus glabris ad apicem saepe ciliatis, calyce glanduloso ad apicem tubi interne breviter barbato longioribus.

lc. Hoffm. et Link l. c. t. 10 — *O. heracleoticum. Matth. comm. 2. p. 60* — *Lob. ic. 492.*

In aridis sylvaticis, sed magis quam praecedens rarum.

Junio, Augusto. ☞

Praeter characteres notatos, in reliquis cum praecedente convenit.

276. MICROMERIA.

Benth. lab. p. 368, et in *Dec. pr. 12. p. 212* — *Vis. distrib. labiat. p. 17.*

1. *M. GRAECA*. *Benth. in Dec. l. c. p. 214*, excl. nonn. syn. — *Satureja graeca. Lin. sp. pl. 794* — *Ten. fl. nap. 5. p. 4* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 45*, excl. pl. syn.

lc. Ten. fl. nap. t. 151. f. 2 — *Satureja annua*, orientalis, tenuior, ad singulos nodos florifera. *Moris. hist. 3. s. 11. t. 17. f. 2* — *S. perennis. Riv. mon. irr. t. 44.*

b. angustifolia; foliis superioribus anguste lanceolatis. *Ten. l. c.*

Ad muros, ad rupes, et in lapidosis.

Majo, Junio. $\frac{1}{2}$, et basi $\frac{1}{3}$

Vulgo *Erba della tosse*; quia ejus decoctum in tussi inveterata curanda adhibetur.

Pubescens, vel hirsutiuscula, obscure virens: *folia* inferiora latiora, ovata; reliqua oblongo-linearica: *cymulae* axillares, pauciflorae, oppositae; *bracteolis* calyce hispido subjectis illo duplo brevioribus: *corollae* parvae purpurascens.—Var. *b.* cum vera *M. tenuifolia* (Satureja. *Ten.*) non est confundenda, in qua florum *cymulae* fere fasciculatae, ut in *M. juliana*, et bractea lineari longa suffultae.

250. CALAMINTHA.

Moench. meth. 408 — Vis. distrib. labiat. p. 17.

Cal. cylindricus, rectus, 13-nervis. *Stam.* apice conniventa: *antherae* loculis connectivo ovato oblique adnatis. *Cymae* axillares, pedunculatae, basi 2-3-bracteatae.

1. *C. OFFICINALIS.* *Moench. l. c. p. 409 — Benth. in Dec. pr. 12. p. 228 — Melissa Calamintha. Lin. sp. pl. 827 — Thymus Calamintha. Ten. fl. nap. 5. p. 28 — Bertol. fl. ital. 6. p. 223.*

1c. *Melissa Calamintha. Lam. ill. gen. t. 312. f. 1 — Bull. herb. t. 251 — C. montana. Dod. pempt. 98 — Riv. mon. irr. t. 46.*

b. villosissima. Benth. l. c.

In sylvaticis, et ad sepes; at var. *b.* magis obvia.

Augusto, Septembri. $\frac{1}{2}$

Planta nostra ad *C. sylvaticam* *Bromf. in Dec. l. c.* valde accedit habitu, foliis plerisque basi cuneatis, et florum magnitudine; nam corollae 4-5-plo fere calycem superant; sed in specimine anglico *C. sylvaticae* ab amico *Alexander* communicato calycis dentes inferiores exquisite incurvo-ascendentes video, in nostra vero recti; at in ipsa planta anglica dentes nonnulli recti sunt. An ideo ejusdem speciei varietates, uti *Cl. Bertol. l. c.* suspicatur?

2 *C. NEPETA. Hoffm. et Link fl. Port. 1. p. 141 — Benth. in Dec. pr. 12. p. 227, an cum syn. ? — Melissa Nepeta. Ten. fl. nap. 5. p. 27 — Bertol. fl. ital. 6. p. 220.*

1c. *Bluckw. herb. t. 167 — Calamentha folio incano. Riv. mon. irr. t. 47, optima.*

b. micrantha; cymis densioribus breviusque pedunculatis, corollis parvis, staminibus corollae tubum non excedentibus—*Thymus Nepeta. b. Guss. syn. 2. p. 98.*

Ic. nulla.

Ad vias, ad agrorum margines, et in sylvaticis ubique, utraeque varietates. Augusto, Octobri. ♀

Folia in *a.*, et in *b.* subtus glandulis impressis notata; sed in *b.* obscurius virentia, ac fere molliter velutina, non hirsutiuscula: *calyces* in utrisque similes; sed dentes labii inferioris breviores in *a.*: *corollae* tubus in *a.* calycem excedit; lobio inferiore saepius concolore, ad faucem barbato, staminibus exertis; in *b.* corollae tubus calycem non excedit, et lacinia media labii inferioris macula purpurea ad basim instructa, ad faucem minus quam in *a.* barbata.

278. CLINOPODIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 980 — Vis. distr. labiat. p. 17.

Cal. cylindricus, incurvus, 13-nervis. *Stam.* conniventia: *antherae* loculis connectivo ovato oblique adnatis. *Cymae* globosae, breviter pedunculatae, bracteis setaceis plurimis involuatae.

1. *C. VULGARE.* *Lin. sp. pl. 821 — Ten. fl. nap. 2. p. 37 — Bertol. fl. ital. 6. p. 192.*

Ic. Lam. ill. gen. t. 311. f. 1 — C. Matthioli. Clus. hist. 1, p. 354.

In sylvis, et ad sepes passim.

Junio, Julio. ♀

Erectum, villosum, saepe canescens: *cymae* axillares, et terminales multiflorae, verticillatae: *bracteolae* uti *calyces* hispidae: *flores* purpurei.

279. MELISSA.

Koch syn. ed. 2. p. 645 — Vis. distr. labiat. p. 17.

Cal. tubulosus, supra planus, bicarinatus, bilabiatus. *Stam.* apice conniventia: *anther.* biloculares; loculis apice junctis in unicum confluentibus, rimaque communi deliscentibus, connectivo angustissimo, aut parvo.

1. *M. OFFICINALIS.* *Lin. sp. pl. 827 — Ten. fl. nap. 2. p. 38 — Bertol. fl. ital. 6. p. 229, excl. syn. M. altissimae ac M. cordifoliae.*

Ic. Lam. ill. gen. t. 812. f. 1 — Melissa. Dod. pempt. 91 — Riv. mon. irr. t. 45.

In herbosis ad agrorum margines, vel ad sepes umbrosas, aut in sylvaticis humentibus; *Pico alla Starsa, valle del Crovone, eavone delle Nu-celle, via di Catauro, vallone presso al Pennino dello Schiapparo sotto la selva di Fabrizio.*

Majo, Junio. ♀

Erecta, ramosa, glabra, laete virens, grate *Citrum* reolens: *flores* albi, in verticillis axillaribus dimidiatis; qui verticilli aliquando in apice caulis vel ramorum fere spicati.

2. *M. ALTISSIMA.* *Sibth. et Smith fl. gr. pr. 1. p. 423* — *Ten. fl. nap. 5. p. 28* — *M. cordifolia. Pers. syn. 2. p. 232* — *M. corsica. Viv. — M. hirsuta. Dalb. — M. graveolens. Host fl. austr. 2. p. 128.*
 1c. *Sibth. fl. gr. 1. 579* — *M. sylvestris, hirsuta, major, italica. Barr. ic. 1122.*

In sylvaticis, et ad sepes ubique obvia.

Junio, Augusto. ☿

Species ista infauste ab ipsis monographis cum praecedente confusa; a qua eximie dignoscitur odore potius ingrato, hirsutiae, ideoque colore albidiorae, caulibus elatioribus, et fere pyramidato-ramosis; praeterea ex seminibus culta non mutatur!

248. SIDERITIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 969.

1. *S. ROMANA.* *Lin. sp. pl. 802* — *Ten. fl. nap. 2. p. 14* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 84, excl. syn. Gasparr.*
 1c. *Cav. ic. 2. p. 19. t. 187* — *S. genus, spinosis verticillis. Bauh. hist. 3. p. 428* — *Marrubiastrum Sideritidis folio, calyculis aculeatis, floribus candicantibus. Zannich. istor. 1. 39. f. 2.*

In apricis collibus, in campis, et ad vias ubique.

Februario, Majo. ☉

In sterilibus caules vix 1-2-pollicares, verticillis tunc approximatis, et faciem *S. approximatae* Gasp. in hoc statu mentiens; in fertilibus herbosis plusquam pedales vidi, verticillis tunc remotis: *flores* albi, parvi.

247. STACHYS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 974.

a. perennes.

1. *S. GERMANICA.* *Lin. sp. pl. 812.*
b. polystachya; corollarum galea biloba, lobis divaricatis recurvis. Bertol. fl. ital. 6. p. 148 — *S. polystachya. Ten. fl. nap. 2. p. 24.*
 1c. *Ten. l. c. t. 53.*

In sylvis, aut in fruticetis demissis, vel montosis ubique.

Majo, Augusto. ☿

Habitus et alii characteres, ut in speciei typo, a qua solis indicat notis recedit: *caules* erecti, aliquando 2-3-pedales: *folia* cordato-ovata, vel cordato-oblonga, lanato-tomentosa, albida vel canescentia; *flores* rosei, in racemo denso terminali verticillati: *calycis* dentes acuminato-mucronati.

2. *S. SYLVATICA*. *Lin. sp. pl.* 84 — *Ten. fl. nap. 2. p.* 212 — *Bertol. fl. ital. 6. p.* 142.

Fr. Fl. dan. 1102 — *Riv. mon. irr. t.* 26, optima — *Galeopsis* legitima. *Clus hist. 2. p.* 36.

In sylvis, et ad sepes umbrosas humentes.

Majo, Junio. ☼

Erecta, patenter piloso-hirsuta, foetens, superne glanduloso-pilosa: *flores* intense rubentes, in racemis terminalibus remote verticillati.

b. annuae.

3. *S. M. FRUBI FOLIA*. *Viv. fl. Cors. app. p.* 2 — *Reich. cent. 5. p.* 79 — *Benth. in Dec. pr. 12. p.* 478 — *Bertol. fl. ital. 6. p.* 155 — *S. Poiretii. Ten. fl. nap. 5. p.* 15! — *S. arvensis, c. purpurea. Poir. dict. enc. 7. p.* 373.

S. herbacea erecta patenter villosa, foliis inferioribus petiolatis, superioribus subsessilibus, omnibus cordato-ovatis vel ovato-oblongis obtusis crenatis, verticillis sexfloris spicatis, inferioribus remotis, calycinis dentibus triangularibus breviter mucronulatis, supremo ascendente latiore ac longiore, corollis calyce duplo longioribus, tubo calycem aequante, galea emarginato-biloba (integra *Bert.*, et *Benth. l. c.*), labii inferioris trifidi laciniis lateralibus parvis.

lc. nostra t. XI. f. 2. b.

Ad apricos herbosos arenosos agrorum margines; *nel ciglione de' campi sotto la selva de' sig. Aveta lungo un viottolo che intersecando le Chianole del Testaccio conduce al Vataliere* satis rara, et hoc unico loco.

Aprili, Majo. ☉

Caules 1/2-1-pedales simplicissimi, vel pauci-brachiato-ramosi: *folia* lacte virentia, 4—12 lin. longa, 4-6 lin. lata, aliquando inferiora orbiculata: *verticilli* in spicis terminalibus 3-6-pollicaribus dispositi, superiores approximati: *bractea* verticillis subjectae foliis similes, ovatae, concavae, mucronulatae vel obtusae, calyces subaequantes: *calycis* hirsuti dentes laterales reliquis angustiores; infimis duobus parum recurvis et a reliquis remotis, tubum calycinum fere tubuloso-campanulatum aequantibus: *corollae* roseae *labium superius* surrectum, concavum, pubescens, concolor, sub apice constrictum, ad margines inferne atropurpureum; *labium inferius* trilobum; lobis lateralibus brevissimis, obtusis; intermedio concavo, latiore ac longiore; *palatum* al-

biduum, lineolis roseis pictum: *filamenta* albida; *antheris* atropurpureis: *semina* matura non vidi: *habitus* sequentis, sed floribus, et calyce omnino aliens.

4. *S. ARVENSIS*. *Lin. sp. pl.* 814 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 157, ex parte.
b. colorata; planta humiliore, verticillis confertioribus, calycinis dentibus saepeque tubo purpureo coloratis, corollis minoribus — *S. arvensis*. *Guss. syn.* 2. p. 79 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 217 — *Trixago colorata*. *Presl fl. sic. t.* p. XXXVII!

lc. *Reich. cent.* 10. f. 1298 — *S. arvensis*, minima. *Riv. tetr. irr.* t. 27, pro speciei typo.

In campis arenosis, et ad agrorum margines; all'Arso, Bagno, Pico, Testaccio, Crovone, Darano, Moropane, nella valle di Cassiani, vigne del Rotaro, piani arenosi del monte Vezza, selve aperte di Campotese presso Panza, Punta dell'Imperatore presso Forio.

Martio, Aprili. ☉

Humilis, hirsuta, erecta, brachiato-ramosa: *folia* pallide virentia, cordato-ovata, crenata, obtusa: *verticilli* 4-6-flori: *calycis* campanulati dentes fere triangulares, breviter aristati: *flores* parvi, pallide rosei — Comparatis speciminibus exoticis nostra species videtur diversa ob habitum sui proprium; sed quibus firmis characteribus sejungi possit me non invenisse fateor.

282. LAMIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 971.

1. *L. BIRDUM*. *Cyr. pl. rar. neap. fasc.* 1. p. 22 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 11 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 116, excl. var. *b.*

lc. *Cyr. l. c. t.* 17 — *Ten. l. c. t.* 153. f. 2.

In apricis sylvaticis herbosis.

Martio, Aprili. ☉

Corollae albue, tubo recto, elongato; *galea* bifida, laciniis integris, divaricatis: *antherae* hirsutae.

2. *L. AMPLEXICAULE*. *Lin. sp. pl.* 809 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 211 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 122.

lc. *Reich. cent.* 3. f. 373 — *Morsus* gallinae, folio *Hederulae*, alterum. *Lob. ic.* 463. f. 2 — *Galeopsis*, foliis caulem ambientibus, et eadem minor. *Riv. mon. irr.* t. 63.

In herbosis, et in cultis.

Octobri, Majo. ☉

Corollae purpureae; tubo tenui, exerto: *antherae* hirsutae.

3. *L. PURPUREUM*. *Lin. sp. pl.* 809 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 20 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 121.

1c. Fl. Dan. 523 — *Urtiva iners*, altera. *Dod. pempt. 153* — *Galeopsis minor. Riv. mon. irr. t. 62.*

In cultis ubique.

Octobri, Majo. ☉

Corolla rosea, parva, externe pubescens; tubo intra calycem incluso: *antherae* hirsutae.

283. PRUNELLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 990.

1. *P. VULGARIS. Lin. sp. pl. 838* — *Ten. fl. nap. 2. p. 42* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 250.*

1c. *Sturm fl. germ. par. 1. f. 5* — *Brunella. Fuchs. hist. p. 621* — *Riv. mon. irr. t. 29.*

Ad sepes, et in sylvaticis.

Junio, Octobri. ☿

Glaberrima, lacte virens: *folia* integerrima, vel dentato-pinnatifida: *flores* amoene coerulei. Confer sequentem.

2. *P. ALBA. Koch syn. ed. 2. p. 660!* — *Ten. fl. nap. 4. in pr. in fol. p. 86* — *P. laciniata, b. Lin. sp. pl. 837* — *Bertol. fl. ital. 6. p. 551.*

P. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis integris obsolete dentatis, labii calycini superioris dentibus late ovatis acuminato-aristatis, inferioris lanceolato-subulatis pectinato-ciliatis, staminibus longioribus apice spina antrorsum arcuata instructis.

1c. *P. laciniata. Reich. cent. 3. f. 393*, var. fol. pinnatifidis — *Brunella u*, non vulgaris. *Clus. hist. 2. p. 43.*

In argillosis elatis; monte *Vetta alle Petrelle, S. Nicola.*

Majo, Julio. ☿

Planta nostra cum descriptione *C. Koch l. c.* ex asse quadrat; siquidem dentes labii calycini inferioris lanceolato-subulati, marginibus rectis acutati, inter nervos laterales non venulosi, pectinato-ciliati, et staminum longiorum spina antrorsum arcuata!, non recta ut in *P. vulgari*, nec ad gibbositatem reducta, ut in *P. grandiflora*. Praeterea characterum istum variare non vidi in plurimis speciminibus, ideoque sententiae *Cl. Benth.*, qui in *Dec. pr. 12. p. 410*, istam cum *P. vulgari* associat assentire nequeo — Sola varietas foliis integris in huiusmodi occurrit.

284. BALLOTA.

Benth. lab. p. 592, et in Dec. pr. 12. p. 516.

1. *B. NIGRA. Lin. sp. pl. ed. 1. p. 582 — Ten. fl. nap. 2. p. 34 — Bertol. fl. ital. 6. p. p. 170 — B. foetida. Lam. fl. fr. 2. p. 552, et Reich. cent. 8. p. 30.*
lc. Reich. l.c.f. 1041!, optime nostram plantam exhibens — Ballota. Fuchs. hist. 154.

In rudcratis, ad sepes, et ad vias ubique.

Julio, Octobri. $\frac{2}{3}$, et basi fere $\frac{1}{2}$

Erecta, valde ramosa, plus minus hirta-pubescent, foetens: flores violacci, in verticillis dimidiatis; calycinis dentibus ovatis, mucronatis, carinatis, subreflexis.

285. PRASIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 992.

1. *P. MAJUS. Lin. sp. pl. 838 — Ten. fl. nap. 2. p. 44 — Bertol. fl. ital. 6. p. 258.*

lc. Lam. ill. gen. t. 516 — Teucrium fruticans, amplo et albo flore, italicum. Barr. ic. 895.

Ad muros, et ad rupes in demissis; *Ischia al Castello, coste del Pignatiello, di S. Pancrazio, della Scarupata, di Succellaro, Guardiola del Testaccio, scala de' Maronti, S. Angelo, Soccivo, Punta dell' Imperatore, Panza, Forio, Punta di Zale, Lacco al monte Vico, muri di Casamicciola, Bagno sotto S. Alessandro, rupi del Castiglione.*

Aprili, Junio. $\frac{1}{2}$

Frutex sempervirens, cespitosus, glaber: folia nitide virentia: flores albi, axillares, solitarii, vel in apice caulis et ramorum racemoso-spicati.

286. TEUCRIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 960.

1. *T. FLAVUM. Lin. sp. pl. 790 — Ten. fl. nap. 2. p. 10 — Bertol. fl. ital. 6. p. 31.*

lc. Sibth. fl. gr. t. 533 — Sabb. Hort. Rom. 3. t. 89 — Chamædryd assurgens. Dod. pempt. 44 — Teucrium. Riv. mon. irr. t. 10. In apricis sylvaticis, et in saxosis; da S. Nicola alla spiaggia.

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Camedrio doppio*, et pro *T. Chamaedri* ab incolis adhibetur; tamen grate aromaticum, sed non intense amarum, uti illud.

Frutex sempervirens, erectus: *folia* saturate virentia, subtus una cum caule pubescentia: *calyces* bracteae, ac corollae villosae: *flores* albicolluteoli, verticillati in racemis terminalibus; verticillis dimidiatis.

2. *T. FRUTICANS*. *Lin. sp. pl.* 177 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 7 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 18.

lc. *Sibth. fl. gr. t.* 527 — *T. fruticans*, boeoticum. *Dill. Elth. t.* 284. f. 367. — *Clus. hist.* 1. p. 348.

In aridis declivitatibus meridiem spectantibus; *nelle coste aridissime del Fonnoilillo al sud dell'Isola presso la Punta di S. Angelo.*

Majo, Junio. ♀

Fruticosum, erectum, cinereo-omentosum: *flores* pallide coerulesi, axillares, solitarii.

3. *T. CHAMAEDRYIS*. *Lin. sp. pl.* 170 — *Ten. fl. nap.* 2. p. 10 — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 39.

lc. *Plenk pl. med.* 5. t. 477 — *Chamaedrys vera*, mas. *Fuehs. h's.* 869 — *Chamaedrys. Riv. mon. irr.* 1. 10.

In aridis apricis demissis, vel in herbosis elatis; *Testaccio, dal Montagnone a S. Nicola, ed alla Pietra dell'acqua.*

Majo, Junio. ♀, et basi ♀

Vulgo *Camedrio*, et ejus decoctum uti tonicum in dyspepsia, et intermittentibus utuntur.

Suffrutescens, villosopilosum, decumbens, vix aromaticum, amarum: *flores* rosei, axillares, terni, denique in verticillis sexfloris racemosi.

4. *T. SICULUM*. *Raf. giorn. v.* 2. n. XII. p. 171 (sub *Scorodonia*) — *Guss. syn.* 2. p. 837, et *T. scorodonia*, b. *crenatifolium*. l. c. p. 55 — *T. Scorodonia. Ten. fl. nap.* 2. p. 8 ex parte, non *Lin.* — *Bertol. fl. ital.* 6. p. 22, quoad plantam siculam.

b. *inarimense*.

T. tenue molliter pubescens, caule erecto vel ascendente herbaceo basi perennanti, foliis petiolatis cordato-ovatis vel cordato-oblongis, bracteis (parvis) cordatis petiolatis calyce glabro brevioribus, floribus (pallide roseis) solitariis oppositis in racemis axillaribus terminalibusque secundis.

lc. *Horminum Teucrui folio hirsuto, albo spicato flore. Cup. punph.* 2. t. 252, pro speciei typo.

In asperis apricis, et in sylvaticis arenosis herbosis, tam demissis quam elatis ubique; *monte Vezza, e dalle selve del Bagno a S. Nicola nelle coste orientali, e meridionali.*

Majo, Junio. ♀

In planta inarimensi calyces pubescentes, basi gibbosi: corollae tubus sordide albus, calyce angustior, externe pubescens, uti labium inferius; cujus laciniae duae laterales obtusae, non acutae, concolores, aut uti illae labii superioris linea unica coerulescente percursae; intermedia vero dependens, ad apicem pallide rubens, lineis reticulatis intensioribus notata: filamenta pallide rosea uti pistillum, superne sparse villosa; antherae non lateritiae, sed fuscae: stylus glaber: odor aromaticus, levis. Confer syn. l. c.

5. T. PSEUDO-HYSSOPUS. Schreb. unilab. p. 35—Ten. fl. nap. 2. p. 13—T. Polium. Bertol. fl. ital. 6. p. 36, quoad plantam neapolitanam.

lc. Hyssopus apulus Dioscoridis, et Serapionis. Column. ceph. 1. p. 59. t. 67.

In aridis asperis; lungo la strada che scende dalla Cercola al Castiglione; sed nunc rarissimum, et fere destructum.

Majo, Junio. ♀

Suffrutescens, decumbens, cinereo-tomentosum: flores albi, fauce luteo-maculati, in capitulis densis corymbosis.

287. AJUGA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 359.

1. A. CHIA. Schreb. unilab. p. 25—Ten. syll. p. 275—Guss. syn. 2. p. 54.

lc. Sibth. fl. gr. t. 524—Plenk pl. med. 5. t. 473.

In cultis subargillosis rara; nelle terre coltivate sopra Piano Liguori, e nella discesa della costa di Succellaro.

Aprili, Majo. ☉

Piloso-hispida, decumbens, grate resinam redolens: flores lutei, axillares, solitarii, in nostra folia certe non excedunt, at majores sunt quam in A. Chamaeipyti, ac folia hirsutiora. Interim Cl. Bertol. in fl. ital. 6. p. 11 A. chiam in Italia non provenire asserit, et etiam plantam siculam ad A. Chamaeipytim refert.

62. PLUMBAGINEAE. Vent.

288. STATICE.

Boiss. in Dec. pr. 12. p. 634.

1. S. INARIMENSIS. Guss.

S. glabra suffruticosa dense caespitosa, foliis approximatis rosulatis anguste cuneato-spathulatis margine revolutis, scapis brevibus (2-5-poll.)

scabriusculis dichotome ramosis, ramis strictis, sterilibus paucissimis, spiculis rectis! 1-2-floris in spicas distichas aut secundas laxiusculo dispositis, bractea flores includente oblonga convuluto-concava acutiuscula ad margines anguste albido-scariosa, calycis tubo glabriusculo obsolete costato, limbi lobis obtusissimis nervo rubente sub apice evanescente notatis.

1c. *notra t. XII. f. 1. a.*

In saxosis, et lapidosis maritimis; *Bagno a S. Alessandro sul mare, scogli di S. Anna presso Ischia, marina de' Maronti, e della Scarpata, Punta di S. Angelo, rupi della Punta dell' Imperatore presso Forjo, di Zale, e del monte Vico presso al Lacco.*

Jubio, Julio. ♀

Planta caespites aliquando sesquipedales efficiens: caules ramosissimi, 3-5-pollicares, inferne nigri et ramentis multis foliorum vestiti: folia supra vix tuberculato-punctata, convexa, sulco unico notata, virentia aut subglaucescentia, subtus pallida, vix punctata, concava, nervo carinali virenti percursa, apice obtusissima, mutica, 1/2-2 lin. lata, 5-14 lin. longa: scapi tenues ac adpresse puberuli, scabriusculi, ad divisiones squama brevissima lin. longa ovata acutiuscula virenti vel rufescente et margine tenui albo-membranaceo cineta suffulti, superne una cum bractea majori tenue tuberculati: spicae fere paniculatae vel subcorymbosae, 3-5 lin. longae, approximatae: bractee tres, extima basilaris squamis similis; altera priori opposita ei similis, et rufescens; tertia flores proxime includens 3-4-plo reliquas excedens, dorso virescens, apice saepe rubescens, calyce paullo brevior; dum vero flores sunt duo, tum ad floris interioris basim bractea altera omnino hyalino-scariosa, tenuis, exteriore dimidio brevior adest: calyx pedicello conico brevissimo virenti oblique insertus, praesertim latere exteriore ad basim villosus; limbus 5-lobus, albo-scariosus, tubo brevior; lobis obtusissimis: corollae petala obtusa, fere obovata, sat raro emarginata.

S. minuta. *Ten. syll. p. 593* (non *Liu.*), quae in saxosis maritimis prope *Castellammare* provenit huic videtur proxima, et nisi varietas insignis, species propria *S. Tenoreana* appellanda — *S. oleaeifolia, b. pumila Bertol. fl. ital. 3. p. 516.* (excl. syn. *S. cossyrensis*) ex parte forsitan etiam ad hanc spectat. Nec vero *S. minutiflora* cum *S. Smithii, b. minor*, cujus habitum refert, est confundenda.

2. *S. LIMONIUM. Lin. sp. pl. 594 — Bertol. fl. ital. 3. p. 514.*

b. macroclada; subglaucescens, foliis obovato-oblongis oblongisque, apice mucronatis, in longum petiolum attenuatis, scapo elato subterete paniculato-corymboso, paniculae ramosissimae ramis elongatis patentissimis sterilibus paucis, spiculis 1-3-floris remotiusculis subsolitariis bractea majori excisa — S. serotina. Reich. cent. 8. p. 21 — Ten. fl. nap. 3. p. 349.

lc. *Reich. l. e. f.* 998.

In salsis humentibus herbosis; *Dagno presso le sponde del lago all'Ovest;*
sed nunc fere destructa.

Septembri, Octobri. ☼

Folia laete virentia, firma : scapi 1-2-pedales: flores coerulei.

63. PLANTAGINEAE. Juss.

280. PLANTAGO.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 186.

§ PLANTAGINES GENUINAE. Koch.

Scapi nudi : folia indivisa : placenta bidentata.

1. *P. MAJOR. Lin. sp. pl.* 163 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 146 — *Bertol. fl. ital. 2. p.* 153.

lc. *Savi mat. med. t.* 36 — *P. media. Matth. comm. p.* 435.

In hortis, et in cultis humentibus.

Majo, Novembri. ☉

Vulgo *Cinqueniervi.*

Aliquando foliis sparse dentatis variat.

2. *P. LANCEOLATA. Lin. sp. pl.* 164 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 147 — *Bertol. fl. ital. 2. p.* 158.

lc. *Savi mat. med. t.* 39 — *P. minor. Dod. pemp. 107.*

b. capitata ; scapo gracili, brevi, foliis angustioribus (2-4-lin. lin.), spicis subglobosis. *Ten. l. e. var. e.* — *Dec. pr. 13. pars 2. p.* 715, var. *d.* — *P. capitata. Presl fl. sie. 1. p.* 64.

In pascuis apricis, et ad vias ubique var *b.* in elatis marnaceis; *dal monte Vetta a S. Nicola.*

In planta inarimensi in var. *a.* sepala magis albida, et postice longius ciliata : in *b.* vero radices ad collum valde lanatae, pilis albidis, quod quoque in specimenibus magellensibus, et ex Hirpinorum montibus video, sed minus in aliis.

3. *P. LAGOPUS. Lin. sp. pl.* 165 — *Bertol. fl. ital. 2. p.* 164.

b. eriostachya; spicis dense lanatis, lana bracteis argenteas occultantibus, scapis angulato-sulcatis — *P. eriostachya. Ten. fl. nap. 3. p.* 149.

lc. *Ten. l. e. t.* 112. f. 2.

e. denticulata ; spicis ut in *b.*, foliis laxe sed acute dentatis.

In arenosis maritimis, ac in pratis collinum sola var. *b.* ; et var. *c.* in arenosis maritimis, a *Citara presso Forio.*

Majo, Junio. ☉

Scapi adpresse pubescentes: folia glabra, lanceolata, plus minus late expansa, utrinque attenuata, subdenticulata: spicae 5-2-lineares, cylindraceae: bractee acuminatae — In varietate c. folia aliquando ita lata sunt, et virentia, ut *P. majorem*, vel *P. mediam* imitantur.

4. *P. BELLARDI*. *All. ped. 1. p. 82* — *Ten. fl. nap. 3. p. 153* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 167*.

1c. *All. l. c. t. 83. f. 3* — *Holosteum salmanticense*, majus. *Clus. hist. 2. p. 112*.

b. spica laxa elongata, bracteis longe acuminatis squarrosisque.

In apricis herbosis, vel in aridissimis collibus sterilibus ubique: var. b. satis rara; *marina de Maronti, e di S. Angelo*.

Martio, Aprili. ☉

Plant humilis, 4-6-pollicaris, pilis mollibus patentibus tecta, aliquando canescens: scapi teretes, folia numerosa, anguste lanceolato-lineariter erecta vix excedentes: spica 3-8-linearis, cylindracea: bractee acuminatae.

§ 11. *Coronopus*. *Tourn.*

Scapi nudi: folia saepius pinnatifida: placentae 3-4-alatae, semine unico in quotibet loculo.

5. *P. COMMUTATA*. *Guss. syn. 2. p. 199* — *P. Coronopus*, c. *Columnae*, et *P. macrorhiza*, b. *Ten. fl. nap. 3. p. 157*.

P. foliis scapo sub brevioribus basi lanatis integris dentatis 1-2-pinnatifidisque, laciniis anguste linearibus, spicis compactis (gracilibus) cylindricis scapum subaequantibus, bracteis ovatis acutis adpressis (non mucronatis) calyce brevioribus, capsulis 3-spermis, 3-4-locularibus.

1c. *Coronopus laciniatus*. *Column. ceph. 2. t. 71*, etiam ex loco!

In herbosis maritimis arenosis, et ad vias in apricis mari finitimis.

Aprili, Majo. ☉

Cl. *Webb* in *Phyt. can. vol. 3. pars 2. sect. 3. p. 184*, et *Bertol.* in *fl. ital. 2. p. 174* hanc a *P. Coronopo* non distinguunt. Tamen repetitis observationibus innixus eas non esse confundendas denuo suasum habeo, et confer quae dixi in *syn. l. c.* Praeterea vero *P. Coronopus* in hac insula desideratur.

6. *P. GERATOPHYLLA*. *Hoffm. et Link fl. port. 1. p. 431* — *Guss. syn. 2. p. 201*.

P. radice gracili longa (non lignosa), foliis carnosissimis scapoque piloso-hispidis subcanescentibus dentato-pinnatifidis, dentibus subimbricatis patentibusque mucronatis, spicis crassis cylindricis villosis, bracteis acuminato-mucronatis squarrosis calyce longioribus, capsulis 2-spermis 3-4-locularibus, loculo tertio sterili.

lc. *Hoffm. et Link l. c. t. 74.*

In arenosis montosis; *marina de' Maronti, Forio a Citara, ed a Montevergine, Bagno presso al Lago.*

Majo, Junio. ☉, et ♀

In hac, et in sequente *spicae* crassae, diametro 3-4-lineari; in *P. commutata*, et in *P. Coronopo* vix diametrum 1-1½ lin. acquirunt. In *Dec. pr. 12. pars 2. p. 732*, cum sequente associatur, et a *Cl. Berol. in fl. ital. 2. p. 174*, cum *P. Coronopo*, a, a qua prorsus aliena est.

7. *P. MACRORHIZA. Poir. itin. 2. p. 154 — Ten. fl. nap. 3. p. 156*, excl. var. *d?* — *P. Coronopus, b. Bertol. fl. ital. 2. p. 175.*

lc. *Coronopus sculus, fruticosus, platiphyllus. Boec. sic. p. 30. t. 13. f. 2. — Barr. ic. 15.*

In lapidosis arenosisque maritimis; *Forio a S. Francesco, a Montevergine, ed a Citara, marina di Casamicciola, del Lacco, e della punta di S. Angelo.*

Majo, Octobri. ♀, et basi ♂

Ab omnibus speciminibus hujus sectionis; *radice* ad collum multiplici ac lignosa!; foliis congestis abbreviatis, spicisque vix poll. 1-1½ longis facillime digno: c. tur.

§ III. *PSYLLIUM. Tourn.*

Caules foliati, saepe ramosi: pedunculi axillares: placentae 2-alatae.

8. *P. ARENARIA. Wald. et Kit. pl. rar. Hung. 1. p. 51 — Ten. fl. nap. 3. p. 168 — Bertol. fl. ital. 2. p. 180.*

lc. *Wald. et Kit. l. c. t. 51.*

Majo, Julio. ☉

Piloso-pubescentis, stricta: *bracteae* superiores obtusissimae, capitulum involucentes ac elongatae (4-7-lin. longae); quae in sequente brevissimae.

9. *P. PSYLLIUM. Lin. sp. pl. 167 — Ten. fl. nap. 3. p. 160 — Bertol. fl. ital. 2. p. 178.*

b. sicula; caule erecto stricto piloso-viscoso, foliis linearibus medio dentatis erecto-patulis. *Guss. syn. 1. p. 201 — P. sicula. Presl del Prag. p. 70.*

lc. *Psyllium laciniatis foliis. Boec. sic. t. 4. f. A, et B.*

Ad muros, et in collibus sola var. *b.*

Majo, Junio. ☉

Piloso-glandulosa, ramosissima: *spicce* basi aphyllae! *bracteae* subulatae.

64. AMARANTHACEAE.

290. AMARANTHIUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1431.

§ 1. *Capsula circumscissa.*

Amaranthus. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 255.

1. *A. RETROFLEXUS. Lin. sp. pl. 1047—Ten. fl. nap. 5. p. 334—Moqu. l. c. p. 258, b. major.*

lc. Reich. cent. 5. f. 668, optima.

In cultis pinguibus; Bagno negli orti, e nelle vigne, Chiajano fra i seminati di granone, e nelle Chianole del Testaccio, pianure del Crovone, Casamicciola, Lacco e Forio nelle vigne in siti umidi.

Augusto, Septembri. ☉

Vulgo *Jenisco*, uti sequentes species.

Planta stricta, clata, pallide virens, pubescens: spicae terminales, compositae, thyrsoidae, densae: bracteae mucronatae.

2. *A. BLITUM. Lin. sp. pl. 1405!, ex recognitione Planchon in herb. Lin., uti ex Moqu. l. c. p. 263; var. a. — A. sylvestris. Desf. cat. H. Paris. 1854. p. 44 — Ten. fl. nap. 5. p. 332, et Guss. syn. 2. p. 584.*

A. lacte virens glaberrimus, caule erecto, ramis patulis ascendentibusque, foliis longe petiolatis rhombeo-ovatis undulatis apice integris subemarginatisque, glomerulis omnibus axillaribus, spica terminali nulla!, bracteis flores subaequantibus acuminatis, capsulis ovatis rugosis calyce duplo longioribus acutis.

lc. A. sylvestris. Reich. cent. 5. f. 667.

In cultis ubique.

Junio, Novembri. ☉

A. Blitum plurium auctorum ad A. viridcm spectare monet Moqu. l. c. — Semina globoso-lentiformia, nigra, levissima ac nitidissima.

§ 2. *capsula indehiscente.*

Euxolus. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 272.

3. *A. VIRIDIS. Lin. sp. pl. 1405—Euxolus viridis. Moqu. l. c. p. 273, exl. non. var. — A. Blitum. Ten. fl. nap. 5. p. 333.*

A. lacte virens glaberrimus, caulibus ascendentibus glabris, ramis patulis,

foliis (discoloribus) longe petiolatis subrombo-ovatis obtusissimis retusis, bracteis flore brevioribus, glomerulis axillaribus subglobosis terminalibus in spica brevissima nuda dispositis, sepalis obtusiusculis bracteis lanceolatas acutas duplo superantibus, capsula basi corrugato-rugosa calycem duplo excedente.

1c. *A. Blitum*. *Reich. cent. 5. f. 663.*

b. ascendens; caule ascendente vel diffuso, foliis (concoloribus) emarginatis, florum glomerulis axillaribus et in spicis terminalibus elongatis aphyllis dispositis—*Euxolus viridis*, *b. ascendens*. *Moqu. l. c. p. 274* — *Amaranthus ascendens*. *Loisel. fl. gall. ed. 2. v. 2. p. 320.*

1c. *A. spicatus*. *Reich. cent. 5. f. 664, 665* — *Blitum album*, minus. *Zuing. p. 550.*

In herbosis humentibus, et ad vias; var. *a. Lacco, Casamicciola*; var.

b. Ischia nell'orto della Mandria, Bagno negli orti, Lacco, Forio.

Augusto, Septembri. ☉

Var. *b.* species videtur propria, ut olim putavi; sed melius perpensa re, et ex observatione plantarum viventium cognovi quod ab una ad alteram itur.

5. *A. DEFLEXUS*. *Lin. mant. p. 295*, ex recognitione *Planchon* in herb.

Lin., ex *Moqu. l. c. p. 275* — *Amaranthus prostratus*. *Balb. misc. bot. p. 44*—*Ten. fl. nap. 5. p. 333*—*Euxolus deflexus*. *Moqu. l. c.*

A. pallide vireus, caule diffuso apice surrecto ramosissimo sparse piloso, foliis glabris petiolatis undulatis inferioribus deltoideo-ovatis superioribus deltoideo-lanceolatis acutis, florum glomerulis axillaribus et in spicis terminalibus aphyllis subramosis, sepalis lanceolato-linearibus mucronatis bracteis excedentibus, capsulis ovalibus levibus acutiusculis calycem duplo superantibus.

1c. *A. prostratus*. *Balb. l. c. t. 10* — *Reich. cent. 5. f. 666.*

In ruderalis, in lapidosis, nec non in cultis ubique.

Julio, Octobri. ☾

Radices caulescentes, alte ascendentes: *folia* lineata, longe petiolata: *spicae* 4-3-pollicares: *flores* in glomerulis spicati: *semina* ovalia, compressiuscula, nitide nigra, levissima.

IV. MONOCLAMIDEAE.

65. PHYTOLACCEAE. Endl.

291. PHYTOLACCA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 800.

1. *P. DECANDRA. Lin. sp. pl. 631 — Ten. fl. nap. 4. p. 253.*
lc. Lam. ill. gen. t. 393. f. 1 — P. vulgaris. Dill. hort. eth. p. 318.
t. 339. f. 309.
 In ruderalis, in sylvaticis humentibus, nec non in hortis nunc passim
 spontanea.
 Augusto, Septembri. ☞
 Vulgo *Erba di Spagna.*
Radices alto descendentes, diametro saepe pedali et ultra! caules annui,
saepe orgyales: racemi axillares, penduli: flores albi: fructus atreru-
bentes, quorum succus ad ova, et ad dulcia coloranda adhibetur.

66. CHENOPODIACEAE. Lindl.

292. SALSOLA.

Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 179.

1. *S. KALI. Lin. sp. pl. 322 — Ten. fl. nap. 3. p. 360 — Bertol. fl. ital.*
3. p. 53.
lc. Kali, spinoso affinis. Moris. hist. 2. s. 5. t. 32. f. 11.
 In arenosis maritimis.
 Augusto, Septembri. ☉
Haec hirta et scabra; sepalorum alis brevibus: sequens vero undique gla-
berrima; sepalorum alis amplis, roseis, explanatis.
2. *S. TRAGUS. Lin. sp. p. 322 — Ten. fl. nap. 3. p. 360 — Bertol. fl.*
ital. 3. p. 53.
lc. Lam. ill. gen. t. 186. f. 2 — Trago. Matth. comm. 2. p. 382.
 In arenosis maritimis magis quam praecedens obvia.
 Augusto, Septembri. ☉

293. SALICORNIA.

Tourn. inst. 485 — Endl. gen. n. 1908.

1. S. HERBACEA. *Lin. sp. pl. 5 — Ten. fl. nap. 1. p. 1 — Bertol. fl. ital. 1. p. 15.*

l.c. Guss. fl. sic. t. 2 — Zannich. hist. t. 33. f. 2.

In inundatis salsis; *Ischia ne'scogli di S. Anna, Bagno presso al Lago, e ne'margini de'fossi salmastri degli orti vicini.*

Augusto, Septembri. ☉

Glaberrima, glauco-virens, erecta, brachiato-ramosa, articulata, succulenta: *spicae* terminales, cylindratae, subpedunculatae: *areolae* floriferae 3-loculares, loculo superiore altiore.

294. KOCHIA.

Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 130.

1. K. SAXICOLA. *Guss.*

K. adpresse villosa-pubescentia ac glaucescens, caule basi suffruticoso ramosissimo, ramis floriferis surrectis pyramidato-ramulosis, foliis semper-virentibus anguste linearibus teretibus! sessilibus obtusiusculis succulentis, floribus in apice caulis ramorumque subspicatis, in foliorum axillis sessilibus ebracteatis subternis, calycinis appendicibus cuneato-obovatis obtusis (albidis demum rubro-coloratis).

l.c. nostra t. XIII.

In aridissimis rupibus maritimis; *Ischia ne'scogli di S. Anna, e propriamente nel pendio orientale di un solo di essi più prossimo alla terra, e vicino a quello detto a tre pizzi, ideoque satis rara, nam usque adhuc alibi in insula non vidi.*

Augusto, Octobri. ☽

Caules basi caespitosi, obsolete striati, superne uti folia pubescentes, 1/2-1-pedales; ramulis gracilibus, fere filiformibus, erectis, pyramidatis: *folia* sparsa, sub pube glauco-virentia, ac sub forte lente viridi-glanduloso-punctata, approximata, 6-12 lin. longa, diametro vix lineari, recta vel incurva, saepe inferiora cum fasciculo foliorum minorum in axillis; floralia reliquis similia, tamen saepius incurva, omnia aetate demum glabrata ac virentia, et nonnisi exsiccatione plana videntur: *flores* in apice caulis vel ramulorum approximato-spicati, folio suffulti, sed bracteis destituti!: *calyx* villosus, campanulatus, 5-fidus; laciniis erectis, obtusiusculis, demum coarctatis, et dorso sub apice instructis appendi-

ce transversa, supra plana, subtas gibba, patula, glaberrima, basi superne pubescente, integerrima vel crenulata, disco calycis sublongiore, demum pallidissime rosea, aliquando vero in floribus supremis calycinae laciniae sunt incrassatae, fere succulentae, et appendice destitutae: *stylus* bifidus, brevissimus; cruribus rubentibus, villosiusculis, divaricatis: *utriculus* glaber, virescens, orbicularis, depressus: *semen* nitide nigrum, subglobosum, in medio depressum: *embryo* horizontalis.

Nostra differt a descriptione *K. prostratae* auctorum, et ab icone *Jacq. t. 294*, et *All. t. 38*, ramis usque ad apicem ramulosis; foliis exacte cylindricis ac crassiusculis, non planis et exsuccis, nec ad apicem subulatis; habitu totius plantae; denique loco natali. — Praeterea habitus *Maireanae tomentosae Moqu.* in *Dec. pr. 13. pars 2. p. 120*, et in *Ann. Sc. nat. ser. 2. v. 15. p. 96. t. 13 affinis*; sed non tomentoso-hispida, nec calyces ala continua circumdati, ut in icone citata et in descriptione.

293. CHENOPODIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 433.

1. *C. BOTRYOIDES. Smith engl. fl. 2. p. 11—Bertol. fl. ital. 3. p. 29—C. rubrum. Ten. fl. nap. 3. p. 254, non Lin. — Blitum rubrum, a. crassifolium. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 84.*

C. glaberrimum laete virens, caule erecto, ramis patulis, foliis triangulari-hastatis subintegris vel irregulariter profunde et acute sinuato-dentatis, supremis lanceolatis, florum glomerulis in spicis ramosis densis basi foliatis dispositis, calyce demum subbaccato, seminibus nitidis lacvibus (majusculis atris).

l. Engl. bot. t. 2247, ex Bertol.

In hortis pinguibus humentibus maro finitimis; *Ischia nell' orto della Mandria, Dagno negli Orti presso al Lago, Forio in quelli di Citara*, sed in hoc loco satis rarum.

Septembri, Octobri. ☉

Omnes hujus generis species vulgari, et communi? nomine *Erba fetente* appellantur.

Calyx striati, $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pedales, in fertilibus pyramidato-ramosi: *folia* nitide virentia, crassiuscula, basi cuneata, ac ibi integerrima: *spicae* terminales, et axillares numerosae: tota planta demum rubescit, et *calyces* maturi facillime decidunt. — Auctoritate el. *Bertol.* innixus hoc pro *C. botryoides* recipio, nam ipsius planta certe nostra! ex loco, et ista seminibus majusculis, non minutissimis *sabuli tenuioris* iustar a *C. rubro* distinguitur ex ipso auctore; nam quoad alios characteres ab

una specie ad alteram itur. Praeterea *Blitum* et *Chenopodium* in unicum genus mihi associanda esse videntur; siquidem calyces plus minus baccati vel succulenti character puci momenti; et species ista semina horizontalia et verticalia habet; ideoque intra utrumque genus media, et illa conjungens.

2. *C. MURALE*. *Lin. sp. pl.* 318 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 214 — *Bertol. fl. ital.* 3. p. 29.

C. virens glabrum, caule erecto sulcato-angulato ramoso, foliis ovato-rhombicis acutis, superioribus cuneato-oblongis, omnibus subtus pallidis pulverulentisque inaequaliter et acute dentatis, florum glomerulis racemoso-cymosis subaphyllis, calyce fructifero subclauso, staminibus opacis subdepressis.

- lc. *Curtis lond.* 6. t. 20 — *Atriplex sylvestris* in *Math. aomm.* 1. p. 420.

Ad muros, ad vias, in ruderalis, et in cultis pinguibus.

Augusto, Octobri. ☉

Caules 1/2—2-pedales, virentes, demum basim versus rubentes, glabri, sed glandulis sparsis pellucidis conspersi; quae in apice ramorum et in calycibus crebriores, unde partes istae farinosae videntur: *folia* tenuia, non semper nitida, sed potius opaca, subtus pallidiora, et ibi aliquando farinosa, saepius obliqua, petiolo supra canaliculato longiora: *racemi* plus minus ramosi, axillares, folio breviores, terminales fere paniculati: *calycis* laciniae obtusiusculae, concavae, sub apice cornutae, unde calyces ante anthesim pentagoni videntur, ad margines scariosae: *filamenta* calycem aequantia, una cum antheris albidis: *ovarium* ovale, glandulis pellucidis conspersum: *styli* duo rubentes, breves.

3. *C. ALBUM*. *Lin. sp. pl.* 319 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 256 — *Bertol. fl. ital.* 3. p. 30, excl. var. b. — *C. album*, a. *commune*. *Moq. in Dec. pr.* 13. pars 2. p. 71.

C. albo-vel cinereo-farinosum, caule erecto sulcato-striato ramoso elongato, foliis rhombeo-ovatis basi cuneatis apice obtusis acutisve subaequaliter sinuato-dentatis, superioribus oblongis integerrimis acutis, florum glomerulis spicatis in panicula subdensa erecta subaphylla contracta, pedunculis erectis approximatis, calycibus fructiferis clausis carinatis seminibus nitidis levibus.

- lc. *Fl. dan.* 1150 — *Atriplex sylvestris*. *Fuchs. hist.* 119, optima — *Atriplex sylvestris*. *Tabern. hist.* 426.

b. *glomerulosum*; glomerulis densis paniculatis minimis, planta magis albo-farinosa. *Reich. fl. germ.* 2. p. 572.

lc. *nulla*.

In cultis passim; var. b. minus frequens.

Junio, Octobri. ☉

Folia supra cinerascenti-viridia, subtus albida: caules erecti, stricti, arrecto-ramosi: paniculae rami non patentes, sed erecti, glomerulis approximatis: utriculus scabriusculus, sed semen nitidum, leve.

4. *C. VIRIDE. Lin. sp. pl. 319, ex obs. Planch. in herb. Lin.!, ex Moqu., non Curtis nec Loisel.—Ten. fl. nap. 3. p. 256 — C. album, e. viride. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 71—Bertol. fl. ital. 3. p. 31—C. concatenatum. Thuil. fl. paris. p. 125 (quod ex Dec. in suppl. fl. fr. ad C. opulifolium citatur).*

C. virescens, caule erecto sulcato-striato ramoso, foliis rhomboideis subintegris vix farinosis, superioribus oblongis obtusis, florum glomerulis laxiuscule paniculatis, paniculae ramis erecto-patulis, calycibus fructiferis clausis carinatis, seminibus nitidis levibus.

lc. Fl. dan. 1150 — Atriplex sylvestris. Bauh. hist. 2. p. 972.

In cultis, in hortis, ad ruderata ubique.

Junio, Octobri. ☉

Similis praecedenti, sed habitu diversum, et foliorum colore praeter notatos characteres distinguitur.

5. *C. PEDUNCULARE. Bertol. fl. ital. 3. p. 32—C. album, f. pedunculare. Moqu. l. c. p. 71.*

C. foliis rhombeis, vel oblongo-lanceolatis subintegris, supra laete virentibus subtus subfarinosis, florum glomerulis majusculis in panicula longe laxiuscule pedunculatis, calycibus fructiferis clausis carinatis, seminibus levibus nitidis.

lc. nulla.

In cultis, et in ruderatis sero autumnō; Bagno, Chianjano, Chianole del Tentaccio, ai Maronti, Casamicciola, Lacco.

Junio, Novembri. ☉

Folia praecedentis similia, sed inflorescentia diversissima et potius C. albo, b. glomeruloso similis; glomeruli aliquando sessiles.

6. *C. PAGANUM. Reich. fl. germ. 2. p. 579 — C. album, e. viridescens. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 71.*

C. albido-virescens, caule erecto striato ramoso, foliis (subpulverulentis) rhombeo-ovatis sinuato-dentatis, summis oblongis integerrimis, glomerulis spicatis, spicis subramosis pyramidato-confertis aphyllis calycibus fructiferis clausis carinatis, seminibus nitidis levibus.

lc. nulla.

In cultis, et in hortis; Ischia, Bagno.

Julio, Octobri. ☉

Folia utrinque laete virentia, praecedenti similia sed crassiora; racemi confertiores ac approximati.

7. *C. OPULIFOLIUM Schrad. apud Koch et Ziz. cat. pl. Palat. p. 6—Moq. in Dec. 13. pars 2. p. 67 — Ten. fl. nap. 3. p. 256, var. a — Bertol. fl. ital. 3. p. 32.*

C. albo-farinosum, caule erecto ramoso obsolete striato, foliis deltoideo-rhombicis subtrilobis inaequaliter crosso-dentatis obtusissimis basi cuneatis, superioribus ovali-acuminatis, florum glomerulis dense paniculato-spicatis subaphyllis, calycibus fructiferis clausis carinatis, seminibus nitidis levibus.

lc. C. sylvestre, opulifolio. *Vaill. bot. paris. p. 36. t. 7. f. 1.*

In hortis non satis obvium.

Augusto, Octobri. ☉

Rami patulo-ascendentes: folia summa farinosa, albida, et in inferioribus diametros longitudinalis vix transversalem superat: florum glomeruli congesti in spicis brevibus: calycis laciniae obtusiusculae— C. viride *Lin. ex observ. Planchon in herb. Lin.*, uti ex *Moqu. l. c.*, ab hoc plane diversum est.

8. C. VULVARIA. *Lin. sp. pl. 321 — Ten. fl. nap. 3. p. 257 — Bertol. fl. ital. 3. p. 39.*

C. cinereo-pulverulentum (foetens), caule erecto, ramis patulis, foliis rhombico-ovatis integerrimis, florum glomerulis in spicis densis aphyllis conglomeratis terminalibus ramosis, calycibus fructiferis clausis, seminibus nitidis subtilissime punctatis.

lc. *Bull. herb. t. 323 — Garosmos. Dod. pempt. 616.*

In ruderalis, ad vias, et in cultis.

Augusto, Octobri. ☉

9. C. POLYSPERMUM. *Lin. sp. pl. 331 — Ten. fl. nap. 3. p. 267 — Bertol. fl. ital. 2. p. 40.*

C. glaberrimum laete virens demum rubescens, caule erecto ramosissimo, ramis patulis, foliis ovatis aut ovato-oblongis integerrimis obtusis, spicis ramosis aphyllis divaricatis, calycinis laciniis anguste ovalibus in fructu patentibus, seminibus nitidis subtilissime punctatis.

lc. *Engl. bot. t. 1480 — Polyspermon Cassiani. Lobel. ic. 266 — Bli-tum album. Matth. comm. 1. p. 412.*

In cultis humentibus; *Chianole del Testaccio.*

Septembri, Novembri. ☉

Folia tenuia, basi porum in petiolum attenuata: flores minuti; calycinis laciniis angustis, acutis.

206. BETA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 436.

1. B. CICLA. *Lin. sp. pl. 322 — Ten. fl. nap. 3. p. 261 — Bertol. fl. ital. 3. p. 43, var. b.*

lc. B. candida. *Dod. pempt. 620 — B. alba. Zuing. theatr. p. 547.*

b. racenis virgatis, floribus subglomeratis.

In cultis subagrilosis sola var. *b.* ; *coste di S. Pancrazio, e della Guordiola del Tentaccio, fumarole Ac'la contrada del Bell'omo sopra Forio, et colitur passim.*

Najo, Junio. ♂

Vulgo *Foglia mollo*, et inter olera apud incolas locum habet.

Cl. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 56 sub *B. vulgari* sua plures species associat, quae in natura spectatae, et cultae, inter se diversae permanent; tales sunt *B. maritima* Lin., *B. macrocarpo* Guss., *B. sulcata* Caspar. ; et haec posterior potius *B. trigynae*, quam *B. vulgaris* affinis est.

297. ATRIPLEX.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1577.

1. *A. TORNABENI*. Tin. in Guss. syn. 2. p. 589 — Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 104 — *A. laciniata*. Ten. fl. nap. 5. p. 295 !, non Lin.

A. annua argenteo-lepidota, caule centrali erectiusculo ramosissimo, ramis diffusis ascendentibusque, foliis in ramis junioribus obtusis rhombico-ovatis irregulariter angulato-crenatis, reliquis deltoideo-oblongis acutiusculis subintegris, floribus axillaribus foemineis subsolitariis, masculis foemineisque in spicis terminalibus aphyllis, sepalis rhombeis latis levibus (non muricatis) ad latera 1-2 obtuse dentatis.

Ic. *A. marina*, minor, supina, lanceolato folio incano, semine tricuspido alato. Bon. t. 73!

In argillosis, aut arenosis maritimis; *morina del Lacco, di S. Angelo, e di Forio a Citara ed a Montevergine.*

Septembri, Octobri. ☉

A. laciniatae varietatem putat Cl. Moqu. l. c., sed ab hac aliena est. Confer syn. l. c.
2. *A. ROSEA*. Lin. sp. pl. 1493 — *A. polysperma*. Ten. fl. nap. 5. p. 295 — Guss. syn. 2. p. 589 — Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 32, excl. syn. *A. foliosae* Link.

A. glaucescens lepidota vel pulverulenta, caule erecto ramosissimo, ramis inferioribus patulis, foliis deltoideo-ovatis inaequaliter acute sinuato-dentatis basi integris, florum glomerulis numerosis axillaribus terminalibusque spicatis subapproximatis, calycis fructiferi sepalis rhombeis ovatisque anguste marginatis irregulariter dentatis dorso obtuse cristato-tuberculatis.

Ic. Ten. l. c. t. 269. f. 2.

In argillosis maritimis; *Lacco presso ollo collinetta detta Capitello sporgente sul mare prima del paese, e presso la chiesa di S. Restituto.*

Augusto, Septembri. ☉

- Sperimina Svecica, et descriptiones *A. roseae* auctorum cum hac conveniunt; et ex adverso *A. rosea* Ten. et syn. fl. sic. ad *A. foliosam* spectat.
3. *A. FOLIOSA*. Link in Schrad. Journ. 1800. p. 55 — *A. rosea*. Ten. fl. nap. 5. p. 295, et Guss. syn. 2. p. 590, non Lin. !
- A.* subglaucescens lepidota vel farinosa, caule ramosissimo, ramis divaricatis flexuosis, foliis obtuse eroso-dentatis deltoideo-ovatis oblongisque basi integris, florum glomerulis numerosis multifloris axillaribus terminalibusque (vix spicatis), calycis fructiferi sepalis orbiculato-rhombeis cordatis late marginatis acute-dentatis dorso cristatis muricatisque.
- lc. *A. alba*. Scop. del. fl. Ins. 2. p. 16. t. 8?; confer syn. l. c.
- Cum praecedente ! simulque floret.
- Cl. Moqu. l. c. alique species duas istas confundunt, tamen quamvis simul in eodem loco proveniant characteres immutatos servant; et equidem *A. rosea* semper pyramidata, ramis superioribus surrectis; calycis fructiferi sepala angusta; glomeruli florum densi, in apice caulis in spicis foliosis elongatis dispositi — In *A. foliosa*, rami semper patuli ac flexuosi, ideoque forma plantae irregularis; florum glomeruli fere omnes axillares, vix in apice ramorum subspicati; calycis fructiferi sepala duplo latiora sunt.
4. *A. TRIANGULARIS*. Willd. sp. pl. 4. p. 963 — Ten. fl. nap. 5. p. 296 — *A. hastata*, e. *triangularis*. Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 95.
- A.* virescens vel cano-farinosa, caule erectiusculo, ramis inferioribus patulis, foliis plurimis oppositis integris triangulari-hastatis, summis lanceolato-linearibus, florum glomerulis in spicis aphyllis terminalibus paniculatis simplicibusque laxè dispositis, calycis fructiferi sepalis triangularibus, margine versus basim dentatis, disco inappendiculatis.
- lc. *A. folio deltoideo*. Zannich. hist. p. 31. t. 49.
- In humentibus maritimis; *Ischia nell'orto alla Mandria, Bagno alle sponde del lago*, et in aridis a marinis undis perfusis; *scogli di S. Anna presso Ischia*.
- Septembri, Octobri. ☉
- Sepala* disco inappendiculata in hac recte notat Moqu. l. c. !; sed aliquando variat sepalis verrucis elongatis obsitis, ut in sequente, et in unico flore sepala latiora quidem, sed non ampliata.
5. *A. PLATISEPALA*. Guss. syn. 2. p. 590 — Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2 p. 104.
- A.* glabra virescens, caule ramosissimo, ramis inferioribus oppositis patulis diffusisque, foliis integris, inferioribus mediisque hastatis, supremis oblongo-lanceolatis, florum glomerulis axillaribus paucis, in extremitate ramorum glomerulis spicatis aphyllis, calycis fructiferi sepalis triangularibus ampliatis apice subproductis a basi ad medium acute dentatis integrisve, dorso tuberculatis levisque.

lc. *nulla*.

b. *sepalis* calycis fructiferi basi dentatis, verrucis elongatis lanceolato-foliaceis.

In humentibus herbosis pinguibus cultis; *Ischia nell' orto alla Mandria, Bagno negli orti presso al Lago; Forio in quelli di Citara; sola var. 3.* Augusto, Octobri. ☉

Planta semper lacte virens, non glaucescens, aliquando 2-pedalis: in quolibet glomerulo calycis unici fructiferi *sepala* ampla, foliacea, in reliquis duplo minora: in var. b. verrucae ita elongatae sunt, ut sepala excedant, ideoque dentes alios in sepalo, tum margine mentiuntur.

6. A. MACRODIRA. *Guss. syn. 2. p. 592 — Moqu. in Dec. pr. 13. pars 2. p. 103.*

A. *virescens* junior albedo-pulverulenta!, caule erecto, ramis infimis patulis, foliis mediis inferioribusque ovato-lanceolatis basi cuneatis ad medium sinuato-dentatis integrisve, supremis lanceolatis integerrimis, florum glomerulis in spicis terminalibus aphyllis laxè dispositis, calycis fructiferi *sepalis* subdeltoideo-hastatis semen excedentibus latioribusque, auriculis acute irregulariterque dentatis, apice non producto integerrimo, dorso verrucis lanceolatis obsitis.

lc. *nulla*.

In cultis apricis herbosis; *seminati di Catauro presso al Cavone delle Nocelle e della costa di Succellaro, Chianole del Testaccio, vigne di Cavallaro sopra Fontana, e ne' margini delle stesse da Fontana a Calinera, Forio alle fumarole nella contrada del Bell' omo.*

Septembri, Octobri. ☉

Sepala ut plurimum in hac farinosa dum juniora sunt, semper parva, et minime apice producta.

7. A. PATULA. *Lin. sp. pl. 1494 — Ten. fl. nap. 5. 296.*

b. *producta*.

A. *virescens*, caule erecto (saepius stricto), ramis patulis, foliis omnibus lanceolato-oblongis acutis integerrimis, florum glomerulis axillaribus solitariis, et ad apicem ramorum in spicis terminalibus subfoliatis laxiuscule dispositis, calycis fructiferi *sepalis* deltoideis apice productis versus basim denticulatis dorso levibus tuberculatisque semen multoties excedentibus latioribusque.

lc. *nulla*.

In cultis herbosis; *Monte Vetta, sola var. b.*

Septembri, Octobri. ☉

Caulis 4-15-pollicares: *rami* angulo recto patentes: *folia* in brevem petiolum attenuata, 6-12 lin. longa, 4-3 lin. lata; inferiora angustiora; superiora latiora, et acutiora: *florum* glomeruli solitarii, jam ex axillis foliorum inferiorum prodeuntes, et in istis calycis fructiferi *sepala* duplo

minora, quam in superioribus; in quibus sepala ista aliquando 3-4 lin. longa sunt, et earum apex in acumen productus.

8. *A. ANGUSTIFOLIA*. *Smith britt. 3. p. 1092* — *Guss. syn. 2. p. 593* — *Ten. fl. nap. 5. p. 297*.

A. virescens, caule erecto, ramis patulis, foliis infimis lanceolato-ovatis subhastatis subsinuato-dentatis, superioribus lanceolatis integerrimis, florum glomerulis in spicis terminalibus aphyllis laxè dispositis, calycis fructiferi sepalis deltoideis subintegris levibus vel obsolete tuberculatis, semen multoties excedentibus latioribusque.

1c. *Babingt. Trans. soc. bot. Edimb. Jun. 1840. p. 7. t. 1* — *A. sylvestris*, Polygoni, aut Helxines foliis. *Lob. ic. 257*, bona — *A. sylvestris*, prima. *Matth. comm. 1. p. 418*.

Inter segetes, et in vineis; *vigne di Cavallaro sopra Fontana, ed in quelle della costa di Succellaro, Chianole del Testaccio.*

Septembri, Octobri. ☉

Calycis fructiferi sepala duplo triploque, quam in praecedente minora, nunquam farinosa, ut in *A. macrodora*; nec in praecedentem transit.

67. CYNOCRAMBEA. Moqu.

298. THELIGONUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1444.

1. *T. CYNOCRAMBE*. *Lin. sp. pl. 1411* — *Ten. fl. nap. 2. p. 349*.

1c. *Lam. ill. t. 777* — *Cynocrambe. Column. phyt. p. 121. t. 36* — *Barr. ic. 335*.

In ruderalis, ad maceries, et ad rupes in sylvaticis, tam elatis, quam demissis.

Februario, Aprili. ☉

Glabrum, laete virens, decumbens, ramosissimum: *caules* articulati: *folia* ova, integerrima: *flores* albido-virentes, herbacei, parvi, axillares, sessiles: *semina* nitida.

68. POLYGENEAE. *Juss.*

299. POLYGONUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 677.

§ 1. AVICULARIA. *Meisn.*

Flores in axillis foliorum fasciculati, vel foliis ad apicem ramorum diminutis
spicas interruptas formantes: stigmata minutissima.

1. *P. MARITIMUM.* *Lin. sp. pl. 519 — Ten. fl. nap. 1. p. 212 — Bertol. fl. ital. 4. p. 385.*

lc. Sibth. fl. gr. t. 363 — Camer. epit. p. 691, figura tantum dextra— P. majus, incanum. Barr. ic. 561. f. 1.

In arenosis maritimis.

Majo, Octobri. ♀

Caules aliquando ita elongati, ut fere flagelliformes evadunt, nigri, cicatriscati; juniores ocreis longis multinerviis scariosis laceris obtecti: folia coriacea, glaucescentia: flores breviter pedicellati; calycinis laciniis albis, non roseis: stam. 8: styli 3: semina trigona, fusca, glaberrima, nitida, levia.

2. *P. HERNIARIOIDES.* *Del. descr. de l'Aegypt. v. 19. p. 86 — Bertol. fl. ital. 4. p. 381.*

P. diffusum glabrum suffruticulosum, foliis ovalibus crassiusculis approximatis obtusis, ocreis laciniato-laceris, laciniis apice setaceis, floribus axillaribus brevissime pedunculatis subfasciculatis, seminibus trigonis levissimis fuscis utrinque acutis (exiguis).

lc. P. maritimum, minimum, thymifolio. Barr. ic. 559?

In lapidosis apricis ad vias; *lungo la strada dal Lacco a Forio nella discesa da Marecoeo al Purgatorio.*

Septembri, Octobri. ♀, et basi fere ♀

Caules plus minus elongati, terrae adpressi, foliis virentibus dense tecti, tamen nec isti nec folia scabri, uti ex *Bertol. l. c.*, et uti in plantis aegyptiacis video, sed leves; at in reliquis conveniunt: flores parvi.

3. *P. AVICULARE.* *Lin. sp. pl. 519 — Ten. fl. nap. 1. p. 212 — Bertol. fl. ital. 4. p. 378, an cum syn. et var.?*

lc. Engl. bot. t. 1252, ex Bertol.—P. mas, vulgare. Dod. pempt. 113.

Ad vias, et in arvis passim.

Julio, Octobri. ☉

Caules elongati, usque ad apicem foliosi, et foliis latioribus laxè non dense

tecti, ut in praecedente: *semina* brevissime pedicellata, nitidiuscula, minute granulata.

4. *P. GRACILE*. Guss.

P. annuum glabrum, caulibus gracilibus ascendentibus decumbentibusque, foliis (tenuibus) ovalibus distantibus subtus verrucis minimis albidis obtusis tectis, ochreis remote nervosis fimbriato-laceris, laciniis apice setaceis, floribus octandris trigynis axillaribus subsolitariis brevissime pedicellatis, seminibus trigonis (nitidis) tenuissime punctatis.

1c. *novra t. XII. f. 2, c. d. e.* — *P. vulgare*. Zannich. *hist. t. 201*, quoad habitum hoc bene refert.

In cultis apricis, et in agris post messem; *Bagno, Campagnano, Pico, Chiojano, Chianole del Testaccio, valle di Canniani, piano de' Muori*; et prope *Napoli, Portici, ec.*

Septembri, Octobri. ☉

Caulis saepius decumbentes, 1-3-pedales, tamen semper graciles, internodiis elongatis: *folia* distantia, pallide virentia, obtusiuscula, et margine integerrima ac plana, non undulata: *bractae* ochreis conformes: *flores* breviter pedicellati, 2-3 ex axillis bractearum: *calycis* lacinae intus albae, dorso roseae, aut virentes, albo-marginatae, obtusae, post anthesim clausae ac obtuse carinatae: *filamenta* basi incrassata; *antheris* luteis: *stigmata* tria, albida, crassiuscula, et fere capitata: *semina* nigra, acute trigona. — Praecedenti proximum, sed gracilius; *folia* magis distantia, parva—An *P. aviculare, y. neglectum Bess., P. oxyspermum Leed.* in *Reich. fl. germ. 2. p. 573?* — Nec eum *P. Belardi*, nec eum *P. monspeliensi* est confundendum.

§ 11. *PERSICARIA*. Tourn.

Flores in apice ramorum spicati: stigmata magna, capitata.

5. *P. nodosum*. *Pers. syn. 1. p. 440* — *Reich. fl. germ. 2. p. 572* — *P. lapatifolium. Ten. fl. nap. 5. p. 343* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 369*, ex parte.

P. floribus hexandris digynis, seminibus compressis utrinque concavis, spicis linearibus crassiusculis subcernuis, calycibus eglandulosis, foliis lanecolatis utrinque attenuatis margine subtusque ad nervos petiolisque scabriusculis, pedunculis scabris eglandulosis, ochreis breviter ciliatis nudisque, caule erecto vel basi ascendente.

1c. *Reich. cent. 5. f. 689.*

b. *canescens*; foliis subtus adpresse tenneque villosa-canescensibus.

In cultis humentibus; *Ischia ne' fossi dell'orto alla Mandria, Forio a Citara* utraeque varietates.

Septembri, Octobri. ☉

Cave ne var. *b.* cum *P. incano* Willd. confundas, in quo *spicae* breviores; *folia* angustiora, et subtus fere lanato-tomentosa: praeterea quibus notis species ista a *P. lappathifolio* distinguitur, confer *Reich. l. c.* et *Guss. syn. 1. p. 455.*

6. *P. PERSICARIA.* *Lin. sp. pl. 518*, var. *a* — *Ten. fl. nap. 1. p. 211*, et *P. serotinum. Id. fl. nap. 4. p. 180*, nam semina variabilia sunt — *Bertol. fl. ital. 4. p. 370*, excl. syn. *P. laxiflora* Reich.

P. floribus hexandris digynis, seminibus trigonis lenticularibusque, spicis ovalibus (brevibus) crassis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, ochreis pilosis longe ciliatis, pedunculis calycibusque eglandulosis.

lc. Reich. cent. 5. f. 684 — *Persicaria mitis. Bauh. hist. 3. p. 779* mala, uti omnes illae veterum auctorum.

In cultis arenosis humentibus; ne' siti coltivati della valle del Crovone.

Septembri, Octobri. ☉

Spicae in nostro ovals, aut fere globosae, saepius erectae: *bractae* ciliatae: *calycis* lacinae concavae, fere scariosae, integerrimae, albae, uti *stamina* styli et *stigmata*: *stamina* petala subaequantia: *pistilli* duo recurvi, inferne subconnati: *semina* vitide atra, vix punctata, raro trigona, saepius vero hinc convexiuscula, hinc fere plana, obsolete foveolata.

§ III. HELXINE. Dec.

Flores in racemis axillaribus. Styl. unicus, brevis:
stigmatibus unico, trilobo.

7. *P. CONVULVULUS.* *Lin. sp. pl. 522* — *Ten. fl. nap. 1. p. 213* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 388.*

lc. Fl. dan. 744 — *Fagopyrum vulgare, scandens. Zannich. hist. t. 146.*

In sylvaticis, et ad sepes in cultis.

Majo, Septembri. ☉

Vulgo *Corriola.*

Calycis lacinae in hoc ad carinam apterae; carinato-alatae, alis albidis in sequente.

8. *P. DUMETORUM.* *Lin. sp. pl. 522* — *Ten. fl. nap. 1. p. 214* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 389.*

lc. Fl. dan. 756 — *Convolvulum nigrum. Dod. pempt. 396* — *Helxine Cissampelos altera, Atriplicis effigie. Lobel. ic. 624.*

In sylvaticis, vel ad sepes in cultis in hac insula satis rarum; nelle vigne sotto al piano delle Zavatte sopra al Rotaro, semel vidi.

Augusto, Septembri. ☉

300. RUMEX.

Compd. mon. du gen. Rum., et in Endl. gen. n. 1993.

1. R. CRISPUS. *Lin. sp. pl. 476* — *Ten. fl. nap. 3. p. 390* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 236*, excl. var. *b.*
lc. Reich. cent. 6. f. 783 — *Lapathum acutum, crispum. Tabern. ic. 436.*
 In cultis humentibus; *Ischia nell' orto alla Mandria, Foria in quelli di Citara.*
 Aprili, Majo. ♂
Folia lanceolata, undulato-crispa: sepala tria interiora cordato-orbiculata, subintegra, unica vel omnibus graniferis.
2. R. CONGLOMERATUS. *Murr. pr. fl. Gott. p. 52* — *Ten. fl. nap. 5. in prodr. in fol. p. VI*, et *R. nemolapathum. Ten. fl. nap. 3. p. 390?* non *Ehrh. ex loco* — *R. acutus. Bertol. fl. ital. 4. p. 237.*
lc. Reich. cent. 4. f. 552.
 In sylvaticis, etiamque in cultis humentibus.
 Aprili, Majo. ☉
Folia inferiora oblonga, subundulata: flores in quolibet verticillo numerosi; sepalis fructiferis interioribus omnibus graniferis, parvis, fere granulo suo angustioribus — *Cl. Bertol. l. c. a R. acuto Lin. non separat, sed ex observatione Cl. Koch in syn. ed. 2. p. 705 in R. acuto valvae dentatae sunt ex descriptione Lin., dum in hoc integerrimae.*
3. R. PULCHER. *Lin. sp. pl. 427* — *Ten. fl. nap. 3. p. 391* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 240*, an excl. var. *b.?*
lc. Reich. cent. 5. f. 679 — *Lapathum pulchrum, sinuatum. Bauh. hist. 2. p. 988*, quoad folia bona.
 In apricis herbosis, et ad vias.
 Aprili, Majo. ♂
Folia radicialia panduriformia: rami divaricati: sepala tria interiora triangulari-ovata, setaceo-dentata, omnia granifera.
4. R. BUCEPHALOPHORUS. *Lin. sp. pl. 479* — *Ten. fl. nap. 3. p. 392* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 244.*
lc. Cav. ic. 1. t. 44. f. 1 — *Aetosa Oeymifolia, bucephalophoros. Column. ephr. 1. p. 151. f. 150.*
 In apricis herbosis, nec non in aridis asperis passim.
 Martio, Majo. ☉
Glaberrimus virens, sed demum undique intenso rubens: folia oblongo-lanceolata: pedunculi fructiferi demum incrassati, ac reflexi: sepala tria interiora linearia, ciliato-dentata, granulo destituta. Floribus monstrois variat.

3. R. MULTIFIDUS. *Lin. sp. pl.* 482 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 393 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 260.

lc. Acetosa minor, erecta, lobis multifidis. *Docc. mus. 2. p.* 164. t. 126.
In cultis, et ad vias in arenosis; *dalla vetta del Monte S. Nicola al mare.*
Aprili, Junio. ♀, et ♂
Glaberrimus, dioicus, lacte virens: *folia hastata, auriculis palmato-multifidis: flores paniculati: sepala integra, granulo destituta.*

69. LAURINEAE. Dec,

301. LAURUS.

Nees in Endl. gen. n. 2061.

1. L. NOBILIS. *Lin. sp. pl.* 529 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 217 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 399.

lc. *Dukam. arb. ed. 2. v. 2. t.* 32 — *Laurus. Dod. pempt. 849.*
Passim colitur.

Februario, Martio. ♪

Vulgo *Lauro*, et folia, quia grate aromatica, inter obsonia adhibentur.

Sempervirens, glaberrima: *flores luteoli, in racemis axillaribus brevibus: drupa matura nitide-nigra.*

70. THYMELEAE. Juss.

302. DAPHNE.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 664.

1. D. LAUREOLA. *Lin. sp. pl.* 510 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 201 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 334.

lc. *Bull. herb. t.* 37 — *Laureola. Dod. pempt. 365.*

In sylvis umbrosis.

Februario, Martio. ♪

Frutex humilis, glaberrimus, sempervirens, erectus: folia coriacea, nitide virentia: racemi simplices, cernui, axillares: flores virentes, inodori.

2. D. GNIDIUM. *Lin. sp. pl.* 511 — *Ten. fl. nap. 3. p.* 302 — *Bertol. fl. ital. 4. p.* 341.

lc. *Plenk offic. t.* 304 — *Thymelea. Clus. hist. 1. p.* 87.

In fruticetis collium, et in agris mari proximis praecipue *Ischia all'Arso, Lacco o Marecocco, ed a Zale.*

Augusto, Septembri. ♪

Vulgo *Cecavocchioli mascoli*.

Frutex ramosissimus, erectus, glaberrimus, sempervireus: *folia* approximata, tenuia, juniora glauco-virentia: *flares* albi, gratae oleutes, in panicula terminati.

303. PASSERINA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 668.

1. *P. HIRSUTA. Lin. sp. pl. 513 — Ten. fl. nap. 1. p. 204 — Bertal. fl. ital. 4. p. 345.*

lc. Sibth. fl. gr. t. 360 — Erica alexandrina, italorum. Lobel. ic. 2. p. 217 — Sanamunda tertia. Clus. hist. 1. p. 89.

Ad rupes, et in collibus aridissimis, nec non in arenosis mare proximis: *coste alte di S. Panerazia, del Pignatiella, e del Lapillo, marina di Succellara alla Searupata, coste del Funnililla, dalla Punta di S. Angelo a Socciva, Guardiola di S. Gennara, e colline all'avest di Campotese pressa Panza, Punta dell'Imperatore presso Fario, Laccia al mante Vieo, nelle rupi sul mare all'est, ed in quelle di Zule al Nord.*

Septembri, Februario. ♀

Frutex sempervirens, saepe humilis: *caules* valde ramosi; *ramis* arcuatis: *folia* brevia, ovata, concava, 4-fariam imbricata, haete virentia, glabra, intus niveo-tomentosa, coriacea: *flores* externe albo-tomentosi, intus luteoli; *masculi* solitarii; *foeminei* 2-3 glomerati, ac sessiles: *planta* saepius dioica apud nos, uti in Sicilia.

71. SANTALACEAE. *Brown.*

304. OSYRIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1504.

1. *O. ALBA. Lin. sp. pl. 1150 — Ten. fl. nap. 5. p. 275.*

lc. Lam. ill. gen. t. 802 — Zannich. hist. t. 83 — Cassia poetica Monspeliensium. Lobel. ic. 433 — Zuïng. p. 210.

In aridissimis asperisque collibus; *alla sommità della Punta dell'Imperatore, ubi tantum vidi, et satis rara.*

Majo, Junio. ♀

Frutex dense caespitosus, ramosissimus, erectus, glaberrimus: *folia* sempervirentia, coriacea, lanceolato-linearia: *flares* flavescentes, odori, laterales; *masculi* racemosi, *foeminei* solitarii: *drupae* rubentes.

72. CYTINEAE. *Brogn.*

303. CYIINUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1384.

1. *C. HYPOCISTIS. Lin. syst. veg. ed. 12. p. 826—Ten. fl. nap. 5. p. 271. a. ochraceus. Guss. syn. 2. p. 619.*

lc. Ten. cum Carol. tab. in Giorn. enc. nap. ann. 1. p. 21. t. 1—Lam. ill. gen. t. 737—Cav. ic. 2. t. 171 — Hypocistis omnino lutea, sive ochraceo colore. Clus. hist. 1. p. 145.

Ad radices *Cisti salvifolii*, raro *C. monspeliensis* parasiticus.

Aprili, Majo. ☿

Planta humilis, caespitosa, aphylla, rubescens, carnosiuscula: flores ochracei, terminales, fasciculati, squamis imbricatis tecti — Confer pro foecundatione, et embryone hujus plantae *Gasparr. in act. del Cong. degli Scienz. in Nap. 1846. par. 1. p. 981. t. 3.*

73. EUPHORBIACEAE. *Juss.*

306. EUPIORBIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 823.

1. *E. PEPLIS. Lin. sp. pl. 651 — Ten. fl. nap. 1. p. 260 — Bertol. fl. ital. 5. p. 40.*

lc. Reich. cent. 15. f. 4755 — Peplis. Clus. hist. 2. p. 187.

In arenosis maritimis.

Julio, Septembri. ☉

Procumbens, glaberrima, glaucescens, dichotoma: folia crassiuscula, oblonga, oblique cordata: flores solitarii, axillares, petalis non latis: semina levia.

Omnes Euphorbiae species unico generali nomine vulgari *Ceevocchi* appellantur.

2. *E. FALCATA. Lin. sp. pl. 654 — Bertol. fl. ital. 5. p. 48.*

b. mucronata; involucellis imbricatis mucronatis. Pers. syn. 2. p. 15— E. mucronata. Lam. dict. enc. 2. p. 246 — E. acuminata. Ten. fl. nap. 1. p. 261 — E. falcata; b. minor. Koch syn. ed. 2. p. 731 — Guss. syn. 1. p. 554.

lc. Peplis annua, foliis acutis, flore muscoso. Boec. sic. t. 24 — Pithyusa minor, subrotundis et acutis foliis. Barr. ic. 751.

In ter segetes in elatis; *seminati del piano di Muori, delle vigne di Buceto, di monte Vetta, di Ajetola, di Fontana, sola var. b.*

Julio, Septembri. ☉

In hac varietate *folia inferiora obtusa: involucelli foliola basi obliqua, apice obtusa cum mucrone, juxta umbellae radios divaricatos imbricata: semina albida, compresso-tetragona, ad facies transverse foveolata, non corrugato-sulcata, uti dixi in syn. l. c.*

3. E. PEPLUS. *Lin. sp. pl. 653 — Ten. fl. nap. 1. p. 261 — Bertol. fl. ital. 5. p. 42.*

lc. Reich. cent. 15. f. 4773 — Peplus. Dod. pempt. 375.

b. minor; caulibus brevioribus 2-4-pollicaribus, foliis involucrique orbiculatis. Willd. sp. pl. 2. p. 903 — E. rotundifolia. Loisel. fl. gall. ed. 2. v. 1. p. 238 — Ten. fl. nap. 4. p. 259 — E. p̄ploides. Gou. fl. monsp. p. 174.

lc. Loisel. l. c. t. 29 — Reich. cent. 15. f. 4744.

In herbosis apricis, ad agrorum margines, et in cultis: var. b. super muros, et in aridis apricis herbosis.

Octobri, Majo. ☉

Glabra, laete virens, erecta: *umbella trifido-dichotoma: involucella ovata: petala semilunata: semina albida, reticulato-foveolata.*

4. E. HELIOSCOPIA. *Lin. sp. pl. 658 — Ten. fl. nap. 1. p. 268 — Bertol. fl. ital. 5. p. 47.*

lc. Reich. cent. 15. f. 4754 — Tithymalus helioscopius. Dod. pempt. 377.

In herbosis, et in cultis.

Februario, Aprili. ☉

Erecta, glabra: *umbella 5-fida-2-3-fido-dichotoma: petala integra, viridi-luteola: semina obovato-pyriformia, brunnea, lacunos-reticulata. Variat involucellis aliquando rubro-coloratis.*

5. E. PUBESCENS. *Desf. atl. 1. p. 586, excl. syn. Vahl. — Ten. fl. nap. 4. p. 262.*

lc. Reich. cent. 15. f. 4769 — Tithymalus palustris, villosus, mollior, erectus. Barr. ie. 885.

In humentibus maritimis; *Ischia nell'Orto della Mandria, Bagno presso al lago, Forio a Citara, olim frequens, nunc fere destructa.*

Majo, Julio. ☾

Erecta, pallide virens, villosa: *folia oblongo-lanceolata, serrulata: umbella quinquesida-trifida-bifida: semina plumbea, lineolis exasperata. Ab E. pilosa haec non separat Cl. Bertol. in fl. ital. 5. p. 89.*

6. E. CONALLOIDES. *Lin. sp. pl. 659 — Bertol. fl. ital. 5. p. 86.*

b. lanuginosa. Ten. fl. nap. 4. pr. in fol. p. 68; ex quo, E. lanuginosa. Ten. fl. nap. 1. p. 264, var. a.

E. caule erecto inferne simplicissimo folisque sessilibus glabrato, umbel-

la 5-fida 3-fida-subdichotoma, involucri foliisque lanceolatis subserrulatis, involucrellis ovatis, petalis suborbiculatis integerrimis (non lunatis), capsulis obtuse sparseque tuberculatis glabris vel laxe villosis, seminibus cinereis levibus.

1e. *Reich. cent. 15. f. 4768* — *Tithymalus nemorosus, villosus, mollior. Barr. ic. 198.* (pro var. a.).

In sylvis elatis; *selve dell' Ulicella presso Buceto, e sul principio di questa valle, selve delle Falanghe, di Catreca, del Fasano, e delle coste del Polletricello*; tamen in hoc loco satis rara.

Junio, Julio. ♀

In planta inarimensi folia non sunt laete, sed pallide virentia, fere glabrata, nam pilis adpressis sparsis instructa, ad margines ciliata ac tenuissime subserrulata: *umbella* saepe pauciradiata; ramis floriferis sub ipsa nullis, aut paucis ac bifidis: *involucrella* plana: *petala* luteo-aurantiaca, obtusissima, fere orbiculata!, plana: *capsula* virescens, non rubens, subglobosa, sparse villosa aut glabriuscula, tuberculis vel verrucis obtusis irregularibus sparsis plus minus obsita!: *semina* levissima, non lineolis exasperata, ut in speciei typo, recentia cinerica, sed in echartas servata rufescentia evadunt; *caruncula* ceracea.

7. E. DENDROIDES. *Lin. sp. pl. 662* — *Ten. fl. nap. 4. p. 260* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 73.*

1c. *Reich. cent. 15. f. 4772* — E. divaricata. *Jacqu. ic. rar. 1. t. 87* — *Tithymalus Dendroides major, et verior. Barr. ic. 910.*

Ad rupes, et in sylvaticis lapidosis elatis, vel demissis.

Februario, Martio. ♂

Caulis 1-4-pedales: *folia* conferta, late lineari-lanceolata, integerrima, aestate saepius deeidua: *rami* sessiles sub umbella multifido-bifida nulli: *involucrella* rhombo-subrotunda, lutescentia: *dentes* calycini albo-lanati: *petala* transverse ovalia, non lunata: *semina* glabra, subglobosa, carunculata, et uti *capsulae* (quae erectae) levia.

8. E. TERRACINA. *Lin. sp. pl. 254* — *Bertol. fl. ital. 5. p. 50* — E. italiana. *Lam. dict. enc. 2. p. 434* — *Ten. fl. nap. 4. in prodr. in fol. p. 68*; ex quo E. neapolitana ipsius l.c.p.266 — E. provincialis. *Willd. sp. pl. 2. p. 914?*

E. glaberrima laete virens demum rubescens, foliis tenue coriaceis, infimis spatulato-cuneiformibus emarginatis, reliquis late lanceolato-linearibus obtusiusculis mucronulatis tenuissime serrulatis, umbella 3-5-fida-dichotoma, petalis lunatis integris apicibus setigeris, seminibus ovoideis capsulisque levibus.

1c. *Ten. l. c. t. 42* — E. provincialis. *Reich. cent. 15. f. 4790*, dum iron E. terracinae ipsius l. c. f. 4775, ex *Bertol.* potius ad E. *Lagasciae* spectat — *Tithymalus marinus, folio recto, terracinensis. Borr. ic. 833.*

In apricis herbosus; *Laeco al monte Vico nell'alta costa meridionale, ed al piano dell'Arenella; ne' siti arenosi erbosi della marina di S. Montana dietro alle siepi di Agave.*

Martio, Majo. ♀, et aliquando basi fere ♀

Petala viridi-lutescentia, lunata, appendice longa setiformi recta vel incurva terminata, ideoque longe cornuta: capsula glabra, oblonga, vel globosa: semina albida, vel fusca, nec foveolata, nec reticulata, maculis irregularibus rufescentibus notata; caruncula albida. — Sub *E. obliquata* Forsk. (quae *E. alexandrina* Delil. in Steud.) cl. Webb in *Phyt. can. vol. 2. pars 2. sect. 3. p. 247*, *E. seticornem*, *E. provincialem*, ac *E. terracinam* refert; et synonymon *E. neapolitanae*, quod certe ad praecedentes spectat, non citat. Num vero *E. obliquata* Forsk. sit eadem ac nostra definire non audeo.

9. *E. PINEA*. *Lin. syst. nat. ed. 12. v. 2. p. 333—Div. Bern. man. 4. p. 19—Bertol. fl. ital. 5. p. 64* — *E. caespitosa*. *Ten. fl. nap. 4. p. 261.*

E. glaberrima glauco-virescens, caule erecto basi suffruticoso, foliis inferioribus dense approximatis anguste linearibus obtusis acutisque patentibus deflexisque, superioribus distantibus, supremis latioribus ovato-lanceolatis basi oblique trilobis, umbella 5-7-fida-bifida vel dichotoma, involuclis subcordato-reniformibus integerrimis concavis, petalis lunatis, capsularum angulis scabris, seminibus albidis excavato-foveolatis.

1c. *Div. Bern. l. c. t. 5* — *Ten. l. c. t. 43. f. 2* — *E. ragusana*. *Reich. cent. 15. f. 4782. b.*, ex Bertol.

b. seminibus non foveolatis.

bb. involucri foliis elongatis, foliis fere omnibus conformibus.

bbb. foliis latioribus (2-3 lin. latis) obtusioribus, caule clatioro 1-1½-2-pedali.

In aridis apricis, nec non in lapidosis clatis, aut demissis ubique.

Januario, Julio. ♀

Caules basi suffruticosi, at non semper caespitosi, ciratrisati: folia glauco-virentia, 1-3 lin. lata, patentia, demum deflexa, conferta: petala viridi-luteola, aut ceracea, truncata, ad apices appendicula lin. longa lineari terminata, ideoque lunata: capsula ad angulos nervo lato proninulo instructa — Differt ab *E. portlandica*, quoad iconem Ray, foliis anguste linearibus, ramis sub umbella elongatis; a descriptione Lin. et Smith ipso ramorum caractere; tamen confer in *syn. 1. p. 539* observationes quoad specimina exotica. Confer quoque cl. Bertol. *l. c. p. 66.*

10. *E. PARALIAS*. *Lin. sp. pl. 657* — *Ten. fl. nap. 1. p. 265* — Bertol. *fl. ital. 5. p. 68.*

1c. *Reich. cent. 15. f. 4789* — *Tithymalus Paralias*. *Dad. pempt. 370.*

In arcnosis maritimis; *Ischia all' Arso nelle arcne sotto alla chiesa del*

Purgatorio, Lacco alla marina di S. Montano, di Citara e di S. Francesco a Forio, di S. Angelo, e de' Maronti.

Junio, Julio. ♀ et basi ♂

Glauescens, erecta: caules annotini 1-2-pedales: folia coriacea, conferta, dense imbricata, laevaeolata: rami pauci aut nulli sub umbella, quae 3-5-fida-bifida: petala lutescentia, breviter semilunata: semina lutea, cinerea; caruncula parva, reniformi, lutea.

11. *E. BIGLANDCLOSA. Desf. coroll. p. 88—Bertol. fl. ital. 5. p. 72—E. rigida. Ten. fl. nap. 4. p. 264, non Marsch!*

1e. *Desf. l. c. t. 67—Tithymalus Myrsinites, legitimus. Clus. hist. 2. p. 189. In hac insula ex Ten. l. c., sed adhuc non vidi.*

12. *E. CHARACIAS. Lin. sp. pl. 262—Ten. fl. nap. 1. p. 275—Bertol. fl. ital. 5. p. 100.*

b. *inarimensis*; foliis latioribus, Incidis, glauco-virentibus — *E. criocarpa. Bertol. comm. de itin. Neap. p. 22, et fl. ital. 5. p. 101?*

1c. *Bertol. l. c. t. 3?*

In silvaticis umbrosis demissis, vel elatis; *discesa da S. Nicola alle Folanghe ed al Fasano, Bocca della Serra, valle de' Frassitelli, S. Maria del Monte sopra Forio e presso le fumarole del Bell'omo, Panza nelle colline delle Forche e di Campotese, vallata da Serrano a Panza, Casamicciola lungo la strada del ponte del Larito a S. Giuseppe, ed alla salita di Montecito; Lacco alla Cava del monaco, e presso al pubblico pozzo, scala de' Maronti presso al lido.*

Januario, Martio. ♂

Caulis fruticosi, cicatrisati, plures ex eadem radice, tamen simplices: folia subtus pallidiora, latiora quam in *E. Characia*, 3-4 lin. lata: involuella pelviformia, pallide lutescentia: calyces pubescentes: petala concoloria, atropurpurea, vel sordide lateritia, aliquando nitida, truncato-emarginata, in emarginaturae sinu integerrima aut erenulato-crosta, sublunata, appendicibus linearibus brevissimis acutis cito subtus revolutis et aliquando demum evanidis instructa, ita ut demum truncata et obtusa videntur: capsulae villosae, minutissime tuberculatae: semina nitide cinerea, levissima, nec excavata, nec foveolata, caruncula ceracea cordata instructa.

Quoad habitum et folia *E. venetam* refert, sed petalis diversissima, nam in illa semilunata sunt.

307. MERCURIALIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1534.

1. *M. ANNA. Lin. sp. pl. 1465—Ten. fl. nap. 5. p. 280.*

1c. *Reich. cent. 15. f. 4804*—*M. annua. Matt. comm. 2. p. 634* — *M. mas, et foeminea. Dod. pempt. 654.*

In ruderatis, ad muros, et in cultis passim.

Octobri, Aprili. ☉

Vulgo *Mercorella*.

Flores masculi dodecandri: in planta foeminea inter flores sessiles, vel breviter pedicellati (pedunc. 1-1 1/2 lin.) *pedunculus* albidus, 3-6-linearis elongatur, qui florem sterilem gerit; in quo *calyx* 3-sepalus, ut in aliis: *filamenta* 1-2, sterilia, rufescentia: *germinis* rudimentum clavatum, compressum, albidum — Planta bobus, capreis, et pecoribus noxia, quibus haematuriam producit; tamen capreae, et pecora summa etiam debilitate ac demum morte corripiuntur, praesertim si herbam gelu concoctam, et quam tunc avide expetunt, comedunt.

M. perennis, quae prope Neapolim ubique provenit in hac insula deest.

308. CROTON.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1462.

1. *C. tinctorum. Lin. sp. pl. 1425* — *Ten. fl. nap. 2. p. 357*—*Crotophora tinctoria. Juss. (Adr.) in Spr. s. veg. 3. p. 850.*

1c. *Crotophora tinctoria. Reich. cent. 15. f. 4805* — *Heliotropium, minus, triocum. Clus. hist. 2. p. 47.*

In cultis argillosis inter vineas; *fra Panza e Forio*, tamen rarissimum, ac forte sporadicum, nam unica vice vidi.

Augusto, Septembri. ☉

Erectum, stellate tomentoso-farinosum, viridi-canescens: *flores* parvi; masculi racemosi: *capsulae* pendulae, tuberculatae.

74. URTICEAE. Juss.

270. URTICA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1422.

1. *U. dioica. Lin. sp. pl. 1336* — *Ten. fl. nap. 2. p. 342.*

U. setoso-hispida stimulis conspersa, caule herbaceo erecto simplici, foliis ovato-oblongis acuminatis, grosse dentato-serratis, floribus secus pedunculos racemoso-paniculatos glomeratis, nucula ovata valvis perigonalibus aequali vel brevior (Gasp.; qui hujus stirpis varietates sequentes enumerat, tam in hac insula quam in aliis Regni et Siciliae locis provenientes).

- a. *vulgaris*; foliis amplis pallide virentibus, inferioribus et caulium steriliū ovatis obtusis, superioribus 3-5-pollicaribus apice productis, nucula ovata valvis perigonalibus majoribus ejusdem formae aequali.
- 1e. *Lam. ill. gen. t. 761. f. 1* — *U. urens*, altera. *Dod. pempt. 151* — *U. major*. *Zuing. theat. p. 1117.*
- b. *montana*; foliis ovatis, pallide virentibus 2-3-pollicaribus, una cum caule setis stimulisque erebris hispidis, dentibus triangularibus, nucula ovata valvis perigonalibus majoribus ejusdem formae aequali.
- c. *laucifolia*; caule elato, foliis glabrisculis, laevcolatis vel oblongo-lanceolatis, apice longe angustatis, nucula ovata valvis perigonalibus majoribus ovato-oblongis paullo breviora — *Urtica angustifolia*. *Fisch.* in *horti Hafniensis supplemento p. 107?*
- d. *palustris*; atrovirens, crebre setoso-hispida, foliis grandibus apice longe producto subconduplicato, nucula ovata valvis perigonalibus majoribus ejusdem formae modo aequali, modo paullo breviora — *U. hispida*. *Dec. fl. fr. 6. p. 355.*
- e. *argata*; caule humili, foliis cordato-ovatis acuminatis grosse inaequaliterque dentato-serratis, nucula ovata valvis perigonalibus majoribus obovato-oblongis breviora.

Var. a. in demissis, et ruderatis prope *Palermo*: var. b. in appenninis *Lucaniae a Castelgrande*: var. c. tam in montosis quam in demissis utriusque *Siciliae*; *Ischia nelle selve del Rotaro, di Campagnano, delle Falanghe*, ec.: var. d. in paludosis prope *Neapolim*; et in *Ischia presso al lago, e da Casamicciola al Lacco*: var. e. in umbrosis montosis regni *Neapolitani*; habui ex *Calabria alla Sila* a botanophyto *B. Vitelli*, cl. *Gussonius* legit in *Aspromonte Calabriae a S. Sibilia*, et in monte *Maiella Aprutii, nella Valle dell'Orfenta, e di S. Spirito (Gasp.)* Majo, Septembri. Z

Stirps valde polymorpha, prout loci natura, colore plus minus vireuti, villis, setis, stimulisque, quibus semper praedita est, modo crebris, modo raris. Amplitudo foliorum quoque variat, nec non eorum forma; nunc basi cordata, nunc rotundata, apice acuto, acuminato, vel longe producto, plano, vel conduplicato, recto, vel obliquo. Racemi paniculati utriusque sexus occurrunt plus minus ramosi, foliis breviores vel aequales, quandoque longiores, imtio erecti vel patuli, demum penduli. Perigonium quatuor constat valvis vel foliolis basi concretis, cruciatim dispositis; duae minores secus commissuras valvarum majorum. In varietatibus a., et b. valvae minores $\frac{1}{3}$ mill. longae, acutae, oblongae; majores $1\frac{1}{2}$ mill., ovato-subrotundae, nuculae exacte aequales, eique fere omnino conformes. Sed istae in varietate d., in eodem individuo saepe reperiuntur modo nuculae aequales, modo ipsa quidquam longiores: in varietate autem e. semper longiores. Varietas denique c. profert sese

diversa habitu, dentibus argutis attenuatis, et praesertim valvis, perigonalibus minoribus amplis, majoribus quandoque fere aequalibus. Sed praeter hoc caractere, in eodem individuo, in eodemque racemo tot gradus intermedios conspiciuntur, ut nullo pacto, mea sententia, hanc varietatem a specie sejungi possit. At tamen *Urtica dioica* ex Gallia meridionali, ex Anglia, a Berolini, et a Bononia ad cl. *Gussonium* missa praebet nuculam valvis perigonalibus majoribus plus minus breviorum (*Gasp.*).

Haec et sequentes vulgo *Ardica* appellantur.

3. U. BALEARICA. *Lin. sp. pl. 1395* — U. pilulifera. *Ten. fl. nap. 2. p. 342*, non *Lin.*

lc. Blackw. herb. t. 321. f. 1.

In ruderatis, ac ad vias.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Ardica a companielli*.

Differt haec ab U. pilulifera hirsutiae majore: caule robustiore: foliis exacte ovata, profunde cordata (in illa basi fere truncata): stipulae latae, dilatatae; in illa angustae. In cl. *Cambess. fl. balcar.* species haec desideratur.

4. U. URENS. *Lin. sp. pl. 1395* — *Ten. fl. nap. 2. p. 342*.

lc. Fl. dan. 739 — U. urens, minima. *Dod. pempt. 152*.

In cultis, in herbosis, et ad vias ubique.

Octobri, Majo. ☉

Spicae androgynae, geminatae, petiolo breviores, rachide a basi ad apicem undique florum glomerulis obsita.

5. U. NEGLECTA. *Guss. syn. 2. p. 579* — *Ten. fl. nap. 5. p. 346, et pr. in fol. l. c. p. XIV.*

U. herbacea monoica, foliis oppositis sub 5-nerviis ovato-ellipticis argute serratis acutis, stipulis binis, spicis simplicibus axillaribus androgynis geminatis, superioribus petiolo longioribus, rachide non dilatata basi nuda, a medio ad apicem florum glomerulis undique obsita.

lc. nulla.

In herbosis ruderatis, et ad vias, non ita frequens in cultis.

Octobri, Majo. ☉

Notatis characteribus a sequente, cui affinis, dignoscitur. Simul proveniunt nec una in alteram transit. Confer *syn. l. c.*

6. U. MEMBRANACEA. *Poir. dict. enc. 4. p. 638* — *Ten. fl. nap. 2. p. 343*.

U. herbacea monoica, foliis oppositis ovatis grosse-dentatis, stipulis binis, spicis simplicibus axillaribus geminatis dioicis, foemineis inferioribus petiolo brevioribus, masculis elongatis petiolum superantibus, rachide basi nuda a medio ad apicem membranaceo-dilatata, facie superiore florifera, inferiore floribus destituta.

lc. *U. caudata*. *Brot. fl. lusit. 2. t. 151*, non *Poir.*
In cultis umbrosis frequens.
Octobri, Majo. ☉

310. PARIETARIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1576.

1. *P. DIFFUSA*. *Mert. et Koch fl. germ. 1. p. 827* — *P. judaica*. *Lin. sp. pl. 1492* — *Ten. fl. nap. 5. p. 233.*

lc. *P. judaica*. *Lam. ill. gen. t. 853. f. 2* — *P. Oeynifolia*. *Boec. sic. t. 24. f. a*, pro qua confer *syn. 2. p. 640.*

Ad muros, in ruderatis, et ad rupes undique.

Floret fere per totum annum. ♀

Vulgo *Erba di muro* cum sequentibus, et variis medicis usibus addicitur.

Cl. *Bertol. in fl. ital. 2. p. 212* *P. officinalem* *Lam.* (quae *P. erecta* *Mert. et Koch l. c.*) cum *P. diffusa* associat; tamen immerito. Siquidem in *P. officinali* caules erecti; folia oblonga; calyces fructiferi nunquam tubulosi, et elongati, sed fere campanulati; denique *P. officinalis* apud nos non nisi in montibus, et nunquam in ruderatis praesertim maritimis occurrit!, ut in *syn. 2. p. 641* notavi, quam confer.

2. *P. FILIFORMIS*. *Ten. fl. nap. 4. pr. in fol. p. xxiv, et 5. p. 294.*

P. herbacea annua, caulibus filiformibus gracilibus diffusis, foliis orbiculato-ovatis trinerviis basi aequalibus punctatis, involucri partiti laciniis subaequalibus lineari-lanceolatis demum squarrosopatulis calycem fructiferum superantibus.

lc. nulla.

Ad maceries, et ad rupium fissuras in umbrosis; *su de' muri a secco, e nelle rupi di Campagnano.*

Martio, Majo. ☉

Caules in hac magis elongati, quam in sequente, et aliquando ex fissuris rupium dependentes; caeterum *habitus* omnino similis, et solo caractere laciniarum involucri invicem differunt.

3. *P. LUSITANICA*. *Lin. sp. pl. 1492* — *Ten. fl. nap. 5. p. 294* — *Bertol. fl. ital. 2. p. 215*, excl. *syn. P. filiformis* *Ten.*

P. herbacea annua, caulibus filiformibus diffusis erectisque, foliis orbiculato-ovatis trinerviis basi aequalibus punctatis, involucri partiti laciniis omnibus aequilongis ovato-lanceolatis calyces fructiferos immutatos aequantibus, illisque adpressis.

lc. *P. sicula*, *Alsines folio*. *Doc. sic. p. 47. t. 24.*

Ad maceries, ad muros, ad rupium fissuras ubique obvia.

Martio, Majo. ☉

Haec et praecedens confusatae *Cucumis sativi* odorem spirant.

75. MOREAE. *Endl.*

311. MORUS.

*Endl. gen. n. 1856.*1. M. ALBA. *Lin. sp. pl. 1398.*Ic. *Morus candida. Dod. pempt. 810.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☿

Unica varietas colitur, et vulgo *Cieuzo bianco* appellatur.*Arbor* elata, ramosissima: *folia* levia, decidua, glabra, nitide virentia: *fructus* albi.2. M. NIGRA. *Lin. sp. pl. 1398.*Ic. *Blakcw. herb. t. 126* — *Morus. Dod. pempt. 810.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☿

Vulgo *Cieuzo nigro*, sed raro in insula colitur.*Arbor* elata, ramosissima, ramis distortis: *folia* scabra, villosiuscula, obscure virentia, decidua: *fructus* nigri, magni.

312. FICUS.

(Sequentia ad hoc genus spectantia communicavit cl. *Gasp.*)

GASPARRINI

(characteres reformati)

FICUS et **CAPRIFICUS.** *Gasp. nova genera super nonnullis fci speciebus, Neapoli 1845.**Androgyna* et *foemina* in diversis individuis; *receptaculis* axillaribus, pedunculatis, basi bracteis tribus verticillatis praeditis.*Androgyna* tria *receptaculorum* genera profert; praecocia et aestiva (*grossi* et *foruiti*), semper *androgyna*; serotina (*cratiri*) plerumque *foeminea* — **FLORES** pedicellati, bracteati; *masculi* in parte superiore receptaculi; *perigonio* plerumque 5-phyllo; laciniis lineari-subulatis: *stamina* 3-5, laciniis perigonalibus opposita; *filamento* cylindraceo; *anthera* subreniformi, introrsa, biloculari — **FLORES** foeminei in grossis et cratiris steriles, in foruitis nonnulli seminiferi; *perigonio* plerumque 3-phyllo;

ovario uniloculari, sessili, vel brevi gynophoro suffulto; stylo laterali; stigmatē bifido, vel uno latere producto.

Foemina duo receptaculorum genera profert; praecocia (*grossi*) plerumque foeminea, raro androgyna, semper sterilia; serotina aestiva (*forniti*) foeminea, seminifera—**FLORES** masculi pauci in parte superiore et sub ore receptaculi, pedicellati; **perigonio** sub 5-phylo, laciniis versus apicem latioribus: **stamina** 1-5, laciniis perigonii opposita; **filamento** dilatato, margine membranaceo inflexo; **anthera** oblonga, introrsa, biloculari, super laminam ex connectivi amplificatione formatam, imposita — **FLORES** foeminei breviter pedicellati; perigonio plerumque 5-phylo: **pistillum** stylo laterali, stigmatē bifido; **ovario** in fornitiā 1-loculari, in grossis saepissime 2-loculari; **gynophoro** plus minus longo incidente; **ovulum** parieti styligeræ appensum, amphitropum; **microphyle** supero, **drupa** epicarpio molli ab endocarpio indurato fragili (*achenium* auct.) secedente: **semen** appensum, epispermio membranaceo praedito, caruncula hilo contigua: **embryo** fere in centro albuminis caruosi, incurvus, homotropus; **radicula** elongata, supera, carunculae obversa, cotyledonibus ellipticis incumbentibus.

Habitus — Arbor erecta, ramosissima; foliis alternis, petiolatis, palmatolobatis; androgyna insectifera. Species hujus generis mihi certa est tantum *Ficus carica* Lin. Reliquae quas cl. *Miquel* sub eodem recensit novum requirunt examen quod spectat ad florum, fructuum et seminum naturam, ex quibus plura genera forsitan effici possunt.

Veteres scriptores rei herbariae distinguebant **FICUM** a **CAPRIFICO** veluti species diversas; recentiores vero eas censebant prout individua sexualia ejusdem speciei, nempe **CAPRIFICUS** androgynam, et **FICUS** foeminam; propterea quod simul crescunt, earum habitus similis est, et praesertim ob florum naturam; nam istos in quacumque **FICO** semper foemineos esse existimabant; dum in altera sunt duplicis generis, masculi et foeminei in eodem receptaculo.

Ex quo consilium inii perscrutandi rationem caprificationis, prosit ne haec revera **FICO** ad sustinendam majorem fructuum copiam, et quonam modo id effici possit; ideoque necesse fuit utramque plantam novo ac diligentiori examini subicere. Ex quo comperi plures **CAPRIFICI** varietates apud nos sponte enasci, easque tria receptaculorum genera eodem anno proferre, quae Graeci *Ornos* (Latini vero *grossi*) *fornites* et *cratires* appellabant; eaque omnia androgyna esse, et insecta culices alere; sed *fornites* simul seminifera esse. Praeterea in flore masculino perigonium esse plerumque 5-phyllum, stamina 3-5, filamentis teretibus, antheris bilocularibus introrsis, cum connectivo vix conspicuo; et in flore foemineo perigonium 3-phyllum, ovarium sessile, stigma uno latere productum.

Quod ad alteram spectat plantam inspexi omnes *Fici* varietates, aut species duo genera receptaculorum gignere, *grossos et fornites*, in quibus praedicta insecta non inveniuntur; *fornites* flores foemineos tantum continere; *grossos* autem quandoque nonnullos flores masculos foemineis admixtos, vel a superna parte receptaculi prodeuntes. Flores foeminei *Fici* differunt ab illis *Caprifici* perigonio 5-phylo, ovario persaepe stipitato, stigmate bifido: masculi vero foliolis perigonalibus amplioribus concavis, filamentis sulcatis, margine utrinque membranaceo, connectivo valde dilatato concavo. Quae ob discrimina, nec non ex characteribus varietatum utriusque plantae, *Caprificum* prae se ferebat diversam, saltem in specie, a *Fico*. Hisce observationibus innixus *Caprifici* et *Fici* varietates sub generibus diversis recensui in opere cui titulus, *Ricerche sulla natura del Fico e del Caprifico. Napoli 1845 in Rend. della R. Acc. v. 4. p. 133.*

Interim *Ficorum*, quas agricolae nostrates *troiano, lardaro, et sarnese* appellant (quae mihi *Ficus leucocarpa, pachycarpa et polymorpha* sunt) semina anno 1837 serebam. Plantae initio aegre vegetabant, earumque permultae annis insequentibus periire. Superfuere tamen novem, quae anno 1852 tum primum flores edere coeperunt. Earum una androgyna omnino similis erat *F. leucocarpae*, tum forma receptaculi, tum foliorum. Tres ante florescentiam folia habebant conformia illis *F. pachycarpae*: ex his altera protulit receptacula androgyna, altera foeminea, tertia floridam non vidi. Reliquarum, habitum prae se *F. polymorphae* ferentium, una *Ficus* evasit, tres vero androgynae sive *Caprifici*, quarum altera parvitate receptaculorum insignis erat. Res itaque ad pristinum revocanda, nam *Caprificus* et *Ficus*, uti ex experimento seminationis spectat nihil immutandum inveni. Interim *Ficus*, quae in insula *I-narime*, et prope Neapolim sive cultae sive sylvestres occurrunt, uti typos, subspecies, aut varietates pro nunc sequentibus notis distinguendas censeo.

1. *F. LEUCOCARPA. Gasp.*

F. trunco elato, foliis palmato-5-lobis globriusculis submembranaceis, grossis oblongis albis vel ex viridi-subviolaceis basi attenuatis, fornitis albis turbinatis subrotundis, pulpa tenera dulci mellifera, florum pedunculis crassiusculis ex albido-roseis.

a. *rotunda*; bifera, grossis subrotundis persistentibus.

Fico-albo. Galles. pom. ital.

b. *deliciosa*; bifera, grossis turbinato-oblongis persistentibus.

Fico paradiso. Isch.

c. *lutescens*; unifera, grossis abortivis, fornitis turbinatis basi attenuatis, cortice tenuissima lutescenti, pulpa carnea, florum filamentis attenuatis.

Fico pissalutto. Gales. pom. it.

d. *sopida*; unifera, grossis abortivis, fornitis albis turbinatis vel subrotundis, pulpa carnea.

Fico troiano. Isch.

e. *depressa*; fornitis subrotundo-turbinatis apice depressis, pulpa rosea.

Fico pennese. Isch.

Individuum androgynum est *Caprifiscus leucocarpa. Gasp.*; ramis annotinis glabriusculis, receptaculis levibus turbinatis, grossis et fornitis albescentibus, cratiris subviolaceis.

lc. *Gasp. l. c. p. 332. tab. II, et III.*

In muris vetustis, et rupium fissuris prope Neapolim, et insulis circumstantibus.

2. F. DOTTATA. *Gasp.*

F. trunco elato ramosissimo, foliis crassis hirsutis obiter palmato-5-lobis obtusis, grossis plerumque persistentibus oblongis basi constrictis subviolaceis, fornitis glabriusculis oblongo-turbinatis sub rotundisve levissimis albis, cortice subcoriacea, pulpa firmiuscula saccharifera, florum filamentis attenuatis ex albido-roseis.

Fico ottato. Isch.

a. *microcarpa*; fornitis parvis.

Fico zeolella.

b. *fusca*; fornitis mediocribus, cortice ex viridi-fusca.

Fico coteno. Isch.

c. *viridis*; fornitis subrotundis cortice viridi, pulpa carnea.

Fico d' inferno. Isch.

d. *serotino*; grossis abortivis, fornitis albis, sero autumnno maturescentibus.

Fico natalino bianco, o fico a verticillo. Isch.

Individuum androgynum videtur esse *Caprifiscum giganteum. Gasp.*; foliis crassis levibus, grossis turbinatis subsessilibus levibus, maturitate ex viridi-violaceis, cratiris oblongis viridibus.

lc. *Gasp. l. c. p. 333. tab. I.*

In asperis maritimis et submontosis calcareis.

3. F. TURBINATA. *Gasp.*

F. foliis obiter palmato-5-lobis, grossis oblongo-turbinatis plerumque abortivis, fornitis sessilibus turbinato-depressis levibus, cortice subcoriacea.

a. *violacea*; unifera, grossis abortivis, fornitis ex viridi-violaceis, pulpa rubra, florum filamentis attenuatis.

Fico brogiotto verace.

b. *albescens*; unifera, fornitis cortice albida, pulpa rubra.

Fico brogiotto bianco.

e. maxima; bifera, grossis oblongo-turbinatis, fornitis grandioribus quam in aliis varietatibus.

Fico brogiotto imperiale.

d. nigrescens; unifera, fornitis cortice violaceo-nigra.

Fico tintore.

e. viridis; unifera, fornitis viridibus sero autumno maturescentibus, pulpa rubra.

Fico brogiotto verde.

f. serotina; unifera, grossis abortivis, fornitis cortice viridi-violacea, sero autumno maturescentibus, pulpa carnea.

Fico natalino nero. Isch. Fico vernino, fico camaldolese.

g. trifera; grossis decedente vere maturescentibus, fornitis subrotundo-depressis, cortice fusca subviolacea vel albida, per autumnum et hyemem usque ad initium, maturescentibus.

Fico di tre volte l'anno, fico pasquale, fico della Cava.

Individuum androgynum videtur esse *Caprificum sphaerocarpum* Gasp. *l. c. p. 333* grossis rotundis levibus, cortice obscure virenti, pulpa subviolacea.

Reperitur persaepe sylvaticam.

4. *F. COLOMBRA.* — *l. c. Semm. in Rend. l. c. t. 2.*

F. foliis scabris profunde palmato-5-lobis, grossis persistentibus levibus maximis albis rotundato-depressis sessilibus, pulpa alba dulci, fornitis subrotundis ex viridi-illis.

Fico colombrina. Isch.

Sylvaticam adhuc prope Neapolim, nec alibi inveni, neque cultura mutatur. Individuum androgynum ignotum.

5. *F. POLYMORPHA.* Gasp. — *l. c. Semm. in Rend. l. c. t. 2.*

F. ramis annotinis villosissimis, grossis turbinatis levibus fuscis aut subviolaceis persistentibus vel deciduis, fornitis villosis demum glabris rotundato-turbinatis, pulpa rosea, cortice ex viridi-fusca.

Fico pelosello, Isch. Fico mastuccino, fico chiaiese.

a. juliana; truncis bunili, foliorum lobis profundis obscure viridibus, grossis deciduis, fornitis oblongis vel subrotundis praecocius, cortice ex viridi-fusca.

Fico lugliatico, fico lugliarolo — Lusum fructibus minoribus albidis est *fico biancolino* hortulanorum.

b. bifera; grossis persistentibus oblongis, fornitis subrotundis, cortice utrinque ex violaceo-nigra, pulpa carnea.

Fico sampiero: fico di S. Giovanni. Isch.

c. sarnensis; Gasp. foliis submembranaceis obiter lobatis, grossis oblongis basi constrictis levibus raro persistentibus, fornitis turbinatis — *l. c. Semm. in Rend. l. c. t. 7.*

Fico sarnese—Variat fructibus albis et violaceo-fuscis.

d. prolifera; fornitis levibus; aliis simplicibus turbinatis pollicem vel sesquipollicem longis cum pedunculo superne incrassato; aliis oblongis duplieatis altero super alterum imposito, cortice rubro-violacea, pulpa rosea.

Fico neroletto. Isch.

e. melanocarpa; foliis crassiusculis villosis obiter lobatis, grossis deciduis, fornitis subrotundo-turbinatis, cortice violaceo-fusca, pulpa albida.

Fico barbarera — Lusus fructus pedunculo rubro et cortice violaceo-nigra est *fico petronciano* hortulanorum.

f. elegans; foliis profunde palmato-5-lobis, lobis angustis basi constrictis, fornitis cortice subviolacea, aut ex viridi-violacea varia, pulpa carnea.

Fico vezzoso. Galles.

g. haematocarpa; grossis abortivis vel deciduis, fornitis subrotundis, cortice ex viridi-violaceo, pulpa sanguinea.

Fico granato. Isch.; *Fico melograno. Gall.*—Hujus fici lusus est *fico brianzolo* ejusdem auctoris, pro fornitis rotundis cortice integra viridi, pulpa atrosanguinea.

Individuum ejus androgynum est *Coprificus oblongata Gasp. l. c. p. 332*; ramis annotinis scabrusculis, grossis levibus oblongis, maturitate ex viridi sub-violaceis. *Profico chiaiese.*

Crescit prope Neapolim in muris vetustis, rupium fissuris, et in praeeruptis insularum adjacentium. Varietates *e*, et *e* passim occurrunt sylvaticae, praesertim ad radices Vesuvi.

6. *F. PACHYCA'PA. Gasp. l. c. t. v.*

F. trunco elato, foliis scabris profunde palmato-5-lobis, lobis angustis, grossis abortivis deciduis, fornitis levibus turbinatis maximis, saepe proliferis, cortice fusca subviolacea, pulpa rosca firmiuscula, florum filamentis incrassatis.

Fico lardaro.

a. fasciata; fornitis cortice tenui, fascis viridibus flavicantibusquo alternis a basi ad apicem protensis.

Fico limone, fico zigarella.

b. nobilis; foliis crassiusculis, fornitis turbinatis, cortice levi ex viridi lutea, interdum hinc iade subviolacea, pulpa carnea.

Fico regina. Gall.

c. lusitanica; foliorum lobis obtusis, fornitis maximis rotundatis basi in pedunculum crassum attenuatis, cortice ex viridi-fusca levi, pulpa carnea.

Fico portoghese. Gall.

Individuum androgynum videtur esse *Coprificum rugosam. Gasp. l. c. p. 332.*

ramis annotinis villosis, foliis crassiusculis, grossis turbinatis maximis rugosis, maturitate subviolaceis, cratiris depressis vel rotundatis. *Pro fico ricciato* — Sylvaticam adhuc non reperimus.

7. *F. DELICIOSA*. *Gasp.*

F. bifera, foliis amplis palmato-3-5-lobis, grossis oblongis rubro-fuscis, pulpa carnea vel sanguinea, fornitis minoribus fuscis vel subviolaceis, pulpa ex albido-rubra.

a. castanea; foliorum lobis profundis scabris basi constrictis, grossis pulpa carnea, fornitis fuscis subrotundo-depressis, pulpa albida.

Fico datto. *Gall.*

b. sanguinea; foliis amplis membranaccis, lobis latis obtusis subacuminatis, grossorum pulpa sanguinea subviolacea, fornitis subrotundo-turbinatis, cortice viridi, pulpa rubra.

Fico monaco. *Gall.*

c. latifolia; foliis ambitu subrotundis obiter 5-lobatis amplissimis crassis, supra scabriusculis, subtus molliter villosis, fructibus majusculis obconico-turbinatis, cortice fusca vel subviolacea, pulpa carnea.

Fico cervone, fico asinino—Varietates istae coluntur. *Gasp.*

76. CELTIDEAE. *Duby.*

313. CELTIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1591.

1. *C. AUSTRALIS*. *Lin. sp. pl. 1478* — *Ten. fl. nap. 2. p. 374.*

lc. Scop. fl. insub. 2. p. 35. t. 16 — *Lotus arbor. Lobel. ic. 2. 186* — *Zuing. theatr. p. 53*, optima.

Ad sepes ad maceries, et ad rupes; Pico, ed alla Starza, Arso nel boschetto de' sig. Meglio, Casamicciola, Lacco, Forio.

Aprili, Majo. ♀

Vulgo Rosecariello, et fructus comeduntur.

Arbor elata: folia decidua, scabra: flores viriduli, parvi, axillares, solitarii, pedunculati: fructus globosi, jam maturi nigri, dulces ac edules.

77. ULMACEAE. *Mirb.*

314. ULMUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 443.

1. *U. SUBEROSA*. *Ehrh. beir. 6. p. 87*—*Ten. fl. nap. 3. p. 251*—*U. campestris, b. Bertol. fl. ital. 3. p. 64.*

involucrum fructiferum spinis ramosis tectum — In sylvis, quae *Casamicciola* inminent, loco dicto *Ciolaria*, quatuor arbores hujus speciei spectandae sunt, quarum truncus circuitum 23 pedalem exhibet, probantque qualis et quanta sit vegetationis vis in hac Insula, quamvis terra arida et aspera in loco indicato.

317. QUERCUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1447.

1. Q. ILEX. *Lin. sp. pl. 1412 — Ten. fl. nap. 5. p. 253.*

1c. *Duham. arb. ed. 2. v. 7. t. 43 — Ilex angustifolia. Zwing. theatr. p. 158.*

Innumerae varietates hujus speciei passim occurrunt; inter quas magis notatu dignae sequentes:

b. *latifolia*; foliis nempe 1 1/2 poll. latis, 3 poll. longis, serrato-dentatis, aut integerrimis, glabris vel subtus fere tomentosis.

1c. *Ilex latifolia. Zwing. theatr. p. 158.*

c. *racemosa*; fructibus sessilibus in pedunculis elongatis simplicibus aut ramosis dispositis.

In fruticetis, et ad rupes ab elatis ad demissa.

Aprili, Majo. ♀

Vulgo *Ilice*.

Arbor elata, sempervirens, at ad saxorum rimas frutex caespitosus, ramosissimus.

2. Q. PUBESCENS. *Willd. sp. pl. 4. p. 450 — Ten. fl. nap. 5. p. 261.*

Q. foliis deciduis junioribus utrinque albo-lanuginoso-lanatis, adultis subtus pubescentibus vel demum glabratis, basi subcordatis obovato-oblongis obtuse sinuato-lobatis, lobis brevibus integris vel subdentato-crenatis, sinibus basi acutis, fructibus immaturis breviter glomerato-racemosis, adultis paucis subsessilibus, glandibus oblongo-ovalibus cupula duplo longioribus, hujus squamis adpressis.

1c. *Second. Chen. t. 5. ex Sweet. — Platiphyllos foemina. Dalech. hist. p. 2, et 3.*

In omnibus fruticetis passim.

Aprili, Majo. ♀

In hac Insula arbor magna et valde comosa, ejusque lignum tenax ac durum prae aliis magis in praetium est. Trunco resecto facile regerminat, ideoque in sylvis ceduis utilissima.

3. Q. VIRGILIANA. *Ten. fl. nap. 5. p. 269, an excl. syn. Dalech., pro quo confer sequentem.*

Q. foliis deciduis (laete virentibus) oblongis supra glaberrimis, junioribus

subtus tenuè villosis, basi subcuneatis, margine sinuato-lobatis, lobis remotis oblongis obtusis sursum versis subintegris undulatis, sinibus late rotundatis, fructibus sessilibus vel in pedunculo pollicari subglomeratis, glandibus elliptico-oblongis cupula 3-4-plo longioribus, hujus squamis adpressis.

Ic. *nulla*.

In fruticetis, et ad sepes; *Bagno a S. Alessandro, al Castiglione, Ischia al Mandarino*; ec.; sed praecedente rarior.

Aprili, Majo. ♀

Folia in hac semper glaberrima, et magis quam in precedente oblonga; in ramis junioribus acute sinuato-lobata, lobis quoque acutis.

4. Q. CUPANIANA. *Guss. syn. 2. p. 606.*

Q. foliis deciduis superne glabris, subtus sordide cinereo-villosis su'tomentosisque, basi subcordatis, margine obovatis apiceque dilatatis lobatis, lobis latis obtusissimis approximatis integris, sinibus angustissimis, fructibus sessilibus breviter pedunculatis, glandibus oblongis (majusculis) cupula magna triplo longioribus, hujus squamis adpressis.

Ic. *Platiphyllus mas. Dalech. hist. 1. p. 2*, potius hanc quam praecedentem refert, ad quam citatur a cl. *Ten.*

In fruticetis, et ad sepes; *Ischia nelle selve del Mandarino, Bagno a S. Alessandro, Pico, Barano, Moropane, Fontana, collina di Campotese presso Panza.*

Aprili, Majo. ♀

Arbor duarum praecedentium excelsior, et magis comosa: *folia* firmiora, obscurius virentia — Nec ista, nec duae praecedentes ad Q. *Roborem* referri possunt; quae species, quantum scio, apud nos non provenit, at saepe cum aliis commutata.

318. CORYLUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1450.

1. C. AVELLANA. *Lin. sp. pl. 1417 — Ten. fl. nap. 5. p. 263.*

Ic. *Duham. arb. ed. 2. v. 4. t. 5 — Nucces avellanae. Zuing. theat. p. 148. f. 2.*

Ad sepes, in fruticetis, et ad valles; *cavone delle Nocelle, valle di Caniani, selve del Cantariello e del Monte di mezzo sopra Casamicciola, di Moropane, di Fontana, e di Campagnano.*

Februario, Martio. ♀

Vulgo *Nocella*.

Arbuseula ramosissima: *folia* decidua, rugoso-sabra, pubescentia: *amenta* mascula elongata, pendula, numerosa, cito erumpentia: *flores* foemi-

nei pauci, axillares, sessiles: involucrium campanulatum, apice lacero-dentatum: nax glaberrima, nitida.

319. CARPINUS.

Willd. sp. pl. 4. p. 467. n. 1627.

1. C. DUINENSIS. Scop. carn. ed. 2. v. 2. p. 243 — C. orientalis. Willd. sp. pl. 4. p. 468 — Ten. fl. nap. 5. p. 264.

Ic. Scop. l. e. t. 60.

Ad sepes, et in fruticetis; Campagnano, monte Vezza, tamen rarus.

Martio, Aprili. ♀

Arbustula in hac insula ramosissima; ramis subflexuosis: folia decidua, glabra, laete virentia: amenta mascula brevia, vix pollicaria, axillaria, solitaria; foeminea tenuiora: strobili ovati, breves; squamis ovatis, basi obliquis, inaequaliter serrato-subangulatis.

320. OSTRYA.

Michel. gen. p. 223 — Willd. sp. pl. 4. p. 469.

1. O. CARPINIFOLIA. Scop. carn. ed. 2. p. 243 — Ostrya vulgaris. Willd. sp. pl. 4. p. 469 — Ten. fl. nap. 5. p. 264.

Ic. Carpinus Ostrya. Duham. arb. ed. 2. v. 2. t. 39.

Ad sepes, et in fruticetis; Campagnano, cavone delle Nocelle, monte Vezza al Nord, vallone di Moropane, di Fontana, di Serrano, selve di Buceto, del Fasano, di Catreca e della cava di Brusomonte sopra Casamicciola.

Martio, Aprili. ♀

Vulgo Carpiniello.

Arbor plus minus elata: folia decidua, glabra, virentia: amenta mascula elongata, pendula, numerosa; foeminea brevia, laxa, solitaria: strobili ovati, penduli, vix pollicares; utriculis villosis.

80. SALICINEAE. Rich.

321. POPULUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1531.

1. P. ALBA. Lin. sp. pl. 1463 — Ten. fl. nap. 5. p. 278.

Ic. Duham. arb. ed. 2. v. 2. t. 51 — P. alba. Dod. pempt. 855 — Zuing. theatr. p. 195.

In apricis ; *Lacco al monte Vico, ed al capo della Torre di mezzo, Fiorio a S. Antuono, ed alla punta dell'Imperatore, Panza alla Guardia di S. Gennaro, Soccivo, sotto S. Nicola al Sud ed al Nord nelle rupi delle Folanghe, del Fasano, e di Catreeo, Compagnano alle coste del Pignatiello, salita da S. Montano a Zole, via del Corso.*

Februario, Martio. ♪

Vulgo *Cudole selvatiche*, et hujus rami ad vites alligandas inserviunt.

Arbor, vel *frutex*: *folio* decidua, angulato-dentata, subtus una cum ramulis niveo-tomentosa : *amenta* pendula : *stylus* indivisus, virescens, brevissimus ; *stigmatibus* albidis, elongatis, tenue papillosis, bipartitis, ac per paria divaricatis, ideoque cruciatis.

2. *P. NIGRA*. *Lin. sp. pl.* 1464 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 279.

lc. P. nigra. Dod. pempt. 836 — *Zuing. theatr. p.* 195, melior.

Ad sepes, et passim culta ad vites fulciendas.

Februario, Martio. ♪

Vulgo *Arlo*, et rami a plantis deraeuminatis quotannis resecti ad vites alligandas adhibentur, ac vulgo *Cudoli bianchi* appellantur.

Arbor elata : *folia* decidua, glaberrima, sed juniora piloso-villosa, deltoideo-acuminata, glanduloso-dentato-crenata : *omento* pendula ; foemineis demum elongatis : *capsulae* fere ovatae, glabrae, virentes — In planta foeminea lignum est album, tenerum ; rami vix tenaces : in planta masculina lignum ex albo-rubescens, duriusculum, rami tenaces ; et inde ad hanc spectat *P. nigra b. flexilis Ten. l. e.* — Forsan *P. neopolitona* ejusdem ab hac specie non differt, nam habitus alienus a modo quo rami abscinduntur plantationis tempore provenit.

3. *P. AUSTRALIS*. *Ten. fl. nap.* 5. p. 278.

P. petiolis gracilibus compressis, foliis obiter grosseque crenato-dentatis, subtus ramisque glabris, ramorum radicalium ac plantarum juniorum cordato-orbiculatis, in ramis adultis lateralibusque suborbiculatis (parvis), amenti foeminei squamis inciso-digitatis dense villosociliatis.

lc. P. lybica. Dod. pempt. 836 — *Zuing. theatr. p.* 195, ac aliorum potius ad hanc, quam ad *P. tremulam* speetare videntur.

In sylvatris ; *falde del monticello della Pietra perciata, selve delle Folanghe, del Fasano, e di Catreea, Panza a Campotese, ed a Citarrio, nel margine delle vigne sopra la Scarupato.*

Februario, Martio. ♪

Vulgo *Arrianiello*.

Folia semper glabra, aut sat raro juniora in ramis inferioribus subtus pubescentia vidi ; in apice ramorum trunci duplo reliquis majora, nempe usque 6 pollices longa, et 4 1/2 poll. lata, amentiscula : *omentorum* squamae basi cuneatae, fuscae ; *stigmata* duo bipartita, fusco-sanguinea, villosiuscula : *germen* virescens, globosum, glaberrimum.

322. SALIX.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1493.

1. S. ALBA. *Lin. sp. pl. 1449 — Ten. fl. nap. 2. p. 369, et 5. p. 274.*
lc. Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 27. f. A. — Salix. Matth. comm. 1.
p. 180 — Camer. epit. 187.

Ad margines agrorum in locis parum a mare dissitis usque in elatis *sotto*
S. Nicola, tam in marnaceis, quam in argillosis arenosisque variis oc-
 conomicis usibus species ista passim colitur.

Februario, Martio. ♀

Vulgo *Cudole*.

Arbucula in hac insula; at *flores* nunquam vidi, quia rami quotannis se-
 cantur ad vites alligandas: *folia* decidua, lanceolata, utrinque acumina-
 ta, subtus albo-scricea.

2. S. CAPREA. *Lin. sp. pl. 1448 — Ten. fl. nap. 2. p. 363, et 5. p. 274.*
lc. Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 31. f. O.

b. inarimensis; foliis oblongo-obovatis, vel oblongo-lanceolatis, subtus te-
 nue albo-aut virescenti-tomensis, ramis junioribus una cum gemmis
 pubescentibus, amentis pedunculatis grosse bractentis.

Ad sepes humentes in vallibus; *cavone delle Nocelle, dello Schiappone,*
cava delle Rose salendo a Pietrasparaina, valloni di Moropane, e di
Fontana, ai Fasano, sotto Buceto, cava di Brusomonte, e della Pera
sopra Casamicciola, sola var. b.

Januario, Februario. ♀

Arbucula ramosissima: *folia* decidua, rugosa, pubescentia, recurvato-
 acuminata, obsolete undulato-crenata, subtus tenue, non dense tomen-
 toso-villosa ac floccosa: *stipulae* semilunatae, parvae, denticulatae: *amen-*
ta axillaria, erecta; *mascula* vix pollicaria, brevius pedunculata; *foe-*
minea usque bipollicaria, aliquando pendula: *capsulae* breviter pedun-
 culatae, tomentoso-pilosae, cinereo-canescens, ex ovata basi elonga-
 to-attenuatae, 3-4 lin. longae: *stigmata* rufescentia, recta, glabra —
 Planta inarimensis differt a descriptione *cl. Koch syn. ed. 2. p. 550*
 notis indicatis.

81. CUPRESSINEAE. Rich. et Endl. *conif. p. 1.*

323. JUNIPERUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1552—Endl. l. c. p. 7.

1. *J. PHOENICEA. Lin. sp. pl. 1471 — Ten. fl. nap. 5. p. 282.*

a. sclerocarpa; fructu nitido, duro. Endl. l. c. p. 30.

lc. Dukam. arb. ed. 2. v. 6. t. 17 — J. major, Dioscoridis. Clus. hist. 1. p. 38.

In elatis praeruptissimisque rupibus maritimis; nella più elevata parte ed inaccessibile della Scarupata, satis rara.

Octobri, Novembri. ♀

Frutex sempervirens, in hac insula monoicus!, humilis, ramosissimus; ramis ad saxa fere ob ventorum impetum adpressis: folia ovata, obtusiuscula, dorso sulcata, arcte imbricata: fructus immaturi virentes, fere ovoidei; jam perfecti globosi, fusco-rufescentes.

82. ABIETINEAE. Rich. et Endl. *conif. p. 77.*

324. PINUS.

Link Hand. 11. p. 176.

1. *P. PINEA. Lin. sp. pl. 1419.*

lc. Blackw. herb. t. 189 — P. domestica. Matth. comm. 1. p. 87.

Colitur, sed non ita frequenter.

Aprili, Majo. ♀

Vulgo *Pigno.*

Arbor elata, ramis fastigiatis: folia sempervirentia, rigida, gemina, recta, obscure virentia: strobili ovati, magni.

II.

MONOCOTYLEDONEAE

83. ALISMACEAE. Juss.

325. ALISMA.

Juss. gen. p. 46.

1. A. PLANTAGO. *Lin. sp. pl. 486 — Ten. fl. nap. 3. p. 402 — Bertol. fl. ital. 4. p. 279.*
lc. Reich. cent. 17. f. 100 — Red. lil. t. 452 — Plantago aquatica. Matth. comm. 1. p. 458 — Dod. pempt. 606.
 In humentibus ad fossas; *Chianole dal Testaccio nel fosso grande, ove si raccolgono le acque, rara.*
 Majo, Junio. ☉
 Glaberrima, laete virens: folia cordato-ovata, vel lanceolata: scapi verticillato-ramosi: flores albi: capsulae obtusae.

34. POTAMEAE. Juss.

326. RUPPIA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 235.

1. R. MARITIMA. *Lin. sp. pl. 184 — Ten. fl. nap. 5. p. 329 — Bertol. fl. ital. 2. p. 239 — Buccaferrea cirrhosa. Petagn. inst. bot. 5. p. 1826.*

lc. *Reich. cent. 2. f. 307*, et *17. f. 26*—*Buccaferrae. Mich. gen. p. 72. t. 35.*

In laeu del Bagno; sed nunc fere destructa.

Junio, Julio. $\frac{1}{2}$

Sempervirens, fluitans, vel immersa: folia anguste linearia, graminea, basi vaginantia: fructus ovati, oblique erecti, fere in apice pedunculorum (qui demum elongati, et varie flexi) pedicellati.

85. NAJADEAE. Link.

327. ZOSTERA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1390.

1. *Z. nodosa. Ucria pl. ad. Lin. opus add. n. 30*, et in *Guss. syn. 2. p. 565*—*Z. marina, nodosa. Duchart. Inst. an. 1854. n. 1090?*—*Z. nana. Ten. fl. nap. 5. p. 243*, et *syll. in vol. 4. p. 132*, an et aliorum?

lc. *Phucagrostis minor. Cavol. diss. de Phuc. p. 14. t. 2*—*Z. nana. Reich. cent. 17. f. 2?*, an et *Roth*, nam folia multinervia in icone.

In maritimis coenosis.

Julio? $\frac{1}{2}$

Caules graciles, repentes: folia graminea, plurinervia, angustissime linearia: nec flores, nec fructus vidi. Confer quae de hac specie controversa dixi in *syn. l. c.*, et *Reich. l. c. p. 2*.—Ad *Z. nanam Roth*. hanc nostram referri non potest, nam in planta *Rothii* folia trinervia sunt! ex *Duchart. l. c.*

328. PHUCAGROSTIS.

Cavol. diss. de Phuc. p. 13.

1. *P. MAJON. Cavol. l. c.*—*Ten. fl. nap. 3. p. 272*—*Cymodocea aequorea! Koenig. in Spr. s. veg. 3. p. 897.*

lc. *Cavol. l. c. t. 1.*

In laeu del Bagno, sed nunc fere destructa, nec non in mari proximo.

Julio, Augusto. $\frac{1}{2}$

Caules rubentes, articulati, firmi, valde ramosi, articulis elongatis: folia graminea, fere 2-lin. lata, obtusa, basi vaginantia, multinervia: unica tantum vice inveni cum cl. *Gasparrini* fructus maturos, qui semicirculares, compressi, marginati, sessiles, ut in icone *Cavol.* optime exhibentur—Pro inmerito mutato nomine generico a neotericis confer cl. *Ten. l. c.*

329. CAULINIA.

Dec. fl. fr. 3. p. 136 — Pers. syn. 2. p. 162.

(characteres reformavi G. GASPARRINI ex suis observationibus)

Pedunculi terminales, subumbellati, basi bracteati: *bracteis* foliaceis — *Flores* nudi, solitarii, secus dentes pedunculorum approximati; inferiores (plerumque duo) hermaphroditii, terminalis interdum masculus. *Stamina* tria, verticillata, filamento destituta; *connectivo* lato, membranaceo, petaloideo, apice in aristam producto; *anthera* extrorsa, biculari; loculis cylindraccis, plerumque discretis, facie externa connectivi impositis: *pollen* gossypinum, nempe cellulis fusiformibus vel cylindraccis, simplicibus aut ramosis, rectis vel flexis, raro confervoideis, substantia mucoso-granulosa repletis, constitutum. *Carpellum* ovario uniloculare, uniovulato; *stilo* crasso, brevi, cylindraceo, solido; *stigmatibus* undique ramoso: *ovulum* parieti ovarii lateraliter adfixum, non curvatur, nucleo et duabus membranis undique clausis compositum; *micropyle* nulla. *Fructus* loco, *bulbus* ovato-oblongus, laevis, apiculatus, cortice, massa amylacea et gemma constitutus; *cortex* carnosula, tenax, ex ovario efformata, succrescente gemma, apice plus minusve regulariter dehiscens; *massa amylacea* oblonga, paululum compressa, hinc convexa, hinc laeviter concava, epidermide seu membrana involuta; intus per medium secus longitudinem filamento (quod tandem in radiculum inferam evadit) percurta, ab apice ad basim producta, ad basim massae amylaceae desinente in maculam fuscam, forsitan micropyle auctorum. *Gemma* axe, et foliis pluribus composita, terminalis vel subterminalis, massa amylacea inposita epidermide continua (Gasp.).

1. C. OCEANICA. *Dec. l. c. — Ten. fl. nap. 5. p. 289, et syll. in 8. app. 5. p. 45 — Kerneria oceanica. Willd. sp. pl. 4. p. 947 — Posidonia Caulini. Koen. ann. of. bot. 2. p. 96 — Zostera oceanica. Lin. mant. 1. p. 123 — Cavol. de Zost. mon. — Toenidium. Micheli.*

1c. *Cavol. l. c. — Ten. l. c. t. 250. f. 1 — Reich. cent. 17. f. 5 — Mich. in Targ. Tozz. catal. veg. mar. p. 80. t. 1 — Alga marina. Lobel. ic. 251. Ad litora passim in maris fundo.*

Octobri, Novembri. ☞

Vulgo appellantur *Teppa* candices rejecti ab undis, et folia *Alga di mare*. *Caudices* breves, caespitosi, multiplices, fibris foliorum emarcescentium dense teeti: *folia* disticha, late linearia, longa, obtusa: *scapi* intra folia erumpentes, graciles, apice gerentes spicam disticham brevissimam: *fructus* majusculi, virentes, ab undis ad litora saepe rejecti.

86. LEMNACEAE. Link.

330. LEMNA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1400.

1. *L. CIMBA. Lin. sp. pl. 1377 — Ten. fl. nap. 2. p. 334 — Bertol. fl. ital. 1. p. 126.*
 Ic. *Reich. cent. 17. f. 16* — *Lenticula palustris*, major, inferne magis convexa, fructu polyspermo. *Mich. gen. p. 13. t. 11. f. 2.*
 Ad piscinas in elatis; *Casamicciola.*
 Aprili, Majo. ☞
 Laete virens: radix solitaria: frondes obovatae, convexae, aquis innatantes.

87. AROIDEAE. Juss.

331. ARISARUM.

Tourn. inst. 131 — Endl. gen. n. 1673.

1. *A. VULGARE. Spr. s. veg. 3. p. 768 — Arum Arisarum. Lin. sp. pl. 1370 — Ten. fl. nap. 2. p. 353.*
 Ic. *Reich. cent. 17. f. 7* — *A. serpentinum. Barr. ic. 573 — Arisarum. Clus. hist. 2. p. 73.*
 Ad sepes, ad vias, et in collibus apricis ad fruticeta.
 Septembri, Octobri. ☞
 Glaberrimum, acaule: folia obtusa, mucronulata, cordato-sagittata; lobis obtusis: spatha rubro-lineata; ejus tubo cylindrico, pollicari; limbo ovato, concavo, erecto: spadix gracilis, cylindricus, apice subclavatus, incurvatus, spatha brevior.

332. ARUM.

Endl. gen. n. 1676.

1. *A. ITALICUM. Mill. dict. n. 2 — Ten. fl. nap. 2. p. 354, var. a. et b.*
 Ic. *Reich. cent. 17. f. 11 — Sabb. hort. rom. 2. t. 73.*
 b. spatha non concolore, sed rubro-punctato-maculata.
 In sylvaticis, ad sepes humentes, et ad vias passim: var. b. nelle vigne di *Casamicciola*, e nel boschetto del *Castiglione.*
 Martio, Aprili. ☞

Vulgo *Ajale*.

Folia hastato-sagittata, varie albo-maculato-venosa: *spatha* basi tubulosa; limbo lanceolato, acuto, concavo: *spadix* rectus, superne clavatus, *spathae* tubum parum excedens — In var. *a.* *spathae* luteae, concoloris — Var. *b.* cum *A. maculato*, cui proxima, non est confundenda, nam species ista in tota Campania non provenit.

88. ORCHIDEAE. Juss.

333. ORCHIS.

Brown. in *H. Kew. ed. 2. v. 5. p. 188.*

† *Tuberibus indivisis.*

1. *O. FRAGRANS.* *Pollin. hort., et provinc. Veron. pl. nov. p. 25* — *Griseb. spic. fl. Rum. 2. p. 358* — *Guss. syn. 2. p. 533* — *O. coriophora. Ten. syll. p. 442*, quoad locum natalem.

O. foliis lanceolato-linearibus acutis, spica cylindrica densa demum elongata, bracteis lineari-lanceolatis ovario sublongioribus, petalis tribus exterioribus ovato-lanceolatis bracteisque acuminatis coalitis apice breviter divaricatisque, labello subconvexo dependente, ovario triplo brevioris trilobo, lobis subaequalibus, lateralibus ovato-rhombicis oblique truncatis dentato-serrulatis, medio longiore lanceolato integro, calcare saccato-conico curvulo saepius subdescendente ovarium subaequante.

1c. *Pollin. elem. bot. tab. ultim. f. 2.*

In fruticetis apertis, et in sylvaticis apricis elatis; monte *Veza*, nella selva dell' *Ulicella sopra Buceto*, selve del *Fasano*, delle *Falanghe*, di *Catreca*, monte *Trippiti*.

Aprili, Majo. ☞

Spica 3-5-pollicaris: *flores* parvi, sordide carnei, grate olentes—Etiam cl. *Griseb. l. c.* hanc ab *O. Coriophora* distinguit floribus duplo majoribus, odore et colore florum, labelli lacinia media ligulata, statura sesquipedali.

2. *O. PROVINCIALIS.* *Balb. miscell. alt. Taur. p. 20* — *O. Cyrilli. Ten. fl. nap. 2. p. 287.*

1c. *Balb. l. c. t. 2* — *Ten. l. c. t. 87.*

In sylvis elatioribus; selve delle *Falanghe*, del *Fasano*, di *Catreca*, e della *Pera*; in quella dell' *Ulicella sopra Buceto*, del *Roturo*, di monte *Veza*, siepi di *Calimera*: rara in demissis; selve di *Campagnano*.
Aprili, Majo. ☞

- Cl. *Griseb. in spic. fl. Rum. 2. p. 360, O. paucifloram Ten. cum hac associat; tamen sunt inter se plane distinctae; nam in O. pauciflora spica laxior; florum color sulphureus; labellum intense flavum, magis latum, explanatum; dum in O. provinciali spica densior; flores albedo-sulphurei; labellum holosericeo-sulphureum, angustius.*
3. *O. RUBRA Jacq. coll. 1. p. 60 — O. papilionacea. Ten. fl. nap. 2. p. 297, non Lin.; et Griseb. spic. fl. Rum. 2. p. 356.*
- O. foliis inferioribus subcanaliculatis lanceolato-linearibus, spica oblongo-cylindrica laxiuscula, bracteis (carneis) lanceolatis ovario sub brevioribus, petalis tribus exterioribus conniventibus obtusiusculis, labello obovato subampliato venoso vel concolore late canaliculato-concavo subrenulato subemarginato, calcar descendente ovarium subaequante.*
- lc. Jacq. ic. rar. 1. t. 183 — O. montana, humilis, flore majore. Buzb. cent. 3. t. 3.*
- In apricis herbosis elatis, aut demissis passim; da S. Nicola al lido, Martio, Aprili. ♀*
- In vera O. papilionacea Lin. (quae est O. exprinsa Ten. fl. nap. 1. c., uti in syn. 2. p. 331 notavi) labellum expansum, stabelliforme, fere planum; in hac vero obovatum, canaliculato-concavum.*

†† *Tubcribus palmatis.*

4. *O. PSEUDO-SAMBUCINA. Ten. fl. nap. 2. p. 284 — O. romana. Sebast., et Maur. pl. rom. fasc. 2. p. 308.*
- lc. Ten. 1. c. t. 86 — Sebast. et Maur. 1. c. t. 3.*
- In fruticetis et in sylvaticis apricis elatis, tamen frequentior in demissis; all'Arso (rara), selve dello Spennato, e della Croce sul Bagno, in quelle di Castiglione, di Chiummano, di Campagnano, del monte Vezza, di Fontana, dell'Ulicella, e di Campotese presso Panza, Montagnone, Rotaro, Lacco al monte Vico, via vecchia da Casamiciola al Monte della Misericordia.*
- Martio, Aprili. ♀*
- Folia linearilanceolata, 2-4 lin. lata, late canaliculata, erecta, obtusiuscula: spica oblongo-cylindracea, laxiuscula: bracteae lanceolatae, virentes, ovario longiores: flores inodori, rubri, vel lutei: petala duo exteriora retroflexo-conniventia: labellum planum, crenulatum; calcar cylindraceo-conicum, obtusum, ascendens, ovarium excedens.*
5. *O. MACULATA. Lin. sp. pl. 1335 — Ten. fl. nap. 3. p. 298, var. a.*
- lc. Reich. cent. 6. f. 772 — Hall. helv. t. 32 — Satyrium basilicum foemina. Dod. pempt. 240.*
- In sylvis; cavone delle Noelle, selve del Vataliere, e di Chiummano,*

di Campagnano, del monte Vezza, del Rotaro, di Buceto, dell'Ulicella.

Aprili, Majo. \mathcal{Z}

Folia radicalia oblongo-lanceolata, saepius nigro-maculata: *spica* densa, demum elongata: *bracteae* lanceolato-lineares: *flores* lilacini, vix odori; *petalis* lateralibus patulis: *labellum* planum, obovatum, trilobum, lineis punctisque purpureis notatum: *calcar* saccato-conicum, dependens.

334. PLATANThERA.

Rich. mem. du Mus. d'hist. nat. v. 4. p. 20.

1. *P. CHLORANTHA*. *Custor* in *Reich. cent. 9. p. 20* — *Orchis bifolia*. *Ten. fl. nap. 2. p. 282*, quoad plantam prope Neapolim proveniente[m].

P. foliis radicalibus binis oblongis obtusis, caulinis bracteaeformibus, petalis exterioribus obtusiusculis, lateralibus pateutibus, intermedio duplo latiore fornicato-concavo cum binis interioribus connivente, labello indiviso lineari-lanceolato elongato, calcare filiformi horizontaliter porrecto, gynostemio truncato, antherae loculis apice contiguis, inferne divaricatis l

l.c. Reich. l. c. t. 1145 — *Coss. et Germ. atl. fl. Paris t. 32. f. F.*

In sylvis elatis, aut demissis; *selve di Campagnano, del Vataliere, e di Chiummano, delle coste del Piano Liguori, del monte Vezza, del Rotaro, dell'Ulicella sopra Buceto, delle Falanghe, di Catreca, e del Fasano.*

Aprili, Majo. \mathcal{Z}

Folia erectiuscula, plana, vel subconduplicata: *bracteae* lanceolatae, acutae, una cum ovario virentes, illo breviores, semipatentes: *corollae* pallide albae; sed *labellum* virescens, primum patens, mox dependens, retrorsum incurvatum, anguste lineare, 5-6 lin. longum: *calcar* virescens, compressum, filiforme, obtusum, ad apicem vix latius, horizontale, vel ascendens, ovarium excedens: *anthera* a duobus petalis intimis lanceolato-linearibus arcuato-conniventibus tecta — *P. bifolia* differt in primis ab hac, antherae loculis parallelis, non basi divaricatis. Confer hujus icones in *Reich.*, et in *Coss. ac Germ. l. c.*

335. TINEA.

Div. giorn. di Sc. ed Art. per Sicilia an. 1833. p. 149 — *Guss. syn. 2. p. 540.*

Cor. petala 5 in galeam conniventia, gynostemium obtegentia; duo exteriora lateralialia basi subsaccata. *Labell.* decedens, basi subtus saccato-

gibberosum: *gynost.* ad antheram usque adnatum, obtusum, perexiguum: *massae* pollinis lobulatae, cum granulis pedicellatae.

1. *T. CYLINDRICA.* *Biv. l. c.* — *Guss. l. c.* — *Satyrion maculatum. Desf. atl. 2. p. 519* — *Ten. fl. nap. 2. p. 301* — *Orchis secundiflora. Bertol. am. ital. p. 82* — *Ophrys densiflora. Desf. coroll. p. 11* — *Perystylus densiflorus. Griseb. spic. fl. Rum. p. 364.*

lc. Desf. l. c. t. 6 — *Orchis Orchidi Leodiensi* affinis, culicem referens, purpurea, et confertior. *Bon. t. 32*; at *Orchidis* species, capsellis orbiculi orationis dominicalis figura. *Bon. t. 138*, forsitan ad *Listeram ovatam* potius spectat.

In sylvaticis montosis, vel demissis mucosis passim.

Martio, Aprili. ☞

Caules 3-12-pollicares, erecti: *folia* ut plurimum duo, terrae adpressa, ovali-oblonga, rubro-maculato-tuberculata, subtus reticulato-lacunosa, pallida; *caulina* brevissima, semivaginantia: *spica* densissima, cylindracea, sub anthesi brevis, inde elongata, saepe usque 5-pollicaris: *flores* exigui, vix odori, secundi, deorsum imbricati: *petala* vix 3-mill. longa, ad carinam tantum in hac insula colorata; tria exteriora apice libera, acuminata; duo lateralia semiovala, subfalcata; duo interiora breviora, linearia, angustiora: *labellum* basi gibbum, antice planum, apice tripartitum; laciniis angustis, linearibus, rectis, lateralibus duplo angustioribus (filiformibus), parumque brevioribus; intermedia truncata, obtusa, integra, bifida, vel tridentata: *anthera* brevis, 1½ longa, subglobosa, obtusa, dorso convexa, facie plana, bilocularis; loculis oppositis: *pollinis* *massae* facile solubiles: *ovarium* cylindricum, 1½ lin. longum, apice incurvum, *bractea* oblonga acuminata duplo longius.

Ad genus *Perystylum* *Blum*, ad quod refertur a *Cl. Griseb. l. c.* spectare non potest, uti clare patet, si utriusque generis characteres conferantur in *Endl. gen. n. 1517.*

336. OPHRYS.

Koch syn. ed. 2. p. 796 — *Guss. syn. 1. p. 543.*

1. *O. FUSCA.* *Link in Schrad. diar. bot. 1799. v. 2. p. 324* — *Ten. fl. nap. 2. p. 303.*

lc. Reich. cent. 9. f. 1147 — *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 32. f. G.* — *Ten. fl. nap. 2. t. 92* — *O. myodes, fusca, lusitanica. Breyn. cent. 1. t. 41.*

In apricis herbosis montosis rarissima; monte *Vetta alle Petrelle.*

Aprili, Majo. ☞

Petala duo exteriora patentia, intermedium fornicatum; omnia viridi luteo-

la; binis interioribus brevioribus, late-linearibus: *labellum* obovato-conicum, convexum, holosericeo-velutinum ac fuscum, apice truncato-emarginatum, basi maculis binis glabris nitidis intensioribus notatum: *gynostemium* obtusum.

2. O. ARANIFERA. *Huds. angl. ed. 2. p. 392 — Ten. fl. nap. 2. p. 305.*
 Ic. *Reich. cent. 9. f. 1155—Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 32. f. B—*
Orchis fucum referens, colore rubiginoso. Vaill. bot. paris. t. 31. f.
15, 16.

In pratis apricis; *selve di Chiummano, scala de' Maronti sotto al Te-
 staccio*, rara.

Martio, Aprili. ☞

Petala virentia; tria exteriora patentia; duo interiora fere duplo breviora, lineari-lanceolata, glabra: *labellum* oblongo-obovatum, fusco-ferrugineum, velutino-holosericeum, notatum binis lineis plumbeis glabris nitidis, cum altera transversali connexis, apice anguste sed profunde emarginatum: *gynostemium* obtusum.

3. O. EXALTATA. *Ten. fl. nap. 2. p. 306 — Guss. syn. 2. p. 545.*

O. caule folioso elato, petalis omnibus patentibus, tribus exterioribus (albidis ad carinam viridulis) oblongis obtusis, binis interioribus (viridulis) lato-linearibus undulatis obtusis duplo brevioribus glaberrimis *gynostemium* breviter rostratum subsuperantibus, labello obovato convexo obsolete trilobo, lobo medio emarginato appendiculato in ambitu holosericeo in disco puberulo-fusco lineisque subparallelis glaberrimis notato, basi gibbere conico utrinque instructo.

Ic. *Ten. l. c. t. 96.*

In apricis herbosis sylvarum; *selve di Chiummano*, rara.

Aprili, Majo. ☞

Petala tria exteriora concaviuscula, ac incurva; duo interiora dimidio fere breviora, recta ac surrecta, ad margines non revoluta, sed undulata ac fusca: *scintilla*, obtusa!, 1½-1-lin. lata, in hac insula glaberrima: *labellum* fere duplo majus, quam in praecedente, at ejus lineis duabus parallelis cum alia intermedia, ut in illa, conjunctis: *gynostemium* virescens, obtusiusculum: *labelli appendix* recta, ac triangularis, fere virescens.
 Confer *syn. l. c.*

4. O. FUCIFLORA. *Reich. cent. 9. p. 24, an et Pers. syn. p. 510?*

O. caule folioso elato, petalis (albido roseis) tribus exterioribus oblongis obtusis patentibus, binis interioribus triangulari-lanceolatis! velutinis margine revolutis triplo brevioribus *gynostemium* brevissime rostratum subaequantibus, labello (magno) obovato convexo integro (non trifido) velutino-holosericeo (fusco-atro) in disco binis gibberis conicis binisque maculis glabris (nigro-plumbeis) inter se liberis vel cum macula transversali conjunctis instructo, apice emarginato cum appendice carnosae rhombeae inflexae subintegra.

lc. *Reich. l. c. f. 1164.*

In apricis herbosis sylvarum; *selve di Chiummano.*

Aprili, Majo. ☞

Petala tria exteriora praecedenti similia; duo interiora diversissima, siquidem ovato-triangularia, intense rosea, tenue velutina ac ciliata; *labelli appendix* glabra, flavida, brevis, acuta, deorsum inflexa.

- Cl. *Koeh* in *syn. ed. 2. p. 797* hanc *O. arachnitis* nomine describit. Pro speciei tipo confer *Reich. l. c. f. 1162* et *O. arachnites. Cass. et Germ. atl. fl. Paris. t. 32. f. D*, nec non *Orchis fuciflora. Haller. fl. helv. 2. p. 134. t. 24. f. 1*; ex quo huic quoque spectant, *Orchis fucum* referens, major, foliis superioribus candidis et purpurascensibus, *Vaill. bot. paris. t. 30, f. 10, 11, 12, 13*; *O. araneam* referens, *Seguier pl. Veron. suppl. p. 244 t. 8. f. 1*; *O. fuciflora galea* et alis purpurascensibus; *Bauh. hist. 2. p. 766*, icon rudis sed descriptio bona: sed *Orchis apem* referens lusitanica. *Breyn. cent. p. 98. ic. 43* ad aliam speciem spectare videtur, et forsitan ad sequentem.

5. *O. APIFERA. Huds. fl. angl. ed. 1. p. 340 — Ten. fl. nap. 2. p. 307, et 5. p. 241.*

lc. *Reich. cent. 9. f. 1159—Cass. et Germ. atl. fl. Paris. t. 32. f. C — Orchis fucum* referens, galea, et alis purpurascensibus. *Vaill. bot. paris. p. 149. t. 30. f. 9.*

In collibus apricis, et in sylvaticis apertis herbosis boream spectantibus; *colline del Dugno rara, cava di Duceto, di Cerambi, del Carusiello, selve del Pozzale, ed al bosco di Caruwa, e di Campagnano salendo alla torre.*

Martio, Aprili. ☞

In planta inarimensi *petala* duo interiora duplo breviora, triangularia, ad margines revoluta, interne hirta, uti ex *Koeh syn. ed. 2. p. 797*, facie exteriori glabra: *labellum*, obovato-convexum, fusco-flavescens, lineolis olivaceo-flavidis irregularibus, et macula glabra intensiore notatum; lobis lateralibus verticalibus, hirsutis; lobo medio elongato, bilobo, eum appendice subulata interjecta; *gynostemii* rostrum breve, non exsertum — In *O. rostrata Ten. l. c. p. 242*, *petala* duo interiora linearia, non triangularia, dorso villosa; *gynostemii* rostrum longe exsertum.

337. SERAPIAS.

Swartz Act. Holm. 1800. p. 223, in Vild. sp. pl. 4. p. 70.

1. *S. CORDIGERA. Lin. sp. pl. 1345 — Helleborine cordigera. Sebast. et Mauri Fl. rom. pr. p. 312 — Ten. fl. nap. 2. p. 315.*

lc. *Sebast. et Maur. l. c. t. 10.*

In apricis herbosis, vel in aridis elatis aut demissis.

Aprili, Majo. ☞

Tubercula duo radicalia sessilia, in sequentibus altero pedicellato: *flores* atrorubentes, uti in *S. longipetala*, sed *labelli* lobo medio late-ovato, acuminato, dependente, disco piloso: *bracteae* florem parum superantes, non spathaceae.

2. *S. LONGIPETALA*. *Poll. fl. ver. 3. p. 30* — *Ten. syl. p. 458*; et *Helleborine longipetala*, *id. fl. nap. 2. p. 317* — *H. pseudo-cordigera*. *Sebast. et Maur. rom. pl. fasc. 1. p. 14* — *S. lingua*. *Bertol. amoen. ital. p. 202*, non *Lin.* — *S. lingua*, *a. Lin. sp. pl. 1344*.

1c. *Ten. l. c. t. 98* — *Sebast. et Maur. l. c. t. 4. f. 1* — *Seguer veron. 3. p. 248. t. 8. f. 1*.

In apricis herbosis, aut aridis; *Ischia all'Arso, Campagnano, selve della costa di Piano Liguori, alla Scarupata, Succellaro, monte Veza, monte Trippiti, monte Vetta, Guardiolo del Testaccio, Casamicciola al Mortito*, ubi tamen rara, *Torre di Zale fra il Lacco e Forio*.

Aprili, Majo. ☞

Bracteae latae, fere spathaceae, invicem incumbentes, longe acuminatae, florem superantes: *labellum* angustius quam in praecedente, et magis longum, magisque attenuatum, deflexum, non semipatens: *petala* duo inferiora saepius cum exterioribus ad apicem coalita.

3. *S. LINGUA*. *Lin. sp. pl. 1345, b.* — *Helleborine lingua*. *Ten. fl. nap. 2. p. 316*, excl. nonn. var.

1c. *Orchis macrophylla*. *Column. ephr. 1. p. 321. t. 322*.

In apricis herbosis magis quam praecedens obvia.

Aprili, Majo. ☞

Bracteae floribus breviores: *labelli* lobo medio oblongo-lanceolato, acuto, pallide carneo, glaberrimo, dependente: *glandula* basilaris in hac non sulcata, ut in aliis speciebus hujus generis.

4. *S. PARVIFLORA*. *Parlat. giorn. di scienc. per la Sic. fasc. 175. p. 66, et pl. nov. p. 17*.

S. bracteis acuminatis flore subbrevioribus, *labelli* villosiusculi ferruginei *glandula* basilari sulcato-camaliculata, lobis lateralibus acutis rotundatis, medio dependente lineari-lanceolato acuto (ovario non adpresso) *petala* aequante.

1c. *nulla*.

In apricis sylvarum rara; *selve di Buceto e del Rotaro*.

Aprili, Majo. ☞

Habitus praecedentis; sed *labellum* parvum, breve, *petala* aequans, ideoque flores prae reliquis sat parvi.

338. LIMODORUM.

Swartz nov. act. Holm. 1800. p. 80 — Endl. gen. n. 1607.

1. L. ABORTIVUM. Swartz l. c. — Ten. fl. nap. 2. p. 323 — Orchis abortiva. Lin. sp. pl. 1336.

Ic. Holl. helv. n. 1288. t. 36 — Pseudo-Limodorum austriacum. Clus. hist. 1. p. 270.

In sylvis, et in fruticetis passim.

Aprili, Majo. ☞

Aphyllum, scapo bracteis vaginato: flores amoene coerulei: labellum ovatum, undulatum: calcar elongatum, dependens, subulatum, pallidum.

339. CEPHALANTHERA.

Spr. s. veg. 3. p. 677 — Endl. gen. n. 1608.

1. C. ENSIFOLIA. Spr. l. c. p. 707 — Richar. Orch. eur. adn. p. 38 — Serapias ensifolia. Lin. s. veg. ed. 14. p. 815, excl. syn. — Ten. fl. nap. 2. p. 320.

Ic. Fl. dan. 506.

In sylvis, praesertim in illis boream spectantibus; selve di Buceto, dell' Ulicella, delle Falanghe, del Fasano, di Catreca, della Pietra perciata, e di Pietra sparaina sotto al Telegrafo.

Aprili, Majo. ☞

Folia nervosa, subdisticha: flores albi; petalis acutis, conniventibus.

340. EPIPACTIS.

Richar. Orch. eur. adn. p. 21 — Spr. s. veg. 3. p. 677. n. 2956 — Endl. gen. n. 1553.

1. E. MICROPHYLLA. Swartz act. holm. 1800. f. 232 — Ten. fl. nap. 5. p. 242.

Ic. Wald. et Kit. pl. rar. Hung. t. 270 — Helleborine recentiorum. Clus. hist. 1. p. 273.

In sylvis rarissima; Selve del Rotaro sotto all'acquedotto di Buceto.

Majo, Junio. ☞

Folia ovali-lanceolata, parva, ac pauca: flores penduli, parvi, sordide viridi-flavescentes; labelli lamina ovata, acuta; ovarium puberulum, breviter pedunculatum.

341. SPIRANTHES.

*Richar. Orch. eur. adn. p. 20 — Spr. s. veg. 3. p. 677. n. 2959 —
Endl. gen. n. 1547.*

1. *S. AUTUMNALIS. Rich. l. c. — Neottia spiralis. Willd. sp. pl. 4. p. 73
— Ten. fl. nap. 2. p. 314 — Ophrys spiralis, b. Lin. sp. 1340.*

lc. *Hall. helv. t. 38 — Orchidiastrum autumnale, pratense, album, odoratum. Michel. gen. t. 26 — Testiculus odoratus, minor. Dod. pempt. 239.*

In apricis herbosis pascuis demissis, vel in collibus inter fruticeta.

Septembri, Octobri. ♀

Flores albi, fragrantis; labella concavo, in medio albo-viridulo; germen una cum bracteis concavis acuminatis et seapo superne tenuis pubescens — Labellum crispatum, indivisum notant Duby in Bot. gall. p. 448, et Loisel. in fl. gall. ed. 2. v. 2. p. 273; at emarginatum ex Koch in syn. ed. 2. p. 802: in nostra revera crispatum; at minime emarginatum est. Praeterea Cl. Ten. in syll. app. 4. p. 42 notat plantam borealem ex observatione Linkii a nostra differre germinibus fere glabris, floribus virescentibus, nec non statura multo minori. An ideo species propria, et S. australis appellanda?

89. IRIDEAE. Juss.

342. IRIS.

Endl. gen. n. 1226.

1. *I. FOETIDISSIMA. Lin. sp. fl. 51 — Ten. fl. nap. 3. p. 36 — Bertol. fl. ital. 1. p. 238.*

lc. *Reich. cent. 19. f. 775 — Red. lil. t. 351 — Spathula foetida. Lobel. ic. 70.*

In sylvis, fruticetis, et ad sepes; *Campagnano, monte Vezza, covone dello Schiappara, Chiummano, Pica, Casamicciola, cava di Brusomonte e di Buceta, Moropane, Fontana, ec.*

Majo, Junio. ♀

Vulgo *Giglio salvatico*.

Folia confricata foetida sunt: stigmata apice biloba; lobis acutiusculis, fere ovatis, sursum concavis; praeterea ista potius plumbea, quam lutescentia, ad apicem pallidiora, facie superiore carinata, ad carinam intensius colorata.

2. I. GERMANICA. *Lin. sp. pl.* 55 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 36 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 232.
lc. Reich. cent. 19. f. 765 — *Red. lil. t.* 309 — I. vulgaris, germanica, sive sylvestris. *Bauh. theatr.* p. 571 — I. nostras, vulgaris. *Lob. ic.* 59. f. 1.
 Ad muros, sed potius, uti sequens, culta quam spontanea.
 Aprili, Majo. ☞
 Vulgo *Giglio di S. Antonio*, cum sequente.
 Flores coerulei.
3. I. FLORENTINA. *Lin. sp. pl.* 55 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 35 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 231.
lc. Reich. cent. 19. f. 766 — *Red. lil. t.* 23 — Iris nostras, vulgaris, candidis floribus. *Lobel. ic.* 59. f. 2.
 Cum praecedente, eodemque tempore floret. ☞
 Flores albi: radices violam redolent, quod non in praecedente.

343. GLADIOLUS.

Tourn. inst. p. 365 — *Endl. gen. n.* 1239.

1. G. SEGETUM. *Ker in H. Kew. ed. 2. v. 1. p.* 102 — *Ten. fl. nap.* 1. p. 11, sub nomine *G. communis*, ex indice in vol. 5. p. 364 — *G. communis. Bertol. fl. ital.* 4. p. 227, quoad plantam siculam, et neapolitanam.
lc. Reich. cent. 6. f. 819, et cent. 19. f. 781! — *Ker bot. mag. t.* 719 — *Gladiolus. Dod. pempt.* 209?
 In vineis, et in cultis inter segetes; seminati *del monte Vezza, Panza, Forio, siti coltivati delle Falanghe e del Fusano, Luceo nelle vigna ed a monte Vico, Casamiociola al Cacciuto.*
 Aprili, Majo. ☞
Bulbi ovati, basi proliferi, tunicarum tenuium ac castaneorum fibris parallelis stipatis, areolis anguste linearibus: corollae distantes, lacinia suprema a lateralibus divaricata: semina globosa, subbaccata, non alata, sed deorsum producta!
2. G. INARIMENSIS. *Guss.*
G. fibris tunicarum bulborum tenuibus parallelis dense stipatis, areolis copiosis angustissimis, corollae laciniis superioribus approximatis, inferioribus macula lanceolata sanguinea immarginata notatis, duabus lateralibus lanceolatis, infima (duplo latiori) obovato-cuneata, antheris filamento brevioribus, stigmatibus laciniis a basi ad medium linearibus, supra medium subito in lamina spatulatam obtusam dilatatis, capsula obovato-oblonga, angulis obtusis, seminibus deorsum productis.

lc. *nostra* t. XIV — *G. narbonensis*, flore purpureo. *Beal. dist. ver. ord.*
4. fol. 111?

In argillosis cultis humidiusculis; nelle vigne della Cava di Buceto, di
Cerambi, di Brusomonte sopra Casamicciola.

Majo, Junio. ☿

Bulborum tunicae castaneae, ac factae a fibris tenuibus ita approximatis,
ut fere membranam continuam constituunt: flores *G. communi* similes,
ex icone *Reich. cent. 19. f. 777*: corollarum lacinae superiores omnes
approximatae, ut in *G. communi*, et in *G. dubio*, non vero intermedia a
lateralibus remota, ut in praecedente; tres inferiores macula lanceolata
notatae, non albo-marginata ut in *G. dubio*, sed linea alba elevata per
medium percursae; duae laterales late-lanceolatae, acutae; infima duplo
latisior, obovato-cuneata, obtusa: *antherae* filamentis sanguineis breviores,
stigma aequilatae, auriculis acuminatis, semper parallelis, non di-
varicatis, ut in *G. illyrico*: *stigmatis* lacinae a basi ad medium gla-
brae, supra medium ad margines papilloso-ciliatae, una cum stylo san-
guineae: *capsula* trisulcate-lobata, apice impressa, angulis obtusis,
non acute carinatis, ut in *G. illyrico*: *semina* deorsum tantum produ-
cta, ut in praecedente, non marginata ut in *G. dubio* et *communi*.

Planta intermedia inter *G. communem*, *dubium* et *illyricum*, sed chara-
cteribus notatis ab illis distincta, ac praesertim seminibus a primo om-
nino diversa. Confer icones *Reich l. c.*

341. ROMULEA.

Maratti in *Sebast.*, et *Maur. fl. rom. pr. p. 11* — *Bertol.*
fl. ital. 1. p. 219.

1. R. COLUMNAE. *Sebast. et Maur. l. c. p. 18* — *Bertol. l. c. p. 224* — *Ixia*
Bulbocodium, a. minima. *Ten. fl. nap. 1. p. 13*, ex ipso in *v. J.*
p. 35 — R. minima. *Ten. mem. p. 117.*

lc. *Reich. cent. 19. f. 784, et 785* — *Sisyrinchium* Theophrasti. *Co-*
lumn. echpr. 1. p. 327.

In apricis pascuis; Arso, Rotaro, Montagnone, Bagno, Castiglione, Ca-
samicciola, Lacco al monte Vico, Forio, S. Angelo.

Januario, Martio. ☿

Spathae valva superior late membranaceo-marginata: *corollae* pallidis-
sime coerulae, sed in hac insula saepius albidae, in fundo lutescentes,
parvae, spatium subaequantes: *stamina* pistillo-longiora: *capsula* ob-
longa, obtusa.

90. AMARYLLIDAEAE. *Brown.*

345. PANCRACTIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 351.

1. *P. MARITIMUM.* *Lin. sp. pl. 418* — *Ten. fl. nap. 1. p. 148* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 22.*
Ic. Red. lil. t. 8 — *Narcissus marinus. Dod. pempt. 229, mediocris* — *Clus. hist. 1. p. 167.*
 In arenosis maritimis; *Lacco alla marina di S. Montano, Forio alla marina di Citara, e di Montevegine, marina di S. Angelo.*
Julio, Octobri. ♀
Vulgo Giglio di S. Restituta.
Flores candidi, fragrantis: folia glauca, late-linearia, acutiuscula.

346. NARCISSUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 550.

1. *N. TAZZETTA.* *Lin. sp. pl. 416*, quoad foliorum descriptionem! (*foliis planis*) — *Ten. fl. nap. 1. p. 163, a.*
 N. glaucescens, scapo multifloro erecto striato tereti vel altero latere nervo elevato notato, foliis obtusis striatis linearibus (subloriformibus) explanato-caniculatis (planiusculis) scapum subaequantibus erectis apice patulis, earum carina inter duas lineas elevatas depressa, nectario (flavo) campanulato truncato integro aut subcrenulato petalis (albis) ovatis vel late ellipticis patentibus (non reflexis) subaequalibus alternis appendiculatis duplo brevioribus.
Ic. nostra t. xv. f. 2. — *Reich. cent. 19. f. 813*, optima quoad flores, sed folia nimis canaliculata — *Lam. ill. gen. t. 229. f. 2*, quoad folia, sed flores pessimi — *N. orientalis, medio croceus, major. Best. ver. ord. 3. fol. 13. f. 2* — *N. flore pleno 11. Clus. hist. 1. p. 16*, quoad folia — *N. medio luteus, Pisanus. Bauh. hist. 2. p. 605*, et forsitan etiam *N. multos ferens flores, medio luteus. Bauh. l. c. p. 603* — *N. latifolius, albicans, medio croceus, ampliori brevi calyce. Barr. ic. 918*, et *N. latifolius albicans, medio croceus, calyce mediocri, praecox. Barr. l. c. ic. 919*, quoad folia bonae, sed flores nimis ampli.
 In apricis herbosis sylvaticis; *Lacco al monte Vico alla Costa ne' margini erbosi delle vigne.*
 Febuario, Martio. ♀

Major et robustior quam sequens, seriusque floret: scapi striati, vix ancipites, et aliquando altero latere tantum nervo elevatori notati!, foliis breviores, vel parum excedentes: folia obtusiora, et latiora (8-10 lin. lata), subtus tenue striata, erecta, et apice tantum patula, non a basi patula, ut in *N. patulo* Loisel., et in *N. neglecto* Ten. ind. scin. *H. bot. neap. an. 1825; p. 6, et an. 1829, p. 8; nec non cat. 1845, p. 88: petala* 4-5 lin. lata, 6 lin. longa, basi invicem incumbentia, patentia; tria exteriora paullo latiora, apiculo brevissimo instructa.

Flores in hoc, et in sequente gratissime odori, refracto-nutantes; pedicellis erectis, spatham superantibus; petalis candidis, stellato-patentibus, et nonnisi florescentia jam peracta reflexis, non vero sub anthesi, ut in *N. neglecto*, et *N. patulo* (confer *Bertol. fl. ital. 4. p. 13, et Ten. l. c.: capsulae* in utrisque oblongae, trigonae, glaucescentes — Synonima ad hanc et sequentem speciem pauca citavi, nam apud auctores saepe species istae simul confusae, et nonnisi plantis vivis sedulo comparatis distinguui possunt, ut in aliis generibus hujus familiae, nec non in *Liliaceis* evenit.

2. *N. CANALICULATUS*. Guss. — *N. Tazzetta*. Boiss. pl. exicc. Hisp. australis, et *Jord. pl. exic. Gall. austr. ex Hyeres.*

N. viridi-glaucescens, scapo multifloro erecto striato ancipiti, foliis late linearibus semicylindrico-canaliculatis scapo brevioribus obtusiusculis strictis apice oblique tortis subtus aequaliter striatis, nectario (flavo) cyathiformi ore subconstricto truncato integerrimo, petalis (albis) ovalibus lanceolatisque patentibus (non reflexis) alternae angustioribus longioribusque mucronulatis apiculatis triplo breviorae.

lc. nostra t. xv. f. 1, a—*N. major, juncifolius. Basl. eist. ver. ord. 3. fol. 4. f. 1, quoad folia* — *N. medio luteus. Dod. pempt. 223, quoad folia bona*—*N. albus, medio croceus, stellatus, parvo calyce, serotinus, romanus. Barr. ic. 957; et N. albus, medio croceus, stellatus, majori calyce, serotinus, romanus. Barr. ic. 958?, quoad folia et flores bonae.*

Ad sepes, et ad margines agrorum, nec non in sylvaticis apricis; *Lacco al monte Vico luogo detto l'Arenella, e ne' margini delle vigne al Cantariello, non che presso alla Torre, Lacco superiore a Ndecalauri, S. Michele salendo da Ischia a Campagnano a dritta nel fondo di Mazzella.*

Decembri, Martio. ☞

Scapi uti folia stricti, istis saepius duplo fere longiores et spiraliter torti: folia apice tantum oblique torta, 3-4 lin. lata, facie interiore non explanato-canaliculata, sed semicylindrico-canaliculata!, subtus aequaliter striata, non ut in praecedente ad carinam sulco latiore inter duos nervos elevatos notata: petala concaviuscula, basi saepe distincta ac fere lanceolata; tria exteriora ovalia, parum breviora, obtusiuscula, 3-4 lin.

lata, 6 lin. longa; tria interiora parum longiora, ac angustiora, ideoque fere ovali-lanceolata, ad apicem obtusiusculum mucronulo uncinato, fere lin. longo instructa; *tubus* triquetrer, pallide virescens, 6-lin. longus petala excedens: *nectarium* non fere campanulatum, ut in precedente, sed cyathiforme (idest ore subconstrictum): *stamina* tria supra medium tubi inserta, intra *nectarium* exerta; tria infra medium tubi, et intra istum inclusa: *stylus* apice albidus, vix exertus, una cum filamentis luteus: *stigmata* triquetra: *capsula* ovalis, triquetra, immatura virescens.

91. AGAVEAE. *Endl.*

347. AGAVE.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 582.

1. A. AMERICANA. *Lin. sp. pl. 461* — *Ten. fl. nap. 1. p. 188, var. a.* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 154.*

1c. A. spinosa, sive Americana. *Cam. hort. med. p. 10, ic. tab. 5.* et A. americana, florens. *Zuing. theatr. p. 790, bonae* — A. folio mucronato. *Lobel. ic. 374.*

Colitur, sed ad sepes nunc spontanea, praecipue a *Pico, alla Starza, al Testaccio, a Barano, a Succellaro, a S. Angelo, Panza, Forio a Citara, Lacco al monte Vico, ed a S. Montano: ec.*

Junio, Julio. ☞

Vulgo *Sempreviva*, et ad sepes conficiendas, nec non foliorum filamentis ad filis parandos utuntur.

Acaulis, caespitosa: *radices* valde soboliferae: *folia* crassa, glauca, dentato-spinosa ac mucronata: *scapi* firmi, crassi, elati, aliquando 4-orgyales; *ramis* patentibus, floriferis pyramidatis: *flores* erecti, luteo-virentes: *capsula* oblonga, majuscula, coriacea.

92. DIOSCOREAE. *Brown.*

348. TAMUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1527.

1. T. COMMUNIS. *Lin. sp. pl. 1458* — *Ten. fl. nap. 5. p. 277.*

1c. *Lam. ill. gen. t. 817* — *Vitis sylvestris, sive Tamus. Dod. pempt. 401*, et *Vitis nigra. Zuing. theatr. p. 291, planta foemina.*

In sylvis, et in fruticetis passim.

Aprili, Majo. ☞

Vulgo *Viticella*, o *Vitarella*; et turiones teneri lixati ac oleo conditi comeduntur.

Glaberrima, scandens: *caules* annotini, *graciles*: *folia* nitide virentia, indivisa, cordata, acuta: *flores* luteolo-virentes; masculi longe racemosi; foeminei breviter pedunculati: *baccæ* globosæ, coccineæ—Occurrit aliquando foliis late cordatis subtrilobis, quæ forma *T. creticam* quodammodo refert.

93. SMILACEAE. Brown.

349. SMILAX.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1528.

1. *S. ASPERA. Lin. sp. pl. 1458 — Ten. fl. nap. 5. p. p. 277.*
lc. Duham. arb. ed. 2. v. 1. t. 53—Zuing. theatr. p. 288, optima—S. aspera, nitido fructu. Clus. hist. 1. p. 112, fig. inferior.
 Ad maceries, et ad rupes in fruticetis.
 Septembri, Octobri. ♀
 Vulgo *Ruscaja*, una cum sequente.
2. *S. MAURITANICA. Desf. atl. 2. p. 367 — Ten. fl. nap. 5. p. 277.*
lc. S. aspera, seu spinosa, latifolia. Bon. t. 61, optima.
 Ad rupes, et in sylvaticis frequens; ad maceries rara.
 Septembri, Octobri. ♀
 In utrisque *fructus* maturi coccinei: *flores* albi, odoratissimi: *folia* coriacea, sempervirentia, sed in hac 2-3-plo latiora, nitidiora, et tota planta minus aculeata, ac altius quam antecedens scandens.

350. RUSCUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1559.

1. *R. ACULEATUS. Lin. sp. pl. 1474 — Ten. fl. nap. 5. p. 77.*
lc. Bull. herb. t. 249 — Ruscus. Besl. eist. ver. ord. 1. fol. 1. f. 1 — R. major. Zuing. theatr. p. 134—Ruscum. Dod. pempt. 744.
 In sylvaticis, et in fruticetis passim; *cavone delle Nocelle, dello Schiaparo, delle Rose, &c.*
 Septembri, Octobri. ♀
 Vulgo *Pugnienti*, et turiones teneri ac cocti in acetariis locum habent.
Fruticulus humilis, caespitosus, sempervirens: *folia* coriacea, ovato-lanceolata, pungentia, glaberrima: *flores* solitarii, subsessiles, faciei superioris foliorum adnati, parvi, purpurei: *baccæ* subsessiles, demum nitide coccineæ, globosæ.

351. ASPARAGUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 573.

1. *A. ACUTIFOLIUS. Lin. sp. pl. 449 — Ten. fl. nap. 3. p. 313 — Bertol. fl. ital. 4. p. 151.*

1c. Sibth. fl. gr. t. 337—Corruda prior. Clus. hist. 2. p. 77—A. sylvestris. Zuing. theatr. p. 671.

b. inarimensis; foliis fere duplo longioribus, floribus cylindraceis, petalis tribus interioribus apice incurvis.

Ad sepes, et in sylvaticis, nec non ai Scogli di S. Anna presso Ischia; var. b. siepi sopra Ischia.

Augusto, Septembri. ♀

Vulgo tota planta appellatur Ruseo, et Sparaci turiones teneri, qui comeduntur.

Caules ramosissimi, plus minus intricati, et elongati ac caespitosi: folia sempervirentia, rigidissima, pungentia, aciformia, brevia, fasciculata: flores parvi, luteoli, axillares, solitarii vel fasciculati, in pedunculis articulatis. — Cl. Ten. var. b. pro distincta specie proponit nomine A. commutati, et forsitan non immerito.

94. LILIACEAE. *Lindl.*

352. TULIPA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 563.

1. *T. OCLUSUS SOLIS. St. Amans soc. de Agric. 1. p. 75—Guss. mem. in act. Soc. Borb. ined.—Ten. syll. app. 5. p. 12—Bertol. fl. ital. 4. p. 87.*

1c. Red. lil. 4. t. 219 — Guss. l. o.

In vineis solo fertilior; vigne di Casamicciola superiore presso al ponte della marina nelle vigne di Mannella, ed in quelle di Casamicciola inferiore presso al Vallone de' Bagni; vigne del Lacco al luogo detto l' Addomada, ed in quelle di Piro.

Martio, Aprili. ♀

Flores coccinei; petalis acutis, infra medium notatis macula atropurpurea angusta-elongata margine lacera in campo flavo; quae in externis apice lacero-multidentata, in internis brevior ac tricuspidata.

333. MUSCARI.

Tourn. inst. p. 347—Desf. atl. 1. p. 308.

1. *M. COMOSUM*. *Mill. dict. n. 2. — Bertol. ital. 4. fl. p. 161 — Leopoldia comosa. Parlat. gior. bot. ital. v. 3. p. 160 — Hyacinthus comosus. Lin. sp. pl. 445 — Ten. fl. nap. 1. p. 187.*

lc. Hyacinthus comosus. Red. lil. t. 231 — Besl. eist. vern. ord. 2. fol. 17. f. 1 — H. comosus, spurius, tertius. Dod. pempt. 218.

b. ramosus; racemo ramoso, floribus ut in a.

In cultis, in vineis, nec non in sylvaticis apricis ubique; var. b. in cultis, a Monte Vetta.

Martio, Aprili. ☞

In var. b. pedunculis lateralibus flores tantum steriles gerunt, ideoque inter speciei typum et var. monstruosam media.

2. *M. NEGLECTUM*. *Guss. in act. Soc. Borb. ined., et in syn. 1. p. 411 — Ten. syll. app. 5. p. 13.*

M. racemo denso brevi cylindraceo, corollis ovali-oblongis demum deorsum imbricatis apice denticulatis, et ob denticulos obtusos reversos per viis, summis (paucis) sterilibus, foliis anguste linearibus (1-2 lin. latis) late canaliculatis erecto-patentibus, demum laxis.

lc. Guss. l. e.

In argillosis inter vineas; vigne di Casamicciola superiore, e del Lacco. Martio, Aprili. ☞

Flores intense atrocoerulei.

334. SCILLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 567.

1. *S. HYACINTHOIDES*. *Lin. syst. veg. 529 — Ten. fl. nap. 1. p. 181 — Bertol. fl. ital. 4. p. 105.*

lc. Bot. mag. t. 440 — Bulbus eriophorus. Clus. hist. 1. p. 172.

Ad sepes in apricis; Casamicciola nelle siepi del Mortito, sed nunc ob locorum culturam satis rara.

Aprili, Majo. ☞

Folia elongata, late linearia, concava, virentia: flores amoene coerulei, in racemo longo stricto raro.

2. *S. MARITIMA*. *Lin. sp. pl. 445 — Ten. fl. nap. 1. p. 186, var. a — Bertol. fl. ital. 4. p. 104 — Urginea maritima. Steinhell in ann. sc. nat. 1834. 1. p. 321.*

lc. Red. lil. t. 116 — S. hispanica. Clus. hist. 1. p. 171.

In apricis mari finitimis non satis obvia; *Casamicciola* in fruticetis presso *Pietra Vona*, et in rupibus del *Mortito*.

Septembri, Octobri. ☞

Bulbi tunicati, albi: *folia* latissima, fere oblonga, sub-canaliculata: *flores* candidi, odori, in racemo stricto demum longissimo.

355. ORNITHOGALUM.

Link Hand. 1. p. 146 — Endl. gen. n. 1132.

1. *O. ARABICUM*. *Lin. sp. pl. 441 — Ten. fl. nap. 1. p. 178 — Bertol. fl. ital. 4. p. 93.*

lc. Red. lil. t. 63 — Clus. hist. 1. p. 186.

Ad murorum supercilium; *Ischia al Castello, Casamicciola superiore.*

Aprili, Junio. ☞

Flores magni, albi, odori: *folia* late-lineararia, canaliculata.

2. *O. UMBELLATUM*. *Lin. sp. pl. 441 — Ten. fl. nap. 1. p. 174 — Bertol. fl. ital. 4. p. 95.*

lc. Jacq. austr. 4. p. 95. t. 343 — Eliocarmos. Reneal. spec. t. 87 —

Bulbus leucanthemus, minor. Dod. pempt. 221.

In cultis, et in vineis, quibus infestum.

Martio, Aprili. ☞

Bulbi basi valde proferi: *folia* anguste-lineararia, non ciliata, exquisite canaliculata, linea alba notata: *flores* corymbosi; *pedunculis* bractea longioribus, patentibus, sed non refractis: *petala* lanceolata, intus candida, extus dorso viridia: *capsula* orecta, oblonga, hexagona.

356. ALLIUM.

Endl. gen. n. 1137.

§ 1. MOLICM. Don.

Rad. bulbosa: *folia* lato-lineararia, plana, omnia radicalia: *scapus* nudus: *stam.* simplicia, imo petalorum inserta.

1. *A. NICOTM*. *Lin. sp. pl. 430 — Bertol. fl. ital. 4. p. 61 — A. magicnm. Ten. fl. nap. 1. p. 156.*

lc. A. speciosum. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 2. p. 12. t. 5 — Moly Theophrasti. Clus. hist. 1. p. 191 — Moly latifolium. Dod. pempt. 685.

b. floribus albidis. *Guss. syn. 1. p. 380.*

In apricis pinguibus inter viucos; *vigna del Lacco superiore presso alla Chiesa, sola var. b.*

Martio, Aprili. ☞

Folia omnia radicalia, glauco-virentia, erecta, late canaliculata, 1 1/2-2 1/2 poll. lata, sesquipedalia, saepe cum folio apice bulbifero interjecto: *spatha* 2-3-partita; laciniis latis, acutis: *umbella* dense-multiflora, convexa: *petala* lanceolata, concava, acuta, albida, ad carinam virentia, incurva, erecto-patula, aut stellate-patentia: *filamenta* basi subconnexa, albida, petala subaequantia: *stylus* brevissimus: *capsula* globoso-ovata, sulcata, fere tricoeca.

Omnes inferius enumeratae *Allii* species vulgo *Aglie selvatico* dicuntur.

2. *A. ROSEUM*. *Lin. sp. pl.* 432 — *Ten. fl. nap. 1.* 158 — *Bertol. fl. ital. 4.* p. 53.

lc. A. majale. Ten. fl. nap. 1. p. 160. t. 29 — Magn. bot. monsp. t. 10.
In cultis, et in vineis; *Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☞

Folia linearia, late canaliculata, viridi-glauescentia: *spatha* 1-valvis, subquadri-fida: *petala* rosea, elliptico-oblonga, obtusa: *stamina* inclusa.

3. *A. CHAMAEMOLY*. *Lin. sp. pl.* 433 — *Ten. fl. nap. 1.* p. 169 — *Bertol. fl. ital. 4.* p. 46.

lc. Cav. ic. 3. p. 4. t. 207. f. 1 — Red. lil. t. 325 — Chamaemoly, an Moly Dioscoridis. Column. ecphr. 1. t. 326.

In apricis herbosis; *Ischia all'Arso, Bagno nella collina del Lago, falde meridionali, e fondo del Cratere del Montagnone, Lacco al monte Vico.*

Decembri, Januario. ☞

Scapus subnullus: *folia* ciliata ac pilosa, terrae adpressa: *flores* parvi, albi.

4. *A. CILIATUM*. *Cyr. pl. rar. neap. fasc. 2.* p. 11 — *Ten. fl. nap. 3.* p. 366.

A. scapo basi folioso, foliis planis late-caniculatis margine ciliatis utrinque spase pilosis, *spatha* 1-valvi, umbella fastigiata!, *petalis* lanceolatis acutis carina coloratis *stamina* duplo superantibus, *stylo-filiformi* demum elongato, *capsulis* emarginatis obverse pyramidatis.

lc. Cyr. l. c. t. 3.

Inter maceries in humentibus; *Casamicciola ne' muri a secco delle vigne sotto al Mortito*; et in herbosis humentibus; *vigne di Casamicciola alla fontina sotto alle Croci.*

Aprili, Majo. ☞

Cum sequente adhuc a nonnullis male confusum, a quo *petalorum* et *capsularum* characteribus egregie differt; ideoque denuo phrases specificas dedi.

5. *A. SUBHIRTUM*. *Lin. sp. pl.* 424 — *Ten. fl. nap. 1.* p. 135 — *Bertol. fl. ital. 4.* p. 47, excl. var. *b.* — *A. ciliatum. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1.* p. 16.

A. scapo basi folioso, foliis planis basi late-caniculatis margine ciliatis subtus pilosis, *spatha* univalvi, umbella multiflora patente!, *petalis* oblongis obtusiusculis concoloribus (carina non coloratis) *stamina* duplo

superantibus, stylo non elongato, capsulis obcordatis profunde emarginatis.

Ic. *Cyr. l. c. t. 6* — *Ten. l. c. t. 137. f. 2* — Moly minus. *Clus. hist. 1. p. 192.*

In vineis humidiusculis, ad macerics, ad muros, ad rupes ubique, praesertim da *Casamicciola a Forio.*

Aprili, Majo. ☞

Cl. *Ten. l. c.* adhuc suspicatur *A. ciliatum* *Cyr.* ab *A. subhirsuto* *Lin.* differre, innixus auctoritate speciminis missi a *Merat*; sed mihi non differre videntur.

6. *A. TRIQUETRUM. Lin. sp. pl. 431* — *Ten. fl. nap. 1. p. 168* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 57.*

Ic. *Red. lil. t. 319* — *A. palustre, trigonum, candido hyacinthino, seu campanulato flore pendulo, linea viridi per medium. Bon. t. 24, optima.*

In humentibus herbosis, ad sepes, ad muros, in sylvaticis solo fertili; nec non in pinguibus umbrosis, ubi (uti *nelle selve di Catreca*) folia ac scapi sesquipediales evadunt.

Martio, Aprili. ☞

Flores candidi, uno latere penduli, ac scapo approximati; petalis oblongo-lanceolatis, acuminatis, carina virentibus, sub anthesi campanulatis, demum conniventibus: stamina petalis breviora: capsula turbinato-globosa: odor alliaceus fortis.

§ 11. SCORODON. Koch.

Rad. bulbosa: scapus inferne, vel ad medium foliis vestitus: folia plana, aut subteretia, profunde canaliculata, non vero fistulosa: stem. simplicia, basi aliquando dentata, imo petalorum inserta.

7. *A. SATIVUM. Lin. sp. pl. 425.*

Ic. *Allium. Dod. pempt. p. 682.*

Colitur.

Majo, Junio. ☞

Vulgo *Aglia*, et passim bulbi ad varia alimenta condienda adhibentur.

8. *A. COPPOLENTI. Tin. cat. hort. Pan. 1827. p. 257, et in Guss. syn. 1. p. 394.*

A. scapo terete inferne folioso, foliis semiteretibus, spatha bivalvi, valva altera elongata subulata umbellam globosam densam excedente, pedunculis tenuibus subdiffusis, staminibus filiformibus petala obtusa (demum albida) subaequantibus, stylo antherisque exertis, capsulis globosis trigonis.

Ic. *A. montanum, Cepae foliis, flore et odore. Bon. t. 25.*

In vineis; *alla sommità della valle di Buceto nelle vigne all' Ovest*, sed rarissimum.

Junio, Julio. \mathcal{Z}

Folia in planta inarimensi 2-3 lin. lata, et *scapi* firmiores, ita ut iconi Bonannianae magis similes. Confer quae de hac specie dixi in *syn. l. c.*
Ab *A. pallenti* penitus diversum, eum quo ideo male associatum a Cl. Bertol. in *fl. ital. 4. p. 38.*

§ III. PORRUM. Tourn.

Rad. bulbosa: *scapi* inferne, vel ad medium foliosi: *petal.* carinato-concava: *stam.* alterna latiora, tricuspidata; cuspe intermedia antherifera, lateralibus setaceis, plerumque tortis.

a. folia plana, sed carinato-canaliculata.

9. A. GASPARRINI. Guss.

A. bulbo composito ex bulbillis semi-ovatis tunica communi involutis basique sobolifero, foliis (angustis) ad carinam marginesque leviusculis, spatha univalvi mucronata, umbella capsulifera multiflora exacte globosa, pedunculis aequaliter elongatis undique radiantibus 1, floribus globoso-ovatis (pallide roseis), petalis oblongo-ellipticis ad carinam marginesque obsolete denticulatis, filamentis infra medium ciliato-denticulatis, cuspidibus lateralibus elongatis, intermedia antherifera breviora vix exserta, capsula perfecta globoso-ovata petala adpressa subaequante.

lc. nostra t. XVI. f. 1, a, b, c, d.

In vineis, interque maceries; *vigne nella discesa della Schiappa di Garofalo sopra Pico* — Cl. Gasparrini primum in Calabria prope Corigliano collegit; et provenit quoque in Sicilia.

Majo, Junio. \mathcal{Z}

Scapi elati, tamen graciles (diametro nempe 1 $\frac{1}{2}$ lin.), teretes, pallide rosei, 2-3-pedales: *folia* quam in tribus sequentibus angustiora: *spatha* mucrone fere 3-pollicari terminata: *umbella* diametro 2-2 $\frac{1}{2}$ pollicari; cujus *pedunculi* graciles, purpurascens, basi crassiores ac bracteolis nonnullis albis suffulti, aequaliter globoso-radiato-patentes, nempe interiores erecti, medii patentes, exteriores deorsum versi; dum in aliis umbella quoque globosa, sed pedunculi omnes supra spatham surrecti, non ut in hac infra ipsam dependentes: *petala* saepe integerrima; tria exteriora perum longiora, acutiora, acuteque carinato-concava, ad carinam intensius colorata, ibique saepius levia, vel obsolete scabriuscula; tria interiora obtusiora, et minus carinato-concava; omnia conniventia, capsulae adpressa, illamque tegentia: *filamenta* albo-scariosa: *antherae*

luteolac : *stylus* albidus : *capsula* tenuissimis punctis impressis notata

10. A. AMPELOPRASUM. *Lin. sp. pl.* 423 — *Ten. fl. nap. 1. p.* 152 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 28.

A. bulbo composito ex bulbillis semi-ovatis tunica communi involutis basi-que sobolifero, foliis angustis ad carinam et margines obsolete serrulato-scabris, spatha univalvi mucronata, umbella capsulifera densa multiflora globosa demum ob pedunculos interiores elongatos ovata, floribus ovatis (purpureis), petalis ovato-ellipticis ad carinam muricato-scabris margine obsolete serrulato-ciliatis, staminibus subexertis, filamentis (albidis) infra medium obsolete ciliatis, capsula perfecta globoso-ovata petalis adpressis aequilonga.

- 1c. *nostra t. xvi. f. 2. c, f, g* — *Red. lil. t.* 585 — *Scorodoprasum latifolium*, spontaneum, italicum, floribus dilute purpureis, odoratis. *Mich. gen. t.* 24. f. 5.

In vineis, et in apricis cultis; *vigne di Bueeto ed in quelle del Carusiello sopra Casamicciola, monte Vetta alle Petrelle, Schiappa di Garofalo sopra Pico, Capomanno alle case di Mazzella, Forio a Monte nuovo presso S. Maria del Monte, sotto al Fasano sopra le selve della Massara, ed alla punta dell'Imperatore.*

Junio, Julio. ☼

Bulbi saepe basi ita proliferi, ut in *Ornithogalo umbellato*; bulbillis non pedunculatis: seapi virentes, 1 1/2-4 pedales, firmi: spatha mucrone 1/2-2-pollicari terminata: umbella diametro 1 1/2-2-pollicari, ejusque peduncali graciles, purpurei, basi bracteolis brevissimis albidis suffulti, sub anthesi fere aequales, inde interiores irregulariter elongati, 8-12 lin. longi; nonnulli vero brevissimi, albi, flores quoque albidos abortivos gerunt: *petala* omnia concava, ad carinam intensius colorata; tria exteriora parum longiora, ac acutiora; tria interiora obtusissima: *filamenta* albedo-scariosa; tria latiora petalis aequilata; tria angustiora infra apicem evidentius ciliata: *stylus* albidus, magis quam in praecedente exsertus: *capsula* nec sulcata, nec angulata, petalis undique tecta.

Uso oeconomico colitur, et tunc ejus folia glauca ut in specie, sed recta non arcuata, ac triplo latiora sunt, et vulgo appellatur *Aglicione*; tamen non semina, sed bulbilli terrae incolae committunt, qui inde tertio culturae anno colliguntur, ac bulbi isti culti, ex 3-6 bulbillis compositi, saepe diametrum 4-pollicarem! acquirunt — Male a Cl. Gay in *ann. sc. nat. ser. 3. v. 8*, et in *Allii spec. mon. p.* 26, pro hujus speciei varietate *A. Porrum* habet, nam *A. Ampeloprusi* bulbi culti in hac insula acerrimi sunt prae illos *A. sativi*, dum mitioris saporis esse debent in *A. Porro* ex ipso Gay. aliisque.

11. A. ALBESCENS. *Guss.*

A. bulbo composito ex bulbillis semi-ovatis tunica communi involutis, bul-

billis alijs rar'is ovatis pedunculatis intra tunicas ascendentibus sobolifero, foliis ad carinam et margines serrulato-scabris, spatba univalvi mucronata, umbella capsulifera densa multiflora globosa demum ob pedunculos interiores subelongatos ovata, floribus ovatis (albido-roseis), petalis oblongo-ellipticis obtusis ad carinam obsolete muricato-scabris margine levibus, staminibus subexertis, filamentis (albidis) glaberrimis, capsula globoso-ovata petalis adpressis subaequilonga.

lc. nulla.

In cultis, et in vineis; *Chianole del Testaccio, vigne di Buceto, e della casa del Carusiello, Schiappe di Garofalo sopra Pico, Lacco al monte Vico, monte Vetta nella vallata sottoposta presso al piano de' Muori, Forio alla punta dell' Imperatore, Panza alla Guardiola di S. Gennaro.*

Junio, Julio. ♀

Habitus praecedentis; sed bulbi non soboliferi, aut subsoboliferi; bulbillis pedunculatis, ut in *A. sphaerocephalo*: scapi 1 1/2-3-pedales; folia parum angustiora: *umbellae* minores: *petala* candida, ad carinam virentia, vel pallide ex albo-rosea, prope basin saepius transverse plicato-incrassata, ac demum fere basi soluta videntur: *filamenta* nec ciliata, nec denticulata; tria latiora petalis parum angustiora: *stylus* petala parum excedens.

12. *A. COMMUTATUM*. Guss.—*A. rotundum*. Guss. *syn. 1. p. 392*, excl. *syn. praeter Jan.*

A. bulbo non sobolifero composito ex bulbillis semi-ovatis tunica communi involutis, foliis ad carinam et margines serrulato-scabris, spatba univalvi longe mucronata, umbella capsulifera densa multiflora globosa, pedunculis demum non elongatis, floribus (lilacinis) ovalibus, petalis ellipticis subaequalibus obtusis ad carinam scabriusculis margine subciliato-serrulatis, staminibus exertis, filamentis infra medium tenue ciliato-serrulatis, capsula perfecta globoso-ovata petala adpressa illam tegentia superante.

lc. nostra f. XVII.

b. gymnocarpum; petalis oblongo-ellipticis undique minute tuberculato-scabris demum angustatis interque se remotis margine serrulato-ciliatis, capsulam maturam non tegentibus!, staminibus tricuspidatis quam petala inde latioribus.

In aridis rupestribus, et saepe in praeruptis collibus; *Ischia ai scogli di S. Anna, Schiappe di Garofalo sopra Pico, costa di S. Pancrazio, e di Succellaro, Forio a Citara nelle rupi, alla Punta dell' Imperatore, ed a Montenuovo presso S. Maria del Monte, non che sopra la selva della Massara, Panza alla Guardiola di S. Gennaro, Lacco al monte Vico al Cantariello e nella costa scendendo a S. Montano;*

in elatis monte *Vetta alle Petrelle* : var. *b. Lacco al monte Vico nelle rigne del Cantariello, Panza alla Guardiola di S. Gennaro, Forio alla Punta dell'Imperatore.*

Junio, Julio. \mathcal{Z}

Scapi firmi, 2-4-pedales: *spatha* mucrone 2-3-pollicari terminata: *umbella* diametro 10-14-lineari: *pedunculi* 5-7 lin. longi, apice parum incrassati, pallide lilacini, aut albido-virentes, omnes surrecti, nunquam dependentes! : *petala* lilacino-rubentia, 2 lin. longa, valde concava, obtusa, ac obtuse carinata, apice demum approximato-conniventia; interiora vix breviora, obtusiora: *filamenta* tricuspidata, petalis aequalata, aut parum angustiora: *stylus* albidus, vix exsertus: *ovarium* virescens, ovato-conicum, sexsulcatum: *capsula* perfecta petala semel excedens, obtusissime trigona, apice parum depressa, levis, sed lineolis notata: *semina* atra, triquetra, levia, varie transverse plicata — Discrepat ab *A. rotundo*, pro quo habui, foliorum ac bulborum notis! — Ab *A. Ampelopraso*, cui magis proximum, pedunculorum caractere, proportione petalorum cum capsula, bulbis non soboliferis!

In var. *b.* bulbi ut in *a.*, sed aliquando bulbilli pedunculati intra tu nicas scorsum prodeunt, ut in praecedente: *scapi* saepe firmiores: *spatha* basi globoso-conica, mucrone sesquipollicari inferne vacuo terminata: *umbella* diametro 1 1/2-2-pollicari: *pedunculi* 5-10 lin. longi, pallide rosei, aut virentes: *fores* globoso-ovati, rosei, demum elliptici albido-virentes: *petala* apice aperta, lin. lata, ideoque capsulas non ut in aliis tegentia, basi soluta, ac inde parum producta (uti *Sedorum* folia), inter se subaequalia: *filamenta* tenue ciliato-serrata, et quae tricuspidata oblonga sunt, ac petalis demum latiora! quod non in var. *a.*: *ovarium* fere ellipticum, obsolete sexsulcatum: *capsula* subglobosa, minutis punctis impressis notata. An species propria?

Species 9, 10, 11, 12 conveniunt inter se; *scapo* stricto, terete, usque ad medium folioso; *foliis* distiche patentibus, apice attenuato-acuminatis, arcuato-recurvis, 3-5 lin. laeis, subtus acute carinatis, *ligula* brevissima truncata ad vaginac apicem instructa: tamen in *A. commutato* ac ejus var. *b.*, nec non in *A. albescente* sunt pallide virentia, latius canaliculata, acutius carinata, latiora (6-9 lin.), magis arcuato-potentia; dum in *A. Ampelopraso*, ac *Gasparrini* sunt glauco-virentia, quia utrinque punctis minutissimis albis conspersa, ad margines et ad carinam obsolete denticulata, minus exquisite carinata, angustiora (3-6 lin. lata), apice saepius oblique flexa: *spatha* caduca, basi scarioso-ovata, concava, apice plus minus longo mucronata; *petalis* omnino conniventibus, sub anthesi apicem parum apertis; *filamentis* indivisis, petala aequantibus; cuspidibus vero lateralibus trium aliorum plus minus exsertis, tortisque, albidis, cuspidem intermediam atheriferam parum excedentibus, aut lou-

ge superantibus, quem characterem variare optime monet cl. *Griseb.* in *spic. fl. Rum.* 2. p. 594 sub *A. Ampelopraso*; antheris luteis; denique odore aleiaceo intenso.

b. folia teretia, aut semiteretia, fistulosa.

13. *A. SPHAEROCEPHALUM.* *Lin. sp. pl.* 426—*Ten. fl. nap. f.* p. 163 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 29, excl. var. *b.*

lc. Red. lil. t. 391 — *Scorodoprasum montanum*, juncifolium, capite rotundo, dilute janthino, floribus paucis. *Mich. gen. p.* 25. t. 24. f. 2.

b. haemanthum; bulbo ovato simplici, bulbillis triquetris longe pedicellatis intra tunicas ascendentibus sobolifero, caule usque ad medium folioso, foliis teretibus superne anguste sulcatis, umbella densa capsulifera globosa demum subconica, spatha 2-3-valvi persistente duplo longiore, petalis (atrosanguineis) pyramidato-conniventibus obtusiusculis leviusculis, aut ad carinam vel undique papilloso-scabridis, antheris exsertis, cuspidibus filamentorum lateralibus intermedium antheriferam non excedentibus.

lc. nulla.

Ad rupes, et in vineis ad maceries: *Casamicciola al Mortito, Lacco al monte Vico; Forio alla Punta dell' Imperatore, ed a S. Maria del Monte, Panza alla Guardiola di S. Gennaro, Punta di S. Angelo, coste di Succellaro, della Scarupata, di S. Panerazio, e del Pignanello, Schiappa di Garofalo sopra Pico, sola var. b.*

Junio, Julio. χ

Bulbi solidi, tunicis albis scariosis inclusi: scapi stricti, graciles, 1-1 1/2 pedales, sat raro in fertilibus 4-pedales evadunt, aliquando pallide rubentes: vaginae foliorum levissimae, nervosae, virentes, demum albiae: folia laete virentia, cito marcescentia, scapo breviora, saepe vario curvata: spatha umbella 2-3-ploque brevior, scariosa, saepius 2-raro 3-valvis; valvis ovatis, concavis, acuminatis: umbella diametro 6-12-lineari, floribus nonnullis abortivis albis sessilibus reliquis intermixtis: flores senesendo pallide ex roseo-albidi evadunt: petala semper arcte conniventia; tria exteriora parum breviora; tria interiora longiora, obtusiora, pallidiora, fere levia: filamenta non ciliata, apice violacea, basi albida; tria tricuspidata longiora, earum cuspidibus lateralibus albidis, varie tortis, raro inclusis, saepius exsertis, intermedia antherifera longiore violacea, uti antherae: stylus quoque violaceus, staminibus longior, duplo petala excedens: ovarium ovato-conicum, apice sexsulcatum: capsula matura globoso-ovata, petalis brevior, minutis punctis impressis notata, subtrigona, ad angulos tenue sulcata — Dum capsula maturat petala videntur basi soluta.

- Differt ab *A. sphaerocephalo* a., floribus intensius coloratis, petalis obtusioribus, magis carinatis, scabrioribus; pro quo characterē *A. scabrifloro* Bais. pug. 5. p. 60 proximum, tamen diversum, antheris exsertis, ovario apice glaberrimo, ec. — An species propria?
14. *A. VINEALE*. Lin. sp. fl. 428 — Ten. fl. nap. 1. p. 166 — Bertol. fl. ital. 4. p. 33.
- 1c. Reich. cent. 5. f. 590 — *Scorodoprasum* campestre, juncifolium, nucleis et floribus dilute purpureis. Mich. gen. t. 24. f. 1.
- b. umbella tota bulbifera. Ten. l. c. var. c — Bertol. l. c. p. 34, var. b.
- 1c. *A. sylvestre*, primum. Fuchs. hist. p. 757.
- b. umbella geminata.
- In apricis herbosis, et etiam in cultis, vel in campis aridis passim sola var. b., *mante Vetta alle Petrelle, Chianole di Duceto nelle vigne, Forio alle fumarole del Bell'oma, ed a S. Maria del Monte, Panza a Campotese, Lacco al mante Vico, fra il Cavone delle Nocelle, ed il Valtaliere alla Molara*; et var. bb., *Forio a S. Maria del Monte*.

Majo, Junio. ☼

Folia praecedentis: *spatha* 1-valvis, decidua, mucrone 2-pollicari terminata — Aliquando in umbella bulbilli longum filamentum apice gerant, quod videtur pistilli rudimentum elongatum.

§ IV. *CODONOPRASUM* Koch.

Rad. bulbosa; *scapi* ad medium foliosi: *stam.* omnia simplicia, supra basim petalorum inserta: *spath.* 2-valvis; valva altera longe mucronata.

15. *A. PALLENS*. Lin. sp. pl. 427 — Ten. fl. nap. 1. p. 164 — Bertol. fl. ital. 4. p. 37, excl. syn. *A. Cappaleri*, in obs. p. 38.
- 1c. Red. lil. t. 272 — *Gethylloides sylvestre*. Column. cephr. 2. p. 6. ic. p. 7.
- In cultis subargillosis, et ad viarum margines; *Chianole del Testaccio, discesa de' Muronti sopra i muri a secco, vigne di Barana presso la via che conduce a Pica, in quella di Casamicciola al Rostinale ed a Montecito, presso al Lacco superiore*.
- Julio, Augusto. ☼
- Spathae* persistentes; valva altera 3-4-pollicari, umbellam nubilem multo superante; *pedunculi* graciles, effusi, irregulariter elongati, fructiferi praesertim erecti: *coralloe* campanulatae: *petala* oblongo-cuneata, obtusissima, ex albedo-sordide virentia, carina intensius colorata: *filamenta* basi parum dilatata, alba, non ciliata, petalis aequalia: *ovarium* oblongum, hexagonum, ad angulos obtusos superne verruculosum: *odore*

alliaceo caret! — Ab *A. paniculato* eximie differt florum colore, petalis obtusissimis, spatha brevior.

§ V. *SCHOENOPRASUM*. Koch.

Rad. bulbosa : *scapi* foliis instructi : *folia* perfecta fistulosa , *teretia* : *spatha* brevis, bivalvis.

16. *A. CEPA*. *Lin. sp. pl.* 451.

lc. *Lam. ill. gen. t.* 242. *f.* 2. — *Cepa*. *Lobel. ic.* 150.

Colitur.

Majo, Junio. ☞

Vulgo *Cepolla*, et duas varietates coluntur:

a. *praecox*; bulbo albo depresso diametro 2 1/2-4-pollicari, tunicis tenuibus, sapore magis acri, sed odore minore. Aprili, Majo colligitur.

Cipolla magnese.

b. *serotina*; bulbo albo depresso magno diametro usque 10-pollicari, tunicis crassis, sapore minus acri, sed odore intensiore. Colligitur Junio, Julio.

Cipolla magnese agostegna.

357. ASPHODELUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 569.

1. *A. RAMOSUS*. *Lin. sp. pl.* 444 — *Ten. fl. nap. t. p.* 183 — *Bertol. fl. ital.* 4. *p.* 120.

lc. *Sibth. fl. gr. t.* 334 — *A. major*, albus. *Desl. east. ord. t. fol.* 9—

A. primus. *Clus. hist. t. p.* 196.

In apricis fertilibus; *Ischia al Castello, monte Veza sul piano, da Serrano a Panza, costa della Serra sopra Forio, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☞

Scapi firmi, angulati, ad medium ramosi: *folia* numerosa, surrecta, viridi-glauescentia, elongata, supra late canaliculata, subtus acute carinata (non plana, uti Koch *syn. ed. 2. p.* 818): *pedunculi* in fructu clavati; inferiores bractea longiores: *flores* albi: *filamenta* ex basi orbiculato-ovata abrupte in apicem attenuata: *capsula* matura obovato-globosa, obsolete angulata.

95. JUNCACEAE. *Brown.*

358. LUZULA.

Dec. fl. fr. 3. p. 158.

1. *L. FORSTERI. Dec. fl. fr. supp. p. 304 — Ten. fl. nap. 3. p. 384 — Bertol. fl. ital. 4. p. 207 — Juncus Forsteri. Smith britt. 3. p. 1595.*

1c. *Dec. pl. Gall. rar. t. 2.*

In fruticetis, in sylvaticis, nec non ad sepes ubique.

Martio, Majo. ♀

Folia mollia, pilosa: capsula trigona, acuta, fusca, sepala acuta margine albida aquans: semina fusca, globoso-ovalia, appendice brevi curva terminata!, et saepe albida ac maculata.

2. *L. ERECTA. Desv. journ. bot. 1. p. 156 — Ten. fl. nap. 5. p. 342 — L. multiflora. Lejeun. fl. de Spa. 1. p. 169 — Koch syn. ed. 2. p. 847.*

1c. *Fl. dan. t. 1692?*

In apricis herbosis sylvarum, et in fruticetis.

Martio, Majo. ♀

Spicae atrofuscae, subglobosae, subumbellatae, sessiles, et exteriores longius pedunculatae; pedunculis semper strictis, non demum subcernuis, ut in *L. campestri*: sepala acuminato-mucronata, capsula subrotunda obtusa sed mucronata longiora: semina ovoidea, fusca, opaca; appendice albida, brevissima — Cl. Bertol. in *fl. ital. 4. p. 215* a *L. campestri* non separat.

359. JUNCUS.

Michel. nov. gen. p. 37 — Dec. fl. fr. 3. p. 162.

Culmi foliosi, ramosi: semina appendiculata.

1. *J. ACUTIFLORUS. Ehrh. Beitr. 6. p. 86 — Ten. fl. nap. 3. p. 381 — J. sylvaticus. Reich. fl. moen. franc. 2. p. 181 — J. articulatus, b. Bertol. fl. ital. 4. p. 198.*

1c. *J. sylvaticus. Host. gr. austr. 3. t. 86.*

In sylvaticis humentibus; monte Vetta alla discesa delle Petrelle, sorgenti dirimpetto al piano de' Muori, cava di Buceto sotto l'Ulicella, cava di Brasomonte, Ischia nell'orto della Mandria.

Majo, Junio. ☒

Folia nodosa : *sepala* acuminato-aristata, interiora longiora ; omnia vero *capsula* acuminato-rostrata breviora.

2. *J. BUFONIUS*. *Lin. sp. pl.* 466 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 383, excl. var. b. ad *J. insularem* spectante — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 191.

lc. *Host. gram. austr.* 3. t. 90 — *Gramen bufonium*, erectum, latifolium. *Barr. ic.* 263. f. 1.

In udis arenosis, vel aqua saepius perfusus; *Bagno presso al Lago, Ischia ai scogli di S. Anna, presso le sorgenti di Funnolillo, fra Aeschia ed il mare sopra Cava oscura.*

Julio, Augusto. ☉

Folia enodia: *flores* solitarii, remoti: *sepala* lanceolato-acuminata, *capsula* obtusa oblonga longiora.

2. *Culmi* simplices, nudi, basi tantum foliorum vaginis tecti: *semina* non appendiculata.

3. *J. ACUTUS*, a. *Lin. sp. pl.* 463 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 378 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 173.

lc. *Host. gr. austr.* 4. t. 97 — *J. pungens*, sive *acutus*, capitulis *Sorghii*. *Moris. hist.* 3. s. 8. t. 10. f. 15.

b. *decompositus*; paniculae magis decompositae pedunculis elongatis, sepalis magis concavis, omnibus acutiusculis, interioribus non emarginatis exteriora subexcedentibus, capsulis ovalibus.

In udis, vel in aridis, sed aqua saepius perfusus; *Ischia ai scogli di S. Anna, ed all' Arso sul mare, Bagno presso al Lago, Casamicciola al monte della Misericordia, Lacco all' acqua del Larito, monte Vetta alle Petrelle, ee.*

Aprili, Majo. ☒

Vulgo *Junco*, una cum sequente.

Folia pungentia, enodia : *panicula* densa, conglobata : *sepala* omnia nitide virentia, vel ex viridi-atra, subcarinata, concava; exteriora ex ovata basi lanceolata; interiora latiora, ovalia, obtusissima, integra aut emarginata in a, ad margines subscariosa: *capsula* aliquando globoso-ovata, apice attenuato-mucronata, nitide brunnea, calycem duplo superans ! — In var. b. *antherae* luteae, *sepala* non excedentes: *stylus* sepalis longior; *stigmatibus* tribus compressis, subplumosis, invicem spiraliter tortis, et una cum illo roseis.

4. *J. MARITIMUS*. *Lam. dict. enc.* 3. p. 264 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 378 — *Bertol. fl. ital.* 4. p. 174, excl. var. b.

lc. *Host. gram. austr.* 3. t. 80 — *J. acutus*, maritimus, anglicus. *Moris, hist.* 3. s. 8. t. 10. f. 14.

In cultis arenosis maritimis; *Ischia nell' orto della Mandria, Bagno alla collina, ed alla marinella del Lago, cava del Carosiello in alto presso di una sorgente molto lontana dal mare!*

Majo, Junio. ♀

Folia praecedentis, sed graciliora, uti *culmi* (qui elatiore*), ac minus punctata: *panicula* erecta, laxa; *pedunculis* irregulariter elongatis: *sepalis* lanceolata; interiora obtusa, exteriora acuta, *capsulam* ellipticam mucronatam aequantia; ideoque in *syn. 1. p. 420* per errorem obtusam dixi.

96. CYPERACEAE. Juss.

360. CYPERUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 93.

1. *C. OLIVANIS*. *Targ. mem. delle Soc. ital. v. 13. p. 338* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 267* — *C. rotundus. Ten. fl. nap. 3. p. 44*, non *Lin.*
lc. Reich. cent. 18. f. 671 — *C. rotundus. Zuing. theatr. p. 355* — *C. rotundus, odoratus, vulgaris. Moris. hist. 3. s. 2. t. 11. f. 1.*

In cultis, in hortis, et in arenosis ubique.

Junio, Septembri. ♀

Vulgo *Dente di cavallo*.

Radices fibrosae, ramosissimae, hinc inde incrassatae in tubera numerosa, globoso-ovalia, subzonata, odora, sed amara, radicante, inter se remota, unde vera pestis agrorum, hortorumque, quos longe lateque infestat: *spicae* brunneae, aliquando sesquipollicares — *Cl. Parlat. in Webb Phyt. canar. vol. 3. pars. 2. sect. 3. p. 363* recte *C. radicosum Fl. Gr.*, et *C. tetrastachyum Fl. atl.* cum hoc associat, sed perperam species istas omnes ad *C. rotundum Lin.* refert. Confer *Bertol. l. c.*, et *syn. 1. p. 45* — Ab hoc nostro quoque non video differre *C. hydra Mich. fl. am. bor. 1. p. 27*, quoad specimina Americae septentrionalis ab amico *Alexander* communicata.

2. *C. AUREUS. Ten. fl. nap. 3. p. 45* (non *R. S. s. veg. 2. p. 201*) — *C. Tenorii. Presl cyp.*, et *gram. sic. p. 14* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 265* — *C. meganorhizus. Delil.*, ex ipso in liter. ad *cl. Ten.*
lc. Ten. l. c. t. 101 — *C. Tenorii. Reich. cent. 3. f. 356, et 18. f. 670.*
b. attenuatus; foliis angustissimis longissimis, spicis oblongis, glumis imbricatis adpressis. *Ten. syll. app. 4. p. 3.*

In arvis arenosis, et ad vaporaria in humentibus; var. *b. alla stufa de' Caeciuli presso Casamicciola (Philippi in Ten. l. c.)*

Junio, Octobri. ♀

Vulgo *Dente di cavallo mascolino*.

Radicis tubera zonis carentia, et fere globosa; non ovalia, et transverse zonata, ut in C. esculento, sed dulcia, non amara, uti per errorem dixi in syn. 1. p. 46, et Parl. in gior. bot. ital. 3. p. 129; tamen non grata gustu, ut in C. esculento, cum quo nonnulli confundunt: culmi triquetri, levissimi, palmares vel pedales: folia laete et nitide virentia, acuminata, recurva, margine scabriuscula, culmo plerumque breviora: involucri foliola 3-5, foliis similia, inaequalia, umbellam simplicem aut compositam laxam saepius superantia: spicarum pedicelli brevissimi, infimi saepe ramosi; omnes bractea triangulari acuminata 2-3 lin. longa suffulti: spicae in radiorum inaequalium apice alternae, remotiusculae, vel in umbellae centro subsessiles, 3-5-lin. longae, lanceolato-lineares, acutae, compressae, 5-17-florae, ex aureo-lutescentes; glumis oblongo-lanceolatis, carinatis, retusis cum mucronulo, obsolete nervosis, apice subpatulis: stigma trifidum: semen albidum, ovale, triquetrum, leve, sed sub forti vitro videtur tuberculatum.

3. *C. POLYSTACTUS. Rotb. gram. p. 39—Ten. fl. nap. 3. p. 42—Bertol. fl. ital. 1. p. 257—C. fascicularis. Desf. atl. 1. p. 44, quod syn. observante Cl. Ten. male a R. S. in syst. veg. 2. p. 170 ad C. globosum All. refertur.*

lc. Rotb. l. c. t. 11. f. 1—Lam. ill. t. 38. f. 2, ex Desf.

b. spicis sessilibus in umbellam hemisphaericam congestis. Willd. sp. pl. ed. Dietr. v. 2. p. 236!

Ad omnia vaporaria naturalia hujus insulae in elatis vel demissis, sed praesertim in herbosis bumentibus a grad. 20 ad gr. 70 cent.; *Fumarole di Pietra Vona, e della stufa del Cacciuto e di Montecito presso Casamicciola, del Rotaro, del Fieo sotto le Falanghe (ped. 1550 circ.), del Fasano, del Fango, del Bell'omo sopra Forio, ed in quelle del vallone delle Petrelle, e del Funnotillo presso la punta di S. Angelo, utraeque varietates.*

Aprili, Octobri. ☼

Laete virens, glaberrimus, caespitosus: culmi 3-quetri, leves, foliis longiores, et pro locorum natura palmares, vel pedales, et ultra: folia recta, vel recurva, acuminata, ad margines et carinam scabriuscula, numerosa, culmum basi vaginantia: involucri folia 3-5, foliis similia, valde inaequalia, umbellam subglobosam densam ac plerumque ex capitulis brevissimis pedunculatis compositam multo superantia: spicae sessiles, lanceolato-lineares, 7-19-florae, nitide virentes; glumis lanceolatis, acute carinatis, obsolete nervosis, breviter submarginato-mucronulatis: stylus bipartitus: semina obovato-cuneata, compressiuscula, levia, glabra.

361. HOLOSCHOENUS.

Link hort. Berol. 1. p. 293.

1. *H. VULGARIS.* *Link l. c. p. 293*, excl. non. syn. — *Scirpus Holoschoenus.* *Lin. sp. pl. 72* — *Ten. fl. nap. 3. p. 40* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 282.*
 1c. *H. Linnaei.* *Reich. cent. 18. f. 739.* — *Juncus maritimus*, capitulis rotundis. *Moris. hist. 3. s. 8. t. 18. f. 17.*
 b. *australis*; culmo brevior, capitulis parvis, Pisum subaequantibus, uno solitario sessili, paucis pedunculatis. *Bertol. l. c.* — *Scirpus romanus*, b. *Lin. sp. pl. 72.*
 1c. *Reich. cent. 18. f. 740.*

In humentibus arenosis, argillosisque, vel in aridis maritimis; *Ischia all' Arso presso al mare sotto alla chiesa del Purgatorio, Bagno presso al Lago, Casamicciola, Lacco*: var. b. *monte Vetta alle Petrelle, sorgenti sopra al piano di Muori, cava di Buceto sotto all' Ulicella, Bagno sopra la collina di S. Alessandro, cc.*

Junio, Augusto. ☞

Culmi teretes, nudi; folia semiteretia, tenue canaliculata; capitula globosa, densa, sessilia vel pedunculata, in umbella laterali, involucri valde elongato suffulta.

362. GALILEA.

Parlat. giorn. bot. ital. 3. p. 135.

Squam. 6-7, subdistichae, imbricatae, 1-2 inferiores majores, vacuae, superiores 3-6 floriferae. *Stam.* 3, filamentis longissimis dilatatis, persistentibus; antheris appendiculatis. *Styl.* longissimus, anceps, apice trifidus, deciduus. *Sem.* compresso-trigonum, hinc planiusculum, hinc convexo-obtusangulum, nudum.

1. *G. MUCRONATA.* *Parlat. l. c. p. 137* — *Schoenus mucronatus.* *Lin. sp. pl. 63* — *Ten. fl. nap. 3. p. 38* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 247.*

1c. *Reich. cent. 18. f. 680* — *Host. gram. austr. 4. t. 70* — *Juncus maritimus.* *Lobel. ic. 87.*

In arenosis maritimis.

Majo, Junio. ☞

Radices in arenis valde repentes; *folia recurva, canaliculata, glaurescentia, uti culmi; capitula densa, globosa, involucri 3-6-phylo patenti elongato suffulta; spiculae vix distichae, multiflorae, lanceolatae, purpureae vel fuscae.*

363. SCHOENUS.

Roem. et Schult. s. veg. 2. p. 1. n. 169.

1. *S. NIGRICANS. Lin. sp. pl. 64 — Ten. fl. nap. 3. p. 38 — Bertol. fl. ital. 1. p. 248.*

lc. Reich. cent. 18. f. 679. — Zannich. hist. p. 183. t. 41.

b. recurvus; culmo tereti nudo, foliis apice varie flexis. Guss. syn. 1. p. 42.

In asperis aridisque submontosis; nelle esterne falde meridionali del cratere del Rotaro dirimpetto la chiesa del Crocefisso, sola var. b.

Aprili, Majo. ☞

Radices firmæ, dense caespitosæ: culmi erecti, teretes, basi foliis vaginati; quæ juncea, rigida, numerosa: capitulum terminale, fere globo-ovatum, nigricans, basi involucri diphylo parum elongato suffultum.

364. HELEOCHARIS.

Brown. pr. 1. p. 80.

1. *II. PALUSTRIS. Brown. l. c. — Bertol. fl. ital. 1. p. 305 — Scirpus palustris. Lin. sp. pl. 70 — Ten. fl. nap. 3. p. 39.*

lc. Reich. cent. 18. f. 704 — Juncus Equiseti capitulis. Bauh. theatr. p. 186.

Ad fossarum margines; ne' margini de' fossi, che raccolgono le acque nelle Chianole del Testaccio; et etiam in hoc unico loco rarus.

Aprili, Majo. ☞

Radix repens: culmi nudi, basi tantum vagina rufescente, uti folia truncata, vestiti, tereti-compressi, saepe caespitosi: spica ovali-oblonga, acutiuscula, terminalis: glumæ acutiusculæ, viridi-carinatae, infima reliquis aequalis, semiamplectens: stigmata duo: semen obovato-compressum, leve, glabrum, fuscum.

365. CAREX.

Michel. gen. p. 33 — Endl. gen. n. 957.

1. *C. GYNOMANE. Bertol. rar. pl. ital. dec. 2. p. 43. an. 1806, et amoen. p. 83 — C. Linkii. Schk. in Willd. sp. pl. 4. p. 223.*

lc. Reich. cent. 18. f. 629 — Schk. Caric. t. 666. f. 118 — C. nemorosa, angustifolia, caule exquisite triangulari, capitulis strigosis, ec. Michel. gen. p. 66. t. 33. f. 2, mala.

In sylvaticis, et ad saepes in siccis aut humentibus ubique.

Aprili, Majo. ☞

Planta laete virens, dense caespitosa; foliis angustis, numerosis; culmis levibus, gracilibus: spiculae androgynae, duae, superae masculae pauci-ac laxiflorae, inferior breviter pedunculata: fructus elliptici, rostrati, rostro integro: bractea spica infima subjecta valde elongata, foliis conformis.

2. *C. VULPINA*. Lin. sp. pl. 1382 — Ten. fl. nap. 5. p. 245.

b. nemorosa; bracteis setaceis spiculas inferiores excedentibus, spiculis minoribus remotiusculis. Koch syn. ed. 2. p. 866 — C. nemorosa. Willd. sp. pl. 4. p. 282.

lc. Reich. cent. 18. f. 563.

In humentibus; *Ischia nell'orto della Mandria.*

Aprili, Majo. ☞

Radix fibrosa: culmus ad angulos scaberrimus: spica decomposita, spiculis superne masculis: fructus ovati, plano-convexi, squarrosi-patentes, in rostro bifido serrulato-scabro attenuati.

3. *C. DIVULSA*. Gaod. ae. Soc. Lin. Land. 2. p. 160 — Ten. fl. nap. 5. p. 245.

lc. Reich. cent. 18. f. 570 — Schk. caric. p. 20. t. Dd., et Ww. f. 81 — *C. nemorosa, fibrosa radice, caule exquisite triangulari, spica longa divulsa, seu interrupta, capitulis solitariis, praesertim ultimo. Michel. gen. p. 69. t. 33. f. 10, et 11.*

Ad saepes, et in sylvaticis elatis aut demissis; *fra Fontana e Calimera, selve delle Falanghe, del Fasana, di Pietra Perciata, de' Frassitelli; Chianale del Testaccio, Panza a S. Gennara, Lacco al manto Vico ed alla Guardiola di Zale.*

Aprili, Majo. ☞

Radix fibrosa: culmus gracilis, superne subriusculis: fructus ovati, plano-convexi, in rostro serrulato-scabro attenuati: spica elongata; spiculis inferioribus remotis, superne masculis, supremis approximatis.

4. *C. PRAECOX*. Jacq. fl. austr. 5. p. 23, non Schreb. — Ten. fl. nap. 5. p. 247.

lc. Reich. cent. 18. f. 634. — Jacq. l. c. t. 446 — Schk. caric. p. 68. t. F. f. 27 — *C. filiformis. Leers. herbar. t. 16. f. 5.*

In apricis herbosis, vel in aridis sylvarum, et in vallibus apertis passim.

Martio, Aprili. ☞

Radix stolonifera: culmi graciles, breves: spicae foemineae paucae (1-3), approximate, infima aliquando pedunculata: fructus in hac specie pubescentes, quod minime in aliis hujus Insulae, obovati, trigoni, breviter rostrati.

5. *C. OLIENSIS*. Jord. obs. 5. p. 211.

C. spica mascula solitaria linearis, foemineis 2-3 oblongo-linearibus erectis remotis, suprema sessili masculae approximata, reliquis longe et

exerte pedunculatis, bracteis foliaceis, stigmatibus tribus, fructibus obovatis triquetris pedicellatis inflatis glabris tenuè nervosis glumam lanceolatam cuspidatam aequantibus breviter rostratis, rostro subcompresso emarginato-denticulato, foliis firmis erectis (non elongatis) nervosis margine carinaeque scabris culmum triquetrum subaequantibus, radice fibrosa caespitosa.

lc. *Jord. l. c. t. 12. f. A. 1-12.*

In apricis sylvarum; *selve di Chiummano, di Catauro, e del Rotaro sopra la Chiesa.*

Aprili, Majo. ☞

Radices nunquam repentes: *folia* cyperacea, rigidiuscula, erecto-patentia, exquisite canaliculato-carinata, 2-3 lin. lata: *spica* mascula terminalis, gracilis, pollicem et ultra longa; foemineae crassiusculae, inferiores saepe longissime pedunculatae: *glumae* in spicis foemineis aliquando obovatae, inmerone longo scabro terminatae, dorso virentes, margine albo-membranaceae: *fructus* virentes: *bractea* superior spicula mascula brevior, reliquae elongatae, foliis similes, margine etiam ac carina scabrae.

Habitus *C. depauperatae*, sed in hac folia longiora: *spicae* foemineae 3-5-florae (in *C. olbiensi* 8-10-florae); *spica* mascula brevior, sed longius pedunculata: *fructus* obtuse trigoni.

6. *C. SERRULATA.* *Biv. man. 4. p. 9* — *Ten. fl. nap. 5. p. 253.*

C. spicis masculis foemineisque subternis, foemineis (saepe apice masculis) cylindraceis erectis, infima pedunculata remotiuscula, bracteis foliaceis non vaginantibus, inferiore culmum subexcedente, stigmatibus tribus, fructibus ellipticis inflatis subtriquetris glabriusculis, gluma acuminata serrata subbrevioribus sed latioribus margine vix ciliato-serratis apice brevissime rostratis, rostro subbidentato levi, foliis glaucis carinatis, radice repente.

lc. Cyperoides, spicis typhoidibus spadiceo coloris, caule triangulo. *Don. t. 153.*

In collibus apricis, et in sylvaticis.

Aprili, Majo. ☞

Folia rigidiuscula, recurva: *glumae* spicarum foeminearum ovaes, mucronatae, ad carinam albidae, ad margines fuscae, fructus subaequantibus: *fructus* virentes!, obsolete nervosi: *spica* infima saepe longe pedunculata. — Cum *C. glauca Scop.* forsitan non immerito hanc associat cl. *Reich.* in *cent. 18. p. 29*, nam ejus iconem *l. c. f. 648* a nostra planta non video differre.

7. *C. DISTANS.* *Lin. sp. pl. 1387* — *Ten. fl. nap. 5. p. 250.*

lc. *Reich. cent. 18. f. 622* — *Coss. et Germ. atl. fl. Paris. t. 35. f. C.*

In humentibus maritimis; *Ischia nell' orto della Mandria, Bagno presso al Lago.*

Majo, Junio. ☞

Radix caespitosa: spicae foemineae ovali-oblongae, infima longe remota, longeque pedunculata: fructus ovati, trigoni, subinflati, in rostro bifido serrulato-scabro attenuati.

8. *C. SYLVATICA*. *Hud. angl. ed. 1. p. 353 — Ten. fl. nap. 5. p. 251 — C. Drymeja. Lin. f. suppl. p. 414.*

lc. Reich. cent. 18. f. 603 — Schk. caric. p. 411. t. Ll. f. 101.

In humbrosis sylvarum; *selve fra il Vataliere, e Chiummano*, sed satis rara.

Majo, Julio. ☞

Radix fibrosa: culmi graciles, elatiusculi: spicae graciles, filiformes; foemineae pollicares et ultra, longe pedunculatae, pendulae: fructus ovales, trigoni, glabri, levissimi, in rostro lineari bifido glabro, attenuati.

97. GRAMINEAE. Juss.

366. AEGYLOPS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1572.

1. *A. OVATA*. *Lin. sp. pl. 1489 — Ten. fl. nap. 5. p. 287 — Bertol. fl. ital. 1. p. 785.*

lc. Reich. cent. 11. f. 1353 — Aegylops II. Matth. comm. 2. p. 547 — Zuing. theatr. p. 352, mala.

In campis aridis, et ad vias passim.

Junio, Julio. ☉

367. PSILURUS.

Trin. fund. agrostr. p. 93.

1. *P. NARDOIDES*. *Trin. l. c. — Bertol. fl. ital. 1. p. 771 — Nardus aristata. Lin. sp. pl. 78 — Ten. fl. nap. 3. p. 48.*

lc. Reich. cent. 11. f. 1332 — Gramen junceum, nodosum, minimum, capillare. Barr. ic. 117. f. 1.

In apricis aridis passim.

Martio, Aprili. ☉

Planta gracilis: folia setacea: spica solitaria, longa, tenuis, varie curvata.

368. ROTBOELLA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1573.

1. R. INCURVATA. *Lin. fl. supp. p. 114—Ten. fl. nap. 3. p. 103—Bertol. fl. ital. 1. p. 764—Aegylops incurvata. Lin. sp. pl. 1490.*

1c. *Cyr. pl. rar. neap. fasc. 1. t. 6. f. A—Lepturus incurvatus. Reich. cent. 11. f. 1333—Gramen loliaceum, maritimum, spicis articulatis. Moris. hist. 3. s. 8. t. 2. f. 8.*

In arenosis maritimis, vel in marnaceis siccis mare finitimis; uti nell'alto della costa della Scarupata, di S. Pancrazio, e del Pignatiello, costa di Chiummano sopra Succellaro, da Soccivo a S. Angelo, ec.

Majo, Junio. ☉

Culmi valde ramosi, ascendentes, vel decumbentes: spicae axillares, et terminales, cylindricae, acutae, incurvatae, saepe approximatae: calyces 2-valves, 4-flori, adpressi.

369. LOLIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 126.

1. L. PERENNE. *Lin. sp. pl. 122—Ten. fl. nap. 3. p. 111, var. a. vulgare—Bertol. fl. ital. 1. p. 757, excl. plur. syn.*

1c. *Host gr. austr. 1. t. 25—Reich. cent. 11. f. 1346—Gramen loliaceum, spica simplici, vulgare. Moris. hist. 3. s. 8. t. 2. f. 2.*

In humentibus, et ad vias passim.

Majo, Junio. ☿

Uti notat Cl. Kock in *syn. ed. 2. p. 956*, folia juniora complicata sunt in hac specie, et convoluta in *L. italico* Al. Brawn—Praeterea valva calycina in hoc leviter 3-5-nervia, ad margines glabra ac anguste scariosa, apice acutiuscula; valvula corollina exterior acuta, 5-nervia: demum spiculae fructiferae anguste lineares, fere teretes, quod non in sequente.

2. L. FESTUCACEUM. *Link H. Ber. 1. p. 277, et 2. p. 175—Reich. fl. germ. 1. p. 17.*

L. radice perenni fasciculis foliorum sterilibus agente, culmo vaginisque levibus, foliis junioribus complicato-canaliculatis (non convolutis), spiculis multifloris lanceolatis valde compresso-dilatatis muticis valvam calycinam exquiste 7-9-nerviis 2-3-plò superantibus, valvula corollina exteriori 3-nervia ac calyce ad margines tenuissime ciliatis.

lc. *Reich. cent. 11. f. 1347.*

b. *ramosum*; spica ramosa, spiculis muticis — L. perenne, c. *ramosum* Guss. *syn. 1. p. 58!*

lc. *Reich. l. c. f. 1348*, optima — Gramen loliaceum, spica longiori, ramosa, supinum. *Bon. t. 3.*

In apricis herbosis passim; var. b. in apricis elatis, *monte Vetta.*

Majo Junio. ☾

Culmi saepe decumbentes: *folia* levia, praecedentis similia: *spiculae* 5-6 lin. longae, fere 2 lin. latae, distichae: *valva* calycina obtusa, margine et apice non scariosa, uti *valvula* corollina exterior, quae etiam exquisite nervosa: *rachis* ad margines ciliato-scabra.

3. L. MULTIFLORUM. *Gaud. fl. helv. 1. p. 354*, a, et b., ex *Bertol. in fl. ital. 1. p. 757* — *Ten. fl. nap. 3. p. 113.*

lc. *Reich. cent. 11. f. 1345.*

Ad agrorum margines, et inter segetes passim.

Aprili, Majo. ☉

Radix fasciculis foliorum sterilibus destituta, quod non in duobus praecedentibus: *spiculae* valde compressae, *valva* calycina triplo longiores, multiflorae; *flosculis* imbricatis, longe aristatis.

4. L. TENUE. *Lin. sp. pl. 122?* — *Guss. syn. 1. p. 59* — L. rigidum. *Gaud. fl. helv. 1. p. 355* — L. strictum. *Prest. cyp., et gram. sic. p. 49!*

L. radice subbienni fasciculis foliorum sterilibus subdestituta, spiculis compressis 5-10-floris obtusis *valvam* calycinam 7-nerviâ subaequantibus longioribusque demum cylindraceis *rachide* arcte adpressis, *flosculis* lanceolatis muticis.

lc. Phoenix. *Dalech. hist. 1. p. 416?*

In herbosis apricis; *Fontana, Calimera, Guardiola del Testaccio, Succellaro, Forio a Citara, colline del Bagno, ec.*

Majo, Junio. ☉

Radix annua, aut raro biennis, et tunc fasciculum foliorum sterile gerit, tamen saepe caespitosa: *culmi* non semper in hac insula simplices ac stricti, sed saepe basi ramosi, et ascendentes: *valva* calycina exterior obtusa ac apice albo-scariosa, obsolete nervosa — Recte cl. *Koch* in *syn. ed. 2. p. 957* refert L. strictum *Prest* ad L. rigidum *Gaud.* — Interim pro specie Linnaeana confer quae dixi in *syn. l. c.*

5. L. MAXIMUM. *Willd. sp. pl. 1. p. 462* — L. temulentum, b. *Bertol. fl. ital. 1. p. 767*, quoad *syn. L. speciosi* Guss.

lc. L. robustum. *Reich. cent. 11. f. 1340* — L. decipiens. *Dum. agr. belg. p. 98. t. 2. f. 8* — *Lolium*. *Matth. comm. 1. p. 372* — *Zuing. theatr. p. 350.*

Inter segetes; *seminati della Valle del Crovone presso all'Arso.*

Aprili, Majo. ☉

Spiculae fructiferae ellipticae vel ovatae, turgidae, non compressae, ut in sequente: culmi firmi, stricti, fere 3-pedales in fertilibus: radix fasciculis foliorum sterilibus destituta, uti in sequentibus.

6. L. TEMULENTUM. *Lin. sp. pl.* 122 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 112 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 760, excl. var. b.

lc. *Reich. cent.* 11. f. 1342, ad 1344 — *Host gram. austr.* 1. t. 26.

Inter segetes; seminati nel fondo del Vataliero, in quello del Crovone, di Catauro, di Chiajano, del Bagno, ec.

Aprili, Majo. ☉

Spiculae compressae, valvam calycinam acutam 5-nerviam subaequantes, aristatae; aristis spicula fere longioribus, ideoque calycem 2-plo excedentes.

7. L. LINICOLA. *Sander in Koch syn. ed.* 2. p. 957 — L. arvense. *Schrad. fl. germ.* 1. p. 399 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 111, et plur. auctor., non *Wither.*

L. radice fasciculis foliorum sterilibus destituta, spiculis compressis oblongis ovatisve valvam calycinam subsuperantibus, flosculis breviter aristatis muticisque fructiferis ellipticis.

lc. L. arvense. *Reich. cent.* 11. f. 1337, et 1338.

Inter segetes rarum; nei seminati fra le vigne sotto la stufa del Caciuto presso Casamicciola.

Aprili, Majo. ☉

Valva in specimenibus inarimensibus spiculam duplo superat, aut aequat: *spiculae* duplo fere praecedentis minores.

370. GAUDINIA.

Paliss. agrost. p. 95.

1. G. FRAGILIS. *Paliss. l. c.* — *Avena fragilis. Lin. sp. pl.* 119 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 98 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 725.

lc. *Reich. cent.* 11. f. 1367 — Gramen loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, minus, medium, sive vulgare, maximum. *Barr. ic.* 905.

Inter segetes; presso la Punta Cavallaro, e la Pietra dell'acqua, satis rara.

Aprili, Majo. ☉

Folia et vaginae pilosae: spica terminalis, anguste linearis, elongata, demum fragilis.

371. HORDEUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 129.

1. *H. LEPORINUM.* *Link symb. fl. gr. p. 133* — *Guss. syn. 2. p. 781* —

H. murinum. Ten. fl. nap. 3. p. 105, quoad plantam neapolitanam.

H. spiculis omnibus aequaliter aristatis, valvis calycinis ciliatis, flosculorum lateralium masculorum (raro neutrorum) setaceis, intermedii pedicellati hermaphroditi lineari-lanceolatis, radice annua.

lc. nulla.

In pascuis, et ad vias uhique.

Martio, Aprili. ☉

Spica quam in H. murino robustior: valvae latiores: flosculus hermaphroditus non sessilis ut in illo, sed plus minus pedicellatus.

2. *H. VULGARE.* *Lin. sp. pl. 125.*

lc. Host gr. austr. 3. t. 34 — *Blackw. herb. t. 423* — *Hordeum. Lobel. ic. 28. f. 2.*

Colitur.

Martio, Aprili. ☉

Vulgo Vuorio.

3. *H. HEXASTICHON.* *Lin. sp. pl. 125.*

lc. Host gr. austr. 3. t. 35 — *H. polystachium, hybernus. Wein. phyt. 3. t. 577. f. c.*

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo Vuorio a sei tagli.

372. SECALE.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 127.

1. *S. CEREALIS.* *Lin. sp. pl. 124.*

lc. Host gram. austr. 3. t. 48 — *Blackw. herb. t. 424* — *Socale. Lob. ic. 28. f. 1.*

Colitur.

Martio, Aprili. ☉

Vulgo Jernano grande; et colitur quoque var. minor, quod vulgo Jernano piccolo dicitur.

373. TRITICUM.

Koch syn. ed. 2. p. 950.

§ 1. CEREALIA. *Spiculae* plus minus ventricoso-turgidae; *valvae* ova-
tae, aut oblongae. Koch l. c.

1. T. AESTIVUM. *Lin. sp. pl. 126—Roem. et Schult. s. veg. 2. p. 761—*
T. vulgare. Vill. delphin. 2. p. 153.

1c. *Host gram. austr. 3. t. 26—T. aristis laxiusculis, spica alba.*
Wein. phyt. 4. t. 981. f. c.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Sequentes varietates in Insula coluntur:

a. glumis glabris aristatis, aristisque albis. *R. S. l. c.*

Vulgo *Grano guarracino*, o *Grano bianco*.

b. glumis glabris aristatis, aristisque rufis. *R. s. l. c.*

Vulgo *Grano russo*.

2. T. HYBERNUM. *Lin. sp. pl. 126—R. et Schult. l. c. p. 763.*

1c. *T. vulgare. Host gram. austr. 3. t. 26, f. 8—T. hybernum. Wein.*
phyt. 4. t. 981. f. a.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Sequentes varietates coluntur:

a. spica mutica.

Vulgo *Carosella*.

b. spica aristata.

Vulgo *Carosella pelosa*, et haec satis raro colitur.

3. T. COMPOSITUM. *Willd. en. H. Berol. p. 133—Roem. et Sch. l. c.*
p. 163.

1c. *Host gram. austr. 3. t. 27—T. rufum, hexastichon. Wein. phyt.*
4. t. 981. f. d.

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Grano di Egitto*.

4. T. TURGIDUM. *Lin. sp. pl. 126—Roem. et Schult. l. c. p. 763.*

1c. *Hall. helv. t. 1—Host gram. austr. 3. t. 28—T. aristis circum-*
vallatum. Wein. phyt. 4. t. 381. f. b. ?

Colitur.

Aprili, Majo. ☉

Vulgo *Grano turco*.

Ab omnibus praecedentibus e longe dignoscitur aristarum et glumarum colore atro-fusco!, habitu robustiore.

5. T. VILLOSUM. *Marsch. fl. cauc. 1. p. 85*—*Bertol. fl. ital. 1. p. 797*—*Secale villosum. Lin. sp. pl. 124*—*Ten. fl. nap. 3. p. 106*.

lc. *Reich. cent. 11. f. 1390*—*Secale villosum. Host gram. austr. 2. p. 35. t. 47*.

In arenosis; *Ischia all' Arso sotto alla Chiesa del Purgatorio, rarum.*

Aprili, Majo. ☉

§ 11. AGROPYRA. *Spiculae non ventricoso-turgidae: valvae lanceolatae, vel lineari-oblongae, apice rectae, nec extrorsum flexae.*
Koch l. c.

6. T. REPENS. *Lin. sp. pl. 128*—*Ten. fl. nap. 3. p. 107*—*Bertol. fl. ital. 1. p. 803*.

lc. *Agropyrum repens. Reich. cent. 11. f. 1384, 1385*—*Schreb. gram. 1. 26. f. 3*.

b. *glaucum*; foliis intenso glaucescentibus.

T. *glaucum. Host gr. austr. 4. t. 10?*

c. *Leersianum*; caule firmo 3-4-pedali et ultra, foliis glaucescentibus profunde striatis, spicis continuis pedalis et ultra, valvis acuminatis carina scabris, valvula exteriori longe aristata. *Guss. syn. 1. p. 67*—*T. repens, c. aristatum. Ten. l. c.*

lc. *Agropyrum repens, Leersianum. Reich. l. c. f. 1388*—*Elymus europaeus. Leers herb. p. 46. t. 12. f. 4*.

Ad sepes tam in elatis, quam in herbosis maritimis; var. b. in maritimis magis frequens; et c. ad sepes in fertilibus.

Majo, Junio. ☾

7. T. GIGANTEUM. *Retz. obs. bot. p. 7*—*Ten. fl. nap. 3. p. 108*—*T. elongatum. Bertol. fl. ital. 1. p. 802, non Schleich.*

lc. *T. elongatum. Host gram. austr. 2. t. 23*.

In arenosis maritimis; *Lacco alla marina di S. Montano.*

Junio, Julio. ☾

Radix fibrosa, non repens, sed caespitosa: culmi firmi, 2-4-pedales: folia glaucescentia, superne exquisite nervosa: spica fero pedalis; spiculis sub anthesi cylindraceis, denuim compressis: planta inter alias robustior.

8. T. JUNCEUM. *Lin. sp. pl. 128*—*Ten. fl. nap. 3. p. 107*—*Bertol. fl. ital. 1. p. 799*.

lc. *Reich. cent. 11. f. 1394*—*Host gr. austr. 3. t. 33*—*T. farctum. Viv. fl. ital. frag. 1. p. 28. t. 26. f. 1*.

b. *vaginis velutinis striatisque. Guss. syn. 1. p. 68.*

In arenosis maritimis; *marina del Bagno presso al Lago, Lacco a S. Montano, Forio a Citara; sed var. b. magis frequens.*

Majo, Junio. ☞

Culmi fareti: *folia* ad basim albida, utrinque glauca, ad margines levissima, supra striata, et ad strias molliter dense sed brevissime velutina, primum plana, demum involuto-juncea, et fere pungentia: *ligula* brevis, truncata, ciliato-dentata: *spiculae* a rachide parum divaricatae: *antherae* luteolae, et *stigmata* albido-penicillata, e medio spiculae emergentia.

9. *T. scirp. um.* *Cass. syn. 1. p. 66* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 801* — *Agropyrum scirpeum. Presl cypr., et gram. sic. p. 49.*

T. spica erecta elongata, spiculis remotis lanceolato-ovalibus 5-7-floris muticis, valvis multinerviis truncatis, valvula exterior obtusa 9-nervia, nervis lateralibus per paria approximatis, foliis omnibus demum involutis, radice subrepente.

lc. nulla.

In arenosis udis maritimis; *Bagno nelle arcne fra il Lago ed il mare, ma presso le sponde di quello*; tamen nunc fere destructum una cum praecedente: et in proximo continenti, *presso Mare Morto.*

Majo, Junio. ☞

Planta undique virens, non glaucescens!: *culmi* fareti, 2-3-pedales, tamen graciles, foliorum vaginis fere ultra medium texti, leves, stricti: *vaginae* cinereo-velutinae, lineatae, suprema elongata: *ligula* brevissima, truncata, biaurita, vel nulla, et ejus loco tunc annulus albidus, villosus, auriculatus, incrassatus ad basim folii: *folia* rectangule patentia, ad margines scabra, subtus dum nervosa ad nervos una cum vaginis glabra, sed scabriuscula, primum plana, demum involuto-juncea, ad basim albida, apice attenuata: *spiculae* immaturae incurvae, ideoque apice a rachide remotae, compressae, acutae: *valvae* obtusae, flosculis duplo breviores: *valvula* exterior obtusa; interior ad flexurae angulos ciliata — lc. *Host gr. austr. 2. t. 22*, nomine *T. juncei*, quae inde ex correctione in *vol. 3. p. 23*, ad *T. intermedium* *Host (T. glaucum Dcaf. spectat)* hanc nostram speciem quodammodo refert.

374. CATAPodium.

Link H. Berol. 1. p. 44.

1. *C. Loliaceum.* *Link l. c.* — *Triticum loliaceum. Smith britt. 1. p. 159* — *Ten. fl. nap. 3. p. 110* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 817.*

lc. *Reich. cent. 11. f. 1372* — *Triticum unilaterale. Vir. fl. ital. fragm. 1. p. 19. t. 23. f. 1.*

In maritimis herbosis secus muros, ad lapides, et ad rudera.

Martio, Majo. ☉

Culmi humiles, caespitiosi, simplices, aut ramosi, saepius ascendentes: *spicae* rigidae, unilaterales, compressae, simplices aut basi ramosae: *spiculae* muticae, parvae, acutae, approximatae, brevissime et crasse pedicellatae, rachide compressa flexuosa rigida hinc concava arte adpressae.

375. BRACHYPODIUM.

Link H. Bertol. 1. p. 58.

1. B. SYLVATICUM. *R. S. s. veg. 2. p. 741* — *Bromus gracilis. Willd. sp. pl. 1. p. 438* — *Ten. fl. nap. 3. p. 91* — *Festuca gracilis. Bertol. fl. ital. 1. p. 644.*
 1c. B. gracile. *Reich. cent. 11. f. 1373* — *Bromus sylvaticus. Host gr. 1. t. 24.*
 b. *glabratum.*
 1c. Gramen bromoides, panicula minus sparsa. *Buxb. cent. 4. p. 32. t. 36?*
 Ad sepes, et in sylvaticis utraeque varietates.
 Majo, Junio. ♀
Radix fibrosa, non repens: *culmi* ad internodia, et genicula inferiora villosi: *folia* flaccida, una cum vaginis pilosa: *spica* disticha, nutans: *spiculae* subsessiles, alternae, pubescentes, aristatae; *aristis* fusculeorum superiorum valvula sua longioribus.
2. B. PINNATUM. *R. S. s. veg. 2. p. 736* — *Bromus pinnatus. Lin. sp. pl. 115* — *Ten. fl. nap. 3. p. 90* — *Festuca pinnata. Bertol. fl. ital. 1. p. p. 646.*
 1c. *Reich. cent. 11. f. 1376* — *Bromus pinnatus. Host gr. austr. 1. t. 22* — Gramen spica Brizae majus. *Bauh. pr. p. 18.*
 In sylvaticis rupestribus rarum; *discesa della Serra, e de' Frassitelli sopra Forio.*
 Majo, Junio. ♀
Radix repens: *culmi* ad genicula inferiora villosi: *folia* rigidiuscula, sparse pilosa vel glabra: *spica* disticha, erecta: *spiculae* subsessiles, alternae, pubescentes, aut glabratae, aristatae; *arista* valvula sua brevior.
3. B. PHOENICOIDES. *Link H. Berol. 1. p. 39* — (non *R. S. s. veg. 2. p. 740*) — *Guss. syn. 1. p. 71* — *Festuca phoenicioides. Bertol. fl. ital. 1. p. 649, excl. plur. syn.* — *Bromus ramosus. Lin. mant. 1. p. 34.*
 B. *spica* erecta, *spiculis* glabris approximatis sub anthesi patentibus aristatis, *aristis* valvula sua brevioribus, foliis planis erecto-patulis distichis cito involuto-subulatis, culmo caespitose basi ac superne ramoso, radice repente.
 1c. *Bromus ramosus. Sibth. fl. gr. t. 84* — Gramen spica Brizae majus, asperum, panicula supra caulem sciatim procumbente. *Bon. t. 137.*

b. bracteolatum; culmo humiliore, basi dense caespitose, foliis infimis abbreviatis approximatis, spicis brevioribus, valvis valvulisque exquisitè nervosis, spicularum inferiorum pedicellis saepius bracteolatis ipatis.

Ad maceriem, et in saxosis apris; sat raro in sylvaticis aridis; nec non *ai scogli di S. Anna presso Ischia*: var. *b. da sotto S. Nicola alla Pietra dell'acqua*.

Majo, Julio. ♀

Vulgo *Paliero*, ac herba virescens aestivis mensibus copiosum pabulum animalibus praebet, et siccata pro ipsis hyeme quoque inservit.

Radix valde repens, etiam intra rupium fissuras, e quibus planta saepe pendit: *culmi* caespitose-ramosi, 1-3-pedales, tamen saepius graciles: *folia* viridi-glauescentia, glabra, 1-2 lin. lata, acuta, superne striata: *spiculae* sessiles.

4. *B. DISTACHYUM*. *R. S. s. veg. 2. p. 741* — *Bromus distachyos*. *Lin. sp. pl. 115* — *Ten. fl. nap. 3. p. 92* — *Festuca distachya*. *Bertol. fl. ital. 1. p. 651*.

a. monostachyum; spicula unica.

Ic. *Festuca monostachya*. *Desf. atl. 1. p. 92. t. 24. f. 2*.

b. genuinum; spiculis 2-5.

Ic. *Bromus distachyos*. *Host gr. austr. 1. t. 20* — *Trochynia distachya*. *Reich. cent. 11. f. 1363* — *Bromus spiculis subbinatis compressis sessilibus*. *Ger. gallopr. p. 98. t. 5. f. 1*.

In vulcanicis aridis, vel in herbosis, ad muros, et in saxosis passim: var. *a.* in collibus arvisque aridissimis.

Aprili, Majo. ♀

Culmi glabri, ad genicula villosi, saepe genu decumbentes: *folia* brevia, plana, striata; pilis longis sparsis tecta; vaginis glabris: *spiculae* sessiles, alternae, erectae, aristatae; *aristis* valva sua longioribus.

376. BROMUS.

Link H. Der. 1. p. 162.

1. *B. MOLLIS*. *Lin. sp. pl. 112* — *Ten. fl. nap. 3. p. 83* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 662*.

Ic. *Host gr. austr. 1. t. 19* — *Reich. cent. 11. f. 1591, et 1592*.

b. nanus. *Ten. l. c.*

Ic. *B. nanus*. *Weigel obs. 8. t. 10. f. 9, ex Koch*.

In herbosis, ad vias, ad muros, et in pascuis: var. *b.* in arvis aridissimis, Aprili, Majo. ☉

Culmi erecti, ad apicem pubescentes: *folia* uti vaginae dense molliterque villosa: *panícula* ovata, erecta, saepius ramosa, deflorata contracta: *spi-*

culae ovato-oblongae, molliter pilosae, raro glabratae; flosculis late ellipticis, fructiferis margine invicem se tegentibus, aristatis; *aristis* valvula sua subaequilongis, semper rectis— Variat spiculis plus minus pubescentibus, vel glabris, pauci-vel multifloris.

2. *B. INTERMEDIUS*. *Guss. pr. 1. p. 114, et syn. 1. p. 75 — Ten. fl. nap. 5. p. 317, et ex ipso B. commutatus, b. nanus l. e. v. 4. in syll. in fol. p. 17 — Bertol. fl. ital. 1. p. 663.*

B. panicula erecta densiflora, pedunculis subsimplicibus, spiculis molliter villosis anguste oblongo-linearibus subcompressis sub 10-floris, flosculis imbricatis, valvula exteriore apice acute bidentata aristata, arista dorsali primum recta demum divaricato-patente illam aequante, foliis vaginisque pubescentibus.

- 1c. Gramen phalaroides, minus, erecta spica, obliquis aristis. *Barr. ic. 24. f. 2.*

In cultis elatis; *ne' seminati fra Fontana e S. Nicola, et in dumetis, presso la Pietra dell'acqua sotto S. Nicola, selve del Fusano cominciando sotto Montenuovo, ai Frassitelli sopra Forio, monte Vetta.*

Aprili, Majo. ☉

- Cl. *Koch in syn. ed. 2. p. 917 ad B. confertum Marsch. hanc speciem refert, et cl. Bertol. in fl. ital. 5. p. 589, ad hanc citat iconem B. conferti Reich. cent. 11. f. 1539, sed in hac icone panicula, spiculae et aristae omnino a nostra planta alienae sunt, et ideo ad B. confertum verum spectare mihi videtur.*

3. *B. MAXIMUS*. *Desf. atl. 1. p. 95 — Ten. fl. nap. 3. p. 88 — B. maximus, b. Bertol. fl. ital. 1. p. 678.*

B. panicula erecta laxiuscula demum contracta, spiculis crassis confertis omnibus breviter pedunculatis 4-6-floris utrinque convexiusculis longe aristatis, aristis rectis valvula exteriore scaberrima apice profunde bifida 2-3-plo longioribus, valvula interiore acuminata, rachide pedunculis foliis vaginisque pubescentibus.

- 1c. *Desf. l. e. t. 26.*

In arenosis maritimis; *Bagno alla marinella, Casamicciola al Castiglione, Forio alla marina di Citara e di Montevergine; sed non satis obvius.*

Aprili, Majo. ☉

Confer sequentem, et quae notavi in *syn. 1. p. 79.*

4. *B. GUSS. NIJ. Parlat. Brom. sic. p. 8 — Guss. syn. 1. p. 79 — B. maximus, a. Bertol. fl. ital. 1. p. 578 — B. maximus, Guss. pr. 1. p. 117, non Desf. — B. sterilis. Ten. fl. nap. 3. p. 87?*

B. panicula laxiuscula subsecunda apice propendente, pedunculis scabriusculis glabris erecto-patulis, inferioribus longioribus subramosis, spiculis utrinque convexiusculis subsexfloris late lanceolatis apice latioribus erectiusculis demum subpropendentibus, aristis validis rectis val-

vula exteriore late lanceolata scaberrima 7-nervia profunde bifida 3-plo longioribus, calycis valva superiore acuminata, foliis vaginisque villosis.

lc. *B. maximus*. Reich. cent. 11. f. 1585, non Desf.

In herbosis arenosis maritimis, et in collibus; *Ischia, Campagnano, Bagno alla foce del Lago, muri a secco delle vigne del Castiglione presso il Bagnitiello, Casamicciola alla Pera superiore, Lacco al monte Vico, da Serrano a Panza, Forio a Citara.*

Aprili, Majo. ☉

In praecedente culmi vix sesquipedales, in hoc usque 4-pedales: panicula erecta: pedunculi brevissimi, uti folia et vaginae pubescentes: spicae superiores inter se approximatae, et axi adpressae, non vero ut in hoc laxae et demum dependentes, ac superne latiores: aristae sub apice valvulae prodeunt.

5. *B. SCABERRIMUS*. Ten. fl. nap. 3. p. 89 — Bertol. fl. ital. 1. p. 676, excl. var. b.

B. panicula laxa subcernua, pedunculis scabris erecto-patulis, inferioribus longioribus subramosis, spicis scabris planissimis late lanceolatis apice latioribus 8-10-floris demum pendulis, flosculis anguste lineari-subulatis, glumis omnibus late scarioso-marginatis, valvula exteriore apice profunde 7-nervia, nervis duobus validioribus margine interque se approximatis, interiore acutiuscula pectinato-ciliata, aristis validis rectis valvula sua 3-4-plo longioribus, foliis vaginisque villosis.

lc. Ten. l. c. t. 105 (sub nomine *B. asperrimi*).

In sylvaticis herbosis, et ad agrorum margines; *Burano, Pico, ed alla Starza, Chianano.*

Aprili, Majo. ☉

Species inter praecedentem et sequentem exacte media; cum illa spiculis latis convenit; sed istae semper compressae ac planissimae, non erassae et utrinque convexiusculae ut in illa; praeterea flosculi remotiores angustioresque: a sequente vero recedit spiculis multo latioribus, flosculis numerosioribus remotioribusque.

6. *B. STERILIS*. Lin. sp. pl. 113 — Bertol. fl. ital. 1. p. 674 — *B. jubatus*. Ten. fl. nap. 3. p. 87.

lc. Host gr. austr. 1. t. 16 — Reich. cent. 11. f. 1585 — *Leers herb. born. p. 37. t. 11. f. 4.* — Ten. l. c. t. 106.

In sylvaticis, ad sepes, ad maceriarum fastigia herbosa passim.

Aprili, Majo. ☉

Spiculae maturae in plantis exsiccatis facillime decidunt, dum in sequente magis persistunt: panicula laxissima, demum apice nutans: ramis elongatis: spiculae compressae, pendulae, superne latiores, demum cylindraceae, et uti tota planta saepius atrorubentes: aristae ex apice valvulae acute bifidae, ipsa 3-4-plo longiores — Specimina *B. sterilis*, quae

nuper ex Anglia accepi ab amico *Alexander* cum hoc nostro ex asse in omnibus conveniunt.

7. *B. MADRITENSIS*. *Lin. sp. pl.* 114 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 85 — *B. scaberrimus*, *b. Bertol. fl. ital.* 1. p. 676.

B. panicula laxiuscula erecta, fructifera contracta apice subnutante, pedunculis inferioribus vix ramosis, spiculis (tenuibus) sub anthesi lineari-lanceolatis superne latioribus pedunculisque glabris, valvula exteriori leviuscula obsolete 7-nervia acuta bipartita, arista recta ipsam subexcedente, valvula interiore acuminata, foliis vaginisque glabriusculis, culmo glabro.

- lc. Host gr. austr.* 1. t. 171 — *Reich. cent.* 11. f. 1584 — *B. sterilis*, erecta panicula, major. *Barr. ic.* 76. f. 1, optima.

In collibus aridis, ad muros, et in cultis herbosis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Pedunculi erecti, vix pollicares, ideoque duplo quam in praecedentibus duobus breviores: *spiculae* angustiores, breviusque aristatae; arista sub apice acute bifido valvulae, non infra ipsius apicem fere ad medium bifidum inserta, uti ex *Koch syn. ed.* 2. p. 950 — *Cl. Bertol. l. c.* hunc a *B. madritensi* vero diversum credit, sed hujus specimina ex Anglia ab ipso amico *Alexander* missa a nostris non differunt — *Cl. Parlat. in Webb phyt. can. v. 3. pars 2. sect. 3. p. 473* *B. scaberrimum Ten.* ab hoc non differre putat, dum sunt species diversissimae! — Praeterea hic monendum ceuseo plantam hujus insulae (non vero Siciliae), quam olim pro *B. fasciculato* habui, nonnisi *B. matritensis* varietatem esse, nam verus *B. fasciculatus* prope Neapolim non provenit.

337. FESTUCA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 119.

1. *F. MYRUS*. *Lin. sp. pl.* 109 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 77 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 636, excl. var. *b.*

lc. Host gr. austr. 2. t. 93 — *Vulpia pseudo-myurus. Reich. cent.* 11. f. 1325 — *Leers herb. born. t. 3. f. 5* — Gramen festuceum, myurum, elatius, spica heteromalla gracili. *Barr. ic.* 99. f. 2, quae a *Bertol.* ad *F. ciliatam* citatur.

b. spiculis leviusculis brevissime setoso-scabris.

In herbosis, in sylvaticis, in collibus apricis, et ad murorum supercilia passim: var. *b. Notaro, Bagno.*

Martio, Aprili. ☉

Panicula secunda, anguste linearis, 5-12-pollicaris et ultra, sub anthesi aequaliter a basi ad apicem semipatens, ante et postea contracta, apice nu-

tans, basi vagina folii superioris inclusa: *spiculae* anguste lineares, vix etiam maturae compressae, et semper teretes; in *σ.* glabrae, sed turberculato-scabrae: *valva* altera calycina 3-plo brevior, nunquam compressa, aristis valvula sua 3-4-plo longioribus scabris — Varietatis *b.* specimina nomine *F. pseudo-myuri* Koch a cl. *Zeyer* accipi.

2. *F. bromoides*. *Smith britt. ed. 2. vol. 1. p. 142*, non *Lin.* — *Guss. syn. 1. p. 85* — *Savi cose bot. p. 51* — *Ten. fl. nap. 3. p. 77. var. b* — *F. myurus, b. Bertol. fl. ital. 1. p. 636*.

F. panicula oblonga secunda laxiuscula vel densa (non elongata) erecta basi folii superioribus vagina non involuta, ramis inferioribus in anthesi patulis ante et postea contractis, spiculis lanccolatis maturis compresso-dilatatis 3-6-floris glabris levibus vel scabriusculis, valvis calycinis utrisque spicula brevioribus concavo-compressis acuminatis, altera duplo longiore trinervia, arista corollinam valvulam exteriorem duplo excedente, foliis radicalibus filiformibus margine utrinque involutis, ligula truncata obsoleta.

- 1c. *Lam. ill. gen. t. 46. f. 4*, medioeris — *Vulpia bromoides. Reich. cent. 11. p. 24. f. 1529* — Gramen bromoides, panicula heteromalla, longioribus aristis donata. *Scheuch. agr. p. 290. t. 6. f. 101* — *G. paniculatum bromoides*, minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *Plukn. phyt. t. 33. f. 10* — Gramen exile, junceum, mollius, festucaeae panicula, radice rufa. *Bar. ic. 100*.

b. ambigua; culmo 2-3-pollicari, paniculae anguste-linearis ramis simplicibus raro ramosis, spiculis paucifloris, valva altera calycina 3-plo brevior — *Ten. l. c. var. a*.

- 1c. *Bromus ambiguus. Cyr. pl. rar. Neap. fasc. 1. p. 10. t. 2*.

In apricis sylvarum; *Ischia all' Arso, Bagno sopra i muri del fondo de' signori Areta presso alla strada che mena a Casamicciola, e nelle selve dello Spennato, Campagnano, Pico, Lacco al monte Vico, punta di Zole; var. b. Bagno*.

Aprili, Majo. ☉

Radix fibrosa, saepe caespitosa: *culmi* solitarii, vel plures, erecti, raro geniculati, et tunc ascendentes, leves, striati, supra medium nudi, ac uti folia glaberrimi; nodis saepe rubentibus: *folia* radicalia numerosa, fasciculata, erecto-patentia, vagina sua longiora, glabra, levia, tenue striata, laete virentia, et ob margines involutos angustissima, 1-3 poll. longa; caulinum superius parum latius, canaliculato-concavum: *vaginae* striatae, versus apicem albo-membranaceo-scariosae, laxiusculae: *ligula* ita brevius, ut fere oblitterata, truncata, ciliato-lacera: *paniculae* 1/2-3-pollicaris rami inferiores magis divisi, reliqui in sterilibus simplices, una cum rachide ciliato-scabri: *spiculae* maturae ob flosculorum remotiorum semper compressae, ac dilatatae apud nos pallide luteolo-virentes, 1-2-lin.

latae, glaberrimae, vel sat raro tenuissime pubescentes: calycis valvae ad carinam scabrae, margine albo-membranaceae; altera 4-nervia, duplo brevior, et duplo angustior, altera major in acumen aristaeformem nunquam producta!, sed tantum acuminata: *valvula* corollina exterior obsolete 5-nervis, versus apicem una cum sua arista plus minus scabra — Pro locorum natura variat; nam in aridissimis 3-4-pollicaris, culmi fere solitarii: *panicula* vix 1½-pollicaris, ramis omnibus simplicibus, et folia sat raro sparse pilosa; in umbris sylvaticis fertilibus, (ad *Rotaro*), culmi usque pedales, folia firmitiora, crassiora: *panicula* 1½-2½-pollicaris, ramis repetito-ramosis, spiculis numerosis approximatis, et etiam in ramis secundis, ita ut *F. ligusticae* habitum referat; *pedunculi* longiores.

De *F. Myuro*, *bromoide*, et *sciuroide*, varii auctores varie sentiunt. Certe *F. myurus* cum hac non confundenda, nec uti ejus varietas habenda, nam utriusque characteres notati constantes sunt, et quamvis saepe simul proveniant, una in alteram non transit — *F. sciuroides* Roth. ac *Gmel* ex specimenibus germanicis non differt a *F. bromoide* Smith nisi *panicula* magis elongata ac depauperata, culmo aliquando elatiore, sed ipsam *F. bromoidem* a nonnullis nomine *F. sciuroidis* habui. Denique quod spectat ad *F. bromoidem* Lin. hujus nuper specimenia misit cl. *Jordan* ex *Lyon*, et ista egregie differunt a *F. bromoide* Smith, habitu robustiore; foliis vaginae brevioribus; spiculis crassioribus, longius aristatis, ac fere illas *F. uniglumis* aemulantibus; sed potissimum *valva* calycina altera in longum acumen aristaeformem producta, id quod cum nota Linneana *calycis valva aristata* optime convenit, ac ad istam bene spectat icon, Gramen paniculatum, bromoides, minus, paniculis aristatis, unam partem spectantibus. *Scheuch. agr. p. 297. t. 6. f. 14* — Tamen cum fere omnes auctores speciem *Smithii* pro *F. bromoide* habeant, sic confusionis vitandi gratia *F. Villemetii*, uti cl. *Savi* proposuit, appellanda videtur, quem confer in *l. c. p. 49, et 53*; nec non alii auctores.

3. *F. CILIATA*. *Dec. fl. fr. 3. p. 55*, non *Pers.* — *Ten. fl. nap. 3. p. 78*, ex parte — *Bertol. fl. ital. 1. p. 639*, exclusa Sicilia a locis natalibus.

F. panicula spicata contracta subsecunda simplici vel ramosa plerumque exerta, spiculis lineari-teretiusculis 5-floris, calycinis valvis acutiusculis spicula brevioribus altera minima, corollina valvula exteriori obsolete 5-nervia ad margines longe ciliata, et basi externe sparse pilosa aristasuam non aequante, foliis radicalibus convolutis lineari-setaceis, culmo gracili simplici ramosoque.

1c. *Savi cose bot. t. 3. f. 2. a, b.* — *Host gram. austr. 4. t. 65* — Gramen festucaceum, myurum, minori spica heteromalla. *Barr. ic. 99. f. 1.* — *G. festucaceum*, myurum, minori spica heteromalla. *Schuch. agr. t. 6. f. 12.*

In aridis apricis; *Ischia all' Arso*, satis rara.

Aprili, Majo. ☉

Culmi in hac insula gracillimi, simplices, solitarii, 3-5-pollicares: *folia* vere setacea, levia, glaberrima: *spicae* plus minus a folii superioris vagina vix spathacea exertae, pollicem longae, simplices, raro ramosae: *spiculae* graciles, adpressae, viridi-rubentes, vix 1/2-lin. latae, flosculis maturis non remotis, ideoque fere teretes: corollina valvula exterior brevius, et laxius ciliata, quam in sequente.

4. *F. GAUDINIANA* — *F. ciliata*. *Guss. syn. 1. p. 84*, excl. syn. praeter *Presl, Reich., Cupan., et Bonn.* — *F. ciliata*. *Ten. fl. nap. 3. p. 78* ex parte — *Bertol. fl. ital. 1. p. 699*, quoad pl. siculam — *F. barbata*. *Gaud. fl. hel. 1. p. 274* ex loco!, non *Schrk.*

F. panicula subspicata subcontracta secunda ramosa (raro simplici) laxiuscula e folii superioris vagina late spathacea subinvoluta, spiculis 7-floris compresso-dilatatis, flosculis laxis, calycinis valvis acutis spicula brevioribus altera minima, corollina valvula exteriore obsolete 5-nervia ad margines longissime denseque ciliata basi externa vel undique pubescenti-pilosa aristam suam non aequante, foliis radicalibus convolutis lineari setaceis, culmo simplici!

lc. *Vulpia myurus*. *Reich. cent. 11. f. 1524?* — Gramen aristatum, cristatum, hauginosum. *Cup. panph. 2. t. 234* — *Bon. t. 37*, optimae!!

In aridis, et in herbosis apricis, ad muros passim.

Aprili, Majo. ☉

Culmi simplicissimi, plures ex eadem radice, 4-10-pollicares, basi aliquando geniculati, nunquam ramosi! ut in *F. ciliata*: *panicula* duplo latior, sed laxior, et secunda, basi vagina late spathacea folii superioris involuta: *spicae* etiam in sicco e luteolo-virentes!, semper compressae; flosculis non confertis, sed laxiusculis longiusque aristatis.

Differt haec a praecedente, fere uti *F. bromoides* a *F. myuro*. In utrisque folia similia; et rachis ac pedunculi brevissime piloso scabri; calycis valvae persistentes, demumque albo-scariosae, uti optime monet. *cl.* *Bertol. l. c.*, quod minime in duabus primis — *F. barbata* *Gaud. l. c.* ex loco natali et characteribus certe ad hanc spectat!, sed ille *cl.* auctor specimina macrissima vidit; et nomen ejus *F. barbatae* mutavi, confusionis vitandi causa.

5. *F. UNGLUMIS*. *Smith britt. 1. p. 118* — *Ten. fl. nap. 3. p. 78* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 634*.

lc. *Vulpia unglumis*. *Reich. cent. 11. f. 1626*, et 1527 — *Hort gram. austr. 4. t. 64*.

In arenosis maritimis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Culmi infracti, aut ascendentes: *folia* convoluta: *panicula* spiciformis, densa

secunda, coarctata: *spiculae* scaberrimae, compressae: *valva* calycina exterior aut oblitterata, aut si adest angustissime linearis, 1-3 $\frac{1}{2}$ lin. longa, scaberrima; interior longe aristata; *valvula* corollina exterior in aristam longam attenuata.

6. *F. EXALTATA*. *Presl fl. sic. p. xiv* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 613* — *F. drymeja. Guss. syn. 1. p. 87*, excl. iconibus, non *Mert.* et *Koch.* — *Poa trinervata Ten. fl. nap. 3. p. 74.*

F. panicula ramosissima diffusa secunda apice nutante, pedunculis scabris sub anthesi patentibus, spiculis ovato-oblongis muticis compressis 3-5-floris, *valva* calycina superiore 3-nervia, nervis supra medium productis, *valvula* corollina exteriore 5-nervia acuta subtilissime punctata, foliis supra glaucescentibus latiusculis (2-4 lin.) planis, radice repente.

lc. nulla.

In sylvis, et ad sepes in umbrosis; *cavone delle Nocelle, selve di Chiummano, e di Campagnana; in quelle della Pera, di Bureto, e di Catreca sopra Casamicciola; in quella delle Falanghe e del Fasano sul Lacco.*

Majo, Junio. ☞

Vulgo *Falasca*.

Habitus Poae: culmi fere orgyales, superne longo tractu nudi, erecti: *folia* ad margines scabra: *panicula* saepe pedalis, lacte virens, spiculis parvis, pendulis. Confer *Bertol. l. c.*

7. *F. ELATION*. *Lin. sp. pl. 111* — *Ten. fl. nap. 3. p. 80* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 616.*

lc. Host gr. austr. 2. t. 79 — *Reich. cent. 11. f. 1568* — Gramen arundinaceum, locustis viridi-spadicis oliaceis, breviter aristatis. *Schuch. agr. 1. 5. f. 18.*

In apricis sylvaticis elatis, aut demissis; *selve delle Falanghe, del Fasano, di Catreca, di Bureto, del Rotara, della cava delle Rose, di Chiummano, di Campagnano, della cava del Larito sul Lacco, di Cavallara presso Fantana.*

Junia, Julio. ☞

Vulgo *Falascane*.

Planta glaberrima: *culmi* leves, elati, erecti: *folia* radicalia, numerosa, plana, striata, scabra; *caulina* pauca: *panicula* ampla, sed laxa ac sparsa, fere pedalis, sub anthesi patens, ramis semiverticillatis, irregulariter elongatis: *spiculae* oblongo-lanceolatae, tereti-compressae, subquadriflorae, breviter aristatae — *Radices* apud nos subrepentes; et inde planta densos caespites format.

378. TRIODIA.

Brown. pr. p. 82.

1. *T. DECUMBENS.* *Paliss. agr. p. 11* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 558* — *Festuca decumbens. Lin. sp. pl. 110* — *Ten. fl. nap. 3. p. 82.*

1c. *Reich. cent. 11. f. 1572* — *Festuca decumbens. Leers herb. t. 7. f. 5.*

In apricis aridis, vel humentiusculis sylvarum; *selve del Bagno, di Casamicciola, del Rotaro, del monte Trippiti, e del monte Vezza.*

Majo, Junio. ♀

Radix non repens: *folia* laete virentia, fere plana, glabra, margine scabriuscula; *caulina* pauca, conduplicata, ascendendo breviora, earum vagina elongata: *ligula* nulla, sed ejus loco pilorum series: *panicula* pauciflora, spicata, brevissima (pollicaris), pedunculis inferioribus pedicello brevi auctis: *spiculae* muticae, paucae, virentes, glaberrimae, 4-5-florae, axi adpressae, basi penicillo pilorum stipatae: *valvae* calycinae flores excedentes, muticae, acutae, obsolete trinerviae: *valvula corollina* exterior concava, sed non carinata, a basi ad medium albo-ciliata, apice breviter 3-dentata.

379. DACTYLIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 117.

1. *D. HISPANICA.* *Roth. cat. bot. 1. p. 8* — *Ten. fl. nap. 3. p. 71.*

1c. *Reich. cent. 11. f. 1621* — *Dum. agr. belg. tent. p. 115. t. 6. f. 24.*

b. *glaucescens*; foliis glaucescentibus acute carinatis, apice obtusiusculus valvulis obsolete 5-nerviis — *D. glaucescens. Willd. en. 1. p. 111.*

In herbosis sylvaticis: var. b, ad rupes maritimas, et ad muros.

Majo, Julio. ♀

Stolones nulli: *folia* glabra, rigidiuscula, inferiora latiora: *vaginae* compressae, ac fere ancipites, striatae, pubescentes, vel glabratae: *ligula* albo-scariosa, brevis, truncato-lacera, in medio acumine fere per lineam producto instructa: *panicula* secunda, densa, sublobata, saepe glomerato-spicata, ac ramis brevibus: *valvae* calycinae, et *valvulae* corollinae (quae acuminatae) pubescentes, ad carinam longe ciliatae, vel glabratae.

- Cl. *Bertol. in fl. ital. 1. p. 588*, alique hanc a *D. glomerata* non distinguunt; sed in hac insula, ac in maritimis totius Regni ista sola forma provenit, et praeterea *D. glomerata* in locis a mare dissitis occurrit. Confer quae notavi in *syn. 1. p. 90.*

*

480. SCLEROCHLOA.

Link H. Berol. 1. p. 149.

1. *S. MARITIMA*. Link H. ber. 2. p. 274 — *Triticum maritimum*. Lin. sp. pl. 128 — Ten. fl. nap. 3. p. 109 — Bertol. fl. ital. 1. p. 814.
 Ic. Reich. cent. 11. f. 1519 — *Triticum maritimum*. Cyr. pl. rar. neap. fasc. 2. p. 2. t. 2 — Gramen loliacea panicula ramosa, maritimum. Scheuch. agr. t. 6. f. 5.

In arenosis maritimis.

Majo, Junio. ☉

Culmi ad genicula fusco-rubentes; articulis inferioribus etiam ita coloratis: folia glaucescentia, canaliculata, demum involuta: spiculae glauco-virentes, divaricatae, compressae; floribus demum deciduis: valvae ad margines albedo-scariosae: valvula exterior prope marginem 2-3-nervia.

2. *S. RIGIDA*. Link H. Ber. 1. p. 150, et 2. p. 273 — *Poa rigida*. Lin. sp. pl. 101 — Ten. fl. nap. 3. p. 76 — Bertol. fl. ital. 1. p. 522.
 a. *muralis*; virens, culmo 4-6-pollicari ascendente fere undique vaginis tecto, spiculis subadpressis. Guss. syn. 1. p. 95, var. b.
 Ic. Reich. cent. 11. f. 1518 — *Poa rigida*. Host gram. austr. 2. t. 74 — Gramen arvense, filicina duriore panicula, gracilius. Barr. ic. 49.
 b. *patens*; virens, culmo erectiusculo, pedunculis leviusculis patentibus — *S. patens*. Presl fl. sic. 1. p. 45 — *S. rigida*, c. Guss. l. e.
 Ic. Gramen hortorum rigidulum, tamariscinis glumis. Bon. t. 90.

In cultis, in muris, interque segetes.

Aprili, Majo. ☉

Glabra, ramosa: culmi basi saepe infracti: folia supra tenue striata, leviuscula: ligula oblonga: panicula rigida, disticha; ramis ramulisque triquetris, brevibus: spiculae lineari-lanceolatae, approximatae, brevissime pedicellatae, 6-12-florae, mucronatae.

481. POA.

Reich. fl. germ. excur. 1. p. 45.

1. *P. BULBOSA*. Lin. sp. pl. 102 — Ten. fl. nap. 3. p. 73 — Bertol. fl. ital. 1. p. 534.
 Ic. Host gram. austr. 2. t. 65 — Reich. cent. 11. f. 1620 — Gramen vernum, radice ascalonica. Vaill. Bot. paris. t. 17. f. 8.
 Ad murorum supercilia, et in pascuis siccis aprieis a montis vertice ad litus.

Aprili, Majo. ☉

Radix fibrosa; *sed culmi caespitiosi, erecti, leves, basi bulbosi: folia brevia, glabra, tenuia: ligula oblonga: panicula erecta, brevis, ovata aut oblonga, densa, sub anthesi patens; ramis scabris: spiculae ovatae, compressae, acutae, 4-5-florae: valvae calycinae ad carinam ciliato-scabrae; flosculis margine et dorso vilio copioso longe protrahendo cohaerentibus.*

2. *P. ANNUA. Lin. sp. pl. 99 — Ten. fl. nap. 3. p. 73 — Bertol. fl. ital. 1 p. 529, var. a.*

1c. *Host gr. austr. 2. t. 64 — Reich. cent. 11. f. 1621 — Leers herbor. t. 6. f. 1. — Gramen pratense, paniculatum, minus. Bauh. theatr. p. 30. ic. p. 31.*

In cultis humentibus, ad vias, et in herbosis.

Martio, Majo. ☉

Glabra, ac virens: *culmi compressi, basi saepe decumbentes, et radicantes: folia mollia; vaginis compressis: ligula superior oblonga: panicula ovata, subsecunda; ramis glabris, levibusque, primo erectis, inde patulis, demum fructiferis deflexis: spiculae oblongae, obtusae, compressae, 3-7-florae; flosculus liberis, ad carinam nervisque pilosis.*

3. *P. TRIVIALIS. Lin. sp. pl. 99 — Ten. fl. nap. 3. p. 73 — Bertol. fl. ital. 1. p. 538.*

1e. *Reich. cent. 11. f. 1634 — P. dubia. Leers herbor. t. 6. f. 57 — Gramen pratense, paniculatum, majus. Bauh. theatr. p. 28.*

In pascuis, ad agrorum at sylvarum margines in herbosis elatis, aut demissis.

Aprili, Majo. ☉

Radices omnino fibrosae: calyces-5-flori: valvulae corollinae 5-nerviae.

4. *P. SYLVICOLA. Guss.*

P. stolonibus tuberoso-nodosis brevibus subrepentibus, culmo vaginisque glabris, vagina suprema scabra folio suo multo longiore, ligula triangulari acutissima integerrima, paniculae patentis ramis scabris, inferioribus semiverticillatis subquinis, spiculis ovatis sub 3-floris glabris, flosculis basi villo paucis brevissimis connexis margine glabris, corollina valvula exteriori 3-nervia, carina usque ad medium ciliata.

1c. *nostra t. XVIII.*

In sylvaticis apricis ubique vulgatissima; nec non prope Neapolim, et Stabias.

Majo, Junio. ☽

Habitus P. pratensis et antecedentis, lacte virens: stolones articulati, et fere moniliformes, albi, squamis saepe tecti, 2-3-pollices longi, vix repentes, et inde radices aliquando fere caespitosae: culmi erecti, aut ascendentes, viridi-lineati; lineis binis approximatis: folia planiuscula,

levia, brevia, subtus carinata: vaginae striatae, scabriusculae: ligula fere lineam longa: calycina valva exterior acula, 3-nervia, glaberrima, ad margines albido-scariosa, praecipue versus apicem: valvula corollina exterior sub lente tenuissime punctata— Notatis characteribus inter *P. triviale* et *pratensem* media, sed ab utrisque diversa.

382. ERAGROSTIS.

Paliss. agr. p. 71.

1. *E. MEGASTACHYA*. Link *H. Berol. 1. p. 188*—*Briza Eragrostis*. Lin. *sp. pl. 103*—*Poa megastachya*. Ten. *fl. nap. 3. p. 75*—*Bertol. fl. ital. 1. p. 554*.

lc. *Reich. cent. 11. f. 1662*—*Gramen eranthemum*, seu *Eragrostis phalaroides*, paniculatum, multiplici ac tenui *Brizae* spica. *Burr. ic. 43*.

In cultis, et ad vias ubique.

Augusto, Septembri. ☉

Culmi ramosi: folia plana, glabra, concinne striata, ad margines tenue tuberculata: vaginae superne pilosae, et loco ligulae pilorum series: panicula oblonga, patens; ramis ramulisque brevibus, ad basim pilosis: spiculae ex cordata basi lanceolatae pauci-vel multiflorae, flosculis ad apicem obtusum emarginatum vix aristatae.

E. poaeoidem in hac insula non vidi, et in hac spiculae lineares.

383. BRIZA.

Paliss. agr. p. 67.

1. *B. VIRENS*. Lin. *sp. pl. 103*—*B. minor*. Ten. *fl. nap. 3. p. 76*, ex loco—*Bertol. fl. ital. 1. p. 561*—*Guss. syn. 1. p. 104*, et fere omnium auctorum florum italicarum.

lc. *Reich. cent. 11. f. 1664*.

In apricis herbosis sylvarum, aut in cultis, interque segetes passim.

Aprili, Majo. ☉

Spicae parvae, virentes, earum diametro transversali longitudinalem superante, ideoque fere transverse oblongae; dum in icone 1663 *Reich. l. c.* spicae triangulari-ovatae, earum diametro longitudinali transversalem superante—Confer quoque quae notavi in *syn. l. c.* et *Bertol.*, qui uti alii plures hanc pro *B. minore* habent. Tandem notandum puto specimina *B. minoris* ex Anglia nostris similia esse, uti ex adverso illa *B. virentis* ex Gallia meridionali cum nostra planta adamussim quadrant.

2. *B. MAXIMA*. *Lin. sp. pl.* 103 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 77 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 565.

1c. *Host gr. austr.* 2. t. 30 — *Reich. cent.* 11. f. 1666 — Gramen tremulum, seu phalaroides, majus, erecta panicula, rufum, et citrinum. *Barr. ic.* 23. f. 1. et 2.

In pascuis apricis, et in herbosis.

Aprili, Majo. ☉

Erecta, glaberrima: *folia* plana, ad margines scabra: *ligula* acuta: *panicula* laxa, apice nutans, secunda, rariflora; ramis subsimplicibus, gracilibus: *spiculae* maximae, pendulae, cordato-oblongae, 13-17-florae.

384. CYNOSURUS.

Pers. syn. 1. p. 86.

1. *C. ECHINATUS*. *Lin. sp. pl.* 105 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 67 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 586.

1c. *Host gr. austr.* 12. t. 35 — *Reich. cent.* 11. f. 1349 — Gramen alopecuroides, spica aspera. *Scheuch. agr.* t. 2. f. 8.

In collibus herbosis, et inter segetes.

Aprili, Majo. ☉

Erectus, glaber: *folia* plana, ad margines ac utrinque scabriuscula: *ligula* oblonga: *panicula* densa, brevis, glomerata, ovata, unilateralis: *spiculae* oblongae: *involucri* valvae alternae, distichae, lanceolato-lineares, albo-scariosae, basi incrassatae, inferiores et corollinae valvae exterior longe aristatae: *calycis* valvae lanceolatae, et uti illae *involucri* scabrae.

C. cristatus *Lin.* in Inarime non occurrit.

385. SETARIA.

Paliss. agr. p. 51.

1. *S. VE-TICILLATA*. *Paliss. l. cr.* — *Panicum verticillatum*. *Lin. sp. pl.* 82 — *Ten. fl. nap.* 3. p. 68 — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 410.

S. racemo spiciformi-pyramidato acuto simplici vel composito, racemulis tunc verticillatis, inferioribus longioribus, involucellis unifloris inaequalibus bisetis, setis denticulato-hispidis, denticulis reversis, valvis flosculi hermaphroditi leviuseculis, culmo erecto.

1c. *Reich. cent.* 11. f. 1465 — *Panicum verticillatum*. *Host gram. austr.* 2. t. 13!

In cultis ubique, praesertim in hortis.

Julio, Octobri. ☉

Vulgo *Zecchetella*.

2. *S. AMBIGUA*. *Guss. syn. 1. p. 114.*

S. racemo spiciformi-pyramidato acuto simplici vel composito, racemulis tunc verticillatis, inferioribus longioribus, involuclis unifloris inaequalibus bisetis, setis denticulato-hispidis, denticulis sursum versis!, valvis flosculi hermaphroditi leviusculis, culmo erecto.

lc. nulla.

Cum praecedente, et eodem tempore floret.

Iterum iterumque speciem hanc sedulo observavi, et characteres etiam cultura constantes in denticulorum cujusque setulae directione vidi! Illic miror quod adhuc nonnulli (*Part. in Webb. phyt. can. v. 3. pars 2. sect. 3. p. 381*) cum praecedente aut sequente conjuxerint, dum in multis graminum speciebus pro aliis characteribus minoris momenti non species tantum, sed etiam et genera constituent!

3. *S. VIRIDIS*. *Paliss. l. e.* — *Panicum viride*. *Lin. sp. pl. 83 — Ten. fl. nap. 3. p. 68 — Bertol. fl. ital. 1. p. 420*, excl. syn. *S. ambiguae*. *Guss.!*

lc. Reich. cent. 11. f. 1467 — Panicum viride. Host gram. austr. 2. t. 14.

In vineis, et in hortis.

Junio, Septembri. ☉

Citius quam duae antecedentes floret; et spicae in hac semper virentes!, ac cylindraceae; in duabus praecedentibus saepius aetate rubescent, et earum forma omnino aliena, quia fere semper pyramidalis.

386. PANICUM.

Endl. gen. n. 770.

1. *P. REPENS*. *Lin. sp. pl. 87 — Ten. fl. nap. 3. p. 69 — Bertol. fl. ital. 1. p. 430.*

lc. Cav. ic. rar. 2. t. 110 — Brot. fl. lusit. 1. t. 6.

In arenosis herbosis; *Bagno presso le foce del Lago.*

Augusto, Septembri. ☿

Glauescens, erectum: radix stolonifera: culmi 1-2-pedales, erecti, saepius simplices, basi nodoso-tuberosi: folia disticha, fere glabra, plana, sed cito convoluta, basim versus ad margines tuberculata, inferiora breviora: vaginæ ad oras praesertim pilosa: panicula erecta, virgata, 3-4-pollicaris, sub anthesi erecto-patens, laxiflora; ramis alternis, divisis: spiculae remotae, sed geminatae, glaberrimae, saepius albidoscariosae: antherae aurantiacae; sed stigmata purpurea.

387. ECHINOCHLOA.

Paliss. agr. p. 53.

1. E. CRUSGAL' I. *Paliss. l. c.*—*Panicum crusgalli*. *Lin. sp. pl. 83—Ten. fl. nap. 3. p. 68—Bertol. fl. ital. 1. p. 423.*

a. spiculis muticis.

- 1c. *Reich. cent. 11. f. 1411* — *Panicum crusgalli*, *Host gr. austr. 2. t. 19.*

b. spiculis aristatis.

1c. *Reich. l. c. f. 1412.*

In cultis humentibus; *Ischia all' Orto della Mandria, Bagno presso al Lago, Casamicciola, Lacco, Forio*, utraque varietates.

Augusto, Septembri. ☉

Culmi subteretes, ramosi, erecti, vel ascendentes; *folia* glabra, ad margines et ad carinam scabra: *vaginae* compressae: *ligula* nulla: *spicae* alternae, basi setis longis stipatae, late lineares, pollicares, et ultra: *spiculae* sparse glomeratae: *valvae* calycinae ad nervos hispidae.

388. DIGITARIA.

Hall. hclv. 2. p. 244—Juss. gen. 29.

1. D. SANGUINALIS. *Scap. carn. cd. 2. v. 1. p. 52—Ten. fl. nap. 3. p. 68—Bertol. fl. ital. 1. p. 414*, excl. var. b. — *Panicum sanguinale*. *Lin. sp. pl. 84.*

D. caule decumbente ad nodos radicante, foliis vaginisque subpilosiss., spicis subquinis digitatis erecto-patulis, rachide ciliato-scabra, spiculis ellipticis, valva calycina majore exquisite 7-multinervia, ad nervos scabra ad margines pubescente.

- 1c. *Reich. cent. 11. f. 1407* — *Panicum sanguinale*. *Host gr. austr. 2. t. 17*—*Ischaemum* Plinii. *Cbus. hist. 2. p. 17.*

In cultis, ad vias, et in hortis ubique.

Augusto, Septembri. ☉

Vulgo *Piede di pulla* (*Bagno*); *Migliarinolo* (a *Pico, Morapano, Barano, e Fario*), una cum sequente.

2. D. GRACILIS. *Guss.*

D. caule erecto vel decumbente ad nodos radicante, spicis gracilibus 2-4, erecto-patulis, rachide levi, spiculis lanceolatis (minutis), valva calycina majore depresso 5-nervia, ad nervos levi ac glabra, ad margines pubescente.

In cultis arenosis, in humentibus ad vaporaris; *alla stufa del Cacciato, e di Montecito presso Casamicciola, fumarole del Fico sotto le Falanghe, in quelle del Fango sopra al Lacco, del Bell'omo sopra Forio*. Septembri, Octobri. ☉

Radix fibrosa: *culmi* teretes, glabri, 1½-1 1/2 pedales, vix ramosi et tunc erecti; vel ramosissimi, et tunc primum prostrati, inde erecti, ad geniculos infimos radices agentes; articulis ascendendo longioribus: *folia* mollia, supra laete virentia, subtus pallida, acuta, plana, saepius vero versus apicem crispato-undulata, vel subcanaliculata, glabra, tamen ad margines sparse pilosa ac tenuissime serrulato-sabra: *vaginae* viridi-striatae, compressae, articula infima omnino vaginantes, patenter pilosae; pilis glandula insertis: *ligula* albida, brevissima, truncata, denticulata: *spicae* digitatae, 2-3, sat raro plures, et tunc in fertilibus approximato-digitatae, virides, demum aliquando rubentes: *rachis* compressa, anguste linearis, dorso plana, saepe nervo dirempta, utrinque ad nervum hinc inde excavata, ad margines levi, vel sub lente tenuissime serrulato-sabra: *glandulae* duae, globosae, rubentes, tenuissime pubescentes inter spicarum basim: *spiculae* imbricatae, ad rachidem adpressae, geminae; altera sessilis, altera pedicello 1 1/2 lin. longo ad angulos scabro suffulta: *calyx* trivalvis; valva exterior ovato-lanceolata, acuta, 5-nervis, ad margines ciliata, brevissima (vix 1/2 lin. longa); altera praecedenti opposita 5-nervia, ad nervos interiores ac inter ipsos glaberrima ac levis, ad margines tenno villosa; interior membranacea, paullo minor, glaberrima, obsolete trinervia; nervis depressis: *stigmata* duo, purpurascens, plumosa, ex apice spiculae emergentia.

Habitus omnino *D. debilis*, quoad tenuitatem spicarum, sed tertiae valvae calycinae praesentia prorsus aliena; pro quo caractere *D. sanguinalis* proxima, sed gracilitate omnium partium, spiculis parvis, et aliis notis indicatis diversa.

389. CYNODON.

Pers. syn. 1. p. 85. n. 159.

1. *C. DACTYLON. Pers. l. c.—Tcn. fl. nap. 3. p. 70—Bertol. fl. ital. 1. p. 412—Panicum Dactylon. Lin. sp. pl. 85.*

lc. Reich. cent. 11. f. 1404—Host gr. avatr. 2. t. 18—Gramen legitimum. Clus. hist. 2. p. 217.

b. villosum, foliis vaginisque piloso-ciliatis.

In cultis, ad vias, nec non in arenosis ubique; var. *b.* in arenosis maritimis; *Forio a Citara.*

Angusto, Octobri. ☼

Vulgo *Gramegna*; et hujus radices pro illis *Triticis repentis* uso medico inserviunt, uti herba aestiva tempestate copiosum pabulum armentis suppeditat.

Radices albae, articulatae, valde repentes, ad nodos squamatae, et ex istis stolones ramosissimi repentes, et *culmos* simplices aut ramosos emittentes: *folia* plana, patentia, saepius glaucescentia, ad margines aculeolata, subtus una cum vaginis in a. sparse pilosa: *ligula* brevissima, truncato-lacera: *spicae* in apice culmi ac ramorum digitatae, 3-7, filiformilineares, facie superiore nudae; *spiculis* unilateralibus, glabris, muticis, approximatis, ovatis, compressis, aliis sessilibus, aliis pedicellatis.

390. PHALARIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 106.

1. *P. PARADOXA*. *Lin. sp. pl. 1665* — *Ten. fl. nap. 1. p. 18* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 345.*

lc. Hist. gr. austr. 2. t. 40 — *Reich. cent. 11. f. 1491* — Gramen phalaroides, lusitanicum. *Moris. hist. 3. s. 8. t. 3. f. 6.*

Inter segetes rara; *fra Fontana, e la Pietra dell'acqua.*

Aprili, Majo. ☉

Culmi erecti, inferne ramosi: *folia* plana, scabra; *vaginis* superioribus ventricosis, inflatis: *panicula* cylindracea, spiciformis, densa: *flor* intermedius in quolibet ramulo hermaphroditus, ejus valvis longo acuminatis dorsoque alatis; laterales neutri, minores, obtusissimi.

391. PHLEUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 109.

1. *P. ARENARIUM*. *Lin. sp. pl. 88* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 360* — Phalaris arenaria. *Ten. fl. nap. 3. p. 60.*

lc. Reich. cent. 11. f. 1482 — Gramen typhinum, maritimum, minus *Plukn. phyt. t. 33. f. 8.*

In arenosis maritimis; *Lacco alla marina di S. Montano (Ten.)*, sed nunc non vidi.

Aprili, Junio. ☉

392. CRYPSIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1710.

1. *C. ACULEATA*. *Ait. H. Kew. ed. 2. v. 1. p. 68* — *Ten. fl. nap. 3. p. 63* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 363.*

1a. *Reich. cent. 11. f. 1469* — *Gramen supinum, aculeatum. Bauh. hist. 2. p. 464.*

In argillosis inundatis maritimis; *Forio alla Marina di Citara presso al diruto Fortino*, ubi quondam artificialis salina.

Julio, Augusto. ☉

Culmi ramosi, diffusi: *folia* brevia, margine scabriuscula; *ligulae* loco pilorum series: *spica* terminalis, sessilis, globoso-ovata, basi a vaginis ampliatis duorum foliorum horizontalium pungentium cincta: *valvae* calycinae ad carinam serrulato-ciliatae.

393. LAGURUS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 123.

1. *L. OVATUS*. *Lin. sp. pl. 119* — *Ten. fl. nap. 3. p. 94* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 728.*

1a. *Host gr. austr. 2. t. 46* — *Reich. cent. 11. f. 1415* — *Gramen alopecurum, molle, spica incana. Barr. ic. 116. f. 1, et 2.*

In campis, et in arenosis maritimis.

Aprili, Majo. ☉

Folia brevia, et una cum vaginis molliter villosa: *ligula* brevis, truncata: *panicula* ovata, aut oblonga, densissima, mollissime sericea: *calycis valvae* angustissime lineares, plumosae: *valvula* corollina exterior calyce brevior, terminata aristis duabus rectis; tertia dorsali, elongata, demum contorta ac refracta.

394. STIPA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 121.

1. *S. TORTILIS*. *Desf. atl. 1. p. 99* — *Ten. fl. nap. 3. p. 95* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 688.*

1a. *Desf. l. c. t. 31. f. 1* — *Spartum spica, et setulis tenuissimis caudam equinam imitantibus. Bocc. mus. t. 97.*

In aridissimis asperis : *discesa dal Testaccio ai Maronti, ed alle coste di Succellaro.*

Aprili, Majo. ☉

Folia anguste linearia, margine scabra, cito convoluta, inferiora angustiora: *ligula* brevissima, truncato-ciliata: *panicula* stricta, anguste spiciformis, vagina folii supremi involuta: *valvae* calycinae acuminato-atenuatae: *valvula* corollina exterior calyce triplo brevior, hirsuta, apice longe aristata; aristas invicem convolutis, superne tamen refractis divaricatisque.

395. PIPTATHERUM.

Paliss. agr. p. 18 — Endl. gen. n. 794.

1. *P. MULTIFLORUM.* *Paliss. l. c. — Roem. et Sch. s. veg. 2. p. 329 —* Urachne multiflora, et U. frutescens. *Link H. Ber. 1. p. 93 — Milium multiflorum. Cav. dem. bot. p. 36 — Ten. fl. nap. 3. p. 51 — Bertol. fl. ital. 1. p. 386 — Agrostis miliacea. Lin. sp. pl. 91.*

1c. *Milium multiflorum. Reich. cent. 11. f. 1459 — Agrostis miliacea. Host gr. austr. 3. t. 45 — Gramen miliaceum, majus, nutante panicula, arundinaceum. Barr. ic. 751.*

In asperis, ad rupes, et ad muros.

Aprili, Septembri. ☿, et basi fere ♀

Culmi basi duri, et fere suffutescentes, numerosi: *folia* plana, ad margines scabra: *ligula* brevis, obtusa, ciliata: *panicula* laxa, patens, demum subcontracta, ramosissima; ramis remote semiverticillatis, inferioribus saepe sterilibus: *spiculae* parvae, aristatae; aristas rectis calycem 2-3-plo superantibus — Confer pro hac specie, et pro *P. frutescenti*, quae notavi in *syn. 1. p. 131, et Bertol. l. c.*

396. GASTRIDIMUM.

Paliss. agr. p. 21 — Endl. gen. n. 811.

1. *G. LENDIGERUM.* *Gaud. agrost. helv. 1. p. 176 — Milium lendigerum. Lin. sp. pl. 91 — Ten. fl. nap. 3. p. 51 — Bertol. fl. ital. 1. p. 390.*

1c. *Reich. cent. 11. f. 1418 — Milium lendigerum. Host gr. austr. 3. t. 24 — Agrostis ventricosa. Cov. H. monsp. p. 11. f. 2, mala.*

In cultis, et in campis apricis.

Aprili, Majo. ☉

Culmi saepius erecti, ac stricti: *folia* ad margines scabra: *ligula* oblonga: *panicula* nitide albida, spiciformis, densa, lanceolata, sub anthesi vix

patens: *spiculae* parvae, aristatae; arista sub apice inserta, calycem parum excedente, demum contorta.

397. POLYPOGON.

Desf. atl. 1. p. 66.

1. *P. MONSPELIENSE. Desf. l. c. — Ten. fl. nap. 3. p. 66 — Bertol. fl. ital. 1. p. 379 — Alopecurus monspeliensis. Lin. sp. pl. 89.*

lc. Reich. cent. 11. f. 1446 — Agrostis panicea. Host gr. austr. 3. t. 46 — Gramen alopecurum, majus, spica virescente divulsa, pilis longioribus. Barr. ic. 115. f. 2.

In udis humentibus; *Bagno alle sponde del Lago, Casamicciola, Lacco, Forio a Citara.*

Aprili, Majo. ☉

Culmi erecti, aut ascendentes: *folia* acuminata, ad margines scabra: *ligula* oblonga, brevis, lacera: *panicula* densa, lobata, oblongo-lanceolata, coarctata, sub anthesi patens, virescens: *spiculae* parvae, appropinquatae: *calycis valvae* puberulo-scabrae, ad margines tenue scariosae denseque ciliatae, ex apice breviter emarginato-bifido aristatae; arista recta, valvam multo excedente.

2. *P. ASCENDENS. Guss. in Bertol. fl. ital. 2. p. 777 — Ten. fl. nap. 5. p. 319.*

P. culmo ascendente ad nodos inferne radieante, panicula ovali-lanceolata composito-lobata densiflora, valvis calycinis oblongo-lanceolatis subretusis arista sublongioribus dorso hispidulis, carina ciliatis margine nudis apice subretusis.

lc. nostra t. XIX. f. 1. a, et b.

In humentibus; *Bagno presso al lago al di là delle case di Buonocore.* Junio, Augusto. ☿

Folia plana, patentia, ad margines et subtus scabra, supremum paniculam subvaginans: *ligula* bilinearis, lacera: *paniculae* rami scabriusculi, sub anthesi erecto-patuli; spiculis in ipsis unilateralibus: *calyces* 1-2-flori; valvis ad carinam virentibus, caeterum albis, acutiusculis aristatis; aristis utriusque valvae istas aequantibus, non altera brevioribus, ut in *P. litorali*; *valvula* levis, et major vix sub apice aristata — Cum *P. monspeliense* nullimodo confundendum, sed *P. litorali* Smith magis affinis, tamen uti notat Cl. Bertol. l. c. in planta *Smithii* racemuli parciales longius pedunculati, inter se remotiores; calyces dorso subnudi, margine longe ciliati, evidenter acute bidentati. Confer *lc. Reich. cent. 17. f. 1117.*

Inter *Juncos* prope Neapolim ai Bagnoli inveni, et inde in loco notato vidi, ubi nunc fere destructum.

308. AGROSTIS.

Endl. gen. n. 810.

1. *A. ALBA*. *Lin. sp. pl.* 93 — *Dec. fl. fr.* 3. p. 22, et *Duby bot. gall.* 509, ex eorum descriptione! — *A. alba, a. Ten. fl. nap.* 3. p. 53 — *Schrad. fl. germ.* 1. p. 209, et *Smith engl. fl.* 1. p. 93? — *A. stolonifera, d. gracilis. Pers. syn.* 1. p. 75?

A. radice repente, caule basi ramoso saepe ad nodos radicante, foliis planis striatis margine scabris, ligula oblonga obtusa, panicula lanceolato-oblonga sub anthesi patente, ante posteaque subcontracta, spiculis ovato-lanceolatis, valvis calycinis patulis subaequalibus enerviis obsoleto carinatis ovali-lanceolatis acutis (non acuminatis margine albido-scariosis) ad carinam una cum pedunculis hispidulo-scabris valvulam corollinam majorem obtusam 3-dentatam fere duplo superantibus.

lc. Leers herbor. p. 21. t. 4. f. 5. (nam valvae muticae, sub anthesi horizontaliter patentes, spiculae albae, demum flavescens in descr.) *A. coarctata. Reich. cent.* 11. f. 143? quoad habitum et calyces — *A. varia. Host gr. austr.* 4. t. 57, *lc. sinistra ex Marsch.*

b. valvis glabris ad carinam elevatam intense virentibus, margine vix scariosis.

In apricis herbosis, et in cultis: var. *a.* *Chianole del Testaccio, al monte Vetta, ed alla salita delle Petrelle, al piano de Muori, al Jetto* : var. *b.* *nella parte bassa della cava di Cerambi.*

Aprili, Majo. 2

Spiculae in hac ob valvarum figuram ovato-lanceolatae, non exacte lanceolatae, uti in sequente: valvae apice non acuminatae, saepius semipatentes — *Synonyma* pauca ad hanc et sequentem citavi, quia species extricatu difficiles, et a plerisque auctoribus in unam confusae.

2. *A. STOLONIFERA*. *Lin. sp. pl.* 93 — *Dec. l. c.* p. 23, et *Duby l. c.* p. 503, ex eorum descriptione. *A. alba, var. b. Ten. fl. nap.* 3. p. 53.

A. radice stolonifera, culmo basi subramoso, foliis planis striatis margine scabris, ligula oblonga obtusa, panicula lanceolato-elongata densiuscula sub anthesi patente antea posteaque contracta, pedunculis hispido-scabris, valvis subaequalibus lanceolatis acuminatis exquisite carinatis (pallide virentibus opacis) ad carinam una cum pedunculis hispido-scabris caeterum glabris valvulam corollinam majorem truncatam tridentatam excedentibus.

400. AMPELODESMOS.

Link *H. Ber.* 1. p. 136.

1. *A. TENAX.* Link l. c. — *Arundo Ampelodesmos.* Cyr. *pl. rar. neap. fasc. 2. p. 30* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 738* — *A. festuroides.* Desf. *atl. 1. p. 168* — *Ten. fl. nap. 3. p. 102.*

lc. *Reich. cent. 17. f. 501*, optima—Cyr. l. c. t. 12—*Calamagrostis nastroides, avenacea panicula.* Barr. ic. 363.

In aridissimis asperis; *pressa la strada che dal Lacco conduce al Carusa sotto Zale* paucos caespites tantum vidi.

Aprili, Majo. ♀

Planta dense caespitosa: culmi farcti, superne nudi; folia intense virentia, tenacia, numerosa, longe attenuata, ad margines scaberrima, apice recurvato-dependentia: panicula secunda, densiuscula, elongata; ramis demum dependentibus.

401. ARUNDO.

Link *H. Ber.* 1. p. 135.

1. *A. DONAX.* Lin. *sp. pl. 120* — *Ten. fl. nap. 3. p. 100* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 732.*

lc. *Reich. cent. 11. f. 1731*—*A. Donax sativa, sive Cypria.* Lob. ic. 51. Ad economicos usus olim culta, nunc spontanea etiam in siccis ad agrorum margines.

Septembri, Octobri. ♀

Vulgo *Canna.*

Culmi fruticosi, firmi, 6-14-pedales: folia glaucescentia, lata, acuminata: panicula oblongo-ovalis, densa: spiculae pallide albidae.

2. *A. PLINIANA.* *Turr. fl. ital. pr. p. 63* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 734*—*A. mauritanica.* Desf. *atl. 1. p. 106* — *A. collina.* *Ten. fl. nap. 3. p. 101.*

A. panicula elongata erecta ramosissima subcontracta, calycibus subtrifloris, floribus barbatis pilis corollam aequantibus calyce brevioribus, valvula corollina exteriori acuminato-aristata, arista calycem subexcedente, foliis late linearibus planis, culmo fruticoso inferne semifarcto.

lc. *Reich. cent. 11. f. 1732* — *Ten. l. c. t. 108* — *Arundo semifarcta Rheni Bononiensis Plinii. Zannon. cum Mant. hist. pl. p. 27. t. 19. f. 2, ex Bertol.*

Ad sepes, ad rupes, et in marnaceis collibus passim.

Augusto, Septembri. ☿

Vulgo *Cannella*.

Radices late repentes: *culmi* erecti, potius graciles, sed 4-6-pedales, superne fistulosi: *folia* late linearia, margine scabra: *ligula* brevissima, truncata: *panicula* 1-2-pedalis; ramis sub anthesi patentibus: *spiculae* numerosae, virentes, aut viridi purpurascetes, saepius 1-2-florae.

402. PHRAGMITES.

Trin. fund. agr. p. 134.

1. P. COMMUNIS. *Trin. l. c.* — Arundo Phragmites. *Lin. sp. pl. 120* — *Ten. fl. nap. 3. p. 101* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 741*.

lc. Reich. cent. 11. f. 1729 — Arundo Phragmites. *Schrad. fl. germ. 1. t. 5. f. 4.*

b. humilis, culmo 1-3-pedali, foliis saepe convulso-pungentibus magis glaucescentibus, panicula contractiore, spiculis virentibus, corollina valvula exteriore pilos excedente, pilis ad omnes paniculae ramificationes copiosioribus longioribusque. *Guss. syn. 1. p. 140.*

In udis arenosis; *Bagna alle spande del Laga*, sola var. *b*, sed nunc fere destructa.

Julio, Augusto. ☿

Radices repentes: *folia* acuminata: *panicula* erecta, ovalis.

403. MELICA.

Lin. sp. pl. ed. Schreb. n. 113.

1. M. CILIATA. *Lin. sp. pl. 97* — *Ten. fl. nap. 3. p. 59*, var. *a*. *panicula* spicata — *Bertol. fl. ital. 1. p. 487*.

lc. Reich. cent. 11. f. 1574, et 1575 — Gramen montanum, Avenae, semine. *Clus. hist. 2. p. 199.*

In sylvaticis rupestribus; *nella via della selva della Nace, in quella che attraversa l'Arso verso S. Michele, discesa dal Fanga a S. Giuseppe, nella strada sotto S. Nicola, Lacca nella salita da S. Mantano a Zallo, ec.*

Majo, Junio. ☿

Culmi erecti: *folia* plana, demum convoluta: *ligula* brevis integra, aut laciniata: *panicula* densa, spiciformis, elongata: *spiculae* fere horizontales, demum albidae, ac longe ciliatae, ob flosculi inferioris fertiliis valvam corollinam exteriorem margine undique pilosam, dorso scabram.

404. KOELERIA.

Pers. syn. 1. p. 97.

1. **K. PHLEOIDES.** *Pers. l. c.* — *Ten. fl. nap. 3. p. 93* — *Festuca cristata.*
Bertol. fl. ital. 1. p. 624 — *Poa cristata. Lin. sp. pl. 111.*

a. valvis calycinis, et valvula corollina exteriore hirsutis. *Guss. syn. 1. p. 144.*

1c. *Lophochloa phleoides. Reich. cent. 11. f. 1581* — *Festuca phleoides. Host gr. austr. 3. t. 21!* — *Festuca phleoides. Desf. atl. 1. p. 93. t. 23.*

b. valvis calycinis, et valvula corollina exteriore glabris, carina scabris.
Guss. l. c.

c. valvis calycinis, et valvula corollina exteriore undique glabris levibusque, ad carinam superne pilosis. *Guss. l. c.*

cc. *tuberculata*; valvulis corollinis inter nervos tuberculatis.

In apricis campis, ad vias, ad murorum supercilia, et in cultis passim: var. cc.
Panza alla Guardiola di S. Gennaro.

Martio, Majo. ☉

Panicula densiflora, cylindracea, saepe lobata, virescens: spiculae parvae, approximatae, aristatae; flore ultimo mutico; aristas mollibus, calycem parum excedentibus.

2. **K. BARRELIERI.** *Ten. syll. p. 39* — *Phalaris Barrelieri. Ten. fl. nap. 3. p. 61.*

K. panicula cylindraco-oblonga, spiculis 1-2-floris, floribus calyce subbrevioribus, valvis calycinis obtusis piloso-hispidis denseque pubescentibus, valvula corollina exteriore mutica vel remote sub apice breviter aristata, arista inclusa, foliis vaginisque pubescentibus, culmis a foliorum vaginis exertis.

1c. K. villosa. *Reich. cent. 11. f. 1667.*

b. culmis a foliorum vaginis tectis.

In arenosis maritimis; *Bagno nelle arene della marinella presso al Lago, Lacco alla marina di S. Montano, Forio a Citara.*

Aprili, Majo. ☉

Valvae calycinae ad margines late albo-scariosae, ad carinam et ad faciem exteriorem pilosae; pilis tuberculo insidentibus: valvula corollina exterior brevissime aristata, ad carinam tantum ciliato-sabra, caeterum levis ac glabra (non tuberculato-sabra); interior apice bifida.

2. **K. VILLOSA.** *Pers. l. c. p. 97* — *Ten. fl. nap. 3. p. 93* — *Avena pubescens. Vahl symb. 3. p. 9?* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 439, excl. plur. syn.*

K. panicula cylindraco-oblonga, spiculis 1-2-floris, floribus calyce subbrevioribus, valvis calycinis piloso-hispidis acutis margine tenui scarioso

sis, valvula corollina exterior sub apice aristata, arista exerta, foliis vaginisque molliter pubescentibus.

lc. nulla.

In arenosis maritimis una cum praecedente provenit.

Aprili, Majo. ☉

Culmi parum exerti: *valvae* calycinae angustae: *valvula* corollina exterior tuberculato-scabra, ad carinam scabriuscula, quod non in praecedente, at paniculae in utrisque pallide ex albido-virentes, 1½-1-pollicares: *ligula* truncata, brevissima, ciliato-lacera.

405. TRisetum.

Endl. gen. n. 863.

Spiculae ovatae, paniculatae, 2-4-florae; floribus 3-5, hermaphroditis, vel summo sterili, distichis, remotiusculis, alternis. *Valvae calycinae* subaequales, carinatae, 1-3-nerviae, floribus breviores. *Valvula corollina* exterior bidentata, vel bisubulata, supra medium dorsi aristata; arista tortili. *Ovar.* apice glabrum.

1. *T. MICHELII* — Bromus Michelii. *Savi eose bot. p. 40* — Festuca Michelii. *Kunt. en. 1. p. 397* — Bertol. *fl. ital. 1. p. 629* — Koeleria macilentata. *Dec. fl. fr. 5. p. 270* — Ten. *fl. nap. 5. p. 318* — Avena puberula. *Guss. pl. rar. p. 55.*

lc. *Savi l. c. t. 5. f. 1, et l. 9. f. a. b.* — *Guss. l. c. t. 10. f. 2.*

In apricis asperis; *Ischia all' Arso, e ne' scogli di S. Anna, colline del Bagno, Casamicciola al Mortito, Lacco al monte Vico.*

Aprili, Majo. ☉

Culmi graciles, stricti, saepe caespitosi, 3-8-pollicares: *folia* anguste linearia, pubescentia, uti *vaginae* quae striatae: *stipula* brevis, lacero-dentata: *panicula* stricta, contracta, spicaeformis: *spiculae* sub 3-florae: *valva calycina* altera triplo longior: *valvula corollina* exterior carinato-caniculata, ad carinam scabra, apice bifida; laevius angustis, acuminatis, sub apice aristata; arista reeta, setiformi.

2. *T. NEGLECTUM*. *Roem. et Schult. s. veg. 2. p. 660* — Ten. *fl. nap. 3. p. 99* — Avena neglecta. *Savi fl. pis. 1. p. 132* — Bertol. *fl. ital. 1. p. 719* — A. panicea. *Lam. ill. gen. n. 1117.*

lc. *Reich. cent. 11. f. 1687* — *Savi l. c. t. 4.*

In asperis apricis, et ad vias secus muros in herbosis; *Ischia all' Arso, Bagno nella collina di S. Pietro, Forio alla marina di Montevergine.*

Aprili, Majo. ☉

Culmi simplices, aut ramosi, basi saepe infracti, in hae insula 3-6-pollicares: *folia* ac *vaginae* pubescentes: *ligula* brevis, truncata, lacero-den-

tata : *panicula* densa , oblongo-cylindracea , sublobata , pallide virens (nunquam aurea) , ante et post anthesim cuarctata , sub anthesi erecto-pateus : *spiculae* 4-6-florae : *calycis valvae* acutae , 3-nerviae , ad carinam scabrae : *valvula corollinae* exterior albo-scariosa , breviter bicuspidata , supra medium dorsi aristata ; arista gracili , recta , subtorta — *T. condensato* affinis ; a quo foliis vaginisque pubescentibus , panicularum forma oblongo-cylindracea , spiculis pallide virentibus , et florum numero in qualibet spicula egregie recedit.

406. AVENA

Endl. gen. n. 864.

Spiculae oblongae , laxe paniculatae (saepius pendulae) , 3-multiflorae ; floribus alternis , remotiusculis , hermaphroditis , summo saepe sterili. *Valvae calycinae* 3-multierviae , muticae , subaequales , concavae , flores superantes. *Valvula corollina* exterior apice bifido-bicuspidata , supra basin aristata ; arista geniculata , inferne torta. *Ovar.* apice hirsutum.

1. *A. ATHERANTHA. Presl cyp. et gram. sic. p. 30—Ten. syll. p. 51—Guss. syn. 2. p. 787, et A. hirsuta. Guss. syn. 1. p. 155, non Roth.*

A. panicula secunda effusa , ramis infimis subdivisis , spiculis sub 3-floris , floribus omnibus aristatis calyce aequalibus , valvula corollina exteriore infra medium axeque hirsuta apice bifida , laciniis setiformibus elongatis , aristas valvula sua 2-3-plo longioribus.

lc. nulla.

In campis aridis , ad agrorum margines , et supra muros ac maceries ubique.

Aprili , Majo. ☉

Culmi erecti , simplices , 1/2-3-pedales : *folia* glabriuscula , ad margines scabra : *vaginae* tenne striatae , pubescentes : *ligula* acuta , vel truncato-lacera : *panicula* laxa , apice nutans ; ramis praesertim inferioribus sub anthesi rectangule patentibus : *spiculae* dependentes , raro triflorae : *valvae calycinae* scariosae , acuminatae , 7-nerviae , non 9-nerviae , ut in *A. hirsuta* Roth (*Koch syn. ed. 2. p. 918*) ; nervis virentibus , linea albida in medio notatis : *valvulae corollinae* exterioris nervi quoque virentes ; apices vero aristaeformes albi , ac elongati : *aristae* a basi ad medium fuscae. — *Cl. Bertol. in fl. ital. 1. p. 695* , hanc ab *A. fatua* non separat , quia valvulae exterioris corollinae apices aristaeformes quoad longitudinem variare dicit ; tamen in innumeris speciminibus hoc non vidi — Praeterea *cl. Parlat. in Webb. phyt. can. v. 3. pars 2. sect. 3. p. 401, et Cosson in Bull. soc. bot. de Franc. Juin 1854* ab *A. hirsuta* , pro qua olim habui , non distinguunt , sed confer quae dixi in *syn. 1. c.*

2. *A. STERILIS*. *Lin. sp. pl.* 118 — *Ten. fl. nap. 3.* p. 96 — *Bertol. fl. ital. 1.* p. 692.

1c. *Reich. cent. 11. f.* 1711 — *Host gram. austr. 2. t.* 57 — *Gramen avenaceum*, utriculis lanugine flavescens. *Scheuch. agr. p.* 239 t. 5. f. 1.

In cultis, et in vineis; nelle coste occidentali della cava del Carusiello, e di Cerambi, ne'siti coltivati di monte Vetta alle Petrelle, ed in quelli delle Falanghe.

Majo, Junio. ☉

Spiculae majusculae, dependentes: *flosculi* duo superiores steriles, mutici, et uti axis glabri; duo inferiores aristati, ac a basi ad medium valvularum corollae sotoso-pilosi — Mihi non latet plures auctores sed praesertim *Link H. Berol. 1. p.* 108, ac 2. p. 260, et *Koch syn. ed. 2. p.* 916 ad hoc genus *Trisetia*, et *Airae* species nonnullas retulisso, sed rectius cum aliis uti diversa enumeranda putavi, ob notatos characteres, et habitum peculiarem. — Confer. *Coss. l. c.*, et *Jord. pug. pl. nov. p.* 143.

407. AIRA.

Endl. gen. n. 859.

Spiculae globoso-ovales, paniculatae, definite 2-florae; floribus hermaphroditis, omnibus perfectis, aequaliter sessilibus, vel altero brevissime pedicellato. *Calycinae* valvae uninerviae, nitidae, scariosae, muticae, concavae, subaequales, flores excedentes. *Corollina valvula* exterior apice 2-dentata, mutica vel dorso infra medium aristata; arista plicata, tortili. *Ovarium* glabrum.

1. *A. TERNATI*. *Guss. syn. 1. p.* 147 — *Bertol. fl. ital. 1. p.* 444 — *A. pulchella*. *Link H. Ber. 1. p.* 130, non *Spr.*, nec *Roem. et Schult.* — *Airopsis pulchella*. *Ten. fl. nap. 3. p.* 56.

A. paniculae rariflorae ramosissimae ramis capillaribus trichotomis patentissimis divaricatisque, ramulis ultimis elongatis sparsis uniloculiferis, valvis calycinis levibus obtusis sub anthesi patentibus flores muticos superantibus, valvulis corollinis glabris, seminibus oblongis obtusis altero latere sulcatis, foliis inferioribus involuto-setaceis, vaginis scaberrimis, culmo erecto vel genu decumbente.

1c. *Ten. l. c. t.* 102 — *Gramen paniculatum, arvense, minimum*. *Burb. cent. 5. p.* 35. t. 67. f. 1.

b. *aristata*; floribus utrisque dorso aristatis, arista exerta, panicula minus laxa, spiculis confertioribus.

In asperis sterilibus ubique; sed var. b. satis rara, et unica vice vidi presso Forio nel basso nelle falde settentrionali della punta dell'Imperatore sopra Citara.

Aprili, Majo. ☉

Caulis 3-8-pollicares, graciles, leves: *folia* deorsum scabra, superiora parum latiora: *vaginae* striatae: *ligula* oblongo-lanceolata, acuta: *panicula* circumscriptione fere globosa, ramis ita tenuibus, ut vix conspiciatur: *spiculae* globoso-ovatae, valde minutae; floribus basi glabratis: *valvae* calycinae enerviae, concavae, carinatae, subintegrae, in apice albido-scariosae, et demum uti paniculae rami purpurascetes, in b. pallide luteolae, apice non scariosae: *valvula corollina* exterior enervia, obtusa.

2. *A. CAPILLARIS*. *Host gr. austr.* 4. p. 20 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 322. — *Bertol. fl. ital.* 1. p. 457, excl. var. b., et *seyn Bar.* a var. a.

A. paniculae ramis trichotomis capillaribus divaricato-potentibus, ramulis ultimis elongatis, spiculis oblongis (minutis) sparsis (non approximatis), pedicello 5-6-plo brevioribus, floribus altero vel utrisque aristatis, valvis calycinis acutis subintegris carina leviusculis, corollina exteriori basi glabra apice scabriuscula acute ac longiuscule bifido-aristata, arista dorsali calycem duplo excedente, foliis radicalibus setaceis, vaginis scabris, ligula oblonga acuta sublucera.

lc. nostra t. xx. f. 1. a, et b. — *Host l. c. t. 35* — *Reich. cent. 11. f. 1677*.
In sylvaticis apricis; *selve dell' Ulicella sotto Trippiti, del Rotaro, del Castiglione, del monte Verza.*

Aprili, Majo. ☉

Culmi plures, erecti, 5-12-pollic. res: *folia* glaberrima, pallide virentia; caulina superiora latiora, tenue striata: *paniculae* rami leviusculi, et aliquando ita divaricati ut in praedente: in eadem panicula flores utriusque aristati, vel tantum alter: *valvula corollina* exterior apice scabriuscula. — *A. ambiguae*, et *A. intermediae* valde affinis; sed in hac valvae calycinae obtusissimae, leves, et apices aristaeformnes valvulae corollinae exterioris breviores: in prima paniculae rami minus divaricati; spiculae paulo majores.

3. *A. CORSICA*. *Jo d. pug. pl. nov. p. 113*, ex specimine.

A. paniculae ramis irregulariter trichotomis capillaribus semi-potentibus (non divaricatis), ramulis ultimis parum elongatis, spiculis ovalibus (minutis) approximatis pedunculo 1-2-plo brevioribus, flore altero aristato, calycinis valvis obtusis cum acumine sub-erosis ad carinam scabris margine minutissime denticulatis, corollina valvula posteriore basi glabra minutissime muricato-scabra breviter bifido-aristulata, arista dorsali calycem duplo excedente, foliis radicalibus setaceis vaginisque asperis, ligula acutissima bifida.

lc. nostra t. xx. f. 2. c.

In aridis apricis, *nelle selve delle Falanghe, e del Rotaro.* } 3

Aprili, Junio. ☉

Paniculae rami minus divaricati, sed densius setoso-scabri; *spiculae* magis ovals—Recte notat cl. *Jord.* l. e. hanc differre a praecedente paniculae ramis ultimis brevibus; *spiculis* minoribus, fructiferis saepe approximatis, nec omnibus solitariis distantibusque; colore totius plantae non ut in illa pallidissimo.

4. *A. CUPANIANA.* Guss. *syn.* 1. p. 148.

A. paniculae ramis trichotomis capillaribus sub anthesi semipatentibus, demum subcontractis, spiculis approximatis ovatis (parvis) pedicellum subaequantibus, flore altero aristato, valvis calycinis apice denticulata-laceris obtusis cum acumine carina scabris, corollina valvula exteriore undique muriculata breviter bifido-aristata, basi brevissime pilosa, arista dorsali calycem duplo excedente, foliis setaceis vagina scabriusculis, ligula oblonga acuta subintegra.

lc. *nostra* t. xx. f. 3. d. — Gramen tenue, avenacea versicolori panicula. *Bon.* t. 145.

b. flosculis utrisque aristatis, valvis calycinis dorso atrorubentibus apice margineque albo-scariosis.

In apricis mare finitimis rara; *Ischia all'Arso, Forio: var. b. all'Arso.*

Var. b. quae forsans species propria ad specimina *A. caryophylleae* ex *Dania* accepta maxime accedunt.

5. *A. CARYOPHYLLEA.* *Lin. sp. pl.* 97—*Ten. fl. nap.* 3. p. 56, excl. var. b. *Bertol. fl. ital.* 1. p. 455.

A. paniculae ramis trichotomis filiformibus patentibus demum erecto-patulis, spiculis oblongis approximatis pedicellum subaequantibus, calycinis valvis acutis apice denticulatis carina scabris, corollina valvula exteriore ad apicem muricata basi pilosa apice bifido-aristata, arista dorsali calycem duplo excedente, foliis infimis lineari-setaceis, vaginis asperis, ligula oblonga acuta fissa.

lc. *Reich. cent.* 11. f. 1676 — *Host gram. austr.* 2. t. 44—Gramen paniculatum, minimum, molle. *Scheuch. agr.* p. 215. t. 4. f. 15.

In sylvaticis arenosis; *Rotaro, Vutaliere, alle Falanghe, ec.*

Aprili, Majo. ☉

Culmi ad summum 5-pollicares: *folia* laete virentia: *spiculae* in hac majores, quam in praecedentibus: *valvula* corollina major apice longius bifida, laciniis setaceis.—Specimina ex Gallia, Germania, Helvetiaeque accepta cum nostra conveniunt, uti quoque illa quae nomine *A. divaricatae Loisel.* cl. *Jord.* ex Gallia meridionali misit; sed in istis vaginae leves, et icon *Loisel. fl. gall. ed.* 2. t. 23, tam a nostra quam a planta *Jord.* habitu, et statura humillima recedit. Illa vero quae ex *Dania* habui var. b, *A. Cupanianae* exacte referunt — Tandem *Cl. Vis. in fl. dalm.* 1. p. 68. *A. capillarem* cum hac uti varietatem associat, sed in natura minime variant.

408. CORYNEPHORUS.

Paliss. agr. p. 90. — Endl. gen. n. 856.

1. *C. ARTICULATUS.* *Paliss. l. c. p. 90 — Roem. et Schult. s. veg. 2. p. 689 — Aira articulata. Desf. atl. 1. p. 70 — Ten. fl. nap. 3. p. 453 — Bertol. fl. ital. 1. p. 453.*

lc. *Desf. l. c. t. 13.*

In sabulosis maritimis passim, sed in litore meridionali hujus Insulae deest.

Aprili, Majo. ☉

Culmi graciles, erecti: *folia* glaucescentia, ad margines scabra, radicalia setacea; caulina plana, demum convoluta: *ligula* integra, elongata: *paniculae* aequalis oblongae rami graciles piloso-scabri, patentes, post anthesim contracti: *spiculae* parvae, approximatae: *flores* calyce minores: *valvae* calycinae acuminatae.

409. HOLCUS.

Pers. syn. 1. p. 78.

1. *H. LANATUS.* *Lin. .p. pl. 1485 — Ten. fl. nap. 5. p. 286 — Bertol. fl. ital. 1. p. 477.*

lc. *Host gr. austr. 1. t. 2 — Reich. cent. 11. f. 1718, ad 1720 — Leers herb. t. 7. f. 6 — Gramen pratense, paniculatum, molle. Bauh. pr. p. 5.*

In herbosis, in asperis, et in arenosis sylvaticis ubique.

Junio, Augusto. ☽

Planta undique molliter pubescens: *panicula* ovata, densa, albido-virens, sub anthesi patens: *valvula corollina* exterior latior, parum longior et trinervia aristata; *arista* apice recurva, apud nos parum exerta.

410. SORGHUM.

Pers. syn. 1. p. 101.

1. *S. HALEPENSE.* *Pers. l. c. — Bertol. fl. ital. 1. p. 473 — Holcus halepensis. Lin. sp. pl. 1485.*

b. *Schreberi*: *panicula* laxa diffusa, floribus hermaphroditis inferioribus munitis, superioribus foemineisque aristatis, masculis binis pedicellatis unico versu inflexis, florum hermaphroditorum corollis 2-valvibus. *Ten. fl. nap. 5. p. 286.*

1c. *Host gr. austr. 1. p. 1. t. 1*, optima — *Reich. cent. 11. f. 1503* — Gramen palustre, arundinaceum, Milii panicula, seminè Phalaridis. *Barr. ic. 8.*

In cultis arenosis passim.

Septembri, Octobri. ☞

Cl. *Ten.* speciem diversam putat a vero *S. halepense*, sed omnes auctores, praeter *Sibth.* in *fl. gr. v. 1. p. 159. t. 68*, valvulas corollinas duas huic speciei tribuunt, et ita in natura sunt. Praeterea in herbario meo duo specimina habeo a Cl. *Siebero* missa; unum prope Tergestum lectum nomine *Holchi arundinacei*; in quo radices repentes, ac panicula ampla; et ad istum nostra planta spectat: alterum nomine *Holchi halepensis* ex Aegypto (quod habui quoque a cl. *Savio* ex plantis aegyptiacis *Raddianis*) in cujus schedula notatur *radices fibrosae*; et in isto folia angustiora; panicula minus ampla ac contracta, in utrisque tamen glumae corollinae bivalves; ita ut si hoc erit verum *S. halepense*, uti videtur, tunc nostrum nomine *S. arundinacei*, quia antè, recognoscendum.

411. IMPERATA.

Cyr. pl. rar. neap. f. 2. p. 26.

1. I. ARUNDINACEA. *Cyr. l. c.* — Saccharum cylindricum. *Lam. dict. enc. 1. p. 594* — *Ten. fl. nap. 3. p. 49* — *Bertol. fl. ital. 1. p. 332* — *Lagurus cylindricus. Lin. sp. pl. 120.*

1c. *Cyr. l. c. t. 11* — I. cylindrica. *Reich. cent. 11. f. 1504.*

In herbosis aridis, aut humentibus; nelle falde meridionali esterne del cratere del Rotaro verso la metà poco sopra la strada dirimpetto le case, Casamicciola presso la stufa del Cacciuto, presso la punta di S. Angelo alle fumarole della costa del Funnelillo.

Majo, Junio. ☞

Radices repentes: folia intense virentia, rigida, stricta, plana, demum convoluta, supremo spathaceo: panicula densa spiciformis, sericeo-mollissima, nivea.

412. ANDROPOGON.

Link H. Berol. 1. p. 230.

1. A. HIRTUM. *Lin. sp. pl. 1482* — *Ten. fl. nap. 5. p. 285*, excl. var. b. — *Bertol. fl. ital. 1. p. 468.*

A. spicis in pedunculorum pubescentium aut craviorum apice geminis, altera pedicellata, spiculis obtusis villosis-sericeis, pilis erecto-patenti-

bus, mascula mutica, hermaphrodita aristata, aristis valvula corollina sua 4-plo longioribus, foliis anguste linearibus canaliculatis elongatis, culmo apice ramoso.

1c. *Reich. cent. 11. f. 1498* — Gramen dactylon, spicis ab eodem exortu geminis. *Boec. mus. di Fisic. p. 315. t. 8. f. 1.*

In asperis, et in saxosis ubique.

Aprili, Octobri. ☿

Vulgo *Cajarcieri*, una eum sequente.

2. A. PUBESCENS. *Vis. pl. rar. Dal. p. 3* — *Bertol. fl. ital. 4. p. 779* — A. hirtum, b. *Ten. fl. nap. 5. p. 285.*

A. spicis in pedunculorum glabrorum apice geminis, altera pedicellata, spiculis acutis adpresse pilosis, mascula mutica, hermaphrodita aristata, aristis valvula sua 6-plo longioribus, foliis anguste linearibus canaliculatis brevibus, culmo apice ramoso.

1c. *Reich. cent. 11. f. 1499.*

Cum praecedente, simulque floret.

Species istae quamvis simul proveniant, et admodum affines inter se sint, tamen una in alteram non transit. Confer quae notavi in *syn. 1. p. 162.*

413. ZEA.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1403.

1. Z. MAIS. *Lin. sp. pl. 1378.*

1c. *Blaekw. herb. t. 547. a, et b.* — Frumentum indicum. *Dod. pempt. 509* — *Zuing. theatr. p. 328.*

Colitur.

Majo, Junio. ☉

Vulgo *Granodindia*, et duae varietates coluntur:

a. semine majori, culmo clatiore.

Granodindia grosso.

b. semine minori, caule humiliore.

Granodindia quarantino.

III.

ACOTYLEDONEAE-VASCULARES

98. EQUISETACEAE. Dec.

414. EQUISETUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1614.

1. E. TELMATEJA. Ehrh. Beitr. 2. p. p. 159 — E. fluviatile. Ten. fl. nap. 5. p. 300, non Lin.
 Ic. Vauch. mon. des Preles t. 2. — Hippuris major. Dod. pempt. 73.
 IN udis argillosis; monte Vetta alla sulita delle Petrelle, presso le sorgenti del piano de' Muori, e della cava di Bueto, di Brusomonte, Casamicciola nel vallone di Ombraseo, Lacco nella cava del Larito.
 Januario, Febuario. ♀
 Vulgo Pignazze.
 Caules fructiferi praecoces, demum evanidi, crassi, simplicissimi; vaginis amplis, tubulosis, approximatis, 20-30-setaceo-dentatis, fusco-lineatis; steriles seriores scabri, elati, verticillato-ramosissimi, eorum vaginis angustis, 4-5-dentatis: spicae terminales, crassae, 1-2-pollicares.
 Cl. Koch in syn. ed. 2. p. 964 synonymum E. fluviatilis Lin. ab hac specie excludit.
2. E. RAMOSUM. Schleich. cat. pl. Helv. 1801. p. 27 — Koch syn. ed. 2. p. 966 — E. ramosissimum. Desf. atl. 2. p. 398, non Humb. et Bonpl. — E. multiforme. b, et c. Ten. fl. nap. 5. p. 301.
 Ic. Vauch. l. e. t. 6.
 IN umbris sylvaticis, et in humentibus argillosis; Bueto, piano de' Muori, valle di Canniani, salita del Telegrafo di Pietra sparaina, cavone delle Nocelle, e dello Schiapparo.
 Junio, Julio. ♀
 Caules leves, numerosi, steriles, ac fructiferi conformes, simplices, vel ramosi; ramis verticillatis: vaginae breves, 6-8-dentatae; dentibus plerumque sphaelatis: spicae terminales, cylindraceae, vel ovaes, acutae, fusco-atrae, 5-10 lin. longae.

99. OPHIOGLOSSAE. *Brown.*

415. OPHIOGLOSSUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1621.

1. *O. LUSITANICUM.* *Lin. sp. pl. 1518 — Ten. fl. nap. 5. p. 301.*

lc. Lam. ill. t. 864. f. 3 — O. angustifolium, minimum. Barr. ic. 252. f. 2.

In apricis herbosis; Ischia all'Arso, Bagno nella collina fra il lago ed il mare, Chiajano nel boschetto di Napolcone ne' siti aperti, costo alte del Montagnone a Sarzano, e nel fondo del craterc.

Novembri, Martio. ☿

Planta pusilla, glaberrima, vix pollicem excedens: frons sterilis, anguste lanceolato-linearis, 1-2- lin lata: spica brevis, angusta, solitaria.

100. LYCOPODIACEAE. *Dec.*

416. LYCOPODIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1615.

1. *L. DENTICULATUM.* *Lin. sp. pl. 1569 — Ten. fl. nap. 5. p. 309—*

Selaginella denticulata. Spring. in Koch syn. ed. 2. p. 971, sub S. helvetica.

lc. Dill. musc. t. 66. f. 1. A — Muscus terrestris, lusitanicus. Clus. hist. 2. p. 249.

Ad muros, ad rupes muscosas in umbrosis ubique.

Januario, Martio. ☿

Laete virens, glabrum: caules ob folia disticha complanati videntur, saxis vel humo adhaerentes ac radicantes, ad apices floriferos surrecti: folia ovata, acute mucronata, tenuissime ciliato-serrulata, et 4-ariam imbricata, cuspidata — In humidibus calidis prope vaporaria aliquando ramorum extremitates fructiferae per pollices 2-3 elongantur.

101. POLYPODIACEAE. *Brown.*

417. ASPIDIUM.

Swartz syn. fl. p. 51.

1. *A. ACULEATUM.* *Swartz. l. c. p. 53 — Polypodium aculeatum. Lin. sp. pl. 1552.*

b. hastulatum; fronde bipinnata, pinnulis infimis basi tripartitis, caeteris ovato-semihastatis, omnibus serrato-aristatis, superioribus confluentibus, soris discretis, indusiis albido-cinereis glabris orbicularibus! (non reniformibus) stipite rachique paleaceo-strigosis — *A. hastulatum*. *Ten. fl. nap. 5. p. 304.*

l.c. Ten. l. c. t. 280. f. 1.

In sylvaticis, et in vallibus umbrosis passim sola varietas *b.*

Martio, Aprili. ♀

Vulgo *Felece mascolo*.

Stipites 1 1/2-3-pedales, virentes aut atrorubentes, basi paleis latis scariosis rufescentibus acuminatis approximatis tecti: *frondes* ambitu lanceolate: *pinnæ* alternæ, subsessiles, versus apicem et basin frondium decreescentes: *pinnulae* oblique ovatae, nempe basi sursum lobulo auctae, altero latere excisae, subtus sparse piloso-hirsutae, versus apicem frondis et pinnarum confluentes, virentes, subtus pallidiores: *indusia* juniora margine denticulata, albido-scariosa, demum cinerva.

418. SCOLOPENDRIUM.

Smith mem. Acc. Taur. 5. p. 410.

1. *S. OFFICINARUM*. Swartz *syn. fl. p. 89* — *Asplenium Scolopendrium*. *Lin. sp. pl. 1537*, excl. var. *b.* — *Ten. fl. nap. 5. p. 306.*

l.c. Bull. herb. t. 167 — *Phyllitis*. *Math. comm. 2. p. 186* — *Scolopendria*. *Zuing. theatr. p. 897.*

In umbrosis sylvaticis; *cavone delle Nocelle, e dello Schiapparo, rupi di Campagnano al Nord, valloni di Barano, di Fontana, di Moropane, alle falanghe presso al fosso della neve, valloni di Casamicciola.*

Martio, Majo. ♀

Stipites paleacei, rufescentes: *frondes* indivisae, pedales et ultra, latae oblongo-jugulatae, basi exciso-cordatae, supra glaberrimae, ad costam subtus sparse paleaceae; ibique *sori* rufescentes, lineares, ad ipsam obliqui, atque ab hac, uti a margine remoti.

419. WOODWARDIA.

Smith in act. Acc. Taur. 5. p. 411.

1. *W. RADICANS*. Swartz *syn. filic. p. 117* — *Ten. fl. nap. 5. p. 308* — *Blechnum radicans*. *Lin. sp. pl. 307.*

l.c. Schkur cryt. 101. t. 112, ex Willd. — *Filix italica*, non ramosa, glabra, Polypodii folio, gallas ferens. *TiH. II. Pis. p. 62. t. 24.*

In umbrosis vallibus ad praerupta; *Casamicciola nel vallone dell' acqua-fresca, nella parte bassa della cava di Cerambi, valloni di Moropane, e di Fontana, di Campagnano a Carauce.*

Aprili, Majo. ♀

Vulgo *Felce mascolo.*

Stipites sparse paleacco-pilosi, 1 1/2-4-pedales: *frondes* deltoideo-oblongae, amplae, glabrae, sub apice ad costam gemmiferae ac quia arcuatae radicanes, pinnatae; pinnis alternis, latis, oblongo-linearibus, acutis vel acuminatis, pinnatifidis, acutaeque serrulatis, extimis cum lateralibus confluentibus: *sori* anguste lineares, utrinque truncati, recti, inter se approximati, rachide pinnarum utrinque simplici ordine paralleli ac proximi, rufescentes.

420. ASPLENIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1631.

1. *A. ADIANTHUM NIGRUM. Lin. .p. pl. 1541 — Ten. fl. nap. 5. p. 306.*

lc. Blackw. herb. t. 220 — Dryopteris nigra. Dod. pempt. 466.

Ad rupes, et ad maceries in umbrosis rarum.

Octobri, Januario. ♀

Stipites nudi, atrorubentes: *frondes* deltoideo-lanceolatae, basi tripinnatae; pinnis a basi ad apicem frondis decrescentibus; pinnulis basi subcuneatis, acute inciso-dentatis: *sori* discreti, oblongi.

2. *A. VINGILLI. Dory exped. in Mor. v. 3. p. 289 — A. Adiantum nigrum, c. acutum. Tcn. fl. nap. 5. p. 306.*

A. stipitibus elongatis, frondibus 3-4-pinnatis, pinnis subarcuatis oblongo-lanceolatis longe acuminatis, pinnulis anguste lanceolato-linearibus acute inciso-dentatis terminalibus confluentibus, soriis linearibus oblongis demum totam pinnulae paginam inferiorem occupantibus.

lc. A. acutum. Poll. fl. ver. 3. p. 288. t. 2. f. 2, optima.

Ad maceries in umbrosis ubique obvium.

Octobri, Martio. ♀

Species praecedenti proxima, a qua notatis characteribus recedit.

3. *A. OBOVATUM. Viv. nov. spec. diagn. ad calcem Fl. Lybiae p. 68 — Ten. fl. nap. 5. p. 305, an excluso a locis natalibus Aprutio?*

A. fronde ovato-lanceolata bipinnata, pinnis pinnulisque exterioribus confluentibus in rachide partiali, superioribus in rachide universali decurrentibus, omnibus oblique obovato-cuneatis dentato-crenatis, soriis suborbiculatis.

lc. Guss. pl. rar. p. 376. t. 61.

b. cuneifolium, frondium pinnulis magis basi cuneato-attenuatis. Tcn. l. c.

Ad maceries, et ad fissuras rupium in umbrosis demissis.

Octobri, Aprili. ☞

Stipites glabri, basi atrorubentes: *frondes* 3-12-pollicares, glaberrimae: *sori* fere orbiculares, distincti, sed demum confluentes, et tunc fusci; indusiis albedo-scariosis.

4. A. TRICHOMANES. *Lin. sp. pl.* 1540 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 306.

lc. *Bull. herb. t.* 185 — *Trichomanes. Fuchs. hist.* 796 — *Zuing. theatr.* p. 1162.

b. pinnulis dentato-incisis — *Trichomanes* foliis eleganter incisis. *Tourn. inst.* 539 — *Ten. l. c.*

lc. *Tourn. l. c. t.* 315. f. C.

Ad maceries, ad muros, et ad rupes in umbrosis ubique obvium.

Octobri, Aprili. ☞

Stipites nudi, atrorubentes, subtus carinati: *frondes* late lineari-lanceolatae, pinnatae, glaberrimae: pinnulis ovalibus, crenulatis, basi oblique excisis, versus apicem decrescentibus: *sori* lineares, obliqui, alterni, atri: *indusia* oblonga, albedo-scariosa — In affini A. *viridi* *stipites* subtus complanati, et pinnulae antice truncato-cuneatae.

421. PTERIS.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1626.

1. P. AQUILINA. *Lin. sp. pl.* 1533 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 307.

lc. *Bull. herb. t.* 207 — *Pteris foemina. Fuchs. hist.* 569 — *Dod. pempt.* 462.

In sylvis, et in fruticetis ubique.

Septembri, Octobri. ☞

Vulgo *Felece*.

Stipites annotini, aliquando orgyales: *frondes* superne glabrae supradecompositae: *pinnulae* oblongo-lanceolatae, margine revolutae, inferiores pinnatifidae, superiores aliquando crenatae: *sori* numerosi prope marginem pinnularum, sed saepe demum totam paginam inferiorem occupantes.

2. P. LONGIFOLIA. *Lin. sp. pl.* 1531 — *Ten. fl. nap.* 5. p. 307.

lc. *Jaeg. H. Schoenbr. 3. p.* 78. t. 399, et 400 — *Polypodium majus*, acutioribus foliis, cordubense. *Barr. ic.* 1111 — *Doec. mus. p.* 56. t. 46 — *Phyllitis ramosa. Alp. exot. p.* 66, optima.

Ad vaporaria ad g. 26 ad 30 cent.; fumarole della stufa del Caccinto presso Casamicciola, ed in quelle del Fungo sopra del Lacco, sed nunc paucissimae tantum plantae remanent, nam a viatoribus botanicis exteris exstirpatae.

Majo, Octobri. ☞

Stipites basi sparse palacco-hirti, perennantes, inter pinnas glabrati: *frondes* lanceolatae, vel obovato-lanceolatae, alterne impari-pinnatae; pinnis lineari-lanceolatis, acuminatis, integris, basi obliquo cordatis, sursum excisis, infimis abbreviatis: *sori* marginales angustissimi.

422. ADIANTHUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1633.

1. A. CAPILLUS VENERIS. *Lin. sp. pl. 1558* — *Ten. fl. nap. 5. p. 308.*
lc. Jacq. miscell. 2. t. 7 — *Adiantum. Math. comm. 2. p. 542* —
Zuing. theatr. p. 1161.

Ad muros, ad rupes, in umbrosis humentibus, nec non ad vaporaria.

Aprili, Octobri. ☞

Vulgo *Capillo videntolo*, et medico usu adhibetur.

Stipites graciles, glabri, atropurpurei, inter pinnas flexuosi: *frondes* tenerae, glaberrimae, 2-3-pinnatae; pinnulis obovato-flabelliformibus, basi oblique cuneatis, apice inaequaliter inciso-lobatis, lobis crenulatis: *sori* ad apicem loborum marginales, oblongo-lineares.

423. POLYPODIUM.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1632.

1. P. VULGARE. *Lin. sp. pl. 1544* — *Ten. fl. nap. 5. p. 303.*
lc. Bull. herb. t. 191 — *P. majus, et minus. Dod. pempt. 464.*

Ad rupes, ad maceries, et ad arborum truncos.

Novembri, Martio. ☞

Vulgo *Felceiella*.

Stipites glabri, sed rhizoma horizontaliter repens squamis tectus: *frondes* tenerae glaberrimae, oblongae, pinnatifidae; pinnis late linearibus, sub-crenulatis, approximatis, rectangule patentibus, versus apicem frondis decrescentibus: *sori* rufescentes, orbiculati, approximati, juxta rachidem pinnularum opposito seriati.

424. GRANMITIS.

Swartz syn. filic. p. 21.

1. G. LEPTOPHYLLA. *Swartz. l. c. p. 23, et 218* — *Ten. fl. nap. 5. p. 302* —
Gasparr. observ. sulla Granmitis — *Гymнограмме leptophylla Desv.*
jour. bot. 1. p. 25.

lc. *Gosporr. l. c. optima* — *Adiantum marinum*, folio vario. *Magn. bot. monsp. p. 5. t. 5* — *A. filicinum*, *leptophyllum*, *elatus*, *hispanicum*. *Barr. ic. 431*.

Ad muros, ad rupes, ad agrorum margines in umbrosis ubique.

Aprili, Majo. ☉

Laete virens, tenera, glaberrima: *stipites* virentes, vel rubentes: *frondes* oblongae, 1-2-pinnatae; pinnulae cuneiformi-flabellatae, inciso-lobatae, alternae: *sori* parvi, globosi, nigri, demum confluentes, et totam pinnulam subtus occupantes.

423. CETERACH.

Douh. pin. 354 — *Dec. fl. fr. 2. p. 566*.

1. *C. OFFICINARUM. Dec. l. c.* — *Willd. sp. pl. 5. p. 136* — *Ten. fl. nap. 5. p. 302*—*Gymnogramme Ceterach. Spr. s. veg. 4. p. 38*—*Asplenium Ceterach. Lin. sp. pl. 1538*.

lc. *Grammitis Ceterach. Webb. et Moor. filie. t. 3. f. 1, 2* — *Barr. ic. 603, 604, 143, 144, 1051, 1052*, formae vix diversae hujus speciei sistent — *Asplenium. Zuing. theatr. p. 945*, optima.

Ad maceries in umbrosis; *via da Ischia per Casalauro sotto lo Mandarino, alle case del Rotaro, Bagno alla salita del Lapillo ne' muri a secco dirimpetto al Nord*.

Januario, Martio. ☾

Stipites breves, et dense squamosi: *frondes* late lineares, alterne pinnatifidae; *lacinae* ovatae oblongaeve, obtusae, integerrimae, supra glabrae intense virentes, subtus paleaceo-squamosae; squamis scariosis, albidis, acuminatis, integerrimis, *soros* numerosos oblongo-lineares tegentibus.

Majo 1855.

FINIS.

ADDENDA.

Pag. 28. RESEDA HOOKERI.

Ad loca natalia lege sic:

In herbosis, vel saxosis apricis: *Bugno, Lacco, Punta S. Angelo.*

In hac specie aliquando folium terminale in foliis inferioribus semel reliqua excedit.

Post hanc inseratur:

4. R. FRUTICULOSA. *Lin. sp. p. 645*—R. fruticulosa, a. *Guss. syn. 1. p. 529.*

R. laete virens glaberrima, caule basi suffruticoso, foliis vix interrupte pinnatis, foliolis subdecurrentibus anguste lineari-lanceolatis acutis subundulatis, impari reliquis duplo longiore, calycibus 5-6-partitis, capsulis oblongo-ellipticis 4-5-dentatis.

Ic. Jacq. ic. rar. 475?—R. undata. *Reich. cent. 12. f. 4447?*, nam habitus parum alienus, et quoad istum magis icon 4449 hanc refert—*Reseda maxima Lob. ic. 222?*

In apricis herbosis; *Lacco a S. Restituta sopra ai muri*, sed rara.

Aprili, Majo. Σ

Caules elati, striati, valde fistulosi: *foliola* canaliculata, saepius acuminata, vix lin. lata, margine verrucis albidis serrulato-sabra: *calycis* 5-raro-6-partiti laciniae lanceolatae, mucronatae, anguste marginatae: *racemi* densi ut in praecedente, et demum uti in illa elongati: *petala* alba, omnia obovato-cuneata, tripartita; lacinis angustis obtusiusculis, subaequilatis, calycem parum superantibus: *styli* quatuor, virentes, divaricati; *stigmatibus* candidis, penicillatis: *capsula*, ut in praecedente.

Pag. 44. SILENE TENOREANA. *Adde:*

Vulgo *Tufolilli*.

Pag. 68. TRIBULUS TERRESTRIS. *Adde:*

Vulgo *Vasapiedi*.

Pag. 94. PSORALEA BITUMINOSA. *Adde:*

Vulgo *Fasolara*.

Pag. 120. ROSA CANINA. Adde:
Vulgo *Rosa selraggia*.

Pag. 153. VIBURNUM TINUS. Adde:
Vulgo *Trecena*.

Pag. 160. VALERIANELLA ACRICULA — Citationem Bertol. sic restitue:
Valerianella dentata. Bertol. fl. ital. 1. p. 189.

Pag. 169. Post ACHILLEAM LIGUSTICAM addatur:

2. A. MILLEFOLIUM. *Lin. sp. pl. 1267 — Ten. fl. nap. 2. p. 251 — Bertol. 1. fl. ital. 9. p. 403.*

lc. *Bull. herb. t. 163 — Lam. ill. gen. t. 683. f. 1 — Millefolium vulgare, album. Zannich. hist. t. 143.*

In herbosis apricis submontosis; *Piano Liguori ne' margini erbosi della selva de' Sig. Tirabelli unico angustissimo spatio praeterito Aprili inveni, sed flores non vidi.*

Quoad habitum foliorum ab *A. Millefolio* vulgari parum diversa videtur.

Pag. 170. CHRYSANTHEMUM CORONARIUM. *Locis natalibus adde:*
Ischia nelle rupi sotto al Castella all' ovest inter Opuntiam Ficum indicam.

Pag. 172. ARTEMISIA VARIABILIS. Adde:
Vulgo *Tremalice*.

Pag. 176. SENECIO POENICULACEUS. *Post hanc speciem inseratur:*

2. S. CRASSIFOLIUS. *Willd. sp. pl. 3. p. 1982 — Ten. fl. nap. 2. p. 215 — Bertol. fl. ital. 9. p. 217, excl. pl. syn.*

lc. *nulla.*

In cultis apricis subarenosis; *Lacco al Monte Vica all' est nelle vigna delle Schiappe di Giampietro sopra gli Varuni satis rarus.*

Februario, Martio. ☉

Planta glaberrima, lacte et nitide virens, semipedalis, et ultra, caespitosa: caulis striatus, centralis erectus; ramis ascendentibus: folia carnosula; inferiora oblongo-spathulata, obtuse sinuato-dentata, in petiolum attenuata; superiora oblonga, sessilia, sinuato-pinnatifida, basi dilatata amplexicaulia: flores corymbosi: pedunculi striati, in axillis floerum o pilorum instructi, nonnullis bracteis intactis aut sphaerelatis tecti: anthadium basi non incrassatum, glaberrimum; folialis una cum squamis apice sphaerelatis, rarius intactis: corollulae

radi patentés, demum revelutae : odor tenuis, foeniculaceus — Nec cum *S. veruo*, nec cum *S. humili*, vel *S. leucanthemifolio* associandus; nam habitu et characteribus non variat.

Pag. 213. *HELIOtropium tenuiflorum*, et *H. macrocarpum*. *Addatur*:
Decedente Majo has species florentes vidi in hortis di *Citara presso Forio*.

Pag. 259. *CALAWINTHA NEPETA*. *Adde*.
Vulgo *Nepetella*.

Pag. 289. *OSYRIS ALBA*. *Loco natali adde*:
Provenit quoque *nelle coste boreali della detta punta sopra Citara*.

Pag. 307. *QUERCUS PUBESCENS*. *Adde*.
Vulgo *Cerza*, uti aliae species.

Pag. 314. *SALIX CAPREA*. *Adde*:
Vulgo *Chiuppo*, una cum sequente; et *inde inseratur*:

2. *S. constricta*. *Guss.*

S. amentis masculis sessilibus, foemineis demum pedunculatis, pedunculo bracteato inde nudo, capsulis supra basim globosam constrictis inde elongato-lanceolatis pedicellatis adpresse sericeo-pubescentibus, bracteis piloso-pubescentibus! (non longe ciliatis); stigmatibus linearibus bifidis, foliis elliptico-oblongis planis serratis subtus glauco-tomentosis, supra glabratiss, stipulis semilunatis.

lc. nulla.

In sylvaticis umbrosis humentibus; cava delle Nocelle, ed in quella delle Rose sotto Pietra sparaina.

Januario, Februario. ♀

In hac specie, folia sunt praecociora, firmiora, oblongo-lanceolata, apice saepe latiora, 4-18 lin. lata, 2-3 poll. longa, margine regulariter crispato-serrata, subtus magis cinereo-tomentosa, una cum ramis junioribus petiolisque; dum in praecedente, et in ejus var. b. sunt latiora, nempe 2-poll. et ultra lata, 3 1/2-4 poll. longa, elliptico-oblonga, irregulariter serrato-dentata, vel obiter crenata, et tenuiora: stipulae in utrisque semilunatae, et plus minus denticulatae; sed in hac saepius duplo minores ac integrae; amenta foeminea breviora, saepe pollicaria: bractae brevius, non longissime ciliatae: capsulae minus sericeo-villosae, virentiores, ad collum constrictae, et inde attenuatae, non ut in illa ex ovata basi sensim attenuatae.

Pag. 333. *Post MUSCARI inseratur*:

bis 353. ALOE.

Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 227.

1. A. VULGARIS. Dec. pl. grass. p. 27 — A. vera. Lam. Dict. enc. 1. p. 86 — A. barbadensis. Mill., ex Schult. s. veg. 7. p. 693.

1c. Dec. 1. c. t. 27 — Aloe, Scmpervivum marinum. Lob. ic. 374.

In rupestribus; Ischia sotto al Castello inter Opuntiam Ficum indicam nunc spontanea.

Majo, Junio. ☼

Caulis brevissimi, et inde planta ob multas propogines dense coespitosa : folia valde crassa, mollia, concoloria, viridi-glauescentia, supra late et vix canaliculata, subtus convexa, apice attenuata, margine serrato-spinosa: scopi compressi, saepe ramosi, foliis longiores: spica densa, cylindracea; pedunculis brevibus, basi bracteatis: corollae flavescens, cylindraceae, pollicares, sub anthesi pedulæ.

Pag. 337. ALLIUM GASPARRINI. Adde:

Umbella sub anthesi compacta: petala atrorubentia uti stygium, qui exertus: filamenta rosea. Progressa florescentia pedunculi elongantur, ideoque umbella laxior; petala dilutius colorata, demum pallide rosea, ac filamenta albo-scariosa, uti in l. c. notavi.

Pag. 354. CAREX SERRULATA. Post hanc speciem inseratur:

6. C. EXTENSA. Gooden. tr. Lin. soc. v. 2. p. 175 — Ten. fl. nap. 5. p. 248.

1c. Good. l. c. 1. 21. f. 7. — Reich. cent. 18. t. cclxxiv.

In bumentibus; Bagno presso al lago, sed nunc destructa; Casamicciola nel vallone de' Bagni del Monte della Misericordia nella costa a dritta presso l'acqua di Spennapollastro.

Aprili, Majo. ☼

Dense caespitosa: radicee fibrosae: folia viridi-glauescentia, rigida, canaliculata, apice attenuata, ad margines et carinam serrulato-scrabra: bractee elongatae, foliis conformes: spica mascula solitaria; foemineae 3-4; infima remota, incluse vel exerte-pedunculata: squamae acutae, nuticae, exquisite trinerves, fructu perfecto duplo breviores: fructus ovato-conici, utrinque convexi, glabri, rostro brevi bidentato terminati, juniores valentur encrves, nitide vireutes, sed maturi nervosi.

Pag. 355. GAUDINIA FRAGILIS. Locis natalibus adde:

Ischia all'Arso dietro le case nel pennino di Mangialisi.

Pag. 366. *FESTUCA CILIATA*. *Loco natali adde:*

Castiglione, Casamicciola.

b. elongata; valvis calycinis, et pedunculis undique pubescentibus, panicula elongata ramosiore.

In herbosis apricis; *Chiajanò, Pico.*

An species propria?, nam quoad paniculam *F. myurum* refert.

Pag. 373. *CYNOSURUS ECHINATUS*. *Post hanc speciem inseratur:*

2. *ELEGANS*. *Desf. atl. 1. p. 82 — Ten. syll. p. 37 — Bertol. fl. ital. 1. p. 588.*

1c. Desf. l. e. t. 17.

In umbrosis herbosis; *su de'muri a secco a sinistra salendo dal ponte del Larito sotto Casamicciola a S. Giuseppe, sed rarus.*

Aprili, Majo. ☉

Panicula parva, densa, secunda: spicularum sterilium valvae longe aristatae, pubescentes; valvae calycinae spiculae fertiles anguste lineares, pallidae: habitus quam in praecedente gracilior.

Pag. 384. *MELICA CILIATA*. *Locis natalibus adde:*

Nella via da S. Giuseppe al Cerriglio, e da questo sito alla Croce del Capizzo sopra Forio.

Post hanc speciem inseratur:

2. *M. PYRAMIDALIS*. *Bertol. am. ital. p. 329, et fl. ital. 1. p. 494 — Ten. fl. nap. 3. p. 59.*

1c. Gramen avenaceum, tenui et erecta panicula. Barr. ic. 96. f. 1.

In fruticetis boream spectantibus; *nelle basse coste della Punta dell'Imperatore sopra Citara presso al viottolo, che sale alla sommità.*

Aprili, Majo. ☿

Culini 3-4-pedales, raro inferne ramosi: ligula brevis, truncato-lacera: folia plana, scabra: panicula laxa, pyramidalis ob ramos inferiores rectangule patentes ac elongatos: apiculae nutantes, imberbes: valvae, et valvulae acutae, albidae, sed dorso saepius rubro-maculatae.

Pag. 388. *AIRA TENORII*.

Varietatem undique atrorubentem inveni, alla salita delle selve di Funoferrato, ed alla Cava bianca presso al Notaro. Praetera cum denno ac citius quam alias vices visitaverim la Punta dell'Imperatore, sic in loco natali notato, nec non ad illius verticem, numerosa specimina var. b. aristatae collegi; in quibus paniculae rami sub anthesi divaricati uti in specie; valvae ac valvulae in utrisque similes, et istae nitide atrorubentes, levissimae, glaberrimae; tamen spiculae in b. quidquam oblongae ac pallidiores, dum in a. fere globosae et intensius coloratae; interim in aliis Insulae locis varietatem b. adhuc non visi.

Pag. 389. AIRA CAPILLARIS. *Locis natalibus adde:*

Provenit quoque passim ad vias in umbrosis siccis, et ad apricos sylvarum margines.

Pag. id. AIRA CORSICA. *Adde:*

In demissis aridis apricis ubique obvia, et ad margines sylvarum, una cum praecedente, a qua spiculis demum approximatis in apice pedicellorum quoque dignoscitur.

ALTITUDINES MONTIUM

ALIORUMQUE LOCORUM

INSULAE INARIMES

PEDIBUS PARIENSIBUS EXPRESSAE.

	<i>Guss.</i>	<i>Hoffm.</i>		<i>Guss.</i>	<i>Hoffm.</i>
Ajetola (sopra Fontana)	1663		Monte Trippiti	1435	
Arso Fondo del Cratere)	405		— Vetta	1682	
— (Vetta del Cratere)	562		— Vezza	1141	
Barano (alla piazza)	638		— Vico	309	
Boeca della Serra	1686		— della Misericordia	47	
Calimera	1352		Montagnone (Vetta all'Ovest)	913	
Campagnano (all' Annunziata)	414	477	— (Fondo del cratere)	565	
Canniani (Valle)	848		Moropane	847	
Casamicciola (Piazza di)	370	341	Mortito (o Monte Taborre)	164	
Casino de Angelis (al Bagno)	159		Nitroli (sorgente di)	665	
— Reale (al Belvedere)	414		Piano Ligoori (Monte)	1139	
Castiglione	215		— de Moori	1312	
Cava di Ba lerino	1029		— del Tesaccio	463	
Cereola	282		Piso	467	
Chiajano	549		Pietra dell'arca	2074	
Crovone (all'acquidotto)	188		— Perriata	1565	
Falanche (piano delle)	1638		— Sparaina (al Telegraf)	1051	
Fondo di cavallaro	143		— Vona	289	
— Ferrato (sotto al Rotaro)	512		Ponta dell'Imperatore	746	
Fontana	1358	1382	— S. Alessandro	99	
Fumarole del Fasano, o del Fango	1024		— S. Angelo	323	
— del Fico	1556		— S. Pietro	93	
— dei Frassitelli	1083		Rotaro (Fondo del cratere)	532	
— del Bell'omo	1000		— (Pianura del)	719	
— di Montecito	435		— (Trivio a Cavabianca)	867	
Lacco superiore	81		— (Vetta del cratere al Sud)	926	927
Mareocco	310		Santa Maria del Monte	1289	
Monte di Barano	611		Sentinella (a Casamicciola)	377	
— Buceto	1161		Serrano	1166	1120
			Stofa di S. Lorenzo (sul Lacco)	174	
— Epomeo	2107	2407	Testaccio	420	
			Torre di Campagnano	968	
			Vateliere (al trivio)	383	
— Nnovo	1406		— (Fondo del cratere)	208	

ADDENDA

II.

Pag. 77. sub § II. FALCATAE inseratur ante MEDICAGINEM HELICEM:

2. a M. FALCATA. *Lin. sp. pl. 1096. Ten fl. nap. 5. p. 164. var. a.*
— *Bertol. fl. ital. 8. p. 261.*

1c. *Fl. dan. t. 293* — *Medica flavo flore. Clus. his. 2. p. 243.*

Ad apricos herbosos vinearum margines; *Lacco al monte Vico nel viotolo che conduce al Cottano* unico loco, ideoque satis rara.

Junio, Julio. ♀

Planta virens, subdecumbens, et excepta corolla ac foliorum pagina superiore, pilis brevibus adpressis tecta: *foliola* in foliis inferioribus obovata, reliqua lineari-cuneata, omnia cum mucrone emarginata, versus apicem denticulata: *stipulae* superiores integrae, lanceolato-attenuatae: *racemi* breviter pedunculati, subcapitati: *pedicelli* calycem aequantes, bractea ex ovata basi setacea duplo longiores: *calycis* dentes tubum excedentes, inter se subaequales, vexillo duplo breviores: *vexillum* facia externa concolor triste lutescens, interna dilutius coloratum, a medio ad basim venis intensioribus notatum: *alae* vexillo semel breviores carinam luteam parum excedentes, obtusae, porrectae, superne remotiuseculae, concavae, ad apicem livido-maculatae: *legumina* pauca in quolibet racemo, falcata, ac varie flexa, compresso-tumida, et in nostra videntur levia, non reticulata — Haec notavi, quia florum colore a specie i typo nonnihil recedit.

Pag. 105. Post VICIAM ANGUSTIFOLIAM inseratur:
21. a V. PEREGRINA. Lin. sp. pl. 1038—Ten. fl. nap. 5. p. 118—Bertol.
fl. ital. 7. p. 521.

1c. Sturm. ff. germ. f. 32—V. peregrina, angustissimis foliis, siliqua
lata glabra. Pluk. Phyt. t. 233. f. 6.

In apricis; Lacco al monte Vico presso alla casa del Contoriello non sa-
tis obvia.

Majo, Junio. ☉

Planta glabra, virescens, cirrhis scandens, sed saepe humilis: foliola
anguste linearia, truncato-emarginata: stipulae semihastatae: flores coe-
rulescentes, breviter pedunculati: legumina late linearia, incurve ro-
strata, pendula: semina compresso-globosa, grandiuscula, velutina,
cinereo-rufescentia, varie lineato-maculata.

Pag. 162. SCABIOSA GRANDIFLORA d. *prolifero*. Adde:
Lacco al Monte Vico.

Pag. 178. CENTAUREA DEUSTA. Adde:

Varietas a. in ripestribus aridis maritimis cum var. b. passim occurrit.

Pag. 288. LACRUS NOBILIS.

Cum nuper parvam ac praecipitem semitam, illi qui in hac insula argillam
effodiunt per acclivia latera angustissimae ac praeruptae vallis vulgo di-
cta *Cova della Rossa* prope balneos di *Casamicciola* perfererint, sic
brevem tractum vallis illius paucis ab hinc diebus percurrere mihi da-
tum fuit, et inde in hac vidi, sed colligere non licuit, arbusculas plu-
res LACRUS NOBILIS provenire una cum peculiari varietate *latifolia* RHAM-
NI ALATERNI, POPELO AUSTRALI ac WOODWARDIA RADICANTE, quae ibi
copiosissima; ideoque arbor ista potius indigena illius insulae, quam
cultae, uti dixi, habenda est.

Pag. 310. POPULUS AUSTRALIS. Adde:

Nella cava della Rossa presso ai bagni di Casamicciola.

Pag. 377. Post CYNODON DACTYLOX inseratur:

389. DACTYLOCTENIUM.

Willd. en. II. Ber. p. 1029.

1. D. AEGYPTIACUM. Willd. l. c.—Bertol. fl. ital. 1. pag. 581—Cynodus
aegyptius. Lin. sp. pl. 106—Eleusine aegyptia. Pers. syn. 1. pag. 37.
—Ten. fl. nap. 3. pag. 71.

1c. *Paliss. agr. p. 72. t. 15. f. 2* — Gramen polystachyon, millepede effigie. *Bon. t. 4.*

In asperis aridisque; *al principio della valle delle Petrelle presso S. Angelo, unico angusto spatio.*

Majo, Junio. ☉

Decumbens, glabrum: *folia laeta virentia, flaccida, subundulata: ligula brevissima, truncata: spicae digitato-subquaternae, cruciatim dispositae, demum patentissimae.*

Pag. 387. AVENA STERILIS.

Cum Vites *Oidii* damno adhuc laborant, sic ob latiore[m] inductam Cervallium culturam, in aliis insulae locis sparsim provenit species ista.

Junio 1855.

SUMMA GENERUM ET SPECIERUM

CUJUSQUE FAMILIAE.

I. DICOTYLEDONEAE			
1. RANUNCULACEAE.			
1 Clematis	2		
2 Anemone	1		
3 Ranunculus	7		
4 Helleborus	1		
5 Nigella	1		
6 Delphinium	2		
<i>Gen. 6.</i>		14	
2. PAPAVRACEAE			
7 Papaver	7		
8 Glaucium	1		
9 Chelidonium	1		
10 Hyecoum	1		
<i>Gen. 4.</i>		10	
3. FUMARIACEAE			
11 Fumaria	7		
<i>Gen. 1.</i>		7	
4. CRUCIFERAE			
12 Raphanus	2		
13 Cakile	1		
14 Bunias	2		
15 Rapistrum	1		
16 Neslia	1		
17 Capsella	1		
18 Lepidium	1		
19 Draba	1		
20 Koniga	1		
21 Cardamine	1		
22 Arabis	2		
23 Matthiola	4		
24 Barbarea	1		
25 Alliaria	1		
		<hr/>	31
26 Malcolmia	1		31
27 Sisymbrium	3		
28 Diplotaxis	2		
29 Brassica	3		
30 Eruca	1		
31 Sinapis	2		
<i>Gen. 20.</i>			32
5. CAPPARIDAE			
32 Capparis	1		
<i>Gen. 1</i>			1
6. RESEDACEAE.			
33 Reseda	5		
<i>Gen. 1.</i>			6
7. CISTINEAE.			
34 Cistus	4		
35 Helianthemum	4		
<i>Gen. 2.</i>			8
8. VIOLARIEAE.			
36 Viola	5		
<i>Gen. 1.</i>			5
9. CARYOPHYLLAE.			
37 Dianthus	4		
38 Saponaria	1		
39 Silene	13		
40 Lychnis	1		
41 Sagina	2		
42 Spargula	2		
43 Lepigonum	2		
44 Alsine	2		
45 Moehringia	1		
46 Arenaria	1		
		<hr/>	52
			<hr/>
			83

		276				318
104	Rosa	3		34. CRASSULACEAE.		
	<i>Gen. 6.</i>		9	125 Tillaea	1	
	25. SANGUISORBEAE.			126 Umbilicus	2	
105	Alchemilla	1		127 Sedum	4	7
106	Poterium	1		<i>Gen. 3.</i>		
	<i>Gen. 2.</i>		2	35. FICOIDEAE.		
	26. POMACEAE.			128 Mesembryanthemum	2	
107	Crataegus	3		<i>Gen. 1.</i>		2
108	Mespilus	1		36. CACTEAE.		
109	Pyrus	2		129 Opuntia	1	
110	Sorbus	1		<i>Gen. 1.</i>		1
111	Cydonia	1		37. SAXIFRAGAE.		
	<i>Gen. 5.</i>		8	130 Saxifraga	1	
	27. ONAGRINAE.			<i>Gen. 1.</i>		1
112	Epilobium	3		38. UMBELLIFERAE.		
	<i>Gen. 1.</i>		3	131 Eryngium	1	
	28. LYTHRARIKAE.			132 Sanicula	1	
113	Lythrum	2		133 Apium	1	
	<i>Gen. 1.</i>		2	134 Petroselinum	1	
	29. MYRTACEAE.			135 Ammi	1	
114	Myrtus	1		136 Pimpinella	1	
	<i>Gen. 1.</i>		1	137 Bupleurum	1	
	30. GRANATEAE.			138 Oenanthe	1	
115	Punica	1		139 Crithmum	1	
	<i>Gen. 1.</i>		1	140 Foeniculum	3	
	31. CUCURBITACEAE.			141 Ferula	3	
116	Lagenaria	1		142 Daucus	6	
117	Cucurbita	3		143 Orlaya	1	
118	Citrullus	1		144 Torilis	3	
119	Cucumis	3		145 Scandix	1	
120	Ecbalium	1		146 Chaerophyllum	1	
	<i>Gen. 5.</i>		9	147 Echinophora	1	
	32. PORTULACAE.			148 Smyrniolum	1	
121	Portulaca	1		149 Coriandrum	1	
	<i>Gen. 1.</i>		1	<i>Gen. 19.</i>		30
	33. PARONYCHIAE.			39. ARALIACEAE.		
122	Corrigiola	1		150 Hedera	1	
123	Herniaria	1		<i>Gen. 1.</i>		1
124	Polycarpon	1		40. CORNEAE.		
	<i>Gen. 5.</i>		3	151 Cornus	1	
			315	<i>Gen. 1.</i>		1
				41. CAPRIFOLIACEAE.		
				152 Sambucus	2	
						358

133 Viburnum	1	358	195 Cynara	2	385
134 Lonicera	1		196 Carduus	2	
<i>Gen. 5.</i>		4	197 Cirsium	2	
42. RUBIACEAE.					
135 Sherardia	1		198 Lappa	1	
136 Asperula	2		199 Scalymus	1	
137 Crucianella	1		200 Lapsana	1	
138 Rubia	3		201 Rhagadiolus	1	
139 Galium	6		202 Hedyotis	2	
160 Vaillantia	1	14	203 Cichorium	3	
<i>Gen. 6.</i>			204 Tolpis	2	
43. VALERIANEAE.					
161 Valerianella	3		205 Hypochaeris	2	
162 Ceuranbus	2		206 Seriola	1	
163 Valeriana	1		207 Thrinicia	1	
<i>Gen. 5.</i>		6	208 Leontodon	1	
44. DIPSACEAE.					
164 Dipsacus	1		209 Urospermum	2	
165 Scabiosa	2		210 Helminthia	2	
<i>Gen. 2.</i>		3	211 Picris	1	
45. COMPOSITAE.					
166 Eupatorium	1		212 Lactuca	6	
167 Tussilago	1		213 Chondrylla	1	
168 Aster	1		214 Tarasacum	3	
169 Erigeron	1		215 Crepis	5	
170 Bellis	2		216 Zacyntia	1	
171 Solidago	1		217 Picridium	1	
172 Conyza	2		218 Sonchus	3	
173 Inula	4		219 Andryala	2	
174 Pulicaria	2		220 Hieracium	5	109
175 Pallenis	1		<i>Gen. 55.</i>		
176 Marua	2		46. AMBROSIACEAE.		
177 Anthemis	2		221 Ambrosia	1	
178 Arhillea	2		222 Xanthium	2	
179 Diotis	1		<i>Gen. 2.</i>		3
180 Matricaria	1		47. CAMPANULACEAE.		
181 Chrysanthemum	2		223 Campanula	2	
182 Pyrethrum	2		224 Specularia	3	
183 Artemisia	2		<i>Gen. 2.</i>		5
184 Helichrysum	2		48. ERICACEAE.		
185 Filago	4		225 Arbutus	1	
186 Cnicaria	2		226 Erica	1	
187 Senecio	5		<i>Gen. 2.</i>		2
188 Calendula	2		49. PRIMULACEAE.		
189 Carlina	2		227 Cyclamen	1	
190 Centaurea	5		228 Lysimachia	1	
191 Galactites	1		229 Anagallis	2	
192 Kentrophyllum	1		230 Samolus	1	
193 Onopordon	1		<i>Gen. 4.</i>		5
194 Silybum	1		50. OLEACEAE.		
		385	231 Fraxinus	1	
			232 Olea	1	
					509

CUJUSQUE FAMILIAE

413

		509			564	
233	Phillyrea	2		263	Veronica	9
	<i>Gen. 5.</i>		4	264	Euphrasia	2
				265	Odontites	2
					<i>Gen. 8.</i>	31
	51. APOCYNÆÆ.				58. OROBANCHÆÆ.	
234	Vinca	1		266	Orobanche	7
	<i>Gen. 1.</i>		1	267	Phelipsea	2
					<i>Gen. 2.</i>	9
	52. ASCLEPIADÆÆ.				59. ACANTHACÆÆ.	
235	Gomphocarpus	1		268	Acanthus	1
	<i>Gen. 1.</i>		1		<i>Gen. 1.</i>	1
					60. VERVENACÆÆ.	
236	Erythraea	3		269	Verbena	1
237	Chlora	2		270	Vitex	1
	<i>Gen. 2.</i>		5		<i>Gen. 2.</i>	2
					61. LABIATÆÆ.	
	53. GENTIANÆÆ.			271	Lavandula	1
238	Batatas	1		272	Mentha	5
239	Convolvulus	3		273	Salvia	2
240	Calystegia	2		274	Rosmarinus	1
241	Cuscuta	1		275	Origanum	2
	<i>Gen. 4.</i>		7	276	Micromeria	1
				277	Calamintha	2
	55. BORAGINÆÆ.			278	Chenopodium	1
242	Heliotropium	4		279	Melissa	2
243	Cerinthe	1		280	Sideritis	1
244	Echium	2		281	Stachys	4
245	Borago	1		282	Lamium	3
246	Achusa	2		283	Prunella	2
247	Lycopsis	1		284	Ballota	1
248	Symphytum	1		285	Prasium	1
249	Lithospermum	3		286	Teucrium	5
250	Nyctotis	2		287	Ajuga	1
251	Cynoglossum	1			<i>Gen. 17.</i>	35
	<i>Gen. 10.</i>		10		62. PLUMBAGINÆÆ.	
				288	Statice	2
	56. SOLANACÆÆ.				<i>Gen. 1.</i>	2
252	Datura	1			63. PLANTAGINÆÆ.	
253	Nyctaginia	2		289	Plantago	8
254	Capsicum	5			<i>Gen. 1.</i>	8
255	Solanum	5			64. AMARANTHACÆÆ.	
256	Lycopersium	4		290	Amaranthus	5
257	Lycium	1			<i>Gen. 1.</i>	5
	<i>Gen. 6.</i>		18			
	57. SCROPHULARINÆÆ.					
258	Verbascum	4				
259	Linaria	8				
260	Antirrhinum	2				
261	Scrophularia	3				
262	Digitalis	1				
			564			657

		657		75. MOREAE.	723
	65. PHYTOLACCAE.				
291	Phytolacca	1		311 Mirus	2
	<i>Gen. 1.</i>		1	312 Ficus	7
				<i>Gen. 2.</i>	9
	66. CHENOPODIACEAE.			76. CELTIDAE.	
292	Salsola	2		313 Celtis	1
293	Salicornia	1		<i>Gen. 1.</i>	1
294	Kochia	1			
295	Chenopodium	9		77. ULMACEAE.	
296	Beta	1		314 Ulmus	1
297	Atriplex	8		<i>Gen. 1.</i>	1
	<i>Gen. 6.</i>		22		
	67. CYNOCAMBAE.			78. JUGLANDIDAE.	
298	Theligonum	1		315 Juglans	1
	<i>Gen. 1.</i>		1	<i>Gen. 1.</i>	1
	68. POLYGONAE.			79. CUPULIFERAE.	
299	Polygonum	8		316 Castanea	1
300	Rumex	5		317 Quercus	4
	<i>Gen. 2.</i>		13	318 Corylus	1
	69. LAURINEAE.			319 Carpinus	1
301	Laurus	1		320 Ostrya	1
	<i>Gen. 1.</i>		1	<i>Gen. 5.</i>	8
	70. THYMELAE.			80. SALICINEAE.	
302	Daphne	2		321 Populus	3
303	Passerina	1		322 Salix	3
	<i>Gen. 2.</i>		3	<i>Gen. 2.</i>	6
	71. SANTALACEAE.			81. CUPRESSINEAE.	
304	Osyris	1		323 Juniperus	1
	<i>Gen. 1.</i>		1	<i>Gen. 1.</i>	1
	72. CYTINAE.			82. ABIEPTINEAE.	
305	Cytinus	1		324 Pinus	1
	<i>Gen. 1.</i>		1	<i>Gen. 1.</i>	1
	73. EUPHORBIAEAE.			II. MONOCOTYLEDONEAE	
306	Euphorbia	12		83. ALISMACEAE.	
307	Mercurialis	1		325 Alisma	1
308	Croton	1		<i>Gen. 1.</i>	1
	<i>Gen. 5.</i>		14	84. POTAMAE.	
	74. URTICAE.			326 Ruppia	1
309	Urtica	6		<i>Gen. 1.</i>	1
310	Parietaria	3			
	<i>Gen. 2.</i>		9		
			<hr/>		<hr/>
			723		753

	844		945
392 Crypsis	1	99. OPHIOGLOSSAE.	
393 Lagurus	1		
394 Stipa	1	415 Ophioglossum	1
395 Piptatherum	1	<i>Gen. 1.</i>	1
396 Gastridium	1		
397 Polygogon	2	100. LYCOPODIACEAE.	
398 Agrostis	3		
399 Calamagrostis	1	416 Lycopodium	1
400 Ampelodesmos	1	<i>Gen. 1.</i>	1
401 Arundo	2		
402 Phragmites	1	101. POLYPODIACEAE.	
403 Melica	2		
404 Koeleria	3	417 Aspidium	1
405 Trisetum	2	418 Sclopendrium	1
406 Avena	2	419 Woodwardia	1
407 Aira	5	420 Asplenium	4
408 Corynephorus	1	421 Pteris	2
409 Holcus	1	422 Adiantum	1
410 Sorghum	1	423 Polypodium	1
411 Imperata	1	424 Grammitis	1
412 Andropogon	2	425 Ceterach	1
413 Zea	1	<i>Gen. 2.</i>	
<i>Gen. 48.</i>	10		13
III. ACOTYLEDONEAE		Spec.	960
VASCULARES			
98. Equisetaceae.			
414 Equisetum	2		
<i>Gen. 1.</i>	2		
	945		

EX ISTA ENUMERATIONE CONSEQUUNTUR SEQUENTIA :

SPECIES 960 hujus florulae sunt sic distributae :

DICOTYLED.	MONOCOTYL.	ACOTYL. VASCUL.
751	193	17

Ideoque sunt inter se, uti 44 ad 11, et ad 1.

FAMILIAE NATURALES

82	15	4
----	----	---

FAMILIAE majorem *Generum* numerum continentes

Compositae	55 Gramineae	48 Polypodiaceae	9
Leguminosae	29 Orchideae	9	
Umbelliferae	19		
Cruciferae	20		
Labiatae	17		
Caryophylleae	13		

FAMILIAE majorem *specierum* numerum habentes

Compositae	109 Gramineae	103 Polypodiaceae	13
Leguminosae	108 Liliaceae	25	
Caryophylleae	37 Orchideae	20	
Labiatae	35 Cyperaceae	15	
Cruciferae	31		
Serophularineae	31		
Umbelliferae	30		

GENERA unicam *speciem* continentia

70	36	9
----	----	---

GENERA majorem *specierum* numerum habentia

Trifolium	22 Allium	16 Asplenium	4
Vicia	21 Carex	9 Pteris	2
Medicago	13 Bromus	7	
Silene	13 Festuca	7	

Plantarum vascularium numerus et superficies milliarum quadratae Britanniae, totius Regni Neapolitani citra Pharus, Siciliae (insulis circumstantibus comprehensis), et Inarimes

	Milliaria quadrata	Num. plantar.
Britanniae	68521	1580
Regni Neapolitani	22827	3350
Siciliae	7423	2890
Inarimes	11	960
		53

INDEX NOMINUM TRIVIALIUM.

	A			24, 25
Accio		Carolo		23
Agljo	140	— — selvaggio		189
— — salvatico	336	Cazzabuotti		290
Aglione	333	Cecavocchi		98
Ajale	338	Cecere		61
Aino	317	Cedro		243
Alga di mare	252	Cepolla		117
Amarena	315	Ceraso		402
Amennola	118	Cerna		61
Amenta	112	Cetrangolo		132
Ardica	255	Cetrulo		26
Arlo	297	Chiappariello		403
Arora	310	Chiuppo		108
Arvaniello	155	Cicerchia		185
Arucola	310	Cicoria		185
— — di montagna	25	— — di S. Pasquale		298
Aruta	23	Cleuso		208
	69	Cimmino		269
		Cinqueniervi		130, 131
		Cocosa		130
		Cocozzelli		133
		— — selvaggi		167
Brancalupo	251	Coda di pecora		152
Broccolo	24	Cogliandro		286
		Corriola		60
		Cotone		127
		Cotugno		114, 115
		Crisomolo		311
		Cudole		310
		— — bianche		310
		— — salvatiche		136
		Cuppitiello		346
				346
				109
				181
				178, 182, 184
				175
				132
				309
				306
				175
				299
				298
				61
				276

Erba, o erba janca	471	M	
— tentà	27		
F			
Falasco	268		
Falascione	368		
Fasolara	401		
Fasulo	110, 111		
Felece	398		
— mascolo	396, 397		
Feleciella	399		
Fico	301, 305		
— d'India	138		
Finnerchio	143		
Fiorilli gialli di bosco	244		
— russi di bosco	244		
Faglia molla	240		
Fragola	119		
— selvaggia	119		
Fumaria	10		
Fuoco muorto	1		
G			
Garofalo selvaggio	35		
Giglio di S. Antonio	326		
— di S. Restituta	328		
— selvatico	325		
Gramegna	377		
Granato	129		
Graufa di gatta	142		
— di quaglia	142		
Grano	357		
Grano d'India	393		
I			
Jancolella	173		
Jenesta	74		
Jenisco	272		
Jermano	336		
Jlice	307		
Jojome	69		
Junco	343		
I.			
Latierno	206		
Lattuca	191		
Lazerola	127, 123		
Lauro	288		
Limoncello	61		
Limone	61		
Lenticchia	107		
Lentisco	70		
Lupinello	71		
Lopino	70		
Malaporone			29
Malva			89
Mellone d'acqua			131
— di pane			122
Mentastro			253
Mercorella			291
Migliarinolo			375
Milo			115
Morole			119
Mortella			129
Morviglina			84
Moita di sangur			70
Mussaporcielli			187
N			
Nea			245
Nepetella			402
Nespolo			123
Noce			306
Noceffa			308
Nocepersico			114
O			
Ogliastro			206
Olivo			206
Orniello			206
P			
Paliero			361
Papagno			6
— dello Snonno			9
Paparacchio			163
Paparastello			196
Pastinaca selvaggia			145
Pastinachella			144
Patata			224
Patrostace			177
Peperuolo			222, 221
Perenoco			113, 114
Persico			144
Petrosino			140
Piede di pullo			375
Pignasse			391
Pigno			342
Piro			123
Pisello			107
Pomodoro			230
— selvaggio spinoso			214
Pumodorella selvaggia			227
Porchiarra			133
Portogallo			61
Pratilli bianchi			81

INDEX NOMINUM TRIVIALIUM

421

Pratilli mascoli	82	Suorvo	126
Profico	305	--- peluso	203
Pruno	113, 116	Suscella	112
Prot-ca	166		
Pugnianti	331		
		T	
	R	Tabacco salvatico	222
		Tejpe	315
Radice selvaggia	16	Trenalice	402
Rafaniello	15, 16	Trccna	401
Rapa	25	Trunzo	196
Rapiciola	23		
Ravajuolo	97	V	
--- mascolo	95	Vasapiardi	481
Regano	258	Verruchio	212
Rocchiella	154	Verrvena	282
Rosa selvaggia	401	Vessa	99
Rosamarina	257	Viola	32
Rosecariello	305	--- marina	20
Rosolania	29	Vitaura	1
Rostina	119	Viticella o Vitarelle	331
Rostinella janra	120	Vorraccia	217
Ruscaja	331		
Rusco	332	U	
Rotaccio	74	Ulere	203
--- riccio	74	Urmo	206
		Una	61
		Uorio	356
	6		
Sanguiniello	152	Z	
Savico	153	Zecchetella	20, 374
Scarola	186	Zecchetelli grüssi	181
Scarelomi	185	--- minntoli	190
Sempreviva	330	Zotta de Vuoi	163
Senacoli	26		
Spalatro	74		
Spataci	332		
Sucauele	216		

INDEX GENERUM

(N mina literis cursivis impressa synonyma indicant)

	A		
		<i>Agargia</i>	167, 188
		<i>Apium</i>	140
		<i>Arbutus</i>	203
		<i>Arctium</i>	183
		<i>Arenaria</i>	83
		<i>Arenaria</i>	51, 52, 53
		<i>Arnopogon</i>	188
		<i>Artemisia</i>	171, 402
		<i>Arabis</i>	49
		<i>Arabis</i>	22
		<i>Arisarum</i>	316
		<i>Arum</i>	316
		<i>Arum</i>	316
		<i>Arundo</i>	383
		<i>Arundo</i>	382, 383, 384
		<i>Asparagus</i>	332
		<i>Asperula</i>	154
		<i>Aspidinum</i>	395
		<i>Asplenium</i>	397
		<i>Asplenium</i>	396, 400
		<i>Asphodelus</i>	343
		<i>Aster</i>	163
		<i>Astragalus</i>	95
		<i>Athanasia</i>	169
		<i>Astrolobium</i>	98
		<i>Atriplex</i>	280
		<i>Avena</i>	387
		<i>Avena</i>	385, 386
		B	
		<i>Ballota</i>	205
		<i>Barbarea</i>	21
		<i>Barbarea</i>	194
		<i>Bartsia</i>	243, 244
		<i>Batatas</i>	210
		<i>Bellis</i>	104
		<i>Beta</i>	279
		<i>Biserrula</i>	96
		<i>Blitum</i>	276
		<i>Blechnum</i>	396
		<i>Borago</i>	217
		<i>Brachypodium</i>	360
<i>Aranthus</i>	pag. 251		
<i>Acer</i>	63		
<i>Achillea</i>	109, 402		
<i>Aegilops</i>	332		
<i>Adiantum</i>	399		
<i>Agave</i>	330		
<i>Agrimonia</i>	119		
<i>Agrostis</i>	381		
<i>Agrostis</i>	380		
<i>Aira</i>	388		
<i>Aira</i>	391		
<i>Aira</i>	388		
<i>Airopsis</i>	267		
<i>Ajuga</i>	124		
<i>Akchémilla</i>	313		
<i>Alisma</i>	21		
<i>Alliaria</i>	334, 404		
<i>Allium</i>	403		
<i>Alce</i>	380		
<i>Alopecurus</i>	52		
<i>Alone</i>	51, 54		
<i>Alzine</i>	19		
<i>Alyssum</i>	272		
<i>Amaranthus</i>	200		
<i>Ambrosia</i>	140		
<i>Ammi</i>	383		
<i>Ampelodesmos</i>	112		
<i>Amygdalus</i>	112		
<i>Amygdalus</i>	205		
<i>Anagallis</i>	217		
<i>Anchusa</i>	392		
<i>Andropogon</i>	62		
<i>Androschemum</i>	197		
<i>Andryala</i>	2		
<i>Anemone</i>	142		
<i>Anethum</i>	168		
<i>Anthemis</i>	168		
<i>Anthemis</i>	75		
<i>Anthyllis</i>	75		
<i>Anthyllis</i>	238		
<i>Antirrhinum</i>	233, 278		
<i>Antirrhinum</i>			

INDEX GENERUM

425

Digitalis 239
Digitaria 375
Dimorphanthus 163
Diotis 199
Diplazis 22
Dipsacus 161
Dolichos 111
Draba 18

E

Echaliun 133
Echinochloa 375
Echinophora 131
Echium 216
Epilobium 137
Epipactis 324
Equisetum 394
Eragrostis 372
Erica 203
Erigeron 163
Erigeron 163, 166
Erodium 66
Erophila 18
Eruea 25
Eruum 106
Eruum 100, 101
Eryngium 132
Erysimum 21, 22
Erythraea 208
Eupatorium 162
Euphorbia 290
Euphrasia 243

F

Fedia 159, 160
Ferula 143
Festuca 361, 405
Festuca 361, 385, 386
Ficaria 2
Ficus 299
Filago 173
Foeniculum 142
Fragaria 119
Frasinus 205
Fumaria 10

G

Galactites 179
Galilea 318
Galium 187
Gastroidium 379
Gaudinia 355, 401
Genista 71

Gentiana 208
Geranium 61
Geum 118
Glancium 9
Gladiolus 326
Gomphocarpus 207
Gonphalium 172, 173, 174
Gossypium 60
Grammitis 399
Gymnogramme 399, 400

II

Hedera 152
Hedynois 181
Heleocharis 319
Helianthemum 30
Helichrysum 172
Heliotropium 213, 403
Helleborine 323
Helleborus 5
Helmiathia 189
Herniaria 111
Hesperis 23
Hieracium 198
Hieracium 194
Holchus 391
Holchus 391
Holoschoenus 349
Hordeum 336
Hyosciamus 221
Hypocoum 10
Hypericum 62
Hypericum 62
Hypochaeris 186

I

Imperata 392
Inula 166
Inula 167
Iris 325
Juglans 396
Juncus 314
Juncus 314
Juniperus 312

K

Kentrophyllon 180
Kerria 315
Korhia 275
Kohleuschia 34
Koeleria 385
Koeleria 386
Koniga 19

	L		Micromeria	258
			<i>Milium</i>	379
<i>Laetara</i>		191	Moenchia	54
<i>Lagenaria</i>		130	Moheringia	53
<i>Lagotis</i>		194	<i>Mollia</i>	135
<i>Lagurus</i>		378	<i>Momordica</i>	133
<i>Lagurus</i>		393	Morus	299
Laminum		263	Muscari	323
Lappa		183	<i>Myagrurn</i>	17
Lapsana		181	Myosotis	219
Lathyrus		108	Myrtus	119
Lavandula		252		N
Lavatera		10	Narcissus	328
Laurus		289	<i>Nardus</i>	322
Lemna		316	Neslia	17
Leontodon		188	<i>Neottia</i>	325
<i>Leontodon</i>	187, 192, 191	18	Nigella	5
Lepidium		81		O
Lepigonum		51	Odontites	214
Limosorum		321	Oenanthe	141
Linaria		233	Olea	206
Linum		57	Ononis	72
Lithospermum		219	Onopordon	180
<i>Lobularia</i>		19	Ophiglossum	395
<i>Logfia</i>		174	Ophrys	320
Lolium		353	<i>Ophrys</i>	320, 321
Lonicera		151	Oymnia	108
<i>Lophoclaa</i>		383	Orchis	317
Lotus		92	<i>Orchis</i>	319, 320, 321
<i>Luula</i>		311	Origanum	258
Lupinus		70	Orlaya	148
Lychnis		49	<i>Ormenis</i>	168
Lycium		231	Ornithopus	97
Lycopersium		229	Ornithogalum	331
Lycopodium		395	Orobanche	211
Lycopsis		218	<i>Orobancha</i>	250
Lysimachia		201	Ostrya	309
Lythrum		128	Osyris	289, 403
	M		<i>Othanthus</i>	162
			Oxalis	68
Malcolmia		22		P
Malva		58	Pollenis	107
Marua		168	Pancretium	328
Matricaria		170	Panicum	374
<i>Matricaria</i>		171	Papaver	6
Matthiola		20	Parietaria	298
Medicago		76	Passerina	289
Melica	384, 405		Persica	112
Melilotus		81	<i>Peristylus</i>	320
Melissa		260	Petcoselinum	140
<i>Melissa</i>		259	<i>Phagnalon</i>	165
Mentha		253	Phalaris	377
Mercenialis		291		
Mesembryanthemum		138		
Mespilus		123		
<i>Mesum</i>		142		

<i>Phalaris</i>	f	383	<i>Rosa</i>	120, 102
<i>Phaseolus</i>		110	<i>Rosmarinus</i>	237
<i>Phelipaea</i>		250	<i>Rothoella</i>	333
<i>Phillyrea</i>		206	<i>Rubia</i>	156
<i>Phleum</i>		377	<i>Rubus</i>	118
<i>Phragmites</i>		381	<i>Rumex</i>	587
<i>Picridium</i>		196	<i>Ruppia</i>	313
<i>Picris</i>		136	<i>Ruscus</i>	331
<i>Picris</i>		189	<i>Ruta</i>	98
<i>Pimpinella</i>		141		
<i>Pinus</i>		313		S
<i>Piptaltherum</i>		379	<i>Saccharum</i>	392
<i>Pistaria</i>		50	<i>Salicornia</i>	275
<i>Pisum</i>		107	<i>Sagina</i>	49
<i>Phucagrostis</i>		311	<i>Sagina</i>	84
<i>Phucagrostis</i>		314	<i>Salix</i>	314, 403
<i>Phytolacca</i>		274	<i>Salix</i>	274
<i>Plantago</i>		269	<i>Salvia</i>	256
<i>Platanthera</i>		319	<i>Salvia</i>	153
<i>Poa</i>		370	<i>Sambucus</i>	203
<i>Poa</i>		383	<i>Samolus</i>	139
<i>Polycarpum</i>		131	<i>Sanicula</i>	36
<i>Polygonum</i>		284	<i>Saponaria</i>	75
<i>Polypodium</i>		399	<i>Sarothamnus</i>	258
<i>Polypodium</i>		399	<i>Satureja</i>	320
<i>Polygonum</i>		380	<i>Satyrium</i>	139
<i>Populus</i>		309	<i>Saxifraga</i>	161
<i>Portulaca</i>		133	<i>Scabiosa</i>	150
<i>Posidonia</i>		318	<i>Scandix</i>	333
<i>Potentilla</i>		119	<i>Scilla</i>	348, 349
<i>Poterium</i>		121	<i>Scirpus</i>	370
<i>Praeanthes</i>		191	<i>Sclerochloa</i>	349
<i>Prasium</i>		265	<i>Schoenus</i>	348
<i>Prunella</i>		261	<i>Schoenus</i>	396
<i>Prunus</i>		114	<i>Scelopendrium</i>	183
<i>Psidium</i>		352	<i>Scolymus</i>	96
<i>Psoralea</i>		91, 401	<i>Scorpiurus</i>	196
<i>Pteris</i>		398	<i>Scorzonera</i>	238
<i>Pulicaria</i>		167	<i>Scrophularia</i>	356
<i>Punica</i>		129	<i>Secale</i>	136
<i>Pyrethrum</i>		171	<i>Sedum</i>	175, 402
<i>Pyrus</i>		123	<i>Senecio</i>	322
	Q		<i>Serapias</i>	324
<i>Quercus</i>		307, 403	<i>Serapias</i>	183
	R		<i>Serratula</i>	157
<i>Ranunculus</i>		2	<i>Seriola</i>	373
<i>Raphanus</i>		15	<i>Setaria</i>	151
<i>Rapistrum</i>		17	<i>Sherardia</i>	138
<i>Rapistrum</i>		17	<i>Sideritis</i>	261
<i>Reseda</i>		27, 401	<i>Silene</i>	36, 401
<i>Rhagadiolus</i>		181	<i>Silybum</i>	151
<i>Rhamnus</i>		69	<i>Sinapis</i>	25
<i>Romulea</i>		327	<i>Sinapis</i>	23
			<i>Sisymbrium</i>	22
			<i>Sisymbrium</i>	23
			<i>Smilax</i>	331

<i>Smyrniun</i>	154	<i>Tulipa</i>	332
<i>Solanum</i>	223	<i>Tussilago</i>	163
<i>Solidago</i>	164		U
<i>Sonchus</i>	196		
<i>Sonchus</i>	196	<i>Ulmus</i>	305
<i>Sorbus</i>	126	<i>Umbilicus</i>	135
<i>Sorghum</i>	321	<i>Urachne</i>	379
<i>Spartium</i>	73	<i>Urospermum</i>	188
<i>Spartium</i>	73, 75	<i>Urtica</i>	295
<i>Specularia</i>	201		V
<i>Spergula</i>	50		
<i>Spiranthes</i>	325	<i>Vaillantia</i>	159
<i>Stachys</i>	261	<i>Valeriana</i>	161
<i>Statice</i>	267	<i>Valeriana</i>	160
<i>Stellaria</i>	81	<i>Valerianella</i>	15, 402
<i>Stipa</i>	378	<i>Verbascum</i>	231
<i>Symphytum</i>	248	<i>Verbena</i>	231
		<i>Veronica</i>	240
		<i>Viburnum</i>	153, 402
		<i>Vicia</i>	98
		<i>Vinca</i>	207
		<i>Viola</i>	32
		<i>Vitex</i>	252
		<i>Vitis</i>	63
		<i>Vulneraria</i>	75
			W
		<i>Woodwardia</i>	320
			X
		<i>Xanthium</i>	201
			Z
		<i>Zacintha</i>	195
		<i>Zea</i>	393
		<i>Zizyphus</i>	69
		<i>Zostera</i>	311
		<i>Zostera</i>	313

Errata

Corrige

pag.	lin.		
2	3	ab infra sep.	neep.
3	15	ab in. <i>De</i> , et <i>Ten. f.</i>	<i>Dec. et Ten. l.</i>
4	3 et 30	ab in. <i>Baba'</i>	<i>Ombrasco</i>
8	20	foveolata	foveolata
16	8	ab in. oblongi	oblongis
17	18	strangula	strangulato-
17	15	leularum	licularum
30	11	<i>Mareoc</i>	<i>Mareococo</i>
31	19	puberulis	puberulis
31	8	ab in. similes	similes
33	18	pallidus	pallidus
35	3	ab in. obovata	obovato
41	8	pedunculi	pedunculi
44	3	ab in. inflato	inflata
51	7	ab in. deficiant	deficiunt
74	7	<i>Smith</i>	<i>Sibth.</i>
79	7	ab in. e	et
83	10	ab in. <i>Cor.</i>	<i>Cor.</i>
85	3	sulosa	rufoa
90	3	<i>Baba'</i>	<i>Ombrasco</i>
96	14	ab in. var.	var.
96	7	inserta	insertas
97	15	pedunculatis	pedunculatis
111	19	<i>Fasolilla</i>	<i>Fasolilla</i>
111	6	ab in. <i>Oxyanthum</i>	<i>Oxyanthum</i>
120	13	var. e.	var. b.
120	13	var. e.	var. b.
138	9	e n ^o <i>songli</i>	e n ^o <i>songli</i>
151	9	ab in. <i>Costasavum</i>	<i>Costasavum</i>
168	6	ab in. post <i>Guaiaco</i>	adde, ad
209	10	337	337
234	3	ab in. <i>Chou</i>	<i>Chou.</i>
243	13	ab in. idoque	ideoque
267	5	vevo	vero
273	3	ab in. ascendentes	descendentes
276	9	ab in. post commani	dele j
288	1	3	5
297	3	praeter hoc caractere	etiam hujus caractereis
318	13	ab in.	dele a post <i>Uticella</i>
325	11	albi	albi
329	6	isti	isti
333	34	floris	floras
338	14	pedunculati	pedunculati
347	17	ab in. 70	50
560	7	<i>Berol</i>	<i>Berol.</i>
561	3	stipatis	stipatis
563	3	<i>Trachynia</i>	<i>Trachynia</i>
571	19	ab in. at	et
574	16	ab in. rubescent	rubescent
578	16	ovatus	ovatus
583	4	thyn. 3	3
589	11	seyn	syn.

Napoli 22 Marzo 1854.

CONSIGLIO GENERALE

DI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la dimanda del Tipografo Francesco Saverio Lanciano con che à chiesto di porre a stampa l'opera intitolata : *Enumeratio plantarum Vascularium* ec.

Visto il parere del Regio Revisore signor D. Domenico Presutti.

Si permette che l'indicata opera si stampi; però non si pubbli-
chi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso
Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confron-
to esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Presidente

M. APUZZO.

Il Segretario Generale

GIUSEPPE PIETROCOLA.

98 548173



F. Tamarit des *F. Annunculus* Chry. *F. Imperialis* var
F2 Silene Gussii



G. Sannelli del. F. 1. *Fumaria Tordani*. G. Imperato inc.
 F. 2. *negruia*.



*Tamarix serotena*





G. Jannelli del.

G. Imperato inc.

Daucus setulosus.



F. Sannelli, del.

P. Imperato, inc.

Daucus nitidus




Calendula micrantha Desf.

Calendula micrantha Desf.


Calendula micrantha



F. 1. Helictotropium tenuiflorum / *F. 3. europaeum*
2. — macrocarpum / *4. — Boissieri*



F. 1. *Senecio acutangula* L. *maritimensis*
 F. 2. *Senecio cuneata*



G. Sannelli del. F. 1. *Linaria Pastandracae*. G. Imperato del.
F. 2. *Linaria graeca*.



F. 1. *Mentha inarimensis*
 F. 2. *M. viridis* v. *neapolitana*



F. 1. *Mentha ambigua*
 F. 2. *Stachys marrubifolia*



J. Sannelli, des.

Des. Imperato, inc.

Fig. 1. *Stutice inarimensis*


Fig. 2. *Polygonum gracile*



L. Sannelli des.

Pas. Imperato inc.

Kochia . Scariola



Gladiolus inarimensis.



F. 1. *Iris canaliculatus*
 F. 2. *Iris sordida*.



1 *Allium Gasparinii*
 2 *Allium Ampeloprasum*



Allium commutatum.



S. Farnella, dis.

Osa, Imperato, inc.

Osa sylvicola



§ Sannelli det F. 1 *Polypogon ascendens* § Imperato inc
 F. 2 *Lydaria gracilis*



J. Junceus var.

F. 1. Juncus Capillaris

2. — *Corsica*

3. — *Cupanensis*

J. Torquatus var.



PREZZO DELL'OPERA

1866. 2 -- Fr. 21