




**THE
GEO. M. GREENE
COLLECTION**





JOHNSON & SONS,
44, LUDGATE HILL,
LONDON, W.C.

INSECTA SVECICA DESCRIPTA

A

LEONARDO GYLLENHAL

EXCUB. PRAÆF. ET EQUIT. AUR. ORD. DE WASA;
REG. ACAD. SCIENT- HOLMENSIS ET SOCIET.
SCIENT. UPSAL. MEMBRO, UT ET REG.
ACAD. OECON. CORRESP.

Leonard Gyllenhal

CLASSIS I.
COLEOPTERA
SIVE
ELEUTERATA

TOMI I, PARS III.
To H. S. Barber
from Geo. M. Green 3/2/42

SCARIS
Litteris F. J. LEVERENTZ, 1813.



AUCTORES CITATI,

CUM EXPLICATIONE ABBREVIATIONUM;

Continuatio.

- Bonsd. Curc. : , - Diss. Acad: Historia Naturalis Curculionum Sveciæ, Auft. G. Bonsdorff; P. 1 & 2 Ups. 1785. 4:o.
- Coqveb. Illustr. - , J. A. Coqvebert, Illustratio Iconographica Insectorum, qvæ in Musæis Parifinis observavit & in lucem edidit Joh. C. Fabricius. Tabularum Decades 1-3. Parisiis An. 7-12. 4:o Maj.
- Forst. Cent. - , Novæ Species Insectorum, Centuria æ, Auft. Joh. R. Forster. Londini 1771. 8:o.
- Hoppe Inf. Erl. . , Dav. Henr. Hoppe Enumeratio Insectorum Elytratorum circa Erlangam Indigenarum, &c. Erlangæ 1795. 8:o
- Knoch. Beytr. . , Beyträge zur Insecten-geschichte, von Aug. Wilh. Knoch. Leipzig 1781-83. 8:o.
- Latreille Gen. Inf. . , P. A. Latreille Genera Crustaceorum & Insectorum, secundum Ordinem Naturalem in Familias disposita, Iconibus Exemplisque plurimis expedita. Parisiis & Argentorati, 1806-7. Tom. 1-3. 8:o.
- Linn. Mant. : , C. Linnaei Mantissa plantarum altera, Generum Editionis VI. & specierum Edit. II. Holmiae 1771, 8:o.

Linn. Pand. & Fl. Ryb. Pandora & Flora Rybyensis;
Diss. Acad. Præf. c. Linnæo,
Upl. 1771. 4:o.

Reich. Mant. . . . Mantissæ Insectorum, Iconibus
illustratæ. species novas aut
nondum depictas exhibens, fa-
sciculus I, Auft. God. Chr.
Reich, Noribergæ 1797. 8:o

CLASSIS I.
COLEOPTERA:

SECTIO III.

TETRAMERA.

Tarsi omnes articulis quatuor.

Familia I. Bruchelæ.

Caput insertum, deflexum, in rostrum latum depresso productum. Antennæ ante oculos insertæ; plerumque extrorsum crassiores. Elytra abdomine breviora, anum non tegentia.

ANTHRIBUS.

Palpi quatuor æquales filiformes. Labium emarginatum. Maxilla bifida. Antennæ rostro plano insidentes, articulis inferioribus simplicibus cylindricis, ultinis 3 s. 4 crassioribus remotis, apicis acuminato. Caput insertum, absque collo, nec posterius angustatum. Elytra apice inflexa. Femora postica vix vel parum incrassata.

I. A. latirostris: oblongus niger subdepressus, rostro rugoso, fronte, elytrorum Ins. Svec. T. I, P. III. A

apice abdomineque cinereo-pilosis, thorace angulato, postice striga transversa elevata.

Fabr. Eleut. 2. 408. 16. *Herbst. Col.* 7. 160. 2.
Tab. 106. f. 3. *Payk. fn. 3.* 159. 1. *Panz.*
fn. 15. f. 12.

Macrocephalus latirostris. *Oliv. Ent.* 4. 80. 7.
6. *Tab. 1. f. 6.*

Curculio latirostris. *Bonsd.* *Circ.* 1. 17. 2. fig.
2. 3.

Habitat in truncis Fagi, Alni, Betule,
passim.

Descr. A. albino plerumque duplo major, sed variat etiam magnitudine minori. Caput magnum latum nigrum, cum rostro oblongo-quadratum, planum, inaequale, rugoso-punctatum, rostro fronteque totis pube depressa albidio cinerea tectis; oculi globosi prominuli brunnei. Antennæ thorace breviores nigro-piceæ, tenues, articulis tribus ultimis magnis compressis. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus pone medium in lobum sub-bidentatum dilatus, supra depresso, valde inaequalis, profunde rugosus et punctatus; intra basin carinula transversa lunata utrinque, et paullo anterius linea elevata sub-obliqua, e lobo lateralí exiens, in medio fere interrupta. Scutellum minutum inaequale nigrum, cinereo-pubescent. Elytra thoracis basi multo latiora, et illo fere triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra dorso plana, fere impressa, nigra, sat profunde, sed minus regulariter punctato-striata; apex totus e pube densa depressa late cinereo-albidus, cum puncto fusco didymo in futura; margo anticus plagæ albidæ undulatæ dentatus; in speciminiibus illæsis

præ-

præterea fasciæ tres, valde undulatæ et quasi maculæ, e pube fusco-cinerea, intermixtis maculis atro-holofericeis; pube detrita, apex totus, ut et maculiæ baseos, rufo-picea. Anus extra elytra, et venter subtus, pube densa cinereo-albida, interdum nivea, tecta; corpus reliquum subtus nigrum, parce punctatum, tenue pubescens. Pedes mediocreis nigri. fasciis crebris cinereo-albidis variegati; femora omnia in medio crassiora, sub-æqualia.

2. A. albinus: oblongus nigro-fuscus, convexus, fronte, rostro, fascia antennarum, elytrorum macula disci apiceque albo-pilosus, thorace tri-tuberculato.

Fabr. Eleut. 2. 408. 15. Herb. Col. 7. 153 1.
Tab. 106. f. 1, 2. Payk. fn. 3. 160. 2. Panz.
fn. 3. f. 16.

Curculio albinus. Linn. Syst. 2 616. 79. Fn. Sv.
632. De Geer Ins. 5. 255. 44. Tab 8. f.
1. 2. Knoch. Beytr. 1. 81. 1. Tab. 6. f. 1-
7. Bonsd. Cure. 1. 16. 1. fig. 1.

Macrocephalus albinus. Oliv. Eat. 4. 80. 5. 4.
Tab. 1. f. 4. a, b.

Habitat in truncis Quercus, Betulæ, Salicis,
passim.

Descr. Magnitudo valde variat. Caput magnum deflexum, cum rostro lato depresso oblongo quadrangulum, carinula media tenui, supra os albida; nigrum, fronte tota, rostroque supra pube nivea densa depressa tectis; oculi parvi laterales prominuli brunnni. Antennæ nigrae, fusco-pubescentes, articulo octavo toto, nono basi niveo-pubescentibus; ma-

ris saepe corpore longiores, articulo ultimo elongato acuto; feminæ aut longitudine dimidii corporis, aut breviores, extrosum magis incrassatæ, articulo ultimo brevissimo acuto. Thorax basi spiceaque truncatus, antice paullo angustior, compressus, lateribus nonnihil rotundatus, posterius et basi tenuè marginatus, supra valde convexus, crebre subtiliter rugoso-punctatus, niger, pube densa depresso-fusco-brunnea obductus, margine antico inæqualiter niveo-pilosus; in medio dorsi tubercula tria elevata, transversim posita, pilis atro-holo-sericeis fasciculata. Scutellum minutum punctiforme niveo-pilosum. Elytra thorace paullo latiora et triplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, profunde punctato-striata, nigra, pube fusco-brunnea testa; apex totus late inæqualiter niveo-pilosus, cum macula communis fusca in ipso apice; in disco antico, juxta suturam, macula lobata nivea; in disco interiori series e fasciculis 5 vel 6 atro-holo-sericeis pilosis. Anus extra elytra fuscus. Corpus subtus nigrum, sed thorax pube fusco brunnea tectus; pectus pube nivea variegatum; venter totus pube nivea tectus, maculis marginalibus tantum denudatis. Pedes validi nigropicei; annulis niveo- et brunneo-pilosis.

3. *A. albirostris*: oblongus nigro-fuscus, rostro elytrisque postice albis nigro-varillis, oculis approximatis, thoracis striga elevata sub-recta.

Fabr. Eleut. 2. 408. 17. *Herbst. Col.* 7. 162.
3. Tab. 106. f. 4. D. Payk. fu. 3. 162. 3. a.
Panz. fn. 15. f. 13.

Macrocephalus albirostris, *Oliv. Ent.* 4. 80. 7. 7.
Tab. 1. f. 7. a, b.

Habi-

Habitat in Sylvaticis Scaniæ, Savolaxiæ, rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Minimis præcedentis speciei individuis adhuc minor. Caput deflexum nigrum, rostro lato elongato plano, apice dilatato, supra pube alba seu nivea vistito. et fulculo tenui impresso; oculi magni ovati depresso brunnei, in fronte fere conniventes. Antennæ vix longitudine thoracis, nigræ, clava albido-pilosa. Thorax antice multo angustior, truncatus, lateribus obliquis sub-rectis, postice bi-sinuatus, supra modice conexus niger, sat profunde punctatus, foveolisque quatuor dorsalibus impressus, pube griseo-albida hinc inde adspersus; paullo ante basin striga transversa elevata sub-recta, ad latera antorsum arcuata. Scutellum minutum rotundatum albo-pilosum. Elytra thoracis basi parum latiora, et illo vix triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra, profunde punctato-striata; ante medium macula lobata obsoletior albo-pilosa, et in apice plaga magna niveo-pubescentia, maculam magnam palmatam nigram exterius includens; versus suturam series e fasciculis atro-villosis, saepe detritis. Corpus subtus nigrum, albido pubescentia. Pedes mediocres nigri, annulis albido-pubescentibus variegati.

q. A. dorsalis: oblongus niger, rostro, thoracis lateribus, elytrorum macula communis rhombea, punctisque niveis, thoracis striga elevata arcuata.

Thunb. *Mus. Ups.* app. 4. 146.

Anthribus albirostris. Payk. fn. 3: 162. 3. var. b.

Habitat in Sveciæ australis frutetis, rarius.

Descr. Præcedenti dimidio major et ultra, co-
iore et striga thoracis arcuata distinctus. Caput de-
flexum, rostro lato elongato plano, apice dilatato,
rotundato, supra, una cum fronte et capitis lateri-
bus pube nivea testo, vertice solo nigro; oculi ma-
jusculi ovati nigri, in fronte minus approximati
quam in priori. Antennæ thorace longiores nigræ
pubescentes, clava magna tri-articulata atre. Tho-
rax antice multo angustior, truncatus, lateribus ob-
liquis subrectis, postice sinuatus, supra dorso parum
convexus, niger, obsolete punctatus & foveolatus;
latera subtus late albo pubescentia, & in dorso linea
longitudinalis albida angulata; intra basin striga ele-
vata sinuata, in medio nempe angulum posterius e-
mittens, & versus latera utrinque arcuata. Scutel-
lum punctiforme niveo-pilosum. Elytra thorace la-
tiora & triplo longiora, apice rotundata, supra con-
vexa, nigra, sat profunde punctato-striata; interstitia
alterna serie e fasciculis atro-holoericis & albidis
alternantibus tessellata, & in dorso antico plaga ma-
gna communis sub-rhombea, dense albo-pubescentis.
Corpus subtus nigrum, albido pubescens, Pedes me-
diores nigri, annulis albidis,

5. A. niveirostris: oblongus nigro-fuscus,
antennis ferrugineis, rostro brevissimo,
elytrorum apice anque niveo-pilosus.

Fabr. Ent. 2. 499. 18.

Macrocephalus niveirostris. Oliv. Ent. 4. 80. 8.
8. Tab. 1. f. 8. a, b.

Anthribus brevirostris. Panz. fn. 57. f. 9. Crit.
Rev. 1. 122.

Curculio brevirostris. March. Ent. Br. 1. 295.
168.

Habi-

Habitat in Coryletis, ad montem Kinna-kulle Westrogothicæ rarissime lectus.

Descr. Statuta præcedentium, sed A. albi-rostris duplo minor, & abunde distinctus. Caput deflexum, rostro lato plano brevissimo, apice rotundato, pube densa nivea tecto; oculi laterales brunnei. Antennæ longitudine thoracis, tenues ferrugineæ, clava crassa obtusa. Thorax antice angustior, truncatus, lateribus obliquis, sub-rectis, ante basin angulum formantibus, basi truncatus, supra modice convexus, niger, fusco-pubescent, immixtis hinc illuc pilis albidis; ante basin striga transversa recta valde elevata, & pone illam thorax declivus, angustatus, cum linea media alba. Scutellum punctiforme albo-pubescent. Elytra thorace paullo latiora, & triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigro-fusca; sat profunde punctato-striata, apice toto late albo-pubescente immaculata; interstitia alterna fasciculis atro-holosericeis & albidis tessellata. Anus extra elytra planus rotundatus albo pubescens. Corpus subitus nigro-fuscum, cinereo-pubescent. Pedes annulsi obsoletis albidis variegati, femoribus nigris antibus, tibiis tarsque fusco-ferrugineis.

6. A. cinctus: oblongo-ovatus niger, cinereo-pubescent, capite elongato, thorace striga postica elevata transversa arcuata.

Payk. ju. 3. 164. 6.

Anthribus marchicus. Herbst. Col. 7. 167. 9.
Tab. 106. f. 8. E?

Habitat in Svecia Australi rarius. Dom. de Paykull,

Descr. Minutus, statura A. niveirostris, sed triplo minor. Caput magnum elongatum deflexum nigrum, fronte rostroque planis, pube densa griseo-albida tectis; oculi magni ovati brunnei, parum prominuli. Antennæ longitudine thoracis, fuscopiceæ, articulo primo crasso cylindrico, secundo longo ob-conico, apice incrassato, 3-8 elongatis, valde tenuibus; 9, 10, crassioribus truncatis, ultimo adhuc crassiori ovato obtuso. Thorax antice angustior, sub-rotundatus, compressus lateribus obliquis immarginatis, versus bafin angulatis, postice truncatus, supra modice convexus, niger opacus, crebre obsolete punctulatus, tenue pubescens; pone medium striga transversa valde elevata, arcuata, & pone illam thorax valde declivus. Scutellum punctiforme cinereo-pubescens. Elytra thorace parum latiora, sed triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, pube depressa cinerea inæqualiter variegata. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, pubescens. Pedes mediocrem nigro-picei pubescentes.

Obs. Synonymon Herbstii minus certum, quoniam strigam elevatam thoracis non memorat.

7. A. **Scabrosus:** ovatus niger, elytris punctato-striatis rufis, interstitiis alternis elevatioribus, fasciculis atro-holofericeis albidisque alternantibus tessellatis.

Fabr. Eleut. 2. 411. 27. Herbst. Col. 7. 164. 5.

Tab. 106. f. 5. B. Payk. fn. 3. 163. 4. Panz. fn. 15. f. 15.

Macrocephalus scabrosus. Oliv. Ent. 4. 80. 14. 20. Tab. 2. f. 20. a, b, c.

Var.

Var. b, Elytris nigris, macula magna humerali rufa, pedibus rufo nigroque variis.

Habitat in Rhamno Cathartico Uplandiæ rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Statura brevis ovata ferè Byrrhi, & B. æneo paullo minor. Caput parvum deflexum rotundatum nigrum opacum pubescens, fronte plana rugoso punctata; os piceum; oculi parvi globosi brunnei, Antennæ thorace multo breviores nigrae, clava magna compressa obtusa tri-articulata. Thorax brevis transversus, antice in medio rotundatus, utrinque sub-emarginatus, angulis obtusis, lateribus subrectis, postice profunde bi-emarginatus, angulis retrosum valde productis acutis; supra disco valde convexus, pulvinatus, totus niger opacus, crebris punctatus, pube cinereo albida, saepe in lineas digesta, adspersus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thorace latiora et vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, rufa sub-opaca, profunde punctato-striata, interstitiis alternis paullo elevatoriis, maculis oblongis atro holosericeis & cinereo-albidis alternatis tessellatis; sutura & margo exterior ab apice ultra medium infuscata. Anus extra elytra rotundatus planus rufus, nigro-marginatus. Corpus subtus nigrum punctatum, cinereo-pubescentia. Pedes breves validi nigro-picei, pilis albidis hinc inde irrorati,

Var. b, differt: elytris nigris, macula magna quadrata rufa in ipso humero; interstitia elytrorum alterna maculis cinereis tessellata; anus niger; pedes rufo-ferruginei, femoribus & tibiis basi apiceque tarsisque nigro-piceis; cætera ut in præcedenti omnino.

8. A. varius: ovatus nigro-fuscus opacus, thorace cinereo-lineato, elytris maculis cinereis sub-quadratis tessellatis.

Fabr. Eleut. 2. 411. 29. *Payk. fn.* 3. 165. 5.
Panz. fn. 15. f. 16. *Herbst. Col.* 7. 165. 6.
Tab. 106. f. 6. C?

Macrocephalus varius. *Oliv. Ent.* 4. 80. 16. 22.
Tab. 2. f. 22. a, b.

Habitat in frondibus abietis passim; etiam in floribus pratorum sylvestrium; hibernat in rimis corticis Pini abietis.

Descr. Statura omnino praecedentis, sed plerumque duplo, imo triplo & quadruplo minor. Caput parvum deflexum oblongo-triangulare nigro fuscum, fronte plana rugoso punctata pubescente; oculi laterales globosi brunnei. Antennae thorace multo breviores, nigræ, articulis duobus primis magnis crassis, 3-8 parvis coarctatis, ultimis tribus iterum magnis, clavam latam compressam obtusam formantibus. Thorax antice rotundatus, angulis compressis, unde ibi multo angustior appareat, lateribus sub-rotundatus, immarginatus, postice bi-finuatus, angulis sub-acuminatis; supra valde convexus, pulvinatus, totus nigro-fuscus opacus, crebre rugoso-punctatus; in dorso lineæ tres, puncta duo disci, paria & lineolæ aliquot laterales abruptæ, e pilis cinereo-albidis. Scutellum parvum rotundatum, cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi parum latiora, & illo vix triplo longiora, sub-quadrata, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, nigro-fusca, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis planis subtilissime rugosæ; in intersticiis alternis disci maculæ sub-quadratae nigriores & cinereo-pilosæ alternantes, seriatim dispo-

spositæ. Corpus subtus nigro-fuscum punctatum, tenui pubescens. Pedes breves validi nigro-picei pubescentes.

Obs. A. varius Herbstii l. c. forte potius var. obscura A. Scabrosi.

B R U C H U S.

Palpi inæquales filiformes. Labium membranaceum sub-emarginatum, ciliatum. Maxilla bifida. Antennæ filiformes, plerumque serratae. Caput exsertum, postice in collum angustatum. Elytra abdomine breviora. Femora postica incrassata, sepe dentata.

1. *B. granarius*: ovatus niger, thorace elytrisque albo punctatis, antennarum basi pedibusque anticus rufo-testaceis, femoribus posticis unidentatis.

Linn. sust. 2. 605. 5. Fabr. Eleut. 2. 399. 24.

Oliv. Ent. 4. 79. II. 10. Tab. I. f. 10. a, b.

Payk. fn. 3. 157. I. Panz. fn. 61. f. 3.?

Circulio atomarius. Linn. fn. 628.

Var. *b*, duplo minor, parum albo-punctatus, an mas?

Habitat in floribus, præsertim Orobis tuberosi, sat frequens.

Descr. Byrrho Scrophulariæ paullo major. Caput angustum deflexum nigrum opacum, creberrime subtiliter punctulatum, collo longiori thoraci adnexum; oculi lunati prominuli nigri. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, articulis quatuor baseos

angustioribus rufo-testaceis, sequentibus multo crassioribus perfoliatis atris, ultimo ovato, oblique subacuminato. Thorax brevis transversus, antice angustior, rotundatus, lateribus immarginatus, in medio nonnihil sinuatus, & ante sinum fasciculo parvo pilorum, dentem mentientem notatus; postice bi-sinatus, angulis acuminatis; supra modice convexus, niger opacus, subtiliter rugoso-punctatus, pilis cinereo-albidis, praesertim versus margines, adspersus; in medio dorso puncta duo parva paria albida, & in medio baseos macula major triangularis, e pilis depresso albidis. Scutellum parvum oblongo-quadratum albido-pilosum. Elytra thorace multo latiora, & pone basin adhuc magis dilatata, apice obtuse rotundata, abdome breviora, supra parum convexa, nigra subnitida, regulariter punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis; in ipsa sutura pone scutellum lineola griseo-albida, & praeterea puncta plura parva albo-pilosa sparsa, praesertim posterius. Podex, sive apex abdominis pone elytra rotundatus, pubes tenue cinereo-argentea tectus, maculis duabus oblongis fuscis. Corpus subtus valde convexum, totum nigrum, subtilissime punctulatum, tenue sericeo-pubescentes. Pedes primi paris tenues rufo-testacei, femorum basi tarsisque nigro-fuscis; reliqui nigri, posticii multo longiores, femoribus clavatis, subtus ante apicem dente acuminato armatis.

Var. b. duplo minor, punctis perplicatis albidis in elytris notatus & podice minus pubescente diversus, cæterum simillimus.

Obs. Inter centena specimenia lustrata, nullum vidi antennis totis, pedibusque etiam intermediis testaceis, adeoque var. b, Cl. Dom. Paykullii loc. cit, mihi plane ignota,

2. B. Loti: ovatus niger, griseo-pubescentis,
antennarum basi pedibusque anticis rufo-
testaceis, femoribus posticis uni-dentatis.

Payk. fn. 3. 158. 2.

Habitat in floribus Loti corniculati, in Up-
landia, mensē Junio, *Dom. de Paykull*; in
Westrogothia, ipse.

Descr. Sratura præcedentis, & magnitudo fere
var. b, ejus, cui valde similis & affinis, differt ta-
men pubescens tenui æqualiter sparsa, nec in ma-
culas condensata, ut & thoracis lateribus integris,
&c. Capitis structura ut in præcedenti omnino,
nigrum opacum, crebre rugoso-punctatum, pube-
scens, ore rufo-piceo; oculi lunati prominuli nigri.
Antennæ ut in priori, etiam quoad colorem. Thorax
brevis transversus, antice angustior, rotundatus,
lateribus integer, postice bi-sinuatus, angulis acu-
minatis; supra convexus, niger crebre subtiliter ru-
goso-punctatus, pube tenui depressa, cinerea undi-
que æqualiter obductus. Scutellum punctiforme,
densius griseo-pubescentis. Elytrorum forma ut in
præcedenti omnino, supra parum convexa, nigra,
regulariter punctato-striata, interstitiis subtiliter co-
riaceis, pube simili ac thorax adspersa; pone scutel-
lum, in ipsa futura, lineola e pube densiori grisea;
sed in disco maculæ omnino nullæ. Pedes niger,
tenue pubescens, immaculatus. Corpus subtus ni-
grum subtilissime punctulatum; ventre pube densio-
ri sericea vestito. Pedes ut in præcedenti omnino;

3. B. Cisti: ovatus niger, tenui griseo-pube-
scens, antennis longioribus basi obscure
ferrugineis; femoribus muticis,

Fabr.

Fabr. Eleut. 2. 400. 26. Oliv. Ent. 4. 79. 22.
30. Tab. 3. f. 30. a, b. Payk. fn. 3. 159. 3.
Panz. fn. 66. f. 15.

Bruchus ater. Marsh. Ent. Br. 1. 236. 4.

Habitat in floribus Cisti Helianthemi, passim.

7. Descr. Magnitudo; statura & facies præcedentis, sed differt antennis longioribus, pedibus totis nigris, femoribus muticis. Caput quoad structuram ut in præcedentibus omnino, nigrum opacum, creberrime subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Antennæ longitudine dimidii corporis, extrorsum crassiores nigrae, articulis quatuor baseos tenuioribus obscure ferruginea, supra fuscis. Thorax brevis transversus, antice angustior, rotundatus, lateribus obliquis integris, postice bi-sinuatus, angulis prominulis acutis; supra modice convexus, totus niger, crebre rugoso-punctatus, pube tenuissima grisea adspersus. Scutellum minutum, densius griseo pubescens. Elytra ut in prioribus; tota nigra, punctato-striata; intersticiis subtiliter coriaceis, pube subtilissima grisecente, nullibi condensata, adspersa. Podex & corpus subtus nigra; subtilissime punctulata, tenue griseo-pubescentia. Pedes omnes toti nigri, postici multo longiores & crassiores, femoribus omnino muticis.

4. B. seminarius: oblongo-ovatus niger; pube grisea sub-variegatus, antennarum basi, genubus tibiisque anterioribus rufostaceis, femoribus muticis.

Linn. syst. 2. 605. 6. Fabr. Eleut. 2. 400. 29.

Oliv. Ent. 4. 79. 12, 12. Tab. 2. f. 12, a,

b. Marsh. Ent. Br. 1. 236. 3.

Habi-

Habitat in floribus Hollandiæ, Scaniæ, rai-
rius.

Deser. Parvus, proxime præcedentibus angu-
stior, sed non brevior, oblongo-ovatus, & vere di-
stinctus. Caput oblongum deflexum, collo longo
& crasso thoraci adnexum, totum nigrum sub nitidum,
creberrime subtiliter punctulatum, ore piceo;
oculi lunati brunnei prominuli. Antennæ longitudi-
ne dimidii corporis, articulis quatuor baseos angu-
stioribus rufo-testaceis, sequentibus multo latioribus
compressis nigris. Thorax latitudine baseos parum
brevior, antice multo angustior, rotundatus, lateri-
bus obliquis integris, postice bi sinuatus, angulis
prominulis; supra modice convexus, totus niger,
crebre rugoso-punctatus, pube grisea depressa, in lo-
bo medio baseos magis condensata, adspersus. Scut-
ellum minutum nigrum, parum griseo-pubescentia.
Elytrorum forma ut in prioribus, supra parum con-
vexa, nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter
coriaceis, pube longiori grisea depressa obducta;
Podex & corpus subtus nigra, creberrime punctula-
ta, pube grisea subnitida obducta. Pedes quatuor
anteriores tenues rufo-testacei, femoribus a basi ul-
tra medium nigris, tarsis fusco-ferrugineis, postici
multo longiores & crassiores, toti nigri; femoribus
muticis;

Familia 2:da Curculionites

Caput in rostrum, sœpe valde elongatum
corneum, producētum. Os parvum, in
apice rostri situum. Palpi minuti, articu-
lo

lo ultimo conico. Antennæ rostro insidentes, longe ante oculos insertæ. Corpus convexum, plerisque durum.

Sect. I. Recticornes.

Antennarum articulo primo sequentibus parum longiori, nec angulatim fracto.

ATTELABUS.

Palpi filiformes, articulo ultimo conico acuminato. Maxilla brevis lata membranacea bifida. Antennarum clava oblonga perfoliata, articulis coarctatis. Caput exsertum elongatum, plerunque postice attenuatum; rostrum breve crassum. Tibiae anticae apice spinis armatae.

i. A. Coryli: niger glaber, thoracis margine postico, elytrisque crenato-striatis totis rufis, rostro, capite thoraceque sulcatis.

Linn. syst. 2. 619. 1. Fn. Sv. 638. Fabr. Eleut. 2. 416. 1. Herbst. Col. 7. 143. 1. Tab. 105. f. 5. Payk. fn. 3. 168. 1.

Var. b, Thorace supra rubro, macula anticæ oblonga nigra.

Curculio ex-coriato-ruber. De Géer Inf. 5. 257. 46. Tab. 8. f. 3. 4.

Var. c, Thorace supra rubro, macula obsoleta nigro-fusca; femoribus basi rufescensibus,

Var. d.

Var. *d*, Thorace supra rufo-testaceo immaculato, femoribus rufis, apice nigris.

Fabr. Payk. Herbst. loc. cit. var. *b*.

Attelabus Avellanæ. Linn. syst. 2. 619. 2.

Attelabus Coryli. Panz. fn. 100. f. 8.

Habitat in frutetis, præfertim in *Coryli* foliis; var. *b*, frequens, *a* & *c*, rarius occurunt.

Descr. Major in hoc genere. Caput oblongum; posterius valde angustatum, fere ob-conicum, collo tenui thoraci adnexum, totum nigrum nitidum, obsolete strigosum, fronte tenue canaliculata; oculi globosi prominuli brunnei; rostrum capite brevius, crassum, arcuatum, supra late canaliculatum, punctatum, nigrum, ore piceo. Antennæ capite parum longiores, nigrae, articulo primo crassiore ob conico; 2 brevi nodoso; 3-7 ob-conicis, sensim paulo crassioribus, ultimis quatuor adhuc paullo majoribus, coarctatis, clavam oblongam acuminatam formantibus. Thorax fere conicus vel triangularis, antice valde angustatus, basi truncatus, supra parum convexus, niger nitidus, sub-inæqualis, obsolete strigosus, margine postico late rufo-ferrugineo; in medio dorsi canalicia abbreviata & intra basin striga transversa profunde impressa. Scutellum semi-orbiculatum nigrum depresso. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, oblongo-quadrata, apice singulatim rotundata dehiscentia, supra convexa, ante medium dorsi impressa, tota rubra vel rufo-testacea, parum nitida, sat profundè crenato-striata, intersticiis sub-rugosis; sutura tota, ut & interstitium secundum quartumque a sutura antice elevata. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, confer-

tissimum

tissime & sat profunde punctatum. Pedes elongati nigri, femoribus clavatis, interdum macula piceo-ferruginea oblonga notatis.

Var. b. differt, thorace supra rubro, margine antico, & macula oglonga disci majori vel minori, nigredine apicis connexa, nigris.

Var. c. simillima var. b. sed macula thoracis minor, obsoletior, tantum fusca, & femora magis ferrugineo-tincta, praesertim versus basin

Var. d. thoracem gerit totum rufo-testaceum immaculatum & femora etiam rufo-testacea, genubus plus minusve nigris; cæterum omnes quoad minimm punctum simillimi.

2. A. Curculionoides: niger glaber, thorace, elytris, antennarumque basi rufis, capite cylindrico, elytris subtilissime punctato-striatis.

Linn. Syst. 2. 619. 3. Fabr. Eleut. 2. 420. 22.

Herbst. Col. 7. 145. 2. Tab. 105. f. 6. Payk. fn. 3. 169. 2. Panz. fn. 100. f. 9.

Habitat in Scaniæ Quercu, rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Praecedenti similis, sed paullo minor. capite postice non angustatato, elytrisque subtilissime tantum punctato-striatis abunde distinctus. Caput oblongum sub-cylindricum, posterius non angustatum, totum nigrum nitidum, pone oculos & in fronte obsolete rugoso-punctatum; juxta oculos linea impressa arcuata utrinque; oculi globosi-prominuli brunnei; rostrum capite paullo brevius, crassum, arcuatum, profunde punctatum, obsolete canaliculatum, nigrum, ore piceo. Antennæ capite parum longiores, fru-

etura

Cura ut in praecedenti, nigræ, articulis 2-6 ferrugineis. Thorax sub-quadratus, antice tamen paulo angustior, compressus, basi apicemque truncatus. Supra modice convexus, totus saturate rufo-testaceus nitidus, æqualis, omnium subtilissime punctulatus. & intra basin strigosus. Scutellum rotundatum nigropiceum lœve. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, sub-quadrata, apice singulatim rotundata, dehiscentia, supra convexa, æqualia, tota saturate rufo testacea nitida, subtiliter punctato-striata, intersticiis adhuc subtilius parce punctulatis. Copus subitus nigrum, cæbre punctatum, ab domine interdum piceo. Pedes elongati nigri, femoribus clavatis, anticis interdum plaga rufescente utrinque notatis,

RHYNCHITES.

Instrumenta Cibaria ut in Attelabo. Rostrum
plerumque capite longius, versus os dilata-
tum. Antennarum articuli tres ultimi ma-
iores, remoti. Tibiae antice inermes.

I. R. Betuleti: supra viridi-sericeus nitidus glaber, corpore, pedibus rostroque viridi-aureis, fronte parum impressa.

Var. b; forte femina, thorace utrinque spina porrecta acuta armato.

Herbst. Col. 7. 126. 2. Tab. 104. f. 2.

Attelabus betuleti. Fabr. Eleut. 2. 421. 28.
 Panz. tn. 20. f. 6.

Curculio betulae. Linn. Syst. 2. 611. 39. Fn.

Sv 605. De Géer Inf. 5. 248. 36. Tab. 7.
f. 25. 26.

Attelabus Populi. Payk. fn. 3. 170. 3. a.

Var. c, supra cœruleo-violaceus, subtus
cum pedibus rostroque viridi-sericeus.

Circulio nitens. March. Ent. Br. 1. 242. 10.

Var. d, totus supra & infra cœruleo-viola-
ceus.

Attelabus Populi. Payk. fn. 3. 171. var. b.

Habitat in frutetis, præsertim in foliis Be-
tuæ & Alni, non infrequens.

Descr. Statura fere Attel. Coryli, sed plerum-
que paullo minor, præsertim brevior. Caput inser-
tum oblongum angustum sub cylindricum, supra vi-
ridi sericeum nitidum, crebre rugoso-punctatum,
fronte inter oculos obsoletius impressa; regio ocu-
lorum & nucha cupreo-aurea; oculi laterales brun-
nei, parum prominuli; rostrum capite longius, cras-
siuscum, sub-arcuatum, apice nonnihil dilatatum,
supra fere planum, subtiliter rugoso-punctatum, to-
tum virescenti-aureum seu cupreum nitidum. Anten-
næ vix capite cum rostro longiores, totæ nigræ, ar-
ticulis 1-5 oblongis, angustioribus, 6-8 brevibus
truncatis, paullo crassioribus, 9, 10, determinate ma-
joribus perfoatis, ultimo æque crasso. brævi, acu-
minato. Thorax antice angustior, truncatus, lateri-
bus immarginatus, pone medium dilatato-rotundatus,
basi sub-sinuatus, supra valde convexus, viridi-seri-
cens nitidus, crebre & concinne punctulatus, in me-
dio obsolete canaliculatus. Scutellum parvum viri-
di-aureum rotundatum. Elytra thoracis basi fere di-
midio latiora, humeris prominulis, & illo fere tri-
plo longiora, apice rotundata, supra convexa, dorso
vero

vero antico obsolete impræssa; viridi-sericea, versus la-
tera magis aureo micantia, creberrime & sat profun-
de punctato-striata, striis in singulo circiter sedecim,
quibusdam minus regularibus. Corpus subtus con-
fertissime punctatum, tenui griseo-pubescenti,
pectore cupreo-aureo, ab domine viridi-aeneo. Pedes e-
longati rubro-cuprei, femoribus clavatis virescenti-
æneis.

Variat etiam dimidio minor.

Var. b. forte femina, differt tantum spina acu-
ta, antrosum porrecta in utroque latere thoracis,
ante medium,

Var. c, colore tantum differt; corpus supra cœ-
ruleo-violaceum, rostro, scutello, elytrorumque la-
teribus, ut & tota pagina inferiori, cum pedibus
viridi-sericeis, hinc illinc parum æneo-micantibus.

Var. d, paullo minor; corpus totum tam supra
quam infra, cum rostro, scutello & pedibus, cœ-
ruleo-violaceum unicolor; medi quasi inter hanc
& sequentem speciem, sed frons parum impressa, &
antennarum articulus ultimus brevior, quare ad spe-
ciem præsentem referenda; in varietatibus indicatis
occurunt etiam aliæ thorace spinoso, aliæ mutico.

2. R. Populi: supra viridi-æneus nitidus gla-
ber, rostro, pedibus corporeque subtus
cœruleo-violaceis, fronte profundius ca-
naliculata.

Var. b, forte femina, thorace utrinque spi-
na porrecta armato.

Herbst, Col. 7. 128. 3. Tab. 104. f. 3.

Attelabus Populi. Fabr. Eleut. 2. 422. 29.

Payk. fn. 3. 171. 3. var. c. Panz. fn. 20. f. 7.

Curculio Populi. Linn. Syst. 2. 611. 40. Fn.

Sv. 606. De Géer Ins. 5. 249. 37.

Var. c, dimidio minor, thorace elytrisque supra ruhydro-cupreis.

Habitat præsertim in foliis Populi tremulæ, sat frequens.

Deser. Præcedenti simillimus & valde affinis, specie tamen diversus videtur, dimidio minor, fronte inter oculos profuadius canaliculata, antennarum articulo ultimo longiori, & colore paginæ inferioris. pedum, scutellique semper coeruleo-violaceo distinctus. Caput ut in præcedenti constructum, supra viridiæneum, subtiliter strigosum & punctatum, fronte inter antennas canali profundo & lato, sed brevi, exarata; rostrum etiam inter antennas canaliculatum, basi supra viridiæneum, apice vero & subtus, uti caput, nigro-coerulescens. Antennæ ut in præcedenti, modo articulus ultimus-paullo longior, conicus, magis acuminatus. Thorax ut in priori, supra viridiæneus nitidus, subtus coeruleo-violaceus. Scutellum parvum rotundatum violaceum. Elytra viridiæneæ, quoad formam & strias ut in præcedenti. Corpus subtus coeruleo-violaceum punctulatum, ventre interdum coeruleo-yirescente. Pedes coeruleo-violacei, tarsis nigricantibus.

Var. b, thorace utrinque spina armato, uti var. b, præcedentis, unice differt; spinæ istæ longicudine variant.

Var. c. dimidio minor & ultra; differt præterea colore thoracis, & præsertim elytrotum, rubro-cupreo,

3. R. Bacchus: oblongus, aureo-cupreus nitidus, longius pubescens, antennis tarsisque nigris, elytris rugoso-punctatis, obsolete striatis.

Var. b, forte femina, virescenti-cuprea, thorace utrinque spina porrecta armato,

Herbst. Col. 7. 124. 1. Tab 104. f. 1.

Attelabus Bacchus. Fabr. Eleut. 2. 421. 27.

Payk. fn. 3. 172. 4. Panz. fn. 20. f. 5. Crit. Rev. 1. 123.

Circulio Bacchus. Linn. Syst. 2. 6n. 38.

Circulio purpureus. De Geer Ins. 5. 250. 38.

Linn Syst. 2. 607. 14. Fn. Sv. 535.

Habitat in Svecia Australi rarius.

Descr. Rh. Betuleti paullo longior, sed angustior, totus pube longiori erecta fusca undique adspersus. Caput breve convexum aureo-cupreum nitidum, sat profunde punctatum; oculi globosi brunnei; rostrum thorace longius, sub arcuatum. punctis lineisque interruptis impressum. basi fusco-cupreum, apicem versus non nihil dilatatum nigrum. Antennæ ante medium rostri inseritæ, & vix illo longiores, nigræ, pilosæ, structura fere ut in Rh. Betuleti. Thorax antice multo angustior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium dilatato-rotundatus, supra convexus, totus aureo-cupreus nitidus, crebre & profunde punctatus. Scutellum rotundatum fusco-cupreum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris gibbis, & illo fere quadruplo longiora, apice singulatim rotundata, dehiscencia, supra dorso antico depressa, tota aureo-cuprea vel purpurascens nitidissima, punctis impressis, &

rugul'is transversis elevatis creberrime obsita, unde striæ non nisi inspectu obliquo discernendæ. Corpus subtus cupreum, crebre punctulatum, pubescens. Pedes elongati, femoribus clavatis aureo-cupreis nitidissimis, tibijs fusco-cupreis, tarsis nigris.

Var. b. dimidio major; thorax utrinque spina porrecta armatus ut in prioribus; color virescentiæneus; minus fulgidus; forte femina.

Obs. Curculo purpureus Cl. Linnæi loc. cit. testante inventore Cl. De Géer. forte hoc pertinet, præsertim quum in Ed. 1:a. Fn. Sv. N 457. Cl. a Linné illum cum Cerc. Betuleti comparat.

4. R. cupreus: supra obscure æneus opacus, tenue griseo pubescens, subtus obscurior, elytris sub-quadratis, profunde punctato-striatis.

Herbst. Col. 7. 138. 14. Tab. 105. f. 2. A.

Attelabus cupreus. Fabr. Eleut. 2. 423. 35.

Payk. fn. 3. 173. 5. Panz. fn. 20. f. 9.

Curculio cupreus. Linn. Syst. 2. 608. 21. Fn. Sv. 593.

Var b, fusco-cupreus, elytris femoribusque purpurascenti-cupreis.

Habitat in frutetis passim, præsertim in foiliis Sorbi, Coryli.

Descr. Magnitudo & fere statura Rh. Populi; variat etiam dimidio minor. Corpus totum pubescentissimi erecti fusca obductum. Caput breve convexum fusco-cupreum, creberrime punctulatum, oculis globosis brunneis; rostrum capite longius, subarcuatum, sulculis abbreviatis exaratum, basi fusco-

eu-

cupreum, extrosum nigrum, parum dilatatum. Antennæ vix capite cum rostro longiores, nigrae, structura ut in Rh. Betuleti. Thorax oblongus angustus, fere cylindricus, anterius tamen paulo angustior, basi apiceque truncatus, supra convexus, fuscocæneus, cæberrime punctatus. Scutellum rotundatum fuscum depresso. Elytra magna, thorace duplo latiora, & fere quadruplo longiora, apice rotundata, supra convexa, obscure ænea, paulo magis nitida, profunde punctato-striata, interstitiis transversim rugulosis. Corpus subtus obscurius fuscocæneum punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati fuscocæni, femoribus clavatis nitidioribus, tarsis nigris.

Var. b. colore tantum differt; caput & thorax fuscocuprea; elytra saturatius purpurascens.

Obs. Rhychintes punctatus Herbst. Col. 7. 131.
7. Tab. 104. f. 7. A. secundum descriptionem forte modo var. major hujus speciei.

5. R. æquatus: obscure æneus punctatissimus, fuscopubescent, elytris rubris, profunde punctato-striatis, thorace canaliculato.

Herbst. Col. 7. 132. 8. Tab. 104. f. 8. B.

Attelabus æquatus. Fabr. Eleut. 2. 422. 32.

Payk. fn. 3. 173. 6. Panz. fn. 20. f. 8.

Curelio æquatus. Linn. Syst. 2. 607. 9.

Var. b, Antennarum medio pedibusque rufis.

Curculio æquatus. Marsh. Ent. Br. 1. 238. 1.

Habitat in Salicetis rarius.

Descr. Statura & similitudo praecedentis, sed plerumque duplo minor; corpus totum pube tenui

erecta fusca tectum. Caput breve convexum fuscæneum punctatissimum, oculis globosis brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, tenuë, arcuatum, nigro-piceum, striis & punctis oblongis exaratum, apice parum dilatatum. Antennæ vix longitudine rostri, tenues, fuscopiceæ, clava nigra. Thorax oblongus angustus sub-cylindricus, basi apiceque truncatus, supra convexus, obscure æneus, confertissime punctulatus, in medio obsolete canaliculatus. Scutellum parvum rotundatum fuscum. Elytra magna, thorace duplo latiora, et fere quadruplo longiora, supra convessa, saturate rubra subnitida, interdum dilutius testacea, profunde punctato-striata, interstitiis sub-lævibus; sutura antica saepe infuscata. Corpus subtus æneum sub nitidum punctulatum. Pedes elongati, femoribus clavatis æneis, tibis fuscopiceis, tarsis nigro-fuscis.

Var. b. differt tantum antennarum articulis 2-8 dilutius ferrugineis, femoribus totis, tibisque superne rufis.

6. R. Alliariæ: ovatus cyaneus nitidus, longius pubescens, thorace punctatissimo, elytris profunde punctato-striatis, interstutiis subtilissime seriato-punctulatis.

Attelabus Alliariæ. Fabr. Eleut. 2. 425. 47.

Payk. fn. 3. 175. 8.

Curculio Alliariæ. Linn. Syst. 2. 606. 4. Fn. Sv. 580.?

Curculio cæruleus. De Géer Inf. 5. 251. 39.

Curculio nanus. Marsh. Ent. Br. 1. 238. 3.

Habitat in Svecia Australi rarius.

Deser.

Deler. Statura ovata Rh. æquati, & minimis ejus vix major. totus pubescentia longa erecta fusca undique adspersus. Caput sub-quadratum convexum coeruleum sub-nitidum, creberrime punctatum, oculis globosis bruneis; rostrum longitudine capitatis thoracisque arcuatum nigro piceum, apice dilatatum, supra abrupte striatum. Antennæ vix rostro longiores, nigro fuscæ, articulis 1 & 2 oblongis crassiusculis, 3-5 etiam oblongis tenuibus, 6-8 brevibus, scutum crassioribus, 9, 10, crassis truncatis, ultimo æque crasso ovato sub-acuminato. Thorax basi apiceque truncatus, antice paullo angustior, lateribus pone medium rotundato-dilatatus, supra parum convexus, totus coeruleus, confertissime punctulatus. Scutellum rotundatum depresso, obscure coeruleum. Elytra thoracis basi vix duplo latiora, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, dorso antico depressa, tota coerulea, magis nitida, sat profunde punctato striata, intersticio singulo serie regulari e punctis minimis impressis. Corpus subtus coeruleum nitidum punctulatum. Pedes elongati, femoribus clavatis coeruleis, tibiis fuscocærulescentibus valde pilosis, tarsis nigritantibus.

Obs. Synonymon Cl. Paykullii certum; reliquorum auctorum vero dubia, ob descriptionum insufficientiam; Cl. Fabricii & De Géeri, ob indicatam pubescentiam, huic vel in sequenti Speciei tribuenda; Cl. Linnaei potius ad Rh. nanum, utpote in Svecia frequentiorem, referendum videtur.

7. R. minutus: ovatus virescenti-coeruleus sub-nitidus pubescens, thorace punctatissimo, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis impunctatis,

Herbst. Col. 7. 135. n. Tab. 104. f. n. E.

Curculio æneo-virens, Marsh. Ent. Br. 1. 239. 5.

Habitat in floribus, præsertim Rosarum & Geranii sanguinei, in Kinnakulle Westrogothiæ pluries lectus.

Descr. Præcedenti valde similis & affinis, sed plerumque dimidio minor & ultra, interstitiis striarum in elytris impunctatis, præcipue distinctus; corpus totum pubescentia fusca parcus adspersum. Caput sub quadratum obscure cœruleo-virescens punctatissimum, oculis brunneis; rostrum & antennæ ut in præcedenti omnino. Thorax obscure cœruleo-virescens, confertissime punctulatus, structura ut in priori. Scutellum ut in præcedenti. Elytrorum forma eadem, supra convexa, cœruleo-virescens, magis nitida, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, nullo modo punctulatis. Corpus subtus cœruleo-virescens punctulatum. Pedes ut in præcedenti.

8. *R. nanus*: oblongus angustior cœruleo-virescens glaber, thorace profunde punctato, elytris sub cylindricis punctato-striatis, interstitiis impunctatis.

Attelabus nanus. Payk. fn. 3. 176. 9.

Habitat in fruticibus & plantis passim, præsertim in foliis Betulæ albæ.

Descr. Longitudo proxime præcedentium, sed multo angustior, variat etiam duplo, imo triplo minor; corpus totum glabrum, aut cœruleum, aut magis virescens, nitidum. Caput breve convexum, thoracis latitudine, cœruleo-virescens, subtilissime & valde obsolete punctulatum; oculi globosi nigro-brun-

brunnei; rostrum capite cum thorace paullo brevius, nigro subæneum nitidum, apicem versus dilatatum, supra fere planum, parum punctulatum. Antennæ vix longitudine, rostri cum capite, nigræ, structura omnino ut in proxime præcedentibus, articulis duobus baseos oblongis crassiusculis. Thorax oblongus angustus sub cylindricus, pone medium tamen parum latior, supra convexus, hinc inde obsolete impressus; profunde, sed minus crebre punctatus, totus cœruleo virescens. Scutellum minutum cœruleo-virescens. Elytra thorace dimidio latiora, & quadruplo longiora, sub cylindrica, apice rotundata, supra convexa, tota cœrulea vel virescentia nitida, sat profunde punctato-striata, intersticiis lævibus. Corpus subtilis cœruleo-virescens punctulatum. Pedes elongati cœruleo-virescentes, femoribus clavatis, tarsis nigris.

9. R. Betulæ: ovatus ater nitidus, tenuissime pubescens, rostro brevi depresso, capite magno, collo angustiori thoraci adnexo.

Var. b, femoribus posticis crassissimis saltatoriis, forte mas.

Herbst. Col. 7. 133. 9. Tab. 104. f. 9. C.

Attelabus Betulæ. Linn. syst. 2. 620. 7. Fn. Sv. 640. Fabr. Eleut. 2. 427. 61. Payk. Ju. 3. 174. 7. Panz. fn. 20. f. 15.

Curculio excoriato-niger. De Geer Ins. 5. 259. 47.

Curculio Populi. Scop. Carn. 74. ♂ var. b,
Curculio Fagi ibid. n. 73.

Habi-

Habitat in foliis Betulæ fréquens, quas ró-
dendo pulchre crispa reddit.

Deser. Statura & fere magnitudo Rh. Cuprei;
variat etiam duplo, imo triplo minor, totus ater,
pube tenuissimâ concolori adspersus. Caput magnum
sub quadratum atrum, erebertime punctatum, fronte
plana, collo paullo angustiori thoraci adnexum; o-
culi globosi brunnei; rostrum capite vix longius;
apice rotundato-dilatatum; supra depresso; subtiliter
rugoso-punctatum, nigrum, ore rufo piceo. Anten-
næ longitudine capitis cum rostro, nigrae, structura
ut in prioribus omnino. Thôrax basi apiceque trun-
catus; antice angustior; pone medium rotundato di-
latatus; supra parum convexus; obsolete canalicula-
rus; totus ater; confertissime punctatus. Scutellum
parvum rotundatum atrum. Elythra thoracis postico
dimidio latiora; humeris prominulis. & illo qua-
druplo longiora, apice rotundata, supra convexa,
in dorso antice depressa; tota atra, magis nitida;
regulariter & profunde punctato-striata. intersticiis
vix visibiliter seriatim punctulatis Alæ amplæ fusco-
hyalinæ. Corpus subtus atrum sub-nitidum, obsolete
punctatum. Pedes mediocres atri, femoribus nitidis
elavatis, posticis longioribus arcuatis.

Var. b. differt tantum femoribus posticis maxi-
mis incrassatis saltatoriis, forte mas.

10. R. Rhinomacer: oblongus niger, den-
se cinereo-villosus, antennis longioribus
pedibusque testaceis, elytris vase puncta-
tis.

Anthribus Rhinomacer. Payk fn. 3. 166. 8.

Rhinomacer attelaboides. Fabr. Eleut. 2. 428. 3.

Atte-

Attelabus. Illig. Mag. 4. 137. 3.

Habitat in frondibus Abietis, tempore ver-
nali, passim.

Descr. Reliquis magis oblongus, angustus, sub-
cylindricus. Cure. T. Albo Linn. magnitudine &
statura non dissimilis; variat etiam duplo minor;
corpus totum pube densa depresso cinerea, in junio-
ribus saepe flavescente, tectum. Caput breve trans-
versum convexum, cum oculis thorace fere latius,
fuscō nigrum, creberrime punctulatum, oculis glo-
bosis brunneis; rostrum capite duplo longius, apice
rotundato dilatatum, supra planum, nigrum, obsole-
te punctatum; ore testaceo. Antennæ ante medium
rostri insertæ, longitudine fere dimidii corporis, to-
tae testaceæ, articulis obconicis, ultimis quatuor cras-
fioribus remotis. Thorax oblongus angustus sub-
cylindricus, basi apiceque truncatus, supra parum
convexus, totus fuscō-niger, crebre subtiliter punctu-
latus. Scutellum parvum rotundatum fuscum. Ely-
tra thorace dimidio latiora, & fere quintuplo longi-
ora, sub-linearia, apice rotundata, supra convexa,
nigro-fusca, creberrime & profundius vase punctata.
Corpus subtus nigro-fuscum, obsoletius punctula-
tum, pubescens. Pedes elongati flavo-testacei gla-
briores, tarvis apice dilatatis fuscis; femora interdum
superne infuscata,

APION.

Instrumentum. Cibaria ut in præcedentibus forte. An-
tennae rectæ, articulo primo tamen longiori;
secundo etiam oblongo-ovato, sequentibus ma-
jori; clava ovato-acuminata triarticulata, coar-
ctata. Rostrum tenue cylindricum, saepe ex-
trema-

trorsum attenuatum. Corpus ob-pyriforme, anterius valde attenuatum, thorace sub-conico, elytris abdomineque ultra medium dilatatis.

- x.** *A. frumentarium*: pallide sanguineum opacum, oculis solis nigris, rostro breviori arcuato glabro, pedibus pallidioribus, elytris crenato-striatis.

Herbst. Col. 7. 107. 6. Tab. 102. f. 6. F.

Attelabus frumentarius. Fabr. Eleut. 2. 427 59.

Payk. fn. 3. 177. 10. Panz. fn. 20. f. 14.

Crit. Rev. 1. 124.

Curculio frumentarius. Linn. Syst. 2. 608. 15.

Fn. Sv. 586.

Curculio sanguineus. De Geer Inf. 5. 251. 40.

Habitat in arenosis aridis, agris, etiam in floribus & plantis, sat frequens; nunquam in frumento mihi obvius; forte quoad habitationem cum Calandra granaria Fabr. recens exclusa, confusus, ut etiam autumat Cl. Dom. Illiger, in Mag. 4. 136. 59.

Descr. Medium in hoc genere; variat etiam rarius magnitudine duplo majori. Corpus totum pallide sanguineum, non nitidum, pube tenuissima depresso cinereo-albida parce adspersum. Caput oblongum porrectum, parum convexum, crebre interne punctatum, oculis globosis nigro-brunneis; rostrum cylindricum arcuatum glabrum nitidum; interdum capite duplo, in aliis ino parum longius, quod torte sexus differentiam indicat. Antennæ longitudine capitis

pitis cum rostro, articulo primo longiori ob-conico, basi tenui, secundo oblongo-ovato crassissimo, 3-8 parvis, tensim brevioribus coarctatis, clava magna ovata acuminata, triarticulata; totæ rufæ. Thorax basi apiceque truncatus, antice vix capite latior, posterius nonnihil dilatatus; supra modice convexus, crebre punctatus, ante medium baseos lineola obsoleta impressus. Scutellum minutum punctiforme concolor. Elytra antice thoracis basi patina latiora, at illo quadruplo longiora, ultra medianæ dilatata, apice rotundata, supra valde convexa, præsertim posterius, tota sanguinea opaca, profunde regulariter striata, & in striis concavæ pendente, inter stititis elevatis planis sub-lævibus. Coxas subtus concolor, obsoletius punctatum. Pedes elongati, plerumque pallidius sanguinei, ungulorum apice nigricante.

2. A vernali: fusco-piceum, pube densa cinereo-albida tectum, antennis pedibusque testaceis, elytris fasciis duabus obliquis denudatis, fusco piceis.]

Mas: rostro erassiunculo, thorace breviori, albido-pubescente.

Femina: rostro tenuiori glabro, longitudine thoracis.

Herbst. Col. 7. n^o 12. Tab. 102. f. 12. M,

Attelabus vernalis Fabr. Eleut. 2. 427. 60.

Payh. fn. 3. 183. 18.

Curculio Lythri. Panz. fn. 17. f. 8.

Curculio concinnus Marsh. Ent. Br. 1. 248. 26.

Habitat in *Urtica dioica*, pasim.

Deser.

Ins. Svec. T. I. P. III. C

Descr. Statura præcedentis, sed minimis ejus plus duplo minus. Caput breve porrectum fusco-piceum, griseo pubescens, crebre punctatum, oculis globosis brunneis, rostrum maris vix capite duplo longius; crassiusculum, fusco-piceum, pube depresso griseo-albida testum; feminæ longitudine capitum cum thorace, cylindricum angustum piceum nitidum glabrum. Antennæ vix longitudine thoracis, structura ut in præcedenti, testacea pubescentes, clava obsecuriori. Thorax oblongus, anterius paullo angustior, supra convexus; obsolete canaliculatus, crebre punctatus, nigro-piceus, pube densa depresso griseo-albida tectus. Scutellum punctiforme piceum sub-nitidum. Elytra antice thoracis basi paullo latiora, & illo plus triplo longiora, ultra medium uonnihil dilatata, supra convexa; dilutius brunnea, profunde punctato-striata. pube densa cinereo-albida testa, relicis fasciis duabus glabris brunneis, una latiore in medio, nonnihil obliqua, altera pone medium minori abbreviata. Corpus subtus nigro-piceum punctulatum, parcus pubescens. Pedes pallide testacei pubescentes, unguis fuscis.

3. A. pallipes: nigrum obscurum, tenui griseo-pubescentes, antennarum basi pedibusque testaceis, elytris angustioribus, rostro arcuato cylindrico.

Habitat in plantis, locis umbrosis; minus frequens.

Descr. Statura angusta A.. vernalis, illoque parum majus, sequenti quoad colores simillimum, sed differt elytris multo angustioribus, rostro magis arcuato, cylindrico, &c. Corpus totum nigrum subopacum, pube tenui depresso grisea parce adspersum. Caput sub-quadratum nigrum depresso, crebre

bre rūgoso-punctatum, oculis globosis brunneis; rostrum feminæ longitudine thoracis, valde arcuatū, cylindricum glabrum nigrum nitidum; maris paullo brevius & crassius, supra griseo-pubescentes. Antennæ longitudine capitis cùm rostro, basi ferruginea, extorrisum nigrae pubescentes, structura ut in prioribus. Thorax antice truncatus, paullo angustior, pone apicem ab utroque latere leviter impressus, basi sub fuscatus, supra parum convexus, totus niger opacus, creberrime punctatus, foveola oblonga intra medium baseos impressus. Scutellum punctiforme nigrum. Elytra thoracis bali parum latiora, sed illo quaduplo longiora, in medio vix dilatata, supra valde convexa, nigra opaca, sat profunde punctato-striata. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, parum pubescens. Pedes elongati paleide testacei, ipsa basi femorum tarsisque nigrofuscis.

Obs. Descriptio Attelabi atri-rostris Fabr. Eleut. 2. 424. 45. huic nostro omnimode convenit, sed patria aliena.

4. A. Viciæ: nigrum obscurum, supra tenui, subtus dense albido pubescens, antennis pedibusque pallidis, elytris latioribus, rostro sub-attenuato.

Attelabus Viciæ. Payk fn. 3. 181. 16.

Apion difficile. Herbst. Col. 7. 124. 13. Tab. 103. f. 1. A.

Curculio Trifolii. Marsh. Ent. Br. 1. 246. 22.

Habitat in Vicia cracca, Ervo, aliisque plantis, locis umbrosis, pasim.

Descr. Præcedenti, ut dictum, quoad colores simillimum, attamen vere distinctum, elytris multo

lationibus ovatis, rostro parum arcuato, apicem versus nonnihil attenuato; & pubescens pagi & inferioris, præsertim pectoris, multo densiore albida. Corpus totum nigrum sub-opacum, supra tenue griseo-pubescentia. Caput porrectum depresso rugoso-punctatum, oculis magnis globosis brunneis; rostrum maris vix longitudine thoracis, sub rectum, supra densius griseo-pubescentia; feminæ thorace fere longius, parum arcuatum, glabrum nitidum, in utroque sexu extrorsum nonnihil angustatum. Antennæ capite cum rostro vix longiores, structura ut in prioribus, pallide testaceæ, clava plerumque obscuriori. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, niger obscurus, crebre punctatus, lineola media obsoleta impressus. Scutellum ut in priori. Elytra antice thoracis basi fere duplo latiora, in medio adhuc magis dilatata, supra valde convexa, sub-gibbosa, nigra, sat profunde sulcata, & in sulcis crenulatim punctata. Corpus subtus nigrum punctatum, pube albida, ad latera pectoris magis condensata, fere nivea, tectum. Pedes flavo-testacei, tarsis omnibus, tibiisque posterioribus plerumque nigro-fuscis.

5. A. flavipes: nigrum glabrum, antennarum basi, femoribus tibiisque testaceis, thorace elongato elytrisque angustis, rostro longo cylindrico.

Herbst. Col. 7. 106. 5. Tab. 102. f. 5. E.

Attelabus flavipes. Fabr. Eleut. 2. 427. 57.

Payk. fn. 3. 182. 17.

Var. b, tibiis posterioribus nigro-fuscis.

Attelabus flavipes. Panz. fn. 20. f. 13.

*Apion flavi-femoratum. Herbst. Col. 7. 125.
III. Tab. 103. f. 2 B. Cur-*

Curculio ater, femoribus exalbidis. Linn. fn.
Sv. Ed. 1:a N:o 469, ejus descriptio in e-
ditione secunda erroneæ ad *Curc Fagi*, N:o
609. allegata.

Var. c, tibiis posterioribus nigris, annulo
testaceo cinctis.

Habitat in plantis & gramine ubique fre-
quentis.

Descr. Statura angusta A. Vernalis, & saepè
illo vix majus; variat tamen magnitudine dimidio,
imo duplo majori. Corpus totum saturate nigrum
sub-nitidum, omnino glabrum. Caput oblongum
porrectum nigrum, fronte inter oculos depressa,
longitudinaliter striata; oculi globosi brunnei; ro-
strum longitudine fere thoracis cum capite, cylindri-
cum, non nihil arcuatum, maris paulo crassius,
punctatum, feminæ tenuius, laxe, politum. An-
tennæ rostro parum longiores, nigro-fuscæ, articu-
lis 3 s. 4 basi testaceis. Thorax oblongus angu-
stus sub-cylindricus, anterius paulo angustior, to-
tus niger, creberrime rugoso-punctatus, lineola im-
pressa obsoletiori, Scutellum punctiforme nigrum.
Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, & illo
quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra,
magis nitida, sed profunde sulcata, & in succis pun-
ctata, interstitiis planis levibus. Corpus subtus ni-
grum sub nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes
elongati pallide testacei, tarsis omnibus nigris.

Ver. b. simillima, sed antennarum basis obseu-
re ferruginea, & tibiæ, aut omnes, aut faltem qua-
tuor posteriores, nigro fuscæ.

Var. c, ut var. b, sed tibiæ posteriores prope
basin annulo testaceo cinctæ; hæc varietas rarius oce-
currit.

6. *A. Craccae*: nigrum opacum, cinereo-pubescent, antennis basi ferrugineis, rostro crasso arcuato, apice attenuato, elytris gibbosis punctato striatis.

Herbst. Col. 7. 102. 2. Tab. 102. f. 2 B.

Curculio Craccae. Linn. Syst. 2. 606. 6.

Attelabus Craccae. Payk. fn. 3. 177. II. Fabr. Eleut. 2. 425. 51.?

Curculio Viciae. De Gér. Ins. 5. 353. 43. Tab. 6. f. 31-36.

Curculio glaber. Marsh. Ent. Br. 1. 245. 19.

Mas: fere duplo minor, rostro breviori, crassiori, dense cinereo-pubescente, antennis totis ferrugineo-testaceis.

Curculio Craccae. Marsh. Ent. Br. 1. 245. 18.

Apion ruficornis. Herbst. Col. 7. 110. 8 Tab. 102. f. 8 H.

Habitat in Vicia cracca, aliisque, frequens; etiam in foliis Coryli, locis umbrosis, saepè vulgaris.

Descri. Præcedenti duplo majus, & postice magis convexus; corpus totum nigrum opacum, supra pube tenuissima rariori, subtrus densiori cinerea adspersum. Capit oblongum porrectum nigrum; crebre punctatum, oculis magnis globosis brunneis; rostrum seminæ longitudine fere thoracis, crassum; supra arcuatum, nigrum punctatum sub-glabrum, apice tenui cylindrico lævi nitido instructum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, crassiusculæ nigrae, articulo primo longiori ferrugineo. Thorax oblor-

oblongus, antice angustior, truncatus, postice bi-sinuatus, supra convexus, niger, crebre & sat profunde punctatus, lineola media tenui impressus. Scutellum parvum nigrum. Elytra magna ovata, antice thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, praesertim posterius, tota nigra, sat profunde sulcata, & in sulcis tenue catenato-punctata, interstitiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum opacum punctatum, pube densiori cinereo-albida depressa testum. Pedes elongati nigri, cinereo-pubescentes.

Mas fere duplo minor; rostrum thorace brevius, valde crassum, apice tantum attenuatum, supra totum pube densa cinereo-albida vestitum; Antennæ fere totæ testaceæ vel ferrugineæ, clava paullo obscuriori; cætera ut in semina omnino.

Obs. Character & descriptio Cl. Fabricii non exacte concordant, forte tamen eandem speciem designare voluit.

7. A. Pomonæ: nigrum sub-opacum, tenuissime pubescentis, antennis basi testaceis, rostro crasso apice attenuato, elytris gibbosis cœruleoscentibus.

Attelabus Pomonæ. Fabr. Eleut. 2. 425. 48.

Attelabus cyaneus. Panz. fn. 20. f. 12.

Circulio cœruleoscentis. Marsh. Ent. Br. 1. 245. 20.

Habitat in floribus Pomonæ, & in foliis fruticum, minus frequens.

Descr. Statura & affinitas præcedentis, sed fere diplomajus; corpus nigrum sub-opacum, pube subtilissima rariori griseo-adspersum, elytris cœruleoscentibus nitidioribus. Caput oblongum por-

rectum planum, crebre punctatum, oculis magnis brunneis; rostrum maris capite duplo longius, crassum convexum in-sequale nigrum, profunde punctatum, pubescentis. antice attenuatum. apice ipso atro glabro nitido; rostrum feminæ longius, apice longiori tenui sub-cylindrico glabro nitido. Antennæ vix capite cum rostro longiores nigræ, articulis 2 f. 3 primis testaceo-ferrugineis. Thorax oblongus, antice angustior, in medio nonnihil rotundatus, basi bisignatus, supra parum convexus, niger obscurus interdum sub-cœrulescens, crebre & profunde punctatus, canalicula postica profundiori impressus. Scutellum parvum oblongum nigro-cœrulescens. Elytria magna antice thoracis basi diuidito latiora, & illo quadruplo longiora, ultra medium dilatata, supra valde convessa, tota cœrulecentia, magis nitida, regulariter striata, & in striis concinne punctata, intersticiis latis planis, subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, ventre sub-cœrulecente. Pedes elongati, toti nigri, pubescentes.

Obs. In figura Pauzeri loc. cit. structura rostri, magnitudo & color, hanc speciem melius exprimunt, quam Ap. cyaneum.

8. A. *Aeneum*: nigrum glabrum, elytris æneis nitidis, striis impunctatis, rostro cylindrico crassissimo, fronte canaliculata.

Herbst. Col. 7. 101. 1. Tab. 102. f. 1. A.

*Attelabus aeneus. Fabr. Eleut. 2. 423. 37. Payk.
fn. 3. 179 14.*

Circulio Aeneus. Marsh. Ent. Br. I. 243. 13.

*Attelabus craccæ. Panz. fn. 20. f. 10. Crit.
Rev. I. 124.*

Var.

Var. b, Elytris cœruleo virescentibus.

Curculio chalceus. Marth. Ent. Br. I. 243. 12.

Habitat in Malvis Scaniæ, Hallandiae, passim; in Hyssopo officinali Uplandie. Dom. de Paykull.

Deler. Statura angusta A. flavipedis, sed duplo majus & ultra; corpus nigrum, certo situ in fusco-æneum vergens, glabrum, pectore & pedibus tantum pube tenuissima parce adspersis. Caput porrectum depresso nigrum, crebre punctatum, fronte inter oculos canalicula brevi sat profunda exarata; oculi globosi brunnei; rostrum vix longitudine capitis cum thorace, valde arcuatum, cylindricum, crassiusculum, crebre punctatum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ, nigro piceæ, cinereo-pubescentes. Thorax oblongus sub-cylindricus, anterius parum angustior, supra convexus, niger, vel fusco-sub æneus, sat crebre, concinne punctulatus, ante scutellum foveola sub-rotunda impressus. Scutellum parvum sub-rotundum fusco-æneum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra convexa, fusco ænea nitida, regulariter, sed tenue striata, striis impunctatis, interstitiis planis vix visibiliter coriaceis. Corpus sub-tus nigrum punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati nigri pubescentes, femoribus crassiusculis fusco æneis nitidis levibus, tibiis anticis longioribus aequaliatis.

Var. b, differt tantum colore clytrorum cœruleo-virescente.

9. A. a terrimum: nigrum, tenuissime pubescens, elytris cœruleo-virescentibus;

striis profundioribus obsolete punctatis,
vertice transversim impresso.

Curculio aterrimus. Marsh. Ent. Br. 1. 244. 14.

Attelabus aeneus. Payk. su. 3. 180. var. b.

Habitat in Scaniæ Malvis passim; in Car-
duis Uplandiæ. Dom. de Paykull.

Descr. Statura angusta, & affinitas præceden-
tis, sed plerumque dimidio minus, & distinctum.
Corpus totum pilis tenuissimis rarioribus adspersum.
Caput porrectum nigrum, creberrime rugoso puncta-
tum, vertice pone oculos transversim impressio, fron-
te nona canaliculata; oculi globosi brunnei; rostrum
maris capite cum thorace paullo brevius, crassiuscu-
lum cylindricum arcuatum nigrum, crebre punctu-
latum, tenui pubescens; feminæ paulo longius, te-
nuius, parcus punctatum, glabrum, magis nitidum.
Antennæ ut in præcedenti omnino. Thora-
cis structurae esdem, supra convexus, totus niger-
sub-opacus, tenui pubescens, creberrime punctatus;
foveola ante-scutellaris oblonga, obsoletior. Scu-
tellum ut in priori. Elytra quin forma eadem, supra
convexa, cœruleo-virescentia, parum nitida, striis mul-
to latioribus & profundioribus quam in priori exa-
rata. & in striis sat evidenter, et si minus crebre
punctata. Corpus subtus nigrum punctatum, ano
piceo. Pedes elongati nigri pubescentes.

so. A. Sorbi: nigrum glabrum, elytris sub-
globosis cœruleo-virescentibus, rostro cylindri-
co arcuato, longitudine corporis, thora-
ce utrinque impresso. Femina.

Herbst. Col. 7. iii. 9. Tab. 102. f. 9. I.

[Atte]

Attelabus Sorbi. Payk. fn. 3. 173. 12. Fabr.
Eleut. 2. 426. 52? Pauz. fn. 20 f. 11:?

Curculio viridescens. Marsh. Ent. Br. 1. 249. 31.

Mas: fere duplo minor, rostro paulo breviori & crassiori, elytris nigris nitidis.

Curculio aterrimus. Linn. Syst. 2. 607. 19. fn.
Sv. 582.

Habitat in floribus, praesertim Sorbi; et jam in fruticibus & plantis passim.

Descr. Femina Ap. Craccae paulo major, & elytra magis globosa. Caput porrectum uigrum, posterius laeve nitidum, fronte inter oculos crebre subtiliter striata; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum cum capite longitudine fere reliqui corporis, cylindricum, arcuatum nigrum, vix visibiliter punctulatura. Antennae rostro breviores, crassiusculæ nigrae, extrosum pubescentes. Thorax antice angustior, lateribus prope apicem utrinque impressus, dein rotundato dilatatus, postice iterum paulo angustior, basi truncatus, supra convexus, totus niger, sat crebre & profunde punctatus; ante medium baseros fovea oblonga, antrosum acuminata, profunda impressa. Scutellum punctiforme nigrum. Elytris thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominulis, in medio adhuc magis dilatata, thorace vix quadruplo longiora, supra valde convessa, nigro-coerulea nitida, interdum coeruleo-virescentia, alia vice violacea regulariter striata, & in striis concinne punctata, intersticiis planis, vix visibiliter coriaceis. Corpus subfuscum nitidum, sat profunde punctatum. Pedes elongati nigri, tibiis tarsisque tenue pubescentibus.

Mas duplo minor, & ultra: rostrum vix capiteum thorace longius, crassiusculum, valde arcuatum,

tum, evidentius punctulatum, apicem versus tenuis pubescens; elytra corpori concolora, tota nigra, magis tamen nitida; cætera ut in femina omnino, & cum illa sœpius in copula captus.

Obs: Synonyma Cl. Paykullii, Herbstii & Marshamij indubia; Cl. Fabricii & Panzeri, ob rotsti longitudinem & colores indicatos, etiam huc pertinere mihi videntur, et si Cl. Dom. Illig, in Mag. 4. 135. 52. aliter judicat.

II. *Astragali*: viridi-cœrulescens glabrum nitidum, rostro arcuato tenui, thorace profunde punctato canaliculato, utrinque impresso, elytris punctato-striatis.

Attelabus Astragali. Payk. fn. 3. 180. 15.

Habitat in foliis & caulis Astragali Glycyphyllo, in Westrogothia non infrequens.

Descr. Ap. flavipedi vix majus. Caput porrectum viride nitidum, postice lœve, fronte inter oculos subtiliter striata; oculi globosi brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, tenui, cylindricum, valde arcuatum, viride nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro longiores, nigrae, apice pubescentes. Thorax antice angustior, truncatus, lateribus prope apicem utrinque impressus, dein nonnihil rotundato-dilatatus, basi sub-truncatus, supra parum convexus, totus aut viridis, aut cœruleo virescens, profunde & sat crebre punctatus, canalicula media profundiori abbreviata impressus. Scutellum parvum concolor. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris sub prominulis, in medio nonnihil dilatata, thorace fere quadruplo longiora, supra modice convexa, viridi-cœrulefcentia, rarius

rarius violacea, nitida, profunde striata, & in striis evidenter punctata, intersticiis subtiliter coriaceis. Corpus subtus plerumque viride, vel viridiæneum, rarius cœrulescens, sat profunde punctatum. Pedes longiusculi viridiænei, tarsis nigro-fuscis pubescen-tibus.

12. A. cyaneum: nigrum glabrum, cœrule-scenti micans, rostro medioctri cylindri-co, thorace obfoletius punctato, canali-culatoque, elytris gibbosis cœruleis pun-ctato-striatis.

Attelabus cyaneus. Fabr. Eleut. 2. 426. 53.

Apion sulcifrons. Herbſt. Col. 7. 122. 25. Tab. 103. f. 12. M.

Curculio ater, elytris nigro-cœrulecentibus. Linn.
fn. Ed. 1:a No 467. Cujus descriptio in
Fannæ Ed 2:da Curc. cyaneo N:o 581. per-
peram adjecta.

Habitat in plantis & fruticibus parvæ.

Descr. Præcedenti paullo majus, & in elytris præsertim latius, statura fere Ap. Craccæ. Caput porrectum sub-quadratum nigrum, fronte inter oculos striis 3 s. 4, longitudinalibus exarata; oculi ma-gni g'obosi brunnei; rostrum seminæ longitudine fe-re capitis cum thorace, parum arcuatum, tenui, cylindricum, nigrum nitidum sub-læve; maris paul-lo brevius & crassius, subtiliter punctulatum. An-tennæ rostro parum longiores, nigræ. Thorax an-tice angustior, truncatus, lateribus prope apicem utrinque impressus, dein rotundato-dilatatus, & po-sterius iterum paullo angustior. supra parum conve-xus, totus niger, vel nigro sub-cœrulescens, obfo-letius

letius punctatus; canalicula media tenui exaratus; Scutellum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, hameris prominulis, pone medium adhuc magis dilatata, supra valde convexa, saturatius cœrulea sub-nitida, regulariter striata, & in striis profunde, sed non crebre punctata. Corpus subtus nigrum punctatum, abdominis medio cœruleo-micante. Pedes elongati nigri, femoribus cœruleo-micantibus.

Obs. Curculio cyaneus. Linn. Syst. 2. 606. 5.
Fn. Sv. 581. forte Curc. globosus Payk. Herbst. Attelabus globosus Fabr. Panz. secundum specimen detritum descriptus; Attel. cyaneum Panz. fn. 20 f. 12 ad Ap. Pomona, ob rostri structuram, &c. re-
tulit; Attel. cyaneus Fabr. loc. cit. forte idem ac-
noster; latera thoracis in medio dilatata, tubercu-
lum quodammodo formant,

13. A. punctiger: nigrum, cœrulecenti-ini-
cans, glabrum, rostro arcuato sub-atte-
nuato, thorace subtiliter punctulato, vix fo-
veolato, elytris globofis cœruleis.

Attelabus punctiger. Payk. fn. 3. 179. 13.

Apion cœruleam. Herbst. Col. 7. 113. II. Tab.
102. f. II. L.

Habitat in plantis & fruticibus passim, locis
umbrosis.

Descr. Praecedenti simillimum & valde affine;
sed paulo majus, rostro longiori sub-attenuato, tho-
race subtilius punctulato, non canaliculato, &c.
distinctum. Caput porrectum nigrum, fronte inter
oculos obsoletissime striata, vix visibiliter punctula-
te, vertice nigro-cœrulecente; oculi globosi brun-
nei; rostrum longitudine capitis thoracisque, cras-
siuncu

fuscum, arcuatum, nigrum nitidum lœve, ante antennarum insertionem nonnihil attenuatum. Antennæ crassiusculæ nigræ, vix rostro longiores. Thoracis structura ut in proxime præcedentibus omnino, supra parum convexus, nigro-subcœruleuscens, subtiliter & minus crebre punctulatus, foveola antescutellari obsoletissima, vix observanda. Scutellum minutum oblongum, nigro-cœruleuscens. Elytra antice thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominuis, in medio adhuc magis dilatata, supra valde convexa, sub-globosa, cœrulea, parum nitida, minus profunde striata, & in striis punctata, intersticiis planis subtilissime coriacis. Corpus subtus nigro-cœruleuscens sub nitidum punctatum. Pedes elongati nigri, femoribus nigro-cœruleuscensibus.

I4. A. Marchicum: nigrum glabrum, elytris cœruleis profunde striatis punctatisque, rostro elongato crassiusculo, thorace sub-cylindrico angustò.

Herbst. Col. 7. 18. 19. Tab. 103. f. 7. G.

Attelabus flavipes. Payk. fn. 3. 183. var. c.

Habitat in Vicia sativa, aliisque plantis, non infrequens.

Descr. Præcedentibus iterum simillimum; præsertim quoad colores sed differt thorace angustiori sub-cylindrico, elytris minus convexis, profundius sulcatis & punctatis. Caput porrectum, valde angustum, nigrum opacum, fronte obsolete striata, vertice lœvi; oculi nigri parum prominuli; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassum, cylindricum, nigrum opacum; crebre subtilissime punctulatum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, nigræ, tenues, clava oblongo-ovata acuminata cine-

reco-

reo-pubescente. Thorax parvus angustus sub cylindricus, vix antrosum angustior, supra modice convexus, totus niger sub-opacus, crebre, sed obsoletius punctatus, foveola ante-scutellari parva obsoleta. Scutellum minutum nigro-cœrulescens. Elytra antice, thoracis basi duplo latiora, & illo quintuplo longiora, in medio dilatata, supra modice convexa, tota cœrulea sub nitida, profunde striata, & in striis evidenter punctata, interstitiis platis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, creberrime punctatum. Pedes elongati tenues, toti nigri.

15. A. ebeninum: atrum glabrum nitidum, rostro crassiusculo arcuato, thorace obsolete punctulato, elytris profunde sulcatis punctatisque, anterius angustatis.

Habitat in Orobio vernali, aliisque, locis umbrosis, rarius.

Descr. Statuta angusta, & magnitudo Ap. flavidipennis var b. Corpus totum magis quam in reliquis atrum, immaculatum, nitidum. Caput breve atrum, fronte inter oculos subtilissime punctulata, vertice laevi; oculi nigri, patum prominuli, rostrum capite duplo longius. crassum, cylindricum, valde arcuatum, atrum, subtilissime punctulatum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, crassæ, nigrae, clava cinereo-pubescente. Thorax oblongus sub-cylindricus, in medio per parum dilatatus, supra convexus, totus ater nitidus, subtilissime parce punctulatus, foveola parva rotunda ante-scutellari impressus. Scutellum vix ullum. Elytra antice vix thoracis basi latiora, ultra medium dilatata, dein iterum attenuata, supra modice convexa, tota atra nitida, sulcis latis profundis exarata, & in his pun-

cta

& a majuscula remota impressa, interstitiis angustis lăvibus. Corpus subtus atrum nitidum, parce pubescens. Pedes minus elongati valdi, toti atri nitidi.

16. A. Æneo-cephalum: nigrum glabrum, capite thoraceque fusco-æneis, elytris depressiusculis cœruleo-virentibus, rostro tenui valde arcuato.

Id. Dom. Kirby in litteris.

Apion virens. Herbst. Col. 7. us. 18. Tab. 103. f. 6. F.?

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, paſſim.

Descr. Minutum, A vernali fere minus. Caput breve porrectum, cum oculis latitudine fere thoraci, nigrum, supra plus minusve æneo-micans, fronte subtilissime punctulata & sub-striata, collo lăvi; oculi magni globosi brunnei; rostrum maris capite duplo longius; nigrum, subtilissime punctulatum, apice sub-pubescent; feminæ longitudine capitatis cum thorace, magis tenui, in utroque sexu valde arcuatū. Antennæ longitudine fere capitatis cum rostro; tenues nigrae, articulo primo elongato, clava pubescente. Thorax sub-cyindricus angustus, supra modice convexus, niger, plus minusve æneo-micans, subtiliter punctulatus, foveola parva punctiformi ante scutellum impressus. Scutellum minutum nigro-virescens. Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, in medio nonnihil dilatata, supra antice fere plana, posterius declivia, tota aut viridia, aut cœruleo-virescentia, profunde striata, & in striis punctata, interstitiis angustis convexis tenuissime coriaceis, Cor-

Ins. Svec. T. I, P. III, D.

pus subtus nigrum, parum virescenti-micans, nitidum, crebre & profunde punctulatum. Pedes tenues nigri, femoribus parum virescentibus.

Obs. In Ap. virenti Cl. Herbstii l. c. rostrum parum arcuatum, & thorax absque foveola ante-scutellari describitur, quare Synonymon minus certum.

17. *A. violaceum*: nigrum glabrum, concinne punctulatum, elytris ovatis violaceis nitidis punctato-striatis, minus convexis, rostro crassiusculo arcuato.

Var b. Elytris cœruleis nitidis.

Apion cyaneum. Herbst. Col. 7. 108. 7. Tab. 102. f. 7 G.

Circulio sub-sulcatus. Marsh. Ent. Br. 1 249. 32.

Habitat in plantis & gramine sat frequens.

Descr. Ap. Craccæ plerumque dimidio minus, & in elytris multo minus convexum; variat etiam magnitudine duplo minori, & ultra. Caput breve latum nigrum sub-nitidum, concinne punctulatum, oculis globosis brunneis; rostrum feminæ longitudine fere capitis cum thorace, validum, cylindricum nigrum nitidum, subtilissime punctulatum, maris paullo brevius & crassius, magisque arcuatum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, nigrae, clava magaa oblongo-ovata acuminata pubescente. Thorax antice paullo angustior, basi apiceque truncatus, supra modice convexus, niger sub-nitidus, concinne punctulatus, foveola parva obsoletiori ante-scutellari impressus. Scutellum parvum nigrum. Elytra ovata, antice thoracis basi parum latiora, ultra medium dilatata, supra anterius parum convexa, tota violacea nitida, regulatiter sed minus profunde pun-

punctato striata, intersticiis planis subtilissime coriacis. Corpus subtus nigrum nitidum, crebre punctatum. Pedes mediocres nigri, femoribus crassiusculis nitidis, tarsis fuscis.

Var. b, differt tantum colore elytrorum cœruleis, rarius etiam virescente.

18. *A. Hydrolapathi*: nigrum glabrum, creberrime punctulatum, elytris ovatis subdepressis cœruleo-virescentibus, simpliciter striatis, rostro brevissimo crassiusculo.

Cicindela hydro-lapathi. Marsh. Ent. Br. 1.

. 249. 33.

Habitat in Scania rarius, Dom. Fallén.

Descr. Statura & fere magnitudo Ap. ænei, a quo differt, rostro multo breviori recto, capite thoraceque consertissime punctulatis, elytris profundius striatis, &c. Caput oblongum porrectum, cum oculis latitudine fere thoracis, depresso nigrum opacum, consertissime subtiliter rugoso-punctulatum; oculi prominuli brachii; rostrum maris capite vix longius, crassum, rectum, cylindricum. nigrum opacum, subtiliter rugoso-punctatum; feminæ capite paullo longius, minus crassum, extrosum nitidum. Antennæ ante medium rostri insertæ, vix longitudine rostri cum capite, crassiusculæ nigræ, clava magna acuminata picea. Thorax angustus cylindricus, anterius per-parum angustatus, supra convexus niger opacus, consertissime subtiliter punctatus; ante medium baseos foveola oblonga impressa. Scutellum minutum nigro-cœrulescens. Elytra ovata, antice thorace dimidio latiora; in medio nonnihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra minus convexa, tota viridi-cœrulescens nitida, regulariter

sat profunde striata, striis sub-lævibus; dum vero oblique inspiciuntur, striæ obsolete punctatæ apparet; interstitia stiarum plana, subtilissime coriacea. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres nigri, femoribus validis nitidis.

19. *A. gibbirostre*: nigrum sub-glabrum, elytris nigro-cœruleofuscatis punctato-striatis, antennis juxta basin rostri sub gibbere elevato insertis.

Habitat in carduis aliisque plantis, passim.

Descr. Statura fere *A. violacei*, sed fere dimidio majus. Caput breve latum nigrum depresso, crebre subtiliter rugoso-punctatum, oculis magnis globosis nigro-brunneis; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, cylindricum arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum; prope basin utrinque gibber vel tuberculum obtusum laterale, antennarum basin occultans. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassæ nigræ, juxta basin rostri sub gibbere descripto insertæ. Thorax vix capite latior, cylindricus niger, crebre & sat profunde punctatus, foveola antecutellari parva oblonga impressus. Scutellum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigro-cœruleofuscia vel plumbea, sat profunde striata, striis evidenter punctatis, interstitiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, sat crebre punctatum. Pedes mediocres toti nigri.

20. *A. brevirostre*: nigrum, tenui pubescens, rostro brevissimo sub-recto truncato

to, thorace angusto crebre punctato, elytris punctato-striatis.

Herbst. Col. 7. 120. 22. Tab. 103. f. 10 k.

Habitat in floribus & plantis, locis aridis, passim.

Descr. Statura ovata depressa omnino Ap. violacei, & minimis ejus magnitudine æquale. Caput latum sub-quadratum depresso nigrum, crebre punctulatum, oculis globosis brunnescens; rostrum maris capite parum longius, crassum, fere rectum, nigrum subtilissime punctulatum & pubescens, apice truncatum; feminæ capite dimidio longius, apice lœve nitidum. Antennæ vix capite cum rostro longiores, crassæ, nigrae, clava magna acuminata. Thorax angustus, vix capite latiior, sub cylindricus niger, crebre & sat profunde punctatus, foveola ante-scutellari obsoletiori impressus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, ultra medium non-nihil dilatata, supra minus convexa, præsertim anterius, tota nigra, tenui pubescens, sat profunde striata, & in striis punctata, intersticiis planis sub-lævibus. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, sat profunde punctatum, parum pubescens. Pedes validi nigri.

21. A. vorax: nigrum pubescens, antennis tenuibus inferne testaceis, elytris plumbeo-cœrulecentibus, rostro elongato tegnui, oculis prominulis.

Herbst. Col. 7. 119. 20. Tab. 103. f. 8. H.

Curculio villosulus. Marsh. Ent. Br. I. 250. 34.

Habitat in Pisis, viciis, alijsque plantis, non infrequens.

Desc. Ap. Craccæ feminæ fere magus, præser-tim longius. Caput elongatum nigrum pubescens, subtiliter punctulatum, oculis magnis globosis brun-neis; rostrum maris longitudine capitis thoracisque cylindricum, arcuatum nigrum, longius pubescens, subtiliter punctulatum; feminæ adhuc longius & ter-nius, fere glabrum lœve nitidum. Antennæ rostro-cum capite longiores, tenues, articulo primo longiori quam in plerisque hujus generis speciebus; articuli 3 s. 4 baseos pallide testacei, reliqui nigri pu-bescentes, clava angusta elongata acuta. Thorax parvus, antice angustior, margine sub-elevato, supra parum convexus; totas niger opacus creberrime gra-nulato punctatus, pubescens, in medio obsolete ca-naliculatus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, in medio nonnihil dilatata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, plumbea, vel nigro cœruleo-ventrata sub-nitida, regulariter sat profunde striata, & in striis punctata, intersticiis planis subtiliter coriaceis, pu-bescentibus. Corpus fabtus nigrum opacum, crebre punctatum, pectore densius albido-pubescente. Pe-des elongati tenues nigri, cinereo-pubescentes.

22. A. Æthiops: nigrum immaculatum pu-bescens, capite angusto oculis depresso, rostro longissimo crassissimo, elytris pro-funde punctato-liratis.

Herbst. Col. 7. 120. 21. Tab. 103. f. 9. I.

Attelabus Pis. Fabr. Eleut. 2. 425. 50. ? Il-lig. Mag. 4. 135. 50. ?

Ha-

Habitat in viciis, aliisque plantis, sat frequens.

Descr. Statura & fere magnitudo praecedentis, sed differt capite angustiori, oculis non prominulis, rostro crassiori & longiori, ut & colore antennarum & elytrorum. Caput elongatum valde angustum, rostro parum latius, nigrum opacum pubescens, crebre punctatum, oculis brunnneis perparum prominulis; rostrum meritis longitudine capitis thoracisque crassum, arcuatum, cylindricum, nigrum pubescens punctatum; feminæ adhuc longius, paullo minus crassam, minusque pubescens. Antennæ vix capite cum rostro longiores nigrae, articulo primo basi piceo, rarus elongato quam in praecedente. Thorax parvus sub-cylindricus, antrosum parum angustior, niger opacus pubescens, sat crebre punctatus, linea ante-scutellari obsoleta impressus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, in medio nonnihil dilata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, vix plumbeo-micantia, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis planis sub-lævibus. Corpus subtes nigrum sub-opacum punctatum, tenuè pubescens. Pedes elongati nigri, tenuè pubescentes.

Obs. Synonyma Cl. Fabricii & Illigeri minus certa, nam neque elytra globosa, nec color illarum cyaneus.

23. A. Ervi: nigrum tenuè pubescens, antennis inferne testaceis, rostro elongato tenui arcuato, elytris nigris striato-punctatis.

Curculio fusi-cornis, Marsh. Ent. Br. I. 244 17.²

Ha-

Habitat in Ervo, vicia, aliisque plantis oleraceis, sat frequens.

Descr. Ap. voraci quoad colores simillimum, sed plus duplo minus, Ap. Viciae æquale & simile. Caput breve latum nigrum; subtiliter striatum & punctulatum, oculis magnis globosis brunneis; rostrum maris capite plus duplo longius, tenue arcuatum, nigrum, pilis depresso-cinereo-albidis adspersum; feminæ adhuc longius & tenuius, glabrum lœve nitidum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues, testaceæ, clava nigra pubescente, articulo primo minus elongato quam in Ap. voraci. Thorax sub-cylindricus, antice tamen paullo angustior, supra parum convexus, niger pubescens, sat profunde crebre punctatus, canalicula postica abbreviata exaratus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra antice vix thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, ultra medium dilatata, supra valde convexa, nigra, cinereo-pubescentia, sat profunde striata, & in striis evidenter punctata, intersticiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre profunde punctatum, petore dense, abdomine parcius albido-pubescentibus. Pedes elongati nigri, cinereo-pubescentes.

24. A. Angustatum: nigrum immaculatum, tenue pubescens, capite angusto, rostro elongato tenui arcuato, antennis brevioribus crassiusculis.

Attelabus flavipes. Payk. fn. 3. 182. 17. var. b.
Habitat in plantis & gramine, locis aridis, sat frequens.

Descr. Statura angusta Ap. flavigeris, sed paulo majus, pubescentia, colore pedum, thorace breviori & paulo latiori distinctum. Caput elongatum angustum nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, o-

culis nigro-brunneis parum prominulis; rostrum capite cum thorace fere longius, tenue, arcuatum, nigrum nitidum, subtilissime punctulatum, nec in triginti individuali secundum sexum variare observavi. Antennæ vix rostro longiores, crassiusculæ nigrae, cibâ pubescente. Thorax latitudine vix longior, antice parum angustior, supra modice convexus, niger, crebre punctatus, foveola ante-scutellari parva oblonga angusta, sat profunde impressa. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, sed fere quintuplo longiora, in medio parum dilatata, supra modice convexa, nigra, subnitida, interdum nonnihil plumbeo micantia, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis convexis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum sub nitidum, crebre punctatum, tenui pubescens. Pedes mediocres nigri.

25. A. tenuius: nigrum immaculatum, longius pubescens, capite angusto, rostro elongato tenui arcuato, antennis longioribus, thorace breviori.

Id. Dom. Kirby, in litteris.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, non infrequens.

Descr. Præcedenti simillimum & valde affine, sed plus duplo minus, & ut videtur distinctum, pubescentia longiori & densiori, thorace breviori, &c. Caput & oculi ut in præcedenti; rostrum maris vix longitudine capitis cum thorace, arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum, pubescens; femoræ capite cum thorace longius, tenui, nigrum nitidum, fere glabrum. Antennæ longitudine fere capitis cum rostro, nigro-piceæ, minus crassæ quam in priori. Thorax longitudine latior, sub-cylindricus convexus nig-

ger.

ger; crebre punctatus, longius pubescens, foveola ante-scutellari parva oblonga. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytrorum forma & punctura ut in priori, sed pubescencia longior & densior. Corpus subtus nigrum sub-nitidum. crebre punctatum, pubescens. Pedes mediocres nigri pubescentes.

26. A superciliosum: nigrum sub-nitidum, tenue pubescens, elytris angustioribus fusco sub-aeneis punctato-striatis, orbita oculorum pectoreque albido-villoso.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, passim.

Deser. Praecedenti paullo majus, magis nitidam. Caput subquadratum nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, oculis modice prominulis brunneis; orbita oculorum in speciminibus illæsis dense albido-villosa; rostrum mari capite duplo longius, cylindricum, arcuatum, nigrum, basi depresso, tenue pubescens & punctulatum, apice glabrum; feminæ longitudine capitis cum thorace, tenuis, fere totum glabrum nitidum. Antennæ paullo ante medium rostri insertæ, longitudine rostri cum capite, tenues nigrae, clava magna pubescente. Thorax antice angustior, & posse apicem utrinque leviter impressam, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, totus niger, tenui pubescens. crebre punctatus, foveola ante-scutellari obsoletissima. Scutellum parvum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, & ante medium parum dilatata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra, parum aeneo-maculata, sub nitida, sat profunde punctato striata, intersticis subtiliter coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctulatum, tenui pubescens, pectoris lateribus densius & longius albido-villoso.

Pedes elongati nigri pubescentes, femoribus sub-clavatis.

27. A. minimum: atrum sub-opacum, tenuissime pubescens, rostro breviori crassiusculo, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis angustis costatis.

Herbst. Col. 7. n. 5. 15. Tab. 103. f. 3. C.

Habitat in floribus & plantis, locis aridis, paucim.

Descr. Magnitudo & fere statuta praecedentis, sed color magis ater; pubescens tenuior, elytra profundijs striata, interstitiis costatis, &c. Caput breve latum nigrum, subtiliter rugoso-punctulatum, oculis globosis nigro-brunneis; rostrum maris vix capite duplo longius, crassiusculum porrectum nigrum, subtilissime punctulatum & pubescens, parum arcuatum; femoræ paullo longius & tenuias, glabrum nitidum. Antennæ longitudine capitis cum rostro, crassiascuæ nigræ, paullo ante medium rostri insertæ. Thorax antice angustior, in medio nonnihil dilatatus, supra parum convexus, totus ater opacus, tenui pubescens, creberrime & lat profunde rugoso-punctatus, soveola ante-scutellari vix ulla. Scutellum punctiforme atrum. Elytra antice vix thoracis basi dimidio latiora, in medio nonnihil dilatata, thorace quadruplo longiora, supra modice convexa, atra sub nitide, profunde striata, & in striis punctis magnis impressa, interstitiis, præsertim exteriorius, angustis elevatis, ut fere clathrata dici queant elytra. Corpus subitus nigrum sub-nitidum, obsoletius penctatum, tenui pubescens. Pedes elongati validi nigri, cinereo-pubescentes.

28. A. Loti: nigrum immaculatum, tenuē pubescens, thorace brevi anterius angustato, elytris magnis latis, humeris prominulis.

Habitat in Loto corniculato aliisque plantis, locis aridis, paſſim.

Descr. Parvum, Ap. Ervi fere dimidio minus, præsertim brevius, reliquis magis coarctatum, humeris elytrorum latioribus prominulis. Caput breve latum nigrum opacum, subtiliter punctatum, oculis magnis globosis nigro-brunneis; rostrum maxime capite duplo longius, tenuē, arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum &c pubescens; seminæ longitudine capitis thoracisque, adhuc nigris tenuē, glabrum nigrum. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassiusculæ nigrae, prope basin rostri insertæ, clava magna ovata pubescente. Thorax latitudine baseos brevior, antice multo angustior, & pone apicem utrinque impressus, basi bisignatus, elytris arte applicatus, supra sub-depressus, præsertim postice, totus niger sub-opacus, crebre punctatus, tenuē pubescens, foveola ante-scutellari parva rotunda. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra magna, antice thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, ante medium adhuc magis dilatata, thorace fere sextuplo longiora, supra valde convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, intersticiis latis planis, subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre punctulatum, tenuē pubescens. Pedes longiusculi nigri pubescentes.

29. A. Atomarium: nigrum immaculatum, densius pubescens, thorace brevi anterius
an-

angustato; elytris minus latis, rostro valde arcuato sub-deflexo.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, paissim.

Descr. Præcedenti in multis simile, sed fere triplo minus, adeoque minimum mihi cognitum in hoc genere, Latridio gibboſo æquale, pubescentia densiori, elytris minus latis, pedibus validioribus, &c. a priori præterea distinetum. Caput breve latum nigrum pubescens, subtilissime punctulatum, oculis globosis nigro-brunneis; rostrum maris vix capite duplo longius, valde arcuatum, deflexum, nigrum, subtilissime punctulatum & pubescens; feminæ capite cum thorace fete longius, magis tenue, æque arcuatum & deflexum, glabrum nitidum. Antennæ vix rostro longiores, nigræ, basi piceæ, prope rostri basi insertæ. Thorax brevis, postice latus; structuræ omnino ut in præcedenti, niger, crebre punctatus, densius pubescens, foveola ante-scutellari parva punctiformi. Scutellum ut in priori. Elytra thoracis basi parum latiora, nec in medio dilatata; thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra; densius pubescentia, sat profunde punctato striata, intersticiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes nigri pubescentes, femoribus crassiusculis.

Sectio 2. Fracticornes.

Antennarum articulus primus valde elongatus, reflexus, adeo ut antennæ quasi fractæ vel geniculatae appareant,

L I X U S.

Palpi quatuor æquales brevissimi, articulo ultimo subulato. Maxilla cornuta acuta integræ. Antennæ thorace breviiores, ante medium rotari insertæ clava oblonga, utrinque attenuata. Rostrum crassiusculum cylindricum subrectum. Corpus elongatum, angustum, cylindricum.

L. *Paraplecticus*: fusco-cinereus pubescens, virescenti-farinosis, elytris apice mucronatis dehiscentibus, antennis ferrugineis clava fusca.

Fabr. Eleut. 2. 498 1.

Curculio paraplecticus. Linn. Syst. 2. 610. 34. fn. Sv. 604. It. Scan. 184. Herbst. Col. 6. 42. 1. Tab. 62 f. 1. Payk. fn. 3. 244. 63. Panz. fn. 6. f. 15.

Curculio Phellandrii, De Geer Ins. 5. 224. 18. Tab. 7. f. 3 - 9.

Habitat in Phellandrio, Sio, aliisque planitis æquaticis umbellatis, passim. Larva alba, capite brunneo, intra caules Phellandrii sub aqua degit; Paraplegiam Equorum causare fertur.

Descr. Longitudo semi-pollicaris & ultra, sed corpus valde angustum, cylindricum, reapse quidem nigrum, sed pubescens tenui cinerea, & pulvere flavo-virescenti plus minusve testum, Caput parvum,

rostro parum latius, fuscum, breve, obsoletē punctulatum pubē brevi densa flavo-grisea, & pulvere concolore testum, oculis parvis brunneis, parum prominentibus; rostrum thorace paullo brevius, crassiusculum, cylindricum subrectum, punctura & pubē simili ac in capite, apice plerumque sub-nudo. Antennae capite cum rostro parum longiores, tenues, falco-ferrugineæ, clava oblonga obscurius fusca. Thorax oblongus, antice angustior, truncatus, basi bisinuatus, supra parum convexus, sub-inæqualis, nigro-fuscus, subtilissime coriaceus, in medio obsolete canaliculatus, pubē & pulvere simili uti caput obductos, relicta tænia longitudinali magis denudata obscuriori. Scutellum minutum triangulare pubescens. Elytra vix thoracis basi latiora, sed illo quintuplo longiora, cylindrica, spicè attenuata, in spinam elongatam arcuatam scutam, extorsum & sursum non-nihil arcuatum, excurrentia, unde apices elytrorum dehiscentes; supra convexa, nigro-fusca, versus latera densius pubescentia, dorso obscuriora, magis denudata, regulariter punctato striata, punctis plerisque oblongis remotis. Corpus subtus fuscum, subtilissime punctulatum, totum pubē densa pallida seu flavo cinerascente testum. Pedes tenues fusi pubescentes.

Mas dimidio minor, præsertim angustior, magis fuscus, pubē rariori adspersus,

R H Y N C H A E N U S.

Palpi quatuor filiformes. Maxilla cylindrica uni-dentata. Antennæ in medio rostri, vel paullo anterius insertæ, clava ovata, coarctata, plerumque 4 articulata, sub acuminata. Rostrum cylindricum vix thorace brevius.

Fam.

Fam. I. Femoribus muticis.

Sect. I. Corpore oblongo ovato,
interdum lineati.

I. R. Articus: niger, griseo-pubescent, rostro crassissimo carinato, thorace medio dilatato, elytris puncto disci albo-piloso.

Curculio Arcticus Payk. f. 3. 221. 40.

Habitat in soliis Salicis, in Bothnia occidentali & Lapponia, passim. Dom. de Pay-hull & Grape.

Descr. Maximus nostratum, Statura Rh. Pinti, sed plerumque dimidio major, variat tamen minor, illi æqualis. Caput parvum retractum nigrum, dense griseo-pubescent, crebre rugoso-punctatum, canalicula brevi profunda inter oculos impressum; oculi ovati brunnei sub-depressi; rostrum longitudine thoracis, crassum, parum arcuatum, nigrum opacum, griseo-pubescent, crebre rugoso-punctatum, cum carina media longitudinali elevatori, & alia utrinque tenui obsoleta. Antennæ capite cum rostro parum longiores, crassæ, nigrae, articulo primo longissimo clavato, 2, 3, ob-conicis, sequentibus quatuor paullo longioribus, 4-7, brevibus nodosis, 8-11, multo crassioribus, clavam ovato-acuminatam, coarctatam formantibus. Thorax basi apice truncatus, lateribus paullo ante medium rotundato-dilatatus, supra sub-depressus, in-æqualis, totus niger, opacus, pubescent, crebre rugoso-punctatus; in medio dorsi carinula elevata, basin non attingens, & in utroque latere linea sub-abrupta e pilis cinereo-pallidis condensatis, Scutellum par-

vum-

vum elevatum nigrum lœve. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, tota nigra opaca, pube cinereo-albida, hinc inde in maculas irregulares condensata, adspersa, obsolete striata, & in striis punctis magnis oblongis remotis impressa; interstitiis conflatisse rugoso-tuberculatis; in medio dissei cuiusvis elytri macula major rotundata albido-pilosa distincta, & intra apicem, alia obsolete. Corpus sub-tus nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, pubescens, ventre sub-impresso, utrinque serie e maculis quatuor pallido-pilosis notato. Pedes longiusculi validi nigri pubescentes, femoribus sub-clavatis, verius apicem apnulo albente cinctis.

2. R. Pineti: nigro-piceus sub-nitidus, pallido-pubescentes, rostro crassiusculo tereti, thorace sub-rugoso, elytris fasciculato-pilosis.

Fabr. Eleut. 2. 440. 6.

Curculio Pineti. Herbst. Col. 6. 293. 264. Tab. 82. f. 10. Payk. fn. 3. 223. 41.

Habitat in Pino Sylvestri & Abiete, passim:

Descr. Rh. Abietis similis, sed plerumque dimidio major, thorax magis rugosus, elytra profundiis striata, & femora mutica. Caput rotundatum convexum nigro-piceum, crebre punctatum, tenuo pallido-pubescentes, inter oculos punto rotundato profundo impresso; oculi ovati brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine fere thoracis, crassum, nigro-piceum, crebre subtiliter rugoso-punctatum, minime carinatum, sed ante apicem obsolete canali-

culatum, tenui pubescens, parum arcuatum. Antennæ capite cum rostro parum longiores, nigro-piceæ, structa ut in præcedenti. Thorax antice sub-rotundatus, basi truncatus, lateribus in medio nonni-hil rotundato-dilatatus, supra parum convexus, totus nigro-piceus sub nitidus, inæqualis, crebre & profunde rugoso punctatus, pilis rigidis depresso-flavescens adspersus; in medio dorsi interdum carinula abbreviata irregularis. Scutellum oblongum elevatum nigrum nitidum lœve. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra convexa, nigro-picea sub-nitida, punctis magnis oblongo-quadratis profundis approximatis striata, intersticiis crebre granulato-rugosis; pili rigidi depresso-pallidi vel flavescentes, fasciculatim congesti, superficiem undique commaculant. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, pilis flavescens discretis parce adspersum, pectore fortius, ventre tenui punctulatis. Pedes longiusculi validi, plerumque dilutius rufo-picei, pubescentes, femoribus sub-clavatis.

3. R. Pini: rufo-piceus, pallido-squamosus, rostro tenui ferrugineo, elytris profunde punctato-striatis, fasciis duabus maculatis pallido-squamosis.

Fabr. Eleut. 2. 440. 7.

Curculio Pini. Linn. Syst. 2. 608. 19. Fn. Sv. 589. Herb. Col. 6. 147. 107. Tab. 70. f. 2. De Géer Ins. 5. 222. 15. Payk. fn. 3. 225. 43. Panz. fn. 42. f. 1.

Habitat in Arboribus refinosis, præsertim in Abietis frondibus, & ligno nuper cæso, frequens.

Descr.

Descr. Medius, statura fere præcedentis, sed triplo vel quadruplo minor. Caput parvum convexum rufo-piceum, subtiliter punctulatum, fronte inter oculos impressa; oculi ovati nigro-brunnei; rostrum feminæ longitudine sese capitis cum thorace, tenui, arcuatim, rufo-ferrugineum nitidum, subtiliter punctulatum; maris paullo brevius & crassius, evidentius punctatum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ rufo piceæ, clava obscuriori. Thorax antice multo angustior, sub-truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, postice bisinuatus, supra parum convexus, saturatius piceus, creberrime rugoso punctatus; pilis rigidis depresso-griseo-albidis adspersus, obsolete carinatus; in medio dorso puncta duo remota, paria, e squamis flavo-pallidis, quibus detritis loco illarum foveola Æduse impressæ observantur; ante scutellum etiam foveola oblonga, squamulis ejusmodi repleta; intra marginem utrinque linea obliqua, in medio interrupta, pallido-squamosa, & extra illam adhuc punctum pallidum, adeo ut puncta quatuor dorsalia, in lineam transversalem disposita, conspicuntur. Scutellum parvum rotundum elevatum, totum squamis albidis tectum. Elytra thoracis basi vix latiora, sed illo triplo longiora, apice attenuata, supra dorso parum convexa, ante apicem callo vel gibbere notata, plerumque dilutius rufo-picea, striis e punctis valde profundis oblongo-quadratis exarata, interstitiis creberrime transversim rugoso-granulatis; squamulis pallidis depresso-acuminatis sparsis undique adspersa, & præterea ante medium fascia, utrinque abbreviata; e maculis tribus conflata, & altera ponit medium fere transversa, subarcuata, e maculis circiter octo in singulo elytro concatenata, ambo e squamis flavo-albidis magis condensatis. Corpus subtus nigro-piceum, sat profunde punctatum, puncto singulo squama pallida, obtusa fœto. Pedes longiusculi validi, plerumque dilutius rufo-picei, femoribus clavatis, anticis ex assioribus;

ante apicem femorum, & in medio tibiarum, annulus e squamulis angustis albidis.

Obs. Squamulis detritis, corpus totum dilutius rufo-piceum, magis nitidum evadit. Descriptio Cure. Pini in Linn. Fn. Sv. ed. 2:da loc. cit. ad Cure. Abietis pertinet, & vicissim, ut ex coliatione cum editione prima Faunæ patebit, & hic error Scriptores Entomologæ plurimos in ambiguitatem de genuina Specie induxit.

4. *R. Hercyniae*: niger, pallido-squamosus, rostro tenui nigro, elytris profunde punctato-striatis, fasciis duabus macularibus albido-squamosis.

Illig. in Panz. Crit. Rev. t. 130.

Curculio Hercyniae. Herbst. Col. 6. 294. 265.
Tab. 82. f. 11.

Curculio 4-notatus. Panz. fn. 57. f. 12. Crit. Rev. t. 130.

Habitat in frondibus Abietis passim, minus frequens.

Deser. Præcedenti plerumque duplo, sœpe etiam triplo aut quadruplo minor, cæterum colore excepto simillimus & nimis affinis, auctoritate tamen auctorum allegatorum ut peculiarem speciem ad ulteriorem examinationem propono. Caput, oculi, rostrum ut in præcedenti, sed omnia nigra sub-nitida, vertice interdum dilutiori; rostrum secundum sexum ut in priori variat. Antennæ nigrae, articulo primo rufo-piceo. Thorax niger, margine antico anguste ferrugineo, cæterum quoad structuram, signaturas & omnia ut in præcedenti. Scutellum parvum elevatum, squa-

squamulis niveis tectum. Elytra nigra, alias ut in priori costructa, etiam punctis profundis oblongo-quadratis striata; interstitia angustiora, magis elevata, quod tamen ex animalculi magnitudine minori existere videtur; fasciæ maculares ut in illo plerumque albidiores & obsoletiores. Corpus & pedes ut in praecedenti, sed nigra, variat tamen pedibus dilatius rufo-piceis.

5. R. notatus: rufo-piceus, pallido-squamulosus, rostro tenui nigro-piceo, elytris tenuius punctato-striatis, fasciis duabus latioribus abbreviatis pallido-squamosis.

Illig. Mag. 4. 150. 17.

Curculio notatus. *Herbst. Col. 6. 65. 291. E,*
Tom. 7. 23. Tab. 97. f. 3.

Lixus notatus. *Fabr. Eleut. 2. 501. 17.*

Var. b, rufo-ferrugineus glaber, detritus:

Curculio palmarum. *Herbst. Col. 6. 169. 123. Tab. 71. f. 10.*

Curculio castanus. *Di Gise Ins. 5. 231. 19.*

Curculio brunnneus. *Panz. Jr. 26. f. 17. Crit. Rev. 1. 431.*

Habitat in frondibus & ligno recenti Abietis, passim.

Descr. Rh. Pini simillimus & valde affinis, plerumque tamen duplo minor & ultra, puncta striarum in elytris multo minora, & fasciæ latiores, alter constructæ. Caput rufo-piceum, rostrum nigrum, basi plerumque dilatius piceum, structura omnino

ut in Rh. Pini. Antennæ piceæ, basi dilutiores. Thoracis structura ut in Rh. Pini omnino, supra conseruissime punctatus, evidenter carinatus, rufo-piceus, squamulis albidis adspersus; puncta quatuor albo-squamosa, in medio transversim posita, ut in prioribus. Scutellum squamis niveis tectum. Elytrorum forma ut in prioribus, rufo picea, squamis crebris pallidis adspersa, punctato striata, punctis striarum interiorum quidem oblongo-quadratis, sed parvis, parum profundis, exteriorum adhuc minoribus, obsoletis; ante medium macula transversa didyma, aut albido, aut flavescenti-squamosa & paullo pone medium fascia fere transversa, in medio antrorsum dilatata, similiter squamosa. Corpus subitus nigro-piceum, squamis latioribus albis adspersum. Pedes rufo-ferruginei, albido-pilosæ & squamosi ut in prioribus.

Var. b. tantum colore dilutius rufo-ferrugineo differt, quod ex detritu squamularum unice cauflatur; punctula bina media thoracis, & medietas fasciæ posticæ elytrorum, plerumque tenacius adhaerent.

6. *R. Piniphilus*: rufo-piceus, concinne albo-squamosus, rostro tenui concolore, thorace sub-lævi, elytris subtiliter punctato-striatis, macula media albo-squamosa.

Circulio: Piniphilus. Herbst. Col. 7. 24. 582.
Tab. 97. f. 4. B.

Habitat in frondibus Abietis rarius.

Descr. Praecedentibus iterum simillimus & valde affinis, sed adhuc minor, Rh. acridulo æqualis, thorace leviori nitido, squamulis brevioribus punctiformibus, & situ maculæ elytrorum, a reliquis magis

gis diversus. Caput parvum rufo-piceum nitidum, obsolete punctulatum, puncto singulo squamula alba rotundata punctiformi testo, ut nisi squamulis detritis, superficies omnino laevis appareat, oculi ovati nigro-brunnei depresso; rostrum feminæ vix longitudo capitis cum thorace, tenui, arcuatum, rufo-piceum nitidum, subtilissime punctulatum, apice nigricante; maris paullo brevius & crassius, evidentius punctatum. Antennæ longitudine rostri cum capite, piceæ, basi dilutiores. Thorax quoad structuram ut in prioribus, supra sub-depressus, rufo-piceus nitidus, obiter inspectus laevis, punctis albis creberrime adspersus, sed revera subtiliter punctulatus, puncto sanguio iquamula punctiformi alba occultato, ut in capite: puncta quatuor paullo majora alba, in medio transversim collocata, & carinula longitudinalis elevata, ut in prioribus. Scutellum mediocre sub-cor- datum, squamis niveis tectum. Elytrorum forma ut in prioribus, supra modice convexa, rufo-picea, punctato striata; punctis plerisque rotundis, squamula punctiformi alba fœtis. unde sub-ocellata apparent, interstitiis angustis, rugoso-granulatis, similiter albo-squamosis, alternis plerumque elevationibus; in medio singuli elytri macula sub-transversa albida, e squamis multo majoribus ovatis. Corpus subtus nigro-piceum punctatum, squamis albidis irroratum, Pedes rufo-picei, pilis & squamulis albidis adspersi.

7. R. indigena: angustus niger, griseo-pubescent, rostro tenuissimo arcuato atro nitido, antennis, pedibus, elytrisque rufo-testaceis.

Curculio indigena. Herbst. Col. 6. 170. 130. Tab. 71. f. 12. Payk. fn. 3. 252. 72.

Var. b.

E 4

Var. b. Thorace aut fusco rufescente, basi apiceque nigro, aut toto rufo-testaceo.

Var. c, corpore toto pallide testaceo, rostro oculisque folis nigris.

Habitat in Pini Sylvestris frondibus; non infrequens.

Descri. Miusans, vix Ap. vernali latior sed paullo longior, linearis. Caput breve latum nigrum, subtiliter punctulatum, pube densa griseo-flavescente tectum; oculi globosi nigri prominenti; rostrum capite cum thorace fere longitas, tenuissimum, valde arcuatum, glabrum, nigrum nitidum laxe. Antennae capite cum rostro fere longiores, tenues, rufo-testaceae, clava apice obscuriori. Thorax antice angustior, sub-retundatus, basi bi-sinuatus, supra convexus, niger, pube densa griseo-flavescente tectus, qua detrita superficies creberrime & sat profunde rugoso-punctata videtur. Scutellum minutum nigrum, pube albida tectum. Elytra thoracis basi parum latiora, sed illo quintuplo longiora, supra valde convexa, sub-cylindrica, tota rufo-testacea, parcus pubescens, profunde punctato-striata, interstitiis sublaevibus. Thorax subtus & pectus nigra, punctata, dense albido-pubescentia; abdomen nigro-piceum, parcus pubescens. Pedes breviusculi validi, toti testacei pubescentes.

Var. b, differt tantum colore thoracis, aut rufo-testaceo teto, aut fusco-testaceo, basi apiceque nigro-marginato.

Var. c, tota pallidius testacea, rostro oculisque folis nigris, forte nuper exclusa.

R. ethiops: niger glaber, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longissimo arcuato,

cuato, thorace oblongo, elytris oblongo-ovatis punctato-striatis, interstiliis sub-lævibus.

Fabr. Eleut. 2. 446. 41.

Circulio aethiops. Herbst. Col. 6. 270. 241. Tab. 30. f. 10. Payk fn. 3. 236. 54.

Circulio badensis. Linn. Syst. 2. 607. 8?

Var. b, corpore toto, vel faltem elytris dilutius rudo-piceis.

Var. c. Pedibus nigris vel nigro-piceis.

Circulio holmianus. Herbst. Col. 6. 271. 242. Tab. 30. f. 11. teste Dom. Illig. in Mag. 4. 141. 41.

Habitat ad ripis arenosas Bothniæ occidentalis frequens. Dom. de Paykull & Grape; in pratis humentibus Westrogothiæ pallid.

Descr. Statura Rh. Acriduli, sed fere triplo major, Rh. rotato æqualis, totus glaber, & abunde distinctus. Caput parvum nigrum, crebre punctulatum, oculis depresso-brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde arcuatum, nigrum nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, rufo-ferrugineæ, clava pubescente. Thorax latitudine longior, in medio rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra modice convexus, sub-palvius, totus niger nitidus, crebre & sat profunde punctatus, linea angusta longitudinali lævi. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo triplo longiora, supra dorso antico parum convexa, tota nigra nitida, sat profunde punctato-striata, intersti-

tiis planis, sub oculo acute armato subtilissime obsolete punctulatis. Corpus subitus nigrum sub-nitidum, crebre & profunde punctatum. Pedes medios validi, aut rufo-picei, femoribus basi obscurioribus, aut toti dilutius rufo-testacei.

Var. b, differt tantum colore dilutiori, aut totius corporis, aut modo elytrorum & pedum.

Var. c, pedibus saturatius nigro-piceis tantum diversa.

9. *R. bi-maculatus*: niger, fusco-pubescentia, rostro longissimo arcuato atre, elytris obsolete striatis, intersticiis rugosis, puncto disci albo-piloso.

Fabr. Eleut. 2. 442. 16.

Circulio bimaculatus. Herbst. Col. 6. 291. 262.

Tab. 82. f. 8.

Habitat in plantis aquaticis ratus.

Descr. Magnitudo & statura praecedentis. Caput parvum nigrum nitidum laxe, subtiliter punctatum, oculis depresso-brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuatum atrum nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, tenues, piceæ, extrorsum pubescentes. Thorax latitudine medii paullo brevior, ante sub-sinuatus, basi truncatus, lateribus rotundatus, supra minus convexus, niger, crebre & profunde rugoso-punctatus, pilis fusco-griseis depresso-adspersus, in medio linea sub-elevata angusta lœvi instructus; intra latera utrinque linea obliqua sub-arcuata e pilis griseis condensatis. Scutellum parvum triangulare fuscum. Elytra thoracis medio vix latio-

fiora, sed illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigro-fusca opaca, pilis crebris depresso-fuscis adpersa, obsolete punctato-striata, interstitiis confertissime transversim rugoso-granulatis; paulo pone medium, versus suturam, punctum parvum distinctum albido-pilosum. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, crebre punctatum, parce pubescens. Pedes mediocres validi pubescentes, femoribus nigris, tibiis tarsisque fusco-piceis.

10. R. acridulus: niger, griseo-pubescent; antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longissimo arcuato atro, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis rugosis.

Fabr. Eleut. 2. 454. 79.

Curculio acridulus. Linn. Syst. 2. 607. 13. Fn.
Sv. 584. Herbst. Col. 6. 272. 244. Tab. 81.
f. 1. De Géer Ins. 5. 235. 22. Payk. fn. 3.
238. 56. Panz. fn. 42. f. 10.

Var. b, Elytris puncto posteriori albido.

Rhynchænus punctum. Fabr. Eleut. 2. 442. 17.

Curculio rigidus. Marsh. Ent. Br. 1. 270. 97.

Habitat in humidis, praesertim in plantis
Tetradynamis, frequens.

Descr. Statura & similitudo precedentis, sed duplo, imo triplo minor. Caput mediocre conatum nigrum nitidum, sat profunde punctatum, oculis depresso-brunneis; rostrum capite cum thorace sere-longius, arcuatum nigrum nitidum punctulatum, & in masculis striatum. Antennæ rostro cum capite longiores, rufo-ferrugineæ, extorsum fuscæ

fusco-piceæ pubescentes. Thorax latitudine sere brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra minus convexus, niger vel nigro-piceus, tenuè pubescens, creberrime profunde punctatus, linea media sub-elevata lœvi. Scutellum parvum rotundatum piceum. Elytra thoracis besi vix dimidio latiora, & illo triplo longiora, supra dorso parum convexa, postice declivia, plerumque dilutius nigro-picea, e pube densiori fuscescentia, sat profunde crenato-arcuata, interstitiis subtilius transversim rugulosis vel coriaceis. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, crebre & profunde punctatum, parum pubescentes, aro piceo. Pedes longiusculi pubescentes, aut dilutius rufo-testacei, aut femoribus jobcurius piceis.

Var. b, in omnibus simillima, differt tantum puncto piloso cipero paullo pone medium cujusvis elytri, versas suturam.

II. R. Festucæ: oblongus fuscus, dense cinereo-squamulosus, rostro longissimo tenui arcuato, pedibusque rufo-ferrugineis.

Circulio Festucæ. Herbst. Col. 6. 327. 301.
Tab. 85. f. 13. Payk. fn. 3. 239. 57.

Circulio Caricis. Thunb. Mus. Upf. App. 6.
p. iii.

Circulio inquisitor. Herbst. Col. 7. 42. 606.
Tab. 97. f. 12. G. sorte idem.

Habitat in Caricis acutæ floribus, aliisque plantis aquaticis, in flaviis & lacubus passim.

Deser.

Descr. Statura Rh. æthiopis, sed plerumque dimidio minor. Caput breve latum nigro-fuscum opacum, subtilissime punctulatum, pube & squamu- lis minutis griseis tectum, oculis magnis ovatis brunneis, parum prominulis; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuatum, tenuis, rufo-ferrugineum nitidum, subtilissime punctulatum. An- tennæ rostro cum capite longiores, tenues, piceæ, clava pubescente. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra parum conve- xus, fuscus opacus, creberrime subtiliter & obsole- te punctulatus, lateribus & subtus squamulis minu- tis cinereo-albidis tectus, dorso medio longitudina- liter magis nudo fuscus, pilis tenuibus griseis adsperso. Scutellum parvum rotundatum, squamulis albi- dis tectum. Elytra thoracis medio vix latiora, sed illo quadruplo longiora, apicem versus attenuata, supra dorso parum convexa, fusca opaca, obsoleta punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, sqau- mulis minutis cinereo-albidis, in illæsis individuis omnino tecta, saepe vero hinc inde magis deundata, unde fuso-variegata evadunt; in his tamen macula ovata in medio baseos, & alia obliqua paullo pone medium juxta suturam, semper densius squamu- losa, unde elytra quadri-maculata apparent, ut in figura Herbstii. Corpus subtus nigro-fuscum, subtiliter crebre punctulatum, pectoris & abdominis lateribus dense albido-squamulosis, ventris medio magis nu- do. Pedes elongati tenuis rufo-testacei, parce pu- bescentes.

12. R. nereis: linearis elongatus fuscus, su- pra obscure ferrugineus, dense cinereo- squamosus, rostro longissimo tenui, pe- dibusque rufo-ferrugineis, elytris antice piceis.

Curculio nereis. Payk. f. 3. 240. 58.

Habitat in plantis aquaticis Scaniæ, rarius.
Dom. Fallén.

Descr. Præcedenti duplo minor, præsertim angustior, linearis, ceterum in multis simillimus & aequalis. Caput breve latum fusco-ferrugineum punctulatum, pube & squamulis cinereis adpersum, oculis magnis ovatis nigro-brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde terue, arcuatum, rufo-ferrugineum sub-læve. Antennæ ante inedium rostri insertæ, & illo cum capite longiores, tenues, fusco-ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax basi apiceque truncatus; lateribus rotundato-dilatatus; supra parum convexus, fusco-ferrugineus vel brunneus opacus, crebre subtiliter rugoso-punctatus, lateribus & subtus dense albido-squamulosus, dorso medio longitudinaliter denudato. Scutellum parvum rotundatum nigrum, cinereo-squamosum. Elytra thoracis medio vix latiora, sed quadruplo longiora, angusta, apice attenuata, supra parum convexa, obsolete crenato-striata, intersticiis subtiliter coriaceis; lateribus & postice late rufo-ferruginea opaca, dense cinereo-squamulosa, plagiæ dorsali communi a basi ad medium magis denudata nigro-picea. Corpus subtus fusco-piceum, creberime punctulatum, petoris & abdominis lateribus dense albido-squamulosis, ventris medio obscuriori sub-nudo. Pedes elongati rufo-ferruginei pubescentes, femoribus subtus macula nigricante.

13. R. *Cylindrus*: linearis-elongatus nigricans, cinereo-squamulosus, antennis tibiisque fusco-ferrugineis, rostro mediocri arcuato atro, elytris postice compressis.

Cur-

Cneculio cylindrus. Payk. fn. 3. 241. 60.

Habitat in Scaniæ Lemna, aliisque plantis aquaticis passis. Dom. Fallén.

Descr. Parvus, angustus, Rh. indigena paullo longior, sed non latior. Corpus reapse nigrum, sed plerumque argilla & luto tectum, ut & squamulis vel pubescentia subtilissima adspersum, unde griseum appareat. Caput rotundatum nigrum, parum convexum, crebre subtiliter punctulatum, oculis parvis brunneis; rostrum thorace paullo brevius, deflexum, arcuatum, atrum nitidum læve, apice piecum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues, piceæ, vel fusco-ferrugineæ. Thorax latitudine longior, juxta ipsum apicem transversim impressus, angustior, lateribus ante medium dilatatus, dein nonnihil angustatus, basi truncatus, supra parum convexus, nigro-fuscus, creberrime subtiliter punctulatus. Scutellum parvum fuscum. Elytra thoracis antico vix latiora, sed illo triplo longiora, versus apicem attenuata, compressa, supra modice convexa, nigro-fusca opaca, obsolete-punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, subtiliter crebre punctulatum, squamulis cinereis, præsertim versus latera tectum. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, interdum basi fusco-testaceis, tibiis fusco-ferrugineis, tarsis fuscis.

14. R. T. album: linearis elongatus niger nitidus, pectoris abdominisque lateribus subtus albo-squamosis, rostro mediocri incurvo.

Curculio T. album, Linn, Syft. 2, 609, 23. Fn. Sv. 594.

Curculio funereus, Herbst. Col. 6. 164. 122.

Tab. 71. f. 3.

Curculio atriplicis. Payk. fn. 3. 243. 62.

Curculio hypoleucus. Marsh. Ent. Br. 1. 274.
109.

Curculio Geoffr. Inf. 1. 285. 17.

Habitat in plantis & gramine; locis humidis, passim.

Descr. Longitudo fere Rh. acriduli, sed duplo angustior, linearis, statura Rh. nereidis. Caput rotundatum convexum nigrum nitidum, subtiliter punctulatum, oculis depresso nigro-brunneis; rostrum vix longitudine thoracis, deflexum, valde arcuatam, atrum nitidum laxe. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassiusculæ nigrae, clava magna ovata picea. Thorax latitudine fere longior, antice angustior, in medio rotundato-dilatatus, supra subdepressus, niger nitidus, crebre & sat profunde punctatus, lineola media angusta laxe, versus latera pilis tenuissimis griseis adspersus. Scutellum minutum rotundatum nigrum. Elytra latitudine thoracis, & illo triplo longiora, linearia, apice rotundata, supra perparum convexa. nigra nitida, regulariter & sat profunde striata, striis sub-laxeibus, intersticiis planis, punctis minimis, seriatim digestis; e quovis punctulo, in illæsis individuis, setula minuta grisea encastitur, unde setulæ istæ etiam striatim positæ. Thorax subtus niger punctatissimus, parce albido-squamulosus; pectus & abdomen squamulis densis albis, interdum flavescens, tecta, relicta area media longitudinali, nuda nigra nitida punctulata. Pedes mediocres toti nigri, femoribus clavatis.

Obs. Lixus atriplicis. Fabr. Eleut. s. 1604. 31.
huc non pertinet, secundum sententiam Dom. Illigeri, in Mag. 4. 151. 25. 15 R.

35. R. Artemisiæ: niger nitidus glaber, rostro mediocri valde arcuato, thorace profunde punctato, elytris striatis, intersticiis seriatim punctatis.

Fabr. Elext. 2. 456. 92.

Curelio Artemisiæ. Herbst. Col. 6. 101. 61.

Tab. 66. f. 5. Payk. fn. 3. 237. 55. Panz.
fn. 18. f. 10.

Habitat in culmis & juxta radices Artemisiæ vulgaris, in agris arenosis Westrogothiae passim.

Descr. Præcedenti similis, sed brevior & latior, totus niger glaber. Caput breve conhexum nigrum, subtiliter punctulatum, oculis ovatis depresso nigro-brunneis; rostrum fere longitudine thoracis cum capite, crassiusculum, deflexum, valde arcuatum, nigrum subtiliter crebre punctulatum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ nigrae, basi piceæ, clava pubescente. Thorax antice multo angustior, coarctatus, sed mox pone apicem dilatatus, basi sat profunde bi-sinuatus, supra parum convexus, totus niger nitidus, crebre & valde profunde punctatus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi paullo latiora, humeris prominulis, sed illo vix triplo longiora, supra modice convexa, tota nigra nitida, profunde regulariter striata, striis vix visibiliter crenato-punctatis, intersticiis latis planis, singulis serie regulari e punctis parvis impressis. Corpus subitus nigrum nitidum, crebre, & antice profundius punctatum. Pedes breviusculi nigri punctati, tarsis piceis.

16. R.

16. R. Pruni: niger sub-opacus, antennis ferrugineis, rostro breviori recto, thorace bi-tuberculato, elytris elongatis sub-cylindricis crenato-striatis.

Fabr. Eleut. 2. 447. 45.

Curculio Pruni. Linn. *Syst.* 2. 607. 12. Payk.
fn. 3. 246. 65.

Curculio erythroceros. Herbst. *Col.* 6. 73. 36.
Tab. 64 f. 6.

Curculio incognitus. Herbst. *Col.* 6. 97. 57.
Tab. 65. f. 13, mas, vel var. minor.

Habitat in Pruni, Cerasi & Padi foliis frequens, Larva gelatinosa, Limaciformis.

Descr. Longitudo Rh. T. albi, sed crassior, præsertim postice; variat etiam duplo, imo triplo minor. Caput magnum latum convexum nigrum, crebre obsoletius punctulatum fronte inter oculos angusta impressa; oculi magni prominuli brunnei, post mortem sæpe albicantes; rostrum vix capite longius, rectum, crassiusculum cylindricum nigrum punctulatum, apice nitidum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, erassisculæ ferrugineæ, clava magna ovata cinereo-pubescente. Thorax longitudine latior, antice angustatus, in medio rotundato-dilatatus, basi sub-truncatus, angulis prominulis; supra parum convexus, totus niger opacus, creberrime punctato-granulatus, pilis paucis minutis adspersus; in medio antico canaliculæ rudimentum, & versus latera utrinque tuberculatum elevatum.

vatum obtusum; ante basin utrinque striga abbreviata impressa. Scutellum rotundatum nigrum punctatum. Elytra magna, antice thorace fere dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, sub cylindrica, vel posterius nonnihil dilatata, apice singulatim rotundata, supra convexa, tota nigra, sub nitida, profunde crenato striata, intersticiis angustis convexis rugoso punctulatis. Thorax subtus & pectus nigra opaca, confertissime punctata; venter magis nitidus, parce & obsolete punctatus. Pedes mediocrem nigri, tarsis piccis,

17. R. Rhina: niger sub opacus, rostro breviori recto, thorace sub mutico, elytris elongatis sub cylindricis crenato striatis, antennis nigris, clava longissima.

Rhina Cerosi. Lalreille in Illig. Mag. 3. 1042
Var. b, Antennis ferrugineis, clava longissima fusca.

Habitat cum praecedenti, rarius.

Descr. Praecedenti simillimus & nimis affinis, structura & colore antennarum fere unice distinctus. Caput, oculi, rostrum, ut in priori omnino. Antennæ rostro cum capite multo longiores, crassissimæ, nigrae, clava maxima fusco pubescente tritarticulata, longitudinem fere dimidiari totius Antennæ æquante. Thorax paullo brevior & latior videtur, ceterum ut in praecedenti, etiam quoad puncturam & colorem, supra sub depresso, hinc inde foveolatus, inæqualis, tuberculis laterilibus vix observandis. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma eadem, tota nigra opaca, profunde crenato-

friata, interstitiis confertissime rugulosis. Corpus & pedes ut in præcedenti omnino.

Var. b, differt tantum antennis inferne ferrugineis, clava elongata fusca; elytra etiam paullo magis nitida, minus rugulosa.

18. R. bi-nodulus: niger, dense fusco-squamulosus, rostro breviusculo arcuato, elytrotum interstitiis alternis elevationibus, posterius acute callosis, tibiis arcuatis apice ferrugineis.

Curculio bi-nodulus. Herbst. Col. 6. 247. 211.
Tab. 77. f. 15.

Curculio atrirostris. Payk. fn. 3. 227. 45. var. major.

Habitat in plantis aquaticis apud nos rarius.

Descr. Magnitudo Rh. Rumieis. Caput parvum retractum, parum convexum, nigrum, squamulis fusco-griseis, & luto adglutinato omnino testum, crebre rugolo-punctulatum, fronte inter oculos canaliculata; oculi ovati nigri, parum prominenti; rostrum thorace fere brevius, crassum, arcuatum, nigrum subnitidum, crebre subtilissime punctulatum. Antennæ capite cum rostro paullo longiores, tenues, ferrugineæ, clava ovata fusca. Thorax subcylindricus, antice pro receptione capitis late emarginatus, paullo pone apicem transversim impressus, uade margo elevatus videtur, basi truncatus, supra parum convexus, niger, squamulis fusco-cinereis tectus, crebre subtiliter punctulatus, canalicula media obsoleta exaratus. Scutellum parvum rotun-

rotundatum; griseo-squamulosum. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, apicem versus attenuata, dorso antico depressa, posterius valde declivia, tota nigra, squamulis fusco-cinereis omnino tecta, obsolete punctato-striata, interstitiis creberrime subtilissime coriaceis; interstitia alterna, nempe 2. 4 & 6 a sutura, magis elevata, quarum secundum pone medium in tuberculum sub-acuminatum exaltatur, & quartum apicem proprius tuberculum simile emittit; sextum antice in humero elevato-carinatum; apex elytrorum pone tuberculata valde declivus. Corpus subtus nigrum, crebre subtiliter punctulatum, squamulis & luto uti supra tectum. Pedes elongati tenues, femoribus nigris, basi valde attenuatis, apicem versus elavatis, tibiis longis valde arcuatis, basi nigris apice ferrugineis, spina arcuata acuta armatis, carnis elongatis rufo-piceis.

19. R. lutosus: niger, cinereo-squamulosus, pedibus ferrugineis, rostro breviusculo arcuato, elytris apice attenuatis, callo unico obtuso, tibiis arcuatis.

Curculio collignensis. Herbst. Col. 7. 50. 602.
Tab. 98. f. 7. C.?

Habitat ad ripas aquarum rarius.

Descr. Statura & summa affinitas praecedentis, sed quadruplo minor, aliter squamosus, & callo elytrorum tantum uno praeditus. Caput parvum retractum nigrum, subtilissime punctulatum, cinereo-squamulosum, fronte inter oculos obsolete impressa; oculi parvi brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine fere thoracis, crassiusculum arcuatum nigrum, subtilissime punctulatum, a basi ultra

tra medium squamulis fusco cinereis tectum, apice nudum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, tenues, ferrugineæ, clava nigricante. Thorax latitudine brevior, prope apicem transversim profunde impressus, margine antico elevato, supra parum convexus, niger, crebre subtiliter punctulatus, in medio obsolete canaliculatus, squamulis pallide cinereis testus, lineis duabus latis dorsalibus obscurioribus approximatis. Scutellum minutum cinereo-squamulosum. Elytra thorace dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, apicem versus valde attenuata, dorso antico parum convexa, postice declivia, sutura elevato-carinata; nigro fuscæ, obsoletius punctato-striata interstitiis confertissime subtiliter coriaceis; interstitia alterna parum elevatione, & quartum a sutura posterius in tuberculum satis magnum elevatum; latera elytrorum inæqualiter pallidius cinereo-squamulosa, dorso longitudinaliter magis fuscæ. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum; squamulis cinereis omnino testum. Pedes elongati tenues, fuscocastanei, structa omnino ut in præcedenti.

20. R. lutulentus: niger, squamulis cinereis variegatus, tibiis arcuatis ferrugineis, rostro breviuscule arcuato, elytris apice obtusis, callo obsoleto.

Var. b, fuscocastaneus unicolor, tibiis foliis ferrugineis.

Curculio atrirostris, var. *pygmaea*. Payk. fn. 3. 227 45

Var. c, cinereo variegatus, antennis inferne ferrugineis.

Curculio temprilivus. Herbst. Col. 6. 246. 210.

Tab. 77. f. 14.

Habitat in argilla & luto, juxta aquas, pasim.

Descr.

Descr. Proxime præcedenti iterum simillimus & valde affinis, sed adhuc duplo minor & ultra, elytris spicè obtusioribus, sutura non carinata, callo postico minori, &c. ut videtur distinctus. Caput, oculi, rostrum, ut in præcedenti omnino. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ, totæ nigrae, articulo primo apice crassiori; & clava apicis majori, quam in præcedenti. Thoracis structura ut in priori omnino, supra fuscus, linea dorsali angusta, & lateribus late pallidius cinereo-squamofis. Elytra thorace dimidio latiora, humeris prominulis, thorace vix quadruplo longiora, apice rotundata, parum attenuata, supra antice sub-depressa, apice obtuse declivia, sutura non carinata, tota nigro-fusca, obsoletè punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis, versus latera late inæqualiter cinereo-squamulofis, dorso magis nudo obscuro; interstitia alterna nonnihil elevata, & quartum a sutura pectice in tuberculum obsoletum desinens. Corpus subtus ut in priori. Pedum structura etiam eadem, femoribus levatis nigris, tibiis arcuatis ferrugineis, tarvis fuscis.

Var. b. differt corpore toto nigro-fusco squamulis nullis pallidius cinereis, quæ forte in his detrita; tibiæ fusco-ferrugineæ.

Var. c, omnino ut a, sed antennæ ferrugineæ, apice articuli primi, & clava terminali nigro-fuscis; femora etiam interdum basi ferruginea.

21. R. Alismatis: niger, squamis cinereo-albidis variegatus, rostro breviusculo sub-recto, thorace utrinque impresso, elytrorum intersticiis planis, tibiis arcuatis testaceis.

Curculio Alijmatis. Marsh. Ent. Br. i. 273.
108.

Habitat in plantis aquaticis, præterim ali-
mante plantagine, non infrequens.

Deser. Magnitudo, statura & affinitas proxime
præcedentis, attamen in pluribus diversus. Caput
breve retractum nigrum, squamis cinereo-albidis o-
mnino tectum, quibus detritis, superficies subtilis-
me punctulata videtur; frons inter oculos sulco
abbreviato profunde impressa; oculi depresso nigro-
brunnei; rostrum longitudine fere thoracis, sub re-
ctum, nigrum squamulis similibus uti caput tectum,
apice nudum, punctulatum. Antennæ vix capite
eant rostro longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, ar-
ticulo primo apice incrassato fusco-piceo; & cla-
va magna nigra. Thorax angustus, longitudine non
latiior, antice late emarginatus, margine sub-eleva-
to, saepe pallescente, intra apicem obsoletissime im-
pressus, supra parum convexus, crebre subtiliter
punctulatus, in medio leviter canaliculatus, & ver-
sus medium marginis utinque foveola obsoleta im-
pressus; totus niger, squamis densis cinereo-albidis
vestitus, relictis lineis duabus latis dorsalibus ap-
proximatis denudatis nigris. Scutellum parvum ro-
tundatum cinereo pubescens. Elytra thorace fere
duplo latiora, humeris prominulis, & illo plus tri-
plo longiora, apice sub-attenuata, supra parum con-
vexa, obsolete punctato-striata, interstitiis subtilissi-
me coriaceis; tota nigra, squamulis cinereo-albidi-
nis testa, relictis in dorso maculis plurimis differ-
mibus nigris; in medio dorsi versus futuram macu-
la composita obliqua reliquis albidior; interstitia stri-
arum planæ æqualia, sed quartum a futura postice in
tuberculum vel callum elevatum. Corpus subtus
squamis densis cinereo-albidis omnino tectum, ob-
sole-

solite punctulatum. Pedes elongati tenues, obscure rufescens, femoribus extremitate clavatis apice nigricantibus, tibias valde arcuatis, sepe medio insulatis, tarsis nigro-fuscis.

22. R. costatus: niger dense cinereo-squamulosus, rostro brevi recto, thorace tri-punctato, elytris lineis tribus elevatis, calloque didymo, tibiis rectis.

Habitat in littoribus Scanie rarius. Dom. Falién.

Descr. Statura & similitudo praecedentium Rh. lutoso paullo minor, et distinctus. Caput parvum retractum, squamis cinereis tectum, oculis parvis brunneis; rostrum vix longitudine thoracis, crassum, rectum, punctatum, squamis cinereis tectum, apice nudo nitido. Thorax longitudine latior, anteice late emarginatus, postice sub-sinuatus, supra parum convexus, pone apicem punctis tribus sat profundis, transversim positis, impressus, in medio obsoleto canaliculatus, crebre punctatus, niger, totus squamis cinereis tectus. Scutellum parvum fuscum. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris valde prominulis, & illo plus triplo longiora, supra parum convexa, postice declivia, nigra, tota squamulis cinereis tecta, obsoleto punctato-striata, interstitiis alternis, 2, 4 & 6 a sutura angustis, elevato-carinatis, postice in callum magnum didymum concurrentibus. Corpus totum subius squamulis cinereo-albidis, & praeterea pilis rigidis depressis sparsis, omnino tectum. Pedes longiusculi validi fuscii, squamulis cinereis variegati, tibiis brevioribus omnino rectis.

Obs. Carc. lunato & elevato. Fabr. Eleut. 2.
524. 100. & 102. proximus videtur.

23. R. Sisymbrii: niger sub-depressus, dense
albo-squamulosus, supra fusco-variegatus,
rostro longissimo tenui, punctoque hu-
merali elytrorum glabris nigris.

Fabr. Eleut. 2. 452. 68.

Curculio Sisymbrii. Herbft. Col. 6. 159. 116.

Tab. 70. f. 12. Payk. fn. 3. 247. 66.

Panz. fn. 17. f. 6.

Habitat in Sisymbrio Amphibio Uplandiae
farius.

Descr. Parvus, Rh. nigri-rostri brevior, ma-
gis depresso. Caput sub-globosum nigrum, cibre
punctulatum, squamulis densis albido tectum; oculi
parvi brunnei; rostrum longitudine fere dimidii
corporis, tenui, valde arcuatum, glabrum, nigrum
nitidum, subtilissime punctulatum. Antennæ longi-
tudine fere rostri cum capite, tenues, nigræ, clava o-
vata pubescente. Thorax antice multo angustior,
marginè elevato, pone apicem utrinque impressus,
dein lateribus dilatato-rotundatus, basi bi-sinuatus,
supra sub-depressus, in medio evidenter canalicula-
tus, niger, creberrimo subtiliter punctulatus, sub-
tus & lateribus squamulis densis albido tectus, dorso
magis nudo fusco, cum linea angusta albidiiori in
medio. Scutellum minutum albido-squamulosum. E-
lytra thoracis basi vix dimidio-latiora, humeris pro-
minulis, & illo vix triplo longiora, apice rotunda-
ta, supra dorso sub-depressa, nigra, subtiliter pun-
ctato-striata, intersticiis crebre, subtilissime punctu-
latis; squamulis densis albido tecta, relictis maculis
plus

pluribus oblongis indeterminatis fuscis, magis denuo datis, præsertim antice; callus humeralis elevatus omnino glaber, niger nitidus. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, dense albo-squamosum. Pedes elongati tenues nigri, dense albo-squamosi.

24. R. Equiseti: niger, squamulis albidis variegatus, rostro longissimo atro, thorace globoso, elytris tuberculatis nigris, limbo, punctisque quobus disci albidis.

Fabr. Eleent. 2. 443-24.

Curculio Equiseti Herbst. Col. 6. 287. 258.
Tab. 82. f. 4. Payk. fn. 3. 220. 44. Panz.
fn. 42. f. 4.

Curculio nigro-gibbosus. De Geer Ins. 5.
224. 17.

Habitat in Equiseto arvensi, aliisque planis, in arvis aridis, pasim.

Descr. Statura feræ Rh. Lapathi, sed plerumque dimidio minor. Caput parvum convexum nigrum, crebre punctatum, squamulis angustis cinereo-albidis tectum; oculi depresso nigro-brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, minus tenue, valde arcuatū, nigrum nitidum, crebre punctulatum. Antennæ longitudine rostri cum capite, nigrae, interdum basi & in medio rufo-piceæ. Thorax basi apicaque truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, supra valde convexus, sub-globosus, niger sub-opacus, confertissime rugoso-punctatus, in medio baseos impressus, subitus & lateribus squamis densis albidis & cinereo-flavescens mixtis, tectus, relieta area magna dorsali, antice sinuato-augusta-

gustata, nuda, nigra. Scutellum parvum oblongum albido-squamosum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominulis, & thorace triplo longiora, apice attenuata, dorso antico parum convexa, in-aequalia, posterius declivia, tota nigra opaca, evidenter punctato-striata, interstitiis confertissime subtiliter coriacēis; margo exterior ab humero versus medium inaequaliter, & apex late, ad tertiam partem totius elytri, squamis similibus uti thorax testa, reliqua area magna antica communi lobata atra, interdum punctis sparsis albidis contaminata, quarum unum utrinque versus medium suturæ, oblongum, transversum, reliquis magis conspicuum; interstitia alterna, 2, 4 & 6 a futura. anterius marginis elevata, sed interrupta, unde exstant tubercula oblonga, seriatim disposita. Corpus subitus nigrum, confertissime punctulatum, pectoris lateribus late, ventris marginibus angustius albo-squamosis. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, annulo albo-squamoso, tibiis obscure ferrugineis, apice albo-pilosis, tarsis nigro-fuscis.

25. R. Atri-rostris; niger, dense cinereo-squamulosus, rostro longissimo atro, thoracis globosi, elytrorumque dorso antico obscurioribus.

Febr. Eleut. 2. 445. 34? Herbst. Col. 6.
443. 439.

Habitat in Lapponia. Dom. Forsström;

Descr. Statura & summa affinitas praecedentis, sed paullo minor, squamulis obscurius cinereis, dorsum thoracis & elytrorum etiam occupantibus, fere unice distinctus. Caput ut in praecedenti, squamis angue-

angustis cinereis tectum; oculi, rostrum & antennæ ut in præcedenti omnino. Thoracis structura & punctura eadem, subtus & lateribus squamulis densis cinereo-albidis tectus, dorso medio obscuriori squamulis paucioribus angustis piliformibus depresso. Elytrorum forma, striæ, punctura & color ut in priori, sed undique squamulis cinereis obducta, relictis tantum in area dorsali antica maculis sparsis magis denudatis fuscis, quarum nonnullæ sub-elevatæ. Corpus & pedes ut in præcedenti omnino. Vix satis distincta species.

26. *R. brunni-rostris*: niger, squamulis & pilis cinereis tectus, rostro longissimo arcuato glabro, pedibusque obscure ferrugineis, elytris æqualibus striatis.

Fabr. Eleut. 2. 445. 35.

Curculio brunnirostris. *Herbst. Col.* 6. 444. 440.

Habitat in Scania ad Elperöd. *Dom. Fallén.*

Descr. Statura fere *Rh. Equiseti*, sed duplo minor elytris non tuberculatis, totis squamulis & pilis cinereis tectis, ut & colore rostri & pedum distinctus. Caput parvum retractum convexum nigrum, crebre punctulatum, squamulis angustis, & pube rariori cinerea adspersum, oculis depressis brunneis; rostrum longitudine dimidii corporis, valde arcuatum, rufo-brunneum, nitidum, glabrum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, tenues ferrugineæ, clava nigro-fusca acuminata. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, supra valde convexus, pulvinatus, nigro-fuscus, obsoletius granulato-punctulatus, dorso toto pube cide-

rea deppressa adspersus, lateribus & subtus squamu-
lis concoloribus tectus. Scutellum parvum eleva-
tum fuscum. Elytra thoracis basi duplo latiora, hu-
meris prominulis, & illo triplo longiora, apice ro-
tunda, supra modice convexa, fusa, punctato-
striata, intersticiis æqualibus convexis, subtilissime
coriaceis; squamuvis densis cinereis tecta, & præte-
rea pilis concoloribus seriatim adspersa. Corpus sub-
tus nigrum opacum, confertissime punctatum,
parce squamulosum, quo piceo. Pedes elongati, to-
ti ferruginei pubescentes, femoribus clavatis.

27. R. Runicis: niger, squamulis cinereo al-
bidis nitentibus variegatus, rostro brevio-
ri subrecto, thorace sub-cylindrico, li-
neis duabus fuscis.

Fabr. Eleut. 2. 456. 93.

Curculio Runicis. Linn. Syst. 2 614. 60. Fn.
Sv. 590. De Géer Ins. 5. 231. 20. Tab. 7.
f. 10-16. Herbst. Col. 6. 241. 205. Tab. 77.
f. 9. Payk. Fn. 3. 229. 47.

Var. b, dorso elytrorum denudatō nigro,
macula oblonga obliqua albo-squamosa
juxta suturam utrinque.

Curculio Acetosæ. Panz. Fn. 42 f. 9. Crit.
Rev. 1. 127.

Var. c. Squamulis pallide brunneis vel te-
staceis variegatus. Payk. loc. cit. var. b.

Var. c. Thorace elytrisque fere tolis squa-
mulis cinerascentibus tectis, vix vel pa-
cum fuscoc-variegatis. Payk. loc. cit. var. c.

Habl.

Habitat in foliis Rumiçis acuti, crispi, a-
liorumq; ubique vulgaris, folia subtus
exedendo commaculans.

Descr. Medius, Rh. Polygoni fere æqualis. Caput parvum nigrum, crebre punctulatum, squamulis angustioribus cinereo-albidis nitidis tectum; oculi ovati depresso brunnei; rostrum maris thorace fere brevius, crassiusculum, rectum, nigrum, crebre punctulatum, pilis rigidis depresso cinereis tectum; feminæ paullo longius, magis nudum. Antennæ capite cum thorace fere longiores, crassiusculæ, obscuræ ferrugineæ, extrosum nigro-fuscæ, clava oblongo-ovata. Thorax sub-cylindricus, lateribus param rotundato-dilatatus, basi apiceque truncatus. supra minus convexus, niger opacus, confertissime punctulatus, subtus & lateribus dense albido-squamosus, dorso longitudinaliter magis denudato nigro-fusco, linea media arguta squamuosa in strias duas latas diviso. Scutellum minutum triangulare albo-squamofsum. Elytra thorace fere duplo latiora, humeris prominulis, & illo plus triplo longiora, supra parum convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis omnium subtilissime obsolete coriaceis; tota squamulis densis cinereo-albidis testa; relicta area sub-quadrata circum scutellum, ut & punctis maculisque sparsis denudatis nigris. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, pube & squamulis cinereo-albidis nitidis dense obductum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes & squamuosi, tibiarum apice tarsisque interdum fusco-ferrugineis.

Var. b, differt tantum plaga dorsali elytrorum denudata nigra majori, cum macula distinctiori oblonga, antrosum obliqua, juxta suturam utrinque.

Var. c, colore squamularum aut testaceo, aut pallide brunneo, tantum differt.

Var. d, thoracem & elytra gerit fere unicoloria, squamulis cinereo-albidis undique obducta; dorsum thoracis, & regio scutellaris elytrorum tamen obscuriora, parcus squamulosa.

Obs. Cl. a Linné Cuc. cervinum forte cum hac specie confudit, dum in Systemate illi femora dentata tribuit, quarum in Fn. Sv. nulla fit mentio.

28. *R. Pollux*: niger, squamulis cinereo-albidis nitentibus variegatus, rostro breviori sub-arcuato, elytris lineis tribus distinctioribus albis, nigro-tesselatis.

Fabr. Eleat. 2. 457. 94.

Curculio cominaculatus. Herbst. Col. 6. 230.
194. Tab. 76. f. 8.

Curculio Ruminis. Payk. fn. 3. 229. 47. var. d.

Curculio interruptus. Marsh. Ent. Br. 1.
269. 95.

Var. b, Squamulis cupro-æneis variegatus.

Habitat in plantis & gramein passim, non vero præcedenti mixtus.

Descr. Statura & magnitudo præcedentis, cui valde affinis, diversus tamen videtur, rostro non nihil arcuato, thorace paullo magis dilatato, & elytrorum signaturis. Caput & oculi ut in præcedenti omnino; rostrum paullo magis arcuatum, ceterum simillimum. Antennæ ut in illo omnino. Thorax interibus paullo magis rotundato-dilatatus videtur,
alias

alias ut in priori omnino. Elytrorum forma, striæ & punctura eadem, sed indumentum squamulosum diversum; interstitium tertium. sive inter strias 2 & 3 a sutura, ab apice fere ad basin usque reliquis magis albo-squamulosum, maculis sub-quadratis unigris tessellatum; reliqua dorsalia parciens & obscurius squamulosa, maculis denudatis plurimis irregularibus sparsis; interstitium quintum basi tantum, septimum & nonum vero tota magis albida. nigromaculata; octavum & extimum obscurius-squamosa immaculata. Corpus subtus & pedes ut in præcedenti omnino.

Var. b, differt tantum colore squamularum cupero vel æneo, magis nitido.

29. R. miles: apterus niger, dense cinereo-pubescent & squamulosus, rostro breviori arcuato, thorace convexo utrinque rotundato, elytris fusco punctatis.

Femina: Elytris latioribus, posterius subdepressis.

Curculio miles. Payk. f. n. 3. 233. 51.

Curculio suspiciosus. Herbst. Col. 6. 265. 234.

Tab. 80. f. 3

Curculio bi-tæniatus. Marjh. Ent. Br. 1. 268. 93.

Mas: paullo minor, elytris multo angustioribus.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, etiam sub lapidibus tempore vernali, sat frequens.

Descr. Femina Rh. Rumicis paullo major, latior, thorax convexior, magis dilatatus, &c. Caput breve convexum nigrum, crebre punctulatum, tenue griseo-pubescent, fronte inter oculos canaliculatas.

culata; oculi depressi brunnei; rostreum vix longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, nigrum, punctulatum, griseo pub-scens, apice glabrum nitidum. Antennæ capite cum rostro longiores, ferruginea, clava oblonga fusca. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus: supra modice convexus, niger, creberrime punctulatus, subitus & lateribus squamulis angustis piliformibus cinereis, saepe metallico-nitentibus tectus, dorso obscuriori magis nudo, cum linea angusta media e pilis nitidis. Scutellum minutum angustum pilosum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris rotundatis, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra anterius sub-convexa, a medio ad apicem deplanata, nigra, evidenter punctato-striata, intersticiis subtilissime obsolete coriaceis; tota squamulis piliformibus depresso-nitidis, aut cinereis, aut brunneo-metallicis tecta; in singulo elytro series quinque e maculis parvis fuscis denudatis, quarum prima juxta suturam, reliquæ in intersticiis alteris locatae. Corpus subitus nigrum punctulatum, squamulis minutis argenteo-micantibus tectum; venter feminæ segmentis quinque constat, quarum ultimum paullo longius, apice rotundatum. Pedes validi nigri, cinereo-pubescentes, ungibus ferrugineis.

Mas: minor, praesertim multo angustior, elytris posterius compressis; rostrum apice canaliculatum; venter segmentis Sex compositus, quarum penultimum praecedentibus latius, in medio rotundato productum, ultimum angustum sinuatum; cæterum feminæ simillimus, saepe in copula captus.

30. R. pedestris: apterus niger, pube squamulisque cinereis æqualiter obductus, rostro breviori arcuato, thorace convexo utrinque rotundato.

Circulio pedestris. Payk. fn. 3. 233. 50.

Habitat in Scania, Hollandia, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, etiam secundum Sexum. Caput, oculi, rostrum, antennæ, ut in præcedenti omnino: Thoracis strucutra, color & punctura eadem, sed pubescentia ratiō, tenuior, æqualiter sparsa, nec versus latera vel in medio in lineas condeūsata. Scutellum ægre observandum, tamē adest, et si minutissimum, elytris arcte applicatum. Elytrorum forma in utroque sexu, ut & illarum color, striæ & punctura ut in priori, sed pubescentia & squamulæ minutiores, pareiores, absqve maculis denudatis. Corpus subtus & pedes ut in præcedenti omnino.

Obs. Species dubia & obscura, vix à præcedenti distingvenda,

§1. R. elongatus: apterus niger, cinereo-pubescent, rostro breviori arcuato, thorace rotundato sub-trilineato, elytris elongatis, obsolete fusco-maculatis.

Circulio elongatus. Payk. fn. 3. 236. 53.

Habitat in Svecia meridionali rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Præcedentibus iterum valde affinis, sed Rb. milite major, præsertim in elytris multo longior. Caput breve convexum nigrum, subtiliter punctulatum, tenui griseo-pubescent, fronte inter oculos plana; oculi ovati depresso brunnei; rostrum longitudine fere thoracis, crassiusculum, sub-arcuatum, nigrum, punctulatum, obsolete carinatum, tenui pubescens. Antennæ capite cum rostro multo longiores;

res, crassiusculæ, ferrugineæ, clava oblonga acuminata nigro-tusca. Thorax basi spiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra minus convexus, totus niger, crenatissime punctulatus, tenui griseo-pubescentis, in medio obsolete canaliculatus, linea media angusta. & alia lateralí latiori utrinque cinereis obsoletioribus. Scutellum parvum depresso-nigrum, Elytra thoracis basi vix duplo latiora, humeris rotundatis, & illo ferè quintuplo longiora, supra dorso antico depresso, posterius declivia, tota nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, pubescenti cinerea, & versus latera squamu is minimis concoloribus immixtis adspersa. punctisque fuscis obsoletis, eodem ordine ac in Rh. milite notata. Corpus subtus nigrum punctulatum, tenui pubescens & squamu losum. Pedes elongati validi nigri, cinereo-pubescentes, structura ut in prioribus.

32. R. Arundinis: apterus niger, squamulis pilisque densis lutescentibus tectus, thorace sub-cylindrico, fuscobilineato, rostro breviori sub-arcuato.

Curculio arundinis. Fabr. Eleut. 2. §21. 85.

Herbst. Col. 6. 162. 120. Tab. 71. f. 1. Payk. fn. 3. 234. 52. Panz. fn. 19. f. 11.

Var. b, Squamulis pilisque obscurioribus, grisecentibus. Payk. loc. cit. var. b.

Habitat in arundine Scaniæ rarius. Dom. Quensel.

Descr. Rh. Rumicis duplo major, ceterum statura & longitudine rostri illi simillimus, quare in hac serie collocandus. Caput breve convexum nigrum

grum punctulatum, squamulis cinereo-lutescentibus adpersum, fronte inter oculos impressa; oculi depresso nigro-brunnei; rostrum longitudine thoracis, cylindricum, sub-arcuatum; minus incrassatum, nigrum punctulatum, supra lutescenti pubescens, apice glabro. Antennæ capite cum rostro parum longiores, tenues, nigrae, basi piceæ. Thorax basi apicisque truncatus, antice paullo angustior, lateribus parum rotundatus, supra minus convexus, niger, subtiliter punctulatus, subtus & lateribus squamulis pilisque lutescentibus omnino tectus, dorso magis nudo fuscidente, linea media lutescente in strias duas latas diviso. Scutellum parvum triangulare pallido-squamosum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo fere quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, tenue punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; tota squamulis pilisque densis lutescentibus tecta; in apice suturæ macula communis fusca. Corpus subtus nigrum punctulatum, indumento simili ac supra tectum. Pedes elongati nigri, parcus cinereo-pubescentes,

Var. b, differt tantum colore squamularum magis cinereo.

33. R. Viciæ: alatus niger, cinereo-squamulofus, rostro breviori sub-arcuato, thora-ce sub-depresso, lateribus valde dilatato, elytris seriatim fuscō-maculatis.

Var. b, Squamulis metallico-nitentibus tectus.

Var. c, testaceus, æneo-squamulosus, rostro nigro, thoracis dorso pedibusque fuscis.

Habitat in Vicia Sylvatica, in Kinnakulle,
& Mysleberg Westogotiae non infrequens.

Deser. Rh. militi quoad signaturas similis, sed duplo minor, alatus, thorace depresso lateribus magis dilatato, elytrisque convexioribus distinctus. Caput breve convexum nigrum, subtiliter punctulatum, tenue griseo piceans, fronte inter oculos impressa; oculi depressi brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, nigrum, crebre punctulatum, tenuis pubescens. Antennæ capite cum rostro longiores, nigrae, basi piceæ. Thorax latitudine medii multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra sub-depressus, niger, subtiliter punctulatus, subtus & lateribus squamulis densis cinereo-albidis nitidis tectus, dorso longitudinaliter magis denudato nigro-fusco, cum linea media albida obsoletiori. Scutellum minutum triangulare griseo-squamosum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris rotundatis, & illo fere quintuplo longiora, apice attenuata, supra convexa, nigra, squamulis pilisque cinereo-albidis ombino tecta, punctis denudatis fusca quintuplici serie adspersis, omnino ut in Rh. milite. Alæ, in plerisque saltem, ample, albo-hyalinæ. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis densis albo-argenteis tectum, Pedes longiusculi nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore squamularum pallide æneo, interdum aureo-micante.

Var. c, differt elytris, pectore abdomineque pallide testaceis, squamulis flavo-æneis nitidis obductis; Caput, thorax & pedes obscurius fusco-brunnea; rostrum nigrum; signaturæ præterea variatum omnino, ut in Specie maturata,

34. R. Plantaginis: niger, cinereo-squamulosus, pedibus fusco ferrugineis, thorace sub-depresso, utrinque valde dilatato, elytris macula magna laterali denudata.

Fabr. Eleut. 2. 456. 91.

Curculio plantaginis. De Geer Ins. 5 237 241

Tab. 7. f. 17-21. Herbst. Col. 6. 264. 233.

Tab. 30. f. 2. Payk. fn. 3. 231. 48. var. b.

Var. b, elytris pectore abdomineque testaceis, pedibus pallidioribus. Payk. loc cit. a.

Var. c, duplo, imo triplo minor, ceterum ut a.

Var. d, magnitudine var. c, colore ut in b.

Var. e, magnitudine var. c & d, totus testaceus, rostri apice solo nigro.

Habitat in Plantagine majori, aliisque planitis, in pratis aridis passim.

Dscr. Magnitudo praecedentis, sed in elytris magis depresso, Rh. Trifolii similis. Caput, oculi, rostrum, omnino ut in praecedente descripta. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ, rufo-ferrugineæ, clava pubescente nigro-fusca. Thorax-latinus modii multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus fere angulariter valde dilatatus, supra sub-depressus, niger, subtilissime punctulatus, subtus & lateribus squamulis cinereo-albidis, saepè metallico-micantibus, tectus, dorso sub-nudo nigro-fusco, cum linea media distincta e pilis & squamulis albo-argenteis, interdum virecentibus, nitidis. Scutellum parvum albo-squamosum. Elytra thoracis basi duplo latiora, & illo fere quadruplo

longiora, supra parum conyexa, nigro brunnea, punctato-striata, interstitiis subtilissime coriacis, squamulis cinereo-albidis. in dorso saepe pallide brunneis, tecta, interjectis pilis longioribus & biocis seriatis; in disco cujusvis elytri macula magna oblonga, utrinque attenuata, nigro-fusca, denudata, punctis pluribus fuscis sub-connexis circumdata; in basi interiori stria oblonga fusca. & in apice suturæ lineola nigra communis. Alæ longæ albidæ tenues in multis, saepe vero desunt. Corpus subtus nigrum punctulatum, cinereo-squamulosum. Pedes elongati validi rufo-ferruginei pubescentes, femoribus clavatis fusco-piceis,

Var. b, simillima, sed pallidior; caput brunnescens. rostro nigro; elytra brunneo-testacea; pes etus & abdomen pallida; pedes toti rufo-testacei; signaturæ thoracis & elytrorum in hac & sequentibus varietatibus, omnino ut in a descriptæ.

Var. c, d & e, longe minores, Rh. nigri-rostri æquales, colore tantum inter se differunt; var. c, simillima a; var. d, ut var. b; var. e, vero adhuc pallidior tota, rostri apice nigricante, vertice, thoracis lineis dorsalibus, & macula disci elytrorum pallide brunneis.

Obs. Varietates c, d, e, Rh. nigriostri similes, sed thorax brevior & latior, ut & signaturæ elytrorum, bene distingvunt.

35. R. variabilis: niger, cinereo squamu-
losus, antennis tibiisque ferrugineis, tho-
race sub-depresso lateribus rotundato,
lineis duabus dorsalibus, puncto que ut-
rinque fusca, elytris fusco-punctatis.

Cura-

Circulio variabilis. Herbst. Col. 6. 263. 232.
Tab. 80. f. 1.

Habitat in Scania & Blekingia. Dom. Fal-
lén & Billberg.

Deser. Magnitudo, statura & summa affinitas
præcedentis; differt tamen thorace longiori, lateri-
bus minus dilatato, & signaturis aliis. Caput, o-
culi, rostrum & antennæ ut in præcedenti omnino.
Thorax in medio vix longitudine latior, lateribus
æqualiter rotundatus, nec angulariter productus,
supra sub-depressus. fusca vel nigro-brunneus,
crebre punctulatus, stria lata lateralí utrinque e squa-
mulis pilisque cinereo-albidis, saepè metallico-ni-
tentibus, in qua. paullo ante medium, punctum de-
nudatum fuscum distinctum; in medio dorsi linea
angusta e squamulis argenteo-micantibus. Scutel-
lum ut in priori. Elytrorum forma, striae & pun-
ctura etiam ut in illo, fuscoc-brunnea; a basi ultra
medium area magna lata communis denudata, &
pone illam sutura alba, nigro-punctata; ceterum e-
lytra dense cinereo-squamulosa & pubescentia. in-
testitiis alternis, tertio nempe, quinto & septimo
a sutura, pilis albidiioribus seriatis, & punctis fu-
scis denudatis interruptis, præsertim posterius. Cor-
pus subtus nigro-brunneum punctulatum, cinereo-
pubescens. Pedes mediocres cinereo-pubescentes,
femoribus nigro-piceis, ribiis tarsisque ferrugineis.

Variat etiam elytris, pectore, abdomine, femo-
ribusque dilutius ferrugineis, forte nuper exclusus.

Obs. Rh. variabilis Fabr. Eleut. 2. 449. 54.
certe modo var. Rh. nigrirostris, quare nomen spe-
cificum Herbstii huic nostro retinui.

36. R. murinus: niger, dense griseo-squa-
mosus, antennis tibiisque ferrugineis, tho-

race sub-depresso rotundato, fusco-bilineato; elytris striis albidis nigro punctatis.

Curelio murinus. Fabr. Eleut. 2. 520. 76.
Herbst. Col. 6. 492. 516.

Curelio plantaginis. Marsh. Ent. Br. 1. 265. 84.
Habitat in Scania. Dom Fallén.

Deser. Precedenti quoad structuram & signaturas similis, sed fere triplo major. Rh. Polygoni latior, thorax brevior, &c. Caput breve convexum nigrum punctulatum, cinereo-pubescentia, fronte inter oculos longius albo-pilosa; oculi, rostrum & antennæ ut in prioribus. Thorax in medio longitudo latior, basi apiceque truncatus, lateribus æqualliter rotundatus, supra parum convexus, niger, crebre punctulatus, utrinque linea lata e squamulis pilisque cinereo-albidis, certo situ argenteo æneoque micantibus, & in medio linea angustior, e squamulis adhuc magis nitidis, argenteo-virescentibus; lineæ duæ dorsales interjacentes obscuræ, squamulis paucioribus adspersæ. Scutellum ut in prioribus. Elytra thoracis basi duplo latiora, & fere quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter coriaceis, lateribus & postice squamulis densis cinereo-albidis nitidis testa, area communi lata, a basi ultra medium obscurius fusca, non tamen omnino nuda, sed spuamulis fulcis adspersa; pone medium sutura alba, punctis aliquot fusca; apex suturæ niger; interstitium tertium, quintum & septimum a sutura, punctis fusci tessellata, præsertim posterius; inter strias 5 & 6 a sutura, sœpe stria distincta fusca abbreviata. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis pilisque metallico nitidis obductum. Pedes mediocres dense cinereo-pubescentes, femoribus nigris, tibiis terfusque ferrugineis vel testaceis.

37. *R. fasciculofusus*: niger, dense albido-fuscoque squamu'osus, fasciculisque pilosis atris adspersus, thorace subdepresso-roundato, albo-trilineato, antennis tibialisque ferrugineis.

Curtalio fasciculatus. Herbst. Col. 6. 289. 260.
Tab. 82 f. 6.

Habitat in pratis & agris aridis passim.

Descr. Praecedente fere latior, sed non longior. Caput breve nigrum punctulatum, dense cinereo-pubescent, fronte depressa, pube albidiiori vestita; oculi depresso nigro-brunnei; rostrum vix longitudine thoracis, crassum, sub-arcuatum, nigrum punctulatum, supra dense albido-pubescent, apice nudum. Antennæ rostro cum capite longiores, crassissimæ, fusco-ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax longitudine multo latior, lateribus paullo ante medium rotundato-dilatatus, supra parum convexus, niger, crebre punctulatus, squamulis & pilis fusco-zenæis testus, lineis tribus, antice conniventibus, & squamulis albo-argenteis, areis interjectis & lateribus fasciculis atris variegatis. Scutellum parvum albo-squamulosum. Elytra magna, thoracis bæsi fere duplo latiora, & illo quadruplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, nigra. Obsolete punctato-striata, undique squamulis dersiz omnino testa, interne versus suturam fusco-brunneis. Externe, praesertim versus humerum albidiioribus interjectis pilis rigidis albidis longioribus seriatis; sutura tota albido-squamosa, fasciculis quadratis atris tessellata; interstitia alterna disci etiam fasciculis atris seriatis adspersa; in bæsi interiori lineolæ duæ abbreviatæ atro-holosericeæ, & versus medium disci linea arcuata ejusdem coloris; extra illam pli-

ga magna humeralis albidior, vix maculata. Corpus subtus squamulis densis cinereis & fuscis tectum. Pedes mediocre picei, cinereo-variegati, femoribus versus apicem annulo albo squamoso cinctis.

38. R. punctatus: niger obscurus, griseo-squamulosus, rostro brevi, thorace trilineato antrorsum sub-latiōri, elytris fasciulis nigris seriatis.

Curculio punctatus. Fabr. Eleut. 2. 529. 133.
Herbst Col. 6. 505. 540. Payk. fn. 3. 306.
129. Ross. fn. Etr. 1. 131. 335.

Curculio medius. Marsh. Ent. Br. 1. 302. 185.
Var. b, Corpore, pubescentia squamulisque fusco-ferrugineis variegato.

Curculio Austriacus. Herbst, Col. 6. 243. 207.
Tab. 77. f. II. Marsh. Ent. Br. 1. 302. 184.

Habitat in arenosis aridis rarius.

Descr. Statura lata & similitudo præcedentis, sed adhuc dimidio major, & vere distinctus. Caput rotundatum nigrum, dense cinereo-pubescent, punctulatum, oculis depresso brunneis; rostrum thorace paullo brevius, crassum nigrum arcuatum, crebre punctatum, fusco-pubescent. Antennæ capite cum rostro longiores, crassiusculæ, piceæ. Thorax anterior longitudine paullo latior, lateribus mox pone apicem dilatatis, dein obliquis sub-rectis, supra parum convexus, niger, crebre punctulatus, subtus & lateribus pale squamulisque cinereis & fuscis mixtis tectus, dorso obtcuriori magis nudo cum linea angustiori cinereo-squamosa, saepe obsoleta. Scutellum parvum cinereo-squamosum, Elytra magna

gna ovata, thoraeis basi duplo latiora, humeris rotundatis, & illo quadruplo longiora, supra dorso sub-depressa, nigra, profunde punctato-striata, interstitiis subtiliter coriaceis; striæ dorsales per paria magis approximatæ videntur, quoniam interstitia alterna paullo latiora & elevatiora, nempe futuræ proximum, tertium, quintum & septimum, quæ etjam in illæsis individuis squamulis cinereis densioribus tecta, interjectis pusclis seriatis fulvo-pubescentibus; latera elytrorum dense cinereo-squamulosa, fere immaculata. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis cinereo-albidis & fuscescentibus mixtis variegata. Pedes validi nigro-fusci, cinereo-pubescentes, femoribus ante apicem annulo albidiiori cinctis.

Var. b, differt præcipue colore indumenti fulco-ferrugineo; rostrum etjam paullo longius & minus crassum videtur, vix tamen diversa Species, sed potius femina prioris.

Obs. Hic & insequens, ut & Rh. arundinis ante descriptus, ab auctoriibus plerisque inter Curculiones brevirostres collocati; sed nimia cum reliquis hujus Phalangis speciebus similitudo ac affinitas, ab illis separare non permittunt.

39. *R. Polygoni*: angustior niger, rostro mediocri, thorace rotundato lineis tribus albis, elytris cinereo-squamosis, sutura dentata, lineisque tribus abbreviatis nigris.

Curculio Polygoni. *Fabr. Eleut.* 2. 520. 77.

Herbst. Col 6. 242. 206. *Tab. 71. f.* 10.

Payk. fn. 2. 228. 46.

Curculio fasciatus. *De Gier Ins.* 5. 334. 21.

Curculio liniatus. Herbst. Col. 6. 497. §27. Tab. 95. f. 5. a, b.

Var. b, Elytris testaceis, futura dentata lineisque brunneis. Payk. loc. cit. var. b.

Curculio Polygoni Linn. Syst. 2. 609. 26. Fns. Sv. 597, Panz. fn. 19. f. 10.

Curculio arator. Linn. Mant. 2. 531. Marsh. Ent. Br. 1. 266. 87.

Habitat in aridis, præsertim in agris & viis arenosis, ubique frequens.

Descr. Medius, Rh. Rümicis paullo longior, sed non latior. Caput rotundatum fuscum punctulatum, tenui griseo-pubescentia, fronte impressa, linea albo-pilosa a medio rostri in verticem ducta; oculi depresso-brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum arcuatum nigrum punctulatum, supra albo-pubescentia. Antennæ capite cum rostro longiores ferruginea, clava fusca. Thorax antice angustior, emarginatus, basi truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra modice convexus, totus niger, creberime punctulatus, squamulis pilisque fuscocinereis adspersus, dorso lineis tribus distinctis e squamulis albo-margaritaceis, interdum virescentibus, alia vice pallidis, quatum laterales anterius angustatæ, media æqualis. Scutellum minutum albidio-squamosum. Elytra thoracis basi duplo latiora, & illo fere quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, punctato-striata, intersticiis subtilliissime coriaceis, squamulis densis cinereis tecta; sutura antice alba; dein punctis crebris nigro-pilosis alternantibus quasi dentata; a basi interiori stria acuminata, ante medium definens, & ab apice striæ duæ, initio connexæ, afflurgunt, quarum exterior longior, oblique versus humerum directa, interior

vix ultra medium extensa, attenuata, omnes e pilis fusco-brunneis seu nigris; interstitia striarum alterna paullo magis elevata, & in illæsis individuis albo-lineata. Corpus subtus nigrum punctulatum, cincinno-pubescent & squamuosum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b; differt tantum colore elytrorum dilutiori, testaceo, signaturis brunneis; variat etiam corpore pedibusque fusco-testaceis, forte immaturus.

40. R. Trifolii: niger, cinereo-pubescent; antennis tibiisque ferrugineis, rostro tenuiori mediocri, thorace brevi depresso trilineato, pectore aeneo-squamoso.

Curculio Trifolii. Herbst. Col. 6. 266. 236.

Tab. 80 f. 5. Payk. fn. 3. 232, 49.

Var. b, Elytris obscure testaceis.

Var. c, Testaceus, rostro nigro, thorace supra brunneo.

Curculio trilineatus. Marsh. Ent. Br. 1. 268. 90.

Var d, pallidius testaceus, rostri apice fuscō, thorace supra ferrugineo.

Curculio Sisamineus. Marsh. Ent. Br. 1. 267. 88.

Habitat in Trifolio pratensi, in pratis aridis passim; varietates pallidiores sèpius in agris, & ad horrearum parietes, post messem, obviæ.

Descr. Magnitudo, statura & affinitas Rh. Plantaginis, sed differt rostro longiori, magis tenui. & Signaturis aliis. Caput parvum rotundatum rugosum

punctulatum, cinereo-pubescent, oculis ovatis de pressis brunneis; rostrum thorace fere longius, minus quam in prioribus crassum, arcuatum nigrum nitidum punctulatum, fere glabrum. Antennæ capite cum rostro longiores, crassiusculæ ferrugineaæ, clava cinereo-pubescente. Thorax latitudine multo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, niger, creberime subtiliter punctulatus, pube tenui grisea adspersus; in medio linea angustior, & versus latera utrinque alia latior arcuata, e squamulis piliformibus, aut albidis, aut virescentibus nitidis. Scutellum parvum albido-pubescent. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, nigra, tenuè punctato-striata, interstitiis subtilissime coriacis, pube & squamulis minimis obscure cinereis testa, fasciculis pilosis albidiioribus, & lineolis abbreviatis, punctisque obscurioribus denudatis, plus minusve variegata; sutura anterius fusca, posterius albida fusco-punctata. Alæ longæ albo-hyalinæ, stigmate flavescente, ante medium marginis sita. Corpus subtus nigrum vel nigro-piceum, creberime punctulatum, griseo-pubescent, pectore squamulis nitidis, aut cinereo-argenteis, aut viridi-micantibus testo. Peæ mediocres cinereo-pubescentes, femoribus validis nigris, tibiis tarisque plerumque ferrugineaæ vel obscure testaceis.

Var. b, differt tantum colore elytrorum dilutius brunneo, aut fusco-testaceo.

Var. c, colore magis differt; rostrum nigrum, saepe basi brunneum; caput & thorax supra brunnea seu fulco-ferruginea; elytra, corpus subtus cum pedibus dilutius testacea, femoribus tamen interdum fuscescientibus.

Var. d, adhuc pallidior; rostrum ferrugineum apice fuscum; caput & thorax supra ferruginea; ely-

tra testacea, ferrugineo striata; corpus subtus paleo testaceum; pedes toti pallidi; In omni varietate si naturæ eadem ac in a; et si obsoletiores; forte immaturæ, nuper exclusæ, Specie non distinguendæ.

Occurrunt etiam individua varietatis a, detrita, quæ tota nigra, antenæ tibiisque ferrugineis; Squamulæ nitidæ pectoris tamen tenacius adhaerent.

41. R. posticus: niger, parum cinereo pubescens, antennis, tibiis, elytrorumque apice ferrugineis, rostro breviusculo, thorace brevi depresso, pectore albido squamoso.

Cuculio haemorrhoidalis. Herbst. Col. 6. 266. 235.

Tab. 80. f. 4.

Cuculio bi-maculatus. Marsh. Ent. Br. 1. 266. 36.

Habitat in pratorum collibus passim.

Deser. Præcedenti simillimus, & pro ejus varietate detrita facile habendus, sed paullo major, præterim longior; rostrum brevius, elytrorum apex ferrugineus. & squamulæ pectoris non metallicæ nitentes. Caput & oculi ut in præcedenti; rostrum thorace fere brevius, crassiusculum, arcuatum nigrum punctulatum glabrum. Antennæ ut in priori. Thoracis structura etiam ut in illo, supra depresso, niger, margine antico saepe rufo-piceo; confertissime & paullo profundius punctatus, pilis squamulisque cinereis, versus latera densioribus, dispersus. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo fere quintuplo longiora, apice compressa, subattenuata, supra convexa, nigro-picea, apicem versus plus minusve rufo-ferruginea, sat profunde pun-

ctato-

Et ito. striata, pilis squamulisqve cinereis parcus ad. sparsa. Corpus subius nigrum, creberrime punctatum, tenui cinereo-pubescenti, ano piceo; pectus pubes squamulisqve cinereo-albidis, non metallico-nitentibus, testum. Pedes ut in praecedenti, femoribus nigro-piceis, tibiis tarsisque ferrugineis.

42. R. nigrirostis: nigro piceus, antennis perbusque rufo-testaceis, rostro mediocri glabro, thorace longiori, lineis tribus viridibus, elytris viridi-squamulosis.

Fabr. Eleut. 2. 448. 53.

Curculio nigri-rostris. Herbst. Col. 6. 281. 254 Tab. 81. f. 11, 12. Payk. fn. 3. 247. 67. Panz. fn. 36. f. 14.

Curculio virescens. Qrenzel Diss. p. 16.

Var. b, Niger, thorace virescenti-vel albido-lineato, elytris fulco-squamulosis. Herbst. loc. cit. var. 1 ♂ 2.

Var. c, fulco-piceus. elytris abdomine-qve testaceis, thoracis lineis aut albidis aut virescentibus. Herbst. loc. cit. var. 3.

Var. d, testaceus, rostro brunneo, thoracis dorso ferrugineo, virescenti-lineato, pedibus pallidis. Payk. loc. cit. var. b. Herbst. l. c. var. 4.

Rhynchænus variabilis. Fabr. Eleut. 2. 449. 54.

Habitat in floribus & plantis variis, locis aridis, sat frequens.

Descr.

Descr. Parvus, Rh. Trifolii dimidio angustior. Caput parvum rotundatum nigro-brunneum punctulatum, tenui griseo-virescenti pubescens, oculis depresso brunnis; rostrum vix longitudine thoracis, crassitaculum arcuatum nigrum punctulatum, basi coarctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, crassissimæ ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax latitudine medii vix brevior, lateribus æqualiter modice rotundatus, supra parum convexus, niger contractus, punctulatus, pilis griseo-virescentibus adpersus; in medio linea angusta recta, & versus latera utriusque alia latior arcuata, e squamulis pilisque viridi-argenteis nitidis. Scutellum parvum virescenti-pubescentes. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & in quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, obsoletius punctato-striata, pubē squamulisque subtilissimis lāete viridibus tecta, interjectis pilis longioribus albido seriatim. Corpus subtus nigro-piceum, crebre & profunde punctatum, tenui cinereo-pubescentes. Pedes breviusculi validi, toti rufo-ferruginei, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum colore indumenti in elytris, aut cinereo, aut obscurius fulco.

Var. c, differt elytris ab domine que testaceis, colore linearum thoracis albidiō, pedibus pallidis.

Var. d, adhuc pallidior, rostro brunneo apice fusco, thoracis dorso ferrugineo, virescenti-lineato, elytris, corpore pedibusque pallide testaceis.

Obs. Varietates omnes, præter colorem, simillimæ, nullo modo specie distingvendæ. In Oñonide arvensi varietatem duplo fere majorem copiose legi, varietatibus c & d, cæterum simillimam.

43. R. borealis: brunneus, thoracis dorso lineis alternis griseis nigrisque pilosis,

lytris ovatis, maculis griseis nigrisqve variegatis.

Curculio borealis. Panz. fn. 3. 249. 68.

Habitat in Salice arenaria ad Muonioniska Bothniæ occidentalis, mense Junio. Dom. Quensel. Mus. Dom. Paykull.

Descr. Insectum in Museo Dom. de Paykull tantum visum, quare descriptionem ejus loc. cit. afferre licet. Rh. nigri rostri paullo minor. Caput brunneum, fronte griseo-pubescente; oculi depresso-nigri; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum nigrum, sub-arcuatum. Antennæ rostro longiores fusco-ferruginea, clava nigricante. Thorax longitudine latitudinis, convexo sub-globosus, brunneus, subtus pilis rarioribus brevissimis griseofuscis, supra in medio linea dorsali angusta e pilis brevissimis depresso-griseofuscis orta; tum, linea utrinque paullo lato, pilorum adhuc fere breviorum nigrentium; tum iterum utrinque linea angusta pilosa grisea, cui adjacet utrinque linea angusta pilosa lateralis nigra. Scutellum punctiforme piceum. Elytra thorace multo latiora, & plus duplo longiora, convexo-ovata, caudo postico nullo, subtilissime punctato-striata brunnea, macula magna sub trianguli communis baseos e pilis brevissimis nigris; postice & ad latera maculis punctisque plurimis griseis nigrisqve pilosis variegata. Alæ albo hyalinæ. Pectus, abdomen & pedes brunnea, pilis rarioribus brevissimis griseofuscis.

44. R. dissimilis: brevior niger, squamulis metallico nitidis asspersus, antennis pedibusque rufo-testaceis, thorace breviori di-

dilatato trisineato, sutura elytrorum postei-
rius alba.

Curculio dissimilis. Herbst. Col. 6. 290. 261.

Tab. 82. t. 7.

Var. b, niger, squamulis densioribus cine-
reo-albidis testus.

Var. c, fusco-testaceus, squamulis metalli-
co-nitidis variegatus, thorace fusco-
brunneo tri-lineato, pedibus pallidis.

Habitat in Trifo io montanæ, ad Mysse-
berg Westrogothiæ pluries lectus.

Descr. Parvus, Rh. bi-punctato brevior, sed
non angustior, sutura ovata fere Specierum sectionis
sequentis, sed pæcedentibus quoad signaturas &
rostri suturam valde affinis. Caput parvum nigrum
punctulatum, cinereo pubescens, oculis depresso-
brunneis; rostrum longitudine thoracis, crassitou-
lum nigrum arcuatum punctulatum, basi coarctatum;
Antennæ rostro cum capite longiores, ferrugineæ,
clava obscuriori. Thorax longitudine lator, late-
ribus valde dilatato-rotundatus, supra parum con-
vexus, niger, creberrime punctulatus, squamulis
æneo-micantibus adspersus, linea media angusta,
sæpe obsoleta, & alia utrinque intra marginem latiori
arcuata, & squamulis nitidis condensatis. Scutellum parvum albido squamosum. Elytra ovata,
breviora quam in reliquis hujus sectionis, antice tho-
racis basi duplo latoria, & illo triplo longiora,
supra convexa, nigra vel brunnea, sat profundo
punctato-striata, squamulis pallide æneis & brun-
neis absqve ordine variegata, & pilis longioribus
erectis fuscis adspersa, interjectis maculis obscurioribus
denudatis; sutura pone medium albo-squam-
ia,

fa, nigro-maculata. Corpus subfuscum nigro-piceum, crebre punctulatum, cinereo pubescens, pedibus squamulis metallico-nitidis adspersis. Pedes viridi, toti rufo-testacei, cinereo pubescentes.

Var. b, magnitudine & statura si-jllime, sed obscurius nigra, squamulis cinereo albitis, nitidis, variegata; Pedes rufo ferruginei, femoribus ante apicem macula nigro-fusca.

Var. c. colore pallidiori differt; caput, rostrum & thorax fuscobrunnea; elytra, pectus & Abdomen dilutius testacea; cæterum squamulis teneo minantibus lineata & variegata, omnino ut in a; Pedes pallidius testacei immaculati,

d

45. *R. Scanicus*: rufo-testaceus, cinereo-pubescentia, capite pectoreque fuscobrunneis, elytris futura lineolisque abbreviatis albido-pilosis, rostro tenuiori mediocri.

Fabr. Eleut. 2. 450. 63. *Panz. fn.* 99. f. 9.

Curculio Scanicus. *Payk. fn.* 3. 251. 70.

Curculio s-maculatus. *Linn. Syst.* 2. 609. 30.
Fn. Sv. 601?

Curculio rubicundus. *Herbst. Col.* 6. 267. 237.
Tab. 80. f. 6.

Curculio placidus. *Herbst. Col.* 7. 16. 576. *Tab.* 96. f. 9.

Habitat in Scania. *Dom. Qvensel;* in amantis femineis Populi Tremulæ, mense Majo, in Westrogothia pluries lectus.

Descr. Rh. nigri rostri paullo angustior. Caput rotundatum nigro piceum, crebre punctulatum, griseo pubescens, oculis depresso brunneis; rostrum longitudine thoracis, cylindricum, minus crassum quam in prioribus, rufo-testaceum nitidum sublæve, interdum basi piceum. Antennæ longitudine rostri cum capite, totæ rufo-ferrugineaæ. Thorax ante angustior, lateribus nonnihil rotundatus, basi truncatus, supra modice convexus, rufo-testaceus, crebre punctatus, pilis depressis griseo-albidis testus, limbo interdum infuscato. Scutellum parvum rotundatum fascum, griseo pubescens. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, sed quadruplo longiora, supra convexa, rufo-testacea, profunde punctato-striata, intersticiis sub ævibus, pilis depressis griseo-albidis adpersa; in dorso antico macula communis nigra, aut minor, brevior, aut magna, ultra medium extensa, ut & sutura pone maculam infuscata, sed in illæsis sutura tota linea contigua epulis densis cinereo-albidis testa. & striolæ abbreviatæ, præsertim ad basin, & hinc illinc in disco, interdum in fascias collocatæ, albido-pilosæ. Pectus nigrum punctulatum, dense albido pubescens; abdomen rufo-testaceum, basi nigricans, tenue pubescens. Pedes breviusculi validi, toti rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

46. R. bipunctatus: angustus niger, dense cinereo-pubescentes, antennis, tibialis tar-
sisque testaceis, elytris utrinque macula
denudata nigra, rostro mediocri.

Hab. Eleut. 2. 452. 70.

Circulio bipunctatus. Linn. Syst. 2. 609. 28. Fn.
Sv. 599. Herbst. Col. 6. 234. 198. Tab.
77. f. 2. Payk. fn. 3. 250. 69. Panz. fn.
42. f. 7.

Habitat in foliis & floribus Salicis, tempore vernali, passim.

Descr. Parvus, Rh. nigrirostri minor, angustior. Caput rotundatum nigrum punctulatum, griseo-pubescent, oculis nigro-brunneis, parum prominentis; rostrum thorace paullo longius, arcuatum, nigrum nitidum punctulatum, minus tenue. Antennæ rostro cum capite vix longiores, crassiusculæ, toro rufo-testaceæ. Thorax antice a gustior, lateribus nonnihil rotundatus, basi truncatus, supra parum convexus, niger, crebre punctatus, pube depresso pallide cinerea tectus. Scutellum rotundatum cinereo-pubescent. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, sed quadruplo longiora, supra convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-lævibus, pube longiori depresso pallide cinerea tecta; in medio disci, versus futuram, macula majuscula denudata nigra, postice emarginata. Corpus subtus nigrum punctatum, parcus pubescens. Femora clavata nigra; tibiæ & tarsi testacei.

Obs. Macula dorsalis interdum obsoletior, pube tenuiori obducta; pubescentia paginae superioris saepe detrita vel rara, tenuis, unde corpus totum magis nigrum evadit,

47. R. Carpini; niger sub-depressus, pube cinereo-ferricea nitida tectus, antennis pedibusque testaceis, rostro longissimo tenui arcuato.

Fabr. Elevt. 2. 452. 71.

Curculio Carpini Herbst. Col. 6. 204. 165. Tab. 74. f. 3. a, b.

Habitat in floribus Salicis cinereæ passim.
Deser.

Deser. Præcedenti paullo brevior, sed in elytris latior, magis depresso, rostro multo longiori & tenuiori, abunde distinctus. Caput rotundatum nigrum, subtisissime punctulatum & pubescens, oculis depresso nigro brunneis; rostrum longitudine fere dimidi corporis, tenui, valde arcuatim, nigrum nitidum, subtilissime punctulatum. Antennæ vix rostro longiores, crassiusculæ, totæ pallide testaceæ. Thorax antice angustior, lateribus primum rotundatus, basi truncatus, supra sub-depresso, niger, crebre punctulatus, pube densa depresso cinereo-sericea, vel argenteo-virescente nitida tectus. Scutellum parvum rotundatum pubescens. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, & plus triplo longiora; supra sub-depresso, nigra, punctato-striata, pube simili ac thorax obducta. Corpus subtus nigrum punctulatum, pectore densius, abdomine paucius pubescente, ano piceo. Pedes breviuscuiusmodi testacei, femoribus plerumque obscurius fuscis, saltem in medio.

Obs. Occurrit etiam obscurior, pube minus densa, cinereo-albida adpersus, forte adultior, magis detritus,

48. R. picirostris; convexior nigro-piceus, pube sericea nitida tectus, rostro longiori attenuato, antennis, pedibus rostrique apice rufo-ferrugineis.

Fabr. Elout. 2. 449. ss.

Curculio picirostris. Payk. fn. 3. 253. 73. Herbst. Col. 6. 446.

Curculio tomentosus. Herbst. Col. 6. 278. 250. Tab. 81. f. 7.

Var. b, obscurior, parcus cinereo-pubescentis, antennarum clava femoribusque fusco-piceis.

Curculio cinerascens, Marsh. Ent. Br. i. 248. 28.
Habitat in floribus Trifolii pratensis, sat frequens.

Descr. Statura angusta Rh bipunctata, sed dimidio minor, magis convexus. Caput rotundatum piceum, subtilissime punctatum, pubescens, oculis depresso-brunneis; rostrum thorace fere longius; parum arcuatum, subtiliter punctulatum, basin versus crassius, piceum, pubescens, apice attenuatum rubrum, glabrum nitidum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, crassiusculæ, rufo-ferrugineaæ. Thorax latitudine longior, anterius angustior, & juxta apicem transversim impressus, basi truncatus, supra modice convexus, nigro-piceus, crebre punctulatus, pube depresso-sericea, cinereo-virescente nitida, tectus. Scutellum parvum pubescens. Elytra thorace parum latiora, & illo triplo longiora, supra convexa, nigro-picea, posterius saepe dilutius rufo-ferruginea, sat profunde punctato-striata, interstitiis coriaceis, pube simili ac thorax tecta. Corpus subtus piceum punctulatum, squamulis densis piliformibus cinereo-albidis tectum. Pedes crassiusculi rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

Var. b, saepe paullo minor, pube rariori, minus nitida adspersus, antennarum clava, femoribusque obscurius fusco-piceis, forte mas.

49. R. Beccabungæ: niger, thoracis lateribus pectore que albido squamosis, antennarum basi

basi, tibiis elytrorumque plagi rufo-testaceis, thorace brevisimo postice sinuato.

Fabr. Eleut. 2. 493. 263.

Curculio Beccabungæ. Payk. fn. 3. 254 74.

Var. b, Thorace fere toto squamulis cinereo-albidis testo, elytris rufo-testaceis, futura margineque nigro fuscis, pedibus totis testaceis.

Curculio Beccabungæ. Linn. Syst. 2. 611. 41.

Fn. Sv. 697. Herb. Col. 6. 202. 164. Tab. 74. f. 2. a, b.

Var. c, Niger, elytris ferrugineis, vix fulvo-marginatis, pedibus rufo-piceis.

Var. d, Elytris nigris immaculatis, cæterum ut a.

Var. e, Elytris pedibusque totis nigris, cæterum ut a & d.

Habitat in plantis aquaticis, præsertim Veronica Beccabunga, minus frequens.

Descr. Rh. picrostri plerumque paullo major, præsertim in elytris latior, sed variat etiam multe minor. Caput breve latum nigrum punctulatum, griseo-pubesceus, oculis brunneis prominulis; rostrum vix thorace longius, minus tenuis, parum arcuatum, nigrum, nitidum, punctulatum. Antennæ vix longitudine rostri cum capite, crassiusculæ ferrugineæ, clava majuscula ovata nigra. Thorax brevissimus transversus, antice angustior, & juxta apicem striga transversa impressus, postice sub-sinuatus.

tus, supra modice convexus, niger, crebre punctatus, subrufus & lateribus squamulis & pube cinereo-albidis densis tectus, dorso magis nudo, pilis sparsis depresso. Scutellum rotundatum griseo pubescens. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra minus convexa, nigra, sat profunde punctato striata, pilis rigidis cinereis subseriatis adspersa; in disco posteriori singulo i elytri plaga oblonga rufa ferruginea, interdum cum apice suturæ rufa conjuncta. Corpus subtus nigrum prætulatum, cinereo-pubescent, pectoris suturis densius albido squamulosis. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, minime vero Saltatoriis; tibiis tarsisque rufo-testaceis.

Var. b, differt, thorace fere toto squamulis albidis tecto, area tantum antica in medio magis nudata; elytris rufo-testaceis, margine sururaque plus minusve intuscati, pedibusque totis rufo-testaceis.

Var. c, ut a, sed elytra tota obscurius ferruginea, & pedes rufo-picei.

Var. d, omnino ut a, sed elytra nigra immaculata.

Var. e, ut a & d, sed elytra & pedes toti nigri.

50. R. pascuorum; niger, griseo-pubescent, plaga elytrorum, antennarum basi tibiisque ferruginea, thorace longiori basi sinuato, rostro longissimo tenui.

Curculio dorsalis. Linn. Syst. 2. 608. 17. Fn.
Sv. 588?

Var. b, Elytris nigris immaculatis.

Habitat

Habitat in plantis, locis humentibus, rarius.

Descr. Præcedenti paullo minor, & similis, sed differt rostro multo longiori, & tenuiori, thorace longiori subtus & lateribus non albido-squamoso; Rh. pici-rostri æqualis & similis, sed rostrum totum nigrum. Caput rotundatum nigrum punctulatum, tenui pubescens, oculis depresso brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, tenui, parum arcuatum, nigrum nitidum punctulatum. Anterioræ vix longitudine rostri cum capite, crassissimæ ferrugineaæ, clava fusca. Thorax postice vix longitudine lator, anterius multo angustior, juxta apicem striga tenui transversa impressus, basi sub sinuatus. supra modice convexus, niger, crebre punctulatus, pilis depresso cinereis rigidis, minus crebris, adspersus. Scutellum rotundatum, densius albido-pubescentia. Elytra thoracis basi parum latiora, sed triplo longiora, supra modice convexa, nigra, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis obsoleta coriaceis, pilis rigidis cinereis seriatis adspersa; in disco posteriori singuli elytri plaga rufo-ferruginea obsoletior, cum rubidine apicis interdum conjuncta, in detritis individualis evidenter. Corpus subtus nigrum, crebre punctatum, cinereo-pubescentia. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigro-piceis, tibiis tarsisque ferrugineis.

Var. b, differt tantum elytris nigris immaculatis. Rh. picirostri var. b, simillima, sed rostrum vix apice rufum.

Obs. Qvod c. dorsalis Cl. Linnæi, non idem cum Insecto ejusdem nominis reliquorum auctorum, ex descriptione in Fauna Svecica satis constat; dubium

bium tamen remanet, num ad nostrum pertineat, nam etjam huic antennæ fractæ.

51. R. tricolor: niger, cinereo pilosus, antennarum basi tibiisque rufo testaceis, elytris rufo-ferrugineis, basi, sutura fasciisque duabus abbreviatis nigris, thorace brevi.

Curculio tricolor. Marsh. Ent. Br. i. 259. 65.

Habitat in collibus aridis, graminosis, rarius.

Descr. Magnitudo & statura Rh. picrostris. Caput rotundatum nigrum punctulatum pubescens, fronte depreesa; oculi brunnei prominuli; rostrum arcuatum nigrum punctulatum in masculis longitudine thoracis, in feminis adhuc longius, magis tenue. Antennæ longitudine rostri cum capite, crassiusculæ rufo-testaceæ, clava nigro-fusca. Thorax brevis transversus, antice paullo angustior, basi subfuscatus, supra modice convexus, niger, crebre punctatus, pilis rigidis cinereo-albidis adspersus, ante scutellum in maculam albidorem condensatis. Scutellum rotundatum, dense albido-pubescentia. Elytra thoracis basi parum latiora, sed fere quadruplo longiora, supra convexa, rufo ferruginea, sat profunde striata, & in striis punctata, pilis rigidis albidis seriatis adspersa; basis interior, & sutura tota nigra; ante medium fascia nigra, anterius obliqua, suturæ connexa, marginem non attingens; pone medium macula, seu plaga major ovata nigra, et jam posterius suturæ connexa, cum puncto albido-piloso in medio. Corpus subtus nigrum punctatum, pilis cinereis adspersum. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, tibiis tarsisque rufo-testaceis.

52. R.

52. R. Lythti: niger nitidus, griseo-subpubescent, antennatum basi pedibusque pallidis, elytris gibbosis, testacea abbreviata maculaque testaceis; albo-pubescentibus, thorace conico.

Fabr. Eleut. 2. 453. 76.

Curculio Lythri. *Payk. fn.* 3. 263. 85. *Marsh.*
Ent. Br. 1. 252. 41.

Curculio pygmaeus. *Herbst. Col.* 6. 142. 102.
Tab. 69 *f.* 7.

Var. b, *Elytrotum* disco testaceo. *Payk. l.*
c. var. b.

Rhynchænus Salicariæ. *Fabr. Eleut.* 2. 449. 58.

Curculio Salicariæ. *Panz. fn.* 17. *f.* 4. *Marsh.*
Ent. Br. 1. 251. 40.

Habitat in floribus Lythri Salicariæ, pas-
sim copiose.

Descr. Rh. picrostri parum major, sed multo convexior, utrinque attenuatus. Caput parvum, angustum nigrum nitidum, subtiliter punctulatum, tenui pubescent, oculis depresso brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, cressiusculum, nigrum, parum erucatum, basi sub-serratum. Antennæ capite cum rostro longiores, tendue, pallide testaceæ, clava magna elongata nigra. Thorax fere conicus, anterius valde angustatus, basi sub-sinuatus, supra convexus, pulvinatus, totus niger nitidus, obsolete punctulatus, pube rario cinereo-albida adspersus. Scutellum minimum, vix observandum, Elytra antice vix thoracis basi latiora, ante me-

medium dilatata, posterius attenuata, supra antice valde convexa, sub-gibbosa, nigra, profunde striata, & in striis punctata, interstitiis lævibus; ante medium fascia magna inæqualis communis, marginem non stingens, quasi e lineis 5 vel 6 inæqualibus conflata, e pilis densis albidis, quibus detritis, fundus elytri sub fascia testaceus apparet; ante apicem macula, e tribus lineolis similibus constans: in ipsa bæsi etiam linea æ nonnullæ albidæ. Corpus subter nigrum, obsoletè punctulatum, tenuè pubescens, pectore dense albo squamoso. Pedes elongati pallidi, aut immaculati, aut genubus femoribusque supra plus minusve nigris.

Var. b, in omnibus simillima, sed discus elytricæ latius testaceus, fascia nempe cum macula postica confluente; variat etiam, rarius licet, elytris quoad maximam partem testaceis, bæsi marginibusque nigro fuscis; in junioribus interdum thorax testaceo-variegatus.

53. R. *Ptinoides*: piceus, cinereo-squamulosus, supra spinulis erectis nigris muricatus, antennæ, rostro pedibusque ferrugineis, thorace oblongo.

Cerculio Ptinoides. Marsh. Ent. Br. i 258. 59.

Habitat in Westmannia, Dom. Crug; in Scania, Dom. Fallén; rarissime tamen apud nos obvius; ex Anglia a Dom. Kirby misus.

Descr. Rh. bipunctato minor, angustior, magis convexus, Ptino furi facie quodammodo similis Caput rotundatum convexum rufo piceo punctulatum, squamuvis cinereis tectum, oculis parvis press-

nas brunneis; rostrum vix longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, arcuatum, rufo ferrugineum, punctulatum, apice depresso, nonnihil dilatatum. Antennæ capite cum rostro longiores, tenues, pallide testaceæ. Thorax latitudine postica longior, anterius multo angustior, basi truncatus, supra convexus, piceus, profunde punctatus, squamulis depressis cinereis variegatus, et spinulis crebris erectis nigris adspersus. Scutellum vix ullum. Elytra ante thoracis basi parum latiora, ante medium dilata, thorace vix triplo longiora, posterius attenuata, supra valde convexa, sub-gibbosa, nigro-picea, profunde et rude punctato-striata, squamulis depressis cinereis variegata, aliisque majoribus erectis nigris spiniformibus striatis adspersa. Corpus subtus rufopiceum punctatum, dense cinereo-squamulosum. Pedes medios fusco-ferruginei, dense cinereo-pubescentes & squamulosi.

54. R. Lemnæ: nigro-piceus, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro crassiusculo, spice sub-depresso, elytris ovatis, profunde punctato-striatis, cinereo-nebulosis.

Fabr. Eleut. 2. 455. 88.

Curculio Lemnæ. Payk. fn. 3. 267. 89. Panz. fn. 17. f. 10.

Curculio inspectatus. Herbst. Col. 6. 302. 274. Tab. 83. f. 9.

Habitat in Lemnæ foliis, ad ripas arenosas, passim.

Déscr. Minutus, Latridio gibboſo vix major. Caput rotundatum nigro-piceum, ſubtiliter punctuatum; oculis depreſſis brunnēis; roſtrum vix longitudine capiti cum thorace, crasifuculūm nigro-piceum, arcuatum, apice nonnihi dilatatum et depreſſum, baſi punctulatum. Ant nūx roſtro cum capite parum longiores, crasifuculæ, rufo piceæ, clava ovata obſcuriori. Thorax longitudine vix latior, baſi aq' ceq' truncatus, lateribus nonnihi rotundatus, ſupra convexus, nigro-piceus; cebre punctulatus, interdum linea laterali, e pube minu-tiſſima cinerea, utrinque ornatus. Scutellum nullum. Elytra thoracis baſi fere duplo latiora, hu-meris prominulis, & illō quadruplo longiora, apice attenuata, declivia, anum obtegentia, ſupra conve-xa, dorſo antico ſub-depreſſa, nigro-picea, profun-de ſtriata, fere ſubcata, & in ſtrīis purętata, interſtrīis convexis ſub-ævibus; juxta baſio & in diſco lituræ aliquot cinereæ, e pube tenuiſſima fugaci or-tæ, & valde obſoletae. Corpus ſubtus nigro piceum porętatum, tenuiſſime pubefcens. Pedes elongati validi rufo-picei, femoribus clavatis, verſus apicem nigro-piceis.

Sectio 2:da, Corpore breviori, ova-to vel ſub-quadrato.

Subdiviſio I:a, Thorace ſub-æqua-li, non tuberculato; elytris a-num non tegentibus.

55 R. Campanulæ: niger ſub-depreſſus, pilis cinereo-albidis, elytrorum ſeriatis, adſperſus; thorace poſtice rotundato, roſtro cylindrico tenui.

Fabr. Elut. 2. 448. 52.

Curt

Circulio Campanulæ. Linn. Syst 2. 607. 7.

De Gér. Iul 5. 236. 23. Herbst. Col 6. 161,

*119. Tab 70. f. 15 Payk fn. 3. 212. 29. Næ-
zéa Act. Holm. 1794. 4. 269. 4 Mas.*

Habitat in floribus, præsertim *Campanulæ*
rotundifoliæ, freqvens.

Descr. Medius inter minores, Rh. Geranii æqualis. Caput valde retractum rotundatum nigrum, obsolete punctulatum, tenuissime pubescens, pronte impressa; oculi sub-depressi nigro-brunnei; rostrum longitudine fere dimidii corporis, tenue, arcuatum, nigrum nitidum, basi punctulatum. Antennæ vix capite cum rostro longiores, nigrae, clava pubescente. Thorax latitudine multo brevior, antice angustior, margine elevationi, striga tenui transversa a disco distincto; lateribus & postice omnino rotundatus, supra parum convexus, niger, crebre evidenter punctatus, pilis tenuissimis cinereo-albidis depresso-parce adspersus. Scutellum oblongo rotundatum nigrum sub-læve. Elytra thorace latiora, humeris non nihil prominulis, & illo plus triplo longiora, apice obtuse rotundata, abdome breviora, supra parum convexa, nigra, sat profunde striata, & in striis punctata, interstitiis confertissime rugoso-punctatis; in singulo interstitio series duæ vel tres e pilis brevibus depresso-rigidis cinereo-albidis nitidis, unde elytra concinne albido striata apparent. Corpus subtus nigrum punctulatum, tenue cinereo-pubescentia, pectoris lateribus densius albido-squamulosis; segmentum penultimum ventrale maris, in medio profunde impressum, denticulis duobus validis armatum; seminæ convexum muticum. Pedes elongati nigri, cinereo-pubescentes, femoribus omnino mucicis in utroque sexu.

Obs. Speciem jam descriptam multoties in capuia legi, & sexus inter se magnitudine femoribus quæ muricis simillimos inveni; quam pro feminâ hujus assumit Cl. Dom. Paykull, loc. cit. peculiarem esse Speciem credo, differt enim magnitudine dimidio majori & ultra, femoribus dentatis, pubescens longiori, mirus nitida, &c., in sequenti familia sub nomine Rh. graminis describenda.

56. R. Viscariæ: niger sub-depressus, pube densa depressa, supra cinereo-virescente, subitus albida tectus, thorace postice sub-angulato.

Fabr. Ecut. 2. 449. 56.

*Curculio Viscariæ. Linn. Syst. 2. 609. 27. Fn.
Sv. 598. Payk. Fn. 3. 261. 82.*

Var. b, obscurior, pube cinerea tectus.

Habitat in Lychnidis Viscaria floribus, passim.

Descr. Statura & magnitudo omnino præcentis, sed differt pubescens multo densiori, thorace postice sub-angulato, antice latius impresso, &c. Caput rotundatum, minus quam in præcedenti retractum, nigrum, punctulatum, pube densa cinereo-virescente tectum; oculi brunnei sub depresso; rostrum vix longitudine dimidii corporis, minus tenui, arcuatum nigrum punctulatum, pube depresso cinerea adspersum, apice glabrum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, crassissimæ, basi rufopiceæ, extrosum nigrae, clava pubescente. Thorax longitudine paulo latior, antice coarctatus, margine apicis latiori elevato, striga transversa sat

præ-

profunda & lata a disco distincto, lateribus & angulis posticis rotundatus, basi media nonnihil productus. supra parum convexus, niger crebre subtiliiter punctatus, pube densa depresso cinereo-virescente tectus. Scutellum rotundatum nigrum, cinereo-pubescentes. Elytrorum forma ut in praecedenti omnino, supra parum convexa, nigra, minus profunde punctato striata, interstitiis subtiliiter coriaceis, pube densa cinereo virescente depresso undique tecta. Corpus subtus nigrum punctulatum, squamulis albidis sub-nitidis omnino tectum. Pedes validi nigri, dense cinereo pubescentes.

Var. b. differt tantum colore paginæ superiores magis fusco, aut detritus, aut polline florure minus dense adpersus.

57. R. signatus: niger sub-depressus, pube squamuvisque supra ferrugineo-aureis, subtus albitis, omnino tectus, thorace postice bi-sinuato, elytris litura media fusca albaque.

Panz fn. 99. f. 10.

Habitat in Scania ad Esperöd, rarius. Dom. Fallén.

Descr. Statura omnino praecedentium, sed triplo minor, Rh. Lemæ æqualis. Caput rotundatum exsertum nigrum, vix punctulatum, squamuvis minimis ferrugineo-aureis omnino tectum, oculis brunneis parum prominulis; rostrum longitudine ferre capitis cum thorace, arcuatum nigrum, supra densè ferrugineo-squamulosum, apice nudum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, crassifluiæ nigrae, basi piceæ. Thorax vix longitudine

latior, anterius angustatus, juxta apicem striga lata & sat profunda trahensversa impressus, postice sub-bifurcatus, in medio productus, supra modice convexus, squamulis ferrugineo-aureis nitidis omnino tectus, quibus deraesis, sed illicime punctulatus, niger. Scutellum rotundatum, similiter squamulosum. Elytra thorace parum latiora, numeris prominulis, & illo triplo longiora, supra modice convexa, obsolete punctato striata, squamulis sibilibus uti thorax omnino tecta; paulo pone medium dorsi litura communis obsoleta fusca, postice albido-marginalata, & interdum etiam anterius litura una alterave pallide cinerea; saepe tamen lituræ illæ valde obsoletæ, vix conspicuae. Corpus totum subtus squamulis densis a'bidis tectum, interdum anum verius ferrugineo-tinctis. Pedes mediocrem nigricantes, dense cinereo-pubescentes, tibiis tarassisque saepe fuscæ-ferrugineis.

58. *R. globosus*: supra niger glaber, subtus albo-squamulosus, antennis pedibusque piceis, elytris gibbosis nigro-cœruleofuscis, striis levibus, scutello albo-squamoso.

Attelabus globosus. Fabr. Eleut. 2. 426. 54.

Panz. fn. 57. f. 10.

Curculio globosus. Herbst. Col. 6. 144. 105. Tab. 69. f. 10. Payk. fn. 3. 264. 86.

Curculio hypoleucus. Quens. Diss. p. 16.

Curculio cyaneus. Linn. Syst. 2. 606. 5. Fn. Sv. 581.

Habitat in arenosis aridis paucim, minus frequens.

Deser.

Descr. Rh. Campanulæ paullo minor, & omnibus nostris magis convexus, fere globosus. Caput intra thoracem omnino retractum, fronte solum conspicit, quæ parum convexa, nigra, subtilli-
punctata. pennis tenuibus albidis adspersa; oculi magni depresso, in fronte approximati: rostrum longitudine dimidii corporis, arcuatum, nigrum, punctatum & sub-striatum, pectori arete applicatum. Antennæ rostro cum cipire longiores, evi-
denter geniculatae. fusco-ferrugineaæ pubescentes. Thorax brevissimus transversus, antice angustior, lateribus & postice rotundatus, supra convexus, niger, saepe cœruleo-vel violaceo-micans, subtiliter oblongo-punctatus. fere glaber, lateribus & subtus squamu'is densis cinereo-albidis tectus; ante scutellum ejusdem squamuæ aliquot albidæ. Scutel-
lam elevatum rotundatum nigrum, albo-squamulosum. Elytra antice thoracis bisi multo latiora, humeris rotundatis, & illo triplo longiora, posterius valde attenuata, apice rotundata, supra valde convexa, pectoris anterius gibbosa, nigro cœrulecentia.
interdum violacea nitida glabra, tenuè striata, striis lœvibus. interstitiis latis planis, apex summus ely-
trorum saepe ferrugineus. Corpus subtus nigrum, vix punctatum, squamulis densis cinereo-albidis omnino tectum. Pedes elongati crassiusculi nigro-
picei, dense cinereo-squamosi, tibiis tarsisque dilu-
tius fusco-ferrugineis.

Obs. Descriptio in Linn. Fn. loc. cit. quatenus e Faunæ editione 1:a n:o 467, desumpta, ad ap on cyaneum pertinet; additamentum vero in Faunæ Ed. 2:da, ut & character in Systemate, loc. cit. speciem jam descriptam designant.

59. R. Scortillum: niger convexus, subtus
albido-squamulosus, pedibus rubris, elytris

profunde punctato-striatis apice rufis, futura basi albo-squamosa.

Circulio Scortillum: Herbst. Col. 6. 418. 402.

Tab. 92. f. 13.

Circulio Agricola: Payk. fn. 3. 260. 81.

Circulio inflexus: Marsh. Ent. Br. 1. 253. 43.

Habitat in arvis paßim.

Descr. Parvus, Rh. Lemnæ parum major. Caput rotundatum nigrum sub nitidum, crebre punctatum, tenue pubescens, oculis brunneis, nonnihil prominulis; rostrum longitudine capitis cum thorace. valde arcuatum, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ longitudine rostri, cum capite, rufo-piceæ, clava magna fusca. Thorax latitudine brevior, anterius angustior, basi bisinuatus, supra valde convexus, æqualis, niger, crebre & sat profunde punctatus, pilis minimis cinereis adpersus, lateribus & subtus dense albido squamosus. Scutellum vix ullum. Elytra thoracis basi ferre dimidio latiora, humeris prominulis, & illo plus triplo longiora, supra modice convexa, antrosum nigra, apicem versus indeterminate, plus minusve rufa, profunde punctato-striata, interstitiis sub-lævibus, pilis minimis adpersa; futuræ basis pierumque albido-squamosa. Corpus subtus nigrum punctatum, dense albido-squamosum. Pedes mediocres, læte rufo-testacei, ipsa basi femorum, angvibusque fusco-piceis.

60. R. rubicundus: niger convexus, cinereo-squamulosus, pedibus rufis, elytris profunde punctato-striatis rufo-testaceis, futura fusca, basi albo-squamosa.

Panz.

Panz. Fn. 99. f. 12. in Tab. Rh dumetorum
in Textu, secundum specimen detritum de-
scriptus.

Curculio rubicundus. Payk. Fn. 3. 263. 84.

Curculio melanocephalus. Marsh. Ent. Br. 1.
253 44.

Var. b. Elytris obscurius rufo-brunneis.

Var. c, rostri apice, thoraceque rufo-fer-
ruginosis.

Habitat in foliis Betulæ albæ, locis paludo-
sis, passim.

Descr. Rh. Quercus magnitudine & facie si-
milis, sed convexior, elytra multo profundius pun-
ctato-striata, & color alius. Caput convexum ro-
tundatum retractum nigrum, crebre & profunde pun-
ctatum, cinereo squamulosum, oculis depressis bru-
nneis; rostrum longitudine sere dimidii corporis, ini-
minus tenui, arcuatum nigrum, crebre punctulatum,
fæpe apice brunneum. Antennæ longitudine rostri
cum capite, tenues, rufo-piceæ, clava parva fu-
sca. Thorax brevis, antice coarctatus, & ante api-
cem late & profunde transversim impressus, margi-
ne reflexo elevato ferrugineo; postice bi-sinuatus,
supra convexus, niger, crebre & profunde puncta-
tus, in medio obsolete canaliculatus, squamulis ci-
nereo-albidis, subtus, versus latera & postice den-
sioribus tectus, disco plerumque derafis. Scutellum
parvum nigrum, albo-squamulosum. Elytra thoracis
basi dimidio latiora, humeris prominulis, & illo
quadruplo longiora, supra convexa, aut saturatius
rubra, aut pallidius testacea, profunde punctato-
striata, intersticiis planis sub-lævibus; sutura ple-
rumque, non vero semper, nigro fusca, a basi ver-

fus medium albido. squamosa; striolæ plures longi
tudinales abruptæ e squamulis albicantibus. præf-
tim prope basis & p. ne medium, in illæsis inservi-
dus elytra commaculant. facile vero deteruntur.
A æ longæ fusco. hyæ inæ Corpus subitus nigrum
punctulatum. pectore densius, abdomen parcius al-
bito. squamosis. Pedes medioeres rufo-ferruginei,
ipsa basi femorum, tarsisque nigricantibus vel fuscis.

Var. b, differt tantum elytrorum colore obsec-
rius brunneo.

Var. c, pallidior; rostri medietas antica rufo-
brunnea; thorax supra ferrugineus; elytra & pedes
fere toti rufo testacei; anus saepe rufo-piceus; ce-
tera ut in prioribus.

61. R. Quercus: depresso, nigro-fuscus,
cinereo-squamulosus. pedibus fusco-ferru-
gineis, elytris obofoletius punctato striatis
testaceis, fasciis undulatis cinereo-squa-
mosis.

Fabr. Ent. 2. 455. 34.

Curculio Quercus. Herbst. Col. 6. 412. 394. Tab.
92. f. 7 Payk. fn 3. 261. 83. *Curculio pal-*
lens. Marsh. Ent. Br. 1. 251. 38.

Var. b, rostri apice rufo, cætera ut in a.

Curculio ruber. Marsh. Ent. Br. 1. 251. 39.

Var. c, rufo testaceus, rostro nigro, pe-
ctore abdominisque basi fuscis.

Curculio Melanorrhynchus. Marsh. Ent. Br. 1.
250. 37.

Habitat in foliis *Quercus Roboris*, non in
freqvens.

Dofers

Descr. Magnitudo, & fere statura depressior *Rh. Campanulæ*, præcedenti alias, ut dictum; similis; variat etiam dimidio minor & ultra. Caput rotundatum fusco-nigrum, subtiliter punctulatum, griseo-squamulosum, oculis nigro-brunneis, parum prominulis; rostrum longitudine capitis cum thorace, arcuatum vixrum punctatum. Antennæ longitudine capitis cum thorace, tenues, medio ferrugineæ, basi apiceque fuscae. Thorax antice coarctatus, juxta apicem striga transversa lata & profunda impressus, margine elevato reflexo ferrugineo, postice sat profunde bi-sinuatus, supra parum convexus, dorso nigro-fuscus, obsoletius punctulatus, in medio canaliculatus, lateribus & subtus fusco-testaceus, dense cinereo-squamosus dorso magis nudo, cum linea squamosa in medio. Scutellum oblongum angustum fuscum. E'ytra thoracis basi dimidio latiora, humeris gibbis, & illo triplo longiora, supra parum convexa, minus profunde & obsoletius punctato-striata, interstitiis ruguiosis; jam pallidius testacea, jam obscuriora, basin versus & ad suturam magis infuscata, fasciis tribus angustis cinereo-squamosis notata, quarum duæ priores antrorsum arcuatæ, tertia retrosum curvata, cum cineritie marginali callum posticum, interdum infuscatum, circulariter incluens. Pectus & abdomen nigra punctulata, dense cinereo-squamosa. Pedes mediocres fusco-ferruginei pubescentes, femoribus, præsertim posticis plerumque basi & subtus nigro-fuscis.

Var. b, differt tantum rostri apice plus minusve rufo.

Var. c, pallidior; caput, thorax & anus fuscos testacea; elytra & pedes dilutius testacea; rostrum nigrum; pectus & abdomen antice fusca; cetera ut in prioribus.

Obs. Curculio Quercus Cl. Linnæi potius ad *Rh. viminalem* Fabricii pertinere, mihi videtur.

Sub-

Subdivisio 2:da, Thorace bi – vel
4 – tuberculato.
2, Rostro longiore tenui.

2. *R. Geranii*: niger, subtus albido, squamosus, thorace pulvinato obsolete bi-tuberculato, antice transversim impresso, elytris striatis, interstitiis seriatim tuberculatis.

Curculio Geranii. Payk. fm 3. 256. 76.

Habitat in floribus Geranii pratensis, sylvestris & sanguinei, non infreqvens.

Descr. Magnitudo & fere statura Rh. didymi. Caput parum convexum nigrum opacum, creberrime rugoso-punctatum, oculis bruneis nonnihil prominulis; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, inflexum, valde arcuatum, nigrum, creberrime rugoso-punctatum. Thorax antice angustior, & juxta apicem profunde transversim impressus, margine antico alte reflexo elevato; postice bisinuatus, supra valde convexus, pulvinatus; niger opacus, creberrime punctatus, vix visibiliter pubescens; versus latera utrinque tuberculum parvum elevatum, saepe obsoletum. Scutellum vix ullum. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, pone basin magis dilata, thorace duplo longiora, epice singulatim rotundata, abdomine paullo breviora, supra convexa, nigra, sat profunde & late striata, striis obsolete rugoso-punctatis, interstitio singulo serie e tuberculis elevatis squamæ-formibus, posterius majoribus; suturæ basis valde impressa. Corpus subtus nigrum, crebre & profunde punctatum, dense albido squamosum. Pedes longiusculi validi nigri, cinereo-pubescentes.

scentes, tibiis externe nigro-ciliatis, dente obtuso ante apicem armatis.

63. R. *Affimilis*: niger, supra tenue, subitus densius albido squamulosus, thorace depresso scuto canaliculato bi-tuberculato, rostro longissimo tenui.

Fabr. Eleut. 2. 451. 67.

Curculio affimilis. *Puyk.* fn. 3, 257. 77. *Panz.* fn. 42. f. 6.

Curculio alauda. *Herbst. Col.* 6. 410. 392. *Tab.* 92. f. 5.

Curculio obstrictus. *Marsh. Ent. Br* 1. 255. 50.

Habitat in floribus, præsertim *Brassicæ* & congenerum, sat freqvens.

Descr. Præcedenti paullo minor, angustior, rostro longiori & tenuiori, thorace canaliculato subdepresso, &c. abunde distinctus. Caput nigrum, crebre punctatum, parum pubescent, in statu quieto vel terrefacto intra thoracem retractum, rostro pectori arcte applicato, ut in pterisque hujus sectionis; oculi brunnei, parum prominenti; rostrum dimidio corpore fere longius, tenuissimum, valde arcuatum, nigrum nitidum, basi sub-punctatum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenui, nigro-piceæ, clava pubescente. Thorax antice multo angustior, & juxta apicem transversim profunde impressus, postice bi-sinuatus, supra sub depresso, niger, crebre punctatus, squamulis piliformibus parce adspersus, canalicula dorsali, basi apiceque profundiori, densus albido-squamulosa, exaratus, & tuberculo late-

zal

rali transverso utrinque armatus. Scutellum nullum. Elytra thoracis bâsi paullo latiora, & pone basin magis dilatata, thorace triplo longiora, supra parum convexa, nigra, saepe plumbea, regulariter striata, striis obsolete rugoso punctatis, interstitiis subtiliter crenulatis, squamulis parvis depresso piliformibus cinereo-albidis adspersis. Alæ corpore duplo longiores, hyalinæ. Corpus subtus nigrum punctatum, squamis densis albidioribus tectum. Pedes elongati tenuis nigri, cinereo-pubescentes, femoribus omnibus simplicibus.

Obs. Rh. sulcicollis, in familia sequenti sub no 133, descriptus, huic ut ovum ovo simillimus, sed femori ille dentata, & rostrum paullo crassius, bâsi magis punctatum; an modo Sexu distincti?

64. R. Erysimi: nigro-aeneus sub-nitidus, iusto pedibusque nigris, elytris cœruleis, profunde punctato striatis, humeris prominentibus, thorace canaliculato bituberculato.

Fabr. Elut. 2. 452. 72.

Circulio Erysimi. *Herbst. Col.* 6. 407. 388.

Tab. 92. f. 1. Payk. fn. 3. 265. 87. Panz.
fn. 17 f. 7.

Var. b. Elytris virentibus.

Habitat in plantis, præcipue *Tetradynamis*, freqvens.

Descr. Statuta omnino præcedentis, sed plus duplo minor, brevior. Caput nigrum, parum aeneum, crebre & sat profunde punctatum, fronte im-

impressi; oculi brunnei non nihil prominuli; rostrum capire cum thorace fere longius, tenuer. valde arcuatum, nigrum nitidum, basi sub-punctatum. Antennæ longitudine capitis cum restro, tenues nigrae, clava magna pubescente. Thorax brevis transversus, antice multo angustior, & juxta apicem profunde & late transversim impressus, margine elevato reflexo. postice bisinuatus; supra parum convexus, fusco-aeneus sub-nitidus, profunde & sat crebre punctatus, in medio canaliculatus, tuberculo laterali obtuso utrinque armatus. Scutellum valde depresso triangulare nigrum, sub-thoracis angulo medio excurrente omnino occultatum. Elytra thoracis basi in modo latiora, humeris valde prominulis, thorace fere quadruplo longiora, supra convexa, saturata cœrulea, interdum violacea, sub-nitida, profunde punctato-striata, intersitis planis sub lœvibus, apicem versus tuberculato-rugosis. Corpus subitus virescenti-aeneum sub nitidum, profunde punctatum, parce cinereo-pubescentis & squamuolosum. Pedes elongati tenues nigri, parum pubescentes.

Var. b, differt tantum elytris virescentibus; variat etiam colore obscuriori, fuscens, parum aeneo-micante.

65. *R. contractus*: niger sub nitidus, elytris nigro-cœrulecentibus profunde punctato-striatis, humeris prominulis, thorace biuberculato, obsolete canaliculato.

Curculio contractus. Marsh. Ent. Br. 1. 250. 36.

Habitat in plantis & gramine, sat frequens;

Descr. Statura & summa affinitas præcedentis;
sed plus duplo minor, Rh. Lemæ æqualis, totus nigro-

ger; elytris vix cœrulecentibus. Caput nigrum, cum oculis, rostro, antennis, omnino ut in præcedenti. Thoracis structura eadem, supra niger, profunde punctatus, obsoletius cana iculatus, bituberculatus. Elytrorum forma ut in priori omnino, supra convexa, nigra, interdum nigro-cœrulecentia, profunde crenato-striata, intersticiis sub rugosis, postice tuberculatis. Corpus subtus nigrum, profunde punctatum, squamulis cinereo-albidis parce adspersum. Pedes elongati tenues nigri,

Obl. Pro varietate pygmæa obscura præcedentis facile haberi posset, sed similes tantum cum similibus copulatos visi.

66. R. Cochleariæ: niger, cinereo-subpubescens, suturæ basi pectoreque albido-squamosis, thorace canaliculato bituberculato basi hisinuato, disco convexo, elytris profunde punctato-striatis, humeris rotundatus.

Habitat in floribus Cochleariæ officinalis, ad littora maris, in Balusia, Hallandia, pâssim copiose.

Descr. Præcedenti paullo major, convexior, Rh. florali æquivalis, utrisque valde similis & affinis, differt tamen, a Rh. contracto; thoracis disco elytrisque convexioribus, parce cinereo-pubescentibus; humeris rotundatis; suturæ basi pectoreque dense albido-squamosis; ab Rh. florali; Elytris convexioribus, profundius punctato-striatis, tenuius pubescentibus. humeris rotundatis, &c. Caput rotundatum nigrum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens, oculis brunneis parum prominulis; rostrum capi-

capite cum thorace longior, tenui, valde arcuatū, nigrum nitidū, basi punctulatū. Antennæ longitudine rostrī cum capite; -tenues, nigræ, clava picea pubescente. Thorax brevis transversus, antece multo angustior, & iuxta apicem late & profunde transversim impressus, basi bi-sinuatus, supra parum convexus, niger, profunde, sed minus crebre punctatus, in medio obsolete canaliculatus, tuberculo obtuso utrinque armatus. Elytra thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, pone basin & ultra medium rotundato-dilatata. thorace plus triplo longiora, supra valde convexa, nigra, profunde punctato-striata, interstitiis sub-rugosis, pilis minimis depresso-cinereo-albidis parce adspersa, sutura basi sub-depressa, dense albido-squamosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, thorace pectoreque dense, ventre parcius albido-squamosis. Pedes longiseuli tenues nigri, cinereo-pubescentes.

67. R. floralis: niger, sutura corporeaque subtus dense albido-squamosis, thorace canaliculato bi-tuberculato sub-convexo, basi bi-sinuato, elytris obsoletius crenato-striatis cinereo-lineatis, humeris prominulis.

Fabr. Elevt. 2. 450. 59.

Curculio floralis. Payk. Fn. 3. 266. 88. Herbst. Col. 6. 448.

Var. b, sutura elytrorum vix albo-squamosa.

Var. c, supra niger, parum cinereo-pubescentes.

Curculio constrictus. Marsh. Ent. Br. I. 253. 61.
Habitat in floribus freqvenci

Descr. Parvus, præcedenti æqualis, & ut dictum, simillimus. Caput rotundatum convexum nigrum, creiberrime subtiliter punctulatum, pube tenui grisea adspersum, vertice obsolete carinato; oculi nigro-brunnei parum prominuli; rostrum capite cum thorace fere longius, tenui, vnde arcuatum, nigrum, nitidum, basi supra punctulatum, cinereo-pubescentes. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues nigrae, clavæ breviori ovata. Thorax brevis transversus, structura omnino ut in præcedenti descriptus, postice profunde bi-sinuatus, supra striga apicis, canalicula media, & tuberculis lateribus ut in priori, niger, crebrius & minus profunde punctatus, densius cinereo-pubescentes & squamulosos, præsertim versus latera. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, supra minus convexa, præsertim anteriorius, tota nigra, regulariter striata, striis obsoletius crenato-punctatis, interstitiis crebre transversim rugosis; sutura fere tota dense albido squamulosa, & interstitia singula serie duplice e pilis rigidis depresso depressis cinereis approximatis adspersa, unde elytra cinereo-lineata appareant. Ata longæ albidae subopacæ. Corpus subtus nigrum punctatum, squamu-lis densis albidis tectum. Pedes mediocres nigri, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt tantum elytrorum sutura disco fere concolori, vix densius albido-squamosa.

Var. c, supra nigrior, parce cinereo-pubescentes. forte adutior & magis detrita, Rh. Cochleariae simillima, sed elytris minus convexis, striis obsole-

foletius punctulatis, humeris prominulis, &c. distincta.

68 R. depresso collis: niger, subtus dense albido-squamulosus, thorace depresso obsolete canaliculato bituberculato, postice truncato, elytris obsoletius crenato-striatis, cinereo-lineatis, humeris prominulis.

Curculio nigrinus. Marsh. Ent. Br. i. 250. 35.

Habitat in floribus sat frequens.

Descr. Statura & magnitudo praecedentis, cui primo intuitu ut ovum ovo simillimus, sed thoracis structura longe alia, antennarum clava longior, elytorum sutura disco concolor, &c. Caput, oculi rostrum ut in praecedenti omnino. Antennæ capite cum rostro longiores, nigrae, medio piceæ, clava valde elongata acuminata pubescente. Thorax subtransversus, antice multo angustior, & juxta apicem transversim impressus, minus tamen profundè quam in prioribus, margine antico elevato reflexo; basi truncatus, in medio foveola angusta profunda, antrorsum in canaliculam obsoletam continua, impressus. supra depresso, praesertim posterius, totus niger, crebre punctatus, pube cinerea depresso adspersus, utrinque tuberculo obtuso armatus. Scutellum vix ullum. Elytra quoad structuram, strias, & lineas pilosas interstitiarum, omnino ut in praecedenti, sed sutura non densius pilosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, dense albido pubescens. Pedes longiusculi tenues nigri, cinereo-pubescentes, tarsis fusco-ferrugineis.

69. R. Ericæ: niger, virescenti-pollinosus, suturæ basi pectoreque albo-squamulosis,

antennis, pedibus, rostroque longissimo tenui rufis, thorace sub-depresso bituberculato.

Var. b, corpore toto rufo-testaceo.

Habitat in floribus Ericæ vulgaris, mente Augusto, passim, non infreqvens.

Descr. Statura Rh. flóralis, & vix illo major; corpus ræpse nigrum, sed plerumqve poliline florum virescenti dense adspersum. Caput rotundatum nigrum, crebre punctulatum, pilis & squamulis cindereis adspersum, vertice sub-carinato; oculi prominuli nigro-brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, tenue, areuatum, rubrum nitidum, apice saepe magis fuscum. Antennæ longitudine rostri cum capite, tenues, pallide rufescentes, clava ova-ta pubescente. Thorax antice angustior, margine sub-reflexo, medio parum emarginato, postice sub-truncatus, vel in medio parum productus, supra sub-depressus, niger, creberrime granulato punctatus, pilis minimis cinereis parce adspersus, in medio vix canaliculatus, tuberculo parvo elevato utrinque armatus. Scutellum parvum triangulare nigrum depresso. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, sed illo vix triplo longiora, supra modice convexa, nigra, sat profunde punctato striata, interstitiis tuberculato-rugosis, & pilis rigidis cinereis seriatis adipersis; futura a basi versus medium albo-squamosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, thorace pectorque dense, abdomine parcus albo-squamosis. Pedes mediocres validi, toti rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

Var. b, differt, corpore toto rufo-ferrugineo, antennis pedibusqve pallidioribus, forte nuper exclusa,

70. R. Qverceti: niger, subtus dense, supra
parcius albido-squamulosus, antennarum
medio, pedibus, elytrorumque apice rufo-
testaceis, thorace acute bi-tuberculato.

Habitat in Qvercetis rarius.

Descr. Parvus, minimis Rh. Qvercus individuis
æqualis & similis, sed differt thorace bituberculato,
colore, &c. Caput rotundatum nigrum, crebre
punctatum, parce albido-squamulosum, oculis brun-
neis lat prominulis; rostrum longitudine dimidiū
corporis, tenui, valde arcuatum, nigrum nitidum,
basi punctulatum. Antennæ rostro cum capite lon-
giores, tenues, medio rufo-testaceæ, basi apiceque
fusco-piceæ. Thorax brevis transversus, antice val-
de coarctatus, & juxta apicem transversim profunde
& late impressus, margine elevato reflexo, saepe
ferrugineo; basi sub-truncatus, supra niger, crebre
punctatus, in medio transversim convexus, obsolete
canaliculatus, tuberculo laterali valido acuminato
utrinque armatus, lateribus & subtus dense, dorso
parcius albido-squamulosus. Elytra thoracis basi di-
midio latiora, humeris valde prominulis, & illo
plus triplo longiora, apice singulatim rotundata,
supra nigra opaca, obsoletius punctato-striata, in-
terstitiis creberrime subtiliter rugulosis, squamulis
albidis, ad futuræ basin magis condensatis, adspersa;
apex late rufo testaceus. Corpus subtus ni-
grum, crebre punctatum, pectore dense, ventre par-
cius albido-squamosis. Pedes elongati rufo-testa-
cei pubescentes, femoribus sub-clavatis, interdum
obscurioribus.

71. R. subrufus: rufo-testaceus totus, sub-
tus albido-squamulosus, thorace bi-tuber-

culato, antice posticeqve impresso, elytris
fasciis duabus linearibus albido-squamosis.

Fabr. Elevt. 2. 454. 30.

Curculio sub-rufus. Herbst. Col. 6. 418. 403.
Tab. 92. f. 14.

Habitat in frutetis pessim.

Deser. Majoribus Rh. Quercus individuis æqualis & similis, sed thorace tuberculato, colore, &c. distinctus. Caput rotundatum rufo-testaceum, crebre punctulatum, pilis rigidis depresso, saepe aureo-nitidis adspersum; oculi brunnei parum prominuli; rostrum longitudine fere dimidii corporis, arcuatum, tenue, saturate rufum nitidum, lateribus baseos striato-punctatis. Antennæ rostra cum capite fere longiores, valde tenues, rufo-testaceæ, clava parva pubescente. Thorax brevis transversus, antice valde coarctatus, & juxta apicem transversim impressus, margine elevato, non vero reflexo, cum sovea valde profunda in medio intra apicem; postice profunde bitemarginatus, supra in medio valde convexus, pulvrius, totus rufus, crebre punctatus, pilis rigidis squamæ formibus cinereis, interdum aureo-micantibus, ad latera & subtus densioribus, adspersus. Scutellum parvum rotundatum testaceum. Elytra thoracis bæsi vix dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, supra modice convexa, pallidius rufo-testacea, regulariter punctato-striata, interstitiis crebre rugulosis; fasciæ duæ angustæ arcuato-undulatae e squamulis cinereo-albitis, una paullo ante, altera pone medium, quatuor anterior juxta futuram versus scutellum reflexa. Corpus subtus saturatus rufum punctatum, squamulis latioribus albidis tectum. Pedes mediocres rufo-testacei pubescentes.

72. R. Epilobii: niger, cinereo-nebulosus,
antennis ferrugineis, thorace quadri-tu-
berculato, margine antico emarginato, e-
lytris basi cruce albida.

Curculio Epilobii. Payk. En. 3. 259. 80.

Habitat in Epilobio angustifolio Westrogo-
thiae, rarius.

Deser. Rh. Geranii paullo minor, saturate
niger. Caput rotundatum nigrum, crebre puncta-
tum, pilis rigidis albidis adspersum, fronte inter o-
culos impressa; oculi brunnei parum prominuli; ro-
strum longitudine capitis cum thorace, minus te-
nue, arcuatum, nigrum, basi supra striatum, inter-
dum albido squamulosum. Antennæ capite cum ro-
stro fere longiores, tenues, fusco-ferrugineæ, cla-
va cinereo-pubescente. Thorax antice valde coar-
ctatus, juxta apicem transversim late impressus,
margine valde elevato sub-reflexo, in medio sat
profunde emarginato, unde quasi duo tubercula ibi
exstant; postice bi-emarginatus, supra in æqualis,
totus niger, crebre punctatus, pilis cinereis parcus
adspersus, in medio sat profunde canaliculatus, tu-
berculis quatuor, in lineam transversalem colligatis,
armatus, quarum laterales elevationes, sub-acumi-
natæ, intermediæ latiores, valde obtusæ. Scutel-
lum punctiforme nigrum. Elytra thoracis basi fere
dimidio latiora, humeris prominulis, & illo vix
quadruplo longiora, supra modice convexa, obsole-
tius punctato striata, intersticiis transversim sub-ru-
gosis, squamulis parvis albidis, hinc inde in nebu-
las magis condensatis, adspersa; sutura a basi versus
medium dense albo squamosa, adjacente utrinque
macula duplii albida, unde quasi crux formatur.
Corpus subtus nigrum, obsoletius punctatum, parce

albido-squamulosum. Pedes elongati nigri, cinereos pubescentes, tarsis piceo-ferrugineis.

73. R. Myriophylli: sub-depressus niger opacus, subtus dense albo-squamulosus, supra fuliginoso-squamulosus albido-irroratus, pedibus testaceis, thorace inæquali tuberculato.

Habitat in Spicis Myriophylli, in aquosis Roslagiae, rarius; Dom. Forsström.

Deser. Magnitudo fere præcedentis, sed multo magis depresso, Rh. 4-tuberculato quodammodo similis. Caput rotundatum nigro-piceum. subtiliter punctulatum, albido-squamulosum, oculis nigro-brunneis, parum prominulis; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, piceum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, fusco-ferrugineæ, clava obsecure. Thorax anterius paullo angustior, apice truncatus, margine parum elevato, denticulis duobus parvis remotis armato; postice profunde bisinuatus, supra depresso, inæqualis, tuberculo valido acuminato utrinque armatus, in medio profunde canaliculatus, & impressione dorsali obliqua utrinque impressus, totus niger opacus, obsolete punctulatus, supra squamulis fuliginosis testus, lateribus & subtus dense albido-squamulosus. Scutellum parvum depresso nigrum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, & illo quadruplo longiora, supradorsum depresso, nigra opaca, obsolete striata, squamulis fuliginosis omnino testa, immixtis nubulis e squamulis griseo-albidis; latera elytrorum inflexa dense albido-squamosa, & macula alba brevior communis in sutura antice, Corpus

totum subtus dense albo-squamulosum. Pedes elongati tenues, rufo-testacei. albido-pubescentes, genubus tarsisque nigro fascis

Obs. Ob rostrum brevius & crassius, haec species transitum ad seriem sequentem parat.

b. Rostro breviori incrassato.

74. R. 4-tuberculatus: niger, supra cinereo-nebulosus, subtus albido-squamulosus, tibiis testaceis; thorace depresso foveolato quadri-tuberculato.

Fabr. Elevt. 2. 448. 49.

Circulio 4-tuberculatus. Herbst. Col. 6. 409.

390. Tab 92. f. 3. Payk. Ets. 3. 258. 79.

Habitat in arvis passim.

Descr. Statura Rh. Didymi, sed paullo minor; Caput rotundatum depresso nigrum, crebre punctatum, pilis parvis, saepe aureo vel purpureo-micantibus tectum. limbo postico albido-squamulosus; oculi nigro-brunnei sub-prominuli; rostrum capite parum longius, crassum arcuatum nigrum, creberissime punctulatum, pilis micantibus uti caput adspersum. Antennæ rostro cum capite parum longiores, crassiusculæ rufo-piceæ, clava obscuriori. Thorax antice coactatus, truncatus, margine vix elevato, tuberculis duobus parvis remotis, lateraliter inclinatis, armato; postice bi-sinuatus, supra sub-depressus, niger, crebre punctatus, tuberculo valido, acuminato utrinque armatus, foveolisque tribus dorsilibus impressus, una juxta apicem profundiori, duabus in medio, paribus. Elytra thoracis basi dimidio latiora; humeris gibbis, & illo triplo longiora.

giora, supra parum convexa, nigra opaca, punctatostriata, intersticiis subtilissime coriaceis, squamulis cinereo-albidis, hinc iode congestis, nebulosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, albido & brunneo squamosum. Pedes elongati tenues, cinereo-pubescentes, femoribus nigris, annulo cinereo versus apicem cinctis, tibiis tarsisque ferrugineis.

75. R. quadricornis: niger, subtus albido-squamulosus, antennis pedibusque totis testaceis, suturæ basi alba, thorace convexiori quadri-tuberculato.)

Circulio 4-tuberculatus. Herbst. Col. 6. 409.
390. var.

Habitat in arvis & campis aridis rarius.

Descr. Præcedenti valde similis & affinis, sed differt thorace convexiori non soveolato, elytris non nebulosis, sed macula alba scutellari notatis, pedibus totis testaceis, &c. Caput depresso nigrum, crebre punctulatum, limbo postico albo-squamoso; oculi brunnei sub-prominuli; rostrum brevius quam in priori, nigrum punctulatum, apice magis incrassatum. Antennæ crassiulæ ferrugineæ. Thorax antice angustior, compressus, truncatus, margine vix elevatiore, tuberculis duobus ut in priori armato; postice bi-sinuatus, supra modice convexus; sub-æqualis, niger, crebre & profunde punctatus, utrinque tuberculo valido acuto erinatus, dorso fere nudus, subtus & lateribus dense albo-squamulosus. Elytrorum forma, striæ & puncturae ut in præcedenti omnino, tota nigra, pilis vix vilibus raris adpersa, nebulis vero nullis cibetis contaminata; in basi suturæ macula ovata albo-

bo-squamosa. Corpus subtus nigrum punctulatum, dense albo-squamosum. Pedes elongati tenues ferruginei, femoribus apice paucis obscurioribus.

76. R. quadri-nodosus: niger, suturæ basi corporeque albido-squamosis, pedibus rufis, thorace profunde punctato, elytris que tuberculatis.

Habitat in arenosis aridis passim.

Descr. Præcedenti iterum similis & affinis, sed fere duplo minor, thorax profundius punctatus, elytra exterre tuberculata, &c. Caput nigrum, crebre & profunde punctatum, tenui cinereo-pubescentis, fronte depresso; oculi brunnei prominuli; rostrum & antennæ ut in præcedenti. Thorax ante angustior, margine, præsertim in medio adscendente, ibique sat profunde, sed non late emarginato, unde exstant tubercula duo approximata, perfecta, nec lateraliter deflexa ut in prioribus; postice vix sinuatus, supra convexus, æqualis, niger sub-nitidus, punctis magnis crebris profundis pertusus, & versus posteriora utrinque tuberculo parvo armatus, supra fere glaber; lateribus & subtus parte cinereo-squamosus. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora; humeris rotundatis, & illo triplo longiora; supra valde convexa, nigro picea; posterius saepe rufo-picea, profunde punctato-striata; interstitiis interioribus subrugosis, exterioribus tuberculis elevatis sub-acutis seriatim armatis; versus basin suturæ lineola angusta e squamulis albidis. Corpus subtus nigrum punctatum, squamulis albidis adpersum. Pedes mediocres, saturate rufo-testacei; ipsa basi femorum nigricante.

77. R. Comari: niger, supra cinereo-variegatus, subtus albido squamosus, antennis tibiis tarsi que testaceis, thorace canaliculato obsolete bi-tuberculato.

Circulio Cognari. Herbst. Col. 6. 4u. 393. Tab. 92. f. 6.

Habitat in pratis humentibus, praesertim in Comaro palustri, passim.

Deser. Statura & similitudo Rh. q.tuberculati, sed paullo minor, thoracis margo anterior muticus, &c. Caput sub-depressum nigrum, crebre punctulatum, postice cinereo-squamulosum, oculis brunneis prominulis; rostrum vix capite longius, crassum nigrum opacum, confertissime punctulatum. Antennæ capite cum rostro longiores, crassiusculæ, articulo primo pallido, crassiori & breviori quam in plerisque hujus generis, vix quartam partem totius attingente; secundo crasso ob-conico fusco, reliquis obscure ferrugineis, clava pubescente. Thorax antice angustior, truncatus, margine mutico, vix elevato, postice bi-sinuatus, supra parum convexus, niger, crebre subtiliter punctulatus, in medio canaliculatus, & tuberculo obtoleto laterali usque armatus; subtus & lateribus squamulis densis albidis tectus, quæ albide in medio laterali ramulum introsem emittit, unde discus niger inaequalis. quasi lobatus evadit; canalicula dorsalis etjani squamulis albidis repleta. Elytra thoracis base duplo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, supra convexa, nigra, sat profunde striata, sed in striis obsolete punctata, interstitiis convexis subtilissime coriaceis, squamulis cinereo-albidis, praesertim posterius & ad latera variegata.

Cor.

Corpus subtus dense albido-squamosum. Pedes elongati tenues, scutis nigris, tibiis tarsisque testaceis.

78. *R. pericarpius*: niger, sururæ basi corporeoque albido-squamofis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace obsolete bimaculato, elytrorum interstitiis subtiliter coriacis.

Fabr. Elevt. 2. 451. 65.

*Circulio pericarpius. Herbst. Col. 6. 401. 381.
Tab. 91. f. 12. Payk. fn. 3. 255. 75.*

Habitat in plantis variis, præsentim in foiliis Romicis, quas misere dévastat, ubique freqvens.

Deser. Mas Rh. didymo magnitudine æqualis; femina duplo major; cæterum ambo sexus in omnibus simillimi. Caput rotundatum nigrum, creberissime punctulatum, pilis minimis cinereis parce adspersum, fronte inter oculos depresso; oculi brunnescens prominuli; rostrum vix capite longius, crassum, arcuatum, nigrum, crebre subtiliter rugoso-punctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, ferrugineæ, articulo primo pallidiori. Thorax brevis transversus, antice angustior, truncatus, margine pallido-ciliato, in medio leviter emarginato, minime reflexo; postice bisinuatus, supra convexus, niger, creberrime & profunde punctatus, pilis minimis cinereis parce adspersus, in medio obsoletè canaliculatus, canali postice albido-squamoso; subtus & lateribus densius albido-squamosus; versus posteriora utrinque tuberculum laterale obtusum, valde obsoletum, Elytra thoracis basi vix di-

midio-

midio latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora; supra convexa, nigra opaca, profunde punctato striata, interstitiis planis subtiliiter rugulosis vel coriaceis; pilis squamulisque minimis depresso cinereis æqualiter adspersa, nullo modo variegata; in basi suturæ macula communis oblonga, niveo squamosa. Pectus & abdomen nigra punctata, squamis densis albidis testa. Pedes validi, obscure rufo-ferruginei, cinereo pubescentes.

Obs. Curc. pericarpins Cl. Linnæi potius ad Rhynch. Castorem Fabricij referendus; C. pericarpinus Panz. Fn. 42 f. 5. secundum figuram rostrum gerit longum, tenuem, quod nostro non competit.

79. R. inconspectus: niger, supra pube fulvo-cinerea variegatus, subitus cinereo-squamulosus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace acute bi-tuberculato.

Circulio inconspectus. Herbst. Col. 6. 405. 385.

Tab. 91. f. 15.

Circulio accipitrinus. Reich. Mant. i. s. 2.

Tab. 1. f. 1.

Habitat in humidis ad ripas passim, præfertim in Polygono Amphibio, quod saepe omnino devitat.

Deser. Praecedenti simillimus & valde affinis, sed major; mas prioris feminæ æqualis, semina adhuc duplo major, & ultra; pæterea thorace acutius bi-tuberculato, corpore variegato, habitatione, &c. distinctus. Caput rotundatum, rigum, crebre punctatum, pube brunnea seu cinereo palliente, sensu adpersum, fronte impressa; oculis nigro-brun-

brunnei prominuli; rostrum capite vix longius, crassum, arcuatum, nigrum, fusco-pubescent, crebre punctulatum, dorso sub-carinatum. Antennæ ut in priori omnino. Thorax latitudine brevior, anterius angustior, margine sub-elevato integro; postice bisinuatus, supra minus convexus, evidenter canaliculatus, niger, crebre & valde profunde punctatus, pube cinereo flavescente adspersus, lateribus & subtus, ut & in canalicula dorsali, squamulis flavescenti, cinereis tectus; versus posteriora utrinque tuberculum laterale elevatum, sub acuminatum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra convexa, rude crenato-striata, interstitiis rugosis; pilis squamulisque fusco-flavescentibus variegata; sutura lata subtilius coriacea, squamulis fusco-brunneis tecta. Corpus subtus nigrum punctatum, squamulis brunneo-cinereis, interdum flavescentibus, tectum. Pedes mediocres obscure ferruginei, cinereo-pubescentes.

go. R. Castor: niger, supra cinereo-nebulosus, futuræ basi corporeque albo-squamosis, pedibus ruso testaceis thorace bi-tuberculato antice reflexo, interstitiis elytrorum tuberculatis.

Febr. Elevt. 2. 451. 64.

Curculio fruticosus. Herbst. Col. 6. 400. 379.
Tab. 91. f. 10.

Curculio pericarpius. Linn. Syst. 2. 609. 31.
Fn. Sv. 602. dito v-r. Payk. fn. 3. 255. 75.
Curculio leucostigma Marsh. Ent. Br. 1. 255.
si. ♂ *Curc. melanostigma*, ibid. 256. 53.

Var

Var. b, supra niger, fere glaber, subtus parce albido - squamosus, pedibus rufis.

Circulio interstitialis. Reich. Mant. i. 6. 2. Tab.
1. f. 2.

Habitat in arenosis aridis, agris, ubique
freqvens.

Descr. Statura & summa affinitas Rh. pericarpii, sed paullo minor, thorax evidentius tuberculatus, margine antico elevato, elytra cinereo-variegata, interstitiis tuberculato-muricatis, &c. Caput, rostrum, antennæ, ut in Rh. pericarpio, sed frons & rostri basi dense cinereo-pilosa & squamulosa. Thorax anterius angustior, truncatus, margine elevato sub-reflexo, basi bi-sinuatus, supra posterius convexus; anterius transversim depresso, niger, crebre punctatus, in medio obsolete canaliculatus, tuberculo laterali elevato sub-acuminato utrinque armatus; lateribus, subtus, & in canalicula dorsalium squamulis albidis, saepe lutescenti aut ferrugineo-tinctis obductus, disco dorsali tenui cinereo-pubescente. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis; & illo plus triplo longiora, supra convexa, nigra. late & profunde striato-sulcata, striis crenato-punctatis, interstitiis angustis elevatis coriaceis, tuberculis sub-acuminatis seriatis praeterea exasperatis; superficies tota pilis & squamulis cinereo-albidis depressis nebulosa; sutura lata, subtilius coriacea, absqve tuberculis; ad basin macula communis oblonga e squamulis densis, aut niveis, aut paliide rufescentibus notata, dein nigra, pone medium iterum cinereo albida. Corpus subtus nigrum, crebre & profunde punctatum, squamulis densis, aut albidis, aut flavo-rufescentibus tectum. Pedes mediocres rufo-testacei, cinereo-pubescentes.

Var;

Var. b, quoad magnitudinem, structuram, et omnina simillima, sed supra fere nuda nigra. unde tuberculæ elytrorum evidentiora; subtus etiam parcus squamuſos, et pedes nitidius ruſi. forte detrita, et me judge, specie non distinguenda.

81. R. levocogaster: nigro-piceus, supra cinereo, subtus albido-squamulosus, perlibus testaceis fusco variegatis, thorace hinc tuberculato, antice elevato ferrugineo, elytris vix tuberculatis.

Curculio levocogaster. Marsh. Ent. Br. l. 253 45.
Habitat in arenosis aridis pessim, minus frequens.

Descr. Magnitudo, statura et summa affinitas praecedentis, differre tamen videtur, elytris vix, vel obsoletissime tuberculatis, apice rufo-piceis vel ferrugineis, suturæ basi obseura, absque macula albo-squamosa, etc. Caput, rostrum, antennæ, ut in praecedenti omnino; thoracis structura eadem, sed margino anticus reflexus, plerumque ferrugineus. Elytrorum forma etiam ut in illo, anterior nigro-picea, apicem versus rufo-ferruginea, profunde punctatostriata, interstitiis elevatis rugosis, vix vero tuberculatis, squamulis fusco-ferrugineis vel brunneis densis obsita, absque macula distincta albo squamosa in basi suturæ. Cipus subtus nigrum punctatum, parcus albido squamuſosum. Pedes elongati tenues testacei, femoribus clavatis, ante apicem insulcatis; summus apex tibiarum, et unguli, etiam nigricantes.

Obs. Variat elytrorum paga apicali rufa, oblique versus humerum adscendente.

Fa-

Familia 2:da, femoribus dentatis.

Sectio 1:a, Corpore oblongo.

82. *R. fuscō-maculatus*: niger, thorace profundius punctato, lateribus rotundato, elytris inæqualibus, maculis plurimis flavescenti-pilosis, femoribus obsolete dentatis.

Curculio fuscō-maculatus. Fabr. Eleut. 2. 537.
187. Herbst. Col. 6. 329. 304. Tab. 86. f. 2.
Payk. fn. 3. 184. 1.

Curculio Germanus. Linn. Syst. 2. 613. 58.
Marsh. Ent. Br. 1. 290. 153.

Habitat in Svecia Australi rarius.

Descr. Maximus fere nostratum, Rh. Arctico excepto; variat tamen magnitudine minori. Caput parvum retractum nigrum, parce punctulatum, fronte lineola impressa; oculi depresso brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassum, nigrum, crebre punctatum, stria lateralī utrinque impressum. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ nigrae, articulo primo longissimo clavato, reliquis fuscō pilosis. Thorax basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra convexus, niger, crebre et sat profunde punctatus, in dorso tamen, præsertim antice, obsoletius, lateribus vero confertissime rugoso-granulatus, ibique pilis rigidis depresso-favescens, in maculas tres irregulares condensatis, adspersus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra antice thoracis medio vix latiora, pone basia dilatata, apice rotundata, supra valde convexa. tota nigra, subtiliter coriaceo-rugulosa, maculis plurimis e pilis rigidis depresso-favescen-

vescentibus adspersa, quibus detritis, superficies fo-
veolis crebris rotundatis obsoletis impressa videtur;
elytra connata, absque alis. Corpus subitus fere pla-
num nigrum, granulato punctatum, pilis sordide fla-
vescentibus adpersum. Pedes longiusculi validi ni-
gri, femoribus clavatis, anterioribus fere muticis,
posticis dente obsoleto armatis.

83. R. Germanus: niger sub-nitidus, tho-
race subtiliter punctato, lateribus parum
rotundato, elytris æqualibus concinne co-
riaceis, parum flavescenti-maculatis, fe-
moribus acute dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 475. 1808.

Curculio Germanus. Herbst. Col. 6. 328. 303.
Tab. 86. f. 1. Payk. Fn. 3. 185. 2. Panz.
fn. 42. f. 16.

Curculio Anglicanus. Marsh. Ent. Br. 1. 290.
154.

Habitat in Scania; Hallandia, Farius.

Descr. Praecedenti simillimus et valde affinis, sed
plerumque dimidio minor, magis nitidus, thorax
subtilius punctulatus, postice vix angustior; femora
acute dentata, etc, Caput, oculi, rostrum et anten-
nae ut in praecedenti omnino. Thorax latitudine se-
re longior, basi spicque truncatus, et pilis fla-
vescentibus ciliatus, antice paullo angustior. lateribus
vix vel per-parum rotundatus, adeoque basi non an-
gustatus, supra convexus, niger sub nitidus, dorso
crebre, at subtiliter et concinne punctulatus, lineola
media angusta lævi; lateribus crebie subtiliter gra-
nulatus,

nulatus, utrinque maculis duabus, una supra alteram, e pilis rigidis flavescens ornatus. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma eadem, supra convexa, nigra sub-nitida, concinna coriacea, veluti squamulis imbricatis tecta, æqualia, nec foveis ut in priori impressa, maculis aut nullis, aut paucis tantum piloso-flavescens versus latera et postice adspersa; oblique inspecta, series nonnullæ e punctis impressis observantur, ut quodammodo punctato striata dici queant. Corpus subtus planum, nigrum sub nitidum, crebre punctulatum, abdomine utrinque serie e maculis piloso-flavescens decorato; pectus flavo pilosum. Pedes validi nigri, femoribus clavatis, omnibus dente valido acuminato-armatis.

84. R. colon: niger, squamulis pilisque cinereis tectus, thorace sub-carinato, postice dilatato, utrinque albo-lineato, elytris puncto disci albo.

Fabr. Eleut. 2. 441. 15.

Circulio colon. *Linn. Mant.* 2. 531. *Herbst. Col.* 6. 89. 50. *Tab. 65. f. 6.* *Payk. Fn.* 3. 223. 42. *Panz. fn. 42. f. 2.*

Var. *b*, lineis lateralibus thoracis, punctisque elytrorum flavescens. *Payk. l. c. var. b.*

Habitat in Sveciæ australis pratis humidis rarius.

Descr. Statura Rh. arundinis, sed multo major, Rh. abietis fere æqualis. Caput breve nigrum, subtiliter punctatum, dense cinereo-pubescent, foveola parva inter oculos impressum; oculi nigro-brunnei sat prominuli; rostrum thorace fere longius, crassifiscalum

uscum arcuatum nigrum, crebre punctatum, dorso carinatum, cinereo-pubescentes. Antennæ versus apicem rostri insertæ, crassiusculæ nigræ, cinereo-pubescentes. Thorax anterius multo angustior, supra parum convexus, sub-inæqualis, niger, crebre granulato-rugosus, dorso. præsertim antico carinatus, pube squamulisque cinereis tectus, linea laterali arcuata utrinque e squamulis pilisque albidioribus. Scutellum parvum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, et illo plus triplo longiora, apicem versus attenuata, supra parum convexa, nigra, sat profunde punctato striata, interstitiis subtiliter coriaceis; pube squamulisque densis bruneo cinereis seu cervinis, versus latera magis albicanibus, tecta; in medio disci cuiusvis elytri macula rotundata albido squamosa. Corpus subtus nigrum punctatum, cinereo pubescentes, abdominis lateribus utrinque serie e maculis cinereo-albidis deorsum pilosis. Pedes longiusculi nigri cinereo-pubescentes, femoribus subclavatis, ante apicem annulo albidiiori cinctis; femora antica semper, reliqua interdum dente parvo armata.

Var. b, differt tantum lineis thoracis punctisque elytrorum flavescentibus, e polline florum forte.

85. R. binotatus: niger, squamulis pilisque fusco cinereis tectus, thorace sub-carinato postice dilatato, utrinque albido-lineato, elytris puncto postico albicante.

Curculio bi-notatus. Fahr. Eleut. 2. 538. 190.

Ross. Mant. 1. 39. 97. Payk. fn. 3. 225. not.

Curculio semi-colon. Herbst. Col. 6. 151. 110.
Tab. 70. f. 5.

Habitat in Scania & Gotllandia, sub lapidi-
bus, tempore vernali, rarius. Dom. Wet-
terhall.

Deser. Præcedenti similis et affinis, sed paullo bre-
vior, poste ius magis obtusus, et vere distinctus.
Caput, rostrum et antennæ ut in præcedenti omni-
no. Thorax longitudine latior, anterius paullo an-
gustior, lateribus non nihil rotundatus, supra parum
convexus, niger, crebre granulato rugosus, dorso,
præsertim antico carinatus, pilis, squamulisque pili-
formibus depresso rigidis fusco cinereis parcus ob-
ductus; linea obliqua laterali utrinque e pilis albi-
dioribus. Scutellum ut in priori Elytra thoracis
basi paullo latiora, et illo plus triplo longiora, po-
sterius compressa, apice rotundata, dorso parum
convexa, nigra regulariter punctato-striata, pilis squa-
mulisque fusco-cinereis albidisque densius tecta et
variegata; versus posteriora, ubi callus solito exstat,
punctum cuneiforme e pilis densis albidiорibus, in
finguo elytro. Corpus subtus nigrum, paullo ma-
gis nitidum, crebre punctulatum, pube cinerea par-
cius adspersum, absque maculis lateralibus. Pedes
longiusculi validi nigri, cinereo-pubescentes, femo-
ribus obtuse dentatis.

85. R. Abietis: nigro-piceus opacus, flave-
scenti-pilosus, thorace antice coarctato,
elytris tenuius cancellato-striatis, intersti-
tis valde rugosis, fasciis macularibus flave-
scenti-pilosis.

Fabr. Eleut. 2. 464. 130.

Circulio Abietis. Linn. Syst: 2. 613. 57. Fn.
Sv. 615. De Géer. Ins. 5. 204. I. Tab. 6.

f. II.

J. II - 13. Herbst: Col. 6. 149. 108. Tab. 70.
J. 3. Payk. fn. 3. 186. 3. Panz. fn. 42. fn
14.

Curculio Pini. Marsh. Ent. Br. I. 289. 152.

Habitat in frondibus & ligno recenti Pini
& Abietis, vulgaris.

Deserit. Inter majores nostratum Rh. Pini triplo major: mas tamen femina dimidio minor et ultra. Caput breve, piceum, crebre rugoso-punctatum, pallido-pubescentes, fronte inter oculos impressa, fasciculo e pilis longioribus flavescentibus juxta oculos utrinque; oculi depresso-brunnei; rostrum longitudine thoracis, crassum, arcuatum, rufo piceum, cerebrime rugoso-punctatum, dorso carinatum, tenue pallido-pubescentes. Antennæ versus apicem rostri insertæ, et illo cum capite parum longiores, crassæ, rufo-piceæ pubescentes. Thorax latitudine longior, antice multo angustior, coarctatus, lateribus parum rotundatus, basi truncatus, supra minus convexus, nigro-piceus, confertissime profunde rugoso-punctatus, in medio obsolete carinatus, pilis longioribus depresso-rigidis flavescentibus, versus latera, et in linea dorsali, adspersus: Scutellum parvum triangulare nigro-piceum, tenue cinereo-pubescentes. Elytra thorace paullo latiora, et plus triplo longiora, supra convexæ, nigro-picea sub-opaca, striis minus latis crebre cancellatis exarata, quarum foveolæ oblongo-quadratae sat profunde impressæ, interstitiis confertissime rugoso tuberculatis. maculæ plurimæ e pilis longis rigidis depresso-rigidis flavescentibus; in fascias collatæ, quarum una ante medium obliqua, futuram non attingit, altera pone medium arcuata, fere transversa, et aliæ abbreviatæ irregulares, e maculis 3 s. 4 conflatae; ante apicem callus elevatus in quovis

elytro. Corpus subtus nigro-piceum punctatum, pilis rigidis flavescentibus adspersum, ad latera abdominis maculas formantibus. Pedes longiusculi validi nigro-picei, femoribus clavatis, omnibus dentes crasso acuminato armatis.

Obs. Descriptiones C. Pini et Abietis in Cl. Linnæi *Fauna Svecica*, errore quodam mutatæ, unde confusio orta.

87. R. Pinastri: nigro-piceus sub-nitidus, cinereo-pilosus, thorace lateribus rotundato, elytris profunde cancellato-striatis, interstiliis subtilius rugosis, fasciis macularibus albido-pilosis, pedibus rufis.

Habitat in fondibus & ligno Pini & Abietis, non in frequens.

Deser. Præcedenti simillimus et valde affinis, distinctus tamen videtur, duplo, imo triplo vel quadruplo minor, magis nitidus, thorace antice non coarctato, elytrorum striis latioribus, pedibus rufis, etc., nec unquam nisi similes inter se copulatos vidi. Caput, rostrum, antennæ ut in præcedenti, sed color dilutius rufo-piceus, magis nitidus. Thorax latitudine medii vix longior, antice non nihil angustior, non vero coarctatus, lateribus æqualiter rotundatus, supra parum convexus, crebre, sed minus profunde rugoso-punctatus, nigro-piceus, pilis longioribus depresso-cinereis parce adspersus. Scutellum parvum rotundatum nigrum, pilis longioribus densis albidis tectum. Elytrorum forma ut in præcedenti omnino, supra convexa, nigro-picea subnitida, interdum rufo-picea, striis cancellatis, respectu magnitudinis Insesti, latioribus et profundioribus quam in priori, interstiliis

terstitiis planis, multo subtilius rugulosis; maculae et pīis depresso-albidis fascias duas formant, interiectis aliis sparsis, fere ut in priori. Corpus subitus nigro-piceum punctatum, parce cinereo-pilosum. Pedes elongati rufo-ferruginei, femoribus clavatis, acute dentatis.

88. R. Lapathi: gibbosus niger opacus, thoracis lateribus, elytrorum fascia baseos apiceque ab eo squamosis, thorace elytrisque atro fasciculatis.

Fabr. Eleut. 2. 466 140.

Curculio Lapathi. Linn Syst. 2. 608. 20. Fig.
Sv 591. Herbst. Col. 6. 153. III. Tab. 70.
f. 6. Payk. fn. 3. 187. 4. Panz. fn. 42. f.
15.

Curculio albicaudis. De Geer Ins. 5. 223. 16.
Tab. 7. f. 1, 2.

Habitat in Rumice acuta, Alno, Salice, minus frequens.

Deser. Rh. Equiseti facie et statura similiis, sed duplo major. Caput rotundatum nigrum punctatum, fronte squamis erectis atris muricata; oculi brunnei parum prominuli; rostrum thorace fere longius, minus crassum, valde arcuatum, nigrum, basi carinatum, rugoso punctatum, apice laxe nitidum. Antennae rostro cum capite vix longiores, fusco-ferrugineae. Thorax transversus, antice coarctatus, lateribus rotundato-dilatatus, basi bilobatus, supra parum convexus, crebre rugoso punctatus, in medio carinatus, tuberculis duobus marginis antici, et tribus majoribus ante medium transversim positis, e squa-

mis erectis atris; dorso niger, lateribus et subtus dense albo squamosus. Scutellum rotundatum nigrum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, et illo fere quadruplo longiora, posteriorius attenuata, supra valde convexa, apicem versus declivia, callo protuberante instructa, nigra, profunde punctato-striata, intersticiis creberrime rugulosis; ab humero ad humerum fascia albo-squamosa inaequalis arcuata, fere semi-circularis, ad suturam sub-interrupta, et apex totus late albo-squamosus; in intersticiis alterpis a futura anterius series e tuberculis atro-squamosis. Corpus subtus nigrum, pectore-crebre punctato albo squamoso, ventre in medio parce punctato, fere nudo. Pedes elongati nigri, femoribus anticis ultra medium, reliquis annulo albo-squamosis; femora omnia maris bi-dentata, posteriora feminæ fere mutica,

89. R. vorax: fusco-piceus, cinereo-pubescentia, rostro longissimo tenui arcuato atro, striato; elytris ferrugineo cinereoque variegatis, pedibus tenuibus ferrugineis, anticis elongatis.

Fabr. Eleut. 2. 491. 251.

Curculio vorax. Herbst. Col. 6. 165. 123. Tab. 71. f. 4. Payk. fn. 3. 189. 5. Panz. fn. 18. f. 13.

Curculio longimanus. Marsh. Ent. Br. 1. 293. 161.

Habitat in Svecia meridionali rarius.

Desc. Rh. tortrice let tremulæ similis et effinis, sed major, præsertim longior, rostro multo longiori et tenuiori, pedibus anticis elongatis, &c. distinctus.

Cepat

*C*aput parvum rotundatum fusco-piceum punctulatum, dense cinereo-pubescent, oculis depresso nigro-brunneis; rostrum dimidio corpore fere longius, tenuissimum, valde arcuatum, nigrum, sat profunde striatum, striis utrinque tribus, obsolete punctulatis, interdum apice ferrugineum. Antentæ rostro cum capite fere longiores, tenuissimæ, ferrugineæ, articulo primo longissimo, reliquos simul sumtos superante. Thorax brevis transversus, antice cito coarctatus, transversim obsolete impressus, lateribus dilatato rotundatus, basi sub-truncatus, supra disco modice convexus, fusco-piceus, crebre subtiliter punctulatus, dense cinereo pubescens, lineis tribus dorsibus obscurioribus, magis denudatis; margo anticus et posticus sœpe dilutius rufo-ferruginei. Scutellum parvum fusco-ferrugineum pubescens. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, humeris prominulis, sed illo quintuplo longiora, supra parum convexa, fusco ferruginea, disco longitudinali et externe maculis disformibus coherentibus nigro fuscis inquinata, pube cinerea hinc illinc densiori variegata; regulariter punctato-striata, intersticiis subtilissime coriaceis. Corpus subtus fusco piceum, subtiliter punctulatum, cinereo pubescens, abdominis lateribus quoque dilutius ferrugineis. Pedes elongati, tenues obscure ferruginei, genubus nigro fuscis, antici maris longissimi, femoribus tenuibus rectis; feminæ paulo breviores, crassiores, omnibus in utroque sexu denticulo armatis.

90. R. Tremulæ: fusco-ferrugineus, cinereo-pubescent, rostro longo tenui arcuato atro, sub-striato, elytris cinereo-fusco que variegatis, pedibus mediocribus.

Curculio tremulæ. Payk. fn. 3. 189. 6.

Vari

Var. b, Capite, thoracis fascia media, elytrorum disco, pedibusque fusco-piceis,

Fabr. Eleut. 2. 492, 253.?

Circulio tenuiatus. Herbst. Col. 6. 271. 243.
Tab. 30. f. 12.

Circulio maculatus. Marsh. Ent. Br. 1. 292,
158.

Circulio fumosus. Ross En. Etr. 1, 124. 317.

Habitat in foliis & truncis Populi tremulæ,
p. s. sim.

Descr. Rh. tortrice magnitudine fere æqualis, paullo tamen longior, minus convexus. Caput parvum rotundatum fusco-ferrugineum, subtiliter punctulatum, cinereo-pubescent, fronte impressa; oculi depresso brunnei; rostrum longitudine fere dimidi corporis, atrum, nitidum, valde arcuatum, obsoletius striatum. Antennæ pallide testaceæ, tenues, structura ut in p. r. e. c. e. d. e. n. t i. Thorax brevis transversus, ante parum coarctatus, obsoleto transversim impressus, lateribus valde dilatato-rotundatus, basi truncatus, supra disco posteriori convexus, fusco-testaceus, aut totus, aut plaga magis fusca utrinque notatus; subtiliter punctulatus, in medio fere laevis, dense cinereo pubescens, lineis tribus magis denudatis. Scutellum parvum fusco-testaceum. Elytra thoracis medio parum latiora, sed illo quadruplo longiora, supra minus convexa, punctato striata, fusco-ferruginea, maculis difformibus sparsis, minus confluentibus nigro fuscis sub nudis, aliisque cinereo-pubescentibus; crebre marmorata. Corpus subtus fusco-ferrugineum punctulatum, cinereo pubescens, pectore obscuriori. Pedes mediocres rufo-ferruginei, fe-
goribus elevatis, genubus nigro-fuscis.

Var. b;

Var. b, tantum colore obscuriori differt; Caput fuscum, thorax fusco piceus, antice posticeque rusofestaceus; elytra fusco-picea cinereo-marmorata, sutura margineque fusco-ferrugineis; ante apicem punctata duo albidiora, unum pone alterum. Pectus & abdominis basi fusco picea; cæterà ut in priori.

Obs. Utrum Rh. tremulæ Cl. Fabricii loc. cit. ad varietatem nostram b, vel ad Curc. affinem Paykulli pertineat, ex descriptione insufficienti vix dijudicari queat; Curc. tæniatus Herbstii loc. cit. ob rostri longitudinem, colorem &c. melius huic quam Rh. tæniato Fabr. concordat,

91. *R. tortrix*: pallide testaceus sub-nitidus immaculatus, tenuissime pubescens, pectore fusco, rostro mediocri parum arcuato, elytris convexioribus.

Fabr. Eleut. 2. 491. 252.

Curculio tortrix. Linn. Syst. 2. 615. 67. *Fns* Sv. 622. Herbst. Col. 6. 155. 113. Tab. 70. f. 8. Payk. fn. 3. 192. 9. Panz. fn. 18. fo 14.

Curculio fulvus. De Géer Inf. 5. 214. 6.

Var. b, corpore saturatius ferrugineo, pectore nigricante. Payk, loc. cit. var. b.

Habitat in foliis & truncis Populi tremulæ, sat frequens.

Descr. Medius. Corpus totum pallide testaceum nitidum, interdum flavescens, pube tenuissima concolori parse adpersum, Caput parvum rotundatum, crebre

crebre punctulatum, fronte impressa; oculi nigro-brunnei parum prominuli; rostrum vix longitudine dimidij corporis, tenue; minus arcuatum quam in prioribus, pallidum, nitidum, apice ipso fuscum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, tenues, totæ pallidæ. Thorax brevis transversus, antice subito coarctatus, transversim impressus, lateribus rotundatus, basi truncatus; supra modice convexus, sat crebre punctulatus, leviter carinatus. Scutellum rotundatum concolor pubescens. Elytra thorace vix dimidio latiora, sed plus quam quadruplo longiora, supra modice convexa, tota pallide testacea, concinne punctato-striata, intersticiis omnium subtilliissime obsolete punctulatis. Pectoris lamina fusco picea, densius pallido pubescens; reliquum corpus pallide testaceum, subtiliter obsolete punctulatum. Pedes flavo testacei nitidi, femoribus clavatis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis saturatius rufo-ferrugineo, pectore nigrante.

92. *R. affinis*: niger; densius cinereo-pubescent, antennis pedibusque obscure ferrugineis, rostro crassiori rugoso, thorace brevissimo, elytris ferrugineo cinereoque variegatis.

Cervulio affinis. Payk. fn. 3. 190. 7.

Var. b, corpore pallidiori, fusco-variegato.

Habitat in Populi tremulæ foliis & truncis, sat frequens.

Deser. Rh. Tremulæ simillimus, plerumque paulo minor; rostro multo breviori, crassiori, rugoso; pæcipue distinctus; Caput parvum rotundatum nigrum,

gram, vel fusco-piceum, crebre punctulatum tenuē pubescens, fronte longius cinereo-villosa; oculi depresso nigro-brunnei; rostrum vix capite cum thorace longius, crassum, parum, arcuatū, nigrum, carinatum, crebre et sat profunde longitudinaliter rugosum et striatum, versus basin supra cinereo-pilosum. Antennæ rostro cum capite longiores; crassiœculæ, ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax brevissimus transversus, antice posticeque paullō angustior, lateribus rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra parum convexus, niger, crebre evidenter punctatus, in medio leviter carinatus, pube longiori depresso cinerea testus, lineis tribus dorsalibus, puncto que extra lineas utrinque obscurioribus, denudatis; margo anticus & posticus saepè ferruginei. Scutellum parvum nigrum, cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra parum convexa, nigra, punctato-striata, pube densa depresso cinerea testa, maculis punctisque plurimis denudatis oigro-fuscis marmorata; humeri, sutura & latera elytrorum saepè ferruginea. Corpus subtus saturatius nigrum punctulatum, parcus cinereo pubescens, margine summo ventris saepè rufopiceo. Pedes validi, plerumque obscure ferruginei, interdum dilutius rufescentes, femoribus clavatis acuti dentatis, tibiis basi nigro-fuscis.

Var. b, colore dilutioni tantum differt; thorax antice posticeque latius testaceus; elytra ferruginea fuso & cinereo variegata; venter, præsertim posterioris, fusco-testaceus, cætera ut in a.

93. R. tæniatus: fusco-piceus; pedibus testaceis, thorace postice sub-angustiori, basi apiceque testaceo, elytris pallidis fusco-maculatis, rostro crassiori rugoso.

Fabr. Eleut. s. 492. 255.

Curculio tæniatus. *Payk. fn. 3. 191.* 8.

Var. *b*, niger, thorace rufo, parum fusco-maculato, elytris rufo-ferrugineis, fusco-cinereoque nebulosis, pedibus rufis.

Var. *c*, plus duplo minor, niger, cinereo-pubescent, ferrugineo fuscoque variegatus, pectore albido - villoso.

Curculio effinis, usr. pygmaea. *Payk. fn. 3. 191* 8.

Habitat in foliis Salicum. passim, minus frequens; var. *c*, in Salicibus Bothniæ & Lapponiæ. *Dem. Haft.*

Descr. Praecedenti simillimus & valde affinis, sed paullo minor, thorax paullo longior & postice angustior, pedes unicolores, &c. Caput parvum rotundatum fusco piceum punctatum, fronte impressa cinereo pubescente; oculi depressi nigro-brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassifuscum nigrum; parum arcuatum, carinatum & striatofrugosum, ore rufescente. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ ferrugineæ, clava fuscescente. Thorax brevis, antice nonnihil coarctatus; lateribus ante medium rotundato-dilatatus, posterius angustior, supra parum convexus, in medio transversum fusco piceus, antice angustius, postice late inæqualiter testaceus, undique obsoletius punctatus, pube cinerea adspersus. Scutellum parvum piceum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra parum convexa, punctato-striata, pallidius testacea, pube depressa cinerea, maculisque irregularibus fuscis dehudatis variegata. Corpus subtus nigro-piceum punctulatum, parce pubescens, ano fusco ferrugineo. Pedes breviusculi variati, pallide rufo-testacei immaculati.

Var.

Var. b, colore saturationi tantum differt; caput & rostrum nigra; thorax rufo-ferrugineus, in medio plus minusve infuscatus; elytra obscure ferruginea, nigro cinereoque variegata; corpus nigrum; pedes rufo-testacei.

Var. c, magis diversa, fere triplo minor, sequenti æqvalis; caput nigrum; rostrum rugosum-piceum. apice rufum; thorax niger, antice & postice anguste ferrugineus, pube longiori albidiori tectus; lineis tribus dorsalibus, punctoque laterali utrinque, denudatis; Elytra fusco-ferruginea, plaga magna longitudinali nigra vel fusca in disco interiori, maculisque sparsis albido pubescentibus, variegata; pes nigrum, dense albido pubescens; abdomen rufo-piceum; pedes obscure ferruginei.

Obs. var. c, ob thoracem longiorem, posterius angustiorem, potius hinc quam praecedenti speciei ad socianda; forte tamen propria species.

94. *R. majalis*: niger, cinereo-pubescent; thorace, elytris, antennis, pedibus quoque ruto-ferrugineis, rostro crassiori rugoso; elytrorum disco fulco-nebuloso.

- Var. b, thorace macula disci nigra.

Var. c, rostro dimidiato-ruso, elytris rufo-testaceis, futura nigra.

Curculio majalis. Payk. fn. 3. 251. 71.

Var. d, thorace, elytris pedibusque flavescentibus, ab domine flavescente, basi fulco.

Habitat in floribus Salicis cinereæ, in mense Majo & Junio, passim.

Descr.

Descr. Parvus, Rh bipunctato æqualis, ceterum præcedentibus similissimus; & valde affinis. Caput parvum; rotundatum, nigrum, crebre punctulatum, tenui pubescens, oculis depresso nigro-brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, parum arcuatum, nigrum, crebre rugosum, ore rufescente. Anteriorre rostro cum capite paullo longiores, crassiusculæ, rufæ, clava obscuriori. Thorax latitudine brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra parum convexus, totus undique rufo-testaceus, sat crebre punctatus, linea dorsali media sub-lævi, pube longiori cinerea depressa adspersus. Scutellum punctiforme fusco-testaceum. Elytra thoracis bali dimidio latiora & quadruplo longiora, supra modice convexa, rufo-testacea, punctato-striata, pube cinerea depressa variegata, interjectis in disco interiori cunjunctis elytri, maculis irregularibus fusco-dengatis. Pectus & abdominis basis nigra, punctata, pubescens, ano rufo-testaceo. Pedes mediocres, toti rufo-testacei, femoribus crassis, clavatis, plerumque denticulo piloso armatis, posterioribus interdum muticis.

Var. b, differt tantum thorace macula vel lineola media nigro-fusca notato.

Var. c, paullo pallidior; rostrum ab apice ultra medium rufum; elytrorum sutura plus minusve infuscata.

Var. d, adhuc pallidior: caput & rostrum fusco-picea; pectus & abdominis basis fusca; elytrorum discus parum fusco-irroratus; cætera omnia pallida sen flavescentia; forte nuper exclusa.

95. R. pectoralis: rufo-testaceus, cinereo-pubescent, pectore nigricante, rostro longiori punctato, apice fusco, elytris cinereo

reo fuscoque variegatis, femoribus clavatis acute dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 490. 246.

Curculio pectoralis. Panz. fn. 36. f. 16.

Curculio rubellus. Marsh. Ent. Br. 1. 293. 162.

Var b, rufo-testaceus totus, rostri apice oculisque tantum fusco-brunneis.

Curculio melanophthalmus. Payk. fn. 3. 196. 13.

Var. c. corpore toto pallido seu flavescente.

Rhynchænus arcuatus. Fabr. Eleut. 2. 490. 248.

Curculio arcuatus. Panz. fn. 18. f. 6. Crit. Rev. 1. 129.

Habitat in foliis Salicis capreæ, passim.

Descr. Statura & affinitas precedentium, Rh. Majali duplo major, rostro longiori, tenuiori, rufo, femoribus acute dentatis, distinctus. Caput parvum rotundatum, rufo-testaceum, obsolete punctulatum, fronte impressa cinereo-pubescente; oculi depresso brunnei; rostrum capite cum thorace longius, magis tenue quam in prioribus, arcuatum, rufo-testaceum, nitidum, basi striato-punctatum, ore fusco-brunneo. Antennæ rostro cum capite longiores, cressusculæ, rufo-testacea. Thorax antice abrupte contractus, ante spicem transversim impressus, lateribus rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra modice convexus, totus rufo-testaceus, crebre & sat profunde punctatus, pube cinereo-testacea, depressa, adspersus. Scutellum punctiforme testaceum. Elytra thorsæ dimidio latiora, & illo sere quintuplo longiora, supra modice convexa, sat profundè punctata-striata, pube densiori magis rigida cinereo-al-

bicante variegata, & in disco maculis nonnullis fusco denudatis obfoletis contaminata. Pectus aut nigro-fuscum, aut fusco-piceum, punctatum, cinereo-pubescent; abdomen taurate rufo-ferrugineum, basi media plus minusve fuscescente. Pedes toti rufo-testacei, femoribus crassis, dente valido armatis.

Var. b, differt tantum pectore elytrorumque disco, reliquo corpore concoloribus.

Var. c, corpore toto pallido seu flavescente diversa, forte nuper exclusa; Elytra pube cinerascente variegata, ut in prioribus, ideoque descriptio Cl, Fabricii satis conveniens.

96. *R. semi-cylindricus*: linear-elongatus niger, cinereo-pubescent, antennarum basi tarsisque ferrugineis, elytris punctato-striatis, femoribus obsolete dentatis.

Curculio semi-cylindricus. Marsh. Ent. Br. 1.
294. 164.

Habitat in aridis pratorum sylvestrium, rarius.

Descr. Statura elongata & magnitudo Rh. T. albi. Caput rotundatum nigrum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens, oculis depresso brunneis; rostrum maris vix thorace longius, arcuatum, nigrum, subtiliter punctulatum; feminæ longius, magis tenue, valde arcuatum, lœve, nitidum. Antennæ capite cum rostro paullo longiores, fusco-ferrugineæ, clava ovata nigricante. Thorax antice paullo angustior, & juxta apicem striga tenui transversæ impressus, basi apiceque truncatus, supra parum convexus. æqualis, totus niger, subtiliter & obfoletius rugoso-punctatus. pube tenui depresso cinerea adspersus, Scutellum triangulare nigrum, densius cinereo-

nereo pubescens. Elytra thoracis basi vix latiora, sed triplo longiora, linearia, supra modice convexa, nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter rugulosis, pube cinerea depressa adspersis; apex elytrorum interdum rufo-piceus. Corpus subitus nigrum, crebre & sat profunde punctatum, tenue cincto pubescens. Pedes breviusculi, validi, nigri, femoribus crassis, anticis dente parvo armatis, posterioribus saepius muticis,

97. R. Violaceus: nigro-cœrulescens, subglaber, elytris posterius latioribus, cyanis, tenue punctato-striatis, interstitiis seriato-granulatis, capite convexo, sublaevi.

Fabr. Eleut. 2. 486. 227.

Curculio violaceus, Linn. *Syst.* 2. 614. 63. *Fn.* 579. *De Géer Ins.* 5. 213. 5. *Herbst.* Col. 6. 71. 34. *Tab.* 64. f. 4. *Payk. fn.* 3. 195. 12. *Panz. fn.* 42. f. 20.

Var. b, elytris purpurasceni-violaceis. *Payk.* l. c. var. b.

Habitat in Pini Sylvestris frondibus & tusionibus non infrequens.

Descr. Magnitudo valde variat: majores Rh. Pini fere æquales; alii duplo, imo triplo minores, Rh. Pruni æquales et similes. Caput breve, rotundatum, nigro-cœrulescens, vix, vel obsoletissime subtiliter punctulatum. fronte inter oculos profunde impressa; oculi depresso brunnei, post mortem saepè albido-glaucescentes; rostrum vix longitudine capitis cum thoraee, porrectum, arcuatum, tenui, ni-

grum, nitidum; feminæ subtilissime, maris paullo evidenter punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, basi tenues, piceæ, exterrsum nigrae, clava magna oblongo-ovata. Thorax antice subito coarctatus & depresso, postice profunde bisinuatus, angulis lateraliter reflexis, productis, supra posteriorius convexus, nigro cœrulescens, opacus, creberissime & sat profunde punctatus. Scutellum oblongum, nigro cœrulescens. Elytra thorace vix dimidio latiora, sed illo plus triplo longiora, posterioris nonnihil dilatata, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, minus profunde punctato-striata, intersticiis planis. Singulo serie simplici e tuberculis parvis, certo sita punctoribus; aut late cyaneæ, aut nigro-cœrulecentes. Pectus nigrum, punctatum, versus latera cinereo-pubescentes; abdomen nigro-virescens, vix, vel obsoletissime punctulatum. Pedes validi nigri, per se cœrulecentes, femoribus omnibus acute dentatis.

Var. b. differt tantum colore, præsertim elytrorum, purpurascenti violaceo.

98. R. Phlegmaticus; nigro-cœrulescens, sub-glaber, elytris cyaneis, posterius latioribus, tenue punctato-striatis, intersticiis crebre punctatis; capite elongato, subdepresso, punctulato.

Circulio phlegmaticus. Herbst. Col. 7. 6. 567.

Tab. 96. f. 1. A.

Habitat in frutetis passim.

Descr. Magnitudo, statura & color ut in præcedenti, cui valde affinis, sed diversus videtur, capite angustiori, depresso, punctulato; thorace longiori, antice transversim impresso, margine elevato, ely-

elytrorumque intersticiis crebre punctulatis, &c. Caput oblongum angustum, sub conicum, depresso, nigro cœruleo-sens, creberrime subtiliter punctulatum, oculis magnis, prominulis, pallide brunneis; rostrum & antennæ ut in præcedenti. Thorax latitudine longior, antice coarctatus, & juxta apicem sat profundè transversim impressus, margine apicis levato, sub-reflexo; postice bisinuatus, angulis reflexis; supra parum convexus, fere planus, nigro-cœruleo-sens, interdum virescens, creberrime punctatus. Elytrorum forma, color & striæ ut in præcedenti, sed intersticia crebre, evidenter punctulata. Corpus & pedes ut in priori omnino.

Variat rarius colore totius corporis fere nigro, lateribus elytrorum tanquam cœruleo-scentibus,

99. R. Cerasi: ater opacus, thorace brevi mutico punctatissimo, elytrorum intersticiis creberrime granulato-coriaceis, rostro breviori cylindrico, femoribus obsolete dentatis.

Curculio Cerasi. Linn. Syft. 2. 607. II. Fn.
Sv. 583. Herbst. Col. 6. 68. 32. Tab. 64. f.
1. femina. Payk. fn. 3. 193. 10. fem.?

Rhynchænus carbonarius. Fabr. Eleut. 2. 485.
224.

Curculio carbonarius. Panz. fn. 42. f. 18?

Habitat in foliis Cerasi & Pruni, minus frequens.

Descr. Statura præcedentigm, Rh. Pruni paulo major, crassior, Rh. Raina, in: o 17 anna simillimus; antennarum clava multo breviori, rectro longiori.

giori arcuato et femoribus sub-dentatis, fere unice ab illo distinctus. Caput rotundatum, convexum, atrum, opacum, obsolete punctulatum, fronte impressa; oculi depresso brunnei; rostrum fere longitudine thoracis, crassiusculum, cylindricum, arcuatum, atrum, sub-nitidum, obsolete punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, nigrae, basi tenues, clava magna, oblongo ovata, acuminata, pubescente. Thorax brevis, transversus, artice contractatus et depresso, lateribus valde dilatato-rotundatus, postice profunde bisinuatus, angulis exterioribus reflexis, acuminatis; supra disco fere planus, versus margines undique declivus, totus sfer opacus, confertissime et sat profunde rugoso punctatus. Scutellum rotundatum, depresso nigrum. Elytra antice thoracis medio vix latiora, posterius nonnihil dilatata, thorace plus triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra dorso parum convexa, lateribus declivia, tota atra opaca, concinne striata, et in striis punctata, interstitiis planis confertissime granulato-rugosis. Corpus subtus nigrum, opacum, crebre obsoletius punctatum. Pedes longiusculi validi nigri, femoribus clavatis, denticulo parvo, saepe obsoleto, armatis.

Obs. Synonima Cl. Linnæi et Herbætii certa mihi videntur; figura Panzeri l. c. etiam nostrum exprimit, sed dentes femorum nimis validi; Cerc. Cerasi Payk l. c. femina, dubie allegatus, quia femora acute dentata, et elytra sub-nitida describuntur.

100. R. Stygius; ater, opacus, thorace sub-quadrato, antice utrinque dentato, parcus punctulato; elytrorum interstitiis subtilissime coriaceis; rostro brevi, lato; femoribus acute dentatis.

Curculio Stygius, Marjh. Ent. Br. 1. 294. 165.

Rhynchænus Ceraci. Fabr. Eleut. 2. 486. 226.

Curculio Cerasi, mas. Herbst. Col. 6. 68. 32.

Tab. 64. f. 2. Payk. fn. 3. 193. 10. ? Panz.
fn. 42. f. 19. ?

Habitat in soliis Pruni Cerasi, rarius.

Descr. Magnitudo et statura præcedentis, cui etiam in plurimis simillimus, sed thoracis restrique structura, ut et femorum dentes validi, nimis differunt; num ejus mas, ulterior experientia docbit. Caput parvum, rotundatum, parum convexum, atrum, opacum, obsolete punctulatum, oculis magnis, depresso, glaucis; rostrum thorace brevius, crassum, apice dilatatum, supra planum, atrum, rugoso-punctatum. Antennæ rostro cum capite multo longiores, crassissimæ, piceæ, clava ovata nigra. Thorax sub-quadratus, antice ad ipsum marginem non nihil coarctatus et transversim depresso, lateribus fere rectis, anterius juxta angulum dente majori, et crenulis 2 s. 3 minutis, armatus, postice perparum sinuatus, angulis vix prominulis; supra modice convexus, ater, opacus, subtiliter et parcus punctulatus. Elytrorum forma et color ut in priori, sed minus profunde punctato striata, interstitiis planis subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum. Pedes validi, nigri, femoribus crassis, omnibus dente valido, acato, armatis.

Obs. Figura Panzeri antennas flavescentes, et spinam thoracis versus medium lateris sitam, representant, quod in nostro non ita.

101. R. Carbonarius: niger, sub-nitidus,
glaber, thoracis lateribus crenulatis; ely-

trorum striis cancellatis, interstitiis convexis sub-lævibus, femoribus acute dentatis; rostro longiori arcuato.

Curculio Carbonarius. Linn. Syst. 2. 612. 48.
Fn. Sv. 614. Herbst. Col. 6. 70. 33. Tab.
64. f. 3. Payk fn. 3. 194. n?

Rhynchænus aterrimus. Fabr. Eleut. 2. 486.
225.

Curculio atramentarius. Marsh. Ent. Br. 1.
293. 163.

Habitat in foliis Sorbi, Betulæ, Coryli,
non infreqvēns.

Descri. Statura Rh. violacei; magnitudo pāmodo valde variat, ac in illo, Caput rotundatum pigrum, obsolete punctatum, oculis depresso brunneis; rostrum longitudine fere capitis cum thorace, cylindricum, arcuatum, nigrum, subtiliter punctatum. Antennæ vix rostro cum capite longiores, pigræ, basi tenues, capilla oblongo-ovata, cinereo-pubescente. Thorax in medio vix longitudine latior, apice coarctatus et transversim depresso, lateribus dilatato rotundatus, basi-bifinguatus, anguis reflexis acuminatis; supra modice convexus, sub-pulvinatus, totus niger, crebre et profunde reticulato-punctatus, linea media lævi abbreviata; ante medium marginis utrinque denticulus parvus acuminatus, et pone illum crenulæ aliquot, sensim minores, jam evidentes, jam minutæ et fere obsoletæ. Scutellum triangulisre depresso nigrum. Elytra antice thoracis medio parum latiora, humeris prominatis, pone medium nonnihil dilatata, thorace fere quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, nitida, profunde

funde striata, striis cancellatis, seu punctis striarum intervallo transversali angusto, elevato, distinctis; interstitiis striarum convexis, sub levibus, vel subtilissime transversim strigosis. Corpus subrufum nigrum, parce et obsoletissime punctulatum. Pedes longiuscui i nigri, femoribus clavatis, dente valido armatis, praesertim in anterioribus.

Obs Curculio aterrimus Cl. Linnæi, certe Apion, et verosimile Apion Sorbi, mas, antea p. 43. n:o 10.

102 R. atratus; niger, sub-nitidus, glaber, thoracis lateribus, crenulatis, elytrorum striis cancellatis, rostro brevi, crasso, apice dilatato, antennis crassis.

Curculio aterrimus. *Herbst. Col. 6. 72. 35. Tab. 64. f. 5.*

Habitat in frutetis passim; praesertim in floribus Pruni Spinosa & Crataegi oxyacanthæ.

Deser. Minoribus praecedentis individuis æqualis, et ut ovum ovo simillimus, modo antennarum et rostri structura distinctus. Caput et oculi ut in praecedenti; rostrum capite parum longius, crassum, sub rectum, apice dilatum, ibique supra planum, sulculo abbreviato impressum, totum nigrum, opacum, obsoleto rugoso punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, valde crassæ, nigræ. articulo primo etiam crasso, vix tertiam partem totius attinente clava valde elongata, articulata, utrinque attenuata, fusca, cinereo-pubescente. Thorax, elytra corporis, pedes, quoad minimum punctum, ut in praecedenti omnino; an modo Sexu distinctus?

103. R. Pomorum: fusco-piceus, cinereo-pubescent, elytris ferrugineis, fascia posticâ obliqua albida, nigro-inclusa; scutello niveo; rostro tenui arcuato.

Fabr. Eleut. 2. 491. 250.

Curculio Pomorum, *Linn. Syst.* 2. 612. 46. *fn.*
Sv. 612 *Herbst. Col.* 6. 157. 115. *Tab.* 70. *f.*
ii. *Payk. fn.* 3. 199. 16.

Var. *b*, triplo minor, elytris obscurioribus.

Curculio incurvus *Panz* *fn.* 36. *f.* 17. *Crit. Rev.* 1. 129.

Habitat in floribus Pomonæ, quas destruit; hibernat sub cortice Pyri mali; var. *b*, in foliis Pruni Padi, ad Alingsåhs Westrogothiæ, copiose lectus.

Descr. Rh. druparum plerumque paulo minor, et in Elytris minus convexus. Caput parvum rotundatum, nigro-piceum, punctulatum, dense cinereo-pubescent, fronte impressa; oculi globosi nigro-brunnei; rostrum feminæ longitudine fere dimidii corporis, tenui, arcuatum, nigro-piceum, subtilissime punctulatum, fere glabrum; maris paullo brevius & crassius, basi magis pubescens, evidentius punctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, ferrugineæ, articulo primo longissimo, clava parva, fusca. Thorax antice multo angustior, & juxta apicem transversim impressus, margine sub-elevato; postice leviter bi-sinuatus, supra parum convexus, crebre punctatus, rufo piceus, in disco obscurior, linea lata media, aliaque utrinque laterali arcuata, dense cinereo-villosis. Scutellum parvum, valde elevatum, rotundatum, niveo-villosum, Elytra thoracis

racis basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra parum convexa, fusco-ferruginea, punctato striata, dense cinereo-pubescentia; juxta scutellum macula oblonga fusco-brunnea; in medio fascia ejusdem coloris, denudata, valde obliqua, & posteriorius alia sub-transversa, obsoletior; spatium inter fascias densius albido villosum, fasciam introrsum angustatam format, punctis marginalibus adhuc albidioribus utrinque notatam. Corpus subtus nigrum, punctatum, longius cinereo pubescentis, segmentis posterioribus ventris plerumque ferrugineo marginatis. Pedes elongati rufo-ferruginei. femoribus clavatis, in medio infuscatis, anticis longioribus & crassioribus dente maximo, valido, acuto armatis; dens reliquorum femorum multo minor, obsoletior.

Var. b, fere triplo minor; elytra magis fusca, humeris & lateribus tamen ferrugineis; fascia postica obsoletior, pube flavescente obducta; cæterum simillima, vix specie distincta;

104. R. Ulmi: rufo-testaceus, sub-pubescentis; capite, rostro tenui arcuato elongato, pectore que nigro-piceis; thoracis linea media, scutello, elytrorumque fascia postica transversa, albiss.

Curculio Ulmi. De Geer Ins. 5. 215. 18. Tab. 6. f. 26 - 30. Marsh. Ent. Br. 1. 287. 145.

Curculio pomorum. var. Herbst. Col. 6. 158.

Var. b, fusco-piceus, rostro, antennis pedibusque rufis, elytris fusco-ferrugineis, albido-fasciatis.

Curculio fasciatus. Marsh. Ent. Br. 1. 286. 144.

Var. c

Var. c, capite ferrugineo; rostro rufo-testaceo, apice fusco, elytris ante fasciam albido-variegatis.

Circulio pedicularius. Linn. Syst. 2. 615. 66.

Fn Sv. 620. Marsh. Ent. Br. 1 286. 143.

Circulio avarus. Fabr. Eleut. 2. 488. 233.

Circulio druparum. var. Herbst. Col. 6. 157.

Tab. 70. f. 10.

Habitat in foliis ulmi; Padi, passim, minus frequens.

Descr. Rh. Pomorum similis & valde affinis, sed minor, praesertim brevior, & in elytris convexior. Caput parvum, rotundatum, nigro-fuscum, crebre punctulatum, griseo pubescens, fronte impressa; oculi prominuli nigro-brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, tenui, arcuatum, nigrum, nitidum, punctulatum, basi saepe brunneum. Antennæ ut in praecedenti. Thorax anterius multo angustior, juxta apicem obsolete impressus; basi leviter bi sinuatus, supra parum convexus, totus rufo-testaceus, crebre punctatus, tenui pubescens; in medio dorsi linea longitudinalis angusta, albo pilosa. Scutellum parvum, elevatum, niveo pubescens. Elytra thoracis postero-dimidio latiora, humeris prominulis, & illo quadruplo longiora, supra posterius convexa, pone basin transversim obsolete impressa, rufo-testacea, sat profunde punctato-strigata, tenui pubescencia; in singulo elytro, ante medium, plaga magna, oblongo-quadrata, fusco-brunnea; & pone illam fascia transversa, parum areolata, albo-villosa; plaga brunnea interdum dilutior observatur, maculis albido pilosis interratata. Corpus subtus ferrugineum, pubescens, punctulatum, pectore fusco-piceo. Pedes ut in praecedenti omnino;

Var. b.

Var. b, paullo minor, obscurior, forte mas; caput nigro-fuscum; rostrum paullo brevius, rufo ferrugineum, apice fuscum; thorax fusco-ferrugineus, linea dorsali albido pilosa; elytra brunnea, basi apiceque dilutiora, fasciis duabus irregularibus albido-pilosis, una prope basin, altera pone medium; pesctus & abdomen nigro-picea.

Var. c. simillima primo, sed rostrum totum rufum, apice parum infuscatum; elytra tota rufo-testacea, absque plaga nigricante; fascia albida pone medium aut integrum ut in a, aut irregularis; ante medium nebulae plures albido villosae; cætera ut in a.

Variat etiam colore pallidius testaceo, pectori concolor.

Ics R. druparum: rufo-testaceus, griseo-pubescent, rostro tenui, sub recto, elytris convexis, fasciis duabus undato-dentatis, denudatis.

Fobr. Eleut. 2. 489. 243.

Curculio druparum. Linn. Syst. 2. 614. 62.

Fn. Sv. 617. De Géer Ins. 5. 214. 7. Herbst:

Col. 6. 156. 114. Tab. 70. f, g. Payk. Fn.
3. 197. 14.

Habitat in Pruni Padi foliis & nucleis, sat frequens.

Descr. Rh. Pemorum paullo maior, & in elytris valde convexus. Caput parvum, rotundatum, rufo-testaceum, subtiliter punctulatum, tenui pubescent, fronte impressa; oculi prominuli, nigro brunnei; rostrum longitudine dimidii corporis, tenui, fere rectum, rufum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, pallide

lido rufo testaceæ, clava elongata, angusta, obseu-
riori. Thorax sub cōnicus, anterius valde angusta-
tus, iuxta apicem transversim obsolete impressus,
basi sub-bisinuatus, supra convexus, saturate rufo-
ferrugineus, crebre subtiliter punctatus, pube longi-
ori cinereo-flavescente, depressa, tectus. Scutellum
oblongum, rugosum, valde elevatum, ferrugineum.
Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora: & illo
quintuplo longiora, supra valde convexa, præsertim
posteriori; saturate rufo testacea, punctato-striata, in-
terstitiis subtilissime coriacis; pube densa, depressa,
cinereo flavescente, obducta; in medio elytrorum
fascia, suturam versus latior, & altera posterior,
magis obsoleta, utrinque dentata. Ambo obscuriores;
fere nudæ. Corpus subtrus rufo-testaceum, puncta-
tum, dense pallido pubescens. Pedes elongati, pal-
lidius rufescentes, femoribus clavatis, anticis longi-
oribus & crassioribus, omnibus versus apicem biden-
tatis, dente interiori magno, recto; acuto; altero
parvo, obsoleto.

106. R. pübescens: niger, longius cinereo-
fuscens, thorace, elytris pedibusque rufis,
scutello albo, rostro elongato, arcuato, ru-
fo, apice fuscus; femoribus sub-dentatis.

Curculio pubescens. Payk. fn. 3. 198. 15.

Var. b, pallide testaceus, rostri apice capi-
teque tantum fuscis.

Habitat in frondibus Pini abietis, præsertim
in Svecica Boreali, passim.

Descr. Magnitudo & fere statura Rh. druparum;
Caput parvum, rotundatum, nigrum; crebre puncta-
tum, pube longa cinerea tectum; oculi globosi ni-
gro-

gro-brunnei; rostrum dimidio corpore fere longius, tenuer, arcuaturn, punctulatum, saturate rufum, nitidum, apice plus minusve infuscatum. Antennæ longæ, tenues, rufo testaceæ, clava elongata, fuscæ. Thorax antice coarctatus & transversim impressus, lateribus nonnihil rotundatus, basi bisinuatus. supra modice convexus, rufus, crebre & sat profunde punctatus, pube longa cinereo albida, depresso, tectus. Scutellum parvum elevatum, dense albo pubescens. Elytra thorace dimidio latiora & quintuplo longiora, supra valde convexa, dilutius rufa, profunde punctato-striata, pube longa cinerea, depresso, parcus adspersa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, cinereo-pubescent, ano interdum rufo-piceo. Pedes elongati, saturate rufi, femoribus clavatis, anterioribus dente parvo armatis, posticis fere muticis.

Var. b, pallidius testaceus, etiam subtus; caput solum nigrum, & rostrum brunneum, apice fuscum.

Obs. *Rhynchænus melanocephalus*, Fabr. Eleut. 2. 490. 245. *Curculio phyllocola* Herbst. Col. 6. 161. 118. tab. 70. f. 14, huic similissimus & valde affinis, sed paulo minor; rostrum totum nigrum; femora acutius dentata, & tarsi nigrescentes; an vere distinctus; apud nos vero non occurrit, quantum mibi innotuit.

107 R. varians: niger, longius cinereo pubescens, elytris rufis, margine omni nigro; Scutello albo; thorace profunde punctato; femoribus acute dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 485. 222.

Curculio varians. Herbst. Col. 6. 268. 239. Tab. 80 f. 8. Payk. fn. 3. 202. 19.

Ins. Svec. T. I. P. III. N.

Var. b, minor, elytris totis nigris. *Payk.*
l. c. var. b.

Curculio perforator. *Herbst. Col. 6. 143. 103.*
Tab. 69. f. 8.

Habitat in Pini Sylvestris frondibus, præ-
 ficitim in Svecia boreali, passim.

Deser. Statura omnino præcedentis, sed dimidio
 minor & ultra. Caput parvum, nigrum, profunde
 punctatum, tenue pubescens, fronte impressa; oculi
 nigri, prominuli; rostrum longitudine dimidii corpo-
 ris, tenue, arcuatim, nigrum, nitidum, sub-læve.
 Antennæ longæ, valde teretes, testaceæ, clava fusce-
 scente. Thorax antice coarctatus & transversim im-
 pressus, lateribus rotundatus, basi bisinuatus, supra
 medice convexus, niger, sat profunde sed minus
 cæbre punctatus, pube longiori cinerea depressa ad-
 spersus. Scutellum parvum, elevatum, dense albo-
 viilosum. Elytra thoracis basi paullo latiora, humeri
 prominulis, & illo quadruplo longiora, supra val-
 de convexa, rufa vel rufo testacea, sub-nitida, pro-
 funde punctato striata, parum pubescens; margo
 lateralis late, sutura paullo angustius, & basis obso-
 lete nigra. Corpus subius nigrum, punctatum, cine-
 ro-pubescentia. Pedes elongati, validi, nigri, femo-
 ribus clavatis, anticis crassioribus & longioribus,
 dente validiori armatis; posterioribus obsoletius den-
 tatis; tibiæ anticæ saepe extrosum ferrugineæ.

Var. b, plurimumque minor, elytris totis nigris;
 cæterum omni puncto conveniens.

108. R. Rubi: niger, tenuè pubescens, scu-
 tello alto; antennarum basi, genubus tar-
 siisque piceis; thorace confertissime subtili-
 ter

ter punctulato, femoribus obsolete dentatis.

Fahr. Eleut. 2. 446. 42.?

Curculio Rubi. Herbst. Col. 6. 167. 126. Tab.
71. f. 8.

Curculio melanopterus. Marsh. Ent. Br. 1. 289.
151.

Var. b, E'ytris, pedibus abdomineque fusco-ferrugineis.

Habitat in Rubo idæo, cæsio, aliisque, non infrequens.

Descr. Varietati b, præcedentis, quidem valde similis, sed adhuc minor, pubescens brevior, thorax confertissime, subtiliter punctulatus, & femora minutissime dentata. Caput parvum, rotundatum, nigrum, subtilissime punctulatum, tenue pubescens, fronte impressa; oculi nigri, parum prominuli; rostrum longitudine dimidii corporis, arcuatum, nigrum, obsolete carinatum. Antennæ röstro cum capite longiores, tenties, basi ferrugineaæ seu piceæ, extorsum nigræ, clava oblonga. Thorax antice coarctatus & prope apicem transversim impressus, lateribus parum rotundatus, basi leviter bisinuatus; supra convexus, niger, opacus, confertissime subtiliter granulato-punctatus, pube brevi, tenui, cinerea, interdum in medio & versus latera in tres lineas obsolete condensata, adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, pube albida tectum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra, opaca, profunde punctato-striata, pube tenui cinerea depressa, adspersa. Corpus subtus nigrum, punctulatum,

tum, pubescens, ano sœpe piceo. Pedes elongati, tenues, nigri, femorum basi, genubus tarsisque fusco piceis; femora longa, sub clavata, omnia dente parvo armata.

Var. b, differt tantum colore elytrorum, pedum & abdominis pallidiori, fusco-testaceo vel livido; forte nuper exclusa.

Obs. Cl. Fabricius suum Rh. Rubi ut Rh. Aethiope paullo tantum minorem, femoribusque muticis, describit; Cl. Herbstii & noster Rh. Aethiope ad minimum quadruplo minor, & femora illi armata, unde vix idem,

109. R. dorsalis: niger, fere glaber, elytris rubris, margine suturaque antica dimidiatâ nigris, rostro longiusculo, crassiori, striato.

Fabr. Ent. 2. 454. 83.

Curculio dorsalis. Oliv. Ent. 5. 83. Tab. 14. f. 169. a, b Herbst. Col. 6. 101 62. Tab. 66. f. 6. Payk. fn. 3 200. 17. Panz. fn. 17 f. 9. C. it. Rev. 1. 127.

Habitat in frutetis, præsertim in Salice caprea, rarius.

Deser. Rh. Pomorum paullo minor, præsertim angustior. Caput rotundatum, nigrum, convexum, profunde punctatum, oculis depressis brunnens; rostrum longitudo capitis cum thorace, crassiusculum, arcuatum, nigrum, sub carinatum, striato punctatum. Antennæ rostro cum capite longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, clava ovata nigra. Thorax antice corosatus & transversim obsolete impressus, lateribus totum-

rotundatus, basi fere truncatus, supra parum convexus, niger, profunde punctatus, pilis minutissimis parce asperitus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, laxe. Elytra thoracis medio parum latiora, sed quadruplo longiora, supra modice convexa, saturate rubra, nitida, profunde punctato-striata, interstitiis levibus; margo exterior a basi ultra medium niger, ut & sutura antica versus medium magis dilatata. Corpus subrufum nigrum, parce pubescens, pectore crebrius, abdomine obsolete, punctulatis. Pedes validi nigri, femoribus clavatis, anticis crassioribus, omnibus dente mediocri armatis.

Obi. Nuper exclusus multo pallidior; thorax & pectus ferruginea, elytra tota & abdomen testacea.

Rh. dorsalis Fabricii et si inter muticos collocatus, forte tamen idem ac noster, quemadmodum figuras Olivieri, Herbstii & Panzeri, ut & descriptionem accuratissimam Paykullii, citavit; Curc. dorsalis Linnæi vero forte ad Rh. pascuorum, N:o 50 antea descriptum, vel ad varietatem Rh. Beccabungæ, elytris pallidioribus, pertinere videtur.

No. R. 5-punctatus: niger, supra squamu-
lis purpurascenti-aureis, subtus niveis, te-
ctus; thoracis linea dorsali, elytrorum su-
tura maculisque quatuor albo-squamo-
sis antennis tibiisque ferrugineis.

Fabr. Eleut. 2. 482. 204.

Curculio 5-punctatus. Linnae Syst. 2. 614 64.
En. Sv. 618. Herbst. Col. 6. 274 246. Tab.
81. f. 3. Payk. fn. 3. 201. 18. Panz. fn.
84. f. 8.

Var. b, Supra squamulis cinereo-argenteis tectus.

Habitat in floribus, præsertim Orobi tuberosi, passim.

Deser. Rh. nigri-rostri paullo latior & convexior. Caput parvum, nigro brunneum, crebre punctatum, vertice squamulis fusco-aureis, fronte majoribus albis, tectis; oculi magni prominuli, nigro brunnei; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, arcuatum, nigro piceum, squamoſum. apice attenuatum, glabrum, sæpe rufo testaceum; Antennæ rostro cum capite paullo longiores, crassiusculæ, rufo-ferrugineæ. Thorax antice coarctatus & transversim depressoſus, lateribus valde rotundato dilatatus, basi truncatus, supra parum convexus, niger, crebre punctatus, supra squamulis densis fusco aureis, sæpe purpureſcentibus omnino tectus; in medio dorsi linea, postice latior & evidenter, e squamulis albis seu niveis. Scutellum parvum, depressoſum, albo-squamosum. Elytra thoracis medio vix latiora, & illo triplo longiora, supra convexa, nigro-picea, posterius sæpe rufescentia, obfoletius crenato-striata; interstitiis subtiliter rugulosis; tota squamulis simili- bus, uti thorax tecta; sutura fere tota late albo-squamosa; in singuli elytri humero macula major & pone medium disci alia minor, etiam albo seu niveo-squamosæ. Corpus subtus nigrum, punctatum, dense albo-squamosum. Pedes breviſculi, validi, femoribus clavatis nigris, ratius, rufo piceis, albo-squamosis, omnibus acute dentatis; tibiis tarſisque fusco-ferrugineis.

Var. b, differt tantum colore squamularum paginæ superioris pallidiori, cinereo-argenteo, unde signaturæ albæ minus conspicuæ.

III. *R. venustus*: niger, supra squamulis pliisque brunneo-cinereis, subitus albis, testis; thorace elytrisque albito lineatis; rostri apice, antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.

Fabr. Eleut. 2. 456. 90.

Curculio venustus. *Herbst.* 6. 163. 121. *Tab.* 71 *f.* 2. *Curc. pegaso.* *ibid.* *p.* 103. 63. *tab.* 66. *f.* 7. *vix differt.*

Curculio vernalis. *Reich. Mant.* 1. 3. 4. *f.* 4. *Marsh. Ent. Br.* 1. 272. 105.

Curculio bi-vittatus. *Marsh. Ent. Br.* 1. 281. 129.

Curculio paralellus. *Panz. fa.* 18. *f.* 5. *Crit.* *Rev.* 1. 128.

Habitat in *Gottlandia rarius.* *Dom. Wetter-*
hall.

Descr. Statura & affinitas præcedentis, sed plerumque paullo minor, præsertim angustior. Caput parvum, retractum, nigrum, squamulis angustis brunneo-cinereis tectum, oculis & obosis brunneis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde arcuatum, basi crassius, cinereo squamosum, pone medium nudum, nigrum, nitidum, apicem versus attenuatum, apice ipso rufo-ferrugineo. Antennæ capite cum rostro longiores, crassifusculæ, ferrugineæ, cinereo-pucescentes, clava plerumque obscuriori. Thorax longitudine latior, antice angustatus & juxta apicem nigra transversa impressus, lateribus dilatato rotundatus, supra parum convexus, niger, obsolete punctulatus,

latus, squamulis angustis, piliformibus, depresso-brunneo-cinerosis, interdum metallico-nigentibus, alia vice pallidius cinereis, densis, testis, linea longitudinali media, lateribus & pagina inferiori albo squamosis. Scutellum parvum, rotundatum, dense albo-squamosum. Elytra thorace latiora, & fere triplo longiora, apice rotundata, anum non perfecte occultantia, supra modice convexa, nigra, punctato-striata, squamulis similibus uti thorax testa; sutura tota semper late albosquamosa; interstitia alterna, quartum & sextum, rarius etiam secundum a sutura, lineis albido squamosis, posterius angustatis, notata, quarum exteriora saepe antice confluunt; saepe etiam margo exterior albido-squamosus. Corpus subtilis piceum, squamulis brevioribus, latioribus, albis, omnino testum. Pedes crassiusculi, femoribus clavatis fusco-piceis, dense cinereo-squamulosis, denticulo obsoleto armatis; tibiis tarsisque fusco-ferrugineis.

112. *R. squamifer*: fusco-brunneus, convexus, cinereo-squamulosus, antennis pedibusque rufescens; supra squamis erectis nigris, sparsis, exasperatus; elytris connatis, profunde striatis; rostro tenui, arcuato.

Curculio Squamifer. Payk. fn. 3. 206. 22.

Habitat in Sylvis acerosis, rariissime; in Silva Kinnensi Westrogothiae semel lectus; & altera vice, a Dom. Wetterhall, in Smolandia captus, donoque mihi missus.

Descr. Statura fere Rh. dorsalis, sed dimidio minor. Caput parvum, rotundatum, rufo-brunneum, dense cinereo-squamulosum; oculi depresso-nigri; rostrum

rostrum capite cum thorace longius, tenue, arcuatū, rubrum, basi sub-punctatum, apice nigro-fuscum, lāeve. Antennæ crassiusculæ, rufo ferrugineæ, pubescentes. Thorax subglobosus, basi apicēque angustior, truncatus, lateribus rotundatus, supia convexus, pulvinatus, fusco-brunneus, punctulatus, squamulis depresso-cinereis, in linea dorsali & alia utrinque lateralī magis condensatis, tectus & præterea squamis latioribus, erectis, elongatis, nigris, in lineas duas dorsales dispositis, muricatus. Scutellum nullum. Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, ante medium magis dilatata, apicem versus attenuata, thorace fere triplo longiora, valde convexa, connotata, profunde striata, striis sub-lævibus; fusco-brunneæ, squamulis depresso-cinereis variegata, interstitiis singulis serie e squamis erectis, elongatis, exasperatis, quarum dorsales majores, plerque nigrae. laterales minores, cinereæ. Corpus subtus brunneum, dense cinereo-squamosum. Pedes elongati, rufescentes, femoribus obscurioribus, clavatis, squamis cinereis annulatis, omnibus dente valido, acuto armatis.

Fam. 2. Sect. 2. Corpore breviori, sub-quadrato.

Subdivision I. Thorace latiori, sub-æquali, non tuberculato, nec antice reflexo.

113. R. Nucum: niger, sub-depresso, dense flavescenti-villosum, antennis pedibusque ferrugineis, rostro tenui, longitudine corpore.

poris, extrosum rufo; elytris sub-triangularibus.

Fabr. Eleut. 2. 486 228.

Curculio nucum. Linn. Syst. 2. 613. 59. Fn.
Sv. 616. De Geer Ins. 5. 205. 2. Tab. 6.
f. 14 - 16. Herbst. Col. 6. 197. 158. Tab. 73.
f. 10. Payk. fn. 3. 204 20. Panz. fn. 42.
f. 21.

Var. b., Pube cinerea vestitus.

Curculio glandium. Marsh. Ent. Br. I. 284.
137.

Habitat in Corylo avellana, cuius nucleos
larva destruit.

Descr. Rh. Pini brevior, sed in medio latior,
Caput parvum rotundatum, convexum, nigrum, cre-
bre punctulatum, pube densa cinereo-flavescente te-
ctum; oculi magni, subdepressi, brunnei; rostrum
maris vix longitudine corporis, ante antennarum in-
sertionem crassius, nigro-piceum, carinatum, pun-
ctato stictatum, pubescens; extra antennas tenue, val-
de arcuatum, rufum, nitidum, glabrum, laxe, sum-
mo apice nigricante; rostrum feminæ toto corpore
fere longius, valde tenue & arcuatum, rubrum, ni-
tidum, laxe, basi apiceque parum fuscescens. An-
tennae rostro cum capite parum longiores, tenues,
fusco-ferrugineæ, extrosum pilosæ & pubescentes.
Thorax brevis, antice multo angustior & transver-
sum obsolete impressus, basi bi-sinuatus, supra convexus,
sub carinatus, niger, creberrime punctulatus, pubes-
densa cinereo flavescente, depressa, vestitus. Scutel-
lum rotundatum, elevatum, dense pallido pubescens.
Elytra antice thoracis basi latiora, humeris promi-
nulis,

nulis, & illo duplo longiora, posterius valde angustata; sub triangularia; supra depressa, nigra, punctato striata, interstitiis crebre rugulosis; pube cinereo flavescente tecta, maculisque pallidioribus, e pilis magis condensatis; variegata. Corpus subitus nigrum, crebre subtiliter punctulatum, pube simili ac supra tectum; ad latera antica pectoris lamina obliqua cuneata, pallidior. e pube magis condensata. Pedes validi, obscure ferruginei, cinereo-pubescentes, genubus fusco-piceis; femora omnia clavata, acute dentata.

Var b, differt tantum colore pubescentiæ magis cinereo.

114. R. villosus: niger, sub-depressus, pareius cinereo-pubescentes; antennis ferrugineis; rostro tenuissimo, longitudine corporis; scutello elytrorumque fascia postica albidis.

Fabr. Eleut. 2. 484. 218. Rh. esuriens, ibid. 487. 232. idem.

Circulio villosus. Herbst. Col. 6. 195. 156. tab. 73 f. 8. Archiv. 5. 76. 41. Tab. 24. f. 19. Payk. fn. 3. 205. 21.

Var. ♂, Scutello fasciaque elytrorum lutescentibus.

Rhynchænus Cerasorum. Fabr. Eleut. 2. 488. 238.

Circulio Cerasorum. Panz. fn. 42, f. 22. Marth. Ent. Br. 1. 284. 138.

Habitat in Svecia Australi, rarius. Dom. Quinzel.

Deser. Statura omnino Rh. Nucum, sed plus duplo minor, femora minus valide dentata, & p. bescentiae color alius. Caput parvum, rotundatum, nigrum, obsolete punctatum, parum cinereo-pubescentis; oculi magni, depresso, brunnei; rostrum seminæ corpore fere longius, tenuissimum, valde acutum, nigrum, nitidum, tæve, in medio, ante antennarum basi, rufo-brunneum; rostrum maris paulo brevius & crassius, basi substriatum. Antennæ longæ, tenuæ, ferrugineæ, clava cinereo pubescente. Thorax artierius angustior ibique obsolete transversim imprimatus, basi bisinuatus, supra parum convexus, niger, crebre, obsolete punctulatus, adspersus pilis rarioribus cinereis, in medio dorsi in linea evidenterem albidam condensatis. Scutellum rotundatum, dense albo-villosum. Elytra antice thoracis basi latiora, humeris prominulis, thorace plus duplo longiora, posterius attenuata, supra sub-depressa, nigra, punctato striata, interstitiis crebre coriaceis; pube cinerea depresso; paulo pone medium fascia communis albidi, extorsum angustata, margines non attingens. Corpus subtus convexum, nigrum, obsolete punctulatum, cinereo pubescens. Pedes nigri, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, dente parvo armatis.

Var. b, differt tantum scutello & fascia elytrorum lutescentibus seu flavo-ferrugineis.

Obs. Secundum observationem Cl. Illigeri in Mag. 4. 218, 232 & 238, tres aliatae Species Fabri-gianæ in unam reducendæ,

215. R. Cerasorum: rufo-brunneus, sub-depressus, pube pallida variegatus, rostro rufo, longitudine corporis; pedibus testaceis, femoribus obsolete dentatis.

Curen'io Cerasorum. Pauk. fn. 3 206' 22. Herbst.
Col. 6. 196. 157. Tab. 73. f. 9.

Habitat in Scania rariis, Dom. Qvensel; in
solis Betulae albæ & Alni in Weitrogo;
thia aliquoties captus.

Descr. 'Statura omnino præcedentium, sed par-
vus, Rh. druparum sere minor. Caput rotundatum,
convexum, rufo-ferrugineum, crebre obsolete pun-
ctatum, pilis parvis pallidis adspersum; oculi ma-
gni, de pressi, brunnei; rostrum longitudine corporis,
arcuatum, rufum, nitidum, basi sub striatum. An-
ternæ longæ, terues, rufo-ferrugineæ, extrorsum
pubescentes. Thorax antice angustior, ante apicem
transversim impressus, lateribus non nihil rotundatus,
basi bi sinuatus, supra parum convexus, ante ius sub-
carinatus, totus rufo brunneus, subtiliter obsolete
punctatus, pilis parvis, rigidis, depresso, flavescenti-
bus ad latera & in linea dorsali media adspersus;
versus medium basos punctum parvum utrinque
impressum. Scutellum rotundatum, dense pallido-
pubescent. Elytra thoracis basi multo latiora, hu-
meris prominuis, sed illo vix triplo longiora, poste-
rius attenuata, subtriangularia, supra sub depresso,
rufo brunnea, evidenter punctata, interstitiis
subtiliter rugulosis; pilis pallidis rigidis, hinc inde in
fascias irregulares, undulatas, collocatis, adspersa.
Corpus subius obsolete punctatum, pube cinereo-
pallescente adspersum, pectore brunnio, ventre dilu-
tis testaceo. Pedes rufo-testacei, semoribus clava-
tis, omnibus dente parvo armatis.

Obs. Rh. Cerasorum Cl. Fabricii, modo var. præ-
cedentis speciei teste Dom. Illiger, ut antea indicat-
um; nomen Cl. Paykullii & Herbstii ideo huic re-
tinendum.

xi6. R. Salicivorus: niger, supra cinereo-sub-pubescent, scutello corporeque sub-tus albo-squamosis: antennis basi ferrugineis; rostro longissimo, arcuato, atro.

Curculio Salicivorus. Payk. fn. 3. 214. 32.
Herbst. Col. 6. 200. 160. tab. 73. f. 12.

Curculio Napo-brassicæ. Bierkand. Att. Holm. 1780. p. 194.

Rhynchænus brassicæ. Fabr. Eleut. 2. 483. vii?

Curculio arcuatus. Marsh. Ent. Br. 1. 288. 148.

Var. b, Antennis fere totis ferrugineis.

Curculio curvatus. Marsh. Ent. Br. 1. 287. 147.

Habitat in foliis & floribus Salicum, passim;
etiam in floribus Brassicæ, aliisque plan-
tis oleraceis, sat frequens.

Descr. Rh. Campanulæ fere duplo minor, præ-
sertim angustior. Caput orbiculatum, nigrum, sub-
tiliter punctulatum, parum pubescens, oculis magnis,
depressis, brunneis; rostrum feminæ longitudine fe-
re corporis; tenue, valde arcuatum, nigrum, nitidum,
sub læve; maris paullo brevius & crassius, basi stria-
tum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues,
articulo primo clavato, rufo-ferrugineo, reliquis fu-
scis-piceis, pilosis. Thorax latitudine longior, antice
non nihil coarctatus, lateribus rotundatus, basi sub-
bisanguatus, supra modice convexus, totus niger, sub-
tiliter granulato punctatus, pube tenui cinerea ad-
spersus; in medio baseos macula parva, triangulatis,
& alia longior utrinque versus latera, e pilis albidis,
magis condensatis. Scutellum rotundatum elevatum,
dense

dense albido-squamosum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo plus duplo longiora, posterius angustiora, supra convexa, nigra, sat profunde punctata & iata, interstitiis subtilater rugulosis, singulis serie duplice squamulis minutis cinereis, depresso-filiformibus, rotatis. Corpus subitus nigrum, punctulatum, squamulis densis albidis, rotundatis, testum. Pedes longiusculi, nigri, femoribus clavatis omnibus acute dentatis.

Var. b, differt tantum corpore paullo minori, & antennis fere totis rufo ferrugineis, clava tantum obscuriori.

Obs. Cl. Fabricius neque scutelli, nec corporis squamositatem albida memorat, unde Synonymon ejus dubium; forte tamen hoc pertinet, secundum spesimina detrita descriptus.

117. R. Antirrhini: niger, sub depresso, dense griseo-pubescent, rostro recto, apice attenuato, antennis brevibus, crassis; femoribus obsolete dentatis.

Curculio Atmirrhini. Payk. fn. 3. 257. 78.
Marsh Ent. Br. 1. 264. 80.

Curculio ellipticus. Herbst. Col. 6. 171. 131. tab.
71. f. 13.

Habitat. in floribus Antirrhini Linariæ, passim.

Descr. Statura & magnitudo R. Campanulae, sed abunde differt, rostro crassiori, recto, apice attenuato; pubescens longiori & densiori; antennis crassiorebus, &c. Caput parvum, rotundatum, convexum, nigrum, crebre granulato-punctulatum; pilis densis griseis,

griseis, depressis, adspersum; oculi brunnei, sat pro-
minuli; rostrum maris vix longitudine thoracis, o-
mnino rectum, nigrum, basi crassum, punctatum, pu-
bescens, exterius attenuatum, sublæve, glabrum; ro-
strum feminæ paullo longius & magis tenuë, alias
ejusdem structæ. Antennæ vix rostro cum capite
longiores, nigræ, valde crassæ, articulo primo ob-
conico, vix tertiam partem totius antennæ efficien-
te, clavâ magna, ovata, griseo pubescente, articulis
valde coarctatis. Thorax posterius longitudine paul-
lo latior, anterius angustior, & juxta ipsum apicem
striga transversa impressus; lateribus posterius rotun-
datu\$, basi etiam obtuse rotundatus, angulis omnino
nullis; supra sub depresso, niger, creberrime puncta-
tus, pube longiori, densa, grisea, adspersus. Scutel-
lum triangulare, nigrum, pubescens. Elytra thorace
paullo latiora, humeris prominulis, & illo vix tri-
plo longiora, apice obtuse rotundata, supra sub-de-
pressa, nigra, opaca, punctato-striata, interstitiis ru-
gulosis, pube longiori, grisea, sub seriata, adspersis;
Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, dense
griseo pubescens. Pedes mediocres, nigri, pubescentes,
femoribus clavatis, posterioribus dente obsoletò
notatis.

Obs. Rh. teter, Fabr. Eleut. 2. 448. 50, jam de-
scripto simillimus & valde affinis, sed plus duplo
major, rostrum feminæ longius, cylindricum, &c;
nec apud nos indigenus.

fig. R. Linariæ: niger, sub-depresso, par-
cius cinereo-pubescent, rostro crassiuscu-
lo, valde arcuato, antennis brevibus,
crassis, femoribus obsolete dentatis.

Curculio linariae. Panz. fn. 26. f. 12. Crit.
Rev. i. 125.

Cur-

Ceratilio Ajugæ. Herbst. Col. 6. 172. 132?
Habitat in Antennino linaria, Epilobio,
ranius.

Deser. Statura & summa affinitas præcedentis;
plerumque tamen dimidio major, rostri structura
præcipue distinctus. Caput parvum, rotundatum,
nigrum, crebre granulato-punctatum, pube tenui,
depressa, dilutius cibera, adspersum; oculi depresso-
nigro brunnei; rostrum longitudine thoracis, cras-
siusculum, valde arcuatum, supra sub-depressum, basi
punctulatum, pubescens, apice lœve, glabrum, saepe
rufo-ferrugineum. Antennæ breves, crassæ, nigrae,
omnino ut in præcedenti constructæ. Thorax bie-
vis, transversus, anteice paullo angustior & striga
apicis tenui, transversa, impressus, lateribus dilatato-
rotundatus. postice etiam obtuse rotundatus, supra
sub-depressus. dorso obsoletissime carinatus, totus
niger, creberrime punctatus, pilis parvis, depresso-
cinereo-albidis adspersus. Scutellum obtuse trian-
gulare, nigrum, pubescens. Elytra thoracis medio
parum latiora, sed plus triplo longiora, supra dorso
depressa, tota nigra, sat profunde punctato-striata,
intestitiis rugulosis, pube tenui, depressa, cinereo-
albida adspersa. Corpus subtus nigrum, crebre pun-
ctulatum, tenue pubescens. Pedes mediocres, nigri,
semoribus clavatis, posterioribus obsolete dentatis.

Obs. Figura Panzeri, quoad rostri & antennarum structuram, nostrum exacte representat; Synonymon Herbstii minus certum, ob descriptionis insufficienciam.

119 R. collinus: niger, sub-depressus, lon-
gius griseo-pubescens; rostro mediocri-
sub-ax-

Ins. Suc. T. I. P. III. O

sub-arcuato; antennis brevibus, crassis,
piceis; femoribus acute dentatis.

Habitat in collibus aridis pratorum, ratus.

Descr. Statura & summa affinitas praecedentis, plerumque paullo minor, rostro parum arcuato, pube longiori & obscuriori, femoribusque omnibus saltem in masculis, acute dentatis, distinctus. Caput rotundatum, nigrum, punctulatum, pube longiori grisea fere tectum; oculi depressi, brunnei; rostrum maris vix longitudine thoracis, crassiusculum, parum arcuatum, nigrum, basi punctulatum & pubescens, apice nudum piceum; feminæ paullo longius & tenuius, extrosum magis glabrum, nitidum. Antennæ breves, crassæ, fusco-piceæ, basi dilutius ferrugineæ, structura omnino ut in duobus praecedentibus. Thorax brevis, transuersus, structura omnino ut in Rh. Linariæ, supra sub-depressus, obsoete carinatus, nigro-fuscus, punctulatus, pube longiori, densa, fusco-grisea obductus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, cinereo pubescens. Elytrorum forma ut in priori, supra sub-depressa, nigra, punctato-striata, interstitiis subtiliter punctulatis, pube longiori grisea adspersis. Corpus subtus nigrum vel fusco-piceum, obsoletius punctulatum, dense griseo-pubescens. Pedes mediocres, nigri, pubescentes, testis fusco-ferrugineis, femoribus clavatis, in mare omnibus neutre dentatis; in femina anticis sub-muticis, reliquis dente parvo instructis.

210 R. graminis: niger, sub-depressus, cinereo-pubescentes, rostro longiori, cylindrico, sub-arcuato; antennis longioribus, tenuioribus; femoribus posticis dentatis.

Curculio campanulæ, femina. Payk. Fn. 3.

Habitat in gramine, ad agrorum margines rarius.

Descr. Præcedentibus iterum valde affinis, sed Rh. Linariæ adhuc major, rostrum longius, magis tenuis, parum arcuatum; antenæ longiores, tenuiores, &c. Rh. Campanulæ etiam similissimus, sed duplo major, pubescens longior, caput non ita retrahitum, femora crassiora & postica dentata; nec ejus femina esse possit, nam ambo illius sexus multoties in copula capti, bene cogniti, ut antea ad N:o 55. indicatum. Caput exsertum, rotundatum, convexum, nigrum, punctulatum, tenue pubescens; oculi magni, brunnei, modice prominuli; rostrum capite cum thorace fere longius, tenuis, cylindricum, parum arcuatum, nigrum, punctulatum, basi pubescens. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, nigrae, clava oblonga, minus crassa. Thorax posterius longitudine latior, anterior angustatus & juxta apicem striga transversa, angusta, impressus, basi obtuse rotundatus, supra sub depresso, niger, crebre punctatus, pube longiori grisea, depresso, obductus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum; pube densa, cinereo-albida, tectum, Elytra thorace parum latiora, & vix triplo longiora, supra sub-depressa, nigra, profunde punctato-striata; interstitiis obsolete rugulosis, pube longiori, grisea, seriatim digesta, adspersis. Corpus subtus nigrum, obsoletius punctatum, dense griseo-pubescentes. Pedes longiusculi, validi, nigri, pubescentes, femoribus clavatis, anterioribus muticis, posticis dente obtuso armatis.

Fam. 2. Sect. 2. Subdivisio 2:a. Thorace parvo, elytris duplo angustiori; elytris magnis, sub-quadratis; Antennis 10-articulatis, clava oblonga, 4-articulata.

Obs. Species hujus sub-divisionis, a Cl. Dom. Latreille & Clairville, in proprio genere, sub nomine Cionus, colocatae; vix vero sufficiunt notæ ad Genus peculiare determinandum.

121. R. Scrophulariæ: niger, thorace pectoraliterque pilis fluorescentibus testis, elytris biunneis, intersitis alternis elevationibus, atro alboque tessellatis, maculis duabus suturalibus magnis atro-holofericeis.

Fabr. Eleut. 2. 478. 191

Circulio scrophulariæ. Linn. *Syst.* 2. 614. 61.

Fn. Sv. 603. *De Geer Inf.* 5. 208. 3. var.

1 ♂ 2. *Tab.* 6. f. 17 - 25. *Herbst Col.* 6. 184. 147. *tab.* 73. f. 1. *Payk. Fn.* 3. 207. 24.

Var. b; thoracis pectorisque pubescencia alba.

Var. c thoracis dorso longitudinaliter nudo, nigro.

Rhynchænus Verbasci. *Fabr. Eleut.* 2. 479.

193. *Dilig. Mag.* 4 146. 193

Circulio Verbasci. *Herbst. Col.* 6. 189. 149.

Habitat in Scrophularia nodosa, sat frequens.

Descr.

Deser. Magnitudo minoris Pisi. Caput parvum, nigrum, obsolete punctulatum, dense pallido-pubescentia, oculis magni brunneis, depresso; rostrum capite cum thorace longius, crassigulatum, arcuatum, nigro-piceum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, fuscocerrugineæ, clava oblonga obscuriori. Thorax parvus brevissimus, anterius angustior, truncatus, basi subsinuatus, supra inæqualis, antice depresso, pone medium transversim elevatus, tuberculo obsoleto utrinque notatus; niger, subtiliter punctulatus, totus supra & subtus pilis longiusculis, rigidis, depresso, densis, pallide flavis, tectus. Scutellum oblongo rotundatum, depresso, piceum, flavopilosum, praesertim apice. Elytra magna, subquadrata, thoracis basi fere duplo latiora, hemeris elevatis, rectangulis, thorace plus quam quadruplo longiora, supra convexa, dorso antico tamen fere plana, aut nigro picea, aut dilutius rufo-brunnea, minus regulariter punctato-striata, interstitiis alternis elevationibus, maculis villosis, atro-holofericeis, majoribus, aliisque minoribus albidis alternantibus, tessellatis; sutura etiam in medio simili modo tessellata; pone scutellum macula magna, communis, oblongo ovata, holofericeo-atra, postice macula contigua alba aucta; versus apicem suturæ macula altera communis, oblonga, atro-holofercea, antice macula oblonga albæ, postice alia brevi ejusdem coloris inclusa. Corpus subtus nigro, piceum, punctulatum, pectore pilis densis pallidis tecto, ab domine parcius pubescente. Pedes elongati, validi, picei, pilis pallidis variegati, tarsis rufe centibus, femoribus omnibus dente valido, acuto, armatis.

Var. b. differt tantum colore pubescentiæ thoracis & pectoris albo, interdum niveo.

Var. c. obscurior, magis atra; thoracis dorsum vitta lata, inæquali, sub-nuda, atra, notatum, puncta alternantia in interstitiis elytrorum non alba, sed

cinerea; antennarum clava plerumque longior, fuscotestacea; cætera omnino convenient; an tamen Species distincta?

122. *R. Thapsus*: fuscobrunneus, undique cinereo-virescenti pubescent, elytris maculis denudatis, obsolete tessellatis, duabusque futuralibus atro-holosericeis, orbiculatis, simplicibus.

Fabr. Eleut. 2. 479. 192.

Curculio Thapsus. *Herbst. Col.* 6. 187. 148.
Tab. 73. f. 2. *Marsh. Ent. Br.* 1. 277. 118.

Curculio Scrophulariae var. *Linn. Syst.* 2. 614.
61. *Fn. Sv.* 603. *De Geer Ins.* 5. 208. 3.
var. 3. *Payk. Fn.* 3. 208. b.

Habitat in Verbasco Thapsus, passim.

Descr. Statura, magnitudo & summa affinitas præcedentis, differt tamen, non solum pubescens diversa, maculisque futuralibus orbiculatis, simplicibus, sed etiam intersticiis elytrorum alternis, vix vel per-parum elevatis, maculis oblongis brunneis obsoletis, denudatis, nec atro-holosericeis, tessellatis, &c. Caput paryum, fuscopiceum, punctulatum, pube cinereo virescente testum, oculis magnis, depresso, brunneis; rostrum copite cum thorace longius, crassiusculum, sub-arcuatum, nigrum, opacum, creberrime granulato-punctulatum, pubescent, Antennæ ut in priori. Thoracis structura etiam ut in illo, totus fuscopiceus, subtiliter punctulatus, pube densa, cinereo-virescente, interdum flavicante, undique tectus, lineis duabus dorsalibus approximatis, punctisque duobus utique, magis denudatis. Scutellum

tellum totum dense pubescens. Elytrorum forma ut in priori, dilutius fusco-ferruginea seu brunnea, minus regulariter punctato-striata, pube cinereo-virescenti, densa, obducta, interstitiis alternis vix elevatioribus, sed tantum maculis oblongis, seriatis, deundatis, in dorso paucis, obsoletis, versus latera crebrioribus, tessellatis; ante medium dorsi macula magna suturalis orbiculata, atro holosericea, absqne adjacente alba macula, & ante apicem altera, paullo minor, etiam rotundata, simplex, Corpus subtus fusco brunneum, punctatum, dense pubescens. Pedes, quoad structuram, ut in priori, fusco brunnei, pube cinereo-virescente variegati, tarsis & interdum tibiis anterioribus ferrugineis.

123. *R. hortulanus*: fusco-brunneus, undique cinereo-virescenti pubescens, elytris maculis duabus suturalibus orbiculatis, atro-holosericeis, interstitiis alternis denudato pallidoque tessellatis, rostro tenuiori.

Curculio hortulanus. Marsh. Ent. Br. 1. 278.
119.

Habitat in Verbasco nigro, ad Mysseberg Westrogothiæ pluries lectus.

Descr. Proxime praecedenti simillimus, sed dimidio minor; rostrum magis tenui; elytra evidenter tessellata, &c. Caput & oculi ut in praecedenti; rostrum capite cum thorace longius, magis tenui quam in prioribus, maris piceum, punctulatum, pubescens; feminæ rufo-brunneum, apice glabrum. Antennæ totæ ferrugineæ, structura ut in prioribus. Thorax & scutellum ut in praecedenti omnino. Elytrorum forma, punctura & maculæ suturales etiam ut

in illo, sed interstitia alterna maculis denudatis brunneis, aliisque alternantibus pallidis, e. pube magis quam in reliqua superficie cordenata, evidenter & concinne tessellata. Corpus subvix ut in priori. Pedum strūctura & pubescētia etiam ut in illo, in feminā fere toti testacei, in mare fusco-brunnei, tarsis dilutioribus.

124. R. Solani: fusco-brunneus, griseo-pubescentia, elytrorum interstitiis alternis sub-elevatis, maculis atro-holosericeis fasciculisque erectis albidis tessellatis, thorace brevissimo.

Fabr. Eleut. 2. 480, 199.

Curculio Solani. *Payk. fn.* 3. add. 457. 25-6.
Herbst. Col. 6. 199. 151.

Curculio pulchellus. *Herbst. Col.* 6. 356. 330.
Tab. 88. f. 1.

Curculio immunis. *Marsh. Ent. Br.* 1. 278. 120.

Curculio ovalis. *Linn. Syst.* 2. 612. 47. *Fn.*
Sv. 613?

Habitat in Uplandia, Dom. de Paykull. In Scrophularia nodosa Westrogothiæ, prope urbem Alingsås. Dom. Grönbom.

Descr. Præcedentibus longe minor, vix Rh. Fraxini æqualis, alias similis, et si elytra paullo longiora. Caput parvum, fusco piceum, punctulatum, pube grisea adspersum; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum capite cum thorace paullo longius crassiusculum, parum arcuatum, piceum, crebre punctulatum pubescens. Antennæ rostro cum capite paullo

paullo longiores. ferrugineæ. clava ovata, fusca. Thorax brevissimus, transversus anterius angustior, truncatus, basi sub-sinuatus, supra in æqualis, ante apicem transversim impressus. disco posteriori convexus, totus fusco-piceus, subtiliter punctulatus; in dorso lineæ tres e pilis depresso-cinereo-brunneis, quarum media recta, laterales arcuatæ, anterius concaventes. Scutellum fuscum, griseo-pubescent. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominentibus, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, dilutius brunnea seu ferruginea, sat regulariter punctato striata, intersticiis alternis elevatioribus, maculis atro-holosericeis, seriatis, fasciculisque e pilis erectis griseo-albidis alternantibus. tessellatis, pone medium futuræ plerumque litura obsoleta nigra, fasciæ formis. Corpus subtus piceum, punctulatum, cincereo pubescens. Pedes longiusculi, ferruginei, pubescentes, femoribus clayatis, saepe in medio infuscatis, omnibus dente valido, acuto, armatis.

125. R. Fraxini: fusco-brunneus, cinereo-squamulosus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis; elytris rufo-ferrugineis, plaga magna, communi, antica, nigro-picea.

Fabr. Eleut. 2. 489. 244.

Curculio Fraxini. De Geer Ins. 5. 212. 4.
Herbst. Col. 6. 192. 153. *Tab. 73. f. 5. Payk.*
fn 3. 209. 25.

Var. b, nigro-piceus, thoracis lateribus et
elytrorumque maculis flavescenti-squamulo-

Curculio rectangulus. Herbst. Col. 6. 193. 154
Tab. 73. f. 6.

Habitat in foliis Fraxini excelsioris, paf-
sim.

Descr. Statura Rh. Scrophulariæ, sed plus du-
plo minor. Caput parvum, fusco-piceum, crebre
punctatum, squamulis parvis, cinereo-albidis, adsperso;
oculi brunnei, modice prominuli; rostrum ca-
pite cum thorace multo longius, crassiusculum, val-
de arcuatum, sub carinatum, creberrime rugoso pun-
ctatum, plerumque rufo-brunneum, apice nigro-pi-
ceum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores,
tenues, rufo-ferrugineæ, clava nigro-fusca.
Thorax brevis, antice angustior, truncatus, basi sub-
sinuatus, supra dorso depresso, obsolete canalicula-
tus. brunneus seu fusco piceus, margine antico late-
ribusque sæpe dilutius ferrugineus, subtus & late-
ribus dense cinereo-squamosus, area dorsali, anteriorius
angustiori, punctoque utrinque magis denudatis, ob-
scerioribus. Scutellum oblongo-rotundatum, fusco-
piceum. Elytra magna, thoracis basi duplo latiora,
humeris elevatis, rectangulis, thorace quadruplo
longiora, supra dorso parum convexa, rufo ferrugi-
nea, tenui punctato-striata, interstitiis subtilissime
punctulatis, squamulis cinereo-albidis, præsertim ver-
sus latera & postice, plus minusve variegata; a basi
ultra medium plaga magna, communis, nigro-picea,
& margo lateralis anteriorius ejusdem coloris. Corpus
subtus fusco-piceum, punctulatum, dense cinereo-
squamosum. Pedes rufo-ferruginei, cinereo-squa-
mosi, femoribus omnibus dente valido armatis, an-
tice sæpe basi piceis.

Var. b, differt tantum colore magis nigro-piceo,
squamulis flavo-brunneis adperso; squamulæ vero
facile deteruntur, unde aliena facies.

Fam. 2. Sect. 2. Subdivisio 3:a, Thorace inæquali, aut tuberculato, aut margine antico elevato, reflexo.

126. *R. trimaculatus*: niger, opacus, subdepressus, elytris punctato-striatis, cruce baseos apicisque, macula utrinque laterali, corporeque subtus albo-squamosis, thorace mutico.

Fabr. Eleut. 2. 484. 216.

Curculio trimaculatus. *Payk. fn.* 3. 209. 26.
Herbst. Col. 6. 471. 482.

Curculio cruciger. *Herbst. Col.* 6. 394. 373.
Tab. 91. f. 4. a.

Habitat in Uplandia rarius; Dom. *de Paykull*; in Verbasco Thapsus ad Kinnakulle Westrogothiæ pluries legi.

Describ. Rh. Scrophulariæ paullo minor. Caput rotundatum, nigrum, crebre punctatum, fronte late impressa, vertice carinato; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusulum, valde arcuatum, nigrum, opacum, punctulatum, dorso carinatum. Antennæ rostro cum capite longiores, medio ferrugineæ, articulo primo nigro, clava apicis fusca. Thorax brevis, antice coarctatus, & juxta apicem profunde & late transversim impressus, margine valde elevato, reflexo; lateribus rotundatus, basi sub-bisinuatus, supra depresso, niger, confertissime punctulatus, in medio obsolete canaliculatus, lateribus anticis, lineaque dorsali media griseo-pilosus; subtus dense albido-squamo-

squamulosus. Scutellum minutum, immersum, nigrum. Elytra thoracis basi latiora, humeris carinato-elevatis, thorace plus duplo longiora, posterius angustiora, supra sublepressa, nigra, sat profunde punctato striata, i terstitiis planis, subtiliter punctulatis, pilis squamulisque depresso-fusca, obductis; in basi suturæ linea longa, lata, albo-squamosa, cum linea breviori punctisque binis utrinque; crucem formante; versus apicem suturæ etiam linea elongata, adiacente utrinque alia brevi, & tertia extorsum, arcuatim producta, lunata; in medio laterali utrinque puncti tria, in maculam transversim coalita, omnes albo-squamosæ. Corpus subitus nigrum, punctulatum, squamis densis albidis tectum. Pedes elongati, validi, nigri, femoribus crassis, clavatis, dente magno, obtuso armatis, versus apicem annulo albidiiori cinctis; tarsi ferruginei.

227. R. viduatus: niger, opacus, subdepressus, elytris leviter striatis, macula laterali utrinque: lunula apicis corporeaque tuberculata albido-squamosa; thorace mutico; pedibus fusco ferrugineis.

Habitat in plantis rariis.

Descri. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed dimidio minor, elytronum striae fenuiores, vix punctatae, macula nulla alba in basi suture, pedes pallidiores, &c. Caput & oculi ut in præcedenti; rostrum-capite cum thorace longius, valde arcuatum, nigro piceum, opacum, creberrime punctulatum, non vero carinatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tennes, ferrugineæ, clava fuscescente, Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra disco fert planus, totus niger, creberrime punctulatus, in medio

medio basos, soveola profunda impressus, obsoletissime canaliculatus & in sulculo albido-squamulosus, præsertim antice. Scutellum minutissimum, immersum. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominentibus, & illo plus duplo longiora, supra modice convexa, nigra, tenui striata, striis vix punctulatis, interstitiis planis, consertissime granulato-coriaceis, squamulis minimis fuscis obductis; suturæ basis immaculata, concolor, sed in apice elytri singuli lunula transversa, cinereo albida, & pone humerum, ante medium lateris, macula albido squamosa, transversa, e tribus punctis quasi coadira. Corpus subtus nigrum, punctatum, squamis densis cinereis tectum. Pedes longiusculi, validi, ferruginei, cinereo variegati, femoribus clavatis, omnibus dente miris lato, sed multo magis acuto, quam in priori, armatis,

123. R. *Asperifoliarum*: niger, sub-depressus, subtus albo-squamulosus, antennis, tibiis carnisque ferrugineis, thorace submutico, elytris leviter striatis, maculis quatuor albo-squamosis.

Curculio Asperifoliarum. Dom. Kirby, in lit.

Habitat in Cynoglosso officinali ad Kinna-kulle Wellrogothiae, rarius; in Scania, Dom. Wetterhall,

Dscr. Præcedentibus iterum similis & affinis, sed longe minor, vix Rh. didymo æqualis. Caput rotundatum, nigrum, opacum, crebre punctulatum, in vertice catinatum, fronte plana, albido-squamosa; oculi sub globi brunnei; rostrum capite cum thorace longius, valde arcuatum, nigrum, crebre punctulatum,

Etulatum, pubescens. Antennæ capite cum rostro longiores, obscure ferrugineæ, clava scumjnata, nigricante. Thorax brevis, antice coarctatus & juxta apicem late & profuude transversim impressus, margine valde elevatò, reflexo; lateribus rotundatus, margine sub incrassato; basistruncatus. Elytris arcte applicatus, supra depresso, niger, opacus, crebre punctulatus, squamulis cinereis irroratus, in medio & ad latera in lineas tres oblongetas condecoratis; in medio baseos foveola impressa, vix in canalicu' am continuata. Scutellum minutum nigrum, oblongum. Elytra thoracis bisi multo latiora, humeris valde prominulis, carinatis, thorace fere triplo longiora; posterius attenuata, supra parum convexa, nigra, opaca, tenui striata, striis vix punctatis, interstitiis planis, crebre subtiliter granulato coriaceis, squamulis cinereo albidis hinc inde adpersis; ante medium suturæ macula communis ob cordata, albo squamosa; ante apicem linea suturalis longior; juxta illam alia brevis, obsoleta, & demum tertia utrinque, extorsum arcuata, lunata, omnes cinereo albidæ; in medio laterali macula magna, transversa, niveo-squamosa, e tribus coalita; media minori. Corpus subfuscum nigrum, punctulatum, pectore dense, abdomine parcus albo-squamosis. Pedes elongati, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis, nigris, dente mediocri armatis; tibiis tarfisque ferrugineis.

229. R. litura: niger, sub-depressus, squamis niveis supra variegato-maculatus, subfuscus omnino tectus; thorace bi-tuberculato, canaliculato; femoribus acute dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 484. 217.

Circulio litura. Payk. fn. 3. 210. 27. Herb. Col. 6. 472. 483.

Cur-

Curculio cruciger, var. *Herbst. Col. 6. 395.*

Habitat in Carduis, aliisque, plantis, minus frequens.

Descr. Rh. trimaculato quoad signaturas similis; sed triplo minor, thorax tuberculatus, elytra paullo longiora, minus attenuata. Caput rotundatum, retractum, nigrum, crebre punctulatum, dense albido-squamulosum. oculis parvis, brunneis; rostrum capite cum thorace longius, valde arcuatum, nigrum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, ferrugineæ, seu rufo, piceæ. Thorax antice coarctatus ibique transversim profunde impressus. Imagine elevato, reflexo; postice sub sinuatus, supra fere planus, niger, crebre punctulatus, obsolete canaliculatus, subtus & lateribus dense albo-squamulosus, plaga dorsali, antrofusca angustata, magis denudata, nigra, livida albo-squamosa medio interrupta; versus latera utrinque tuberculatum pervum, denudatum, nigrum. Scutellum minutum, nigrum, immersum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, posterius patum, attenuata, supra sub-depressa, nigra, tenui striata, striis obsolete punctulatis, interstitiis subtiliter coriacieis; in basi suturæ linea lata, elongata, albo-squamosa, cum macula adnexa, & saepe præterea puncto libero utrinque ejusdem coloris; limbus totus lateralis & apicalis albo-squamulosus, cum macula cruciformi denudata nigra utrinque ante apicem; ante medium utrinque fascia albo-squamosa, abbreviata, margini contigua. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis albis omnino tectum. Pedes mediocres, nigri, albido-squamulosi, tarsis fusco-ferrugineis, femoribus acute dentatis, ante apicem annulo albo-squamoso cinctis.

Variat linea baseos suturæ squamulis cinereo-brunneis tecta,

130. R. marginatus: niger, sub-depressus,
supra fuscō-squamulosus, futuræ basi corporo-
reque subtus albi lo-squamulosus; thorace
mutico, antice reflexo, femoribus obsole-
te dentatis.

Circulio marginatus. Payk. fn. 3. 211. 28.

Habitat in pratis aridis W. Strogothiæ, præ-
fertim in Trifoliis, passim.

Descr. Statura Rh. trimaculati, sed duplo minor;
futuræ basi tantum alba, femoribus obsoleta denta-
tis, &c. distinctus; variat etiam adhuc minor, Rh.
didymo æqualis. Caput rotundatum, retræctum, ni-
grum, opacum, cæbre punctulatum, pilis squamu-
lisque fuscis obductum; oculi parvi brunnei; ro-
strum capite cum thorace longius, arcuatum, nigrum,
cæbre punctulatum. Antennæ rostro cum capite
longiores, piceæ, clava oblonga, acuminata. Tho-
rax brevis, latus, antice coarctatus. & juxta apicem
transversim profunde, sed minus late, impressus, mar-
gine valde elevato, reflexo, basi truncatus, supra fe-
re planus, niger, cæberriime punctulatus, fuscus pu-
bescens, in medio canaliculatus. Scutellum vix ob-
servandum. Elytra thoracis basi paulo latiora, hu-
meris rotundatis, thorace vix triplo longiora, po-
sterius angustiora, supra parum convexa, nigra, o-
paca, tenui striata, striis vix punctulatis, interstitiis
planis, cæberriime subtiliter granulato-coriaceis,
squamulis minutis fuscis, aliisque cinereo-albidis,
sparsis obducta; in ipsa basi suturæ linea simplex,
& margo exterior antice, dense albo-squamosa.
Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense albido-
squamulosum. Pedes validi, fusco-picei, cinereo-
pubescentes, femoribus clavatis, dente parvo, obso-
leto, armatis.

131. R. Didymus: niger, convexus, subitus albo-squamulosus, thorace canaliculato, bimaculato, elytris profunde punctato striatis, maculis quatuor albido-squamosis.

Fabr. Eleut. 2. 482. 209.

Circulio didymus. *Payk. fn.* 3. 213. 30. *Herbst.* *Col.* 6. 397. 375. *tab.* 91. *f.* 6.

Circulio arquata. *Herbst. Col.* 6. 396. 374. *Tab.* 91. *f.* 5. *forte.*

Circulio Urticæ. *Schranck. enum.* 114. 216. *Marsh. Ent. Br.* 1. 281. 128.

Circulio viduus. *Panz. fn.* 42. *f.* 17. *Crit.* *Rev.* 1. 128.

Habitat in urtica dioica, frequens.

Descr. Parvus, Rh. Campanulæ vix æqualis, sed multo convexior. Caput rotundatum, retractum, nigrum, crebre punctulatum, dense cinereo squamu-losum, vertice sub carinato; oculi brunnei, sub-prominuli; rostrum capite cum thorace multo longius, valde arcuatum, inflexum, nigrum, crebre punctulatum, cinereo-pubescentes. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, ferruginæ, clava fuscescente. Thorax brevis, antice valde coarctatus, & juxta apicem transversim profunde, sed non late, impressus, margine elevato, reflexo; postice bi-sinuatus, supra disco convexus, in medio canaliculatus, versus latera utrinque tuberculo valido armatus, totus niger, crebre punctatus, subitus & lateribus dense albido-squamulosus, dorso magis nudo. Scutellum minutum, profunde impressum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, poste-

rius

rius angustiora, supra convexa, nigra, sat profunde striata, striis latis, crenato punctatis, interstitiis planis, subtiliter granulatae coriaceis, squamulis minutis fuscis aliisque albido intermixtis, obducta; suturæ basis & apex, ut & macula transversa, composta, in singuli elytri medio lateralí albida, e squamis condensatis; signaturæ istæ tamen facile determinantur. Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense albido squamosum. Pedes cinereo-squamosi, femoribus clavatis, dente parvo armatis, pierumque nigris, interdum tamen ferrugineis; tibiæ & tarsi semper ferruginei.

132. *R. pollinarius*: niger, sub-depressus; supra brunneo-cinereoque, subtus albido-squamulosus; antennis tarsisque ferrugineis; rostro elongato, atro, arcuato, thorace canaliculato, bi-tuberculato.

Circulio pollinarius. Forst. Cent. N:o 33.

Circulio dentatus. Marsh. Ent. Br. I. 280.
125.

Rhynchænus Raphani. Fabr. Eleut. 2. 485. 221?

Habitat in Scania ad Bælteberga, ratius, Dom. Wetterhall.

Descr. Statura depressa Rh. Borraginis, sed magis rotundatus & plus duplo major, Rh. marginato majori æqualis. Caput parvum, angustum, nigrum, sat crebre punctatum, squamulis piliformibus, depressis, cinereo-albidis, dispersum, vertice sub-carinato, fronte inter oculos depresso; oculi magni, globosi, brunnei, circumcirca albo ciliati; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuatum atrum, sub nitidum,

tidum, crebre granulato-punctulatum. Antennæ rostro cum capite fere longiores, tenues, ferrugineæ, pubescentes, articulo primo apice clavato, piceo. Thorax antice valde coarctatus; & intra apicem transversim impressus, margine elevato; basi truncatus, cum angulo producto, obtuso, in medio; supra depresso, fere planus, in medio sat profunde canaliculatus, margine postico elevato; totus niger, crebre granulato-punctatus, supra squamulis rarioribus cinereis, subtus & lateribus densioribus, albido dispersus; in utroque latere, paullo pone medium, tuberculum magnum, elevatum, acuminatum. Scutellum vix ullum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo plus duplo longiora, apice singulatim obtuse rotundata, anum non tegentia, supra depressa, obsoletius striata, striis vix crenulatis, interstitiis creberrime rugoso-coriaceis; tota nigra, squamulis cinereis, hinc inde in maculas obsoletas condensatis, aliisque interjectis fusco brunneis, submicantibus, nebulosa; ante apicem cujusvis elytri arcus e tuberculis elevatis, & pone illum macula, densius & albido squamosa, fere in ipso apice. Corpus subtus nigrum, obsolete punctatum, dense albido squamosum. Pedes elongati, nigri, albido-squamosi, femoribus clavatis, omnibus dente valido, acute armatis. Tibiarum ipso apice, tarsisque totis rufo-ferrugineis.

133. R. Borraginis: niger, sub-depressus, subtus cinereo-squamulosus, tarsis rufis, thorace canaliculato, bi-tuberculato, elytris cinereo-irroratis, suturæ basi albidae.

Fabr. Eleut. 2. 483. 212.

Curelio Borraginis. Payk. fn. 3. add. 457.

30-31.

Curculio quadridens. Panz. fn. 36. f. 13. Crit.
Rev. 1. 128.

Curculio Quercicola. Marsh. Ent. Br. 1. 280.
126.

Habitat in plantis oleraceis, Raphano, bras-
fica, aliisque, passim.

Descr. Statura depressa Rh. assimilis, sed plerumque paullo major. Caput rotundatum, retractum, nigrum, opacum, crebre punctulatum, dense cinereo-squamulosum; oculi brunnei, sub-depressi; rostrum capite cum thorace longius, inflexum; arcuatum, nigrum, punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, fuscò-ferrugineæ. Thorax antice coarctatus, transversim late & profunde impressus, margine elevato, reflexo; postice bi-sinuatus, supra depresso, in medio sat profunde canaliculatus, urinque tuberculo valido, obtuso; armatus, totus niger, opacus, crebre punctatus; supra squamulis pilisque cinereis parcus adspersus, subtus & lateribus squamis densis cinereo-albido tectus. Scutellum parvum, nigrum, demersum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris carinato prominulis, thorace plus duplo longiora, supra parum convexa. nigra, opaca, tenue striata, striis sub-simplicibus, interstitiis subtiliter rugulosis; tota squamulis cinereis variegata; ad basin futuræ macula cinereo-albida, evidenter, squamulosa; ante apicem singuli elytri callus elevatus, tuberculis pluribus exasperatus. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis cinereo albidis tectum. Pedes nigri, cinereo-pubescentes, tarsis rufo-ferrugineis, femoribus parum clavatis, dente parvo armatis.

134. R. Sulcicollis: niger, sub-convexus,
subtus cinereo-squamulosus, thorace ca-
nalicula-

canaliculato, bi-tuberculato, elytris leviter striatis, pectore utrinque punto dense albo-squamoso.

Curculio sulcicollis. Payk. Fn. 3. 217. 34.

Curculio pleurostigma. Marsh. Ent. Br. 1. 282.
131.

Var. b, corpore supra densius cinereo-squamuloso.

Curculio affinis. Panz. fn. 57. f. 15. Crit.
Rev. I. 126.

Habitat in plantis passim.

Descr. Rh. assimili, antea sub N:o 63 descripto; ut ibi dictum, statura & magnitudine simillimus, nimisque affinis, sed differt: corpore paullo magis convexo, femoribus crassioribus, dente parvo armatis, &c. Caput rotundatum, nigrum, crebre punctulatum, parum pubescens, vertice sub-carinato; oculi parvi brunnei; rostrum capite cum thorace longius, tenui, valde arcuatum, nigrum, nitidum, basi punctulato-striatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, nigræ, clava oblonga, fuscopubescente. Thorax antice coarctatus, juxta apicem late & profunde transversim impressus, margine elevato, reflexo; basi bi-sinuatus, supra disco convexus, in medio sat profunde canaliculatus, lateribus utrinque tuberculo parvo armatus, totus niger, crebre & sat profunde punctatus, subtus & lateribus squamulis cinereo albidis parte adspersus, supra sere glaber, pilis tantum paucis minutissimis. Scutellum minutum, demersum. Elytra thoracis h[ab]et multo latiora, humeris prominulis, & illo plus duplo longiora, posterius angustata, supra modice convexa, nigra, tenui striata, striis levibus, interstitiis planis, subtiliter

liter rugulosis, pilis minutissimis cinereis, depresso, parce adspersa. Corpus subtus nigrum, punctarum, pectore densius, ventre parcius; cinereo albido squamosis; lamina pectoralis, inter thoracis & elytrorum basin utrinque ascendens, apice dense albo-squamosa, punctum album referens. Pedes longisculpi, nigri, femoribus crassiusculis, dente parvo, obsoleto, albo piloso. armatis.

Var. b, supra, præsertim in elytris, squamulis parvis, cinereis, densioribus, adspersa, unde color magis plumbeus, ut in Rh. assimili; sed notæ essentiales ut in a. omnino.

Obs. Varietatem, elytris nigro-æneis, a Dom. Paykull, loc. cit. memoratam, non vidi.

135. R. Quercicola: niger, opacus, subtus cinereo-squamulosus, thorace depresso, bistrabeculato, basi canaliculato; elytris cinereo-variegatis, futuræ basi alba.

Fahr. Eleut. 2. 451. 66.

Curculio Quercicola. Payk. fn. 3. 215. 33.

Herbst. Col. 6. 403. 383. Tab. 91. f. 13.

Habitat in Quercetis passim, minus frequens.

Descr. Parvus, Rh. Erysimi vix major. Caput retractum, nigrum, opacum, crebre punctulatum, squamulis cinereis, nitidis, adipersum, oculis brunneis, sub-prominulis; rostrum longitudine capitis cum thorace, valde arcuatum, nigrum, subtilissime punctulatum, apice lave, nitidum. Antennæ rostro cum capite longiores, nigræ, clava oblonga, acuminata. Thorax antice valde coarctatus, juxta apicem minus

minus late & profunde transversim impressus, margine elevato, reflexo; basi truncatus, supra depresso, in medio baseos profunde cinatculatus, versus latera utrinque tuberculo parvo armatus, totus niger, crebre subtiliter punctulatus, supra squamulis minutis, purpuraceen i metallicis, subtus cinereo-albidis densioribus obdustus. Scutellum vix illum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominentiis, & illo plus duplo longiora, apice singulatim rotundata, abdome breviora, supra modice convexa, nigra, op. c. 1, tenue striata, striis sub-punctatis, interstitiis subtilissime coriaceis, squamu is parvis fuscis & cinereo-albidis mixtis, absque ordine variegata; suturæ basi, fere ad medium, late albo squamosa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense cinereo-squamulosum, Pedes longiusculi, nigri, pilis cinereis variegati, femoribus dente parvo, in anticis saepe obfoleto, armatis.

136. *R. rugulofus:* nigro-piceus, subtus cinereo-squamulosus, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace depresso; bi-tuberculato elytrisque cinereo-lineatis, macula media suturali oblonga, atra.

Curculio rugulosus. *Herbst. Col. 6.* 406. 386.
Tab. 91. f. 16.

Curculio Quercicola var. *Payk. fn. 3.* 216. b.

Curculio melanostictus. *Marjh. Ent. Br. I.* 282.
132.

Curculio uni-guttatus. *Marjh. Ent. Br. I.* 283.
135. forte idem.

Var. b, fusco-ferrugineus, elytris pedibusque dilutius testaceis.

Var. c, niger, elytris fasciis duabus albido-squamosis, anteriori flexuoso-arcuata, posteriori undulata.

Habitat in plantis, præsertim oleraceis, non infrequens.

Deser. Magnitudo & fere statura præcedentis, distinctus tamen, thorace postice minus depresso, femoribus acutius dentatis, colore & signaturis longe aliis. Caput rotundatum, nigrum, punctulatum, dense cinereo pilosum & squamosum, oculis prominulis brunneis; rostrum capite cum thorace fere longius, valde arcuatum, nigrum, crebre punctulatum. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, piceæ, clava oblonga, acuminata. Thorax brevis, transversus, antice valde coarctatus, ibique profunde transversim impressus, margine elevato reflexo; postice fere truncatus, supra sub depresso, in medio tenui canaliculatus, in ipso margine laterali utrinque tuberculo obtuso armatus, totus niger, crebre subtiliter punctulatus, subtus & lateribus dense cinereo-squamulosus, supra linea dorsali media, aliaque obsoletiori laterali arcuata, cinereis. Scutellum minutissimum, depresso. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo fere triplo longiora, abdomen tegentia, supra modice convexa, nigra, tenui striata, striis obsolete punctatis, interstitiis subtiliter granulato coriaceis; futura albido-squamosa, sed a medio versus posteriora macula magna, oblongo-quadrangulari, interrupta; superficies reliqua squamulis fulvo cinereis, aliquaque albidis, in lineolas abbreviatas condensatis, obducta. Corpus subtus piceum, punctulatum, dense cinereo-squamulosum. Pedes elongati, cinereo-pubescentes, femoribus piceis, omnibus evidenter dentatis, tibiis tarassisque testaceis.

- Var. b, colore dilutiori tantum differt; elytra brunnea seu obscure testacea; femora ferruginea, basi obscuriora; signaturæ prærerea ut in a.

Var. c, supra magis nigra; thorax tantum linea dorsali lateribusque cinereo-squamosa; elytrorum sutura ut in a, sed superficies reliqua parum squamosa; ante medium fascia angusta, albido-squamosa, valde flexuosa, a basi suturæ, oblique versus medium disci ducta, dein antrorsum versus marginem humeralem flexa; versus apicem fascia altera, inæqualis, undulata, fere transversa; cærera ut in a.

337. R. *Troglodytes*: rufo-brunneus, subitus albido-squamosus, antennis pedibusque rufo-testaceis, thorace mutico, cinereo-trilineato, elytris profunde punctato-striatis, squamulis erectis, albidis, seriatis, muricatis.

Fabr. Eleut. 2. 485. 223.

Curculio Troglodytes. Payk. *fn.* 3. 214. 31.
Herbst. *Col.* 6. 473. 484. Marsh. *Ent. Br.*
l. 281. 127.

Var. b, corpore supra glabro, rufo-brunneo, sutura obscuriori, forte detritus.

Curculio Puso. Panz. *fn.* 36. *f.* 15. *Crit. Rev.* *l.* 129?

Var. c, Pallide testaceus, elytrorum sutura fulca, rostro brunneo.

Curculio Spiniger. Herbst. *col.* 6. 410. 391. *tab.* 92. *f.* 4.

Var. d, Paullo minor, thorace lineis tribus,
elytris litoris variis albo-squamosis.

Habitat in pratis aridis, ad agrorum margines, paucim; var. d, in Smolandia, rarius, Dom. Liungh; in Westrogothiæ arvis, ipse.

Descr. Parvus, praecedenti fere æqualis, Rh. di-dymo dimidio minor. Caput rotundatum, fusco-brunneum, crebre & profunde punctatum, cinereo-squamulosum, oculis nigro brunneis, parum prominatis; rostrum capite cum thorace multo longius, valde arcuatum, aut piceum, aut dilutiis rufo-brunneum, sat profunde striato punctatum, apice laeve. Antennæ rostro cum capite longiores, tenues, totæ rufo testaceæ. Thorax anterius angustatus, non vero abrupte coarctatus, ut in prioribus, ante apicem sat profunde transversim impressus, margine elevato, reflexo, in medio emarginato; basi sub-truncatus, supra modice convexus, in medio obsolete canaliculatus, rufo-brunneus, crebre & profunde reticulato-punctatus, margine postico angusto, elevato, nigro-piceo; in medio linea lata cinereo-squamosa, & versus latera utrinque alia, obliqua, obsoletior; subtus pierumque saturius fusco-brunneus, densius cinereo-squamosus. Scutellum minutum, punctiforme, fuscum. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominatis, & illo plus duplo longiora, anum tegentia, supra modice convexa, brunnes, seu rufo ferruginea, icta basi & futura obscurioribus, fuscis seu piceis; punctato striata, punctis profundis, remotis, interstitiis convexis, levibus; in singulo interstitio series regularis e squamulis parvis, erectis, albidis, & ante apicem callus elevatus, tucerculato muricatus. Corpus subtus aut piceum, aut dilutiis rufo-brunneum, pectore densius, ventre parcus albido-squamosis,

Pedes

Pedes breviusculi, validi, pallide rufo testacei, femoribus evidenter dentatis.

Var. b., differt tantum corpore supra glabro, squamu's forte detritis; ad latera thoracis & versus postica elytrorum, squamulæ plerumque tenacius adhaerent.

Var. c, pallidior; rostrum rufo brunneum; caput, thorax & corpus rufo testacea; elytra, antennæ & pedes pallida; forte nuper exclusa,

Var. d, primo aspectu magis differt, plerumque dimidio minor; linea'e thoracis albo, vel fere niveo-squamose; elytra lituris variis albo-squamosis nota-ta, versus postica squamulis erectis, albis, seriatim, adspersa; cætera quoad minimum punctum, ut in a, omnino, ut vix Specie distingui queat.

338. R. globulus: niger, sub-opacus, linea futurali pectorisque lateribus albido-squamosis, elytris globosis, profunde sulcatis punctatisque, intersticiis angustis, crenatis.

Curculio globulus. Herbst. col. 6. 398. 376. tab. 91. f. 7.

Habitat in surculis Populi tremulæ, locis umbrosis, Sylvaticis, in Westrogothia rarius lectus.

Descr. Rh. Troglodyta var. d, fere minor, elytra breviora, sed multo latiora, rostrum crassum, &c, Caput rotundatum, retractum, nigrum, opacum, obsolete punctatum, squamulis albidis, piliformibus, adspersum, oculis globosis nigris; rostrum longitudo fere capitis cum thorace crassiusculum, valde arcuatum, nigrum, creberrime rugoso-punctatum, Antennæ

Antennæ rostro cum capite paullo longiores, crassifusculæ, nigro piceæ, clava magna, acuminata, Thorax latitudine baseos paullo brevior, anterius angustatus, margine parum elevato. lateribus sub-rotundatus, basi bisinuatus, supra disco postico convexus, in medio obsolete canaliculatus, intra basin utrinque impressus, totus niger, sub-opacus, creberrime & profunde punctatus, squamulis albidis, in medio & versus latera in lineas obsoletas condensatis, adspersus. Scutellum vix ulla. Elytra, antice thorace plus quam dimidio latiora, humeris prominulis, posterius angustiora, anum fere totum tegentia, supra valde convexa, nigra, perum nitida. squamulis minutis albidis seriatim adspersa, profunde sulcata, & in sulcis punctis magnis, profundis, impressa, unde interstitia crenata appareant. Corpus subtus nigrum, punctatum, pectoris lateribus dense albido-squamosis. Pedes longiusculi, validi, nigro-picei, squamulis cinereo-albidis, crebre adspersi, femoribus clavatis, omnibus dente parvo armatis.

Familia 3'a, Saltatorii, femoribus posticis crassis, clavatis. *Orchesites*, Illig.

Obs. Species hujus familiæ ut peculiare Genus considerarunt Dom. Illiger & Latreille; vix vero sufficiunt notæ; plurimis quidem singularis habitus, capite parvo, infexo, oculis in fronte fere conniventibus, femoribus posticis crassissimis, saepe subtus angulatis & dentatis, &c.; aliis vero oculi distantes, femo-

ra postica parum incrassata, quibus tamen saliunt, Rhynchænis plerisque simillimi, quare ut familiam huic generi adjunxi.

Sect. I. Femoribus dentatis aut serratis.

139. R. Viminalis: rufo-testaceus pubescens; oculis pectoreque nigris, elytris plaga antennæ triangulare cinereo-pubescente, femoribus posticis maximis ferrato-dentatis.

Fabr. Eleut. 2, 494. 265.

Circulio viminalis. Herbst. col. 6. 420. 405.
Tab. 93. f. 1. Payk. fn. 3. 219. 38.

Circulio Saltator Ulmi. De Géer Ins. 5. 260.
48. tab. 8. f. 5 - 11.

Circulio Quercus. Linn. Syst. 2. 609. 25. Fn.
Sv. 596. Uddmann. Diff. 13. 25.

Habitat in *Quercus roboris* foliis passim;
in rimis corticis truncorum *Quercus* hibernat; Larva in foliis sub-cutanea.

Descr. Major in hac sectione, Rh. plantaginis var. c. d, fere æqualis. Caput parvum, deflexum, rufo testaceum, pubescens, oculis magnis, nigro-brunneis, in fronte fere conniventibus; rostrum longitudine capitis cum thorace, crassiusculum, arcuatum, inflexum, rufo testaceum, sub-nitidum, obsoletè striatum. Antennæ rostro cum capite longiores, rufo testaceæ, in medio rostri insertæ, articulo primo extrosum crassiori, tertiam partem totius antennæ æquante; secundo etiam magno, ob-conico; sequente tubo

tibus parvis, clava ovata, tri-articulata. Thorax parvus, antice multo angustior, basi bisinuatus, supra modice convexus, saturate rufo-testaceus, adspersus pube pallida, depressa, immixtis pi'is erectis, obscuris; in dorso obsolete canaliculatus, subtus in medio nigro-fuscus. Scutellum parvum, rotundatum, albidu-pubescentia. Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice obtuse rugulata, supra parum convexa, ante apicem arcuatim impressa, rufo-testacea, regulariter punctato-striata; in dorso antice area magna, triangularis, communis, ab humero ultra medium suturæ extensa, dense pallido pubescentia, qualis pubescens etiam margines, & apicem cingit, relicta plaga posteriori cuiusvis elytri magis denudata, saturatius ferruginea. Pectus nigrum, obsolete punctulatum, parce pubescentia; abdomen aut totum pallidus testaceum, aut segmentis 2 s. 3 anticis nigricantibus. Pedes toti pallide testacei, femoribus quatuor anterioribus spinula parva, acuta, in medio armatis; posticis maximis, subtus angulatis, a medio ad apicem canaliculatis, serie duplii e spinulis 6 vel 7 acutis notatis.

Obs. Curc. Quercus Cl. Linnæi; loc. cit. potius
huc pertinere mihi videtur, quam ad Rh. Quercus
fabricii, nam in illo fasciæ elytrorum transversales,
minime triangulum formantib; Cl Dom. Kirby et-
jam nostrum ut C. Quercus Linnæi, secundum ejus
museum, mihi communicavit.

40. R. Alni: niger, pubescens, thorace,
elytris, anno tarsisque rufo-testaceis; ely-
tris maculis quatuor nigris; femoribus po-
sticis maximis, ferrato ciliatis.

Fabr. Eleut. 2. 492. 256.

Curc.

Curculio Alni. Linn. Syst. 2. 611. 42. Fn Sv.
508. Herbst. Col. 6. 425. 411 Tab. 93. t. 7.
De Géer Ins. 5. 262. 49. Pauk. fn. 3. 220.
39. Thunb. Act. Upl. 5. 95. 14.

Var. b, Testaceus, capite; pectore femori-
busque nigris, elytrorum maculis fuscis;
obsoletis. Payk. l. c. var. b.

Habitat in foliis Alni, minus frequens.

Deser. Statūra & affinitas præcedentis, sed di-
midio fere minor, colore & femoribus tenuius arma-
tis, distinctus. Caput parvum, deflexum, nigrum, pu-
bescent, oculis nigris, in fronte approximatis; rostrum
ut in præcedenti, sed nigrum. Antennæ rufa testa-
ceæ; basi obscuriores, structura ut in priori. Thorax
parvus, antice angustior, basi bisinatus, supra mo-
dice convexus, rufa testaceus, pubescent, subtus in-
ter pedes nigro-fuscus; in medio dorsi interdum ma-
cula transversa fusca. Scutellum parvum, rotundatum,
nigrum. Elytra magna, thoracis basi di-
midio latiora, & illo quintuplo longiora, antice obtu-
se rotundata, supra modice convexa, rufa testacea, sat
profunde punctato striata, pubescentia; in medio ba-
ses cujusvis elytri macula oblonga, angusta, nigra
& in medio disci, versus suturam, alia, magna, ro-
tuosa, saepe cum opposita confluens. Pectus
& abdomen nigra, punctata, pubescentia, ani margi-
ne testaceo. Pedes validi, nigri, tarsis testaceis; fe-
mora postica maxima, subtus angulata, dente medio;
& pone illum serie e ciliis rigidis, armata.

Var. b, colore dilutiori tantum differt; forte
nuper exclusa; caput & rostrum nigra; thorax &
elytra pallide testacea; maculis elytrorum fuscis ob-
soletis;

soletis; Pectus fusco-piceum; abdomen testaceum; basi fuscescens. Pedes fusco-testacei, femoribus interdum obscurioribus.

41. *R. scutellaris*: oblongus, rufo-ferrugineus, oculis, rostri apice, pectore ab domineque nigris, scutello albido-pilofo, femoribus posticis magnis unidentatis.

Fabr. Eleut. 2. 495. 268.

Curculio rufus. *Schranck. Austr.* 116. 220.

Marsh. Ent. Br. 1. 261. 69.

Curculio Alni var. *Payk. fn.* 3. 221. 39. c.

Var. b, rostro, thorace, elytris pedibusque pallidis.

Habitat in foliis alni passim, non infrequens.

Descr. Præcedentibus affinis, sed angustior, rostro tenuiori, elytris profundius striatis, scutello albido, ab domine toto nigro, femoribusque posticis tantum unidentatis, distinctus. Caput parvum, rufo-ferrugineum, punctatum, pubescens, oculis nigris, in fronte magis remotis quam in prioribus; rostrum longitudine thoracis, inflexum, arcuatum. minus crassum, rufum, nitidum, parum punctularum, apice fusco piceum. Antennæ totæ rufo-ferrugineæ, struita ut in prioribus. Thorax parvus, antice angustior, & pone apicem transversim impressus, basi bisinuatus, supra modice convexus; in medio canaliculatus, totus rufo ferrugineus, rugoso-punctatus, pubescens, subtus inter pedes nigro fuscus. Scutellum mediocre, rotundatum, fuscum, pube densa cinereo-albida nitente tectum, Elytra magna, thoracis basi

vix dimidio latiora, sed illo quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, saturate rufo-ferruginea, profunde crenato striata, intersticiis convexis, sub-rugosis, pube rigida, depressa, pallida inæqualiter adspersa, unde variegata apparent. Pectus & abdomen nigra, immaculata, obsolete rugoso-punctata, tenue pubescentia. Pedes validi, saturate rufo-ferruginei, pubescentes, femoribus anterioribus muticis, posticis magnis, subtus angulatis, dente unico parvo medio armatis.

Var. b, differt tantum colore pallido vel flavescente; forte nuper exclusa.

Obs. In Musæo Celeb. Dom. Sehestedt & Lund, hanc speciem ut genuinum Rh. scutellarem Fabricii vidi; eandem etiam ex Anglia, a Dom. Kirby, ut C. rufum Marshami, obtinui.

142. R. Ilicis: oblongo-ovatus, niger, pube cinereo-albida variegatus, antennis tarsisque testaceis, femoribus posticis magnis, ferrato-dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 494. 266.

Curculio Ilicis. Payk. Fn. 3. 218. 37. Herbst. Col. 6. 432. 420.

Curculio pilosus. Herbst. Col. 6. 426. 412. tab. 93. f. 8. Marsh. Ent. Br. 1. 262. 72.

Curculio Saltator Segetis. De Geer Ins. 5: 264. 50.

Habitat in Quercus Roboris foliis, passim:

Descr. Statura Rh. Viminalis, sed dimidio minor & ultra. Caput parvum, nigrum, punctatum, pubes-

pubescens, oculis magnis, concoloribus, in fronte conniventibus; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, nigrum, rugoso-punctatum, gresso pubescens. Antennæ rotæ testaceæ. structura ut in prioribus. Thoracis structura ut in proxime præcedenti, totus niger, rugoso-punctatus, pubescens, dorso sub-canaliculatus, plaga magna inæquali densius albido pubescente. Scutellum parvum, rotundatum, dense albido pubescens. Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, punctato striata, interstitiis planis, sub rugosis; pube cinereo albida & ferruginea immixta, hinc inde variegata; in basi suturæ linea oblonga albido pilosa; sutura posterior, ut & interstitia alterna disci, maculis albido-pilosis & nigris denudatis obsolete tessellata. Corpus subtus nigrum, punctatum, dense pubescens. Pedes validi, nigri, tarsis testaceis; femora quatuor anteriora subatus dente medio parvo, acuto; postica magna, subatus angulata, dente medio & serie e spinulis parvia armata,

243. R. pilosus: oblongo-ovatus, niger, dense cinereo-pubescent, antennis basi testaceis, scutello pectorisque margine albidis, elytris maculis quinque denudatis; femoribus posticis unidentatis.

Fabr. Eleut. 2. 493. 258.

Curculio pilosus. *Payk. fn.* 3. 218. 36.

Var b, Elytris undique pubescentibus, immaculatis.

Habitat in foliis Betulæ albæ, locis uliginosis, passim.

Descr.

Descr. Statura fere præcedentis, sed paullo minor. Caput parvum, nigrum, cinereo-pubescent, oculis magnis nigro brunneis, in fronte fere conniventibus; rostrum longitudine thoracis, arcuatum, nigrum, sub-nitidum, parce punctulatum. Antennæ pallide testaceæ, clava nigro-fusca, structura ut in prioribus. Thorax brevis, antice angustior, lateribus rotundatus, basi fere tri-sinuatus, supra parum convexus, in medio canaliculatus, totus niger, crebre rugoso punctatus, pube rigida, depressa, cinerea, undique æqua'iter adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, dense albido-pubescent. Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, nigra, punctato-striata, interstiis planis, sublaevibus; pube cinerea, depressa, adspersis, relictis maculis quinque derudatis, nigris; quarum una in singuli elytri disco, pone basin; tertia communis in medio suturæ, ultimæ obsoletiores, una in singuli elytri callo postico. Corpus subtus nigrum, punctulatum, parce pubescent; pectoris laminæ laterales utrinque dense albido pubescentes. Pedes validi, nigri, pubescentes, tarsis fusco-ferrugineis; femora anteriora mutica, postica magna, subtus angulata, dente parvo instructa.

Var. b, differt tantum maculis denudatis elytrorum valde obsoletis, fere nullis; pube detrita totus niger evadit.

¶44. R. Fagi: oblongus, niger, immaculatus; tenue pubescent, antennis tarsisque pallide testaceis, femoribus omnibus unidentatis, posticis crassis, angulatis.

Curculio Fagi. Linn. It. Scan. III.

Rhynchænus calcar. Fabr. Eleut. L. 493. 261?

Rhynchænus Fragariæ. Fabr. Eleut. 2. 495.
271? an idem?

Curculio Fragariæ. Payk. fn 3. 217. 35. Herbst.
col. 6. 423. 407. Tab. 93. t. 3.

Curculio Rhododactylus. Marsh. Ent. Br. 1.
262. 74.

Habitat in foliis Fagi Sylvaticæ, in Svecia
australi, non infrequens.

Descr. Præcedenti quidem similis, sed minor,
angustior, & vere distinctus. Caput parvum, nigrum,
creberrime punctulatum, osu'is concoloribns, in
fronte fere coeuntibus; rostrum longitudine thora-
cis, arcuatum, nigrum, magis nitidum, rugoso-pun-
ctatum. Antennæ totæ pallide testaceæ, structura ut
in prioribus. Thorax brevis, antice angustior &
pone apicem transversim impressus, lateribus rotun-
datus, basi sub-tri-fiuatus, supra modice convexus,
obsolete canaliculatus, totus niger, creberrime pun-
ctatus, pube tenuissima fusca adpersus. Scutellum
parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis basi
vix dimidio latiora, sed sextuplo longiora, supra mo-
dice convexa, nigra, regulariter, sed tenue punctato-
friata, interstitiis planis, sub-lævibus, pube tenuissi-
ma fusca, interdum obscure virecente, parce adper-
sa. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum,
tenue pubescentia. Pedes validi, nigri, talvis pallide
testaceis; femora quatuor anteriora subtus spinula
parva, recta, in medio; postica magna, crassa, subtus
angulata, spina paullo validiori, & ciliis nonnullis
seriatis, armata.

Obs. Curculio Fagi Linn. It. Scen. certe idem
ac noster, sed errore quodam in Fauna Svecica &
Systemate, Apion flavipes loco ejus descriptum fuisse
videtur; Rh. Fagi Fabr. Eleut. 2. 495. 270. e scri-
ptis

ptis Linnæi translatus, etiam idem; utrum Rh. Calcar Fabr. vel Rh. Fragariæ, S. El. 2. 495. 271. hue pertinet, ex descriptionibus incompletis vix dijudicandum.

Sect. 2:da Femoribus muticis.

145. R. Salicis: ovatus, niger, scutello, fasciisque duabus elytrorum undato-flexuosis albido-pilosis, thorace parvo, angusto, basi sub-truncato.

Fabr. Eleut. 2. 494. 264.

Curculio Salicis. Linn. Syst. 2. 611. 43. Fn. Sv. 610. De Geer Ins. 5. 264. 51. Herbst. Col. 6. 422. 406. Tab. 93. f. 2. Payk. fn. 3. 269. 91. Marsh. Ent. Br. I. 264. 79.

Curculio scrutator. Herbst. Col. 6. 191. 152. Tab. 73. f. 4. idem. vid. Tom. 7. p. 4.

Habitat in Salicibus, Populo, frequens.

Descr. Parvus, depresso-saturate niger. Caput parvum, nigrum, profunde & crebre punctatum, oculis brunneis, in fronte approximatis; rostrum longitudine thoracis, crassiusculum, arcuatum, atrum, rugoso-punctatum. Antennæ rufo-piceæ, clava nigro-fusca, structura ut in prioribus. Thorax parvus, antice valde angustatus, basi sub-truncatus, vix sinuatus, supra sub-depressus, totus niger, opacus, creberrime rugoso-punctatus, linea dorsali angusta, griseo-pilosa. Scutellum parvum, rotundatum, dense niveo-pubescentia. Elytra thorace plus quam dimidio latiora & quintuplo longiora, supra sub-depressa, vel perparum convexa, saturate nigra, sub-nitida, profunde striata, & in striis crenato-punctata, interstitiis

sub-lævibus; ante medium fascia piloso-albida, communis, valde inæqualis, extrorsum angusta, arenata, margines non attingens, introrsum latior, in futura ad scutellum usque producta, in singulo elytro ramulum rectum antrorsum, & alium, futuræ propriæ, retrorsum emittens; medium hujus fascæ juxta futuram, sëpe colore rufo-ferrugineo tinctam; pone medium fascia altera, macularis, angustior, magisque abbreviata, apicibus antrorsum flexis. Corpus subtus nigrum, nitidum, punctatum. Pedes validi, toti nigri, femoribus posticis mediocre incrassati,

146. R. Signifer: ovatus, niger, antennis, tibiis tarsisque testaceis, elytris plaga magna, lobata, baseos, fasciaque postica abbreviata albido-pilosis, thorace latiori, basi sinuato.

Orcheses signifer. Creutz. Ent. Eut. Vers. 125. 17. tab. 3. f. 29. a.

Curculio avellanæ. Marsh. Ent. Br. 1 263. 78.
Curculio bi-fasciatus var. Payk. fu. 3. 270.
92. b.

Habitat in foliis *Quercus roboris*, minus frequens.

Descr. Statura fere præcedentis, sed paullo minor, thorace latiori, fasciarum situ, colore antennarum & pedum, abunde distinctus, sequente magis affinis. Caput parvum, nigrum, opacum, tenue pubescens & punctulatum, oculis nigro-brunneis, in fronte conniventibus; rostrum longitudine thoracis, arcuatum, nigrum, nitidum, sub-striatum. Antennæ pallide testaceæ, claya paullo obscuriori, structura ut

in prioribus. Thorax brevis, transversus, antice angustior, basi evidenter bi sinuatus, supra modice convexus, niger, opacus, crebre punctulatus, pube cinereo albida, deprecta, præsestim anterius, tectus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, parum pubescens. Elytra antice thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, in medio dilatata, thorace quintuplo longiora, supra parum convexa, nigra, subnitida, sat profunde punctato striata, interstitiis planis, subævibus; in basi interiori plaga magna, lobata, albido pilosa, juxta suturam longius producta, quasi e lunulis duabus crassis, prope scutellum connexis, composita, & longe pone medium, versus apicem elytrorum, fascia macularis angusta, valde abbreviata, albidior; apex ipse pilis ferrugineis obsitus. Corpus subtus nigrum, subnitidum, punctulatum, tenue griseo-pubescent. Pedes validi, femoribus nigris, posticis magnis, incrassatis, tibiis testaceis, basi saepè obscurioribus, tarolis pallidis.

147. *R. bi-fasciatus*: ovatus niger, antennis tarsisque testaceis, elytrorum futura baseos fasciisque duabus macularibus, approximatis, albido-pilosis, thorace latiori, profundius punctato.

Fabr. Eleut. 2. 454. 78.?

Curculio bi-fasciatus. *Payk. fn. 3. 270. 92.*

Curculio Rusci. *Herbst. col. 6. 424. 410. tab. 93. f. 6.?*

Habitat in foliis Betulæ albæ, passim.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, differt tamen, thorace nitidiori, profundius punctato, tibiis nigris, & fasciarum situ in elytris

tris longe alio. Caput parvum, nigrum, opacum, punctulatum pubescens, oculis nigro-brunneis, in fronte coeuntibus; rostrum longitudine thoracis, arcuatum, nigrum, nitidum, sub-læve. Antennæ totæ pallide testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax brevis, transversus, antice angustior, basi evidenter bi sinnatus, supra modice convexus, niger sub-nitidus, profunde punctatus, pube griseo-albida, depresso, maculatim adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, opacum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, versus medium dilatata, thorace quintuplo longiora, supra parum convexa, nigra, sub-nitida, sat profunde punctato-striata, intersticiis sub-convexis, lævibus; in ipsa futura, pone scutellum, stria elongata dense albido-pubescentia; versus medium fascia macularis, non nihil arcuata, & paullo pone medium altera, brevior, fere recta, etiam e pilis albidis, interdum sub-flavescentibus. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, punctatum, tenui pubescens. Pedes validi, nigri, tarsis foliis pallide testaceis; semora postica satis crassa, mucronata.

Obs. Synonymon Herbstii minus certum, quum colore antennarum & tarsuum pallidum, non memorat.

148. R. Jota: oblongo-ovatus, convexus, niger, scutello niveo piloso, rostro longitudine thoracis, elytris profunde crenato-striatis, intersticiis rugosis, oculis coadunatis.

Fabr. Eleut. 2. 495. 269.

*Curculio Jota. Payk. fn. 3. 271. 93. Herbst.
Col. 6. 432. 421.*

Habi-

Habitat in foliis Salicis, Betulæ, Alni, sat frequens.

Descr. Rh. Scutellari paullo minor, convexior, variat etiam duplo minor & ultra. Caput parvum, nigrum, opacum, punctulatum, oculis nigro-brunneis, in utroque sexu conniventibus; rostrum arcuatum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, maris capite cum thorace brevius, feminæ illis longius. Antennæ nigræ, clava griseo-pubescente, structura fere ut in prioribus, sed articulus secundus crassior, ovatus, vix ob conicus. Thorax anterius valde angustatus, basi sub-truncatus, supra modice convexus, niger, sub-opacus, creberrime rugoso-punctatus, pube subtilissima, cinerea, præsertim subtus & lateribus, adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, pube densa alba vestitum. Elytra magna, thoracis basi dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, ante medium transversim impressa, tota nigra, parum nitida, profunde punctato striata, interstitiis convexis, transversim sub-rugosis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre punctatum, tenue cinereo-pubescentes. Pedes medios, toti nigri, cinereo-pubescentes, femoribus posticis parum incrassatis.

Obs. Dom. Fabricius erroneæ futuræ basin albam dicit, nam scutellum solum pilositate alba vestitum.

149. R. Populi: oblongo-ovatus, niger, antennis pedibusque pallide testaceis, femoribus posticis fascia nigra, pectore albidio-pubescente.

Febr. Eleut, 2. 195. 272.

Curculio Populi. Herbst. col. 6. 423. 408. tab. 93. f. 4. Payk. fn. 3. 268. 90. Panz. fn. 18. f. 17.

Habitat in foliis Salicis Pentandræ, Populi, passim.

Deser. Statura oblonga præcedentis, sed majoribus ejus duplo minor, Rh. Fagi fere æqualis. Caput parvum, nigrum, sub-opacum, crebre punctulatum, oculis nigro brunneis, in fronte conniventibus; rostrum vix longitudine thoracis, crassiusculum, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ pallide testaceæ, struita, ut in Rh. viminali, clava paulo abscuriore. Thorax brevis, transversus, anteriorius angustior, lateribus rotundatus, basi sub-truncatus, supra in medio transversim convexus, versus apicem & basin depresso, totus niger, subtiliter crebre rugoso punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, in illæsis individuis albido pubescens. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra sub depresso, nigra, sub-nitida, profunde crenata striata, intersticiis planis, tenue rugosis. Pectus nigrum, punctatum, pube densa albida omnino tectum; abdomen nigro-piceum, punctatum, parum pubescens. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus posticis parum incrassatis, ante apicem annulo nigro cinctis,

250. R. Saliceti: oblongo-ovatus, niger; sub pubescens, antennarum basi tibiisque testaceis, elytris convexis, profunde punctato-striatis, pectore albido-pubescente.

Fabr. Eleut. 2. 493. 262.

Curculio Saliceti. Payk. fn. 3. 271. 94. Herbst. col. 6. 430. 418. Var.

Var. b, femoribus anterioribus obscure testaceis.

Habitat in Salicis Cinereæ floribus, tempore vernali, passim.

Descr. Statura oblonga præcedentis, sed quadruplo minor, sequenti æqualis, & bene distinctus. Caput parvum, nigrum, opacum, subtiliter punctulatum, tenue pubescens, oculis nigro brunneis, in fronte connexis; rostrum capite cum thorace brevius, valde arcuatum, depresso, nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ testaceæ, structura ut in prioribus, clava nigro-tusca. Thorax antice paulo angustior, lateribus rotundatus, basi sub-truncatus, supra in medio transversim convexus, versus basin & apicem depresso, totus niger sub-opacus, crebre punctulatus, tenue pubescens. Scutellum parvum rotundatum, albido-pubescentia. Elytra ovata, antice thoracis basi vix dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, nigra, sub-opaca, profunde punctato-striata, pube tenuissima cinerea adspersa: Pectus nigrum, pube densa cinereo albida omnino tectum; abdomen nigrum, sub nitidum, subtiliter punctulatum, parum pubescens. Pedes mediocres, femoribus nigris, posticis modice incrassatis, tibiis pallide testaceis, tarsis paulo obscurioribus.

Var. b, differt tantum femoribus quatuor anterioribus dilutioribus, fusco-testaceis.

151. *R. pulicarius*: oblongo-ovatus, niger, sub-nitidus, antennis basi testaceis, thorace antice angustato, rostro infexo, pectori applicato.

Curculio pulicarius. Herbst. Col. 6. 429. 416.

Tab. 93. f. 12. Payk. Jn. 3. 272. 95.

Curs

Curculio Oxyacanthæ. Marsh. Ent. Br. 1. 263.

77.

Habitat in Betulæ albæ foliis, sat frequens,
celerrime Saliens.

Descr. Minimus forte in hoc genere, præcedenti adhuc fere minor, Latridio gibboſo æqvalis, thorace antroſum valde angustato, roſtro inflexo, & colore diſtinctus. Caput minutum, angustum, nigrum, ſubtiliſſime puncṭulatum, oculis concoloribus, in fronte conniventibus; roſtrum vix longitudine thoracis, arcuatum, depreſſum, nigrum, nitidum, ſubtiliter puncṭulatum, ſemper pectori tam arcte applicatum, ut vix Rhynchænus eſſe videtur, ſed potius pro altica habendus, niſi probe impiciatur. Antennæ pallide teſtaceæ, clava nigra, acuminata. Thorax antroſum valde anguſtatus, pone apicem transverſim impressus, baſi ſub truncatus, ſupra parum convexus, obſolete canaliculatus, totus niger, ſub-nitidus, ſubtiliter puncṭulatus. Scutellum minutum, nigrum, rotundatum. Elytra antice thoracis baſi parum latiora, posterius dilatata, thorace quinque longiora, ſupra modice convexa, nigra, nitida, regulariter puncṭatoſtriata, interſtitiis planis laevibus. Corpus ſubtus nigrum, nitidum, ſubtiliter puncṭulatum. Pedes toti nigri, femoribus poſticis longis & craffoſi.

152. R. plantaris: ovatus, niger, convexus, antennis baſi teſtaceis, ſcutello pectorisque lateribus albidis, roſtro brevi, craffo; oculis remotis.

Curculio plantaris. Næzén Act. Helm. 1794. 4.

270. 5.

Habi-

Habitat in Betu'æ & Alni foliis, sat frequens; tarde Sa'iens.

Descr. Rh. Jota similis, sed minimis ejus adhuc duplo minor, præsertim brevior, ovatus, magis convexus; rostrum multo crassius, & oculi distantes. Cicut parvum, nigrum, subtiliter punctulatum, oculis lateralibus, depresso, remotis; rostrum crassum, parum arcuatum, nigrum, crebre rugoso punctatum, feminæ vix longitudine thoracis, maris adhuc brevius. Antennæ nigrae, structura ut in prioribus, articulo primo & secundo testaceis. Thorax antice paulo angustior, basi bi sinuatus, supra convexus, obsolete carinatus, totus niger, crebre & sat profunde punctatus, pilis minutissimis, depresso, parce adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, dense albido-pubescentia. Elytra thoracis basi paulo latiora, humeris elevatis, & illo vix quadruplo longiora, supra valde convexa, tota nigra, sub nitida, profunde & late crenato striata, interstitiis planis, laevibus; pilis similibus uti thorax, parce adpersa. Corpus subtus nigrum, sub nitidum, sat profunde punctatum, pectoris lateribus densius albido-pubescentibus. Pedes mediocre, toti nigri, femoribus posticis perparum crassioribus, tarsis subtus albo-spongiosis.

153 R. sub-fasciatus: ovatus, convexus, niger, albido-irroratus, lineola scutellaris corporeque albido-squamosis, antennarum basi tibiisque testaceis, rostro brevi, crassiusculo.

Var. b, pedibus totis testaceis.

Habitat in Scaniæ frutetis, Dom. Fallens in Smolandia, Dom. Wetterhall; raro obvius.

Descri

Descr. Rh. bifasciato vix major, sed magis con-
vexus, rostro breviori, crassiori, oculis distantibus,
ut & colore a reliquis distinctus. Caput nigrum,
punctulatum, squamulis pilisque albiatis adpersum,
fronte inter oculos impressa; oculi laterales, pro-
minuli, nigri; rostrum capite parum longius, cras-
sum, arcuatum, nigrum, punctulatum, albido pubes-
cens. Antennæ fusco piceæ, basi dilutius testaceæ,
clava majuscula pubescente. Thorax sub cylindricus,
antrorsum parum angustatus, basi bi-sinuatus, supra
convexus, in medio obsolete canaliculatus, totis ni-
ger, crebre & profunde punctatus, subtus densius al-
bido-squamulosus, supra tenue pubescens, linea me-
dia, aliisque lateraliter utrinque, densius albido-sqamo-
sis. Scutellum minutum, rotundatum, nigrum. E-
lytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris ele-
vatis & illo vix triplo longiora, apice obtuse rotun-
data, supra modice convexa, nigra, profunde puncta-
to striata, interstitiis angustis, sub rugosis; in basi su-
turæ lineola communis dense albo-squamosa, & in
disco apiceque lituæ irregulares obsoletæ, e squa-
mulis albidis, rarioribus, facile deterendis. Corpus
subtus nigrum, subtiliter punctulatum, dense albido-
squamosum. Pedes mediocres, albido-pubescentes,
femoribus nigris, sub-clavatis, posticis perparum
crassioribus, tibialis testaceis, tarsis fusco ferrugineis.

Vär. b, differt tantum pedibus totis testaceis.

Obs. Et si femora postica perparum incrassata,
tamen satis alte saltat, teste Dom. Fallén. Species
duæ ultimæ a reliquis hujus familiæ Speciebus dif-
ferunt, rostro breviore, crassiore, oculis remotis, &
femoribus posticis minus crassis. Sectioni 2:dæ fami-
liæ primæ affines, familiam ultimam cum præceden-
tibus conjungunt.

CALANDRA.

Mandibula lata, fornicata, truncata. Antennæ prope basim rostri insertæ, articulis 2-7, parvis, nodosis, clava truncata, articulo ultimo spongioso. Corpus sub-depressum. Thorax elongatus. Elytra abdente breviora.

- i. *C. granariae*: elongata, rufo picea; glabra, thorace profunde punctato, elytrorum longitudine, elytris profunde striatis, striis obsolete punctatis.

Fabr. Eleut. 2. 437. 39.

Rhyncophorus granarius. Herbst. col. 6. 14. 82
Tab. 60. f. 7.

Circulio granarius. Linn. Syst. 2. 608. 16. Fn.
Sv. 587. De Geer Ins. 5. 239. 25. Payk. fn.
3. 245. 64. Panz. fn. 17. f. 11.

Habitat in frumento diutius asservato, valde noxius; apud nos tamen adhuc non frequens.

Descr. Magnitudo fere Cossoni chlorepī, totus rufopiceus, interdum dilutius ferrugineus. Caput parvum, piceum, sub læve, oculis lateralibus, valde depresso; rostrum tenue, sub-rectum, rufopiceum, sub læve, thorace brevius. Antennæ prope basim rostri, sub tuberculo laterali insertæ, erassisculæ, rufo piseæ, rostro cum capite vix longiores. Thorax magnus, valde elongatus, anterius paulo angustior, basi truncatus, ibique elytris fere latior, supra sub-depressus, rufopiceus, punctis magnis, oblongis, sat crebre perforatus. Scutellum minutum, depresso, rotundatum; piceum. Elytra thoracis basi angustica

ra, & vix illo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, rufo-picea, profunde striata, striis in fundo obsolete punctatis. Corpus subtus rufo-piceum, sat profunde & crebre punctatum. ano dilutiori. Pedes breviusculi, dilutius rufo ferruginei, femoribus anticis paullo crassioribus, arcuatis.

Obs. Curculio segetis. Linn. Syst. 2. 612. 45: secundum descriptionem in Fn. Sv, n:o 611, forte idem,

C O S S O N U S.

*Mandibula incurva, acutissima. Antennæ breves, crassiusculæ, pone medium rostri inseritæ, clava solida, oblonga. uni articulata. Corpus elongatum, sub-cylindricum. Elytra anum occultantia. Tibiæ angustæ, non serratæ *).*

s. *C. linearis: niger, glaber, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longiori, apice dilatato, thorace postice in medio impresso.*

Fabr. Eleut. 2. 496. 1.

Curculio linearis. Payk. fn. 3. 242. 60. Panz. fn. 18. f. 7.

Cur-

*.) Obs. Species nonnullæ, huc referendæ, rostrum gerunt valde abbreviatum, ut Curc. *Chloropus auctorum*, & plures exoticæ, ad *Hylesinos* & Dom. *Fabricio* relatæ; sed *Hylesinis* clava antennarum aliter constructa, & tibiæ dilatatae, serratae, quibus notis facile distinguuntur,

Curculio parallellipipedus. Herbst. col. 6. 275.
247. var.

Var. b, Antennis, elytris, abdomine pedibusque dilutius ferrugineis. Payk. loc. cit.
var. b.

Curculio parallellipipedus. Herbst. Col. 6. 275.
247. Tab. 84. f. 4.

Habitat in Scania & Hallandia, rarissime,
Dom. Qvenjel; in Westmanniae Salice Fra-
geli. Dom. Doct. Hall.

Descr. Statura elongata, angusta, Rhynchæni T. albi, sed plerumque dimidio major. Caput porrectum, nigrum, subtilissime punctuatum, vertice laevi; frons inter oculos foveola parva impressa; oculi laterales nigri, parum prominuli; rostrum vix capite duplo longius, arcuatum, basi angustius, extrotsum valde dilatatum, nigro-piceum, crebre punctatum. Antennæ rostro cum capite paullo longiores, extra medium rostri insertæ, rufo ferrugineæ, articulo primo longo, clavato; 2-8 brevibus, crassiusculis, coarctatis, nono magno, ovato, ut videtur, in articulato; in apice pubescente tamen suturæ obsoletæ obseruantur, ut forte articuli plures adsunt, etsi parvi, sub retracti. Thorax latitudine multo longior, subquadragulus, juxta spicem coarctatus & transversim impressus, basi truncatus, angulis rotundatis, supra parum convexus, in medio basos obsoleto impressus, totus niger, glaber sub nitidus, sat crebre & profunde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace vix latiora, sed fere duplo longiora, linearia, supra modice convexa, nigra, subnitida, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, elevatis

elevatis. lœvibus. Corpus subtus nigrum, crebre, evidenter punctatum. Pedes breviusculi, tenues, rufopicei, femoribus anticis paullo crassioribus,

Var. b, colore dilutiori tantum differt, forte junior.

2. *C. lignarius*: nigro-piceus, glaber, antennis pedibusque dilutioribus, thorace subtiliter punctulato, rostro capite longiori, cylindrico.

Curculio lignarius. Marsh. Ent. Br. 1. 275. n^o 3.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, præsertim Populi, in Westrogothia plures lectus.

Descr. Magnitudo & facies *C. Chloropi*, sed ab unde distinctus. rostro multo longiori & tenuiori, antennis longioribus, &c. Caput porrectum, nigro-piceum. nitidum, subtilissime punctulatum, oculis lateribus parvis, depresso, nigris; rostrum capite duplo longius, crassiusculum, cylindricum, parum arcuatum, piceum, nitidum, subtiliter punctulatum. Antennæ extra medium rostri, in foveola obliqua insætæ, rostro cum capite multo longiores, dilutius rufo-ferrugineæ, clava ovata, adhuc pallidiori, apice vix visibiliter annulata. Thorax latitudine longior, basin & apicem versus angustior, lateribus rotundatus. supra modice convexus, obsoletissime carinatus, nigro picens. nitidus, glaber, sat crebre, sed subtilissime, punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum. E' ytra thoracis basi latiora, humeris sub prominulis, & illo fere triplo longiora, apice rotunda-ta, supra convexa, dilutius picea, sub-nitida, minus profunde punctato-striata, intersticiis planis, lœvibus.

Corpus

Corpus subtus dilutius piceum, crebre punctulatum. Pedes breviusculi, tennes, rufo-picei, femoribus anticis crassioribus, clavatis.

3. C. chloropus: niger, glaber, antennis brevibus, crassis, pedibusque rufo-piceis, rostro brevissimo, latè depresso, elytrorum interstitiis obsolete seriato-punctulatis.

Hylesinus chloropus. Fabr. Eleut. 2. 393. 17.

Curculio chloropus. Herbst. Col. 6. 56. 19. tab. 62. f. 12. Payk. fn. 3. 311. 134. Panz. fn. 19. f. 14.

Curculio ater. Linn. Synt. 2. 617. 86. Fn. Sv. 637. Bonsd. Curc. 2. 31. 19. f. 20.

Habitat in ligno sicco, putrescente, frequens.

Descr. Parvus, angustus, Rh. T. albo statura similis, sed plerumque paulo minor. niger, glaber. Caput porrectum, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, oculis parvis, lateralibus, nigris, prominulis; rostrum latitudine capitis. & illo vix longius, subdepressum, nigrum, crebre punctulatum, obsolete canaliculatum. Antennæ extra medium rostri in foveæ obliquæ insertæ, rostro cum capite, parvum, longiores, crassæ, fusco-ferrugineæ, articulo primo longo, clavato. 2-8 brevibus, crassis, cætartatis, non pau- lo crassiori, ovato, pallidiori, apice pubescente, vix visibiliter annulato. Thorax latitudine multo longior, anterius sensim angustior, basi apiceq[ue] truncatus, supra modice convexus, æqualis, niger, sub-nitidus, crebre & sat profunde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, lœve. Elytra thoracis

bsti vix latiora, sed illo fere duplo longiora, sub. linearia, apice rotundata, supra convexa, nigra, minus nitida, sat profunde punctato striata, intersticiis planis, singulis serie regulari e punctis minutissimis, impressis. Corpus subtus nigro piceum, sub-nitidum, crebre & sat profunde punctatum. Pedes breves, tenues, rufo picei, femoribus anticis paulo crassioribus, compressis, arcuatiss.

Variat etiam colore totius corporis rufo-piceo.

4. C? lymexylon: fusco-piceus, sub. pubescens, antennis brevissimis, rufo-mentibus, ante medium rostri insertis, rostro longiori cylindrico, thorace scabro, elytris profunde punctato striatis.

Lixus lymexylon. Fabr. Eleut. 2. 504. 32.

Circulio lymexylon. Herbst. Col. 6. 231. 195.

Tab. 76. f. 9. Payk. En. 3. 240. 59. Panz. fn. 18. f. II.

Habitat sub cortice arborum emortuarum; præsertim *Quercus*, apud nos rarius.

Deser. Statura fere C. chloropi, sed paulo minor, fuscus, opacus, pulvere griseo plerumque testus. Caput porrectum, fuscum, granulato scabrum, genis parvis, lateralibus, nigris, depresso; rostrum capite duplo longius, porrectum, crassum, tub cylindricum, in medio sub gibbosum, fusco piceum, granulato-punctatum. Antennæ ante medium rostri inferæ, brevissimæ, rostro parum longiores, rufo-ferrugineæ, articulo primo clavata, sere dimidium totius longitudinis efficiente; 2-8 perfoliatis, validè contractatis, sensim crassioribus; nono adhuc crassiori, ovato,

ovato, solido, apice pubescente, cum acumine minuto, prominulo. Thorax latitudine paullo longior, antice angustior, & ante apicem transversim profunde impressus, margine apicis elevato; basi subbifidus, supra modice convexus, fusco piceus, granulis elevatis, obsoletis scaber, & pube subtilliissima, depresso, fuscus adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, impressum, fuscum. Elytra thoracis basi latiora, & illo plus duplo longiora, apicem versus attenuata, apice rotundata, supra convexa, nigro-fusca, profunde & late crenato sulcata, interstitiis angustis elevatis, laevibus. Corpus subitus fusco-piceum, opacum, sat crebre punctatum. Pedes breves, tenues, rufo picei, femoribus anticis parum crassioribus.

Obs. Propter antennas, ante medium rostri insertas, huic generi non exacte correspondet; nec generi Lixus apte associari queat, ob antennarum clavam solidam; medius quasi inter genera Calandæ & Coffoni,

C. U. R C U. L I O.

Palpi quatuor brevissimi, articulo ultimo longiori, subulato. *Maxilla* brevis, apice dilatata, truncata. *Antennæ* tristriatae, versus apicem lateralem rostri insertae, clava tri-articulata. *Rostrum* breviusculum, crassum, versus apicem plerumque dilatatum.

Fam. I. Femoribus muticis.

Sect. I. Alati, corpore plerumque oblongo.

C. fulcirostris: niger, dense cinereo-pubescent, elytris tenui punctato-striatis,

fasciis obliquis, denudatis, rostro sulcis tribus æqualibus.

Linn. Syst. 2. 617. 85. Fabr. Eleut. 2. 515. 51.
Herbst. Col. 6. 74. 37. Tab 64. f. 7. De
Géer Ins 5. 240. 26. Payk. fn. 3. 297.
121. Bonsd. Curc. 2. 21 4. fig. 5.

Lixus sulcirostris. Latreille Gen. Ins. 2. 260. 2.
Curculio nebulosus. Knoch. Beytr. 1. 87. 2.
tab. 6. f. 8-ii.

Habitat in arenosis, aridis, ericetis, passim.

Descr. Inter maiores nostrates hujus generis. Caput breve, nigrum, subtiliter rugoso punctatum; pube depressa, cinereo-flavicante, tectum, oculis oblongis, depresso-lateralibus, brunneis; rostrum capite duplo longius, crassum, nigrum, punctatum, supra sulcis tribus latis & profundis, ad oculos usque productis, exaratum, pube simile uti caput, præsertim in sulcis, tectum. Antennæ vix capite cum rostro longiores, crassiusculæ, nigrae, clava cinereo-pubescente. Thorax versus basin longitudine fere latior, anterius paullo angustior, apice late, sed non profunde emarginatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, niger, granulato-rugosus; in medio dorsi linea longitudinalis dense cinereo-pubescentis, antice & postice impressa, in medio carinula brevi, elevata, nuda, notata; versus latera utrinque linea duplex dense cinereo-pubescentis, arcuata. Scutellum parvum, angustum, dense albido-pubescentis. Elytra thoracis basi latiora, & illo fere quadruplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, nigra, antice inspecta subtiliter punctato-criata, intersticiis subtilissime coriaceis, & præterea rugulis transversis, elevatis, præsertim in dorso antico adspersis; tota pube densa.

densa depressa, cinereo-albicante, interdum brunne-
scente, obducta, relictis plagiis duabus, retrorsum
obliquis, calloque postico magis nudis, nigris. Cor-
pus subeius nigrum, subtiliter coriaceum, minus den-
se cinereo-pubescentes, relictis in ventre punctis cre-
bris denudatis nigris. Pedes longiusculi validi, ni-
gri, cinereo-pubescentes, femoribus anticis crassiori-
bus, posticis longioribus; angustis, arcuatis, spongiis
tarsum ferrugineis.

2. *C. tri-sulcatus*: niger, elytris tenui pun-
ctato-striatis, pube cinereo-albida varie-
gatis, rostro sulcis tribus, media angu-
stiori, abbreviata.

Herbst. Col. 6. 89. 49. Tab. 65. f. 5.

Habitat in Dalekarlia, Dom. *Ferrström*; in
Scania, Dom. *Fallén*, raro obvius.

Descr. Præcedenti similis, sed quadruplo minor,
& ultra, minoribus *C. albidi* speciminibus æqualis.
Caput breve, nigrum, subtilissime punctulatum, cine-
reо-pubescentes, oculis ohlongis, depresso, lateralibus
nigris; in fronte inter oculos foveola oblonga, im-
pressa; rostrum capite duplo longius, crassum, ni-
grum, punctatum, cinereo-pubescentes, supra suicis tri-
bus exaratum, quarum laterales latæ; sed parum
profundæ, ad oculos usque productæ; medius an-
gustus, brevior, ac apice vix ultra medium extensus.
Antennæ longitudine rostri cum capite, nigro-piceæ,
clava acuminata cinereo-pubescente. Thorax institu-
dine baseos fere longior, apicem versus angustior,
basi bi-sinuatus, supra modice convexus, niger, gra-
nulato coriaceus; in medio dorsi linea longitudinalis
angusta, e pube densiori cinereo-albida, basi impressa,
in medio obsoletè carinata; in utroque latere lineæ

dure cinereo pubescentes, interiori introrsum, exteriori extorrisum arcuata. Scutellum parvum, angustum, cinereo-pubescentis. Elytra thorace latiora & plus triplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigra. anterius inspecta, obsolete punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis, rugulis elevationibus, sub-transversis, notatis; pube cinereo albida fasciculatim irregulariter adpersa. Corpus subtus nigrum, subtiliter coriaceum, pube rariori cinerea adpersum, relictis in ventre punctis crebris denudatis. Pedes mediocres, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus anticis crassioribus, posticis angustis, vix longioribus.

3. *C. nebulosus*: elongatus niger, dense cinereo-pubescentis, elytris acuminatis, profundius punctato-striatis, fasciis obliquis denudatis, rostro thoraceque carinatis.

Linn. Syst. 2. 617. 84. Fn. Sv. 635. Fabr. Eleut. 2. 514. 46. Herbst. Col. 6. 76. 38.

Tab. 64. f. 8. Bonsd. Curt. 2. 20. 3. f. 4.

Cureulio carinatus. De Geer Ins. 5. 241. 27.

Habitat in arenosis, aridis, passim, minus frequens.

Descr. Statura elongata & magnitudo omnino C. Sulcirostris. Caput breve, nigrum, subtiliter coriaceum, pube cinerea, saepe brunnecente, adpersum, fronte inter oculos carinula elevata, e rostro continuata; oculi oblongi, nigri, laterales, parum prominuli; rostrum capite vix duplo longius, crassum, sub arcuatum, nigrum, rugoso-punctatum, pube densa, grisea, depressa, saepe ruto. aut ferrugineo-tincta, tectum, relicta carina longitudinali nu-

da,

da, nigra, versus caput magis elevata, inter anten-
parum insertionem nonnihil rotundato-dilatata, pun-
ctum majuscum impressum includente. Antennæ
vix rostro cum capite longiores, nigrae, clava acu-
minata, cinereo-pubescente. Thorax latitudine ba-
ses vix longior, anterius paullo angustior, apice
late emarginatus, basi bi-sinuatus, supra modice
convexus, niger, profunde rugoso punctatus, ab
apice ultra medium carinula evidenter elevata nota-
tus, postice in medio impressus; ab introque latere
carinæ ruga longitudinalis elevata, nigra, rugoso-
punctata, pone medium extrorsum arcuata, versus
basin iterum intorsum flexa, spatio medio interje-
cta, ut & linea arcuata, rugæ exterius adjacente,
pilis densis cinereis aut rufo-brunneis obductis.
Scutellum nullum, sed angulus e medio thoracis
emissus, locum ejus occupat. Elytra antice thora-
cis basi parum latiora, sed illo fere quintuplo lon-
giora, pone basin dilatata, in medio marginis si-
nuata, apice acuminata, praesertim in semina; supra
convexa, nigra, evidenter punctata-striata. vellere
denso cinereo, depresso, obducta, relicta fasciis
duabus retrorsum obliquis, calloque postico denuda-
tis, nigris; striæ quatuor dorsales in singulo elytro
per paria approximatæ, anterius scrobiculis profun-
dis, oblongis, loco punctorum, exaratae; versus po-
stica vero, ut & in striis exterioribus, puncta plera-
que parva. Corpus subtus nigrum, subtiliter coria-
ceum, cinereo pubescens, ventre punctis obsoletis
sub-nudis variegato. Pedes longiusculi, nigri, ci-
nereo-pubescentes, femoribus parum crassis, posti-
cis paullo longioribus, & tarsis ejusdem paris val-
de elongatis.

4. C. glaucus: brevior, niger, vellere cine-
reo-brunnescente tectus, elytris sub-acu-
minatis
R 5

minatis, profunde punctato-striatis, fasciis arcuatâs nudioribus, rostro carinato.

Fabr. Eleut. 2. 516. 57. Herbst. col. 6. 486.
506. Tab. 95. f. 1. Panz. fn. 19. f. 62.

Curculio nebulosus. Payk. fn. 3. 298 422.

Habitat in arenosis, aridis, præstrum Eritetis, sat frequens.

Descr. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed brevior, quare etiam Synonymon Cl. Paykullii hoc retero; differt præterea sculptura tho acis, fasciis denudatis elytrorum aliter constructis, &c. Caput breve, nigrum, subtilissime rugoso-punctatum, vellere denso, depresso brunneo aut cinereo-rufescente tectum, fronte fere plana, in medio inter oculos foveola rotundata, profunda, impresso, posterius carinula elevata nuda nigra notato; oculi oblongi nigri laterales depressi; rostrum quondam structuram & pubescentiam ut in præcedenti. sed carinula media elevata nigra, plerumque antice inter antennarum basin definit, ibique bifida evadit. Thoracis structura sere ut in priori, sed angulus medijs baseos brevior, scutelli locum non exacte replet; supra modice convexus, niger, profunde rugoso-punctatus, in medio baseos impressus, carinula antica valde abbreviata, saepè obsoleta; lineæ laterales arcuatæ, & impressiones variæ dorsales, pube cinereo-rufescente ut in priori obductæ. Scutelium minutum, demersum, nigrum, apice solo adscendente, cinereo-pubescente. Elytra antice thoracis basi parum latiora, humeris rotundatis, thorace fere quadruplo longiora, apice sub-acuminata, supra convexa, simili modo ac in præcedenti striata, nigra, vellere denso cinereo, saepè pallido-brunnescente, testa, relictis fasciis duabus mediis transversis, externe abbreviatis,

viatis, antrosum arcuatis, calloque postico, magis denudatis, nigro-fuscis. Corpus subtus nigru[m] subtiliter coriaceum, pube densiori cinerea obductum; relictis punctis crebris denudatis, etiam in pectore. Pedes nigri, cinereo-pubescentes, punctis nudis variegati, structula omnino ut in priori.

Obs. Dom. Iliger in Mag. 5. 244. 57. hanc speciem ut varietatem praecedentis dijudicat, at vix jure.

5. *C. albidus*: niger, albido-pubescent, thoracis dorso, elytrorum fascia maculisque quatuor denudatis, rostro bi-sulcato, carinula apice bifida.

Fabr. Eleut. 2. 517. 59. Herbst. col. 6. 80. 41.
tab. 64. f. 11. Payk. fn. 3. 300. 23. Panz.
fn. 19. f. 7.

Curculio niveus. Bonsd. cure. 2. 21. 5. f. 6.

Habitat in arenosis, aridis, rarius.

Descr. Statura *C. glauci*, sed triplo minor. Caput breve, nigrum, fronte rugoso-punctata, vertice laeviori, fulvo-pubescente; oculi laterales, oblongi, brunnei; rostrum capite paulo longius, apicem versus nonnihil angustatum, nigrum, utrinque sulco, basi profundiori, impressum, carinula media elevata, apice bifida, os non attingente. Antennae capite cum rostro paulo longiores, minus crassae quam in prioribus, nigræ, basi ferrugineæ, clava acuminata cinereo-pubescente. Thorax latitudine brevior, antice nonnihil compressus, basi bisinuatus, supra modice convexus, profunde rugoso-punctatus, canalicula media obsoleta, postice profundiore, impressus; subtus & lateribus pube densa albida,

bida, interdum brunnescente, obductus, quæ albedo supra versus apicem utrinque maculam rotundatam nigrum, denudatam, includit. Scutellum minutum, triangulare, albido-pubescentia. Elytra thorace paullo latiora, & illo quadruplo longiora, apice sub-acuminata, dehiscentia, supra convexa, nigra, sat profunde punctato striata, pube densa, brevi, depressa, alba, saepe nivea, testa, relictis macula magna humerali, fascia media sinuata, maculaque minori in callo postico, denudatis, nigris, punctis sparsis albis irroratis. Corpus subtus nigrum, subtiliter coquaceum, pube densa albida, interdum flavescens, tectum, ventre posterius & ad latera maculis denudatis nigris seriatis notato. Pedes mediocrem nigri, pube albida testi, femoribus versus apicem annulo albidiiori cinctis.

5. *C. palliatus*: elongatus niger, pilis squamulisque densis, superne fuscis, subtus & lateribus cinereo-albidis tectus, thorace longiori, rostro obsolete impresso.

Fabr. Eleut. 2. 513. 38. *Panz. fn.* 19. f. 5.
Ilig. Mag. 4. 153. 38.

Curculio canescens. *Herbst. col.* 6. 240. 204.
Tab. 77. f. 8.

Curculio diffinis. *Marsh. Ent. Br.* 1. 309. 205.

Habitat in Scania, prope urbem Landskrona a Dom. Wetterhall carissime lectus.

Descr. Magnitudo & fere Statura C. incani, sed in elytris paullo latior, thorace multo longiori, rostro sub-conicalato, abunde distinctus. Caput breve, porrectum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, pilis rigidis griseo-fuscis adipersum, fronte deprecta;

depressa; oculi laterales, nigro-brunnei, parum prominentes; rostrum latitudine fere capitis, & vix illo longius, supra planum, in medio longitudinaliter obsolete impressum, colore, punctura pilisque ut in capite. Antennae longitudine fere capitis cum thorace, tenues, nigrae, griseo-pubescentes. Thorax latitudine multo longior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, lineola tenui, obsoleta, canaliculatus, niger, crebre rugoso-punctatus, supra pube densa, depresso, rigida, fusca, subtus & lateribus cinereo-albida, tectus; in medio laterali utrinque foveola obliqua impressa, plerumque obsoletissima. Scutellum parvum, triangulare, dense albido-squamosum. Elytra thoracis basi difidio latiora, humeris prominulis, & illo fere triplo longiora, apice sub-acuminata, dorso parum convexa, nigro-fusca, regulariter punctato striata, intersticiis planis, rugoso-coriaceis, squamulis piliformibus, depressis, fuscis, versus latera densioribus, griseo-albidis, tecta. Corpus subtus nigro-fuscum, obsolete punctulatum, squamulis minoribus, densis, cinereo-albidis, interdum metallico-nitentibus, tectum. Pedes validi, nigri, pilis squamulisque densis griseo-albidis, nitidis, tecti,

7. *C. viridis*: niger, supra parcius viridis squamosus, subtus lateribusque dense flavovirescens, rostro carinato, elytris apice sub-mucronatis.

Linn. Syst. 2. 616. 76. Fn. Sv. 629. Fahr.

Eleut. 2. 512. 34. Herbst col. 6. 136. 95.

Tab 69 f. 4. Payk. fn. 3. 301. 124. Bonsd.
curc. 2. 22. 6. f. 7. Panz. fn. 107. f. 3.

Brachyrinus viridis, Latreille Gen. Ins. 2.
255. I. Cur-

Curculio flavo-cinctus. De Geer Ins. §. 256.

45.

Habitat in Sveciæ australis frutetis, rarius.

Descr. C. incano plerumque brevior, sed in e-
lytris latior. Caput porrectum, breve, nigrum, ob-
solete punctatum, squamulis angustis, piliformibus,
virescentibus, parce adspersum: oculi laterales, brun-
nei, prominuli; rostrum capite duplo longius, cras-
sum, latum, nigrum, rugoso-punctatum, squamulis
nitentibus uti caput adspersum, apice late emarginat-
um, ore piloso; in medio rostri carinula elevata
glabra, ad frontem usque producta. Antennæ vix
longitudine rostri cum thorace, nigrae, pubescentes,
articulo primo clavato, vix tertiam partem totius
attingente. Thorax latitudine baseos paullo longior;
antrorum nonnihil angustior; apice truncatus, basi
bi-sinuatus, angulis prominulis, acuminatis; supra
convexus, niger, crebre rugoso-punctatus, in me-
dio obsoleto canaliculatus, squamulis similibus, uti
caput parce adspersus; subtus & lateribus squamulis
densis flavo-virescentibus tectus. Scutellum parvum,
rotundatum, flavo-virescens. Elytra thoracis basi
dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, apicem
versus attenuata, apice ipso mucrone parvo, piloso,
recto armata, supra modice convexa, nigra, regu-
lariter punctato-striata; interstitiis latis, planis, sub-
tiliter coriaceis; dorso squamulis minutis cinereo vi-
rescentibus adspersa, versus latera vero late squamu-
lis densis flavescentibus tecta. Corpus subtus ni-
grum, punctulatum, squamis densis flavo-virescenti-
bus tectum. Pedes elongati, tenues, nigri, femori-
bus squamulis virescentibus, nitidis, plus minusve
adspersis, tibias anticis longioribus arcuatis.

Obs. Curc. pollinosus Germanorum huic simili-
mus, sed paullo minor, elytorum mucro longior;

cho.

thorax postice vix sinuatus, & carinula rostri brevior, obsoletior.

8. C. flavipes: elongatus, niger, squamulis viridi-sericeis, pilisque fulcis tectus, antennis tenuibus pedibusque pallide testaceis, rostro brevissimo.

*De Geer. Ins. 5. 245. 31. Marsh. Ent. Br. 1.
31. 21.*

*Curculio sericeus. Herbst. col. 7. 37. 595. Tab:
97 f. 10. F.*

Habitat in frutetis passim, minus frequens.

Descr. C. argentato quoad magnitudinem, statuam & colorem primo intuitu ut ovm ovo similimus, sed rostro multo breviori, antennis tenuioribus & femoribus omnino mutatis, abunde differt. Caput satis magnum, porrectum, nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis minutis, rotundatis, viridi-sericeis, & pilis parvis, erectis, griseo-fuscis, omnino tectum, oculis parvis, lateralibus, brunneis, globosis; rostrum ante oculos brevissimum, vix dimidiam capitis longitudinem attingens, crassum, supra planum, apice emarginatum, indumento simili ut caput tectum. Antennae capite cum thorace longiores, valde tenues, testaceae, extrorsum paullo obscuriores, clava angusta, lanceolata. Thorax brevissimus, transversus, basi apiceque trunkeatus, lateribus in medio nonnihil dilatatus, supra in disco transversim convexus, intra basin & apicem depresso, niger, opacus, subtiliter granulato-coriaceus, squamulis & pube simili ut caput undique tectus. Scutellum parvum, triangulare, viridi-squamosum. Elytra magna, thorace dimidio latiora, & illo plus quam

quam Sextuplo longiora; apice acuminata, supra convexa. præsertim posterius, tota nigra, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, lœvibus, nitidis; squamulis minutis sericeo-viridibus, & pube erecta griseo-fusca testa, relictis tamen punctis striarum, ut & aliis minimis, fere seriatis, in interstitiis, nigris, denudatis. Corpus subtus squamulis similibus & pube tenui ut supra testum. Pedes elongati, tenues, pallide testacei seu flavescentes, unguis solis apice fuscis; femora sub-clavata, omnino mutica; tibiae omnes arcuatæ.

9. *C. parvulus*: brevior, niger, squamulis pallide viridibus, opacis, tectus, antennis crassiusculis, tibiis tarsisque testaceis, rostro mediocri.

Fahr. Eleut. 2. 528. 119. *Herbst. col.* 6. 500.

531.

Curculio fulvipes. *Payk. In.* 3. 310. 133.

Curculio argentatus. - *Bonsd. curc.* 2. 27. 12.
var. b.

Curculio uniformis. *Marsh. Ent. Br.* 1. 311. 210.

Var. b, Squamis cœruleo-virescentibus, antennis, tibiis tarsisque obscurius ferrugineis.

Var. c, Squamis cinereo-flavescentibus.

Habitat in urtica dioica, aliisque plantis & fruticibus, frequens.

Descr. Præcedente multo brevior, præsertim in elytris; Antennæ multo crassiores, elytra postice minus

minus convexa, rostrum paullo longius & angustius, color squamularum pallidior, opacus, pubescens erecta omnino nulla, adeoque species abunde distincta. Caput satis magnum, porrectum, nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis minutis, pallide viridibus, opacis, omnino tectum, oculis parvis, globosis, lateralibus, brunneis; rostrum capite paullo brevius & angustius, colore & squamulis similibus. Antennae vix longitudine dimidii corporis; crassiusculæ, testaceæ, pubescentes, clava mediocri ovato-acuminata, coarctata. Thorax brevis, transversus, paullo latior quam in priori, basi apiceque truncatus, lateribus perparum rotundatus, supra modice convexus, ante basia & apicem obsolete impressus, niger, subtiliter coriaceus, squamulis similibus uti caput tectus. Scutellum parvum, rotundatum, viridi-squamolum. Elytra thorace vix dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, levibus, tota squamulis pallide viridibus, opacis, testa, absque punctis interstitiarum denudatis. Corpus subitus nigro-piceum, subtiliter punctulatum, squamulis pallide viridibus tectum, in ventre angustioribus; minus crebris. Pedes mediocre, femoribus clavatis, nigro-piceis, viridi-squamosis, tibiis vix arcuatis; tarsisque testaceis.

Var. b, differt tantum colore squamularum, aut cœruleo-virescente, aut fere plumbeo, & colore antennarum, tibiarum tarsorumque saturatius ferrugineo:

Var. c, squamis pallidioribus, cinereo-flavescientibus tecta; cetera ut in a.

10. C. viridicollis: niger, nitidus, antennis crassiusculis, tibiis tarsisque ferrugineis,

Ins. Svec. T. I. P. III. S.

neis, thoracis lateribus pectoreque viridi-squamofis.

Fabr. Eleut. 2. 528. 120. *Herbst. col.* 6. 222.
186. *Tab.* 75. f. 12. *Payk. fn.* 3. 309. 131.
Panz. fn. 19. f. 13.

Var. b, Elytris, abdomine femoribusque rufo-castaneis.

Habitat in collibus pratorum aridis, præsertim in Artemisia campestris, passim copiose.

Deser. Statura & affinitas præcedentis, sed plurimque paullo minor. Caput majusculum, porrectum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, fronte depressa rostroque squamulis angustis, piliformibus, viridi-argenteis adspersis; oculi parvi, globosi, laterales, brunnei; rostrum capite paullo brevius & angustius, rugoso-punctatum, nigrum. Antennæ longitudine capitis cum thorace, crassiusculæ, ferrugineæ, clava ovato-acuminata obscuriori. Thorax latitudine medii paullo brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra modice convexus, niger, crebre rugoso-punctatus, squamulis angustis, viridi-argenteis, nitidis, subtus & lateribus densioribus, testus, in dorso rarioribus adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, dense viridi-squamosum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, & illo quadruplo longiora, apice acuminata, supra convexa, nigra, nitida, fere glabra, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, levibus. Pectus nigrum, punctatum, dense viridi-squamosum; venter nigro piceus, obsolete punctulatus, squamulis pilisque rarioribus adspersus. Pedes longiusculi, validi, femoribus clavatis nigris, viridi-squamofis, tibiis tarsisque ferrugineis.

Var. b,

Var. b, tantum colore dilutioni differt; elytra, abdomen & femora jam saturatius, jam dilutius rufo-castanea; tibiae & tarsi pallidiores.

II. C. Undatus elongatus; niger, squamu-
lis cinereo-argenteis tectus, antennis pe-
dibusque rufis, thorace angusto, cylindri-
co, elytris fasciis tribus undatis fusco-
squamosis.

Fabr. Elent. 2. 525. 109. *Payk. fn.* 3. 303.
126.

Curculio tereticollis. *De Geer Ins.* 5. 246. 330.
Bonsd. Curc. 2. 28. 14. f. 14.

Curculio albo-fasciatus. *Herbst. col.* 6. 220.
183. *Tab.* 75. f. 9.

Var. b, Elytris fere unicoloribus, vel ob-
soletissime tantum fasciatis.

Habitat in foliis Betulæ, Coryli, &c., fre-
quens.

Descr. Magnitudo & fere statura C. argentatis
variat etiam dimidio major & ultra. Caput porre-
ctum, nigrum, confertissime punctatum, squamulis
cinereo-albidis crebre adspersum; oculi laterales,
nigro-brunnei, modice prominuli; rostrum longitu-
dine fere capitidis, sed illo paullo angustius, nigrum,
supra planum, confertissime punctatum, squamulis
similibus fere tectum. Antennæ vix longitudine di-
midii corporis, tenues, rufescentes. Thorax latitu-
dine fere longior, sub-cylindricus, basi apiceque
truncatus, supra convexus, æqualis niger, opacus,
confertissime punctatus, subtus & lateribus squamu-
lis densis cinereo-argenteis, nitidis, tectus; dorso ra-
zioribus.

rioribus, minusque nitidis. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, parce squamosum. Elytra magna, thorace fere duplo latiora, & illo quintuplo longiora, apice acuminata, supra convexa, præsertim posterius, nigra, nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis lœvibus; tota squamulis densis omnino tecta, versus latera & apicem plerumque albido-argenteis, in dorso præsertim antico, obscurius cinereo-albidus; præterea fasciæ tres communes valde undulatæ, e squamis jam saturatius, jam dilutius fuscis, quarum prima obliqua, fere ab humero versus futuram ducta, secunda in medio, tertia pone medium, minor ambæ abbreviatæ, margines non attingentes. Corpus subtus nigrum, creberrime subtiliter punctulatum, squamulis albo-argenteis nitidioribus tectum. Pedes elongati rufescentes, femoribus clavatis albedo-squamofisis.

Var. b, differt tantum fasciis elytrorum obsoletissimis, saepè vix discernendis.

12. *C. fulvicornis*: elongatus, rufo-brunneus, cinereo-squamulosus, antennis pedibusque ruto-testaceis, elytris fasciis tribus denudatis, thorace inæquali.

Fabr. Eleut. 2. 525. 109. *Herbst. Col.* 6. 223.

127. *Tab* 75. *f.* 13. *Payk. fn.* 3. 304. 127.

Curculio ruficornis. *Bonsd. curc.* 2. 27. 13 *f.* 13.

Habitat in arboretis paßim, minus frequens.

Descr. Statura omnino præcedentis, & minoribus ejus æquatis. Caput obscure brunneum, confermissime punctatum, squamulis minutis cinereis crebre adspersum; oculi laterales nigri, prominuli; rostrum

strum capite paullo brevius, & basi illo angustius, rufo-ferrugineum, crebre rugoso-punctatum, cinereo-squamulosum, supra foveolis nonnullis impressum. Antennæ capite cum thorace paullo longiores, tenues, rufescentes. Thorax parvus, angustus, sub-cylindricus, vix latitudine longior, basi apiceque truncatus, lateribus inaequalis, bis impressus, supra in medio transversim convexus, brunneus, opacus, creberrime punctulatus, squamulis pilisque minutis cinereis adspersus; prope apicem transversim impressus, margine antico elevato; paullo pone medium utringue striga lateralis abbreviata, sat profunde impressa. Scutellum rotundatum, dense cinereo pubescens. Elytra magna, thoracis basi fere duplo latiora, & illo quintuplo longiora, apice acuminata, supra convexa, dilutius rufo-testacea, sat profunde punctato-striata, interstitiis levibus, squamulis minimis, pilisque tenuibus cinereo-albidis adspersa, relictis fasciis tribus denudatis, quarum prima obliqua, ab humero ad suturam, saepe obsoleta, secunda & tertia paullo pone medium, undatae, abbreviatæ. Pectus & abdominis basis nigro fusca, crebre punctulata, squamulis cinereis parcus adspersa, ano testaceo. Pedes elongati, tenues, dilute rufescentes.

13. *C. caninus*: niger, dense fusco-squamosus, thorace longiori, subtilissime punctulato, obscure tri-lineato, angulis posticis sub-prominulis, antennarum basi tibiisque ferrugineis.

Fabr. Eleut. 2. 524. 101.

Curculio neophytis. Herbst. col. 6. 218. 181. tab. 75. f. 7.

*Curculio lineatus. Payk. fil. 3. 308. 130. var. b.
S 3 Var. b,*

Var. b, flavo-testaceus, supra obscurior.

Curculio lineatus. *Bonsd. curc.* 2. 30. 16. *var.*
b. f. 16.

Curculio flavescens. *Marsh. Ent. Br.* I. 311,
212.

Habitat in plantis, locis aridis, sat fre-
quens.

Descr. C, lineato valde affinis, sed paulo major,
latior, thorax longior & aliter constructus, ut & sig-
naturæ aliæ, quare diversus mihi videtur. Caput
porrectum, nigrum, subtilissime punctulatum, squa-
mulis minutissimis, piliformibus, brunneis, certo si-
tu cupro micantibus, omnino tectum, fronte plana,
linea tenui impressa, quæ ultra medium restri ex-
tenditur, canaliculata; oculi majusculi, nigro bru-
nei, laterales, modice prominuli; rostrum capite fere
brevius, & paulo angustius, supra depresso, lateri-
bus elevatis, carinatis, colore, punctura & indumen-
to simili ac caput, ore emarginato, piloso. Anten-
næ vix longitudine capitis cum thorace, ferrugineaæ,
clava oblonga, nigricante. Thorax latitudine mediæ
paulo longior, antice truncatus, lateribus in medio
nonnihil rotundatus, basi sub-emarginatus, angulis
retrosum prominulis; supra modice convexus, to-
tus niger, confertissime subtiliter punctulatus, squa-
mulis minimis, depresso, undique omnino tectus,
subtus cinereo-albidus, supra fusco brunneis; in me-
dio dorfi linea angusta, recta, nitidior, pallidius brun-
nea, saepe metallico-micans, & versus latera utrinque
alia latior, arcuata, brunneo flavescens; in disco in-
terior lineas puncta quatuor parva, flavo brunnea, in
tetragonum posita, saepe obsoleta. Scutellum par-
vum, triangulare, brunneo pubescens. Elytra tho-
racis basi fere duplo latiora, & illo plus triplo longi-
qua,

ora, spicè rotundata, supra minus convexa, nigra; regulariter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis; tota squamulis fusco-testaceis tecta, interdum maculis seriatis pallidioribus in interstutiis alternis variegata. Corpus subtus nigrum, subtilissime punctulatum, squamulis cinerascentibus, nitidis, tectum. Pedes mediocres, cinereo-pubescentes, femoribus sub-clavatis, nigris, tibiis tarsisque ferrugineis.

Var. b., differt tantum colore pallidiore, forte nuper exclusus; alia vice variat obscurior, squamulis fere nigro-fuscis tectus, & dum squamulae omnino detritæ, niger, glaber evadit.

14. *C. lineatus*: niger, supra sulco-, subtus cinereo-argenteo-squamulosus, thorace breviori posterius latiori, subtilissime punctulato, antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace albido-lineato.

Linn. Syst. 2. 616. 30. Fn. Sv. 630. Fabr. Eleut. 2. 524. 99. Payk. fn. 3. 307. 130. Bonsd. curc. 2. 29. 16. f. 17.

Curculio griseus. Marsh. Ent. Br. 1. 313. 217.

Var. b, Elytris etiam albido-lineatis.

Curculio lineatus. De Gér Inf. 5. 247. 35. Marsh Ent. Br. 1. 309. 206.

Curc. cinerascens. Herb. col. 6. 214. 176, tab. 75. f. 2. 1

Curculio Mus. Fabr. Eleut. 2, 524. 103.

Var. c, lineis thoracis elytrorumque viridibus. Payk. loc. cit. var. c.

Var. d, totus niger, squamulis nempe de-tritis.

Curculio chloropus. Linn. Syst. 2. 617. 82. Fn. Sv. 633. Bonsd. curc. 2. 31. 18. f. 19.

Curculio ruficlavis. Marsh. Ent. Br. 1. 312. 214.

Habitat in plantis, locis aridis, ubique fre-quens; var. c, vero rarius occurrit.

Deser. Præcedenti, ut dictum, paulo minor, in elytris augustinior, thoracis structura præsertim distin-ctus. Caput, oculi, rostrum, quoad structuram & puncturam omnino ut in præcedenti, sed squamulæ cinereæ minus condensatæ, fundum non omnimode occultant. Antennæ paulo longiores & tenuiores, dilutius rufescentes, clava parum obscuriore. Tho-rax versus basin longitudine fere latior, anterius an-gustior, basi apiceque truncatus, lateribus pone me-dium dilatato. rotundatus, supra modice convexus, juxta apicem transversim impressus, margine apicis sub-elevato; totus niger, confertissime subtiliter pun-ctulatus, squamulis minutis, subtus densis, cinereo-sub. argenteis, tectus, supra rarioribus, piliformi-bus, fusco-cinereis, adspersus, lineisque tribus sub-rectis, e squamulis condensatis albidis, ornatus. Scu-tellum minutum, rotundatum, dense albo-squamo-sum. Elytra thoracis postico dimidio latiora, & il-lo quadruplo longiora, apice rotundata, supra mo-dice convexa, nigra, regulariter punctato-friata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis, squamulis minutis fusco-cinereis, plus minusve densis, tecta; in basi suturæ lineola abbreviata albidi-or, & alia e-jusmodi versus humerum utrinque. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, squamulis pilisque densis

densis cinereo - sub - argenteis omnino tectum. Pedes ut in præcedenti omnino.

Var. b, differt tantum elytrorum sutura, lineisque tribus in singulo elytro albioribus, continuis, quarum media cujusvis elytri evidentior.

Var. c, simillima var. b, modo squamulæ linearum in thorace & elytris læte virescentes; squamulæ reliquæ etiam virescentes.

Var. d, aut parce squamulosa, aut omnino nuda, squamis plus minusve detritis, unde facies aliena, sed forma & punctura omnino cædem.

Obs. Curculio lineatus. Herbst. Col. 6. 497. 527. tab. 95. f. 5. a, b, minime huc pertinet; figura potius Rhynchænum Polygoni representat.

35. C. lineellus: niger, squamulis setisque fuscis tectus, thorace albo-lineato, profundius punctato, elytris linea utrinque unica inæquali, albida, nigro-maculata.

Bonsd. eurc. 2. 30. 17. f. 18. Linn. F. Sv. 546. 2274. Sepos.

Curculio lineatus. Payk. fn. 3. 308. 130. var. d.

Var. b, Pedibus totis pallidius testaceis.

Var. c, thorace elytrisque squamulis & pube densioribus cinereo-albidis tectis, lineis punctisque fuscis irroratis.

Curculio occator. Herbst. col. 6. 219. 182. tab. 75. f. 8.

Curculio macularius. Marsh. Ent. Br. 1. 312. 215.

Var. d., duplo minor, elytris lineis pluribus
albido - squamosis.

Habitat in plantis, præsertim siliquosis, u-
bique vulgaris.

Deser. C. lineato duplo minor & ultra, præ-
sertim brevior, capite thoraceque profundius pun-
ctatis, & signaturis aliis distinctus. Caput latum,
nigrum, sat profunde punctatum, squamulis crebris
fuscouscentibus, pone oculos & in linea media verti-
cis albidioribus tectum, fronte capalicula sat profun-
da, versus apicem rostri continua, exarata; oculi
majusculi, prominuli, nigri; rostrum capite brevius
& paullo angustius, similiiter punctatum & squamo-
sum. Antennæ capite cum thorace breviores, cra-
siusculæ, ferrugineæ, clava obscuriori. Thorax lati-
tudine vix longior, bæsi apiceque truncatus, lateribus
pone medium nonnihil dilatatus, supra convexus,
prope apicem transversim impressus, totus niger,
crebre & profunde punctatus, tubus squamulis den-
sis cinereo - albidis, interdum metallico - nitidis,
te-
ctus, supra rarioribus, minutis, fusco - cinereis ad-
spersus, lineis tribus densius squamosis, media recta,
angustiori, saepe obsoleta, lateralibus latioribus,
ar-
guatis, aut albidis, aut cupro vel argenteo micanti-
bus, nitidis. Scutellum parvum, rotundatum, den-
se albido - squamosum. Elytra thorace dimidio la-
tiora, & triplo longiora, supra modice convexa, re-
gulariter punctato - striata, nigra, squamulis minutis,
etisque brevibus, erectis, fusco - cinereis, tecta; a
bæsi lineæ lateralis thoracis, sere ad apicem elytro-
rum, linea albo - squamosa, lata, inæqualis, ab ut-
roque latere maculis irregularibus nigro - fuscis, sub-
denudatis, quasi dentata. Pectus & abdomen nigra,
punctulata, squamulis densis cinereo subargenteis
recta. Pedes mediocres, femoribus elayatis nigris,

basi testaceis, ante apicem annulo albido-squamoso cinctis; tibiæ & tarsi rufo-testacei.

Var. b, differt tantum femoribus totis testaceis.

Var. c, densius albido-squamosa in thorace & elytris, unde in thorace linea duæ obscuræ angustiores, & in elytris linea albida vix observanda, sed maculæ fuscæ illam cingentes melius conspicuæ.

Var. d, plerumque duplo minor; indumentum elytrorum magis cinereo-albidum; lineas plures obsoletas in intersticiis striarum format, maculis fuscis vix observandis.

16. *C. tibialis*: niger, parcus cupreo-squamulosus, thorace subtilissime punctulato, supra trilineato, pectoris lateribus linea argentea utrinque, tibiis testaceis.

Herbst. col. 6. 217. 179. Tab. 75. f. 5.

Curculio sulcifrons. Thunb. Mus. Upj. app. 6. 113.

Var. b, elytris punctis vagis, cinereo-pilosis, adspersis.

Curculio atomarius. Marth. Ent. Br. 1. 312. 216.

Curculio campestris. Herbst. col. 7. 36. 594. tab. 97. f. 9. E.

Habitat cum præcedentibus, non infrequens.

Descr. Præcedentibus iterum valde affinis, & *C. lineello* var. d, magnitudine æqualis, a quo tamen differt, thorace subtilissime tantum punctulato, & colore alio. Caput, oculi, rostrum, quoaz stru-

eturam omnino ut in *C. lineello*, sed punctura subtilior, & squamulae pauciores, minutissimae, fusco-cupreæ; canalicula frontis & rostri ut in illo. Antennæ testaceo-ferrugineæ, clava acuminata, paulo obscuriori, structura ut in *C. lineello*. — Thorax longitudine fere latior, antice sub rotundatus, lateribus in medio dilatatus, basi truncatus, supra modice convexus, intra basin & apicem obsolete transversim impressus, niger, creberrime, sed subtilissime punctulatus, squamulis minutissimis fusco-cupreis parce adpersus, sed superne in tres lineas, solito modo dispositas, etiam saepe obsoletas, magis condensatis; sub latere thoracis utrinque linea distincta & evidens, e squamulis albo-argenteis, per margines pectoris continuata, nitida. Scutellam parvum, fusco-cupreo squamułosum. Elytra thoracis basi dimidio latiora, & illo plus triplo longiora, supra convexa, evidenter punctato-striata, nigra, squamulis minimis fusco-cupreis, densius quam thorax, adpersa. Corpus subtus piceum, punctulatum, pectore, praeterquam in linea sub-argentea laterali, parcus, ventre vero paulo densius cinereo-squamulosus. Pedes mediocres, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis, plerumque nigris, tibiis tarsisque ferrugineis.

Var. b, differt tantum elytris punctis parvis, sparsis, cinereo-pilosis irroratis,

37. *C. hispidulus*: niger, fusco-squamosus, thorace profunde punctato, cinereo-lineato, elytris cinereo-variis, pilis erectis albidis feriatis.

Fabr. Eleut. 2. 526. III. Payk. fn. 3. 305. 128.

Marsh. Ent. Br. 1. 310. 208.

Curculio cinnitus. Herbst. col. 6. 245. 209. tab. 77. f. 13.

Habitat in plantis aquaticis passim, minus frequens.

Descr. Curc. lineello similis & affinis, sed plerumque paullo major, latior, thorace adhuc profundius punctato, elytrisque pilosis distinctus. Caput breve, nigrum, sat profunde punctatum, squamulis minutis fuscis adspersum, fronte inter oculos linea impressa, fere ad rostri apicem continuata, canaliculata; oculi nigro-brunnei, sub-depressi; rostrum vix capite longius, & illo parum angustius, supra planum, colore, punctura & squamulis ut in capite. Antennae vix longitudine capitis cum thorace, ferrugineæ, clava fusca. Thorax latitudine medii vix lengior, basi apiceque truncatus, lateribus in medio nonnihil rotundatus; supra parum convexus, niger, profunde, sed minus crebre punctatus, squamulis minutis fuscis adspersus, lineisque tribus e squamulis densioribus ciuereo-albidis, media angusta, saepe obsoleta, lateralibus latis, sub-arcuatis. Scutellum minutum, cinereo-squamosum. Elytra vix thoracis basi dimidio latiora, sed plus triplo longiora, supra modice convexa, nigra, sat profunde punctato-striata. Squamulis fusco-cinereis, densis. tecta, & praeterea setis erectis rigidis albidis seriatis hispida. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis densis tectum, in thorace & pectore magis nitidis, sub-metallicis, in ventre obscurioribus, fusco-cinereis. Pedes mediocres, femoribus clavatis piceis, cinereo-squamulosis, tibiis tarassisque testaceis.

Fam, I. Sectio 2:da, Apterī.

Subdivisio 1:a, Corpore elongato, sub-lineari.

18. *C. incanus*: elongatus, niger, fusco-pubescent, antennis tenuibus ferrugineis; thorace brevissimo transverso, supra depresso.

Linn. syst. 2. 616. 81. Fn. Sv. 631. Fabr. E-leut. 2. 518. 66. Herbst col. 6. 236. 201. tab. 77. f. 5. Payk. fn. 3. 296. 120. Panz. fn. 19. f. 8. Bonsd. curc. 2. 41. 36. f. 37.

Brachyrinus incanus. Latr. Gen. Inf. 2. 256. 2.

Curculio griseo-apterus. De Geer Inf. 5. 242. 28.

Habitat in Pinetis, sat frequens.

Descr. *C. albido* paullo longior & angustior, sub-depressus. Caput breve, latum, nigrum, sublaeve. griseo-pubescent, oculis lateralibus brunneis, prominulis; rostrum brevissimum, vix capite longius, ejusque fere latitudine, nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, in medio late, sed obsolete, impressum, cinereo-pubescent. Antennæ longitudine dimidiū corporis, tenues, rufo-ferrugineæ, articulo primo longissimo, clavato, clava apicali angusta, acuminata. Thorax brevissimus, transversus, basi apiceque truncatus, anterius paullo angustior, lateribus pone medium rotundatus, supra fere planus, saepe in medio impressus, niger, subtiliter punctatus, pube griseo-fusca testus. Scutellum minutum, triangulare, nigrum. Elytra oblongo-ovata, ante thorace non latiora; pons basin sessim dilatata, apicem versus interum

terum angustiora, thorace sextuplo longiora, supra dorso antico sub-depressa, postice declivia, tota nigra, tenue punctato-striata, intersticiis subtiliter rugosis, tota pube fusco-grisea tecta. Corpus subtus nigrum, obsoletius punctatum, griseo pubescens. Pedes elongati fusco-picei, griseo-pubescentes, tarsis saepe dilutioribus.

19. *C. hirticornis*: fuscobrunneus, opacus, dense fusco-squamulosus, griseoque variegatus, subtus dilutior, thorace profunde punctato, antennis crassis, hirtis.

Herbst. col. 6. 327. 302. *Tab.* 85. f. 14. *Payk.*
fn. 3. add. 458. 117-18.

Habitat in frutetis passim, minus frequens.

Deser. Statura elongata, deppressa, fere C. incani, sed quadruplo minor. Caput parvum, brunneum, subtiliter coriaceum, dense griseo-squamulosum, fronte deppressa, inter oculos canaliculata; vertice transversim prominulo; oculi nigro-brunnei, parum prominuli; rostrum longitudine capitinis, apice incrassatum, supra canaliculatum, dense griseo-squamulosum, apice lato emarginatum, laciniis acutis. Antennae longitudine dimidii corporis, fusco-ferrugineae, valde incrassatae, articulo primo magno, erasso, dimidiā fere totius longitudinem effidente, pilis brevibus, rigidis, arcuatis, densis hirsuto; articuli sequentes pilis densis, rectis, pubescentes, clava parum crassiori, acuminata. Thorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, sub-cylindricus, supra valde convexus, brunneus, profundē, sed non crebre punctatus, dorso squamulis densis fuscis, subtus, lateribus & litura dorsali obsoleta dilutius griseis,

Et usq;

Etus. Scutellum minutum, triangulare, fuscum. Elytra basi ipsa parum thoracis basi latiora, sed posse basin & ultra medium dilatata, thorace quadruplo longiora & ultra, apice rotundata, supra subdepressa, praesertim anterius, tota fuscobrunnea; regulariter punctato-striata, squamulis densis omnino testa, dorso toto fuscis & griseis maculatum variegatis, versus latera griseis, unicoloribus. Corpus subitus dilutius brunneum, punctulatum, squamis densis cirereis nitidis tectum. Pedes rufobrunnei, dense cinereo-squamulosi & pubescentes, femoribus parum clavatis.

Subdivisio 2:a, Corpore breviori, ovato.

20. **C. tenebricosus:** niger, sub-nitidus, pedibus elongatis rufo-piceis, thorace angusto capiteque subtilissime coriaceis, elytris oblongo-ovatis, obsoletissime striatis, apice attenuatis, rostro emarginato, subcarinato.

Herbst. col. 6. 333. 307. tab. 86. f. 5.

Curculio morio. Payk. fn. 3. 294. 118.

Curculio clavipes. Bonsd. curc. 2. 40. 35. f. 36.

Curculio niger. Marsh. Ent. Br. 1. 297. 172

Var. b, rufo-piceus, sub-pubescentes, pedibus dilutius rufo-testaceis.

Habitat in arenosis maritimis Scaniæ & Hallandiae, rarius; ad urbam Ystad, frequenter. Dom. de Paykull.

Descr.

Descr. Longitudo fere C. Ligustici, sed angustior. Caput parvum, breve, nigrum, nitidum, creberrime subtiliter punctatum, oculis brunneis, parum prominulis, ad lucem auro-micantibus; rostrum capite dimidio longius, spicè dilatatum, supra sub depresso, nigrum, crebre rugoso-punctatum, cinereo-pubescentes, carinula media, ante apicem obsoleta bifida, marginibusque elevatis, ad os late emarginatum & pilosum. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigrae, dense cinereo-pubescentes, articulo primo longissimo, recto, clava apicis valde angusta, oblonga. Thorax latitudine longior, angustus, sub-cylindricus, vel lateribus perparum dilatatus, basi apiceque truncatus, supra valde convexus, totus niger, sub. nitidus, confertissime subtiliter coriaceus vel granulato punctatus, in illæsis individuis, pube tenui, depresso, cinerea, parce adpersus. Scutellum minutum, triangulare, nigrum. Elytra antice thoracis basi parum latoria; sed maxime basin valde dilatata, thorace quadriplo longiora, versus apicem iterum elongato-attenuata, apice ipso rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, striis punctatis obsoletissimis, in disco vix observandis, versus futuram & margines paullo evidenteribus, & apice in sulculas aliquot abbreviatas exentibus; interstitia striarum tenue & obsolete transversim rugulosa; in illæsis individuis superficies tota pilis minutis cinereis, hinc inde in maculas parvas condensatis, adpersa. Corpus subtus nigrum, crebre subtilissime punctulatum, pube tenui cinerea adpersum. Pedes elongati, jam dilutius rufo-ferruginei, jam rufo-picei, tarsis nigricantibus, femoribus longis, basi tenuibus, extrosum clavatis.

Var. b, modo junior videtur, colore dilutioni differt; corpus supra brunneum, subtus rufo-piceum; pedes rufo-testacei, tarsis fuscis.

Insc. Svec. T. I. P. III. T. Q. L.

Obs. C. unicolor, Herbst. Col. 6. 334 308.
tab. 86 f. 6 magnitudine, statura & colore huic si-
millimus, sed elytra in illo catenato - striata, - apice
minus attenuata, pedes toti semper nigri, &c.

21. C. atro-apterus: niger, sub-nitidus,
pedibus rufo-piceis, thorace lateribus di-
latato, capiteque subtilliissime coriaceis, e-
lytris ovatis, obtusis, obsoletissime sulcatis,
granulatis, rostro carinato, sub-integro.

De Geer Ins. 5. 243. 29. tab. 7. f. 22-24.

Habitat in Scaniæ & Hallandiæ arenosis
maritimis, passim.

Descr. Præcedenti quidem valde affinis, atta-
men distinctus videtur, duplo minor, thoraci lateri-
bus magis dilatatis, elytris apice non attenuatis,
nec punctato striatis, femoribus crassius clavatis,
rostro vix apice emarginato. &c. Caput breve ni-
grum, nitidum, subtiliter punctulatum. fronte inter
oculos foveola parva impressa; oculi brunnei, modi-
ce prominuli; rostrum capite pruilo longius, apice
dilatatum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, cari-
nula elevata, abbreviata, longe ante apicem desi-
nente; os perparum emarginatum. Antennæ longi-
tudine dimidi corporis, crassissimæ, rigæ, articu-
lo primo longissimo, clava apice ovato-acuminata,
multo crassiori quam in præcedenti. Thorax latitu-
dine medii vix longior, basi apiceque truncatus, la-
teribus rotundato-dilatatus, supra convexus, sub-
pulvinatus, ante basin & apicem transversim depre-
sus, totus niger, sub-nitidus, crebre subtiliter pun-
ctulatus, pilis minutis griseis parce adspersus. Deu-
tellum parvum triangulare nigrum. Elytra antice
thoracis basi parum latiora, sed versus medium val-

de dilatata, posterias iterum angustiora, non vero elongato-attenuata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, nigra; sub-nitida, obsoletissime squalida, non vero in sulcis punctata, superficie tota granulis minutis, elevatis, & pilis parvis, depresso-crevatis adspersa. Corpus subitus nigrum, sub-oculatum, crebre subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes elongati, validi, rufo-picei, semoribus valde crassis, praesertim anticis.

22. C. ater: niger, pedibus rufis, tarsis genuisque nigris, thorace angusto, subtilissime coriaceo, elytris rugosis, obsoletissime sulcato punctatis

Herbst. col. 6. 332. 306. tab. 86. f. 4.

Curculio niger. Payk. fn. 3. 295 u9.

Habitat in arenosis Hallandiæ rarius. Dom. Osbeck.

Descr. Statura & similitudo C. tenebricosi, sed paullo minor, elytris multo magis rugosis, pedibus dilute rufis, nigro geniculatis, &c. Caput breve, nigrum, subtilissime punctulatum, fronte depressa, oculis brunneis, parum prominulis; rostrum capite longius, apice incrassatum, totum nigrum; subtilissime crebre punctulatum. apice parum emarginatum, supra carinula elevata, apice bifida, notatum. Antennæ longitudine dimidii corporis, totæ nigrae, clava valde angusta, oblonga, cinereo pubescente. Thorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra valde convexus, totus niger, creberrime subtiliter rugoso-punctatus, pube tenuissima cinerea versus latera adspersus. Scutellum minutum triangulare nigrum.

Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed versus medium sensim dilatata, dein iterum attenuata, thorace fere quadruplo longiora, supra convexa, nigra, sub-nitida. Superne inspecta obsoletissime sulcata, sulcis punctis latis, sed parum profundis, notatis, interstitiis angustis transversim rugosis, praesertim versus margines; unde elytra, a latere inspecta, inordinate rugosa apparent. Corpus subitus nigrum vel nigro-piceum, subtilissime rugoso punctatum, tenue pubescens, segmento anali tenuissime substriato. Pedes longiusculi, validi, late rufescentes, femoribus crassis, clavatis, apice nigris; tarsi etiam nigri, pubescentes.

Obs. Curculio niger, Fabr. Eleut. 2. 530. 137. hoc non pertinet, teste Dom. Illiger in Mag. 4 157. 137, ideoque nomen Herbstii retinendum; Curculio ater Cl. Linnæi in Cossoni genere descriptus.

23. C. laevigatus: niger, nitidus, antennis pedibusque piceis, thorace subtiliter punctulato, elytris subtilissime punctato-striatis, posterius angustatis, rostro non carinato.

Fabr. Eleut. 2. 531. 139. Herbst. col. 6. 347. 320. tab. 37. t. 6.

Habitat sub lapidibus ad littora maris, in Bahusia, Hallandia, Scania, non frequens.

Descr. Praecedentibus minor, brevior, C. tristis tamen perumque paullo major, posterius magis angustatus. Caput mediocre, nigrum, nitidum, glabrum, subtiliter punctularum, oculis parvis brunneis; rostrum capite parum longius, crassum, nigrum,

grum. supra planum, creberrime rugoso-punctatum, non carinatum. apice emarginatum. Antennæ longitudine fere dimidii corporis, rufo-piceæ, articulo primo longo, saepe saturatius nigro. Thorax latitudine medii parum longior, basi apiceque truncatus, lateribus in medio rotundato-dilatatus, supra valde convexus, niger, nitidus, glaber, dorso subtiliter crebre punctatus, lateribus & subtus creberrime granulatus. Scutellum minutum, triangulare nigrum, sub-læve. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin valde dilatata, a medio versus apicem attenuata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, nitida, glabra, subtilissime punctato-striata, intersticiis planis, adhuc subtilius crebre & vage punctulatis. - Corpus subtus nigrum, oitidum, subtiliter crebre punctulatum. Pedes elongati, jam nigri, jam saturatius vel dilutius rufo-picei, femoribus valde clavatis, nitidis, sub-lævibus, tibiis arcuatis scabris, tarisque parce cincereo-pubescentibus.

24 C maurus: niger, sub-nitidus, parce cinereo-pubescentis, antennis pedibusque rufo-piceis, thorace confertissime granulato, elytris ovatis, punctato-striatis, intersticiis sub-lævibus.

Curculio morio. Bon. d. cure. 2. 36. 28. f. 29.

Curculio sulcatus. Payk. fn. 3. 276. 98. var. b.

Habitat sub lapidibus, foliis deciduis, tempore vernali, passim.

Descr. C. lævigato paullo major, elytris latioribus, ovatis, posterius magis oblongis, thorace evidenter granulato, &c. distinctus. Caput breve, nigrum;

grum, sub-nitidum, vertice laevi, fronte parce punctata, foveola rotundata inter oculos impressa; oculi brunnei, sub-prominuli; rostrum capite longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, cinereo-pubescentes, carinula media elevata, apice bifida, notatum. Antennae longitudine fere dimidii corporis, crassiunctae, rufo-piceae, cinereo pubescentes. Thorax longitudine latior, basi apicemque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra modice convexus, niger, granulis rotundatis, elevatis undique confertissime obsitus, pilisque parvis cinereis adpersus. Scutellum vix illum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin dilatata, ovata, apice obsoleta rotundata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, sub-nitida, regulariter, sed non profunde punctato-striata, interstitiis sub-laevibus, vel obsoletissime sub-rugosis, pilis parvis, depresso, cinereo-sub-metallicis hinc inde variegatis, quae vero facie deteruntur. Corpus subitus nigrum, opacum, pectore fortius, ventre obsoletè punctulatis, tenue pubescentibus. Pedes longiusculi, rufi picei, pubescentes, femoribus parum clavatis, omnino muticis.

25. C. obscurus: nigro-piceus, dense fulco-cinereo squamosus, rostro thoraceque canaliculatis, elytris punctato-striatis, sutura postice carinata, setosa.

Fabr. Eleut. 2. 530. 134. Herbst. col. 6. 344. 317. tab. 87 f. 3. Payk. fn. 3. 292. 116.

Curculio honorus. Herbst. col. 7. 59. 617. tab. 100. f. 3. var. major.

Curculio murinus. Bonsd. curc. 2. 37. 30. f. 31.

Habitat

Habitat in aridis, sub lapidibus, in plantis
& gramine, nequens.

Descri. Major, saepe C. Ligustici æqualis; variat tamen dimidio minor & ultra. Caput breve, nigrum, parce punctatum, squamulis cinereis, interdum cupro micantibus, plus minusve dehis, tectum; oculi nigri, depresso, rostrum capite longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, canalicula impressa a fronte fere ad apicem exaratum, squamuus uti caput adspersum. Antennæ vix longitudine rostri cum thorace, aut nigro-aut rufo pieæ, pubescentes, clava ovata, acuminata, obscuriori. Thorax latitudine medii brevior, anterius paullo angustior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra minus convexus, niger, antice punctatus, lateribus & postice obsolete granulatus, in medio canaliculatus, squamis fusco cinereis, aut densioribus, aut rarioibus adspersus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, elevatum. Elytra thorace paullo latiora, humeris antrosum prominulis, thorace trip'o longiora, apicem versus compressa, sub-attenuata, supra convexa, nigra, punctato-striata, interstitiis crebre subtiliter coriaceis, alternis. 3 & 5 a sutura plerumque elevationibus, ut & sutura posterius elevata, carinata; tota squamulis minimis, valde condensatis, tecta, aut uni-coloribus, cinereis, aut obscurioribus, maculatim congestis, variegata; versus apicem praeterea setulæ erectæ, cinereæ, seriatæ, tam in sutura, quam in interstitiis lateribus. Corpus subtus nigro-piceum, obscurum, crebre subtiliter punctulatum, parce cinereo pubescentes, anō saepe dilutius ferrugineo. Pedes validi, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis, nitidis, tibiis tarsisque saepe ferrugineis.

26. C. Mercurialis: niger, squamulis fusco-cupreis adspersus, thorace carinato, elytris punctato-striatis, sutura postica interstiliique alternis elevatis, antennis tibiisque rufo-piceis.

Fabr. Eleent. 2. 530. 135.

Curculio elevatus. Herbst. Col. 6. 235. 199.
Tab. 77. f. 3.

Curculio lapidarius. Pauk. fn. 3. 292. 115.

Curculio æcidii. Marsh. Ent. Br. 1. 307. 201.

Var. b, Elytrorum intersticiis vix vel pa-
rum elevatis.

Curculio lepidotus. Herbst col. 6. 233. 197.

Curculio obtusus. Bonsd. curc. 2. 37. 29. f. 30.

Habitat sub lapidibus, tempore vernali, &
in plantis præcipue Mercurialide perren-
ni, in umbrosis Westrogothiæ, Scaniæ,
paßim.

Descr. Statura fere præcedentis, sed duplo aut triplo minor, sequenti æqualis: Caput breve, ni-
grum, crebre subtiliter punctulatum, squamulis mi-
nutis, cupreo vel auro-micantibus tectum, fronte
inter oculos foreola parva impressa; oculi depresso-
brunnei; rostrum cespite longius, crassum, nigrum,
crebre rugoso-punctatum, linea parva, elevata, ea-
riatum, squamulis similibus uti caput supra adspersum.
Antennæ longitudine rostri cum thorace, ru-
fo-piceæ, clava obscuriöri. Thorax latitudine fere
longior, anterius perparum angustior, basi apiceque
truncatus, lateribus vix dilatatus, supra modice con-
vexus,

vexus, carinula longitudinali elevata notatus, niger, obsolete punctatus, squamu's aureo & æneo micantibus æqualiter adspersus. Scutellum minutum, vix observandum. E'ytra antice thorace latiora, humeris antrosum prominulis, ante medium dilatata, posterius attenuata, thorace triplo longiora, supra valde convexa, dorso antico tamen deprecta. lateribus inflexa, tota nigra, punctato striata, striis versus latera profundioribus, interstitiis crebre punctulatis, interstitiis alternis. 3. 7. 5 & 9 a sutura, magis elevatis; sutura etiam postice elevata carinata, sub-tetosa; superficies tota squamulis densis testa. hinc inde aureo aut æneo-micantibus, interjectis maculis obscurioribus. Corpus subitus nigrum, crebre sed obsoletius punctulatum, squamulis angustis, metallico-nitidis, parcus adspersum. Pedes mediocres, femoribus clavatis nigris, pilis metallico-nitidis adspersis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.

Var. b, differt tantum interstitiis alternis elytrorum vix vel parum elevatis; cætera omnia exacte convenient, adeoque non Species distincta.

27. *C. raucus*: niger, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris profunde punctato-striatis, pube grisea fuscisque nebulosis, postice carinatis, thorace sub-carinato.

Fabr. Eleut. 2. 529. 130. *Herbst. col.* 6. 343. 316. *tab. 78. f. 2.* *Payk. fn. 3.* 291. 114.

Curculio tristis. *Bonsd. curc.* 2. 36. 27. f. 28.

Var. b, Elytris griseis immaculatis.

Curculio tristis. *Fabr. Eleut.* 2. 529. 129.

Habitat in plantis & fruticibus; etiam sub lapidibus, tempore vernali, sat frequens.

Descr. Statura præcedentium; magnitudo variat. Caput breve, nigrum, fronte parce punctata, pilis griseis adspersa, vertice levi, glabro; oculi sub depresso brunnei; rostrum capite parum longius, spicè incrassatum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, pilis griseis adspersum, carinula obsoleta, ab eviata, notatum. Antennæ longitudine fere dimidi corporis, crassæ, fusco ferrugineæ, pubescentes, interdum basi piceæ. Thorax latitudine medii vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra modice convexus, niger, opacus, crebre rugoso-punctatus, fere granulatus, pilis rigidis, depresso, griseis, parce adspersus, carinula media abbreviata, angusta, notatus. Scutellum triangulare nigrum, opacum, perunque sub thorace occultatum. Elytra ovata, antice thoracis basi vix latiora, humeris rotundatis, pone basin & ultra medium rotundato-dilatata, apicem versus attenuata, thorace triplo longiora, supra convexa, nigra, profunde & rude puncto striata, interstitiis angustis, subtilissime coriaceis; sutura postice valde elevata carinata; superficies tota pilis densis, rigidis, depresso, griseis & fusco maculatim confluentibus, testa & variegata, humeris & lateribus plerumque pallidius cinereis. Corpus subitus nigrum, opacum, creberime punctulatum, parce griseo-pubescentes, ano perunque rufo piceo. Pedes mediocres pubescentes, aut toti rufo-ferruginei, aut femoribus saturatius nigro-piceis, apice dilutiорibus.

Var. b, differt tantum pilis elytrorum concoloribus griseis, nec fusco variegatis; versus humeros tamen & ad latera plerumque pallidioribus.

28. C. setosus: fusco-rufescens, squamulis cinereo-albidis variegatus, antennis pedibusque

busque dilutioribus, elytrorum interstitiis
alternis carinatis, seriato-setiferis.

Fabr. Eleut. 2. 527. 115.

Curculio Septentrionis. *Herbst. col.* 6. 360. 335.
Tab. 88. *f* 6. *Payk. fn.* 3. 290. 113.

Curculio griseo punctatus. *De Geer Ins.* 5.
244. 30.

Curculio Scaber. *Bonsd. curt.* 2. 35. 26. *f.* 27.
an id. *Linn. syst.* 2. 699. 22. *En. Sv.* 592²

Habitat præsertim in Pini Abietis frondibus;
etiam in truticibus & plantis aliis, non
intrequens.

Descr. Statura fere præcedentis, sed plerumque paullo minor. Caput angustum, piceum, crebre punctatum, squamu*s* minutis cinereis tectum. fronte inter oculos lineola impressa; oculi depresso nigris rostrum vix capite longius, piceum. punctatum, supra cinereo-squamosum, apice incrassatum, sub-nudum. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassifusculæ, fusco-ferrugineæ, pubescentes. Thorax latitudine medii longior, anteriorus angustatus, basi apiceque truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, supra valde convexus, fusco-piceus, crebre granulo rugosus, squamulis cinereis opacis tectus. Scutellum minutum piceum. Elytra thoracis basi fere dimidio longiora, humeris rotundatis, thorace triplo longiora, posterius attenuata, supra modice convexa, fusco-rufescens, squamulis cinereo-sub metallicis, hinc illinc magis condensatis, variegata, punctis profundis, remotis striata, puncto singulo in medio squamula majori cinerea notato, unde ocellata apparet; sutură & interstitia alterua, 2, 4

& 6 a futura, elevato-carinata, singula serie e setis crebris, erectis, vel parum recinatis, validis, piceis. armata Corpus subtrus fusco-ferrugineum vel rufo piceum, obsolete punctulatum, tenue pubescens. Pedes mediocre, dilutius rufo-ferruginei, cinereo-pubescentes, femoribus clavatis.

Obs. Num C. Scaber Cl. Lionæ huc referendus, vix certe dicendum, quoniam illum inter longirostres numerat.

29. *C. pilofellus*: niger, griseo-hirtus squamosusque, fronte canaliculata, oculis prominulis, thorace brevissimo, postice sinuato, supra cinereo quadri-lineato, elytris antice angustioribus.

Circulio pilosus. Herbst. col. 6. 237, 202. tab. 77. f. 6.

Circulio limbatus. Marsh. Ent. Br. t. 301. 183.

Habitat in littoribus marinis arenosis, in Hollandia, Scania & Bahusia, passim.

Deser. *C. Coryli* quodammodo similis, sed major, praesertim multo longior, elytra angustiora, minus convexa; a *C. limbato*, cui adhuc magis affinis, differt magnitudine majori, fronte profundius canaliculata, thorace postice sinuato, & elytris antice angustioribus, &c. Caput latum, nigrum, obsolete coriaceum, squamulis cinereo-albidis fere testum, fronte plana, stria longitudinali sat profunde canaliculata; oculi laterales brunnei, valde prominenti; rostrum capite paullo longius, & aequo latum, nigrum, similiter squamulosum. supra planum, basi foveola obsoleta, transversa, impressum, & in medio

dio lineola parva, brevi, a canalicula frontali continuata, ex-ratum. Antennæ capite cum thorace fere breviores, tenues, fusco-piceæ, pilosæ, clava parva, cinereo-pubescente. Thorax brevis, transversus, antice truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, basi bi-sinuatus, angulis sub-prominulis, supra modice convexis, nigra, sat profunde rugosa, punctatus, pube tenui, erecta, grisea, cebre adspersus, & præterea lineis quatuor arcuatæ, e squamulis cinereo-albidis, densioribus, notatus; in medio basos foveola brevis, sat profunde impressa, & ab illa anteriorum lineola longitudinalis impressa, plerumque obsoleta. Scutellum nulium. Elytra in ipsa basi coarctata, thorace fere angustiora, & transversim impressa, dein nonnihil latiora, oblongo-ovata; thorace quadruplo longiora, supra convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, lævibus, alternis paullo angustioribus, unde striæ per paria magis approximatæ; superficies tota pube densa, erecta, tenui, grisea adspersa, & interstitia latiora præterea squamulis densioribus cinereo-albidis testa, unde elytra cinereo-lineata apparent. Corpus subrufum nigrum, obsolete-punctulatum, parcus cinereo-squamulosum. Pedes validi, nigri, cinereo pubescentes, femoribus clavatis.

Obs Cl. Dom. Illig. in Mag. 4. 156 118. hunc eundem cum sequenti, seu C. limbato Fabr. Payk. esse credit, sed vix jure, nam thorax in illo basi truncatus, elytra antice non coarctata, &c.

50. *C. limbatus*: niger, sub nitidus, oculis prominulis, thorace postice truncato, elytris ovatis, æqualibus, suturæ basi linea-que lateralí argenteo-lquamosis.

Fabr. Eleut. 2. 527. 118. Payk. fn. 3. 288. III.
Herbst. col. 6. 499. 530. Ha-

Habitat in Hallandiæ arenosis, Dom. Osbeck; in Kinnakulle Westrogothiæ, ipse; rarius occurrit.

Descr. Præcedenti, ut dictum, simillimus. & valde affinis, sed paullo minor, glabrior. nitidior. Caput breve, latum, nigrum, sub-nitidum, punctatum, squamulis paucis albidois adspersum; fronte minus plana, canalicula obsoletiori exata; oculi ut in præcedenti omnino; rostrum vix longitudine capitis, crassum, nigrum, crebrius & subtilius quam caput punctatum, striga transversa, arcuata, sat profunda, a fronte distinctum. Antennæ ferrugineo-piceæ, structura ut in priori. Thorax brevis, transversus, basi apicequè truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra convexus; niger, sub nitidus, sat crebre punctatus, lineis quatuor archatis e squamu-lis albido-argenteis notatus, eodem ordine ac in priori, saepe tamen detritis. Scutellum nullum. Elytra ovata, antice thoracis basi paullo latiora, nec juxta basin coarcta vel transversim impressa, pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora. supra convexa, nigra, sub-nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, sub-lævibus, æqualibus, nec alternis angustioribus; squamulis minutis albido-argenteis in disco parce adspersis; in basi futuræ macula oblonga. & versus latera utrinque linea lata, inæqualis, e squamulis densis, albido-argenteis; ipse margo inflexus & apex futuræ etiam squamulis similibus decorati. Corpus subtus nigrum, punctatum. pectore densius, ventre paucius argenteo-squamulosus. Pedes validi, nigro-picei, pubescentes;

si. C. geminatus: niger, dense fusco-squamulosus; cinereo-lineatus, elytris latis, sub-globosis,

g'obofis, albido-setosis; rostro plano; vix
canaliculato.

Fabr. Eleut. 2. 523. 94. Herbst. col 6 343.

321. Tab. 87. f. 7. Payk. fn. 3. 289. 112.

Cure. plagiatus. Schäll Abb. Hall. 1. 284.

Curculio maritimus. Marsh. Ent. Br. 1. 307.
202.

Habitat in arenosis, ariasis, passim; in are-
na volatili ad littora maris in Hollandia,
Scania; frequens.

D ser. Facies fere C. Coryli, sed elytra latio-
ra, magis globosa, rostrum non canaliculatum, &c.
Magnitudo valde variat; majores C. taucum supe-
rant, alii, præsertim mares, triplo minores & ul-
tra. Caput breve, latum nigrum, subtiliter crenate
punctulatum, squamulis densis fuscis & cinereo al-
bidis mixtis, pubesque tenui, erecta, coeruleo te-
ctum, fronte sub depresso, integra, rarius in ipso
margine antico striola parva exarata; oculi parvi,
globosi, brunnnei; rostrum vix capite longius & pa-
rum angustius, a fronte linea parva transversa, im-
pressa, distinctum, supra planum, non canalicula-
tum, colore, punctura & indumento simili uti caput.
Antennæ vix longitudine capitinis cum thorace, fusco-
ferrugineæ, pubescentes. Thorax brevissimus, trans-
versus. basi apiceque truncatus, lateribus non nihil
rotundatus, supra convexus, niger, crenate subtiliter
rugoso punctatus, squamulis densis undique tectus,
subtus & in lineis duabus dorsalibus latis, arcuatis,
cinereo-albidis, in interstitiis dorsalibus obscurius
fuscis, & præterea pube tenui, erecta, grisea, obfi-
tus. Scutellum parvum, angustum, nigrum. Ely-
tra magna, antice quidem thoracis basi parum la-
tiora;

tiora, sed mox pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra; subtiliter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime coriaceis; tota squamulis densis omnino tecta, & pubescentia erecta, cinerea, antice tenui, posterius magis rigida, sub-setosa, adspersa; color squamulorum variat; plerumque interstitia dorsalia alterna fusca & cinereo-albida, unde elytra cinereo & fusco-lineata; latera inflexa fere semper albidiora; interdum dorsum totum fusco-squamulosum, parum albido-variegatum; alia vice pagina tota superior albido-squamosa, vix fusco-lineata. Corpus subtus nigro picatum, subtiliter punctulatum, dense albido-squamulosum. Pedes crassiusculi, dense cinereo-squamulosi & pubescentes.

Obs. Occurrit saepe totus niger, sub-nitidus, indumento nempe omni, praesertim in elytris & femoribus, detrito.

32. *C. Coryli*: niger, squamulis densis fusco cinereisque variegatus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; fronte rostroque latis, sulcato-rugosis.

Fabr. Eleut. 2. 524. 98. Herbst. Col. 6 349.

322. Tab. 87. f. 8. Payk. fn. 3. 287. 110.
Panz. fn. 19. f. 12.

Curculio capitatus. De Geer Ins. 5. 245. 32.

Bonsd. Cure. 2. 33. 23. f. 24.

Var. b, minor, griseus vel testaceus, cinereo fuscoque variegatus, elytris macula baseos albida utrinque.

Curculio Cervinus. Fabr. Eleut. 2. 528. 121.

Cure.

Circulio retusus. Marsh. Ent. Br. I. 306. 196.

Var. c, Corpore toto squamulis concoloribus cinereis tecto.

Circulio obesus. Marsh. Ent. Br. I. 304. 191.

Var. d, niger glaber; antennis pesibusque dilutius rufis; dentibus.

Carc. trunculus. Busd. curc. 2. 33. 22. f. 23.

Habitat in arboribus, fructibus & plantis, præsum in Corylo & Betula, ubique vulgaris.

Descri. Majores C, setoso æquales, sili triple aut quadruplo minores. Caput breve, latum, nigrum, longitudinaliter valde rugosum, rugis sulcisque alternantibus, sulco vel canalicula media profundiota; totum squamulis fusco cinereis omnino testum; oculi laterales, brunnei, valde prominuli; rostrum breve, latum, capite parum angustius, nec longius, nigrum, valde inæquale, coniculatum & rugosum, rima transversa a fronte distinctum, rugum, basi squamulis fusco-cinereis testum, apice magis nudum. Antennæ longitudine capitis eam thorace, tenues, rufo-ferrugineæ, cinereo-pubescentes. Thorax brevis, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra convexus, niger, opacus, crebre rugoso punctatus, squamulis densis cinereis & pubè brevissima, erecta, fusca, testus, dorso lineis tribus obscurioribus, e squamulis fuscis, notata. Scutellum vix ultum. Elytra antice thoraci basi prolio latiora, & mox ponit basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, sat profunde punctato-friata, interstitiis convexus, sub laevibus; tota squamulis densis fuscis.

Ins. Svis. T. I. P. III. U

fusco-cinereis tecta, immixtis maculis lineisque e squamulis albioribus, præsertim versus latera & infra basi interiori; præterea etiam pube tenui, erecta, fusca, undique adspersa; ipsa basis futuræ magis nuda, nigra. Corpus subtus piceum, punctulatum, dense albidio-squamulosum. Pedes validi rufo-ferruginei, cinereo-pubescentes.

Var. b, simillima, modo minor, pallidior; squamulæ sœpe sub-aeneo micantes; forte maris iadivida juniora.

Var. c, tota squamulis pallidins cinereis, unicoloribus, tecta, nec variegata; futuræ basis tamen magis nuda, nigrior.

Var. d, tantum speciminibus detritis constat, & tunc tota nigra, elytris nitidis, antennis pedibusque saturate rufis.

33. C. squamulatus: sub-globosus, fuscus, dense albo-squamulosus pilosusque, antennis, tibiis transque testaceis, thorace brevissimo, æquali, elytris tenui striatis, rostro lato, emarginato.

Fabr. Eleent. 2. 527. u6. Herbß. col. 6. 353.
326. tab. 87. f. 12.

Habitat in Gotlandia, ad Porticum Slitö, rarissime; Dom. Wetterhall.

Descr. Statura omnino & affinitas C. hirsutulus, sed vere distinctus, paullo major, totus supra & infra squamulis densis albidis tectus; & præterea pilis crebris, erectis, concoloribus, adspersus. Caput latitudine thoracis fere, cum rostro contiguo, porrecto, æque lato, apice late emarginato, thorace longius, supra planum, nigro-fuscum; undique squamu-

lis

lis densis albis, pilisque brevibus erectis, tectum; oculi parvi, laterales, prominuli, nigri. Antennæ capite cum thorace fere longiores, minus crassæ & pilosæ quam in *C. hirsutulo*, pallide testaceæ, cava nigro-fusca. Thorax brevissimus, transversus, basi apiceque truncatus, lateribus vix rotundatus, supra parum convexus. æqualis, colore & indumento simili uti caput. Scutellum minutum, a bo, squamosum. Elytra magna, thorace dimidio latiora & quadruplo longiora, humeris & apice rotundata, supra valde convexa, fere globosa, sutura posterius sub-elevata; nigro-fusca, tenue striata. striis vix punctatis, interstitiis latis, planis, subtilissime co-iacens, tora squamulis albis & pilis erectis, uti caput & thorax, testa, relictis punctis parvis denudatis nigris, in quovis interstitio fere seriatim dispositis. Corpus subtus fuscum, vix punctulatum, squamulis pilisque albis uti supra tectum. Pedes mediocre, dense albo-squamosi & pilosi, femoribus clavatis, extorsum fusci, tibiis, tarsis femorumque basi pallide testaceis.

Obs. Figura Herbstii loc. cit. nostrum bene repræsentat; forte etiam idem Fabricii, quum thorax & rostrum non canaliculata; descriptiones alias nimis insufficientes.

34. *C. hirsutulus*: nigro fuscus, pubescens, antennis pedibusque pallide testaceis, elytris globosis, hispidis, profunde punctato-striatis, thorace angusto rostroque non canaliculatis.

Fabr. Eleut. 2. 526. 112. Herbst. Col. 6. 352.

325. Tab. 87. f. II. Payk. fn. 3. 286. 109.

Panz. fn. 7. f. 7. Marsh. Ent. Br. 1. 305.

193. **U 2**

Var.

Var. b, rufo-brunneus seu ferrugineus, capite thoracisque disco fuscis, antennis pedibusque pallidis.

Curculio echinatus. Bonsd. curc. 2. 33. 21. f. 22.

Habitat in plantis & gramine non infrequens.

Descr. Parvus, C. lineello brevior, sed in elytris crassior. Caput parvum, nigrum, punctatum, pilis rigidis, depresso, albidis tectum, fronte plana, non canaliculata; oculi nigri, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitinis, & illo paullo angustius, nigrum, punctatum, albido-pilosum, apice emarginatum. Antennæ breves, crassæ, dilute rufo-testaceæ, dense pilosæ. Thorax parvus, brevis, antice truncatus, basi bi-sinuatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, nigro-fuscus, punctulatus, subtus & lateribus late, margine antico & linea dorsali anguste, obsolete, albido-squamulosus, & præterea undique pilis crassis, erectis, spiniformibus, crebre adspersus. Scutellum minutum, piceum. Elytra magna, antice quidem thorace parum latiora, sed mox pone basin valde dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, sub-globosa, nigro-fusca, profunde punctato-striata, interstitiis planis, sub-lævibus, squamulis minutis, piliformibus, griseo-albidis, parce adspersa, & præterea pilis crebris, erectis, rigidis, spiniformibus, fuscis, undique muricata. Corpus subtus nigro-piceum, crebre punctuiatum, parce cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, pallide rufo-testacei, pubescentes.

Var. b; colore pallidiore tantum differt; caput, rostrum & thoracis dorsam fusca; elytra & corpus testaceo-ferruginea; antennæ & pedes dilute testacei.

35. C: scabriculus: ovatus; niger; dense fuscō-squamosus, antennis pedibusque fuscō-ferrugineis, thorace latiori, inaequali rostroque canaliculatis, elytris squamis erectis albidis seriatis, muricatis.

Linn. Mant. 2. 531. Fabr. Eleut. 2. 527. 114.
Herbst col. 6. 351. 324. Tab. 87. f. 10.
Payk. fn. 3. 285. 108. Bonsd. curc. 2. 32.
20. f. 21. Marsh. Ent. Br. 1. 304. 192.

Var. b, Elytris fuscō cinereoque obsolete tessellatis, posterius tantum muricatis.

Curculio hispidulus. Herbst. Col. 6. 354. 328.
tab. 87. f. 14.

Habitat sub lapidibus & foliis deciduis, locis aridis, passim.

Descr. Similis praecedenti, sed vere distinctus; thorace latiori rostroque canaliculatis, elytris longioribus, antice minus convexis, &c. Caput parvum, angustum, nigrum, depresso, crebre rugoso-punctatum, squamulis densis fuscis tectum; oculi nigri, sub-depressi; rostrum capite dimidio longius, æque latum, nigrum, rugoso-punctatum, in medio sat profunde canaliculatum. Antennæ breves, valde crassæ, dense pilosæ, fulco-ferrugineæ. Thorax brevis, latus, antice angustior, truncatus, juxta apicem transversim impressus, lateribus valde dilatato-rotundatus, basi sub-bisinuatus, supra parum convexus, inaequalis, sat profunde canaliculatus, & versus latera utrinque foveola oblonga impressus, niger, creberrime subtiliter rugoso-punctatus, squamulis densis fuscis tectus, & præterea spinulis erectis, albidis, sparsis, muricatus. Scutellum nullum.

Elytra antice thoracis basi parum latiora, versus medium nonnulli dilatata, thorace quintuplo longiora, supra anterius parum convexa, posterius magis gibbosa, nigra, striato punctata, interstiliis sub-convexis, creberrime punctato rugulosis, squamulis minimis fusco, depresso, omnino tecta, & praeterea in signo interstitio series e squamulis lati, erectis, albidis, posterius majoribus & crebrioribus, unde elytra valde muricata. Corpus subtus piceum, punctulatum, parce fuscō squamosum. Pedes fusco-ferruginei, pubescentes, femoribus saepe obscurioribus, setosis,

Var. b. differt elytris cizereo & fuscō obsolete tessellatis. & squamis erectis paucioribus, minoribus, versus posteriora tantum conspicuis.

Obs. Animalculum totum, praeter maculas densas, depresso, saepissime luto adglutinato tectum, unde canalicula rostri, foveolæ thoracis & puncta striarum in elytris ægre conspicua; indumento vero detrito, elytra evidenter punctato-striata, punctis majusculis, remotis.

Familia 2·da femoribus dentatis.

Sectio 1·a Apteris.

36. C. Ligustici: niger, griseo-squamosus, rostro carinato, thorace granulato, elytris scabris, versus margines punctato-striatis.

Linn. Syst. 2. 615. 68. Fn. Sv. 621. Fabr.

Eleut. 2. 538. 188. Herbst. col. 6. 337. 310. tab. 86. f. 7. De Géer Inf. 5 218. 10.

Payk. fn. 3. 274. 97. Bonnel. curc. 2. 38.

32. f. 33. Marsh. Ent. Br. 1. 313. 220.

Bre-

Brachyrinus Ligustici. Latr. Gen. Inf. 2.

257. 3.

Var b, Elytris maculis obsoletis cinereo-albidis variegatis.

Habitat sub lapidibus, locis aridis; etiam in plantis, praesertim Ligustico, sat frequens.

Descri: Inter maximos nostratum hujus generis. Caput breve, nigrum, rugoso-punctatum, squamulis depresso, griseis, piliformibus adspersum, oculis brunneis, parum prominulis; rostrum capite dimidio longius, crassum, nigrum, rugoso-punctatum, a basi ultra medium carinatum, versus apicem canaliculatum, carinula nempe ibi bifida; apice emarginatum, squamulis similibus uti caput adspersum. Antennæ longitudine capitis cum thorace minus crassæ, nigro-piceæ, cinereo-pubescentes, articulo primo longissimo, arcuato; clava apicis parva, acuminata. Thorax latitudine medii brevior, basi apiceque truncatus, lateribus valde rotundato-dilatatus, supra parum convexus, in medio dorsi longitudinaliter obsolete impressus, niger, undique tuberculis elevatis, rotundatis, in dorso majoribus, confertissime obsitus, pilisque rigidis, depresso, griseis, parce adspersus. Scutellum nullum. Elytra magna, ovata, ante thoracis basi paullo latiora, humeris obliquis, & pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigra, opaca, confertissime subtiliter granulato-tuberculata, versus margines rude punctato-striata, pilis rigidis, vel squamulis piliformibus, depresso, griseo albidis, crebre adspersa. Corpus subtus nigrum, densius albido squamufosum. Pedes mediocres nigri, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, subtus versus apicem dente parvo, armatis.

U 4

Var.

Var. b. differt tamum squamulis elytrorum hinc
inde in maculas condensatis, unde elytæ fusco- &
griseo variegata apparent.

37. *C. nubilus*: niger, opacus, dense cine-
reο-squamosus, antennis tenuis rufo-
piceis, thorace subtiliter coriaceo, sub-cri-
nato, elytris punctato-striatis, maculis
fusco-squamosis tessellatis.

Fabr. Eleut. 2. 538. 191. *Herbst. col.* 6. 335.
309. *tab. 86. f. 7.* *Payk. fr.* 3. 273. 96.
Panz. fn. 107. f. 5.

Curculio tessellatus. *Bonap. curc.* 2. 38. 31. f. 32.

Var. b., paullo minor. squamulis elytorum
abidioribus, magis condensatis.

Curculio Chrysopterus, *Herbst. col.* 6. 339. 312.
tab. 86. f. 10.

Curculio floccosus. *Marsh. Ent. Br.* 1. 314. 222.

Var. c, piceus, antennis, elytris piceibus-
que brunneis vel ferrugineis, detritus.

Habitat in plantis, locis umbrosis, passim.

Descr. Major, G. Ligustici saepe æqualis; variat
tamen dimidio minor & ultra. Caput nigrum, sub-
tiliter coriaceum, squamu lis piliformibus, depresso-
cinereis adspersum, fronte inter oculos sovola par-
va impressa; oculi brunnei, parum prominuli; ro-
strum capite paullo longius, apicem versus incrassa-
tum, totum nigrum, supra planum, subtiliter coria-
ceum, cinereo-squamulosum. Antennæ capite cum
thorace paullo longiores, tenues, rufo piceæ, clava
obscuri or, valde acuminata. Thorax brevis, basi a-
picea

piceo tridentis. lateribus rotundato-dilatatus, supra in medio transversim convexus. niger, opacus, cibae subtiliter granulo-coriaceus. squamulis angustis, depresso-cinereis, versus latera & subtus denticulis, sub-metallici, tectas; in medio dorsi linea elevata, abbreviata. saepe obsoleta. Scutum humi triangulare, nigrum, denso cinereo, seu mulosum. Elytra magna, a tice thoracis basi fere dimidio latiora, & illo quintuplo longiora, apice acuminata, supra va de convexa, praetertim posterius, tota nigra, regulariter punctato striata, interstitiis siccissime coricis; squamulis minutis cimicis densis tecta, & in sutura interstitiisque alteris, 2. 4 & 6 a sutura, serie e maculis fusco-squamulis tessellata. Corpus subtus nigro-piceum subtiliter coriaceum, squamulis, cinereo a bidis, in pectore saepe metallico-nitidis, adpersum. Pedes nigri, cinereo-pubescentes, femoribus dente parvo armatis.

Vari. b. paullo minor; squamulae, praetertim elytrorum densiores & albidiores, unde interstitia alterna evidenter tessellata apparent.

Vari. c. tanum colore diutiori differt, ut in diagnosis dictum; saepe magis nuda, aqua & frictione, squamulis orbata.

38. C. fulcatus: oblongus, niger, astannis, piceis, rostro furcato, thorace oblongo, tuberculato, elytris profunde sulcatis, maculis sparsis pallido-pilosis.

Fabr. Ejent. 2. 539. 197. Herbst. col. 6. 347.

319. tab. 87. t. 5. Marsh. Ent. Br. 1. 315.
224.

Curculio griseo-punctatus. De Gér. Ins. 5.
217. 9.

Habitat in Svecia australi rarius. Dom.
De Geer.

Deser. Præcedentibus parum brevior, sed angustior, & minus convexus. Caput breve nigrum, parce punctulatum & pubescens, fronte inter oculos foveola impressa; oculi brunnei, parum prominui; rostrum capite parum longius, crassum, apice dilatatum, nigrum, rugoso-punctatum, cinereo pubescens, supra sulco lato & profundo exaratum. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, piceæ seu fusco-ferrugineæ, pubescentes, clava parva, acuta. Thorax latitudine multo longior, basi apiceque truncatus, lateribus perparum rotundatus, supra subdepressus, in medio obsolete canaliculatus, totus niger, usque tuberculis crebris elevatis, sub-nitidis, granulatus, pilisque parvis cinereo pallidis adspersus. Scutellum minutum nigrum. Elytra thorace fere dimidio latiora, & illo quadruplio longiora, supra dorso parum convexa, nigra, sat profunde sulcata, intersticiis sulcisque valde rugoso-tuberculatis; maculæ parvæ, irregulares, e pilis pallide ferrugineis, depresso-absque ordine undique sparsæ. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, parce cinereo-pubescentes. Pedes longiusculi, nigri, cinereo-pubescentes, femoribus obtuse dentatis.

39. C. æneo-punctatus: brevior, niger, cinereo-pubescentes, rostro sub-carinato, thorace breviori, granulato, elytris ovatis, obsolete sulcatis, maculis sparsis, æneo-maculatis, femoribus acute dentatis.

Curculio sulcatus. Payk. fn. 3. 275. 98. Bonsd.
curc. 2. 40. 34. f. 35. Habi-

Habitat in plantis & fruticibus passim.

Descr. Præcedente dimidio sere minor præser-tim brevior, convexior, & abunde distinctus. Caput breve, nigrum, fronte plana: punctata, pilis depresso-sinereis adspersa, vertice sub. ævi, glabro; oculi ma-jusculi, brunnei, sub prominu'i; rostrum capite vix longius, crassum, apice dilatatum, nigrum, supra planum, rugoso punctatum, cinereo pilosum, catinula tenui, apice bisida, notatum. Antennæ longitu-dine dimidii corporis, nigro-piceæ, extorsum fusæ, pubescentes. Thorax latitudine mediæ non longior, basi apiceque truncatus, lateribus dilatato rotundatus, supra convexus, totus niger, tuberculatis parvis, ele-vatis, crebre granulatus, pilis minatis, depresso-sinereis parce adspersus. Scutellum minutum, depre-sum, nigrum. Elytra ovata, antice thoracis basi pa-rum latiora, ante medium dilatata, thorace quadru-plo longiora, supra convexi, nigra, obsolete sulcata, interstitiis creberrime tuberculato rugosis; pilis depresso-sinereis parce adspersa, & præterea maculis sparsis e squamu'lis argenteo-aenesis, interdum cupreis, ornata. Corpus subtus nigrum, obsoleta punctula-tum, pilis parvis sinereis adspersum. Pedes medio-cres, nigri, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, dente valido, acuto armatis.

Obs. E Germania, sub nomine: C. Silesiacus Me-gerlei, pluries missus.

40. C Lepidopterus: oblongus, niger, squamu'lis argenteo-virescentibus tectus, pedibus fusis, acute dentatis, thorace sub-globoso, granulato, elytris obsolete stria-tis, interstitiis rugosis.

Fabr. Eieut. 2. 541. 207. Herbst, col. 6. 362.

373.

337. tab. 88. f. 8. Payk. fn. 3. 276. 99.
Panz. fn. 26. f. 19.

Habitat in Dalekarlia & vicinitate Alpium.
Dom. de Paykull.

Descr. Praecedente vix brevior, sed angustior. Caput breve, nigrum, fronte plana, rugoso-punctata, pilis depressis cinereis, & squamulis argenteo-virescentibus tecta; oculi parvi, brunnei, parum prominenti; rostrum capite longius, nigrum, rugoso-punctatum, apice incrassatum, supra pilis & squamulis similibus uti caput, tectum, carinula tenui elevata, apice bifida, notatum. Antennæ dimidio corpore fere longiores, tenues, piceæ, cinereo-pubescentes. Thorax latitudine medii non longior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus niger, crebre granulato-tuberculatus, dorso pilis depressis cinereis parce adspersus, lateribus & subtus squamulis densis argenteo-virescentibus tectus. Scutellum minutum, depresso. Elytra oblongo-ovata, antice thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora; supra dorso antico minus convexa, tota nigra, obsolete striata, interstitiis crebre seriatim rugoso-tuberculatis, undique squamulis argenteo-subvirescentibus, nitidis, denfis tecta. Corpus subtus nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, pilis cinereis, depressis adspersum, pectoris lateribus argenteo-squamosis. Pedes saturate rufi, genibus fuscis, femoribus clavatis, omnibus dente pervo, acuto, armatis.

41. C. Zebra: oblongus, niger, pilis squamulisque cinereo-albidis variegatus, thorace granulato, sub-carinato, elytrorum sutura postice carinata, femoribus anticis crassis, dentatis.

Fabr.

Fabr. Eleut. 2. 538. 189. Herbst. col. 6. 361.
336. Tab. 88. f. 7. Payk. fn. 31278. 101.

Habitat in Svecia Australi, rarius.

Descr. Statura & similitudo praecedentis, plerumque paullo minor. thorace longiori, elytrorumque sutura postice carinatis, femoribus anticis crassioribus, valide dentatis, &c. distinctus. Caput nigrum, rugoso punctatum, fronte cinereo-pubescente, inter oculos foveola impressa; oculi majusculi, brunnei, parum prominuli: rostrum vix longitudine capitis, nigrum, rugoso punctatum, cinereo-pubescentes. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassissimæ, fusco-ferrugineæ, pubescentes. Thorax latitudine fere longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus; supra modice convexus, niger crebre rugoso-punctatus, pilis depresso-cinereis, & ad latera squamulis micantibus adspersus, lineola dorsali elevata, plerumque abbreviata, saepe obsoleta. Scutellum vix ullum. Elytra antice thoracis basi parum latiora, versus medium nonnihil dilatata, apice attenuata, thorace triplo longiora, supra modice concreta, nigra, rude punctato-striata, interstitiis crebre transversim rugosis; pilis depresso-cinereis adspersa, & praeterea maculis irregularibus, transversis, e squamulis albidis, saepe metallico-nitentibus, variegata; sutura communis ante apicem elevato-carinata, pilosa. Corpus subtus piceum, punctulatum, cinereo-pubescentes. pectoris lateribus argenteo-squamofisis. Pedes longiusculi, picei vel fusco-ferruginei, cinereo-pubescentes, femoribus anticis magnis, clavatis, dente valido, acuto armatis; posterioribus sub-muticis.

42. C. picipes: oblongo-ovatus, piceus, dense fusco cinereoque squamosus, thora-

ee granulato, elytris sulcatis, ocellato-punctatis, pedibus rufo-piceis, temoribus sub-dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 546. 201. Herbft. col. 6. 359.
334. Tab. 88. f. 5. Payk. in 3 293. 117.

Curculio singularis. Linn. sist 2. edd. 1066. 3.

Curculio notatus. Bonsd. cur. 2. 39. 33. f. 34.

Curculio Asper. Marsh. Ent. Br. 1. 301. 181.

Habitat in umbrosis, sub lapidibus & foliis
deciduis, etiam in plantis & fruticibus;
passim, minus frequens.

Descr. Statura omnino C. sulcati, sed duplo
minor & ultra. Caput porrectum, nigrum, fronte
sub rugosa, squamulis cinereis adpersa, inter oculos
foveola oblonga impressa; oculi brunnei, parum pro-
minuli; rostrum vix longitudine capitis, crassum,
piceum; sub rugosum, cinereo squamuolosum. Anten-
nae longitudine dimidii corporis, crassissimæ, fusco-
piceæ, cinereo-pubescentes. Thorax latitudine me-
dii fere longior, basi apiceque truncatus, lateribus
rotundato-dilatatus, supra valde coavexus, piceus
crebre tuberculatus, squamulis fusco cinereis, subius
& ad latera densis tectus, in dorso ratiobibus; in
medio dorsi canalicula longitudinalis obsoleta. Scu-
tellum nullum. Elytra ovata, aurice thoracis basi
parum latiora, sed pone basin dilatata, thorace tri-
plo longiora, supra dorso antico partim convexa, pi-
cea, squamulis densis fuscis cinereisque omnino te-
cta, & abque ordine variegata, pili que subrectis
hirta; in quovis elytro series decem punctorum o-
cellatorum, puncto singulo e squamula pallidius
grisea, orbiculata, circulo depresso cincta, constante,
& in quovis interstitio series alia e tuberculis parvis
elevatis.

elevatis, glabris, piceis; indumento omni detrito, elytro late & sat profunde sulcata, sulco singulo serie e punctis majusculis impressis, intersticiis elevatis transversim rugosis. Corpus subnas piceum, punctulatum, griseo pubescentis, pectoris lateribus cinereo-squamosis. Pedes longiusculi, dense cinereo pubescentes, jam picei, jam dilutius ferruginei, femoribus clavatis, articis dente obtuso armatis, posterioribus sub muticis.

43. *C. rugifrons*: niger, opacus, parce cinereo-pubescentis, elytris punctato-striatis, dorso sub-depressis, fronte rostroque longitudinaliter rugosis, femoribus dente parvo, acuto, armatis.

Var. *b*, rufo-piceus, pedibus dilutius ferrugineis.

Habitat sub lapidibus, in Gotlandia ad Siltö, Dom. *Wetterhall*; in Bahusiae, Hallandiae littoribus marinis, ipse.

Descr. Statura C. ovati; sed paullo major, opacus, fronte rugosa, antennis crassioribus, femoribus denticulo tantum parvo armatis, &c. abunde distinctus. Caput porrectum, nigrum, vertice laevi, fronte rostroque supra planis, lineis plurimis elevatis, tenuibus, irregularibus notatis, pilisque paucis cinereis depressis adspersis; oculi parvi, depresso-brunnei; rostrum vix capite longius, crassum, nigrum, apice dilatum. Antennae longitudine fere dimidii corporis, crassiusculæ, nigrae. Thorax vix latitudine longior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra convexus, totus niger. Opacus, crebre & rude rugoso-punctatus, lateribus fe-

re tuberculatus, pilis paucis cinereis depresso-
sus. Scutellum natum. Extrah antice thoracis ba-
si parum latiora, sed versus medium rotundato di-
latata, thorace fere quadruplo longiora, supra
dorso antico sub-dpresso; tota nigra, opaca,
punctis oblongo-quadratis striata, interstitiis ru-
gozo-tuberculatis, pilis cinereis, sub-erectis; se-
riatis, adspersis. Corpus subtus nigrum, crebre
punctulatum, parcus pubescens. Pedes longiusculi;
femoribus patum clavatis, nigris, nitidis, omnibus
subtus dente parvo, acuto-armatis; tibiis tarsisque
piceis, cinereo-pubescentibus;

Var. b, differt tantum colore dilutiori, brunneo
vel fusco-piceo, antennis pedibusque rufo-ferrugineis;

44. *C. ovatus*: niger, sub-nitidus, anten-
nis pedibusque rufo-ferrugineis; fronte
rostroque subtilissime coriaceis, thorace
sub-globoso, rugoso; femoribus valide
dentatis.

*Linn. Syst. 2. 615. 69. Fn. Sv. 626. Fabr. E-
leut. 2. 544. 224. Herbst. col. 6. 357. 331.
tab. 88. f. 2. Payk. fn. 3. 277. 100. Bonsd.
Curc. 2. 35. 25. f. 26. Marsh. Ent. Br. 15.
315. 223.*

Curculio Roja: *De Geer Ins. 5. 219. II.*

Var. b, ferruginetus, antennis pedibusque
pallide testaceis,

Curc. pubulinus, *Panz. fn. 57. f. 19. Crit.
Rev. 1. 133.*

Habitat sub Japidibus, foliis deciduis, etiam in plantis & fruticibus, sat frequens.

Descr. Minor. Caput porrectum, nigrum, vertice laevi, fronte rostroque supra depresso, subtiliter rugoso-punctatis, pilis parvis cinereis parce adspersis; oculi parvi, nigri, parum prominuli; rostrum capite fere brevius, crassum, nigrum. Antennæ dimidio corpore fere longiores, minus crassæ, rufo-ferrugineæ. Thorax latitudine medii vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra valde convexus, sub-globosus, totus niger, sub-nitidus. tuberculis elevatis confertissime obsitus, in medio dorsi plerumque in rugas longitudinales confluentibus, pilis paucis, minutis, cinereis adspersus. Scutellum nullum. Elytra ovata, antice thoracis basi parum latiora, sed mox dilatata, thorace triplo longiora, supra convexa, dorso tamen antico sub-depressa, nigra vel nigro-picea, sub-nitida, rude punctato-striata, interstitiis rugoso-granulatis, pilis parvis cinereis parce adspersis. Corpus subtus nigro-piceum, punctulatum, parum pubescens. Pedes elongati validi, rufo-ferruginei, femoribus crassis, clavatis, praesertim anticis, omnibus dente valido, elongato, acuto armatis.

Var. b, colore dilutiori tantum differt, jam obscurius, jam pallidius ferrugineus, antennis pedibusque adhuc pallidioribus; forte nuper exclusus.

45. *C. muricatus*: Oblongo-ovatus, fusco-piceus, dense cinereo-squamulosus, antennis pedibusque fusco-ferrugineis, thorace brevi, angusto, elytris punctato-striatis, setis erectis hispidis.

Fabr.

Fabr. Eleut. 2. 544. 223. *Herbst. col.* 6. 351.
323. *tab. 87. f. 9.* *Payk. fn.* 3. 279 102.

Curculio asperatus. *Fabr. Eleut.* 2. 541. 205.
Bonid. curc. 2. 34. 24. *f. 25.*

Habitat in Sylvaticis, sub foliis deciduis,
etiam in plantis & fruticibus, locis um-
brosis, passim.

Descr. C. Coryli paullo major, præsertim lon-
gior. Caput porrectum, nigro-piceum. subtiliter ru-
goso-punctatum, squamulis cinereis nitidis omnino
tectum; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum
longitudine capitis, & vix illo angustius, nigrum, ru-
goso-punctulatum, supra planum, fere impeslum,
ultra medium squamulis cinereis tectum, apice nu-
dum, nigrum. Antennæ longitudine dimidii corpo-
ris, tenues, rufo-ferrugineæ, clava obliquiori, acumi-
nata. Thorax parvus, sub cylindricus, latitudine bre-
vier, basi apiceque truncatus, lateribus perparum di-
latatus, supra convexus, piceus, crebre subtiliter ru-
goso-punctatus. squamulis densis cinereis nitidulis,
versus latera & in linea media dorsali albidiорibus,
tectus. Scutellum parvum, triangulare, piceum, ci-
nereo-squamosum. Elytra oblongo-ovata, antice
thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin di-
latata, thorace quintuplo longiora, supra convexa,
dilutius rufo-picea, regulariter punctato striata, inter-
stitiis sub levibus; tota squamulis densis fuscis tecta,
aliisque immixtis cinereis plus minusve variegata,
& præterea in singulo interstitio serie e pilis crebris
erectis, rigidis, fusco-cinereis maricata. Corpus sub-
tus piceum, punctulatum, pectoris lateribus dense,
ventre parcus cinereo-squamosis. Pedes elongati, aut
rufo-ferruginei toti, aut femoribus fusco-piceis; fe-
mora longa, clavata, subtus dente parvo armata.

Sectio 2:da, Alati.

46. C. Pyri: oblongus, niger; squamulis angustis viridi-sericeis tectus, antennis pedibusque rufo-ferruginitis, femoribus crassis, dente valido armatis.

Linn. Syst. 2. 615. 72. Fabr. Eleut. 2. 541. 210.

Herbst. col. 6. 259. 226. tab. 79. f. 2. a, b.

Payk. fn. 3. 280. 103. Panz. fn. 107. f. 4.

Cure. æruginosus. Bonsd. cure. 2. 23. 7. f. 8.

Cure. Cæsius. Marsh. Ent. Br. i. 318. 232.

Var. b, Corpore squamulis cœuleo-virentibus tecto, femoribus basi apiceque, tibialisque nigro-luscis.

Var. c, Squamulis ut in b, pedibus totis nigris. Payk. loc. cit. var. b.

Cure. alneti. Fabr. Eleut. 2. 542. 211. Herbst. col. 6. 260. 227 tab. 79 f. 3.

Cure. Cnides. Marsh. Ent. br. i. 318. 232.

Habitat in umbrosis humentibus, præferit in foliis Alni, spireæ Ulmariae, &c., plurim; var. c. apud nos rarius occurrit.

Deter. Statura & affinitas C. argentati, sed duplo imo triplo major, squamulae angustæ, piliformes, & pubescentia erecta vix ulla. Caput porrectum, nigrum, subtiliter rugoso-punctatum, squamulis angustis, piliformibus, depresso, viridi sericeis tectum, fronte obsolete carinata; oculi brunnei, sat prominenti; rostrum longitudine capitum, crassum, nigrum, similiter uti caput punctulatum & squamulosum, io-

ter antennas foveo'la oblonga impressum. Antennæ longitudine dimicri corporis, tenues, jam totæ dilute ferrugineæ, jam basi apiceque obscurius fulcæ. Thorax parvus, antice paullo angustior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra in medio transversim convexus, antice posticeque depresso-punctatus seu coriaceus, squamulis similibus uti caput omnino tectus. Scutellum triangulare nigrum, viridi squamosum. Elytra elongata, thorace ad minimum sextuplo longiora, & illo dimidio latiora, humeris prominulis, supra convexa, nigra, regulariter punctato striata, intersticiis subtilissime coriaceis; tota squamulis minutis, brevioribus, viridi sericeis, omnino tecta, pilis vero erectis nullis, nisi in ipsa futura, versus apicem. Alæ longæ, hyalinae, costa antica flavescente. Corpus subitus nigrum, subtilissime coriaceum, ano rufo-piceo, pectore abdominisque basi dense viridi squamosis. Pedes crassiusculi, temoribus validis, saepe apice viridisquamosis, subtus dente magno, acuto armatis; jam toti rufo-ferruginei, jam tibiis, praesertim anticis, nigro fuscis.

Var. b. obscurior, squamulis cœruleo-virescentibus, parum nitidis, testa; femora plerumque basi & apice ut & tibiæ & tarsi nigro-picei.

Var. c, ut var. b, sed femora tota nigra; cætera omnino convenient, adeoque vix specie distincta.

Obs. Ex comparatione cum C. argentato, in Sust. Nat. 2. 615. 73. videtur Cl. a Linneum speciem jam descriptam ut C. Pyri inspexisse; in Fauna Svecica vero, N:o 623, certe C. micantem Fabricii descripsit.

47. *C. argentatus*: oblongus, niger, squamulis rotundatis viridi-argenteis tectus, pilis-

pilisque erectis adspersus, antennis crassiusculis, tibiis tarsisque flavescentibus, femoribus valide dentatis.

Linn. Syst. 2. 615. 73. Fn. Sv. 624. Fahr.
Eleut. 2. 543. 220. Herbst. col. 6. 260. 228.
tab 79. f. 4. Payk. fn. 3. 283. 106. Bonsd.
curc. 2. 27. 12. f. 12.

Curc. Urticæ. De Géer Inf. 5. 219. 12.

Var. *b*, femoribus etiam flavo-testaceis.

Curc. a; gentatus. Marsh. Ent. br. 1. 318. 233.

Var. *c*; corpore squamis pallide cinereo-argenteis tecto.

Var. *d*, corpore squamulis cœruleo-virescentibus tecto, antennis, tibiis tarsiisque rufo-ferrugineis. Payk. loc. cit. not.

Var. *e*, ut var. *d*, sed tibiæ etiam nigropiceæ.

Habitat in-arboribus, fructicibus & plantis,
ubique frequens.

Descr. Statura oblonga præcedentis, sed, ut dictum, duplo minor & ultra, squamulis brevibus, rotundatis, & pilositate erecta præterea distinctus. Caput oblongum, porrectum, nigrum, crebre, subtilissime coriaceum, squamulis parvis, rotundatis, viridi argenteis sive sericeis, nitidis, tectum, & præterea pilis tenuibus, erectis, pallidis adspersum; oculi nigro-brunnei, sat prominuli; rostrum capite brevius & paullo angustius, nigrum, subtiliter coriaceum, supra obsolete canaliculatum, squamulis & pilis similibus uti caput tectum. Antenæ dimidio corpore

pore fere longiores, crassiusculæ, pallide testaceæ seu flavescentes, articulo primo longo, clavato, arcuato. Thorax parvus, brevis, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil dilatatus, supra in medio transversim convexus, intra basin & apicem impressus, margine antico posticōque sub elevato; totus niger, subtilissime coriaceus, indumento simili uti caput omnino tectus. Scutellum rotundatum, nigrum, similiter squamułosum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, supra convexa, nigra, regulariter, sed parum profunde punctato-striata, intersticiis planis, lœvibus; tota squamułis & pube uti caput & thorax tecta. Alæ longæ fuscescentes. Corpus subtus nigrum, subtilissime coriaceum, squamułis & pube uti supra, versus latera tectum, ventris medio, & postico magis nudis. Pedes validi, femoribus crassis, clavatis, nigris, viridi-squamosis, dente valido, acuto, armatis, tibialis tarsisque pallidis vel flavescentibus.

Var. b, differt tantum femoribus etiam flavo-testaceis,

Var. c, colore squamularum pallidiori, cinereo-argenteo, differt; cætera ut in a.

Var. d, squamułis coeruleo-virescentibus tecta, antennæ, tibiæ & tarsi saturatiū ferruginei.

Var. e, etiam squamułis coeruleo-scentibus, minus nitidis, tecta; antennæ & tibiæ obscurius piceæ, tarsi solis dilutioribus.

Obs. In omni varietate occurunt specimina triplo aut quadruplo minora.

48. R. fericeus: oblongus, niger, squamułis rotundatis viridibus opacis tectus, antennis tenuibus, pedibusque pallide testaceis, femoribus sub-dentatis.

Schall.

Schall. Act. Hall. 1. 286.

Habitat in Arbustis Hallandiæ, Scaniæ, ratiōnē.

Descr. Majoribus præcedentis speciei individuis æqualis & similis, abunde tamen differt, antennis tenuioribus, femoribus minus crassis, obsoleto tantum dentatis, defectu pubescentiæ erectæ corporis, &c. C. flavipedi, antea sub N:o 8 descripto, adhuc magis similis, sed rostro longiori, pubescentiæ defectu, femoribus sub-dentatis, etiam ab illo bene distinctus. Caput oblongum, porrectum, nigrum, subtiliter coriaceum, squamulis parvis, rotundatis, saturate viridibus, minus nitidis tectum, fronte inter oculos fo-veola impressa; oculi brunnei, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitis, & illo angustius, rotundatum, colore, punctura & indumento simili uti caput. Antennæ longitudine dimidii corporis, pallide testaceæ, clava angusta, acuminata, nigricante; articulus primus sub rectus, clavatus, vix tertiam partem totius excedit. Thorax latitudine vix brevior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, sub-æqualis, versus basin & apicem obsoletissime impressus, totus niger, subtiliter coriaceus, squamulis similibus uti caput tectus. Scutellum rotundatum, nigrum, læve, viridi-squamosum. Elytra magna, thoracis basi plus quam dimidio latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, supra convexa, præsertim posterius, ubi sutura elevata, sub carinata; nigra, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub lævibus, squamulis rotundatis, saturate viridibus, sub-opacis, tectis, striis vero nudis, punctis conspicuis, nigris. Corpus subtus nigropiceum, dense viridi-squamosum, ano magis nudo, dilutius testaceo. Pedes mediocres, toti pallide testacei, femoribus parum crassis, extus viridi-squamosis, subtus dente parvo, obsoleto, armatis; tibiaz ticeo

ticæ reliquis longiores, arcuatæ; postice rectæ, intus longius pilosæ,

49. *R. micans*; niger, squamulis angustis, aureo-igneis adspersus, antennis brevioribus, tenuibus pedibusque rufis, femoribus posticis sub-dentatis, elytris magnis, posterius gibbosis.

Fabr. Eleut. 2. 519. 75. *Herbst. col.* 6. 249. 214. *tab. 78. f. 3.* *Payk. fn.* 3. 302. 125. *Panz. fn. 19. f. 9.*

Curc. Pyri. Linn. Fn. Sv. 623. *De Geer Ins.* 5. 246. 34. *Bonsd. curc.* 2. 24. 8. f. 9.

Var. *b*, squamulis obscurioribus, cinereo-argenteis, interdum griseis, adspersus, *Payk. Bonsd. loc. cit.*

Habitat in foliis *Pyri*, *Pruni*, *Padi*, aliisque, saepe copiosissimus, folia commaculans, dilacerans.

Descr. C. *Pyri* brevior, sed in elytris latior, posterius magis gibbosus. Caput oblongum, porrectum, nigrum, crebre punctulatum, squamulis angustis, piliformibus, depresso, aureo-igneis adspersum, oculis brunneis, modice prominulis; rostrum capite paullo brevius & angustius, colore, punctura & indumento capitatis. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, tenues, pallide testaceæ, clava acuminate fusca. Thorax parvus, angustus, brevis, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, æqualis, niger, creberrime & profunde punctatus, squamulis similibus uti caput, parce

parce adspersus. Scutellum rotundatum, nigrum, aureo-squamulosum. Elytra magna, antice thoracis basi fere duplo latiora, humeris prominulis, posteriorius adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longiora, apice acuminata, supra valde convexa, praesertim posterius sub gibbosa, aut nigra, aut dilutius rufopicea, regulariter crenato striata, intersticiis laevibus, squamulis paullo latioribus & brevioribus quam in thorace, etiam densioribus, aureo-igneis, certo situ cinereo-argenteis, micantibus fere tecta. Corpus subtilissime punctulatum, pectoris lateribus dense, ventre parcius metallico-squamulosis. Pedes mediocres, toti rufo-testacei, femoribus subclavatis, posticis dente parvo armatis.

Var. b, differt tantum squamularum colore, aut cinereo virescente, aut cinereo-argenteo, rarius tantum cinereo, parum metallico-nitente; indumento omni detrito, corpus nigrum, glabrum, ut in var. b, Bonsdorffii; latera tamen pectoris, etjam in his, metallico-squamofusa.

50. C. Rubi: ovatus, niger, squamulis glauco-argenteis undique tectus, antennis pedibusque testaceis, femorum clava nigricante, posticorum dentata, thorace convexo, rotundato.

Habitat in Rubo Cælio Scaniæ, rarius
Dom Wetterhall.

Descr. Statura convexa fere C micantis, sed parvus, C. viridicollis minor. Caput breve, latum, convexum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, squamulis albido-argenteis tectum; oculi parvi, brunnei, parum prominuli; frons inter oculos impressa; rostrum breve, crassum, paulo angustius, nigrum, rugoso-

punctatum, similiter ac caput squamosum. Antennæ
six longitudine capitis cum thorace, rufo-testaceæ,
extrorsum fuscescentes. Thorax latitudine medii paulo
brevior, basi apiceque truncatus, lateribus rotunda-
tus, supra convexus, pulvinatus, fere sub globosus,
niger, crebre & sat profunde punctato-rugosus, squa-
mis glauco-argenteis, nitidis, undique tectus. Ely-
tra ante thoracis medio paulo latiora, humeris ro-
tundatis, thorace plus triplo longiora, ultra medium
dilatata, spice acuminata, supra valde convexa, pæ-
sertim posterius, ubi sutura carinato-elevata, tota
nigra, regulariter & sat profunde punctato-striata,
intersticiis planis, sub lœvibus, squamis densis glau-
co-argenteis omnino tecta. Corpus subtus nigro-pi-
ceum, subtiliter punctulatum, squamulis minoribus
glauco-albidis testum, ano acuminato, obscure te-
staceo, magis nudo. Pedes elongati, obscure testa-
cei, albido-pubescentes & squamosi, femoribus cla-
vatis fuscis vel nigricantibus, basi testaceis, posticis
dente valido, obtuso, armatis.

51. C. mali: oblongus, niger, squamulis an-
gustis, cupreo-aureis adspersus, antennis
crassis, pedibusque testaceis, scutello albo-
squamofo.

Fabr. Eleut. 2. 542. 213. *Herbst.* col. 6. 261.
230. tab. 79. f. 5. a, b. *Payk.* fn. 3. 281.
184. *Marth. Ent.* tr. 1. 317. 230.

Var. b, squamulis griseis, vix metallico-ni-
tidis adspersus, femoribus apice piceis.

Curc. Padi. *Bonsd. curc.* 2. 26. II. f. II.

Curc. rusipes. var. *major*, *Bonsd. curc.* 2. 25.
19. f. 10. forte idem, detritus.

Var.

Var. c, duplo minor, parce griseo-squamulosus, pedibus palli is.

Curculio fulvipes. Fabr. Eleut. 2. 525. 104 1e.
cundum Lili Mag 4. 156. 104.

Habitat in arboribus & plantis frequens.

Descr. C. micante parum brevior, sed multo angustior, minusque convexus, praesertim in Elytris. Caput latum, porrectum, nigrum, opacum, subtilissime, creberrime rugoso-punctatum, fronte, depressa, squamulis angustis, piliformibus, depressis griseis, certo situ aureo & cupreо miçantibus, adspersum; oculi nigro-brunnei, parum prominuli; rostrum vix longitudine capitis, & illo parum angustius, supra late, sed non profunde canaliculatum, colore, punctura & indumento capitis. Antennae longitudine dimidi corporis, crassissimae, rufo-testaceae, articulo primo valde longo & valido; clava apicis plerunque fusca. Thorax latitudine brevior, anterius angustior, basi apiceque truncatus, lateribus rotundatus, supra in medio transversim convexus. antice posticeque depresso-totus niger subtilissime creberrime rugoso-punctatus, indumento simili uti caput aut persus. Scutellum rotundatum, nigrum, squamulis densis albidis tectum. Elytra thoracis basi vix dimidio latiora, humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, nigra, subnitida, tenui punctato-striata, intersticiis sublævibus, squamulis paullo latioribus & densioribus, aut aureo-igneis seu cupreis, aut virescenti-argenteis, fere tecta. Corpus subtus, nigro-piceum, subtilissime punctulatum, pectore squamulis densis metallico-nitidis tecto, ventre magis nudo, cinereo-pubescente. Pedes longiusculi, rufo-testacei, femoribus clavatis, omnibus dente mediocri acuto armatis; femora saepe versus apicem nigro-picea, ut in variate sequente.

Var.

Var. b, differt tantum squamulis obscurioribus, griseis, vix vel parum metallico-nitidis.

Var. c, duplo minor; cæterum ut var. b, quoad colorem squamularum; pedes plerumque pallidius testacei.

52. *C. Cervinus*: oblongus, niger, squamu-
lis rotundatis cinereis nitidulis usq[ue] adspersus, antennis tenuibus, basi rufe-
scens, elytris maculis denudatis fusq[ue].

*Linn. Syst. 2. 615 70. Fn. Sv. 627. Payk fn.
3. 282. 105. Bonsd. curc. 2. 27. 15. Marth.
Ent. br. 1. 317. 228.*

*Curculio Iris. Fabr. Eleut. 2. 541. 206. ♂ for-
te curc. vespertinus, ibid. 542. 212. ? an idem?*

*Curculio messor. Herbst. col. 6. 222. 185. Tab.
75. f. II.*

Curculio griseo-aeneus. De Geer Ins. 5. 220. 13.

Var. b, plerumque dimidio major, squamu-
lis flavescenti-aureis tectus. *Bonsd. loc.
cit. var. b, fig. 15.*

*Curc. maculofus. Herbst. col. 6. 232. 196. Tab.
76. f. 10.*

Var. c, minor, squamulis argenteo-vire-
scens, adspersus. *Payk. loc. cit. Not.*

Habitat in arboribus & fruticibus sat fre-
quens; Var. b, & c, præsertim in fron-
dibus Pini & Abietis.

Descr. Magnitudo valde variat; majores præcedenti æquales, alii triplo minores & ultra. Caput latum, porrectum, nigrum, creberrime subtiliter rugoso punctulatum, squamulis parvis albido-argenteis tectum, oculis preminulis, brunneis; rostrum capite multo brevius & angustius, supra sub-depressum, colore, punctura & indumento ut in capite. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, tenues, basi pallidæ testaceæ, extrosum nigro-fuscæ. Thorax parvus, brevis, antice paullo angustior, basi apiceque truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra parum convexus, intra basin & apicem transversim impressus, totus niger, subtilissime, creberrime rugoso-punctatus, subtus. lateribus & in linea angusta dorsali squamulis densis cinereo-argenteis tectus, disco reliquo magis nudo. Scutellum oblongo-rotundatum, densius albido-squamulosum. Elytra thoracis b. si dimidio latiora, humeris prominulis, versus posteriora, præsertim in femina, adhuc magis dilatata, tho ace sextuplo longiora, apice acuminata, supra convexa, nigra, regulariter, sed parum profunde punctato-striata, interstitiis lœvibus. squamulis parvis cinereo sub-argenteis tecta, relictis in interstutiis dorsalibus maculis inæqualibus denudatis, nigro fuscis, seriatis. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis densis cinereo-argenteis tectum. Pedes longinseculi, tenues, nigri, cinereo pubescentes, tarsis ferrugineis, tibialis arcuatis, femoribus omnibus dente parvo, acuto, armatis.

Var. b, saepe dimidio major, sed præterea tantum colore squamularum, aut cupreo, aut pallidius flavescenti-aureo distincta, nullo modo specie diversa.

Var. c, differt squamularum colore virescenti & quod plerumque minor, in umbrosis solum obvia.

Obs. Squamulæ, præsertim paginæ superioris, facile detinuntur, unde totus niger evadit; C. Iris, Fabr. loc. cit. certe ad hanc Speciem pertinet; C.

Vesper-

Vespertinus vero potius ad varietatem minorem præcedentis referendus.

53. *C. oblongus*: elongatus, angustus, niger, longius cinereo-pubescent, antennis pedibusque rufis, elytris pallide ferrugineis, margine nigro.

Linn. Syst. 2. 615. 71. Fn. Sv. 625. Fabr. Eleut. 2. 544. 222. Payk. fn. 3. 284. 107. Bousd. curc. 2. 25. 9. Panz. fn. 19. f. 15. Marsh. Ent. br. 1. 316. 226.

Curc. floricola. Herbst. col. 6 220. 184. tab. 75. f. 10.

Var. *b*, Elytris brunneis, nigro-marginatis:
Payk. l. c. var. b.

Var. *c*, totus pallidus, elytrorum marginē solo fusco.

Curc. rufescens. Marsh. Ent. br. 1. 316. 227. teste Dom. Kirby.

Habitat in arboretis, apud nos rarissime:
a *Linné*.

Descr. Minoribus præcedentis individuis angustior, sed paullo longior, fere linearis. Caput oblongum, porrectum, nigrum, crebre punctulatum; pilis longioribus cinereis, depresso-adspersum; oculi globosi, brunnei, valde prominuli; rostrum capite multo brevius & angustius; basi nigrum, punctulatum; pubescens, apice rufo-piceum, impressum. Antennæ longitudine dimidii corporis, minus tenues, pallide testaceæ, clavæ elongata, angusta, sattirationi.

Tho-

Thorax parvus, antice paullo angustior, basi apice-que truncatus, lateribus nonnihil rotundatus, supra in medio convexus, intra basin & apicem transversim impressus, niger, sat crebre punctatus, pube longiori tenui cinerea adspersus. Scutellum parvum, nigrum, pubescens. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, supra modice convexa, aut saturatius ferruginea, aut dilutius testacea, sat profunde punctato-striata; intersticiis sub-levibus, pube longiori cinerea adsparsa; margo lateralis inflexus a basi ultra medium nigro-piceus. Corpus subtus nigrum, subnitidum, obsolete punctulatum, cinereo-pubescens. Pedes longiusculi, validi, aut rufo-ferruginei, aut pallidius testacei, femoribus clavatis, dentatis, tibiis arcuatis.

Var. b, differt tantum elytrorum colore saturatius brunneo, margine laterali nigriori.

Var. c, tota pallida, margine elytrorum fulvo, forte nuper exclusa.

H Y L E S I N U S.

Palpi brevissimi, articulo ultimo conico. Mandibulae valide, cornue, arcuatae, acutae. Antennae brevissimae, vix capite longiores, clava ovato acuminata, articulata. Caput exsertum, in rostrum breve, latum productum, postice latitudinem apieis thoracis attingens. Thorax antice angustior. Tibiae compressae, denticulatae.

i. H. Ligniperda nigro piceus, longius pubescens, antennis testaceis, clava obtusa, elytris punctato-striatis, intersticiis tuber-

tuberculato-rugosis, thorace subtiliter punctato.

Fabr. Eleut. 2. 391. s?

Bostricus ligniperda. Payk. fn. 3. 149. 7.

Bostrichus micans. Kugell. Schneid. Mag. 5. 523. 12.

Var. b, testaceus, capite pedumque geniculis nigris.

Bostricus ligniperda. Herbst. col. 5. 107. s. tab. 48. f. 5.

Habitat in Pini abietis truncis emortuis, sub cortice, in Westrogothia, Hallandia, Scania, rarius.

Descr. Statura omnino H. Piniperdæ, sed plurimque quadruplo major, Bostr. Typographum fere excedens. Corpus totum undique pube longiori, erecta, pallide cinerea, crebre adspersum. Caput magnum, crassum, nigro-piceum, vertice convexo, sub-lævi, fronte rostroque fere planis, confertissime rugoso-punctatis; lineola tenuis impressa, e vertice in frontem ducta; oculi laterales brunni, elongati, valde angusti & depresso; rostrum vertice paulo angustius, brevissimum, in medio foveola profundiori impressum, ore rufo-piceo, colore, punctura & pubescentia capitis. Antennæ brevissimæ, vix capitis longitudine, rufo-testaceæ, pilosæ, articulo primo maximo, obconico, secundo brevi, crassiusculo, tertio minori, ob-conico, 4-8 brevissimis, coarctatis, exterioribus sensim crassioribus, clava mediocri, ovata, sub-compressa, tri-articulata. Thorax latitudine baseos vix longior, anterius multo angustior, vertici æqualis, ibique in medio sub-

sub-emarginatus, basi sub sinuatus, angulis reflexis, rotundatis. supra convexus, ante apicem transversim impressus, totus nigro piceus, sat crebre punctatus; in medio dorsi carinula obsoleta, parum elevata. Scutellum minutum piceum, valde depresso. Elytra thoracis basi non latiora, sed illo triplo longiora, antice singulatim rotundata, margine baseos elevato, granulato, supra valde convexa, sub-cylindrica, nigro-picea, apicem versus saepe dilutius ferruginea, punctato striata, interstitiis crebre granulato-rugosis. Corpus subtus dilutius piceum, sub-nitidum, creberrime, subtilissime punctulatum, pubescens. Pedes breviusculi, picei, pubescentes, tibiis compressis, apicem versus dilatatis, omnibus externe ferrato-dentatis, tarsis dilutius ferrugineis.

Var. b, modo junior, colore pallidiori diversa; Caput fusco piceum; thorax & elytra testacea; Corpus & pedes pallida, genibus denticulisque tibiarum piceis.

2. H. Piniperda: nigro-piceus, brevius pubescens, antennis tarsisque rufo-testaceis, elytris tenue punctato-striatis, interstitiis punctulato-subrugosis, thorace subtiliter punctato.

Fabr. Eleut. 2. 392. 9.

Bostriechus piniperda. Herbst. col. 5. 106. 4. tab. 48. f. 4. d. Payk. fn. 3. 152. II.

Ips Piniperda. De Géer Ins. 5. 194. 2. tab. 6. f. 8-10. Marsh. Ent. br. I. 57. 18.

Var. b, Elytris rufo-piceis. Payk. loc. cit. var. b.

Dermes-

Ins. Svec. T. I. P. III. V

Dermestes Piniperda. Linn. *Syst.* 2. 563. II.
En. Sv. 421.

Bostrichus Piniperda. Panz. *fn.* 15. f. 9.

Var. c Nigro piceus, thorace antice, elytris pedibusque totis rufis.

Var. d. Supra ruso-testaceus, subtus, cum pedibus, pallidus, oculis sois nigro-brunneis. *Payk. loc. cit.* var. c.

Hylesinus testaceus. Fabr. *Eleut.* 2. 393. 14.

Bostrichus testaceus. Herbst *col.* 5. 110. 8. tabo

.. 48. f. 8-9. Panz. *fn.* 66. f. 14. *Crit.*

Rv. 1. 121. *Creutz. Ent. Verf.* 1. 136.

Ips sumatus. De Géer *Inf.* 5. 195. 3.

Ips rufus. Marsh. *Ent. br.* 1. 57. 19.

Habitat in Pini Sylvestris ramulis, quos perforat & exsiccat; etiam in ligno & sub cortice, frequens.

Descr. Minor. Caput crassum, nigro-piceum, subnitidum, subtiliter punctulatum, tenui pubescens; oculi oblongi, brunnei, depresso; rostrum vix longitudine capitis, illoque parum angustius, nigro piceum, punctulatum, cum carina elevata, abbreviata. Antennæ brevissimæ, ruso-testaceæ, clava sub-acuminata, triarticulata. Thorax latitudine basi sere brevior, antérius multo angustior, capiti æqualis, & intra apicem transversim impressus, basi sub-sinuatus, angulis rotundatis; supra parum convexus, nigro-piceus, nitidus, subtiliter punctatus, pubescenti, pallida, sub erecta asperitus. Scutulum minutum piceum, valde compressum. Elytra thoraci basi non latiora, sed illo plus triplo longiora, sub cylindrica, valde

valde convexa, nigro-picea, nitida, subtiliter punctato-striata, interstitiis punctato subrugosa, pube brevi, sub-erecta, pallida, parce adspersa; basis singuli elytri rotundata, elevata, crenato-muricata, ut in priori. Corpus subitus nigro-piceum, punctulatum, parum pubescens. Pedes breviusculi, nigro picci, tarsis paleide testaceis, tibiis apice dilatatis, externe serrato-dentatis.

Var. b, differt tantum elytris aut rufo-piceis, aut dilatius rufis.

Var. c. ut var. b, sed pedes toti pallide testacei. & thorax antice late rufo-testaceus, qui color in medio magis extenditur.

Var. d, tota pallidior, oculis solis nigro-brunneis; Caput & thorax aut rufo testacea, aut fusco-testacea: elytra pallidiora; corpus & pedes flavescentia, forte nuper exclusa, nulla essentiali nota distinguenda.

3. *H. crenatus*: brevis, niger, thorace inaequali, granulato-punctato, elytris profunde crenato-striatis pedibusque piceis, antennis ferrugineis.

Fahr. Eieut. 2. 390. 2.

Bostrichus crenatus. Payk. fn. 3. 150. 8.

Ips Sulcatus. Marsh. Ent. br. 1. 59. 26.

Var. b, Elytris rufo-ferrugineis, pedibus totis rufo-testaceis.

Bostrichus crenatus. Panz. fn. 15. f. 7.

Habitat sub cortice Fraxini excelsioris; rarius.

Descr. H. Piniperda brevior, sed dimidio latior ovatus. Caput breve, crassum, nigrum, crebre subtiliter punctulatum, vix pubescens, oculis oblongis brunneis; rostrum capite brevius, latum, convexum, nigrum, punctatum, mandibulis magnis, latis, compressis. Antennae capite paullo longiores, ferrugineae, clava acuminata, articulata. Thorax latitudine baseos vix longior, anterius angustior, vertici aequalis, basi sinuatus, angulis rotundatis, supra convexus, niger, rugoso-punctatus, versus latera granulatus, pilis minutis parce adspersus, in dorso postico foveolis nonnullis obsoletis impressus. Scutellum parvum triangulare, nigrum. Elytra thoracis basi vix latiora, sintice singulatim rotundata, margine elevato, granulato; thorace duplo longiora, apice rotundata, supra convexa, nigro picea, profunde & rade crenato striata, interstitiis valde rugosis. Alæ longæ, fuscae. Corpus subtus nigrum, obsolete punctulatum, tenue pubescens. Pedes breviusculi, nigro-picei, tarsis, & interdum tibiis dilutius fusco-ferrugineis; tibiæ apice dilatatae, externæ crenatae.

Var. b, tantum colore differt; caput, thorax & corpus subtus nigra; elytra rufo picea vel ferruginea; antennæ & pedes toti rufescentes.

Obs. *Bostrychus crenatus* Herbst. Col. 5. 112. 10. tab. 48. f. 10. i, neque secundum figuram, nec descriptionem, hue pertinere possit;

4. *H. palliatus*: brevior, nigro-piceus, subpubescens, thorace supra, elytris, tibiis, tarsis, antennarumque basi rufo-ferrugineis, thorace brevi, lateribus dilatato, supra carinato.

Bostrychus ater. Payk. fn. 3. 154. 12. var. b.

Bostr.

Bosstr. angustatus. var. *brunnea.* *Herbst.* col.
5. ill. 9.

Var. *b.* *rufo-testaceus,* capite solo nigro,
antennarum clava fusca.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
præsertim Pini & Abietis, sat frequens.

Descr. *H. Piniperda* duplo minor & ultra, præ-
fertim brevior, sequentibus duobus valde affinis,
structura tamen thoracis, &c. bene distinctus. Ca-
put breve, convexum, nigrum, opacum, creberrime
& subtilissime obsolete punctulatum, oculis oblongis,
nigris, depresso; rostrum capite paulo angu-
stius multoque brevius, & ab illo fovea arcuata
impressa, distinctum; nigrum, opacum, similiter uti
caput punctulatum, versus os densius, subtiliter pu-
bescens, carinula elevata instratum, quæ tamen in
frontem nunquam continuatur. Antennæ vix capite
longiores, rufo-ferrugineæ, clava majuscula, ovata,
articulata, fusca. Thorax latitudine bælos sere bre-
vior, antice multo angustior, coarctatus, vertici æ-
qualis, & intra apicem transversim impressus, lateri-
bus rotundato-dilatatus, basi sub-sinuatus, supra pa-
rum convexus, rufo-ferrugineus, creberrime rugoso-
punctatus, in medio evidenter carinatus; subtus ni-
ger, sub-nitidus, punctatus. Scutellum parvum,
rotundatum, piceum. Elytra thoracis basi non latio-
ra, sed illo triplo longiora, supra valde convexa,
sub cylindrica, rufo-ferruginea, sat profunde & rude
crenato-striata, interstitiis convexis, creberrime rugo-
sis, pilis parvis, depresso, cinereis adspersis; sutura
multo subtilius rugulosa, magis fusca; basis singuli
elytri rotundatus, margine elevate, crenulato, ut in
prioribus. Corpus subtus nigrum, sub nitidum, evi-
denter punctatum, incisuris ventralibus profunde im-
pressis. Pedes breviuscui, cinereo pubescentes, se-

moribus plerumque nigro-piceis, tibiis tarsisque rufo-ferruginaeis; tibiæ dilatatae, extus crenatae.

Var. b, colore pallidiore tantum differt; caput & antennæ ut in a; thorax, elytra, venter & pedes toti dilutius rufo-testacei; pectus paulo suraturius rufo-piceum.

5. *H. angustatus*: brevior, niger, sub-pubescentia, antennarum basi tarsisque testaceis, elytris pedibusque piceis, rostro non carinato, thorace sub-cylindrico, evidenter carinato.

Bostricus angustatus, var. *nigra*. Herbst col. 5. m. 9. Tab. 48. f. 9. h.

Ips ater. Marsh. Ent. br. 1. 59. 25.

Var. b, corpore toto rufo-testaceo, occulis solis brunneis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, præfertim Abietis, minus frequens.

Descr. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed plerumque adhuc minor, angustior; rostrum non carinatum, thorax sub-cylindricus, & color aliis. Caput, oculi, rostrum, antennæ, quoad minimum punctum, ut in præcedenti omnino, modo carinula rostri deest. Thorax latitudine longior, anterius nonnihil angustior, obsoletissime impressus, lateribus perparum rotundatus, basi truncatus, supra convexus, niger, sub-opacus. Cerebro pubescens, carinula longitudinali magis perspicua, nitida. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis basi vix latiora, & illo triplo longiora, supra convexa cylindrica, nigra, opaca, late & profunde crenato-

striata, intersticiis angustis, crebre, subtiliter granulata, rugosis, plicis parvis, compressis, cinereis paucis, sparsis. Corpus subitus nigrum, subopacum, crebrum punctatum, tenui pubescens. Pedes brevissimi picei, cinereo pubescentes, tibiis compressis, extremitate cruentatis is, pice, tibialis ferrugineis.

Var. b., differt in um colore totius corporis laxe rufo testaceo; oculis sois brunneis; cæterum omni puncto converiens.

Obs. Ob magnitudinem minorem, & thoracem in medio non i. dilatatum. B. angustatum Herbsti hinc magis quam s'quenti convenientem judicavi; plurique auctores alias species tres præsentes ut variantes inspexerint.

6. *H. ater*: elongatus, cylindricus, niger, nitidus, fere glaber, antennis ferrugineis, rostro fronteque caudinatis, thorace elongato, subcylindrico, vix carinato.

Fabr. Eleut. z. 394. 19. Iilig. Mag. 4. 130. 19.

Bostrichus ater. *Payk. fn. 3. 153. 12.*

Bostr. angustatus. *Kugell. Schneid. Mag. 5. 524. 13.*

Ips niger. *Marsh. Ent. br. 1. 59. 24?*

Var. b., nigro-piceus, elytris brunneis, pedibus fusco-testaceis.

Var. c, rufo-ferrugineus totus, oculis sois brunneis.

Habitat in ligno sicco & sub cortice arborum emortuorum, præsertim Pini & Abietis, sat frequens.

Descr. Præcedentibus duobus valde affinis, sed multo major, præsertim longior, *H. piniperda* fere æqualis, thorace longiori, sub-cylindrico. non carinato, &c. distinctus. Caput breve, nigrum, subnitidum, crebre punctulatum, oculis oblongis, nigris; rostrum longitudine fere capitis, sed illo paulo angustius, nigrum, punctulatum, impressione transversa, obsoleta a capite distinctum, apice subretusum, vel foveis duabus latis, rotundatis impressum, carinula longitudinali elevata, saepe in frontem rarius ad verticem usque continuata, distinctis. Antennæ capite parum longiores, ferrugineæ, clava maxima pallidiore. Thorax latitudine multo longior, sub cylindricus, anterius perparum angustior, margine saepe ferrugineo; basi sub sinuatus, supra-convexus, niger, sub-nitidus, crebre punctatus, æqualis, nec carinatus, et si, oblique inspectus, interdum ita appareat. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace non latiora, sed plus duplo longiora, supra convexa, cylindrica, nigra, saepe nigro-picea, rude crenato-striata, interstitiis planis, crebre transversim rugulosis; versus apicem elytra magis scabra, opaca, pilis parvis cinereis adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, crebre punctatum. Pedes breviusculi, compressi, nigro-picei, tibiis exterius evidenter serrato-dentatis, apice tarsisque dilutius rufo-piceis.

Var. b, differt tantum elytris dilutius brunneis, vel rufo-piceis, & pedibus totis fusco-ferrugineis.

Var. c, corpore toto rufo-ferrugineo differt, forte nuper exclusa.

Obs. Cure. chloropo primo intuitu similis est hæc species, sed major, antennarum clava crassa, tibiæ compressæ, dilatatae, serratae, &c. bene distinguunt.

7. H. Fraxini: brevis, niger, subtus dense cinereo-pubescent, supra squamulis cinereis tuscisque variegatus, antennis ferrugineis, clava magna acuminata fusca.

Fabr. Eleut. 2. 390. 3.

Bostrichus Fraxini. Panz fn. 66. f. 15. Crit. Rev. 1. 120. Creutz. Ent. Vers. 1. 136. 4.

Ips varius. Marsh. Ent. br. 1. 54. 9.

Var. b, dilutius fusco-ferrugineus, pedibus testaceis, femoribus basi tuscis.

*Scolytus varius. Oliv. ent. 4. 78. II. 17. pl. 2.
f. 17. a, b.*

Hylesinus varius. Fabr. Eleut. 2. 391. 4?

Ips griseus. Marsh. Ent. br. 1. 55. 10.

Habitat in ramulis exsiccatis Fraxini excelsioris, sub cortice, in Scania, Westrogothia, passim.

Descr. Statura brevis fere H. crenati, sed triplo minor & ultra. Caput breve, nigrum, opacum, vix vel omnium subtilissime punctulatum, fronte plana, pube sub-erecta cinerea, in majusculis individuis longiori & densiori, adspersa; oculi oblongi nigro-brunnei; rostrum brevissimum, capite parum angustius, nigrum, mandibulis validis, atris, nitidis. Antennae capite paullo longiores, ferrugineæ; clava magna, oblonga, acuminata, fusca, pubescente, sat evidenter articulata. Thorax latitudine baseos fere duplo brevior, anterius multo angustior, margine apicis sub-elevato, piceo; postice profunde bisinuatus, supra convexus, sub-pulvinatus, niger, opacus, omnium subtilissime granulato-punctatus, subtus, la-

teribus late, & plaga magna ante scutellari, pube minutissima, depressa, cinereo-micante vestus. Scutellum minutum, nigrum, cinereo-pubesce. Elvra thoracis b^e-si parum latiora, sed illo plus tripla longiora, supra modice convexa, nigra, opaca, regulariter sed tenue punctato striata. interstius anteriorius evidenter granulatis; tota tiquamvis cenis, minotilimis, cinereo-albidis & nigro-brunneis irregulariter & sub-fasciatim marmorata; basi singuli & ytri rotundatus, elevatus, granulatus. Corpus subies nigrum, subtiliter creberim punctulatum, pube densa, depressa, cinereo-albida testum. Pedes breves, compressi, picei, tibiis apice dilatatis, denticulatis, tarsis ferrugineis.

Var. b, colore dilutiori differt; caput, thoracis dorsum, pectus & femorum basis plerumque nigro-fusca; thoracis latera, elytra, anus & pedes ferruginea; cæterum priori similimus.

Obs. H. varius Fabr. loc. cit. forte secundum specimen pallidum, immaturum, hujus varietatis determinatus,

ECCOPTOGASTER.

Antennarum clava compressa, solida, non articulata. Tibiae compressæ. vix externe serratae. Cætera ut in Hylesino.

E. Scolytus: niger; nitidus, antennis tarsisque rufo-testaceis, thorace subtilissime punctulato, elytris truncatis, punctato-striatis, interstius vase punctulatis, abdome subtus retuso.

Mas: fronte pilis longis fulvis vestita.

Herbst.

Herbst. col. 5. 125. 1. tab. 49 f. 1. a.

Hylesinus Scolytus. Fabr. Elert. 2. 390. 1.

Bostrichus Scolytus. Payk. fn. 3. 151. 9.

*Scolytus destructor. Oliv. Ent. 4. 78. 5. 4.
pl. I. f. 4. a, b, c.*

Var. b, Elytris pedibusque rufo-ferrugineis.

Bostr. Scolytus. Panz. fn. 15. f. 6,

Ips Scolytus. Marsh. Ent. br. I. 53. 6.

*Habitat in truncis exsiccatis Betuæ albæ,
sub cortice, paßim.*

Descr. Latitudo fere Bostr. Typographi, sed multo brevior; variat etiam diuidio minor & ultra. Caput crassum, nigrum, longitudinaliter subiissime rugulosum, vertice canaliculato, oculis brunneis, valde elongatis; rostrum brevissimum, latitudine fere capitis, nigrum, rugulosum, medio impressum, cum carinula parva elevata; apice emarginatum; labrum pilis longis, fulvis, nitidis tectum; mandibulæ magnæ, atræ; frons & rostrum matris pube densi, erectæ, fulvo-cinerea tecta. Antennæ vix capite longiores, rufo testaceæ, articulo primo magno, ob-conico, secundo crasso, globoso, sequentibus 3 & 4, brevissimis, valde coarctatis, claya magna, ovata, compressa, non visibiliter articulata. Thorax magnus, latitudine multo longior, anterius angustior, & juxta apicem transversim impressus, margine elevato ferrugineo; basi truncatus, supra valde convexus, præfertim posterius; totus niger, nitidissimus, glaber, omnium sub iilissime, sed minus crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, valde depresso. Elytra vix latitudine baseos thoracis, & illo parum longiora,

longiora, apice truncata, anum non exakte tegentia; supra convexa, circum scutellum impressa, nigra, saepe picea, nitida, glabra; disco interiori regulariter punctato striata, interstitiis punctis subtilissimis, vagis, interdum sub seriatis; versus latera creb ius & profundius punctata. Corpus subtus nigrum. crebre punctatum, tenui pubescens, segmento primo ventris convexo, apice valde retuso, sequentibus depremis, adeo ut abdomen posterius quasi excisum appareat. Pedes breviusculi, picei, tibiis compressis, parum dilatatis, nec externe ferratis, anticus apice dente valido, arcuato armatis; tarsi tenues, rufo testacei, articulo penultimo bilobo.

Var. b, differt tantum elytris & pedibus totis rufo-ferrugineis.

2. E. pygmæus: niger, nitidus, antennis testaceis, pedibus rufo-piceis, elytris rufo-ferrugineis, confertissime punctato-striatis, thorace crebrius punctulato, abdomine retuso.

Herbst. col. 5. 127. 2. tab. 49. f. 2.

Hyletinus pygmæus. *Fabr. Eleut.* 2. 395. 25.

Bostricus pygmæus. *Payk. fn.* 3. 152. 10. *Röß.*
Mant. 1. 18. 36.

Scolytus pygmæus. *Oliv. Ent.* 4. 78. 6. 5. pl.
1. f. 5. a, b.

Ips multifasciatus. *Marsh. Ent. br.* 1. 54. 8.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
præsertim *Quercus*, minus frequens.

Descr. Præcedenti simillimus & affinis, sed triplo sut quadruplo minor, thorace crebrius punctulato, elytris confertissime punctato striatis, &c. distinctus. Caput crassum, nigrum, opacum, tuberculatum, tenue pubescens, oculis oblongis brunneis; rostrum brevissimum, medio impressum, absque carinula elevata. Antennæ pallide testaceæ, omnino ut in priori constructæ. Thorax ut in præcedenti, niger, nitidus, margine antico plerumque ferrugineo, & interdum plaga baseos ejusdem coloris, sed crebrius, & respectu magnitudinis insecti multo profundius punctatus, præsertim versus latera. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma eadem, tota rufo-ferruginea vel brunnea, subnitida, punctato-striata, interstitio singulo serie regulari e punctis paucis minus profundis, unde elytra confertissime punctato-striata evadunt; versus latera striæ minus regulares. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes quoad structuram ut in priori omnino, femoribus rufo piceis, tibiis tarsisque dilutius testaceis.

3. *E. poligraphus*: fusco-piceus, pubescenti-scaher, antennis pedibusque pallidis, elytris vix striatis, abdomine integro, antennatum clava acuminata.

Dermestes Poligraphus. Linn. Syst. 2. 562. 10.
Fn. Sü. 420.

Bostrichus poligraphus. Fabr. Eleut. 2. 387.
12. Herbst. col. 5. 108. 6. tab. 48. f. 6. 6.
Payk. fn. 3. 155. 15. Panz. fn. 15. f. 5.

Ips polygraphus. De Geer Ins. 5. 196. 5.
Marsh. Ent. br. 1. 52. 3.

Habitat

Habitat sub cortice arborum emortuarum
passim, minus frequens.

Deser. Parvus. Bostr. chalcographo non longior, sed paulo crassior. Caput porrectum, nigro-piceum, subtiliter crebre punctulatum, pube brevi, cinerea adspersum. oculis oblongis, depressis nigris; rostrum brevissimum, apice emarginatum, colore & instrumento capitis. Antennae vix capite longiores, flavescentes, articulo primo longissimo, clavato, medijs minutissimis, coactatis, clava oblonga, acuminata, non visibiliter articulata. Thorax latitudine baseos vix longior, anterius angustatus, capiti æqualis, basi sub-sinuatus, supra convexus, obsolete carinatus, fulco piceus, crebre, subtiliter punctulatus, pilis brevissimis, rigidis, cinereis adspersus. Scutellum breve, latum, depresso, nigrum, punctulatum, ante basin elytrorum situm. Elytra thoracis basi non latiora, sed illo plus duplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, fusca, crebre granulata-punctata, pilis brevissimis, rigidis, squamuisque cinereis, dense adspersa; ad basin & apicem rudimenta obsolete striarum observantur, in disco vero nulla. Corpus subitus saturatius nigro-piceum, subnitidum, obsolete punctulatum, tenue pubescens, abdomine integro, convexo. Pedes breviusculi; validi, pallide testacei, tibiis apicem versus dilatatis, externe ciliato-subferratis.

Obs. Abdomine non retuso, corpore scabro, & tibiis sub-ferratis, a præcedentibus hujus generis discrepat. Hylesinis valde similis, sed antennarum clava non articulata; thorace antice angusto, a Bostrichis diversus, quare heic locavi speciem ambiguam.

Nuper exclusus, totus pallide testaceus.

BOSTRICHUS.

Caput parvum, deflexum. Antennarum clava rotundata, compressa sub solida, vel in apice obsoletissime transversim annulata. Thorax magnus giblus, ante capite multo latior. Tibiae ferrato-dentatae. Cætera ut in prioribus.

Sect. i. *Elytris postice retusis; plerumque dentatis.*

i. *B Typographus: nigro piceus, sub-nitidus, longius flavescens pilosus, elytris profunde striato-punctatis, apice circulatim truncato-retusis, singuli ambitu sex-dentato, dente quarto majore.*

Fabr. Eleut. 2. 385. 7. Herbst. col. 5. 81. 1 tab. 48. f. 1. a. Payk. fn. 3. 145. 1. Panz. fn. 15. f. 2.

Scolytus Typographus. Oliv. ent. 4. 78. 7. 7: pl. 1. f. 7 a, b.

Ips Typographus. De Geér Inf. 5. 193. 1. tab. 6. f. 1-7. Aßt. Holm. 1752. 156. tab. 3. f. 11, 12. Marsh. Ent. br. 1. 51. 1.

Var. *b*, corpore toto pallide testaceo.
Habitat sub cortice Pinorum Sylvestris & Abietis, labyrinthos & characteres formans, ubique vulgaris, Pinorum pestis.

Descr. *Magnus in hoc genere, tres lineas longius, cylindricus. Caput rotundum, deflexum, retrorsum, piecum, opacum, crebre rugoso. punctatum, plus*

pilis longis rufo-flavescensibus, in margine antico crebrioribus, adspersum; in medio antico, prope os, tuberculum parvum, elevatum, & paullo superius ruga vel carinula transversalis, saepè interrupta, obsoleta; mandibulæ crassæ. atræ, nitidæ; oculi valde elongati, brunnei, depresso, antice sub sinuati. Antennæ brevissimæ, vix longitudine capitis; testaceæ, saepè medio piceæ. articulo primo maximo, elongato, clavato; secundo etiam crasso, sed brevi, obconico; tertio parvo, obconico, basi tenui; 4-6 brevissimis, valde coarctatis, crassi scutulis, clava dilata-
ta, rotundata, valde compressa, pallidiori, versus apicem striolis 2 seu 3 tenuissimis, transversis notata, articulos forte indicantibus. Thorax magnus, crassus, latitudine longior, basi apiceque truncatus; angulis rotundatis, supra valde convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, anterius rugis tuberculisque creber-
rimis exasperatus, posterius lævior, subtiliter punctatus, præsertim in medio; antice & ad latera pilis longis, rufo-flavescensibus adspersus. Scutellum minutum, nigro-piceum, læve. Elytra a thorace spatio remota, illo fere angustiora, & parum longiora, cylindrica, lateribus inflexa, sinuata, supra valde convexa, nigro-picea, nitida, punctis majuscu-
lis, sat profundis, regulariter striata, intersticiis con-
vexis, lævibus, nitidis; versus apicem profunde cir-
culatim excavato-truncata, excavationis ambitu in singulo elytro 6-dentato, dente primo seu supero minuto, quarto reliquis multo majore, saepè capi-
tato; fundus excavationis rugoso-punctatus. ejusque ambitus, ut & latera elytrorum, pilis longis, rufo-
flavescensibus adspersa. Corpus subtus aut nigro-
aut rufo piceum, sub-nitidum, subtiliter punctula-
tum, pubescens. Pedes breves, validi, pilosi. femo-
ribus plerumque rufo-ferrugineis, nitidis, tibiis com-
pressis, apice dilatatis; obscurius piceis, tarvis tenui-
bus; pallide testaceis;

Var. b, colore dilutiori tantum differt, aut ferrugineus, aut pallidius testaceus, mandibulis, oculis dentibusque elytrorum semper nigro-piceis.

Obs. Opus præstantissimum Dom. Prof. Latreille „Genera Crustaceorum & Insectorum,” Parisis annis 1806-9, impressum, tandem consulere contigit; in hoc opere, tom. 2. p. 270., genus præsens, *Tomicus* audit, & Species descripta; Tom. Typographus, nostro in plurimis convenit, sed tubercula frontis, & forma dentium in apice elytrorum non omnimode similia. Derm. *Typographus* Cl. Linnæi in Syst. 2. 652. 7. Fn. Sv. 418., potius ad sequentem speciem pertinet, ob magnitudinem minorem in Fn. Sv. Derm. *Piniperda* æqualem, & ob dentes in apice elytrorum pauciores; forte tamen primæ tres Species nostræ a Cl. Linnæo & aliis ut variates tantum inspeclæ. Nostra jam descripta Species, pluries mihi e Germania, vario sub nomine missa, utut *B. Stenographus* Creutzeri, *B. Pinastri* Beckstein, *B. Decumanus* Illiger, &c. omnes quo-ad minimum punctum nostri simillimi.

2. *B. octo-dentatus*: nigro-piceus, subnitidus, flavescenti-pilosus, elytris punctato-striatis, apice circulatim truncato-retusis, singuli ambitu 4-dentato, dente tertio majore.

Payk. fn. 3. 146. 2.

Dermestes Typographus. *Linn. Syst. 2. 562. 7.*

Fn. Sv. 418.

Var. b, Corpore aut dilutius brunneo, aut pallide testaceo.

Habitat cum præcedente, sat frequens.

Ins. Suec. T. I. P. III. Z Descr.

Deser. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed plerumque triplo minor, & numero constante dentium in apice elytrorum, præcipue distinctus. Caput parvum, deflexum, retractum, nigro-piceum, opacum crebre granulato-punctatum, dense pubescens; supra os plerumque foveola parva, impressa, loco tuberculi in priori specie, nec ruga transversa superior in hac observatur; mandibulæ validæ piceæ, basi dilutiores; antennæ testaceæ, in medio obscuriores, structura ut in priori, sed articulus secundus brevior, sere globosus. Thoracis structura, color, punctura & pubescens, ut in præcedenti omnino. Scutellum etiam ut in illo. Elytrorum forma eadem, plerumque dilutius brunnea, similiter punctato-striata stria saturæ proxima reliquis latiore & profundiore, crebrius crenato-punctata, quod etiam in priori ite; versus apicem simili modo profunde circulatim excavato-truncata, excavationis ambitu in singulo elytro 4-dentato; dente primo seu supero minuto, tertio reliquis majori, longiori. Corpus subtus dilutius rufo-piceum seu brunneum, nitidum, punctulatum, pubescens. Pedes rufo-testacei, structura ut in præcedenti.

Var. b; tantum colore dilutioni differt:

3. B. Laricis: nigrō-piceus, subnitidus; pallido-pilosus, elytris longioribus punctato-striatis, apice circulatim retusis; ambitu irregulariter dentato; intersticiis striarum seriato-punctatis.

Fabr. Eleut. 2. 386. 10. Herbst. col. 5. 114. 13.
tab. 48. f. 13. Payk. su. 3. 147. 3. Panz.
su. 15. f. 3.

Scolytus chalcographus. Oliv. Ent. 4. 78. 7. 8.
pl. I. f. 8. a-c. Var.

Var. b, Elytris brunneis, pedibus rufo-testaceis.

Var. c, totus aut rufo-brunneus, aut pallide testaceus.

Ips micrographus. De Geér Ins. S. 195. 4.
Marsh. Ent. br. 1. 52. 2.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat frequens.

Descr. Præcedentibus iterum simillimus & valde affinis, sed B. 8-dentato iterum duplo minor & ultra, præsertim angustior, elytra longiora, apice aliter dentata, &c. Caput parvum, deflexum, piceum, punctulatum, supra os transversim obsolete impressum, absque tuberculis; mandibulæ validæ, piceæ; Antennæ rufo-testaceæ, concolores, structura ut in priori. Thorax quoad structuram ut in prioribus, nigro-piceus, sub-nitidus, antice rugoso-granulatus, postice, versus latera crebre, in medio parcus, subtiliter punctulatus, pilis longis pallide cinereis adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigro-piceum, lœve. Elytra cylindrica, thorace fere angustiora, sed longiora, lateribus inflexa, sinuata, supra valde convexa, nigro-picea, nitida, apice plerumque rufo-brunnea, sat regulariter punctato-striata, intersticiis planis, punctis paullo minoribus, & multo paucioribus, remotis, seriatis, impressis; versus apicem minus profunde, nec exacte circulariter excavato-truncata, ambitu excavationis in singulo elytro dentibus quatuor parvis, sub-equalibus, armato, & præterea interius in dico dentes duæ majores, remotæ, unde dentes quasi duplicitæ appareant. Corpus subtus nigro-piceum, pubescens, obsolete punctulatum. Pedes breves, validi, femoribus nigro-piceis, tibiis tarsisque dilutiis brunneis.

Var. b. differt tantum elytris totis rufo-brunneis, pedibusque dilutius rufo-testaceis.

Var. c. colore totius corporis dilutioni diversa; aut rufo-brunnea, aut pallidius testacea.

4. B. monographus: cylindricus; brunneo-testaceus, nitidus, pallido-pubescent, elytris subtilissime obsoletè puræ et non striatis, apice sub-retusis, singulo denticulis 3 aut 4, uno exteriori.

Fabr. Eleut. 2 387. 13. Payk. fn. Sv. 3.
149. 6. Herbst. col. 5. u8. 19. Kugell.
Schneid. Mag. 5 524. 14.

Bostrichus tuberculosus. Herbst col. 5. 113. 126
tab. 48 f. 12.

Habitat in Svecia Australi rarius, Dom. de Paykull; mihi vivus non visus.

Descri. Statura præcedentium, & B. Laricis magnitudine fere æqualis, sed abunde distinctus, thorace minus scabro, elytris subtilissime punctato striatis, apice parum retusis. &c. Caput parvum, deflexum, rectulum, testaceum seu brunneum, obsoletè granulato-punctatum, supra os longius pilosum, mandibulis piceis; oculi elongati nigro-brunnei. Antennæ testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax quoad structaram ut in præcedentibus, rufo testaceus, anterius subtiliter granularis, subopacus, pubescent, posterius nitidus, punctis minimis parce adspersus. Scutellum minutum, rotundatum, brunneum. Elytra thorace longiora, cylindrica, rufo-brunnea, nitida, subtilissime obsoletè punctato striata, stria futuræ proxima reliquis non profundiore; versus apicem oblique retusa, minime ve-

to excavato-impressi; in singulo plerumque dentes tres in serie recta, non procul a sutura, supero minuto, interdum desiciente, & juxta ultimum alius exterior, parvus, obtusus. Corpus subtilis rufo testaceum, obsolete punctatum. Pedes breves validi, rufo-testacei, pubescentes.

5 *B. bidentis*: nigro-piceus, sub-nitidus, griseo-pubescentis, elytris crebre subtiliter punctato-striatis, apice circulatum truncato-retusis, singulo dente superio elongato, hamato.

Fabr. Eleut. 2. 389. 22. *Payk. fn.* 3. 148. 5.
Panz fn. 39. f. 21.

Scolytus bidentatus. *Oliv. Ent.* 4, 78. 10. 13.
pl. 2. f. 23. a, b.

Bostr. bidentatus, *Herbst. col.* 5. 109. 7. *Tab.* 48. f. 7. f.

Var. b., Elytris sub-retusis, muticis, apice diluviis rufo-testaceis.

Bostr. chalcographus. *Payk. fn.* 3. 147. 4. alter Sexus.

Habitat sub cortice arborum emortuarum passim, minus frequens.

Descr. Magnitudo, statura & affinitas *B. Chalcographi*, sed magis pubescentis, elytra fere tota nigra, apice determinate excavato-retusa, aliter dentata, frons in utroque sexu integra, nec impressa, &c. Caput parvum, dectum, retectum, nigrum, sub-opacum, tenue pubescentis, fronte convexa, crebre subtiliter granulato-punctata, ore longius ciliata. An-

tenuæ breves, pallide testaceæ, structura ut in præribus. Thorax quoad structuram ut in præcedentibus, niger, antice tuberculato scaber, opacus, longius pubescens, in medio transversim obsolete impressus, postice glabrior, nitidior, punctulatus, in medio longitudinaliter sub-carinatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, læve. Elytra thorace paullo angustiora, sed multo longiora, cylindrica, nigro-picea, nitida, pubescentia, posterius interdum rufo picea. punctis parvis impressis crebre striata, intersticiis nempe etiam seriato punctatis, stria suturali vix vel parum profundior; ante apicem circulatim excavato-retusa, dente magno retrosum hamato in margine superiore excavationis singuli elytri, & plurimæ alio parvo, obtuso, versus apicem. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, pubescens, obsolete punctulatum. Pedes breves, validi, nigro-picei, tarsis & interdum tibiis dilutius rufo-piceis.

Var. b, in omnibus simillima, modo apex elytrorum perparum retusus, muticus, absque dentibus & semper rufo ferrugineus; forte femina, in societate cum præcedenti pluries testa, a sequenti elytris cerebrius punctulatis, thorace postice carinato, colore obscuriori &c, distincta.

6. *B. chalcographus*: nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque testaceis, elytris rufo piceis, basi nigricantibus, apice subretusis, singulo dentibus tribus armato.

Mas: Fronte supra os profunde impressa.

Var. b, corpore toto rufo-piceo, vel pallide testaceo.

Fahr Eleut. 2. 387. 11. *Herbst.* col. 5. 103. 2.
tab. 48. f. 2. b. *Payk. fn.* 3. 147. 4. *Panz.*
fn. 39. f. 20. *Derm-*

Dermestes chalcographus. Linn. Syst. 2. 562. 8.

Ips Spinosus. De Géer Inf. 5. 197. 7.

Var. b, ferrugineus vel pallide testaceus totus.

Scolytus 6-dentatus. Oliv. Ent. 4. 73. n. 15.
pl. 2. f. 15. a, b.

Habitat in arboribus resinosis ubique frequentissimus.

Descr. Minutus, præcedente magis glaber & nitidus, præsertim in elytris. Caput parvum, deflexum, retractum, nigro-piceum, crebre obsolete granulato punctatum, fronte supra os in masculis late & profunde excavato impressa, in femina fere æquали, parum tantum transversim depressa; os pallido-ciliatum. Antennæ breves, testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax quoad structuram ut in præcedentibus, nigro piceus, antice tuberculato-scaber, in medio transversim obsolete impressus, posterius punctulatus, nitidus, non aut vix carinatus, lateribus & antice nonnihil ciliato-pilosus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum, læve. Elytra thorace paullo angustiora, sed illo nonnihil longiora, cylindrica, rufo-ferruginea, nitida, quasi oleo inuncta, basi & lateribus anticis plus minusve nigra vel infuscata, subtilissime punctato-striata, interstiiis lævibus, vel vix punctulo uno alterove minutissimo notatis; juxta suturam postice impresso retusa, & in singulo ibi dentes tres in lineam positæ, supremo minuto, sequentibus majoribus, obtusis, tuberculiformibus. Corpus subtus piceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes breves validi, toti, rufo-ferruginei, tibiis crenato-ciliatis.

Var. b, differt tantum colore dilutioni, aut toto rufo-ferrugineo, aut capite thoraceque saturatius rufo-piceis.

7. *B. fuscus*: fusco-piceus, longius pubescens, thorace antice scabro, opaco, elytris longioribus, cylindricis, confertissime subtiliter punctato-striatis, apice retusis, muticis.

Ips fuscus. Marsh. Ent. br. I. 53. 5.

Var. b, corpore toto pallide testaceo.

Habitat sub cortice Fagi in Insula Bokö prope Alingsåhs Westrogothiaæ, rarius ex Anglia a Dom. Kirby, ut *Ips fuscus* Marsh. missus.

322.2.7.6
Descr. Minutus B. Chalcographo non crassior, sed in elytris paullo longior, multo magis pubescens, elytris crebrius & evidentius punctato-striatis. Caput parvum, deflexum, retractum, fusco-piceum, crebre subtiliter punctulatum, pilis longioribus pallescentibus adspersum, fronte superius convexa, versus os transversim impressa; oculi oblongi nigri; antennæ breves, testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax quoad structuram ut in præcedentibus, fusco-piceus, longius pubescens, anterius tuberculato-scaber, opacus, pone medium transversim subimpressus, posterius lævior, magis nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum minutum, rotundatum, piceum, læve. Elytra thorace paullo angustiora, & illo fere duplo longiora, convexa, cylindrica, dilutius rufo-picea, sub-nitida, longius pallido-pilosa, præsertim posterius, punctis seriatis creberrime striata, intersticiis nempe punctis æque crebris & profundi-

dis notatis, unde obiter intuenti vage punctata apparet; apex late, circulatim plano-retusus, absque ullis dentibus. Corpus subtus piceum, obsolete punctulatum. Pedes breves, validi, testacei, femoribus interdum obscurius rufo-piceis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis pallide testaceo, oculis solis nigro-brunneis.

Sect. 2:da, Elytris postice integris,
rotundatis.

8. *B. villosus*: brunneus, sub-nitidus, longius pallido-pilosus, thorace ovato, cerebrime aequaliter punctato, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis subtilius se-riato-punctatis.

*Payk. fn. 3. 154. 13. Panz. fn. 15. t. 8. Herbß.
col. 5. 121. 24.*

Hylesinus villosus. Fabr. Eleut. 2. 391. 7.

Var. b, corpore toto aut dilutius rufo-ferrugineo, aut pallidius testaceo.

Ips villosus. Marsh. Ent. br. 1. 53. 4.

*Scolytus micrographus. Oliv. Ent. 4. 78. 9. 12.
Pl. 2. f. 12. a, b?*

Derm. micrographus. Linu. En. Sv. 419.

Habitat sub cortice arborum emortuarum;
frequens.

Descr. *B. Laricis* paullo major. Caput deflexum, brunneum, fronte convexa, crebre punctuata, ore fulvo-ciliato; mandibulae validae, piceae; oculi oblongi, lunati, nigri. Antennae breves, pallide testaceae,

ceæ. structura ut in prioribus. Thorax ovatus, latitudine mediæ paullo longior, antice & lateribus rotundatus, basi truncatus, supra convexus, totus brunneus, sub nitidus, pilosus, dorso toto æqualiter, crebre granulato-punctato. Scutellum parvum, rotundatum, piceum, lœve. Elytra thoracis basi latiora, & illo fere dimidio longiora, cylindrica, apice obtuse rotundata, integra, plerumque dilutius rufo-brunnea, nitida, pilis longis pallide cinereis, præsertim versus latera & apicem, adspersa, profunde punctato striata, intersticiis planis, singulis serie e punctis longe minoribus notatis. Corpus subitus dilutius rufo-brunneum vel ferrugineum, nitidum, punctatum. Pedes breves: validi, testaceo-ferruginei, tibiis omnibus compressis, apice dilatatis, serrato-dentatis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis pallidiori, aut ferrugineo, aut testaceo.

Variat etiam duplo minor & ultra, fronte densius villosa, alias simillimus, forte mas.

9. *B. micrographus*: ferrugineus, nitidus, sub-pubescent, thorace oblongo, antice scabro, elytris subtilissime punctato-striatis, apice obtusis, muticis.

Payk. fn. 3. 155. 14. Panz. fn. 66. f. 15. Fabr. Eleut. 2. 387. 15?

Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius.

Deser. Minutus *B. chalcographo* fere minor, ejusque var. b, simillimus & nimis affinis, elytris apice muticis tantum distinctus. Caput deflexum, ferrugineum, nitidum, punctatum, parce pubescens, oculis

oculis oblongis nigris; mandibulæ apice piceæ. Antennæ breves, pallide testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax oblongus, omnino ut in *B. chalco-grapho* constructus, totus rufo-ferrugineus, antice rugoso scaber, opacus, postice subtilissime punctatus, versus medium baseos fere omnino lævis, nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, ferrugineum, læve. Elytra vix thorace angustiora, & illo fere dimidio longiora, cylindrica, ferruginea, nitida, versus latera & apicem parce pubescentia, anterius subtilissime punctato-striata, posterius fere lævia, stria suturæ proxima profunde impressa; præsertim versus apicem, ubi etiam sutura elevatior; apex elytrorum obtuse rotundatus, absque denticulis. Corpus subitus pallidius testaceum, nitidum, subtiliter punctulatum, tenui pubescens. Pedes brèves, validi, pallide testacei.

Obs. Species dubia, a plerisque auctòribus confusa; Dom. Paykull & Panzer nostrum intellectissimè videntur; Derm. micrographus Linn. Faun. N:o 419 forte ad *B. villosum* pertinet, ut etiam Scolytus micographus Oliv. Derm. micographus Linn. Syst. 2, 562. q. *B. chalco-grapho* aptius allegatur. Ips. micographus De Geeri & Marshami, ad *B. Laricis* jure refertur.

10. *B. dispar*: nigro-piceus, longius pubescens, antennis, tibiis tarsisque testaceis, thorace brevi rotundato, antice exasperato, elytris brunneis, punctato-striatis, apice declivibus.

Mas: Parvus, thorace depresso, sub-orbiculari, elytris thorace parum longioribus.

Illig. Mag. 4. 129. 21.

Apate

Alete dispar. Fabr. Eleut. 2. 332. 21. Payk.
fn. 3. 143. 4.

Bostricus brevis. Panz. fn. 34. f. 20. Crit.
Rev. 1. 118. var. *pallida*.

Femina: duplo aut triplo major, thorace
valde convexo, sub-globo, elytris tho-
race duplo longioribus Illig. Payk. loc.
cit. *femina*.

Bostrichus dispar. Herb. col. 5. 113. II. Tab.
48. f. II. k.

Bostr. thoracicus. Panz. fn. 34. f. 18. Crit.
Rev. 1. 118.

Habitat in Blekingiae, Sino'andiæ, Westros-
gothiae sylvis acerofosis, rarius.

Descr. Mas & femina valde dissimiles; Mas par-
vus, B. chalcographò vix longior; sed plus duplo
länger, ovatus. Caput parvum, deflexum, sub tho-
race occultatum, nigrum, sub-nitidum, punctulatum;
pubescens, mandibulis validis, atris, nitidis. Anten-
næ capite paulo longiores, crassiue, pallide te-
stacea, structura ut in prioribus. Thorax magnus,
sub-orbiculatus, vel latitudine medijs parum longior,
anterius paulo angustior, supra fere planus, vel per-
parum convexus, nigro picéus, sub nitidus, pilis lon-
gis griseis adspersus, antice obsoletius tuberculato-
scaber, postice fere lœvis. Scutellum parvum, ele-
varum, rotundatum, nigrum, lœve. Elytra obtuse
ovata, antice thoracis basi latiora, in medio adhuc
magis dilatata, supra antice convexa, a medio ad a-
picem valde declivia, rufo picea seu brunnea, sub-
nitida, sat profunde punctato striata, pilis longis gri-
seis ad latera & apicem adspersa. Corpus subitus pi-
ceum

ceum, punctulatum, pubescens. Pedes longiusculi, validi, pilosi, femoribus pictis; apice testaceis, tibiis compressis, inteme dilatatis, ferratis, totis, tarsisque pallide testaceis.

Femina triplo major. B. villoso fere æqualis; caput magis exstremum, fronte convexa, supra os carinata brevi notata. Antennæ breviores, tenuiores. Thorax va de convexis, sub-globosus, antice fortius tuberculato scaber, postice sub-lævis. Elytra thorace fere duplo longiora, sub-cylindrica, fere a medio ad apicem valde declivia. Pedes respectu corporis breviores quam in mare; rufo testacei, femoribus basi plus minusve pictis.

ii. *B. domesticus*: cylindricus, niger, subglaber, tarsis antennarumque clava, oblique acuminata, testaceis, thorace sub-globoso; exasperato. elytris griseo-pallidis, futura limboque nigro-fuscis.

Deimestes domesticus. Linn. Syst. 2. 563. 12.
Fn. Sv. 424.

Ips domesticus. De Geer Inf 15 196. 6.

Apate limbatus. Fabr. Eleut. 2. 382. 20.
Panz. fn. 43. f. 19. dito var. Payk. fn. 3.
144. 5.

Bostrichus limbatus. Oliv. Ent. 4. 77 17 22.
pl. 3. f. 22. a, b. Herbst. col. 5. 105. 3.
tab. 48. f. 3. c.

Habitat in truncis arborum emortuarum;
præsentim Alni, præssim; non solum sub
corticis, sed eti in liguum ipsum perpendiculariter perforans.

Defecti

Descr. Magnitudo fere B. villosi. Caput deflexum, nigrum, sub-nitidum, sub-tiliter punctulatum, fronte tota maris profunde impresso excavata; feminae convexa, supra os utrinque parum impressa, in utroque Sexu carinula media parva, abbreviata. Antennae breves, testaceae, plerumque basi obscuriores, clava magna, oblonga, compressa, apice acumine obliquo, in mare longiori, subuato, armata. Thorax longitudine fere latior, valde convexus, sub-globosus, basi tamen truncatus, totus niger, sub-opacus, antice tuberculo-exasperatus; postice subtiliter rugosus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace angustiora, sed illo plus duplo longiora, cylindrica, livida, seu griseo pallida; nitida, glabra, tenui & obsoletius punctato-striata; interstitiis planis, vix vel obsoletissime punctulatis; stria futurae proxime reliquis profundior, praesertim versus apicem; Sutura tota, versus apicem magis late, & margines laterales etiam late nigro fuscæ. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, punctulatum. Pedes breviusculi, nigri, nitidi, tarpis & interdum tibiarum apice ferrugineis.

§2. B. lineatus: cylindricus, niger, sub-pubescentia, antennis, pedibus, thoracis sub-globosi, exasperati postico, elytrisque rufo-testaceis, elytrorum sutura margine lineaque media nigris, antennatum clava obtusa.

Oliv. Ent. 4. 77. 18. 23. pl. 3. f. 23. a, b.

Apate limbatus. Payk. fn. 3. 144. 5.

Var. b; thorace rufo-testaceo, lateribus anticis, margine apicali, saepiusque linea media

media abbreviata nigris, elytris testaceis,
futura, margine lituraque obsoleta posti-
ca nigricantibus.

Bostr. melanocephalus. *Herbst. col. 5. us. 14.*
tab. 48. f. 14. n.

Var. ē, pallidius rufo-testaceus, capite ni-
gricante; thoracis antico pectoreque sæ-
pius sulcescitibus.

Hylesinus melanocephalus. *Fabr. Eleut. 2. 394.*
21.

Bostrichus Serratus. *Panz. fn. 34. f. 19?*

Habitat in truncis arborum emortuarum;
præsertim Betulae albæ, passim, lignum
ipsius; uti præcedens, perforans.

Descr. Præcedenti quidem similis & affinis, at-
tamen vere distinctus, paullo minor, brevior, clava
antennarum obtusa, thorace magis pubescente, sub-
tilius asperato, colore thoracis, elytrorum pedumque
&c. Caput deflexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter
punctulatum, pubescens, fronte maris late & pro-
funde impressa, feminæ convexa, integra; in utroque
carinula parva media, obsoleta, supra os notata.
Antennæ, breves, testaceæ, clava ovata, compressa,
obtusa. Thorax quoad structuram ut in præcedenti
omnino, valde convexus, pilis erectis griseis pube-
scens, tuberculis rugisque minoribus exasperatus, ni-
ger, basi transversim plus minusve rufo-ferrugineus.
Scutellum ut in priori. Elytrorum forma fere ea-
dem, sed paulo minus elongata, rufo testacea, nitida,
parum pubescentia, evidenter punctato-striata;
margo exterior late niger; sutura etiam anterius ni-
gra, & linea media longitudinalis in singulo elytris
apicem

apicem non attingens, ejusdem coloris. Corpus sub-tus nigrum, nitidum, punctulatum, ano dilutius rufo-piceo. Pedes toti rufo-testacei, structura ut in praecedente.

Var. b, simillima, modo thorax rufo-testaceus, margine antico & lateraliter anterius nigris; saepe etiam linea media abbreviata nigra, margini antico contigua. Elytra rufo-testacea, margine laterali & suturali plus minusve infuscatis; lineæ mediæ rudimentum in hac varietate rarius conspicuum.

Var. c. fere tota pallidius testacea, modo caput nigricans; thoracis margo anticus, ut & pectus, interdum fuscescentia; forte nuper exclusa.

B. asperatus: sub-cylindricus, niger, opacus, sub-pubescent, antennis pedibusque testaceis, thorace sub-orbiculato, tuberculato-sebro, elytris confertissime vage punctulatis, apice dilutioribus.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius.

Descr. Parvus, B. chalcographo paulo minor. Caput deflexum, nigrum, crebre subtilissime punctulatum, ore pallide testaceo, mandibulis brevibus, validis, testaceis, apice fulcis. Antennæ crassiusculæ, testaceæ, clava ovata, compressa, evidenter 4-articulata. Thorax valde convexus, fere orbiculatus, niger, opacus, pubescens, dorso fere toto tuberculis elevatis exasperato. Scutellum minutum, nigrum, laeve. Elytra thoracis medii latitudine, & illo plus duplo longiora, sub-cylindrica, anterius nigro-fusca, posterius livido-testacea, sub-opaca, tenuis pubescentia, creberrime subtiliter vage punctata, punctis versus latera hinc inde sub-seriatis. Corpus subtus nigrum,

nigrum, sub-nitidum, tenue pubescens, parce & obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, testacei, tibiis externe ciliatis.

Obs. Specimen unicum possideo, cui elytra tota nigro-picea, ante apicem sub-depressa vel sub-retusa, callo obsoleto supero notata, & versus latera evidenter punctato-striata, cæterum in omnibus convenientis, ut vix pro specie peculiari habendum.

14. B. *Tiliæ*: sub-cylindricus, fuscus, opacus, sub-pubescent, antennis pedibusque testaceis, thorace sub-orbiculato, medio scabro, elytris obsolete punctato-striatis, apice dilutioribus.

Illig. Mag. 4. 129. 17.

Apate Tiliæ. Fabr. Eleut. 2. 383. 27. Panz. fn. 3. f. 14.

Var. b, corpore toto pallido, capite obscuriori.

Habitat sub cortice *Tiliæ* Europeæ, rarius.

Descr. Præcedenti simillimus & valde affinis, sed duplo minor, thorax posterius minus tuberculatus, & elytra punctato-striata, &c. Caput majusculum, rotundatum, nigrum, fronte convexa, omnium subtilissime crebre punctulata, carinula parva media supra os notata, ore cinereo-ciliato. Antennæ breves, crassiusculæ, testaceæ, clava ovata, compressa, evidenter articulata; omnino ut in priori. Thorax sub orbiculatus, fuscus, opacus, supra valde convexus, plaga triangulari, posterius angustata, magis elevata, tuberculato scabra, saepe tufo-picea vel ferruginea,

ruginosa, lateribus, postice latius, crebre punctulatis; fuscis. Scutellum minutissimum, fuscum, laxe. Elytra thoracis medii latitudine, & illo plus duplo longiora, cylindrica, apice rotundata, integra, dilutius fuso-livida, pube brevissima cinerea adspersa, sat regulariter, eis tenue & obsolete punctato-striata, interstiliis fere laxeibus. Corpus subtus fuscum, pubescens, subtilissime punctulatum. Pedes mediocres, toti testacei, tibiis ciliatis.

Var. b, colore dilutiori tantum differt.

15. B. cinereus: oblongus. cinereo-testaceus, sub-opacus, tenuissime pubescens, thorace ovato, subtilissime punctulato, elytris crenato-striatis.

*Herbst. col. 5. 116. 15. tab. 48. f. 15. o. Kugell.
Schneid. Mag. 5. 524. 15.*

*Bostrichus pubescens. Mørsh. Ent. br. 1. 58. 23?
Hylesinus minimus. Fahr. Eleut. 2. 395. 28?*

Habitat sub cortice arborum emortuarum; passim.

Descr. Minutus, B. Tiliæ adhuc minor, vix dilucidum linea longus. Caput deflexum, rotundatum, fuscotestaceum, fronte convexa, subtilissime punctulata, versus os densius pubescente. Antennæ breves, testaceæ, clava rotundata, compressa, Thorax latitudine paullo longior, ovatus, supra parum convexus, ferrugineus vel fuscotestaceus, sub-opacus, subtilissime punctulatus, versus latera tenuissime pubescens. Scutellum minutum, fuscotestaceum, laxe. Elytra thoracis latitudine, & illo duplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, dilutius

tius cinereo testacea, sub-opaca, sat profunde crenata striata, tenuissime pubescentia. Corpus subtus ferrugineum, sub-nitidum, punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, tibiis ferrato-ciliatis.

16. *B. pusillus*: oblongus, nigro-piceus, nitidus, sub-pubescent, antennis, tibiis tarisque testaceis, thorace longiori, subtiliter punctulato; elytris punctatō-striatis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, frequens;

Descr. Præcedente fere adhuc minor, angustior & valde affinis, thorace paulo longiori, superficie magis nitida, elytrorum striis simpliciter punctatis, &c. distinctus. Caput parvum, deflexum-nigro-piceum, nitidum, subtilissime punctulatum, tenuissime pubescent, ore testaceo. Antennæ brevissimæ, pallide testaceæ, clava rotundata, compressa, vix articulata. Thorax latitudine multo longior, supra parum convexus, nigro-piceus, nitidus, subtilissime punctulatus, pube brevissima, erecta adpersus. Scutellum minutum, piceum. Elytra vix thoracis latitudine, sed illo duplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, plerumque dilutius rufo-picea, nitida, punctis simplicibus, seriatis, striata, vix pubescentia. Alæ longæ, albæ. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, subtilissime punctulatum, tenue pubescent. Pedes mediocres picei, tibiis ciliatis, plerumque apice tarisque testaceis.

Variat etiam toto corpore pallidiori, forte immaturus.

Obs. Species duæ ultimæ *Hylesinus* quidem affines, sed clava antennarum compressa, rotundata. Utrum *Hylesinus minutus*, Fabr. Eleut. 2, 395. 27.

ad speciem nostram ultimam pertinet, vel num ad Genus *Cis* referendus, ut Dom. Latreille in Gen. Crust. & Ins. Tom. 3. p. 12, autumat. ex descriptione insufficienti vix dijudicandum. *Bostrichus minutus*, Panz. fn. 45. f. 11, ob magnitudinem majorem, colorem aliud, &c., neque nostris competit.

Familia 3:a, Xylophagi.

Caput antice non rostratum. Antennæ breviores, clavatæ, vel extrofsum crassiores, articulis 10 aut 11. Caput thoraci ad oculos usque intrusum. Palpi breves, plerumque filiformes, vel parum extrofsum crassiores.

A P A T E.

Palpi filiformes. Maxilla bifida, lacinia interna paulo minori. Labium truncatum. Antennæ breves, 10-articulatæ, clava serrata aut sub-peñinata. Oculi globosi, prominuti. Thorax brevis, elevatus, saepe scaber. Tibiae angustæ, elongatae.

I. *A Capucina: nigra, opaca, sub-pubescentia, elytis munitis, vage reticulato-punctatis, abdomineque rufis, thorace ante sub-emarginato, tuberculato-muricato.*

*Fabr. Eleut. 2. 381. 12. Payk. fn. 3. 141. 1.
Panz. fn. 43. f. 18.*

Bostri-

Bostrichus Capucinus. Oliv. Ent. 4. 77. 8. 7.

pl. i. f. 1. a, b, c. Latr. Gen. Ins. 362.

Ligniperda Capucinus. Herbst. col. 5. 34. 1.

tab. 46. f. 7.

Dermestes Capucinus. Linn. Syst. 2. 562. 5.

Pl. Sv. 416.

Habitat in ligno antiquo, apud nos rarissime.

Descr. Magnitudo valde variat, a Bostr. Typographi, ad quadruplo majorem. Caput parvum, deflexum, angulatum, nigrum, opacum, crebre rugosopunctatum, ore fulvo ciliato; oculi globosi, brunnei. Antennæ breves, piceæ, articulo primo crassio, clavato, 2:0 minori, sub-globoso; 3:0 minimo, sub-cylindrico; 4-7 brevibus, transversis, truncatis, exterioribus sensim crassioribus; 8, 9, magnis, crassis, apice truncatis, introrsum producto-acuminatis; decimo ovato, sub-compresso. Thorax brevis, rotundatus, niger, opacus, tenui pubescens, anterius in medio impresso-emarginatus, utrinque tuberculis acutis muricatus, superficie reliqua crebre reticulato-rugosa & punctata. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, rugosum. Elytra basi truncata, thorace paulo latiora, humeris prominulis, posterius nonnihil dilatata, thorace plus triplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, tota rubra seu rufa, fere glabra, crebre & profunde, vage, reticulato-punctata; juxta marginem lateralem striæ duæ regulares, punctuæ, interstitio elevata, carinata. Pedes & abdominis basis nigra, pubescentia, obsoletissime punctulata; abdomen reliquum rubrum, subtilissime punctulatum. Pedes longiusculi, tenues, nigro picei, talpis interdum dilutioribus, unguibus rubris.

2. A. sub-striatus: linearis-elongatus, nigro-piceus, opacus, pubescens, antennarum apice pedibusque rufo-piceis, thorace tuberculato-scabro, elytris creberime rugosis, obsolete striatis.

Payk. fn. 3. 142. 2.

Habitat in truncis exsiccatis Pini & Abietis, sub cortice, rarius.

Descr. Magnitudo variat; majores Bostr. 8-dentato longiores, sed angustiores, alii duplo, imo triplo minores. Caput breve, transversum, nigro-piceum, opacum, rugoso-punctatum, inter antennas transverse impressum, ore fulvo-ciliato, collo magno, laevissimo, nitidissimo, in thorace recontendo; oculi globosi, nigri, prominuli. Antennae breves, crassiusculæ, piceæ, articulis tribus ultimis rufo-testaceis, 8:o & 9:o magnis, truncatis, perfoliatis, 10:o paullo minori, rotundato, compresso. Thorax brevis, rotundatus, convexus, nigro-piceus, opacus, pubescens, supra tuberculis crebris, sub-acuminatis, anticus majoribus, exasperatus. Scutellum parvum, elevatum, nigrum, laeve. Elytra thoracis medio vix latiora, sed illo triplo longiora, linearis-cylindrica, apice rotundata, supra convexa, nigro-picea, subopaca, pubescentia, confertissime rugoso-tuberculata, striis obsoletis, situ obliquo tautum dignoscendis, exarata. Corpus subtus fuscopiceum, pubescens, obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, femoribus validis, piceis, tibiis externe denticulatis, tarisque dilutius ferrugineis.

3. A. elongatus: linearis-elongatus, nigro-piceus, fere glaber, antennarum clavae pe-

pedibusque rufo-piceis, thorace sub-tuberculato, elytris nitidis, punctato-sub-striatis.

Payk. fn. 3. 143. 3.

Apate linearis. Kugell. Schneid. Mag. 4.
495. 4.

Habitat cum præcedente, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, sed differt corpore fere glabro, thorace subtilius punctulato, elytris nitidis, minime rugoso-tuberculatis, modo seriato-punctatis, &c. Caput, oculi, os, antennæ, collum, ut in præcedenti omnino. Thoracis structura eadem, sed supra fere glaber, & tubercula multo minora, non acuminata. Elytrorum forma etiam ut in præcedenti, sed omnino glabra, nitida, minime rugoso tuberculata, sed punctis parvis impressis, minus regulariter seriatis, notata. Corpus subtus & pedes ut in præcedenti omnino.

C O R Y N E T E S.

Palpi quatuor inæquales, jub-filiformes, articulo ultimo longiori, sub-conico. Mandibula cornea, acuta, bidentata. Ligula membranacea, elongata, apice dilatata, rotundata, integra. Antennæ breviores, II-articulatæ, clava triarticulata, obconica, articulo ultimo maximo, sub-quadrato, angulis rotundatis. Thorax antice truncatus, lateribus & postice rotundatus, anguste marginatus.

I. *C. violaceus*: violaceo-sub-virescens, nitidus, fusco-villosus, antennis nigris, pedibus fusco-virescentibus, elytris rude striato-punctatis.

Fabr. Eleut. I. 285. 1. *Herbst. col.* 4. 150. 1. tab. 41. f. 8. h. *Payk. fn.* I. 275. 1. *Schönh.* synon. 2. 50. 1.

Desmestes violaceus. *Linn. syst.* 2. 563. 13. *Fn. Sv.* 422. *Panz. fn.* 5. f. 6.

Necrobia violacea. *Latr. Gen. Inf.* I. 274. 1. *Oliv. Ent.* 4. 76. bis 5. 1. pl. 1. f. 1. a, b, c.

Clerus violaceus. *Illig. Col. Bor.* I. 282. 2.

Habitat in cadaveribus, frequens: occurrit etiam in floribus.

Deser. Magnitudo valde variat; maiores Mala chio bipustulato æquales, alii triplo minores & ultra. Color plerumque coeruleo-sub-virescens, rarius intensive coeruleo-violaceus; corpus totum supra villositate tenui, erecta, fusca, in capite & thorace longiore, vestitum. Caput sub-deflexum, rotundatum, coeruleo-virescens, punctatum, ore piceo; oculi magni, globosi, nigro-brunnei. Antennæ vix longitudine thoracis, articulo primo magno, clavato, virescente; secundo multo minori, globoso; 3:0 longiori, ob-conico; 4-8, brevioribus, nodosis; 9, 10, magnis, latis, sed brevibus, truncatis, perfoliatis; ultimo maximo, sub-quadrato, compresso, angulis rotundatis. Thorax longitudine paucio latior, antice truncatus, lateribus, angulis posticis & basi rotundatus, anguste marginatus, supra conexus, coeruleo-virescens, crebre & sat profunde punctatus. Scutellum rotundatum, fusco-coerulescens,

rulescens, obsolete punctulatum. Elytra thorace latiora, humeris prominulis, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, cœruleo-virescentia; nitida, striatim punctata, punctis anterius majoribus, versus apicem fere evanescentibus, interstitiis obsolete punctulatis. Corpus subtilis cœruleo-virescens, obsoletius subtiliter punctulatum, cinereo-pubescentes. Pedes mediocres, nigro-virescentes, cinereo-pubescentes, tarsis omnibus quadriarticulatis.

C I S. Latreille.

Mandibulæ breves, conico-trigonæ, apice æque bidentatae. Palpi valde inæquales; maxillares multo majores, extrorum sensim crassiores, articulo ultimo sub-ovato; labiales minimi, subulati, articulo ultimo tenuiori, conico. Maxilla bifida, lacinia interna parva, dentiformi. Antennæ capite fere duplo longiores, articulis tribus ultimis magnis, perfoliatis. Corpus ovatum, supra convexum. Oculi globosi, prominuli. Thorax transversus, marginatus, antice sâpe elevatus & productus.

I. C. Boleti: fusco-piceus, sub-pubescentes, antennis pedibusque testaceis, thorace inæquali, antice reflexo, lateribus late marginato, postice obtuse angulato, elytris sub-vage rugoso-punctatis.

Latreille Gen. Inf. 3. 12. 1.

Anobium Boleti. Fabr. Eleut. 1. 323. 7. Illig. Col. Bor. 1. 332. 8. Payk. fn. 1. 308. 7.

Anobium bidentatum. Oliv. Ent. 2. 16. II. 9.
pl. 2. f. 5. a, b, c.

Dermestes picipes. Herbst. col. 4. 137. 17. tab.
41. f. 3. c. c.

Bostrichus Boleti. Kugell. Schneid. Mag. 4.
497. 9.

Var. b, corpore toto aut dilute brunneo,
aut pallide testaceo.

Dermestes variabilis. Fabr. Eleut. 1. 319. 38.
sec. Mus. Dom. Lund.

Habitat in fungis arboreis, ubique frequens.

Descr. Major in hoc genere, Bostr. lineato-
fere æqualis, vel paullo crassior; variat tamen ma-
gnitudine minori. Caput deflexum, piceum, sub
thoracis lobo eminente occultatum, fronte fere pla-
na, crebre subtiliter punctulata, in medio tubercu-
lo obsoleto notata, marginibus in masculis alte e-
levatis, reflexis, in medio angulariter emarginatis;
in femina ad latera tantum parum elevatis; oculi
prominuli, globosi, brunnei. Antennæ thorace pau-
lo breviores, testaceæ, articulis decem, primo ma-
gno, crasso, ovato; secundo dimidio minori, etiam
ovato; tertio angustiori, ob-conico; 4-7, brevissi-
mis, coarctatis, truncatis, perfoliatis; 8, 9, ma-
gnis, truncatis, perfoliatis, ultimo magno, ovato;
tres ultimi pubescentes, saepè obscuriores. Thorax
brevis, transversus, antice bi-sinuatus, lobo medio
magno, porrecto, elevato, rotundato, interdum sub-
emarginato, angulis lateralibus deflexis, prominu-
lis, obtusis; lateribus rotundatis, margine valde di-
latato, reflexo; basi sub-truncatus, angulis obtusis;
supra valde convexus, hinc inde obsolete foveola-
tus, crebre subtiliter punctulatus, tenui pubescens.
totus

totus fusco-piceus, sub-opacus. Scutellum parvum, rotundatum, fuscum, pubescens. Elytra latitudine medii thoracis, humeris oblique rotundatis, thorace fere triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa. fusca vel fusco-picea, opaca, pube brevissima, cinerea, subnitente adspersa, anterius sub-rugosa, & punctis majusculis, obsoletioribus, hinc inde in series obsoletas dispositis, imprecisa, versus apicem laeviora, subtilius obsolete punctulata. Corpus subtus fusco-piceum, magis nitidum, subtiliter obsolete punctulatum. Pedes breviusculi, validi, testacei, tarsum articulis anterioribus brevissimis, unguiculari magno, clavato.

Var. b., colore pallidiori tantum differt, aut brunneus, aut ferrugineus, aut pallide testaceus.

2. *C. micans*: *fusco-piceus, pube brevissima, micante dense adspersus, antennarum basi pedibusque testaceis, thorace æquali, antice sinuato, lateribus anguste marginato, elytris obsolete, vase, punctato-subrugosis.*

Anobium micans. Fabr. Eleut. I. 324. 14. Illig: col. bor. I. 331. 7. Payk. fn. I. 309. 8.

Herbst. col. 5. 64. 10. tab. 47. f. II. k.

Ptinus villosulus. Marsh. ent. br. I. 86. 14.

Habitat in fungis arboreis, passim, non infrequens.

Descr. Praecedenti simillimus & affinis, sed triplo minor & ultra, thoracis lateribus anguste tantum marginatis, angulis posticis rotundatis, & pube densiori, micante distinctus. Caput & oculi ut in praecedente omnino, etiam secundum Sexum; antenna

teonarum structura eadem, stipite testaceo, clava nigra vel nigro fusca. Thorax brevis, transversus, antice bi sinuatus, lobo medio supra caput nonnihil producto, rotundato, non vero elevato, angulis latera ibus sub rectis, parum prominulis; lateribus & angulis posticis exacte rotundatis, anguste marginatis; basi ipsa truncatus, ibiaque etiam anguste marginatus; supra valde convexus, æqualis, fusco piceus, cæberreme & evidentius quam in priori punctatus, pilis brevissimis, rigidis, certo ad lucem situ irideo micantibus, adpersus; Scutellum ut in præcedenti, fusco picea, rugulis punctisque impressis, vagis, anterius evidenteribus, & pubescenti uti thorax adspersa. Corpus & pedes ut in præcedenti omnino.

Variat uti præcedens colore dilutius brunneo aut ferrugineo.

3. *C. hispidus*; fusco-piceus, pubescentia, rigida asperitus, antennis pedibusque testaceis, thorace æquali, antice sinuato, lateribus anguste marginato, elytris obsolete punctato-striatis.

Anobium hispidum. Payk. fn. 1. 310. 9.

Anobium micans. Panz. fn. 10. f. 8.

Var. b, capite thoraceque ferrugineis.

Var. c, corpore toto ferrugineo, aut testaceo.

Habitat in fungis arboreis passim.

Descr. Præcedentibus iterum pauculo minor, cæterum simillimus & valde affinis. elytris punctato-striatis præcipue distinctus. Caput & oculi ut in præ-

precedentibus cariro. Antennarum structura es-
dem, totae pallide testaceae. Thorax paulo longior
& minus convexus quam in C. micante, antice sub-
bisinuatus, lobo medio non nihil producto, rotunda-
to, non reflexo, angulis lateralibus parum productis,
obtusis; lateribus & angulis posticis exacte ro-
undatus, tenue marginatus, basi truncatus, arguste
marginatus, supra modice convexus, aequalis, subti-
lissime crebre punctulatus, fusco piceus, pilis brevissi-
mis, rigidis, micantibus adspersus. Scutellum par-
vum, rotundatum piceum. Elytrorum forma fere
ut in prioribus, humeris tamen paullo magis re-
ctangulis, supra convexa, fusco-picea, apicem ver-
sus dilatius ferruginea, sat regulariter, sed obsolete,
punctato-striata, praesertim anterior, pube simili uti
thorax adspersa. Corpus & pedes ut in prioribus,

Var. b., colore capitis thoracisque ferrugineo,
tantum differt.

Var. c, aut toto corpore ferrugineo, aut palli-
de testaceo, diversa.

Obs. Anobium micans Parzeii. elytris in pi-
cta punctato-striatis, huic speciei aptius allegatur.

4. C. festivus: fusco-testaceus, angustior,
pube brevissima, rigida adspersus, anten-
nis pedibusque testaceis, thorace antice
truncato, lateribus tenue marginato, ely-
tris creberrime subtiliter vage punctulatis.

Anobium festivum. Panz. fn. 6 f. 7.

Habitat in fungis arboreis rarius.

Descr. Praecedente adhuc minor, praesertim an-
gustior, thorace antice truncato, elytris vage pun-
ctulatis, distinctus. Caput transversum, minus quam

in prioribus deflexum, fusco-testaceum, subtilissime punctulatum, margine antice reflexo; oculi globosi, nigro-brunnei. Antennæ thorace paullo breviores, pallide testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax longitudine parum latior, antice oblique truncatus, angulis non productis, lateribus & angulis posticis exacte rotundatus, tenue marginatus, basi truncatus, anguste marginatus, supra modice convexus, æqualis, fusco-testaceus, subtilissime crebre punctulatus, pilis brevissimis, rigidis, nitidis adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, concolor. Elytra latitudine medii thoracis, & illo fere triplo longiora, angusta, supra convexa, æqualia, fusco-testacea, undique creberriime subtiliter punctulata, pubesimili uti thorax adspersa. Corpus subtus fusco-testaceum, subtiliter punctulatum. Pedes pallide testacei, structura ut in prioribus.

Variat colore totius corporis pallidius ferrugineo.

5. C. nitidus: piceus, nitidus, glaber, antennis pedibusque testaceis, thorace æquali, antice sub-sinuato, lateribus & postice tenue marginato, elytris obsoletius vase punctatis.

Schönh. synon. 2. 106.

Anobium nitidum. Fabr. Eleut. 1. 324. 15.

Payk. fn. 1. 311. 10.

Var. b, pallidior, aut ferrugineus, elytris obscurioribus, aut castaneus vel rufo-ferrugineus totus, aut pallide testaceus.

Anobium nitidum. Panz. fn. 10. f. 9.

Habitat in fungis arboreis, & sub cortice arborum emortuarum, sat frequens.

Déscr. C. micante paulo minor, corpore glabro, &c a præcedentibus distinctus. Caput transversum, deflexum, piceum, nitidum, omnium subtilissime punctulatum, margine antico in masculis nonnihil reflexo, obsolete bidentato, in feminis sub-muticosis angustius, nonnihil productum, testaceum; oculi globosi nigri. Antennæ thorace breviores, structa ut in prioribus pallide testaceæ, clava interdum obscuriori. Thorax longitudine parum latior, antice leviter bisinuatus, lacinia media magna, rotunda, nonnihil productæ, mirime reflexa; lateribus & angulis posticis rotundatus, ibique & basi anguste marginatus, supra valde convexus, pulvinatus, piceus, nitidus, glaber. omnium subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, piceum, læve. Elytra thorace non latiora, sed illo plus duplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, picea, nitida, glabra, punctis majoribus quam in thorace, sed obsoletis, inæqualiter sparsis, impresa. Corpus subtus dilutius piceum, nitidum, subtilissime punctulatum. Pedes breves, validi, pallide ferruginei vel testacei.

Var. b. colore dilutiore tantum differt, ut in diagnosi dictum.

6. C. bidentatus: nigrō-piceus, sub-nitidus, fere glaber, valde convexus, anten-nis pedibusque ruso-testaceis, thorace bre-viori, antice profunde bisinuato, elytris que creberrime concinne punctatis.

Mas: Capitis thoracisque margine antico bidentato.

Ptis

Ptinus bidentatus. Marsh. Ent. Br. 1. 86. 17.

Femina: Capite thoraceque initicis.

Ptinus inermis. Marsh. Ent. Br. 1. 87. 18.

Var. b, corpore toto dilutiori, aut testaceo,
aut pallido.

Habitat in fungis arboreis perennantibus,
præsertim Alni, passim.

Descr. Medius, C. micante æqualis, fere glaber,
vel pube omnium minutissima, vix visibili, adspersus;
C. nitido multo magis convexus, thorace brevi, ante
ice profunde bisinuato, elytrisque concinne punctu-
latis, abunde distinctus. Caput maris, deflexum, pi-
ceum, fronte plana, vix punctulata, marginibus la-
teralibus elevatis, antice in medio cornubus duobus
erectis, acuminatis, armato; os ferrugineum, parum
productum. Antennæ thorace multo breviores, te-
stacea, structura ut in prioribus. Thorax longitu-
dine multo latior, antice profunde bisinuatus, angu-
lis lateralibus productis, lobo medio prominulo, su-
pra depresso, fere excavato, antice emarginato, cor-
niculis duobus porrectis, jam majoribus, acuminatis,
jam parvis, obtusis, armato; lateribus & angulis
posticis rotundatus, ibique & postice, anguste mar-
ginatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, ni-
gro piceus; parum nitidus, crebre & subtiliter con-
cinne punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum,
piceum, sublæve. Elytra latitudine thoracis, hu-
meris rotundatis, thorace plus duplo longiora, api-
ce acuminata, supra valde convexa, plerumque di-
litius picea, parum nitida, æqualia, crebre, concin-
ne punctulata. Alæ longæ, albidæ. Corpus subtus
dilute piceum, obsolete punctulatum. Pedes brevi-
taculi, testacei, subnitidi.

Femina simillima, sed capitis mārgō anticus reflexus, fere integer, & lobus anticus thoracis æqualis, non impressus, nec corniculatus.

Var. b, differt tantum colore pallidiori, ut in plerisque hujus generis speciebus.

Obs. Apate fronticornis Frölich, e Germania missus, nostro quidem similis, sed quadruplo minor, pilis rigidis albidis adspersus; thorace etiam maris, antice integrō, mutico, adeoque abunde diversus.

7. C. perforatus: brevior, convexus, nigro-piceus, longius pubescens, ore, antennis pedibusque testaceis, thorace antice oblique truncato, elytris profunde vague punctatis.

Habitat in fungis arboreis rarius; in Silva Kinnensi Westrogothiae lectus.

Descr. Magnitudo & statura convexa præcedentis, paullo tamen brevior videtur. Caput deflexum, piceum, fronte depressa, subtilissime punctata, marginibus parum reflexis; os productum, ferrugineum, mandibulis piceis. Antennæ thorace breviores testaceæ, structura ut in prioribus. Thorax longitudine latior, antice oblique truncatus, lateribus & angulis posticis rotundatus, ibique & postice angustissime marginatus, supra valde convexus, subpulvinatus, nigro-piceus, crebre, subtiliter & obsoletius punctatus, pube tenui, erecta, cinerascente adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum, lœve. Elytra latitudine thoracis, & illo plus duplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, plurimqne dilutius rufo picea, subnitida, punctis magnis,

nis, profunde impressis, vagis, minus crebris, undique adspersa, & pube simili uti thorax vestita. Corpus subtus piceum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, validi, saturate ruso-ferruginei, tibiis apice dilatatis.

g. *C. Alni*: longior, minus convexus, nigro-piceus, pube brevissima, nitente adspersus, ore, antennis pedibusque testaceis, thoracis lateribus latius marginatis, elytris crebre, vage punctulatis.

Habitat in fungis arboreis, praesertim *Alni*, passim.

Descr. Proxime precedentibus longior, angustior & multo minus convexus, thoracis margine laterali latiori, &c. præterea distinctus. Caput deflexum, piceum, fronte sub-convexa, crebre subtiliter punctulata, supra os transversim impressa, marginibus lateralibus parum reflexis; oculi prominuli nigro-brunnei; os productum, pallide testaceum. Antennæ thorace paullo breviores, basi pallide testaceæ, clava obscuriori, structura ut in prioribus. Thorax longitudine paullo latior, antice subsinuatus, angulis nonnihil prominulis, lateribus rotundatus, marginibus latioribus, reflexis; basi truncatus, anguste marginatus, supra minus convexus, crebre subtiliter punctulatus, piceus, margine antico, saepe in medio latius, pallide testaceo. Scutellum parvum, rotundatum, fusco testaceum. Elytra latitudine thoracis, sed ito triplo longiora, supra modice convexa, fusco-picea, crebre subtiliter & creberrime punctulata, pilis brevissimis, depresso-micantibus, uti thorax adpersa. Corpus subrus piceum, sub nitidum, obsoletum punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei.

Var.

Var. b, colore pallidiori tantum differt.

Obs. Nitidula dubia, Ins. Sv. 1, 243. 33. huie generi quodammodo propinqua, sed antennarum strutura alia, &c.

MYCETOPHAGUS.

Palpi quatuor inaequales, articulo ultimo paulo crassiori, sub-truncato. Maxilla bifida. Ligula rotundata, integra. Antennæ vix thorace longiores, extrorsum crassiores. Corpus ovatum, minus convexum. Thorax postice latior. Tarsi filiformes, simplices.

Sect. I. *Antennis extrorsum sensim crassioribus.*

I. *M. 4-maculatus: ferrugineus, antennarum medio, thorace elytrisque nigris, his striato-punctatis, singulo maculis duabus flavescenti-ferrugineis.*

Fabr. Eleut. 2. 565. 2. Hellwig. Schneid. Mag. 4. 396. 1. Payk. fn. 3. 315. 1. Latr. Gen. Ins. 3. 9. 1. Panz. fn. 12. f. 9.

Carabus 4-pustulatus. Linn. Syst. 2. 672. 34. Fn. Sv. 811.

Chrysomela 4-pustulata. Linn. Syst. 2. 597. 80. Fn. Sv. 549.

Boletaria 4-pustulata. Marsh. Ent. Br. 1. 138. 1.

Var. b, Elytris saturatius nigris, macula tantum baseos ferruginea.

Habitat in fungis arboreis, præsertim Quercinis, passim; var b, rarius occurrit.

Descr. Major reliquis nostris hujus generis, Derm. pellione latior. Caput parvum, triangulare, ferrugineum, crebre punctatum, inter antennas striga profunda impressum; oculi globosi, nigro-brunnei. Antennæ vix thorace longiores, inferne ferrugineæ, articulis 6. 10 nigris, sensim crassioribus, truncatis, ultimo longiori, acuminato, pallide testaceo. Thorax transversus, antice multo angustior, late sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, postice bi-sinuatus, angulis productis, acuminatis; undique anguste marginatus, supra convexus, niger, pubescens, creberrime punctatus, & versus basin utrinque foveola rotundata; profunda, impressus. Scutellum mediocre, rotundatum, nigrum, punctatum. Elytra latitudine baseos thoracis, eique arcte applicata, thorace quadruplo longiora, apice rotundata; supra parum convexa, nigra, vel nigro picea, pubescens, crebre, sed leviter & obsoletius punctato-vel potius crenato striata, intersticiis subrugosis; in singulo maculae duæ flavo-ferrugineæ, quarum una baseos, magna, inæqualis, altera pone medium, sublunata, sinu apicem elytrorum respiciente. Corpus totum subtus ferrugineum, creberrime, subtiliter & obsolete punctulatum, tenue pubescens. Pedes longisculi, tenues, pallidius testacei.

Var. b, in omnibus simillima, modo elytra saturatius nigra, magis nitida, macula posteriori pallida omnino deficiente,

a. *M. atomarius*: fusco-ferrugineus, supra niger, elytris macula humerali, fascia postica

stica arcuata, punctisque disci testaceis,
antennarum articulo ultimo brevi ovato.

*Fabr. Eleut. 2. 563. 14. Hellwig. Schneid. Mag.
4. 399. 3. Payk. fn. 3. 317. 3. Panz. fn. 12. f. 10.*

Dermestes atomarius. Thunb. Ins. Sv. 6. 78.

Boletaria atomaria. Marsh. Ent. Br. 1. 141. 7.

Var. b, Elytris fusco-ferrugineis vel brun-
neis, signaturis pallidis.

Habitat in Fungis arboreis, non infrequens.

Descr. Statura præcedentis, sed dimidio minor
& ultra. Caput parvum, triangulare, fusco-piceum,
punctatum, ore testaceo, striga impressa a fronte di-
stincto; oculi globosi, nigro brunnei. Antennæ lon-
gitudine thoracis, crassiusculæ, extrorsum sensim
erassiores, inferne fusco-ferrugineæ, articulis 6. 10
nigrioribus, ultimo ovato, brevi, pallide testaceo.
Thorax brevis, transversus, antice angustior, trun-
catus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi
bi-sinuatus, supra convexus, niger, vel nigro-piceus,
tenue pubescens, crebre punctatus; versus basin u-
trinque foveola profunde impressa, & præterea im-
pressionses tres obsoletæ, una in medio baseos, duæ
in disco. Scutellum orbiculatum, nigrum, puncta-
tum, pubescens. Elytra latitudine thoracis & illo
quadruplo longiora, supra parum convexa, nigra,
evidenter punctato-striata, tenue pubescentia; in ictio
humero macula magna sub-quadrata, testacea; paul-
lo inferius versus suturam alit parva, rotundata,
tum puncta 3. 4 aut 5 sparsa, in disco; dein fascia
transversa, arcuata, abbreviata, & demum intra api-
œm macula rotundata, omnes testaceæ aut ferru-
gineæ. Corpus subtus fusco-ferrugineum, creberri-
me subtilissime punctulatum, pubescens, ventre ple-

rumque dilutiori. Pedes tenues, fusco-ferruginei, interdum dilutius testacei.

Var. b, differt tantum colore dilutiori; thoracis latera plerumque ferruginea; elytra brunnea vel fuso ferruginea, signaturis pallidis; pedes testacei,

3. *M. variabilis*: piceo-ferrugineus, elytris nigro-piceis, basi maculisque ferrugineis, antennarum articulo ultimo longiori, pallido.

Hellwig. Schneid. Mag. 4. 397. 2.

a. Elytris fascia lata baseos, alia parva, abbreviata simplici, lunata, pone medium, punctoque intra apicem, testaceis. *Hellwig. l. c. var. d, e.*

Mycetophagus piceus. Fabr. Eleut. 2. 569. 22.

Panz. fn. 1. f. 22.

Boletaria varia. Marsh. Ent. br. 1. 140. 5.

Var. b, puncto insuper parvo, pallido, in medio marginis elytrorum, inter fascias.

Hellw. l. c. var. e.

Mycetophagus piceus. Payk. fn. 3. 318. 4. ditto var. Panz. fn. 2. f. 5.

Var. e, ut var. b, sed thorax dilutius ferrugineus.

Mycetophagus lunaris. Fabr. Eleut. 2. 568. 19.

Var. d, ut b, c, sed etiam elytra ferruginea, maculis punctisque pallidioribus.

Myce-

Mycetophagus brunneus. Panz. fn. 57. f. 21.
Ilig. Mag. s. 245. 22.

Var. *e*, ut var. *b*, *c*, sed fascia posterior elytrorum flexuoso-undata.

Boletaria undulata. Marsh. Ent. br. I. 140. 6.

Var. *f*, fascia baseos elytrorum interne abrupta, posteriori fascia aut lunata, aut flexuosa.

Mycetoph. atomarius. Payk. fn. 3. 318. 3. var. *b*.

Var. *g*, minor, nigrior, fasciis omnino ut in var. *f*.

Var. *h*, elytris nigris, macula majori humerali, puncto marginali medio, punctis tribus loco fasciae posterioris, maculaque intra apicem, testaceis. Hellwig. loc. cit. f. var.

Habitat in fungis arboreis, præsertim Quercus, Alni, paßim.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, articulo antennarum ultimo majori, & signaturis elytrorum præcipue distinctus. Caput, oculi, os ut in præcedenti omnino. Antennæ longitudine thoracis, crassiusculæ, extrotsum sensim erasiores, ferrugineæ, ante apicem plerumque obscures, articulo ultimo oblongo-ovato, pallido, multo majori quam in præcedenti. Thorax & scutellum ut in priori omnino. Elytrorum forma eadem, nigro-picea, tenui pubescens tubiliter punctato-striata; in ipsa basi fascia lata ferruginea, postice finuta, versus futuram magis producta, includens maculam sub-quadratam, nigram, scutellum ambientem;

pone medium fascia abbreviata, simplex, aut subrecta, aut lunata; & intra apicem macula, aut major, aut parva, punctiformis, omnes ferrugineæ vel testaceæ. Corpus subtus ferrugineum, subtilissime punctulatum, pubescens. Pedes tenues, ferruginei, interdum pallidius testacei.

Varietates b, c, d, simillimæ, differunt modo notis in illarum diagnosi indicatis.

In var. e, fascia posterior elytrorum flexuosa, antrorsum angulum emittens.

In var. f, fascia baseos interne abrupta, e maculis duabus constans, humerali majori, subquadra- ta, altera versus suturam, paullo inferior, rotunda- ta, aut libera, aut priori connexa; fascia posterior aut simplex ut in a, b, c; aut flexuosa ut in e.

Var. g, minor, saturatius nigra, antennis nigri- oribus, basi & atticulo ultimo pallidioribus, fasciis elytrorum ut in var. f.

Var. h, quoad signaturas magis diversa, ut in diagnosi; cæterum varietatibus a-f, simillima.

4. M. Populi: rufo-testaceus, sub-pubescent, thorace vix punctulato, elytris pallidioribus, subtiliter punctato-striatis, fascia media apiceque late fuscis.

Fabr. Eleut. a. 570. 26. Payk. fn. 3. 319. 5.

Habitat in fungis arboreis, præcipue in truncis emortuis Populi tremulæ, rarius.

Descr. Statura præcedentis, & præsertim ejus var. d, similis, sed paullo minor; thorace vix punctulato, elytris multo subtilius punctato-striatis, ali- ter coloratis, distinctus. Caput subtriangulare, rufo- testaceum, subtilissime, ut vix visibiliter, creberrime punctulatum, tenui pallido-pubescent, striga trans- versæ,

versa, profunda, inter antennas impressam; oculi glebosi, nigro-brunnei. Antennæ thorace parum longiores, ferrugineæ, extrorsum sensim crassiores, articulo ultimo longiori, ovato. Thorax brevissimus, transversas, antice late, sed non profunde emarginatus, margine ipso emarginaturæ fuscescente; latetibis parum rotundatus, tenue marginatus, basi sub-truncatus vel vix sinuatus, supra parum convexus, rufo-testaceus, tenue pubescens, vix, vel omnium subtilissime punctulatus; intra basin utrinque veola impressa, punctiformis, multo minor quam in prioribus. Scutellum rotundatum, rufo-testaceum, subtilissime punctulatum. Elytra thoracis latitudine, sed quadruplo longiora & ultra, supra parum convexa, pallidius testacea, subtiliter punctato-striata, tenue pubescentia; in medio fascia fusca, extrorsum latior, & ad suturam etiam dilatata, pone quam fascia obliqua, abbreviata, pallida. & dein apex late fuscus, cum puncto pallido, obsoleto, in singulo; fuscedo apicis plerumque ad suturam cum fascia media confluit, & interdum sutura ante fasciam, ut & regio scutelli paullo obscuriora. Corpus subtus rufo-testaceum, tenue pubescens, vix punctulatum, Pedes tenues, rufo-testacei, interdum pallidiores.

5. *M. multi-punctatus*: oblongus, ferrugineo-piceus, sub-pubescent, antennis pedibusque dilutioribus, thorace punctato, elytris punctato-striatis, maculis punctisque plurimis testaceis.

Var. *b*, pallidior, elytrorum maculis ita dilatatis, ut interstitia obscura lineolas irregulares, anastomozantes tantum formant.

*Fabr. Eleut. 2. 568. 16. Hellwig, Schneid. Mag.
4. 399. 4. Payk. fn. 3. 320. 7. Panz.
fn. 12. f. 11.*

*Dermestes multi-punctatus. Thunb. Int. Sv. 6.
79.*

*Boletaria multipunctata. Marsh. Ent. br. I.
139. 3.*

Var. c, testacea, elytris dilutioribus, maculis punctisque pallidis obsoletis.

Habitat in fungis arboreis, praesertim Alni, sat frequens.

Deser. Praecedentibus paullo longior & langui-
stior. Caput triangulare, rufo-piceum, crebre, evi-
denter punctatum, tenue pubescens, ore dilutiori,
striga transversa, impressa a fronte distincto; oculi
majusculi, globosi, nigri. Antennæ thorace multo
longiores, extrorum sensim crassiores, obscure fer-
ruginæ, articulo ultimo breviter ovato. Thorax
brevis, transversus, antice angustior, truncatus, la-
teribus rotundatus, evidenter marginatus, basi bi-
nuatus, supra modice convexus, rufo-piceus
vel brunneus, crebre & sat profunde punctatus, te-
nue pubescens, intra basin utrinque foveola majori
impressus. Scutellum rotundatum, dilutius rufo-pi-
ceum, punctatum, pubescens. Elytra thoracis lati-
tudine, sed quintuplo longiora, supra modice con-
vexa, jam dilutius, jam saturatius rufo-picea, sat pro-
funde punctato striata, interstitiis sub-rugosis; macu-
lis punctisque plurimis testaceis variegata, quarum
una in humero, major, sub-quadrata, alia rotunda,
paullo inferius juxta suturam, tum 10 aut 12 in di-
scio, aut minores discretæ, aut magis dilatatae &
confluentes, quarum ultimæ ante apicem interdum
fasciam

fasciam irregularem formant; juxta apicem in singulo elytro macula major, rotundata. Corpus subtiliter punctulatum. Pedes longiusculi, testacei, interdum pallidi.

Varietates b. & c, colore pallidiori tantum distinctæ, ut in diagnosi indicatum, forte recentius exclusæ, immaturæ.

6. *M. fulvicollis*: oblongus, niger, longius pubescens, thorace pedibusque rufis, elytris sub-depressis, punctato striatis, margine fasciisque duabus interruptis pallide testaceis.

Fabr. Eleut. 2. 569. 21. *Payk. fn.* 3 320. 6.

Panz. fn. 62. f. 4.

Habitat in Fungis arboreis, apud nos rarius; in Smolandia a Dom. *Westrin* lectus.

Descr. Magnitudo & statura oblonga præcedentis, sed paullo minus convexus, longius pubescens, quam cæteræ hujus generis Species. Caput triangulare, nigro-piceum, crebre punctatum, ore rufo, stria transversa, profunde a fronte distincta; oculi majusculi, globosi, nigro-brunnei. Antennæ thorace longiores, extrosum sensim crassiores, articulis 1-6 rufis, 7-10 nigris, undecimo breviter ovato, ferrugineo. Thorax transversus, antice sub-emarginatus, lateribus æqualiter rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-truncatus, supra parum convexus, sat profunde punctatus, pube longiori, præfertim versus margines, adspersus, totus supra & infra rufo-testaceus, Scutellum rotundatum. rufo-piceum, punctatum.

tum. Elytra thoracis medio non latiora, sed illo quadruplo longiora, supra parum convexa, nigra, sat profunde punctato-striata, pube longiori, suberecta, fuscescente adsparsa, margine laterali & apicis inæqualiter pallide testaceo; in singulo elytro præterea maculæ duæ lunatæ, cum margine connexæ & ejusdem coloris, altera pone humerum, suturam non attingens, altera pone medium, cum opposita fere connexa, unde fasciæ duæ transversales, sub-interruptæ exstant. Pectus piceum, profundius punctatum; venter ferrugineus, pubescens, vix punctulatus. Pedes longiusculi, pallidius rufo-testacei.

Sect. 2:da, Antennarum articulis
ultimis determinate majoribus.

7. *M. bi-fasciatus*: niger, pubescens, antennarum basi pedibusque ferrugineis, elytris vase punctatis, fasciis duabus apiceque pallide testaceis.

Latreille Gen. Ins. 3. 10. 2.

Cryptophagus bifasciatus. *Herbst. col.* 4. 175.
4. tab. 42. f. 12. *Payk. fn.* 3. 353. 2.

Ips bi-fasciata. *Fabr. Eleut.* 2. 579. 14.

Mycetophagus signatus. *Panz. fn.* 57. f. 29.
Crit. Rev. 1. 135.

Dermestes fasciatus. *Thunb. Act. Ups.* 4. 5. 7.

Var. b, pallidior, elytrorum fasciis latioribus, confluentibus.

Ips marginalis. *Panz. fn.* 2. f. 24, *Crit. Rev.* 1. 135.

Habi-

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
præsestim Betulæ, Alni, Quercus, non
intrequens.

Descr. Parvus, Cryptophago cellari vix major,
statura & signaturis præcedentibus non dissimilis.
Caput subtriangulare nigrum, opacum, crebre subti-
liter punctulatum, ore rufo piceo, stria transversa,
arcuata, inter antennas a fronte distincto; oculi glo-
bosci nigro brunnei. Antennæ vix longitudine thora-
cis, sub pilosæ, articulis 1-6, angustioribus, ferru-
gineis; 7-8 paullo crassioribus, sed brevibus, trun-
catis, nigris; 9, 10 adhuc multo crassioribus, etiam
brevibus, truncatis, nigris; ultimo oxato, apice te-
staceo. Thorax transversus, antice angustior, vix e-
marginatus, lateribus rotundatus, immarginatus, basi
sub sinuatus, angulis retrorsum productis; supra con-
vexus, niger, crebre subtiliter rugoso-punctatus, te-
nue pubescens, angulis posticis & margine laterali
ultra medium, anterius angustato, pallido-pelluci-
dis. Scutellum rotundatum, nigrum, crebre pun-
ctulatum. Elytra latitudine baseos thoracis, & illo
plus triplo longiora, supra parum convexa, nigra,
subnitida, creberrime, subtiliter, vase, rugoso-pun-
ctata, pube tenui, depressa adspersa; margo exterior
& apex elytrorum plerumque testacea; intra hume-
rum macula major, anterior, sub quadrangula, testa-
cea, cui utrinque adjacet alia inferior, parva, ejus-
dem coloris, quæ sœpe confluant, & fasciam irreg-
ularem, arcuatam constituant; paullo pone medium
macula transversa, arcuata, interne latior, sinu po-
steriora spectans, & intra apicem litura obsoletior,
communis, omnes aut testacea, aut pallidæ. Cor-
pus subtus piceum, sub nitidum, subtiliter punctula-
tum, tenue pubescens. Pedes tenues, ferruginei,
tarsis elongatis, tenuibus, articulis 1:0 & 4:0 inter-
mediis multo longioribus;

Var b

Var. b, simillima, modo pallidior, forte immatura; thorax & elytra fusco testacea vel dilute brunnea, signaturis albido·flavescens.

8. *M. punctatus*: pilosus, ferrugineus, elytris crebre, vage punctatis, fusco-casta-neis, basi punctoque intra apicem ferrugineis.

Hellwig. *Schneid. Mag.* 4. 401. 8. *Panz. fn.* 12. f. 12. *Crit. Rev.* 1. 135.

Ips punctata. *Fabr. Eleut.* 2. 579. 13.

Cryptophagus punctatus. *Payk. fn.* 3. 352. 2.

Cryptophagus pilosus. *Herbst. col.* 4. 177. 7.
tab. 42. f. 15.

Silpha humeralis. *Marsh. Ent. Br.* 1. 123. 22.

Habitat in Fungis arboreis, praesertim Fagi,
in Svecia meridionali, rarius.

Descr. Minoribus M. variabilis individuis æqualis, sed magis convexus, pube longiori, sub-erecta, cinerea, undique adspersus. Caput sub-triangulare, obscure ferrugineum, crebre & profunde punctatum, supra os striga transversa, arcuata, impressum; oculi globosi nigro-brunnei. Antennæ vix thorace longiores, ferrugineæ, pilosæ; articulis tribus ultimis determinate majoribus, ut in priori. Thorax transversus, antice angustior, sub-emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, margine subtiliter crenulato; basi fere trisinuatus, supra convexus, totus saturate ferrugineus, crebre, profunde punctatus, pubescens. Scutellum fere transversum, truncatum, ferrugineum pubescens, Elytra latitudine baseos

baseos thoracis, sed illo quadruplo longiora, & ultra, apice rotundata. supra convexa, crebre & sat profunde, vase punctata, aut nigro castanea, subnitida, aut dilutius fusco-brunnea, basi transversim inæqualiter ferruginea, & intra apicem punctum vel macula parva, ovata, ejusdem coloris, quæ tamen saepe vaide obsoleta. Corpus subtus ferrugineum, pubescens, pectori obscuriori, fortius punctato, ventre subtilius punctulato. Pedes mediocre, pallide ferruginei, pubescentes, tarsis ut in praecedenti.

Obs. Cryptophagis in multis similis & affinis, sed tarsi in utroque Sexu 4-articulati, quantum mihi videre licuit.

9. *M. fumatus: ferrugineus, pallido-pubescentis, oculis nigris, elytris subtiliter striato-punctatis, intersticiis rugulosis.*

Dermestes fumatus. Linn. *syst.* 2. 564. 22. teste Dom. Kirby, secundum Museum Cl. a Linne. id. Marsh. *Eut. Br.* 1. 65. II. Schönh. *synon.* 2. 94. 45.

Dermestes stercoreus. Linn. *Fn. Sv.* 432.

Cryptophagus variabilis. Payk. *fn.* 3. 354. 3. Müller in Illig. *Mag.* 4. 207. ♂ 216.

Dermestes variabilis. Herbst. *col.* 4. 141. 22. tab. 41. f. 5?

Habitat in quisquiliis, ad domos; etiam in fungis, floribus, sat. frequens.

Descr. Statura fere praecedentis, sed longe minor, *Cryptophago Lycopteroi* æqualis. Caput subtriangulare, ferrugineum, crebre subtiliter punctulatum,

tum, supra os friga arcuata, transversa, impressum; oculi globosi, nigri. Antennae vix thorace longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, pubescentes, articulo primo crasso, cylindrico; 2:0 etiam crassiusculo, obconico; 3-8 brevioribus, truncatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; 9, 10 magnis, truncatis; ultimo etiam magno, ovato. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, sub-bisinuatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi etiam sub-sinuatus, supra modice convexus, totus ferrugineus, crebre subtiliter punctulatus, longius pallido-pubescens; juxta basin utrinque foveola parva, obsoleta impressus. Scutellum breve, transversum, ferrugineum, punctulatum. Elytra latitudine baseos thoracis, sed illo fere quintuplo longiora, supra minus convexa, ferruginea, longius pallido-pubescentia, punctis parvis, seriatis, obsolete striata, intersticiis crebre, subtiliter transversim rugulosis. Corpus subtus dilutius ferrugineum, subtilissime punctulatum, tenue pubescens. Pedes mediocres, pallide ferruginei.

Obs. Etiam hæc Species *Cryptophagis* valde affinis, sed tarsi semper 4-articulati, quantum mihi videre licuit, & Dom. Müller loc. cit. p. 216, etiam confirmat; *Dermestes variabilis*, Fabr. Eleut. I. 319, 38. ad *Cis Boleti* var. b, pertinet; *Synonymon Herbstii* minus certum.

10. *M. testaceus*: ovatus, convexus, rufo-testaceus, oculis nigris, elytris subtiliter vage punctulatis, antennarum articulis quinque ultimis determinate majoribus.

Fabr. Eleut. 2. 570. 28. Hellwig. Schneid.
Mag. 4. 400. 7. Müller in Illig. Mag.
4. 207.

Diaperis, an? Illig. Mag. 5. 245. 28.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
præsertim Quercus; in Westrogothia ra-
rius lectus.

Descr. Minimus hujus generis, *Cryptophago*
Abietis æqualis. Caput subtriangulare, ferrugineum, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas
sat profunde transversim impressa; oculi globosi, nigri. Antennæ vix thorace longiores, testacea, articulo primo majori, cylindrico; secundo minori;
3 d, parvis, brevibus, approximatis; 7 - 10, latis, brevibus, truncatis, persoliatis; ultimo æque lato, ovato. Thorax brevis, transversus, antice multo angustior, sub bisinuatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, bæsi etiam obsolete sinuatus, supra convexus, totus testaceus, crebre subtilissime punctulatus, pube tenuissima, depresso, pallida adspersus. Scutellum sub triangulare, testaceum, punctulatum. Elytra latitudine baseos thoracis, & illo quadruplo longiora, supra convexa, tota testacea, undique creberrime & subtilissime vase punctulata, pube simili uti thorax adspersa. Corpus subitus pallidus testaceum, omnium subtilissime punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, tarsis, saltem posticis, certe 4-articulatis.

Obs. Oculatissimus Dom. Müller, loc. cit. tar-
sos anteriores 5-articulatos esse contendit, unde ad
Sectionem præcedentem pertineret. hoc Insectum;
sed vix apta Generibus Hypophloeo aut Diaperidi
associari queat.

N.E.

NEMOZOMA. Latreille.

Palpi juba-æquales, filiformes, articulo ultimo longo. sub-cylindrico. Mandibulæ validæ, porrectæ, elongatæ, sub-dentatæ. Maxillæ elongatæ, simplices, membranaceæ. Ligula brevis, membranacea, sub-quadrata, acute emarginata. Antennæ capite parum longiores, clava triarticulata. Corpus linearis-elongatum; cylindricum. Caput magnum, elongatum, thorace latius.

i. *N. elongatum*: glabrum, nigrum, nitidum, antennis pedibusque rufis, elytris vase punctatis, basi maculaque intra apicem testaceis, fronte profunde sulcata.

| Latreille Gen. Ins. 3. 13. 1. tab. II. f. 4.

Dermestes elongatus. Linn. Syst. 2. 561. 2. Fn. Sv. 409.

Colydium fasciatum. Herbst. col. 7. 281. 2. tab. 112. f. 12. Panz. fn. 31. f. 22. Crit. Rev. 1. 134.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, apud nos rarissime; Upsaliæ, Dom. Uddman; in Pino Sylvestri Bahusiae, Ipse.

Descr. Corpus parvum, lineare, valde angustum, Lycto bipustulato Fabr. paullo longius, sed angustius. Caput magnum, crassum, elongatum, porrectum, nigrum, nitidum, convexum, sat profunde sed minus crebre punctatum, fronte antica fulco profundo longitudinali exarata, fere fissa; os piceum; oculi parvi, laterales, depresso, nigri. Antennæ capite

capite parum longiores, ferrugineæ, articulis decem, primo crasso, ovato; secundo multo minori, brevi; 3-7 brevissimis, coarctatis, exterioribus sèpsum crassioribus; 8, 9, magnis, truncatis, perfoliatis, ultimo æque crasso, ovato. Thorax vix capite longior, basi apiceque truncatus, antice latitudine capitis, posterius angustior, lateribus & basi anguste marginatus, supra modice convexus, niger, nitidus, evidenter, sed minus crebre punctatus. Scutellum minutum, rotundatum, rufo-piceum. Elytra a thorace spatio remota, illius basi latiora, & illo plus triplo longiora, linearis cylindrica, convexa, vage punctata, antice fere ad tertiam partem rufo-testacea, dein nigra, nitida, cum macula ovata testacea intra apicem, in singulo elytro. Corpus subtus nigrum, nitidum, parce punctatum. Pedes breviusculi, validi, rufo-testacei.

C O L Y D I U M.

Palpi inæquales, articulo ultimo crassiori, ovato, vel sub-cylindrico. Ligula membranacea, emarginata. Labrum brevissimum, exsertum, transversum, integrum. Antennæ capite parum longiores, articulis duobus baseos majoribus; 3-8, parvis, brevissimis, coarctatis; 9, 10, latis, truncatis, ultimo etiam magno, ovato. Corpus linearis elongatum. Caput thorace brevius, antice obtusum.

I. C. elongatum: nigrum, nitidum, antennis pedibusque ferrugineis, thorace tricusato, elytro singulo costis quatuor elevatis, interstitiis duplice serie punctulatis.

Fabr. Eleut. 2. 556. 5. Latr. Gen. Inf. 3. 21.

1. Herbst. col. 7. 279. 1. tab. 112. f. 11. Payk.

fn. 3. 312. 1. Panz. fn. 3. f. 17.

Ips linearis. Oliv. Ent. 2. 18. 5. 3. pl. 2. f. 17. a, b. Ross. Fn. Etr. 1. 50. 123. tab. 2. f. 45.

Tritoma Sulcata. Thunb. Mus. Ups. 3. 39.

Var. b, Elytris basi rufo-ferrugineis. Payk.
1. c. var. b. Kugell. Schneid. Mag. 4. 495. 1.

Colydium filiforme. Fabr. Eleut. 2. 556. 7.
Panz. fn. 104. f. 10.

Habitat in truncis arborum emortuarum,
præsertim Quereus, Alni, Abietis, intra
lignum, paßim.

Descr. Corpus lineare, valde angustum; ma-
gnitudo variat; majores longitudinem Hypophloei
castanei attingunt, alii longe minores, & semper
illo angustiores. Caput porrectum, sub-quadratum,
parum convexum, subtiliter, obsolete punctulatum,
nigrum, nitidum; versus os rufo-ferrugineum; su-
pra basin antennarum lineola obliqua, impressa u-
trinque; oculi laterales, nigri. Antennæ capite pa-
rum longiores, obscure ferrugineæ, apice dilutio-
res. Thorax latitudine baseos duplo longior, ante-
rius paullo latior, basi apiceque truncatus, lateribus
& basi marginatus. supra modice convexus; niger,
nitidus, parce & obsoletius punctulatus; canalicula
media profundiori. & alias utrinque tenui, margini
parallelæ, exaratus. Scutellum brevissimum, trans-
versum, elevatum, nigrum. Etyra thoracis basi pa-
rum latiora, & illo duplo longiora, apice obtuse
rotundata, supra convexa, nigra vel nigro picea, ni-
tida;

tida; in singulo lineaæ vel costæ quatuor longitudinales elevatæ, pæter costam lateralem & suturam, & in singulo interstitio series duæ e punctis parvis, impressis. Corpus subtus dilutius piceum, subnitidum, vix visibiliter punctulatum. Pedes breviusculi, tufo ferraginei.

Var. b, differt tantum elytris antice rufo-ferrugineis, sœpe ad tertiam partem totius longitudinis.

S I L V A N U S. Latreille.

Palpi brevissimi, inæquales, articulo ultimo majori, subcylindrico. Ligula coriacea, transverso quadrata, integra. Antennæ thorace paullo longiores, nude insertæ, articulis non distinctis, ultimis tribus multo majoribus, clavam constituentibus. Corpus elongatum, angustum, sub-lineare, depresso. Caput anterius angustatum, sub-triangulare. Tarsi omnes 4-articulati.

S. unidentatus: testaceo-ferrugineus, punctulatus, oculis nigris, thorace elongato, postice angustato, angulis anticus acuminato-productis, elytris punctato-striatis.

Latr. Gen. Ins. 3. 20. I. tab. II. f. 2.

Dermestes unidentatus. Fabr. Eleut. I. 317. 27.
Panz. fn. 3. f. 6.

Colydium unidentatum. Payk. fn. 3. 314. 9.

Colydium planum. Herbst. col. 7. 285. 7. tab. 113. f. 3.

Lyctus unidentatus. Kugell. Schneid. Mag. 5.
566. 9. Müller Illig. Mag. 4. 204.

Ips unidentata. Oliv. Ent. 2. 18 9. 12. pl. 1.
f. 4 a, b.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
passim.

Descr. Parvus, tenuis, Lycto bipustulato minor. Caput majuscum, porrectum, sub-triangulare, convexum, crebre subtiliter punctulatum, oculis nigris, modice prominulis. Antennæ longitudine thoracis, crassiusculæ, ferrugineæ, articulo primo magnò, clavato; 2, 3, minoribus, ob conicis; 4-8 brevibus, nodosis; 9, 10, crassis, truncatis, perfoliatis, ultimo æque crasso, rotundato, pallidiore. Thorax elongatus, antice multo latior, sub-bisinuatus, angulis prominulis, acuminatis, lateribus immarginatus, basi rotundatus; supra dorso planus, hinc iude obsoletissime impressus, totus ferrugineo-testaceus, subtilissime crebre punctulatus. Scutellum parvum, transversum, ferrugineum. Elytra à thorace spatio remota; illius basi dimidio fere latiora, & illo plus duplo longiora, linearia, apice rotundata, supra subdepressa, tota testaceo-ferruginea, subtiliter, crebre punctato-striata, pilis minutissimis parce adspersa. Alæ amplæ, niveæ. Corpus subtus ferrugineum, subtilissime punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei, femoribus validis.

Obs. Dermestes bidentatus, Fabr. Panz. huic proximus, sed major; thorace antice magis dilatato, dorso evidenter sulcato, distinctus; apud nos, quantum mihi innotuit, non lectus.

s. S. 6-dentatus: fusco-testaceus, pubescens, thorace sulcato, utrinque sex-dentato, elytris

elytris punctato-striatis, interstitiis alternis elevationibus.

Dermestes 6-dentatus. Fabr. Eleut. 1. 317. 25.
Panz. fn. 14. f. 11.

Colydium 6-dentatum. Payk. fn. 3. 313. 2.

Colydium frumentarium. Fabr. Eleut. 2. 557.
ii. Herbst. col. 7. 283. 4. tab. 113. f. 1. a.

Ips frumentaria. Oliv. Ent. 2. 18. 10. 14. pl.
2. f. 13. a, b.

Dermestes Surinamenis. Linn. syst. 2. 565. 29.

Tenebrio Surinamenis. De Géer Ins. 5. 54. 5.
tab. 13 f. 12.

Lyctus 6-dentatus. Kugell. Schneid. Mag. 5.
566. 10.

Habitat in Mercatorum tabernis, praesertim
inter grana Oryzæ.

Descr. Statura parva, angusta praecedentis, sed paullo magis convexus. Caput magnum, porrectum, fusco-testaceum, anterius minus angustatum, supra fere planum, creberrime subtiliter punctulatum; oculi globosi nigri. Antennæ longitudine thoracis, crassiusculæ, fusco-testaceæ, structura fere ut in praecedenti. Thorax oblongus, antice sub bisquatus, lateribus dentibus sex validis, sub-aequalibus, utrinque armatus, postice paullo angustior, rotundatus; in dorso lineæ tres elevatae longitudinales, quarum media recta, laterales nonnihil arcuatæ, unde exstant in dorso sulci duo lati, paralleli, parum profundi; totus præterea fusco-testaceus, creberrime punctulatus, pube brevi, depresso, grisea adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, fuscum, Ely-

tra a thorace remota, illius basi fere dimidio latiora, & illo plus duplo longiora; apice rotundata, supra modice convexa, fusco testacea, pube densiori, depressa, cinerea adsparsa, sat profunde punctatostriata, intersticiis alternis elevationibus, densius pubescentibus. Corpus subitus fusco testaceum, crebse subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, dilutius testacei, femoribus validis.

LYCTUS.

Palpi breves, filiformes, articulo ultimo acuminato. Mandibulæ exsertæ, apice bifidæ. Antennæ longitudine fere thoracis, articulis II distinctis, ultimis duobus multo majoribus. Corpus elongatum. Caput prominulum, anterius angustatum. Thorax sub-quadratus, postice elytris angustior.

I. *L. canaliculatus*: fusco-brunneus, opacus, pubescens, thorace sub-quadrato, lateribus denticulato, dorso sovea oblonga impresso, elytris convexo-cylindricis, striatim pilosis.

Fabr. Eleut. 2. 562. 13. Payk. fn. 3. 332. 9.
Panz. fn. 4. f. 16.

Lyctus oblongus. Latr. Gen. Ins. 3. 16. 1.

Ips oblonga. Oliv. Ent. 2. 18. 7. 8. pl. 1. f. 5. a, b.

Bitoma unipunctata. Herbst. col. 5. 26. 1. tab. 46. f. 3. c.

Silpha fusca. Linn. syst. 2. 573. 28.

Synchita

Synehita canaliculata. Hellwig Schneid. Mag.

4. 405. 8.

Dermestes linearis. Thunb Att. Ups. 4. 4. 4.

Habitat in ligno secco Quercus, sat frequens.

Descr. Magnitudo valde variat; majores longitudinem Colvdii elongati attingunt, & illo paulo latiores; alii duplo, imo triplo minores, & ultra; color etiam variabilis, aut fuscus, aut brunneus, aut testaceus. Caput porrectum, breviter triangulare, fuscum, crebre rugoso punctatum, pubescens, oculis magnis, globosis, nigris; Palpi pallide testacei; mandibulæ validæ, parum arcuatæ. Antennæ longitudine fere thoracis, crassiusculæ, fusco-brunneæ, pilosæ, articulo primo crasso, cylindrico; secundo rotundato, crassiusculo; 3-9, nodosis, sub æqualibus; decimo magno, truncale; ultimo etiam magno, conico, plerumque pallidiori. Thorax sub-quadratus, antice paulo latior, rotundatus, lateribus obliquis, sub-rectis, anguste marginatis, subtiliter crenulatis; basi media truncatus, angulis oblique prominulis; supra modice convexus, fuscus, opacus, crebre rugoso-punctulatus, pube densa cinereo-flavescente, depressa, adspersus; in medio dorsi fovea lata, oblonga, impressa, neque basin nec apicem attingens. Scutellum parvum, rotundatum, fuscum, elevatum. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo fere quadruplo longiora, linearicylindrica, convexa, obsoletius striata, striis crebre, subtiliter punctatis, intersticiis siugulis serie e pilis depresso, cinereo-flavescientibus adspersis, unde cinereo-lineata apparent. Corpus subtus dilutius brunneo-testaceum, vix punctulatum, tenue pubescens. Pedes breviusculi, tenues, dilutius testacei, pubescentes.

2. *L. contractus*; ferrugineo-castaneus, glaber, thorace sub cordato, bi-foveolato, elytris depresso-depressis, punctato-striatis, sutura plerumque nigra.

Fabr. Eleut. 2. 563. 16. *Payk. fn.* 3. 333. 10.

Bitoma bi-punctata. *Herbst. col.* 5. 28. 3. *tab.* 46. *f. 5^e*

Synchita bi-punctata. *Hellwig. Schneid. Mag.* 4. 405. 9.

Tritoma colon. *Rhen in Schueid. Mag.* 2. 240. 7.

Var. *b*, corpore toto ferrugineo.

Ips. contracta. *Oliv. Ent.* 2. 18. 6. 5. *pl.* 2. *f. 10. a, b?*

Habitat sub cortice truncorum Pini, passim.

Descr. Praecedente paullo latior, magis depresso-depressus, cæterum simili modo magnitudine variat. Caput porrectum, castaneum, aut rufo-piceum, crebre & profunde rugoso-punctatum, versus os angustatum, oculis globosis, prominulis, nigris; mandibulæ arcuatae, apice evidenter bifidæ, laciniis sub-æqualibus, acutis. Antennæ thorace breviores, ferrugineæ, articulo primo crasso, sub-globoso, subtus inciso; secundo brevi, truncato; tertio longiori, ob-conico; 4-9 brevibus, truncatis, decimo magno, lato, perfoliato, truncato; ultimo paullo minori, lenticulari. Thorax latitudine antica paullo longior, antice subtruncatus, angulis deflexis, prominulis, lateribus ponere apicem dilatato-rotundatis, dein oblique versus basin directis, vix marginatis; basi multo angustior, truncatus, angulis oblique prominulis; supra parum convexus, fusco-castaneus, vel rufo-piceus, crebre &

& profunde punctatus; in dorso antico fovea magna, profunda, irregularis, & pone illam, versus basin, alia minor, rotundata. Scutellum mediocre, rotundatum, piceum. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo fere triplo longiora, basi inaequaliter emarginata, humeris arcuato-rotundatis, prominulis; versus medium laterale magis dilatata, apice sub acuminata, supra sub depressa, rufo-ferruginea, nitida, sutura late nigro picea; tenuē punctato striata, stria suturæ proxima, profundiori, reliquis per paria magis approximatis, interstitiis planis, lœvibus. Corpus subtus plerumque nigrum vel nigro-piceum, subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi validi, rufo-ferruginei, tarsis omnibus evidenter quadri-articulatis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis dilutius ferrugineo, sutura concolore.

3. L. nitidus: linearis-cylindricus, niger, glaber, nitidus, antennis, palpis pedibusque ferrugineis, elytris subtilissime punctato-striatis.

Fabr. Eleut. 2. 563. 15. Payk. fn. 3. 331. 8.
Panz. fn. 6. f. 18.

Ips cylindrica. Oliv. Ent. 2. 18. 9. 10. pl. 2.
f. 16.

Habitat sub cortice arborum emortuerum, apud nos rarissime; Dom. de Paykull, mihi non obvius, nec Insectum possideo, quare descriptionem Cl. Paykullii afferre licet.

Descr. Longitudo Lycti ferruginei Payk. (Rhyzophagus Herbst, Müller & nobis), sed angustior.
Caput

Caput parvum, porrectum, subtilissime punctatum, nigrum, antice rufescens, palpis pallide ferrugineis. Antennæ thorace breviores, ferrugineæ, 11 articulatæ, primo & ultimis duobus magnis. Thorax longitudine latior, convexo-cylindricus, posterius paullo angustior, niger, subtilissime punctulatus, tenue marginatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra thoracis latitudine, sed triplo longiora, nigra, convexo cylindrica, abdomen fœgenus, omnium subtilissime, ut vix visibiliter, punctato-striata. Pectus & abdomen nigro-picea, punctulata. Pedes ferruginei.

BITOMA.

Palpi breves, filiformes, articulo ultimo cylindrico, obtuso. Mandibulæ absconditæ. Antennæ thorace breviores, clava bi-articulata. Caput breve, obtusum. Corpus oblongum. Thorax postice latitudine fere elytrorum.

B. crenata: nigra, opaca, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris punctato-striatis rufis, cruce nigra, intersticiis alternis elevatis, thorace utrinque bi-carinato.

Herbst. col. 5. 30. 4. tab. 46. f. 6. F. Latr.
Gen. Inf. 3. 16. i.

Lyctus crenatus. Fabr. Eleut. 2. 561. 10. Payk.
fn. 3. 334. ii.

Ips crenata. Oliv. Ent. 2. 18. 6. 6. pl. 2. f.
9. a, b.

Monotoma crenata. Panz. fn. 1. f. 24.

Synchita crenata. Hellwig. Schneid. Mag. 4.
405. 7 Var.

Var. *b*, Elytris nigris, macula humerali a-
spicisque rufa.

Var. *c*, corpore ferrugineo, elytris pallidi-
oribus, -cruce fusca, obsoleta.

Habitat sub coitice arborum emortuarum,
sat frequens.

Descr. Rhizophago bi-punctato paullo brevior,
sed latior. Caput sub quadratum, depresso, ni-
grum, opacum, crebre, obsolete punctulatum, ore
ferrugineo; supra os foveolæ duæ oblongæ, im-
pressæ; oculi parum prominuli, nigri. Anterioræ
capite paullo longiores, ferrugineæ, articulis duo-
bus baseos majoribus, ob conicis; 3-8, parvis, no-
dosis; coarctatis; nono paullo majori, truncato;
decimo lato, perfoliato, truncato, ultimo etiam ma-
gno, rotundato. Thorax sub quadratus, antice late,
sed non profunde emarginatus, angulis prominulis,
lateribus sub rectis, elevato-mARGINATIS, obsolete cre-
nulatis, basi truncatus; angulis oblique prominulis;
supra dorso medio planus, ante scutellum foveolis
duabus oblongis, obsoletis, impressis, ab utroque
latere costis seu carinulis duabus elevatis, margini
parallelis, notatus; totus niger, opacus, creberrime
subtiliter rugoso-punctatus. Scutellum parvum,
transversum, elevatum nigrum. Elytra a thorace
non nihil remota, illo perparum latiora, sed plus tri-
plo longiora, linearia, apice rotundata, supra modice
convexa, rufa, sub opaca, obsoletius crenato-striata,
interstitiis alternis costato-elevatis, angustis; futura
tota anguste nigra, & in medio fascia lata, trans-
versa, ejusdem coloris, quæ cum sutura crucem ni-
gram format. Corpus subtus nigro-piceum, opa-
cum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes brevi-
sculi, ferruginei, femoribus crassiusculis, saturatius
piceo-rufescens.

Var. *b*.

Var. b, differt tantum elytris, quoad maximam partem, nigris, maculis tantum duabus rufis in singulo, una juxta humerum, altera intra apicem.

Var. c, pallidior, forte immatura; caput, thorax & corpus piceo-ferruginea; elytra pallidius testacea, cruce obsoleta, fusca; antennae & pedes pallide testacei.

2. B. lunata: oblongo-ovata, supra nigro-picea, pubescens, elytris punctato-striatis, lunula duplii dorsali cinereo-pubescente, thorace utrinque costa elevata intra marginem.

Dermestes lunatus. Fabr. Eleut. I. 317. 27.

Payk. fn. I. 288. 15. Panz. fn. 75. f. 14.

Nitidula lunata. Oliv. Ent. 2. 12. 19. 29. pl. 3. f. 26. a, b.

Nitidula punctata. Ross. Fn. Etr. I. 58. 143.

Silpha Sphaerica. Marsh. Ent. br. I. 122. 21.

Var. b, corpore toto fusco-testaceo.

Habitat sub cortice arborum emortuarum rarius; var. b, in Scania, a Dom. Fallén lecta.

Descr. Præcedenti paullo brevior & latior, facie Dermostidis, sed antennæ omnino hujus generis; magnitudo vix Derm. tomentosi. Caput parvum, depresso, rotundatum, nigro piceum, punctatum, pubescens, ore dilute testaceo; oculi laterales, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ capite parum longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, articulo primo magno, crasso, ob-conico; secundo paullo minori, etiam

etiam ob-conico; 3 9, brevibus, granulatis, exteris
oribus sensim paullo crassioribus; decimo valde in-
crassato, perfoliato, truncato; ultimo rotundato,
compresso lentiformi, vix decimi latitudine. Tho-
rax brevis, transversus, anterius paullo angustior,
ibique late, sed non profunde emarginatus, lateri-
bus nonnihil rotundatus; margine reflexo, sub-cre-
nato, ciliato; postice sub-sinuatus, supra convexus,
pulvinatus, nigro-piceus, sub nitidus, pubescens, sat
crebre punctatus; intra marginem utrinque costa e-
levata, margini parallela. Scutellum rotundatum
piceum; pubescens. Elytra thoracis basi vix latiora.
sed illo quadruplo longiora; in medio dilatata, a-
pice obtuse rotundata; supra modice convexa, nigro-
picea, sub nitida, pubescentia, sat profunde puncta-
to-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; in medio
dorsi, juxta suturam, in singulo elytro, macula lu-
nata, cinereo pubescens, sinu apicem respiciente. Cor-
pus subtus dilutius piceum, sub nitidum; subtiliter
punctulatum. Pedes breviisculi, ferruginei; tenui
pubescentes.

Var. b. differt tantum colore dilutiori, supra
rufo ferrugineo, subtus cum pedibus pallide testa-
ceo; forte nuper exclusa.

C E R Y L O N. Latreille.

*Palpi inaequales, filiformes; antici multo inajo-
res, articulo ultimo longiori, versus apicem
attenuato, truncato. Maxilla bifida, lacinia
exterita majori, obtrigona, interna parva,
dentiformi. Mandibulae cornicæ, arcuatæ. An-
tennae thorace breviores, 10-articulatæ, arti-
culo decimo magno, ovato; apice sub-annula-
to, veluti articulo parvo auctio. Corpus ob-
longo-ovatum. Thorax sub-quadratus.*

I. C. Juglandis: fuscus, opacus, scaber, annulatus, pedibus maculaque humerali rufotestaceis, thorace transversim quadrangulo, undique marginato, elytris crenato-striatis, seriatim hispidis.

Lyctus Juglandis. Fabr. Eleut. 2. 561. 8.

Payk. fn. 3. 330. 6. Kugell. Schneid. Mag. 5. 563. 4. Panz. fn. 5. f. 17. sed antennarum clava erroneæ bi-articulata.

Elophorus humeralis. Fabr. Eleut. 1. 205. 4. teste Dom. Kugell.

Monotoma striata. Herbst. col. 5. 23. i. tab. 46. f. 1. a.

Synchita Juglandis. Hellwig. Schneid. Mag. 4. 403. 2.

Var. b, thoracis limbo elytrisque fere totis testaceis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum; præsertim Alni; in Westrogothia saepius lectus.

Descr. Statura fere bitomæ crenatae; sed paulo brevior, interdum illo major, saepius vero duplo, imo triplo minor. Caput parvum, breve, nigro-fuscum, creberrime subtiliter punctulatum, ore toto labroque testaceis; Mandibulæ corneæ, tenues, valde arcuatæ; oculi majusculi, nigri, parum prominuli. Antennæ thorace multo breviores, crassulæ, ferrugineæ, articulis duobus basos crassis, ob conicis; 3. 9. brevissimis, coarctatis, exterioribus sensim paulo crassioribus; decimo magno rotunda-

to,

to, cum acumine parvo, obsoleto. Thorax longitudine latior, transversim quadrangulus, angulis obtusis, undique elevato-mARGINatus, margine lateraliter obsoleto crenulato; supra parum convexus, creberime, sed obsoletius punctatus, pilis depresso-griseis adspersus, nigro-fuscus, opacus, margine antico testaceo. Scutellum parvum, rotundatum, fuscum. Elytra a thorace nonnihil remota, illo parum latiora, sed quadruplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, dilutius fusca, macula humerali, jam minori, jam magis dilatata, indeterminata, obscure testacea; fat profunde crenato-striata, pilis brevissimis, rigidis, sub-erectis, pallide cinereis, seriatim adspersa. Corpus subtus fusco piceum, opacum, subtilissime punctulatum. Pedes breviusculi, ferruginei, femoribus sub-clavatis.

Var. b, differt tantum colore dilutiori; thorax fuscus, limbo plus minusve testaceo; elytra aut tota, testacea, aut dorso nonnihil infuscata.

2. C. picipes: niger, opacus, sub-hispidus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, thorace oblongo-quadrato, lateribus crenato, postice bi-foveolato, elytris crenato-striatis, apice truncatis.

Monotoma picipes. Herbst. col. 5. 24. 2. tab. 46. f. 2.

Lyctus picipes. Payk. fn. 3. 331. 7.

Latridius monotomus. Kugell. Schneid. Mag. 5. 576. 8.

Corticaria contracta. Marsh. Ent. Br. 1. 110. 13.

Var. b, elytris castaneis.

Ius. Svec. T. I. P. III. Dd

Var.

Var. c, corpore toto pallidius testaceo.

Habitat ad domos, parietes, in fenestris,
etiam sub cortice arborum, non infre-
quens.

Descr. Parvus, C. Histeroide paullo angustior, præsertim antice. Caput magnum, exsertum, porrectum, triangulare, antice attenuatum, nigrum, opacum, crebre punctatum; oculis globofis, prominulis; in vertice, pone oculos, utrinque angulus seu spinula acuminata, reflexa. Antennæ thorace breviores, crassiulæ, ferrugineæ, articulo primo magno, secundo paulo minore, ob-conicis; 3 · 9, brevibus, granulatis, decimo magno, globofo, apice acumine albido aucto. Thorax latitudine longior, antice truncatus, angulis acuminatis, prominulis, lateribus sub rectis, subtiliter crenulatis, basi media truncatus, angulis oblique obtusis; supra parum convexus, niger, opacus, creberrime & sat profunde punctatus; intra basin foveolæ duæ oblongæ, pâtes, sub-obliquæ, impressæ. Scutellum minutum, rotundatum, nigrum. Elytra thorace latiora, humeris prominulis; & illo duplo longiora; apice truncata, abdomine breviora; supra modice convexa, nigro-fusca, opaca, crebre sed obsoletius crenato-striata, interstitiis transversim rugulosis; pilis brevissimis, cinereis, seriatim adspersis. Corpus subtus fusco-piceum, subtiliter obsolete punctulatum. Pedes breviulci, pallide testacei, femoribus clavatis.

Var. b, differt tantum Elytris dilutius castaneis.

Var. c, corpore toto pallidiori differt; caput & pectus tamen plerumque obscuriora.

3. C. Histeroides: depresso, niger, nitidus, glaber, antennis pedibusque rufo-testaceis,

ceis, thorace quadrato, immarginato, profunde punctato, elytris obsolete punctato-striatis.

Latreille Gen. Ins. 3. 14. 1.

Lyctus Histeroides. Fabr. Eleut. 2. 561. 9.

Payk. fn. 3. 329. 5. Panz. fn. 5. f. 16.

Rhyzophagus Histeroides. Herbst. col. 5. 21. 3.
tab. 45. f. 11. L.

Synecita Histeroides. Hellwig. Schneid. Mag.
4. 404. 5.

Corticaria pilicornis. Marsh. Ent. Br. 1. 112. 20.

Var. b, corpore toto aut castaneo, aut ferrugineo, aut testaceo.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
sat frequens.

Descr. Parvus, Histere flavicorni æqualis, & facie similis. Caput insertum, parvum, breve, piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, ore angustato, toto labroque ferrugineis; oculi parvi, prominuli, nigri. Antennæ thorace paullo breviores, crassiusculæ, ferrugineæ, articulo primo magno, crasso, clavato; secundo longe minori, brevi; 3-9, parvis, coarctatis, exterioribus sensim paullo latioribus; decimo magno ovato, pallidiori, piloso, apice acumine minuto aucto. Thorax sub-quadratus, longitudine paullo latior, apice late, sed non profunde emarginatus, lateribus subrectis, immarginatis, basi obsolete bisinuatus, elytris arcte applicatus, supra depresso, niger nitidus, crebre & profunde punctatus. Scutellum breve, transversum, nigrum, lœve. Elytra antice thoracis latitudine, in medio nonnihil dilatata, thorace plus duplo longiora, ap-

ce rotundata, anum occultantia, supra perparum convexa, nigra, nitida, evidenter striata, striis obsolete punctatis. Corpus subtus, nigro-piceum, nitidum, crebre punctulatum. Pedes mediocres, aut dilute testacei, aut obscurius rufo-picei.

Var. b, colore totius corporis dilutiori, aut rufo-castaneo, aut ferrugineo, aut pallide testaceo differt; saepe etiam paullo minor occurrit, & separatis a nigris, societas numerosas format; vix tamen species distincta, notas saltem distinctivas erue-re non valui.

Obs. Species tres sub hoc genere jam descrip-tæ, quoad antennarum structuram satis conveniunt, in cæteris vero multum discrepant, ut potius gene-ra totidem constituere debeant.

R H Y Z O P H A G U S.

Palpi brevissimi, filiformes. Mandibulæ arcua-tæ, cornæ, apice bifidæ. Antennæ thora-ce multo breviores, articulo decimo magno, rotundato, articulo parvo, obsoleto aucto. Corpus linear-i-elongatum, angustum, glabrum. Thorax sub-quadratus. Elytra truncata.

Obj. Tarsi quatuor Anteriores 5-articulati, postici vero 4-articulati, ut justè observavit Dom. Müller, in Illig. Mag. 4. pag. 204. & 213, quare hoc genus ad Sectionem præce-dentem pertinet, ibique juxta Hypophloeum & Phaleriam, in Familia Diperialium col-locandum.

1. *R. ferrugineus*: rufo-ferrugineus, gla-ber, nitidus, thorace sub-quadrato, pro-funde

funde punctato, elytris profunde punctato-striatis, antennarum stipite fusco.

Lyctus ferrugineus. Payk. fn. 3. 326. 1

Tritoma stercorea. Thunb. Mus. Ups. 3. 39.

Var. b, thorace supra nigro-piceo.

Habitat sub cortice truncorum pini & Abietis, sat frequens.

Descr. Sequentibus paullo major, Clivina fossori sere æqualis, magnitudine parum varians. Caput exsertum, ante antennarum insertionem subito coarctatum, ibique fovea laterali instructum, totum rufo-ferrugineum, nitidum, sat crebre sed minus profunde quam thorax punctatum; oculi parvi, globosi, nigricantes. Antennæ thorace multo breviores, basi apiceque ferrugineæ, medio fusco-piceæ, articulo primo magno, clavato; secundo multo minori, truncato; testio ob-conico, basi angusto; 4. 9 brevibus coarctatis, exterioribus sensim paullo crassioribus; decimo magno, rotundato, piloso, cum rudimento obsoleto articuli apicalis. Thorax sub-quadratus, vel latitudine parum longior, antice truncatus, angulis sub-rectis; lateribus & basi anguste marginatus, angulis posticis oblique rotundatis, supra parum convexus, rufo-ferrugineus, nitidus, sat crebre & profunde punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, ferrugineum, lœve. Elytra latitudine thoracis, humeris prominulis, thorace vix triplo longiora, apice truncata, anum non tegentia, supra modice convexa, rufo-ferruginea, nitida, sat profunde punctato-striata. Corpus subtus rufo-ferrugineum, nitidum, sat evidenter punctatum. Pedes breviusculi, pallidius testacei, tibiis apice latioribus, spinulosis,

Var. b, differt tantum colore thoracis supra nigro-piceo.

2. R. depresso: rufo-ferrugineus, glaber, nitidus, sub-depresso, subitus rufo-piceus, thorace sub-quadrato, subtiliter punctulato, elytris tenui punctato-striatis.

Lyctus depresso. Fabr. Eleut. 2. 569. 2. Payk.
fn. 3. 327. 2.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
præsertim Quercus, minus frequens.

Descr. Statura & similitudo præcedentis, sed magis depresso, dimidio minor, thorax multo subtilius punctulatus, &c. Caput exsertum, rufo-ferrugineum, nitidum, subtiliter punctulatum, ante antennarum insertionem minus coarctatum, oculis parvis, nigris. Antennæ totæ ferrugineæ, structura ut in præcedenti. Thoracis forma ut in priori omnino, sed supra magis depresso, rufo-ferrugineus, creberrime, sed subtilissime punctulatus, margine omni plerumque angustissime piceo. Scutellum parvum, rotundatum, rufo-piceum, læve. Elytrorum structura ut in priori, sed supra magis depressa, rufo-ferruginea, nitida, evidenter punctato-striata, futura plerumque saturatius rufo-picea. Thorax subitus testaceus; pectus aut totum, aut versus latera saltem, saturatius piceum, subtiliter punctulatum; venter antice piceus, ano semper, & interdum medio longitudinali testaceis. Pedes pallidius testacei, structura ut in præcedenti.

Variat rarius corpore toto pallidius testaceo, subitus fere concolore.

3. R. politus: niger, nitidus, sub-depressus, antennis pedibusque obscure ferrugineis, thorace quadrato, subtiliter punctulato, elytris punctato-striatis.

Lyctus politus. Fabr. Eleut. 2. 560. 1. Panz.
fn. 4. f. 18.

Synchita polita. Hellwig. Schneid. Mag. 4.
404. 4.

Lyctus depresso., var. Payk. fn. 3. 328. 2. b.

Ips picipes. Oliv. Ent. 2. 18. 7. 7. pl. 2. f.
12. a-d.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
Dom. de Paykull; mihi intra patriam non
obvius.

Descr. Magnitudo, statura & summa similitudo præcedentis, vix tamen ejus varietas; præter colorem longe alium, etiam forma capitis diversa, lateribus ante basin antennarum profundius coarctatis, ut in Rh. ferrugineo. Caput porrectum, nigrum, nitidum, sat crebre, evidenter punctatum, ante basin antennarum subito coarctatum, ore rufo-piceo; oculi prominuli, nigri. Antennæ thorace multo breviiores, ferrugineæ, structura omnino ut in prioribus. Thorax quoad formam ut in præcedentibus omnino, paullo evidentius marginatus, supra depresso, niger, nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum nigrum, læve. Elytrorum struetura ut in prioribus, nigra, nitida, evidenter punctato striata. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, ano rufescente. Pedes breviasculi, validi, femoribus rufo-piceis, tibiis tarsisque dilutius testaceis,

4. R. parvulus: nigro-piceus, nitidus, subdepressus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace sub-quadrato, subtiliter punctato, elytris luride testaceis, punctato-striatis.

Lyctus parvulus. Payk. fn. 3. 329. 4.

Habitat sub cortice arborum emortuarum, rarius.

Descr. Statura & summa affinitas Rh. depresso-politi, sed duplo minor; a priori praeterea forma capitis diversus. Caput exsertum, piceum, nitidum; subtiliter punctulatum, antice rufo-testaceum, ante basin antennarum cito coactatum, oculis globosis nigris. Antennae thorace multo breviores, ferrugineae, structura ut in prioribus. Thorax subquadratus, antice truncatus, angulis deflexis, subrectis, lateribus evidenter marginatus, basi media truncatus, angulis oblique rotundatis, supra dorso depresso, nigro-piceus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, piceo-testaceum. Iæve, Elytra quoad formam omnino ut in prioribus, linda vel luride testacea, nitida, evidenter punctato-striata, limbo laterali & postico plerumque fuscescente. Corpus subtus piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, ano rufescente. Pedes breviusculi, ferruginei, structura ut in prioribus.

5. R. dispar: linearis, nitidus, thorace oblongo, subtiliter punctulato, postice angustiori, elytris punctato-striatis.

a, Rufo-ferrugineus, elytris fascia media lata nigro-picea.

Lyctus dispar. Payk. fn. 3. 328. 3.

Ips elongata. Oliv. Ent. 2. 18. 8. 9. pl. 2.
f. 15. a, b.

Var. *b*, rufo-ferrugineus, thorace supra,
pectore abdominisque basi nigro-piceis,
elytris nigris, basi apiceque ruto-ferru-
gineis. Payk. loc. cit. var.

Rhyzophagus bipunctatus. Herbst. col. 5. 19. 1.
tab. 45. f. 9. i.

Var. *c*, paullo minor, niger, antennis pe-
dibusque ferrugineis, elytris lunula rufa
ante apicem. Payk. loc. cit. var. *b*.

Lyctus bi-pustulatus. Fabr. Eleut 2. 561, 4.

Rhyzophagus clavicornis, Herbst. col. 5. 20. 2.
tab. 45. f. 10. k.

Var. *d*, ut var. *c*, sed elytrorum basis et-
jam rufo-ferruginea.

Var. *e*, corpore toto pallide testaceo.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
frequens.

Descr. Rh. depresso paullo longior & conve-
xior, non vero latior; varietates *c.* & *d.* dimidio
minores; thorace longiori præsertim a præcedenti-
bus distinctus. Caput exsertum, rufo-ferrugineum,
nitidum, subtiliter punctulatum, ante basin antennarum
plus minusve coarctatum, oculis parvis, glo-
bosis, nigris. Antennæ vix capite dimidio longio-
res, ferrugineæ, structura ut in prioribus. Thorax
latitudine antica longior, posterius sensim angustior,
antice truncatus, angulis deflexis, sub rectis, lateri-
bus & postice anguste marginatus, angulis baseos

rotundatis; supra modice convexus, rufo-ferrugineus, nitidus, subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, ferrugineum, laxe. Elytra thoracis basi paullo latiora, humeris prominulis, thorace plus duplo longiora, apice truncata, abdomine breviora, supra modice convexa, concinne punctato-striata, basi apiceque late rufo-ferruginea, in medio transversim jam latius, jam angustius nigro-picea, undique nitida. Corpus subtus rufo ferrugineum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, toti, rufo ferruginei.

Var. b, colore tantum differt; caput rufo-testaceum, superne interdum obscurius castaneum; thoracis dorsum, pectus & abdominis basis nigro-picea. Elytra nigra, basi & apice angustius rufo-ferruginea.

Var. c, plerumque dimidio minor, corpore toto nigro, nitido, ore, antennis pedibusque obscurius ferrugineis; in apice cujusvis elytri lunula obscure ferruginea, saepe obsoleta, sinu angulum posticum spectans, ad suturam & apicem angustata.

Var. d, omnino ut var. c, modo basis elytrorum etiam obscure ferruginea.

Var. e, tota pallide testacea, forte immatura; in majoribus umbra fusca in medio elytrorum interdum observatus, unde var. a, proxima.

Obs. Var. c, & d, forte speciem propriam constituant, quum separatim vivunt, & cum similibus unice copulantur, sed praeter magnitudinem minorem, & colorem, notas distinctivas eruere non valui,

Familia 4:a, Erotylenæ.

Antennæ abrupte perfoliato-clavalæ. Maxillæ unguæ corneo instructæ. Mandibulæ apice fissæ aut bidentatæ. Palpi antici articulo ultimo lunato aut securiforme. Latr.

P H A L A C R U S.

Palpi sub filiformes, articulo ultimo longiori, cylindrico ovali. Mandibulæ angustæ, arcuatæ, apice bidentatæ. Ligula labio angustior, cordato-sub-quadrata. Antennæ capitulo oblongo, tri-articulato; articulo ultimo elongato, ovali aut conico. Corpus hæmisphærice-ovatum, glabrum, sub-læve, in globum non contractile. Thorax angulis acutis. Pedes compressi. Latreille.

i. *Ph. corruscus:* breviter ovatus, valde convexus, niger, nitidissimus, elytris lævibus, ad futuram uni-striatis, antennarum articulo ultimo elongato, acuminato.

Payk. fn. 3. 438. 1. Schönh. synon. I. 108. 1.

Sphæridium fimetarium. Fabr. Eleut. I. 97. 27.

Dermestes fimetarius. Marsh. Ent. br. I. 74. 42.

Habitat in floribus, sat frequens.

Descr. Statura & fere magnitudo Sphæridii hæmorrhoidalis; variat tamen magnitudine dimidio minori. Caput parvum, triangulare, versus os angustum, nigrum, nitidissimum, vix visibiliter pun-

punctulatum. oculis lateralibus depresso. Antennæ longitudine fere thoracis, nigrae, articulo primo crasso, sub cylindrico; secundo paullo minori; tertio elongato, tenui, extrorsum paullo crassiori; 4-8 parvis, coarctatis; 9, 10, crassis, truncatis, brevibus, ultimo his duobus longiori, sub-acuminato. cinereo-pilosus. Thorax brevis, transversus, antice angustior, ibique pro receptione capitis late emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, anguste marginatus, basi sub-sinuatus, elytris arte applicatus & illis contiguus, angulis fere rectis; supra valde convexus, niger, nitidissimus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum mediocre, triangulare, nigrum, nitidissimum. Elytra latitudine baseos thoracis, & illo triplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, nigra, nitidissima, vix visibiliter punctulata, stria unica versus suturam impressa, anterius valde obsoleta. Alæ longæ, albæ, costa antica fuscescente. Corpus subtus nigro-piceum, minus nitidum, vix punctulatum. Pedes breves nigri femoribus latis, compressis, tibiis brevibus, rectis, pilosis, tarsis tenuibus, cinereo pilosis.

a. Rh. sub-striatus: breviter ovatus, valde convexus, niger, nitidissimus, elytris obsolete punctato-striatis, antennarum articulo ultimo crassiori, obtuso.

Phalaerus corruscus. Schönh. synon. 1. 109, 2.

Anisotoma corruscum. Illig. Coll. Bor. 1. 79.

10. Panz. fn. 37, f. 10. forte.

Habitat in floribus, sat frequens.

Descr. Statura & summa similitudo praecedentis, sed dimidio, imo duplo minor, & ultra, elytris obsolete punctato-striatis, &c. distinctus. Caput, thorax,

rax, scutellum, ut in præcedenti omnino, quoad minimum punctum. Antennæ etjam ut in illo, sed articulus ultimus crassior, apicem versus parum angustatus, obtusus. Elytrorum forma & color omnino ut in priori, sed sub oculo armato regulariter punctato-striata, striis antrorsum valde obsoletis, fere evanescentibus. Corpus subtus & pedes ut in præcedenti.

Obi. Sub nomine allato Speciem hanc a Dom. Kirby ex anglia missam obtinui. Synonyma Cl. Illicheri & Panzeri, ob elytra sub-striata potius huic quam præcedenti competit; antennarum clava in figura Panzeri erroneæ picta videtur.

3. Ph. Millefolii: oblongo-ovatus, posterius sub-angustatus, minus convexus, niger, nitidissimus, subtus piceus, elytris subtilissime, crebre, punctato-striatis, antennis apice obtusis.

Payk. fn. 3. 439. 4. Panz. fn. 103. t. 5.
Schénh. synon. I. 109. 5.

Habitat in floribus Achilleæ milesolii, in Svecia australi; rarius; Dom. de Paykull mihi e Germania missus.

Descr. Minoribus præcedentis Speciei individuis sub. æqualis, sed paulo longior, posterius nonnihil angustatus, & minus convexus. Caput & antennæ ut in proxime præcedenti omnino. Thoracis struetura & color etjam ut in illo, sed paulo minus convexus videtur. Elytra antice thoracis latitudine, posterius nonnihil angustata, & illo plus triplo longiora, supra minus convexa, nigra, nitidissima, punctis minimis; in strias crebriores quam in præcedenti, colle-

collocatis, levissime striata. Corpus & pedes ut in prioribus, sed plerumque dilutius picea.

Obs. Figura Panzeri varietatem minorem præcedentis potius repræsentat, ob structuram corporis breviorem; sed specimen, a Dom. Sturm missum, nostro jam descripto omnino coovenit. Sub nomine "Ph. striatulus", idem hoc Insectum ex Anglia a Dom. Kirby missum.

4. *Ph. Ulicis*: ob-ovatus, convexus, niger, nitidissimus, posterius sub angustatus, subtus piceus, elytris lævissimis, versus futuram bi-sinuatis, antennarum articulo ultimo breviter conico.

Habitat in floribus & gramine, sat frequens; etiam ex Anglia, sub hoc nomine a Dom. Kirby missus.

Descr. Statura fere & affinitas Ph. ænei, sed triplo minor, brevior, & in elytris convexior, niger nitidissimus, vix ad æneum vergens. Caput quoad structuram ut in prioribus, nigrum, nitidissimum, læve, ore piceo. Antennæ basi rufo-testaceæ, extrorsum fusco-piceæ, articulo ultimo basi crasso, apice acuminato, breviter conico, cæterum structura ut in prioribus. Thorax ut in præcedentibus constructus, convexus, niger, nitidissimus, lævis. Scutellum ut in reliquis. Elytra antice latitudine baseos thoracis, & illo triplo longiora, posterius attenuata, supra valde convexa, præsertim anterius; tota nigra, nitidissima, lævissima, striis duabus tenuissimis, antice evanescientibus, versus futuram, in singulo elytro; in disco etiam, certo situ inspecto, rudimenta obsoletissima striolarum observantur. Corpus subtus & pedes aut nigro-picei, aut dilutius rufo-brunnei, struita ut in prioribus.

5. Ph. æneus: oblongo-ovatus, convexus, virescenti-æneus, nitidissimus. posterius angustatus, subtus piceus, elytris bistriatis, antennarum articulo ultimo breviter conico.

Pyk. fn. 3. 349 Illig Mag. I. 41. 14. Schónh.
Synon. I. 109. 4.

Sphæridium æneum. Fabr. Eleut. I. 98. 29.

Payk. fn. I. 65. 15. Panz. fn. 103. f. 3.

Dermestes ovatus. Marth. Ent. br. I. 76. 48.

Habitat in floribus frequens.

Descr. Medius in hoc genere. Ph. corrusco angustior, sed vix brevior. Caput breviter triangulare, æneum, nitidissimum, lœve, ore piceo. Antennæ basi ferrugineæ, extrosum nigrae; clavæ structura omnino in proxime præcedenti. Thoracis structura omnino ut in prioribus, supra convexus: virescenti-æneus, nitidissimus, lævissimus, subtus aut niger aut piceus. Scutellum breviter triangulare, æneum, nitidum. Elytra antice latitudine baseos thoracis, & illo quadruplo longiora, posterius attenuata, supra modice convexa, virescenti ænea, nitidissima; versus suturam in singulo elytro striæ duæ tenues, basim non attingentes. Corpus subtus nigro-piceum, vix punctatum. Pedes breves, validi, structura ut in prioribus, aut nigro-picei, aut dilutius brunnei.

6. Ph. bicolor: oblongo-ovatus, niger, nitidissimus, antennis, pedibus corporeque subtus rufo-testaceis, elytris bistriatis, macula ante apicem ferruginea.

Payk.

Payk. fn. 3. 439. Latr. Gen. Ins. 3. 66. I.

Schönh. synon. I. 109. 3.

Anisotoma bicolor. Fabr. Eleut. I. 82. 24. Illig.

Col. Bor. I. 80. 13. Panz. fn. 103. f. 4.

Sphaeridium bicolor. Payk. fn. I. 65. 14.

Var. b; macula elytrorum ferruginea apicem fere totum occupante.

Habitat in floribus, sat frequens.

Descr. Statura omnino præcedentis, & ab ejus magnitudine, ad duplo, imo triplo minorem variat. Caput breve, sub triangulare, nigrum, nitidissimum, lœve, ore ferrugineo; antennæ totæ pallide ferrugineæ vel testaceæ, structura ut in priori omnino. Thorax & scutellum ut in præcedenti formata, nigra, nitidissima, lœvia. Elytrorum forma etiam ut in illo, nigra, nitidissima, striis duabus in singulo, versus futuram, postice coeuntibus, basin vero vix attingentibus; paulo ante apicem cuiusvis elytri macula rotundata, rubra, rarius determinata & evidens, plerumque in nostris obsoletior, indeterminata. Pedes & abdomen aut dilutius rufo-testacea, aut obscurius ferruginea, tenui punctulata & pubescencia. Pedes pallidius rufo-testacei, structura ut in prioribus.

Var. b, differt tantum macula elytrorum aut in apicem excurrente, aut apicem totum occupante; occurunt etiam specimina, præsertim minora, apice elytrorum latius, fere versus medium usque, rufo-testacea.

7. Ph. testaceus: ovatus, brunneo-testaceus, nitidissimus, antennis, pedibus elytrorum

trorumque spicē pallidis, elytris stria unica futurali.

Schönh. synon. I. 109. 7.

Anisotoma testaceum. Illig. Col. Bor. I. 30. 12.
Panz. fn. 37. f. 12.

Phalacrus geminus. Illig. in Panz. Crit. Rev.
I. 27.

Dermestes consimilis. Marsh. Ent. Br. I. 75. 46.
Habitat in Scaniæ floribus rarius. Dom.
Fallén.

Descr. Parvus, Ph. bicolori brevior, posterius minus attenuatus; Ph. corticali Germanorum similimus, sed multo minor, brevior, & elytra vix striata; &c. Caput breviter triangulare, rufo-castaneum, nitidissimum lève, ore parvo, pallide testaceo; oculi laterales, depresso, nigri. Antennæ longitudo fere thoracis, totæ pallidæ, structura ut in proxime præcedentibus. Thorax, & scutellum quoad formam ut in prioribus, castanea, nitidissima, lævia, marginibüs thoracis sèpè pallidioribus. Elytra thoracis basi vix latiora, sed illo plus triplo longiora, posterius parum angustata, supra valde convexa, castanea, nitidissima, apice indeterminate flavo-palliida; juxta futuram stria unicā, tenuis, & versus humerum rudimentum unum alterumve striolæ abbreviatæ, obsoletissimæ; cæterum superficies ævissima. Corpus subtus pallidius castaneum vel testaceum, obsoleto punctulatum. Pedes breviusculi, pallide testacei, structura ut in prioribus.

Familia 5:ta, Chrysomelinæ.

Antennæ plerumque extrorsum sensim crassiores, interdum fere filiformes, saepe moniliformes. Maxillæ inermes, lacinia interna plerisque Palpi-formi, bi-articulata. Labium breve, crassum, rotundatum, vel sub-quadratum, integrum. Corporis forma diversa, aut clypeiformis, aut orbiculata, aut sub-ovata, aut oblonga. Caput ad oculos usque thoraci intrusum.

Subdivisio i:ma, Cassideæ.

Antennarum basis saepissime sub-thorace occultata. Caput horizontaliter sub thorace absconditum, ore in sterno antico excipiendo. Corpus clypeiforme, sub-orbiculare, infra planum, disco sursum elevato, thorace saepius semi-circulati; elytrorum limbo plerumque dilatato. *Latreille.*

CASSIDA.

Palpi antici clavati, postiti filiformes. Labium elongatum, integrum. Antennæ sub-filiformes, extrorsum paul' o crassiores.

C. Murræa: ovata, nigra, thorace angulato, elytis punctato-striatis, juxta futuram confertius, disco parcius nigromaculatis,

a, Tho-

a, Thorace elytrisque ferrugineis.

Linn. syst. 2. 575. 2. Fabr. Eleut. 1. 390. 14.

Ilig. Col. Bor. 1. 476. 1. Payk. fn. 2. 48.

5. Herbst. col. 8. 240. 17. tab. 130. f. 12,

13. Schónh. synon. 2. 213. 17.

Var. b, Thorace elytrisque viridibus. Fabr.

Ilig. Payk. Schónh. loc. cit. var.

Cassida maculata. Linn. syst. 2. 575. 6. De

Gér. Ins. 5. 175. 3.

Habitat in Carduis, aliisque plantis, minus
frequens; In Inula Salicina ad Kinnakullē
& Mysseberg Westrogothiæ, pluries copio-
se legi, vix vero a, & b, mixtos vidi.

Descri. C. Equestri paullo angustior, sed non
brevior, magis ovata. Caput parvum, sub thorace
occultatum nigrum, fronte profunde punctata, oculis
oblongis brunneis. Antennæ thorace paullo lon-
giores, nigrae, extrotsum crassiores, articulo ultimō
majori, acuminato. Thoracis clypeus fere semi-cir-
cularis, anguste marginatus, basi sinuatus, angulis
lateralibus sub-rectis, in medio rotundatim produ-
ctus, supra disco posteriori parum convexus, intra
margines depresso, versus basin utrinque foveola
profundiori impressus, rufo-ferrugineus, obsolete
punctatus. Scutellum triangulare, nigrum, obsolete
punctatum, Elytra thoracis basi vix latiora, sed tri-
plo longiora, supra valde convexa, rufo-ferruginea,
parum nitida, rude punctato-striata; juxta suturam
series fere contigua e maculis difformibus, inæqua-
libus nigris; in medio baseos cuiusvis elytri ma-
cula transversa, nigra, cui externe adjungitur alia
longitudinalis, arcuata, flexuosa; in disco posteriori
puncta 2 seu 3 minora, etiam nigra; margo exte-
rior

rior late explanatus, reflexus, disco concolor. Corpus subtus fere planum, nigrum, vix punctulatum, ventris lateribus ferrugineo maculatis. Pedes breviusculi, nigri, spongiis cinereo-albidis.

Var. b, omni puncto simillima, sed color thoracis & elytrorum late viridis; venter fusco-niger, lateribus late lividis vel virescentibus,

2. *C. Equestris*: breviter ovata; supra late viridis, crebre vase punctulata, thoracis angulis rotundatis, subtus nigra, abdominis limbo late, pedibusque totis luteo-ferrugineis:

Fabr. Eleut. 1. 388. 3. *Latreille Gen. Ins.* 3.
51. 1. *Herbst. col.* 8. 216. 2. *tab.* 130. *f.* 10.
Payk. fn. 2. 45. 1. *Panz. fn.* 96. *f.* 5.
Schönh. synon. 2. 210. 3.

Cassida Cardui. De Geer. Ins. 5. 174. 2.

Cassida viridis. Illig. Col. Bor. 1. 480. 5. *Herbst. col.* 8. 209. 1. *Marsh. Ent. br.* 1. 143. 1.
Linn. syst. 2. 574. 1. *Fn. Sv.* 467?

Habitat in plantis variis, præcipue in Men-thæ Speciebus, sat frequens.

Descr. Præcedenti, ut dictum, latior, brevius ovata. Caput parvum, nigrum, fronte subtiliter punctata. Antennæ vix thorace longiores, pallide testaceæ, apice crassiores, nigræ. Thorax brevis antice & angulis posticis rotundatus, basi sinuatus, in medio nonnihil productus, supra parum convexus, totus late viridis, crebre, subtiliter, & in disco obsolete punctulatus. Scutellum triangulare, pallide virescens. Elytra antice thoracis basi latiora, & illo plus triplo longiora, basi sinuato-emarginata, angulis

lis valde productis, rotundatis, lateribus & apice rotundata, supra, disco anteriori modice convexa, plaga triangulari, communī, baseos declivi, fere plana; discus totus saturatius viridis, creberrime, vagè punctatus; limbus lateralis & apicis latus, depresso, pallidus virens, pellucidus, punctis vagis, sub-ocellatis adspersus; in vivo Insecto linea abbreviata argentea, nitida, marginem interiorem baseos elytrorum, juxta scutellum, cingit, quæ tamen cum vita perit. Pectus & abdomen nigra, sub-nitida, subtiliter punctulata & sub strigosa, ventris marginibus late luteo-ferrugineis. Pedes breviusculi, luteo ferruginei, femoribus in vivo virescentibus.

Obs. Hæc Species a Cl. Linnæo, De Géero, Herbstio, pluribusque auctoriis cum sequenti confusa, ut ex descriptionibus ambiguis & incompletis videtur, quare nomen Cl. Fabricii retinendum judico.

3. *C. rubiginosa*: ovata, obscurius viridis, thoracis angulis acuminatis, elytris substriato-punctatis, basi rufescens, postice declivibus, pedibus pallidis, femoribus nigris.

*Illig. Col. Bor. 1. 479. 4. Herbst. col. 8. 223.
5 tab. 129. f. 7.*

Cassida viridis. Latr. Gen. Ins. 3. 52. Panz.
fn. 96. f. 4. Payk. fn. 2. 45. 2. a. Att.
Holm. 1801. 119. a. Schónh. jynon. 2. 209. 1.

Var. *b*, femoribus basi tantum nigris.

Var. *c*, pedibus totis pallidis.

Cassida prasina. Herbst. col. 8. 221. 4. tab.
129. f. 6.

Var. *d*, ut var. *c*, sed basi & sutura elytrorum concolora, pallide virentia, & in basi thoracis maculae duæ lunatæ pallidæ.

Cassida prasina. *Fabr. Eleut.* 1. 388. 4. *Illig.*
Col. Bor. 1. 481. 6. *Schónh. synon.* 2. 211. 4.

Cassida viridana. *Herbst. col.* 3. 224. 6. *tab.*
129. *f.* 8. *Schónh. synon.* 2. 212. 8.

Var. *e*, supra pallide rufo testacea, femoribus basi nigris. *Illig.* *Schónh. loc. cit.*
var. *b*.

Habitat in plantis variis, praesertim carduis, ferratula, aliisque, sat frequens.

Descr. Praecedente minor, minus lata, thoracis angulis posticis acuminatis, elytrorum punctis subseriatim, illarumque basi & sutura rufescens, distincta. Caput parvum, nigrum, fronte subtiliter punctulata. Antennæ longitudine thoracis pallide testaceæ, extrosum crassiores, nigræ. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, angulis posticis subacuminatis; basi leviter sinuatus, supra parum convexus, totus viridus, undique crebre punctulatus. Scutellum triangulare, pallide virens. Elytra antice thoracis laticuaine, & illo triplo longiora, basi sub sinuata, angulis perparum prominulis, supra disco antico convexa, posterius declivia, marginibus late explanatis, depresso; in vivo saturate viridia, plaga magna, triangulari, communi baseos rufescente; juxta suturam in singulo elytro, striæ duæ punctatæ, sat regulares; dein interstitium latius, subelevatum, læve; tum striæ tres, minus regulares, punctis sparsis interjectis confusæ; iterum interstitium elevatum, antice extrosum flexum, postice ab-

bre-

breviatum, & extra illud striæ 4 vel 5, parum regulares, in disco elevationi, qui circumscribitur serie e punctis majoribus, rudit; margo explanatus punctis minoribus & rugulis transversis, crebris, notatus, Pectus & abdomen nigra, nitida, subtilissime punctulata & stigosa, ventris lateribus anguste, saepe interrupte, testaceis. Pedes breviusculi, femoribus nigris, apice, cum tibiis & tarsis testaceis,

Var. b, simillima, sed femora basi tantum plus minusve nigra vel nigro-fusca.

In var. c, pedes toti pallidi vel dilute testacei.

Var. d, tota supra pallidius virens, elytrorum basi & sutura concoloribus; in basi thoracis lunulæ duæ oppositæ, pallidiores, lutescentes, interdum in annulum confluentes; Pedes aut toti pallidi, ut in var. c, aut femora basi nigricantia; cæterum omni puncto simillima, ut, me judice, specie distingui non possit.

Var. e, colore paginæ superioris testaceo vel pallescente, differt, forte adultior.

Obs. Cl. a Linné, De Géer, aliique auctores, hanc ut præcedendis varietatem inspexerunt, ut antea indicatum, quare nomen Cl. Illigeri præferendum.

4. *C. thoracica*: ovata, thorace rufescente, postice ferrugineo, elytris punctato-striatis, viridibus, postice declivibus, macula baseos ferruginea, pedibus testaceis.

Fabr. Elenct. I. 388. 2. Illig. Col. Bor. I. 473.

3. Herbst. col. 8. 228. 10. tab. 129. f. II.

Panz. fn. 38. f. 24. Schönh. synon. 2. 210. 2.

Cassida viridis var. Payk. Att. Hom. 1801. 120, b.

Habitat in plantis rariis.

Descr. Statura, magnitudo & summa affinitas præcedentis, attamen distincta videtur, thoracis angulis magis rotundatis, elytrorum angulo humerali magis producto, & colore alio. Caput ut in præcedenti; antennarum structura eadem fere totæ pallide testaceæ. Thorax brevis, transversus, antice æqualiter, postice sinuato rotundatus, fere transversaliter ovalis, angulo obtuso fere in medio laterali situ; supra versus latera late depresso, medietate baseos magis convexo, convexitate fere ad apicem thoracis acuminatum producta; tota basis transversim late, inæqualiter, saturate rufo-ferruginea vel brunnea, pars vero anterior dilute rufescens, pellucida. Scutellum triangulare, pallide brunneum. Elytra antice profunde sinuato emarginata, angulo humerali valde producto, cæterum forma, colore & punctura ut in præcedenti omnino, præterquam quod in basi, circum scutellum, plaga magna, communis, saturate rufo-brunnea, antice lata, posterius angustior, versus medium suturæ fere producta, inæqualis, interdum interrupta. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, ventris lateribus pallide testaceis. Pedes breviusculi, toti pallide testacei.

5. C. vibex: oblongo-ovata, viridis, thorace longiori, postice parum sinuato, elytris convexioribus, distincte punctato-striatis, basi interiori suturaque rufo-brunneis.

Linn. syst. 2. 575. s. Fabr. Eleut. I. 389. 6.

Herbst. col. 8. 218. 3. tab. 129. f. 5. c. Illig.

Col. Bor. I. 477. 2. a. & d. Payk. Att.

Holm.

Holm. 1801. 118. *Panz.* fn. 96. f. 6. *Schónh.*
synon. 2. 211. 5.

Var. b, supra ferruginea, sutura elytrorum
 brunnea. *Illig.* *Payk.* *Schónh.* loc. cit. var. b.

Habitat in plantis, minus frequens.

Descr. *C. rubiginosa* vix brevior, sed multo angustior, in élytris magis convexa, præsertim postice. Caput parvum, nigrum, fronte plana, punctata; antennæ longitudine thoracis, pallidæ, extremitate crassiores, fuscæ. Thorax fere semi circularis, longitudine vix duplo latior, basi parum sinuatus, angulis obtusis, supra in medio baseos convexus; versus margines depresso; totus lète viridis, sub-nitidus, crebre obsoletius punctatus, marginibus sub-ferrugineis. Scutellum triangulare, pallide virescenti-brunneum. Elytra antice vix thorace latiora, sed illo triplo longiora, supra disco valde convexa, lète vivida, nitida, sat regulariter & profunde sed non crebre punctato-striata, basi plaga sub triangulari rufa brunnea, & sutura tota, jam anguste, jam latius brunnea; margo lateralis depresso, minus dilatatus quam in prioribus, subtiliter punctulatus & rugulosus, marginè ipso rufo-brunneo. Thorax subtus in medio niger, punctatus: pectus & abdomen nigra, nitida, subtiliter punctulata & strigosa, ventris lateribus interrupte pallido-marginatis. Pedes breviusciti, pallide testacei, femoribus basi plus minus-ve infuscatis.

Var. b, colore paginæ superioris tantum differt.

Obs. *C. Vibex* var. c, *Payk.* *Act. Holm.* 1801.
 pag. 119 mihi ignota, si non *C. rubiginosa* nostra
 var. d, eadem.

6. *C. Sanguinolenta*: ovata, viridis, thorace postice arcuato, elytris distincte pun-

stato-striatis, plaga communi baseos sanguinea, pedibus pallidis.

Fabr. Eleut. 1. 389. 8. Herbst. col. 8. 222 n.
tab. 129. f. 12. Illig. Col. Bor. 1. 482. 7.
Latr. Gen. Ins 3. 52. Payk. fn. 2. 46. 3.
Schönh. synon. 2. 212. 7.

Cassida cruentata. Marsh. Ent. Br. 1. 145. 4.
Habitat in aridis, sub lapidibus, rarius.

Descr. Statura convexa fere præcedentis, sed dimidio minor & ultra. Caput parvum, nigrum, fronte plana, crebre punctulata; antennæ longitudo thoracis, pallidæ, extrosum paullo crassiores & obscuriores. Thorax fere semi-circularis, postice valde sinuatus, versus latera arcuatus, angulis obtusis, supra in medio inæqualiter convexus, ante scutellum foveola rotundata impressus, totus lœte viridis, crebre subtiliter punctatus. Scutellum triangulare, pallide virescens. Elytra thoracis postico non latiora, sed illo fere triplo longiora, basi sinuata, angulis productis, supra in disco valde convexa, tota lœte viridia, nitida, sat regulariter & profunde punctato striata; interstitiis secundo & quinto a sutura magis elevatis; in medio baseos, circum scutellum, plaga magna, transversa, indeterminata, lœte rosea aut sanguinea; margo lateralis ut in præcedenti, vage punctulatus & sub rugosus, serie arcuata e punctis magnis, profundis, a disco distinctus. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre subtiliter punctuatum; ventris marginibus late virescenti-pallidis. Pedes breviusculi, toti pallidi vel virescentes.

7. *C. nebulosa*: ovata, supra griseo-flavescens, thoracis angulis rotundatis, elytris nigro-

nigro-maculatis, profunde punctato-striatis, punctis sub-ocellatis.

Linn. syst. 2. 575. 3. Fn. Sv. 468. Herbst.
col. 8. 236. 15. tab. 130. f. II. Payk. tu 2.
47. 4. Illig. Col. Bor. 1. 483. 9. b. Schönh.
synon. 2. 215. 21. b.

Cassida affinis. Fabr. Eleut 1. 388. 5.

Var. b, supra pallide virens; junior. Payk.
l. c. var. b. Illig. Schönh. Herbst. loc. cit. a.

Cassida tigrina. De Géer. Ins. 5. 168. I. tab.
5. f. 15. 25.

Habitat in plantis variis, ubique frequens.

Descr. Magnitudo & statura C. rubiginosæ, C. Murræa brevior, sed vix angustior. Caput parvum, fronte plana, pallida, subtiliter punctata, oculis magnis nigro brunneis; antennæ thorace paullo longiores, pallidæ, extrorsum crassiores, nigro-fuscæ. Thorax brevis, semi circularis, postice sinuatus, angulis rotundatis, supra, in disco posteriori inæqualiter convexus, lateribus depresso, totus griseo-flavescens, obsolete punctatus, basi media plerumque pallidior, Scutellum triangulare, pallidum, sub-îeve. Elytra thorace latiora, & triplo longiora, supra in disco valde convexa, profunde punctato striata, punctis plerisque sub-ocellatis, seu puncto centrali elevato instructis, interstitiis alternis hinc inde elevatoribus; tota pallide grisea, maculis punctisque irregularibus nigris, vagis, adspersa; margo lateralis obsolete vase rugoso punctatus, antice latior, immaculatus, posterius maculis majoribus nigris, transversis, contaminatus. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulato-strigosum, abdominis limbo pallido. Pedes mediocres, aut pallidi, femoribus basi infuscatis,

scatis, aut femoribus nigris, apice plus minusve pallidis.

Var. b. simillima, sed pallide virescens, ubi prior griseo flavescentia vel testacea; puncta elytrorum pleraque in hac simplicia, absque puncto centrali elevato; forte junior, nuper exclusa.

8. *C. obsoleta*: ovata, supra griseo-flavescentia, fronte pedibusque pallidis, thorace lateribus depresso. elytris profunde punctato-striatis, punctis ocellaribus, interstitiis elevatis.

Illig. Col. Bor. I. 484. 10. *Herbst.* col. 8. 248.
29, tab. 131. f. 5. *Schönh.* synon. 2. 215. 22.

Cassida pallida. *Payk.* fn. 2. 50. 8.

Cassida flaveola. *Thunb.* Inf. Sv. 8. p. 103.

Cassida ferruginea. *Marsh.* Ent. Br. I. 148. II.

Var. b, thorace postice macula fusca, elytrorum disco antico fusco-nebuloso.

Cassida nebulosa. *Fabr.* Eleut. I. 390. II.

Habitat in plantis, sat frequens.

Descr. Statura & affinitas praecedentis, sed duplo minor & ultra, *C. nobili* æqualis; thorax praeterea postice parum sinuatus, pedes toti pallidi, &c. Caput parvum, fronte plana, pallida, oculis magnis, nigro bruneis; antennæ thorace paullo longiores, pallidæ, extrellum crassiore, fuscescentes. Thoracis structura fere ut in praecedenti, sed postice minus sinuatus, supra in disco postico convexus, fere lævis, lateribus depresso, crebre punctulatis; totus pallidus, sed in medio disci posterioris interdum macula oblon-

oblonga fusca. Scutellum triangulare pallidum, sublæve. Elytra thoracis basi paullo latiora, & illo triplo longiora, supra in disco valde convexa, pallide grisea, profunde punctato-striata, punctis plerisque ocellaribus, seu puncto centrali elevato-instructis, interstitiis 2:0, 4:0 & 6:0 paullo elevatioribus; margo lateralis depresso, antice latior, undique crebre, vage & obsolete punctulatus. Corpus subfuscum, nitidum, subtilissime punctulatum, ventris limbo pallido. Pedes mediocres, toti pallide testacei.

Var. b, differt tantum macula fusca in disco posteriori thoracis semper conspicua, & disco anteriore elytrorum obsolete fusco-nebuloso.

Obl. Cassida ferruginea auctorum, huic primo intuitu simillima, sed brevior, magis rotundata punctis in disco elytrorum multo crebrioribus, vagis, simplicibus, lineisque elevatis evidentioribus distincta, a Dom. Prof. Thunbergio, Inf. Sv. 8 p. 104. ut Sveciae incola aliata; sed vix apud nos lecta, quantum mihi innotuit.

9. C. nobilis: oblongo-ovata, convexa, griseo-flavescens, elytis profunde punctato striatis, marginibus deflexis, interstitio secundo dorsali latiori, cœruleo-argenteo, corpore femoribusque nigris.

Linn. Syst. 2. 575. 4. Fn. Sv. 469. Fabr. Eleut. 1. 396. 47. Illig. Col. Bor. 1. 485. II. Herbst. col. 8. 238. 16. tab. 130. f. 15. Payk. fn. 2. 49. 7. Schönh. Jynon. 2. 219. 68.

Var. b, Sutura elytrorum fusca; linea dorsalis aut cœruleo-argentea, aut cupreo-aurea

aurea, & saepe præterea striolæ 2 seu 3 exteriore abbreuiatæ, ejusdem coloris.
Illig. Schónh. loc. cit. var. b.

Cassida pulchella. Panz. fn. 39. f. 15. Crit. Rev. 1. 73.

Cassida larvis. Herbst. col. 8. 250. 21. tab. 131. f. 6. d.

Cassida Splendidula. Marsh. Ent. Br. 1. 147. 8.
Habitat in plantis variis, sat frequens.

Descr. Minor, præcedente paulo longior, sed non latior, multo magis convexa, elytrorum margine deflexo vel dependente, non ut in prioribus depresso vel reflexo. Caput parvum, nigrum; fronte triangulari, creberrime punctulata; oculi magni, nigro-brunnei, supra frontem conniventes; Antennæ thorace paullo longiores, nigro-fuscæ, basi pallidæ. Thorax brevis, antice rotundatus, non tamen exacte in formam segmenti circularis, sed paullo magis in medio angustatus, basi sinuatus, versus latera oblique adscendens, angulum obtusum fere formans; supra in disco valde convexus, versus latera sensim declivus, disco fere lævis, versus latera subtiliter punctulatus, totus griseo flavescens. Scutellum oblongo-triangulare, flavescens, læve. Elytra antice thorace paullo latiora, angulo productæ, thorace plus triplo longiora, supra valde convexa, margine laterali dilatato dependente, præsertim anteriori, nec depresso vel reflexo ut in prioribus; tota griseo-flavescens, profunde punctato-striata; punctis quibusdam. sub ecclio armato, sub-ocellatis; sutura iata, lævis, & juxta illam stria profunda, crebre punctata; interstitium secundum a suturâ reliquis latius, læve, nitidum, in vivo cœruleo-argenteum, interdum cupreo-aureum, nitidissimum, post

post mortem vero pallide flavum; interstitium tertium in medio latius, punctis nonnullis vagis impressum; margo lateralis obsolete, vage, punctulato-subrugosus. Corpus subitus nigrum, nitidum, subtutissime punctulatum, subdominis limbo late testaceo. Pedes breviusculi; obscure testacei, femoribus nigris, genibus plus minusve testaceis.

Var. b. differt tantum sutura elytrorum late fuscata, & striola una alterave abbreviata metallico-nitente in disco exteriori & versus humerum.

Obs. Post mortem saepe tota supra pallide flavescens, unicolor.

10. C. viridula: oblongo-ovata, convexa, supra pallide virescens, unicolor, elytris minus profunde punctato-striatis, margine deflexo, femoribus basi nigro-fuscis.

Payk. fn. 2. 49. 6. Schönh. synon. 2. 220. 7t.

Cassida margaritacea var. *Herbst.* col. 3. 225.
7. tab. 130.. f. 16.

Cassida Spergulae. Marsh. Ent. Br. 1. 144. 3.

Habitat in agris arenosis, praesertim in *Spergula arvensi*, passim.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas praecedentis, colore fere unice distincta. Caput & antennae ut in praecedenti. Thorax & scutellum quoad structuram etiam ut in illo, sed tota pallide viridia. Elytrorum forma eadem, ut & striarum situs, interstitio nempe secundo a sutura reliquis latiore, tertio in medio dilatato, punctis nonnullis vagis adsperso; sed tota pallide viridia, unicolora, & puncta striarum paulo minora, simplicia. Pectus &

& abdomen in medio fusca, lateribus late pallide virescentibus. Pedes pallide virescentes, femoribus basi nigricantibus.

Obs. Color vitidis paginæ superioris post mortem in pallidum, fere albidum, pellucidum, transit; remanente tamen hinc inde tinctura virescente; an modo varietas junior præcedentis? Dom. Herbst. loc. cit. hanc ut varietatem magis oblongam Cassidæ margaritaceæ veræ Fabricii inspexisse videtur.

Cassida margaritacea, Thunb. Ins. Svec. 8. p. 103, quæ certe *C. hæmisphærica* Herbst. Col. 8. 220. 8. „Sub-orbiculata, elytris crebre, vage punctatis, abdomine pedibusque totis pallidis;“ vix in Svecia occurrit. *Cassida pallida*, Thunb. loc. cit. mihi plane ignota; anne secundum Specimen immaturum alias Speciei descripta?

Subdivisio 2:da. Hispoideæ:
Antennæ penitus exsertæ, porrectæ; caput exsertum, verticale, ore nudo, in sternio antico non recipiendo. Corpus elongato-ovatum, antice angustius; Thorax trapeziformis; vel sub-quadratus; antice angustior. Latr.

H I S P A.

Palpi æquales; medio crassiores. Maxilla bifida. Mandibula quadrato-subtrigona, apice vix angustiori, sub-æque bidentata. Labium cornuum; integrum. Antennæ cylindricæ.

L H.

1. H. atra: atra, opaca, antennarum articulo basilari majori, uni-spinoso, thorace antice spinis duabus geminis, lateribus dilatatis, spina gemina, aliaque simplici, elytris multi-spinosis.

Linn. sylt. 2. 603. 1. var. parva, Svecana.

Fabr. Eleut. 2. 58. 2. Payk. fn. 2. 151. 1.

Ross. Fn. Etr. 1. 52. 129.

Habitat ad radices graminum, in Svecia Australi, rarius.

Descr. Parva, Ptno rufipede non longior, sed paullo latior. Caput mediocre, obtusum, atrum, opacum, subtilissime coriaceum, ore deflexo; oculi parvi, nigro-brunnei. Antennæ vix dimidio corpore longiores, crassæ, sub-filiformes, porrectæ, nigrae, extorsum fuscæ, articulo primo majore, ovato, supra spina longa, sub arcuata armato; secundo brevi, utrinque in spinulam brevem producto; sequentibus valde coarctatis, perfoliatis, inferioribus utrinque acuminato-productis, ultimo breviter conico. Thorax antice angustior, capiti æqualis, lateribus valde rotundato-dilatatus, basi truncatus, supra parum convexus, pone medium transversim profunde impressus, totus ater, opacus, subtilissime coriaceus; intra apicem spinæ duæ, geminatæ, ramis divaricatis, & in utroque latere spina, etiam gemina, anterior, & alia simplex, posterior, omnes elongatæ, acuminatæ, atræ. Scutellum rotundatum, atrum, opacum. Elytra thoracis medio non latiora, sed illo triplo longiora, supra convexa, rude punctato-striata, tota atra, opaca; in singulo series sex spinarum, quarum laterales magis regulares, spinis longioribus & crebribus instructæ, dorsales vero spinis minoribus, paucioribus remotis. Corpus subtus atrum, opacum;

Inj. Svec. T. I. P. III. Ff.

ob-

obsolete coriaceo-punctatum. Pedes breviusculi validi, atri, tibiis anticis externe spina acuta armatis, posterioribus angulo tantum in medio instructis.

Obs. Aliam Indicam, magnitudine & colore similissimam, a beato Dom. T. Lund obtinui, quæ tam certe distincta Species, antennis longioribus; articulo primo Spina tri ramosa, secundo simplici, armatis, thoracis lateribus etiam spina tri-ramosa, utrinque, spinis omnibus multo longioribus, quam in Specie Europæa; alia iterum a Dom. Prof. Ad. Afzelio a Sierra Leonæ allata, & benebole communicata, adhuc magis diversa, plus duplo major, antennis longioribus, muticis, articulo tertio longissimo, cylindrico; thoracis lateribus spinulis tribus simplicibus, & spinis elytrorum paucioribus, brevioribus, &c.

Subdivisio 3:a, Chrys. Genuinæ.

Antennæ ante oculos insertæ, moniliformes, gradatim extrorsum crassiores. Palpi maxillares aut filiformes, aut extrorsum crassiores, articulo ultimo plerumque truncato. Maxillæ bifidæ, lacinias fere æqualibus, sub-cylindricis, externa paullo latiore. Corporis forma varia, aut sub-hemisphærica, aut ovata, aut elongato-ovata, &c.

C H R Y S O M E L A.

Palpi maxillares exserti, maxillis longiores, articulo ultimo crassiori, truncato. Labium transverso quadratum, coriaceum. Antennæ extrorsum gradatim crassiores. Corpus crassum,

sum, convexum, aut sub-orbicularē, aut ova-
tum. Tarsum articulus tertius rotundatus,
parum emarginatus.

Sect. I. Elytris vase punctatis, saltem in
disco, punctis versus margines tamen in-
terdum sub-seriatis.

I. C. coriaria: aptera, gibbosa, nigra; cre-
bre inaequaliter punctulata, subtus viola-
cea, thorace tenue marginato, posterius
angustiori, antennis longitudine thoracis.

Fabr. Eleut. I. 424. 6. Panz. fn. 44. f. 2.
Marth. Ent. br. I. 170. 2. Schönh. Synon. 2.
239. II.

Chrysomela Goettingensis. Payk. fn. 2. sl. I.

Var. b, supra cœruleo-nigricans.

Chrysomela violaceo-nigra. De Géer Ins. 5.
298. 8.

Habitat in Svecia australi, rarius.

Descr. Chr. Populi fere brevior, sed latior &
multo magis convexa; mas plerumque dimidio mi-
nor. Caput rotundatum, nigro-violaceum. crebre
punctulatum, fronte antica inaequali, impressa; ocu-
li oblongi, brunnei. Antennæ vix thorace longio-
res, crassiusculæ, basi violaceo-nigræ, extrorsum
nigro-fuscæ, pubelentes, articulo primo magno,
clavato; 2. 10, nodosis, distantibus, exterioribus
gradatim paullo crassioribus, ultimo majori, acumi-
nato. Thorax brevis, transversus, antice late, sed
parum profunde, semi-circulariter emarginatus, la-
teribus ante medium latior, posterius nonnihil an-
gustatus, basi truncatus, angulis sub-prominulis;

undique, etiam basi & apice anguste marginatus, supra modice convexus, niger, nitidus, crebre, subtiliter punctulatus, punctis sub-aequalibus. Scutellum breve, transverso-triangulare, nigrum, laxe. Elytra magna, antice thoracis basi multo latiora & illo quadruplo longiora, pone basin dilatata, dein sinuata, lateribus dupliciter marginata, apice rotunda, supra valde convexa, nigra, nitida, crebre punctata, punctis inaequalibus, aliis nempe paullo majoribus, aliis minutis, varie mixtis; margo inflexus coeruleo-violaceus. Corpus totum subitus coeruleo-violaceum, nitidum, punctulatum. Pedes longiculati, validi, violacei, tarsis valde dilatatis, praesertim in masculis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris coerulecente.

Obs. Varietatem maris e Germania obtinuit corpore subitus pedibusque fere nigris, vel perparum coerulecentibus, qui forte Tenebrio latipes, Linn. Syst. 2, 678. 30.

2. *C. hæmoptera*: gibbosa, nigro-coerulea tota, antennis basi ruto-piceis, thorace obsolete punctulato, lateribus vix incrassato, elytrorum punctis profundioribus, irregulariter sub-seriatim.

Linn. syst. 2. 587. II. Fn. Sv. 512. Marsh.
Ent. br. 1. 171. 5.

Chrysomela Hottentotta. Fabr. Eleut. I. 429.
37. Payk. fn. 2. 67. 17. Schönh. synon. 2.
243. 40.

Habitat in pratis apricis, tempore vernali,
paullum.

Descr.

Descr. Magnitudo & statura brevis, gibbosæ, Chr. staphyleæ, tota supra & subtus nigro-cœrulea, nitida. Caput parvum, breve, rotundatum, obsolete punctulatum, ore nigro-piceo; oculi majusculi, oblongi, brunnei. Antennæ thorace longiores, basi rufo-piceæ, extrorsum nigro-fuscæ, pubescentes. Thorax brevissimus, transversus, antice angustior, ibique late, semi-circulariter emarginatus, angulis prominulis, acutis, lateribus oblique sub-rectis. vix incrassatis, subtus anguste marginatis; basi bisinuatus, angulis acuminatis; supra modice convexus, nigro-cœruleus, nitidus, crebre, sed valde obsolete, minutissime punctulatus, versus margines laterales insuper punctis aliquot majoribus impressus. Scutellum oblongo-triangulare, nigro-cœruleum, parce punctatum. Elytra thoracis basi parum latiora, pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, nigro-cœrulea, nitida, punctis majusculis, sat crebris, versus latera & suturam irregulariter sub-teriatis, impressa. Alæ ample, paleo rufescentes. Corpus subtus nigro-cœruleum, nitidum, parce obsoletius punctatum. Pedes medios cœrulei nitidi, tibiarum apice interne spongiosisque tarsuum cinereo-villofis.

3. C. Goetingensis: breviter ovata, tota violacea, subtilissime punctulata, antennarum basi, palpis tarsisque rufo-testaceis.

Linn. syst. 2. 586. 4. Fn. Sv. 506. Panz. fn. 44. f. 3. Marsh. Ent. Br. 1. 171. 4. Fabr. Eleut. 1. 429. 36? Schönh. synon. 2. 242. 39.

Chrysomela hæmoptera. Payk. fn. 2. 52, 2.

Habitat in pratis apricis, aridis, sub lapi-
dibus, muscis, tempore vernali, passim.

Descr. Statura brevis, fere C. Staphyleæ, sed paullo major; mas duplo minor femina, tarsis latioribus. Caput rotundatum, violaceum, subtiliter punctulatum, ore palpisque rufo-piceis. Antennæ thorace longiores, nigro-piceæ, articulis duobus baseos rufis. Thorax brevis transversus, antice late, semi-circulariter emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, basi sub-bifinnatus, supra modice convexus, totus violaceus, nitidus, in disco subtilissime, versus latera paullo evidentius punctulatus. Scutellum oblongo-triangulare, violaceum, laxe. Elytra thoracis bæsi parum latiora, sed illo quintuplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, rufescenti-violacea, nitida, creberrime punctulata, punctis parvis certo situ hinc inde in series irregulares dispositis, aliisque minimis, sparsis interjectis. Corpus subitus violaceum, nitidum, parcius punctulatum. Femora clavata, violacea, nitidissima; tibiæ violacea, apice rufescentes; tarsi toti rufo-testacei.

4. *C. Lusitanica*: breviter ovata, supra cupreo-aenea, nitida, subitus violaceo aenea, elytrorum punctis paucis, profundis, iride cœrulecenti cinctis.

Fabr. Eleut. I. 430. 40. *Schónh.* synon. 2.

244. 44.

Chrysomela metallica. *De Géer Ins.* 7. 661. 65.
tab. 49. f. 12.

Habitat in *Finlandia Dom. Argillander*, iste Dom. *Schónherr*.

Descr. Statura & magnitudo C. Goettingensis. Caput parvum, rotundatum, cupreum, fronte inæquali, vix punctata; oculi magni, oblongi, brunnei.

Antennæ

Antennæ thorace longiores, nigro-cœrulecentes, extrorsum fusco-pubescentes, articulo primo subnigra ferrugineo. Thorax brevissimus, transversus, antice late emarginatus, lateribus nonnihil incrassatus, anguste marginatus, basi sub-bi-sinuatus, supra modice convexus, cupreo-aeneus, nitidissimus, disco lœvis, versus latera punctis paucis, profundis, impressus. Scutellum oblongo-triangulare, viridæneum, nitidum, lœve. Elytra thoracis basi latiora, & illo quintuplo longiora, supra valde convexa, cupreo-aenea, nitidissima, punctis magnis, sed non crebris, profunde impressis, spatio inæquali remotis, sparsis, obscure cœrulecentibus, & iride concolori cinctis; puncta alia pauca, minutissima, vaga, prioribus interjecta, etiam observantur. Corpus sub-tus violaceo-aeneum, nitidum, vix punctatum. Pedes validi, violaceo-aenei, spongiis tarsuum cincinati-villosis.

5. C. Staphylæa: breviter ovata, brunneo-testacea, supra sub-aeneo micans, thoracis margine valde incrassato, elytris crebre subtiliter punctulatis.

Linn. Syst. 2. 590. 26. Fn. Sv. 518. Fabr. Eleut. I. 434. 71. Payk. fn. 2. 53. 4. Schönh. Jynon. 2. 251. 80.

Chrysomela cuprea. De Géer Ins. 5. 294. 3. tab. 8. f. 24.

Habitat in plantis, sub lapidibus, foliis deciduis, tempore vernali, frequens.

Descr. Media, brevis, valde convexa; mas duplo minor femina. Caput rotundatum, brunneo-testaceum, nitidum, subtilissime punctulatum, ore dilatius

Iutius rufescens; supra os linea arcuata, impressa; oculi oblongi, nigri, prominuli. Antennæ longitudo dimidii corporis, totæ ferrugineæ. Thorax brevissimus, transversus, antice angustior, late, sed non profunde emarginatus; lateribus rotundatus, margine valde incrassato, elevato, fovea longitudinali arcuata, punctata, a disco distincto; postice bisinuatus, supra disco convexus, subtilissime, obsolete punctulatus, totus brunneo-castaneus, æneo-micans. Scutellum oblongo-triangulare, castaneum, læve. Elytra magna, antice thoracis basi paullo latiora, versus medium dilatata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, castanea, æneo-micans, nitida, pubescens parvis, inordinatis, crebre adspersa. Corpus sublus aut dilutius testaceum, aut saturatus brunneum, obsoletè punctulatum. Pedes longiusculi, validi, ferrugineo-testacei, nitidi.

6. C. polita: breviter ovata, viridi-ænea, nitida, thorace aureo, marginibus incrassato, elytris brunneo-testaceis, subtiliter punctulatis.

Linn. syst. 2. 590. 27. En. Sv. 522. Fabr. Eleut. 1. 434. 73. De Géer Ins. 5. 294. 2. t. 8. f. 23. Payk. tn. 2. 54. 5. Schönh. syn. non. 2. 252. 82.

Var. *b*, cœrulea, nitida, elytris brunneo-testaceis. Payk. loc. cit. var. *b*.

Habitat in plantis & gramine, ut & sub lapidibus, muscis, frequens.

Descr. Praecedenti similis, sed paullo longior, minus convexa, & plerumque paullo minor. Caput rotundatum, viridi-ænum, nitidum, subtiliter obsole-

solete punctulatum, oculis magnis, brunneis. Antennæ nigro-fuscæ, articulis tribus baseos sub-ferrugineis. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra in disco aut cupreo-aureus, aut magis virescenti-aureus, nitidissimus, obsolete punctulatus, marginibus incrassatis viridi-æneis. Scutellum triangulare, viridi-æneum; nitidum, lœve. Elytra quoad formam fere ut in priori, modo paullo longiora & minus convexa, dilutius brunneo-testacea, nitida, punctis parvis, inorcinatis, crebre adspersa. Corpus subtus aut viride, aut viridi-æneum, aut viridi-cœrulescens, abdominis dorso, lateribus quoque ferrugineis. Pedes longiusculi, validi, viridi-ænei, tarsis piceis, spongiosis ferrugineis.

Var. b, differt tantum colore capitis, thoracis, corporis pedumque cœruleo, thoracis disco tamem plerumque virescente.

7. C. Populi: ovata, nigro-cœrulea, nitida, thorace parvo, utrinque impressio, elytris amplis rufis, consertissime punctulatis, ipso apice nigris.

Linn. syst. 2. 390. 30. Fn. Sv. 523. Fabr. Eleut. 1. 433. 68. De Géer Ins. 5. 290. 1. tab. 8. f. 16-22. Payk. fn. 2. 55. 6. Panz. fn. 100. f. 3. Schénh. Jynon. 2. 250. 77.

Habitat in foliis Populi tremulæ & Salicis, frequens.

Descr. Maxima fere nostratum hujus generis; C. Goettingensi in elytris multo latior; variat tamen statura minore. Caput parvum, nigro-cœruleum, subtiliter punctulatum, fronte inæquali, plurimque canaliculata, supra os arcuatim impressa,

truncata; oculi prominuli, brunnei. Antennæ thorace parum longiores, nigrae, extorsum fuso-pubescentes. Thorax parvus, transversus, antice late & sat profunde semi-circulariter emarginatus, lateribus rotundatus, angustissime marginatus. vix impressatus, basi etiam sub-rotundatus, angulis nonnihil prominulis; supra parum convexus, nigro-ceruleus, in medio levissimus, nitidus, versus latera crebre punctatus, sovea arcuata, abbreviata, longe intra marginem utrinque impressus. Scutellum parvum, triangulare, nigro-ceruleum, leve. Elytra amplia, thorace multo latiora & textuplo longiora, supra satis convexa, in vivo saturate rubra, post mortem ferrugineo-testacea, confertissime subtiliter punctulata, apice ipso anguste nigro. Corpus sub-tus nigro-ceruleum, nitidum, pectoris lateribus rugoso-punctatis, ventris marginibus testaceis. Pedes mediocres, nigro-cerulei, tarsis nigris, cinereo-spongiosis.

3. C. Tremulae: ovata, cœruleo-virescens, nitida, thorace utrinque profunde impresso, basi sub-truncato, elytris rufo-testaceis, immaculatis, sub-rugosis.

Fabr. Eleut. I. 434. 69. Payk. fn. 2. 55. 7.

Panz. fn. 100. f. 6. Schönh. synon. 2. 251. 78.

Habitat in foliis Populi tremulæ, apud nos rarius.

Descr. Præcedenti similis & affinis, sed dimidio minor, thoracis foveæ profundiores, elytta apice concolora, &c. Caput parvum, cœruleo-virescens, nitidum, subtiliter punctulatum, fronte inæquali, supra os arcuatim impressa, truncata; oculi oblongi brunnei. Antennæ thorace parum longiores,

tes, inferne cœruleo-nigræ, extrosum crassiores, fuscæ. Thorax brevis, transversus, antice late emarginatus, lateribus sub-rotundatus, anguste marginatus, basi sere truncatus, angulis nonnihil prominulis; supra in disco convexus, cœruleo-virescens, nitidissimus, subtilissime, obsolete punctulatus, versus latera sæt profunde punctatus; longe intra marginem utrinque fovea, profunde impressa, arcuata, crebrius punctata. Scutellum oblongo-triangulare, cœrufescens, læve. Elytra thoracis basi latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, rufo-testacea, nitida, creberime & paullo fortius quam in præcedenti, punctata, superficie reliqua sub-rugosa. Corpus subtus cœruleo-virescens, nitidum, parce punctulatum, ventris marginibus testaceis. Pedes mediocres cœruleo-virescentes.

9. *C. collaris*: ovata, nigro-cœrulea, nitida, thoracis lateribus luteo-ferrugineis, puncto nigro, elytris violaceis, creberime punctulatis.

Linn. *Syst. 2. 591. 37.* Fn. Sv. 528. De Geer.
Ins. 5. 302. 13. Payk. fn. 2. 58. 10. a.
Schönh. *synon. 2. 254. 89. b.*

Chrysomela Salicis. Fabr. Eleut. 1. 436. 81.

Var. b., nigro-cœrulea, thoracis lateribus flavo-albidis, elytris viridi-æneis, vel æneo-subviolaceis. Payk. loc. cit. var. b., Schönh. loc. cit. a.

Chrys. collaris. Fabr. Eleut. 1. 433. 80. Panz.
fn. 78. fc 2.

Habitat in foliis Salicis, Populi, frequens;
var. a & b, separatim degunt, & cum
similibus tantum copulantur.

Deser. Statura & magnitudo C. politæ. Caput nigro sub-cœrulescens, fronte depressa, inæquali, sœpe canaliculata, parce punctata, oculis oblongis brunneis. Antennæ thorace parum longiores, inferne piceo-ferrugineæ, extrorsum crassiores, nigræ. Thorax transversus, antice late emarginatus, lateribus sub-rectis, anguste marginatis, basi sub-sinuatus, angulis acuminatis; supra parum convexus, in medio longitudinaliter nigro-cœrulescens, nitidus, subtilissime punctulatus, lateribus late, inæqualiter luteo-ferrugineis, profundius punctatis, cum puncto parvo fusco, paullo ante medium utrinque. Scutellum parvum, triangulare, cœruleo-virescens. Elytra thoracis basi latiora, & pone basin, ultra medium, magis dilatata, thorace fere quinto longiora, apice, in femina reflexo-acuminata, in mare sub-mutica, supra valde convexa, cœruleo-violacea, interdum nigro-violacea, nitida, creberrime vage punctulata. Corpus subtus nigrum, parum cœrulecenti nitens, vix punctatum, ventris marginibus postice ferrugineis. Pedes mediocres, nigro-cœrulecentes, nitidi, tibiis apice crassioribus, externe canaliculatis, sœpius macula oblonga rufescente notatis.

Var. b, colore tantum differt; thoracis latera in vivo fere alba, post mortem flavo-albida. Elytra vi-

gidiænea, interdum violaceo-tincta.

so. C. sanguinolenta: ovata, nigro-cœrulescens, elytris nigris, profunde rugosopunctatis, margine lateralí late sanguineo.

Linna.

Linn. *Syst.* 2. 591. 38. Fn. Sv. 529. Fabr.
 Eleut. 1. 441. 115. Payk. *fn.* 2. 52. 3.
 Panz. *fn.* 16. f. 10. Schónh. *synon.* 2. 262.
 123

Chrysom. rubro-marginata. De Geer *Ins.* 5.
 298. 7. tab. 8. f. 26.

Habitat in Sveciæ australis graminosis, ratiūs.

Descr. Statura & magnitudo C. Goettingensis. Caput parvum, rotundatum, nigrum, parum cœruleo-ſcenti-micans, supra os arcuatim impressum, subtiliter puctulatum. Antennæ thorace longiores, tenues, nigrae, basi sub-cœruleſcentes. Thorax brevissimus, transversus, antice late & profunde emarginatus, lateribus rotundatus, incrassatus, sub latere anguste marginatus, basi bi ſinuatus, supra parum convexus, niger, parum cœruleſcenti-micans, disco elevationi, subtiliſſime obſolete, punctulato, lateribus punctis magnis profundis, inæqualibus impressis. Scutellum sub-triangulare, cœruleſcens, nitidum, læve. Elytra magna, antice thorace multo latiora, & pone basin adhuc magis dilatata, thorace textuþlo longiora, supra valde convexa, nigra, nitida, punctis crebris, profundis, & rugis elevatis lævibus, varie confluentibus, valde iræqualia, margine lateralí toto late sanguineo, post mortem rufo-testaceo. Corpus subtus nigro-cœruleum, nitidum, vix punctulatum. Pedes mediocres, cœruleſcentes, femoribus evidenter punctatis.

ii. C. limbata: breviter ovata, nigra, nitida, subtiliter punctulata, elytrorum limbo toto

toto late sanguineo, punctis versus latera
sub-serialis.

Fabr. Eleut. I. 441. 113. Payk. fn. 2. 70. 23.
Panz. fn. 16. f. 8. Schönh. synon. 2. 262.
122.

Habitat in pratis apricis, sub lapidibus, in
Scania, Westrogothia, tempore vernali,
peccim.

Descr. Statura & magnitudo fere C. politæ.
Caput rotundatum, nigrum, nitidum, subtilissime
punctulatum, fronte inæquali, supra os arcuatim
impressa; Palporum maxillarium artieulus ultimus
brevis, crassus, truncatus. Antennæ thorace longio-
res, inferne rufo-piceæ, extrorsum nigro-fuscæ. Tho-
rax brevis, latus, transversus, antice late & profun-
de emarginatus, lateribus rotundatus, incrassatus;
sub latere anguste marginatus, basi sub sinuatus, su-
pra modice convexus, niger, nitidus, perparum æ-
neo-micans; in disco subtilissime punctulatus, versus
latera antice punctis majusculis & ad basin utrinque
fovea profunda impressus. Scutellum triangulare,
nigrum, sub-læve. Elytra antice thorace parum la-
tiora, post basin non nihil dilatata, thorace fere
quintuplo longiora, supra valde convexa, disco com-
muni nigra, limbo omni late sanguineo; creberri-
me, subtiliter punctata, punctis versus latera & su-
curam hinc inde abrupte serialis. Corpus subtus ni-
grum, nitidum, parce & obsolete punctulatum. Pe-
des longiusculi, vajidi, nigri, femoribus nitidissimis;
vix punctulatis.

Obs. Chrys. carnifex, Fabr. Eleut. I. 441. 114;
huius quidem valde similis & affinis, attamen distin-
cta mihi videtur, corpore paullo longiori & angu-
stiori, thoracis lateribus minus incrassatis, palporum
maxil-

maxillarium articulo ultimo longe minori, elytris basi nigris, &c.; sed haec apud nos non occurrit, quantum mihi intuitum.

12. C. Lapponica: oblongo-ovata, viridiænea, elytris rufo-testaceis, futura, macula magna, difforini basi os, fascia media sub-undata, arcuque intra apicem cœruleis.

Linn. syst. 2. 591. 34. Fn. Sv. 526. Fabr. Eleent. 1. 437. 95. Payk. fn. 2. 57. 9. Panz. fn. 23. f. 13. Schönh. synon. 2. 258. 103.

Var. b, Elytris cœruleis, margine lineisque variis arcuatis rufo-ferrugineis.

Chrysom. curvi-linea. De Gér. Ins. 5. 302. 12. tab. 9. f. 3.

Var. c, elytris cœruleis, margine punctoque uno alterove disci rufescentibus. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

Habitat in Lapponiæ & Provinciarum Borealis Salicibus, passim.

Descr. Statura fere C. æneæ, sed paullo longior, & in elytris angustior. Caput parvum, rotundatum, viridi-æneum, subtiliter punctulatum, fronte inæquali; oculi majusculi, brunnei; Antennæ thorace parum longiores, inferne testaceæ, extrorsum crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antice late & profunde emarginatus, lateribus subrectis, evidenter marginatis, & intra marginem incassatis; basi fere truncatus, supra parum convexus, viridi-æneus, in medio elevatior, nitidus, vix punctula-

Etulatus, versus latera impressus, profunde rugosus punctatus. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo Sextuplo longiora, supra modice convexa, rufotestacea, nitida, crebre, inordinate punctata, sutura tota late coerulecente; intra basin cuiusvis elytri macula magna, difformis, intus angustior, rarius in duas disjuncta, coerulescens; in medio fascia transversa, subundata, suturæ connexa, margines laterales non attingens, ejusdem coloris, & intra apicem arcus magnus coerulescens, a sutura antrosum circumlatim productus, versus anum apertus. Corpus subtus obscure viridi-aeneum, vix punctatum. Pedes mediocres, femoribus viridi-aeneis, tibiis rufo-ferrugineis, tarsis piceis.

Var. b, differt tantum signaturis coeruleis elytrorum valde dilatatis, confluentibus, relictis tantum margine laterali & lineis nonnullis arcuatis disci, rufo testaceis.

Var. c, elytra gerit fere tota coerulecentia, excepto margine laterali, & punto uno alterove disci testaceis.

83. **C. cuprea**: ovata, viridi-aenea, thorace parvo, lateribus incrassato, elytris magnis, gibbosis, cupreis, basi plicatis, abdominis margine rufescente.

Fabr. Eleut. i. 432. 61. Payk. fn. 2. 56. 8.

Panz. fn. 25. f. 8. Schönh. synon. 2. 248.
66.

Var. b, corpore toto supra obscure virescenti-aeneo. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

Chrysomela ruficaudis. De Gér. Ins. 5. 305. 17.

Var.

Var. *a*, atro-subvirescens, elytris cœruleo-violaceis. Payk. Sshōnh. loc. cit. var. *a*.

Habitat in foliis Salicis, apud nos rarius.

Descr. Statura Chr. æneæ, sed plerumque dimidio major, thoracis latera incrassata, elytra magis convexa, &c. Caput parvum, rotundatum, virescenti-æneum, sat crebre punctulatum, fronte canaliculata, & supra os triangulariter depressa; oculi oblongi, brunnei. Antennæ vix capite cum thorace longiores, inferne rufo-piceæ, extrotsum crassiores, nigræ. Thorax parvus, brevis, transversus, elytris multo angustior, antice late emarginatus, lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, & longe intra marginem fovea, illi paralella, profunde impressa; utrinque, unde latera incrassata appareant; basi sub-sinuatus, angulis acutis, reflexis; supra in disco sub-convexus, virescenti-æneus, nitidus, vix vel obsoletissime punctulatus, linea media longitudinali impressa canaliculatus, versus latera crebre & sat profunde punctatus. Scutellum triangulare, viridi-æneum, nitidum, lave. Elytra magna, antice thoracis basi multo latiora, pone basin dilatata, thorace sextuplo longiora, supra anterius valde convexa, fere gibbosa; posterius declivia, tota rubro-cuprea, nitida, creberrime subtiliter vague punctulata; intra humerum callus elevatus, & juxta illum interne fovea satis magna, impressa, unde elytra basi plicata. Corpus subtus virescenti-æneum, nitidum, obsoleto strigosum, ventris lateribus & ano rufescentibus. Pedes mediocres, viridi-ænei, tibiis externe canaliculatis.

Var. *b*, simillima, sed color elytrorum idem ac thoracis & capitis, obscurius virescenti-æneus.

Var. *c*, colore magis differt; caput, thorax & corpus fere nigra, parum cœrulecenti vel æneo-

micantia; elytra lāte rufescenti - vel cærulecenti-violetaceo, nitida; canalicula dorsalis thoracis in hac varietate plerumque obsoletior.

14. C. Bulgharenfisi: ovata, virescenti-cærulea, nitida, thorace lateribus incrassato, dorso lævi, elytris magnis, cyaneis, basi plicatis.

Fabr. Eleut. 1. 444. 134.

Chrysom. ænea, var. Schönh. synon. 2. 249. 67. b.

Illig. Mag. 3. 159. 134.

Habitat in Finlandia, Dom. Pfeiff.

Descr. Statura præcedentis, sed triplo minor, thoracis dorso non canaliculato, elytris minus convexis, distincta; a Chr. ænea, thorace utriusque profunde impresso, lateribus incrassato, disco lævi, &c., etiam vete diversa mihi videtur. Caput parvum, rotundatum, cæruleo-virescens, sat crebre punctulatum, fronte non canaliculata, sed supra os triangulariter impressa, ore ferrugineo. Antennæ articulis 2-6 ferrugineis, reliquis nigris, structura ut in præcedente. Thorax brevis, transversus, quadrangulus, antice late emarginatus, lateribus fere rectis, anguste marginatis, & longe intra marginem fovea profunda, impressa, unde latera elevata videntur; postice parum sinuatus, angulis sub-rectis, supra in disco convexus, cæruleo-virescens, nitidissimus, lævis, versus latera crebre & profunde punctatus. Scutellum parvum, triangulare, cæruleum, læve. Elytra magna, antice thorace multo latiora, & illio sextuplo longiora, supra æqualiter, modice convexa, cyanea seu cæruleo-subviolacea, nitida, crebre subtiliter punctulata, margine lateraliter crasso, sub-elevato; in basi elytrorum callus humeralis & illi

integ.

Interioris adjacens foveola impressa, ut in priore. Corpus subtus cœruleo-virescens, nitidum, vix punctulatum, ventris marginibus posticis anguste rufescentibus. Alæ longæ, fuscescentes. Pedes mediocre; cœruleo-virescentes, tibiarum apice tarfisque rufo-piceis.

15. C. ænea: ovata, supra viridi-ænea, nitidissima, creberrime punctulata, subtus obscurior, ano ferrugineo, thoracis lateribus non incrassatis.

Linn. syst. 2. 587. s. Fn. Sv. 510. Fabr. E-leut. 1. 444. 133. Payk. fn. 2. 59. u. Panz. fn. 25. f. 9. Schönh. synon. 2. 248. 67.

Chrysom. viridis Alni. De Géer. Ins. 5. 305: 18.

Var. b, cœruleo-violacea tota, ano rufescente. Payk. Schönh. loc. cit. var. b.

Chrysom. cœruleo-violacea. De Géer Ins. 5: 316. 22.

Habitat. in foliis Betulæ alni, frequens, flora misere devastans.

Descr. Media, C. collaris æqualis; variat etiam duplo minor, præsertim mas. Caput parvum, viridi-æneum, sœpe aureum, nitidissimum, crebre subtilater punctulatum, fronte impressa, plerumque canaliculata, supra os arcuatim depressa; oculi oblongi, brunnei. Antennarum structura ut in proxime præcedentibus, inferne rufo-piceæ, extrorsum nigrae. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late & profunde emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, anguste marginatus, minime incrassatus,

basi parum sinuatus, angulis acuminatis; supra parum convexus, viridiæneus, saepe aureo-micans, nitidissimus, undique creberrime punctulatus; in medio dorsi interdum canaliculæ rudimentum, ut & foveolæ lateralis utrinque, at obsoletissimæ. Scutellum triangulare, viridiæneum, laxe. Elytrorum forma ut in proxime praecedenti omnino; virescentiæne, saepe aureo-micania, nitidissima, crebre subtiliter vase punctulata, ad basin plicata, ut in prioribus. Corpus subrufus obscurius viridiæneum, nitidum, tenue strigosum, ano ventrisque lateribus rufescens. Pedes mediocres viridiænei, tarsis piceis.

Var. b, differt tantum colore totius corporis cœruleo-violaceo, nitido, cæterum omni punto conveniens.

Variat etiam supra viridiæneæ, lituris variis rubro-aureis maculatim adspersa.

16. C. graminis: oblongo-ovata, convexa, tota viridi-aurea, cœruleo-micans, nitidissima, crebre punctata; elytrorum punctis hinc illinc sub-seriatim.

Linn. Syst. 2. 587. 7. Fn. Sv. 509. Fabr. E-leut. 1. 432. 58. De Géer Ins. 5. 304 16. Payk. fn. 2. 63. 16. Schönh. synon. 2. 247. 63.

Var. b, capite, thorace, futura vittaque laterali elytrorum media cœruleo-violaceis.

Var. c, æneo- seu cupreo-aurea, nitidissima, futura & vitta media elytrorum læte virescentibus.

Chrysom. fulgida. Fabr. Eleut. 1. 432. 59.
Schönh. synon. 2. 247. 64.

Habitat in pratis aridis, sat frequens; var. c, tamen apud nos raro occurrit. Dom. Schönherr.

Descr. Inter majores, Chr. Sanguinolenta fere longior, sed paullo angustior. Caput rotundatum, viridi-æneum, subtiliter punctulatum, fronte obsolete canaliculata, supra os rotundatum depressa; oculi oblongi, brunnei; os piceum, labro viridi æneo. Antennæ thorace longiores, tenues, cœruleo virescentes, extrorsum nigro-fuscae, articulis duobus baseos subtus ferrugineis. Thorax brevis, transversus, antice late, sed minus profunde emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, vix incrassatus, basi sub-sinuatus, angulis acutis; supra valde convexus, viridi-æneus, certo situ sæpe cœruleo-micans, crebre punctatus, punctis versus latera majoribus, confluentibus. Scutellum triangulare, cœruleo-virescens, læve. Elytra thorace latiora, & quintuplo longiora, supra valde convexa, viridi-ænea, nitida, versus latera aureo-ænea, sutura & plaga media longitudinali certo situ cœruleo-micantia, crebre punctata, punctis versus latera & suturam sub-seriatis. Corpus subtus viridi-aureum, nitidissimum, parce punctulatum. Pedes longiusculi, viridi-ænei, nitidi, spongiis tarsuum cinereis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris cœruleo-violaceo; oblique inspecta, color viridi-æneus tamen translucet, saltem versus margines.

Var. c, etiam colore tantum differt, ut in diagnosis indicatum; in cæteris vero ne punctuio diversa,

17. *C. fastuosa*: ovata, convexa, tota viridi-aurea, cœruleo-micans, elytrorum sutura vittaque media abbreviata saturate, cœruleis, antennis basi ferrugineis.

Linn. syst. 2. 588. 18. Pand. & Fl. Rub. p. 8. Fabr. Eleut. 1. 440. 109. Payk. Jn. 2. 64. 18. Panz. Jn. 44. f 12. Thunb. Nov. Att. Ups. 5. 108. 37. Schönh. Synon. 2. 260. 118.

Habitat in plantis oleraceis, gramine, sat frequens.

Descr. Præcedenti colore simillima, sed triplo minor & ultra, statura brevior, antennæ extrosum crassiores, basi ferrugineæ, &c. Caput rotundatum, viridi-aureum, nitidissimum, versus latera punctatum, fronte lœvi, tenue canaliculata, supra os rotundatum depreßa. Antennæ dimidio corpore fere longiores, basi ferrugineæ, extrosum crassiores fuscæ, pubescentes. Thoracis structura & color ut in præcedenti omnino, supra modice convexus, in disco subtilissime & obsolete, versus latera evidentius punctulatus. Scutellum ut in priori. Elytra thoracè latiora & quadruplo longiora, supra valde convexa, viridi-aurea, nitidissima, crebre, evidenter punctata, punctis versus latera & futuram sub-seriatim; futura tota, & vitta in singuli elytri medio, abbreviata, nec basin neque apicem attingens, cœruleo-viola-cea. Corpus subtus viridi-æneum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes mediocres, viridi-ænei, tarsis obscurioribus, cinereo-spongiosis.

Obs. Chrys. Speciosa, Linn. syst. 2. 588. 19. Fabr. Eleut. 1. 441. 112., secundum sententiam Dom. Illigeri & Schönherrii, hujus Speciei varietas elegantior, sed hæc mihi plane ignota.

18. *C. varians*: breviter ovata, convexa, thoracis margine parum incrassato, elytris creberime, vase punctatis, colore vario.

Var. *a*, supra æneo-virescens, subtus cœrulea.

Fabr. Eleut. 1. 433. 64. *Payk. fn.* 2. 60. 12.

Panz. fn. 44. f. 9. *Schönh. synon.* 2. 249. 70.

Var. *b*, supra cuprea, nitidissima, subtus viridi-ænea, femoribus cupreis. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Chrys. Centaurei. *Fabr. Eleut.* 2. 428. 31.
Panz. fn. 44. f. 10.

Chrys. Marshami. *Marsh. Ent. Br.* 1. 173. 10?

Var. *c*, supra cœruleo-virescens, subtus cœrulea.

Var. *d*, tota cœrulea.

Var. *e*, tota violacea.

Chrys. Hyperici. *De Geer Ins.* 5. 312. 20. tab.
9. f. 13.-17.

Var. *f*, tota nigra, femoribus sub-cœruleo-scentibus.

Chrysom. æthiops. *Fabr. Eleut.* 1. 429. 38?

Habitat in plantis variis, præsertim in Hypericis, ubique frequens; var. *f*, tamen rarius occurrit.

Descr. Magnitudo fere præcedentis, sed paullo brevior, rotundato-ovata. Caput breve, rotundatum, viridi-æneum, nitidum, obsolete punctulatum, ore

nigro-piceo; Antennæ thorace longiores, extrorsum crassiores, totæ nigrae, articulo primo supra viridææneo. Thorax brevis, latus, transversus, antice late & sat profunde emarginatus, lateribus sub-rectis, anguste marginatis, parum incrassatis; basi bisinuatus, supra convexus, viridææneus, nitidas, in disco subtilissime, obsolete, versus latera evidenter punctulatus. Scutellum triangulare, cœruleo-virescens, lave. Elytra antice thorace parum latiora, sed pone basin dilatata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, virescens, nitidissima, creberrime, vage punctulata. Corpus subtus cœruleo-violaceum, certo situ virescens, nitidum, vix punctulatum. Pedes mediocres, cœruleo-virescentes, tarsis piceis, griseo-spongiosis.

Var. b, supra aut saturatius rubro-cuprea, aut dilutius æneo-cuprea, subtus, cum pedibus, æneo-virescens; cæterum omni puncto conveniens; Thoracis margines vix in ulla varietate hujus speciei incrassati dici queant, modo punctura fortiori, & interdum impressione obsolete versus basin, a disco distincti.

Var. c, d, e, etiam colore tantum distincti, secundum diagnosin cuivis datam, & per transitum ab una in alteram connexi.

Var. f, fere tota nigra, interdum tamen in elytris & femoribus cœrulescenti-micans.

19. C. Raphani: oblongo-ovata, supra viridi-aurea, nitida, confertissime punctata, subtus cœrulea, thorace antice vix emarginato, fronte sulcata.

Fabr. Eleut. I. 430. 47. Payk. fn. 2. 62. 15.

Schönh. synon. 2. 245. 51.

Chrysom. viridula. De Géer Ins. 5. III. 19.

Chrysom. Polygoni. Linn. Fn. Sv. 520, var.
b. Ed. I:ma N:o 421.

Chrysom. Hypochæridis. Marsh. Ent. Br. I.
184. 35, teste Dom. Kirby; an id. Linn. just.
2. 589. 21. Fn. Sv. 516? forte secundum fe-
minam gravidam descripta.

Habitat in plantis oleraceis passim, minus
frequens; in Westrogothiæ Paroecia Wil-
ska-Klefwa, Rheum palmatum hortorum
quotannis misere devastat.

Descr. Magnitudo & statura C. Polygoni. Ca-
put majusculum, porrectum, viridi æneum, creber-
ime punctulatum, fronte canaliculata; oculi oblon-
gi, brunnei; os piceum, palporum maxillatum ar-
ticulo ultimo conico; antennæ thorace longiores,
crassiusculæ, basi viridi-æneæ, extrorsum nigro-fu-
scæ. Thorax brevis, transversus, antice vix emargi-
natus, lateribus parum rotundatus, anguste margi-
natus, basi truncatus, supra modice convexus, viri-
di-æneus, nitidus, creberime punctulatus. Scutel-
lum rotundatum, viridi-æneum. lœve. Elytra tho-
race multo latiora, & quadruplo longiora; supra
modice convexa, viridi ænea, nitida, confertissime
& profundius quam thorax, vase punctata. Corpus
subtus cœruleo-virescens, nitidum, vix punctulatum.
Pedes mediocres, viridi-ænei, nitidi, tarsis piceis.

Variat colore viridi cœrulecente, præsertim in
thorace. In feminis gravidis abdomen valde tumi-
dum evadit, ab elytris vix ultra dimidium occulta-
tum; talem forte, sub nomine C. Hypochæridis, de-
scriptis Cl. a Linné, loc. cit.

20. C. Polygoni: oblongo-ovata, cœrulea, nitida, confertissime punctata, thorace, ano pedibusque rufis.

Linn. syst. 2. 589. 24. Fn Sv. 520. Fabr. Eleut. 1. 439. 102. De Géer Ins. 5. 322. 26. Thunb. Act. Upf. 5. 108 38 Payk. fn. 2. 2. 61. 14. Schónh. Synon 2. 258. vii.

Galleruca ruficollis. Fabr. Eleut. 1. 479. 6. Schónh. synon. 2. 289. 9. forte eadem, secundum sententiam Dom. Illig. in Mag. 3. 158. 102.

Habitat in *Polygono aviculari*, Rumice, aliisque plantis, ubique frequens.

Descr. Parva. Caput rotundatum, saturate cœruleum, subtiliter punctulatum, oculis oblongis, nigro-brunneis. Antennæ thorace multo longiores, basi plerumque ferrugineæ, extrorsum crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversus, antice parum emarginatus, lateribus & postice nonnihil rotundatus, angulis obtusis, supra convexus, totus rufus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum rotundatum, cœruleum, sub-læve. Elytra thorace multo latiora, & quadruplo longiora, supra valde convexa. cœrulea, interdum violacea, rarius virescens micantia, confertissime & profundius quam thorax, vase punctata. Thorax subtus rufus, medio nigro-cœruleus; pectus & abdomen cœrulea, parce punctata, ano rufo. Pedes mediocres, rufi, tarsis supra piceis.

21. C. Armoraciæ: breviter ovata, cœruleo-virescens, nitida, creberrime punctulata, subtus nigra, elytris basi plicatis.

Linn

Linn. Juss. 2. 588. 16. Fn, Sv. 515. Fabr.
Eleut. 1. 445. 136. Poyk. fn. 2. 60. 13.
Panz. fn. 44. f. 14. Schönh. Synon. 2. 268.
143.

Chrys. cœrulea Salicis. De Gèer Ins. 5. 318.
24. tab. 9. f. 24-33.

Var. b, Supra nigro-violacea.

Habitat in foliis Salicis, Betulæ, apud nos
rarius.

Descr. Minor, rotundata, Chr. cochleariae pa-
rum major, minus convexa. Caput breve, rotun-
datum, cœruleum, subriitter, obsolete punctulatum,
fronte sub-canaliculata; os piceum. Antennæ ino-
race parum longiores, inferne rufo-ferragineæ, ex-
trorum crassiores, nigrae. Thorax brevis, transver-
sus, antice paulo angustior, late & sat profunde e-
marginatus, lateribus anguste marginatus, basi ro-
tundatus, angulis sub-rectis; supra parum convexus,
cœruleus, vel cœruleo-virescens, nitidus, subtilissi-
me obsolete punctulatus. Scutellum parvum, trian-
gulare, cœruleo-virescens. Elytra thoracis basi la-
tiora, & pone basin magis dilatata, thorace quintu-
plo longiora, supra modice convexa, cœruleo-vi-
rescentia, nitida, creberissime, evidentius punctata,
punctis in ipsa basi rarioribus, sub-seriatis. Corpus
subtus nigrum, parum metallico-nitens, vix pun-
ctulatum. Pedes mediocres, nigri, tarsis piceis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superio-
ris, vel saitem elytrorum, violacea, interdum nigri-
cante sub-violaceo.

22, C. Sophiæ: breviter ovata, valde con-
vexa, cœruleo-virescens, antennarum ba-
si,

si, tibiis tarsisque pallide testaceis, elytris postice attenuatis, sub-acuminatis.

Fabr. Eleut. I. 445. 139. **Schall. Act. Hall.** I. 272. **Illig. Mag.** I. 416. 139. **Panz. Jn.** 25. f. 10. **Schénh. Jynon.** 2. 269. 147.

Habitat in *Finlandia*, ad *Urbem Wasa*.
Dom. Falander.

Descr. C. *Polygoni* brevior, sed crassior, multo magis convexa. Caput sub-triangulare, anterius angustatum, coeruleo-virescens, crebre, subtiliter punctulatum, foveolis duabus oblongis intra antennarum basin impressum, ore piceo; Antennæ thorace longiores, basi ferrugineæ, extrosum crassiores, nigrae. Thorax transversus, antice paullo latior, truncatus, lateribus anguste marginatus, basi rotundatus, supra valde convexus, coeruleo-virescens, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum rotundatum, coeruleo-virescens, sub-læve. Elytra antice thorace paullo latiora, & illo quadruplo longiora, apicem versus attenuata, sub-acuminata, supra anterius valde convexa, posterius declivia, tota coeruleo-virescentia, nitida, crebre, sed parum profunde, vase punctata. Corpus subtus obscure coeruleum, pectore fortius, ventre subtilissime punctulatis. Pedes mediocres, femoribus coeruleo-virentibus, nitidis, tibiis pallide testaceis, basi nigrantibus, tarsis testaceis, supra fuscescentibus.

Obs. Variat corpore toto supra læte violaceo. Vix Colaspidis generi associanda, sed potius *Colaspis Barbara*, **Fabr. Eleut.** I. 415. 15, quæ huic quoad structuram simillima, etiam ad Chrysomelas reducenda, ut rite observarunt **Dom. Latreille** & **Illiger**.

Sect. 2. Elytris regulariter punctato-striatis.

23. *C. geminata*: ovata, supra violacea, thoracis disco subtilissime punctulato, elytrorum striis per paria sub-approximatis, punctis striarum crebris, coarctatis.

Payk. *fn.* 2. 65. 19. Schônh. *funer.* 2. 244. 43.

Chrysom quinquejugis. Marsh. *Ent. Br.* 1.
173. 9?

Habitat in plantis passim, praesertim in Hypericis,

Descr. Chr. variante paullo major magisque ovata, alias varietati ejus e, colore simillima. Caput breve, rotundatum, violaceo-purpurascens, subtilissime, parce punctulatum, supra os rotundatim depresso, oculis magnis, oblongis, nigro brunneis. Antennæ thorace longiores, nigræ, extrosum parum crassiores. Thorax transversus, antice angustior, late & sat profunde semi-circulariter emarginatus, lateribus sub-rotundatus, anguste marginatus, evidenter incrassatus, postice sinuatus, angulis sub-rectis; supra modice convexus, violaceo-purpurascens, nitidus, in disco omnium subtilissime, obsolete punctulatus, intra margines sub-impressus, evidentius punctatus, impressione ad basin soveam brevem, profundam formante. Scutellum obtuse triangulare, cœruleo-violaceum, lœvissimum. Elytra thorace parum latiora, sed quintuplo longiora, supra valde convexa, violaceo-purpurascens, nitida; in singulo series novem e punctis majoribus, quarum octo exteriores per paria paullo magis approximatae, punctis in quavis serie ultra 24; interstitia seriarum etiam subtilissime, vase punctulata, Corpus subtus obscurius.

rius cœruleo. subvirescens, vix punctulatum. Pédes validi, cœrulei, tarsis piceis, subtus dense cinereo-spongiosis.

Obs. Chrys. quinque-jugis, Marsh. loc. cit. & Chr. gemellata, Panz. Fn. 44. f. 6, forte hujus speciei varietas, supra viridi-cuprea; propter puncta striarum crebra, numerosa; sed talis mihi non visa; Chrys. Hyperici, Marsh. Ent. Br. 1. 173. 8. Chr. gemellata, Rossi Mant. 1. 30. 72. quæ forte Chr. bicolor & fucata, Fabr. Eleut. N:o 39 & 32. huic quidem valde affinis, attamen diversa, paullo minor, striis gemelis evtrorum magis approximatis, punctis longe majoribus & paucioribus, vix ultra 12 ad 14 in singula stria, &c.

24. C. lamineæ ovata, supra viridi-cœrulea-scens, nitida, thorace levissimo, lateribus valde incrassato, elytris simpliciter punctato-striatis, punctis profundiis, remotis.

Fabr. Eleut. 1. 430. 45. Payk. fn. 3 add. 451. 19-20. Panz. fn. 44. f. 5. Schönh. synon. 2. 245. 49.

Chrysomela olivacea. Sthall. Att. Hall. 1. 272.

Chrysomela incrassata. Marsh. Ent. Br. 1. 186. 40.

Habitat in Scaniæ graminosis rarius. Dom. Fallén.

Descr. - Statuira precedentis, sed paullo major. Caput rotundatum, viridi-cœruleans seu olivaceum, nitidum, vix punctulatum, ore piceo. Antennæ thorace multo longiores, nigræ, basi rufo-piceæ, extorsum paullo crassiores, fuscæ-pubescentes. Tho-

rax brevis, transversus, anterius angustior, ibique late, sed parum profunde emarginatus, lateribus obliquis, rectis, anguste marginatis; basi sub-sinuatus, angulis acuminatis; supra in disco modice convexus, totus olivaceus vel viridi-cœrulescens, nitidissimus, lœvissimus; versus latera utrinque sulcus profundus, sub-arcuatus, impunctatus, unde latera valde incrassata appareant. Scutellum obtuse triangulare, concolor, lœve. Elytra antice vix thoracis basi latiora, sed pone basin dilatata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, olivacea, seu viridi-cœrulecentia, nitida; in singulo series novem, æquali spatio distantes, e punctis majusculis, impressis, remotis, stria suturali & lateralí punctis minoribus, magis coarctatis. Corpus subtus cœruleo visorescens, minus nitidum, sub-lœve. Pedes validi, cœruleentes, tarsis dense griseo-spongiosis.

Obs. Chr. Banksii, Fabr. Eleut. I. 430. 43, a Dom. Paykull in Fn. Sv. 3. add. 450. I-2. ut Finlandiæ incola erroneæ allata, ad Europam meridionalem pertinet, vid. Schönh. Synon. 2. 244. 46.

25. C. Cochleariæ: breviter sub-ovata, cœrulea, nitida, subtus obscurior, elytris subtilissime punctato-striatis, humeris gibbis, anno testaceo.

Fabr. Eleut. I. 445. 137. Payk. fn. 2. 75. 29.
Panz. fn. 44. f. 15. Schönh. synon. 2. 268.
144.

Altica Erucæ. Panz. fn. 21. f. 2. Crit. Rev.
I. 88.

Var. b, supra violacea, nitida,

Chry-

Chrysom. Betulae. Linn. syst. 2. 537. 10. Fn.
Sv. 514. Marsh. Ent. Br. 1. 178. 20.

Chrys. Plantaginis. De Géer Ins. 5. 322. 25.

Var. c, cœruleo-virescens, plerumque dimidio minor.

Habitat in plantis aquaticis, Veronica Becabunga; Ranunculis; aliisque, ubique frequens.

Descr. Parva, brevis, statura C. Armoraciæ, sed minor. Caput sub-triangulare, versus os angustum, cœruleum, nitidum, crebre punctulatum, oculis magnis, brunneis. Antennæ thorace longiores, nigræ, extortum multo crassiores. Thorax brevis, transversus, anterius paullè angustior, ibique late emarginatus, lateribus obliquis, sub-rectis, anguste marginatis; basi sub-sinuatus, supra modice convexus, cœruleus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus, absque rudimento impressionis lateralis. Scutellum sub rotundatum, cœruleum, laxe. Elytra magna, thorace multo latiora & quadruplo longiora, supra valde convexa, cœrulea, nitida, subtilissime punctata, striata, punctis crebris, coarctatis, interstitiis adhuc subtilius, obsolete punctulatis; in medio baseos fovea impressa, & extra illam callus humeralis elevatus. Corpus subitus obscurius nigro-cœruleum, obsolete punctulatum, ani margine testaceo. Pedes mediocres, nigro-cœrulecentes, tarsis griseo-spongiosis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris, præsertim elytrorum, violaceo-purpureo-centre, nitidissimo.

Var. c, plerumque dimidio minor, supra magis virescens, cæterum omnes simillimæ,

26. C. litura: breviter ovata, convexa, rufo-testacea, elytrorum sutura vittaque abbreviata, nigris, abdominalis antennarumque apice fuscis.

Fabr. Eleut. I. 429. 34. Payk. fn. 2. 74 28.

Panz. fn. 78. f. 6. Marsh. Ent. br. I. 182.
27. Schönh. Synon. 2. 242. 37.

Var. b, pallidior; sutura elytrorum sola obscuriori. Payk. Schönh. l. c. var. b.

Chrysomela olivacea. Marsh. Ent. Br. I. 181.
26.

Var. c, pallida, elytrorum sutura concolore.

Chrysomela flavicans. Fabr. Eleut. I. 429. 33.

Chrys. Cerasi. Linn. Syst. 2. 588. 13?

Habitat in foliis Pruni Padi, apud nos rarius. Dom de Paykull.

Descr. Minor, Chr. Polygoni fere brevior, magis convexa. Caput rotundatum, testaceum, nitidum, sat crebre punctatum; vertice maculis duabus fuscis, saepe sub-thoracis margine occultatis; oculi oblongi, brunnei. Antennae thorace longiores, pallide testaceæ, extrorsum crassiores, fuscæ. Thorax brevissimus, transversus, antice late, sed non profunde emarginatus, lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, basi, sub-sinuatus, supra valde convexus, rufo-testaceus, nitidus, in disco subtilissime versus latera evidenter punctulatus. Scutellum rotundatum, fulco-piceum, læve. Elytra thorace parum latiora, sed quadruplo longiora & ultra, supra valde convexa, plerumque pallidius testacea, interdum cinerascenti-olivacea, nitida, sat profunde

Inj. Succ. T. I. P. III. Hh pun-

punctato-striata, interstitiis in disco posteriori etiam crebre punctatis; sutura tota nigro-fusca. & vitta inaequalis, abbreviata, in disco anteriori cuiusvis elytri, ejusdem coloris. Corpus sertus rufo-piceum, punctulatum, ano dilutiori. Pedes toti testacei, tibiis apice exteriori acuminato-productis.

Var. b, differt tantum defectu vittæ lateralis elytrorum.

Var. c, sutura elytrorum concolore, pallida differt.

Obs. Chrys. Cerasi Linn. Syst. 1. c. hoc pertinere videtur, sed Insectum sub eodem nomine in Fa. Sv. n:o 570, descriptum, certe Crioceris Cerasi, Fabr. Eleut. 1. 456. 30. Orsodachna, Chlorotica Schönh; Synon. 2. 287, 1,

27. C. dispar: oblongo-ovata, convexa, flavo-testacea, thorace scrobiculato-punctato, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis levibus.

Payk. fa. 2. 66. 20. a. Schönh. synon. 2. 256-98.

Chrysomela pallida. Linn. syst. 2. 589. 25. Fa. Sv 521. Fabr. Eleut. 1. 437. 90. Panz fa. 78. f. 4.

Chrysomela Padi. De Gér Inf. 5. 301. II. tab. 9. f. 2.

Var. b, pectore abdomeque piceis.

Var. c, tota flavo-testacea; elytris nigromaculatis. Payk. Schönh. 1. c. var. b.

Var. d, ut var c, sed pectus & abdomen nigro-picea.

Var.

Var. *e*, ut var. *d*, sed thorax etiam nigro-brunneus, & elytra parum nigro-maculata.

Var. *f*, nigra, capite, vel saltem ore, antennis; pedibus, thoracis lateribus, elytrorumque maculis variis, obsoletis, testaceis. Payk. l. c. var. *e*. Schönh. var. *c*.

Var. *g*, nigro-brunnea, capite, vel saltem ore, antennis pedibusque testaceis. Payk. var. *f*. Schönh. var. *d*.

Var. *h*, nigra, capite, antennis, genubus tarsisque testaceis.

Var. *i*, nigra, ore, antennarum basi, genubus tarsisque testaceis. Payk. var. *f. not.* Schönh. var. *e*.

Habitat in Corylo, Pado; ubique frequens, folia misere devastans; varietates vero *e-i*, rarius, & praesertim in Alpium vicinilis occurunt.

Descr. Statura fere C. viminalis, sed pleramque dimidio minor, angustior. Caput rotundatum, testaceum, rude & obsoletius punctatum, oculis oblongis nigris, prominulis. Antennae thorace longiores, tenues, testaceae, interdum apice fasciculentes. Thorax brevis, latus, transversus, antice late, sed non profunde emarginatus, lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, non incrassatus, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, totus testaceus, parum nitidus, crebre punctatus, punctis in disco minoribus, versus latera profundis, difformibus, confluentibus, unde latera scrobiculato-rugosae.

sa apparent; in medio dorsi plerumque puncta duo impressa, paria, saepe fusca. Scutellum breve, rotundatum, testaceum, laeve. Elytra antice vix thorace latiora, sed pone basin dilatata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, flavo-testacea, magis nitida, profunde punctato-striata, praesertim anterius & versus latera, striis in disco posteriori irregularibus, confusis. Corpus subtus flavo-testaceum, obsoletius punctulatum. Pedes longiusculi, validi, flavo-testacei, tibiis ante apicem externe; dente valido armatis.

Var. b, simillima, modo pectus & abdomen plus minusve picea.

Var. c, quoad colorem corporis ut in a, & var. d, ut in b, omnino, sed elytra plus minusve nigro-maculata; plerumque in singulo elytro puncta quinque, primum parvum, juxta humerum; secundum majus, versus scutellum; tertium in disco, paullo ante medium; quartum in medio futuræ, utrisque elytris commune; quintum paullo pone medium, in disco; puncta haec interdum magna, dilata, fere in fascias confluentia, saepius vero parva; uno alterove etiam deficiente; punctum centrale tamen plerumque adest.

Var. e, ut var. d, sed thorax etiam obscuratus, nigro-brunneus, lateribus pallidioribus.

Var. f, ut var. e, sed adhuc magis infuscata, maculis elytrorum ita dilatatis & confluentibus, ut fundus pallidus hinc illinc tantum obsolete translucet.

Var. g, h, i, adhuc obscuriores, secundum diagnosis cuivis datam.

Obs. Color Insecti nimis variabilis, nominis mutationem justificat,

28. C. affinis: oblongo-ovata, convexa, nigra, thoracis disco sub-lævi, elytris rufotestaceis, tenue punctato-striatis, maculis quinque nigris.

Schónh. *synon.* 2. 257. 99. var. c.

Chrysoniela dispar. *Payk. fn.* 2. 67. 20. var. d.

Var. b, Elytro singulo maculis tantum quatuor nigris. *Schónh. loc. cit. var. d.*

Var. c, thoracis lateribus tibiisque rufescens tibus, maculis elytrorum ut in a. *Schónh. loc. cit. var. b.*

Var. d, thoracis lateribus tibiisque rufescens tibus, elytrorum maculis ut in b; *Schónh. l. c. a.*

Chrys. dispar. *Payk. fn.* 2. 67. 20. var. c.

Habitat in Provinciis Borealibus, Lapponia, Finlandia, in foliis Salicum; a & b, frequentiores, c & d, rarius occurunt.

Descr. Præcedenti quidem similis & affinis, at tamen vere distincta videtur, nitidior, subtilius punctata, thoracis disco nempe subtilissime punctulato, elytrorum striis tenuibus, macularum sito. alio, &c. Caput breve, rotundatum, nigrum, nitidum, subtilissime, obsolete punctulatum, oculis brunneis. Antennæ longitudine fere dimidii corporis, extorsum crassiores, nigræ, inferne ferrugineæ, articulo primo supra nigro. Thorax brevis, transversus, ante late, sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi bisinuatus, angulis prominulis, acutis; supra modice convexus, otus niger, nitidus, in disco subtilissime, ut vix

visibiliter, punctulatus, versus latera evidentius, vage punctatus. Scutellum rotundatum, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice thoracis basi paullo latiora, pone basin nonnihil dilatata, thorace quinto longiora, supra valde convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter punctato-striata, punctis striarum parvis, valde coarctatis, interstitiis laevibus, praeterquam in disco posteriori, ubi puncta nonnulla parva, inter striae sparsa; in singulo elytro maculæ quinque nigrae, quarum prima intra humerum, parva, oblonga; secunda versus scutellum, magna, difformis; tertia intra marginem, ante medium, transversa; quarta versus suturam, paullo pone medium, magna, oblonga, saepe cum macula scutellari connecta; quinta intra marginem, pone medium, minor, rotundata. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes mediosres, toti nigri, structura ut in praecedente.

Var. b, differt tantum defectu maculæ posticæ intra marginalis elytorum.

Var. c, ut a, sed tibiæ & latera thoracis plus minusve pallidiora, testacea aut livida.

Var. d, ut var. c, sed maculæ elytorum ut in b.

Obs. Variat etiam macula humerali in duas divisæ, ut quatuor maculæ intra-marginales extant,

39. *C. rufipes*: oblongo-ovata, nigra; ore, pedibus, thorace elytrisque rufis, his nigro-maculatis, elytris tenue punctato-striatis, interstitiis obsoletius punctulatis.

*De Géer Ins. 5. 295. 4. tab. 8. f. 25. Payk.
fn. 2. 69. 22. Schónh. synon. 2. 254. 92.*

Chrys. io-notata. Marsh. Ent. Br. 1. 175. 13.

Ha-

Habitat in foliis Populi tremulæ, non infrequens.

Descr. Magnitudo & statura omnino Chr. viminalis, sed os & pedes semper rufa, &c. Caput breve, rotundatum, nigrum, creberrime punctulatum, ore toto, cum labro & area sub-triangulari supra-labiali rufo-testaceis. Antennæ thorace parum longiores, testacea, extorsum crassiores, fuscæ. Thorax brevis, latus, transversus, antice paucilo angustior, late & sat profunde emarginatus, lateribus parum rotundatus, angustissime marginatus, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, in disco subtilissime, versus latera evidenter punctatus; juxta basin maculæ duæ difformes nigrae, striga angustiori in ipsa basi connexæ. Scutellum rotundatum, nigrum, nitidum, læve. Elytra thoracis basi parum latiora, sed quintuplo longiora, supra valde convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter punctata-striata, interstitiis confertissime, sed obsolete punctulatis; in singulo plerumque maculæ quinque nigrae, prima intra humerum, magna, oblonga; secunda illi opposita, versus futuram, rotundata; tertia intra marginem, ante medium, plerumque transversa; quarta versus futuram, pone medium, rotundata, saepe parva; quinta intra marginem, posterius, etiam rotundata & plerumque parva; ultimæ duæ etiam saepe delectant, aut ambæ, aut una alterave. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, confertissime punctatum, ventris lateribus, ano, & interdum segmentorum posticorum marginibus testaceis. Pedes breviusculi, validi, toti rufo-testacei, tibiis ante apicem externe dente valido armatis, ut in prioribus.

so. C. viminalis: oblongo-ovata, nigra, ore pedibusque concoloribus, elytris subtiliter
Hh 4

liter punctato-striatis, interstitiis conser-
tissime punctulatis, antennarum basi ano-
que testaceis.

Var. *a*, Thorace elytrisque rufo-testaceis,
immaculatis.

Chrys. viminalis. Panz. fn. 78. f. 3.

Var. *b*, Thorace rufo, immaculato, elytris
rufis, basi nigro-maculatis.

Var. *c*, thorace rufo, punctis baseos duo-
bus, saepe tribus, nigris, elytris rufis,
immaculatis.

Chrys. viminalis. Linn. syst. 2. 590. 31. Fn.
Sv. 524. Fabr. Eleut. 1. 436. 83. Payk.
fn. 2. 68. 21. a. Schönh. synon. 2. 254. 93.

Chrys. hæmorrhoidalis, alter Sexus, De Geer.
Ins. 5. 297. 6.

Var. *d*, Thorace ut in var. *c*, elytris basi
nigro-maculatis.

Var. *e*, thorace rufo, plaga magna media
baseos nigra, elytris rufis immaculatis.

Var. *f*, thorace ut in var. *e*, elytris rufis,
basi nigro-maculatis.

Var. *g*, omnino ut var. *f*, sed elytro sin-
gulo maculis quinque nigris, distinctis,
notato. Payk. Schönh. var. *b*.

Chrys. 10-punctata. Linn. syst. 2. 590. 32. Fn.
Sv. 525. Fabr. Eleut. 1. 436. 86. Panz. fn.
109. f. 7.

Chrys.

Chrys. nigripes. De Géer Ins. 5. 296. 5.

Var. *h*, ut var. *g*, sed maculae elytrorum valde dilatatae, confluentes. Schónh. l. c. var. *e*.

Chrys. Baaderi, mas, Panz. fn. 24. f. 14. Crit. Rev. 1. 75.

Var. *i*, ut var. *h*, sed plaga nigra thoracis major, apicem fere attingens, & elytra nigra, margine laterali & baseos, ut & suturæ antica pars, rufo-testacea. Schónh. l. c. var. *f*. Payk. l. c. var. *d*.

Chrys. Baaderi, femina. Panz. fn. 59. f. 2.

Var. *k*. Thorace toto nigro, elytris rufis immaculatis. Payk. Schónh. l. c. var. *c*.

Var. *l*, tota nigra, antennarum basi annoque rufescens. Payk. l. c. var. *e*, Schónh. l. c. var. *f*.

Chrys. hæmorrhoidalis. Fabr. Eleut. 1. 444. 131. De Géer. Ins 5. 297. 6. a. Panz. fn. 78. f. 7. Linn. Syst. 2. 587. 6. Fn. Sv. 508.?

Habitat in foliis Salicis, præsertim cinereæ, ubique vulgatissima; varietates *h*, *i*, *k*, tamen parcus obviæ.

Descr. Media. Caput rotundatum, nigrum, ore concolore; fronte inæquali, creberrime punctulata; inter oculos interdum puncta duo ferruginea. Antennæ thorace parum longiores, inferne ferrugineaæ, extorsum crassiores, nigræ. Thoracis structura ut

in praecedenti omnino, in a, & b, supra rufo-testaceus, sub-nitidus, immaculatus, in disco subtilissime, versus latera profundiis punctatus. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma etiam eadem, supra valde convexa, subtilater punctato-striata, interstitiis confertissime punctulatis, tota rufo-testacea. Thorax subitus in medio niger, lateribus late rufis; pectus & abdomen nigra, nitida, crebre punctata, ani marginè rufescente. Pedes mediocre, toti nigri, structura ut in prioribus.

Var. b, simillima a, sed prope basin elytrorum maculæ duæ aut tres nigræ, una oblonga juxta humerum, altera ei opposita, rotundata, versus suturam, & interdum tertia, minor, intra marginem, ante medium.

Var. c, versus basin thoracis gerit puncta duo nigra, libera, paria, aut parva, auf magis dilatata, & saepissime inter illos tertium, oblongum, interdum cum lateralibus confluens; cætera ut in a, omnia,

Var. d, quoad thoracis signataras ut var. c, elytra vero ut in b, basi nigro-maculata; præter maculas tres in var. b, descriptas, hæc varietas saepe gerit quartam, oblongam, interne versus suturam, pone medium.

Var. e, ad basin thoracis gerit maculam magnam, sub-emarginatam, nigram, quasi e punctis varietatu in c, & d, valde dilatatis, confluentibus, conflatam; cætera ut in a.

Var. f, quoad thoracem ut var. e, quoad elytra vero ut var. b, d.

Var. g, quoad thoracem ut var. e, & f; in elytris maculæ 5 distinctæ, nigræ; quatuor priores ut in var. d, descriptæ, quintum parvum, intra marginem, versus apicem.

Var. h, ut var. g, sed maculæ elytrorum valde dilatatae, vario modo confluentes,

Var.

Var. i, differt macula thoracis majori, apicem sere attingente, ut modo latera, anterius latius, ferruginea; elytrorum discus totus niger, limbo laterali inæqualiter, baseos anguste, & pars antica suturæ rufo-testaceis.

Var. k, thorace toto nigro, & elytris rufis immaculatis, differt, sed vix Chrys. lurida Linn. & Fabr. Sub hoc nomine aliam, colore simillimam, e Germania obtinui, vere distinctam, thoracis lateribus incrassatis, elytrorum striis multo profundioribus, interstitiis lœvissimis.

Var. l, tota nigra, nitida, antennarum basi annoque rufescens, exceptis; cæterum simillima, & saepe cum varietatibus antea descriptis copulata occurrit. Chrys. hæmorrhoidalis, Linn. Fn. Sv. 503, secundum descriptionem, vix huc pertinet.

gr. C. marginata: oblongo-ovata, supra fuscocastanea, thoracis lateribus incrassatis, elytrorum margine exteriori flavescente, alis rufescens.

Linn. syst. 2. 591. 39. Fn. Sv. 530. Fabr. E-leut. I. 441. 116. De Géer Ins. 5. 303. 14. Payk. fn. 2. 71. 24. Panz. fn. 16. f. 11. Schönh. synon. 2. 263. 125.

Var. b, Elytris castaneis, vix vel parum cæneo-micantibus, margine pallido.

Var. c, capite, thorace corporeque subtus piceis aut rufo-brunneis, nitidis, ore, antennis, elytris pedibusque testaceis.

Habitat in pratis & agris aridis, præsertim in Scabiosa arvensi, passim; var. c, in Gort-

Gottlandia, a Dom. *Odhner* capta, a
Dom. *Schönherr* communicata.

Deser. Magnitudo & fere statura præcedentis, sed paullo minus convexa; variat etiam dimidio minor. Caput breve, rotundatum, fusco-æneum, nitidum, subtilissime, parce punctulatum, ore oculisque nigris; Antennæ thorace longiores, basi rufo piceæ, extorrisum paullo crassiores, nigræ. Thorax brevis, transversus, anterius paullo angustior, ibique late & sat profunde emarginatus, lateribus incrassatus, anguste marginatus, basi sinuatus, supra modice convexus, fusco-æneus, nitidus, in disco subtilissime, obsolete punctulatus, versus latera longitudinaliter impressus, impressione profundius punctata. Scutellum oblongo-triangulare, virescenti-æneum, nitidum, læve. Elytra antice thorace parum latiora, pone basio dilatata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, fusco-virescenti-ænea, parum nitida, margine lateralí toto late luteo seu flavo-rufescente; striæ elytrorum punctatæ, tenues, minus regulares, per paria nonnihil approximatae, intersticiis hinc illinc vague punctulatis. Alæ pallide rufescentes. Corpus subtus nigrum vel nigro-virescens, magis nitidum, vix punctulatum, ani margine livide. Pedes mediocres, nigri, nitidi, tarsis piceis.

Var. b, differt tantum elytrorum colore pallidiori, castaneo, vel fulco-testaceo, interdum æneomicante, margine semper pallidiori.

Var. c, adhuc dilutior, ut in diagnosi indicatum, forte nuper exclusa & immatura.

32. C. analis: oblongo-ovata, nigra, thorace lateribus non incrassato, disco lævissimo, elytris obscurioribus, margine laterali rufo, alis albidis,

Linn.

Linn. *Just.* 2. 592. 42. Fabr. *Eleut.* 1. 442. 118.
 Payk. *fn.* 2. 72. 25. Panz. *fn.* 16. f. 13.
 Schönh. *Iynon.* 2. 263. 127.

Var. *b*, capite thoraceque nigro-æneis, nitidissimis, elytris obscurioribus, sub-violaceis, subtiliter punctato-striatis, margine rufo. Payk. Schönh. loc. cit. var. *b*.

Chrysom. Schach. Fabr. *Eleut.* 1. 441. 117.

Var. *c*, capite thoraceque cœruleo-violaceis, nitidissimis; elytris rubro-violaceis obscurioribus, margine rufo. Schönh. 1. c. var. *c*.

Chrysom. Schach. Panz. *fn.* 16. f. 12.

Chrysom. lomata. Herbst. *Archiv.* 4. 54. 20.
tab. 23. f. 8.

Habitat in aridis, sub lapidibus, non infrequens.

Descr. Statura præcedentis, sed duplo minor & ultra. Caput rotundatum, nigrum, nitidissimum, læve, ore piceo. Antennæ thorace multo longiores, nigrae, extrorsum crassiores, articulis duobus baseos ferrugineis. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra parum convexus, niger, nitidissimus, politus, in disco lævissimus, versus latera punctatus, sed non impressus, quare latera non incrassata apparet; intra marginem utrinque, saepe, non vero semper, punctum majusculum, impressum. Scutellum triangulare, nigrum, nitidissimum, læve. Elytrorum forma ut in priori, supra nigra, interdum fusca, æneo-micantia, obscuriora, subtiliter & minus ordinatae punctato-striata, interstitijs etiam hic illic vagè pun-

punctulatis; margo lateralis totus late rufus. Alae cinereo-albidæ. Corpus subitus nigrum, nitidum, lœve, ani marginæ fulco-testaceo. Pedes mediocres, nigri, nitidi.

Var. b, & c, colore tantum differunt, aut nigro-væneo, aut cœruleo-virescente, aut violaceo, nitidissimo; plerumque etiam magnitudine minores; forte masculi, saepius in copula cum a, capti.

33. C. aucta: ovata, convexa, supra cœrulea vel cœruleo-virescens, elytrorum margine rufo, capite thoraceque confertissime punctatis.

Fabr. Eleut. 1. 442. 119. Payk. fn. 2. 72. 26.

Panz. fn. 16. f. 14. Schénh. synon. 2. 264. 128.

Var. b, Elytrorum margine concolore.

Chrys. glabra. Herbst. Archiv. 4. 60. 45.

Habitat in pratis humidis, non infrequens;

var. b, raro occurrit.

Deser. Parva, Chr. Polygoni duplo minor, breviter ovata, obtusa, convexa; aut cœrulea, aut cyanæ, aut cœruleo-virescens. Caput retractum, rotundatum, cœruleum, fronte inæquali, creberrime profunde punctata. Antennæ thorace longiores, totæ nigrae, extorsum multo crassiores. Thorax brevis, transversus, anterius fere latior, ibique late & profunde emarginatus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus, anguste marginatus, basi sinuatus, supra modice convexus, cœruleus, confertissime profunde punctatus, præsertim versus latera. Scutellum rotundatum, cœruleum, lœve. Elytra thoracis basi latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde

valde convexa, cœrulea, magis nitida. regulariter punctata, interstitiis lœvibus; margo lateralis totus late rufo-testaceus. apice suturæ tantum cœruleo. Corpus subtus nigrum, vel nigro-subvirescens, confertissime punctulatum. Pedes medios, nigro-cœrulecentes, femoribus nitidis.

Var. b, omni puncto simillima, modo margo elytrorum disco concolor; nigro-cœrulecens vel virescens;

54. C. marginella: oblonga, supra cœrulea vel cœruleo-virescens, thoracis elytrorumque lateribus late luteis.

Linn. syst. 2. 591. 40. Fn. Sv. 531. Fabr. Eleut. i. 442. 122. Payk. fn. 2. 73. 27. Panz. fn. 16. f. 15. Schönh. synon. 2. 264. 130.

Chrysom. marginella ranunculi. De Géer Ins. 5. 304. 15.

Var. b, Vitta abbreviata lutea in apice elytrorum, juxta suturam, cum flavedine marginis connexa. Schönh. l. c. var. b.

Chrysom. Hannoveriana. Herbst. Arch. 4. 54. tab. 23. f. 10.

Var. c, vitta eadem abrupta, nec cum flavedine marginis connexa. Schönh. loc. cit. var. c.

Chrysom. Potentillæ. Herbst. Arch. 4. 55. 23. tab. 23. f. ii.

Var. d, vitta eadem contigua, versus basin elytrorum extorrisum flexa. Payk. l. c. var. b. Schönh. var. d. Chrys.

Chrys. Hannoverana. Fabr. Eleut. I. 443. 123.

Panz. fn. 16. f. 16.

Chrys. Ranunculi. Herbst. Arch. 4. 55. 24. tab.
23. f. 12.

Habitat in pratis humidis, præsertim in Caltha palustri, Ranunculis, frequens; var. c, & d, parcius occurunt.

Descr. Longitudo C. Polygoni, sed angustior, præsertim a, qui forte mas; var. b, seu femina, crassior, magis ovata. Caput sub triangulare, versus os angustatum, nigro-cœrulescens, crebre & sat profunde punctatum, supra os impressum. Antennæ thorace longiores, extrorsum multo crassiores, totæ nigræ. Thorax transversim quadrangulus, antice late, sed non profunde emarginatus, lateribus sub-incrassatus, anguste marginatus, basi truncatus, supra modice convexus, undique crebre punctatus, in medio longitudinaliter cœruleus, nitidus, lateribus supra & subtus late luteis. Scutellum rotundatum, cœruleum, nitidum, lœve. Elytra thorace latiora, & fere quintuplo longiora, supra modice convexa, cœrulea, nitida, regulariter punctato-striata, interstitiis lœvibus; margo lateralis totus late luteus. Pectus & abdomen nigro-cœrulecentia, pectore crebre & sat profunde, ventre parcius & subtilius punctatis. Pedes longiusculi, nigro-cœrulecentes.

Var. b. paullo major, præsertim crassior, forte femina; differt præterea vitta abbreviata lutea in apice elytorum; juxta suturam, cum margine flavo connexa;

In var. c, vitta eadem a margine ab-rupta, & præterea sœpe versus basin elytorum exterius, lineola alia abbreviata, lutes.

In

In var. d, vitta illa integra, basin attingens, & ante medium extrosum arcuata; propter staturam crassiorem, varietates omnes ad sexum femineum pertinere videntur.

35. C. vitellinæ: oblongo-ovata, parum convexa; viridi-ænea, nitida, elytris tenui punctato-striatis, basi plicatis, ani margine rufescente.

Linn. syst. 2. 589. 23. Fn. Sv. 519. De Geer Ins. 5. 323. 27. Marsh. Ent. Br. 1. 180. 23. Schönh. synon 2. 266. 138.

Galleruca vitellinæ. Fabr. Eleut. 1. 487. 49. Payk. fn. 2. 94. 12. Panz. fn. 44. f. 16.

Var. b, corpore supra cupreo aut obscurius olivaceo-æneo.

Var. c, corpore supra nigro, subtus nigro-æneo. Payk. Schönh. loc. cit. var. c.

Var. d, cœrulea, nitida, plerumque dimidio major. Fabr. Payk. Schönh. l. c. var. b.

Chrys. vulgatissima. Linn. syst. 2. 589. 22. Fn. Sv. 517. Marsh. Ent. Br. 1. 179. 22.

Chrys. cœrulea Betulæ. De Geer Ins. 5. 317. 23.

Galleruca Betulæ. Panz. fn. 102. f. 4.

Habitat in Salicibus, Populo, Betula; ubi que vulgatissima; folia exedens; var. c, parcus occurrit.

Inj. Svec. T. I. P. III. II Descri

Descr. Statura oblonga praecedentis, sed plurimumque paullo major. Caput sub-triangulare, versus os angustatum, viridi-aeneum, nitidum, sat crebre punctulatum, oculis prominulis, brunneis. Antennae thorace multo longiores, basi sub-ferrugineæ; extorsum paullo crassiores, nigrae. Thorax brevis, transversas; antice late, sed parum profunde emarginatus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus, anguste marginatus, basi sub-truncatus, supra modice convexus, viridi-aeneus, nitidus, in disco subtilius, versus latera profundius, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, lave. Elytra thorace latiora, & illo quintuplo longiora, supra parum convexa, viridi-aenea, nitida, punctis parvis coarctatis, in disco interiori sat regulariter, versus latera magis confuse striatis. Corpus subfuscus obscurius virescenti-aeneum, vix punctulatum, anno plerumque, non vero semper, ferrugineo-marginato. Pedes mediocres, viridi-aenei, tarsis fusco-spongiosis.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris, aut saturatius cupreo, aut olivaceo-aeneo.

Var. c, supra tota nigra, subitus nigro-coeruleo-fuscens;

Var. d, plerumque dimidio major, tota saturatae coerulea, interdum virescenti-micans, cæterum omni punto conveniens, ut vix specie distincta.

H E L O D E S.

Palpi breves, medio crassiores; maxillares vix maxillarum longitudine, haud prominulæ; articulo ultimo fere omnium breviter ob-conico. Labium ad basin sub-angustius, ad apicem rotundato-dilatato-membranaceum. — Antennæ

articulis 5 ultimis, clavam elongatam, fere componentibus; clavæ hujus articulis 4 primis semi-globosis.

*Corpus elongatum, sub-lineare, latitudine saltu-
tem triple longius, depresso. Thorax qua-
dratus.* Latreille.

i. *H. Phellandrii:* nigro-aenea, nitida, tho-
racis margine laterali sinuato, femorum
basi tibialisque flavis, elytris punctato-stria-
tis, flavis, suturâ tota vittaque media æ-
neis.

Fabr. Eleut. i. 469. 1. Payk. fn. 2. 84. 1.
Schönh. Synon. 2. 277. 1.

Chrys. Phellandrii. Linn. syst. 2. 601. III. Fn.
Sv. 569. De Geer Ins. 5. 324. 28. tab. 9. f.
34.

Prasocuris Phellandrii. Latr. Gen. Ins. 3. 59. 1.

Crioceris Phellandrii. Thunb. Nov. Att. Upj.
5. III. 42. Panz. fn. 83. f. 9. Crit. Rev.
2. 89.

Habitat in plantis aquaticis, præsertim Phel-
landrio, frequens.

Descr. Chrysom. marginella multo longior, sed
angustior, cæterum ejus var. d, facie similis. Ca-
put porrectum, anterius angustatum, nigro-aeneum,
vel virescens, nitidum, crebre punctatum, fronte
impressa; oculi magni, oblongi, brunnei. Antennæ
vix thorace longiores, articulo primo magno, cla-
vato; 2-6 angustis, nodosis, his omnibus nigro-vi-
rescentibus, nitidis; ultimis quinque crassioribus,

griseo-fuscis, pubescentibus, opacis. Thorax sub-quadratus, apice parum emarginatus, lateribus fere reticis, tenue marginatis; basi truncatus, angulis sub-prominulis; supra parum convexus, crebre punctatus, nitidus, in medio longitudinaliter nigro-aeneus, lateribus late, sinuatim flavis. Scutellum mediocre, postice rotundatum, nigro-virescens, nitidum, vix punctulatum. Elytra thorace paullo latiora, & plus triplo longiora, sub-linearia, supra modice convexa, regulariter & sat profunde punctato striata, intersticiis sub-lævibus; flava, sutura tota, antrorium latius, & in singulo elytro vitta lata media, ante apicem abbreviata, nigro-aeneis, vel virescentibus. Corpus subitus nigro virescens, creiberrime punctulatum, thoracis lateribus late, antiquo margine luteis. Pedes breviusculi validi, femoribus basi luteis; tarsis crassiusculis nigro-virescentibus.

2. *H. Beccabungæ*: cœrulea vel sub-virescens, nitida, ano rufescente, elytris punctato-striatis, striis regularibus, rectis.

Payk. fn. 3. add. 451. 2.

Chrysom. Beccabungæ. Illig. Schneid. Mag. 5. 600. 7. Panz. fn. 25. f. II. Crit. Rev. I. 75. Marsh. Ent. Br. I. 186. 39.

Helodes violacea. Fabr. Eleut. I. 470. 3. Schönh. synon. 2. 278. 2.

561. *Habitat in Veronica Beccabunga & Anagallide; in Svecia Australi, rarius.*

Descr. Statura omnino præcedentis, sed plerique minor; etiam similis Chrys. Vitellinæ var. d. (*C. vulgarissima Linn.*) sed multo angustior, thorax longior, sub-quadratus, antice fere integer. &

striæ elytrorum regulares, adeoque abunde distinctæ, ut monstravit Dom. Prof. Illiger loc. cit. Caput quoad formam ut in præcedenti, cœruleum, nitidum, crebre & sat profunde punctatum, ore piceo; oculi oblongi, brunnei. Antennæ thorace paullo longiores, structura omnia ut in priori, articulis 6 inferioribus nigro-cœruleis, ultimis quinque majoribus, nigro fuscis, tenui pubescentibus. Thorax sub-quadratus, vel longitudine parum latior, antice vix emarginatus, lateribus sub-rectis, anguste marginatis; basi truncatus, angulis sub-prominalis; supra parum convexus, sub inæqualis, crebre & sat profunde punctatus, totus cœruleus, nitidus, interdum cœruleo-virescens. Scutellum mediocre, rotundatum, cœruleum, nitidum, vix punctatum. Elytra thorace paullo latiora, & fere triplo longiora, supra modice convexæ, cœrulea, interdum virescentia, nitida, regulariter & concinne punctato-striata, striis rectis, interstitiis subtilissime coriaceis. Corpus subtus cœruleo subvirescens, creberrime punctulatum, ani lateribus rufo-testaceis. Pedes breviusculi, validi, cœruleo-virescentes, tarsis crassiusculis, subtus griseo-spongiosis.

Subdivisio 4:ta Gallerucoideæ.

Antennæ inter oculos insertæ, saepe approximatae, filiformes, aut sensim extrosum paulo crassiores, articulis sub-cylindricis. Palpi medio crassiores, ad apicem conico-acuminati. Maxillæ bifidæ, lacinias sub-æque longis, externa graciliori, sub-lineari, interna sub-quadrata.

G A L L E R U C A.

*Instrumenta Cibaria & Antennæ ut in dia-
gnosi sub-divisionis indicatum. Caput par-
Li 3 vum,*

vum, semi-retractum, versus os angustatum.
Thorax brevis transversus, sc̄pissime iuæqualis, impressus. Elytra magna, ovata. Femora postica simplicia, non saltatoria.

Sect. IIa, Antennarum articulo secundo dimidio aut ultra breviori tertio.

¶. G. Tanaceti: nigra, immaculata, supra confertissime, profunde rugoso-punctata, thorace inæquali lateribus sinuato, elytris obsolete elevato-lineatis.

*Fabr. Eleut. 1. 481. 16. Latr. Gen. Ins. 3. 61.
 1. Payk. fn. 2. 86. 1. Panz. fn. 102. f. 2.
 Schónh. synon. 2. 290. 19.*

*Chrysom. Tanaceti: Linn. syst. 2. 587. 5. Fn.
 Sv. 507. It. Gottl. 270. De Geer. Ins. 5.
 299. 4. tab. 8. f. 27.*

Var. b, thorace elytrisque griseis.

Habitat in pratis & pascuis apricis, ubique frequens, tarda & ignava valde; var. b, raro occurrit.

Descr. Major in hoc genere, præsertim femina, quæ cum ovis gradata, valde intumescit. Caput rotundatum, convexum, nigrum, sub-nitidum, creberime & sat profunde punctatum, fronte obsolete canaliculata; os cinereo-pubescentes, oculi laterales brunnei, parum prominuli. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, nigræ, apice pubescentes, articulo primo magno, ob-conico; secundo parvo nodoso; 3-10 sub-obconicis, exterioribus gradatim paullo brevioribus; ultimo sub-conico. Thorax brevissimus, transversim quadrangulus, ante-

tice parum emarginatus, angulis prominulis, lateribus ante medium rotundato dilatatus, juxta apicem & versus basin sinuato-emarginatus, margine laterali elevato, reflexo, praesertim antice; basi tri-sinuata; supra parum convexus, totus niger, parum nitidus, inaequalis, vel hinc illinc, obsolete impressus, punctis majusculis, saepe confluentibus, creberrime obsitus. Scutellum rotundatum, nigrum, magis nitidum, obsoletius punctatum. Elytra magna; thorace multo latiora, & pone medium adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, tota nigra sub-nitida, punctis majusculis, sat profundis, vagis, creberrime adpersa, quoram interstitia rugulas retiformes constituant; margo lateralis valde reflexus, praesertim anterius; interdum in singulo elytro observantur lineæ quinque longitudinales elevatae, quarum suturæ proxima tenuis, obsoleta, reliquæ intra apicem per paria coeuntes, secunda nempe cum quinta, & tertia cum quarta; saepissime tamen omnes valde obsoletæ, vix observandæ. Alæ obscure fuscæ. Corpus subnigrum, sub-nitidum, subtilius & obsolete punctatum, tenue pubescens. Pedes longiusculi, validi, nigri, femoribus nitidis, tibiis ciliato-scabris.

Var. b, differt tantum thorace elytrisque griseis, adeoque sequenti simillima, elytrorum lineis elevatis magis obsoletis, unice distinguenda.

a. *G. rustica*: nigra, supra confertissime, profunde rugoso-punctata, thorace lateribus sinuato, elytrisque griseis, his lineis elevatis evidentioribus.

Fabr. Eleut. 1. 481. 15. Payk. fr. 2. 87. 3.

Panz. fn. 102. f. 1. Schönh. synon. 2. 290 17.

II 4 Chry-

Chrysom. rustica. Schall. *Ast. Holl.* 1. 274.

Habitat in Svecia Australi rarius. Dom.
de Paykull.

Descr. Majoribus præcedentis speciei individuis plerumque adhuc major, & color thoracis elytrorumque griseus, ut in ejas var. b; lineæ elevatæ elytrorum eodem numero ac situ, ut apud præcedentem, descriptæ, semper multo evidentiores, magis elevatæ, nitidæ; cæterum formatio partium, punctura & omnia, quoad minimum usque punctum famillima; an igitur vere distincta species, ut contendit Dom. Schaller, loc. cit.?

Obs. Varietas, a Dom. Payk. l. c. memorata: „Elytrorum lineis elevatis interruptis,“ quæ a Dom. Illiger Mag. 1. 423. 13. & Schönherr Synon. 2. 290. 18. ut distincta Species, sub nomine G. interrupta, numeratur, mihi plane ignota, nec Sveciæ incomitam esse credo.

g. *G. Capreæ:* oblongo-ovata, nigra, supra glabra, grisea, punctatissima, capite masculisque thoracis nigris, antennis longo-tibibus, inferne, tibiisque griseo-variis.

Fabr. Eleut. 1. 487. 46. Payk. fn. 2. 83. 4.
Panz. fn. 102. f. 7. Schönh. Synon. 2. 297.
57.

Chrysom. Capreæ. Linn. *Syst.* 2. 600. 100. Fn.
Sv. 566.

Var. b; thorace antennisque fere totis nigris, elytris fusco-brunneis. Payk. Schönh.
loc. cit. var. b.

Habi-

Habitat in Salice cinerea, aliisque, frequen-
tissima, folia misere devastans.

Descr. Media inter nostras hujus generis. Caput parvum, nigrum, crebre & sat profunde punctatum, fronte inaequali, canaliculata; oculi magni, prominuli, nigro brunnei. Antennæ filiformes, di-midio corpore multo longiores, articulo primo magno, crasso, obconico, basi nigro, apice griseo; secundo parvo, toto griseo, sequentibus sub obconicis, exterioribus gradatim brevioribus, tertio quartoque basi griseis, reliquis totis nigris. Thorax brevis, transversus, antice latior vix emarginatus, lateribus anguste marginatus, in medio rotundato-dilatatus, basi fere triangulatus, etiam anguste marginatus, supra parum convexus, inaequalis, rude rugoso-punctatus, glaber, griseus, maculis tribus nigris, media ob-triangulari, antice latiori, lateralibus difformibus, transversis. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sublaeve. Elytra thoracis basi latiora, humeris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, supra convexa, grisea, subnitida, glabra, confertissime vague punctata, sutura calloque humerali plerumque brunneis. Thorax & totum corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, tenui pubescens. Pedes longiusculi, validi, femoribus nigris, posticis crassioribus, sub arcuatis; tibiis basi griseis, extrosum fluorescentibus; tarsis nigro-fuscis.

Var. b, colore obscuriori tantum differt; Antennæ fere totæ nigrae; maculae nigrae thoracis dilatatae, confluentes, discum fere totum occupant; elytra fusco-brunnea; tibiæ tantum anteriores basi fusco-griseæ, extus nigrae,

4. G. Sanguinea: ovata, supra glabra, ru-
fa, confertissime profunde punctata, sub-

tus nigra, ano pedibusque rufis, antennis brevioribus, rufescentibus, apice fuscis.

Fabr. Eleut. i. 428. 54. Payk. fn. 2. 94. II.
Schönh. synon. 2. 299. 69.

Crioceris sanguinea. Ross. Fn. Etr. i. 105. 267.

Var. b, Elytro singulo lineolis duabus abbreviatis nigris. Payk. Ross. Schönh. loc. cit. var. b. Panz. fn. 102. f. 8.

Crioceris Crataegi. Marsh. Ent. Br. i. 223. 23.

Habitat in Svecia Australi rarius. Dom. de Paykull.

Descr. Praecedenti similis & affinis, sed paulo brevior, aliter colorata, antennis brevioribus, &c. distincta. Caput parvum, rufum, creberrime rugoso-punctatum, fronte sat profunde canaliculata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ vix dimidio corpore longiores, cæterum structura ut in priori, basi rufæ, articulis apice intuscati, extrosum nigro-fuscae. Thorax adhuc brevior quam in praecedente, cæterum similiter constructus, totus rufus, immaculatus, supra parum convexus, creberrime punctatus, in medio obsolete canaliculatus, & versus latera atrinque fovea lata impressus. Scutellum triangulare, piceo-rufum, sub-læve. Elytra thorace multo latiora; humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, supra convexa, tota rufa, glabra, confertissime & adhuc profundijs quam in praecedenti, rugoso-punctata. Pectus & abdomen nigra, subtiliter punctata, tenui pubescens, ano late rufo. Pedes inmediocres, toti pallidius rufi.

Var. b, differt tantum elytro singulo lineolis quibus abbreviatis nigris, una ante medium, inter-

rior, brevior, altera intra medium marginis, longior, utrinque attenuata.

Obs. Color paginæ superioris, pedum & ani, in vivo Insecto lâte sanguineus, post mortem dilutius rufus.

5. G. Viburni: ovata, convexa, flavescens-
ti- grisea, holoericeo-pubescent, subtilissime
coriacea, macula verticis, lineis trif-
bus thoracis calloque humerali elytrorum
nigris.

Polyk. fn. 2. 89. 5. Schönh. Synon. 2. 296. 55.

Crioceris Viburni. Marsh. Ent. Br. 1. 224. 13.

Habitat in foliis Viburni opuli, paucim co-
piose.

Descr. Statura G. Capreæ, & mas illi magnitudine æqualis; femina plerumque dimidio, imo du-
plo major. Caput crassum, deflexum, griseo-flave-
scens, subtilissime coriaceum, tenue pubescens, ver-
tice macula magna, rotundata nigra; mandibulæ a-
pice nigræ; oculi brunnei, minus prominuli. An-
tennæ maris dimidio corpore longiores, femoræ bre-
viores, in utroque nigræ, articulis basi testaceis.
Thorax brevissimus, transversus, antice truncatus,
lateribus ante medium angulato-dilatatus, vix margi-
natus; postice fere tri. sinuatus, supra conve-
xus, griseo flavescent, subtilissime coriaceus, tenue
pubescens; in medio dorsi fovea longitudinalis ob-
soleta, inæqualis, linea nigra inducta, & latera ut-
rinque latius nigra. Scutellum nigrum, coriaceum,
pubescens, apice truncatum vel sub-emarginatum.
Elytra thorace multo latiora, humeris prominulis,
& illo quintuplo longiora, supra convexa, griseo-
brunnea, subtilissime coriacea, pube brevi, deprecta,
grisea.

grisea, holosericeo-micante, obducta; callus humeralis vaide elevatus, niger, nitidus. Corpus subtus griseo-flavescens, subtilissime punctulatum, tenue pubescens, segmentorum ventralium marginibus fuscis. Pedes mediocres, griseo-flavescentes, tenue pubescentes.

6. *G. Calmariensis*: oblongo-ovata; subdepressa, supra griseo-flavescens, creberim punctulata, thorace maculis tribus, elytris vitta intra-marginali lineolaque baseos nigris.

Fabr. Eleut. I. 488. 52. *Latr. Gen. Inf.* 3. 62. 2. *Schönh. Synon.* 2. 298. 67.

Crioceris Calmariensis. *Thunb. Nov. Act. Ups.* 5. 93. 10.

Var. b, lineola nigra baseos elytrorum deficiente. *Schönh. l. c. var. b.*

Galleruca Calmariensis. *Payk. fn.* 2. 90. 8.

Habitat in foliis Ulmi, in Svecia Australi, Tarius.

Descr. Longitudo fere feminæ præcedentis, sed angustior, & multo minus convexa. Caput rotundatum, griseo-flavescens, crebre punctatum, fronte profunde canaliculata; in vertice macula triangularis nigra, opaca, & supra antennarum basin alia, didyma, nigra, nitida; oculi magni, prominuli, brunnei. Antennæ dimidio corpore fere longiores, supra longitudinaliter nigrae, subtus flavo-testaceæ. Thorax brevis, transversus, antice truncatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-triangularis, supra parum convexus, inæqualis, griseo-flavescens,

Greg

creberrime punctulatus, maculis tribus nigris, media longiori, lateralibus rotundatis, intra margines locatis. Scutellum rotundatum, flavescens, obsolete punctulatum. Elytra thorace multo latiora, & plus quam sextuplo longiora, supra parum convexa, griseo-flavescens, consertissime punctulata; tenui pubescentia; in signulo vitta intra-marginalis nigra, posterius latior, e callo humerali inchoata, apicem non attingens; & in medio baseos lineola parva, tenuis, abbreviata, ejusdem coloris. Thorax subtilis flavescens; pectus & abdomen nigra, obsoleta punctulata, parce pubescentia, ventris limbo testaceo. Pedes longiusculi validi, flavo-grisei, femoribus externe puncto, tibiis interne lineola nigro-fusca notatis; tibiae posticæ arcuatæ.

Var. b, differt tantum defectu lineolæ nigrae basos elytrorum.

7. *G. Nymphææ*: oblongo-ovata, sub-depressa, nigra, thorace flavo, maculis tribus nigris, ore, elytrorum margine laterali pedibusque flavis, femoribus basi nigris; major.

*Fabr. Eleut. I. 486. 45. Payk. fn. 2. 92. 10.
Panz. fn. 102. f. 6. Schönh. synon. 2.
296. 56.*

*Chrys. Nymphææ. Linn. suct. 2 600. 99. Fn.
Sv. 565. De Gér Ins. 5. 326. 31. tab. 10.
f. 1-6.*

*Crioceris Nymphææ. Marsh. Ent. Br. I. 224.
12.*

Var. b, thorace pallido, punctis tribus nigris, minutis, elytris cinereo-testaceis, margine pallido. Ha-

Habitat in foliis Nymphaeæ, in lacubus & fluviis passim.

Descr. Præcedente paullo major, præsertim latior, magis depressa. Caput rotundatum, flavo-testaceum, subtilissime coriaceum, vertice fere toto nigro; frons antica inter antennas tenue canaliculata; labrum & mandibularum apices nigro-piceæ; oculi prominuli nigro brunnei. Antennæ longitudine dimidiæ corporis, nigriæ, articulo primo apice, sequentibus 5, vel 6, basi, sub testaceis. Thorax brevissimus, transversus, antice latior, truncatus, lateribus paullo ante medium angulato-dilatatus, anguste marginatus, basi sub-trisinuatus, supra parum convexus, flavo-testaceus, valde inæqualis, in medio dorsi nempe foveoïæ duæ irregulares, una pone alteram, & alia utrinque versus latera, magna, rotundata, profunde punctata; in medio dorsi præterea litura oblonga, nigra, & versus marginem utrinque macula magna, rotundata, ejusdem coloris, marginem fere attingens. Scutellum sub-triangulare, apice rotundatum, nigrum, subtilissime punctulatum. Elytra thoracis basi multo-latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, apice ipso acuminata, supra depressa, in dorso medio fere impressa, nigra, opaca, crebre inæqualiter punctata, pilis minutissimis, depresso, cinereo-nitidis, crebre adspersa, margine laterali & apicis late flavescentibus. Thorax subtus lateribus flavus, medio niger; Pectus & abdomen nigra, opaca, subtilissime punctulata, tenuè pubescentia, ano late flavo-testaceo. Pedes longiusculi, flavo-testacei, femoribus basi plus minusve, genubusque nigro-fuscis.

Var. b, colore pallidiori tantum differt; thorax fere totus supra pallide flavus, lituris nigris parvis, obsoletis; elytra cinereo-testacea, margine pallidiori; pedes fere toti pallidi; cæterum magnitudo & omnia ut in a.

s. G. Sagittariæ: oblongo-ovata, parum convexa, nigra; thorace flavo, maculis tribus nigris, ore, elytrorum fuscorum margine, pedibusque flavescentibus, femoribus basi fuscis; minor.

Var. b, pallidior, thorace griseo-flavescente, maculis nigris obsoletis, elytris griseo-testaceis, margine pallidiori, femoribus basi parum infuscatis.

Payk. fm. 2. 93. not. sub G. Nympheæ.

Habitat in Sagittaria Sagittifolia, aliisque plantis aquaticis, passim.

Descr. Præcedenti quoad colores simillima, sed plus duplo minor, paullo magis convexa, præser-tim in elytris, & ut mihi videtur, vere distincta. Caput quoad formam & colores ut in præcedenti o-mnino, sed paullo evidenter punctulatum, fronte profundius impressa. Antennæ ut in præcedenti. Thoracis structura eadem, etiam color & soveolæ, sed maculæ nigrae minores, saepè obsoletæ, & punctura plerumque fortior. Scutellum brevius quam in priori, sub-quadratum, apice truncatum, nigro-piceum, punctulatum, tenue pubescens. Elytra quoad puncturam & pubescenciam ut in priori, sed paullo breviora, apice minus acuminata, supra paullo magis convexa, nullatenus impressa, rarius nigricatia, plerumque fusca vel fusco-brunnea, mar-gine laterali & apicis pallido; sutura etiam plerum-que pallescit. Corpus subtus ut in præcedenti. Pe-des plerumque griseo-pallidi, genubus tassisque in-fuscatis, cæterum quoad structuram ut in priori.

Var. b, colore pallidiori tantam differt; thorax flavescentia, maculis fuscis minoribus, magis obsole-tis;

tis; elytra grisea, interdum brunneo-testacea, margine semper pallidiori; pedes pallidiores; femorum basi genubusque parum infuscatis; interdum fere concoloribus.

9. *G. lineola*: oblongo-ovata, supra flavo-testacea, punctata, sericeo-pubescent, vertice, lineola thoracis scutelloque nigra; subtus nigra; ano pedibusque flavo-testaceis.

*Fabr. Eleut. l. 486. 44. Payk. fn. 2. 90. 6.
Panz. fn. 102. f. 5. Schönh. synon. 2. 296.
53.*

*Chrus. grisea Alni. De Geer. Inf. 5. 325. 30.
tab. 9. f. 36.*

Var. *b*, Elytris vitta longitudinali fusca, indeterminata. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Habitat in foliis Alni, Salicis, sat frequens.

Descr. Longitudo G. Viburni; sed angustior; minus convexa; mas fere duplo minor femina. Caput parvum, flavo-testaceum, subtiliter punctulatum, fronte sat profunde canaliculata, vertice macula magna semi-circulari; nigra; mandibulæ apice piceæ; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigræ, articulis plerisque basi flavo-testaceis. Thorax brevis, transversus; antice paullo latior, vix emarginatus. lateribus rotundatus, anguste marginatus; basi sub-sinuatus, supra perparum convexus, fere planus, in medio dorsi longitudinaliter impressus, totus flavo-testaceus, parce, obsolete punctatus, macula cuneiformi nigra in medio dorsi notatus. Scutellum nigrum,

grum, pubescens, vix punctulatum, apice obtuse rotundatum. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo sextuplo longiora, supra modice convexa, disco testacea, evidenter, vagè punctata, pube subtilissima, depressa, cinerea, certo situ holosericeo. micante testa, limbo toto, suturali tamen angustius, pallide flavo; callus humeralis elevatus, niger, vel nigro-fuscus. Thorax subtus flavescens; pectus & abdomen subtus nigra, subnitida, cinereo-pubescentia, vix punctulata, ano late flavescente. Pedes mediocres, toti flavo testacei.

Var. b, differt tantum vitta elytrorum lata, indeterminata intra-marginali nigro-fusca, quæ sœpe maximam disci partem occupat.

10. G. Lythri: oblongo-ovata, supra testacea, profunde punctata, punctis sub-ocellatis, vertice, lineola thoracis, scutelloque nigris; subtus nigra, ano pedibusque testaceis.

Schönh. synon. 2. 296. 54.

Var. b, Elytris vitta intra-marginali nigra, sat determinata, poslice abbreviata. Schönh.

l. c. var. b.

Chrysom Calmariehsis. Linn. syst. 2. 600. 102.

Crioceris Calmariensis. Marl. Ent. br. 1. 227.

21.

Var. c, tota pallida, antennis extrorsum maculaque verticis nigro-fuscis.

Habitat in Lythro Salicaria, aliisque planis, ad ripas & littora aquarum, passim.

Ins. Svec. T. I. P. III. Kk Descr.

Descr. Præcedenti quoad structuram & colores simillima, sed plus duplo minor, respectu magnitudinis fortius punctata, præsertim in elytris, punctis sub ocellatis, &c. Media quasi inter G. lineolam & tenellam, sed posteriori plus duplo major, fortius punctata, &c. Caput parvum, rotundatum, testaceum, crebre punctulatum, fronte canaliculata, vertice macula semi-circulari nigra. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigro-fuscæ, articulis tribus primis fere totis testaceis. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra perparum convexus, testaceus, crebre & profunde punctatus, tenue pubescens, inæqualis, canalicula nempe media, longitudinali, nigro-inducta, & fovea profundiori, rotundata, utrinque impressus. Scutellum fusco-piceum, pubescens, punctulatum, apice sub-emarginatum. Elytrorum forma fere ut in priori, sed supra paullò magis convexa, & multo profundius, creberime punctata, punctis plerisque sub-ocellatis, seu punctulo centrali elevato notatis; tota testacea, limbo vix pallidiori; Callus humeralis elevatus, sed parum infuscatus. Thorax subtus pallide testaceus; pectus & abdomen nigra, sub-nitida, vix punctulata, pube cinerea, sericeo-micante, obducta, ano late pallide testaceo. Pedes mediocres, toti pallide testacei.

Var. b, differt macula thoracis nigra magis dilatata, & in elytris vitta nigra, intra-marginali, ex callo humerali exeunte, posterius latiori, intra apicem desinente, satis determinata.

Var. c, tota pallidius testacea, etiam subtus, modo macula verticis & apex antennarum nigro-fusca; forte junior, nuper exclusa.

II. *G. tenella*: oblongo-ovata, convexa, subtus nigra, ano pedibusque pallidis, elytris

tris simpliciter punctatis testaceis, margine, thoraceque toto lāete flavis.

Fabr. Eleut. 1. 490. 62. Payk. fn. 2. 93. 10.

Schōnh. synon. 2. 301. 78.

Chrysom. tenella. Linn. syst. 2. 600. 102. Fn. Sv. 564.

Var. b; thorace lineola longitudinali; elytris vitta intra-marginali abbreviata, nigris.

Gallerucā tenella. Panz. fn. 102. f. 9.

Habitat in pratis humentibus, ubique frequens.

Descr. Proxime præcedenti iterum plus duplo minor, alias structura & fere coloribus simillima, sed viva saturatus flava in thorace & margine elytrorum, &c. Caput parvum; rotundatum, flavo-testaceum, crebre punctulatum; fronte canaliculata, vertice late nigro; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores; basi testaceæ, extrorsum nigræ. Thorax quoad structuram ut in præcedenti, supra perparum convexus, crebre & sat profunde punctatus, in medio canaliculatus, & utrinque fovea rotunda impressus, totus flavus vel flavescenti-pallidus, plerumque immaculatus, interdum lineola fusca in canalicula dorsali notatus. Scutellum fulco-piceum, punctulatum, structura ut in priori. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo quintuplo longiora, supra convexa, crebre, evidenter punctata, punctis simplicibus; in disco aut testacea, aut rufescenti-ferruginea, sub-nitida, margine laterali late reflexo, suturaque lāete flavis; Callus humeralis sub-elevatus, plerumque puncto fusco notatus. Corpus subtus & pedes ut in præcedenti omnino.

Var. b, simillima, sed linea nigra in canalicula dorsali thoracis saturatior, evidentior, & in elytris vitta nigra intra-marginalis, e callo humerali exiens, paullo ultra medium extensa, sat determinata, ut in var. b, præcedentis.

12. G. 4-maculata: oblonga, glabra, ore, antennis, pedibus thoraceque flavo-testaceis, elytris subtilissime punctulatis flavis, maculis duabus nigris remotissimis.

Fabr. Eleut. I. 485. 36. Payk. fn. 2. 91. 9.

Schönh. synon. 2. 294. 41.

Chrysom. 4-maculata. Linn. syst. 2. 600. 103.

Fn. Sv. 571.

Crioceris bi-maculata. Panz. fn. 48. f. 16.

Habitat in plantis & fruticibus, locis humentibus, minus frequens.

Descr. G. lineola paullo major, longior, præsertim in elytris. Caput breve, latum, postice nigrum, anterius flavo-testaceum; nitidum, vertice cruce impressa; oculi magni, prominuli, nigro brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, filiformes, totæ flavo-testaceæ. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, lateribus obliquis, sub-rectis, evidenter marginatis; basi media etiam truncatus, angulis obliquis, obtusis; supra parum convexus, totus supra & infra flavo-testaceus, nitidus, glaber, vix punctulatus; in dorso antico foveola parva, impressa; & posterius alia magna, transversa, lunata. In caput respiciente. Scutellum rotundatum, flavo testaceum, nitidum, vix punctulatum. Elytra thorace multo latiora, & plus quam sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa,

vexa, flavo-testacea, minus nitida, subtilissime, crebre punctulata; in basi interiori singuli elytri, versus scutellum, macula minor rotundata nigra, & longe ultra medium alia magna, transversim ovata, ejusdem coloris. Pectus & abdomen nigra, nitida, subtilissime punctulata. Pedes longiusculi, toti pallide testacei.

Obs. Variat rarius macula posteriori elytrorum sub-lunata, & fere in duas divisa.

13. *G. flavipes*: oblonga, nigra, nitida, glabra, thorace toto, antennarum basi pedibusque flavis, femoribus basi nigris.

Latreille Gen. Inf. 3. 63.

Crioceris flavipes. Fabr. Eleut. 1. 461. 55.
Payk. fn. 2. 79. 4. Thunb. Act. Ups. 5.
115. 50. Panz. fn. 32. f. 4. Schönh. synon.
2. 275. 55.

Chrysomela flavipes. Linn. syst. 2. 601. 106.

Luperus. Geoffr. Inf. 1. 231. 1. tab. 4. f. 2.

Mas: Antennis longitudine corporis.

Habitat in foliis Betulæ, Alni, sat e
quens.

Descr. Statura oblonga G. 4-maculata, sed tripli minor & ultra. Caput sub-triangulare, nigrum, nitidum, vertice lœvi, fronte supra antennarum basin impressa; oculi magni, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ feminæ dimidio corpore paullo longiores, filiformes, nigræ, articulis tribus vel quatuor baseos flavis. Thorax transversim quadrangulus, antice paullo latior, truncatus, lateribus anguste marginatus.

tus, ante medium nonnihil rotundato dilatatus, basi media truncatus, angulis oblique prominulis; supra modice convexus, totus supra & infra lète flavus, nitidissimus, vix punctulatus. Scutellum sub-triangularē, nigrum, nitidum, lève. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, supra convexa, nigra, nitida, glabra, creberrime, sed subtilissime & obsoletius punctulata. Alæ longæ, fuscescentes. Pectus & abdomen nigra, nitida, parce & obsoletè punctulata. Pèdes longiculi, flavescentes, femoribus, præsertim posticis, basi nigricantibus.

Mas plerumque dimidio minor, antennis longitudine totius corporis, & ultra, articulo primo supra fusco; thorax paullo angustior quam in femina, cæterum simillimus,

14. *G. rufipes*: oblonga, nigra, nitida, glabra, antennarum basi pedibusque flavis, femoribus basi nigris.

Crioceris flavipes. Payk. Schönh. l. c. var. b.

Crioceris rufipes. Fabr. Eleut. I. 461. 54.
Panz. fn. 23. f. 5.

Luperus. Geoffr. Ins. I. 231. 2.

Mas: Antennis longitudine corporis.

Ptinus longicornis. Fabr. Eleut. I. 325. 4.

Ilig. Mag. I. 387. 4.

Habitat in foliis Betulæ, alni, aliisque frequens.

Descr. Præcedenti ut ovum ovo simillima, & omni puncto conveniens, modo thorax totus supra &

& infra niger, nitidissimus; minime vero Sexu tantum differunt, ut autumat Dom. Geoffroi loc. cit.; nam ex utraque Specie inveniuntur specimina antennis medioeribus, & alia antennis corporis longitudo vel ultra; millies quoque ambas species copulatas vidi, sed ne unica vice nisi similes cum similibus, unde vero simillimum mihi videtur, distinctas esse species.

Obs. Plurimas Fabricii Criocerides ad Gallerucas retulit Dom. Latreille, loc. citato, & quidem summo jure, ut mihi videtur.

Sectio 2:da, antennarum articulis secundo & tertio brevioribus quarto.

45. G. Alni: ovata, cœruleo-violacea, nitida, elytris rufescenti-violaceis, confertissime, vage punctulatis, antennis, tibiis tarsisque nigris.

Fabr. Eleut. 1. 483. 27. Payk. fn. 2. 87. 2.
Panz. fn. 102. f. 3. Schönh. synon. 2. 292.
30.

Chrysom. Alni. Linn. syst. 2. 587. 9. Fn. Sv.
511. De Geer Inf. 5. 314. 21. tab. 9. f. 13.

Var. b, corpore fere toto supra nigro.

Habitat in soliis Betulæ Alni, passim.

Descr. Statura ovata fere G. Tanaceti, & macculis ejus magnitudine æqualis. Caput parvum, rotundatum, cœruleum, nitidum, crebre rugoso punctatum, fronte profunde impressa, antrotsum canaliculata; oculi magni, brunnei, prominuli. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, nigrae, articulo

tertio vix longiori secundo, cæterum ut in prioribus. Thorax brevis, transversus, antice late, sed non profunde emarginatus, angulis prominulis, lateribus rotundatus, evidenter reflexo-marginatus, basi rotundatus, supra convexus, coeruleo sub-violaceus, nitidus, creberrime subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, nigro coerulescens, nitidum, laevissimum, politum. Elytra magna, antice thorace latiora, & ultra medium adhuc magis dilatata, thorace sextuplo longiora, supra valde convexa, violacea, rubro-micantia, nitida, confertissime subtiliter vase punctulata. Corpus subitus, nigro coeruleum, nitidum, parce punctatum. Pedes longiusculi, femoribus coeruleis, nitidis, tibiis tarsisque nigris, opacis, pubescentibus. Var. b, differt tantum colore paginae superioris nigro, aut nigro sub-coerulecente; apex elytrorum tamen plerunque magis violaceo-nitens.

H A L T I C A.

Instrumenta cibaria & Antennæ ut in Galleruca. Femora postica incrassata; Saltatoria.

Obs. Secundum Regulas Systematicas Cl. Fabricii, Halticæ non nisi in subdivisione sub genere præcedenti collocandæ essent, dum instrumenta Cibaria & Antennæ non discrepant; sed ob commoditatem tironum, ut peculiare Genus, a plurisque Entomologis receptum, retinui, propter rationes a Dom. Prof. Illiger, in Mag. I. p. 416, & Dom. Prof. Latreille, in Gen. Ins. 3. p. 63. adhibitas.

Sect. I. Elytris vase punctatis.

1. H. fuscicornis: ovata, nigra, capite, thorace, pedibus antennarumque basi rufis,

fis, elytris cœruleo-virentibus, subtiliter, vagè punctulatis.

Ent. Heft. 2. 51. 28. Schönh. synon. 2. 306. 34.

Chrysom. fuscicornis. Linn. syst. 2. 595. 66.

Crioceris fulvipes. Fabr. Eleut. 1. 463. 68.

Galleruca rufipes. Payk. fn. 2. 97. 14.

*Chrysom. rufipes. De Géer Inf. 5. 343. 47.
tab. 10. f. 11.*

Altica rufipes. Panz. fn. 21. f. 10.

Habitat in Malvis aliisque plantis, apud nos rarius.

Descr: G. Oleracea paullo brevior, sed non angustior. Caput parvum, rufum, nitidum, vix vel obsoletissime punctulatum, ore piceo; oculi nigri, prominuli. Antennæ longitudine dimidii corporis, basi rufæ, extrorsum paullo crassiores, nigræ. Thorax brevis, transversus, antice parum emarginatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi subtruncatus, angulis reflexis, acutis; supra satis convexus, æqualis, totus supra & infra rufus, nitidus, subtilissime, obsolete punctulatus. Scutellum subtriangulare, cœrulescens, nitidum, lœve. Elytra antice thoracis medio paullo latiora, ultra medium magis dilatata, supra valde convexa, cœrulea, vel cœruleo-virescentia, nitida, creberrime subtiliter & obsoletius punctulata. Pectus & abdomen nigra, nitida, parce punctata. Pedes mediocres, toti rufi, nitidi, femoribus posticis modice incrassatis.

2. *H. oleracea: oblongo-ovata, convexa, cœruleo-virescentia, antennis nigris, thorace postice transversim impresso.*

Ent.

*Ent. Heft. 2. 54. 30. Latreille Gen. Inf. 3.
63. 2. Panz. fn. 21. f. 1. Schönh. synon.
2. 319. 142.*

*Chrysom. oleracea. Linn. Syst. 2. 593. 51. Fn.
Sv. 534 De Géer. Inf 5. 344. 49.*

*Galleruca oleracea. Fabr. Eleut. 1. 498. 108.
Payk. fn. 2. 96. 13.*

*Var. b, corpore supra obscuriori, aut fu-
scō-æneo, aut fusco-virescente, aut fere
nigro.*

*Var. c, tota cœrulea vel cœruleo-violacea,
nitida, antennis tarsisque nigro-fuscis.
Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Galleruca Erucæ. Fabr. Eleut. 1. 497. 99.

Chrysom. Erucæ. Marsh. Ent. Br. 1. 193. 53.

*Habitat in plantis ubique frequens, folia
& cotyledones devastans; etiam in fru-
ticibus, præsertim Corylo avellana, aliis-
que.*

*Descr. Major inter nostrates hujus generis.
Chrys. Vitellinæ fere æqualis, sed magnitudine val-
de variat, ad quadruplo minorem usque. Caput par-
vum, triangulare, cœruleo-virescens, nitidum, parce
punctatum, fronte inæquali, inter antennas carinula
longitudinali elevata; oculi magni, prominuli, brun-
nei. Antennæ dimidio corpore paullo breviores,
nigræ, cinereo-pubescentes, articulis nonnullis baseos
viridi-cœruleis, nitidis. Thorax brevis, antice paul-
lo latior, fere truncatus; lateribus obliquis, eviden-
ter marginatis, basi sub-rotundatus, angulis obtusis;
supra anterius modice convexus, totus cœruleo-vire-
scens.*

scens, nitidus, subtilissime & obsolete punctulatus; pone medium striga transversa, sat profunde impressa, margines fere attingens; intra apicem saepe foveolæ duæ impressæ, obsolete, & in disco interdum puncta duo, paria, parva. Scutellum sub-triangulare, virescens, nitidum, læve. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis & illo quintuplo longiora & ultra, supra modice convexa, aut viridia, aut viridi cœrulecentia, nitida, creberrime subtiliter vage punctulata. Corpus subtus cœruleo-virescens, minus nitidum, obsolete punctatum, ventre pube tenui cinerea adsperso. Pedes longiusculi, validi, cœruleo-virescentes, tarsis nigro-fuscis; femora postica reliquis longiora, ultra medium incrassata, apice item angustata, subtus canaliculata.

Variet. b, & c, colore tantum differunt, ut in diagnosi indicatum; in omni varietate diversæ magnitudinis individua occurunt; varietates superne infusatæ præsertim in Coryli foliis obviæ; var. c, saepe in Ericetis invenitur,

3. *H. Mercurialis*: breviter ovata, valde convexa, nigra, nitida, supra nigro-cœrulescens, subtilissime punctulata, thorace postice striga abbreviata impressa, utrinque foveola profundiori terminata.

Schönh. synon. 2. 320, 149.

Galleruca Mercurialis. *Fabr. Eleut.* 1. 499, 113.

Habitat in Mercurialide perenni Scaniae.
Dom. Fallén.

Descr. Reliquis brevior, crassior, magis convexa, rotundato-ovata, *H. Helxines* latior, sed brevior. Caput breve, sub-triangulare, nigro-æneum
vel

vel cœrulescens, vix punctulatum, fronte inæquali; oculi nigro-brunnei, modice prominuli. Antennæ dimidio corpore longiores, crassiusculæ, extrorsum nigro-fuscæ, pubescentes, articulo primo apice & nonnullis insequentibus rufo-piceis. Thorax brevissimus, transversus, antice late sed parum profunde emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, evidenter marginatus, basi media etiam rotundatus, supra anterius transversim valde convexus, fere pulvinatus, nigro-cœrulescens, nitidissimus, vix vel subtilissime punctulatus; intra basin striga transversa, impressa, abbreviata, utrinque fovea profunda, sub-lunata, basin thoracis fere attingente, terminata. Scutellum parvum, triangulare, nigro-cœrulescens, læve. Elytra antice thorace latiora, humeris rotundatis, & ultra medium multo magis dilatata, rotundato-ovata, thorace vix quadruplo longiora, supra valde convexa, nigro-cœrulecentia, nitida, subtilissime & obsolete, paullo tamen evidentius quam thorax, punctulata. Corpus subtus nigrum, parum cœrulecentimicans, sat crebre, subtiliter punctulatum. Pedes breviusculi, nigri, femoribus nitidis, posticis modice incrassatis, parum cœrulecentimicantibus.

4. H. cœrulea: ovata, supra cœrulea, nitida, antennarum basi pedibusque pallide testaceis, femoribus posticis apice fuscis, thorace non impresso, elytris crebre, subtiliter punctulatis.

Ent. Heft. 2. 55. 31. Schénh. Jynon. 2. 312. 69.

Galleruca cœrulea. Payk. fn. 2. 97. 15.

Chryom. flavipes. Herbst. Arch. 4. 61. 53.

Var. b, supra cœruleo-virescens. Ent. Heft. Schénh. var. b. Ali-

Altica Hyoscyami. Panz. fn. 21. f. 4.

Habitat in plantis & gramine, locis humentibus, apud nos rarius.

Descr. Magnitudo & fere statura H. Helxines, sed magis convexa. Caput triangulare, cœruleum, nitidum, vix punctulatum, fronte convexa, inæquali; oculi nigro brunnei, modice prominuli. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 4 vel 5 baseos pallide testaceis, sequentibus gradatim crassioribus, nigro fuscis. Thorax brevis, transversus, antice paullo latior, vix emarginatus, lateribus obliquis, evidenter marginatis, basi sub truncatis, supra modice convexus, totus cœruleus, nitidissimus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum sub-rotundatum, cœruleo virescens, nitidum, lœve. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris rotundatis, ultra medium magis dilatata, thorace sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, angulo suturali sub-recto; supra modice convexa, tota cœrulea, nitida, crebre, subtiliter & obsoletius vase punctulata, intersticiis rugulosis, unde tenue coriacea apparent. Corpus subtus nigrum, parum cœrulescenti-micans, obsolete punctulatum. Pedes longiusculi, pallide testacei vel flavescentes, femoribus posticis apice nigricantibus.

Var. b, differt tantum colore paginæ superioris cœruleo-virescente, præsertim in capite & thorace.

5. H. Euphorbiæ: ovata, nigra, nitida, supra æneo vel cœrulescenti-micans, antenarum basi pedibusque pallidis, thorace sub-lœvi, non impresso, elytris subtiliter punctulatis.

Ent. Heft. 2. 58. 34. Schönh. synon. 2. 312. 7^o.
Crio-

Crioceris Euphorbiæ. Fabr. Eleut. i. 467. 87.

Galleruca Euphorbiæ. Payk. fn. 2. 101. 20.

Habitat in pratis & agris, sat frequens.

Descr. Parva, præcedente fere triplo minor, brevior, magis convexa, H. Rubi fere æqualis. Caput triangulare, nigrum, nitidum, sub-læve, vel omnium minutissime, parce punctulatum, fronte antica inter antennas tenue canaliculata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis quinque baseos læte flavo-testaceis; reliquis gradatim crassioribus, nigris; ultimo acuminato. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, truncatus, lateribus rotundatus, anguste marginatus, basi sub-rotundatus, supra modice convexus; æqualis, niger, nitidissimus, vix visibiliter punctulatus, interdum æneo vel cœruleo-micans. Scutellum, parvum, triangulare, nigrum, nitidum, læve. Elytra thorace multo latiora, humeris rotundatis; & illo quintuplo longiora, apice obtuse rotundata; angulo futurali sub-recto; supra valde convexa, nigra, nitidissima, saepius cœruleo-micantia, crebre, subtiliter punctulata. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, parce punctulatum. Pedes longiusculi, flavo-testacei, femoribus posticis apice plus minusve nigricantibus;

6. *H. parvula*: ovata, nigra, supra piceo-ænea; omnium subtilissime punctulata, antennarum basi pedibusque griseo-pallidis, femoribus posticis fusco-piceis.

Ent. Heft. 2. 59. 35. Schönh. synon. 2. 312.
72.

Galleruca parvula. Payk. fn. 2. 102. 22.

Crio-

Crioteris atra. Fabr. Eleut. I. 467. 88.

Var. b, dilutius picea, præsertim in elytris.
Ent. Hest. Et Schönh. var. b.

Habitat in pratis humentibus, umbrosis,
non infrequens.

Descr. Statura præcedentis, sed adhuc fere tripli minor, inter nostrates hujus generis facile minima; color paginæ superioris fusco-æneus, in piceum vergens, minus politus & nitidus quam in priori. Caput triangulare, nigrum, sub-nitidum, laxe, fronte inter antennas carinula parva elevata; oculi prominuli; nigro brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis quinque baseos testaceis, sequentibus gradatim crassioribus, nigro fuscis, ultimo acuminato. Thoracis structura ut in præcedenti omnino, supra modice convexus, fusco-æneus, minus nitidus, sub oculo acute armato crebre subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, fusco-æncum, nitidum. E'ytra thorace multo latiora & sextuplo longiora, supra modice convexa; fusco-ænea, certo situ piceo micantia, præsertim posterius; undique subtilissime obsolete punctulata. Corpus subtus nigrum sub-nitidum, vix punctulatum. Pedes longiusculi, obscurius testacei, femoribus posticis fuso piceis; femora anteriora etiam saepe basi fuscæstantia.

Var. b, differt tantum colore dilutiori, piceo-æneo, elytris apicem versus pallidioribus.

7. H. Lepidii: oblongo-ovata, sub-depressa, viridi ænea, consertissime subtiliter punctulata, antennis pedibusque nigris, thorace antice angustiori, elytris obtusis.

Ent.

Ent. Heft. 2. 64. 39. Schónh. synon. 2. 313. 75.

Altica nigripes. Panz. fn. 21. f. 5. Crit. Rev. I. 77.

Var. *b*, tota cœrulea vel cœruleo-virescens.

Chrysomela lens. Thunb. Act. Up. 4. 13. 22.

Habitat in plantis oleraceis apud nos rarius; in Smolandia, Dom. Bogeman; var. *b*, Upsaliæ, Dom. Prof. Thunberg.

Descr. Statura oblonga, sub-depressa H. nemorum, sed plerumque dimidio minor. Caput triangulare, viridi æneum, sub-nitidum, crebre, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas longitudinaliter sub-carinata; oculi majusculi, prominuli, brunnei, Antennæ longitudine dimidii corporis, totæ nigræ, extorsum crassiores, pubescentes. Thorax latitudine medii paullo brevior, anterius nonnihil angustior, truncatus, angulis deflexis, compressis, unde magis angustatus appareat; lateribus rotundato-dilatatus, anguste marginatus, basi sub-bisinuatus, angulis obtusis; supra parum convexus, totus viridi-æneus, sub nitidus, crebre & concinne, subtiliter punctulatus. Scutellum parvum, sub transversum, viridi-cœrulescens, vix punctulatum. Elytra thorace multo latiora, & illo quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, angulo suturali recto; supra parum convexa, viridi-cœrulescens, sub-nitida, confertissime & paullo fortius quam thorax, concinne punctata. Corpus subitus nigro-cœrulescens, crebre, obsoletius punctulatum. Pedes mediocres, nigri, femoribus parum cœruleo-micantibus.

Var. *b*, differt tantum colore paginæ superioris saturatius cœruleo vel violaceo; cæterum simillima.

8. *H. atra*: oblongo-ovata, sub-depressa; nigra, sub-nitida, confertissime, evidentius punctata, antennis basi piceo-ferrugineis, thorace antice angustiori, elytris obtusis.

Ent. Heft. 2. 63. 38. Schónh. Iynon. 2. 313. 74.

Galleruca atra. Payk. fn. 2. 100. 19.

Chrysom. punctulata. Marsh. Ent. Br. 1. 200. 73.

Habitat in pratis umbrosis, humentibus, passim.

Descr. Statura oblonga; sub-depressa, omnino praecedentis, cui valde affinis, sed tota saturate atra, multo profundius punctata, praesertim in Elytris. Caput triangulare, nigrum, crebre, subtiliter punctulatum, fronte inter antennas carinula longitudinali elevata, nitida; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, articulo primo magno, piceo; nonnullis insequentibus dilutius piceo-ferrugineis, reliquis gradatim crassioribus, nigris, tenue pubescentibus. Thorax latitudine medii fere duplo brevior, transversus, antice paullo angustior, truncatus, angulis deflexis; lateribus rotundato-dilatatus, tenue marginatus, basi vix sinuatus, angulis obtusis; supra parum convexus, saturate niger, sub-nitidus, creberrime, evidenter punctatus. Scutellum breve, transversum, obtulatum, nigrum, sub-læve. Elytra thorace multo latiora, & illo fere sextuplo longiora, apice obtusa, angulo suturali sub-recto; supra parum convexa, tota nigra, sub-nitida, rarius nonnihil cœrulecenti-micantia, confertissime, & adhuc fortius quam thorax punctata. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes medios cres nigri, femoribus, praesertim posticis, nitidis, tarsis fuscescentibus.

Ins. Svec. T. I. P. III. LI. g. H.

9. *H. nemorum*: oblongo-ovata, sub-depressa, nigra, crebre punctata, elytris vitta longitudinali integra sulphurea, antenarum basi, tibiis tarsisque testaceis.

Ent. Heft. 2. 70. 41. Panz. fn. 21. f. 19.

Schönh. synon. 2. 313. 77.

Chrysoloma nemorum. Linn. Syst. 2. 595. 62.

Fn. Sv. 543.

Crioceris nemorum. Fabr. Eleut. i. 467. 89.

Galleruca nemorum. Payk. fn. 2. 98. 16.

Habitat in plantis, præsertim Tetradynamis; ubique vulgaris, & valde noxia.

Descr: Parva, & magnitudine valde varians. Caput triangulare, nigrum, sub-nitidum, creberreme punctulatum, fronte inter antennas carinula longitudinali elevata, superne foveola impressa in duas divisa; oculi prominuli; nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulo primo magno, ob-conico, nigro-piceo, apice pallido; secundo & tertio ob-conicis, totis pallidis; reliquis nigris, in femina gradatim extrosum crassioribus; in masculis quartus & quintus proxime præcedentibus, & præcipue sexto majoribus, crassioribus; sextus parvus; reliqui gradatim majores, ut in semina. Thorax latitudine multo brevior, basi apiceque sub-truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, evidenter marginatus, supra parum convexus, niger, pierumque virescenti-micans, creberrime & profundius quam caput punctatus. Scutellum rotundatum, nigro-virescens, lœve. Elytra thoracis basi multo latiora, & illo sextuplo longiora, supra modice convexa, nigro-virescentia, sub-nitida, creberrime & sat profunde punctata, callo humerali elevato; in medio cujusvis

eujusvis elytri vitta lata sulphurea seu pallide lutea, integra, latere interiori fere recta, externe in medio nonnihil arcuata, apice introrsum flexa, apicem ipsum elytrorum non attingens. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime, crebre punctulatum. Pedes mediocres, femoribus nigris, genubus anterioribus, una cum tibiis tarsisque omnibus plerumque testaceis.

10. *H. flexuosa*: oblongo-ovata, subdepressa, nigra, crebre punctata, elytris vitta longitudinali sinuata, luteo-testacea, antennarum basi genubusque piceo-testaceis.

Ent. Heft. 2. 71. 42. *Schónh. synon.* 2. 314. 79.
a, vitta elytrorum angustiori, sub-integra, vel externe parum sinuata. *Ent. Heft.* & *Schónh.* l. c. a.

Altica Nasturtii. *Panz. fn.* 21. f. 9. *Crit. Rev.* 1. 83.

Var. b, Vitta elytrorum dilatata, in medio exteriori sinu brevi, semi-circulari, nigro, emarginata. *Ent. Heft.* & *Schónh.* l. c. var. b.

Altica flexuosa. *Panz. fn.* 25. f. 12.

Var. c, vitta elytrorum lata, externe sinu elongato emarginata. *Ent. Heft.* & *Schónh.* l. c. var. c.

Altica flexuosa. *Illig. Schneid. Mag.* 5. 601. 8.

Var. d, vitta elytrorum, per sinum exteriorum dilatum, aut fere abrupta, reman-

nente modo lineola angusta lutea; vel omnimode in maculas duas separatas divisa. *Ent. Heft. 8 Schónh. l. c. var. d, e.*
Galleruca nemorum. Payk. fn. 2. 98. 16. var. b.
 Habitat in plantis & gramine non infrequens.

Descr. Præcedenti simillima & nimis affinis; magnitudine pari modo varians, forma & colore saturatori vittæ elytrorum fere unice distincta. Strukturæ partium & punctura omnino ut in priori, sed color magis saturate niger, vix virescens. Antennæ secundum sexum simili modo constructæ, sed articuli baseos plerumque obscuriores, piceæ. Pedes autotí nigri, aut genua & basis tarsuum tantum obscure testacea. Vitta elytrorum saturatius testacea; interdum rufo-tincta; in a fere integra, angustior quam in *H. nemorum*, externe vix vel per paucum sinuata; ex hac varietate feminas tantum vidi, & in societate cum varietatibus sequentibus legi.

In var. b, & c, vitta elytrorum mox pone calum humeralem, externe dilatata, dein versus medium iterum angustata, nigredine marginis nempe in medio sinum introrsum emittente, aut breviorem, semi-circularem, ut in var. b, aut longius extensem, ut in c; pone medium vitta iterum extorsam dilatata, spicæ nonnihil inflexa, abbreviata, unde valde sinuata evadit; ad basin elytrorum vitta eadem plerumque versus scutellum inflexa, unde futura anterius angustius nigra.

In var. d, sinus medius nigredinis marginalis ita dilatatus, ut vitta lutea aut omnimode abrupta, & in maculas duas separatas divisa, aut maculæ istæ tantum stria tenui, angusta, conjunctæ; Specimina pleraque, quas vidi, hujus varietatis, masculina fuerunt

Obs.

Obs. Varietatem pedibus fere totis flavis, cæterum var. b., simillimam, ex Anglia a Dom. Kirby obtinui.

II. H 4-pustulata: brevior, ovata, convexa, saturate nigra, crebre, subtiliter punctulata, elytro singulo lineolis duabus, antennarumque basi flavo-testaceis.

Ent. Heft. 2. 73. 43. tab. 3. f. 5. Schönh. syn. non. 2. 307. 38.

Galleruca 4-pustulata. Payk. fn. 2. 99. 17.

Chrysom. exclamationis. Thunb. Act. Ups. 4. 14. 23.

Var. b, elytrorum lineolis dilatatis, stria tenui flavescente connexis.

Habitat in plantis & gramine, locis humentibus, sat frequens.

Descr. Proxime præcedentibus similis, sed plus duplo minor, præsertim brevior, magis convexa, & vere distincta. Caput triangulate, atrum, subnitidum, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas tenue carinata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, crassulae, articulo primo magno, ob conico, testaceo; secundo & tertio parvis, ob. conicis, etiam testaceis; quarto paullo majori, piceo; quinto, in masculis, magno, elongato, ob-conico, nigro, apice incrassato; sexto parvo, brevi, nodoso, nigro; sequenti bus etiam nigris, gradatim crassioribus; ultimo ova-to, obtuso; in femina articulus quintus quidem prioribus, & præcipue sexto longior, sed non crassior. Thorax latitudine medii multo brevior, basi spicula-

que sub-truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, evidenter marginatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, totus niger, sub-nitidus, creberrime punctulatus. Scutellum rotundatum, atrum, nitidum laxe. Elytra thoracis bafi multo latiora, & illo quadruplo longiora, supra valde convexa, atra, sub-nitida, creberrime & profundius quam thorax, punctata; in singulo lineolæ duæ longitudinales flavo-testaceæ, una pone alteram, prior in medio basos, ante medium elytri definens, posterior intra apicem, cuneiformis, sub-arcuata. Corpus subtus atrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum. Pedes mediocres, femoribus atris, nitidis, tibiis tarsisque fusco-piceis.

Var. b, differt tantum lineolis elytrorum magis dilatatis, arcuatis, & stria tenui, angusta, interne connexis, unde varietatibus b, & c, præcedentis Speciei facie similis evadit, sed statura corporis brevior, magis convexa, satis distinguit.

12. H. Holsatica: ovata, convexa, atra, nitida, crebre punctulata, elytris macula postica rotundata rubra, antennarum basi tibiisque anterioribus rufis.

*Ent. Heft. 2. 60. 36. Schönh. synon. 2. 311.
64.*

*Chrysom. Holsatica. Linn. syst. 2. 595. 67. Fn.
Sv. 544.*

*Criocoris Holsatica. Fabr. Eleut. 1. 467. 85.
Galleruca Holsatica. Payk. fn. 2. 99. 18.*

Var. b, macula apicali elytrorum sub-cor data, vel antice emarginata. *Ent. Heft.
& Schönh. l. e. var. b.*

Chry-

Chrysomela pulicaria. Linn. Syst. 2. 595. 64.

Altica pulicaria. Thunb. Act. Ups. 5. 13. 45.

Habitat in pratis humentibus, non infrequens.

Descr. Statura convexa praecedentis, sed plurumque dimidio major. Caput triangulare, nigrum, nitidum, subtilissime punctatum, fronte inter antennas carinula longitudinali elevata; oculi prominenti, nigro brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis tribus primis pallide testaceis, reliquis nigris, exterioribus gradatim crassioribus. Thorax latitudine brevior, antice paullo latior, truncatus, lateribus sub-obliquis, vix rotundatis, evidenter marginatis; basi etiam truncatus, supra valde convexus, totus niger, nitidus, crebre, subtilissime punctulatus. Scutellum breve, triangulare, nigrum, nitidum, laxe. Elytra antice thorace latiora, humeris rotundatis, & ultra medium valde dilatata, thorace quintuplo longiora, apice rotundata, angulo suturali sub-recto; supra valde convexa, nigra, nitida, creberrime & profundius quam thorax, punctata; ante apicem cuiusvis elytri macula rotundata, rubra, pellucida, interdum parva, punctiformis, plerumque vero major, rarius ad apicem usque dilatata. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, femoribus nigris, anterioribus saepe apice testaceis; tibiæ & tarsi anteriores testacei, postici fusco-picei.

Var. b, differt tantum macula rubra apicali elytrorum antice emarginata, cordiformi.

Obs. Chrysomela bi-pustulata, Thunb. Act. Ups. 4. 13. 21, a Dom. Schönherr ad Halticas relata, Synon. 2. 311. 63. certe coccinella Reppensis, Payk. Fn. 2. 27, 28, var. b.

13. H. Anchusæ: ovata, convexa, atra, subnitida, antennarum basi, tibiis tarsisque pallidis, elytris confertissime punctatis, apice singulatim rotundatis, abdome brevioribus.

*Ent. Heft. 2. 62. 37. Schönh. synon. 2. 313.
73.*

Galleruca Anchusæ. Payk. Jn. 2. 101. 21.

Habitat in Anchusa & Cynoglofso Westrogothiæ, passim.

Descr. H. Buphorbiæ paullo major, variat tamen etiam statu minori. Caput triangulare, nigrum, nitidum, vix visibiliter punctulatum, fronte antica inter antennas longitudinaliter carinata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, crassiusculæ, articulo primo majori, basi fusco-piceo, extrosum pallido, sequentibus 4 aut 5 angustioribus, pallidis, reliquis nigris, gradatim crassioribus, ultimo sub-acuminato. Thorax latitudine brevior, basi apiceque truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, anguste marginatus, supra valde convexus; totus saturate niger, nitidus, crebre subtilissime punctulatus. Scutellum sub-rotundatum, nigrum, nitidum, lœve. Elytra antice thoracis medio parum latiora, humeris oblique rotundatis, sed ultra medium dilatata, thorace quintuplo longiora, apice valde obtuse & singulum per se rotundata, abdome paullo breviora, angulo suturali debidente; supra valde convexa, tota saturate nigra, creberissime & profundius quam thorax punctata. Alæ vix ullæ, saltè in majoribus, forte feminis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus nigris, anterioribus apice testaceis.

14. *H. lurida*: ovata, convexa, nigro-picea, antennarum basi pedibusque livido-testaceis, elytris brunneis, contortissime, profunde punctatis, apice singulatim rotundatis.

Schönh. synon. 2. 399 s.l.

Galleruca atricilla. Payk fn. 2. 104. 23. var. e.

Var. b, thorace aut piceo, aut rufescente, elytris ferrugineis, fusco-obumbratis, pedibus lividis, femoribus posticis, saltu apice, nigricantibus. *Schönh. l. c. var. b.* Payk. l. c. var. d.

Altica pratensis. Ent. Heft. 2. 88. 50.

Altica fuscescens. Dom. Kirby in litteris.

Var. c, rufo-ferruginea, antennis pedibusque pallidioribus, oculis, pectore abdomineque nigro-fuscis.

Chrysomela lurida. Ross. Fn. Etr. 1. 89. 226.

Habitat in plantis & gramine, præsertim locis umbrosis, ubique frequentissima.

Descr. Statura, magnitudo & affinitas præcedentis; simili modo magnitudine valde variat, ut alii aliis triplo vel quadruplo minores. Caput triangulare, nigro piceum, nitidum, subtilissime obsolete punctulatum, fronte inter antennas carinata; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ seminæ dimidii corporis longitudine, maris multo longiores & crassiores, in utroque livido-testaceæ, extrorsum gradatim crassiores, suscrescentes, & tenue pubescentes. Thorax brevis, transversus, basi apiceque

truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, confertissime, sed obsoletius rugoso-punctatus. Scutellum breve, sub-triangulare, piceum, nitidum, laxe. Elytra antice thoracis medio vix latiora, humeris oblique rotundatis, dein ultra medium valde dilatata, thorace quintuplo longiora, apice singulatim obtuse rotundata, sub-dehiscentia, in feminis abdomine paullo breviora, supra valde convexa, jam saturatius, jam dilutius brunnea, apicem versus plerumque pallidiora, undique confertissime & profunde punctata. Alæ vix utilæ, faltem in feminis. Corpus subtus nigro-piceum, parum nitidum, vix vel subtilissime punctulatum. Pedes livido-testacei, femoribus posticis magnis, superne infuscatis.

Var. b, colore dilutiori tantum differt; thorax aut piceus, aut rufescenti brunneus, antice saepe obscurior. Elytra vel brunnea, vel rufescenti-testacea, jam unicolora, jam versus suturam & margines plus minusve infuscata; pedes plerumque pallidiores, femoribus posticis aut concoloribus, aut supra piceo-infuscatis.

Var. c. adhuc dilutior, fere tota jam rufo-testacea, jam magis pallida, oculis solis nigris, pectore abdomineque aut fusco-aut rufo-piceis.

Obs. Mares plerumque duplo minores & ultra, elytris longioribus, abdomen occultantibus, apice minus obtusis, & antennis longioribus, extrosum crassioribus, a feminis distinctæ.

Obs. Dom. de Paykull, in Fn. Sv. 2. 104. 23. sub Galleruca atricilla, ut varietates conjunxit Halticas fere omnes indigenas pallidiores, elytris vase punctatis. & in Eat. Heft. 2. 88. 50. Auctores illius operis, easdem sub altica pratensi coilocarunt, exceptis tantum A. atricilla & Verbasci; vix vero jure, quoniam formatio partium, punctura & colores

res s^epe constanter aliæ; quare illas accuratius distingueret & determinare in sequentibus tentavi; Synonymia tamen s^epe incerta & dubia, n^am characteres & descriptiones auctorum incompletæ.

15. *H. pratensis*: ovata, convexa, nigra,
supra subtiliter, crebre punctulata, antennarum basi, thorace, elytris pedibusque pallidis, elytrorum humeris apiceque singulatim rotundatis.

Panz. fn. 21. f. 16. Crit. Rev. 1. 86. id. var.
Ent. Heft. 2. 88. 50. Schönh. synon. 2. 309.
50.

Var. *b*, capite etiam pallide testaceo.

Chrysomela exoleta. Linn. syst. 2. 594. 59. Fn.
Sv. 541?

Galleruca atricilla. Payk. fn. 2. 102. 23. a.

Var. *c*, tota pallida, oculis nigris, abdominis basi interdum fusca.

Altica tabida. Panz. fn. 21. f. 15. Crit. Rev.
1. 85?

Altica pallens. Dom. Kirby in litteris.

Habitat in plantis & gramine frequens.

Descr. Statura fere præcedentis, & magnitudo pari modo varians, sed multo subtilius punctulata, color longe alias, &c. Caput triangulare, nigropiceum, nitidum, subtilissime punctulatum, fronte antica sub-carinata, vertice s^epe dilutius piceo; oculi prominuli, brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, basi pallidæ, extrorsum gradatim crassiores,

res, sub-serratæ, nigro-fuscæ. Thorax brevis, transversus, antice paullo latior, -basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, pallide testaceus, sub-nitidus, creberrime, subtiliter & obsoletius punctulatus; ipse margo anticus plerumque niger, & intra marginem striga fusa, saepe obsoleta; intra basin etiam interdum striga fusa, abbreviata. Scutellum parvum, breve, rotundatum, pallidum, laeve. Elytra antice thorace parum latiora, humeris rotundatis, sed mox pone basin valde dilatata, thorace quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, saepe abdomine breviora, angulo suturali obtuso; supra valde convexa, griseo-pallida, pellucida, magis nitida, crebre & paullo profundius quam thorax punctata, sutura concolore, nec infuscata. Thorax subtus pallide testaceus; pectus & abdomen nigra, sub-nitida, creberrime, subtiliter & obsoletius punctulata. Pedes mediocres, anteriores toti pallidi, postici saturati testacei, femoribus crassis, apice externo interdum nonnihil infuscatis.

Var. b, differt tantum capite pallide testaceo, ore rufescente; saepe etiam apex abdominis dilutius rufo-piceus.

Var. c, corpore toto pallido differt, oculis solidis nigris; antennarum apex vix obscurior; pectoris medium, & abdominis antica pars in nonnullis fluorescentia; varietas haec saepe dimidia, imo duplo minor, & ultra,

16. *H. atricilla*: oblongo-ovata, convexa, nigro-picea, crebre punctulata, antennarum basi pedibusque anterioribus pallidis, thorace sub-testaceo, æneo-micante, antice compresso, elytris griseis, sutura nigricante.

Ent.

*Ent. Heft. 2. 86. 49. Schönh. syron. 2. 308. 44.
Crioceris atricilla. Fabr. Eleut. 1. 465. 75. Co-
queb. Illustr. 3. 124. tab. 28. f. 7.*

Galeruca atricilla. Payk. fn. 2 103. 23. var. 'b.

Chrysomela atricilla. Linn. syst. 2. 594. 55.

Fn. Sv. 537. Marsh. Ent. Br. 1. 200. 74.

*Vat. b, femoribus posticis rufo-testaceis;
superne plus minusve insulcatis.*

*Habitat in plantis & gramine passim; in
Lathyro heterophyllo ad Mysleberg We-
stogothiae sepe copiose lecta.*

Descr. Præcedente dimidio major, præsertim longior, æque convexa; thorace anterius compresso, supra, ut caput, æneo-micante. sutura elytrorum senioribusque posticis nigricantibus, &c. distincta. Caput majuscum, triangulare, nigro-piceum, vertice triangulariter sub-elevationi, sub-lævi, vel omnium subtilissime punctulato, æneo-micante, nitidissimo; frons inferior nigra, opaca, rugulosa, inter antennas sub carinata; oculi magni, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, articulis 4 aut 5 baseos testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigris, pubescentibus. Thorax brevis, transversus, basi apiceque sub-truncatus, lateibus valde deflexus, parum rotundatus, marginatus, anterius compræssus, ut ibi angustior appareat; supra valde convexus, rufo-testaceus, crebre, subtiliter punctulatus, æneo-micans, nitidissimus. Scutellum parvum, rotundatum, æneo-micans, nitidum. Elytra antice thorace parum latiora, humeris oblique rotundatis, dein ultra medium non nihil latiora, versus apicem iterum attenuata, singulatim rotundata, supra valde convexa, cinereo-pallida,

lida, nitida, crebre & profundius quam thorax punctata, sutura fere tota nigro-fusca. Corpus subtus nigropiceum, nitidum, crebre punctulatum. Pedes quatuor anteriores, ut & tibiæ & tarsi posticorum pallide testacei; femora postica magna, nigro-picea, plerumque basi & subtus rufo-ferruginea.

Var. b, differt tantum femoribus posticis dilutioribus, quoad maximam partem rufo-ferrugineis, superne vero & apice nigro-piceis,

17. *H. tabida*: oblongo-ovata, minus convexa, flavo-pallida, ore, oculis antennarumque apice nigricantibus, elytris latioribus, subtilissime punctulatis.

Schönh. synon. 2. 311. 65.

Crioceris tabida. *Fabr. Eleut.* 1. 467. 86.

Chrysomela tabida. *Marsh. Ent. Br.* 1. 203. 82.

Habitat in Sveciæ australis graminosis, rarius; eadem ex Anglia, ut Chrys. tabida Marshami, a Dom. Kirby missa.

Descr. Præcedente fere duplo major, elytra multo subtilius punctata, illarum humeri magis prominuli, &c.; Halt. Verbasci magis affinis, eique magnitudine fere æqualis, elytris antice paullo latioribus, corpore, ut videtur, minus convexo, & colore pallido, distincta. Caput sub-triangulare, convexum, pallide testaceum, nitidum, vix punctulatum, fronte antica inter antennas carinata; os nigro-fuscum; oculi prominuli, nigri. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, pallidæ, extrorsum fulcescentes. Thorax brevis, transversus, basi apiceque

ceque sub-truncatus, lateribus parum rotundatus. evidenter marginatus. supra modice convexus, pallidus, nitidus, subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, pallidum, laxe. Elytra thorace multo latiora, humeris fere rectangularis, thorace quintuplo longiora, spicatae sub-acuminatae, supra minus convexa, tota pallida vel flavescens, nitida, sat crebre, sed subtilissime punctulata. Corpus subitus paullo magis testaceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes pallide testacei, femoribus posticis concoloribus, modice incrassatis.

Obs. Hæc jam descripta species, ob magnitudinem majorem, Halt. exoleta fere æqualem, Crioceris tabida Fabricii esse videtur; Altica vero tabida Panzeri & Rossi. utpote minores, potius ad varietatem pallidam H. pratensis pertinent; Sed utrum hæc nostra a sequenti vere diversa, pro certo dijudicare nequeo, nam vivam non vidi; inter magnam copiam speciminum H. Verbasci, ne unicum tamen exacte similem reperi.

ig. H. Verbasci: ovata, convexa, griseo-pallida, nitida, thorace sub-lævi, elytris subtilissime punctulatis; subitus nigro-picea, femoribus posticis obscure ferrugineis, superne infuscatis.

Panz. fn. 21. f. 17. Crit. Rev. 1. 87. Schönh.
Synon. 2. 309. 47.

Chrysomela Verbasci. Marsh. Ent. Br. 1. 202.
78.

Var. b, subitus dilutius rufo-ferruginea.
Schönh. 1. c. var. b.

Alt-

Altica verbasci. Ent. Heft. 2. 84. 48. var.
b. tab. 3. f. 8. b.

Habitat in Verbasci Thapsi foliis; in Smo-
landia. Dom. *Bogeman*; juxta villam amœ-
nam Sparrsätta Westrogothiae, jam domi-
ciliū amicissimi Dom. *Schönherr*, æstate
præterita copiose lecta.

Descr. Major reliquis nostris hujus phalangis;
H. testacea fere æqualis, sed magnitudine variat.
Caput triangulare, fusco-ferrugineum, vertice lævi,
nitido, fronte antica carinata, punctata, ore nigro-
piceo; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ
dimidio corpore paullo longiores, cinereo-pallidæ,
extrosum parum crassiores, dilute fuscescentes. Tho-
rax brevis, transversus, basi apiceque truncatus, la-
teribus rotundatus, marginatus, supra convexus,
griseo-testaceus, pellucidus, nitidissimus, vix visibi-
liter punctulatus; intra apicem pierumque striga
transversa fusca, abbreviata. & interdum etiam in
disco posteriori altera, obsoletior. Scutellum par-
yum, rotundatum, fusco-testaceum, nitidum, læve.
Elytra antice vix thoracis basi latiora, humeris ob-
lique rotundatis, sed ante medium valde dilatata,
thorace quintuplo longiora, apice singulatim rotun-
data, supra valde convexa, griseo-testacea, nitida,
pellucida, crebre, subtilissime punctulata, sutura paul-
lo saturatius testacea. Thorax subtus griseo-testa-
ceus; pectus & abdomen nigro-picea, nitida, cre-
bre punctulata. Pedes quatuor anteriores, ut & po-
sticorum tibiæ tarsiique pallidi; femora postica magaz,
fusco-ferruginea, supra & apice obscurius picea.

Var. b. simillima, sed corpus subtus dilutius
ferrugineum, & femora postica minus infuscata.

Obs. Sub nomine *Chrysomela Thapsi*, Marsh.
Ent. Br. 1; 202. 79. ex Anglia, a Dom. Kirby, aliam
accepi,

accepi, - huic simillimam, sed cui sutura elytrorum tota nigro fusca, antennæ obscuriores, etiam versus basin; pectus, abdomen & femora postica nigro-picea; forte hæc Altica Verbasci. Ent. Heft. 2. 84. 48^a, & Crioceris Sisymbrii Fabr. Eleut. I. 465. 76; sed nullum individuum, ita coloratum, cum H. Verbasci apud nos legi, quare nec de identitate cum illa dijudicare possum.

19. *H. melanocephala*: ovata, convexa, nigra, thorace sub-lævi, iuso-ferrugineo, elytris testaceis, apice acuminatis, sutura nigricante, antennarum basi tibiisque pallidis.

Schönh. Synon. 2. 309. 45.

Chrysom. melanocephala. De Géer Ins. 5. 348.

57?

Chrysom. exoleta. Marsh. Ent. Br. I. 201. 75²

Var. b, femoribus anterioribus etiam testaceis.

Habitat in plantis & gramine, passim.

Descr. *H. atricilla* quoad colores similis, sed paullo minor, brevior; thorax multo subtilius punctulatus; elytra apice sub-acuminata, &c. Caput triangulare, nigro-piceum, vertice nitido, sub-lævi, fronte antica opaca, subtiliter rugoso-punctata, inter antenas carinata; oculi magni, prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 5 vel 6 inferioribus testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigro-fuscis pubescentibus, Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, lateribus oblique rotundatus, marginatus, basi etiam

Ins. Svec. T. I. P. III. Mm rotun-

rotundatus, supra modice convexus, totus rufo-ferrugineus, nitidus, vix, vel omnium subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, rufo-piceum, lœve. Elytra antice thorace parum latiora, humeris rotundatis, dein ultra medium dilatata, thorace quintuplo longiora; apice suturali sub acuminata, supra modice convexa, pallide testacea, crebre, subtiliter punctulata, sutura fere tota nigro fusca. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, crebre, evidenter punctatum. Femora quatuor anteriores nigro-picea, apice plerumque testacea; tibiæ & tarsi anteriores testacei; femora postica magna, nigra, nitida, subtilissime punctulata, tibiis piceis, tarsis testaceis,

Var. b, differt tantum femoribus anterioribus testaceis interdum basi obscurioribus; femora postica etiam saepe basi inferiori rufo-picea, & tibiæ ejusdem parvis fusco-testaceæ.

Obs. Sub nomine Chr. exoleta Marshami, & Dom. Kirby missa, sed descriptioni non exakte quadrat; Dom. De Geer suturam elytrorum nigram non memorat cætera correspondent.

20. *H. luteocens*: ovata, minus convexa, flavo-testacea, subtilissime punctulata, ore, oculis, antennarum femorumque posticorum apice, elytrorum sutura, pectore ab domineque nigris.

Habitat in plantis & gramine, locis umbrosis, non intrequens.

Descr. *H. melanocephala* paullo minor, minus convexa, elytrorum humeri magis prominuli; Caput semper flavo-testaceum, sutura elytrorum angustius,

stius, sed saturatius & magis determinate nigra; color in vivo læte flavus, post mortem magis testaceus, præsertim in capite & thorace. Caput majus sculum, triangulare, flavo-testaceum, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas vix carinata, sed tuberculis duobus parvis, paribus, notata, fere ut in *H. Cyprissim*, Ent. Heft. 2. 80. 47; os nigro-piceum; oculi mediocres, prominuli, nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 4 seu 5 baseos pallidis, sequentibus gradatim crassioribus, nigris. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, lateribus oblique rotundatus, evidenter marginatus, basi etiam sub-rotundatus, supra parum convexus, subtilissime obsolete punctulatus, in vivo læte flavus, nitidus, post mortem saepe pallide testaceus. Scutellum parvum, triangulare, flavum, leve. Elytra thoracis basi multo latiora, humeris prominulis, & illo quintuplo longiora, apice conjunctim rotundata, angulo futurali sub-acuminato: supra parum convexa, læte flava, nitida, confertissime, subtiliter punctulata; in ipsa latura stria communis, angusta, saturata nigra, abbreviata, nec balin neque apicem attingens. Alæ longæ albo-hyalinæ. Thorax subtus lateribus pallidus, medio niger; pectus & abdomen nigra, sub-nitida, crebre punctulata, ano saepe dilutijs palecente. Pedes mediocres, pallidi, tarsis fuscis; femora postica magna, pallida, apice late nigra, nitida, præsertim supra.

Obs. Nuper exclusa subtus dilutior, pallide fusca; cæterum hæc species semper sibi similis, nec inter centena individua ullam variationem observavi. *Chrysomela ochroleuca*, Marsh. Ent. Br. I. 202. 80, quam ex Anglia misit Dom. Kirby, huic quidem similima, sed corpus totum flavo-testaceum, ore, oculis femorumque posticorum apice solis nigris, futura elytrorum nullo modo infuscata, unde forte distincta species.

21. *H. Nasturtii*: ovata, minus convexa, nigro-picea, nitida, antennarum basi, tibiis talisque ferrugineis, elytris latioribus, confertissime punctatis, testaceis, futura margineque nigro-fuscis.

Var. *b*, femoribus quatuor anterioribus etiam ferrugineis.

Crioceris Nasturtii. *Fabr. Eleut.* i. 463. 771

Haltica praten sis. *Ent. Heft.* 2. 88. 50. var. *b*. tab. 3. f. 9. *Schönh. Synon.* 2. 309. 50. var. *b*.

Galleruca atricilla. *Payk. fn.* 2. 103. 23. var. *c*.

Chrysomela futuralis. *Marsh. Ent. Br.* i. 201. 77.

Var. *c*, elytris nigro-fuscis, plaga media obsoleta testaceo-peilucida.

Habitat in plantis & gramine, sat frequens.

Descr. Statura fere proxime praecedentis, sed plerumque paullo minor. Caput majusculum, triangulare, nigrum, vertice nitido, interdum æneo-micante, subtilissime punctulato, fronte antica nigra, opaca, inter antennas carinata; oculi magni prominenti, nigro brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, articulis 4 seu 5 baseos ferrugineis, reliquis nigris, gradatim crassioribus. Thorax parvus, brevis, transversus, capite vix latior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, supra minus convexus, crebre, subtilissime & obsolete punctulatus, niger, nitidus, saepe æneo-micans. Scutellum mediocre, rotundatum, nigro-piceum, lave. Elytra thorace multo latiora, hume-

ris prominulis, & illo fere sextuplo longiora, apicem rotundata, angulo suturali obtuso; supra modice convexa, jam dilutius, jam obscurius testacea, confertissime, evidenter punctata; futura tota & margine laterali, saltem in medio, nunc anguste, alia vice latius nigro-fascis. Alae amplae, albo-hyalinæ. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime, parce punctulatum. Femora quatuor anteriora nigro-picea, genibus, tibiis tarsisque testaceis; femora postica magna, nigra nitida, tibiis fuscis, tarsis testaceis.

Var. b, differt tantum colore pedum dilutiori, anteriores quatuor toti testacei, ut & tibiæ posticorum; femora postica basi plus minusve ferruginea.

Var. c, differt elytris obscurioribus, fere nigris, plaga tantum media oblonga, paullo pallidiori, at obsoleta, vix nisi elytris elevatis conspicua.

22. *H. pusilla*: ovata, nigro-picea, convexa, thorace rufo-piceo, elytris pallide testaceis, immaculatis, antennarum basi pedibusque testaceis, femoribus posticis apice nigris.

Habitat in plantis & gramine, passim.

Descr. Statura fere præcedentis, sed minimis ejus adhuc minor, vix *H. parvula* æqualis, elytris totis pallide testaceis, thorace rufo-piceo, &c. distincta. Caput majuscum, triangulare, vertice piceo, nitido, subtilissime punctulato, fronte antica obscuriori, opaca; inter antennas carinata; oculi magni, prominuli, nigri. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, crassiusculæ, inferne rufo-testaceæ, extrosum gradatim crassiores, fuscæ, pubescentes. Thorax brevis, transversus, basi apiceque

truncatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, supra modice convexus, subtilissime, crebre punctulatus, in disco rufescens, nitidus, limbo, præsertim antico & lateralí, fuscō-piceo. Scutellum triangulate, piceum, læve. Elytra thorace latiora, humeris sub-prominulis, thorace quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, tota pallide testacea, sub nitida, crebre & evidentius quam thorax punctata. Corpus subitus, nigro-piceum sub-nitidum, subtilissime punctulatum. Pedes mediocres, rufo-testacei, femoribus posticis supra & apice plus minusve nigro fuscis,

Obs. Sub nomine „Altica Anglica“ dubie licet, a Dom. Kirby missa, sed vix Crioceris Anglica Fabricii.

23. *H. testacea*: sub-orbiculata, gibba, rufo-testacea, nitida, subtilissime, obsolete punctulata, oculis solis nigris, thorace antice emarginato, postice sinuato.

Ent. Heft. 2. 50. 27. Panz. fn. 21. f. 13.
Schönh. synon. 2. 305. 29.

Chrysomela testacea. Fabr. Eleut. 1. 448. 159.
Marsh. Ent. Br. 1. 202. 81.

Galleruca testacea. Payk. fn. 2. 104. 24.

Habitat in Svecia meridionali, rarius.

Descr. Reliquis magis globosa, statura Cocclinellæ, & C. impunctata Linn. C. aptera Payk. magnitudine æqualis & facie similis. Caput parvum, triangulate, rufo-testaceum, vertice semi-circuiariter elevato, vix punctulato, striga arcuata, impressa, a fronte antica distincta; supra antennarum insertio-

nem tubercula duo parva, elevata, paria, & aliud majus, oblongum, inter antennas; oculi magni, prominuli, nigri. Antennæ dimidio corpore parum longiores, totæ testaceæ, extorsum gradatim crassiores, articulo ultimo acuminato. Thorax brevissimus, transversus, antice angustior, late, sed minus profunde emarginatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi valde sinuatus, in medio nempe rotundato-productus, & utrinque bis leviter emarginatus, angulis lateralibus sub-rectis; supra valde convexus, totus rufo-testaceus, nitidissimus, crebre, sed subtilissime & valde obsolete punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, rufo-testaceum, laxe. Elytra antice vix thorace latiora, humeris rotundatis, sed mox pone basin valde dilatata, dein versus posteriora attenuata, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, tota rufo-testacea, nitidissima, paullo evidentius quam thorax punctulata. Corpus totum subtus rufo-testaceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes pallidius testacei, femoribus nitidis, tibiis, præsertim mediis, arcuatis, apice crassioribus.

Obs. Sub nomine Alt. Cardui, Dom. Kirby etiam ex anglia misit, huic quidem simillimam, sed corpore magis oblongo, minus convexo, & paullo fortius punctato distinctam.

Sectio 2:a, Elytris punctato-striatis.

24. *H. exoleta*: oblongo-ovata, rufo-testacea, nitida, immaculata, oculis solis nigris, thorace postice transversim impresso, elytris regulariter punctato-striatis.

Ent. Hest. 2. 17. 5. Panz. fn. 21. f. 14. Schönh.
Synon. 2. 310. 56.

Crioceris exoleta. Fabr. Eleut. I. 466. 80.

Galleruca exoleta. Payk. fn. 2. 108. 30.

Chrysomela exoleta. Herbst. Archiv. 7. 168. 63.
tab. 44. f. 7.

Mordella flava. Linn. En. Sv. ed. 1a n:o 535.

Habitat in plantis & gramine frequens, præ-
sertim in Caricibus, locis humentibus.

Dscr. Statura fere Chrysol. marginellæ, &
femina ab his mari illius magnitudine sub æqualis;
mas præsentis dimidio minor femina. Caput trian-
gulare, rufo-ferrugineum, nitidum, subtilissime pun-
ctulatum, fronte inæquali, supra antennarum basin
tuberculis duobus, sœpe confluentibus, & supra os
carinula longitudinali, notata; oculi magni, promi-
nuli, nigri. Antennæ dimidio corpore parum lon-
giores, totæ testacea, extrosum gradatim crassio-
res. Thorax longitudine dimidio latior, antice
late, sed parum profunde emarginatus, lateribus ro-
tundatus, evidentiter marginatus, basi media etiam sub-
rotundatus, angulis prominulis; supra antice valde
convexus, fere pulvinatus, postice striga transversa,
abbreviata, utrinque fovea profundiori, in basin ex-
currente, terminata, impressus; totus rufo-testaceus,
nitidus, subtilissime punctulatus. Scutellum parvum,
triangulare, rufo-testaceum, laxe. Elytra thoracis
basi latiora, humeris sub-elavatis, rotundatis, & illo
sextemplo longiora, supra minus convexa, regulariter
& sat profunde punctato-striata, punctis striarum
versus apicem minoribus, obsoletioribus; tota rufo-
testacea, nitida, apicem versus paullo pallidiora. A-
lae longæ, albo-hyalinæ. Corpus subtus saturatius
rufo-ferrugineum, crebre, subtilissime punctulatum.
Pedes mediocrés, pallidius testacei, femoribus nitidi-
bus, posticis modice incrassatis.

Obs. Chrysom. exoleta. Linn. Syst. & Fn. Svs ed. 2:da, ad H. pratensem var. b, ante, pertinere videtur, secundum diagnosis ibi datam; sed descrip̄io in Faunæ editione primæ N:o 535. data, H. exoletæ veræ competit, & in editione secunda Faunæ erroneæ ad aliam speciem translata.

Chrysomela transversa, Marsh. Ent. Br. I. 203. 83, & Dom. Kirby communicatæ, quæ etiam Altica exoleta major, Ent. Heft. 2. p. 19, species distincta videtur, fere duplo major, striis elytrorum irregularibus, punctis striarum multo minoribus, magis coarctatis, dispersis, præcipue diversa; sed hæc apud nos non lecta, quantum mihi innotuit.

25. H. affinis: oblongo-ovata, minus convexa, nigra, thorace, elytris, antennis, tibiis tarsisque pallide testaceis, sutura elytrorum nigricante.

Ent. Heft. 2. 35. 16. Schönh. synon. 2. 319. 57.

Galleruca affinis. Payk. fn. 2. 109. 31. var. major, capite nigro.

Altica atricilla. Panz. fn. 21. f. 8. Crit. Rev. I. 84.

Habitat in plantis & gramine, minus frequens

Descr.' Magnitudine & colore H. melanocephala similis, sed elytra latiora, profunde punctato-striata, &c. Caput triangulare, nigrum, nitidum, vix punctulatum, vertice & fronte non tuberculatis; oculi magni, prominuli, brunnei. Antennæ dimidio corpore parum longiores, totæ pallide testaceæ, extor-

trosum gradatim crassiores. Thorax brevis transversim quadrangularis, antice truncatus, lateribus vix rotundatus, evidenter marginatus, basi sub sinuatus, angulis prominulis; supra parum convexus, pallide testaceus, confertissime, subtiliter & obsolete punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, testaceum, laeve. Elytra antice thorace multo latiora, & pone basin valde dilatata, dein versus apicem attenuata, thorace sextuplo longiora, supra parum convexa, pallide seu livide testacea, regulariter & profunde punctato-striata; futura, praesertim in medio, nigro-fusca. Alæ longæ albidae. Thorax subtus lateribus testaceus, medio niger; pectus & abdomen nigra, nitida, obsolete punctulata. Pedes quatuor anteriores, tenues, femoribus piceis, apice cum tibiis terisque testaceis; femora postica magna, tota nigra, nitida; tibiæ & tarsi ejusdem paris testacei; tibiis apice acumine elongato ultra tarsuum insertionem auctis.

Obs. Nuper exclusa fere tota pallida, oculis nigris, pectore, abdominis basi, femorumque posticorum apice fuscescentibus. Utrum Chrysomela exoleta Linnæi, secundum sententiam Dom. Illigeri in Mag. I. 420. 80, ab hanc speciem pertinet, vel ad Halt. pratensem antea, vix certo dijudicandum, quoniam de clytorum punctura, aut vaga sit, aut striatum digesta, nil memoratur.

26. *H. Salicariæ*: ovata, convexa, pallide testacea, elytris dilutioribus, pectore abdomineque piceis, oculis nigris, antennis apice fuscescentibus.

Schönh. synon. 2. 311. 58.

Galleruca Salicariae, Payk. sp. 3, add. 453.

Habitat in Lythro Salicaria, ad lacuum littora, passim copiose.

Deser. Similis praecedenti, sed dimidio minor & ultra, praesertim brevior, multo magis convexa. Caput triangulare, rufo-testaceum, parum nitidum, vix punctulatum, fronte depressa, sub-inaequali; oculi prominuti, nigri. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, inferne pallide testacea, extorsum gradatim crassiores, fusco cinereæ, pubescentes. Thorax brevis, transversus, antice vix emarginatus, lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, basi truncatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus aut rufo-testaceus, aut pallidior, nitidus, omnium subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, testaceum; lœve. Elytra antice thorace multo latiora, & pone basin magis dilatata, apicem versus parum angustata, thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, sat profunde punctato-striata, striis versus apicem evanescitibus; pallidius testacea, nitida posterius adhuc dilutiora; futura communis interdum, non vero semper, nonnihil infuscata. Thorax subtus uti supra, totus testaceus, pectus & abdomen nigro-piceo, sub-nitida, subtilissime punctulata, ano saepe dilutiori. Pedes crassissimi, validi, toti pallide testacei.

27. *H. pubescens*: ovata, convexa, nigra, nitida, antennarum basi pedibusque testacea, thorace creberrime punctato, posse impresso elytris profunde punctato-striatis, tenue pubescentibus.

Ent. Heft. 2. 37. 17. Panz. fn. 99. f. 6.

Schönh. synon. 2. 315. 87.

Habitat in aridis, graminosis, in Westrogothia rarissime. Lecta.

Descr. Statura brevis, convexa, fere præcedentis, sed paullo minor. Caput retractum, triangulare, nigrum, subtilissime, crebre punctulatum, vertice elevatori, subnitido, fronte antica opaca, sub-carinata; oculi laterales, nigri, prominuli. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, versus basin pallide testaceæ, extrorsum gradatim crassiores, nigrofuscæ, pubescentes. Thorax brevissimus transversus, antice late, sed non profundus emarginatus, caput amplectens, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, basi sub sinuatus, angulis prominulis, acutis; supra anterius valde convexus, pulvinatus, pone medium striga transversa, abbreviata, utrinque foveola profundiori terminata, simplicessus; totus niger, nitidus, parum metallico-micans, confertissime, concinne & evidenter punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, lœve. Elytra antice thoracis basi vix latiora, humeris rotundatis, sed mox pone basin valde dilatata, thorace vix quintuplo longiora, apice conjunctim obtuse rotundata, supra modice convexa, dorso antico sub-impressa, tota nigra, sub-nitida, regulariter & sat profunde punctato striata, intersitti pilis brevibus, cinereis, sub-reflexis, adspersis. Corpus subitus nigrum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes quatuor anteriores testacei, femoribus interdum basi infuscatis; femora postica magna, nigra, nitida, tibiis tarsisque testaceis.

Obs. Eandem omnino ex Insulis St. Bartholomæi & St. Eustachii, a D. Forssström obtinui, & simillimam, modo, antennæ, fere totæ, pedes anteriores & posteriorum tibiæ tarsiæ dilutiùs pallidi; varietates elytris flavo-maculatis, in Ent. Heft, loc. cit. memoratae, mihi non obviæ.

28. *H. nigritula*: ovata, convexa, nigra, nitida, antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis, thorace vix punctulato, postice impresso, elytris profunde punctato-striatis, apice sub-laevibus.

Habitat in Finlandiae graminosis, Dom. Pfeiff, & ab illo sub nomine: *Altica globosa*, missa.

Deser. Statura fere praecedentis, sed duplo major, *H. affini* æqualis. Caput retractum, triangulare, nigrum, vertice nitido, vix punctulato, fronte supra antennarum insertionem tuberculis duobus obsoletis, notata, & anterius carinula parva, elevata; oculi prominuli, nigro brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassissimæ, pubescentes, rufo piceæ, articulo primo & ultimis paullo obscurioribus. Thorax brevis, transversus, antice late, sed parum profunde emarginatus, lateribus vix rotundatus, evidenter marginatus, basi sub sinuatus, angulis prominulis; supra anterius valde convexus, pulvinatus, pone medium striga transversa, abbreviata, utrinque foveola profundiori, in basin thoracis excurrente terminata, impressus; totus niger, nitidus, parum metallico-micans, vix, vel omnium subtilissime & obsolete punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, laeve. Elytra antice thoracis basi patum latiora, humeris rotundatis, sed mox pone basin dilatata, dein versus apicem attenuata, thorace vix quintuplo longiora, supra valde convexa, nigra, nitida, glabra, anterius sat regulariter & profunde punctato-striata, punctis majusculis, remotis, striis pone medium omnino evanescientibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum. Pedes breviuscui, validi, femoribus nigro-piceis, tibiis tarsisque dilatioribus, rufo-piceis.

29. *H. rufipes*: ovata, thorace, postice impresso, capite, antennis pedibusque totis rufis, elytris cœruleo-virentibus, regulariter, minus profunde punctato-striatis, pectore abdomeisque nigris.

Ent. Heft. 2 n. 2. Thub. Act. Ups. 5. 112.
44. Schönh. synon 2. 307. 36.

Chrysomela rufipes. Linn. syst. 2. 595. 65. Fn. Sv. 545.

Crioceris ruficornis. Fabr. Eleut. 1. 464. 70.

Chrysom. cœruleo-striata. De Gér. Ins. 5. 343. 48.

Galleruca ruficornis. Payk. fn. 2. 108. 29.

Altica ruficornis. Panz. fn. 21. f. 12.

Habitat in plantis variis, locis umbrosis, non infrequens.

Descr. Statura & magnitudo H. exoletæ. Caput triangulare, totum rufum, vertice nitido, vix punctulato; frons inæqualis, inter antennas longitudinaliter carinata, & superius tuberculis duobus, paribus notata; oculi prominenti, nigro-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, totæ ruso-testaceæ, extrorsum gradatim crassiores. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, angulis prominenti, acutis; lateribus parum rotundatus, late marginatus, basi sub-sinuatus, supra antice valde convexus, pulvinatus; pone medium stria profunda, abbreviata, utrinque fovea profundiori, rectangulariter in basin thoracis excurrente, terminata; impressus; totus rufus, nitidus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum triangulare, cœruleo-virens, nitidum, laxe. Elytra antice thorace parum latiora,

latiora, dein ultra medium magis dilatata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, dorso antico sub-depressa, tota cœruleo virescentia, nitida, regulariter, sed minus profunde punctato-striata, punctis parvis, coætatis, præsertim versus futuram; striis pœnulo ante apicem irregularibus, evanescentibus; intra humerum sœveola baseos impressa, unde callus humeralis elevatus appareat. Thorax subitus rufus; pectus & abdomen nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata. Pedes validi, toti rufo-testacei, femoribus posticis modice incrassatis; superne paulo saturatius ferrugineis.

30. *H. femorata*: ovata, capite, thorace poslice impresso, tibiis sarsi que rufis, elytris cœruleis, regulariter, profunde punctato-striatis, ote, femoribus, pectore ab domineque nigris.

Haltica rufipes. Schönh. synon. 2. 307. 36.
var. b.

Habitat in Lapponia, Dom. Grape; a Dom. Sthönherr benevole communicata.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, distincta tamen videtur, non solum colore oris femorumque nigro, sed etiam punctis striarum in elytris majoribus, profundioribus, paucioribus, &c. Caput, oculi, antennæ ut in præcedenti omnino, modo os nigro-piceum. Thoracis structura, color, punctura & impressiones etiam exæcte ut in illa. Scutellum ut in præcedenti. Elytrorum forma eadem, sed color saturatius cœruleus, & puncta striarum multo majora, profundiora, pauciora in quavis stria, unde magis remota, etiam in striis dorsilibus;

libus; alias striæ simili modo intra apicem in punctata irregulariter sparsa resolventur. Cordus subtus ut in priori. Pedum structura eadem, sed femora omnia tota nigra, nitida, tibiis tarsisque solis rufis.

31. *H. fuscipes*: ovata, convexa, nigra, capite, thorace antennarumque basi rufis, elytris cœruleo-virentibus, minus regulariter punctato-striatis, thorace postice utrinque sub-impresso.

Ent. Heft. 2. 10. 1. Panz. fn. 21. f. n. Crit.

Rev. 1. 80. Schönh. synon. 2. 306. 35.

Crioceris fuscipes. *Fabr. Eleut. 1. 464. 69.*

Coqueb. Illustr. 3. 124. tab. 28. f. 5.

Galleruca fuscipes. *Payk. fn. 2. 107. 28.*

Habitat in Svecia meridionali rarius. Dom.
de Paykull.

Descr. Magnitudo & fere statura *H. rufipedis*, sed paullo brevior & magis obtusa. Caput sub-triangulare, rufum, vertice nitido, vix punctulato, fronte inæquali, inter antennarum insertionem obsolete carinata; os fusco-piceum; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, articulis 3 seu 4 baseos, rufis, reliquis gradatim crassioribus nigris, pubescentibus. Thorax brevis, transversus, antice sub-emarginatus, angulis prominulis, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus rufus, nitidissimus, omnium subtilissime punctulatus; in ipsa basi utrinque foveola parva, obliqua, impressa, sed stria postica transversa omnino nulla. Scutellum triangulare, nigro-cœrulescens, lœve, elytra

tra thoracis basi latiora, & illo quintuplo longiora, supra modice convexa, cœruleo-virescentia, nitida, tenue punctato-striata, punctis minus regulariter ordinatis, saepe duplicatis. Thorax subtus rufus; pedes & abdomen nigra, sub-nitida, subtiliter, obsolete punctulata. Pedes validi, nigri, tarsis piceis, femoribus posticis modice incrassatis, nitidis.

32. *H. nitidula*: oblongo-ovata, thorace postice impresso, subtiliter punctulato, capiteque viridi-aureis, elytris cœruleis, striis subtilioribus, intricatis, antennarum basi pedibusque anterioribus rufis.

Ent. Hest. 2. 13. 3. *Schönh. synon.* 2. 303. 20.

Chrysom. nitidula. *Linn. syst.* 2. 594. 60. *Fn.*

Sv. 542. *Fabr. Eleut.* 1. 447. 151. *De Geer Ins.* 5. 346. 54.

Galleruca nitidula. *Payk. fn.* 2. 105. 26.

Habitat in Populo, Salice, passim.

Descr. Magnitudo & fere statura *H.* exoletæ, sed minus convexa; mas fere duplo minor femina. Caput triangulare, viridi aureum, vertice nitidissimo, vix punctulato, fronte inter antennas carinula longitudinali elevata, & supra illam tuberculis duobus, paribus, notata; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, pallide testaceæ, extrorsum paullo crassiores, nigro-fuscæ. Thorax brevis, transversus, antice latior, truncatus, angulis deflexis, lateribus parum rotundatus, late-marginalis, basi sub sinuatus, supra, anterius modice convexus, pone medium striga transversa, abbreviata, utrinque foveola profundiori, rectangulariter in basin thoracis excurrente, terminata impressus; totus

Ins. Suec. T. I. P. III. Nn vire-

virescenti-aureus, nitidissimus, crebre, subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, nigro-cerulescens. Elytra thoracis basi latiora, humeris fere rectangularis, thorace fere sextuplo longiora, supra modice convexa, cerulea, nitida, tenui punctato-striata, striis minus regularibus, punctis saepe duplicatis & invicem intricatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, parum virescenti-micans, obsolete punctulatum. Pedes validi, flavo-testacei, femoribus posticis latis, compressis, nigris, nitidis, æneo-micantibus.

33. *H. Helxines*: ovata, supra metallica, thorace profunde punctato, postice impresso, elytris regulariter, profunde punctato-striatis, antennis pedibusque flavo-testaceis.

a, Supra aut viridi-ænea, aut viridi-aurea, aut in capite & thorace magis aureo-cuprea.

Ent. Hest. 2. 15. 4. var. a, b, c, d, e, & i.
Panz. fn. 21. f. 6. Schönh. synon. 2. 303.
21. var. a, b, c, d, e, & i.

Chrysomela Helxines. Fabr. Eleut. 1. 447. 152.
Linn. syst. 2. 594. 58. Fn. Sv. 540, exclusa
descriptione, erroneæ e Faunæ ed. 1: a translata.

Chrysom. viridi-aurata. De Géer Inf. 5. 345. 52.

Galleruca Helxines. Payk. fn. 2. 106. 27. a, b.

Var. b, supra rubro-cuprea tota. Ent.
Hest. & Schönh. loc cit. var. f.

Chrysom. fulvicornis. Fabr. Eleut. 1. 447. 153.

Var. c, supra fusca, aut fusco-cuprea,
aut cupreo-violacea, aut violaceo-nigricas,

cans, præsertim in elytris. *Ent. Heft. & Schönh. l. c. var. g. h.*

Var. *d*, supra aut cœruleo-virescens, aut capite thoraceque viridibus vel viridi-æneis, elytris cœruleis, aut tota cœruleo-violacea. *Ent. Heft. loc. cit. var. k. l; Schönh. l. c. var. k, l, m. Payk. l. c. var. c, d.*

Chrysom. violaceo-punctata. De Géer Ins. 5. 344. 50.

Chrysom. cyanea. Marsh. Ent. Br. i. 196. 62.

Habitat in Salicibus, Populo, ubique frequentissima; varietates *c*, & *d*, tamen parcius occurunt.

Descr. Statura præcedentis, sed duplo minor & ultra, punctura profundiori, striis elytrorum regularibus, &c. abunde distincta. Caput triangulare, vertice viridi-æneo; nitidissimo subtilissime punctulato, fronte inferiori viridi, opaca, inæquali, cariula tuberculisque ut in priori notata; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, pallide testaceæ; extrosum gradatim crassiores & interdum apice obscuriores. Thorax brevis, transversus, antice latior, vix emarginatus, angulis deflexis, lateribus oblique rotundatus, basi bi sinuatus, angulis sub-rectis; supra anterius modice convexus, posterius striga transversa, abbreviata, utrinque foveola profundiori terminata, impressus, undique creberime, profunde punctatus, aut viridi æneus, aut aureo-vel cupreo-æneus, nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, obscure virescens, læve. Elytra thoracis basi latiora, & illo quintuplo longiora, supra minus convexa, dorso antico plerumque sub-depressa, regulariter & profunde punctato-striata, intersti-

tiis lœvibus, callo humerali oblongo, elevato; aut læte viridia, aut viridi ænea, aut virescenti-aurea, plerumque tamen minus fulgida quam thorax & caput. Pectus subtus viride, nitidum, lœve; abdomen nigro sub-virescens, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus posticis apice superiori macula nigro-fusca notatis.

In var. b, color paginæ superioris intense rubro-cupreus, lateribus elytrorum tamen plerumque virescentibus; femora postica in hac varietate sæpe tota testacea, vel macula fusca apicis obsoleta.

Var. c, supra oscarius colorata; quasi fusco inducta, ut in diagnosi indicatum; elytra præsertim obscurata, lateribus tamen viridi-nitentia; apex femorum posticorum sæpe latius niger; pleraque hujus varietatis individua ad sexum masculinum; pertinent, ut ex copulatione & magnitudine minori concludi possit.

In var. d. elytra cœrulea vel cœruleo-violacea; caput & thorax rarius elytris concolora, sed plerumque magis virescentia; cæterum omnes varietaes in essentialibus simillimæ, nec singulas coloris variationes fusius determinare opus est; præcipue cum minus inconstantes sint, & una in alteram successive transit.

Obs. Character Chrysom. Helxines Linnæi in Syst. Nat. & Fn. sv. ed. 2:da, certe nostro competit, sed descriptio Faunæ, ex editione 1:ma translatæ, potius ad Halticam dentipedem pertinet.

Obs. Amicissimus Dom. Schönherr ex Musæo suo Halticam conimicavit, medium quasi inter Halt. nitidulam & Helxines; priori magnitudine æqualis. eique quoad colorem & puncturam capitis, thoracis corporis & pedum, simillima; sed elytra virescenti ænea, regulariter & profunde punctatostriata, ut in H. Helxines; nec vero patria pro cer-

te cognita, nec secundum unicum individuum speciem novam determinandam existimo, quare heic leviter tantum indicavi Insectum dubiae originis.

34. H. Dulcamaræ: ob-ovata, convexa, posterius attenuata, atro-cœrulea, nitida, antennis basi rufis, pedibus nigris, elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis obsolete punctulatis.

*Ent. Heft. 2. 24. 9. tab. 2. f. 5. Schónh.
synon. 2. 304. 14.*

Habitat in Solano Dulcamara, prope Holmiam, Dom. Schónherr.

Descr. Statura & affinitas H. Hyoscyami, sed paullo major, latior, magis convexa; præterea colore atro-cœruleo pedibusque nigris, ab illa abunde distincta. Caput parvum, retractum, triangulare, vertice cœruleo-virescente, nitido, parce, subtiliter punctulato, linea semi-circulari impressa a fronte antica distincto; frons inter antennas triangulariter elevata, etiam ejusdem coloris & puncturæ; regio otis obscurior, nigro-picea; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, crassifuscæ, articulis tribus baseos testaceis, reliquis gradatim crassioribus, nigro-fuscis. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late sed non profunde emarginatus, angulis deflexis, prominulis, caput amplectentibus; lateribus rotundatus, late marginatus, basi bi-sinuatus, iu medio rotundatim productus; supra modice convexus, æqualis, nigro-cœruleus, nitidus, parum virescenti-micans, versus latera crebrius, in disco posteriori parce punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, nigro-cœruleum, laxe, Elytra antice thorace paullo latiora, &

mox pone basin magis dilatata, dein versus apicem attenuata, apice ipso rotundata, thorace fere sextuplo longiora, supra modice convexa, dorso antico sub-depressa, tota nigro-cœrulea, nitida, subtiliter, ordinata punctato-striata. interstitiis subtilissime, obsolete punctulatis. Alæ longæ, cinereo-albidæ. Corpus subtus nigrum, parum cœrulecenti. vel æneomicans; crebre punctulatum. Pedes breviusculi, anteriores quatuor nigri, tarsis & interdum tibiis primi paris fusco-piceis; femora postica maxima, cœuleo-violacea, nitidissima; tibiæ & tarsi ejusdem paris fusco piceæ, tibiis apice ultra tarsuum insertio-nem longe productis, arcuatis, apice ipso sub-biden-tato, ut in H. affini, antea, & pluribus jam inse-quentibus.

35. *H. Hyoscyami*: ob-ovata, convexa, posterius attenuata, supra, femoribusque posticis viridi-æneis, antennarum basi pedibusque testaceis, elytris regulariter punctato-striatis, interstutiis crebre punctula-tis.

Ent. Heft. 2. 27. 10. tab. 2. f. 6. Schönh. sy-non. 2. 301. 15.

*Chrysomela Hyoscyami. Linn. syst. 2. 594. 54.
Fn. Sv. 536. Fabr. Eleut. 1. 447. 149. De
Geer Ins. 5. 345. 51.*

Galleruca Hyoscyami. Payk. fn. 2. 104. 25. a.

Habitat in Hyoscyamo nigro, sat frequens.

Descr. *H. exoleta* fere major, in medio latior, sed posterius magis attenuata; variat tamen statura minori. Caput parvum, retractum, triangulare, ver-tice

tice & fronte superiori viridi-æneis, nitidis, crebre subtiliter punctulatis, ut in priori constructis; regio oris nigro-picea; oculi prominuli, brunnei. Antennæ crassiusculæ, longitudine dimidii corporis, articulis tribus seu quatuor baseos pallide testaceis. reliquis gradatim crassioribus, nigro piceis. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late sed non profunde emarginatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi sub-bisinuatus, supra modice convexus, æqualis, virescenti æneus, nitidus, subtilissime & sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, virescenti-æneum, læve. Elytra antice vix thoracis basi latiora, sed mox pone basin dilata, dein versus apicem sensim attenuata, thorace sextuplo longiora, supra modice convexa, virescenti-ænea, nitida, regulariter & paullo profundius quam in præcedenti punctato-striata, interstitiis crebre, subtilissime & obsoletius punctulatis. Alæ longæ, cinnereo-albidæ. Corpus subtus nigro-æneum, sub nitidum, crebre punctatum. Pedes quatuor anteriores & posticorum tibiæ tarsique pallide testacei; femora postica magna, crassi, nigro-ænea, nitida, tibiis ejusdem paris quoad structuram omnino ut in præcedente descriptis.

Obs. Chrys. Hyoscyami Linn. Syst. & Fn. Sv. ed. 2:da certe huc pertinet, sed Mordella ovata, coerulea, &c. Fn. Sv. ed. 1:ma N:o 540, erroneæ cum illa conjuncta, ad H. Napi vel Chrysocephalam aptius referenda, ut & Paykullii Gall. Hyoscyami var. b.

36. H. Napi: ovata, convexa, posterius minus attenuata, supra nigro-coerulea, antennis inferne pedibusque testaceis, femoribus posticis nigro-coeruleis, elytris regulariter punctato-striatis, interstitiis vix punctulatis. N.n 4 E.t.

Ent. Heft. 2. 30. 12. Schönh. synon. 2. 301. 13.

Chrysomela Napi. Fabr. Eleut. 1. 446. 148.

Chrysomela Hyoscyami. Payk. fn. 2. 105. 25.
var. b.

*Mordella ovata cœrulea. Linn. Fn. ed. 1:ma
N:o 540.*

Habitat in plantis oleraceis passim, minus
fréquens.

Descr. Præcedente fere duplo minor, posterius
minus attenuata, supra tota nigro-cœrulea. Caput
sub triangulare, convexum, cœruleo-virescens, parce
& obsolete punctulatum, fronte vix carinata, regio-
ne oris picea; oculi prominuli, brunnei. Antennæ
dimidio corpore longiores a basi ultra medium te-
staceæ, extrorsum gradatim crassiores fuscæ. Tho-
rax brevis, transversus, antice paullo angustior, pa-
rum emarginatus, angulis deflexis, lateribus rotun-
datus, late marginatus, basi bi-sinuatus, supra valde
convexus, nigro-cœruleus, nitidus, parum virescenti-
micans, subtilissime, obsolete punctulatus. Scutel-
lum triangulare, nigro-cœrulescens, lœve. Elytra
antice vix thoracis basi latiora, sed pone basin dila-
tata, dein versus apicem attenuata, minus tamen
quam in H. Hyoscyami; thorace quintuplo longio-
ra, supra valde convexa, nigro-cœrulea, nitida, re-
gulariter punctato-striata, interstitiis lœvibus. Cor-
pus subtus nigrum, parum cœrulecenti- vel æneo-
micans, nitidum, subtiliter crebre punctulatum. Pe-
des mediocres, pallide testacei, femoribus posticis
magnis, nigro-cœrulecentibus; tibiæ posticæ ut in
proxime præcedentibus construclæ.

37. H. Chrysocephala: ob-ovata, conve-
xa, posterius attenuata, thorace, elytris
femo-

femoribusque posticis nigro-cœruleis, fronte, antennarum basi pedibusque testaceis.

Ent. Heft. 2. 31. 13. tab. 2. t. 8. Schönh. *synon. 2. 302. 27.*

Chrysomela chrysocephala. Linn. *Syst. 2. 594.*
53. Fn. Sv. 535. Marsh. *Ent. Br. 1. 193. 54.*

Altica Napi. Panz. *fn. 21. f. 3.* Crit. Rev.
1. 75.

Var. *b*, femoribus anterioribus infuscatis.

Var. *c*, pedibus anterioribus nigro piceis,
genubus tarsisque fusco-testaceis.

Chrysomela erythrocephala. Linn. *Syst. 2. 594.*
56. Fn. Sv. 538. Fabr. Eleut. *1. 448. 157.*

Haltica erythrocephala. Schönh. *synon. 2. 305. 27.*

Habitat in plantis oleraceis, præfertim Ra-
phano sativo, sat frequens.

Descr. H. Hyascyami paullo longior, posterius magis attenuata, cæterum similis & affinis. Caput triangulare, rufo-testaceum, fronte inter antennas carinata; vertex sive frons superior convexa, subtilissime punctulata, aut rufo picea, aut nigro-virescens, nitida; palpi maxillares nigri; oculi magni, prominenti, brunnei. Antennæ longitudine dñmidii corporis, tenues, basi testaceæ, extorsum parum crassiores, nigro-fuscæ, articulo ultimo oblique acuminato. Thorax brevis, transversus, antice angustior, parum emarginatus, angulis deflexis. lateribus sub-rotundatus, late marginatus, basi leviter bi-sinuatus, supra valde convexus, vix vel omnium subtilissime, crebre punctulatus, minus nitidus, aut nigro-virescens, aut cœruleiscens. Scutellum triangulare, nigro-cœrule-

scens, lœve. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed mox pone basin dilatata, dein versus apicem valde attenuata, thorace textuplo longiora, supra modice convexa, nigro-cœrulea vel virescentia, magis quam thorax nitida, regulariter sed tenue punctato striata, interstitiis obsoletissime rugulosis. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, confertissime subtiliter punctulatum, ano sc̄epe dilutius rufo-piceo. Pedes quatuor anteriores, ut & tibiæ tarsique posticorum, rufo-testacei; femora postica magna, nigra, nitida, parum cœruleo-micantia, tenue cinereo-pubescentia; tibiæ posticæ apice elongato-productæ, ut in prioribus.

Var. b. differt tunc femoribus quatuor anteriores fusco-piceis, apice plerumque testaceis.

In var c, etiam tibiæ & tarsi omnes plus minusve infuscati, genubus, tibiarum apice, tarsuumque basi testaceis.

38. *H. elongata*: ob-ovata, convexa, posterius attenuata, capite, thorace, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, elytris cœruleo-virentibus, pectore, abdome femoribusque posticis nigro-piceis.

Habitat in Smolandie plantis oleraceis, rarius; Dom. Wetterhall; ex Italia eandem pluries obtinui.

Descr. Præcedenti magnitudine & statura similis, nimisque affinis; differt tamen thorace toto rufo-testaceo, immaculato, paullo evidentius punctulato. Caput quoad strūturam ut in præcedente, aut totum testaceum, aut in vertice nonnihil infuscatum; os interdum fusco-piceum; oculi & antennæ ut in priori. Thoracis strūtura eadem, sed totus

tus rufo-testaceus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, nigro-cœruleum, læve. Elytrorum forma, striæ & punctura ut in p̄cedenti, aut nigro cœrulea, aut cœruleo-virescentia, nitida. Thorax subtus rufo-testaceus; pectus & abdomen nigro-picea, nitida, creberrime punctulata. Pedes aut toti pallide testacei, femoribus posticis tantum nigro-piceis, nitidis, aut femora anteriora basi infuscata.

39. H. Spergulae: oblongo-ovata, convexa, utrinque attenuata, supra viridi-ænea, antennarum basi, tibiis tarsisque testaceis, thorace confertissime punctato, antice valde compresso.

Habitat in agris arenosis, præsertim in Spergula arvensi, sat frequens.

Descr. H. Chrysocephala fere triplo minor, præsertim angustior, alias statura similis & affinis, utrinque attenuata. Caput triangulare, retractum, obtusum, viridi-æneum, nitidum, subtilissime punctulatum. fronte inter antennas foveola rotundata, impressa; os piceum; oculi prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, tenues, articulis 4 vel 5 baseos pallide testaceis, reliquis gradatim paullo crassioribus, nigris. Thorax brevis, transversus, antice sub-rotundatus vel oblique truncatus, ibique reapse latior quam postice, sed valde compressus, angulis lateribusque dependentibus, unde superne inspectus, multo angustior appareat; lateribus parum rotundatus, anguste marginatus, basi leviter sinuatus, supra valde convexus, viridi-æneus, subnitidus, confertissime, evidenter punctatus. Scutellum triangulare, viridi-æneum, læve. Elytra antice thora-

thoracis basi non latiora, sed pone basin nonnihil dilatata, dein sensim versus apicem attenuata, thorace sextuplo longiora, supra modice convexa, viridia, nitida, parum æneo-micantia, regulariter & sat profunde punctato-striata, interstitiis obsoletissime vase punctulatis. Corpus subtus nigro-piceum, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum, ano plerumque dilutiori. Femora quatuor anteriora basi fusco-picea, extrorsum testacea; tibiæ & tarsi omnes pallide testacei; femora postica magna, viridi-ænea, nitidissima, subtus rufo picea; tibiæ posticæ apice elongatæ ut in prioribus.

Obs. Altica attenuata, Ent. Heft. 2. 34. 15. A Dom. Sturm communicata, huic simillima & valde affinis, sed thorax minus convexus videtur, & elytrorum apex ferrugineus, quod in nostris nunquam vidi, et si magnam speciminum copiam examinavi.

40. *H. occultans*: oblongo-ovata, convexa, nigra, supra cœrulecenti-micans, thorace crebre punctato, caput occultante, elytris confertissime punctato-striatis.

Ent. Heft. 2. 23. 8. tab. 2. f. 4. Schönh. sy. non. 2. 315. 90.

Habitat in aridis Westrogothiæ, cum præcedenti rarius lecta.

Descr. Longitudo præcedentis, sed paullo latior, ut inque obtusa. Caput omnino intra thoracem retractum, ut in *Cryptocephalis*, fronte sola conspicua, quæ nigra, sub nitida, vix punctulata, inter antennas sub carinata; oculi magni, depresso-brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis, basi ferrugineæ, extrorsum gradatim crassiores, nigro-fuscae, Thorax brevis,

brevis, transversus, antice truncatus, angulis & lateribus valde deflexis, compressis, unde cylindricus appareat; latera tamen inferne marginata, nonnihil rotundata; basi bisinuatus, supra valde convexus, nigro æneus vel cœrulescens; sub nitidus, creberrime & sat profunde punctatus. Scutellum triangulare, nigro - cœrulescens; læve. Elytra antice thoracis basi parum latiora, humeris oblique rotundatis. sed mox pone basin dilatata, posterius vix attenuata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, nigro cœrulea, nitida, confertissime & sat profunde punctato striata, interstitiis nempe seriatim & fere æque profunde aè ipsæ striæ punctatis; ob copiam vero punctorum, striæ certo situ minus regulares apparent. Corpus subtus nigrum, patim nitidum, creberrime punctulatum. Pedes breviusculi, validi, nigri, tarsis piceis; femora postica magna, cœruleomicantia; tibiæ posticæ apice appendiculo brevi testaceo, apice bifido; supra tarsuum insertionem, instructæ:

41. H. dentipes: cœrulea, parum convexa, nigra, supra viridi-ænea, antennarum basi tibialisque ferrugineis, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis lævibus, tibiis posticis dentatis.

Ent. Heft. 2. 38. 18. tab. 3. f. i. Schönh.
synon. 2. 315. 85.

Chrysomela concinna. Marsh. Ent. Br. 1. 196.
61.

Var. b, thorace cupreo, elytris viridi-æneis.

Var. c, supra nigro-ænea. Ent. Heft. 1. &
var. a. Mor-

Mordella sub rotunda atro-aenea. Linn. Fn.
Sv. ed. 1: a 539.

Var. d, supra nigra. Ent. Heft. & Schönh.
loc. cit. var. b..

Habitat in plantis & gramine, præsertim
locis aridis, ubique frequens.

Descr. Magnitudo & fere statuta H. affinis, vel
adhuc minus convexa: variat etiam duplo minor &
ultra. Caput triangulare, æneum, parum nitidum,
crebre, subtilissime punctulatum, fronte inter anten-
nas carinula longitudinali elevata; abbreviata; oculi
prominuli, brunnei. Antennæ longitudine dimidii
corporis, plerumque a basi ultra medium ferrugineæ,
extrosum gradatim crassiores, nigro-fuscæ, articulo
ultimo majori, ovato, sub-acuminato. Thorax trans-
versus, longitudine duplo latior, antice truncatus,
lateralibus sub rectis, evidenter marginatis, basi sub-si-
nnatus, in medio rotundate productus. supra parum
convexus, virescenti-æneus, sub-nitidus, crebre & sat
profunde punctatus; in basi utrinque, versus mar-
ginem, foveola obliqua, impressa, plerumque valde
obsoleta. Scutellum parvum, rotundatum, virescen-
ti-æneum, lave. Elytra antice thoracis basi parum
latiora, sed mox pone basin valde dilatata, thorace
quintuplo longiora, supra parum convexa, virescenti-
ænea, nitida, regulariter & profunde punctato-stria-
ta, intersticiis planis, lævibus. Corpus subtus, ni-
grum, sub nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes validi, femoribus nigris, posticis magnis, æ-
neo-micantibus; tibiæ & tarsi obscure ferruginei;
tibiæ posticæ externe, paullo infra medium, dente
parvo, albido-setoso, armatæ.

Var. b, differt tantum colore capitis & thora-
cis magis cupreis, elytris æneo-cupreis,

In var. c, color paginæ superioris obscurior, nigro-æneus.

Var. d, supra fere tota nigra vel nigro-viola-cea, parum nitida; latera elytrorum tamen plerumque æneo-virescentia.

42. *H. aridella*: oblongo-ovata, convexa, fusco-ænea, antennarum basi; tibiis tarsisque ferrugineis, tibialis posticis dentatis, elytrorum striis dorsalibus intricatis.

Ent. Heft. 2. 41. 20. tab. 3. f. 2. Schönh. syn-
non. 2. 315. 84.

Galleruca aridella. Payk. fn. 2. m. 34.

Chrysomela nigro-ænea. Marsh. Ent. Br. 1.
197. 64.

Var. b, supra virescenti-vel æneo-cœrulea. *Ent. Heft. 1. c. 2.*

Var. c, supra cœrulea vel cœruleo-viola-cea. *Ent. Heft. Schönh. & Payk. 1. c. var. b.*

Var. d, supra fere nigra. *Ent. Heft. & Schönh. 1. c. var. c.*

Habitat in pratis aridis, ubique frequens.

Deser. *H. Chrysanthemi*, N. 44. infra. quoad magnitudinem & staturam similis, sed vere distincta, elytrorum striis dorsalibus irregularibus, tibiis posticis dentatis, thorace postice non impresso, &c. Caput majuscum, triangulare, fusco-æneum, parum nitidum, confertissime punctatum, fronte juxta antennarum basin striga tenui, transversa, arcuata, impressa; oculi prominenti, nigro-brunnei. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, articulis 3 seu 4 baseos

baseos obscure ferrugineis, reliquis gradatim paulo crassioribus, nigris; ultimo conico. Thorax brevis, transversus, antice paulo latior, truncatus, lateribus nonnihil obliquis, evidenter marginatis, basi sub-sinuatus, supra modice convexus, æqualis, absque foveolis posticis, undique confertissime & sat profunde punctatus, aut fusco-æneus, aut virescenti micans, magis nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, fusco-æneum, læve. Elytra antice thoracis basi non latiora, sed mox pone basin dilatata, thorace vix quintuplo longiora, supra modice convexa, fusco-ænea, profunde punctato-striata, striis versus latera, sat regularibus, in dorso autem consulis & intricatis, ut obiter intuenti vage punctata appareant. Corpus subitus nigro-æneum, sub-nitidum, crebre & evidenter punctatum. Pedes breviusculi, validi, femoribus nigro-æneis, posticis magnis, nitidissimis; tibiis rarsisque ferrugineis; tibiæ posticæ externe dente setoso armatae, ut in præcedente.

Varietates colore tantum differunt; var. b, aut tota supra virescenti-cœrulea, aut in capite & thorace magis virescens, in elytris cœruleo-violacea.

Var. c, aut tota supra nigro-cœrulea, aut cœruleo-violacea.

Var. d, supra fere nigra, vel parum cœruleescens-micans;

43. *H. semi-ænea*: elongato-ovata, valde convexa, sub-cylindrica, thorace virescenti-æneo, postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis, obscure cœruleis, apice pedibusque rufo-ferrugineis.

Ent. Heft. 2. 43. 22. Schönh. synon. 2. 305. 25.

Chryso-

Chrysomela semi-aenea. Fabr. Eleut. 1. 448. 156.

Galleruca semi-aenea. Payk. fn. 2. 109. 32.

Var. b, elytris rufo-ferrugineis, sutura virescenti-cerulea, anterius latiori.

Habitat in plantis & gramine, locis aridis, paucim.

Descr. H. Modeeri, N:o 46 infra, fere dimidio longior, sed non latior, nec thorax postice depresso ut in illa. Caput triangulare, obscure virescens. sub aitidum, crebre, subtilissime punctulatum, fronte inter antennas striga transversa impressa; os piceum; oculi prominuli brunnei. Antennae vix longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, basi fusco ferrugineæ, extrorsum gradatim malto crassiores, nigrae, articulo ultimo oblique acuminato. Thorax brevis, transversus, antice paullo latior, truncatus, lateribus ante medium dilatato-rotundatus; anguste marginatus, basi bisinuatus, supra modice convexus, obscure virescens, parum æneo-micans, concinne, sed minus crebre punctulatus; ad basin utrinque, versus marginem, lineola nonnihil obliqua, sat profunde impressa. Scutellum parvum, rotundatum, ceruleo-virescens, laxe, Elytra antice thorace parum latiora, versus medium nonnihil dilatata, thorace sextuplo longiora, supra valde convexa, regulariter & sat profunde punctato-striata, intersticiis levibus; anterius aut nigro cerulea, aut ceruleo-virescentia, nitida, apice ad tertiam fere partem totius elytri, rufo-ferruginea, interdum dilutius testacea. Corpus subitus nigrum, parum virescenti-micans, crebre, subtilissime punctulatum. Pedes rufo-testacei, femoribus posticis magnis, nigro-virescentibus; femora anteriora etiam interdum rufo-picea; tibiæ posticæ apice, ad insertionem tarsuum, truncatae, acumine minuto tantum armatae.

Var. b, colore tantum differt; thorax dilutius viridiæneus; elytra rufo ferruginea, sutura jam late, præsertim anterius, jam anguste virescenti-cœrulea; Pedes aut ut in a, aut toti pallidius rufo-testacei, femoribus posticis apice tantum piceis.

44. H. Chrysanthemi: oblongo-ovata, valde convexa, fusco-ænea, thorace postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis, apice, pedibusque testaceo-ferrugineis.

Ent. Heft. 2. 45. 23. Schönh. Synon. 2. 305. 24.

Habitat in pratis apricis, aridis, sat frequens.

Descr. Præcedenti in plurimis similis & affinis; sed statura multo breviori & colore alio præcipue distincta. Caput triangulare, fusco-æneum, parum nitidum, crebre subtiliter punctulatum; striga transversalis in fronte inter antennas obsoletissima, vix conspicua; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ ut in præcedenti, sed pallidius testaceæ, articulis tantum ultimis fuscis. Thoracis structura ut in priori omnino, sed supra fusco-æneus, parum nitidus, crebrius subtiliter punctulatus, lineola postica obliqua utrinque impressus, ut in illa. Scutellum parvum, rotundatum, fusco æneum, læve. Elytra ante vix thoracis basi latiora, dein ultra medium nonnihil dilatata, thorace vix quintuplo longiora, supra valde convexa, fusco-ænea, subnitida, apicem versus indeterminate dilatiora, testaceo-ænea, regulariter & sat profunde punctato striata, interstitiis lævibus. Corpus subtus nigrum, æneo-micans, nitidum, subtilissime punctulatum, Pedes validi, ferruginei.

ruginei, femoribus posticis saturatius ferrugineo-piceis, æneo-micantibus; tibiæ posticæ inermes, apice truncatæ; cum scutum parvo ut in priori.

45. H. obtusata: oblongo-ovata, convexa, nigro-cœrulea, antennarum basi, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis.

Habitat in pratis graminosis pessim.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas praecedentis, sed tota supra nigro-cœrulea, parum nitida, & femora omnia nigra vel nigro-picea; ab H. aridella var. b, cui etiam facie simillima, constanter differt, thorace postice utrinque lineola impresso, elytris regulariter punctato-striatis, tibiisque posticis multicisis, &c. Caput triangulare, nigro-cœruleum, parum nitidum, creberrime subtiliter punctulatum, fronte inter antennas striga transversa evidenter impressa; oculi prominuli, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore breiores, articulis 3 seu 4 baseos ferrugineis, reliquis gradatim multo crassioribus, nigris. Thorax brevis, transversus, antice truncatus, lateribus æqualiter rotundatus, evidenter marginatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, nigro-cœruleus, parum nitidus, creberrime, subtiliter punctulatus; in ipsa basi utrinque lineola obliqua, impressa, ut in proxime praecedentibus. Scutellum parvum, rotundatum, nigro-cœruleum, læve. Elytra antice thoracis basi vix latiora, dein versus medium dilatata, thorace quintuplo longiora, supra anterius valde convexa, posterius declivia, tota nigro-cœrulea, sub-nitida, regulariter & sat profunde punctato-striata, interstitiis lævibus. Corpus subitus

nigrum, parum cœrulecenti-micans, subtiliter punctulatum. Pedes mediocres, tibiis tarsisque omnibus ferrugineis, femoribus quatuor anterioribus nigropiceis, posticis nigro-cœruleis, nitidissimis; tibiæ posticæ externe inermes, apice truncatae, cum acuminé parvo ut in proxime præcedentibus.

46. H. Modeeri: breviter ovata, convexa, ænea, nitidissima, antennarum basi, elytrorum apice pedibusque lutescentibus, thorace postice transversim impresso.

*Ent. Heft. 2. 47. 24. Panz. fn. 21. f. 7.
Schönh. synon. 2. 304. 23.*

*Chrysoloma Modeeri Linn. syst. 2. 594. 57.
Fn. Sv. 539. Fabr. Eleut. 1. 448. 155.*

Galleruca Modeeri. Payk. Fn. 2. 110. 33.

Habitat in arenosis, aridis, paßim.

Descr. Parva, H, dentipede vix longior, sed multo magis convexa, postice obtusa. Caput triangulare, æneum, nitidum, subtiliter punctulatum, fronte inter antennas longitudinaliter carinata; os produtum, piceum; oculi prominuli, nigri. Antennæ vix longitudine dimidii corporis, crassiusculæ, basi testaceæ, extorsum gradatim multo crassiores, nigræ, articulo ultimo oblique acuminato. Thorax brevis, transversus, antice sub truncatus, lateribus parum rotundatus, late marginatus, basi bi-sinuatus, supra anterius vaide convexus, pone medium transversim obsolete depresso, utrinque foveola profunda, in basin excurrente, impressus; totus æneus, nitidissimus, sat crebre, subtilissime punctulatus. Scutellum parvum, fusco-æneum laeve. Elytra antice thoracis basi parum latiora, sed dein ultra medium valde dilatata, thorace

thorace quintuplo longiora, supra valde convexa, ænea, nitidissima, regulariter & sat profunde punctato-striata, callo humerali elevato; apex totus fere ad tertiam partem clytri, pallide lutescens vel flavus. Corpus subitus crebre punctulatum, pectore abdominisque basi nigro-æneis, nitidis, ano rufo-piceo. Pedes validi, pallide testacei, femoribus posticis crassis, apice rufo piceis; tibiæ posticæ apice, ad insertionem tarsum, truncatæ, interne tantum acumine minuto armatæ.

47. H. Rubi: ovata, convexa, nigra, nitida, antennis pedibusque rufis, thorace subtilissime punctulato, non impresso, elytris profunde regulariter punctato-striatis.

Ent. Heft. 2. 43. 21. Schönh. synon. 2. 314. 82.

Criocevis Rubi. Fabr. Eleut. 1. 468. 92.

Galleruca Rubi. Payk. fn. 2. 112. 35.

*Chrysomela striatula. Marsh. Ent. Br. 1. 205.
90.*

Var. b, Supra brunnea aut dilute picea, subtus pallide testacea. *Schönh. l. c. var. b.*

Chrysomela picina. Marsh. Ent. Br. 1. 206. 92.

Habitat in foliis Rubi idæi, cæsi & fruticosi, ut & in Fragaria, aliisque plantis, sat frequens.

Descr. Parva, præcedente plus duplo minor, H. 4. pustulata æqualis. Caput triangulare, nigrum, sub-nitidum, crebre subtilissime punctulatum, ore piceo; oculi prominuli, nigri. Antennæ longitudine dimidii corporis, extrorsum gradatim crassiores, to-

tæ pallide testaceæ. Thorax brevis, transversus, antice lator, truncatus, lateribus obliquis, late marginatis, basi etiam truncatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, æqualis, absque impressionibus baseos; totus niger nitidus, confertissime subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, læve. Elytra antice vix thoracis basi latiora, sed mox posse basin valde dilatata, thorace vix quintuplo longiora, supra valde convexa, tota nigra, interdum non-nihil coerulecenti - vel æneo-micanria, nitida, regulariter & profunde punctato-striata, interstitiis lævibus. Alæ nullæ. Corpus subitus nigrum, nitidum, crebre subtilissime punctulatum. Pedes mediocres, rufo-testacei, fémoribus posticis apice saturatius rufi - piceis.

Var. b., colore dilutioni tantum differt; supra aut pices, aut brunneo-testacea, subitus pallidior, forte nuper exclusa.

Subdivisio 5:a, *Cryptocephaloideæ.*

Mandibulæ apice emarginatæ vel bidentatæ; Maxillæ lacinia externa plerumque multo major interna. Ligula latitudine longior; Labium distincte emarginatum. Antennæ ante oculos insertæ. Caput verticale, thoraci ter: penitus intrusum.

E U M O L P U S,

Palpi, imprimis labiales, apice crassiores, articulo ultimo sub-ovato. Antennæ corpore breviore, articulis ultimis latioribus, saepe compresso-dilatatis. Thorax elytris multo angustior, dorso valde convexus, sub-gibbosus.

I. E.

s. E. obscurus: niger, sub-opacus, tenui
pubescens, confertissime punctulatus, an-
tennis basi ferrugineis, thorace sub-globo-
so, elytris sub-quadratis, humeris elevatis.

Fabr. Eleut. I. 423. 19. Schónh. synon. 2.
236. 24.

Chrysomela obscura. Linn. syst. 2. 599. 96. Fn.
Sv. 561.

Cryptocephalus obscurus. Payk. fn. 2. 141. 14.
Panz. fn. 5. f. 12. Schneid. Mag. 2. 219. 32.

Chrysomela nigro-quadrata. De Gér Ins. 5.
35. 40.

Var. s. rufo-ferrugineus, elytris pallidiori-
bus, thorace fulco-piceo, antennis ex-
trosim, oculis genibusque nigris.

Var. c. ut var. b, sed thorax pallidior, rufo-
ferrugineus.

Habitat in Epilobio angustifolio, frequens.

Descr. *Cryptocephalo bipunctato* paullo brevior,
sed non angustior. Caput retractum, rotundatum,
nigrum, obscurum, confertissime punctulatum, tenui
pubescens, fratre a vertice usque longitudinaliter
canaliculata; capiti prominuli, nigro-brunnei. An-
tennae dimidio capite paullo longiores, articulis 3
seu 4 baseos ferrugineis, reliquis gradatim crassiori-
bus, nigris, pubescens, ultimo elongato, conico,
quasi e duobus articulis composto, unde 12 articuli
extant. Thorax longitudine latior, antice truncatus,
lateribus dilatatus, rotundatus, immarginatus, basi me-
dia rotundatus supra valde convexus, pulvinatus,
totus niger, parum levigatus, confertissime puncta-

tus, pube tenui grisea adspersus. Scutellum oblongum nigrum, apice triangulariter acuminatum, basi punctatum. Elytra thoracis basi fere dimidio latiora, humeris valde elevatis, prominulis, thorace quaduplo longiora, apice singulatim rotundata, anim non tangentia, supra valde convexa, pone humerum transversim impressa, tota nigra, subnitida, gribopubescentia. confertissime sed inaequilatero punctata, punctis versus latera inflexa sub-seriatis; obliqu inspecta anterius obsolete fulcata appareant, & in his sulcis puncta crebrius congesta. Corpus subtus nigrum, magis nitidum, vix pubescens, crebre subtilissime punctulatum. Pedes elongati, nigri, femoribus omnibus clavatis nitidis, tibiis apice dente sericeo-pubescentibus.

Varietates colore dilutioni tantum different, numerus exclusae; in var. b, caput, corpus & p^{es} saturate rufo-ferrugineæ; elytra pallidius testacea; thorax, præsertim supra, fusco-piceus; antennæ extorsum, oculi & genua nigra; in var. c, thorax etiam rufo-ferrugineus, cætera ut in var. b.

Obs. Eum. Vitis, Fabr. Eleent. I. q. 20. quallem e Germania obtinui, & qui cum descriptione Cl. Prof. Latreille in Gen. Ins. 3. 5^o 2. omnino convenit; huic nostro, colore excepto quoad minimum usque punctum simillimus; cut., thorax, corpus, antennæ extorsam, nigra uina; Elytra, tibiæ & antennarum basis rufo-testacea; femora saepe in medio rufo-picea; an ex viet & climate modo prioris varietas?

C L Y T H R A

*Palpi quatuor inaequales, in medio crassiores.
articulo ultimo conico-cylindrici. Antennæ
serratae.*

serratae vel sub-serratae, semper exsertae, vix thorace longiores. Corpus breviter cylindricum, utrinque obtusum.

q. C. 4-punctata: nigra, nitida, griseo-pubescentia, elytris rufo-testaceis, singulo maculis duabus nigris, posteriori majori, transversa, saepe duplicita.

Fabr. Eleent. 2. 31. 13. Latr. Gen. Inf. 3. 54.

I. Panz. fn. 106. f. 10. Schneid. Mag. 2. 191. 7. Schönh. synon. 2. 344. 14.

Cryptoccephalus 4-punctatus. Payk. fn. 2. 123. 1.

Chrysomela 4-punctata. Linn. syst. 2. 596. 76.

Fn. Sv. 547. De Geer Inf. 5. 329. 32. tab. 10. f. 7.

Habitat in foliis Coryli, Betulae, aliisque, sat frequens.

Descr. Maxima nostratum hujus generis. Caput retractum, rotundatum, nigrum, opacum, fronte subtilissime rugoso-punctata, obsolete longitudinaliter canaliculata; oculi magni, oblongi, prominenti, brunnei. Antennæ thorace breviores, articulo primo magno, clavato, nigro; 2, 3, parvis, nodosis, testaceis, reliquis nigris, 4-10 interne valde productis, pectinatis, ultimo ovato, acuminato. Thorax brevis, transversus, antice late, rotundate emarginatus, lateribus & angulis posticis rotundatus, evidenter marginatus, basi bi-sinuatus, Iobio medio producto, rotundato; supra valde convexus, totus niger, nitidus, versus margines undique crenatissime, in disco parce, subtiliter punctulatus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum laxe. Elytra antice thorace angustiora, sed mox pone ba-

fin dilatata, deinde in medio leviter contracta & posterius iterum latiora, thorace sextuplo longiora, supra valde convexa, sub-cylindrica, jam saturate rufo-ferruginea, jam pallidius testacea, nitida, subtiliter punctulata, punctis hic illuc sub-seriatim; in ipso callo humerali macula rotundata nigra, & paulo pone medium, futuræ proprius, altera, rarius parva, rotundata, plerumque major, transversa, inæqualis, externe angustior, quasi e duobus conflata. Corpus subtus nigrum, opacum, confertissime subtiliter punctulatum, pube tenui cinerea, sericeo-micante, nitida, obductam. Pedes validi, nigri, pube simili uti corpus obducti; pedes antici in masculis reliquis parum longiores.

Obl. Varietatem e Rossia obtinui, cui macula posterior elytrorum valde dilatata, transversim ovata; cæteram simillima.

2. C. taxicornis: nigro-cœrulea, punctatissima, elytris testaceis immaculatis, thorace lateribus ferrato, basi sub-truncato, antennis elongatis, compressis, ferratis.

Fabr. Eleut. 2. 34. 29. Schönh. Iynon. 2. 347.
39.

Cryptocephalus taxicornis. Payk. fn. 2. 130. 3.

Clythra similis. Schneid. Mag. 2. 191. 8. feminæ.

Habitat prope Holmiam rarissime. Dom. de Paykull & Schönherr.

Descr. Præcedente paulo minor, præsertim in elytris brevior. Caput rotundatum, nigro cœruleum, opacum, confertissime subtiliter rugoso-punctatum.

tum. fronte impressa, obsolete canaliculata; oculi parvi, protinuli, brunnei; mandibulæ maris maximæ. valde arcuatæ, spatiam magnum vacuum, orbiculatum, includentes. Antennæ, præsertim maris, thorace cum capite paullo longiores, nigrae, parum violacea tinctæ, articulo primo magno, elevato; 2, 3. parvis nodosis; 4, majori, ob-conico; 5-10 magnis, compressis, intromisum valde dilatatis, ferratis, ultimo ovato. compresso, apice sinuato. Thorax brevissimus, transversus, antice truncatus, lateribus dilatato-rotundatus, margine inæqualiter ferrato, vel crenato; basi etiam fere truncatus, margine angusto angulisque sub-elevatis; supra in doso parum convexus, totus nigro-cœruleus, parum nitidus, confertissime, evidenter rugoso-punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, vel apice obtusum, nigro-cœruleum, punctulatum. Elytra quoad structuram ut in præcedenti omnino, sed thorace vix quintuplo longiora, tota pallide testacea, immaculata, sat crebre, subtiliter vase punctulata. Corpus subtus nigro-cœruleum, sub nitidum, crebre punctulatum, tenue cinereo-pubescentes. Pedes validi, nigro-cœruleentes, antici maris longissimi, coxis maximis, tibiis valde arcuatibus.

Femina simillima, modo mandibulæ mediocres, vel parvae. & pedes antici minus elongati.

s. *C. tridentata*: cœruleo-virescens, punctatissima, elytris testaceis immaculatis, thoracis angulis posticis elevatis, antennis brevioribus, pedibus anticis elongatis, femoribus rectis.

Schneid Mag. 2. 191. 10. Schönh. synon. 2.

347. 27.

Chryso-

Chrygomela tridentata. Linn. Syst. 2. 596. 73.
Fn. Sv. 546. De Géer Ins. 5. 333. 36. tab.
10. f. 10.

Cryptoccephalus tridentatus. Payk. fn. 2. 129.
2. var.

Clytra longimana. Fabr. Eleut. 2. 37. 4c.
Panz. fn. 48. f. 14.

Habitat in Corylo, Salice, passim.

Descr. Cl. 4. punctata, fere duplo minor. Caput retractum, coeruleo-virescens, confertissime subtiliter rugoso-punctatum, fronte impressa; mandibulæ maris magnæ, elevatæ, triangulariter conniventes, spatium vacuum includentes; mandibulæ feminæ minores, parum prominulæ; oculi parvi, prominuli, brunnei. Antennæ vix longitudine capitis cum thorace, articulo primo magno, clavato, nigro; 2, 3, parvis; nodosis, fusco testaceis; reliquis nigro-coerulecentibus, quartum quartus parvus, ob-conicus; 5 - 10 multo majores, internæ acuminato-productæ, serratæ; ultimus ovatus, acuminatus. Thorax brevis, transversus, antice fere truncatus, lateribus valde rotundatus, late marginatus, basi profande bi-sinuatus, angulis alte elevatis, sub-acuminatus, lobo medio rotundato; supra in dorso parum convexus, inæqualis, totus coeruleo-virescens, nitidus, crebre, evidenter punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, coeruleo-virescens, laxe. Elytra quoad strucutam omnino ut in praecedentibus descripta, thorace quintuplo longiora, tota pallide testacea, nitida, creberrime & sat profunde vase punctata. Corpus subtus coeruleo-virescens, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes elongati tenues coeruleo-virescentes, nitidi, primi parvis in usque sexu reliquis longioribus, in masculis tamen multo

multo magis; femoribus crassis, externe rectis, interne nonnihil arcuatis; tibiæ tenues, valde arcuati.

Obit. Etsi magnam copiam specimatum collegi & examinavi, ne unicum inveni, puncto humerali nigro in elytris notatum, unde verosimile videtur, Cl. Dom. de Paykull Clythram humeraiem Schneideri & Panzeri, Schönh. Syn. 2, 346, 26, ut hujus varietatem inspexisse; sed haec dimidio, imo duplo major, mandibulæ maris multo majores, rotundato-arcuatae; &c; nec in Svecia occurrit, quantum mihi innotuit.

4. C. longimana: viridi-ænea, nitida, puncticatissima, elytris testaceis, callo humerali fusco, thoracis angulis posticis elevatis, pedibus anticis longissimis, femoribus sub-arcuatis.

Schneid. Mag. 2. 191. 9. Schönh. synon. 2. 347. 28;

Chrysomela longimana. Linn. syst. 2. 599. 95;

Fn. Sv. 562.

Cryptocephalus longimanus. Payk. fn. 2. 131. 4.

Clythra tridentata. Panz. fn. 48. f. 12.

Habitat in pratis aridis, praesertim in Trifolio montano, paucim.

Descr. Præcedenti quoad structuram similima, sed fere duplo minor, viridi-ænea, magis nitida, thorax paullo convexior, & pedes antici multo longiores, femoribus subflexuosis, tibiis valde arcuatis, &c. Caput viridi-æneum, nitidum, crebre subtiliter punctulatum, fronte in medio profunde impressa, vertice obsolete canaliculato; mandibulæ maris magræ, rotundatae

tundato arcuatae; oculi & antennae ut in priori omnino. Thoracis structura eadem ut in illo, sed supra in medio transversim magis convexus. totus viridissimus, nitidus, crebre punctatus. Scutellum viridissimum, ut in priori constructum. Elytrorum forma, color & punctura ut in praecedenti, sed punctum nigro fuscum in cello humerali apud feminas fere semper conspicitur, in masculis vero saepe deest, vel valde obsoletum. Corpus subitus viridissimum, crebre, subtiliter & obsolete punctulatum. Pedes viridissimi, antici maris longitudine fere totius Insecti femoribus lateraliter sub flexuosis, tibiis longissimis, valde arcuatis, tenuibus; pedes antici in femina minus elongati, posterioribus tamen longiores, tibiis angustioribus, magis arcuatis.

Obs. E Lusitaria specimen masculinum obtinui, nostris simillimum, sed duplo fere majorem, thorace vix punctulato, & puncto humerali magno nigro notatum; an Specie distinctum?

5. C. 4-maculata: nigro-cerulea, nitida; thorace rufo-testaceo, elytris pallidioribus, maculis duabus magnis transversis nigro ceruleis, labro tibialisque testaceis.

*Fabr. Eleut. 2. 36. 38. Illic. Mag. 3. 164. 38.
Schöuh. synon. 2. 349. 44.*

Chrysomela 4--maculata. Linn. syst. 2. 596. 77.

Clythra Scopolina. Panz. fn. 48. f. 15. Crit. Rev. 1. 92.

Habitat prope Holmiam rarissime. Dom: Haffner.

Descr: Parva; Cryptocephalo 10. punctato pa-
rum major. Caput rotundatum, nigro-ceruleum,
nitidum,

pitidum, fronte retusa; inæquali, parce obsolete punctulata; labrum totum flavo testaceum; mandibulae maris magnæ, arcuatae, nigrae, & caput ejus capite feminæ multo majus, fronte inter antennas siheola transversa, elevata; oculi oblongi, prominuli, brunnei. Antennæ vix longitudine thoracis cum capite, nigrae, articulis secundo & tertio ferrugineis, structura omnino ut in proxime præcedentibus. Thorax brevis, transversus; antice truncatus, lateribus angulisque omnibus rotundatus, basi sub-bisinuatus, supra convexus, pulvinatus, totus late rufo-testaceus, nitidus, vix visibiliter punctulatus. Scutellum triangulare, cœruleo-virescens, lœve. Elytra quoad strucuturam ut in præcedentibus, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa; flavo-testacea, minus nitida, parcus & obsolete punctulata; in ipsa basi humerali macula magna nigro-cœrulea, interdum cœruleo-virescens, exterius latior, & paulo pone medium altera ejusdem coloris, major; transversim ovalis; sub-sinuata, interdum ad futuram & marginem usque dilatata. Thorax sub-tus testaceus; pectus & abdomen nigro-cœruleescens, subtilissime crebre punctulata, cinereo-pubescentia. Pedes mediocres, ferioribus nigro-cœruleis, genibus plus minusve testaceis; tibiis omnibus totis testaceis, tarolis fuscis.

6. Cl. cyanea: atro-cyanea, thorace toto, pedibus antennarumque basi rufo-testaceis; elytris cyaneis, confertissime punctatis.

Fabr. Eleut. 2. 39. 50. Schneid. Mag. 2. 193.

12. Panz fn. 45. f. 5. Schönh. synon. 2: 351. 56.

Cryptocephalus cyaneus. Payk. fn. 2. 132. 5.

Habitas

Habitat in Svecia passim. Dom. de Paykull's
in Finlandiae Betula & Corylo. Dom.
Pfeiff.

Descr. Magnitudo & statura brevis, fere Crypt,
disparis (Cr. bipunctati F.). Caput rotundatum, ni-
gro-cœruleum, nitidum; fronte retusa, inæquali;
sat crebre punctata; os piceum; oculi prominuli,
brunnei. Antennæ vix thorace longiores, compres-
sæ, articalis 4 baleos testaceis, reliquis nigro-pi-
ceis, structura ut in prioribus. Thorax brevissimus,
transversus, antice sub-truncatus, lateribus & an-
gulis posticis rotundatus, evideater marginatus, ba-
si leviter bi-sinuatus, supra valde convexus, pulvi-
natus, totus læte rufo-testaceus, nitidus, vix visibi-
liter punctulatus. Scutellum nigrum, opacum, api-
ce carinatum. Elytrorum forma ut in prioribus,
supra modice convexa, cyanea vel cœruleo-viola-
cea, interdum virescenti-micantia, confertissime &
sat profunde vage punctata. Thorax subtus rufo-te-
staceus; pectus & abdomen nigro-cœrulecentia,
parum nitida, crebre subtiliter punctulata, terue pu-
bescentia. Pedes mediocres, rufo-testacei, femori-
bus posticis basi nigro-cœruleis.

7. C. affinis: nigro-cœrulea, nitida, ore,
thoracis lateribus, pedibus antennisque in-
ferius ruto-testaceis, elytris cœruleis, con-
fertissime punctatis.

Ellig. Schneid. Mag. 5, 6ii. 17. Schönh. synon.
2. 349. 42.

Cryptocephalus affinis. Payk. fn. 2. 132. 6.
Panz. fn. 25. f. 1.

Clythra muciformis. Schneid. Mag. 2. 194. 15.

Habitat

Habitat in Finlandia. Dom. de Paykull.

Descr. Parva; præcedente fere triplo minor. Caput rotundatum, nigro-cœrulescens vel virescens, fronte retusa, sub-inæquali, crebre punctulata; os testaceum; oculi majusculi, prominuli, brunnei. Antennæ vix longitudine thoracis, testaceæ, extrorsum fuscescentes, structura ut in prioribus. Thorax quoad structuram omnino ut in proxime præcedenti, supra valde convexus, subtiliter & crebre punctulatus, in medio longitudinaliter cœruleo virescens, lateribus late luteus vel aurantiacus. Scutellum triangulare, nigrum, opacum, læve. Elytrorum forma ut in præcedentibus omnino, thorace quadruplo longiora, supra modice convexa, cœrulea. interdum sub-virescens, nitida, confertissime & sat profunde punctata. Thorax subtus, lateribus testaceus, medio niger; pectus & abdomen nigro-cœrulea, parum nitida, crebre subtiliter punctulata, tenui pubescens. Pedes mediocres, pallide testacei, femoribus posticis bafi parum infuscatis.

CRYPTOCEPHALUS.

Instrumenta cibaria & structura corporis ut in Clythra. Antennæ simplices, filiformes, sæpe corporis longitudine, articulis cylindrico-obconicis.

Sect. I, Elytris, in disco saltem, vagè punctatis, punctis versus latera interdum sub-seriatis.

I. C. cordiger: niger, thorace flavo-variegato, elytris rubris, punctis duobus nigris
Ins. Svec. T. I. P. III. Pp sim-

simplicibus, femoribus apice macula alba,
tibiis ferrugineis.

a, Thorace macula ante-scutellari cordata,
lineola antica abbreviata, lateribusque la-
te flavis puncto nigro; aut distincto, aut
cum nigredine disci confluente.

Fabr. *Eleut.* 2. 44. 19. **Payk.** *fn.* 2. 133. 7.
Schneid. *Mag.* 2. 209. 18. **Panz.** *fn.* 13. f. 6.
Schóuh. *Synon.* 2. 357. 19.

Chrysomela cordigera. **Linn.** *syft.* 2. 598. 91.
Fn. *Sv.* 558. **De Gér** *Ins.* 5. 30. 33.

Var. b, thorace ut in **a**, sed in elytro sin-
gulo puncta tria, duo nempe anterius.
Schónh. *l. c.* *var. b.*

Var. c, macula ante-scutellaris in thorace
parva, sub-quadrata, vix emarginata;
punctum nigrum laterale thoracis cum
nigredine disci confluens. **Schónh.** *l. c.*
var. c.

Habitat in foliis *Coryli*, *Salicis*, minus
frequens; var. **b**, & **c**, in *Finlandia* ra-
rius occurunt.

Descr. Statura Cr. *disparis* (bipunctati **Fabr.**)
sed dimidio major & ultra. Caput valde retractum,
nigrum, fronte impressa, crebre punctulata; supra
os macula terti. circularis flava; oculi oblongi, lu-
nati, brunnei. Antennæ corpore paullo breviores,
filiformes, nigræ, articulis quatuor baseos testaceis.
Thorax latitudine dimidio brevior, anterius paullo
angustior, late emarginatus, angulis prominulis, la-
teribus

teribus parum rotundatus, anguste marginatus, basi bi-sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, niger nitidus, crebre & concinne punctulatus; in medio baseos macula magna, sub-quadrata, flava antice aut late emarginata, aut angustius incisa; in medio antico linea ob-conica ejusdem coloris, versus medium disci producta, & latera tota utrinque late flava, cum puncto medio nigro. aut libero, flavedine undique inclusa, aut dilatato, cum nigredine disci coniuncto. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laxe. Elytra antice thoracis basi non latiora, sed mox pone basin lobo rotundato dilatata, dein ante medium iterum coarctata, apice singulatim rotundata, thorace quadruplo longiora, supra modice convexa, saturate rubra, nitida, creberrime, vase punctata, sutura anguste nigra; paullo pone callum humeralem elevatum macula rotundata nigra & infra medium magis introrsum, altera, paullo major, etiam rotunda, & ambae semper simplices. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre, subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes brevusculi, femoribus nigris, nitidis, apice exteriori macula albida notatis, & coxis primi paris etiam flavo-albidis; tibiæ & tarsi testacei, unguibus nigro-fuscis.

In var. b, insuper punctum parvum nigrum interius, versus basin elytrorum.

In var. a, macula antescutellaris thoracis minor, sub-quadrata, antice fere integra.

2. C. variabilis: niger, thorace vittis tribus flavis, media postice dilatata, elytris rubris, punctis quatuor nigris, fronte maculis tribus albidis, pedibus nigris,

Schneid. Mag. 2. 207. 17. Panz. fn. 13. f. 7.

Schönh. Synon. 2. 357. 20.

Cryptocephalus cordiger. Payk. fn. 2. 134. 7.
var. b.

Var. b, Punctis elytrorum paucioribus, aut tribus, aut duobus tantum in singulo, interiorum nempe vel priori, vel posteriori, vel utroque deficiente. Schönh. l. c. var. b; c, d, Payk. l. c. var. c.

Crypt. variabilis. Fabr. Eleut. 2. 44. 20.

Var. e, elytro singulo puncto tantum unico, parvo; pone medium. Schönh. l. c. var. e. Payk. l. c. var. d.

Habitat in frutetis, apud nos rarius; in Finlandia frequentius occurrit.

Descr. Præcedenti quidem valde similis & affinis, sed paullo minor, & in pluribus distinctus. Caput nigrum, fronte subimpressa, obsolete canaliculata, crebre punctulata; supra os maculae tres pallide flavescentes, media majori, subtriangulari; oculi lunati brunnei. Antennæ ut in priori, sed articulus primus obscurior, nigro-piceus, apice dilutior. Thoracis structura eadem, supra valde convexus, pulvinatus, niger, nitidus, crebre, concinne punctulatus; in utroque latere vitta lata, flavo-albida, in medio latior, interne sub crenata, margine ipso exteriori anguste nigro-fusco; margo anticus anguste flavescens, & ab illo, in medio, vitta tertia exit, anterius angusta, postice dilatata in maculam magnam ovatam, lineola tenui longitudinali abbreviata nigra, in medio, notatam. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma & punctura eadem, sed color

color pallidius testaceus, sutura margineque obscurius fuscis; juxta callum humerale macula nigra, aut magna, ovata, aut minor, oblonga, & interius versus suturam alia parva, punctiformis; paullo posne medium maculæ duæ, transversim positæ, exteriori majori, difformi, interiori parva, saepe cum exteriori coalita. Corpus subtus ut in priori. Pedes toti nigri, maculis flavescentibus in apice femorum & coxis anticis, ut in praecedenti.

In var. b, puncta interiora elytrorum desunt, aut unum alterumve, aut ambæ; vitta media thoracis saepe interrupta, & postice in maculas duas parvas divisa,

In var. c, punctum tantum unicum posterius adest, reliquis omnibus evanescentibus,

3. *C. variegatus*: niger, thoracis marginibus maculaque postica didyma flavescentibus, elytris testaceis, singulo punctis duobus, pedibusque totis nigris.

Fabr. Eleut. 2. 46. 27. Payk. fn. 2, 135. 8.

Schönh. synon. 2. 359. 25.

Cryptoceph. distinguendus. Schneid. Mag. 2.
209. 19. Panz. fn. 13. f. 8.

Chrysom. cordigera, var. *De Geer Ins.* 5. 331:
33.

Chrysom. M. Uddman. diff. 12. 23.

Var. b, thorace ut in a, elytris puncto tantum humerali nigro. Payk. Schönh. l.
s. var. b.

Var. *c*, thoracis marginibus anguste testaceis, maculaque ejus postica aut deficiente, aut parva, linearis, saepe in duas divisa; elytrorum punctis ut in a. Schönh. l. c. var. *c*.

Var. *d*, thorace ut in var. *c*, elytris puncto tantum humerali nigro, ut in var. *b*. Schönh. l. c. var. *d*.

Habitat in *Corylo*, *Betula*, passim.

Descr. Magnitudo & statura C. variabilis, fronte non impressa, signaturis thoracis elytrorumque aliis, pedibus nigris immaculatis, distinctus. Caput parvum, nigrum, fronte plana, crebre punctulata; sub oculis utrinque punctum parvum, flavescentia; oculi lunati, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, articulo primo crasso, obconico, piceo, apice testaceo; 2, 3, 4, testaceis; reliquis nigro-fuscis, gradatim crassioribus. Thorax brevis, transversus, antice paullo angustior, late sed non profunde emarginatus, angulis prominulis, lateribus obliquis, vix rotundatis, late reflexo-marginalis; basi sub-bisinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, niger nitidus, crebre concinne punctulatus; margines laterales latius, sinuatim, anticus cum illic conjunctus, angustius, in medio vittam plus minusve abbreviatam emittens, flavo-testacei, & in medio baseos macula magna transversa, antice in medio incisa, ejusdem coloris; signaturæ istæ interdum magis dilatatae, & tunc nigredo discei literam M, rudem repræsentat, ut a Dom. Uddman descripta, sed saepius vitta antica & macula baseos multo minores evadunt. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, læve. Elytra quoad formam ut in prioribus omnino, supra modice convexa, pallide testacea, nitida, crebre

crebre & sat profunde vage punctata, satura marginaque baseos nigro-fuscis; in ipso callo humerali macula major, oblonga, nigra, nitida, & paullo ponere medium, margini proprius, altera minor, obsoletior, difformis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, confertissime punctulatum, tenue pubescens. Pedes mediocres, toti nigri, immaculati.

Var. b, differt tantum defectu puncti posterioris elytrorum.

In var. c, thoracis margo anticus & laterales anguste tantum testacei, & basis aut immaculata, aut lineola angusta, saepe in medio interrupta, notata; elytrorum puncta quatuor ut in a.

Var. d, quoad thoracis signaturas uti var. c, elytris macula tantum humerali ut in var. b.

4. C. 6-punctatus: niger, thorace testaceo-variegato, elytris ruto-testaceis, margine omni, singuloque maculis tribus magnis difformibus nigris, ore albo-maculato.

a, Thorace testaceo, margine lateralii, maculis duabus anticis fasciaque baseos abbreviata, tricuspidata nigris; maculis elytrorum aut distinctis, aut interioribus sutura connexis.

Fabr. Eleut. 2. 46. 30. Payk. fn. 2. 136. 9.
Schneid. Mag. 2. 206. 16. a. Schónh. synon
2. 359. 28.

Chrysomela 6-punctata. Linn. syft. 2. 599. 92.
En. Sv. 559, De Géer Ins. 5. 331; 34. tab.
12. f. 9.

Var. *b*, maculis nigris thoracis cum angulis fasciæ baseos confluentibus, plagam Anchoræ formem testaceam includentibus; maculis elytrorum aut ut in *a*, aut posterioribus in fasciam continuam connotatis. Schneid. Schönh. l. c. var. *b*. Panz. fn. 68. f. 7.

Var. *c*, thorace nigro, vitta laterali lata rufo-testacea, puncto nigro notata, margine antico anguste rubro, in medio lineolam simplicem, abbreviatam emittente; elytrorum maculis ut in *a* & *b*. Payk. l. c. var. *b*. Schneid. Schönh. l. c. var. *c*.

Var. *d*, thorace nigro, margine antico, lineolam latiorem abbreviatam in medio emittente, vittaque laterali utrinque, puncto nigro notata, rubris; elytris nigris, macula baseos trigona, fascia media undulata, maculaque magna apicis rufo-testaceis. Schönh. l. c. var. *f*.

Var. *e*, Thorax ut in var. *d*, elytra nigra, lunula baseos, macula obsoleta in medio marginis, & alia magna intra apicem rubris. Schönh. l. c. var. *g*.

Var. *f*, Thorace nigro, margine antico & lateralibus flavo-testaceis, elytris rubris, punctis quatuor nigris, posteriori nempe in duos diviso. Payk. l. c. var. *c*. Schönh. var. *c*.

Habitat in Corylo, Betula, passim; varietas d, e, f, in Provinciis borealibus raro occurunt.

Descr. Statura & magnitudo proxime præcedentium. Caput nigrum, fronte retusa, sub impressa, subtiliter punctulata; supra os macula semi-circularis, & alia minor utrinque sub oculis, flavo-albidæ; oculi lunati nigri. Antennæ corpore paullo breviores, filiformes nigrae, articulis inferioribus subtus ferrugineis. Thorax quoad structuram omnino ut in præcedente descriptus, supra valde conexus, pulvinatus, crebre, concinne punctulatus, in a, quoad maximam partem flavo-testaceus, margine summo laterali nigro; intra apicem maculæ duæ magnæ, ovatæ, pares, nigrae, & in medio baseos fascia, utrinque abbreviata, nigra, anterius tricuspidata; fascia hæc rarijs in medio interrupta, relicta tamen lineola parva media, cuspidis medii locum tenente. Scutellum triangulare nigrum, nitidum, lœve. Elytra quoad formam omnino ut in prioribus, crebre & sat profunde vage punctata, jam saturatius rufo-testacea, jam dilutiore, sub. nitida; in callo humerali macula magna, ovata, nigra; interiorius versus scutellum altera, paullo minor, subrotundata, saepè cum sutura nigra connexa; paulo ponere medium tertia, maxima, transversa, saepè cum margine & satura, in fasciam continuam dilatata. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtiliter crebre punctulatum, tenue pubescens. Pedes brevuscui, nigri, femoribus in apice exteriori macula albida notatis, in anticis minuta, saepè obsoleta; coxæ primi paris etiam antice albi.

Var, b, differt tantum maculis anticis nigris thoracis cum angulis lateralibus productis fasciæ baseos confluentibus, unde discus testaceus anchoræ formam præbet; maculæ elytrorum variant ut in a.

In var. c, thoracis discus totus niger, sed in utroque latere vitta lata rufo-testacea, in medio puncto parvo nigro notata, & margo anticus anguste testaceus, in medio lineolam simplicem versus medium disci emittens; elytra ut in a, & b. . .

Var. d, & e, ut in diagnosi fusius designatae; in elytris maculæ nigrae ita dilatatae & confluentes, ut maximam occupent partem.

In var. f, lineola media anterior thoracis deest, & puncta elytrorum minora, posteriori diviso.

5. C. Coryli: niger, fronte lineolis duabus flavis, elytris rufis, futura fusca, thorace nitido, subtilissime punctulato, maris nigro, feminæ rufo.

Fabr. Eleut. 2. 45. 26. Payk. Fn. 2. 137. 10.

Schneid. Mag 2. 204. 14. Panz. fn. 68.

f. 6. Schónh. synon. 2. 358. 24.

Chrysomela Coryli. Linn. syst. 2. 598. 88. Fn. Sv. 555.

Cryptocephalus vitis. Panz. fn. 68. f. 5. Crit. Rev. 1. 93. mas.

Var. b, Elytro singulo punctis duobus nigris, uno in ipso humero, altero paullo pone medium. quorum tamen aut anterius aut posticum interdum deest, & hoc in utroque Sexu. Payk. Schónh. l. c. var. b, c.

Cryptocephalus bimaculatus. Næzén Act. Holm. 1794. 268. 3. tab. 9. f. 1.

Chryso-

Chrysomela. Uddman. Diff. 12. 22. mas.

Habitat in foliis Coryli passim; mares multo rarius occurunt.

Descr. Magnitudo & fere statura præcedentium, sed paullo longior. Caput nigrum, fronte rotusa, subtiliter punctulata; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennæ corpore parum breviore, filiformes, nigrae, articulis 2, 3, 4, ferrugineis. Thorax brevis, anterius paullo angustior, late sed non profunde emarginatus, lateribus vix rotundatus, late reflexo-marginatus, basi bi-sinuatus, supra valde convexus, palvinatus, subtilissime parce punctulatus, maris totus niger, feminæ supra rufus, in utroque nitidissimus. Scutellum oblongum, nigrum, nitidum, lœve, apice elevatum, rotundatum. Elytra quoad strucram ut in prioribus, thorace quintuplo longiora, supra convexa, rufa, vel raso-testacea, parum nitida, subtiliter & minus crebre punctulata, punctis in dorso hinc inde sub-seriatis; callus humeralis oblongus, valde elevatus, & juxta illum interne sovea sat profunde impressa, in ipsa basi; sutura communis & margo baseos anguste nigro-fusca. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre subtiliter punctulatum, tenui pubescens. Pedes toti nigri, femoribus nitidis.

Var. b, differt tantum punctis nigris in elytris, uno parvo, nitido, in callo humerali, altero paullo majori in disco pone medium obsoletiori; saepe tandem deest aut prius, aut posterius, & hoc in utroque sexu.

5. C. Pini: testaceus, elytris pallidioribus, oculis antennarumque apice nigris, capite thoraceque confertissime punctulatis.

Fabr.

Fabr. Eleut. 2. 56. '83. *Payk. fñ.* 2. 138. 11.

Schneid Mag. 2. 211. 21. *Panz. fñ.* 39. f.

17. *Schönh synon.* 2. 369. 87.

Chrysomela Pini. *Linn. syst.* 2. 593. 89. *Fñ.* Su. 556.

Var. b, saturatius rufo-testaceus, corpore subtus elytrorumque dilco interdum nigro-brunneis. *Payk. Schönh. l. c. var. b.*

Habitat in Pini Sylvestris frondibus, frequens.

Descr. Præcedentibus longe minor, Cr. Moræi æqualis; mas adhuc duplo minor femina, ut in illo, & plerumque subtus obscurior, fusco-brunneus. Caput testaceum, fronte retusæ, confertissime subtiliter punctulata; oculi oblongi, lunati, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, basi testaceæ, extrorsum nigræ, articulis gradatim paullo crassioribus, interne nonnihil dilatatis. Thorax brevis, antice parum emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, late marginatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus, confertissime subtiliter punctulatus, margine antico anguste, lateralibus latius pallide testaceis vel flavescentibus. Scutellum sub-triangulare pallide testaceum, parce punctulatum. Elytra quoad formam fere ut in prioribus, thorace vix quintuplo longiora, apice singulatim rotundata, supra modice convexa, pallidius testacea, saepe flavescentia, præsertim versus latera, futuram & apicem, disco antico saturatius testaceo; undique sat crebre & profundius quam thorax, vage punctata. Corpus subtus saturatius testaceum, subtiliter crebre punctulatum, tenue pubescens, in masculis pectus & abdomen plerumque adhuc obscuriora,

teuriora, fusco-brunnea. Pedes breviusculi, validi, pallide testacei, tibiis compressis, apice dilatatis.

Var, b, colore obscuriori differt; discus elytrorum, pectus & abdomen fusco-brunnea, rarius nigra; e sexu masculino tantum tales vidi.

7. *C. sericeus*: viridi-sericeus, aureo, æneo vel cœrulecenti-micans, antennis nigris, thorace evidenter punctulato, elytris rugoso-punctatis, apice singulatim rotundatis, juxta scutellum elevatis.

Fabr. Eleut. 2. 49. 46. *Latr. Gen. Ins.* 3. 54.

1. Payk. fn. 2. 139. 12. Schneid. Mag. 12. 214. 26. Panz. fn. 102. f. 13. Schönh. synon. 2. 361. 42.

Chrysoloma sericea. *Linn. syst.* 2. 598. 86. *Fn. Sv.* 554. *De Geer Ins.* 5. 334. 47.

Var. b, totus cœruleus vel violaceus. *Payk. Schneid. l. e. var. b. Schönh. var. c.*

Var. e, cupreo-violaceus, versus latera virescens. *Schneid. var. c. Schönh. var. d.*

Habitat in floribus, præsertim Hypocheridis & Hieraciorum, ubique frequens; var. b, & c, parcius occurunt.

Descr. Majores *C. Coryli* statura & magnitudo ne æquales, sed variat duplo, imo triplo minor. Caput valde retractum, fronte retusa viridi ænea, confertissime rugoso punctata, in medio obsolete impressa, ore pieco; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, nigrae, articulatæ

ticulo primo virescente; extrorsum parum cæssiores, articulo ultimo acuto. Thorax latitudine brevior, antice vix emarginatus, angulis, & lateribus valde deflexis, compressis, lateribus rotundatus, late marginatus, præsertim posterius; basi profunde bifinatus, lobo medio truncato, angulis lateralibus acuminatis; supra valde convexus, pulvinatus, aut viridæneus, aut virescentia-aureus, aut cœruleo-micans, nitidus, creberrime & s.t evidenter punctulatus; ante scutellum foveolæ duæ obliquæ, impressæ, in majoribus individuis evidentes, in parvis magis obsoletæ. Scutellum triangulare viridiæneum, nitidum, parce punctulatum, apice adscendens. Elytra antice thoracis bæsi non latiora, sed mox pone bafin lobo rotundato dependente dilatata, dein iterum coarctata, apice singulatim obtuse rotundata, dehiscentia, thorace vix quadruplo longiora, anum non tegentia, supra modice convexa, confertissime & profunde rugoso-punctata: rarius thoraci concolora, plerumque saturatiæ viridia, minus nitida, sericeo-micantia, saepe cœruleo-virescentia; juxta callum humeralem interius fovea sat profunda & basis interior versus scutellum etiam depressa, sed sutura ad apicem scutelli in tuberculum fere elevata. Alæ longæ, fuscæscentes. Anus extra elytra viridiæneus nitidissimus, subtiliter punctulatus, tenue sericeo-pubescentia, margine elevato cinctus. Corpus subtus, viridiæneum nitidum, creberrime subtiliter punctulatum, tenui pubescens; segmentum ultimum ventrale in utroque sexu sub-emarginatum, apud feminam in medio profunde, in mare obsoletius impressum.

Var. b; differt tantum colore totius corporis, tam supra quam infra, cœruleo vel violaceo; variat etiam elytris corporeaque cœrulecentibus, capite thoraceque viridiæneis; rarius variat e contrario capite thoraceque cœruleis, elytris viridiæneis,

In var. c, color paginæ superioris cupreο-vio-
laceus, certo situ sub-virescens, præsertim versus
latera.

8. *C. violaceus*: supra cœruleo-violaceus,
subtus niger, thorace subtilissime punctu-
lato, elytris rugoso punctatis, apice singu-
latim rotundatis, segmento ultimo ventra-
li integro.

*Fabr. Eleut. 2. 47. 33. Schmid. Mag. 2. 215.
27. Panz. fn. 102 f. 12. Schönh. lynon. 2.
360. 31.*

Habitat in floribus rarius.

Descr. Minoribus præcedentis Speciei indivi-
duis æqualis & valde affinis; distinctus tamen vi-
detur, thorace multo subtilius punctulato, basi non
impresso; segmento ultimo ventris integro, conve-
xo; colore paginæ inferioris obscuriori &c. Caput
valde retractum, fronte nigro cœrulea, creberrime
punctulata; os & oculi ut in priori, Antennæ di-
midio corpore longiores, filiformes, nigræ, arti-
culo primo parum cœruleo-virescente. Thoracis
structura ut in præcedenti omnino, supra valde con-
vexus, pulvinatus, æqualis, absque foveolis ante-
scutellaribus; totus nigro cœruleus, parum virescen-
ti-micans, nitidus, omnium subtilissime punctulatus.
Scutellum nigro cœruleoscens, vix punctulatum, stru-
ctura ut in priori. Elytrorum forma, striæ, im-
pressions baseos & elevatio juxta scutellum exacte
ut in priori, tota cœrulea, plus minusve vio-
laceo-micantis, rarius in dorso cupro nitentia. Anus
extra elytra nigro cœruleus, crebre, subtilissime pun-
ctulatus,

Etulatus. Corpus subtus nigrum, perparum cœrulescenti-micans, creiberrime punctulatum, tenue pubescens; segmentum ultimum ventrale integrum, convexum. Pedes nigri, structura ut in priori, femoribus parum cœrulecentibus.

9. *C. nitens*: niger, thorace lœvissimo elytrisque nigro-cœruleis nitidis, ore, antennarum basi pedibusque totis flavis, elytrorum disco vase, subtiliter punctato; Femina.

Fabr. Eleut. 2. 49. 47. *Payk. fn.* 2. 140. 13.
a. *Panz. fn.* 68. f. 8. *Schneid. Mag.* 2.
216. 28. var. b. *Schönh. synon.* 2. 362. 43.

Chrysomela nitens, *Linn. Jyst.* 2. 598. 84. *Fn.*
Dv. 551. *De Géer Insl.* 5. 334. 28.

Mas: dimidio minor, antennis longioribus,
vertice punctis duobus flavis remotis, pe-
dibus quatuor posterioribus nigris, primi
paris flavis, femoribus externe linea ni-
gra. *Payk. l. e. var. h. Schneid. l. c. ipsa*
Species descripta.

Cryptoccephalus assimilis. *Herbst. Archiv.* 4. 63 13.

Cryptoccephalus flavifrons. *Fabr. Eleut.* 2. 51.
59. *Schönh. synon.* 2. 365. 60.

Habitat in foliis Betulæ albæ, Alni, sat fre-
quens.

Descr. Cr. bipunctato paullo angustior, sed non brevior. Caput retractum, fronte rotula nigro-cœrulea, parce punctulata, obsolete canaliculata; supra os macula magna triangularis flava in medio, & alia minor utrinque, priori contigua; labro tamē ipso nigro cœrulecente; oculi depresso, lunate, brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, tenues, filiformes, articulis 4 vel 5 baseos flavescens, reliquis nigris. Thorax omnino ut in Cr. sericeo constructus, supra fere adhuc magis convexus, pulvinatus, totus nigro-cœruleus, nitidissimus, omnino latus. Scutellum triangulare, nigro-cœruleus, nitidum, latus; apice adscendens. Elytra quoad formam etiam ut in Cr. sericeo, apice singulatim rotundata; dehiscentia, anum non tegentia; supra modice convexa, callo humerali & futuræ basi juxta scutellum elevatis; tota nigro-cœrulea, nitida, punctis minutis impressis, versus basin & futuram sub-seriatim, in disco exteriori vagis, parce adspersa. Podex pone elytra, uti totum corpus subitus, nigra, vix cœrulecenti-micantia, subtilissime punctulata, tenui pubescens; segmento ultimo ventris in medio profunde impresso. Pedes breviusculi; toti pallide testacei vel flavescentes:

Mas dimidio minor, antennis longitudine fere corporis; præter maculas flavas supra os, lineolæ duæ parvæ ejusdem coloris in vertice, ad marginem superiorem singuli oculi; pedes primi parvis flavi, femoribus externe versus apicem linea nigra; posteriores quatuor nigri; femoribus intermediis basi subitus flavescentibus; segmentum ultimum ventrale integrum, non impressum.

Obs. Cr. flavifrons, Fabr. I. c. ad masculum jam descriptum pertinere videtur, nam elytra ut vix striata describuntur, & reliqua satis apte concordant.

10. C.

10. *C. nitidulus*: niger, thorace levissimo viridi-aeneo, elytris profundius punctatis virescenti-cyaneis, ore toto. macula frontali cordata, antennarum basi pedibusque flavis, femoribus posticis nigris: Femina.

Mas: dimidio minor, thoracis angulis marginisque antico plerumque flavis, segmento ventrali ultimo convexo;

Fabr. Eleut. 2. 51. 54. *Schönh. synon.* 2. 363.
51.

Cryptocephalus nitens. *Payk. fns.* 2. 141. 13.
var. c. *Schneid. Mag.* 2. 216. 28. var. a.

Chrylomela nitens var. *De Géer Ins.* 5. 335.
38.

Var. b, Supra cupreo-cyaneus, vel cupreо-
aureo-virescenti- & cœruleo mixtus.

Habitat in foliis Betulæ, Alni, non infre-
quens.

Descr. Præcedenti in utroque sexū paullo bre-
vior, non vero angustior, colore multo splendido-
ri, signaturis capitis aliis, &c., constanter distinctus.
Capitis frons retusa, parce punctulata, obsolete ca-
naliculata, infra antennas, cum ore toto, flava, su-
perius viridi-aenea, nitida, macula cordata flava in
medio, cum flavedine inferiori connexa; oculi &
antennæ ut in præcedenti. Thoracis structura o-
mnino eadem, supra valde convexus, levissimus,
aut lète viridis, aut viridi-aeneus, semper nitidissi-
mus, politus. Scutellum viridi-aeneum, structura
ut in priori. Elytrorum forma omnino eadem, etiam
quoad callum humeralem & elevationem baseos su-
ture

turæ juxta scutellum; tota aut saturatius viridia, aut cyaneo-micantia, minus nitida, profundius quam in priori punctata, punctis hinc inde sub-seriatim. Podex pone elytra & corpus subtus nigra, parum metallico micantia, subtiliter punctulata, tenue pubescentia, segmento ultimo ventrali in medio profunde impresso. Pedes breviusculi, anteriores quatuor flavi, femoribus supra linea nigra; femora postica tota nigra, tibiis tarsisque flavis.

Mas dimidio minor, antennis longitudine fere corporis; margo anticus & laterales thoracis anguste flavi, interdum interrupte, ut anguli solum distincte flavi; segmentum ultimum ventris non impressum.

Var. b, colore paginae superioris magis fulgido, varie mixto, tantum differt, ut in diagnosi indicatum; tibiæ & tarsi postici in hac varietate interdum nigro-fusci.

II. *C. flavipes*: niger, fronte, antennarum basi pedibusque testaceis, thorace brevissimo, elytris antice sub-striatis, margine laterali baseos albido; femina.

Fabr. Eleut. 2. 51. 58. Payk. fn. 2. 144. 16.
Panz. fn. 68. f. 10. Schönh. synon. 2. 364.
58.

Mas: dimidio minor, thoracis margine antico & lateralibus flavo-albidis. Payk., Schönh. l. c. mas.

Cryptoccephalus parenthesis. Schmid. Mag. 2,
203. II.

Chrysomela glauco-cephala. Schall. Act. Hall. 1.

277.

Chrysomela Bothnica var. De Geer Inf. 5.

336. 39.

Habitat in foliis Betulæ, Populi, passim.

Descr. - Statura omnino Cr. nitentis, sed dimidio minor in utroque Sexu; Cr. Moræi magis æqualis & similis, sed in illo thorax subtiliter punctulatus, elytra regulariter punctato-striata; os & maxima pars pedum nigra; elytra flavo-maculata, &c. Caput retractum; fronte retusa, subtiliter punctulata, in vertice canalicula brevi exarata, una cum ore flava, vertice ipso anguste nigro; supra labrum macula triangularis fusca in femina; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennæ corpore pallio breviores, filiformes, a basi fere ad medium flavo-testaceæ, dein nigræ, pubescentes. Thorax quoad structuram ut in proxime præcedentibus omnino; totus niger, nitidus, lævissimus, politus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum; læve, postice elevatum. Elytrorum forma ut in prioribus omnino; suturæ basi juxta scutellum etiam in tuberculum elevata; tota nigra, minus nitida, anterius evidenter, parce punctata, punctis in striae, licet parum regulares, dispositis; posterius fere lævia, vel obsoletissime punctata; margo lateralis a basi fere ad mediodim anguste albus. Anus extra elytra & totum corpus subitus, nigra, sub-nitida, crebre punctulata. Pedes mediocres, validi, anteriores quatuor flavo-testacei, femoribus supra linea nigra notatis; femora postica nigra, nitida; genubus tibiisque testaceis, tarsis fuscis.

Mas. dimidio minor; Antennæ longitudine corporis; macula triangularis nigra supra os deest; ipse mar-

margo anticus thoracis elevatus niger, sed intra illum linea angusta alba, contigua, quæ & latera ad angulum posticum usque cingit, & versus angulum anticum magis dilatata, lineam punctatam nigram includens; segmentum ultimum ventris convexum, integrum, quod in femina profunde impressum; cætera ut in femina omnino.

12. C. 4-pustulatus: niger, ore, antennarum basi, pedibus anterioribus thoracisque lœvissimi angulis anticis flavo-testaceis, elytris irregulariter sub-seriato-punctatis, macula marginali apicisque flavo testaceis.
Mas: dimidio minor, antennis longioribus, segmento ultimo ventrali non impresso.

Fabr. Eleut. 2. 55. 75.? *Schônh. synon. 2. 369.*
80,

Var. b, elytris apice immaculatis, mas & femina.

Habitat in foliis arborum & fruticum, pa-

sim.

Descr. Præcedenti magnitudine & statura similis, sed punctura elytrorum & signaturis diversus; Cr. Moræi primo intuitu adhuc magis similis, sed thorax lœvissimus, elytrorum striæ irregulares, &c. Caput retractum, fronte retusa nigra, sub nitida, subtiliter punctata, ore facieque infera sub-antennis flavo-testaceis; palporum & mandibularum apices nigro-fusci; oculi lunati, nigro-brunnei. Antennæ ut in prioribus, basi flavo-testaceæ, extrorsum nigræ. Thoracis structura ut in præcedentibus omnino, supra valde convexus, pulvinatus, niger nitidus, lœvis-

simus, politus; anguli antici & pars angulo contigua tam marginis antici quam laterum, anguste flavo-testacei, in utroque sexu. Scutellum ut in priori. Elytrorum forma omnino eadem, nigra, nitida, sat crebre punctulata, punctis hic illic abrupte subseriatis; in basi laterali macula elongata flavo-testacea, margini contigua, stria intra-marginali nigra punctata quasi divisa; intra apicem macula altera transversa, ejusdem coloris, aut major, ovata, aut angusta, linearis. Podex & corpus subtus nigra, subnitida, subtiliter punctulata. Pedes mediocres, primi paris flavo-testacei, femoribus supra linea nigra; medii femoribus supra late nigris; subtus cum tibiis flavo-testaceis, tarsis fuscis; postici femoribus totis nigris nitidis, tibiis tarsisque fuscis.

Mas simillimus, modo dimidio minor, antennis longioribus & ventris segmento ultimo integro, ut in prioribus.

Var. b, omni puncto simillima, sed macula apicalis elytrorum deest; & hoc in utroque sexu.

Obs. Chrysomela 4-pustulata Linnæi ad Mycetophagum 4-maculatum pertinet; utrum vero *Cryptoceph.* 4-pustulatus Fabricii l. c. idem ac noster, pro cerbo dijudicari non possit, charactere sufficiente & descriptione deficientibus.

Sectio 2:da, Elytris regulariter punctato-striatis.

13. C. dispar: niger, antennis longis inferne ferrugineis, thorace levissimo, elytrum colore vario.

, Elytris rufis, margine omni punctisque duobus nigris.

Payk. fn. 3. 142. 15. *Schönh.* *synon.* 2. 355.
18. a.

Cryptocephalus bi-punctatus. *Fabr.* *Eleut.* 2.
~ 43. 16. *Schneid.* *Mag.* 2. 205. 15. *Panz.* fn.
68. f. 2.

Chrysomela bi-punctata. *Linn.* *Syst.* 2. 597. 78.
Fn. *Sv.* 548. *De Geér* *Ins.* 5. 332. 35.

Var. b, *Elytris rubris*, margine omni vitta-
que lata longitudinali singuli elytri ni-
gris. *Linn.* *Payk.* *Schönh.* l. c. var. b.
Schneid. l. c. var. a.

Cryptocephalus lineola. *Fabr.* *Eleut.* 2. 44. 17.
Panz. fn. 102. f. 10. *Marsh.* *Ent. Br.* 1.
207. 3.

Var. c, *elytris nigris limbo angustiori rufo*,
margine ipso nigro. *Payk.* *Schönh.* var. c.
Schneid. var. b.

Var. d; *elytris nigris*, macula sub-lunata a-
picis, aliaque obsoleta sub scutello rubris.
Payk. *Schönh.* l. c. var. d.

Var. e, *elytris nigris*, macula apicis aut ro-
tundata rufo-flava, aut sub-lunata, angu-
sta, rufa. *Payk.* *Schönh.* l. c. var. e. *Schneid.*
var. c.

Cryptocephalus bi-pustulatus. *Fabr.* *Eleut.* 2.
54. 73. *Panz.* fn. 68. f. 15.

Cryptocephalus bi-guttatus. *Herbst.* *Archiv.* 7.
163. 20, tab. 44. f. 6.

Var. *f*, Elytris nigris immaculatis. Payk.
Schönh. l. c. var. *f*.

Habitat in soliis Coryli, Betulae, Salicis,
&c. frequens; varietates *c*, - *f*, tamen
parcius occurunt.

Descr. Medius, Cr. 6 - punctato paullo angustior; variat etiam dimidio minor. Caput nigrum, fronte retusa, sub-inæquali, crebre subtiliter & obsolete punctata; oculi depresso, lunati, brunnei. Antennæ in utroque sexu longitudine fere corporis, filiformes, articulo primo magno obconico, piceo; 2, 3, 4, angustis, ferrugineis, reliquis nigris, ultimo linearie elongato, præcedentibus angustiori, sub-acuminato. Thorax quoad structuram omnino ut in Cr. sericeo, nitente, &c. supra valde convexus, pulvinatus, totus niger, nitidus, lævissimus, politus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, læve, apice adscendens. Elytrorum forma etiam omnimode ut in Cr. sericeo, aut saturatius rufa, aut dilutius rufo-testacea, nitida, sat regulariter & profunde punctato striata, striis nonnihil obliquis; limbus totus undique niger, & præterea in callo humerali elevato punctum parvum, oblongum, nigrum, & paullo pone medium in disco interiori macula major, aut rotundata, aut oblonga, anterius producta, acuminate, ejusdem coloris. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre subtiliter punctulatum, tenue pubescens. Pedes longiusculi, toti nigri, femoribus nitidis.

Var. *b*, differt maculis nigris elytrorum dilatatis, confluentibus in vittam vel plagam magnam longitudinalem, abbreviatam, neque basin nec apicem attingentem; ex hac, ut & reliquis varietatibus ambo occurunt sexus, ut ex copulatione, & quoque ex impressione profunda in ultimo segmento ventra-

li feminæ concludendum; sæpius tamen hanc varietatem cum a copula junctam vidi, & plerumque ut illius mas.

In var. c, plaga nigra disci ita dilatata, ut limbis rufescens valde angustus intra margines remauet.

In var d. Elytra nigra, macula intra apicem aut rotundata, aut sub-lunata rubra, & in disco antico prope scutellum alia, valde obsoleta.

Var. e, ut var. d, sed litura disci deest.

In var. f, macula spicis etiam deest, & elytra tota nigra, immaculata; varietates d. e, f, nonquam cum prioribus copulatas vidi, quare dubium de identitate specifica remanet; præter colorem, nullam tamen notam distinctivam investigare potui.

14. C. Moræi: niger, macula frontali cruciata, thoracis margine antico angulisque posticis flavis, elytris maculis duabus marginalibus flavo-testaceis, thorace subtiliter punctulato; Mas.

Femina: dimidio major, fronte maculis tantum duabus flavis, thoracis margine antico immaculato.

Fabr. Eleut. 2. 52 61. Payk. fn. 2. 145. 17.

Panz fn. 68. f. II. Schneid. Mag. 2. 201.

7. Schönk. synon. 2. 365. 63.

Chrysomela Moræi. Linn. syst. 2. 597. 82, Fn. Sv. 550.

Cryptocephalus 4-pustulatus. Schranck. Fuesly Neue Mag. 2. 319. 27. fem.

Habitat in Hyperico quadrangulo & perforato, sat frequens.

Deser. Cr. flaviped. secundum utrumque sexum, magnitudine æqualis, illi & Cr. 4. pustulato etiam quoad colorem & signaturas simillimus, sed thorace subtiliter punctulato elytrisque regulariter punctato-striatis ab utroque distinctus, ut apud illos dictum. Caput retusum, fronte nigra, crebre subtiliter punctulata, litura flava cruciformi vel potius litteram X referente, notata, & præterea sub quovis oculo macula parva triangularis flava; oculi lunati, depresso-nigro-brunnei. Antennæ longitudine fere corporis, filiformes, nigrae, inferne fusco-ferrugineaæ. Thorax latitudine brevior, antice paulo latior, vix emarginatus, angulis & lateribus valde deflexis, compressis; unde ibi angustior appareat; lateribus obliquis, fere rectis, anguste marginatis; basi bisinuatus, angulis acuminatis, sub-elevatis; supra valde convexus, pulvinatus, niger, nitidus, sed crebre subtiliter punctulatus; juxta marginem anticum linea angusta flava continua, margine tamen summo tenuissime nigro, & in quovis angulo postico macula triangularis flava sub-elevata. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, laxe, apice elevatum. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra modice convexa, nigra, nitida, sat regulariter & profunde punctato-striata, interstitiis levibus; juxta humerum macula marginalis oblonga flava, utrinque attenuata, medium marginis fere attingens, & juxta apicem altera, transversim ovata, ejusdem coloris. Podex & corpus subtus nigra, sub-nitida, crebre subtiliter punctulata. Pedes longiusculi, nigri, femoribus anticis subtus linea flava, tibiis ejusdem parvis piceis.

Femina dimidio, imo duplo major, fronte nigra, maculis duabus oblongis flavis, paribus, supra antennarum insertionem; margo anticus thoracis disco concolor, absque striga flava; maculae elytrorum plerumque saturatores, flavo-testaceæ; cætera ut in mare.

Obs.

Obs. Var b., Schneid. & Schönh. l. c. e Germania sub nomine „Cr. bivittatus.“ missa, quoad signaturas capitum & thoracis, masculis Cr. Morzi hemillima, sed plus duplo major. elytra profundius striata. macula anterior in fasciam utrinque dentata, futuram fere attingentem. dilatata, & posterior etiam multo major quam in nostra; tibiae omnes plerumque testaceæ; utrum hæc mera varietas, vel potius propria Species, pro certo dijudicare nequeo, nec talis apud nos occurrit.

15. C. 10-punctatus: niger, thorace punctulato, vitta media, posterius dilatata, maculisque lateralibus; fronte pedibusque anterioribus flavo-testaceis, elytris flavis, maculis quinque nigris.

Fabr. Eleut. 2. 53. 66. Schneid. Mag. 2. 197.
4. Panz. fn. 68. f. 12. Schönh. synon. 2.
366. 68.

Chrysomela 10-punctata Linn. syst. 2. 599. 93.
Fn. Sv. 560.

Cryptacephalus varians. Payk. tis. 2. 149. 21.
var. b.

Var. h, maculis elytrorum dilatatis, vario modo confluentibus. Schneid. l. c. var. a.
Schönh. var. b.

Var. c, elytris nigris, thoracis margine antico vittaque media postice dilatata, stria-
la fusca divisa, testaceis. Payk. l. c. a.
Schneid. var. c. Schönh. var. f.

Cryptoccephalus Bothnicus. Fabr. Eleut. 2. 45.
22. Panz fn. 68. f. 3.

Chrysomela Bothnica Linn. syst. 2. 598. 90. Fn.
Sv. 557.

Var. *d*, linea media testacea thoracis abrupta, posterius punctis duobus oblongis aucta. Schónh. l. c. var. *e*.

Cryptocephalus ornatus. Herbst. Archiv. 4. 63.
15. tab. 23. f. 24.

Var. *e*, thoracis vitta media testacea angusta, simplici, abbreviata, vix medium disci attingente. Schneid. var. *d*.

Cryptocephalus Bothnicus. Herbst. Archiv. 7.
164. 21. tab. 44. f. 8.

Chrysomela Bothnica. De Géer Inf. 5. 335. 39.

Habitat in foliis Salicis cinereæ, passim.

Descr. Statura & magnitudo præcedentis; variat etiam dimidio minor. Frons retusa, crebre subtiliter punctulata, sub antennis flavo-testacea, superne nigra, macula magna biloba flavo-testacea, cum flavedine oris connexa; oculi depressi, lunati, brunnei. Antennæ corpore paullo breviores, inferne ferrugineæ, extrosum paullo crassiores, nigræ. Thorax brevis, antice paullo angustior, parum emarginatus, lateribus rotundatus, marginatus, basi bi-sinuatus, supra modice convexus, sat crebre punctulatus, niger, nitidus; margo anticus jam totus, jam in medio tantum flavo-testaceus; in medio dorsi vitta lata ejusdem coloris, cum margine antico connexa, posterius angulariter valde dilatata, basin non omnimode attingens, postice lineola fusco-ferruginea notata; in utroque latere macula flavo-testacea, aut magna, elongata,

gata, cum flavedine marginis antice connexa, aut minor, separata; in medio laterali foveola transversa impressa utrinque. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum laxe. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra modice convexa, regulariter & sat profunde punctato striata; laxe flava, margine omni anguste nigro; in ipso humero macula, ovata nigra, margini connexa, interius versus scutellum altera, paulo major, rotundata, libera; tertia in medio marginis & illi connexa, quartaque ei opposita in disco interiori, ambæ rotundatae; quinta intra apicem paulo minor, transversim ovata. Podex & corpus nigra sub nitida, crebre subtiliter punctulata. Pedes breviusculi, tenues, femoribus quatuor anterioribus supra linea nigra, posticis aut totis aut in medio plus minime nigro piceis.

In var. b, color niger magis dilatatus; thoracis maculae laterales testaceæ aut parvæ, aut omnino defunt; margo anticus & vitta media angustiores; maculae nigrae elytrorum valde dilatatae; vario modo confluentes, aut omnes, aut anteriores per paria fascias constituentes; plerique hujus varietatis masculini sexus sunt.

In var. c, d, elytra tota nigra; thorax etiam niger; inargine antico & vitta media longitudinali flavo testaceis; vitta illa aut continua, posterius dilatata, lineola fusca in medio posteriori divisa; aut in medio abrupta, parte posteriori in lineolas duas parvas separata.

Var. e, ut var. c, d, sed vitta media thoracis parva, angusta, valde abbreviata, ab apice vix medium disci attingens, & margo anticus tantum in medio testaceus; variat etiam thorace fere toto nigro; absque vitta testacea, margine antico vix vel parum testaceo-marginato.

Obs. varietates c, & d, Schönh. Syn. in *Svecia* non occurunt, quantum mihi innotuit. Var. c, d, e, sœpe

sæpe cum a, & b, copula connexas vidi, & priores semper ut feminas.

16. C. insignis: niger, thorace levissimo, macula antica pallida, elytris atro-cyanis, subtilissime punctato-striatis, ore pedibusque pallidis.

Payk. Att. Holm. 1799. p. 116. Fn. Sv. 3. add. 453. 20. 21. Schönh. Synon. 2. 365. 62.

Habitat in Insula Singön Roslagslæ, rarissime; Dom. Grauberg; mihi non visus, quare descriptionem Cl. Dom. de Paykull transscribo.

Deser. Cr. Moræi vix major. Caput antice pallidum, clypeo obscuriori, postice nigrum, punctulatum; Antennæ corpore paullo longiores, filiformes, simplices, nigrae, basi flavescentes. Thorax longitudo antice fere dimidio, postice vix duplo latior, convexus, levissimus, marginatus, niger, nitidus, macula magna antica pallida, punctum vel maculam minorem fuscescentem antice includente. Scutellum minutum, nigrum. Elytra thorace vix latiora, at latitudine plus quam dimidio longiora, atro-cyanæ, nitida, cylindrica, abdomen obtentrix, subtilissime punctato-striata, oculo armato rugis levissimis intersectis. Pectus & abdomen nigra, opaca. Pedes flavo-pallidi.

Obi. Cl. Dom. Schönherr Crypt. communicavit, huic, ut videtur affinem, Cr. Moræi paullo maiorem, cui character: „Niger, nitidus, fronte, thoracis levissimi margine antico anguste, lateribus large, sinuatim, pedibusque totis flavo-testaceis, elytris sub-

subtiliter punctato-striatis;“ sed patria hujus incerta, quare ulterior descrip^tio omittitur.

17. *C. flavidabris*: cœruleo-violaceus, ore antennarumque basi flavo-testaceis; thorace punctulato, postice obsolete impresso, elytris profunde punctato-striatis, pedibus virescentibus.

Fabr. Eleut. 2. 51. 57. *Payk. En.* 2. 146. 18.

Schneid. Mag. 2. 217. 29. *Schönh. synon.* 2. 354. 56.

Var. *b*, elytris punto apicis flavescente.

Payk. Schönh. var. b.

Var. *c*, supra niger, subitus nigro-cœruleus.

Chrysomilä Barbareæ. *Linn. syst.* 2. 598. 25.
En. Sö. 552?

Cryptocephalus Barbareæ. *Marsh. Ent. Br.* 1.
212. 13. *Schönh. synon.* 2. 364. 55.

Habitat in foliis Betulae albæ, paßim.

Descr. Cr. Moræi quoad utrumque sexum magnitudine sub æqualis, vel paulo longior; Mas dimidio minor femina, magis virescens, antennis longioribus. Caput cœruleo-virescens, nitidum, cræbre punctulatum, vertice obsolete canaliculato; regio oris infra antennas flavo-testaceæ, labro nigro-piceo; oculi lunati, depresso-brunnei. Antennæ maris longitudine corporis, feminae paulo breviores, in utroque basi testaceæ, extrorsum gradatim paulo crassiores, nigrae. Thorax latitudine brevior, antice non-nihil emarginatus, angulis deflexis, prominulis, lass

teribus parum rotundatus, late marginatus, basi bisinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, cœruleo-violaceus vel virescens, nitidus, sat crebre, subtiliter punctulatus; in medio baseos ante scutellum foveolæ duæ impressæ, obsoletæ, obliquæ, versus margines laterales leviter continuatæ. Scutellum triangulare, nigro-violaceum, lœve, apice adscendens. Elytra quoad structuram ut in prioribus omnino, et jam callo humerali & tuberculo communi juxta scutellum elevatis, tota coeruleo-violaceo, nitida, profunde & sat regulariter punctato-striata, striis versus apicem tenuioribus, evanescentibus. Podex & corpus subtus nigro coeruleo-scentia, nitida, crebre subtiliter punctulata. Pedes breviusculi coeruleo-virescens, interdum viridi-ænei, nitidi.

Var. b, differt tantum macula parva transversa testacea intra apicem elytrorum.

Var. c, colore obscuriore tantum differt; corpus fere totum supra nigrum, versus latera tamen plerumque violaceo micans; subtus nigro-coeruleo-scentia pedibus magis virescentibus. Chrys. Barbareæ Linn. l. c. forte talis obscurâ varietas, alias illa mihi ignota.

Obs. Cl. Dom. Prof. Illiger in Mag. 3. 168. 57. Cr. flavidabrem masculum Cr. marginati esse contendit, sed apud nos mas & femina semper similimi occurunt, nec Cr. marginatum unquam in Svecia inventum audivi; quare de identitate specifica dubium remanet.

ig C. punctiger: niger, fronde, thoracis margine antico, antennarum basi pedibusque anterioribus flavo-testaceis, thorace punctato, elytris cœruleis, profunde punctato-striatis.

Payk. fn. 2. 146. 19. Schönh. synon. 2. 364. 57.

Habitat in foliis Salicis Capreæ, passim.

Deser. Cr. labiato paullo longior, sed femina ejus non crassior. Caput postice nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum, vertice canalicula brevi exarato; regio oris sub antennis tota flava, macula frontali biloba supra antennarum insertionem, cum flavedine inferiori cohærente; oculi lunati, nigro-brunnei. Antennæ corpore breviores, basi testaceæ, extrorsum paullo crassiores, nigræ. Thorax brevissimus, transversus; antice præniglio latior, truncatus, angulis valde deflexis compressis, lateribus parum rotundatus, evidenter marginatus, basi bi-sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, niger nitidus, sat evidenter sed minus crebre punctatus; ipse margo anticus anguste, ut & anguli anteriores & rarius margines laterales angustissime flavescentes; versus latera dorsi utrinque foveola obliqua indeterminata impressa. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, lœve, spicè elevatum. Elytra quoad structuram ut in prioribus, apice obtuse rotundata, anum fere tegentia, supra modice convexa, cœrulea vel cœruleo-virescentia nitida, regulariter profunde punctato-striata, intersticiis lœvibus; callus humeralis & regio scutelli elevati ut in prioribus. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre, subtiliter punctulatum. Pedes longiusculi, validi, anteriores quatuor flavo-testacei, femoribus supra linea fusca; postici nigri, tarsis dilutiорibus,

19. *C. pallifrons*: supra nigro-cœruleus, subtus niger, fronte, antennarum basi pedibusque flavo-testaceis, thorace lœvissimo, elytris profunde punctato-striatis.

Ins. Svec. T. I. P. III. Rr Habi-

Habitat in foliis Betulæ, Salicis, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa similitudo præcedentis, sed thorax lævissimus, cœrulescens, vix flavo-marginatus, pedes postici etiam flavescentes, femoribus in medio tantum fuscis, etc. Frons ferè tota flava, parce subtiliter punctulata, vertice lineola longitudinali abbreviata nigra; dum caput magis exsertum, vertex ipse etiam transversim niger; palpi anteriores fusco-picei; oculi lunati brunnei. Antennæ corpore paullo breviores, basi flavo-testaceæ, extrorsum gradatim multo crassiores, nigrae. Thorax quoad structuram ut in præcedenti omnino, supra nigro-cœruleus, nitidus, lævissimus, foveola laterali obliqua utrinque impressus, ut in priori; intra angulum anticum utrinque lineola parva, brevis, flavo-testacea. Scutellum ut in priori, sed nigro-cœrulescens. Elytrorum forma, color, striæ & omnia ut in præcedenti omnino. Podex & corpus totum subtus nigrum, nitidum, parum violaceo-vel cœrulecenti-micans, sat crebre punctulatum. Pedes longiusculi, validi, flavo-testacei, femoribus anterioribus supra linea fusca, posticis in medio annulo latè nigricante,

20. *C. frontalis*: niger, nitidus, fronte, antennarum basi, pedibus, thoracis marginibus, elytrorum costa antica, scutellique spicè flavo-testaceis, thorace brevi lævissimo.

Marsh. Ent. Br. 1. 211. 12. Schönh. synon.
2. 365. 59.

Cryptocephalus labiatus. Schneid. Mag. 2. 204.
12. var. b.

Habi-

Habitat in foliis Betulæ albæ, rarius.

Descr. Proxime præcedentibus paullo brevior, sed non angustior, feminæ Cr. labiati æqualis, sed thorax brevior, elytrorum striæ magis regulares, ad apicem usque excurrentes, & signaturæ pallidæ longe aliae. Frons fere tota flava, parce punctata, vertice ipso, in medio lineolam vel maculam oblongam emitente, nigris; oculi lunati brunnei. Antennæ corpore parum breviores, basi pallidæ. extrorsum gradatim crassiores, nigræ. Thorax brevissimus, transversus, omnino ut in proxime præcedentibus constructus, niger, nitidus, lævissimus, foveolâ obliqua utrinque impressus, ut in prioribus; margo anticus totus, ut & anguli anteriores & pars anterior marginis lateralis pallide flavo-testacei. Scutellum oblongo-triangulare, pallide flavum, basi fulcum, apice elevatum. Elytrorum forma fere ut in prioribus, sed paullo breviora, supra modice convexa, nigra, nitida, profunde punctato-striata; striis lateralibus ad apicem usque excurrentibus, interstitiis planis, lævibus; margo lateralis a basi ultra medium linea flavo-albida cinctus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes longiusculi, validi, flavo-testacei, femoribus anterioribus supra linea fusca, posticis in medio late nigro-fuscis.

21. C. labiatus: niger, ore, antennarum basi pedibusque anterioribus flavis, thorace lævissimo, elytris anterioribus profunde punctato-striatis, apice lævibus.

Fabr. Eleut. 2. 51. 56. Payk. fn. 2. 147. 20.

Panz. fn. 48. f. 9. Schneid. Mag. 2. 203. 12. Schönh. synon. 2. 363. 53.

Chrylomisla labiata. Linn. *syft.* 2. 598. 87. *Fn.*
Sv. 553.

Habitat in soliis Betulæ, Alni, Salicis, frequens ubique; Larva intra saccum subcylindricum fuscum dedit.

Descr. Parvus; Cr. minuto æqualis; mas plerumque dimidio minor semina. Frons supra antenras nigra, nitida, vix punctulata, obsolete canaliculata, sub antennis, una cum ore, fere tota flava. Oculi lunati brunnei. Antennæ maris longitudine corporis; feminæ breviores, in utroque sexu basi flavæ, extiorum gradatim crassiores nigræ, pilis paucis longioribus adpersæ. Thorax latitudine paullo brevior, antice compressus, sub-emarginatus, angulis nonnihil prominulis, lateribus parum rotundatus, late marginatus, basi sat profunde bi sinuatus, supra valde convexus, pulvinatus, totus niger, lævissimus, nitidus, politus. Scutellum oblongo-triangularē, nigrum, nitidum, læve, apice adscendens. Elytra quoad formam ut in prioribus omnino, callo humerali & suturæ basi elevatis, tota nigra; nitida, a basi ultra medium regulariter & sat profunde punctato-striata, striis, præsertim disci, longe ante apicem omnino evanescientibus. Podex & corpus subtus nigra, parum nitida, crebre, subtiliter punctulata. Pedes longiusculi, antici flavi, femoribus plerumque supra linea nigra; medii etiam flavi; femoribus supra & in medio plus minusve nigris; postici femoribus totis nigris, tibias aut flavis, aut apice infuscatis; variat etiam, præsertim femina, pedibus totis flavis, femoribus posticis tantum in medio infuscatis.

Obs. Dom. Schönherr *Cryptocephalum* communicavit huic simillimum, & minimis masculis æqualem, cui frons superior lineis duabus flavis notata; hic certe Cr. labiatus var. a, Schneid. l. c. & var. b, Schönh. l. c.; sed in illo thorax subtilissime

punctulatus videtur & elytrorum striæ apicem fere attingunt, quare propria forte species, nec in Svecia lectum credo.

22. C. minutus: thorace laevissimo fulvo, e-lytris pallidis, capite, antennarum basi pedibusque testaceis, pectore, abdomen antennarumque apice nigris.

Fabr. Eleut. 2. 57. 87. Payk. fn. 2. 149. 22.

Panz. fn. 39. f. 18. Schönh. synon. 2. 370. 89.

Chrysomela exoleta. De Géer Ins. 5. 338. 42.

Var. b, sutura calloque humerali elytrorum nigris. Payk. Schönh. l. c. var. b.

Var. c, Thorace femoribusque posticis fusco-brunneis.

Var. d, elytrorum sutura, punto calloso humerali maculaque magna pone medium, interdum in fasciam dilatata, nigris. Payk. var. c, Schönh. var. d.

Cryptocephalus pusillus. Fabr. Eleut. 2 56. 85.

Schneid. Mag. 2. 211. 22. Marsh. Ent. Br. 1. 210. 9.

Chrysomela minuta. Herbst. Archiv. 4. 57. 31. tab. 23. f. 19.

Habitat in collibus aridis pratorum, sœpe copiose; var. c, in Scania rarius lecta.

Descr. Magnitudo & statura Cr. labiati. Caput retractum, fronte flavo-testacea, punctis paucis in medio impressa, ore margineque verticis infuscatis; in fronte superiori canalicula obsoleta, interdum

infuscata; oculi lunati brunnei. Antennæ corpore breviores, basi testaceæ, extrorsum gradatim crassiores nigro-fuscæ, pilis paucis adspersæ. Thorax quoad structuram omnino ut ad Cr. labiatum descriptus, supra fulvo-testaceus, laevissimus, nitidus, politus versus marginem anticum & laterales pallidior, flavescens. Scutellum triangulare, laxe, apice adscendens, aut fusco-brunneum, aut apice flavescens. Elytra quoad formam ut in prioribus, supra convexa, pallida, regulariter & sat profunde punctato-striata, striis ad apicem usque excurrentibus. Thorax subtus testaceus, saltem versus latera; podex, petitus & abdomen nigra, parum nitida, crebre, evidenter punctata, ani margine testaceo. Sexus differentia ut in prioribus. Pedes mediocres, toti pallide testacei.

Var. b, differt tantum sutura elytrorum magis infuscata, & callo humerali nigro.

Var. c, ut var. b, sed magis obscura, thorace brunneo, lateribus dilutiori, femoribus posticis etiam brunneis.

Var. d, etiam ut var. b, & præterea in elytris, paullo pone medium, macula magna nigra, saepe ad futuram usque dilatata, & cum opposita fasciam fere constitente.

Obs. Varietates g, & h, Schönh. l. c. quarum prior Cr. marginellus Marsham, posterior Cr. gracilis Fabr. Pauz, apud nos non detectæ, quantum mihi innotuit.

23. C. bilineatus: niger, thorace subtilissime rugoso, flavo-marginato, elytris flavis, sutura vittaque media nigris, antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

Mas: fronte flava, postice nigro-marginata.

Femi-

Femina: fronte nigra, ore punctisque duobus verticis flavis.

Payk. fn. 2. 150. 23. Schneid. Mag. 2. 202. 9.

Thunb. Nov. Act. Ups. 5. 112. 43. Schönh. Synon. 2. 363. 49.

Chrysomela bilineata. Linn. Syst. 2. 597. 83.

Var. b, vitta nigra disci elytrorum ante apicem cum vitta suturali connexa.

Var. c, vittis nigris elytrorum dilatatis, maximam disci partem occupantibus, maculas quatuor flavas includentibus.

Habitat in collibus pratorum aridis, passim copiose.

Descr. Cr. labiato plerumque paullo minor. Caput valde retractum, fronte retusa, sat profunde rugoso-punctata, in mare flava, margine postico lineolaque brevi verticis nigris; in femina nigra, ore punctisque duobus verticis flavis; oculi lunati, nigro-brannei. Antennæ corpore breviores, inferne pallide testaceæ, extrorsum gradatim crassiores, nigrae, pilis paucis adspersæ. Thorax paullo brevior quam in Cr. labiato, cæterum eiusdem structuræ niger, parum nitidus, rugulis vel striolis longitudinalibus subtilissimis crebris notatus; margo anticus continue, laterales saepe in medio interrupte, anguste flavi, ipso margine extimo tamen fusco. Scutellum triangulate nigrum læve, apice elevatum. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra modice convexa, læte flava, sub nitida, regulariter & profunde punctata. Striata, striis ad apicem usque productis; sutura tota fere ad apicem late nigra, & in medio cuiusvis elytri vitta lata nigra, a basi humerali

per medium elytri ducta, intra apicem abbreviata, Podex pone elytra & totum corpus subitus nigra, crebre subtiliter punctulata. Pedes validi, toti pallide testacei.

In var. b, vitta media singuli elytri intra apicem introrsum arcuata & cum sutura nigra connecta, unde in singulo elytro vitta interior flava, a basi paullo ultra medium extensa, nigredine undique cincta, exstat.

In var. c. vitta interior flava varietatis b, ante medium fascia nigra interrupta, unde existant in singulo elytro maculæ duæ flavæ, una baseos transversa, altera in medio, oblonga, quæ jam majores, jam parvæ, obsoletæ, nigredine dilatata discum fere totum occupante; ex hac varietate feminas tantum vidi, ex var. b, vero ambæ occurrunt sexus.

Subdivisio 6:a, Lemoideæ.

(*Criocerides Latreille.*)

Maxillæ lacinia exteriori vix vel obsoletissime bi-articulata, forma & colore palpum non æmulante. Thorax cylindricus, abdomine elytrisque manifeste angustior. Corpus elongatum. *Latreille.*

L E M A.

Palpi quatuor crassiusculi, filiformes. Mandibulæ apice bidentatæ. Maxillæ bifidæ, lacinia exteriori lanceolata, acuta. Ligula membranacea, dilatata, apice rotundata, integra. Antennæ sub-filiformes, cylindricæ, articulo pri-

primo crasso, ovato vel globoſo, ſequentibus plerumque moniliformibus. Caput exsertum, collo diſtincto thoraci adnexum. Oculi prominuli, interne emarginati. Thorax immarginatus, posterius attenuatus, elytris multo anguſtior.

I. L. Merdigera: nigra, thorace elytrisque rufis, immaculatis, thorace poſtice utrinque profunde impreſſo, elytris ſubtilius punctato-striatis.

Fabr. Eleut. I. 472. 9. Schönh. Synt. 2. 279. 9.

Crioceris merdigera. Latr. Gen. Inf. 3. 47. 1.

Payk. fn. 2. 81. 5. var. b. Panz. fn. 45. f. 2.

Chrysomela merdigera. Linn. Syst. 2. 599. 97.

Fn. Sv. 563. var. capite pedibusque nigris.

Chrysomela rubra Liliorum. De Geér Inf. 5.

338. A3.

Habitat in plantis Liliaceis hortorum, apud nos rarius.

Descr. Hæc & infequens reliquis nostris hujus generis majores, praesertim in elytris latiores. Caput parvum, triangulare nigrum, fronte plana, inaequali, bis cruciatim impressa, obfolete punctulata; oculi valde prominuli, lunati, nigro-brunnei, interne ſinu profundo, angusto emarginati; collum capite multo angustius, convexum, nigrum, nitidum, læve. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, crassiusculæ, totæ nigrae, articulo primo magno, ova-to; ſecundo minimo, nodoso; 3. 4. parvis, ob-conicis, his quatuor nitidis. politis; reliquis multo

Er 5

majoꝝ

majoribus, sub-cylindricis, opacis. Thorax latitudine fere longior, antice paullo latior, truncatus, lateribus immarginatus, paulo pone medium utrinque profunde transversim incisus, basi etiam truncatus, supra modice convexus, rufus, nitidus, vix puncto uno altero obsoleto impressus; in medio canalicula longitudinalis obsoleta, serie punctorum indicata, & paullo ante basin stria transversa, profundius impressa. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, nitidum, laxe. Elytra magna, thoracis basi duplo latiora, humeris valde elevatis rectangularis, thorace quadruplo longiora, apice rotundata. anum occultantia, supra modice convexa, ante medium transversim indeterminate impressa, tota rufa, nitida, posterius regulariter sed parum profunde punctato-striata, versus basin punctis magnis, distantibus, minus ordinatis impressis, callo humerali valde elevato, levissimo. Thorax subtus in medio niger, lateribus sinuatim rufus; pectus & abdomen tota nigra, nitida, vix punctulata. Pedes longiusculi, toti nigri, femoribus clavatis, tarsis subtus cinereo-spongiosis; tarsuum articulus penultimus reliquis latior, bilobus,

2. *L. brunnea*: nigra, capite thoraceque supra, elytris, ano pedibusque rufis, genubus tarsisque nigris, thorace utrinque profunde impresso, elytris profundius punctato-striatis.

Fabr. Eleut. 1. 473 *n.* *Schönh. synon.* 2. 280. 10.

Crioceris brunnea. *Panz. fn.* 45. *f.*, 1.

Chrysomela merdigera. *Linn. syst.* 2. 599. 97.
Fn. 563. capite pedibusque rufis.

Crioceris merdigera. *Payk. fn.* 2. 81, 5. a.

Chry-

Chrysomela rubra Liliorum, var. *De Gér*
Ius. 5. 338. 43.

Habitat in *Convallaria majali*, non infrequens.

Descr. Praecedenti magnitudine, statura & formatione partium ut ovm ovo simillima, colore & habitatione fere unice distincta; Elytrorum striæ tamen paullo profundiores videntur. Caput & collum aut tota rufa, aut os & gula obscurius rufo-picea; oculi, antennæ, thorax supra & infra ut in praecedenti omnino. Scutellum plerumque rufo-ferrugineum vel rufo-piceum. Elytra tota rufa, paullo profundius, cæterum pari modo punctato-striata, ut in priori. Pectus & abdomen nigra, nitida, lævia, segmentis duobus ultimis analibus fere totis rufis. Pedes rufi, genibus tarsisque nigris.

3. L. 12:punctata: rubra, elytris dilutionibus, singulo punctis sex nigris, antennis, pectore, genibus tarsisque nigris, thorace ovato, convexo.

Fabr. Eleut. 1. 473. 12. *Schönh. Jynon.* 2. 280. 13.

Crioceris 12-punctata. *Payk. fn.* 2. 81. 6. *Panz.*
fn. 45. *f. 3.*

Chrysomela 12-punctata. *Linn. syst.* 2. 601.
110. fn. Sv. 568.

Auchenia 12-punctata. *Thunb. Att. Upl.* 5. 95 13.

Habitat in *Asparago*, apud nos ratissime.

Descr. Praecedenti parum brevior, sed dimidio angustior & ultra. Caput sub-triangulare, rufum, fronte plana, inæquali, sovea oblonga, profunda in vertice, & supra antennarum insertionem, linçolis variis impressa, supra os crebre subtiliter coriacea; oculi

oculi magni, prominuli, antece profunde sed anguste incisi. Antennæ dimidio corpore parum longiores, crassæ, totæ nigrae. Thorax latitudine medii paullo longior, ovatus, basi apiceque truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, supra valde convexus, pulvinatus, juxta basin stria transversa, parum profunda, impressus. totus saturate rufus, nitidus, lœvis, vel omnium subtilissime, obsolete punctulatus. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, nitidum, lœve. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris elevatis, rectangularis, & illo quadruplo longiora, supra modice convexa, regulariter & sat profunde punctato-striata, dilutius rufo-flavescens; in singulo puncta sex nigra; primum in ipso callo humerali; secundum paullo posterius, juxta marginem; tertium illi oppositum, versus suturam, in impressione sat profunda locatum; haec tria parva, rotundata; quartum in medio, magius, transversum; quintum pone medianum, juxta suturam, parvum, rotundatum; sextum longe intra spicem, magus, transversum. Corpus subtus crebre subtiliter punctulatum, thoracis medio, pectore toto abdominisque basi nigris, thoracis lateribus ventrisque parte posteriori rufis nitidis. Pedes longiusculi, rufi, genubus tarsisque nigris, structura ut in prioribus.

4. L. Asparagi elongata, nigro-cœrulea, thorace rubro, punctis duobus nigris, elytris flavis, cruce communi punctisque quatuor nigro-cœruleis, aut liberis, aut cruci connexis.

Fabr. Eleut. 1. 474. 17. Panz. fn. 71. f. 12.
Schönh. synon. 2. 282. 19.

Crioceris asparagi, Payk. fn. 2. 82. 7.

Chry-

Chrysonela Asparagi. Linn. syst. 2. 601. 112.

Fn. Sv. 567. De Geer Ins. 5. 341. 45.

Habitat in Asperago, apud nos rarissime.

Descr. Præcedenti vix brevior, sed adhuc angustior, fere linearis. Caput triangulare, cœruleo-virescens, nitidum, crebre subtiliter punctulatum, fronte canaliculata; oculi valde prominuli, brunnei, antice profunde incisi; collum capiti concolor. convexum, punctulatum. Antennæ longitudine dimidiū corporis. crassæ, nigrae. Thorax latitudine longior, basi apiceque truncatus, lateribus parum rotundatus, supra modice convexus, rufus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus; aut immaculatus, aut punctis duobus parvis, aut lineolis duabus paribus, saepe confluentibus nigro-cœruleis, in medio dorsi notatus, Scutellum parvum triangulare. cœruleo-virescens, nitidum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris rectangularis, & illo vix quadruplo longiora, supra parum convexa, regulariter punctata-striata, flavo-testacea, sutura tota late cœruleo-virescente, in medio utrinque ramum breviter quadrangulum ejusdem coloris. emitte; in callo humerali macula oblonga cœruleo-virescens, plerumque libera, interdum vero angulariter versus suturam continua-ta & illi connexa; intra apicem macula altera ovata ejusdem coloris, plerumque cruci adnata. Corpus subtus nigro-cœruleum, vel cœruleo-virescens, crebre subtilissime punctulatum. Pedes mediocres nigro-cœrulei nitidi, tibiis basi annulo ferrugineo cinctis.

5. L. Melanopa: cœrulea nitida, thorace pedibusque rufis, antennis tarsisque nigris, thorace subtilissime punctulato, postice striga transversa impresso,

Ead.

Fabr. Eleut. I. 476. 27. Panz. fn. 91. f. 12.

Schönh. synon. 2. 285. 32.

Crioceris melanopa. Payk. fn. 2. 82. 8.

Chrysonela melanopa. Linn. syst. 2. 601. 105.

Fn. Sv. 573. De Gér. Ins. 5. 342. 46.

Habitat in plantis & gramine, non infrequens.

Descr. Media, sed magnitudine valde variat. Caput triangulare cœruleum, fronte inæquali subtilater obsolete punctulata; collum convexum, concolor, punctulatum, in medio canalicula impressum; oculi valde prominuli brunnei, antice incisi. Antennæ dimidio corpore longiores, totæ nigrae, extrotum paullo crassiores. Thorax latitudine antica vix longior, basi apiceque truncatus, lateribus anterius rotundato. dilatatus, supra valde convexus, subglobose, juxta basin striga transversa sat profunda impressus, totus saturate rufus, nitidus subtilissime & minus crebre punctulatus. Scutellum triangulare cœruleo-virescens lœve. Elytra thoracis basi duplo latiora, & illo quadruplo longiora, supra minus convexa, dorso antico sub-impressa, tota cœrulea vel cœruleo-virescentia, nitida, regulariter punctato-striata, callo humerali oblongo, elevato, lœvi. Thorax subtus lateribus rufus, medio cœruleus; pectus & abdomen cœruleo-virescentia, nitida, crebre punctulata. Pedes longiusculi, lœte rufi, tarsis nigro-fuscis, subtus cinereo-spongiosis.

6. *L. cyanella*: cœrulea nitida, antennis tarisque nigris, corpore subtus pedibusque subtilissime hispidulis.

Mas:

Mas: duplo minor, thorace antice valde convexo, nitido, punctis paucis minutis adsperso; postice transversim profunde impresso.

Femina: duplo major, thorace supra parum convexo, crebre & profunde rugosopunctato, postice obsolete impresso, lateribus antice gibbo, in medio profunde impresso.

Fabr. Eleut. 1. 475. 23. *Panz. fn.* 71. f. 1.
Schönh. funor. 2. 284. 26.

Crioceris cyanella. *Payk. fn.* 2. 83. 9.

Chrysomela cyanella. *Linn. syst.* 2. 600. 104.
Fu. Sv. 572. *De Géer Ins.* 5. 340. 44.

Var. *b*, supra nigra opaca, subtus nigro-cerulea. *Payk. l. c. not.*

Habitat in plantis & gramine sat frequens.

Descr. Præcedente paullo brevior, sed in elytris latior; Mas duplo minor femina. Caput triangulare coeruleum, fronte inæquali, crebre punctulata; collum concolor, punctulatum, canalicula brevi exaratum; oculi valde prominuli brunnei, antice profunde incisi. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, extrosum gradatim crassiores, totæ nigrae. Thorax antice latior & latitudine antica parum longior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium coarctatus, supra anterius valde convexus, sub. globosus, ante basin transversim late & profunde impressus, margine baseos elevato; totus coeruleus nitidus, punctis paucis minutis hic illuc adspersus. Scutellum sub-triangulare coeruleum nitidum,

tidum, læve. Elytra thoracis basi duplo latiora & illo vix quadruplo longiora, supra parum convexa, in medio dorso sub-impressa, tota cœrulea vel cœruleo-virescentia, nitida, regulariter & sat profunde punctato-striata. Corpus totum subtus cœruleum nitidum, crebre punctulatum, pilis brevissimis rigidis cinereis adspersum. Pedes longiusculi, cœrulei, tarsis nigris, densius pilosiss.

Femina duplo major & ultra; thorax a thorace maris valde diversus, lateribus antice angulariter productus, in medio lateraliter profunde impressus, supra parum convexus, crebre & profunde rugoso-punctatus; in dorso anteriori lineæ duæ impressæ, punctatæ, sed striga transversa ante basin valde obsoleta; cætera ut in mare.

Var. b, differt tantum corpore toto supra nigro, opaco, subtus nigro-cœrulecente, & hoc in utroque sexu,

7. L. Sub-spinosa: nigra, capite, thorace, antennatum basi pedibusque flavo-testaceis, thorace profunde punctato utrinque uni-spinoso, elytris confertissime vague punctatis.

Panz. fn. 83. f. 10. Schönh. syuon. 2. 285. 33.

Crioceris subspinoja. Fabr. Eleut. I. 461. 57.

Payk. fn. 2. 78. 3.

Auchenia subspinosa. Thunb. Act. Ups. 5. 16.

51. Marsh. Ent. Br. I. 216. 7.

Var. b, duplo major, collo capiteque supra late nigris, thorace obsoletius punctato; an femina? Schönh. l. c. var. b.

Au-

Auchenia flavicollis., Marsh. Ent. Br. I. 217. 8.
Habitat in foliis Betulæ, Populi, Coryli,
passim.

Descr. Parva, L. cyanella triplo minor. Caput majusculum triangulare flavo-testaceum nitidum, crebre & sat profunde punctatum, postice in collum breve angustatum; mandibulæ apice piceæ; oculi prominuli brunnei, antice incisi. Antennæ longitudo dimidii corporis, articulis quatuor baseos flavo-testaceis, reliquis gradatim crassioribus nigris. Thorax antice latior, truncatus, lateribus paullo ante medium in spinam validam triangularem dilatatus, basi truncatus, supra modice convexus, crebre & profunde rugoso-punctatus, totus supra & infra flavo-testaceus. Scutellum parvum triangulare nigrum, cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris rectangulis, & illo plus triplo longiora, supra convexa, ante medium dorsi sub-impressa, tota saturate nigra, sub-nitida, confertissime & profunde punctata, margine suturali & lateralí elevatis. Alæ longæ fuscæ. Pectus & abdomen subtus nigra, confertissime, subtiliter punctata, tenuè pubescentia. Pedes longiusculi, toti flavo-testacei, pubescentes.

Var. b, fere duplo major, capite supra antennarum insertionem colloque late nigris; thoracis punctata obsoletior, minus crebra, & color illius, ut & oris, pedum baseoque antennarum pallidius flavus.

Obs. Var. b, Payk. loc. cit. quæ var. c, Schönb. „Elytris etiam pallidis“; mihi non visa; forte secundum specimen immaturam designata,

Obs. Secundum sententiam Cl. Dom. Latreille, Gen. Ins. 3. 45, hæc Species genus proprium constitutere

stituere debet, Megalopo proximum; in plurimis tamen cum Lemæ Speciebus convenit, quare heic retineo.

O R S O D A C H N A.

Palpi elongati, crassiusculi, anticorum articulo ultimo apice oblique truncato; eodem posticorum sub-conico. Mandibulæ & maxillæ ut in Lema. Caput exsertum, absque collo distincto thoraci adnexum. Oculi globosi, prominuli, integri. Antennæ extrorsum paullo crassiores, articulis fere omnibus ob-conicis. Corpus oblongum. Thorax postice angustior.

O. chlorotica: elongata, supra glabra, vage punctata, subtus sericeo-pubescentia; thorace anterius utrinque rotundato-dilatato.

a, Capite thoraceque rufo-testaceis, e'y-tris pedibusque pallidioribus, pectore ab domine nigro-tuscis.

Latr. Gen. Ins. 3. 44. i. Schönh. synon. 2.

287. i.

Crioceris fulvicollis. Payk. fn. 2. 77. 2. a.
Panz. fn 83. f. 8.

Crioceris Cerasi. Fabr. Eleut. i. 456. 30.

Lema fulvicollis. Illig. Mag. i. 418. 30.

Var. b; abdomine & interdum etiam pectore testaceis.

Vär.

Var. c; capite thoraceque rufo-brunneis,
elytris pallide testaceis, limbo corpore-
que nigris. Payk. Schönh l. c. var. c.

Galleruca Cerasi. Fabr. Ent. Syst. 2. 22. 43.

Var. d, capite antice, thorace toto, abdo-
minis apice pedi usque rufo-testaceis,
vertice, elytris pectoreque nigris. Payk.
l. c. var. d; Schönh var. e.

Crioceris glabrata. Fabr. Eleut. 1. 455. 28.
Panz. f. 84. f. 6.

Habitat in floribus Pruni Padji, Crataegi O-
xyacantæ, Pyri, aliisque passim.

Descr. Statura oblonga Lemæ melanopæ, & ab
illis magnitudine ad triplo majorem variat. Caput
magnum, porrectum, versus os angustatum, pone
oculos etiam contractum, sed non callo distincto a
thorace disjunctum, rufo-testaceum nitidum, evi-
denter sed minus crebre punctatum, vertice saepe ni-
gro; oculi globosi brunnei integri; mandibulae cor-
neæ fornicatae, apice nigrae, evidenter bifidae, laci-
niis æqualibus acutis. Antennæ vix longitudine di-
midii corporis, aut totæ testaceæ, aut extrotsum
obscurores, articulis fere omnibus obconicis vel api-
ce introtsum dilatatis, exterioribus gradatim paullo
crassioribus. Thorax oblongus, antice lator, trun-
catus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus,
immarginatus, posterius multo angustior, basi trun-
catus, supra modice convexus, rufo-testaceus nitidus
glaber, evidenter, sed minus crebre pupillatus.
Scutellum sub triangulare, subtiliter punctatum,
aut testaceum, aut obscurius piceum, præsertim ba-
si. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, hume-
ris elevatis rectangularis, thorace plus triplo longio-

ra, supra modice convexa, dilatius flavo-testacea, nitida, glabra, undique crebre & sat profunde vague punctata. Thorax subtus testaceus; pectus & abdomen nigra vel nigro-pices; vix punctulata, pubes depresso sericeo-nitente obducta. Pedes longiusculi validi, pallide testacei.

Var. b, differt tantum abdome & interdum etiam pectore, testaceis.

In var. c, caput rufo-brunneum, vertice nigro; thorax aut rufo-testaceus, aut obscurius brunneus; Scutellum nigro-brunneum; elytrorum limbus jam late, jam angustius nigro-fuscus, disco longitudinale pallide testaceo; pectus & abdomen ut in a; thorax etiam subtus obscurius brunneus. In uno specimine hujus varietatis thorax paullo pone medium utrinque foveola oblonga impressus.

In var. d, caput rufo-testaceum, vertice late nigro; thorax totus; antennae & pedes rufo-testacea; elytra, pectus & abdomen nigra; ano obscurè tristaceo; cetera in omni varietate simillima.

2. O? Betulæ: elongata, nigro-fusca, pubescens, punctatissima, ore, antennis, pedibus elytrorumque margine laterali pallidioribus, thorace utrinque denticulato, elytris lineis tribus elevatis.

Lema Betulæ. Schönh. synon. 2. 286. 38.

Crioceris Betulæ. Fabr. Eleut. 1. 462. 61. Payk. fa. 2. 76. 1.

Var. b; dimidio major, capitis vertice thoraceque ferrugineis vel brunneis, elytris pallidis, sutura lineaque humerali brunneis; forte femina.

Habi-

Habitat in Betulæ albæ frondibus, in Dalekarlia & Bothnia, Dom. de Paykull; in Westrogothiæ Silva Kinnensi, ut & prope Alingsås, pluries a me lecta.

Deser. Magnitudo & statura elongata Lemæ Asparagi. Caput majuscum, rotundatum, aut nigro-fuscum, aut brunneum, creberrime & sat profunde punctatum, tenue pubescens, sub antennis flavum, mandibularum apice piceo; oculi ovati, prominuli, nigro-brunnei, integri; collum non distinctum. Antennæ dimidio corpore longiores, filiformes, basi pallidæ, extrosum ferrugineæ vel brunneæ, articulis ob-conicis, ultimo longiori acuminato. Thorax latitudine medii fere brevior, antice truncatus, angulis lateraliiter prominulis, lateribus in medio dilatatus, denticulis plerumque tribus armatus; media majori, saepe duplicata; basi etiam truncatus, supra parum convexus, fusco-brunneus, opacus, tenue pubescens, confertissime rugoso-punctatus; in medio dorsi canalicula longitudinalis impressa, saepe obsoleta. Scutellum oblongum fusco-brunneum, pubescens, apice obtusum. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris rectangularis, & illo fere quintuplo longiora, sub-linearia, supra modice convexa, jam obscurius fusco-brunnea, jam dilutius fusco-testacea, margino lateralí & apicis semper pallidis, sutura carinaque lateralí nigro-fuscis; in singulo elytro linea tres elevatae, quarum exterior, e callo humerali exiens, magis distincta, carinata, interiores saepe obsoletæ; superficies tota elytrorum confertissime & sat profunde punctata, punctis plerisque feriatis. Corpus subtus jam saturatus fusco-brunneum, jam dilutius ferrugineum, praesertim pectus & regio ani, semper crebre subtiliter punctulatum, tenue griseo-pubescentes. Pedes medios pallidi pubescentes, femoribus tibiisque saepe in medio saturatus ferrugineis.

Var. b., dimidio major & pallidius colorata; caput & thorax supra ferruginea aut dilute brunnea; elytra pallida, fatura & linea angusta in carinula laterali brunneis; os, antennæ, corpus, pedes pallide testaceæ; forte femina.

Obs. Palpi: maxillæ, labium & ligula ut in *Lema merdigera*; antennæ & oculi ut in *Orsodachna chlorotica*; mandibulæ apice tridentatæ; forte proprii generis, ut dudum monuit Dom. Schönherr, loc. cit.

D O N A C I A.

Palpi quatuor filiformes. Maudibulæ apice bifidæ. Maxillæ membranaceæ bifidæ. Ligula truncata integræ. Antennæ filiformes, articulis sub-cylindricis, basi approximatae. Oculi semi-globosi, integri. Caput porrectum, collo distincto thoraci adnexum. Elytra sub-trigona, posterius angustata, apice plerumque truncata. Femora clavata.

Sect. I. Femoribus posticis dentatis.

I. *D. crassipes*: depresso-piana, supra violacea, subtus argenteo-sericea, thoracis disco canaliculato laevi, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis laevibus, femoribus posticis longissimis arcuatis.

Mas: Femoribus posticis subtus versus apicem tri-dentatis, dente medio majori.

Femina: Femoribus posticis uni-dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 126. 1. Payk. fn. 2. 191. 4.

Leptus

Leptura aquatica. Linn. Syst. 2. 637. 1. Fn.
Sv. 677, var. b.

Leptura aquatica spinosa. De Géer Ins. 5. 140.
18. tab. 4 f. 14-16.

Donacia striata. Panz. fn. 29. f. i. Crit. Rev.
L. 99.

Donacia micans. Hoppe Ins. Erl. 39. f. 1.

Leptura micans. Marsh. Ent. Br. 1. 344. 8.

Var. b, supra viridi-aenea.

Donacia aquatica. Thunb. Act. Ups. 5. 119. 56.
var. b,

Habitat in plantis aquaticis, præsertim in
foliis Nymphaeæ, passim.

Descr. Media; sed magnitudine variat. Caput nigrum opacum, sub-læve, tenuissime pubescens, frönte canalicula longitudinali profunda exarata; collum elevatum, capiti concolor; oculi valde prominuli, semi-globosi, brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, filiformes, nigrae, articulis inferioribus basi ferrugineis; articulus primus magnus, crassus, ob-conicus; secundus reliquis brevior, etiam ob-conicus; sequentes elongati, sub-cylindrici, apice paullo crassiores. Thorax anterius latior, truncatus, & latitudine antica brevior, lateribus obliquis, sub-inæqualibus, basi etiam truncatus, angulis lateraliter prominulis; supra depresso-planus, in medio canalicula longitudinali abbreviata exaratus, & intra angulum anticum utrinque tuberculo elevato, rotundato, fovea sat profunda arcuata a disco distincto, notata; intra basin transversim obsolete impressus; discus præterea lævis vel omnium subtilissime coriaceus, violaceus sub-nitidus, lateribus sub-virecentibus. Scutellum oblongo-triangula-

Iare nigrum, lœve, pubescens. Elytra antice thoracis basi fere duplo latiora, humeris valde elevatis, rectangulis, thorace sextuplo longiora, posterius angustata, spicè ipso late truncata, supra depresso-plana, punctis sat profundis, rotundatis, simplicibus regulariter & pulchre striata, interstitiis lœvibus, vel sub lente subtilissime coriaceis; dorso toto violacea, sub-nitida, lateribus & postice viridi-sericea. Corpus totum subtus vellere densissimo tectum, antice inspecto argenteo vel margaritaceo-sericeo, a posteriori vero lustrato fusco-plumbeo. Pedes elongati obscure testacei, albido pubescentes, femoribus tibiisque supra nigro-fuscis; femora omnia clavata, postica valde elongata & arcuata, basi tenuia, apicem versus incrassata, clavata, maris intra apicem subtus dentibus tribus in serie locatis, armato, medio majori, extimo minuto, saepe obsoleto; in femoribus feminæ dens tantum unicus, medius nempe, adest.

Var. b, differt tantum colore dorsi thoracis & elytrorum viridi, parum æneo-micante; cetera ut in a omnia.

a. *D. bidens*: convexior, supra viridi-ænea, violaceo-micans, subtus argenteo-sericea, elytris crenato-striatis, interstutiis thoracisque dorso transversim rugosis, femoribus crassis fusco-violaceis, posticis minus elongatis.

Mas: femoribus posticis subtus dentibus duobus acutis, paribus.

Oliv. Ent. 4. 75. n. 12. Pl. 2. f. 12. a, b.

Donacia dentata. Hoppe Enum. Ins. Erl. 40.

f. 2.

Fe-

Femina: femoribus posticis dente tantum uno, plerumque parvo, obsoleto.

Donacia claripes. Payk. fn. 2. 190. 3.

Var. b. pedibus totis fusco-æneis; femina.

Habitat in plantis varlis, locis humidis, sat frequens.

Descr. Præcedenti quidem similis, sed pluribus notis essentialibus abunde distincta. Caput quoad strukturam ut in priori, nigro-fuscum, interdum fuso-æneum, pubescens, obsolete punctatum, fronte canaliculata; oculi ut in priori. Antennarum strutura eadem, sed articuli fere omnes basi latius ferruginei. Thorax angustior quam in præcedente, ferre quadratus, basi apiceque truncatus, angulis non-nihil prominulis, supra magis convexus, in medio canalicula abbreviata, plerumque rubro-aurea, impressus, viridi-sericeus, in dorso saepè fuscus violaceo micans, undique crebre transversim rugosus & punctatus; tuberculum elevatum anguli antici magis oblongum. Scutellum triangulare viridi æneum, pubescens, læve. Elytorum forma ut in priori, modo supra magis convexa, viridi-sericea; dorso plus minusque fuscoviolacea, sat profunde crenato-striata, interstitiis crebre transversim rugosiss. Corpus totum subrus indumento simili ut in priori tectam. Pedes breviores quam in præcedenti, femoribus crassis fusco-violaceis; basi tantum testaceis, posticis multo minus arcuatis, nec basi ita attenuatis, maris versus apicem subtus dentibus duodus acutis, paribus, transversim positis, armata, inter quas tibia reclinata locatur; femora feminæ dente tantum uno, parvo, saepè obsoleto; notata; tibiæ & tarsi fuscotestacei, pubescentes.

Var. b, simillima, sed pedes toti fusco-ænei, pubescentes; feminas tantum hujus varietatis vidi.

Quod hæc D. clavipes Paykullii, ex autopsia asseveravit Dom. Schönherr.

3. *D. dentipes*: sub-depressa, thorace æneo, crebre rugoso-punctato, elytris vitta lata media rubro-cuprea, marginibus suturaque viridibus; subitus flavescenti-fericea, pedibus æneis.

Fabr. Eleut. 2. 127. 6. *Payk. fn.* 2. 195. 8.
Panz. fn. 29. f. 5.

Donacia vittata. *Oliv. Ent.* 4. 75. 7. 5. *Pl.* 1.
f. 5. a, b.

Donacia fasciata. *Hoppe Ins. Erl.* 41. f. 3.

Donacia aquatica. *Thunb. Act. Ups.* 5. 119.
56. var. 1.

Leptura aquatica. *Linn. syst.* 2. 637. 1. a. *Fn.*
Sv. 677. a.

Lept. aquatica fasciata. *De Géer Ins.* 5. 142. 2.

Lept. fasciata. *Marsh. Ent. Br.* 1. 344. 9.

Var. b, obscurior, thorace fusco-virescente,
elytris viridibus, vitta media rufescente
obsoleta.

Habitat in floribus Calthæ, Carlicum, aliisque,
locis humidis, sat frequens.

Descr. Magnitudo & fere statura D. crassipes,
sed paullo magis convexa. Caput majusculum,
porrectum, cum collo elevato fusco-æneum, opacum,
subtiliter pallido-pubescentem, fronte canaliculata,
oculis semi-globosis brunnneis. Antennæ nigræ,
artic.

articulo primo sub æneo pubescens, cæterum ut in prioribus constructæ. Thorax sub-quadratus, vel latitudine penullo longior, anterius nonnihil latior, basi apiceque truncatus. angulis omnibus lateraliter prominuis; supra parum convexus, aut æneus nitidus, aut rubro-æneus vel cupreus, crebre transversim rugulosus & punctatus. in medio dorsi canalicula brevi exaratus; tuberculum anguli antici oblongum, saepe obsoletum. Scutellum triangulate fusco-æneum, dense pallido pubescens. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris valde elevatis, rectangulis; thorace quintuplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso truncata, supra parum convexa, paullo ante medium, juxta futuram, foveola obsoleta, saepe aureo-micante, impressa, in medio longitudinaliter purpureo-cuprea, lateribus & sutura viridi-sericeis; basis inter caelum humeralem & futuram crebre vase punctata, cæterum sat regulariter punctato-striata; intersticiis subtiliter transversim strigosis vel coriaceis. Corpus totum subitus virescens æneum, velleto denso griseo-savescens, sericeo-mieante, rectum. Pedes ænei, flavescenti pubescentes, posticii multo longiores, femoribus modice incrassatis, verius apicem subitus dente unico, in masculis crasso, valido, in feminis minori, armatis.

Var. b, colore obscuriori tantum differt; thorax aut. fusco virescens, aut sub-violaceus; elytra cœruleo-virescentia, vitta media parum rufescens, obsoleta.

4. D. Sagittariæ: sub-depressa, supra viridis-sericea, subitus flavescenti-autro pubescens, thorace sub-quadrato rugoso-punctato, elytris lacunosis; subtiliter punctato-striatis, basi parum vase punctatis.

Fabr. Eleut. 2. 128. 8. *Latr. Gen. Inf.* 3. 46.

¶ *Payk. fn.* 2. 192. 5. *Oliv. Ent.* 4. 75. 6.

4. *Pl. 1. f. 4. a-c.* *Panz. fn.* 29. t. 7.

Donacia aurea. *Hoppe Inf. Erl.* 43. f. 5.

Donacia aquatica. *Thunb. Act. Ups.* 5. 118. 56. a.

Var. b, supra obscurius viridis, thorace cœrulecente. *Iilig. Mag.* 3. 179. 8.

Donacia collaris. *Panz. fn.* 29. f. 8.

Habitat in plantis aquaticis passim, minus frequens.

Deser. Præcedentibus psullo major, præsertim longior. Caput & collum viridia vel viridiæne, creberrime punctata, fronte profunde canaliculata; oculi globosi brunnei, Antennæ nigræ, structura ut in prioribus, articulo primo virescente. Thorax subquadratus, antice parum latior, basi apiceque truncatus, angulis omnibus sub-prominulis; supra depresso, in medio obsoleto canaliculatus. viridiæneus vel orichalceus, sericeo-micans, confertissime rugoso-punctatus; tuberculum anguli antici obsoletum, parum elevatum. Scutellum triangulare viride opacum pubescens. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris valde elevatis, rectangularis, thorace sextuplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso truncata; supra perparum convexa, inæqualia, foveolis plurimis impressa; una nempe communis pone scutellum; in medio dorsi quatuor, in quadrangulum positiæ, duæ scilicet in singulo elytro; in medio disci alia oblonga & juxta callum humeralem interius iterum alia, arcuata; tota flavo-virescentia vel orichalcea, sericeo-micantia, parum profunde punctato-striata, striis interioribus ad basin usque sat regulatis, punctis in lacuna humerali tantum vagis, in ordi-

ordinatis, crebrioribus; interstitia striarum confertissime subtiliter strigosa vel coriacea. Corpus subtus virescentiæ æneum, totum vellere denso flavo-aureo nitente omnino testum. Pedes mediocres viridi ænei, flavo-pubescentes, femoribus clavatis, posticis minus elongatis, subtus versus apicem dente parvo armatis.

Var. b, colore obscuriori tantum differt; caput & thorax coeruleo-virescentie; elytra saturatius viridia, vix orichalceo-micantia; cætera ut in a.

5. D. Lemnæ: sub-depressa, supra fusco-ænea, sub nitida, subtus cinereo-holo-sericea, thorace sub-quadrato, rugoso-punctato; elytris lacunosis, basi parum vase punctatis, vitta intra-marginali purpurea, femoribus posticis obsolete dentatis.

Fabr. Eleut. 2. 128. 10.

Donacia limbata. Panz. fn. 29. f. 12.

Var. b, elytris præterea macula purpurea in basi interiori singuli Elytri.

Donacia vittata. Panz. fn. 29. f. 11.

Donacia marginata. Hoppe Ins. Erl. 42. f. 4.

Leptura vittata. Marsh. Ent. Br. 1. 345. 10.

Var. c, elytris unicoloribus, absque vittis purpureis.

Habitat in plantis aquaticis Scaniæ, Halandiæ, rarius.

Descr. Magnitudo, statura & summa affinitas præcedentis, colore obscuriori, signaturis elytrorum & femoribus posticis obsoletissime tantum dentatis, distinx.

distincta. Caput & collum fulco-ænes, opaca, crebre obsoleta punctata, tenui pubescantia, fronte sulco profundo exarata; ocelli globosi brunnei. Antennæ nigræ, articulo primo fusco-æneo, pubescente. Thorax quoad structuram ut in præcedenti omnino, supra sub-depressus, fusco-æneus, subnitidus, obsolete canaliculatus, confertissime rugoso-punctatus. Scutellum triangulare fusco-æneum pubescens. Elytrom forma, impressiones, striæ & punctura omnino ut apud præcedentem descripta, sed color multo obsoerior, fusco-æneus, parum nitidus; intra marginem lateralem utrinque vitta rubro-purpurea, e callo humerali exiens, apicem elytri fere attingens. jam latior & pulchre colorata, jam angustior, dilatior & magis obsoleta. Corpus totum subtilis vellere dense cinereo, holosericao micante, interdum cinereo-flavescente tectum. Pedes longisculi, validi, nigro-sahvirescentes, cinereo pubescentes, femoribus clavatis, posterioribus versus apicem dente minuto, saepe obsoeto, notatis.

In var. b, præter vittam intra-marginalem purpuream, in medio baseos cuiusvis elytri macula oblonga ejusdem coloris, quasi initium vittæ interioris, sed mox abbreviatum. E Germania Specimen hujus varietatis obtinui, coloribus magis nitidum, pedibus æneis, & vellere corporis flavescente; cæterum vero ne punctulo diversum.

Var. c, elytra gerit concolora, absque rudimento vittæ purpureæ.

6. D. obscura: sub-depressa, supra fusco-ænea, sub-opaca, subtilis flavescenti-aureo-pubescentia, thorace sub-quadrato, rugoso-punctato, elytris lacunosis, basi crebre vage punctatis, femoribus posticis valide dentatis. Habi-

Habitat in plantis aquaticis paßim.

Descr. Magnitudo, statura, formatio partium, & impressiones elytrorum omnino ut in duobus proxime præcedentibus, sed tota valde obscure, unicolor. elytrorum basis fere tota crebre vage punctata, & femora postica dente valido armata, unde distincta species mihi videtur. Caput cum collo obscure fuscō æneum, opacum, crebre subtilissime & obsolete punctulatum, dense griseo-pubescentia, fronte profunde canaliculata; oculi semi-globosi brunnei. Antennæ ut in prioribus constructæ, nigrae, articulo primo fusco-æneo pubescente. Thoracis structura ut in proxime præcedentibus omnino, supra sub-depressus, fuscō-subæneus, parum nitidus, creberrime rugoso-punctatus, in medio obsolete canaliculatus. Scutellum triangulare fusco-æneum, dense cinereo-pubescentia. Elytrorum forma & impressiones ut in D. Sagittariæ omnino, sed basis fere tota, præsertim versus callum humeralem, crebre vage punctata, ceterum simili modo ac in prioribus punctato-striata, interstitiis subtilissime strigoso-coriaceis; tota obscure fusco ænea, opaca. Corpus totum subtus velle re denso flavescenti-holosericeo testum. Pedes longiusculi fusco ænei, femoribus clavatis, magis nitidis, posticis subtus dente valido acuto armatis.

7. D. impressa: supra sub-depressa, fuscō-ænea nitida, subtus flavescenti-sericea, thorace sub-quadrato punctatissimo, elytris regulariter punctato-striatis, dorso quadrifoveolatis, femoribus posticis obsolete dentatis.

Poyk. fn. 2. 193. 6.

*Leptura aquatica ænea. De Geer Ins. 5.
143. 21.*

Var. b, corpore supra aut fusco-æneo, aut obscure virescente. Payk. l. c. var. b.

Var. c, Thorace elytrisque rubro-cupreis.

Habitat in plantis aquaticis frequens; var. c, tamen rarius occurrit.

Descr. Proxime præcedenti simillima & valde affinis, sed duplo minor & ultra; color paginæ superioris multo magis nitidus; puncta vix ulla vaga in basi elytrorum, & femora postica plerumque obsoletissime tantum dentata. Caput & collum fusco-ænea, opaca, subtilissime crebre punctulata, tenui griseo-pubescentia profunde canaliculata; oculi semi-globosi brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigræ, articulo primo fusco-æneo. Thorax quadratus, vel latitudine fere brevior, supra parum convexus, fusco-æneus, nitidus, confertissime punctatus, in medio obsoleto canaliculatus. Scutellum fusco-virescens, obsoleto punctulatum, dense cinereo-pubescent. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, supra parum convexa, fusco-ænea, nitida, regulariter punctato-striata, intersticiis subtilissime transversim strigosis; iuxta callum humerale puncta pauca vaga, sed nulla in reliquis intersticiis; in medio dorsi soveolæ quatuor obsoletæ, in quadrangulum positæ, ut in prioribus. Corpus totum subtiliter vellere denso cinero-flavescente, nitido tectum. Pedes elongati ænei, femoribus nitidis, sutilissime punctulatis, posticis plerumque dentè minuto, obsoleto, interdum vero evidenter armatis.

Var. b, colore paginæ superioris obscuriori differt, sicut obscurius fusco-æneo, aut fusco-virescente.

In var. c, thorax & elytra rubro-cuprea, interdum rubro-ænea, cæterum prioribus simillima-

S. D. sericea: convexa, supra metallica, varicolor, suotus tenuius sericea, thorace ob-

Jongo sub-lævi, elytris crenato-striatis,
interstiliis transversim rugosis, femoribus
crassis, posticis valide unidentatis.

Illig. Mag. 3. 179. 4.

a. Supra aut cœrulea, aut cœruleo-violacea, aut rubro violacea.

*Leptura sericea Linn. syst. 2. 638. 8. Fn. Sv.
683.*

Donacia Nymphaeæ. Payk. fn. 2. 195. 9. var. b.

*Donacia crassipes. Oliv. Ent. 4. 75. 4. t. Pl.
t. f. t. var. c.*

Donacia Festucæ. Panz. fn. 29. f. 2?

*Donacia discolor. Panz. fn. 29. f. 3. mas.
Crit. Rev. 1. 99.*

Leptura Festucæ. Marsh. Ent. Br. 1. 346. 13.

Var. b, Supra nigro-cœrulescens vel nigro-
subviolacea.

Donacia Festucæ. Fabr. Eleut. 2. 127. 4.

Var. c, supra viridi-cœrulescens.

Leptura sericea. Fabr. Eleut. 2. 365. 64.

Var. d, supra virescenti-aenea.

Donacia micans. Panz. fn. 29. f. 9.

Donacia ænea. Hoppe Ins. Erl. 44 f. 6.

Donacia crassipes. Oliv. Ent. loc. cit. a.

Donacia Nymphaeæ Payk. loc. cit. mas.

Var. e, supra cupreo- vel aureo- ænea,
splendida.

Int. Svec. T. I. P. III. Tt Dona-

- Donacia discolor* Panz. fn. 29. f. 4. *femina*.
Donacia Splendens. Dom. Anderjh. in litteris.
Leptura ænea. Marsh. Ent. Br. 1. 346. 12.
Donacia armata. Payk. fn. 2. 194. 7. *var. b.*
Var. f. supra rubra cuprea.
Donacia Nympheæ. Fabr. Eleut. 2. 128. 7.
Payk. l. c. femina. Panz. fn. 29. f. 6.
Donacia crassipes. Oliv. l. c. *var. b.*
Leptura Nympheæ. Marsh. Ent. Br. 1. 347. 15.
Var. g, *Supra obscure ænea, elytris nitidioribus*.
Donacia armata. Payk. fn. 2. 94. 7. a.

In omni varietate præterea color antennarum & pedum variat: in aliis antennæ nigrae, basi parum æneo-micantes, & tum pedes aut cœruleo-violacei, aut ænei vel virescentes, immaculati, secundum colorem paginae superioris; in aliis antennarum articuli plurimi basi ferruginei, & in his tibiarum basis, tarsi & interdum femorum basis plus minusve ejusdem coloris; vix vero discrepantiæ istæ lexum indicant.

Habitat in plantis aquaticis frequens; a & b, parcus occurunt.

Descr. Media in hoc genere; mas plerumque minor, angustior, magis linearis. Caput cum collo in a, obscure cœruleo-violaceum, confertissime subtiliter punctulatum, tenui griseo-pubescenti, fronte cana.

canaliculata; oculi semi-globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, maris paulo longiores & tenuiores. articulis inferioribus in utroque sexu cœrulecentibus, reliquis aut totis nigris, aut basi ferrugineis. Thorax latitudine longior, anterius paulo lator, basi apiceque truncatus, lateribus in medio impressus, supra sub-depressus, totus cœruleus vel violaceus, parum nitidus, canalicula longitudinali exaratus, disco plerumque laevis, interdum vero plus minusve obsolete & tenue rugulosus; tuberculum intra angulum anticum sat elevatum, oblongum, oblique positum. Scutellum triangulare, obscure cœruleum, dense cinereo-pubescentis. Elytra thoracis basi duplo latoria, humeris valde elevatis, fere rectangulis, thorace quadruplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso obtuse rotundata, angulo futurali recto; supra convexa, sub æqualia, foveola tantum unica obsoleta ante medium versus futuram impressa, aut cœrulea, aut cœrulecenti-violacea, aut rufescenti-violacea, nitida, regulariter punctato-striata, intersticiis rugis elevatis majoribus transversis, minus crebris, notatis, unde striæ quasi crenatæ apparent. Corpus subtus cœruleo-vel violaceo-virescens, antice inspectum pubetenui, minus densa, cinereo-micante, obductum, a posteriori vero visum, fere nudum videtur. Pedes longiusculi, validi, cœrulei vel violacei, femoribus omnibus crassis, clavatis, posticis parum longioribus, subtus versus apicem dente magno valido, acuto, armatis.

Varietates recensitæ colore paginæ superioris præcipue differunt, secundum diagnosin cuivis datum; color pedum plerumque colori paginæ superioris similis; tomentum paginæ inferioris interdum magis flavicans, imprimis in var. f, & ex hac varietate rarius occurruat specimina antepnis pedibusque ferrugineo-variegatis; var. g. reliquis obscurior, fu-

ænea (Gallice „couleur de Bronze“), nitida tamen, præsertim in elytris nulla præterea essentiali nota a reliquis distincta.

9. *D. violacea*: convexa, supra cœruleo-violacea, subtus tenue sericea, thorace oblongo sub-lævi, elytris punctato-striatis interstitiis lævibus, femoribus clavatis, posticis valide unidentatis.

Fabr. Eleut. 2. 127. 5. *Hoppe Inj. Erl.* 44. f.
7? *Illig. Mag.* 3. 179. 5.

Donacia Festucæ. *Panz. fn.* 29. f. 2?

Habitat in plantis aquaticis rarius.

Descr. *Don. Sericea*, a; ut ovum ovo simillima, nec punctulo diversa, præterquam quod interstitia striarum in elytris non transversimi rugosa, modo sub oculo acute armato subtilissime strigoso-coriacea; vix ideo, me judice, ut species distincta considerari queat.

Obs. Incertum omnino num *D. Hoppe & Panz.* 1. c. hanc, vel var. a, præcedentis intellexerint, dum interstitiarum qualitatem non meminerint.

10. *D. discolor*: metallica, antennarum basi, ano pedibusque rufis, thorace latiori, subtilissime punctulato, elytris crenato-striatis, spicè rotundatis, femoribus crassis, posticis valide unidentatis.

Mas: Supra nigro-violaceus.

Femina: Supra virescenti-ænea.

Hoppe

Hoppe Inj. Erl. 45. f. 8, 9.

Donacia nigra. Payk. fn 2. 196. 10. Oliv.

Ent 4. 75. 5. 3. Pl. I. f. 3. a, b. mas; ♂
D. rufipes. ibid. n:o 2. Pl. I. f. 2. a, b,
 femina.

Leptura discolor. Marsh. Ent. Br. I. 346. 14.

♂ *Lept. fusca* ibid. 349. 20. var. obscura
 maris forte.

Donacia simplex. Thunb. Act. Ups. S. 1:8. 55.

Var. b, nigra, ano, antennarum articulis
 exterioribus tibiisque rufis.

Habitat in floribus Calthæ, Ranunculorum,
 aliisque, locis humidis, frequens; var. b,
 rarius occurrit.

Descr. D. Sericea paullo brevior, sed latior,
 præsertim in thorace. Caput & collum maris nigro-
 violacea, sub-opaca, creberrime subtiliter punctulata,
 fronte profunde canaliculata, ore toto rufo; oculi
 globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram
 ut in prioribus, articulo primo & secundo rufis,
 reliquis aut totis nigris, aut basi rufis; apice nigris,
 aut fere totis rufis, apice parum infuscatis, & hoc
 in utroque sexu. Thorax latitudine antica non lon-
 gior, anterius multo latior, basi apiceque truncatus,
 lateribus obliquis, non impressis; supra parum con-
 vexus, nigro-violaceus sub-nitidus, creberrime subtil-
 liter punctulatus, in medio obsolete canaliculatus,
 interdum foveolis duabus paribus in doto poste:io-
 ri impressus; tuberculum anguli antici-valde obsole-
 tum. Scutellum triangulare nigrum opacum, tenui-
 pubescens. Elytra thoracis basi dimidio latiora, hu-
 meris minus elevatis, sub-rotundatis, thorace vix

quadruplo longiora, apice rotundata, supra modice convexa, æqualia, dilutius violacea sub nitida, regulariter sed minus profunde crenato striata, interstitiis subtilissime coriaceo strigosis. Corpus subtus cœruleo virescens, pube tenui cinerea sericeo-micante obductum, segmentis ultimis ventralibus lâete rufis. Pedes longisculi, validi, toti pallide rufescentes, femoribus omnibus crassis clavatis, posticis parum longioribus, subtus dente crasso valido acuto armatis.

Femina dimidio major & ultra, supra virescens, ænea, magis nitida, elytrorum interstitiis evidenter strigoso-coriaceis; femora minus crassa; cæterum simillima.

Var. b, fere tota nigra, parum nitida; antennarum articulus primus totus niger, reliqui basi rufi; os, tibiarum basis & anus rufo-ferruginea; cætera ut in a omnia.

Obs. Donscia nigra Fabr. Eleut. 2. 128 .9. D. palustris Panz. Fn, 29. f. 10. D. abdominalis Oliv. Ent. 4. 75. 9. 8. huic quoad staturam & colores similis, sed fere triplo major, thorax longior, elytrorum interstitia evidenter transversim rugosa, &c; sed hæc apud nos non occurrit, quantum mihi innotuit.

Sect. 2. Femoribus inermibus.

ii. D. Menyanthidis: elongata, sub-depressa, supra viridi-ænea nitida, subtus argenteo-sericea, antennis extrorsum pedibusque rufo-ferrugineis, elytris crenato-striatis, interstitiis transversim rugosis.

Fabr. Eleut. 2. 129. 14.

Donacia clavipes, Oliv. Ent. 4. 75. 8. 6. Pl. 1.
f. 6.

f. 6 a, b. Panz. fn. 29. f. 13. Crit. Rev.
1. 99. Fabr. Ent. Syft. 2. 117. 7.

Donacia simplex. Payk. fn. 2. 189. 2.

Leptura aquatica mutica. De Gér. Ins. 5. 142.
19.

Leptura simplex. Marsh. Ent. Br. I. 348. 19.

Habitat in plantis aquaticis, præsertim Iride Pseudacoro, in fluviis & lacubus paſſim.

Descr. Reliquis nostris major, longior; fere dimidio minor femina, cæterum simillimus. Caput & collum fulco-virescenti-ænea, crebre subtilissime punctulata, tenue pubescentia, fronte profunde canaliculata; oculi globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, basi fulco-piceæ, extrofsum rufescentes. Thorax latitudine fere longior, antice laevis, basi apiceque truncatus, lateribus in medio sat profunde impressus, supra subdepressus, viridi-æneus nitidus, obsolete canaliculatus, utrinque bis foveolatus, in disco sub-lævis, versus apicem & basin crebre subtiliter strigosus. Scutellum triangulare nigrum depresso, dense cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere duplo laetiora, humeris elevatis rectangulis, & illo fere sextuplo longiora, apice obtuse rotundata, fere truncata, supra parum convexa, viridi-ænea nitida, saepè aureo-ænea, sat profunde crenato striata, interstitiis crebre & valide transversim rugosis. Corpus totum subtilis vellere denso margaritaceo vel argenteo-sericeo nitido omnino tectum. Pedes elongati rufo-ferruginei, tenue sericeo pubescentes, femoribus parum incrassatis, posticis multo longioribus arcuatiss., basi attenuatis.

12. D. simplex: brevior, sub-convexa, supra virelcentiænea, subtus cinereo-sericea, pedibus fusco-ferrugineis, thorace punctatissimo, elytris crenato-striatis, dorso rubro-cupreis, interstiliis transversim rugosis.

Fabr. Eleat. 2. 129. 13. *Illig. Mag.* 3. 180. 13.

Donacia semi-cuprea. *Panz. fn.* 29. f. 14.

Crit Rev. 1. 99.

Leptura melanocephala. *Marsh. Ent. Br.* 1.
348. 18.

Habitat in plantis aquaticis passim, minus frequens.

Deser. Parva, D. setacea plerumque minor, praesertim mas, qui duplo fere minor femina. Caput & collum fusco-ænea sub-opaca, crebre subtiliter punctulata, dense cinereo-pubescentia, canalicula frontali saepius interrupta; oculi semi-globosi brunnei. Antennæ quoad structaram ut in prioribus, nigro-fuscæ, articulis saepe basi ferrugineis; interdum etiam apex totus testaceus. Thorax latitudine paullo longior, antice latior, basi apiceque truncatus, lateribus in medio impressus, supra parum convexus, virescentiæneus, interdum cupro-micans, sub-nitidus, obsolete canaliculatus, confertissime punctatus, tuberculo anguli antici obsoleto. Scutellum triangulare fuscum, dense cinereo-pubescentia. Elytra thoracis basi fere duplo latiora, humeris elevatis, thorace vix quintuplo longiora, apice obtuse rotundata, sub-truncata, supra modice convexa, æqualia, lateribus viridi-ænea, nitida, dorso communi cupreo, colore plus minusve vivo; sat regulariter & profunde crenato-striata, interstiliis evidenter transversim rugosis. Corpus sub-

tus æneo-micans, vellere denso cinereo-argenteo nitido tectum. Pedes elongati obscure ferruginei, pubescentes, femoribus clavatis, versus apicem fulco-æneis, posticis longioribus arcuatissimis.

13 D. linearis: elongata, sub-depressa, supra obscure virgescenti-ænea, subtus argento-sericea, antennis pedibusque ferrugineo-variegatis, thorace quadrato punctatissimo, elytrorum interstitiis subtilissime strigosis.

Hoppe Ins. Erl. 46. f. 10.

Leptura linearis. Marsh. Ent. Br. 1. 347. 16.

Donacia simplex. Oliv. Ent. 4. 75. II. II. Pl. 2. f. II. a, b. Panz. fn. 29. f. 15. Crit. Rev. 1. 99. Illig. Mag. 3. 180. 13.

Donacia clavipes. Fabr. Eleut. 2. 128. II?

Var. b, Elytris vitta suturali purpurea vel rubro-cuprea.

Var. c, Thorace elytrisque totis rubro-cupreis.

Habitat in plantis aquaticis passim, minus frequens, Var. c, raro occurrit.

Descr. Statura elongata, sub-depressa D. Meny: anthidis, sed semper minor, & inter se magnitudine vaide varians. Caput & collum fulco-ænea opaca, confertissime subtiliter punctulata, tenue pubescentia, fronte canaliculata; oculi globosi nigro-brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigrae, articulis basi plus minusve ferrugineis, Thorax sub-

quadratus, vel latitudine antica non longior, antice latior, basi apiceque truncatus, lateribus parum inaequalis, supra sub-depressus, obscure virescenti æneus, parum nitidas, obsoletissime canaliculatus, creberrime punctatus; tuberculum anguli antici oblongum, oblique positum. Scutellum triangulare nigrofuscum, dense cinereo-pubescent. Elytra thoracis basi dimidio latiora, humeris elevatis, & illo sextuplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso truncata, supra sub-depressa, præsertim in dorso antico, tota fusco virescenti ænea, parum nitida, versus latera plerumque magis sericeo-micantia, regulariter & sat profunde punctato-striata, punctis rotundatis simplicibus, interstitiis crebre subtilissime transversim strigosis; in medio dorsi foveolæ quatuor impressæ, in quadrangulum positæ, saepe obsoletissimæ. Corpus totum subitus veliere denso argenteo-sericeo, nitido tectum. Pedes longiusculi, tenues, postici reliquis multo longiores; femora omnia ænea nitida, basi testacea; tibiæ tenues arcuatæ, fusco-testaceæ, tarsis obscurioribus.

Var. b, simillima, sed in singulo elytro, juxta suturam vitta lata, apicem non attingens, aut purpurea, aut rufo-cuprea, interdum colore atro-cœruleo inducta.

In var. c, thorax & elytra tota rufo-cuprea & femora etiam cupro-micantia, cæterum simillima.

Obs. Descriptio D. clavipedis in Fabr. Ent. Syst. 2. 117. 7. exacte D. Menyanthidi Fabr. Eleut. convenit; quænam vero D. clavipes ejus Syst. Eleut. 2. 128. II. descriptione deficiente dijudicari non potest. D. clavipes Payk. Fn. 2. 190. 3, certe D. bigens femina, ut antea dictum.

14. D. Hydrochæridis; latior, depressa, obscure fusco-ænea, opaca, tenue cinereo-pubescent, thorace quadrato, vix punctulato, elytris subtiliter punctato-striatis, intersticiis subtilissime coriacis.

Fabr. Eleut. 2. 129. 15.

Donacia Hydrocharis. Oliv. *Ent.* 4. 75. 12. 13.
Pl. 2. f. 13. a, b. *Payk. fn.* 2. 189. 1.
Panz. fn. 29. f. 17.

Leptura Hydrocharis. Marjh. *Ent. Br.* 1. 347.
17.

Donacia terjata. Panz. *fn.* 29. f. 16.

Donacia cinerea. Herbſt. *Archiv.* 5. 109. 6.
Hoppe Inf. EYL. 46. f. 11.

Habitat in *Typha*, aliisque plantis aquaticis, minus frequens.

Descr. D. Menyanthidis minor, præsertim multo brevior; mas duplo minor femina. Caput & collum fulca, opaca, vix æneo-tincta, crebre subtilissime punctulata, pube densa brevissima depressa cinerea obducta, fronte canalicula, saepè interrupta, impressa; oculi globosi nigro brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigræ, articulis, præsertim exterioribus saepè basi ferrugineis. Thorax subquadratus, vel latitudine paullo brevior, antice parum latior, basi apiceque truncatus, lateribus in medio impressus, supra fere planus, fusco-subæneus, opacus, vix visibiliter punctulatus, pube densa depressa cinerea tectus, obsoletissime canaliculatus, tuberculata anguli antici magno elevato rotundato. Scutellum triangulare fuscum, dense cinereo-pubescent. Elytra thoracis

thoracis basi fere duplo latiora, humeris modice elevatis, thorace vix quintuplo longiora, apice subtruncata, supra dorso antico depressa, tota fusco-subænea, opaca, subtiliter ordinate punctato-striata, interstitiis subtilissime coriaceis; pube tenui depresso cinerea undique obducta. Corpus totum subtus pube densa cinereo-argentea nitida testum. Pedes longisculi pubescentes, femoribus clavatis, externe fuscæ æneis, basi testaceis; tibiæ angulatæ tarsiisque fuscæ-testacei.

Obs. Dom. Prof. Fallén specimen Donaciæ communicavit, in Scovia captum, D. Hydrochæridis finmillium, sed totum supra pube flavescenti testum; tuberculatum anguli antici thoracis obsoletum, & pedes toti testacei, femoribus tantum ante apicem non-nihil infusatis; forte hæc species distincta, sed secundum individuum unicum, minus bene conservatum, pro certo determinare non audeo.

15. D. Fennica; latior, sub-convexa, supra rufo-testacea, subtus argenteo-fericæa, thorace subtilissime rugoso, elytris profunde punctato-striatis, apice rotundatis, muticis.

Rhagium Fennicum. Payk. fn. 3. 70. 5.

Habitat in Finlandia rarius, Dom. Pfeiff.

Descr. Statura & fere magnitudo præcedentis. Caput & collum nigra opaca, crebre subtilissime punctata, pube densa cinerea depresso obducta, fronte tenuo canaliculata; oculi globosi nigro brunnei. Antennæ quoad structuram ut in prioribus, nigro-fuscæ, pubescentes, articulis basi ferrugineis. Thorax latitu-

latitudine parum longior, anterius latior, basi apice-que truncatus, lateribus parum inæqualis, supra modice convexus, dorso & lateribus rufus, sub-nitidus, glaber, crebre subtiliter transversim rugosus, in medio postico obsolete canaliculatus, tuberculo anguli antici oblongo, minus elevato. Scutellum triangula-
re nigro-piceum, derse cinereo-pubescentes. Elytra thoracis basi duplo latiora, humeris valde prominu-
lis, thorace vix quintuplo longiora, apice obtuse ro-
tundata, mutica, supra modice convexa, dorso obso-
letissime quadri-foveolata, tota dilutius rufo-testacea
nitida glabra, regulariter & profunde punctato-stria-
ta interstitiis lœvibus. Corpus totum subtus vellere
denso cinereo-argenteo nitido tectum, segmentorum
ventralium marginibus rufo-testaceis. Pedes longiu-
sculi fusco-testacei pubescentes, femoribus clavatis,
superne infuscatis.

16. D. Zosteræ: angustior, convexa, thora-
ce nigro-bilineato pedibusque flavo-te-
staceis, elytris pallidioribus apice spinosis,
stictis nigro-punctatis, per paria approxi-
matis.

Fabr. Eleent. 2. 127. 3.

Rhagium muticum. Payk. fn. 3. 69. 4.

Var. b, duplo minor.

Donacia Equiseti. Fallén Obs. Ent. i. p. 16.

Habitat in Finlandiæ aquosis rarius; var. b;
in Scaniæ, Bahusia maritimis; ad Insulam
Afskerö Bahusia in Ruppiæ aliisque plan-
tis marinis, & mox aqua crescente in ip-
sis undis circumvagantes & sese copu-
lantes, semel vidimus.

Descr. D. dentipede paullo minor, angustior
& multo convexior, Caput porrectum nigro-fuscum,
vellere

vellere denso cinereo-sericeo tectum, ore deflexo elongato, vertice profunde canaliculato; oculi parvi semi-globosi brunnei. Antennæ corpore parum breviores, nigro fuscæ, articulis inferioribus apice annulo angusto cinereo albido cinctis. Thorax antice paulò latior, basi apiceque truncatus, angulis sub-prominulis, supra modice convexus, in medio longitudinaliter canaliculatus, totus flavo-testaceus, opacus, omnium subtilissime coriaceus; in utroque latere dorsi linea obliqua, jam nigra, jam dilutius fuscæ, sepe etiam obsoleta, rix observanda, præsertim in masculis; semper abbreviata, margines nullibi tangens. Scutellum oblongo-triangulare angustum nigrum, cinereo-pubescentia. Elytra antice thoracis basi dimidio latiora, humeris rotundatis, & illo quintuplo longiora, apicem versus attenuata, apice ipso emarginata, angulo exteriori in spinam elongatam acutam producto, interiori obtuso, parum prominulo; supra convexa pallida glabra nitida, punctatostriata, striis per paria approximatæ, punctis striarum crebris coarctatæ, omnibus nigro-fuscis, unde elytra nigro-lineata & interstitia alterna latiora magis elevata, lineas flavas formant. Pectus & abdominis basis fuscæ, vellere denso cinereo-flavescente, sericeonitente, tecta, ano testaceo. Pedes valde elongati, tenues, flavo-testacei, femoribus sub-clavatis, tibiis posticis flexuosis.

Var. b, in omnibus simillima, modo duplo minor & ultra.

Obs. Donacia Equileti Fabr. Eleat. 2. 127: 2. D. appendiculata, Panz. Fa. 24. f. 17. D. mucronata, Hoppe Inf. Erl. 47. f. 12. hujus varietas, teste Dom. Illig. in Mag. 3. 178. 2; sed si picturæ Panzeri & Hoppii naturæ siveies, striæ elytrorum non per paria approximatæ, unde dubium oritur, nam tales apud nos non vidi.

Finis Partis Tertiae.

A D D E N D A ;
ad Partem Primam.

Pag. 6. *Panmodius.*

2. *P. elevatus.* var. b, immatura forte, corpore toto saturate ferrugineo, in Gotlandia a Dom. *Odhner* lecta, & a Dom. *Schönherr* communicata.

Pag. 39. *Aphodius.*

36. *A. Sus:* varietatem paullo obscuriorem, maculis fuscis elytrorum magis dilatatis & confluentibus, in Gotlandia a Dom. *Odhner* captam, communicavit Dom. *Schönherr*.

Pag. 44. *Copris.*

- 1-2. *C. Taurus:* Femina: ovata nigra subpubescens, clypeo thoraceque nigro-æneis, elytrorum limbo obscure ferrugineo, clypeo rotundato integerrimo, lineis duabus transversis elevatis.

Var. b, linea anteriori clypei valde obsoleta:
Fabr. Eleut. I. 45. 69. *Ilig. Col. Ber.* I. 44.
8. *Creutz. Ent. Vers.* I. 72. 25.

Habitat in Gotlandiæ stercoratis, Dom. *Odhner*, qui plures feminas, nullum vero marem ibi detexit.

Descr. Statura C. nuchicornis, sed plerumque paullo major. Capitis clypeus sub-orbiculatus, margine antico integerrimo, reflexo, supra sub-depressus, niger, virescenti-æneo micans, crebre, at obsoletius

foletius coriaceo-punctatus; in vertice carinula transversa elevior, utrinque abbreviata, saepe in medio depresso, sub-emarginata; & ante illam in medio clypei alia, minus elevata, sed longior, margines fere attingens. Antennae breves, ferrugineæ, clava fusca. Thorax magnus, elytris fere latior, antice late & profunde emarginatus, angulis prominentibus obtusis, lateribus rotundato dilatatus, postice in medio nonnihil productus, angulum obtusum formans; supra valde convexus, niger, virescens-aeneo-micans, parce pubescens, concinne punctatus; antice in medio impresso retusus, quæ excavatio, a disco superiori elevata, carinula transversa, obtusa, abbreviata, in medio humiliori, distinguitur; in medio disci rudimentum obsoletissimum canaliculæ longitudinalis, & ab utroque latere foveola oblonga; cui extus adjacet tuberculum elevatum. Elytra brevia, antice thoracis medio angustiora, ante medium dilatata; apice singulatim obtuse rotundata, supra depressa, tenue striata, interstitiis parce punctulatis; nigro-picea opaca, pubescentia, limbo exteriori dilutius fusco-ferrugineo. Corpus subtus nigrum, virescens-micans, nitidum, pubescens, pectore crebrus, ventre parce punctulatis. Pedes breviusculi, validi, nigri, femoribus latis, compressis, nitidis; tibialis anticis externe 4-dentatis.

Var. b, in omnibus simillima, sed carinula anterior clypei valde obsoleta, vix observanda.

Obs. Utrum C. capra auctorum a C. Taurō vere distincta, dijudicare nequeo; feminam vero jam descriptam ad C. Taurum verum pertinere, ex accuratestima determinatione Dom. Creutzeri; Loc. cit. indubium mihi videtur;

Pag. 71. AESALUS.

Palpi quatuor inaequales, filiformes. Mandibula brevis, cornea, arcuata, acuta, feminæ dente parvo, interno, maris supra versus apicem dente vel cornu magno eretto, obtuso, armata. Maxilla brevissima, cornea, apice compresa, rotundata, hirsuta, ab que laciniis, juxta apicem palpigera. Ligula vix ulla. Labium breve, cornuum truncatum integrum. Antennæ breves, articulo primo magno, arcuato; penultimis duobus latis, interne acuminate-productis, ultimo ovato. Corpus breviter ovatum, convexum. Tibiae latæ, compressæ, externe denticulis plurimis serratae.

- i. *Æ. Scarabæoides*: fuscocastaneus, obscurus; confertissime punctatus, elytris lineis elevatis interruptis, e quavis erectis piliformibus nicticantibus formatis.

Fabr. Eleent. 2. 254. i. Latr. Gen. Ins. 2. 133. 1.

Lucanus Scarabæoides. Panz. fn. 26. f. 15. 16.

Habitat in ligno putrido *Quercus*, ad Stromsrum Smolandiæ, non procul ab Urbe Carlskrona, in Julio, mense 1812, a Dom. Ribbing & Mæcklin copiose lectus.

Descr. Statura brevis, convexa & fere facies Byrrhi, B. pillula paullo minor. Caput sub rotundatum, fuscocastaneum, parum nitidum, confertissime punctatum, oculis lateralibus nigris nitidis. Antennæ thorace multo breviores, dilutius ferrugineæ, articulo primo maximo, valde arcuato, tertiam Ins. Svec. T. I. P. III. Ju partem

partem totius lanternæ effidente; secundò brevissimo, sed sequentibus crassiori, perfoliato; 3-8 minutis, valde coarctatis, exterioribus gradatim paullo crassioribus; 9, 10 magnis, latis, sed brevibus, interne acuminato-productis; ultimo etiam magno, rotundato compresso. Thorax antice multo angustior, ibique late & profundè emarginatus, angulis productis, acuminatis, lateribus sub-rotundatus, marginatus, basi bi-sinuatus, lobò medio magis producto. obtuse rotundato, angulis lateribus sub-rectis; supra valde convexus, pulvinatus, fusco-castaneus, parum nitidus, confertissime concinne punctatus, squamulis densis piliformibus, vel pilis rigidis erectis, brevissimis fuscis obductus, quales etiam in fronte observantur. Scutellum ovatum fusco-castaneum, crebre punctatum, squamułosum. Elytra antice latitudine baseos thoracis, sed mox pone basin valde dilatata, dein pone medium iterum coarctata, apice obtuse rotundata, ariam tegentia, thorace quadruplo longiora, supra valde convexa, fusco-castanea, confertissime punctata, punctis hic illis sub-seriatim, omnibus umbilicatis vel sub-ocellatis; in singulo elytro series tres aut quatuor, inæqualiter interruptæ, fasciculorum e squamulis erectis fuscis piliformibus brevissimis. Corpus subtus fusco-castaneum, paullo magis nitidum, crebre rugoso-punctatum. Pedes breves validi, femoribus compressis, punctatis, pilis parvis cinereis depresso-adspersis, tibiis angulatis, externe dilatatis, spinulis plurimis inæqualibus, apicis majori, armatis.

Pag. 91. *Hister.*

21. *H. virescens*:

Habitat etiam in Scania, rarissime. Dom.
Wetterhall.

Obs.

Obs. H. metallico statura & magnitudine similis, magis tamen viridis, & ab illo distinctus, thoracis superficie tota punctulata, et si in disco parcius & subtilius; fronte convexa, crebre punctulata, absque rugis transversis; tibiæ antice etiam magis dilatatae videntur, dentibus pluribus & minoribus armatae; elytrorum apex fere totus punctatus; ut & discus ad basin fere, a stria secunda ad quinquaginta, et si parcius.

Pag. 100. *Sphæridium*.

i. S. Scarabæoides:

Var. c, Elytris apicè immaculatis, macula humerali saturate rufa;

Habitat prope Holmiam. Mus. Dom. Schönherr:

Var. c, cum præcedentibus omni punto conveniens, modo elytrorum apex disco concolor, absque macula pallida seu rufescente; simillima S. marginato, sed major, & margo thoracis disco concolor.

Pág. 136. G E O R I S S U S. Latreille:

Palpi breves, sub-æquales; extrosum crassiores; maxilares paulo longiores, articulo ultimo ovoato; eodeni labium sub-globoso. Mandibulæ validæ cornicæ, basi latiores, extrosum arcuato angustatæ, apice obtuso, sub-emarginato. Maxillæ breves, crustaceæ, sub-redigæ, processu terminali trigono, appendice membranacea, denticulo interno instruta, stipulis lateret interno timido oblongo, vix leviter angustato. Uva genitrix sicca omnibus

bria membranacea aucto *Labium sub-crustaceum*, tuncato trigonum, basi latius, apice utrinque coarctato; *Ligula membranacea*, transversa, ad basin labii inserta. Antennæ thorace breviores, articulis novem, tribus ultimis clavam sub-orbitulatam, ferme sub-solidam aut obsoletissime perfoliatam formantibus. Corpus breve; sub-globosum; Caput valde inflexum & sub thorace penitus abscondendum. Latreille.

Obs. Generi *Macronycho* Mylleri, in Illig. Mag. 5. p. 207, proximum; attamen in multis distinctum.

1. *G. pygmæus*: sub-globosus niger, fronte rugulosa, thorace inæquali antice angustiori, elytris profunde punctato-striatis, humeris prominulis.

Latreille Gen. Ins. 4. add. p. 377.

Pimelia pygmæa. Fabr. Eleut. i. 133. 31. Payk. fn. 3. add. 440. i. Illig. Mag. i. 338. 31. Schönh. synon. i. 136. 52.

Trox dubius. Panz. fn. 62. f. 5. Crit. Rev. i. 28.

Var. b, elytris posterius fusco-ferrugineis.

Habitat ad ripas & littora aquarum, in Uplandia, Scania, Hallandia, Blekingia, &c. passim; plerumque luto & granulis arenaceis adglutinatis tectus, ut ægre investigatur.

Descr. Parvus, brevis, rotundatus, Sphæridio atomario sere minor, eique facie quodammodo similis.

lis. Caput parvum sub triangulare, valde retractum & sub thorace inflexum, nigrum opacum fronte inaequali subtiliter ruguloso-coriacea; oculi parvi laterales oblongi prominuli brunnei. Antennæ capite parum longiores, fulcæ, articulo primo crassio, oblongo; secundo æque crassio, sed brevi sub globoso; 3-6 angustioribus; 7-9 iterum crassis, compressis, coarctatis, clavam ovatam formantibus. Thorax anterius multo angustior, apice rotundatus, margine sub-elevato vel reflexo; lateribus pone medium dilatatus, basi sub-bisinuatus, supra in disco posteriori convexus, pulvinatus, fere lœvis, ante medium transversim impressus, ante impressionem, ut & versus latera posterius rugulosus, inaequalis totus niger, parum nitidus. Scutellum vix ullum. Elytra ante thorace multo latiora, humeris elevatis, rectangularis, thorace vix triplo longiora, apicem versus attenuata, supra valde convexa, posterius declivia, tota nigra, magis nitida, punctis magnis, profundis, seriatim digestis, striata, intersticiis subtilissime coriacis. Alæ amplæ, albo-hyalinæ. Corpus subfuscum, opacum, obsoletius punctatum. Pedes longisculi nigri, tibiis anticis brevibus, arcuatis, posterioribus elongatis, rectis, sub-linearibus; tarsi 5-articulati videntur, primo parvo, angusto; secundo reliquis majori, ob-conico; 3, 4 etiam ob-conicis, secundo gradatim paullo minoribus; unguiculari longiori, arcuato.

Var. b, differt tantum elytro singulo versus apicem plaga majori vel minori obscure rufescente notato, futura tamen semper nigra.

Pag. 175. *Cryptophagus.*

12-13. C. elongatus: angustus niger opacus, dense cinereo-pubescent, antennis pedibusque fusco-piceis, thorace oblongo sub-

depresso postice angustiori, elytris obsolete rugulosis.

Habitat in Gotlandia, sub lapidibus, rarissime, Dom. Wetterhall. In Smolandia ad Strömsrum. Dom. Marklin.

Descr. Cr. Caricis, Inf. Sy. 2. add. p. IV. N:o 12, vix brevior, sed multo angustior, magisque depresso. Caput magnum, porrectum, sub triangulare, nigrum, parum convexum, crebre sed obsolete ruguloso punctulatum, cinereo-pubescentis, oculis lateribus globosis nigris. Antennae vix capite cum thorace longiores, crassiusculæ, fusco-piceæ, pubescentes, articulis tribus ultimis crassioribus. Thorax latitudine longior, antice truncatus, lateribus ante medium nonnihil dilatato-rotundatus, subtiliter crenulatus, posterius angustatus, basi obtuse rotundatus, supra subdepressus, totus niger, cinereo-pubescentis, crebre sed obsoletissime rugoso-punctatus. Scutellum breve transversum, truncatum nigrum pubescens. Elytra thoracis basi paullo latiora & illo fere triplo longiora, spicata rotundata, supra parump convexa, nigra, opaca, crebre & evidentius rugoso-punctata, pilis rigidis depresso-cinereis, fere seriatim dispositis adspersa. Corpus subitus nigrum, magis nitidum, crebre subtilissime punctulatum, tenuissime pubescens, ano piceo. Pedes breviusculi, validi, fusco-picei, pubescentes, tarsis crassiusculis 5-articulatis.

Pag. 179. *Cryptophagus*.

16-17. C. plicatus: oblongus rufo-castaneus nitidus, capite exerto, rotundato, thorace postice depresso, elytris basi plicatis.

Habitat

Habitat in Smolandiae Parœcia Säby, a Dom.
Wetterhall rarissime lectus.

Descr. Parvus, Cr. atro fere angustior, sed longior. Caput exsertum, rotundatum, thorace parum angustius, supra saturate castaneum nitidum, fronte depressa, subtiliter punctata; os inflexum, dilutius testaceum. Antennæ capite cum thorace paullo longiores, crassæ, testacea, articulis tribus ultimis majoribus. Thorax quadrangulus, longitudine latior, basi truncatus, angulis fere rectis, supra in disco antico convexus, pulvinatus, lateribus & postice depresso, saturate castaneus, nitidus, crebre subtiliter punctulatus. Scutellum minutum. vix observandum. Elytra thorace parum latiora, sed illo plus triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra valde convexa, dilutius rufo testacea, nitida, sat crebre vase punctata; in ipso humero tuberculum vel carinula elevata, & intra illam foveola parva impresa, unde elytra quasi plicata apparent. Corpus subtus dilutius rufo castaneum, nitidum. Pedes longituscui, tenues, rufo-testacei.

Obs. Ab hoc genere differt: Capite majori, exerto, scutelloque minuto, vix transverso; Scutellæ quodammodo similis, prælertim elytris basi pli-
catis; sed palpi breves hujus generis videptur.

Pag. 236. *Nitidula*.

25-26. N. Olivacea: fusco-testacea, pubescens, crebre punctulata, capite, scutello, elytrorum sutura apiceque fusca, antenarum clava nigra, thorace magno, transverso, antice vix emarginato.

Habitat in floribus Scaniæ rarissime. Dom.
Wetterhall.

Descr. Parva, N. Pediculariae æqualis & colore excepto simillima. Caput breve, triangulate, fuscum, dense cinereo-pubescent, fronte plana, creberim punctata; oculi parvi prominuli nigri. Antennæ vix longitudine thoracis, arcuatæ, basi testaceæ, extrosum fuscescentes, clava magna nigricante. Thorax latus, transversus, antice paullò angustior, sub truncatus, vel perparum emarginatus, lateribus anguste marginatus, bsi elytorum latitudine & illis adæquatus, angulis retrosum nonnihil prominulis, supra valde convexus, fuscotestaceus, creberime subtiliter punctulatus, dense cinereo-pubescent. Scutellum majuscum, rotundatum, fuscum, subtilissime punctulatum. Elytra latitudine fere thoracis & illo vix triplo longiora, apice obtuse rotundata, supra modice convexa, testacea, crebre subtiliter punctulata, dense cinereo-pubescentia, satura tota & apice late infuscatis. Corpus subtus fuscotestaceum, sub-læve. Pedes testacei, unguis fuscescens.

Obs. An modo specimen immaturum N. Pediculariae?

Pag. 242. *Nitidula*.

32-33. N. polita: brevis ovata nigra nitida laevissima, antennarum basi pedibusque pilosis, capite laevissimo, elytris truncatis.

Var. b, capite rufescente.

Habitat in Smolandiæ Betula alba, rarissime. Dom. Wetterhall.

Descr. Minuta, N. erythropa minor, Cryptophago globulo æqualis, brevis, utrinque obtusa, convexa, nigra nitida laevissima. Caput cum oculis latitudine fere thoracis, sed breve, convexum, nigrum, nitidum,

nitidum lœve, versus os angustatum; oculi magni laterales nigro-brunnei. Antennæ thorace breviores, tenues, arcuatæ, basi piceæ, extorsum nigræ, articulo primo magno clavato; secundo brevi globoso, crassiusculo; 3-8 minutis coarctatis, clava ob ovata, obtusa, parum incrassata. Thorax brevis, latus, antice in medio rotundatus, versus angulos subemarginatus, lateribus rotundatis deflexis; basi truncatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, niger, nitidus, lœvissimus. Scutellum breve triangulare nigrum nitidum lœve. Elytra latitudine thoracis, & illo vix triplo longiora, apice truicata. a-nun tamen tegentia, supra valde convexa, nigra, nitida, lœvissima, polita. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, tenuè griseo pubescens. Pedes breves, tenues, nigro-picei.

Var. b, simillima, modo caput totum rufo-testaceum, semel in copula cum praecedente capta.

Pag. 265. *Silpha*.

4. *S. tristis*:

Var. b, fusco-testacea, capite, thoracis disco, antennis pedibusque nigro-piceis; immatura, nuper exclusa, certe.

Habitat in Gotllandia. Dom. Odhner.

Pag. 283. A G Y R T E S.

Palpi quatuor: maxillares extorsum paulo crassiores, articulo ultimo ovato; labiales filiformes. *Mandibulæ* exsertæ, validæ, apice valde arcuatæ acutissimæ, edentulæ. *Maxillæ* apice bitidæ, lacinias sub-æqualibus. *Ligula* membranacea, me-

dio late divaricato-emarginata, laciniis angustis, apice obtusis. Labium breve, transversum, coriaceum, sub-quadratum. Antennæ vix thorace longiores, articulis brevibus, penultiinis quatuor paullo crassioribus, perfoliatis, ultimo ovato, Corpus ovatum, convexum. Thorax transversus, anteice angustior. Pedes validi, femoribus compressis, tibij ciliato-spinosis.

I. A. castaneus: glaber, nigro-piceus, ore, antennis, elytris pedibusque castaneis, elytris punctato-striatis, tibialis spinoso-ciliatis.

Frölich Naturf. 28. 18. tab. 1. f. II. *Latr. Gen. Ins.* 2. 26. 1. *Illig. Mag.* 4. 165. 25.

Mycetophagus castaneus. *Fabr. Eleent.* 2. 569. 25.

Payk. fn. 3. 316. 2.

Mycetophagus spinipes. *Panz. fn.* 24. f. 20. *Crit. Rev.* 135.

Habitat apud nos rarissime, Dom. de Paykull. In Westrogothia semel a Dom. Schönherr captus.

Descr. Statura sere Catopis fornicali, sed plurimque paullo major, longior. Caput rotundatum nigro piceum nitidum, glabrum, subtilissime punctulatum, ore rufo-castaneo; oculi parvi semi-globosi brunnei. Antennæ vix longitudine thoracis, crassissimæ, rufo-castaneæ, articulis tribus primis crassioribus, ob conicis; 4-6 parvis, nodosis; 7-10 crassioribus, transversis, truncatis; ultimo ovato, obtuso. Thorax latitudine brevior, anterius angustior, ibique emarginatus, lateribus rotundatus, evidenter marginatus, basi truncatus, supra convexus, nigro-piceus;

piceus, nitidus, glaber, subtiliter punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, basi punctulatum. Elytra thoracis basi patum latiora, sed illo quadruplo longiora, apice rotundata. abdomen tegentia, supra convexa, rufo-castanea, nitida, margine laterali, praesertim posterius obscuriori; regulariter & sat profunde punctato striata, intersticiis levibus. Aliæ longæ albo-hyalinæ. Corpus subitus nigro-piceum, nitidum, glabrum punctatum, anno dilutius rufo-castaneo. Pedes validi, rufo-castanei, femoribus compressis, glabris tibiis dense ciliato-spinosulis, apice crassioribus, tarsis elongatis tenuibus.

Pag. 286. *Scydmænus.*

2.3. S. Wetterhallii: niger nitidus sub-pubescent, palpis, antennis pedibusque fuscotestaceis, thorace antice angustiori, elytris sub-lævibus, antennarum articulis tribus ultimis abrupte majoribus, fuscis.

Habitat in Gotlandia ad Slitö, rarissime, Dom. Wetterhall, cohortis militaris sub-præfectus, vir integer, Entomologus oculatissimus, præmatura morte d. ii. Febr. hujus anni defunctus.

Descr. Sc. hirticollis simillimus & valde affinis, sed thorax fere glaber, & antennarum articuli tres ultimi tantum abrupte majores. Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, ore piceo; oculi pauci, depresso, concolores; palpi antici elongati testacei, articulis duobus baseos tenuibus, tertio magno, elongato, ob conico, apice truncato; quarto minuto, retracto, viꝝ observando. Antennæ longitudine capitum cum thorace, crassiusculæ, obscure testaceæ, articulis

ticulis tribus ultimis abrupte majoribus, fuscis, apicali sub acuminato. Thorax latitudine medii longior, anterius angustior, supra convexus, totus niger, nitidus, sub-laevis, lateribus parum pubescens, versus basin utrinque foveola, interdum duplicita, impressus. Scutellum vix observandum. Elytra oblongo ovata, thorace plus triplo longiora, antice thoracis basi vix latiora, versus medium dilatata, spicè rotundata, supra valde convexa, nigra, nitida, sub laevis, pilis paucis cincereis adspersa; in basi sieguli elytri striolæ vel plicæ duxæ abbreviatæ, impressæ. Corpus subitus nigro piceum, sub-nitidum, obsolete punctulatum. Pedes elongati, femoribus basi tenuibus, testaceis, extorsum valde clavatis, incrassatis, obscure castaneis, tibiis tarsisque tenuibus, pallidius testaceis.

Pag. 230. *Lampyris.*

3. L. hemiptera: nigra obscura, ano pallido, elytris brevissimis, antennis crassis compressis.

Fabr. Eleut. 2. 106. 33. *Oliv. Ent.* 2. 28. 25.
25. *Pl. 3. f. 25. a, b. Geoffr. Ins.* 1. 168. 2.
Müller in Illig. Mag. 4. 175.

Habitat in Gotlandiæ pratis Sylvaticis rariſſime. Dom. *Wetterhall.*

Descr. Parva, L. noctiluca quadruplo minor, nigro-fusca, parum nitida. Caput parvum, pallidius fuscum, sub thoracis clypeo omnino reconditum, oculis parvis globosis lateralibus remotis nigris. Antennæ longitudine vix dimidii corporis, filiformes nigrae, pubescentes, valde crassæ, nonnihil compressæ, articulo primo pallidiori, ob conico, basi tenui; secun-

secundo brevi, angusto; 3-10, crassis, coarctatis, apice truncatis, sub-equalibus; ultimo reliquis duplo longiori, apice rotundato. Thoracis clypeus semi-ovalis, basi latior, sub-emarginatus, angulis retrorsum acuminatis, antice obtuse rotundatus, supra in disco longitudinaliter convexus, intra margines lat profunde impressus, margine elevato, reflexo; totus niger, immaculatus, parum nitidus, subtiliter granulato punctatus; intra marginem utrinque series e punctis paulo majoribus; ante medium baseos foveola impressa obsoleta, cui utrinque adjacet elevatio transversa, nitida. Scutellum magnum triangulare; nigrum, opacum, sub rugosum. Elytra parva, vix thoracis longitudine, apice dehiscentia, rotundata, nigra; opaca, subtiliter coriaceo-rugosa, fusco pubescens. Abdomen elytris triplo aut quadruplo longius, latum, depresso, nigrum, paulo magis nitidum, subtiliter granulafo coriaceum, segmentis duabus ultimis pallidioribus; abdominis latera posterius ferrata, segmentis 3-6 in angulum utrinque productis. Corpus subtus nigrum, opacum, segmentis duobus analibus flavis. Pedes breves, validi, compressi, nigro-fusci, genubus tarsisque pallidius lividis, femoribus tibiisque linea impressa canaliculatis.

Pag. 325. *Dasytes.*

1-2. D. obscurus: elongatus nigro sub-virescens, hirtus, thorace brevi, elytris subtiliter rugoso-punctatis; antennis obtuse serratis; maris elongatis.

Habitat in floribus, prope Holmiam, Dom. Schönherr; in Gotlandia, Dom. Wetterhall; in Westrogothia, ipse; raro tamen obvius.

Descri. Medius quasi inter D. coeruleum & nigrum; priori magnitudine & statura elongata æqualis, etiam antenarum maris structura similis; color ut in posteriori; ab utroque tamen distinctus. Caput maris cum oculis thorace latius, nigrum, obsoletius punctatum, fronte icter oculos fovea lata impressa; uti totum corpus supra pittis longis fuscis hirtam; oculi maximi globosi brunnei. Antennæ nigrae, pubescentes, longitudine dimidii corporis, intus obtuse serratae, articulis triangularibus, 7-10 reliquis multo longioribus, ultimo adhuc longiori, sub-cylindrico. Thorax brevis transversus, antice truncatus, angulis deflexis, lateribus & angulis posticis rotundatus, supra in disco convexus, ante apicem & basin transversim obsolete impressus, in medio nigro sub-virescens; nitidior, parce punctatus; versus margines crebre rugoso-granulatus, obscure niger. Scutellum obtusum nigro virescens, obsolete punctulatum. Elytra antice thoracis medio paulo latiora, humeris elevatis prominulis, & illo sextuplo longiora, pone medium nonnihil dilatata, apice rotundata, supra convexa, nigro sub-virescentia, parum nitida, crebre subtiliter rugoso-punctata, hirta. Pectus nigro-sub-aeneum, magis nitidum, obsolete punctulatum; venter concolor; sub punctatus, pubetenui depresso fusco-testacea vestitus, segmento penultimo late & profunde emarginato. Pedes elongati tenues, femoribus nigro-virescentibus, tibiis tarsisque nigro-piceis.

Femina longitudine maris, sed fere dimidio latior; Antennæ thorace parum longiores, extrorsum etassiores; articulis omnibus obtuse serratis; segmentum penultimum ventrale integrum; non emarginatum; cætera ut in mare.

Pag. 477. *Dytiscus.*

10. II. D. Bogemannii: oblongus niger, ore, antennis, pedibus totis Sternique laciniis testaceis, thorace testaceo fascia media abbreviata nigra, elytris mediocreiter transversim strigosis.

Dytiscus striatus. Gyll. Inf. Sv. i. 470. 10.

var. c.

Habitat in aquis stagnantibus, minus frequens; Monente Nob. Domino C. J. Bogeman, Capitaneo, Entomologo oculatissimo, Insectum hoc ut distinctam speciem considerare, ejusque nomine designare, justum censui.

Descr. Magnitudo & summa affinitas D. striati, sed minus convexus; & posterius minus angustatus; pedes toti & sterni laciniæ testaceæ; elytrorum strigæ, præsertim in femina profundiores; a D. dolabrato, cui etiam valde affinis, differt magnitudine fere duplo majori, corpore posterius minus attenuato, elytrorum striis duabus longitudinalibus sat evidenter, & strigis transversis minus profundis, sub simplicibus, cum in illo freqventer bifidi & ferè anastomozantes &c. Caput sub-depressum, nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, ore toto late, maculisque duabus frontalibus rufo testaceis; palpi testacei, apice parum suscescentes; oculi glaucescentes. Antennæ capite cum thorace paulo longiores, tenues, totæ testaceæ. Thorax brevissimus, transversus, anterius angustior, late emarginatus, angulis prominulis acutis, basi sub-truncatus, supra subdepressus, striolis crebris tenuibus irregularibus exaratus, flavo-testaceus, nitidus, fascia media abbreviata nigra

nigra inæquali notatus. Scutellum triangulare nigro-piceum. Elytra oblongo-ovata, antice thoracis basi parum latiora, in medio nonnihil dilatata, apice rotundata, supra parum convexa, nigro fusca, margine laterali latius, baseos anguste flavescente; superficies tota creberrime transversim strigosa; strigis in mare tenuibus, in semina multo profundioribus, in utroque hic illuc bifidis, non vero ita crebre anastomozantibus ut in D. dolabrato; præterea in singulo elytro striæ duæ longitudinales, irregulariter punctatae, in masculis evidenter, in semina parum conspicuae, propter strigas profundiores. Thorax subitus, pectus & venter nigra, crebre, subtilissime strigulosa, segmentorum posteriorum marginibus ferrugineis; sternum postice bifidum, lacinias divaricatis rotundatis rufo-piceis. Pedes validi, toti testacei, pilosi, tarsis anticis maris dilatatis; feminæ simplicibus.

Pag. 493. *Dytiscus.*

26. D. Sturmii: var. c. omnino ut var. b,
sed pedes picei, tarsis obscurioribus. E
Lapponia, a Dom. Schönherr communicata.

Pag. 500. *Dytiscus.*

32. D. angustior:

Obs. In var. c, e Lapponia, a Dom. Schönherr communicata, striolæ lateralis pallidioris rudimentum obsoletum observatur.

Pag. 529. *Hyphydrus.*

- 13-14. H. nigro-lineatus: oblongo-ova-
tus, subitus niger, supra pallide testaceus,
thora-

thorace macula media rhombea, elytron
rum sutura lineisque quatuor nigris, striis
impressis nullis.

Schônh. synon. 2. 33. 16. Tab. 4. f. 2. a, b.

Habitat in aquis Scaniæ rarissime, Dom.
Fallén; in Oelandia, Dom. Marklin.

Descr. H. lineello facie, colore & fere magnitudine simillimus, macula discoidali thoracis, & de-
cetu striarum impressarum in elytris, satis distinctus. Caput obtuse rotundatum, pallide testaceum, subtilis-
sime; ut vix visibiliter punctulatum, margine summo
verticis nigricante; oculi depresso brunnæ. Anten-
næ vix capite cum thorace longiores, testaceæ, ex-
trorsum fuscescentes; Thorax brevissimus, transver-
sus, anterius paulo angustior, pro capite late emar-
ginatus, postice bi sinuatus, in medio protractus, su-
pra transversim elevato convexus; basi apiceque de-
pressus, pallide testaceus, subtilissime punctulatus,
margine summo antico fuscescente; in medio dorsi
macula parva rhombea nigra, posterius elongata. E-
lytra antice vix thoracis basi latiora, versus medium
dilatata, apice rotundata, supra parum convexa, pal-
lide testacea, creberrime & paulo evidentius quam
thorax vage punctata, sutura tota lineisque quatuor
parallellis, neque basin exacte, nec apicem attingenti-
bus, nigris; extima in medio attenuata, saepe inter-
rupta; extra illas interdum præterea linea quinta,
parva, angusta, nigra. Pectus & abdomen nigra,
sub nitida, subtiliter punctulata. Pedes elongati rufo-
testacei, tarsis obscurioribus.

Pag. 535. *Hyphydrus*.

18-19. H. Marklini: oblongo-ovatus, gla-
ber, niger, antennarum basi, fronte, tho-
racis. Svec. T. I. P. III. X x racis

racis fascia media, pedibusque testaceis, e-
lytris griseis, plaga magna sinuata nigra.

Habitat in Oelandiæ aquis, Dom G. Mar-
klin, Medicinæ studiosus, Inspectorum, præ-
sertim Plezatorum, scrutator eximus; vir
integer, amicus exoptatissimus.

Descr. Magnitudo & fere statura H. 6 pustulati,
vel paulo magis convexus. Caput latum, antice ro-
tundatum, crebre subtiliter punctulatum, fronte late
testacea nitida, limbo toto nigro-piceo; oculi mag-
ni, depresso, brunnei. Antennæ thorace longiores,
crassiusculæ, testaceæ, apice nigro-piceæ. Thorax
brevissimus, transversus, antice in medio truncatus,
angulis antrorsum prominulis, caput ambientibus,
lateribus sub-rotundatus, anguste marginatus, basi
sinuatus, in medio, loco scutellæ, angulariter produ-
ctus, supra in medio transversim convexus, teste-
us nitidus, subtiliter punctulatus, margine antico an-
gustius, baseos late, inæqualiter nigro-piceis. Ely-
tra antice thoracis basi paulo latiora, & pone basin
adhuc magis dilatata, posterius angustata, apice sub-
acuminata, thorace sextuplo longiora & ultra, supra
parum convexa, undique confertissime punctulata,
griseo-testacea, sutura tota nigra, & in singulo ely-
tro plaga magna sinuata, posterius cum sutura con-
nexa, ejusdem coloris; plaga hæc quasi e lineis
confluentibus composita videtur, antice præcipue con-
spicua; in disco anteriori cuiusvis elytri striæ duæ
crebrius punctatæ. quarum interior magis conspicua.
Thorax subtus testaceus; pectus & abdomen nigro-
picea nitida, crebre punctata. Pedes longiusculi te-
stacei, femoribus in medio infuscatis.

Pag. 540. *Hyphydrus.*

25. H.

25. H. Granularis:

Var. b, elytrorum lineis pallidis valde obsoletis, vix observandis.

Habitat in aquis stagnantibus Gotlandiae; paucim. Dom. Wetterhall.

Var. b, paullo minor, angustior quam a; differt praesertim elytris concordibus, vix pallido-lineatis; linea media rudimentum tamen plerumque antice conspicendum; ceterum omni puncto cum a conveniens; ut specie non distinguenda.

Pag. 544 *Hyphydrus*.

29. H. hamulatur: ovatus, thorace testaceo, basi utrinque striola impresso, elytris pallidis, sutura, linea longiori postice hamata, aliaque abbreviata nigris.

Habitat in conservis marinis Gotlandiae ad Slitö. Dom. Wetterhall.

Descr. Minutus, H. gemino aequalis & quoad sculpturam thoracis similis. Caput rotundatum rufopicenum, punctulatum. Antennae ferrugineae, apice obscuriores. Thorax brevissimus, transversus, antice paullo angustior, late & sat profunde emarginatus, angulis productis, acutis, lateribus sub-rectis, tenue marginatis, basi sub truncatus, in medio loco scutellii nonnihil productus, supra modice convexus, pallide testaceus, subtilissime punctulatus, margine iuso baseos anguste infuscato; ab utroque latere baseos ferre in medio inter marginem & centrum dorsale, lineola brevis impressa, introrsum obliqua. Elytra antice thoracis basi parum latiora, ante medium pon-

nihil dilatata, posterius attenuata, thorace quintuplo longiora, supra modice convexa, pallida, subtilissime creberrime punctulata, tenue pubescentia; basis ipsa juxta thoracem non nihil infuscata; sutura tota late nigra, sub-nitida; juxta suturam in singulo elytro linea lata nigra, utrinque abbreviata, postice extrorsum hamulum emittens, & extra illam anterius lineola brevis ejusdem coloris; intra marginem posteriorius lineola fusca obsoleta. Corpus piceum. Pedes tenues testacei;

Addenda ad Partem Secundam.

Pag. 40. *Nebria*.

3. N. Gyllenhalii.

Varietatem elytris rufo-piceis, forte immaturam, e Lapponia, communicavit Dom. Schönherr.

6. N. multipunctata pag. 44.

Varietatem violaceo-virescentem, nitidam, e Lapponia, communicavit Dom. Schönherr.

Pag. 85. *Harpalus*.

6. H. oblongo-punctatus.

Varietatem fere omnino nigram, palpis, tibialis tarsisque nigro-piceis, e Lapponia, communicavit Dom. Schönherr.

Pag. 97. *Harpalus*.

16. *H. rufipes.*

Var. ♂; mares etiam hujus varietatis e Lapponia, communicavit Dom. Schónherr; Pedes, imprimis femora, in hac varietate obscurius rufo-picei.

Pag. 98. *Harpalus.*

16-17. *H. pumicatus*: oblongus nigro-piceus nitidus, antennis pedibusque rufescens, mandibulis productis, thorace ob-ovato, fovea utrinque simplici, elytris punctato-striatis.

Carabus pumicatus. Illig. Col. Bor. I. 186. 62.

Panz. fn. 30. f. 16. Schónh. synon. I. 190. 120.

Carabus tenuis. Marsh. Ent. Br. I. 468. 97.

Habitat in Scania. Dom. Fallén.

Descr. Statura angusta H. oblongi, sed fere duplo major, thorace anterius latiori, foveis baseos angustioribus impunctatis, mandibulis elongatis, &c. abunde distinctus. Caput porrectum nigrum nitidum sub-læve, fronte inter oculos utrinque fovea obliqua impressa; mandibulæ valde elongatae, arcuatæ, rufo-piceæ; Palpi elongati, pallide testacei; oculi prominuli nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, rufo-testaceæ, pubescentes, articulo primo valde elongato. Thorax oblongus, antice multo latior, truncatus, lateribus rotundato-dilatatus, anguste marginatus; posterius valde angustatus, basi sub-emarginatus, angulis prominulis acutis; supra valde convexus, niger, nitidus, lævis, in medio profunde canaliculatus, & intra angulum utrinque fovea oblonga, angusta, profunda, lævi, impressus. Scutellum

parvum, rotundatum, nigro piceum, laxe. Elytra oblongo ovata, antice thoracis basi laticora, & ab illo remota, angulis humerum rotundatis; ultra medium dilatata, apice rotundata, supra modice convexa, nigro picea, saepe dilutius rufo picea nitida, profunde striata & in striis subtiliter punctata, interstitiis planis, laxeibus; intra marginem series, in medio interrupta, e foreolis sub orbiculatis. sub-ocellatis vel umbilicatis, sed in disco puncta majora nulla. Corpus subtus dilutius rufo-piceum nitidum, thorace pectoreque crebre punctatis, ventre sub laxe. Pedes elongati validi, pallide rufo-testacei, tibiis tarsisque ciliatis,

Pag. 114. *Harpalus.*

30. *H. cupreus.*

Var. g, femoribus rufis.

Habitat in Finlandia. Dom. Schönherr.

Var. g, praecedentibus omni puncto simillima, sed femora tota laxe rufo-testacea, tibiis tarsisque fusco piceis; color paginæ superioris variat, aut æneus, aut coerulescens ut in a, d, & e, antea.

Pag. 123. *Harpalus.*

34-35. *H. azureus: cyaneo-virens*, sub-pubescent, subitus piceus, antennis pedibusque rufis, thorace profunde punctato, elytris striatis, punctulatissimis.

Carabus azureus. Fabr. Eleut. 1. 196. 145.

Illig. Mag. 1. 51. 36-7. Schönh. synon 1. 203. 200.

Carabus chlorophanus Panz. fn. 73. f. 3. Crit. Rev. 42.

Habitat in Gotlandia. Dom. Odhner.

Descr. Magnitudo, statura & affinitas H. puncticollis, N:o 25 antea, sed thoracis anguli nullatenus producti, & color longe alias. Caput breve, rotundatum, nigrum, parum cœrulecenti-micans, sat profunde, sed in disco minus crebre punctatum, labro, ore palpisque rufescentibus; oculi parvi laterales prominui nigri. Antenoæ thorace paullo longiores, filiformes rufæ, pubescentes. Thorsæ longitudine latior, antice sub-emarginatus, basi truncatus, lateribus reflexo marginatus, ante medium rotundato-dilatatus, angulis posticis sub-rectis, nullatenus prominulus; supra cœruleo-violaceus, nitidus, tenui pubescens, in disco antico nonnihil convexus, ibique parcus, in limbo omni crebrius profunde punctatus, in medio obsolete canaliculatus, foveolis vero posticis vix ullis. Scutellum parvum triangulare nigrum. Elytra thoracis basi latiora, illoque plus triplo longiora, apice rotundata, supra parum convexa, cœruleo-virescentia sub-opaca, subtilissime pubescentia, tenui, regulariter striata, striis sub-lævibus, interstitiis confertissime punctulatis. Alæ amplæ albo-hyalinæ. Corpus subitus piceum, sub nitidum, parce punctulatum. Pedes breviusculi, validi, toti pallidius rufo-testacei, tibiis tarfisque ciliato-spinosulis.

Obs. Variat colore thoracis elytrorumque obscurius cœruleo-nigricante.

Pag. 123. *Harpalus*.

34-35. H. punctulatus: sub-depressus niger, lævis, elytris subtiliter punctato-striatis, thorace intra angulum posticum carinula elevata utrinque.

Carabus punctulatus. Fabr. Eleut. I. 191. 175.
Illig Col. Bor. I. 175. 46. *Panz. fn.* 30. f.
io. Schall. Att. Hall. I. 318. *Schönh. synon.*
I. 197. 165.

Habitat in Gotlandia passim, Dom. *Wetterhall & Odhner*; in Oelandia, Dom. *Marklin*.

Deser. H. tardo major, longior. H. Cisteloidi æqualis. Caput magnum porrectum nigrum nitidum læve, foveola oblonga inter oculos utrinque impressum, palpis piceis; oculi magni globosi brunnei. Antennæ thorace paullo longiores, basi nigrae, extrosum fuscæ, pubescentes. Thorax longitudine latior, antice parum emarginatus, lateribus nonnihil rotundatus, margiatus, basi truncatus, angulis obtusis, ante scutellum sub-emarginatus, supra sub depresso, totus niger, lævis, lineola longitudinali tenui impressus; juxta angulum posticum utrinque carinula elevata brevis, & intra illam foveola lata, sed non profunda, obsoleta, parce punctata. Scutellum parvum triangulare nigrum læve. Elytra antice latitudine thoracis & illo triplo longiora, in medio nonnihil dilatata, reflexo - marginata, verius apicem sinuato - attenuata, supra sub - depressa, in medio baseos retusa, tota nigra nitida, striis subtilissimis e punctis parvis seriatis notata, interstitiis omnino lævibus; in stria tertia a futura punctata tria majora, remota, & intra marginem series e punctis majusculis, in medio magis distantibus. Alæ amplæ albo - hyalinæ. Corpus subtus atrum, magis nitidum, pectore parce punctato, ventre lævi, seriebus quatuor e punctis majoribus remotis. Pedes mediocres nigri, femoribus validis, tibiis spinoso - ciliatis, tarsis piceis.

57. 58. *H. Bogemannii*: nigro-piceus depresso-subtus dilutior, thorace breviori cordato, elytris obsolete inæqualiter striatis, interstitiis subtilissime strigosis.

Habitat in Smolandia rarissime, Dom. Bogeman; etjam in Finlandia, a Dom. Schönherr communicatus.

Descr. Statura depressa & affinitas *H. liventis*, sed fere duplo minor, thorace breviori, striis elytrorum, &c. ubunde distinctis, *H. picepedi* magnitudine æqualis & similis, sed multo magis depresso-subtus, thoracis structura longe alia &c. Caput oblongum nigrum nitidum lævissimum, fronte antica inter oculos utrinqua impressa; os piceum; palpi rufopicei, medii crassiores & minus elongati quam in *H. picipede*; oculi oblongi prominuli, in mortuo glauci. Antennæ vix longitudine dimidij corporis, basi piceæ, extrosum fuscæ, pubescentes. Thorax cordatus, latitudine apicis vix longior, antice truncatus, lateribus ante medium non nihil dilatatus, basi multo angustior, truncatus, angulis rotundatis; supra parum convexus, niger nitidus, subtilissime transversim strigosus, in medio tenue canaliculatus, intra basin utrinque foveola rotundata sat profunda impressus; margo lateralis, posterius latior, valde elevatus, Scutellum oblongo-triangulare nigrum nitidum sub-læve, quoad maximam partem in interstitio inter thoracem & elytrorum basin situm. Elytra ampla, thoracis basi fere duplo latiora, humeris rotundatis, & illo fere quadruplo longiora, lateribus non dilatata, apice oblique sinuato-truncata, supra depressa, dilutius nigra, minus nitida, obsolete striata, striis vix punctuletis, per paria magis approximatis, unde interstitia alterna, 2, 4, 6, 8, a

sutura paullo latiora. & omnia sub oculo acute armato omnium subtilissime & crenatim transversim strigosa; margo lateralis antice reflexus, posterius latius explanatus, & intra marginem series e foveolis sub-ocellatis vel umbilicatis, remotis. Corpus subtus ditius piceum, nitidum, laxe, uno lato, obtuso, extra elytra parum prominulo. Pedes elongati, tenues, picei, basi diluti^{us} rufescentes.

Pag. 156. *Harpalus.*

63 H. Sex-punctatus: var.

Specimina mortua, equis diutius immersa, colorē nigrum induant, unde difficile distinguenda,

Pag. 162. *Harpalus.*

68-9 H. Wetterhallii: niger nitidus, antennis pedibusque testaceis, elytris depressis basi ferrugineis, thorace transverso antice emarginato, foveis baseos nullis.

Habitat sub lapidibus, in Gotlandia ad Slit-ö, rarius, Dom. *Wetterhall*; in Oelandia Dom. *Marklin*.

Descr. H. Vespertino fere brevior, sed latior depresso. Caput rotundatum nigrum nitidum laxe, foveolis obsoletis in fronte & inter antennas impressum; oculi prominenti brunnei; os pallide testaceum, palpis omnino hujus generis. Antennæ thorace cum capite paullo longiores, filiformes, tenues, totæ pallide testaceæ. Thorax brevis transversas, ab elytris remotas, antice late & sat profunde emarginatus, lateribus & postice rotundatus, supra convexus, tenui canaliculatus. niger nitidus lœvis, margine laterali angusto reflexo ferrugineo, foveis pos-

ticis.

sticis omnino nullis. Scutellum minutum triangulae piceum. Elytra antice vix latitudine thoraco, posterius dilatata, apice oblique truncata, supra depresso, fere plana, regulariter striata, striis tenuibus vix punctatis, interstitiis planis, lœvibus; nigra nitida, basi transversim saturate ferruginea; margo lateralis inflexus, & ipse apex etiam anguste ferrugineus; intia marginem series e foveolis majoribus obsoletis posterius magis coarctatis. Corpus nudus nigro-piceum nitidum lœve. Pedes mediocres validi, toti testacei, tibiis tarsisque nigro-ciliatis.

Pag. 210. *Omalium.*

II. *O. depressum:*

Var. b, elytris fusco-testaceis.

Var. c, Antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, thorace, elytris corporeaque rufo pictis.

*Silpha hemiptera. Illig Schueid. Mag. 5. 597. 5.
Panz. fn. 25. f. 6.*

Habitat var. b, cum precedente in stercore & fungis; var. c, in Smolandiae fungis, Dom. Wetterhall.

Var. b, differt tantum elytris pallidioribus, aut brunneis aut fusco-testaceis.

Var. c, paulo major; caput nigrum; antennæ basi rufo-testaceæ, extrosum suscescentes; thorax lateribus testaceus, disco obscurior; elytra rufo picea, lateribus interdum dilutiora; abdomen piceum; pedes toti rufo testacei; cæterum conformatio partium, punctura & omnia ut in a, quare specie distinguui non possunt.

Pag. 224. *Omalium,*

22-23. O. inflatum: ovatum, valde conve-
xum, rufo-testaceum, nitidum, profundius
crebre punctatum, capite elytrisque piceis.

Var. b, Thorace etiam piceo.

Habitat in Smolandia, Dom. Wetterhall; in
Westrogothia ad Mysseberg, in floribus
Spireæ Ulmariae, aliquoties captum.

Deter. O. pygmæo proximum, sed adhuc bre-
vius, multo magis convexum magisque nitidum,
profundius punctatum, fere glabrum. Caput sub-
triangulare, supra piceum, nitidum, crebre & sat pro-
funde punctatum, inter antennas foveola obsoletissi-
ma utrinque impressum, ore palpisque testaceis; o-
culi laterales sub-globosi nigri. Antennæ thorace
fere longiores, crassiusculæ rufo-ferrugineæ, pilis
longis hirtæ, articulo primo longo, crasso ob-coni-
co; secundo æque crasso, sed brevi, nodoso; tertio
angusto, ob-conico; 4-6. parvis, sub-globosis; 7-
10 multo latioribus, sed brevibus, perfoliatis; ultimo
adhuc crassiori ovato. Thorax brevis transversus,
basi apiceque truncatus, lateribus satis late marginat-
us. in medio rotundato-dilatatus, angulis posticis
sub rectis, supra in disco valde convexus, crebre &
sat profunde punctatus, saturate rufo-testaceus, nitidus,
sub-glaber, vel sub oculo acute armato, pilis
subtilissimis adspersus. Scutellum triangulare rufo-
testaceum lœve. Elytra thorace triplo longiora, anti-
ce ejus medio vix latiora, versus apicem sensim
dilatata, apice truncata, angulis exterioribus rotun-
datis; supra valde convexa, veluti inflata, picea vel
rufo brunnea nitida, uti thorax sub-glabra, crebre
& sat profunde punctata, antice præsertim verius
humerum & marginem lateralem, dilutius rufo-te-
stacea. Abdomen breve, latum, versus anum sub-a-
cumina-

cuminatum, uti totum corpus subtilis pallidius, rufo-testaceum, nitidum, laxe, fere glabrum. Pedes tenuis pallide testacei.

Var. b, differt tantum thorace etiam supra obscuriori, piceo vel rufo-brunneo.

Obs. Ob figuram corporis brevem, ovatam, hac species aptius in sectione priori, juxta Om. assimile collocanda, sed propter summam cum Om. pygmeo affinitatem illi subiungere idoneum censui.

Pag. 224 *Omalium.*

22-23 O. luridum: oblongo-ovatum rufo-piceum, antennis exrrorsum gradatim crassioribus pedibusque testaceis; thorace postice angustiori, elytris confertissime punctatis.

Habitat in Smolandiæ Paroecia Sæby, tempore hiemali in glacie captum, a Dom. Wetterhall; e Finlandia etiam a Dom. Falander missum.

Descr. Magnitudo & fere statura O. pygmæi; sed distinctum, thorace postice angustiori, elytris multo profundius punctatis, corpore glabriori, &c; ab O. inflato differt: corpore longiori, minus convexo, antennarum structura, &c. Caput sub-triangulare brunneum punctatum, inter antennas vix impressum; ore testaceo; oculi laterales sub globosi nigri. Antennæ capite thoraceque longiores, pallide testaceæ, tenui pubescentes, articulo primo valde elongato, apice incrassato, ob-conico; secundo etiam crasso, sed brevi; tertio tenui, longiusculo ob conico; quarto parvo globoso; 5-10 gradatim crassioribus; truncatis; ultimo adhuc crassiori, ovato. Thorax longitudine latior-basi apiceque truncatus, latefibus

ribis tenui marginatus, ante medium rotundato-dilatatus, posterius angustior, angulis sub rectis; supra modice convexus, aequalis, rufo-piceus, parum nitidus, crebre punctatus. Scutellum parvum triangulare piceum lœve. Elytra thorace duplo longiora, antice thoracis basi latiora, posterius non nihil dilatata, apice truncata, angulo exteriori rotundata; supra in dorso sub-depressa, saturans picea, conflitissime & sst profunde punctata, pilis minutissimis griseis parce adpersa. Abdomen pone e systra illarum fere longitudine, latum, marginatum, piceum, lœve, anō sub acuminato testaceo. Corpus subtus pallidius rufo testaceum, nitidum, lœve, Pedes tendes pallide testacei.

Pag. 231. *Omalium.*

28 *O. striatum:*

Var. b, thorace fusco-ferrugineo; elytris pallide testaceis, corpore subtus anōque rufo-testaceis.

Habitat in Scania. Dom. Prof. Fallén.

Var. b, colore pallidiiori tantum differt; caput fusco-piceum; thorax obscure ferrugineus; elytra pallidius testacea; corpus totum subtus & anō supra rufo-testacea; pedes pallidi; cætera ut in a.

Pag. 247. *Tathyporus.*

io-ii. T. bi-punctatus: convexus niger nitidus, pubescens, ore anō, pedibus, elytrorumque macula baseos lunata testacea; antennis crassis nigris, basi apiceque testacea.

Gray. Mitr. 133. 13. Monogr. 5. 4.

Habi-

Habitat in Boletis arboreis Smölandiaæ raffissime, Dom. Wetterhall.

Descr. Minutus, T. pediculario æqualis & affinis, sed differt antennis adhuc crassioribus, medib. nigris, elytrorum macula rufo-testacea, &c. A T. bipustulato, cui etiam similiis, differt magnitudine quadruplo minori, antennis multo crassioribus, &c. Caput breve latum, convexum nigrum nitidam, ore toto palpisque testaceis. Antennæ longitudine thoracis, extrosum valde incrassatae, nigro-piceæ, articulis quatuor baseos, ultimoque sub globoso testaceis. Thorax amplius, attice angustior, sub emarginatus, lateribus vix marginatus, postice multo lator, truncatus, angulis fere rectis; supra valde convexus, niger nitidus, tenuissime pubescens, margine summo baseos testaceo pellucido. Scutellum triangulare nigrum punctulatum. Elytra thoracis postico paullo angustiora, at illo fere duplo longiora, apice truncata, angulis rectis; supra convexa nigra nitida, tenui pubescens, vix punctulata; in singulo versus basin macula transversa lunata rufo testacea, sinu spicem respiciente. Abdomen pone elytra illis brevius, conicum, setis longis undique adspersum, nigrum, ano late testaceo. Corpus subtus nigrum, minus nitidum, subtiliter crebre punctulatum, ventre rufo-piceo. Pedes tenues, toti rufo-testacei.

Pag. 296 *Staphylinus.*

15. S. Stercorarius:

Var. b, antennis totis nigro-piceis.

Grav. Monogr. 155. 130. var.

Habitat in Smolandia Dom. Wetterhall in Westrogothia Dom. Delman.

Obs. Ab a, differt tantum antennarum basi sti-
piti concolore, nec rufo; cætera omnino convenient.

Pag. 364. *Lathrobium*.

1-2. L. rufipenne: nigrum sub-nitidum, ely-
tris saturatius rufis, basi nigris, capite ob-
longo, profunde punctato, ore, antennis
pedibusque testaceis.

Mas: segmento penultimo ventrali tri-e-
marginato.

Femina: segmento eodem rotundato in-
tegro.

Habitat in Smålandia, ad litora lacus Sæ-
byensis, rarius. Dom. Vetterhall.

Descr. Medium quasi inter L. elongatum & fulvi-
penne, utroque tamen paullo minus & distinctum,
præsertim capite longiori, crebrius & multo profun-
dius punctato, elytris saturatius rufis, nitidioribus,
&c. Caput thorace paullo latius, oblongo-quadrangulum,
nigrum, convexum, undique creberrime &
profunde punctatum, ore palpisque testaceis, man-
dibulis piceis; oculi parvi brunnei. Antennæ longi-
tudine fere thoracis, filiformes, rufo-ferrugineæ; in
médio interdum obscuriores, structura ut in L. elon-
gato. Thorax oblongo-quadrangulus, niger, paulo
minus crebre & subtilius quam caput punctatus, li-
nea media longitudinali angusta levissima. Scutel-
lum triangulare nigrum, obsolete punctatum. Ely-
tra thorace paulo latiora & longiora, supra parum
convexa, subtiliter & obsoletius vase punctata, læ-
te rufa, basi vix ad tertiam partem nigra. Abdo-
men pone elytra reliquo corpore paulo brevius,
supra uti totum corpus subtus, nigrum sub-nitidum,
creber-

creberrime subtilissime punctulatum, pubescens, ano supra concolore, segmentis posterioribus ventralibus subtus anguste testaceo-marginatis; segmentum penultimum ventrale matis in medio leviter, versus latera utrinque late emarginatum, non impressum; feminæ rotundatum integrum; ultimum in utroque sexu conicum, stylis duobus longioribus rigidis nigris armatum. Pedes breviusculi validi, pallide rufo-testacei, structura omnino ut in L. elongato.

Pag. 367. *Lathrobium*.

3-4. L. multipunctum: rufo-piceum nitidum, pectore abdomineque nigris, ore, antennis, pedibus anoque testaceis, elytris profunde seriato-punctatis.

Grav. Micr. 52. 2. Monogr. 131. II. var. 2.

Habitat in Gotlandia sub lapidibus, rarissime. Dom. *Wetterhall*.

Descr. Statura omnino L. elongati, sed paullo minus, praesertim angustius, elytrorum punctis magnis, profundis, seriatim digestis, a reliquis nostris distinctum. Caput thorace latius, sub-quadratum, angulis rotundatis, supra convexum, saturate rufo-piceum, nitidum, lateribus crebre, in fronte vero parcus mediocriter punctatum, oculis parvis nigro-brunneis; os & palpi dilutius rufo-testacei, anticorum articulo tertio magno clavato. Antennæ longitudine thoracis, filiformes, rufo-testaceæ, pubescentes, structura ut in L. elongato. Thorax oblongo-quadrangulus, dilutius rufo-brunneus nitidus, sat crebre punctatus, punctis hic illis in series abbreviata, confusas, dispositis; in medio dorsi linea longitudinalis lævis, ut in prioribus. Scutellum tri-

Ins. Svec. T. I. P. III. X y ar-

angulare brunneum, lœve. Elytra thorace latiora, sed parum longiora, posterius dilatata, deflexa, supra patum convexa, rufo-picea vel brunnea, nitida, punctis magnis, profundis, introrsam in series vel strias 6, vel 7, sat regulares dispositis, versus latera vero vagis, adspersa. Abdomen pone elytra reliquo corpore paullo brevius, nigrum, parum nitidum, crebre subtilissime punctulatum, ano rufo-piceo. Caput & thorax subitus testacea; pectus & venter nigra, magis nitida, crebre punctulata, ano late testaceo; segmentum penultimum feminæ obtuse rotundatum, integrum. Pedes breviusculi validi, toti pallide testacei, structura ut in *L. elongato*.

Obs. Marem non vidi.

Pag. 492. *Anthicus.*

3. A. *Antherinus.*

Var. c. tota pallida, capite fusco, thorace rufo-piceo, elytris fascia obliqua apiceque fuscescentibus, prope Holmiam a Dom. Schónh. capta, immatura certe, nuper declarata.

Pag. 509. *Pytho.*

i. *P. depresso.*

Var. f. thoracis lateribus testaceis.

Habitat cum prioribus passim.

Var. f, ut var. e, sed thoracis latera plus minusve testacea; occurrit etiam thorace fere toto testaceo; in aliis etiam abdomen & pedes toti flavo-testacei, ut in varietate a Dom. De Géer memorata; in reliquis femora plerumque nigro-picea.

Pag.

Pag. 561. *Anisotoma*.

5. A. orbiculare.

Var. b. corpore toto pallide testaceo, oculis solum nigris, antennarum clava, capite thoraceque supra saturatius rufo-testaceis.

Habitat in Uplandia. Mus. Dom. Schönh.

Var. b, omni puncto simillima; colore pallido excepto, forte immatura, nuper exclusa.

Pag. 561. *Anisotoma*.

5-6. A. sub-testaceum: sub-globosum testaceum, capite, thoracis disco antennarumque clava 5-articulata nigro-piceis, elytris subtilissime punctato-striatis, intersticiis vase punctulatis.

Habitat in Gotlandia rarissime. Dom. Wetterhall.

Descr. Statura sub-globosa A. orbicularis, sed minutum, A. brunneo vel dentipedi æquale. Capitum mediocre transversum nigro-piceum, subtilissime crebre punctulatum, ore palpisque testaceis; oculi nigro-brunnei, parum prominuli. Antennæ vix longitudine thoracis, basi ferrugineæ, clava magna nigra, 5-articulata, structura ut in prioribus omnino. Thorax brevis transversus, antice late & sat profunde emarginatus, angulis deflexis, lateribus & postice rotundatus, tenui marginatus, supra valde convexus, omnium subtilissime obsolete punctulatus, nigro-piceus nitidus, limbo laterali & postico ferrugineo-pellucidis. Scutellum mediocre, triangulare, testaceum, sublæve. Elytra thorace latiora, hinc meritis

fere rectangulis, & illo triplo longiora, lateribus & postice rotundata, supra valde convexa, tota testacea, immaculata; juxta suturam posterius stria impressa, & in disco series simplices regulares e punctis minutis, quarum interstitia etiam crebre subtilissime punctulata. Corpus subtus ferrugineum, subtiliter punctulatum. Pedes breves, pallide testacei, femoribus simplicibus, parum crassus.

Pag. 566. *Anisotoma*.

9-10. A. multi-striatum: oblongo-ovalis, ferrugineum nitidum, capite thoraceque saturatioribus, subtiliter punctulatis, elytris confertissime striato-punctatis.

Habitat in Svecia. Mus. Dom. Fallén.

Descr. Minimis, A. ferruginei individuis adhuc paullo minus, praesertim angustius, magisque oblongum; quoad puncturam elytrorum cum A. punctulato convenire videtur, sed statura magis oblonga, caput & thorax parcus & multo subtilius punctulata, &c. Caput transversum, convexum, saturate ferrugineum, fere rufo-castaneum, nitidum, subtilissime & minus crebre punctulatum, ore pallidiori; mandibulae validae, arcuatæ, apice fuscescentes; oculi sub-depressi, nigro-brunnei. Antennæ thorace cum capite breviores, crassiusculæ, saturate ferrugineæ, clava ut in prioribus 5-articulata, ultimis tribus magnis nigro-brunneis. Thorax brevis transversus, antice paullo angustior, ibique late sed non profunde emarginatus, lateribus & postice nonnihil rotundatus, tenui marginatus supra convexus, rufo-castaneus nitidus, subtiliter & minus crebre punctulatus. Scutellum breviter triangulare ferrugineum nitidum, subtiliter punctulatum. Elytra thoracis basi vix latiora, sed illo fere quadruplo longiora, posterius attenuata.

tenuata, supra convexa, dilutius rufo-ferruginea, nitida, confertissime seriato-punctata; striæ impressæ vix observandæ, sed puncta in seriebus alternis paulo profundiora & magis approximata, quam in seriebus interstiliarum; versus humerum striæ minus regulares. Corpus subtus dilutius rufo-testaceum nitidum, vix punctulatum, pestore saturatiori. Pedes mediocres pallide testacei, femoribus compressis, tibiis ciliato-spinosis, posticis parum arcuatis.

Pag. 566. *Anisotoma.*

9 10. A. spinipes: oblongo-ovatum, rufo-brunneum, antennarum clava 5-articulata nigricante, elytris punctato-striatis, interstitiis transversim rugosis, femoribus posticis dente valido acuto armatis.

Habitat prope Upsiloniam, Dom. Falander; Mus. Dom. Schönherr; in Westrogothiaæ silva Kinnensi, ipse; rarissime tamen occurrit.

Descr. Minimis A. ferruginei individuis adhuc dimidio minus, præsertim angustius, reliquis hujus generis magis oblongum. Caput deflexum, transversum, saturate brunneum, fere nigrum, nitidum, obsolete punctulatum, ore palpisque ferrugineis, mandibulis piceis; oculi parvi laterales nigri. Antennæ thorace breviores, inferne tenues, testaceæ, clava magna, crassa, 5-articulata nigricante, structura ut in prioribus. Thorax transversus, antice fere truncatus, vix emarginatus, lateribus angulisque posticis rotundatus, tenue marginatus, basi truncatus, supra valde convexus, fere pulvinatus, rufo-brunnens nitidus, sat crebre sed obsolete punctulatus. Scutellum triangulare rufo-piceum, obsolete

Y y 2

Iete punctulatum. Elytra thoracis medio vix latiora, humeris rectangularis, & thorace fere quadruplo longiora, apice rotundata, supra valde convexa, rufobrunnea nitida; juxta suturam stria unica sat profunda, antice abbreviata, & in disco series plurimæ sat regulares e punctis parvis, parum profundis, subobsolete; superficies tota præterea rugulis crebris transversis tenuibus obsita, unde series punctorum ægre observantur. Aliae longæ cinereo-hyalinæ, Caput & thorax subtus testacea; pectus & abdomen fusco-brunnea, obsolete punctulata, tenue pubescens. Pedes crassiusculi rufo testacei, femoribus posticis crassioribus clavatis, versus apicem subtus dente magno valido acuto, anterius sub-arcuato, armatis; tibiae omnes sub-rectæ, pubescentes, vix ciliatæ.

Pag. 570. *Anisotoma*.

13-14. A. ferricorne: sub-globosum rufotestaceum nitidum, elytris vase punctulatis, basi, thoracisque disco antico nigris, antennis inferne testaceis ferratis, clava 5-articulata nigra.

Habitat in ligno putrescente Silvæ Kinnensis Westrogothiæ rarissime, mense Junio captum.

Descr. Statura globosa A. Staphylæi, sed fere dimidio minus, antennarum stipite ferrato, ut & maculis thoracis elytrorumque nigris, a reliquis distinctum. Caput deflexum, sub-rotundatum, rufotestaceum nitidum, vix visibiliter punctulatum, margine lone oculos nigro; oculi mediocres nigricantes. Antennæ longitudine thoracis arcuatæ, inferne testacea. Clavæ articulis 3-6 introrsum producetis, acuminate, clava magna, elongata 5-articulata, nigri-

nigricante, structura fere ut in primis speciebus, articulo septimo tamen introrsum magis producto, acuminato; octavo ejusdem structuræ, sed parvo. Thorax transversus, antice multo angustior, late & profunde emarginatus, lateribus & postice rotundatus, supra valde convexus, pallide testaceus, nitidus, vix visibiliter punctulatus, macula magna nigro-picea ovata transversa, in disco antico. Scutellum triangulare testaceum lœve. Elytra vix thoracis basi latiora, humeris sub-rectangulis, & illo fere triplo longiora, supra valde convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter vase punctulata, basi transversim saturate nigra, nitida. Caput & thorax subtus pallide testacea; pectus & venter rufo-picea, subtiliter punctulata. Pedes pallide testacei, femoribus compressis, parum incrassatis, tibiis tarsisque tenuibus intermisibus.

Pag. 584. *Hypophloeus?*

8. H. brunneus: rufo-brunneus nitidus glaber, capite magno rotundato, thorace ampio, punctato, elytris brevioribus obsolete vase punctulatis.

Habitat in Boleto suberofo Smolandiae, raffissime. Dom. Wetterhall. E. Germania Insectum idem, sub nomine: Lyctus fitmetarius Müller, obtinui.

Descr. Minutus, Lycto Histeroide minor, praesertim angustior. Caput magnum, semi-orbiculatum, convexum, rufo-brunneum nitidum, crebre punctulatum, oculis parvis lateralibus brunneis. Antennæ capite parum longiores tenues, pallide testaceæ, articulis duobus baseos crassioribus, 3-8 parvis, angustis; 9-II iterum crassioribus, compressis. Thorax amplius, antice elytris fere latior, basi illis æqua-

lis, latitudine paullo longior, basi apiceque truncatus, supra convexus, rufo-brunneus nitidus, crebre punctulatus, lateribus & postice tenue marginatus. Scutellum vix ullum. Elytra antice latitudine basaeos thoracis, & illo vix duplo longiora, posterius nonnihil angustata, apice rotundata, supra convexa, rufo-brunnea nitida, vase & præsertim posterius, obsolete punctulata. Corpus subtus rufo-brunneum. Pedes tenues pallidius testacei.

Pag. 596. *Blaps.*

2. B. obtusa: latior, nigra immaculata, thorace breviori crebre punctato, elytris connatis, rugoso-punctatis, apice obtusis.

Fabr. Eleut. 1. 141. 4. *Schönh. synon.* 1. 144. 4.

Blaps mortisaga, femina. Herbst. Col. 8. 184.
tab. 128. *f. 3. Illig. Col. Bor.* 1. 112. 1.

Habitat in Scaniæ suffocatis. Dom. *Fallén*
& *Wetterhall.*

Descr. Bl. motisagæ simillima, & pro ejus femina a pluribus habita, differre tamen videtur, corpore multo latiori, thorace breviori, transverso, cebrius punctato, & elytris rugoso punctatis, apice parum acuminatis. Caput, labrum, oculi ut in priori, sed superficies capitis fortius punctulata. Antennæ paullo breviores & crassiores quam in priori, cæterum articuli simili modo constructi. Thorax transversus, latitudine multo brevior, antice emarginatus, angulis rotundatis, lateribus ante medium rotundato-dilatatus, evidenter marginatus, basi subfinuatus, anguste marginatus, angulis sub-rectis; supra parum convexus, totus niger, crebre, evidenter punctatus, in medio obsolete punctulatus & foveolis obfoletis hinc inde impressus. Scutellum ut in priori,

priori, Elytra antice thoracis basi parum latiora, dein ultra medium dilatata, versus apicem iterum attenuata, apice parum producto, bifido; supra convexa, connata, nigra, crebre evidenter coriaceo-rugulosa & punctulata; latera elytrorum bi-marginata, lobo inferiori lœvi, corporis latera amplectante. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, crebre ruguloso-punctatum. Pedes ut in priori.

Pag. 611. *Mordella.*9. *M. variegata:*

Var. *c*, thorace nigro, macula parva transversa testacea ante medium utrinque, elytris testaceis, marginibus apiceque late fuscis, femoribus posticis infuscatis.

Var. *d*, omnino ut var. *c*, sed elytra nigra, macula humerali oblonga testacea.

Var. *e*, ut var. *d*, sed thorax fere totus niger, et antennæ fuscae, basi apiceque pallidiores.

Habitat in floribus rarius; var. *c*, *d*, in Smolandia, Dom. *Bogeman*; var. *e*, prope Holmiam, Dom. *Schönherr*; in Westrogothia ipse.

Var. *c*, var. *b*, paullo major, *a*, æqualis, sed thorax niger, macula tantum parva, transversa, obsoleta testacea ante medium utrinque; elytra ut in *b*, omnino; femora postica disco infulcata; cætera ut in *a*.

Var. *d*, omnino ut var. *c*, quoad thoracem & femora postica, sed elytra ut in *a*, saturate nigra, macula humerali oblonga testacea, vix medium disci attingente.

Var. e, ut var. d, sed thoracis latera vix pallidiora, & antennæ fuscæ, basi apiceque pallidiores.

Pag. 623. *Cistela*.

2-3. *C. rufipes*: nigro-picea, fusco-pubescentia ore, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, elytris creberrime punctulatis, obsoletissime striatis.

Fabr. Ent. Syst. 2. 19. 12. *Schönh. synon.* 2. 334. 10.

Cistela fusca. *Illig. Schneid. Mag.* 5. 610. 16.
Panz. fn. 25. f. 19. *Crit. Rev.* 1. 90.

Habitat in Blekingia rariissime, a Dom. Schönherr 1810. capta, & in museo ejus aservata.

Descri. Statura omnino & fere color *C. muri-*
pæ var, b, sed plus duplo major, *C. fulvipedi* æqualis. Caput parvum, rotundatum, nigro piceum, subtiliter punctulatum, griseo-pubescentia, oculis lunatis nigris; os rufo-ferrugineum, palporum anticorum articulo ultimo compresso, triangulari, basi dilatato. Antennæ dimidio corpore fere longiores, setaceæ, rufo-ferrugineæ, apice obscuriores. Thorax transversus, antice obtuse rotundatus, fere semi-circularis, basi sinuatus, elytris adæquatus, angulis retrorsum productis, acuminatis; supra parum convexus, niger vel nigro-piceus, omnium subtilissime crebre punctulatus, pube fusco-ferruginea micante obductus. Scutellum parvum triangulare rufo-piceum, pubescentia, punctulatum. Elytra thoracis basi vix latiora, sed illo fere quintuplo longiora, apice sub-acuminata, supra convexa, nigro-picea, confertissime & paulo evidenter quam thorax coriaceo-punctata, pube fusco-

fusco-ferruginea micante obducta, antice & verso^s latera obsoletissime, apicem & futuram versus paulo evidentius striata. Corpus subtus pallidius rufo-piceum, magis nitidum, subtilissime punctulatum & pubescens. Pedes mediocres, dilutius rufo-testacei, pubefcentes.

Pag. 644. *Salpingus.*

5. *S. denticollis*: elongatus fuscus, capite, thorace antennis pedibusque testaceis, elytris basi palescentibus, thorace punctatissimo, postice attenuato, lateribus denticulato.

Habitat in Scania ad Esperöd, rarissime.
Dom. Fallén.

Descr. *S. atro minor*, præsertim angustior, & ejus var. b., colore similis, thorace lateribus denticulato, postice magis angustato, abunde distinctus. Caput oblongum, porrectum, cum oculis thorace fere latius, totum testaceum, glabrum, fronte inæquali, depressa, crebre punctulata, ore producto; oculi prominuli nigri. Antennæ thorace paullo longiores, crassiusculæ, ferrugineæ, structura ut in *S. atro*. Thorax oblongo-cordatus, antice latior, truncatus, lateribus ante medium rotundato-dilatatus, utrinque denticulis 3 s. 4 parvis crenatus, posterius valde attenuatus, totus rufo-testaceus, glaber, supra convexus, creberrime punctulatus, pone medium foveolis duabus obsoletis impressus. Scutellum triangulare fusco-testaceum punctulatum. Elytra thoracis basi duplo latiora, & illo quadruplo longiora, sub-linearia, apice rotundata, supra convexa, crebre, sed minus regulariter punctato-striata, lateribus &

po-

postice fusco-brunnea, antice intorsum oblique pallide testacea. Pectus & abdomen fusco-picea, nitida, subtilissime punctulata. Pedes mediocres, toti pallide testacei, tarsis, ut videtur, hujus generis.

6. S. cursor: oblongus, brunneus, glaber, thorace sub-quadrato, lateribus denticulato, supra sub-inæquali, cæbre punctato, elytris punctato-striatis.

Tenebrio cursor. Linn. syst. 2. 675. 8. Fn. Sv. 818.?

Habitat in ligno sicco Fagi, ad prædium Belteberga Scaniæ rarissime. Dom. Wetterhall.

Descr. S. atro magnitudine & statura similis, sed paullo longior & angustior, thorace sub-quadrato, lateribus denticulato, a reliquis evidenter distinctus. Caput cum oculis vix thorace latius, breve, rufo-brunneum nitidum, fronte inæquali punctata; oculi globosi nigri. Antennæ vix thorace longiores brunneæ, structura omnino ut in præcedentibus. Thorax sub-quadratus, antice tamen paullo latior, truncatus, lateribus parum rotundatus, utrinque denticulis quinque armatus, quarum duæ posteriores parum majores, approximatæ; supra parum convexus, cæbre punctatus, ante basin utrinque obsolete impressus, totus brunneus seu castaneus, sub-nitidus. Scutellum rotundatum fusco-brunneum, subtiliter punctulatum. Elytra thoracis basi latiora & illo quadruplo longiora, sub-linearia, apice rotunda, supra convexa, ante medium transversim impressa,

pressa, sat regulariter & profunde punctatō - striata,
tota brunnea seu dilute castanea, nitida. Corpus sub-
tus brunneum, nitidum, punctulatum. Pedes brevi-
uscui, dilutius ferruginei.

Addenda ad Partem Tertiam.

Pag. 383. Cis.

5. 6 C. mandibularis: castaneus nitidus
glaber, subtilissime punctulatus, antennis
pedibusque pallide testaceis, capite lato
inæquali, mandibulis magnis elongatis.

Habitat sub cortice arborum emortuarum,
in Westrogothia a Dom. Schönheyr et
Marklin captus.

Descr. C. nitido statura & magnitudine simillimus, sed caput multo latius & mandibulæ, præser-
tim maris, magnæ, elongatæ. Caput maris latitu-
dine thoracis, sed breve, postice valde convexum,
totum rufo-castaneum, subtilissime punctulatum, fron-
te fere tota impresso-excavata, margine supra os non-
nihil prominulo, sub emarginato; mandibula sinistra
maris longitudine fere capit is, valida, arcuata, api-
ce bifida, laciniis divaricatis, superiori paullo longi-
ori, adscendente; mandibulæ feminæ capite brevio-
res, parum arcuatæ, apice bifidæ, dente inferiori
longiori. Oculi parvi, globosi, nigri. Antennæ ca-
pite parum longiores, pallide testaceæ, structura ut
in prioribus. Thorax latitudine brevior, antice fere
truncatus, lateribus valde deflexus, rotundatus, ibi,
qui

que & basi anguste marginatus, supra modice convexus, æqualis, totus castaneus nitidus glaber, subtilissime crebre punctulatus. Elytra vix latitudine thoracis, sed illo fere triplo longiora, supra valde convexa, ad suturam nonnihil depressa, tota castanea nitida, crebre & paullo evidentius quam thorax punctulata; juxta suturam stria unica impressa, antice abbreviata. Corpus subtus castaneum, nitidum, glabrum, crebre subtilissime punctulatum. Pedes breves validi pallide testacei.

Pag. 455. *Chrysomela.*

5. C. *staphylæa.*

Var. *b*, tota dilutius rufa.

Habitat in Oelandia, ad littora maris, sub scincis rejectis. Dom. *Marklin.*

Var. *b*, omni puncto simillima, modo color totius corporis dilute rufus, forte ex salcedine fucorum oriundus.

Pag. 504. *Galleruca.*

2. 3. G. *interrupta*: nigra, supra subtilius confertissime rugoso-punctata, thorace lateribus sinuato, limbo fusco-testaceo, elytris griseis, singulo lineis 5 vel 6 elevatis interruptis.

Illig.

Illig. Mag. 1. 423. 13. *Schönh. Synon* 2. 290. 18.

Galleruca rusticæ var. lineis elytorum interrūptis. *Payk. su.* 2. 88. 3.

Galleruca fusca, elytris lineis elevatis interrūptis. *Geoffr. Ins.* 1. 253. 1.

Habitat in Blekingia rariſſime. Dom. Schönherr, qui etiam ſpecimina ſimiſſima e Germania benevolē communicavit.

Deser. G. rusticæ valde ſimiſis & affinis, ſed punctura thoracis & elytrorum multo crebrior & ſubtilior; lineæ elevatæ elytrorum plures, frequenter interrūptæ, &c; ſpecimina a me viſa etiam paulo minora. Caput rotundatum nigrum, confertifſime rugoſo-punctatum, fronte obſolete canaliculata, ore dilatius livido; oculi laterales brunnei. Antennæ longitudine dimidii corporis nigræ, ſtructura omnino ut ad G. Tanaceti deſcriptæ. Thoracis ſtructura etiam omnino ut in G. Tanaceti. ſupra parum convexus, inæqualis, nigro-fuscus, limbo obſcure testaceo, undique confertifſime & ſubtilius rugolo-punctatus. Scutellum rotundatum nigro-piceum, obſoletius punctulatum. Elytrorum forma ut in prioribus omnino, griseo-livida, confertifſime & ſubtilius quam in illis punctata; in ſingulo elytro lineæ ſex elevatæ, obſcuriores, nigro-piceæ, frequenter & inæqualiter interrūptæ, extima tamen ſæpe fere integra; futuræ proxima valde obſoleta, anterius tantum conſpicua; ſecunda, quarta & ſexta a futura interjacentibus elevationes. Corpus ſubtus nigrum, magis nitidum, crebre ſubtiliſſime ſtriguloſo-punctatum, pilis breviſiſmis rigidis depreſſis cinereis adſperſum. Pedes ut in prioribus.

Obſ.

Obs. Clarissimus Dom. de Paykull mihi ad describendum benevole communicavit Insectum singulare, ab Ipso in ligno putrido Abietis Blekingiæ captum, quod forte proprii Generis, Cucujis quodammodo affine; sed Instrumenta ejus cibaria enucleare mihi non contigit, quare determinationem hac vice omittere coactus fui; Dom. Sturm Insectum idem, sub nomine: „Ryssodes exaratus Illigeri, ex America boreali,“ ad Dom. Schönherr misit, forte in Illig. Mag. Tom. 6, descriptum. Ips monilis, Oliv. Ent. 2. 18. 4. 2. Pl. 1. fig. 6. a, b, secundum figuram & descriptionem, nostro affinis videtur, & forte ejusdem Generis.

Finis Partis 3:tiæ.

INDEX.

GENERUM ET SPECIERUM PARTIS III:iiæ

	pag. n:o		APION p. 31
AESALUS. add.	673		<i>Æneocephalum</i> 49 16
Scarabæoides	673	1	<i>æœum</i> 40 8
AGYRTES. add.	681		<i>æthiops</i> 54 22
castaneus	682	1	<i>angustatum</i> 56 24
ALTICA vid. HALTICA.			<i>astragali</i> 44 11
ANISOTOMA add.			<i>aterimum</i> 41 9
multi striatum	708	9-10	<i>atomarium</i> 60 29
orbiculare, var. b.	707	5	<i>brevirostre</i> 52 20
ferricorne	710	13-14	<i>Craccæ</i> 38 6
spinipes	709	9-10	<i>cyaneum</i> 45 12
sub-testaceum	707	5-6	<i>Ebeninum</i> 48 15
ANTHICUS. add.			<i>Ervi</i> 55 23
anterinus var. c.	706	3	<i>flavipes</i> 36 5
ANTRIBUS p. 1.			<i>frumentarium</i> 32 1
albinus	3	2	<i>gibbirostre</i> 52 19
albirostris	4	3	<i>Hydrolopathi</i> 51 18
cinctus	7	6	<i>Loti</i> 60 28
dorsalis	5	4	<i>marchicum</i> 47 14
latirostris	1	1	<i>minimum</i> 59 27
niveirostris	6	5	<i>pallipes</i> 34 3
scabrosus	8	7	<i>pomonæ</i> 39 7
varius	10	8	<i>punctiger</i> 46 13
APATE p. 372.			<i>Sorbi</i> 42 10
Capucina	372	1	<i>superciliosum</i> 58 26
elongatus	374	3	<i>tenuius</i> 57 25
sub striatus	374	2	<i>vernale</i> 33 2
APHODIUS add.	671		<i>viciæ</i> 35 4
<i>Sus</i> , var.	671	36	<i>violaceum</i> 50 17
<i>Ins. Svec. T. I. P. III.</i>			<i>vorax</i> 53 21
			AT-
			Z z

- ATTELABUS** p. 16
Coryli . . . 16 1
Cuculionoides . 18 2
BITOMA p. 412.
crenata . . . 412 1
lunata . . . 414 2
BLAPS add. p. 712
obtusa . . . 712 2
BOSTRICHUS p. 35^t
asperatas . . . 368 13
bidens . . . 357 5
chalcographus 358 6
cinereus . . . 370 5
dispar . . . 363 10
domesticus . . 365 11
fuscus . . . 360 7
Laricis . . . 354 3
lineatus . . . 366 12
micrographus . 362 9
monographus 356 4
oestodentatus .. 353 2
pustulosus . . . 371 16
Tiliæ . . . 369 15
Typegraphus . 35^t 1
villosum . . . 35^t 8
- BRUCHUS** p. 11.
Cisti 13 3
granarius . . . 11 1
Loti 13 2
feminarius . . . 14 4
- CALANDRA** p. 255.
granaria 255 1
- CASSIDA** p. 434.
equestris 435 2
murræa 434 1
nebulosa 442 7
- nobilis* 445 9
obsoleta 444 8
rubiginosa 437 3
sanguinolenta 441 6
thoracica 439 4
vibex 440 5
viridula 447 10
- CERYLON** p. 415.
Histeroides 418 3
Juglandis 416ⁿ 1
picipes 417 2
- CHRYSOMELA** p. 450.
aenea 467 15
affinis 485 28
analis 492 32
armoraciæ 474 21
aucta 494 33
Bulgharenfis 466 14
dispar 482 27
Cochleariæ 47^t 25
collaris 459 9
coriaria 45^t 1
cuprea 464 13
fastuosa 470 17
geminata 477 23
Goettingensis 453 3
graminis 468 16
haemoptera 452 2
lamina 478 24
Lapponica 463 12
limbata 461 11
litura 481 26
Lusitanica 454 4
marginata 491 31
marginella 495 34
polita 456 6
poly-

Polygoni . . .	474	20	COPRIS add.	p. 671
Populi . . .	457	7	Tau'us . . .	671 1-2
Raphani . . .	472	19	CORYNETES p.	375
rufipes . . .	486	29	violaceus . . .	376 1
sanguinolenta .	460	10	COSSONUS p.	256
Sophiæ . . .	475	22	Chloropus . . .	259 3
staphy'aea . ,	455	5	lignarius . . .	258 2
- dito var, add	718	5	linearis . . .	256 1
Tremu'æ . . .	458	8	Lymexylon ,	260 4
varians . . .	471	18	CRYPTOCEPHALUS	
viminalis . . .	487	30		p. 593
vitellinæ . . .	497	35	bilineatus . . .	630 23
CIS p. 377.			cordiger . . .	593 1
alni . . .	386	8	coryli . . .	602 5
bidentatus . . .	383	6	10 punctatus ,	619 15
Boleti , . .	377	1	dispar . . .	614 13
festivus . . .	381	4	flavilabris , ,	623 17
hispidus . . .	380	3	flavipes . . ,	611 11
mandibularis ad-			frontalis . . .	626 20
dit. . .	717	5-6	infignis . . .	622 16
micans . . .	379	2	labiatus . . .	627 21
nitidus . . .	382	5	minutus . . .	629 22
perforatus . .	385	7	Moræi . . .	617 14
CISTELA add.			nitens . . .	608 9
rufipes . . .	714	2-8	nitidulus . . .	618 10
CLYTRA p. 584.			pallifrons . . .	625 19
affinis . . .	592	7	Pini . . .	603 6
cyanea . . .	591	6	punctiger . . .	624 18
longimana . . .	589	4	4-pustulatus .	613 12
4 maculata . .	590	5	sericeus . . .	605 7
4-punctata , . .	585	1	6 punctatus .	599 4
taxicornis . . .	586	2	variabilis . . .	595 2
tridentata . . .	587	3	variegatus . ,	597 3
COLYDIUM p. 403			violaceus . , ,	607 8
elongatum . , ,	403	1		

CRY-

CRYPTOPHAGUS

- add p. 677
elongatus . . 677 12-13
plicatus . . 678 16-17

CURCULIO p. 261

- aeneopunctatus* 314 39
albidus . . 267 5
argentatus . . 324 47
ater . . 291 22
atro apterus . . 290 21
caninus . . 277 13
cervinus . . 332 52
coryli . . 304 32
flavipes . . 271 8
fulvicornis . . 276 12
geminatus . . 302 31
glaucus . . 265 4
hirsutulus . . 307 34
hirticornis . . 287 19
hispidulus . . 284 17
incanus . . 286 18
lævigatus . . 292 23
lepidopterus . . 315 40
Ligustici . . 310 36
limbatus . . 301 30
lineatus . . 279 14
lineellus . . 281 15
mali . . 330 51
maurus . . 293 24
Mercurialis . . 296 26
micans . . 323 49
muricatus . . 321 45
nebulosus . . 264 3
nubilus . . 312 37
oblongus . . 334 53
obscurus . . 297 25

- ovatus* 320 44
palliatus 268 6
parvulus 272 9
picipes 317 42
pilosellus 300 29
Pyri 323 46
raucus 297 27
Rubi , 329 50
rugifrons 319 43
scabriculus 309 35
sericeus 326 48
setosus 298 28
squamulatus 306 33
fulcatus 313 38
fulcirostris 261 1
tenebriçosus 288 20
tibialis 283 16
trisulcatus 263 2
undatus 275 11
viridicollis 273 10
viridis 269 7
Zebra 316 41

DASYTES add. p. 685

- obscurus* 685 1-2

DONACIA p. 646

- bidens* 648 2
crassipes 646 1
dentipes 650 3
discolor 660 10
Fennica 668 15
Hydrochæridis 667 14
impressa 655 7
Lemnæ 653 5
linearis 655 13
Menyanthidis . 662 11

<i>obscura</i>	:	.	654	6	<i>GEORISSUS</i>	add.	p. 675
<i>sagittariæ</i>	:	.	551	4	<i>pygmæus</i>	.	676 1
<i>tericea</i>	:	.	656	8	HALTICA	p. 520	
<i>simplex</i>	:	.	664	12	<i>affinis</i>	.	553 25
<i>violacea</i>	:	.	660	9	<i>anchusæ</i>	.	536 13
<i>Zosteræ</i>	:	.	669	10	<i>aridella</i>	.	575 42
DYTISCUS					<i>atra</i>	-	529 8
<i>angustior</i> var.	.	.	688	32	<i>atricilla</i>	.	540 16
<i>Bogemannii</i>	.	.	687	10 11	<i>Chrysantenii</i>	.	578 44
<i>Sturmii</i> var. c.	.	.	688	26	<i>chrysocephala</i>	.	568 37
ECCOPTOGASTER					<i>cœrulea</i>	.	54 4 4
<i>poligraphus</i>	.	.	349	3	<i>dentipas</i>	.	573 41
<i>pygmæus</i>	.	.	348	2	<i>Duicamaræ</i>	.	505 34
<i>scolytus</i>	.	.	346	1	<i>elongata</i>	.	570 38
EUMOLPUS	p.	582			<i>Euphorbiæ</i>	.	525 5
<i>obscurus</i>	.	.	583	1	<i>exoleta</i>	.	551 4
GALLFRUCA	p.	501			<i>femorata</i>	.	559 30
<i>Alni</i>	.	.	519	15	<i>flexuosa</i>	.	531 10
<i>Calmariensis</i>	.	.	508	6	<i>fuscicornis</i>	.	520 1
<i>Capreæ</i>	.	.	504	3	<i>fuscipes</i>	.	560 31
<i>flavipes</i>	.	.	517	13	<i>Helxines</i>	.	562 33
<i>interrupta</i> add.	.	.	718	2 3	<i>Holsatica</i>	.	534 12
<i>lineola</i>	.	.	512	9	<i>Hyoseyami</i>	.	566 35
<i>Lythri</i>	.	.	513	10	<i>Lepidii</i>	.	527 7
<i>Nymphaeæ</i>	.	.	509	7	<i>lurida</i>	.	537 14
<i>maculata</i>	.	.	516	12	<i>lutescens</i>	.	546 20
<i>rufipes</i>	.	.	518	14	<i>melanocephala</i>	.	545 19
<i>rustica</i>	.	.	503	2	<i>Mercurialis</i>	.	523 3
<i>sagittariæ</i>	.	.	511	8	<i>Modéeri</i>	.	580 40
<i>sanguinea</i>	.	.	505	4	<i>Napi</i>	.	567 36
<i>Tanaceti</i>	.	.	502	1	<i>Nasturtii</i>	.	548 21
<i>tenella</i>	.	.	514	11	<i>nemorum</i>	.	530 9
<i>Viburni</i>	.	.	507	5	<i>nigritula</i>	.	557 28
					<i>nitidula</i>	.	561 32
					<i>obtusata</i>	.	579 45
					<i>occultans</i>	.	572 40

oleracea	.	521	2
parvula	.	525	6
pratensis	.	539	15
pubescens	.	555	27
pusilla	.	549	22
4 pustulata	.	533	11
Rubi	.	581	47
rufipes	.	558	29
falcariæ	.	554	26
semi ænea	.	570	43
spergulæ	.	571	39
tabida	.	542	17
testacea	.	550	23
Verbasci	.	513	18

HARPALUS add.

zureus	.	695	34-5
Eogemanni	.	697	57-8
cupreus var. g.	694	30	
oblongo-punctatus			
var.	.	692	6
pumicatus	.	693	16 17
punctulatus	.	695	34-5
rufipes var c.	,	693	16
6 punctatus var.	698	63	
Wetterhallii	.	698	68-9

HELODES p. 498

Beccabungæ	.	500	2
Phellandrii	.	499	1

HISPA p. 448.

atra	.	449	1
------	---	-----	---

HISTER add. 674

virescens	.	674	21
-----------	---	-----	----

HYLESINUS p.	335	
angustatus	.	343
ater	.	343
crenatus	.	339
Fraxini	.	345
ligniperda	.	335
palliatus	.	340
Piniperda	.	337

HYPHYDRUS add.

granularis var. b.	691	25
hamulatus	.	691
Marklini	.	689
nigro-lineatus	688	13 14

HYPOPHLOEUS add.

brunneus	.	711
----------	---	-----

LAMPYRIS add.

hemiptera	.	684
-----------	---	-----

LATHROBIUM add.

rufipenne	.	704
multipunctum	.	705

LEMA p. 632

asparagi	.	636
brunnea	.	634
cyanella	.	638
12 punctata	.	635
melanopa	.	637
merdigera	.	633
sub spinosa	.	640

LIXUS p. 62.

paraplecticus	.	62
---------------	---	----

- LYCTUS p. 408
 canaliculatus . . 408 1
 contractus . . 410 2
 nitidus . . 411 3
- MORDELLA add.
 variegata, var. c,
 d, e, . . 713 9
- MYCETOPHAGUS p. 387
 atomarius . . 388 2
 bifasciatus . . 395 7
 fulvicollis . . 395 6
 fumatus . . 399 9
 multipunctatus 393 5
 populi . . 392 4
 punctatus . . 398 8
 maculatus . . 387 1
 testaceus . . 400 10
 variabilis . . 390 3
- NEBRIA add.
 Gyllenhalii, var., 692 3
 multipunctata var. 692 6
- NEMOZONA p. 402
 elongatam . . 402 1
- NITIDULA add. 679
 olivacea . . 679 25·6
 polita . . 680 32·3
- OMALIUM add.
 depresso var. b,
 c, 699 11
 inflatum . . 700 22·3
- luridum . . 701 22·3
 striatum var. b, 702 28
- ORSODACHNA p. 642
 Betulæ . . 644 2
 chlorotica . . 642 1
- PHALACHUS p. 427
 æneus . . 431 5
 bicolor . . 431 6
 corruscus . . 427 1
 millefolii . . 429 3
 substriatus . . 428 2
 testaceus . . 432 7
 Ulicis . . . 430 4
- PSAMMODIUS add.
 elevatus var. b, 672 1
- PYTHO add.
 depresso, var. f, 706 1
- RYNCHÆNUS p. 64
 abietis . . . 166 86
 acridulus . . . 75 10
 æthiops . . . 72 8
 affinis . . . 174 92
 alismatis . . . 87 21
 alni 238 140
 anthirrini . . . 207 117
 arcticus . . . 64 1
 artemisiæ . . . 81 15
 arundinis . . . 100 32
 asperifoliarum 221 128
 assimilis . . . 141 63
 atratus . . . 187 102
 atrirostris . . . 92 25

- Beccabungæ* . . 122 49
bifasciatus . . 247 147
bimaculatus . . 74 19
bi-nodulus . . 84 18
bi-notatus . . 165 85
bi-punctatus . . 119 46
borealis . . 115 43
Borraginis . . 227 133
brunnirostris . . 93 26
campanulæ . . 139 55
carbonarius . . 185 101
carpini . . 120 47
castor . . 159 80
cerasi . . 183 99
ceraforum . . 204 115
cochleariae . . 144 66
collinus . . 209 119
colon . . 164 84
comari . . 156 77
contractus . . 143 65
costatus . . 89 22
cylindrus . . 78 13
depressicollis . . 147 68
didymus . . 225 131
dissimilis . . 116 44
dorsalis . . 196 109
druparum . . 191 105
elongatus . . 99 31
epilobii . . 155 72
equiseti . . 91 24
ericæ . . 147 69
erysimi . . 142 64
fagi . . 243 144
fasciculofus . . 107 37
festucæ . . 76 11
floralis . . 145 67
fraxini . . 217 125
fusco-maculatus . . 162 82
Getanii . . 140 62
Germanus . . 163 83
globosus . . 134 58
globulus . . 235 138
graminis . . 210 120
Hercyniæ . . 68 4
hortulanus . . 215 123
Ilicis . . 241 142
inconspectus . . 158 79
indigena . . 71 7
Jota . . 248 148
Lapathi . . 169 88
Lemnæ . . 129 54
leucogaster . . 161 81
Linariæ . . 208 118
litura . . 222 129
lutosus . . 85 19
latulentus . . 86 20
Lythri . . 127 52
majalis . . 177 94
marginatus . . 224 130
miles . . 97 29
marinus . . 105 36
Myriophylli . . 152 73
Nereis . . 77 12
nigrirostris . . 114 42
notatus . . 69 5
nucum . . 201 113
pascuorum . . 124 50
pectoralis . . 178 95
pedestris . . 98 30
pericarpius . . 157 78
phlegmaticus . . 182 98
picrostris . . 121 48
pilosus . . 242 143
Pinastræ . . 168 87
 pi-

pineti . . .	65	2	semi - cylindri-
pini . . .	66	3	cus . . . 180 96
piniphilus . . .	70	6	figvatus . . . 133 57
plantaginis . . .	103	34	signifer . . . 246 140
plantaris . . .	252	152	Sisymbrii . . . 90 23
pollinarius . . .	226	132	Solanii . . . 216 124
Pollux . . .	96	28	squamifer . . . 200 112
Polygoni . . .	109	39	stygius . . . 184 100
pomorum . . .	188	103	sub - fasciatus . . . 253 153
populi . . .	249	149	sub - rufus . . . 149 71
posticus . . .	113	41	sulcicollis . . . 228 134
pruni . . .	82	16	tæniatus . . . 175 93
ptinoides . . .	128	53	T. album . . . 79 14
pubescens . . .	192	106	Thapsus . . . 214 122
pulicarius . . .	251	151	tortrix . . . 173 91
punctatus . . .	108	38	Tremulæ . . . 171 90
quadricornis . . .	154	75	tricolor . . . 126 51
quadri nodosus . . .	155	76	Trifolii . . . 111 40
quadri-tuberculata-			trimaculatus . . . 219 126
tus . . .	153	74	Troglodytes . . . 233 137
Querceti . . .	149	70	Ulmæ . . . 189 104
Quercicola . . .	230	135	variabilis . . . 104 35
Quercus . . .	138	61	varians . . . 193 107
5 punctatus . . .	197	110	venustus . . . 199 111
Rhina . . .	83	17	viciæ . . . 101 33
Rubi . . .	194	108	viduatus . . . 220 127
rubicundus . . .	136	60	villosum . . . 203 114
rugulosus . . .	231	136	viminalis . . . 237 139
Rumicis . . .	94	27	violaceus . . . 181 97
Saliceti . . .	250	150	viscariæ . . . 132 56
Salicis . . .	245	145	vorax . . . 170 89
Salicivorus . . .	200	116	
Scanicus . . .	118	45	RHYNCHITES p. 19.
scortillum . . .	135	59	æqvatus . . . 25 5
Scrophulariæ . . .	212	121	alliarie . . . 26 6
scutellaris . . .	240	141	Bacchus . . . 23 3
			Betulæ . . . 29 9

<i>Betuleti</i>	.	19	1	<i>SILPHA</i> . add.
<i>cypreus</i>	.	24	4	<i>trifinis</i> var. b, 681 4
<i>minutus</i>	.	27	7	
<i>nanus</i>	.	28	8	<i>SILVANUS</i> . 405
<i>Populi</i>	.	21	2	<i>Sexdentatus</i> . 406 2
<i>Rhinomacer</i>	.	30	10	<i>unidentatus</i> 405 1
RHYZOPHAGUS. 420				
<i>depressus</i>	.	422	2	<i>SPHAERIDIUM</i> . add.
<i>dispar</i>	.	424	5	<i>Scarabæoides</i> , var.
<i>ferrugineus</i>	.	420	1	c. . 675 1
<i>parvulus</i>	.	424	4	STAPHYLINUS add.
<i>politus</i>	.	423	3	<i>Stercorarius</i> , var.
SALPINGUS. add.				
<i>cursor</i>	.	716	6	TACHYPORUS add.
<i>denticollis</i>	.	715	5	<i>bipunctatus</i> , 702 10 II
SCYDMOENUS. add.				
<i>Wetterhallii</i>	.	683	2-3	

ERRATA CORRIGENDA.

- Pag. 5 lin. 6 pro: *vistito* . . *lege:* *vestito*,
 . . 12 . . 21 . . *tenue* . . *tenui*
 . . 18 . . 5 . . *oglonga* . . *oblonga*.
 . . 36 . . *ult.* . . 111 . . 14.
 . . 43 . . 24 . . *E.vtris* . . *Elytra*.
 . . 49 . . 3 . . *ualdi* . . *validi*.
 . . 64 . . 4 . . *articus* . . *arcticus*.
 . . 79 . . 3 . . *passis* . . *passim*.
 . . 96 . . 22 . . *gramein* . . *gramine*.
 . . 102 . . 7 . . *griseo puceiens* . . *griseo-pube
scens*.
 . . 126. num. pag. . . 261 . . 126.
 . . 134 . . 7 . . *numeris* . . *humeris*.
 . . 154 . . *penult* . . *visilibus* . . *visibilibus*,
 . . 156 . . 25 . . *albede* . . *albido*.
 . . 107 . . 29 . . . ;
 30 . . . ;
 . . 175 . . 20 . . *oigro* . . *nigro*.
 . . 214 . . 24 . . *cupite* . . *capite*.
 . . 232 . . 29 . . *qvadrangulari* adde *atra*.
 . . 255 . . 26 . . *piceæ* *lege:* *piceæ*.
 . . 287 . . 4 . . *gricea* . . *grisea*,
 . . 288 . . 7 . . *griceis* . . *griseis*.
 . . 297 . . 10 . . , *interstitiis* *deleatur*.
 3, 7, 5 *lege:* 3, 5, 7,
 . . 304 . . 6 . . *squamalorum* . . *squamularum*,
 . . 310 . . 16 . . *maculus* . . *squamulas*.
 . . 311 . . 17 . . *pucescentes* . . *pubescentes*.
 . . 328 . . 1 . . *postice* . . *posticæ*.
 . . 330 . . 2 . . *xix vix-*
 . . 342 . . 5 . . *saturatius* . . *saturatius*.
 . . 349 . . 21 . . *taftaceis* . . *testaceis*.
 . . 374 . . 14 . . *recontendo* . . *recondendo*.
 . . 401. penult. . . *apta* , . . *apte*.
 . . 426 . . 26 . . *observatus* . . *observatur*-
 . . 427 . . 18 . . *convevus* . . *convexus*-
 . . 430 . . 12 . . *bi sinuatis* . . *bi-striatis*.
 . . 440 . . 12 . . *acuminatum* . . *acuminatim*.

- . 448 . , 12 . . 220 . , 226.
• . 480 . . 5 . . Rub. . . Býb.
• . 585 . , 22 . . sito . . situ
• . 494 . . 3 . . marginæ . . margine.
• . 500 . . 16 . . luteis, adde: extrofsum nigro
virescentibus, tibiis arcuatistis
tis luteis, tarfis &c.
• . 517 . . 21 . . pro: fate- . . lege: sat fre-
• . 527 . . 19 . . thoruce . . thorace.
• . 536 . . 11 . . Buphorbiæ . . Euphorbiæ.
• . 551 . . 23·4 . . etjam . . aliam.
• . 564 . . 25 . . minus . . nimis.
• . 579 . . 16 . . multicis . . muticis.
• . 594 . . 11 . . 30 . . 330.
• . 595 . . 28 . . var. a, . var e.
• . 614 . . 25 . . cerbo . . certo.
• . 618 . . 18 . . sed . . sat:
• . 653 . . 9 . . virescertie . . virescentia.
• . 656 . . 32 . . sut . . aut.
• . 658 . . 5 . . rubra cuprea . , rubro-cuprea.
• . 669 . . 31 . . post. undis adue: per millia.
• . 675 . . ult . . stipilis . . stipitis.
• . 697 . . 10 . . ubunde . . abunde,
• . 688 . . 11 . . eqvis . . aqvis.
• . 700 . . 4 . . etaim . . etjam.
-

Erratum in parte r:o emendandum:
Pag. 395. lin. 15, pro: Elytris - lege: Anteapis.





SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00830 6763