

### *Astragalus trigonus* DC.



Lbas

**Synonymes :** *Astragalus franchii* Trotter (1915)  
*Astragalus leucacanthus* Boiss. (1849)  
*Astragalus pseudotrigonus* Batt. & Trab. (1912)  
*Astragalus trigonus* var. *franchii* (Trotter) Maire & Weiller (1939)

**Description :** plante pluriannuelle, pouvant former des buissons petits, denses et très épineux (les rachis des feuilles se transforment en épines). **Tiges** épaisses, de couleur claire, duveteuses. **Feuilles** pennées. **Folioles** larges, d'un vert sombre, ciliées et bordées d'une marge claire. **Fleurs** jaunes, de taille moyenne (moins de 15 millimètres), groupées par 3 à l'aisselle des feuilles. **Calice** hispide (nombreux et longs poils blancs). **Fruits** : gousses fusiformes (5-25 millimètres de long), terminées par un bec plus ou moins épineux.

**Biogéographie :** espèce endémique saharienne.

**Type biomorphologique de Raunkier :** chamaephyte pouvant se comporter en thérophyte.

**Port :** petit buisson pouvant se comporter aussi en plante annuelle.

**Préférences édaphiques :** espèce psammophile et saxicole.

**Préférences hydriques :** espèce xérophile.

**Tolérance aux sels :** non.

**Biotopes :** espèce des ensablements saharo-méditerranéens, plus ou moins limoneux.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** peut fournir abri et éventuellement nourriture.

**Espèce voisine :** *Astragalus gombo* Bunge est une autre endémique saharienne, plus méditerranéenne, caractérisée par de grandes fleurs jaunes (plus de 25 millimètres).

#### Références bibliographiques

Ozenda	302	Quézel & Santa	551	Barry & Celles	231	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--




Jeune individu en floraison et en début de fructification.



Rameau fleuri.



Fleurs.



Rameau portant des fruits.

