

Ziziphus lotus subsp. *saharae* (Batt. & Trab.) Maire



Basionyme : *Ziziphus saharae* Batt. & Trab. (1907)

Lbas

Synonymes : *Ziziphus nummularia* var. *saharae* (Batt. & Trab.) A. Chev.

Description : forme des buissons denses ou des petits arbustes épineux, de moins de 2 mètres de haut. **Feuilles** petites (environ 8 x 15 millimètres), pubescentes sur les deux faces et à bords plus ou moins finement crénelés. **Épines** stipulaires dissemblables : l'une grande, plus ou moins droite et dressée vers le haut, l'autre plus petite et courbée en crochet vers le bas. **Fleurs** groupées par 3 à 4 à l'aisselle des feuilles, de couleur jaunâtre verdâtre. **Fruit** : drupe (environ 1 centimètre de diamètre) à gros noyau, de couleur brun orangé à maturité.

Biogéographie : plante saharo-sindienne, alors que la sous-espèce type est nettement plus méditerranéenne.

Type biomorphologique de Raunkier : nano-phanérophyte.

Port : buisson moyen très rameux et épineux.

Préférences édaphiques : plante des sols sablo-limoneux pouvant être rocailleux.

Préférences hydriques : espèce xérophile mais utilisant des réserves hydriques plus ou moins profondes.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante se développant dans les lits d'oued, certains épandages et les bas de pentes rocailleuses.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : **PLANTE IMPORTANTE**. L'espèce est appréciée et fournit abri et nourriture en zone désertique.

Références bibliographiques

Ozenda	336	Quézel & Santa	620	Barry & Celles	307	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Petits buissons denses.



Jeunes rameaux.



Inflorescence sous forme de quelques fleurs jaunâtres.



Détail d'un jeune rameau montrant les feuilles pubescentes crénelées et les épines stipulaires dimorphes.



Jeunes fruits.

