

*Silicea*, 30.<sup>a</sup> C., cuando haya dolores lancinantes, provocando grande escozor que prive el dormir, gracias á la necesidad de estar siempre rascando. La *Silicea*, cuando haya abundante supuración, también estará indicadísima. Bastará una gota mañana y tarde.

El *Hidrato de cloral* se dará si es muy rebelde la comezón, como en el *eccema*.

*Arsenicum*; *Graphites*; *Hépar*; *Rhus*, y *Sül.*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>tes</sup>, serán oportunos.

CUIDADOS ACCESORIOS. La *Higiene* y la *Dietética* son del todo necesarias.

§ VIII.

**Pitiriasis.** (DARTRO FURFURÁCEO).

Es una inflamación crónica y superficial de la piel, caracterizada por la presencia, en el tegumento, de *pequeñas manchas* más ó menos coloreadas ó rojas, casi imperceptibles, en su mayoría de veces, seguidas de grande y constante prurito y *descamación furfurácea*, distinta del de los *efélides* ó *manchas hepáticas*, que tienen la descamación farinácea.

NOSOGENIA. Las causas son las de la psora.

DIAGNOSIA Y CURSO. Además de lo dicho anteriormente, podemos añadir que las manchas de la *pitiriasis* son secas y ásperas, como también lo es la piel sana de sus contornos.

Es dolencia que no respeta punto alguno de los tegumentos cutáneos, pero sus sitios preferentes son: el cuero cabelludo, las mejillas, labios y pubis. Su curso es brevisimo, pues desaparece generalmente en pocos días.

La *pitiriasis* da origen á la piogenia; y según el sitio donde se presente, se la llama *pitiriasis capitis*, *cóporis* ó *pubis*.

La *primera* da lugar á la presencia de piojos cenicientos en la cabeza, produciendo una picor desusada, segregando el mal un liquido viscoso más ó menos abundante, que aglutina los

cabellos, dándoles el aspecto de pelo engomado pero húmedo. La piel del cuero cabelludo se escoria, da sangre con facilidad, vuélvese costrosa, y á veces con erupción parecida á la sarna, la cual se corre por la nuca y espaldas.

La *segunda* produce grande desarrollo de piojos blancos por el cuerpo, haciendo su morada especial en el pecho y axilas, derivando sobre los pelos. Cuando el mal es de alguna fecha, se forman en la piel unos tubérculos papulosos encarnados y de forma cónica, ó bien unos tumorcitos pequeños que al abrirlos dejan escapar piojos. *Este es el hecho de la verdadera pitiriasis*. Entonces hay un gran *prúrriigo* pedicular, creyéndose multiplicarse de una manera asombrosa, pareciendo que hasta la misma limpieza los aumenta.

La *tercera variedad* produce piogenia en el pubis. Estos pueden subir á la barba, cejas y axilas, adheriéndose fuertemente á los pelos.

NOSOCRONIA. Es enfermedad de duración incierta, y muy duradera cuando se arraiga en los pelos.

TERMINACIONES. En la salud de la piel, fuera los casos rebeldes que ataca los cabellos, en cuyo caso suele provocar su caída. Después de muchos años puede causar el marasmo.

FARMACOLEXIA Y DINAMOLEXIA.

*Cáusticum*, 24.<sup>a</sup> D., si el mal radica en el cuero cabelludo. En su defecto *Cántharis*, 24.<sup>a</sup> D.

*Sülphur*, 24.<sup>a</sup> D., es el tipo de medicamentos. En su defecto *Phósphorus*, 24.<sup>a</sup> D.

Son útiles *Calcárea-carb.*; *Silicea*; *Lycop*; *Sep.*; *Graph.*; *Solúbilis*; *Petróleum*; *Arsenicum*, y *China*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>tes</sup>.

FARMACONOMÍA. La de siempre.

FARMACOPOLLAXIA. Son suficientes de dos á tres cucharaditas diarias, procurando un gran descanso, cuando el tratamiento dura más de quince días. Este reposo tendrá lugar al tener que cambiar de remedio, que es lo general para todas las dolencias crónicas en tratamiento.

HIGIENE. Para destruir la piogenia es bueno, si hay esco-riaciones, untar las partes enfermas con *aceite cocido en ta-baco negro*; si no las hay, el *vinagre* es preferible al aceite.

Cuando es general la piogenia, los baños calientes *sulfu-rosos* son recomendables. Las ropas, hasta que estén sucias deben servir las mismas, pero las de cambio conviene zahu-marlas con flor de azufre.

Para mejores detalles, véase *Piogenia*.

DIETÉTICA. Es preciso una sana alimentación, escogiendo de entre todos los alimentos, aquellos que más apetezca y di-giera el niño.

§ IX.

**Psoriasis.**

Es una enfermedad cutánea, caracterizada por placas más ó menos extensas, irregulares y salientes, cubiertas de esca-mas secas y de un blanco brillante.

NOSOGENIA. Es enfermedad muy común y hereditaria, que se manifiesta especialmente en la primavera y otoño, ata-cando á los niños de preferencia á las hembras, desde su 7.º año, en la cual el frío y el calor son sus principales causas; empero el *escrofulismo* está en primer término.

DIAGNOSIA Y CURSO. Presencia de pequeñas placas irregu-lares de algunos milímetros de extensión, más ó menos nu-merosas, parecidas á gotas de agua tiradas sobre varios pun-tos de la piel, formando en este caso la *psoriasis guttata*, la cual variedad radica de un modo preferente en la cara exter-na de los miembros y parte posterior del tronco. Pueden las dichas placas ser irregulares, muy extensas y angulosas, inva-diendo todo un miembro ó todo el cuerpo, dando lugar á la *psoriasis difusa*; y en la *inveterata* la erupción parece que da á la piel mayor espesor, endurecimiento, color, el que es ro-jo oscuro, causando hendiduras al rascarse.

Hay también la *punctata*, que son tuberculitos como una cabeza de alfiler asentados sobre montículos de escamas amon-tonados unos sobre otros.

Conviene no confundir esta dolencia con la *psoriasis sifi-lítica*, que es una variedad de la sífilis, la cual ocupa la cara cóncava de las articulaciones, siendo de un rojo-oscuro, con escamillas más pequeñas y de color cobrizo.

La *psoriasis* puede atacar el cuero cabelludo, la cara y los labios (*psoriasis labialis*); el tronco, el escroto, los miem-bros, la palma de las manos (*psoriasis palmaris*), ó *planta-ris*, si es en los pies, y muy particularmente los codos y ro-dillas.

Se distingue de la *lepra*, en que ésta se presenta por pla-cas orbiculares, redondas, con bordes elevados, teniendo el centro sano.—Del *liquen*, y del *eccema*, en que su descama-ción está en ésta acompañada de vesículas y de pápulas.—De la *pyttriasis* se distingue por el estado furfuráceo; y de las *sifilides escamosas*, por su color cobrizo.

La *psoriasis*, cuando sus escamas se desprenden, vése la piel roja y sanguinolenta, á poco de rascarla.

Hay formas en que las placas se agrandan como una mo-neda constituyendo la *psoriasis nummularis*; y en este caso desaparecen del centro las escamas, quedando rojiza la piel, para luego volver á ser natural (*psoriasis orbicularis*), y cuan-do por su grandor varias máculas se confunden formando circunvalación (*psoriasis gyrata*), aquéllas acaban al fin por desaparecer.

La *psoriasis* al principio da comezón, mas luego es lo re-gular carezca de ella. Difícilmente produce trastornos en la economía.

NOSOCRONIA. Es de duración indefinida.

TERMINACIONES. En la salud después de largo tiempo.

FARMACOLEXIA Y DINAMOLEXIA.

*Manganum*, 6.<sup>a</sup> D., es su remedio específico. Con él cesa

la picor, y en su defecto, *Arsenicum*, 24.<sup>a</sup> D.

*Sulphur*, 24.<sup>a</sup> D., en la forma indolente.

De incidir las manos ó piés, *Sulphur*, *Muriatis-ac.*, y *Clematis-erecta*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

Si el escroto, *Nitri-acidum*, *Thuja*, *Petróleum*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>

Si es muy difusa, *Cicuta*, *Dulcamara*, *Lycopod.*, *Sulphur*, *Arsenicum*, *Graphites*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

En la forma inveterada, *Clematis, erecta*, *Sulphur*, *Calcárea-carbónica*, *Solubilis*, *Rhus*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

Si afecta la cara ó cuero cabelludo, *Calcárea*, *Graphites*, *Lycopodium*, *Sulphur*, *Oleánder*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

En los labios en particular, *Solubilis*, *Nátrum*, *Graphites*, *Mezéreum*, 24.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

De todos modos, en general, vienen indicados en primer lugar, *Ars.*; *Cale.*; *Cicuta*; *Clematis*; *Cónium*; *Dulcamara*; *Ledum*; *Lycop.*; *Mercurius*; *Sulphur*; *Manganum*; *Oleánder*; *Phosphorus*; *Petróleum*, y *Hépar sulphuris*.

FARMACONOMÍA. La de siempre.

FARMACOPOLLAXIA. Bastan de dos á tres cucharaditas diarias, descansando algunos días si pasa de 15 el tratamiento. Y como siempre, al cambiar de remedios, cuidese al darlos, de que el anterior haya agotado ya todo su efecto.

HIGIENE Y DIETÉTICA, como en el escrofulismo. Gran limpieza como en todas las dermatosis.

§ X.

**Prúrrigo.**

Es una erupción cutánea caracterizada por *pápulas* poco salientes, del volumen de una cabeza de alfiler, que producen algunas veces una comezón insoportable.

NOSOGENIA. Como quiera que en niños robustos y con buena higiene no se presenta, y sí en los mal nutridos y peor higienizados, de ahí el suponer suyas sus causales. No es enfermedad contagiosa.

DIAGNOSIA Y CURSO. Se presentan bajo de cualquier punto de los tegumentos cutáneos, unas eminencias duras al tacto y visibles perfectamente; teniendo la piel que las cubre, un color rojizo.

Así que nacen, producen tal picazón que es casi forzoso rascar la piel fuertemente, con cuya operación, á veces se hace brotar de las mismas un ligero coagulito de sangre, recubriéndolas de costritas que dan entonces á la dolencia un carácter especial.

El calor del lecho y las comidas, aumentan la comezón, que en ciertas ocasiones es insoportable.

Estos tuberculillos cuyo tamaño es el de un grano de mijo al tamaño del de un cañamón, brotan especialmente en las partes anteriores del tronco y extremidades; raras veces en la cara cóncava de las articulaciones, y es tal en algunos momentos la comezón, que á fuerza de rascarse el niño se desgarró la piel.

Esta enfermedad jamás puede ser *la sarna*, de la cual se distingue, á pesar de su semejanza cuanto á la gran comezón, por faltarle el *ácarus*. Del *líquen* se distingue en que las pápulas de éste son agrupadas, y en el *prúrrigo* son aisladas.

Es dolencia de frecuentes recidivas, y de desaparición primitiva y rápida. Unos tuberculitos brotan, mientras los anteriores ya desaparecen sin dejar señal en la piel, menos en el caso de haberse el niño rascado grandemente, y haberse formado por esta causa costritas.

NOSOCRONIA. Es mal que puede hacerse muy persistente, por sus grandes recidivas.

PROGNOSIA. De por sí sola no es grave, pero puede serlo cuando recidivando mucho el niño se vé obligado á rascarse siempre, llegando á sufrir emaciación de su ser, ya suficientemente empobrecido.

FARMACOLEXIA Y DINAMOLEXIA.

*Solubilis*, 30.<sup>a</sup> D., y en su defecto, *Arsenicum*, 30.<sup>a</sup> D.

Si estos dos medicamentos no curan, se darán:

*Si el frote calma el escozor*, *Asce-fœtida*; *Muriatis-acidum*; *Calçarea-carbónica*; *Cyclámen*, ó *Phos.*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando el frote no mejore la comezón*, *Pulsatilla*; *Spongia*; *Angustura*; *Magnesia-muriática*, ó *Ranunculus-sceleratus*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando el prúrriigo cambie de lugar por el frote*, *Ignatia*; *Mezereum*; *Staphisagria*; *Ácid.-sulphúr.*, y *Zincum*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando el frote aumente la comezón*, *Anacardium*; *Pulsatilla*; *Cáusticum*; *Cápsicum*; *Silicea*, ó *Lédum*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Si la comezón es muy quemante*, *Arsenicum*, *Ambra-gris*, ó *Agáricus*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Si dolorosa*, *Baryta-carb.*; *Nitrum*, ó *Alúmina*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Si parecida á la sarna*, *Verátrum*, ó *Ambra*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Si muy violenta*, *Lachesis*; *Dulcamara*, ó *Agáricus*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando el prúrriigo radica en el escroto*, *Graphites*, *Pulsatilla*; *Dulcamara*, ó *Ácidum-nitricum*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando en el ano*, *Ácidum-nitricum*; *Cáusticum*; *Silicea*; *Sepia*; *Súlphur*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>, ó *Corrosivus*, 30.<sup>a</sup> C.

*Cuando en la vulva*, *Sepia*; *Alúmina*; *Nátrum-muriaticum*; ó *Rhus-tox.*

*Cuando en el prepucio*, *Lycopodium*; *Nitri-ac.*; *Nux-v.*; *Pulsatilla*, etc.

*Cuando en la vagina*, *Kreosotum*; *Cántharis*; *Cónium*, ó *Súlphur*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando en el clitoris*, *Súlphur*, 30.<sup>a</sup> D.

*Cuando en el glánde*, *Solubilis*; *Nitri-acidum*; *Thuja*, ó *Sepia*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando en el pecho*, *Phósphorus*; *Lycopodium*; *Stannum*, ó *Car.-vegetabilis*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>les</sup>.

*Cuando en las extremidades*, *Lachesis*; *Lycopod.*; *Calçarea*; *Rhus*, ó *Belladonna*.

FARMACONOMÍA. Igual.

FARMACOPOLLAXIA. Mientras dure la gran comezón, dése una cucharadita cada tres horas. Fuera de esto, para evitar las recidivas, se darán dos ó tres diarias por ocho días seguidos, descansando luego quince.

HIGIENE. Es de entre las enfermedades cutáneas de las que más limpieza requieren, puesto que su falta es la causa de su producción. El aire sano y puro es de grandes efectos para evitar las recaídas y acortar el mal, tanto como sirven las múltiples lociones de agua pura y fresca.

RÉGIMEN. Sustancioso sin ser excitante. Las leches, huevos y caldos son recomendables, y en general lo es toda alimentación sana y nutritiva.

PROFILAXIA. No caer en las mismas causas que produjeron la enfermedad.

§ XI.

**Empeines.** (VARROS).

Son unas pequeñas manchas, al principio amarillas y luego negras, que pueden presentarse en distintos puntos de la piel, y propias de los folículos sebáceos, cuyo conducto excretor cierran, pero cuyo asiento principal está en la cara, orejas, dorso y espaldas.

NOSOGENIA. Los varros son más comunes en la infancia que en otras edades, siendo la causa próxima de su aparición, una acumulación grasienta, á manera de sebo en el interior de las glándulas sebáceas, dependiendo esto, ó de la destrucción de sus conductos excretores, ó de la consistencia anormal de su segregado; causa esta última la más probable, explicándonos así el por qué los empeines son más comunes en los escrofulosos, que en los robustos, gracias á la tenden-

cia que tiene su sistema ganglionar en ser destruido por una materia caseiforme.

Crean varros la falta de aseo, una mala alimentación, abuso de farinosos, la pobreza y el escrofulismo, de un modo particular.

CURSO. Poco á poco las manchas varrosas van hinchándose y formando pequeñas mucosidades, cuyo color por el pronto no difiere del de la piel, llevando ya en su centro un punto negro.

Cuando uno de aquellos tumorcitos es apretado entre las uñas, deja escapar por su centro el sebo dérmico á modo de un gusanillo de una línea de longitud, terminado en un apéndice negro y cilíndrico.

Los folículos pilosos comprimidos del modo dicho, quedan en sus conductos excretorios muy libres, mas luego son objeto de nuevo depósito sebáceo.

Hay ocasiones en que el empeine llega á inflamarse, supurando su folículo, en cuyo caso queda trasformado en verdadero *acné*.

También los hay que producen calentura por la tarde, no faltando niños con empeines, que despiden muy mal olor.

Casos existen también en que en el mismo folículo se desarrolla una especie de *acarus*, llamado *foliculorum*, que carece de toda influencia en el desarrollo de los empeines é inflamación consecutiva.

Los empeines, cuando son múltiples, debilitan á los niños, lo cual ha hecho pensar á algunos *monógrafos*, si á sus expensas, vivían los tales gusanillos que se dice contienen, y que no son otra cosa que el sebo dérmico, salido en forma de lombriz.

#### TRATAMIENTO.

Forman la base de la cura de los empeines, tanto como la medicación interna, los medios higiénicos y alimenticios.

En el primer caso, se eligen los medicamentos entre los que tienen profunda acción sobre el organismo, dado que, repitiendo lo dicho, son escasos los niños con empeines que no sean escrofulosos.

Así, pues, *Calcárea-carbón.*: 24.<sup>a</sup> D., se dará cuando el niño sea marcadamente escrofuloso, y su piel carezca de rugosidad.

*Arsenicum*, 30.<sup>a</sup> D., cuando la piel tenga cierta comezón de carácter ardiente.

*Súlfur*, 30.<sup>a</sup> D., si es áspero el tegumento.

*Silicea*, 30.<sup>a</sup> D., de haber infartos glandulares.

*Individualizando los caracteres generales del empeine, concendrán los siguientes medicamentos:*

En los *empeines fluentes* constituyendo ya el *acné sebáceo* de *Bielt*, ó el *flujo sebáceo* de algunos autores, y que no es otra cosa que la hipersecreción de los folículos sebáceos, produciendo á veces elevaciones cutáneas que suelen comunicar á la piel una sensación de dulzura, á modo de aceite vertido en la misma; dulzura ó fineza untuosa hija por otra parte del humor untuoso salido de los folículos sebáceos, que, secándose, forma en algunos casos cierta grasa morena, muy observada en los cabellos y pestañas, convendrá: *Calcárea-carbónica*; *China*; *Barita-car.*; *Selénium*; *Solúbilis*; *Nátrum-muriáticum*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>tes</sup>.

Cuando los *empeines* se presentan en la piel bajo la forma de pequeños puntos negros formados de una materia grasa, saliendo una materia ordinariamente negra ó morena, teniendo la forma de un verme filiforme, presentación frecuente en la cara, pezones, esternón y región yigomática, convendrán: *Graphites*; *Nátrum*; *Selénium*; *Súlfur*; *Calcárea*; *Bellad.*; *Hépar*; *Plúmbum*, 30.<sup>as</sup> D.<sup>tes</sup>.

*Y para los empeines enquistados*, que consisten en unos tumorcitos solitarios del volumen hasta de un guisante, ó diminutos como avellanas, muy propios del *cuero cabelludo*,

*dorso y cara*, tumorecitos blandos y sin alteración de la piel que los cubre, muy parecidos á las lúpias, de cuya variedad parece forman parte, los cuales, abiertos, contienen una materia fétida parecida á la leche coagulada siempre que por cualquier causa se hubiesen inflamado sus paredes, estarán indicados: *Sabadilla*; *Silicea*; *Cáusticum*; *Kali-car.*; *Graphites*; *Calcárea-car.*; *Súlfur*, ó *Hépar*, 30.<sup>as</sup> D<sup>les</sup>.

En los *empeines miliares*, ó sea en aquellos que son caracterizados por pequeñas eminencias duras y resistentes, redondas unas veces, y otras acumuladas, siempre de color gris, cuyos puntos de preferencia son la frente, de las cloróticas sobre todo, llegando á tal punto que dan á las partes en que tienen asiento la semejanza al *cúrtis enserina* ó *carne de pollo*; eminencias frecuentemente entremezcladas de puntos negros, en cuyo centro se distingue á simple vista ó con simple lente un punto bien negro, que sólo consiste en la alteración del folículo piloso, convienen: *Súlfur*; *Calcárea*; *Graphites*; *Nitri-ácídum*; *Baryta-car.*; *Hépar*; *Kali-car.*; *Silicea*; *Selénium*, etc., 30.<sup>as</sup> D<sup>les</sup>.

FARMACONOMÍA. La misma de siempre.

FARMACOPOLLAXIA. Una semana de medicación, con quince días de descanso y á razón de dos ó tres cucharaditas diarias.

HIGIENE. El niño con *empeines* ha de quedar limpio mañana y tarde, entreteniéndose en ello de un modo especial. Si es muy general el *empeine*, convendrá de vez en cuando un baño tibio de salvado, frotando bien la piel, para que los folículos sebáceos puedan funcionar perfectamente quitado el sebo de que pueden estar cubiertos. En verano el baño convendría fuese repetido.

Es bueno oprimir los *empeines* con la llave del reloj de bolsillo ó con la yema de dos dedos para que salga por completo el sebo dérmico que constituye el *empeine*. En agua ligeramente acidulada con vinagre se frotará luego la parte,

con lo cual se logra mayor prontitud en cerrarse el agujero de la glándula sebácea, abierta en extremo por nuestra presión. Si son muchos los *empeines*, con el dorso de un cuchillo de boj se les desaloja también de su sebo. Hecha esta operación, se lavarán las partes con agua tibia jabonosa á fin de desengrasarla, y luego se las limpiará con sola agua tibia. Siempre que de esta pequeña operación el *empeine* quedara con una abertura considerable, al objeto de que el polvo y suciedad no penetren y le dañen, se cubrirá aquella con un pedacito de tafetán.

Como salgan menos *empeines* cuanto más fuerte sea la piel, bueno será frotarla diariamente en los puntos invadidos con agua mezclada con algunas gotas de ron.

RÉGIMEN. El del escrofulismo.

PROFILAXIA. Desde la cuna obsérvese una buena higiene y una sana nutrición.

## § XII.

### *Acné.* (GRANOS. VARUS).

Es una inflamación de varias de las glándulas sebáceas y pilosas, que se presenta bajo la forma de tuberculillos ó de pustulitas, cuyo tamaño varía entre un grano de mijo y el de una pequeña avellana, teniendo un color rojo claro, ó rojo-oscuro.

NOSOGENIA. Sus causas son las del *empeine*, con cuyo mal se mezcla muchas veces, al inflamarse el conducto piloso ó sebáceo.

DIAGNOSIA Y CURSO. Se presentan en el tronco, cara, ó espaldas pustulitas puntiagudas y aisladas, que no se pueden confundir con la *sífilis pustulosa*, porque con todo y presentarse ésta como el *acné* en la frente originando la *corona veneris*, en cambio tiene ésta un color cobrizo, cuando es el rojo el propio del *acné*. Por otra parte la *sífilis pustulosa*