

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια. • Περιέχει **pendimethalin**. **Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.** • Το υλικό και ο περιέκτης ή τα θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την εκλευθέρωση στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.
«Για να αποφευχθούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το φεκατικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό γιατί υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης εκτός εάν υπάρχει συμβουλή γιατρού. Ποτέ μην προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε τίποτα από στόματος αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει ασπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Χορηγήστε καρδιοκαρδιοειδή δια εισπνοής για να αποφευχθεί πνευμονικό οίδημα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αέρασκατη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αέρασκατη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται από πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκατικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστρωθούν προηγούμενες με τρίτημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφεται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκατικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναθεωρημένο τον αντιστοιχήμεν δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναθεωρημένα συνεχώς.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις αντιστοιχήμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Όλες οι καλλιέργειες: Δεν ορίζεται λόγω πολύ νωρίς χρόνου εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ:

- ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΤΑΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

1) Ξόανα, βαμβάκι, μπιζέλι, σκόρδο, κίληνας και μεταφύτευόμενες καλλιέργειες μπορούν να σπαρτούν/φτευτούν οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του STOMP AQUA 455 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ).

2) Πατάτα μπορούν να φτευτεί 3 μήνες μετά την εφαρμογή του STOMP AQUA 455 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ).

- ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

1) Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρτούν/φτευτούν 6 μήνες μετά την εφαρμογή του STOMP AQUA 455 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ).

2) Ζαχαρότευλα μπορούν να σπαρτούν 10 μήνες μετά την εφαρμογή του STOMP AQUA 455 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -- ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Παρήξης: Ως ένα μέρος συσκευασίας
Ημερ. Παραγωγής: Ως ένα μέρος συσκευασίας
Ημερ. Λήξης: Ως ένα μέρος συσκευασίας



031203α



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 79304/1-2010
ZIZANIOKTONO

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF SE, Γερμανία.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ -- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Agri-Production S.A.S, Γαλλία.

© Σήμα κατατεθέν της BASF



STOMP AQUA 455 CS
Pendimethalin
(Πεντιμεθαλίν)
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
Εγγυημένη σύνθεση: Pendimethalin 45.5% β/ο. (ομάδα δινιτροανιλίνες)
Βοηθητικές ουσίες 57% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Το STOMP AQUA 455 CS είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιομηχανικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μύησης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροαμινοξικών των βλαβερών σπέρματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, στο λήθαργο, προσπορτικά με ενσωμάτωση, με ενσωμάτωση πριν ή μεταεμφύτευση/φύτευση, προσπορτικά στην επιφάνεια του εδάφους ή νωρίς μεταεμφύτευση.
ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΧΕΙΛΕΙ:

• Ετήσια Αγρωστική Ζιζάνια
Ευαίσθητα: Μουχρίτσα, Πράσινη Σέπια, Σποδυλιτική Σέπια, Αμαμόχορτο.
Μερίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη.
• Ετήσια Πλατύφυλλα Ζιζάνια
Ευαίσθητα: Πικαστό Βλάχο, Τραχύ Βλάχο, Αναγλήσι, Αναγλήσι, Κανάη ηλιοτόμο, Πικακώμη, Αγριοποτριά, Αναγρωμένο πολυκόμο, Πλυερίθρα, Παπαρούνα, Κουφόχορτο, Στέλλαρι, Άουρα Σινάτι, Σπύρος, Ζυχός, Τριβόλι, Βερόνια, Μαργαράς.
Μερίως ευαίσθητα: Αγριομαρμακάκι, Κατόχορτο, Καλλιθέα, Ραουόκοιλος, Ραπαδιά.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (αι δόσεις αναφέρονται σε κ.ε. εκκευασίας/στρέμμα):
ΕΞΠΕΡΙΔΕΙΔΗ (Προκαλά, Λεμόνια, Μαντανιό, Γκρέπ-φρουτ, Φράγα): Κατευθυνόμενος φεκατικός προσπορτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πρώτα μέρη των δένδρων. Δόση: 250-300. **ΜΙΛΩΔΙΗ (Μαύλη, Ακλεδάκι, ΤΥΡΗΝΟΚΑΛΑ, ΠΡΟΒΑΝΟΚΑ, Νεοκρονιά, Βερόνια, Κουφόχορτο, Κουφόχορτο, με εκκευασί προσπορτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). Δόση: 250-300. **ΑΜΠΕΛ:** Κατευθυνόμενος φεκατικός προσπορτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (κατά τον λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης). Δόση: 250-300. **ΦΡΑΥΛΙΑ:** α) πριν την εγκατάσταση υπαθούς καλλιέργειας με ενσωμάτωση ή β) κατά τον λήθαργο σε εκκατεστημένη φυτεία. Δόση: 250-300. **ΚΑΡΠΟΤ:** Προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 250-300. **ΚΡΕΜΜΥΔΑ - ΣΚΟΡΔΟ:** Νωρίς μεταεμφύτευσης της καλλιέργειας (στο σπάσιμο του μαστιγίου). Δόση: 250-300. **ΤΟΜΑΤΑ - ΛΑΧΑΝΟ - ΜΠΙΣΚΟΛΑ - ΜΑΡΟΥΛΙ - ΜΑΡΟΥΛΙ:** Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση. Δόση: 250-300. **ΑΡΥΙΔΑ - ΨΗΛΑΦΗ (Μπιζέλι):** Προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 250-300. **ΑΙ ΤΥΡΗΝΟΚΑΛΑ:** Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση σε εκκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν της ένα ανάπτυξη, σε μινώ εδάφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων. Δόση: 200-250. **ΟΞΥΡΙΑ (Μπιζέλι, Κουκιά):** Προσπορτικό με ενσωμάτωση ή προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 250-300. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Προσπορτικό με ενσωμάτωση ή προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 360-430. **ΗΛΙΑΘΕΟ - ΣΟΤΙΑ:** Προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 250-300. **ΠΑΤΑΤΑ:** Προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 250-300. **ΚΑΠΝΟΣ:** Πριν τη φύτευση με ενσωμάτωση. Δόση: 250-300. **ΣΠΑΡΑ - ΚΡΗΘΑΡΑ - ΣΙΚΑΛΗ -- ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ - ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Προσπορτικό της καλλιέργειας. Δόση: 250-300. **ΚΑΛΑΜΙΝΤΑΚΙΑ (Φούδινα, Δένδρο):** Κατευθυνόμενος φεκατικός προσπορτικό των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εκκατεστημένες φυτείες. Δόση: 200-300.**

Όγκος φεκατικού υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες.
Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: • Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόσταφυλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φεκατοστατευτικού προϊόντος STOMP AQUA 455 CS.
• Α) Η δράση του STOMP AQUA 455 CS στις μεταεμφυτεύσεις εφαρμόζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Ανακατάσσει στις περικοπές αυτές περίπου 24 - 48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση - ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. Β) Στο βαμβάκι για την καλύτερη αντιμετώπιση του σπύριου (*Solenum nigricum*), πριν την προσπορτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπορτικού, προσπορτικό της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που δράει ως η δραστική ουσία φλουμεταλόν στη δόση 250 κ.ε/στρέμμα (σκέυασμα 50% περιεκτικότητας σε δραστική ουσία) ή 125 γρ/στρέμμα, δραστικής ουσίας/στρέμμα. Γ) Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφρά έδαφη - χαμηλής περιεκτικότητας οργανικού υλικού και κερκός πληθυσμίου ζιζανίων. Δ) Η μεγαλύτερη δόση αναφέρεται σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικό υλικό ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων. Στις περικοπές που χρησιμοποιούνται οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική κατάσταση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. Δ) Το STOMP AQUA 455 CS καταπολεμά τα ζιζάνια που φερώνονται ή βρίσκονται σε πολύ νεώρο στάδιο (φύτρωμα - κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρώματα ζιζανία θα πρέπει προηγουμένως να καταστρωθούν με ανάσπασμα ή βλάστηση ή με κατάλληλη μεταεμφύτευση ζιζανιοκτόνο. Ε) Τα περιβόλαια καλλιπωτικών φυτών που μπορεί να εφαρμοστούν είναι: *Phacelia* (φασελιά), είδη *Prunus* sp., *Coultrossocarpus* (*Cyprinoscyris heylandii*), *Βιβούλιο* (*Viburnum* sp.), *Κράταγος* (*Crataegus* sp.), *Μυρτο πορτοφύρι* (*Ilex* sp.), *Παυγαλιά* (*Syringa vulgaris*), *Μανόλια* (*Magnolia grandiflora*), *Δρυς* (*Quercus* sp.), *Φοινίκας* (*Phoenix* sp.), *Πεύκο* (*Pinus* sp.), *Λεύκα* (*Populus alba*), *Πλάτανος* (*Platanus orientalis*), *Πιά κλαούσα* (*Salix babylonica*), *Καρδιά* (*Juglans regia*), *Ροδόδευτρο* (*Rhododendron* sp.), *Πεύκος* (*Buxus* sp.), *Καμυλιά* (*Camelia japonica*), *Γαρβάνε* (*Gardenia jasminoides*), *Κοιδωνιστόρα* (*Conocephala* sp.), *Κυπαρίσση* (*Cupressus sempervirens*), *Ευώνυμο* (*Euonymus japonicus*), *Πυρκαϊά* (*Pyracantha coccinea*), *Φοινιά* (*Forsythia intermedia*), *Βίβκος* (*Hibiscus syriacus*), *Ακροκάλυ* (*Jasminum* sp.), *Λεβάντα* (*Levanderia angustifolia*), *Αγλέλια* (*Pittosporum* sp.), *Μυρτιά* (*Myrica carolinensis*), *Παρόδιον* (*Nerium oleander*), *Χαμορπός* (*Chamaerops* sp.), *Φωτίνια* (*Photinia* sp.), *Λιγυστόρα* (*Ligustrum* sp.), *Δάφνη Απάλλωνος* (*Laurus nobilis*), *Πούκα* (*Yucca* sp.), *Κισσός* (*Hedera helix*), *Πελαργόνο* (*Pelargonium* sp.), *Γαλαξία* (*Jasminum* sp.), *Μυρτορόμα* (*Myrsorum parviflorum*), *Σταραγός* (*Asparagus officinalis*), *Φρέζια* (*Freesia* sp.), *Λιλιούμ* (*Lilium* sp.), *Παιώνια* (*Paeonia* sp.), *Γαϊτανία* (*Wisteria* sp.), *Αμπισπία* (sp.) Τ) Το STOMP AQUA 455 CS είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλιπωτικών φυτών (φυτά θάμνων, δένδρων) που έχουν ήδη βερυνηθεί ή εκλεκτικότητά που σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανασπόμενες επιπτώσεις από την καταπολέμηση είναι οι παρακόμενες περικοπές διαφόρων συνθηκών, συνθήκες που αναδύονται ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επισημαίνουμε, συνιστάται, πριν τη γενεκευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέταση τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Ζ) Μην κάνετε καθολικές εφαρμογές σε φυτεία ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το STOMP AQUA 455 CS σε καλλιπωτικά φυτά που έχουν εμβολοσταθεί ή είναι σε έντονη βλαστική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το STOMP AQUA 455 CS σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη προηγουμένη ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σπασίονα του φεκατικού υγρού να πέσουν πάνω στο φυτό, να πέσουν στο έδαφος ή να φερθούν στο έδαφος. Η) Η εφαρμογή του φεκατικού υγρού με ενσωμάτωση θα επιτρέψουν την επαφή του STOMP AQUA 455 CS με το ριζικό σύστημα των καλλιπωτικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του STOMP AQUA 455 CS πριν τον εμβολισμό ή την άνθιση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλιπωτικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτεύετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί STOMP AQUA 455 CS κατά την προηγουμένη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφύτευονται νωμόρροζα, μην εφαρμόζετε το STOMP AQUA 455 CS πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση. Η) Μην εφαρμόζετε το STOMP AQUA 455 CS σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.