

ca. 5, cortamente pediceladas. Frutos alados, de 4 mm, de largo Tallos aéreos de 0,06-0,08 m.

Provincias de Tarapacá i de Atacama.

6. *M. PAUCIFLORUM* R. Nov. spec.

Planta perenne, con muchos tallos bajos, ramosos i dispuestos en céspedes densos, convexos. Las ramas en la rejion inferior cubiertas de las hojas muertas. Las hojas numerosas, atejadas, rijidas; el pecíolo corto, con la base pestañosa i dilatada; lámina indistintamente separada del pecíolo, gruesa, dividida en 3 segmentos elíptico-oblongas, agudas, recorridas por un nervio fuerte y  $\pm$  cubiertas de pelos blancos. Largo total de la hoja de 1 cm.; de sus segmentos de 3-4 mm. Individuos dioicos. Umbelas en las axilas de las hojas superiores, al florecer casi ocultas entre ellas, mui cortamente pedunculadas. Invólucro en forma de una vaina 2-partida, trasparente. Flores pocas, 3-4 en cada umbela, las ♂ sobre pedicelos delgados de 5-7 mm. Cáliz indistinto. Pétalos oblongos, amarillos. Flores ♀ desconocidas. Frutos grandes, de 8 mm. de largo i de contorno elíptico.

En terrenos de arena volcánica de la cordillera de Curicó, con *Azorella apoda*, *Viola Philippii*, etc., 2,500 m. Enero, Febrero.

Especie problemática.

7. *M. ALBOVAGINATUM* Hook. Bot. Misc. I páj. 328.—Gay III páj. 91.

Tallos ramosos, dicótomos, envueltos en las vainas de las hojas muertas. Las hojas a veces lijeramente vellosas, partidas en 3 divisiones aovado-lanceoladas, mucronadas; las divisiones mucho mas anchas i ménos tiesas que en otras especies. Umbela de pocas flores, sésil en el axila de las hojas. Fruto elíptico comprimido, tetrágono, casi con 4 alas.—Tal vez *Azorella spinosa* Pers.?

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza.

10. *Bolax*.—Comm.

Flores ♂. Cáliz indistinto. Pétalos sésiles, aovados, agudos. Estilos cortos. Mericarpios con el dorso cóncavo; las costillas