

Planta carnosa con las hojas angostas, tupidas. Cápsula del largo del cáliz.

En las tierras magallánicas.

Sección *Eu-Anagallis* Hook. Estambres libres en la base.

J. F. 2. A. ARVEN SIS L. Spec. Plant. páj. 148. — Gay IV páj. 370.

Planta anual, pelada, ramosa, con las ramas tendidas, prismáticas, casi aladas. Hojas *opuestas*, aovadas, agudas, sésiles, de 6-8 mm. de largo, mas cortas que los entrenudos. Pedúnculos solitarios, axilares, delgados, mas largos que las hojas. Divisiones calicinales lanceolado-lineares. Corola del largo del cáliz, de color de ladrillo (*A. pinoenicea* Scop.) o azul (*A. coerulea* Lam.), con 5 divisiones trasaovadas, obtusas, finamente pestañosas. Cápsula subglobosa, \pm del largo del cáliz, sobre pedúnculos por fin arqueados atras. Semillas negruzcas, tricuetras, punteadas. Tallos 0,1-0,15 m.

Planta europea, pero ahora aclimatada en una gran parte del globo; en Chile principalmente desde la provincia de Concepcion hasta Valdivia. También en Juan Fernández (Masafuera) Noviembre a Enero.

6. *Centunculus*. — L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz de 4-5 divisiones persistentes. Corola mas corta que el cáliz, con el tubo corto, sub-globoso i el limbo abierto en 5 divisiones. Estambres 4-5, insertados en la garganta de la corola, con los filamentos cortos, dilatados. Anteras obtusas. Ovario globoso con los óvulos numerosos. Cápsula abierta en una zona circular, trasversal. — Plantitas pequeñas con las hojas enteras i las flores solitarias, axilares. — Tres especies esparcidas sobre el globo, de las que una tambien en Chile.

J. F. 1. C. PENTANDRUS R. B. Prodr. páj. 427; (*Micropyxis pumila* Dub. var. *ovalis* Dub.; *Anagallis ovalis* R. et. P.; *A sessilis* Salzm.; *Micropyxis ovalis* Phil. Anal. Univ. Santiago 1856 páj. 159; vol. 43 (1873) páj. 509; *Centunculus erectus* Phil. Flor. atac. N.º 226.)