

Trientalis europaea. Filamentos cortamente unidos en la base; de 5-6 mm. Anteras versátiles. Cápsula verde o roja, abierta en 5 valvas. Semillas pardas, tricuetras, con tres alas longitudinales. Tallos 0,2-0,8 m.

En localidades húmedas y sombrías desde las cordilleras bajas de Chillan hasta las del rio Puelo; tanto en la zona litoral como en el interior. Diciembre, Enero.

4. *Pelletiera*.—St. Hil.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz profundamente 5-partido. Corola mucho mas corta que el cáliz, con el tubo cortísimo y el limbo 3-partido. Estambres 3, insertados en la base de la corola. Ovario globoso con 2 óvulos. Cápsula 3-valva con 2 semillas cóncavas.— Plantita anual con las hojas enteras, opuestas y las flores pequeñas, solitarias, axilares.— Una especie de Sud-América (Uruguai, Arjentina, Chile), introducida tambien en la isla Gran Canaria, segun Kurtz, Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba XVI (1900) páj. 235.

I. P. SERPYLLIFOLIA Webb.—Berthel. Phytogr. Canar. III páj. 173; (*Lysimachia serpyllifolia* Poir.; *Pelletiera verna* St. Hil. —Gay IV páj. 369; *Asterolinum trinum* Baudo.)

Plantita pífmea, pelada, con el tallo prismático, sencillo o ramoso. Hojas lanceoladas, agudas, sésiles, de 3-4 mm. de largo. Divisiones calicinales lanceolado-alesnadas, estiradas en una punta larga. Corola sin lente casi invisible, blanca. Estambres con las anteras versátiles. Tallos solamente de 0,02-0,06 m.

Desde la Provincia de Aconcagua hasta Valdivia, en la primavera.

5. *Anagallis*.—L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz persistente de 5 divisiones. Corola con el tubo corto y el limbo de 5 divisiones es-tendidas. Estambres 5. Ovario globoso con el estilo filiforme y el estigma obtuso. Ovulos numerosos. Cápsula polisperma, dehiscente por medio de un opérculo.