

传染性软疣

什么是传染性软疣？

由痘病毒科中的一种病毒感染引起的良性皮损。


好发于儿童（1至10岁），但也可能感染任何年龄的人。

如果成人感染，尤其当皮损部位为阴部、大腿或腹部时，则被认为患有性传播疾病（性病/STI）。

皮损通常在感染后的2至8周出现，但潜伏期也可能延长至6个月。

会出现什么样的皮损？

出现可触摸到的疹子，呈粉红色、白色或肉色，中央凹陷。可能簇集；通常无症状，有时会出现瘙痒；可出现在身体任何部位。



如何诊断？

通常为临床诊断。

有哪些治疗方法？

6至18个月后软疣可自行消退，也可采取以下治疗方式：

基于氢氧化钾、水杨酸、过氧化氢、过氧化苯甲酰或5%咪喹莫特乳膏等进行局部治疗。

- 冷冻治疗。
- 刮除术或手动挤压。

由于会自行消退，可根据皮损数量、部位与不适感，考虑是否对儿童进行治疗。对成人而言，如被诊断可能患有性病，则需接受治疗避免性病传播。

哪些预防措施可避免感染或促进治愈？

为防止皮损蔓延，不宜在皮损部位抓挠或剃除体毛。

为避免传染他人，不应让他人直接接触患者的皮损部位，患者也不应与他人分享玩具、毛巾、沐浴海绵、衣物等用具。

在学校参与团队运动或可能暴露皮损部位的活动时，必须用衣物或绷带完全覆盖皮损部位。造成他人意外接触患者皮损部位时，接触者必须彻底清洗手部和暴露部位。

如果皮损位于肛周生殖器区域或摩擦区域，应避免性交。

如果成人患者出现疑似性病的皮损，则需验血以排除其他感染的可能。无需研究患者接触史。