

POSOLOGÍA

ALDESLEUKINA se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel).

La dosis recomendada es según prescripción médica.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Aldesleukina?

La administración de la inyección se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:

1.-Lávese las manos cuidadosamente.

2.-Limpie el tapón del vial con un algodón con alcohol.

3.-Reconstituya el vial con 1,2 ml de agua para inyección. Dirija el agua hacia la pared del vial para evitar la formación excesiva de espuma. Haga rodar suavemente el vial en la mano hasta que se haya disuelto completamente el polvo. No lo agite.




4.-La solución resultante deberá ser clara y sin partículas. Contendrá 18 millones UI de Aldesleukina por ml y es estable 24 horas.

5.-Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar.



6.- Introduzca la aguja con una inclinación de 45°. Inyecte lentamente el contenido de la jeringa, presionando el émbolo.

7.-Al terminar la inyección, retire la aguja y suelte la piel. Coloque de nuevo el tapón en la jeringa y desinfecte la piel con alcohol.



Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.

Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrarse una dosis hágalo lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente administración y no doble nunca la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO se debe administrar Aldesleukina?

- Si usted es alérgico a Aldesleukina, así como a cualquiera de los componentes de la solución.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si sufre psoriasis, enfermedad coronaria, pulmonar o del tiroides.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central: benzodiazepinas
- Antihipertensivos
- Corticoides

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Reacciones en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.
- Náuseas, diarrea, vómitos.
- Hipotensión, dolor en el pecho.
- Dificultades para respirar, tos.
- Vértigo, irritabilidad, somnolencia.
- Otros: dolor de cabeza, retención de líquidos, pérdida de peso y apetito

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como escalofríos, fiebre > 38°C, tos, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor abdominal agudo.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los viales en su envase original,
dentro de la nevera (entre 2 y 8°).

NO CONGELAR

La solución reconstituida es estable 24 h



CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los viales.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

ALDESLEUKINA

Proleukin®

18 mill UI/ml vial para
inyección subcutánea

Nombre del Paciente:

Fecha: