



3 2044 106 421 084

F9120

W. G. FARLOW.

There is said to be
a 2d Edit. of this work
dated 1824. See List of
Fris. works in 9 cores Selecti
Vol. II. From this one might
infer that the two editions
were identical in contents.
Pritzel, however, gives the
number of pages as different
in the two editions. The only
copy of second edit. which
I have yet seen (No. 1877)
is that in the library of the
Mass. Hist. Soc. In that
copy both volumes are
bound in one and vol. I
has the date 1824 and
the contents of it are identical
with that of Vol. I. 1815 but
the plates I-IV are bound
with the V-VIII of Vol. II
at the end of the whole
volume. In the volume
of the Mass. Hist. Soc. →
the vol. II is dated 1818

but in
places, etc., that some
are not colored are the
same as in the original
edition of Vol. II.

Apparently the Mass.

Hart. Soc. volume is
the Editio Nova of Vol. I
but the Vol. II is the
original and not
the Editio Nova. This
volume belonged to

Mrs. C. J. Sprague who
presented it to John
L. Russell in 1873
and was bequeathed
by him to the Mass.
Hart. Soc.

Ly. was the young
Vol. II of Vol. II, identified
with the original Vol. II
1818 as said the Edict
Nova have only one volume

Digitized by the Internet Archive
in 2016



Indp
OBSERVATIONES

MYCOLOGICÆ.

Auctore


E. M. F R I E S.

Cum Tab. IV aenclis.

H A V N I A.

Sumptibus Gerhardi Bonnier;

MDCCCXV.



OBSERVATIONES MYCOLOGICÆ.

AMANITA. PERS.

1. *Amanita incarnata*, pileo campanulato villosa albo, lamellis carneis, stipite solido nudo albo.

· *A. incarnata*. *Pers. Syn.* p. 248.

Agaricus incarnatus. *Batsch. El. fung.* p. 51.

Ag. bombycinus. *Schæff. Fung. Bav.* t. 98.

Fungus magnus esculentus e volva erumpens, pileolo villoso albo, lamellis carneis, pediculo cylindrico albo. *Mich. Gen.* t. 76. f. c.

Habitat ad truncos arborum in Italia, Germania, Svecia.

Descr. *Fungus nondum explicatus*, volva involucratus, ovatus totus albus. *Volva* dein

A

laxa suberecta 1-2 uncialis membranacea viscosa
laciniata albida v. flavescentia. *Stipes* 3-6 uncia-
lis crassit. digitus minimi solidus teres adscendens
curvatus albus glaber, sursum nudus attenuatus.
Pileus carnosus junior globosus, mox campanu-
latus hemisphaericus demum convexus subumbonatus
3-7 uncial. squamuloso-villosus sericeus,
rarius apice calvus, albus interdum nigro-punc-
tatus. *Caro* alba. *Lamellæ* juniores albidæ mox
incarnatæ liberæ lato-lanceolatæ 2-4 natæ tan-
demque deliquescentes.

2. *Amanita pusilla*, minor, Pileo hemi-
sphaerico subpiloso incarnato-albido, lamellis ro-
seis, stipite fistuloso nudo albido.

A. *pusilla*. *Pers. Syn.* p. 249. *Obs. myc.*

2. p. 36. t. 4. f. 4.

Agaricus volvaceus. *Bull. Champ.* t. 30.

β. *minor*.

Ad vias, in hortis &c. Etiam in *Svecia*
legi.

Obs. Descr. dedit *Peerson* l. c. Hæc et
antecedens species *Coprinis* affines; lamellas enim
semper deliquescentes et in hæc nonnunquam ni-
gescentes, observavi.

3. *Amanita fulva*, pileo planiusculo gla-
bro striato volvaque fulvis, lamellis stipiteque
fistuloso nudo pallidis.

A. spadicea. *B. fulva.* *Pers. Syn.* p. 248.
Albert. et Schweitn. Consp. Fung. *Nisk.* p. 141.

Agaricus fulvus. *Schäff. Fung.* t. 95.

Agaricus trilobus. *Bolt. Fung.* t. 38. f. 2.
Abbild. der Schwäm. t. 9.

Agaricus vaginatus. *Bull. Champ.* t. 512.
f. F. G. H. L. N. O.

In silvis frequens. Etiam in paludibus turfosis.

Descr. *Stipes* fistulosus v. substantia spongiosa intus farctus 4 - 5 uncial. crass. pennæ anserinæ l. cygneæ fragilis æqualis l. sursum attenuatus cæpius albus, interdum flavescens, lævis l. squamulosus. *Volva* vaginalis elongata lævis glabra fulvo-rubra. *Annulum*, qui in *A. livida* juniori adest, nunquam in hac vidi. *Pileus* carnosus 1 - 2 uncial. junior campanulatus mox explanatus, umbone parvo subobsoleto, fulvus nudus l. squamis majusculis albis vestitus, margine striatus. *Lamellæ* liberæ latiusculæ 2-natæ l. integræ candidæ carne pilei latiores.

Obs. *Aman. livida* et *spadicea* & P., omnino sunt varietates, inter quas nulli dantur limites. *Pileus* campanulatus et planiusculus ab ætate solum pendet. Ex hac specie, plurimis sub nominibus ab Auctoribus descripta, *Aman. fulva* etiam sine dubio originem ducit; sed ob magni-

tudinem minorem, stipitem nudum, pilei volvæque coloreni constantem distinxit.

4. *Amanita nitida*, candida, pileo convexo nitido albo-maculato, lamellis subadnatis, stipite annulato basi bulboso.

In pinetis *Sveciae*.

Descr. *Stipes* 2-3 unc. initio crassior deinde elongato-angustatus solidus candidus lœvis glaber, sed ex *annulo* albo laxo reflexo sublacero ad apicem stipitis inserto fibrillosus nonnunquam, basi bulbosus volvatus. *Volva* albida mollis obliterata submarginata glabra, diam. interdum ultra uncial. *Pilens* carnosus junior subcampanulatus obtusus, deinde convexus, tandemque planus candidus nitens fere flavescens $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$ unc. non striatus, squamulis majusculis irregularibus folididis & pallidis irregulariter sparsis exasperatus. *Caro* alba. *Lamelle* albæ numerosæ tenues tenaces inæquales subadfixæ.

Obs. *A. virescenti* P. proxima; sed ab unde distingua. Cum *A. bulbosa* P. et *umbrina* P. in Nov. Fl. Svec. p. 17 descriptis nullam habet affinitatem.

AGARICUS. LINN. PERS.

Fam. I. LEPIOTACEI

5. *Agaricus caperatus*, subsolitarius, pileo carnoso convexo rugoso pallente-citrino, lamellis ochraceo-argillaceis, stipite solido supra annulum obliquum squamuloso.

Species non differt:
Agaricus caperatus. Pers. Obs. myc. I. p. 48
 descr. Ejusdem Sym. p. 273.

In fccis Sveciae cum *A. alutario* Pers. copiose.

Descri. Solitarius magnus. *Stipes* solidus l. a vermis eroſus 3 - 6 unc. subæqualis crassit. digitus intermedii albidus, supra annulum obliquum album subcyanescens evidenter albido-squamosus. *Pileus*, carnosus convexus demum planiusculus 4 unc. et ultra glaber disco laevis, marginem versus lacuoso-fuscatus dilute flavus. *Lamellæ* versus stipitem rotundatae leviter adfixæ 4-natae ochraceo-argillaceæ.

Obs. Fungus noster a Persoonii differt magnitudine, stipite subæquali et lamellis rotundato-adnexis.

6. *Agaricus olivaceo-albus*, subsolitarius, pileo carnoſo convexulo subumbonato fusco-oli-

vaceo, lamellis candidis adnatis, stipite annuloque fugaci viscoſo albidis.

Ag. brunneus. Schæff. F. t. 312. (var.)

In pinetis *Sveciæ*, Germaniæ.

Descr. *Stipes* solidus 2-5 unc. penna anserina crassior subæqualis interdum flexuosas firmus albidus l. fuscō-maculato-reticulatus subviscosus. *Annulus* albus fugax viscosus cortinæ haud dissimilis. *Pileus* carnosus primum convexus demum planiusculus umbonatus $\frac{1}{3}$ -2 unc. viscidus fuscō-olivaceus, rarius olivacco-brunneus, umbone prominente obscuriori, margine striatulo dilutiori. *Caro* albida. *Lamellæ* albæ totæ adnatæ interduin fere decurrentes firmæ 2-natae carne pilei latiores.

Obs. *A. brunneus* P. longe alia est species. — Ad *Cortinarias* ob lamellas candidas immutabiles hæc species referri nequit.

Fam. II. CORTINARIA.

7. *Agaricus scaber*, gregarius cinereo-fuliginosus, pileo squamoso subcampanulato, lamellis obscurioribus, stipite fibrilloso dilutiori cylindrico.

A. scaber. Sowerb. Fung. t. 207.

In silvaticis Angliæ, *Sveciæ*, subcæspitosis.

Deser. *Stipes* solidus subbipolliearis crass.
digiti minimi sursum subangustatus cylindricus
 pallide cinerascenti - sordidus, squamis obscurioribus fibrillosis vestitus. *Pileus* campanulatus l.
 convexus 1 - 2 unc. carnosus dilute cinereo - fuligineus siccus, squamulis minutis scabris obscurioribus exasperatus, margine deflexo regulari.
Caro albida. *Lamellæ* cinero - fuligineæ adnatæ subalternæ carne pilei sublatiores. *Cortina* fugax albida.

8. Ut Novitiae Floræ Sveciæ; nec a Cel. Swartz in *Vet. Acad. Handl.* descriptæ, hoc loco nominandæ:

1. *A. nudus.* Pers. Syn. p. 278. Bull. Herb. t. 439. f. A.

In pinetis.

2. *A. violaceo - cinereus.* Pers. Syn. p. 279. Schæff. Fung. t. 3.

In silvis frondosis.

3. *A. argentatus.* Pers. Syn. p. 286.
 In silvis muscosis acerosis.

4. *A. sangvineus.* Pers. Syn. p. 289. Sowerb.
 f. 43.

In pinetis. Descripsi in *Nov. Fl. Svec.* p. 18.

5. *A. albobrunneus.* Pers. Syn. p. 293. Schæff.
 Fung. t. 38.

In silvis.

6. *A. fulgens.* Pers. Syn. p. 294. Schaff.
Fung. t. 24.

In betuletis meum legi fungum.

7. *A. subrepandus.* Pers. Syn. p. 300.
In fagetis.

Ceterum *A. Monachella.* Schaff. t. 66
aliique in parte secunda describendi.

Fam. III. G Y M N O P U S.

+ *Pileo albido.*

9. *Agaricus candidus*, pileo carnosō
sericeo-fibroso albo-nitido, lamellis albido-brun-
nescentibus sub'iberis, stipite solidō brevi.

Agar. candidus. Batsch. El. fung. p. 133.
t. 20. f. 106.

In ericetosīs sylvaticīs circa Temfis in Svecia
vulgaris.

Descr. *Stipes* solidus uncialis crassiuscu-
lus glaber lāvis l. subtriatus candidus, semper
subæqualis et rarissime deorsum subincrassatus.
Pileus carnosus convexus albido-pallescens 1 - 2
uncialis sericeo-fibrosus, vix umbonatus, demum
rimoso-repandus. *Caro* alba. *Lamellæ* albidae
mox folidæ cinerascentes, sed simul parum in

ochraceum colorem vergentes semiiovatae 2 - 4 natæ liberae.

Obs. Quamvis fungus meus stipite subæquali et pileo vix umbonato recessat, secundum iconem tamen idem omnino fungus. — Affines etiam sunt:

- 1) *Agar. decumbens* P., sed stipes decumbens bulbosus, lamellæ adnexæ magis ochraceæ &c.
- 2) *Ag. argillaceus* P., sed differt. stipite tenuiori 1 lin. crasso, pileo acute umbonato, lamellis adnexis &c.
- 3) *Ag. tricholoma*, *Albert.* et *Schweitzn.* stipite quoque tenuiori, lamellis decurrentibus &c.

10. *Agaricus albus*, totus albus, pileo carnoso glabro convexo, lamellis totis adnatis, stipite subsolido brevi.

Agar. albus. *Perf. Syn.* p. 363. *Albert.* et *Schweitzn.* l. c. p. 181.

Ag. virgineus. *Batsch. El. fung.* p. 39. t. 3. f. 12.

In fagetis &c. *Sveciæ*, *Germaniæ*.

Descri. Solitarius, totus albus. *Stipes* brevis uncialis, raro subelongatus, $\frac{3}{4}$ unc. crassus solidus, medio interdum cavus, glaber lævis subirregularis nunc rectus nunc adscendens, nunc

sursum nunc deorsum subattenuatus. *Pileus* convexus carnosus 2-3 unc. demum subplaniusculus lævis glaber, margine deflexo l. involuto glabro, interdum repando. *Lamellæ* distinctæ latiusculæ 2-natæ interdum flexuosaæ, "serrulatae Pers." totæ adfixæ.

In pinetis sæpius minor.

II. *Agaricus inamoenus*, lacteus graveolens, pileo planiusculo subumbonato carnose glabro, lamellis adnatis, stipite solido elongato tenaci.

In pinetis, præsertim abietinis Sveciæ frequens.

Descr. — Odor et forma *A. sulphurei*, cui perquam affinis et in ejus consortio crescit. Distinctam tamen esse speciem, vix est quod moneam. — Totus albus. *Stipes* 2-4 unc. solidus subæqualis l. sursum angustatus lævis glaber, basi pubescens tenax. *Pileus* junior convexus dein planiusculus sæpe umbonatus glaber lævis albus uncialis et ultra, margine patente. *Caro* alba. *Lamellæ* alternæ firmæ subadnatæ, carne pilei latiores. Odor ingratus.

Agar. graveolens. Schrad. Spic. p. 120. stipite fragillimo tantummodo differt.

12. *Agaricus erythropus*. γ. *rhodopus*, pileo subcarnoso convexo glabro. lamellisque

latisimis liberis albis, stipite fistuloso glabro roseo.

Ag. erythropus. Pers. Syn. p. 367. var.

In fagetis umbrosis Octobri.

Descr. *Stipes* fistulosus $1\frac{1}{2}$ - 3 unc. crassit. pennæ gallinæ teres glaber sursum attenuatus subfragilis roseus lævis, interne ad latera stipitis cavi subvillosum. *Pileus* subcarnosus convexus vertice demum planiusculus albus $\frac{3}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ unc. latus glaber lævis I. margine demum substriatus. *Lamellæ* latisimæ candidæ liberæ distinctæ 2 - 4 natæ.

Sequenti, etiam in Svecia a me primo lecto, vix affinis. Hujus descriptionem etiam dabo.

13. *Agaricus confluens*, cæspitosus pileo subcarnoso convexo glabro lamellisque angustis liberis albidis, stipite fistuloso subcompresso rubro pulverulento-tomentoso.

Ag. confluens. Pers. Obs. myc. I. p. 8. Pers. Syn. p. 368. Ic. et descr. f. p. 15. t. 5. f. I. Albert. et Schweitn. l. c. p. 184. $\alpha.$ et $\beta.$ rufo-cinnamomeus.

Ag. tremulus et dispar. Batsch. El. fung. p. 104, 210.

In fagetis et pinetis frequens. Etiam in Svecia.

Descr. Cæspitosus. *Stipes* 3 - 5 uncialis

crass. pennæ gallinæ majoris, nunc teres nunc compressus, in speciminiibus teretibus fistulosus, in compressis solidus, superne sæpe parum incrassatus l. dilatatus rufus, ubique tomento pulverulento subcinerascenti adpresso vestitus, basi cum pluribus confluens. *Pileus* subcarnosus fere membranaceo-coriaceus tenax flexilis convexus l. campanulatus albus explanatus 1-2 unc. glaber laevis. — Sæpe totus rufescit. *Lamellæ* confertæ angustæ, sed carne pilei sublatiores liberæ albidae polynatae.

14. *Agaricus xanthopus*, pileo membranaceo-carnoso planiusculo glabro substriato, lamellisque liberis albidiis, stipite fistuloso fulvo-flavo glabro.

In pinetis, Septembri.

Descr. Priori valde affinis, sed optime distinctus. *Stripes* fistulosus 3-5 unc. subæqualis teres l. sursum subattenuatus glaber crass. pennæ gallinæ et ultra erectus flavo-fulgens l. rufescenti-flavus unicolor glaber laevis. *Pileus* planiusculus tenax subcarnosus, margine membranaceus patens substriatus, albus l. pallidus 1-2 uncialis glaber. Ut antecedens species nonnunquam rufescit, haec flavescit. *Lamellæ* albæ liberæ inæquales carne pilei latiores approximatæ. — Etiam Mycenis affinis est.

Obs. Ad plurimas novas species s^epius attuli, cui proximae sint e notis; expertus enim novi, quantam in fungis determinandis affert utilitatem.

15. *Agaricus fordarius*, albidus, pileo carnos^o convexo-glabro, lamellis longissime decurrentibus stipite solid^o.

Ag. fordarius. *Perf. Syn.* p. 370.

In silvaticis.

Descr. *Stipes* 1 - 1 $\frac{1}{4}$ unc. solidus crassit. digitⁱ minimi, vix ultra, subæqualis l. deorsum incrassatus glaber lavis albidus compactus elasticus. *Pileus* carnosus compactus hemisphæricus unicolor fordide albus lavis 1 unc. et ultra, margine deflexo primū involuto tomentoso, denūm glabro acuto. *Lamellæ* latiusculæ congestæ albidæ 4-natæ longissime decurrentes.

Affinis est Ag. mollis, *Bolt.* t. 40 et vix specie differt.

16. *Agaricus cretaceus*, cæspitosus albus, pileo carnos^o planiusculo lamellis subconfertis adnexit, stipite longiusculo solid^o subtomentoso. *Perf. Syn.* p. 369.

β. *ambiguus*, pileo subexcentrico.

In fagetis ad ligna putridissima.

Descr. Stipites numerosissimi cæspitosi basi connati radicati, radice albida lignum intrant,

curvati adscendentes subflexuosi 1 - 2 $\frac{1}{2}$ unciales, crass. 2 lin., quisque lavis glaber basi albo-villosus candidus flexilis nec fragilis solidus. *Pileus* carnosus difformis subexcentricus junior convexus demum planiusculus glaber lavis pallescenti-albus l. candidus 1 - 2 unc., margine deflexo l. patente. *Lamellæ* totæ adnatæ tenues confertæ angustæ candidæ, carne pilei alba tenaci sublatiores.

Pileus tactus rarius rufescit. — Ad *A. lignatilem* etiam accedit.

17. *Agaricus repens*, pileo carnose planiusculo cinerascenti-albo, lamellis basi truncatis latis albis, stipite albido compresso cavo, radiculis longissimis repentibus.

In fagetis, *Augusto*.

Stipes 2 - 3 uncial. cavus glaber lavis subæqualis l. basi subincrassatus albidus difformis, compressus saepe curvatus longitudinaliter fissilis, deorsum albido-pubescentis radiculis simplicissimis pedalibus et ultra albis horizontaliter repentibus auctus. Variat teres et bifidus. *Pileus* 3 - 6 uncialis subcarnosus fere pellucidus glaber planus exalbido-cinerascentis tenax margine membranaceo patente acuto. *Lamellæ* vix adnatæ, sed prope stipitem oblique truncatae 4 - 8 natæ albæ latæ (carne pilei 8ties latiores).

Singularis species, *Ag. compresso proximus*;

sed differt *stipite* s^epe tereti, nunquam torto, cavo, *pileo* majori piano tenaci regulari dilutiori et radicibus repentibus &c.

18. *Agaricus discoxanthus*, subsolitarius, *pileo* carnofo planiusc^ulo viscofo albido, disco flavescente, lamellis adnatis fuscescentibus latiusculis, *stipite* cavo squamuloso albo.

Descr. *Stipes* cavus 2 unc. crass. pennæ anserinæ æqualis albus rectus, totus albido-farinulentus l. obsolete squamulosus. *Pileus* planus orbicularis valde viscosus carnosulus 1½ - 2 unc. albus vertice obsolete subumbonatus flavesiens, margine patente subintegro nonnunquam striato. Variat, licet raro, *pileo* unicolori albo et 3 unc. *Lamellæ* albido-fuscescentes leviter adnatæ 4-natae decurrentes.

Differunt sequentes species maxime affines:

1. *Ag. eburneus*, Pers. Swartz., gregarius, *pileo* subcarnoso convexiusc^ulo viscofo unicolori albido margine lævi, lamellis decurrentibus candidis latiusculis, *stipite* solido sub *pileo* farinulento.
2. *Ag. discoideus*, Pers., subcæspitosus, *pileo* carnofo planiusc^ulo viscofo albido, disco flavescente, lamellis decurrentibus albidis tenuibus, *stipite* subsolido squamuloso.

Non multum forte erraverit, qui has, ut subspecies, conjunixerit.

** Pileo cinerascenti.

19. *Agaricus umbrosus*, pileo carnosomembranaceo planiusculo rugoso-squamulosofrigesceni-umbrino margine piloso, lamellis confertis latissimis liberis roseis, stipite solido albido.

A. umbrosus. *Perf. Syn.* p. 353. *Ic. et descr.* I. p. 8. n. 9. t. 2. f. 5, 6.

In ligno putrido fagineo locis umbrosis.
Octobri.

Descr. *Stipes* 2-3 unc. crassit. pennæ anserinæ cylindricus solidus albidus subsquamulosus. *Pileus* subcarnosus planiusculus rugosus squamulosus 2-3 unc. umbrinus, margine integro villoso. *Caro* tenuis superne pileo concolor. *Lamellæ* latisimæ liberæ 4-natæ roseæ, juniores dilutiores.

An ab *Ag. pluteo* P. vere distinctus? In hujus consortio sequentem legimus *A. plutei variatatem*:

Ag. plutens. *B. permutteratus*, minor, pileo glabro flavescente, lamellis flavescenti-roseis, stipite flavescente striato. — *Pileum* etiam vidi cinereum sed lamellas et stipitem flavescentes.

20. *Agaricus agathosmus*, pileo convexiusculo carnosò papilloso siveolenti, cinereo, lamellis albis decurrentibus, stipite solido albo.

In silvis abietinis densis, una cum *Ag. inamoeno*, sed rarer. Septembr. Octobr.

Descr. *Stipes* solidus & uncialis crassit. *pennæ anserinæ æqualis glaber* basi albido pubescens lavis albus rectus, raro curvatus, elasticus, demum cavus. *Variat sursum subattenuatus et squamuoso-pubescentia.* *Pileus* carnosus convexus demum planiusculus 1 - 1½ unc., interdum subviosus, papillis minutissimis dilutionibus obsitus. *Lamellæ* albae & natæ decurrentes distinctæ latiusculæ. *Odor* gratissimus.

Diu pro varietate *Agar. pustulari* P. habui, a quo charactere ægre distinguitur, sed odore gratissimo, colore et magnitudine satis differre videtur. Ceterum nullo modo *Ag. eburneo* affinis, ut de fungo hoc attrulerunt observatores diligentissimi de *Albertini* et de *Schweiniz.* — Noster *Ag. fraganti* potius affinis et hinc summa differentia appetet!

21. *Agaricus tumidus*, pileo carnosulo convexo-plano lævi cinerascenti, lamellis distinctis albis latis emarginato-adnexis, stipite longo tumido.

Ag. tumidus. Pers. Syn. p. 350.

In pinetis Sveciæ, Germaniæ rarer, Septembri.

Descr. *Stipes* ventricosus crassus difformis

subradicatus, radice deorsum subangustata præmorsa glabra, carnosus solidus glaber striatus pallidus albus, semel subflavescens visus, subeurvatus firmus 3-4-6 uncialis, 1 unc. crassus. *Pileus* carnosus convexus mox planus, raro subumbonatus cinereus, glaber lævis 3-4 uncialis, sape diffornis et demum margine rimosus. *Caro* alba. *Lamella* $\frac{1}{2}$ unc. totæ distinctæ albæ emarginatæ, denticulo stipiti adfixæ.

22. *Agaricus lachnopus*, pileo carnoſo repando convexiusculo cinereo, lamellis candidis angustissimis subvenofis, stipite villoſo subcavo cinerascente.

In fagetiſ umbrosiſimiſ ad ligna putreſcentia. *Inizio Octobr.*

Distincta species, si qua; nulli alio mihi noto affinis.

Gregarius l. cæſpitosus carnosus firmus. *Sipes* solidus l. cavus, intus medulla spongiosa centro faretus 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. undique pube tenui obſitus curvatus adſcendens crassit. fere digitii minimi ſubſtriatuſ cinerascents. *Pileus* irregularis ſubhorizontalis convexiusculus, nunc integer nunc di- midiatuſ nunc centraliſ nunc exentricuſ, lobatus lobis rotundatis firmis minime flexibilibus marginalibus, ſed interdum usque ad ſtipitem firſtus, cinereus furfuraceo-pubefſens l. glaber

1 - 1 $\frac{1}{2}$ unc. margine revoluto repando. Lamellæ angustissimæ marginem pilei versus subvenosæ, prope stipitem incrassato-adfixæ candidæ inæquales sæpe dichotomæ.

23. *Agaricus lampropus*, pileo subcarnoso convexo cinereo-griseo fibrilloso, lamellis albidis denticulo-adnatis, stipite nitido coeruleo fistuloso.

Ag. columbarius. *Bull. Champ.* t. 408. f. 1.
In silvaticis frondosis.

Descr. *Stipes* fistulosus 1 - 2 unc. 2 - 3 lin. crassus subæqualis glaber lævis nitidus coeruleus l. cyanescens teres, demum nonnunquam compressus. *Pileus* uncialis et ultra tenue carnosus convexus, raro umbilicatus, cinereo-griseus fibrillosus. *Lamellæ* latæ distinctæ pallidæ sordide-albæ l. cinerascentes denticulo adfixæ.

Ag. atro-cyaneo P., cyanipede &c. affinis, sed colore distinctus. Etiam satis diversus videtur Ag. columbarius, *Sowerb.* t. 161.

24. *Agaricus polius*, cæspitosus, pileo subcarnoso convexo dilute cinerascenti glabro, lamellis albidis adnatis, stipite solidò albo.

In fagetis inter folia dejecta, æstate et autumno.

Descr. Stipites plurimi (40 - 50) basi connati cæspitosi solidi 2 - 3 unc. crasfit. vix

pennæ anserinæ æquales flexuosi glabri læves albi.
Pileus primo convexus mox planiusculus subcar-
nosus glaber orbicularis dilute cinerascens $\frac{1}{2}$ - 2
unc., raro subumbonatus. *Lamellæ* 4-natæ al-
bidæ adfixæ. Oder et sapor nullus.

Ag. canus, *Schum. Scell.*, hujus eset loci,
nisi pileus sericeus.

25. *Agaricus lanuginosus*, pileo carnosò
convexo squamuoso-villoso griseo-murino, la-
mellis adnatis cinerascentibus, stipite solidò ob-
scure cinereo.

Ag. lanuginosus. *Bull. Ch.* t. 370.

Juxta vias in silvis Svecicis meum fungum
haud raro legi.

Descr. *Stipes* solidus brevis (subuncialis)
æqualis rectus teres firmulus plus minusve ob-
scure cinereus lævis l. tenuissime fibrilloso-squa-
mulosus. *Pileus* carnosus convexus griseo-mu-
rinus 1 - $1\frac{1}{2}$ unc. villoso-squamulosus. *Caro* di-
luta. *Lamellæ* 2-4 natæ carne pilei latiores ci-
nerascentes totæ adnatae.

26. *Agaricus mammosus*, pileo subcar-
nosò convexo umbonato fuscescenti-griseo glabro,
lamellis levissime adnatis griseis, stipite fistulo-
concolori.

Ag. mammosus. *Linn. Svec.* 2. n. 1218.
(*quoad descr.*)

In silvis frequens.

Descr. *Stipes* fistulosus elongatus 2 - 4 unc. teres subfragilis striatulus glaber subæqualis pileo concolor. *Pileus* primo conicus dein convexus umbo rotundatus glaber lævis fuscescens griseus l. subfuscus vertice carnosus totus explanatus $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ unc. *Lamellæ* 2 - 4 natae griseæ distinctæ subliberæ l. levissime adnatae, margine rarius crenatae.

Obs. Agarici cinerei numerosissimi et hinc caute determinandi. — Ex sexcentis aliis, tales nonnullos modo attuli, qui ratiore sunt et ab aliis proprietate quadam singulari distinguuntur. Ut Novitiae Fl. Svecicæ nominandi *Agaricus nebularis*, *obscurus* &c. ex hac sectione.

*** Pileo pallidescens - flavescente, virescente et cinereo - flavo.

27. *Agaricus lepideus*, pileo carnoſo compacto convexo subsquamoso flavescente, lamellis albis ferratis crenatisque decurrentibus, stipite ſolido squamoso.

Ag. squamosus. Schæff. *Fung.* t. 29, 30. optime. Dicks. *Crypt. Brüt.* 2. p. 24. Huds. Angl. 2. p. 614.

In truncis pineis Svecicæ, Germanicæ, Angliae, solitarie.

Obs. Cum A. squamoso Pers. Syn. p. 409
non confundendus.

Descri. *Stipes* durus sublignosus solidus
uncialis et ultra crass. dīgiti minimi æqualis ra-
dīcatus squamis fuscis erectis vestitus albido-fu-
scescens. *Pileus* compactus carnosus convexo-
polypinatus durus crassus sordide flavescens sub-
squamosus, squamis obscurioribus adpressis, mar-
gine deflexo submembranaceo. *Lamellæ* latiusculæ
4-natæ albæ longissime decurrentes margine fer-
ratae. *Pileus* 1 ½ - 2 unc. latus.

Ad *A. tigrinum*, Bull. t. 70 Cel. Pearson,
dubie licet, retulit et cum hoc miro modo *stipe*
duro *squamoso*, *pileo* *squamoso*, *lamellis* *decurren-*
tibus *ferratis* *albis*, *magnitudine*, *loco natali* &c.
convenit, sed *pileus* in *leideo* *constanter* *convexus*
flavescens *crassior*, *squamæ* *minus* *pilosæ*, *stipes*
firmior &c.

28. *Agaricus corticatus*, *pileo* *carnoso*
convexo *levi* *firmo* *pallescidente*, *lamellis* *distinctis*
liberis *stipiteque* *solido*, *cortice* *fuscescente* *sub-*
villoso-rugoso *obtecto*, *albis*.

In graminosis, Augusto.

Descri. Odor subfortis gratus. *Stipes*
2-3 unc., penna anserina tenuior, solidus, sub-
stantia interna fibrosa strictus firmus glaber lævis;
sed cortice crassifculo dissolubili albido fusce-

scente deorsum præcipue villoso-rugoso vestitus. *Pileus* carnosus convexus, demum planiusculus glaber laeviusculus 1-2 unc. subhumidus flavescenti-pallidus, raro subumbonatus, margine striato. *Capo* alba. *Lamellæ* distinctæ 2-natæ firmæ latæ liberæ, prope stipitem truncato-dilatæ, albæ.

Notabilis sane species, odore, stipite corticato strictissimo, lamellis latis liberis et nonnunquam obbifidis.

29. *Agaricus penetrans*, pileo carnosò convexo-plano glabro flavescenti, lamellis adnatis albidis crebris, stipite solido albo striato, radice albo-villosa.

Truncos putridos pineos in *Svecia* penetrat.

Descr. *Stripes* 2-3 unc. 4-5 lin. crassus æqualis solidus glaber albus striatus radicatus, radice elongata æuali albo-villosa. *Pileus* subcarnosus convexus 1. subplanus tenax siccus rugulosus glaber 1-2 unc. pallide flavus margine demum fissus. *Lamellæ* adfixæ pallidæ albæ 1. flavescentes inæquales confertæ.

Varietatem *A. peronati* Sow. esse suspicatus sum, donec hunc invenerim.

A. fusipede ceterum proximus, quamvis ab hoc etiam abunde differt.

30. *Agaricus peronatus*, pileo carnosò-

membranaceo convexo glabro flavescenti, lamellis liberis subochraceis distinctis, stipite solidi albidio, deorsum flavescenti-strigoso radicato.

- $\alpha)$ *A. peronatus*. *Perf. Syn.* p. 331. *Bol. F.* t. 58. *Sowerb. F.* t. 37.
- $\beta)$ *approximatus*, pileo ochraceo, lamellis liberis subdistantibus stipiti approximatis, stipite albo-strigoso.
- $\gamma)$ *remotus*, pileo flavescenti, lamellis liberis a stipite remotis, stipite flavo-l. albo-strigoso.
- $\delta)$ *apricarius*, lamellis stipitem subattentibus, stipite pallide strigoso.

In Germania, Anglia, Svecia, frequens.

α , β . Inter folia dejecta faginea præcipue legi, locis subhumidis γ . Eisdem locis siccioribus. δ . Semel visus in ericeto aprico ad folia betulina.

Descr. Conveniunt omnes allatæ, hujus sine dubio loci, varietates:

Stipite solidi 2-3 unc. crassit. pennæ gallicæ l. anserinæ firmo subelasto levæ l. striatulo pallescenti-albido, rarius sordide ochraceo sursum recto subglabro basi subcurvato radicato subincrassato tomentoso, tomento erecto strigoso elongato conferto pallido. *Pileo* carnosæ membranaceo fere coriaceo flaccido subumbonato; juniore convexo demum explanato glabro sèpius rugu-

loso flavescente l. pallide ochraceo 1-2 unc.,
marginē primum inflexo, dein patente. *Carne*
tenaci tenui alba. *Lamellis* liberis, sed ad stipi-
tem plus minusve approximatis, 4-8 natis carne
pilei latioribus firmis pileo subconcoloribus.

α. Distinguitur: lamellis stipitem attingen-
tibus et tomento stipitis flavo.

β. Lamellis pileo subobscurioribus ochra-
ceis, stipite interdum subfistuloso et in solidis
demum compreso, utrinque dilatato, basi albo-
villoso.

γ. Lamellis a stipite remotis albido-ochra-
ceis, stipite superne tomento adpresso vestito, in-
ferne tomentoso; tomento nunc pallide flavo,
nunc albido.

δ. Lamellis stipitem attingentibus, stipite
albo-strigoso.

31. *Agaricus flavovirens*, pileo carnosō
subdepresso flavescente, squamis minutis nigrescen-
tibus, lamellis stipiteque subfistuloso concolore.

Ag. flavovirens. *Pers. Syn.* p. 319. *Akk.*
der Schw. 3. t. 24.

A. aureus. *Schäff. Fung.* t. 41.

In ligno putrido pineo Germaniæ, *Sve-
cia* &c.

Descr. *Stipes* 2-3 unc. pennæ anserinæ
crasfit. subcentralis glaber lœvis l. squamulis ci-

nerascentibus vestitus, teres subfistulosus citrinus subcurvatus deorsum attenuatus. *Pileus* carnosus subdiformis flavus 3 unc. primo convexiusculus deinum et depresso, in quo statu cum *A. trichæo*, *bello* &c. non confundendus, squamulis cinereo-nigris obsito, marginem deflexum l. patentem versus rariatribus. *Lamellæ* citrinæ 4-8 natæ adfixæ demum subliberæ.

32. *Agaricus luridus*. *Perf. Syn.* p. 321. *Schæff.* t. 69.

Ad hunc, et secundum iconem *Schæfferi* et descriptionem *Persoonii* sequens fungus referri debet:

δ. *spodoxanthus*, lamellis subtotis adnatis, stipite cavo.

In ligno fagineo putrido loco umbroso, semel in Svecia lectus, sed copiose.

Descr. Truncigenus gregarius l. cæspitosus: *Stipes* subcavus 1½-2 unc. crassit. pennæ gallinæ subæqualis subtenax teres flavescens, superne subsquamosus farinulentus, interdum sub-compressus. *Pileus* convexus carnosus demum planiusculus ½-¾ unc. lævis virescendi-cinereo-flavescens, margine lævi subpatente. *Lamellæ* 4-8 natæ cinereo-flavescentes nonnunquam virescentes confertæ totæ adnexæ.

Agaricus cerineus, *Floræ Sveciæ Novitia*, et

nonnullæ aliæ novæ species huic proximæ, omnino etiam differunt.

**** Pileo rubro, rufo &c.

33. *Agaricus pratensis*, pileo carnoso convexo glabro rubescenti, lamellis subobscurioribus distantibus decurrentibus, stipite solido deorsum attenuato.

A. *pratensis*. *Perf. Syn.* p. 304. *Comm. in Schæff. Fung.* p. 124.

A. *fulvosus*. *Bolt. F.* 2. f. 56.

A. *miniatus*. *Sowerb. F.* t. 141.

In muscosis Svecia, Germaniæ, Galliæ, Anglia &c.

Descr. *Stipes* 1 - 1½ uncialis basi attenuatus crassit. pennæ gallinæ transerinæ solidus firmus teres glaber lævis. *Pileus* varius, campanulato-dilatatus subconvexus l. planiusculus subumbonatus glaber lævis nitidus 1 - 1½ unc. varie fulvo-rubescens. *Lamellæ* subcinnamomeo-rubræ (obscureiores pileo) decurrentes firmæ distantes carne pilei pallida vertice angustiores, margine latiores.

34. *Agaricus imbricatus*, pileo carnoso convexiusculo subumbonato, squamulis villosis imbricatis, spadiceo-rufo, lamellis albidis adnatis, stipite subsquamuloso.

In silvis. Octobri.

Descr. *Stipes* solidus l. sæpius cavus firmus rectus teres 2-2½ unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus subsquamulosus l. glaber sordidus albidus l. rufescens. *Pileus* carnosus convexus demum magis explanatus subumbonatus umbrino-rufus (fere *Hydn. imbric.* sed color magis rufus) squamulis villosis subimbricatis minoribus dense obsitus 2-3 unc. subæqualis firmus, carne alba. *Lamellæ* albidæ 4-natæ firmæ adnatæ tenuissime emarginatæ.

35. *Agaricus picreus*, cæspitosus, pileo carnoſo convexo cinnamomeo glabro, lamellis flavis emarginato-adnatis, stipite glabro fulvo-umbrino.

Ag. picreus. Pers. Syn. p. 315. Ic. et descr. Fung. p. 14. t. 4. f. 7.

In truncis, præsertim pineis, Germaniæ, Sveciæ.

Descr. Gregarius cæspitosus. *Stipes* 2 unc. crassit. pennæ gallinæ l. parum crassior fistulosus fulvo-umbrinus subæqualis cylindricus glaber lævis ascendens. *Pileus* subcarnosus convexus glaber cinnamomeus lævis 1-2 uncial. siccus l. interdum humidus margine integro. *Lamellæ* flavæ emarginatæ, adfixæ tamen leviter, subangustæ, sed carne pilei latiores, approximatæ 4-natæ. — Sapor nunc amarus nunc etiam nullus.

IV. MYCENAE.

A) Graveolentes.

Obs. Familia hæc, a *Michaelio* constituta, maxime naturalis et species affines conjungit; hinc a me restituta.

36. *Agaricus scorodonius* (*Schæfferi*) graveolens, pileo subcarnoso planiusculo lamellisque crispis albidis, stipite brevi rufescenti glabro.

A. *Schæfferi*. *Perf. Obs. myc.* 2. p. 55.

A. *alliatus*. *Perf. Syn.* p. 373. *Swartz in Ver. Ac. Handl.* 1808. p. 91. *Schæff. F.* t. 99.

A. *alliaceus*. *Siv. Bot.* n. 179.

Fungus non vescus exilis albicans pediculo spadiceo, odore allii. D. *Breynii*. *Mich. Gen.* t. 77. f. 2.

In ericotosis frequens.

Obs. Dederunt *Swartz* l. c. *Persoon* l. c.

37. *Agaricus cepaceus* (*Michelii*) graveolens, pileo submembranaceo convexo luteo, lamellis albis, stipite mediocri lutescenti glabro.

Fungus parvus luteus odore Allii, lamellis albis, pediculo superna parte concolore. *Mich. Gen.* l. c. t. 98. f. 5.

Habitat in Italia in fimo per agros fusco-autumno. *Michelius*.

Obs. Non vidi, sed auctoritate Michelii attuli, cum quoad descriptionem, iconem et locum natalem omnino a sequenti differre videtur.
Stipes deorsum incrassatus 2 - 3 unc. *Pileus* $\frac{1}{3}$ - $1\frac{1}{2}$ unc. (Quoad Ic.)

38. *Agaricus porreus* (Scopoli), graveo-lens, pileo submembranaceo convexo lamellisque fusco-flavescens, stipite longiusculo rufescenti basi piloso.

Ag. *porreus.* *Perf. Syn.* p. 376. *Swariz.* l. c. p. 92.

A. *Scopolii.* *Perf. Obs. myc.* 2. p. 55.

A. *alliaceus.* *Scop. carn.* 2. p. 454. *Sow.* *Fung.* t. 81.

In nemoribus Carnioliae, Angliae, Daniæ, Sveciae inter folia dijecta.

Obs. *A. allicinus* (Bulliard). Schum. *Sell.* *Bull.* t. 158, 524. f. 1, a me non visus; nec ab antecedenti et sequenti sufficientes invenire potui characteres.

39. *Agaricus alliaceus* (Jacquinii) graveo-lens, pileo membranaceo convexo fuscescenti, lamellis albidis, stipite elongato nigrescenti-glaucobasi strigoso.

A. *alliaceus.* *Perf. Syn.* p. 375. *Obs. myc.* 2. p. 54. *Jacq. Obs. Bot.* p. 100. *Fl. Austr.*

t. 82. *Fl. Dan.* t. 1251. *Schum. Sæll.* 2. p. 270.
Albert. et Schwein. l. c. p. 190.

Fungus alpinus odore et sapore Allii &c.
Mich. Gen. p. 144. t. 78. f. 4.

In fagetis umbrosis subudis. Etiam in ligno putrido.

Hæc, ut etiam omnes sequentes Mycenæ species, a me in *Svecia* primo lecta. — Hujus descriptionem dare superfluum foret, cum variis l. c. exstat; sed nomen specif. emendavi &c.

40. *Agaricus leptocephalus* (*Persoonii*) graveolens cinereus, pileo membranaceo umbonato sulcato repando, lamellis crassiusculis adnatis, stipite brevi glabro.

A. *leptocephalus*. *Perf. Syn.* p. 381. *Ic.*
et descr. t. 12. f. 4.

Ad truncos in umbrosis *Svecia*, Germaniæ.

Descr. *Stipes* fistulosus uncialis l. parum ultra, crass. vix pennæ gallinæ æqualis glaber lævis cinereus. *Pileus* membranaceus umbonatus, umbone obscuriori cinereus opacus glaber striatus, striis profundis obscurioribus, margine subrepando; totus explan. $\frac{2}{3}$ unc. &c. *Lamellæ* obscure glauco-cinereæ crassæ distinctæ, in meis speciminiibus totæ fere adnatæ. *Odor* fortis nitrosus.

Obs. *A. epipterygium* Pers. semper graveo-lentem inveni (tacent tamen omnes fere Auctores) et hinc ad hanc familiam pertinet.

B) Inodori.

+ Stipite lactescente.

(Etiam hæc Sectio naturalis.)

41. *Agaricus crocatus*, subsolitarius, pileo membranaceo cinereo obselete striato, lamellis albis stipiteque succo croceo refertis.

Ag. crocatus. Pers. Syn. p. 380. Schrad. Spic. p. 127. Schum. Sæll. 2. p. 272.

β. truncigenus, pileo minori cinereo-rubro.

Inter folia dijecta faginea locis umbrosis humidis in Germania, Dania, *Svecia australi*.

β. Ad truncos fagineos.

Descr. *Stipes* 3-5 unc. crassit. culmi gramin. rectus strictus l. flexuosus croceo-ruber laevis glaber, *radice* obliqua repente fibrilloso-villosa. *Pileus* campanulatus membranaceus papillatus glaber dilute cinereus striatus, vertice laevi subcarnoso obscure rubicundo. *Diamet.* infer. 4-5 lin., pilei explanati uncialis. *Lamellæ* distinctæ 2-natæ candidæ basi attenuato adfixæ et, stipitis instar, succo croceo refertæ.

Var. β. colore, magnitudine et loco natali tantum differt.

42. *Agaricus hæmatopus*, cæspitosus, pileo carnoso - membranaceo rufescenti striato, lamellis albis stipiteque succo atro - sanguineo refertis.

Ag. hæmatopus. Pers. Syn. p. 379. Obs. myc. 2. p. 56. Albert. et Schwein. p. 192.

Ad truncos putridos, præsertim fagineos, Germaniæ, Sveciæ.

Descr. Cæspitosus truncigenus totus fere lacte sanguineo - purpureo refertus. Stipites numerosissimi confertim nascentes fistulosi 2 - 4 unc. crassit. pennæ gallinæ adscendententes glabri deorsum pubescentes, rupti lactescentes. Pileus submembranaceus, disco pseudo - umbonato subcarnoso, campanulatus demum convexus uncialis glaber striatus pallido - roseus l. exalbido - rufescens. Lamellæ leviter adfixæ, denticulo decurrente, 2-natæ albidae.

43. *Agaricus sanguinolentus*, subsolitus, pileo membranaceo rubello striato, lamellis concoloribus atro - purpureo - marginatis, stipite succum dilute rubrum stillante.

Am. sanguinolenta. Albert. et Schwein. I. c. p. 196.

In Germania, Svecia. Meum fungum in paludosis sphagnosis foliis abietinis adhaerentem legi.

Descr. Terrestris solitarius l. gregarius. *Stipes* fistulosus elongatus 4 - 5 unc. - filiformis strictus glaber tenax lævis, basi dilutior subfibrilosus. *Pileus* vere membranaceus late campanulatus obtusus dilute roseus, disco subobscuriori exsiccus glaber striatus, striis saepe obscurioribus 2 - 3 lin. altus, sed explan. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ unc. *Lamellæ* distinctæ dilutiores 2 - natæ subliberæ, margine atropurpureo, interdum concolori. *Succus* stipitis dilute roseus.

44. *Agaricus galopus*, subsolitarius, pileo membranaceo nigrescenti - glauco striato, lamellis albis, stipite succum album secernente.

A. galopus. *Perf. Syn.* p. 379. *Obs. myc.* 2. p. 56. *Alberi. et Schwein.* p. 192.

A. lactescens. *Schrad. spic.* p. 128. n. 35.

In silvis muscosis præsertim humentibus Germaniæ, Sveciæ. Ad ligna putrida, raro.

Descr. Solitarius saepius epigeus, sed etiam epixylus. *Stipes* fistulosus 1 - 3 unc. gracilis basi subincrassatus, radice pubescente auctus, adscendens glaber lævis cinereo-nigricans sursum dilutior. *Pileus* membranaceus campanulatus 3 - 4 lin. striatus glaber "pruinatus *Perf.*" colore plus minusve nigrescenti - cinereo 1 glaucescente. *Lamellæ* liberae albidæ 2 - 3 natæ marginem versus latiores interdum cum pileo, ut stipes semper, lactescentes.

O b s. Lamellas nunquam arcuato - adnexas, ut apud *Persoonium*; sed semper liberas cum *Schradero* inveni.

†† *Stipite exsucco.*

* Lamellis albis, pileo discolori.

45. *Agaricus lavigatus*, subgregarius, pileo membranaceo campanulato lavigato dealbato - cinereo, lamellis albis, stipite basi fibrilloso.

Ag. *lavigatus*. *Pers. Syn.* p. 380. *Albert.* et *Schwein.* p. 192.

In pinetis muscosis humentibus passim; etiam in *Svecia*.

Descr. Gregarius terrestris. *Stipes* fistulosus elongatus 2 - 4 unc. crassit. $1\frac{1}{2}$ - 2 lin. *rectus* subtenax albidus l. cinerascenti - albus lavis glaber basi piloso-fibrillosus. *Pileus* membranaceus campanulatus 4 - 6 lin. latus obtusus nec papillatus, omnino fere lavis exalbido - cinerascens, vertice subobscuriori. *Lamellæ* albidæ latiusculæ 2 - natæ adfixæ.

46. *Agaricus pilosus*, solitarius, pileo membranaceo subhemisphærico papillato striato, lamellis stipiteque basi villoso - albidis.

Ag. *pilosus*. *Pers. Syn.* p. 380. *Albert.* et *Schwein.* l. c. p. 193. *Borsch. El. fung.* p. 67. t. 1. f. 2. non differt.

Ag. filopes. *Bull. Champ.* t. 320.

A. membranaceus. *Hoffm. Nomencl.* t. 6. f. 1.

In silvaticis intra folia dijecta faginea &c. —
Etiam in *Svecia* non infrequens.

Descr. Subsolitarius terrestris. *Stipes* fistulosus elongatus 2—4 unc. gracilis strictus subæqualis albido-cinerascens lævis glaber, basi villo albido radicatus. *Pileus* meinbranaceus, junior cain-palliatus mox hemisphæricus umbonatus striatus glaber albido-cinereus semiuncialis et infra. *Lamellæ* albæ distinctæ alternæ, breviores adfixæ.

47. *Agaricus conigenus*, gregarius, pileo subcarnoso difformi planiusculo umbonato lævigate, lamellis albis confertis, stipite brevi radiculis albis.

Fungus parvus in conis abietis dejectis na-scens. *Buxb. Cent.* I. p. 36. t. LVII. f. 2.

α) *fuligineo-lividus.* *Ag. conigen.* *Pers. Syn.* p. 388.

β) *pallens.* *Albert. et Schwein.* I. c. p. 195.

In Strobilis *Pini Abietis* et *sylvestris* in *Svecia*, Germania &c.

Obs. Fungus Svecicus, quem describo, ad β pertinet. *Buxbaumius* utrumque describit. Icon Ejus, ab omnibus neglecta, bona.

Descr. *Stipes* fistulosus $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ unc. crassit. vix pennæ gallinæ æqualis albus, pulvere conce-

lõre conspersus, basi fibrillis longis rectis albis squâmulas strobilorum adhæret. *Pileus* subcarnosus tenuis convexus subumbonatus dénum planiusculus subdifformis angulatus l. depresso-lævis l. margine tenuissime striatus $\frac{1}{2}$ unc. pallide cinerascenti-rufescens (var. β) et cinereo-lividus P. (var. α). *Perf.* Lamellæ confertæ candidæ angustæ liberæ quidem, sed stipitem fere attingentes.

O b s. Præter colorem pallentem β . ab α . nullo modo differt.

48. *Agaricus vulgaris*, gregarius, pileo membranaceo papillato, dénum subumbilicato subviscofo, cinereo striato, lamellis albidis, stipite crassiusculo viscofo.

Ag. vulgaris. *Perf. Syn.* p. 394. *Albert.* et *Schwein.* p. 198.

In silvis, præsertim Svecicis, autumno pluvioso, sat copiose.

Descr. Gregarius confertus parvus terrestris rarer epixylus. *Stipes* 1-2 unc. fistulosus $1\frac{1}{2}$ -2 lin. crassus deorsum subincrassatus viscosus cinereus inferne pilis albis folia pinea adhæret. *Pileus* membranaceus subviscosus, junior campanulatus mox planiusculus subumbilicatus cinereus striatus 2-3 lin. Lamellæ distinctæ albidæ 2-natae uncinato-adfixæ, etiam subdecurrentes in pileo umbilicato, hinc omphaliis affinis.

Ad hanc sectionem pertinent e Specieis Ag.
galericulatus, polygrammus, spinipes, astivus &c.

** Lamiellis albis; pileoque concolore.

49. *Agaricus lacteus*, subgregarius albus,
pileo membranaceo campanulato obtuso striato, la-
mellis subliberis, stipite longiusculo basi hirsuto.

Ag. lacteus. Pers. Syn. p. 394. Albert. et
Schwein. l. c. p. 198.

β *pithynus*, pilis radicalibus densis subradiat-
is. Pers. l. c.

Habitat in pinetis pasim. Frequens in
Svecia.

Descr. Subgregarius epigaeus, raro epixy-
lus, totus albus. Stipes fistulosus 2 - 3 unc. sub-
filiformis fragilis basi parum crassior adscendens
hirsuto. radicatus, pilis densis albis folia pinea
adnatus, superne glaber laevis. Pileus membra-
naceus campanulatus obtusus, rarissime umbona-
tus, striatus glaber $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ unc. haud ultra. Variat
viscosus. Lamellæ caudidæ subliberæ distinctæ
alternæ l. æquales.

Lamellæ subadnatae secund. Persoon.

50. *Agaricus tuberosus*, gregarius albus,
pileo subcarnosæ convexo laevi, lamellis adnatis,
stipite brevi sclerotiis adnato.

Ag. tuberosus. Pers. Syn. p. 374. Albert.

et Schwein. l. c. p. 190. Bull. t. 25C (in Scler. cornuto Fr.) et t. 522 (in Scl. Fungorum P.)

Ag. bulbosus. Schum. Siell. 2. p. 307.

Ag. amanitæ. Batsch. El. fung. Cont. 1. p. 109. t. 18. f. 93. Pers. Obs. myc. 2. p. 52. & *uberosus* et *B. Sclerotii*.

Ag. alumnus. Bolt. Fung. p. 155. t. 155.

$\beta.$ *cirrhatus*, stipite deorsum piloso. Pers. Syn. l. c. $\beta.$ Obs. myc. l. c. γ ; Alb. l. c. β .

Habitat intra Agaricos putridos et muscos in Sclerotio muscorum, fungorum, cornuto &c. — Passim in Svecia.

Descr. Gregarius confertus parvus in fungis parasiticus. Stripes subfibrillosus tenuis $\frac{1}{2}$ unc. et ultra subæqualis $\frac{1}{2}$ lin. crassus varie flexus plus minusve glaber basi variis Sclerotii inlatus. Pilus 1—2 lin. latus convexus tenuissime carnosus laevis glaber albus papillatus. Lamellæ alternæ adnatae tenues subdistinetæ candidæ.

Obs. Quod de basi hujus fungi polymorpha attulerunt Auctores, ad Sclerotia, quibus innascitur, pertinet. Hinc etiam duæ varietates in Obs. myc. l. c. Vide alio loc.

51. *Agaricus stylobates*, solitarius albidus, pilo membranaceo convexo striato, lamellis piano-adscendentibus, stipite basi membranulae orbiculari imposito.

Ag. stylobates. Pers. *Syn.* p. 390. t. 5. f. 4.
Schum. Sæll. 2. p. 267. *Albert. et Schwein.* l. c.
 p. 196.

Habitat in Germania, Svecia, Dania. A me variis locis lectus ex. gr. in foliis arborum, *vaccinii* *vitis* *id.* et in *Rhizomorpha* *subcorticali* et ligno putrido et præsertim copiose in pinetis ad terram supra folia pinea putrescentia.

D e s c r. Solitarius, rarissime gregarius. *Stipes* fistulosus uncialis et ultra, in specimenibus epipsyllis fere capillaris, in epigæis firmior et saepe transversim corrugatus, glaber albus, basi membranula orbiculari convexa pilosa 1-2 lin. albida l. fuscescens. *Pileus* membranaceus convexus 3 lin. glaber striatus pelucidus albidus, demum cinerascens. *Lamellæ* albidæ plano-adscendentes demum subliberæ 2-4 natæ semiobovatae.

Agar. nanus. Bull. Specifice vix differt. Sequentem hujus subspeciem, valde notabilem, in trunco putrido semel (18. Jul.) legi.

52. *Agaricus dilatatus*, solitarius, pileo planiusculo membranaceo vertice lævi, lamellis liberis, basi membranulæ orbiculari imposito.

In trunco betulino.

D e s c r. Species vix est distincta, sed nec pro mera proris varietas habenda. *Stipes* $1\frac{1}{2}$ unc. fistulosus fragilis lævis, nec corrugatus, glaber

albus deorsum subincrassatus et membranula orbiculari concolore striata glabra convexa 2-lineari impositus. *Pileus* convexo-planiusculis membranaceus albidus uncialis, vertice lœvi margine subdeflexo sulcato-striato, striis sebrazosis. *Lamellæ* albæ distinctæ semilanceolatæ 4-natæ liberæ.

53. *Agaricus integrillus*, fascicularis candidus, pileo membranaceo hemisphærico striato, lamellis decurrentibus distantibus subintegris, stipe deorsum pubescente.

Ag. integrillus. *Pers. Syn.* p. 393. *Ic. & descr. Fung.* p. 54. t. 13. f. 5. *Schum. Scell.* 2. p. 336.

B. lignatilis. *Albert. et Schwein. I. c.* p. 197.

In umbrosis supra folia dijecta et ramulos putrescentes, rarer in Germania, Dania, Svecia.

Descr. Fungus polymorphus, totus semper candidus, fascicularis l. saltim gregarius. — *Stipes* fistulosus saepe uncialis et ultra $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. crassi, suberectis firmulus basi tenuissime incrassatus et pubescens. *Pileus* membranaceus junior conicus, mox hemisphæricus subdiformis basi 2-3 lin. latus, sed explanatus interdum fere semiunc. glaber tenuissime striatus. *Lamellæ* integræ distantes rugæformes subdecurrentes marginem saepe vix attingentes.

Obs. Descri. nostra a Persoonii parum recedit, sed idem omnino fungus.

*** Lamellis albis, margine discoloribus.

54. *Agaricus subromarginatus*, pileo campanulato - convexo membranaceo obtuso cinerascenti - pallido, lamellis adnatis albis purpureo-mARGINATIS, stipite exsucco.

In pinetis *Sveciae* supra folia et strobilos *Pini Abietis*.

Descr. Species maxime distincta, et *Ag. sanguinolentio*, cui descriptio proxima, ne affinis quidem. *Stipes* fistulosus 1 - 2 unc. erectus l. basi curvatus subtenuis albidus æqualis glaber laevis basi fibrillosus exsuccus. *Pileus* junior campanulatus mox convexus non papillatus cinerascenti - pallidus, rarius rufesceni - cinereus $\frac{1}{2}$ unc. et ultra. *Lamellæ* distinctæ firmæ totæ adnexæ 2 - natæ albidæ, margine purpureo - rubræ.

*** Lamellis roseis, rubris &c.

55. *Agaricus rhodellus*, gregarius roseus, pileo campanulato papillato striato, stipite filiformi pallescente fistuloso, basi fibrilloso.

Agar. roseus. *Perf. Syn.* p. 393 t. 5. f. 3.

Ag. fistulosus. *Bull.* t. 518 inter Litt. D.

& P.

In pinetis præcipue abietinis. — Etiam in *Svecia*, cum *strobilino*, qui ad hanc sectionem pertinet.

Descr. Gregarius terrestris. *Stipes* fistulosus 1 - 3 uncial. strictus laevis glaber pallide rubicundus, basi villis albidis vestitus. *Pileus* membr. campanulatus papillatus demum convexus roseus striatus glaber, explan. diam. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ unc. *Lamellæ* dilutiores distantes 2 - 4 natæ arcuato-adfixæ.

Nomen triviale, ne cum *A. roseo* Sowerb., Bull., Witter., Swartz. in *Vet. Ac. Handl.* 1808. p. 84 l. cum *A. roseo* Schäff., Pers. Obs. myc. l. cum *rosaceo* P. et *rosello* Batsch. confundetur, licet invitus, mutav.

56. *Agaricus prerigenus*, subgregarius dilute roseus, pileo convexo obtuso laevigato, stipite capillari pallescente solido, basi glabro. *Icon. vidi Mscr. ad Flor. Dan. apud Cel. Prof. Horne-mann.*

In stipidibus dejectis, praesertim Filicibus, locis umbrocis humidis Svecia, Daniæ.

Descr. Subgregarius tenuissimus. *Stipes* 1 - 3 unc. capillo tenuior solidus (saltim ob tenuitatem solidus videtur) æqualis tenax flexilis dilutissime roseus, basi glaberrimus. *Pileus* tenerime membranaceus junior subglobosus deinde convexus 1 - 2 lin. glaber sublaevis non papillatus, quin potius demum subumbilicatus, sed *Omphal.* species non est, dilute roseus. *Lamellæ* paucæ distinctæ concolores latiusculæ adnatæ.

***** Lamellis flavescentibus, citrinis
ochraceis et rubiginosis.

57. *Agaricus citrinellus*, gregarius, pileo hemisphærico papillato striato stipiteque breviusculo basi piloso citrinis, lamellis uncinatis dilutioribus.

Ag. citrinellus. *Pers. Syn.* p. 384. *Ic. et descr. Fung.* p. 44. t. II. f. 3.

Ag. tenellus. *Batsch. El. fung.* Cont. I.
p. 103. t. 18. f. 88.

In pinetis; rarer in Svecia.

Descr. Parum quidem fungus noster et a *Personii* et a *Batschii* recedit, sed a neutro differt. *Stipes* fistulosus 1-2 unc. filiformis æqualis glaber l. subviscosus rectus lævis citrinus deorsum subobscurior. *Pileus* membranaceus striatus citrinus vertice striisque obscurioribus 2-3 lin. glaber, junior conicus dein late campanulatus. *Lamellæ* albido-citrinæ integræ l. 2-natæ arcuato-adnexæ.

58. *Agaricus elongatus*, solitarius, pileo hemisphærico lævi flavescenti, lamellis adnatis subconcoloribus, stipite longissimo fibrilloso.

Ag. elongatus. *Pers. Syn.* p. 384. *Ic. et descr.* p. 3. t. 1. f. 4.

In paludosis inter Sphagna; passim in Svecia.

Descr. Solitarius terrestris. *Stipes* 4-6 unc. fistulosus crass. pennæ gallinæ rufospadiceus, superne glaber lævis, deorsum villoso-fibrillosus radicatus. *Pileus* convexus flavescens 3-4 lin. latus lævis glaber. *Lamellæ* latiusculæ concordes basi rotundatæ adnatae.

Cum varietatibus *Agar. hypnorum* præcipue *g. Spagnorum* et *d. rubiginoso* (*Ag. rubig. Pers.*) non confundendus, a quibus pileo lævi mox distinguitur.

Obs. In fungum nostrum omnino quadrat descriptio *Persoonii*, sed pileum virescentem ut l. c. depictus, nondum vidi. Pictoris forte culpa.

59. *Agaricus carpophilus*, subgregarius, pileo convexo lævi pallescente, lamellis subliberis ochraceis, stipite brevi solido.

Bull. t. 24. f. 2. *subsimilis*, sed aplo major.

In pericarpiis nucum Fagi dejectis semiputridis, in umbrosis humidis in Svecia.

Descr. Solitarius l. gregarius. *Stipes* solidus? uncialis capillaris rectiusculus glaber lævis pallidus l. subalutaceus, basi fibrillis adfixus. *Pileus* membranaceus convexus 2 lin. latus lævis glaber obtusus sordide pallescens l. pallescenti-albidus. *Lamellæ* ochraceæ latiusculæ liberæ l. levissime adnatae.

60. *Agaricus tener*, subsolitarius ochraceo-ferrugineus pileo conico glabro striatulo; lamellis adscendentibus, stipite longiusculo fistuloso glabro.

Ag tener. *Pers. Syn.* p. 386. *Schæff. F.* t. 70. *Sowerb. F.* t. 33.

Habitat in pratis et graminosis; passim in *Svecia*.

Descr. Solitarius l. sparsus, terrestris tener fragilis. *Stipes* fistulosus 2-4 unc. 1 lin. crassus subæqualis l. deorsum tenuissime incrassatus cylindricus lævis glaberrimus striatulus obtusus flavo-ferrugineus 3-5 lin. altus, explan. uncialis. *Lamellæ* subobscurores cinnamomeæ 2-4 natæ adscendententes.

61. *Agaricus pilosellus*, subsolitarius ochraceo-ferrugineus, pileo conico piloso læviusculo, lamellis adnatis, stipite longiusculo fistuloso villoso.

Ag. pilosellus. *Pers. Syn.* p. 387.

Ad truncos dijectos, raro. In *Svecia* truncos fagineos putridissimos incolit solitarie; in abietino gregarium legerunt in Germania *Albert.* et *Schwein.* l. c. p. 194.

Descr. Solitarius fragilis truncigenus. *Stipes* fistulosus 1-2 unc. filiformis rectus ochraceo-ferrugineus basi subradicatus, villo-denso

tenui albido undique vestitus. *Pileus* conicus l. campanulatus membranaceus ochraceo-ferrugineus superne piloso leviusculo 3 lin. altus et latus. *Lamellæ* subconcolores latiusculæ 4-natæ adfixæ; dentic. decurrente.

***** *Lamellis cyaneis, cinereis &c.*

62. *Agaricus Batschii*, solitarius atrocyaneus, pileo cuculato striato, margine lamelisque dilutioribus, stipite mediocri striato.

Ag. atrocyaneus. *Batsch.* *El. fung.* *Cont.* I. p. 101. t. 18. f. 87. (*a Persoonio ad Ag. polygrammum relatus*).

In graminosis Germaniæ, Sveciæ rarissime.

Descr. Solitarius terrestris. *Stripes* fistulosus uncialis æqualis glaber striatus obscure canus violaceus, vix radicatus. *Pileus* cuculatus l. subconicus obtusus nec umbonatus membranaceus glaber profunde striatus 3-4 alt. 2 lat. cyanus demum subpruinatus, margine dilutior. *Lamellæ* 2-4 natæ rectæ cyaneæ lanceolatae subliberæ, margine albescunt.

Obs. Cum *A. atrocyaneo* Pers. non confundendus.

63. *Agaricus grisens*, solitarius cinereus, pileo convexo striato, margine concolori subpatente, lamellis canis, stipite mediocri tavy. Fries.

β. Ag. griseus. Batsch. El. fung. Cont. I.
p. 87. f. 80.

In pineti ad Temsiö (16. Aug.) semel vidi.

Descr. *Stipes* fistulosus 1-2 unc. eras-
siusculus subfragilis glaber lœvis canescens - cine-
reus. *Pileus* convexus demum explanatus mem-
branaceus striatus glaber obscure cinereus, exsic-
catus canus, minime umbonatus $\frac{1}{4}$ unc. latus.
Lamellæ latiusculæ canæ 2-natae adfixæ. *Stripes*
basi pubescens.

Obs. De *Coprinis*, Genere distincto
Conf. Link in Schrad. n. Journ. 3. p. 12. t. I.
f. 16, 17, in secunda parte.

V. PRATELLA.

64. *Agaricus stipatus*, cæspitosus, pileo
convexo lœvigate fuscescente-livido, exsiccatione
ruguloso pallidente, lamellis adnatis confertis in-
carnato-fuscis, stipite albicante lœvi subnudo.

Ag. stipatus. Pers. Syn. p. 423.

Ag. spadiceus. Schäff. Fung. t. 237.

Ad truncos passim. In Svecia præcipue ad
truncos fagineos.

Descr. Cæspitosus fragilis truncigenus.
Stipes plurimi conferti, 2-3 unciales fistulosi

erecti l. curvati cylindrici aqnose pallidi glabri
læves nudi. *Pileus* membranaceus, vertice sub-
carnoso, convexus $\frac{1}{2}$ - 1 uncial. glaber lavis mar-
gine striatulo plus minusve fuscescens lividus l.
rufescenti-ipadiceus, siccatus expallens rugulosus.
Lamellæ confertæ incarnato-fuscæ latiusculæ 4-
natae adfixæ subnebulosæ pulverulentæ.

65. *Agaricus aleuriatus*, subsolitarius,
pileo subconico, demum explanato subdepresso,
subviscofo, lamellis subliberis ochraceo-cinereis,
stipite albido farinoso nudo.

Agar. farinosus. *Gmel. Syst. Linn.* II. 2.
p. 1414.

Ag. farinulentus. *Schäff. Fung.* t. 205.

In ligno putrido fagineo, in *Svecia*, Ger-
mania &c.

Descr. Solitarius l. gregarius, nec cæspito-
sus. *Stipes* fistulosus $1\frac{1}{2}$ l. $2\frac{1}{2}$ uncial, crass.
pennæ gallinæ l. anserinæ, rectus l. curvatus albus
æqualis, basi interdum incrassatus, glaber, sed
farina albida undique conspersus. *Pileus* junior
conicus mox campanulatus demum planiusculus,
rarius planus, vertice subdepresso, glaber subvisco-
sus tenuissime carnosus dilute cinereus, vertice ob-
scuriori subolivaceo fusco, 1 - 2 unc. laviusculus,
margine striato. Colorem pilei etiam subroseo-
cinerascentei et flavescentem vidi. *Lamellæ* sub-

tenues, sed carne pilei multo latiores, inæquales
stipitem approximatæ, sed rotundato-liberae di-
luteæ ochraceo-cinereæ deum obscuriores.

Obs. E *synopsi Fungorum*. hanc speciem ex-
clusit et in *Comment. Fung. Schæff.* pro varietate
Ag. cernui habendam esse suspicatus Cel. Per-
soon. Nomina illa: *farinosus*, *farinaceus*, *fari-*
natus, *farinulentus* &c. nimiam habent similitu-
dinem et de cetero pluribus apud Auctores com-
munia sunt.

66. *Agaricus cernuus*, subgregarius, pileo
hemisphærico albido, lamellis adnatis cinereo-ni-
gricantibus, stipite albido nudo lævi subcurvato.

Ag. cernuus. *Fl. Dan.* t. 1008.

Ad truncorum radices in *Svecia*, *Dania* &c.
In fimo. *Vahl.*

Descr. Alia dubia Mycologis species, ab
A. aleuriato Fr. vere distincta. Gregarius. *Stipes*
fistulosus *fragilis* 2 uncial., *crass.* *pennæ gallinæ*,
arcuato-ascendens *nudus* *lævis* *albus*, *absque*
pulvere. *Pileus* *membranaceus* *hemisphæricus*
uncialis *subfragilis* *albido-l. flavescenti-cinereus*
glaber *læviusculus*, ob stipitem sæpe curvatum
nonnunquam cernuus. *Lamellæ* *adnatae* *cinereo-nigricantes*, *juniore*s *dilutiores*, 4-8 natæ di-
stinctæ.

Etiam hujus nomen triviale non optimum.

67. *Agaricus farcocephalus*, subsolitaritus, pileo subhemisphærico carnoſo flavescente, lamellis cinereo-fuligineis adnatis, stipite longissimo ventricoso glabro.

In silvis Sveciæ, rarior. Augusto legimus.

Descr. Solitarius, raro gregarius, terrestris. *Stipes* fistulosus strictus 4-6 unc., penna gallina parum crassior, glaber flavesiens rugato-flexuoso-ventricoso. *Pileus* conico-convexus deinde hemisphæricus convexus carnosus glaber flavesiens sublævis l. margine rugulosus, explanatus ultra uncial. *Caro* alba a vermisbus sæpe erosa. *Lamellæ* cinereo-fuligineæ margine albicantes latiusculæ 2-4 natæ adfixæ denticulo decurrente.

Vera omnino Pratellæ species. A *Persoonianis* distinctissima.

68. *Agaricus polytrichi*, subgregarius, pileo convexo subcarnoso flavescente, lamellis adnatis albidis dein cinerascenti-fuligineis, stipite longissimo æquali fibrilloso subannulato.

Ag. mutabilis. *Batsch. El. fung. Cont. 2.* t. 38. f. 208 fungum meum bene refert, sed ab *A. caudicino*, ad quem retulit Cel. Persoon, distinctissimus.

In humidis Sveciæ inter *Polytrichæ* &c.

Descr. *Stipes* fistulosus 2-3 unc., crassit. pennæ gallinæ, subæqualis flavesiens lævis glaber

deorsum fibrillosus. *Annulus* albus fugacissimus. *Pileus* convexus fere membranaceus tenuissime carnosus $\frac{1}{3}$ -1 unc. lævis glaber flavescens, margine deflexo. *Lamellæ* primo albidæ dein cinerascentes fuligineo-nebulosæ latiusculæ adfixæ.

Obs. In animadversariis etiam descripsi varietatem stipite flexuoso et lamellis subliberis.

69. *Agaricus pascuus*, subsolitarius, pileo membranaceo conico dein dilatato cinereo-umbro, lamellis liberis latiusculis incarnatis, stipite glabro nudo æquali.

Ag. pascuus. Pers. Syn. p. 427. Albert. et Schwein. I. c. p. 207.

Ag. pyramidatus. Schæff. Fung. t. 229.

Ag. irregularis. Bolt. Fung. t. 13.

In graminosis et pascuis; passim in Svecia, Germania, Anglia &c.

Descr. *Stipes* fistulosus 2-3 unc., crassit. pennæ gallinæ l. ultra, fragillimus subæqualis cylindricus glaber lævis pileo concolor l. dilutior cinerascens. *Pileus* membranaceus conicus mox campanulatus subconvexus obtusus subflexuosus subaquosus fragilis glaber striatus spadiceus l. sèpius fuligineo-pallens (vid. Alb. et Schw. I. c.) explanatus 1 unc. *Lamellæ* latiusculæ 2-natæ

subliberæ exalbido - roseæ demum incarnato - rufæ
marginè subdenticulatæ.

Vix specie differt:

70. *Agaricus fuligineus*, gregarius, pileo
e campanulato - convexo cinereo - livido, lamellis
liberis tenuioribus, stipite glabro nudo deorsum
incrassato.

Ag. fuligineus. *Pers. Syn.* p. 427.

Habitat quoque in consortio prioris.

Descr. A præcedenti, cui proximus, dif-
fert fungus noster: Stipite subbreviori deorsum in-
crassato cinereo, pileo leviusculo sed demum sub-
ruguloso, striis tamen obscurioribus saepè picto,
tenuioribus roseis et integerrimis lamellis.

71. *Agaricus montanus*, gregarius, pi-
leo subcarnoso convexo fuscescente, lamellis sub-
decurrentibus umbrinis, stipite brevi fibrilloso
equali.

Ag. montanus. *Pers. Syn.* p. 428 (exclus.
var.) *Obs. Myc.* I. p. 9.

β . *xylarius*, truncigenus, stipite fuscescenti-
albido, lamellis adnatis.

γ ? *coriarius*, cæspitosus, pileo repando, sti-
pite farinoso, lamellis rubris.

Ag. montanus. *Albert. et Schwein.* l. c.
p. 207. $\gamma\gamma$.

Ipse var. β . tantummodo in lignis putridissimis ad terram locis sylvaticis dejectis legi.

Varietas β . Pers., me judice, vix hujus loci. Vide inter *Omphalias*.

Obs. Descriptio Persoonii in fungum meum β . bene quadrat, ut vix sit distinguendus nisi loco natali et lamellis minus decurrentibus. Var. γ . vero dubia. *Ag. obtusus*, quoad locum natalem proprius accedit, sed stipite deorsum incrassato &c. differt. An var. β . ad hanc potius referenda?

Descr. β . Stipites plures gregarii, rarius vero cæspitosi, unciales nec ultra subrecti fuscescentes subalbidi æquales, crass. + lin. subfibrillosi. Pileus membranaceo - subcarnosus $\frac{1}{2}$ unc. hemisphaericus obtusus absque umbone, demum plano - convexus fuscescens l. spadiceus (exsiccatus fere canescens) glaber subhumidus lævis margine striato. Lamellæ latiusculæ 4 - natæ umbrinæ nebulosæ totæ adnexæ, raro tamen decurrentes.

72 *Agaricus renax*, subsolitarius, pileo subcarnoso campanulato flavo, lamellis adnatis nebulosis, stipite longiusculo glabro nudo.

In silvis inter folia *Pini Abietis*, Septembri.

Descr. Species optime distincta a reliquis, ut e descriptione patebit. Stipes subfistulosus rectus 2 - 4 uncialis cylindricus subæqua-

lis, interdum, forte monstruosas, medio angustatus, glaber laevis albido-fuscus aliasve coloris. *Pileus* subbarnosus campanulatus flavus l. ochraceus, in margine aquose-flavescens glaber laevis explanatus 1½ - 2 uncialis. *Lamellæ* latiusculæ 4-natae affixaæ nebulosaæ subvirescentes. *Substantia* stipitis et pilei tenax!

VI. L A C T A R I U S.

* Pileo albido.

73. *Agaricus pergamenus*, pileo planiusculo subdepresso candido subcoriaceo, lamellis sordide albidis, stipite obscuriori.

Agar. pergamenus. *Swartz in Vet. Acad. Handl.* 1809. p. 90.

Ag. urens. *Schum. Sæll.* 2. p. 343.

Ag. piperatus. *Bartsch. El. fung.* Cont. I. p. 34. t. 13. f. 59. *in fungum meum bene quadrat.*

In Svecia, Dania, Germania locis umbrosis subhumidis.

Obs. Descriptionem optimam dedit *Illustr. Swartz* l. c. Stipes variat exalbido-coerulescens, spadiceus et badius. Hinc synonymon *Schumacheri* huc etiam retuli.

Hujus loci e Svecicis Ag. Listeri Sowerb.,
controversus P.

** Pileo pallido, cinerascenti, flave-
scenti, &c.

74. *Agaricus pubescens* pileo albido azono
subumbilicato pubescente, lamellis adnatis albo-
lactescientibus, stipite pubescente.

Ag. pubescens. Schrad. Spic. p. 122.

In museois rarissime. Semel in *Svecia* ad
Femfjö legi.

Descr. Stipes breviusculus uncialis, crass.
digiti, solidus teres interdum parum compressus
subæqualis carnosus lævis albidus, pubescens
concolori molli brevi subadpressa ubique tectus.
Pileas sub-2-uncialis carnosus planus, vertice de-
pressus, albidus lævis siccus pubescens, marginè
deflexo subinvoluto villoso. Caro alba. Lamellæ
albæ confertæ affixæ nec decurrentes carne pilei
angustiores.

Obf. Ag. piperati L. (*torminosi* Auct.),
varietas esse videtur.

75. *Agaricus pallidus*, pileo incarnato
pallido umbilicato subviscofo, lamellis subdecur-
rentibus albo-lactescientibus, stipite glabro, basi
subpubescente.

Ag. pallidus. *Pers. Syn.* p. 431. *Albert.*
et Schwein. l. c. p. 209.

Ag. incarnatus. *Pers. disp. Fung.* p. 64.

In silvis umbrosis, præsertim betulinis fre-
quens. Inter *Svecicos* tamen non attulit *Celeb.*
Swartz l. c.

76. *Agaricus intermedius*, pileo flavescenti
luteo umbilicato viscoso margine involuto tomen-
toso, lamellis dilutioribus exalbido-flavo-lacte-
scentibus, stipite deorsum pubescente æquali.

Agar. thejogalus. *Swartz.* l. c. p. 91.
(*exclus. syn.*)

Ag. thejogalus. β. luteus. *Alb. et Schw.*
l. c. p. 208. (*Descriptio optima*)

Ag. crinitus. *Schæff. Fung.* t. 228.

Ag. scrobiculatus. *Schæff.* l. c. t. 227.

In silvis abietinis muscosis humidis.

Descr. *Stipes* nunc solidus, nunc cavus
 $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ unc. crassit. $\frac{1}{2}$ unc. æqualis teres subfir-
mus flavesiens l. albidus sæpius maculis pallidio-
ribus pictus glaber deorsum pubescenti-radicatus.
Pileus carnosus, junior convexiusculus demum
subinfundibuliformis latissimus (3-12 unc., ut
optime monuerunt *Albert. et Schwein.* l. c.) lâte
luteus l. flavesiens, recens viscosus villo ochraceo-
fulvo adglutinato, margine, ut in *torminoso*, in-
voluto tomentoso. *Substantia* alba. *Lac* album,

mox sulphureum. *Lamellæ* 4 - natæ affixæ angustatæ approximatæ exalbido - flavescentes.

In betuletis siccis legimus varietatem *expallentem*, cuius

Descr. *Stipes* cavus vix uncialis albus sub-æqualis l. deorsum angustatus pubescens. *Pileus* carnosus 4 - 5 unc. subsiccus fere infundibuliformis subglaber albidus, margine patente l. erecto, rarius deflexo, et vix involuto. *Lac* omnino prioris. *Lamellæ* 6 - 8 natæ subsimplices albidae decurrentes.

Obs. Medius omnino inter *Ag. torminosum* Schaff. (*piperatum* Linn.) et *thejogalum* Bulliard. Ab utroque vero, ut videtur, distinctissimus. Ad illum, me judice, proprius accedit et ad quem quoque icones Schafferi referendas esse suspicatus est *Persoon* in Obs. Myc. 2. p. 41, cum quo etiam optime comparavit illustr. Swartz et hinc sanguum ejus haud dubius retuli. *Ag.* vero *thejogalus*, quem in Dania vidi, habitu et colore quam maxime differt; sed ob lactis colorem vic affinis. Synonyma hujus, quæ vera videntur:

Ag. thejogalus. *Perf. Syn.* p. 431. *Bull. Herb.* t. 567. f. 2. *Schum. Säll.* p. 347.

77. *Agaricus flexuosus*, pileo rufo - cinescidente subpallido lobato - flexuoso duro azono,

lamellis albo-lactescentibus flavis, stipite brevissimo cinerascente glabro.

Ag. azonatus. *Bull. l. c. t. 559. f. 1.*

In silvis. In *Svecia* legi.

Descr. Gregarius. *Stipes* solidus brevis uncialis, crass. fere unciali, firmus carnosus, deorsum subangustatus difformis, vix teres, glaber lavis cinerascens. *Pileus* carnosus firmus undulatus flexuoso-lobatus rufo-cinerascens azonus 2-4 uncial. glaber lavis siccus. *Lamellæ* flavæ totæ adnatae polynatae interdum furcatæ.

Vix differre videtur *A. flexuosus* Pers. Syn. p. 430. Quam plurima alia Synonyma; licet dubia, afferre possem; sed species plurimæ affines, satis tamen distinctæ, *acris*, *luridus* &c. ex figuris difficilius, quam e descriptionibus determinantur.

*** *Pileo umbrino aut fuliginoso nigrescente.*

78. *Agaricus Necator*, pileo ex olivaceo-umbrino, disco subdepresso zonato, margine tomentoso-involuto, lamellis albolactescentibus, stipite subolivaceo.

Ag. *Necator*. *Pers. Syn. p. 435. Bull. Herb.*

t. 43. Albert. et Schwein. p. 210.

In Gallia, Germania pasim, in *Svecia* rarer.

Minime varietas *A. piperati*. L.

Descr. *Stipes* brevis uncialis, crass. digiti intermedii, firmus solidus, raro demum cavus glaber lactifluus fuligineo-umbrinus l. subolivaceus laevis elasticus intus carnosus albus. *Pileus* carnosus 2 - 4 uncialis convexiusculus, vertice depresso olivaceo-umbrino l. subfuligineo-olivaceo, laevis glaber concentrica subzonatus, margine tomentoso involuto. *Caro* alba firma parere lactescens. *Lamellæ* pallido-albidæ adfixæ sæpe dichotomæ 2 - 4 natæ.

79. *Agaricus blennius*, pileo cinereo-olivaceo piano depresso viscoso margine patente, lamellis albo-lactescentibus, stipite cinerascente.

Krapf. Esh. Schw. I. t. vi. f. 1, 2.

In fagetis Sveciae non infrequens.

Descr. *Stipes* solidus $1\frac{1}{4}$ unc. deorsum angustatus glaber rectus l. basi interdum incurvus elasticus laevis pallidus cinereus lactescens. Variat stipite æquali. *Pileus* carnosus primo planiusculus dein vertice depresso cinereo-olivaceus valde viscosus 2 - 4 unc.; ceterum nec villosus nec striatus, margine glabro patente. *Siccus* observatur interdum coelo sereno, sed humectatus vox viscosus. *Caro* superne cinerascens, inferne alba lactiflua. *Lac* album acre immutabile. *Lamellæ* adnatae albæ inæquales.

Species vere distincta et priori vix affinis.
Eigura citata fungum meum bene refert. — Hu-
jus etiam loci esse videntur:

Agar. xylophilus β. viscosus. *Perf. Syn.*
p. 438 et

Ag. curtipes. *Scbum. Sæll.* 2. p. 343.

80. *Agaricus trivialis*, pileo obscure ci-
nerascenti-incarnato depresso subviscofo, lamellis
albo-lactescentibus, stipite elongato albidō.

Krapf. Esb. Scbw. I. t. 5. f. 1, 2, 3.

In pinetis sat frequens.

Descr. *Stipes* elongatus 2-4 uncial. cras-
sus cavus subæqualis l. inferne parum crassior
subfragilis lævis superne glaber deorsum pubes-
cens. *Pileus* planiusculus, vertice depresso, sub-
infundibuliformis carnosus 2-4 unc. lævis siccus
l. viscosus, quod a coeli temperie pendet, obscure
cinereo-incarnatus, margine subreflexo. *Lamellæ*
albidæ subdecurrentes inæquales, venis sæpe con-
nexis, interdum dichotomæ carne pilei basi angu-
stiores, apice latiores. Variat lamellis adnatis.
Lac, ut in priori, album subacre, non vero
acerimum, immutabile.

Varietatem l. potius monstrositatem, *pileo*
depresso piloso-squamulofo, succo aquoso, *stipite*
rufescente subvilloso eisdem locis semel observa-
vimus.

Ag. pallido proximus, sed colore et magnitudine valde diversus. Ab *A. lurido* lacte immutabili pluribusque aliis differt characteribus. Habitu quodam triviali semper distinguitur.

81. *Agaricus acris*, pileo cinereo-fuligineo azono planiusculo, lamellis exalbido-rufescenti-lactescentibus demum alutaceis, stipite cinerascente.

Agar. acris. Pers. Syn. p. 437. Alb. et Schweiz. l. c. p. 216. Bolt. Fung. 2. t. 60.

Ag. opacus. Batsch. f. 68.

In silvis Sveciae, Germaniae, Daniæ, Angliae &c. minime rarus.

Descr. *Stipes* nunc cavus nunc solidus 2-3 unc. æqualis, crass. pennæ anserinæ l. digiti minimi, lævis subelasticus pallide cinerascens glaber basi subpubescens. *Pileus* carnosø planus subdepressus azonus cinerascens cinereo-lividus l. fuligineus, vertice nonnunquam obscuriori fuligineo, 2-3 unc. lævis glaberrimus, margine junioris reflexo mox patente. *Caro* pallida alba. *Lamellæ* adnatæ alutaceæ l. ochraceæ subdistantes inæquales. *Lac* album demum rufesceni-lateritium.

Ab *Ag. lurido* B. Swartz l. c. p. 212, cui affinis, differt: *stipite* subcavo elastico, *pileo* azono-cinereo-livido, *lamellis* mox alutaceis.

Inter plures novas hujus, quas legimus,

varietates, unam, quam diximus *Agalum*, describamus: *Stipes* elongatus 1-uncialis, crass. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ unc., subæqualis sæpe curvatus subsolidus intus spongiosus glaber lævis. *Pileus* carnosus 3-4 unc. planiusculus subdepressus lævis siccus glaberrimus, margine concolore sæpe flexuoso. *Lamellæ* suberoceæ substeriles 4-8 natæ adfixæ carne pilei marginæ versus latiores. *Odor* non ingratus! *Sapor* et *Lac* fere nullum! et hujus tamen omnino loci: colore pilei et substantia ab *Agar. flexuoso*, antea descripto, quam maxime differt.

82. *Agaricus pyrogatus*, pileo plumbeo-livido subzonato planiusculo, lamellis distinctis albido-lactescentibus pallidis stipite recto fuliginoso. — *Perf. Syn.* p. 436. cum synonym.

In silvis Svecicis sequentes hujus legimus varietates:

α) *obsoletum*: pileo obsolete-zonato, stipite cavo.

Descr. *Stipes* 2-unc. et ultra rectus, crass. digiti minoris, subcavus cinereo-fuliginosus lævis l. sublacunosus, interdum serobiculatus glaberrimus. *Pileus* carnosus plumbeo-lividus planus interdum excentricus, vertice subdepresso, 2-3 unc. glaber lævis; margine patente, zonis obsoletis l. nullis.

Lac album acre immutabile. *Lamellæ* pallidæ
l. albidæ adfixæ inæquales polynatae subdecur-
rentes carne pilei æquales.

3) *dissimilem*: pileo azono, stipite solidio breviori.
Differt: *Stipite* crass. pennæ cygneæ basi sub-
pubescente læviusculelo elastico, *Pileo* subcarnoso
cinereo l. spadiceo-cinereo depresso excavato
fere infundibuliformi, zonis nullis. *Lamellæ*
sunt flavæ decurrentes 4-natae carne pilei latio-
res. — *Pileus* in hac varietate subrugulosus.

Agar. plumbeus P. ab hac variet. vix nisi
magnitudine differt.

γ) *elongatum*: pileo azono, stipite demum cavo
longissimo.

In hoc fungo *Stipes* junior solidus mox
cavus 4-6 unc. fursum reticulatus, olivaceus
l. olivaceo-plumbeus. *Pileus* 2 unc. vere car-
nosus planiusculus depresso nigricanti-fuscus
rugosus, margine duplicito-crenatus l. flexu-
oso-lobatus. *Lamellæ* albæ parum decurrentes
4-natae.

Inter *Polytricha* &c. sæpius viget.

VII. R U S S U L A.

(Distinctum forte Genus. Conf. *Link.*
in *Schrud. Journ.* l. c.)

* Pileo albido.

83. *Agaricus galochrous*, pileo albo margine lavi, lamellis stipiteque mediocri concoloribus. (*Russula galochroa*. Fr.)

Agar. pectinaceus. *Bull.* t. 509. f. L.

Ag. lacteus. *Perf. Syn.* p. 439 (*sed minime confundendus cum lacteo Ejusd. l. c. p. 394.*)

In silvis præsertim umbrosis et fagetis *Sveciae* &c.

Obs. Plurimas *Russulæ* species iterum conjungendas esse nullum dubium est et optime jam monuerunt *Alb.* et *Schwein.* l. c. p. 211 sq. Descr. vero accuratos, ex quibus pateat summa affinitas, superfluas non fore speramus.

Descr. *Stipes* elongatus 2-3 unc., diam. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ uncial. carnosus intus medulla spongiosa farctus basi subangustatus lavis glaber albus. *Pileus* carnosus planiusculus mox depresso concavus albus rectus glaber lavis 3 uncial., margine nudo, absque tuberculis, interdum substriatus. *Lamellæ* albidæ crassiusculæ subdecurrentes æquales, nonnullis ramosis.

Variat pileo virescente: Agar. æruginosus.
Schum. Sall. p. 246.

84. *Agaricus chioneus*, pileo niveo margine tuberculoso, lamellis stipiteque brevi concoloribus. (*Rusula chionea*. Fr.)

Ag. niveus. Pers. Syn. p. 438. Albert. et Schw. l. c. p. 211. (Nomen plurimis commune.)

In umbrosis cum priori.

Ab antecedenti satis forte distincta, sed fragili, depallenti, exalbitanti P. maxime affinis. — Species enim enumeratae ruborem suum saepe plane omittunt; quod etiam testantur maculae illæ rubellæ in hac specie saepe obviae.

Descr. *Stipes* uncialis glaber laevis æqualis candidus subfirmus, crass. digiti minoris, subcavus l. intus spongiosus non tamen eodem modo ac in præcedenti. (In illo enim substantia spongiosa medullam a stipitis liberam format, in hac vero confluunt.) *Pileus* planiusculus albus 2 unc. glaber laevis carnosus, margine striatus tuberculatus. *Lamellæ* subtenues distinctæ adnatæ albæ. *Sapor* (in nostro) americano.

85. *Agaricus lengotbejus*, pileo albido margine striato, lamellis stipiteque flavescentibus. (*Rusula leucoxantha*. Fr.)

In quergetis inter muscos rarer. In Svecia.

Defcr. Cui affinis sit ignoro et, nostro iudicio, vere est distinctus. *Stipes* carnosus vere solidus, nec medulla spongiosa farctus, uncialis et ultra laevis glaber cylindricus flavidus, basi parum incrassato. *Pileus* depresso subconcavus pallide albidus glaber uncialis et ultra medio subcarnosus margine membranaceus fere striatus subtuberculatus patens. *Lamellæ* flavescentes subtenues aquales basi angustissimæ, ut stipitem vix attingunt.

** Pileo rubro.

86. *Agaricus Linnæi*, pileo planiusculo subdepresso margine substriato rubro, lamellis integris albis, stipite albo rubellove. (*Russula Linnæi*. Fr.)

Agar. integer. *Linn. et Auctorum! Fl. Svec.*
p. 449. *Schäff. t. 15, 16. fig. plur. &c. Sowerb.*
t. 201.

Ag. pectinaceus. *Bull. Herb. t. 509. f. plur.*

In silvis vulgatissimus.

Qui hanc speciem attente obseruaverit, omnino videbit, sequentes a me allatas varietates hujus esse loci. (Conf. *Albert. et Schwein. l. c.*)

α) *emeticus*, pileo depresso margine sulcato sanguineo-rubro, stipite saepe rubicundo.

Agar. emeticus. Pers. Syn. p. 439.
 Swartz l. c. p. 213. Schæff. t. 15. Bull.
 l. c. fig. ~~t. u. 2.~~ Krapf. Esb. Schw. f. 2, 3.
 Schum. Sæll. 2. p. 245.

β) *sanguinarius*, pileo explanato subdepresso
 margine substriato obscure rubro, stipite
 albo.

Agar. *sanguinarius*. Schum. Sæll. 2.
 p. 244. Bull. Champ. R. 42. Elrotb t. 2.
 f. 2. c, d. Schæff. Fung. t. 16. f. 4, 5, 6.
 Fl. Dan. t. 1009 &c.

γ) *pulcherrimus*, pileo planiusculo rubro ni-
 tente, margine substriato, stipite toto roseo.

In graminosis subhumidis frondosis.

Descr. *Stipes* longus 3-4 uncial.
Solidus fragilis subtenuis levis glaberrimus.
Pileus 1-2 unc. subtenuis subcarnosus pla-
 niuseulus subdepressus, cum stipite latissi-
 mè roseo-ruber, margine tenuissime stria-
 tus, interdum inflexus. *Lamellæ* candidæ
 rarissime inæquales et rubromarginatæ.

Sequentibus proximus. Sapor ut in
 omnibus varietatibus nunc dulcis nunc
 acerrimus.

δ) *fragilis*, pileo depresso rubefcente-subopaco,
 margine tuberculo-so-striato, stipite albo.

Agar. *fragilis*. Pers. Syn. p. 440.

Schum. Sæll. 2. p. 245. *Albert. et Schwein.*
l. c. p. 212.

Obs. Colore a priori et margine profundius striato differt.

- ε) *vagus*, pileo explanato depresso obscure rubro striato, stipite deo-sum angustato rubro.
sanguinario proximus.

- ξ) *paradoxus*, pileo disco depresso nigrescenti-rubro, ceterum rubello, lamellis emarginatis!

Ceterum a *sanguinario* non differt. —
Sapor duleis solanaceus. Specimen unicum tantum lectum in consortio *Ag. emetici*.

- η) *depallens*, pileo planiusculo læviusculo fuscidente rubro disco depallente, stipite albo l. rubro.

Ag. depallens. Persf. Syn. l. c. p. 440.
Ellr. Esb. t. 3. fig. 1, 2. a, b. *Schaff.*
(t. 112.) 167.

Sapor in eodem specimine nunc dulcis
nunc acris!

- θ) *expallens*, pileo rubro, margine albo.

- ι) *totus albidus*?

Cam plurimis aliis, quas omnes enumerare et superfluum et ingratum foret opus. Nulli enim omnino dantur varietatum limites. Et sapor, quod iam *Persoon* l. c. aliquique annotaverunt maxime in iisdem formis ludit. *Stipes* al-

bus l. rubellus maxime variat, sed lamellas con-
stanter albas vidi, hinc, quamvis invitūs, *alura-
ceum* separavi. Eriam hoc retulissem *Ag. rosa-
ceum* Pers., vulgarem in Svecia, nisi substantia,
auctoritate Cel. *Link* in *Schrud Journ.* l. c.
difficeret. Contextus in hac vesiculosus et in
R. emitica flocculosus. Ceterum nulla differentia.
Fatentum mihi quoque est, easdem formas eis-
dem locis quotannis sāpe crescere, nihilo tamen
minus minime separandæ; hæc enim a loco solo
que omnino pendet. Observationes oculatissimo-
rum de *Albertini* et de *Schweiniz* cum
propriis omnino convenientiunt.

Alia hujus subspecies est:

87. *Agaricus fallax*, pileo depresso spa-
diceo margine dilutiori tuberculofo-striato, laamel-
lis stipiteque aquose-pallidis. (*R. fallax* Fr.)

In paludibus subumbrosis inter *Sibagna*. —
A priori originem dicit et color, quamvis con-
stans, neminem fallat.

Descr. *Stipes* aquose pallidus albus gla-
ber l. deorsum tenuissime pubescens et parum in-
crassatus $1\frac{1}{2}$ unc., apice crass. pennæ auferinæ l.
parum crassior. *Pileus* carnosus subconcavus de-
pressus glaber, obscure spadiceus margine palli-
diori striato-tuberculofo recto l. patente. *Lamellæ*
omnes simplicissimæ fragiles candidæ, sed pallidis-
simæ, distinctæ dentato-connexæ totæ adnatae.

86. *Agaricus alutaceus*, pileo planiusculo rubro, margine tuberculoſo lamellis integris flavis, stipite albo-rubellovo. (*Russ. alutacea*. Fr.)

Ag. alutaceus. *Pers. Syn.* p. 441. α , β . *Schum. Sall.* 2. p. 244. *Albert. et Schwein.* I. c. p. 213.

Ag. Russula. *Scop. carn.* 2. p. 436.

Russula esculenta. *Pers. Obs. Myc.* I. p. 101. β .

In silvis passion.

Eisdem occurrit formis ac *Agar. Linnæi*, quare has enumerare superfluum duxi. Etiam pro hujus varietate habendus:

β . *Xanthopus*, pileo substriato, lamellis flavis, stipite dilutiori flavescente.

Ag. esculentus. *Pers. Syn.* p. 441. *Schæff. Fung.* t. 15. f. 1-3. *Krapf.* I. c. t. 5.

Russ. esculenta. *Pers. Obs. Myc.* I. p. 101.

Cum priori.

Descr. *Agar alutacei*. . *Stipes* crassiusculus, carnosus intus spongiosus sūsum incrassatus, diam. $\frac{1}{2}$ unc., rectus becurvatus 1-2 uncialis lāvis glaber albus l. albus rubro variegatus, in β dilute flavescens. *Pileus* planiusculus vertice depresso ruber, rarius expallens glaber subvifosus l. siccus margine striato patente, sāpe pallidiori. *Lamellæ* juniores pallide-flavescentes de-

inde ochraceæ, plus minusve nitidæ, omnes æquales adfixæ! Sapor in hac specie sæpius dulcis solanaceus; sed tamen, licet rarius, emeticus l. stypticus.

Agaricum campanulatum P. non vidi; forte vero ob pileum campanulatum, qualem nunquam observavi, læve inque species est distincta.

Inter reliquos *Agaricos pectinaceos* Bull. etiam hujus exstat icon.

A. nitidus aliquique huic forte nimis affines.

*** Pileo fulvo l. flavescente.

89. *Agaricus ochraceus*, pileo convexo vitellino margine striato, lamellis ochraceis conferatis, stipite pallescente. (*R. ochracea*. Fr.)

Ag. ochraceus. Pers. Syn. p. 443. Schum. Sæll. 2 p. 245.

In fagetis Sveciæ &c.

Descr. *Stipes* elongatus $1\frac{1}{2}$ - 2 unc., diam. $\frac{3}{4}$ uncial., intus carnosus solidus subæqualis l. sursum subattenuatus lævis glaber candidus in nostro fungo, nec intus medulla spongiosa farctus. *Pileus* carnosus convexus vitellinus subviscosus 2 - 3 unc interdum obliquus, margine sæpius reflexo pallidiori sulcato striato. *Lamella* pallidæ ochraceæ l. flavæ æquales confertæ subtenues leviter adnatæ.

Satis diversus videtur ab *Ag. ochraceo* P. —
 Cel. *Swartz* in *Sv. Vet. Ac. Handl.* 1809. p. 92.
 sub hoc nomine descripsit var. β *sulcata* *Albert.*
 et *Schwein.*, quæ differt *stipite* solidusculo intus
 medulla spongiosa farcto, *pileo* margine lœvi, nec
 striato.

Agar. ochracei var. *stipite* *flavo* describunt
Albert. et *Schwein.* l. c.

90. *Agaricus foetens*, *pileo* convexo-de-
 presso *flavo*, *margine* *tuberculato-sulcato*, *lamellis*
subinæqualibus, *stipiteque* *albidis*. (*R. foetens*. P.)

Ag. foetens. *Perf. Syn.* p. 443.

Ag. fastidiosus. *Perf. in Ust. Annal. Bot.*
nov. 9. p. 9.

Ag. piperatus. *Bull. Herb.* t. 292. (exclus.
Syn.)

Russula foetens. *Perf. Obs. Myc.* I. p. 102.

In *silvis* *loca* *graminosa* *eligit*.

Descr. Reliquis Russulis vix affinis. *Stipes*
cavus *fragilis* 2 unc. *crass.* *pollicari* *subæqualis*
glaber *lœvis* *albus*. *Pileus* *subcarnosus* *junior*
subconvexus *depressus* *demum* *et* *subexplanatus*
flavus *viscosus* *foetidus* *margine* *submembrana-*
ceus *fornicatus* *tuberculosus* *sulcatus* *patens*. *La-*
mellæ *pall*. *scentes* *albidæ* *affixæ*, *basi* *venis* *con-*
nexæ, *latisimæ* *aliæ* *dimidiatæ* *aliæ* *basi* *furcatæ*.

Obs. Hoc de fungo parum dubius sum;

icon *Bulliard* haud dissimilis; sed descriptio completa desideratur et *Ag. ochroleucus* P., cum quo conjugendum voluerunt *Alb.* et *Schwein.* I. e., nullo modo affinis. Ipse etiam legi varietatem *Ag. ochroleuci* Eorum *sulcatam*, quæ vero in foetentein minime transfire posset.

**** Pileo obscuro purpurascente
virescente et subolivaceo.

Ex hac sectione in Svecia crescunt *R. grisea* P., *cynoxantha* Schäff., *livida* P., *nauseosa* P. *furcata* aliæque, de quibus rarioribus in secunda hujus opellæ parte.

VIII. O M P H A L I A.

+ Carnosi.

* Pileo flavescente, rufescente l. spadiceo.

91. *Agaricus cochleatus*, cæspitosus, pileo lobato-contorto tenaci, lamellis ferratis flavescen-tibus, stipite sulcato basi connato.

Var. *Agar. cochleati*. *Pers. Syn.* p. 450.

Abb. d. Schwämme. 3 H. t. 26. 7. 16.

Ag. confluens. *Sow. Fung.* t. 188.

In horto ad Femsjö in Svecia lectus.

In omnibus notis essentialibus convenit fungus noster cum Persooniano, sed colore parum differt. E fig. citatis et deser. *Alberti et Schwein.* l. c pag. 218 tamen hujus loci esse luculenter appetet.

Deser. Cæspitosus sphaeolens, substantia tenaci. *Scipes* longus 4-5 unc. solidus, crassitie digitii minimi, subæqualis basi cum pluribus conatus adscendens flexuosus l. contortus, rufescenti-nigricans intus flavus firmus elasticus sub-sulcatus. *Pileus* carnosus firmus subconvexus umbilicatus glaber lobato-contortus flavescens (rufesceni-fuscus P.) demum rugulosus. *Caro* alba angusta tenax. *Lamellæ* latissimæ serratæ flavescentes inæquales decurrentes.

92. *Agaricus trichæus*, pileo carnoso alutaceo sparsim squamuoso piloso umbilicato, lamellis decurrentibus stipiteque cavo luteis.

Ag. trichæus. *Perf. Syn.* p. 451.

Ad ligna pinea putrida, in silvis *Sveciae*, Germaniæ &c. solitarie.

Deser. *Scipes* fistulosus uncialis, crass. pennæ gallinæ, subæqualis incurvus glaber, basi radice albido-tomentosa lignum intrante, lavis tenax elasticus. *Pileus* in nostro carnoso-membranaceus 1 unc. rarissime 2 unc. sordide flavus squamuoso-pilosus convexus umbilicatus, mar-

gine subreflexo glabro. *Lamellæ latiusculæ luteæ distinctæ 2-3 natæ arcuatæ decurrentes carne pilei flavescente latiores.*

93. *Agaricus pachophyllus*, pileo subcarnoso cinerascenti-luteo subglabro depresso, lamellis decurrentibus albido-flavescentibus, stipite sub-solido luteo.

In silvis, Julio lectus. Pulchra species.

Descr. *Ag. bellæ, trichæ &c. proximus. Solitarius. Stipes 1½ unc., crass. pennæ gallinæ, glaber lævis luteus solidus apice subcavus. Pileus convexo-planiusculus, vertice depresso, subcarnosus subglaber l. tenuissime flocculosus 1-1½ unc. cinerascenti-luteus, intus cavus! margine demum rimosus. Lamellæ crassæ distinctæ horizontaliter decurrentes albido-flavescentes.*

De *Ag. tubæformi, nivali &c.* vid. alio loco.

De speciebus Svecicis Swartz l. c.

** Pileo albido.

94. *Agaricus fragrans, odoratus*, pileo convexiusculo nitido lamellisque albidis l. albido-brunneis, stipite tereti concolore. Swartz l. c. p. 245 cum syn. et descr. optima.

In pinetis sub juniperos legi varietatem: Stipite 2-3½ unc. subflexuoso, pileo toto albo margine reflexo, lamellis viridibus decurrentibus.

95. *Agaricus candidans*, inodorus albo-nitens, pileo carnoſo ſubdepreſo lævi, lamellis ſubdecurrentibus, ſtipite firſtuloſo.

Agar. candidans. *Perf. Syn.* p. 456. *Alb. et Schwein.* l. c. p. 219.

Ag. umbilicatus. *Bolt. Fung.* t. 17.

Inter folia dejecta faginea in *Svecia*, Germany.

Descr. Solitarius et raro gregarius. *Stipes* firſtulosus uncialis l. parum ultia ſubcurvatus glaber l. baſi tenuiſime elongato-radicatus ſub-pubesſens, albus lævis. *Pileus* ſubcarnosus ni-tens albus haud uncial. glaberrimus lævis, junior convexus dein depreſſus et fere ſubumbilicatus. Observavi quoque pileum zonis nitidioribus variegatum! *Lamellæ* candidæ approximatæ anguſtæ 4-natæ ſubdecurrentes.

Agar. dealbato. *Sow. Fung.* t. 123 minor, pileus integer nitens, lamellæ nunquam ſordidæ.

96. *Agaricus chryſoleucus*, cæſpitosus; pileo carnoſo-membranaceo hemiſphærico albido, lamellis ſubdecurrentibus ſulphureis, ſtipite albo firſtuloſo.

Ag. chryſoleucus. *Perf. Syn.* p. 457.

Ad terram nudam fungum *Svecicum* legi.

Descr. Gregarius ſubcæſpitosus. *Stipites* plures læviter connati unciales, crasf. pennæ gal-

linæ, æquales glabri albidi l. albido-pallidi, a situ
ſæpe curvati, juniores solidi dein fistulosi. *Pileus*
carnoso-membranaceus, junior convexus deinde
hemisphærico-planiusculus subumbilicatus glaber
albidus l. pallescens uncialis margine striatulo.
Junior interdum etiam dilutissime flavescens. *Caro*
tenuissima pallida. *Lamellæ* latiusculæ 4-natæ di-
ſtinctæ leviter decurrentes sulphureæ l. ochraceæ.

97. *Agaricus phyllophilus*, subcapitatus
candidus, pileo carnoso umbilicato lævi, lamellis
decurrentibus, ſtipite fistuloso basi piloso.

Agar. phyllophilus. Pers. Syn. p. 457.
Albert. et Schwein. p. 219.

In filvis abietinis Sveciæ legi.

Defcr. *Stipes* cavus 2-3 unc. albidus
glaber, striatulus l. lævis basi subincurvus radica-
tus pubescens, radice subfusciformi. *Pileus* car-
nosus lævis umbilicatus candidus 2 unc. et ultra
glaber, demum subinfundibuliformis, margine
ſæpius deflexo. *Lamellæ* decurrentes 4-6 natæ
diſtinctæ. *Odor* debilis.

*** Pileo nigrescente, cinereo, livido,
subviolaceo.

98. *Agaricus adustus*, magnus, pileo car-
nosu demum nigrescenti-adusto, lamellis albis
adnatis, ſtipite firmo ſolido.

Ag. adustus. *Pers. Syn.* p. 459. *Schum.*
Sall. 2. p. 309.

Ag. elephantinus. *Sowerb. Fung.* t. 36.
Bolt. Fung. t. 28.

Ag. nigricans. *Pers. Obs. Myc.* 2. p. 50.
Bull. Herb. t. 370. f. 2. — t. 589. /non quadrant/

In silvis et pratis stéril oribus, sat frequens
 etiam in *Svecia*, sed a Mycologis nostris neglectus.

Descr. dedit *Persoon* in *Obs. Myc.* l. c.
 sed parum recedit fungus noster, hujus quamvis
 certissime loci. *Stipes* breviusculus 1 - 2 pollic.
 firmus 1 - 1½ unc. fere crassus subæqualis solidus
 glaber lævis albidus mox cinereo-fuligineus, in-
 tensus albidus cinerascens dein fuligineo-niger. *Pileus*
 carnosus 3 - 6 unc. convexiusculus vertice
 subdepresso, junior albus l. cinereus lævis mox
 fuscescens demum niger subtesulatim rimosus.
Caro pilei alba cinerascens fuligineo-nigricans
 compacta nec elastica absque succo rubescente;
 nec pileus umquam coerulescit l. fit olivaceus.
Lamellæ albæ pallescentes demum fuligineo ni-
 gricantes crasæ fragiles adnatae carne pilei an-
 gustiores.

Descriptiones Ag. elepbantini melius in no-
 strum quad: ant.

Mycogenus fungus. In hoc nascuntur *Aga-*
ricus parasiticus Buill. *Asterophora agaricoides* Fr.
 (Ag. lycoperd. Buill. Aster. lycop. Distm.) *Peziza*

mycophila Fries et plures Sclerotii species cum
Ag. tuberoso &c.

99. *Agaricus expallens*, pileo carnosso-
membranaceo umbilicato gibro livido - cinereo
marginе striato, lamellis decurrentibus dilutiori-
bus, stipite pallido.

Ag. expallens. *Pers. Syn.* p. 461.

Inter *polytricha* &c. iam aestate in *Svecia* legi.

Descr. *Agarico tardo* P. omnino nimis
affinis nec ulli dantur limites, quod e descrip-
tione cuin optima *Swartzii* l. c. *Agar. tardi*
comparata patebit. *Solitarius* l. *gregarius*. *Sti-*
pes solidus uncialis haud ultra, crass. pennæ gal-
linæ l. anserinæ, elasticus lævis rectus l. basi cur-
vatus glaber, ad radicem subfibrillosus sordide
albidus l. cinerascenti-pallidus. *Pileus* planiu-
sculus vertice depresso margine subdeflexo glaber
lævis tenuissime striatulus, unciamē haud attin-
git latitudinem, tenax carnosso-membranaceus li-
vido-cinereus siccus. *Lamellæ* dilute cinereæ l.
sordide albido-cinerascentes subdistantes tenues
4-natæ decurrentes.

100. *Agaricus dicolor*, pileo subcarnoso
hemisphærico umbilicato cinereo demum albescen-
te, lamellis subdecurrentibus dilutioribus, stipite
subcompresso deorsum obscure cinereo.

Ag. dicolor. *Pers. Syn.* p. 462. *Albers.*

et Schwein. l. c. p. 221. cum plur. var., quibus addenda:

d. teretiusculus, pileo subcarnoso, lamellis emarginato-decurrentibus, stipite teretiusculo.

In pinetis Sveciae, gregarie et subcaespitose.

Descr. *Stipes* $1\frac{1}{2}$ – 3 unc. villoso-pruinatus firmus, crass. pennæ anserinæ, deorsum subincrasatus villosus saepe curvatus teres, rarius subcompressus, cinereus. *Pileus* subcarnosus umbilicatus l. infundibuliformis laevissimus glabriusculus 1 – 3 unc. nigricante-cinereus subnitens demum expallescens, junior saepe convexiusculus. *Lamellæ* carne pilei tenui-cinerascenti latiores sub-distinctæ albidae l. cinereæ 4-natæ emarginato-adnatæ; sed ob formam pilei infundibuliformem decurrentes esse videntur.

101. *Agaricus difformis*, pileo carnosomembranaceo cinereo-livido striato umbilicato, lamellis latiusculis decurrentibus albis, stipite tereti albido.

Ag. difformis. Pers. Syn. p. 462.

In graminosis humidis subumbrosis denso agmine. Septembri.

Descr. Gregarius nec caespitosus terrestris. *Stipes* solidus dein fistulosus 2 – 4 uncial., crassitie pennæ gallinæ subtenuis, sed tenax, subflexuoso albidus glaber laevis æqualis. *Pileus* carnos-

membranaceus planiusculus vertice depresso, interdum excavatus et fere infundibuliformis junior elitus demum cinereo-lividus l. obscure cinerascens $\frac{1}{2}$ - 1 unc. latus glaber subirregularis striatus. Lamellæ carne pilei latiores adfixæ planodecurrentes albidæ demum dilute cinerascentes.

102. *Agaricus epichysium*, cinereo-nigricans, pileo submembranaceo infundibuliformi striato, lamellis distinctis decurrentibus dilutioribus, stipite basi subvilloso.

Ag. epichysium. Pers. Syn. p. 462. Ic. pict. t. 13. f. 1.

β. *icmadophilus*, tenerrimus, pileo obscure cinereo, lamellis plano-decurrentibus cinereis. Pers. l. c. p. 463.

In truncis putridis præsertim fagineis in Svecia, Germania &c. β. in paludibus inter sphagna. — Reliquas ab Albert. et Schwein. l. c. allatas varietates non apud nos vidi.

Descr. *Stipes* uncialis 1 - $1\frac{1}{3}$ lin. crassus subfirmus æqualis teres basi pubescens, ceterum glaber laevis rectus solidus cinereus. *Pileus* tenuissime carnosus (forte potius dicendus membranaceus) infundibuliformis cinereus l. cinereo-fuligineus, exsiccatus canus, glaber $\frac{1}{2}$ unc., margine reflexo striato. *Lamellæ* decurrentes cinereæ, interdum albidæ, 2-natæ distinctæ subangustataæ, carne pilei latiores. *Caro* fuscescens.

+ Pileo membranaceo.

* Lamellis adnatis, vix decurrentibus.

103. *Agaricus ocellatus*, pileo plano lævi albo, umbilico obscuriori, lamellis adnatis albis, stipite fistuloso fuscescente.

In pinetis juxta vias locis graminosis. Ad Femsjö in Svecia mihi obvius.

Descr. *Stipes* fistulosus vix uncialis, crass. culmi graminei minoris, æqualis erectus lævis glaber exalbido-pallide-fuscescens, basi radicula sublonga villosa appendiculatus. *Pileus* membranaceus planus, vertice depresso obscuriori, glaber tenax $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ uncial. albidus lævis, margine patente crenulato-striatulo. *Lamellæ* albæ basi latiores alternæ totæ adnatæ sed non decurrentes et a stipite facile decadunt.

Habitu quodam communi distinguitur; apud recentiores Mycologos non invenio.

104. *Agaricus pictus*, pileo ovali-oblongo nigro-striato fuscescente umbilico discolori, lamellis adnatis albidis, stipite solido spadiceo fusco.

Ag. glandifer, pileo oblongo nigro-fusco striato: margine constricto-albo, stipite linearie nigro-fusco, lamellis albis elongatis. *Batsch. El. fung. Cont. I. p. 99. t. 18. f. 86. (minime tamen cum Ag. glandifero Pers. confundendus.)*

In silva *Femsiönenſi* locis umbrosis supra folia *Vaccin. Myrtilli* 2 l. 3 specimina rarissimi hujus fungi et optime distincti mihi obvia. Unicum tantum vidit Cel. *Bartsch.*

Descr. *Stipes* solidus 2 - 3 unc. subfili-formis æqualis, vel sursum tenuissime incrassatus strictus laevis glaber nigro-fuscus l. spadiceus apice dilutior basi membranula fusco-strigosa radiata impositus. Specimen unum vidi stipite valde flexuoso. *Pileus* membranaceus umbilicatus ovali-oblongus subcuculatus 2½ lin. altus 2 lin. latus fusco-spadiceus, junior dilutior, demum nigrescenti-fuscus, umbilico depresso albo-flavescenti (saltim in nostro), striis primum oliveis mox nigris pictus, margine saepe constrictus dilutior. *Lamellæ* distinctæ subæquales breves latæ albidæ dein subgriseæ adnato-decurrentes.

Ad hanc sectionem pertinent: *Ag. androscapus, epiphyllus &c.*

** Lamellis longissime decurrentibus.

105. *Agaricus roridus*, pileo hemisphærico-conico sublævi albo, umbilico concolori, lamellis arcuato-decurrentibus, stipiteque copiosissime candido-viscosis.

In pinetis, locis præcipue umbrosis roridis, in ramis *Vaccin. Myrtilli*, surculis *Lycopodii* an-

notini, foliis *fagineis*, *pineis* &c. *solitarie*, sed minus infrequens in *Svecia*.

Deser. Alia iterum species ab omnibus distinctissima, ut ne ullæ quidem dentur affines. *Solitarius*. *Stipes* solidus $\frac{1}{2}$ - 1 unc. albus æqualis subtenax adhærens, *visco copiosissimo nitidissimo!* corticatus. *Pileus* junior conicus denum hemisphæricus umbilicatus glaber siccus sublævis albus 2 - 3 lin. latus. *Lamellæ* latiusculæ candidæ 2-natæ arcuato-deurrentes.

106. *Agaricus stellatus*, pileo convexo striate albo, umbilico concolore, lamellis decurrentibus, stipite sicco membranula convexa strigoso-radiata imposito.

Ag. stellatus, pileo striato, stipite gracili involuero radicali stellato cincto. Hoffm. Nomencl. fung. I. n. 306. t. 6. f. 2.?

Ad truncos putridos humidos in *Svecia* rarer.

Deser. *Ag. stylobati*, lacteo β. epiphyllum γ. aliisque ob stipitem basi tuberculatum affinis. Distinctus tamen videtur. Totus albus gregarius. *Stipes* subsolidus vix uncial. æqualis, crass. pennæ passerinæ minoris, subgracilis fragilis curvato-ascendens (a loco), basi membranula convexa concolore 1 - 2 lin. strigoso-radiata. Interdum membranulæ duo confluant. *Pileus* membranaceus convexus umbilicatus diaphanus glaber striatus

sub 4 lin. siccatus interdum flavescens. *Lamellæ* candidæ tenues integræ l. alternae distinctæ decurrentes. (In *stylobati sublicheræ*!)

An figura citata ad hanc l. reliquos affines pertineat species, dubius sum. Huic tamen proximus

Ag. stellatus. *Retz.* in *Vet. Acad. Handl.* 1769 p. 252 est *Ag. corticola.* *Pers.* *Swartz.*

Ad hunc etiam pertinent *Ag. corticalis,* *Som.* t. 243, et *Ag. hyemalis* *Osbeck* in *Retz. Suppl.* 1. *Fl. Scand.* p. 19.

107. *Agaricus hepaticus*, pileo convexulo profunde umbilicato lævi lamellisque decurrentibus hepaticis, stipite fistuloso dorsum subincrasato subpubescente.

Ag. hepaticus. *Bartsch.* *El. fung.* *Cont.* 2. t. 38. f. 211.

In terra nuda *Sveciæ*, *Germaniæ*.

Descr. Non *Agar. montani* varietas, ut vult *Cel. Persoon*; sed *Agar. ericorum* me judice proximus. *Stipes* 1 - 1½ unc., 2 lin. crass. fistulosus subadscendens lævis dilutior hepatico-rufescens glaber, basi subincrasatus albidus tenissime pubescens. *Pileus* convexus submembranaceus (parum carnosus) ½ unc. subglaber l. nonnunquam fibrillosus rufo-hepaticus, umbilico profundo concolore, margine subinfuso. *Lamellæ* latiusculæ rectæ 2-natæ albido-hepaticæ arcuato-decurrentes.

Ag. serrula P. etiam huic affinis videtur, an potius ad carnosas species referendus?

108. *Agaricus ericetorum*, pileo plano umbilicato striato sordide flavescente l. griseo, lamellis decurrentibus, stipite deorsum pubescente subfistuloso.

Ag. ericetorum. *Albert. et Schwein.* l. c. p. 225.

Ag. nothus, albidus cinerascens flavicansve, lamellis decurrentibus, carne alba, stipite gracili farcto. *Gmel. Syst. Linn.* 2, p. 1423. (*diagn. bona, coloris mutationes exprimens.*)

Agar. pseudo-androsaceus. *Bull. Champ.* t. 276. (*optime.*)

α) *albicans* l. *flavescens.* *Alb.* l. c. p. 225. α.

Ei. Dan. t. 1015. f. 1. (*exclus. syn.*)

β) *griseus.* *Alb. et Schwein.* l. c. γγ.

Ag. ericetorum. *Pers. Syn.* p. 472. *Obs. Myc.* 1. p. 50. t. 4. f. 12. *cum descr.*

In ericotosis humidis α) copiosissime, β) rarissime in *Svecia* legi.

Descr. α) *Stipes* subfistulosus (sed haud raro solidus) $\frac{1}{2}$ – 1 unc. subæqualis, crassit. pennæ gallinæ et ultra, teres firmus glaber lævis pallidus albus l. exalbido-flavescens, basi pilis tenuissimis, interdum nullis, obsitus. *Pileus* membranaceus (l. disco carne tenuissima albida) $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ unc. flavescens pallidus subsordidus planus umbilicatus striatus, margine patente, in speciminibus

Juxtantibus undulato-lobato, radiis obscurioribus pecto. Lamellæ pallidæ latissimæ basi crassiores (*male, me judice, dicitur: basi latiores*) 2-natæ pallidæ decurrentes distantes. — In pratis humidis legi formam: stipite solido albido glabro $\frac{1}{2}$ - 1 unc. subflavescenti, pileo subcarnoso infundibuliformi, turbinato flavescenti-albido sublævigato. Lamellis 4-natis.

109. *Agaricus campanella*, subcæspitosus, pileo hemisphærico umbilicato ferrugineo, lamellis decurrentibus, stipite fistuloso spadiceo æquali.

Ag. campanella. Pers. Syn. p. 469. Batsch. El. p. 74.

Ag fragilis. Schaff. Fung. t. 230.

Ad truncos pineos, frequens. I. Floris Svecicis neglectus tamen.

Descr. Gregrarius subcæspitosus. Stipes fistulosus 2 unc., crassit. vix pennæ gallinæ, glaber subæqualis elasticus spadiceus l. castaneus sursum dilutior, radice fibrillosa pubescente subcurvata. Pileus membranaceus hemisphæricus glaber striatus tenax umbilicatus $\frac{1}{4}$ - $\frac{2}{3}$ unc. flavoferrugineus. Lamellæ decurrentes dilutiores flavescentes subalternæ basi venis inter se connexæ.

110. *Agaricus tricolor*, gregarius, pileo convexo umbilicato ochraceo-flavo, lamellis decurrentibus basi crassis, stipite solido sursum incrassato.

Agar. tricolor. *Albert. et Schwein.* I. c.
p. 224. t. 9. f. 5.

Habitat in silvis, pascuis &c. Germaniæ,
Sveciæ.

Obs. *Fungus Svecicus* ad variet. β . *bicolor*-
lorem proprius accedit. Ceterum vix differt nisi
lamellis flavescentibus aurantiacis et vix roseis.
A priori, cui habitu haud dissimilis, abunde
distinguitur: *stipite* solido sursum incrassato, *pileo*
minus striato dilutioni et *lamellis* basi crassis. —
Non *Ag. tricolor* Bolt.

111. *Agaricus muralis*, subgregarius, pileo
convexo umbilicato striatulo rufescente, lamellis
decurrentibus, stipite solido fuscescente-rufo.

Ag. muralis. *Swartz in Vet. Acad. Handl.*
1809. p. 94. *Sowerb.* t. 322. •

Meum fungum in palustribus legi.

Recedit a descr. Swarziania: *stipite* unciali
sursum incrassato, *pileo* minus umbilicato et la-
mellis flavis. Varietas saltim esse videtur.

112. *Agaricus (fibula. P.) γ. hydrinus*,
lamellis flavescentibus, major.

In palustribus.

Color pilei vulgaris hujus fungi ludit quam
maxime, aurantiaco, albido, albo et fulvo varie-
gato, rufescente &c. (vid. *Bull. Champ.* t. 550)
sed lamellæ sæpius albæ. In sylva deusta pa-
ludosa legimus varietatem nunc describendam,
cujus *Stipes* brevis vix uncialis teres junior

solidiusculus deinde fistulosus (hinc in *communi*
etiam solidus ab his, fistulosus ab illis describi-
tur) lavis glaber l. deorsum pubescens pileo con-
color. *Pileus* subinfundibuliformis membranaceus
 $\frac{2}{3}$ - $1\frac{1}{4}$ unc. latus! ochraceus l. aquose flavus radiis
obscurioribus ramosis striatus, margine deflexo
nonnunquam undulato-lobatus. *Lamellæ* dilutio-
res flavæ latiusculæ 4-natæ distinctæ decurrentes.

113. *Agaricus Swartzii*, pileo planiusculo
umbilicato lavigato albido, disco fusco, lamellis
longissime decurrentibus albis, stipite solido.

In fageis umbrosis roridis, *Svecia* inter-
muscos, rarer.

Vere distinctus et stipite solido aliisque no-
tis haud difficile a sequenti distinguitur.

Descr. *Stipes* solidus glaber lavis rectus
uncialis deorsum subangustatus subfirmus fusce-
scens albidus. *Pileus* planiusculus junior con-
vexus umbilicatus 2 lin. latus (haud ultra) lavis
albidus vertice fusco. *Lamellæ* longissime decur-
rentes albæ tenuisculæ in stipite angustiores.

Icones harum alio loco dabo.

114. *Agaricus speireus*, pileo planiusculo
umbilicato striato cinerascenti, disco fusco, lamel-
lis longissime decurrentibus albis, stipite fistuloso.

In truncis quercuum dejectis muscosis in
Svecia, sparsim crescens.

Species illæ *Swartzii*, *speireus* et *ocellatus*
tribum naturalem, quem *discoideos* dixi efficiunt.

Descr. Solitarius rarius subgregarius. *Stipes* uncialis et ultra inter muscos s^epe radicatus fistulosus rectus l^avis glaber gracilis tenax filiformis albidus. *Pileus* membranaceus planiusculus umbilicatus glaber striatus pallide cinereus vertice fusco striisque obscurioribus variegato, 2-3 lin. latus haud ultra. *Lamellæ* candidæ alternæ basi latiusculæ distinctissimæ longissime decurrentes.

115. *Agaricus* (?) *ditopus*, pileo subcarnoso - coriaceo - membranaceo undulato - lobato cinerascente umbilicato, lamellis adnato - decurrentibus stipiteque cavo concoloribus.

An varietas Agar. buccinalis. Batsch. El. fung. Cont. 2. p. 25. t. 39. f. 214.

In silvis abietinis densis Sveciæ inter muscos. De tribu hujus fungi dubius sum, *pileus* fere infundibuliformis hujus loci esse svadet, sed excentricus s^epe est, et substantia fere coriacea ad *Pleuropodes* accedit.

Descr. *Stipes* cavus 2-uncial. crassitie penæ anserinæ crassiorve teres l. compressus cinerascens glaber basi pubescens. *Pileus* difformis carnoso - coriaceus undulato - lobatus subexcentricus subinfundibuliformis cinereus glaber 1-2 unc. et ultra. *Lamellæ* tenues polynatæ cinerascentes adnato - decurrentes in lobis pilei divergentes.

Transitum ad sequentem familiam efficit.

IX. PLEUROPUSS.

* Pileo integro, stipite excentrico.

116. *Agaricus corticatus*, pileo carnosō convexo floccoso-villoso cinerascente, margine subinvoluto, lamellis decurrentibus candidis, stipitibus excentricis albo cortinatis.

In truncis fagineis adhuc vivis Sveciæ.

Species maxime notabilis. *Fungos* tamen juniores tantum non modo vidi, hinc magnam cum *Ag. Lepiota Alb. et Schwein.* l. c. p. 229 suspicor affinitatem. *Cortina* alba, stipite non verticali aliisque notis differre videtur. An varietas?

Descr. Subsolitarius. *Stipes* solidus 2 unc., $\frac{3}{4}$ unc. crassus subæqualis firmus adscendens fibrilloso-villosus l. g'aber. *Pileus* carnosus convexus cinerascens floccoso-vilosus 2 unc. margine subinvoluto, *cortina* alba lamellas nondum explicatas obtegente appendiculatus, excentricus, sed integer. *Lamellæ* candidæ longissime decurrentes inæquales subangustæ basi tenuiores s'ape dichotomæ subdistinetæ.

117. *Agaricus ulmarius*, imbricato-gregarius, pileo exalbido-lutescente latissimus, lamellis latis subemarginato-adnexis, stipite excentrico nudo.

Ag. ulmarius. Pers. Syn. p. 473. Sowerb. Fung. t. 67. Bull. Herb. t. 510. Sibib. Ox. p. 345.

$\beta.$ *epiphegus*, subsolitarius, pileo albido-lividente, lamellis truncato-adnexis.

In truncis. $\alpha.$ in truncis *Populi nigræ* ad Lundinum. $\beta.$ ad *Fagos* putridas legimus.

Var. $\alpha.$ optime descripsit Illustr. *Swarz* l. c. 1808. p. 251 in eademque arbore legit.

Descr. $\beta.$ Minor gregarius, 2-3 basi connati. *Stipes* adscendens curvatus teretiusculus deorsum subincrasatus solidus fere glaber 1-2 unc. elasticus. *Pilei*-sæpe imbricati, sed pauciores quam in vulgari, integri excentrici horizontales convexi margine deflexo involuto 1-2 unc. albido-cinerascens. *Caro* alba. *Lamelle* albæ 2-4 natæ latæ truncato-adnatæ. — Species non est distincta.

Obs. Distinguendum inter lamellas rotundato-adnexas, truncato-adnexas et emarginato-adnexa, quæ optimos sæpe præbent characteres.

118. *Agaricus spodoleucus*, subsolitarius, pileo convexo cinereo glabro, lamellis angustis decurrentibus albis, stipite excentrico nudo.

Ad trunco fagineos Sveciæ.

Primo obtuitu *Ag. ulmario* $\beta.$ *epiphego* similis, ut pro varietate omnino habereim, nisi lamellis longissime decurrentibus distingueretur.

Descr. Solitarius l. gregarius, vix exspitosus. Odor nullus. *Stipes* brevisimus vix $\frac{1}{2}$ unc. crassus (penna anserina saepius crassior)

solidus elasticus adscendens glaber laevis cinerascens l. pallidus. *Pileus* convexus carnosus uncialis et ultra glaber cinereus l. cinerascenti-fuscus integer; sed excentricus, margine deflexo, initio inflexo. *Lamellæ* albæ l. pallescentes decurrentes angustæ 2-4 natæ carne pilei alba angustiores confertæ eglandulosæ; quamvis *Agar. glanduloso Bull.* et præcipue ejus varietate *B. horizontali Albert.* affinis.

119. *Agaricus torulosus*, carneo-subsuberosus, pileo infundibuliformi margine revoluto suboliquo fulvo-carneo, lameilis longe decurrentibus, stipite brevi griseo-tomentoso. *Pers. Syn.* p. 475. *Albert. et Schwein.* l. c. p. 227.

Ag. griseo-tomentosus. *Batsch. El. fung.* f. 33.

Ab hoc fungo sequentem varietatem separare non ausus sum:

B. nephrotricus, pileo planiusculo cinereo-alutaceo stipiteque griseo-tomentosis.

Ad truncos destructos *Sveciae.*

Descr. Gregarius. *Stipes* brevis vix unciam attingens crassiusculus deorsum subincrasatus solidus curvatus albidus griseo-tomentosus. *Pileus* planiusculus carnosus molliusculus, integer; sed valde excentricus subobliquus alutaceo-cinereus griseo-tomentosus 3-5 unc. forma sappius subrotunda l. obovata, n. argine subinfuso.

Lamellæ candidæ longissime decurrentes subdistinctæ 4-natæ margine integerrimo.

Conf. *Albert. et Schwein.* l. c.

** Pileo dimidiato, stipite marginali,
subnullo.

120. *Agaricus atro-coeruleus*, mollis subacaulis pileo subvilloso sicco atro-coeruleo intus gelatinoso, lamellis albidis.

Ag. molli. Pers. (sæpe a me lecto) affinis,
sed differt colore, odore, pileo villoso &c.

In trunko fagineo putridissimo loco umbroso ad terram dejecto.

Descr. Subgregarius acaulis, immo cæspitosus. *Pilei* horizontales l. parum adscendenttes 1-2 uncial. subobovati basi angustati siccii rugulosi villosi, rarius glabri coeruleo-nigricantes molles, margine integro sæpe inflexo. *Odor* debilis haud ingratus. *Substantia* interna mollis, superne stratum crassum (2-3 lin. et ultra) gelatinosum (ut in volva *Phalli impudici*) fusco-nigricantem ferens, carne pilei albida tenuissima facillime disseparabili crassior. *Lamellæ* ad basin decurrentes 4-8 natæ albide demum subflavescentes carne pilei latiores firmæ approximatæ margine integerrimo.

Substantia interna gelatinosa omnino paradoxæ species. Cum Persoonianis, si a molli dis-

cesseris, nihil habet communne, sed affinis videtur
Agaricus. Schæff. *Fung. Bav.* t. 246.

Legi varietatem odore fortiori gratissimo.

121. *Agaricus flabelliformis*, subsesilis,
 pileo multiformi cervino subvilloso, lamellis pal-
 lidis ferratis, stipite subnullo.

Agar. flabelliformis. Pers. Syn. p. 479.
Bolt. Fung. t. 157 (*minus bona*).

In *Fago cava* ad *Femsjö* quot annis viget.

Descr. *Fungus* sesilis cæspitosus imbrica-
 tus. *Pileus* margine stipitiformi elongatus car-
 nosus adscendens l. horizontalis sæpe reniformis
 2 - 4 uncial. difformis subconvexus colore vario,
 plus minusve rufescens, hepaticus fusco-spadiceus
 l. castaneo-flavescens adultus subtomentosus, to-
 mento erecto breviusculo concolore denso, et inter-
 dum farina alba conspersus, margine glabro dilu-
 tiori subcrenato. *Lamellæ* ad radicem decurren-
 tes divergentes latisimæ (carne pilei 4-plo latio-
 res) albidæ ferrato-dentatæ longitudine inæquales.

An tomentum parasiticum? — *Agarici* pleu-
 ropodes, præsertim dimidiatae, maxime variant pilei
 forma, colore &c. ex. gr. *Ag. salignus*, *ostreatus*,
mollis, *nidulans*, *variabilis*, *epigaeus* aliique, hinc
 difficile firmis distinguuntur characteribus.

MERULIUS.

Cantharellus.

122. *Merulius rubiformis*, gregarius subcæspitosus, pileo membranaceo umbilicato rugoso-squamuloso, plicis rectis cinerascenti-flavis, stipite flavo deorsum incrassato.

M. tubiformis. *Perf. Syn.* p. 489. *Comm. Schæff.* p. 62. *cum. syn.*

Mer. helvelloides. *Gmel. Syft. Linn. II.*
2. p. 1430.

Mer. *villosum*, cæspitosus, pileo umbilicato squamoso - villoso pallescente - fuligineo, plicis distantibus cinereo-pallidis, stipite cavo deorsum incrassato lutescente. *Perf. ic et descr.* p. 17. t. 6. f. 1. (*me judice, non differt.*)

Helvella tubæformis, *Bull. Herb.* t. 461.
f. A. C. (optime).

Peziza undulata. *Bolt. Fung.* t. 105. f. 1.

β . *epixylus*, pileo turbinato, stipite solidō.

In silvis umbrofis subhumidis et fagetis
et pinetis, vulgaris etiam in *Suecia*.

Descr. Maxime variabilis. Gregarius 1.
cæspitosus. *Stipes* saepius cavus, sed etiam, præcipue in β , solidus 2—3 unc. glaber laevis
nunc teres nunc compressus deorsum saepius
incrassatus rectus 1. ascendens subfirmus
elasticus, semper late *flavus*. *Pileus* membra-

naceus, sed in β subcarnosus, $\frac{1}{4}$ —2 unc. subrugoso-fibrillosum squamulosum, sed etiam glaber, convexus umbilicatus l. totus infundibuliformis demum pervius flavescenti-cinerous l. cinereo-spadiceus, margine subundulato crispo irregulari. Venæ flavo-cinerascentes, saepius dilutius flavescentes ac pileus, sed etiam cinereæ dichotomæ distantes venis connexæ subdecurrentes.

Quibus notis differt *M. fuligineus* P. me fugit.

123. *Merulius cinereus* cæspitosus, pileo subinfundibuliformi squamuloso nigrescente, plicis crassis glauco-cinereis, stipite cavo nigrescente.

M. cinereus. Pers. Syn. p. 490. Ic. et descr. p. 10. t. 3. f. 3.

Helvella hydropipes. Bull. H. t. 465. f. 2.

In silva (*Hallanäseni*) prope Femsiö in Suecia adhuc tantum lectus.

Descr. *Mer. cornucopioidi* maxime affinis, sed hymenio valde plicato aliterque colorato differt.

Reliquas hujus sectionis a me intra Patriæ fines lectas species optime in *Vet. Ac. Hand.* 1809 descripsit Celeb. Prof. Swartz,

*** **S t e r o p à** (pileo dimidiato verticali
obs. ** **Gomphus**).

124. *Merulius crucibulum*, pileo verticali cupulæformi carnoso alboflavescenti, intus venis luteis ramosis.

In hymenio *Boleti igniari* et ligno putrido.

Descr. Gregarius sessilis carnosus, ubique radiculis byffoideis, cupularis (*Cyat. crucibulum* haud male referens) 4—6 lin. et ultra, extus albido-flavescens subglaber, margine inflexo acuto, intus aurantiacus venosus, venis dichotome ramosis crispatis flavis, ejusdem coloris et indolis ac in *M. aurantiaco* Pers.

Obs. Cauter distingueundus ab *Merul. retirugo*, *bryophilo*, *crispo* &c. quos etiam cupulæformes vidi; sed ab omnibus notis speciebus hujus sectionis colore etc. venarum differt.

125. *Merulius tremellofus*, acaulis imbricatus l. resupinatus, pileo effuso reflexo tomentoso albo, plicis poriformibus acutis rubicundis.

Merulius tremellofus. Pers. *Syn.* p. 496.
Obs. myc. 2. p. 92. *Schrad. spic.* p. 139. *Schum. Sæll.* 2. p. 372. *Albert. et Schwein.* p. 238. *Merulius. Hall. hist.* n. 2329. *betulinus Gmel.* *Agaricus betulinus. Wulf.* — *Fl. Dan.* t. 776. (*omnino hujus loci.*)

Ag. cantharellus. *Batsch.* *El.* p. 95. f. 34.

In truncis *Suecicis* primus, sed frequenter, legi. Apud exterios vulgatissimus videtur.

Tot locis descriptus ut superflua foret descriptio nostra.

**** Serpula.

126. *Merulius vastator*, orbicularis aureus planus margine subbyssoideo albo, venis gyrofis crispis.

M. vastator. *Pers. syn.* p. 497. *Tode in Abh. Hall. Naturf.* l. p. 351. t. 2. f. 1—4. *Schum. Sæll.* p. 371. *Albert et Schwein.* l. c. p. 236.

$\beta.$ *epiphyllus*, tenuisimus glaber dilutior.

$\alpha.$ Ad ligna pinea putrida in silvis. $\beta.$ in foliis *Syringæ vulgaris* loco umbroso notabilem hanc legi varietatem.

Obs. Odor fungi noster subnullus et tubercula caulescentia rarissima.

Ut Novitiæ Floræ Suecicæ etiam nomi-
nandi *M. serpens* Tode et *M. rufus* P., hunc
hyeme ad truncos fagineos, illum æstate ad
pineos observavi.

127. *Merulius fugax*, resupinatus tenuis
candidus, venis prominulis ad tactum eva-
nescentibus.

In ligno pineo putrido.

Descr. B. (P.) *reticulato* affinis, sed venis omnino distinctus. Effusus tenuissimus subglaber, hymenio difformi *reticulato* l. *reticulato-venoso*. Adeo tenuis, ut ad tactum evanescat.

***** **Mesenterica** (gelatinosa, venis subdistantibus.)

128. *Obs.* *Mesenterica* genus ad fungos byssoideos s. e. filis compositos referre non potui et cum a *Meruliis* nullo differunt charactere cum his conjunci. *Mer.* *tremelloſi* substantia etiam est tremellosa l. gelatinosa, fugacitate et venis subdistantibus, cum *M. fugaci* aliisque conveniunt. — Vide *Schrad. spic.* p. 142. Sequentes hujus subgeneris species mihi notae:

- 1) *Merulius* (*mesf.*) *aureus*; citrinus l. aureus.

Mesent. lutea. *Pers.* *Syn.* p. 706. *Albertini et Schwein.* l. c. p. 374.

Mesf. *tremelloides*. *Tod. fung.* *Meckl.* I. p. 7. t. 2. f. 12.

- 2) *Merulius coeruleus*, *coeruleus*.

Mesent. *coerulea*, *Pers.* l. c. — *Tod.* l. c. 3.

3) *Merulius erysibe*, ferruginosus, venis reticulatis.

In trunco fagineo.

4) *Merulius griseus*, griseus, venis ramosissimis. — Albert. l. c.

Eodem ac antecendens loco meum fungum legi.

5) *Merulius sanguinolentus*, lacteus, ad tactum sanguinolentus.

Mes. sanguinolenta. Alb. l. c.

6) *Merulius argenteus*, albus immutabilis.

— Pers. Syn. p. 706. Vaill. par. t. 8. f. 1.

Ex his M. coeruleum et sanguinolentum non vidi. — Quam maxime tamen dubito, an species sint distinctae. Si igitur quis has sub nomine M. mesenterici conjungeret, non multum forte erraret.

SCHIZOPHYLLUS. FRIES.

Sporangium pileiforme sessile subtus lamellis longitudinaliter bifididis, margine revolutis, thecis superficialibus, spora subeffusa (*in rima longitudinali*).

129. *Schizophyllum communis*. Agaricus alneus. Linn, et omn. fere Auct. — Sow.

t. 183. Bull. ch. t. 346. 581.

Ag. multifidus. Batsch El. fung. f. 126.

Merulius alneus. Gmel. Syst. Linn. II. 2.

p. 1431. Schum. Sæll. p. 370.

In truncis fagineis, alneis, tiliaceis, betulinis et populneis legi. Singularis hic fungus, nunc ad *Agaricos* nunc ad *Merulios* relatus, et ab omnibus Mycologis male intellectus, distincti esse generis. nullus dubito. *Lamellæ* fissæ, quæ *Valvellæ* dici possent, margine revolutæ et villosæ illum a veris *Agaricis* et *Merulii* abunde distinguunt; sed fructificationis processus etiam tam longe recedit, ut ab his non posfit non separari. Hujus iconem ad aliud tempus reservare cogor.

Obs. Ut *Sistotrema* ab *Hydro*, *Schizophyllum* ab *Agarico* differt.

DÆDALEA. PERS.

130. *Dædala quercina*. Pers. *Boll. t. 63.*
hujus legimus varietatem.

v. nigricantem, extus nigram, intus atro-rufescens.

Agaricus dædaleis sinubus excavatus nigricans. Batt. *fung. arim.* p. 72.

In truncis quercinis. — Specie non differt ut in *Synopspi suspicatus* Cel. *Persoon.*

131. *Dædala betulina*, coriacea zonata tomentosa pallens, sinulis rectiusculis, laminis ramosis.

D. betulina. Rebent. *fl. neom.* p. 371.

Agaricus betulinus. Linn. *Fl. Suec.* p. 1244.
Sow. fung. t. 182. Batt. *t. 30. f. D.*

A. coriaceus. Pers. *Syn.* p. 486. *Bolt. F.*
t. 158. Bull. t. 394.

A. versicolor. Plan. *Erf.* p. 4.

In truncis betulinis et quercinis.

Descr. Gregarius, raro imbricatus. *Pileus* durus firmus tuberofo-coriaceus dilatato reniformis subcinerascens planus l. convexulus zonatus tomentosus, zonis magis elevatis villofis aliis depresso glabriusculis. *Sinuli* recti, laminis lignoso-coriaceis saepius ramoso-connatis difformibus interdum rectis simpli-

cibus 4 natis, albide-pallidis. Ætate fuscescit et nomumquam virescit ut D. gibbosa.

Synonymon Linnæi ad hanc speciem sine dubio pertinet.

132. *Dædalea sepiaria*. Swartz l. c. 1810.
p. 2. cum syn. et deser.

Synonymis addendum.

Agaricus acaulis utrinque planiusculus.
Linn. Fl. Suec. n. 1243. (*Errant igitur qui hunc pro A. betulino L. habent*).

Ag. squamosus. Liliebl. Sw. Fl. 2.

Merulius squamosus. Schrad. in Gmel.
Syst. et in spic. p. 140. (*ubi et apud Wulf. l. c. plurima synonyma*).

M. sepiarius, Wahlenb. Fl. lapp.

133. *Dædalea cinerea*, imbricato-connata subsuberosa tomentosa cinerea, sinulis variis flexuofissimo-sinuatis l. performibus, laminis lignosis.

Agaricus squamosus dædaleis sinubus cinereus. Batt. Fung. t. 38. f. G. optime.

In truncis fagineis muscosis; ad Femsiö in Suecia.

Descr. Pilei acaules cæspitofi imbricato-connati numerofissimi juniores interdum fere resupinati demum subpulvinati suberosi duri; sed non crassi, subelaстici flexibles $1\frac{1}{2}$ —3 uncii-

ales subundulati plus minusve cinerascentes, etiam ferruginescentes et virescentes, villofi zonati, zonis latis elevatis paucioribus, margine patente concolore l. spadiceo-cinereo, subitus planus demum convexus. *Sinuli* valde difformes, in junioribus pauci poriformes subrotundi, demum longissimi maxime divaricati flexuofi angustissimi albidi l. pallescentes, detriti fuscescentes; etiam cretaceo-albivisi. *Lamini* non distincti crassi lignosi minime flexibles, ut in priori.

Optimam hujus generis ideam præbet, an satis differt *D. confragosa*, Pers.?

134. *Dædalea gibbosa*, gregaria suberosa subomentosa albida, basi gibbosso-porrecto, sinulis rectiusculis.

Dædalea gibbosa. Pers. syn. p. 501. Schum. Sæll. p. 373. Rebentisch Fl. neom. p. 372.

Merulius gibbosus. Pers. obs. myc. I. p. 21.

Boletus suberosus. Linn. Suec. p. 453.

Bol. sinuosus. Sowerb. f. t. 194. (sec Rebent.)

In truncis fagineis meum fungum frequenter legi.

Descr. Gregarius vix cæspitoso-imbricatus. *Pileus* suberosus albidus, demum pulvere viridi conspersus, pulvinatus elasticus subomentosus interdum zonatus magnitudine varia

(2—4 unc. latūs) bafi sāpe gibboſo-porrecto, marginē obtuso ſāpius obscuriori cinereo; pileus demum cinerascit. Caro alba tenacissima. Sinuli oblongi recti, alii ſubrotundi albi.

Synonymon *Linnæi* huc certe pertinet.

135. *Dædalea mollis*, gregaria carnosa rugosa incarnata, ſinulis variis flexuoso-elongatis et ſubrotundis albidioribus.

Boletus mollis. *Pers. syn. p. 526. Obs. myc. I. p. 22. Albert et Schwein. l. c. p. 247.*
In truncis pineis *Sueciae*, Germaniæ.

Descr. Gregarius l. ſubcæſpitofo-imbri-catus. Pileus carnosus mollis dilatatus (1—6 Lin.) crasiusculus triqueter incarnatus rugosus l. ſubvilloſo-strigofus, etiam glaber, marginē acuto, bafi effuſo-dilatato. In adultis zonam erecto-strigofam nonnumquam obſervavi. Sinuli peranguſti alii poriiformes plurimi demum longifimi peranguſti flexuofi albidi l. pallide incarnati a pilei ſubſtantia.

136. *Dædalea albilla*, gregaria ſuberofa ſubglabra alba, ſinulis angulatis ſubelongatis concoloribus.

Agaricus dædaleis ſinibus minoribus.
Batt. fung. ar. t. 38. F. E. F.

Ad truncos betulinos *Sueciae* legit *Forsander*.

Descr. Acaulis gregaria rarius imbricata. *Pileus* dilatatus subreniformis convexus albus glaber subrugulosus, junior albida sericea hirsutie obtectus, subero-so-coriaceus azonus l. zonis elevatis concoloribus, subtus concaviusculus. *Caro* tenuissima suberosa concolor. *Sinuli* juniores periformes angulati, dein elongati suberosi firmi recti, marginem versus poriformes, albi, e pilei substantia formati.

137. *Dædalea heteromorpha*, resupinata, sinulis irregularibus pallidis flexuofis, margine bysino albido.

Ad ligna pinea putrida *Suecia*.

Mera omnino Dædaleæ species, nec Porriæ, quamvis habitus diversus.

Descr. Resupinatus effusus latisimus, subiculo subobsoleto, margine irregulari bysino albicante. *Sinuli* suboliqui longissimi flexuofi connati nonnulli poriformes maxime irregulares, non vero dentato-laceri, ut *Sistotrema* affinis esset, molliusculi pallescentes, tacti flavescenti-cinerascentes l. subrubiginosi, tubis obliquis breviusculis persistentes.

BOLETUS. Fries.

Suillus. Mich. Gen. p. 126. t. 6. f. G.
O. Pori integri toti e substantia propria, a pilei diversa et libera, formati.

Habitus: Stipitati carnosí horizontales, tubis elongatis a pileo facile disjunctis.

Obs. Genus hoc, a *Michelio*, alio licet sub nomine, constitutum, maxime naturale, et omnia Genera naturalia sunt optima et servanda, præcipue cum characteribus optimis distingvitur tantique momenti, quanti apud Lichenes, inter quos ad Classes (*Ach. syn.*), l. si malles familias, distinguendas valent.

* Stipite annulato.

138. *Boletus luteus*, annulatus, pileo pulvinato viscoſo subcaſtaneo-livido l. flavescente, poris subrotundis luteis, stipite albo crasiusculo.

B. *luteus*, Linn. Fl. Suec. p. 452. Schrad. spic. p. 142.

B. *virgatus*, pileo rufo virgato, de cetero nullò modo differt.

B. *annulatus*. Pers. Syn. p. 503. Comm. Schæff. p. 45. Schæff. fung. t. 114. Bull. champ. t. 33².

γ. *sericeus* pileo subcaſtaneo sericeo.

B. luteus Schæff. t. 84.

In silvis frequens.

Var. β. præter notas allatas omnino convenit, in Europa meridionali frequentior esse videtur; rara autem in Suecia ubi a vulgarissima.

Obs. Verus est *Bolet.-luteus* Linn. contra sententiam summi Mycologi Persoonis.

139. *Boletus flavidus*, annulatus, pileo pulvinato subglabro cinereo-flavescente, poris angulatis flavescentibus, stipite dilutiori tenui.

In silvis humidis Sueciæ.

A priori omnino diversus.

Descr. *Stipes* annulatns 2—3 unc. albidus 1. flavesiens angustius, diametr. pennæ anserinæ 1. parum crassior, æqualis et basi neminimum incrassatus glaber lævis tenax rectiusculus 1. subflexuosus. Variat stipite striato. *Pileus* convexus pulvinatus pallide flavesiens 1. cinereo-flavus interdum umbonatus glaber ficcus 1. coelo pluvioso viscosus 2—3 unc., margine nunc regulari patente nunc irregulare repando, subtus planus. *Caro* flavesiens mollis immutabilis, interdum vero cinerascens. *Tubuli* $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ unc. flavi. — *Pori* angulati magni difformes subcompositi in stipitem fixi et sæpe decurrentes.

Affinitate quadam naturali cum *Boll. bovino* conjunctus.

Diffrerit; 1.) ab *B. cortinato* P. (species mihi dubia) stipite tenui æquali, carne flavescente nec crispa, pileo porisque aliter coloratis.

2.) a *B. decurrenti Schum.* et 3.) elegante *Sch.* poris angulatis maximis, colore &c.

4.) a *B. cinereo* P. (floccopode *Fl. Dan.* t. 1252) pileo glabro pluribusque characteribus.

** Stipite squamufo.

140. *Boletus niveus*, pileo pulvinato glabro niveo, poris subrotundis stipite verrucisque concoloribus.

In fagetis umbrosis humidis et pinetis.

Descr. Subgregarius. *Stipes* solidus elongatus 3—5 unc. candidus sursum sensim angustatus e punctis concoloribus reticulato-icaber squamufo, tactus cinerascit, basi albotomentosus nec bulbosus. *Pileus* pulvinatus convexus carnosus mollis lævis glaber albus, demum virescens, 2—unc., margine patente lævis, subtus planus. *Caro* mollissima alba digitis tacta cinerascit. — *Tubuli* albidi subcinerascentes carne pilei longiores, *Pori* candidi minuti rotundi,

B. scabro P. (*viscido vero Linnæi*) affinis. — Hujus varietas lœvis est *B. rufus*. Pers. Obs. 2. p. 13, nec specifice differre videntur *B. aurantius*, *leucopodium* et noster *niveus*.

Ad hanc sectionem pertinent species nominatae et *B. circinans* P. e Suecicis.

*** Stipite lœvi l. reticulato.

141. *Boletus bovinus*, pileo pulvinato glabro flavescente-fordido, poris compositis acutis flavo-griseis, porulis angulatis brevioribus, stipite pallescente.

B. bovinus. Linn. Fl. Suec. 1246. (exclus. plur. syn.)

In silvis Sueciæ, ubi vulgaris; sed vix alibi.

Obs. De distinctissima hac specie dubii sunt omnes Botanici apud exterros. Et cum horum neminem illum descripsisse l. depinxisse viderim, extra Sueciam vix crescere suspicor. *B. bovinus* Gmel. ad edulem, Schum. ad subtomensem etc. pertinent.

Descr. *Stipes* 2—3unc. subæqualis, crassit. $\frac{1}{2}$ —1 unc., saepè curvatus elasticus nudus lœvis l. e. poris decurrentibus reticulatus, glaber firmus flavescens, numquam rubicundus. *Pileus* carnosus convexus pulvinatus demum planiusculus etiam vertice depresso glaber

lævis 3 uncial. et ultra, subsiceus, sed æstate pluviosa viscosus, qua nota a *subtomentoso* etiam differt, sordide flavescens 1. cinereo-flavus, margine patente. Caro semper immutabilis pallida spongiosa. Tubuli nunquam $\frac{1}{2}$ unc. attingentes carne pilei breviores. Pori flavogrisei omnium maximi, e pluribus (3-4) brevioribus conformibus compositi, angulati, interdum flexuosi.

A. Gregarius *Fl. Dan.* huic proximus.

142. *Boletus subtomentosus*, pileo pulvinato subtomentoso subflavo-cinerascenti, poris sublimplicibus majusculis læte flavis, stipite subrufescente.

B. *subtomentosus*, *Linn.* *Suec.* 1251. *Perf.* *Syn.* p. 506. *Ejusd.* *Obs. myc.* 2. p. 9-11. (ubi varictates, synonyma etc. optime determinantur.) *Albert.* et *Schwein.* *l. c.* p. 239. B. chryseuteras. *Schrad. spic.* p. 144.

B. bovinus. *Schum.* *Sæll.* 2. p. 376.

Icones. *Schæf.* f. t. 112. 133. *Fl. Dan.* t. 1074. *Bull. h.* t. 393, 490, 499. f. 2. *Bolt.* t. 87. *Vulgaris.* 2. t. 3.

Descr. Conf. *Perf.* *l. c.* non tamen superflua fungi Suecici, ut magis differentia ab antecedenti, cui tamen minime affinis, eluceat,

Stipes 1—3 unc. solidus, statu senescent interdum cavus, crass. digitii minoris majorisve subæqualis glaber carnosus flavescens l. subrubricundus, plus minusve reticulatus, etiam lævis. *Pileus* carnosus pulvinatus 1½—5 unc. olivaceo-flavescens, alutaceo cinerascens & sericeo-tomentosus l. glaber, nunquam viscidus, margine obtuso, subtus initio concavus mox planiusculus. *Tubuli* carne pilei subæquales flavi. *Pori* flavi (numquam in priori) majusculi angulato-subrotundi inæquales. *Cæro* immutabilis, sed interdum coerulescit.

143. *Boletus piperatus*. P. Sow. t. 34. Swartz l. c. 1810. p. 9. (cum descr.)

B. *squamulosus*, pileo pulvinato, squamulis dilute flavis obsito, stipite brevi.

Color pilei flavescens. Loca humidiora ac vulgaris elitit. De cetero minor.

144. *Boletus felleus*, pileo molli dilute castaneo-fulvo glabro, poris albido-roseis subrotundis carneque demum roseis, stipite reticulato.

B. *felleus*. Bull. champ. t. 379. (optime) Albert. et Schwein. p. 240.

In pinetis ad Femsiö Sueciae nonnulla legi specimina.

Descr. Inter pulchras species, solitarius. *Stipes* nudus carnosus subrectus 2—4 unc.

glaber reticulatus subæqualis 1. basi incrassatus $\frac{1}{3}$ —1 unc. crassus, in nostro olivaceo-fu-
ligineus, intus albus, marginem versus saepe
virescens, vulneratus dilutissime roseus. *Pileus*
carnosus junior convexus, dein planiusculus
dilute castaneus 1. fulvus glaberrimus laevis
 $1\frac{1}{2}$ —4 unc., carne alba demum subrosea mol-
lisima spongiosa, margine obtuso. *Tubuli*
longissimi molles recti saepius albido-rosei.
Pori subrotundi regulares albido-rosei, tacti
saepius obscuriores.

145. *Boletus alutarius*; pileo molli alu-
taceo glabro, carne subimmutabili, poris al-
bis subroseis, stipite elongato laeviusculo.

In pinetis, numquam vero in prioris
confortio, rarissime. Medius inter *felleum* et
cyanescens.

Descr. Priori affinis: at ut ejus subspe-
cies non censenda. Characteres constanter ser-
vat, et majore jure, ac *aurantiacus* P. a *scabro*
distinguitur, eodem modo ut *rubeol*, a *lurido*.
Stipes elongatus 4—5 unc. sursum subangusta-
tus glaber laeviusculus 1. tenui reticulatus al-
bidus carnosus, carne immutabili. *Pileus* con-
vexus pulvinatus carnosus molliusculus palli-
de alutaceus, sed sordidus, glaber laevis 3—4
unc. *Caro* alba immutabilis 1. dilutissime

rosea. *Tubuli* mediocres albi, saepius dilute rosecentes. *Pori* l. difformes l. subrotundi albido-rosei.

146. *Boletus cyanescens*, pileo pulvinato planiusculo flavescente l. subfuligineo, poris albis carneque mox cyanescentibus, stipite laevi.

B. cyanescens Bull. h. t. 369. Pers. syn. p. 508 (*sub constricto*).

In silvis Galliae, Angliae, Sueciae.

Quoad colorem fungus noster recedit, sed omnia dubia, quin hujus esset loci, Icon *Bulliardiana* optima, sustulit.

Descr. Species notabilis et a reliquis carne coeruleoente praeditis quam maxime differt. Diagnosis nostra in fungum et gallicum et sueicum quadrat; sed descriptiones tamtummodo fungi a me lecti dabo.

Stipes, ut in reliquis, solidus; sed in hac specie medulla molliori subspongiosa (nec elastica) cum stipite contigua farctus, nudus $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ unc. deorsum incrassatus ventricosus semper laevis glaber l. villoso-pulverulentus albus, interdum flavescentia, tactus l. aëri expositus olivaceus l. fuligineo-cinereus, intus albus coerulescens. *Pileus* junior semiglobosus, mox convexus subtus planus, demum planiusculus inferne convexus, carnosus haud elasticus 2—5 uncial. flavescentia, nunc late-

nunc pallide, nunc etiam subcinereus, villoso-pulverulentus, e pilis quasi adpresis brevibus, raro glaber, margine patente acuto. **Caro** albida, rupta mox coerulescit, compressa succum coeruleum sæpius copiosum fundens. **Tubuli** breves albi coerulecentes. **Pori** minuti subrotundi albi, a stipite liberi, etiam colorem coeruleo-cyaneum brevi assumentes.

147. *Boletus variegatus*, pileo pulvinato fordide flavo fasciculato-pilofo, pilis adglutinatis, poris viridi-luteis, stipite lævi flavo, *Swartz in Vet. Ac. Handl.* 1810. p. 8.

In pinetis Suecicis vulgaris.

Descr. **Stipes** nudus 1—3 unc. crasfit, $\frac{1}{2}$ —1 unc. subæqualis glaber omnino lævis cylindricus firmus unicolor flavus, raro rubescens. **Caro** stipitis pallide flava subimmutabilis elastica nec spongiosa. **Pileus** plano-convexus nunc pilofo-squamulosus nunc glaber ficcus 1. tempestate pluviosa subviscosus flavus, margine acute lævi, subtus junior concaviusculus dein planus. **Diam.** 3—5 unc. **Caro** pallide flavescentis mollis nec elastica crassiuscula subimmutabilis rarius coerulescens. **Tubuli** carne pilei breviores cinereo-flavescentes hymenio læte flavo villosiusculo adfixæ. **Pori** obscure flavi, juniores fere spadicei dein

cinereo. I. viridi-flavescentes æquales minutæ
subrotundi obtuse angulati.

Stipitem nonnisi rarissime rubicundum
vidi.

148. *Boletus pachypus*, pileo pulvinato
alutaceo I. olivaceo-fuscescente, poris demum
flavis (*minime rubris*) carneque subcoeruleacen-
tibus, stipe reticulato flavo rubroque vario,
basi bulbose.

B. olivaceus. Schæf. fung. t. 105.

B. vitellinus. Pers. Obs. myc. 2. p. 11.
Hujus, ni fallor, loci. Descr. bona.

In fagetiis umbrosis Germaniæ, Sueciæ,
ad Almåhs.

Sequenti affinis, sed vere distinctus, et
qua ratione e Synopsi a Persoonio exclu-
sus nescio. A *Lurido* P. *rubeolario* P. (Bull.
t. 100) et *erythrop* P., qui familiam l. tri-
bum naturalem efficiunt, abunde distinctus:
poris numquam rubris, eademque nota ab his
differt *A. calopus*. P.

Descr. Stipes brevis 1—2 uncialis ovatus
crassus apice angustatus 1 unc. crass. et ultra
carnosus firmus evidenter reticulatus deorsum
medioque ruber apice flavus (et hunc colo-
rem constantem vidi, quallem etiam descrip-
xit Persoon,) glaber l. deorsum radiculis pau-
cis tomentiformibus, carne margine flave-

scente intus albo mox coerulecente. *Pileus* convexus fuscesceni-cinereus olivaceus l. alutaceus 2—8 unc. latus compactus subtomentosus demum glaber, margine subinvoluto mox patente obtuso. *Caro* albida, parum coerulescens et nonnumquam subimmutabilis, qualem etiam fungum suum optine descripsit *Persoon*. *Pori* minuti subrotundi læte flavi, juniores albidi, tacti coerulescentes, *tubulis* concoloribus breviuiculis subvirescentes.

149. *Boletus calopus*, pileo pulvinato subolivaceo, poris demum flavis carneque coerulecentibus, stipite reticulato rubro equali.

B. calopus. *Perf. syn. p. 513.*

B. terreus. *Schæff. fung. t. 315.*

In sylvaticis, ericetis & pasim.

Descr. *Stipes* carnosus æqualis 3—6 unc. glaber reticulatus ruber unicolor l. deorsum nonnumquam olivaceus, numquam apice flavus, 1 unc. crass. firmus, intus flavescens mox coerulescens, substantia fibrosa. *Pileus* convexus demum plano-pulvinatus olivaceus l. pallide flavescenti-cinereus, junior subvillus, dein glaber læviusculus mollis 4—6 unc. *Caro* albida mollis demum spongiosa mox coerulescens. *Tubuli* sublongi læte flavi, fracti mox coerulei. *Pori* æquales in omni

ætate læte flavi juniores tenuissimi, adulti
æquales subrotundi.

150. *Boletus? fistotremoides*, pileo utrinque
plano castaneo-rubo, stipite rufescenti pal-
lido tenui, hymenio gyroso-poro so venoso den-
ticulito, gyris a pileo seperabilibus.

Paradoxi hujus fungi specimina plurima
gregarie in silva *Femsiönenfi*, mense *Septembri*,
legi.

Descr. Gregarius. *Stipes* solidus nudus
2—4 unc. subæqualis, crassit. digitii minoris
erectis l. parum curvatus glaber, bafi subvil-
losus, subrufescenti - pallidus l. parum flave-
scens. *Pileus* carnosus utrinque planus ca-
staneo rufus l. vaccinus l. fusco-brunneus 2—3
unc. submollis, aqua atmosphærica bibulus,
glaber l. subsericeus, margine patente obtu-
fiuscule. *Caro* mollis aquosa albida immu-
tubilis. *Hymenium* gyroso - porosum venosum
flavescens, demum subfulvum; margine in-
terdum poris angulatis integris; tubulis bre-
vissimis vix 1 lin. a substantia propria for-
matis et a pileo liberis, et medio in dentes
difformes compressos obtusos lacerum.

Sistotremati quoad characteres, Boletis
quoad substantiam proximus. An vero mon-
strofa progenies? Nulli vero alio fungo a me
viro similis.

POLYPORUS. MICH. restit. FRIES.

Mich. Gen. p. 129. t. 70. f. A. B.

Pori integri toti e substantia pilei formati, cum qua et inter se connati. *Habitus:* *Stipitati, dimidiati et resupinati; carnosí, coriacei ut plurimum suberosí, tubis brevibus pileo arcte adnatis nec disjungendis.*

Obs. 1. Inter *Polyporos* et *Porias* nulli dantur limites et plurimi Boleti acaules etiam resupinati variant. Ceterum, praeter formam, characteres habituales solum præbentem, nullæ dantur notæ,

Obs. 2. Quamvis omnes hujus Generis species notas in *Mscr.* disposuerim, has hoc loco enumerare superfluum duxi, cum non solum nomina trivialia *Persoonii*; sed saepe etiam specifica retinuerim. Hinc rariores nonnullas modo describam species.

I. Mesopus Albert. et Schwein. pileo integro stipitato; sed saepe excentrico. (*Peltea Fries.*)

151. *Polyporus subsquamulosus*, pileo carnoso albido subsquamoso, poris oblongis flexuosis niveis, stipite brevi centrali. *Disp. Boletid. Mscr.*

Boletus subsquamulosus. Linn. Fl. Suec. 1250.

In pinetis Sueciæ, rarer.

Descr. Stipes brevis $\frac{1}{2}$ unc. l. parum ultra crassit. fere unciali cylindricus acqualis carnosus glaber laevis (reticulatum non vidi) sordide albus l. cinerascens. Pileus carnosus compactus firmus forma varia, nunc convexus, saepe planiusculus, nunc subdepressus, 2—5 unc. latus siccus glaber sed in squamulas discedens (*Hydno imbricato subfimilis*) siccus pallidus sordide albus l. subflavescens, margine junioris inflexo demum evoluto reflexo subundulato glaberrimo acuto. Caro dura alba crassiuscula immutabilis. Tubuli vix ulli, nec ad *Boletum* pertinet, ut suspicatus est Illust. Swartz (in *Vet. Ac. Handl. l. c.*) Squamulae difformes apice subpatentes. Pori nivei minuti elongati flexuosi difformes,

Species optime distincta. *Bolet. caranthiacus* Pers. *syn.* p. 514. (*Wulf.* in *Jacq. Coll.* I. p. 342.) si non idem, saltim varietas.

152. *Polyporus ciliatus*, pileo spadiceo-rubo suberofo-coriaceo margine ciliato, poris minutissimis subrotundis pallidis, stipite tenui centrali. *Disp. Bol. msc.*

In truncis Sueciæ, rarer.

An distinctus ab *B. ciliata* Fl Dan., qui ad hunc l. *P. circularium* pertinet.

Descr. Pol. circulario maxime affinis, sed colore obscuriori et præcipue poris minutissimis æqualibus rotundis abunde diversus. Centrum *Stipes* uncial l. fere et subradicatus, saepe flexuosus et *Pileus* ciliis marginalibus non rigidis obſitus.

153. *Polyporus nummularius*. *Disp. Bol. Mscr.* (*Bol. num. P.*)

$\gamma.$ *minimus*, minutissimus, pileo plano subtus convexo, stipite centrali deorsum nigro.

In stipitibus *filicum*, *urticæ* etc. locis umbrosis humidis dejectis.

Descr. *Stipes* 1—4 lin. æqualis durus lignosus glaber subflexuosus læviusculus, superne flavescentia inferne niger. *Pileus* $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. nec ultra suberosus crassiusculus glaber lævis subnitens junior albidus demum flavescentia, su-

perne planus, inferne convexus, poris minuti rotundis æqualibus pallidis.

II. Labium, stipite laterali, manubrii instar elongatus (unde nomen: λαβη.)

154. *Obs.* Familia hæc cum priori sæpe confluit, ex. gr. *P. badius*, *varius* &c. qui nunc integri nunc dimidiati reperiuntur. Ad hanc sectionem de cetero pertinent: *Pol. frondosus*, *giganteus*, *platyporus*, *lucidus* &c.

III. Acropus. Dimidiati sessiles, stipite nullo.

155. *Polyporus croceus*, pileo dimidiato effuso-sessili subcarnoso subtomentoso lutescente, poris croceis.

Boletus croceus. *Pers. syn. p. 525.* *Obs. myc. I. p. 87.*

In Quercu cava in *Suecia* legi.

Obs. Optime demonstrat, quanta inter *Polyporos* et *Porias* affinitas; fungus enim meus *Quercum* nominatam lateri interiori totus obtegens, totus fere erat resupinatus et ad margines tantum reflexus, quam *Person* descripsit.

156. *Polyporus chioneus*, pileo dimidiato
sesili carnose glabro porisque candidis.

In truncis putridis.

Descr. Sesfilis subsolitarius. *Pileus* basi
refupinato-dilatatus utrinque subconvexus car-
nosus mollis albus 1—2 unc. junior subpube-
scens, dein glaberrimus, margine acuto. *Sub-
stantia* carnosa mollis aquosa candida. *Tubuli*
2 lin. sublongi *Porique* rotundi glabri can-
didi minuti tenues. *Subodorus*. *P. flyptico*
proximus; sed margo pilei concolor, nec cæ-
spitosus et gibbosus &c. Magis affinis *P. de-
structori*, sed poris glabris &c. diversus.

157. *Polyporus amorphus*, acaulis sub-
imbricatus difformis terrestris carnosus albus,
poris difformibus flavescentibus.

In foliis dejectis *Pini Abietis* rarissime.

Descr. Cum *P. heteroclito* comparandus.
Polymorphus. *Pileus* carnosus subrefupinato-
reflexus subcæspitosus albus subpubescens odo-
rus subcupulæformis, margine acuto. *Tubuli*
brevisimi flavescentes, poris subrotundis dif-
formibus flavescentibus. Forma *Mer. tremelloso*
similis.

158. *Polyporus dichrous*, pileo sesili
subimbricato molli coriaceo villoso albo, po-
ris minutis subrotundis fuscocinnamomeis.

Boletus pelleporus, *Bull. champ.* t. 501.
f. 2. (*non differt.*)

Ad truncos fagineos, *Sueciæ*, *Galliæ* &c.

Descr. Theléphoræ obiter inspectus superne haud dissimilis. Cæspitosus, saepe imbricatus basi effuso resupinato plurima specimena conjungente. *Pileus* coriaceus flexilis molliusculus (et hinc ab *P. conchato* Pers., cui affinis videtur, distinctus,) 1—2 unc. longus candidus villosus, hirsutie alba adpressa, zonis elevatis subobsoletis concoloribus, margine acuto patente concolore. *Caro* tenax nivea. *Pori* minuti subrotundi æquales integri fusco-cinnamomei.

159. *Polyporus pubescens*, pileo sessili subimbricato carneo-suberofo pubescenti albo, poris minutis subrotundis concoloribus.

B. *pubescens*. *Schum. Sæll.* 2. p. 384.

In truncis betulinis *Sueciæ*. *Daniæ*.

Descr. Gregarius subcæspitosus imbricatus. *Pileus* junior carnoso-suberosus dein suberosus pulvinatus 1— $2\frac{1}{2}$ unc. latus, crass. varia, albus subreniformis, zonis elevatis pubescentibus latiusculis variegatus, ceterum fere glaber, margine patente acute concolore lutescente (in meo numquam ferrugineo), subtus planus. *Pori* subrotundi albi, demum subflavescentes, minuti glabri.

160. Plures in parte secunda. Ceterum sequentes, ut Novitiae Fl. Suecicæ, nominandi:

Polyph. betulinus. Bol. *betulinus.* *P. Fl.* *Dan.* t. 1254.

In truncis betulinis frequens.

Pol. fraxineus. B. *fraxineus.* *P. syn.* *Bull. champ.* t. 433. f. 1.

Pol. ochraceus. B. *ochraceus.* *Perf. syn.* *Schäff.* t. 269.

Hic in truncis *populneis* frequens; ille semel in trunco *fraxineo* visus ad *Bökeberg* in par, *Femsiö*.

Pol. crispus. Bol. *crispus.* *Perf. Obs. myc.* 2. p. 8. *Albert. et Schweiu. l. c.* p. 249.

In truncis fagineis.

Pol. ribis. Bol. *ribi.* *Schum.* *Sæll.* 2. p. 386. (*affinis fomentario*, ut recte annotavit *Rebentisch.*)

Suo loco frequens ad Lundinum.

Pol. angulatus. Bol. *angulatus.* *Schum.* *Sæll.* 2. p. 388.

In truncis fagineis.

Et nonnullæ aliæ species e Schumacherianis, alio loco describendis, Ceterum conf. *Swartz* l. 6.

IV. PORIA. Resupinati.

161. *Polyporus latisimus*, effusus crassus suberosus undulatus subpallens, poris demum prominulis inæqualibus, tubulis brevisimis.

In truncis fagineis dejectis muscosis. Difficile describitur distinctissima species. *Substantia* suberosa crassa albida inter zonata. *Pileus* resupinatus latisime effusus ($\frac{1}{2}$ —3 pedalis) firmus pallidus, tactus subobscurens; margine angustissimo albo sterili, sed non byssino, hinc inde libero, saepius adnato. *Superficie* junior saepe apora, dein poris hinc inde prominulis subliberis rotundis minutis punctiformibus, absque tubulis; demum tota porosa, poris variis, aliis elongatis angustis flexuosis, aliis rotundis, tubulis brevisimis cum pilei carne confluentibus.

162. *Polyporus xanthus*, effusus elongatus luteus, margine subnullo glabro, poris subrotundis obliquis, tubulis mediocribus.

In assulis semiputridis, serie elongata. Colore lætissime luteo ab omnibus differt. *Subiculum* subnullum. *Pori* ejusdem formæ ac *P. obliqui*, cui proximus, sed crebrius prominuli et subrotundi — 2—3 unc. longus,

2 lin. crassus, duriusculus et siccatus omnino immutabilis.

163. Speciebus hujus familiæ ab illustr. *Swarzio l. c.* descriptis, ut indigenæ, addendæ:

P. ol. salicinus. — *Bol. salicinus.* *Pers. syn.* p. 543.

Suo loco in Scania, Smolandia.

P. destructor. — *B. destructor.* *Schrad. spic.* p. 166.

In domibus, Illustr. Prof. et Eques *Acharius.* et in truncis pineis.

P. contiguus. — *B. contiguus.* *P. syn.*

In truncis fagineis.

P. molluscus. — *B. molluscus.* *P. syn.*

Ad ligna pinea.

P. epiphyllus. — *B. epiphyllus.* *P. Obs. myc.* 2. p. 15.

In foliis dejectis; a priori sine dubio distinctus, sed variis aliis nimis affinis.

P. hyssinus. — *Bol. byssinus.* *Schrad. spic.* p. 172. t. 3. f. 1.

In truncis pineis.

P. subtilis. — *B. subtilis.* *Schrad. l. c.* p. 173. t. 3. f. 2.

In trunco populi nigræ.

P. sanguinolentus. — *B. sanguinol.* *Albert.* et *Schwein. l. c.* p. 287.

Ad truncos pineos.

P. reticulatus. — *B. reticul.* *Pers.* *Mucilago retic.* *Hoffm.* *Germ.* 2. t. 12.

Cum priori. &c.

Obs. *Fistulina (heparica)*, me judice,
distinctum efficit genus.

SISTOTREMA. *Pers.*

*** *Xylodon*.

164. *Sistotrema fallax*, interrupte effusum tenue, dentibus minutis acutis flavescenti-ochraceis, margine bysino albo. *Fries Nov. Fl. Svec.* p. 39.

In hymenio *Polyporis suberosi* parasiticum.

Obs. *Polyp. suberosi* hymenium adeo incrustans, ut pro *Hydni* species, nec *Polypori*, haberri posset. *Subiculum* membranaceum tenuie, *aculeis* flavescenti-ochraceis minutis confertis acutis incisis, margine sterili bysino albido.

L. c. etiam descripta sunt *S. fagineum* *P. quercinum*, *P. et obliquum* *Albert.*

HYDNUM. *Linné Pers.*

- † *Stipitata* (Harum specierum monographia.)
 * *Suberosa*.

165. *Hydnnum aurantiacum*, pileo azono aurantiaco l. albo-variegato, intus zonato stipiteque aurantiaco.

H. aurantiacum. Swartz in *Vet. At. Hand.* 1810. p. 247. — Albert et Schwein. l. c. p. 265. — *Fl. Dan.* t. 1439. (*A tribus Auctoribus eodem fere tempore eodemque nomine, ut distincta et nova species (descriptam!)*)

Hydn. suberosum. *ß. aurantiacum*. Batsch. *El. fung. Cont.* 2. f. 222.

Hydn. floriforme. Schäff. t. 146. f. 4. &c.

Hydn. hybridum. Pers. comm. Schäff. p. 59. (*exclus. nonnullis syn.*)

In silvis Femfiönensibus, ubi hoc et sequentia crescunt, optimæ mihi fuerunt occasionses has species obbservandi et quamvis, Botanicorum sententiæ ut placerem, hoc loco distinxerini, nullos inter hoc et sequens præcipue dari limites, mihi persuasissimum habeo. — Ceterum, ut in *Synopfi Lichenum* p. 103 optime monuit Cel. Prof. Acharius, non omnia, quæ confluere possunt, commiscere licet; ut nullus etiam dubito, quin magis erret, qui separat, quam qui conjungat.

Synonyma a plurimis Auctoribus nimis neglecta.

Descr. Swartziano l. c. optima (quare etiam ejus Synonymon primum attuli) sed in omnes status non quadrat. *Pileus* totus saepe albus. — Ceterum Substantiae internae color certissimos semper mihi praebuit characteres.

166. *Hydn um compactum*, pileo azono flexuoso rugoso olivaceo-ferrugineo tomentoso, intus fusco et coeruleo variegato, stipite brevissimo.

Hydn um compactum. Pers. *syn.* p. 556. Swartz in *Vet. Ac. Handl.* 1810. p. 245, Wahl. *Fl. lapp.* p. 532.

Hydn um floriforme. Schäff. t. 146. f. 3, 5. 147. f. 7. &c.

H. suberosum a. *spongiosum*. Batsch. l. c. f. 221. a.

In silvis ericetosis muscosis.

Descr. Varium flegarium subconfluens. *Stipes* brevissimus durus crassus subtuberosus rigidus difformis subangulosus, saepe subnul-lus. *Pileus* olivaceus l. ferrugineo-spadiceus, tomento concolore l. albido obtectus; aut turbinatus superne planiusculus subregularis laeviusculus 1—2 unc. latus, aut dilatato-con-fluens terram crustae instar obtegens conve-

xiusculus undulato - tuberculatus 3—6 une. margine inaequali, coelo pluvioso aqua repletus. Caro suberosa tenax coeruleo et fusco-variegata. Tubuli numerosissimi longiusculi saepe obliqui spadicei fusti l. castanei.

167. *Hydn um ferrugineum*, pileo azono ferrugineo-rubro molli-suberofo, intus stipite que elongato concolore.

Hydn um hybridum. *Bull. herb.* t. 453.
f. 2.

β. *glabratum*, pileo glabro.

In pinetis.

Descr. Gregarium nec confluens. *Stipes* duriusculus 1½—3 unc. subdifformis ferrugineus, intus concolor, rectus, basi vix incrassatus. *Pileus* molliusculus planus l. depresso obconicus l. saepius dilatatus subconnatus villosus ferrugineus 1—4 unc. *Substantia* mollior ferruginea unicolor. *Subuli* recti firmi tenaces longiusculi fusco-ferruginei.

Varietatem *Hydn. suberosi* ferrugineam etiam commemorat Cel. *Batsch.* Magis a precedentibus differt; saltim ab *aurantiaco* distinctissimum.

168. *Hydn um pullum*, swaveolens, pileo subzonato sericeo tomentoso, intus albo-coeruleo-variegato, stipite inaequali coerulescente.

Hydn um pullum. *Swartz l. c. p.* 248.

H. suberosum $\gamma.$ *cinereum.* *Batsch.* *l. c.*
f. 223.

In filvis, cum prioribus.

Species a præcedentibus optime distincta; sed cum *H. svaevolenti* magnam suspicor affinitatem, saltim bona descriptio ab *Albertini* et *Schweinitz l. c. p. 264* vix recedit.

Deser. Gregarium subconcrescens suberosum obconicum svaevolens. *Stipes* brevis, unciam haud superans, plus minusve albido-coeruleus rigidus subtomentosus, basi saepe bulbosus. *Pileus* turbinatus aut simplex aut cum vicinis coalitus difformis varie undulato-lobatus, junior sericeo-pubescentia dein glabriusculus subrugulosus albus l. sordide cinereus, rarissime in meis speciminibus fusco-olivaceus, siccus (nec viscosus, ut *H. svaevol.* describitur) planus l. subdepressus marginem versus saepe obsolete zonatus. *Caro* pilei albida, zonis coeruleis variegata, stipitis unicolor coerulea. *Subuli* cæfio-violacei subcinerei tenues tenaces in stipite decurrentes.

169. *Hydn um nigrum*, inodorum, pileo azono coeruleo-nigro, intus unicolori stipiteque nigro.

In filvis abietinis densis *Sueciae*. Optime distincta species.

Descr. Cæspitosum confluens difforme. *Stipes* suberosus uncialis radicatus rigidus inæqualis, ex eadem basi plures et sœpe confluentes, niger, inferne tomentosus superne glaber, intus unicolor. *Pileus* suberosus, junior clavæformis dein turbinatus demum convexus planiusculus cum vicinis semper fere coalitus, hinc difformis rugulosus tuberculatus, coeruleo-niger, tomento concolori l. albido vestitus, margine acuto concolori l. albido. *Caro* crassiuscula dura unicolor nigra nec zonata, quo charactere a reliquis distinguitur. *Subuli* albidi tactu cinerascentes tenaces breviusculi.

Obs. Minime H. tomentoso affinis species, ut e descriptione pilei forte quis suspicaret.

170. *Hydnum infundibulum*, pileo carnoso suberoso infundibuliformi spadiceo lævi, margine flexuoso-plicato, subulis albis demum badiis, stipite toruloſo inæquali. *Swartz l. c.*
p. 244.

In pinetis Sueciæ, rarius.

A prioribus abunde differt substantia, stipite 2—3 unc. deorsum angustato, pileo infundibuliformi &c. Ad sequentem sectionem transitum efficit. Semper coriaceos suberosis maxime affines esse credidi, sed aliud natura docuit. *Descr.* hujus dedit *Swartz l. c.*

** Carnosa.

171. *Hydnum coeruleum*, carnosum obconicum, pileo convexo coeruleo centro albido, subulis albidis, stipite basi fusco. *Fl. Dan. t. 1374.*

In pinetis Norvegiæ. *Vahl.*

Obs. Speciebus dubiis adnumerare non debui, cum ē figura distinctissimam esse speciem patet. *Gregarium.* *Stipes* brevisimus vix $\frac{1}{2}$ unc., crassus $\frac{1}{3}$ —1 unc. glaber lævis colore chocolatæ sursum in *pileum* 1—3 unc. violaceo-coeruleum convexum expallescens crassum dilatatus. *Aculei* albi in stipite decurrent. (*Quoad icon.*)

$\beta.$ *violascens*, carnoſo-fibroſum ſordide violaceum, pileo rugoſo flexuoſo ſublobato tomentoſo, marginē albicante, ſubulis tenuibus acutis albīs, ſtipitibus basi ſubtuberofis connatis longiusculis. *H. violascens.* *Albert.* et *Schwein.* *l. c. p. 265.*

In pinetis Germaniæ. *Albertini et Schweiniz.*

Obs. Prioris videtur varietas. Color ſtipitis (omnino), pilei ex albo-coeruleo variegati et ſubularum, conſtentia, ſubuli &c. omnino conveniunt. Differt præcipue ſtipite elongato ſubtuberofo.

172. *Hydnum imbricatum*, pileo planiusculo umbrino squamoso, subulis albido cineris, stipite albreviato.

Hydn. imbricatum. *Linn. Suec. n. 1257*
(cum descr. ad n. 1256) et *Auct.* — *Perf. syn. p. 554. Schæff. fung. t. 140. Sow. fung. t. 73. Fl. Dan. t. 176 & t. 1500.*

Hydn. cervinum. *Perf. Obs. myc. l. p. 74. Hall. helv. 2324. β.*

In pinetis autumno frequens.

*Obs. Illustr. a Linné non descriptiones proprias solum confudit, sed etiam squonyma ex. gr. *Erinaceus esculentus albus crassus Mich.* Gen. t. 72. f. 2. ad hunc fungum dubie pertinet; sed hujus synonymon e *Michelio* est: *Erinaceus esculentus*, pileo superne veluti squamoso et fuliginoso, inferne cinereo, pediculo cum superna pilei parte ejusdem coloris. Mich. Gen. p. 133; nec in hunc quadrant synonyma *Halleri*, *Bauhini* et *Raji*; nisi, ut monuit *Haller* l. c. hujus speciei varietas sit.*

Descr. Solitarium l. gregarium, nunquam cæspitosum. *Stipes* brevis uncialis crassus deorsum subangustatus glaber lævis firmus solidus cinerascenti-albidus. *Pileus* carnosus, junior convexus dein planiusculus, latisimus palmaris et ultra subfirmus umbrinus l. fu-
sco-subcinereus squamosus, squamis apice

subreflexis imbricatis, centro erectis obscurioribus; versus marginem acutum pallidior. **Caro albida.** Subuli teretes acuti numerosissimi subtenaces recti l. rarius obliqui albido-cinerascentes.

Hydn. subsquamulosum Batsch (El. fung. p. 111. f. 43. *Hydn. squamosum*. Bull. p. 310. t. 409) huic nimis affine videtur; distinctam tamen esse speciem urgent Albert. et Schwein. l. c. p. 264. Ipse vivum non vidi et nec ex Iconibus neque e descriptionibus sufficientes inventi characteres, quare ex hac monographia Hydnorum stipitatorum, a me rite cognitorum, exclusi.

173. *Hydnnum repandum*, pileo carnoso subrepando flavo l. rufescente glabro, subulis subteretibus pallidis stipiteque difformi.

Hydn. repandum. Pers. syn. p. 555. Obs. myc. p. 90. Schum. Sæll. 2. p. 293.

a. *Denudatum*, pileo repando glabro lævi.

Hydn. repandum, pileo convexo lævi flexuoso, Linn. Suec. 1258. cum syn. Mich. Dillen. et Hall.; sed descr. ad 1257 et Auct.—Sow. fung. t. 176. Bull. h. t. 172. Fl. Dan. t. 310.

a.) *Flavidum*, pallide luteum.

Hydn. flavidum. Schæff. fung. t. 318. *Erinaceus esculentus* pallide luteus. Mich. Gen. p. 132. t. 72. f. 3.

b. *Rufidum, rufescens.*

Hydn. rufescens. Schæff. fung. t. 141.
fig. plur.

H. carnosum. Batsch. El. fung. t. 26. f. 136.

*Echinus petiolatus subrufus, petiolo
lævi.* Hall. helv. 2325.

c. *Albidum, pallidum.*

H. medium. Pers. Obs. myc. 2. p. 97.
hujus sine dubio loci.

β. *Squamosum, pileo repando subsquamoso.*

Hydn. squamosum. Schæff. f. t. 273.

H. imbricatum. Bolt. f. t. 87. (excl. syn.)

γ. *Intermedium, pileo orbiculari regulari
lævi.*

Boletus pileolo pulvinato integerrimo
&c. Gled. meth. fung. p. 74. n. 6.

Vulgare in fagetis et pinetis.

Descr. Fungus gregarius l. subcæspitosus, colore forma et superficie valde variabilis. *Stipes* irregularis flavescens glaber fragilis deorsum interdum incrassatus, longit. et crass. varia. *Pileus* difformis, in γ. regularis, flexuosus l. lobatus flavus, sed variat nunc ruber nunc albidus, lævis l. rugulosus, in β. subsquamosus, fragilis margine inæquali concolore; interdum dimidiatus. *Subuli* crassi sculi fragillimi flavescentes pallidi, nunc teretes integri, nunc incisi. *Substantia* carnosa pallide flava,

Plures ad hoc adhuc referri debent species ab Auctoribus descriptæ. Nec differt *H. carnosum* pileo convexo glabro rubello, aculeis griseis stipiteque subconcoloribus. *Gmel. Syst. Linn. II. 2.* p. 1438.

174. *Hydnus rufescens*, pileo orbiculari rufescenti - subcarneo subtomentoso, subulis subcompressis incarnato-ochraceis, stipite cylindrico.

H. rufescens. Pers. syn. p. 555. Obs. myc. 2. p. 95.

H. repandum. Bolt. fung. t. 88. (sec. Pers.) Meum fungum in fageto legi.

Descr. Priori tantum affine, ut specie vix distinguendum; nec notæ, quibus distinguitur, sunt constantes. Differt: *Stipite subæquali tenuiori albido, pileo regulari tenuissime tomentoso marginem versus interdum obsolete zonato, subulis saepius incisis aliter coloratis.*

175. *Hydnus levigatum*, pileo carnoso convexo castaneo lævi, aculeis mollibus albido-cinereis, stipite inæquali elongato. *Swartz l. c. p. 243. — Mich. Gen. p. 132. t. 72. f. 1.*

β *Coriaceum*, pileo coriaceo planiusculo lævi, aculeis tenacibus albidis, stipite æquali elongato.

γ . *Brachypus*, pileo carnoso-coriaceo plano subdepresso lævi, aculeis tenacibus albido - cinereis, stipite brevi crasso.

In pinetis Suecicis α) legit Cel. *Schwartz*,
 $\beta.$ $\gamma.$ a me lecta sunt.

Varietatem $\alpha.$ descripsit *Swartz* l. c. et ad hanc fungum meum pertinere vix credidisse, nisi Ipse illustr. vir specimina mea pro suo fungo agnovisset. *Var.* $\beta.$ *Descr.* *Stipes* elongatus crass. pennæ anserinæ l. digitæ minimi subcarnosus erectus 2—3 unc. glaberrimus æqualis solidus dilute cinereus. *Pileus* carnosò-coriaceus tenax flexibilis planiusculus glaber lævis azonus cinereus, margine sèpius flexuoso vario concolori. *Caro* tenuis alba tenax. *Subuli* numerosi tenues flexiles tenaces albi, siccati vero rufescentes.

Ab amic. *Forsandro* etiam observatum.

Var. $\gamma.$ *Descr.* A priori differt: *stipe* brevi l. unc. longo et crasso subdifformi et medio interdum incrassato demum cavo (a vermibus forte perforato) *pileo* 3 unc. plano vertice subdepresso ruguloso, (a foliis pineis scil. obtectus) subulis albidis l. dilute cinereis.

*** *Pileo coriaceo.*

176. *Hydn um melaleucum*, pileo convexo-plano subzonato glabro vertice scrobiculato umbilicato violaceo-atro, margine aculeisque albis.

Hydn, melaleucum, Swartz in litteris.

Hydn. n. sp. *Swartz* in *Vet. Ac. Handl.*
l. c. post pulli descr.

H. pullum *Schäff.* *fung.* t. 272.

H. zonatum. *Gmel.* *syst. Linn.* 11. 2. p. 1438.

H. tomentosum. *γ.* *atroalbum*. *Albert.*
et Schwein. *l. c.* p. 266. (*descr. bona.*)

H. cyathif. *β.* *Schrad.* *Spic.* p. 175. *exclus.*

Syn. *Willd.* *Batsch.* &c.

In silvis abietinis muscosis rarissime.

Descr. Suberofo-coriaceum gregarium, rarius simplex, saepissime difforme, stipitibus pileisque confluentibus. *Stipes* uncialis crassus, pennae gallinæ, vix anserinæ, tenuis elasticus glaber deorsum saepe angustatus, saepissime monstrosus e pluribus connatis ramulos compressus &c. ater. *Pileus* planus umbilicatus, sed non infundibuliformis, coriaceus zonatus coeruleo-niger l. violaceo-ater glaber vertice scrobiculato, margine albicante l. concolore, saepius autem, quam maxime irregularis, plures connati l. imbricati lobati &c. etiam fere proliferi. *Subuli* albi, tacti subcinerascentes, breves subtenaces, in stipite non decurrentes.

Egregia ab Auctoribus confusa species! et distinctissima tamen. In synonymis eruditis summam posui operam et allata vera esse spero.

177. *Hydn um tomentosum*, pileo plano-infundibuliformi zonato subcinereo vertice tomentoso, margine aculeisque albis.

Hydn. tomentosum. Linn. Suec. p. 455
(cum descr.) et Florist. Suec. Pers. syn. p. 556. a. β.

Hydn. cyathiforme. Fl. Dan. t. 1020. f.

2. (excl. syn. Mich. et Hall. Schäff. fung. t. 139.

Descr. Plurima specimina confertim saepius crescunt, pileis stipitibusque subconcretis. Stipes prioris subbrevior vix unc. superans crass. fere pennae anserinæ subglaber cinereus inæqualis basi subbulbosus l. strato subjacente subterraneo adnatus; cum plures connati sint, quam maxime irregularis. Pileus planus l. subinfundibuliformis subuncialis flacidus nunc dilutius nunc obscurius sed semper constanter cinereus, centro obscuriori fusco-tomentoso, tomento brevi, fasciis discoloribus subzonatus, margine acuto patente albido. Substantia pilei et præsertim stipitis subero-so-coriacea subzonata. Aculei albi firmi breviusculi nec in stipite decurrentes.

Obs. *Hydn. tomentosum*; Fl. Dan. 534.
ad hanc speciem non pertinet; sed forte potius varietas monstrofa *Hydni strigosi* Swartz.

178. *Hydn um scrobicularum*, pileo infundibuliformi azono ferrugineo subpubescente, vertice colliculo squamoso, subulis fusco-rufescensibus, stipite glabro subæquali.

H. cyathiforme, exiguum coriaceum ferrugineum, stipite brevisimo, pileo primum suborbiculari, omnino echinato, demum infundibuliforme. Bull. Champ. p. 308. t. 156.
(hujus videtur loci).

H. cyathiforme, gregarium pileo infundibuliformi fasciato fibroso elastico, stipite brevi *Gmel. syst. Linn. II. 2. p. 1439.* (*excl. var. β. cinerea*) *Schrad. spic. p. 174.* (*excl. var. β. zonata*)

Erinaceus alpinus minor discoides fulvo-ferrugineus. *Mich. Gen. p. 132. t. 72. f. 7.*

In pinetis non infrequens.

Nomina Auctorum specifica, quia illustrant fungum attuli.

Descr. *Stipes* brevis $\frac{1}{2}$ unc. circiter, teres suberosus tenax elasticus subæqualis glaber fusco-rufescens, radice elongata radicatus. *Pileus* valde infundibuliformis coriaceo-suberosus (sequentis multo minor sed crassior fere) junior subplaniusculus valde lobato-difformis vix concrescens subtilissime sericeus, vertice tuberculato-scrobiculatus squamoso-fibrosus, valde irregularis semper azonus. *Substantia interna* subsuberosa azona. *Subuli* tenues fragiles densi fusco-rufescentes nec in stipite decurrentes.

Magna cum sequenti, præcipue quoad colorem, affinitas, ut dubius hæserim, utrum conjungerem l. separarem. Separandum tamen est; characteres constanter servat et a sequenti magis differt, quam *rufescens* a *repando* et *aurantiacum* a *compacto*. Ceterum incredibilem in hoc Genere confusionem, Botanicorum conjungendi studio ortam, distinguendo tollenda, nec confundendo augenda; nec illustrat rem, qui varia ob similitudinem commiscet.

179. *Hydn um concrescens*, pileo plano-infundibuliformi ferrugineo-cinereo l. spadiceo-zonato glabro striato, subulis fusco-nitidis, stipite tomento inaequali.

H. concrescens. *Pers. syn.* p. 556. *Obs. myc.* I. p. 74 (*exclus. syn.*) *Swartz* I. c. p. 246. *Alb. & Schwein.* I. c. p. 266.

H. zonatum. *Willd. ber.* 1242. *Batsch El. Fung. Cont.* 2. p. 111. f. 224.

Erinaceus caespitosus coriaceus ferrugineus superne circularibus striis excavatus &c. *Mich. Gen.* p. 132. 6.

Erinaceus infundibulum imitans coriaceum colore ex fulvo-ferrugineo, pileo desuper veluti sericeo(?) & striis circularibus excavato. *Mich. I. c. 4. t. 72. f. 4. vix differt.*

In pinetis satis frequens.

Deser. vide *Sw.* I. c.

A. priori differt: *Stipite longiori basi bulboso unciali inaequali s. bventricoso ferrugineo-tomentoso, rarissime deorsum glabro; pileo juniori infundibuliformi, demum excavato-planiusculo coriaceo glabro, vertice non colliculoso, sed radiato striato colore e zonis obscurioribus variegato, subulis cinereis, dein fusciscentibus subtenacibus &c.*

180. *Hydnus auriscalpium*, pileo ciliaceo dimidiato spadiceo, stipite tomentoso.

H. auriscalpium, Linn. Suec. n. 1260. cum syn. Pers. Syn. p. 557. Comm. in Schæff. p. 55. Schæff. f. t. 143 Bull. h. t. 481 f. 3. Curt. Lond. t. 190. Fl. Dan. t. 1020. f. 1. Bolt. f. t. 90.

Erinaceus parvus hirsutus ex fusco-fulvus
pileo semiorbiculari, pediculo tenuiori. Mich.
Gen. t. 72. f. 8. Hall. helv. n. 2321.

Fungus erinaceus parvus in conis abietis
nascens. Buxb. cent. 1. t. 57. f. 1. Buxb. Hall.
129. c fig.

β bicolor, pileo dilutiori. Alb. I. c. p. 267.

In silvis passim in conis pineis.

β in abiegnis tantum legi.

Deser. Subsolitarium. *Stipes* 2--3 unc.
fimus flexibilis sursum attenuatus crassit pennæ
gallinæ erectus tomentosus spadiceo-niger, basi
cortice tomentoso-spongioso. *Pileus* dimidi-
atus laterali; sed subobicularis, excisus, lobis
haud raro circumscriptis, coriaceus tenax flexi-
bilis fusco-spadiceus 1 badius, junior sæpe fer-
rugineus & pallidus, convexiusculus tomento-
sus $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ unc., margine patente acuto interdum

flexuoso, lateribus s^epe hymenioque dilutioribus. *Subuli* spadicei longiusculi fumi.

**** Pileo gelatinoso.

181. *Hydn um gelatinosum*, albido-g'au-
guin, stipite lateral.

H. gelatinosum. *Perf Syn p. 560 Swartz*
I. c. p. 249. Scop. carn. 2. p. 472. Jacq.
austri. t. 239. Alb. &. Schwein I c p. 263.
a. & b. dichroum, nec differt Schaff. f. t. 144
145, quod

H. clandestinum. *Gmel. Syst. nat. II. 2*
p. 1439.

H. crystallinum. *Fl. Dan. t. 71?*

Ad truncos putrescentes pineos, præsertim
abiegnos.

Deser. *Gregarium gelatinosum* (suum
carnosum dicit *Schaffer.*) *Stipes* lateralis
brevis aquoso-pallidus mollis teretiusculus sub-
æqualis glaber l. tenuissime papilloso-pubes-
cens. *Pileus* junior sublinguiformis l. obova-
tus deinceps cordato-reniformis aliusve formæ
adscendens l. horizontalis $\frac{1}{2}$ —2 unc. subdiapha-
nus plus minusve planiusculus cinereo-glaucus
l. aquose albidus, superficie tenuissime rugu-
loso-papillosa. *Subuli* dilutiones albidi subdi-
stincti pyramidati molles nec fragiles.

Variat pileo difformi subsessili.

182. *Hydnorum stipitatorum species mihi dubiae:*

1) *H. suaveolens*, pileo rugoso viscoſo subto-
mentoſo, aculeis violaceis, ſtipite brevi crasso.
Scop. carn. 2. p. 472. *Alb. & Schwein* l.
c. p. 267.

An varietas *pulii* Sw.?

Obſ. Pileus dicitur coriaceus; ſed habi-
tus *Hydni compacti*.

2) *H. cinereum*. *Bull. champ.* t. 419.

Ad *H. scrobiculatum* retulit *Gmelin* ſed vix
recte quoad iconem. Forte diſtinctum l. to-
mentoſo proximum.

3) *H.* — *Erinaceus non vescus ramosus niger*.

Mich. gen. p. 70. c. Desideratur deſcriptio
aculeorum &c., forte ad *H. nigrum* l. *mela-*
leucum referendum, illo vero, ſecundum *Gle-*
ditschium l. c. propius accedere videtur.

4) *H. album* — *Erinaceus eſculentus albus*
crassus. *Mich. Gen.* l. c. f. 2. ſecundum
Hallerum varietas eſt *H. imbricati*.

De *H. subsquamido* *Batsch* ad *H. imbrica-*
tum, pro cuius ſubſpecie habeo, meam attuli
ſententiam.

183. *Species paradoxæ l. falso ad Hydnæ
stipitata: a relate:*

- 1) *H. lactescens* Hatt. *Helv.* 2323.
Hydni species vix est.
 - 2) *H. spadiceum*. Pers. — *Swartz* l. c. p.
232. &
 - 3) *H. sublamellosum*. Bull. t. 453. f. 1.
Sistotrema species sunt.
 - 4) *H. tomentosum*. Fl. Dan. t. 534. Ceterum,
ut species falsæ, plurimæ nominari possent,
quæ l. ex aliis compositæ sunt l. quorum
differentia in solis nominibus consistit.
Has ad species ad quas pertinent, annotavi.
-

††† Odontia.

184. *Hydnnum pinastri*, resupinatum
flavescens membranaceum, margine hyffino al-
bido, aculeis obliquis subadnatis. Sistotrema
pinastri. *Fries Nov. Fl. Suec.* 2. p. 38.

In ligno pineo putrido.

Descr. Resupinatum interrupte effusum
membranaceum leviter adnatum, junius villo-
sum, dein reticulatum, demum aculeatum gla-
brum, margine hyffino. *Aculei* acuti subinte-

gri flavescentes longiusuli, sed subiculo adpresso
& fere adnati.

185. *Hydn um fusco-atrum*, resupinatum late effusum ferrugineo-fuscum glabrum,
subulis distinctis nigris. Fr. l. c. p. 39.

In ligno dejecto fagineo putrido.

Obs. Hujus, sequentis, *crustosi* &c. deser.
l. c. dedi.

186. *Hydn um Agardhii*, effusum subcarnosum albidum glaberrimum intus viride-
cens, aculeis minutis obtusis, apice rubis. Fr.
l. c. p. 39.

In truncis abiegnis ad terram dejectis.

THELEPHORA P.

187. *Thelephora* (Cort.) *maculiformis* adpressa pallide rosea, junior subrotunda,
pseudo-papillo unico, mox confluens, margine
glaberrimo.

In cortice ramulorum.

Obs. A *Theleph. fallaci* omnino distincta
& *Th. laevi* & *roseæ* affinior; sed margine
glaberrimo distincta. *Pileus* effusus crustafor-
mis tenuissimus membranaceus glaberrimus di-
late & eleganter roseus, statu simplici vix lin.,
subrtundus mox confluens disformis 2--4

lin. *Papilla* unica centralis a nodulis corticis orta, in speciminiibus confluentibus plures, ceterum lăvissima.

188 *Thelephora odorata*, fraveclena suberofo-membranacea glabra lăviuseula confluens pallida.

Ad trunco abiegnos destructos putridissimos.

Desc. Resupinata effusa tota arce adnata suberofo-membranacea crassiuscula glaberrima (etiam in margine) albida l. exalbido-alutacea l. subrufescens 1—2 unc. confluens 4—5 unc. lăviuseula, papillis rarissimis. Odor gratus, fere *B. odorati*, cum quo affinitatem habet, licet abunde distincta.

189. *Thelephora amphibolia*, effusa tenuis brevis fuscescens subalutacea, papillis sparsis majusculis.

In hymenio *Boleti suberosi* tantum, sed s̄æpe legi.

Obs. Inodora & tota arce adnata color, pallescens. A *Sistotr. fallaci* omnino distineta.

190. *Thelephora ochracea*, effusa latissima subtenuis ochracea, papillis sparsis irregularibus majusculis.

In ligno abieguo putrido.

Obs. A *Th. granulosa* P. vere distincta.
Tota arctissime adnata, longissime & atissime
effusa pedalis & ultra. *Margo* nunc glaber
nunc hyssinus villosus. *Papille* ab asperitati-
bus ligni ortae videntur.

191. *Thelephora gigantea*, maxima diffor-
mis sub libera glabra lactea, margine sublibero
glaberrimo.

Th. lactea Schrad. spic. p 186 (quoad
diagnos h: evissinam hujus quidem loci; sed *Th.*
lacaea P. longe alia est species.)

Supra c: rticem *Pini sylvestris*.

Descr. Membrana 5—9 unc. longa la-
taque maxime difformis truncos leviter adhæ-
rens flexibilis undulata, sine vestigio papillarum,
contigua, utrinque margineque glaberrima lactea.

Obs. Species maxime singularis. An
distincti Generis?

192. *Thelephora confusa*, subrotun-
da arcte adnata lavissima contigua glabra, mar-
gine adnato.

$\alpha.$ *alba*.

$\beta.$ *lavissime flava*.

Th. lucida. Achar. sec. spec.

Ad ramos beculinos, raro.

Descr. Membrana lœvissima contigua vix umquam uncialis ramos arctissime adhærens subrotunda ætate confluens irregularis utrinque margineque glaberrima. Color nunc albus nunc lète flavus, detritus immutabilis, nec fuscescens l. inquinans.

193 *Thelephora cretacea*, effusa humida farinoso-cretacea alba subinquinans.

Theleph. calcea γ. Pers Syn p 581.

Corticium Sambuci. Ejusd. disp. meth. p 31.

Ad truncos *Sambucinos* frequens, in *Pineos* rarer.

Obs. vere distincta species.

194. Varietas novæ notabiliores specierum descriptarum.

Theleph. frustulata β. *tessulata*, crassissima tessulata cinnamomea, pulvere concolori obtecta.

In ligno ad terram dejecto.

Theleph. hirsuta. δ. *decipiens*, effusa resupinata glaberrima lœvigata aurantiaca.

In truncis horizontaliter dejectis.

Obs. Facillime pro distincta haberi possit specie.

Th. laciniata. $\beta.$ *permixta*, effusa resupinata, papillis marginalibus sparsis.

195. *Thelephora corrugata*, effusa eretissime adnata tenuis rimosissimo-corrugata lurida, papillis nullis.

In ligno decorticato.

Obs. Facile rugis suis, a *rinnis ortis*, distincta species, sed color difficilius determinatur. Proxime tamen accedit *luridum*, quem in *K. Vec. Ac. Handl.* 1813 t. 4. f. 11. Cl. Billberg delineavit. Irregulariter effusa, 2—3 unc. glabra.

196. *Thelephora Pini*, effusa duriuscula subtenuis rimoso-partita glabra ferugineofusca, papillis irregularibus

Theleph. Pini. Schleicher.

Ad truncos *Pini sylvestris* in Helvetia, Suecia.

Obs. Specimen, quod ex Helvetia postideo, a Suecico non differt. Ceterum frustulis tenuibus, glabritie, colore &c. a reliquis affinibus facile distinguitur.

197. *Thelephora evolvens*, junior subrotunda clausa, dein evolvens tubeupulatormis, extus margineque pallida tomentosa, disco glabro obscuriori. Tab. 10 f. 12. b.

In ramis & truncis betulinis rarissimam
& distinctissinam speciem invenit mecumque li-
beralissime communicavit ill. Prof. & Eques
Acharius.

Deser. Vera omnino Thelephoræ spe-
cies; sed more crescendi a reliquis quam maxi-
me differt, nec alii euidam mibi notæ affinis.
Primo tuberculum subrotundum convexum villo-
sum pallidum sicut, dūn magis magisque evol-
vitur & ex pularis fit $\frac{1}{2}$ —1 unc. disco dilatato
glabro subincarnato lido, primo laxi, dein
subrugoso; extus marginèque involuto pallide
tomentosa. Papillas veras non vidi.

STEREUM.

LINN.

in Berl. Mag. 1809 p. 39. f. 32.

198. *Stereum rubiginosum*, imbrica-
tum rubiginoso-spadiceum subglabrum, papillis
majusculis.

Thelephora rubiginosa. Pers. et Auct.

Singularem hujus legimus varietatem quo,
cel. Achario per litteras monente, forte est
Thelephora fuliginosa Schleich. & diximus.

β. corticiatum, effusum resupinatum pa-
pilosum confluens concentrice zonatum.

Ad truncos quercinos ad terram horizon-
taliter dejectos.

MERISMA.

192. *Merisma cavulare*, erectum co-
riaceum rufo fuscum inodorum pulverulentum,
basi subtuberosum, sursum dilatato-ramosum,
ramulis subconcoloribus. Tab. I. f. I.

In silvis abiegnis *Sueciae*. Ad Åker Amic.
Hesflin. Ad Femsjö *Ipse*.

M. anthocephalo Swartz in *K. Vet. Ac.*
Handl. 1811. p. 84 affine; sed diversum vide-
tur. (*Conf. Ic. Bulliardii cum nostra*) $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}$
uncial. fusco-ferrugineum, basi subtuberosum. *Sti-*
pes deorsum angustatus subteres sensim compre-
sus digito-ramosus. *Rami* pulvere concolori
conspersi complanati inaequales, apice sublaci-
piati concolores.

CLAVARIA. LINN.

200. *Clavaria suecica*, ramosissima erecta
ochraceo-incarnata opaca, caule crassissimo leor-
sum albido-tomentoso, ramis multifidis acutis.

In pinetis abiegnis muscosis *Sueciae*, sat
frequens.

Desr. *Gregaria ochracea* L. ochraceo-rufescens. *Caulis* crassiusculus (non tamen ad crassicaules pertinet) solidus mollis brevi sculus æqualis, basi tomento fibrilloso abdo radicatus, 3—4 lin. crassus erectus numquam decumbens. *Rami* 1—1½ unc. laxiusculi flexibiles suberecti glaberrimi solidi, intus aquosi, multifidi acuminati.

Obs. Cl. gracili P. proxima; sed vere distincta.

201. *Clavaria byssifeda*, varia ramosa albida, radiculis byssoides concoloribus insidens. Cl. byssifeda. Pers. Syn. p. 593. Obs. myc. l. p. 39. cum. descr. breviss.

Ramaria fimbriata. Holmsk. et. p. 98. cum ic.

In ligno dejecto quercino.

Desr. Species val'e polymorpha & habitu singulari. Junior *Himantia albæ* similis; sed ramulis furcatis spinulosis differt. *Tuncus* non quidem crassus; sed ramis simul summis sæpe crassior, albus subglaber, basi radiculis albis byssoides pubescentibus insidens. *Rami* stricti recti albi breves subsimplices acuti.

Meum fungum numquam rufescenter vidi.

202. *Clavaria rugosa*, ramosa albida,
caule tenui, ramis simplicibus rugosis difformi-
bus incrassatis.

Clav. rugosa, *Pers. Syn.* p. 594. *Comm.*
p. 57 *cum syn.*

In pinetis Fennsionensibus; satis frequens
in Suecia.

Descr. Majuscula albida gregaria variabi-
lis, junior subsimplex. *Caulis* brevis angustus
(ramo singulo subangustior.) glaber solidus sub-
lævis. *Rami* pauci difformes sepe connati
incrassati glabri rugosissimi, juniores læviores,
solidi 1—2 unciales subobtusi. *Substantia*
mollis.

De numero his varietatibus conf. ll.
ec. Hujus alia varietas lævior est *Cl. rugosa*
Fl. Dan. t. 1301. quæ in nostris silvis cum *Cl. hercynica* P. crescit.

Optimam Clavariarum Suecicarum mono-
graphian dedit Cel. *Swartz in Vet. Ak. Handl.*
1811. Desiderantur species descriptæ, *Cl. hel-
veola*, quam legi in ericeto ad Jonstorp in Hak-
landia, *Cl. palmata* &c.

GEOGLOSSUM P.

203. *Geoglossum difforme*, nigrum viscosum, clavula nitente compressa demum curvata difforni.

In pinetis locis graminosis. Sept. Octbr.
Desr. Gregariun interdum subcapitatum
2—unciale totum nigrum viscosum, nec
villosum l. squamulosum.

Stipes $\frac{1}{2}$ unc. subcompressus, non elasticus.

Clavula nitens complanata obtusa subcurva difformis stipiti ongiore levigata, intus cinereo-nigricans, a stipite subdiscreta.

Clavula junior subcanaliculata.

A *Geogl. glutinoso* & *viscoso* in Nov.
Fl. Succ. l. c. descriptis, abunde differt.

Non in omnibus Geoglossi speciebus stipes a pileo discretus, ut apud *Link* l. c. p. 40;
ex. gr. in *G. viscoso*. &c.

MITRULA PERS.

disp. meth.

Pileus stipitatus (*Leotia Link.*) ovatus l.
cylindricus undique theigerus, stipitem distinctum erctissime ambiens.

204. *Mitrula Todei*, stipite elongato capillari albido glabro, pileo sublineari flavo.

Chordostylum Clavaria, erectum tenacissimum simplex, stipite capillari glabro flexuoso, capitulo pyriformi coriaceo. *Tode Fung. Meckl.* l. p. 37. t. 6. f. 55.

In stipibus locis humentibus dejectis, præcipue in Filicibus & frondibus *Pteridis aquilinæ*. Aug Septemb.

Obs. Vera omnino me judice, Mitrulæ species, quamvis habitu parum recedat. Fungis mycoroideis nullo modo adnumerari potest; sed de synonymo *Todei* vix dubius sum.

Vix hujus loci reliquæ Chordostyli *Tod.* species?

Reliquæ species Suecanæ sunt M. *Hederi*, *Ludvigii*, *Dicksonii* & *Bulliardii*, quæ vero tres ultimæ nimis affines.

205. Characteres Generum affinium:

1. *Mitrula Pers.* disp. meth. Fr. (Leotia Link. Leotiæ sect. 1mæ Pers. Syn.)

Vide supra.

2. *Leotia Pers* — Fr. (Leot. sect. 2da Pers. Syn. Helotii species Link, Swartz.)

Pileus stipitatus o biculuis plano-convexus margine revoluto, inferne thecigerus.

Ab Helotiis abunde differt fructificatione inferna, a qua pagina sporulae fumi instar avolantes nudo oculo videri possunt.

Species Suecane sunt: *L. circinans* P. *lubrica* P. *β. tremula*, *marcida* P. & *truncorum* Alb. & Schwein.

3) *Verpa Swartz* (Leot. sect. 3tiæ Pers.)
Pileus stipitatus levius æqualis conicus inferne thecigerus.

Inferne etiam fructificat, sec. observationes
Ipsius *Swartzii*.

Spec. Suec. *V. candida* Sw. & *conica*,
(*Phallus conicus* Fl. Dan.)

RHIZINA. FR.

Pileus sessilis bullatus convexus, supra thecigerus, subtus concavus fibrillis pluribus radicatus (*unde nomen.*)

206. *Rhizina undulata*, undulata fusca
subtus pallida.

: *Helvella acaulis*. *Perf. Syn.* p. 614. *Obs. myc.* 2 p. 20. *Alb. & Schwein l. c.* p. 298.

H. inflata. *Schäff. fung.* t. 153

In silvis fabulosis & deustis in Smolandia
ad Femsjö &c.

Caro fragilis albida. Subtus concava al-
bida læviuscula glabra, fibris pluribus crassiu-
sculis simplicibus albis radicata.

207. *Rhizina lavigata*, convexa læviu-
scula, subtus pallida.

Octospora Rhizophora, *Hedw.* *Descr. musc.*
frond. II, p. 15 t. 5 f. a.

Peziza rhizophora, *Willd.* *Ber.* n. 1170.

Phallus acaulis *Batsch.*

In silvaticis; etiam in *Suecia*.

Obf. triori valde affinis. Utriculi (the-
ca) in mea non ita prominent, ut in iconē *Hedw.*

Obf. Medium Genus inter *Helvellam*
et *Pezizam*; his vero proprius accedit, ut jam
monuit Cel. *Link*; sed distinctum genus.

PEZIZA. LINN.

I. *Burcardia*. Gelatinosæ s. Tremel-
losæ.

Obf. Proprie ad hanc sectionem tantum-
modo referre vellem P. *inquinantem* P. (Tr.
Agaricoid. Retz.) P. *Burcardiam* P. (Lycoperd.
truncatum Linn. sec. *Hall in Vet. Ac. Handl.*
1812.) P. *puram* P. (*Fries Nov. Fl. Succ.* p 21)
& clavum Albert.; reliquas tamen ut heterocli-
tas & intermedias heic militantes reliqui. Pez.

tamen *Gelatinosa* P. (Tr. sagarum Retz) & *sarcoidis* P. ad Tremellas venosas forte potius reducendæ. Plurimas novas species possideo; sed alio loco cum iconibus illustrandæ.

208. *Peziza viridi-nigra*, majuscula carnosò-gelatinosa virescenti-nigra subglobosa, disco cupulari concolori.

P. atrovirens. *Summa Veg. Scand.* p. 63.
(nec. Pers.).

In ligno pineo putrido autumnno pluvioso,
rara.

a *P. atrovirente* differt: Substantia firmiori, magnitudine, colore magis opaco subnigro, forma globosa urceolato-cupulæformi: intus concolor est.

209. *Peziza rubella*, minuta carnosò-tremellosa rubra subconvexa, margine demum flexuoso-ferrulato.

P. rubella. *Pers. Syn.* p. 635.

In ligno putrido fagineo legi. Rarior Fungus.

Defcr. Gregaria sessilis tremellosa minuta tota glabra pallide incarnato-rubra, subtus planitcula nuda lævis, supra convexa, margine primum integro dein ferrulato flexuoso.

II. *Aleuria*. Extus farinosæ s. *Helvelloidei*.

210. *Peziza badia*, magna sessilis subflexuosa intus obscure brunnea, margine extusque dilutior, basi farinosa.

P. badia, Pers. Obs. myc. 2 p. 78. sine descr. Syn. p. 639.

P. cochleata, Bolt. Fung. t. 99. (bona).

In silvaticis locis graminosis Sueciae, Agliae Germaniae &c.

Defcr. Pulchra species; omnino digna, quæ describatur. 1—2 unc. lata, $\frac{1}{2}$ —1 unc. alta, cupularis disformis subflexuosa intus glabra laevis obscure brunnea l. cinnamomeo-rufa, margine inæquali in junioribus subinfexo, extus dilutior subglabra & basi tantum farinosa subtillissime villosa (sub lente).

P. fascicularis Alb. & Schwein an ad sect. V referenda? crescit in Suecia.

III. *Lachnum*. Extus villosæ.

Pezizæ hujus Familiæ hoc charactere facile distinguuntur.

V. *Dermea*. Coriaceæ glabræ.

211. *Peziza mycophila*, gregaria minuta planicula pallide virescens. Nov. Fl. Suec. p. 21.

In Agaricis putrefactibus ex. gr. *Ag. adustus* &c.

Descr. Coriacea sessilis minuta glaberrima, junior concava viridis margine æquali integro; dein planiuscula virescenti-albida subconfluens difformis.

212. *Peziza leucoftigma*, gregaria minuta alba disco subcinerascens.

In ligno nigricante fagineo, in quo ut granula alba apparet.

Descr. Sessilis coriacea minuta gregaria concava junior punctiformis, dein subapplanata, alba disco subcinerascens, exsiccatæ subflavescit, margine orbiculari integro $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$ lin. lata.

213. *Peziza abietis*, cæspitosa rugosa opaca sordide nigra rotunda aut subcompressa. oris inflexis. *Perf. Syn.* p. 671.

Quam in ramis exsiccatis pineis legi, pa- rum differt, hinc describenda:

Cæspitosa coriacea sessilis subglabra opaca nigra. Cupulæ subcompressæ rugosæ difformes subconfluentes, oris integris conniventibus. Cæspit. 2—3 lin.

Obs. Numerofissimas ceterum Floræ Suecicæ Novitias ex hoc Genere legi, in *Vet. Ac.*

Handl. 1812 non *allatas*. Ex. erint *Peziza brunnea* Alb. & Schw., *P. pura*, *P. gelatinosa* *P. sarcoides* *P. turbinata* Vahl, *carnosa* V. *aurea* *P. appланata* Hedw. *macropus* *P. carbonaria* Alb. & Schw. *fascicularis* Eorund. *villosa* *P. clandestina* *P. Rosæ* *P. marginata* Schum. *Phiala* Vahl, *ciborium* Vahl, *tuba* Bolt. *faginea* *P. confluens* *P. umbonata* *P. atrata* *P. compressa* *P. hysterium* *P. populnea* *P. prunastri* *P. truncata* *P. Verrucaria* Alb. & Schw. *subhirsuta* Sch. *flava* Schum. &c.

214. *Peziza lecideola*, minuta *gregaria* *subconfluens* *concava nigra*, *crustæ cinerascenti insidens*. Tab. IV. f. 2. a. b.

In Helvetia ad terram supra folia pinea *dejecta*.

Descr. *Cupulae* minutæ punctiformes glabrae concavæ margine subobtuso, in junioribus æquales, dein subconfluentes irregulares, omnino pezizoideæ; sed crustæ effusæ cinerascenti tenui, a solo, cui innascitur, inæquali insidentes & hinc Lecideis, quam maxime affinis; sed ad has non referendam esse, docuit suminus Lichenologus Cel. *Acharius*.

215. *Peziza xanthostigma*, minuta

*subgregaria orbicularis concava flavescenti-aurea
coriacea glabra.*

In ligno *Pini Abietis* putrido in Polonia.
Cupulis tenuissimis coriaceis minoribus
margin'e orbiculari integerrimo a *Pez. aurea*,
cui proxima, & colore cupulisque magis con-
cavis a *P. leuco-stigmate* distincta.

PHACIDIUM. FR.

Fileus innato-sessilis subplaniusculus epi-
dermide (*nigra*) deum rupta involucratus, e
thecis oblongis subprominentibus compositus.

216. *Phacidium coronatum*, margi-
ne epidermidis ruptae crenato, disco pallide
flavescenti.

Ascoholus coronatus Schum. Sæll. 2 p. 437.

Xyloma Pezizoides. Fers. Syn. p. 105.
L. pict. t. 18 f. 1.

Peziza comitialis. Sov. Fung. t. 118.

P. viridis. Bolt. Fung. t. 119. f. 1.

Sclerotium quercinum. Fl. Dan. t. 1380.

In foliis dejectis Quercinis, Fagineis,
Betulinis, Alneis &c.

Fungus distincti Generis, hinc nunc ad
hoc, nunc ad illud est relatus. A Xylomatis
propriis (vide *Link in Berl. mag. 1. c. p. 35*)

omnino differt & cum thecæ in superficie demum sunt collocatæ & sporidia in his seriatim disposita ad fungos proprios (*Link l. c.*) referri debet. Ex his, ut optime jam observavit **Cel Schumacher** Ascobolis proxime accedit; sed pluribus characteribus & toto habitu differt. Ad Scleromycos tamen transitum efficit.

217. *Phacidium integerrimum*, margine epidermidis ruptae integerrimo, disco paleo lutescenti.

In caule plantæ cujusdam aridæ semel legi.

Descr. Priori affine; sed minus, margine epidermidis integerrimo cinctum & hinc quasi patellatum. *Color* præced.

Hujus Generis etiam forte aliæ Xylomatis species **Auct.** ex gr. *X. salicinum* P. disco concolori, epidermide rupta, sporidiis fumi instar avolantibus &c.

SPHÆRIA. P.

II. *Periphærica.*

218. *Sphaeria repanda*, subcupulæformis nigra, subtus corrugata, marginè repando, stromate albo, sphaerulis papillatis. **Tab. I.** f. 5. a b. c.

In fruncis sorbeis.

Defcr. Nulli alii speciei affinis. Gregaria; sed non confluens, subcupulæ formis oblonga $\frac{1}{2}$ —1 unc., extus nigra, subtus quam maxime corrugata, supra laevis; sed papillis sphærularum tuberculosa. Sphærulae periphæricæ (in cupulam supernam) oblongo-lineares, stromato albo suffultæ.

219. *Sphaeria connata*, turbinato-substipitata cinerascens mox nigra, supra planiuscula sphærulifera, dein latissime confluens.

In fago cava copiose legi.

Defcr. Suberosa gregaria, junior subcinera, mox nigra, 2— $2\frac{1}{2}$ lin. alta, supra plana 2—4 lin. lata, turbinato-substipitata, stipite crasso brevi, dein vero plurima specimina plane confluunt & stipes fere evanescit, ad marginem tamen Sphaerulæ hujus latæ effusæ videatur. Sphærulae majusculæ prominentes paucæ in disco superiori positæ.

Obs. Hæc & antec. species a reliquis hujus sectionis differunt: sphærulis tantummodo supernis; sed hoc a modo crescendi pendet.

220. *Sphaeria multififormis*, subeffusa varia opaca fusco-rubiginosa intus obscure nigra, cortice non dissepabili, sphærulis prominentibus.

Sphæria argillacea. Pers. ic. pīct. t. 3.
f. 1—3 (quoad ic.)

Polymorpha; sed numquam globosa, ut
Sphær fragiformis.

Varietates præcipuae sunt:

$\alpha.$ *Sph. coarctata*, erumpens gregaria con-
vexa elongata utrinque attenuata rufo-fusca,
sphærulitis sublatentibus. Tab. 1. f. 2. a. b. c.

Ex epidermide *Betule alba* transvertim
erumpit, forma lanceolata distincta, locis vero
decorticatis fit.

$\beta.$ *dilatata*, superficialis effusa confluens
planiuscula, sphærulitis prominentibus. Tab.
1. f. 1. 3.

In truncis betulinis.

Ab his magis recedit:

$\gamma.$ *alnea*, erumpens crassia varia subnigre-
scens, sphærulitis prominentibus papillatis.

In truncis alneis cortice crasso tectis.

Forma in omnibus varietatibus a loco, cui
innascitur, pendet.

Diagnosis *Sphæriæ fragiformis*, subglobo-
sa confluens miniato-rubiginosa intus atro-ni-
tens, cortice disseparabili (*decidua*), sphærulitis
papillatis. — *Sph. rubiginosa*, in truncis fagi-
neis Sueciæ vulgaris, huic vix affinis. —

221. *Sphaeria argillacea*, subglobosa
argillacea l. lutescenti-cinerea, intus fuscescens
nigra, sphaerulis prominentibus papillatis. Tab.
II. f. 5. a. b.

Sph. argillacea. *Perf. syn.* p. 10. *Alb.*
& Schwein. l. c. p. 4.

In truncis betulinis legi.

Obf. *Sph. fragiformi* & *multiformi* ma-
xime affinis & colore præcipue differt. *Sphae-*
rulae ut in *multiformi*. Cum vero *Ieon Per-*
sooniana (*Ic. piæt.* t. 3. f. 1—3) colore a
nostra omnino recedat, colore & magnitudine
naturali depictam fistit *Tab. I.* f. 4. a. auc-
tam. f. 4. b.

222. *Sphaeria rhodogramma*, erumpens
subseriato-confluens convexiuscula rosea, sphæ-
rulis latentibus. *Tab. I.* f. 4. a. b.

In truncis dejectis fagineis.

Descr. Pulcherrima species, cum *Sph.*
rhodogramma P. comparanda, cui tamen vix
affinis. Eruipens suberosa rosea subpulveru-
lenta intus nigricans, junior subrotunda 2—3
lin. longa, dein seriato-confluens $\frac{1}{2}$ —1 unc.
subirregularis magis explanata convexiuscula,
Sphaerulae periphericæ, osticulis latentibus,

III. COMPOSITÆ.

223. *Sphaeria Mezerei*, crumpens orbicularis planiuscula intus concolor, ostiolis papillatis prominentibus.

Sph. Mezerei. Schleich. sec. spec. Helv.

In ramis emortuis *Daphnidis Mezerei*, in Helvetia, Suecia (Forsander.)

Obs. *Sphaeriæ disciformi* nimis affinis, in qua ostiola, negante licet *Persoonio*, etiam saepe prominent; sed hæc minor est, ostiolis confertioribus & substantia interna nigra.

224. *Sphaeria rubra*, epiphylla orbicularis rubra, margine glabro, ostiolis subimmersis obscurioribus.

Xyloma rubrum. Pers. syn. p. 105. Obs. Myc. 2. p. 101. Schum. Sæll. 2. p. 179. Alb. & Schw. p. 64.

In foliis *Pruni spinosæ* & *domesticæ* æstate & autumno frequens.

Vera omnino *Sphaeriæ* species & *Xylomatis* l. Æcidiis nullo modo affinis, ut omnes voluerunt Auctores.

225. *Sphaeria Xantha*, epiphylla subirregularis ochraceo-flava, margine glabro, ostiolis immersis obscurioribus.

Sph. ochracea. *Wahlenb. Fl. Lapp.* p. 513
sec. spcc. Lapp. (excl. *syn. Pers.*)

Xyloma aurantiacum. *Schleich. sec. spcc.*
Helv.

In foliis *Pruni Fadi* frequenter.

Priori nimis affinis; differt tamen forma minus orbiculari, colore & ostiolis rarioribus magis immersis.

Ne cum *Sph. ochracea* P. l. *aurantia* Ejusd. confundatur, nomina Auctorum trivialia mutare coactus sum.

226. *Sphaeria Ulmi*, epiphylla convexa nigra, ostiolis numerosissimis papillatis.

Sphaeria Ulmi. *Schleich. exsicc.*

In foliis *Ulmi campestris* dejectis putridis, in *Suecia*, *Helvetia*.

Obs. Vix alii affinis. Sub epidermide folii creseere incipit & hac tecta cineraescens apparet. Habitus fere periphäricarum; sed intus cava & stromate caret. Hinc ad sect. 4tem pertineret. 2—3 lin. lata.

Specimina Suecica, a. Cel. *Swartzio* liberalissime missa, ab Helveticis nullo modo differunt.

IV. MONOSTICHÆ.

227. *Sphæria atro-purpurea*, effusa
applanata atro-purpurea, sphærulis ovatis, osti-
olis papillatis.

Sph. atropurpurea. *Tod. Fung. Meckl.* 2.
p. 32. t. 13. f. 106. a—d. *Rebent. fl. Neom.*
p. 324.

In ligno fagineo putrido in Suecia meum
legi fungum.

Distinctissima quidem species, quam *Sph. rubiginosæ* varietatem esse suspicatus est Cel. *Persoon* & *Sph. stigmatis* Cel. *Schumacher*. Neutri tamen affinis, vixque Cl. *Tode* Ipse fungum perfectum vidit. Ad latitudinem 3—5 unc. effusam legi, colore plus minusve atro-purpureo, sphærulis adultis prominulis, apice planiusculis papillatis.

Sph. Maculae *Tod.*, in ligno fagineo
Sueciæ etiam crescenti, proxima quidem, sed
omnino distincta; nec hæc cum *Sph. stigmatis*
P. conjungenda, ut voluit Cel. *Schumacher*.

228. *Sphæria Ostruthii*, epiphylla mi-
nuta difformis, sphærulis crustæ cinerascenti
immersis subconfluentibus.

In averla parte foliorum *Imperatoriaæ Ostru-*
thii.

Sphaeræ Anethi vere affinis & forte non differt *Sph.* *Podagrariae* Roth. Nudo oculo maculam nigricantem & irregularem sibit; sublente vero crista tenuis cinerascens, cui sphæruleæ nigricantes subimmersæ, apparet.

V. TUBERCULATÆ.

229. *Sphaeria extensa*, subrotunda nigra, stromati late effuso cinereo-nigro innata, ostiolis oblongis opacis depresso perforatis. Tab. 3. f. 2. a h.

Sph. extensa. *Achar.*

In ramis arborum, rarer. (in *Sorbo*).

Species optime distincta.

VII. CÆSPITOSÆ.

230. *Sphaeria elongata*, cæspitibus inæqualibus seriatis undique confluentibus, sphæruleæ nigris disco planiusculis annulatis papillatis, intus concoloribus farctis.

In ramis dejectis fagineis, primo vere.

Descr. Pulchra species. *Cæspites* maxime polymorphi, rarissime subrotundi æquales distincti, plurimi seriatis erumpentes longissime undique confluentes, & ramulos saxe ann-

bientes. *Stroma* (receptaculum P.) tenuē nigrum.

Sphærulæ globose nigræ solidæ læves, apice depresso-planiusculæ linea depressa annulatæ subpapillataæ.

Illustratur. 231. *Sphæria rufo-fusca*, cæspitibus subrotundis æqualibus, sphærulis rufo-fuscis intus albidis cavis depresso-umbilicatis. Tab. IV f. 3 a—d.

Sphæria berberides. Schleich. sec. spec. a cel. Achario miss.

In ramis exsiccatis, *Berberidis* forte, in Helvetia.

Descr. *Sphær.* appendiculataæ proxima & *Sph.* *berberidis* vix affinis. Cæspites subrotundi distincti haud magni convexi 2—3 lin. *Stroma* tenuē nec appendiculatum glabrum. *Sphærulæ* subrotundæ læves cavæ umbilicataæ rufesceni-fuscæ intus albidæ. — Variat cæspit. confluentibus.

232. *Sphæria conglobata*, cæspitibus subglobosis minutis, sphærulis solidis nigris ovatis astomis subrugulosis.

In ramis betulinis, rarior.

Descr. Inter minores hujus sectionis & tuberculatis sat similis; sed sphærulæ liberæ

sunt. *Cespites* 1½—3 lin., e sphærulis valde prominentibus, subglobosi nigri a quales distincti. *Stroma* subconvexum tenuē. *Sphærulae* minutæ astomæ ovatæ l. globosæ opacæ tenuissime corrugatæ.

VIII. SIMPLICES.

I. MACROSTOMÆ.

Sph. platystomas P. sub *Lophio* retuli,

233. *Sphæria excipulæformis*, sphærulis nudis ovatis nigris levibus ostiola cylindrica æquantibus. *Tab. IV. f. 5. a—c.*

In cortice arborum frondosarum *Aceris*, *Fraxini* &c. Æstate.

Obf. Forma ovata, ostiolo brevi crasso (sphærulis etiam nonnumquam breviori) & loco natali a reliquis hujus sectionis facile distincta. Proxima *Sph. biformis*, in qua tamen sphærulae globosæ sparse pilosæ & ostiola conica, capsula breviora.

234. *Sphæria capillata*, sphærulis subnudis minutis ovatis nigris; ostiolis rectis setaceo-capillaribus.

In fungis suberosis, ex. gr. *Boleto pinicola*, ad terram dejectis.

Defcr. *Sphærula* nunc nuda, nunc subimmersa ovata nigra nitida duriuscula lævis, basi omnino glabra, minuta vix 1 lin. lata, Ostiolo longissime setaceo concolori subrecto; sed minime stricto.

235. *Sphaeria rostellata*, sphærulis congestis nigris subrotundis supra depresso umbonatis, ostiolis cylindricis obtusis hispidis.

Tab. III. f. 3. a—e.

In caulis dejectis. *Acharius*, qui nomen & iconem dedit.

Species polymorpha. *Sphærula* primun hemisphærica ostiolo papilliformi (f. b), dein vero elongantur (f. d.) Variat etiam ostiolis pyramidatis (f. c) & collapsis (f. e.)

2. BRACHYSTOMÆ (♂ astomæ).

236. *Sphaeria rhodomelas*, sphærulis confertis subrotundis patellatis nigris, crustæ tomentosæ rubræ insidentibus.

In truncœ Pyri Mali.

Sph. *rostellæ* Alb. & Schw., quam semel tantum in suecia vidi, valde affinis. Crusta eadem; sed *Sphærula* maxime differunt & in *S. rhodomel.* sunt patelliformes, margine integerimo, nigrae &, ni fallor, astomæ.

237. *Sphaeria nigrella*, sphaerulis ova-to-globosis levibus nigris, maculae elongatae concolori innatis, ostiolis distinctis perforatis. Tab. IV. f. 4 a—c.

In caulinibus plantarum ex. gr. *Galeopsidis* &c rarer.

Defcr. Macula elongata $\frac{1}{2}$ —1 unc. tenuissima glabra levius. Sphaerulae oblongae basi applanatae (hinc ovato-globosae) nigræ nitidæ levæ glabrae ostiolis pertusis 1. umbilicatis. (f. c. dissecta.)

Cum *Sph. herbarum* P. aliisque in macula heterogena parasiticis non confundenda.

238. *Sphaeria malina*, sphaerulis sparsis minutis rubris astomis, maculae aurantiacæ immersis. Tab. II. f. 3. a. b.

In pomo *Pyri Malii* vivo semel tantum vidi.

Macula $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ unc. lata tenuissima, sensim dilatata. Sphaerulae immersæ & parum tantum prominent, oblongo ovatae roseo rubrae.

239. *Sphaeria palmicola*, gregaria nigra nitida glabra convexa, demum umbilicato-perforata.

In epidermide fructus *Coccoes nuciferae* ex India Orientali allati.

Descr. Inter minores, subimmersa. **Color** præcipue sub lente nitidus. Irregularis est & hinc diagnostin e speciminibus perfectis desumsi. Eisdem locis maculæ sordidæ nigricantes opacæ observantur, quæ caute destinguendæ.

240. *Sphæria resinæ*, sphærulis subimmersis globosis glabris levibus aurantiaco-rubris astomis.

In resina Pini Abrietis. *Swartz.*

Obs. Minuta punctiformis. subsolitaria, humectata gelatina albida farcta. Non confundenda, cum :

Lecidea resinæ, crusta tenuissima membranacea contigua cinerascenti, apotheciis sparsis sessilibus concavis flavo rubris.

Quam in eodem loco ad Feimfiö legi.

241. *Sphæria? crispa*, gregaria subconfluens, sphærulis convexo-applanatis crispa-to tuberculosis astomis nigris.

Sph. crispa. *Achar.* cui spec. debeo..

Ad corticem arborum in Lusatia. *Mosig.*

Obs. De loco dubius sum. Nisi Lichenis species, quod negat Lichenologus summus; sphæriis proxima. 1—2 lin. & plures demum confluunt.

242. *Sphaeria umbonata*, gregaria subconfluens, sphærulis convexiusculo-applanatis lœvibus nigris papillatis.

In ligno fagineo putrido.

Descr. Tota nigra (etiam intus) orbicularis ligno adplanata disco convexiusculo papillato. *Papilla* minuta punctiformis.

243. *Sphaeria appланata*, sparsa, sphærulis concaviusculo-applanatis nigris intus concoloribus astomis, disco demum subrugoso.

In lignis emortuis.

Descr. Primo obtutū Pezizæ cuidam planæ similis. Astoma intus & extus nigra junior tenuissime concava submarginata lœvis; dein vero convexiuscula imarginata atra, margine orbiculari lœvi, disco subrugulofo.

244. *Sphaeria sepинcola*, gregaria, sphærulis subrugosis nigris intus subalbidis cavis, ostiolis minutis impresso-punctatis, s̄ape nullis.

In caulis Rosarum emortuis. Swartz.

Ipse.

Obs. *Sphaer. herbarum* forte proxima; sed sphærulis cavis, ostiolo &c. differt. Sub epidermide crescit & hinc junior tecta. In nonnullis observavi ostiola subperforata, in aliis nulla, quod cum multis aliis commune, quam

ob causam Astomas cum Brachystomis coniunxi; etiam forte paucissimæ l. nullæ vere astomæ sunt, quamvis ostiola nondum detecta. Hæc disponendi methodus species maxime affines, ex. gr. *Sph. rosellam* & *rhodomel.*, nimis etiam removet.

245. *Sphaeria Lonicerae*, aggregata, sphærulis globosis superficialibus nigris intus albicantibus, disco depresso pezizoideo.

In caulis aridis *Lonicerae Peryclymeni*.

Descr. Affinis *Sph. patellæ*; sed abunde diversa: forma subglobosa, disco pezizoideo profunde depresso, margine obtusissimqo obiculari subconnivente, disco lœvi astoma, strato interno, tenuissimo albicaute, magnitudine seminis Papaveris.

246. *Sphaeria mycophila*, subconfusa, sphærulis convexis superficialibus fragilibus nigris subnitidis papillatis, ostiolis oblongis dein deciduis perforatis.

In fungis suberolis putridis.

A *Sph. pulveracea*, pertusa aliisque firmo charactere ægre distinguitur. His tamen nullo modo affinis. *Peritheciu*m nigrum nitidum lœve glabrum convexum tenuissimum fragillimum intus cavum.

247. *Sphaeria pithya*, gregaria varia; sphærulis subrotundis nigris intus concoloribus solidis lœvibus superficialibus astomis.

In cortice *Pini sylvestris*, vulgaris.

β. *Strobilina*, polymorpha junior subapplanata, rugulosa.

In strobilis dejectis *Pini sylvestris*, frequens. Forma irregulari & loco natali præcipue distincta species. Inter minimas.

248. *Sphaeria Hederæ*, epiphylla sparsa, sphærulis superficialibus convexis nitidis nigris, ostiolo albo distincto pertuso. Tab. IV. f. 6 a—c.

In foliis *Hederæ Helicis*. Vere.

Defcr. Pulcherrima. Sphærulae innatae oblongulares convexae glabrae laves nigrae nitidæ. Ostium distinctum album pertusum, subfari-nulosum; sed in junioribus subobsoletum. —

Sphærulae demum magis applanatae, ostiolis umbilicatis nudis subnigris.

In foliis *Hederæ* etiam vigent: *Sphaeria Dematium* β. P. *Mucor Dematium* Fr. *Sphaeria punctif.* β. P. &c. (In horto Lundensi)

249. *Sphaeria Taxi*, gregaria minuta, sphærulis convexis subimmersis nigricantibus, ostiolo truncato albo.

In ramulis & foliis *Taxi baccatae*, per totum aenum; sed specimina ostiolis instructa vere tantum vidi.

Affinis priori; sed omnino distincta. Multo minor & color nudo oculo cinerascens.

Non confundendum cum *Xylomate Taxi*. Fr. a quo ostiolo truncato albo, nec pertuso ut in præc., differt.

Sph. Hederæ, Taxi, atrovirens Alb. & Schw., quæ omnes in horto Lundensi adsunt, tribum naturalem efficiunt.

250. *Sphaeria patella*. Tod.

Hujus, in caulibus herbarum vulgaris, varietatem vidimus, quæ :

β *Xylaria*, minor, disco laxi, non pliato, papillato.

In lignis exsiccatis duris, rarer.

251. *Sphaeria ocellata*, sparsa, sphærulæ plano-concavæ opacis nigris, marginè orbiculari albo cinctis.

In ramis *Betulae nanæ* emortuis exsiccatis in Smolandia.

Epidermidem subelevat & in ambitu albam reddit, qua nota facile distinguitur hæc species. Margo vero albus ab incauto pro *Sphaeria* & sphærula nigra pro ostiolio haberi posset

quo facto vix differret *Sph. melastoma*. Re-
bent. — Sæpius astoma, & papillam mini-
mam in disco observare semel tantum mihi
contigit.

252. *Sphæria speirea*, sparsa, sphæ-
rulis planis immersis opacis nigris orbiculari-
bus immarginatis astomis, in foliis vivis para-
siticis.

In foliis vivis *Ægapodii Podagrariæ*.

Cum *Sph. Ægapodii P.* & *Pedagrariæ Roth.*
loco convenit; neutri vero affinis. Macula
enim nulla & sphærulæ sparsæ planæ, qua nota
etiam a *Sph. maculiformi* differt. Differunt
quoque:

1. *Sph. punctiformis*, sphærulis subnitidis,
disco subumbilicatis, loco in foliis emor-
tuis &c.

2. *Sph. appianata*, sphærulis 3— plo &
ultra majoribus superficialibus submarginatis,
disco demum ruguloſo, loco &c.

• 3. *Sph. Glechomæ Schleich.* (sec. spec.
Helv.) sphærulis majoribus rotundis superflia-
libus, minime nigricantibus.

253. *Sphæria alnea*, epiphylla sparsa,
sphærulis minimis convexis nigris opacis, oft-
alo albo, demum collapsis concavis.

In foliis putridis *Petulae Albi.*

Folia, quibus hæ sphærulæ minimæ innascuntur, subalbicant. — Sub Microscopio determinanda & nihilo tamen minus characteres difficillime ex his atomis eruuntur.

Ostiola tantum in adultis adsunt. Magis a *Sph. Hederæ* & *Taxi* differt, quam e descriptione crèderes.

254. *Sphæria macularis*, epiphylla, sphærulis minutissimis subrotundis ostomis nigris, maculæ cinerascenti tenuissimæ insidentibus.

α *populnea*, macula cinerascenti. Tab. II. f. 4. a. b. c.

In foliis populneis dejectis.

Sphærulæ nudo oculo inconspicuae fere.

β *grisea*, macula grisea subradiata.

In foliis betulinis.

Affinem speciem, in foliis *Allii* crescentem, nuper misit Cel. Swartz, Fautor summus; sed magnitudine maxime diversa. (*Sph. allicina*)

NÆMASPORA. P.

255. *Næmaspora hyalosperma*, tuberculo tenui, cirrhis hyalinis.

N. hyalosperma. Achr.

Ex America boreali, ad ramos crescens.

Obs. Inter minores species, tuberculo tenui epidermide corticis, parum bullatim elevati, rupta cincto. Cirrhi in specimine meo nulli adfuerunt.

256. *Næmaspora melasperma*, tuberculo tenui, cirrhis solitariis nigris crassiusculis.

N. nigra. Rebent. fl. Neom. p. 340

In ramis betulinis ex mortuis fungum meum sat frequenter legi.

Obs. Tuberculum, licet tenue, adest. A. *N. juglandis* & *faginea* Schum. cirrhorum forma & a reliquis colore differt.

N. grisea & *N. leucosperma* parum differt.

SPÆRONEMA.

Fr. Tab. II. f 6—8 a—k.

(*Sphæriæ globiferæ* P. Tod. *Calicii spec.*

Ach.)

Receptaculum nullum (*in nonnullis tamen hypothallus heterogenus adest*). Peritheциum receptaculiforme varium, sæpius stipitiforme cy-

lindricum. *Gelatina* in globulos demum fatigantes erumpens.

257. *Sphaerонema cladoniscum*, perithecio cylindrico simplici l. ramoso, globulo minuto punctiformi albo. Tab. II. f. 7. c—f magn. auct.

Calicium cladoniscum. *Achar. syn. Lich.* p. 61. *Lich. univ.* p. 241.

In lignis putrescentibus Helvetiæ, Lusatia, Sueciæ.

Obs. Hypothallus tenuissimus albido saepe deest. Observ. in *Lichen. Univ. Add.* p. 673 forte ad *Sphaeron.* aliam pertinet. Hanc sicut. Tab. II. f. 6. a, b.

258. *Sphaerонema ventricosum*, perithecio simplici ventricoso compresso nigro, globulo minuto punctiformi cinereo. Tab. II. f. 8. m. a.

Calicium ventricosum. *Achar. l. l. c.*

Ad corticem arborum in Lusatia.

Specimina cum iconé Cel. *Achario*, Fautori summo, debeo.

Obs. Peritheciū vix lin. attingens. *Hypothallus* cinerascens in hac specie semper fere adeſt. Colore & peritheciī & hypothalli

globulisque, perith. cylindricis &c. sequens
differt species.

259. Relique hujus Generis species:

3. *Sph. acrosperrum.*

Sphaeria acrosp. Tod. Fung. Meckl. 2.

P. 47.

α . *nigra.* Tod. l. c. t. 15. f. 119. Alb.

& Schwein. p. 50.

β . *tricolor.* Tod. l. c. f. 120.

4. *Sph. cylindrica.* —

Sphaeria cylindrica. Tod. l. c. p. 42. t.

15. t. 114.

Etiam in Suecia frequens. Primus legit
Cel. Prof. Agardh.

5. *Sph. acicularis.*

Sphaeria dubia. Tod. l. c. p. 45. Alb. &

Schwein. l. c. p. 50.

6. *Sph. subulata.*

Sphaeria subulata. Pers. syn. p. 94. Tod.

l. c. p. 44. t. 15. f. 117.

Vulgaris in Suecia.

7. *Sph. conica.*

Sphaeria conica. Tod. l. c. p. 43. t. 15.

f. 116. Alb. & Schwein. p. 51.

In Suecia etiam visa.

8. *Sph. parabolica.*

Sphæria parab. Tod. I. c. p. 43. t. 15.

f. 115.

9 *Sph. hemisphaerica*.

Sphæria hemisphær. Alb. & Schwein. I.
c. p. 51. t. 8. f. 8.

In Suecia.

10. *Sph. versiformis*.

Sphæria versiformis. Alb. & Schwein. I.
c. p. 52. t. 9. f. 3.

Genus habitu & firmis characteribus op-
time distinctum. Affinitatem quandam cum
Næmasporis habet. *Sphæria penetrans* Tod.
(*S. patella* P.) *S. peziza* T. & *gelatinosa* T.
(*pallida* P.), *Persoonio* jam inveniente, hujus
Generis non sunt,

ACTIDIUM. Fr.

Tab. III. f. 1. e. f.

Receptaculum nullum *Perithecium* sphæri-
cum solidum, rimis pluribus radiatis. *Gela-*
tina nulla.

260. *Actidium Acharii.* Tab III.
f. 1. a.-f. *Sphæria stellulata.* Achar, see spec.
In ligno emortuo Ostrogothia. *Acha-*
rius.

In ramis *Rhamni frangulae* in Hallandia.

Ipse.

Nudo oculo Sphæriæ cuidam minutæ similis. Substantia interna Hysteriorum, quibus proprius accedit, quam Sphæriis.

LOPHIUM. Fr.

(*Sphæriæ Macrostomæ. P.*)

Receptaculum nullum. Peritheciū compressum & subglobosum solidiusculum, Ostio sublatissimo rimæformi cristato. Gelatina subindurata.

261. *Lophium fallax*, perithecio basi semigloboso farcto, sursum cylindrico nigro, ostiolo lato aperto.

Sphæria fallax. Pers. syn. p. 90. Ic. &
descr. 2. t. 10. f. 11. 12. Wahlenb. fl. Lapp.
p. 522.

In ramis & lignis exsiccatis.

Obf. Ceterum ad hoc Genus referendæ omnes *Sphæriæ macrostomæ* Pers. — Inter Sphærias & Hysteria medium est; his firma & characteribus externis, illis substantia accedit. In nonnullis tamen hæc etiam cum Hysteriis fere convenit. Omnes Sphæriæ nostræ ostiolo-

æquali instructa sunt, & hinc hoc genus a me non temere esse distinctum, spero.

Hysterium mytilinum P. & *pedicellatum* Schum. etiam affinia sunt.

H Y S T E R I U M . T O D .

262. *Hysterium varium*, superficiale nigrum subelongatum varium, labiis subobsoletis discoque concoloribus.

In ligno exsiccato quercino durissimo, rariſſimum.

Descr. Habitus a reliquorum recedit. Magnum; sed nudo oculo tamen *Sphæriæ* cui-dam immaturæ similis Forma nunc rotunda, nunc oblonga, sèpius elongata. Labia sub lente distincta apparent, rugosa opaca demum confluentia & discum convexulum difformen formant.

263. *Hysterium melaleucum*, superficiale nigrum oblongum lave, labiis subconniventibus albis. Tab. II. f. I. a. b. c. d.

In foliis *Vaccinii* *Vitis* ideæ circumortuis copiose.

Descr. Pulchra & optime distincta species. *Perithecium* nigrum lave oblongum sub-

triquetrum linea transversali alba notatum, quæ
sub lente *Labia* alba distincta levissima.

264. *Hysterium pulchellum*, superficie nigrum ovale læve, labiis distinctis virescenti-flavis Tab. II. f. 2 a—d.

In foliis *Vaccinii Vitis* idæ putridis, rarissime.

A priori omnino distinctum, forma ovali (nec triquetra) juniori concava, labiis distinctis aliter coloratis &c.

Huic proximum *H. versicolor* Wahlenb.; sed sec. spec. Lappon. omnino diversum.

265. *Hysterium elongatum*, superficie elongato-lineare opacum nigrum, labiis convexis læviusculis.

H. elongatum, oblongo-lineare acutiusculum tumidulum striatum. Wahlenb. Fl. Lapp. p. 523. excl. syn. Pers.

In ramis salicinis — *Rhamni Frangulae* in Hollandia.

H. pulicari P. et *fraxineo* P. valde affine, ab utroque tamen diversum videtur. Ab hoc enim situ superficiali, forma magis angusta et ab illo forma, labiis læviusculis (etiam in spec. mea Lapponica) &c, differt.

266. *Hysterium graphicum*, superficialiter radiato ramosum curvato - flexuosum difforme nigrum, tadiis demum distantibus concoloribus.

In cortice *Pini sylvestris*, semel (sed copiose) legi.

Defcr. Quoad habitum *Opegraphis* similimum; sed crusta nulla et perithecia omnino *Hysterii*, quamvis ramo'a radiata, quanota a reliquis differt haec species. *Labia* juniora distincta subconniventia, dein distantia, disco dilatato opaco, demum tenuissima. Majusculum.

267. *Hysterium sticticum*, immerso-erumpens minutum punctiforme oblongum acutum, labiis tenuissimis sub-convexis.

In ligno putrido in Helvetia.

Obs. *Stictibus*-affine; sed hujus sine dubio lo. i. Minutie et forma a reliquis immersis differt. Sub lente determinanda; sub nudo enim oculo ut puncta cinereo-nigra apparet. *Labia* convexiuscula laevia. *Peritheciun* subnullum, hypothallo tenuissimo albicanti immersum.

268. *Hysterium ellipticum*, immersum nigrum minutum ellipticum, labiis tenuissimis planiusculis.

In cortice crassiuscula laevigata *Pini sylvestris*. *Acharius*.

Priori affine; sed diversum videtur. Hypothallus plane nullus. Sub nudo oculo caesio-nigrum, sub lente nigrum perithecio tenui subnullo, labiis planiusculis laevibus.

269. *Hysterium viride*, erumpens elongatum subpulverulentum viride, perithecio labiisque subnulis.

In ligno dejecto quercino putrido passim.

Dubia species, ob formam hue relata. *Perithecium* proprium non vidi nec labia; ligno enim prominente cinctum, *Discus* viridis, junior subpulverulentus; dein dilatatus. Ob summa cum *H. pezizoides* Wahlenb. affinitatem hue retuli. Species illa dubia *H. viride* Alb. et Schw. hujus forte status imperfectus.

H. pezizoides W. et Sorbi Ejusd. in Suecia australi etiam sunt lecta.

H. tuberculatum Schum, non est vegetabile. Varias adhuc species, *H. Berberidis*, *Cotini*, *Aucuparie* &, ex *Helvetia* favore Cel-Acharii possideo; sed parum differunt duo.

ultima ab *H. petiolari* Alb. et Schw. aliisque
et *H. Berberidis* ad *Xyloomba* nimis accedit.

LEPTOSTROMA.

Fr. Tab. I. f. 6 b.

Receptaculum nullum *Perithecium* tenuissi-
mum effusum maculæforme disco subumbona-
tum. *Ostiolum* gelatinaque nulla.

270. *Leptostroma sphæroides*, or-
biculare dilatato - tenuissimum, disco convexu-
lo lœvi.

In caulis Herbarum majorum ex. gr.
Chærophyllo *bulbosi* &c.

1—1½ lin. Ob discum latius umbona-
tum *Spæriæ* subsimile; sed defectu gelatinæ
ostio et fere perithecia differt.

Obs. Medium Genus inter *Hysterium*
et *Xylooma*; ab utroque nimis differt perithecio
subnullo. Affinia sunt *Hysteria* sine petrithecio
vero et hujus forte Generis.

271. *Leptostroma hysteroides*, ob-
longum nigrum varium, disco substriato carnu-
loso.

In caulis variarum plantarum ex. gr.
Euphorbiæ palustris, *Pæoniae* &c.

Forma ovali oblonga distinctum.

272. *Leptostroma xylomoides*, subrotundum varium nigrum, disco ruguloso.
Tab. I. f. 6 a. b.

In caulis Herbarum, præcipue *Scirpi lacustris*.

Xyloma macula olim dixi.

273. *Leptostroma filicinum*, elongatum nigrum disforme, disco læviuseulo tenui.

In stipitibus *Osmundæ regalis* &c.

X Y L O M A. P.

274. *Xyloma Leptostromæ*, epixylum tenuissimum nigrum subrotundum, dein irregulariter ruptum.

In Caulibus *Vaccinii Vitis* ideaem mortuis,

Bene distincta species; sed habitu &c. *Leptostromatis* proprius accedit. Cortex vero exterior reliquorum Xylomatum epixylorum instar rumpitur, ut de genere nullum sit dubium — i lin. latum.

275. *Xyloma Montiniæ*, epiphyllum orbiculare clausum planiusculum nigrum, intus fuscescens.

In Capite Bonae spei in foliis *Montiniæ acris*. Dedit Cel. Acharius sub nomine *Sphaeria caffra*.

Inter maiores species, 21. latum orbiculare, nudo oculo lave, armato rugulofo. Colore interno optime distinctum.

276. *Xyloma Lonicerae (rubiforme)*, epiphyllum compositum orbiculare sparsum convexum nigrum tuberculosum, tuberculis prominentibus. Tab IV. f. 7. a—c.

In Helvetia ad folia *Lonicerae*. Sub hoc nomine liberalissime communicavit Cel. *Aeharius*.

Descr. Pulcherrima species. *Tubercula* astoma nitenti-nigra lavia in acervos orbiculares æquales convexos 1—1½ lin. latos sparsos conglomerata. An cum sequenti ad *Sphaerias* referendum?

X. rubiforme potius dicendum.

277. *Xyloma betulinum*, epiphyllum compositum angulato difforme confluens planiusculum nigrum tuberculosum, tuberculis punctiformibus.

In foliis *Berulae albae* semivivis autumno, frequens in Suecia.

Descr. Priori quidem affine; sed certissime distinctum. *Forma juniorum*, punctiformis, in adultis confluentibus maxime inæqualis. *Perithecia* 1—2 lin. lati, dein vero

confluentia, planiuscula nigra superne punctato-tuberculosa.

278. *Xyloma Solidaginis*, epiphyllum maculæforme orbiculare cinereo-nigrum, peritheciis simplicibus subglobosis aggregato-confluentibus.

In pagina inferiori foliorum vivorum *Solidaginis Virgaureæ* in monte inter Kungibacka et Tölo in Hallandia boreali tantum Lgi. Aestate.

Descr. Cum *Xylomate punctato* P, cui tamen sec. specimina mea e Germania vix affine, comparandum. In pagina foliorum superiori observantur maculae steriles irregulares flavescentes et in inferiori orbic. lares 3—4 lin. latæ l. confluentes planæ tuberculosæ, Uredini cuidam similia, cinereo nigra margine flavescenti. Sub microscopia observantur Perithecia numerosissima globosa densissime aggregato-conflentia opaca cinerascenti-nigra.

Etiam ab X. concentrico distinctissimum.

279. *Xyloma Linnaeæ*, petiolis immersum nervisequium lanceolatum lave nigrum, intus album.

In petiolis *Linnææ borealis*.

Xylomiti nervali, Alb. et Schwein proximum; sed diversum esse ex ipsa diagnosi patet. 2—3 lin.

In foliis *Linnææ* crescit *Sph. setacea* P.

280. *Xyloma Pteridis*, epiphyllum superficiale subnervosum elongato-lineare cinereo-nigrum subcorrugatum, intus subicolor.

Sphæria Pteridis. Rebent. *Fl. neon.* t. I.
f. 3. p. 344.

In foliis subemortuis *Pteridis aquilinæ* frequens.

Hujus, ni fallor, generis et *X. nervali* proxima species. Semel iuptum inveni et pulvere nigricante farctum.

281. *Xyloma Trientalis*, epiphyllum subrotundum l. oblongum tenue rugulosum nigrum intus concolor.

In foliis emortuis *Trientalis europææ*.

Ab affinibus (*X. Andromedæ*) tenuitate et colore interno differt.

Obs. Xylomata haec majora valde inter se disferunt et ad distincta forte genera referenda. Saltim diversas efficiunt sectiones, ex. gr.

A) *Epixyla*. Alb. et Schw.

B) *Tuberculata*: Fr. *Xyloma betulinum*,
Lonicerae.

C) *Macularia*: Fr. A. punctatum P. So-
lidaginis Fr.

D) *Nervisequia*: X. nervale Alb. Lin-
næa, Pteridis.

E) *Contigua*: X. Andromedæ, Trienta-
lis, Montiniæ, acerinum &c.

F) *Punctata*: X. rubrum P. aurantia-
cum Schl. ad Sphærias retuli.

282. *Xyloma Taxi*, minus applanatum
nigranti-cinereum opacum laxe et irregu-
lariter ruptum, nucleo tenui nigrescente.

In foliis *Taxi* in Horto Lundensi, raro
obvium.

Descr. Subgregarium. A. (Sph.) *Taxi*,
cum qua non confundendum, colore opaco ci-
nereo, forma applanata 3plo latiori, epidermi-
de irregulariter erupta, laciniis albicantibus &c.
differt.

283. *Xyloma Ilicis*, minus convex-
um nigrum transversim ruptum, nucleo tenui
nigrescente.

X. *Ilicis*, Ach. sec. spec.

In foliis *Ilicis Aquifolii* in Europa au-
strali.

Priori affine; sed multo minus, colore, forma et rupendi modo differt. Laciniæ albicans,

Tribum naturalem haec duo species et nonnullæ aliæ efficiunt.

284. *Xyloma erumpens*, minutum erumpens nigrum, junius sphæricum, dein umbilicato-depressum, denum cupulare.

In foliis emortuis *Vaccinii Vitis* idæ, rarius.

Nullam aliam speciem laciniis epidermidis foliorum cinctam erumpere vidi. Clavatum de cetero remanet, quod sub nomine X. *Vaccinii uliginosi* Wahleub. dedit Cel. Swartz.

X. erumpenti nostro non affine; sed ad sequens potius accedit.

285. *Xyloma geographicum*, minutum concaviusculum nigrum, maculæ tenuissimæ flavescenti insidens.

X. geographicum. Pers. sec. spec. ab. Achar. liberalissime missa.

Lichen castanearius. La Mark.

In foliis *Fagi Castaneæ* in Gallia.

Nudo oculo punetiforme; lente concaviusculum subpezizoideum, laeve opacum parum difforme.

Cum *Sph. Castaneæ* Schum., etiam apud nos vulgatissima, confundi nequit. Etiam sicc. spec. ex Helvétia omniño differt *Xyloma Castaneæ* Schleich.

Xyl. Convallariae, Schleich. ad hoc genus vix pertinet.

Plurimas alias hujus Generis species legi, ex quibus *Xyloma Sorbi*. Mihi (compositum) in foliis *Sorbi aucupariæ* semivivis autumno vulgarissimum.

SCLEROTIUM. T o d.

Genus priori maxime affine. Sic ex gr. *huc referri possent X. nervale* Alb., *Linnææ* Fr. et ad *Xylomata*.

286. *Sclerotium dipsaceum*, venise-
quium nigrum oblongum appланatum, intus
subconcolor. In Calycibus exsiccatis *Dipsaci*,
hieme et vere.

Defcr. *Scl. duro*, ut videtur, proxim-
um - Calycibus totum arctissime adnatum et
cum horum substantia quasi connatum. For-
ma varia, in calyce communis ovato-acuminata,
in reliquis oblonga lanceolata l. linearis, sem-
per nervisequia. Substantia carnoſa tenuis extus

nigra, intus cinereo-nigricans. Superficies lævis glabra; sed e ciliis calycis pseudohispida.

β . *Stramonii*, rotundo-oblongum conglomeratum.

In capsulis *Daturæ Stramonii*, vere.

287. *Sclerotium rectum*, magnum subiectum difforme appланatum læve nigrum, intus albidum.

In caulis exsiccatis Herbarum majorum, primo vere.

Sub epidermide crescere incipit, hinc subiectum. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ unc. longum.

288. *Sclerotium vulgatum*, liberum globosum flavum læve glabrum, intus albidum.

α . *vernale*, opacum, interdum difforme. In stipitibus dejectis putrescentibus, vere.

μ *Filicinum*, læte flavum globosum liberum.

In frondibus dejectis *Pteridis Aquilinæ* estate.

γ . *Fimetarium*, flavum globosum submersum.

In fimo locis sylvaticis, rarius. *Autumno.*

289. *Sclerotium rugulosum*, oblongum nigrum semiaplanatum glabrum subrugulosum.

In *Agarico* putrido exsiccato.

Uno latere planum, altero convexum 2. lin. læve, sub lente rugulosum.

290. *Sclerotium cornutum*, gregarium confertum rufum corniforme læve glabrum, intus albidum.

In *Agaricis* putridis.

Descr. 3—5 lin. longum, cornu caprino exacte sæpe simile, læve glabrum rufum intus albidum, basi rotundatum obtusum, apicem versus subcurvatum attenuatum acutum.

In hac specie, et in nonnullis aliis Sclerotiis, parasitatis *Ag. tuberosus* P. — Ab omnibus, tamen Auctoriibus pro basi stipitis hujus fungi habetur; at perperam. Conf. *A. tuberos.* P. 39.

291. *Sclerotium foliaceum*, foliaceum sublobatum nigrum.

In stipite *Agarici parasitici* P. parasiticum, autumno.

Nulli alii affinis et distincti forte Genèris fungus. Folium sublobatum exacte refert, erectum tenue nigrum opacum glabrum 3—4 lin. planum læve L rugosum.

292. *Sclerotium tomentosum*, subrotundum album villosum.

Scl. villosum, sphæricum villosum aggregatum. Tod. Fung. Meckl. I. p. 6, t. I, f. 10? (sub *Peziza villosa* P.)

In tuberibus putrescentibus Solani tuberosi
œstate.

2—3 lin. Etiam distincti forte generis
species.

ERYSIPHE. DE CAND.

293. *Erysiphe varium*, receptaculo
albo, capitulis flavescentibus fuscisque.

Sclerotium Erysiphe. Pers. *Syn.* p. 124.
Obs. Myc. p. 13. et Auct. recent.

Scl. Heraclei.

Mucor Erysiphe. Linn. Suec. p. 462. et
Auct. veter:

Species maxime vulgaris et polymorpha,
in foliis plantarum copiosissimum vitium.

β. *suffultum*, disco impresso villoso.

Sclerotium Erysiphe. β. Corylae. Pers.
Syn. p. 124.

Scl. *suffultum*, epiphyllum, granulis glo-
bosis fusco-nigricantibus, in basi pilis rigidi-
usculis suffultis, disco impresso villoso. Reb.
Fl. Neom. p. 300 t. III. f. 14 a.b.

Variant *Capitula suffulta*, pedicellata et
sessilia; flava et fusca; globosa, plana et de-
pressa & saxe in eodem specimine.

294. *Erysiphe radiosum*, receptaculo fulvo fibroso - radiato, capitulis nigris.

Sclerotium radiosum. *Achar.*

In foliis *Rosæ*. *Acharius.*

In foliis observantur maculae tenues fuscescentes 3—5 lin., sub lente fibroso stellato-radiatae, capitulis nigris l. nullis.

295. *Erysiphe album*, receptaculo tenuissimo subnullo, capitulis nigris.

Ex. album. *Achar.*

In foliis *Inglandicis* in Helvetia.

Nudo oculo ut puncta alba appetet.

TUBERCULARIA. P.

296. *Tubercularia Acaciae*, minuta applanato - sessilis convexa dura rubra, intus concolor, humectata flavescentia.

In ramis emortuis *Robiniae Pseudoacaciae*, vere.

Species bene distincta, licet reliquæ hujus generis species nimis confluunt. Substantia compacta firma nec humectata gelatinosa, nec secca farinosa. *T. salignæ* (vid *Alb.* et *Sw.* p. 69), in Scaniæ semel lectæ, affinis quidem est, sed species vere diversa.

297. *Tubercularia farmentorum*, minuta sessilis convexa oblonga extus farinosa rubra, intus gelatinosa obscurior.

In ramis exsiccatis *Vitis viniferae*, *Hederae Helicis*, *Panmacis* 5 foliæ, *Clematis* &c.

Sequenti affinis; sed magnitudine, colore, forma et substantia differt. Intermedia est:

298. *Tuber c. Menisperni*, minuta sessilis subglobosa dura obscure rubra, intus concolor.

In ramis *Menisperni canadensis*. Media inter *T. Acaciæ*, *farmentorum* et *herbarum*.

299. *Tubercularia herbarum*, maiuscula sessilis subglobosa pallide rubra, intus concolor, humida gelatinosa, secca farinosa.

In caulis exsiccatis herbarum ex. gr. *Cucubali tartarici* &c. Statu humido *Agyrio Urticæ Fr.* (*Tremella P.*) simillima; sed colore dilutiori, forma subglobosa et exsiccatione differt. — *T. Artemisiæ Schum.* stipitata, minor &c.

300. *Tubercularia Liceoides*, gregaria sessilis globosa, cortice exteriori fusco-spadiceo rufo deciduo, pulvere argillaceo-roseo nucleus tegente.

In ramis deciduis vere.

Alii vix affinis; sed veram *Tuberculariæ speciem* esse nullus dubito. *Gregaria* sæpe

confuens laevis granuliformis, granulis magnitudine seminum *Viciae*, rarius *Pisi*; cortice exteriori rufo-fusco l-fusco-spadiceo demum deciduo. Dein farina subcompacta copiosa argillacea rosea includit fungum, quasi nucleus intus duriusculum pallidum, zona obscuriori fusca circumdata.

STILBUM. P.

301. *Stilbum Lanugo*, capitulo sub-turbanato, stipiteque nigro.

In caulis et foliis emortuis putridis *Paeoniarum* vere.

Nudooculo villum tenuissimum fistit, sub microsc. comp. stipes distinctus saepè flexuosus, deorsum subincrassatus. Capitulum nigrum nunc turbinatum nunc oblongum saepè deciduum.

MUCOR. P.

302. *Mucor albo-virens*, cæspitosus ex albido-virens, peridiis globofis adultis albidis.

In *Hydno aurantiaco* exsiccato vidi. Iunior viridis est stipite brevi: dein stipites elongati

gati et peridia albicantes. Sporidia minuta numerofissima.

303. *Mucor Dematum*, cæspitosus, peridiis albis, stiptibus tuberculo radiato-infertis.

In foliis *Hederae Helicis*, rarer.

Minuta species, tuberculo suo facile distincta. Fugax est; præcedens vero subpersistens.

MONILIA. LINK.

304. *Monilia hyalina*, filis aggregatis simplicibus erectis sursum crassioribus hyalinis, articulis subgloboso-ovatis. *Achar.* — *Ic. Tab. III. f. 4. a—d.*

In culnis graminis.

Media videtur inter *Torulas* et *Monilias* *Link*; sed ob fila erecta subrigida et articulos non exacte globosos hujus loci.

HIMANTIA. P.

305. *Himantia ochracea*, densissime intertexta ochracea, fibris tenuissimis.

In pinetis ad strobilos *Pini Abietis* putridos &c.

Xylostromatis affinis; nam densissime est intertexta. Pulchra species et ab *H. sulphurea* vere distincta.

306. *Himantia Rosea*, radiato-ramosa rosea, fibris crassiusculis, extimis byssaceis.

In cortice *Iuniperi*, *Pini* &c. dejecto.

Colore a reliquis differt; margine subalbicat. Nullius fungi initium.

307. *Himantia grisea*, densissime contexta villoso-pulverulenta grisea, fibris tenuissimis.

In *Hypno proliferis* locis silvaticis, rarer.

Nudo oculo villoso-pulverulenta et fibri sub microsp. compos. detegendi.

308. *Himantia violascens*, densissime contexta violaceo-alba, fibris arachnoideis.

Ad terram nudam in silvis.

Fibri etiam hujus sub microsp. compos. determinandi.

Obs. Omnes hujus generis species Poriarum, Thelephorarum aliorumque fungorum primordia esse statuit Cel. Link; sed haec sententia in Observationes meas non quadrat *).

*) Rhizomorphas tantummodo Merulii esse primordia pessime statuit Cl. Palliot. Conf. hujus Generis monograph. in Veteri

Hyphasma fumicola, nigra et nonnullæ aliæ species Rebent. in Suecia crescunt et ad hoc Genus referendæ.

A. c. Hand. 1814. p. 201. f. IX. 1—15. Auct.
Achario. Distinctissimum esse hoc Genus et ad Lichenes referendum I. c. luculentissime demonstravit. Species nonnullas a me detectas et I. c. descriptas, novo uno alioque synonyme addito, enumерare placet.

1. *Rhizemorpha Alectrioides*, thallo plano compresso gracili nitido elevato-substriato atro, intus griseo, ramosissimo, ramis capillaceis parentibus ramulosis confertis complicatis. Achar. I. c. p. 214. t. 9. f. 3. a.

Rh. alectrioides. Fries.

In trunco putrido coryleo, ramis Vaccinii Vitis ideæ, Myrtilli &c.

β. subsimplex, thallo subsimplici tortuoso striato. Ach. I. c. f. 3. b.

Rh. alect. subsimplex. Fr.

In ramulis et foliis dejectis.

Distinguenda ab *Rh. setiformi* β. scandente Fr. — Achar. I. c. p. 213 in Pinis destruatis raro observata.

2. *Rh. Raciodioides*, thallo teretiusculo molli tenerrimo atro opaco, intus concolori ramosissimo; ramis creberrimis flexuosis attenuatis densissime intricatis, ramulis

O b s. *Ozonium auricomum* Link in Suecia crescit cum variis aliis novis hujus Generis speciebus; cum autem Cel. *Link* Ipse se plurimis capillaceis multifido-cirrhosis. Achar. l. c. p. 215. t. 9. f. 15. a. b. Rh. Racodioides. Fr.

In Rhizomorpha angulosa emortua ad Femsiö. Conf. Pers. disp. méth. Fung. p. 42.

3. *Rh. cirrhosa*, thallo tereti gracili glabro dilute castaneo intus albido, superne ramoso, fibrillis lateralibus terminalibusque capillaceis simplicibus cirrhosis. Ach. l. c. p. 217 f. II. Rh. cirrhosa. Fr.

In trunco fagineo putridissimo ad Femsiö in Smolandia.

Pulcherrima species.

4. *Rh. corrugata*. Achar. syn. Lich. p. 391. Vet. Ac. Handl. p. 221. t. 9. f. 13.

In truncis putridis in palude ad Femsiö lecta.

5. *Rh. angulosa* Ach. syn. Lich. p. 228. Vet. Ac. Handl. p. 226. f. 12.

In Scania, Smolandia.

6. *Rh. Friesii*, thallo teretiusculo tenue strigoso fragili nigro, intus concolori, dichotome ramoso, ramis rameulisque erectis strictis acuminatis. Achar. Vet. Ac. Handl. p. 227. t. 9. f. 4. a. b.

res novas species vidisse dixerit, harum determinationem exspectare satius duxi.

Rh. stricta. Fr.

Sub cortice *Pini sylvestris* ad Femsiō, rarissime.

7. *Rh. Achariana*, thallo tereti filiformi lāviūsculo fragili nigro-fusco opaco, intus rufescente, simpliciūsculo pinnato-ramoso; ramis lateralibus approximatis horizontalibus distichis rectiusculis attenuatis apice subdivisis rufis. *Achar.* l. c. p. 229. t. 9. f. 8 a. b.

Rh. Achariana. Fr.

In ligno dejecto abietino, frequens in Smolandia. Superficie, substantia &c ab *Him.* umbra maxime differt.

8. *Rh. muscicola*, thallo compressiūsculo tenui glabro elevato-striato obscure fusco, intus griseo, ramoso, ramis sparsis capillaceis planis adpressis raris elongatis curvatis subsimplicibus. *Ach.* l. c. p. 229 t. 9. f. 6.

Rh. muscicola. Fr.

β epiphylla. Fr.

Inter muscos locis humidis umbrosis, β in foliis dejectis.

9. *Rh. corticata.* *Ach.* syn. p. 391.
Vet. Ac. H. p. 232. t. 9. f. 5.

RACODIUM. P. LINK.

309. *Racodium vulgare*, expansum molle laxe contextum nigrum, filis æqualibus.

Rhiz. filiformis. Fr.

Agaricum luteum, radicibus arborum fibrosis simile inter humum et ligna l. lepides innascens. Mich. Gen. p. 125.

In ferragine ad Femsiö.

Sub nomine: *Elvella monstrosa*, lutea et alba corporo fibroso, inæquali, ramosissimo et expanso, hanc cum sequenti conjunxit Gleditsch in libro paradoxo: Meth. fung. p. 52 XII, a.

10. Rh. *Xylostroma*. Fr. Achar. I. c. p. 233. t. 9. f. 7. Rh. cancellata. Ach. syn. Lich. p. 391.

Agaricum candidum, radicibus arborum fibrosis simile &c. Mich. gen. p. 125. n. 22.

In truncis cavis et ad terram.

11. Rh. fibrillosa, thallo teretiusculo capillari molli lœvi candido ramosissimo fibriloso, axillæ compressis, ramis strictis divaricatis subanastomosantibus sursum fibrillosis. Ach. I. c. p. 228. t. 9. f. 9.

Rh? fibrillosa. Fr.

Elvella nivea corporo reticulari, fibroso, ramis compressis, in apice cristato-laciniatis.

Rac. nigrum. Schum. Saell. II. p. 447.
Dematium pinastrum. Schleich. sec. spec.
Helw. (*Non differt*).

In ligno et ramis *Betule*, *Fagi*, *Pini*
Abietis &c. locis umbrosis, muscis et foliis
 tertis.

Purimæ *Racodii* species nigræ sunt. A.
R. cellari P. difficile distinguitur, nisi colore
 magis nigro, contextu laxo, loco &c.

310 *Racodium resinæ*, expansum
 molliusculum dense contextum nigrum, filis
 inæqualibus.

In resina *Pini Abietis* in silvis Suecicæ
 paucim.

Habitu et loco notali distinctum. Fila
 divaricato-ramosa; aia rigidula apice capituli-
 fera, sub microsc. *Corembo* Link. similia.
Demat. villosum Schleich. huic simile; sed sub
 microsc. fila maxime differunt.

Gled. I. c. b. *Himantia albida*. Pers.
 disp. Feth. Fung. p. 42.

Obs. Ultimos tres, ut etiam R. h. ca-
 pilaris Roth ad fungos potius pertinent,
 et 9-10 distinctum forte efficiunt genus.

TAPHRIA. FR.

Erinei spec. P.

Thallus e floccis cæspitosis globosis granulæformibus non septatis foliis cupulaforme impressus.

* 311. *Taphria populina*, aurea.

Erineum aureum. Ach. — Pers. syn. p. 700 Alb. et Schw. p. 371. Schum. Saell. II. p. 446.

In foliis *Populi* dilatatae, nigræ, tremulæ &c. æstate.

Genus maxime distinctum nec sequentibus affine. An flocci sic dicti in hoc sporidia? Ulterius examinandum, specimina enim sicca tandem vidi.

PHYLLERIUM. FR.

Erineum. Link.

Thallus e floccis cæspitosis simplicibus varie tortis subcompressis non septatis, apicibus subattenuatis.

Obs. Ad *Rubiginem* Link, nomen alii subgeneri jam sacratum, nomen *Erinei* reservo; in hoc enim quadrant descr. *Persoonii* et plurimæ species.

312. *Phyllerium sorbeum*, floccis dense intricatis compressis latiusculis albis, exsiccalis flavescens.

In foliis *Sorbi aucupatiæ*, frequens. Aestate.

In utraque foliorum pagina viget. Nudo oculo lanam refert. Flocci sub microscopio composito simplices intricati varie torti compressi, *Ulvæ* subsimiles.

313. *Phyllerium acerinum*, floccis densissime intricatis tenuissimis filiformibus albidò cinereis.

In foliis *Aceris platanoidis*, vere.

In utraque pagina foliorum crescit. Nudo oculo præcedenti simillimum, hoc vero magis villosum, illud grumosum appetet. Sub microsc. composito flocci quam maxime differunt, ut e diagnosi patet.

314. *Phyllerium juglandinum*, planum floccis dense intricatis brevibus filiformibus roseo-cinereis.

Erineum juglandis. Schleich.

In foliis *Juglandis* in Helvetia, unde mea specimina habeo.

Paginam folii inferiorem occupat, sequenti affine; sed forma, flocus &c, differt.

315. *Phyllerium tiliaceum*, convexum pulvinatum, floccis densissime intricatis variis pallide-roseis.

An *Erineum tiliaceum*. Pers. syn. p. 700.
Obs. Myc. I. p. 25. et Auct.?

In foliis *Tiliae Europeæ vulgare*. Aestate.

De synonymis dubius cum cinereo-pallidum omnes describunt Auctores, nostrum vero pallide roseum. Utramque foliorum paginam amat.

316. *Phyllerium viteum*, effusum planiusculum, floccis intricatis tortis compressis, dein rufis.

Erineum Vitis Schrad. — *Funk. Crypt. Gew. Fichteg.* n. 285.

In pagina inferiori foliorum *Vitis viniferae* in Helvetia, Germania.

Habitus Erinei; sed sub micr. comp. patet hujus esse Generis. Flocci torti peli acidi.

317. *Phyllerium pyrinum*, effusum crassiusculum, floccis laxe intricatis variis aureis.

Erineum pyrineum. Auct.?

In foliis *Pyri Mali*, *Pruni spinosæ &c.* Colore ab. *E. pyrino* Auct. differre vide-
rur; sed loco et reliquis notis convenit.

Specimina in *Pruno spinosa* parum tenuiora. Æstate viget.

Color in Phylleriis et Erineis maxime variabilis.

318. *Phyllerium Gei*, floccis subliberis tenuissimis rectiusculis filiformibus albidis.

In foliis *Gei rivalis*, æstate. (In monte Kullaberg tantum legi).

Folio immersum. Filis rectiusculis parum intricatis et habitu a reliquis maxime recedit.

CRONARTIUM. Fr.

Thallus e floccis aggregatis simplicibus cylindricis rectis non septatis, apicibus aquilibus.

319. *Cronartium asclepiadeum*, rufescens.

Erineum asclepiadeum. *Funk. Crypt. Fichtelgeb.*

In foliis *Asclepiades*. Ex horto Upsaliensi dedit Cel. *Swarz*.

Obs. Superficiale, varie effusum. Flocci aggregati non cæspitosi nudo oculo facile distinguuntur.

ERINEUM. P.

Rubigo. Link.

320. *Erineum purpureum*, effusum superficiale supra-foliaceum rufo fuscum dein sanguineo purpureum, cupulis stipitatis scutellatis, margine erecto, stipite crassissculo brevioribus.

E. betulinum. Alb. et Schw. I. c p. 370.

E. roseum. Scultze Starg.

In pagina superiori foliorum *Betulae albae*, vere et aestate.

Omnis Erinei species sub microscopio composito determinandæ. Color enim maxime iudit. In hac vero specie non nisi in prima infans pallide roseum vidi; sed semper fere purpureum, quale etiam descripscrunt Albertini et Schweinitz.

221. *Erineum betulinum*, conglomeratum subimmersum infra-foliaceum albidum dein rufo fuscum, cupulis stipitatis pyxidatis stipite deorsum angustato duplo brevioribus.

E. betulinum. Schum. Sall. II. p. 445.

In pagina inferiori foliorum *Betulae albae* delaps. l. semiviv., autumno.

Maxime a priori differt; tempore et loco natali, colore, forma &c.; sed præcipue cu-

polarum forma; in hac specie pyxidata l. turbinata, in illa scutellata l. rotundato-excavata.

322. *Erineum padineum*, effusum infrafoliacum superficie albidum mox spadiceorufum, cupulis stipitatis urceolatis, marginem versus constrictis.

In foliis *Pruni Padi* et pagina inferiori autumno.

Ad formam juniores pertinet dubia species *E. Padi* spud Alb. et Schw. l. c. — Cupularum forma admodum differt a reliquis haec species.

323. *Erineum acerinum*, subeffsum infrafoliaceum submersum, primo albidum, dein roseo-rubrum, demum rufo-fuscum, cupulis stipitatis late cupulatis stipitem subæquantibus.

E. acerinum. Pers. syn. p. 700. Disp. meth. p. 43. Schum. Saell. l. c. Alb. et Schw. p. 370. Link. in Berl. Mag. 1809. t. I. f. 36. (optime).

Mucor ferrugineus. Rull. t. 5 $\frac{1}{2}$ 4. f. 12. σ

In foliis acerinis vivis meum fungum legi, in delapsis Pers. — Schum. — Albert. — Aestate autumno et vere.

Cupulæ dilatatae.

324. *Eriinum populinum*, conglomera-
tum immersum flavescens, mox rufescens, de-
num spadiceum, cupulis minutis scutellatis
breviter stipitatis, stipe crasso.

E. populinum. *Pers. Syn.* p. 700. *Obs.*
Myc. I. p. 100. *Schum. Saell.* II. p. 446. *Alb.*
et Schwein. p. 371.

In inferiori pagina *Populi tremulæ* foli-
rum. Aestate vigeat; sed perennat.

Folia et viva et sicca amat. Cupula folii
cum cupulis floccorum, quas in diagnosi intel-
lexi, non confundenda.

325. *Eriinum alneum*, conglomera-
tum superficiale pulvinatum fulvum, cupulis
stipitatis subconvexis tuberculosis.

Er. alneum. *Pers. Syn.* p. 701. *Schum.*
I. c. Albert et Schwein. c. I.

In foliis dejectis *Alni glutinosæ* autumno.
Paginam inferiorem eligit. Stipes cras-
siusculus; cupulæ convexæ tuberculosæ, forma
Helotii tuberculati. Fl. Dan.

326. *Eriinum negundineum*, effusum ~~pers. t.~~
superficiale infrafoliaceum tenue luteolum, cu-
pulis turbinatis cum stipe confluentibus. p. 372

E. tiliaceum. *Schleich. sec. spec. Helv.*
In foliis *Aceris Negundinis* in Helvetia.

A *Phyll. tiliaceo* quam maxime differt; nec alii affine. *Adinodum* tenue et paginam inferiorem incolit.

327. *Eriueum platanoideum*, latissime effusum superficiale infrafoliaceum tenue cine-reum, cupulis irregularibus variis.

In foliis *Aceris platanoides* in Suecia, vere et aestate.

Erysiphis species primo obtutu esset, quo ad crustam, nisi floeci sub micr. comp. ejusdem essent naturae ac reliquarum specierum. Formam vere distinctam et regularem detegere non potui. *E. acerino* minime affine.

388. *Eriueum extentum*, conglomerato-lineare seriatum convexum infrafoliaceum superficiale crassiusculum, cupulis minutis vix distinctis, rufum.

E. extentum. Achar.

E. Guinea in foliis arboris novi generis. *Afzelins.*

Nec formam cupularum hujus speciei certam determinare potui.

Obs. E. fagineum. P. nondum vidi.

AREGMA. Fr.

Pucciniæ Heterocl. Link;

Uredo. 3. c. von Straur.

Sporidia cylindrica clausa septulis pluribus distincta stipitata in plantis vivis parasitica.

329. *Aregma obtusata*, sporidiis obtusis, septulis tribus, pedicello attenuato.

Uredo obtusa. Straur in Act. Vetteraw.
2. p. 107. t. 11. f. 49.

Puccinia potentillæ. Pers. syn. p. 229.
et alior.

In foliis *Potentillæ argenteæ* frequens vere et Autumno.

Etiam in *Tormentilla erecta*. Straur.

Genus distinguendum esse jam monuit. Cel. Link; non enim "forma solum sporidii" semper clausi et septulis differt; sed "toto etiam habitu et crescendi modo" a veris Puccinii, quod in Generibus distinguendis maximi semper est momenti.

Aregnam, Bullariam, Pucciniam, Uredinem &c. egregie i lustravit Lib. Bar. von Straur; sed haec Genera non recte conjunxit, ut e scriptis summorum Mycologorum Persoonii et Linkii patet. Eiusque de varietate sporidiorum conclusio ad hoc saltim Genus non pertinet.

330. *Aregma mucronata*, sporidiis acutis, septulis subtribus, pedicello apice fusiformi terminato.

Puccinia mucronata. Pers. syn. p. 233.
rosæ (exclus. var. β.) Alb et Schwein. p. 134.

P. Rosæ. Schum. Sall. p. 235.

Uredo mucronata. *Straur.* l. c. p. 103.

f. 50.

In plurimis *Rosæ* speciebus, præcipue in *Rosa coriifolia*. Fr. sed etiam in speciebus foliis glaberrimis, ex. gr. in *R. canina*, *glaucæ* Fr. &c.

Nunc folio nunc *Uredine Rosæ* insidet.

331. *Aregma acuminata*, Sporidiis acutis, septulis 3 4nis, pedicello apice elongato-incrassato acuto.

In foliis *Rubi saxatilis*, autumno.

Media inter antecedentem et sequentem; illi vero proxima. Sporidia acervata cæspites maiores villosos formant. Apex incrassatus fere fusiformis, sed multo tenuior et brevior ac in præced.

332. *Aregma bulbosa*, sporidiis acutiusculis, septulis subquatuor, pedicello apice incrassato obtuso.

Uredo b. Ibosa. *Straur.* l. c. p. 108. f. 51.

Puccinia Rubi. *Schum.* l. c.

P. mucronata. β. *Pers.* l. c. *Albert.* et *Schw.* l. c.

In *Rubo* idæo aliisque.

Obs. Aliam speciem magis distinctam semel vidi in foliis *Comari palustris*. Omnes Aregme species in Plantis Senticosis, ut *Rosa*, *Rubo*, *Potentilla*, *Tomentilla* &c. crescere videntur et in foliorum emarcidorum l. semivivorum pagina inferiori.

EXPLICATIO ICONUM

Tab. I.

Fig. 1. *Merisma clavellare*, magn. nat.

Fig. 2. *Sphaeria multiformis*, a, coarctata.

a. Specimina plura, magn. nat.

b. Specimen tuberculatum magn. nat.

c. —— dissectum in us nigricans, cum spätrulis periphæticis. magn. auct.

Fig. 3. *Sphaeria multiformis*, β. dilatata. magn. nat.

Fig. 4. *Sphaeria rhodogramma*.

a. magn. nat.

b. specimen dissectum, magn. auct.

Fig. 5. *Sphaeria repanda*.

a. spec. integrum, magn. nat.

b. spec. dissectum, magn. nat.

c. Ejusdem pars, magn. auct.

Fig. 6. *Lepiostroma xylocomoides*.

a. spec. elongata, magn. nat.

b. —— orbiculata disco rugoso, magn. auct.

Obs. In his sub microscopio composito, nihil aliud detegi, adeoque has icones sufficienes credidit.

Tab. II.

Fig. 1. *Hysterium melaleucum*.

- a. Folium cum fungillis. magn. nat.
- b. pars folii cum fung. magn. auct.
- c. Perithecium solitarium, magis auct.
- d. —— e latere visum. Ejus d. magn.

Fig. 2. *Hysterium pulchellum*.

- a. b. c. d. Eisdem modis ac antecedens de-
- picum.

Fig. 3. *Sphaeria malina*.

- a. macula cum sphærulis. magn. nat.
- b. Sphærulæ dissectæ. sub. micr. compos.

Fig. 4. *Sphaeria macularis*.

- a. Folium populneum cum maculis cinereis abs-
- que sphærulis, nudo oculo inconspicuis.
- magn. nat.
- b. Pars maculæ cum sphærulis sub micr.
- compos.
- c. Sphærulæ e latere visæ. Sub micr. comp.

Fig. 5. *Sphaeria argillacea*. P.

- a. Cortex cum sphæriis. magn. nat.
- b. Sphæria solitaria. magn. auct.

Fig. 6. *Sphaeronema cladonifca*.

- a. b. Hujus initium sec. Acharium, parum a
- Sph cylindrica aliisque diversum. Sub
- micr. comp.
- c. d. e f. Specimina varia formæ. sub micr.
- comp.

Fig. 7. *Sphaeronema ventricosa*.

- g. h. i. k. Spec. varia sub micr. compos.

Tab. III.

Fig. 1. *Aetidium Acharii*.

- a. ramulus decorticatus cum fungillis magn.
- nat.
- b. Ejusdem pars, magn. auct.
- c. d. Perithecia e latere visa. sub. micr. comp.
- e. f. Eadem superne visa, sub micr. comp.

Fig. 2. *Sphaeria extensa.*

- a. ramulus cortice tectus sphærulis erumpentibus, magn. nat.
- b. — orbatus, sphærulis stromati extenso insidentibus magn. nat.
- c. Cæspes Sphæriarum cum parte stromatis.
- d. Ostiolum junius, apice puneto depresso.
- e. f. Ostiola adulta, impresso-perforata.
- g. Ostiolum vetustum, apertura lata submargi-nata.
- h. Stroma horizontaliter sectum cum sphærulis. Omnes sub, microsc. comp.

Fig. 3. *Sphaeria rostellata.*

- a. Caulis herbæ cum sphærulis, magn. nat.
- b. Spæria junior hemisphærica ostiolo, papilli-formi.
- c. Varietas ostiolo subpyramidato.
- d. Sphæria adulta umbonata, ostiolo hispido.
- e. Sphæria ostiolo deciduo, umbonata. Omnes sub microsc. comp.

Fig. 4. *Monilia hyalina.*

- a. culmus Bronii cum floccis. magn. nat.
 - b. c. Flocci magis aucti.
 - d. — magnopere aucti.
-

Tab. IV.

Fig. 1. *Thelophora evolvens.* Fr.

- a. Spec. junius clausum. magn. nat.
- b. — evolutum magn. nat.

Fig. 2. *Peziza Lecideola.*

- a. magn. nat.
- b. pars sub microsc. comp.

Fig. 3. *Sphaeria rufo-fusca.*

- a. ramulus cum cespitibus pluribus. Duplo auct.
- b. cæspes perpendiculariter sectus cum stroma-
to. Dupl.

- c. — horizontaliter sectus cum spærulis cavis
intus albis. Duppi. auct
- d. Sphæria solitaria, sub microsc. comp.
maxim. aucta.

Fig. 4. *Sphaeria nigrella.*

- a. Caulis urticæ cum maculo et sphæriis, magn.
nat.
- b. Idem auctus.
- c. Sphæria solitaria dissecta, sub micr. comp.

Fig. 5. *Sphaeria excipuliformis.*

- a. a. magn. nat. cum ostiolo.
- b. — ostiolo deciduo.
- c. Sphæria sub. micr. comp. ostiolo breviori.

Fig. 6. *Sphaeria Hederae;* a. magn. nat.

- b. magn. auct.
- c. spæria solitaria sub. microsc. comp.

Fig. 7. *Xylaria rubiformis; Lonicerae.*

- a. magn. nat. in folio vivo.
- b. Pars folii auct. cum Perith.
- c. transversim dissecta, sub microsc. comp.

Tab. I.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.








Fig. 4.

*av**c*

Fig. 5.


*av**cl**5*

Fig. 6.





Fig. 8.






Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.





Fig. 4.






Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 7.




Fig. 6.

