

9. SINIF

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI

Sınıf
Ders Kitabı

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI



T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
LABORATUVARI

9

DERS KİTABI

YAZARLAR

Hasan YEŞİLYURT

Nedret SELVİ

Ömer Faruk KARAGÜL



T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

HAZIRLAYANLAR

YAZAR : Hasan YEŞİLYURT
YAZAR : Nedret SELVİ
YAZAR : Ömer Faruk KARAGÜL
DİL UZMANI : Şükran ERTAŞ
GRAFİK TASARIM : Ali DEMİRCİ



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'sım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY


GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaffet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	9
ÖĞRENME BİRİMİ 1 HAYVANLARDA HAREKET SİSTEMİ.....	15
1.1. Anatomik yönler.....	16
1.2. Sık Kullanılan Anatomi Terimleri ve Anlamları	18
1.3. Kemikler (Os, Ossa).....	22
1.3.1 Kemiklerin Yapısı	22
1.3.2. Periost, Endost ve Kemik İliği	23
1.4. Kemik Çeşitleri	23
1.5. İskeleti Oluşturan Kemikler	24
1.5.1. Omurga (Columna Vertebralis)	24
1.5.2. Omurgayı Oluşturan Kemiklerin Genel Yapısı.....	24
1.5.3. Omurgayı (Columna Vertebralis) Oluşturan Kemikler.....	25
1.6. Ön Bacak Kemikleri (Ossa Membri Thoracici).....	30
1.6.1. Kürek kemiği (Scapula)	30
1.6.2. Kol kemiği (Humerus)	31
1.6.3. Ön Kol kemiği (Ossa Antebrachium)	31
1.6.4. Ön Ayak İskeleti (Skeleton Manus).....	32
1.7. Os Coxae (Ossa Membri Pelvini)	35
1.7.1. Pelvis.....	36
1.7.2. Uyluk kemiği (Os Femoris).....	36
1.7.3. Diz Kapağı kemiği (Patella).....	37
1.7.4. Bacak kemikleri (Ossa Cruris).....	37
1.7.5. Ayak bilek kemikleri (Ossa Tarsi).....	38
1.7.6. Topuk kemiği (Os Calcaneus).....	38
1.7.7. Ayak Tarak kemikleri (Ossa Metatarsus).....	39
1.7.8. Ayak Parmak kemikleri (Ossa Digitorum Pedis).....	39
1.8. Göğüs Kafesi (Thorax) Kemikleri	41
1.8.1. Göğüs kemiği (Sternum)	41
1.8.2. Kaburgalar (Costae, Kosta).....	42
1.9. Kafatası Kemikleri (Ossa Cranii).....	42
1.9.1. Art Kafa kemiği (Os Occipitale)	43
1.9.2. Ara Duvar kemiği (Os İnterparietale)	43
1.9.3. Şakak kemiği (Os Temporale).....	43
1.9.4. Duvar kemiği (Os Parietale).....	43
1.9.5. Alın kemiği (Os Frontale)	44
1.9.6. Burun kemiği (Os Nasale).....	44
1.9.7. Gözyaşı kemiği (Os Lacrimale)	44
KISSADAN HİSSE	44
1.9.8. Üstçene kemiği (Os Maxilla)	45
1.10. Eklemler	47
1.10.1. Eklem Çeşitleri.....	47
1.11. Oynar Eklem Çeşitleri.....	49
1.12. Eklem Hareketleri	49
1.13. Kas Sistemi	52
1.13.1. Kas Çeşitleri.....	53
1.13.2. İskelet Kasları.....	54
1.13.3. Kalp Kası.....	54

1.13.4. Düz Kaslar.....	55
1.14. Kasların Sınıflandırılması	55
1.14.1. Baş Kasları (Musculus Capitis).....	55
1.14.2. Boyun Kasları (Musculi Colli).....	55
1.14.3. Göğüs Kasları (M. Thoracis).....	56
1.14.4. Karın Kasları (M. Abdominis)	57
1.14.5. Ön Bacak Kasları	57
1.14.6. Arka Bacak Kasları	58
1.15. Vücut Duruşları.....	59
1.15.1. Ön Bacak Duruşlarının Önden Görünüşü	60
1.15.2. Ön Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü	60
1.15.3. Arka Bacak Duruşlarının Arkadan Görünümü	61
1.15.4. Art Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü	61
1.16. Ayak Duruşları.....	62
1.16.1. Düzgün Ayak Duruşu.....	62
1.16.2. Bozuk Ayak Duruşları.....	62
1.17. Topallık	64
1.17.1. Topallıkların Sınıflandırılması	64
1.17.2. Topallığın Sebepleri	65
1.17.3. Topallığın Kontrolü.....	65
ÖĞRENME BİRİMİ 2 HAYVANLARDA DERİ VE MUKOZA KONTROLÜ	69
2.1. Derinin (Cutis) Görevleri	70
2.2. Derinin Yapısı ve Katmanları	70
2.2.1. Epidermis	71
2.2.2. Dermis	71
2.3. Epidermal Oluşumlar	72
2.3.1. Kıl (Pilus).....	72
2.3.2. Kıl Folikülü	72
2.3.3. Deri Bezleri (Glandula Cutis, Glandula Kutis).....	73
2.3.4. Meme (Mamma) Süt Bezleri (Glandula Lactifera).....	73
2.3.5. Tırnak (Organum Digitale)	74
2.4. Derideki Patolojik Değişiklikler	77
2.5. Hayvanlarda Mukoza	82
2.5.1. Görülebilen Mukozalar	82
2.5.2. Mukozadaki Patolojik Değişiklikler	82
ÖĞRENME BİRİMİ 3 : HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ	87
3.1. Sindirim Sistemini Oluşturan Organların Yapısı ve Çalışması.....	88
3.1.1. Ağız boşluğu (Cavum Oris)	88
3.2. Besinlerin Alınışındaki Fizyolojik Olaylar	101
3.2.1. Açlık ve Tokluk.....	101
3.2.2. İştah	101
3.2.3. Susuzluk	102
3.2.4. Besinlerin Ağıza Alınması	102
3.2.5. Su İçme ve Süt Emme	103
3.2.6. Çiğneme	104
3.2.7. Yutma.....	104
3.2.8. Kusma	105
3.3. Mide (Gaster, Ventriculus).....	107
3.3.1. Çok Odacıklı Midelerin Yapısı	107

3.3.2. Midede Sindirim	110
3.3.3. Tek Odacıklı Midelerde Sindirim	111
3.3.4. Çok Odacıklı Midelerde (Geviş Getirenlerde) Sindirim	111
3.3.5. Geviş Getirenlerde Mide Hareketleri	112
3.4. Bağırsak ve Defekasyon Kontrolü	116
3.4.1. Karın Boşluğu ve Periton	116
3.4.2. Bağırsaklar	116
3.4.3. Karaciğer (Hepar) ve Safra Salgısı	117
3.4.4. Pankreas	119
3.4.5. Bağırsak Hareketleri.....	119
3.4.6. Dışkılama (Defekasyon).....	119
ÖĞRENME BİRİMİ4: HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ.....	129
4.1. Solunum ve Solunum Sistemini Oluşturan Organlar	130
4.1.1. Burun (Nasus) ve Burun Delikleri (Nares)	131
4.1.2. Gırtlak [Larynx (Larinks)]	133
4.1.3. Soluk Borusu [Trachea (Trake)]	133
4.1.4. Akciğerler (Pulmones)	134
4.2. Akciğerlerde Gaz Alışverişi	136
4.3. Göğüs Boşluğu ve Pleura (Plevra)	137
4.4. Solunum Mekanikliği	137
4.5. Solunumun Sinirsel Kontrolü.....	138
4.5.1. Soluk Alma (İnspirasyon)	138
4.5.2. Soluk Verme (Ekspirasyon)	139
4.5.3. Solunum Sesleri	139
4.6. Solunumla İlgili Bazı Terimler	139
4.7. Solunum Sayıları	140
4.8. Kanatlı Hayvanlarda Solunum Sistemi	141
4.9. Solunum Yollarının Kontrolü	141
4.10. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi.....	149
4.10.1. Kalp [Cor (kor)]	149
4.10.2. Kalp Kapakları	153
4.10.3. Kalbin Damarları.....	154
4.10.4. Kalbin Sinirleri, Uyarı ve İletim Sistemi	154
4.10.5. Kalbin Örtüleri	154
4.10.6. Kalbin Çalışması	154
4.10.7. Nabız, Kan Basıncı, Büyük ve Küçük Tansiyon.....	156
4.11. Kan Dolaşımı, Fötal Dolaşım ve Damar Sistemi	158
4.11.1. Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı	158
4.11.2. Fötal Kan Dolaşımı	158
4.12. Damar Sistemi.....	159
4.12.1. Atardamarların Yapısı ve Görevleri.....	159
4.12.2. Toplardamarların Yapısı ve Görevleri	160
4.12.3. Kılcal Damarların Yapısı ve Görevleri	160
4.12.4. Lenf sistemi ve lenf damarları.....	160
4.12.5. Dalak (Lien)	164
4.12.6. Timus (Thymus).....	164
4.12.7. Bursa Fabricius	165
4.13. İç Salgı Bezleri ve Ürettikleri Hormonlar	165
4.13.1. Pankreas	165

4.13.2. Tiroit Bezi (Glandula Thyroidea).....	165
4.13.3. Paratiroit Bezi.....	165
4.13.4. Hipofiz Bezi	166
4.13.5.Böbrek Üstü Bezi [Adren, Glandula (Suprarenalis)]	166
4.14. Kanın Yapısı ve Görevleri	166
4.15. Kan Hücreleri (Kanın Şekilli Elemanları).....	168
4.15.1. Alyuvarlar (Eritrositler)	168
4.15.2. Akyuvarlar (Lökositler)	170
4.16. Trombositler.....	173
4.17. Plazma ve Serum.....	173
4.18. Pıhtılaşma Mekanizması	174
4.19. Hemoliz.....	175
4.20. Anemi (Kansızlık).....	175
4.21. Sedimentasyon (Alyuvarların Çökmesi)	175
4.22. Hematokrit.....	175
4.23. Hemaglutinasyon.....	176
ÖĞRENME BİRİMİ 5: BOŞALTIM SİSTEMİ VE GENİTAL SİSTEM	181
5.1. Boşaltım Sistemine İlişkin Yapılar	182
5.1.1. Boşaltım Sistemini Oluşturan Organlar ve Görevleri	182
5.2.Böbrek (Ren).....	182
5.2.1. Nefronun Yapısı ve Fonksiyonları	183
5.2.2.Boşaltım ve Böbrek Fonksiyonu	185
5.3. İdrar Boruları (Üreterler).....	187
5.4. İdrar Kesesi (vesica urinaria)	187
5.5. İdrar Kanalı (Urethrae).....	188
5.6. İdrar Oluşumu	188
5.7. İdrar Yapma	189
5.8. Ürinsiyonun Sinirsel Kontrolü	189
5.9. Üriner Sistemin Kontrolü.....	189
5.9.1. Ürinsiyon Sırasında Hayvanların Aldığı Pozisyonlar	189
5.9.2. Ürinsiyon Sayısı	190
5.9.3. Ürinsiyon Sırasında Ağrı Belirtilerinin Kontrolü.....	190
5.9.4. Üriner Sistemin Fiziksel Kontrolü	191
5.10. Dışı Genital Sistemi	193
5.11. Dışı Genital Organların Yapısı Özellikleri	193
5.11.1. Vulva	193
5.11.2. Clitoris.....	193
5.11.3. Vagina	194
5.11.4. Uterus (Rahim, Döl yatağı, Kuzuluk)	194
5.11.5. Cervix Uteri.....	195
5.11.6. Corpus Uteri	195
5.11.7. Cornu Uteri	195
5.11.8. Yumurta Kanalı (Tuba uterina, Oviduct, Salpinx).....	196
5.11.9. Ovaryum.....	196
5.12. Dışı Üreme Hormonları.....	198
5.12.1.Östrojen.....	198
5.12.2.Progesteron.....	198
5.13. Dışı Genital Organların Kontrolü	198
5.13.1. Vulva ve Vajinanın Kontrolü	198

5.13.2. Uterusun ve Ovaryumların Kontrolü	199
5.14. Memeli Hayvanlarda Erkek Genital Organların Yapısı ve Görevleri.....	202
5.14.1.Penis (Cav, Kamış).....	202
5.14.2.Scrotum	202
5.14.3.Testis (Orchis).....	203
5.14.4.Epididimis	203
5.14.5. Ductus Deferens	204
5.14.6. Funiculus Spermaticus	204
5.14.7. Preputium	204
5.14.8. Erkek Eklenti Bezleri	204
5.14.9. Erkeklerde Üreme İşlevinin Hormonal Kontrolü.....	205
ÖĞRENME BİRİMİ 6 : HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİ.....	213
6.1. Sinir Sisteminin Görevleri	214
6.2. Sinir Sisteminin Özellikleri.....	215
6.3. Merkezi Sinir Sistemi.....	217
6.3.1.Dura Mater (Sert Zar).....	217
6.3.2.Araknoid Mater (Örümceksi Zar)	218
6.3.3.Piamater (İnce Zar)	218
6.4. Omurilik (Medulla Spinalis)	218
6.5. Beyin (Cerebrum).....	219
6.5.1.Beyin sapı.....	220
6.5.2.Pons (Metencephalon).....	220
6.5.3.Beyincik (Cerebellum)	220
6.6.Beyinden Çıkan Sinirler (Nn. Craniales)	223
6.7.Spinal sinirler	223
6.7.1.Boyun Spinal Sinirleri.....	223
6.7.2. Sırt Spinal Sinirleri.....	223
6.7.3. Bel Spinal Sinirleri.....	224
6.7.4. Sağrı Spinal Sinirleri	224
6.7.5. Kuyruk Spinal Sinirleri	224
6.8.Periferik Sinir Sistemi (Çevresel Sinir Sistemi)	224
6.9.Otonom Sinir Sistemi.....	224
6.9.1.Sempatik Sinirler.....	224
6.9.2. Parasempatik Sinirler	224
6.10. Somatik Sinir Sistemi.....	225
6.11. Refleksler ve Refleks Kontrolü.....	225
6.12. Görme Duyu Organı Göz.....	229
6.13. İşitme Duyusu ve Denge Organı, Kulak	233
6.13.1.Dış kulak (Auris Externa)	233
6.13.2. Orta kulak (Auris media)	234
6.13.3. İç kulak (Auris interna).....	234
CEVAP ANAHTARLARI.....	238
KAYNAKÇA.....	239

HAYVANLARDA HAREKET SİSTEMİ



ÖĞRENME BİRİMİ 1: HAYVANLARDA HAREKET SİSTEMİ



KONULAR

1. İskelet Sistemi
2. Eklem Yapıları
3. Kas Sistemi
4. Hareket Kontrolü

TEMEL KAVRAMLAR

- Anatomi
- Anatomi Terimleri
- Kemiklerin Yapısı
- Kemiklerin Sınıflandırılması
- Eklem
- Eklem Çeşitleri
- Kas Çeşitleri
- Hareket Kontrolü
- Topallık

Bu öğrenme biriminde;

- Anatomi ve anatomi terimlerini,
- Genel olarak kemiklerin yapı ve çeşitlerini,
- İskelet sistemini oluşturan kemikleri,
- Omurgayı oluşturan kemikleri,
- Ön bacağı oluşturan kemikleri,
- Arka bacağı oluşturan kemikleri,
- Göğüs kafesini oluşturan kemikleri,
- Kafatasını oluşturan kemikleri,
- Kanatlı hayvanlarda iskelet sistemindeki farklılıkları,
- Hayvan türlerine göre kemikleri karşılaştırmayı,

öğreneceksiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Veteriner kliniklerine veya hayvan hastanelerine giderek hareket sistemine ilişkin bulguların nasıl alındığını araştırıp bilgi toplayınız.
- Hayvanların hareket sistemine ilişkin bulguları alma hakkında kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinde araştırma yapınız.
- Konuyla ilgili dosya ve sunum oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Anatomi


Anatomi terimi ilk kez "Anatome" olarak Aristoteles (M.Ö. 384-322) tarafından kullanılmıştır. "Anatomie" Yunanca kökenli bir kelime olup kesmek, keserek ayırmak manasına gelir. Anatomi canlı vücudunu oluşturan organların normal şeklini, yapısını, büyüklüğünü, doğal duruş ve komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Anatomi ile beraber akla gelen organların fonksiyonlarını, çalışma prensiplerini inceleyen bilim dalı ise fizyolojidir.

Kemik Bilimi : Osteologia (Osteoloji)
Eklem Bilimi : Arthrologia (Artroloji)
Kas Bilimi : Myologia (Miyoloji)
Hücre Bilimi : Sitologia (Sitoloji)
Doku Bilimi : Histología (Histoloji)

Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu Latince, bir kısmı da Grekçe sözcüklerden oluşur. Vücut yapı ve fonksiyonlarını iyi anlayabilmek için bazı temel anatomik terim ve yönleri iyi öğrenmek gereklidir. Anatomide yön belirten terimler coğrafyada olduğu gibi çok önemlidir.

1.1. Anatomik yönler

Dorsal : sırtta doğru
Ventral : karna doğru
Medial : orta hatta (median düzlem) doğru
Lateral : median düzlemde dış tarafa doğru
Cranial (kranial) : başa doğru
Caudal (kaudal) : kuyruğa doğru
Rostral : baş üzerinde buruna doğru
Caudal : baş üzerinde geriye doğru
Proximal : kol ve bacakta gövdeye doğru (yukarı)
Distal : kol ve bacakta gövdeden uzağa doğru (aşağı)



Görsel 1.1: Köpek üzerinde anatomik yönler

Anatomik terimler her ülkede tıp alanında dil birliğini sağlamıştır. Canlı varlıkların organ yapısını ve organların birbiri ile ilişkisini inceleyen bilim dalı olan anatomi kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Anatomia veterinaria comparativa (karşılaştırmalı veteriner anatomisi) : Evcil memeli ve evcil kanatlı hayvanları inceleyen anatomi dalıdır.

Anatomia sistematica (sistemik anatomi) : Organizmayı organ topluluklarından oluşan sistemlere ayırıp, incelemeyi esas tutar.

Anatomia şirurjika (cerrahi anatomi) : Operasyon yönünden çok önemli olan bölgeleri konu alan anatomi dalıdır.

Anatomia topographica - Anatomia regionalis (bölgesel anatomi) : Vücudu bölgelere ayırarak buralarda yer alan doku ve organları dıştan içe inceleyen anatomi dalıdır.

TARTIŞIYORUM

**Anatomik terimleri Latince yerine Türkçe kullanmamız mümkün olabilir mi?
Arkadaşlarınızla tartışınız**

1.2. Sık Kullanılan Anatomi Terimleri ve Anlamları

LATİNCE	TÜRKÇE OKUNUŞU	ANLAMI
Aboralis	Aboralis	Ağızdan uzak olan, ağız gerisinde bulunan
Ala	Ala	Kanat
Alveolus	Alvolus	Akciğerin bal peteği biçimindeki küçük kesecikleri
Angulus	Angulus	Açı
Anterior	Anteriyor	Ön, önde olan, önceki
Apertura	Apertura	Delik, açıklık
Arcus	Arkus	Kemer, yay, kavis
Auris	Auris	Kulak
Axilla	Aksilla	Koltuk altı
Brachium	Brahium	Kol, üst kol
Brevis	Birevis	Kısa
Bursa	Bursa	Kese, torba
Calcaneus	Kalkenyus	Topuk kemiği
Canalis	Kanalis	Kanal, boru, kanat
Capitus	Kapitus	Başı olan
Caput	Kaput	Baş
Carpus	Karpus	El bileği
Cartilago	Kartilago	Kıkırdak
Cauda	Kauda	Kuyruk
Cavum	Kavum	Boşluk
Cervix	Serviks	Boyun
Choana	Kohana	Huni, krater
Cochlea	Koklea	Salyangoz kabuğu
Collateralis	Kolletaralis	Yanda olan
Collum	Kollum	Boyun
Columna	Kolumna	Sütun, direk
Condylus	Kondilus	Kıkırdak kaplı eklem çıkıntısı
Corona	Korona	Taç
Cornu	Kornu	Boynuz
Corpus	Korpus	Esas kısım, gövde

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI

Costa	Kosta	Kaburga
Coxae	Koksa	Kalça
Cranialis	Kıranialis	Craniumdan (Kıranyum) başa (kafatası) yakın
Caudalis	Kaudalis	Kuyruk tarafına yakın olan
Cranium	Kıranyum	Kafatası, kafa
Crista	Kırısta	İbik, tarak
Crus	Kurus	Baldır
Cutis	Kutis	Deri
Dens	Dens	Diş
Dexter	Dekster	Sağ
Diameter	Diyameter	Çap
Distalis	Distalis	Gövdeden uzak, yere yakın bulunan
Ductus	Duktus	Kanal, boru
Duo	Duo	İki
Dorsum	Dorsum	Sırt
Dorsalis	Dorsalis	Sırta bakan, sırta ait
Epiphysis	Epifiz	Kemik ucu ve beyinde bir bez
Equidae	Ekude	Tektırnaklı hayvan, at familyası
Extensor	Ekstensor	Açııcı, açan, gerici, geren
Externus	Eksternus	Dışta, dış tarafta bulunan
Extremitas	Ekstremitas	Kol, bacak, taraf
Facies	Fasies	Yüz
Fissura	Fissura	Yarık
Flexor	Fileksor	Bükücü
Foramen	Foramen	Delik
Fossa	Fossa	Çukur
Fovea	Fovea	Yuvarlakça çukur
Fundus	Fundus	Dip, temel, taban
Genu	Genu, jenu	Diz
Glandula	Gılandula	Bez
Gluteus	Guluteus	Sağrı kası, kaba et
Horizontalis	Horizantalis	Yatay
İncisura	İnsisura	Çentik

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI

İncisivus	İnsisivus	Kesici
Inferior	İnferyor	Alt, aşağı, alttaki
İnter	İnter	Ara, arasında
İnterior	İnteryor	İçte olan, iç tarafta bulunan
İntermedius	İntermedius	İki şeyin arasında
İnternus	İnternus	İç, iç yan
İntra	İntra	İçinde olan, içinde
Labium	Labium	Dudak
Lacrima	Lakrima	Gözyaşı
Lateralis	Lateralis	Yan tarafta, dış yanda bulunan
Major	Major	Daha büyük
Malleus	Malleus	Çekiç
Mandibula	Mandibula	Altçene kemiği
Manus	Manus	El
Margo	Margo	Kenar
Maxilla	Maksilla	Üst çene kemiği
Meatus	Meatus	Yol, geçit, kanal
Medialis	Medialis	Ortaya, içe yakın olan, iç yan
Medius	Medius	Orta çizgide bulunan
Mentum	Mentum	Çene
Minor	Minör	Daha küçük
Molaris	Molaris	Öğütme işi ile ilgili, öğütücü dişlere ait
Musculus	Muskulus	Kas, adale
Nares	Nares	Burun delikleri
Nervus	Nervus	Sinir
Nuchae	Nuha	Ense
Oralis	Oralis	Ağızdan, ağza yakın, ağız tarafına olan
Palatum	Palatum	Damak
Planum	Pılanum	Düzlem
Patella	Patella	Dizkapağı
Pelvis	Pelvis	Leğen kemiği
Periosteum	Periostum	Kemik dış zarı
Phalanx	Falanks	Parmak kemiği

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI

Posterior	Posteriyor	Art, arkada olan, arkadaki
Proximalis	Proksimalis	Gövdeye daha yakın bulunan
Regio	Regyo	Bölge, çevre
Saccus	Sakkus	Kese, torba
Sacrum	Sakrum	Sağrı kemiği
Scapula	Sıkapula	Kürek kemiği
Septum	Septum	Bölme, ara duvar
Sinister	Sinister	Sol
Sinus	Sinus	Boşluk
Spina	Sipina	Diken, kılıç
Sulcus	Sulkus	Oluk,
Superficialis	Süperfisiyalis	Yüzlek
Superior	Süperior	Üst, üstteki
Supra	Supra	Üst, üstünde, üzerinde
Sutura	Sutur	Dikiş
Symphysis	Simfisiz	Kemik kaynak yeri
Tendo	Tendo	Kiriş
Thorax	Toraks	Göğüs kafesi
Torus	Torus	Kabartı, tümsek, şiş
Transversalis	Tıransversalis	Enine olan
Trochlea	Tıroklia	Makara
Tuber	Tuber	Yumru, tümsek
Tuberculum	Tuberkulum	Tümsekçik, yumrucuk
ventralis	ventralis	Karın ile ilgili, karna yakın olan
vertebra	vertebra	Omur
verticalis	vertikalıs	Dikey bulunan

Tablo 1.1: Sık kullanılan Latince terimler

Eğlenerek Öğreniyorum

Yukarıdaki tabloda Latinceleri ve Türkçe anlamları verilen terimlerin yazıcıdan çıktısını alarak veya elle yazarak Latince terimler ile Türkçe anlamlarını ayrı ayrı kesiniz. Latince terimleri ayrı bir kutuya, Türkçe anlamlarını da ayrı bir kutuya koyunuz. Rastgele kutudan çektiğiniz Latince terimlerin anlamlarını veya çektiğiniz Türkçe anlamın Latincesini arkadaşınıza söyleyiniz. Her doğru için belirlediğiniz puanı kendi hanenize yazınız. Arkadaşınızla dönüşümlü olarak işlemi tekrar ediniz. Sınıfınızdaki arkadaşlarınızla gruplar halinde de bu etkinliği yapabilirsiniz.

1.3.Kemikler (Os, Ossa)


Kemikler memelilerin ve kanatlı hayvanların iskelet yapısını oluşturur. Hareket sisteminde pasif rol olarak canlının morfolojik şeklinin oluşmasına yardımcı olurlar. Kemikleri inceleyen bilim dalına osteologia (osteoloji) denir. Latincece os kemik, ossa ise kemikler anlamındadır.

1.3.1 Kemiklerin Yapısı

Kemikler genel olarak sarımtırak beyaz renktedirler; ancak damar yoğunluğuna bağlı olarak sarımtırak pembe renkte de görünebilirler. Genç hayvanların kemikleri kırmızı kemik iliği ve kan damarlarınca zengin olduğundan yaşlı hayvanların kemiklerine nazaran kırmızımtıraktır. Yaşlı hayvanlarda ise genellikle sarımtıraktır.

Kemikler vücudun sert ve dayanıklı kısımlarını oluştururlar. Kasların bağlandığı oluşumlardır. Kemikler ayrıca vücudun önemli organları olan beyin, omurilik, kalp ve akciğer gibi organların etrafını kuşatarak koruyuculuk görevi de yaparlar. İçinde bulundurdukları ilik sayesinde kanın şekilli elemanlarının yapılmasında rol alırlar.

Kemikler histolojik (doku bilimi, mikrobiyolojik anatomi) olarak incelendiğinde kemik doku, organik ve inorganik maddeleri içerdiği görülür. İnorganik maddeler kemik dokusunun %60-70'ini oluşturur. İnorganik maddelerin %85'ini kalsiyum fosfat, %10'unu kalsiyum karbonat geri kalan kısmını magnezyum fosfat, kalsiyum klorit, kalsiyum florit ve bazı tuzlar oluşturur. İnorganik maddeler kemiğe sertlik ve dayanıklılık verir. Organik maddeler kemik dokusunun %30-40'ını teşkil eder ve kemiğe elastikiyet kazandırır.



Görsel 1.2: Kemiğin yapısı

BİLGİ KUTUSU

Evcil memeli hayvanlarda iskeleti oluşturan kemik sayıları çok farklıdır. Bu farklılık, öncelikle omurgayı oluşturan kemikler ve kaburga sayıları arasındaki farklılıktan ileri gelir. Yine parmak kemiklerinin farklı sayıda oluşu, bazı kemiklerin fetüste veya gençlerde bulunmasına karşın erişkinlerde birbirleriyle kaynaşmaları sonucu kaybolmaları da kemik sayısını etkiler.

Bütün bu nedenlerle erişkin evcil hayvanlarda 180-230 arasında değişen sayıda kemik mevcuttur.

1.3.2. Periost, Endost ve Kemik İliği

Kemiğin iç ve dış yüzleri, kemiği oluşturan hücrelerden ve bağ dokusundan oluşan tabakalarla örtülüdür. Bunlardan periost (dış kemik zarı), kemiklerin dış yüzünü örten fibröz (ipliksi) ve elastik ince bir zarıdır. Periost gelişimini tamamlamamış olan kemiğin kalınlaşmasında ve beslenmesinde; gelişimini tamamlamış kemiklerde ise kemiğin onarımında rol alır. Periostun zarar görmesi kemiğin de zarar görmesi anlamına gelir. Endosteum kemiğin içindeki bütün boşlukları örten iç kemik zarıdır.


Uzun bir kemikte periostun hemen altında substantia compacta bulunur. Substantia compacta, kemik dokusunun en sert ve dayanıklı kısmıdır. Özellikle uzun kemiklerin gövde çevresinde dışta yoğun, sıkışık bir kısım oluşturur. Substantia spongiosa; uzun kemiklerin iç kısmında kemik dokusundan yapılmış, ancak ince kemik bölümlerinden oluşmuş kısım. Uzun kemiklerin özellikle uçlarını işgal eder. Yassı kemiklerde iki kompakt tabakası arasına yer alır. Kemik dokusundan yapılmış son derece ince bölme ya da yapraklardan ve sütunlardan meydana gelmiştir. Trabeküllerin aralarında kemik iliği ile dolu boşluklar vardır.

Kemik iliği; kan damarlarından zengin yumuşak bir maddedir. Gelişme evresinde kemiklerde, kırmızı kemik iliği halinde bulunur. Yaşın ilerlemesi ile yağ dokusu çoğalır. Kırmızı kemik iliği sarı kemik iliğine dönüşür. Yalnız vertebra (omur), sternum kemiği ve iliumun yapısında ileri yaşlarda bile kırmızı kemik iliği bulunur.

1.4. Kemik Çeşitleri

Kemikler üç boyutlu oluşumlar olduğundan kemiklerde uzunluk, genişlik ve derinlik vardır. Kemikler şekillerine göre gruplandırıldığında üç büyük gruba ayrılırlar:

- Kısa kemikler (ossa brevia)
- Yassı kemikler (ossa plana)
- Uzun kemikler (ossa longa)



Görsel 1.3: Kemik çeşitleri

Uzun kemiklerde kemiğin uzunluğu genişliğinden ve kalınlığından fazladır. Uzun kemiğin gövdeye yakın olan ucuna üst uç (extremitas proximalis), gövdeden uzak olan ucuna alt uç (extremitas distalis) denir. Kısa kemiklerin (ossa brevia) uzunluğu, genişliği ve kalınlığı yaklaşık olarak birbirine eşittir. Çok sayıda kenar ve açılar vasıtası ile birbirinden ayrılmış eklem yüzlerine sahiptir. Yassı kemiklerde kalınlık son derece azdır.

1.5. İskeleti Oluşturan Kemikler

Omurga, kafatası kemikleri, göğüs kafesini (thorax) oluşturan kemikler, leğen kemiği, ön ve arka extremita kemikleri iskeleti oluşturan kemiklerdir.

1.5.1. Omurga (Columna Vertebralis)


Omurgayı oluşturan omurların sayıları çok değişkendir. Omurların sayısı; atlarda 51–57, sığırlardada 49–51, koyun ve keçilerdede 47–51, köpeklerde 50–53, kedilerde 50-54 adettir. Omurga yukarıdaki omurların art arda sıralanmasından oluşmuş bir sütundur. Omurların sıralanması ile oluşan kanala canalis vertebralis denir. Canalis vertebralisten omurilik geçer. Omurga (columna vertebralis) baş, göğüs ve karın organlarının ağırlığının taşınmasında sağlam bir destek görevi yapar. Columna vertebralis önden arkaya doğru beş kısma ayrılır:

- Boyun kısmı (pars cervicalis)
- Göğüs kısmı (pars thoracalis)
- Bel kısmı (pars lumbalis)
- Sağrı ve kuyruk sokumu kısmı (pars sacralis)
- Kuyruk kısmı (pars caudalis)

1.5.2. Omurgayı Oluşturan Kemiklerin Genel Yapısı

Omurga, omur (vertebra) denilen kemik parçalarında oluşurlar. Bir omurda dört ana kısım bulunur. Bunlar:

- Omur gövdesi (corpus vertebrae)
- Omur kemeri (arcus vertebrae)
- Omur çıkıntıları (processus vertebrae)
- Omur çentik ve delikleri (incisurae et foraminae vertebrae) dir.



Görsel 1.4: Sığır iskeleti

Omur Gövdesi (corpus vertebrae)

Omurun esas kısmını oluşturur ve omur deliğinin altındadır.

Omur Kemerini (arcus vertebrae)

Corpus vertebrae'nin dorsal yüzünün iki yan kenarından çıkan medianda birbirleri ile birleşen iki kemik yaprağından meydana gelmiştir. Foramen vertebralenin tavanını oluşturur.

Omur Çıkıntısı (processus vertebrae)

Bu anatomik oluşumlar, dikensi çıkıntı (processus spinosus), eklem çıkıntı (processus articularis), enine çıkıntı (processus transversus), mememsi çıkıntı (processus mamillaris) olarak çeşitli şekillerdedir.

Omur Çentik ve Delikleri (incisura et foraminae vertebrae)

Omurların korpusu ile arkusunun birleşim yerinin önünde ve arkasında sağlı sollu olmak üzere birer tane çentik (incisurae) vardır. Bunlardan önceki çentiklere, incisurae vertebralis cranialis ; arkadaki çentiklere, incisura vertebralis caudalis denir.

Omur deliği (foramen vertebrae): omur gövdesi ile omur kemerinin çevrelediği her bir omurun ortasında bulunan deliktir. Omurların üst üste dizilmesiyle foramen vertebraelar üst üste gelerek bir kanal oluştururlar. Oluşan bu kanala omurga kanalı (canalis vertebralis) denir. Bu kanalda merkezi sinir sistemi organı olan omurilik bulunur.

1.5.3. Omurgayı (Columna Vertebralis) Oluşturan Kemikler


Boyun omurları; sırt omurları, bel omurları, sağrı ve kuyruk omurları olmak üzere beş kısımda incelenir.

1.5.3.1.Boyun Omurları (Vertebrae Cervicalis)

Sayıları tüm evcil hayvanlarda yedi adettir. Boynun ağırlığını taşımakla görevlidir.

➤ Atlas

İlk boyun omurudur. Önden başa bağlı, arkadan ise ikinci boyun omuru olan axise bağlıdır. Diğer omurlarda olan corpus yoktur. Processus transversusu kanat şeklindedir ve alae atlantis adını almıştır.



Görsel 1.5: Koyun atlasının üstten görünüşü


Ayırıcı Özellik

Atın atlasının alae atlantisindeki foramen transversus sığırın atlasında yoktur. Atın atlasında fossa atlantis çok derin, sığırda sığdır ve foramen transversus bulunmaz. Koyun ve keçinin atlasında foramen transversus yoktur.


Köpeğin atlasında kelebeğe benzer processus transversus vardır.

➤ Axis

En belirgin özelliği dens denilen bir çıkıntıya sahip olmasıdır. Dens, corpusun cranialinde öne doğru uzanmış bir çıkıntıdır. Axis öndeki atlas ile eklem yapar. Axisin processus spinalisi dik ve ibik şeklindedir.



Görsel 1.6: Sığır axisinin soldan görünüşü




Görsel 1.7: Axis yandan görünüşü

Ayırıcı Özellik

Atın densi uzun ve kürek şeklindedir. Processus spinalisi alçak bir crista ile başlayıp belirli yükseltiden sonra alçak olarak biter.

Siğırın axisinin densi kısa ve küttür. Processus spinalisi alçak bir crista ile yükselir, keskin bir inişle biter. Koyun ve keçinin Axisi siğırın axisine benzer.

Köpek Axisinde dens koni biçimindedir. Processus spinosusu crista şeklinde olup ön ucu densin ucuna doğru uzamıştır.



Görsel 1.8: Kedide atlas ve axis

➤ 3. 4. 5. 6.ve 7. Boyun omurlarının genel özellikleri

Atta 3.,4.,5.,6.ve 7. boyun omurları üstten bakıldığında bu omurlar dikdörtgen şeklinde görülür. Processus spinosuslar kısadır.

Siğırda 3. 4. 5. 6 ve 7. boyun omurları üstten bakıldığında tipik kare görünümündedir. Processus spinosuslar belirgindir ve yükseklikleri geriye doğru artar.

1.5.3.2.Sırt Omurları (Vertebrae Thoracicae)


Omurganın sırt kısmını oluştururlar. Sayıları atta 18, siğırda 13, koyun, keçi ve köpekte 13 adettir. Corpus vertebraesi en kısa, processus spinalisleri en uzundur. Corpus vertebrae üzerinde önde iki yanda fovea costalis cranialis, arkada iki yanda fovea costalis caudalis denilen costalarla eklem yapan eklem çukurları vardır.

Ayırıcı Özellik

Atın sırt omurlarının sayısı on sekizdir. Corpus vertebrae kısadır. Processus spinosusu dar ve yüksektir. Arka kenarında bir yiv bulunur.

Siğırın sırt omurları 13 adet olup corpus vertebrae uzun ve makara biçimindedir. Processus spinosusu uzun, yassı ve geniştir. Caudal kenarı ince ve keskindir. Koyun ve keçinin sırt omurları sayı ve şekil yönünden siğırın sırt omuruna benzer.

Köpeğin sırt omurları 13 adet olup corpus vertebrae kısadır. Processus spinosuslar ince ve dardır. Uçları küt ve ovaldir.




Görsel 1.9: Koyunun vertebrae thoracalisinin görünüşü

1.5.3.3. Bel Omurları (Vertebrae Lumbales)

Omurganın bel bölgesini oluşturur. Önemli özelliği processus transversus çok uzundur. Bel omurlarının hareketi sırt omurlarının hareketinden daha azdır. Bu sayede arka bacadan gelen ileri hareketini kayba uğratmadan vücudun ön kısmına iletir.

Ayırıcı Özellik

Bel omurları atta 6 , merkepte ve Arap Atında 5 adettir. Processus spinosusun yüksekliği genişliğinden daha fazladır. Siğırın bel omurlarının sayısı 6 adettir. Processus spinosusun yüksekliği genişliğine eşittir. Processus transversusların ön ve arka kenarları keskindir. Corpusu tipik makara biçimindedir. Koyun ve keçinin bel omurları da siğırın bel omuruna benzer.




Görsel 1.10: Sığırın V. lumbalis'inin önden görünüşü

Köpeğin 7 adet bel omuru vardır. Processus spinosusun yüksekliği genişliğinden fazladır. Processus transversusları cranioventral yönden uzamıştır ve bel omuruna kızak görünümü vermiştir.

1.5.3.4. Sağrı omurları (vertebrae sacrales)

Sakrum, sağrı omurlarının birleşmesi ile oluşmuş tek bir kemiktir. Genel olarak büyük bir üçgeni andırır. Önden bel omuruna arkadan kuyruk omuruna eklenmiştir. Pelvisin üst kısmında iki os coxae arasına yerleşmiştir ve pelvis boşluğunun tavanını oluşturur. Sakrumun tek parça oluşu, iki os coxae ile birleşmesi arka bacakta oluşan hareketin kayba uğramadan gövdeye geçişini sağlar. Sakrumun iki ucu vardır. Geniş olan ön kısmına basis ossis sacri, dar olan arka kısmına apex ossis sacri denir. Sakrumun iki de yüzü vardır. Pelvis boşluğuna bakan yüzüne facies pelvina dorsale bakan yüzüne facies dorsalis denir. Sakrumun facies dorsalis yüzünde processus spinalis bulunur. Processus spinalis sığırlarda birbirleri ile kaynaşmış crista sacralis mediyi oluşturmuştur. Processus spinalis atlarda kaynaşmamıştır.



Görsel 1.11: Sığır sacrumunun soldan görünüşü

Ayrırcı Özellik

At sacrumunun özelliği: Atın sakrumu 5 adet sacral omurun kaynaşması ile oluşmuştur. Processus spinalisler kaynaşmamıştır. Atın sakrumunun facies pelvina yatay düzleme paraleldir.

Sığır Sacrumunun özelliği: Sığırın sacrumu 5 adet sacral omurun birleşmesinden meydana

gelmiştir. Processus spinalisleri birbirleri ile tam olarak kaynaşmış crista sacralis mediayı oluşturmuştur.

Koyun, keçi sakrumunun özelliği: koyun sakrumu 4, keçi sakrumu 5 adet sacral omurun kaynaşması ile meydana gelmiştir.

Köpeklerin sakrumu 3 adet sakral omurun birleşmesinden meydana gelmiştir. Eni boyuna eşit olup bir kare biçimindedir.

1.5.3.5. Kuyruk Omurları (Vertebrae Caudales)


Kuyruk omurlarının sayıları evcil hayvanlarda çok farklıdır. Etçillerde 20–23, tektırnaklılarda 15–21, sığırdı 18–20, keçide 12–16, koyunda 16–22 arasındadır. Genel olarak ilk 2–3 kuyruk omurları normal omur özelliği gösterir. Diğer omurlarda bu özellik kaybolur.

1.6. Ön Bacak Kemikleri (Ossa Membri Thoracici)

Os scapula, os humerus, ossa antebrachium, ossa carpi, ossa metecarpi ve ossa phalanxtan oluşmaktadır.

1.6.1. Kürek Kemiği (Scapula)


Ön bacak kemiklerinin birincisi olup yassı kemiklerdendir. Kaslar aracılığı ile göğsün ön yan duvarına bağlanır. Scapula yassı kemik grubundan olup üçgene benzer. İki yüzü üç kenarı vardır. Scapulanın kaburgalara bakan yüzüne facies costalis denir. Scapulanın dışı bakan yüzüne facies lateralis denir. Bu yüz üzerinde spina scapula denilen bir çıkıntı vardır. Spina scapula bu yüzü iki parçaya ayırmıştır. Spina scapulanın humerus tarafında acromion denilen bir çıkıntısı bulunur. Ossa scapulanın sağ veya sol bacağı aittir. Scapulanın keskin olan margo cranialis öne getirilir ve spina scapula hangi elle tutulursa o taraftaki bacağı aittir. Scapulanın öne bakan yüzüne margo cranialis, arkaya bakan yüzüne margo caudalis, yukarıya bakan yüzüne margo dorsalis denir.



Görsel 1.12: Sığırdın sol scapulası

Ayırıcı Özellik

Atın scapulasında spina scapula, facies lateralis üç eşit parçaya böler ve spina scapula ön 1/3'ten iner. Spina scapula alçak başlayıp alçak biter ve acromion oluşturmaz. Sığırın scapulasında spina scapula facies lateralis dört parçaya bölmüştür ve ön ¼' te scapulayı böler ve spina scapula alçak başlayıp acromion oluşturarak yüksek iner. Koyun keçi scapulası sığırın scapulası gibidir.

1.6.2. Kol kemiği (Humerus)

Görsel 1.13: Sığırın humerusu

Humerus uzun ve kalın kemiklerdendir. Humerusun üst ucuna extremitas proximalis, alt ucuna extremitas distalis, arasına da corpus denir. Humerusun scapula ile eklem yapan yüzüne caput humeri denir. Caput humerusun lateraldeki büyük çıkıntısına tuberculum majus denir. İki tuberculum arasındaki oluğa sulcus intertubercularis denir. Humerusun distal ön yüzündeki çukurluğa fossa radialis, arka yüzündeki çukurluğa fossa olecrani denir.


Ayırıcı Özellik

Atın humerusunda tuberculum intermedium mevcuttur. Sığırın humerusunda tuberculum majus caput humeriden yüksek ve tuberculum minusa dönüktür.

Köpek humerusunun distalinde foramen supratrochleare vardır. Kedi humerusunda foramen supracondylare mevcuttur.

1.6.3. Ön Kol kemiği (Ossa Antebrachium)

Uzun kemik grubundan olup birbirine paralel olarak os ulna ve os radii olarak oluşmuştur. Bu kemikler equide ve ruminantta kaynaşmış, carnivorlarda ise ayrıdır. Önde ve iç tarafta olan kemiğe radius denir.



Görsel 1.14: Sığırın sol antebrachiumu

➤ Ön Kol kemiği (Radius)

Önde ve iç tarafta olan bu kemiğin üst ucu geniş alt ucu dardır. Üst ucuna caput radii denir. Daralmış alt kısmına collum radii denir. Radiusun distal ucu makaraya benzer, buraya trochlea radii denir. Gövdesine de corpus radii denir.

➤ Dirsek kemiği (Ulna)

Ön kolun arkasında ve dış yan tarafında yer alan uzun bir kemiktir. Ulnanın radiusu aşan kısmına olecranon denir. Serbest ucuna da tuber olecrani denir. Tuber olecrani tektırnaklılarda tek, ruminantlarda iki, karnivorlarda üç çıkıntılıdır. Tektırnaklılarda ulna radiusun uzunluğunun 1/3'üne kadar uzanır ve kaynaşarak sonlanır. Ulna ruminantlarda radiusun distal ucuna kadar iner. Karnivorlarda ulna, radiusun distal ucuna kadar uzanır ve bu iki kemik arasında uzunlukları boyunca spatium interosseum antebrachii vardır.

Ayırıcı Özellik

Atın antebrachiumunda tuber olecrani tek çıkıntılıdır. Ulna radiusun 1/3'üne kadar iner.

Sığır antebrachiumunda ulna radiusun distaline kadar inmiştir ve bu nedenle kemikte iki açıklık oluşmuştur.

Köpek antebrachiumunda ulna ve radius ayrı ayrı iki kemiktir. Üstte ve altta eklem ile birbirleri ile hareketli eklemlenmiştir.

1.6.4. Ön Ayak İskeleti (Skeleton Manus)

Ön ayak iskeleti; ön ayak bilek kemikleri (ossa carpi), ön ayak tarak kemikleri (ossa metacarpi) ve ön ayak parmak kemikleri (ossa digitorum) olmak üzere üç grupta toplanır.

➤ Ossa carpi


Ön ayak iskeletinin başlangıcını oluştururlar. Üst üste dizilmiş iki sıra toplam sekiz kemikten oluşur. Üst sırada dört kemik alt sırada dört kemik şeklinde dizilmişlerdir.

➤ Ossa metacarpus

Metacarpus kemikler evcil memeli hayvanlarda gerek sayı gerek şekil yönünden farklılık gösterirler. Evcil memeli hayvanlarda esas metacarpusun üst ucuna basis metacarpalis, alt ucuna caput metacarpalis, ikisi arasına da corpus metacarpalis denir. Caput metacarpalisin phalanxlara bakan uçları bir crista vasıtasıyla iki yüze ayrılmıştır. Metacarpus önden arkaya doğru biraz basık olduğundan iç taraf düz, dış taraf biraz ovaldir. Bu yüzden kesit yüzü yarım ay şeklindedir.


Tektırnaklılarda üç adet metacarpus vardır. Bunlar 2, 3 ve 4. numaralı metacarpuslardır. Esas metacarpusu 3 numaralı metacarpus oluşturur 2. ve 4. metacarpuslar 3. metacarpusun arkasında rudimenter (gelişmemiş) halinde bulunur. 1. metacarpus ile 5. metacarpus mevcut değildir.

Ruminantlarda 3, 4 ve 5 nolu metacarpuslar mevcuttur. 3 ile 4 nolu metacarpuslar birbirleri ile kaynaşarak tek bir metacarpusu oluşturmuşlardır. 5 nolu metacarpus ise talidir. 3 ve 4 nolu metacarpusların kaynaşma noktasında önde ve arkada bir oluk oluşmuştur. Ruminantların esas metacarpuslarının distal ucu bir oluk ile iki başa ayrılmıştır. Bu durum tektırnaklılarda tek başlıdır. Ruminantlarda 1 ve 2 nolu metacarpuslar yoktur.




Görsel 1.15: Sığır ve atın metacarpusu

➤ Ossa Digitorum Manus Ön Ayak Parmak Kemikleri



Görsel 1.16: Atın sol metacarpus ve ossa digitorum manusunun medialden görünüşü



Görsel 1.17: Sığırda metacarpus ve ossa digitorum manusunun görünüşü


Ön ayak parmak kemikleri parmak sayıları türler arasında farklılık gösterir. Parmak sayısı karnivorlarda 5 adet, ruminantlarda 2 adet, tektırnaklılarda ise 1 adettir. Her parmakta üç adet phalanx bulunur. Phalanxlar proximalden distale doğru birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, adlandırıldığı gibi phalanx proximalis, phalanx media, phalanx distalis diye de adlandırılır. Ruminantlarda üst ucu bir çıkıntı ile iki eklem çukuruna ayrılmıştır. Phalanx medianın uzunluğu phalanx proximalisin yarısı kadardır. Tektırnaklılarda phalanx media kübik şeklindedir. Yani eni boyu yaklaşık birbirlerine eşittir. Ruminantlarda phalanx media phalanx proximalenin yarısı kadardır.

Karnivorlarda phalanx media, phalanx proximalenin uzunluğunun $2/3$ 'ü kadardır. Phalanx distalis hayvan türlerine göre değişik şekildedir. Tırnağı taşır ve tırnağın şekline uygunluk gösterir. Ön yüzüne phalanx distalis ve yan yüzüne facies parietalis denir. Phalanx media ile eklem yapan yüzüne facies articularis denir. Phalanx distalisin yere dönük olan yüzüne facies solearis denir. Facies parietalisi facies articularisten ayıran kenara margo coronalis denir. Facies parietalisi facies solearisten ayıran kenara da


margo solearis denir.

1.7. Os Coxae (Ossa Membri Pelvini)

Os coxae (kalça kemiği): Os ilium, os ischii ve os pubisin acetabulum denilen bir çukurda bu üç kemiğin birbirleri ile birleşmesi ile oluşmuştur. İki os coxae kemiği ventralden symphysis pelvis denilen bir eklemlerle, dorsalden de os sacrumla eklem yaparak pelvisi oluştururlar. Acetabulum caput femoris ile eklem yapan bir çukurdur. Acetabulum üzerinde atlarda geniş, sığırlarda dar bir incisura acetabuli vardır.



Resim 1.18: Koyunun os coxae



Görsel 1.19: Koyunun Os coxae (yandan görünüşü)

Os ilium acetabulumun üst üçte birinden yukarıya doğru kısmıdır. Corpus ossis ilii (gövde) ile ala ossis ilii (kanat) diye iki bölümü vardır. Corpus ossis ilii, os iliumun gövdesini oluşturur ve acetabulum katılan kısımdır. Alae ossis ilii'nin arkaya ve dış yana bakan yüzüne facies glutea denir. Bu yüz üzerinde iliumun craniodorsal kenarında crista iliaca bulunur. Os iliumun sacrum yönündeki çıkıntısına tuber sacrale, dış tarafa bakan çıkıntısına tuber coxae denir.

Os ischii, os coxae'nin arka alt kısmını oluşturur. Corpus ossis ischii ve ramus ossis ischii diye iki kısımdan oluşur. Corpus ossis ischii gövde kısmını oluşturur ve acetabulumun oluşumuna katılır. Os ischii'nin en geniş ve düz olan kısmına tubula ossis ischii denir. İki os ischii'nin symphysis pelvis denilen eklemlerle birleşmesi ile caudalde bir kemer oluşur. Bu kemere arcus ischiadicus denir. Caudal kenarın lateral kenarla birleşmesinden tuber ischiadicum denilen bir tümsek bulunur.

Os pubis os coxae'nin ön ve alt kısmını oluşturur. Foramen obturatumu ön ve medialden sınırlar iki Os pubis'in birleşme noktasında ve kolları seviyesinde, içte dorsalde ve ventralde iki tümsek oluşur. Bu tümseğin içteğine tuberculum pubicum dorsale, ventraldeki tümseğe tuberculum pubicum ventrale denir.

Ayırıcı Özellik


Atın os coxae'sında tuber coxae ortadan basık bir dikdörtgen şeklindedir. İncisura acetabuli geniştir. Tuber ischiadicum iki çıkıntılıdır. Sığırın os coxae'sında tuber coxae ortası yüksek yanları basık bir çıkıntılıdır. İncisura acetabuli dar, tuber ischiadicum üç çıkıntılıdır.

1.7.1. Pelvis

İki os coxae ve os sacrum tarafından oluşturulmuştur. Os coxae'ler symphysis pelvis ile birleşmiştir. Yukarıdan tuber sacralelerin arasına sacrum girer ve az oynar bir eklem yapar. Pelvisin girişine apertura pelvis cranialis, çıkışına da apertura pelvis caudalis denir. Pelvisin boşluğuna da cavum pelvis denir.

1.7.2. Uyluk kemiği (Os Femoris)

İskelet sisteminin en uzun ve kalın kemiğidir. Üst uç, gövde ve alt uç olmak üzere üç bölüme ayrılır. Femurun acetabulumla eklem yapan bir caput femoris'i vardır. Caput femoris üzerinde merkezde bir çukurluk bulunur. Buna fovea capitis denir. Fovea capitis'e kalça eklemine ait ligament yapışır. Femurun lateralindeki çıkıntıya trochanter majör denir. Trochanter majörün alt kısmında femurun medialinde yer alan çıkıntıya trochanter minör denir. Femurun distal ucunda condyluslar vardır.



Görsel 1.20: Koyun femurunun görünüşü


Köpeklerde condylusların üst yüzeylerinde susam kemiğinin yaptığı eklem yüzü vardır. Femurun distal ucu ön tarafta üzerinde patellanın kaydığı trochlea ossis femoris denilen makara bulunur.

Ayırıcı Özellik

Atın femurunun 1/3'ünde lateral tarafta trochanter tertius denilen bir çıkıntı vardır. Trochanter majör bir incisurae ile iki parçaya ayrılmıştır. Sığırın os femurunda trochanter tertius yoktur. Trochanter majör tek parçalıdır. Köpeğin femurunda trochanter majör, caput femoris seviyesindedir. Femurun distalinde ve caudal tarafında susam kemiği eklem yüzü vardır.


1.7.3. Diz Kapağı Kemiği (Patella)

Patella femurun distalinde ve ön tarafta yer alan onunla eklem yapan bir kemiktir. Patellanın geniş olan kısmına basis patella, dar olan sivri kısmına apex patella denir. Atın patellası dörtgen, sığır patellası üçgen şeklinde diğer hayvanlarda ise ovale yakındır.




Resim 1.21: Koyun patellası

1.7.4. Bacak Kemikleri (Ossa Cruris)



Görsel 1.22: Atın sol ossa crurisinin önden görünüşü

Ön bacakta ossa antebrachiumun karşılığıdır. İki kemikten oluşmuştur. İçte bulunan kemik tibia, dışta bulunan kemik fibuladır. Tibia (kaval kemiği) femurdan sonra en uzun kemiktir. Bacağın iç tarafında yer alırlar. İki ucu bir gövdesi vardır. Tibianın alt ucuna cochlea tibia denir. Tibianın distal ucu yani cochlea tibia tektırnaklılarda oblik(eğimli), ruminantlarda ise paralel yönde crista ile sınırlanmıştır.



Görsel 1.23: Koyun tibiasının görünüşü

1.7.5. Ayak Bilek Kemikleri (Ossa Tarsi)

Ossa tarsi bir üst (proximal) bir alt (distal), iki sıra kemik ile arasına girmiş bir parça kemikten oluşmuştur. Üst sırada talus ve calcaneus bulunur.

Os talus (aşık kemiği) üç ana kısımdan oluşur. Baş kısmına caput tali, boyun kısmına collum tali, gövde kısmına corpus tali denir. caput tali talusun alt kısmıdır. Collum tali caput talinin üst ve daralan kısmıdır. Corpus tali esas kısmı oluşturur. Yandan calcaneus ile eklem yapar. Üst kısmı makara görünümündedir ve trochlea tali adını alır. Bu kısım, eklem kıkırdağı ile kaplıdır

1.7.6. Topuk Kemiği (Os Calcaneus)




Görsel 1.24: Os calcaneus

Talusun arka yanında yer alır ve onunla eklem yapar. Calcaneusun eklem yapmayan serbest ucuna tuber calcaneus denir. Atın calcaneusunun arka tarafı düzdür. Sığırın calcaneusunun arka tarafında yukarıdan aşağıya uzanan belirgin bir oluk vardır. Talus ve calcaneus kemiklerinin alt tarafında iki sıra halinde os tarsiler bulunur.

1.7.7. Ayak Tarak Kemikleri (Ossa Metatarsus)

Tarsal kemikler ile phalanxlar arasında yer alırlar ve birbirlerine paralel olarak sıralanırlar. Uzun kemiklerden olup bir üst ucu (proximal) ve bir de alt ucu (distal) vardır. Metatarsusun üst ucuna basis metatarsale, alt ucuna da caput metatarsale denir. Metatarsusun üst ucu ile alt ucu arasında kalan kısa corpus metatarsale denir.

Metatarsus üst ucu os antebrachinin distal ucu ile metatarsusun alt ucu ise os phalanx ile eklem yapar.



Resim 1.25: Sığırın metatarsusu

Metatarsiler os metacarpilere genel olarak benzerlik gösterse de önemli farklı yanları vardır. Bu farklar şunlardır:

- Metacarpusların corpuslarının enlemesine kesit yüzeyleri ovaldir.
- Metatarsuslar, metacarpuslardan daha kalın ve yuvarlaktır.
- Metacarpusların kesit yüzeyinin arka yüzeyi düz ön yüzeyi oval olması ile yarım elips görünümündedir.

Tektırnaklılarda 2, 3, 4 nolu metatarsuslar vardır. 3. metatarsus esas metatarsusu oluşturur. 2 ve 4 nolu metatarsuslar 3 nolu esas metatarsusun arka yüzünde tali olarak bulunur. Tektırnaklılarda 1 ve 5 numaralı metatarsus kemikler yoktur.

İşkembeli hayvanlarda 2, 3, 4 numaralı metatarsuslar vardır. 3 ve 4 numaralı metatarsuslar kaynaşarak tek bir kemik olarak esas metatarsusu oluştururlar. 2 numaralı metatarsus, 3 numaralı metatarsus'un arkasında tali olarak bulunur. Ruminantlarda ise 1 ve 5 numaralı metatarsus yoktur. Etçillerde 5 adet metatarsus vardır.

1.7.8. Ayak Parmak Kemikleri (Ossa Digitorum Pedis)

Metacarpus kemiklerinden sonra gelir. Sayıları hayvan türlerine göre değişir. Parmak sayısı esas metatarsus sayısına eşittir. Karnivorlarda 5 adet, tektırnaklılarda 1 adet, ruminantlarda 2 adettir. Her parmak 3 adet phalanx'tan oluşur. Phalanxlar birinci phalanx (phalanx proximalis), ikinci phalanx (phalanx media), üçüncü phalanx (phalanx distalis) diye adlandırılır.

OKUMA PARÇASI

ATLARIN BACAKLARI KIRILDIĞINDA İYİLEŞMEZ Mİ?

Bacağı kırılan bir atın iyileşmesi mümkün olmadığı için vurulduğunu filmlerde görmüş olabilirsiniz. Atlardaki kemik kırıklarının iyileşmesi küçük boyuttaki hayvanlardan ve insanlardan çok daha zordur. Çünkü atlar çok ağır (kütleleri 1 tona yaklaşabilir) ve büyük hayvanlardır.


Atların bacaklarındaki kırıkların farklı türleri olabilir. Kemiğin çatladığı ancak parçalara ayrılmadığı durumlar, görece basit problemlerdir. Kemiğin parçalandığı kırıklar tam kırık olarak isimlendirilir. Kırılan kemik iki parçaya ayrılmış ve deride hasara neden olarak açık bir yaraya yol açmamışsa görece basit bir tam kırık olduğu söylenebilir. Kemiğin ikiden fazla parçaya ayrıldığı kırıklar ise parçalı kırık olarak isimlendirilir. Kırık kemik ucunun deriye zarar vermesi sonucu açık kırık olarak isimlendirilen durum ortaya çıkar.

Atların bacaklarındaki ciddi kırıklarda (özellikle kırığın deride hasara neden olması durumunda) kaslar ve sinirler hasar görebilir, kırık bölgesinde kan akışı bozulabilir ve ilerleyen aşamalarda enfeksiyon ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun tedavi edilmesi için gerekli olan antibiyotik miktarı vücut kütlesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle atlarda enfeksiyonun tedavi edilmesi hayli zordur.

Atın bacağına bir kırık ortaya çıktığında ilk müdahale çok önemlidir. Çünkü at çok ağır bir hayvandır ve üç bacağı üzerinde dengeli bir şekilde yürüyemez. Yaralanan at dengesini sağlamak için çabalarırken kırılan kemiğin daha da hasar görmesine neden olabilir.

Kırıkların iyileşme sürecinde kırık olan bölgenin hareket ettirilmemesi ve o bölgeye ağırlık verilmemesi gerekir. Ancak atlarda bunun sağlanması hayli zordur. Ayrıca kırık olan bacak uygun şekilde korumaya alınsa bile, iyileşme sürecinde at ağırlığını diğer üç bacağına vereceği için, sağlıklı bacaklarda toynak ile kemiğin birleştiği bölümde aşırı yüklenmeye bağlı olarak enfeksiyon gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/atlarin-bacaklari-kirildiginda-iyilesemez-mi> 02.05.2020 17:50



<https://secure.vet.cornell.edu/oed/sunymusc/BonesAndJoints.aspx> 09.05.2020 15:24

Görselde gördüğünüz kemiklerin adını kutucukların içine yazarak tik işareti ile gösteriniz.


1.8. Göğüs Kafesi (Thorax) Kemikleri

Yanlardan kaburgalar, üstten sırt omurları, alttan göğüs kemiğinin birbirleri ile eklem yaparak oluşturdukları kafes şeklinde bir yapıdır. Esnek ve hafiftir. Göğüs kafesinin bir girişi bir de çıkışı vardır. Göğüs kafesi girişine apertura thoracis cranialis denir. Çıkışına da apertura thoracis caudalis denir

1.8.1. Göğüs Kemiği (Sternum)

Göğüs kafesinin alt kısmını oluşturur. Sternebrae denilen küçük parçaların peş peşe birleşmesi ile oluşur. Sternumun ön kısmına manubrium sterni, gövde kısmına corpus sterni ve arka kısmına processus xiphoideus denir. Sternum kaburgalarla eklenerek bağlantı kurar. Manubrium sterni sternumun ön tarafındaki kısımdır. Kaburgalarla bağlantısı yoktur.

Corpus sterni sternumun esasını oluşturur. Tektırnaklılarda 6, ruminantlarda 7, karnivorlarda 8-9 sternebraeden oluşur ve kaburga ile eklenir. Processus xiphoideus, sternumun arkasında kaburga ile bağlantısı olmayan sternumun uzantısıdır.



Görsel 1.26: Sternum


Ayırıcı Özellik

Atın sternumunun ön kısmı yanlardan basıktır. Altta crista sterni oluşmuştur. Tipik bir kayığa benzer. Sığırın sternumunun ön ucu arka ucundan kalındır ve uzunluğu boyunca üstten ve alttan basıktır. Köpeğin sternumu çok uzun ve incedir. Yanlardan basık bir çubuk görünümündedir.

1.8.2. Kaburgalar (Costae, Kosta)

Kemer şeklinde bükülmüş uzun kemiklerdir. Üstten sırt omurlarına bağlandıklarından sayıları sırt omurlarının iki katı kadardır. Hayvan türlerine göre değişen sayıları vardır. Bir kaburga iki ana bölümden incelenir. Birinci kısım kaburganın büyük kısmını teşkil eden kemik dokudan oluşur, üst kısmına os costae denir. İkinci kısım kıkırdak dokudan oluşan daha küçük alt kısımdır. Bu kısma cartilago costalis denir. Costanın iki ucu arasındaki kısım gövde kısmıdır. Buraya corpus costae denir.

Kaburganın omur tarafında omurla eklem yapan kısım vardır. Buna caput costae denir. Kostanın dış yüzüne facies externa, iç yüzüne facies interna denir.



Görsel 1.27: Costanın yandan görünüşü

Ayırıcı Özellik


Atta toplam 18 çift kaburga kemiği vardır. Atın kaburgası dar ve silindirik yapı gösterir. Önemli ölçüde dış bükey özellik gösterir.

Sığırdaki 13 çift kaburga vardır. Dış bükeyi azdır. Yassı ve geniştir. Callum costae uzun ve belirgindir. Koyun ve keçilerin kaburgası sayı ve şekil yönünden sığıra benzer.

Köpekte 13 çift kaburga vardır. Çok kuvvetli bir yapıya sahiptir. Dışa doğru kavisleme gösterir. Sulcus costae pek belirgin değildir.

1.9. Kafatası Kemikleri (Ossa Cranii)

Kafa iskeletinin tamamına cranium denir. Kafa kemiklerine ossa cranii denir. Kafa iskeleti hareketsiz eklemle birleşmiş kafa kemikleri, eklem vasıtası ile birleşmiş alt çene kemiği ve dil kemiğinden oluşmuştur.



Görsel 1.28: Sığıra ait kafatasının soldan görünüşü

Cranium iki ana bölüm altında incelenir. Birinci bölüme neurocranium kısmı denir. Neurocranium beyni çevreler ve beynin etrafını sarar. İkinci kısma ise viscerocranium denir. Viscerocranium ağız ve burun boşluklarını çevreler. Evcil memelilerin baş iskeleti uzunca bir dikdörtgen piramidi andırır. Bu piramidin tabanı geriye, sivri tarafı ise öne dönüktür. Hayvan türüne hatta ırkına göre bu piramit uzun veya kısa olabilir. Baş iskeleti 20'si çift, 5'i tek olmak üzere 25 kemikten oluşur.

1.9.1. Art Kafa kemiği (Os Occipitale)

Tek kemiklerden birincisidir. Kafa iskeletinin arka bölümünde yer alır. İçerisinden foramen magnum denilen bir delik geçer. Foramen magnum, cavum cranii ile canalis vertebralis ile birleşir.

1.9.2. Ara Duvar kemiği (Os İnterparietale)

Os occipitalenin yukarısında üçgen şeklinde bir kemiktir. Equidelerde ve karnivorlarda os parietaleler ile os occipitale arasında bulunur. Ruminantlarda ense tarafındadır.

1.9.3. Şakak kemiği (Os Temporale)

Çift kemiklerdendir. Alt çene kemiği ile eklem yapar. Bu ekleme articulatio mandibularis denir. Ayrıca iki kulak yolu da bu kemik içinden geçer. Dış kulak yoluna meatus acusticus externus denir. İç kulak yoluna meatus acusticus internus denir.

1.9.4. Duvar kemiği (Os Parietale)

Os parietale kafa kemiklerinin çatısını ve yanlarını oluşturan yassı bir çift kemiktir. Sığır kafatasının yan ve arka (ense) tarafına kaymıştır.

1.9.5. Alın kemiği (Os Frontale)

Alın kısmı pars frontalis, burun kısmı pars nasalis, göz çukuru kısmı pars orbitalis, şakak kısmı pars temporalis'tir. Sığırdaki os frontale kafatasının en büyük kemiği olup tek başına alını kaplar.

1.9.6. Burun kemiği (Os Nasale)

Burun boşluğunun tavanını oluşturan bir çift kemiktir. Burun kemiğinin dış yüzüne facies externa, iç yüzüne facies interna denir. Dış yüz özellikle ruminantlarda belirgin bir dış bükey yapı gösterir. İç yüz biraz iç bükeydir.

1.9.7. Gözyaşı kemiği (Os Lacrimale)

Orbitanın medial duvarının önünde yer alan ince ve küçük bir kemiktir ve orbitanın gelişimine katılır. Os lacrimale'nin orbita tarafında huni biçiminde derin bir çöküntü vardır. Buna fossa sacci lacrimalis denir. Bu çukurun içinde burun boşluğu ile iştirakli olan foramen lacrimale vardır.

OKUMA PARÇASI

KISSADAN HİSSE

Halinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam, deniz kenarında oltayla balık tutuyordu. Tesadüfen oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona :

- Oltana ben burada iken ilk takılan şey ne olursa sana onun ağırlığına altın vereceğim, dedi.

Biraz sonra oltaya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar balıkçıya :

- Ne yapalım, şansın bu kadar, oltana ağır bir şey takılmadı, diyerek alıp sarayına götürdü.

Saraya varınca adamlarına, balıkçıya elindeki kemiğin ağırlığına altın vermelerini emretti. Kemiği terazinin kefesine koydular, öbür kefesine de altın koymaya başladılar. Beş, on, yirmi, elli diyerek altınları koydular ama kemik yerinden oynamıyordu. Görünüşte dört beş altını zor tartar dedikleri halde, tahminlerin on misli üzerinde altın koydular kemik bana mısın demedi. Altını doldurmaya devam ettiler, terazinin kefesi doldu taşı ama kemik tarafı yerinden kımıldamıyordu Bunda bir sır olduğunu anladılar. Bir bilgeyi çağırıp bu sırrın ne olduğunu sordular. Bilge kemiği eline alıp şöyle bir baktıktan sonra şu açıklamada bulundu: "Bu kemik ağgözlü bir insanın göz çukurudur. Siz bunu tartmak için bütün hazineyi koysanız yine yerinden oynamaz. Çünkü doymaz. Ama bir avuç toprak bunu doyurur." Nitekim bir avuç toprak alıp terazinin kefesine koydular ve kemik yukarı kalkıverdi.

<https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/578441.aspx> 03.05.2020 00:38

1.9.8. Üstçene Kemiği (Os Maxilla)

Yüz kemiklerinin en büyüğüdür. Çift kemiktir. Burun boşluğunun tabanını, ağız boşluğunun tavanını oluşturur. Os maxilla alt yüzünde dişlerin yerleştiği alveoller vardır.

1.9.9. Üstçene Ara Kemiği (Os İncisivum)

Kafa iskeletinin ön ucunda maxillanın önünde yer alan bir kemiktir. Üst çene kesici dişler bu kemiğe tutunur.

1.9.10. Damak Kemiği (Os Palatinum)

Ağzın tavan çatısını oluşturur. Sert damağın kemik çatısını da oluşturur.

1.9.11. Elmacık Kemiği (Os Zygomaticum)

Orbitanın alt çene ve yan duvarını oluşturan bir kemiktir. Os zygomaticumun dış yan tarafında ventral, kenar yakınında uzunlamasına belirgin bir çıkıntı görülür. Bu çıkıntıya crista facialis denir. Bu equidelerde çok belirgin ve düz olduğu halde ruminantlarda yatay bir S şeklindedir.

1.9.12. Altçene Kemiği (Mandibula)

Yüz iskeletinin alt bölümünü oluşturan çift kemiktir. Mandibula ön uçta ve orta noktasından bir eklemlerle iki kemiğin birleşmesi ile oluşmuştur. Ruminantlarda bu birleşme hiçbir zaman kemiksel bir kaynaşmaya dönüşmez.

Mandibula corpus mandibulae ve ramus mandibulae diye iki kısımda incelenir. Corpus mandibulae dişlerin tutunduğu ve yatay olarak uzanan kısımdır. Tektirnaklılarda ve ruminantlarda diş kapsamayan ve margo interalveolaris denilen bir kısımda ikiye ayrılmıştır. Mandibula üzerinde diş köklerinin yerleştiği çukurluğa alveoli dentalis denir. Diş çukurları birbirlerinden diş kökü sayısına uygun olarak septa interradicularia denilen kemik bükümleri ile ayrılmışlardır. Ramus mandibulanın dorsal serbest ucunda derin bir çentik vardır, bu çentiğe incisurae vasorum denir. Atlarda nabız buradan alınır.

Ayırıcı Özellik

At mandibulasının alt kenarı yatay düzleme düzdür. Sığırın mandibulasında corpus mandibulanın ventral kenarı dış bükeydir. Bu hali ile bir kayığa benzer. Köpek mandibulasında corpus mandibulanın ventral kenarı dışbükeydir.

1.9.13. Dil Kemiği (Os Hyoideum)

Yassı yuvarlak, kemiksel parçalardan oluşur. Altçene kemiği ve gırtlak arasında yer alır. Baş iskeletinde diğer kemiklerle eklem yapmayan tek kemik budur. Kendisine bir sürü kas ve eklem bağı tutunur. Üç bölümden oluşur

- Basihyoideum
- Ceratohyoideum
- Thyrohyoideum

ÖĞRENME ETKİNLİĞİ

ÖĞRENME ETKİNLİĞİ

Anatomi ve fizyoloji laboratuvarındaki kemikleri arkadaşınızın rastgele vermesini isteyiniz. Arkadaşınızın verdiği kemiğin adını ve hangi hayvana ait olduğunu arkadaşınıza söyleyiniz. Eğer söylediğiniz bilgiler doğru ise kemiğin anatomi modeli üzerindeki yerini gösteriniz. Bu etkinliği tüm kemikler üzerinde arkadaşınızla birlikte hepsi doğru olana kadar yapınız. Sınıfınızda veya anatomi ve fizyoloji laboratuvarında gruplara bölünerek bu etkinliği puanlayarak yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ 1

Kendi seçtiğiniz beş adet kemiğin hangi hayvana ait olduğuna dair farkları gösteren sunu hazırlayarak sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sunum hazırlarken aşağıdakileri dikkate alınız

- Sunumdaki resimler net görünür ve bilgiler doğru olmalıdır.
- Hayvan türlerine göre kemikler karşılaştırmalı açıklanır, kazanımını kapsamalıdır.
- Sunumda yazı, resim, tablo, grafik, video, şekil, fotoğraf vb. en az beş farklı materyal kullanılmalıdır.
- Sunumda Türkçe doğru kullanılmalı, dinleyicilerle göz teması kurulmalı, beden dili ve ses tonu doğru kullanılmalıdır.
- Sunum süresi 7 dakika aralığında olmalıdır.
- Sunumun değerlendirmesinde aşağıdaki puanlama anahtarı kullanılacaktır


	4 puan	3 puan	2 puan	1 puan
İçerik	Sunulan bilgiler doğru ve konu ile ilgili tüm kapsamı içermektedir.	Sunulan bilgiler doğru ancak kapsam yeterli derecede yansıtılmamıştır.	Sunulan bilgilerde kısmen yanlışlıklar vardır	Sunulan bilgilerde önemli ölçüde yanlışlıklar vardır.
Materyal	Sunum en az beş farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum dört farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum üç farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum sadece yazılı materyalden oluşmaktadır.
Sunum Becerisi	Akıcı dil kullanıldı, göz teması kuruldu, ses tonu ve beden dili doğru kullanıldı.	Belirtilen özelliklerden üçü yerine getirildi.	Belirtilen özelliklerden ikisi yerine getirildi	Belirtilen özelliklerden biri yerine getirildi.
Zaman Yönetimi	Verilen süre içinde sunuyu tamamladı	Verilen süreye +/- 2 dakika uymadı.	Verilen süreye +/- 3 dakika uymadı.	Verilen süreye +/- 4 dakika uymadı.

1.10.Eklemler

Eklemler (articulatio, artikulasyo) iskelet sistemini oluşturan kemiklerden en az iki veya daha fazla kemiğin bir araya gelmesiyle oluşan ve kemikler arasında fonksiyonel bağlantıyı sağlayan anatomik yapılardır. Kemikler hareketli veya hareketsiz olarak birbirine bağlanmışlardır.

1.10.1. Eklem Çeşitleri

Kemikler birbirleri ile hareketsiz, az hareketli veya tam hareketli olarak birleşirler.



Görsel 1.29: Eklem hareketleri

Sadece iki kemik arasında şekillenen eklem basit eklem (articulatio simplex) denir. Örnek olarak articulatio humeri verilebilir. Eklemi oluşturan kemik sayısı üç ya da daha fazla ise bileşik eklem (articulatio composita) olarak tanımlanır. Örnek: Articulatio cubiti.

İskelet kemiklerinin birbirleri ile hareket edecek şekilde bağlanmaları şu şekillerde olur:

- Bağ doku [Syndesmosis (sindesmozis)] :iki veya daha fazla kemiğin bağ doku aracılığı ile birbirlerine bağlanmasıdır.
- Kıkırdak [synchondrosis (sinkondrozis)]: Kemikler birbirine kıkırdak ile bağlanır. Örnek: symphysis pelvis
- Kaslar [symsarcosis (sinsarkozis)]: Hareket özelliği oldukça yüksek olan bağlantı şekli kaslar aracılığıyla yapılır. Ön bacakların gövdeye bağlanması örnek verilebilir.
- Eklem [diarthrosis (diyartrozis)] : İskelet kemiklerinin harekete elverişli eklemlerle birbirlerine bağlanmasıdır. Oynar eklemdir. Diğer eklemlerden ayıran en önemli özellik eklem kapsülüdür.

1.10.1.1 Hareketsiz Birleşmeler (Synarthrosis, Sinartrozis)

Bu tür bağlantılar daha çok kafatası kemiklerinde görülür. Hareketsiz eklem ya da oynamaz eklemlerdir. Eklem boşluğu ve eklem kapsülü yoktur. Eklemi oluşturan kemikler birbirlerine fibröz bir doku aracılığıyla bağlandıkları için bu eklemlere "fibröz eklemler" de denir.


1.10.1.2. Az Hareketli ya da Yarı Oynar Eklemler (Amphiartrrosis)

Eklemin oluşumuna katılan eklem yüzleri arasında kıkırdak doku vardır. Bu eklemlere “kartilaginöz eklemler” adı da verilir. Bu tip eklemlere göğüs kemiği (sternum) ve omurlar arası eklem örnek verilebilir.

Evcil memeli hayvanlarda ön bacakların gövdeye bağlanması kaslar aracılığı ile olur. Bu eklem tipine synsarcosis denir.

1.10.1.3. Tam Hareketli ya da Oynar Eklemler (Diarthrosis)


Vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturan tam hareketli eklemlerdir. Oynar eklemi oluşturan kemik yüzleri arasında boşluk bulunur ve bu boşlukta synovia adı verilen sıvı vardır. Bu eklemlere “synovial eklemler” de denir.



Görsel 1.30: Synovial bir eklem anatomik yapısı

Eklem çıkıntısına şekil yönünden uygun bir eklem çukurluğu bulunmadığı durumlarda eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlamak için araya giren fibröz kıkırdak özelliğinde meniscus articularis adı verilen bir yapı bulunur. Bu yapıya diz ekleminde rastlanır.

Sadece iki kemik arasında oluşan eklemlere basit eklem denir. Örneğin, articulatio humeri (omuz eklemi), scapula (kürek kemiği) ile humerus (kol kemiği) arasındaki basit bir eklemdir.



Görsel 1.31:Articulatio humeri

İkiden fazla sayıdaki kemikler arasında oluşan eklemlere de bileşik eklem denir. Articulationes genus; femur, tibia ve patella kemiklerinin katılımıyla şekillenmiş bileşik eklemdir.

1.11. Oynar Eklem Çeşitleri

Düz Eklemler (Articulatio Plana)

Eklem yüzleri düzdür. Sınırlı kayma hareketi yapabilirler. Os ilium ile sacrum arasındaki articulatio sacroiliaca bu özelliği gösteren bir eklemdir.

Articulatio Spheroidea

Eklem yüzlerinden biri küre şeklinde yuvarlak, diğeri bu küreyi içine alacak şekilde çukurdur. Yanal bağlar olmadığı için hemen hemen tüm hareketleri yapabilir. Articulatio humeri (omuz eklemi) ve articulatio coxae (kalça eklemi) sferoid tip eklemlerdir.

Articulatio Ellipsoidea (Condylaris)

Eklem çıkıntısının şekli elips şeklindedir. Articulatio atlantooccipitalis bu eklem tipine örnektir.

Ginglymus

Eklem yüzlerinden biri yarım silindir ya da makara, diğeri bu makarayı içine alacak şekildedir. Çok kuvvetli yan bağlara sahiptir. Articulatio cubiti (dirsek eklemi) ginglymus ekleme güzel bir örnektir.

Eklem çıkıntısının şekline göre ginglymus olmasına karşın eklem çıkıntısını tam olarak içine almayan eklem çukurluğunun olmadığı Articulatio femorotibialiste olduğu gibi durumlarda vardır. Bu durumda eklem yüzleri arasına bir eklem çukurluğu oluşturmak üzere ara kıkırdak, meniskus girmiştir.

Articulatio Trochoidea

Bu eklemdede, eklem çıkıntısı dingil ya da mil tarzında uzamıştır. Eklem çukurluğu buna uyacak yapı ve şekildedir. Birinci boyun omuru atlas ile aksisin dens denilen çıkıntısı arasındaki eklem (articulatio atlantoaxialis) bu ekleme örnektir.

Articulatio Sellaris


Bu eklem tipinde eklem çıkıntısı vücudun uzun eksenine göre transversal olarak bulunur. Orta kısmı at eyeri biçiminde çukurlaşmış bir silindir şeklindedir. Articulatio interphalangea proximalis ve articulatio einterphalangea distalis buna örnektir.

1.12. Eklem Hareketleri

Extension / Flexion:

Extend (gerilme hareketi): İki kemik arasındaki eklem açısının artması

Flex (bükülme hareketi): İki kemik arasındaki eklem açısının azalması




Görsel 1.32:Eklem hareketleri extension / flexion

Abduction / Adduction:

Abduct (bacakların vücuttan uzaklaşması)

Adduct (bacakların vücuda doğru yaklaşması)




Görsel 1.33:Eklem hareketleri abduction / adduction

Supination / Pronation:

Supinate (el sırtı caudale bakacak şekilde dönme hareketi)

Pronate (el sırtı craniale bakacak şekilde dönme hareketi)



Görsel 1.34: Eklem hareketleri supination / pronation

OKUMA PARÇASI

PARMAK EKLEMLERİMİZE BASTIRDIĞIMIZDA NEDEN SES ÇIKAR?

Dr. Tuba Sarıgöl 27/06/2016 - 14:34

Vücudumuzdaki oynar eklemlerden ortaya çıkış sebepleri farklı olan sesler gelebilir. Bu sesler arasında en aşina olduğumuz sesin parmak eklemlerinden gelen çıtlama sesi olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle parmak eklemlerine bastırıldığında ortaya çıkan sesin tekrar oluşabilmesi için belli bir zaman geçmesi gerekir. Bazı insanların alışkanlık haline getirdiği bu durumun neden ortaya çıktığıyla ilgili çeşitli görüşler var.

Oynar eklemler, vücudumuzdaki en yaygın eklem türüdür. Vücudun hareket kabiliyeti en yüksek bölümlerinde (omuzlarda, dirseklerde, bileklerde, boyunda parmaklarda) yer alırlar. Oynar eklemlerin boşluklarında kemiklerin aşınmasını önleyen eklem sıvısı bulunur. Bu bölgelere bir kuvvet uygulandığında eklem yüzeyleri başlangıçta birbirlerinden uzaklaşmamak için direnç gösterir. Belli bir noktadan sonra ise aniden birbirlerinden ayrılırlar. Bu sırada eklem sıvısı içinde baloncuk olarak da tanımlanan boşluklar oluşabilir. Uygulanan kuvvetin etkisiyle eklem yüzeyleri birbirinden ayrılırken eklem sıvısının içindeki basınç düşmeye başlar. Bu durum eklem sıvısı içinde çözünmüş gazların açığa çıkarak baloncuklar oluşturmasına neden olur. Yakın zamana kadar bu süreçte duyulan çıtlama sesinin bu baloncukların içe doğru çökmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyordu. Sonuçları Plos One dergisi'nde yayımlanan araştırmada ise bilim insanları, çıtlama sesinin baloncukların içe doğru çökmesi sonucu değil; baloncukların oluşumu sırasında ortaya çıktığını belirledi.

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/parmak-eklemlerimize-bastirdigimizda-neden-ses-cikar>

UYGULAMA FAALİYETİ 2

- Etrafınızda gördüğünüz hayvanların eklemlerini ve eklem hareketlerini inceleyiniz.
- Mezbahada kesilmiş hayvanların eklemlerini ve yapısını, eklem sıvısını inceleyiniz.
- Eklem çeşitlerini ve yapısını gösteren bir sunum hazırlayınız.

Sunumu Aşağıdakileri Dikkate Alarak Hazırlayınız


- Sunumdaki bilgiler doğru ve resimler net görünür olmalıdır.
- Eklem türleri görsellerle desteklenerek açıklanmalıdır.
- Sunumda yazı, resim, tablo, grafik, video, şekil, fotoğraf vb. en az dört farklı materyal kullanılmalıdır.
- Sunumda Türkçe doğru kullanılmalı, dinleyicilerle göz teması kurulmalı, beden dili ve ses tonu doğru kullanılmalıdır.
- Sunum süresi 7 dakika aralığında olmalıdır.
- Sunumun değerlendirmesinde aşağıdaki puanlama anahtarı kullanılacaktır:

	4 puan	3 puan	2 puan	1 puan
İçerik	Sunulan bilgiler doğru ve konu ile ilgili tüm kapsamı içermektedir.	Sunulan bilgiler doğru ancak kapsam yeterli derecede yansıtılmamıştır.	Sunulan bilgilerde kısmen yanlışlıklar vardır	Sunulan bilgilerde önemli ölçüde yanlışlıklar vardır.
Materyal	Sunum en az dört farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum üç farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum iki farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum sadece yazılı materyalden oluşmaktadır.
Sunum Becerisi	Akıcı dil kullanıldı, göz teması kuruldu, ses tonu ve beden dili doğru kullanıldı.	Belirtilen özelliklerden üçü yerine getirildi.	Belirtilen özelliklerden ikisi yerine getirildi	Belirtilen özelliklerden biri yerine getirildi.
Zaman Yönetimi	Verilen süre içinde sunuyu tamamladı	Verilen süreye +/- 2 dakika uymadı.	Verilen süreye +/- 3 dakika uymadı.	Verilen süreye +/- 4 dakika uymadı.

1.13. Kas Sistemi

İskeletin hareket etmesini sağlayan anatomik oluşumlara kas Latince *musculi* (muskuli), tek bir kasa da *musculus* (muskulus) adı verilir. Kaslar, kemik sisteminin üzerine kaplayarak tuttukları anatomik oluşumları hareket ettirirler. Bu işlemi yaparken geçici olarak uzayıp kısalabilirler. Kaslar hareketin aktif organlarıdır. Kaslar buldukları organı hareket ettirirken daima çekme şeklinde yaparlar. İtme şeklinde hareket yoktur. Kasları oluşturan hücrelerde görevsel ve yapısal yönde önemli farklılıklar vardır. Kaslar hareketin aktif organlarıdır. Elastik yapıya sahiptirler. Canlıya karakteristik görünümünü verirler.

Hayvan veya insan vücudundaki kaslar kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür. Bu kas hareketlerini yapabilmek için ATP'ye ihtiyaç duyarlar. Ölüm anında kas katılığı ve sertliği ATP eksikliğinden kaynaklanmakta olup *rigor mortis* adını almaktadır. Kuvvet oluşumu için kimyasal enerjiyi kullanma olayı en mükemmel şekline kaslarda ulaşmıştır. Kas hücreleri (kas teli) bir zar (membran) tarafından kuşatılmıştır. Buna sarkolemma (sarko, kas) denir. Kas hücresinde sitoplazma sarkoplazma adını almıştır. Kas hücresi sarkoplazma'sında diğer hücrelerde bulunmayan ve bol miktarda oksijen depo etme yeteneğine sahip olan myoglobin adı verilen bir protein bulunur. Myoglobin oksijene hemoglobinden daha fazla duyarlıdır. Myoglobinde depo edilen oksijen mitokondriler tarafından aerobik olarak metabolizmada kullanılır. Uzun süre kasılma yeteneği gösteren kas hücresinde myoglobin miktarı ve mitokondri sayısı fazladır.



Görsel 1.35:Kasın yapısı

1.13.1. Kas Çeşitleri


Hayvan vücudunda bulunan kaslar fonksiyonları bakımından üç ana grupta incelenir

- İskelet kası
- Kalp kası
- Düz kas

Bu kas tiplerinin tümünde ATP hidrolizi ile açığa çıkan enerji mekanik enerjiye çevrilir. Düz kasta kas iplikleri düzensiz dağılım gösterirken iskelet ve kalp kasında düzenlidir ve enine çizgilenme gösterir. Düz kas istemsiz çalışır (Otonom sistem kontrol eder). İskelet kası istemlidir. (Beyin omurilik tarafından

kontrol edilir). Kalp kası atım sayısı ve gücü otonom sistemle kontrol edilir, devamlı çalışır. Üç kas tipi arasında belirgin farklılıklar olmasına rağmen, üçünde de güç oluşturma mekanizması benzerdir. Her üç kas tipinin de paylaştığı bazı fonksiyonel özellikler şunlardır:

- Elastikiyet : Uzar ve ilk uzunluğuna geri döner
- Uyarılabilirlik : Uyarana cevap verir
- Kontraktilite : Kasılıp kısalabilir



Görsel 1.36: Kas dokuları

Kaslar şekillerine göre de şu şekilde isimlendirilirler

- Uzun Kaslar (musculus longus)
- Geniş Kaslar (musculus vastus)
- Büzücü Kaslar (musculus sphinter)
- Kalın Kas (musculus crassus)
- Halkamsı Kas (musculus anulare)
- Dişli Kas (musculus serratus)

1.13.2. İskelet Kasları

Uzun silindirik kas tellerinden (kas hücrelerinden) yapılmıştır. İskelet kası merkezi sinir sistemi kontrolünde işlev yapar. Bu nedenle isteğe bağlı olarak görev yaparlar ve istemli kaslar olarak da adlandırılırlar. İskelet kasları genellikle iki kemik arasında gerilmişlerdir. Kasılmaları ile tutundukları yeri vücut kesimlerine karşı harekete geçirdikleri için vücudun yer değiştirmesini sağlarlar. Vücutta iskelet kası hacim olarak en fazla olan kastır. Memelilerde toplam beden ağırlığının yaklaşık %40'ı iskelet kaslarından, %5-10 kadarı da kalp kası ve düz kaslardan oluşur. İskelet kasına aynı zamanda çizgili kas da denir. Nedeni ise ışık mikroskopunda incelendiğinde çizgili bir görünümde olmasıdır.

1.13.3. Kalp Kası

Kalp kasında kas lifleri enine çizgilenme gösterdiği için iskelet kasına benzer; fakat istemli olmayan ritmik kasılması nedeniyle de düz kaslara benzerler. Kalp kasının diğer bir özelliği kas tellerinin yan kollar aracılığı ile birbirlerine bağlanarak ağ oluşturmalarıdır.

1.13.4. Düz Kaslar

Düz kas hücrelerinden meydana gelmiştir. İçi boş organların ve damarların duvarında bulunurlar. Bu nedenle organ kası diye de isimlendirilmektedirler. Düz kasların çalışması istemsiz olarak oluşur. Düz kaslarda kasılma ve gevşeme iskelet kaslarına oranla daha yavaştır.

1.14. Kasların Sınıflandırılması

Kasları buldukları bölgeye göre sınıflandırma yapabiliriz.

1.14.1. Baş Kasları (Musculus Capitis)

- **M. rectus capitis ventralis:** Atlanto occipital eklemin altında bulunan kısa bir kastır. Başın bükücü kasıdır.
- **M. rectus capitis dorsalis major :** Axisten başlar protuberantia occipitalis externada son bulur. Başın arkaya eğilmesinde görev alır.
- **M. orbicularis oris :** Görevi dudakların kapatıcısı, dudak bezlerinin sıkıcısıdır. Bu kas liflerinin istikameti daireseldir.
- **M. zygomaticus :** Arcus zygomaticus ve crista facialis üzerinden başlar. Ağız açısı yakınında son bulur. Ağız açısını yukarı ve geri çeker.
- **M. caninus :** Kalın bir kastır. Crista facialisin ön ucundan başlar. Burun kanadının yanlarında son bulur. Burun kanadını ve üst dudağı yana ve aşağı çeker.
- **M. depressor labii inferioris :** Köpekte bulunmaz diğer hayvanlarda uzun bir kastır. Mandibuladan başlar. Alt dudağın kas yapısında ve derisinde son bulur. Alt dudağı aşağıya çeker.
- **Çiğneme Kası (m. masseter) :** Bu kas alt çene kemiğinin dış yüzündeki çukurluğu doldurur. M. masseter mandibulayı yukarı kaldırarak çeneyi kapatır.

1.14.2. Boyun Kasları (Musculi Colli)

- **M. brachio cephalicus :** Humerusun alt kısmından başlayıp çiğneme kası bölgesine kadar giden yassı geniş ve bileşik bir kastır.
- **M. sterno mandibularis:** Birinci kaburgadan ve manibrium sterniden başlar. Angulus mandibulareye yapışarak sonlanır. Başın tespit edilmesi, çenenin açılma işlevinde rol alır.
- **M. sternomastoideus :** Manibrium sterniden başlar. Os temporalenin Processus mastoideus'un da sonlanır. Tek taraflı kasıldığında başı ve boynu kasıldığı tarafa eğer. İki taraflı kasıldığında baş ve boynu tespit eder.
- **M. trapezius :** Boyun ve cidago bölgesinin yan yüzünde derinin hemen altında yer alan üçgen şeklinde bir kastır. Scapulayı öne ve yukarı çeker. Musculus trapezius cervicalis kası kas içi enjeksiyon için tercih edilen kastır.



Görsel 1.37: Sığırlarda anatomik olarak enjeksiyon yerleri

- **M. latissimus dorsi** : Göğüs bölgesinin yan kısmında üst tarafında yer alan üçgen tarzında geniş yassı bir kastır. Bu kas bacak sabit olduğunda gövdeyi ileri çeker. Gövde sabit olduğunda ön bacakları geri çeker.
- **M. serratus ventralis cervicis** : Boynun yan tarafında boyun omurlarının processus transversus'ları ile scapulanın ön iç açısı arasında yer alır. Yassı geniş ve kalın bir kastır. Scapula'nın komşu ucundan başlayarak ventral kenarına doğru birbirinden uzaklaşan düzenli dişçikler şekillendiren kas ipliklerinden oluşmuştur. Bu kas, Ön bacakları gövdeye bağlar. Musculus serratus cervicis kas içi enjeksiyon için tercih edilen kastır.

1.14.3. Göğüs Kasları (M. Thoracis)

Göğsün ventralinde yer alan sternum, humerus ve scapula arasında uzanan kaslardır.

- **M. pectoralis descendens** : Manibrium sterniden başlayarak humerusa yapışır. Bacak sabit olduğunda thoraxı öne ve dış tarafa, bacak sabit olmadığında ise bacağı geriye çeker. Thoraxı iki bacak arasında aşağıya indirilmesine de katılır.
- **M. pectoralis profundus (m. pectoralis ascendens)** : Kalın bir kastır. Tektırnaklılarda 4. cartilago costalis, ruminantlarda ve etçillerde 2. cartilago costalis'lerden başlayarak humerusun tuberculum minus'unda sonlanır.
- **M. serratus centralis thoracis** : Scapulanın caudal açısı ile göğüs duvarı arasında yer alır. Yelpaze şeklinde geniş yassı bir kastır. Kenarı düzenli dişler şeklinde ayrılmıştır.
- **Diyafram Kasları**, hayvanlarda göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran göğüs boşluğuna doğru kubbelenmiş kastan ve kirişten oluşmuş perdemsi bir oluşumdur. Kiriş kısmı üzerinde bazı önemli organ ve kan damarlarının geçmesini sağlayacak üç delik vardır. Aortun geçtiği hiatus aorta, yemek borusunun geçtiği hiatus oesophagus ve geri ana toplardamarın geçtiği foramen vena cava caudalis olarak isimlendirilir. Diyaframın ön yüzü konveks olup pleura ile örtülüdür, geri yüzünde konkav olup peritonla örtülüdür. Vazifesi doğum ve solunum olayına yardımcı olmaktadır.

1.14.4. Karın Kasları (M. Abdominis)

Karın bölümü dıştan içe doğru:

- deri
- deri altı bağ dokusu
- deri altı kas dokusu
- sarı karın zarı şeklindedir.

Karın duvarının kassal temelini oluşturur. Yassı ve geniştirler. İpliklerin seyri birbirleriyle çaprazlaşacak şekilde üst üste tabakalar oluşturur. Dört adet karın kası vardır:

- M. rectus abdominus
- M. oblicus abdominus externus
- M. oblicus abdominus internus
- M. transversus abdominis'tir.

Bu kaslardan M. rectus abdominus karın central duvarında diğer üçü karın yan duvarında yer alır.

Karın Kaslarının Görevleri : Önce karın duvarını oluşturmak ve karın iç organlarını taşımaya yardım etmektir. Bunun yanında, kasıldığı zaman soluk vermeye, ayrıca ürinaryona, doğum ve defakasyona da yardımcı olurlar.

1.14.5. Ön Bacak Kasları

Ön Bacak Yukarı Kasları

- **M.deltoideus spinae scapulae**: Humerusun üst yarımı arasında uzanan bir kastır. M. subraspinatus spina scapula tarafında yer alır. M.infraspinatus spina, scapula'nın arka tarafında yer alır.
- **M. biceps brachi**: Humerusun ön ve kısmen iç tarafında yer alan uzun mekik şeklinde bir kastır. Equidelerde çok sağlamdır. Equidelerin uzun süre ayakta kalmalarına hatta bu pozisyonda istirahat etmesini imkân sağlar.
- **M.triceps brachi**: Scapulanın arkasında scapula ile humerus arasında oluşan üçgen şeklindeki kısmı dolduran kastır.

Ön Bacak Kapayıcı Kasları

- **M. flexor carpi radialis**: Antebrachiumun radial tarafında yer alan uzun bir kastır.
- **M. flexor carpi ulnaris**: Antebrachiumun iç yüzünde yer alır.
- **M. flexor digitorum superficialis**: Antebrachiumun arka tarafında yüzeysel olarak bulunur.
- **M. flexor digitorum profundus**: Antebrachiumun arka yüzeyinde yer alır.

1.14.6. Arka Bacak Kasları

Dış Sağrı Kalça Kasları (m. glutei)

- **M. gluteus superficialis:** İnce bir kastır. Carnivorlarda biraz daha kuvvetli olarak bulunurlar. Kalça ekleminin bükücüsü, bacağına öne geriye ve dışarıya doğru çekicisidir.
- **M. gluteus medius:** M.gluteus superficialisin altında yer alır. Evcil hayvanlarda sağrının en geniş kısmını oluşturur.

Uyluğun Yan ve Arka Tarafındaki Kaslar

- **M. biceps femoris:** Femurun arka ve dış yanı boyunca uzanan bir kastır. Derinin hemen altında yer alır.
- **M. Semitendinosus:** Uyluğun arka ve yan tarafında yer alır.
- **M. Semimembranosus:** Uyluğun arka ve iç tarafında yer alır.

ÖNEMLİ UNUTMAYINIZ

Önemli damar ve sinir kollarının bulunmadığı boynun her iki tarafındaki musculus trapezius cervicalis, musculus serratus cervicis ile arka bacaklarda; musculus semimembranosus, musculus semitendinosus ve gluteal kaslar kas içi enjeksiyon için en uygun yerlerdir. Ayrıca ön bacaklarda musculus triceps brachiiye kas içi enjeksiyon yapılır. (Gluteal kaslar , kas içi enjeksiyonlar için bazı kaynaklarda önerilmemektedir.)

UYGULAMA FAALİYETİ 3

- Canlı veya maket hayvan üzerinde kas içi enjeksiyon yerlerini gösteriniz.
- Sığır, koyun, keçi , kedi, köpek ve at resimleri üzerinde kas içi enjeksiyonlarını gösteren görseller hazırlayınız.
- Mezbahada kesilmiş hayvanlardaki kaslar üzerinde enjeksiyon yerlerini inceleyiniz.
- Çeşitli hayvanlarda kas içi enjeksiyon yerlerini ve kasların isimlerini işaret eden görsel ağırlıklı bir sunum hazırlayınız.

Sunum hazırlarken aşağıdakileri dikkate alınız

- Sunumdaki resimler net görünür ve bilgiler doğru olmalıdır.
- Kas içi enjeksiyon yerleri net gözükmelidir.
- Sunumda en az üç farklı hayvan türünün resmi (at, sığır, koyun, keçi, kedi köpek, manda vs.) kullanılmalıdır.
- Sunumda Türkçe doğru kullanılmalı, dinleyicilerle göz teması kurulmalı, beden dili ve ses tonu doğru kullanılmalı
- Sunum süresi 7 dakika aralığında olmalıdır.
- Sunumun değerlendirmesinde aşağıdaki puanlama anahtarı kullanılacaktır.

	4 puan	3 puan	2 puan	1 puan
İçerik	Sunulan bilgiler doğru ve konu ile ilgili tüm kapsamı içermektedir.	Sunulan bilgiler doğru ancak kapsam yeterli derecede yansıtılmamıştır.	Sunulan bilgilerde kısmen yanlışlıklar vardır	Sunulan bilgilerde önemli ölçüde yanlışlıklar vardır.
Materyal	Sunum en az dört farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum üç farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum iki farklı materyal ile desteklenmiştir.	Sunum sadece yazılı materyalden oluşmaktadır.
Sunum Becerisi	Akıcı dil kullanıldı, göz teması kuruldu, ses tonu ve beden dili doğru kullanıldı.	Belirtilen özelliklerden üçü yerine getirildi.	Belirtilen özelliklerden ikisi yerine getirildi	Belirtilen özelliklerden biri yerine getirildi.
Zaman Yönetimi	Verilen süre içinde sunuyu tamamladı	Verilen süreye +/- 2 dakika uymadı.	Verilen süreye +/- 3 dakika uymadı.	Verilen süreye +/- 4 dakika uymadı.

1.15. Vücut Duruşları

Hayvanların gözle yapılan kontrollerinde duruşlarını bilmek önemlidir. Damızlık olarak seçilecek hayvanlarda seçim yaparken veya hayvanın genel kontrolünü yaparken bu bilgiler oldukça işimize yarayacaktır. Vücut duruşlarını ön bacak, arka bacak ve ayak duruşları olarak gruplandırabiliriz.

1.15.1. Ön Bacak Duruşlarının Önden Görünüşü

- Düzgün duruş
- Önleri açık ve geniş
- Öküz dizli
- Önleri kapalı veya dar
- (O) veya fıçı bacaklı
- Paytak bacaklı diye incelenir.

Düzgün Duruş

Omuz ekleminde indirilen düşey çizgi şekilde görüldüğü gibi bacağı ve tırnağı ortadan ikiye bölerek yere değer.




Görsel 1.38: Düzgün ön bacak duruşunun önden görünüşü

1.15.2. Ön Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü

- Düzgün duruş
- Önleri ileri
- Çukur dizli
- Yatık bilekli
- Ayı ayaklı
- Önleri geri
- Bükük dizli
- Dik bilekli olarak incelenir.

Düzgün Duruş

Kürek kemiği ortasından indirilen düşey çizgi dirsek eklemi hizasından başlayarak topuk eklemine kadar bacağı ortasından ikiye böler. Yumuşak ökçelerin hemen arkasından yere değer. Böyle bacağın ayak eksenini, yer ile 45-50°'lik bir açı meydana getirir.



Resim 1.39: Düzgün ön bacağın yandan görünüşü

1.15.3. Arka Bacak Duruşlarının Arkadan Görünümü

- Düzgün duruş
- Artları açık
- X bacaklı
- İt elli
- Artları kapalı ya da dar
- Fiçı ya da O bacaklı
- Paytak bacaklı diye incelenir.

Düzgün Duruş

Tuber ischiadicum'dan indirilen düşey çizgi tuber calcanei ve topuk eklemine değecek şekilde yumuşak ökçelerin tam ortası hizasında yere değer.



Görsel 1.40: Düzgün art bacak duruşunun arkadan ve yandan görünüşü

1.15.4. Art Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü

- Düzgün duruş
- Artları ileri
- Kılıç bacaklı
- Yatık bilekli
- Artları geri
- Dik bilekli diye incelenir.

Düzgün Duruş


Kalça ekleminden indirilen düşey çizgi tırnağı yandan iki eşit kısma bölerek yere değer yahut tuber ischiadicumdan indirilen çizgi tuber calcanei ve topuk eklemine değecek şekilde yumuşak ökçelerin biraz arkasında yere düşer.

1.16. Ayak Duruşları

Bacağın topuk ekleminde aşağı kalan kısmına ayak denir

1.16.1. Düzgün Ayak Duruşu

Ayağa önden veya arkadan baktığımız vakit falanksların ortasından geçirildiği düşünülerek ayak eksenini, ayağı iki eşit kısma böler. Ayak eksenini yukarıdan aşağıya düz bir çizgi olarak uzanır.



Görsel 1.41: Düzgün ayak duruşunun önden ve arkadan görünümü

1.16.2. Bozuk Ayak Duruşları

Düz olan ayak ekseninin yer ile meydana getirdiği açı 45 dereceden küçük olursa, yatık bilekli veya sivri tırnaklı; 55 dereceden büyük olursa, dik bilekli veya dik tırnaklı ayak duruşu adı verilir.

Ayak ekseninin corium coronarium hizasında arkaya doğru kırılarak öne doğru açılan bir açı oluşturduğu ayaklarda tırnağın ökçeleri çok kısa veya tırnağın ön kısmı çok uzundur. Yani yatık veya sivri bir tırnaktır. Ayak ekseninin düz yer ile meydana getirdiği açı ise 45 dereceden küçüktür. Böyle bir ayakta tırnak yatıktır.

Ayak ekseninin corium coronarium hizasında öne doğru kırılarak arkaya doğru açılan bir açı oluşturduğu ayaklarda tırnağın ökçeleri çok yüksek yahut ön kısmı çok kısadır. Ayak ekseninin düz yer ile meydana getirdiği açı ise 50 dereceden daha büyüktür. Burada ise ayak eksenini corium coronarium hizasında öne doğru fazla kırılarak arkaya doğru açılan bir açı oluşturmuştur. Burada tırnak çok diktir.



Görsel 1.42: Düzgün normal ayak ve bukağılık eksenini

UYGULAMA FAALİYETİ 4

- Çevrenizde gördüğünüz hayvanların önden, yandan ve arkadan duruşlarını inceleyiniz
- Vücut duruşlarından bozuk duruş şekillerini araştırarak etrafınızdaki hayvanlardan bozuk duruş gösteren hayvanların resimlerini çekiniz.
- Bozuk duruş şekillerini gösteren resimlerden sunu yaparak sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

Hayvanların resimlerini çekerken ve çalışmanızı hazırlarken aşağıdakilere hususlara dikkat ediniz.

- Çektiğiniz resimlerde mümkünse sadece hayvanın gözükmesine dikkat ediniz.
- Hayvanın tahmini yaşını hayvan sahibine sorarak not alınız.
- Hayvanın barınma ortamını hayvan sahibine sorunuz. Cevabını not alınız.
- Size göre hayvanın bozuk duruşu hangi tiptir? Fikirlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Hazırladığınız sunuyu sınıfta ile paylaşınız.
- Sununuzun 5 dakikayı geçmemesine dikkat ediniz.


Puanlama

	4 puan	3 puan	2 puan	1 puan
İçerik	Sunulan bilgiler doğru ve konu ile ilgili tüm kapsamı içermektedir.	Sunulan bilgiler doğru ancak kapsam yeterli derecede yansıtılmamıştır.	Sunulan bilgilerde kısmen yanlışlıklar vardır	Sunulan bilgilerde önemli ölçüde yanlışlıklar vardır.
Materyal	Çalışmada en az üç görsel kullanılmıştır.	Çalışmada en az iki görsel kullanılmıştır.	Çalışmada en az bir görsel kullanılmıştır.	Sunu sadece yazılı materyalden oluşmaktadır.
Görsel Tasarım	Sunu planlamasında resimler ve yazılar etkili ve dengeli bir şekilde kullanılmıştır.	Sunu planlamasında resimler ve yazılar etkili ve dengeli bir şekilde kullanılmamıştır.	Yazılar etkili kullanılmamış ancak görseller dengeli kullanılmıştır.	Hem yazılar hem de görseller etkili ve dengeli kullanılmamıştır.
Süre	5 dakikalık süreye dikkat edilmiştir.	Süre beş ila yedi dakika arasındadır.	Süre üç ila beş dakika arasındadır.	Süre üç dakikadan azdır.

1.17. Topallık

Bacak dokularında meydana gelen hastalıklar sebebiyle yürüyüş düzeninin bozulmasına topallık denir. İş hayvanlarında topallık önemli bir yer tutar.

Bacakların topuk eklemının altında kalan bölümü “ayak” diye adlandırılır. Sığırlar, doğal yaşam alanı olan çayır ve meralarda yetiştirildiğinde ayak sorunları yok denilecek kadar azdır. Ancak günümüzde yaşamlarının büyük kısmını kapalı mekanlarda beton zeminler üzerinde geçirmeye zorlanan ağır cüsseli, yüksek verimli kültür ırkı sığırlarda topallık ve ayak problemleri sıklıkla yaşanmaktadır. Ayak hastalıkları; damızlık niteliğini belirleyen et, süt ve döl verim kayıplarının yanı sıra, tedavi giderlerine, gıda ve çevre kirliliğine de ciddi oranda yol açmaktadır. Ayak hastalıklarında ortaya çıkan şiddetli ağrı beynin hipotalamus ve hipofiz sistemlerini bloke ederek, hayvanın bütün yaşam ve verim fonksiyonları altüst etmektedir. Bu nedenle erken teşhis ve zamanında yapılan ayak bakımları büyük önem arz etmektedir.



1.17.1. Topallıkların Sınıflandırılması

Topallıklar doku, yer, süre, derece ve durumlarına göre bölümlerine ayrılır :

- Doku Topallıkları
- Tendo Topallıkları
- Eklem Topallıkları
- Kas Topallıklarıdır.

Yerlerine göre:

- Yukarı Topallıklar
- Aşağı Topallıklar

Yukarı topallıklarda yumuşak arazide topallık artar, adımlar kısa olup dinlenme halinde tabanı ile yere basar. Aşağı topallıklarda sert zeminde topallık artar, hayvan tırnak ucu ile yere basar.

Süreye göre iki kısımda incelenir:

- Akut Topallık
- Kronik Topallık

Derecesine göre:

- Hafif
- Orta
- Şiddetli seyreder.

Durumuna göre:

- Soğuk topallık
- Sıcak topallık şeklinde görülür.

Soğuk topallıkta ilk harekette topallık fazla olur, yürüdükçe kaybolur. Sıcak topallıkta ise tam tersi olarak ilk harekette topallık görülmeyip hareket arttıkça topallık artar.

1.17.2. Topallığın Sebepleri

Ayağın yumuşak ve sert dokularında yaralanma, hasar, incinme ya da mikropların bulaşması veya tahrişine bağlı oluşan problemler ayak hastalığı olarak tanımlanır. Bunlar kabaca; boynuzsu tırnak, tırnağın boynuzsu tırnak içerisindeki canlı dokusunun, tırnak üzeri ve parmaklar arası deri hastalıkları, ayak bölgesindeki kiriş, kemik ve bağların hastalıkları olarak ayrılabilirler. Devamlı olarak ahırda barındırma, bağlı veya hareketsiz kalan hayvanlarda, asitli rasyonlarla besleme (melas, küspe, vb.), aşırı konsantre yemle besleme, ahır zeminin sürekli kirli ve ıslak olması (fazla dışkı ve idrar birikimi) gibi nedenler tırnağın yumuşamasını ve çabuk uzamasını sağlamaktadır. Tırnağın aşırı uzaması, kırılması, bozuk (deforme) tırnak yapılarının meydana gelmesi, vücut ağırlığının tırnağın taşınma yüzeylerine dengeli aktarılmasını kötü yönde etkilemekte ve bunun sonucunda tırnaktaki canlı doku hasar görmektedir. Bu hasara bağlı olarak topallık görülmektedir. Ülkemiz barınak koşulları, yetersiz ve kalitesiz kaba yem üretimi göz önünde bulundurulduğunda ayak hastalıklarının süt sığırcılığında büyük ekonomik kayıplara ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir.

Topallık sebepleri iki kısımda incelenir

- **Hazırlayıcı Nedenler** : Duruş bozukluğu, çalıştırılan arazi, hizmetin ağırlığı, yaşlılık, hatalı hesaplanmış ve hazırlanmış rasyon, atlarda nal ve nallama hatalarıdır.
- **Yapıcı Sebepler** : Vurma, çarpma gibi travmatik sebeplerdir.

1.17.3. Topallığın Kontrolü

Topallığın kontrolünde hayvanın dinlenme halinde dururken veya hareket halindeki durumuna dikkat edilir. Hayvan yürütülerek topallamanın hangi ayakta olduğuna ve nereden kaynaklandığına bakılır. Küçükbaş hayvanlarda sürü kontrolünde ise topallayan hayvanların sürünün en arkasından geleceğini dikkate almak gerekir. Topallayan hayvan dinlenme halinde vücut ağırlığını hasta ayak üzerine vermekten çekinir. Topallık ön ayakta ise ön ayağını öne doğru uzatır. Vücut ağırlığını arkaya vererek arkaya doğru bir vaziyet alır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalarda bir inekte görülen ayak hastalığının işletmeye maliyetinin yaklaşık 480 \$ olduğu ortaya konmuştur. Uzun süreli olgularda hastalığın şiddetine bağlı laktasyon sürecinde % 20'lere varan et ve süt kayıpları oluşabilmektedir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi ayak hastalıklarında da tedavi çok zor ve masraflıdır. Her zaman ve her koşulda en ucuz ve en etkili tedavinin, hastalıktan koruma olduğu unutulmamalıdır.

BİLGİ KUTUSU

Kemiklerinizin Güçlenmesine Yardımcı Olacak En Önemli Besinler

İlerleyen yaşlarda zayıflayan kemiklerimizi güçlendirmeye daha çok ihtiyaç duyarız. Kemiklerin güçlenmesindeki en önemli madde 'Kalsiyum'dur. Omega-3 ve kalsiyum açısından zengin besinleri tüketmek kemik sağlığı için çok önemlidir.

Yoğurt ve peynir

Yoğurt ve peynirdeki kalsiyum miktarı sütte çok daha fazla orandadır. Yaklaşık olarak sütün 3 katı kadar kalsiyum içerirler. Bu yüzden kemikler için çok faydalı besinlerdir.

Sardalya balığı

Hem birçok vitamini barındıran hem de yüksek miktarda kalsiyum içeren bir besindir. 3 adet sardalya balığının kuyruğu, bir bardak süte eşittir.

Soya Ürünleri

Soyanın her türüsü de kalsiyum açısından zengindir. 100 gram soya içeren bir besin bile günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılayacak kadar kalsiyum içerir.

Süt

Kemikleri geliştiren kalsiyumu bolca barındıran bir besindir. 50 yaş üstü kişilerin alması gereken günlük kalsiyum miktarı, 1000 miligramdır. 50 yaş altı yetişkinler ise 1200 mg kalsiyum almalıdır. 35 miligram süt; 510 miligram kalsiyum içerir. Günlük beslenmemizde ve kalsiyum ihtiyacımızı karşılamada sütün önemi çok büyüktür.

Somon

Omega 3'ü bolca barındıran somon, kemiklerin gelişiminde ve sağlamlaşmasında oldukça büyük bir rol oynar. Sağlıklı kemikler için haftada 2 kez somon tüketmelisiniz.

Fasulye

Kalsiyum açısından oldukça zengin bir besindir. İçerdiği Omega-3 ile kemik sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir.

(Kaynak: <https://hthayat.haberturk.com/saglik/beslenme/haber/1011604-kemikleri-guclendiren-6-besin...>) 10.05.2020 21:43

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Cranial – başa doğru, caudal – kuyruğa doğru demektir.
2. () Proximal kol ve bacakta gövdeden uzağa doğru (aşağı) demektir.
3. () Anatomia topographica-anatomia regionalis, karşılaştırmalı veteriner anatomi demektir.
4. () Substantia spongiosa uzun kemiklerin iç kısmında kemik dokusundan yapılmış ancak ince kemik bölümlerinden oluşmuş kısımdır.
5. () Köpeğin atlasında kelebeğe benzer processus transversus vardır.
6. () Atın sırt omurlarının sayısı yirmi ikidir.
7. () Ön bacak kemiklerinin sıralaması os humerus, os scapula, ossa antebrachium, ossa carpi, ossa metacarpi ve ossa phalanx şeklindedir.
8. () Atın antebrachiumunda tuber olecrani çift çıkıntılıdır.
9. () Koyun antebrachiumunda ulna ve radius ayrı ayrı iki kemiktir.
10. () Os coxae (kalça kemiği) os ilium, os ischii ve os pubis'in acetabulum denilen bir çukurda bu üç kemiğin birbirleri ile birleşmesi ile oluşmuştur.
11. () Atta toplam 13 çift, sığırdaki ise 18 çift kaburga kemiği vardır.
12. () Altçene kemiğine maxilla denir.
13. () Mandibula üzerinde diş köklerinin yerleştiği çukurluğa alveoli dentalis denir.
14. () Eklemler, iskelet sistemini oluşturan kemiklerden en az iki kemiğin bir araya gelmesiyle oluşan ve kemikler arasında fonksiyonel bağlantıyı sağlayan anatomik yapılardır.
15. () Soğuk topallıkta ilk harekette görülen topallık fazla yürüdükçe artar.

DERİ VE MUKOZA KONTROLÜ



**ÖĞRENME BİRİMİ 2: HAYVANLARDA DERİ VE MUKOZA
KONTROLÜ**



KONULAR

1. Deri

Kontrolü

2. Mukoza

Kontrolü

TEMEL KAVRAMLAR

- Deri (Cutis)
- Kıl (pillus)
- Epidermis
- Pigmentasyon
- Mukoza
- Apse
- Hematom

Bu öğrenme biriminde;

- Derinin görevlerini,
- Derinin yapısını,
- Epidermal oluşumları,
- Derideki patolojik değişiklikleri,
- Anormal pigmentasyonu,
- Mukozanın yapısını,
- Görülebilen mukozaların yerlerini,
- Mukozalardaki patolojik değişiklikleri,

öğreneceksiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Hayvanlarda derinin yapısı ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini inceleyiniz
- Çevrenizdeki mezbahalara giderek hayvan derilerinin yapısal özelliklerini ve kalınlıkları arasındaki farkları inceleyiniz.
- Deri ile ilgili bulduğunuz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Hayvanlarda Deri


Deri, göz dışında vücudun bütün dış yüzeyini örter. Vücudun en büyük organıdır. Cildin geçici yardımcıları olan dolaşım ve bağışıklık sistemlerinden gelen diğer hücre türleriyle birlikte vücudun en kompleks organıdır.

2.1. Derinin (Cutis) Görevleri

- Deri dokunma duyusunu oluşturur.
- Gaz alış verişi yaparak solunuma yardımcı olur.
- Deri, iç ve dış ortamlar arasında etkili iki yönlü bir bariyerdir.
- Zengin damar ağı sayesinde, kan basıncı değişimlerine yardımcı olur.
- Hareketlerin yapılması için yardımcı olur.
- Fiziksel, kimyasal, radyasyon ışınları ve patojenlere karşı savunma yapar.
- Kıl kürk oluşumu ve terleme yolu ile vücut ısı düzenlemesi yapar.
- Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle D vitamini sentezine yardım eder.
- Zehirli maddelerin terleme ile dışarı atılmasını sağlar.

2.2. Derinin Yapısı ve Katmanları

Epidermis, dermis ve subkutis (hipodermis) olmak üzere üç farklı katmandan oluşur: Epidermis çok katlı yassı epitel dokudan oluşmuştur. Dermis bağ doku elemanlarından oluşur. Hipodermis ise bağ doku bölümleriyle birbirinden ayrılmış ve lopçuklar halinde düzenlenmiş değişik miktardaki yağ dokudan oluşmaktadır.



Görsel 2.1: Derinin Katmanları

2.2.1. Epidermis

Derinin en dışındaki tabakadır. Çok katlı yassı epitel hücrelerden oluşur. Kan damarı bulunmaz. Beslenmesini dermis tabakasının hücreleri arasından, diffüzyonla geçen doku sıvıları ile sağlar. Epidermis tabakasındaki langerhans hücreleri bağışıklık görevi yapar. Ayrıca hücreler arasında dokunma duyusu alan merkel hücreleri de yer alır. Üç tabakadan oluşmuştur.

En üst tabakanın keratinleşme özelliği vardır ve zamanla en üst tabaka dökülür. En alttaki tabakadan yeni hücreler gelir. Bu süre yaklaşık 25-30 gün sürer. Hayvanın ırkına, yaşına, cinsiyetine göre bu devir değişiklik gösterir. En üst tabakanın keratinleşme özeliğinden dolayı sürüngenlerin derilerindeki pullar ile hayvanlarda bulunan kıl, tırnak ve boynuz oluşumunu sağlar.

Epidermis tabakasında pigmentasyon hücreleri mevcuttur bu hücreler canlının renk özelliği kazanmasını sağlar bu pigmentasyon hücrelerin eksikliğinde albino (doğuştan renk maddesi melanin eksikliği) oluşur.

2.2.2. Dermis

Epidermin altındaki dermis tabakası derinin % 90'ını oluşturur. Bağ dokudan oluşmuş bir tabakadır. Alt deride sinir uçları, kıl kökleri, kan ve lenf damarları, ter ve yağ bezleri ile düz kaslar bulunur. Kalınlığı ise vücut bölgelerine göre değişir. Dermis tabakasında bolca kılcıl damarlar ve sinir uçları (reseptörler) bulunur. Reseptörler aracılığı ile yumuşaklık, sertlik, şekil, ağrı, dokunum ve ısı gibi duyular alınır. Burada bulunan kılcıl damarlar ise kan akışını azaltarak veya artırarak vücut ısısının düzenlenmesinde rol alır. Dermiste ayrıca ter bezleri, yağ bezleri ve kıl kökleri bulunur.

2.2.3. Hipodermis (Subkutis, Deri Altı Bağdokusu)

Dermis tabakasının altında bulunur. Hipodermis yapı olarak gevşek bağ doku ve bol yağ dokudan oluşur. Bu tabakada duysal sinirler, yüzeysel ven ve arterler, lenf damarları ve mimik kasları bulunur. Yapısının gevşek bağ doku oluşu nedeniyle üzerindeki deri rahatça hareket ettirilebilir. Yağ dokusu ise vücut ısısının korunmasında etkilidir. Bu tabakadan deri altı enjeksiyon yapılır.



Görsel 2.2:Deri altı enjeksiyon


2.3. Epidermal Oluşumlar

Deri hayvanlarda ırk, tür, cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak farklılaşma gösterir. Deride boynuz, kıl, deri bezleri ve tırnak oluşumları şekillenir. Bu oluşumlara **epidermal oluşumlar** denir.

2.3.1. Kıl (Pilus)

Derinin epidermis tabakasının boynuzlaşarak oluşturduğu yapılardır. Kıl makroskobik olarak üç bölümden oluşur

- Kök (radix)
- Gövde
- Uç kısım (apex)



Görsel 2.3: Kılın kısımları)

Kıllar evcil hayvanların tüm vücudunu örter. Kıllar bulunduğu bölgeye ve fonksiyonuna göre : örtü kılları, uzun kıllar ve dokunma kılları olarak üç gruba ayrılır. Hayvanların tüm vücudunu örten kıllar örtü (capilli) kıllarıdır. Kısa ve sert olan kıllara setae denir. Domuz için karakteristik olan vücut kılı bu gruptandır. Uzun kıllar vücudun belli bölgelerinde bulunur. Bunlara örnek olarak da keçinin sakalı, göz kirpikleri bazı canlıların ayaklarında metacarpusta bulunan kıllar gösterilebilir. Dokunma kılları (Pili tactiles), özellikle baş bölgesinde yer alan uzun, kalın ve kuvvetli kıllardır. Canlıların çevreye uyum sağlamasına yardımcı olur.

Derinin elastikiyetini kontrol etmek neden önemlidir?
Arkadaşlarınızla grup araştırması yaparak sonuçları
sınıfta açıklayınız.

2.3.2. Kıl Folikülü

Kıllar, kök kısımları ile epidermisin meydana getirmiş olduğu folikül adı verilen çukurluklar içerisine dik veya az çok yatık olarak yerleşmişlerdir. Kıl kökü folikül tabanında dermis tarafından meydana getirilmiş bir papilla üzerine oturmuştur. Parmak şeklindeki bu oluşum damardan ve sinir tellerinden zengindir.

Yağ bezleri bir kanal aracılığıyla salgılarını kıl folikülleri içerisine akıtır. Yağ bezlerinin salgıladığı yağ, kılları ve deriyi yağlayarak yumuşaklığını ve direncini artırır. Kılların dikleşmesini sağlayan düz kas telleri (musculus erector pili) göreve uygun bir açıyla kıl foliküllerine yapışır. Her folikül bir veya birkaç kıl teli taşıyabilir.

2.3.3. Deri Bezleri (Glandula Cutis, Glandula Kutis)

Epiderminin değişime uğraması sonucu bir takım bezler meydana gelmiştir. Morfolojik olarak birbirlerine benzer olsalar da salgıladıkları madde bakımından farklıdır. Epitel dokuların bir araya gelerek oluşturdukları yapılardır. Salgı işlemine sekresyon denir. Salgıların niteliklerine göre yağ bezleri ve ter bezleri olarak isimlendirilir. Bir de özel bezler vardır.

Çevrenizde bulunan canlıların deri yapısını inceleyiniz.

2.3.3.1. Yağ Bezleri (Glandula sebaceae)

Alveolar biçimde ve lobüler görünüşlüdür. Genital organlar ve anüs civarındaki kıllı bölgede daha gelişmiştir. Her bezin bir kanalı vardır. Kanallar çoğunlukla kıl foliküllerine açılır. Vücut yüzeyine açılanlar da vardır. Sebum adı verilen bir salgıya sahiptir. Sebum deri ve kılların yağlayıcısıdır. Dudak, göz kapakları, glans penis ve praeputiumda olduğu gibi kılların bulunmadığı bazı bölgelerde de yağ bezlerine rastlanır. Meme başı, boynuz, pulvinus unguiae (yumuşak ökçeler), burun ve buradaki planumlarda yağ bezlerine rastlanmaz. Bu bezlerin salgısından çıkan koku özellikle seksüel devrede hayvanlar için önemli bir rol oynar.

2.3.3.2. Ter Bezi (Glandula sudoriferae)

Dış derinin mukozaya yakın olan kısmında, etçillerin tabanlarında, koyunda kuyruk altı bölgesinde, kedi ve domuzda meme başlarına yakın olan bölgelerde hem büyük hem de sayıca çok olarak buldukları halde tırnakta, glans penis ve sığırdaki meme başında yoktur. Ter (sudor) üre, tuz ve diğer bazı maddeleri kapsayan asit karakterli bir sıvıdır. Bu sıvının deri üzerinden buharlaşmasıyla fazla ısının atılması sağlanır.

2.3.3.3. Özel Deri Bezleri

Bu bezler hayvan türlerine göre farklı bölgelerde ve farklı amaçlarla ortaya çıkmışlardır. Örnek olarak sığırlarda merme (planum nasolabiale) gösterilebilir. Sığırlarda bu bölgenin nemsiz olması hastalık göstergesi olarak kabul edilebilir. Koyunda medial göz açısı altındaki çukurlukta yer alan gll. sinus infraorbitales, (glandula kelimesinin kısaltması gll.) keçilerde boynuz kökünde bulunan gll. cornuales, koyunda parmak arası boşluğunda yer alan gll. sinus interdigitales, köpekte anüs bölgesinde gll. circumanales, evcil etçillerde aynı bölgedeki gll. paranales, koyunda inguinal bölgedeki gll. sinus inguinales bu tür bezlerdendir. Meme bezleri de (gl. mammae) ter bezlerinin ayrı ve bağımsız biçimde gelişmesinden oluşmuştur.

2.3.4. Meme (Mamma) Süt Bezleri (Glandula Lactifera)

Meme, derinin epidermis kısmından oluşmuştur. Sayı ve buldukları yer bakımından türler arasında değişiklik gösterir. Yerleşim bölgesi olarak da kedide torakoabdominal, köpek ve domuzda torakoinguinal olarak, ruminant ve equidelde inguinal bölgede yer alır.

Memenin gelişmesi ergenliğe ve gebeliğe kadar geçen sürede yavaştır. Asıl gelişme gebelik döneminde hormonların salgılanması ile başlar ve süt sağım (laktasyon) dönemi bitinceye kadar devam eder. Süt verme dönemi bitince küçülmeye başlar. Meme, kompleks bir yapıdan oluşur. Meme kompleksi ise üç kısımda incelenir. Bunlar

- Corpus mammae (meme gövdesi)
- Papilla mammae (meme başı)
- Sinus lactiferi (boşluk sistemi)



Görsel 2.4: İnekte meme

2.3.4.1. Corpus Mammae

Meme dokusunun esas kısmını oluşturur. Salgı bezleri, bağ dokusu ve yağ dokusundan oluşur. Memeler hem dıştan hem de içten bağ dokusu ile ayrılır. Her meme aslında birbirinden bağımsızdır.

2.3.4.2. Papilla Mammae

Her memede bulunur ve dışarı açılan kısımdır. Sivri ve silindirik yapıdadır. Yapısı türlere göre farklılık gösterir. Her corpusmammae için bir papilla mammae bulunur.

2.3.4.3. Sinus Lactiferi (Boşluklu Sistem)

Meme içerisinde bulunan boşluklu sistem olup sütün depo edildiği yerdir. Corpus mammae içerisinden ve papilla mammae içerisinden geçer.



Görsel 2.5: Meme yapısının içten görünümü

2.3.5. Tırnak (Organum Digitale)

Tırnak, derinin epitel dokusunun farklılaşarak boynuzumsu yapı oluşturması ile oluşur. Evcil hayvanların parmaklarının bitimindeki epitel dokunun fiziki etkenlere bağlı olarak şekil değiştirmesidir. Tırnaklar hayvanlar için önemli bir yapı teşkil etmektedir. Hayvanlar tırnak sayısına göre çift tırnaklılar (sığır, koyun, keçi) ve tektırnaklılar (at, katır, eşek) olarak sınıflandırılmışlardır.

Çift tırnaklıların iki tırnak arasındaki bölge interdigital bölge olarak adlandırılır. Tırnak hastalıklarının en çok görüldüğü bölgedir. Teşhis ve tedavi için önemlidir. Tırnak iki bölümde incelenir

- Cansız tırnak (*capsula unguiae*)
- Canlı tırnak (*corium unguiae*)



Görsel 2.6: Tırnağın cansız kısmı (Koyun tırnağı)



Görsel 2.7 Tırnağın cansız kısmı (Sığır tırnağı)

2.3.5.1. Cansız Tırnak (*Capsula Ungulae*)

Tırnağın en dıştaki cansız tabakasıdır. Damar ve sinir uçları bulunmaz. Tırnak, düzeltme ve kesme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Sert bir yapıdadır keratin bulunduğu için su ile yumuşama gösterir. Bu yumuşama düzeltme ve kesme işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırır. Dışarıdan gelen darbelere karşı ayak kabı görevi üstlenir. Cansız tırnağın bölümleri şunlardır

Taban (*solea ungualea*): Tırnağın toprağa temas eden yüzeyini oluşturur. Tırnağın ön ve yan duvarlarıyla (*paries ungualea*) birleşme noktalarına taban kenarı (*margo solearis*) denir.

- **Tırnak ön ve yan duvarları (*paries ungualea*):** Boynuzsu tırnağın ön ve yandan görülen kısmıdır.
- **Beyaz çizgi (*linea alba*):** *Solea ungualea* ile *paries ungualea*'nin birleştiği kısımda 2 mm kalınlığında bulunur. Bu çizgi canlı dokuyla tırnak arasındaki sınırı oluşturur. Tırnağın uzayan bölümleri bu sınıra kadar kesilmelidir.
- **Tırnak ökçesi (*torus ungualea*):** Yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu durum yumuşak ökçeden (taban yastığı) ileri gelir. Vücut ağırlığının yer ile temasında ayağa gelebilecek darbelerin etkisini en aza indirir.

2.3.5.2.Canlı Tırnak (Corium Ungulae)

Tırnağın canlı kısmıdır damar ve sinir uçları mevcuttur. Tırnak kesimi, bu bölüme kadar yapılmalıdır.



Görsel 2.8: Nal temizliği

2.3.6. Boynuz (Cornu)

Boynuz, derinin epidermis katmanının farklılaşması ile meydana gelen oluşumdur. Os frontaledeki boynuz çıkıntısının (processus cornualis) üzerinde yer alır. Onun şekline uyan bir kalıp oluşturur ya da onun üzerine bir kılıf gibi geçer. Kıl ve bez bulunmaz. Hayvanın korunma organı olan cornunun şekil ve yapısı ırk ve türe göre değişiklik gösterir. Üç kısmı vardır. Bunlar: Basis cornus (radix cornus), corpus cornus ve apex cornustur.




Görsel 2.9: Boynuz çeşitleri ve koçta boynuz

2.3.7.Diğer Oluşumlar

Deri değişikliğe uğrayarak boynuzlaşır. Bu şekilde oluşan yapılar kestane, mahmuz ve kanatlıların gagalarıdır.

2.4. Derideki Patolojik Değişiklikler

Deride fiziksel, kimyasal, mikrobiyal, genetik, ışınal, dengesiz beslenme ve bazı iç organ hastalıkları gibi faktörlere bağlı olarak patolojik oluşumlar (hastalıklı oluşumlar) şekillenir.




Görsel 2.10: Dermatitli deri ve mantar

- **Nodül (küçük düğüm):** Deri altında çıkan iyi veya kötü olduğu bilinmeyen şişlik veya kitledir. Sınırlı ve yuvarlaktır.



Görsel 2.11: Deride nodül

- **Tümör (ur, neoplazma):** Hücrenin belirsiz bir şekilde sınırsız olarak çoğalması anlamına gelir. İlk türediği hücreye benzese de belirli bir hücre yapısı yoktur. Tümörler organizmada tek ya da yaygın olarak gözlenirler. Nodül şeklinde olan tümöral gelişmeler deride veya mukozalarda meydana gelebilir. Mantar şeklinde veya karnabahar şeklinde çıkıntılı olabilir. Tümörlerin kötü huylularına malign, iyi huylularına ise benign denir.



Görsel 2.12: Melanoma (cilt kanseri)

- **Ödem:** Hücre dışı (ekstraselüler) sıvının deri altı dokuda birikmesidir. Hamur kıvamında, bastırıldığında parmak izi kalan şişliklerdir. Ödemler buldukları yere göre yaygın veya sınırlı olur. Doğum öncesi sığırlarda memelerde ve önündeki derialtında oluşan ödem fizyolojiktir. Vurma, çarpma veya sistemik bozukluklardan ileri gelenler ise patolojik ödemlerdir.
- **Apse (çıiban):** Deri altında irin birikmesidir. Bakteri enfeksiyonlarına karşı vücudun verdiği bir reaksiyondur. Vücudun herhangi bir yerinde bir doku ya da organda oluşan apse, kendini ağrı, kızarıklık ve şişlikler meydana getirerek belli eder. Bazı apseler olgunlaşarak kendiliğinden açılır ve irin dışarı akar. Apseler, sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılır:



Görsel 2.13: İnek sırt kısmında apse

- **Sıcak Apse:** Her zaman yangılı bir dönem vardır. İrin toplandığında o bölge kızarır. Ateş, ağrı, şişlik ve sancı söz konusudur. Çevresi sert, ortası yumuşak ve dalgalı (fluktuan) yapıdadır.
- **Soğuk Apse:** Genellikle sıcak apselerin tedavi edilmeyip beklemesi (kronikleşmesi) sonucu oluşur. İrinin etrafının kapsülleşmesi ile şekillenen ve deri altında ağrısız, ateşsiz, sert yapıda bir şişlikle kendini belli eder.
- **Hematom (kan oturma):** Herhangi bir nedenle (vurma, çarpma vb.) deri bütünlüğü bozulmaksızın kan damarlarının yırtılması ile deri altında kan birikmesi olayına hematom denir. Boyutları damarlardan akan kanın miktarıyla ilgilidir. Başlangıçta dalgalı (fluktasyon) ve yumuşak

kıvamdadır. Zamanla sertleşir ve hamur kıvamını alır. Elle muayenede çıtırtı (krepitasyon) sesi duyulur.



Görsel 2.14: Kedi kulağında hematoma

- **Amfizem (hava toplanması):** Deri altında hava veya gaz birikimi sonucu oluşur. Çıtırtılı, yumuşak şişkinliklerdir. Elle bastırılınca deri altındaki gazın yön değiştirdiği hissedilir. Özellikle solunum ve sindirim yollarındaki yaralanmalarda oluşur. Yanıkara gibi bazı enfeksiyonlarda da gözlenir.
- **Parazitler:** Deri altında bazı parazit larvaları şişkinlik oluşturabilir. Sığırlarda nokra (hipoderma bovis) deri altında fındık ve ceviz büyüklüğünde şişliklerin oluşmasına sebep olur



Görsel 2.15: Deride parazit

- **Ülser (ulcus) ve Doku Kayıpları (erozyonlar):** Kendiliğinden iyileşme eğilimi olmayan maddi kayıplı yaralara ülser denir. Evcil hayvanlarda ülserlerin çoğu bakterilerden (ruam, malleus vb.) ileri gelir. Bazen parazitler, insan ve memeli hayvanlarda ülser oluşumuna neden olur. Örneğin, şark çibani etkeni Leishmania türlerinde olduğu gibi. Uyuz etkenleri deri içine yerleşerek şiddetli kaşıntı yapar ve sonuçta deride erozyonlara yol açar.
- **Anormal Tüy Örtüsü:** Normal tüy örtüsünde matlık, farklı yönlere bakan, karışık bir durum olmaması gerekir. Türler ve cinslere göre tüy yapısı farklılık gösterir. Koyunlardan örnek verecek olursak, merinos koyunun tüy yapısı diğer koyun türlerine göre çok farklıdır. Bu türlerin asıl tüy yapısı bilinip bir anormallik var mı sorgulanıp tanısı konulmadır. Anormal tüy yapısı beslenmeye bağlı olabildiği gibi çeşitli sebeplerin yanı sıra stres faktörleri ile de ilişkilidir.

- **Anormal Pigmentasyon:** Anormal pigmentasyon çoğunlukla genetik faktörlerle ilişkili olarak görünse de sonradan olanları da vardır. Pigment yetersizliğine bağlı olarak albino (vücutlarında normal pigment olmadan doğma) deri yapıları gözlenmektedir. Beslenme bozukluklarına bağlı olarak da pigmentasyon anormallikleri şekillenebilmektedir.



Görsel 2.16: Sağlıklı hayvanlarda normal görünüm

Aşağıda fotoğrafını gördüğünüz hayvanın derisinde hangi patolojik durum oluşmuştur? Araştırarak arkadaşlarınızla bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız.



Görsel 2.17: Derisindeki anormal durum ne olabilir?

YAPAY DERİYE SAHİP ROBOTLAR ARTIK HİSSEDEBİLİYOR

Günümüzde robotlar insanların yaptığı birçok işi yapabiliyor. Dış görünüş olarak insanlara benzeyen robotlar insansı robot olarak isimlendiriliyor. Gelecekte insansı robotların insan vücudunun gerçekleştirdiğine benzer işlevleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

İnsansı robotların insanlar gibi çevreleri ile etkileşim hâlinde olabilmesi için çevrelerini hassas bir şekilde algılayabilmesi gerekiyor. Münih Teknik Üniversitesinden Prof. Gordon Cheng ve arkadaşları bu amaçla robotlarda kullanılacak yapay bir deri geliştirdi. Yapay deri, çapı yaklaşık 2,5 cm olan altıgen şekilli sensör birimlerinden oluşuyor. Bu sensörler sıcaklığı, basıncı, mesafeyi ve ivmelenmeyi tespit edebiliyor.



İnsan derisinde yaklaşık beş milyon algılayıcı hücre var. Yapay bir deriye bu kadar yüksek sayıda sensör yerleştirildiğinde bu sensörlerden gelen verilerin işlenebilmesi için çok büyük bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Yeni araştırmada bilim insanları, bu sorunun üstesinden gelebilmek için daha önce geliştirilen yapay deri sistemlerinden farklı bir yöntem kullandı.

Bu yöntemde yapay derideki bütün sensörlerden gelen sinyaller analiz edilmiyor. Bunun yerine sadece sinyalinde değişim olan yani aktif hâle gelen sensörlerden elde edilen veriler işleniyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri yapay deriyi H-1 isimli insansı robota yerleştirdi. Robotun gövdesinde, kollarında, bacaklarında hatta ayaklarının altında toplam 13.000'den fazla sensör var. Bu sayede robot bütün "vücuduyla hissedebiliyor". Örneğin pürüzlü bir zeminde dengeli bir şekilde yürüyebiliyor, bir insana sarılabiliyor ya da elini sıkabiliyor.

Geliştirilen teknoloji, robotların insanlarla ve çevreleriyle güvenli bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olabilir.

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/yapay-deriye-sahip-robotlar-artik-hissedebiliyor> 14.06.2020 04.08

2.5. Hayvanlarda Mukoza

Sindirim, solunum, üreme ve boşaltım (ürogenital) sistemlerinde, boşluklu (lumen) organların iç yüzünü kaplamış olan zarlara mukozalar denir. Deride olduğu gibi mukozalar da iki katlı bir zarıdır. Mukozaların epitelden yapılmış yaprağına epitel kat (lamina epitelyalis), bağ dokudan yapılmış olan yaprağına ana kat (lamina propria) adı verilir. Ağız, burun, anüs vb. gibi vücudun tabii boşluklarında deri ile mukozalar birbirlerine geçiş yapar.

Tüm vücudun dışını kaplayan deri, doğal delikler olan ağız, burun, anüs, vulva ve urethradan içeriye dönerek mukozayı oluştururlar. Mukozanın dış deriden en önemli farkı yağ ve ter bezleri ile killardan yoksun oluşudur.

2.5.1. Görülebilen Mukozalar

Ağız, dış genital organların iç yüzünü kaplayan müköz doku gözlenebilir bulgular yönünden incelenir. Normal mukozalar açık pembe renkli, nemli ve dokusunda belirgin olmayan damarlaşma vardır. Mukozaların kırmızimsı renkte olması yangıyı, soluk görünüşte olması anemiyi, mavimsi renkte görünmesi oksijen yetersizliğini, sarı renkte görülmesi kanda sarılık maddesinin düzeyinin yükselmesine, kuruluk vücut sıvı kaybına, damarlaşmanın artması kan dolaşımı ile ilgili hastalıklara işaret eder.

Ağız ve burun boşluğu mukozaları, dış genital organ mukozaları ve göz kapağının iç yüzeyini oluşturan mukozalar (konjunktiva) dıştan görülüp muayene edilebilir. Sağlıklı hayvanlarda söz konusu mukozaların nemli, parlak, düzgün ve açık pembe renkte olduğu gözlenir.



Görsel 2.18: Ağız ve göz mukozası

2.5.2. Mukozadaki Patolojik Değişiklikler

Mukozadaki renk değişiklikleri deriden daha iyi belirlenir. Safra pigmentlerinden meydana gelen sarılıkta (ikterus) mukozaların sarıya boyandığı görülür. Kansızlık (anemi) olaylarında mukozalarda aşırı derecede solgunluk, şiddetli vakalarda porselen beyazı renk gözlenir.

Mavi yeşil renk (siyanoz) kalp ve dolaşım bozukluklarına, şiddetli solunum sistemi hastalıklarına ve kan gazı değişiminin bozulduğu bazı zehirlenmelere işarettir. Mukozalarda kırmızılık çoğunlukla bölgesel ve genel yangıya bağlıdır. Sistemik enfeksiyonlarda ve zehirlenmelerde (toksikasyon) mukozalar kirli kırmızı, mat renkte ve hamurumsu kıvamdadır. Bazı hastalıklarda deri ile birlikte mukozalarda da nokta tarzında (peteşi) veya biraz daha yaygın (ekimoz) kanama odakları görülür.

ÖĞRENME BİRİMİ	HAYVANLARDA DERİ VE MUKOZA KONTROLÜ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	HAYVANLARDA DERİ VE MUKOZA KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	CANLI VEYA KESİLMİŞ HAYVAN ÜZERİNDE DERİNİN VE MUKOZANIN KONTROLÜ	12 DERS SAATİ

AMAÇ–

- Hayvanlarda derinin esnekliğini, kalınlığını, sıcaklığını, rengini ve parlaklığını kontrol etmek
- Canlı hayvan üzerinde ağız, konjunktiva, vajina gibi Mukozaların görünüşünü kontrol etmek

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Sağlıklı bir derinin belli bir elastikiyeti vardır. Kıl örtüsü ve derinin durumu, sağlığın, iyi bakım ve beslenmenin göstergesidir. Kıl örtüsü sığırlarda düzgün ve parlak olup, her ilkbaharda ve sonbaharda yenilenir. Yazın kıl örtüsü daha ince ve kısadır. Kışın daha uzun, sık ve çoğunlukla serttir. Kıl örtüsünün değişimindeki bir gecikme veya tamamen sertleşme ve kabalaşma kıl büyümesinde bir bozukluğun işaretidir. Sağlıklı kıllar, yağ bezlerinin düzenli çalışmasıyla yağlanarak parlak bir görünüm alır.
- Deri sıcaklığını ölçmeden önce hayvanın dinlendirilmesine, bulunduğu ortamın hava akımının standart olmasına, hayvan sıklığının olmamasına dikkat ettikten sonra, hayvanın vücudunu gözle ve elle muayene edip, deride sıcaklık ve kaşıntı olup olmadığını tespit ediniz.
- Hayvanın derisini yağlanma bakımından elle ve gözle kontrol ediniz. Yağlanmanın sebebini metabolizma veya enfeksiyon yönünden araştırınız.
- Deride görülen şişlikleri elle kontrol ederek kıvamını, büyüklüğünü, organlarla olan bağlantısını araştırıp, şişliğin neden kaynaklandığını anlamaya çalışınız. Deride oluşan yangı ve lezyonları tespit edip sebebini araştırınız.
- Derinin elastikiyet kontrolü vücuttan su kaybının tespiti açısından önemlidir. Bu kontrol için deriyi baş ve işaret parmakları arasında tutup çektiniz. Derinin eski şeklini alma süresine dikkat ederek, su kaybı olup olmadığını belirleyiniz.
- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyiniz.
- Çeşitli hayvanlara ait derileri laboratuvara getirerek anatomik yapısını inceleyiniz. Aynı işlemi maket hayvan üzerinde de yapınız.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde inek, koyun keçi gibi hayvanların meme yapısını inceleyiniz. Memenin yapısını kontrol ederek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söyleyiniz.

2.KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri, canlı hayvan türleri
- Kesilmiş hayvanın derisi ve organları
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3.İŞLEM BASAMAKLARI

- Kıl örtüsünün görünümünü kontrol ediniz.
- Derinin elastikiyetini kontrol ediniz. Deriyi baş ve işaret parmakları arasında tutup çekiniz. Derinin eski şeklini alma süresine dikkat ederek, su kaybı olup olmadığını belirleyiniz.
- Deriyi koku bakımından kontrol ediniz. Derinin rengini kontrol ediniz
- Derinin sıcaklığını ve kaşıntı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Deride yağlanma olup olmadığını araştırınız.
- Deriyi şişkinlikler, yangı ve lezyonlar yönünden inceleyiniz.
- Görülen mukozaları, renk değişiklikleri, lezyonlar ve kanamalar yönünden kontrol ediniz.
- Göz, ağız, vulva ve vajina mukozalarını tekniğine uygun kontrol edip, renk değişikliği olup olmadığını belirleyiniz. Bu mukozalarda görülen lezyon ve kanamaları tespit ederek kaynağını araştırınız. Tespitlerinizi yazarak sınıfta paylaşınız.
- Memenin anatomik yapısını gözle kontrol ederek anatomik yapısını meme üzerinde gösteriniz.

Not: Ders öğretmeninizden yardım alınız. Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	30	50	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1-)Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden değildir?

- A) Organizmayı mikroorganizmaların hastalık yapıcı etkilerinden korur.
- B) C vitamini metabolizmasında görev alır.
- C) Vücut sıcaklığını ayarlar.
- D) Zehirli maddelerin terleme ile dışarı atılmasını sağlar.
- E) Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle D vitamini sentezine yardım eder

2-)Aşağıdaki meme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Süt verme dönemi doğumdan sonra başlar.
- B) Süt verme dönemi bitiminde memeler küçülür.
- C) Her hayvan türünde meme sayısı eşittir.
- D) Memeler kedide göğüs karın bölgesinde yer alır.
- E) Süt yavrunun beslenmesinde rol oynar.

3-)Deri altında kan birikmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ödem
- B) Apse
- C) Hematom
- D) Amfizem
- E) Ulcus (ülser)

4-)Aşağıdaki deri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Deri, dokunma duyusu sayesinde çevreden aldığı uyarıları canlıya iletir.
- B) Canlının vücudunu çepeçevre kuşatarak dış etkilere karşı korunmasını sağlar.
- C) Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle A vitamini sentezine yardım eder.
- D) Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
- E) Deri vücuda gevşek bir bağ dokuyla bağlanmıştır

5-)Aşağıdakilerden hangisi deri altı enjeksiyonun yapıldığı yerdir?

- A) Dermis
- B) Epidermis
- C) Hipodermis
- D) Cutis
- E) Sarkolemma

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

6-) Tırnağın.....kısmıdır, damar ve sinir uçları mevcuttur. Tırnak kesimi, bu bölüme kadar yapılmalıdır.

7-) Hayvanların tüm vücudunu örten kıllar örtü kıllarıdır. Kısa ve sert olan kıllaradenir.

8-) Tümörlerin kötü huylularınave iyi huylularınadenir

9-) Meme içerisinde bulunan boşluklu sistem olup sütün depo edildiği yeredenir.

10-) Deri bezlerinin (glandula cutis) salgı yapmasına.....denir.

HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ



ÖĞRENME BİRİMİ 3: HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ



KONULAR

1. Ağız, Diş ve İştah Kontrolü

2. Mide Yapıları

3. Bağırsak ve Defekasyon Kontrolü

TEMEL KAVRAMLAR

Diş, Hayvanlarda diş sayıları
Sindirim, Sindirim sistemi organları
Geviş getirme
Yutma, Kusma
Yem Yeme, su içme
Mide
Rumen
Retikulum
Omasum
Abomasum
Bağırsaklar
Defekasyon

Bu öğrenme biriminde;

- Sindirim sistemi ve sindirim organlarının önemini,
- Sindirim sistemi ile ilgili anatomik ve fizyolojik terimleri,
- Sindirim sistemini oluşturan organları,
- Ağız, dil ve dişlerin yapısını ve görevlerini,
- Hayvan türlerine göre diş formüllerini,
- Tükürük bezlerinin yapısı ve görevlerini,
- Tükürük bezlerinin yerlerini, Yutağın yapısını ve görevlerini, Yemek borusunun yapısını ve görevlerini, Açlık, tokluk, iştah ve susuzluk olaylarını,
- Besinlerin ağza alınmasını,
- Su içme ve süt emmenin izahını,
- Yutmanın izahını, kusma nedenlerini,
- Ağız boşluğundaki yapıların kontrolünü,
- İştah ve yeme içme kontrolünü,
- Tek ve çok odacıklı midenin yapısını,
- Tek ve çok odacıklı midelilerde sindirimi,
- Geviş getirenlerin mide hareketlerini,
- Geviş getirmenin izahını,
- Geğirmenin izahını, mide kontrolünü,
- Bağırsak bölümlerini, bağırsaklarda sindirimi,
- Pankreas ve karaciğerin yapısını ile görevlerini,
- Bağırsak hareketlerini, ishal ve kabızlığı,

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Hayvan kesim yerlerine giderek hayvanların sindirim organlarını inceleyiniz.
- Hayvanlarda sindirim sistemi ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini inceleyiniz.
- Hayvancılık yapılan işletmelere, haralara giderek hayvanların yem yeme ve su içmelerinin nasıl yapıldığını araştırıp bilgi toplayınız.
- Hayvanların yem yeme ve su içmeleri ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internetten araştırma yapınız.
- Mideden salınan musin olmasaydı ne olurdu? Araştırınız.
- Midesi alınan canlı yaşayabilir mi? Yaşarsa hangi beslenme bozuklukları ile karşılaşır? Araştırınız.
- Yukarıdaki sorularla ilgili araştırmalardan elde ettiğiniz bulgu ve gözlemlerinizi dosya oluşturarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.1. Sindirim Sistemini Oluşturan Organların Yapısı ve Çalışması

Sindirim, besin maddelerinin sindirim ve emilim için hazırlanması, sindirim sonucu oluşan artık ürünlerin dışarı atılması, sindirim kanalının hareketleri ve salgılarıyla şekillenen son ürünlerin emilerek dolaşım sistemiyle alınıp dokulara taşınması anlamına gelmektedir.

Sindirim sistemi ağızla başlayan ve anüsle son bulan bir kanal sistemidir. Sindirim olayını gerçekleştiren organ ve yapıları sindirim sistemi (systema digestorium) denir. İnsan ve hayvanlar yaşama, büyüme, iş ve verim aktivitelerini yapabilme, yeni bir canlı dünyaya getirme, onarım ve yeniden yapılanma, enerji üretme gibi canlılık faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan besin maddesi almak zorundadır.

Sindirim sistemi; besin maddelerinin alınmasını, parçalanmasını, bir takım fiziksel ve kimyasal değişikliklere tabi tutulduktan sonra sindirilmesini ve faydalı kısımların emilerek işe yaramayan kısımların dışarı atılmasını sağlayan sistemdir.

Ağız (os), ağız boşluğu (cavum oris), yutak (farinks), besleme kanalı ve eklenti bezleri (tükürük, karaciğer, pankreas) sindirim sistemini oluşturan organlardır. Beslenme kanalı; yemek borusu (özefagus), mide (gaster), ince bağırsaklar (duodenum, jejunum, ileum), kalın bağırsaklar (secum, colon, rectum) ve anüsten oluşur.

3.1.1. Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

Ağız boşluğunun görevi; dil, diş, tükürük bezleri yardımıyla besin maddelerinin alınmasını, seçilmesini, çiğnenmesini ve tükürükle karıştırılarak lokma hâline getirilmesini sağlamaktır. Dudaktan başlayarak yutak girişine kadar uzanır. Önde dudaklar yanda yanaklar tarafından çevrelenmiştir.

Cavum orisin tavanını sert damak (palatum durum), tabanını dil ile iki çene kemiği (mandibula) arasını dolduran organlar yapar. Ağız boşluğu, arka kısımda yutağın ağız girişi (oro farinx), dil kökü (radix lingua) ve yumuşak damak (palatinum molle) ile birleşmiştir.

3.1.1.1. Ağız Boşluğunun İçinde ve Çevresinde Yer Alan Organlar

Ağız boşluğunun ön duvarını dudaklar, yan duvarını ise yanaklar oluşturur. Tavanında sert ve yumuşak damak (palatum durum ve palatum molle) yer alır. İçinde yer alan dişler (dentes) ve dilden (lingua) başka, çevresinde tükürük bezleri (glandulae salivariae) bulunur.

3.1.1.2. Dudaklar (Labia Oris)

Alt dudak (labium inferius) ve üst dudak (labium superius) olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Üst dudak, alt dudaktan daha büyüktür. İki dudak arasında kalan yarığa rima oris denir.

Dudaklar dıştan içe doğru:

- Deri,
- Kas tabakası,
- Bez tabakası
- Mukozadan oluşur.

Bezler seröz karakterde olup sulu salgı yaparlar. Mukoza dudakları içten örter, sonra dişetlerine geçer. Dudaklar atta uzun ve hareketli, sığırdada ise kısadır.



Görsel 3.1:Atta ve koyunda dudak

3.1.1.3. Yanak (Bucca)

Ağız boşluğunun yanlarını sınırlandırır. İç tarafta mukoza, dışta deri ile örtülüdür. Kulak altı tükürük bezinin akıtıcı kanalları yanaktan ağız boşluğuna açılır. Geviş getiren hayvanlarda yanak ve dudağın iç tarafında yutmaya yardımcı olan papillalar bulunur.



Görsel 3.2: Buzağı yanak mukoza

3.1.1.4. Diş Etləri (Gingiva)

Dişlerin yerlerinde tespitine yarar.



Görsel 3.3: At gingiva

3.1.1.5. Dişler (Dentes)


Dişler ağza alınan gıda maddelerinin koparılmasını, parçalanmasını ve ezilmesini sağlayan vücudun en sert oluşumlarıdır. İnsan ve evcil hayvanlarda dişler üst çene (maxilla) ve alt çene kemiğinin (mandibula) alveol adı verilen boşluklarına yerleşmişlerdir.



Görsel 3.4: Sığırda ve köpekte dişler

Dişlerin şekilleri ve yapıları ile hayvanların beslenme durumları arasında bir uyum söz konusudur. Gelişimi tamamlanmış bir dişte şu kısımlar görülür

- Diş kökü (radix dentis): Dişin alveol içine gömülü olan kısmıdır.
- Diş Boynu (collum dentis): Diş kökü ile diş tacı arasındaki kısmıdır.
- Diş Tacı (corona dentis): Dişin ağız boşluğu içinde görülen bölümüdür. Dişin üzerini dıştan çok sert yapıda, beyaz renkte, diş minesi olarak bilinen kemiksi doku kaplar. Dişlerin korunması için çok büyük bir önem taşır.



Görsel 3.5: Dişin yapısı ve kısımları

Dişler görevine ve şekillerine göre dört gruba ayrılır

- Kesici dişler (dentes incisivi),
- Köpek dişleri (dentes canini),
- Ön öğütücü dişler (dentes premolares),
- Arka öğütücü dişler (dentes molares).

Geviş getirenlerde üst çene ön öğütücü dişler bulunmaz.

	Kalıcı Dişler				Toplam Kalıcı Diş sayısı
	I	C	P	M	
At	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	40
	3	1	3	3	
Ruminant:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	32
	4	0	3	3	
Köpek	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	42
	3	1	4	3	

Görsel 3.6: Diş formülleri



Görsel 3.7: Sığır 2 yaş diş maketi



Görsel 3.8: Sığır 3 yaş diş maketi

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	AĞIZ DIŞ VE İŞTAH KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKET ÜZERİNDE YA DA KADAVRADA DIŞ YAPILARINI İNCELEMEK	DERS SAATİ: 10

AMAÇ –Sindirim sistemine ilişkin organların anatomik yapısını gözlemleyerek, incelemek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Mezbaha ziyareti planlanarak kesilmiş hayvan üzerinde veya kesilmiş hayvanda diş yapılarını laboratuvara getirerek anatomik yapıları incelenir. Aynı işlem maket hayvan üzerinde de yapılır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde diş yapılarını gösterip, koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Dişlerin anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların sindirim sistemini oluşturan organlarını kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş hayvanın alt ve üst çenesi, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI


Ders öğretmeninizden yardım alarak

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait alt ve üst çene yapılarını inceleyiniz.
- Ağız boşluğunu baştan itibaren kontrol ediniz.
- Herbivor ve omnivor canlıların diş yapılarının farklılıklarını kadavra ya da maket üzerinde inceleyiniz.
- Yerleşim yerleri ve görevlerine göre diş kısımlarını sıralayınız ve kesilmiş hayvan, kadavra yahut maket üzerinde sayarak gösteriniz.
- Dişlerin, alveola dentis boşluğuna oturan kök kısmını gösteriniz ve anatomik adlarını söyleyiniz..
- Çeşitli türde hayvanlara ağız diş maketlerini inceleyerek dişlerle yaş tayini yapınız.


Sığırlarda Dişlerle yaş tayini özellikle kurbanlık hayvan seçiminde önemlidir. Örnek maket fotoğraflarını inceleyiniz. (Mandibula dorsal çekim)



Görsel 1: 14 günlük



Görsel 2: 1 yaş



Görsel 3: 1,5 yaş




Görsel 4: 2 yaş



Görsel 5: 3 yaş




Görsel 6: 4 yaş



Görsel 7: 5 yaş



Görsel 8: 9 yaş



Görsel 9 : 14 yaş

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BEÇERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	AĞIZ DIŞ VE İŞTAH KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	CANLI HAYVAN ÜZERİNDE AĞIZ VE DIŞ KONTROLÜ YAPMAK	12 DERS SAATİ

AMAÇ –Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Belediye barınağı, geçici hayvan bakımevi, veteriner klinikleri, süt ve besi üretim işletmelerine ziyaret planlanır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde diş yapılarını gösterip, koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Dişlerin anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların sindirim sistemini oluşturan organlarını kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Canlı hayvan materyali (Kedi, köpek, koyun-keçi, at sığır)
- Dezenfektanlar, Padan(ağız açma için cerrahi materyal)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak canlı hayvana bakıcı veya yardımcı eşliğinde zapturapt altına alınız.
- Kedi-köpek ve koyun keçide bir elinizle üst diğer elinizle alt çeneyi tutunuz ya da padan yerleştirerek ağız açınız ve diş yapılarını inceleyiniz.
- Karnivor hayvanlarda;
- Kanın diş yapılarını inceleyiniz.Diş taşları oluşumu varsa, gözlemleyiniz not ediniz ve fotoğraflayınız
- Ön dişleri inceleyiniz Süt dişlerinin yapısını ve sayısını inceleyerek yaş hakkında tahminde bulunmaya çalışınız.
- Sığırlarda hayvana soldan yaklaşınız iki elinizle maxillanın dişsiz bölgesinden tutarak ya da padan yerleştirerek ağız açınız
- Sığırlarda, bir önceki uygulama dersindeki maket görsellerini inceleyerek canlı hayvan üzerinde karşılaştırma yapınız.
- Geviş getiren hayvanlarda os incisivum üzerinde dişlerin olmadığını gözlemleyiniz ve nedenini açıklayınız.
- Dişlerde oluşabilecek kırılma, çürüme, diş etlerinde apse gibi patolojik durumların varlığını inceleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	AĞIZ DIŞ VE İŞTAH KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	CANLI HAYVAN ÜZERİNDE AĞIZ VE DIŞ KONTROLÜ YAPMAK	10 DERS SAATİ

AMAÇ –Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Belediye barınağı, geçici hayvan bakımevi, veteriner klinikleri,süt ve besi üretim işletmelerine ziyaret planlanır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde diş yapılarını gösterip, koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Dişlerin anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların sindirim sistemini oluşturan organlarını kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Canlı hayvan materyali (Kedi-köpek-koyun-keçi-at-sığır)
- Dezenfektanlar
- Padan(ağız açma için cerrahi materyal)

3. İŞLEM BASAMAKLARI Ders öğretmeninizden yardım alarak

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak canlı hayvana bakıcı veya yardımcı eşliğinde zapturapt altına alınız.
- Kedi-köpek ve koyun keçide bir elinizle üst diğer elinizle alt çeneyi tutunuz ya da padan yerleştirerek ağzı açınız ve diş yapılarını inceleyiniz.
- Karnivor hayvanlarda diş yapılarını inceleyiniz.
- Diş taşları oluşumu varsa, gözlemleyiniz not ediniz ve fotoğraflayınız
- Ön dişleri inceleyiniz Süt dişlerinin yapısını ve sayısını inceleyerek yaş hakkında tahminde bulunmaya çalışınız.
- Sığırlarda hayvana soldan yaklaşınız iki elinizle maxillanın dişsiz bölgesinden tutarak yada padan yerleştirerek ağzı açınız
- Sığırlarda, bir önceki uygulama dersindeki maket görsellerini inceleyerek canlı hayvan üzerinde karşılaştırma yapınız.
- Geviş getiren hayvanlarda os incisivum üzerinde dişlerin olmadığını gözlemleyiniz ve nedenini açıklayınız.
- Dişlerde oluşabilecek kırılma, çürüme, diş etlerinde apse gibi patolojik durumların varlığını inceleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI - SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	AĞIZ DIŞ VE İŞTAH KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	ÇEŞİTLİ HAYVANLAR ÜZERİNDE DIŞ YAPISINI VE SAYISINI KONTROL ETMEK	14 DERS SAATİ

AMAÇ -Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Belediye barınağı, mezbaha, geçici hayvan bakımevi, veteriner klinikleri, süt ve besi üretim işletmelerine ziyaret planlanır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde diş yapılarını gösterip koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Dişlerin anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların sindirim sistemini oluşturan organlarını kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Canlı hayvan materyali (Kedi-köpek-koyun-keçi-at-sığır)
- Kadavra, karkas.
- Dezenfektanlar
- Padan (ağız açma için cerrahi materyal)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak canlı hayvana bakıcı veya yardımcı eşliğinde zapturapt altına alınız.
- Üst ve alt çenedeki dişleri görev ve yapılarına göre sayarak inceleyiniz.

	Kalıcı Dişler				Toplam Kalıcı Diş sayısı
	I	C	P	M	
At	3	1	3	3	40
Ruminant:	0	0	3	3	32
Köpek	3	1	4	2	42

Çeşitli hayvan türlerinde diş yapıları ve sayıları



- Atta diş yapılarının incelenmesi



- Köpekte diş yapılarının incelenmesi



- Sığır Karkasında diş yapılarının incelenmesi


4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI - SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

3.1.1.6. Dil (Lingua, Glossa)

Dil ağız mukozasıyla örtülü, çok hareketli, kaslı bir organdır. Üç bölümde incelenir

- Dil ucu (apex lingua)
- Dil gövdesi (corpus lingua)
- Dil kökü (radix lingua)




Görsel 3.9: Dilin anatomik yapısı

3.1.1.7. Tükürük Bezleri (Glandula salivales)

Tükürük bezleri, tükürük (saliva) denen bir salgı yaparlar ve ağız boşluğuna akıtırlar. Ağız boşluğuna salgılarını akıtan çok sayıdaki tükürük bezlerinden en büyükleri şunlardır:

- Kulak altı tükürük bezi (glandula parotis): Alt çenenin arka kenarı ile birinci boyun omuru (atlas) arasına sıkışmış bir bezdir.
- Alt çene tükürük bezi (glandula submandibularis): Alt çene altında bulunur.
- Dil altı tükürük bezi (glandula sublingualis): Dil ucunun alt tarafında, hilal şeklinde yana doğru uzanmış olarak bulunur.



Görsel 3.10: Köpekte tükürük bezleri

Tükürük, renksiz, kokusuz, yapışkan, kolayca köpüren bir sıvıdır. Tükürük salgısının bileşiminde potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, bikarbonat ve fosfat tuzları gibi inorganik maddelerle, karbonhidratları parçalayan enzim (amilaz veya pityalin) ve proteinler bulunur.

Tükürüğün pH'ı 6,2 ile 7,4 arasında değişir. İnsanda ve dinlenme hâlindeki köpekte hafif asittir. Uyarılan köpekte tükürüğün pH'ı 7,5 olur. Geviş getirenlerde daha alkalidir. Tükürüğün en iyi etki gösterdiği pH değeri 6,8'dir. Yüksek pH, kalsiyum ve fosfor gibi maddelerin çökmesi sonucu diş taşlarının oluşmasına yol açar.

İnsanda bir günde salınan tükürük miktarı ortalama 1 litredir. Tükürük salgısı etçil hayvanlarda az, otçul hayvanlarda ise fazladır. Normal yemleme sırasında attı günde 42 litre tükürük oluşabilmektedir. Tükürüğün miktarı alınan besinin özelliğine ve parçalanma büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Yeşil yemlerle beslemede alınan yemin yarısı kadar, arpa yulaf gibi tane yemlerde yemin miktarından biraz fazla, kuru ot yedirmede ise yemin 4 katı kadar tükürük oluşur.

En çok salgı, besin alma ve geviş getirme dönemlerinde görülür. Sığırlar da günlük tükürük miktarı 100–200 litreyi, koyunda 8–13 litreyi bulmaktadır.

Tükürüğün Görevleri şunlardır


- Tükürükte bulunan müsin maddesi ağız mukozasının nemli ve kaygan tutulmasını sağlayarak mukozayı korur.
- Sıcak ve soğuk besinleri vücut ısısına yaklaştırır.
- İçeriğinde yer alan bikarbonat sayesinde pH'ı nötrleştirir. Böylece dişlerin Ca⁺⁺ kaybetmesini önler.
- Besinleri ıslatıp yumuşatarak lokma haline getirir.
- Dişler üzerindeki kalıntıları temizleyerek diş sağlığına yardımcı olur.
- Susama duygusunun düzenlemesinde önemli rol oynar.
- İçerisinde bulunan lizozim maddesi bazı mikrop türlerine karşı öldürücüdür.
- Omnivorlarda (insan, rat ve domuz) ve karnivorlarda tükürükte bulunan pityalin (alfaamilaz) enzimi karbonhidratları dekstrinlere ve maltoza kadar parçalar.
- Kanda ve ekstrasellüler sıvıdaki cıva, kurşun, üre gibi toksik maddeler ile kuduz gibi hastalık etkenlerinin tükürme yoluyla dışarıya atılmasını sağlar.

Geviş getiren hayvanlarda rumende sindirimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gereklidir. Ruminantlarda tükürük ayrı bir öneme sahip olup içerisinde bulunan bikarbonat ve fosfat tamponları sayesinde rumenin pH'ını nötralize eder. Böylece rumendeki mikroorganizmaların yaşamaları için gerekli olan pH 6–7 değeri sağlanmış olur.

3.1.1.8. Damak (Palatum)

Ağız boşluğunun çatısını oluşturur. İki kısımdan meydana gelmiştir

- Sert damak (palatum durum): Ağıza yakın olarak bulunur. Kesici dişlerden genzin kenarına kadar devam eder.
- Yumuşak damak (palatum molle): Yapısında kemik olmayıp kaslar ve mukoza vardır.



Görsel 3.11: Sığırdamakta damak

3.1.1.9. Bademcikler (Tonsillea)

Özellikle ağız ve yemek borusu mukozasının değişik yerlerinde yer alan, vücuda giren mikroplarla mücadele eden oluşumlardır

3.1.1.10. Yutak (Farinks, Pharynx) ve Görevleri

Yutak, (farinks) ağız ve burun boşluklarının arkasında soluk ve yemek borusunun giriş kısımlarının önünde yer alır. Hava yolu ile yemek yolunun birbiri ile çaprazlaştığı yerdir. Boşluğuna, yutak boşluğu (kavum farinks) denir. Bu boşluğun duvarları yutağı oluşturur.

3.1.1.11. Yemek Borusu (Özefagus) ve Görevleri

Özofagus; yutak ile mide arasında bulunan kaslı, iç yüzeyi mukoza ile kaplı, boru şeklinde bir organdır. Önce gırtlak ve soluk borusunun üstünde (dorsal) seyreder. Göğüs boşluğundan (cavum pectoris) sonra diyaframdan (göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kaslı bölme) geçerek karın boşluğuna ulaşır ve midenin cardia adı verilen girişinde son bulur.

Özofagus dıştan içe doğru şu üç katmandan oluşmuştur:

- Adventitia tabakası (dış kat): En dıştan organı saran gevşek bağ dokudan yapılmıştır.
- Kas tabakası (orta kat): Yutulan lokmanın mideye sevk edilmesine yardım eder.
- Mukoza tabakası (iç kat): Çok katlı epitelden oluşan bir mukoza yapısına sahiptir.

Dil besinleri yutağa doğru iter. Bu sırada soluk borusu gırtlak kapağı ile kapatılır. Yutak ile mide arasında yemek borusu bulunur. Yutulan besinler yemek borusuna geldiğinde, yemek borusu peristaltik hareketlerle kasılarak besinin ilerlemesini sağlar. Olayda yerçekiminin de katkısı vardır.

Kanatlılarda kursak yemek borusunun genişlemesiyle oluşmuş torba şeklinde bir organdır. Başlıca görevi besinleri depolamak, ıslatmak ve yumuşatmaktır. Tavukta kursakta, bakterilerin etkisiyle önemli miktarda nişasta sindirimi olur.

3.1.1.12. Kanatlılarda Gaga Yapısı

Gaga, besinin tutulması, yakalanması, taşınması, parçalanması gibi işlemlerin yanı sıra düşmanlara karşı bir savunma aracı olarak da kullanılır ayrıca tüylerin düzeltilmesinde ve daha birçok işte kullanılır. Keratinden oluşan gaga, üst ve alt gaga olmak üzere iki kısımdır. Gaga kenarlarında çoğunlukla diş şeklinde çıkıntılar veya testere gibi tırtıklar bulunur. Alt gaga ise her iki alt çene kemiği uçlarının birleştiği gaga ucu ile çene kemikleri arasını örten, bazı türlerde yumuşak bir deriden oluşan gaga altından oluşur.

3.2. Besinlerin Alınışındaki Fizyolojik Olaylar

3.2.1. Açlık ve Tokluk

Besin maddesine karşı bir ihtiyacın ifadesidir. Mide dolu bile olsa açlık duyulabilir. Mideye besin değeri olmayan maddeler doldurulsa bile açlık duyumu ortadan kalkmaz. Açlığın, kanda bulunması gereken besin maddelerinin yetersiz düzeye inmesi sonucu sinir sisteminde oluşan karmaşık bir duyum olduğu kabul edilir. Mideden başka yollarla verilen besin maddeleri bu duyguyu giderebilmektedir.

Şeker hastalığında açlık duyumu hissedilir. Kanda şeker düşüklüğü (hipoglisemi) bir iştah uyarandır. Şeker hastalarında çok yemenin nedeni, kan glikozu yüksek olmasına rağmen yetersiz insüline bağlı olarak hücrenin şekeri yeterince kullanamamasından kaynaklanmaktadır.

Ateşli hastalarda besin alınmadığı hâlde açlık hissi azalır. Gebelik sırasında yağ, protein ve bazı minerallere olan ihtiyaç daha fazla artar. Bu nedenle böyle besinlere şiddetli istek duyulur. Canlıların açlığa dayanma süreleri, vücutlarında depo edilmiş yağın fazlalığına ve yaşlarına göre değişir. İyi beslenmiş köpekler su içerek 15 hafta kadar aç kalabilirler. Aç kalan canlılarda önce karbonhidratlar harcanır. Bunlar bitince sırayla yağlar ve en son proteinler kullanılır. Proteinlerin parçalanması kasların erimesi demektir. Bunu ölüm takip eder. Ölümden önce kanda azot artışı meydana gelir.

Açlığa bağlı olarak gelişen zayıflama sonucu kan plazmasında bulunan proteinler azalır ve ödemler görülür. Solunum sayısı artar ancak derinliği azalır. Beyne yeterli kan gidememesi sonucu bayılma görülür. Ayrıca besin alımı soğuk havada artar, sıcak havada azalır. Çevre, görme, koklama, tatma ile kazanılmış deneyimler de besin alımı üzerine etkili olur.

3.2.2. İştah

Bazı besin maddelerine karşı bir istek veya zevk duygusu olarak tanımlanabilir. Tok olduğu zamanda dahi hissedilebilir. Besinlere karşı iştah, hipotalamustaki beslenme merkezi ile doyma alanlarının karşılıklı ilişkisine bağlıdır. Beslenme merkezinin uyarılması hayvanlarda beslenme davranışını uyandırırken bu bölgenin harabiyeti sağlıklı hayvanlarda şiddetli iştahsızlığa (anoreksia) yol açmaktadır. Soğaniliğe gelen oksijenin yetersiz oluşu, enfeksiyonlar, karaciğer hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları gibi sebepler iştahsızlık doğurabilir.

3.2.3. Susuzluk

Susama da, iştah olayındaki gibi hipotalamusun denetimindedir. Ayrıca ağız ve yutak mukozasının kuruluşu susama duygusuna yol açar. Organizma; deri, solunum, ağız, dışkı ve idrar yollarıyla sürekli su kaybeder.

Kanın sıvı kısmı azalınca sinirsel ve hormonal yollarla susuzluk duyumu oluşarak organizma su içmeye zorlanır. Suyun vücutta tutulmasına yönelik fizyolojik mekanizmalar (terin ve idrarın azalması) devreye girer. Terleme, şiddetli kusma veya ishaller, kanamalar, mide ve bağırsak yangıları susuzluk duyumunun artmasına sebep olur.

Yapılan araştırmalar aşırı su tüketiminin zehirlenme ve ciddi fiziki sorunlara neden olduğunu ortaya koymuştur. Su zehirlenmesi denilen bu olay, kandaki sodyum oranının düşmesine (hiponatremi), hücrelerde aşırı sulanmaya ve beyin ödemine yol açmaktadır.

3.2.4. Besinlerin Ağıza Alınması

Besin alma organları: dudaklar, dişler ve dildir. Kedinin dilindeki papillalar besinin içeri itilmesine yardımcı olur. En etkin besin alma organı dişlerdir.



Görsel 3.12: Atta otlama

Atlarda dudaklar en önemli besin alma organıdır. Özellikle üst dudak çok hareketlidir. Dil ve dudaklar vasıtasıyla yemlerini alırlar. Sığırdan başlıca besin alma organı dildir. Uzun, kuvvetli ve pürüzlü yüzeye sahip olan dil, kolayca ağızdan dışarı çıkarılabilir.

3.2.5 Su İçme ve Süt Emme

3.2.5.1. Su İçme

Tektırnaklı ve geviş getiren hayvanlarda suyun alınması emme ile olur. Bunun için, ağız tamamen kapatılarak, dudaklar suyun içine daldırılır. Sığırlarda emilerek, ağza alınan su nefes vermeye geçmeden hemen yutulup işkembeye gönderilir.

Köpek ve kedilerde su içmede dil aktif rol oynar. Kedide yalama suretiyle su alım şekli daha çok görülür. Köpekler dillerinin serbest olan ucunu bir kaşık haline sokarak suyu ağızlarına alırlar.

İçilen su miktarı; ırk, yaş, kuru madde tüketimi, çevre ısısı, yem bileşimi, gebelik, süt verimi gibi faktörlere göre değişebilir. Süt ineklerinde sağımdan sonra su içme isteği artar.



Görsel 3.13: Atın su içmesi

3.2.5.2. Süt Emme

Yavrular süt emerken dil vasıtası ile ağız içinde negatif basınç oluştururlar. Dil ve damak arasına alınan meme başına, dil hareketleri ile atmosfer basıncından daha yüksek olan bir basınç uygulanır. Ağız içindeki negatif basınç değeri düşünce memedeki süt ağza çekilir.



Görsel 3.14: Buzayağıda süt içme refleksinin kontrolü

3.2.6. Çiğneme

Çiğneme ile büyük besinler küçük parçalara bölünür ve tükürük bezlerinin salgıları ile iyice karıştırılıp, yumuşatılarak yutmaya hazır hâle getirilir. Besinler küçük parçalara ayrılınca sindirim kanalı salgıları için geniş bir etkime yüzeyi oluşur ve sindirim kolaylaşır

Çiğneme, hareketsiz olan üst çene karşısında, alt çenenin hareketleriyle oluşturulur. Kesici dişler besinin kopartılması ve parçalanmasını, öğütücü dişler ise küçük parçalara öğütülmesine yarar. Çiğneme bütün hayvanlarda aynı önemde değildir. Etçillerde (karnivor) pekiyi yapılmadığı halde, otçullarda (herbivor) ve özellikle geviş getirenlerde özenle sürdürülür. Çiğneme istemli bir hareket olarak başlar, sonra da istem dışı (refleks) olarak devam eder.

Çiğneme sırasında dil, dudak ve yanaklar sürekli hareket hâindedir ve besini dişler arasında tutarlar. Yanak ve özellikle dudaklar besinlerin ağızdan dışarı dökülmesine de engel olur. Bu kasların sığırlarda iyi iş görememesi sebebiyle, bu hayvanlar çiğneme süresince başlarını yatay vaziyette tutarlar.

3.2.7 Yutma

Alınan besinlerin yutak ve yemek borusu yoluyla mideye gönderilmesi olayıdır. Yutmanın meydana gelmesinde çeşitli kaslar, sinirler, soğan ilikteki yutma merkezi ve yutaktaki çeşitli alıcılar rol oynar. Yutma isteğe bağlı bir hareket olarak başlar. Lokma yutak girişine ulaştığında ise refleks olarak devam eder.

Yutmaya hazır lokma, dilin ve yanakların uygun hareketleriyle, oluk biçimine getirilmiş olan dilin üstünde toplanır. Dilin yukarı geriye hareketleri ve sert damak üzerine yaptığı basınçla, yutak girişine gönderilir. Lokma yutak girişi mukozasına değer değmez yutma refleks olaya dönüşür.

Yutak bölgesinde uyarılar, alıcı sinirlerle soğan ilikteki yutma merkezine ulaştırılır. Merkezin uyarımı sonucu besinin soluk borusuna kaçmaması için gırtlaktaki epiglottis tarafından solunum yolu kapatılır. Yutak kaslarında oluşan peristaltik hareketler ile lokma yemek borusuna gönderilir. Yemek borusu kaslarında oluşan peristaltik kasılmalar besini yemek borusunun aşağı bölümlerine iletir.



Görsel 3.15: Yutma refleksi kullanılarak sonda ile hap yutturma

3.2.8. Kusma

Mideye girmiş olan zararlı maddelerden korunmak amacıyla veya tiksindirici maddelere karşısı oluşan reaksiyon sonucu mide içeriğinin ağız yoluyla dışarı atılmasına kusma denir.

Kusma, tükürük salgısında artış ve bulantı ile başlar. Geviş getiren hayvanlarda rumen ve retikulum içeriğinin kusulabildiği bilinmektedir. Kedi, köpek gibi etçil hayvanlar, acele yuttukları besinleri kolayca dışarı çıkarırlar. Tektırnaklılarda; mide girişindeki kasların, kravat benzeri yapısı ve midenin kardias ile piloris bölümlerinin birbirine yakın oluşu kusmaya engeldir. Atlarda kusma şekillenirse içeriğın burundan geldiği gözlenir ve mide yırtılmalarından şüphe edilir.

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	AĞIZ, DIŞ VE İŞTAH KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	FARKLI TÜR HAYVANLARDA YEM YEME, SU İÇME VE İŞTAH KONTROLÜ YAPMAK	12 DERS SAATİ

AMAÇ—Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Belediye barınağı, geçici hayvan bakımevi, veteriner klinikleri, süt ve besi üretim işletmelerine ziyaret planlanır.
- Ders öğretmeninizin nezaretindeki teknik ziyaretinizde çeşitli hayvan türlerinin yeme içme davranışlarını gözlemleyiniz.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş, fizyolojik durum ve kiloda olanların yeme içme davranışlarını gözlemleyiniz.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Canlı hayvan materyali (Kedi, köpek, koyun-keçi, at sığır)
- Dezenfektanlar.

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak;

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak canlı hayvana bakıcı veya yardımcı eşliğinde ziyaret planı oluşturunuz.
- Koyun ve keçi, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ve at çiftliklerinde;
- Serbest halde dolanan ve bağlı şekilde bakılan hayvanların yemlenme alışkanlıklarını izleyiniz ve farklılıkları not ediniz.
- Günlük rasyon uygulamalarını, yem karma makinelerinin kullanımını gözlemleyiniz.
- Yemleme esnasında ağız ve dil ile dişlerin hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığını gözlemleyiniz.
- Yeni doğum yapmış olan, ileri gebe, hastalık ve topallık geçiren hayvanların yemleme davranışlarının sürüdeki sağlıklı hayvanlara göre olan farklılıklarını gözlemleyiniz
Kedi ve köpeklerde;
- Sağlıklı hayvanlarda mama yeme esnasında dudak, dil ve dişlerin nasıl kullanıldığını gözlemleyiniz.
- Farklı fizyolojik durumdaki hayvanların yemleme alışkanlıklarını gözlemleyiniz.
- Yaş mama gibi kıvamları daha yumuşak olan yiyeceklerin yalama şeklinde nasıl tüketildiğini gözlemleyiniz.
- Tüm türlerde yeni doğan hayvanlarda emme refleksini kontrol ediniz
- Tüm türlerde su içme esnasında dudak, dil ve yanakların nasıl kullanıldığını gözlemleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						


3.3. Mide (Gaster, Ventriculus)

Mide yemek borusu ile bağırsak arasında yer alan torba şeklinde bir organdır. Karın boşluğunda genellikle orta (median) hattın solunda bulunur. Midenin yemek borusunun bağlandığı giriş kısmına cardia, on iki parmak bağırsağına (duodenum) bağlandığı çıkış bölümüne pylorus, ikisi arasında kalan bölümüne ise fundus adı verilir.

Mideler tek odacıklı ve çok odacıklı olmak üzere ikiye ayrılır. Tek odacıklı mideye sahip olan insan ve etçillerin mideleri hem tek odacıklı hem de sadece bezli (glandular) mukoza ile kaplıdır. Bu tür midelere basit mideler denir.

İnsan ve etçillerin midesi basit mide yapısındadır. Tek odacıklı olup tamamı bezle (glandula) kaplıdır. Tektırnaklı hayvanların midesi tek odacıklı olup hem bezli (glanduler) hem de bezsiz (kutan) mukoza ile örtülüdür. Bunlar tek odacıklı bileşik mide grubunda yer alır. Tek odacıklı midelerde; cardia, fundus ve pylorus olmak üzere üç bölge ayırt edilir.


Midenin bir yüzü karaciğere, dolayısıyla diyaframa; diğer yüzü bağırsaklara dönüktür. Tektırnaklılarda; mide girişindeki kasların, kravat benzeri yapısı ve midenin kardial ile piloris bölümlerinin birbirine yakın oluşu kusmaya engeldir. Atlar bu nedenle kusamazlar ve atlara kusturucu (emetik) ilaç verilmez. Et yiyicilerde ise bu bölgede lumen geniştir. Köpek, kedi gibi hayvanlar rahatlıkla kusabilir.



Görsel 3.16: Midenin yapısı


3.3.1. Çok Odacıklı Midelerin Yapısı

Geviş getirenlerin mideleri çok odacıklı olup 4 bölmelidir. İlk üçü bezsiz mukoza ile döşenmiş ve ön mide (proventriculus) adını almıştır. Dördüncü bölme bezli mukoza ile kaplanmış olup burası basit midenin karşılığıdır.



Görsel 3.17: Ruminant midesi

Bu odacıklardan ilk üçü ön mideler (proventriculus) olarak isimlendirilen işkembe (rumen), börkenek (reticulum) ve kırkbayır (omasum) adını alır ve bunların iç yüzünü döşeyen mukozada salgı bezi bulunmaz. Dördüncü mide olan şirden (abomasum) ise bezli mukoza ile kaplıdır ve tek odacıklı basit mideye karşılık gelir.



Görsel 3.18: Midenin bölümler

3.3.1.1. İşkembe (Rumen)


Diyaframdan kalça kemiğine (os coxae) kadar uzanır ve karın boşluğunun sol tarafını tamamen doldurur. İşkembe üzerinde değişik derinlikte oluklar bulunur. Rumen mukozası üzerinde bulunan çok sayıdaki küçük çıkıntılara papillae ruminis adı verilir.



Görsel 3.19: Papillae ruminisler

3.3.1.2. Börkenek (Reticulum)

Karın boşluğunun ön, sol kısmında, iškembe ile diyafram arasında bulunur. Bu bölümün kas tabakası iyi gelişmiştir. İç yüzünü döşeyen mukoza üzerinde yer alan crista reticuli isimli çıkıntılar birleşerek bal peteği görüntüsü oluştururlar.



Görsel 3.20: Reticulum

3.3.1.3. Kırkbayır (Omasum)


Karın boşluğunda, orta çizginin biraz sağında yer alır. İç yüzünde birbirine paralel laminae omasi adını alan çok sayıda yaprak bulunur.



Görsel 3.21: Omasum

3.3.1.4.Şirden, Mayalık (Abomasum)

Diğer türlerdeki basit midenin karşılığıdır. Orta hattın sağında yer alır.



Görsel 3.22: Abomasum

3.3.2. Midede Sindirim

Mideye gelen besinlerin bir kısmı midede sindirilir. Midede sindirim hayvan türlerinde farklılık gösterir. Midenin şekil ve fonksiyonları bakımından ikiye ayrılır.

- Geviş getirmeyenlerde (tek odacıklı) sindirim, geviş getirenlerde (çok odacıklı) sindirim
- İnsan, etçil hayvanlar ve tektırnaklılar birinci grupta; sığır, koyun, keçi, deve, manda ve lama gibi hayvanlar da ikinci grupta yer alır.

3.3.2.1. Midenin Görevleri

- Besinlerin vücut ısısına yaklaşmasını sağlar.
- Yutulan besinleri depo eder.
- Salgıladığı hidroklorik asit nedeniyle zararlı mikroplarla savaşır.
- Besin maddelerinin mide salgısıyla karışmasını sağlar.
- Peristaltik kasılmalarla besin maddeleri mide salgılarıyla karıştırılır.
- Besin maddelerinin sindirim ve emilim için uygun bir hızda bağırsağa iletilmesini sağlar.

Mide sıvısıyla karışmış ve sindirime uğramış besin maddesi kütesine kimus denir. Karbonhidrat bakımından zengin besinler mideyi birkaç saatte terk eder. Proteinden zengin olanlar daha yavaş terk eder. Mideyi en yavaş terk edenler ise yağ bakımından zengin olanlardır. Diyetteki besinlerin yağca zengin olması uzun süreli tokluk hissi verir.

Midede sindirim kimyasal ve mekanik olarak yapılır.

3.3.2.2. Midede Kimyasal Sindirim

Nişasta (karbonhidrat) ağızda tükürük amilazı (pityalin) tarafından parçalanır. Pityalinin etkisi besinler mideye girdikten bir süre sonrada devam eder. Pityalin aktivitesi hidroklorik asit salgısı ile durdurulur. Amilaz enzimi en ideal pH 6-7'de etkir. Mideden yağların sindiriminde görevli olan lipaz enzimi salgılanır; fakat yağların asıl sindirimi ince bağırsaklarda olur.

Mide Asidinin (HCl) Görevleri

- Mide antiseptiği olarak görev yapar
- Protein sindiriminde görev alır
- Sütün proteinini (kazeinojen) kazein hâlinde çökeltir.
- Demiri emilebilir hâle getirir.

3.3.2.3. Midede Mekanik Sindirim (Mide Hareketleri)

Mide duvarındaki düz kas katmanları sindirim sırasında besinlerin parçalanarak, mide öz suyu ile karışmasını sağlamak amacıyla bazı kasılmalar (kontraksiyon) yapar. Midenin dolmasından hemen sonra midenin kas tabakası kasılmaya başlar ve mide boşluğunu küçültür. Böylece besin maddeleri mekanik olarak parçalanır ve mide enzimleriyle karışır. Düz kaslar, sinirsel uyarıların etkisiyle peristaltik hareketler yapar. kimusun onikiparmak bağırsağına geçmesini sağlar.

3.3.3. Tek Odacıklı Midelerde Sindirim

Mide mukozası altında, derine yerleşmiş birçok salgı bezi yer alır. Bu bezler buldukları mide bölümüne göre cardia, fundus ve pyloris bezleri olarak isimlendirilir. Bu bezlerde üç farklı hücre grubu bulunur:

- **Mukoid hücreler:** Cardia, pyloris, fundus bezlerinde bulunur. Musin salgılar.
- **Kenar hücreler:** Fundus bezlerinde bulunur. Hidroklorik asit salgılar.
- **Esas hücreler:** Fundus, pyloris bezlerinde bulunur. Pepsinojen, rennin, lipaz, amilaz gibi mide enzimlerini salgılar.

Mide enzimlerinden rennin enzimi daha ziyade bebeklerde ve yavru hayvanların midesinde bulunur. Sütün kazeinini pıhtılaştırır. Bu şekilde kazeinin sindirilmesi kolaylaşır. Mide enzimlerinden en önemlisi pepsinodendir. HCl etkisiyle pepsine dönüştürülür. Pepsin proteinlerin sindiriminde görev alır.

3.3.4. Çok Odacıklı Midelerde (Geviş Getirenlerde) Sindirim

Otçul hayvanlar grubunda yer alan ve mideye gönderilen besini tekrar ağıza getirerek çiğneyenlere geviş getiren hayvanlar (ruminant) denir. Bunlar; sığır, koyun, keçi, bizon, manda, gergedan, geyik, karaca, ceylan, zürafa, antilop gibi çift tırnaklı hayvanlardır.

Ruminantlarda mide, dört bölmeli olup üç bölmeli bir ön mide (proventriculus) ile tek mideli hayvanlardakine benzeyen gerçek mideden oluşur. İşkembe (rumen), börkenek (reticulum) ve kırkbayır (omasum) olarak isimlendirilen ön midelerde sindirim bezleri yoktur. Sindirim bezleri gerçek mide olan şirdende (abomasum) bulunur. Ön midelerde mikroorganizmaların etkisiyle meydana gelen kimyasal olaylara işkembede mayalanma (rumen fermentasyonu) denir.



Görsel 3.23: Ruminat midesi

Bitkilerin başlıca karbonhidratı olan selülozun sindirimi, ancak ot yiyen hayvanların sindirim kanalında bulunan mikroorganizmalarla bu hayvanlar arasında simbiyotik (ortak yaşam) iş birliği ile gerçekleşmektedir. Rumen mikroorganizmaları bakteriler, protozoonlar ve maya mantarlar olmak üzere üç grupta toplanır.

Rumendeki bakteri populasyonunun sayısı çok yüksek olup besinlerin bileşimine (rasyon) ve mevsimlere göre değişir. Rumen sıvısında ortalama rumen içeriğinin % 5-10'u kadar bakteri kitlesi bulunduğu kabul edilir. Bu da ortalama 3-7 kg taze bakteri kitlesine karşılıktır. Rumendeki bakteri ve protozoon sayısı yemlemeye bağlı olarak değişir. Saman ve kuru ot gibi selülozca zengin yemlerin tüketilmesi hâlinde 1ml rumen sıvısında 9-15 milyar bakteri bulunmasına karşın, nişastaca zengin besinlerin tüketilmesi hâlinde bu sayı 5 katına kadar yükselebilmektedir.

3.3.5. Geviş Getirenlerde Mide Hareketleri

3.3.5.1. Rumen ve Reticulum Hareketleri

Rumende kuvvetli kas hareketleri sayesinde rumen içeriği ile yenilen yemler sürekli karışır ve mekanik olarak parçalanır. Midenin bu iki bölmesinin hareketleri birbiriyle uyumlu biçimde sürdürülür. İçeriğin ağza getirilip gevişmeyi sağlamak, fermentasyon sonucu oluşan gazları geçirmeye dışarı atmak ve bu iki mide bölümünde sindirilen besinlerin omasuma iletilmesine yardım etmek bu hareketler sayesinde gerçekleştirilir.

Rumen hareketleri rumenin ön bölümünden başlayıp arka tarafına doğru hareket eden solucanımsı (peristaltik) hareketlerdir. Rumen içeriğinin yer değiştirmesini sağlar. Retikulum hareketleriyle uyumlu çalışır. Rumen hareketleri ile uyum içinde bulunduğu rumen kasılma (sistol) hâlindeyken retikulum gevşeme (diastol) hâlinindedir.

Rumen hareketleri dışarıdan hissedilebilir. Sol açıklık çukurluğu bölgesine yumrukla bastırılarak veya stetoskolla sayılabilir. 5 dakikadaki rumen kasılma sayısı sığırlarda 7-12, koyunlarda 7-14 kadardır. Omasuma gelen besinler mukoza dörümleri (lamina omasi) arasında sıkıştırılarak daha küçük parçalara ayrılır. Sıvı kısmı emilen içerik bezli mideye gönderilir.

Geviş getirenlerin bez içeren ve enzim salgılayan mide bölümü olan abomasumdaki hareketler basit mideli hayvanların midesine benzemektedir. Ritmik ve peristaltik hareketler görülür. Bu

hareketler sayesinde içerik onikiparmak bağırsağına geçer. Azotlu maddelerin sindirimi sonucu oluşan son ürün amonyaktır.

3.3.6. Geviş Getirme (Ruminasyon)

Geviş getirme; geviş getiren hayvanlarda rumen içeriğinin yeniden ağza getirilmesi, içeriğin sıvı kısmının yutulması, geri kalan kısmın tükürükle karıştırılarak çiğnenmesi, oluşturulan lokmanın yeniden yutulması gibi mekanik hareketleri kapsayan karışık bir refleks olayıdır. Sığırlar geviş getirmeye günün üçte biri kadar zaman harcar. Kaba yem geviş getirmeye ayrılacak süreyi artırmaktadır. Kaba yemler hafif olup üstte bulunur ve fermentasyon sonucu oluşan gazların da katılmasıyla daha da hafifler. Ağıza geri getirilenlerin önemli kısmını, rumen sıvısının yüzeyinde bulunan bu kaba maddeler oluşturur. Dışarıdan yeni alınan yemler belirli bir fermentasyona uğramadan ruminasyona katılmazlar.

3.3.7. Geğirme (Ruktus, Gaz çıkarma)

Besinler ağızda çiğnenirken besin içinde bir miktar hava hapsolür. Yutkunma esnasında yutakta kalan solunum havasıyla birleşir ve mideye götürülür. Mideye giden gazlar yemek borusu yoluyla ağız boşluğundan geri atılır. Buna geğirme (ruktus, gaz çıkarma) denir.

Rumendeki fermentasyon olayları sırasında oluşan gazların büyük bir kısmı (karbondioksit, metan) geğirme ile dışarı atılırlar. Bir kısmı rumen duvarından emilir, az bir kısmı da bağırsaklar yoluyla dışarı çıkartılır.

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	MİDE KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	FARKLI TÜRDEN HAYVANLARA AIT MİDELERİN ANATOMİK YAPISINI MAKET YA DA KESİLMİŞ HAYVANLAR ÜZERİNDE İNCELEMELİK	8 DERS SAATİ

AMAÇ –Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Mezbaha ve üniversitelerin anatomi laboratuvarlarına teknik ziyaret düzenlenir ya da kadvralara ait materyaller laboratuvara getirilir.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde farklı hayvan türlerine ait
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş, kiloda olanların mide yapılarını inceleyiniz.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Kadavra karkas ve kesilmiş hayvana ait iç organlar
- Dezenfektanlar.
- Bistüri sapı, neşter ve pens.

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak;

- Kişisel hijyen kurallarına uyarak kadavra ve karkas üzerinde mide yapılarını temiz bir masa üzerine alarak inceleyiniz.
 - Tek mideli hayvanlarda
 - Kardia, fundus ve pylorus bölgelerini inceleyiniz.
 - At kadavrası üzerinde, atların kusmasını engelleyen cardia sphincterini inceleyiniz.
 - Fundus yapısına kesit atarak mide mukozasını inceleyiniz.
 - Ruminantlarda
 - Ön mideler ve abomasumun yerleşim yerlerini inceleyiniz.
 - Geviş getirenlere ait mide kompartımanlarına ayrı ayrı kesit atarak içeriklerini inceleyiniz ve mukozalarında yer alan papillaların arasındaki şekil farklılıklarını inceleyiniz.
 - Yeni doğan ruminant kadavrasında spesifik abomasum içeriği görüntüsü olan sütün peynirleşmesini gözlemleyiniz.
 - Yeni doğan ruminant kadavrasında ön midelerin erişkin ruminantlara göre farklılıklarını inceleyiniz.

Tüm hayvan türlerinde gıdaların aktarımının yapıldığı organlar arası geçiş deliklerini inceleyiniz. Geçişlerde tıkanma yapabilecek yabancı cisimlerin varlığını gözlemleyiniz.



Beslenme eksikliğine bağlı tüy yeme davranışı gösteren bir hayvanın midesinde çıkarılan tüy topakları.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

3.4. Bağırsak ve Defekasyon Kontrolü

Sindirim olayları ince bağırsaklardan sonra kalın bağırsaklarda devam ederek posanın defekasyonla anüsten dışarı çıkarılmasıyla son bulur.

3.4.1. Karın Boşluğu ve Periton

Karın boşluğu (cavum abdominis), diyaframdan leğen boşluğunun (cavum pelvis) girişine kadar devam eder. Karın boşluğunun iç duvarı ve bu boşluktaki karın iç organları bir zarla örtülür. Bu zara periton denir. Periton organları birbirlerine ve karın boşluğunun duvarına bağlayan asıcı bağları oluşturur. Bağırsakların asıcı bağlarına mesenterium, midenin asıcı bağlarına omentum denir.



Görsel 3.24: Omentum

3.4.2. Bağırsaklar

Bağırsaklar, sindirim sisteminin mide ile anüs arasında kalan kısmıdır. İnce bağırsak ve kalın bağırsak olmak üzere iki ana kısımdan oluşur.

İnce bağırsak üç kısma ayrılır:

- Onikiparmak bağırsağı (duodenum)
- Boş bağırsak (jejunum)
- Kıvrık bağırsak (ileum)

Kalın bağırsak da üç kısma ayrılır:

- Kör bağırsak (cecum)
- Sütun bağırsak (colon)
- Düz bağırsak (rectum)

Bağırsaklar, besin maddelerinin enzimlerin etkisiyle küçük moleküllü yapı taşlarına ayrılarak emiliminin gerçekleştiği sindirim kanalının önemli bir bölümüdür.



Görsel 3.25: Bağırsaklar

Bağırsak mukozası ayrıca mikrovillus adı verilen ve emilim yüzeyini daha da artıran mikroskobik kıvrımlara sahiptir.

Kalın bağırsak, simbiyoz yaşamın görüldüğü birkaç çeşit bakteriye ev sahipliği yapar. Bu bakteriler aynı zamanda bağırsakta gaz üretiminin de nedenidirler. Kalın bağırsak ince bağırsağa oranla daha kısadır ve büyük oranda suyun geri emiliminden sorumlu olup dışının koyu kıvrımlı olmasını sağlar. Kalın bağırsaklarda uzun süre kaldığı durumlarda dışı katılaşır ve kabızlığa yol açar.



Görsel 3.26: Bağırsaklar

3.4.3. Karaciğer (Hepar) ve Safra Salgısı

Karaciğer, geviş getirenlerde karın boşluğunun önünde ve sağ tarafında, diğer hayvanlarda biraz daha sola geçmiş şekilde diyaframa yaslanmış olarak bulunur. Yassı, koyu kırmızı, esmer renkli bir organdır.

3.4.3.1. Karaciğerin Görevleri

Karaciğerin ürettiği safra onikiparmak bağırsağına akıtılarak yağların emilimini sağlar. Kolesterol sentezinde görev alır.



Görsel 3.27: Karaciğer

Yaşlanan alyuvarların parçalanması sonucu açığa çıkan hemoglobin biliribine (safra pigmentleri) çevrilir. Glikozun fazlası karaciğer hücrelerinde glikojene çevrilerek depo edilir. İhtiyaç hâlinde tekrar glikoza çevrilip kan dolaşımına verilir.

- Dalaktan sonra en çok kan depo eden organdır.
- İlaç ve zehirlerin etkisiz hâle getirilmesinin gerçekleştiği organdır.
- Üre sentezinde görev alır.
- Yağ metabolizmasında (kolesterol yapımı) görev alır.
- Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan maddeleri sentezler.

3.4.3.2. Safra Salgısı

Karaciğer hücreleri tarafından yapılan safra, ince bağırsağa salınmadan önce safra kesesi adı verilen karaciğere yapışık olan içi boşluklu bir organda depo edilir. Safra bir kanal aracılığı ile onikiparmak bağırsağına akıtılır. Tektırnaklı hayvanlar, deve, fil, zürafa, geyik, güvercin ve papağan gibi hayvanlarda safra kesesi bulunmaz.



Görsel 3.28: Safra kesesi

Safra yeşilimsi sarı renkte koyuca bir sıvıdır. Tadı acı olup alkali reaksiyon verir. Safra alyuvarların yapısında bulunan hemoglobinden sentez edilir.

3.4.3.3. Safranin Görevleri

- Pankreas salgısındaki lipaz enziminin etkinliğini artırır.
- Bağırsakları daima nemli ve yumuşak tutarak emilmeyi kolaylaştırır.
- Vücuttaki bazı toksik maddeler safrayla bağırsaktan dışarı atılır.
- Safra iyi bir bağırsak antiseptiğidir.

3.4.4. Pankreas

Midenin ve karaciğerin gerisinde, omuriliğin altında, onikiparmak bağırsağının üstünde bulunan, açık pembe renkte, bezli bir organdır.

Görevi: Pankreas hem iç salgı (endokrin) hem de dış salgı (ekzokrin) bezi olarak görev yapar. Endokrin bez olarak insulin ve glukagon adındaki hormonları salgılar. Bu hormonlar karbonhidrat (şeker) metabolizmasında önemli rol oynar. İnsulin kan şekerini düşürürken glukagon ise kan şekerini yükseltir. Dış salgı bezi olarak, gıda maddelerini parçalayıcı etkisi olan enzimleri üretir. Karbonhidrat, protein ve yağların sindiriminde etkili olan enzimleri salgılayarak bir kanal vasıtasıyla onikiparmak bağırsağına akıtır.

3.4.5. Bağırsak Hareketleri

İnce bağırsaklarda, bağırsak içeriğini yoğuran ritmik segmentasyon hareketi (boğumlama) ile kanalda ilerlemesini sağlayan peristaltik (solucanvâri) hareketler görülür. Kalın bağırsaklarda ise besin artıklarını dışarı atım öncesi kanalda depo edilmesini kolaylaştırıcı ters (anti) peristaltik hareketler gözlenir.

3.4.6. Dışkılama (Defekasyon)

Dışkının kalın bağırsaklar aracılığıyla anüsten dışarı atıldığı bir refleks olayıdır. Rektumun dışkıyla gerilmesi, kas tabakasında refleks olarak kasılma ve dışkılama isteğini doğurur. Hayvanlarda defekasyon sayısı yedirilen yemin miktarına ve çeşidine bağlı olarak değişir. Atlar ahır beslenmesinde günde 10 – 12, çayır beslenmesinde 16 – 17 kez defekasyon yaparlar. Ot yiyen hayvanlar yenilen yem miktarına ve çeşidine bağlı olarak günde 10–20 kez, et yiyenler ise 2-3 günde bir dışkılarlar.

Dışkılama sırasında hayvanların davranışları farklıdır. At ve sığırlar yürürken, kedi ve köpekler ise durarak dışkılar. Sığırlar yatarken dışkılayabilir. Koyun hariç dışkılama sırasında kuyruk genellikle yukarı kaldırılır.

3.4.6.1. Kabızlık (Konstipasyon)

Çıkarılan dışkının sert ve kuru olması ile miktarının azalması durumuna kabızlık (konstipasyon) denir. Konstipasyon, çoğunlukla bağırsak hareketlerinin azalması ve bağırsak içeriğinin yer değiştirmesinin engellenmesine bağlı olarak oluşur.

Kabızlığın uzun süre devam etmesi halinde otointoksikasyon ve sepsis sonucu ölüm şekillenebilir. Geviş getiren hayvanlarda ön midelerde omasuma (kırkbayır) gelen içeriğin, suyunun çekilmesi sonucu omasum yaprakları arasında sıkışıp kalması, sertleşmesi ve normal sindirim kanalı yolunu izleyememesi sonucu gelişen ciddi bir sindirim kanalı durgunluğudur. Ölümle dahi sonuçlanabilir.

3.4.6.2. İshal

Bağırsak hareketlerinin artması ve bağırsakta emilimin azalmasına bağlı olarak bağırsak içeriği sulanır. Hayvanın sık ve sulu defekasyon yapması durumuna ishal (diyare) denir. Ishalle birlikte ıkınma (tenesmus) gözlenir.

Süt sığırlarında seyrek olmakla beraber, buzağılarda sıkça gözlenen ishal, aşırı su kaybı ve süt düşmeleri ile buzağılarda gelişme bozukluklarına yol açan önemli bir rahatsızlıktır. Büyükbaş hayvanlarda ishalin oluşma nedenleri

- Hayvanlarda alışma süresine tabi tutulmadan yapılan ani yem değişiklikleri,
- Fazla miktarda fabrika yemiyle birlikte az miktarlarda saman (silaj) yedirilmesi. Saman, silaj gibi yemlerin kesim uzunluklarının çok kısa olması (Örneğin, mısır silajının çok ufak doğranmış olması veya kuru otun patozdan geçirilmesi) ve bununla birlikte partikül büyüklüğü çok ufak toz yemlerin yedirilmesi,
- Fabrika yemine ilaveten hayvanlara kırılmış tahılların fazla miktarda yedirilmesi,
- Pelet fabrika yemleri arasında yapılan ani geçişler,
- Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman, silaj gibi yemler ile fabrika yemlerinin yedirilmesi,
- Buzağılara doğumu takiben fazla miktarda ağız sütü veya normal süt verilmesi,
- Buzağılara süttten kesilmeyi takiben fazla miktarda ve aniden fabrika yemi yedirilmesi,
- İneklerde ve buzağılarda gözlenen ve ishale neden olan mikrobiyal ve paraziter hastalıklar ishalin oluşma nedenleridir.

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	BAĞIRSAK KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	FARKLI TÜRDEN HAYVANLARA AIT BAĞIRSAKLARIN ANATOMİK YAPISINI MAKET YA DA KESİLMİŞ HAYVANLAR ÜZERİNDE İNCELEMELİK.	6 DERS SAATI

AMAÇ –Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Farklı hayvan türlerine ait bağırsak yapıları hakkında ön bilgi toplayınız.
- Mezbaha ve üniversitelerin anatomi laboratuvarlarına teknik ziyaret düzenlenir ya da kadavralara ait materyaller laboratuvara getirilir.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde bağırsak yapılarını inceleyiniz.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş, kiloda olanların bağırsak yapılarını inceleyiniz.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Kadavra karkas ve kesilmiş hayvana ait iç organlar
- Dezenfektanlar.
- Bistüri sapı, neşter ve pens.


3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak;

- Kişisel hijyen kurallarına uyarak kadavra ve karkas üzerinde bağırsak yapılarını temiz bir masa üzerine alarak inceleyiniz.
- Pylorus bölgesinden başlayarak ince bağırsağa ait olan duodenum, jejunum ve ileum kısımlarını tespit ediniz.
- Kalın bağırsağa ait cecum colon ve rectum kısımlarını tespit ediniz.
- Hayvan türlerine ait ince bağırsak ve kalın bağırsak kısımlarının uzunluklarını ölçünüz.
- İnce bağırsak ve kalın bağırsaklara longitudinal kesit atarak mukoza yapılarını inceleyiniz.
- Kesilmiş hayvanlara ait bağırsak segmentlerini incelerken mukoza ve dışkı içeriğine ait renk değişimi, kanama gibi farklılıkları gözlemleyiniz.



Görsel 3.26: Normal bağırsağa ait görüntü



Görsel 3.29: Kanamalı bağırsağa ait görüntü



Görsel 3.30: Kanamalı bağırsağa ait mukoza görüntüsü.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNDİRİM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	BAĞIRSAK KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	ÇEŞİTLİ TÜRDEN HAYVANLARDA DEFEKASYON KONTROLÜ YAPMAK	4 DERS SAATİ

AMAÇ –Canlı hayvan üzerinde sindirim sistemi organlarını kontrol etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Canlı hayvan üretim işletmelerine, veteriner klinikleri ve hayvan barınaklarına teknik ziyaret düzenleyiniz.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde farklı hayvan türlerinin dışkılama esnasında aldığı pozisyonlar ıkınma konusunu gözden geçiriniz.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş, kiloda olanların mide yapılarını inceleyiniz.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, rektal eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük.
- Canlı hayvanlar
- Dezenfektanlar.

3. İŞLEM BASAMAKLARI

- Ders öğretmeninizden ve ziyaret ettiğiniz yerdeki sorumlu kişilerden yardım alarak;
- Canlı hayvanları zapturapt altına alınız.
- Eldiven takınız.
- Büyük hayvanlarda rektal palpasyon, küçük hayvanlarda rektal tuşa tekniğine uyarak dışkı alınız.
- Farklı türden hayvanların normal durumdaki dışkılarının şekil, renk ve kıvamlarını gözlemleyiniz.
- Farklı türdeki hayvanların dışkılarının renk, kıvam, dışkıdaki su miktarı ve dışkılama miktarını gözden geçiriniz.
- Serbest halde dışkılama yapan hayvanların dışkılama esnasında aldığı pozisyonları gözlemleyiniz.
- Dışkılama esnasındaki ıkınma, ağrı duyusu, ishal gibi durumları gözlemleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	60	20	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

HAYVAN SEVGİSİ

Her gün çevremizde birçok sokak hayvanı görüyoruz ve yanlarından geçip gidiyoruz. Bir nevi görmezden geliyoruz. Belki de o hayvanlar karşımıza çıkarak bu dünyada yalnız yaşamadığımızı, onlarla doğayı paylaştığımızı bizlere hatırlatıyorlar. Bizim barınabileceğimiz evlerimiz, canımız istediğinde karnımızı doyurabileceğimiz yiyeceklerimiz olmasına rağmen onların çok büyük kısmı bunlara sahip değil. Hatta bu hayvanların bir kısmının hayatı insanlar tarafından zor koşullara sokuluyor. Onların konuşamaması, kendilerini anlayacağımız şekilde ifade etmemeleri, acı çekmedikleri anlamına gelmiyor. Onlar bizim üzerlerinde acımasızlıklarımızı test edeceğimiz denekler ya da bizi eğlendirecek kuklalar değiller. Birazcık empati kurmamız bizim için de iyi olabilir. Çünkü onlar da canlı ve başka canlıları düşünmek insanı daha iyi hissettirir. Belki de bir toplumun, o toplumda yaşayan hayvanlara verdiği önem, o toplumun gelişkinlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan önemli bir göstergedir.

Yapılan araştırmalara göre hayvanları sevmeyen insanların çok büyük bir kısmının insanlarla ilişkilerinin de çok sağlıklı olmadığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda doğanın geri kalanıyla insanların kurmuş olduğu ilişkinin ruhsal terapi yerine geçtiği de bilinmektedir. İnsanın düşünebiliyor olması onu dünyanın en güçlü varlığı yapmıştır; ancak bu gücü pek de olumlu kullandığımız söylenemez. Avcılıkta beslenme amacının dışına çıkmış, birçok hayvanın neslini tüketecek hale gelmiştir. Sokakta bizimle yaşayan dostlarımızı şiddet, keyfi zehirlenme ve önce evcil olmak sonra doğaya salınmak gibi birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Hayvan hakları ya da bu konuda çalışan birçok kuruluş olmakla birlikte hep birlikte bir bilinçlenme olmadan bu sorun devam edecektir

Peki, ne yapabiliriz sorusunun birçok cevabı olmakla birlikte ilk elden şunların yapılabileceği düşüncesindeyiz

1. Hayvanlar için barınakların sayısı ve kalitesi artırılabilir.
2. Özellikle kış günleri için yiyecek, yaz günleri için ise içme suyu temin edebiliriz.
3. Hayvanları bir alım-satım malzemesi olarak görmek yerine sokakta yaşayan onlarca hayvanın sahiplendirilmesine olanak sağlanmalıdır.
4. Eğitim müfredatlarında daha fazla doğa ve hayvanlarla ilgili konu yer alabilir.

Ve unutmayalım ki bu dünya yalnızca bizim değil, bir gün yalnız kalmak istemiyorsak dostlarımıza iyi davranalım.

Sizce yukarıda yazılan yapılabilecekler neler eklenebilir?

Fikirlerinizi buraya yazarak arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

- 1) Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalını oluşturan organlardan değildir?
 - A) İleum
 - B) Rectum
 - C) Larynx
 - D) Lingua
 - E) Rumen

- 2) Ağız boşluğunu çevreleyen ve içinde yer alan organlardan değildir?
 - A) Palatum molle
 - B) Bucca
 - C) Dentes
 - D) Trachea
 - E) Hiçbiri

- 3) Aşağıdakilerden hangisi dişlerin çenede tespitine yarayan oluşumların tanımı için doğrudur?
 - A) Dentes
 - B) Gingiva
 - C) Mandibula
 - D) Maxilla
 - E) Bucca

- 4) Dişlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 - A) Kesici dişler (dentes incisivi)
 - B) Köpek dişleri (dentes canini)
 - C) Ön öğütücü dişler (dentes premolares)
 - D) Arka öğütücü dişler (dentes molares)
 - E) Hepsi

- 5) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 - A) Yutma esnasında yemin tracheaya kaçmasını önlemek için kapanan kapağa papilla denir.
 - B) Dil; apex lingua, corpus lingua ve radix lingua olarak 3 kısma ayrılır.
 - C) Saliva akıntısı, glandula salivares'lerde üretilir ve kanallar aracılığıyla cavum oris'e aktarılır.
 - D) Tükürük salgısının pH'sı 6,2-7,4 arasında değişir.
 - E) Hepsi

- 6) Tükürük içinde bulunan hangi madde mikropların öldürülmesinde etkilidir?
 - A) Pityalin
 - B) Lizozim
 - C) Kalsiyum
 - D) Bikarbonat
 - E) Hiçbiri

7) Midenin giriş ve çıkış delikleri hangisinde doğru adlandırılmıştır?

- A) Pectoris – Pharynx
- B) Cardia – Fundus
- C) Cardia – Pylorus
- D) Diaphragma – Pylorus
- E) Hiçbiri

8) Açlık ve tokluk duyumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Mide dolu olsa bile besin değeri olmayan maddelerle doluluktan dolayı açlık ortadan kalkmaz.
- B) Hiperglisemi, bir açlık uyarandır.
- C) Ateşli hastalıklarda besin alınmadığı halde açlık hissi azalır.
- D) Açlık neticesinde zayıflama ve sonrasında kan plazmasında bulunan proteinler azalır ve vücutta ödemler görülür.
- E) Hiçbiri

9) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) Beynin hipotalamusundaki açlık merkezinin harabiyeti neticesinde açlık duyumu ortadan kalkar.
- B) Susuzluk neticesinde suyun vücutta tutulmasını sağlamak için, vücutta terlemenin ve idrarın artması durumu görülür.
- C) Organizma sadece idrar yoluyla vücuttan su kaybeder.
- D) Mide ve barsak enfeksiyonları gibi ateşli hastalıklarda su içme isteği artar.
- E) Hepsi

10) I. Yenidoğan ruminantlarda emilen sıvılar direkt olarak abomasuma geçer.

II. Süt ineklerinde sağımdan sonra su içme isteği artar.

III. Köpekler dillerini kaşık şeklinde suya sokarak su içerler.

IV. İçilen su miktarı hayvanın türü, yaş ve fizyolojik faktörlerine bağlı olarak değişir.

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur?

- A) I- III
- B) I-II
- C) I-III-IV
- D) I-II-III-IV
- E) II-IV

11) I. Otçul canlıların besinleri çiğneme süresi etçillere göre daha kısadır.

II. Yutma başta istemli bir hareket olarak başlar reflex (istemsiz) olarak devam eder.

III. Sindirim sistemi kaslarında oluşan peristaltik hareketler besinlerin sindirim kanalı boyunca iletimini sağlar.

IV. Atların cardia bölgesinin yapısı gelişigüzel kusmalara elverişlidir.

V. Sığırlarda geviş alma esnasındaki tükürük salgısı iştahın önüne geçilmesi açısından tampon rol oynar.

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri yanlıştır?

- A) I – II
- B) II – IV
- C) II - III - V
- D) I – IV
- E) III-V

12) Sindirim kanalı bölümleri ile ilgili verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?

- A) Cardia – Fundus – Pylorus
- B) Rumen – Retikulum – Omasum – Abomasum
- C) Cecum – Colon – Rectum
- D) Pharynx- Cavum oris – Oesophagus
- E) Hepsi

13)

- İlaç ve zehirleri etkisiz hale getirir.
- Yaşlanan alyuvarların parçalanması sonucu açığa çıkan hemoglobini, bilirubine çevirir.
- Üre sentezinde ve kolesterol metabolizmasında görev alır.
- Glikozu, glikojene çevirerek depo eder ve ihtiyaç halinde dolaşım kanına verir.
- Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeleri sentezler.

Yukarıda verilen bilgilere göre sözü edilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Omasum
- B) Abomasum
- C) Karaciğer
- D) Dalak
- E) Böbrek

- 14) 1. İyi bir barsak antiseptiği olan salgısıyla lipazın etkinliğini artırır.
2. İnsülin ve glukagon hormonlarını salgılayarak şeker metabolizmasında rol oynar.
3. Vücutta zehir ve ilaçların etkisiz hale getirilmesini sağlar.

Yukarıdaki sıralamaya göre sözü edilen organlar hangileridir?

- | | 1 | 2 | 3 |
|----|--------------|--------------|--------------|
| A) | Safra kesesi | Karaciğer | Abomasum |
| B) | Dalak | Safra kesesi | Abomasum |
| C) | Karaciğer | Dalak | Safra Kesesi |
| D) | Safra Kesesi | Pankreas | Karaciğer |
| E) | Hiçbiri | | |


15) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Defekasyon sayısı yedirilen yemin niteliğine ve miktarına bağlı olarak değişir.
- B) Sığırlar yatarken dışkılayabilirler.
- C) Koyunlar dışkılarırken kuyruğunu havaya kaldırmazlar.
- D) Sık sık ve sulu defekasyon gerçekleşmesi olayına tenesmus denir.
- E) Hepsi

HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ



ÖĞRENME BİRİMİ 4: HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ



KONULAR

1. Solunum Sistemi

2. Dolaşım Sistemi

TEMEL KAVRAMLAR

Solunum
İnspirasyon
Ekspirasyon
Öksürük
Akciğer
Dolaşım
Kalp, nabız, kan hücreleri
Lenf sistemi ve lenf bezleri
Salgı bezleri ve hormonlar

Bu öğrenme biriminde;

- Solunum sistemini oluşturan organları,
- Solunum sistemini oluşturan organların yapısını ve görevlerini,
- Göğüs boşluğu ve pleurayı,
- Solunumun mekaniğini, solunum tiplerini,
- Solunum hareketlerinin kontrolünü,
- Üst solunum yolu organlarının kontrolünü,
- Göğüs kafesi ve akciğerlerin kontrolünü,
- Hayvanlarda dolaşım sistemini,
- Kalbin göğüs boşluğundaki konumunu,
- Kalbin iç ve dış yapısını,
- Kalp kapaklarını ve damarlarını,
- Kalbin çalışmasını, büyük ve küçük kan dolaşımını, kalbin uyarı ve ileti sistemini,
- Kanın bileşimi ve görevlerini,
- Nabız, kan basıncı, büyük ve küçük tansiyonu,
- Kan ve lenf damarlarının yapı ve görevlerini,
- Lenfoid organları, lenf yumrularının yapısını ve görevlerini,
- Önemli lenf yumrularının vücuttaki konumlarını,
- Dalak, timus ve bursa fabriciusu,
- Lenf yumrularının kontrolünü,
- İç salgı bezleri ve ürettikleri hormonları,

öğreneceksiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Solunum sistemini oluşturan organları araştırınız.
- Solunum sistemini oluşturan organların görevlerini araştırınız.
- Solunum mukozası üzerinde bulunan titrek tüyler (silyum) ne işe yarar? Araştırınız.
- Veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerine giderek solunum sistemine ilişkin bulguların nasıl alındığını araştırıp bilgi toplayınız.
- Hayvanların solunum sistemine ilişkin bulguları alma hakkında kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinde araştırma yapınız.
- Konuyla ilgili sunum dosyası oluşturarak arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.


4. Hayvanlarda Solunum Sistemi

4.1. Solunum ve Solunum Sistemini Oluşturan Organlar

Hayvanların canlılığını sürdürmesi için hücrel metabolizma tarafından üretilen karbondioksit gazının hücreden dışarı atılması ve yerine oksijenin girmesi yani bir gaz değişiminin olması gereklidir. Hayvanlar, bu değişimi kolaylaştırmanın yanı sıra gazların değişimi ve tüm vücut bölgelerine taşınmasını sağlayan organ sistemlerine sahiptir. Bu sistemde soluk alıp vermeyi sağlayan organlar yer alır. Bu organlar akciğerler (pulmo), havayı akciğerlere getirip götürmede yardımcı olan burun boşluğu [cavum nasi (kavum nasi)], gırtlak boşluğu [cavum laryngis (kavum laringis)], soluk borusu [trachea (trake)] ve solunum havasının akciğerlere dağıtıldığı yollar (bronchus) şeklinde bölümlere ayrılır. Göğüs kafesinin [thoraks (toraks)] genişlemesine yardımcı olan göğüs kasları ile diyafram da bu organlar arasında yer alır.

Solunum sistemi organları ile atmosferden organizmaya oksijenden zengin havanın alınmasına soluk alma (inspirasyon), organizmadan karbondioksitten zengin havanın çıkarılmasına ise soluk verme (ekspirasyon) denir. inspirasyon ile alınan hava içindeki oksijen akciğerlerden kan dolaşımına geçer; kan dolaşımından akciğer alveollerine bırakılan karbondioksit ise ekspirasyon havası ile solunum yollarından atmosfere çıkarılır. Böylece hücrelerin metabolizma faaliyetleri için gerekli olan oksijen inspirasyon ile arteriyel kana geçirilirken hücrelerin metabolizma artışı olarak venöz kanda bulunan karbondioksit ekspirasyon ile vücut dışına atılır. Sonuçta inspirasyon ve ekspirasyon olayının toplamı olarak solunum meydana gelir.


Gerek oksijenin organizmaya alınması, gerekse karbondioksitin organizmadan atılması için solunum sistemi ile dolaşım sistemi sürekli iş birliği içinde çalışır. Örneğin, herhangi bir nedenle organizmada daha fazla O₂ ihtiyacı doğarsa ya da organizmada CO₂ miktarı artarsa sinir sisteminin denetiminde solunum sayısı ve kalp atımı birlikte hızlanır. Bu iş birliğinin sonucu olarak; O₂ ve CO₂ değişimi hem akciğerlerde hem de vücut doku kılcal damarlarında yapılır. Akciğer kılcal damarlarında atmosfer havası ile kan arasında yapılan O₂ ve CO₂ değişimine dış solunum, doku kılcal damarlarında kan ile hücreler arasında yapılan O₂ ve CO₂ değişimine ise iç solunum denir.



Görsel 4.1: Atta soluk borusu (trachea) ve akciğerlerin konumu

Solunum, gaz değişimini sağlayan akciğerler ile akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan (ventilasyon) bir pompadan oluşur. Solunum olayları üzerine etkili olan anatomik yapılar şunlardır:

- Göğüs kafesi [thoraks(toraks)]
- Göğüs boşluğu hacmini arttıran- azaltan solunum kasları
- Kaslarla beynin bağlantısını sağlayan sinirler
- Kasları denetleyen beyin bölgeleri



Görsel 4.2: Atta ve sığırda akciğerlerin yerleşimi

4.1.1. Burun (Nasus) ve Burun Delikleri (Nares)

Hayvanlarda burnun şekilleri farklılıklar gösterebilir. Sağ ve sol tarafta iki burun deliği yer alır. Sığırlarda burun delikleri arasında bulunan üst dudağa taşan bir bölge (merme) vardır. Burası özel bezlere sahip olduğundan daima nemli tutulur. Buranın kontrolü bize hayvanın genel durumu hakkında bilgi verebilir. Atlarda burun delikleri mideye yapılacak sonda uygulamaları açısından önemlidir. Burun boşluğu choana (kohana) adı verilen deliklerle, yutakla bağlantılıdır.



Görsel 4.3: Farklı hayvan türlerinde burun delikleri.

4.1.1.1. Burun Boşluğunun Kısımları

Burun boşluğu, önden geriye doğru kıvrıktan burun bölmesi (cartilago septi nasi, kartilago septi nasi) ile sağ ve sol iki eşit yarıma ayrılır. Burun boşluğu concha (konka, konha) denilen kâğıt benzeri ince oluşumlarla bir takım yollara ayrılmıştır. Konkalar, burun mukozası ile örtülüdür. Bunlardan üstte olan konka dorsalis üst burun kıvrımlarını, altta yer alan konka ventralis ise alt burun kıvrımlarını oluşturur.

4.1.1.2. Burun Yolları

Septum nasi (burun bölmesi) ve iki konka burun boşluğunu dört yola ayırır:

- Üst burun yolu (meatus nasi dorsalis) koku yolu
- Orta burun yolu (meatus nasi medius)
- Alt burun yolu (meatus nasi ventralis) solunum yolu
- Ortak burun yolu (meatus nasi comminus, meatus nasi komminus)

Özellikle atlarda değişik amaçlar için mideye burun-mide sondası uygulamak gerektiğinde solunum yolu (meatus nasi ventralis) kullanılır. Bu yol üste doğru mukoza kıvrımı çıkmaz yol yaptığından sondayı dikkatli kullanmak gerekir.

Bilgi kutusu

Soğuk Havalarda Neden Burnumuz Akar?

Soğuk bir kış gününde yürüyüşe çıktığınız o sırada hasta olmasanız, hatta üşümüyor olsanız bile bir süre sonra burnunuzun aktığına şahit olmuşsunuzdur. Bu, aslında vücudumuzun verdiği son derece normal bir tepkidir. Burnumuzun tek işlevi koku almak değildir. Burnumuz aynı zamanda ciğerlerimize çektiğimiz havanın ısınıp nemlenmesini sağlayarak ciğerlerimizi korur. Soğuk hava genellikle kurudur. Burnumuz soluduğumuz havayı yeterince nemlendirebilmek için sıvı üretimini artırır. Bu sıvının fazlasını burun akıntısı olarak biliriz. Soğuk havalarda burnumuzun akmasının bir nedeni de soluk verirken ciğerlerimizden çıkan ılık ve nemli havadaki su buharının burnumuzda daha soğuk bir ortamla karşılaşarak yoğunlaşması ve burnumuzun iç çeperinde su damlaları oluşturmasıdır.

4.1.2. Gırtlak [Larynx (Larinks)]


Gırtlak, solunum havasını soluk borusu aracılığıyla akciğere gönderdiği gibi aynı zamanda ses organı olarak da görev yapar. Alt çene kemiğinin kolları ile yutağın arkasında, yemek borusunun başlangıcında yer alır. Gırtlak kıkırdaklardan oluşan bir iskelete sahiptir. Gırtlak içinde havanın geçtiği gırtlak boşluğu cavum Larynx (kavum Larinks) yer alır.

Gırtlakın solunumla ilgili görevleri:

- Solunum havasının geçişini sağlar; ancak besinlerin yutulması esnasında epiglottis (gırtlak kapağı) ile alt solunum yollarının ağzını kapatır.
- Yabancı maddelere karşı öksürük refleksini uyarır. Öksürük refleksi ile alt solunum yoluna kaçan yabancı maddeler dışarıya atılır.
- İçerdiği mukus silyalarla solunum yollarını korur. (Silya: eşgüdümlü dalgalanma hareketi ile lümendeki maddelerin hareketine yardım eden epitel hücrelerini örten kıl benzeri çıkıntılardır)

Larynx dört kıkırdaktan oluşur:

- Kalkan Kıkırdak (cartilago thyreoidea)
- Halka Kıkırdak (cartilago cricoidea)
- İbriksi Kıkırdak (cartilago arytenoidea)
- Epiglottis [gırtlak kapağı (cartilago epiglottica)]




LARYNX

Görsel 4.4: Gırtlakın Anatomik Yapısı

4.1.3. Soluk Borusu [Trachea (Trake)]

Gırtlaktan başlayıp akciğerlerde sona eren kıkırdak halkalarının birbirlerine halka bağlarla (ligamentum annulare) birleşmesinden meydana gelen boru şeklinde bir organdır. Tracheanın biri boyun bölgesinde diğeri göğüs boşluğunda seyreden olmak üzere iki kısmı vardır.

Trachea, göğüs boşluğunda akciğerlere girmek üzere iki kola (bifurcatio trachea, bifurkasyo trachea) ayrılır. Soluk borusu bifurcation bölgesinde akciğer loblarına gitmek üzere sağ ve sol iki ana bronşa (bronchus) ayrılır. Bronşların yapısı Tracheaya benzer. İç yüzeyin mukoza örtüsü üzerinde çok sıralı titrek tüyler bulunur.



Görsel 4.5: Tracheanın Anatomik Yapısı

Tektırnaklıların tracheaları üst ve alttan basık olup oval şekillidir. Sığır ve koyunların trachea halkaları yanlardan basık olup üst uçları yukarıya kıvrılmıştır. Köpekte silindirik olan trachea, halka uçları arasındaki aralık, geniş ve birbirine dönüktür. Halka sayıları ruminantlarda 50, atlarda 60, köpeklerde ise 35-43 adettir.

4.1.4. Akciğerler (Pulmones)

Göğüs boşluğu [cavum pectoris (kavum pektoris)] içinde bulunur. Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Elastik, yumuşak, süngersi bir yapı gösterir. Suya atıldığında içinde hava bulunduğundan dolayı su üstünde kalır. Ölü doğanların akciğeri hava ile dolu olmadığından batar. Hayvan türlerine göre farklı bir loplanmaya sahiptirler. Rengi gençlerde pembe, yaşlılarda ise pembeden kırmızıya kadar değişir. Çok uzun süreli kirli havanın solunduğu durumlarda siyahımsı renge döner.

İnsanlarda sigara tüketiminin sonucunda, akciğerlerdeki renk değişikliğinin yanı sıra akciğer kanseri gibi çok ciddi hastalıklara da yakalanılabilir. "Akciğer kanseri için acaba kim daha çok risk altında? " diye düşünülürse, sigara içenlerde gelişme olasılığı çok çok fazladır. Akciğer kanserinin % 80-90'ı sigara nedeniyle gelişmektedir. Kansere yakalanma oranı günde 10 sigarayı uzun süredir içenlerde 5 kez, günde 40 sigara içenlerde ise 24 kez artar. Yani ne kadar uzun süre ve fazla sayıda sigara içiliyorsa risk de o kadar fazladır. Sigara içimi terk edildiğinde akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe azalır. Bu risk beş yıllık süre sonunda sigara içmeyenlerin yarısı oranına iner. Puro, pipo, nargile içenlerde de risk fazladır. "Light sigara" denilen sigara türleri kanser riskini azaltmadığı gibi bazı akciğer kanseri türlerinin gelişim olasılığını artırabilir. Kendileri sigara içmedikleri halde sigara içilen ortamda bulunanlarda da akciğer kanser riski artar.




Görsel 4.6: Akciğer kanseri ve sigara

Akciğerler vücut ağırlığının yaklaşık %1-1,5'i kadardır. Sağ akciğer sol akciğerden daha ağır ve daha çok lopludur. (Lobus; lop, parçalı bir organın küçük bir parçası) Akciğerler, türlere göre değişen çeşitli derinlikteki yarıklarla loplara ayrılmıştır. En basit loplama atlarda görülür. At, kedi ve domuzun sağ akciğerinde 4, sol akciğerlerinde ise 3 lop vardır.

SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
İmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Kanuni Sultan Süleyman



Görsel 4.7: Çeşitli hayvan akciğerlerinin şekilleri

Göğüs boşluğunu örten zar olan pleura, (plöra, plevra) akciğerleri sıkıca sarar ve onları göğüs boşluğuna bağlar



Görsel 4.8: Atın göğüs boşluğu ve akciğerlerin yerleşimi


Bronşlar akciğerler loblarının içine ağaç dalı şeklinde yayılmıştır. Önce büyük bronşlara sonra daha ince dallanma yaparak küçük bronşlara [bronşçuk (bronchiol)] ayrılırlar. Bronşçukların uçlarında akciğerlerin gaz alışverişini sağlayan küçük boşluklar (alveol) bulunur. Alveollerin çeperleri oldukça esnek bir yapı gösterir. Alveollerin duvarlarında solunuma ilişkin yoğun kılcıl damar ağı yer almıştır.



Görsel 4.9: Alveoller

4.2. Akciğerlerde Gaz Alışverişi


Alveoller içindeki oksijen alveol çevresindeki kılcal damarlarda bulunan kana sürekli geçiş yaparken, kandan da alveollere sürekli olarak karbondioksit geçer. Soluk alındığında solunum havası alveol içinde bulunan gazla karışır. Kana geçen oksijenin bıraktığı boşluğu, solunum havasındaki oksijen doldurur. Alveollere gelen karbondioksit solunum havasındaki oksijen ile seyrelir. Alveollerdeki bu karışımın bir kısmı soluk verme yoluyla dışarı atılır.



Görsel 4.10: Alveollerde gaz değişimi

Kılcal damarlardaki kan plazması ile alveole gelen havadaki gazların (oksijen, karbondioksit ve diğerleri) arasındaki kısmi basınç farklılıkları nedeniyle kandaki karbondioksit alveol havasına, alveol havasındaki oksijen ise kana geçer. Alveoller içindeki hava, kılcal damarlardaki kanda bulunan gazlarla yer değiştirir.


Akciğerlerin pompalama mekanizmalarıyla şişip genişlemesinden sonra göğüs boşluğundaki basınç değişikliğinden faydalanarak oksijenin akciğerlere girmesi sağlanır. Gazlar her zaman yüksek basınçtan, düşük basınca doğru hareket ederler. Alveol havasındaki oksijen basıncı, kan basıncından yüksek olduğundan, oksijen alveol havasından kana geçer. Kan basıncının dokulardaki basınçtan yüksekliği ise oksijenin kandan dokulara geçmesini sağlar.



Görsel 4.11: Alveol yapısı ve gaz alışverişi

4.3. Göğüs Boşluğu ve Pleura (Plevra)

Göğüs boşluğu üstte sırt omurları, yanlarda kaburgalar, altta göğüs kemiği ve diyafram tarafından oluşturulur. Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayırır. Kubbe şeklindedir. Solunumun %75'inden sorumludur. Soluk verirken diyafram kası yukarı doğru kubbeleşir, göğüs kafesinin hacmi azalır, iç basınç artar ve karbondioksit dışarı verilir. Soluk alırken, diyafram kası düzleşir, göğüs boşluğunun hacmi artar, iç basınç düşer ve akciğere hava dolar. Soluk alma ve verme ile ve diyafram ile birlikte göğüs boşluğu da hareket eder.



Görsel 4.12: Sığırdaki akciğerlerin toraks (göğüs kafesi) içinde duruşu

Göğüs boşluğunun biri önde diğeri arkada olmak üzere iki deliği vardır. Öndekinden yemek borusu, soluk borusu, damar ve sinirler göğüs boşluğuna geçerler. Arka taraf diyafram ile kapalı olup diyafram üzerindeki deliklerden alt ana atar damar [aorta (abdominalis)], yemek borusu ve alt ana toplardamar [vena cavae caudalis (vena kava kaudalis)] karın boşluğuna geçer.

Göğüs boşluğu duvarının iç yüzü ve bu boşlukta bulunan organların tamamının üzeri seröz bir zar olan pleura ile kaplıdır. Pleura göğüs duvarını örttüğünden sonra göğüs omurları hizasında orta hatta düşey olarak aşağıya, tabana iner. Sağ ve sol akciğer loblarını içine alacak şekilde iki kapalı boşluk (kese) oluşur. Bu iki boşluk arasında oluşan aralığa mediastinum denir.

4.4. Solunum Mekaniği

Akciğerler göğüs kafesi içinde bulunur. Akciğerlerin üzerini örten göğüs boşluğu zarı seröz bir sıvı üretir. Bu sıvı sayesinde akciğerler göğüs kafesi içinde kolayca hareket eder. Sağlıklı canlılarda solunum costo-abdominal tiptir. Solunuma hem göğüs kafesi hem de karın kasları katılır.

Göğüs kafesinde meydana gelen ve ağrıya sebep olarak göğüs kafesinin solunuma katılımının engellendiği durumlarda solunum, karın kaslarının körük gibi çalışmasıyla sağlanır. Bu şekildeki solunuma abdominal tip solunum denir.

Karın bölgesinde meydana gelen ağırlı patolojik durumlar karın kaslarının solunuma katılımını engeller. Solunum, diyafram ve göğüs kasları ile sürdürülür. Buna da kostal tip solunum denir.

4.5. Solunumun Sinirsel Kontrolü

Beyin kabuğundaki solunum merkezi, gelen uyarılar doğrultusunda solunumu isteğe bağlı olarak denetler. Beyindeki pons ve medulla oblongata'da bulunan merkezler solunumu istem dışı olarak devam ettirir.

Nervus vagus solunumu düzenleyici sinirdir. Omuriliğin 3. boyun omuru üzerinden kesilmesi solunumu durdurur. Solunuma yardımcı diyafram kasları bu bölgeden çıkan frenik sinir (nervus phrenicus, nervus frenikus) aracılığıyla uyarılmaktadır.

Solunum, soluk alma (inspirasyon) ve soluk verme (ekspirasyon) olmak üzere iki dönemde gerçekleşir.

ACABA NEDEN?

Arkadaşlarınızla spor müsabakası yaptığınızda neden kalbiniz daha hızlı atar?

Arkadaşlarınızla spor müsabakası yaptığınızda neden daha çok nefes alırsınız?

Her iki sorunun cevabını araştırdıktan sonra edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


4.5.1. Soluk Alma (İnspirasyon)

Göğüs kafesinin ve akciğerlerin genişlemesiyle, dış ortamda bulunan havanın alveollere ulaşmasına soluk alma denir. Normal solunumda göğüs boşluğundaki hacim değişikliklerinin % 70'i diyafram tarafından gerçekleştirilir. Diyafram kasları ile kaburgalar arası kaslar solunuma yardımcı olan kaslardır. Diyaframın göğüs boşluğuna bakan yüzü dış bükey olup solunum esnasında bombe azalır. Akciğerler genişler ve inspirasyon gerçekleşir (kostal tip solunum). Karın boşluğundaki organlar ise arkaya doğru itilir, karın içi basınç artar, karın duvarları yanlara doğru şişkinleşir (abdominal solunum). Diyaframın kasılması esnasında, kaburgalar arasındaki kaslar da kasılır, göğüs kafesinin genişlemesiyle akciğer içi basınç, atmosfer basıncından daha düşük olduğundan (negatif basınç) dışarıdaki hava akciğerlere dolar (inspirasyon). Normal solunumda kostal ve abdominal solunum birlikte (kosto abdominal) yapılır.

4.5.2. Soluk Verme (Ekspirasyon)

Genişlemiş olan göğüs kafesinin ve akciğerlerin eski haline dönmesi ve akciğerlerdeki havanın dışarı çıkmasıdır. Akciğer içi basınç, atmosfer basıncının biraz üstündedir. Soluk verme esnasında kaburgalar arası kasların kasılmasıyla göğüs kafesinin iç hacmi azalır, nefes dışarı verilir. Soluk vermede ön karın duvarı kaslarının kasılması sonucu diyafram yukarı itilir. Karın içi basınç artarken göğüs kafesi içe çekilmiş olur. Normalde soluk verme işlemi pasif olarak meydana gelmektedir. Güç solunumunda ise ekspirasyon aktif olarak yapılır ve hızı artar.

Soluk alıp verme sırasında akciğerlerin büzülmesi göğüs kafesinin daralmasından olur. Bu nedenle göğüs boşluğu ile akciğerler arasında negatif bir basınç şekillenir. Bu durum geviş getirenlerde besinlerin rumenden ağıza getirilmesine de yardımcı olur.



Görsel 4.13: İspirasyon ve ekspirasyon

4.5.3. Solunum Sesleri

Soluk alma ve verme sırasında göğüs bölgesi stetoskopiyle dinlendiği zaman bazı sesler işitilir. İspirasyon sırasında alveollerden kaynaklanan yavaş söylenmiş F ve V harflerini andıran sesler duyulur. Bu sesler solunumla alınan havanın alveollere geldiğinde alveol duvarına çarpması ve alveollerin şişmesi sonucu oluşur. Bu sese benzer bir ses de soluk alırken havanın gırtlaktan geçerken buraya yapmış olduğu basınç nedeniyle oluşur. Gırtlakta meydana gelen bu sesler, göğüs boşluğunun ön kısmında işitilmesiyle alveollerden kaynaklanan sestten ayrılır.

Bronşlarda ve akciğerlerde meydana gelen herhangi bir hastalık, bu seslerin özelliklerinin değişmesine neden olur. Bundan faydalanılarak bronşit (bronchitis), pnömoni (pneumoni) ve bronkopnömoni (bronchopneumoni) gibi hastalıkların teşhisi yapılabilmektedir.

4.6. Solunumla İlgili Bazı Terimler

Eupnea (öpne): Dinlenme halindeyken normal uyarımla yapılan solunum şekline denir.

Hyperpnea (hiperpne): Solunum sayısı, derinliği veya her ikisinin artmasına denir.

Polypnea (polipne): Çabuk, yüzeysel ve kesik kesik olan solunuma denir. Köpeklerin sıcak havalarda yaptığı solunum bu tiptir.

Apnea (apne): Solunumun geçici bir süre durmasına denir.

Dyspnea (dispne): Güç ve sıkıntılı solunuma denir. Costal tip solunum görülür. Bazı karın bölgesi hastalıklarında (peritonik sancı gibi) kostal tip solunum gözlenir.

Hypoxia (Hipoksi): Kan ve dokularda yeterli miktarda oksijen bulunmamasıdır. Ani olarak şekillenen hipoksiler bilinç kaybı ve beş dakika içinde gerçekleşebilen ölümle sonuçlanabilir.

Asfeksi (Nefes alamama) Nefesin kesilmesi şeklinde tanımlanan asfeksinin birçok durum ve hastalıklarda ortaya çıktığı görülür. Soğukta derideki kan damarları büzülerek soğukun etkisiyle yüzeyde bulunan kılcıl damarlarda kan dolaşımı güçleşir. Oksijen çabuk tükendiğinden siyanozise bağlı olarak morarmalar görülür. Soğuk uzun süreli olursa vücut uzantılarında kan dolaşımı tamamen durabilir. Bu durum sinir sisteminde depresyon ve uyku hali doğurur. Duyu organlarının çalışması azalır. Soğuk etkisiyle dolaşım ve solunum merkezleri iyi çalışamaz ve asfeksiye bağlı ölüm meydana gelebilir.

Özellikle doğum öncesi dönemde yavrunun anne ile bağını sağlayan plasenta solunum organı olarak görev yapar. Yavruya kan taşıyan göbek kordonunun doğum öncesi yavruya dolanması veya doğum esnasında erken kopması boğulmalara sebep olabilir.

Siyanoz: Deri ve mukozaların normal görünümü olan pembemsiliğini kaybederek koyu mavi-mor bir renk almasına denir. Bunun nedeni kılcıl damarlarda normalin çok üstünde indirgenmiş hemoglobin bulunmasıdır. Kanda oksijenle bağlanmamış hemoglobin miktarı çok artmıştır. Siyanoz, en kolay mukozalar ile derinin ince olduğu (insanda) kulak memeleri, dudaklar ve parmaklarda görülür. Daha çok dolaşım bozukluğundan ileri gelen durumlarda kan dokularda uzun süre beklediğinden oksijenini kaybeder ve oksijen taşımayan hemoglobin miktarı artar. Kalp yetmezliğinde bu durum görülebilir.

4.7. Solunum Sayıları

Sağlıklı hayvanlarda dakikadaki solunum sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hayvan Türleri	Dakikadaki Solunum Sayıları
At	8-16
Sığır	12-30
Koyun-Keçi	12-20
Köpek	10-30
Kedi	20-30
Tavuk	40-50

Tablo 4.1: Bazı hayvan türlerinde dakikadaki solunum sayısı

Bu sayılar vücut ağırlığı, yaş, egzersiz, heyecan, çevre sıcaklığı, gebelik, sindirim kanalının dolu oluşu ve hastalık gibi durumlarda değişir. İneklerde ağız açık solunum çok sıcak havalarda görülen sıcaklık stresine bağlı en tipik davranışlardan birisidir.

4.8. Kanatlı Hayvanlarda Solunum Sistemi

Solunum sistemi gaga üzerinde yer alan dış burun delikleriyle başlar. Bunlar birer kanalla ağız tavanında yer alan iç burun deliklerine bağlanırlar. Memelilerde olduğu gibi glottis küçük bir yarıklı şeklindedir ve farinksin arka tabanında yer alır. Bu kısımdan sonra gelen larinks kısa olup trakea ile bağlanır. Büyük bir olasılıkla havanın ısıtılması amacıyla trakea uzun ve kıvrımlı bir şekil almıştır. Trakea etrafında yer alan halka şekilli kıkırdak veya kemik yapılar destek ve koruma görevi yaparlar. Akciğerde alveol yoktur. Solunum havasını bronşlarla alırlar. Bronşlar tüm kuşlarda iyi gelişmiştir. Bronşların bir kısmı hava keselerine bağlanır. Nefes alma sırasında bu keselere dolan hava akciğerlerdeki kullanılmış havanın tümünü dışarı atar. Bunun sonucunda akciğerlerdeki kılcal damarlar her zaman yüksek derecede oksijen içeren hava ile temas eder.

Kanatlılarda göğüs boşluğu ile karın boşluğu tam bir diyafram ile ayrılmaz. Diyafram çok az gelişmiştir ve iki boşluğu birbirinden tümüyle ayırmamıştır. Dolayısı ile kanatlılarda vücut boşluğunun açıldığı tek bir boşluk görünümünde olması çok doğaldır. Hava keseleri içi hava dolu bazı kemiklerden oluşur. Memelilerin aksine akciğerlerde belirgin bir loplama görülmez ve vücutla oranlandığında daha küçüktür. Kanatlılarda vücut boşluğu açıldığında akciğerler, memelilere oranla daha küçük ve sırtta yakın bir şekilde görülür. Yani akciğerler göğüs boşluğunun üst kısmında yerleşmiş kaburgalara sıkıca bağlanmıştır.

4.9. Solunum Yollarının Kontrolü

Normal olarak hayvanların burunlarından seröz (serum gibi, sulu) ve ince bir akıntı gelir. Burundaki akıntının artması ve karakterinin değişmesi solunum sistemi hastalıklarının ilk belirtilerindedir. Yalnız sığırlar balgamlarını yuttuklarından, akciğer yangılarında burun akıntısı pek görülmez. Burun akıntısının kontrolünde akıntının tek ya da çift taraflı, rengine, kıvamına, kokusuna, akıntıda yabancı bir cisim, akıntıda kan olup olmadığı dikkat edilmelidir.

Burun akıntısı sinüzitiste (sinusların yangısı) tek taraflıdır. Rengi, kıvamı, kokusunun kontrolünde ise seröz, müköz (koyu kıvamlı, yapışkan), serömüköz (karışık), mukopurulent (koyu kıvamlı ve iltihaplı) ve purulent (iltihaplı, irinli) yönünden bakılır. İltihabi akıntılar genellikle kötü kokuludur. Burun akıntısında yem parçası, mukoza parçaları olup olmadığına bakılmalıdır. Burun akıntısında kan varsa köpüklü olup olmadığına bakılır. Akciğer kanamasında kan köpüklüdür.

Normalde her iki burun deliğinden eşit ısı ve basınçta hava çıkar. Bunu anlamak için hayvanın önünde durulur ve eller çapraz hale getirilerek burun deliklerinin önüne tutulur. Nefesi koklamak için burundan çıkan hava avuca çarptırılarak koklanır. Kangrenli pneumonilerde (zatürre), burun ruamında (ruam: atlarda görülen insana da bulaşabilen bir hastalık) kötü bir koku, ketosiste (metabolizma hastalığı) aseton kokusu, buzağılardaki askaridiosis (bir çeşit parazit) olaylarında sarımsak-eter kokusu algılanır. Tek taraflı tıkanmalarda, daralmalarda çıkan havanın basıncı farklıdır. Ateşli hastalıklarda solunum havası sıcaktır.

Burunda bulunan tıkanma, daralma, yangı ve nezleler, ürtiker, parazit, tümör gibi durumlara bağlı olarak solunum sırasında hırıltı, homurtu gibi sesler duyulur. Tıksırık ise burundaki yangı, nezle ve exudat (eksüda, exudate, damar geçirgenliğindeki artış nedeniyle dokuların dışına çıkan kan sıvısı) parazit gibi cisimlerle irkiltici gazların neden olduğu bir ekspirasyon hareketidir.

Atların burun ruamında, tek veya çift taraflı, kötü kokulu, irinli bazen de kanlı akıntı vardır. Çene altı lenf yumrularında kronik şişlik söz konusudur. Sert mukozada ağrısız, kemiğe yapışık, üzeri pürüzlü ve zimba gibi delinmiş ülserler veya iyileşince yerlerinde buzlu cam görünüşünde sikatriks (yara izi, nedbe) dokusunun yer aldığı gözlenir.

Larinks ve trake inspeksiyon (göz ile yapılan kontrol) ve palpasyon (el ile yapılan kontrol) ile kontrol edilir. Sağlam hayvanlar larinks bölgesine baskı yapınca öksürmezler. Bir yangı varsa öksürük gözlenir. Atlar hariç diğer hayvanların ağız açılarak dil dışarı çekilir. Larinks kontrol edilir. Larinksde apse, ödem, parazit ve tümör olduğu durumlarda solunum hırıltılıdır. Hırıltının ön solunum yolundan mı yoksa larinksden mi kaynaklandığını anlamak için burun tıkanır. Hırıltı sesi kaybolursa burundan, kaybolmazsa larinksden kaynaklandığı anlaşılır.

Öksürüğün kontrolü de oldukça önemlidir. Çünkü öksürük çoğu kez solunum sistemi hastalıklarında semptom (belirti) olarak ortaya çıkar. Solunum sisteminin herhangi bir bölgesinin uyarılması ile ortaya çıkan reflektör olaya öksürük denir. Öksürük larynx ve daha gerideki organların hastalıklarının bir belirtisidir. Öksürük, organda bulunan balgam, parazit veya yabancı cisimlerin dışarı atılmasına hizmet eden ani ve şiddetli bir ekspirasyon hareketidir. Organizmanın savunma sisteminin bir sonucudur. Tektırnaklıları, kedi ve köpekleri öksürtmek için birinci ve ikinci tracheae halkalarına bastırmak yeterlidir. Sağlıklı hayvanlar hiç öksürmedikleri veya bir defa öksürdükleri halde bronş ve akciğer yangısı olan hayvanlar sık sık ve devamlı olarak öksürürler. Sığırları öksürtmek için 30–40 saniye kadar ağız ve burun delikleri kapatılır. Burun delikleri ve ağız açılınca hayvanın öksürdüğü görülür. Bunun ardında bir yutkunma refleksi oluşur.

Hayvan kendiliğinden öksürmüş veya bizim tarafımızdan öksürtülmüşse, öksürüğün aralığına, kuvvetine, yüzlek, derin, yaş, kuru ve ağrılı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Öksürük aralıklarına göre seyrek, sık ve nöbet şeklindedir. Öksürük peş peşe ve en az 1–2 dakika sürüyorsa bu şekil öksürüğe **nöbetli öksürük** veya **öksürük nöbeti** denir.


İnsan ve hayvanlarda solunum havasının larenksteki ses tellerine çarpmasına bağlı oluşan fiziksel olay sonucu ses meydana gelir. Ses canlılarda değişik şekillerde ortaya çıkar. Koyun, kuzu ve keçilerde meleme, köpeklerde havlama, kedilerde miyavlama, atlarda kişneme şeklindedir. Kuduz hastalığında ses kısık ve boğuktur. Larenksin yangısı ve felcinde ses hırıltılı ve ıslık şeklinde çıkar. Akciğerlerin bulunduğu göğüs kısmının inspeksiyonla kontrolünde hayvanın önünden ve yanlarından dolanılarak bölge üzerinde yara, yırtık, şişkinlik ve asimetri olup olmadığına bakılır. Elin tersi veya avuç içiyle ya da parmak uçları bölge üzerinde gezdirilerek sıcaklık farkının olup olmadığına, bastırılarak ağrının bulunup bulunmadığına bakılır. Ağrı varsa hayvanda sakınma ve inilti vardır.

Akciğer seslerini dinlemek için stetoskop iyice deriye bastırılır. Gerekirse kıllar ıslatılarak kılların daha az ses çıkartması sağlanarak dinlenir. Doğrudan kulak göğse yaklaştırılarak da dinleme yapılabilir. Dinleme sonucunda normal akciğer sesi, sertleşmiş veziküler sesi, boru sesi, harhara (bronş veya bronşçuklar içerisinde sıvısı varlığını gösteren hastalık belirtisi sesler) sesleri duyulabilir. Harharalar yaş ve kuru harhara olarak ikiye ayrılır.



Görsel 4.14: köpekte akciğerlerin stetoskop ile dinlenmesi

Akciğerlerden ses alınamaması haline ses kaybı (afoni, aphonie) denir. Akciğer de apse, tümör, parazit keseleri ve hayvanlara ilaç içirme esnasında dikkatsiz davranıldığında akciğere ilaç kaçırılması hallerinde ortaya çıkar.



OKUMA PARÇASI

BALINALAR NASIL ÇOK UZUN SÜRE NEFESLERİNİ TUTABİLİYOR?

Balinalar suda yaşayan memeli türlerinden biridir. Deniz memelilerinin karada yaşayan memeli türlerinden önemli bir farkı var. Suyun altında çok uzun süre nefeslerini tutabiliyorlar. Örneğin, insanlar en fazla birkaç dakika nefeslerini tutabilirken bazı balina türleri iki saat nefes almadan suyun altında kalabiliyor.

Balinaların bu özelliğinin akciğerlerinin boyutuyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Aslında vücut büyüklüklerine oranlandığında denizde yaşayan memelilerin akciğerleri, karada yaşayan memelilerinkinden daha küçüktür. Çünkü balinaların akciğerleri suyun altında oksijen deposu olarak görev yapmaz. Deniz memelilerinin suyun altında uzun süre nefeslerini tutabilmelerinin temel nedeni aldıkları oksijeni uzun süre verimli bir şekilde kullanabilmeleridir.



Deniz memelilerinin solunum ve kalp-damar sistemleri, karada yaşayan diğer memeli türlerinden farklı özelliklere sahiptir. Örneğin; deniz memelilerinde kan hacminin vücut hacmine oranı, insanlardakinden yaklaşık 3-4 kat daha fazladır. Kanlarındaki hemoglobin (kandaki oksijen taşıyan protein) oranı ise insanlardakinin yaklaşık iki katıdır. Deniz memelilerinde kas dokularında oksijen depolayan protein olan miyoglobin oranı da insanlardakinden 10-20 kat daha fazladır. Ayrıca suyun altında oksijen tüketimini mümkün olduğunca azaltabilmek için balinaların kalp atım hızları azalır ve kan sadece kalp, beyin ve kaslar gibi gerekli organlara pompalanır.

Kas hücrelerindeki miyoglobin oranının fazla olması balinaların suyun altında nefeslerini tutarken bile etkin bir şekilde hareket etmelerine imkân verir. Yapılan araştırmalara göre deniz memelilerinde miyoglobin oranının fazla olmasının nedenlerinden biri de, deniz memelilerindeki miyoglobin proteininin yapısının insanlardakinden daha kararlı olmasından kaynaklanabilir. Farklı bir araştırmada ise deniz memelilerindeki miyoglobin proteinlerinin elektriksel olarak artı yüklü olmaları sayesinde, proteinlerin yüksek yoğunlukta olmalarına rağmen bir araya gelip kümelenmelerinin engellendiği, bu sayede kas dokularının daha fazla oksijen tutabildiği belirlendi.

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/balinalar-nasil-cok-uzun-sure-nefeslerini-tutabiliyor> 07.06.2020 23.33

ÖĞRENME BİRİMİ	HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	SOLUNUM SİSTEMİ	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKET VEYA KESİLMİŞ HAYVAN ÜZERİNDE SOLUNUM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ORGANLARIN KONTROLÜ	12 DERS SAATİ

AMAÇ -Solunum sistemine ilişkin organların anatomik yapısını gözlemleyerek, incelemek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Mezbaha ziyareti planlanarak kesilmiş hayvan üzerinde veya kesilmiş hayvanın solunum organları laboratuvara getirilerek anatomik yapıları incelenir. Aynı işlem maket hayvan üzerinde de yapılır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde, solunum sistemini oluşturan organlar gösterilerek, organların yapısı koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (Kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Organların anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların solunum sistemini oluşturan organları kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi, çizme ve gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş hayvanın solunum organları, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait solunum organlarını inceleyiniz.
- Solunum yollarını baştan itibaren kontrol ediniz.
- Sığırlarda mermenin durumunu kontrol ediniz.
- Üst solunum yolunu akciğerlere kadar inceleyerek her bir organın adını, kısımlarını, görevini Latince ve Türkçe olarak söyleyiniz.
- Çeşitli hayvanlarda (at, sığır, koyun-keçi, kedi-köpek vs)akciğerin yerini tespit ediniz.
- Maket veya kesilmiş hayvan üzerinde diyaframı göstererek yapısını inceleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ÖĞRENME BİRİMİ	HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	SOLUNUM SİSTEMİ	SÜRE
UYGULAMA ADI	HAYVANLARDA SOLUNUM SİSTEMİNİN KONTROLÜ	12 DERS SAATİ
<p>AMAÇ -Solunum sistemine ilişkin bulguları alarak solunum sayısını, solunum tiplerini, solunum seslerini, solunum havasının kokusunu kontrol etmek.</p> <p>1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir. • Hayvanın ölçüm öncesinde dinlenmesini sağlayınız. • En az 15 dakika hayvan dinlendikten sonra solunum sayısını ve solunum sistemini kontrol ediniz. • Mümkün olduğunca farklı türdeki hayvanların ve farklı yaş ile kiloda olanlarının solunum sistemini kontrol ediniz. <p>2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çeşitli türdeki canlı hayvanlar • Saat, kronometre • Steteskop • Zapturapt araç gereçleri • Pamuk • Dezenfektanlar <p>3. İŞLEM BASAMAKLARI</p> <p>Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hayvan sahibine hayvanda öksürük, hırıltılı solunum gibi belirtilerin olup olmadığını sorunuz. • Hayvanın dinlenmiş ve sakin olmasını sağlayınız. Dinlenmeden yapılacak kontrollerin yanıltıcı sonuçlar vereceğini unutmayınız. • Ders öğretmeninizin hayvanı ayakta uysal hale getirmesine yardımcı olunuz. • Hayvan iyi tutulduktan sonra ders öğretmeniniz nezaretinde hayvana yaklaşınız. • Hayvanın soluk alma hareketlerine bakarak solunum tipini tespit ediniz. • Hayvanın solunum kokusunu kontrol ediniz. • Solunum yollarını baştan itibaren kontrol ediniz. • Sığırlarda mermenin durumunu kontrol ediniz. • Çeşitli hayvanlarda akciğerin yerini tespit ediniz. • Akciğerin yerini tespit ettikten sonra akciğer seslerini dinleyiniz. Duyduğunuz seslerin hangi sese benzediğini not alınız. 		

- Hayvanın solunumunu sayınız. Elde ettiğiniz solunum sayısını kayıt ediniz. Kayıt yaparken hayvanın yaşı, cinsiyeti, ırkını ve ölçüm zamanını da yazınız.
- Hayvanı hareket ettirdikten (yürütme veya koşturma) sonra ölçtüğünüz solunum sayısını dinlenmiş haldeki solunum sayısı ile karşılaştırınız. Sizin ölçerek bulduğunuz hayvan türüne ait solunum sayısını aşağıdaki tablo ile karşılaştırınız.

Hayvan Türleri	Dakikadaki Solunum
At	8-16
Sığır	12-30
Koyun-Keçi	12-20
Köpek	10-30
Kedi	20-30
Tavuk	40-50

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

4.10. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

Gelişmiş dolaşım sistemi omurgalılarda görülür. Dışarıdan alınan besin ve oksijenin dokulara, dokularda oluşan metabolizma artıklarının da boşaltım organlarına taşınması dolaşım sistemi ile sağlanır. Gelişmiş canlılarda dolaşım sistemi, madde taşınmasından başka vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, bağışıklıkta ve hormonların taşınmasında da görev alır. Hayvanlarda açık ve kapalı dolaşım olmak üzere iki tip dolaşım sistemi vardır. Her ikisinin de üç ana bileşeni vardır:

- Bir dolaşım sıvısı ya da kan, taşıma ortamı olarak fonksiyon yapar.
- Bir kanal sistemi, vücutta kanın dolaşmasını sağlayan borucuklar sistemi veya kan damarları; kanı vücutta dolaştırır.
- Kastan yapılmış bir pompa ya da kalp, kan dolaşımını sağlar.

4.10.1. Kalp [Cor (kor)]

Kalp, dolaşım için metabolik enerjiyi kullanarak emme basma bir tulumba şeklinde çalışması sayesinde kanın hidrostatik basıncını yükseltir. Damarlarda dolaşan kan, basıncını giderek kaybeder ve kalbe geri döner. Kanın dolaşım sistemindeki hareketini bu kan basıncı sağlamaktadır. Damarlar içerisinde bulunan kan hareket ederek vücudun en uç noktasına kadar ulaşır. Bütün evcil memeli hayvanlarda, yaşamın sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan oksijenin yanı sıra besin maddeleri ve hormonlarda vücut hücrelerine kan aracılığıyla taşınır. Kan dolaşımı sayesinde, hücrelerde oluşan üre ve karbondioksit gibi zararlı maddeler, böbrekler ve akciğerlere ulaştırılarak dışarı atılır.

Kalp, tüm kan dolaşımını ritmik kasılmalar ile sağlayan, konik biçimli organdır. Şekli; tepesi aşağıda, tabanı yukarıda olan bir koniye benzer.



Görsel 4.15: Sığırın kalbi

- **Basis cordis (basis kordis):** Kalbin tabanı olup üstte bulunur. Damarların girip çıktığı geniş kısımdır.
- **Apex cordis (apeks kordis):** Kalbin altta ve arkaya dönük olan sivri uçlu kısmıdır.

4.10.1.1. Kalbin Yeri ve Yapısı

Kalp; göğüs boşluğunda, mediastinumun (mediastinum: İki akciğer arasında kalan bölge, boşluk arasındaki bölme) iki yaprağı arasında, biraz sola dönük olarak bulunur. Geviş getiren hayvanlarda 3.-5. kaburgalar, tektırnaklılarda 3.-6. kaburgalar, et yiyenlerde ise 3.-7. kaburgalar arasında yer alır. Kalp yanlardan biraz basıktır. Sağ ve sol olmak üzere iki yüzü, iki de kenarı vardır.


- **Margo cranialis (kalbin başa yakın kenarı):** Hafifçe dış bükey ve uzun olan kenarıdır.
- **Margo caudalis (kalbin arkaya yakın kenarı):** Hafifçe iç bükey ve kısa olan kenarıdır.
- **Sulcus coronarius (taç şeklindeki oluk):** Kulakçık (atrium) ve karıncıklar (ventriculus) arasındaki sınırı dıştan belirleyen oluktur. İçinde arteria coronarianın (kalbin özel besleyici atardamarı) kolları bulunur. Bu damarın tıkanması kalp rahatsızlığına neden olur.



Görsel 4.16: Atta kalbin yeri

Kalp çizgili kaslardan yapılmış olmasına rağmen istek dışı olarak çalışır. Kalp kası üç tabakadan meydana gelmiştir. Perikart, kalbin dışını saran ve arasında kaygan bir sıvı bulunan iki katlı bir zarıdır. Miyokart, kalp kasından oluşur. Endokart, kalbin iç yüzeyini örten, tek sıralı epitel dokudan oluşur.

- **Endocardium (endokardiyum):** Kalp boşluğunu döşeyen içteki tabakadır .
- **Myocardium (miyokardiyum):** Kalbin kas tabakasıdır.
- **Epicardium (epikardiyum):** Kalbin en dışta yer alan kısmı olup üzeri kalp zarı (pericardium, perikardiyum) ile örtülüdür.



Görsel 4.17: Kalbin dış yapısı

Her zaman inandığım bir şey vardır: İyi kalpli olmak, mükemmel olmaktan çok daha iyidir. Jackson Brown

ÖĞRENME BİRİMİ	HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	DOLAŞIM SİSTEMİ	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKET VEYA KESİLMİŞ HAYVAN ÜZERİNDE KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİNİN KONTROLÜ	12 DERS SAATİ

AMAÇ -Dolaşım sistemine ilişkin organların anatomik yapısını gözlemleyerek, incelemek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Hayvan dokularına, organlarına veya parçalarına kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir.
- Mezbaha ziyareti planlanarak kesilmiş hayvan üzerinde veya kesilmiş hayvanın dolaşım organlarını laboratuvara getirerek anatomik yapıları incelenir. Aynı işlem maket hayvan üzerinde de yapılır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde çeşitli hayvan maketleri üzerinde kalbin yerini gösterilmesi, laboratuara getirilen kalbin yapısını koruyucu eldiven ile kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Kalbin anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Büyük ve küçük kan dolaşımı kalp üzerinde gösterilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş hayvan ait kalp, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait dolaşım organlarını inceleyiniz.
- Kalp ve damarlarını kontrol ediniz.
- Dikey kesilen kalp üzerinde anatomik yapıyı, kirli ve temiz kan giriş çıkış damarlarını büyük ve küçük kan dolaşımını izah ediniz.
- Çeşitli hayvanlarda kalbin yerini gösteriniz.


4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

4.10.1.4. Kalbin İç Yapısı

Kalp, dikey bir bölmeyle biri sağ ve önde, diğer yarımı solda ve arkada yer olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ yarımı; sağ kulakçık (atrium dexter) ve sağ karıncık (ventriculus dexter) bölmelerini kapsayıp kirli kanı (venöz kanı) bulundurur. Sol yarımı; sol kulakçık (atrium sinistrum) ve sol karıncık (ventriculus sinister) bölmelerini kapsayıp temiz kanı (arteriel kanı) bulundurur.

Kalbi iki yarıma ayıran kaslı yapıdaki dikey bölmenin iki kulakçık arasındaki kısmına, septum interatriale, iki ventriculus arasındaki kısmına ise septum interventriculare denir.



Görsel 4.18: Kalbin iç yapısı

Her kalp yarımı da ortasındaki anulus fibrozus adındaki sert bağdokudan yapılmış bir bölme aracılığıyla ikisi üstte, ikisi de altta olmak üzere dört bölüme ayrılır. Üstteki bölmelere sağ ve sol kulakçık (atrium), alttaki bölmelere sağ ve sol karıncık (ventriculus) denir. Her kulakçık kendi tarafındaki karıncık ile ostium atrioventriculare denen delik aracılığıyla irtibat halindedir. Kalbin çalışması kasılma ve gevşeme hareketleri şeklindedir. Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine de diastol denir.


➤ Kulakçık ve Karıncıkların Özellikleri

Sol karıncık boşluğu apex cordise kadar uzanır. Duvarı oluşturan kasın kalınlığı sağ karıncığın iki katıdır. Sol karıncık kanı daha büyük bir basınçla vücudun her tarafına pompaladığından duvarı daha kalındır. Kulakçıklar içindeki kanı alt kısımda bulunan karıncıklara gönderdiğinden kuvvetli bir kas yapısına ihtiyaçları yoktur.

Karıncık duvarlarının iç yüzeyinde iki adet musculus papillaris bulunur. Bu kaslardan sayıları 6-10 arası değişen kiriş iplik (chorda tendinea) çıkar ve kalp kapakçıklarının uçlarına yapışır.

İki kulakçık arasındaki bölme fetal dönemde (yavrunun anne rahmindeki dönemi) foramen ovale denilen bir delikle bağlantı halindedir. Bu delik doğum sonrası 2-3 hafta içerisinde kapanır. Bazı hallerde bu delik kapanmaz ve sonuç olarak kirli kan ile temiz kan birbirine karışır. Hücreler ve dokular yeterince oksijen alamaz. Mukozalar siyanoz nedeniyle mavimsi bir renkte görülür.

4.10.2.Kalp Kapakları




Görsel 4.19: kalbin kapakçıkları

Kalp ve kalp üzerindeki bazı damarlarda kapak ve kapakçıklar bulunur. Kapakçıklar pompalanan kanın geri dönmesini engeller ve kanın tek yönde akmasını sağlar. Kapak çevrelerinde anulus fibrosis ve ortalarında ostiumlar (açıklık-delik) yer alır. Kalbin kapakları şunlardır

- Mitral kapak, biküspital kapak
- Aorta kapağı
- Sağ kalp kapakçığı, triküspital kapak)
- Akciğer atardamar kapakçığı

Sağ karıncıkta kanı akciğerlere göndermek üzere akciğer atardamarı (arteria pulmonalis) ile ilişkiyi sağlayan ostium trunci pulmonalis denilen ikinci delik yer alır.

Bu delik denilen üç parçalı yarım ay şeklindeki kapakla kapanır. Sağ karıncıktan akciğer atardamarına gönderilen kanın karıncığa geri dönmesi bu kapakla önlenir.



Görsel 4.20: Kalbin içyapısı: Kalp bölmeleri, kalp kapakları ve kalbe giren çıkan damarlar

4.10.3. Kalbin Damarları

Kalbin damarları aşağıda gruplandırıldığı şekildedir

4.10.3.1. Akciğer Toplardamarları (Vena Pulmonales)

Sol kulakçığın tavan kısmına akciğerlerden gelen ve temiz kan getiren akciğer toplardamarları açılır. Çapları değişik olan ve 5-8 arasında değişen damar yer alır. Bunların deliklerinde kapak bulunmaz.

4.10.3.2. Aorta (Ana Atardamar)

Vücudun en büyük atardamarıdır. Sol karıncığın tabanından başlangıç alır. Baş, göğüs ve karın bölgeleri dâhil vücudun her yerine kan pompalar.

4.10.3.3. Ön Ana Toplardamar (Vena Cava Cranialis)

Başın ve ön bacakların kirli (venöz) kanını sağ kulakçığa toplayan toplardamardır.

4.10.3.4. Arka Ana Toplardamar (Vena Cava Caudalis)

Gövdenin ve arka bacakların kirli kanını toplayan ve sağ kulakçığa taşıyan toplardamardır.

4.10.4. Kalbin Sinirleri, Uyarı ve İletim Sistemi

Kalbin atım sayısı ve kas gücü otonom sinirler (organları istem dışı çalıştıran sinirler) tarafından kontrol edilir. Herhangi bir sebeple kalp otonom sinir sisteminin etkisinden uzak kalsa bile, kendine has bazı uyarı ve ileti merkezleri sayesinde ritmik kasılmalarına devam eder. Bu sistemi oluşturan yapılar sinoatrial düğüm (SA düğümü), atrioventricular düğüm (AV düğümü), his demetleri ve dalları ile purkinje ipleridir.

Hayvanlarda kalp aktivitesi geniş ölçüde merkezi sinir sistemi tarafından ayarlanır. Omurilik soğanında (medulla oblongata) kalbin hareketlerini hızlandıran ve yavaşlatan merkez bulunur. Omurilik soğanından çıkan nervus vagusun (akciğer-mide siniri) kolları kalbe gelir. Omuriliğin göğüs bölgesinden kök alan sempatik sinirler de kalbe gelir. Nervus vagus kesilirse kalp atım sayısı artar. Vagus siniri, kalbin gereğinden fazla çalışmasını önler.

4.10.5. Kalbin Örtüleri


Göğüs boşluğunu ve buradaki organları örten plöra, kalbi en dıştan sarararak kalp kesesini (perikard, pericardium) oluşturur. Perikard ile kalbin dış zarı olan epikard arasında liquor pericardii adı verilen bir sıvı bulunur. Kayganlaştırıcı özelliği sayesinde kalp çalışması esnasında sürtünmelerin önüne geçilmiş olur.

4.10.6. Kalbin Çalışması

Karıncıklar kasılırken, kulakçıklar gevşeme durumundadır. Kulakçıkların ikisinin birden gevşediği, bunun arkasından karıncıkların kasılıp gevşediği görülür. Kasılma olayına systole (sistol), gevşeme olayına

ise diastole (diyastol) denir. Her ikisinin de gevşeme dönemlerinden sonra kısa süren bir dinlenme dönemleri vardır. Bir kulakçık sistolünden ikinci bir kulakçık sistolüne kadar geçen zamana bir kalp periyodu (döngüsü) denir.

Kulakçık sistolu sırasında kan, kulakçıklarla karıncıklar arasındaki kapakçıkları geriye iterek açılmasını sağlar. Karıncıklara dolan kan, karıncık duvarlarına çarpıp geri dönerken kapakçıkları ileri doğru iterek kapanmasını sağlar. Kapakçıkların ucu ile kalbin duvarı arasında gerili olan iplikçikler (corda tendinea) kapakçıkların sıkı şekilde kapanmasına yardım ederek kanın karıncıklara geri dönmesine engel olur.



Görsel 4.21: Kalbin çalışması ve kalp kapaklarının işleyişi

Kalp Sesleri: Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında iki çeşit ses ayırt edilir. Bu sesler “*buh-dup*” şeklinde algılanır. İlk duyulan “*buh*” sesine birinci kalp sesi veya sistolik ses denir. Karıncıkların kasılma esnasında duyulan bu sesin oluşmasına:

- Kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıkların kapanması (mitral ve triküspital kapakların kapanması),
- Aort ve arteria pulmonalisteki semilunar kapakların açılması,
- Myokart hareketi ve tendokordiniaların titreşimleri sebep olur.

İkinci duyulan “*dup*” sesine ikinci kalp sesi veya diastolik kalp sesi denir. Bu sesin oluşmasına:

- Aort ve arteria pulmonalisteki semilunar kapakların kapanması,
- Pompalanan kanın damar çeperine çarpması, damar içerisindeki bir miktar kanın geri dönerek semilunar kapaklara çarpması neden olur.

Birinci kalp sesi ile ikinci kalp sesi arasındaki süre karıncıkların sistol süresine eşittir. İkinci kalp sesinin bitip birinci sesin tekrar oluşması için gereken uzun süre ise karıncıkların diyastol süresine eşittir.



Görsel 4.22: Köpekte kalbin stetoskop ile dinlenmesi

4.10.7. Nabız, Kan Basıncı, Büyük ve Küçük Tansiyon

Karıncığın kasılmasıyla birlikte aorta'ya pompalanan kanın önündeki kan sütununa basınç yapması ile damar çapı genişler ve bu genişleme dalgalı biçimde bütün atardamar sistemi boyunca iletilir. Kalp kasılmalarının atardamarlarda hissedilmesine nabız denir.

Büyük atardamarların kemik üzerinden geçtiği bazı noktalarda parmak ucu ile damar kemik üzerine bastırılırsa nabız kolayca hissedilir. Büyük hayvanlarda alt çenenin alt kenarı gerisinden (arteria facialis), kuyruğun alt yüzünün ortasından (arteria coccygea medialis) ender olarak dirseğin iç tarafından ve kasık içinden nabız alınır. Küçük hayvanlarda (koyun, keçi, köpek, kedi v.s.) ise kasık içinden (arteria femoralis) nabız alınır. Evcil hayvanlarda ortalama nabız sayıları aşağıdaki gibidir:

- Sığır ,dakikada 60-80 adet
- Koyun-keçi , dakikada 70-80 adet
- At ,dakikada 30-40 adet
- Domuz, dakikada 60-90 adet
- Köpek, dakikada 70-120 adet
- Kedi, dakikada 110-130 adet

Kanın içinde bulunduğu arterlerin damar çeperine, sürekli olarak yaptığı, lateral yöndeki (yanlara doğru) basıncına arterial kan basıncı (tansiyon) denir. Karıncıkların kasılması ile çevresel dolaşıma pompalanan kan, damarlardaki kan basıncını en üst düzeye ulaştırır. Buna sistolik basınç veya büyük tansiyon denir. Diyastol (gevşeme) dönemindeki basınca ise diyastolik basınç veya küçük tansiyon denir.

ÖĞRENME BİRİMİ	HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	DOLAŞIM SİSTEMİ	SÜRE
UYGULAMA ADI	ÇEŞİTLİ TÜRDEKİ CANLI HAYVANLAR ÜZERİNDE KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİNİN KONTROLÜ	12 DERS SAATİ

AMAÇ - Çeşitli canlı hayvanlar üzerinde kalp atışlarını kontrol etme ve nabız sayılarını tespit etmek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Büyük hayvanlarda; incisura vasorumda (jugularis) attı iç yüzden, sığırdı dış yüzden parmakla arter hissedildikten sonra nabız dalgaları kontrol edilir. Nabız alınacak yer tespit edildikten sonra en az 30 saniye nabızın sayılması gerekir.
- Hayvanlarda nabız alınan yerleri anatomik olarak söyleyerek gösteriniz.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde çeşitli hayvan türleri üzerinde kalbin yerinin göstererek, nabız alma yeri ve tekniğini inceleyiniz.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Çeşitli türde canlı hayvanlar,
- Stetoskop,
- Saat, kronometre
- Dezenfektanlar

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyarak hayvanın kalp seslerini dinleyiniz.
- Nabız alınacak yer tespit edildikten sonra en az 30 saniye nabızın sayılması gerekir.
- Hayvan türlerine göre nabız alma yerlerinden nabız sayısını tespit ediniz.
- Tespit ettiğiniz değerleri kayıt ederek arkadaşlarınızla karşılaştırınız.
- Hayvanı hareket ettirdikten sonra nabız sayısını tekrar alınız. İki arasındaki farkın sebeplerini sınıfınızda tartışınız.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME


ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BEÇERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	40	40	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

4.11. Kan Dolaşımı, Fötal Dolaşım ve Damar Sistemi

Kan, kalbi terk ettikten sonra arterlere, arterlerden arteriollere, arteriollerden kılcıl damarlara, kılcıl damarlardan venüllere, venüllerden venlere seyahat eder. Kanın, damarlar yoluyla kalpten çıkıp yine damarlar aracılığıyla kapalı bir sistem içinde kalbe dönmeye dolaşım (sirkülasyon) denir. Dolaşımın amacı, mide-bağırsak kanalından emilen besin maddelerini dokulara götürmek ve dokularda oluşan metabolizma artıklarını boşaltım organlarına getirmektir. Kan, ayrıca akciğerler vasıtasıyla alınan oksijeni dokulara götürerek, dokularda metabolik artık olarak oluşan karbondioksiti akciğere getirir.

4.11.1. Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı

Kalpdeki oksijence fakir kanın akciğer atardamarı ile sağ karıncıktan çıkıp akciğere giderek oksijence zenginleştikten sonra akciğer toplardamarıyla sol kulakçığa dönmeye küçük kan dolaşımı denir. Oksijence zengin kanın aortla (ana atar damar) sol karıncıktan çıkıp tüm vücudu dolaştıktan sonra oksijence fakirleşerek alt ve üst ana toplardamarlarla (alt-üst vena cava) kalbin sağ kulakçığına dönmeye ise büyük kan dolaşımı denir.



Görsel 4.23: Büyük ve küçük kan dolaşımı

Genel kural olarak atardamarlar içinde oksijen yönünden zengin temiz kan, toplardamarlar içinde ise oksijen yönünden fakir kan (*kirli kan*) dolaşır. Bu kurala uymayan vena pulmonalis, akciğerlerden sol kulakçığa temiz kan getirir. Kalpten çıkan arteria pulmonalis (akciğer atar damarı) ise sağ karıncıktan akciğerlere kirli kan götürür.

4.11.2. Fötal Kan Dolaşımı


Fötal dönemde (ana rahminde) yavrunun kan dolaşımı doğum sonrası dolaşımdan çok farklıdır. Fetüs ihtiyacı olan besin maddelerini plasenta (yavru zarı) yolu ile ana karnından sağlar. Yavru, akciğer solunumu yapamadığından gaz değişimini plasenta üstlenir. Yavru ile plasenta arasındaki ilişki göbek kordonu ile olur. Göbek kordonunda bu işi gören göbek atardamarı ve toplardamarı (*arteria ve vena umbilicalis*) yer alır.

4.12. Damar Sistemi

Damarlar, kan damarları ve lenf damarları olarak iki gruba ayrılır. Kan damarları da kendi aralarında atardamarlar (*arteria*) ve toplardamarlar (*vena*) olmak üzere yine iki kısma ayrılır. Arter ve venalar merkezden çevreye doğru çapları giderek küçülen kılcal damarları (*kapillar*) oluşturur.

4.12.1. Atardamarların Yapısı ve Görevleri


Kalbin vücuda gönderdiği kanı dağıtma işlemi arterler, toplanması ise venalar aracılığı ile gerçekleşir. Atardamarlar kanı kalpten dokulara doğru iletir. Arterler kalbin sistol hareketi yapması sonucu meydana gelen basınca direnç gösterecek ölçüde kalın bir duvar yapısına sahiptir.



Görsel 4.24: Atardamarların yapısı

Atardamarlar, dıştan içe doğru üç tabakadan oluşur: En dışta lifli bağ doku (*tunica adventitia*, *tunica externa*), arada elastik lifler içeren düz kaslar (*tunica media*), içte ise endotel adı verilen tek sıralı yassı epitel doku (*tunica intima*) bulunur. Atardamarlarda kan basıncı ve kan akış hızı yüksektir. Atardamarlardaki yüksek kan basıncına karşı damarın dayanıklılığını artıran elastik liflerdir. Akciğer atardamarı hariç atardamarların tümü oksijen zengin kan yani temiz kan taşır.

Atardamarlar kesildiği zaman, kalbin kasılmalarına uygun olarak, kanın kesik kesik ve fışkırarak akmasından belli olur. Atardamarlar vücudun derin kısımlarında seyretmek suretiyle dış etkenlerden gelebilecek yaralanmalardan, eklemlerin büküm yüzlerinde yer alarak, gerilmelere bağlı kopmalardan korunmuş olurlar. Bir atardamara çoğu kez toplardamar ve bölgenin sinirleri eşlik eder. Bir bölgedeki atardamar toplardamarlar ince dallarla (*kapillar*) ağ şeklinde birleşir. Buna **anastomoz** (ağızlaşma) denir.



Görsel 4.25: Arter ve venalarda ağızlaşma (anastomoz)

4.12.2. Toplardamarların Yapısı ve Görevleri

Toplardamarlarda kan basıncı düşüktür. Çapları atardamarlardan büyük olduğu için daha çok kan bulundurur. Kan basıncıyla karşılaşmadıkları için atardamarlara göre damar duvarları daha incedir. Kolaylıkla gerilirler. Atardamarlarda kalınlığı sağlayan kas ipliklerinden zengin orta tabaka (*tunica media*) toplardamar duvarlarında yoktur. Kol ve bacak gibi ekstremitelerde toplardamarlarının içlerinde kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar özellikle bacaklarda kanın kendi ağırlığı sebebiyle geri gitmesine engel olur. Bu durum kan dolaşımının daha kolay yapılmasını sağlar. Beyin ve iç organ toplardamarlarında kapakçık yoktur.

4.12.3. Kılcal Damarların Yapısı ve Görevleri

Atardamarlar besin ve oksijeni hücrelere verebilmek için incecik bir damar ağı haline gelirler. Bu damarlara kılcal damarlar (kapillar damar) denir. Atardamar ile toplardamarlar arasında bulunurlar. Endotel adı verilen tek katlı yassı epitel dokudan meydana gelir. Epitel doku, hyalin kırıkdamak, gözün korneası gibi vücut dokularında kılcal damarlar yer almaz. Küçük atar damarlar önce daha küçük çaplı arterleri (*arteriol*) oluşturur. Bunlar da kılcal damarları oluşturmak üzere dallanırlar. Bu dallanarak incelme hücrelere besin ve oksijen götürmek içindir. Kapillar damarlarla gelen besin ve oksijen önce hücreler arası sıvıya verilir. Oradan hücrelere geçerek metabolik faaliyetlerde kullanılır. Oluşan metabolizma artıkları ve karbondioksit hücreler arası sıvıya geçer. Buradan venöz kılcal damarlarla alınarak büyük venalar vasıtasıyla kalbe iletilir.

4.12.4. Lenf sistemi ve lenf damarları

Lenf damarları içerisinde dolaşan, kan plazması ve lenf proteinlerinden oluşan dolaşım sıvısına lenf denir. Lenf sistemi ise lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan ve vücudun içinde bezler, kanallar ve alanlar oluşturan ve beyin hariç vücudun her yerinde devamlı dolaşan lenf sıvısını taşıyan bir organ sistemidir. Lenfatik sistem veya ikinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanabilse de lenf sistemi yapısı itibarıyla dolaşım sisteminden çok farklıdır. Dolaşım sisteminden bağımsız olarak çalışan lenfatik sistem bağışıklık sistemi içeriğini yine dolaşım sistemine boşaltır ve genel olarak bağışıklıkta rol alır.

Görevleri şunlardır:

- Doku ve hücrelerdeki yabancı maddeleri, ölü ve yıpranmış hücreleri, bakteri ve mikropları uzaklaştırmak,
- Kaybedilen proteinlerin bir kısmını tekrar dolaşıma kazandırmak,
- Doku sıvısı ile kan sıvısının dengede kalmasını sağlamak, lenf dolaşımı doku aralıklarında oluşan fazla sıvıyı toplayarak kan dolaşımına döndürülmesini sağlar. Bu şekilde ödem oluşumu engellenmiş olur.
- Bağırsaklarda emilen yağ asitleri, gliserol, A, D, E, K vitaminlerini dolaşıma katmak,
- Vücudun savunma sistemine destek olmak, akyuvar hücrelerinden olan lenfositler bağışıklık oluşumunda görev alırlar.
- Hücreler arası proteini sağlar, kullanılmayan fazla proteini dokulardan uzaklaştırır. Fazla proteinin dokulardan uzaklaştırılmaması hayati tehlike oluşturur.
- Sindirim kanalı dışında deri altı, kas içi yollarla organizmaya giren maddeler lenf damarlarıyla emilir.

Lenf sisteminde, dolaşım sistemindeki kalp gibi pompalama görevi yapacak bir organ yoktur. Lenf sıvısının vücut içindeki hareketi, iskelet kaslarının basıncı ve solunum hareketleri ile sağlanır. Lenf sistemi;

lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur. Lenf damarları lenf sistemine dâhildir. Lenf denilen saydam, açık sarı renkteki sıvıyı taşırlar. Lenf sıvısı, lenf plazması ile içinde bulunan lenfositlerden (akyuvar hücresi) oluşur. Lenf damarı birçok lenf yumruları ile lenf foliküllerinin içerisine ince lenf damarları gönderir. Lenf yumruları ürettikleri lenfosit ve özel savunma proteinlerini (*gama globulin*) lenf sıvısına katar.

Lenf damarları yapı olarak diğer damarlara benzer. venalarda olduğu gibi kapakçığa sahiptir. Lenf damarları kalbe dönük lenf kılcalları halinde başlar. Bu kılcallar lenf yumruları denen süzgeçten geçtikten sonra birleşerek vücudun en büyük lenf damarını oluşturur.

4.12.4.1. Lenfoid Organların Yapısı ve Görevleri


Organizmaya giren mikrop ve yabancı maddelere karşı bağışıklık oluşturulmasında görev alan organlara "*lenfoid organlar*" denir. Bu organlar lenforetiküler dokudan oluşmuştur. Bu organların oluşturduğu sisteme de "*retikuloendotelial sistem*" denir. Lenf yumruları, dalak, timus, bursa fabricius ve kemik iliği bu sistem içerisinde yer alır.

4.12.4.2. Lenf Yumruları [Lenf Düğümleri (Lymphonodi)]

Vücudun belli bölgelerinde, lenf damarları üzerinde yer alan, esmer gri renkte, ortalama 1-2 cm çapında, yuvarlak veya oval oluşumlardır. Besili hayvanların yumruları içinde yağ bulunduğu için rengi sarıya çalar. Enfeksiyöz hastalıklarda lenf yumruları şişer. Lenf yumrularının muayenesi hastalıkların teşhisine yardımcı olur. Lenf düğümlerinde akyuvar hücresi olan ve antikör yapımında görev alan *lenfositler* üretilir. Lenf sıvısı, lenf düğümlerinden geçerken üretilen lenfositler bu sıvıya karıştırılır.

Evcil memelilerden geviş getiren hayvanlarda az olarak da köpeklerde vücut boşluklarının duvarlarında "*hemal lenf yumrusu*" denen koyu kırmızı veya siyah renkli oluşumlar vardır. Bu lenf yumruları lenf damarları üzerinde yer almazlar. Her lenf yumrusunda ilgili lenf damarının giriş çıkışı bir hilus (göbek) vardır. Dıştan zardan bir kapsül ile çevrelenir. Bir bölgenin lenf damarı üzerinde bulunarak o bölgenin savunmasını üstlenen bir veya birkaç lenf yumrusu bulunabilir. Buna lenf merkezi (*lenfocentrum-Lc.*) denir. Vücuttaki bazı lenf bezleri

- **Lenfocentrum parotidicum:** Kulak altı tükrük bezinin ön kenarında, derinin hemen altında görülen lenf yumrusudur.
- **Lenfocentrum mandibulare:** Oldukça büyük bir lenf yumrusudur. Alt çene kemiklerinin iç tarafında bulunur. Derinin hemen altında yer aldığı için elle kolaylıkla muayene edilebilir.



Görsel 4.26: Sığırdaki yüzeysel lenf yumruları

- **Lenfocentrum retropharyngeum:** Yutağın arka duvarının üstünde, ilk boyun omurunun yan çıkıntısına yakın olarak iki parça halinde bulunur.
- **Lenfocentrum servicale superficiale (boynun yüzlek lenf merkezi) :** Üst kol eklemi önünde yüzlek olarak bulunur. Dışarıdan fark edilebilir.
- **Lenfocentrum cervicale profundum (boynun derinde bulunan lenf merkezi) :** Gırtlak ile göğüs kafesi girişine kadar, soluk borusu boyunca yer alan irili ufaklı çok sayıda lenf yumrusundan oluşur. Dıştan fark edilemez. Ön, orta ve arka tarafta olmak üzere üç bölgede bulunur.
- **Lenfonodi axillares propri (koltuk altına ait özel lenf yumrusu):** Koltuk altında üçüncü kaburga arası (intercosta) bölgede bulunur.
- **Lenfonode axillaris primacosta (koltuk altı birinci costa lenf nodülü):** Koltuk altında birinci kaburganın yanında yer alır.



Görsel 4.27: Atta lenf sistemi

ÖĞRENME BİRİMİ	HAYVANLARDA SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	DOLAŞIM SİSTEMİ	SÜRE
UYGULAMA ADI	YÜZLEK LENF YUMRULARININ KONTROLÜ	10 DERS SAATİ

AMAÇ - Yüzlek lenf yumrularını kontrol etmek

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Çeşitli türdeki hayvanlarda lenf yumrularından yüzlek olanların yerini anatomik olarak söyleyerek gösteriniz.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde çeşitli hayvan türleri üzerinde lenf yumrularını göstererek, kontrol tekniğini inceleyiniz.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Çeşitli türde canlı hayvanlar, kesilmiş hayvanlara ait lenf yumruları, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, bisturi, pens

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyarak hayvan üzerinde lenf yumrularının adını ve yerini gösteriniz.
- Hayvan türlerine göre tespit edebildiğiniz lenf yumrularını ve durumlarını, tahmini büyüklüklerini kayıt ederek arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BE CERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	40	40	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						


4.12.5. Dalak (Lien)

Dalak, midenin yakınında olmasına rağmen sindirimde hiçbir rol oynamaz, sadece kan ve lenf ve bunların dolaşımı ile ilgilidir. Tüm omurgalıların bir dalağı vardır. Dalak, lenf noduna benzese de çok daha büyüktür. Aslında, vücuttaki en büyük lenfatik organdır. Orta düzlemin sol yanında ve mide ile karın duvarı arasında bulunur. Tektırnaklarda koyu kırmızı renkte, sığırlarda gri- mavimsi renktedir. Koyun, keçi, dana ve köpekte kırmızı renktedir. Diyaframa bakan yüzü dış bükey olup diyafram yüzü facies diyafragmatika, organlara bakan yüzü ise facies visceralis adını alır. Dalak bir takım bağlarla mide ve sol böbreğe bağlanır. Tektırnaklılarda dalağın bir ucu sivri orak şeklindedir. Sığırdan uzundur ve dile benzer. Koyun ve keçide yuvarlak üçgen şeklindedir. Dalağın görevleri şunlardır:

- Dalak; lenf yumruları gibi lenfosit, monosit ve plazma hücrelerini ürettiğinden, vücut savunmasında görev alır. Bağışıklık ve fagositoz gibi reaksiyonlarla retiküloendotelial sisteme dahil olur. Fagositler bakterileri uzaklaştırır ve bağışıklık cevaplarını başlatır.
- Dalak yaşlanmış alyuvarları ve lökositleri tahrip eder.
- Kan depo eder, gerektiğinde dolaşıma verir.

4.12.6. Timus (Thymus)

Timus, soluk borusunun iki yanında, tiroit bezine kadar uzanan, loblu görünümde bir organdır. Yeni doğanlarda ve gençlerde kırmızı- gri renkte, ergenlerde ise sarımsı renktedir. Timus iç salgı bezlerindedir. Yeni doğanlarda, ergenlik dönemine kadar çok önemli görevi vardır. Kemiklerin normal gelişiminde, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının düzenlenmesinde, büyümede rol oynar. Enfeksiyonlara karşı korumada ve bağışıklık sisteminin devamında gerekli bir organdır. Yeni doğan farelerin timusları çıkarıldığında birkaç ay yaşayabildikleri görülmüştür. Yeni doğanlarda oldukça büyük olan bez, ergenlik döneminin başlamasıyla, genital bezlerin etkisi ile yağ dokusuna dönüşür ve küçülür.



Görsel 4.28: Timus

4.12.7. Bursa Fabricius

Kanatlılara ait bir bezdir. Oval şekilli bir kese olup bağırsağın kloaka ile birleşme yerinde bulunur. Kanatlılarda kemik iliğinden köken alan lenfositlerin B-lenfositlerine dönüştüğü organdır. Bursa fabricius'ları kuluçka döneminde alınan civcivlerde bağışıklık sisteminin gelişmediği gözlenmiştir.

4.13. İç Salgı Bezleri ve Ürettikleri Hormonlar

İç salgı bezleri (endokrin bez) doku ve organların çalışmalarını düzenleyip ve hormon olarak adlandırılan kimyasal maddeleri sentezleyip salgırlar. İç salgı bezlerinin salgı kanalları bulunmaz. Bezleri kan damarları yönünden oldukça zengindir. Ürettikleri hormonlar büyük dolaşım ile bütün vücuda yayılır. Hormonlar bütün vücut hücreleri ile temasa geçebilir, ancak hormona özgü reseptör (alıcı) taşıyan hücreler etkilenir. Bu hücrelere ve organlara hedef hücre veya organ denir.

4.13.1. Pankreas

Pankreas gri-pembe renkli, loblu bir bezdir. Mide, karaciğer ve onikiparmak bağırsağı arasında yer alır. Tükürük bezi yapısındadır. Hem iç salgı hem de dış salgı bezi olarak görev yapar. Pankreas dış salgı bezi olarak sindirim enzimlerini, iç salgı bezi olarak da karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan insülin ve glukagon hormonlarını üretir. İnsülin glikozun hücrelere geçişini kolaylaştırarak kan şeker düzeyini düşürürken, glukagon ise kan şeker düzeyini artırır. İnsülin eksikliği, tedavi edilmezse ölüme sonuçlanabilecek şeker hastalığına (*diabetes mellitus*) yol açar.

4.13.2. Tiroit Bezi (Glandula Thyroidea)

Loblu ve koyu kırmızı renkli bir bezdir. Tiroit bezi, tiroksin adı verilen hormonu salgılar. Bu bezin çalışması hipofiz ön lobunda bulunan tiroit uyarıcı hormon (tirotropin, TSH) ile denetlenir. Tiroit hormonu sentezi için iyot gereklidir. Tiroit hormonlarının etkileri:

- Dokuların metabolik hızını artırır. Oksijen kullanımı arttığından enerji üretimi çoğalır. Vücut sıcaklığı hafif yükselir ve azot atılımı hızlanır.
- Protein ve yağ depoları boşalmaya başlar. Yeterli besin alınmazsa kilo kaybı gözlenir.
- Tiroksin hormonu yetersizliğinde vücutta su tutulur, buna bağlı deri şişkinlikleri (miksödem) görülür.
- Tiroit bezinin fazla çalışması halinde sinirlilik, kalp atımında hızlanma, nabız artışı, kilo kaybı, fazla yeme gibi belirtiler gösterir. Ekzoftalmus (göz yuvarlağını dışarı çıkma hali) görülebilir. Hayvanlarda kış uykusuna yatma, tüy ve deri değiştirme gibi olgular tiroit bezi tarafından düzenlenir.

4.13.3. Paratiroit Bezi

Bu salgı bezi ikisi dışta ikisi içte olmak üzere dört tanedir. Tiroit bezinin arka yüzünde yer alır. Bu bezin salgıladığı hormona parathormon (PTH) denir. Vücutta kalsiyum metabolizmasını düzenler. Kan plazmasında kalsiyumu belli bir seviyede tutar. Kandaki kalsiyum seviyesi bağırsaklardan emilen kalsiyum miktarına, besinlerdeki D vitaminin miktarına ve parathormonun salgılanmasına bağlıdır. Parathormon kemikler üzerine etkili olması için vitamin D'ye muhtaçtır. Parathormon kemiklerden kalsiyum çekip kana verir. Böbreklerden idrarla fosfat çıkışını artırır.

Parathormon az salgılanırsa kanda kalsiyum seviyesi düşer, kaslarda titremeler ve kramplar oluşur. Parathormon çok salgılanırsa kemiklerden kalsiyum çok çekilir, kemiklerden kana geçen kalsiyumun seviyesi artar. Fosfat yoğunluğu azalır kemikler kolayca kırılabilir. Vücutta kalsiyum metabolizmasında görevli diğer bir hormon da tiroid bezi tarafından salgılanan kalsitonindir. Kemiklerde kalsiyumun depolanmasını sağlar.

4.13.4. Hipofiz Bezi

Hipofiz bezi, beynin tabanında bulunan fındık büyüklüğünde bir bezdir, Hipofiz ön lob, orta lob ve arka lob olarak üç kısma ayrılır.

Hipofiz ön lobdan bilinen altı hormon salgılanır. Bunlar:

- Büyüme hormonu (GH),
- Tiroid uyarıcı hormon (TSH),
- Böbrek üstü bezini uyarıcı hormon (ACTH),
- Lüteinize edici hormon (LH),
- Follikül uyarıcı hormon (FSH)
- Prolaktin hormonudur.

İlk beş hormonun etkisi diğer bezler üzerinedir, hormon salgılanmasını uyarırlar (tropik etki). Hipofiz ile hipotalamus arasında sıkı bir iş birliği vardır. Bazı hipofiz hormonları hipotalamusta bulunan hücreler tarafından sentezlenir.

4.13.5. Böbrek Üstü Bezi [Adren, Glandula (Suprarenalis)]

Böbreklerin üst kısmına yerleşmiş olan külah biçiminde sarımtırak renkte bir bezdir. Birbirinden farklı iki kısımdan oluşur. Dışta yer alan kabuk (korteks) içte yer alan ilik (medulla) olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Kabuk (korteks) kısmı bezin büyük bir kısmını oluşturup hayati öneme sahiptir. Korteks kısmı steroid hormonları, medulla kısmı adrenalin, noradrenalin ve dopamin gibi hormonları salgılar.

4.14. Kanın Yapısı ve Görevleri

Kan kapalı bir sistem içerisinde dolaşan, plazma denilen sıvı ile bu sıvı içerisinde yüzen kan hücrelerinden oluşan bir dokudur. Kan insan ve diğer memeli gruplarında kolaylıkla pıhtılaşabilen hafifçe kaygan olan, kolayca köpürebilen bir sıvıdır. Rengi, büyük atardamarlarda (arterlerde) koyu kırmızı, toplardamarlarda (venalarda) ise hemen hemen çok koyu kırmızı-siyah renktedir. Kanın rengi alyuvarlarda bulunan hemoglobinden ileri gelir. Kanın kendine özgü tuzlu bir tadı ve karakteristik bir kokusu vardır. Bu koku plazmadaki buharlaşabilen yağ asitlerinden ileri gelir. Bir çeşit ter kokusunu andıran kan kokusu hayvanlara ve cinsiyete göre değişir.


Kan hücreleri alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositlerdir. Plazma içinde asılı vaziyette bulunurlar. Dolaşımdaki kan miktarı insanda, koyunda, köpekte vücut ağırlığının 1/13' ü, sığırdaki 1/12' si atta ise 1/15' i kadardır. Kan miktarının 1/10' u alınabilir.

İnsanlarda kan grupları nasıl sınıflandırılır?

İnsanlarda kan grupları nasıl tespit edilir?

Kan bağıışı yapmak neden önemlidir?

ARAŞTIRALIM



Görsel 4.29: Santrifüj yapılmış kan örneđi ve kan hücrelerinin görünümü

Kan hacminin % 55 kadarını plazma, %45'ini ise kan hücreleri oluşturur. Plazmanın %90' ı sudur, geri kalanı katı maddelerdir. Hayvanın türüne, diyetine ve incelenen plazmanın miktarına bađlı olarak sarı renk ile renksiz (ince bir tabaka olarak yayıldığında) arasında bir renk dağılımı gösterir. Kedi, köpek, koyun ve keçi gibi türlerde renksiz veya hafif sarı iken, ineklerde ve özellikle de atlarda genellikle daha koyu renklidir. Plazmanın rengi esasen bilirubin adı verilen pigmentin oranına bađlı olup karoten ve diđer pigmentlerin de rolleri vardır.


Kanın Görevleri

- Sindirim kanalından aldığı besin maddelerini organ ve doku hücrelerine götürür.
- Hücrelerde madde deđişimi sonucu oluşan, artık maddeleri vücudun dışarı atma kapılarına götürür.
- Akciđerlerden alınan oksijeni hücrelere taşır.
- Endokrin (iç salgı) bezlerin salgıladıkları hormonları gerekli yerlere iletir, organların uyum içinde çalışmasına yardım eder.
- Organizmada su miktarının ve osmotik basıncın dengede tutulmasında etkilidir.
- Vücut ısısının düzenlenmesini ve ısının vücutta dağılmasını sağlar.

- Alyuvarlarla birlikte bağışıklık maddelerini gerekli yerlere götürecek mikroorganizmalara karşı savunma yapar.
- Vücut hücrelerinin içinde buldukları ortamın değişmez tutulması (homeostasis) hayatın devamı için şarttır. Kan yaptığı işlerle buna yardımcı olur.

4.15. Kan Hücreleri (Kanın Şekli Elemanları)

Kanın şekilli elemanları alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcukları (trombosit) dir.




Görsel 4.30: Kan hücreleri

4.15.1. Alyuvarlar (Eritrositler)


Alyuvarların ortalama yaşam süreleri hayvanlarda farklıdır. Köpeklerde 100-130 gün, kedilerde 70 - 80 gün, atlarda 140 - 150 gün, domuzlarda 75 - 95 gün, ergin ruminantlarda 125 - 150 gün iken kuzularda ve buzağılarda 50 - 100 gündür. Bu süre tavşan, sıçan ve fare gibi laboratuvar hayvanlarında 55-60, tavuklarda ise 28-30 gündür. Kandaki şekilli elemanların çoğunluğunu oluşturur. Memelilerde dolaşıma katılmadan çekirdeklerini kaybederler. Kanatlı, sürüngen ve balıklarda çekirdeklidir. Omurgalıların alyuvarları kana kırmızı rengini veren hemoglobinin pigmentini taşır. Hemoglobin protein yapısındadır. Oksijeni hücrelere iletir. İnsanlarda her iki yüzeyi içbükey (bikonkav) disk şeklindedir. Aktif olarak hareket edemezler, fakat kılcal damarlarda dar olan yerlerden şekillerini değiştirerek kolayca geçerler. Fötal hayatın yarısından sonra asıl kan yapıcı organ olan kemik iliğinde yapımına başlanır ve hayat boyunca burada üretilir. Başlıca kan yapan kemik iliği costalar (kaburga), göğüs kemiği, leğen (pelvis) kemiği ve extremiteler (kol ve bacaklar) de bulunur. Genç hayvanlarda uzun kemik ilikleri kırmızıdır ve kan yaparlar. Yaşlanmayla yağlanarak sarı ilik oluşur, artık eskisi gibi kan hücreleri yapamaz.

Alyuvarın sayısı hayvan türü, ırk, cinsiyet, yaş, yerin seviyesi, çalışma ve istirahat durumuna göre değişir. Genç bireylerde sayıları fazladır. Çalışma durumu alyuvar sayısını artırır, uyku durumunda sayı oldukça düşer. Akşamları en yüksek düzeye çıkar. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azaldığından alyuvarlarda artış gözlenir. Çevre ısısı, gebelik, sağıma girme gibi durumlarda alyuvar değerleri üzerinde etkilidir. 1 mm³ kanda sığırdada 5-10 milyon, atta 6,5-12 milyon, kedide 5-10 milyon, tavukta 2-3 milyon alyuvar bulunur. Hemoglobin oksijen taşıyan demir yönünden zengin bir pigmenttir. Hemoglobinin görevi oksijeni akciğerlerden alarak vücudun bütün dokularına taşımak ve metabolizma artışı olan karbondioksiti dışarı atmak üzere akciğerlere geri götürmektir.




Görsel 4.31: Oksijenin hemoglobine bağlanması

Hemoglobin; oksijen ile gevşek bir tarza bağlanır. Bağlanma geri dönüşümlüdür.



Hemoglobinin karbondioksitle bağlanması da geri dönüşümlüdür.



Hemoglobinin karbonmonoksitle olan birleşimine *karboksihemoglobin* denir. Reaksiyon dönüşümsüz olup bu birleşme nedeniyle kanın oksijen taşıma kapasitesi azalır. Özellikle hava gazı zehirlenmesinde hemoglobin karbon monoksitle şiddetle bağlanır. Alyuvar hücrelerinin içbükey olması, gaz alışverişinin olabildiğince geniş yüzeylerde yapılmasına imkân verir.




Görsel 4.32: Alyuvar hücresi

OKUMA PARÇASI

HAYVANLARDA DA KAN GRUPLARI VAR MIDİR?

İnsan kanları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde çeşitli maddelerin bulunup bulunmamasına göre gruplandırılır ve bugüne kadar tanımlanmış 35 ayrı kan grubu sistemi vardır. Bu sistemlerin en önemlisi ABO gruplandırmasıdır. Avusturyalı bilim insanı Karl Landsteiner tarafından geliştirilen ABO sisteminde, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde A ve B olarak adlandırılan iki ayrı antijeninin olup olmadığına bakılır. Sadece A antijeni olan kanlar A, sadece B antijeni olan kanlar B, hem A hem de B antijeni olan kanlar AB, ne A ne de B antijeni olan kanlarsa O olarak gruplandırılır. Kan grubu kalıtsal bir özelliktir ve hem anneden hem de babadan gelen genler tarafından belirlenir.



İnsanlardan başka canlılarda da kan grupları vardır. Örneğin köpeklerde 13, kedilerde 3, atlarda 8 ayrı kan grubu tanımlanmıştır. İnsanlardaki A, B, AB, O kan gruplarına başka canlılarda da rastlanır. Örneğin maymunların, gorillerin ve kemirgenlerin kanları da ABO sistemi ile gruplandırılır.


<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/hayvanlarda-da-kan-gruplari-var-midir>

4.15.2. Akyuvarlar (Lökositler)

Dolaşım kanında ortalama bin alyuvara bir akyuvar düşer. 1 mm³ kanda sığırdada 4-12 bin koyunda 2,5-7,5 bin, atta 5,5-12,5 bin, köpekte 6-17 bin, tavukta 20-45 bin civarında akyuvar bulunur.

Akyuvar Çeşitleri

Kanda bulunan akyuvarlar iki sınıfa ayrılırlar. Sitoplâzmalarında bir takım granüller bulunanlara granüositler denir. Bu grupta nötrofil, eozinofil ve bazofil yer alır. Sitoplâzmalarında granül bulunmayanlara ise agronüositler denir. Bu grupta ise lenfosit ve monosit bulunur.



Görsel 4.33: Kırmızı kan hücreleri, trombositler, lökositler, lenfositler, eozinofiller, nötrofiller, bazofiller monositler

4.15.2.1. Agranüositler


Lenfositler: Çekirdekleri hücrenin tamamına yakını doldurur. Bağışıklık sistemindeki görevlerine bakarak B lenfositleri ve T lenfositleri olarak ayrılır. Doğumdan sonra bir kısım lenfositler kemik iliğinde üretilir. Lenfositlerin çoğu; daha önceden kemik iliğinden lenf düğümleri, tonsiller, dalak ve timusa gelen öncül hücrelerden üretilir. Timus bezine gelen hücreler T lenfositleri oluşturur ve hücrenel bağışıklıkta görev alır. Kanatlılarda bursa fabricius ve memelilerde bunun karşılığı lenfoit dokulara gelen köken hücreler B lenfositlere dönüşür. B lenfositleri sıvısal bağışıklıkta görev alır.

Lenfositlerin % 2'si dolaşım kanının içinde bulunur, geri kalanı genellikle lenfoid organlardadır. B lenfositlerin yüzeyleri çok sayıda immünooglobulin (Ig) molekülü bulunduru. Bu immünooglobulin molekülleri antijenler için alıcı (reseptör) görevi yapar. Damar dışına çıkan B lenfositleri antijenlerle karşılaşınca çoğalır ve plazma hücrelerine dönüşür

Monositler: Alyuvarların %3-9'unu meydana getirir. Çekirdekleri at nalı şeklindedir. Monositler kemik iliğinden kana geçer, kanda 3-4 gün kaldıktan sonra dokulara geçer. Damar aralarından, yalnız ayak (diapedezis) çıkarak sıyrılıp geçerler. Dokuda amip benzeri hareketlerle ilerlerler. Bu özellik damar dışına çıkabilen tüm akyuvarlarda vardır. Dokudaki monositler, doku makrofajlarına dönüşürler. Bu hücrelerin güçlü fagositoz yetenekleri vardır.


4.15.2.2. Granüositler

Granulositler nötrofil, eozinofil ve bazofil olmak üzere üç tür hücreden oluşmuştur. Kan boyalarından birisi ile boyandıklarında sitoplazmaları içinde bir takım granüllere sahip olduğu görülen akyuvarlardır. Granülsüz akyuvarlarda çekirdek tek parçalı olduğu halde granulositlerde çekirdek birkaç parçadan oluşmuştur. Granulositler de hareketlidir, damar dışına çıkabilirler.



Görsel 4.34: Kan hücrelerinin mikroskopta görünüşü

Nötrofiller, hayvan türlerine göre tüm akyuvarların % 65-70' ini oluşturur. Sitoplazmada bulunan granüller lizozim (sindirim enzimi) içerir. Bu hücrelerin görevi fagositoz yapmaktır. Organizmada oluşan yangılarda damardan çok miktarda nötrofil çıkararak (diapedesis yoluyla) yangılı bölgeye ulaşır. Daha sonra bölgeye makrofajlar da gelir. Nötrofil ve makrofajlar amoboid hareketlerle bakterileri kuşatır. Bakteri ve ölmüş doku kısımlarını fagosite ettikten sonra kendiler de ölürlür. Burada ölmüş hücreler ve yarı sıvı olan bir madde olan irinin meydana gelmesine sebep olur. Kanda nötrofillerin sayısı akut enfeksiyon olaylarında çok çabuk artar. Ömürleri 4-8 gündür.



Görsel 4.35: Nötrofil

Eozinofil: Eozinofil sayı olarak tüm akyuvarların %2'si ile %4'ü kadardır. Organizmada meydana gelen toksik, alerjik ve aşırı duyarlılık halinde belirgin derecede artar. Akciğer veya mide - bağırsak yoluyla vücuda giren parazit enfeksiyonlarında kandaki sayıları yüksek oranda çoğalır.

Bazofil : Kanda en az bulunan akyuvar türüdür. Fagositoz yapmazlar. Damar dışına pek çıkmayan bu hücreler bol miktarda heparin ve histamin taşır. Heparin kanın pıhtılaşmasını önleyen maddedir. Ani aşırı duyarlılık tepkimelerinde histamin salgılayıp, hafif alerjik belirtilerden, şoka kadar değişen reaksiyon verir. Kanın şekilli elementlerinin en küçüklerindedir.

Akyuvarları azaltan ve artıran durumlar: Viral hastalıklarda nötrofillerin sayısı azalır, bakteri ve toksinlerinden ileri gelen rahatsızlıklarda nötrofiller artar. Lenf sistemi tümörlerinde, enfeksiyonlarda, özellikle virüs enfeksiyonlarında lenfositler artar. Aşırı fiziksel çaba cerrahi müdahaleler, gebelik, doğum, enfeksiyon hastalıkları, doku zedelenmeleri, ağrı durumları lökosit sayısını arttırır (lökositosis). Beslenme bozuklukları, açlık, aşırı zafiyet, alerjik şoklar akyuvarları düşürebilir (lökopeni).

Yaşama süreleri: Akyuvarlara göre çoğu akyuvarların hayat süreleri çok kısadır. Granülositler kanda ortalama 12 saat kalırlar. Monositlerin 90 gün, lenfositlerin 100-200 gün ömürlerinin olduğu tespit edilmiştir.

Akyuvar yapımı: Doğum sonrası bütün kan hücrelerinin yapım yeri kemik iliğidir. Lenfosit ve monositler ayrıca lenf yumruları dalak-timus ve bursa fabricius (kanatlılarda) gibi lenfoid organlarda da yapılır.

4.16. Trombositler

Kanın şekilli elementlerinin en küçüğüdür. Kemik iliğindeki dev hücreler olan megakaryosit sitoplazmasının tomurcuklanarak kopan parçalarından trombositler üretilir. Trombositlerin % 60-75'i kan dolaşımında, geri kalanı dalakta bulunur. Sürünge, balık ve kanatlılarda çekirdek taşıyan tipik hücre yapısındadır. Memelilerde, çekirdeksiz çok küçük hücrelerdir. Sitoplazma içinde boyandıklarında granülleri görünür. Kan pulcukları olarak da isimlendirilir. Ömürleri 2-5 gün kadardır. 1 mm³ kandaki sayıları atlarda 300-350 bin, sığırdada 500-900 bin arasındadır. Kanın pıhtılaşmasında görev yapar.

4.17. Plazma ve Serum

Plazma, kan vücut dışına alınır ve pıhtılaştırılsa jelatine benzer bir kitleye dönüşür ve pıhtının büzüşmesiyle, serum adı verilen sıvı dışarı çıkar. Serum plazmaya benzer fakat fibrinojen ve diğer pıhtılaşma faktörlerini içermez. Kan, vücuttan dışarı alınıp pıhtılaşmayı önleyici bir madde ile (*antikaogülant*) karıştırıldıktan sonra bekletilirse, hücreler kabın dibine çöker ve üstte saman sarısı renginde bir sıvı kalır. Kanın şekilli elementlerinden artakalan bu sıvıya plazma denir.

Kanın %55'i plazma, %45'i şekilli elementlerden oluşmuştur. Plazma yaklaşık olarak %92 sudan ve %8 katı maddelerden oluşmuştur. Katı maddelerin %2'sini proteinler, %1'lik kısmını ise organik maddeler ve elektrolitler (pH dengeleyicileri) oluşturur.


Plazma Proteinleri

Gama globulin (immunoglobulinler): Dolaşımda bağışıklık veren (*antikorlar*) maddelerdir. Plazma hücreleri tarafından üretilir.

Albumin: Bağlayıcı, taşıyıcı, osmotik basıncı düzenleyici bir proteindir. Metaller iyonlar, yağ asitleri, aminoasitler, enzimler ve ilaçlar için aynı zamanda taşıyıcı olarak görev yaparlar. Dolaşımdaki proteinlerin %55'ini oluşturur. Karaciğerde üretilirler.

Fibrinojen: Kan pıhtılaşmasında rol oynar. Karaciğerde üretilir. Bunların dışında plazmada protein tabiatında bir çok madde daha bulunur.

İnorganik maddeler; sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, bikarbonat ve fosfat iyonları başlıca elektrolitlerdir. Bunun yanında demir, bakır gibi elementler de içerir. Aminoasit, glikoz, lipitler, enzimler, hormon ve vitaminler plazmada bulunan diğer maddelerdir.




Görsel 4.36: Serum ve plazma

Serum, kan damarlardan alınıp pıhtılaşmaya terk edilir ve kan pıhtısı uzaklaştırılırsa kalan sıvıya serum denir. Aslında serum, fibrinojen ve pıhtılaştırma faktörleri alınmış plazmadan başka bir şey değildir. Serum içerisinde antikorlar (bağışıklık maddeleri) mevcuttur. Hayvanlara belli aralıklarla hastalık yapıcı bir etken (antijen) verilecek olursa, kanda o antijene özgü antikorlar meydana gelir. Bu gibi hayvanlardan alınacak serum, diğer hayvanları bu etkene karşı pasif olarak tedavi etmek ve korumak amacıyla kullanılabilir.

4.18. Pıhtılaşma Mekanizması

Zedelenen damarlardan kanın dışarıya akmasına kanama, hasarlanmış kan damarlarından dışarı akan kanın durdurulmasına ise hemostaz denir. Kan damarı zedelenince ilk reaksiyon zedelenen yerdeki kan damarının büzülmesidir. Damarın büzülmesi, hasar büyük değilse kanamayı azaltır veya durdurur. Hasar büyükse damarın dikilmesi gerekir.

Damarın büzülmesiyle beraber trombosit kesik bölgesinde kümeleşir ve geçici gevşek bir tıkaç oluşturulur. Ancak trombositlerin bu etkisi kanamanın durmasına yeterli değildir, geçici tıkaçın, kalıcı pıhtıya dönüşmesi gerekir. Bu da içindeki trombositlerin yer aldığı gevşek kümeleşmenin, fibrin iplikçikleriyle bağlanmasıyla sağlanır.



Görsel 4.37: pıhtılaşma mekanizması

Trombin enzimi, kanda inaktif enzim olan protrombin halinde bulunur. Protrombinin aktif trombin haline getirilmesi için kalsiyum iyonunun (Ca^{+2}) ve birçok plazma pıhtılaşma faktörlerinin katalizör olarak etkimesine ihtiyaç vardır. Kanın pıhtılaşmasında esas tepkime, çözünür plazma proteini olan fibrinojeninin, çözünmez fibrin haline dönüştürülmesidir. Trombin, fibrinojeni erimeyen fibrine dönüştürür. Fibrin iplikleri ve aralarındaki kan pulcukları pıhtıyı meydana getirir.

4.19. Hemoliz

Çeşitli nedenlerle alyuvarların parçalanarak hemoglobinin dışarı çıkmasına hemoliz denir. Hemoliz doğuran önemli etkenler şunlardır:

- Hipotonik eriyiklerin kana verilmesi: Alyuvar zarı yarı geçirgendir. Alyuvarlar, ozmotik basıncı plazma basıncından daha düşük olan çözeltiler içinde şişer ve hemoglobin çözeltiliye geçer.
- Bakteri toksinleri, arı yılan sokmaları
- Donma ve çözülme, yüksek ısı
- Bazı kimyasal maddeler (safra tuzları, deterjanlar, kuvvetli asit ve alkaliler vb.)
- Kan parazitleri

Bu şekilde açığa çıkan hemoglobin plazmayı kırmızı bir renge boyar, buna hemoglobinemi denir. Plazmadaki hemoglobin idrarla dışarı çıkar, idrarın rengi kırmızı olduğundan bu hemoglobinüri (idrardan kan gelmesi) olarak tanımlanır.

4.20. Anemi (Kansızlık)

Kanda alyuvar ve hemoglobin miktarının azalması, normal değerlerin altına düşmesine denir. Anemi bir hastalık olmayıp bazı hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkan bir belirtidir. Anemiler çok çeşitlidir. Değişik esaslara göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Anemi oluşturan sebeplerden bazıları şunlardır:

- B12 vitamin noksanlığı, insanlarda öldürücü anemi (pernisyöz anemi) meydana getirir.
- Demir eksikliği
- Kemik iliğinin hasarına neden olan etkenler
- Damar bütünlüğünün bozularak fazla kan kaybına neden olan darbeler (travma)
- Mide ve karaciğer parazitlerine bağlı kan kaybı
- Dolaşım kanında, alyuvarlarda yıkım meydana getiren durumlar (anaplazma, piroplazma gibi kan parazitleri, bakır, kurşun zehirlenmeleri, bakteri toksinleri vb.)
- Hemoliz doğuran diğer etkenler

4.21. Sedimentasyon (Alyuvarların Çökmesi)

Pıhtılaşmayı önleyen bir madde ile karıştırılmış kan, bir tüpe konursa, bir süre sonra yerçekiminin etkisi ile kan hücreleri dibe çöker ve üstte plazma kalır. Çöken hücrelerin büyük bölümünü alyuvarlar oluşturur. Alyuvarların çöküş hızı normal insan ve hayvanlarda sabit değerlerdir. Hayvan türleri arasında çökme hızları farklılıklar gösterir. Akut enfeksiyonlarda, romatizma ve tüberküloz gibi hastalıklarda, kötü huylu tümörlerde, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında, gebelikte, alyuvarların çökme hızı artar. Çökme hızı hastalığı bildirmez, mevcut hastalığın seyri (prognoz) bakımından önemlidir.

4.22. Hematokrit

Kanın şekilli elemanlarının (alyuvar, akyuvar, trombosit) hacminin, plazma hacmine oranıdır. Şekilli elemanlar içerisinde en büyük hacmi alyuvarlar oluşturduğu için, hematokritin tanımı "alyuvar hacminin

plazma hacmine oranı” şeklinde de yapılabilir. Genellikle hematokrit değeri, 100 cc kanda bulunan alyuvarların cc olarak hacmini gösterir.

Günümüzde otoanalizör denilen cihazlarla diğer kan parametreleriyle birlikte çok kısa sürede sonuç almak mümkündür. Normal hematokrit değerleri: İnsanda; erkek 47-kadın 42, köpekte 37-55, sığırdaki, 24-46, atta 32-52, arasında değişir. Hematokrit değeri bakılarak bazı hastalıklar teşhis edilebilir ya da teşhiste bir basamak oluşturulabilir.

Hiperbilirubinemi (kanda safra pigmentinin artışı) ile birlikte hematokrit değeri çok düşük olması eritrosit yıkımının arttığını gösterir. Hemolitik anemilerde böyle bir durum gözlenir.

Dehidrasyon (su kaybı) durumlarında ise hematokrit değeri daha yüksek çıkar. Yanık ishal vb. durumlarda kaybedilen su miktarına bağlı olarak kanın yoğunluğu artar. Sıvı miktarı azalır ve hematokrit yüksek çıkar.

4.23. Hemaglutinasyon

Antijenlerden bazıları; süspansiyon haline getirilip alyuvarların yüzeylerine tutunmaları (*adsorbsiyon*) sağlandıktan sonra, elektrolit sıvıları içerisinde kendileri için spesifik (kendine özel) antikorlar ile birleşerek gözle görülebilen çökeltilere neden olurlar. Bu olaya hemaglutinasyon denir. Alyuvarların bu şekilde çökeltiler meydana getirmesi antijen+antikor kompleksinin kurulduğunu gösterir.

Antijenler, bağışıklık sistemini özel olarak uyarabilen ve spesifik antikorla birleşebilen maddelerdir.

OKUMA PARÇASI

BİR İNSANIN KAN GRUBU DEĞİŞEBİLİR Mİ?



Kan grubu kalıtsal olarak belirlenen özelliklerimizdendir. Kırmızı kan hücreleri üzerindeki antijenlerin ve kan plazmasındaki antikorların türüne göre kan grubu sınıflandırma çeşitleri var. Bunlardan en bilineni A, B ve O sistemi ile Rh sisteminin birlikte kullanıldığı sınıflandırmadır.

Kan hücrelerinin büyük kısmı, bazı kemiklerin içindeki boşluklarda bulunan ve süngerimsi bir yapıya sahip olan kemik iliği tarafından üretilir. Kemik iliği nakli, bazı kan ve kemik hastalıkları ile bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bir insanın kan grubu kemik iliği nakli sonrası değişebilir.

Kemik iliği naklinde hastaya önce yüksek dozda kemoterapi ya da radyasyon verilerek kendi kemik iliğinin işlevini kaybetmesi sağlanır ve hastalıklı kan hücreleri yok edilir. Daha sonra vericiden alınan kemik iliği kök hücreleri hastaya nakledilir. Kan hücreleri nakilden sonra vericiden gelen kemik iliği tarafından üretildiği için hastanın kan grubu birkaç hafta içinde vericinin kan grubuna döner.

Kemik iliği nakli için hasta ile verici arasında doku uyumu olması çok önemlidir. Bunun için kan gruplarının değil, beyaz kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlerin (HLA) uyumlu olup olmadığına bakılır.

İlik naklinin yanı sıra çok nadir de olsa bazı hastalıklar kan grubunun değişmesine neden olabilir. Ayrıca sonuçları 2015 yılında *Journal of the American Chemical Society* dergisinde yayımlanan bir araştırmada bilim insanları kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki A ve B antijenlerini uzaklaştıran bir enzim keşfetti. Bu gelişme gelecekte kan grubunun yapay olarak değiştirilebileceği anlamına gelebilir.

Dr. Tuba Sarıgül

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/bir-insanin-kan-grubu-degisebilir-mi> 19.05.2020 19:05

DEĞERLER ETKİNLİĞİ

Bir Ben, Bir de Alışkanlıklarım!

Aşağıdaki alışkanlık örneklerini okuyup yaptıklarınıza ✓ işareti, yapmadıklarınıza da ✗ işareti koyun. Boş bırakılan yerlere siz de yeni maddeler yazarak onlarla ilgili de işaretlemenizi yapın.

İş önlüğü giyme

İş ekipmanlarını amacına uygun kullanma

Çalışma ortamını temiz tutma

İş güvenliği kurallarına uyma

İş ahlakına önem verme

Zamanı verimli kullanma

Çalışma ortamında şakalaşmama

İnsan haklarına saygılı olma

Kişisel temizliğine özen gösterme

Milli manevi değerleri benimseme

İşine özen gösterme

Temrin malzemelerini israf etmeme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () İspirasyon ve ekspirasyon olayının toplamı olarak dolaşım meydana gelir.
2. () Burun boşluğu, choana (kohana) adı verilen deliklerle yutakla bağlantılıdır.
3. () Göğüs boşluğunu örten zar olan pleura, (plöra, plevra) akciğerleri sıkıca sarar ve onları göğüs boşluğuna bağlar.
4. () Sağlıklı canlılarda solunum abdominal tiptir.
5. () Solunumun geçici bir süre durmasına hyperpnea (hiperpne) denir.
6. () Köpeklerde solunum sayısı dakikada 40-50 arasındadır.
7. () Öksürük peş peşe ve en az 1–2 dakika sürüyorsa bu şekil öksürüğe nöbetli öksürük veya öksürük nöbeti denir.
8. () Dünyada her yıl 7 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir.
9. () Apex cordis (apeks kordis) kalbin tabanı olup üstte bulunur. Damarların girip çıktığı geniş kısımdır.
10. () Kalp çizgili kaslardan yapılmış olmasına rağmen istek dışı olarak çalışır.
11. () Karıncıklar kasılırken, kulakçıklar gevşeme durumundadır. Kulakçıkların ikisinin birden gevşediği, bunun arkasından karıncıkların kasılıp gevşediği görülür. Kasılma olayına *diastole* (*diyastol*) gevşeme olayına ise *systole* (*sistol*) denir.
12. () Kalp kasılmalarının atardamarlarda hissedilmesine nabız denir.
13. () Oksijence zengin kanın aortla (ana atar damar) sol karıncıktan çıkıp tüm vücudu dolaştıktan sonra oksijence fakirleşerek alt ve üst ana toplardamarlarla (alt-üst vena cava) kalbin sağ kulakçığına dönmeye ise küçük kan dolaşımı denir.
14. () Organizmaya giren mikrop ve yabancı maddelere karşı bağışıklık oluşturulmasında görev alan organlara "*lenfoid organlar*" denir.
15. () Tektırnaklılarda dalağın bir ucu sivri orak şeklindedir. Sığırdan uzundur ve dile benzer. Koyun ve keçide yuvarlak üçgen şeklindedir.

BOŞALTIM SİSTEMİ VE GENİTAL SİSTEM



ÖĞRENME BİRİMİ 5: BOŞALTIM SİSTEMİ VE GENİTAL SİSTEM



KONULAR

1.Boşaltım Sistemi

2.Dişi Genital Sistem

3.Erkek Genital Sistem

TEMEL KAVRAMLAR

Üriner Sistem Organları

Ürinyasyon

İdrar Oluşumu

Toksik Maddelerin Vücuttan Eliminasyonu

Böbrek

Nefron

Filtrasyon, Rezorbsiyon ve Sekresyon

Üreme Organları

Dişi Hayvanlarda Hormonal Mekanizma

Bu öğrenme biriminde;

- Boşaltım sistemini oluşturan organları,
- Boşaltım sistemini oluşturan organların yapı ve görevlerini,
- Nefronun yapısı ve fonksiyonlarını,
- Hayvan türlerine göre ürinyasyon sayısı ve miktarını,
- Ürinyasyon kontrolünü,
- Ürinyasyon sırasında ağrı belirtilerini,
- Dişi genital organların yapısı ve özelliklerini,
- Oogenezin oluşum ve hormonal mekanizmasını,
- Dişi genital organların kontrolünü,
- Erkek genital organların yapısı ve özelliklerini,
- Erkek eklenti bezlerinin yerleri ve görevlerini,
- Spermatogenezin oluşum ve hormonal mekanizmasını,
- Erkek genital organlarının kontrolünü,

öğreneceksiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Boşaltım sistemiyle ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mezbahalardan veya kasaplardan koyun ve sığır böbreği alarak inceleyiniz.
- Erkek genital organları ile komşu yapıları atlas ve maket üzerinde inceleyiniz.
- Dişi genital organlar ile komşu yapıları atlas ve maket üzerinde inceleyiniz.
- Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.1. Boşaltım Sistemine İlişkin Yapılar

Metabolizma artıklarının vücut dışına atılmasına boşaltım denir. Vücuda alınan ve kullanılan her şey, atık maddelerin oluşumuna neden olur. Hayatın devamı için metabolizma atıklarının vücuttan uzaklaştırılması zorunludur.

Canlılarda vücudun %60-70 kadarı sudur ve bu miktarı koruması gerekir. Normalde vücudun kaybettiği ve kazandığı su miktarı birbirine eşittir. Boşaltımda direkt görev alan organ böbreklerdir. Üreterler, mesane ve üretra bu sisteme yardımcı organlardır. Boşaltım sistemini meydana getiren organlar da idrar oluşturularak zararlı maddelerin dışarıya atılması sağlanır.


5.1.1. Boşaltım Sistemini Oluşturan Organlar ve Görevleri

İdrarın oluşumu ve dışarı atılım sırasına göre bu organlar:



- İdrarı süzen böbrekler (renes),
- İdrarı böbrekten idrar kesesine getiren idrar kanalları (üreterler),
- İdrarı depolayan idrar kesesi (vesica urinaria, vezika urinerya),
- İdrar kesesinden dışarı atan üretheadan, oluşmaktadır.

5.2. Böbrek (Ren)

Böbrekler bel omurlarının ventralinde sağ ve sol yanında bulunurlar.



Görsel 5.1: Büyük ruminantlarda sağ ve sol böbrek



Görsel 5.2: Böbreğin yapısı

Böbreklerin görevleri şunlardır:

- Böbreklerin en önemli görevi vücuttaki zararlı ve atık maddeleri (Üre, Kreatinin, Ürik asit gibi) süzerek vücuttan idrar yolu ile atılmasını sağlama,
- Renin hormonu salgılayarak tansiyonu (kan basıncı) düzenlemektir.

5.2.1. Nefronun Yapısı ve Fonksiyonları

Böbreğin en küçük yapısal birimi nefron adını alır. Nefronun kısımları şunlardır

➤ Malpighi cisimciği	<ul style="list-style-type: none"> • glomerulus kılcalları • Bowman kapsülü
➤ Boşaltım kanalcığı (Nefron kanalcığı)	<ul style="list-style-type: none"> • Proksimal tüp • Henle kulpu • Distal tüp

Bir böbrekteki nefron sayısı 1-3 milyon arasındadır. Nefronlarda gerçekleşen süzme (filtrasyon), salgılama (sekresyon) ve geri emilme (rezorbsiyon) aşamalarından sonra idrar şeklinde atılan miktar 1,5 litre kadardır.

Bowman kapsülü ile glomerulusların ikisi birden birleşerek malpighi cisimciği adını alır. Nefron kanalcığı içindeki Proximal tüp, henle kulpu ve distal tüpler birleşerek tubulusları oluştururlar.

Nefronun görevleri şunlardır:

- Sıvı dengesini düzenlemesi ve kandaki pH düzenlenmesine,
- Vücudumuza gerekli olan bazı minerallerin, (tuz, potasyum, fosfor, magnezyum vb) suyun, glikozun ve proteinlerin dengede tutulmasına,
- Eritropoetin hormonu salgısı ile kemik iliğini uyararak kan yapımına yardımcı olmaya,
- Vücudumuza alınan D vitamininin kullanılmasını sağlayarak kandaki Ca-P seviyesini dengelemek ve sağlıklı bir kemik yapısının olmasına katkıda bulunmaktadır.


5.2.1.1. Malpighi Cisimciği

- **Glomerulus**

Kalbin pompaladığı kanın dörtte biri böbreklere gider ve süzülür. Böbreklere kan götüren arteria renalis, aorta abdominalisten (karın aortu) ayrılır. Kanı götüren vena renalis ise vena cava inferiora bağlanır. Arteria renalis böbreğe girdikten sonra 7 ile 8 parçaya ayrılır. Bunlara interlobar arterler denir. Bunlardan ayrılan kısa kan damarları glomerülleri oluşturur.

Glomerül kılcallarının çeperleri iki katmandan oluşur. Bu yapı, damarların hem yüksek basınca dayanıklı olmasını sağlar hem de protein ve kan hücrelerinin dışarı çıkmasını engeller. Glomerül kılcallarında su ve erimiş maddeler sadece dışarıya verilir.


Glomerül kılcalları, taşıdıkları bol miktarda gözenek sayesinde diğer kılcallardan 100 kat daha geçirgendir. Glomerülün fonksiyonu filtrasyondur.



Görsel 5.3: Glomerulusun yapısı

- **Bowman kapsülü**


Kadeh şeklinde bir yapıdır ve böbreğin başlangıç kısmı olup böbrek korteksinde bulunur. Kalpten basınçla gelen kanın plazmasındaki su, çeşitli tuzlar, glukoz, üre, ürik asit, kreatin vb. maddeler bowman kapsülü duvarından tubulusa geçer. Bowman kapsülünden dakikada kalpten gelen kanın % 20-25'i geçer, böylece 1-2 litre kan filtre edilir. Plazmayı süzmek için gerekli olan kan basıncı, renin enzimiyle böbrek içinde düzenlenir. Bu enzim renal kan damarlarının düz kaslarında sıkışmaya yol açar. Böylece kan basıncı yükselir ve kan bowman kapsülüne süzülür.



Görsel 5.4: Glomerulus ve bowman kapsülü

5.2.1.2. Nefron Kanalcığı

- **Proksimal tubulus:** Tubuler geri emilim ve sekresyon olaylarının büyük kısmı burada gerçekleştiğinden fonksiyonel açıdan önemlidir.
- **Henle kulbu:** Medulladan kortekse çıkarak distal tubülü meydana getirir,
- **Distal tubulus ve kollektör kanallar:** İdrar toplama kanalına bağlanır.






5.2.2.Boşaltım ve Böbrek Fonksiyonu

Canlı yaşamının devamlılığının sağlanmasında iki önemli husus vardır:

- Homeostasis: İç ortamın dengede tutulması,
- Kan pH'sının değerinin ayarlanmasıdır.

Akciğerler ve böbrekler bu iki metabolik faaliyetin işletilmesinde önemli role sahiptirler. Akciğerler; vücutta oksijen ve karbondioksiti dengede tutarken, böbrekler ise vücut için zararlı maddeleri temel boşaltım ürünleri olarak uzaklaştırırlar.

Vücutta Üretilen Temel Boşaltım ürünleri:


Metabolit Adı	Açıklama
 <p>SU VE KARBONDİOKSİT (H₂O VE CO₂)</p>	Besin alımı ile alınan organik bileşiklerden enerji elde edilmesi sırasında ortaya çıkarlar.
 <p>AMONYAK (NH₃)</p>	Protein gibi azotlu besin maddelerinin sindirimi esnasında ortaya çıkar.
 <p>ÜRE VE ÜRİK ASİT</p>	Bazı hayvanlar amonyağı direkt olarak vücuttan uzaklaştırırken bazı hayvanlar ise üre (büyük ruminantlar) ve ürik asite (kanatlı hayvanlar) dönüştürerek uzaklaştırırlar.

Tablo 5.1: Boşaltım ürünleri tablosu

OKUMA PARÇASI

KANDAKİ MİKROPLARI SÜZEN YAPAY BÖBREK

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar genellikle ölümlü sonuçlanan kan enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmaları kandan uzaklaştırabilecek yeni bir cihaz tasarladı. Bir bakıma diyaliz makinelerine benzeyen cihaz nanoteknoloji ve mikro-akışkanlarla ilgili gelişmelerden yararlanılarak geliştirildi.



Sepsis de denen kan enfeksiyonlarında, hastalık yapıcı mikroorganizmaların oluşturduğu bir enfeksiyon vücuda kan yoluyla yayılarak hayati tehlike yaratan vakalara yol açar. Yeni geliştirilen sistem tıpkı böbrekler gibi kanımızı süzer. Ancak süzme işleminin öncesinde mikroorganizmalara ve onların salgıladığı toksinlere bağlanabilecek şekilde tasarlanmış manyetik nano-boncuklar enjeksiyonla kana verilir. Sonra kan hastanın vücudundan alınıp cihazın içinde manyetik bir alandan geçirilir, böylece manyetik nano-boncuklar manyetik alanın etkisiyle belirli bir tarafta toplandığı için onlara bağlanmış haldeki mikropların da kandan ayrılması sağlanır. Mikroplardan arındırılan kan daha sonra vücuda geri verilir.

Araştırmacılar, cihazı tasarlarken çeşitli noktalarda doğadan esinlenmiş. Mikroplara ve toksinlere bağlanarak onları bağışıklık sisteminin hedefi haline getiren bir protein sınıfına odaklanan araştırmacılar, bunlardan 90'ın üzerinde farklı bakteri, virüs, mantar ve toksine bağlanabilen bir proteini genetik olarak değiştirerek manyetik nano-boncukları kaplamak için kullanmış. Yine cihazın içinde kanın geçtiği mikro akışkan kanallar, böbreğin yapısından esinlenerek tasarlanmış. Cihazın içindeki bu kanallarda kan bir tuz çözeltisiyle yan yana akar. Manyetik alan uygulanınca nano-boncuklar, kendilerine bağlı olan mikroplar ya da toksinlerle birlikte bu çözeltiye geçer. Araştırmacılar Donald Ingber sıçanlar üzerindeki deneylerde şimdiden saatte 1,25 litrelik süzme hızına ulaştıklarını belirterek bunun çok daha üstünde hızlara erişebileceklerini düşünür. Sistemin en önemli özelliklerinden biri de mikro-akışkan kanalların iç yüzeyini kaplayan özel malzeme. Etobur Nepenthes bitkisinden esinlenerek tasarlanan kaygan özellikli bu malzeme, proteinlerin ve kan pulcuklarının kanalın yüzeyine yapışmasını ve pıhtılaşmayı tetiklemesini engeller. Diyalizde ise bunu engellemek için hastalara pıhtılaşmayı engelleyici ilaçlar verilmesi gerekir. Araştırmacılar sistemi, kandaki mikroorganizmaların kimliğini tespit ederek normalde günler süren bakteri kültürü sonuçlarını beklemeksizin etkin antibiyotik tedavisinin kararlaştırılmasını sağlayacak biçimde geliştirmeyi hedefler. Bu da geçen her dakikanın önem taşıdığı sepsis vakalarının tedavisi için eşsiz bir imkândır.

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=46&sayi=812&sayfa=6&yaziid=34891_01.07.2020_21.10

5.3. İdrar Boruları (Üreterler)

Üreterler, idrarı böbrekten uzaklaştıran ve vesica urinariaya (idrar kesesine) ulaştıran boru şeklinde, sağlı sollu iki organdır. Üreterler, ostium ureter denilen delikle idrar kesesine açılır.

5.4. İdrar Kesesi (vesica urinaria)


İdrarın depo edildiği, genişleme kabiliyeti oldukça yüksek, kas ve zardan oluşmuş torba şeklindeki bir organdır. Yeri, pelvis boşluğunun tabanında, Sympyhsis pelvinanın ön ucu üzerindedir. Dişilerde uterusun, erkeklerde ise rektumun ventralinde bulunur. Dolduğunda büyür ve özellikle etçillerde abdomen boşluğuna doğru sarkar.



Görüş 5.5: İdrar kesesi, vesica urinaria

İdrar kesesi histolojik olarak dıştan içe:

- Tunica seroza
- Tunica subseroza
- Tunika muskularis
- Tunika submukoza
- Tunica mukoza,



Görüş 5.6: Vesica urinarianın katmanları

olmak üzere 5 katmandan oluşur.

Tunica muskularis katmanındaki kas lifleri idrarın idrar kesesi içinde tutulmasına ve kasılarak idrar kesesinden boşlatılmasına yardımcı olur. Tunica mukoza katmanındaki değişken şeklindeki epiteller ise idrar kesesinin doluluğuna uyum gösterir. Bu katman sayesinde, idrar kesesi, dolu iken genişler ve idrar kesesi boşaldıktan sonra büzüşük bir hal alır.




Görüş 5.7: Vesica urinarianın iç yapısı

5.5. İdrar Kanalı (Urethrae)

İdrarın, vesica urinariadan alınıp vücut dışına atılmasını sağlayan, boşaltım sisteminin son kanalıdır. İdrar, canalis urethralisten geçer ve ostium urethra externumdan (idrar çıkış deliğinden) dışarı atılır. Ostium urethra externum, erkeklerde glans penisten, dişilerde vagina tabanından dışarı açılır. Sığır ve domuzda vagina'ya açıldığı yerin altında ve aynı deliğe açılan bir kör kese veya torba meydana gelmiştir. Buna diverticulum suburethrale denir. Klinikte idrar sondası kullanılırken ve suni tohumlama uygulaması yapılırken bu anatomik durum her zaman gözönünde bulundurulmalıdır.

Özet Olarak İdrarın İzlediği Yol Aşağıda Şematize Edilmiştir.



5.6. İdrar Oluşumu

Dinlenme hâlinde kalbin pompaladığı kanın her dört litresinden üç litresi vücuda, bir litresi ise böbreklere gider. Böbreklere bu kanı getiren böbrek atardamarları karın aortundan ayrılır.

İdrar oluşumu:

- Süzülme (filtrasyon),
- Geri emilme (rezorpsiyon),
- Salgılama (sekresyon)

olmak üzere üç ayrı olayla gerçekleşir.

- **Süzülme (Filtrasyon)**

Kalpten aorta pompalanan kanın yaklaşık 1/4'ü böbrek atardamarıyla böbreklere gelir. Yüksek kan basıncının etkisiyle kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri dışındaki kan içeriğinin glomerulustan Bowman kapsülüne geçmesine filtrasyon denir.

Süzülen sıvıda su, glikoz, aminoasitler, vitaminler, Na, K, Ca, Mg, HCO vb. iyonlar; üre, ürik asit, amonyak ve kreatin gibi boşaltım maddeleri yer alır. Süzüntü içerisinde bulunan bu maddeler afferent (getirici) damarlarda fazla, efferent (götürücü) damarlarda azdır.

- **Geri Emilim (Reabsorbsiyon)**

Filtrasyon ile tubuluslara geçen süzüntü şeklindeki zararlı maddelerin dışında kalan su ve erimiş maddeler, tekrar emilerek kana, yani dolaşıma katılır. Bu olaya reabsorbsiyon denir.

Bazı hormonlar, tubuluslarda geri emilecek maddeler üzerinde etkilidir. Bunlardan aldosteron, distal tubulus bölgesine etki ederek Na⁺ iyonunun geri emilimini artırırken, K⁺ iyonunun idrar ile atılımını hızlandırır. Antidiüretik hormon (ADH), toplayıcı kanalların suya geçirgenliğini kontrol eder. Aynı zamanda ADH, aldosteron ve atriyal natriüretik hormon (ANH), idrar hacminin düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. Diyabetli hastalarda poliüri görülmesinin nedeni de budur.

- **Salgılama (Sekresyon)**

İdrar oluşumunun son aşamasıdır. Vücut için zararlı olmayan ya da zararlı olan atık ve yabancı maddelerin, kandan alınıp tubulus sıvısına verilmesi olayıdır. Sekresyon sırasında, tubuluslardan bizzat bazı maddeler alınır ve idrara verilir. Kandan alınıp idrara verilen maddeler, su, kreatinin, asit, potasyum, magnezyum, sülfat, klorür gibi yabancı maddelerdir.

Uzun süre bekletilen idrarda bakteriler tarafından ürenin amonyağa dönüşmesi sonucu keskin bir amonyak kokusu görülür. İdrarın % 95-96'sı su, kalanı çözülmüş maddelerdir. Normal idrarda glukoz ve plazma proteinleri bulunmaz.

5.7. İdrar Yapma

Vücut fonksiyonlarının devamı için hücrelerden atık maddelerin atılması lazımdır. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak filtre edilirler (süzülürler). Bu atıklar üreterler yoluyla mesaneye geçerek, belli aralıklarla mesanede idrar olarak depolanıp, periyodik olarak vücuttan atılırlar. Bu şekilde idrarın vücuttan atılmasına idrar yapma denir.

5.8. Ürinsiyonun Sinirsel Kontrolü

Ürinsiyon (idrar yapma), sempatik ve parasempatik sinirler tarafından kontrol edilir. Böbreklerden süzülen idrar, üreter aracılığıyla idrar kesesine aktarılır. Sempatik sinirler idrar kesesi kaslarını gevşeterek sfinkterleri kasılı tutarken, parasempatik sinirler kese kaslarını kasarak ve idrar sfinkterlerini gevşeterek idrar yapmaya neden olurlar.

5.9. Üriner Sistemin Kontrolü

Üriner sistemin kontrolü hayvanın genel sağlık durumunu veya hastalığını tespiti açısından önemlidir.

5.9.1. Ürinsiyon Sırasında Hayvanların Aldığı Pozisyonlar

Atlar genellikle istirahat hâlinde idrarlarını yaparlar. Aygır ve kısıraklar idrar yaparken iki ön ayağını ileriye atarlar, karınlarını aşağıya doğru sarkıtırlar. Bu şekilde, karın içi basınç artar. Bu hareket hayvanda inspirasyonu ve solunumunu tutmasını kolaylaştırır. Erkekler penisini preputial keseden çıkararak idrarı yaparlar. Kısıraklar ise idrarlarını vulvadan akıtırlar.

İnekler arka ayaklarını ileri atarlar ve sırtlarını kamburlaştırarak kuyruklarını kaldırır. Erkek sığırlar hareket hâlinde iken yem yerken ayakta durur pozisyonda idrarlarını yaparlar. Boğa ve öküzler idrarını preputium boşluğuna bırakırlar ve idrar oradan dışarı dökülmüş olur. Keçi ve koyunlar inekler gibi, koç ve tekeler boğalar gibi idrarını yaparlar. Dişi köpekler arka ayaklarını bükerek karınlarını yere doğru çökertirler ve bu pozisyonda idrarını yaparlar. Erkek köpekler idrarlarını yapacaklarında arka ayaklarından birini kaldırır ve eşya veya bir maddeyi gördüklerinde idrarını yaparlar.




Görsel 5.8: Sığırın idrar yapma esnasında aldığı pozisyon

5.9.2. Urinasyon Sayısı

Hayvanların ürinasyon sayısı, içtiği su miktarına, çeşitli yollarla kaybettiği su miktarına bağlı olduğu kadar laktasyondaki hayvanların süt verim miktarına bağlı olarak değişmektedir. At ve sığırlar günlük 5-7 kez 6 -12 litre, koyun ve keçiler 1-3 kez 0,5-1,5 litre idrar yaparlar. Köpeklerde ürinasyon sayısı sabit değildir. Köpekler 250-1000 ml, kediler 20-250 ml civarında idrar yaparlar.

5.9.3. Urinasyon Sırasında Ağrı Belirtilerinin Kontrolü

Hayvanlarda çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı idrar miktarı ve sayısı değişebilir. Bu değişikliklerden başlıcaları:



5.9.4. Üriner Sistemin Fiziksel Kontrolü

Böbrek bölgesine basınç uygulandığında yangı var ise ağrı oluşur. Köpeklerde karın duvarının dışından palpe etmek mümkündür. Kedilerde böbrekler kolayca palpe edilir. Dıştan böbreklerin büyüklüğü, ağırlı olup olmadığı, yüzeylerin durumu tespit edilebilir. Ayrıca ultrasonografi böbreklerin durumu ile ilgili detaylı bilgi verir.



Görsel 5.9: Ultrasonografi ile böbreklerin kontrolü

BİLGİ KUTUSU

Vücutun Sıvı İhtiyacı

Vücuttaki atık maddelerin dışarı çıkması için her gün belirli miktarda idrar yapılması gerekir. Bu miktar 500 ml'nin altına düşünce zehirli maddeler kanda birikmeye başlar. Uzun süren bu tür durumlarda tüm organlar olumsuz etkilenir. Yeterli idrar yapmanın en önemli yolu yeterli sıvı alımıdır. Ortalama olarak saatte 50-60 ml olan idrar çıkışını telafi etmek için günde 1500 ml civarında sıvı tüketilmesi önerilir. Sıcak yaz günlerinde, ter veya nefesle kaybedilen su da eklenince, bu miktarı 2,5 litreye kadar çıkarmak gerekebilir. Bu miktarın tamamının su olarak alınması gerekmez. Tüketilen meyve veya sebzeler, çorba, çay olarak alınan sıvılar da vücudun su ihtiyacının bir kısmını karşılar. Sıvı alımına önem verirken, ani ve fazla sıvı kaybının da önlenmesi gerekir. İnsanın, belirli bir zaman aralığında alabileceği sıvı miktarını aşan hızlı bir su kaybı hayati riskler doğurabilir. Yeterli sıvı alınmaması yaşlılarda ve şeker hastalarında böbrek yetmezliğiyle neticelenebilir.

Ani sıvı ve tuz kaybı sıcak çarpmasına yol açar. Halsizlik, iştahsızlık, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, kas krampları ve bilinç bulanıklığıyla kendini gösteren sıcak çarpması acilen tedavi edilmediğinde ölüme neticelenebilir. Bunu önlemek için aşırı sıcaklarda alınması gereken bazı tedbirler vardır. Havanın en sıcak olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmaması, aşırı sıcakta yüksek performans gerektiren sporların yapılmaması, fazla terleten kalın ve naylon içeriği yüksek kıyafetlerin giyilmemesi sıvı kaybını azaltmaya yönelik önlemlerdir. Böbreklerimizimizi korumak için en önemli olan, sıcak yaz günlerinde güneş ışınlarından korunmak ve 2 litre civarında sıvı tüketmektir.

<https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=43&sayi=514&sayfa=98&yaziid=30680> 01.07.2020 21:52

ÖĞRENME BİRİMİ	BOŞALTIM SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKET ÜZERİNDE YA DA KESİLMİŞ HAYVANA AİT BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARINI İNCELEMEK	14 DERS SAATİ

AMAÇ –Boşaltım sistemine ilişkin organların anatomik yapısını gözlemleyerek, incelemek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde boşaltım sistemini oluşturan organlar gösterilerek, organların yapısı koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Organların anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların boşaltım sistemini oluşturan organlarını kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş hayvanın boşaltım organları, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait boşaltım organlarını inceleyiniz. Boşaltım sistemini baştan itibaren kontrol ediniz.
- Sığırlarda böbrek yapısının, diğer türlere göre olan farklılıklarını inceleyiniz.
- Böbreği avucunuzun içine alınız ve longitudinal kesit atarak korteks ve medulla bölgelerini inceleyiniz.
- Hilus bölgesinde üreterleri gözlemleyiniz.
- İdrar kesesini temiz bir kabın içerisine alarak organa kesit atınız, idrar kesesi mukozasını ve idrarı inceleyiniz.
- Boşaltım sistemine ait her bir organın adını, kısımlarını, görevini Latince ve Türkçe olarak söyleyiniz.
- Çeşitli hayvanlarda böbreğin ve idrar kesesinin yerini tespit ediniz.
- İdrar çıkış kanalının dişi ve erkek hayvanlardaki farklılıklarını inceleyiniz.
- Canlı hayvanları idrar yaparken izleyiniz. Aldıkları pozisyon ve idrar yapma sıklığını gözlemleyiniz

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME


ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

5.10. Dış Genital Sistemi

Üreme organları (organa genitalia), erkek üreme organları (organa genitalia masculina) ve dişi üreme organları (organa genitalia feminina) diye iki gruba ayrılır. Dişi üreme organları, dıştan içe doğru ferç (vulva), bızır (clitoris), kılıf veya mehibil (vagina), rahim (uterus), yumurta kanalları (tuba uterina) ve yumurtalıklardan (ovaryum) meydana gelmiştir.

5.11. Dış Genital Organların Yapısı Özellikleri

Dişi üreme organları, dış üreme organları iç üreme organları diye iki grupta incelenir. İç üreme organları: yumurtalık (ovaryum), yumurta kanalı (tuba uterina), rahim (uterus) ve kılıf (vagina); dış üreme organları ferç (vulva) ve bızır (clitoris) olarak incelenir.




Görsel 5.10: Üreme organları ve yerleri

5.11.1. Vulva

Dişi genital sisteminin dış kısmını oluşturur. Anüsün hemen altında ortalama 12-15 cm boyunda vertical bir yarıktır. Deri kıvrımlarından oluşmuş iki dudaktan oluşur. Dudakların her birine labium vulvae iki dudak arasındaki yarığa rimae vulvae denir. Deri, ter ve yağ bezlerinden zengindir. Dudaklar mukozaya kadar kısa kıllarla kaplıdır. Vulva, proestrus ve oestrus evresinde görülen değişikliklerin dış bakıda tanınmasını sağlar.

5.11.2. Clitoris

Clitoris penisin rudimenter (gelişmemiş) karşılığıdır.



Görsel 5.11: Kısırta vulvanın dıştan, inekte ise vulva ve anüs mukozası içten görünüm

5.11.3. Vagina

Cervix uteri ile vulva arasında yer alan kassel, zarsel ve bezsiz bir organdır. Üst tarafında rectum altta idrar kesesi yanlarda pelvis duvarı yer alır. Doğumda yavrunun geçtiği yerdir. Östrüs esnasında salgılanan mukus ile kaygan hâle gelir. Doğal aşımda spermanın bırakıldığı çiftleşme organıdır. Vajinanın cranial ucu cervix uteriye dayanır. Portio vaginalis etrafında derin anuler bir çıkmaz oluşur, buna fornix vaginae denir.



Görüntü 5.12: Koyunda Fornix



Görüntü 5.13: Sığırdada Fornix

5.11.4. Uterus (Rahim, Döl yatağı, Kuzuluk)

İçerisi boş kassel bir organdır. Geride vagina ile önde tuba uterina ile bağlantı hâlinindedir. Dölyatağı, buzağılık, kuzuluk, gibi adlarla da anılır. Embriyonun yerleştiği, korunduğu, gelişen yavrunun doğum sırasında kasılmalar ile dışarı çıkmasını sağlayan organdır. Etçillerde karın boşluğunda, diğerlerinde kısmen karın boşluğunda, kısmen de pelvis boşluğunda yer alır.

Ligamentum latum uteri (mezometriyum) adı verilen peritondan gelen iki büyük bağ ile sublumbal bölgeye asılmıştır. Özellikle ovaryum hormonlarının kontrolü altında döllenmiş yumurtanın implantasyonunu sağlar. Bu aşamadan sonra plasenta oluşur. Plasenta yolu ile hem yavrunun beslenmesi sağlanır hem de yavrunun uterus mukozasına bağlanması tamamlanır. Yavru doğum öncesi gelişmesini tamamlayıncaya kadar uterusda kalır. Uterus doğumdan sonra eski hacmine döner.



Görüntü 5.14: Normal boyutta uterus



Görüntü 5.15: Doğumdan sonra involusyonunu tamamlamamış uterus

Uterus caudalden craniale doğru üç kısımda incelenir :

- Cervix uteri,
- Corpus uteri,
- Cornu uteri

5.11.5. Cervix Uteri


Uterus ile vaginayı birleştiren kıvrımlı, kassel, kalın duvarlı, tavuk boynu şeklinde ve sert kıvamlıdır. vaginaya doğru açılmamış gül görünümlü çıkıntısına portio vaginalis denir. İneklerde uzunlamasına dürümlerden başka 3–5 adet fibroz yapıda enine halkalar bulunur. Bu halkalar suni tohumlama esnasında kateterin geçişini zorlaştırır.

5.11.6. Corpus Uteri

Uterusun ortasında parçadır. Karında kısmen de pelvis boşluğunda yer alır.


5.11.7. Cornu Uteri

Sağlı sollu olmak üzere iki adettir. Karın boşluğunda yer alır. Uçları kısarak ve karnivorlarda böbreklerin arka ucuna kadar uzanır. Silindirik ve kıvrıktır. İki cornu uterinin birleştiği yere bifurcatio uteri denir. Ligamentum latum uteri ile lumbal bölgeye bağlanır.




Görsel 5.16: Uterus

İneğe ait cornu uterilerin endometriyumunda dört sıra hâlinde ve cornuların uçlarına doğru gittikçe küçülen caruncula adında çıkıntılar vardır. Carunculalarda bez bulunmamaktadır. Endometriyumda caruncuların doğuştan yokluğu durumunda veya sonradan tahribi sonucu ortadan kalkması hâlinde ruminant dişisinin gebe kalması mümkün değildir.



Görsel 5.17. İnekte gebe olmayan uterus ve doğum sonrası karunkulalar


Etçillerde uterusun büyük kısmını uzunca olan cornu uteriler oluşturur. Carnivorlarda cornu uteri V harfi şeklindedir.



Görsel 5.18: Carnivorda Uterus

5.11.8. Yumurta Kanalı (Tuba uterina, Oviduct, Salpinx)

Cornu uteri ile ovaryum arasında kalan sağlı sollu çift kanaldır. Ovulasyon sonucu serbest hâle gelen yumurtayı kabul eder ve yumurtayı cornu uteriye iletir. Tuba uterina döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Tuba uterinanın iç duvarını örten tek katlı prizmatik epitel hücreleri kaplı ve uterusu doğru epitel hücrelerin yükseklikleri azalır. Bu hücrelerin bir kısmı hareketli tüycüklüdür. Bu tüylerin hareketi ile ovum ya da embriyo uterusu doğru gönderilir. Titrek tüylerin hareketi uterusu doğru olup hareket tek yönlüdür.



Görsel 5.19: Tuba Uterina

5.11.9. Ovaryum

Dişi üreme sisteminin merkezini teşkil eder. Erkek hayvanlardaki testisin karşılığıdır. Biri sağ tarafta diğeri sol tarafta bulunan bir çift organdır. Ovaryum endokrin bez olarak östrojen, progesteron, vb. hormonları üretirken ve ekzokrin bez olarak yumurta hücresi (ovum) üretir.

Ruminantlarda badem şeklinde 3–4 cm uzunluğunda 2,5 cm genişliğindedir. Köpekte 2 cm uzunluğundadır. Ovaryumun vücuttaki yerleri 4–5 lumbal omur altında, böbreklerin arka ucu yakınında yer alır. Köpeklerde ovaryum 3–4 lumbal omur düzeyinde ya da aynı taraftaki böbreğin hemen arkasında veya onunla temas hâlinindedir.

Ovaryumların en önemli görevi ovumun (dişi üreme hücresi) oluşmasını sağlar. Doğum esnasında mevcut olan primer folliküllerden, puberta (ergenlik) ile sekonder follikül ve onlardan da tersiyer folliküller meydana gelir. Tersiyer folliküllerden graaf follikülü oluşur. Graaf follikülü oluşması sonrasında graaf follikül duvarı yırtılır ve ovum ovaryumu terk eder. Bu olaya ovulasyon adı verilir.

Ovaryumun hormonal işlevi ile follikül duvarından östrojen ve korpus luteumdan progesteron oluşturulur.



Görsel 5.20: Ovaryum kesiti



Görsel 5.21: Ovaryum folikülü



Görsel 5.22: Ovaryumda kist

5.12. Dişi Üreme Hormonları

5.12.1.Östrojen

Östrojen, gebe olmayan dişilerde ovaryumlardaki folliküllerde, gebelerde ise gebeliğin son dönemlerinde plasentada yapılıp kana verilir. Hayvanlarda foliküler evrede östrojen üretimi giderek artar. Kanda belli bir düzeye yükseldiğinde östrus (kızgınlık) baş gösterir. Östrojen:

- Dişilerde ikincil cinsiyet karakterlerini ve davranışlarını belirler.
- Dişilerde uterus ve dişi üreme kanalı gelişiminde sorumludur.
- Meme bezlerinden süt kanallarının gelişimini sağlar.
- Ergenlikte kemiklerin uzamasını uyarır, kemikleşmeye yardımcı olur.

5.12.2.Progesteron

Başlıca korpus luteumlarda yapılan steroid bir hormondur. Uterusta salgı evresini başlatan progesteron, endometriumu dölleniş yumurtanın yerleşmesine ve büyümesine hazır hâle getirir.

Progesteron:

- Uterus kasılmalarını önler, uterusu gevşetir.
- Gebeliğin devam etmesini sağlar. Yavru atmaya engeller.
- Meme bezlerinde alveollerin gelişmesine hizmet eder.
- Hayvan davranışsal olarak uysal hâle gelir.



Görsel 5.23: Suni tohumlama uygulaması

5.13. Dişi Genital Organların Kontrolü

Dişi genital organların kontrolünde, vulva ve vagina ile uterus ve ovaryumların muayenesi yapılır.

5.13.1. Vulva ve Vaginanın Kontrolü

Vulva dudakları temizlenir, baş ve işaret parmakları ile birbirinden ayrılarak vulva ve vestibulum vaginadaki bulgulara bakılır. Vaginanın kontrolü için uygun spekulum asepsi antisepsi kurallarına uygun olarak vulvaya uygulanır. Bu uygulama östrus ve suböstrus gösteren ineklerin tespitinin yanı sıra vagina, serviks ve uterustaki enfeksiyonların tespiti açısından avantaj sağlar.

Vaginal muayenede mukozanın rengine, serviksin açıklığına, çaranın miktarına, kıvamına ve rengine bakılır. Çara renk ve kıvam olarak sağlıklı bir hayvanda yumurta akı görünümündedir.

Normalden ayrı bulgular hastalık bulgusu olarak düşünülmalıdır. Servixten gelen normal akıntı ipliksel, cam gibi, renksiz ve homojendir. Bu akıntıdaki, beyaz sütümsü kurumuş irin parçaları veya irinli görüntü uterus yangısına işaret olarak düşünülmalıdır. Bu gibi şüpheli durumlarda tohumlama yapılmamalıdır.

5.13.2. Uterusun ve Ovaryumların Kontrolü

Büyük hayvanlarda rektal palpasyonla uterus ve ovaryumların kontrolü yapılabilir. Palpasyon ovaryumların durumlarına bağlı olarak siklus dönemlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Uterus ve ovaryum kontrolü yapmadan önce hayvanı zapturapt altına almak kontrol için önemlidir. El uygun şekilde kayganlaştırılır. Parmaklar huni şeklinde birleştirilir. Rektum aşırı güç uygulamadan geçilir. El anüsten dışarı çıkartılmadan rektumdaki gaita boşaltılır.

Ovaryumların kontrolünde folliküler durum ve korpus luteum varlığı araştırılır. Folliküler ya da luteal kist olup olmadığına bakılır. Ovaryumlar büyüklük ve yapışmalar yönünden de incelenir.

ÖĞRENME BİRİMİ	GENİTAL SİSTEM	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	DIŞI GENİTAL SİSTEMİ	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKETÜZERİNDE VEYA KESİLMİŞ HAYVANA AİT DIŞI GENİTAL SİSTEMİ ORGANLARINI İNCELEMEK	14 DERS SAATI

AMAÇ –Dişi genital sistemine ilişkin organların anatomik yapısını gözlemleyerek incelemek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Mezbaha ziyareti planlanarak kesilmiş hayvan üzerinde veya kesilmiş hayvanın boşaltım organlarını laboratuvara getirerek anatomik yapıları incelenir. Veteriner Klinikleri ve belediye barınaklarında yapılan kısırlaştırma operasyonları gözlemlenir ve operasyon sonrası genital organlar incelenir. Aynı işlem maket hayvan üzerinde de yapılır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde dişi hayvanlarda genital sistemini oluşturan organlar gösterilerek, organların yapısı koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Organların anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı türlerin genital sistemini oluşturan organları kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş dişi hayvanın genital organları, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait genital organlarını inceleyiniz.
- Dişi genital sistemini baştan itibaren kontrol ediniz.
- Vulva ve anüs organlarının yerlerini inceleyiniz ve rektum ile vagina ve cervix uteri organlarının yerleşimi arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.
- Sığırlarda bulunan diverticulum suburethrale (kör nokta) yapısının yerini bulunuz ve klitorisi inceleyiniz.
- Fornix (portio vaginalis) adlı yapıyı inceleyiniz ve cervix uteriyi elinize alarak kıkırdaksı yapısını palpe ediniz.
- Cornu uteri, tuba uterina, ovaryumları temiz bir masa üzerine yatırarak inceleyiniz.
- Cornu uterilere longitudinal kesit atarak mukoza yapısını inceleyiniz ve karunkulları bulunuz.

- Ovaryumlar üzerindeki folikül, kist ve Corpus Luteum yapılarını inceleyiniz.
- Gebe kalmamış düve, gebe kalmamış inek ve metritis nedeniyle kesime sevkedilen hayvanların uterus mukozalarını inceleyiniz.
- veteriner kliniği barınak ziyaretleriniz esnasında kısırlaştırma operasyonunu gözlemleyiniz ve operasyon sonrasında çıkarılan uterus ve ovaryum yapılarını inceleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BEGERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						


5.14. Memeli Hayvanlarda Erkek Genital Organların Yapısı ve Görevleri

Testisler, akıtıcı kanallar, eklenti bezleri ve penis olarak 4 kısımda incelenebilir.

5.14.1. Penis (Cav, Kamış)

Çiftleşme organı olan penis idrarı boşaltan ve çiftleşme (koitus) esnasında spermanın vajinaya akıtılmasını sağlayan bir organdır. Penisin kök kısmına radix penis, gövde kısmına corpus penis, uç kısmına glans penis denir. Kan dolması ile penis ereksiyona geçer. Düz kaslar kasıldığında elastik ipler gevşer ve eski hâline döner ve böylece cavernlerden kan boşalır. Ters olduğunda ise düz kaslar gevşeyip uzayarak elastik ipler gerilir, cavernlerde kan dolar ve sertleşme gerçekleşir.

Boğa, koç ve tekede uzun silindirik ve fibro elastik yapıda olan penis, ereksiyon dışında da oldukça serttir. Boğalarda, koç ve domuzda gövde kısmı 'S' şeklinde kıvrılıp flexura sigmoideayı oluşturur. Ereksiyon dışında penis bu sayede üçte bir oranında küçülmüş olur. Flexura sigmoidea'yı kasılarak 'S' şekline getiren ve gevşeyerek düzleşmesini sağlayan kasa musculus retractor penis denir.



Görsel 5.24: Koç boğa teke penisinin uç kısımlarının görünümü

Glans penis, penisin baş kısmıdır. Ruminantlarda glans penis yoktur. Köpeklerde glans penis uzundur. Os penis denilen bu kemik açıklığı aşağıya dönük bir oluklu sonda biçimindedir ve içinden uretra geçer. Diğer hayvanlarda da Uretra penisin ventralinde oluşan kanaldan geçer.

5.14.2. Scrotum

Cutis scroti denilen ince derili elastik yapıda kese şeklinde bir yapıdır. İnce tüyler veya uzun sert ve seyrek kıllar kapsar. Ter bezlerinden zengin, yağ bezlerinden fakirdir. İki testis için ortak bir kesedir.



Görsel 5.25: Scrotum

Musculus cremaster ve scrotum testislerinin normal sperma üretimi için ısı ayarlanmasında testisleri vücut ısısından 4-7 °C aşağıda tutmak için işbirliği yaparak testisleri vücuda yaklaştırır ya da uzaklaştırır.

5.14.3. Testis (Orchis)


Testis erkek üreme bezidir. Testisler, evcil hayvanlarda, embriyonal dönemde böbreklerin yakınında şekillenir ve birçok memeli türünde daha sonra skrotuma inerler. Yalnız kanatlılarda bu inme görülmez abdomen boşluğunda bulunur. Çift organdır.



Görsel 5.26: Testis

Testisler, hem endokrin bez olarak testosteron hormonu hem de ekzokrin bez olarak erkek cinsiyet hücresi (spermatozoon) üreten bir çift erkek üreme organıdır. Testiste tubulus seminiferus contortus denilen kıvrımlı kanallarının içerisinin mitoz ve mayoz bölünme sonucu spermatozoid oluşur.

5.14.4. Epididimis



Görsel 5.27: Epididimis 638964826

Kordon şeklinde bir organdır. Epididimislerin dört önemli görevi vardır. Bu görevler şunlardır:


- Spermatozoonları taşıma,
- Yoğunlaştırma,
- Depolama,
- Olgunlaştırma,

Spermatozoonların taşınması, spermatozoonların üretilmesinden kaynaklanan basınç, epididimiste yer alan silyumlu hücreler, kas kontraksiyonları ve hormonların etkileri aracılığıyla gerçekleşir.

Yoğunlaştırma, boğa ve koçlarda testislerden çıkan spermatozoonlar mililitrede 100 milyon iken epididimiste yoğunlaştırıldıkları zaman mililitrede 4 milyar olmaktadır. Spermatozoonlar kaudo epididimiste depolanmaları sırasında olgunlaşıp, motilite yeteneği kazanırlar. Bu işlem testis sıvısının epididimis epitel hücreleri tarafında absorpsiyonu ile oluşmaktadır. Esas olarak absorpsiyon caput epididimis ve corpus epididimisin üst ucunda meydana gelir.

5.14.5. Ductus Deferens

Taşıma, yoğunlaştırma, depolama ve olgunlaştırma gibi dört önemli görevi vardır. Ductus epididimisin devamıdır. Karın boşluğuna girer ve penisin radixinden vesicula seminalis ile birlikte urethraya dâhil olur.



Görsel 5.28: Testisin yapısı

5.14.6. Funiculus Spermaticus

Inguinal kanalın abdominal ucundan testise kadar uzanan ductus deferens, arter, ven, lenf damarları, musculus cremaster, otonom sinirlerden oluşan ve tunica vaginalisin visceral yaprağı ile örtülü bir oluşumdur.

5.14.7. Preputium

Deriden bir kıvrımdır. Karın duvarı derisinin corpus penisi örttüğten sonra glans penis üzerine kıvrılıp onu örtmesinden oluşur. Yağlı sekresyon salgılar. Bu yağlı sekresyon dökülen epitel doku ve mikroplarla karışarak smegma preputi denilen yoğun ve fena kokulu bir madde meydana getirir. Preputium boğalarda dar ve uzun olup deliğin çevresinde sert ve uzun kıllar mevcuttur.

5.14.8. Erkek Eklenti Bezleri

Urethranın başlangıcından itibaren geriye doğru sıralanan 3 adet bezdir. Bunlar:

- Vesicula seminalis
- Prostat
- Cowper bezidir.

5.14.8.1. Vesicula Seminalis

Mesanenin boyun kısmında sağlı sollu yer almış iki organdır. Carnivorlarda bulunmaz. Beyaz, sarımsak renkte, şeffaf bir salgısı vardır. Bu salgı spermatozoitlerin hareketliliğini artırır.

5.14.8.2. Prostat


Bütün memeli hayvanlarda olan tek bezdir. Ürethranın başlangıcında yer alır. Özel bir kokuya sahip bir salgısı vardır. Bu salgı ejakülasyonun büyük bir kısmını oluşturur. Spermatozoitlerin hareket etme ve dölleme yeteneklerini artırır.

5.14.8.3. Cowper Bezi (Glandula Bulbourethralis)

İki küçük bezdir. Egüidelerde ceviz büyüklüğünde oval ruminantlarda ve kedide ise fındık büyüklüğünde ve yuvarlaktır. Spermanın kıvamının oluşmasına etken bir salgı salgılar. Salgısını direkt urethraya boşaltarak ejakülasyondan önce urethradaki idrar ortamını alkaliye çevirir.

Erkeklerde ergenlik (puberte) ile başlayan spermatozoonların üretimi süreklidir. Erkekte bir çift testis bulunur. Testisler (gonatlar) spermatozoa üretiminin yanısıra hormon yapımından sorumludur. Erkek yumurta hücresi olan spermatozoonlar testislerde üretilir. Epididimis, spermatozoonların kısa süreli depolandığı ve olgunlaşarak hareket yeteneğini kazandığı yerdir. Bu yollara açılarak salgı bırakan eklenti bezleri mevcuttur. Salgısı früktoz içerir ve alkali niteliktedir. Ejakülasyon sırasında üretraya salgılanarak, spermatozoonların birbirlerine yapışmalarını engeller.

Kedi ve köpeklerde iyi gelişmiş olan prostat bezi, spermayı sulandırmaya yarayan alkali özellikle bir salgı üretir. Bu salgı spermatozoonların dişi kanala döküldüğünde hareketliliğini sağlayarak dölleme yeteneğini artırır. Üreme kanalının prostattan sonraki bölümünde cowper bezinden salgılanan muköz özellikteki salgı, üretrayı idrarın asit etkilerinden temizler.



Görsel 5.29: Testislerin yan taraftan anatomik görünümü

5.14.9. Erkeklerde Üreme İşlevinin Hormonal Kontrolü

Özellikle damızlıkta kullanılan veya kullanılacak hayvanlarda daha da önemlidir.

5.14.9.1. Erkek eklenti bezleri

- **Testosteron**

Kolesterolden sentezlenen steroid yapıdaki erkeklik hormonudur. Erkeklerde büyük oranda testiste, Leydig hücrelerinde, az miktarda ise adrenal kortekste üretilir. Kanda steroid hormon bağlayıcı globüline ve albümine bağlanarak az bir kısmı ise serbest şekilde taşınır.

Testosteron, fötüs ve büyüme çağındaki erkek hayvanlarda üreme kanalları ve eklenti bezlerinin gelişiminden sorumludur. Spermatogenezi uyarır. Tür için özel ses, davranış, beden kıl, tüy dağılımı, deri rengi ve niteliği, boynuz yapısı, kas-yağ dağılımı gibi ikincil cinsiyet karakterlerinin oluşmasını sağlar. Hücrelere aminoasit girişini ve protein yapımını artırır. Kas gelişimi ile kemiklerin uzaması ve kalınlaşmasına etki eder. Kas kitlesini artırır.

5.14.9.2. Scrotumun Kontrolü

Scrotumun varlığı, simetrisi, testis üzerinde kayıp kaymaması (orchitiste yapışır), kıl durumu ve pigmentasyon, gerginliği ve üzerindeki yeni oluşumların varlığı, maddi kayıplı yara olup olmadığı, parazitler ve mantar enfeksiyonları ve skrotal deri kalınlığı yönünden kontrol edilir.

5.14.9.3. Testislerin Kontrolü

Testis ve epididimisler skrotum kesesi içinde tespit edildikten sonra palpasyon ölçme yöntemleri ile büyüklükleri, şekilleri, skrotal keseye inip inmedikleri, simetrileri, konumları, kıvamları, serbestlik dereceleri (skrotum içinde), sıcaklıkları, yangı ve ağrı durumları incelenir.

5.14.9.4. Boğalarda Epididimislerin kontrolü

Kaput, korpus ve kauda olarak üçe ayrılır. Kaput, testisin üstünde ve biraz lateralde yer alır. Korpus, testis boyunca testisten daha serttir. Kauda testisin ventralinde kabarık biçimde yer alır. Büyüklük, şekil, simetri, konum, ısı ve ağrı artışı araştırılır.


5.14.9.5. Funiculus Spermaticusun Kontrolü

Büyüklük, simetri, kıvam, hareketlilik, ısı artışı ve ağrı durumları araştırılır.

5.14.9.6. Penis ve Preaputiumun Kontrolü

İnspeksiyon ve palpasyonla dış ve iç baki olarak kontrol edilir. Bu amaçla kıllanma durumu, rengi, büyüklüğü, konumu, ostium preputialenin açıklığı, yangı, akıntı, ısı artışı, parazit ve mantar enfeksiyonları yönünden kontrol edilir.

Penisin muayenesi erektil ya da erektil olmayan durumda yapılır. Penisin dışarıya çıkışı anestezi ile sağlanır. Erektile olmayan durumda büyüklük, serbest hareket, elastikiyet, erektil durumda ise, patolojik oluşum, kanama, maddi kayıplı yara, yapışma yangı, anormal büyüme, apse, kırılma gibi durumlara bakılır.



Görsel 5.30: Köpekte penis ve preaputiumun kontrolü

Aygırlarda penisin üzeri prepusyumdan salgılanan gri kahverengi kazeöz ve krem benzeri kokulu smegma ile kaplıdır. Bazen pul şeklinde kurudur. Penis hafif yumuşak, buruşuk ve pigmentlidir. Distal ucu genişleyerek konveks yüzlü glansı oluşturur, glansın ventral kısmında fossa glandis mevcuttur. Eretil olmayan ergin bir aygırda toplam penis uzunluğu 50 cm'dir.

Boğalarda, preaputium deliği kıllarla örtülü, 2-3 parmak geçer, penisin incelen kısmı hariç her tarafta çapı aynıdır, 25-45 cm uzunlukta; koçlarda, pembe, nemli ve düz yapıdadır, 4 cm uzunluğundaki uretral uzantı penis ucunda görülebilir.

ÖĞRENME BİRİMİ	GENİTAL SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	ERKEK HAYVANLARDA GENİTAL SİSTEM ORGANLARI	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKET ÜZERİNDE VEYA KESİLMİŞ HAYVANA AİT ERKEK GENİTAL SİSTEMİ ORGANLARINI İNCELEMEK	6 DERS SAATİ

AMAÇ –Erkek genital sistemine ilişkin organların anatomik yapısını gözlemleyerek, incelemek.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde erkek hayvanlarda genital sistemini oluşturan organlar gösterilerek, organların yapısı koruyucu eldiven giydiğiniz elinizle (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilerek anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Organların anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir. Türler arasındaki farklar belirtilir.
- Mümkün olduğunca farklı tür, yaş ile kiloda olanların genital sistemini oluşturan organlarını kontrol edilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş erkek hayvanın genital organları, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait genital organlarını inceleyiniz.
- Erkek genital sistemini baştan itibaren kontrol ediniz.
- Testis ve penisin farklı tür hayvanlarda yerlerini inceleyiniz. Penis ve üretra arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.
- Koyun ve keçilerin penis ucundaki soru işaretli şeklindeki kıvrımlı yapıyı inceleyiniz.
- Köpeklerde os penis adlı yapının yerini bulunuz.
- Testislere longitudinal kesit atarak sperma kanalllarını inceleyiniz.

- Testisler üzerinde epididimisi bulunuz ve testis üzerindeki yerleşimini inceleyiniz.
- Veteriner kliniği, barınak ziyaretleriniz esnasında kısırlaştırma operasyonunu gözlemleyiniz ve operasyon sonrasında çıkarılan testis yapılarını inceleyiniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

DEĞERLER ETKİNLİĞİ

Aşağıda sorumluluk kavramının ilkeleri verilmiştir. İlkelerin her biri için size ayrılan yere bir slogan yazınız.

SORUMLULUĞUN BEŞ İLKESİ

1. Yaptığım her şeyden sorumluyum. Eğer iyi yaparsam itibar görürüm. Eğer yapamazsam kendim yapamadığımı kabul ederim ve suçu başkalarına atmam.
.....
2. İyi bir iş ve hayat tarzı için eğitimimden ben sorumluyum dolayısıyla benim yapmam gerekenleri kapasitem yeterli olduğu ölçüde kendim ve çevrem için başkaları değil, ben yaparım.
.....
3. Ailemi ve çevremdeki diğer kişileri anlayış ve saygı çerçevesinde eğitmekten sorumluyum. Farklı olsak, farklı görünsek ve farklı düşünssek bile bu önemli olmamalı; önemli olan her birimizin değerli bir insan olmasıdır.
.....
4. Halkıma, uluslara ve dünyaya destek olmaktan sorumluyum. Bu her bireyi daha adil, daha demokratik ve daha misafirperver olmaya götürür.
.....
5. Dünyayı sevgiyle umursamak ve daima korumaktan sorumluyum.
.....
.....

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Böbrekler bel omurlarının ventralinde sağ ve sol yanında bulunurlar.
2. () Böbreğin en küçük yapısal birimi Bowman kapsülü' dür.
3. () Glomerül kılcalları, taşıdıkları bol miktarda gözenek sayesinde diğer kılcallardan 100 kat daha geçirgendir. Glomerülün fonksiyonu filtrasyondur.
4. () Homeostasis; iç ortamın dengede tutulmasıdır.
5. () Filtrasyon ile tubuluslara geçen süzüntü şeklindeki zararlı maddelerin dışında kalan su ve erimiş maddeler, tekrar emilerek kana, yani dolaşıma katılır. Bu olaya filtrasyon denir.
6. () Köpekler 250-1000 ml, kediler 20-250 ml civarında idrar yaparlar..
7. () Fazla miktarda idrar çıkarmaya oligüri denir.
8. () Clitoris penisin rudimenter (gelişmemiş) karşılığıdır.
9. () Cervix uteri, corpus uteri ve cornu uteri uterusun kısımlarıdır.
10. () Koyunlarda cornu uteri V harfi şeklindedir.
11. () Glans penis, penisin baş kısmıdır. Ruminantlarda glans penis yoktur.
12. () Ductus deferensin taşıma, yoğunlaştırma, depolama ve olgunlaştırma gibi dört önemli görevi vardır.
13. () Vesicula seminalis dişilerde salgılanan bir hormon çeşididir.
14. () Testosteron kolesterolden sentezlenen steroid yapıdaki erkeklik hormonudur.
15. () Testosteron kas gelişimi ile kemiklerin uzaması ve kalınlaşmasına etki eder. Kas kitlesini azaltır.

HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİ



ÖĞRENME BİRİMİ 6 : HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİ



KONULAR

1.Sinir Sistemi Organları

2.Refleks Kontrolü

3.Görme ve İşitme

TEMEL KAVRAMLAR

Systemanervosum,
Nöron, Sinaps
Medullaspinalis
Otonom Sinir Sistemi
Somatik Sinir Sistemi
Refleks ve Refleks Kontrolü
Göz ve Görme
Kulak ve İşitme
Görme İşitme Kontrolü

Bu öğrenme biriminde;

- Sinir sisteminin görevlerini ve canlı için önemini,
 - Nöronların yapısını,
 - Sinapslar ve uyarıların iletimini,
 - Sinir sistemini gruplandırarak merkezi sinir sistemini oluşturan organları ve görevlerini,
 - Refleks ve refleks çeşitlerini,
 - Çevresel sinir sistemi ve görevlerini,
 - Somatik sinir sisteminin görevlerini,
 - Otonom sinir sisteminin görevlerini,
 - Gözün tabakalarında yer alan oluşumları,
 - Görme ve hayvanlarda görme kontrolünü,
 - Gözün yardımcı organlarını,
 - Kulak bölümlerindeki oluşumları ve görevlerini,
 - İşitme mekanizmasını ve işitme kontrolünü,
- öğreneceksiniz.**

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Sinir sistemini oluşturan organların yapısı hakkında araştırma yapınız.
- Sinir sisteminin kontrolünün nasıl yapıldığına dair çevrenizde bulunan Veteriner kliniklerinden, hayvan hastanelerinden bilgi toplayınız.
- Sinir sisteminin ana organı olan beynin çalışmasını ve yapısını araştırınız.
- Konu hakkında edindiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

6. Sinir Sistemi [Systema nervosum (Sistema Nervozum)]

Sinir sistemi, canlı organizmanın içsel ve dışsal bütün uyarıları algılayabilen, yorumlayabilen ve cevap verebilen karmaşık bir sistemdir. Vücut içerisinde sinirsel ağ sayesinde sinyalleri farklı bölgelere iletimini sağlayan organların ve kasların aktivitelerini düzenleyen metabolizmanın birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan yani homeostaziyi sağlayan sistemdir.

Canlı vücudunda, sinir sistemi görev yapmadığında yaşamsal fonksiyonlar durur. Vücudun kasları işlevini göremez. Çünkü kasların harekete geçebilmesi için kendisini uyararak bir sinire ihtiyacı vardır.



Görsel 6.1: Atta sinir sistemi


6.1. Sinir Sisteminin Görevleri

- Duyuları sinir hücresinde bulunan reseptörler sayesinde algılayan ileten ve cevap oluşturan sistemdir.
- Vücudu çevre şartlarına göre ayarlar
- Bezleri uyararak hormon salınımını veya azaltımını sağlayarak vücudun iç dengesini oluşturur.
- Organların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
- Hafıza ve öğrenme için gerekli deneyimleri özümser.
- İstemli ve istemsiz hareketlerin kontrolünü sağlar.

6.2. Sinir Sisteminin Özellikleri

- **Uyarılabilme:** İç ve dış ortamda oluşan uyarıları, duyu sinirlerinin uçlarında bulunan reseptörler tarafından alınır.
- **İletibilme:** Reseptörler tarafından alınan uyarılar, afferent sinirler ile beyin omuriliğe iletilir.
- **Duyuları algılama:** Merkeze gelen bilgilere cevap oluşturulur.
- **Uyarıya cevap verme:** Merkezden verilen cevaplar motor sinirlerle tepki verecek olan kas veya salgı bezine iletilir. Örneğin, köpekle karşılaşıldığı zaman kasları ve bezleri uyararak kaçma planını oluşturur.

Sinir sisteminde nöronlar ve glia hücreleri olmak üzere başlıca iki tür hücre bulunur. Sinir sisteminde bulunan özelleşmiş hücelere nöron denir. Nöronlar ömür boyu aktif olan hücrelerdir. Boyut ve yapı bakımından farklı hücre tipleri vardır. Çekirdekli gövde ve gövdeden çıkan uzantılar olmak üzere iki kısımda incelenir. Kısa uzantılara dentrit, uzun uzantılara ise akson adı verilir. Enerji ihtiyaçları fazla olduğundan mitokondri ve golgi cisimciği sinir hücresinin içinde çok sayıda bulunur. Dentritte miyelin kılıf bulunmaz. Bazı akson uzantılarında miyelin kılıf bulunur. Sinir sisteminde nöronlardan çok daha fazla sayıda glia hücresi bulunur. Glia hücreleri nöronların gövdeleri veya aksonları arasında yerleşerek destek görevi görürler. Bu miyelin kılıf sayesinde dışarı ile bağlantıyı keserek uyarıların daha hızlı iletilmesini sağlarlar. Miyelin kılıfı oluşturan schwann hücreleri bulunur. schwann hücreleri periferal sinirlerde aksonları saran hücrelerdir. Bu hücrelerin plazma zarları içeri çökerek aksonların etrafında kılıf şeklinde düzenli zar katlanmaları yaparak aksonu korurlar ve impulsun kolayca iletilmesini sağlarlar. Böyle sinirlere miyelinli sinirler denir. Aksonun sonunda bulunan çıkıntılara akson ucu denir. Uyarılar dentritten aksona doğru iletilir. Dentrit ve akson uçları birbirlerine çok yaklaşmış olsalar da aralarında bir boşluk vardır bu boşluğa sinaps boşluğu denir.



Görsel 6.2: Sinaps boşluğu ve nöron


Sinaps: iki sinir hücresinin bağlantı kurduğu bölümdür. Uyarıların iletilmesi veya kesilmesinin olduğu bölümdür. Klasik anlamda sinaps, sinir hücresinin ürettiği sinyali o hücreden diğerlerine taşıyan aksonun dallarından birinin uç kısmı ile alıcı hücrenin etrafındaki hücre zarının birbirleriyle yaklaşması sonucu meydana gelir.

Sinapslar, elektriksel sinapslar ve kimyasal sinapslar olmak üzere iki çeşittir. İmpulsların bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine geçişi kimyasal madde ile olursa kimyasal sinaps, doğrudan akson potansiyeli ile (elektriksel aktivite) olan sinapslara da elektriksel sinaps denir.

Kimyasal sinapslar: Omurgalıların sinir sistemindeki çoğu sinaps kimyasal tiptedir. Kimyasal sinapslarda sinaptik aralık adı verilen dar bir boşluk vardır. Bu boşluk, uyarıyı gönderen nöronun sinaptik ucunu alıcı hücreden ayırır. İmpuls uyarıyı gönderen nöronun akson ucuna ulaştığında, nörotransmitter moleküllerden oluşmuş kimyasal bir sinyale dönüşür.


Bir nöronun başka bir nöron veya kasta etki oluşturmak için salgıladığı kimyasal maddelere nörotransmitter adı verilir. Elektriksel uyarıyı (impulsu) kimyasal sinyale dönüştüren, uyarıyı gönderen nöronun alıcı hücrede aksiyon potansiyeli (impuls) oluşturarak impulsu bir nöronun diğer bir hücreye aktarabilen kimyasal haberci moleküllerdir. Akson ucundaki sinaptik keseciklerin içerisinde bulunurlar.

Dopamin, histamin, serotonin, asetilkolin, adrenalin, nöradrenalin gibi maddeler, nörotransmitter olarak görev yapar.



Görsel 6.3: Sinapstaki kimyasal değişimler


Aşağıdaki görselde sinir hücresinin bölümlerini doldurunuz



Sinir sistemi iki bölümde incelenir

Merkezi sinir sistemi (MSS) : Omurilik (medulla spinalis) ve beyinden oluşmaktadır.

Çevresel sinir sistemi (Periferik) : Motor (somatik ve otonom) ve duyuşal (medulla spinalisten çıkan ve vücuda dağılan) sinirlerden oluşur.




Görsel 6.4: Sinir sisteminin bölümleri

6.3. Merkezi Sinir Sistemi

Bu sistem, kafatası boşluğundaki (cavum cranii) beyin (encephalon) ile omurgadaki canalis vertebralis içindeki omurilikten (medulla spinalis) oluşur. Beyin kafatası tarafından omurilik ise omurga tarafından korunur. Beyin, meninges adı verilen beyin zarları ile çevrelenmiştir. Meninges, dıştan içe doğru şu şekilde sıralanır:

- Sert zar (**dura mater**),
- Örümceksi zar (**araknoid mater**),
- İnce zardır. (**pia mater**).



Görsel 6.5: Dura mater, araknoid mater ve pia mater

6.3.1. Dura Mater (Sert Zar)


Kafatası kemiğine yapışık, kalın, dayanıklı iki katmanlı zardır. Beyni, kafatasına bağlar ve dıştan gelen darbelere karşı korur. Epidural anestezi bu boşluğa yapılır. Burada "BOS" (beyin omurilik sıvısı-liquor cerebrospinalis) yoktur. Dura mater ile arachnoidea arasındaki boşluğa ise cavum subdurale adı verilir. Burada da BOS bulunmaz.

6.3.2.Araknoid Mater (Örümceksi Zar)

Sert zarın altındadır. İnce bağ dokusu lifleriyle iki zarı birbirine bağlar. Araknoid mater ile piamater arasında yer alan subaraknoid aralıkta beyin omurilik sıvısı bulunur. Araknoid materin beyni saran bölümüne, araknoidea cranialis denir. Beynin gyrus'larını örter. Medulla spinalisi saran bölümüne arachnoidea mater spinalis denir.

6.3.3.Piamater (İnce Zar)

En içteki piamater tüm beyin ve medulla spinalisi sarar. Çok ince bir tabakadır. Bu zarda bulunan kan damarları, beyin dokusunu besler ve solunum gibi olaylarda görevlidir.



Görsel 6.6: Köpekte sinir sistemi

6.4. Omurilik (Medulla Spinalis)

Foramen magnumdan başlayarak canalis vertebralis içinde seyrederek sakral kemiklerin ortasına kadar seyrederek beyaz ve gri cevherden oluşmuştur. Beyaz ve gri cevher denmesinin sebebi omurilikte bulunan sinir hücrelerinde miyelinli (miyelin, lipid yapıda olduğu için beyaz gözüktür) olanlar beyaz gözüktür o yüzden beyaz cevher denir. Miyelensizler ise gri gözüktür


Omurilik, canalis vertebralisin içini tam olarak doldurmaz. Bu sayede omurların hareketlerinden etkilenmez. Görsel 6.7' de olduğu gibi medulla spinalisin her bir yanından sinirler çıkarak ilgili kaslara uzanır ve onların çalışmasında görev alır.



Görsel 6.7: Medulla spinalisten çıkan sinirler


6.5. Beyin (Cerebrum)

Beyin, tüm beynin en büyük ve en karmaşık parçasıdır. Üzeri girintili çıkıntılıdır. Önden arkaya doğru uzunlamasına derin bir yarıyla sağ ve sol iki yarımküreye (hemisfer) ayrılır. Bu iki yarım kürenin arasındaki yarığa, fissura longitudinalis denir. Her iki hemisfer tabanda corpus callosum ile birbirine bağlanır. Cerebrumun sağ yarım küresi vücudun sol, sol yarım küresi de vücudun sağ tarafını yönetir. Örneğin; sağ ayak sol yarım küre, sol ayak sağ yarım küre tarafından kontrol edilir



Görsel 6.8: Beyinde sağ ve sol hemisferler

Beynin başlıca dört lobu vardır. Bunlar lobus frontalis, lobus occipitalis, lobus parietalis, lobus temporalisdir.



Görsel 6.9: Beynin lobları

Beyin embriyolojik bakımdan ele alındığında beyin üç önemli bölüme ayrılarak incelenir:

- Ön beyin (prosencephalon)
- Orta beyin (mesencephalon)
- Arka beyin (rhombencephalon)

İleriki dönemlerde prosencephalon'dan beyin yarım küreleri (telencephalon) ile diencephalon (arabeyin) adı verilen önemli kısımlar meydana gelir. Rhombencephalon; medulla oblongata, pons ve cerebellumdan oluşur.

6.5.1.Beyin sapı

Tüm beyin sapı, anatomik olarak omuriliği beyne bağlayan bir köprü gibidir. Tüm beyin ile omurilik arasındaki bilgi taşıyan sinir liflerinin geçtiği bölgedir. Temel hayati öneme sahip fonksiyonların kontrolünü sağlayan yerdir. Temel solunum ritimleri gibi solunum fonksiyonları, yutma ve kusma gibi sindirim olayları, kan basıncı refleksleri ve kalp hızı refleksleri gibi dolaşım sistemi kontrolü ayrıca metabolizma uyku ve uyanıklık gibi hayati öneme sahip olan birçok önemli etkinlik beyin sapı tarafından kontrol edilir. Organizmanın içinden gelen duyuların büyük bir kısmı da burada algılanır. Beyin sapı tarafından kontrol edilen bütün işler istem dışı gerçekleşir.


Beyin kökü hareket sistemimizin önemli bir parçası olan beyin, beyincik ile omuriliği birbirine bağlayan çok önemli yollar içerir. Böylece beyin kökü ayakta durma ve vücudun vaziyet alması gibi reflekslerin merkezi olarak da görev yapar

6.5.2.Pons (Metencephalon)

Medulla oblongata'nın önünde enlemesine yer alan kabarık bir yapıdır. Pons yanlara doğru hem biraz daralır. Hem de biraz kıvrılarak cerebelluma giden kısmı oluşturur.

6.5.3.Beyincik (Cerebellum)

Cerebellum rhombencephalonun en büyük parçasıdır. Medulla oblongata ve ponsun üzerinde yer alır. Beyinciğin üst yüzü derin yarıklar aracılığıyla önden arkaya doğru 8 parçaya ayrılır. Beyincik önemli görevlere sahiptir. Kas grubunu doğrudan idare edemez; fakat gerek beyin kabuğu gerekse medulla spinalisten gelen uyarımları kontrol eder ve düzenler. Bedenin dengesini sağlama işini yürütür.



Görsel 6.10: Beyin ve beyin sapı ID: 288031550

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ LABORATUVARI

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNİR SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	SİNİR SİSTEMİ ORGANLARI	SÜRE
UYGULAMA ADI	MAKET ÜZERİNDE YA DA KADAVRAYA AİT SİNİR SİSTEMİ ORGANLARINI İNCELEMEK	6 DERS SAATİ

AMAÇ : Bu uygulamada öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak maket veya kadavra üzerinde sinir sistemine ilişkin kontroller yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Mezbaha ziyareti planlanarak kesilmiş hayvan üzerinde beyin ve omuriliğin laboratuvara getirerek anatomik yapıları incelenir. Aynı işlem maket hayvan üzerinde de yapılır.
- Ders öğretmeninizin nezaretinde beyin ve omuriliğin yapısı eldiven kullanılarak (kesinlikle çıplak elle temas edilmemelidir) kontrol edilir. İncelenen organların anatomik kısımları Türkçe ve Latince olarak söylenir.
- Organların anatomik yapıları organ üzerinde gösterilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ VE MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Anatomik hayvan modelleri
- Kesilmiş hayvanın beyin ve omuriliği, kadavra, karkas
- Dezenfektanlar
- Makas, pens, bistüri (neşter)

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak;

- Kişisel hijyen kurallarına uyararak maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait beyin ve omuriliği inceleyiniz.
- Beynin ve omuriliğin yapısını kontrol ediniz
- Beynin hemisferlerini inceleyiniz.
- Sinir sistemini gruplandırılarak merkezi sinir sistemini oluşturan organlar ve görevleri açıklayınız.
- Farklı hayvan türlerinde omuriliğin yapısını kontrol ediniz.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME				TARİH	.../.../20...	
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	60	20	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

6.6.Beyinden Çıkan Sinirler (Nn. Craniales)

Beyin sinirleri 12 çifttir. Kafatası tabanındaki deliklerden ya dışarı çıkarak innervasyon bölgelerine giderler ya da deliklerden girerek beynin ilgili bölümlerine bağlanırlar. N.trochlearis dışında tümü beyin ventralinden çıkar. Bazıları kafatasının tabanındaki deliklerden çıkar, bazıları ise aynı deliklerden girerek innervasyon (uyarım) bölgelerine giderler. Sırasıyla beyin sinirleri şunlardır:

- Koku Alma Siniri (Nervus olfactorius)
- Görme Siniri (Nervus opticus)
- Göz Oynatan (Nervus oculomotorius)
- Makara Sinir (Nervus trochlearis) Gözün hareket sinirlerindedir.
- Üçüz Sinir (Nervus trigeminus)
- Uzaklaştırıcı Göz Siniri (Nervus abducens)
- Yüz Siniri (Nervus facialis)
- N.vestibulocochlearis (sensibl) Kulak, duyma ve denge siniri
- Dil Yutak Siniri (Nervus glossopharyngeus)
- Nervus vagus (motor-sensibl)
- Ek Sinir (Nervus accessorius) (motor sinir)
- Dilaltı Siniri (Nervus hypoglossus) Dil hareketlerini yaptırır

Beyinden çıkan bu sinirlerin farklı sebeplere bağlı tahrip olması vücutta olumsuz sonuçlar doğurur. Uyarı yaptıkları bölgelerde olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Örnek olarak 2.sinirimiz olan nervus opticusta bir hasar oluşması ile görme işlemi gerçekleştirilemez.

6.7.Spinal sinirler

Omuriliğinden ayrılan sinirlerdir baş tarafı ve arka tarafı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Genel olarak gittikleri bölgelerdeki kasları çalıştırır. Omurilikten sağlı sollu simetrik olarak orijin alan sinirlerdir. Her bölgedeki spinal sinir sayısı hayvan türlerine göre omur sayısı ile paralel olarak değişiklik göstermektedir. Spinal sinirler, omurganın ve köken aldıkları omurilik segmentinin bölümüne göre 5 kısım gösterirler.

6.7.1.Boyun Spinal Sinirleri

Omuriliğin boyun bölümünden köken alırlar. Tüm evcil memeli hayvanlarda servikal spinal sinir sayısı sekiz çifttir

Plexus cervicalis, ilk dört yada beş boyun spinal sinirinin ventral dallarının birleşmesinden oluşan bir sinir ağıdır.

Plexus brachialis, ön ekstremiteler ile göğüs bölgesi deri ve kaslarına yayılır. Bu bölgede sinirsel işlevlerden sorumludur.

6.7.2. Sırt Spinal Sinirleri

Omuriliğin sırt bölümünden köken alırlar. Sayıları sırt omuru sayısı ile aynıdır. Sırt spinal sinirlerinin dorsal dalları ilgili bölgedeki deriden duymayı alırlar ve kasları innerve ederler.

6.7.3. Bel Spinal Sinirleri

Omuriliğin bel bölümünden köken alırlar. Sayıları bel omuru sayısı ile paraleldir. Bel spinal sinirlerinin dorsal dalları ilgili bölgedeki deriden duyu alırlar ve kasları innerve ederler.

6.7.4. Sağrı Spinal Sinirleri

Omuriliğin sağrı bölümünden köken alırlar. Sayıları sacrumu oluşturan omur sayısı ile aynıdır. Sağrıspinal sinirlerinin dorsal dalları ilgili bölgedeki deriden duyu alırlar ve kasları innerve ederler. Plexus lumbosacralis, karın ve pelvis duvarı ile arka bacaklara giden sinirlerin köken aldığı sinir ağıdır. Bu ağdan çıkan siyatik sinir (nervus ischiadicus) vücuttaki en kalın sinirdir ve arka bacakların innervasyonundan sorumludur.

6.7.5. Kuyruk Spinal Sinirleri

Omuriliğin kuyruk bölümünden köken alırlar. Sayıları kuyruk omuru sayısından farklı olarak türler arasında değişmekle birlikte 4-8 arasındadır. Bu sinirler kuyruk kasları ile bölge derisini innerve ederler.

6.8. Periferik Sinir Sistemi (Çevresel Sinir Sistemi)

Motor (Somatik ve otonom) ve duyu (medulla spinalisten çıkan ve vücuda dağılan) sinirlerden oluşur. Periferdeki uyarıları merkezi sinir sisteminde dengelendirerek uyarıları ilgili organ ve kaslara iletir. Periferde reseptörler (alıcılar) tarafından alınan duyu merkezi sinir sistemine iletir. Afferent (alıcı) lifler de denir. Merkezi sinir sisteminden kaslara veya organlara giden lifler ise efferent lifler olarak adlandırılırlar. Bu liflerden çizgili kaslara gidenlere somatomotor, iç organlara gidenlere visceromotor, tükrük bezleri ile iç ve dış salgı bezlerine gidenlere sekretomotor lifler denir.

6.9. Otonom Sinir Sistemi

Kendiliğinden yani istemsiz çalışan kalp kası, damarlar, akciğerler ve organların düz kasları ile salgı bezleri gibi istek dışında çalışan organları çalıştıran bölümdür. Genel olarak miyelinsiz sinir hücrelerinden oluşur.

6.9.1. Sempatik Sinirler

Duyularla aktive olan sistemdir. Korku, sevinç, stres gibi duygularla aktive olur. Örnek verecek olursak bir kedinin korkmasında göz bebekleri büyür, kalp atışı artar, akciğer alveolleri genişler, tükrük salgısı azalır, kan basıncı artar bunların hepsi sempatik sinirler tarafından oluşturulur. Bu olayların geri eski haline almasını parasempatik sinirler tarafından gerçekleştirilir. Göz bebekleri normale döner, kalp atışı yavaşlar, akciğer alveolleri küçülür yani sistem eskisine döner. Sempatik sinirler kalp atım sayısı, kan basıncı, bronşların genişlemesi, büzücü kasların kasılı kalması, zorlanma veya tehlike anında aktif hale geçerken homeostasisi sağlamaya katılır.

6.9.2. Parasempatik Sinirler

İki ana bölümü vardır: Birinci bölümün çıkış merkezi beyinde bulunur. Bunlara kranial bölüm denir. İkinci bölümün çıkış merkezi medulla spinalisin sacral parçasında bulunur. Buna da sakral bölüm denir. Bu çıkış merkezlerinin bulunduğu yerden dolayı parasempatik sisteme kraniosakral sistem adı da verilir.

Parasempatik sinirler uyarılınca irisin yuvarlak kaslarının uyarılmasına neden olarak pupillayı

daraltır. Retina üzerine fazla ışık gelmesine engel olur. Lens cristallinanın uyum sağlamasında önemli rol oynar. Tükürük gözyaşı, burun, mide ve bağırsak bezleri parasempatik sinirler tarafından kuvvetli uyarılır ve bol miktarda salgılanmaya neden olur. Mide, bağırsak, parasempatik sinirler uyarılınca mide bağırsak sisteminin etkinliği artar. Hareketler çoğalarak sindirim kanalı içindeki içerik kitlesi ileriye doğru hızla yol alır. Parasempatik sinir uyarılırsa kalp hareketlerinin yavaşladığı metabolizmanın düştüğü görülür.

6.10. Somatik Sinir Sistemi

İstemli çalışan sinir sistemidir. Somatik sinirlerin hücre gövdeleri beyin ve omurilikte bulunur. Aksonlar ise doğrudan iskelet kaslarına gider. Beynin kontrolünde olan hareket ve davranışlar somatik sinir sistemi ile sağlanır. Miyelinli sinir hücrelerinden oluşur.

Somatik sinirlerin hücre gövdeleri merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Somatik sinirlerde inhibisyon sadece merkezde bir nöronun diğer bir nöronu inhibe etmesi ile olur. Somatik sinir yaralanır veya kesilirse bu sinirle idare edilen iskelet kası dejenere olur. Somatik sinirlerin çapları büyük ve impuls hızları fazladır.

6.11. Refleksler ve Refleks Kontrolü

Canlının dış dünyadan aldığı bazı uyarılara istemsiz olarak kas ve bez yolu ile verdiği ani tepkilere refleks denir. Genel olarak kendini koruma amaçlıdır. Refleks olayının oluşabilmesi için bir götürücü nöron, bir refleks merkezi, bir getirici nöron, bir de iş yapan organ (kas ve salgı bezi) olması gerekir. Bu birimler dizisine refleks yayı (arkı) denir. Reflekslerin azalması, kaybolması ve artması sinir sisteminin düzenli çalışmasını engeller, sinir sisteminin düzenli çalışabilmesi için reflekslerin normal olması gerekir.

Kas grubunun veya bir salgı bezinin yangı, dejenerasyon vs. gibi bozukluğa uğraması, refleks yolundaki bölümlerden birinin devreden çıkması, koma, kollaps, genel anestezi gibi durumlarda refleksler kısmen veya tamamen kaybolur veya zayıflar.

Serebrum ve hipotalamustaki uyarı merkezlerinin zarar görmesi, beyin ile spinal ganglionların arasındaki bağlantının zayıflaması, refleks yolundaki bölümlerden birisinin irrite edilmesi sonucu refleksler artar.

Hayvanlarda klinik olarak kornea, pupilla, patella, pedal, anal, deri, kulak ve emme refleksleri kontrol edilir. Bu kontrol bize canlının sağlığı hakkında önemli bilgiler verir

Kornea refleksi: Parmak ile kornea üzerine bastırıldığında yada bir cisim yaklaştırıldığında canlının göz kapağı kapanır. Genel anestezi durumlarında kornea refleksi kaybolur. Kornea refleksinin kaybolması aynı zamanda refleks yolu felçlerinde de görülür.

Çevrenizdeki hayvanlarda bu reflekslerin kontrolünü yaparken fotoğraf veya video çekimi yapınız. Elde ettiğiniz görüntüleri ders öğretmeninize gösterdikten sonra sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Pupilla Refleksinin Kontrolü: Pupillanın ışık kaynağı karşısında daralması, karanlıkta genişlemesi olaylarına pupilla refleksi denir. Normal durumlarda kontrol için hayvanın iki gözü elle kapatılıp 30-60 saniye bekletildikten sonra açılır. Nervus opticusun felcinde, epileptoid nöbetler sırasında, irisin lens veya korneaya yapışması olaylarında pupilla refleksi kaybolur.



Görsel 6.11: Işık kaynağı yaklaştırılınca pupillanın daralması

Patella refleksi: Yatmış ve dört ayağını uzatmış pozisyonda bulunan hayvanlara uygulanan bir yöntemdir. Yatmış durumdaki bir hayvanın patella ligamenti üzerine bir perküsyon çekiciyle vurularak yapılır. Patella refleksinin normal olduğu durumlarda ayağın gerginleşmesi ve reaksiyon göstermesi dikkati çeker.



Görsel 6.12: Perküsyon çekici

Pedal refleksi: At ve sığırlarda; Corium coronarium bölgesine iğne veya sivri bir cisim batırılmasıyla, kedi ve köpeklerde parmak arası derisinin elle çimdiklenmesiyle hayvanın ayağını aniden geri çekmesi eylemine pedal refleksi denir.

Anal refleks: Perianal bölgeye dokunulur, beklenen yanıt anal sfinkterin kontraksiyonu ve kuyruğun fleksiyonudur.

Deri refleksinin kontrolü: Hayvanın vücudunun bir bölümüne elle dokunulduğunda dokunulan bölgedeki yüzlek kasların titrediği görülür, hayvanın boynunun sağına veya soluna dokunulduğunda, başını dokunulan yöne çevirmesi deri refleksinin normal olduğunun göstergesidir. Hastalık yönünden ağır olan hayvanlar bu refleksi kısmen veya tamamen yapamazlar.

Kulak refleksi: Seslenen hayvanın sesin geldiği tarafa doğru kulaklarını dikmesi ve vücut olarak da o tarafa doğru dönmesidir. Duymanın ve kulak refleksinin normal olduğu kabul edilir. Buna en iyi örnek köpeklerdir. Köpekler sesin geldiği yöne doğru kulaklarını dikerler.

Kuyruk refleksi: Hayvanın kuyruğunu tutup, hareket ettirmek istendiğinde, hayvanın kuyruğunu kurtarmaya çalışması, kuyruğunu bıraktığımızda tekrar eski normal duruma dönmesi kuyruk refleksinin normal olduğunu gösterir.

Emme refleksi: Süt emen hayvanların ağızlarına parmak sokulduğunda emme refleksi normale hayvan ağza sokulan parmağı emer. Özellikle yeni doğan hayvanlarda bu refleksin olmaması hayvanın hastalık yönünden değerlendirilmesi açısından önemlidir.

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNİR SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	REFLEKS KONTROLÜ	SÜRE
UYGULAMA ADI	FARKLI TÜR HAYVANLARA UYARIMLAR VEREREK ÇEŞİTLİ REFLEKSLERE AİT KONTROLLERİ YAPMAK	12 DERS SAATİ

AMAÇ: Farklı tür hayvanlara uyarımlar vererek çeşitli reflekslerin kontrolünü yapmak,

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Emme refleksinin kontrolü için yeni doğmuş yavru bir hayvan tercih edilir.
- Diğer refleksler için her türden ve yaştan canlı hayvan tercih edilebilir.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Çeşitli türdeki canlı hayvanlar, Perküsyon çekici, iğne veya sivri bir cisim
- Zapturapt araç gereçleri

3. İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Hayvan sahibine hayvanda kas titremesi, yürüyüş bozukluğu gibi belirtilerin olup olmadığını sorunuz. Hayvanın dinlenmiş ve sakin olmasını sağlayınız. Dinlenmeden yapılacak kontrollerin yanıltıcı sonuçlar vereceğini unutmayınız.
- Ders öğretmeninizin hayvanı ayakta uysal hale getirmesine yardımcı olunuz.
- Hayvan iyi tutulduktan sonra ders öğretmeniniz nezaretinde hayvana yaklaşınız.
- Kornea refleksini kontrol etmek için parmak ile kornea üzerine bastırıldığında ya da bir cisim yaklaştırıldığında canlının göz hareketlerini kontrol ediniz.
- Pupillanın refleksini öğrenmek için 30 saniye göz kapalı tutulur ışık kaynağı göze yaklaştırılır. Pupillada gördüğünüz değişimleri not alarak sınıfınızda paylaşınız.
- Patella refleksini kontrol etmek için hayvan yan yatırılır. Küçük hayvanlar kucakta tutulur. Perküsyon çekici ile patella ligamenti üzerine hafifçe vurularak patella refleks kontrolü yapılır. Patella refleksinin normal olduğu durumlarda ayağın gerginleşmesi ve reaksiyon göstermesini gözlemleyiniz.
- At ve sığırlarda corium coronarium bölgesine iğne veya sivri bir cisim batırılmasıyla, kedi ve köpeklerde parmak arası derisinin elle çimdiklenmesiyle hayvanın ayağını aniden geri çekmesi eylemi olan pedal refleks kontrol edilir.
- Emme refleksi kontrol edebilmek için süt emen yavru hayvan olması gerekir. Yavru hayvanın ağzına parmak sokulduğunda emme refleksi kontrol edilir. Emme refleksi normalse hayvan ağza sokulan parmağı emer.

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK	SÜRE KULLANIM	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	40	40	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

6.12. Görme Duyu Organı Göz


Kafatasının göz çukurluğu (orbita) içine yerleşmiş göz küresi (bulbus oculi) ve göz küresine yardımcı olan Nervus optikus, göz kapakları, konjunktiva ve gözyaşı bezleri gibi yapıları içine alan bir organdır. Görme olayını gerçekleştirmek için özelleşmiş bir yapıya sahiptir.



Görsel 6.13: Göz küresi (bulbus oculi)

Göz, görme işlevinde direk olarak görev alan kısımları ve bunları koruyan koruyucu yapılardan oluşur. Koruyucu yapılar; kaşlar, göz kapakları, gözyaşı bezleri, kirpikler ile göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan ve gözün hareketini sağlayan kaslardır. Göz kapakları, gözyaşı bezinin ürettiği sıvıyı kırpma hareketi ile gözün saydam tabakasına yayarak bu tabakayı sürekli olarak ıslak tutar ve kurumasını engeller. Ayrıca göz kapakları kapanarak da gözü dış çevrelerden korur. Kornea refleksi buna bir örnektir.

Gözün görme olayına direk olarak katılan kısımları ise, mercek (lens) ışığa duyarlı reseptörler, reseptörlerin aldığı uyarımları beyne taşıyan sinirden oluşur.




Görsel 6.14: Görme olayının fizyolojisi

Göz yuvarlağı dıştan içe doğru üç tabakadan oluşur:

- Sert tabaka,
- Damarlı tabaka
- Ağ tabaka

Çevremizdeki cisimlerden gelen ışınlar, önce korneaya geçer ve ön kamara, pupilla, arka kamara, lens ve humor vitreus geçerek retina gelir. Görme olayının gelişmesi için ışık miktarının ayarlanmasını iris sağlar. İris, corneanın arkasında dairesel bir oluşum şeklinde ve ortasında pupilla denilen delik bulunur. Lens, göze gelen ışınları birbirine yaklaştırarak kırar. Cismin tam ve gerçek görüntüsünü retina üzerine düşürür. Retina tabakasının sarı noktası üzerine ters olarak düşen görüntü, görme siniri aracılığı ile beyin görme alanına iletir; ancak bu görüntüyü yorumlayarak görüntüyü algılayan beyindir. Beyinde görüntü düzeltilir ve cisimler düzgün olarak görünür. Böylece görme olayı gerçekleşir.




Görsel 6.15: Gözün yapısı

Sert tabaka: Gözün arka tarafında gözün beyaz olan kısmıdır. Aynı zamanda ışığın her taraftan göze girmesine engel olur. Ön tarafa doğru geldiğinde ise saydamlaşarak bir kubbemsi yapı oluşturur. Bu kubbemsi yapıya kornea adı verilir. Kornea sert tabakanın içerisinde bulunan bir yapıdır. Kornea ışığın kırılmasını sağlar.

Damar tabaka: Ağ tabaka ile sert tabaka arasını doldurur. Gözü besleyen kan damarlarını bulundurmaktadır. Damar tabakanın iç yüzeyinde siyah renkli melanin renk maddelerini içeren hücreler vardır. Damar tabaka korneanın önünde kalınlaşarak iris denilen renkli kısmı ve merceği tutan askıları meydana getirir. Göze rengini veren maddeler iriste bulunur. İrisin ortasında ışığın göz içine girmesini sağlayan ve göz bebeği adını alan küçük bir delik yer alır. Göz bebeği ışığın miktarına göre büyüyüp küçülebilir. İrisin hemen arkasında göz merceği yer alır. Göz merceği göz bebeğinden giren ışınları kırarak ağ tabakaya düşürür. Saydam tabaka ile iris arasında kalan boşluğa ön oda, iris ile göz merceği arasında kalan boşluğa ise arka oda denir. Bu iki oda özel bir sıvı ile doludur.

Ağ tabaka (retina): Camsız sıvı denilen göze desteklik veren aynı zamanda basınç oluşturup gözün şeklini korumasını sağlayan sıvı bölümdür. İçerisinde damar bulunur. Işığa duyarlı reseptör hücreler bu tabakada bulunur. Bu hücreler çomak veya koni şeklindedir. Çomak hücreleri cisimlerin şeklini, siyah beyaz olduğunu, koni hücreleri ise renkli görmemizi sağlar. Arka tarafında sarı benek denilen görmeyi sağlayan kornea ve çubuk reseptörlerin olduğu bölgeye sahiptir. Sarıbenek denilen yere görüntü düşer. Reseptörlerde oluşan impuls kör noktadan görme sinirine geçerek beyne iletilir.



Görsel 6.16: Gözün retina kısmı

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNİR SİSTEMİ	UYGULAMA YAPRAĞI
KONU	GÖRME VE İŞİTME	SÜRE
UYGULAMA ADI	FARKLI TÜR HAYVANLARDA GÖRME VE İŞİTME KONTROLÜ YAPMAK	12 DERS SAATI

AMAÇ: Farklı türdeki hayvanlar üzerinde görme ve işitme kontrolü yapmak.

1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir.
- Görme kontrolü; hayvanın hareket eden cisimleri izlemesi, engellerden sakınması ve alışık olmadığı çevredeki davranışların izlenmesi ile yapılır. Görerek dokunma refleksinin muayenesi de önemli bulgular sağlar.

2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME

- Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük
- Kedi veya köpek laboratuvar ortamına getirilir.
- Pamuk, ip, aydınlık ortam veya karanlık ortamda ışık kaynağı
- Ağzılık, tasma, zincir vs.

İŞLEM BASAMAKLARI

Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.

- Hayvan sahibine hayvanda körlük, sağa sola çarpma gibi belirtilerin olup olmadığını sorunuz. Farklı bir ortama geldiği için stresten çıkması beklenir ve hayvan serbest bırakılır (15-20 dakika)
- Ders öğretmeninizin hayvanı uysal hale getirmesine yardımcı olunuz. Hayvan iyi tutulduktan sonra ders öğretmeniniz nezaretinde hayvana yaklaşınız.
- Hayvanın gözüne doğru hava akımı oluşturmadan elinizi sallayarak gözler, göz kapakları, pupilla refleksleri muayene edilir. Hayvanın verdiği tepkiyi kontrol ediniz.
- Engel testi uygulayınız. Hayvanı farklı bir ortamda yürüterek engellerden kaçınma yeteneğini değerlendiriniz. Görme kusuru kontrol yapmak için kedi ve köpeğin yaklaşık 1 metre ilerisine ip gerilir. Gerili ipe doğru hareket ettirilir. Göremeyen hayvan ipe takılacaktır.
- Kornea refleksini kontrol etmek için parmak ile kornea üzerine bastırıldığında ya da bir cisim yaklaştırıldığında canlının göz hareketlerini kontrol ediniz. Pupillanın refleksini öğrenmek için 30 saniye göz kapalı tutulur ışık kaynağı göze yaklaştırılır. Pupillada gördüğünüz değişimleri not alarak sınıfınızda paylaşınız.
- Kişisel hijyen kurallarına uyararak kedi ve köpekte aydınlık ortamda gözde, göz kapaklarında patolojik bir durum var mı diye kontrol edilir.
- Görmenin her iki gözde veya tek gözde olduğunu anlamak için gözler sırasıyla tek tek kapatılarak yürütülür.
- Kedi - köpek masa veya varsa operasyon masası üzerine bırakılır. Elimizdeki pamuk hayvana gösterildikten sonra yukarıdan bırakılır. Hayvanın pamuğu izlemesi kontrol edilir. İzleyen hayvanın gördüğünü söyleyebiliriz.
- Yapay ses oluşturarak hayvanın sese verdiği tepkiyi kontrol ediniz. Normal bir hayvan gürültüye cevap olarak kulaklarını hareket ettirir. Bu olmazsa hayvanın arkasında sizi görmeyecek ve fark etmeyecek bir durumda şiddetli bir ses çıkararak işitme kontrolü yapınız

4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME


ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME					TARİH	.../.../20...
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIM	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

ÖĞRENME BİRİMİ	SİNİR SİSTEMİ				UYGULAMA YAPRAĞI		
KONU	GÖRME VE İŞİTME				SÜRE		
UYGULAMA ADI	MAKET ÜZERİNDE YA DA KESİLMİŞ HAYVANA AİT GÖZ VE KULAĞIN ANATOMİK YAPISINI İNCELEMEK				12 DERS SAATİ		
<p>AMAÇ: Maket üzerinde ya da kesilmiş hayvana ait göz ve kulağın anatomik yapısını incelemek</p> <p>1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyilir. • Göz görme işinde görevli yapılarla bu yapıları koruyan yardımcı kısımlardan oluşur. Görmede görevli yapılar kornea, mercek, reseptörler ve sinir hücreleridir. Yardımcı yapılar ise göz kapakları, kirpikler, kaşlar, gözyaşı bezleri, göz yuvarlağının şeklini korumaya yardımcı olan sert tabaka, göz yuvarlağının hareketini sağlayan göz kaslarıdır. Gözler kafatası içindeki göz çukurunda bulunduğu için bazı dış etkilere karşı korunmuştur. Göz yuvarlağı dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşur. Sert tabaka, damar tabaka, ağ tabaka • Kulak, işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdaki organdır. Kulak (auris) üç bölümde incelenir. Dış kulak (Auris externa), orta kulak (Auris media), iç kulak (Auris interna) • Anatomi modelleri temin yoluna gidilir. • Mezbahadan veya kasaptan kesilmiş hayvana ait göz ve kulak temin edilir. <p>2. KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ ve MALZEME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kişisel hijyen kuralları için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme, gözlük • Bisturi, makas, pens, dezenfektanlar • Çeşitli hayvanlara ait göz, kulak veya kafanın tamamı <p>3. İŞLEM BASAMAKLARI Ders öğretmeninizden yardım alarak bunları yapınız.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek için eldiven, maske, iş elbisesi ve çizme giyiniz. <p>Gözün incelenmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gözün çevresini temizleyiniz. Gözün enine kesitini alınız. • Önce sert tabakayı kesiniz. Sırasıyla damar tabaka ve ağ tabaka bölümleri inceleyiniz. • Gözün iç kısmını açıp göz merceğini inceleyiniz. • Merceğin sertliği inceleyiniz. • İnceleme sonucunda gördüğünüz anatomik yapı hakkında not alarak, arkadaşlarınızla paylaşınız. <p>Kulağın incelenmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulağın dış anatomik yapısını inceleyiniz. Auris externa • Orta kulak (Auris media) yapısını inceleyiniz. İç kulak (Auris interna) yapısını inceleyiniz. • İnceleme sonucunda gördüğünüz anatomik yapı hakkında not alarak, arkadaşlarınızla paylaşınız. <p>4. UYGULAMA DEĞERLENDİRME</p>							
ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME				TARİH	.../.../20...	
ADI-SOYADI	DEĞERLENDİRME ALANLARI	BİLGİ	BECERİ	TEMİZLİK DÜZEN	SÜRE KULLANIMI	TOPLAM	ONAY (İMZA)
NUMARASI	ALANLARA VERİLEN PUAN	50	30	10	10	100	
ÖĞRETMENİN ADI – SOYADI	TAKDİR EDİLEN PUAN						

6.13. İşitme Duyusu ve Denge Organı, Kulak

Ses dalgaları, fiziksel ortamlarda titreşim olarak kendini gösterir ve havayla iletilir. Dış kulağın (auricula) topladığı ses dalgalarının kulağın çeşitli bölümlerinde değişikliğe uğradıktan sonra beyine gönderilip burada ses hâlinde algılanmasına işitme denir. Kulak, işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdaki organdır. Kulak (auris) üç bölümde incelenir:

- Dış kulak (auris externa)
- Orta kulak (auris media)
- İç kulak (auris interna)



Görsel 6.17: Kulağın yapısı

6.13.1. Dış Kulak (Auris Externa)

Kulak kepçesi (auricula) ve dış kulak yolundan (meatus acusticus externus) oluşur. Kulak kepçesinin görevi ses dalgalarını toplamak ve dış kulak yoluna iletmektir. Her ne sebeple olursa olsun kulağı kesilen canlılar duyma konusunda sıkıntı yaşarlar. Kulak yolu, dış kulak yapısında bulunup ses dalgalarının iletilmesini sağlar. Salgı bezleri ile kulak zarının esnek bir yapıda olmasını sağlamak da görevleri arasındadır.

Kulak zarı, dış kulak ile orta kulak arasında bulunan bir zarıdır. Kulak yolundan gelen ses dalgasını kuvvetlendirip orta kulağa iletir. Ayrıca kulağa zarar verebilecek maddelerin özellikle tozların orta kulağa geçmesini engeller.



Görsel 6.18: Köpek kulak kepçesi ve iç yapısı


6.13.2. Orta Kulak (Auris Media)

Orta kulak, çekiç (malleus), malleusa yapışık olan örs (incus), ve incusa yapışık üzengi (stapes) kemikleri ve östaki borusundan oluşur. Çekiç, örs, üzengi kemiklerine kemik köprüsü de denir. Bunun denmesinin sebebi güçlenmiş ses dalgasını bir köprü gibi sırasıyla çekiç örs, örs üzengiye iletir, üzengi ise bu ses dalgasını iç kulağa iletir. Orta kulaktan yutağa uzanan bir boru geçidi vardır. Bu boru geçidine östaki borusu denir. Östaki borusu her iki kulakta da bulunur. Östaki borusunun yutak kısmında kapakçıklar bulunur esneme yutkunma gibi olaylarda ve ani basınç değişikliğinde bu kapakçıklar açılarak kulağın iç basıncını dengelemeye çalışırlar.

6.13.3. İç Kulak (Auris Interna)

İşitme ve denge duyusuyla ilgili yapılar vardır. İç kulakta oval pencere, salyangoz ve yarım daire kanalları gibi yapılar vardır. Salyangoz işitme duyusu ilgili görevleri yapar yarım daire kanalları ise denge ile ilgili duyuşsal olaylarda görevlidir. Denge yarım daire kanallarında gerçekleşir. Her kulak için üç adet yarım daire kanalı mevcuttur. Bu kanallar içerisinde de endo lenf sıvısı vardır. Bu sıvının içerisinde otalit taşları mevcuttur. Bu taşlar sarsıntıyı algılayabilen özel taşlardır. Bu taşlar sayesinde denge kurulmuş olur.

Dış kulakta bulunan kulak kepçesi tarafından toplanan ses dalgaları, yine dış kulakta bulunan bir başka yapı olan kulak kanalına iletilir. Kulak kanalı boyunca aktarılan ses dalgalarının dış kulaktaki son durağı, kulak zarı olarak adlandırılan yapıdır ve ses dalgaları burada titreşimlere dönüştürülür. Titreşimlerin oluşmasının ardından orta kulak devreye girer. Orta kulakta bulunan çekiç, örs ve üzengi kemikleri sesin işlenmesini ve iç kulağın harekete geçmesini sağlar. Oval pencereden orta kulakta bulunan salyangoz yapısına aktarılan titreşimler, burada işlenmelerinin ardından işitme siniri vasıtasıyla beyne aktarılır. Beyne gelen titreşimlerin deşifre edilmesiyle birlikte duyum oluşturulur. Sesin, titreşimden algılanan bir duyuma dönüşmesi böylece sağlanmış olur.



Görsel 6.19: İşitme fizyolojisi

BOŞ SAKSININ DEĞERİ

Bir zamanlar, artık yaşlandığını ve yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen bir padişah varmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine; kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Bir gün, ülkesindeki tüm gençleri çağırmış ve: "Artık tahttan inip yeni bir padişah seçme vakti geldi. Sizlerden birini seçmeye karar verdim." demiş. Gençler şaşırılmışlar; ancak o sürdürmüş: "Bugün hepinize birer tohum vereceğim. Bir tek tohum... Ama bu çok özel bir tohum. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp büyütmenizi istiyorum. Tam bir yıl sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Sizi, yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendirip, birinizi padişah seçeceğim."

Saraya çağırılan gençlerin arasında Yiğit adında biri de varmış. O da diğerleri gibi tohumunu almış... Evine gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. Annesi bir saksı ve biraz toprak bulup, onun tohumu ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Her gün sulayıp büyümesini bekliyorlarmış. Yeterince zaman geçtikten sonra diğer gençler tohumlarının ne kadar büyüdüğünü anlatırken, Yiğit hayal kırıklığı içinde, kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş.

Üç hafta, dört hafta, beş hafta geçmiş... Hâlâ hiçbir gelişme yokmuş. Diğerleri yetişen bitkilerinden söz ederken Yiğit çok üzülüyormuş. Padişahın onu beceriksiz sanmasından çok endişeleniyormuş. Arkadaşlarına da hiçbir şey diyemiyor, sabırla bekliyormuş. Sonunda bir yıl bitmiş ve gençlerin yetiştirdikleri bitkileri padişahın huzuruna götürecekleri gün gelip çatmış. Yiğit, annesine boş saksıyı götüremeyeceğini söyleyince, annesi ona cesaret verip; saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanları padişaha anlatmasını istemiş. Yiğit, pek istemese de, annesinin sözünü tutmuş ve boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca arkadaşlarının yetiştirdiği bitkilerin güzellikleri karşısında şaşırılmış. Sonra padişah gelmiş ve tüm gençleri selamlamış. Yiğit, arkalarda bir yerlere saklanmaya çalışıyormuş. "Ne büyük bitkiler, çiçekler ve ağaçlar yetiştirmişsiniz. Bugün biriniz padişah olacak." demiş padişah. Aniden arkada elinde boş saksısıyla Yiğit'i fark etmiş. Hemen muhafızlarına onu öne getirmelerini emretmiş. Yiğit çok korkmuş. "Sanırım beceriksizliğimden dolayı beni öldürtecek." Yiğit öne geldiğinde padişah adını sormuş. "Adım Yiğit." demiş. Diğer gençler gülüşüp onunla alay etmeye başlamışlar. Padişah onları susturmuş. Yiğit'e ve elindeki saksıya dikkatle bakıp kalabalığa doğru dönmüş. "Yeni padişahınızı selamlayın. Adı Yiğit!" demiş. Yiğit inanamamış. Çünkü tohumunu yeşertememiş bile, nasıl padişah olurmuş?

Padişah devam etmiş:

"Bir yıl önce burada herkese bir tohum verdim. Siz ekip, sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz; ama hepinize kaynamış tohum vermiştim. Asla büyüemeyecek olan... Yiğit'in dışında herkes ağaçlar, bitkiler ve çiçekler getirdi; çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz onu bir başka tohumla değiştirdiniz. Sadece Yiğit içinde benim verdiğim tohum olan boş saksıyı getirme cesaret ve dürüstlüğünü gösterdi. Beklentisi gerçekleşmeyince umutsuzluğa kapılsa da, dürüstlüğünden vazgeçmedi... Onun için yeni padişahınız o olacak!"

Dürüstlük en büyük erdemlerden biridir. Onu sıkı tutunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

- Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin görevlerinden biri değildir?**
 - Duyuları reseptörler sayesinde algılayan ileten ve cevap oluşturan sistemdir
 - Vücudu çevre şartlarına göre ayarlar
 - Organların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
 - Hafıza ve öğrenme için gerekli deneyimleri özümser
 - Vücuttaki kan üretiminden sorumludur.
- Aşağıdakilerden hangisinde nöronlarla ilgili verilen bilgi yanlıştır?**
 - Nöronlar gövde ve uzantıları olmak üzere iki bölümden incelenir
 - Nöronlar belirli dönem aktif olan hücrelerdir
 - Dentrit sinir hücresi gövdesinden çıkan kısa uzantılardır
 - Bazı akson uzantılarında miyelin kılıf bulunur.
 - Nöronlar arasında sinaps boşluğu vardır.
- Akson ucundaki sinaptik keseciklerin içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?**
 - Dopamin
 - Histamin
 - Serotonin
 - Depomin
 - Asetilkolin
- Aşağıdakilerden hangisi beyin lobu değildir?**
 - Lobusleteralis
 - Lobusfrontalis,
 - Lobusoccipitalis
 - Lobusparietalis,
 - Lobustemporalis
- Aşağıdakiler hangisi beyinden çıkan 12 çift sinirlerden değildir?**
 - Koku Alma Siniri (Nervus olfactorius)
 - Görme Siniri (Nervus opticus)
 - Göz Oynatan (Nervus oculomotorius)
 - Makara Sinir (Nervus trochlearis)
 - Ön Ayak hareket(Plexus brachialis)
- Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**
 - Parasempatik sistem, kalp hızını yavaşlatır.
 - Sempatik sistem, bağırsak hareketlerini yavaşlatır.
 - Parasempatik sistem, tükürük ve bağırsak salgılarını artırır.
 - Parasempatik sistem, kalp damarlarını genişletir.
 - Sempatik sistem göz bebeklerini (pupilla) genişletir

7. Aşağıdakilerden hangisi gözün yardımcı organlarından birisi değildir?
- A) Göz kasları
 - B) Göz kapakları
 - C) Konjunktiva
 - D) Bulbus oculi
 - E) Glandula lacrimalis
8. Cornea'nın arkasında dairesel bir oluşum olarak bulunan ve ortasında pupilla denilen delik bulunduran anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Lens
 - B) Retina
 - C) Konjunktiva
 - D) Sclera
 - E) İris
9. Aşağıdakilerden hangisi dış kulakta yer alır?
- A) Meatus acusticus externus
 - B) Kulak kemikçikleri
 - C) Östaki borusu
 - D) Vestibulum
 - E) Cochlea
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iç kulak için doğrudur?
- A) İşitme ve denge duyusuyla ilgili yapılar vardır.
 - B) Her kulak için beş adet yarım daire kanalı mevcuttur
 - C) Endo lenf sıvısının içerisinde bazalit taşları mevcuttur
 - D) Bazalit taşları dengeyi sağlar.
 - E) Hepsi

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME BİRİMİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	Y
3	Y
4	D
5	D
6	Y
7	Y
8	Y
9	Y
10	D
11	Y
12	Y
13	D
14	D
15	Y

ÖĞRENME BİRİMİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	B
2	C
3	C
4	C
5	C
6	CANLI
7	SETAE
8	MALİNG BENİNG
9	SİNUS LACTİFERİ
10	SEKRESYON

ÖĞRENME BİRİMİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	C
2	D
3	B
4	E
5	A
6	B
7	C
8	B
9	B
10	D
11	D
12	D
13	C
14	D
15	D

ÖĞRENME BİRİMİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	D
3	D
4	Y
5	Y
6	Y
7	D
8	D
9	Y
10	D
11	Y
12	D
13	Y
14	D
15	D

ÖĞRENME BİRİMİ-5'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	Y
3	D
4	D
5	Y
6	D
7	Y
8	D
9	D
10	Y
11	D
12	D
13	Y
14	D
15	Y

ÖĞRENME BİRİMİ-6'NİN CEVAP ANAHTARI

1	E
2	B
3	D
4	A
5	E
6	C
7	D
8	E
9	A
10	A

KAYNAKÇA

- AYDIN Mustafa, **Anatomi**, Eser matbası, Samsun,1992
- ALAÇAM Erol (Editörlüğünde Komisyon), **Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite**, Konya, 1994.
- BAŞOĞLU Abdullah, **Veteriner İç Hastalıklarında Klinik Muayene**, Bahçivanlar Basım San, Konya, 1998
- BÖLÜKBAŞI Fahri, **Fizyoloji Ders Kitabı-Vücut Isısı ve Sindirim**, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1989
- DOĞUER Sabri, **Evcil Hayvanların Komparatif Sistemik Anatomisi-İç Organlar-Dolaşım Sistemi**, veteriner Fakültesi Yayınları,1973
- DONNERSBERGER A.B., LESAK A.E., **A Laboratory Textbook of Anatomy and Physiology**, 6th edn., Jonesand Bartlett Publishers, London, 1988.
- DURSUN Necdet, **Veteriner Anatomi (I-II)**, Medisan Yayınevi, Ankara,1996
- Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG, **Textbook Of Veterinary Anatomy**, 2nd edn. WB Saunders Com, London, 1996
- ERGANİŞ Osman, Prof. Dr. İSTANBULLUOĞLU Ersin, **İmmünoloji**, Mimoza Yayınlar, Selçuk Üniversitesi veteriner Fakültesi, Konya, 1999
- F.GANONG William, **Tıbbi Fizyoloji**, Nobel Matbaacılık, 2002
- Getty R, **Carnivore Digestive System. In: Sisson And Grossman's The Anatomy Of The Domestic Animals**, vo12, 5 ed. WB Saunders Com, London, 1975
- Hayvan Sağlığı Alanı, **Hayvanlarda Hareket Ve Sinir Sistemi Modülü** , Ankara, 2008
- İMREN Hüseyin Yılmaz, **Veteriner İç Hastalıklarına Giriş**, 2000, Ankara
- İMREN Hüseyin, ŞAHAL Mehmet, **Veteriner İç Hastalıkları**, Fıryal Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti Ankara, 1991.
- İZCİ Celal, **Siğir Ayak Hastalıkları**, S.Ü. Veteriner Fakültesi, Konya, 1999.
- KOMİSYON, **Temel veteriner Fizyoloji**, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, ESKİŞEHİR, Eylül 2011
- KONUĞ Talat, **Pratik Fizyoloji**, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1975
- KÜÇÜKER Nail, **Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi**, Çukurova Üniversitesi Yayınlar, Adana, 1993
- NİCKEL R., SCHUMMER A., SEİFERLE E., **The Viscera of Domestic Mammals**, 2nd ed., verlag Paul Parey, Berlin, 1979.
- NOYAN Ahmet, **Fizyoloji**, Meteksan Yayınevi, Ankara,2004.
- ÖZGEN Hümevra, **Hayvan Besleme**, A.Ü.Basımevi, Ankara, 1978.
- ÖZKOCA Adnan, **Çiftlik Hayvanlarında Suni Tohumlama**, A.Ü. veteriner Fakültesi, Ankara 1972.
- ÖZTÜRKCAN Orhan, **Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizma**, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, 1995.
- POPESKO P, **Atlas of Topographical Anatomy of the Domestic Animals**, 5th edn. Vol 2, WB Saunders Com, London, 1986.
- SEVİNÇ Afif, **Dölerme ve Suni Tohumlama**, A.Ü. veteriner Fakültesi, Ankara, 1972.
- TECİRLİOĞLU Süleyman, **Komparatif Anatomi Terimleri** – Ankara Üniversitesi, veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara,1986
- TEKELİ Tevfik, Kenan ÇOYAN, **İneklerde Suni Tohumlama**, Bahçivanlar Basım Sanayi, Konya,1996
- Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu, **Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü**, Türk Dil kurumu yayınları, İstanbul, 2009
- YAMAN Kemalettin, **Fizyoloji**, Demircan Yayınevi, Kadioğlu Matbaası, 1987.
- Açık Öğretim fakültesi, **Temel Veteriner Anatomi**, Yayın no: 1316

Görsel 1.1, 1.3, 1.29, 1.32, 1.33, 1.34, : http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2020-01/4_6079.PDF 02.05.2020 04:48

Görsel 1.13: Veteriner Hekim Zeynullah Hekimoğlu tarafından çekilmiştir.

Görsel 1.2: 123rf.com: 52435816

Görsel 1.4: shutterstock_1443412832

Görsel 1.25: Veteriner Hekim Yaşar Şahin tarafından çekilmiştir.

Görsel 1.26: 123rf.com: 126423229

Görsel 1.28: Veteriner Hekim Mustafa Canbazoğlu tarafından çekilmiştir.

Görsel 1.30: 123rf.com : 31835391

Görsel 1.31: 123rf.com: 68635286

Görsel 1.32: http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2020-01/4_6079.PDF 02.05.2020 04:48

Görsel 1.35:123rf.com: 56719800

Görsel 1.36: 123rf.com :80631894

Görsel 1.37: Fotoğraf Hakan Köken'den alınarak düzenlenmiştir.

Görsel 1.38, 1.39, 1.40, 1.42 <http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=atlarda-yapisaal-bozukluklar.pdf> 19.05.2020 19:05

Görsel 1.41: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/131533/mod_resource/content/0/6.pdf 27.04.2020 01:47

Görsel 1.5: Veteriner Hekim Tuncay Eker tarafından çekilmiştir.

Görsel 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27

Veteriner Hekim Hasan Yeşilyurt tarafından çekilmiş, düzenlenmiştir.

Görsel 1.8: 123rf.com: 141935966

Görsel 2.1: 123rf.com: 44493562

Görsel 2.12: 123rf.com: 34583510

Görsel 2.14: 123rf.com: 107595147

Görsel 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13,2.15, 2.16, 2.17, 2.18 Veteriner Hekim Nedret Selvi tarafından çekilmiştir

Görsel 2.3: 123rf.com: 69363580

Görsel 2.9: 123rf.com: 110556279 ve shutterstock_1230629371

Görsel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 (2), 3.7, 3.8, 3.9,3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, Veteriner Hekim Nedret Selvi tarafından çekilmiştir.

Görsel 3.18: 123rf.com: 128230655

Görsel 3.3, 3.6(1), 3.10, 3.16: Hayvanlarda sindirim sistemi modülü'nden alınmıştır.

Görsel 4.1: <https://www.shutterstock.com/tr/> ID: 1384019741

Görsel 4.10: <https://www.shutterstock.com/tr/> id:239128069

Görsel 4.11:https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/128270/mod_resource/content/1/Solunum%20Sistemi.pdf

Görsel 4.12: Anadolu üniversitesi Yayını no: 2319

Görsel 4.13:<http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=solunum-fizyolojisi.pdf> 6.6.2020 03:36

Görsel 4.14: Veteriner Hekim Nedret Selvi' den alınarak düzenlenmiştir.

- Görsel 4.15: İsmail Rahman Köse'den ve shutterstock_1571284174 nolu resim alınarak düzenlenmiştir.
- Görsel 4.16: <https://www.shutterstock.com/tr/> ID: 1571284174
- Görsel 4.18 <https://www.shutterstock.com/tr/> ID: 131979947
- Görsel 4.19: <https://www.shutterstock.com/tr/> ID ID: 375878683
- Görsel 4.21: <https://www.shutterstock.com/tr/> ID ID 1478859881
- Görsel 4.22: Veteriner Hekim Nedret Selvi tarafından çekilmiştir.
- Görsel 4.24 <https://www.shutterstock.com/tr/> ID: 267890783
- Görsel 4.25: <https://www.shutterstock.com/tr/> ID: 145028506
- Görsel 4.27: <https://www.shutterstock.com/tr/>ID: 1507412
- Görsel 4.3:Düzenlenmiştir. [Services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=46&sayi=798&sayfa=42&yaziid=34342](http://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=46&sayi=798&sayfa=42&yaziid=34342)
- Görsel 4.30: <https://www.shutterstock.com/tr/>ID 435411736
- Görsel 4.31:<https://www.shutterstock.com/tr/>ID 1358485370
- Görsel 4.34: <https://www.shutterstock.com/tr/>ID:658780867
- Görsel 4.35: https://www.shutterstock.com ID: 1184857141
- Görsel 4.4: <https://www.shutterstock.com/tr/> id:187162100
- Görsel 4.6:<https://www.toraks.org.tr/halk/news.aspx?detail=4722> 07.06.2020 23:42
- Görsel 4.9: <http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=solunum-fizyolojisi.pdf> 06.06.2020 03:36
- Görsel 5.1,5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27: Veteriner Hekim Nedret Selvi tarafından çekilmiştir.
- Görsel 5.2, 5.3, 5.4, 5.6: Hayvanlarda boşaltım sistemi modülü'nden alınmıştır.
- Görsel 6.1: 123rf.com: 130052729
- Görsel 6.2: shutterstock_1547189516
- Görsel 6.3: shutterstock.com ID: 1291434724
- Görsel 6.6 :shutterstock.com ID: 1495576448
- Görsel 6.7 :shutterstock.com ID: 1715271019
- Görsel 6.8 :shutterstock.com ID: 86007007
- Görsel 6.9 :shutterstock.com ID: 526850140
- Görsel 6.10 :shutterstock.com ID: : 288031550
- Görsel 6.11, 6.13: Veteriner Hekim Nedret Selvi tarafından çekilmiştir.
- Görsel 6.12 :shutterstock.com ID: 1687644757
- Görsel 6.16 : shutterstock.com ID 1144480013
- Görsel 6.18: shutterstock.com ID: 1286040280
- BİLGİ KUTUSU <https://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/soguk-havalarda-neden-burnumuz-akar> 12.06.2020 02:47
- http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/laborantveveterinersaglik_ao/tahistoloji.pdf
- <http://vanat.cvm.umn.edu/vetAnomal> 16.04.2020 20:25

http://www.bio.sunyorange.edu/updated2/comparative_anatomy/anat.html1/Lymphatic%20System_files/e_thymus.jpg
17.06.2020 03:08

<http://www.biyolojiportali.com>

<http://www.fao.org/3/t0690e/t0690e0b.htm> 17.06.2020 01:51

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/60388/mod_resource/

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/60388/mod_resource/%20%0dcontent/0/20.%20Dola%C5%9F%C4%B1m%20ve%20Solunum%20%20.pdf%2013.06.2020%2002:51f 13.06.2020 02:51

<https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/kayam/72831/Kanatl%C4%B1%20solunum%20sistemi.pdf> 07.06.2020 22:54

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/bir-insanin-kan-grubu-degisebilir-mi> 19.06.2020 19:05

<https://secure.vet.cornell.edu/oed/sunymusc/BonesAndJoints.aspx> 09.05.2020 15:24

<https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=46&sayi=812&sayfa=6&yaziid=34891>

<https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=46&sayi=815&sayfa=68&yaziid=35053>

<https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=43&sayi=514&sayfa=98&yaziid=30680>
01.07.2020 21:52

https://video-cdn.tjk.org/videoftp/2020_AYGIR_KATALOGU.pdf 25.06.2020 09:33

<https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C%BC%C3%A7%C3%BCkba%C5%9F%20>

<https://www.aa.com.tr/tr/portre/dunyayi-titreten-padisah-kanuni-sultan-suleyman/1575316>

www.ansci.wisc.edu/jp1ansci_repromiscwebsites09thurOvsynchOvsynch.htm.jpg

www.vetmed.wsu.edu

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarı Ders Bilgi Formu, Ankara, 2020.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Ankara, 2020.