

INDEX KEWENSIS
PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM SECUNDUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCXCVI USQUE AD FINEM

ANNI MDCCC COMPLECTENS

DUCTU ET CONSILIO W. T. THISELTON-DYER

CONFECERUNT

HERBARIUM HORTI REGII BOTANICI KEWENSIS CURATORES



OXONII

E PRELO CLARENDONIANO

MDCCCIV

LONDINI ET NOVI EBORACI



APUD HENRICUM FROWDE, A.M.

OXONII: EXCUDEBAT HORATIUS HART, A.M., TYPOGRAPHUS ACADEMICUS

MONITUM

QUUM anno 1895 Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum usque ad annum 1885 editarum sumptu beati CAROLI DARWIN, auxilio Preli Clarendoniani, studio virorum apud Hortum Kewensem ipsum in rebus botanicis versatorum, necnon adiumento cl. J. D. HOOKER et B. D. JACKSON esset confectus et in usum publicum editus, visum est superesse ut nomina plantarum de die in diem vulgata Indici adderentur; quod consensu omnium facilius fieri posset, si ederentur supplementa quinquennalia. Laboribus cl. B. D. JACKSON et Th. DURAND Bruxellensis supplementum 1^{um}, pro hac vice decennale, usque ad annum 1895 prolatum simili modo atque Index ipse iam impressum est.

Supplementa posteriora curatoribus Herbarii Kewensis curae erunt. Iuvat nos supplementi annorum 1895-1900 partem priorem lectoribus benevolis commendare.

Si quid falsi in opere tam laborioso repertum erit, si quid addendum sit, veniam posco, nec frustra, ut opinor, ab iis certe quibus labor noster laborem leviolem fecerit.

W. T. THISELTON-DYER

Scribam in Horto Regio Botanico Kewensi mense Sept. a. 1904.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM SECUNDUM

NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS M.DCCC.XCVI—M.DCCCC EDITA

COMPLECTENS

ABAMA—ACAENA.

ABAMA, Adans. = *Nartheocium*, Moehr. (Liliac.).
californica, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = *N. californicum*.

ABDRA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 205. *CRUCIFERAE*.
brachycarpa, Greene, l. c. 207 (= *Draba brachycarpa*).—Am. bor.

ABEREMOA, Aubl. = *Duguetia*, St. Hil. (Anonac.).
argentea, R. Fries, in Svensk. Vet. Akad. Handl. xxxiv. (1900) no. 5. 23.—Peruv.
bracteosa, R. Fries, l. c. 22 = *D. bracteosa*.
dioica, Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio, vi. 7 (= *Anona dioica*).—Bras.
lepidota, R. Fries, in Svensk. Vet. Akad. Handl. xxxiv. no. 5. 20 (= *Anona lepidota*).—Guiana.
marcgraviana, R. Fries, l. c. = *D. marcgraviana*.
microphylla, R. Fries, l. c. 23.—Bras.
peruviana, R. Fries, l. c. 22.—Peruv.
quitarensis, R. Fries, l. c. 20 = *D. quitarensis*.
rhisantha, R. Fries, l. c. 24 (= *Anona rhisantha*).—Bras.
Sanctae-crucis, R. Fries, l. c. 22 = *D. Sanctae-crucis*.
spixiana, R. Fries, l. c. = *D. spixiana*.

ABIES, Tourn. (Conif.).
arizonica, Merriam, in Proc. Biol. Soc. Washington, x. 116.—Am. bor.
brachytyla, Franch. in Journ. de Bot. 1899, 258.—China.
chinensis, Franch. l. c. 259.—China.
Delavayi, Franch. l. c. 255.—China.
Fargesii, Franch. l. c. 256.—China.
likiangensis, Franch. l. c. 257.—China.
Semenovii, Fedtsch. in Bot. Centralbl. lxxiii. 210.—As. cent.
shastensis, Lemmon, in Gard. & For. 1897, 184.—Am. bor.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. 1899, 258.—China.

ABOLBODA, Humb. & Bonpl. (Xyrid.).
longifolia, Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxii. no. 2 (1897) 20.—Bras.

ABRONIA, Juss. (Nyctag.).
alba, Eastwood, in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 97.—Am. bor.
alpina, Brandegee, in Coult. Bot. Gas. xxvii. 456.—Am. bor.
ammophila, Greene, Pittonia, iv. 226.—Am. bor.
angulata, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 39.—Am. bor.
angustifolia, Greene, Pittonia, iii. 344.—Am. bor.
arenaria, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 137 = *ammophila*.
carnea, Greene, Pittonia, iii. 343.—Am. bor.
elliptica, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 7.—Am. bor.

ABUTILON, Tourn. (Malvac.).
amplissimum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 17 (= *Sida hernandioides*).—Am. trop.
bakerianum, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. (1897) 133.—Mexic.

VOL. III.

ABUTILON :—

Cabrae, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 16.—Afr. trop.
cubanum, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. ii. 70.—Ind. occ.
eetveldeanum, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 17.—Afr. trop.
Goldmani, Baker f. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 170.—Mexic.
hirsutum, Reiche, Fl. Chile, i. 219 (non K. Schum.).—Chili.
Nelsoni, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 134.—Am. cent.
reticulatum, Baker f. & Rose, ex Rose, l. c. 171.—Mexic.
stellatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 18 (= *Wissadula rostrata*).—Cosmop. trop.
tacuarembense, Arech. in Anal. Mus. Montevid. x. (Fl. Urug.) 133.—Urug.
Vidali, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 499 (= *Cristaria Vidali*).—Patag.

ACACIA, Tourn. (Legum.).

amboensis, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 105.—Afr. trop.
andongensis, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 314.—Afr. trop.
angustissima, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 47 = *filicina*.
arenaria, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 105.—Afr. trop.
arundelliana, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 515.—Austral.
aurisparsa, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1303.—Madag.
bellula, Drake, l. c. 1302.—Madag.
Brosiglii, Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 194.—Afr. trop.
campoptila, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 208.—Arab.
Chisholmi, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iv. 47.—Austral.
cowleana, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. 81, nomen; et in Rep. Horn Exped. iii. 187.—Austral.
Cuthbertsoni, Luehmann, in Vict. Natural. xiii. 117.—Austral.
Dawsoni, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxii. 153.—Austral.
difformis, R. T. Baker, l. c. 154.—Austral.
dolichocephala, Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 86.—Afr. trop.
Englerii, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 107.—Afr. trop.
flava, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 214 = *ehrenbergiana*.
Fleckii, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 108.—Afr. trop.
frumentacea, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. 81, nomen; et in Rep. Horn Exped. iii. 187.—Austral.
gansbergensis, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 108.—Afr. trop.
Georginae, F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii. 9.—Austral.

ACACIA :—

glandulicarpa, F. M. Reader, in Vict. Natural. xiii. 146.—Austral.
glandulifera, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 111.—Afr. trop.
Goetzei, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 395.—Afr. trop.
inopinata, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 507.—Ind. or.
kalachariensis, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 114 (non S. Wats.).—Afr. trop.
Kingii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 506.—Ind. or.
longepetiolata, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 1. 114.—Afr. trop.
macrothyrsa, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 396.—Afr. trop.
Michellii, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 28.—Bolivia.
minutifolia, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1303 (non F. Muell.).—Madag.
Nefasia, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 209 = *verugera*.
nossibiensis, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1302.—Madag.
Orfota, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 213 = *nubica*.
palustris, Luehmann, in Vict. Natural. xiii. 117.—Austral.
Perieri, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1304.—Madag.
Perrottii, Warb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 249.—Afr. trop.
polypyrgigenes, Greenman, ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis, vii. 419.—Cuba.
pumila, Maiden & R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xx. 385.—Austral.
rehmanniana, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vi. 525.—Afr. austr.
Rothii, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. vi. 39.—Austral.
sibirica, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 189.—Austral.
subangulata, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 194.—Mexic.
Trentiniani, A. Chevall. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot. 1900, 272.—Afr. trop.
Tysoni, Luehmann, in Vict. Natural. xiii. 112.—Austral.
ulgurensis, Taub. ex Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 396.—Afr. trop.

ACAENA, Linn. (Rosac.).

denudata, Reiche, Fl. Chile, ii. 232.—Chili.
Hieronymi, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 74.—Reg. Argent.
hirta, Citerne, in Rev. Sci. Ouest, vii. 43.—Chili.
insularis, Citerne, l. c.—Ins. St. Paul.
nudicaulis, Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata, vii. 367.—Reg. Magell.
Philippi, P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 167.—Reg. Magell.
pinnata, Citerne, in Rev. Sci. Ouest, vii. 42.—Bolivia.

† B

ACAENA :—

platycantha, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 515.—Patag.
 pulvinata, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 75.*—Am. austr.
 sericea, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. 621* (non Jacq.)
 = Philippi.
 tenera, *Alboff, ex Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 367.—Reg. Magell.

ACALYPHA, Linn. (Euphorb.).

acapulcensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 87.*—Mexic.
 Argomuelleri, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 229.—Peruv.
 celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 624.*—Celebes.
 controversa, *K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 348* (= *Ricinocarpus controversus*).—Bolivia.
 depressinervia, *K. Schum. l. c.* (= *Ricinocarpus depressinervius*).—Afr. austr.
 Dewevrei, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 24.*—Afr. trop.
 Eggersii, *Pax, l. c. xxvi. 505.*—Ecuad.
 flabellifera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 119.*—Bolivia.
 Giraldii, *Pax, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 429.*—China.
 godseffiana, *Masters, in Gard. Chron. 1898, I. 241.*—Hab.?
 lehmanniana, *Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 505.*—N. Granat.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 624.*—Celebes.
 nematorhachis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 402.—N. Guin.
 psilostachyoides, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 188.*—Afr. trop.
 Rehmanni, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi. 733.*—Afr. austr.
 Sanderi, *N. E. Br. in Gard. Chron. 1896, II. 392* = hispida.
 Schinzii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi. 734.*—Afr. austr.
 similis, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 624.*—Celebes.
 umbrosa, *Brandege, in Erythea, vii. (1899) 7.*—Mexic.
 yucatanense, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot. i. 371.*—Mexic.

ACAMPE, Lindl. (Orchid.).

pachyglossa, *Reichb. f. Ota Bot. Hamb. ii. 76* = *Saccolabium pachyglossum*.
 penangiana, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 358.*—Penins. Mal.

ACAMPTOPAPPUS, A. Gray = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

microcephalus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 38.*—Am. bor.

ACANTHOCLADUS, Klotzsch (Polygal.).

Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 595.—Patag.
 tehuelchum, *Speg. l. c. 496.*—Patag.

ACANTHODIUM, Delile = **Blepharis**, Juss. (Acanth.).

grossum, *Wight, Ic. tt. 1535-6* = *B. linariaefolia*.
 hirtum, *Nees, in DC. Prod. xi. 274* = *B. linariaefolia*.
 serrulatum, *Nees, l. c. 275* = *B. serrulata*.
 spicatum, *Acerbi, ex Nees, l. c. 67* = *Nelsonia campestris*.

ACANTHOLIMON, Boiss. (Plumbag.).

Fominii, *Kusn. in Delect. Pl. Furjev. 1900, 50.*—Ross.

ACANTHOPALE, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 62 (1899). **ACANTHACEAE**.

albosetulosa, *C. B. Clarke, l. c. 64.*—Afr. trop.
 azaleoides, *C. B. Clarke, l. c. 63.*—Afr. trop.
 Buchholzii, *C. B. Clarke, l. c. 64.*—Afr. trop.
 confertiflora, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
 decempedalis, *C. B. Clarke, l. c. 63.*—Afr. trop.
 laxiflora, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
 pubescens, *C. B. Clarke, l. c. 64.*—Afr. trop.

ACANTHOPANAX, Miq. (Aral.).

cissifolius, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 50* (= *Aralia cissifolia*).—Reg. Himal.
 evodiaefolius, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 306.*—China.
 Henryi, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 50* (= *Eleutherococcus Henryi*).—China.

ACANTHOPANAX :—

hypoleucum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xii. (1898) 18.*—Japan.
 leucorrhizus, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 50* (= *Eleutherococcus leucorrhizus*).—China.
 senticosus, *Harms, l. c.* (= *Eleutherococcus senticosus*).—China.
 setchuensis, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 488.*—China.
 sieboldianum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xii. (1898) 10.*—Japan.

ACANTHOPHIPPIUM, Blume (Orchid.).

eburneum, *Kraenzl. in Gard. Chron. 1896, II. 266.*—Hab.?
 mantinianum, *L. Lind. & Cogn. in Journ. des Orch. vii. 138.*—Ins. Philipp.
 splendidum, *F. F. Sm. in Tijdschr. Ned. Ind. lviii. fide K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 463.*—Celebes.

ACANTHOSCYPHUS, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, xxv. (1898) 53. **POLYGONACEAE**.

Parishii, *Small, l. c.* (= *Oxytheca Parishii*).—Am. bor.

ACANTHUS, Tourn. (Acanth.).

Dusenii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 108.*—Afr. trop.
 emimens, *C. B. Clarke, l. c. 107.*—Afr. trop.
 Kirki, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 87* = *Sclerochiton Kirki*.
 latisepalus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 108.*—Afr. trop.
 nitidus, *S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 232* = *Sclerochiton nitidum*.
 tetragonus, *R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxxv* = *Blepharis edulis*.

ACER, Tourn. (Sapind.).

Papilio, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 115.*—Reg. Himal.
 radujaensis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 344.*—Eur.

ACERAS, R. Br. (Orchid.).

bolleana, *Siehe, in Gard. Chron. 1898, I. 365.*—As. Min.
 ACERATES, Ell. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclep.).
 Pringlei, *Greenmai, in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 570.*—Mexic.
 Rusbyi, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 37*—Am. bor.

ACETOSELLA, Rupp. = **Rumex**, Linn. (Geraniac.).

longissima, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 31* = *Oxalis longissima*.
 yapacaniensis, *Kuntze, l. c.* = *Oxalis yapacaniensis*.

ACHILLEA, Linn. (Compos.).

anthemiformis, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 626.*—Hab.?
 anthemoides, *Frey & Sint. l. c. iii. 346* (non Willd.) = praec.
 californica, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 369.*—Am. bor.
 cheilanthifolia, *Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xvi. 229.*—Reg. Caucas.
 getica, *Grecescu, Consp. Fl. Roman. 310.*—Eur.
 gigantea, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 370.*—Am. bor.
 macedonica, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar. t. 134.*—Eur.
 magnifolia, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 172.*—Eur.
 millefoliata, *Grecescu, Consp. Fl. Roman. 312.*—Eur.
 Pecten-Veneris, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 371.*—Am. bor.
 striata, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 296.*—Eur.
 Urumoffii, *Halacsy, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 143.*—Bulgaria.

ACHIMENES, P. Br. (Gesner.).

albescens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 94.*—Bolivia.
 flaccida, *Rusby, l. c. 95.*—Bolivia.
 gracilis, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 27* (non Warscz.).—Am. austr.
 heppielloides, *Fritsch, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 151.*—Bolivia.
 Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 95.*—Bolivia.

ACHNERIA, Munro (Gramin.).

ampla, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 836.*—Afr. austr.
 assimilis, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* = *Ecklonii*.
 aurea, *Th. Dur. & Schinz, l. c.*—Afr. austr.
 capensis, *Th. Dur. & Schinz, l. c.*—Afr. austr.
 capillaris, *Staff, in Hook. Ic. Pl. t. 2604.*—Afr. austr.
 curvifolia, *Staff, in Dyer, Fl. Cap. vii. 458.*—Afr. austr.
 Ecklonii, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 836.*—Afr. austr.
 hirsuta, *Staff, in Dyer, Fl. Cap. vii. 462.*—Afr. austr.
 microphylla, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 836.*—Afr. austr.
 setifolia, *Staff, in Dyer, Fl. Cap. vii. 461.*—Afr. austr.
 tuberculata, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 836* = setifolia.

ACHYRANTHES, Linn. (Amarant.).

breviflora, *Baker, in Kew Bull. 1897, 280.*—Afr. trop.
 Carioni, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
 conferta, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 420* (non Ruiz).—Afr. trop.
 pedicellata, *Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 56.*—Afr. trop.
 rubro-lutea, *Lopr. l. c. 57.*—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 421.*—Afr. trop.
 viridis, *Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 55.*—Afr. trop.

ACHYRONIA, Royen = **Aspalathus**, Linn. (Legum.).

latibracteata, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 48* = *A. latibracteatus*.

ACHYROPHORUS, Adans. = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).

leucanthus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 545.*—Patag.

ACHYROSPERMUM, Blume (Labiata.).

africanum, *Hook. f. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 465.*—Afr. trop.
 cryptanthum, *Baker, in Kew Bull. 1898, 162.*—Afr. trop.
 laterale, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 464.*—Afr. trop.
 nyasanum, *Baker, l. c. 465.*—Afr. trop.
 oblongifolium, *Baker, l. c. 464.*—Afr. trop.
 Schlechteri, *Guerke, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 311, nomen.*—Afr. trop.

ACICARPHA, Juss. (Calycer.).

rosulata, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. t. 2636 B.*—Patag.

ACIDANTHERA, Hochst. (Irid.).

brevicaulis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 132.*—Afr. austr.
 Gunnisi, *Rendle, in Journ. Bot. 1898, 31.*—Afr. trop.
 sabulosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 101.*—Afr. austr.
 ukambanensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 359.*—Afr. trop.

ACINODENDRUM, Kuntze = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melast.).

Kuntzei, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 98* = *M. Kuntzei*.

ACIOA, Aubl. = **Couepia**, Aubl. (Rosac.).

Barteri, *Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 332* (= *Griffonia Barteri*).—Afr. trop.
 Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 19.*—Afr. trop.
 Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 381.*—Afr. trop.
 lanceolata, *Engl. l. c. 382.*—Afr. trop.
 Lehmbachii, *Engl. l. c. 379.*—Afr. trop.
 Mannii, *Engl. l. c. 381* (= *Griffonia Mannii*).—Afr. trop.
 parvifolia, *Engl. l. c. 380.*—Afr. trop.
 scabrifolia, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii. 328* (reimpr. ex Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x.).—Afr. trop.
 Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 379.*—Afr. trop.
 tenuiflora, *Dinkl. & Engl. ex Engl. l. c. 382.*—Afr. trop.

ACIPHYLLA, Forst. (Umbellif.).

Dieffenbachii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal. 211* (= *Angelica Dieffenbachii*).—N. Zel.
 Hookeri, *T. Kirk, l. c. 209.*—N. Zel.

ACISANTHERA, P. Br. (Melastom.).

boliviensis, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 94.*—Bolivia.
 rosulans, *Huber, in Bol. Mus. Para. ii. 509.*—Bras.

- ACMADENIA**, Bartl. & Wendl. (Rutac.).
diosmoides, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 439.—Afr. austr.
- ACMANATHERA**, Griseb. (Malpigh.).
Radlkoferi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 27.—Bolivia.
- ACONITUM**, Tourn. (Ranunc.).
balcanicum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 9.—Bulgaria.
bulbiferum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 25.—Am. bor.
cymbulatum, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 213.—Reg. Caucas.
hemsleyanum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 829.—China.
Henryi, *E. Pritz. l. c.*—China.
pantosekianum, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 241.—Eur.
ramosum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 8.—Am. bor.
vaginatum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 328.—China.
- ACRATHERUM**, Link = **Arundinella**, Raddi (Gramin.).
miliaceum, Link, *Hort. Berol.* i. 230 = *A. brasiliensis*.
pumilum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 414 = *A. tenella*.
- ACRIDOCARPUS**, Guill. & Perr. (Malpigh.).
rudis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 28.—Afr. trop.
socotranus, *Oliv. in Hook. Ic. Pl.* t. 2433.—Socotra.
- ACRIOPSIS**, Reinw. (Orchid.).
nelsoniana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 160.—N. Guin.
papuana, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 250, nomen.—N. Guin.
sumatrana, *Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 249.—Sumatra.
- ACROCEPHALUS**, Benth. (Labiata).
centratheroides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 356.—Afr. trop.
dissitifolius, *Baker, l. c.* 362.—Afr. trop.
divaricatus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 76.—Afr. trop.
galeopsifolius, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 356.—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 471.—Afr. trop.
Hensii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 77.—Afr. trop.
hyptoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 362.—Afr. trop.
Laurentii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 79.—Afr. trop.
lippoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 361.—Afr. trop.
masuianus, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 80.—Afr. trop.
monocephalus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 356.—Afr. trop.
oligocephalus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
polytrichus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 358.—Afr. trop.
porphyrophyllus, *Baker, l. c.* 357.—Afr. trop.
succisaefolius, *Baker, l. c.* 356.—Afr. trop.
venosus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
- ACROCOMIA**, Mart. (Palmae).
Mokayayba, *Barb. Rodr. in Plant. Nov. Rio*, v. 11.—Bras.
odorata, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 48.—Bras.
- ACROELYTRUM**, Steud. = **Lophatherum**, Brongn. (Gramin.).
japonicum, Steud. in *Flora*, 1846, 21 = *L. gracile*.
- ACROLOPHIA**, Pfitzer (Orchid.).
fimbriata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 340.—Afr. austr.
- ACRONYCHIA**, Forst. (Rutac.).
Andrewsi, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 174.—Ins. Christmas.
haplophylla, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 180 = *tetrandra*.
Scortechinii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 281.—Austral.
- ACROSEPALUM**, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. (1898) 22. **TILIACEAE**.
klaineanum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
- ACROTOME**, Benth. (Labiata).
Belckii, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 549.—Afr. austr.
- ACTAEA**, Linn. (Ranunc.).
eburnea, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 153.—Am. bor.
- ACTEPHILA**, Blume (Euphorb.).
africana, *Pax, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 210.—Afr. occ.
flaviflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 388.—N. Guin.
gigantifolia, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.
Minahassae, *Koord. l. c.*—Celebes.
reticulata, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 326 (= *Amanoa reticulata*).—Afr. trop.
- ACTINEA**, Juss. = **Cephalophora**, Cav. (Compos.).
doniana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 128 = *C. doniana*.
haenkeana, *Kuntze, l. c.* = *Hymenoxys haenkeana*.
insularis, *Kuntze, l. c.* = *C. insularis*.
scaposa, *Kuntze, l. c.* = *C. scaposa*.
Tweedii, *Kuntze, l. c.* = *Hymenoxys Tweediei*.
- ACTINELLA**, Nutt. (Compos.).
glabra, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyom.* 136.—Am. bor.
- ACTINOLEPIS**, DC. (Compos.).
nubigena, *Greene, Fl. Francisc.* 442 (= *Eriophyllum nubigenum*).—Am. bor.
Pringlei, *Greene, l. c.* 441 (= *Eriophyllum Pringlei*).—Am. bor.
- ACTINOSPERMUM**, Ell. = **Baldwinia**, Nutt. (Compos.).
uniflorum, *Barnh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 411 = *B. uniflora*.
- ACTINOSTEMMA**, Griff. (Cucurb.).
biglandulosa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2622, 2645.—China.
- ACUAN**, Medic. = **Desmanthus**, Willd. (Legum.).
Fendleri, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 5.—Am. bor.
glandulosa, *A. A. Heller, l. c.* (= *Mimosa glandulosa*).—Am. bor.
obtusum, *A. A. Heller, l. c. ed. I.* 4 = *D. obtusum*.
- ADANSONIA**, Linn. (Malv.).
sphaerocarpa, *A. Chevall. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot.* 1900, 271.—Afr. trop.
- ADENANDRA**, Willd. (Rutac.).
acuta, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 162.—Afr. austr.
Bodkinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 315.—Afr. austr.
- ADENANTHERA**, Royen (Legum.).
tamarindifolia, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 392A.—Cochinch.
- ADENIA**, Forst. = **Modecca**, Linn. (Passifl.).
aspidophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 235.—Afr. trop.
cissampeloides, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 255 (= *Ophiocaulon cissampeloides*).—Afr. trop.
cladosepala, *Harms, l. c.* 256 = *M. cladosepala*.
cynanchifolia, *Harms, l. c.* 255 (= *Ophiocaulon cynanchifolius*).—Afr. trop.
densiflora, *Harms, l. c.* 256 = *M. densiflora*.
gracilis, *Harms, l. c.* 255; et in *Engl. Jahrb.* xxvi. 236.—Afr. trop.
gummifera, *Harms, l. c.* 255 (= *Ophiocaulon gummifer*).—Afr. trop.
mukengensis, *Harms, l. c.* (= *Ophiocaulon lanceolatum*).—Afr. trop.
oblongifolia, *Harms, l. c.*; et in *Engl. Jahrb.* xxiv. 236.—Afr. trop.
Pechuelii, *Harms, l. c.* 255 (= *Echinothamnus Pechuelii*).—Afr. trop.
Rowlandi, *Harms, l. c.* (= *Ophiocaulon Rowlandi*).—Afr. trop.
Staudtii, *Harms, l. c.*; et in *Engl. Jahrb.* xxvi. 237.—Afr. trop.
stenophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 238.—Afr. austr.
Wilmsii, *Harms, l. c.*—Afr. austr.
- ADENIUM**, Roem. & Schult. (Apocyn.).
arabicum, *Balf. f. in Trans. Roy. Soc. Edinb.* xxxi. 161.—Arab.
- ADENOCALYMNA**, Mart. (Bignon.).
Ackermannii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 98.—Bras.
asperulum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 113.—Bras.
croceum, *S. Moore, ex Bureau & K. Schum. l. c.* 103.—Bras.
Cymbalum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 112 (= *Bignonia Cymbalum*).—Bras.
hirtum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 100.—Bras.
hypostictum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 99.—Bras.
kerere, *Bureau & K. Schum. l. c.* 119 = *stridula*.
laevigatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 113.—Bras.
multiglandulosum, *Benth. ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 72, nomen.—Bolivia.
nervosum, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 95.—Bras.
pachypus, *Bureau & K. Schum. l. c.* 110 (= *Anemopaegma pachypus*).—Bras.
pleiadenium, *Bureau & K. Schum. l. c.* 107.—Bras.
pohlianum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 114.—Bras.
Sagotii, *Bureau & K. Schum. l. c.* 110.—Guiana.
splendens, *Bureau & K. Schum. l. c.* 115.—Bras.
ternatum, *De Mello, ex Bureau & K. Schum. l. c.* 104.—Bras.
- ADENOGONUM**, Welw. ex Hiern, in *Journ. Bot.* 1898, 290. **COMPOSITAE**.
decumbens, *Welw. l. c.* 291.—Afr. austr.
- ADENONCOS**, Blume = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).
major, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 350.—Penins. Mal.
parviflora, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
- ADENOSACME**, Wall. (Rubiace.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 492, nomen.—Celebes.
- ADENOSMA**, Nees (Acanth.).
africana, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 21 = *Synnemia africanum*.
- ADESMLIA**, DC. (Legum.).
Ameghinoli, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 507.—Patag.
calopogon, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 123.—Chili.
carnosa, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 159.—Reg. Magell.
colinensis, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 139.—Chili.
Dessaueri, *Phil. l. c.* 130.—Chili.
divaricata, *Phil. l. c.* 129.—Chili.
Godoyae, *Phil. l. c.* 161.—Chili.
intricata, *Phil. l. c.* 124.—Chili.
Izquierdi, *Phil. l. c.* 164.—Chili.
latistipula, *Phil. l. c.* 157.—Chili.
maerostachya, *Phil. l. c.* 140.—Chili.
maulina, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 353 (= *Patagonium maulinum*).—Chili.
melanocarpa, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 158.—Chili.
Morenonis, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 70.—Patag.
Negeri, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 161.—Reg. Magell.
pampeana, *Speg. Fl. Vent.* 21.—Reg. Argent.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 508.—Patag.
Peraltae, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 132.—Chili.
racemosa, *Phil. l. c.* 161.—Chili.
renjifoana, *Phil. l. c.* 124.—Chili.
resinosa, *Phil. l. c.* 166.—Chili.
venosa, *Phil. l. c.*—Chili.
Villanuevae, *Phil. l. c.* 127.—Chili.
- ADHATODA**, Tourn. (Acanth.).
acuminata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 400 = *Justicia palustris*.
anselliana, *Nees, l. c.* 403 = *J. anselliana*.
engleriana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 222.—Afr. trop.
fasciata, *Nees, in DC. Prod.* xi. 402 = *J. flava*.
flava, *Nees, l. c.* 401 = *J. flava*.
Hypericum, *Solms-Laub. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 102 = *J. odora*.
Kotschyi, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 483 = *J. calcarata*.

ADHATODA :—

- maculata, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 223.—Afr. trop.
 major, Nees, in DC. Prod. xi. 397 = J. flava.
 microphylla, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 217 = J. microphylla.
 minor, Nees, in DC. Prod. xi. 400 = J. flava.
 odora, Nees, l. c. 399 = J. odora.
 orbicularis, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 222.—Afr. trop.
 palustris, Nees, in DC. Prod. xi. 402 = J. flava.
 paniculata, Benth. in Hook. Niger Fl. 482 = J. laxa.
 plicata, Nees, in DC. Prod. xi. 401 = J. flava.
 robusta, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 223.—Afr. trop.
 Rostellaria, Nees, in DC. Prod. xi. 397 = J. calcarata.
 striata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 216 = J. melampyrum.
 suaveolens, Nees, in DC. Prod. xi. 401 = J. flava.

- ADICEA, Rafin. = **Urtica**, Tourn. (Urtic.).
 mooreana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 991.—Afr. trop.

ADINA, Salisb. (Rubiace).

- multifolia, Havil. in *Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 45.—Ins. Philipp.
 oligocephala, Havil. l. c. 46.—Ind. or.

ADINANDRA, Jack (Ternstroem.).

- bockiana, E. Pritz. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 477.—China.
 Brefeldii, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 642.—Celebes.
 celebica, Koord. l. c.—Celebes.

ADORIUM, Rafin. = **Seseli**, Linn. (Umbellif.).

- Hookeri, Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 501 = *Musenium divaricatum*.

ADORHIZON, Hook. f. in Trimen, Fl. Ceylon, iv. 161 (1898). **ORCHIDEAE**.

- purpurascens, Hook. f. l. c. (= *Dendrobium purpurascens*).—Ind. or.

AECHMEA, Ruiz & Pav. (Bromel.).

- ampullacea, Mes, in DC. Monog. Phan. ix. 257.—Reg. Argent.
 Eggersii, Mes, l. c. 238.—Ecuador.
 humilis, Mes, l. c. 216.—Guiana.
 kuntzeana, Mes, l. c. 208.—Bolivia.
 pitcairnioides, Mes, l. c. 258.—Bras.
 Pittieri, Mes, l. c. 231.—Am. cent.
 remotiflora, Mez, l. c. 219 = *Streptocalyx laxiflora*.
 rubiginosa, Mez, l. c. 285 = A. fernandae.
 serrata, Mez, l. c. 243 = martinicensis.
 Smithiorum, Mes, l. c. 246.—Ins. St. Vincent.
 Sprucei, Mez, l. c. 226 = paniculifera.
 tomentosa, Mes, l. c. 229.—Bras.

AEDESIA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 321 (1897); et in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) 468. **COMPOSITAE**.

- Baummannii, O. Hoffm. l. c.—Afr. trop.
 glabra, O. Hoffm. l. c. (= *Bojeria glabra*).—Afr. trop.

AEGIALOPHILA, Boiss. & Heldr. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

- longispina, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 146.—Lesbos.

AEGILOPS, Linn. = **Triticum**, Linn. (Gramin.).

- turcica, Aznavour, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 177.—Turcia.

AEGIPHILA, Jacq. (Verben.).

- densiflora, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 107.—Bolivia.
 oblongifolia, Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 81.—Bolivia.
 odontophylla, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 157.—Am. cent.
 pacifica, Greenman, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 485.—Mexic.

AEGOPODIUM, Knaut (Umbellif.).

- Henryi, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 497.—China.

AELUROPOUS, Trin. (Gramin.).

- arabicus, Steud. Nom. ed. II. i. 30 = villosus.
 brevifolius, Nees, ex Steud. l. c. = Eleusine brevifolia.
 brevifolius, Wall. Cat. n. 8897 = villosus.

AELUROPOUS :—

- concinus, Figar. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 257 = villosus.
 laevis, Trin. Fund. Agrost. 143 = Eleusine brevifolia.
 lagopodioides, Trin. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 374 = villosus.
 littoralis, Parl. Fl. Ital. i. 461 = villosus.
 mucronatus, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 297 = villosus.
 niliacus, Steud. Nom. ed. II. i. 30 = villosus.
 niloticus, Edgw. in Journ. Linn. Soc. vi. 196 = villosus.
 pubescens, Trin. ex Steud. Non. ed. II. i. 30 = villosus.
 pungens, C. Koch, in Linnaea, xxi. 408 = villosus.
 sinaicus, Figar. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. xii. 257 = villosus.

AEOLANTHUS, Mart. (Labiata).

- Cameronii, S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 273.—Austral.
 conglomeratus, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 397.—Afr. trop.
 cryptanthus, Baker, l. c.—Afr. trop.
 cuneifolius, Baker, l. c. 392.—Afr. trop.
 Goetzei, Guerke, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 467.—Afr. trop.
 linearis, Hua & Briq. ex Briq. in *Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* II. 68 (= *Icomum lineare*).—Afr. trop.
 Medusa, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 396.—Afr. trop.
 myrianthus, Baker, l. c.—Afr. trop.
 nodosus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 868.—Afr. trop.
 nyikensis, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
 petasutus, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 62.—Afr. trop.
 prittwitzianus, Guerke, in *Goetzen, Durch. Afr.* repr. 8.—Afr. trop.
 Rehmannii, Guerke, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 819.—Afr. austr.
 rivularis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 869.—Afr. trop.
 salicifolius, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 161.—Afr. trop.
 sedoides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 870.—Afr. trop.
 serpiculoides, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 395.—Afr. trop.
 Stormsii, Guerke, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 820.—Afr. trop.
 subcaulis, Hua & Briq. ex Briq. in *Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* II. 68 (= *Icomum subcaule*).—Afr. trop.
 tuberosus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 870.—Afr. trop.

AEONIUM, Webb & Berth. = **Sempervivum**, Linn. (Crassul.).

- complanatum, Lem. Pl. Grasses, 12 = S. complanatum.
 Paivae, Lem. l. c. 14 = S. Paivae.

AERACHNE, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1897) 295, sphalm. = **ACRACHNE**, Wight & Arn. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).

- AERANGIS, Reichb. f. = **Angraecum**, Thou. (Orchid.).
 flabellifolia, Reichb. f. in Flora, 1865, 191 = A. flabellifolium.

AERANTHUS, Reichb. f. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).

- distichus, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 901 = M. distichum.
 erythropollinius, Reichb. f. in Flora, 1865, 190 = M. xanthopollinium.
 muscicola, Reichb. f. l. c. = *Listrostachys muscicola*.
 rutilus, Reichb. f. l. c. 1885, 382 = M. rutilum.
 xanthopollinius, Reichb. f. l. c. 1865, 190 = M. xanthopollinium.

AERIDES, Lour. (Orchid.).

- siamense, Klinge, in *Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 134.—Siam.

AEROPSIS, Aschers. & Graebner, Mittel-Eur. Fl. ii. 298 = **Aiopsis**, Desv. (Gram.).

- tenella, Aschers. & Graebner, l. c. = A. globosa.

AERVA, Forsk. (Amarant.).

- Ruspolii, Loqr. in *Engl. Jahrb.* xxvii. 57.—Afr. trop.

AESCHYNANTHUS, Jack (Gesner.).

- celebica, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 627.—Celebes.
 dasycalyx, Hallier f. in *Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lvi. 342.—Borneo.

AESCHYNANTHUS :—

- ellipticus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 541.—N. Guin.
 perakensis, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 499.—Penins. Mal.
 pusilla, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 299.—Ind. or.
 Rhododendron, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 500.—Penins. Mal.

AESCHYNOMENE, Linn. (Legum.).

- acapulcensis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 191.—Mexic.
 compacta, Rose, l. c.—Mexic.
 dissitiflora, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.
 fruticosa, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 192.—Mexic.
 glutinosa, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxxiii. 190.—Afr. trop.
 lateritia, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 292.—Afr. trop.
 nilotica, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 189.—Afr. trop.
 nyikensis, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.
 nyassana, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxxiii. 190.—Afr. trop.
 Palmeri, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 192.—Mexic.
 portoricensis, Urb. Symb. Antill. i. 325.—Ind. occ.
 ruspoliana, Taub. ex Harms, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 94.—Afr. trop.
 saxicola, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxxiii. 189.—Afr. trop.
 simulans, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 192.—Mexic.
 sparsiflora, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.

AETANTHUS, Engl. (Loranth.).

- andreaus, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 186 (= *Phyllostephanus andreaus*).—Ecuad.
 Engelsii, Engl. l. c. (= *Phyllostephanus Engelsii*).—Am. trop.
 Holtonii, Engl. l. c. (= *Psittacanthus Holtonii*).—N. Granat.
 nodosus, Engl. l. c. (= *Loranthus nodosus*).—Am. trop.

AETHEILEMA, R. Br. = **Phaylopsis**, Willd. (Acanth.).

- imbricatum, R. Br. Prod. 478 = P. parviflora.
 micranthum, Benth. in Hook. Niger Fl. 480 = P. micrantha.

AFRAFZELIA, Pierre, Fl. Cochinch. (1899) sub t. 388. **LEGUMINOSAE**.

- africana, Pierre, l. c. (= *Afselia africana*).—Afr. trop.
 attenuata, Pierre, l. c. (= A. attenuata).—Afr. trop.
 bracteata, Pierre, l. c. (= A. bracteata).—Afr. trop.
 cuanensis, Pierre, l. c. (= A. cuanensis).—Afr. trop.
 petersiana, Pierre, l. c. (= A. petersiana).—Afr. trop.

AFRIDIA, Duthie, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xi. (1898) 696. **LABIATAE**.

- nepetaeformis, Duthie, l. c. (= *Nepeta suavis*).—Afghan.

AFROMENDONCIA, Gilg (Acanth.).

- floribunda, Burkill, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 6.—Afr. trop.

AFZELIA, Sm. (Legum.).

- australis, F. M. Bailey, *Queensl. Fl.* 468.—Austral.

AFZELIELLA, Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pf. ii. 4, 1898. **MELASTOMACEAE**.

- ciliata, Gilg, l. c. 5 (= *Guyonia ciliata*).—Afr. trop.

AGAPANTHUS, L'Hérit. (Liliac.).

- ensifolius, Willd. Sp. Pl. ii. 48 = *Polyxena pygmaea*.

AGAPETES, G. Don (Vaccin.).

- costata, C. H. Wright, in *Kew Bull.* 1899, 102.—N. Guin.
 Pottingeri, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 296.—Ind. or.

AGASTACHE, Clayt. = **Lophanthus**, Benth. (Labiata).

- anethiodora, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 85 = L. anisatus.
 urticifolia, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 339 = L. urticifolius.

AGASYLLIS, Spreng. = **Siler**, Scop. (Umbellif.).

- chymysdia, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 221 (= *Chymysdia agasylloides*).—Oriens.

AGATEA, A. Gray = **Agation**, Brongn. (Violac.).

- macrobotrys, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 453.—N. Guin.

AGATHOSMA, Willd. (Rutac.).

- adenandriiflora, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 160.—Afr. austr.
 aemula, *Schlechter*, l. c.—Afr. austr.
 alpina, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1898, 25.—Afr. austr.
 filamentosa, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 439.—Afr. austr.
 lactea, *Schlechter*, l. c. xxvii. 161.—Afr. austr.
 taxifolia, *Schlechter*, l. c.—Afr. austr.

AGAVE, Linn. (Amaryll.).

- Bakeri, *Ross*, *l. c. Pl. Hort. Panorm.* t. 2.—Hab. ?
 collina, *Greenman*, in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 296.—Mexic.
 expatriata, *Rose*, in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 82.—Hab. ?
 grandibracteata, *Ross*, *l. c. Pl. Hort. Panorm.* t. 1.—Hab. ?
 intrepida, *Greenman*, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 567.—Am. cent.
 laxifolia, *Baker*, in *Bot. Mag.* t. 7477.—Mexic.
 Ragusae, *Terr.* in *Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 162.—Hab. ?
 washingtonensis, *Baker & Rose*, ex *Rose*, in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 121.—Mexic. ?
 Woodrowi, *W. Watson*, in *Gard. Chron.* 1899, II. 480.—Hort.

AGELAEAE, Soland. (Connar.).

- brevipaniculata, *Cummins*, in *Kew Bull.* 1898, 73.—Afr. trop.
 cambodiana, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 376 A.—Cochinch.
 Demeusei, *Wildem. & Th. Dur.* in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 61.—Afr. trop.
 densiflora, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 376 B.—Cochinch.
 Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur.* in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 190.—Afr. trop.
 Duchesnei, *Wildem. & Th. Dur.* l. c. xxxix. 59.—Afr. trop.
 fragrans, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 209.—Afr. trop.
 Hulletti, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 19.—Penins. Mal.
 pinnata, *King*, l. c. 18.—Perak.
 Preussii, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 210.—Afr. trop.

AGERATINA, O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* xxviii. (1900) 503. **COMPOSITAE.**

- goetzeana, *O. Hoffm.* l. c. 504.—Afr. trop.
 polyphylla, *O. Hoffm.* l. c. (= *Ageratum polyphyllum*).—Afr. trop.

AGERATUM, Linn. (Compos.).

- polyphyllum, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.

AGLAIA, Lour. (Meliac.).

- acida, *Koord. & Valet.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 143.—Java.
 aquatica, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. IV. 300 (= *Hearnia aquatica*).—Malaya.
 Bamleri, *Harms*, in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 385.—N. Guin.
 barbatula, *Koord. & Valet.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 167.—Java.
 beccariana, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. IV. 298 = *Hearnia beccariana*.
 canariifolia, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.
 cauliflora, *Koord.* l. c.—Celebes.
 celebica, *Koord.* l. c. 634.—Celebes.
 chaudocensis, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 339 B.—Cochinch.
 duperreana, *Pierre*, l. c. 341 B.—Cochinch.
 Dyeri, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 634.—Celebes.
 dysoxylifolia, *Koord.* l. c.—Celebes.
 dysoxylodes, *Koord.* l. c. = praec.
 dysoxylonoides, *Koord.* l. c. 380 = praec.
 euphorioides, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 338 B.—Cochinch.
 Eusideroxylon, *Koord. & Valet.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 128.—Java.
 Helmsleyi, *Koord.* l. c. 383 = seq.
 Helmsleyi, *Koord.* l. c. xix. 635.—Celebes.
 heptandra, *Koord. & Valet.* l. c. xvi. 132.—Java.
 Hiernii, *Koord. & Valet.* ex *Koord.* l. c. xix. 381, nomen (non King).—Celebes.
 indica, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. IV. 300 (= *Beddomea indica*).—Ind. or.
 javanica, *Koord. & Valet.* ex *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 381, nomen.—Celebes.

AGLAIA :—

- lancifolia, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. IV. 298 = *Hearnia lancifolia*.
 menadonensis, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
 Maiae, *Bourd.* in *Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 350.—Ind. or.
 Minahassae, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
 Montrouzieri, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* sub t. 340 A (= *Lepidagliaia Montrouzieri*).—Cochinch.
 oblonga, *Pierre*, l. c. t. 339 A.—Cochinch.
 pleuropteris, *Pierre*, l. c. t. 341 A.—Cochinch.
 quocensis, *Pierre*, l. c. t. 337 B.—Cochinch.
 ramuensis, *Harms*, in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 386.—N. Guin.
 repouensis, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 340 B.—Cochinch.
 Rodatzii, *Harms*, in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 386.—N. Guin.
 sapindina, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. IV. 298 (= *Hearnia sapindina*).—Austral.
 simplicifolia, *Harms*, l. c. 300 (= *Beddomea simplicifolia*).—Ind. or.
 simplicifolia, *Harms*, in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 386, non alibi.—N. Guin.
 Smithii, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
 splendens, *Koord. & Valet.* in *l. c. Bogor.* t. 14.—Java.
 Stapfii, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.
 tetrapetala, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* sub t. 337 A (= *Lepidagliaia tetrapetala*).—Cochinch.
 unifoliolata, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 635.—Celebes.

AGLAONEMA, Schott (Arac.).

- novoguineense, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxv. 22.—N. Guin.
 ovatum, *Engl.* l. c. 21.—Cochinch.
 philippinense, *Engl.* l. c.—Ins. Philipp.
 Treubii, *Engl.* l. c. 22.—Celebes.

AGOSERIS, Rafin. = **Troximon**, Nutt. (Compos.).

- altissima, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 458.—Am. bor.
 carnea, *Rydb.* l. c.—Am. bor.
 dasycarpa, *Greene*, *Pittonia*, iii. 26.—Am. bor.
 graminifolia, *Greene*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 124.—Am. bor.
 Greenei, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 459.—Am. bor.
 Leontodon, *Rydb.* l. c. 457.—Am. bor.
 montana, *Osterh.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 507.—Am. bor.
 monticola, *Greene*, *Pittonia*, iv. 37.—Am. bor.
 pumila, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 457 = *T. glaucum*.
 villosa, *Rydb.* l. c. 458.—Am. bor.

AGRETTA, Eckl. = **Tritonia**, Ker-Gawl. (Irid.).

- grandiflora, *Eckl.* Verz. 23, nomen = *Ixia micrandra stricta*, *Eckl.* l. c. = *T. scillarisi*.
AGRIMONIA, Tourn. (Rosac.).
 brittoniana, *Bickn.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 510.—Am. bor.
 hirsuta, *Bickn.* l. c. 509 = *A. Eupatoria*.
 orbiculata, *Form.* in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 359.—Eur.

AGROPYRON, J. Gaertn. (Gramin.).

- albicans, *Scribn. & F. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 32.—Am. bor.
 arizonicum, *Scribn. & F. G. Sm.* l. c. 27.—Am. bor.
 brevifolium, *Scribn.* l. c. xi. 55.—Am. bor.
 dentatum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 370.—Ind. or.
 Elmeri, *Scribn.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 54.—Am. bor.
 elymoides, *Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 232.—Reg. Magell.
 Gmelini, *Scribn. & F. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 30.—Am. bor.
 Jacquemontii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 369.—Ind. or.
 lanceolatum, *Scribn. & F. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 34.—Am. bor.
 magellanicum, *Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 331 (= *Triticum magellanicum*).—Reg. Magell.
 molle, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 65.—Am. bor.

AGROPYRON :—

- Novae-Angliae, *Scribn.* in *Brain*, L. R. Jones & Eggl. *Fl. Vermont*, *vide Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 55.—Am. bor.
 Parishii, *Scribn. & F. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 23.—Am. bor.
 pseudorepens, *Scribn. & F. G. Sm.* l. c. 34.—Am. bor.
 riparium, *Scribn. & F. G. Sm.* l. c. 35.—Am. bor.
 sanctum, *Hack. ex Form.* in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 157.—Eur.
 Smithii, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 64.—Am. bor.
 spicatum, *Scribn. & J. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 33 = *Triticum missouricum*.
 striatum, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 346.—Ind. or.
 tetrastachys, *Scribn. & F. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 32.—Am. bor.
 Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 370.—Ind. or.
 Vaseyi, *Scribn. & F. G. Sm.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 27.—Am. bor.

AGROSTIS, Linn. (Gramin.).

- abnormis, *Munro*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 268 = *Deyeuxia abnormis*.
 araucana, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 14.—Chili.
 aristulifera, *Rendle*, in *Journ. Bot.* 1899, 381 = bergiana.
 barbuligera, *Stapf*, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 548.—Afr. austr.
 bicuspidata, *Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 264 = *Calamagrostis pilosula*.
 bottnica, *Murb.* in *Bot. Notiser*, 1898, 13.—Scandinav.
 brachiata, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 256.—Ind. or.
 capensis, *Willd. Sp. Pl.* i. 372 = *Sporobolus indicus*.
 ciliata, *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* vi. II. 373 = *Calamagrostis pilosula*.
 Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 257.—Ind. or.
 continuata, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 290.—Afr. trop.
 curvifolia, *Hack.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. 384 = *Achneria curvifolia*.
 Delfini, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 15.—Chili.
 dregeana, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 173 = *lachnantha*.
 Ecklonis, *Trin.* *Agrost.* 364 = bergiana.
 ericetorum, *Préaub. & Bow.* in *Bull. Soc. Sci. Anvers*, n. s. xviii. 86.—Eur.
 fertilis, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 170 = *Sporobolus indicus*.
 filiformis, *Koen.* ex *Kunth, Enum. Pl.* i. 261 = *Cynodon Dactylon*.
 filipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 256.—Ind. or.
 fissa, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 289.—Afr. trop.
 flaccida, *Hack.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 649.—Japon.
 fuegiana, *Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 220.—Reg. Magell.
 fusca, *Heyne*, in *Wall. Cat.* n. 8668 = *Arundinella Metzii*.
 gracilis, *Pilger*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 713.—N. Granat.
 griquensis, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 290.—Afr. austr.
 hookeriana, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 256.—Ind. or.
 idahoensis, *Nash*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 42.—Am. bor.
 imberbis, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 11.—Chili.
 kufuim, *Speg.* in *Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 82.—Reg. Magell.
 lenta, *Ait. Hort. Kew.* i. 96 = *Digitaria tenuifolia*.
 macrathera, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 10.—Chili.
 melanthes, *R. Phil.* l. c. 17.—Chili.
 miliacea, *Linn. Sp. Pl.* 61 = *Oryzopsis miliacea*.
 monostachya, *Poir. Encycl. Suppl.* i. 256 = *Panicum Myurus*.
 Moyanoi, *Speg.* in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 627.—Patag.
 myriantha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 257.—Ind. or.
 natalensis, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 290.—Afr. austr.
 Neesii, *Trin.* *Agrost.* 361 = *lachnantha*.
 nigritella, *Pilger*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 713.—Ecuador.
 oligoclada, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 15.—Chili.
 orientalis, *Nees, Agrost.* Bras. 393 = *Sporobolus orientalis*.
 paludosa, *Scribn.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 49.—Am. bor.
 peninsularis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 255.—Ind. or.
 phalaroides, *Hack.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 26.—Afr. austr.

AGROSTIS :—

- pilosula*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. ii. 372 = Calamagrostis pilosula.
plumosa, Ten. Prod. i. 59 = Tricholaena Teneriffae.
poepigiana, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 13.—Chili.
 polypogonoides, *Stapp*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vii. 549.—Afr. austr.
 Pringlei, *Scribn.* in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. vii. 156.—Am. bor.
 pyrogea, *Spæg.* in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 83.—Reg. Magell.
 rinihuensis, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 14.—Chili.
 Rosei, *Scribn. & Merrill*, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 21.—Mexic.
royleana, Trin. Agrost. ii. 125 = alba.
Roylei, Trin. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 264 = Calamagrostis pilosula.
Rura, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8764 B = Sporobolus coromandelianus.
 Schlechteri, *Rendle*, in *Journ. Bot.* 1899, 380.—Afr. austr.
scoparia, Koen. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 115 = Arundinella nervosa.
 scotantha, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 16.—Chili.
 Serranoi, R. Phil. Reconoc. Rio Palena, 128, ex Anal. Univ. Chil. xciv. 12.—Chili.
spicata, Thunb. Prod. 19 = Sporobolus indicus.
 stenophylla, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 10.—Chili.
 Stuebeli, *Pilger*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 714.—N. Granat. sylvatica, Torr. Fl. N. Am. i. 87 = Muehlenbergia sylvatica.
tenacissima, Linn. f. Suppl. 107 = Sporobolus orientalis.
triracemosa, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 18 = Digitaria tenuiflora.
 vaginata, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 15.—Chili.
 variabilis, *Rydb.* in Mem. N. York Bot. Gard. i. 82.—Am. bor.
vestita, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 401 = lachnantha.
 Volckensii, *Stapp*, in *Kew Bull.* 1897, 289.—Afr. trop.
wallichiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 174 = Calamagrostis pilosula.
 Williamsi, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 12.—Chili.
- AGROSTISTACHYS**, Dalz. (Euphorb.).
 comorensis, *Pax*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 523.—Ins. Comor.
- AGROSTOPHYLLUM**, Blume (Orchid.).
 brevipes, *King & Pantl.* in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 156.—Ind. or.
 myrianthum, *King & Pantl.* l. c. 155.—Ind. or.
 saccatum, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 286.—Borneo.
- AINSWORTHIA**, Boiss. = *Tordylium*, Linn. (Umbellif.).
 bysantina, *Aznavour*, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 170.—Eur.
- AIRA**, Linn. (Gramin.).
 altaica, Trin. in Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 8 = Poa persica.
 aurea, Steud. in Flora, 1829, 470 = Achneria aurea.
 benghalensis, Gmel. Syst. i. 174 = Arundo Donax.
 capensis, Steud. in Flora, 1829, 469 = Koeleria cristata.
 chinensis, Retz. Obs. iii. 10 = Tricholaena Wightii.
 filiformis, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. i. 328 = Leptochloa filiformis.
 glauca, Spreng. Nachtr. Bot. Gart. Halle, i. 10 = Koeleria cristata.
 indica, Linn. Sp. Pl. ed. II. 94 = Panicum indicum.
 ischoemoides, Koen. ex Kunth, Enum. Pl. i. 127 = Isachne australis.
 malatrina, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8675 D = Tragus racemosus.
 micans, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 278 = Deschampsia caespitosa.
 repens, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8743 A = Panicum trigonum.
 triaristata, E. D. Clarke, Trav. ii. 452 = caryophyllea.
 spicata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 95 (non ed. I) = Avena subspicata.
 subspicata, Linn. Syst. ed. X. 878 = Avena subspicata.
 viatica, *Griff. Notul.* iii. 54 (= Axonopus semialatus).—Ind. or.

AIROCHLOA, Link = *Koeleria*, Pers. (Gramin.).
 Alopecurus, Nees, Fl. Afr. Austr. 424 = K. cristata.
 parviflora, Nees, l. c. 425 = K. cristata.
 vallesiaca, Link, Hort. Berol. i. 127 = K. cristata.

AIROPSIS, Desv. (Gramin.).

ampla, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 45 = Achneria ampla.
 aurea, Nees, in Linnaea, vii. 317 = Achneria aurea.
 Steudelii, Nees, l. c. 318 = Achneria capensis.

AIROSERMA, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 1900, 565. RUBIACEAE.
 psychotrioides, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.
 ramuensis, K. Schum. & Lauterb. l. c. 566.—N. Guin.

AIZOON, Linn. (Ficoid.).

asbestinum, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1897, 280.—Afr. austr.
 Dinteri, *Schinz*, in Bull. Herb. Boiss. vi. 523.—Afr. austr.

AJUGA, Linn. (Labiata.).

halacsyana, *Zahlbr.* in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlv. 447.—Eur.
 Piskoi, *Degen & Baldacci*, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1896, 414.—Albania.

AKEBIA, Decne. (Berberid.).

longeracemosa, *Matsum.* in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 18.—Formosa.

ALAFIA, Thou. (Apocyn.).

major, *Stapp*, in *Kew Bull.* 1898, 307.—Afr. trop.
 microstylis, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 230.—Afr. trop.
 orientalis, K. Schum. ex *Engl. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

ALANGIUM, Lam. (Cornac.).

bussyanum, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 262 (= Marlea bussyanum).—N. Caled.
 celebicum, *Koord.* in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 623.—Celebes.
 Griffithii, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 262 (= Marlea Griffithii).—Malaya.
 kingianum, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 294.—Ind. or.
 nobile, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 262 (= Marlea nobile).—Malaya.
 platanifolium, *Harms*, l. c. 261 (= Marlea platanifolia).—As. or.

ALBIZZIA, Durazz. (Legum.).

cambodiana, *Pierre*, Fl. Cochinch. t. 397 A.—Cochinch.
 Gamblei, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 513.—Ind. or.
 Kalkora, *Prain*, l. c. 511 (= Mimosa Kalkora).—As. or.
 Minahassae, *Koord.* in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 417.—Celebes.
 Passargei, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 253.—Afr. trop.
 Pospischilii, *Harms*, in *Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 183.—Afr. trop.
 Thorelii, *Pierre*, Fl. Cochinch. sub t. 399.—Cochinch.
 vialeana, *Pierre*, l. c. t. 399 A.—Cochinch.

ALBUCA, Linn. (Liliac.).

Adlami, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
 affinis, *J. M. Wood & Evans*, in *Journ. Bot.* 1899, 251.—Afr. austr.
 Baurii, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 459.—Afr. austr.
 coarctata, *Dryand.* in Vet. Acad. Nya Handl. Stockh. 1784, 295 = minor.
 collina, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 461.—Afr. austr.
 crinifolia, *Baker*, l. c. 457.—Afr. austr.
 Donaldsoni, *Rendle*, in *Journ. Bot.* 1896, 131.—Afr. trop.
 Elliottii, *Baker*, in *Journ. Bot.* 1891, 71 = trichophylla.
 exuviata, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 456.—Afr. austr.
 Fleckii, *Schinz*, in Bull. Herb. Boiss. iv. App. III. 40.—Afr. trop.
 hereroensis, *Schinz*, l. c.—Afr. trop.
 Lugardi, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Trop. Afr.* vii. 533.—Afr. trop.
 Macowani, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 461.—Afr. austr.
 Melleri, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Trop. Afr.* vii. 532.—Afr. trop.

ALBUCA :—

minima, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 455.—Afr. austr.
 namaquensis, *Baker*, l. c. 456.—Afr. austr.
 nyikensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 286.—Afr. trop.
 pachychlamys, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 458.—Afr. austr.
 polyphylla, *Baker*, in *Journ. Bot.* 1874, 367 = Macowani.
 prolifera, *Wilson*, in *Gard. Chron.* 1898, i. 396.—Afr. austr.
 Schinzii, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Trop. Afr.* vii. 534.—Afr. trop.
 tortuosa, *Baker*, in *Dyer*, *Fl. Cap.* vi. 460.—Afr. austr.

ALCEA, Tourn. = *Althaea*, Tourn. (Malvac.).

thessala, *Form.* in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 197.—Eur.

ALCHEMILLA, Linn. (Rosac.).

acutata, *Buser*, in *Allg. Bot. Zeitschr.* vi. 57.—Eur.
 amphisericea, *Dorfl.* ex *Schube & Dalla Torre* in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xviii. Gen. Heft 30.—Eur.
 caucasica, *Buser*, in Bull. Herb. Boiss. iv. 757.—Rossia.
 minutiflora, *Aznavour*, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 141.—Eur.
 ocreata, *Donn. Sm.* in *Coult. Bot. Gas.* xxiii. 7.—Am. cent.
 retinervis, *Buser*, in Bull. Herb. Boiss. iv. 760.—Rossia.
 rigida, *Buser*, l. c. 756.—Rossia.
 tredecimloba, *Buser*, l. c. 759.—Rossia.
 ulugurensis, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxvi. 375.—Afr. trop.
 Wilmsii, *Engl.* l. c.—Afr. austr.
 Woodii, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 75.—Afr. austr.

ALCHORNEOPSIS, Muell. Arg. (Euphorb.).

portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 337.—Ind. occ.

ALDENELLA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 212. CAP-

PARIDACEAE.

tenuifolia, *Greene*, l. c. (= Polanisia tenuifolia).—Mexic.

ALECTOROLOPHUS, Hall. = *Rhinanthus*, Linn. (Scrophul.).

asperulus, *Murb.* in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 41.—Eur.
 borealis, *Sterneck*, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 25.—Am. bor.
 cryptostomus, *Borb.* in Jahrescat. Wien. Bot. Tauschanst. 1899, 105.—Eur.
 patulus, *Sterneck*, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 433.—Eur.
 Sterneckii, *Wettst.* in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 357.—Eur.

ALEPIDA, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 110, sphalm. = *Alepidea*, La Roche (Umbellif.).**ALEPIDEA**, La Roche (Umbellif.).

aquatica, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 110.—Afr. austr.
 Baurii, *Kuntze*, l. c. 111.—Afr. austr.
 cathcartensis, *Kuntze*, l. c.—Afr. austr.
 lanceolata, *Kuntze*, l. c.—Afr. austr.
 moltenensis, *Kuntze*, l. c.—Afr. austr.
 natalensis, *J. M. Wood & Evans*, in *Journ. Bot.* 1899, 255.—Afr. austr.
 setifera, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* 1896, 161.—Afr. austr.

ALETES, Coult. & Rose (Umbellif.).

Davidsoni, *Coult. & Rose*, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 107.—Am. bor.
 humilis, *Coult. & Rose*, l. c.—Am. bor.
 Macdougali, *Coult. & Rose*, l. c.—Am. bor.
 tenuifolia, *Coult. & Rose*, l. c. 108.—Am. bor.

ALETTRIS, Linn. (Haemodor.).

lactiflora, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 200.—China.
 lutea, *Small*, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 278.—Am. bor.
 luteo-viridis, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 201 (= Metanartheicum luteo-viride).—Japon.
 pumila, *Ait.* Hort. Kew. i. 464 = Kniphofia pumila.
 revoluta, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 202.—China.
 sarmentosa, *Andr.* Bot. Rep. t. 54 = Kniphofia alooides.
 spicata, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 199 (= Hypoxis spicata).—As. or.
 stenoloba, *Franch.* l. c. 203.—China.

ALGUELAGUEN, Feuill. = *Sphaeole*, Benth. (Labiata.).
 affine, *Auct.* in Bull. Herb. Boiss. iv. 957 = S. heteromorpha.

ALGUELAGUEN:—

auriferum, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 108.—Bolivia.
cochabambanum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 807 = *S. cochabambana*.
confusum, Briq. l. c. 806 = *S. confusa*.
Gaudichaudii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 182 = *S. Gaudichaudii*.
heteromorpha, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 847 = *S. heteromorpha*.
Hieronymi, Briq. l. c. 804 = *S. Hieronymi*.
inflatum, Briq. l. c. 848 = *S. inflata*.
Jamesonii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 179 = *S. Jamesonii*.
kuntzeanum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 805 = *S. kuntzeana*.
lindenianum, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 180 = *S. lindeniana*.
mandonianum, Briq. l. c. 176 = *S. mandoniana*.
Sprucei, Briq. l. c. 178 = *S. Sprucei*.
Urbani, Briq. l. c. 182 = *S. Urbani*.

ALIGERA, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv. (1897) 145. **VALERIANACEAE**.
ciliosa, Suksd. l. c. 146 (= *Valerianella ciliosa*).—Am. bor.
eichleriana, Suksd. l. c. 147.—Am. bor.
Grayi, Suksd. l. c.—Am. bor.
insignis, Suksd. l. c.—Am. bor.
Jepsonii, Suksd. in *Erythea*, vi. 24.—Am. bor.
macrocera, Suksd. in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 146 (= *Valerianella macrocera*).—Am. bor.
macroptera, Suksd. l. c.—Am. bor.
mamillata, Suksd. l. c. 147.—Am. bor.
minor, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = *macrocera*.
ostiolatata, Suksd. in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 147.—Am. bor.
rubens, Suksd. l. c. 146.—Am. bor.

ALISMA, Dill. (Alism.).
brevipes, Greene, Pittonia, iv. 158.—Am. bor.
validum, Greene, l. c. iii. 115.—Am. bor.

ALKANNA, Tausch (Borag.).
Shattuckia, Post, Fl. Syria, 545.—Syria.

ALLANBLACKIA, Oliver (Guttif.).
Sacleuxii, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. ii. 155.—Afr. trop.
Stuhlmannii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachr. i. 249.—Afr. trop.
ulgurensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 435.—Afr. trop.

ALLEXIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 25. **VIOLACEAE**.
cauliflora, Pierre, l. c. (= *Alsodeia cauliflora*).—Afr. trop.

ALLIONIA, Loeff. (Nyctag.).
Bandurriae, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. 274.—Chili.
diffusa, A. A. Heller, in Minnés. Bot. Stud. ii. 33.—N. Mexic.
violacea, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 296 (= *Oxybaphus violaceus*).—N. Granat.

ALLIUM, Tourn. (Liliac.).
aegaeum, Heldr. & Halacsy, ex Halacsy in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1899, 195.—Graecia.
aestivale, Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 143.—Eur.
alleghehiense, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 279.—Am. bor.
arenicola, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 506 (non Small).—Am. bor.
arenicola, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 276.—Am. bor.
aristatum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 141.—Lesbos.
baisunense, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 140.—As. cent.
Barszewskii, Lipsky, l. c. 114.—As. cent.
Chauveli, Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 200.—Lycia.
compactum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 141 (non Thuill.).—Lesbos.
crenulatum, Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 135.—Am. bor.
dregeanum, Kunth, Enum. Pl. iv. 382.—Afr. austr.
eginense, Freyn, in Mém. Herb. Boiss. no. 13. 34.—As. Min.

ALLIUM:—

fastigiatum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 142.—Lesbos.
fibrosum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 188 (non Regel).—Am. bor.
hirtovaginum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 142.—Lesbos.
inutile, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898, 104.—Japon.
involutatum, Welw. ex Henriq. in Bol. Soc. Broter. xiii. 98.—Afr. trop.
janthinum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iv. 191.—As. Min.
Komarowi, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 129.—As. cent.
laesericum, Freyn & Bornum. in Mém. Herb. Boiss. no. 13. 31.—Persia.
ledschanense, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iv. 190.—As. Min.
macrantherum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 313.—Parag.
neo-mexicanum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 541.—Am. bor.
ochraceum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvii. 148.—Eur.
peroninianum, Aznavour, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 175.—Turcia.
pruinatum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 140.—Lesbos.
recurvatum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 94.—Am. bor.
Rouyi, G. Gautier, in Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar. t. 247.—Eur.
rubrum, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 506.—Am. bor.
Schmitzi, Henriq. in Bol. Soc. Broter. xiii. 103.—Afr. trop.
simillimum, Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 355.—Am. bor.
spathaceum, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 330.—Afr. trop.
Tubergeni, Freyn, in Mém. Herb. Boiss. no. 13. 32.—As. Min.

ALLOCARYA, Greene = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).
Hendersoni, A. Nelson, in Erythea, vii. 69.—Am. bor.
leptoclada, Greene, Pittonia, iii. 109.—Am. bor.
nitens, Greene, l. c. 108.—Am. bor.
salsa, Brandege, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 452.—Am. bor.
tenera, Greene, Pittonia, iii. 109.—Am. bor.

ALLOMORPHIA, Blume (Melast.).
alata, Scort. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 12.—Penins. Mal.
sertulifera, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. 465 = *Pomastoma sertuliferum*.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 12.—Malaya.

ALLOPHYLUS, Linn. (Sapind.).
acutatus, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 475.—Bras.
Antunesii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 289.—Afr. trop.
calophyllus, Gilg, l. c. 291.—Afr. trop.
chrysonurus, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 479.—Bras.
cinnamomeus, Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 336.—Bolivia.
congolanus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 294.—Afr. trop.
dasystachys, Gilg, l. c. 293.—Afr. trop.
divaricatus, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 493.—Am. austr.
Fischeri, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 292.—Afr. trop.
fulvo-tomentosus, Gilg, l. c. 293.—Afr. trop.
goetzeanus, Gilg, l. c. xxviii. 423.—Afr. trop.
griseo-tomentosus, Gilg, l. c. xxiv. 290.—Afr. trop.
hylophilus, Gilg, l. c. 294.—Afr. trop.
leptocaulis, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 17.—Afr. trop.
leptostachys, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 489.—Bras.
leucoclados, Radlk. l. c. 473.—Bras.
leucophloeus, Radlk. l. c. 478.—Bras.
longipetiolatus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 286.—Afr. trop.
macrobotrys, Gilg, l. c. 288.—Afr. trop.
macrurus, Gilg, l. c. 287.—Afr. trop.
melanophloeus, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 478.—Bras.
membranifolius, Radlk. l. c. 492.—Bras.
oreophilus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 289.—Afr. trop.

ALLOPHYLUS:—

peruvianus, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 488.—Peruv.
schirensis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 289.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Gilg, l. c. 286.—Afr. trop.
stachyanthum, Gilg, l. c. 292.—Afr. trop.
timboensis, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii. 326.—Afr. trop.
Volkensii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. 290.—Afr. trop.
Welwitschii, Gilg, l. c. 287.—Afr. trop.

ALLOPLECTUS, Mart. (Gesner.).
ambiguus, Urb. Symb. Antill. i. 408.—Ind. occ.
calochlamys, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 437.—Am. cent.
grandifolius, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 30.—Am. austr.
stenophyllus, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxv. 153.—Am. cent.
ventricosus, Donn. Sm. l. c. 154.—Am. cent.

ALLOSPONDIAS, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2667 (1900). **ANACARDIACEAE**.
lakonensis, Stapf, l. c.—Malaya.

ALNUS, Tourn. (Cupul.).
cremastogyne, Burkill, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 499.—China.
sinuata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 190.—Am. bor.

ALOCASIA, Neck. (Aroid.).
acuta, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 605 (= *Schizocaesia acuta*).—Malaya.
celebica, Engl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 299.—Celebes.
cuspidata, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 25.—Borneo.
Dahlia, Engl. l. c. 24.—N. Brit.
Hollrungii, Engl. l. c.—N. Guin.
magnifica, Engl. l. c. 23.—N. Guin.
manilensis, Engl. l. c.—Ins. Philipp.
Warburgii, Engl. l. c. 25.—Ins. Philipp.
wavriniana, Mast. in Gard. Chron. 1898, i. 241.—Celebes.

ALOE, Tourn. (Liliac.).
Atherstonei, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. 170 = *pluridens*.
Bolusii, Baker, l. c. 179 = *africana*.
borziana, Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 67.—Afr. trop.
casadensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 313.—Afr. austr.
claviflora, Burch. Trav. i. 272 = *Ecklonis*.
concinna, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 461.—Afr. trop.
congolensis, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 61.—Afr. trop.
depressa, Haw. in Trans. Linn. Soc. vii. 16 = *brevifolia*.
desmetiana, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 329.—Afr. austr.
elegans, Tod. Ind. Sem. Panorm. 37 = *abyssinica*.
fulgens, Tod. Hort. Bot. Panorm. ii. 40.—Hort.
macrospiphon, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 459.—Afr. trop.
Marshalli, Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 353.—Afr. austr.
meagalacantha, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 469.—Afr. trop.
Menyharthi, Baker, l. c. 459.—Afr. trop.
montana, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. App. III. 39.—Afr. trop.
Nuttii, Baker, in Hook. Ic. Pl. t. 2513.—Afr. trop.
otallensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 458.—Afr. trop.
Paxii, Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 68.—Hab. ?
percrassa, Tod. Hort. Bot. Panorm. i. 81.—Afr. trop.
postgenita, Schult. f. Syst. vii. 1714 = *brevifolia*.
Rivae, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 465.—Afr. trop.
rubro-lutea, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. App. III. 39.—Afr. trop.
rupestris, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 327.—Afr. austr.
ruspoliana, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 460.—Afr. trop.
Schinzi, Baker, l. c. 459.—Afr. trop.
somaliensis, C. H. Wright, ex W. Wats. in Gard. Chron. 1899, II. 430.—Afr. trop.
Stuhlmanni, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 457.—Afr. trop.

ALOE:—

subferox, Spreng. Syst. ii. 73 = *ferox*.
subnervis, Lem. Pl. Grasses, 24.—Hort.
transvalensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 314.—Transvaal.
Ucriae, Terr. in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 161.
 —Hort.
virescens, Schult. f. Syst. vii. 637 = *albicans*.
vittata, Schult. f. l. c. 662 = *nigricans*.
vitensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 458.—Afr.
 trop.

ALOMIA, H. B. & K. (Compos.).

Regnellii, Malme, in Svensk. Vet. Akad. Handl.
 xxxii. no. 5. 32.—Bras.

ALOPECURUS, Linn. (Gramin.).

bracteatus, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 6.—Chili.
capensis, Thunb. Prod. 19 = *Koeleria cristata*.
echinatus, Thunb. l. c. = *Lasiocloa ciliaris*.
elator, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 238 = *arundinaceus*.
fulvus, Sm. Engl. Bot. t. 1467 = *aristulatus*.
himalaicus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 238.—Ind. or.
indicus, Murr. Syst. Veg. ed. XIII. 92 = *Pennisetum typhoideum*.
navicularis, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3780 A = *nepalensis*.
otiporensis, Griff. Notul. iii. 94 = *Phalaris minor*.
paludosus, Beauv. ex Mert. & Koch, in Roehl. Deutsch. Fl. i. 481 = *aristulatus*.
ramosus, Poir. Encyc. viii. 776 = *geniculatus*.
rubicundus, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8646 B = *Pennisetum parviflorum*.
subaristatus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 66 = *aristulatus*.
typhoides, Burm. f. Fl. Ind. 27 = *Pennisetum typhoideum*.

ALOPHIA, Herb. = **Herbertia**, Sweet (Irid.).

brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 305 = *H. brasiliensis*.
Hautthalii, Kuntze, l. c. 304.—Parag.
pulchella, Kuntze, l. c. = *H. pulchella*.
unguiculata, Kuntze, l. c. 305 = *H. unguiculata*.

ALPHONSEA, Hook. f. (Anonac.).

Teysmannii, Boerl. in Ic. Bogor. i. 113.—Malaya.

ALPINIA, Linn. (Scitamin.).

Albertisii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 279.—N. Guin.
angustifolia, K. Schum. l. c. —Borneo.
arifakensis, K. Schum. l. c. 296.—N. Guin.
assimilis, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 166.—Penins. Mal.
Blumei, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 282 = *alata*.
brachypoda, K. Schum. l. c. 298.—Borneo.
calycodes, K. Schum. l. c. 295.—N. Guin.
cannaefolium, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 174.—Penins. Mal.
chaunocolea, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 292.—N. Guin.
chrysoarachis, K. Schum. l. c. 283.—Celebes.
coeruleo-viridis, K. Schum. l. c. 293.—Celebes.
colossea, K. Schum. l. c. 289.—N. Guin.
comosa, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 170 (non Jacq.).—Penins. Mal.
compta, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 277.—N. Guin.
corallina, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 225.—N. Guin.
crocydocalyx, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 281.—Borneo.
cylindrocephala, K. Schum. l. c. 297.—Celebes.
cylindrostachys, K. Schum. l. c. 299.—Borneo.
densiflora, K. Schum. l. c. 292.—N. Guin.
elegans, K. Schum. l. c. 288 = *gracilis*.
engleriana, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 102.—N. Brit.
eremochlamys, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 288.—Celebes.
euastra, K. Schum. l. c. 296.—N. Guin.
eubractea, K. Schum. l. c. 289.—Celebes.
eustales, K. Schum. l. c. 288.—N. Guin.
flexistamen, K. Schum. l. c. 281.—Borneo.
formosana, K. Schum. l. c. 283.—Formosa.
glabra, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 168.—Borneo.
grandis, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 103.—N. Brit.
hemisphaerica, D. Dietr. Syn. Pl. i. 13 = *Amomum hemisphaericum*.

ALPINIA:—

latilabris, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 168.—Penins. Mal.
ligulata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 275.—Borneo.
macroscaphis, K. Schum. l. c. 284.—Ins. Philipp.
macrostemon, K. Schum. l. c. 297.—Sumatra.
macrostephanus, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 175 (= *Amomum macrostephanum*).—Penins. Mal.
melanocarpa, Ridley, l. c. 163 (= *Hellenia melanocarpa*).—Penins. Mal.
monopleura, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 287.—Celebes.
myriocratera, K. Schum. l. c. 290.—Ins. Mollucc.
nobilis, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 169.—N. Guin.
Novae-Pommeraniae, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 285.—N. Brit.
oceanica, Burkill, in Proc. Camb. Phil. Soc. ix. II. 98.—N. Brit.
orchioides, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 278.—N. Guin.
orthostachys, K. Schum. l. c. 281.—Celebes.
pelecystyla, K. Schum. l. c. 277.—N. Guin.
plectophylla, K. Schum. l. c. 273.—N. Guin.
polycarpa, K. Schum. l. c. 298.—Borneo.
ptychanthera, K. Schum. l. c. 280.—Borneo.
pulchella, K. Schum. l. c. 276 (= *Globba pulchella*).—N. Guin.
rosella, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 164.—Penins. Mal.
rubricaulis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 281.—Celebes.
rufa, K. Schum. l. c. 293 (= *Hellenia rufa*).—Ins. Philipp.
samoensis, Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 597.—Ins. Samoa.
secundiflora, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 165.—Penins. Mal.
sericiflora, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 294.—Ins. Aru.
stenostachys, K. Schum. l. c. 289.—N. Guin.
strobilacea, K. Schum. l. c. 295.—N. Guin.
strobilifera, Baker, in Kew Bull. 1898, 225 (non Poepp. & Endl.).—Borneo.
submutica, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 280.—Java.
sumatrana, K. Schum. l. c. 291 (= *Strobidia sumatrana*).—Sumatra.
tephrochlamys, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 226.—N. Guin.
versicolor, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 280.—Celebes.
vitellina, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 173 (= *Amomum vitellinum*).—Penins. Mal.
Warburgii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 281.—Celebes.

ALSEODAPHNE, Nees (Laurac.).

canescens, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 137 (= *Euphoebia canescens*).—Sumatra.
chartacea, Boerl. l. c. (= *E. chartacea*).—Java.
cuneata, Boerl. l. c. (= *E. cuneata*).—Ins. Malay.
falcata, Boerl. l. c. (= *E. falcata*).—Sumatra.
macrophylla, Boerl. l. c. (= *E. macrophylla*).—Ins. Malay.
spatulata, Boerl. l. c. (= *Nothaphoebe spatulata*).—Java.
superba, Boerl. l. c. (= *Euphoebia superba*).—Ins. Malay.

ALSINE, Scop. = **Arenaria**, Linn. (Caryophyll.).

americana, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 144.—Am. bor.
brachypetala, Howell, Fl. N. W. Amer. 82 = *Stellaria borealis*.
calycantha, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 244 = *Stellaria borealis*.
cymifera, Rouy & Foucaud, Fl. Fr. iii. 275.—Eur.
decumbens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 13 = *Stellaria decumbens*.
dicranoides, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = *Stellaria dicranoides*.
filifolia, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 175 = *Schimperi*.
Hookeri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 13 = *Stellaria decipiens*.
jamesii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = *Jamesii*.

ALSINE:—

laeta, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 144 = *Stellaria longipes*.
obtusa, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 569 = *Stellaria obtusa*.
oxyphylla, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = *Stellaria oxyphylla*.
prostrata, A. A. Heller, l. c. ed. I. 3 = *Stellaria prostrata*.
rupicola, Hiern, in Journ. Bot. 1899, 318 = *Spergularia rupestris*.
serbica, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 94.—Eur.
serrulata, Form. l. c. xxxiv. 335.—Eur.
Simcoei, Howell, Fl. N. W. Amer. 83.—Am. bor.
uniflora, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. I. 3 = *Stellaria uniflora*.
washingtoniana, A. A. Heller, l. c. ed. II. 4 = *Stellaria washingtoniana*.

ALSOIDEIA, Thou. (Violac.).

Astrolabes, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 451.—N. Guin.
engleriana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 172.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 645.—Celebes.

ALSOIDEIOPSIS, Oliver (Olacac.).

oblongifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr. i. 226, nomen; et in Engl. Jahrb. xxiv. 480.—Afr. trop.
Rowlandii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 479.—Afr. trop.
Schumannii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr. i. 226.—Afr. trop.
Staudtii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 479.—Afr. trop.
Zenkeri, Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr. i. 226, nomen; et in Engl. Jahrb. xxiv. 478.—Afr. trop.

ALSONITRA, M. Roem. (Cucurb.).

pubigera, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. 292.—Ind. or.
trifoliolata, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 155 = *Hookeri*.

ALSTONIA, R. Br. (Apocyn.).

Godeffroyi, Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 667.—Ins. Samoa.
somersetensis, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. i. 229.—Austral.

ALSTROEMERIA, Linn. (Amaryll.).

graminea, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 161.—Chili.
modesta, R. Phil. l. c.—Chili.
patagonica, R. Phil. l. c. 160.—Chili.
polyphylla, R. Phil. l. c.—Chili.
sotoana, R. Phil. l. c. 159.—Chili.

ALTERNANTHERA, Forsk. (Amarant.).

asterotricha, Uline, in Field Columb. Mus. Bot. i. 419.—Am. cent.
culebrasensis, Uline, l. c. 420.—Ind. occ.
Lorentzii, Uline, l. c. 421.—Urug.
Morongii, Uline, l. c. 418.—Am. austr.
obovata, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 360 = *Telanthera obovata*.
Reineckii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 151.—Bras.

ALTHOFFIA, K. Schum. (Tiliac.).

pleiostigma, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 485.—N. Guin.
tripxyis, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

ALUS, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 236 = **Coris**, Tourn. (Primul.).

mediterranea, Bub. l. c. 237 = *C. monspeliensis*.

ALVORDIA, Brandegee (Compos.).

fruticosa, Brandegee, in Erythraea, vii. 5.—Mexic.

ALYSSUM, Tourn. (Crucif.).

arabicum, Th. Dur. & Schins, Conspect. Fl. Afr. i. II. 86 (= *Koniga arabica*).—Aegypt.; Arab.
Arduini, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 253.—Eur.
corymbosoides, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 329.—Eur.
Doerfleri, Degen, in Denkschr. Acad. Wiss. Wien, lxiv. 708.—Eur.

ALYSSUM :—

euboeum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 93.—Graecia.
 gracile, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii.
 196.—Eur.
 intermedium, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i.
 II. 87 (= *Lobularia intermedia*).—Ins. Canar.
 marginatum, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 88 (= *Koniga
 marginata*).—Afr. bor. et Ins. Canar.
 midzorensis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*,
 xxxvi. 89.—Eur.
 rhodopense, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898,
 20.—Bulgaria.
 rubrivirescens, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*,
 xxxvii. 195.—Eur.
 taygeteum, *Heldr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii.
 703.—Eur.
 tenium, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 93 (= *Odontar-
 rhena diffusa*).—Eur.
 thessalum, *Halacsy, l. c.* 95.—Graecia.
 virescens, *Halacsy, l. c.* 94.—Graecia.
 xiphocarpum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv.
 153.—Lesbos.

ALYXIA, Banks (Apocyn.).

macrocarpa, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.*
 xix. 622.—Celebes.
 torulosa, *Boerl. in Bull. Inst. Buitens.* v. 12.—Arch.
 Mal.

AMALOCALYX, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.*
 n. s. i. (1898) 28. **APOCYNACEAE**.**AMANO**A, Aubl. (Euphorb.).

caribaea, *Krug & Urb. in Notisbl. Bot. Gart.
 Berlin*, i. 326.—Ind. occ.

AMARACUS, Gleditsch. = **Origanum**, Linn. (Labiata.).

ciliatus, Brij. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III. A.
 306 = *O. ciliatum*.
Hausknechtii, Brij. l. c. = *O. Hausknechtii*.
leptocladus, Brij. l. c. = *O. leptocladum*.
libanoticus, Brij. l. c. 305 = *O. libanoticum*.
pulchellus, Brij. l. c. = *O. pulchellum*.
pulcher, Brij. l. c. 306 = *O. pulchrum*.
rotundifolius, Brij. l. c. = *O. rotundifolium*.
scaber, Brij. l. c. = *O. scabrum*.
sipyleus, Brij. l. c. 305 = *O. sipyleum*.
Vetteri, Brij. l. c. 306 = *O. Vetteri*.

AMARANTHUS, Linn. (Amarant.).

Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 15.—
 Afr. trop.
 Dussii, *Sprenger, in Bull. Soc. Tosc.ortic.* 1896, 178.
 —Ind. occ.
 glomeratus, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* i. 375.—
 Austria.
 viscidulus, *Greene, Pittonia*, iii. 844.—Am. bor.

AMARYLLIS, Linn. (Amaryll.).

Hallii, Hort. ex Baker, in *Bot. Mag.* t. 7547 = *Lycoris
 squamigera*.

AMBERBOA, Less. = **Volutarella**, Cass. (Compos.).

tubuliflora, Murb. in *Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12.
 (1897) 105 = *V. Lippii*.

AMBLYANTHUS, A. DC. (Myrsin.).

polyantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*,
 491.—N. Guin.

AMBLYGONOCARPUS, Harms, in *Engl. Jahrb.*

xxvi. (1897) 255. **LEGUMINOSAE**.
Schweinfurthii, Harms, l. c.—Afr. trop.

AMEGHINOA, Speg. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897,

539. **COMPOSITAE**.
patagonica, *Speg. l. c.*—Patag.

AMELANCHIER, Medic. (Rosac.).

Bakeri, *Greene, Pittonia*, iv. 128.—Am. bor.
 crenata, *Greene, l. c.* 127.—Am. bor.
 cuneata, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 392.—
 Am. bor.
 Cusickii, *Fernald, in Erythraea*, 1899, 121.—Am. bor.
 Gormanii, *Greene, Pittonia*, iv. 129.—Am. bor.
 polycarpa, *Greene, l. c.* 127.—Am. bor.
 prunifolia, *Greene, l. c.* 21.—Am. bor.
 rubescens, *Greene, l. c.* 128.—Am. bor.
 venulosa, *Greene, l. c.*—Am. bor.

VOL. III.

AMERIMNON, P. Br. = **Dalbergia**, Linn. (Legum.).

oxyphyllum, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 48 = *D.
 oxyphylla*.

AMICIA, H. B. & K. (Legum.).

fimbriata, Harms, ex Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 49.—
 Bolivia.
micrantha, Harms, l. c.—Bolivia.
parvula, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 23.—
 Bolivia.

AMMI, Tourn. (Umbellif.).

seubertianum, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897,
 115.—Ins. Azor.
 thracicum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* I. 132.—Bulgaria.
 trifoliatum, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897,
 116.—Ins. Azor.

AMMOCHLOA, Boiss. (Gramin.).

involutrata, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. Afd. II.
 no. 1. (1900) 11.—Marocco.

AMMODENIA, Patrin. = **Arenaria**, Linn. (Caryo-

phyll.).
major, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 4.—Am. bor.

AMMOSELINUM, Torr. & Gray (Umbell.).

giganteum, Coult. & Rose, in *U. S. Dept. Agric.
 Contrib. Nat. Herb.* vii. 89.—Am. bor.

AMOMUM, Linn. (Scitamin.).

albo-rubellum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee*, 230.—N. Guin.
 album, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix.
 318 (= *Elettaria alba*).—Java.
 anthoidioides, *Koord. l. c.* (= *Elettaria anthoidioides*).
 —Java.

apiculatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 315.—
 Sumatra.

brachyphilus, *K. Schum. l. c.* 318, nomen.—Celebes.

brachypodanthum, *K. Schum. l. c.* 316.—Celebes.

calophrys, *K. Schum. l. c.* 314.—Celebes.

chrysocalyx, *K. Schum. l. c.* 308.—Sumatra.

chrysogynium, *K. Schum. l. c.* 322.—Celebes.

cylindraceum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 136.—Penins. Mal.

deuteramomum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 313.
 —Ins. Philipp.

dictyocoleum, *K. Schum. l. c.* 312.—Borneo.

echinosphaera, *K. Schum. l. c.* 322.—Tonkin.

Elliotii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 309.—Afr.
 trop.

elongatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 303.—
 Java.

fimbriobracteata, *K. Schum. l. c.* 317.—Borneo.

flavo-rubellum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee*, 229.—N. Guin.

flavum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 133.—
 Penins. Mal.

grandiligulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 303.—
 Sumatra.

gymnopodium, *K. Schum. l. c.* 320.—Celebes.

hastilabium, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 137.—Penins. Mal.

Havilandii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 303.—
 Borneo.

heliconiifolium, *K. Schum. l. c.* 319.—Celebes.

hemisphaericum, *K. Schum. l. c.* 307 = *Alpinia hemi-
 sphaerica*.

kandariense, *K. Schum. l. c.* 323.—Celebes.

lappaceum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 134.—Penins. Mal.

Laurentii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc.
 Bot. Belg.* xxxviii. 136.—Afr. trop.

laxesquamosum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii.
 315.—Borneo.

longifolium, *K. Schum. l. c.* 318.—N. Guin.

macroglossa, *K. Schum. l. c.* 314.—Borneo.

masuiianum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend.
 Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 138.—Afr. trop.

melichroum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 322.—
 Celebes.

micranthum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 138.—Penins. Mal.

minus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 305 (= *Eletta-
 ria minor*).—Java.

nasutum, *K. Schum. l. c.* 320.—Borneo.

ochreum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 135.—Penins. Mal.

AMOMUM :—

oliganthum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 321.—
 Borneo.

padangense, *K. Schum. l. c.* 318.—Sumatra.

paludosum, *K. Schum. l. c.* 305 (= *Elettaria palu-
 dosa*).—Java.

pausodipsus, *K. Schum. l. c.* 313, nomen.—Celebes.

penicellatum, *K. Schum. l. c.* 304.—Celebes.

perakense, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 135.—Penins. Mal.

phaeochranum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 304.
 —Borneo.

polycarpum, *K. Schum. l. c.* 312.—Celebes.

pyramidosphaera, *K. Schum. l. c.* 306.—Borneo.

reticulatum, *K. Schum. l. c.* 308.—Borneo.

rubrum, *K. Schum. l. c.* 317 (= *Alpinia rubra*).—Malaya.

sarasinorum, *K. Schum. l. c.* 316.—Celebes.

sarawacense, *K. Schum. l. c.* 304.—Borneo.

solare, *K. Schum. l. c.* 308 (= *Elettaria solaris*).—Java.

stenophyllum, *K. Schum. l. c.* 319.—Celebes.

stenosiphon, *K. Schum. l. c.* 320.—Borneo.

stoloniflorum, *K. Schum. l. c.* 322.—Borneo.

surculosum, *K. Schum. l. c.* 323.—Borneo.

testaceum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii.
 135.—Penins. Mal.

trachycarpum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 316.—
 N. Guin.

trianthemum, *K. Schum. l. c.* 321.—Celebes.

validum, *K. Schum. l. c.* 314.—Sumatra.

vestitum, *K. Schum. l. c.* 319.—Sumatra.

warburgianum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee*, 230.—N. Guin.

zambesiicum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 309.—
 Afr. trop.

AMOORA, Roxb. (Meliac.).

gigantea, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 343 A.—Cochinch.

oligosperma, *Pierre, l. c.* t. 345 A.—Cochinch.

trichanthera, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands
 Plantent.* xvi. 123.—Java.

AMPELOPSIS, Rich. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).

Graebneri, Bolle, in *Wittm. Gartenf.* t. 1462.—Hort.

megalophylla, Diels & Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxix.
 466.—China.

mirabilis, Diels & Gilg, l. c. 465.—China.

AMPHIBLEMMA, Naud. (Melastom.).

wildemannianum, *Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in
 Ann. Mus. Congo, Sér. II.* 22.—Afr. trop.

AMPHIDONAX, Nees = **Arundo**, Linn. & **Zenkeria**,

Trin. (Gramin.).

bifaria, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 410 = *A. Donax*.

Heynii, Nees, in *Wight, Cat. n.* 1747 = *Z. elegans*.

obtusiflora, Thwaites, *Enum. Pl. Zeyl.* 370 = *Z. obtusi-
 flora*.

tenella, *Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 97 = *Z.
 elegans*.

AMPHIDOKA, DC. (Compos.).

glandulosa, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 832.—Afr.
 austr.

AMPHILOPHIUM, Kunth (Bignon.).

Blanchetii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.*
 viii. II. 210 (= *Apllophium Blanchetii*).—Bras.

pannosum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 209 (= *Bignonia
 pannosa*).—Bras.

AMPHIPOGON, R. Br. (Gramin.).

humilis, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 8905 D = *Gracilea
 royleana*.

AMPHISTELMA, Griseb. = **Vincetoxicum**, Moench

(Asclep.).

ephedroides, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 174 = *Metastelma
 ephedroides*.

graminifolium, *Griseb. l. c.* = *Metastelma bonplandia-
 num*.

AMPHITHALEA, Eckl. & Zeyh. (Legum.).

sericea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 440.—Afr. austr.

speciosa, *Schlechter, l. c.* 441.—Afr. austr.

villosa, *Schlechter, l. c.* xxvii. 142.—Afr. austr.

AMPHORCHIS, Thou. Orch. Iles Afr. Tabl. Synopt.

1822. **ORCHIDEAE**.

occidentalis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. 139.—Afr.
 trop.

C

AMSINCKIA, Lehm. (Borag.).
 arenaria, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 133.—Am. bor.
 carnosa, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 35.—Am. bor.
 hispidissima, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 133.—Am. bor.
 maritima, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III.* i. 110.—Am. bor.
 micrantha, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 134.—Am. bor.
 retrorsa, *Suksd. l. c.*—Am. bor.
 St. Nicolai, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III.* i. 109.—Am. bor.

AMYRIS, P. Br. (Burser.).
 Humboldtii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 607.—Am. trop.
 trimera, *Krug & Urb. l. c.* 610.—N. Granat.

ANACARDIUM, Linn. (Anacard.).
 corymbosum, *Barb. Rodr. Pl. Matagross.* 10.—Bras.

ANACOLOSA, Blume (Olacin.).
 arborea, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 9.—Java.
 celebica, *Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 391.—Celebes.

ANACYCLUS, Linn. (Compos.).
 Freyni, *Porta & Rgo. ex Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto*, Ser. III. ii. (1896) 213.—Eur.

ANAGALLIDASTRUM, Mich. = **Centunculus**, Linn. (Primul.).
 exiguum, *Bub. Fl. Pyren.* i. 238 = *C. minimus*.

ANAGALLIS, Tourn. (Primul.).
 hispanica, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vi. 58.—Eur.
 longicaulis, *Laz. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 166.—Eur.

ANAPHALIS, DC. (Compos.).
 subalpina, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 415.—Am. bor.

ANARRHINUM, Desf. (Scrophul.).
 demnatense, *Coss. Illustr. Fl. Atlant.* t. 152.—Marocco.

ANARTHROPHYLLUM, Benth. (Legum.).
 Beauifilii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 50.—Patag.
 Morenonis, *Kuntze, l. c.*—Patag.
 Toninii, *Kuntze, l. c.*—Patag.

ANASTRAPHIA, D. Don (Compos.).
 northropiana, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, vii. 435.—Cuba.

ANATHERUM, Beauv. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
 parviflorum, *Spreng. Syst.* i. 290 = *A. micranthus*.

ANAXAGOREA, St. Hil. (Anonac.).
 ramiflora, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 110.—Borneo.

ANCHOMANES, Schott (Aroid.).
 giganteus, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 419.—Afr. trop.
 Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 88.—Afr. trop.

ANCHUSA, Linn. (Borag.).
 macedonica, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 197.—Bulgaria.
 ottomanum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 176.—Eur.

ANCISTRANTHUS, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. (1900) 225. **ACANTHACEAE**.
 harpochiloides, *Lindau, l. c.* 226 (= *Jacobinia harpochiloides*).—Cuba.

ANCISTROCHILUS, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 44 (1897). **ORCHIDACEAE**.
 thomsonianus, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.

ANCYLOBOTHRYIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 91. **APOCYNACEAE**.
 amoena, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 186.—Afr. trop.
 mammosa, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 92.—Afr. trop.

ANCYLOBOTHRYIS :—
 petersiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 91 (= *Landolphia petersiana*).—Afr. trop.
 pyriformis, *Pierre, l. c.* 126, *vide K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. 1. 519.—Afr. trop.
 robusta, *Pierre, l. c.* 92.—Afr. trop.
 robusta, *Pierre, l. c.* 128 (non *Pierre l. c.* 92), *vide K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. 1. 519.—Afr. trop.
 rotundifolia, *Pierre, l. c.* 92.—Afr. trop.

ANCYLOCLADUS, Wall. = **Willughbeia**, Roxb. (Apocyn.).
 Beccarii, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 98.—Malaya.
 cochinchinensis, *Pierre, l. c.* 97 = *W. cochinchinensis*.
 curtisianus, *Pierre, l. c.* 96.—Malaya.
 glaucinus, *Pierre, l. c.* 98.—Malaya.
 minutiflorus, *Pierre, l. c.* 95.—Malaya.
 nodosus, *Pierre, l. c.* 96.—Malaya.
 sarahaensis, *Pierre, l. c.*—Malaya.
 vriesianus, *Pierre, l. c.* 95.—Java.

ANDREA, Mez, in DC. Monogr. Phan. ix. (1896) 114. **BROMELIACEAE**.
 sellowiana, *Mez, l. c.* 115 (= *Quesnelia selleana*).—Bras.

ANDROCYMBIUM, Willd. (Liliac.).
 albomarginatum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 415.—Afr. austr.
 crispum, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.
 latifolium, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.
 natalense, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 519.—Afr. austr.
 striatum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 336 = *melanthioides*.
 subulatum, *Baker, in Journ. Bot.* 1874, 245 = *melanthioides*.

ANDROLEPIS, Brongn. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
 Donnell-Smithii, *Mez, in DC. Monogr. Phan.* ix. 161—A. Donnell-Smithii.

ANDROPOGON, Linn. (Gramin.).
 acicularis, *Willd. Sp. Pl.* iv. 906 = *aciculatus*.
 aciculatus, *Retz. Obs.* v. 22.—As. trop.; Austral.; Polynes.
 ascendens, *Heyne, ex Wall. Cat. n.* 8906 = *Garnotia stricta*.
 Allioni, *DC. Fl. Fr.* iii. 97 = *contortus*.
 alternans, *J. Presl, Rel. Haenk.* i. 342 = *micranthus*.
 altissimus, *Hochst. in Flora*, 1841, 277 = *rufus*.
 aristulatus, *Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 397 = *wightianus*.
 armatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 197.—Ind. or.
 Arriani, *Hook. f. l. c.* 203 = *Ariani*.
 arundinaceus, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* 274 = *halepensis*.
 ascinodis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. 87 = *apricus*.
 asper, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 189.—Ind. or.
 assimilis, *Steud. in Zoll. Syst. Verz.* 58; *Syn. Pl. Gram.* 397.—As. or.
 asthenos, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 376 = *Ischaemum timorense*.
 Aucheri, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 77.—Oriens; Afr. trop.
 auctus, *Stäpf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 357.—Afr. austr.
 avenaceus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 189 = *halepensis*.
 axilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 166, *sphalm.* = *exilis*.
 Bakeri, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull.* xxiv. 39.—Am. bor.
 Beckettii, *Thwaites, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 244 = *Garnotia Fergussonii*.
 Bellardi, *Bub. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* v. 317 = *contortus*.
 besukiensis, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 367 = *contortus*.
 binatus, *Retz. Obs.* vi. 21 = *Ischaemum augustifolium*.
 bootanensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 166.—Ind. or.
 Brandisii, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 4 = *Coelarthron Brandisii*.
 breviaristatus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 396 = *wightianus*.
 brunneus, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 109 = *Pollinia articulata*.
 brunneus, *Heyne, l. c.* 112 = *Pollinia phaeothrix*.
 Buchananii, *Stäpf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 362.—Afr. austr.
 campyloracheus, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 431.—Am. bor.

ANDROPOGON :—
 capillaceus, *Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 179 = *assimilis*.
 capillaris, *Heyne, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 116 = *Arundinella mutica*.
 capillipes, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 431.—Am. bor.
 cernuus, *Roxb. Fl. Ind.* i. 270 = *A. Sorghum*.
 Chrysopogon, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 157 = *Cymbopogon Welwitschii*.
 ciliolatus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 396 = *monticola*.
 circinnatus, *Hochst. & Steud. ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 387 = *A. Iwarancusa*.
 coeruleus, *Kunth, Rev. Gram.* i. 504 = *micranthus*.
 coeruleus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 395 = *monticola*.
 coloratus, *Nees, ex Wight, Cat. n.* 1703 = *A. Nardus*.
 commutatus, *Aitch. in Journ. Linn. Soc.* xix. 191 = *A. Iwarancusa*.
 compressus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 172.—Ind. or.
 concanensis, *Hook. f. l. c.* 174.—Ind. or.
 contortus, *Linn. Sp. Pl.* ii. 1045.—Reg. calid.
 controversus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 391 = *halepensis*.
 cotulifer, *Thunb. Fl. Jap.* 41 = *Spodiopogon cotulifer*.
 crinitum, *Thunb. l. c.* 40 = *Pogonatherum crinitum*.
 curvatus, *Russ. ex Wall. Cat. n.* 8809 A = *caricosus*.
 cuspidatus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 456 = *Arthraxon ciliare*.
 demissus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 388 = *pumilus*.
 distans, *Nees, ex Steud. l. c.* 387.—Ind. or.
 distichophyllus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 191.—Ind. or.
 diversifolius, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 148.—Afr. trop.
 dregeanus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 112.—Afr. austr.
 dubitatus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 394 = *halepensis*.
 echinatus, *Steud. l. c.* 395 = *A. Gryllus*.
 ensiformis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 175.—Ind. or.
 epiphyllus, *Wall. Cat. n.* 8667 A = *Arundinella brasiliensis*.
 eriocoleus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 329.—Afr. trop.
 eriophorus, *Willd. Sp. Pl.* iv. 90 = *A. Iwarancusa*.
 fasciculatus, *Linn. Sp. Pl.* 1047 = *Pollinia ciliare*.
 festucaeformis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 145.—Afr. trop.
 filiculmis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 181.—Ind. or.
 filipendulinus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 389 = *filipendulus*.
 finitimus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 465 = *filipendulus*.
 floridanus, *Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 145.—Am. bor.
 Foulkesii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 174.—Ind. or.
 gangeticus, *Hack. in DC. Phan. vi. Monogr.* 539 = *fasciculatus*.
 geminatus, *Russ. ex Wall. Cat. n.* 8798 C = *pumilus*.
 glabratus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 395 = *A. Gryllus*.
 glaucopsis, *Steud. l. c.* 397 = *assimilis*.
 glaucus, *Retz. Obs.* v. 20 = *Apluda varia*.
 Grayia, *Steud. Nom. ed. II.* i. 91 = *Sphaerocaryum elegans*.
 Griffithii, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 209 = *filipendulus*.
 Gryllus, *Linn. Cent. Pl.* ii. 33.—Reg. calid.
 guineensis, *Beauv. & Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. 99.—Afr. trop.
 gyrans, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* 1898, 113.—Am. bor.
 Hackelii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 194.—Ind. or.
 halepensis, *Brot. Fl. Lusit.* i. 89.—Reg. calid.
 Hamiltoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 190.—Ind. or.
 heteroclitus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 115 = *Pseudanthistitia heteroclita*.
 huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 146.—Afr. trop.
 increscens, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 396 = *monticola*.
 intonsus, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 114 = *A. Cymbarius*.
 involutus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 373 = *Ischaemum augustifolium*.
 ischynanthus, *Steud. l. c.* 367 = *triticeus*.
 Iwarancusa, *Jones, in Asiat. Research.* iv. 109.—Oriens; Afr. bor.
 javanicus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 396 = *aciculatus*.
 Kelleri, *Hack. ex Schinz, in Mem. Herb. Boiss.* no. 20. 6.—Afr. trop.
 lancearius, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 190.—Ind. or.
 lanceolatus, *Baker, Fl. Maurit.* 144 = *Arthraxon ciliare*.
 laniger, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 379 = *A. Iwarancusa*.
 Lawsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 187.—Ind. or.
 laxus, *Roxb. Fl. Ind.* i. 271 = *halepensis*.
 Lehmannii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 24.—N. Granat.

ANDROPOGON :—

- lepidus*, Nees, Fl. Afr. Austr. 113 = *A. Cymbarius*.
leptostachyus, Benth. in Hook. Niger Fl. 571 = *hirtiflorus*.
liananthus, Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = *triticeus*.
 Lindmani, Hack. ex Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 6. 6.—Bras.
 linnaeanus, Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull. xxiv. 40.—Am. bor.
 lopollensis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 143.—Afr. trop.
marginalis, Steud. in Flora, 1829, 472 = *A. Nardus*.
melanocarpus, Ell. Sketch, i. 146.—Reg. calid.
messanensis, Biv. ex Parl. Fl. Ital. i. 148 = *contortus*.
micans, Steud. Syn. Pl. Gram. 382 = *Arthraxon ciliare*.
micranthus, Kunth, Rev. Gram. i. 165.—Geront. trop.
microtheca, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 208.—Ind. or.
miliaceus, Roxb. Fl. Ind. i. 272 = *halepensis*.
miliiformis, Schult. Mant. ii. 448 = *halepensis*.
minutissimus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 147 = *Arthraxon* sp.
mississippiensis, Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull. xxiv. 40.—Am. bor.
monomeros, Hochst. in Hohen. Pl. Ind. Or. n. 183 = *Pseudanthistiria heteroclita*.
montanus, Roxb. Fl. Ind. i. 267.—Ind. or.
monticola, Schult. Mant. iii. 665.—Geront. subtrop.
muralis, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 8828 = *Arthraxon microphyllum*.
neomexicanus, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 83.—Am. bor.
nigrum, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 8777 E = *serratus*.
nitidulus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 199.—Ind. or.
nodulibarbis, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 396 = *zeylanicus*.
notopogon, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Ischaemum angustifolium*.
obscurus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 380.—Afr. trop.
obvallatus, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Ischaemum angustifolium*.
Olivieri, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 76 = *A. Iwarancusa*.
orysetorum, Hack. in DC. Monogr. Phan. vi. 477 = *pseudoischaemum*.
pachyarthrus, Hack. l. c. 449 = *pumilus*.
pallidus, Kunth, Rev. Gram. i. 165 = *A. Gryllus*.
paniculatus, Lam. Fl. Fr. ed. II. iii. 633 = *A. Gryllus*.
parvispica, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *micranthus*.
pectinatus, Steud. l. c. 369 = *Eremochloa muricata*.
peninsulæ, Steud. l. c. 396 = *zeylanicus*.
pentastachyus, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8815 A = *pseudoischaemum*.
petiolaris, Steud. Syn. Pl. Gram. 398 = *Ischaemum petiolare*.
petiolatus, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 303 = *Ischaemum petiolare*?
pilifer, Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Ischaemum pilosum*.
pilosus, Klein, ex Willd. Sp. Pl. iv. 920 = *Ischaemum pilosum*.
ptipatherus, Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. II. 4 = *cordylotrichus*.
pleiarthron, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 364.—Afr. austr.
plurinodis, Stapf, l. c. 353.—Afr. austr.
polyphyllum, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 194.—Ind. or.
polystachyos, Roxb. Fl. Ind. i. 261.—Ind. or.
polystichus, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 369 = *melanocarpus*.
Pospischilii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 328.—Afr. trop.
Pringlei, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull. xxiv. 7.—Mexic.
pseudograya, Steud. Syn. Pl. Gram. 365 = *hirtiflorus*.
pseudohirtus, Steud. in Flora, 1829, 471 = *A. Nardus*.
pubescens, Visiani, in Flora, 1829, f. Erg. 3 = *hirtus*.
quinqueflorus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 172 = *pseudoischaemum*.
Ritchiei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 201.—Ind. or.
royleanus, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *A. Gryllus*.
rupestris, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 327.—Afr. trop.
saccharatus, Roxb. Fl. Ind. i. 271 = *A. Sorghum*.
Schmidii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 180.—Ind. or.
scribnerianus, Nash, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 432.—Am. bor.
scrobiculatus, Kunth, Enum. Pl. i. 507 = *melanocarpus*.
segaensis, Steud. Syn. Pl. Gram. 367 = *melanocarpus*.
semiberbis, Kunth, Enum. Pl. i. 489 = *hirtiflorus*.

ANDROPOGON :—

- serratifolius*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 8771 B = *Anthistiria Cymbaria*.
serratus, Miq. Prol. Fl. Jap. i. 192 = *micranthus*.
Sorghum, Brot. Fl. Lusit. i. 88.—Reg. calid.
spectabilis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 328.—Afr. trop.
Sprengelii, Kunth, Rev. Gram. i. 166 = *monticola*.
squarrosus, Linn. Herb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 62 = *Chamaeraphis spinescens*.
Stapfi, Hook. f. l. c. 184.—Ind. or.
subrepens, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *assimilis*.
subulatus, Presl, Rel. Haenk. i. 341 = *aciculatus*.
textilis, Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 144.—Afr. trop.
Thwaitesii, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, v. 243.—Zeylan.
thymiodorus, Steud. Syn. Pl. Gram. 365 = *Elionurus argenteus*.
timorensis, Steud. l. c. 376 = *Ischaemum timorensis*.
tolimensis, Pilg. in Engl. Jahrb. xxvii. 23.—N. Granat.
Tracyi, Nash, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 433.—Am. bor.
transvaalensis, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 363.—Afr. austr.
trichopus, Stapf, in Kew Bull. 1897, 287.—Afr. trop.
tridentatus, Roxb. Fl. Ind. i. 261 = *Lophopogon tridentatus*.
Trinii, Steud. Syn. Pl. Gram. 395 = *monticola*.
triticeus, R. Br. Prod. 201.—Malaya; Austral.
umbrosus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 467 = *A. Cymbarius*.
undatus, Jacq. Coll. iii. 237 = *Oplismenus compositus*.
Usorum, Steud. Syn. Pl. Gram. 392 = *A. Sorghum*.
velutinus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 194.—Ind. or.
verticillatus, Roxb. Fl. Ind. i. 263.—Ind. or.
villosulus, Steud. Syn. Pl. Gram. 397 = *micranthus*.
wightianus, Steud. l. c. 395.—Ind. or.
Woodrovi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 173.—Ind. or.
zeylanicus, Arn. ex Benth. Fl. Hongk. 423 = *hirtiflorus*.
zeylanicus, Steud. Syn. Pl. Gram. 397.—Ind. or.

ANDROSACE, Tourn. (Primul.).

- arguta*, Greene, Pittonia, iv. 148.—Am. bor.
asprella, Greene, l. c. 150.—Am. bor.
capillaris, Greene, l. c. 148.—Am. bor.
diffusa, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 318.—Am. bor.
fragilis, Duthie, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xii. 675.—Ind. or.
Gormanii, Greene, Pittonia, iv. 149.—Am. bor.
Harrisii, Duthie, in Rec. Bot. Surv. India, i. 161.—Ind. or.
pinetorum, Greene, Pittonia, iv. 149.—Am. bor.
subumbellata, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 319.—Am. bor.

- ANDROSCEPIA**, Brongn. = *Anthistiria*, Linn. (Gramin.).
glabrata, Anderss. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 216 = *A. Hookeri*.
mutica, Anderss. in Nov. Act. Upsal. Ser. III. ii. 243 = *A. gigantea*.

ANDRYALA, Linn. (Compos.).

- Chevallieri*, Barratti, ex L. Chevall. in Mém. Herb. Boiss. no. 7. 10.—Afr. bor.
ANEILEMA, R. Br. (Commelin.).
acutifolium, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 217.—N. Guin.
fasciatum, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c. 218.—N. Guin.
Lujaii, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. 63.—Afr. trop.
protensum, Wall. Cat. n. 5218.—Zeylan.

- ANEMAGROSTIS**, Trin. = *Apera*, Adans. (Gramin.).
neesiana, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 115 = *Arundinella nervosa*.

ANEMONE, Linn. (Ranunc.).

- Barneoudia*, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 1 (= *Barneoudia chilensis*).—Chili.
californica, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 423.—Am. bor.
Kostyczewi, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. 87.—Turkestan.
nigricans, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 218 = *pratensis*.

ANEMONE :—

- riparia*, Fernald, in Rhodora, 1899, 51.—Am. bor.
sarracensis, Deysson & Cassat, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1899, 195.—Gallia.
seravschanica, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 49.—Turkestan.
soyensis, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vii. 590.—Japon.

ANEMOPAEGMA, Mart. (Bignon.).

- bifarium*, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 124 = *brevipes*.
brachycalyx, Bureau & K. Schum. l. c. 145 (= *Bignonia brachycalyx*).—Bras.
carrerense, Armit. in Journ. Bot. 1898, 188.—Ind. occ.
Chaimberlaynii, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 128 = *racemosum*.
cupulatum, Bureau & K. Schum. l. c. 146 (= *Bignonia cupulata*).—Guiana.
foetidum, Bureau & K. Schum. l. c. 143.—Bras.
goyazense, K. Schum. ex Bureau & K. Schum. l. c. 407.—Bras.
gracile, Bureau & K. Schum. l. c. 132.—Bras.
hilarianum, Bureau & K. Schum. l. c. 124.—Bras.
jucundum, Bureau & K. Schum. l. c. 144 (= *Petastoma jucundum*).—Guiana.
Karstenii, Bureau & K. Schum. l. c. 130.—Venez.
microcalyx, Bureau & K. Schum. l. c. 134 (= *Bignonia microcalyx*).—Guiana.
nigrescens, Bureau & K. Schum. l. c. 125.—Bras.
pachyphyllum, Bureau & K. Schum. l. c. 126.—Bras.
paraense, Bureau & K. Schum. l. c. 131.—Bras.
robustum, Bureau & K. Schum. l. c. 123 (= *Bignonia robustum*).—Guiana.
subundulatum, Bureau & K. Schum. l. c. 133.—Bras.

ANERINCLEISTUS, Korth. (Melast.).

- floribundus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. n. s. lxxix. II. 17.—Penins. Mal.
glomeratus, King, l. c. 18.—Borneo.
macranthus, King, l. c. 15.—Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 16.—Penins. Mal.
sublepidotus, King, l. c. 17.—Penins. Mal.

ANGELICA, Riv. (Umbellif.).

- ampla*, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 375.—Am. bor.
dissoluta, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 499.—China.
Grayi, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 154 (= *Selinum Grayi*).—Am. bor.
involutellata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 501.—China.
Kingii, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 158 (= *Selinum Kingii*).—Am. bor.
laxifoliata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 499.—China.
megaphylla, Diels, l. c. 500.—China.
polycarpa, Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad. i. 148.—Am. cent.
roseana, Hend. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 201.—Am. bor.
trifoliata, Cockayne, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 425 (= *Ligusticum trifoliolatum*).—N. Zel.
valida, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 501.—China.

ANGELONIA, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).

- linarioides*, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 451.—Bras.

ANGELOPOGON, Poepp. = *Myzodendron*, Banks & Soland. (Santal.).

- linearifolium*, Poepp. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1896) 558 = *M. linearifolium*.

ANGOPHORA, Cav. (Myrtac.).

- melanoxyton*, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxv. 85.—Austral.

ANGRAECOPSIS, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 171. *ORCHIDAEAE*.

- tenerrima*, Kraenzl. l. c.—Afr. trop.

ANGRAECUM, Bory (Orchid.).

- affine, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 282, nomen.—Afr. trop.
anocentrum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 342.—Afr. trop.
apiculatum, Hook. Bot. Mag. t. 4159 = *bilobum*.
arcuatum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 186 = *Listrostachys chailluana*.
ashantense, Lindl. Bot. Reg. 1843, Misc. 56 = *Listrostachys ashantensis*.

ANGRAECUM:—

- Batesii, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 139.—Afr. trop. caespitosum, Rolfe, l. c. 150.—Afr. trop. calanthum, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 283, nomen.—Afr. trop. capitatum, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. 137 = *Listrostachys capitata*. caudatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1844 = *Listrostachys caudata*. chailluanum, Hook. f. Bot. Mag. t. 5589 = *Listrostachys chailluana*. clandestinum, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 206 = *Listrostachys clandestina*. clavatum, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 145.—Afr. trop. cornigerum, Cordem. in *Rev. Gén. de Bot.* xi. 418.—Bourbon. curvipes, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 283, nomen.—Afr. trop. Dives, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 142.—Afr. trop. distichum, Lindl. Bot. Reg. t. 1781 = *Mystacidium distichum*. eichlerianum, Kraenzl. in *Berl. Gart. Zeit.* i. (1882) 484.—Afr. trop. exile, Cordem. in *Rev. Gén. de Bot.* xi. 418.—Bourbon. filifolium, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 284, nomen.—Afr. trop. filipes, Schlechter, l. c.—Afr. trop. flabelliforme, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 135.—Afr. trop. Flanaganii, Bolus, *Orchid. S. Afr.* t. 52.—Afr. austr. flexuosum, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 139.—Afr. trop. Fournierae, André, in *Rev. Hort.* 1896, 256.—Madag. glomeratum, Ridl. in *Gard. Chron.* 1885, II. 678 = *Listrostachys glomerata*. Grantii, Batem. ex Baker, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. 153.—Afr. trop. ichneumoneum, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. 136 = *Listrostachys ichneumonea*. infundibulare, Lindl. l. c. = *Mystacidium infundibulare*. Kirkii, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 136.—Afr. trop. kotschyianum, Reichb. f. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1864, 388.—Afr. trop. Kotschyi, Reichb. f. in *Gard. Chron.* 1880, II. 456 = *kotschyianum*. lagosense, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 145.—Afr. trop. marcorrhynchum, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 284, nomen.—Afr. trop. micropetalum, Schlechter, l. c.—Afr. trop. Moloneyi, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 145.—Afr. trop. mombasense, Rolfe, l. c.—Afr. trop. monodon, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard.* ii. 102 = *Listrostachys monodon*. occidentale, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 142.—Afr. trop. pachyurum, Rolfe, l. c. 138.—Afr. trop. pellucidum, Lindl. Bot. Reg. 1844, t. 2 = *Listrostachys pellucida*. penicillatum, Cordem. in *Rev. Gén. de Bot.* xi. 417.—Bourbon. pertusum, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 205 = *Listrostachys pertusa*. plehnianum, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 285, nomen.—Afr. trop. rhipsalisocium, Reichb. f. in *Flora*, 1865, 189 = *Listrostachys rhipsalisocia*. rhodostictum, Kraenzl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 154.—Afr. trop. rohlfsianum, Kraenzl. in *Berl. Gart. Zeit.* i. (1882) 341.—Afr. trop. scandens, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 285, nomen.—Afr. trop. subulatum, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 206 = *Listrostachys subulata*. Thomsoni, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 143.—Afr. trop. trachyrhizum, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 343.—Afr. trop. tridens, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. 135 = *Mystacidium tridens*. vagans, Lindl. l. c. = *Listrostachys vagans*. vesicatum, Lindl. Bot. Reg. 1843, Misc. 6 = *Listrostachys vesicatum*. Wakefieldii, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 146.—Afr. trop.

ANGRAECUM:—

- woodianum, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 343.—Afr. trop.
- ANGYLOCALYX**, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxiii. (1896) 172. **LEGUMINOSAE**. ramiflorus, Taub. l. c.—Afr. trop. schumannianus, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 278.—Afr. trop.
- ANILA**, Ludw. = **Indigofera**, Linn. (Legum.). Kuntzei, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 51 = I. Kuntzei. Kurtzii, Kuntze, l. c. = I. Kurtzii. pretoriana, Kuntze, l. c. 52 = I. pretoriana. tinctoria, Kuntze, l. c. 51 = I. Anil.
- ANISACANTHUS**, Nees (Acanth.). Malmei, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 662.—Parag. Pohlil, Lindau, l. c. 663.—Bras.
- ANISEIA**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.). syringifolia, Damm, in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 38.—Bras.
- ANISOCARPUS**, Nutt. = **Madia**, Molina (Compos.). radiatus, Greene, *Fl. Francisc.* 416 = M. radiata. Rammii, Greene, l. c. 415 = M. Rammii. yosemitanus, Greene, l. c. 416 = M. yosemitana.
- ANISOCHILUS**, Wall. (Labiata). Engleri, Briq. in *Engl. Jahrb.* xix. 190 = africanus.
- ANISOPHYLLEA**, R. Br. (Rhizophor.). apetalá, Scortech. ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 323.—Perak. Cabole, Henriq. in *Bol. Soc. Broter.* xvii. 85.—Afr. trop. Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 326.—Penang. quangensis, Engl. ex Henriq. in *Bol. Soc. Broter.* xvi. 76.—Afr. trop. Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 325.—Perak. Sororia, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1230.—Afr. trop.
- ANISOSTIGMA**, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* v. (1897) App. III. 79. **FICOIDEAE**. Schenkii, Schinz, l. c.—Afr. austr.
- ANISOTES**, Nees (Acanth.). sessiliflorus, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 226.—Afr. trop. Zenkeri, C. B. Clarke, l. c. 227.—Afr. trop.
- ANISOTHRIX**, O. Hoffm. ex Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 129 (1898). **COMPOSITAE**. Kuntzei, O. Hoffm. l. c.—Afr. austr.
- ANNESLIA**, Salisb. = **Calliandra**, Benth. (Legum.). brevipes, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7. 50 = C. brevipes. Chapadae, Lindm. l. c. 51 = C. Chapadae. myriophylla, Lindm. l. c. = C. myriophylla. turbinata, Lindm. l. c. 50 = C. turbinata. Tweediei, Lindm. l. c. 51 = C. Tweediei.
- ANOECTOCHILUS**, Blume (Orchid.). Elwesii, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 297 (= *Odontochilus Elwesii*).—Ind. or. geniculata, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 406.—Penins. Mal. sikkimensis, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 124.—Reg. Himal. tortus, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 298 (= *Odontochilus tortus*).—Ind. or.
- ANOGRA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.). Buffumi, Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 267.—Am. bor. californica, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 176 = O. californica. deltoidea, Small, l. c. 174 = O. deltoidea. gypsophylla, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 8.—Am. bor. neomexicana, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 176.—Am. bor. rhizomata, Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 240.—Am. bor. simplex, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 175 = O. ambigua. trichocalyx, Small, l. c. 174 = O. trichocalyx. xylocarpa, Small, l. c. = O. xylocarpa.

- ANOMATHECA**, Ker-Gawl. = **Lapeyrouisia**, Pourr. (Irid.). angolensis, Baker, in *Journ. Bot.* 1876, 387 = L. Monteiroi. cruenta, Lindl. Bot. Reg. t. 1369 = L. cruenta. grandiflora, Baker, in *Journ. Bot.* 1876, 337 = L. grandiflora.
- ANOMOTASSA**, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. (1898) 730. **ASCLEPIADACEAE**. macrantha, K. Schum. l. c.—Ecuador.
- ANONA**, Linn. (Anonac.). aurantiaca, Barb. Rodr. *Pl. Matogross.* 5.—Bras. cearaensis, Barb. Rodr. in *Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 3.—Bras. cuyabaensis, Barb. Rodr. *Pl. Matogross.* 3.—Bras. geraensis, Barb. Rodr. in *Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 1.—Bras. Heinsenii, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 300.—Afr. trop. Laurentii, Engl. & Diels, l. c.—Afr. trop. macrocarpa, Barb. Rodr. *Pl. Matogross.* 1.—Bras. malmeana, R. Fries, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5. 44.—Bras. Pittieri, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 389.—Am. cent. Prestoie, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2519–20.—Am. trop. Zenkeri, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 300.—Afr. trop.
- ANONIDIUM**, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. (1900) 56. **ANONACEAE**. Laurentii, Engl. & Diels, l. c. (= *Anona Laurentii*).—Afr. trop. Mannii, Engl. & Diels, l. c. (= *Anona Mannii*).—Afr. trop.
- ANOPLYXIS**, Pierre, ex Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. (1900) 49. **RHIZOPHORACEAE**. klaineana, Pierre, l. c. (= *Macarisia klaineana*).—Afr. trop.
- ANPLECTRUM**, A. Gray (Melast.). anomalum, King & Staff, ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. II. 58.—Penins. Mal. lepidotosetosum, King, l. c. 56.—Penins. Mal.
- ANTENNARIA**, Gaertn. (Compos.). aizoides, Greene, *Pittonia*, iii. 283.—Am. bor. alsinoides, Greene, l. c. iv. 83.—Am. bor. ambigens, Fernald, in *Rhodora*, i. 150.—Am. bor. anaphaloides, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 409.—Am. bor. angustata, Greene, *Pittonia*, iii. 284.—Am. bor. angustifolia, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 546.—Am. bor. aprica, Greene, *Pittonia*, iii. 282.—Am. bor. arida, E. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 210.—Am. bor. arnoglossa, Greene, *Pittonia*, iii. 318.—Am. bor. borealis, Greene, l. c. iv. 85.—Am. bor. bracteosa, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 413.—Am. bor. Brainerdii, Fernald, in *Rhodora*, i. 153.—Am. bor. calophylla, Greene, *Pittonia*, iii. 347.—Am. bor. campestris, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 304.—Am. bor. canadensis, Greene, *Pittonia*, iii. 275.—Am. bor. confinis, Greene, l. c. iv. 40.—Am. bor. corymbosa, E. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 212.—Am. bor. decipiens, Greene, *Pittonia*, iii. 278.—Am. bor. exilis, Greene, l. c. 288.—Am. bor. fallax, Greene, l. c. 321.—Am. bor. Farwellii, Greene, l. c.—Am. bor. flavescens, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 411.—Am. bor. foliacea, Greene, *Pittonia*, iii. 279.—Am. bor. fusca, E. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 121.—Am. bor. glabrata, Greene, *Pittonia*, iii. 285.—Am. bor. Holmii, Greene, l. c. iv. 81.—Am. bor. Howellii, Greene, l. c. iii. 174.—Am. bor. imbricata, E. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 211.—Am. bor. insularis, Greene, *Pittonia*, iii. 276.—Am. bor. lanata, Greene, l. c. 288.—Am. bor. Macounii, Greene, l. c. 276.—Am. bor. marginata, Greene, l. c. 290.—Am. bor.

ANTENNARIA :—

- media, *Greene, Pittonia*, iii. 282.—Am. bor.
 microphylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 308.—Am. bor.
 monocephala, *Greene, Pittonia*, iii. 176.—Am. bor.
 mucronata, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 209.—Am. bor.
 nardinae, *Greene, Pittonia*, iv. 82.—Am. bor.
 neglecta, *Greene, l. c.* iii. 173.—Am. bor.
 nemoralis, *Greene, l. c.* iv. 41.—Am. bor.
 neodioica, *Greene, l. c.* iii. 184.—Am. bor.
 nitida, *Greene, l. c.* 288.—Am. bor.
 oblanceolata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 409.—Am. bor.
 oblancifolia, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 121.—Am. bor.
 obovata, *E. Nelson, l. c.* xxvii. 213.—Am. bor.
 occidentalis, *Greene, Pittonia*, iii. 322.—Am. bor.
 Parlirii, *Fernald, in Gard. & For.* x. 284.—Am. bor.
 pedicellata, *Greene, Pittonia*, iii. 175.—Am. bor.
 petaloidea, *Fernald, in Rhodora*, 1899, 73.—Am. bor.
 Petasites, *Greene, Pittonia*, iii. 277.—Am. bor.
 propinqua, *Greene, l. c.* iv. 83.—Am. bor.
 pulcherrima, *Greene, l. c.* iii. 176.—Am. bor.
 pulvinata, *Greene, l. c.* 287.—Am. bor.
 recurva, *Greene, l. c.* 290.—Am. bor.
 reflexa, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 208.—Am. bor.
 rosea, *Greene, Pittonia*, iii. 281.—Am. bor.
 rosulata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 300.—Am. bor.
 rupicola, *Fernald, in Rhodora*, 1899, 74.—Am. bor.
 scariosa, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 210.—Am. bor.
 solitaria, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 304.—Am. bor.
 sordida, *Greene, Pittonia*, iv. 81.—Am. bor.
 suffrutescens, *Greene, l. c.* iii. 277.—Am. bor.
 umbrinella, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 302.—Am. bor.

ANTHAENANTIA, Beauv. (Gramin.)

- columbiensis, *K. Schum. in Fust. Fahresb.* xxvi. 1. 329 (= *Panicum columbiense*).—N. Granat.
 gigantea, *K. Schum. l. c.* (= *Panicum giganteum*).—Bolivia.
 hagenbeckiana, *K. Schum. l. c.* (= *Panicum hagenbeckianum*).—Am. austr.

ANTHAGATHIS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 195 (1897). **LEGUMINOSAE.**

- monadelphica, *Harms, l. c.* 196.—Afr. trop.
ANTHEMIS, Mich. (Compos.)
 Gaudium-solis, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 150.—Bulgaria.
 grangeoides, *Vatke & Hoeffner, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 465.—Afr. trop.
 Halacsyi, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 55.—Eur.
 rouana, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 164.—Eur.
 Stribnyi, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxxvii. 6.—Eur.

ANTHEPHORA, Schreb. (Gramin.)

- cristata, *Hack. ex Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. i. 60.—Afr. trop.
 pubescens, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 74.—Afr. austr.
 undulatifolia, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 12.—Afr. austr.

ANTHERICUM, Linn. (Liliac.)

- Bachmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 315.—Afr. austr.
 Bolusii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 385.—Afr. austr.
 brachypodium, *Baker, l. c.* 389.—Afr. austr.
 Buchanani, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 486.—Afr. trop.
 Cameroni, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. 314 = triflorum.
 capitatum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 384.—Afr. austr.
 carnosum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. 296 = *Bulbinella carnosum*.
 chlamydoxylum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 389.—Afr. austr.
 ciliatum, *Spreng. Syst.* ii. 84 = *Sprengeli*.
 congolense, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. 60.—Afr. trop.
 contortum, *Linn. f. Suppl.* 202 = *Caesia Thunbergii*.
 dregeanum, *Baker, in Journ. Bot.* 1872, 139 = *Caesia dregeana*.
 Drimiopsis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. 301 = *Dasystachys Drimiopsis*.

ANTHERICUM :—

- elongatum, *Willd. Sp. Pl.* ii. 136.—Afr. austr.
 flavoviride, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 490.—Afr. trop.
 flexifolium, *Jacq. Coll. Suppl.* 93 = elongatum.
 Galpini, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 385.—Afr. austr.
 jacquinianum, *Roem. & Schult. Syst.* vii. 462 = elongatum.
 Jamesii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 490.—Afr. trop.
 kemoense, *Hua, Contr. Fl. Congo Franç.* 19 (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x.)—Afr. trop.
 Kunthii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 392.—Afr. austr.
 malosanum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
 matabelense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 484.—Afr. trop.
 multisetosum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 386.—Afr. austr.
 nataglencoense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 314.—Natal.
 nervosum, *Hua, Contr. Fl. Congo Franç.* 18 (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x.)—Afr. trop.
 nudicaule, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 384.—Afr. austr.
 papillosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 360.—Afr. trop.
 Pappi, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 388.—Afr. austr.
 patulum, *Baker, l. c.* 386.—Afr. austr.
 pilosum, *Baker, l. c.* 395 (non *Jacq.*)—Afr. austr.
 polyphyllum, *Baker, l. c.* 388.—Afr. austr.
 platyphyllum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 473.—Mexic.
 pumilum, *Hua, Contr. Fl. Congo Franç.* 20 (*Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x.)—Afr. trop.
 robustum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 386.—Afr. austr.
 Saundersiae, *Baker, l. c.* 384.—Afr. austr.
 serpentinum, *Baker, l. c.* 387.—Afr. austr.
 Sprengii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 127.—Bolivia.
 subcontortum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 390.—Afr. austr.
 tabulare, *Baker, l. c.* 391.—Afr. austr.
 tortifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 315.—Afr. austr.
 transvaalense, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 384.—Afr. austr.
 trichophlebium, *Baker, l. c.* 382.—Afr. austr.
 triphyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 485.—Afr. trop.
 ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 360.—Afr. trop.
 usseramense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 486.—Afr. trop.
 Whytel, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 285.—Afr. trop.
 Zeyheri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xv. 298 = *Caesia eckloniana*.
- ANTHISTIRIA**, Linn. (Gramin.)
 arguta, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 401 = *Iseilema arguta*.
 heteroclita, *Roxb. Fl. Ind.* i. 249 = *Pseudanthistiria heteroclita*.
 Hookeri, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 91.—Reg. Himal.
 latifolia, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb.* ii. 562 = *Andropogon Cymbarius*.
 laxa, *Anderss. in Nov. Act. Upsal.* Ser. III. ii. 243.—Ind. or.
 linneana, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 401 = *Iseilema Wightii*.
 prostrata, *Willd. Sp. Pl.* iv. 901 = *Iseilema Wightii*.
 semiberbis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 125 = *ciliata*.
 strigosa, *Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 214.—Ind. or.
 Thwaitesii, *Hook. f. l. c.* 215.—Ind. or.
 Wightii, *Nees, in Steud. Syn. Pl. Gram.* 400 = *Iseilema Wightii*.
- ANTHOEMBIX**, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 567. **MONIMIACEAE.**
 hospitans, *Perkins, l. c.* (= *Kibara hospitans*).—N. Guin.
 oligantha, *Perkins, l. c.* 568.—N. Guin.
- ANTHOCARAPA**, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 343 (1896). **MELIACEAE.**
 balansana, *Pierre, l. c.* (= *Amoora balansana*).—Cochinch.
 Vieillardii, *Pierre, l. c.* (= *Amoora Vieillardii*).—Cochinch.
- ANTHOCEPHALUS**, A. Rich. (Rubiaceae).
 macrophyllum, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 23 (= *Nuclea macrophylla*).—Arch. Mal.

ANTHOCHLOA, Nees & Meyen (Gramin.)

- colusana, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 221 (= *Neostaffia colusana*).—Am. bor.

ANTHOCHORTUS, Endl. = **Antochortus**, Nees (Restiac.)

- kamerunensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 125.—Afr. trop.
 lanceolata, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
 liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 96.—Afr. trop.
 Zenkeri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 124.—Afr. trop.

ANTHOLYZA, Linn. (Irid.)

- Duffii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 13.—Afr. austr.
 pulchrum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 581.—Afr. austr.
 spectabilis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 13.—Afr. trop.
 watsonioides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 376.—Afr. trop.

ANTHOSPERMUM, Linn. (Rubiaceae)

- ericifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 117 = *A. Lichtensteinii*.
 Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 342.—Afr. austr.
 ternatum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 499.—Afr. trop.
 Welwitschii, *Hiern, l. c.* 500.—Afr. trop.

ANTHOXANTHUM, Linn. (Gramin.)

- dregeanum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 466.—Afr. austr.
 Ecklonii, *Stapf, l. c.*—Afr. austr.
 madagascariense, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 287.—Madag.
 Tongo, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 466.—Afr. austr.

ANTHRISCUS, Bernh. (Umbellif.)

- hispanicus, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 183.—Eur.

ANTHURIUM, Schott (Arac.)

- acutangulum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 371.—Am. cent.
 acutifolium, *Engl. l. c.* 365.—Am. cent.
 acutissimum, *Engl. l. c.* 398.—Ecuador.
 andinum, *Engl. l. c.* 405.—Ecuador.
 angosturense, *Engl. l. c.* 378.—N. Granat.
 angustilaminatum, *Engl. l. c.* 411.—Ecuador.
 angustisectum, *Engl. l. c.* 391.—N. Granat.
 aureum, *Engl. l. c.* 414.—N. Granat.
 barbadosense, *Engl. l. c.* 404.—Ind. occ.
 Buenaventurae, *Engl. l. c.* 363.—N. Granat.
 buganum, *Engl. l. c.* 425.—N. Granat.
 bulaoanum, *Engl. l. c.* 432.—Ecuador.
 calense, *Engl. l. c.* 440.—N. Granat.
 Caramantae, *Engl. l. c.* 424.—N. Granat.
 coeruleascens, *Engl. l. c.* 446.—Ecuador.
 columbianum, *Engl. l. c.* 379.—N. Granat.
 cordatum, *Engl. l. c.* 368 = *cordifolium*.
 costaricense, *Engl. l. c.* 398.—Am. cent.
 crassipes, *Engl. l. c.* 400.—Bras.
 crassivenium, *Engl. l. c.* 390.—N. Granat.
 cubense, *Engl. l. c.* 364.—Ind. occ.
 cuenzanum, *Engl. l. c.* 449.—Ecuador.
 cundinamarcense, *Engl. l. c.* 446.—N. Granat.
 daguense, *Engl. l. c.* 422.—N. Granat.
 deflexum, *Engl. l. c.* 397.—N. Granat.
 densinervium, *Engl. l. c.* 386.—Am. cent.
 Donnell-Smithii, *Engl. l. c.* 389.—Am. cent.
 Durandii, *Engl. l. c.* 401.—Am. cent.
 Dussii, *Engl. l. c.* 403.—Ind. occ.
 ecuadorensis, *Engl. l. c.* 408.—Ecuador.
 Eggersii, *Engl. l. c.* 405.—Ecuador.
 Eichleri, *Engl. l. c.* 396.—Bras.
 eximium, *Engl. l. c.* 412.—Am. cent.
 filiforme, *Engl. l. c.* 376.—N. Granat.
 firmum, *Engl. l. c.* 460.—Am. cent.
 flavoviride, *Engl. l. c.* 447.—N. Granat.
 fortinense, *Engl. l. c.* 366.—Mexic.
 funiferum, *Klotzsch & Karst. ex Engl. l. c.* 381.—N. Granat.
 giganteum, *Engl. l. c.* 448.—Ecuador.
 gracile, *Engl. l. c.* 370 = *rudgeanum*.
 gracillimum, *Engl. l. c.* 371.—N. Granat.
 gualeanum, *Engl. l. c.* 424.—Ecuador.
 guanacense, *Engl. l. c.* 444.—N. Granat.
 guayaquilense, *Engl. l. c.* 373.—Ecuador.
 hacumense, *Engl. l. c.* 363.—Am. cent.

ANTHURIUM—

- Hieronimi, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 386.—Ecuador.
 incurvatum, *Engl. l. c.* 445.—Ecuador.
 incurvum, *Engl. l. c.* 433.—N. Granat.?
 insculptum, *Engl. l. c.* 413.—Bras.
 inzanum, *Engl. l. c.* 450.—N. Granat.
 karstenianum, *Engl. l. c.* 383.—N. Granat.
 Lehmannii, *Engl. l. c.* 429.—N. Granat.
 Lievenii, *Regel, ex Engl. l. c.* 388.—Hab.
 lindmannianum, *Engl. l. c.* 367.—Bras.
 linearifolium, *Engl. l. c.* 370.—N. Granat.
 littorale, *Engl. l. c.* 405.—Am. cent.
 longegeniculatum, *Engl. l. c.* 379.—N. Granat.
 longicaudatum, *Engl. l. c.* 388.—Ecuador.
 longicuspdatum, *Engl. l. c.* 416.—Bras.
 longilaminatum, *Engl. l. c.* 399.—Bras.
 longipetiolatum, *Engl. l. c.* 400.—Bras.
 longistamineum, *Engl. l. c.* 439.—N. Granat.
 Mendonçai, *Engl. l. c.* 416.—Bras.
 monticolum, *Engl. l. c.* 387.—N. Granat.
 Mourai, *Engl. l. c.* 416.—Bras.
 multinervium, *Engl. l. c.* 389.—N. Granat.
 napaeum, *Engl. l. c.* 407.—Ecuador.
 nicolasianum, *Engl. l. c.* 433.—Ecuador.
 nigrescens, *Engl. l. c.* 441.—N. Granat.
 nitidulum, *Engl. l. c.* 397.—Bras.
 nobile, *Engl. l. c.* 366.—Bras.
 obtegens, *Engl. l. c.* 443.—N. Granat.
 ochraceum, *Engl. l. c.* 438.—N. Granat.
 organense, *Engl. l. c.* 415.—Bras.
 ortegianum, *Engl. l. c.* 337.—N. Granat.
 ovatifolium, *Engl. l. c.* 437.—Ecuador.
 pallatangense, *Engl. l. c.* 385.—Ecuador.
 pallidiflorum, *Engl. l. c.* 395.—Ecuador.
 paludosum, *Engl. l. c.* 401.—N. Granat.
 paraguayense, *Engl. l. c.* 361.—Parag.
 pergamentaceum, *Engl. l. c.* 442.—N. Granat.
 peripense, *Engl. l. c.* 412.—Ecuador.
 pichinchae, *Engl. l. c.* 426.—Ecuador.
 Pittieri, *Engl. l. c.* 372.—Am. cent.
 pulchrum, *Engl. l. c.* 449.—Ecuador.
 punctatum, *Engl. l. c.* 404.—Ecuador.
 ranchoanum, *Engl. l. c.* 421.—Am. cent.
 rigidifolium, *Engl. l. c.* 444.—Ecuador.
 rivulorum, *Engl. l. c.* 443.—N. Granat.
 rubriflorum, *Engl. l. c.* 399.—Bras.
 sarmentosum, *Engl. l. c.* 375.—Ecuador.
 Seleri, *Engl. l. c.* 459.—Am. cent.
 silvicolum, *Engl. l. c.* 402.—N. Granat.
 sodiroanum, *Engl. l. c.* 412.—Ecuador.
 Stuebelii, *Engl. l. c.* 391.—N. Granat.
 subandinum, *Engl. l. c.* 377.—Ecuador.
 subcaudatum, *Engl. l. c.* 427.—N. Granat.
 subcoerulescens, *Engl. l. c.* 391.—Ecuador.
 subdeltoideum, *Engl. l. c.* 451.—Ecuador.
 sulcatum, *Engl. l. c.* 402.—Am. cent.
 supianum, *Engl. l. c.* 438.—N. Granat.
 Talamancae, *Engl. l. c.* 386.—Am. cent.
 tenerum, *Engl. l. c.* 377.—N. Granat.
 tenuicaule, *Engl. l. c.* 381.—Ecuador.
 tenuifolium, *Engl. l. c.* 413.—Ecuador.
 theresopolitanum, *Engl. l. c.* 415.—Bras.
 Tonduzii, *Engl. l. c.* 376.—Am. cent.
 torresianum, *Engl. l. c.* 428.—Am. cent.
 triangulum, *Engl. l. c.* 383.—Am. cent.
 truncicolum, *Engl. l. c.* 452.—Ecuador.
 tsakianum, *Engl. l. c.* 423.—Am. cent.
 Tuerckheimii, *Engl. l. c.* 380.—Guatem.
 turrialbense, *Engl. l. c.* 406.—Am. cent.
 umbricolum, *Engl. l. c.* 407.—N. Granat.
 velutinum, *Engl. l. c.* 433.—N. Granat.?
 viridescens, *Engl. l. c.* 428.—N. Granat.
 Wulschlaegelii, *Engl. l. c.* 434.—Ind. occ.
 yarumalense, *Engl. l. c.* 441.—N. Granat.

ANTIARIIS, Lesch. (Urtic.).

- seylanica*, Seem. in *Bonplandia*, x. (1862) 4, in nota
 = toxicaria.

ANTIDAPHNE, Poepp. & Endl. (Loranth.).

- Fendleri*, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.*
 133 (= *Stachyphyllum Fendleri*).—Venez.

ANTIDESMA, Burm. (Euphorb.).

- celebicum*, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix.
 625.—Celebes.
polyanthum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,*
 392.—N. Guin.
Standtii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 327.—Afr. trop.

ANTIRRHINUM, Tourn. (Scrophul.).

- arvense*, Bub. Fl. Pyren. i. 324 = *A. Orontium*.
pulverulentum, *Laz. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.*
 xxix. 164.—Eur.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. i. 324 = *majus*.

ANTIRRHOEA, Comm. (Rubiace.).

- acutata*, Urb. Symb. Antill. i. 439 = *viscosa*.
coriacea, *Urb. l. c.* 436 (= *Guettarda coriacea*).—Ind. occ.
jamaicensis, Urb. l. c. 435 = *bifurcata*.
mucronata, Urb. l. c. 440.—Ind. occ.
obtusifolia, Urb. l. c. 435.—Ind. occ.
radiata, Urb. l. c. (= *Stenostemon radiatum*).—Ind. occ.
Sintenisii, Urb. l. c. 438.—Ind. occ.
tenuiflora, Urb. l. c.—Ind. occ.

ANTOCHORTUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst.

- ed. II. 451 (1836). **RESTIACEAE**.
Ecklonii, Nees, l. c.—Afr. austr.

ANTROCARYON, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.

- n. s. i. (1898) 23. **ANACARDIACEAE**.
klaineanum, Pierre, l. c. 24.—Afr. trop.

ANUBIAS, Schott (Aroid.).

- auriculata*, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 423.—Afr. trop.
nana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

APALATOA, Aubl. = *Crudia*, Schreb. (Legum.).

- chrysantha*, Pierre, Fl. Cochinch. t. 384.—Cochinch.
delagoensis, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 39.—
 Afr. austr.

APHANIA, Blume = *Sapindus*, Linn. (Sapind.).

- golungensis*, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 170.—Afr. trop.

APHANOMIXIS, Blume = *Amoora*, Roxb. (Meliac.).

- amboinensis*, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 iv. 296 = *A. amboinensis*.
borneensis, Harms, l. c. = *A. borneensis*.
cochinchinensis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 343 B.—
 Cochinch.
cumingiana, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 iv. 296 = *A. cumingiana*.
Lauterbachii, Harms, in *K. Schum. & Lauterb. Fl.*
Deutsch. Südsee, 383.—N. Guin.
macrocalyx, Harms, l. c. 384.—N. Guin.
myrmecophila, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 iv. 296 = *A. myrmecophila*.

APHANOMYRTUS, Miq. (Laurac.).

- camphorata*, *Valet. in Ann. Jard. Buitenz. Suppl.* ii.
 149.—Java.
octandra, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.*
 ii. 5.—Java.

APHANOPAPPUS, Endl. = *Lipochaeta*, DC.

- (Compos.).
micranthus, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 914 = *L. mi-*
crantha.

APHANOPLEURA, Boiss. (Umbellif.).

- capillifolia*, *Lipsky, in Bull. Acad. Sci. Pétersb. Sér.*
 V. iv. 379.—As. cent.
leptoclada, *Lipsky, l. c.* 377.—As. cent.

APHANOSTYLIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.

- n. s. i. (1898) 89. **APOCYNACEAE**.
exserens, Pierre, l. c. 90 (= *Carpodinus exserens*).—
 Afr. trop.
flavidiflora, Pierre, l. c. (= *Carpodinus flavidiflora*).
 —Afr. trop.
laxiflora, Pierre, l. c. (= *Carpodinus laxiflora*).—Afr.
 trop.
leptantha, Pierre, l. c. 89 (= *Carpodinus leptantha*).
 —Afr. trop.
Mannii, Pierre, l. c. (= *Clitandra Mannii*).—Afr. trop.
pyramidata, Pierre, l. c.—Hab.?

APHELANDRA, R. Br. (Acanth.).

- Blandii*, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 656.—
 N. Granat.
castanaefolia, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900,
 78.—Bolivia.
dolichantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii.
 438.—Am. cent.
impressa, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 657.—Venez.
kolobantha, *Lindau, in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 39.—Bolivia.
Rusbyi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 77.
 —Bolivia.

APHYLLOCHIS, Blume (Orchid.).

- alpina*, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii.
 261.—Ind. or.
parviflora, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.*
 lxx. 128.—Reg. Himal.

APINELLA, Neck. = *Trinia*, Hoffm. (Umbellif.).

- glauca*, Druce, Fl. Berks. 235 = *T. vulgaris*.

APIOS, Moench (Legum.).

- priceana*, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 451.—
 Am. cent.

APIUM, Tourn. (Umbellif.).

- dissectum*, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 viii. 185 (= *Petroselinum dissectum*).—N. Granat.
fernandezianum, *Johow, Estud. Fl. Juan Fernandez,*
 101.—Ins. Juan Fernandez.
Ikenoi, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 viii. 185 (= *Apodicarpum Ikenoi*).—Japon.
Lingula, *Drude, l. c.* (= *Oreosciadium Lingula*).—
 N. Granat.
seubertianum, Koehne, in *Just, Jahresb.* xxv. ii. 454,
 sphalm. = *Ammi seubertianum*.
trifoliatum, Koehne, l. c. sphalm. = *Ammi trifoliatum*.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 344 = *graveolens*.

APLOPAPPUS, Cass. (Compos.).

- insecticuriis*, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900,
 346.—Am. bor.
laceratus, *Hend. l. c.* 347.—Am. bor.
MacLeanii, *Brandege, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 448.
 —Am. bor.

APLUDA, Linn. (Gramin.).

- aristata*, Linn. Cent. ii. 7 = *varia*.
ciliata, Anderss. in *Oefver. Vet. Acad. Stockh.* 1855,
 177 = *varia*.
communis, Nees & Arn. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix.
 Suppl. i. 194 = *varia*.
geniculata, Roxb. Fl. Ind. i. 327 = *varia*.
gigantea, Spreng. Syst. i. 290 = *varia*.
Gryllus, Beauv. Agrost. 133 = *varia*.
microstachya, Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl.
 i. 194 = *varia*.
mutica, Linn. Sp. Pl. 82 = *varia*.
rostrata, Arn. & Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix.
 Suppl. i. 194 = *varia*.
rugosa, Russ. ex Wall. *Cat. n.* 8864 A = *Ischaemum*
rugosum.
scabra, Anderss. in *Oefver. Vet. Acad. Stockh.* 1855,
 179 = *varia*.
villosa, Schreb. *Graes.* ii. 92 = *varia*.

APOCOPIS, Nees (Gramin.).

- pallida*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 143.—Ind. or.

APOCYNUM, Tourn. (Apocyn.).

- album*, *Greene, Pittonia*, iii. 230.—Am. bor.
medium, *Greene, l. c.* 229.—Am. bor.
nemorale, *G. S. Mill. in Proc. Biol. Soc. Washington,*
 xiii. 87.—Am. bor.
speciosum, *G. S. Mill. l. c.* 83.—Am. bor.
urceolifer, *G. S. Mill. l. c.* 85.—Am. bor.

APODYTES, E. Mey. (Oclacin.).

- javanica*, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.*
 ii. 3.—Java.

APONOGETON, Linn. f. (Naiad.).

- desertorum*, Zeyher, ex Steud. *Nom. ed.* II. i. 114 =
kraussianum.
kraussianum, *Hochst. ex Krauss, in Flora,* 1845, 343.
 —Afr. austr.
leptostachyum, E. Meyer, ex Baker, in *Trans. Linn.*
Soc. xxix. 158 = *kraussianum*.
Loriae, *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.*
 iii. 472.—N. Guin.

APOROSA, Blume (Euphorb.).

- Minahassae*, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix.
 625.—Celebes.

APORRHIZA, Radlk. (Sapind.).

- multijuga*, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 306.—Afr. trop.
urophylla, *Gilg, l. c.* 305.—Afr. trop.

APPENDICULA, Blume (Orchid.).

- calcarata*, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 302.—
 Borneo.
complanata, *Ridley, l. c.* xxxii. 389.—Penins. Mal.

APPENDICULA :—

frutex, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 302.—Malaya.
longipedunculata, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1899, 182.—
Celebes.
lucida, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 392.—
Penins. Mal.
rupestris, *Ridley*, l. c. 391.—Penins. Mal.
uncata, *Ridley*, l. c. 390.—Penins. Mal.

APTANDRA, Miers (Oclacin).

Zenkeri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.*
147.—Afr. trop.

APTERANTHES, Miq. = **Boucerosia**, Wight & Arn.
(Asclep.).

europaea, Murb. in *Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II.
no. 7. (1898) 2 = B. Gussonian.

APTOSMUM, Burch. (Scrophul.).

Randii, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1899, 171.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 755.—Afr.
trop.

AQUILARIA, Lam. (Thymel.).

tomentosa, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 145.—N. Guin.

AQUILEGIA, Tourn. (Ranunc.).

akitensis, *Huth*, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 1090.—Japon.
australis, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 466.
—Am. bor.
coccinea, *Small*, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 280.—
Am. bor.
Darwazi, *Korsh.* in *Bull. Acad. Ptersb.* ix. 401.—
Turkestan.
depauperata, *M. E. Jones*, *Contrib. Western Bot.* viii.
1.—Am. bor.
elegantula, *Greene*, *Pittonia*, iv. 14.—Am. bor.
lamariensis, *Nelson*, *First Rep. Fl. Wyom.* 78.—Am.
bor.
saximontana, *Rydb.* in *U. S. Dept. Agric. Contrib.*
Nat. Herb. iii. 481.—Ins. Union.

ARABIS, Linn. (Crucif.).

albertina, *Greene*, *Pittonia*, iv. 196.—Am. bor.
arenicola, *Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* 1898, 290 (= *Parrya*
arenicola).—Am. arct.
arida, *Greene*, *Pittonia*, iv. 190.—Am. bor.
atriflora, *Suksd.* in *Deutsch. Bot. Monatschr.* xvi.
211.—Am. bor.
Bourgovii, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 186.
—Am. bor.
brebneriana, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898,
373.—Am. bor.
campylobola, *Greene*, *Pittonia*, iv. 192.—Am. bor.
carnulosa, *Tscherning*, in *Delect. Pl. Furjev.* 1900,
42.—Austria.
connexa, *Greene*, *Pittonia*, iv. 197.—Am. bor.
consanguinea, *Greene*, l. c. 190.—Am. bor.
Crandallii, *Robinson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 185.
—Am. bor.
densicaulis, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 190.
—Am. bor.
dispar, *M. E. Jones*, *Contrib. Western Bot.* viii. 41.—
Am. bor.
divaricarpa, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 193.
—Am. bor.
Doerfleri, *Halacsy*, *Consp. Fl. Graec.* i. 51.—Graecia.
drepanoloba, *Greene*, *Pittonia*, iii. 306.—Am. bor.
duriuscula, *Greene*, l. c. iv. 191.—Am. bor.
elegans, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 192.—
Am. bor.
eremophila, *Greene*, *Pittonia*, iv. 194.—Am. bor.
exilis, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 123.
—Am. bor.
Fauriei, *Boissieu*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 787.—
Japon.
Fendleri, *Greene*, *Pittonia*, iii. 156.—Am. bor.
formosa, *Greene*, l. c. iv. 198.—Am. bor.
fruticosa, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 190.—
Am. bor.
glaucula, *Boissieu*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 786.—Japon.
glaucovalvula, *M. E. Jones*, *Contrib. Western Bot.*
viii. 40.—Am. bor.
gracilentia, *Greene*, *Pittonia*, iv. 194.—Am. bor.
graciliceps, *Greene*, l. c. 193.—Am. bor.
karategina, *Lipsky*, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 5.—As.
cent.
Koehlerii, *Howell*, *Fl. N. W. Amer.* 44.—Am. bor.
lignifera, *Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 123.
—Am. bor.

ARABIS :—

lignipes, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 191.—
Am. bor.
magellanica, *P. Dusen*, in *Ergebn. Schwed. Exp. Magell.*
iii. v. 177 (= *Sisymbrium magellanicum*).—Reg.
Magell.
maxima, *Greene*, *Pittonia*, iv. 192.—Am. bor.
oxylobula, *Greene*, l. c. 195.—Am. bor.
oxyphylla, *Greene*, l. c. 196.—Am. bor.
pendulocarpa, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 192.
—Am. bor.
platyloba, *Greene*, *Pittonia*, iv. 198.—Am. bor.
pseudoauriculata, *Boissieu*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii.
787.—Japon.
recondita, *Greene*, *Pittonia*, iv. 195.—Am. bor.
rectissima, *Greene*, l. c. 191.—Am. bor.
rhodantha, *Greene*, l. c. iii. 155.—Am. bor.
sogdiana, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Ptersb.* xxvi. 89.
—Turkestan.
Suksdorfii, *Howell*, *Fl. N. W. Amer.* 43.—Am. bor.
tenuis, *Greene*, *Pittonia*, iv. 189.—Am. bor.

ARACHIS, Linn. (Legum.).

Hagenbeckii, *Harms*, *ex Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 52.
—Parag.

ARAGALLUS, Neck. Elem. Bot. iii. 12 = **Astragalus**,
Tourn. (Legum.).

acutirostris, *A. A. Heller*, *Cat. N. Am. Pl.* 4 = A. acu-
tirostris.
albiflorus, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 62.—Am. bor.
alpicola, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 252.—
Am. bor.
arcticus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis arctica*).
—Geront. arct.
argophyllus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i.
255.—Am. bor.
Bellii, *Greene*, *Pittonia*, iii. 212 (= *Spiesia Bellii*).—
Am. bor.
Besseyi, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 250.—
Am. bor.
Bigelovii, *Greene*, *Pittonia*, iii. 212.—Am. bor.
Blankinshipii, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 58.—Am.
bor.
campestris, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis*
campestris).—Reg. bor. temp. et arct.
caudatus, *Greene*, l. c. iv. 69.—Am. bor.
collinus, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 57.—Am. bor.
deflexus, *A. A. Heller*, *Cat. N. Am. Pl.* 4 (= *Oxy-*
tropis deflexa).—Reg. bor. temp. et arct.
dispar, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 61.—Am. bor.
foetidus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis foe-*
tida).—Eur.
foliolosus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 256
(= *Oxytropis foliolosa*).—Am. bor.
gracilis, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 60.—Am. bor.
grandiflorus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis*
grandiflora).—As. bor.
inflatus, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 59 (= *Oxytropis*
podocarpa).—Am. bor.
involutus, *A. Nelson*, l. c. 64.—Am. bor.
johannensis, *A. A. Heller*, *Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 7.
—Am. bor.
Lagopus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 212 (= *Oxytropis*
Lagopus).—Am. bor.
Lamberti, *Greene*, l. c. (= *Oxytropis Lamberti*).—
Am. bor.
leucanthus, *Greene*, l. c. 211 (= *Oxytropis leucantha*).
—As. bor.
mertensianus, *Greene*, l. c. (= *Oxytropis mertensiana*).
Fret. Behring.
montanus, *Greene*, l. c. 210 (= *Oxytropis montana*).—
Eur.
monticola, *Greene*, l. c. 212 (= *Oxytropis monticola*).—
Am. bor.
multiceps, *A. A. Heller*, *Cat. N. Am. Pl.* 4 (= *Oxy-*
tropis multiceps).—Am. bor.
nanus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 212 (= *Oxytropis nana*).
—Am. bor.
nigrescens, *A. A. Heller*, *Cat. N. Am. Pl.* 4 (= *Oxy-*
tropis nigrescens).—Reg. bor.
nothoxys, *A. A. Heller*, l. c. (= *A. nothoxys*).—Am. bor.
oreophilus, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1899, 59 (= *Oxy-*
tropis oreophila).—Am. bor.
Parryi, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis Parryi*).
—Mexic.
pinetorum, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*,
1899, 548.—Am. bor.

ARAGALLUS :—

Richardsonii, *Greene*, *Pittonia*, iv. 69.—Am. bor.
saximontanus, *A. Nelson*, in *Erythea*, 1900, 190 =
albiflorus.
sericeus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 212 (= *Oxytropis*
sericea).—Am. bor.
songaricus, *Greene*, l. c. 211 (= *Oxytropis songarica*).
—As. bor.
splendens, *Greene*, l. c. (= *Oxytropis splendens*).—
Am. bor.
spicatus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 251 =
albiflorus.
uralensis, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis*
uralensis).—Eur. et As. bor.
verticillaris, *Greene*, l. c. (= *Oxytropis verticillaris*).—
As. bor.
viscidulus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 253.
—Am. bor.
viscidus, *Greene*, *Pittonia*, iii. 211 (= *Oxytropis*
viscida).—Reg. bor. temp. et arct.

ARALIA, Tourn. (Aral.).

atropurpurea, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 301.—
China.
Fargesii, *Franch.* l. c. 302.—China.
glabra, *Matsum.* in *Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 17.—Japon.
Henryi, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 12 (15 Sept.
1896).—China.
pilosa, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 302 (16 Sept.
1896) = Henryi.
stipulata, *Franch.* l. c. 304.—China.
tomentella, *Franch.* l. c.—China.
yunnanensis, *Franch.* l. c. 303.—China.

ARALIOPSIS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.
iv. (1896) 175. **RUTACEAE.**

Soyauxii, *Engl.* l. c. 177.—Afr. trop.

ARBUTUS, Tourn. (Ericac.).

vulgaris, *Bub.* Fl. Pyren. ii. 7 = A. Unedo.

ARCEUTHOBIUM, Bieb. (Loranth.).

Juniperi, *Bub.* Fl. Pyren. i. 181 = A. Oxycedri.

ARCHIDENDRON, F. Muell. (Legum.).

chrysocarpum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.*
Südsee, 344.—N. Guin.
glabrum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 343 (= *Hanse-*
mannia glabra).—N. Guin.
incurvatum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 344.—N. Guin.
kubaryanum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* (= *Pitheco-*
lobium kubaryanum).—N. Guin.

ARCHIPHYLLUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.
Fr. xliii. (1896) 557. **SANTALACEAE.**

brachystachyum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron*
brachystachyum).—Reg. Magell.
macrophyllum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron*
macrophyllum).—Chili.
oblongifolium, *Van Tiegh. l. c.* (= *Myzodendron*
oblongifolium).—Chili.

ARCHONTOPHOENIX, H. Wendl. & Drude
(Palm.).

Jardinei, *F. M. Bailey*, in *Queensl. Agric. Journ.* ii.
129.—Austral.

ARCION, *Bub.* Fl. Pyren. ii. (1900) 123 = **Arctium**,
Linn. (Compos.).

majus, *Bub.* l. c. 124 = A. majus.
minus, *Bub.* l. c. 125 = A. minus.
tomentosum, *Bub.* l. c. 124 = A. majus.

ARCTERANTHIS, *Greene*, *Pittonia*, iii. (1897) 190.
RANUNCULACEAE.

Cooleyae, *Greene*, l. c. (= *Ranunculus Cooleyae*).—
Am. sept.

ARCTOSTAPHYLOS, *Adans.* (Ericac.).

canescens, *Eastw.* in *Proc. Calif. Acad. Ser.* III. i. 84.
—Am. bor.
glandulosa, *Eastw. l. c.* 82.—Am. bor.
montana, *Eastw. l. c.* 83.—Am. bor.

ARCTOTIS, Linn. (Compos.).

parvifolia, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 218.—
Afr. austr.

ARCYTOPHYLLUM, Willd. = **Mallostoma**, *Karst.*
(Rubiace.).

lavarum, *K. Schum.* ex *Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 36 =
M. lavarum.

ARDISIA, Sw. (Myrsin.).

- arborea, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz. ii. 5.—Java.
 auriculata, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 395.—Am. cent.
 brachybotrys, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 488.—N. Guin.
 brevicaulis, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 519.—China.
 diversifolia, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xxxiii. 249.—Java.
 glaucifolia, Urb. Symb. Antill. i. 382.—Ind. occ.
 hospitans, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 490.—N. Guin.
 melanosticta, K. Schum. & Lauterb. l. c. 489.—N. Guin.
 palmana, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 434.—Am. cent.
 pendula, Urb. Symb. Antill. i. 383.—Ind. occ.
 pleurobotrya, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxv. 148.—Am. cent.
 purpurascens, Urb. Symb. Antill. i. 384.—Ind. occ.
 Schlechteri, Gilg, in Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped. 303, nomen.—Afr. trop.
 Sintensis, Urb. Symb. Antill. i. 381.—Ind. occ.
 spicigera, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 434.—Am. cent.
 stenophylla, Donn. Sm. l. c. xxiv. 395.—Am. cent.
 subanceps, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 489.—N. Guin.
 yunquensis, Urb. Symb. Antill. i. 383.—Ind. occ.

ARDUINA, Mill. = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).

- Campanoni, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1222.—Madag.

ARECHA VALETAIA, Speg. in Anal. Soc. Ci.

- Argent. xvii. (1898) 9. **SAMYDACEAE**.
 uruguayensis, Speg. l. c. 10.—Urug.

AREGELIA, Kuntze = **Karatas**, Plum. (Bromel.).

- ampullacea, Mez, in DC. Monogr. Phan. ix. 64 = K. ampullacea.
 Binoti, Mez, l. c. 82 = K. Binoti.
 carcharodon, Mez, l. c. 78 = K. carcharodon.
 Carolinae, Mez, l. c. 74 = K. Carolinae.
 chlorosticta, Mez, l. c. 65 = K. chlorosticta.
 compacta, Mez, l. c. 73 (= *Nidularium compactum*).—Bras.
 concentrica, Mez, l. c. 81 = K. acanthocrater.
 coriacea, Mez, l. c. 77 = K. coriacea.
 cruenta, Mez, l. c. 71 = K. cruenta.
 cyanea, Mez, l. c. 67 = K. denticulata.
 elegans, Mez, l. c. 69 = K. cyanea.
 Johannis, Mez, l. c. 84 = K. Johannis.
 Laurentii, Mez, l. c. 80 = K. Laurentii.
 leucophaea, Mez, l. c. 77 = K. leucophaea.
 longibracteata, Mez, l. c. 79.—Bras.
 marmorata, Mez, l. c. 76 = K. marmorata.
 morreniana, Mez, l. c. 72 = K. morreniana.
 princeps, Mez, l. c. 75 = K. princeps.
 sarmentosa, Mez, l. c. 66 = K. sarmentosa.
 spectabilis, Mez, l. c. 70 = K. spectabilis.
 tristis, Mez, l. c. 68 = K. tristis.

ARENARIA, Rupp. (Caryoph.).

- acutispala, Hausskn. ex Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 395.—As. Min.
 Baldaccii, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 237.—Eur.
 Benthamii, Edgew. in Hook. f. Fl. Br. Ind. i. 242 = glandulosa.
 Bertolonii, Fiori & Paol. Fl. Ital. i. 346.—Italy.
 boliviana, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 425.—Am. trop.
 Burkei, Howell, Fl. N. W. Amer. 85.—Am. bor.
 conferta, Wedd. in Ann. Sci. Nat. Sér. V. i. 293 = boliviana.
 ferruginea, Duthie, ex Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 410.—Reg. Himal.
 gayana, Williams, l. c. 422.—Corsica.
 Littledalei, Hems. in Kew Bull. 1896, 209.—Tibet.
 megalantha, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 379.—Mexic.; Reg. Argent.
 pinetorum, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 350.—Am. bor.
 pumicola, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xi. 169.—Am. bor.
 quadridentata, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 482 (= *Leprodiclis quadridentata*).—China.
 salmonensis, Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 343.—Am. bor.

ARENARIA :—

- subcongesta, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 244.—Am. bor.
 szechuensis, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 437.—China.
 texana, Britton, Fl. N. U. S. ii. 34.—Am. bor.
 uintahensis, Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 7.—Am. bor.

ARENKA, Labill. (Palm.).

- gracilicaulis, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 203.—N. Guin.

ARETHUSANTHA, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.

- xliv. (1897) 179. **ORCHIDAEAE**.
 bletioides, Finet, l. c.—Hab. ?

ARETIA, Hall. = **Androsace**, Linn. (Primul.).

- carnea, Bub. Fl. Pyren. i. 217 = A. carnea.
 elongata, Bub. l. c. 218 = A. elongata.
 maxima, Bub. l. c. 219 = A. maxima.
 villosa, Bub. l. c. 217 = A. villosa.

ARGEMONE, Tourn. (Papaver.).

- bipinnatifida, Greene, Pittonia, iii. 346.—Am. bor.
 gracilenta, Greene, l. c.—Am. bor.
 leiocarpa, Greene, l. c. 345.—Am. bor.
 sanguinea, Greene, l. c. iv. 68.—Am. bor.
 squarrosa, Greene, l. c.—Am. bor.

ARGENTINA, Lam. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

- Anserina, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 159 = P. Anserina.
 Egedii, Rydb. l. c. 158 = P. Egedii.

ARGITHAMNIA, Sw. (Euphorb.).

- Stahlii, Urb. Symb. Antill. i. 386.—Ind. occ.
 tinctoria, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 302.—Mexic.

ARGOPHYLLUM, Forst. (Saxifr.).

- nullumense, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiv. 439.—Austral.

ARGOSTEMMA, Wall. (Rubiace.).

- africanum, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 423.—Afr. trop.

ARGUSSIERA, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 123 = **Hippo-**

- phæ, Linn. (Elaeag.).
 rhamnoides, Bub. l. c. = H. rhamnoides.

ARGYREIA, Lour. (Convolv.).

- adpressa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 513 (= *Lettsomia adpressa*).—Malaya.
 Hieronymi, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 382 (= *Murucoa Hieronymi*).—Reg. Argent.
 Juramenti, K. Schum. l. c. (= *Murucoa Juramenti*).—Reg. Argent.
 Kurzii, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 513 (= *Lettsomia Kurzii*).—Malaya.
 penangiana, Boerl. l. c. (= *Lettsomia penangiana*).—Malaya.
 Peteri, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 382 = *Murucoa Peteri*.
 rubicunda, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 513 (= *Lettsomia rubicunda*).—Malaya.
 sumatrana, Boerl. l. c. (= *Lettsomia sumatrana*).—Sumatra.

ARGYROCALYMNA, K. Schum. & Lauterb. Fl.

- Deutsch. Südsee, 336 (1900). **SAXIFRAGACEAE**.
 arboreum, K. Schum. & Lauterb. l. c. 337.—N. Guin.

ARGYROLOBIUM, Eckl. & Zeyh. (Legum.).

- deflexiflorum, Baker, in Kew Bull. 1897, 253.—Afr. trop.
 dimidiatum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vii. 34.—Afr. austr.
 leucophyllum, Baker, in Kew Bull. 1897, 253.—Afr. trop.
 longipes, N. E. Br. in Kew Bull. 1897, 254.—Afr. austr.
 pachyphyllum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 441.—Afr. austr.
 transvaalense, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vii. 33.—Afr. austr.
 Wilmsii, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 233.—Afr. austr.

ARIOCARPUS, Scheidw. = **Mammillaria**, Haw.

- (Cact.).
 fissuratus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 550 = M. fissurata.

ARIOCARPUS :—

- furfuraceus, H. C. Thomps. in Rep. Missouri Bot. Gard. 1893, 130 = M. furfuracea.
 kotchubeyanus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 259 = M. sulcata.
 pulvilligeris, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 550 = M. pulvilligera.
 trigonus, K. Schum. l. c. = M. trigona.

ARISAEMA, Mart. (Aroid.).

- abbreviatum, Schott, Prodr. Syst. Aroid. 40 = flavum.
 Bockii, Engl. in Engl. Jahrb. xxix. 235.—China.
 davidianum, Engl. l. c. xxv. 27.—China.
 Harmandi, Engl. l. c. 27.—Cochinch.

ARISTARIA, Jungh. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).

- mutica, Hassk. in Tijdschr. Nat. Gesch. x. 117 = A. gigantea.

ARISTEA, Soland. (Irid.).

- Cooperi, Baker, Handb. Irid. 143 = majubensis.
 Goetzei, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 364.—Afr. trop.
 longifolia, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 576.—Afr. trop.
 melaleuca, Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. 236 = *Cleanthe bicolor*.
 montana, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 49.—Afr. austr.
 nandiensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 347.—Afr. trop.
 nyikensis, Baker, in Kew Bull. 1897, 281.—Afr. trop.
 palustris, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 96.—Afr. austr.
 polycephala, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 365.—Afr. trop.
 umbellata, Spreng. Syst. i. 158 = *Moraea edulis*.
 zombensis, Baker, in Kew Bull. 1897, 282.—Afr. trop.

ARISTIDA, Linn. (Gramin.).

- abyssinica, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 134 = Adscensionis.
 adscendens, Trim. Cat. Ceyl. Pl. 108 = setacea.
 angustata, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 556.—Afr. austr.
 articulata, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. 209 = mutabilis.
 brachypoda, Tausch, in Flora, xix. 506 = plumosa.
 bromoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 121 = Adscensionis.
 Burkei, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 557.—Afr. austr.
 chaetophylla, Steud. Syn. Pl. Gram. 420 = Adscensionis.
 circinalis, Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 6. 13.—Bras.
 coarctata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 122 = Adscensionis.
 cognata, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 127 = Adscensionis.
 Combsii, Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull. xxiv. 43.—Am. bor.
 curvata, Nees, ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 392 = Adscensionis.
 decorata, Steud. Syn. Pl. Gram. 228 = hirtigluma.
 delicatula, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 393 = cumingiana.
 dispersa, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 127 = Adscensionis.
 divaricata, Jacq. Eclog. 7. t. 6 = Adscensionis.
 Ehrenbergii, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 136 = Adscensionis.
 elatior, Cav. Ic. vi. 65 = Adscensionis.
 festucoides, Poir. Encyc. Suppl. i. 453 = Adscensionis.
 foenicularis, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 160 = funiculata.
 funicularis, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. i. 181 = funiculata.
 Heymannii, Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. 649 = Adscensionis.
 huillensis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 203.—Afr. trop.
 humilis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 121 = Adscensionis.
 hystricula, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. 208.—As. austr.
 Hystrix, Thunb. Prod. 19 = vestita.
 intermedia, Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Agrost. Bull. xxiv. 44.—Am. bor.
 jacquiniana, Tausch, in Flora, xix. 508 = Adscensionis.
 Kelleri, Hack. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 20. 10.—Afr. austr.
 kunthiana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1849) 151 = mutabilis.

ARISTIDA :—

- linarifolia*, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 300 = *Dichaetaria* Wightii.
macrochloa, Hochst. in Flora, 1855, 200 = *Adscensionis*.
mallica, Edgew. in Journ. Linn. Soc. vi. 209 = *funiculata*.
maritima, Steud. Syn. Pl. Gram. 137 = *Adscensionis*.
meccana, Hochst. ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 152 = *mutabilis*.
modatica, Steud. Syn. Pl. Gram. 139 = *Adscensionis*.
 Mohrii, Nash, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 436.—Am. bor.
montana, Rottl. ex Wall. Cat. n. 8912 B = *Garnotia scoparia*.
nana, Steud. Syn. Pl. Gram. 138 = *Adscensionis*.
nigrescens, Presl, Reliq. Haenk. i. 223 = *Adscensionis*.
oligophylla, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 711.—Ecuador.
pampeana, Speg. Contr. Fl. Ventana, 62.—Reg. Argent.
paniculata, Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 25 = *Adscensionis*.
paradisea, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. 11. 1219 = *hirtigluma*.
paraguayensis, Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 6. 14.—Parag.
piligera, Burch. ex Schult. Mant. ii. 478 = *ciliata*.
pogonophylla, Boiss. Fl. Orient. v. 496 = *hirtigluma*.
pusilla, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 140 = *Adscensionis*.
quingueseta, Steud. Syn. Pl. Gram. 420 = *setacea*.
raddiana, Savi, in Mem. Moden. (1837) 198 = *plumosa*.
royleana, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. (1849) 160 = *paniculata*.
Schimperi, Hochst. & Steud. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 143 = *hirtigluma*.
Schweinfurthii, Boiss. Fl. Orient. v. 493 = *mutabilis*.
sciurus, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 557.—Afr. austr.
simplicissima, Steud. Syn. Pl. Gram. 139 = *Adscensionis*.
spicata, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 226 = *mutabilis*.
spicigera, Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 136 = *Adscensionis*.
swartziana, Steud. Syn. Pl. Gram. 137 = *Adscensionis*.
tenella, Kurz, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 224 = *cumingiana*.
Teneriffae, Steud. Syn. Pl. Gram. 420 = *Adscensionis*.
tenuiflora, Steud. l. c. 139 = *Adscensionis*.
tenuis, Hochst. in Flora, xxviii. 200 = *mutabilis*.
trichodes, Walp. Ann. iii. 753 = *cumingiana*.
vulpioides, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. 251 = *Adscensionis*.
 Welwitschii, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 202.—Afr. trop.
 Zeyheri, Steud. Nom. ed. II. i. 132 = *capensis*.

ARISTOLOCHIA, Tourn. (Aristoloch.)

- Balansae*, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 311.—Tonkin.
boliviensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 271.—Bolivia.
bongoensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 488.—Afr. trop.
calceiformis, Urb. Symb. Antill. i. 300.—Ind. occ.
ceresensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 271.—Reg. Argent.
 Cobra, Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. i. 61.—Mexic.
convolvulacea, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 335.—Am. bor.
cortinata, Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 629.—Ins. Samoa.
 Curtisii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 161.—Penang.
 Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 315.—China.
densivenia, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 489.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 46.—Afr. trop.
echinata, Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio, v. 9.—Bras.
Esperanzae, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 272.—Parag.
gentilis, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 314.—China.
hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. i. 61.—Mexic.
melanoglossa, Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires, i. 83.—Reg. Argent.
polyrrhiza, Bub. Fl. Pyren. i. 119 = *A. Pistolochia*.
 Preussii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 492.—Afr. trop.
pyrenea, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 426.—Bras.
Schweinfurthii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 492.—Afr. trop.

VOL. III.

ARISTOLOCHIA :—

- setchuenensis*, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 312.—China.
 Staudtii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 491.—Afr. trop.
stenocarpa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 271.—Bolivia.
 Stuckerti, Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires, i. 84.—Reg. Argent.
thibetica, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 313.—China.
 Ulei, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 426.—Bras.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 313.—China.
 Zenkeri, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 490.—Afr. trop.
- ARJONA**, Comm. (Santal.).
tandilensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 283.—Reg. Argent.
- ARJONAEA**, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 283 (1898) = **Arjona**, Comm. (Santal.).
- ARMARINTEA**, Bub. Fl. Pyren. ii. 415 (1900) = **Cachrys**, Linn. (Umbellif.).
Morisonii, Bub. l. c. = *C. laevigata*.

ARMERIA, Linn. (Plumbagin.).

- bella*, Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata, vii. 385.—Fuegia.
dalmatica, R. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xiii. i. 16.—Eur.
lacmonica, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. 55.—Eur.

ARNICA, Rupp. (Compos.).

- amplexifolia*, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 434.—Am. bor.
arnoglossa, Greene, Pittonia, iv. 166.—Am. bor.
attenuata, Greene, l. c. 170.—Am. bor.
bernardina, Greene, l. c.—Am. bor.
betonicaefolia, Greene, l. c. 163.—Am. bor.
caespitosa, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 203.—Am. bor.
chionophila, Greene, Pittonia, iv. 171.—Am. bor.
columbiana, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 200.—Am. bor.
columbiana, Greene, Pittonia, iv. 159.—Am. bor.
crocea, Greene, l. c.—Am. bor.
denudata, Greene, l. c. iii. 105.—Am. bor.
diversifolia, Greene, l. c. iv. 171.—Am. bor.
eradiata, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 = *Parryi*.
exigua, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 202.—Am. bor.
gracilis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 297.—Am. bor.
grandifolia, Greene, Pittonia, iv. 172.—Am. bor.
incana, Greene, l. c. 169.—Am. bor.
Lessingii, Greene, l. c. 167.—Am. bor.
lonchophylla, Greene, l. c. 164.—Am. bor.
macilenta, Greene, l. c. 161.—Am. bor.
Macounii, Greene, l. c. 160.—Am. bor.
Merriami, Greene, l. c. 36.—Am. bor.
monocephala, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 435.—Am. bor.
multiflora, Greene, Pittonia, iv. 162.—Am. bor.
occreata, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 201.—Am. bor.
ovalifolia, Greene, Pittonia, iv. 168.—Am. bor.
ovata, Greene, l. c. 161.—Am. bor.
pedunculata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 297.—Am. bor.
polycephala, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 202.—Am. bor.
pumila, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 433.—Am. bor.
rivularis, Greene, Pittonia, iv. 163.—Am. bor.
Rydbergii, Greene, l. c. 36.—Am. bor.
scaberrima, Greene, l. c. 165.—Am. bor.
Sonnei, Greene, l. c. iii. 104.—Am. bor.
spathulata, Greene, l. c. 103.—Am. bor.
subcordata, Greene, l. c. iv. 173.—Am. bor.
subplumosa, Greene, l. c. iii. 104.—Am. bor.
teucrifolia, Greene, l. c. iv. 164.—Am. bor.
tomentella, Greene, l. c. 166.—Am. bor.
tomentosa, Macoun, in Ottawa Natural. 1899, 166.—Am. bor.
ventorum, Greene, Pittonia, iv. 173.—Am. bor.

ARNOSERIS, Gaertn. (Compos.).

- clavata*, Bub. Fl. Pyren. ii. 49 = *pusilla*.

ARRABIDAEA, DC. (Bignon.).

- ateramnantha*, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 68.—Bras.
carichanensis, Bureau & K. Schum. l. c. 62 (= *Bignonia carichanensis*).—Venez.
coleocalyx, Bureau & K. Schum. l. c. 35.—Am. austr.
divaricata, Bureau & K. Schum. l. c. 33.—Peruv.
egensis, Bureau & K. Schum. l. c. 65.—Bras.
elliptica, Bureau & K. Schum. l. c. 26.—Bras.
grandiflora, Hassl. in Bull. Herb. Boiss. vi. App. i. 26.—Parag.
guatemalensis, K. Schum. & Loes. in Engl. Jahrb. xxiii. 129.—Guatem.
japurensis, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 65 (= *Tabebuia japurensis*).—Bras.
lasiantha, Bureau & K. Schum. l. c. 72.—Bras.
lauta, Bureau & K. Schum. l. c. 43.—Bras.
lenticellosa, Bureau & K. Schum. l. c. 64.—Bras.
macrocarpa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 242.—Bolivia.
mazagana, Huber, in Bol. Mus. Para. ii. 512.—Bras.
mollissima, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 46 (= *Bignonia mollissima*).—Venez.
muehlbergiana, Hassl. in Bull. Herb. Boiss. vi. App. i. 25.—Parag.
multiflora, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 47.—Bras.
mutabilis, Bureau & K. Schum. l. c. 38.—Am. austr.
oligantha, Bureau & K. Schum. l. c. 63.—Bras.
parviflora, Bureau & K. Schum. l. c. 53 (= *Pithecoctenium parviflorum*).—Bras.
platyphylla, Bureau & K. Schum. l. c. 38 = *brachypoda*.
pliciflora, Bureau & K. Schum. l. c. 51 (= *Adenocalymna pliciflorum*).—Bras.
praecox, Hassl. in Bull. Herb. Boiss. vi. App. i. 25.—Parag.
quinquenervia, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 44.—Peruv.
rhodantha, Bureau & K. Schum. l. c.—Am. austr.
sordida, Bureau & K. Schum. l. c. 30 (= *Bignonia sordida*).—Guiana.
spicata, Bureau & K. Schum. l. c. 42.—Peruv.
subsertata, Bureau & K. Schum. l. c. 59.—Bras.
subverticillata, Bureau & K. Schum. l. c. 24.—Bras.
trichoclada, Bureau & K. Schum. l. c. 49 (= *Bignonia trichoclada*).—Bras.
xanthophylla, Bureau & K. Schum. l. c. 70 (= *Phyganocydia xanthophylla*).—Bras.
- ARRACACIA**, Bancr. (Umbellif.).
aegopodioides, Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad. i. 139 (= *Smyrnum aegopodioides*).—Mexic.
chiapensis, Coult. & Rose, l. c. 140.—Am. cent.
dissecta, Coult. & Rose, l. c. 141.—Am. cent.
Dugesii, Coult. & Rose, l. c.—Am. cent.
filiformis, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 296, nomen; et in Hook. Ic. Pl. t. 2429.—Mexic.
hemsleyana, Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad. i. 141.—Am. cent.
longipedunculata, Coult. & Rose, l. c. 142.—Am. cent.
montana, Coult. & Rose, l. c.—Am. cent.
rigida, Coult. & Rose, l. c. 143.—Am. cent.
- ARTABOTRYS**, R. Br. (Anonac.).
Antunesii, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 299.—Afr. trop.
aurantiacus, Engl. & Diels, l. c. 300.—Afr. trop.
congolensis, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 2.—Afr. trop.
dahomensis, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 299.—Afr. trop.
lanuginosa, Boerl. in Ic. Bogor. t. 52.—Borneo.
rosea, Boerl. l. c. t. 53.—Borneo.
stenopetalus, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 300.—Afr. trop.
- ARTANEMA**, D. Don (Scrophul.).
Cabrae, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 131.—Afr. trop.
- ARTEMISIA**, Linn. (Compos.).
aromatica, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 273.—Am. bor.
candicans, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 296.—Am. bor.
chewsurica, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. 1893, 130.—Reg. Caucas.
coloradensis, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 506.—Am. bor.

D

ARTEMISIA :—

- elator, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 430.—Am. bor.
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. ii. 211 = maritima.
 floccosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 297.—Am. bor.
 gracilentata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 35.—Am. bor.
 graveolens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 296.—Am. bor.
 Grenardi, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 823.—Tibet.
 kansana, *Britton, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 466.—Am. bor.
 latiloba, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 429.—Am. bor.
 microcephala, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 455 (non Hillebr.).—Am. bor.
 natronensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 485.—Am. bor.
 nova, *A. Nelson, l. c.* 1900, 274.—Am. bor.
 paniculata, Roxb. Fl. Ind. iii. 418 = pallens.
 paucicephala, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 35.—Am. bor.
 pseudopontica, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 168.—Eur.
 rhizomata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 34.—Am. bor.
 Sodiroy, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 55.—Ecuador.
 spiciformis, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 507.—Am. bor.
 subglabra, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 36.—Am. bor.
 tenuifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 214 = campestris.
 tenuis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 431.—Am. bor.
 tripartita, *Rydb. l. c.* 432.—Am. bor.

ARTHATHERUM, Beauv. = **Aristida**, Linn. (Gramin.).

- ciliatum*, Nees, in *Linnaea*, vii. 287 = *A. hirtigluma*.
elatum, Boiss. & Buhse, *Diagn. Ser. II.* iv. 123 = *A. hirtigluma*.
Hystrix, Nees, in *Linnaea*, vii. 287 = *A. vestita*.
lanuginosum, Burch. *Trav.* ii. 612 = *A. vestita*.
pogonoptilum, Jaub. & Spach, *Illustr.* iv. 56 = *A. hirtigluma*.
royleanum, Edgew. *ex Aitch. Cat. Panjab Pl.* 164 = *A. funiculata*.
Schimperi, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 178 = *A. funiculata*.
Zeyheri, Nees, *l. c.* 177 = *A. capensis*.

ARTHAXON, Beauv. (Gramin.).

- cuspidatus*, Hochst. in *Flora*, xxxix. 188 = ciliaris.
 inermis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 145.—Ind. or.
 micans, Hochst. in *Flora*, xxxix. 188 = ciliaris.
 spathaceus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 145.—Ind. or.
 submuticus, *Hochst. in Flora*, xxxix. 188.—As. or.

ARTHROPHYLLUM, Blume (Aral.).

- borneense, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 23.—Borneo.

ARTHROPODIUM, R. Br. (Liliac.).

- curvipes, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 227.—Austral.

ARUNDINARIA, Michx. (Gramin.).

- albomarginata*, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 30 = Veitchii.
 aristata, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 18.—Ind. or.
 armata, *Gamble, l. c.* 130.—Ind. or.
 auricomata, *Mitford, Bamb. Gard.* 100.—Hort.
 borealis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 20.—Japon.
 chartacea, *Makino, l. c.* 55.—Japon.
 Falconeri, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 20.—Ind. or.
 Fischeri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 351, nomen.—Afr. trop.
 Gallatlyi, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 23.—Ind. or.
 gammieana, *Gamble, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 379 = racemosa.
 glaucescens, Beauv. *Agrost.* 144 = *Bambusa nana*.
 jaunsarensis, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 23.—Ind. or.
 Kurzii, *Gamble, l. c.* 25.—Ind. or.
 linearis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 721.—Ins. Luchu.

ARUNDINARIA :—

- Mannii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 26.—Ind. or.
 Matsumarae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 716.—Japon.
 nana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xi. 160.—Japon.
 nipponica, *Makino, l. c.* xiv. 23.—Japon.
 nitida, *Mitford, in Gard. Chron.* 1895, II. 186, nomen; *et in Kew Bull.* 1896, 20.—China.
 nobilis, *Mitford, Bamb. Gard.* 100.—Afr. austr.
 paniculata, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 50 = palmata.
 Pantlingi, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 129.—Ind. or.
 papuana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 186.—N. Guin.
 paraguayensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 841.—Parag.
 patula, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 719.—N. Granat.
 polystachya, *Kurz, ex Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 7.—Ind. or.
 Prainii, *Gamble, l. c.* 21 = *Microcalamus Prainii*.
 purpurascens, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 716.—Japon.
 quadrangularis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, ix. 71, et xiv. 12 (= *Bambusa quadrangularis*).—Japon.
 ramosa, *Makino, l. c.* xiv. 22.—Japon.
 rolloana, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 24.—Ind. or.
 tolange, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 351.—Afr. trop.
 vaginata, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 717.—Japon.

ARUNDINELLA, Raddi (Gramin.).

- agrostoides, *Trin. Ic.* xxiii. t. 265.—As. or.
 birmanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 73.—Ind. or.
 blephariphylla, *Trim. ex Hook. f. l. c.* 77.—Ind. or.
 capillaris, *Hook. f. l. c.* 74.—Ind. or.
 ciliata, Nees, in *Wight, Cat. n.* 1666 = agrostoides.
 Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 75.—Ind. or.
 convoluta, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxviii. 25.—N. Granat.
 Ecklonii, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 80.—Afr. austr.
 elata, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 710.—N. Granat.
 gigantea, *Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 293.—Ind. or.
 hirsuta, Nees, *ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 115 = setosa.
 hookeriana, *Wight & Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 264 = *Calamagrostis pilosula*.
 Hookerii, *Munro, ex Hook. f. l. c.* 73 = villosa.
 lasiostoma, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 174.—N. Guin.
 Lawii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 180.—Zeylan.
 Lawsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 76.—Ind. or.
 laxiflora, *Hook. f. l. c.* 75.—Ind. or.
 leptochloa, *Hook. f. l. c.* 76.—Ind. or.
 martinicensis, *Trin. Gram. Panic.* ii. 62 = brasiliensis.
 mutica, Nees, *ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 116 = capillaris.
 nepalensis, *Trin. Sp. Gram.* t. 268 = brasiliensis.
 nervosa, Nees, in *Wall. Cat. n.* 8662.—Ind. or.
 pallida, Nees, *Agrost. Bras.* 465 = brasiliensis.
 pilosa, *Hochst. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst.* iii. IV. 30 = agrostoides.
 pumila, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 114 = tenella.
 purpurea, *Hochst. ex Steud. l. c.* 74 = fuscata.
 pygmaea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 72.—Ind. or.
 rigida, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 80 = brasiliensis.
 Schultzei, *Benth. Fl. Austral.* vii. 545 = *Axonopus semialatus*.
 setifera, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 115 = setosa.
 spicata, *Dalz. in Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 293.—Ind. or.
 stricta, Nees, in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 102 = setosa.
 Thwaitesii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 77.—Ind. or.
 tuberculata, *Munro, ex Lisboa, Bombay Grasses*, 29.—Ind. or.

ARUNDO, Tourn. (Gramin.).

- bambusifolia*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 303 = *A. Donax*.
 bengalensis, *Retz. Obs.* v. 20 = *A. Donax*.
 bifaria, *Retz. l. c.* iv. 22 = *A. Donax*.
 Coreia, *Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 304 = *Phragmites Karka*.
 dioica, *Spreng. Syst.* i. 36 = *Cortaderia argentea*.
 formosana, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 724.—Formosa.
 Karka, *Retz. Obs.* iv. 21 = *Phragmites Karka*.
 longifolia, *Salisb. Prodr.* 24 = *A. Donax*.

ARUNDO :—

- madagascariensis*, *Kunth, Rev. Gram.* i. 273 = *Neyraudia madagascariensis*.
reynaudiana, *Kunth, l. c.* = *Neyraudia madagascariensis*.
selloana, *Schult. ii. Mant.* 605 = *Cortaderia argentea*.
tibialis, *Roxb. in Wall. Cat. n.* 5017 B = *Phragmites Karka*.
triflora, *Roxb. Ic. Pict.* t. 853 = *A. Donax*.
Zollingeri, *Buese, in Miq. Pl. Jungh.* 343 = *Neyraudia madagascariensis*.

ASARCA, Poepp. = **Chloraea**, Lindl. (Orchid.).

- Arechavaletae*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 208 = *C. Arechavaletae*.

ASARUM, Tourn. (Aristoloch.).

- acuminatum*, *Bickn. in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 513.—Am. bor.
 Balansae, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 303.—Tonkin.
 brevistylum, *Franch. l. c.* 301.—China.
 callifolium, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 334.—Am. bor.
 chinense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 303.—China.
 debile, *Franch. l. c.* 305.—China.
 Fargesii, *Franch. l. c.* 306.—China.
 Fauriei, *Franch. l. c.*—Japon.
 franchetianum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 308.—China.
 heterophyllum, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 33.—Am. bor.
 majus, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 4 = *Hartwegi*.
 Memmingeri, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 34.—Am. bor.
 minus, *Ashe, l. c.* 33.—Am. bor.
 reflexum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 533.—Am. bor.
 Ruthii, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xiv. 35.—Am. bor.
 Savatieri, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 307.—Japon.

ASCLEPIAS, Linn. (Asclepiad.).

- aceratoides*, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1895, 154 = arenicola.
 albens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 5 (= *Gomphocarpus albens*).—Afr. austr.
 appendiculata, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus appendiculatus*).—Afr. austr.
 arenicola, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 252.—Am. bor.
 brevicuspis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 5 (= *Gomphocarpus brevicuspis*).—Afr. austr.
 concolor, *Schlechter, l. c.* 6 (= *Gomphocarpus concolor*).—Afr. austr.
 crispa, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus crispus*).—Afr. austr.
 dealbata, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus dealbatus*).—Afr. austr.
 eustegioides, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus eustegioides*).—Afr. austr.
 expansa, *Schlechter, l. c.* 7 (= *Gomphocarpus expansus*).—Afr. austr.
 firma, *Schlechter, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 684 (= *Schizoglossum firmum*).—Afr. trop.
 foliosus, *Hiern, l. c.* 688 (= *Gomphocarpus foliosus*).—Afr. trop.
 Frederici, *Hiern, l. c.* 684.—Afr. trop.
 gibba, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 7 (= *Gomphocarpus gibbus*).—Afr. austr.
 gomphocarpoides, *Schlechter, l. c.* (= *Xysmalobium gomphocarpoides*).—Afr. austr.
 hastata, *Schlechter, l. c.* = *Gomphocarpus hastatus*.
 Kotolo, *Eastw. in Zoe*, v. 86.—Am. bor.
 meyeriana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 8 (= *Gomphocarpus meyerianus*).—Afr. austr.
 multicaulis, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus multicaulis*).—Afr. austr.
 navicularis, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus navicularis*).—Afr. austr.
 Nuttii, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 308.—Afr. trop.
 Palmeri, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 171.—Am. bor.
 parvula, *Vail, l. c.* 1899, 423.—Am. bor. et cent.
 peltigera, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 8 (= *Gomphocarpus peltigerus*).—Afr. austr.
 physocarpa, *Schlechter, l. c.* (= *Gomphocarpus physocarpus*).—Afr. austr.

ASCLEPIAS :—

- praemorsa, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb. xxi. Beibl.* liv. 8 (= *Gomphocarpus truncatus*).—Afr. austr.
 pumila, *Vail*, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 12.—Am. bor.
 reflectens, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb. xxi. Beibl.* liv. 9 (= *Gomphocarpus reflectens*).—Afr. austr.
 scaposa, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 171.—Am. bor.
 schumanniana, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 688 (= *Gomphocarpus amoenus*).—Afr. trop.
 semiamplectens, *Hiern*, l. c. 684 (= *Gomphocarpus semiamplectens*).—Afr. trop.
 stellifera, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb. xxi. Beibl.* liv. 9 (= *Gomphocarpus revolutus*).—Afr. austr.
 subverticillata, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 178.—Am. bor.
 tenuifolia, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb. xxi. Beibl.* liv. 9 (= *Gomphocarpus linearis*).—Afr. austr.
 vexillata, *Schlechter*, l. c. (= *Gomphocarpus dealbatus*).—Afr. austr.

ASCOCHILUS, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. (1896) 374. **ORCHIDEAE.**
hirtulus, *Ridley*, l. c. 375 = *Sarcochilus hirtulus*.
siamensis, *Ridley*, l. c.—Penins. Mal.

ASCOLEPIS, *Nees* (Cyperac.).

- pinguis*, *C. B. Clarke*, in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. ii. 69.—Afr. trop.

ASIMINA, *Adans.* (Anonac.).

- costaricensis*, *Donn*, *Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxiii. 2.—Am. cent.
foetida, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 134.—Mexic.
obovata, *Nash*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 239 (= *Anona obovata*).—Am. bor.
Rugelii, *Robinson*, in *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 1. 465.—Am. bor.
speciosa, *Nash*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 238 (= *Uvaria obovata*).—Am. bor.

ASPALATHUS, *Linn.* (Legum.).

- Bodkini*, *Bolus*, in *Journ. Bot.* 1896, 19.—Afr. austr.
cliffortioides, *Bolus*, ex *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 144.—Afr. austr.
concava, *Bolus*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 455.—Afr. austr.
desertorum, *Bolus*, in *Journ. Bot.* 1896, 21.—Afr. austr.
Gerrardi, *Bolus*, l. c. 20.—Afr. austr.
intervallararis, *Bolus*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 456.—Afr. austr.
laeta, *Bolus*, in *Journ. Bot.* 1896, 20.—Afr. austr.
latibracteatus, *K. Schum.* in *Just, Jahresb.* xxvi. 1. 353.—Afr. austr.
latifolia, *Bolus*, in *Journ. Bot.* 1896, 21.—Afr. austr.
Leipoldtii, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1897, 341.—Afr. austr.
lenticula, *Bolus*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 456.—Afr. austr.
munita, *Bolus*, l. c.—Afr. austr.
rigida, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 145.—Afr. austr.
robusta, *Bolus*, ex *Schlechter*, l. c.—Afr. austr.
Schlechteri, *Bolus*, l. c. 146.—Afr. austr.
Simii, *Bolus*, in *Journ. Bot.* 1896, 21.—Afr. austr.
sphaerocephala, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 146.—Afr. austr.

ASPARAGUS, *Tourn.* (Liliac.).

- abyssinicus*, *Hochst.* ex *A. Rich.* *Tent. Fl. Abyss.* ii. 319 = africanus.
bechuanicus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 429.—Afr. trop.
conglomeratus, *Baker*, l. c. 428.—Afr. trop.
cuscutoides, *Burch.* ex *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. 606 = *Schizobasis cuscutoides*.
Fleckii, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 43.—Afr. austr.
hereroënsis, *Schinz*, l. c.—Afr. trop.
Judtii, *Schinz*, l. c. 44.—Afr. trop.
lanceus, *Thunb.* *Prod. Pl. Cap.* 66 = aethiopicus.
Lowei, *Kunth*, *Enum. Pl. v.* 79 = umbellatus.
Lugardi, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 431.—Afr. trop.
mitis, *A. Rich.* *Tent. Fl. Abyss.* ii. 319 = asiaticus.
namaensis, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 44.—Afr. austr.

ASPARAGUS :—

- Nelsii*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 44.—Afr. trop.
nitidus, *Forst.* ex *Baker*, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 263 = thunbergianus.
nudicaulis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 428.—Afr. trop.
petitianus, *A. Rich.* *Tent. Fl. Abyss.* ii. 320 = racemosus.
retrofractus, *Forsk.* *Fl. Aegypt.-Arab.* 73 = africanus.
scaberulus, *A. Rich.* *Tent. Fl. Abyss.* ii. 320 = asiaticus.
shirensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 427.—Afr. trop.
spinescens, *Steud.* in *Schult. f. Syst.* vii. 333 = stipulaceus.
spinossissimus, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 315.—Afr. austr.
stachyoides, *Spreng.* ex *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. 624 = racemosus.
suaveolens, *Burch.* *Trav.* i. 226 = stipulaceus.
ternifolius, *Hook. f.* *Bot. Mag.* t. 7728.—Afr. austr.

ASPERELLA, *Humb.* (Gramin.).

- Duthiei*, *Stapp*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 375.—Ind. or.

ASPERUGO, *Tourn.* (Borag.).

- vulgaris*, *Bub.* *Fl. Pyren.* i. 507 = procumbens.

ASPERULA, *Linn.* (Rubiac.).

- asterocephala*, *Bornm.* in *Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. vii. 6, nomen; et in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 116.—Oriens.

ASPHODELINE, *Reichb.* (Liliac.).

- Basilii*, *Siehe*, in *Gard. Chron.* 1898, i. 111.—Oriens.
dammeriana, *Siehe*, l. c.—Oriens.
imperialis, *Siehe*, l. c.—Oriens.
rhytidosperra, *Frey*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 197.—As. Min.

ASPHODELUS, *Tourn.* (Liliac.).

- aestivus*, *Reichb.* *Pl. Crit.* t. 451 = fistulosus.
lusitanicus, *Henriq.* in *Bol. Soc. Broter.* xv. 47.—Eur.
messeniacus, *Heldr.* ex *Halacsy*, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 194.—Graecia.
microcarpus, *Reichb.* *Fl. Germ.* t. 513 = fistulosus.
occidentalis, *Henriq.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 84 = lusitanicus.
parviflorus, *Wight*, *l. c.* t. 2062 = fistulosus.
tenuifolius, *Cav.* in *Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801) 46 = fistulosus.

ASPIDIXIA, *Van Tiegh.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 192. **LORANTHACEAE.**

- anceps*, *Van Tiegh.* l. c. 193 (= *Viscum anceps*).—Afr. austr.
angulata, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. angulatum*).—As. et Austral. trop.
articulata, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. articulatum*).—As. et Austral. trop.
attenuata, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. attenuatum*).—Ind. or.; Malaya.
bivalvis, *Van Tiegh.* l. c. 192.—Afr. austr.
capensis, *Van Tiegh.* l. c. 163 (= *V. capense*).—Afr. austr.
dichotoma, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. dichotomum*).—Ind. or.; Malaya.
Grandidieri, *Van Tiegh.* l. c.—Madag.
Junodi, *Van Tiegh.* l. c.—Afr. austr.
minima, *Van Tiegh.* l. c. 192 (= *V. minimum*).—Afr. austr.
myriophlebia, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. myriophlebium*).—Madag.
ramosissima, *Van Tiegh.* 193 (= *V. ramosissimum*).—Ind. or.
robusta, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. robusta*).—Afr. austr.
semiplana, *Van Tiegh.* l. c.—Afr. trop.
trachycarpa, *Van Tiegh.* l. c. (= *V. trachycarpum*).—Madag.

ASPIDOCARYA, *Hook. f. & Thoms.* (Menisperm.).

- dissitiflora*, *K. Schum. & Lauterb.* *Fl. Deutsch. Südsee*, 312.—N. Guin.
kelidophylla, *K. Schum. & Lauterb.* l. c. 313.—N. Guin.

ASPIDOPTERYS, *A. Juss.* (Malpigh.).

- obcordata*, *Hemsl.* in *Hook. l. c.* Pl. t. 2673.—China.

ASPIDOSPERMA, *Mart. & Zucc.* (Apocyn.).

- guaraniticum*, *Malme*, in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 10. 7.—Parag.

ASPILIA, *Thou.* (Compos.).

- bipartita*, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 30.—Afr. trop.
chrysops, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1900, 459.—Afr. trop.
Dewevrei, *O. Hoffm.* ex *Th. Dur. & Wildem.* in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 32.—Afr. trop.
fontinalis, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 578.—Afr. trop.
latissima, *Malme*, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 63.—Parag.
leucoglossa, *Malme*, l. c. 62.—Bras.
monopetala, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.
montevicensis, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 129 = buphthalmiflora.
Sodiroti, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 38.—Ecuador.
trichodesmoides, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 28.—Afr. trop.
Welwitschii, *O. Hoffm.* l. c. 29.—Afr. trop.
zombensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.

ASPRELLA, *Schreb.* = *Loersia*, *Sw.* (Gram.).

- japonica*, *Hack.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 715.—Japan.

ASSONIA, *Cav.* = *Dombeya*, *Cav.* (Stercul.).

- cuansensis*, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 86 = *D. cuansensis*.
huillensis, *Hiern*, l. c. 87 = *D. huillensis*.
sparmannioides, *Hiern*, l. c. = *D. sparmannioides*.

ASTELIA, *Banks & Soland.* (Liliac.).

- argyrocoma*, *A. A. Heller*, in *Minnes. Bot. Studies*, i. 805 = *menziesiana*.
minima, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 611.—N. Zel.
Petriei, *Cockayne*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 419.—N. Zel.

ASTEPHANUS, *R. Br.* (Asclepiad.).

- fruticosus*, *Speg.* *Contr. Fl. Ventana*, 41.—Reg. Argent.
fusculus, *Schlechter*, in *Urb. Symb. Antill.* i. 242 (= *Metastelma fuscum*).—Cuba.
leptophyllus, *Schlechter*, l. c. 241.—Ind. occ.
pubescens, *Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 299.—Mexic.

ASTER, *Tourn.* (Compos.).

- adsurgens*, *Greene*, *Pittonia*, iv. 216.—Am. bor.
Amani, *Post*, *Fl. Syria*, 16.—Syria.
amplexifolius, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 391.—Am. bor.
amplissimus, *Greene*, in *Proc. Acad. Philad.* 1895, 550.—Am. bor.
apricus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 396.—Am. bor.
armeriifolius, *Greene*, *Pittonia*, iv. 214.—Am. bor.
auriculatus, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 379 (non Schloss.).—China.
Bietii, *Franch.* l. c. 378.—China.
Boltoniae, *Greene*, *Pittonia*, iii. 248.—Am. bor.
brachytrichus, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 372.—China.
brevibracteatus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 392.—Am. bor.
calocephalus, *Malme*, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 47.—Bras.
camptosorus, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 339.—Am. bor.
carmesinus, *Burgess*, ex *Britton & A. Brown*, *Fl. N. U. S.* iii. 356.—Am. bor.
centaurodes, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 129 (= *Pteronia centauroides*).—Afr. austr.
ciliomarginatus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 392.—Am. bor.
Claytoni, *Burgess*, ex *Britton & A. Brown*, *Fl. N. U. S.* iii. 358.—Am. bor.
continuus, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 620.—Am. bor.
cordalenus, *Hend.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 345.—Am. bor.
curvescens, *Burgess*, ex *Britton & A. Brown*, *Fl. N. U. S.* iii. 359.—Am. bor.
Delavayi, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 374.—China.
distichophyllus, *Greene*, *Pittonia*, iv. 213.—Am. bor.
ensatus, *Greene*, l. c. 223.—Am. bor.
esul, *Greene*, l. c. 221.—Am. bor.

ASTER:

- frondeus, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895, 551.—Am. bor.
- fulcratus, *Greene, Pittonia*, iv. 217.—Am. bor.
- furcatus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 358.—Am. bor.
- glastifolius, *Greene, Pittonia*, iv. 218.—Am. bor.
- hispanicus, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 334.—Hispan.
- ianthinus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 360.—Am. bor.
- insularis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 71.—Japon.
- jalapensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 572.—Mexic.
- Jessicae, *Suksd. in Erythea*, 1898, 30.—Am. bor.
- komonoensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 65.—Japon.
- laetevirens, *Greene, Pittonia*, iv. 219.—Am. bor.
- latahensis, *Hend. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 201.—Am. bor.
- latibracteatus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 371.—China.
- leptocladus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 69.—Japon.
- likiangensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 370.—China.
- limoniifolius, *Greene, Pittonia*, iv. 222.—Am. bor.
- limosus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
- lingulatus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 377.—China.
- lujusculus, *Greene, Pittonia*, iv. 215.—Am. bor.
- militaris, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895, 550.—Am. bor.
- missouriensis, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 378.—Am. bor.
- multiformis, *Burgess, ex Britton & A. Brown, l. c.* 361.—Am. bor.
- Nardophyllum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 130.—Patag.
- nebraskensis, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 375.—Am. bor.
- Nelsonii, *Greene, Pittonia*, iv. 219.—Am. bor.
- nobilis, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 361.—Am. bor.
- ochroleucus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131.—Diplostephium ochroleucum.
- oreophilus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 378.—China.
- oxylepis, *Greene, Pittonia*, iv. 223.—Am. bor.
- oxyphyllus, *Greene, l. c.* iii. 103.—Am. bor.
- Piccolii, *Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7669.—China.
- Poncinsii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 345.—Turkestan.
- pratincola, *Greene, Pittonia*, iv. 215.—Am. bor.
- Pringlei, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 379.—Am. bor.
- proximus, *Greene, Pittonia*, iv. 220.—Am. bor.
- Pteronia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131 (= *Pteronia paniculata*).—Afr. austr.
- quinquenervius, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 459.—Afr. austr.
- roscidus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 360.—Am. bor.
- scorzonerifolius, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 530 (= *Erigeron scorzonerifolius*).—Patag.
- Scribneri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 393.—Am. bor.
- sejaensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131.—Bolivia.
- senebierifolius, *Kuntze, l. c.* (= *Alopappus coronopifolius*).—Chili.
- senecioides, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 381.—China.
- sericocarpoides, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvii. I. 375 (= *Doellingera sericocarpoides*).—Am. bor.
- setchuensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 377.—China.
- Sodirol, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 20.—Ecuador.
- Souhei, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 372.—China.
- spithamaeus, *Greene, Pittonia*, iv. 217.—Am. bor.
- squamatus, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 19 (= *Conyza squamata*).—Am. bor. et austr.
- staehelinoides, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 131 (= *Dolichogyne staehelinoides*).—Reg. Argent.
- stactifolius, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 370.—China.
- subracemosus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 394.—Am. bor.
- subspathulatus, *Rydb. l. c.* 385.—Am. bor.
- tenebrosus, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 357.—Am. bor.
- tenuipes, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 64.—Japon.

ASTER:

- tongolensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 376.—China.
- uliginosus, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 252.—Natal.
- vallicola, *Greene, Pittonia*, iv. 221.—Am. bor.
- vellerens, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 380.—China.
- vestitus, *Franch. l. c.* 378.—China.
- Vilmorini, *Franch. l. c.* 373.—China.
- violaceus, *Greene, Pittonia*, iv. 214.—Am. bor.
- violaris, *Burgess, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 361.—Am. bor.
- Wilsonii, *Greene, Pittonia*, iii. 196.—Am. bor.
- Woodhousei, *Wootton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 458.—Am. bor.
- Woodii, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 330.—Afr. austr.
- xylophyllus, *Klatt, l. c.* 331.—Afr. austr.
- yosemitanus, *Greene, Fl. Francisc.* 333.—Calif.
- yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 375.—China.
- ASTERACANTHA**, Nees = **Hygrophila**, R. Br. (Acanth.).
- lindaviana*, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 100 = *H. lindaviana*.
- ASTERISCUM**, Cham. & Schlecht. (Umbellif.).
- Dipterygia, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 135 (= *Mulinum Dipterygia*).—Am. austr.
- fimbriatum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 523.—Patag.
- pungens, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 134 = chilense.
- spinescens, *Drude, l. c.* 135 (= *Gymnophyton spinescens*).—Am. trop.
- spinosissimum, *Drude, l. c.* (= *Gymnophyton spinosissimum*).—Am. trop.
- ASTERISCUM**, Moench = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).
- Morrisoni*, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 245 = *O. aquaticum*.
- pygmaeus*, *Coss. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. 471 = *O. pygmaeum*.
- ASTEROLASIA**, F. Muell. (Rutac.).
- Woombye*, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 281.—Austral.
- ASTILBE**, Buch.-Ham. (Saxifrag.).
- platyphylla, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 684.—Japon.
- ASTRAGALINA**, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 516 (1900) = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
- alpestris*, *Bub. l. c.* = *A. alpinus*.
- alpina*, *Bub. l. c.* = *A. alpinus*.
- australis*, *Bub. l. c.* = *A. australis*.
- ASTRAGALUS**, Tourn. (Legum.).
- aciphyllus, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 604.—Persia.
- aculeatus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 10.—Am. bor.
- agameticus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 38.—As. cent.
- akscheberensis, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 42.—Oriens.
- americanus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 8.—Am. bor.
- amoenus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 112 (= *Phaca amoena*).—Chili.
- amunateguianus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 103 (= *Phaca amunateguiana*).—Chili.
- antiochianus, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 756.—As. Min.
- araucanus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 100 (= *Phaca araucana*).—Chili.
- araxinus, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 281.—Reg. Caucas.
- Arthuri, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 20.—Am. bor.
- assyriacus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 591.—As. Min.
- baissunensis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 32.—As. cent.
- Baldaccii, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 415.—Albania.
- berterianus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 98 (= *Phaca berteriana*).—Chili.
- brachypteris, *Reiche, l. c.* 84 (= *Phaca brachyptera*).—Chili.
- brachytropis, *Reiche, l. c.* 87 (= *Phaca brachytropis*).—Chili.

ASTRAGALUS:

- brevicaulis, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 158.—Reg. Magell.
- brevicaulis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 9.—Am. bor.
- campylophyllus, *Greene, Pittonia*, iii. 195.—Am. bor.
- canescens, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 98 (= *Phaca canescens*).—Chili.
- canonis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 15.—Am. bor.
- carinatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 100 (= *Phaca carinata*).—Chili.
- carniolicus, *A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 3.—Eur.
- cerbicus, *Panç. ex Reichb. Ic. Fl. Germ.* xxii. 202.—Eur.
- chadjanensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
- Chamissonis, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 96 (= *Phaca Chamissonis*).—Chili.
- chilensis, *Reiche, l. c.* 111 (= *Phaca chilensis*).—Chili.
- Chomotowi, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 826.—Turkestan.
- chrysanthus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 108 (= *Phaca chrysanthus*).—Chili.
- clandestinus, *Reiche, l. c.* 80 (= *Phaca clandestina*).—Chili.
- Clusii, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 520 = *A. Glauca*.
- compactus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 82 (= *Phaca compacta*).—Chili.
- concinus, *Reiche, l. c.* 111 (= *Phaca concinna*).—Chili.
- confirmans, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 17.—Oriens.
- coquimbensis, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 109 (= *Phaca coquimbensis*).—Chili.
- Cornu-bovis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 23.—As. cent.
- Craigii, *M. E. Jones, in Zoe*, v. 42.—Am. bor.
- Cruickshanksii, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 101 (= *Phaca Cruickshanksii*).—Chili.
- curvicaulis, *Reiche, l. c.* 102 (= *Phaca curvicaulis*).—Chili.
- curvidens, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 589.—Persia.
- Cusickii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 541.—Am. bor.
- cyaneus, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 236.—Eur.
- cymatodes, *Greene, Pittonia*, iii. 196.—Am. bor.
- depauperatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 80 (= *Phaca depauperata*).—Chili.
- djigensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
- dolichostachys, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 99 (= *Phaca dolichostachya*).—Chili.
- domeykoanus, *Reiche, l. c.* 93 (= *Phaca domeykoana*).—Chili.
- domitus, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 517.—Eur.
- dschuparensis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 600.—Persia.
- elatus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 100 (= *Phaca elata*).—Chili.
- elongatus, *Reiche, l. c.* 111 (= *Phaca elongata*).—Chili.
- eurekensis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 12.—Am. bor.
- exiliformis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 10.—Am. bor.
- fastidius, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 8 = fastidiosus.
- feensis, *M. E. Jones, l. c.* 20.—Am. bor.
- Fialae, *Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 242.—Eur.
- flavus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 107 (= *Phaca flava*).—Chili.
- Galagani, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 258.—Reg. Caucas.
- galilaeus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 978.—Syria.
- gilgianus, *Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 185.—As. Min.
- grandiflorus, *Frey, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1892, 46 = schuschnasensis.
- Gremlii, *Burnat, Fl. Alpes Marit.* ii. 157.—Eur.
- huninensis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 980.—Syria.
- huthianus, *Frey & Bornm. l. c.* v. 605.—Persia.
- intermedius, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. 656 = phoenicis.

ASTRAGALUS :—

involucratus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 46.—As. cent.
 japonicus, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 664.—Japon.
 junceiformis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899.—Am. bor.
 Kelseyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 241.—Am. bor.
 Kindlii, *Form. in Verh. Nat. Ver. Brünn,* xxxviii. 239.—Eur.
 lagunensis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 11.—Am. bor.
 laguriformis, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 602.—Oriens.
laguroides, *Frey, l. c.* iii. 180 = *laguriformis*.
 Landbecki, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 105 (= *Phaca Landbecki*).—Chili.
 lateritians, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 599.—Persia.
 laxiflorus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 99 (= *Phaca laxiflora*).—Chili.
lasicus, *Rouy, Fl. Fr.* v. 190 = *Oxytropis lazica*.
 leiophyllus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 594.—As. Min.
 lesbiacus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 161.—Lesbos.
 Litwinowi, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 39.—As. cent.
 Loczyi, *Kan. in Szech. Keletassai Utj.* ii. 805.—China.
 luristanicus, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 596.—Persia.
 Macounii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 243.—Am. bor.
 macrocarpus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 106 (= *Phaca macrocarpa*).—Chili.
 macrophysus, *Reiche, l. c.* (= *Phaca macrophysa*).—Chili.
 macropodium, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 26.—As. cent.
mediterraneus, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 521 = *sesameus*.
 melanostictus, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 603.—Persia.
 minutissimus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 588.—Persia.
 moabiticus, *Post, Fl. Syria,* 11.—Palaest.
 Morgani, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 601.—Persia.
 Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 601.—Patag.
 Mudfordae, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 18.—Am. bor.
 Mulkak, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 49.—As. cent.
 multispinus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 597.—Persia.
 Muschketowi, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 825.—Turkestan.
 nanus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 112 (= *Phaca nana*).—Chili.
 naryensis, *Frey, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 6.—Oriens.
 nubigenus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 103.—Chili.
 occidentalis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 17.—Am. bor.
 ochroleucus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 97 (= *Phaca ochroleuca*).—Chili.
 ochtoranensis, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 596.—Persia.
 oliganthus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 110 (= *Phaca oligantha*).—Chili.
 oocalycis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 10.—Am. bor.
 oreophilus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 104 (= *Phaca oreophila*).—Chili.
 orites, *Reiche, l. c.* 94 (= *Phaca orites*).—Chili.
 Palenae, *Reiche, l. c.* 85 (= *Phaca Palenae*).—Chili.
 pallens, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvi. i. 353, sphalm. = *Palenae*.
 palousensis, *Piper, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 489.—Am. bor.
 pamirensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
 parvifolius, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvii. 218.—Eur.
 patagonicus, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 256 (= *Phaca patagonica*).—Patag.
 pauperculus, *Greene, Pittonia,* iii. 224.—Am. bor.

ASTRAGALUS :—

phoenicis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 11.—Am. bor.
 Pinonis, *M. E. Jones, l. c.* 14.—Am. bor.
 playanus, *M. E. Jones, l. c.* 6.—Am. bor.
 prunifer, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 239.—Am. bor.
 pulchellus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 82 (= *Phaca pulchella*).—Chili.
 pyrenaicus, *Rouy, Fl. Fr.* 192 (= *Oxytropis pyrenaica*).—Eur.
 quindecimjugus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 83 (= *Phaca quindecimjuga*).—Chili.
 Rahmeri, *Reiche, l. c.* 85 (= *Phaca Rahmeri*).—Chili.
 rascheyanensis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 932.—Syria.
rascheyanus, *Frey & Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlviii. 585 = *rascheyanensis*.
 rufescens, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 981.—Persia.
 rupestris, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 105 (= *Phaca Bustillosii*).—Chili.
 salmonis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 9.—Am. bor.
 Sanctae-Crucis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 505.—Patag.
 San-Romani, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 102 (= *Phaca San-Romani*).—Chili.
 schizostegius, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 14.—As. Min.
 schuschnasensis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 983.—Oriens.
 scopioides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 241.—Am. bor.
 somalensis, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 93.—Afr. trop.
 sonneanus, *Greene, Pittonia,* iii. 186.—Am. bor.
 stenoxychioides, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 11.—As. Min.
 stenophyllus, *Rouy, Fl. Fr.* v. 182.—Reg. Medit.
 stereophyllus, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 8.—As. Min.
 straturensis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 19.—Am. bor.
 striatus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 113.—Chili.
 taldelsensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 344.—Turkestan.
 tenuiscapus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 590.—Persia.
 transcaspicus, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 16.—Oriens.
 Traskiae, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III.* i. 102.—Am. bor.
 tricolor, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 93 (= *Phaca tricolor*).—Chili.
 vagus, *Reiche, l. c.* 106 (= *Phaca vaga*).—Chili.
 variabilis, *Rouy, Fl. Fr.* v. 189 = *Oxytropis foetida*.
 variegatus, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 592 = *rufescens*.
 verticillatus, *Reiche, Fl. Chile,* ii. 86 (= *Phaca verticillata*).—Chili.
 vicarius, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 25.—As. cent.
 Wilsonii, *Greene, Pittonia,* iii. 196.—Am. bor.
 xylobasis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 984.—Oriens.
 xylorrhizus, *Frey & Sint. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1892, 46 = *xylobasis*.
 zebedanensis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 981.—Syria.
ASTROCARYUM, *G. F. W. Mey. (Palm.)*.
 echinatum, *Barb. Rodr. Palm. Matagross.* 51.—Bras.
 leiospatha, *Barb. Rodr. l. c.* 56.—Bras.
ASTROCHLAENA, *Hallier f. (Convolv.)*.
 tubiflora, *Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma,* vii. 228.—Afr. trop.
ASTRODAUCUS, *Drude, in Engl. & Prantl. Pflanzenf.* iii. viii. (1898) 156. **UMBELLIFERAE**.
 leptocarpus, *Drude, l. c.* 157 (= *Daucus leptocarpus*).—Oriens.
 littoralis, *Drude, l. c.* (= *D. bessarabicus*).—Oriens.
 orientalis, *Drude, l. c.* (= *D. pulcherrimus*).—Oriens.
 persicus, *Drude, l. c.* (= *D. persicus*).—Persia.
ASTROLINON, *Bub. Fl. Pyren.* i. (1897) 231 = *Asterolinon*, *Hoffm. & Link (Primul.)*.
 pusillum, *Bub. l. c.* = *A. stellatum*.

ASTRONIA, *Noronha (Melast.)*.

Stapfii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.

ASYSTASIA, *Blume (Acanth.)*.

acuminata, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 201 = *coromandeliana*.
africana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 134.—Afr. trop.
ansellioides, *C. B. Clarke, l. c.* 136.—Afr. trop.
australasica, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 230.—Austral.
calycina, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 478 = *coromandeliana*.
congensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 132.—Afr. trop.
floribunda, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 200 = *coromandeliana*.
kalantha, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 321.—Afr. trop.
multiflora, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 203 = *coromandeliana*.
parvula, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 132.—Afr. trop.
petalioides, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 223.—Arabia.
podostachys, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 199 = *coromandeliana*.
pubescens, *Klotzsch, l. c.* 202 = *coromandeliana*.
quaterna, *Nees, in DC. Prod.* xi. 166 = *coromandeliana*.
querimbensis, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 204 = *coromandeliana*.
scabrada, *Klotzsch, l. c.* 202 = *coromandeliana*.
subhastata, *Klotzsch, l. c.* 200 = *coromandeliana*.

ATAMASCO, *Rafin. = Zephyranthes, Herb. (Amaryll.)*.

arenicola, *Greene, Pittonia,* iii. 187 = *Z. arenicola*.
Atamasco, *Greene, l. c.* = *Z. Atamasco*.
pulchella, *Greene, l. c.* = *Z. pulchella*.
rosea, *Greene, l. c.* 188 = *Z. rosea*.
Simpsoni, *Greene, l. c.* 187 = *Z. Simpsoni*.
taubertiana, *Greene, l. c.* 188 = *Z. taubertiana*.
texana, *Greene, l. c.* 187 = *Z. texana*.
Treatiae, *Greene, l. c.* = *Z. Treatiae*.

ATAXIA, *R. Br. = Hierochloë, S. G. Gmel. (Gramin.)*.

Ecklonis, *Nees, ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb.* v. (1840) 31 = *Anthoxanthum Ecklonii*.
Hookeri, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 77 = *H. Hookeri*.
tenuis, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb.* v. (1840) 32 = *Anthoxanthum Tongo*.
Tongo, *Trin. l. c.* = *Anthoxanthum Tongo*.

ATHAMANTA, *Linn. (Umbell.)*.

hirsuta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* iv. 199 = *cretensis*.

ATHANASIA, *Linn. (Compos.)*.

schistostephiodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 589.—Afr. trop.

ATHENAEA, *Sendt. (Solanac.)*.

Nelsonii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 567.—Mexic.

ATHRIXIA, *Ker-Gawl. (Compos.)*.

asteroides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 430.—Afr. austr.
diffusa, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.
felicoides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 565.—Afr. trop.
stenophylla, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 270.—Afr. trop.

ATHYROCARPUS, *Schlecht. (Commelin.)*.

efoveolatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 319 = *Phaeosphaerion efoveolatum*.
Matthewsii, *Kuntze, l. c.* = *Phaeosphaerion Matthewsii*.
pseudomonosperma, *Kuntze, l. c.*—Bras.

ATOMOSTIGMA, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. (1898) 76. **ROSACEAE**.

matagrossense, *Kuntze, l. c.*—Bras.

ATRACTOGYNE, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.*

n. s. i. (1896) 1261. **RUBIACEAE**.
Gabonii, *Pierre, l. c.* 1262.—Afr. trop.

ATRACYLIS, *Linn. (Compos.)*.

lutea, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 151 = *Carthamus lanatus*.

ATRIPLEX, Tourn. (Chenopod.).

- angustifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 426.—Chili.
 Amanus, *Post, Fl. Syria*, 681.—Syria.
 Autrani, *Post, l. c.* 682.—Syria.
 Cachiyyu, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xv. 518.—Reg. Argent.
 Caput-medusae, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 316.—Am. bor.
 ceratophylla, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 266.—Am. austr.
 Draconis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 40.—Am. bor.
 eremicola, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 284.—Am. bor.
 fruticulosa, *Osterh. l. c.* 207 = eremicola.
 kochiana, *Maiden, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xx. 87.—Austral.
 lapathifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 133.—Am. bor.
 Lorentzii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 266.—Reg. Argent.
 maximowicziana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 2.—Ins. Luchu.
 nivea, *Merino, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxviii. 8.—Eur.
 pabularis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 203.—Am. bor.
 Reichei, *Volkens, ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 190.—Reg. Magell.
 sagittifolia, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 568.—Patag.
 suckleyana, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 134 = A. Endolepis.
 volutans, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 203.—Am. bor.
 vulgatissima, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 569.—Patag.

ATROPIS, Rupr. (Gramin.).

- angusta, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 717.—Afr. austr.
 Borreri, *Stapf, l. c.* 716.—Afr. austr.
 Foucaudii, *Hack. ex Fouc. in Ann. Soc. Sci. Char.-Inf.* xxxii. 222.—Corsica.
 parviflora, *Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 226.—Reg. Magell.
 Preslii, *Hack, l. c.* 227 = Catabrosa tenuifolia.
 vilfoidea, *Rowler & Wieg. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 422 (= *Catabrosa vilfoidea*).—Am. austr.

ATTALEA, H. B. & K. (Palm.).

- Boehmii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 59.—Afr. trop.
 ceraensis, *Barb. Rodr. in Pl. Nov. Jard. Bot. Rio*, vi. 22.—Bras.
 guaranitica, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 27.—Parag.
 insignis, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 56 = Cocos insignis.

ATYLOSIA, Wight & Arn. (Legum.).

- crassa, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 47 (= *Dolichos crassus*).—Penins. Mal.

AUBRIETIA, Adans. (Crucif.).

- thessala, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 288.—Eur.

AUCOUMEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.

- (1896) 1241. *BURSERACEAE*.
 klaincana, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

AUDIBERTIA, Benth. (Labiata).

- pachystachya, *Parish, in Erythraea*, 1898, 91.—Am. bor.

AULACOCALYX, Hook. f. (Rubiace.).

- auriculata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 67.—Afr. trop.
 leptactinioides, *K. Schum. l. c.* xxiii. 453.—Afr. trop.

AULOJUSTICIA, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv.

- (1897) 324. *ACANTHACEAE*.
 limifolia, *Lindau, l. c.*—Afr. austr.

AULOSPERMUM, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 174. *UMBELLIFERAE*.

- cinerarium, *Coult. & Rose, l. c.* 178 (= *Cymopterus cinerarius*).—Am. bor.
 glaucum, *Coult. & Rose, l. c.* 176 (= *C. glaucus*).—Am. bor.
 ibapense, *Coult. & Rose, l. c.* (= *C. ibapensis*).—Am. bor.
 Jonesii, *Coult. & Rose, l. c.* 178 (= *C. Jonesii*).—Am. bor.
 longipes, *Coult. & Rose, l. c.* 175 (= *C. longipes*).—Am. bor.

AULOSPERMUM—

- panamintense, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 177 (= *C. panamintense*).—Am. bor.
 purpureum, *Coult. & Rose, l. c.* 178 (= *C. purpureus*).—Am. bor.
 Rosei, *Jones, ex Coult. & Rose, l. c.* 179.—Am. bor.
 Watsoni, *Coult. & Rose, l. c.* 176.—Am. bor.

AULOSTEPHANUS, Schlechter, in Bull. Herb.

- Boiss. iv. (1896) 451. *ASCLEPIADACEAE*.
 natalensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

AUTUNESIA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.

- Nachtr. i. 327 (1897). *COMPOSITAE*.
 angolensis, *O. Hoffm. l. c.* (= *Newtonia angolensis*).—Afr. trop.

AUXOPUS, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.

- (1900) 275. *ORCHIDAEAE*.
 kamerunensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

AVENA, Linn. (Gramin.).

- aenea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 279.—Ind. or.
 airoides, *Koel. Gram.* 203 = subspicata.
 americana, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* vii. 183 = Hookeri.
 andropogonoides, *Steud. in Flora*, 1829, 486 = Triraphis Rehmanni.
 antarctica, *Thunb. Prod.* 22 = Avenastrum antarcticum.
 argaea, *Boiss. Fl. Orient.* v. 546 = pratensis.
 aristidioides, *Thunb. Prod.* 22 = Pentaschistis aristidioides.
 Azo-carti, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 29.—Chili.
 caffra, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 293 = Avenastrum caffrum.
 Cavanillesii, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. I. 797.—Oriens; Reg. Medit.
 Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 278.—Ind. or.
 colorata, *Steud. in Flora*, 1829, 481 = Pentaschistis juncifolia.
 flaccida, *Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 280.—Ind. or.
 flavescens, *Linn. Sp. Pl.* 80.—As. temp.; Afr. bor.
 glomerata, *Steud. in Flora*, 1829, 483 = Pentaschistis curvifolia.
 leonina, *Steud. l. c.* 484 = Avenastrum antarcticum.
 longa, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 292 = Avenastrum longum.
 malabarica, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 69 = Arundinella avenacea.
 micans, *Hook. f. l. c.* 279.—Ind. or.
 micrantha, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 3.—Am. bor.
 mollis, *Michx. Fl. Am. Bor.* i. 72 = subspicata.
 mortoniana, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 133.—Am. bor.
 muricata, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 247 = Pentaschistis aspera.
 muriculata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 291.—Abyss.
 mysorensis, *Spreng. Syst. i.* 337 = Tripogon bromoides.
 Newtonii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 291.—Afr. trop.
 orientalis, *Schreb. Spicil.* 52 = sativa.
 pallida, *Thunb. Prod.* 22 = Pentaschistis Thunbergii.
 phleoides, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par.* iv. 601 = subspicata.
 polyneura, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 277.—Ind. or.
 quinqueseta, *Steud. in Flora*, 1829, 485 = Avenastrum quinquesetum.
 rigida, *Steud. l. c.* 482 = Danthonia obtusifolia.
 Rothii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 292.—Afr. trop.
 sikkimensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 280.—Ind. or.
 stipoides, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 4 (non Willd.).—Am. bor.
 subspicata, *Clairv. Man. Herb.* 17.—Eur.; As.; Amer.
 toluensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 148 = subspicata.
 trisetata, *Thunb. Prod.* 22 = Pentaschistis trisetata.
 turgidula, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 293.—Afr. austr.
 valesiaca, *Nym. Syll.* 414 = Cavanillesii.

AVENASTRUM, Jess. (Gramin.).

- alpinum, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena alpina*).—Eur.
 antarcticum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 476.—Afr. austr.
 caffrum, *Stapf, l. c.* 477.—Afr. austr.
 Dodii, *Stapf, l. c.* 475.—Afr. austr.
 dregeanum, *Stapf, l. c.* 473.—Afr. austr.
 filifolium, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 54 (= *Avena filifolia*).—Eur.
 longum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 476.—Afr. austr.

AVENASTRUM—

- pseudoviolaceum, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena pseudoviolacea*).—Eur.
 quinquesetum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 475.—Afr. austr.
 sesquitertia, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena sesquitertia*).—Eur.
 turgidulum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 474.—Afr. austr.
 versicolor, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 53 (= *Avena versicolor*).—Eur.

AXONOPUS, Beauv. Agrost. 12 (1812). *GRAMINEAE*.

- cimicinus, *Beauv. l. c.*—As. or.; Malaya.
 corymbosus, *Schult. Mant.* ii. 177 = Digitaria sanguinalis.
 semialatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 64.—Ind. or.

AXYRIS, Linn. (Chenopod.).

- caucasica, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 430.—Reg. Caucas.

AYENIA, Loeffl. (Stercul.).

- echinococca, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 24.—Bras.
 fruticosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 195.—Mexic.
 schumanniana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 24.—Bolivia.

AZALEA, Linn. = Rhododendron, Linn. (Ericac.).

- dilatata, *Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7081 = R. dilatatum.

AZALEASTRUM, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.

- i. (1900) 297. *ERICACEAE*.
 albiflorum, *Rydb. l. c.* (= *Rhododendron albiflorum*).—Am. bor.

AZORELLA, Lam. (Umbellif.).

- acaulis, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132 (= *Huanaca acaulis*).—Reg. Magell.
 andina, *Drude, l. c.* (= *Huanaca andina*).—Chili.
 Bovei, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 58.—Fuegia.
 coriacea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 111 (= *Posoa coriacea*).—Reg. Andin.
 exigua, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132 (= *Posoa exigua*).—N. Zel.
 fuegiana, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 58.—Fuegia.
 Haastii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132 (= *Posoa Haastii*).—N. Zel.
 Hookeri, *Drude, l. c.*—N. Zel.
 pallida, *Kirk, Fl. N. Zeal.* 193 (= *Posoa pallida*).—N. Zel.
 radians, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 132.—N. Zel.
 trifoliolata, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. t. 18 = Hookeri.

B**BABIANA**, Ker-Gawl. (Irid.).

- caerulescens, *Eckl. Verz.* 32 = plicata.
 obtusifolia, *Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot.* i. 234 = stricta.
 pygmaea, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. 165.—Afr. austr.
 rubro-cyanea, *Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot.* i. 234 = stricta.
 spathacea, *Ker-Gawl. ex Sims, in Bot. Mag.* t. 638 = mucronata.
 Sprengelii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xvi. 165.—Afr. austr.
 stellata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 99 (non Eckl.).—Afr. austr.
 stenomera, *Schlechter, l. c.* 100.—Afr. austr.
 sulphurea, *Ker-Gawl. in Kon. & Sims, Ann. Bot.* i. 234 = stricta.
 umbellata, *Ker-Gawl. Gen. Irid.* 31 = Moraea edulis.
 velutina, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 100.—Afr. austr.
 villosa, *Ker-Gawl. ex Steud. Nom. ed. II.* i. 176 = stricta.

BACCAUREA, Lour. (Euphorb.).

- macrophylla, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 21 (non Muell. Arg.).—Afr. trop.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 625.—Celebes.
 Staudtii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 521.—Afr. trop.

BACCHARIS, Linn. (Compos.).

- abietina, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 132.*—Chili.
 chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 611.*
 —Patag.
 Czermakii, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 178.*—Bras.
 debilis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 60.*—Bolivia.
 Dusenii, *O. Hoffm. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 244.*—Patag.
 fallax, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 132.*—Bolivia.
 Jelskii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 24.*—Ecuador.
 iloensis, *Hieron. l. c. 27.*—Ecuador.
 macrocephala, *Sch. Bip. ex Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 576.*—Am. cent.
 mapirensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 61.*—Bolivia.
 neglecta, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 394.*—Am. bor.
 oblanceolata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 61.*—Bolivia.
 oppositifolia, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 133.*—Bolivia.
 padifolia, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 26.*—Ecuador.
 pentodonta, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxii. no. 5. 52.*—Bras.
 perulata, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 133.*—Reg. Argent.
 pluchaeiformis, *Kuntze, l. c. 134.*—Reg. Argent.
 pululahuensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 23.*—Ecuador.
 Sodiroi, *Hieron. l. c. 25.*—Ecuador.
 Vitis-idaea, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 135 (non Oliver).*—Bolivia.

BACOPA, Aubl. (Scrophul.).

- alternifolia, *Engl. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exp. 813, nomen.*—Afr. trop.
 punctata, *Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 499.*—Afr. trop.

BACTRIS, Jacq. (Palm.).

- Anizitzii, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag. 19.*—Parag.
 chapadensis, *Barb. Rodr. Palm. Matogross. 41.*—Bras.
 cuyabaensis, *Barb. Rodr. l. c. 42.*—Bras.
 Frage, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvi. no. 5. 11.*—Bras.
 Hindmanniana, *Drude, ex Lindm. l. c. 12.*—Bras.
 matogrossensis, *Barb. Rodr. Palm. Matogross. 38.*—Bras.
 Mindellii, *Barb. Rodr. in Plant. Nov. Jard. Bot. Rio, vi. 19.*—Bras.

BAERIA, Fisch. & Mey. (Compos.).

- hirsutula, *Greene, Fl. Francisc. 438 (=Lasthenia hirsuta).*—Am. bor.
 microglossa, *Greene, l. c. (=Burrielia microglossa).*—Am. bor.
 tenella, *Greene, l. c. 439 (=Dichaeta uliginosa).*—Am. bor.

BAGUENAUDIERA, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 513 = *Colutea*, Tourn. (Legum.).

- arborea, Bub. l. c. = *C. arborescens.*

BAHIA, Lag. (Compos.).

- Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 309.*—Mexic.
 xylopoda, *Greenm. l. c. 577.*—Am. cent.

BAIKIAEA, Benth. (Legum.).

- anomala, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxvi. 72.*—Afr. trop.

BAILEYA, Harv. & Gray (Compos.).

- nervosa, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 34.*—Am. bor.

BAILLONIA, Bocq. (Verben.).

- juncea, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1144 = *Diostea juncea.*

BAISSEA, A. DC. (Apocyn.).

- Bailloni, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 8.*—Afr. trop.
 borneensis, *Boerl. in Bull. Inst. Buitens. v. 20.*—Arch. Mal.
 floribunda, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 12 (=Guerkea floribunda).*—Afr. trop.
 gracillima, *Hua, l. c. (=Guerkea gracillima).*—Afr. trop.
 Heudeloti, *Hua, l. c. 9.*—Afr. trop.
 major, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 675.*—Afr. trop.

BAISSEA :—

- micrantha *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 11.*—Afr. trop.
 ogowensis, *Hua, l. c. 10.*—Afr. trop.
 spectabilis, *Hua, l. c.*—Afr. trop.
 Tholloni, *Hua, l. c.*—Afr. trop.
 uropetala, *Hua, l. c. 12 (=Guerkea uropetala).*—Afr. trop.
 Welwitschii, *Stapf, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 675 (=Perinerion Welwitschii).*—Afr. trop.
 Wulfhorstii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 816.*—Afr. trop.

BALANSAEPHYTUM, Drake, in Bull. Soc. Bot.

- Fr. xliii. (1896) 82. **URTICACEAE.**
 tonkinense, *Drake, l. c. 83.*—Tonkin.

BALBISIA, Cav. (Geran.).

- microphylla, *Reiche, Fl. Chile, i. 294 (=Ledocarpum microphyllum).*—Chili.

BALFOURODENDRON, Mello (Rutac.).

- riedelianum, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 174 = eburneum.*

BALISAEA, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. (1896) 436.

- LEGUMINOSAE.**
 genistoides, *Taub. l. c. 437.*—Bras.

BALLOTA, Linn. (Labiata.).

- acuta, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 259 = rupestris.*
 cinerea, *Briq. l. c. 260 = hirsuta.*
 Labillardieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 112.*—Syria.
 velutina, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst. ii. 599.*—Eur.

BALSAMEA, Gled. = *Commiphora*, Jacq. (Burser.).

- angolensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 124 = C. angolensis.*
 foliolosa, *Hiern, l. c. 126.*—Afr. trop.
 fraxinoides, *Hiern, l. c. 125.*—Afr. trop.
 longibracteata, *Hiern, l. c. 124 = C. longibracteata.*
 Mulelame, *Hiern, l. c. 125.*—Afr. trop.
 multijuga, *Hiern, l. c. 126.*—Afr. trop.
 Welwitschii, *Hiern, l. c. 124 = C. Welwitschii.*

BALSAMORHIZA, Hook. f. (Compos.).

- Balsamorhiza, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 132 = Hookeri.*
 floccosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 628.*—Am. bor.
 tomentosa, *Rydb. l. c. 629.*—Am. bor.

BAMBUSA, Schreb. (Gramin.).

- albo-marginata, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1900, 31 = Arundinaria Veitchii.*
 amahussana, *Lindl. in Penny Cyclop. iii. 357 = lineata.*
 andropogonifolia, *Griff. Itin. Notes, 124 = Ophalostachyum pallidum.*
 arundinacea, *Ait. Hort. Kew. ed. II. 316 = vulgaris.*
 atra, *Lindl. in Penny Cyclop. iii. 357 = lineata.*
 auriculata, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. 86.*—Ind. or.
 Binghami, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 45.*—Ind. or.
 borealis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 720.*—Japon.
 Brandisii, *Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 109 = Dendrocalamus Brandisii.*
 burmanica, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 35.*—Ind. or.
 calostachya, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. II. 250 = Dendrocalamus calostachyus.*
 critica, *Kurz, l. c. = pallida.*
 cyanostachya, *Kurz, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 389 = polymorpha.*
 elegantissima, *Hassk. Pl. Jav. 42 = Schizostachyum elegantissimum.*
 Falconeri, *Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 95 = nutans et Dendrocalamus Hamiltonii.*
 globifera, *Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 72 = Dendrocalamus Hookeri.*
 Helferi, *Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 114 = Teinostachyum Helferi.*
 heterostachya, *Munro, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 400 = Gigantochloa heterostachya.*
 kingiana, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 46.*—Ind. or.
 kurilensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 719 = Arundinaria kurilensis.*

BAMBUSA :—

- latiflora, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. II. 250 = Dendrocalamus latiflorus.*
 longispatha, *Kurz, l. c. 249 = Dendrocalamus longispatus.*
 Macala, *Buch.-Ham. ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 387 = B. Tulda.*
 Mac-Clellandi, *Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 114 = Dinochloa Mac-Clellandi.*
 Oliveriana, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 130.*—Ind. or.
 orientalis, *Nees, in Linnaea, ix. 475 = arundinacea.*
 patellaris, *Kurz, ex Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 406 = Dendrocalamus patellaris.*
 picta, *Lindl. in Penny Cyclop. iii. 357 = lineata.*
 prava, *Lindl. l. c. = lineata.*
 regia, *Thoms. ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 116 = Thyrsostachys siamensis.*
 Ridleyi, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 34.*—Ind. or.
 Ritcheyi, *Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 113 = Oxytenanthera monostigma.*
 rumphiana, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. II. 86 = lineata.*
 scandens, *Blume, ex Nees, in Flora, vii. (1824) 291 = Dinochloa Tjankorreh.*
 schizostachyoides, *Kurz, ex Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 48.*—Ind. or.
 scriptoria, *Dennis. Schlüss. Hort. Malab. 31 = Ochlandra Rheedii.*
 spinosa, *Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiii. 480 = arundinacea.*
 stenostachya, *Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 725.*—Formosa.
 stridula, *Munro, Cat. 26 = Ochlandra stridula.*
 tanaea, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5038A = Dendrocalamus strictus.*
 Wightii, *Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 111 = Ochlandra Brandisii.*
- BAMLERIA**, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.Südsee, 481 (1900). **MELASTOMACEAE.**
 insignis, *K. Schum. & Lauterb. l. c. = N. Guin.*
- BANALIA**, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 568 = *Hedysarum* Tourn. (Legum.).
 alpina, *Bub. l. c. 570 = H. alpinum.*
 humilis, *Bub. l. c. 569 = H. humile.*
- BANARA**, Aubl. (Samyd.).
 arguta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, iv. 223.*—Parag.
 exechandra, *Briq. l. c. ii. 48.*—Bras.
 Hassleri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. I. 54.*—Parag.
 portoricensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 370.*—Ind. or.
 umbraticola, *Arech. in Anal. Mus. Montevid. xii. 280.*—Urug.
- BANISTERIA**, Linn. (Malpigh.).
 guatemalensis, *Niedensu, in Index Lect. Lyc. Brunsb. 1900, hiem., 6.*—Guatem.
 Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss. vi. App. I. 16.*—Parag.
 lanceolata, *Niedensu, in Index Lect. Lyc. Brunsb. 1900, hiem., 17.*—Bras.
 lanuginosa, *Niedensu, l. c. 1899, i. 9 (=Stigmatophyllum lanuginosum).*—Am. trop.
 ovata, *Niedensu, l. c. 1900, hiem., 7.*—Bras.
 padifolia, *Poepp. ex Niedensu, l. c. 8.*—Peruv.
 quitensis, *Niedensu, l. c. 10.*—Ecuador.
- BAPHIA**, Afzel. (Legum.).
 aurivellerea, *Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 174.*—Afr. trop.
 barombiensis, *Taub. l. c. 177.*—Afr. trop.
 borneensis, *Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 2456.*—Borneo.
 brachybotrys, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachr. 200; et in Engl. Jahrb. xxvi. 281.*—Afr. trop.
 Buettneri, *Harms, II. cc.*—Afr. trop.
 crassifolia, *Harms, l. c. 200; et l. c. 280.*—Afr. trop.
 chrysophylla, *Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 175.*—Afr. trop.
 cuspidata, *Taub. l. c. 176.*—Afr. trop.
 densiflora, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachr. 200; et in Engl. Jahrb. xxvi. 280.*—Afr. trop.
 Dinklagei, *Harms, l. c. 200; et l. c. 279.*—Afr. trop.
 gracilipes, *Harms, l. c.; et l. c. 280.*—Afr. trop.

BAPHIA :—

- henriquesiana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 176.—Afr. trop.
 hypophylla, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* 200; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 282.—Afr. trop.
 leptobotrys, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
 longepetiolata, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 176.—Afr. trop.
 obovata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 815.—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 175.—Afr. trop.
 Zenkeri, *Taub. l. c.* 174.—Afr. trop.

BAPTISIA, Vent. (Legum.).

- cuneata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 189.—Am. bor.
 Hugerii, *Small, l. c.*—Am. bor.
 laevicaulis, *Small, l. c.* 134.—Am. bor.
 texana, *Pollard & Ball, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 133.—Am. bor.

BARBACENIA, Vand. (Amaryll.).

- Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 363.—Afr. trop.
 hereroënsis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 49.—Afr. austr.

BARBAREA, R. Br. (Crucif.).

- americana, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 174.—Am. bor.
 cochlearifolia, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 783.—Japon.
 longirostris, *Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1898, 1.—Eur.
 macrophylla, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 58.—Graecia.
 patens, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 783.—Japon.

BARLERIA, Linn. (Acanth.).

- Afzelii*, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 319 = flava.
 albostellata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 162.—Afr. trop.
 Briartii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 212.—Afr. trop.
 cardiocalyx, *Solms, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 105 = orbicularis.
 chlamydocalyx, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 73 = orbicularis.
 chlorum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 153.—Afr. trop.
 crassa, *C. B. Clarke, l. c.* 151.—Afr. trop.
 Delamerei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 206.—Afr. trop.
 Descampsii, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 318.—Afr. trop.
 diacantha, *Nees, in DC. Prod.* xi. 283, partim.—Afr. trop.
 elegans, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 269.—Afr. trop.
 eranthemoides, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64.—Afr. trop.
 farinosa, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 222.—Arabia.
 fulvostellata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 163.—Afr. trop.
 grandiflora, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64 = grandis.
Harnierii, *Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 106 = parviflora.
 homioitricha, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 154.—Afr. trop.
 hypocrateriformis, *Hochst. ex T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 28 = eranthemoides.
 induta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 146.—Afr. trop.
 jucunda, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 75 = argentea.
 lancifolia, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 28 = alata.
 linearifolia, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 397.—Afr. trop.
 longipedunculata, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 69.—Bolivia.
 longissima, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 93.—Afr. trop.
 Lugardii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 161.—Afr. trop.
 Marghilomanae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 216.—Afr. trop.
 micrantha, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 168.—Afr. trop.
 mollis, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 64 = ventricosa.
 mucronifolia, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 71.—Afr. trop.

BARLERIA :—

- neurophylla, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 166.—Afr. trop.
 nyasensis, *C. B. Clarke, l. c.* 150.—Afr. trop.
 obtusisejala, *C. B. Clarke, l. c.* 158.—Afr. trop.
 Phillipsiae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 377.—Afr. austr.
Pirottaei, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 75 = Hochstetteri.
 proxima, *Lindau, l. c.* 72.—Afr. trop.
Pseudoprionitis, *Lindau, l. c.* 73 = Smithii.
pumila, *Hochst. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 372 = *Justicia diffusa*.
 quadrispina, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 72.—Afr. trop.
 ramulosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 150.—Afr. trop.
 Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 203.—Afr. trop.
 rhynchocarpha, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 204 = *Crossandra nilotica*.
Rivaei, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 74 = Hochstetteri.
 rotundisejala, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 376.—Afr. austr.
 setigera, *Rendle, l. c.* 1896, 395.—Afr. trop.
 Smithii, *Rendle, l. c.* 396.—Afr. trop.
 squarrosa, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 207 = spinulosa.
 stelligera, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 71.—Afr. trop.
 Steudneri, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 155.—Afr. trop.
 triacantha, *Nees, in DC. Prod.* xi. 240.—Afr. trop.
 vixdentata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 165.—Afr. trop.
 waggana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 377.—Afr. austr.

BARLERIANTHUS, Oerst. = **Barleria**, Linn. (Acanth.).

- grandis*, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 136 = *B. grandis*.
BARNADESIA, Mutis. (Compos.).
 glomerata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 135.—Bolivia.
 laurifolia, *Kuntze, l. c.* = *Fucaldea laurifolia*.
 Lehmannii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 77.—Ecuador.

- macrocephala, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 135.—Bolivia.
 Sodiroy, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 78.—Ecuador.
 venosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 69.—Bolivia.

BARRINGTONIA, Forst. (Myrtac.).

- calophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 463.—N. Guin.
 gigantostachya, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens.* ii. 9.—Java.

BARTERIA, Hook. f. (Passiflor.).

- Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 8.—Afr. trop.

BARTONIA, Muhl. (Gentian.).

- iodandra, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 47.—Am. bor.

BARYXYLUM, Lour. (Legum.).

- adnatum, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 390 (= *Peltophorum adnatum*).—Ins. Baham.
 africanum, *Pierre, l. c.* (= *P. africanum*).—Afr. trop.
 brasiliense, *Pierre, l. c.* (= *P. Linnaei*).—Jamaic.
 dasyrachis, *Pierre, l. c.* t. 391 A (= *P. dasyrachis*).—Malacca.
 dubium, *Pierre, l. c.* sub t. 390 (= *P. vogelianum*).—Bras. grande, *Pierre, l. c.* (= *P. grande*).—Hab. ?
 inerme, *Pierre, l. c.* t. 390 (= *P. ferrugineum*).—Austral.
 tonkinense, *Pierre, l. c.* t. 391 C.—Cochinch.

BASEONEMA, Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.

- 1896, 97. ASCLEPIADACEAE.
 Gregorii, *Schlechter & Rendle, l. c.*—Afr. austr.

BASSIA, All. = **Chenolea**, Thunb. (Chenopod.).

- reuteriana, *Guerke, Pl. Europ.* ii. 151 = *Kochia reuteriana*.

BASSIA, Koenig (Sapotac.).

- Thurstonii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2569.—Ins. Fiji.

BASSOVIA, Aubl. (Solan.).

- anceps, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 197 (= *Solanum anceps*).—Peruv.
 Fendleri, *Rusby, l. c.*—Am. austr.
 inaequilatera, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 90.—Bolivia.

BATESANTHUS, N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. t.

- 2500 (1896). ASCLEPIADACEAE.
 purpureus, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.

BATODENDRON, Nutt. = **Vaccinium**, Linn. (Vac-

- cinac.).
 glaucescens, *Greene, Pittonia*, iii. 326.—Am. bor.
 speciosum, *Greene, l. c.*—Am. bor.

BATRACHIUM, S. F. Gray = **Ranunculus**, Tourn.

- (Ranunc.).
 Lobbii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 13 = *R. Lobbii*.

BATRATHERUM, Nees = **Arthraxon**, Beauv.

- (Gramin.).
 khasianum, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 144 = *A. breviaristatus*.
 submuticum, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 382 = *A. submuticum*.

BAUERELLA, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, ii.

- (1898) 153. RUTACEAE.
 australiana, *Borzi, l. c.* 155.—Austral.

BAUHINIA, Linn. (Legum.).

- albolutea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 181.—Malaya.
 amblyophylla, *Harms, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 548.—Am. cent.
 Bainesii, *Schinz, in Mem. Herb. Boiss.* no. 1. 121.—Afr. trop.
 brachyscypha, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 22.—Borneo.
 caloneura, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11. 29.—Bras.
 Cavanillei, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 364 = inermis.
 Creaghi, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 21.—Borneo.
 Curtisii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 195.—Penins. Mal.
 enigmatica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 496.—Ind. or.
 griffithiana, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 183.—Penins. Mal.
 guaranitica, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. no. 7. 30.—Am. austr.
 Hullettii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 183.—Penins. Mal.
 kalantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 398.—Afr. trop.
 Kingii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 189.—Penins. Mal.
 macropoda, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 22.—Borneo.
 Minahassae, *Koord. in Meded. S Lands Plantent.* xix. 629.—Celebes.
 Pottingeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 290.—Ind. or.
 Ridleyi, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 185.—Penins. Mal.
 saccocalyx, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 400 B.—Cochinch.
 Scortechiuui, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 188.—Penins. Mal.
 seleriana, *Harms, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 549.—Am. cent.
 Seminarioid, *Harms, ex Eggers, in Bot. Centralbl.* lxxiii. 69.—Ecuador.
 stenoscycpha, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 22.—Borneo.
 strychnoidea, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 195.—Penins. Mal.
 unilaterale, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 233.—Am. cent.
 wituensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 275.—Afr. trop.
 Wrayi, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 191.—Penins. Mal.

BAUMANNIA, DC. = **Damnacanthus**, Gaertn.

- (Rubiace.).
 hedyotoidea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 456.—Afr. trop.

BECHIUM, DC. = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).

- scapiforme, *DC. Prod.* v. 71 = *V. scapiformis*.

- BECKERA**, Fresen. (Gramin.).
dioica, Heynh. Nom. ii. 63 = Pennisetum unisetum.
glabrescens, Steud. Syn. Pl. Gram. 118 = Pennisetum unisetum.
- BECKWITHIA**, Jepson, in Erythea, vi. (1898) 97.
 RANUNCULACEAE.
 Austinae, *Jepson*, l. c.—Calif.
- BEESEA**, Munro = *Ochlandra*, Thw. (Gramin.).
elegantissima, Kurz, ex Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. 146 = Schizostachyum tenue.
stridula, Munro, l. c. 145 = O. stridula.
travancorica, Bedd. Forest. Man. Bot. 234 = O. travancorica.
- BEGONIA**, Tourn. (Begon.).
 argentinensis, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 53.—Reg. Argent.
 Augustinei, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1900, II. 286.—China.
 Bangii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 105.—Bolivia.
 barbana, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 261.—Am. cent.
 Biolleyi, *C. DC. l. c.* 263.—Am. cent.
 bonthainensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 37.—Celebes.
 bretschnederiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2635.—China.
 chaetocarpa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 105.—Bolivia.
 comata, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
 cuspidata, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 260.—Am. cent.
 dielsiana, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 479.—China.
 Heddei, *Warb. in Wittm. Gartenfl.* 1900, 1.—Hort. hemsleyana, *Hook. f. Bot. Mag. t.* 7685.—China.
 heteroclinis, *Miq. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 484.—Celebes.
 hispidissima, *Zipp. ex Koord. l. c.* 485.—Celebes.
 hygrophila, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 265.—Am. cent.
 juntasensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 106.—Bolivia.
 Lauterbachii, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 458.—N. Guin.
 Lehmbachii, *Warb. in Wittm. Gartenfl.* 1900, 281.—Afr. trop.
 leptophylla, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 445.—Bras.
 macrura, *Gilg, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 301, nomen.—Afr. trop.
 papuana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 458.—N. Guin.
 Ragozini, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 4.—Bras.
 santarosensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 106.—Bolivia.
 Schlechteri, *Gilg, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 301, nomen.—Afr. trop.
 Somervillei, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 17.—Ins. Solomon.
 Tonduzii, *C. DC. ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 264.—Am. cent.
 umbraculifera, *Hook. f. Bot. Mag. t.* 7457.—Bras.
 venosa, *Skan, ex Hook. f. l. c. t.* 7657.—Bras.
 Warburgii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 459.—N. Guin.
 Warpuri, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2656.—Madag.
 Weigallii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1890, 17.—Ins. Solomon.
- BEILSCHMIEDIA**, Nees (Laurac.).
 fruticosa, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 386.—Afr. trop.
 nitida, *Engl. l. c.* 387.—Afr. trop.
 Preussii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
 Staudtii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
 Zenkeri, *Engl. l. c.* 388.—Afr. trop.
- BELLEVALIA**, Lapeyr. = *Hyaacinthus*, Tourn. (Liliac.).
 Freynii, *F. Foerst. in Bull. Herb. Boiss.* v. 73.—As. Min.
 Millingeni, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18. 101.—Cyprus.
 silvestris, *Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto*, 1896, 215.—Eur.
- BELLIA**, Bub. Fl. Pyren. ii. (1900) 411 = *Chaerophyllum*, Linn. (Umbell.).
 aurata, *Bub. l. c.* 412 = C. aureum.
 hirsuta, *Bub. l. c.* 413 = C. hirsutum.
 temulenta, *Bub. l. c.* 412 = C. temulum.
- BELLIS**, Tourn. (Compos.).
 majoricensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 121.—Eur.
 margaritifolia, *Huter, in Jahrescat. Wien. Bot. Tauschanst.* 1899, 107.—Eur.
- BELMONTIA**, E. Mey. (Gentian.).
 debilis, *Schinz, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xxxvii. 332.—Afr. trop.
 divaricata, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 274.—Madag.
 micrantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 102.—Afr. austr.
 oligantha, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
 primulaeflora, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.
- BELOPERONE**, Nees (Acanth.).
 Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 104.—Bolivia.
 cochabambensis, *Rusby, l. c.* 103.—Bolivia.
 consanguinea, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 676.—Bolivia.
 Hassleri, *Lindau, l. c.* vi. App. i. 30.—Parag.
 Mandoni, *Lindau, l. c.* v. 676.—Bolivia.
 Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 488.—Mexic.
 nuda, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 103.—Bolivia.
 pubinervia, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 675.—Peruv.
 urophylla, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 316.—Am. cent.
 variegata, *Lindau, l. c.* 315.—Am. cent.
- BENTHAMANTHA**, Alef. = *Cracca*, Benth. (Legum.).
 caribaea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 53 = C. caribaea.
 sericea, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1900, 19 = C. sericea.
- BENTHAMIELLA**, Speg. (Solanac.).
 acutifolia, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 555.—Patag.
 longifolia, *Speg. l. c.*—Patag.
 Nordenskiöldii, *P. Dusén, ex N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. t.* 2636 A.—Patag.
 pycnophylloides, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 556.—Patag.
- BERARDIA**, Brongn. = *Nebelia*, Neck. (Bruniac.).
 trigyna, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 315.—Afr. austr.
 velutina, *Schlechter, l. c.* 25.—Afr. austr.
- BERBERIS**, Tourn. (Berber.).
 brevifolia, *Philippi, ex Reiche, Fl. Chile*, i. 42.—Chili.
 fragrans, *Philippi, l. c.* 38.—Chili.
 haematocarpa, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 304.—Am. bor.
 Hemsleyi, *Donn. Sm. in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 17.—Am. cent.
 koreana, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 22.—Corea.
 Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 3.—Patag.
 nana, *Greene, Pittonia*, iii. 98.—Am. bor.
 phyllacantha, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 4.—Bolivia.
- BERCHEMIA**, Neck. (Rhamn.).
 yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 123.—Arab.
- BERENDTIA**, A. Gray (Scroph.).
 levigata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 39.—Mexic.
- BERENDTIELLA**, Wettst. & Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Register, 459 (1899) = *Berendtia*, A. Gray (Scroph.).
- BERGHAUSIA**, Endl. = *Garnotia*, Brongn. (Gramin.).
 elata, *Arn. ex Miq. Anal. Bot. Ind.* 32 = G. scoparia.
 Emodi, *Endl. ex Miq. l. c.* = G. polyponoides.
 mutica, *Munro, in Proc. Amer. Acad.* iv. 362 = G. tectorum.
 scoparia, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 242 = G. scoparia.
- BERGIA**, Linn. (Elatin.).
 penteriana, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 58.—Afr. austr.
 prostrata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 22.—Afr. trop.
 spatulata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 526.—Afr. austr.
- BERKHEYA**, Ehrh. (Compos.).
 Adlami, *Hook. f. Bot. Mag. t.* 7514.—Afr. austr.
 amplexicaulis, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 143.—Afr. austr.
 andongensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 375.—Afr. trop.
 angolensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 475.—Afr. trop.
 angusta, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 219.—Afr. austr.
 arctifolia, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 143.—Afr. austr.
 buphthalmoides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 343 (= *Stobaea buphthalmoides*).—Afr. austr.
 carlinopsis, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 34.—Afr. trop.
 echinopsoides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
 Evansii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 501.—Afr. austr.
 gracilis, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 35.—Afr. trop.
 hypoleuca, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 343.—Afr. austr.
 Kuntzei, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 143.—Afr. austr.
 latifolia, *F. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 351.—Afr. austr.
 maritima, *F. M. Wood, in Journ. Bot.* 1899, 253.—Afr. austr.
 montana, *F. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 351.—Afr. austr.
 parvifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
 polyacantha, *Baker, l. c.* 156.—Afr. trop.
- BERKHEYOPSIS**, O. Hoffm. (Compos.).
 Kuntzei, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 136.—Afr. austr.
- BERLA**, Bub. Fl. Pyren. ii: 356 (1900) = *Sium*, Tourn. (Umbellif.).
 monspeliensium, *Bub. l. c.* 357 = S. erectum.
- BERLINIA**, Soland. (Legum.).
 densiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 265.—Afr. trop.
 Scheffleri, *Harms, ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84.—Afr. trop.
- BERMUDIANA**, Tourn. = *Sisyrinchium*, Linn. (Irid.).
 Bermudiana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 305 = S. Bermudiana.
 humilis, *Kuntze, l. c.* = S. humile.
 leucantha, *Kuntze, l. c.* = S. leucanthum.
 rigidifolia, *Kuntze, l. c.* = S. rigidifolium.
- BERNARDIA**, Houst. (Euphorb.).
 Bernardia, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot.* ii. i. 58 = dichotoma.
- BERRIA**, Roxb. (Tiliac.).
 quinquelocularis, *Teyss. & Binn. ex Koord. & Valet. in Ic. Bogor.* t. 5.—Java.
- BERSAMA**, Fresen. (Sapind.).
 acutidens, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 173.—Afr. trop.
 andongensis, *Hiern, l. c.* 174.—Afr. trop.
 Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 424.—Afr. trop.
- BERTIERA**, Aubl. (Rubiace.).
 congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 28.*—Afr. trop.
 glabrata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 450.—Afr. trop.
 globiceps, *K. Schum. l. c.* 451.—Afr. trop.
 retrofracta, *K. Schum. l. c.* 452.—Afr. trop.
 spicata, *K. Schum. l. c.* 451 = africana.
- BESLERIA**, Plum. (Gesner.).
 imbricans, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 155.—Am. cent.
 longipedunculata, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxvii. 69.—Bolivia.
 macropoda, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 155.—Am. cent.
 pauciflora, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 81.—Am. austr.
 robusta, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 156.—Am. cent.
 rotundifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 98.—Bolivia.

BESLERIA :—

Seitzii, *Krug & Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 325.—Ind. occ.
Sprucei, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 81.—Am. austr.

BETONICA, Tourn. = **Stachys**, Tourn. (Labiata).
purpurea, Bub. Fl. Pyren. i. 449 = *S. Betonica*.

BETULA, Tourn. (Cupulif.).

albo-sinensis, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 497.—China.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 205.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.*—China.
insignis, *Franch. l. c.* 206.—China.
kenatica, *W. H. Evans, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 481.—Am. bor.

BIASOLETTIA, Koch (Umbellif.).

Barbeyi, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 614.—Ins. Rhodes.
cynapioides, Drude, in *Engl. & Prantl. Pflanzenf.* iii. viii. 150 (= *Carum cylindricum*).—Oriens.
pumila, Drude, l. c. (= *Freya pumila*).—Eur.
stylosa, Drude, l. c. (= *Freya stylosa*).—Eur.

BICORNELLA, Lindl. (Orchid.).

arabica, Defflers, *Voy. Yemen*, 208. t. 6 = *Habenaria arabica*.

BICUCULLA, Borekh. (Papav.).

formosa, Howell, *Fl. N. W. Amer.* 33 (= *Dicentra formosa*).—Am. bor.
ochroleuca, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 55 (= *D. ochroleuca*).—Am. bor.
pauciflora, Howell, *Fl. N. W. Amer.* 34 (= *D. pauciflora*).—Am. bor.
uniflora, Howell, l. c. (= *D. uniflora*).—Am. bor.

BIDENS, Linn. (Compos.).

africana, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 464.—Ins. Bourbon.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 588.—Afr. trop.
comosa, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 436.—Am. bor.
decipiens, *Warnst. in Herb. Eur.* 1896, 3.—Eur.
decumbens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxi. 576.—Am. cent.
dentata, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 412.—Am. bor.
melanocarpa, *Wiegand, l. c.* 405.—Am. bor.
Nashii, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 481.—Am. bor.
peucedanifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 136 (= *Cosmos peucedanifolius*).—Bolivia.
speciosa, *Parish, in Zee, v.* 75.—Am. bor.
vulgatus, *Greene, Pittonia*, iv. 72.—Am. bor.

BIERMANNIA, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. (1897) 591. **ORCHIDEAE**.
quinquecallosa, *King & Pantl. l. c.*—Ind. or.

BIFARIA, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. (1898) 359. **GRAMINEAE**.

bifaria, *Kuntze, l. c.* (= *Panicum bifarium*).—Bras.
caudiculata, *Kuntze, l. c.* (= *Panicum caudiculatum*).—Bras.
elytrochaeta, *Kuntze, l. c.* (= *Panicum elytrochaetum*).—Bras.

BIFARIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 164. **LORANTHACEAE**.

abyssinica, *Van Tiegh. l. c.* 177.—Afr. trop.
Aitchisoni, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Afghan.
albicans, *Van Tiegh. l. c.* 170.—Ind. occ.
aoraiensis, *Van Tiegh. l. c.* 169 (= *Viscum aoraiense*).—Geront. trop.
apiculata, *Van Tiegh. l. c.* 174.—Ind. or.
attenuata, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ind. or.
Balansae, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
Balfouri, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Rodriguez.
bigibba, *Van Tiegh. l. c.* 171.—Ins. Norfolk.
Bojeri, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Maurit.
breviarticulata, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Austral.
capensis, *Van Tiegh. l. c.* 177.—Afr. austr.
Commersoni, *Van Tiegh. l. c.*—Madag.
complanata, *Van Tiegh. l. c.* 187.—Ins. Sandw.
coralloides, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
coriacea, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
crassa, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.

BIFARIA :—

cylindrica, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 166.—Ins. Sandw.
dauidiana, *Van Tiegh. l. c.* 173.—China.
dichotoma, *Van Tiegh. l. c.* 171.—N. Caled.
disticha, *Van Tiegh. l. c.* (= *Viscum distichum*).—Ins. Norfolk.
fasciata, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.
fasciculata, *Van Tiegh. l. c.* 174.—China.
flava, *Van Tiegh. l. c.* 166.—Ins. Sandw.
garbwalensis, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
Gaudichaudii, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Bourbon.
Helleri, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Hillebrandi, *Van Tiegh. l. c.*—Ins. Sandw.
howensis, *Van Tiegh. l. c.* 171.—Ins. Dom. Howe.
Humboldtii, *Van Tiegh. l. c.* 177.—Ins. Comor.
Jacquemonti, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
japonica, *Van Tiegh. l. c.* 173 (= *Viscum japonicum*).—Geront.
khasiensis, *Van Tiegh. l. c.* 174.—Ind. or.
latissima, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Lepini, *Van Tiegh. l. c.* 169.—Ind. occ.
Mannii, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Metzii, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
mixta, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
multicostata, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
ovalis, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
Pancheri, *Van Tiegh. l. c.*—N. Caled.
Perrottetii, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
platycaula, *Van Tiegh. l. c.* 170.—Ind. occ.
platystachya, *Van Tiegh. l. c.* 175.—Ind. or.
Remyi, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Ins. Sandw.
Richardi, *Van Tiegh. l. c.* 176.—Ins. Bourbon.
rubescens, *Van Tiegh. l. c.* 169.—Ind. occ.
rubra, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Austral.
rugosa, *Van Tiegh. l. c.* 172.—N. Caled.
spiciformis, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Japon.
taenioides, *Van Tiegh. l. c.* 176 (= *Viscum taenioides*).—Geront.
tricostata, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
vitiensis, *Van Tiegh. l. c.* 170.—Ins. Fiji.
vittata, *Van Tiegh. l. c.* 168.—Ins. Sandw.
Walkerii, *Van Tiegh. l. c.* 173.—Ind. or.
Wightii, *Van Tiegh. l. c.*—Ind. or.

BIGELOWIA, DC. (Compos.).
glauca, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 375 (= *Chrysothamnus glaucus*).—Am. bor.
hypoleuca, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 18 (non A. Gray).—Ecuador.
pyramidata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 43.—Mexic.

BIGNONIA, Tourn. (Bignon.).
benensis, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 70.—Bolivia.
boliviana, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
brevipes, *Rusby, l. c.* 71.—Bolivia.
egensis, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 66 = *Arrabidaea egensis*.
impressa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 100.—Bolivia.
inaequilatera, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 222.—Bras.
Karstenii, *Klotzsch, ex Bureau & K. Schum. l. c.* 130 = *Anemopaegma Karstenii*.
laxiflora, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. l. c.* 197 (= *Tynanthus myrianthus*).—Bras.
myrianthus, *Poepp. l. c.* (= *Tynanthus myrianthus*).—Bras.
Pearcei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 100.—Bolivia.
pratensis, *Poepp. ex Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 256.—Bras.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 71.—Bolivia.
tecomaeflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 101.—Bolivia.

BILLBERGIA, Thunb. (Bromel.).
Binoti, *R. Gerard, in Journ. Soc. Hort. Rhône*, 1896 (1).—Bras.
Canterae, *André, in Rev. Hort.* 1897, 60.—Bras.

BIPINNULA, Comm. (Orchid.).
montana, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* xii. 282.—Urug.

BISERRULA, Linn. (Legum.).
mediterranea, Bub. Fl. Pyren. ii. 532 = *B. Pelecinus*.

BLAERIA, Linn. (Ericac.).

microdonta, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 272.—Afr. trop.

BLAKEA, P. Br. (Melast.).

boliviensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 94 = *Topoea boliviensis*.

BLECHUM, P. Br. (Acanth.).

Blechnum, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. i. 100 = *Browni*.
hamatum, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 220 = *Ecolobium hamatum*.

BLEPHARIPAPPUS, Hook. (Compos.).

neomexicanus, *Greene, Pittonia*, iii. 168 (= *Layia glandulosa*).—Am. bor.
nudatus, *Greene, l. c.*—Am. bor.

BLEPHARIS, Juss. (Acanth.).

acanthodioides, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 229, partim = *B. Asteracanthus*.
Asteracanthus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 100.—Afr. trop.
Bainesii, *S. Moore, ex C. B. Clarke, l. c.* 98.—Afr. trop.
cuspidata, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 76 = *molluginifolia*.
diversispina, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 104.—Afr. trop.
fruticulosa, *C. B. Clarke, l. c.* 99.—Afr. trop.
grandis, *C. B. Clarke, l. c.* 104.—Afr. trop.
involutrata, *Solms, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 107 = *boerhaaviaefolia*.
leptophylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 812.—Afr. trop.
obmitrata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 101.—Afr. trop.
Phillipseae, *Rendle, in Journ. Bot.* 1897, 375.—Afr. austr.
pinguior, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 97.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *C. B. Clarke, l. c.* 99.—Afr. trop.
saturejaefolia, *Pers. Syn.* ii. 180 = *molluginifolia*.
Sol, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 100.—Afr. trop.
tenuiramea, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 205.—Afr. trop.
Togodelia, *Solms, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 108 = *boerhaaviaefolia*.

BLEPHARISPERMUM, Wight (Compos.).

hirtum, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2435.—Arab.
yemensis, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 105.—Arab.

BLEPHAROCALYX, Berg = **Myrtus**, Tourn. (Myrtac.).
angustifolius, *Berg, in Linnaea*, xxvii. 421 = *M. montevidensis*.

BLEPHAROCALYX, Endl. = **Leersia**, Sw. (Gramin.).
ciliata, *Endl. Gen.* 1352 = *L. hexandra*.

BLEPHARODON, Decne. (Asclep.).

reflexus, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7. 90.—Bras.

BLEPHARONEURON, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 88. **GRAMINEAE**.
tricholepis, *Rydb. l. c.*—Am. bor.

BLETTIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).

macristhynchila, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 297.—Mexic.

BLITUM, Tourn. = **Chenopodium**, Linn. (Chenopod.).
perenne, Bub. Fl. Pyren. i. 173 = *C. Bonus-Henricus*.

BLOOMERIA, Kellogg (Liliac.).

gracilis, *Borsi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, 1897, 19.—Hort.

BLUFFIA, Nees = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

eckloniana, *Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II.* 447 = *Axonopus semialatus*.

BLUMEA, DC. (Compos.).

adenophora, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 382.—China.
floresiana, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 506.—Celebes.
veronicaefolia, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 382.—China.

- BLUMENBACHIA**, Koel. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
halpensis, Koel. Gram. Gall. et Germ. 29 = *A. halpense*.
- BLUMENBACHIA**, Schrad. (Loas.).
catharinensis, Urb. & Gilg, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 355.—Bras.
- BLYXA**, Noronha (Hydrocharid.).
zeylanica, Hook. f. in *Trim. Fl. Ceylon*, iv. 125 = *zeylanica*.
- BOEA**, Comm. (Gesner.).
acutifolia, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 519.—Penins. Mal.
elegans, Ridley, l. c. 522.—Penins. Mal.
ferruginea, Ridley, l. c. 521.—Penins. Mal.
glabra, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
lanata, Ridley, l. c. 520.—Penins. Mal.
lanuginosa, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 540.—N. Guin.
paniculata, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 519.—Penins. Mal.
patens, Ridley, l. c. 520.—Penins. Mal.
suffruticulosa, Ridley, l. c. 518.—Penins. Mal.
verticillata, Ridley, l. c. 519.—Penins. Mal.
- BOEHMERIA**, Jacq. (Urtic.).
edentata, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 367.—Bolivia.
gracilis, C. H. Wright, in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. 485.—China.
grandis, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies*, i. 812 = *stipularis*.
- BOERHAAVIA**, Vaill. (Nyctag.).
capitata, Heimerl, in *Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus*, Wien, xxiii. repr. 28 (= *Nyctaginia capitata*).—Am. bor.
ciliato-bracteata, Heimerl, l. c. 25.—Reg. Argent.
cordobensis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 265.—Reg. Argent.
rufopilosa, Kuntze, l. c.—Bolivia.
squarrosa, Heimerl, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 813.—Afr. trop.
- BOERLAGIODENDRON**, Harms (Aral.).
celebicum, Harms, ex *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 489, nomen.—Celebes.
Lauterbachii, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 484.—N. Guin.
- BOISDUVALIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).
diffusa, Greene, in *Proc. Acad. Philad.* 1895, 547.—Am. bor.
parviflora, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 199.—Am. bor.
- BOLELIA**, Rafin. = **Downingia**, Torr. (Campanul.).
brachyantha, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 483.—Am. bor.
- BOLLEA**, Reichb. f. (Orchid.).
schroederiana, Hort. Sand. in *Gard. Chron.* 1895, i. 401 = *Pescatoria schroederiana*.
- BOMBAX**, Linn. (Malvac.).
chartifolium, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 16.—Bras.
heteromorphum, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 18.—Bolivia.
Ruizii, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 17.—Ecuador.
- BONAMIA**, A. Gray = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).
abscissa, Hallier f. in *Bull. Herb. Boiss.* v. 812 = *B. abscissa*.
cordata, Hallier f. l. c. vii. 43 (= *Prevostea cordata*).—Madag.
densiflora, Hallier f. l. c. v. 999 = *B. densiflora*.
dietrichiana, Hallier f. l. c. 1012.—Austral.
grandiflora, Hallier f. l. c. 810 = *B. grandiflora*.
Langsdorffii, Hallier f. l. c. 814 = *B. Langsdorffii*.
poranoides, Hallier f. l. c. 1007 (= *Porana densiflora*).—Afr. trop.
- BONATEA**, Willd. (Orchid.).
Emini, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 254.—Afr. trop.
Kayseri, Rolfe, l. c. 255.—Afr. trop.
Phillipsii, Rolfe, l. c. 254.—Afr. trop.
rabaiensis, Rolfe, l. c. 253.—Afr. trop.
volkensis, Rolfe, l. c.—Afr. trop.
- BONNERIA**, Cordem. in *Rev. Gén. de Bot.* xi. (1899) 416. **ORCHIDEAE**.
appendiculata, Cordem. l. c. (= *Angraecum appendiculatum*).—Ins. Bourbon.
corrugata, Cordem. l. c.—Ins. Bourbon.
- BOOPIS**, Juss. (Calycer.).
ooaulis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 127.—Reg. Argent.
ventosa, Kuntze, l. c. (= *Calycera ventosa*).—Bolivia.
- BOOTTIA**, Wall. (Hydrochar.).
crassifolia, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. 239 = *Ottelia crassifolia*.
macrantha, C. H. Wright, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 9.—Afr. trop.
muricata, C. H. Wright, l. c. 569.—Afr. trop.
scabra, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. 454.—Afr. trop.
- BORNUELLERA**, Hausskn. in *Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi.* (1897) 70. **CRUCIFERAE**.
Dieckii, Degen, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 313.—Oriens.
Tymphaea, Hausskn. in *Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi.* 72 = *Vesicaria Tymphaea*.
- BORRAGINOIDES**, Moench = **Trichodesma**, R. Br. (Borag.).
africana, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 721 = *T. africanum*.
Medusa, Hiern, l. c. = *T. Medusa*.
physaloides, Hiern, l. c. = *T. physaloides*.
zeylanica, Hiern, l. c. 720 = *T. zeylanicum*.
- BORRERIA**, G. F. W. Mey. = **Spermacoce**, Linn. (Rubiace.).
alternans, Bello, in *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* x. 283 = *S. alternans*.
andongensis, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 391 = *Tardavel andongensis*.
angustifolia, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 330 = *S. Chamissonis*.
anthospermoides, DC. *Prodr.* iv. 550 = *S. anthospermoides*.
aprica, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 391 = *Tardavel aprica*.
aralioides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 339 = *Emeorrhiza brasiliensis*.
aretioides, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 286 = *S. aretioides*.
argentea, Cham. in *Linnaea*, ix. 215 = *S. argentea*.
arida, DC. *Prodr.* iv. 549 = *S. arida*.
arvensis, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 391 = *Tardavel arvensis*.
basalis, Anderss. *Om Galap. Oarnes Vegetat.* 191 = *S. basalis*.
brachystemonoides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 314 = *S. brachystemodes*.
Buchneri, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 109.—Afr. trop.
centranthoides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 327 = *S. centranthodes*.
decipiens, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 57 = *S. decipiens*.
diodon, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 109.—Afr. trop.
discolor, DC. *Prodr.* iv. 545 = *S. manillensis*.
dispersa, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 217 = *S. dispersa*.
divaricata, Hook. f. l. c. 219 = *S. divaricata*.
equisetoides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 338 = *S. equisetoides*.
ericafolia, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 218 = *S. Hookeri*.
eritrichoides, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 142 = *S. eritrichodes*.
eryngioides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 316 = *S. eryngiodes*.
eupatorioides, Cham. & Schlecht. l. c. 327 = *S. eupatorioides*.
falcifolia, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 219 = *S. falcifolia*.
fastigiata, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 68 = *S. fastigiata*.
filituba, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 110.—Afr. trop.
huillensis, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 391 = *Tardavel huillensis*.
humifusa, Mart. in *Flora*, xxiv. Beibl. ii. 68 = *S. martiana*.
lancea, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 391 = *Tardavel lancea*.
latituba, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 110.—Afr. trop.
- BORRERIA** :—
laxa, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 337 = *S. laxa*.
leiophylla, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 66 = *S. leiophylla*.
linearifolia, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 217 = *S. linearifolia*.
Monodon, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 63 = *S. Monodon*.
neglecta, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 177 = *S. abyssinica*.
ovalis, Anderss. *Om Galap. Oarnes Vegetat.* 192 = *S. ovalis*.
parvifolia, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 218 = *S. parvifolia*.
pedicellata, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 111.—Afr. trop.
perpusilla, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 218 = *S. perpusilla*.
pygmaea, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 58 = *S. spruceana*.
Runkii, K. Schum. l. c. 42 = *S. Runkii*.
saxicola, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 112.—Afr. trop.
scabiosoides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 318 = *S. scabiosodes*.
schumanniana, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxi. 453.—Bras.
squamosa, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 142 = *S. squamosa*.
suberecta, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. 217 = *S. suberecta*.
subvulgata, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 111.—Afr. trop.
tenella, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 217 = *S. suaveolens*.
thalictroides, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 71 = *S. thalictroides*.
thymifolia, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 350 = *S. thymifolia*.
thymioidea, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 391 = *Tardavel thymioidea*.
trichantha, Miq. in *Verh. Nat. Wet. Haarl.* vii. 178 = *S. trichantha*.
umbellata, Spreng. *Neue Entdeck.* ii. 144 = *Emeorrhiza brasiliensis*.
valerianoides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. 335 = *S. valerianodes*.
verbenoides, Cham. & Schlecht. l. c. 331 = *S. verbenodes*.
Warmingii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 42 = *S. Warmingii*.
wyleriana, DC. *Prodr.* iv. 545 = *S. wyleriana*.
Wunschmannii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. 53 = *S. Wunschmannii*.
- BOSCIA**, Lam. (Capparid.).
arabica, Pest. in *Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* III. 127.—Arab.
caloneura, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 390.—Afr. trop.
elegans, Gilg, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 90.—Afr. trop.
hypoglaucula, Gilg, l. c. 91.—Afr. trop.
kalachariensis, Pest. in *Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* III. 98.—Afr. trop.
matabelensis, Pest. l. c. 115.—Afr. austr.
rehmanniana, Pest. l. c. 95.—Afr. trop.
somalensis, Gilg, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 91.—Afr. trop.
transvaalensis, Pest. in *Bull. Herb. Boiss.* vi. *App.* III. 112.—Afr. austr.
xylophylla, Gilg, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 90.—Afr. trop.
- BOSQUEIA**, Thou. (Urtic.).
cerasifolia, Volk. ex *Engl. Monog. Afr. Pfl.* i. 36.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. l. c.* 37.—Afr. trop.
- BOSWELLIA**, Roxb. (Bursar.).
multifoliolata, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 16.—Afr. trop.
Rivae, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
- BOTHRIOCLINE**, Oliver (Compos.).
miseria, O. Hoffm. in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 11 (= *Vernonia misera*).—Afr. trop.
pauana, O. Hoffm. in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 594.—N. Guin.
pauciseta, O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 502.—Afr. trop.
- BOTRYOPLEURON**, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2670 (1900). **SCROPHULARIACEAE**.
axillare, Hemsl. l. c.—China.
latifolium, Hemsl. l. c.—China.
stenostachyum, Hemsl. l. c.—China.
venosum, Hemsl. l. c.—China.

- BOTRYOSICYOS**, Hochst. = **Dioscorea**, Linn. (Dioscor.).
pentaphyllum, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) Bes. Beil. 3 = *D. beccariana*.
- BOUCEROSIA**, Wight & Arn. (Asclepiad.).
adenensis, *Deflers*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 115.—Arab.
awdeliana, *Deflers*, l. c. 116.—Arab.
cicatricosa, *Deflers*, *Voy. Yemen*, 170. t. 4.—Arab.
hispanica, *Coincy*, in *Journ. de Bot.* 1899, 386.—Hispan.
penicillata, *Deflers*, *Voy. Yemen*, 169.—Arab.
tombuctuensis, *A. Chevall.* in *Compt. Rend. Intern. Congr. Bot.* 1900, 271.—Afr. trop.
- BOUCHEEA**, Cham. (Verben.).
Schlechteri, *Guerke*, in *Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 75.—Afr. austr.
Wilmsii, *Guerke*, l. c. 74.—Afr. austr.
- BOUCHETIA**, DC. (Solan.).
anomala, *Loes.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 105 (= *Nierembergia anomala*).—Am. trop.
- BOUGAINVILLEA**, Comm. (Nyctag.).
berberidifolia, *Heimerl*, in *Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxx. 121.—Bolivia.
longispinosa, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 109.—Bolivia.
malmeana, *Heimerl*, in *Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxx. 119.—Bras.
modesta, *Heimerl*, l. c. 118.—Bolivia.
- BOURLAGEODENDRON**, K. Schum. in *Just, Jahresh.* xxvi. 1. (1898) 342, sphalm. = **Boerlagiodendron**, Harms (Aral.).
- BOURRERIA**, P. Br. (Borag.).
litoralis, *Donn. Sm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 150.—Am. cent.
- BOUSIGONIA**, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s.* i. (1898) 35. **APOCYNACEAE**.
mekongensis, *Pierre*, l. c. 36.—Cochinch.
- BOUSSINGAULTIA**, H. B. & K. (Chenopod.).
marginata, *Britton*, ex *Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 128 (= *Tandonia marginata*).—Ecuador.
- BOUTELOUA**, Lag. (Gramin.).
repens, *Scrbn. & Merrill*, in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 26 (= *Dinebra repens*).—Am. bor.
- BOWKERIA**, Harv. (Scrophul.).
calceolarioides, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 120.—Afr. austr.
- BOWLESIA**, Ruiz & Pav. (Umbellif.).
septentrionalis, *Coult. & Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 31.—Am. bor.
- BOYKINIA**, Nutt. (Saxifrag.).
Purpusi, *Brandegee*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 447.—Am. bor.
- BRACHISTUS**, Miers (Solan.).
Feddei, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 674.—Ins. Samoa.
hispidus, *Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 198.—Am. austr.
lasiophyllum, *Rusby*, l. c. (= *Solanum lasiophyllum*).—N. Granat.
leptocaulis, *Rusby*, l. c. 199.—Am. austr.
strigosus, *Rusby*, l. c. 198.—Am. austr.
- BRACHYACTIS**, Ledeb. (Compos.).
angustus, *Britton*, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 383 (= *Aster angustus*).—Am. bor.
- BRACHYCHITON**, Schott & Endl. = **Stereulia**, Linn. (Stercul.).
australis, *Terr.* in *Boll. Ort. Palermo*, i. 62 = *S. trichosiphon*.
diversifolius, *Terr.* l. c. 63 = *S. diversifolia*.
rupestris, *Terr.* l. c. 64 = *S. rupestris*.
- BRACHYCLADOS**, D. Don (Compos.).
involutus, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 137.—Patag.
macrocephalus, *Kuntze*, l. c.—Patag.
obtusifolius, *Kuntze*, l. c.—Patag.
pygmaeus, *Kuntze*, l. c. 138.—Patag.
Stuckerti, *Speg.* in *Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 133.—Reg. Argent.
- BRACHYCOME**, Cass. (Compos.).
alpina, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 271.—N. Zel.
lineata, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 259 (= *Lagenophora lineata*).—N. Zel.
polita, *T. Kirk, l. c.* 261.—N. Zel.
- BRACHYCORYTHIS**, Lindl. (Orchid.).
briantiana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 219.—Afr. trop.
Buchanani, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 570.—Afr. trop.
congoensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* 544.—Afr. trop.
disoides, *Kraenzl. l. c.* 543 (= *Habenaria disoides*).—Madag.
goetziana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 176.—Afr. trop.
Lastii, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 208.—Afr. trop.
Leopoldi, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* 542.—Afr. trop.
parviflora, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 202.—Afr. trop.
rhombo glossa, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* 544.—Afr. trop.
sibangensis, *Kraenzl. l. c.* 547.—Afr. trop.
soyauxiana, *Kraenzl. l. c.* 546.—Afr. trop.
tenuior, *Reichb. f.* in *Flora*, xlvi. (1865) 183 = *Platanthera tenuior*.
- BRACHYELYTRUM**, Beauv. (Gramin.).
procumbens, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* I. 42.—Ecuador.
silvaticum, *Hack. l. c.* (= *Pseudobromus silvaticus*).—Afr. trop.
- BRACHYPODIUM**, Beauv. (Gramin.).
Bolusii, *Stapf*, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 737.—Afr. austr.
columbianum, *Pilg.* in *Engl. Jahrb.* xxvii. 34.—N. Granat.
constrictum, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vii. 363, sphalm. = seq.
contractum, *Presl, Cyp. & Gram. Sic.* 40 = *pinnatum*.
fontanesianum, *Nees, Fl. Afr. Gram.* 457 = *sylvaticum*.
Fontanesii, *Nees, ex Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vii. 363 = *sylvaticum*.
holcooides, *Kunth, Rév. Gram.* ii. 129 = *Arundinella agrostoides*.
nepalense, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 316 = *sylvaticum*.
scaberrimum, *Wight & Arn. ex Steud. Nom. ed. II.* i. 221 = *sylvaticum*.
- BRACHYSTEGIA**, Benth. (Legum.).
cynometroides, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 267.—Afr. trop.
microphylla, *Harms, l. c.* xxviii. 397.—Afr. trop.
mpalensis, *Micheli*, in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 73.—Afr. trop.
Randii, *Baker f.* in *Journ. Bot.* 1899, 433.—Afr. trop.
- BRACHYSTELMA**, R. Br. (Asclepiad.).
caffrum, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 14 = *meyerianum*.
meyerianum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
Rehmannii, *Schlechter*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 449.—Afr. austr.
subaphyllum, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 40.—Afr. trop.
Tavalla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 459.—Afr. trop.
togoense, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 310, nomen.—Afr. trop.
- BRACHYSTEPHANUS**, Nees (Acanth.).
Mannii, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 179.—Afr. trop.
- BRACHYTHALAMUS**, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. (1900) 146. **THYMELAEACEAE**.
caudatus, *Gilg, l. c.*—N. Guin.
podocarpus, *Gilg, l. c.*—N. Guin.
- BRADBURIA**, Torr. & Gray (Compos.).
Schottii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 364.—Mexic.
- BRANDEGEEA**, Cogn. (Cucurb.).
minima, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 121.—Mexic.
Palmeri, *Rose, l. c.* 120 (= *Echinopepon Palmeri*).—Mexic.
- BRASSICA**, Tourn. (Crucif.).
brachycarpa, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 154.—Lesbos.
Hilarionis, *Post*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 18. 90.—Ins. Cyprus.
magellanica, *Pers. Syn. Pl.* ii. 207 = *Sisymbrium magellanicum*.
nostalgica, *Sampaio*, in *Ann. Sci. Nat. Porto*, vi. 142.—Eur.
Parra, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. 118 (= *Sisymbrium Parra*).—Reg. Medit.
- BRAUNERIA**, Neck. = **Echinacea**, Moench (Compos.).
tennesseensis, *Beadle*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 359.—Am. bor.
- BRAYA**, Sternb. & Hoppe (Crucif.).
cachensis, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 46.—Reg. Argent.
linearis, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 254.—Eur.
- BREONIA**, A. Rich. (Rubiace.).
Boivini, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 35.—Madag.
coriacea, *Havil. l. c.* 36.—Madag.
cuspidata, *Havil. l. c.* 37 (= *Nauclea cuspidata*).—Madag.
longipetiolata, *Havil. l. c.* 36.—Hab.?
mauritanica, *Havil. l. c.* 35.—Ins. Maurit.
membranacea, *Havil. l. c.*—Madag.
parviflora, *Havil. l. c.* 37.—Madag.
richardiana, *Havil. l. c.* 36 (= *Sarcocephalus richardiana*).—Madag.
stipulata, *Havil. l. c.* 35.—Madag.
- BRICCHETTIA**, Pax, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1897) 181. **EUPHORBIACEAE**.
somalensis, *Pax, l. c.*—Afr. trop.
- BRIDELIA**, Willd. (Euphorb.).
subnuda, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 393.—N. Guin.
Zenkeri, *Pax*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 327.—Afr. trop.
- BRILLANTAISIA**, Beauv. (Acanth.).
alata, *T. Anders. ex Oliver*, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. 125 = *patula*.
debilis, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 39.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 45.—Afr. trop.
didynama, *Lindau*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 313.—Afr. trop.
fulva, *Lindau, l. c.*—Afr. trop.
Kirungae, *Lindau*, in *Goetzen, Durch Afr.* (repr.) 9.—Afr. trop.
leonensis, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 41.—Afr. trop.
Nyanzarum, *Burkill, l. c.* 39.—Afr. trop.
subcordata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 44.—Afr. trop.
subulugurica, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 42.—Afr. trop.
- BRITTONASTRUM**, Briq. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III. A. (1896) 234. **LABIATAE**.
aurantiacum, *Briq. l. c.* 235 (= *Cedronella aurantiaca*).—Mexic.
breviflorum, *Briq. l. c. Nachtr. I.* 291 (= *Cedronella breviflora*).—Am. bor.
canum, *Briq. l. c.* iv. III. A. 235 (= *Cedronella cana*).—Mexic.
coccineum, *Briq. l. c.* (= *Cedronella coccinea*).—Mexic.
mexicanum, *Briq. l. c.* (= *Cedronella mexicana*).—Mexic.
micranthum, *Briq. l. c.* (= *Cedronella micrantha*).—Am. bor.
pallidiflorum, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 621.—Am. bor.
pallidum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III. A. 235 (= *Cedronella pallida*).—Am. bor.
- BRIZA**, Linn. (Gramin.).
brisodes, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 341 = *elegans*.
deltoides, *Burm. f. Fl. Cap. Prod.* 3 = *minor*.
geniculata, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 21 = *Eragrostis obtusa*.
glomerata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 342.—Reg. Argent.

BRIZA :—

imbricata, Steud. in Flora, xii. (1829) 489 = *Brizopyrum capense*.
patula, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 163.—Chili.
poaeformis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 342 = *triloba*.
rubra, Lam. Illustr. i. 187 = *Eragrostis amabilis*.
Uniolae, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 283 = *Brizopyrum capense*.

BRIZOPYRUM, J. Presl, in Rel. Haenk. 280 (1830).
GRAMINEAE.

acutiflorum, Nees, Fl. Afr. Austr. 371.—Afr. austr.
alternans, Nees, l. c. 369.—Afr. austr.
brachystachyum, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 707.—Afr. austr.
capense, Trin. Fl. Afr. Austr. 371.—Afr. austr.
ciliare, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2602.—Afr. austr.
glomeratum, Stapf, l. c. t. 2603.—Afr. austr.
mucronatum, Nees, in Wall. Cat. n. 8896 = *Halopyrum mucronatum*.
obliterum, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 703.—Afr. austr.

BROCHONEURA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 128. **MYRISTICACEAE**.
acuminata, Warb. l. c. 237 (= *Myristica acuminata*).—Madag.
madagascariensis, Warb. l. c. 234 (= *Myristica madagascariensis*).—Madag.
Vouri, Warb. l. c. 238 (= *Myristica Vouri*).—Madag.

BRODIAEA, Sm. (Liliac.).

Ameghinoi, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 575.—Patag.
brevipes, Baker, in Gard. Chron. 1896, II. 459.—Chili.
candida, Baker, l. c. 239.—Am. bor.
hirtella, Baker, l. c. 459.—Urug.
hyacinthina, Baker, l. c.—Am. bor.
lactea, S. Wats. in Proc. Amer. Acad. xiv. 238 = *hyacinthina*.
Leichtlini, Baker, in Gard. Chron. 1896, II. 459.—Chili.
leptandra, Baker, l. c. 213.—Am. bor.
lilacina, Baker, l. c. 459.—Am. bor.
lugens, Baker, l. c.—Am. bor.
navalis, Baker, l. c.—Chili.
Orcuttii, Baker, l. c. 214.—Am. bor.
patagonica, Baker, l. c. 459.—Patag.
patagonica, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 576.—Patag.
philippiana, Baker, in Gard. Chron. 1896, II. 459.—Chili.
Purdyi, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 427.—Calif.
rosea, Baker, in Gard. Chron. 1896, II. 214.—Am. bor.
scabra, Baker, l. c. 459.—Calif.
sellowiana, Baker, l. c.—Am. austr.
sessiliflora, Baker, l. c.—Chili.
setacea, Baker, l. c.—Am. cent.
subbiflora, Baker, l. c.—Chili.
violacea, Baker, l. c.—Chili.
vittata, Baker, l. c.—Reg. Argent.

BROMELIA, Plum. (Bromel.).

Nidus-puellae, Mes, in DC. Monogr. Phan. ix. 22 (= *Karatas Nidus-puellae*).—Am. trop.
Palmeri, Mes, l. c. 40.—Mexic.
superba, Mes, in Urb. Symb. Antill. ii. 252.—Ind. occ.

BROMHEADIA, Lindl. (Orchid.).

brevifolia, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 340.—Penins. Mal.
pungens, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
rupestris, Ridley, l. c. 341.—Penins. Mal.
scirpoidea, Ridley, in Journ. Bot. 1900, 71.—Malaya.

BROMUS, Dill. (Gramin.).

alaicus, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. 101.—Turkestan.
andinus, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 342.—Chili.
angustatus, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 719.—Bolivia.
annuus, Jacq. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 361 = *patulus*.
araucanus, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 343.—Chili.
chapprianus, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 361, sphalm. = seq.

BROMUS :—

chiapporianus, De Not. ex Nym. Consp. 824 = *patulus*.
confinis, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 320 = *inermis*.
culmineus, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 343.—Chili.
decumbens, Koel. Gram. 242 = *Danthonia decumbens*.
dolichostachys, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 343.—Chili.
dubius, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 373 = *Elymus sibiricus*.
firmior, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 733.—Afr. austr.
himalaicus, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 353.—Ind. or.
japonicus, Thunb. Fl. Jap. 51. t. 11 = *patulus*.
lacmonicus, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xiii. 53.—Graecia.
laevipes, Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 45.—Am. bor.
Leyboldtii, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 344.—Chili.
membranaceus, Jacq. ex Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 74 = *Duthiaea bromioides*.
multiflorus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 865 = *oxyodon*.
multiflorus, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 56 = *polyanthus*.
Munroi, Boiss. Fl. Orient. v. 643 = *inermis*.
Myurus, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 287 = *Tripogon bromioides*.
natalensis, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 732.—Afr. austr.
oliganthus, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 718.—Am. trop.
oxyodon, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 1.—Ind. or.; Turkestan.
pacificus, Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 23.—Am. bor.
patagonicus, Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 230.—Reg. Magell.
pauciflorus, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 713 (= *Festuca pauciflora*).—As. et Am. bor.
pectinatus, Thunb. Prodr. 22 = *patulus*.
pellitus, Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 230.—Reg. Magell.
pindicus, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xiii. 53.—Graecia.
polyanthus, Scribn. ex Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 56.—Am. bor.
scaber, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 341.—Chili.
Schaffneri, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 30.—Mexic.
Stribmyi, Vel. Fl. Bulg. Suppl. i. 297.—Eur.
subvelutinus, Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 52.—Am. bor.
tataricus, Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 369 = *Agropyron Jacquemontii*.
vestitus, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2074 = *patulus*.
villiferus, Steud. Syn. Pl. Gram. 326 = *patulus*.
vulgaris, Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiii. 48.—Am. bor.

BRONGNIARTIA, H. B. & K. (Legum.).

diffusa, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 194.—Mexic.
lunata, Rose, l. c.—Mexic.
suberea, Rose, l. c. 184.—Mexic.

BRONNIA, H. B. & K. = **Fouquieria**, H. B. & K.

(*Tamarisc.*)
Duguetii, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1899, 297.—Calif.
Thiebautii, Van Tiegh. l. c.—Mexic.

BROWNLEEA, Harv. (Orchid.).

alpina, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 287.—Afr. trop.
apetala, N. E. Br. l. c.—Afr. trop.

BRUINSMIA, Boerl. & Koord. in Nat. Tijdschr.

Ned. Ind. liii. (1893) i. 1. **STYRACACEAE**.
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 525.—Celebes.

BRUNFELSIA, Plum. (Solan.).

densifolia, Krug & Urb. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, i. 324.—Ind. occ.
lactea, Krug & Urb. l. c. 323.—Ind. occ.
Picardae, Krug & Urb. l. c. 321.—Ind. occ.
portoricensis, Krug & Urb. l. c. 322.—Ind. occ.
silvicola, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 450.—Bras.

BRUNIA, Linn. (Bruniac.).

Marlothii, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 280.—Afr. austr.
neglecta, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 443.—Afr. austr.

BRUNNICHIA, Banks (Polygon.).

congoensis, Damm. in Engl. Jahrb. xxvi. 357.—Afr. trop.

BRUNSVIGIA, Heist. (Amaryll.).

humilis, Eckl. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 206 = *minor*.
Insizwae, A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien, xv. 27.—Afr. austr.
natalensis, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 208.—Afr. austr.
sphaerocarpa, Baker, l. c. 207.—Afr. austr.

BRUNYERA, Bub. Fl. Pyren. ii. 649 (1900) = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).

biennis, Bub. l. c. = *O. biennis*.

BRYA, P. Br. (Legum.).

buxifolia, Urb. Symb. Antill. ii. 301 (= *Pterocarpus buxifolius*).—Ind. occ.

BRYOPSIS, Reiche, Fl. Chile, i. 206 (1895). **CARYOPHYLLACEAE**.

andicola, Reiche, l. c. (= *Lyallia andicola*).—Chili.

BUCERAGENTIA, Greenm. in Proc. Amer. Acad.

xxxii. (1897) 303. **ACANTHACEAE**.
minutiflora, Greenm. l. c.—Mexic.

BUCHANANIA, Spreng. (Anacard.).

pallida, Pierre, Fl. Cochinch. t. 370 A.—Cochinch.

BUCHENROEDERA, Eckl. & Zeyh. (Legum.).

biflora, Bolus, in Journ. Bot. 1896, 18.—Afr. austr.
pauciflora, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 391.—Afr. austr.
sparsiflora, J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 487.—Afr. austr.

BUCHNERA, Linn. (Scrophul.).

andongensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 775.—Afr. trop.
ensifolia, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 512.—Afr. trop.
fulgens, Engl. l. c. xxviii. 478.—Afr. trop.
humpatensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 777.—Afr. trop.
pallescens, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 512.—Afr. trop.
Randii, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 467.—Afr. trop.
rhodesiana, S. Moore, l. c. 468.—Afr. trop.
trinervia, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 512.—Afr. trop.

BUCKLEYA, Torr. (Santalac.).

graeberiana, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. (1900) 306.—China.
Henryi, Diels, l. c.—China.

BUDA, Adans. = **Spergularia**, C. & J. Presl

(Caryoph.).
campestris, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 13 = *S. rubra*.
grandis, Kuntze, l. c. = *S. grandis*.

BUDDLEIA, Houst. (Logan.).

acutifolia, C. H. Wright, in Kew Bull. 1896, 24.—China.
anchoensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 200.—Bolivia.
canescens, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 78.—Bolivia.
Giraldii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 535.—China.
megaloccephala, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 10.—Am. cent.
montana, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 544.—Am. bor.
oreophila, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiii. 202.—Afr. trop.
tiraquiensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 201.—Bolivia.
verleyseniana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxv. 722.—Ecuador.
Woodii, Gilg, l. c. xxiii. 201.—Afr. austr.

BUETTNERIA, Loeffl. (Stercul.).

campicola, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 444.—Bras.
macrocarpa, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 239.—Am. cent.
subulifolia, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. lx. 15.—Bras.

BUGLOSSITES, Bub. Fl. Pyren. i. 494 (1897) = **Lycopsis**, Linn. (Borag.).
arvensis, Bub. l. c. = *L. arvensis*.

BUGULA, Tourn. = **Ajuga**, Linn. (Labiata).
montana, Bub. Fl. Pyren. i. 471 = *A. pyramidalis*.
moschata, Bub. l. c. 472 = *A. Iva*.

BULBINE, Linn. (Liliac.).
brunsvigiaefolia, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 366.
—Afr. austr.
caespitosa, Baker, l. c. 361.—Afr. austr.
caulescens, Linn. *Hort. Cliff.* 122.—Afr. austr.
concinna, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 534.—Afr. austr.
flexuosa, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1898, 27.—Afr. austr.
frutescens, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 372 = *caulescens*.
natalensis, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 366.—Afr. austr.
parviflora, Baker, l. c. 361.—Afr. austr.
tenuifolia, Baker, ex Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 317.—Afr. austr.
Zeyheri, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xv. 263 = *aloooides*.

BULBINELLA, Kunth (Liliac.).
punctulata, A. Zahlbr. in *Ann. Hofmus. Wien*, xv. 16.
—Afr. austr.

BULBINOPSIS, Borzi, in *Boll. Ort. Bot. Palermo*, (1897) 20. **LILLIACEAE**.
semibarbata, Borzi, l. c. 21.—Austral.

BULBOPHYLLUM, Thou. (Orchid.).
antioquiense, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 457.—N. Granat.
apetalum, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. 127 = *Polystachya bulbophylloides*.
attenuatum, Rolfe, in *Kew Bull.* 1896, 45.—Borneo.
avicella, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 270.—Penins. Mal.
botryophorum, Ridley, l. c. 275.—Penins. Mal.
clarkeanum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. 338.—Ind. or.
cleistogamum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 277.—Penins. Mal.
Collettii, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 585.—Ind. or.
congolanum, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
Cornu-cervi, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. 332.—Ind. or.
cryptanthum, Cogn. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 120.—Bras.
cylindricum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. 333.—Ind. or.
decipiens, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
densiflorum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 277 (non Rolfe).—Penins. Mal.
depressum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 585.—Ind. or.
Drallei, Reicheb. f. in *Regel, Gartenfl.* 1885, 20 = *flavidum*.
ebulbum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. 334.—Ind. or.
elatum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 275.—Borneo.
flammuliferum, Ridley, in *Journ. Bot.* 1898, 211.—Penins. Mal.
forsythianum, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 163.—Madag.
gabunense, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
galbinum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 267.—Penins. Mal.
galeatum, Lindl. *Gen. & Sp. Orch.* 57 = *Polystachya grandiflora*.
Gigas, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 277.—Penins. Mal.
gilgjanum, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 162.—Afr. trop.
gracilipes, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 119.—Ind. or.
hirtulum, Ridley, in *Journ. Bot.* 1900, 71.—Malaya.
hispidum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 268.—Penins. Mal.
imbricatum, Lindl. *Bot. Reg.* 1841, Misc. 37 = *Megaclinium imbricatum*.
insigne, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 272.—Borneo.

BULBOPHYLLUM :—
intermedium, Bailey, in *Bull. Dept. Agr. Queensl.* xiv. 12.—Austral.
kamerunense, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
laurentianum, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 58.—Afr. trop.
lehmannianum, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 458.—N. Granat.
Leoni, Kraenzl. l. c. xxviii. 164.—Ins. Comor.
leptorrhachis, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
lilacinum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 276.—Penins. Mal.
linearifolium, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 586.—Penins. Mal.
Listeri, King & Pantl. l. c. lxxiv. 334.—Ind. or.
longibulbum, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 281, nomen.—Afr. trop.
longiflorum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 268.—Penins. Mal.
longiscapum, Rolfe, in *Kew Bull.* 1896, 45.—Ins. Fiji.
macrochilum, Rolfe, l. c.—Borneo.
melinostachyum, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 342.—Afr. trop.
micropetalum, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* vi. 127 = *Polystachya micropetala*.
mirabile, Hallier f. in *Ann. Jard. Buitens.* xiii. 316.—Borneo.
monanthos, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 271.—Penins. Mal.
monticolum, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. 219 = *gravidum*.
multiflorum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* 1896, i. 294 (= *Odonostylis multiflora*).—Ind. or.
Nummularia, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 35.—Afr. trop.
oblanceolatum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 586.—Penins. Mal.
orthoglossum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* 1896, i. 326.—Malaya.
oxychilum, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
oxypterum, Schlechter, l. c.—Afr. trop.
pectinatum, Finet, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 268.—Hab.?
pedicellatum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 278.—Borneo.
piluliferum, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 76.—Ind. or.
popayanense, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 458.—N. Granat.
prismaticum, Thou. *Orch. Afr.* t. 109.—Ins. Mascar.
ptiloglossum, Wendl. & Kraenzl. in *Gard. Chron.* 1897, i. 330.—Madag.
puberulum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 275.—Borneo.
pumilum, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 54 = *Polystachya bulbophylloides*.
radicans, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 81.—Austral.
reticosum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 273.—Borneo.
Ridleyi, Kraenzl. in *Gard. Chron.* 1896, i. 294 = *multiflorum*.
rigidum, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 69.—Ind. or.
roseum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 276.—Penins. Mal.
rugosum, Ridley, l. c. 266.—Penins. Mal.
Sangae, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
sanguineo-maculatum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 265.—Penins. Mal.
schinzianum, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 57.—Afr. trop.
sessiliflorum, Kraenzl. in *Xenia Orch.* t. 290.—Afr. trop.
shanicum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 587.—Ind. or.
spectabile, Rolfe, in *Kew Bull.* 1898, 193.—Ind. or.
Stella, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 277.—Penins. Mal.
subumbellatum, Ridley, l. c. 274.—Penins. Mal.
tardiflorens, Ridley, l. c. 276.—Borneo.
teretifolium, Schlechter, *Westafr. Kautschuk-Exped.* 282, nomen.—Afr. trop.
Trifolium, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 278.—Penins. Mal.

BULBOPHYLLUM :—
urbanianum, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 163.—Afr. trop.
Vanessa, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 587.—Penins. Mal.
virescens, J. J. Sm. in *Bull. Inst. Buitens.* vii. 3.—Arch. Mal.
vitellinum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 271.—Sumatra?

BULBOSTYLIS, Kunth (Cyperac.).
arenaria, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 19 (= *Isolepis arenaria*).—Bras.
atrosanguinea, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 611 (= *Scirpus atrosanguineus*).—Afr. trop.
Burkei, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 208.—Afr. austr.
fimbriata, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 86.—Ind. occ.
floccosa, C. B. Clarke, l. c.—Ind. occ.
Jacobinae, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 18 (= *Isolepis Jacobinae*).—Bras.
junciformis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 337 (= *Isolepis junciformis*).—Bolivia.
parvinox, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 207.—Afr. austr.
Rehmanni, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 615 = *filamentosa*.
scabra, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 18 (= *Isolepis scabra*).—Bras.
scleropus, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 207.—Afr. austr.
sphaerocephala, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 18 (= *Scirpus sphaerocephalus*).—Bras.
subaphylla, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 86.—Ind. occ.
trichobasis, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 616 (= *Scirpus trichobasis*).—Afr. trop.

BULLIARDA, DC. = **Tillaea**, Mich. (Crassul.).
rosea, Bub. Fl. Pyren. ii. 710 = *T. Vaillantii*.

BUMELIA, Sw. (Sapot.).
cassinifolia, Small, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 442.—Am. bor.
lucida, Small, l. c. 443.—Am. bor.
megacocca, Small, l. c. 441.—Am. bor.
microcarpa, Small, l. c. 440.—Am. bor.
rigida, Small, l. c. 444.—Am. bor.
rufomentosa, Small, l. c. 440, sphalm. = seq.
rufotomentosa, Small, l. c. 438.—Am. bor.

BUNCHOSIA, Rich. (Malpigh.).
costaricensis, Rose, ex Pittier, in *Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 63.—Am. cent.
gracilis, Niedenzu, in *Ind. Lect. Lyc. Brunsb.* 1898, i. 5.—Am. cent.
guatemalensis, Niedenzu, l. c.—Am. cent.
jamaicensis, Urb. & Niedenzu, ex Niedenzu, l. c. 10.—Ind. occ.
lancifolia, Niedenzu, l. c. 6.—Am. cent.
macrophylla, Rose, ex Pittier, in *Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 64.—Am. cent.

BUNIAM, Linn. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).
apiculatum, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 194 = *C. apiculatum*.
avromanum, Drude, l. c. = *C. avromanum*.
burianum, Drude, l. c. = *C. burianum*.
chaerophylloides, Drude, l. c. = *C. chaerophylloides*.
cornigerum, Drude, l. c. = *C. cornigerum*.
cylindricum, Drude, l. c. = *C. cylindricum*.
Elwendia, Drude, l. c. = *C. Elwendia*.
imbricatum, Drude, l. c. = *C. imbricatum*.
Sewersowi, Drude, l. c. = *C. Sewersowi*.
trichophyllum, Drude, l. c. = *C. trichophyllum*.

BUPHANE, Herb. (Amaryllif.).
Fischeri, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.

BUPLEURUM, Tourn. (Umbellif.).
gracilipes, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 493.—China.
microcephalum, Diels, l. c. 494.—China.
thianshanicum, Freyn, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 13. 23.—Oriens.

- BURMANNIA**, Linn. (Burm.).
 australis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xii. no. 8. 25.—Bras.
 grandiflora, *Malme, l. c.* 27.—Bras.
- BURMEISTERA**, Karst. & Triana (Campan.).
 microphylla, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xv. 146.—Am. cent.
 tenuiflora, *Donn. Sm. l. c.* 147.—Am. cent.
- BURNATASTRUM**, Briq. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iv. III. A. 358 (1897). **LABIATAE**.
 lanceolatum, *Briq. l. c.* (= *Plectranthus lanceolatus*).—Madag.
 lavanduloides, *Briq. l. c.* (= *Plectranthus lavanduloides*).—Madag.
 spicatum, *Briq. l. c.* (= *Plectranthus spicatus*).—Afr. austr.
- BURSERIA**, Jacq. (Burser.).
 diversifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 113.—Mexic.
 glabrifolia, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. IV. 251 = penicillata.
 Macgregorii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 282.—Austral.
- BURTONIA**, R. Br. (Legum.).
 simplicifolia, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 349.—Austral.
- BUTTONIA**, MacKen (Scrophul.).
 Hildebrandtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 509.—Afr. trop.
- BUXANTHUS**, Van Tiegh. in *Ann. Sc. Nat. Sér. VIII.* v. (1897) 325. **EUPHORBIAEAE**.
 Hildebrandtii, *Van Tiegh. l. c.* 326 (= *Buxus Hildebrandtii*).—Afr. trop.
 pedicellatus, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
- BUXELLA**, Van Tiegh. in *Ann. Sc. Nat. Sér. VIII.* v. (1897) 326. **EUPHORBIAEAE**.
 Macowani, *Van Tiegh. l. c.* (= *Buxus Macowani*).—Afr. austr.
 madagascariensis, *Van Tiegh. l. c.* (= *Buxus madagascariensis*).—Madag.
- BUXUS**, Linn. (Euphorb.).
 benguelensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 115.—Afr. trop.
 pubescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 481.—Mexic.
 vulgaris, *Bub. Fl. Pyren.* i. 117 = sempervirens.
- BYRONIA**, Endl. (Illicin.).
 anomala, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 847 (= *Ilex anomala*).—Ins. Sandw.
- BYRONIMA**, Rich. (Malpigh.).
 biacuminata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 13.—Bolivia.
 brachybotrya, *Niedensu, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 206.—Am. austr.
 cornifolia, *Niedensu, l. c.*—Bras.
 glazioviana, *Niedensu, l. c.*—Bras.
 spruceana, *Niedensu, l. c.* 207.—Bras.
 wrightiana, *Niedensu, l. c.* 206.—Ind. occ.
- BYSTROPOGON**, L'Hérit. (Labiata).
 andinum, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 83.—Bolivia.
 axillare, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 108.—Bolivia.
 kuntzeanum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 800.—Reg. Argent.
 mandonians, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. 192.—Bolivia.
 minutus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 803.—Bolivia.
 ovatus, *Briq. l. c.* 800.—Bolivia.
 pavonianus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. 193.—Peruv.
 setosus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 801.—Bolivia.
- C**
- CACALIA**, Burm. = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).
 Harveyi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 138 = V. monocephala.
 Hieronymi, *Kuntze, l. c.* = V. Hieronymi.
 Kuntzei, *Kuntze, l. c.* = V. Kuntzei.
 Lehmannii, *Kuntze, l. c.* = V. Lehmannii.
- CACALIA** :—
 mattogrossensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 139 = V. mattogrossensis.
 praecox, *Kuntze, l. c.* = V. praecox.
 rufipapposa, *Kuntze, l. c.* = V. rufipapposa.
 santacruzensis, *Kuntze, l. c.* = V. santacruzensis.
 scabrifoliata, *Kuntze, l. c.* = V. scabrifoliata.
 Schlechteri, *Kuntze, l. c.* = V. Schlechteri.
 sordidopapposa, *Kuntze, l. c.* = V. sordidopapposa.
 squamulosa, *Kuntze, l. c.* = V. squamulosa.
 subacuminata, *Kuntze, l. c.* = V. subacuminata.
 tarijensis, *Kuntze, l. c.* = V. sericea.
 tristis, *Kuntze, l. c.* = V. tristis.
- CACALIA**, Linn. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
 ampullacea, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 577.—Am. cent.
 linumae, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 80 (= *Senecio linumae*).—Japon.
 lobatifolia, *Makino, l. c.*—Japon.
 nikomontana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 94.—Japon.
 pendula, *Forsk. Fl. Aegypt.-Arab.* 145 = S. pendulus.
 shikokiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 80.—Japon.
 suffulta, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 310.—Mexic.
- CACARA**, Rumph. = **Pachyrhizus**, Rich. (Legum.).
 orbicularis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 261.—Afr. trop.
- CACOUCIA**, Aubl. (Combret.).
 Barteri, *Hemsl. in Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.
 exannulata, *O. Hoffm. in Linnæa*, xliii. (1880-82) 182 = *Campylogne exannulata*.
 splendens, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2548.—Afr. trop.
- CACTUS**, Linn. = **ACTEAE**.
 Notesteinii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 272 = *Mammillaria Notesteinii*.
 Palmeri, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 108.—Calif.
- CADABA**, Forsk. (Capparid.).
 barbiger, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 94.—Afr. trop.
 divaricata, *Gilg, l. c.* 93.—Afr. trop.
 mirabilis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
 Ruspolii, *Gilg, l. c.* 94.—Afr. trop.
 termitaria, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. t.* 2527.—Afr. trop.
- CADALVENA**, Fenzl (Scitamin.).
 pistiaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 297.—Afr. trop.
- CAESALPINIA**, Linn. (Legum.).
 bicolor, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 22.—Peruv.
 caymanensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 1. 49.—Ind. occ.
 ciliata, *Urb. Symb. Antill.* ii. 275 (= *Guilandina ciliata*).—Ind. occ.
 cubensis, *Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 416.—Ind. occ.
 divergens, *Urb. Symb. Antill.* ii. 271.—Ind. occ.
 domingensis, *Urb. l. c.* 279.—Ind. occ.
 glauca, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 53.—Bras.
 glaucophylla, *Urb. Symb. Antill.* ii. 274.—Ind. occ.
 Hauthalii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 54.—Parag.
 intermedia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 274.—Ind. occ.
 lucida, *Urb. l. c.* 275.—Ind. occ.
 melanosperma, *Urb. l. c.* 276 (= *Guilandina melanosperma*).—Ind. occ.
 oblongifolia, *Urb. l. c.* 281.—Ind. occ.
 ovalifolia, *Urb. l. c.* 273.—Ind. occ.
 parviflora, *Prain, ex King, in Fourn. As. Soc. Beng.* lxxv. 230.—Penins. Mal.
 rugeliana, *Urb. Symb. Antill.* ii. 278.—Ind. occ.
 spinosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 54 = tinctoria.
 Trothaei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 277.—Afr. trop.
 wrightiana, *Urb. Symb. Antill.* ii. 274.—Ind. occ.
- CAESIA**, R. Br. (Liliac.).
 africana, *Baker, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1875) 160 = *Dasytachys Grantii*.
- CAIOPHORA**, Presl = **Blumenbachia**, Schrad. (Loas.).
 acanthoides, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 286.—Reg. Argent.
 aequatoriana, *Urb. & Gilg, l. c.* 313 = B. contorta.
- CAIOPHORA** :—
 andina, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 287.—Bolivia.
 angustisecta, *Urb. & Gilg, l. c.* 300.—Reg. Argent.
 aspera, *Urb. & Gilg, l. c.* 347 = B. aspera.
 chuquisacana, *Urb. & Gilg, l. c.* 322.—Bolivia.
 chuquitensis, *Urb. & Gilg, l. c.* 301 (= *Loasa chuquitensis*).—Peruv.
 cinerea, *Urb. & Gilg, l. c.* 321.—Bolivia.
 clavata, *Urb. & Gilg, l. c.* 308.—Reg. Argent.
 dumetorum, *Urb. & Gilg, l. c.* 309.—Reg. Argent.
 Kuntzei, *Urb. & Gilg, l. c.* 314.—Bolivia.
 lorentziana, *Urb. & Gilg, l. c.* 289.—Reg. Argent.
 mandoniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 299.—Bolivia.
 pachylepis, *Urb. & Gilg, l. c.* 288.—Peruv.
 patagonica, *Urb. & Gilg, l. c.* 341 (= *Loasa patagonica*).—Am. austr.
 platyphylla, *Urb. & Gilg, l. c.* 317.—Reg. Argent.
 Preslii, *Urb. & Gilg, l. c.* 306.—Am. austr.
 pterosperma, *Urb. & Gilg, l. c.* 324.—Peruv.
 pulchella, *Urb. & Gilg, l. c.* 272.—Reg. Argent.
 pycnophylla, *Urb. & Gilg, l. c.* 274.—Reg. Argent.
 saltensis, *Urb. & Gilg, l. c.* 317.—Reg. Argent.
 silvestris, *Urb. & Gilg, l. c.* 338 = B. scandens.
 Spagazzinii, *Urb. & Gilg, l. c.* 312.—Reg. Argent.
 sphaerocarpa, *Urb. & Gilg, l. c.* 296.—Bolivia.
 stenocarpa, *Urb. & Gilg, l. c.* 330.—Peruv.
 tomentosula, *Urb. & Gilg, l. c.* 340.—Chili.
 tucumana, *Urb. & Gilg, l. c.* 315.—Reg. Argent.
- CAJAN**, Adans. = **Cajanus**, DC. (Legum.).
 Cajan, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 53 = C. indicus.
- CAKILE**, Linn. (Crucif.).
 alacranensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 130.—Am. cent.
 Chapmanii, *Millsp. l. c.*—Am. sept.
 fusiformis, *Greene, Pittonia*, iii. 346.—Am. bor.
 geniculata, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 126.—Am. sept.
- CALAMAGROSTIS**, Adans. (Gramin.).
 alaskana, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 32.—Am. bor.
 americana, *Rydb. & Shear, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* v. 27.—Am. bor.
 angusta, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 21.—Am. bor.
 californica, *Kearn, l. c.* 37.—Am. bor.
 chrysostachya, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 344 (= *Deyeuxia chrysostachya*).—Chili.
 debilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 260.—Ind. or.
 decora, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
 deserticola, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 21 (= *Deyeuxia deserticola*).—Chili.
 fasciculata, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 23.—Am. bor.
 Fauriei, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 653.—Japon.
 foliosa, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 17.—Am. bor.
 fuegiana, *Spig. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 85.—Fuegia.
 fulva, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 344 = *Deyeuxia robusta*.
 grata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 22.—Chili.
 griffithiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 263.—Ind. or.
 Hirthi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 22.—Chili.
 inaequiglumis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 651.—Japon.
 Jacquemontii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 265.—Ind. or.
 labradorica, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 38.—Am. bor.
 lalesarensis, *Torg. & Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 77.—Persia.
 laxiflora, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 34.—Am. bor.
 laxiflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 18.—Chili.
 Lemmoni, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 16.—Am. bor.
 lithuanica, *Bess. in Roem. & Schult. Add. ad Mant.* ii. 602 = epigeios.
 longiseta, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 650.—Japon.
 magellanica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 20.—Am. austr.
 micrantha, *Kearn, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 36.—Am. bor.
 nemoralis, *Kearn, l. c.* 26.—Am. bor.
 nemoralis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 18.—Chili.

CALAMAGROSTIS—

- nepalensis*, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 193 = littorea. pentapogonodes, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 344.*—Bolivia.
- pilosula*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 263.*—Ind. or. *plebeia*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 343* = *Deyeuxia plebeia*. *quadrisseta*, *Kuntze, l. c.* = *Deyeuxia quadrisseta*. *robusta*, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 19* = *Deyeuxia robusta*.
- Schmidii*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 264.*—Ind. or. *scirpiformis*, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 20.*—Chili.
- Stolizkai*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 262.*—Ind. or. *subflexuosa*, *Kearn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 22.*—Am. bor.
- suka*, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 85.*—Fuegia.
- tartarica*, *Jacq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 262* = littorea.
- tripilifera*, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
- urelytra*, *Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 653.*—Japon.
- variegata*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 345* = *Deyeuxia variegata*.
- vilmensis*, *Bess. in Roem. & Schult. Add. ad Mant. ii. 602* = *epigeios*.
- Welwitschii*, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 205.*—Afr. trop.
- CALAMINA**, Beauv. = **Apluda**, Linn. (Gramin.). *humifera*, Beauv. Agrost. 129 = *A. varia*. *humilis*, *Roem. & Schult. Syst. ii. 810* = *A. varia*.
- CALAMINTHA**, Tourn. (Labiata). *caucasica*, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 207.*—Reg. Caucas. *oaxacana*, *Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 564.*—Mexic. *thessala*, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. 46.*—Graecia. *thracica*, *Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1899, 7.*—Eur. *Troodii*, *Post, in Mém. Herb. Boiss. no. 18. 97.*—Ins. Cyprus.
- CALAMUS**, Linn. (Palm.). *Cabrae*, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 151.*—Afr. trop. *Iaboolum*, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii. 14.*—Austral. *longipinna*, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 203.*—N. Guin. *Moti*, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii. 13.*—Austral. *ralumensis*, *Warb. ex K. Schum. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 98.*—N. Brit. *Warburgii*, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 203.*—N. Guin.
- CALANDRINIA**, H. B. & K. (Portul.). *glaucopurpurea*, *Reiche, Fl. Chile, ii. 342.*—Chili. *Grayi*, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 137.*—Am. bor. *macrocarpa*, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires, i. 131.*—Reg. Argent. *pygmaea*, *A. Gray, in Proc. Amer. Acad. viii. 623* = *Grayi*. *thyrsoides*, *Reiche, Fl. Chile, ii. 342.*—Chili. *Tweedyi*, *A. Gray, in Proc. Amer. Acad. xxii. 277* = *Lewisia Tweedyi*.
- CALANTHE**, R. Br. (Orchid.). *arcuata*, *Rolfe, in Kew Bull. 1896, 196.*—China. *celebica*, *Rolfe, l. c. 1899, 129.*—Celebes. *Englishii*, *Rolfe, l. c. 111.*—N. Guin. *ensifolia*, *Rolfe, l. c. 1896, 197.*—China. *Hancockii*, *Rolfe, l. c.*—China. *Henryi*, *Rolfe, l. c.*—China. *lamellosa*, *Rolfe, l. c.*—China. *nipponica*, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xiii. 128.*—Japon. *saccata*, *f. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 3.*—Arch. Mal. *Shelfordi*, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxiii. 23.*—Arch. Mal. *trulliformis*, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 337.*—Ind. or. *tunensis*, *f. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 3.*—Arch. Mal. *Volkensii*, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 46.*—Afr. trop. *whiteana*, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. xv. 121.*—Ind. or.

- CALATHEA**, G. F. W. Mey. (Scitam.). *Pearcei*, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 123.*—Bolivia. *picta*, *Hook. f. Bot. Mag. t. 7674.*—Bras.
- CALCEOLARIA**, Linn. (Scrophul.). *sciadephora*, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxv. 151.*—Am. cent.
- CALCEOLARIA**, Loeff. = **Ionidium**, Vent. (Violac.). *parviflora*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 8* = *I. glutinosum*. *serrata*, *Kuntze, l. c.* = *I. lorenzianum*. *sessiliflora*, *Kuntze, l. c.* = *I. sessiliflorum*.
- CALEA**, Linn. (Compos.). *guatemalensis*, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 9.*—Am. cent. *longipedicellata*, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 28.*—Mexic. *megacephala*, *Robinson & Greenm. l. c. 21.*—Mexic. *Nelsonii*, *Robinson & Greenm. l. c. 25.*—Mexic. *Oliverii*, *Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxix. 106.*—Guiana. *Pittieri*, *Robinson & Greenm. l. c. 105.*—Am. cent. *Sodiroyi*, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 51.*—Ecuador. *ternifolia*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 294.*—N. Granat. *ternifolia*, *Oliv. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. 277* = *Oliverii*. *terrifolia*, *Index Kew. i. 383*, sphalm. = *ternifolia*. *thysanolepis*, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 22.*—Mexic.
- CAESIAM**, Adans. = **Odina**, Roxb. (Anacard.). *ambacensis*, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 177.*—Afr. trop. *antiscorbutica*, *Hiern, l. c. 178.*—Afr. trop. *rubra*, *Hiern, l. c. 177.*—Afr. trop. *Welwitschii*, *Hiern, l. c. 179.*—Afr. trop.
- CALLIANDRA**, Benth. (Legum.). *bijuga*, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 135.*—Mexic. *fulgens*, *Hook. f. Bot. Mag. t. 7626.*—Mexic. *haematostoma*, *Urb. Symb. Antill. ii. 263* = *haematostoma*. *inaequilatera*, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 28.*—Bolivia. *laevis*, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 194.*—Mexic. *nicaraguensis*, *Taub. & Loes. in Engl. Jahrb. xxiii. 124.*—Am. cent. *oaxacana*, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 193.*—Mexic. *penduliflora*, *Rose, l. c.*—Mexic. *peninsularis*, *Rose, l. c. 135.*—Mexic. *serjanioides*, *Urb. Symb. Antill. ii. 262.*—Ind. occ. *silvicola*, *Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 429.*—Bras. *unijuga*, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 193.*—Mexic.
- CALLIANTHEMUM**, C. A. Mey. (Ranuncul.). *acaule*, *Cambess. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7603* = *rutaefolium*. *alatavicum*, *Freyne, in Bull. Herb. Boiss. vi. 882.*—As. cent. *angustifolium*, *Witasek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1899, 336.*—As. cent. *cachemirianum*, *Camb. in Jacquem. Voy. Bot. 5* = *rutaefolium*. *isopyroides*, *Witasek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1899, 341.*—As. cent. *pimpinelloides*, *Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 26* = *rutaefolium*. *sajanense*, *Witasek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1899, 338.*—As. cent. *tibeticum*, *Witasek, l. c. 330.*—Tibet.
- CALLICARPA**, Linn. (Verben.). *Pringlei*, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 345.*—Mexic. *repanda*, *K. Schum. & Warb. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 144.*—N. Brit. *vastifolia*, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 547.*—China.
- CALLIGONUM**, Linn. (Polygon.). *aphyllum*, *Guerke, Pl. Europ. ii. 111* = *C. Pallasia*. *arborescens*, *Litwinow, in Delect. Pl. Furjev. 1900, 52.*—Turkestan.

- CALLIPRORA**, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.). *albida*, *Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, 1897, 20.*—Hort. *scabra*, *Greene, in Erythea, iii. 126* = *B. scabra*.
- CALLIRHOË**, Nutt. (Malvac.). *geranioides*, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 283.*—Am. bor. *scabriuscula*, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am. i. 1. 302.*—Am. bor.
- CALLITRICHE**, Linn. (Halorag.). *aeolica*, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 157.*—Lesbos.
- CALLYNTRANTHELE**, Niedenzu, in Ind. Lect. Lyc. Brunsb. 1897, aest. 4. **MALPIGHIACEAE**. *angustifolia*, *Niedenzu, in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 206* (= *Byrsonima angustifolia*).—Venez.
- CALOCARPUM**, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 274 (1897) = **Lucuma**, Molina (Sapotac.).
- CALOCHORTUS**, Pursh (Liliac.). *acuminatus*, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 189.*—Am. bor. *Purdyi*, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 137.*—Am. bor.
- CALOLISIANTHUS**, Gilg (Gentian.). *macranthus*, *Gilg, in Engl. Jahrb. xxii. 346.*—Bras.
- CALONYCTION**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.). *campanulatum*, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. v. 1050.*—Am. trop. *Pawoni*, *Hallier f. l. c. 1048.*—Am. trop. *setosum*, *Hallier f. l. c.* = *I. setosa*.
- CALOPHANES**, D. Don (Acanth.). *crenatus*, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. 415* = *Dyschoriste depressa*. *linifolius*, *T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 76* = *Dyschoriste linifolius*. *Nagchana*, *Nees, in DC. Prod. xi. 109* = *Dyschoriste depressa*. *radicans*, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 23* = *Dyschoriste radicans*. *setosus*, *Nees, in DC. Prod. xi. 112* = *Ruellioopsis setosa*. *verticillaris*, *T. Anders. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. xxix. 126* = *Dyschoriste verticillaris*.
- CALOPHYLLUM**, Linn. (Guttif.). *Chapelierii*, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1220.*—Madag. *costatum*, *F. M. Bailey, Queensl. Fl. 104.*—Austral. *Kiong*, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 450.*—N. Guin. *laxiflorum*, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1220.*—Madag. *Pervillei*, *Drake, l. c.*—Madag. *subsessile*, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 142.*—Penins. Mal.
- CALOPOGONIUM**, Desv. (Legum.). *orthocarpum*, *Urb. Symb. Antill. i. 327.*—Ind. occ.
- CALORHABDOS**, Benth. (Scrophul.). *axillaris*, *Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 963* = *Botryopleuron axillare*. *Fargesii*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. 16.*—China. *latifolia*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. 196* = *Botryopleuron latifolium*. *stenostachya*, *Hemsl. l. c.* = *Botryopleuron stenostachyum*. *sutchuenensis*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. 16.*—China. *venosa*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. 197* = *Botryopleuron venosum*.
- CALOSTIGMA**, Decne. (Asclep.). *Mosenii*, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 7. 68.*—Bras. *multiflorum*, *Malme, l. c. 67.*—Bras. *Regnelii*, *Malme, l. c. 66.*—Bras.
- CALOTHECA**, Spreng. = **Aeluropus**, Trin. (Gramin.). *arabica*, *Spreng. Syst. i. 348* = *A. villosus*. *elegans*, *Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 199* = *Pappophorum elegans*. *niliaca*, *Spreng. Syst. i. 348* = *A. villosus*.

- CALPOCALYX**, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 191 (1897). *LEGUMINOSAE*.
Dinklagei, Harms, l. c. (= *Erythrophloeum Dinklagei*).—Afr. trop.
- CALPURNIA**, E. Mey. (Legum.).
Antunesii, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 173.—Afr. trop.
macronulata, Harms, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 54.—Afr. austr.
obovata, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 426.—Afr. austr.
Woodii, Schinz, l. c. 428.—Afr. austr.
- CALTHA**, Rupp. (Ranuncul.).
Chelidoni, Greene, Pittonia, iv. 75.—Am. bor.
chionophila, Greene, l. c. 80.—Am. bor.
confinis, Greene, l. c. 76.—Am. bor.
Howellii, Greene, l. c. 79.—Am. bor.
Macounii, Greene, l. c. 77.—Am. bor.
malvacea, Greene, l. c. 75.—Am. bor.
rotundifolia, Greene, l. c. 80.—Am. bor.
uniflora, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 474.—Am. bor.
- CALVOA**, Hook. f. (Melastom.).
Molleri, Gilg, in Engl. Monogr. Afr. Pf. ii. 31.—Afr. trop.
sessiliflora, Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 22.—Afr. trop.
- CALYCADENIA**, DC. = *Hemizonia*, DC. (Compos.).
bicolor, Greene, Fl. Francisc. 421.—Calif.
campestris, Greene, l. c.—Calif.
ciliosa, Greene, l. c.—Calif.
elegans, Greene, l. c. 423.—Calif.
hispidula, Greene, l. c. 421 = H. Douglasii.
oppositifolia, Greene, l. c. 423 = H. multiglandulosa.
ramulosa, Greene, l. c.—Calif.
scabrella, Greene, l. c. 420 = H. scabrella.
spicata, Greene, l. c. 422 = H. Douglasii.
- CALYCERA**, Cav. (Calycer.).
integrifolia, Reiche, in Engl. Jahrb. xxix. 116 (= *Boopis integrifolia*).—Chili.
leucanthera, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 127 (= *Boopis leucanthera*).—Chili.
sympaganthera, Kuntze, l. c. = balsamitaefolia.
- CALYCOPEPLUS**, Planch. (Euphorb.).
Helmsii, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xvi. 341.—Austral.
- CALYCOTHRIX**, Meissn. = *Calythrix*, Labill. (Myrtac.).
Watsoni, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xvi. 355.—Austral.
- CALYPSO**, Salisb. (Orchid.).
occidentalis, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 193.—Am. bor.
- CALYPTRANTHES**, Sw. (Myrtac.).
Tonduzii, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 245.—Am. cent.
- CALYPTROCARYA**, Nees (Cyperac.).
glomerulata, Urb. Symb. Antill. ii. 169 = fragifera.
- CALYPTROTHECA**, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 307. *CAPPARIDACEAE*.
somalensis, Gilg, l. c.—Afr. trop.
- CALYSACCION**, Wight = *Ochrocarpus*, Thou. (Guttif.).
excelsum, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1225 = O. excelsum.
Harmandi, Pierre, l. c. 1226 = O. Harmandi.
- CALYSTEGIA**, R. Br. (Convolv.).
atriplicifolia, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. v. 385.—Am. bor.
discolor, Damm, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvi. 42.—Bras.
Glaziovii, Damm, l. c. 41.—Bras.
- CALYTHRIX**, Labill. (Myrtac.).
desolata, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 191.—Austral.
- CAMARA**, Plum. = *Lantana*, Linn. (Verbenac.).
lilacina, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 250 = L. lilacina.
montevidensis, Kuntze, l. c. = L. sellowiana.
- CAMARIDIUM**, Lindl. (Orchid.).
parviflorum, Fawcett, in Urb. Symb. Antill. i. 472.—Ind. occ.
polyanthum, Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 488.—Ecuador.
- CAMAROTIS**, Lindl. = *Sarcochilus*, R. Br. (Orchid.).
Mannii, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 239 = S. Mannii.
- CAMASSIA**, Lindl. (Liliac.).
azurea, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 547.—Am. bor.
- CAMELLIA**, Linn. (Ternstroem.).
lutchuensis, Ito, ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xii. 332.—Ins. Luchu.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 643.—Celebes.
- CAMMARUM**, Fourr. (Ranuncul.).
hyemale, Hill, British Herbal, (1756) 47 = *Eranthis hyemalis*.
- CAMPANOPSIS**, Kuntze = *Wahlenbergia*, Schrad. (Compos.).
Krebsii, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 185 = W. Zeyheri.
- CAMPANULA**, Tourn. (Campanul.).
albicans, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 319 (= *Trachelium albicans*).—Eur.
angustiflora, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 132.—Am. bor.
arenaria, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 290.—Eur.
asperuloides, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 319 (= *Trachelium asperuloides*).—Eur.
Brotheri, Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 199.—Reg. Caucas.
chalcidica, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 319 (= *Trachelium chalcidicum*).—Eur.
cinerea, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 289 (non Linn.).—Eur.
esculenta, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 148 (non A. Rich.).—Lesbos.
formanekiana, Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxiv. 702.—Eur.
luristanica, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 791.—Persia.
Plasonii, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvii. 155.—Eur.
Postii, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 318 (= *Trachelium Postii*).—Oriens.
revoluta, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxviii. 190.—Eur.
saxifragoides, Doumergue, in Compt. Rend. Assoc. Fr. xxvii. 11. 455.—Afr. bor.
semisecta, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12. (1897) 115.—Hispan.
tubulosa, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 319 (= *Trachelium tubulosum*).—Oriens.
wilkinsiana, Greene, Pittonia, iv. 38.—Am. bor.
- CAMPDERIA**, Benth. (Polygon.).
paniculata, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 440.—Am. cent.
- CAMPTANDRA**, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. (1899) 103. *SCITAMINEAE*.
latifolia, Ridley, l. c. 104.—Penins. Mal.
parvula, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
- CAMPTOSEMA**, Hook. & Arn. (Legum.).
nobile, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 7. 12.—Am. austr.
Sanctae-Barbarae, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 439.—Bras.
- CAMPTOSTYLUS**, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. (1898) 57. *BIXACEAE*.
caudatus, Gilg, l. c.—Afr. trop.
- CAMPULOA**, Desv. (Gramin.).
hirsuta, Desv. in Journ. Bot. i. (1813) 69 = *Harpechloa capensis*.
- CAMPULOSUS**, Desv. (Gramin.).
falcatus, Beauv. Agrost. 157 = *Harpechloa capensis*.
hirsutus, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. 189 = *Harpechloa capensis*.
- CAMPYLOCENTRON**, Benth. (Orchid.).
Kuntzei, Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 298.—Bolivia.
- CAMPYLOCHITON**, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 353 (1898). *COMBRETACEAE*.
platypterus, Hiern, l. c. 354.—Afr. trop.
- CAMPYLOGYNE**, Welw. ex Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2550 (1899). *COMBRETACEAE*.
exannulata, Hemsl. l. c.—Afr. trop.
- CAMPYLOSTEMON**, Welw. (Celastr.).
Duchesnei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 57.—Afr. trop.
- CAMPYLOTHECA**, Cass. = *Coreopsis*, Linn. (Compos.).
mutica, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 916 = C. macrocarpa.
- CANARIASTRUM**, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 364. *BURSERACEAE*.
Zenkeri, Engl. l. c.—Afr. trop.
- CANARIELLUM**, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. (1896) 242. *BURSERACEAE*.
oleiferum, Engl. l. c. (= *Canarium oleiferum*).—N. Caled.
- CANARIUM**, Rumph. (Burserac.).
edule, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 285 = *Pachylobus edulis*.
Greshoffi, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 375, nomen.—Celebes.
greveanum, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 241 = multiflorum.
liebertianum, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 270.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 376, nomen.—Celebes.
Mubajo, Ficalho, in Bol. Soc. Geogr. Lisboa, Ser. II. 611 = *Pachylobus edulis*.
Saphu, Engl. in Engl. Jahrb. xv. 99 = *Pachylobus edulis*.
- CANAVALIA**, DC. (Legum.).
lasiocalyx, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 55.—Bolivia.
rusiosperma, Urb. Symb. Antill. i. 473.—Ind. occ.
- CANNA**, Linn. (Scitamin.).
bidentata, Bertol. in Mem. Acc. Sc. Bolog. x. (1859) 33 = indica.
Ehrenbergii, Bouché, in Linnaea, viii. 150 = indica.
orientalis, Rosc. Scit. t. 12 = indica.
- CANNOMOIS**, Beauv. (Restiac.).
aristatus, Mast. in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxxvi. 19.—Afr. austr.
complanatus, Mast. l. c.—Afr. austr.
congesta, Mast. in Dyer, Fl. Cap. vii. 143.—Afr. austr.
Schlechteri, Mast. in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxxvi. 18.—Afr. austr.
spicatus, Mast. l. c. 19.—Afr. austr.
- CANSCORA**, Lam. (Gentian.).
ramosissima, Baker, in Kew Bull. 1898, 158 = *Torenia spicata*.
- CANTHIUM**, Lam. = *Plectronia*, Linn. (Rubiac.).
Chamaedendrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 545 = P. Chamaedendrum.
ciliatum, Kuntze, l. c. = P. ciliata.
golungense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 478.—Afr. trop.
huillense, Hiern, l. c. 476.—Afr. trop.
inermis, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 545 = P. ventosa.
kraussioides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 473.—Afr. trop.
lactescens, Hiern, l. c. 511.—Afr. trop.
Medusula, Hiern, l. c. 474.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 493, nomen.—Celebes.
pauciflorum, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 545 = P. pauciflora.

CANTHIUM:—

pergracile, Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xii. 352.—Ind. or.
platyphyllum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 479.—Afr. trop.
rhamnoides, Hiern, l. c. 472.—Afr. trop.
spinosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = *P. spinosa*.
suaveolens, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 194.—Austral.
sylvaticum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 477.—Afr. trop.
tenuiflorum, Welw. ex Hiern, l. c.—Afr. trop.
umbrosum, Hiern, l. c. 479.—Afr. trop.
virgatum, Hiern, l. c. 473.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 475.—Afr. trop.
zanzibaricum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 545 = *P. zanzibarica*.

CAPNOIDES, Tourn. = *Corydalis*, Vent. (Papaverac.).

Brandegei, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = *C. Brandegei*.
claviculata, Druce, Fl. Berkshire, 36 = *C. claviculata*.
Cusickii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = *C. Cusickii*.
Halei, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 137.—Am. bor.

CAPPARIS, Tourn. (Capparid.).

andamanica, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 119.—Ins. Andaman.
Atamisquea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 6 = *Atamisquea emarginata*.
Bangii, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 5.—Bolivia.
Dahlia, Gilg & K. Schum. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, i. 208.—N. Brit.
discolor, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 389.—Am. cent.
Erycibe, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 217.—Java.
filipes, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 2.—Am. cent.
Gallatlyi, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 118.—Ind. or.
Henryi, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 33.—Formosa.
malmecana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. 23.—Parag.
portoricensis, Urb. Symb. Antill. i. 309.—Ind. occ.
Rivae, Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 89.—Afr. trop.
somalensis, Gilg, l. c. 90.—Afr. trop.
thyrsoflora, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvii. I. 480, sphalm. = *Cleome thyrsoflora*.

CAPSELLA, Medic. (Crucif.).

draboides, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix. 416.—Turkestan.
Gelmii, Fos. Murr. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 171.—Eur.
villosula, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xvi. 335.—S. Austral.

CAPSICUM, Tourn. (Solanac.).

grandiflorum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 218.—Bolivia.

CARAGANA, Lam. (Legum.).

Aitchisoni, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 372.—Ind. or.
chumbica, Prain, l. c. 370.—Reg. Himal.
polourensis, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii. 321.—Tibet.

CARALLIA, Roxb. (Rhizophor.).

borneensis, Oliv. in Hook. Ic. Pl. t. 2459.—Borneo.
eugenoidea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 320.—Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 319.—Penins. Mal.

CARALLUMA, R. Br. (Asclep.).

huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 697.—Afr. trop.
scutellata, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliiii. 114.—Arab.

CARANDAS, Rumph. = *Carissa*, Linn. (Apocyn.).

edulis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 664 = *C. edulis*.

CARDAMINE, Tourn. (Crucif.).

argentina, Speg. Contr. Fl. Vent. 12.—Reg. Argent.
bilobata, T. Kirk, Fl. N. Zeal. 27.—N. Zel.
caledonica, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 4 (= *Nasturtium caledonicum*).—Afr. austr.

CARDAMINE:—

callosicrenata, Piper, in Coult. Bot. Gaz. xxii. 488.—Am. bor.
dentipetala, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 51.—Japan.
drakeana, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vii. 791.—Japan.
Enisii, Cheesem. ex T. Kirk, Fl. N. Zeal. 28.—N. Zel.
fernandeziana, Johow, Fl. Juan Fernandez, 110 = *chenopodiifolia*.
Fialae, Fritsch, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 44.—Eur.
foliacea, Greene, Pittonia, iv. 201.—Am. bor.
fulcrata, Greene, l. c. iii. 155.—Mexic.
gemmifera, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 49.—Japan.
hederaefolia, Greene, Pittonia, iv. 202.—Am. bor.
Krusselii, Johow, Fl. Juan Fernandez, 112.—Ins. Juan Fernandez.
modocensis, Greene, Pittonia, iv. 203.—Am. bor.
nasturtiifolia, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vii. 793 (non Steud.).—Japan.
neglecta, Greene, Pittonia, iii. 154.—Am. bor.
occidentalis, Howell, Fl. N. W. Amer. 50.—Am. bor.
orbicularis, Greene, Pittonia, iv. 202.—Am. bor.
patagonica, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 490.—Patag.
purpurea, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 130 (non Cham.).—Am. bor.
pygmaea, P. Dusen, in Ergeb. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 175.—Reg. Magell.
umbellata, Greene, Pittonia, iii. 154.—Am. bor.
unijuga, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 246.—Am. bor.
vallicola, Greene, Pittonia, iii. 116.—Am. bor.
xanthina, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 267.—N. Zel.

CARDANTHERA, Buch.-Ham. (Acanthac.).

africana, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1075 = *Synnema africanum*.
justicioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 6 = *Hemigraphis abyssinica*.

CARDIACANTHUS, Schau. = *Jacobinia*, Moric. (Acanthac.).

fragrans, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. vii. 577.—Am. cent.
tetramerioides, Lindau, l. c.—Am. cent.

CARDIOSPERMUM, Linn. (Sapind.).

galapageium, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 38.—Ins. Galap.

CARDOSANCTUS, Bub. Fl. Pyren. ii. 152. (1900) =

Carbenia, Adans. (Compos.).
officinalis, Bub. l. c. = *C. benedicta*.

CARDUNCCELLUS, Adans. (Compos.).

Battandieri, Barratte & Chevall. ex Chevall. in Mém. Herb. Boiss. no. 7. 9.—Afr. bor.

CARDUUS, Tourn. (Compos.).

Andrewsii, Greene, Fl. Francisc. 478 (= *Cnicus Andrewsii*).—Am. bor.
canoviens, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 450.—Am. bor.
Chevallieri, Barratte, ex Chevall. in Mém. Herb. Boiss. no. 7. 9.—Afr. bor.
cymosus, Greene, Fl. Francisc. 480.—Calif.
Flodmanii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 451.—Am. bor.
Hallii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 (= *Cnicus Hallii*).—Am. bor.
hookerianus, A. A. Heller, l. c. (= *Cnicus hookerianus*).—Am. bor.
inamoenus, Greene, Fl. Francisc. 479.—Calif.
Kelseyi, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 449.—Am. bor.
Lecontei, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 157.—Am. bor.
leiocarpus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 (= *Cnicus Eatoni*).—Am. bor.
nebraskensis, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 487.—Am. bor.
nevadensis, Greene, Pittonia, iii. 26.—Am. bor.
Nuttallii, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 157 (= *Cnicus Nuttallii*).—Am. bor.
perennans, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 123.—Am. bor.

CARDUUS:—

prasinus, Glaab, in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 148.—Eur.
scariosus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 (= *Cnicus scariosus*).—Am. bor.
spinulosus, Glaab, in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 147.—Eur.
Tweedyi, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 449.—Am. bor.
validus, Greene, Fl. Francisc. 479.—Calif.
Wheeleri, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7 (= *Cnicus Wheeleri*).—Am. bor.
Wrightii, A. A. Heller, l. c. 8 (= *Cnicus Wrightii*).—Am. bor.

CAREX, Dill. (Cyperac.).

altocaulis, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 326 = *saltuensis*.
amurensis, Kueh. in Bot. Centralbl. lxxvii. 94.—As. bor.
andina, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 485.—Chili.
Anwandteri, R. Phil. l. c. 498.—Chili.
aomorenensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III. viii. 198.—Japan.
araucana, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 495.—Chili.
arcuata, Wahl. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. xxiv. (1803) 151 = *extensa*.
arkansana, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xxi. 6.—Am. bor.
ascotreta, C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III. ix. 182.—China.
atrovirens, Boeck. Cyper. Nov. i. 52.—Reg. Argent.
Balansae, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III. viii. 258.—Tonkin.
baviensis, Franch. l. c. x. 77.—Tonkin.
Bicknellii, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 360.—Am. bor.
bisexualis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 302.—Afr. austr.
Blankinshipii, Fernald, in Erythea, vii. 121.—Am. bor.
Bolusii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 304.—Afr. austr.
boniana, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 190.—Tonkin.
Bornmulleri, Kueh. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 136.—Persia.
Brehmeri, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 190.—Bolivia.
Brotherorum, Christ, in Act. Hort. Petrop. xvi. 434.—Reg. Caucas.
brunnescens, Boeck. Cyper. Nov. i. 44.—Reg. Argent.
Buchanani, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 305.—Afr. austr.
calbucana, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 499.—Chili.
canariensis, Kueh. in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 235.—Ins. Canar.
capitellata, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 174 (non Boiss. & Bal.).—Bras.
catamarcensis, C. B. Clarke, ex Kueh. in Engl. Jahrb. xxvii. 513.—Reg. Argent.
catharinensis, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 191.—Bras.
chlorosaccus, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 298.—Afr. trop.
colchaguensis, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 484.—Chili.
Congdoni, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xxi. 6.—Am. bor.
Costei, Rouy, Ill. Pl. Eur. Rar. t. 149.—Eur.
cristatella, Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 357.—Am. bor.
cryptantha, Holm, in Amer. Journ. Sci. Ser. IV. x. 267.—Am. bor.
Delacosta, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 332 (= *Uncinia macloviana*).—Ins. Falkland.
Dessaueri, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 496.—Chili.
distachya, Desf. Fl. Atlant. ii. 336.—Reg. Medit.
distichoidea, Léveillé & Van. in Bull. Acad. Glogr. Bot. x. 108.—Japan.
drakensbergensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 309.—Afr. austr.
Durandii, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 189.—Costa Rica.
dussiana, Boeck. Cyper. Nov. ii. 42.—Ind. occ.
Eggertii, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xxi. 6.—Am. bor.

CAREX :—

- elynoïdes, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* 1900, i. 356.—Am. bor.
- fibrata, *Vidal, Phanerog. Cuming.* 156.—Ins. Philipp.
- fuegina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 491.—Chili.
- fulva, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* viii. 202.—Japon.
- galbana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Mexic.
- gracilirostris, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* ix. 138.—China.
- haematosaccus, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 297.—Madag.
- Hassei, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 5.—Am. bor.
- helodes, *Link, in Schrad. Journ.* ii. (1799) 309.—Eur.
- hinnulea, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 159.—Ind. occ.
- Idaho, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 5.—Am. bor.
- inconspicua, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 612.—N. Zel.
- irrasa, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Am. bor.
- kurtziana, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 503.—Reg. Argent.
- laevigata, *Sm. in Trans. Linn. Soc.* v. (1800) 272.—helodes.
- lamprocarpa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 497.—Chili.
- lateriflora, *R. Phil. l. c.* 488.—Chili.
- latibracteolata, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 518.—Chili.
- laticeps, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* ix. 178.—China.
- laxiflora, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 48.—Eur.
- ligniciensis, *Figart, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 38.—Eur.
- Linkii*, *Willd. ex Schkuhr, Riedgr.* ii. 39 = distachya.
- longispica, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 174.—Tonkin.
- longistolon, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* viii. 243.—China.
- luctuosa, *Franch. l. c.* ix. 130.—China.
- lugens, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* Ser. IV. x. 269.—Am. bor.
- madrensis, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 270.—Mexic.
- mancaeformis, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* ix. 62.—China.
- mandoniana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 174.—Bolivia.
- melanolepis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 499 (non Boeck.)—Chili.
- melinacra, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* ix. 135.—China.
- Moelleri, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 487.—Chili.
- Molinae, *R. Phil. l. c.* 486.—Chili.
- microtricha, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* ix. 189.—Japon.
- multimoda, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 5.—Am. bor.
- Nebularium, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 492.—Chili.
- nervulosa, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* ix. 120.—Japon.
- nigrolutea, *Gaud. Étrennes de Fl.* 196 = glauca.
- Novae-Zelandiae*, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 273 = rubicunda.
- oaxacana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Mexic.
- ochrolepis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* x. 48.—Japon.
- ochrostachya, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 500.—Chili.
- oreocharis, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* 1900, 358.—Am. bor.
- Ortegae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 488.—Chili.
- oxyphylla, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* x. 57 (non Britton).—China.
- patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 626.—Patag.
- pedicellata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 500.—Chili.
- Peraltae, *R. Phil. l. c.* 490.—Chili.

CAREX :—

- Pittieri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 190.—Am. cent.
- posnanienis, *Sprub. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 184.—Eur.
- praticola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 84.—Am. bor.
- Preussii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 340.—Afr. trop.
- promaucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 496.—Chili.
- pseudobicolor, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 44.—Reg. Himal.
- pseudopunctata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 191.—Bras.
- pseudoscirpoidea, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 78.—Am. bor.
- pterocharpa, *Petrie, Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 353.—N. Zel.
- pterolepta, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* viii. 215.—China.
- pusilla, *Valb. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* iv. 174 (non Pers.).—Eur.
- Raddei, *Kuek. in Bot. Centralbl.* lxxvii. 97.—As. bor.
- Rahmeri, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 502.—Chili.
- rariflora, *Sm. in Sowerby, Engl. Bot.* t. 2516.—Reg. bor. et arct.
- reicheana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 173.—Chili.
- Reichei, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxvii. 504.—Chili.
- rubicunda, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 353.—N. Zel.
- Sagei, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 494.—Chili.
- samoensis, *Boeck. in Engl. Jahrb.* xxv. 588.—Ins. Samoa.
- schenckiana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 35.—Bras.
- schwackeana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 191.—Bras.
- seatoniana, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 270.—Mexic.
- sepulta, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 494.—Chili.
- Serranoi, *R. Phil. l. c.* 501.—Chili.
- setifolia, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i.* 332 = eburnea.
- sicula, *Presl, Cyp. et Gram. Sic.* 9 = distans.
- sonderiana, *Boott, ex Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 38.—Bras.
- sparsinax, *C. B. Clarke, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* x. 66.—China.
- taurina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 490.—Chili.
- temnolepis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III.* x. 61.—Japon.
- tenuissima, *Boott, in Proc. Linn. Soc.* i. (1845) 288.—China bor.; Japon.
- Thompsonii*, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 298 = pterocarpa.
- turgidula, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 271.—Am. bor.
- tymphaea, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 279.—Eur.
- uleana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 42.—Bras.
- Vallisulphrae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 487.—Chili.
- Vilmorini, *Mottet, in Rev. Hort.* 1897, 79.—N. Zel.
- vratislaviensis, *Figert, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 39.—Eur.
- xanthocarpa, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 21.—Am. bor.
- Zeyheri, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 303.—Afr. austr.

CAREYA, Roxb. (Myrtac.).

- niedenzuana, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 136.—N. Brit.

CARICA, Linn. (Passifl.).

- dolicaula, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 247.—Am. cent.

CARINIANA, Casar. = Couratari, Aubl. (Myrtac.).

- estrellensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 89 = C. estrellensis.
- legalis, *Kuntze, l. c.* = C. legalis.

CARLINA, Linn. (Compos.).

- macrocephala, *Form. in Deutsch. Bot. Monatschr.* 1898, 18.—Eur.
- neglecta, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxv. 172.—Eur.
- officinalis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 173 = acaulis.
- rhodopea, *Form. in Deutsch. Bot. Monatschr.* 1898, 19.—Eur.
- rigida, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxiv. 305.—Eur.
- striata, *Form. l. c.* xxxvii. 169.—Eur.
- sylvestris, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 174 = vulgaris.

CARLOSTEPHANIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 658 (1900)

- = *Circaea*, Tourn. (Onagrac.).
- major, *Bub. l. c.* 659 = C. lutetiana.
- minor, *Bub. l. c.* 660 = C. alpina.

CARLOWRIGHTIA, A. Gray (Acanth.).

- glandulosa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 40.—Mexic.
- linearifolia, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 661 (non A. Gray).—Mexic.
- Pringlei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 40.—Mexic.

CARLUDOVICA, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).

- Goebelii, *J. E. Weiss & Wagn. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 138.—Venez.
- laucheana, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7683.—N. Granat.
- mattogrossensis, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 8. 6.—Bras.
- rvularis, *Lindm. l. c.* 4.—Bras.

CARMICHAELIA, R. Br. (Legum.).

- acuminata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 506.—N. Zel.
- angustata, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
- Hookeri, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
- Petriei, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
- robusta, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.
- subulata, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 112.—N. Zel.
- violacea, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 506.—N. Zel.
- virgata, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.

CAROLOFRITSCHIA, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi.

- (1899) 362. *GESNERACEAE.*
- diandra, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

CARPACOCE, Sond. (Rubiace.).

- heteromorpha, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 25.—Afr. austr.

CARPESIMUM, Linn. (Compos.).

- eximium, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 58.—China.
- Faberi, *Winkl. l. c.* 65.—China.
- humile, *Winkl. l. c.* 70.—China.
- Lipskyi, *Winkl. l. c.* 68.—As. cent.
- velutinum, *Winkl. l. c.* 73.—China.

CARPINUS, Linn. (Cupulif.).

- Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 202.—China.
- polyneura, *Franch. l. c.*—China.
- pubescens, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 502.—China.
- seemeniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 279.—China.

CARPODINUS, R. Br. (Apocyn.).

- congolensis, *Staff, in Kew Bull.* 1898, 303.—Afr. trop.
- decipiens, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 37, nomen.—Afr. trop.
- exserens, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 219.—Afr. trop.
- flava, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 37, nomen.—Afr. trop.
- flavidiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 220.—Afr. trop.
- foretiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 38, nomen.—Afr. trop.
- friabilis, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
- fulva, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
- glabra, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
- gracilis, *Staff, in Kew Bull.* 1898, 303.—Afr. trop.
- hirsuta, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1900, 312.—Afr. trop.
- Iganda, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 38, nomen.—Afr. trop.
- Jumellei, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.
- klaineana, *Pierre, l. c.* 36 = Klainii.

CARPODINUS :—

- klainii, *Pierre*, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 38, nomen.—Afr. trop.
 laxiflora, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 220.—Afr. trop.
 leptantha, *Stapp*, in *Kew Bull.* 1898, 303 (non *K. Schum.*).—Afr. trop.
 lignustrifolia, *Stapp*, l. c. 304.—Afr. trop.
 macrantha, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 220.—Afr. trop.
 maximus, *K. Schum. ex Hallier f.* in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 105.—Afr. trop.
 myriantha, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 221.—Afr. trop.
 parvifolia, *Pierre*, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 38, nomen.—Cochinch.
 rufonervis, *Pierre*, l. c.—Afr. trop.
 Schlechteri, *K. Schum.* in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 306, nomen.—Afr. trop.
 tenuifolia, *Pierre*, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 37, nomen.—Afr. trop.
 trichanthera, *Pierre*, l. c. 38, nomen.—Afr. trop.
 turbinata, *Stapp*, in *Kew Bull.* 1898, 304.—Afr. trop.
 umbellata, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 221.—Afr. trop.
 violacea, *K. Schum. ex Hallier f.* in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 112.—Afr. trop.
 watsoniana, *Vogtherr*, in *Koehl. Medicinalpfl.* iii. sub t. 14 (= *Landolphia watsoniana*).—Afr. trop.

CARPOLOBIA, G. Don (Polygal.).

- Goetzei, *Guérke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 417.—Afr. trop.
 macrostachya, *Chod.* in *Bull. Herb. Boiss.* v. 117.—Afr. trop.

CARRIEREA, Franch. in *Rev. Hort.* 1896, 498. **BIXACEAE.**

- calycina, *Franch.* l. c.—China.

CARSONIA, Greene, *Pittonia*, iv. (1900) 211. **CAPARIDACEAE.**

- sparsifolia, *Greene*, l. c. 212 (= *Cleome sparsifolia*).—Am. bor.

CARTHAMUS, Tourn. (Compos.).

- ambiguus, *Heldr. ex Halacsy*, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1899, 186.—Eur.
 Boissieri, *Halacsy*, l. c. = glaucus.

CARUM, Rup. (Umbellif.).

- colchicum, *Lipsky*, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. 277.—Reg. Caucas.
 pachypodium, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 157.—Lesbos.

CARVI, Bub. Fl. Pyren. ii. 352 (1900) = **Carum**, Rup. (Umbellif.).

- Bulbocastanum*, Bub. l. c. = *C. Bulbocastanum*.
careum, Bub. l. c. = *C. Carvi*.
flexuosum, Bub. l. c. 354 = *C. flexuosum*.
verticillatum, Bub. l. c. 353 = *C. verticillatum*.

CASEARIA, Jacq. (Samyd.).

- andamanica, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 16.—Ins. Andaman.
 attenuata, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 40.—Bolivia.
 bicolor, *Urb. Symb. Antill.* i. 372.—Ind. occ.
 boliviana, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 69.—Bolivia.
 Clarkei, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 18.—Malaya.
 commutata, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 65.—Am. trop.
 coriacea, *Thwaites*, *Enum. Pl. Zeyl.* 20 = *Thwaitesii*.
 ehrenbergiana, *Urb. Symb. Antill.* i. 373.—Ind. occ.
 ferruginea, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 70.—Bras.
 Glaziovii, *Brig.* l. c. 72.—Bras.
 gossypiosperma, *Brig.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* I. 55.—Parag.
 Grisebachii, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 62 (= *Valentiniacoriacea*).—Ind. occ.
 Junodii, *Schinz*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 52.—Afr. austr.
 Kunstleri, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 17.—Malaya.
 lindeniana, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 67.—Mexic.

CASEARIA :—

- obovata, *Poepp.* ex *Eichl.* in *Mart. Fl. Bras.* xiii. i. 472 = commutata.
 orizabana, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 67.—Mexic.
 platyphylla, *Brig.* l. c. 68.—Mexic.
 Pringlei, *Brig.* l. c. 65.—Mexic.
 rusbyana, *Brig.* l. c. 73.—Venez.
 Thwaitesii, *Brig.* l. c. 62.—Zeylan.

CASIMIROA, La Llave (Rutac.).

- Pringlei, *Engl.* in *Engl. & Prantl, Pflansenf.* iii. iv. 178 (= *Sargentia Pringlei*).—Mexic.
 tetrameria, *Millsp.* in *Field Columb. Mus. Bot.* i. 401.—Mexic.
 Watsonii, *Engl.* in *Engl. & Prantl, Pflansenf.* iii. iv. 178.—Mexic.

CASSIA, Tourn. (Legum.).

- angolensis, *Welw.* ex *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 291.—Afr. trop.
 Caeciliae, *Harms*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 549.—Am. cent.
 confinis, *Greene, Pittonia*, iii. 225.—Am. bor.
 goyazensis, *Taub.* in *Engl. Jahrb.* xxi. 435.—Bras.
 guatemalensis, *Donn. Sm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 6.—Am. cent.
 myrtifolia, *Phil. ex Reiche*, *Fl. Chile*, ii. 86.—Chili.
 Nelsoni, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 135.—Mexic.
 portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 317.—Ind. occ.
 Pringlei, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 194.—Mexic.
 proboscidea, *Pollard*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 281.—Ind. occ.
 seleriana, *Harms*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 551.—Am. cent.
 Stahlia, *Urb. Symb. Antill.* i. 316.—Ind. occ.
 unijuga, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 195.—Mexic.

CASSIDA, Tourn. = **Scutellaria**, Riv. (Labiata).

- minor, *Bub.* Fl. Pyren. i. 424 = *S. minor*.

CASSINE, Linn. (Celastr.).

- Burchellii, *Loes.* in *Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 223.—Afr. austr.
 laciniata, *Loes.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 432.—Afr. trop.
 schinziana, *Loes.* in *Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 223 (= *Maurocena schinziana*).—Afr. austr.
 schlechteriana, *Loes.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 432.—Afr. trop.

CASSINIA, R. Br. (Compos.).

- alba, *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 470.—Afr. trop.
 amoena, *Cheesem.* in *Trans. N. Z. Inst.* xxix. 391.—N. Zel.

CASSINOPIS, Sond. (Oclacin.).

- ilicifolia, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 36 = capensis.

CASSYTHA, Linn. (Laurin.).

- pondoensis, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxvi. 392.—Afr. trop.

CASTANOPSIS, Spach (Cupul.).

- Delavayi, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1899, 194.—China.
 Fargesii, *Franch.* l. c. 195.—China.
 Henryi, *Skan*, in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. 523.—China.
 orthacantha, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1899, 194.—China.
 tonkinensis, *Seemen*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. *Beibl.* lvii. 55.—Tonkin.

CASTANOSPORA, F. Muell. (Sapind.).

- longistipitata, *F. M. Bailey*, *Queensl. Fl.* 288.—Austral.

CASTELNAVIA, Tul. & Wedd. (Podostem.).

- lindmaniana, *Warm.* in *Danske Vid. Selsk. Skrift.* Ser. VI. ix. 140.—Bras.

CASTILLEJA, Mutis (Scrophul.).

- Applegatei, *Fernald*, in *Erythea*, 1898, 49.—Am. bor.
 aurea, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 39.—Mexic.
 brachyantha, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 360.—Am. bor.
 Breweri, *Fernald*, in *Erythea*, 1898, 49.—Am. bor.

CASTILLEJA :—

- cervina, *Greenm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 269.—Am. bor.
 chromosa, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 245.—Am. bor.
 confusa, *Greene, Pittonia*, iv. 1.—Am. bor.
 covilleana, *Hend.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 353.—Am. bor.
 Crista-galli, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 355.—Am. bor.
 Cusickii, *Greenm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 267.—Am. bor.
 Dixonii, *Fernald*, in *Erythea*, 1899, 122.—Am. bor.
 Elmeri, *Fernald*, l. c. 1898, 51.—Am. bor.
 fasciculata, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 133.—Am. bor.
 Haydeni, *Greene, Pittonia*, iv. 1.—Am. bor.
 lanceifolia, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 357.—Am. bor.
 lauta, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 269.—Am. bor.
 levisecta, *Greenm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 268.—Am. bor.
 lineata, *Greene, Pittonia*, iv. 151.—Am. bor.
 longispica, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 480.—Am. bor.
 lutea, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 268.—Am. bor.
 lutescens, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 359.—Am. bor.
 montana, *Congd.* in *Erythea*, 1900, 188.—Calif.
 oreopola, *Greenm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 264.—Am. bor.
 pallescens, *Greenm.* l. c. 266 (= *Orthocarpus pallescens*).—Am. bor.
 pilosa, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 361 = *Orthocarpus pilosus*.
 pinetorum, *Fernald*, in *Erythea*, 1898, 50.—Am. bor.
 pruinosa, *Fernald*, l. c.—Am. bor.
 remota, *Greene, Pittonia*, iv. 2.—Am. bor.
 rhexifolia, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 356.—Am. bor.
 rubida, *Piper*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 398.—Am. bor.
 rupicola, *Piper*, ex *Fernald*, in *Erythea*, 1898, 45.—Am. bor.
 rustica, *Piper*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 398.—Am. bor.
 stricta, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 354 (non *Benth.*).—Am. bor.
 subinclusa, *Greene, Pittonia*, iv. 2.—Am. bor.
 sulphurea, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 359.—Am. bor.
 Tweedyi, *Rydb.* l. c. 358.—Am. bor.
 villosa, *Rydb.* l. c. 361.—Am. bor.

CASTILLOA, Cervant. (Urtic.).

- Tunu, *Hemsl.* in *Hook. Ic. Pl.* t. 2651.—Am. cent.

CASUABINA, Linn. (Casuarin.).

- Cabbagei, *R. T. Baker*, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 605.—Austral.
 Luehmanni, *R. T. Baker*, l. c. 608.—Austral.

CATABROSA, Beauv. (Gramin.).

- himalaica, *Stapp*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 311.—Ind. or.
 nutans, *Stapp*, l. c. 312.—Ind. or.
 sikkimensis, *Stapp*, l. c. 311.—Ind. or.
 Thomsoni, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
 Wallichii, *Hook. f. l. c.* 312.—Ind. or.

CATAPODIUM, Link = **Festuca**, Linn. (Gramin.).

- filiforme, *Nees*, ex *Steud.* *Syn. Pl. Gram.* 301 = *Triopogon abyssinicus*.
 tenellum, *Husnot*, *Graminées*, i. 68 = *F. Poa*.
 unilaterale, *Griseb.* in *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 347 = *F. tenuiflora*.

CATARIA, Adans. = **Nepeta**, Linn. (Labiata).

- latifolia, *Bub.* Fl. Pyren. i. 428 = *N. latifolia*.
 tenuifolia, *Bub.* l. c. 426 = *N. Nepetella*.

CATASETUM, Rich. (Orchid.).

- rostratum, *Klinge*, in *Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 134.—Ind. occ.

CATESBAEA, Linn. (Rubiace.).

- melanocarpa, *Krug & Urb.* in *Urb. Symb. Antill.* i. 427.—Ind. occ.
 nana, *Greenm. ex Combs*, in *Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 428.—Ind. occ.

- CATHCARTIA**, Hook. f. (Papav.).
lyrata, *Cummins & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* l. xv. 325.—Reg. Himal.
polygonoides, *Prain, l. c.* 326.—Ind. or.
- CATOPHERIA**, Benth. (Labiata).
spicata, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 374 (= *Orthosiphon spicatus*).—N. Granat.
- CATOPSIS**, Griseb. (Bromel.).
berteroniana, *Mex, in DC. Monog. Phan.* ix. 621.—Am. bor.
deflexa, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. 323.—Bras.
morreniana, *Mex, in DC. Monog. Phan.* ix. 628.—Mexic.
Mosenii, *Mex, l. c.* 622.—Bras.
nitida, *Baker, Handb. Bromel.* 154 = berteroniana.
oerstediana, *Mex, in DC. Monog. Phan.* ix. 630.—Am. cent.
sessiliflora, *Mez, l. c.* 625 = nutans.
tenella, *Mex, l. c.* 631.—Mexic.
wawreana, *Mex, l. c.* 626.—Mexic.
- CATTLEYA**, Lindl. (Orchid.).
Alexandrae, L. Linden & Rolfe, in *Gard. Chron.* 1892, i. 522 = elongata.
brasiliensis, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 135.—Bras.
Patini, *Cogn. Dict. Ic. Orch. Cattl.* t. 25.—Ind. or.
- CAUCALIS**, Linn. (Umbellif.).
cordisepala, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12. (1897) 85.—Afr. bor.
grandiflora, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 160 (non Linn.).—Lesbos.
heterocarpa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. Afd. II. no. 1. (1900) 33.—Afr. bor.
homaeophylla, *Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 571.—Eur.
mossamedensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 432.—Afr. trop.
- CAVENDISHIA**, Lindl. (Vaccin.).
capitulata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 147.—Am. cent.
- CAYAPONIA**, Silva Manso (Cucurb.).
Aubia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 121 = attenuata.
grandifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 496 = *Melothria grandifolia*.
- CEANOETHUS**, Linn. (Rhamnac.).
glaber, *Trel. in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 412 (non Spach).—Am. bor.
laevigatus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 114.—Am. bor.
Martini, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 41.—Am. bor.
perplexans, *Trel. in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 417.—Am. bor.
- CECROPIA**, Linn. (Urtic.).
polyplebia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 442.—Am. cent.
- CEDELEA**, P. Br. (Meliac.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 636.—Celebes.
oaxacensis, *C. DC. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 190.—Mexic.
occidentalis, *C. DC. & Rose, l. c.*—Mexic.
- CEIBA**, Medic. = *Eriodendron*, DC. (Malvac.).
boliviana, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 174.—Bolivia.
Glasiiovii, K. Schum. in *Just, Jahresh.* xxvi. i. 343.—Bras.
Mandoni, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 175.—Bolivia.
Schottii, *Britten & Baker f. l. c.* 173.—Am. cent.
Sipolisii, K. Schum. & Schwacke, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 16.—Bras.
tunariensis, K. Schum. in *Just, Jahresh.* xxvi. i. 343.—Bolivia.
- CELASTRUS**, Linn. (Celastr.).
angustifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 37 = *polyacanthus*.
- CELASTRUS** :—
hypoleucus, *Warb. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 445 (= *Erythrospermum hypoleucum*).—China.
Moya, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 37 (= *Moya spinosa*).—Reg. Argent.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 195.—Mexic.
racemosa, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 222 = *Maytenus racemosa*.
rosthornianus, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 445.—China.
Saharae, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 251.—Afr. bor.
Schlechteri, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 37 = *Gymnosporia Schlechteri*.
- CELMISIA**, Cass. (Compos.).
argentea, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 292.—N. Zel.
flaccida, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 423.—N. Zel.
mollis, *Cockayne, l. c.*—N. Zel.
- CELOME**, Greene, Pittonia, iv. (1900) 210. *CAPPARIDACEAE*.
platycarpa, *Greene, l. c.* 211 (= *Cleome platycarpa*).—Am. bor.
- CELOSIA**, Linn. (Amarant.).
chenopodiifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 276.—Afr. trop.
cuneifolia, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
falcata, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 58.—Afr. trop.
loandensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 277.—Afr. trop.
minutiflora, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
nana, *Baker, l. c.* (non Blanco).—Afr. trop.
oblongocarpa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 418.—Afr. trop.
pandurata, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 276.—Afr. trop.
semperflorens, *Baker, l. c.* 277.—Afr. trop.
staticodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 886.—Afr. trop.
stuhlmanniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 419.—Afr. trop.
- CELSIA**, Linn. (Scrophul.).
atroviolacea, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 201.—Reg. Caucas.
Bottae, *Defflers, Voy. Yemen,* 178.—Arab.
carmanica, *Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 51.—Persia.
- CELTIS**, Tourn. (Urtic.).
Durandii, *Engl. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 22.—Afr. trop.
georgiana, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 439.—Am. bor.
Helleri, *Small, l. c.*—Am. bor.
Henriquezii, *Engl. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 22.—Afr. trop.
Prantlii, *Priemer, ex Engl. l. c.* 23.—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Stuhlmanni, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 22.—Afr. trop.
- CENCHRUS**, Linn. (Gramin.).
alopocuroides, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 24 = *Pennisetum typhoideum*.
Anjania, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 8649 B = *Pennisetum cenchroides*.
annularis, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 553 = catharticus.
asperifolius, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 388 = *Pennisetum orientale*.
bulbifer, *Hochst. ex Boiss. Fl. Orient.* v. 443 = biflorus.
frutescens, *Sieb. in Bot. Zeit.* ix. 14 = *Phragmites communis*.
hordeiformis, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 24 = *Pennisetum macrurum*.
insularis, *Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 26.—Am. cent.
Lapeta, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 8654, A, D = catharticus.
longifolius, *Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 109 = *Pennisetum cenchroides*.
macrocephalus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 110.—Am. bor.
montanus, *Nees, in Royle, Illustr. Bot. Himal.* 416 = biflorus.
mutabilis, *Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 88 = *Pennisetum cenchroides*.
- CENCHRUS** :—
mutilatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 347 (= *Pennisetum mutilatum*).—Reg. Argent.
nervosus, *Kuntze, l. c.* (= *Pennisetum nervosum*).—Bras.
panicus, *Heyne, ex Wall. Cat. n.* 8650 = *Pennisetum typhoideum*.
pennisetiformis, *Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed.* II. i. 317 = *Pennisetum cenchroides*.
pubescens, *Steud. l. c.* = *Antheophora pubescens*.
purpurascens, *Thunb. in Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 329 = *Pennisetum compressum*.
quinquevalvis, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 8854 B, C = biflorus.
Schimperi, *Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed.* II. i. 317 = biflorus.
spicatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 346 = *Pennisetum typhoideum*.
triflorus, *Aitch. Cat. Panjab. Pl.* 163, sphalm. = biflorus.
tripsacoides, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 62 = biflorus.
tristachyus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 347 (= *Pennisetum tristachyon*).—Ecuador.
uniflorus, *Ehrens. ex Boiss. Fl. Orient.* v. 448 = biflorus.
villosus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 347 = *Pennisetum villosum*.
- CENOSTIGMA**, Tul. (Legum.).
sclerophyllum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11. 24.—Parag.
- CENTAUREA**, Linn. (Compos.).
Adamovicii, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 173.—Eur.
aragonensis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 162.—Eur.
asperula, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 588.—Eur.
Bridgesii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 169.—Chili.
confusa, *Coste & Sennen, in Magnier, Scrinia Fl. Select. fide Just, Jahresh.* xxv. II. 335.—Hybr.
confusa, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 596.—Eur.
drakiensis, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 783.—Eur.
emigrantis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 165.—Eur.
epirota, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 581.—Eur.
ferulacea, *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iii. 370.—Eur.
hoffmanniana, *Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl.* 752 = pulchra.
hoffmanseggiana, *Lasaro, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 150.—Eur.
Jankae, *Brandea, in Anal. Acad. Roman.* Ser. II. iv. (1884) 42.—Eur.
kalambakensis, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* v. 784.—Eur.
kanitziana, *Janka, ex Brandea, in Anal. Acad. Roman.* Ser. II. iv. (1884) 43.—Eur.
Kochii, *Claire, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1900, 45.—Eur.
lacerata, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 591.—Eur.
lactiflora, *Halacsy, l. c.* 601.—Eur.
Linarsii, *Laz. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxix. 152.—Eur.
macedonica, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 595 = *Grisebachii*.
ossaea, *Halacsy, l. c.* 591.—Eur.
pallidior, *Halacsy, l. c.* 594.—Eur.
parnonia, *Halacsy, l. c.* 648.—Eur.
paucifuga, *Halacsy, l. c.* 595.—Eur.
peregrina, *Coste & Sennen, in Magnier, Scrinia Fl. Select. fide Just, Jahresh.* xxv. II. 335.—Hybr.
Rouyi, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 165.—Eur.
saxifraga, *Coincy, l. c.* 45.—Eur.
setabensis, *Coincy, l. c.* 332.—Eur.
Sibthorpii, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 635.—Eur.
Spina-badia, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 160 = caeruleascens.
spruneriana, *Halacsy, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 640 = *Spruneri*.
subarachnoidea, *Halacsy, l. c.* 638 = laconica.
transiens, *Halacsy, l. c.* 587.—Eur.
Urumovi, *Vel. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1899, 5.—Eur.
Wettsteinii, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 726.—Eur.
- CENTAURODENDRON**, Johow, Fl. Juan Fernandez, 63 (1896). *COMPOSITAE*.
dracaenoides, *Johow, l. c.*—Ins. Juan Fernandez.
- CENTAUROPSIS**, Boj. (Compos.).
Boivini, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 103.—Madag.

CENTELLA, Linn. = **Hydrocotyle**, Linn. (Umbellif.).
callioda, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 119 = *H. callioda*.
Chamissonis, Drude, l. c. 120 = *H. Centella*.
debilis, Drude, l. c. = *H. debilis*.
eriantha, Drude, l. c. 119 = *H. eriantha*.
flexuosa, Drude, l. c. = *H. flexuosa*.
glochidiata, Drude, l. c. 120 = *H. glochidiata*.
hederifolia, Drude, l. c. 119 = *H. hederifolia*.
homalocarpa, Drude, l. c. 120 = *H. verticillata*.
Solandra, Drude, l. c. = *H. Solandra*.
triloba, Drude, l. c. = *H. triloba*.

CENTEEMA, Hook. f. (Amarant.).
alternifolia, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 419.—Afr. trop.
glomerata, Loopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 49.—Afr. trop.
gracilentata, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 890.—Afr. trop.
polygonooides, Loopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 48.—Afr. trop.
rubra, Loopr. l. c. 49.—Afr. trop.

CENTOTHECA, Desv. (Gramin.).
owariensis, Hack. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo, 333 (= *Eragrostis beninensis*).—Afr. trop.
parviflora, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 559 = *Iappacea*.

CENTRATHERUM, Cass. (Compos.).
grande, Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo, 169 (= *Decaneurum grande*).—Afr. trop.; Madag.

CENTRILLA, Lindan, in Urb. Symb. Antill. ii. (1900) 232 = *Dianthera*, Gronov. (Acanth.).
sagraeana, Lindan, l. c. = *D. sagraeana*.

CENTROMADIA, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 196 (1894). **COMPOSITAE**.
Fitchii, Greene, l. c. 197.—Calif.
maritima, Greene, l. c. 196.—Calif.
Parryi, Greene, l. c. 197.—Calif.
perennis, Greene, Pittonia, iii. 26.—Calif.
pungens, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 196.—Calif.
rudis, Greene, l. c. 197.—Calif.

CENTROPHORUM, Trin. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
chinense, Trin. Fund. Agrost. 106. t. 5 = *A. aciculatus*.

CENTROPLACUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 114. **BIXACEAE**.
glauclus, Pierre, l. c. 115.—Afr. trop.

CENTROPOGON, Presl (Campan.).
Bangi, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 372.—Bolivia.
brittonianus, A. Zahlbr. l. c. 373.—Bolivia.
gloriosus, A. Zahlbr. l. c. (= *Siphocampylus gloriosus*).—Bolivia.
incanus, A. Zahlbr. l. c. (= *Siphocampylus incanus*).—Bolivia.
undavensis, A. Zahlbr. l. c. 374 (= *Siphocampylus undavensis*).—Bolivia.

CENTROSEMA, Benth. (Legum.).
Schottii, K. Schum. in Just, Fakresb. xxvi. i. 353 (= *Bradburya Schottii*).—Mexic.

CENTUNCULUS, Dill. (Primul.).
pumilus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 193 = *pentandrus*.

CEPHALANTHERA, Rich. (Orchid.).
Austinae, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II, 4 = *oregana*.
chartacea, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lvi. 598.—Ind. or.
royleana, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. 490 = *Epipactis gigantea*.

CEPHALARALIA, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 22. **ARALIACEAE**.
cephalobotrys, Harms, l. c. 23 (= *Panax cephalobotrys*).—Austral.

CEPHALARIA, Schrad. (Dipsac.).
natalensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 126.—Afr. austr.

CEPHALOCEREUS, Pfeiff. = **Cereus**, Haw. (Cact.).
macrocephalus, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 197.—Mexic.

CEPHALOSTACHYUM, Munro (Gramin.).
fuchsianum, Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc. vii. 107.—Ind. or.
schizostachyoides, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 565 = *Bambusa schizostachyoides*.

CEPHALOSTIGMA, A. DC. (Campan.).
candolleum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 629.—Afr. trop.

CEPHALOTAXUS, Sieb. & Zucc. (Conif.).
celebica, Warb. *Monsunia*, i. (1900) 194.—Celebes.
Griffithii, Oliv. in Hook. Ic. Pl. t. 1933 = *Oliveri*.
Oliveri, Mast. in Bull. Herb. Boiss. vi. 270.—China.

CERASTIUM, Dill. (Caryoph.).
argentinum, Williams, in Journ. Bot. 1898, 387.—Reg. Argent.
Blyttii, Baenits, in Herb. Eur. 1896, 16.—Eur.
Buffumae, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 239.—Am. bor.
chassium, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 193.—Eur.
chewsuricum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. 1898, 129.—Reg. Caucas.
fimbriatum, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxix. 320.—China.
fuegianum, Alboff, ex Alboff & Kurts, in Rev. Mus. La Plata, vii. 364.—Reg. Magell.
Ianthes, Williams, in Bull. Herb. Boiss. vii. 131.—Japon.
macropodon, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 156.—Lesbos.
minutum, Kom. in Trav. Soc. Natural. St. Pétersb. xxvi. 139.—Turkestan.
robustum, Williams, in Bull. Herb. Boiss. vii. 130.—Japon.
rupestre, Krasan, in Mitth. Naturw. Ver. Steiermark, 1896, 308.—Eur.
sordidum, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. 1900, 58.—Mexic.
spurium, Pospich. Fl. Oesterr. Küst. i. 443.—Eur.
subtetrandrum, Murb. in Herb. Eur. 1896, 16.—Eur.
szechuense, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 433.—China.
viscosioides, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 156.—Lesbos.

CERASUS, Tourm. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
hippohaoides, Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 15.—As. Min.

CERATANDRA, Eckl. (Orchid.).
venosa, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 433 (= *Pterygodium venosum*).—Afr. austr.

CERATOMINTHE, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 875. **LABIATAE**.
achalensis, Briq. l. c. 877.—Reg. Argent.
kuntzeana, Briq. l. c.—Bolivia.

CERATOSTYLIS, Blume (Orchid.).
cryptantha, Malley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 309.—Penins. Mal.

CERATOTHECA, Endl. (Pedal.).
elliptica, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 452.—Afr. trop.

CERCESTIS, Schott (Arac.).
Dinklagei, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 422.—Afr. trop.

CERCOCARPUS, H. B. & K. (Rosac.).
Traskiae, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 136.—Am. bor.

CERCOPETALUM, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 308. **CAPPARIDACEAE**.
dasyanthum, Gilg, l. c.—Afr. trop.

CEREFOLIUM, Riv. = **Anthriscus**, Hoffm. (Umbellif.).
sylvestre, Bub. Fl. Pyren. ii. 410 = *A. sylvestris*.
vulgare, Bub. l. c. 411 = *A. vulgaris*.

CEREUS, Mill. (Cact.).
aggregatus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 395 = *coccineus*.
alamosensis, Coult. l. c. 406.—Mexic.

CEREUS—
amecaensis, Heese, in Hesdörf. Monatsheft. Blum.-Gartenfr. i. (1897) 317.—Mexic.
Anisitsii, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1899, 185.—Parag.
aureus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 124 (= *Cactus aureus*).—Peruv.
bavosus, A. Web. ex K. Schum. l. c. 84.—Mexic.
bradtianus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 406.—Mexic.
Brandegei, Coult. l. c. 389.—Am. bor.
calvus, Engelm. ex Coult. l. c. 409.—Mexic.
Candelabrum, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 107 = *Weberi*.
Cavendishii, Monv. ex Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 211 = *paxtonianus*.
Chiotilla, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 83.—Mexic.
Cumengei, A. Web. in Monatsschr. Kakt. 1896, 137.—Calif.
Dussii, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 89.—Ind. occ.
euchlorus, A. Web. ex K. Schum. l. c. 84.—Am. austr.
flaviflorus, Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 391.—Am. bor.
flexuosus, Engelm. l. c. 411.—Mexic.
Funkii, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 61.—Chili.
galapagensis, A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 312.—Ins. Galap.
Ghiesbreghtii, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 81.—Mexic.
hankeanus, A. Web. ex K. Schum. l. c. 88.—Am. austr.
Hassleri, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1900, 45.—Parag.
hirschtianus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 130.—Am. cent.
hollianus, A. Web. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 411.—Mexic.
hyalacanthus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 101.—Reg. Argent.
isogonus, K. Schum. l. c. 102.—Am. austr.
Jusbettii, Rebut, ex K. Schum. l. c. 137.—Am. austr.
Kerberi, K. Schum. l. c. 89.—Mexic.
lamprospermus, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1899, 166.—Parag.
laniceps, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 93.—Bolivia.
lindbergianus, A. Web. ex K. Schum. l. c. 151.—Parag.
Lindmanii, A. Web. ex K. Schum. l. c. 163.—Parag.
malletianus, Cels, ex K. Schum. l. c. 120.—Am. austr.
mamillatus, Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 405.—Mexic.
maritimus, Coult. l. c. 397.—Am. bor.
monvilleanus, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 67.—Am. trop.
Neumannii, K. Schum. ex Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 91.—Am. cent.
octacanthus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 395 (= *Echinopsis octacantha*).—Am. bor.
Orcuttii, K. Brandegei, in Zoe, v. 3.—Calif.
pacificus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 397.—Mexic.
Palmeri, Engelm. ex Coult. l. c. 401.—Mexic.
parviflorus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 100.—Bolivia.
patagonicus, A. Web. ex Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 604.—Patag.
perlucens, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1900, 173.—Am. trop.
phatnospermus, K. Schum. l. c. 1899, 186.—Parag.
polyrhizus, A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 151.—N. Granat.
pomanensis, K. Schum. l. c. 136.—Reg. Argent.
Poselgeri, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 398.—Am. bor.
rhodoleucanthus, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1899, 187.—Parag.
Roelzii, Haage, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 64.—Am. trop.
sanborgianus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 398.—Am. bor.
Schumannii, Mathsson, ex K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1899, 131.—Hort.
Spegazzinii, A. Web. in Monatsschr. Kakt. 1899, 102.—Reg. Argent.
stenogonus, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1899, 165.—Parag.
Tetazo, A. Web. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 409.—Mexic.

CEREUS :—

- theligonus, *A. Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 78.*—Reg. Argent.
 Thoursii, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 312.*—Ins. Galap.
 Titan, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 409.*—Mexic.
 tuberosus, *Poselg. in Allg. Gartenz. xxi. 135* = Poselgeri.
 Weberi, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 410.*—Mexic.
 Wittii, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1900, 153.*—Bras.

CEROLEPIS, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 111.* BIXACEAE.

CEROPEGIA, Linn. (Asclep.).

- biddumana, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 41.*—Afr. trop.
 boerhaaviifolia, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 112.*—Arab.
 fusiformis, *N. E. Br. in Kew Bull. 1897, 273.*—Afr. trop.
 Giletij, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 95.*—Afr. trop.
 gymnopoda, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss. iv. 450.*—Afr. trop.
 kachinensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. 170.*—Ind. or.
 papillata, *N. E. Br. in Kew Bull. 1898, 308.*—Afr. trop.
 paricyma, *N. E. Br. l. c. 309.*—Afr. trop.
 Perrottetii, *N. E. Br. l. c. 308.*—Afr. trop.
 pumila, *N. E. Br. l. c. 309.*—Afr. trop.
 rupicola, *Deflers, Voy. Yemen, 167.*—Arab.
 ruspoliana, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 42.*—Afr. trop.
 sepium, *Deflers, Voy. Yemen, 167.*—Arab.
 tubulifera, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. 1896, 111.*—Arab.
 yorubana, *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 310, nomen.*—Afr. trop.

CERVICINA, Delile = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campan.).

- hederacea, *Druce, Fl. Berkshire, 324* = *W. hederacea*.
 huillana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 631* = *W. huillana*.

CESPEDESIA, Goudot (Ochnac.).

- excelsa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 17.*—Bolivia.

CESTRUM, Linn. (Solan.).

- atroxanthum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 219.*—Bolivia.
 bourgeauium, *Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 572.*—Mexic.
 dasyanthum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 11.*—Am. cent.
 flavescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 572.*—Am. cent.
 fulvescens, *Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 572.*—Mexic.
 floribundum, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 92* (non Willd.).—Bolivia.
 pacificum, *Brandegee, in Erythea, 1899, 6.*—Mexic.
 sparsifolium, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 22.*—Peruv.

CHABRAEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 640 (1900) = **Lythrum**, Linn. (Lythrac.).

- compressa, *Bub. l. c. 645* = *Peplis Portula*.
 hyssopifolia, *Bub. l. c. 642* = *L. hyssopifolia*.
 serpyllifolia, *Bub. l. c. 641* = *L. thymifolia*.
 vulgaris, *Bub. l. c. 640* = *L. Salicaria*.

CHAENACTIS, DC. (Compos.).

- floribunda, *Greene, Pittonia, iii. 169.*—Am. bor.
 gracilentata, *Greene, Fl. Francisc. 447.*—Calif.
 orcuttiana, *Fernald, in Erythea, 1898, 92.*—Am. bor.
 pedicularia, *Greene, Pittonia, iv. 98.*—Am. bor.

CHAENARRHINUM, Lange = **Linaria**, Tourn. (Scrophul.).

- Formenterae, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvi. 140.*—Eur.

CHAENOCEPHALUS, Griseb. (Compos.).

- pallatangensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 47.*—Ecuador.

CHAENOSTOMA, Benth. (Scrophul.).

- divaricatum, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii. 476.*—Afr. trop.
 gracile, *Diels, l. c.*—Afr. trop.
 heucherifolium, *Diels, l. c. 475.*—Afr. trop.
 huillanum, *Diels, l. c. 477.*—Afr. trop.
 macrosiphon, *Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 502.*—Afr. austr.
 montanum, *Diels, in Engl. Jahrb. xxvi. 121.*—Afr. austr.
 neglectum, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 352.*—Afr. austr.
 sessilifolium, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii. 476.*—Afr. austr.
 stenopetalum, *Diels, l. c. 477.*—Afr. trop.
 violaceum, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 180.*—Afr. austr.
 woodianum, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii. 474.*—Afr. austr.

CHAEROPHYLLUM, Linn. (Umbell.).

- azoricum, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard. 1897, 116.*—Ins. Azor.
 silvicola, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiv. 273.*—Reg. Caucas.
 texanum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 59.*—Am. bor.

CHAETACHEME, Planch. (Urtic.).

- serrata, *Engl. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 24.*—Afr. trop.

CHAETANTHERA, Ruiz & Pav. (Compos.).

- euphrosiodes, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 140* = debilis.
 salsolodes, *Kuntze, l. c.* = linifolia.
 subligiosa, *Kuntze, l. c.*—Chili.

CHAETARIA, Beauv. = **Aristida**, Linn. (Gramin.).

- bromoides, *Roem. & Schult. Syst. ii. 396* = *A. Adscensionis*.
 caerulea, *Beauv. Agrost. 30* = *A. Adscensionis*.
 canariensis, *Beauv. l. c.* = *A. Adscensionis*.
 coarctata, *Roem. & Schult. Syst. ii. 396* = *A. Adscensionis*.
 elatior, *Beauv. Agrost. 30* = *A. Adscensionis*.
 Forskolii, *Nees, Fl. Afr. Austr. 188* = *A. barbicollis*.
 humilis, *Roem. & Schult. Syst. ii. 396* = *A. Adscensionis*.
 interrupta, *Beauv. Agrost. 30* = *A. Adscensionis*.
 murina, *Nees, ex Trin. & Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vii. 160* = *A. Adscensionis*.
 nana, *Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 340* = *A. Adscensionis*.
 royleana, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 143* = *A. funiculata*.

CHAETOBROMUS, Nees (Gramin.).

- dregeanus, *Nees, Fl. Afr. Austr. 343.*—Afr. austr.
 fascicularis, *Nees, l. c. 341* = *Danthonia stricta*.
 interceptus, *Nees, l. c. 339.*—Afr. austr.
 involucreatus, *Nees, l. c. 344.*—Afr. austr.
 Schraderi, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap. vii. 538.*—Afr. austr.

CHAETOCALYX, DC. (Legum.).

- scandens, *Urb. Symb. Antill. ii. 292* (= *Coronilla scandens*).—Ind. occ.

CHAETOCHLAMYS, Lindau (Acanth.).

- ciliata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 677.*—Bras.

CHAETOCHLOA, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull.

- Agrost. iv. (1897) 38 = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).
 ambigua, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 18* = *S. ambigua*.
 amplifolia, *Scribn. in Donn. Sm. Pl. Guatem. v. 91* = *S. composita*.
 apiculata, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. (1897) 9.*—Austral.
 australiensis, *Scribn. & Merrill, l. c. 29.*—Austral.
 brevispica, *Scribn. & Merrill, l. c. 15.*—Am. bor.
 caudata, *Scribn. in Rep. Missouri Bot. Gard. 1899, 52* = *S. setosa*.
 composita, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. (1897) 39* = *S. macrostachya*.
 corrugata, *Scribn. l. c.* = *S. corrugata*.
 flava, *Scribn. l. c.* = *S. glauca*.
 gibbosa, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 24.*—Am. bor.
 glauca, *Scribn. l. c. iv. 39* = *S. glauca*.
 gracilis, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 15* = *S. gracilis*.
 Grisebachii, *Scribn. l. c. iv. 39* = *S. Grisebachii*.
 hispida, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 25.*—Am. bor.
 imberbis, *Scribn. l. c. iv. 39* = *S. viridis*.

CHAETOCHLOA :—

- italica, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 39* = *S. italica*.
 latifolia, *Scribn. l. c. xi. 44.*—Mexic.
 leucopila, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 26.*—Am. bor.
 Liebmanni, *Scribn. & Merrill, l. c. 31* = *S. Liebmanni*.
 longipila, *Scribn. & Merrill, l. c. 22* = *S. longipila*.
 macrosperma, *Scribn. & Merrill, l. c. 33.*—Am. bor.
 macrostachya, *Scribn. & Merrill, l. c. 29* = *S. macrostachya*.
 magna, *Scribn. l. c. iv. 39* = *S. magna*.
 onurus, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 27.*—Am. bor.
 penicillata, *Scribn. l. c. iv. 39* = *S. penicillata*.
 perennis, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 107.*—Am. bor.
 polystachya, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. 37* = *S. polystachya*.
 purpurascens, *Scribn. & Merrill, l. c. 13* = *S. viridis*.
 rigida, *Scribn. & Merrill, l. c. 30.*—Am. bor.
 scandens, *Scribn. ex Donn. Sm. Pl. Guatem. v. 91* = *S. scandens*.
 setosa, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 39* = *S. setosa*.
 versicolor, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 105.*—Am. bor.
 verticillata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 39* = *S. verticillata*.
 villosissima, *Scribn. & Merrill, l. c. xxi. 35.*—Am. bor.
 viridis, *Scribn. l. c. iv. 39* = *S. viridis*.

CHAETOSPORA, R. Br. = **Schoenus**, Linn. (Cyperac.).

- antarctica, *Hook. f. Fl. Antarct. ii. 361. t. 147* = *S. antarcticus*.

CHAETOSTOMA, DC. (Melast.).

- scoparia, *Cogn. in Engl. Jahrb. xxi. 447.*—Bras.

CHAETOTROPIS, Kunth (Gramin.).

- araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 17.*—Chili.

CHAILLETTA, DC. (Chaillet.).

- chartacea, *C. H. Wright, in Kew Bull. 1896, 160.*—Afr. trop.
 setosa, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 515.*—Penins. Mal.
 tessellata, *King, l. c.*—Penins. Mal.

CHALAZOCARPUS, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.

- 464 (1898). RUBIACEAE.
 hirsuta, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

CHALMERSIA, F. Muell. ex S. Moore, in Journ. Bot.

- 1900, 174 = **Dichrotrichum**, Reinw. (Gesnerac.).
 papuana, *F. Muell. l. c.* = *D. papuanum*.

CHAMAECRISTA, Moench = **Cassia**, Tourn. (Legum.).

- Aeschynomene*, *Greene, Pittonia, iv. 32* = *C. mimosoides*.
 angustissima, *Greene, l. c. 30* = *C. mimosoides*.
 aspera, *Greene, l. c. iii. 243* = *C. nictitans*.
 bifoliolata, *Greene, l. c. iv. 31* = *C. rotundifolia*.
 brevifolia, *Greene, l. c. 30* = *C. brevifolia*.
 brevipes, *Greene, l. c. 31* = *C. brevipes*.
 calycioides, *Greene, l. c. 32* = *C. calycioides*.
 chamaecristoides, *Greene, l. c. 29* = *C. chamaecristoides*.
 cinerea, *Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5* = *C. cinerea*.
 complexa, *Pollard, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 47.*—Ind. occ.
 cuneata, *Greene, Pittonia, iv. 31* = *C. cuneata*.
 depressa, *Greene, l. c. iii. 242* = *C. depressa*.
 diphylla, *Greene, l. c. iv. 28* = *C. diphylla*.
 fascicularis, *Greene, l. c. iii. 242* = *C. fasciculata*.
 flavicoma, *Greene, l. c.* = *C. flavicoma*.
 flexuosa, *Greene, l. c. iv. 27* = *C. flexuosa*.
 glandulosa, *Greene, l. c. 28* = *C. glandulosa*.
 grammica, *Pollard, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 47* = *C. grammica*.
 Greggii, *Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5* = *C. Greggii*.
 hecatophylla, *Greene, Pittonia, iv. 32* = *C. mimosoides*.
 lineata, *Greene, l. c. 31* = *C. lineata*.
 Millspaughii, *Pollard, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 47.*—Ind. occ.
 mimosoides, *Greene, Pittonia, iv. 27* = *C. mimosoides*.
 mississippiensis, *Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5* = *C. mississippiensis*.
 multipinnata, *Greene, Pittonia, iii. 243* = *C. multipinnata*.
 nigricans, *Greene, l. c. iv. 30* = *C. nigricans*.
 Palmeri, *Greene, l. c. iii. 242* = *C. Palmeri*.

CHAMAECRISTA:—

patellaria, Greene, Pittonia, iv. 32 = *C. patellaria*.
Persoonii, Greene, l. c. 31 = *C. uniflora*.
pilosa, Greene, l. c. 28 = *C. pilosa*.
procumbens, Greene, l. c. = *C. procumbens*.
robusta, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5.—Am. bor.
rotundifolia, Greene, Pittonia, iv. 31 = *C. rotundifolia*.
serpens, Greene, l. c. 29 = *C. serpens*.
Simpsoni, Pollard, ex A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = *C. Simpsoni*.
tristricula, Greene, Pittonia, iii. 242 = *C. tristricula*.
virgata, Greene, l. c. iv. 31 = *C. virgata*.

CHAMAELA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1898, 244. **SIMARUBACEAE**.
pulverulenta, Van Tiegh. l. c. (= *Cneorum pulverulentum*).—Ins. Canar.

CHAMAEMELUM, Tourn. = **Anthemis**, Linn. (Compos.).
lesbiacum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 143.—Lesbos.
tempkyanum, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 781.—Eur.

CHAMAEMELUM, Vis. = **Matricaria**, Linn. (Compos.).
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 225 = *M. Chamomilla*.

CHAMAENERION, Tourn. = **Epilobium**, Linn. (Onagr.).
Fleischeri, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 392 = *E. Fleischeri*.

CHAMAEPERICLIMENUM, Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 225. (1898). **CORNACEAE**.
canadense, Aschers. & Graebn. l. c. 799 (= *Cornus canadensis*).—Am. bor.
suecicum, Aschers. & Graebn. l. c. 589 (= *Cornus suecica*).—Reg. bor.

CHAMAERANTHEMUM, Nees (Acanth.).
Tonduzii, Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica, viii. 303.—Am. cent.

CHAMAERAPHIS, R. Br. (Gramin.).
depauperata, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 49 = *spinescens*.
paradoxa, Poir. Encycl. Suppl. II. 189 = *spinescens*.
rachitricha, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 347 = *Panicum rachitrichum*.
sulcata, Kuntze, l. c. = *Panicum sulcatum*.

CHAMAERHODENDRON, Bub. Fl. Pyren. ii. 5 (1900), sphalm. = seq.

CHAMAERHODODENDRON, Bub. Fl. Pyren. ii. pp. ii et 18. (1900) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
ferrugineum, Bub. l. c. 5 = *R. ferrugineum*.
hirsutum, Bub. l. c. 18 = *R. hirsutum*.

CHAMAETAXUS, Bub. Fl. Pyren. i. 118 (1897) = **Empetrum**, Tourn. (Empetrac.).
nigra, Bub. l. c. = *E. nigrum*.

CHAMISSONIA, Endl. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
acuminata, Reiche, Fl. Chile, ii. 263 (= *Sphaerostigma acuminatum*).—Chili.
dentata, Reiche, l. c. 264 = *O. dentata*.
paradoxa, Reiche, l. c. = *O. micrantha*.

CHAPTALIA, Vent. (Compos.).
cordata, Hieron. in Engl. Jahrb. xxi. 370.—N. Granat.
ebracteata, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. I. 376.—Bolivia.
Stuebelii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxi. 371.—Ecuador.

CHARADROPHILA, Marloth, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 358. **GESNERACEAE**.
capensis, Marloth, l. c.—Afr. austr.

CHARPENTIERA, Gaudich. (Amarant.).
elliptica, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 820.—Ins. Sandw.

CHASALIA, Comm. (Rubiace.).
Afzelii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 469 (= *Psychotria Afzelii*).—Afr. trop.
macrodiscus, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
parvifolia, K. Schum. l. c. xxviii. 103.—Afr. trop.
violacea, K. Schum. l. c. 498.—Afr. trop.
yorubensis, K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 322, nomen.—Afr. trop.

CHASMANTHERA, Hochst. (Menisperm.).
strigosa, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 14.—Afr. trop.

CHASMONE, E. Mey. = **Argyrolobium**, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
Gesneri, Bub. Fl. Pyren. ii. 460 = *A. linneanum*.

CHAVICA, Miq. = **Piper**, Linn. (Piperac.).
hainana, C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 275.—China.

CHEILOPSIS, Moq. = **Acanthus**, Tourn. (Acanth.).
Steudneri, Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 243 = *A. arboreus*.

CHEIRANTHUS, Linn. (Crucif.).
angustatus, Greene, Pittonia, iii. 132.—Am. bor.
arenicola, Greene, l. c. 131 (= *Erysimum arenicolum*).—Am. bor.

argillosus, Greene, l. c. 136.—Am. bor.
aridus, Greene, l. c. iv. 198.—Am. bor.
aridus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 351.—Am. bor.

arkansanus, Greene, Pittonia, iii. 135 (= *E. arkansanum*).—Am. bor.
asperimus, Greene, l. c. 133 (= *E. pumilum*).—Am. bor.

californicus, Greene, l. c. (= *E. californicum*).—Am. bor.

cheiranthoides, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 (= *E. cheiranthoides*).—Eur.; Am. bor.

elatus, Greene, Pittonia, iii. 135 (= *E. elatum*).—Am. bor.

inconspicuum, Greene, l. c. 134 (= *E. inconspicuum*).—Am. bor.

insularis, Greene, l. c. 131 (= *E. insulare*).—Am. bor.

nivalis, Greene, l. c. 137.—Am. bor.

perennis, Greene, l. c. 132.—Am. bor.

syrticola, Greene, l. c. 136 (= *E. syrticum*).—Am. bor.

Wheeleri, Greene, l. c. 135 (= *E. Wheeleri*).—Am. bor.

CHEIRODENDRON, Nutt. = **Panax**, Linn. (Araliac.).
trigynum, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 870 = *P. Gaudichaudii*.

CHEIROSTYLIS, Blume (Orchid.).
heterosepala, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 188.—Afr. trop.
yunnanensis, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 201.—China.

CHELONECARYA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1260. **MENISPERMACEAE**.
fusca, Pierre, l. c. 1261.—Afr. trop.

CHELONOPSIS, Miq. (Labiata).
longipes, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898, 57.—Japan.

CHENOPODIUM, Tourn. (Chenopod.).
antarcticum, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 568 (= *Blitum antarcticum*).—Patag.

atrovirens, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 131.—Am. bor.

fuegianum, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 72.—Reg. Magell.

Sanctaeclarae, Johow, Fl. Juan Fernandez, 119.—Ins. Juan Fernandez.

striatum, Jos. Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr. xiv. 32.—Eur.

CHESMONE, Bub. Fl. Pyren. ii. 460 (1900), sphalm. = **CHASMONE**, E. Mey. = **Argyrolobium**, Eckl. & Zeyh. (Legum.).

CHESNEYA, Lindl. = **Calophaca**, Fisch. (Legum.).
ferganensis, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. 90.—Turkestan.

CHEVALIERIA, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
comata, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 153 = *A. comata*.
stephanophora, Mez, l. c. 154 = *A. stephanophora*.

CHILDSIA, Childs, Cat. Rar. Fl. 1899, 1 = **Hidalgoa**, La Llave (Compos.).
Wercklei, Childs, l. c. = *H. Wercklei*.

CHILIOPHYLLUM, Phil. (Compos.).
fuegianum, O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 96.—Reg. Magell.

CHILIOTRICHUM, Cass. (Compos.).
diffusum, P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 99 = *amelloideum*.

CHILOCARPUS, Blume (Apocyn.).
alyxifolius, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 102.—Malaya.
beccarianus, Pierre, l. c. 101.—Malaya.
brachyanthus, Pierre, l. c.—Malaya.

CHILOCHLOA, Beauv. = **Phleum**, Linn. (Gramin.).
dentata, Trin. Gram. Unifl. 168 = *Prionanthium rigidum*.

CHIONACHNE, R. Br. (Gramin.).
barbata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 18 = *Polytoca barbata*.

Koenigii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 357 = *Polytoca barbata*.
Wightii, Munro, ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 1113 = *Polytoca Wightii*.

CHIONANTHUS, Gaertn. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
celebicus, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 637.—Celebes.

cordulatus, Koord. l. c. 638.—Celebes.

gigantifolius, Koord. l. c.—Celebes.

CHIONOPHILA, Benth. (Scrophul.).
Tweedyi, Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 352.—Am. bor.

CHIONOTRICH, Hook. f. (Amarant.).
latifolia, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 54.—Afr. trop.

CHIRITA, Buch.-Ham. (Gesner.).
elata, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 518.—Penins. Mal.

Forbesii, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 175.—Sumatra.
mollissima, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 517.—Penins. Mal.

Viola, Ridley, l. c. 516.—Penins. Mal.

CHIRONIA, Linn. (Gentian.).
angolensis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxvi. 104.—Afr. trop.

Bachmannii, Gilg, l. c. 103.—Afr. austr.

erythraeodes, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 709.—Afr. trop.

humilis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxvi. 105.—Afr. austr.

laxa, Gilg, l. c.—Afr. austr.

rosacea, Gilg, l. c. 104.—Afr. austr.

transvaalensis, Gilg, l. c. 106.—Afr. austr.

Tysonii, Gilg, l. c. 104.—Afr. austr.

Wilmsii, Gilg, l. c. 105.—Afr. austr.

CHISOCHETON, Blume (Meliac.).
beccarianus, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 296 (= *Dasycoleum beccarianum*).—Borneo.

celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 636.—Celebes.

cochinchinensis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 346 B.—Cochinch.

coriaceus, Pierre, l. c. t. 346 A.—Cochinch.

cumingianus, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 296 (= *Dasycoleum cumingianum*).—Ins. Philipp.

globosus, Pierre, Fl. Cochinch. t. 347 A.—Cochinch.

harmandianus, Pierre, l. c. sub t. 347.—Cochinch.

Kingii, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 636.—Celebes.

Lauterbachii, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 382.—N. Guin.

microcarpus, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 115.—Java.

pachyrhachis, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 382.—N. Guin.

philippinus, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 296 (= *Dasycoleum philippinum*).—Ins. Philipp.

polyanthus, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 383.—N. Guin.

rugosus, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 347.—Cochinch.

sandoricocarpus, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 111.—Java.

sarawakanus, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 296 (= *Dasycoleum sarawakanum*).—Borneo.

Thorelii, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 346.—Cochinch.

CHLAINANTHUS, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. (1896) 257. **LABIATAE**.
 platycalyx, Briq. l. c. 258 (= *Lagochilus platycalyx*).—
 As. bor.

CHLAMYDOCARDIA, Lindau (Acanth.).
 nuda, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 235.—
 Afr. trop.

CHLAMYDOCARYA, Baill. (Olacac.).
 glabrescens, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 485.—Afr. trop.
 klaineana, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1817.—
 Afr. trop.
 lobata, Pierre, l. c. 1816.—Afr. trop.
 Staudtii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 486.—Afr. trop.
 tenuis, Engl. l. c.—Afr. trop.

CHLOOTHAMNUS, Buese = *Schizostachyum*, Nees
 (Gramin.).
 chilianthus, Buese, in Miq. Pl. Jungh. 386 = *S. chili-*
 anthus.

CHLORAEA, Lindl. (Orchid.).
 phoenicea, Spig. Pl. Nov. Argent. iii. (1897) 6.—Reg.
 Argent.

CHLORANTHUS, Sw. (Chloranth.).
 kachinensis, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxix. 173.
 —Ind. or.

CHLORIDION, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2640 (1900).
GRAMINEAE.
 Camerani, Stapf, l. c.—Afr. trop.

CHLORIS, Sw. (Gramin.).
 abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.
 406 = gayana.
 barbata, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 443 =
 polydactyla.
 beyrichiana, Kunth, Rév. Gram. i. 89 = pycnothrix.
 brachystachys, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. 556
 = virgata.
 brevispica, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 438.
 —Am. bor.
 caudata, Trin. ex Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 70 =
 virgata.
 clandestina, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric.
 Bull. Agrost. xxiv. 25 (= *Cymnopogon longifolius*).
 —Mexic.

compressa, DC. Cat. Pl. Hort. Monsp. 94 = virgata.
cryptostachya, Steud. ex J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap
 Verd. Ins. 148 = virgata.
decora, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 205 = virgata.
delicatula, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.
 290.—Ind. or.
digitata, Steud. Syn. Pl. Gram. 207 = incompleta.
falcata, Sw. in Ges. Naturf. Freunde, Neue Schr. iii.
 (1801) 160 = *Harpechloa capensis*.
filiformis, Poir. Encycl. Suppl. II. 238 = *Leptochloa*
cynosuroides.
glabrata, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. ii. 557 =
 gayana.
intermedia, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 407 = pycno-
 thrix.
latisquamea, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 439.
 —Am. bor.

leptostachya, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.
 407 = pycnothrix.
meccana, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 205 = virgata.
multiradiata, Hochst. in Flora, 1855, 204 = virgata.
mysuroides, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 290.—Ind. or.
Nealleyi, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 435 =
 texensis.
pallida, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 289 (non Hack.).—
 Ind. or.
pycnothrix, Trin. Gram. Unif. 234.—Afr. austr.
Roxburghii, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 183
 = incompleta.
somalensis, Rendle, in Journ. Bot. 1899, 66.—Afr.
 trop.
subaequigluma, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 222.—
 Afr. trop.
tenuispica, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 436.
 —Am. bor.
tetrameris, Trin. Gram. Unif. 235 = incompleta.
Tetrapogon, Beauv. Agrost. 158 = villosa.
tetrastachys, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 291
 = virgata.

VOL. III.

CHLORIS:—
 texana, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 441.—
 Am. bor.
 texensis, Nash, l. c. 1896, 151.—Am. bor.
triangulata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.
 409 = tenella.
 villosa, Pers. Syn. i. 87.—Reg. Medit.; Ind. or.
 wightiana, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 206.—Ind. or.

CHLOROCHARIS, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot.
 xxvii. (1895) 564 = *Eleocharis*, R. Br. (Cyperac.).
balanseaana, Rikli, l. c. = *E. balanseaana*.
capitata, Rikli, l. c. = *E. capitata*.
emarginata, Rikli, l. c. = *E. emarginata*.
geniculata, Rikli, l. c. = *E. geniculata*.
palustris, Rikli, l. c. = *E. palustris*.
subprolifera, Rikli, l. c. = *E. afflata*.
tuberculosa, Rikli, l. c. = *E. tuberculosa*.
vivipara, Rikli, l. c. = *E. vivipara*.

CHLOROCYPERUS, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss.
 Bot. xxvii. (1895) 563 = *Cyperus*, Mich. (Cyperac.).
abyssinicus, Rikli, l. c. 564 = *Pycrus flavescens*.
aegyptiacus, Rikli, l. c. = *C. aegyptiacus*.
articulatus, Rikli, l. c. 563 = *C. articulatus*.
badius, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = *C.*
longus.

Barteri, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. xxvii.
 (1895) 563 = *C. pustulatus*.
cimicinus, Rikli, l. c. (= *Pycrei sp.*).—Am. trop.
confertus, Rikli, l. c. 564 = *C. confertus*.
Eragrostis, Rikli, l. c. 563 = *C. Eragrostis*.
flavescens, Rikli, l. c. = *Pycrus flavescens*.
glaber, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = *C.*
glaber.
glomeratus, Palla, l. c. = *C. glomeratus*.
grammicus, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot.
 xxvii. (1895) 563 (= *Pycrei sp.*).—Chili.
intermedius, Rikli, l. c. (= *Pycrei sp.*).—Afr. trop.
Iria, Rikli, l. c. 564 = *C. Iria*.
Jaquini, Rikli, l. c. 563 = *C. nutans*.
junciformis, Rikli, l. c. = *C. laevigatus*.
laevigatus, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 221 = *C.*
laevigatus.

latispicatus, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot.
 xxvii. (1895) 564 (= *Pycrei sp.*).—Ind. or.
longus, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = *C.*
longus.

megapotamicus, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot.
 xxvii. (1895) 563 = *Pycrus megapotamicus*.
melanostachyus, Rikli, l. c. 564 (= *Pycrei sp.*).—Mexic.
Mundlii, Rikli, l. c. 563 = *Pycrus Mundlii*.
nilagiricus, Rikli, l. c. 564 = *Pycrus capillariss*.
pannonicus, Rikli, l. c. 563 = *C. pannonicus*.
Papyrus, Rikli, l. c. = *C. Papyrus*.
patuliflorus, Rikli, l. c. = *Pycrus albomarginatus*.
pauper, Rikli, l. c. (= *Pycrei sp.*).—Abyss.; Reg. Himal.
polystachyus, Rikli, l. c. = *C. polystachyus*.
rivularis, Rikli, l. c. 564 = *C. rivularis*.
serotinus, Palla, in Allg. Bot. Zeitschr. 1900, 201 = *C.*
 Monti.

CHLOROMYRTUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.
 n. s. i. (1898) 71. **MYRTACEAE**.
 klaineana, Pierre, l. c. 72.—Afr. trop.

CHLOROPATANE, Engl. in Engl. Jahrb. xxvii.
 (1899) 388. **MONIMIACEAE**.
 africana, Engl. l. c.—Afr. trop.

CHLOROPHYTUM, Ker-Gawl. (Liliac.).
abyssinicum, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 46 = laxum.
asparagifolium, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 361.—Afr.
 trop.
bracteatum, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x.
 673.—Afr. trop.
brevipes, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 497.—Afr.
 trop.
brunneum, Baker, l. c. 507.—Afr. trop.
capense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 316 = elatum.
Carsoni, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 499.—Afr.
 trop.
colubrinum, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 362 = *Dasy-*
stachys colubrina.
debile, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 260 = laxum.
delagoense, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 399.—Afr. austr.
drepanophyllum, Baker, l. c. 398.—Afr. austr.
durbanense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 316.—Afr. austr.
falcatum, Baker, in Saund. Ref. Bot. t. 333 = laxum.

CHLOROPHYTUM:—
 Fischeri, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 506.—Afr.
 trop.

floribundum, Baker, in Kew Bull. 1897, 285.—Afr. trop.
gallabatense, Schweinf. ex Baker, in Journ. Linn.
 Soc. xv. 325.—Afr. trop.

Goetzei, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 361.—Afr. trop.
 Haygarthii, J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.
 1899, 254.—Afr. austr.

hispidulum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 53.—Afr.
 trop.

krookianum, A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien, xv.
 19.—Afr. austr.

longipes, Baker, in Journ. Bot. 1878, 325 = *andongense*.
 Mannii, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 498.—Afr.
 trop.

ruahense, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 361.—Afr. trop.
scabrum, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 497.—Afr.
 trop.

Schweinfurthii, Baker, l. c. 503.—Afr. trop.
stamineum, A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien, xv.
 18.—Afr. austr.

thollonianum, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun,
 x. 672.—Afr. trop.

ukambense, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 504.—
 Afr. trop.

vaginatum, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 397.—Afr.
 austr.

vaginatum, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x.
 674.—Afr. trop.

CHOMELIA, Jacq. (Rubiace.).
 Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.
 Sér. II. i. 29.—Afr. trop.

Junodii, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 10. 66.—
 Afr. austr.

meiantha, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 61.—Afr.
 trop.

mechowiana, K. Schum. l. c. xxiii. 434.—Afr. trop.
oligoneura, K. Schum. l. c.—Afr. trop.

ulugurensis, K. Schum. l. c. xxviii. 61.—Afr. trop.

CHOMELIA, Vell. = *Ilex*, Tourn. (Ilicin.).
amara, Vell. Fl. Flum. i. t. 107 = *I. amara*.

CHONDODENDRON, Ruiz & Pav. (Menisperm.).
macrophyllum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 16.—
 Afr. trop.

CHONDRILLA, Tourn. (Compos.).
viminea, Bub. Fl. Pyren. ii. 105 = *juncea*.

CHONDRORHYNCHA, Lindl. (Orchid.).
albicans, Rolfe, in Kew Bull. 1898, 195.—Am. cent.

CHONDROSTYLIS, Boerl. in Ic. Bogor. t. 23 (1897).
EUPHORBIAEAE.
bancana, Boerl. l. c.—Malaya.

CHONEMORPHA, G. Don (Apocyn.).
mollissima, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 400.—
 Java?

nouettiana, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 30
 (= *Nouettea cochinchinensis*).—Cochinch.

CHORISTIGMA, Baill. = *Schoepfia*, Schreb. (Olacac.).
stuckertianum, Kurtz, Pharmac. Post. xxx. no. 37, fide
 K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 520.—Reg.
 Argent.

CHRISTOLEA, Cambess. (Crucif.).
pamirica, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.
 iv. 89.—Turkestan.

CHRYSANTHEMUM, Tourn. (Compos.).
djilgense, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. ii.
 345.—As. cent.

lineare, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 83.—
 Japon.

obtusum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 141 = *Matricaria*
globifera.

CHRYSASPIS, Desv. Fl. Anjou, (1827) 338 = **Tri-**
folium, Tourn. (Legum.).
agraria, Greene, Pittonia, iii. 205 = *T. procumbens*.
aurea, Greene, l. c. 204 = *T. agrarium*.
badia, Greene, l. c. 206 = *T. badium*.
campestris, Desv. Fl. Anjou, 338 = *T. campestre*.
dubia, Greene, l. c. 206 = *T. dubium*.
spadicea, Greene, l. c. 205 = *T. spadiceum*.

G

- CHRYSITHRIX**, Linn. (Cyperac.).
Dodii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 760.—Afr. austr.
- CHRYSOBALANUS**, Linn. (Rosac.).
sublanatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 76.—Bras.
- CHRYSOCYCNIS**, Linden & Reichb. f. (Orchid.).
rhomboglossum, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 479.—N. Granat.
- CHRYSOPHYLLUM**, Linn. (Sapot.).
argyrophyllum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 641.—Afr. trop.
batangense, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. trop.
cerasiferum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 643 (= *Sapota cerasifera*).—Afr. trop.
Disaco, *Hiern, l. c.* 642.—Afr. trop.
excelsum, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 55.—Hort.
ferrugineo-tomentosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 447.—Afr. trop.
ulugureuse, *Engl. l. c.* 448.—Afr. trop.
- CHRYSOPOGON**, Trin. (Gramin.).
acicularis, Duthie, *Grass. N. W. Ind.* 22 = *Andropogon aciculatus*.
aciculatus, Trin. *Fund. Agrost.* 188 = *Andropogon aciculatus*.
arnottianus, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 396 = *Andropogon zeylanicus*.
asper, Heyne, ex Wall. *Cat. n.* 8784 = *Andropogon asper*.
ciliolatus, Boiss. *Fl. Orient.* v. 458 = *Andropogon monticola*.
Elliottii, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 21.—Am. bor.
Esenbeckii, Am. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 395 = *wightianus*.
glabratus, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* ii. 318 = *Andropogon Gryllus*.
Gryllus, Trin. *Fund. Agrost.* 188 = *Andropogon Gryllus*.
increscens, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 396 = *Andropogon monticola*.
montanus, Trin. in *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 93 = *Andropogon monticola*.
muricatus, Wight, ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* vii. 242 = *Garnotia tenuiglumis*.
pictus, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* v. 252 = *Andropogon assimilis*.
serrulatus, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* ii. 318 = *Andropogon monticola*.
subulatus, Trin. ex Steud. *Nom. ed. II.* i. 360 = *Andropogon aciculatus*.
trivialis, Arn. & Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. 171 = *Andropogon aciculatus*.
velutinus, Arn. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* vii. 194 = *Andropogon velutinus*.
verticillatus, Trin. ex Steud. *Nom. ed. II.* i. 360 = *Andropogon verticillatus*.
violascens, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* ii. 319 = *Andropogon micranthus*.
wightianus, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 366 = *Andropogon zeylanicus*.
zeylanicus, Thw. *l. c.* = *Andropogon zeylanicus*.
- CHRYSOPSIS**, Ell. (Compos.).
Bakeri, *Greene, Pittonia,* iv. 153.—Am. bor.
Brandegei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 43.—Calif.
camphorata, *Eastw. in Zoe,* v. 81.—Am. bor.
camporum, *Greene, Pittonia,* iii. 88.—Am. bor.
depressa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 381.—Am. bor.
fastigiata, *Greene, Pittonia,* iii. 296.—Am. bor.
flexuosa, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 107.—Am. bor.
floribunda, *Greene, Pittonia,* iii. 100.—Am. bor.
fulcrata, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 119.—Am. bor.
hirsuta, *Greene, Pittonia,* iii. 296.—Am. bor.
hirsutissima, *Greene, l. c.* iv. 153.—Am. bor.
latisquamea, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xiii. 131.—Am. bor.
nivosa, *Greene, Pittonia,* iii. 43 = *Aplopappus niveus*.
pedunculata, *Greene, l. c.* iv. 154.—Am. bor.
Ruthii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 493.—Am. bor.
- CHRYSOSPENIUM**, Tourn. (Saxifr.).
beringianum, *Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 275.—Am. bor.
Scouleri, *Rose, l. c.* 277 = *glechomaefolium*.
- CHRYSOTHAMNUS**, Nutt. = *Bigelowia*, DC. (Compos.).
affinis, A. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* 1899, 374.—Am. bor.
arizonicus, *Greene, Pittonia,* iv. 42.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* 152.—Am. bor.
collinus, *Greene, l. c.* iii. 24.—Am. bor.
formosus, *Greene, l. c.* iv. 41.—Am. bor.
glaucus, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 377.—Am. bor.
gnaphalodes, *Greene, Pittonia,* iv. 42.—Am. bor.
humilis, *Greene, l. c.* iii. 24.—Am. bor.
latisquameus, *Greene, l. c.* iv. 42.—Am. bor.
linifolius, *Greene, l. c.* iii. 24.—Am. bor.
nauseosa, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 326 = *B. graveolens*.
occidentalis, *Greene, Fl. Francisc.* 369.—Calif.
oreophilus, A. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* 1899, 374.—Am. bor.
pallidus, A. Nelson, *l. c.* 372.—Am. bor.
plattensis, *Greene, Pittonia,* iv. 42.—Am. bor.
pulcherrimus, A. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 370.—Am. bor.
tortifolius, *Greene, Fl. Francisc.* 368.—Calif.
wyomingensis, A. Nelson, in *Coult. Bot. Gaz.* 1899, 372.—Am. bor.
- CHUPALON**, Adans. = *Thibaudia*, Pav. (Vaccin.).
turbinatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 190.—Bolivia.
viridiflorum, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
- CHUQUIRAGUA**, Juss. (Compos.).
brasiliensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 141 = *glabra*.
Dusenii, *O. Hoffm. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 246.—Patag.
mattogrossensis, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 77.—Bras.
paranahybensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 455.—Bras.
- CHUSQUEA**, Kunth (Gramin.).
Lehmannii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxvii. 35.—N. Granat.
longipendula, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 348.—Bolivia.
macrostachya, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 350.—Chili.
Nelsoni, *Scribn. & F. G. Sm. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 16.—Mexic.
Palenae, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 350.—Chili.
parviflora, *R. Phil. l. c.* 349.—Chili.
ramosissima, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 24.—Am. trop.
serrulata, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 719.—N. Granat.
spadicea, *Pilg. l. c.* xxvii. 35.—N. Granat.
- CHYLISMA**, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 506. (1840) = *Oenothera*, Linn. (Onagr.).
brevipes, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 194 = *O. brevipes*.
cardiophylla, Small, *l. c.* 193 = *O. cardiophylla*.
cruciformis, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 233 = *O. scapoidea*.
heterochroma, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 193 = *O. heterochroma*.
multijuga, Small, *l. c.* = *O. multijuga*.
Parryi, Small, *l. c.* = *O. Parryi*.
pterosperma, Small, *l. c.* = *O. pterosperma*.
scapoidea, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 506 = *O. scapoidea*.
- CHYTRACULIA**, P. Br. = *Calyptanthus*, Sw. (Myrtac.).
Chytraculia, *Mills. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 80 = *C. Chytraculia*.
punctata, *Mills. l. c.* i. 431 = *C. punctata*.
- CHYTRANTHUS**, Hook. f. (Sapind.).
edulis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1249.—Afr. trop.
macrophyllus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 298.—Afr. trop.
stenophyllus, *Gilg, l. c.* 297.—Afr. trop.
Zenkeri, *Gilg, l. c.* 298.—Afr. trop.
- CICENDIOLA**, Bub. *Fl. Pyren.* i. 536 = *Cicendia*, Adans. (Gentianac.).
filiformis, *Bub. l. c.* = *C. filiformis*.
Vaillantii, *Bub. l. c.* = *C. pusilla*.
- CICHORIUM**, Tourn. (Compos.).
Bottae, *Defters, Voy. Yemen,* 159.—Arab.
- CICUTA**, Tourn. (Umbell.).
Curtisii, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 97.—Am. bor.
Douglasii, *Coult. & Rose, l. c.* 95 = *crassifolia*.
mexicana, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 145.—Am. cent.
orientalis, *A. Degen, in Pötfús. Termész. Közl.* xxxvi. (1896) 38; *ex Just, Jahresb.* xxiv. II. 210, 358.—Eur.
- CIENFUEGOSIA**, Cav. = *Fugosia*, Juss. (Malvac.).
yucatanensis, *Mills. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 74.—Am. cent.
- CIENKOWSKYA**, Solms = *Kaempferia*, Linn. (Scitam.).
aethiopica, *Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 197. t. 1 = *K. aethiopica*.
Kirkii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 5994 = *K. Kirkii*.
- CIMICIFUGA**, Linn. (Ranunc.).
rubifolia, *Kearn. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 561.—Am. bor.
- CINCINNOBOTRYIS**, Gilg, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 265 (1897). *MELASTOMACEAE*.
oreophila, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
- CINERARIA**, Linn. (Compos.).
bracteosa, *O. Hoffm. in Goetsen, Durch Afr.* (repr.) 10.—Afr. trop.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 402.—Afr. trop.
Grisebachii, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxiv. 725.—Eur.
pinnata, *O. Hoffm. ex Schins, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 73.—Afr. austr.
Prittwitzii, *O. Hoffm. in Goetsen, Durch Afr.* (repr.) 10.—Afr. trop.
- CINNAMODENDRON**, Endl. (Canell.).
Dinisii, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 5.—Bras.
- CINNAMOMUM**, Tourn. (Laurac.).
elegans, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 633.—Ins. Samoa.
- CIRRHOPETALUM**, Lindl. (Orchid.).
acuminatum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 282.—Penins. Mal.
brunnescens, *Ridley, l. c.* xxxi. 279.—Borneo.
caudatum, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 93 (non Wight).—Ind. or.
ciliatum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 136.—Hort.
citrinum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 279.—Malaya.
Curtisii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7554.—Malaya.
emarginatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* 1897, 269.—Hab. ?
Fordii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 193.—China.
graveolens, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 33 = *robustum*.
kamersianum, *Zahlbr. in Wien. Ill. Gart. Zeit.* xxv. 193.—Hort.
Koordersii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 128.—Celebes.
linearifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 283.—Penins. Mal.
longissimum, *Ridley, l. c.* 280.—Penins. Mal.
maximum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 70.—Malaya.
microbulbon, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 283.—Penins. Mal.
ochraceum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 212.—Malaya.
pileolatum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 137.—Hort.
Proudlockii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 588.—Ind. or.
psittacoides, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 280.—Penins. Mal.
semibifidum, *Ridley, l. c.* 284.—Penins. Mal.
sikkimense, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 90.—Ind. or.
Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon,* iv. 158.—Zeylan.

CIRSIIUM, Tourn. = **Cnicus**, Tourn. (Compos.).
abruptum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 62.—Eur.
candidissimum, Damm. in Gard. Chron. 1898, I. 161.—As. Min.
dolopicum, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 74.—Eur.
exiguum, Bub. Fl. Pyren. ii. 137 = *C. acaulis*.
hystrix, Porta, in Atti Accad. Agiati Rovereto, 1896, 213.—Eur.
latinervium, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvii. 167.—Eur.
montanum, Bub. Fl. Pyren. ii. 131 = *C. monspessulanus*.
narbonense, Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar. t. 240.—Eur.
Pelii, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 303.—Eur.
validum, Form. I. c.—Eur.

CISSAMPELOS, Linn. (Menisperm.).
Dinklagei, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 399.—Afr. trop.
lycioides, Th. Dur. & Schins, Consp. Fl. Afr. i. II. 50 (= *Antisoma lycioides*).—Afr. austr.
miersiana, Th. Dur. & Schins, l. c. (= *Antisoma miersiana*).—Afr. austr.
tenuipes, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 399.—Afr. trop.
truncatus, Engl. l. c. 398.—Afr. trop.

CISSAROBRYON, Poepp. = **Viviania**, Cav. (Geran.).
elegans, Poepp. Fragm. Syn. Fl. Chil. 29 = *V. elegans*.
macrophyllum, Phil. in Linnaea, xxxiii. 32 = *V. macrophylla*.
parvifolium, Phil. l. c. 33 = *V. microphylla*.

CISSUS, Linn. = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).
barbeyana, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 11.—Afr. trop.
Beya, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 427.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 12.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 58.—Afr. trop.
hasslerianus, Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. I. 73.—Am. cent.
haullevilleana, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 12.—Afr. trop.
hauptiana, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 278.—Afr. trop.
prostrata, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 13.—Afr. trop.
schumanniana, Gilg, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 429.—N. Guin.
setulosa, Diels & Gilg, in Engl. Jahrb. xxix. 466.—China.
stenopoda, Gilg, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 298, nomen.—Afr. trop.

CISTANTHERA, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 234 (1897). **TILIACEAE**.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 174.—Afr. trop.
kabingensis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 234.—Afr. trop.

CITHAREXYLUM, Mill. (Verben.).
Germaini, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 343.—Chili.
glabrum, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 300.—Mexic.
Jurgenseni, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 342.—Mexic.
ovatifolium, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 301.—Mexic.
scandens, Briq. & Spruce, in Bull. Herb. Boiss. iv. 341.—Mexic.
spicatum, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 81.—Bolivia.

CITRULLUS, Forsk. (Cucurb.).
Citrullus, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 606 = *vulgaris*.

CITRUS, Linn. (Rutac.).
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 639.—Celebes.
dolichophylla, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 377.—N. Guin.

CLADAPUS, Moeller, in Ann. Jard. Buitenz. xvi. (1899) 115. **PODOSTEMACEAE**.
Nymani, Moeller, l. c.—Java.

CLAOXYLON, A. Juss. (Euphorb.).
bicarpellatum, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 398.—N. Guin.
Preussii, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 23.—Afr. trop.
sphaerocarpum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 284.—Afr. austr.
tomentosum, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 843.—Ins. Hawaii.

CLARKIA, Pursh (Onagr.).
Breweri, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 136.—Calif.
concinna, Greene, l. c.—Calif.
grandiflora, Greene, l. c.—Calif.

CLATHROSPERMUM, Planch. (Anonac.).
pilosum, Th. Dur. & Schins, Consp. Fl. Afr. i. II. 44 (= *Popowia pilosa*).—Afr. trop.

CLAUSENA, Burm. (Rutac.).
Forbesii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 178.—Sumatra.
impunctata, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 117.—Afr. trop.
melioides, Hiern, l. c.—Afr. trop.

CLAYTONIA, Gronov. (Portul.).
aurea, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 260.—Am. bor.
calycina, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxviii. 592 (non Kuntze).—N. Zel.
depressa, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898, 221.—Am. bor.
multicaulis, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 259.—Am. bor.
washingtoniana, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898, 220.—Am. bor.

CLEISOSTOMA, Blume (Orchid.).
armigera, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 123.—Reg. Himal.
bambusarum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 233 = *Sarcanthus bambusarum*.
crassum, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 295.—Borneo.
gemmatum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 234 = *Saccolabium gemmatum*.
Ionosma, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 366.—Penins. Mal.
Koordersii, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 181.—Celebes.
Lauterbachii, Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 251, nomen.—N. Guin.
micranthum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 239 (= *Saccolabium micranthum*).—Ind. or. .
parvum, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 366.—Penins. Mal.
tenuicaule, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 596.—Penins. Mal.
zollingerianum, Kraenzl. in Gard. Chron. 1897, I. 70.—Malaya.

CLEISTACHNE, Benth. (Gramin.).
Stocksii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 162.—Ind. or.

CLEISTANTHUS, Hook. f. (Euphorb.).
caudatus, Pax, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. I. 49.—Afr. trop.
glaucus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 955.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 625.—Celebes.

CLEISTOPHOLIS, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 160 (1897). **ANONACEAE**.

CLEMATIS, Dill. (Ranunc.).
arizonica, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 547.—Am. bor.
Bakeri, Greene, Pittonia, iv. 147.—Am. bor.
boissieriana, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix. 400.—Turkestan.
brevifolia, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 8.—Am. bor.
Everettii, Hemsl. in Kew Bull. 1896, 37.—Celebes.
Gattingeri, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 210.—Am. bor.
glaucophylla, Small, l. c. 337.—Am. bor.
Goetzei, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 388.—Afr. trop.
Hillii, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 266.—N. Zel.
iringaensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 388.—Afr. trop.

CLEMATIS:—
rubifolia, C. H. Wright, in Kew Bull. 1896, 21.—China.
spectabilis, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xvii. I. 12.—China.
tangutica, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix. 399.—As. cent.
uhemensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 387.—Afr. trop.

CLEMATOCLETHRA, Maxim. (Ternstroem.).
Giraldii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 472.—China.

CLEOME, Linn. (Capparid.).
epilobioides, Baker, in Kew Bull. 1897, 243.—Afr. trop.
hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. vi. App. I. 12.—Parag.
humilis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 196.—Mexic.
inornata, Greene, Pittonia, iv. 16.—Am. bor.
macradenia, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 188.—Arab.
montevicensis, Arech. in Anal. Mus. Montevid. ix. (Fl. Urug. 54).—Urug.
polyandra, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 196 = *kunthiana*.
thyrsiflora, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 14.—Afr. trop.
tunarensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 6.—Bolivia.

CLEOMELLA, DC. (Capparid.).
alata, Eastw. in Zoe, v. 87.—Am. bor.
gracilis, Brandegee, in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 444.—Am. bor.

CLERMONTIA, Gaudich. (Campan.).
clermontoides, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 906 = *Gaudichaudii*.

CLERODENDRON, Linn. (Verben.).
angolense, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 291.—Afr. trop.
aurantiacum, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 313.—Afr. trop.
Barteri, Baker, l. c. 298.—Afr. trop.
Bernieri, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 348.—Madag.
bipindense, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 296.—Afr. trop.
bolivianum, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 82.—Bolivia.
botryoides, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 516.—Afr. trop.
caesium, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 300.—Afr. trop.
carosulum, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 311.—Afr. trop.
congestum, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 296.—Afr. trop.
conglobatum, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 296.—Afr. trop.
cuneatum, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 303 (non Turcz.).—Afr. austr.
cuneifolium, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 306.—Afr. trop.
Dekindtii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 301.—Afr. trop.
dumale, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 519.—Afr. trop.
Dusenii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 293.—Afr. trop.
emarginatum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 348.—Am. trop.
eupatorioides, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 295.—Afr. trop.
Giletii, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 113.—Afr. trop.
glabratum, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 295.—Afr. trop.
Greyi, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 308.—Afr. trop.
Guerkii, Baker, l. c.—Afr. trop.
Holstii, Guerke, ex Baker, l. c. 303.—Afr. trop.
hysteranthum, Baker, l. c. 306.—Afr. trop.
ingratum, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 526.—N. Guin.
Kalbreveri, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 311 = *violaceum*.
kentrocaule, Baker, l. c. 296.—Afr. trop.
Kirkii, Baker, l. c. 299.—Afr. trop.

CLERODENDRON—

- kissakense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 304.—Afr. trop.
 longitubum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 74.—Afr. trop.
 Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* xxxviii. 213.—Afr. trop.
 macrostachyum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 159 (non Turcz.).—Afr. trop.
 mandarinorum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 549.—China.
 Mannii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 519.—Afr. trop.
 megasepalum, *Baker, l. c.* 306.—Afr. trop.
 orbiculare, *Baker, l. c.* 307.—Afr. trop.
 polyanthum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 295.—Afr. trop.
 porphyrocalyx, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 526.—N. Guin.
 Rehmannii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 294.—Afr. trop. et austr.
 Scheffleri, *Guerke, l. c.* 301.—Afr. trop.
 Schlechteri, *Guerke, l. c.* 302.—Afr. trop.
 Schlechteri, *Guerke, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 310, nomen.—Afr. trop.
 silvicola, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 299.—Afr. trop.
 speciosum, *Guerke, l. c.* xviii. 171 = angolense.
 strictum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 305.—Afr. trop.
 subreniforme, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 291.—Afr. trop.
 subscaposum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2675.—China.
 suffruticosum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 302.—Afr. trop.
 syringaeifolium, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 160.—Afr. trop.
 Thonneri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 292.—Afr. trop.
 thyrsoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 309 = Mannii.
 thyrsoides, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 293.—Afr. trop.
 toxicarium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 298.—Afr. trop.
 ulugurensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 294.—Afr. trop.
 violaceum, *Guerke, l. c.* 303.—Afr. trop.
 Whitfieldii, *Seem. in Bonplandia*, x. 250 = capitatum.
 Wilmsii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 304.—Afr. austr.
 yaundense, *Guerke, l. c.* 297.—Afr. trop.
 zambesiaceum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 309.—Afr. trop.

CLEYERA, DC. (Ternstroem).

- albopunctata, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 537.—Ind. occ.
 Nimanimae, *Krug & Urb. l. c.* 540 (= *Freziera Nimanimae*).—Ind. occ.

CLIBADIUM, Linn. (Compos.).

- Sodiroid, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 32.—Ecuador.
 subsessilifolium, *Hieron. l. c.*—Ecuador.

CLIDEMIA, D. Don (Melastom.).

- costaricensis, *Cogn. ex Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 28, nomen.—Am. cent.

CLIFFORTIA, Linn. (Rosac.).

- amplexistipula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 140.—Afr. austr.
 neglecta, *Schlechter, l. c.* 141.—Afr. austr.
 pedunculata, *Schlechter, l. c.* xxiv. 444.—Afr. austr.
 phyllanthoides, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 ramosissima, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 repens, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 392.—Afr. austr.

CLINOGYNE, Salisb. (Scitamin.).

- arillata, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 96.—Afr. trop.
 azurea, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 canniformis, *K. Schum. l. c.* (= *Thalia cannaeformis*).—Ind. or.; Malaya.
 congensis, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 filipes, *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 651 = Donax filipes.
 leucantha, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 96.—Afr. trop.
 oligantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

CLINOGYNE—

- schweinfurthiana, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 96 (= *Arundastrum schweinfurthianum*).—Afr. trop.
 ugandensis, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

CLINOPODIUM, Linn. = **Calamintha**, Tourn. (Labiata).

- carolinianum, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 7 = C. caroliniana.
 kuntzeanum, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 259 = *Satureia kuntzeana*.
 multiflorum, Kuntze, l. c. = *Satureia multiflora*.

CLITANDRA, Benth. (Apocyn.).

- Buchanani, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 118.—Afr. trop.
 flavidiflora, *Hallier f. l. c.* 124 (= *Carpodinus flavidiflorus*).—Afr. trop.
 gracilis, *Hallier f. l. c.* 117 (= *Carpodinus gracilis*).—Afr. trop.
 henriquesiana, *K. Schum. ex Warb. in Tropenpfl.* i. 135.—Afr. trop.
 kilimanjarica, *Warb. l. c.* iv. 614.—Afr. trop.
 landolphoides, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 119.—Afr. trop.
 laxiflora, *Hallier f. l. c.* 124 (= *Carpodinus laxiflorus*).—Afr. trop.
 leptantha, *Hallier f. l. c.* 123 (= *Carpodinus leptantha*).—Afr. trop.
 macrantha, *Hallier f. l. c.* 117 (= *Carpodinus macrantha*).—Afr. trop.
 viscidiflua, *K. Schum. ex Hallier f. l. c.* 127.—Afr. trop.

CLITORIA, Linn. (Legum.).

- humilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 169.—Mexic.
 subsessilis, *Rose, l. c.*—Mexic.
 tanganicensis, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 60.—Afr. trop.

CLOSIOSPERMUM, Neck. (Compos.).

- asperum, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 68 = *Picris hieracioides*.
 sprengerianum, *Bub. l. c.* 69 = *Picris sprengeriana*.

CLUSIA, Linn. (Guttif.).

- Burchellii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 248.—Guiana.
 guedesiana, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 508.—Bras.
 krugiiana, *Urb. Symb. Antill.* i. 367.—Ind. occ.
 purpurea, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 248.—Guiana.

CLUYTTIA, Boerh. (Euphorb.).

- crassifolia, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 736.—Afr. austr.
 Galpini, *Pax, l. c.*—Afr. austr.
 glauca, *Pax, ex A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 50.—Afr. austr.
 Krookii, *Pax, l. c.* 49.—Afr. austr.

CLYTOSTOMA, Miers = **Pithecoctenium**, Mart. (Bignon.).

- campanulatum, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 148 = P. tenuiflorum.
 convolvuloides, *Bureau & K. Schum. l. c.* 154.—Bras.
 costatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 150.—Bras.
 decorum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 151 (= *Anemopaegma decorum*).—Bras.
 noterophilum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 153 (= *Bigonia noterophila*).—Bras.
 ramentaceum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 150.—Bras.
 sciuripabulum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 149.—Bras.
 uniflorum, *K. Schum. ex Bureau & K. Schum. l. c.* 408.—Bras.

CNESTIS, Juss. (Connarac.).

- aurantiaca, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 216.—Afr. trop.
 emarginata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 81.—Afr. trop.
 polyantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 215.—Afr. trop.
 riparia, *Gilg, l. c.* 217.—Afr. trop.
 togoensis, *Gilg, l. c.* 216.—Afr. trop.

CNICUS, Linn. (Compos.).

- bipinnatus, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser.* III. i. 121.—Am. bor.
 diffusus, *Eastw. l. c.*—Am. bor.
 Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 22.—China.
 Henryi, *Franch. l. c.* 21.—China.

CNICUS—

- hesperius, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser.* III. i. 122.—Am. bor.
 Leduci, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 23.—China.
 pinnatisectus, *Klatt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 292.—Am. cent.
 Provosti, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 23.—China.
 Souliei, *Franch. l. c.* 21.—China.
 tioganus, *Congd. in Erythraea*, vii. 186.—Calif.

CNIDIUM, Cusson = **Selinum**, Linn. (Umbell.).

- ajanense, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflansenf.* iii. VIII. 210 (= *Tilingia ajanensis*).—As. bor.
 pratense, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 381 = *Silaus flavescens*.
 silaifolium, *Fiori & Paol. Fl. Ital.* ii. 170 = *Carum rigidulum*.
 virescens, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 418 = *Silaus carvifolius*.

COCCINIA, Wight & Arn. (Cucurb.).

- Dinteri, *André, in Rev. Hort.* 1900, 276.—Afr. trop.
 ecirrhosa, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 822.—Afr. trop.
 hirtella, *Cogn. l. c.* 821.—Afr. austr.
 suburceolata, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* i. 450.—Ind. occ.

COCCOLOBA, Linn. (Polygon.).

- cereifera, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 7.—Bras.
 Dussii, *Lindau, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 213.—Ind. occ.
 Harrisii, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* i. 228.—Ind. occ.

COCCOTHRINAX, Sargent, in Coult. Bot. Gaz.

- xxvii. (1899) 87. **PALMAE**.
 Garberi, *Sargent, l. c.* 90 (= *Thrinax Garberi*).—Am. bor.
 jucunda, *Sargent, l. c.* 89.—Am. bor.

COCCULUS, DC. (Menisperm.).

- Blumei, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 40.—Java.
 celebicus, *Boerl. l. c.*—Celebes.

COCHLEARIA, Tourn. (Crucif.).

- Hobsoni, *H. H. W. Pearson, in Hook. Ic. Pl.* t. 2643.—Tibet.

COCLIODA, Lindl. (Orchid.).

- stricta, *Cogn. in Gard. Chron.* 1897, i. 410.—N. Granat.

COCHLOSPERMUM, Kunth (Bixac.).

- balicum, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 49.—Ind. or.

COCOS, Linn. (Palm.).

- paraguayensis, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* (1899) 9.—Parag.
 sapida, *Barb. Rodr. l. c.* 12.—Parag.

CODONANTHE, Hanst. (Gesner.).

- macradenia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 154.—Am. cent.

CODONIUM, Vahl = **Schoepfia**, Schreb. (Olacac.).

- chrysophylloides, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 552 = S. chrysophylloides.
 pallidum, *Van Tiegh. l. c.* 550 = S. pallida.

CODONOCROTON, E. Mey. ex Engl. & Diels, in Engl.

- Monogr. Afr. Pfl. iii. (1899) 95 = **Combretum**, Linn. (Combret.).
 triphyllum, *E. Mey. l. c.* = C. bracteosum.

CODONURA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896)

229. **APOCYNACEAE**.
 calophylla, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

COELACHNE, R. Br. (Gramin.).

- brachiata, *Munro, ex Benth. Fl. Austral.* vii. 626, in obs. = pulchella.
 infirma, *Buese, in Miq. Pl. Jungh.* 350 = pulchella.
 japonica, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 701.—Japon.
 perpusilla, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 373 = pulchella.

COELACHYRUM, Nees = **Eragrostis**, Beauv. (Gramin.).

- praeflorum, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 75.—Afr. trop.

COELARTHON, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1897)

163. **GRAMINEAE**.
 Brandisii, *Hook. f. l. c.* 164.—Ind. or.

COELIDIUM, Vog. (Legum.).

- humile, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 218.—Afr. austr.

COELOCOCCUS, H. Wendl. = **Metroxylon**, Rottb. (Palm.).
salomonensis, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1896, 141.—Polynes.

COELOGLOSSUM, Hartm. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
diphyllum, Fiori & Paol. Fl. Ital. i. 248 = *H. cordata*.

COELOGYNE, Lindl. (Orchid.).
angustifolia, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 322.—Penins. Mal.
bimaculata, Ridley, l. c. 327.—Penins. Mal.
casta, Ridley, l. c. 322.—Penins. Mal.
Delavayi, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 195.—China.
Henryi, Rolfe, l. c.—China.
lauterbachiana, Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 113.—N. Guin.
mandarinorum, Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 269.—China.
pachybulbon, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 324.—Penins. Mal.
pogonioides, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 196.—China.
prasina, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 326.—Penins. Mal.
pulchella, Rolfe, in Kew Bull. 1898, 194.—As. trop.
pusilla, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 327.—Penins. Mal.
quadrangularis, Ridley, l. c. 323.—Penins. Mal.
tenuiflora, Ridley, l. c. xxxi. 287.—Borneo.
zeylanica, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, iv. 161.—Zeylan.

COELOPLEURUM, Ledeb. = **Archangelica**, Hoffm. (Umbellif.).
actaeifolium, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 142 = *A. Gmelini*.
brevicaule, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 212 (= *Angelocarpa brevicaulis*).—As. cent.
longipes, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 142.—Am. bor.
saxatile, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 213 = *Angelica saxatilis*.

COFFEA, Linn. (Rubiace.).
arnoldiana, Wildem. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot. 1900, 236.—Afr. trop.
canephora, Pierre, ex Froehn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 237.—Afr. trop.
congensis, Froehn. l. c. 235.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 202.—Afr. trop.
divaricata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 461 (non Tausch).—Afr. trop.
gilgiana, Froehn. in Engl. Jahrb. xxv. 267.—Afr. trop.
Ibo, Froehn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 234.—Afr. trop.
Laurentii, Wildem. in Compt. Rend. Congr. Intern. Bot. 1900, 234.—Afr. trop.
macrochlamys, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 462.—Afr. trop.
pulchella, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
scandens, K. Schum. l. c. 463.—Afr. trop.
spathicalyx, K. Schum. l. c. 464.—Afr. trop.
Staudtii, Froehn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 236.—Afr. trop.

COGNIAUXIA, Baill. (Cucurb.).
trilobata, Cogn. in Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo, 141.—Afr. trop.

COINOCHELAMYS, T. Anders. (Acanth.).
congolana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiii. 197.—Afr. trop.

COIX, Linn. (Gramin.).
agrestis, Lour. Fl. Cochinch. 551 = *C. Lacryma-Jobi*.
crypsoides, C. Muell. in Bot. Zeit. xix. 334 = *Polytoca barbata*.
Koenigii, Spreng. Syst. i. 228 = *Polytoca barbata*.
Ma-Yüén, Romanet, in Bull. Soc. Acclimat. Sér. II. viii. 442 = *C. Lacryma-Jobi*.
stigmatisata, C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) 9 = *C. Lacryma-Jobi*.
sulcata, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 102 = *punctata*.

COLA, Schott & Endl. (Stercul.).
angustifolia, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 115.—Afr. trop.
anomala, K. Schum. l. c. 134.—Afr. trop.

COLA :—
Ballayi, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 13.—Afr. trop.
brevipes, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 119.—Afr. trop.
caricifolia, K. Schum. l. c. 111 = *Afzelii*.
chlamydantha, K. Schum. l. c. 112.—Afr. trop.
congolana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 181.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. l. c. 184.—Afr. trop.
diversifolia, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 306.—Afr. trop.
flavo-velutina, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 306.—Afr. trop.
hypochrysea, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
lateritia, K. Schum. l. c. 307.—Afr. trop.
micrantha, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
Preussii, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 120.—Afr. trop.
pugionifera, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
rhodoxantha, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 307.—Afr. trop.
rhynchophylla, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 119.—Afr. trop.
Scheffleri, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
semecarpophylla, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 308.—Afr. trop.
urceolata, K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v. 114.—Afr. trop.
vera, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 15.—Afr. trop.

COLCHICUM, Linn. (Liliac.).
bifolium, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iv. 198.—As. Min.
chalconicum, Asemov. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 174.—Eur.
Doerfleri, Halacsy, ex Degen & Doerfl. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxiv. 742.—Eur.
halepense, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 803.—Syria.
halophilum, Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v. 800.—Persia.
hiemale, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 802.—Cyprus.
Tuntasium, Heldr. in Bull. Herb. Boiss. vi. 395.—Graecia.
varians, Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v. 801.—Persia.

COLEONEMA, Bartl. & Wendl. (Rutac.).
gracile, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 163.—Afr. austr.

COLEOSANTHUS, Cass. = **Brickellia**, Ell. (Compos.).
abbreviatus, Greene, Pittonia, iv. 125.—Am. bor.
ambigens, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 118.—Am. bor.
densus, Greene, Pittonia, iv. 126.—Mexic.
humilis, Greene, l. c. 124.—Am. bor.
Nevinii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 8 = *B. Nevinii*.
petiolaris, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 117.—Am. bor.
polyanthemus, Greene, Pittonia, iv. 126.—Mexic.
scaber, Greene, l. c. iii. 100.—Am. bor.
verbenaceus, Greene, l. c. iv. 125.—Mexic.
Wootoni, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 511.—Am. bor.

COLEUS, Lour. (Labi.).
aconitiflorus, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 866.—Afr. trop.
albidus, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 321 = *lanuginosus*.
aromaticus, Benth. in DC. Prodr. xii. 72 = *amboinicus*.
assurgens, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 428.—Afr. trop.
aulihanensis, Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis, 211.—Afr. trop.
betonicoides, Baker, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 866.—Afr. trop.
Briquetii, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 441.—Afr. trop.
bullulatus, Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. 69.—Afr. trop.
caninus, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 318 = *comosus*.
concinnus, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 443.—Afr. trop.
cuneatus, Baker f. in Journ. Bot. 1899, 64.—Afr. trop.
cunenensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 443.—Afr. trop.

COLEUS :—
Dewevrei, Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. 71.—Afr. trop.
Dupuisii, Briq. l. c. 70.—Afr. trop.
etveldeanus, Briq. l. c. 78.—Afr. trop.
elatus, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 427.—Afr. trop.
floribundus, Baker, l. c. 438.—Afr. trop.
Forskohlii, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 359 = *barbatus*.
fulvescens, Kurz, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 521 = *Plectranthus fulvescens*.
Gaudichaudii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 237.—Ins. Philipp.
Igolotorum, Briq. l. c. 236.—Ins. Philipp.
leptophyllus, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 427.—Afr. trop.
Mahonii, Baker, l. c. 434.—Afr. trop.
Malinvaldi, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 240.—Afr. trop.
Mannii, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 211 = *Solenostemon Mannii*.
Marquesii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 239.—N. austr.
nyikensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 439.—Afr. trop.
orbicularis, Baker, l. c. 437.—Afr. trop.
palliolatus, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 464.—Afr. trop.
palustris, Vatke, in Linnaea, xxxvii. 319 = *edulis*.
rupestris, Hochst. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 409 = *Plectranthus rupestris*.
ruwenzoriensis, Baker, l. c. 427.—Afr. trop.
savannicola, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 529.—N. Guin.
Schinzi, Guerke, in Bull. Herb. Boiss. vi. 555.—Afr. austr.
Sodaliun, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 526.—Afr. trop.
speciosus, Baker f. in Journ. Bot. 1899, 64.—Afr. trop.
tetensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 431.—Afr. trop.
thyrsoidens, Baker, in Hook. f. Bot. Mag. t. 7672.—Afr. trop.
ulugurensis, Guerke, in Engl. Jahrb. xxviii. 470.—Afr. trop.

COLIGNONIA, Endl. (Nyctag.).
acutifolia, Heimerl, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxx. 136.—Peruv.
ovalifolia, Heimerl, l. c. 132.—Ecuador.
rufopilosa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 264.—Bolivia.

COLLIGUAJA, Molina (Euphorb.).
patagonica, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 572.—Patag.

COLLINSIA, Nutt. (Scrophul.).
callosa, Parish, in Erythraea, 1899, 96.—Am. bor.
inconspicua, Congd. in Erythraea, 1900, 187.—Calif.

COLLOMIA, Nutt. (Polemon.).
aristella, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 318 = *Gilia aristella*.
bellidifolia, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Amer. ii. 76 = *gracilis*.
chubutensis, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 619.—Patag.
humilis, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Amer. ii. 76 = *gracilis*.
mazama, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xi. 35.—Am. bor.
patagonica, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 550.—Patag.
pusilla, P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 135.—Reg. Magell.

COLOBANTHUS, Bartl. (Caryoph.).
squarrosus, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xxviii. 534.—N. Zel.

COLOCASIA, Schott (Arac.).
violacea, Hort. in Hook. f. Bot. Mag. t. 7732 = *antiquorum*.

COLOGANIA, Kunth (Legum.).
erecta, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 136.—Mexic.

COLPODIUM, Trin. (Gramin.).
nutans, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 76 = *Cata-brosa nutans*.

COLPODIUM :—

- planifolium*, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 330 = *Poa planifolia*.
subspicatum, Hack. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 311 = *Catabrosa himalaica*.

COLUBRINA, Rich. (Rhamn.).

- anomala*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 377.—Penins. Mal.
Colubrina, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 69 = *ferruginosa*.
pedunculata, Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl. 175.—Ins. Christmas.
spinosa, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 4.—Am. cent.

COLUMELLIA, Ruiz & Pav. (Columell.).

- serrata*, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 93.—Bolivia.

COLUMNEA, Plum. (Gesner.).

- filipes*, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 2428.—N. Granat.
oblongifolia, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 98.—Bolivia.
Tulae, Urb. Symb. Antill. i. 409.—Ind. occ.

COLUTEA, Tourn. (Legum.).

- longialata*, Koehne, in Mitth. Dendrol. Ges. 1896, 49.—Oriens.

COLUTEASTRUM, Moehr. ex Kuntze, Rev. Gen. i.

- (1891) 171 = *Lessertia*, DC. (Legum.).
benguellense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 232 = *L. benguellensis*.

COMANTHOSPHECE, S. Moore (Labiata).

- barbinervis*, S. Moore, in Journ. Bot. 1877, 293 = *japonica*.
stellipila, S. Moore, l. c. = *japonica*.
sublanceolata, S. Moore, l. c. = *japonica*.

COMARELLA, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii.

- (1896) 156. **ROSACEAE**.
multifoliata, Rydb. l. c. (= *Potentilla depauperata*).—Am. bor.
sabulosa, Rydb. l. c. 157 (= *P. sabulosa*).—Am. bor.

COMBRETUM, Linn. (Combret.).

- Azelii*, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 22.—Afr. trop.
albidiflorum, Engl. & Diels, l. c. 46.—Afr. trop.
Antunesii, Engl. & Diels, l. c. 58.—Afr. trop.
aphanopetalum, Engl. & Diels, l. c. 76.—Afr. trop.
atropurpureum, Engl. & Diels, l. c. 74.—Afr. trop.
auriculatum, Engl. & Diels, l. c. 79.—Afr. trop.
bipindense, Engl. & Diels, l. c. 77.—Afr. trop.
bongense, Engl. & Diels, l. c. 53.—Afr. trop.
borumense, Engl. & Diels, l. c. 64.—Afr. trop.
bracteatum, Engl. & Diels, l. c. 100 (= *Cacoucia bracteata*).—Afr. trop.
bracteosum, Engl. & Diels, l. c. 95 (= *Poirvea bracteosa*).—Afr. austr.
Bricchettii, Engl. & Diels, l. c. 34.—Afr. trop.
brosigianum, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 192.—Afr. trop.
bruchhausenianum, Engl. & Diels, l. c. 189.—Afr. trop.
brunneum, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 48.—Afr. trop.
Buchananii, Engl. & Diels, l. c. 40.—Afr. trop.
caffrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 87 = *salicifolium*.
calobotrys, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 74.—Afr. trop.
chionanthoides, Engl. & Diels, l. c. 79.—Afr. trop.
cinereopetalum, Engl. & Diels, l. c. 84.—Afr. trop.
cinnabarinum, Engl. & Diels, l. c. iv. 35.—Afr. trop.
conchifolium, Engl. & Diels, l. c. iii. 22.—Afr. trop.
cordofanum, Engl. & Diels, l. c. 50.—Afr. trop.
coriifolium, Engl. & Diels, l. c. 75.—Afr. trop.
Denhardtiorum, Engl. & Diels, l. c. 93.—Afr. trop.
dolichopetalum, Engl. & Diels, 91.—Afr. trop.
Elliotii, Engl. & Diels, l. c. 42.—Afr. trop.
exannulatum, Engl. & Diels, l. c. 88 (= *Cacoucia exannulata*).—Afr. trop.
flammeum, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 344.—Afr. trop.
floribundum, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 18.—Afr. trop.
fulvotomentosum, Engl. & Diels, l. c. 39.—Afr. trop.
Galpinii, Engl. & Diels, l. c. 41.—Afr. austr.
ghasalense, Engl. & Diels, l. c. 47.—Afr. trop.

COMBRETUM :—

- gloriosum*, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 35.—Bolivia.
Goetzei, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 96.—Afr. trop.
guanaiense, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 34.—Bolivia.
Hensei, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 85.—Afr. trop.
Hobol, Engl. & Diels, l. c. 36.—Afr. trop.
insculptum, Engl. & Diels, l. c.—Afr. trop.
insulare, Engl. & Diels, l. c. 21.—Afr. trop.
ischnothyrsus, Engl. & Diels, l. c. 96.—Afr. trop.
kachinense, King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxix. 169.—Ind. or.
karagense, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 55.—Afr. trop.
kilossanum, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 193.—Afr. trop.
Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 340.—Penins. Mal.
lasiocarpum, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 96.—Afr. trop.
lasiopetalum, Engl. & Diels, l. c. 65.—Afr. trop.
latialatum, Engl. ex Engl. & Diels, l. c. 86.—Afr. trop.
lawsonianum, Engl. & Diels, l. c. 101 = *Cacoucia paniculata*.
lecananthum, Engl. & Diels, l. c. 42.—Afr. trop.
Lecardii, Engl. & Diels, l. c. 73.—Afr. trop.
leonense, Engl. & Diels, l. c. 51.—Afr. trop.
longipilosum, Engl. & Diels, l. c. 30.—Afr. trop.
longispicatum, Engl. & Diels, l. c. 95 (= *Cacoucia longispicata*).—Afr. trop.
lydenburgianum, Engl. & Diels, l. c. 26.—Afr. austr.
macrostigmatum, Engl. & Diels, l. c. 24.—Afr. trop.
Mannii, Laws. ex Engl. & Diels, l. c. 74.—Afr. trop.
marginatum, Engl. & Diels, l. c. 18.—Afr. trop.
Marquesii, Engl. & Diels, l. c. 51.—Afr. trop.
Menyharti, Engl. & Diels, l. c. 46.—Afr. trop.
mittuense, Engl. & Diels, l. c. 83.—Afr. trop.
molle, Engl. & Diels, l. c. 80.—Afr. trop.
multispicatum, Engl. & Diels, l. c. 47.—Afr. trop.
mussaendiflorum, Engl. & Diels, l. c. 87.—Afr. trop.
nervosum, Engl. & Diels, l. c. 101.—Afr. trop.
nigrescens, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 340.—Penins. Mal.
nummularium, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 34.—Bolivia.
obtusatum, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 58.—Afr. trop.
odontopetalum, Engl. & Diels, l. c. 60.—Afr. trop.
ondongense, Engl. & Diels, l. c. 56.—Afr. trop.
padoides, Engl. & Diels, l. c. 13.—Afr. trop.
Palmeri, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 136.—Mexic.
parvulum, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 67.—Afr. trop.
Passargei, Engl. & Diels, l. c. 45.—Afr. trop.
patelliforme, Engl. & Diels, l. c. 12.—Afr. trop. et austr.
paucinervium, Engl. & Diels, l. c. 17.—Afr. trop.
Poggei, Engl. & Diels, l. c. 85.—Afr. trop.
polystictum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 351.—Afr. trop.
populifolium, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 54.—Afr. trop.
porphyrobotrys, Engl. & Diels, l. c. 73.—Afr. trop.
porphyrolepis, Engl. & Diels, l. c. 63.—Afr. austr.
prunifolium, Engl. & Diels, l. c. 29.—Afr. trop.
puetense, Engl. & Diels, l. c. 46.—Afr. trop.
quangense, Engl. & Diels, l. c. 98.—Afr. trop.
ramosissimum, Engl. & Diels, l. c. 72.—Afr. trop.
Rautanenii, Engl. & Diels, l. c. 64.—Afr. trop.
rhodanthum, Engl. & Diels, l. c. 92.—Afr. trop.
rhodesicum, Baker f. in Journ. Bot. 1899, 435.—Afr. trop.
rigidifolium, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 342.—Afr. trop.
sambesiicum, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 63.—Afr. trop.
Schinzii, Engl. ex Engl. & Diels, l. c. 54.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Engl. & Diels, l. c. 50.—Afr. trop.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 341.—Penins. Mal.
sericogyne, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 87.—Afr. trop.
somalense, Engl. & Diels, l. c. 81.—Afr. trop.
subvemicosum, Engl. & Diels, l. c. 48.—Afr. trop.
suluense, Engl. & Diels, l. c. 54.—Afr. austr.
taitense, Engl. & Diels, l. c. 80.—Afr. trop.
tenuipes, Engl. & Diels, l. c. 13.—Afr. austr.

COMBRETUM :—

- ternifolium*, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 49.—Afr. trop.
towaense, Engl. & Diels, l. c. 11.—Afr. trop.
Trothae, Engl. & Diels, l. c. 13.—Afr. trop.
ukamense, Engl. & Diels, l. c. 57.—Afr. trop.
ulugurensis, Engl. & Diels, l. c. 35.—Afr. trop.
undulatum, Engl. & Diels, l. c. 48 (non Wall.).—Afr. trop.
velutinum, Engl. & Diels, l. c. 100 = *Cacoucia velutina*.
verticillatum, Engl. & Diels, l. c. 52.—Afr. trop.
virgulosum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 345.—Afr. trop.
Welwitschii, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 40.—Afr. trop.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 339.—Penins. Mal.
Zenkeri, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. iii. 66.—Afr. trop.

COMMELINA, Plum. (Commelin.).

- clarkeana*, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 343.—Afr. trop.
crispa, Wootton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 451.—Am. bor.
dammeriana, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 343.—Afr. trop.
microspatha, K. Schum. l. c. 342.—Afr. trop.
scaposa, C. B. Clarke, ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 220.—Afr. trop.
Thwaitesii, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, iv. 302.—Zeylan.

COMMIPHORA, Jacq. (Burser.).

- Antunesii*, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 255.—Afr. trop.
chlorocarpa, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 414.—Afr. trop.
coriacea, Engl. l. c. xxvi. 369.—Afr. trop.
Gurreh, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 253.—Afr. trop.
loandensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 370.—Afr. trop.
mombassensis, Engl. l. c. 372.—Afr. trop.
porensis, Engl. l. c. 371.—Afr. trop.
pruinosa, Engl. l. c. 368.—Afr. trop.
pyracanthoides, Engl. l. c.—Afr. trop.
quadricincta, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. II. 283.—Afr. trop.
rehmanniana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 255.—Afr. austr.
Rivae, Engl. l. c.—Afr. trop.
samharensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. II. 290.—Afr. trop.
Schlechteri, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 372.—Afr. austr.
spondioides, Engl. l. c. 371.—Afr. trop.
Stuhlmannii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 255.—Afr. trop.
Trothai, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. 371.—Afr. trop.
ulugurensis, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 255; et in Engl. Jahrb. xxvi. 369.—Afr. trop.

COMPSONEURA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.

- lxviii. (1897) 125. **MYRISTICACEAE**.
capitellata, Warb. l. c. 146 (= *Myristica capitellata*).—Peruv.
debilis, Warb. l. c. 144 (= *Myristica debilis*).—Bras.
Sprucei, Warb. l. c. 148 (= *Myristica Sprucei*).—Am. trop.
Trianae, Warb. l. c. 147.—N. Granat.

CONAMOMUM, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,

- xxxii. (1899) 121. **SCITAMINEAE**.
citrinum, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
utriculosum, Ridley, l. c. 122.—Penins. Mal.

CONANTHUS, S. Wats. (Hydrophyll.).

- angustifolius*, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 479.—Am. bor.
carnosus, Wootton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 262.—Am. bor.
Coulteri, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = *Nama Coulteri*.
demissus, A. A. Heller, l. c. = *Nama demissus*.
densus, Lemmon, ex A. A. Heller, l. c. = *Nama densum*.
depressus, Lemmon, l. c. = *Nama depressum*.
dichotomus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 203 = *Nama dichotomum*.

CONANTHUS—

- echioides*, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 203 = *Nama undulatum*.
Havardi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = *Nama Havardi*.
hispidus, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 479 = *Nama hispidum*.
jamaicensis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = *Nama jamaicensis*.
Lobbii, A. A. Heller, l. c. = *Nama Lobbii*.
origanifolius, A. A. Heller, l. c. = *Nama origanifolium parviflorum*, Greenm. in *Erythea*, vii. 117.—Am. bor.
pusillus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = *Nama pusillum*.
Rothrockii, A. A. Heller, l. c. = *Nama Rothrockii*.
sandwicensis, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies*, i. 879 (= *Nama sandwicense*).—Ins. Sandw.
stenocarpus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 6 = *Nama stenocarpum*.
stenophyllum, A. A. Heller, l. c. = *Nama stenophyllum*.

- CONCHOPHYLLUM**, Blume = *Dischidia*, R. Br. (Asclep.).
maximum, Karst. in Ann. Jard. Buitenz. xii. 158 = *D. maxima*.

CONDAMINEA, DC. (Rubiaceae).

- angustifolia*, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 45.—Bolivia.

- CONIONEURA**, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 148 (1897) = *Lavalleopsis*, Van Tiegh. (Olacac).

CONIOSELINUM, Fisch. = *Ligusticum*, Linn. (Umbell.).

- Dawsoni*, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 152 (= *Selinum Dawsoni*).—Am. bor.
Gmelini, Coult. & Rose, l. c. 150 (= *Selinum Gmelini*).—Am. bor.
mexicanum, Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad. i. 147.—Mexic.
pacificum, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 152 (= *Selinum pacificum*).—Am. bor.
scopolorum, Coult. & Rose, l. c. 151 = *L. scopolorum*.

CONNARUS, Linn. (Connar.).

- amplifolius*, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 377 D.—Cochinch.
atpoevensis, Pierre, l. c. t. 377 C.—Cochinch.
bariensis, Pierre, l. c. sub t. 377.—Cochinch.
cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 378 (= *Tricholobus cochinchinensis*).—Cochinch.
ellipticus, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxvi. 7.—Penins. Mal.
harmandianus, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 377 B.—Cochinch.
hebephyllum, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxvi. 5.—Penins. Mal.
mekongensis, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 377.—Cochinch.
nicobaricus, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxvi. 6.—Ins. Nicobar.
punctulatus, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 189.—Afr. trop.
quocensis, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 377 A.—Cochinch.
rufulus, Pierre, l. c. t. 378 B.—Cochinch.
schumannianus, Gilg, in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 341.—N. Guin.
Staudtii, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxxiii. 208.—Afr. trop.
tricarpos, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 47.—Bras.
villosiflorus, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxxiii. 208.—Afr. trop.

CONOCARPUS, Linn. (Combret.).

- lanceifolius*, Engl. *Monogr. Afr. Pfl.* iv. 32.—Afr. trop.

CONOCEPHALUS, Blume (Urtic.).

- sinensis*, C. H. Wright, in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. 471.—China.

CONOPODIUM, Koch (Umbell.).

- graecum*, Freyn & Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* v. 613.—Eur.

CONOSTEGIA, D. Don (Melastom.).

- tenuifolia*, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 334.—Am. cent.

CONRADINA, A. Gray (Labiata).

- puberula*, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 469.—Am. bor.

CONVOLVULUS, Tourn. (Convolv.).

- americanus*, Greene, *Pittonia*, iii. 328.—Am. bor.
aridus, Greene, l. c. 330.—Am. bor.
breweriaecus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 212 = *Breweria sericea*.
camporum, Greene, *Pittonia*, iii. 328.—Am. bor.
collinus, Greene, l. c. 326.—Am. bor.
crinicalyx, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = *Pharbitis crinicalyx*.
deltoides, Greene, *Pittonia*, iii. 331.—Am. bor.
engleriana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 211 = *Astrochlaena engleriana*.
ficifolius, Kuntze, l. c. 213 = *Ipomoea ficifolia*.
fistulosus, Kuntze, l. c. = *Ipomoea fistulosa*.
fruticetorum, Greene, *Pittonia*, iii. 333.—Am. bor.
gracilentus, Greene, l. c. 329.—Am. bor.
hewittaceus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = *Jacquemontia hewittacea*.
Hieronymi, Kuntze, l. c. 217 = *Murucua Hieronymi*.
hirsutiflorus, Damm, in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. Ivi. 41.—Bras.
hirtellus, Hallier f. in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 536.—Afr. austr.
Hochstetteri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = *Ipomoea pinnata*.
itatiayensis, Kuntze, l. c.—Bras.
Juramentii, Kuntze, l. c. = *Murucua Juramentii*.
linnophilus, Greene, *Pittonia*, iii. 329.—Am. bor.
Lorentzii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213 = *Jacquemontia Lorentzii*.
Macounii, Greene, *Pittonia*, iii. 331.—Am. bor.
magnusianus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214 = *Ipomoea magnusiana*.
malacophyllum, Greene, *Pittonia*, iii. 326 (= *Calyptegia villosa*).—Calif.
malvaeoides, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214 = *Ipomoea malvaeoides*.
mattogrossensis, Kuntze, l. c.—Bras.
Meisneri, Kuntze, l. c. = *Ipomoea Selloi*.
Mina, Kuntze, l. c. 215 = *Quamoclit Mina*.
Moricandi, Kuntze, l. c. 214 = *Jacquemontia evoluloides*.
Nuttallii, Greene, *Pittonia*, iii. 330.—Am. bor.
nyctagineus, Greene, l. c. 327.—Am. bor.
obcordatus, Millsp. in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 88.—Am. cent.
oblongatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214 = *Ipomoea oblongata*.
omanensis, S. Moore, in *Fourn. Bot.* 1899, 405.—Arab.
Peteri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 218 = *Murucua Peteri*.
physosepalus, Hallier f. in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 535.—Afr. austr.
polymorphus, Greene, *Pittonia*, iii. 331.—Am. bor.
Pseudomina, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 214.—Bolivia.
purpuratus, Greene, *Pittonia*, iii. 332.—Am. bor.
Ruspolii, Damm, ex Hallier f. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1898) 225.—Afr. trop.
secundiflorus, Fernald, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 90.—Mexic.
setosus, Hallier f. in *Bull. Herb. Boiss.* v. 1048 (= *Ipomoea setosa*).—Bras.
tenuis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 215 = *Ipomoea tenuis*.
tomentellus, Greene, *Pittonia*, iii. 327.—Am. bor.
transvaalensis, Schlechter, in *Fourn. Bot.* 1896, 502.—Afr. austr.
ukambensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 215 = *Ipomoea crassipes*.
Volkensii, Kuntze, l. c. = *Astrochlaena Volkensii*.

CONYZA, Linn. (Compos.).

- cordata*, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 142.—Reg. Argent.
major, Bub. Fl. Pyren. ii. 249 = *Inula viscosa*.
minor, Bub. l. c. 250 = *Inula graveolens*.
pinnata, Kuntze, l. c. = *pinnatilobata*.
pinnatifida, Franch. in *Fourn. de Bot.* 1896, 381 (non Less.).—China.
ulmifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 142 = *incisa*.

CONYZELLA, Rupr. = *Erigeron*, Linn. (Compos.).

- Coulteri*, Greene, Fl. Francisc. 386 (= *Conyza Coulteri*).—Am. bor.
linifolia, Greene, l. c. = *E. linifolium*.

COPAIBA, Adans. = *Copaifera*, Linn. (Legum.).

- arnoldiana*, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 64.—Afr. trop.

COPAIFERA, Linn. (Legum.).

- Demeusei*, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 195.—Afr. trop.

COPAIFERA :—

- Dinklagei*, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 265.—Afr. trop.
hemitomophylla, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 332.—Am. cent.
Kuntzei, Harms, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 56.—Bolivia.

COPROSMA, Forst. (Rubiaceae).

- Banksii*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxx. 433.—N. Zel.
kauensis, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies*, i. 894.—Ins. Sandw.
Kirkii, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xxix. 390.—N. Zel.
lanceolata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 270.—N. Zel.
margarita, Colenso, l. c. xxviii. 594.—N. Zel.
obconica, T. Kirk, Fl. N. Zeal. 237.—N. Zel.
sagittata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 270.—N. Zel.
Solandri, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxix. 522.—N. Zel.

COPTIS, Salisb. (Ranunc.).

- chinensis*, Franch. in *Fourn. de Bot.* 1897, 231.—China.
japonica, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo*, 1899 (198) = *orientalis*, etc.
ospiocarpa, Bruehl, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 89.—Ind. or.
venosa, Howell, Fl. N. W. Amer. 21.—Am. bor.

CORALLOCARPUS, Welw. (Cucurb.).

- Millspaughi*, Cogn. ex Millsp. in *Field Columb. Mus. Bot.* i. 322.—Mexic.

CORALLORRHIZA, Hall. (Orchid.).

- involuta*, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 474.—Mexic.
Pringlei, Greenm. l. c. 475.—Mexic.

CORBULARIA, Salisb. = *Narcissus*, Tourn. (Amaryllid.).

- Herberti*, Rouy, *Illustr. Pl. Eur. Rar. t.* 247.—Eur.

CORDIA, Linn. (Borag.).

- bahamensis*, Urb. *Symb. Antill.* i. 392.—Ind. occ.
Bakeri, Britton, in *Fourn. Bot.* 1895, 88.—Afr. trop.
Bellonis, Urb. *Symb. Antill.* i. 393.—Ind. occ.
borinquensis, Urb. l. c. 390.—Ind. occ.
buddleoides, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 83.—Bolivia.
Buchii, Urb. *Symb. Antill.* i. 475.—Ind. occ.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 37.—Afr. trop.
ensifolia, Urb. *Symb. Antill.* i. 476.—Ind. occ.
erosa, Sond. in *Linnaea*, xxiii. 81 = *caffra*.
Gharaf, Ehrenb. ex Aschers. in *Sitzungsber. Naturf. Fr. Berl.* 1879, 46.—Afr. trop.
Goetzei, Guerke, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 307.—Afr. trop.
insularis, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 483.—Mexic.
liebrectsiana, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 38.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 541, nomen.—Celebes.
multicapitata, Britton, ex Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 146.—Bolivia.
natalensis, Sond. in *Linnaea*, xxiii. 81 = *caffra*.
obovata, Baker, in *Kew Bull.* 1894, 28 = *Bakeri*.
perlonga, Fernald, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 90.—Mexic.
rupicola, Urb. *Symb. Antill.* i. 392.—Ind. occ.
Rusbyi, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 83.—Bolivia.
socorrensis, Brandegee, in *Erythea*, 1899, 5.—Mexic.
umbrosa, Spruce, ex Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 147.—Bolivia.
Zeyheri, Sond. in *Linnaea*, xxiii. 81 = *caffra*.

CORDYLINE, Royen (Liliac.).

- Cheesemani*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 509.—N. Zel.

COREOPSIS, Linn. (Compos.).

- ambacensis*, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 536.—Afr. trop.
aspilioides, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 153.—Afr. trop.
helianthoides, Beadle, in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 448.—Am. bor.
Lewtonii, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 146.—Am. bor.

COREOPSIS :—

rhycophila, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 313.—Mexic.
speciosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 585.—Afr. trop.

CORETHROGYNE, DC. (Compos.).

caespitosa, *Greene, Fl. Francisc.* 378.—Calif.
viscidula, *Greene, l. c.*—Calif.

CORIARIA, Niss. (Coriar.).

intermedia, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 62.—Ins. Formosa.
lurida, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 98.—N. Zel.

CORIDOCHELOA, Nees = **AXONOPUS**, Beauv. (Gramin.).

cimicina, Nees, in *Edinb. N. Phil. Journ.* xv. 381 = A. cimicinus.
fimbriata, Nees, ex *Wight, Cat.* 1656 = A. cimicinus.
semialata, Nees, ex *Benth. Fl. Austral.* vii. 473 = A. semialatus.

CORISPERMUM, B. Juss. (Chenopod.).

villosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 191.—Am. bor.

CORMONEMA, Reissek (Rhamnac.).

ovalifolium, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 242.—Am. cent.

CORNUS, Tourn. (Cornac.).

Bretschneideri, *J. Henry, in Le Jardin*, 1899, 309.—China.
corynostylis, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1896, 286.—Reg. Himal.
Hessei, *Koehne, l. c.* 1899, 340.—Am. bor.
homeric, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 337 = C. Mas.
microcarpa, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 103.—Am. bor.
Purpusi, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1899, 338.—Am. bor.
quinquineris, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 307.—China.
sylvestris, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 337 = sanguinea.
Volkensii, *Harms, in Engl. & Prantl. Pflanzenf.* iii. viii. 266.—Afr. trop.

CORNUTIA, Plum. (Verben.).

obovata, *Urb. Symb. Antill.* i. 395.—Ind. occ.

COROKIA, A. Cunn. (Cornac.).

macrocarpa, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 224.—N. Zel.

CORONILLA, Tourn. (Legum.).

trifoliolata, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 564 = scorpioides.

COROYA, Pierre, Fl. Cochinch. t. 392 C (1899).

LEGUMINOSAE.
dialoides, *Pierre, l. c.*—Cochinch.

CORTADERIA, Stapf, in *Gard. Chron.* 1897, II. 396.

GRAMINEAE.
aracana, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
argentea, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
jubata, *Stapf, in Bot. Mag. t.* 7607.—Am. austr.
pilosa, *Hack. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exped. Magell.* iii. v. 222 (= *Arundo pilosa*).—Reg. Magell.
Quila, *Stapf, in Gard. Chron.* 1897, II. 396.—Am. austr.
radiuscula, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
seloana, *Aschers. & Graebn. Mittel-Eur. Fl.* ii. 325 = argentea.
speciosa, *Stapf, in Gard. Chron.* 1897, II. 396.—Am. austr.

CORYDALIS, Vent. (Papav.).

Balansae, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 25.—Tonkin.
Boissieri, *Prain, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 172.—Oriens.
casimiriana, *Duthie & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 27.—Reg. Himal.
Clarkei, *Prain, l. c.* 34.—Reg. Himal.
crispa, *Prain, l. c.* 30.—Reg. Himal.
cyrtocentra, *Prain, l. c.* 20.—Reg. Himal.
drakeana, *Prain, l. c.* 31.—China.
dubia, *Prain, l. c.* 36.—Reg. Himal.
filicina, *Prain, l. c.* 30.—Reg. Himal.
fimbriifera, *Korsch. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* ix. 406.—As. cent.
franchetiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 34.—Reg. Himal.
Gortschakovii, *Hook. f. & Thoms. Fl. Ind.* 266 = thysiflora.

CORYDALIS :—

graminea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 23.—Reg. Himal.
hemsleyana, *Franch. & Prain, ex Prain, l. c.* 29.—China.
Hookeri, *Prain, l. c.* 34.—Reg. Himal.
Kingii, *Prain, l. c.* 30.—Reg. Himal.
Laelia, *Prain, l. c.* 25.—Reg. Himal.
lathyroides, *Prain, l. c.* 23.—Reg. Himal.
modesta, *Prain, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 168 = rutaefolia.
pirotensis, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 79.—Eur.
ramosa, *Hook. f. & Thoms. Fl. Ind.* 267 = Stracheyi.
ramosa, *O. & B. Fedtsch, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 806 (non Wall.).—Eur.
Stracheyi, *Duthie, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 37.—Reg. Himal.
thysiflora, *Prain, l. c.* 35.—Reg. Himal.

CORYLUS, Tourn. (Cupulif.).

californica, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 580.—Am. bor.
chinensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 197.—China.

CORYMBIS, Thun. (Orchid.).

Lauterbachii, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 241.—N. Guin.
Thouarsii, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* vii. (1849) 868 = corymbosa.

CORYMBOSTACHYS, Lindau, in *Engl. Jahrb.*

xxiv. (1897) 322. **ACANTHACEAE.**
Elytraria, *Lindau, l. c.*—Madag.

CORYNANTHE, Welw. (Rubiace.).

macroceras, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 424.—Afr. trop.

CORYNELLA, DC. (Legum.).

dubia, *Urb. Symb. Antill.* i. 322 = polyantha.

CORYNEPHORUS, Beauv. (Gramin.).

deschampsoides, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 645.—Syria.
laxus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. Afd. II. no. 1. (1900) 4.—Syria.
oranensis, *Murb. l. c.* 1.—Alger.

CORYSANTHES, R. Br. (Orchid.).

himalaica, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 128.—Reg. Himal.
Matthewsii, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 351.—N. Zel.

CORYTHOLOMA, Decne. = **Gesneria**, Mart. (Gesner.).

bulbosum, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxv. 22 = G. bulbosa.
confertifolium, *Fritsch, l. c.* 19 = G. confertifolia.
igneum, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 5. 23 (non Decne.).—Bras.
latifolium, *Fritsch, l. c.* 20 = G. latifolia.
pusillum, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxv. 20.—Bras.
Selloi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 241 = G. Selloi.
striatum, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxv. 21.—Bras.
uleanum, *Fritsch, l. c.* 22.—Bras.
verticillatum, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 5. 19 = G. verticillata.

COSMIA, Domb. = **Calandrinia**, H. B. & K. (Portulac.).

quadrivalvis, *Britten, in Journ. Bot.* 1900, 77 = C. quadrivalvis.

COSTULARIA, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii.

274 (1898). **CYPERACEAE.**
brevicaulis, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. austr.
paludosa, *C. B. Clarke, in Kew Bull.* 1899, 114.—N. Guin.

COSTUS, Linn. (Scitamin.).

acanthocephalus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 845.—Sumatra.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 139.—Afr. trop.
edulis, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 141.—Afr. trop.
Lamingtonii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 160.—N. Guin.
laterifolius, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 301.—Afr. trop.

COSTUS :—

ligularis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 298.—Afr. trop.
maculatus, *Rosc. Scitam. t.* 82 = afer.
nudicaulis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 300.—Afr. trop.
paradoxus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 345.—Borneo.
podocephalus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 250.—Am. cent.
pulcherrimus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 301.—Bolivia.
spectabilis, *Zipp. ex K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 348 = Tapeinochilus spectabilis.

COTONEASTER, Rupp. (Rosac.).

arborescens, *Zabel, in Mitth. Dendrol. Ges.* 1897, 25.—As. cent.
dielsianus, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 385.—China.
rugosus, *E. Pritz. l. c.*—China.

COTULA, Tourn. (Compos.).

Haastii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 325.—N. Zel.
macroGLOSSA, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 209.—Afr. austr.
melaleuca, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 458.—Afr. austr.
microGLOSSA, *O. Hoffm. & Kuntze, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 142 (= *Cenia microGLOSSA*).—Afr. austr.
obscura, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 327.—N. Zel.
paradoxa, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20. 36.—Afr. austr.
pulchella, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 328.—N. Zel.
radiata, *O. Hoffm. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 142.—Afr. austr.
Traillii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 324.—N. Zel.

COTYLEDON, Tourn. (Crassul.).

macrantha, *Berger, in Monatsschr. Kakt.* 1900, 106.—Hort.
Purpusii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin.* i. 161 (= *Cotyledon Purpusii*).—Eur.
saxosum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 28.—Am. bor.

COUBLANDIA, Aubl. = **Muellera**, Linn. (Legum.).

fluvialis, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7. 21.—Am. austr.

COUEPIA, Aubl. (Rosac.).

dodecandra, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2620-1.—Am. cent.
formosana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 429.—Bras.
polyandra, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 196 = kunthiana.

COULA, Baill. (Olacina.).

Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 189.—Afr. trop.

COULTEROPHYTUM, Robins. (Umbell.).

brevipes, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 157.—Mexic.
macrophyllum, *Coult. & Rose, l. c.* 156.—Mexic.
pubescens, *Coult. & Rose, l. c.* 157.—Mexic.

COURALIA, Splitg. (Bignon.).

rosea, *Donn. Sm. in Pittier, Prim. Fl. Costaric.* ii. 204 (= *Tabebuia rosea*).—Mexic.

COURBONIA, Brongn. (Capparid.).

brevipilosa, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma.* vi. 92.—Afr. trop.
subcordata, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

COUSINIA, Cass. (Compos.).

albescens, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* iv. 223.—Persia.
Bormuelleri, *Winkl. l. c.* 235.—Persia.
caesia, *Winkl. l. c.* 238.—Turkestan.
contumax, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 168.—Persia.
Elymaea, *Hauskn. & Winkl. ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 225.—Persia.
fragilis, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 169.—Persia.
iranica, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 233.—Persia.
Komarovii, *Winkl. l. c.* 219.—Turkestan.
Korshinskyi, *Winkl. l. c.* 236.—Turkestan.
Lamakini, *Winkl. l. c.* 220.—Turkestan.
larvae, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 167.—Persia.

COUSINIA :—

- Lipskyi, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 237.—Turkestan.
 longifolia, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 168.—Persia.
 machaerophora, *Winkl. & Bornm. l. c.* 166.—Persia.
 macilenta, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 222.—Turkestan.
 rava, *Winkl. l. c.* 227.—As. cent.
 Regelii, *Winkl. l. c.* 229, nomen.—Turkestan.
 rhombiformis, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. l. c.* 232.—Persia.
 sagittata, *Winkl. & Strauss, l. c.* 233.—Persia.
 sicigera, *Winkl. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 166.—Persia.
 Straussii, *Hauskn. & Winkl. ex Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 235.—Persia.
 xiphacantha, *Winkl. & Strauss, ex Winkl. l. c.* 225.—Persia.

COUSSAREA, Aubl. (Rubiaceae).

- rudgeoides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club.* vi. 48.—Bolivia.

COUTHOVIA, A. Gray (Loganiaceae).

- celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 537.—Celebes.

COVILLEA, A. M. Vail = **Larrea**, Cav. (Fibroid).

- tridentata, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club.* 1899, 302 = *L. mexicana*.

CRABBEA, Harv. (Acanthaceae).

- ovalifolia, *Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* 24 = nana.
 reticulata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 119.—Afr. trop.

CRACCA, Benth. (Legum.).

- Greenmani, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 299.—Mexico.

CRACCA, Linn. = **Tephrosia**, Pers. (Legum.).

- argyrotricha, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II.* 57 = *T. argyrotricha*.
 coronilloides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 224 = *T. coronilloides*.
 decora, *Hiern, l. c.* = *T. decora*.
 drepanocarpa, *Hiern, l. c.* = *T. drepanocarpa*.
 flexuosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 7 = *T. flexuosa*.
 gracillima, *A. A. Heller, l. c.* = *T. gracillima*.
 holosericea, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1900, 15 = *T. virginiana*.
 intermedia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club.* 1894, 303 = *T. intermedia*.
 Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II.* 68.—Bolivia.
 Rugelii, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 7 = *T. Rugelii*.
 Seemanni, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1900, 16.—Mexico.
 triphylla, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II.* 57 = *T. triphylla*.

CRANICHIS, Sw. (Orchid.).

- thysanochila, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 35.—Mexico.

CRANIOLARIA, Linn. (Pedal.).

- argentina, *Spig. Pl. Nov. Argent.* iii. (1897) 1.—Reg. Argent.

CRANTZIA, Scop. = **Alloplectus**, Mart. (Gesner.).

- hirtella, *Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxx.* 8 = *A. sparsiflorus*.

CRANZIA, Schreb. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).

- angolensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 115.—Afr. trop.

CRASPEDOLEPIS, Steud. = **Restio**, Linn. (Restiac.).

- fimbriata, *Mast. in DC. Monogr. Phan. i.* 280 = *R. filiformis*.
 Verreauxii, *Steud. Syn. Pl. Cyp.* 264 = *R. filiformis*.

CRASSOCEPHALUM, Moench = **Gynura**, Cass. (Compos.).

- diversifolium, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 594 = *G. polycephala*.
 minutum, *Hiern, l. c.* 595 = *G. miniata*.
 scandens, *Hiern, l. c.* = *G. scandens*.

VOL. III.

CRASSULA, Dill. (Crassul.).

- aloides, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 161 = *acinaciformis*.
 anomala, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 370.—Afr. austr.
 aphylla, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 371.—Afr. austr.
 closiana, *Reiche, Fl. Chile, ii.* 369 (= *Tillaea closiana*).—Chili.
 cogmansensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 347.—Afr. austr.
 compacta, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 550.—Afr. austr.
 confusa, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 366.—Afr. austr.
 crassiflora, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 347.—Afr. austr.
 cyclophylla, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 363.—Afr. austr.
 Dodii, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 372.—Afr. austr.
 drakensbergensis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 861.—Afr. austr.
 elongata, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 552.—Afr. austr.
 Flanaganii, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 362.—Afr. austr.
 Galpini, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 547.—Afr. austr.
 griquaensis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 860.—Afr. austr.
 hirsuta, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 365.—Afr. austr.
 hispida, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 368 (non *D. Dietr.*).—Afr. austr.
 inandensis, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 364.—Afr. austr.
 involucrata, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 863.—Afr. austr.
 lambertiana, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 371.—Afr. austr.
 latipathulata, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 364.—Afr. austr.
 laxa, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 549.—Afr. austr.
 leucantha, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 369.—Afr. austr.
 macowaniana, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 361.—Afr. austr.
 maritima, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 862.—Afr. austr.
 Marlothii, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 553.—Afr. austr.
 Massoni, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 485.—Afr. austr.
 minima, *Reiche, Fl. Chile, ii.* 369 (= *Tillaea minima*).—Chili.
 mucronata, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 38.—Afr. austr.
 multiflora, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 368.—Afr. austr.
 namaquensis, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 367.—Afr. austr.
 nana, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 372.—Afr. austr.
 natalensis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 861.—Afr. austr.
 nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 265.—Afr. trop.
 oblanceolata, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 365.—Afr. austr.
 Ovallei, *Reiche, Fl. Chile, ii.* 370 (= *Tillaea Ovallei*).—Chili.
 pachystemon, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 367.—Afr. austr.
 pallens, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 361.—Afr. austr.
 paludosa, *Reiche, Fl. Chile, ii.* 369 (= *Tillaea paludosa*).—Chili.
 papillosa, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 371.—Afr. austr.
 parvisepala, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 549.—Afr. austr.
 Promontorii, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 366.—Afr. austr.
 punctulata, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 362.—Afr. austr.
 quadrangula, *Endl. ex Walp. Rep. ii.* 253 = *pyramidalis*.
 radicans, *Reiche, Fl. Chile, ii.* 370 (= *Tillaea radicans*).—Chili.
 rubescens, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 363.—Afr. austr.
 Rudolfi, *Schoenl. & Baker f. l. c.*—Afr. austr.
 scalaris, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 369.—Afr. austr.
 Schlechteri, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 551.—Afr. austr.
 simiana, *Schoenl. l. c.* 552.—Afr. austr.
 Southi, *Schoenl. l. c.* 550.—Afr. austr.

CRASSULA :—

- spiciformis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 347.—Hort.
 subcaulis, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 370.—Afr. austr.
 swaziensis, *Schoenl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 548.—Afr. austr.
 tenuicaulis, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 864.—Afr. austr.
 tenuifolia, *Schoenl. l. c.* 860.—Afr. austr.
 transvaalensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 347.—Afr. austr.
 Woodii, *Schoenl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 863.—Afr. austr.
 yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 284.—China.
 zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 266.—Afr. trop.

CRATAEGUS, Tourn. (Rosac.).

- alabamensis, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 342.—Am. bor.
 alleghaniensis, *Beadle, l. c.* 337.—Am. bor.
 aprica, *Beadle, l. c.* 335.—Am. bor.
 arenicola, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 5.—Am. bor.
 Ashei, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 339.—Am. bor.
 atrorubens, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. ii. 78.—Am. bor.
 austromontana, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 412.—Am. bor.
 biltmoreana, *Beadle, l. c.* 406.—Am. bor.
 Boyntoni, *Beadle, l. c.* 409.—Am. bor.
 brevipedicellata, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 6.—Am. bor.
 brevipedunculata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxviii. i. 453, sphalm. = praec.
 Brownii, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 447.—Am. bor.
 campestris, *Britton, l. c.* 449.—Am. bor.
 catawbiensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 6.—Am. bor.
 ciliata, *Ashe, l. c.* 13.—Am. bor.
 coccinioides, *Ashe, l. c.* xvi. ii. 74.—Am. bor.
 collicola, *Ashe, l. c.* 75.—Am. bor.
 columbiana, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 163.—Am. bor.
 cullasagensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 10.—Am. bor.
 Cuthbertii, *Ashe, l. c.* 15.—Am. bor.
 disperma, *Ashe, l. c.* 14.—Am. bor.
 dsungarica, *Zabel, ex Lange, Revis. Crataeg.* 43.—As. bor. or.
 durifolia, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 12.—Am. bor.
 Egani, *Ashe, l. c.* 15.—Am. bor.
 Eggertii, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 447.—Am. bor.
 flabellata, *Kydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 228 = coccinea.
 flavocarnis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 9.—Am. bor.
 Gattingeri, *Ashe, l. c.* 12.—Am. bor.
 geniculata, *Ashe, l. c.* 16.—Am. bor.
 haemacarpa, *Ashe, l. c.* 8.—Am. bor.
 Harbisoni, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 413.—Am. bor.
 holmesiana, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. ii. 78.—Am. bor.
 illinoensis, *Ashe, l. c.* 76.—Am. bor.
 lambertiana, *Lange, Revis. Crataeg.* 58.—Hab.?
 macrosperma, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 73.—Am. bor.
 Margaretta, *Ashe, l. c.* 72.—Am. bor.
 Mohri, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 416.—Am. bor.
 multispina, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 7.—Am. bor.
 neofluvialis, *Ashe, l. c.* xvi. ii. 71.—Am. bor.
 occidentalis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 448.—Am. bor.
 palustris, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. i. 13.—Am. bor.
 Pearsoni, *Ashe, l. c.* 10.—Am. bor.
 pertomentosa, *Ashe, l. c.* xvi. ii. 70.—Am. bor.
 pinetorum, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 343.—Am. bor.
 polybracteata, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 79.—Am. bor.
 Porteri, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 448.—Am. bor.

† H

CRATAEGUS :—

- pulcherrima, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvi. 11. 77.—Am. bor.
 pyriformis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 449.—Am. bor.
 riparia, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. 1. 11.—Am. bor.
 roribacca, *Ashe, l. c.* 4.—Am. bor.
 rubella, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 344.—Am. bor.
 rugosa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. 1. 5.—Am. bor.
 saligna, *Greene, Pittonia*, iii. 99.—Am. bor.
 Sargentii, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 407.—Am. bor.
 Schneeki, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. 1. 8.—Am. bor.
 senta, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 341.—Am. bor.
 silvicola, *Beadle, l. c.* xxviii. 414.—Am. bor.
 sororia, *Beadle, l. c.* xxx. 336.—Am. bor.
 straminea, *Beadle, l. c.* 345.—Am. bor.
 tenuifolia, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 448.—Am. bor.
 tiliaefolia, *Koehne, ex Lange, Revis. Crataeg.* 31.—Am. bor.
 triflora, *Chapm. Fl. S. U. S. Suppl.* 11. (1892) 684.—Am. sept.
 Vaillae, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxiv. 53.—Am. bor.
 venusta, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 338.—Am. bor.
 yadkinensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. 1. 17.—Am. bor.

CRATERIPHYTUM, Scheff. ex Koord. in *Meded. S Lands Plantent.* xix. (1898) 540; et ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. (1899) 445. **LOGANIA-CEAE.**
 moluccanum, *Scheff. ex Boerl. l. c.* 456.—Ins. Molucc.

CRATERISPERMUM, Benth. (Rubiace).

- angustifolium, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 89.—Afr. trop.
 congolatum, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 90.—Afr. trop.
 Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 88.—Afr. trop.

CRATEROSTIGMA, Hochst. (Scrophul.).

- crassifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 500.—Afr. trop.
 Goetzei, *Engl. l. c.* xxviii. 477.—Afr. trop.
 hirsutum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 461.—Afr. trop.
 linearifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 501.—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Engl. l. c.* (= *Torenia Schweinfurthii*).—Afr. trop.
 Smithii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 461.—Afr. trop.
 Welwitschii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 501.—Afr. trop.
 Wilmsii, *Engl. l. c.* xxvi. 122.—Afr. austr.

CRATYLIA, Mart. (Legum.).

- argentea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 58 = hypargyrea.

CRAWFURDIA, Wall. (Gentian.).

- Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 306.—China.
 thibetica, *Franch. l. c.* 307.—China.

CREAGHIELLA, Stapf, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2455 (1896). **MELASTOMACEAE.**

- purpurea, *Stapf, l. c.*—Borneo.

CREMASPORA, Benth. (Rubiace).

- coffeoides, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 18.—Afr. trop.
 comorensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 453.—Ins. Comor.
 confluens, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

CREMASTRA, Lindl. (Orchid.).

- unguiculata, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 285.—Japon.

CREMASTUS, Miers = **Bignonia**, Linn. (Bignon.).

- sceptrum, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. 11. 216 = *B. glutinosa*.

CREMOLOBUS, DC. (Crucif.).

- subscandens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 4.—Bolivia.

CREPIDOPSIS, Arv. Touv. in *Ann. Conserv. & Jard.*

- Bot. Genève, i. (1897) 105. **COMPOSITAE.**
 mexicana, *Arv. Touv. l. c.*—Mexic.

CREPIS, Vaill. (Compos.).

- ambacensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 618.—Afr. trop.
 atrabarba, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 314.—Am. bor.
 barbiger, *Leiberg, ex Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 565.—Am. bor.
 bumbensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 616.—Afr. trop.
 cichorioides, *Hiern, l. c.* 617.—Afr. trop.
 costata, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 147.—Lesbos.
 dumicola, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 618.—Afr. trop.
 ephemera, *Hiern, l. c.* 616.—Afr. trop.
 Gillii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 170.—China.
 gracilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 461.—Am. bor.
 grandifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 107.—Am. bor.
 lancifolia, *Greene, l. c.* 108.—Am. bor.
 monticola, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 562.—Am. bor.
 platyphylla, *Greene, Pittonia*, iii. 27.—Am. bor.
 pumila, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 462.—Am. bor.
 riparia, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 486.—Am. bor.
 rostrata, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 564.—Am. bor.
 sagittata, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 213 (non Wender).—Eur.
 scopulorum, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 563.—Am. bor.
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 84.—Ecuador.
 subacaulis, *Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 562 = modocensis.
 subcarnosa, *Greene, Pittonia*, iii. 107.—Am. bor.
 trojanensis, *Urum. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 202.—Eur.
 turcica, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 417.—Eur.

CRINUM, Linn. (Amaryll.).

- acaule, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 532.—Afr. austr.
 belkianum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 47.—Afr. trop.
 brevistylum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 197.—Austral.
 brisbanicum, *F. M. Bailey, l. c.* iv. 47.—Austral.
 distyllum, *Herb. Amaryll.* 260.—Afr. trop.
 majakallense, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 399.—Afr. trop.
 Menyharthii, *Baker, l. c.* 395.—Afr. trop.
 natans, *Baker, l. c.* 396.—Afr. trop.
 parvum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 284.—Afr. trop.
 pestilentis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ii. 198.—Austral.
 rhodanthum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 397.—Afr. trop.
 Stuhlmanni, *Baker, l. c.* 578.—Afr. trop.
 tanganyikense, *Baker, l. c.* 400.—Afr. trop.
 Woodrowi, *Baker, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7597.—Ind. or.
 yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 209.—Arab.

CRIOCERAS, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1897) 1311. **APOCYNACEAE.**

- dipladeniiflorum, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzens. Nachtr.* II. 56 (= *Tabernaemontana dipladeniiflora*).—Afr. trop.
 longiflorus, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1312.—Afr. trop.

CRISTARIA, Heist. (Malv.).

- glabra, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, i. 256 = australis.
 pannosa, *Phil. l. c.* 261.—Chili.
 patagonica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 18.—Patag.

CRITHO, E. Mey. = **Hordeum**, Linn. (Gramin.).

- Aegiceras*, E. Mey. *Ind. Sem. Hort. Regiom.* 5 = *H. vulgare*.

CROCODILINA, Bub. Fl. Pyren. ii. 171 (1900) =

- Atractylis**, Linn. (Compos.).
 cancellata, *Bub. l. c.* 274 = *A. cancellata*.
 humilis, *Bub. l. c.* 171 = *A. humilis*.

CROCODILOIDES, Adans. = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).

- amplexicaule*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 143 = *B. amplexicaulis*.

CROCODILOIDES :—

- andongensis*, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 609 = *B. andongensis*.
arctiifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 143 = *B. arctiifolia*.
Autunesii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 608 = *B. Antunesii*.
carduodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 143 = *B. cardui-formis*.
carlinopsis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 608 = *B. carlinopsis*.
gracilis, *Hiern, l. c.* 609 = *B. gracilis*.
Kuntzei, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 143 = *B. Kuntzei*.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 608 = *B. Welwitschii*.

CROCUS, Tourn. (Irid.).

- niveus, *Bowles, in Gard. Chron.* 1900, 11. 334.—Eur.

CROFTIA, King & Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxx. (1896) 298. **SCITAMINEAE.**

- spectabilis, *King & Prain, l. c.*—Ind. or.

CROSSANDRA, Salisb. (Acanth.).

- pubescens*, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb.* 213 = *puberula*.
 Smithii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 462.—Afr. trop.
 stenostachya, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 113.—Afr. trop.
 subacaulis, *C. B. Clarke, l. c.* 116.—Afr. trop.

CROSSOTROPIS, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 317 (1898). **GRAMINEAE.**

- eleusinoides, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 226.—Afr. trop.
 grandiglumis, *Rendle, l. c.*—Afr. trop. et austr.

CROTALARIA, Dill. (Legum.).

- apiculata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 126.—Afr. trop.
 argyrolobioides, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
 Barkae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 226.—Afr. trop.
 caespitosa, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 252.—Afr. trop.
 cernua, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 127.—Afr. trop.
 Collettii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 349.—Ind. or.
 colorata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 127.—Afr. trop.
 comanestiana, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 203.—Afr. trop.
 Deflersii, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 224.—Arab.
 Descampsii, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 53.—Afr. trop.
 dura, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 487.—Afr. austr.
 filifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 136.—Mexic.
 Fleckii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 128.—Afr. trop.
 formosana, *Matsum. ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 395.—Formosa.
 gambica, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 179.—Afr. trop.
 Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 399.—Afr. trop.
 grandistipulata, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
 gymnocalyx, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 252.—Afr. trop.
 Heidmannii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 128.—Afr. trop.
 Johnstoni, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 250.—Afr. trop.
 karongensis, *Baker, l. c.* 252.—Afr. trop.
 leucotricha, *Baker, l. c.* 251.—Afr. trop.
 lukwangulensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 400.—Afr. trop.
 minima, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 52.—Afr. trop.
 nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 250.—Afr. trop.
 oocarpa, *Baker, l. c.* 252.—Afr. trop.
 pauciflora, *Baker, l. c.* 251.—Afr. trop.
 phyllostachys, *Baker, l. c.* 250.—Afr. trop.
 pilosiflora, *Baker, l. c.* 251.—Afr. trop.
 Poggei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 179.—Afr. trop.
 polyantha, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
 quangensis, *Taub. l. c.* 177.—Afr. trop.
 schumanniana, *Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 89.—Afr. trop.

CROTALARIA :—

- sertulifera, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 178.—Afr. trop.
 sparsifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
 squamigera, *Deflers, Voy. Yemen*, 126. t. 8.—Arab.
 squarrosa, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 130.—
 Afr. trop.
 stenothyrsus, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 178.—Afr. trop.
 tappenbeckiana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 351.—N. Guin.
 Thomasi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 283.—Afr. trop.
 trifoliolata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 53.—Afr. trop.
 truncata, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 130.—
 Afr. trop.
 valida, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 253.—Afr. trop.

CROTON, Linn. (Euphorb.).

- amphileucus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 227.—Mexic.
 Antunesii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 523.—Afr. trop.
 arboreus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 303.—
 Mexic.
 costaricensis, *Pax, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 331.—Am. cent.
 Eggersii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 503.—Ecuador.
 fluminensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 348.—
 Bras.
 Hauthalii, *K. Schum. l. c.*—Parag.
 impressus, *Urb. Symb. Antill.* i. 335.—Ind. occ.
 integrifolius, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 732.—Afr. trop.
 Lehmannii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 504.—Ecuador.
 Menyhartii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 733.—Afr. trop.
 peruvianus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 228.—Peruv.
 Pittieri, *Pax, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 328.—Am. cent.
 poecilanthus, *Urb. Symb. Antill.* i. 334.—Ind. occ.
 Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 119.—Bolivia.
 Sivaki, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat.* i. 36 = *Coriaria japonica*.
 subdioecus, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 349.—
 Reg. Argent.
 subglaber, *K. Schum. l. c.*—Bras.
 Tonduzii, *Pax, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 330.—Am. cent.
 trinitatis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 57 = *chamaedryfolius*.
 ventaniculus, *Speg. Contr. Fl. Vent.* 54.—Reg. Argent.

CROTONOGYNE, Muell. Arg. (Euphorb.).

- Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 524.—Afr. trop.
 Zenkeri, *Pax, l. c.* xxvii. 327.—Afr. trop.

CROTONOGYNOPSIS, Pax, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 328. **EUPHORBIACEAE**.

- usambarica, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

CRUDDASIA, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. (1899) 287. **LEGUMINOSAE**.

- insignis, *Prain, l. c.*—Ind. or.

CRUDEA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. (1900) 353, sphalm. = seq.**CRUDIA**, Schreb. (Legum.).

- caudata, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 219.—Malaya.
 chrysantha, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 353 (= *Apalatoa chrysantha*).—Cochinch.
 Curtisi, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 220.—Penins. Mal.
 glauca, *Prain, l. c.* 221.—Penins. Mal.
 gracilis, *Prain, l. c.* 223.—Penins. Mal.
 Scortechinii, *Prain, l. c.* 220.—Penins. Mal.
 speciosa, *Prain, l. c.* 222.—Penins. Mal.
 Wrayi, *Prain, l. c.*—Penins. Mal.

CRUMENARIA, Mart. (Rhamnac.).

- Glaziovii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 1.—
 Bras.

CRUSEA, Cham. & Schlecht. (Rubiace.).

- calicicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 305.—
 Mexic.

CRYPISIS, Ait. (Gramin.).

- compacta, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 151 = *Heleochloa schoenoides*.
 vaginiflora, *Opiz, Natural.* viii. 83 = *Heleochloa schoenoides*.

CRYPTANDRA, Sm. (Rhamnac.).

- petraea, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 184.—
 Austral.

CRYPTANGIUM, Schrad. (Cyper.).

- brevifolium, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 143.—
 Bras.
 dioicum, *Boeck. l. c.* 142.—Bras.
 griseum, *Boeck. l. c.* 143.—Bras.
 insigne, *Boeck. l. c.*—Bras.
 parviflorum, *Ind. Kew. Suppl.* i. 117, sphalm. = seq.
 pauciflorum, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 142.—
 Bras.

CRYPTANTHE, Benth. & Hook. f. = **Eritrichium**, Schrad. (Boragin.).

- calycosa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 331.—
 Am. bor.
 costata, *Brandege, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 453.—
 Am. bor.
 excavata, *Brandege, l. c.* 452.—Am. bor.
 multicaulis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 194.—
 Am. bor.
 ramulosissima, *A. Nelson, in Erythea*, vii. 68.—Am. bor.
 Torreyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 331 = *Krynitzkia torreyana*.

CRYPTOCARYA, R. Br. (Laurac.).

- laxiflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 503.—
 Chili.
 liebertiana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 390.—Afr. trop.
 nativitas, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monogr. Christmas Isl.* 187.—Ins. Christmas.
 pauciflora, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 333.—N. Guin.
 Woodii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 391.—Afr. austr.

CRYPTOCORYNE, Fisch. (Aroid.).

- cruddasiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 174.—
 Ind. or.
 Grabowskii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 28.—Borneo.
 Nevillii, *Trim. Fl. Ceylon*, iv. 346.—Zeylan.

CRYPTOLAPPA, Kuntze = **Camarea**, St. Hil. (Malpigh.).

- argentea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 27 = *Janusia argentea*.
 lanata, *Kuntze, l. c.* = *C. lanata*.
 linearifolia, *Kuntze, l. c.* = *Janusia linearifolia*.
 linearis, *Kuntze, l. c.* 28 = *C. linearifolia*.
 robusta, *Kuntze, l. c.* 27 = *C. robusta*.
 salicifolia, *Kuntze, l. c.* = *C. salicifolia*.

CRYPTOLEPIS, R. Br. (Asclep.).

- angolensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 677.—
 Afr. trop.
 myrtifolia, *Hiern, l. c.* (= *Ectadiopsis myrtifolia*).—
 Afr. trop.

CRYPTOSEPALUM, Benth. (Legum.).

- Staudtii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 267.—Afr. trop.

CRYPTOTAENIA, DC. (Umbell.).

- africana, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflansenf.* iii. VIII. 189 (= *Anthriscus africanus*).—Afr. trop.

CTENIUM, Panz. (Gramin.).

- brevispicatum, *J. G. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 363.—
 Am. bor.
 digitatum, *Spreng. Syst.* i. 274 = *Chloris incompleta*.
 glandulosum, *Scribn. & J. G. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 362.—Am. bor.
 indicum, *Spreng. Syst.* i. 274 = *Chloris tenella*.
 sechellense, *Baker, Fl. Maurit.* 452 = *Enteropogon melicoides*.

CUCURBITA, Tourn. (Cucurb.).

- andreaana, *Naud. in Rev. Hort.* 1896, 542.—Urug.

CUDRANIA, Tréc. (Urtic.).

- crenata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 469.—
 China.

CULCASIA, Beauv. (Aroid.).

- Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 418.—Afr. trop.
 falcifolia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
 lanceolata, *Engl. l. c.* 419.—Afr. trop.
 obliquifolia, *Engl. l. c.* 418.—Afr. trop.
 striolata, *Engl. l. c.* 417.—Afr. trop.

CULCITUM, Humb. & Bonpl. (Compos.).

- sessile, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 533.—
 Patag.
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 63.—
 Ecuador.

CULLUMIA, R. Br. (Compos.).

- Massoni, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 404.—Afr. austr.

CULLUMIOPSIS, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1899, 103. **COMPOSITAE**.

- Grandidieri, *Drake, l. c.*—Madag.

CUNIGUNDA, Bub. Fl. Pyren. ii. 273 (1900) =

- Eupatorium**, Tourn. (Compos.).
vulgaris, *Bub. l. c.* = *E. cannabinum*.

CUNILA, Linn. (Labiata.).

- Arechevaletae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 194.—Urug.
 tomentosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—
 Mexic.

CUPANIA, Plum. (Sapind.).

- concolor, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 587.—
 Bras.
 crassifolia, *Radlk. l. c.* 574.—Bras.
 howeana, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 126.—Austral.
 laxiflora, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 585.—
 Bras.
 revoluta, *Radlk. l. c.* 577.—Bras.
 schizoneura, *Radlk. l. c.* 584.—Bras.
 semidentata, *Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 337.—
 Venez.
 verrucosa, *Radlk. in Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 578.—Bras.

CUPHEA, P. Br. (Lythrac.).

- acicularis, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 22.—Bras.
 affinitatum, *Koehne, l. c.* 20.—Bras.
 Caeciliae, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 564.—
 Am. cent.
 cristata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 196.—Mexic.
 crulsiana, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 23.—Bras.
 emarginata, *Koehne, l. c.* 21.—Bras.
 empetrifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 137.—Mexic.
 fuscineris, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 156.—Bras.
 Gaumeri, *Koehne, l. c.* 154.—Am. cent.
 hybognyna, *Koehne, l. c.* xxiii. Beibl. lvii. 27.—Bras.
 koehneana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.
 Nelsoni, *Rose, l. c.* 137.—Mexic.
 pseudericoides, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 21.—Bras.
 reflexifolia, *Koehne, l. c.* 24.—Bras.
 remotifolia, *Koehne, l. c.*—Bras.
 roseana, *Koehne, l. c.* xxix. 161.—Mexic.
 sanguinea, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 565.—
 Am. cent.
 Schumannii, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 160.—
 Mexic.
 Seleri, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 565.—Am. cent.
 sordida, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 155.—Am. trop.
 trichopetala, *Koehne & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 40.—Bolivia.
 trichopetala, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 196.—Mexic.
 venusta, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxix. 159.—Mexic.
 watsoniana, *Koehne, l. c.* xxiii. Beibl. lvii. 29.—Mexic.

CUPIDONIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 47 (1900) = **Catananche**, Linn. (Compos.).

- caerulea, *Bub. l. c.* = *C. caerulea*.

CURATELLA, Linn. (Dillen.).

- Glaziovii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 25.—Bras.

- CURCUMA**, Linn. (Scitamin.).
ceratotheca, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 335.—Celebes.
- CURTIA**, Cham. & Schlecht. (Gentian.).
malmeana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xv. *Beibl.* ix. 42.—Bras.
- CUSCUTA**, Tourn. (Convolv.).
blepharolepis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 743.—Afr. trop.
Engelmanni, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. 95.—Turkestan.
falkiiformis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 449.—Afr. austr.
fragrans, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 85.—Bolivia.
plattensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 131.—Am. bor.
- CUSPIDARIA**, DC. (Bignon.).
schumanniana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 243.—Bolivia.
- CUSSONIA**, Thunb. (Araliac.).
Boivini, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 125.—Ins. Comor.
Buchananii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 251.—Afr. trop.
hamata, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 53; *et l. c.* 247.—Afr. trop.
laciniata, *Harms, l. c.* 53; *et l. c.* 248.—Afr. trop.
microstachys, *Harms, l. c.* 54; *et l. c.* 250.—Afr. trop.
- CUVIERA**, DC. (Rubiace.).
australis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 78.—Afr. trop.
leniochlamys, *K. Schum. l. c.* 79.—Afr. trop.
trichostephana, *K. Schum. l. c.* xxiii. 461.—Afr. trop.
- CYANASTRUM**, Oliv. (Haemodor.).
goetzeanum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 359.—Afr. trop.
hostifolium, *Engl. l. c.* 358.—Afr. trop.
Johnstoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 336.—Afr. trop.
- CYANEA**, Gaudich. (Campan.).
longifolia, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 909 = arborea.
spatulata, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.
sylvestris, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.
- CYANELLA**, Linn. (Haemodor.).
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 26.—Afr. austr.
- CYANOCARPUS**, F. M. Bailey (Proteac.).
cribbiana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 370.—Austral.
- CYANOTHYRSUS**, Harms, in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. (1897) 197. **LEGUMINOSAE.**
oblongus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 270 (= *Daniella oblonga*).—Afr. trop.
Ogea, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
Soyauxii, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
- CYANOTIS**, D. Don (Commelin.).
nyctitropa, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 234.—Arab.
obtusata, *Trim. Fl. Ceylon*, iv. 312.—Zeylan.
- CYATHANTHUS**, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. (1897) 120. **URTICACEAE.**
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
- CYATHISCUS**, Van Tiegh. (Loranth.).
montanus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 188.—As. et Austral. trop.
- CYATHOCALYX**, Cham. (Anonac.).
bancanus, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 54.—Malaya.
birotulatus, *Boerl. l. c.* t. 55.—Borneo.
borneensis, *Boerl. l. c.* t. 56.—Borneo.
cauliflorus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 318.—N. Guin.
Havilandi, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 57.—Borneo.
Kingii, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 333.—Celebes.
Minahassae, *Koord. l. c.* 334.—Celebes.
- CYATHODES**, Labill. (Epacrid.).
articulata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 600.—N. Zel.
- CYATHOGYNE**, Muell. Arg. (Euphorb.).
Dewevrei, *Pax, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II.* i. 1. 49.—Afr. trop.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 521.—Afr. trop.
- CYATHOSTEMMA**, Griff. (Anonac.).
grandifolium, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 318.—N. Guin.
sumatrana, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 58 (= *Anaxagorea sumatrana*).—Sumatra.
- CYATHULA**, Lour. (Amarant.).
albida, *Loqr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 53.—Afr. trop.
Mannii, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 278.—Afr. trop.
polycephala, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
spatulata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 421.—Afr. austr.
spatulifolia, *Loqr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 54.—Afr. austr.
- CYCAS**, Linn. (Cycad.).
schumanniana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 154.—N. Guin.
- CYCLAMEN**, Tourn. (Primul.).
libanoticum, *Hildebr. in Engl. Jahrb.* xxv. 477.—Oriens.
Mindleri, *Heldr. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 386.—Eur.
rohlfsianum, *Aschers. in Bull. Herb. Boiss.* v. 528.—Afr. bor.
- CYCLAMINOS**, Heldr. in Bull. Herb. Boiss. vi. (1898) 386 = praec.
- CYCLAMINUM**, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 229 = **Cyclamen**, Tourn. (Primul.).
vernium, Bub. l. c. = *C. hederacifolium*.
- CYCLANTHEROPSIS**, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 169. **CUCURBITACEAE.**
parviflora, *Harms, l. c.* (= *Gerrardanthus parviflorus*).—Afr. trop.
- CYCLOCHEILON**, Oliv. (Verben.).
eriantherum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 508.—Afr. trop.
Kelleri, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. (1897) 26 = somalense.
minutibracteatum, *Engl. l. c.* 27 = eriantherum.
- CYCLOSTEMON**, Blume (Euphorb.).
Afzeli, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 520.—Afr. trop.
celebicum, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 591.—Celebes.
Dingklagei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 520.—Afr. trop.
euryodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 961.—Afr. trop.
Minahassae, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 590.—Celebes.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 326.—Afr. trop.
Staudtii, *Pax, l. c.*—Afr. trop.
- CYCNIUM**, E. Mey. (Scrophul.).
aquaticum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 479.—Afr. trop.
Bricchetti, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 30.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 129.—Afr. trop.
erectum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 128.—Afr. trop.
gallaense, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 29.—Afr. trop.
paucidentatum, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
suffruticosum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 479.—Afr. trop.
tomentosum, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 29.—Afr. trop.
- CYDONIA**, Tourn. (Rosac.).
cathayensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2657-8.—China.
- CYLINDROPSIS**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 38. **APOCYNACEAE.**
parvifolia, *Pierre, l. c.* 39 (= *Carpodinus parvifolia*).—Cochinch.
togolana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 133.—Afr. trop.
- CYLINDROPSIS**:—
watsoniana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 134 (= *Carpodinus watsoniana*).—Afr. trop.
- CYLINDROSOLENIUM**, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 670. **ACANTHACEAE.**
Sprucei, *Lindau, l. c.* 671.—Peruv.
- CYLISTA**, Ait. (Legum.).
Preussii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 303.—Afr. trop.
- CYMBIDIUM**, Sw. (Orchid.).
acutum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 334.—Penins. Mal.
Faberi, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 198.—China.
Leai, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 221.—Austral.
pedicellatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 268.—Japan.
queeneanum, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 137.—Austral.
Sparkesii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1898, 221.—Austral.
Stephensi, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 71.—Malaya.
Whiteae, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 193.—Ind. or.
- CYMBOPOGON**, Spreng. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
andongensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 159.—Afr. trop.
arabicus, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 387 = A. Iwarancusa.
Arriani, *Aitch. Cat. Punjab Pl.* 174 = A. Iwarancusa.
circinnatus, *Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 203 = A. Iwarancusa.
filipendulus, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 157 = A. filipendulus.
finitimus, *Rendle, l. c.* = A. finitimus.
glandulosus, *Spreng. Pugill.* ii. 14 = A. Wightii.
laniger, *Duthie, in Atkins. Gaz. N. W. Ind.* 640 = A. Iwarancusa.
Nardus, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 155 = A. Nardus.
Phoenix, *Rendle, l. c.* 156.—Afr. trop.
rufus, *Rendle, l. c.* 155 = A. rufus.
Ruprechtii, *Rendle, l. c.* 160 = A. Ruprechtii.
Schimperii, *Rendle, l. c.* 155 = A. Schimperii.
Welwitschii, *Rendle, l. c.* 157.—Afr. trop.
- CYMOPTERUS**, Rafin. (Umbell.).
bulbosus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 241.—Am. bor.
calcareus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 32.—Am. bor.
corrugatus, *M. E. Jones, in Am. Nat.* xvii. 973.—Am. bor.
lapidosus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 31 (= *Peucedanum lapidosum*).—Am. bor.
Leibergii, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 182.—Am. bor.
petraeus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 32.—Am. bor.
- CYNANCHUM**, Linn. (Asclep.).
adriaticum, *R. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xiii. 30 (= *Vincetoxicum adriaticum*).—Eur.
brachyphyllum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 726.—Ecuador.
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 533, nomen.—Celebes.
cucullatum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 272.—Madag.
defoliascens, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 38.—Afr. trop.
dentatum, *K. Schum. l. c.* 39.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II.* i. ii. 42.—Afr. trop.
dimidiatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoctonum dimidiatum*).—Malaya.
Henryi, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 542.—China.
intricatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 727.—Ecuador.
lineare, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 273.—Madag.
longipes, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.
microstegium, *K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 39.—Afr. trop.
muricatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoctonum muricatum*).—Java.
nipponicum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 39.—Japan.

CYNANCHUM :—

- palustre, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 6 (= *Vincetoxicum palustre*).—Am. bor.
 pichinchense, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. 727.—Ecuador.
 pleianthum, K. Schum. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 39.—Afr. trop.
 quitense, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. 728.—Ecuador.
 Sodiroi, K. Schum. l. c.—Ecuador.
 stenospira, K. Schum. l. c. 729.—Ecuador.
 subcoriaceum, Schlechter, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 447.—Madag.
 trifurcatum, Schlechter, l. c. 448 (= *Schizostephanus somalensis*).—Afr. trop.
 tuberculatum, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoconum tuberculatum*).—Java.
 unguiculatum, Ruiz & Pav. ex Britton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 499 = *Vincetoxicum unguiculatum*.
 villosum, Matsum. in *Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 39.—Ins. Luchu.
 Welwitschii, Schlechter & Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 99.—Afr. trop.
 Zollingeri, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Cynoconum Zollingeri*).—Malaya.

CYNAPIUM, Riv. = *Aethusa*, Linn. (Compos.).
vulgare, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 372 = A. *Cynapium*.

CYNOCRAMBE, Tourn. = *Thelygonum*, Linn. (Urtic.).
Dioscoridis, Bub. *Fl. Pyren.* i. 75 = T. *Cynocrambe*.

CYNOCTONUM, E. Mey. = *Vincetoxicum*, Moench (Asclep.).
angustifolium, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 129.—Am. bor.
crassifolium, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 216 = V. *obtusifolium*.

CYNODON, Rich. (Gramin.).
elongatus, Trin. in Spreng. *Neue Entdeck.* ii. 64 = Chloris incompleta.
erectus, J. & C. Presl, *Rel. Haenk.* i. 290 = C. *Dactylon*.
filiformis, Voigt, *Hort. Suburb. Calc.* 712 = C. *Dactylon*.
glabratus, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 212 = C. *Dactylon*.
Neesii, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 371 = *Leptochloa poly-stachya*.
pascuus, Nees, *Agrost. Bras.* 425 = C. *Dactylon*.
radiatus, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 38 = C. *Dactylon*.
ruspolianus, Chiov. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 70.—Afr. trop.
ternatus, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 405 = *Digitaria ternata*.
virgatus, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 213 = C. *Dactylon*.

CYNOGLOSSOSPERMUM, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 204 (1898) = *Eritrichium*, Schrad. (Borag.).
capituliflorum, Kuntze, l. c. = E. *capituliflorum*.
humile, Kuntze, l. c. = E. *humile*.
uliginosum, Kuntze, l. c. = E. *uliginosum*.

CYNOGLOSSUM, Tourn. (Borag.).
albanicum, Degen & Baldacci, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* vi. 337.—Eur.
Bottae, Defters, *Voy. Yemen*, 173.—Arab.
macrostylum, Bunge, in *Lehm. Reliq. Bot.* (1847) 236 = *Paracaryum heliocarpum*.
viride, Eastw. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 428.—Calif.

CYNOMARATHERUM, Nutt. ex Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. *Contrib. Nat. Herb.* vii. (1900) 244. **UMBELLIFERAE.**
alpinum, Coult. & Rose, l. c. 245.—Am. bor.
Brandegei, Coult. & Rose, l. c. 246 (= *Peucedanum Brandegei*).—Am. bor.
Eastwoodae, Coult. & Rose, l. c. 247.—Am. bor.
Nuttallii, Coult. & Rose, l. c. 245.—Am. bor.
Parryi, Coult. & Rose, l. c. 246 (= *Peucedanum Parryi*).—Am. bor.
scabrum, Coult. & Rose, l. c. 247.—Am. bor.

CYNOMETRA, Linn. (Legum.).
Beddomei, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 478.—Ind. or.
Carvalhoi, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 261.—Afr. trop.
dongnaiensis, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 389 A.—Cochinch.

CYNOMETRA :—

- megalophylla, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 262.—Afr. trop.
 portoricensis, Krug & Urb. in *Urb. Symb. Antill.* i. 312.—Ind. occ.
 Schlechteri, Harms, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 290, nomen.—Afr. trop.
 sessiliflora, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 262.—Afr. trop.
 trinitensis, Oliv. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2443.—Ind. occ.

CYNORCHIS, Thou. (Orchid.).
 Buchanani, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 260.—Afr. trop.
 Hanningtoni, Rolfe, l. c. 261.—Afr. trop.
 Johnsoni, Rolfe, l. c.—Afr. trop.
 Kirkii, Rolfe, l. c.—Afr. trop.
 Usambarae, Rolfe, l. c. 260.—Afr. trop.

CYNOSCIADIUM, DC. (Umbell.).
pumilum, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. *Contrib. Nat. Herb.* vii. 121.—Am. bor.

CYNOSORCHIS, Thou. = *Cynorchis*, Thou. (Orchid.).
betsileensis, Kraenzl. *Orch. Gen. et Sp.* i. 492.—Madag.
boiviniana, Kraenzl. l. c. 483.—Ins. Comor.
buchwaldiana, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 175.—Afr. trop.
calanthoides, Kraenzl. *Orch. Gen. et Sp.* i. 475 = C. *gibbosa*.
cyliandrostachys, Kraenzl. l. c. 489.—Maurit.
gracilis, Kraenzl. l. c. 488.—Corea.
humboldtiana, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 176.—Ins. Comor.
japonica, Kraenzl. *Orch. Gen. et Sp.* i. 487.—Japon.
lowiana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* 1888, i. 424 = *purpurascens*.
oblonga, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 333.—Afr. trop.
platyclinoides, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 367.—Afr. trop.
purpurea, Kraenzl. *Orch. Gen. et Sp.* i. 482 (= *Habenaria purpurea*).—Madag.
sigmoidea, Kraenzl. l. c. 490.—Ins. Comor.
tenerrima, Kraenzl. l. c. 493 (= *Habenaria tenerrima*).—Madag.

CYNOSURUS, Linn. (Gramin.).
Ara, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 3816 I = Eleusine indica.
aurasiacus, Murb. in *Act. Univ. Lund.* xxxvii. *Afd.* II. no. 1, (1900) 15.—Alger.
Cavara, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 3818 B = Eleusine aegyptiaca.
ciliaris, Rottl. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 296.—Ind. or.
coracanus, Linn. *Syst. ed. II.* 875 = Eleusine indica.
coromandelianus, Rottl. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 297 = *Dinebra arabica*.
falcatus, Thunb. *Prod.* 23 = *Harpechloa capensis*.
juncus, Murb. in *Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, (1900) 13.—Afr. bor.
macara, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 3818 C = Eleusine aegyptiaca.
paniculatus, Thunb. *Prod.* 23 = *Brizopyrum capense*.
retroflexus, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 20 = *Dinebra arabica*.
Uniolae, Linn. f. *Suppl.* 110 = *Brizopyrum capense*.

CYPELLA, Herb. (Irid.).
 Mandoni, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 125.—Bolivia.

CYPERUS, Mich. (Cyperac.).
aequalis, Krauss, in *Flora*, 1845, 754 = *isocladius*.
araeus, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 346.—Chili.
atronitens, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 20 = *Pycrus elongatus*.
biuncialis, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853, (1855) 156 = *Mariscus confertus*.
blandus, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 36 = *marginatus*.
 Boeckleri, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 344.—Chili.
Bolusi, Boeck. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 585 = *Mariscus umbilensis*.
brevis, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. 341 = *Mariscus congestus*.
brisaesus, Vahl, *Enum.* ii. 316 = *Mariscus brizaesus*.
brunneus, Sw. *Fl. Ind. Occ.* i. 116 = *Mariscus brunneus*.
Buchanani, Boeck. *Cyp. Nov.* i. 4 = *esculentus*.
bulbifex, E. Mey. ex Drège, in *Linnaea*, xx. 245 = *usitatus*.

CYPERUS :—

- caffer*, Bertol. f. in *Mem. Rend. Ist. Bologna*, 1853-4, 33 = *compressus*.
caymanensis, Millsp. in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 120.—Ind. occ.
cognatus, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 52 = *rupestris*.
compactus, Lam. *Tabl. Encyc.* i. 144.—Madag.
confertus, Sw. *Fl. Ind. Occ.* i. 115 = *Mariscus confertus*.
congensis, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, 285.—Afr. trop.
congestus, Vahl, *Enum.* ii. 358 = *Mariscus congestus*.
Cooperi, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 328 = *Mariscus Cooperi*.
coracana, Heyne, ex Wall. *Cat. n.* 3815 = *Eleusine brevifolia*.
cyperodes, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 333 (= *Scirpus cyperoides*).—Austral.
Cyprius, Post, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 102.—Ins. Cyprus.
deciduus, Boeck. in *Flora*, 1879, 547 = *Mariscus deciduus*.
dissitiflorus, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853, (1855) 153 = *Mariscus confertus*.
dissitiflorus, Nees, in *Linnaea*, ix. 285 = *Mariscus dissitiflorus*.
elegantulus, Steud. in *Flora*, 1842, 583 = *Pycrus elegantulus*.
elephantinus, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 559 = *Mariscus elephantinus*.
Engelmanni, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 47 = *Torulinium michauxianum*.
esculentus, E. Mey. in *Drège, Zwei Pfl. Docum.* 177 = *isocladius*.
filiformis, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 20 = *Torulinium filiforme*.
flavicomus, Pursh, *Fl. Am. Sept.* i. 53 = *Torulinium michauxianum*.
flavissimus, Schrad. *Anal. Fl. Cap.* 5 = *compactus*.
flavissimus, Steud. in *Flora*, 1829, 152 = *sphaerospermus*.
flexifolius, Boeck. ex Reinecke, in *Engl. Jahrb.* xxv. 586.—Ins. Samoa.
flexuosus, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 566 = *Torulinium Vahl.*
fluminalis, Ridley, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. 127 = *Pycrus fluminalis*.
glaucus, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 42 = *Mariscus brizaesus*.
haematocephalus, C. B. Clarke, ex Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 333.—Natal.
havanensis, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 84 = *Torulinium filiforme*.
Hensii, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, 289.—Afr. trop.
hirtus, Thunb. in *Hoffm. Phytogr. Blaett.* i. 6 = *Fimbristylis exilis*.
involutus, K. Schum. in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 328 = *Mariscus involutus*.
isocladius, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 37.—Afr. austr.
joeladus, E. Mey. in *Drège, Zwei Pfl. Docum.* 177 = *isocladius*.
lanceus, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 18 = *Pycrus umbrosus*.
lepidus, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 347 (non F. Muell.).—Chili.
lutescens, R. Phil. l. c. 345 (non Torr. & Hook.).—Chili.
Mauryi, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 333 (= *Pycrus Mauryi*).—Bras.
micans, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 12 = *Pycrus ferrugineus*.
michauxianus, Schult. *Mant.* ii. 123 = *Torulinium michauxianum*.
minutulus, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 339 (non Vahl).—Afr. trop.
multibracteatus, Boeck. in *Flora* (1875), 107 = *Torulinium Eggersii*.
Nocha, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 346.—Chili.
oakportensis, Boeck. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 543 = *Pycrus oakportensis*.
obtusiflorus, Vahl, *Enum.* ii. 308 = *compactus*.
Oerstedii, Liebm. in *Vidensk. Selsk. Skr.* v. II. 224 = *Torulinium Vahl.*
olivetorum, Murb. in *Act. Univ. Lund.* xxxv. *Afd.* II. no. 3, (1899) 25.—Tunis.
ornithopus, Pers. *Syn.* i. 61 = *Torulinium filiforme*.
paposanus, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 343.—Chili.
parvinox, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 167.—Afr. austr.
permutatus, Boeck. in *Linnaea*, xxxv. 477 = *Pycrus umbrosus*.

CYPERUS :—

planifolius, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. 106 = *Mariscus purpurascens*.
pohlianus, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 334* (= *Mariscus pohlianus*).—Bras.
pseudobromoides, Boeck. in Linnaea, xxxv. 464 = *Pycrens angulatus*.
purpurascens, Vahl, Enum. ii. 359 = *Mariscus purpurascens*.
rancoanus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 345*.—Chili.
rehmannianus, *Boeck. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 334* (= *Mariscus rehmannianus*).—Afr. austr.
Reinecke, Boeck. in Engl. Jahrb. xxv. 585.—Ins. Samoa.
retusus, Nees, in Linnaea, ix. 285 = *latifolius*.
rufinus, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. v. II. 222 = *Torulinium michauxianum*.
rupestris, *Kunth, Enum. Pl. ii. 52*.—Afr. austr.
samoensis, *Boeck. in Engl. Jahrb. xxv. 586*.—Ins. Samoa.
siberianus, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 96 = *Mariscus siberianus*.
speciosus, Vahl, Enum. ii. 364 = *Torulinium michauxianum*.
sphaerocephalus, Vahl, l. c. 310 = *compactus*.
subchoristachys, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 177*.—Afr. austr.
tenuiflorus, Rottb. Descr. et Ic. 30 = *longus*.
tenuis, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 119 = *Mariscus tenuis*.
tetragonus, Ell. Sketch, i. 71 = *Mariscus tetragonus*.
toisensis, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 334* (= *Mariscus involutus*).—Afr. austr.
umbilensis, *Boeck. ex Kuntze, l. c.* (= *Mariscus umbilensis*).—Afr. austr.
unifolius, Boeck. in Linnaea, xxxvi. 374 = *Torulinium filiforme*.
Urbani, Boeck. Cyp. Nov. i. 10 = *Mariscus Urbani*.
Vahl, Steud. Syn. Pl. Cyp. 43 = *Torulinium Vahl.*
virginicus, Steud. l. c. 47 = *Torulinium michauxianum*.
webbianus, Steud. l. c. 20 = *sexangularis*.

CYPHIA, Berg. (Campan.).

lasiandra, *Diels, in Engl. Jahrb. xxvi. 111*.—Afr. trop.
lobelioides, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 628*.—Afr. trop.
longiflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 194*.—Afr. austr.
nyasica, *Baker, in Kew Bull. 1898, 157*.—Afr. trop.
oligotricha, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 195*.—Afr. austr.
stenopetala, *Diels, in Engl. Jahrb. xxvi. 112*.—Afr. austr.
tenera, *Diels, l. c.*—Afr. austr.
wilmsiana, *Diels, l. c. 113*.—Afr. austr.

CYPHOCARPA, Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899)42. **AMARANTACEAE.**

Petersii, *Lopr. l. c. 43*.—Afr. trop.
resedoides, *Lopr. l. c. 44*.—Afr. austr.
Wilmsii, *Lopr. l. c. 42*.—Afr. austr.

CYPHOKENTIA, Brongn. (Palm.).

samoensis, *Werb. in Engl. Jahrb. xxv. 588*.—Ins. Samoa.

CYPHOMANDRA, Mart. (Solan.).

acuminata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 196*.—Am. austr.
benense, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
heterophylla, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 436*.—Am. cent.
uniloba, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 90*.—Bolivia.
yungasense, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 195*.—Am. austr.

CYPHOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 186 (1898) =

Cyphia, Berg. (Campan.).
elata, Kuntze, l. c. = *C. elata*.
Gerrardii, Kuntze, l. c. = *C. Gerrardii*.
volubilis, Kuntze, l. c. = *C. volubilis*.

CYPRIPEDIUM, Linn. (Orchid.).

Chica, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 36* (= *Selenipedium Chica*).—Am. cent.
Crawshawae, *O'Brien, in Gard. Chron. 1898, I. 18*.—Ind. or.
czerwiakowianum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 49* (= *Selenipedium czerwiakowianum*).—Peruv.
ebracteatum, *Rolfe, in Kew Bull. 1896, 204*.—China.
epidendricum, *Vell. Fl. Flum. ix. t. 64* = *Eulophia Woodfordii*.

CYPRIPEDIUM :—

sargentianum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 38* (= *Selenipedium sargentianum*).—Bras.
yatabeanum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 91*.—Japon.

CYRILLA, Garden (Cyrill.).

parvifolia, *Shuttlew. in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 101*.—Am. bor.
Perrottetii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 232*.—Ind. occ.

CYRTANDRA, Forst. (Gesner.).

Beckmanni, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 680*.—Ins. Samoa.
bruteliana, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 550, 627*.—Celebes.
campanulata, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 681*.—Ins. Samoa.
cupulata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 527*.—Penins. Mal.
degenerans, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 887* = *latebrosa*.
Engleri, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 550, 628*.—Celebes.
Funkii, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 677*.—Ins. Samoa.
gayana, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 887*.—Ins. Sandw.
geminata, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 681*.—Ins. Samoa.
geminiflora, *Nad. in Journ. de Bot. 1897, 118*.—Ins. Societ.
geocarpa, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 550, 627*.—Celebes.
Godeffroyi, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 677*.—Ins. Samoa.
Hufnagelii, *Reinecke, l. c. 680*.—Ins. Samoa.
hypogaea, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 550, 628*.—Celebes.
Jellesmani, *Koord. II. cc.*—Celebes.
Kraemeri, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 679*.—Ins. Samoa.
Kruegeri, *Reinecke, l. c. 678*.—Ins. Samoa.
lanceolata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 527*.—Penins. Mal.
mamillata, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 287*.—Malaya.
Mamolea, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 679*.—Ins. Samoa.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 551, nomen*.—Celebes.
velutina, *Nad. in Journ. de Bot. 1899, 4* (non Korth.).—Ins. Societ.
virgata, *Nad. l. c.*—Ins. Societ.

CYRTANTHUS, Ait. (Amaryll.).

aboluteus, *Burch. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 225* = *lutescens*.
Elliottii, *Baker, l. c. 220*.—Afr. austr.
Flanagani, *Baker, l. c. 532*.—Afr. austr.
leucanthus, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 454*.—Afr. austr.
rectiflorus, *Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 222*.—Afr. austr.
sanguineus, *Hook. f. Bot. Mag. t. 5218*.—Afr. trop.
stenanthus, *Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 532*.—Afr. austr.

CYRTOCHILUM, H. B. & K. = **Oncidium**, Sw. (Orchid.).

micranthum, *Kraenzl. in Gard. Chron. 1896, II. 63*.—Bras.

CYRTOPERA, Lindl. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

amazonica, *Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov. ii. 180* = *E. Woodfordii*.
flavopurpurea, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb. i. 68* = *E. flavopurpurea*.
formosana, *Rolfe, in Kew Bull. 1896, 198*.—Ins. Formosa.
longifolia, *Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 668* = *E. Woodfordii*.
papuana, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 104* (non Ridley).—N. Brit.
Shupangae, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 116* = *E. Shupangae*.
velliosiana, *Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov. ii. 179* = *E. Woodfordii*.
Walleri, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb. ii. 117* = *E. Walleri*.
Woodfordii, *Lindl. Gen. & Sp. Orch. 189* = *E. Woodfordii*.

CYRTOPODIUM, R. Br. (Orchid.).

ecristatum, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 433*.—Am. bor.
Woodfordii, *Sims, in Bot. Mag. t. 1814* = *Eulophia Woodfordii*.

CYRTORRHYNCHA, Nutt. = **Ranunculus**, Tourn. (Ranunc.).

neglecta, *Greene, Pittonia, iv. 146*.—Am. bor.

CYRTOXIPHUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. (1897) 203. **LEGUMINOSAE.**

Staudtii, *Harms, l. c. 204*.—Afr. trop.

CYSTORCHIS, Blume (Orchid.).

aphylla, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 400*.—Penins. Mal.

CYTISUS, Linn. (Legum.).

bosnaicus, *Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xi. 57*.—Eur.
cantabricus, *Bub. Fl. Pyren. ii. 464* (= *Sarothamnus cantabricus*).—Hispan.
glaber, *Bub. l. c. 463* = *Genista sessilifolia*.
hirsutus, *Bub. l. c.* = *triflorus*.
Nejceffii, *Urum. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 54*.—Eur.
medius, *Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 339*.—Eur.
Petrovicii, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 95*.—Eur.
rectipilosus, *Adamov. l. c.*—Eur.

D**DACTYLIS**, Linn. (Gramin.).

adscendens, *Schrad. ex Schult. Mant. ii. 351* = *Lasiochloa ciliaris*.
aschersoniana, *Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 274*.—Eur.
brevifolia, *Koen. ex Willd. Sp. Pl. i. 410* = *Eleusine brevifolia*.
hirta, *Schrad. in Schult. Mant. ii. 350* = *Lasiochloa longifolia*.
hispida, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 22* = *Lasiochloa longifolia*.
ibizensis, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 139*.—Eur.
interrupta, *Rottl. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 325* = *Eragrostis cynosuroides*.
laevis, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 22* = *Festuca scabra*.
lagopodioides, *Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 298* = *Aeluropus villosus*.
lagopoides, *Linn. Mant. i. 33* = *Aeluropus villosus*.
madraspatensis, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 297* = *Dinebra arabica*.
massaviensis, *Steud. Syn. Pl. Gram. 298* = *Aeluropus villosus*.
ovata, *Steud. l. c.* = *Lasiochloa obtusifolia*.
paucinervis, *Nees, Fl. Afr. Austr. 429* = *Diplachne paucinervis*.
phleoides, *Klein, ex Steud. Nom. ed. II. i. 478* = *Eragrostis phleoides*.
repens, *Desf. Fl. Atlant. i. 79* = *Aeluropus villosus*.
serrata, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 22* = *Festuca scabra*.
villosa, *Thunb. l. c.* = *Koeleria cristata*.

DACTYLOCTENIUM, Willd. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).

falcatum, *Willd. Enum. Hort. Berol. 1030* = *Harpechloa capensis*.
geminatum, *Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 26*.—Afr. austr.
glaucophyllum, *Courb. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. 133* = *E. aristata*.

DACTYLODES, Zanon-Monti = **Tripsacum**, Linn. (Gramin.).

Dactyloides, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 349* = *T. dactyloides*.

DACTYLOPETALUM, Benth. (Rhizophor.).

verticillatum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. 866* = *Cassipourea verticillatum*.

DAHLIA, Cav. (Compos.).

dumicola, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxv. 289*.—Ind. occ.
tenuis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 48*.—Mexic.

DALBERGIA, Linn. (Legum.).

- ajudana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 295.—Afr. trop.
 anomala, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 381.—Cochinch.
 bariensis, *Pierre, l. c.* t. 380 B.—Cochinch.
 Brownei, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 781 (= *Ecastaphyllum Brownei*).—Am. austr.
 burmanica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 448.—Ind. or.
 cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 383 A.—Cochinch.
 cochinchinensis, *Pierre, l. c.* t. 382 B.—Cochinch.
 dekindtiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 298.—Afr. trop.
 Dinklagei, *Harms, l. c.* 293.—Afr. trop.
 dongnaiensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 382 A.—Cochinch.
 duperreana, *Pierre, l. c.* t. 381 B.—Cochinch.
 elata, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 296.—Afr. trop.
 fusca, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 381 A.—Cochinch.
 Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 407.—Afr. trop.
 Hemsleyi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 450.—Ind. or.
 hiemalis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 15.—Bras.
 Hullettii, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 119.—Penins. Mal.
 kingiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 289.—Ind. or.
 Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 121.—Penins. Mal.
 Kurzii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 450.—Ind. or.
 lagosana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 298.—Afr. trop.
 laxiflora, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 64.—Afr. trop.
 luluensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 294.—Afr. trop.
 macrothyrsus, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
 mammosa, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 380 A.—Cochinch.
 menocoides, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 120.—Penins. Mal.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 430, 630.—Celebes.
 mossambicensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 295.—Afr. trop.
 Nelsii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 729.—Afr. trop.
 ochracea, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 297.—Afr. trop.
 Oliveri, *Gamble, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 451.—Ind. or.
 oxyphylla, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 49.—Bolivia.
 Prazeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 452.—Ind. or.
 Preussii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 294.—Afr. trop.
 saigonensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 381.—Cochinch.
 sessiliflora, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 296.—Afr. trop.
 subsympathetica, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 116.—Penins. Mal.

DALEA, Linn. (Legum.).

- Anthonyi, *Brandege, in Erythea*, vii. 2.—Mexic.
 azurea, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 77 (= *Psoralea azurea*).—Chili.
 Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 59.—Bolivia.
 Purpusii, *Brandege, in Erythea*, vii. 2.—Mexic.
 retusifolia, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 59.—Bolivia.
 tapacariensis, *Harms, ex Kuntze, l. c.*—Bolivia.

DALECHAMPIA, Plum. (Euphorb.).

- brevipes, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 232.—N. Granat.
 Galpini, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 736.—Afr. austr.

DAMAPANA, Adans. = **Smithia**, Ait. (Legum.).

- Welwitschii*, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 238 = *S. Welwitschii*.

DAMASONIUM, Mill. (Alism.).

- Damasonium*, Aschers. & Graebn. *Mittel-Eur. Fl.* i. 389 = *stellatum*.

DAMMARA, Rumph. = **Agathis**, Salisb. (Conif.).

- celebica*, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 263.—Celebes.

DAMMERA, K. Schum. & Lanterb. *Fl. Deutsch.*

- Südsee, 201 (1900). **PALMAE**.
ramosa, K. Schum. & Lanterb. *l. c.*—N. Guin.
simplex, K. Schum. & Lanterb. *l. c.*—N. Guin.

DANIELIA, Lem. *Pl. Grasses*, (1869) 94 = **Rochea**, DC. (Crassul.).

- coccinea*, Lem. *l. c.* = *R. coccinea*.
jasminea, Lem. *l. c.* 95 = *R. jasminea*.
odoratissima, Lem. *l. c.* = *R. odoratissima*.
versicolor, Lem. *l. c.* = *R. versicolor*.

DANTHONIA, DC. (Gramin.).

- airoides*, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 234 = *Pentastichis airoides*.
andina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 30.—Chili.
andina, *R. Phil. l. c.* 33 (non *R. Phil. l. c.* 30).—Chili.
andongensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 212.—Afr. trop.
angustifolia, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 302 = *Pentastichis angustifolia*.
araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 31.—Chili.
aristidioides, Lehm. ex Nees, *Fl. Afr. Austr.* 318 = *Pentastichis aristidioides*.
Bachmanni, Hack. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. 385 = *curva*.
brachyphylla, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 520.—Afr. austr.
cachemyriana, *Jaub. & Spach, Illustr.* iv. 46.—Ind. or.
calva, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 31.—Chili.
circinnata, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 239 = *Achneria setifolia*.
cirrhulosa, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 309 = *Pentastichis angustifolia*.
collinita, Nees, *l. c.* 315 = *Pentastichis tristeta*.
colorata, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 241 = *Pentastichis colorata*.
Cumminsii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 282.—Ind. or.
curvifolia, Schrad. in *Schult. Mant.* ii. 386 = *Pentastichis curvifolia*.
cyatophora, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 286 = *Pentastichis airoides*.
decumbens, DC. *Fl. Fr.* iii. 33.—Eur.; Afr. bor. et austr.
denudata, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 320 = *Pentastichis curvifolia*.
dregeana, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 244 = *Chaetobromus dregeanus*.
dura, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 527.—Afr. austr.
elegans, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 296 = *Pentastichis elegans*.
eriosoma, Nees, *l. c.* 304 = *Pentastichis eriosoma*.
exilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 281.—Ind. or.
fascicularis, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 243 = *stricta*.
filiformis, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 293 = *Pentastichis filiformis*.
glabra, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 43.—Am. bor.
glabra, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 30.—Chili.
hapalotricha, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 715.—N. Granat.
heptamera, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 309 = *Pentastichis heptamera*.
himalica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 281.—Ind. or.
hirsuta, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 282 = *Achneria hirsuta*.
inermis, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 534.—Afr. austr.
intercepta, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 243 = *Chaetobromus interceptus*.
involutocrata, Steud. *l. c.* 244 = *Chaetobromus involutocratus*.
juncea, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. II.* (1838) 35 = *macrantha*.
kashmiriana, Duthie, in *Atkins. Gaz. N. W. Ind.* 630 = *cachemyriana*.
leonina, Steud. ex Kunth, *Enum. Pl. i.* 303 = *Avenastrum antarcticum*.
leptophylla, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 421 = *Tripogon abyssinicus*.
Lima, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 312 = *Pentastichis Lima*.
livida, Trin. *Sp. Gram.* t. 50 = *Pentastichis curvifolia*.
longiglumis, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 306 = *Pentameris longiglumis*.
Macowanii, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 527.—Afr. austr.
macrocephala, *Stapp, l. c.* 522.—Afr. austr.
micrantha, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i.* (1831) 71 = *Pentastichis Thunbergii*.
mossamedensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 211.—Afr. trop.
nervosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 612 (non *Hook. l.*)—N. Zel.
nutans, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 314 = *Pentastichis nutans*.

DANTHONIA :—

- octoflora, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 31.—Chili.
 oreoboloides, *Stapp, in Hook. Ic. Pl.* t. 2606.—N. Guin.
 oresigena, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 32.—Chili.
pallescens, Schrad. in *Schult. Mant.* ii. 386 = *Pentastichis pallescens*.
papillosa, Trin. *Sp. Gram.* t. 66 = *Pentastichis aspera*.
 Parryi, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 133.—Am. bor.
patula, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 285 = *Pentastichis patula*.
porosa, Nees, *l. c.* 283 = *Achneria setifolia*.
procumbens, Nees, ex Drège, in *Linnaea*, xx. 254 = *Pentastichis Thunbergii*.
radicans, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 243 = *Pentastichis capensis*.
rigida, Steud. *l. c.* = *obtusifolia*.
rufa, Nees, in *Linnaea*, vii. 316 = *lanata*.
rupestris, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 300 = *Pentastichis rupestris*.
setosa, Nees, *l. c.* 325 = *purpurea*.
speciosa, Lehm. ex Nees, *Fl. Afr. Austr.* 307 = *Pentameris speciosa*.
suffrutescens, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 533.—Afr. austr.
tandilensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 349.—Reg. Argent.
Thouarsii, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 337 = *Pentameris Thuarii*.
Thuarii, Desv. *Opusc.* 99 = *Pentameris Thuarii*.
Thunbergii, Kunth, *Rév. Gram.* i. 107 = *Pentastichis Thunbergii*.
tortuosa, Trin. *Sp. Gram.* t. 68 = *Pentastichis tortuosa*.
trichotoma, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 318 = *Pentastichis aristidioides*.
villosa, Steud. ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. II.* (1838) 34 = *Pentastichis Thunbergii*.
viscidula, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 303 = *Pentastichis viscidula*.
webbiana, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 240 = *Pentastichis airoides*.

DAPHNE, Tourn. (Thymel.).

- gemmata, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 481.—China.
 gracilis, *E. Pritz. l. c.* 480.—China.
 Stapfii, *Bornm. & Keissl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1897, 36.—Persia.
 tenera, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 505.—Chili.
 Vahlhi, *Keissl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 214.—Oriens.

DARWINIA, Rudge (Myrtac.).

- Luehmanni, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 353.—Austral.

DASIPHORA, Rafin. *Ant. Bot.* 167 (1838) = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

- fruticosa*, Rydb. in *Mem. Columb. Univ.* ii. 188 = *P. fruticosa*.

DASISTOMA, Rafin. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).

- bignoniiflora*, Small, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 285.—Am. bor.

DASYANTHUS, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 198 (1900) = **Gnaphalium**, Linn. (Compos.).

- conglobatus*, Bub. *l. c.* 199 = *G. luteoalbum*.
fuscus, Bub. *l. c.* 200 = *G. sylvaticum*.
supinus, Bub. *l. c.* 201 = *G. supinum*.
sylvaticus, Bub. *l. c.* 200 = *G. sylvaticum*.
uliginosus, Bub. *l. c.* 199 = *G. uliginosum*.

DASYPOA, Pilg. in *Engl. Jahrb.* xxv. (1898) 716.

- GRAMINEAE**.
tenuis, *Pilg. l. c.*—Peruv.

DASYSPHAERA, Volkens, in *Engl. & Prantl*,

- Pflanzenf. Nachtr.* i. 153 (1897). **AMARANTACEAE**.
lanata, *Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 153.—Afr. trop.
Robecchii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 52.—Afr. trop.
tomentosa, *Volkens, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 153.—Afr. trop.

DASYSTACHYS, Baker (Liliac.).

- aurea*, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 512.—Afr. trop.
crassifolia, *Baker, l. c.* 511.—Afr. trop.
debilis, *Baker, l. c.* 513.—Afr. trop.
decorata, *Baker, l. c.* 512.—Afr. trop.

DASYSTACHYS :—

- Drimiopsis, *Baker, ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 789.—Afr. trop.
 gracilis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 510.—Afr. trop.
 marginata, *Baker, l. c.* 512.—Afr. trop.
 papillosa, *Baker, l. c.* 514.—Afr. trop.
 polyphylla, *Baker, l. c.* 511.—Afr. trop.

DATURA, Linn. (Solanac.).

- pruinosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 436.—Mexic.
 villosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 571.—Mexic.

DAUCUS, Tourn. (Umbell.).

- Daucorlaya, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 250 (= *Orlaya Daucorlaya*).—Eur.
Matthioli, Bub. Fl. Pyren. ii. 403 = *D. Gingidium*.
pumilus, *D. rade, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 249 = *muricatus*.
sahariensis, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 89.—Afr. bor.
syrticus, *Murb. l. c.* 87.—Afr. bor.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 402 = *D. Carota*.
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 142.—Arab.

DAVILLA, Vand. (Dillen.).

- alata*, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 217 = *vaginata*.
Lechleri, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 2.—Bolivia.
neurophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 24.—Bras.
parviflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 3.—Bolivia.

DAVYELLA, Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 134

- = *Neostapfia*, *Davy* (Gramin.).
colusana, *Hack. l. c.* 134 = *N. colusana*.

DEANEA, Coult. & Rose (Umbell.).

- diffusa*, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 155.—Am. cent.
glauca, *Coult. & Rose, l. c.* 156.—Am. cent.
longibracteata, *Coult. & Rose, l. c.* 154.—Am. cent.
montana, *Coult. & Rose, l. c.* 155.—Am. cent.
Nelsoni, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.

DEBREGEASIA, Gaudich. (Urtic.).

- obovata*, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 492.—China.
rhodopleura, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 380 (= *Villebrunea rhodopleura*).—N. Guin.

DECANEURUM, DC. = *Centratherum*, Cass. (Compos.).

- platylepis*, *Boivin, ex Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 236 = *Vernonia platylepis*.

DECASPERMUM, Forst. (Myrtac.).

- neurophyllum*, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 468.—N. Guin.
pyrifolium, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xl. 40 (= *Nelitris pyrifolia*).—Java.

DECASTELMA, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 264 (1898). **ASCLEPIADACEAE**.

- Broadwayi*, *Schlechter, l. c.* 265.—Ind. occ.

DEHAASIA, Blume (Laurac.).

- borneensis*, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 136 (= *Haasia borneensis*).—Borneo.
cyrtopoda, *Boerl. l. c.* (= *Haasia cyrtopoda*).—Sumatra.
spectabilis, *Boerl. l. c.* (= *Haasia spectabilis*).—Sumatra.

DELANIRA, Cham. & Schlecht. (Gentian.).

- cyathifolia*, *Barb. Rodr. Plant. Matogross.* 32.—Bras.

DEIDAMIA, Noronha (Passif.).

- clematoides*, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 254 = *Efulensia clematoides*.

DEINACANTHON, Mez, in DC. Monogr. Phan. ix. (1896) 12 = *Rhodostachys*, Phil. (Bromel.).

- urbanianum*, *Mez, l. c.* 13 = *R. urbaniana*.

DEINANDRA, Greene, Fl. Francisc. 424 (1897) = *Hemizonia*, DC. (Compos.).

- fasciculata*, *Greene, l. c.* = *H. fasciculata*.

DEINANDRA :—

- Heermanni*, *Greene, Fl. Francisc.* 425 = *H. Heermanni*.
Kelloggii, *Greene, l. c.* 424 = *H. Kelloggii*.
Lobbii, *Greene, l. c.* 425 = *H. Lobbii*.
virgata, *Greene, l. c.* = *H. virgata*.
Wrightii, *Greene, l. c.* 424 = *H. Wrightii*.

DEINBOLLIA, Schum. & Thonn. (Sapind.).

- brachybotrys*, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 295.—Afr. trop.
Elliotii, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
hierniana, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
leptophylla, *Gilg, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 298, nomen.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
stenobotrys, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiv. 297.—Afr. trop.
unguiculata, *Gilg, l. c.* 296.—Afr. trop.

DELAMEREA, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 457. **COMPOSITAE**.

- procumbens*, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.

DELARBREA, Vieill. (Aral.).

- Lauterbachii*, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 485.—N. Guin.

DELPHINIUM, Tourn. (Ranunc.).

- albescens*, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 583.—Am. bor.
cognatum, *Greene, Pittonia*, iii. 14.—Am. bor.
cucullatum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 262.—Am. bor.
densiflorum, *Duthie, ex Brühl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 102.—Ind. or.
dinaricum, *Fritsch, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. 239.—Eur.
diversifolium, *Greene, Pittonia*, iii. 93.—Am. bor.
exiguum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 327.—China.
foetidum, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis*, ii. 235.—Reg. Caucas.
geraniifolium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 583.—Am. bor.
glareosum, *Greene, Pittonia*, iii. 257.—Am. bor.
glaucescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 155.—Am. bor.
gracilentum, *Greene, Pittonia*, iii. 15.—Am. bor.
Hanseni, *Greene, l. c.* 94.—Am. bor.
Karategini, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* ix. 402.—Turkestan.
Lipskii, *Korsh. l. c.* 403.—Turkestan.
macroseratilis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 585.—Am. bor.
midzorensis, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 20.—Eur.
Nelsonii, *Greene, Pittonia*, iii. 92.—Am. bor.
oreganum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 22.—Am. bor.
pachycentrum, *Hemsl. ex Brühl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 107.—As. or.
Purpusi, *Brandege, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 444.—Am. cent.
Sonnei, *Greene, Pittonia*, iii. 246.—Am. bor.
Stapelliosmum, *Brühl, in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 102.—Ind. or.
strictum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 263.—Am. bor.
subalpinum, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.
Trelesei, *Bush, in Minnes. Bot. Studies*, ii. 444.—Am. bor.
turkmenum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 2.—As. cent.
viridescens, *Leiberg, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xi. 39.—Am. bor.
willametense, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 210.—Am. bor.
Wootoni, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 587.—Am. bor.

DELPHYODON, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. Beibl. lix. (1898) 31. **APOCYNACEAE**.

- oliganthus*, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.

DELPINOIA, H. Ross, in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 1898, 116. **AMARYLLIDACEAE**.

- gracillima*, *H. Ross, l. c.* 117.—Am. bor.

DELPYDORA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1275. **SAPOTACEAE**.

- macrophylla*, *Pierre, l. c.* 1277.—Afr. trop.

DEMAZERIA, Dum. (Gramin.).

- acutiflora*, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 900 = *Brizopyrum acutiflorum*.
alternans, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* = *Brizopyrum alternans*.
oblitera, *Hemsl. Bot. Voy. Challenger*, i. II. 90 = *Brizopyrum oblitterum*.
Uniolae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 349 (= *Poa Uniolae*).—Bras.

DEMEUSEA, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. (1900) 77. **AMARYLLIDACEAE**.

- longifolia*, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 78.—Afr. trop.

DENDROBANGIA, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. (1896) 19. **OLACACEAE**.

- boliviana*, *Rusby, l. c.*—Bolivia.

DENDROBIUM, Sw. (Orchid.).

- abietinum*, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 252.—Penins. Mal.
Aegle, *Ridley, l. c.* 260.—Penins. Mal.
albicolor, *Ridley, l. c.* 250.—Penins. Mal.
Anthrene, *Ridley, l. c.* xxxi. 272.—Borneo.
Armitiae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 48.—N. Guin.
atrorubens, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 247.—Penins. Mal.
barbatum, *Cogn. in Gard. Chron.* 1897, II. 394.—Ind. or.
brevicaule, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 110.—N. Guin.
breviracemosum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 158.—N. Guin.
callibotrys, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 258.—Penins. Mal.
chordiforme, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 246, nomen.—N. Guin.
Clavator, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 255.—Penins. Mal.
cochinchinense, *Ridley, l. c.* 244.—Penins. Mal.
coeleste, *Loher, in Gard. Chron.* 1897, II. 1.—Ins. Philipp.
coespitosum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 332.—Reg. Himal.
cymbiforme, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 192.—Sumatra.
Dixsoni, *F. M. Bailey, in Queensl. Bot. Bull. Dept. Agric.* xiii. 33.—N. Guin.
Eoum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 261.—Siam.
flexile, *Ridley, l. c.* 251.—Penins. Mal.
Foxii, *Ridley, in Journ. Bot.* 1900, 70.—Malaya.
fragrans, *Hort. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 7525 = *sarmentosum*.
Gamblei, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 584.—Ind. or.
Giulianettii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 158.—N. Guin.
hainanense, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 193.—China.
hirtulum, *Rolfe, l. c.* 1898, 193.—Burma?
Hodgkinsoni, *Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7724.—N. Guin.
inaequale, *Rolfe, l. c.* t. 7745.—N. Guin.
inconcinnum, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 255.—Penins. Mal.
jennyannum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 329.—Hab.?
Keithii, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 247.—Penins. Mal.
Kelsalli, *Ridley, l. c.* 237.—Penins. Mal.
lacinosum, *Ridley, l. c.* 242.—Penins. Mal.
Mannii, *Ridley, l. c.* 246.—Penins. Mal.
modestum, *Ridley, in Journ. Bot.* 1898, 211.—Malaya.
ovatifolium, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 271.—Borneo.
pallens, *Ridley, l. c.* xxxii. 241.—Penins. Mal.
pallidiflorum, *Ridley, l. c.* 240.—Penins. Mal.
pandaneti, *Ridley, l. c.* 257.—Penins. Mal.
paniculatum, *Sw. in Schrad. Neues Journ.* i. (1805) 97 = *Polystachya paniculata*.
papilio, *Loher, in Gard. Chron.* 1897, I. 416.—Ins. Philipp.
parvulum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 127.—Celebes.
pauciflorum, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. 332.—Reg. Himal.
pensile, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 253.—Penins. Mal.
pinifolium, *Ridley, l. c.* xxxi. 269.—Borneo.
prostratum, *Ridley, l. c.* xxxii. 248.—Penins. Mal.

DENDROBIUM—

- pumilum*, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 97 = *Polystachya bulbophylloides*.
quadrilobum, Rolfe, in *Kew Bull.* 1896, 44.—N. Guin.
Rhizophoreti, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 245.—Penins. Mal.
rigidifolium, Rolfe, in *Kew Bull.* 1899, 110.—N. Guin.
ritaeum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 583.—Reg. Himal.
roseatum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 261.—Penins. Mal.
rosellum, Ridley, l. c. xxxi. 268.—Borneo.
roseopunctatum, Ridley, l. c. xxxii. 240.—Penins. Mal.
roseum, Sw. in Schrad. Neues Journ. i. (1805) 97 = *Polystachya elastica*.
schimperianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 282 = *Angraecum schimperianum*.
schwartzkopffianum, Kraenzl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 106.—N. Brit.
setifolium, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 270.—Borneo.
sordidum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 583.—Reg. Himal.
tigrinum, Rolfe, ex Hemsl. in *Ann. Bot.* v. 507 = *spectabile*.
trinervium, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 242.—Penins. Mal.
triviale, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxv. 604.—Ins. Samoa.
Victoriae-reginae, Loher, in *Gard. Chron.* 1897, i. 399.—Ins. Philipp.
virescens, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 259.—Penins. Mal.
viridiflorum, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* ii. 285.—N. Guin.
viridulum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 259.—Penins. Mal.
yunnanense, Finet, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 419.—China.

DENDROCALAMUS, Nees (Gramin.).

- Brandisii*, Kurz, *For. Fl. Brit. Burma*, ii. 560.—Ind. or.
collettianus, Gamble, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 93.—Ind. or.
criticus, Kurz, *For. Fl. Brit. Burma*, ii. 559 = *Bambusa pallida*.
griffithianus, Kurz, l. c. 562 = *Bambusa griffithiana*.
latifolius, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 188.—N. Guin.
longifimbriatus, Gamble, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 92.—Ind. or.
multispiculatus, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 187.—N. Guin.
patellaris, Gamble, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 86.—Ind. or.

DENDROCHILUM, Blume (Orchid.).

- album*, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 287.—Penins. Mal.
crassum, Ridley, l. c. 288.—Penins. Mal.

DENDROCOLLA, Blume = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).

- carinatifolia*, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 382 = *S. carinatifolia*.
carcosa, Ridley, in *Journ. Bot.* 1898, 216 = *S. carnosus*.
filiformis, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 382 = *S. filiformis*.
fulgens, Ridley, l. c. 383.—Hab. ?
fusca, Ridley, l. c. xxxi. 296.—Borneo.
maculata, Ridley, l. c. xxxii. 381.—Penins. Mal.
merguensis, Ridley, l. c. 380 = *S. merguensis*.
pardalis, Ridley, l. c. 382 = *S. pardalis*.
pungionifolia, Ridley, l. c. 380 = *S. pungionifolius*.
Trichoglottis, Ridley, l. c. 381 = *S. Trichoglottis*.

DENDROPANAX, Decne. & Planch. (Aral.).

- cuneifolium*, Seem. in *Journ. Bot.* 1868, 140 = *Hedera cuneifolia*.
Listeri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 294.—Ind. or.
Maingayi, King, l. c. 58.—Malaya.
samydifolium, Seem. in *Journ. Bot.* 1868, 140 = *Sciadophyllum samydifolium*.

DENDROPEMON, Blume = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

- bicolor*, Krug & Urb. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 24.—Ind. occ.
caribaens, Krug & Urb. l. c. 27.—Ind. occ.
Constantiae, Krug & Urb. l. c. 20.—Ind. occ.
montanus, Krug & Urb. l. c. 23.—Ind. occ.

DENDROPEMON—

- Picardae*, Krug & Urb. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 20.—Ind. occ.
purpureus, Krug & Urb. l. c. 26 (= *Loranthus psilobotrys*).—Ind. occ.
pyncophyllus, Krug & Urb. l. c. 19.—Ind. occ.
Sintenisii, Krug & Urb. l. c. 25.—Ind. occ.

DENDROPHTHORA, Eichl. (Loranth.).

- chrysostachya*, Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 285 (= *Phoradendron chrysostachyum*).—Peruv.
clavata, Urb. l. c. (= *Viscum clavatum*).—Am. trop.
confertiflora, Krug & Urb. ex Urb. l. c.—Ind. occ.
costaricensis, Urb. l. c.—Ind. occ.
crassuloides, Urb. l. c. (= *Phoradendron crassuloides*).—Am. trop.
Danceri, Krug & Urb. ex Urb. l. c. 284 (= *Distichella Danceri*).—Ind. occ.
eichleriana, Urb. l. c. 287.—Venez.
elliptica, Krug & Urb. ex Urb. l. c. 285 (= *Phoradendron ellipticum*).—Am. trop.
flagelliformis, Krug & Urb. l. c. 287 (= *Viscum flagelliforme*).—Ind. occ.
gracilis, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 141 = *pendula*.
hexasticha, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 181 (= *Phoradendron hexastichon*).—Am. trop.
lindeniana, Van Tiegh. l. c. 182.—N. Granat.
mesembrianthemifolia, Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 285 (= *Phoradendron mesembrianthemifolium*).—N. Granat.
oocarpa, Krug & Urb. ex Urb. l. c. 291.—Ind. occ.
Pavoni, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 182.—Peruv.
pedicellata, Van Tiegh. l. c.—Mexic.
pendula, Krug & Urb. ex Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 290.—Ind. occ.
Poepigii, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 182.—Bras.
portulacoides, Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 285 (= *Viscum portulacoides*).—Ecuador.
purpurascens, Krug & Urb. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 57.—Ind. occ.
serpyllifolia, Krug & Urb. ex Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1896, 287 (= *Phoradendron serpyllifolium*).—Ind. occ.
sessilifolia, Krug & Urb. ex Urb. l. c. 285 (= *Phoradendron sessilifolium*).—Ind. occ.
subtrinervis, Urb. l. c.—Bolivia.

DENDROSERIS, D. Don (Compos.).

- gigantea*, Jofow, *Fl. Juan Fernandez*, 69.—Ins. Juan Fernandez.

DENISAEA, Neck. = **Phryma**, Linn. (Verben.).

- dehiscens*, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 250 = *P. dehiscens*.
prismatica, Kuntze, l. c. 254 = *Bouchea Ehrenbergii*.

DENTARIA, Tourn. = **Cardamine**, Linn. (Crucif.).

- appendiculata*, Matsum. in *Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 51 = *C. appendiculata*.
corymbosa, Matsum. l. c. 52.—Japon.
cuneata, Greene, Pittonia, iii. 123 = *C. cuneata*.
Douglassii, Greene, l. c. 124 = *C. Douglasii*.
gemmata, Howell, *Fl. N. W. Amer.* 49 = *C. gemmata*.
petersiana, Graebn. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 275.—Hab. ?
pulcherrima, Greene, Pittonia, iii. 123 = *C. pulcherrima*.
quercetorum, Greene, l. c. = *C. quercetorum*.
rhomboidea, Greene, l. c. 124 = *C. rhomboidea*.
rotundifolia, Greene, l. c. = *C. rotundifolia*.
sinuata, Greene, l. c. 123 = *C. sinuata*.

DEROEMERIA, Reichb. f. (Orchid.).

- montigena*, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 196.—Afr. trop.
Schimperi, Rolfe, l. c. 197.—Afr. trop.
squamata, Reichb. f. *Poll. Orch. Comm.* 29.—Afr. trop.
triloba, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 197.—Afr. trop.

DERRIS, Lour. (Legum.).

- andamanica*, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 104.—Ins. Andaman.
latifolia, Prain, l. c. lxxvii. 288.—Ind. or.
leptorhachis, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 302.—Afr. trop.
malaccensis, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 107.—Penins. Mal.
oligosperma, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 361.—N. Guin.
rufula, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

DERRIS—

- sinuata*, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. 311 = *andamanica*.
Stuhlmannii, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 408 (= *Deguelia Stuhlmannii*).—Afr. trop.
Wallichii, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 99 = *Pterocarpus floribundus*.

DESCHAMPSIA, Beauv. (Gramin.).

- brachyphylla*, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 23.—Chili.
fuegina, R. Phil. l. c.—Fuegia.
Martini, R. Phil. l. c. 24.—Chili.
micrantha, R. Phil. l. c.—Chili.
tenella, R. Phil. l. c. 25.—Chili.

DESCURAINIA, Webb & Berth. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).

- erodiifolia*, Auct. in *Just, Jahresb.* xxiv. ii. 362 = *S. erodiifolium*.

DESMANTHODIUM, Benth. (Compos.).

- lanceolatum*, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 576.—Am. cent.

DESMANTHUS, Willd. (Legum.).

- Camponi*, Drake, in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1301.—Madag.
greveanus, Drake, l. c.—Madag.

DESMAZERIA, Dum. = **Demazeria**, Dum. (Gramin.).

- composita*, Hack. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 27.—Afr. austr.
unioloides, Deflers, *Voy. Yemen*, 220 = *Halopyrum mucronatum*.

DESMOCHAETA, DC. (Amarant.).

- distorta*, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 891.—Afr. trop.
uncinulata, Hiern, l. c. 890 (= *Achyranthes uncinulata*).—Afr. trop.

DESMODIUM, Desv. (Legum.).

- ancistrotrichum*, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 358.—N. Guin.
insigne, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 398.—Ind. or.
khasianum, Prain, l. c. 395.—Ind. or.
kingianum, Prain, l. c. 398.—Ind. or.
kulhaitense, C. B. Clarke, ex Prain, l. c. 395.—Ind. or.
megalanthum, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 192.—Afr. trop.
Minahassae, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 431, nomen.—Malaya.
olivaceum, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 389.—Ind. or.
rugosum, Prain, l. c. 137.—Penins. Mal.
Tashiroi, Matsum. ex Ito & Matsum. in *Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 415.—Ins. Luchu.
tenuiflorum, Micheli, in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 59.—Afr. trop.
Wallichii, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 388.—Ind. or.
wylerianum, Urb. *Symb. Antill.* ii. 302.—Ind. occ.

DESMOGYNE, King & Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. (1898) 297. **VACCINIACEAE.**

- neriifolia*, King & Prain, l. c.—Ind. or.

DESMONCUS, Mart. (Palm.).

- cuyabaensis*, Barb. *Rodr. Palm. Mattogross.* 30.—Bras.
prostratus, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 5, 8.—Bras.

DESMONEMA, Miers (Menisperm.).

- mucronulatum*, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 409.—Afr. trop.
oblongifolium, Engl. l. c. 408.—Afr. trop.

DESMOSTACHYA, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 632 (1900). **GRAMINEAE.**

- bipinnata*, Stapf, l. c.—As. et Afr. trop.

DETRIS, Adans. = **Felicia**, Cass. (Compos.).

- ericifolia*, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 545 = *F. Schimperi*.
hyssopifolia, Hiern, l. c. 547 = *F. angustifolia*.
mossamedensis, Hiern, l. c. 546.—Afr. trop.
smaragdina, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 370.—Afr. trop.

DEUTEROCOHNIA, Mez (Bromel.).

meziana, *Kuntze, ex Mez, in DC. Monog. Phan. ix.* 465.—Bras.

DEUTZIA, Thunb. (Saxifr.).

baroniana, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix.* 372.—China.
corymbiflora, *Lemoine, in Rev. Hort.* 1898, 401.—China.
Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 281.—China.
setchuensis, *Franch. l. c.* 282.—China.

DEVERRA, DC. = **Pituranthos**, Viv. (Umbellif.).

aphylla, *DC. Prod. iv.* 143 = *P. aphylla*.

DEVILLEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 380 (1900) = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).

pyrenaica, *Bub. l. c.* = *L. pyrenaicum*.

DEWEVREA, Micheli, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii.

(1898) 47. **LEGUMINOSAE**.
bilabiata, *Micheli, l. c.* 48.—Afr. trop.

DEYEUXIA, Clar. (Gramin.).

abnormis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 268.—Ind. or.
amoena, *Pilg. in Engl. Jahrb. xxvii.* 28.—Bolivia.
aracantha, *Pilg. l. c.* xxv. 711.—N. Granat.
bogotensis, *Pilg. l. c.* 712.—N. Granat.
elatiof, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 266.—Ind. or.
filiformis, *Hook. f. l. c.* 268.—Ind. or.
freticola, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, v.* 87.—Reg. Magell.
Griffithii, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 263 = *Calamagrostis griffithiana*.
leptostachya, *T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 586.—N. Zel.
macrophylla, *Pilg. in Engl. Jahrb. xxv.* 711.—Ecuador.
nemoralis, *Phil. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. ii.* 344 = *Calamagrostis nemoralis*.
nivicola, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 267.—Ind. or.
nuda, *Pilg. in Engl. Jahrb. xxvii.* 29.—N. Granat.
pubescens, *Pilg. l. c.* xxv. 712.—N. Granat.
pulchella, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 268.—Ind. or.
sclerophylla, *Stapp, in Hook. Ic. Pl. t.* 2605.—N. Guin.
secunda, *Pilg. in Engl. Jahrb. xxv.* 712.—Ecuador.
Stuebelii, *Pilg. l. c.* 713.—Ecuador.
triaristata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 266.—Ind. or.

DIALIUM, Linn. (Legum.).

ambiguum, *Prairie, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi.* 172.—Penins. Mal.
cochinchinense, *Pierre, Fl. Cochinch. t.* 384 A.—Cochinch.
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi.* 275.—Afr. trop.
englerianum, *Henriques, in Bol. Soc. Brot.* 1899, 48.—Afr. trop.
Kingii, *Prairie, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi.* 175.—Penins. Mal.
Kunstleri, *Prairie, l. c.* 168.—Penins. Mal.
Schlechteri, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi.* 276.—Afr. trop.
Staudtii, *Harms, l. c.* 275.—Afr. trop.
Wallichii, *Prairie, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi.* 174.—Penins. Mal.

DIALYANTHERA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 126. **MYRISTICACEAE**.

gordonifolia, *Warb. l. c.* 153 (= *Myristica gordoniae-folia*).—Peruv.
Otoha, *Warb. l. c.* 149 (= *M. Otoha*).—Am. austr.

DIANTHERA, Gronov. (Acanth.).

celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 164.—Celebes.
flava, *Vahl, Symb. i.* 5 = *Justicia flava*.

DIANTHUS, Linn. (Caryophyll.).

brachyzonus, *Borb. & Form. ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv.* 194.—Eur.
chalcidicus, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 707.—Eur.
Degenii, *Baldacci, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. vi.* 27.—Eur.
epirotus, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 708.—Eur.
exilis, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst. i.* 452.—Eur.
fallacinus, *Rouy & Foucaud, Fl. Fr. iii.* 190.—Eur.
glanduloso pubescens, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlvi.* 706.—Eur.
lateritius, *Halacsy, Consp. Fl. Graec. i.* 213.—Eur.

DIANTHUS :—

namaensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 84.—Afr. austr.
pindicola, *Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1897, 31.—Eur.
pseudo-Grisebachii, *Gracescu, Consp. Fl. Roman.* 100.—Eur.
Samaritani, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec. i.* 213.—Eur.
serenaes, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 53.—Eur.
Sibthorpii, *Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1897, 33.—Eur.
szechuensis, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 428.—China.
ventricosus, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec. i.* 204.—Eur.

DIAPEDIUM, Koen. = **Dicliptera**, Juss. (Acanth.).

cochabambense, *Kuntze, Rev. Gen. iii. ii.* 248 = *D. cochabambensis*.
falciiflorum, *Kuntze, l. c.* = *D. falciifolia*.
multicaule, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi.* 105.—Bolivia.
niederleinianum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. ii.* 248 = *D. niederleiniana*.
scutellatum, *Kuntze, l. c.* = *D. scutellata*.
Torreyi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7* = *D. Torreyi*.

DIASCIJA, Link & Otto (Scrophul.).

Engleri, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii.* 471.—Afr. austr.
gracilis, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii.* 177.—Afr. austr.
nana, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii.* 472.—Afr. austr.
nutans, *Diels, l. c.*—Afr. austr.
Pentheri, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 431.—Afr. austr.
veronicoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii.* 178.—Afr. austr.

DIASPERUS, Linn. = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

cordobensis, *Kuntze, Rev. Gen. iii. ii.* 285.—Reg. Argent.
humilis, *Kuntze, l. c.* = *P. humilis*.

DIASTEMA, Benth. (Gesner.).

latiflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi.* 96.—Bolivia.
purpurascens, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 28.—Am. austr.

DIASTEMANTHE, Steud. = **Stenotaphrum**, Trin. (Gramin.).

platystachys, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 360 = *S. glabrum*.

DICELLANDRA, Hook. f. (Melastom.).

iberica, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl. ii.* 33 = *Phaeoneuron setosum*.
setosa, *Hook. f. in Oliv. Fl. Trop. Afr. ii.* 459 = *Phaeoneuron setosum*.

DICHAELIA, Harv. = **Brachystelma**, R. Br. (Asclep.).

circinnata, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxi.* Beibl. liv. 13 = *B. circinnatum*.

DICHAETARIA, Nees, in Steud. Syn. Pl. Gram. 145. **GRAMINEAE**.

Wightii, *Nees, l. c.*—Ind. or.

DICHAPETALUM, Thou. = **Chailletia**, DC. (Chaillet.).

acutifolium, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.* iv. 348; et in *Engl. Jahrb. xxiii.* 136.—Afr. trop.
acutisepalum, *Engl. l. c.* 349; l. c. 140.—Afr. trop.
adnatiflorum, *Engl. l. c.* 350; l. c. 142.—Afr. trop.
andamanicum, *Engl. l. c.* 348 = *C. andamanica*.
Bangii, *Engl. l. c.* 349 = *C. Bangii*.
Barteri, *Engl. l. c.* 348; l. c. 134.—Afr. trop.
benthamianum, *Engl. l. c.* 348 = *C. benthamiana*.
benthamianum, *Engl. l. c.* 349 = *C. Benthamii*.
bocageanum, *Engl. l. c.* 349 = *C. bocageana*.
Bojeri, *Engl. l. c.* 348 = *C. Bojeri*.
chlorinum, *Engl. l. c.* 348 = *C. chlorina*.
cubense, *Engl. l. c.* 349 = *C. cubensis*.
cuneifolium, *Engl. l. c.* 349; l. c. 141.—Afr. trop.
cymosum, *Engl. l. c.* 349 = *C. cymosa*.
cymulosum, *Engl. l. c.* 349 = *C. cymulosa*.
discolor, *Engl. l. c.* 348 = *C. discolor*.
Donnell-Smithii, *Engl. l. c.* 349; l. c. 144.—Guatem.
Dusenii, *Engl. l. c.* 348; l. c. 135.—Afr. trop.

DICHAPETALUM :—

ferrugineo-tomentosum, *Engl. in Engl. Jahrb. xxiii.* 139.—Afr. trop.
ferrugineum, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.* iv. 349; et in *Engl. Jahrb. xxiii.* 139.—Afr. trop.
flavicans, *Engl. l. c.* 349; l. c. 145 = *C. flavicans*.
flexuosum, *Engl. l. c.* 349 = *C. flexuosa*.
floribundum, *Engl. l. c.* 348 = *C. floribunda*.
fructuosum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 138.—Afr. trop.
gabonense, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.* iv. 348; et in *Engl. Jahrb. xxiii.* 137.—Afr. trop.
gelonioides, *Engl. l. c.* 348 = *C. gelonioides*.
Griffithii, *Engl. l. c.* 348 = *C. Griffithii*.
hainanense, *Engl. l. c.* 348 = *C. hainanensis*.
Heudelotii, *Engl. l. c.* 349 = *C. Heudelotii*.
hirtellum, *Engl. l. c.* 348 = *C. hirtella*.
hypoleucum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 138.—Afr. trop.
Johnstonii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.* iv. 349; et in *Engl. Jahrb. xxiii.* 141.—Afr. trop.
kamerunense, *Engl. l. c.* 350; l. c. 142.—Afr. trop.
Laurocerasus, *Engl. l. c.* 348 = *C. Laurocerasus*.
Leucosia, *Engl. l. c.* 348 = *C. Leucosia*.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix.* 55.—Afr. trop.
macrophyllum, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.* iv. 349 = *C. macrophylla*.
malaccense, *Engl. l. c.* 348; et in *Engl. Jahrb. xxiii.* 143.—Ind. or.
mombuttense, *Engl. l. c.* 348; l. c. 135.—Afr. trop.
mundense, *Engl. l. c.* 348; l. c. 134.—Afr. trop.
nigrescens, *Engl. l. c.* 348 = *C. nigrescens*.
oblongum, *Engl. l. c.* 349 = *C. oblonga*.
Pachypus, *Engl. l. c.* 348 = *C. Pachypus*.
pallidum, *Engl. l. c.* 349 = *C. pallida*.
papuanum, *Engl. l. c.* 348 = *C. papuana*.
parvifolium, *Engl. l. c.* 348; l. c. 136.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.* 349; l. c. 141.—Afr. trop.
retroversum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 139.—Afr. trop.
rufipile, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii.* iv. 349 = *C. rufipilis*.
rufo-tomentosum, *Engl. l. c.* 349.—Afr. trop.
rufum, *Engl. l. c.* 348 = *C. rufa*.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.* 349; et in *Engl. Jahrb. xxiii.* 140.—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.* 348; l. c. 137.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. l. c.* 349; l. c. 139.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. l. c.* 348.—Afr. trop.
subauriculatum, *Engl. l. c.* 349 = *C. subauriculata*.
subcordatum, *Engl. l. c.* 349 = *C. subcordata*.
tenuifolium, *Engl. l. c.* 348 = *C. tenuifolia*.
Thomsonii, *Engl. l. c.* 349 = *C. Thomsonii*.
timoriense, *Engl. l. c.* 348 = *C. timoriense*.
tomentosum, *Engl. l. c.* 349; l. c. 138.—Afr. trop.
tonkinense, *Engl. l. c.* 348; l. c. 143.—Cochinch.
Virchowii, *Engl. l. c.* 348 = *C. Virchowii*.
vitiense, *Engl. l. c.* 348 = *C. vitiense*.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 349; l. c. 138.—Afr. trop.

DICHAZOTHECE, Linn. in Engl. Jahrb. xxv.

Beibl. ix. (1898) 47. **ACANTHACEAE**.
cylindracea, *Lindau, l. c.*—Bras.

DICHOSTEMMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.

(1896) 1259. **EUPHORBIACEAE**.
glaucescens, *Pierre, l. c.* 1260.—Afr. trop.
Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii.* 25.—Afr. trop.

DICHOTRICHUM, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 174, sphalm. = **Dichrotrichum**, Reinw. (Gesnerac.).**DICHROMENA**, Michx. (Cyperac.).

filiformis, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill. ii.* 102.—Ind. occ.
Grisebachii, *C. B. Clarke, l. c.*—Ind. occ.
hispidula, *Kunth, Enum. Pl. ii.* 279 = *Rynchospora trichodes*.
longa, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 23.—Bras.
pusilla, *Kunth, Enum. Pl. ii.* 275 = *Rynchospora Berterii*.
seslerioides, *Benth. ex C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill. ii.* 100.—Ind. occ.

DICHROTRICHUM, Reinw. (Gesnerac.).

papuanum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 174.—N. Guin.

DICLIPTERA, Juss. (Acanth.).

- aculeata, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 257.—Afr. trop.
 colorata, C. B. Clarke, l. c. 260.—Afr. trop.
 Elliotii, C. B. Clarke, l. c. 258.—Afr. trop.
 iopus, Lindau, in *Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 305.—Am. cent.
 laxata, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 258.—Afr. trop.
 laxispica, Lindau, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Expd.* 316, nomen.—Afr. trop.
 lingulata, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 257.—Afr. trop.
 nilotica, C. B. Clarke, l. c. 260.—Afr. trop.
 Pringlei, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 302.—Mexic.
schumanniana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxxi. 204 = *Megalochlamys Marlothii*.
 sciadephora, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 13.—Am. cent.
 Sumichrasti, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 665.—Mexic.

DICLIS, Benth. (Scrophul.).

- sessilifolia, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxxiii. 473.—Afr. trop.
 tenella, Hemsl. in *Kew Bull.* 1896, 163.—Afr. trop.

DICOMA, Cass. (Compos.).

- megacephala, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 271.—Afr. trop.
 nana, Welw. ex Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 614.—Afr. trop.
 nyikensis, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 271.—Afr. trop.
 ramosissima, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 843.—Afr. trop.
 somalense, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 60.—Afr. trop.

DICORIA, Torr. & Gray (Compos.).

- paniculata, Eastw. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 298.—Am. bor.

DICRANOLEPIS, Planch. (Thymel.).

- baertsiana, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 54.—Afr. trop.
 laciniata, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 204.—Afr. trop.
 Persei, Cummins, in *Kew Bull.* 1898, 78.—Afr. trop.
 polygaloides, Gilg, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Expd.* 301, nomen.—Afr. trop.
 pulcherrima, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 203.—Afr. trop.
 Thonneri, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 114.—Afr. trop.

DICRASTYLIS, Drum. (Verben.).

- Carnegiei, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2582.—Austral.

DICRAURUS, Hook. f. (Amarant.).

- alternifolia, Uline & W. Bray, in *Coult. Bot. Gaz.* xxi. 355 = *Iresine alternifolia*.

DICTYOCHLOA, Camus, in *Compt. Rend. Intern. Congr. Bot.* 1900, 344. **GRAMINEAE.**

- involutrata, Camus, l. c. (= *Ammochloa involutrata*).—Afr. bor.

DICTYONEURA, Blume = **Cupania**, Linn. (Sapind.).

- Bamleri, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 421.—N. Guin.

DICTYOPHLEBA, Pierre, in *Bull. Soc. Lin. Par.* n. s. i. (1898) 92. **APOCYNACEAE.**

- lucida, Pierre, l. c. 93 (= *Landolphia lucida*).—Afr. trop.

DIDESMANDRA, Stapf, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2646 (1900). **DILLENACEAE.**

- aspera, Stapf, l. c.—Borneo.

DIDICIEA, King & Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. (1896) 118. **ORCHIDEAE.**

- Cunninghami, King & Prain, l. c. 119.—Ind. or.

DIDISSANDRA, C. B. Clarke (Cyrtandr.).

- atropurpurea, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 504.—Penins. Mal.
 Clarkei, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 551.—Celebes.
 Delavayi, Franch. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 250.—China.
 Fargesii, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 123.—China.

DIDISSANDRA :—

- flammea, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 503.—Penins. Mal.
 latisejala, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
 Morgani, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 124.—China.
 plicata, Franch. l. c. 123.—China.
 quercifolia, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 504.—Penins. Mal.
 Rosthornii, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 574.—China.

DIDYMOCARPUS, Wall. (Gesner.).

- ascendens, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 512.—Penins. Mal.
 Brownei, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 551, 628.—Celebes.
 caerulea, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 513.—Penins. Mal.
 citrina, Ridley, l. c. 508.—Penins. Mal.
 crenata, Baker, in *Kew Bull.* 1896, 25.—Borneo.
 cyaneus, Ridley, in *Journ. Bot.* 1900, 68.—Malaya.
 dentata, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 515.—Penins. Mal.
 eliator, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 299.—Ind. or.
 flava, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 507.—Penins. Mal.
 hispida, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
 inaequalis, Ridley, l. c. 506.—Penins. Mal.
 laxa, Ridley, l. c. 510.—Penins. Mal.
 puncticulata, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
 purpurea, Ridley, l. c. 508.—Penins. Mal.
 regularis, Ridley, l. c. 515.—Penins. Mal.
 sericea, Ridley, l. c. 513.—Penins. Mal.
 violacea, Ridley, l. c. 509.—Penins. Mal.

DIDYMOPANAX, Decne. & Planch. (Aral.).

- Kuntzei, Harms, ex Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 115.—Bolivia.
 micans, Krug & Urb. in *Urb. Symb. Antill.* i. 204 = *Panax splendens*.
 tremulum, Krug & Urb. l. c. 206.—Ind. occ.

DIDYMOPELEXIS, Griff. (Orchid.).

- cornuta, J. J. Sm. in *Bull. Inst. Buitens.* vii. 1.—Java.
 minor, J. J. Sm. l. c.—Java.

DIDYMOSPERMA, H. Wendl. & Drude (Palm.).

- humile, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 204.—N. Guin.
 microcarpa, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c. = *Arenga microcarpa*.

DIEFFENBACHIA, Schott (Arac.).

- aurantiaca, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 566.—Am. cent.

DIERAMA, C. Koch (Irid.).

- cupuliflorum, Klatt, in *Decken, Reisen Ost-Afrika*, iii. 73, t. 3 = pendulum.
 ensifolium, C. Koch & Bouché, in *Walp. Ann.* vi. 43 = pendulum.
 pendulum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. 99.—Afr. trop.

DIERBACHIA, Spreng. (Solan.).

- australis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 220 = *Ioichroma australe*.
 breviflora, Kuntze, l. c. = *Acnistus breviflorus*.
 obovata, Kuntze, l. c. = *Lycium obovatum*.
 parviflora, Kuntze, l. c. 221 = *Acnistus parviflorus*.

DIGITARIA, Heist. (Gramin.).

- aegyptiaca, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 93 = sanguinalis.
 affinis, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 470 = *Panicum paspaloides*.
 angolensis, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 165.—Afr. trop.
 argyrograpta, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 374.—Afr. austr.
 barbata, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 91.—Penins. Mal.
 bififormis, Willd. l. c. 92 = sanguinalis.
 ciliaris, Pers. *Syn.* i. 85 = sanguinalis.
 commutata, Schult. *Mant.* ii. 262 = sanguinalis.
 conjugata, Schult. l. c. = *Paspalum conjugatum*.
 cruciata, Nees, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 14 = sanguinalis.
 cuspidata, Schult. *Mant.* ii. 265 = *Panicum colonum*.
 debilis, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 91.—Reg. *Medit.* ; Afr.
 decipiens, Fig. & De Not. in *Mem. Acc. Torin. Ser. II.* xiv. 359 = debilis.

DIGITARIA :—

- diagonalis, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 381.—Afr. trop. et austr.
 didactyla, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 91 = sanguinalis.
 disticha, Fiori & Paoletti, *Fl. Ital.* i. 50 (= *Paspalum distichum*).—Reg. trop. et subtrop.
 diversinervis, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 379.—Afr. austr.
 elongata, Spreng. *Syst.* i. 271 = *Chloris incompleta*.
 elyptroblephara, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 439 = barbata.
 eriantha, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 468.—Oriens; Afr.
 eriogona, Link, *Hort. Berol.* i. 227 = sanguinalis.
 fenestrata, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 163.—Afr. trop.
 filiformis, Koel. *Desc. Gram.* 26 = glabra.
 flaccida, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 382.—Afr. austr.
 glabra, Beauv. *Agrost.* 51.—Reg. bor. temp. et trop.
 horizontalis, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 92.—Afr. trop. et austr. ; Am. trop.
 humifusa, Pers. *Syn.* i. 85 = glabra.
 linearis, Rostaf. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xxii. 99 = glabra.
 longiflora, Pers. *Syn.* i. 85.—Geront. trop.
 marginata, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 102 = sanguinalis.
 mauritiana, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 35 = *Panicum muticum*.
 moninensis, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 164.—Afr. trop.
 monodactyla, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 373.—Afr. austr.
 nervosa, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 473 = sanguinalis.
 nitens, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 165.—Afr. trop.
 procumbens, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* i. 508 = glabra.
 pruriens, Buese, in *Miq. Pl. Jungh.* 379 = sanguinalis.
 pseudo-Durva, Nees, ex Schlecht. in *Linnaea*, xxvi. 458 = tenuiflora.
 puberula, Link, *Hort. Berol.* i. 223.—Geront. trop.
 radiata, Spreng. *Syst.* i. 272 = *Cynodon Dactylon*.
 radicata, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 437 = sanguinalis.
 repens, Willd. ex Kunth, *Enum. Pl.* i. 84 = sanguinalis.
 Rottleri, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 471 = sanguinalis.
 Roxburghii, Spreng. *Syst.* i. 270 = tenuiflora.
 sanguinalis, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 52.—Cosmop.
 sanguinea, Weber, in *Wigg. Prim. Fl. Holsat.* 6 = sanguinalis.
 sanguinolenta, Edgew. ex Aitch. *Cat. Punjab Pl.* 161 = sanguinalis.
 setifolia, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 376.—Afr. austr.
 setigera, Roth, ex Roem. & Schult. *Syst.* ii. 474 = sanguinalis.
 setosa, Hamilt. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 6 = horizontalis.
 tenuiflora, Beauv. *Agrost.* 51.—Afr. austr. ; Geront. trop.
 ternata, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 376.—Afr. austr.
 tricholaenoides, Stapf, l. c. 381.—Afr. austr.

DIGLYPHOSA, Blume = **Chrysoglossum**, Blume

- (Orchid.).
 macrophylla, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 98 = *C. macrophyllum*.

DIGRAPHIS, Trin. = **Phalaris**, Linn. (Gramin.).

- americana, Loud. *Hort. Brit.* 27 = *P. arundinacea*.

DILLENIA, Linn. (Dillen.).

- pedunculata, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 445.—N. Guin.

DILLWYNIA, Sm. (Legum.).

- acerosa, S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 187.—Austral.

DILOCHIA, Lindl. = **Arundina**, Blume (Orchid.).

- Cantleyi, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 332 = *A. Cantleyi*.

DILOPHIA, T. Thoms. (Crucif.).

- Dutreuilii, Franch. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 321.—Tibet.

DIMERIA, R. Br. (Gramin.).

- alata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 105.—Ind. or.
 chloridiformis, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 165 = pilosissima.
 Kurzii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 103.—Ind. or.
 Trimeni, Hook. f. in *Trim. Fl. Ceylon*, v. 198.—Zeylan.

DIMERCOCOSTUS, Kuntze (Scitamin.).

- Guttierezii, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 301.—Bolivia.

DIMORPHOCHLAMYS, Hook. f. (Cucurb.).

- Cabraei, Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 24.—Afr. trop.
 crepiniana, Cogn. l. c. 25.—Afr. trop.

DIMORPHOSTACHYS, Fourm. (Gramin.).
Schaffneri, Fourm. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 499 = *Paspalum* Schaffneri.

DIMORPHOTHECA, Vaill. (Compos.).
spectabilis, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1897, 220.—Afr. austr.

DINACRIA, Harv. (Crassul.).
grammanthoides, Schoenl. in *Bull. Herb. Boiss.* v. 859.—Afr. austr.

DINKLAGEA, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1897) 242. **CONNARACEAE.**
macrantha, Gilg, l. c.—Afr. trop.

DINOCHLOA, Buese (Gramin.).
andamanica, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. II. 253 = *D. Tjankorreh*.

DINOPHORA, Benth. (Melastom.).
Thonneri, Cogn. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 114.—Afr. trop.

DINTERA, Stapf, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20. (1900) 27. **SCROPHULARIACEAE.**
pteroaulis, Stapf, l. c. 29.—Afr. trop.

DIOCLEA, H. B. & K. (Legum.).
pauciflora, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 25.—Bolivia.

DIODIA, Gronov. (Rubiace.).
benguellensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 502.—Afr. trop.
flavescens, Hiern, l. c. 501.—Afr. trop.
paludosa, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 118.—Parag.

DIOLENA, Naud. (Melastom.).
boliviensis, Cogn. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 277.—Bolivia.

DIONYSIA, Fenzl (Primul.).
heterochroa, Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 72.—Persia.
hissarica, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 83.—As. cent.
janthina, Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 70.—Persia.
oreodoxa, Bornm. l. c. 68.—Persia.
Sintensis, Stapf, ex Bornm. l. c. in nota.—Mesopot.

DIOSCOREA, Plum. (Dioscor.).
acerifolia, Uline, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
acerifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 15.—Chili.
adenantha, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Bras.
albicaulis, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 425.—Am. cent.
andina, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 16.—Chili.
andongensis, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 37.—Afr. trop.
angustiflora, Rendle, l. c. 39.—Afr. trop.
astrostigma, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 431.—Am. cent.
axilliflora, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 11.—Chili.
brachystachya, R. Phil. l. c. 7.—Chili.
Brownii, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 11.—Afr. austr.
ceratandra, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Bras.
cissophylla, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 18.—Chili.
costermansiana, Wildem. & Th. Dur. in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 52.—Afr. trop.
crotalariaifolia, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 85.—Bras.
dendrotricha, Uline, l. c. 84.—Bras.
Dinteri, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 11.—Afr. trop.
dregeana, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 250.—Afr. austr.
epistephioides, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxi. 425.—Bras.
esurientium, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 429.—Am. cent.
Gayi, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 9.—Chili.
Geissei, R. Phil. l. c. 8.—Chili.
Henryi, Uline, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
hypotricta, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 87.—Afr. trop.

DIOSCOREA :—
Kuntzei, Uline, ex Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 311.—Bolivia.
laevis, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 425.—Am. cent.
latifolia, Benth. in Hook. Niger Fl. 535 = *sativa*.
Lehmannii, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 430.—N. Granat.
Liebmannii, Uline, l. c. 429.—Mexic.
liebrechtsiana, Wildem. & Th. Dur. in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 53.—Afr. trop.
lobata, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 427.—Mexic.
longipes, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 6.—Chili.
longituba, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Mexic.
macrocapsa, Uline, l. c. 83 (non Wall.)—Bras.
macrothrysa, Uline, l. c. 87.—Bras.
macroura, Harms, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 266.—Afr. trop.
matagalpensis, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 432.—Am. cent.
microcephala, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 85.—Chili.
microcuspis, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 250.—Afr. austr.
montana, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 143 = *Testudinaria Elephantipes*.
nervosa, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 20.—Chili.
nigrescens, R. Phil. l. c. 5.—Chili.
oaxacensis, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86; et in *Proc. Amer. Acad.* xxxv. 322.—Mexic.
orizabensis, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Mexic.
parvifolia, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 8.—Chili.
paupera, R. Phil. l. c. 12.—Chili.
pedatifida, R. Phil. l. c. 18.—Chili.
pencana, R. Phil. l. c. 7.—Chili.
polyantha, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 37.—Afr. trop.
pteroaulon, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 58.—Afr. trop.
pumicola, Uline, in *Proc. Amer. Acad.* xxxv. 322.—Mexic.
racemosa, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 430 (= *Helmia racemosa*)—Am. cent.
Rehmannii, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 248.—Afr. austr.
reversiflora, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 426.—Mexic.
Rosthornii, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
Rusbyi, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 86.—Bolivia.
Schlechteri, Harms, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Expd.* 273, nomen.—Afr. trop.
semperflorens, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 87.—Afr. trop.
smilacifolia, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 58.—Afr. trop.
Sprucei, Uline, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 84.—Ecuador.
stenophylla, Uline, l. c. 83.—Bras.
synandra, Uline, l. c. 86.—Bras.
thermarum, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 17.—Chili.
thinophila, R. Phil. l. c. 10.—Chili.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 109, t. 55.—Afr. trop.
trichoneura, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 6.—Chili.
uliginosa, R. Phil. l. c. 12.—Chili.
urceolata, Uline, in *Engl. Jahrb.* xxii. 426.—Mexic.
violacea, Uline, l. c. 423.—Mexic.
warburgiana, Uline, ex Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 313, nomen.—Celebes.
Welwitschii, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 39.—Afr. trop.
yucatanensis, Uline, in *Field Columb. Mus. Bot.* i. 416.—Am. cent.

DIOSCOREOPHYLLUM, Engl. (Menisperm.).
strigosum, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 407.—Afr. trop.
tenerum, Engl. l. c.—Afr. trop.

DIOSPYROS, Linn. (Eben.).
atropurpurea, Guerke, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 67.—Afr. trop.
bipindensis, Guerke, l. c. 70.—Afr. trop.
gabunensis, Guerke, l. c. 72.—Afr. trop.
Hiernii, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 521.—Celebes.

DIOSPYROS :—
humilis, Bourd. in *Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xii. 352.—Ind. or.
kamerunensis, Guerke, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 69.—Afr. trop.
Koordersii, Hiern, ex Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 521.—Celebes.
latifolia, Guerke, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 63.—Afr. trop.
monbuttensis, Guerke, l. c. 66.—Afr. trop.
physocalycina, Guerke, l. c. 68.—Afr. trop.
Staudtii, Guerke, l. c. 65.—Afr. trop.
suaveolens, Guerke, l. c. 68.—Afr. trop.
tetramera, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 75.—Bolivia.
tuberculosa, Guerke, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 65.—Afr. trop.
usaramensis, Guerke, l. c. 64.—Afr. trop.
utilis, Koord. & Valet. ex Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 522.—Celebes.
Welwitschii, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 653.—Afr. trop.

DIOSTEA, Miens (Verben.).
chamaedryfolia, Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7695 = *juncea*.
juncea, Miens, in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. 102.—Chili.

DIOTHONEA, Lindl. (Orchid.).
lehmanniana, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 489.—Ecuador.

DIPANAX, Seem. (Aral.).
dipyrena, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies*, i. 870 (= *Heptapleurum dipyrenum*).—Ins. Sandw.
gymnocarpa, A. A. Heller, l. c. (= *Pterotropia gymnocarpa*).—Ins. Sandw.
kavaicensis, A. A. Heller, l. c. 871 (= *Heptapleurum kavaicense*).—Ins. Sandw.

DIPCADI, Medic. (Liliac.).
arenarium, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 520.—Afr. trop.
elatum, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 449.—Afr. austr.
fesoghense, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 519.—Afr. trop.
firmifolium, Baker, l. c.—Afr. trop.
gracillimum, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 446.—Afr. austr.
magnum, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 522.—Afr. trop.
megalanthum, A. Zahlbr. in *Ann. Hofmus. Wien*, xv. 21.—Afr. austr.
platyphyllum, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 518.—Afr. trop.
polyphyllum, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 446.—Afr. austr.
Readii, Baker, l. c. 447.—Afr. austr.
thollonianum, Hua, in *Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 675.—Afr. trop.
vaginatum, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 523.—Afr. trop.
venenatum, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 42.—Afr. austr.
viride, Moench, *Meth. Suppl.* 267.—Afr. trop. et austr.
volutum, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 448.—Afr. austr.
wentzelianum, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 362.—Afr. trop.
zambesiicum, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 517.—Afr. trop.

DIPELTA, Maxim. (Caprifol.).
yunnanensis, Franch. in *Rev. Hortic.* 1891, 247.—China.

DIPERIUM, Desv. = *Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.).
cylindricum, Desv. Opusc. 76 = *R. perforata*.

DIPHASIA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. (1898) 68. **RUTACEAE.**
klaineana, Pierre, l. c. 70.—Afr. trop.

DIPLACHNE, Beauv. (Gramin.).
alba, Hochst. in *Flora*, xxv. (1842) I. Beibl. 134 = *fusca*.
andropogonoides, Nees, Fl. Afr. Austr. 258 = *Triraphis Rehmannii*.
capensis, Nees, Fl. Afr. Austr. 256 = *fusca*.
carinata, Hack. ex F. Kurtz, in *Bol. Acad. Cordoba*, xvi. repr. 32 (= *Atropis carinata*).—Reg. Argent.
Fleckii, Hack. in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 25.—Afr. trop.
Gatacrei, Stapf, in *Kew Bull.* 1898, 229.—Ind. or.
grandiglumis, Hack. in *Engl. Jahrb.* xi. 404 = *Crosso-tropis grandiglumis*.

DIPLACHNE :—

Halei, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 292.—Am. bor.
indica, Spreng. Syst. i. 351 = *fusca*.
latifolia, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* ii. 6 (= *Tricuspis latifolia*).—Reg. Argent.
livida, Nees, Fl. Afr. Austr. 254 = *fusca*.
mendocina, F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba, xv. 521 = *Ipnium mendocinum*.
nana, Nees, Fl. Afr. Austr. 259 = *Triraphis nana*.
pallida, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iii. 387 = *fusca*.
paucinervis, *Hack. l. c.* iv. App. III. 25.—Afr. trop. et austr.
pungens, *Hack. l. c.*—Afr. trop.

DIPLACRUM, R. Br. (Cyperac.).

longifolium, C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill. ii. 153 = *Pteroscleria longifolia*.

DIPLACUS, Nutt. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).

Clevelandi, Greene, in Erythea, iv. 22 = *M. Clevelandi*.

DIPLADENIA, A. DC. (Apocyn.).

Myriophyllum, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 448.—Bras.
peduncularis, A. DC. in DC. Prod. viii. 482 = *pastorum*.
pendula, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiv. 234.—Bras.
Sanderi, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1896, II. 652.—Bras.
tenuifolia, A. DC. in DC. Prod. viii. 482 = *pastorum*.

DIPLANTHEMUM, K. Schum. in Engl. & Prantl.

Pflanzenf. Nachtr. i. (1897) 284. **TILLIACEAE**.
viridiflorum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

DIPLANTHERA, Banks & Soland. (Bignon.).

hirsuta, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 11.—Austral.

DIPLASANTHERA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 196,

sphalm. = **DIPLASANTHUM**, Desv. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

DIPLASPIS, Hook. f. = **Huanaca**, Cav. (Umbell.).

Morenonis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. 367 = *H. Morenonis*.

DIPLOLEGNON, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,

1900, 29. **GESNERACEAE**.
riceanum, *Rusby, l. c.* 30.—Am. austr.

DIPLOLEPIS, R. Br. (Asclep.).

longirostrum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 725.—Ecuador.

DIPLOMERIS, D. Don (Orchid.).

Boxalli, *Rolfe, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 470.—Ind. or.
chinensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 203.—China.

DIPLOMORPHA, Meissn. = **Wikstroemia**, Endl.

(Thymel.).
bicornuta, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 861 = *W. bicornuta*.

buxifolia, A. A. Heller, l. c. = *W. Uva-ursi*.
elongata, A. A. Heller, l. c. 859 = *W. elongata*.
Hanalet, A. A. Heller, l. c. 861 = *W. Hanalet*.
oahuensis, A. A. Heller, l. c. 860.—Ins. Sandw.
phillyraefolia, A. A. Heller, l. c. 861 = *W. phillyraefolia*.
sandwicensis, A. A. Heller, l. c. = *W. sandwicensis*.
Uva-ursi, A. A. Heller, l. c. = *W. Uva-ursi*.
villosa, A. A. Heller, l. c. = *W. villosa*.

DIPLOPAPPUS, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).

serrulatus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 86 = *A. xylophyllus*.

DIPLOSTEPHIUM, H. B. & K. (Compos.).

corymbosum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 8.—Am. cent.
paniculatum, *Donn. Sm. l. c.*—Am. cent.

DIPLOTHEMIUM, Mart. (Palmae).

Anizitzii, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 16.—Parag.
pectinatum, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 81.—Bras.

DIPLUSODON, Pohl (Lythrac.).

ciliiflorus, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 35.—Bras.
crulsianus, *Koehne, l. c.* 33.—Bras.
Glaziovii, *Koehne, l. c.* 32.—Bras.
humilis, *Koehne, l. c.* 33.—Bras.

DIPLUSODON :—

nigricans, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 34.—Bras.
paniculatus, *Koehne, l. c.* 30.—Bras.
pulchellus, *Koehne, l. c.* 32.—Bras.
retroimbricatus, *Koehne, l. c.* 34.—Bras.
sordidus, *Koehne, l. c.* 31.—Bras.

DIPODIUM, R. Br. (Orchid.).

elegans, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitens.* vii. 4.—Arch. Mal.
pandanum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vi. 287.—N. Guin.

DIPTERACANTHUS, Nees = **Ruellia**, Linn. (Acanth.).

elongatus, Nees, in DC. Prod. xi. 140 = *Whitfieldia elongata*.
gendumanus, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. 680 = *R. gendumana*.
pilosus, Nees, in Linnaea, xv. (1814) 353 = *R. ovata*.
subringens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 31 = *R. subringens*.

DIPTEROCARPUS, Gaertn. f. (Dipterocarp.).

pubescens, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Buitens.* ii. 2.—Java.
Van-der-Hoevenii, *Koord. & Valet. l. c.* 3.—Java.

DIPTEROPELTIS, Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss.

Anst. xvi. (1898) repr. 4. **CONVOLVULACEAE**.
poranoides, *Hallier f. l. c.* 5.—Afr. trop.

DIPTEROSIPHON, Huber, in Bol. Mus. Para. ii.

(1898) 502. **BURMANNIACEAE**.
spelacicola, *Huber, l. c.*—Bras.

DIPYRENA, Hook. (Verben.).

dentata, *Phil. in Linnaea*, xxix. 22 = *Diostea juncea*.

DISA, Berg. (Orchid.).

alpina, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. 220 = *Brownleea alpina*.
aperta, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 286.—Afr. trop.
atrorubens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 427.—Afr. austr.
aurantiaca, *Reichb. f. in Flora*, l. (1867) 98 = *ochrostachya*.
auriculata, *Bolus, Ic. Orch. Austr.-Afr.* t. 77.—Afr. austr.
bolusiana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 426.—Afr. austr.
Carsoni, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 277.—Afr. trop.
concinna, *N. E. Br. l. c.* 284.—Afr. trop.
forcipata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 428.—Afr. austr.
Forficaria, *Bolus, Ic. Orch. Austr.-Afr.* t. 87.—Afr. austr.
goetzeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 178.—Afr. trop.
Leopoldi, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 218.—Afr. trop.
luxurians, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 369.—Afr. trop.
Macowani, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 106 = *versicolor*.
Princeae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 370.—Afr. trop.
robusta, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 282.—Afr. trop.
satyriopsis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 177.—Afr. trop.
Schimperi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 279.—Afr. trop.
Thodei, *Schlechter, ex Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 796.—Afr. trop.
zombica, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 278.—Afr. trop.

DISCARIA, Hook. (Rhamn.).

articulata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 38 (= *Colletia articulata*).—Chili.
discolor, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 153 (= *Colletia discolor*).—Patag.
dumosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 38 (= *Colletia dumosa*).—Chili.

DISCARIA :—

integrifolia, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 502.—Patag.
prostrata, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 14 (= *Colletia nana*).—Chili.
trinervis, *Reiche, l. c.* (= *Colletia doniana*).—Chili.

DISCHIDIA, R. Br. (Asclep.).

amphorantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 511.—N. Guin.
Cominsii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2674.—Ins. Solomon.
Hollrungii, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 510.—N. Guin.
Lauterbachii, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 511.—N. Guin.
maxima, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 534.—Celebes.
neurophylla, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 141.—N. Brit.
ruscifolia, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 511 (non Decne.).—N. Guin.

DISCHISMA, Choisy (Selagin.).

affine, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 187.—Afr. austr.
occludens, *Schlechter, l. c.* 188.—Afr. austr.
squarrosum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
tomentosum, *Schlechter, l. c.* 189.—Afr. austr.

DISCHISTOCALYX, Lindau = **Distichocalyx**, T.

Anders. (Acanth.).
pubescens, *Lindau, in Goetzen, Durch Afr.* repr. 9.—Afr. trop.

DISCOLOBIUM, Benth. (Legum.).

paucijugum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 60.—Parag.

DISPARAGO, Gaertn. (Compos.).

hoffmanniana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 203.—Afr. austr.

DISPERIS, Sw. (Orchid.).

anomala, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 333.—Afr. austr.
aphylla, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 71.—Afr. trop.
Bodkini, *Bolus, Ic. Orch. Austr.-Afr.* t. 96.—Afr. austr.
bolusiana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 430.—Afr. austr.
comorensis, *Schlechter, l. c.* 429.—Ins. Comor.
Johnstoni, *Reichb. f. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. Bot. Ser. II.* ii. 349.—Afr. trop.
kamerunensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 431.—Afr. trop.
mozambicensis, *Schlechter, l. c.* 428.—Afr. trop.
papuana, *Michol. & Kraenzl. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 844.—Australas.
Preussii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 291 = *kamerunensis*.
togoensis, *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 274, nomen.—Afr. trop.
virginalis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 431.—Afr. austr.

DISPERMA, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v.

79 (1899). **ACANTHACEAE**.
angolense, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. trop.
densiflorum, *C. B. Clarke, l. c.* 82.—Afr. trop.
dentatum, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. trop.
kilimandscharicum, *C. B. Clarke, l. c.* 80.—Afr. trop.
parviflorum, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. trop.
quadrangulare, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
quadrisepalum, *C. B. Clarke, l. c.* 80.—Afr. trop.

DISSOCHAETA, Blume (Melast.).

anomala, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* n. s. lxix. 55.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.*—Penins. Mal.

DISSOCHONDROS, O. Kuntze, ex Hack. in Engl. &

Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 41 (1897). **GRAMINEAE**.
biflorus, *O. Kuntze, l. c.*—Ins. Sandw.

DISSOTIS, Benth. (Melast.).

cinnamata, *Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pf.* ii. 20.—Afr. trop.
cordata, *Gilg, l. c.* 17.—Afr. trop.
Elliotii, *Gilg, l. c.* 19.—Afr. trop.
falcipila, *Gilg, l. c.* 23.—Afr. trop.
Goetzei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 442.—Afr. trop.

DISSOTIS—

macrocarpa, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 18.—Afr. trop.
 magnifica, *Gilg*, l. c. 22.—Afr. trop.
 minor, *Gilg*, l. c. 12.—Afr. trop.
 penicillata, *Gilg*, l. c. 14.—Afr. trop.
 Perkinsiae, *Gilg*, l. c. 21.—Afr. trop.
 polyantha, *Gilg*, l. c. 16.—Afr. trop.
 pulcherrima, *Gilg*, l. c. 20.—Afr. trop.
 scabra, *Gilg*, l. c. 21.—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
 Trothae, *Gilg*, l. c. 19.—Afr. trop.
 violacea, *Gilg*, l. c. 22.—Afr. trop.
 Whytei, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.

DISTEGIA, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. (1896) 463.
COMPOSITAE.

acida, *Klatt*, l. c. (= *Didelta tomentosa*).—Austral.

DISTICHELLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 184. **LORANTHACEAE.**
 Danceri, *Van Tiegh.* l. c. 185.—Ind. occ.
 gracilis, *Van Tiegh.* l. c. (= *Dendrophthora gracilis*).—Ind. occ.

opuntoides, *Van Tiegh.* l. c. (= *Dendrophthora opuntoides*).—Ind. occ.

DISTICHLIS, Rafin. (Gramin.).

aracuana, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 162.—Chili.
 tenuifolia, *R. Phil.* l. c.—Chili.
 texana, *Scribn.* in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 286 (= *Poa texana*).—Am. bor.
 viridis, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 163.—Chili.

DISTICHOCALYX, T. Anders. (Acanth.).

angustifolius, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 61.—Afr. trop.
 brevifolius, *C. B. Clarke*, l. c. 62.—Afr. trop.
 capitellatus, *C. B. Clarke*, l. c. 61.—Afr. trop.
 grandifolius, *C. B. Clarke*, l. c.—Afr. trop.
 hirsutus, *C. B. Clarke*, l. c.—Afr. trop.
 laxiflorus, *Lindau*, in *Engl. Jahrb.* xx. 13 = *Acanthopale laxiflora*.
 polyneurus, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 61.—Afr. trop.
 strobilinus, *C. B. Clarke*, l. c.—Afr. trop.

DISTICTIS, Mart. (Bignon.).

cinerea, *Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 487 (= *Pithecoctenium cinereum*).—Mexic.
 crassa, *Bureau & K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* viii. 117 (= *Cremastus crassus*).—Bras.
 elongata, *Bureau & K. Schum.* l. c. 178 (= *Bignonia elongata*).—Am. austr.
 Glaziovii, *Bureau & K. Schum.* l. c. 180 (= *Pithecoctenium Glaziovii*).—Bras.
 granulosa, *Bureau & K. Schum.* l. c. 179 (= *P. granulosa*).—Guiana.
 guianensis, *Bureau & K. Schum.* l. c. 176 (= *P. guianense*).—Guiana.
 laxiflora, *Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 486 (= *P. laxiflorum*).—Mexic.
 racemosa, *Bureau & K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* viii. 117.—Am. austr.

DITASSA, R. Br. (Asclep.).

apiculata, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 21.—Bras.
 odorata, *K. Schum.* l. c.—Bras.
 racemosa, *Britton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 498.—Am. bor.
 refractifolia, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 22.—Bras.

DITAXIS, Vahl = *Argithamnia*, Sw. (Euphorb.).

laevis, *A. A. Heller*, Cat. N. Am. Pl. 5 = *A. laevis*.
 neomexicana, *A. A. Heller*, l. c. = *A. neomexicana*.
 pilosissima, *A. A. Heller*, l. c. = *A. pilosissima*.
 sericophylla, *A. A. Heller*, l. c. = *A. sericophylla*.
 serrata, *A. A. Heller*, l. c. = *A. serrata*.

DJERATONIA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* (1898) 37 = *Carpodinus*, R. Br. (Apocyn.).**DOBERA**, Juss. (Salvador.).

loranthifolia, *Ward.* ex *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 282.—Afr. trop.

DODECATHEON, Linn. (Primul.).

acuminatum, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 304.—Am. bor.
 cylindrocarpum, *Rydb.* l. c. 305.—Am. bor.

DODECATHEON—

puberulentum, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 311.—Am. bor.
 pubescens, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 306.—Am. bor.
 pulchrum, *Rydb.* l. c. 305.—Am. bor.
 salinum, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 131.—Am. bor.
 uniflorum, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 307.—Am. bor.

DODONAEA, Linn. (Sapind.).

Camfieldi, *Maiden & Betche*, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 150.—Austral.

DOELLINGERIA, Nees = *Aster*, Linn. (Compos.).

humilis, *Britton & A. Brown*, Fl. N. U. S. iii. 392.—Am. bor.
 infirma, *Greene*, *Pittonia*, iii. 52 = *A. infirmus*.
 reticulata, *Greene*, l. c. 53 = *A. reticulatus*.
 sericocaroides, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 620.—Am. bor.

DOLIANTHUS, C. H. Wright, in *Kew Bull.* 1899, 106. **LOGANIACEAE.**

vaccinioides, *C. H. Wright*, l. c.—N. Guin.

DOLICHOLOBIUM, A. Gray (Rubiace.).

acuminatum, *Burkill*, in *Hook. Ic. Pl. t.* 2630.—Ins. Solomon.
 Gertrudis, *K. Schum.* in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 553.—N. Guin.
 oxylobum, *K. Schum. & Lauterb.* l. c. 554.—N. Guin.

DOLICHOLUS, Medic. = *Rhynchosia*, Lour. (Legum.).

ambacensis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 270.—Afr. trop.
 americanus, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 111 = *R. menispermoidea*.
 angolensis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 266 = *R. congensis*.
 angustifolius, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 60 = *R. Senna*.
 Balansae, *Kuntze*, l. c. = *R. Balansae*.
 calycinus, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 267 = *R. congensis*.
 capensis, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 60 = *R. glandulosa*.
 caribaeus, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 267 = *R. caribaeus*.
 ciliatus, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 60 = *R. puberula*.
 cinereus, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 112 = *R. cinerea*.
 debilis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 269 = *R. debilis*.
 Drummondii, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 116 = *R. tomentosa*.
 erectus, *Vail*, l. c. 115.—Am. sept.

filicaulis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 268 = *R. filicaulis*.
 Hauthalii, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 60 = *R. Hauthalii*.
 hirsutus, *Kuntze*, l. c. 61 = *R. nervosa*.
 huillensis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 271.—Afr. trop.
 intermedium, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 115.—Am. sept.
 Kuntzei, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 61 = *R. Kuntzei*.
 laetissimus, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 268 = *R. latissima*.
 latifolius, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 61 = *R. Orthodanum*.
 latifolius, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 114 = *R. latifolia*.
 Lewtoni, *Vail*, l. c. 113.—Am. sept.

luteolus, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 269.—Afr. trop.
 melanostictus, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 62 = *R. melanostictus*.
 Memnonia, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 267 = *R. Memnonia*.

Michauxii, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 112 = *R. Michauxii*.
 mollissimus, *Vail*, l. c. 116.—Am. sept.

parvifolius, *Vail*, l. c. 108 = *R. parvifolia*.
 phaseolodes, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 62 = *R. phaseoloides*.
 procurrens, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 268.—Afr. trop.
 puberulus, *Hiern*, l. c. 272 = *R. puberula*.
 reticulatus, *Millsp.* in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 53 = *R. reticulatus*.

Schomburgkii, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 62 = *R. pallida*.
 Senna, *Kuntze*, l. c. = *R. Senna*.

simplicifolius, *Vail*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 114.—Am. sept.
 Swartzii, *Vail*, l. c. 108.—Ind. occ.; Am. trop.

texensis, *Vail*, l. c.—Am. bor. et austr.
 tomentosus, *Vail*, l. c. 112 = *R. tomentosa*.
 Torreyi, *Vail*, l. c. 113 = *R. Torreyi*.

totta, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 62 = *R. totta*.
 venulosus, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 271.—Afr. trop.
 violaceus, *Hiern*, l. c. 269.—Afr. trop.

viscidulus, *Hiern*, l. c. 272 = *R. viscidula*.

DOLICHOS, Linn. (Legum.).

Anchietae, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 265.—Afr. trop.
 Antunesii, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 318.—Afr. trop.
 Baummannii, *Harms*, l. c. 313.—Afr. trop.
 bongensis, *Taub.* ex *Harms*, l. c. 316.—Afr. trop.
 brachypus, *Harms*, l. c. 323.—Afr. trop.
 Buchananii, *Harms*, l. c. 318.—Afr. trop.
 cardiophyllus, *Harms*, l. c. xxviii. 410.—Afr. trop.
 fimbriatus, *Harms*, l. c. xxvi. 319.—Afr. trop.
 Fischeri, *Harms*, l. c. 317.—Afr. trop.
 Goetzei, *Harms*, l. c. xxviii. 411.—Afr. trop.
 longipes, *Buchw. ex Harms*, l. c. xxvi. 316.—Afr. trop.
 longistipellatus, *Harms*, l. c. 314.—Afr. trop.
 macrothyrus, *Harms*, l. c. 320.—Afr. trop.
 malosanus, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.
 nanus, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 411.—Afr. trop.
 paniculatus, *Hua*, in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 327.—Afr. trop.
 pseudopachyrhizus, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 320.—Afr. trop.
 reticulatus, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1897, 219.—Afr. austr.
 shuterioides, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.
 stenophyllus, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 314.—Afr. trop.
 tricostratus, *Baker f.* in *Journ. Bot.* 1899, 431.—Afr. trop.
 trinervatus, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 262.—Afr. trop.

DOLIOCARPUS, Roland. (Dillen.).

ferrugineus, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 3.—Bolivia.

DOLOSANTHUS, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 472 (1896). **COMPOSITAE.**

silvaticus, *Klatt*, l. c. 473.—Afr. trop.

DOMBEYA, Cav. (Stercul.).

alasca, *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 37.—Afr. trop.
 bracteopoda, *K. Schum.* l. c. 23.—Ins. Comor.
 calantha, *K. Schum.* l. c. 23.—Afr. trop.
 damarana, *K. Schum.* l. c. 36.—Afr. trop.
 Decus-silvae, *K. Schum.* l. c. 25.—Afr. austr.
 elegans, *K. Schum.* l. c. 31 (non *Cordem.*).—Afr. austr.
 Goetzenia, *K. Schum.* in *Goetzenia*, *Durch Afr.* repr. 5.—Afr. trop.
 gracilis, *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 30.—Afr. austr.
 huillensis, *K. Schum.* l. c. 35.—Afr. trop.
 Johnstonii, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 301.—Afr. trop.
 lasiostylis, *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 24.—Afr. trop.
 laxiflora, *K. Schum.* l. c. 37.—Afr. trop.
 Mupangae, *K. Schum.* l. c. 39.—Afr. trop.
 myriantha, *K. Schum.* in *Notiabl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 302.—Afr. trop.
 parvifolia, *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 30.—Afr. trop.
 platypoda, *K. Schum.* l. c. 29.—Afr. trop.
 polyphylla, *K. Schum.* l. c. 32.—Ins. Comor.
 runsorensis, *K. Schum.* l. c. 23.—Afr. trop.
 sparmannioides, *K. Schum.* l. c. 26.—Afr. trop.
 Stuhlmannii, *K. Schum.* in *Notiabl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 302.—Afr. trop.
 tanganyikensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 244.—Afr. trop.
 umbraclifera, *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 38.—Afr. trop.

DONACODES, Blume = *Amomum*, Linn. (Scitam.).

elongata, *Teijsm. & Binn.* Cat. Hort. Bogor. 380 = *A. elongatum*.

DONALDSONIA, Baker f. in *Journ. Bot.* 1896, 53. **PASSIFLORACEAE.**

stenopetala, *Baker f.* l. c.—Afr. trop.

DONDIA, Adans. = *Suaeda*, Forsk. (Chenopod.).

americana, *Britton*, in *Britton & A. Brown*, Fl. N. U. S. i. 584.—Am. bor.
 californica, *A. A. Heller*, Cat. N. Am. Pl. 3 = *S. californica*.
 conferta, *Small*, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 280.—Am. bor.
 depressa, *Britton*, in *Britton & A. Brown*, Fl. N. U. S. i. 585 = *S. depressa*.
 diffusa, *A. A. Heller*, Cat. N. Am. Pl. 3 = *S. diffusa*.
 intermedia, *A. A. Heller*, l. c. = *S. intermedia*.

DONDIA :—

linearis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 3 = *S. linearis*.
minutiflora, A. A. Heller, l. c. = *S. minutiflora*.
multiflora, A. A. Heller, l. c. = *S. torreyana*.
occidentalis, A. A. Heller, l. c. = *S. occidentalis*.
suffrutescens, A. A. Heller, l. c. = *S. suffrutescens*.

DONIOPHYTON, Wedd. (Compos.).

anomalum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 144 = *andicolum*.

DOPATRIUM, Buch.-Ham. (Scroph.).

luteum, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 498.—Afr. trop.
tricolor, Engl. l. c. 499.—Afr. trop.

DORONICUM, Tourn. (Compos.).

calcareum, Vierh. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1900, 112.—Eur.
latifolium, Bub. Fl. Pyren. ii. 181 = *D. Pardalianches*.

DORSTENIA, Plum. (Urtic.).

arabica, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2503.—Arab.
caudata, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 377.—Afr. trop.
crispa, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 27.—Afr. trop.
Debeerstii, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 75.—Afr. trop.
dionga, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 377.—Afr. trop.
foetida, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 120 = *obovata*.
frutescens, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 12.—Afr. trop.
gabunensis, Engl. l. c. 14.—Afr. trop.
Goetzei, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 378.—Afr. trop.
harmisiana, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 286, nomen.—Afr. trop.
intermedia, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 17.—Afr. trop.
Klainei, Heckel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. 260.—Afr. trop.
multiradiata, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 15.—Afr. trop.
mundamensis, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 286, nomen.—Afr. trop.
Phillipsiae, Hook. f. Bot. Mag. t. 7676.—Afr. trop.
ruahensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 377.—Afr. trop.
saxicola, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 22.—Madag.
Schlechteri, Engl. l. c. 23.—Afr. trop.
Staudtii, Engl. l. c. 13.—Afr. trop.
subtriangularis, Engl. l. c. 15.—Afr. trop.
variegata, Engl. l. c. 16.—Afr. trop.
variifolia, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 376.—Afr. trop.
Zenkeri, Engl. Monog. Afr. Pfl. i. 14.—Afr. trop.

DORTIGUEA, Bub. Fl. Pyren. i. 305 (1897) = **Erinus**,

Linn. (Scroph.).
alpestris, Bub. l. c. = *E. alpinus*.

DORTMANNA, Linn. = **Lobelia**, Linn. (Campan.).

bicalcarata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 186 = *L. bicalcarata*.
decurrentifolia, Kuntze, l. c. 187 = *L. decurrentifolia*.
lutea, Kuntze, l. c. = *L. lutea*.
stellarioides, Kuntze, l. c. 188 = *L. stellarioides*.
wanreenensis, Kuntze, l. c. = *L. wanreenensis*.

DOUGLASSIA, Lindl. (Primul.).

biflora, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 277.—Am. bor.

DOVEA, Kunth (Restiac.).

aggregata, Mast. in Dyer, Fl. Cap. vii. 101.—Afr. austr.
cylindrostachya, Mast. l. c. 100.—Afr. austr.
nitida, Mast. in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxvi. 6.—Afr. austr.
recta, Mast. in Dyer, Fl. Cap. vii. 101.—Afr. austr.
rigens, Mast. in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxvi. 7.—Afr. austr.

DRABA, Dill. (Crucif.).

alticola, Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb. xxvi. 103.—Turkestan.
Ameghii, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 491.—Patag.
andina, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 352.—Am. bor.
argentina, Speg. Contrib. Fl. Vent. 13.—Reg. Argent.
crassa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 182.—Am. bor.
deflexa, Greene, Pittonia, iv. 20.—Am. bor.
helleriana, Greene, l. c. 17.—Am. bor.
integrifolia, Greene, l. c. 201.—Am. bor.
lonchocarpa, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 181.—Am. bor.
longisiliqua, Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1898, 554.—Syria.
luteola, Greene, Pittonia, iv. 19.—Am. bor.

DRABA :—

melanopus, Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb. xxvi. Index.—Turkestan.
menalopus, Kom. l. c. 102, sphalm. = *melanopus*.
monantha, Gilg, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 4.—Patag.
neomexicana, Greene, Pittonia, iv. 18.—Am. bor.
oligosperma, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 593 = *spagazziniana*.
pallida, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 626.—Am. bor.
patens, A. A. Heller, l. c. 624.—Am. bor.
petrophila, Greene, Pittonia, iv. 17.—Am. bor.
physocarpa, Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb. xxvi. 102.—Turkestan.
pinetorum, Greene, Pittonia, iv. 18.—Am. bor.
praealta, Greene, l. c. iii. 306.—Am. bor.
rubricaulis, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 626.—Am. bor.
saximontana, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 264.—Am. bor.
spectabilis, Greene, Pittonia, iv. 19.—Am. bor.
spagazziniana, P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 177.—Reg. Magell.
surculifera, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 237.—Am. bor.
yellowstonensis, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 189.—Am. bor.

DRACAENA, Vand. (Liliac.).

acutissima, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x. 669.—Afr. trop.
breviflora, Ridley, in Journ. Bot. 1896, 165.—Malaya.
capitulifera, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 59.—Afr. trop.
cerasifera, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x. 663.—Afr. trop.
congolensis, Hua, l. c. 668.—Afr. trop.
elegans, Hua, l. c. 665.—Afr. trop.
Elliotii, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 449.—Afr. trop.
gabonica, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x. 669.—Afr. trop.
Hanningtoni, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 438.—Afr. trop.
hnerkiana, K. Koch, Wochenschr. iv. 394 = *arborea*.
Lecomtei, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x. 667.—Afr. trop.
mayumbensis, Hua, l. c.—Afr. trop.
nitens, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 252 = *reflexa*.
Ombet, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 47.—Afr. trop.
phanerophlebia, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 448.—Afr. trop.
siamica, Ridley, in Journ. Bot. 1896, 166.—Siam.
silvatica, Hua, in Bull. Soc. Nat. Hist. Autun, x. 665.—Afr. trop.
singaporensis, Ridley, in Journ. Bot. 1896, 166.—Malaya.
tholloniana, Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun, x. 662.—Afr. trop.
Thwaitesi, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. 144.—Zeylan.
ugandensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 445.—Afr. trop.
yuccaefolia, Ridley, in Journ. Bot. 1896, 168.—Siam.

DRACONTIUM, Linn. (Arac.).

Pittieri, Engl. in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 364.—Am. cent.
spinusum, Linn. Sp. Pl. 967 = *Lasia aculeata*.

DRACONTOMELON, Blume (Anacard.).

celebicum, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 410, nomen.—Celebes.
duperreanum, Pierre, Fl. Cochinch. t. 374 B.—Cochinch.
sinense, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2641.—As. trop.

DRACOPHYLLUM, Labill. (Epacrid.).

angustifolium, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxviii. 603.—N. Zel.
brachycladum, Colenso, l. c. xxxi. 275.—N. Zel.
brachyphyllum, Colenso, l. c. xxviii. 604.—N. Zel.
heterophyllum, Colenso, l. c. 605.—N. Zel.
pungens, Colenso, l. c. 602.—N. Zel.
varium, Colenso, l. c. 603.—N. Zel.
virgatum, Colenso, l. c. 605.—N. Zel.

DREGEA, E. Mey. (Asclep.).

pubescens, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 438 (= *Wattakaka pubescens*).—Java.

DREJERELLA, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 222

(1900). **ACANTHACEAE**.
mirabiloides, Lindau, l. c. (= *Beloperone lamarchiana*).—Ind. occ.
memorosa, Lindau, l. c. 223 (= *Adhatoda tetramera*).—Ind. occ.
origanoides, Lindau, l. c. 225 (= *Adhatoda origanoides*).—Ind. occ.

DREPANOCARPUS, G. F. W. Mey. (Legum.).

cuyabensis, Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxv. no. 11, 18.—Bras.

DRIMIA, Jacq. (Liliac.).

angustifolia, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 440.—Afr. austr.
Bolusii, Baker, l. c. 443.—Afr. austr.
brevifolia, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 527.—Afr. trop.
capitata, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 442.—Afr. austr.
chlorantha, Baker, l. c. 443.—Afr. austr.
Coleae, Baker, in Bot. Mag. t. 7565.—Afr. trop.
Fischeri, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 526.—Afr. trop.
neriniformis, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 442.—Afr. austr.
sphaerocephala, Baker, l. c. 441.—Afr. austr.
zombensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 525.—Afr. trop.

DRIMIOPSIS, Lindl. & Paxt. (Liliac.).

humifusa, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 474.—Afr. austr.
maxima, Baker, l. c.—Afr. austr.
Saundersiae, Baker, l. c.—Afr. austr.
Stuhlmanni, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 544.—Afr. trop.
Volkensii, Baker, l. c.—Afr. trop.
Woodii, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 473.—Afr. austr.

DRIMYS, Forst. (Magnol.).

Traversii, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxx. 379.—N. Zel.

DROQUETIA, Gaudich. (Urtic.).

iners, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 146 (= *Urtica iners*).—Hab.?

DROSERA, Linn. (Droserac.).

atra, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 269.—N. Zel.
ligulata, Colenso, l. c.—N. Zel.
ruahinensis, Colenso, l. c. xxviii. 593.—N. Zel.
stylosa, Colenso, l. c.—N. Zel.

DRUDEOPHYTUM, Coult. & Rose, in U. S. Dept.

Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 80. **UMBELLIFERAE**.
glancom, Coult. & Rose, l. c. 82 (= *Velaea glauca*).—Am. bor.
Hartwegi, Coult. & Rose, l. c. 81 (= *Arracacia Hartwegi*).—Am. bor.
Howellii, Coult. & Rose, l. c. 82 (= *Velaea Howellii*).—Am. bor.
Kelloggii, Coult. & Rose, l. c. 81 (= *Arracacia Kelloggii*).—Am. bor.
Parishii, Coult. & Rose, l. c. 82 (= *Velaea Parishii*).—Am. bor.
vestitum, Coult. & Rose, l. c. 83 (= *Arracacia vestita*).—Am. bor.

DRUSA, DC. = **Bowlesia**, Ruiz & Pav. (Umbellif.).

acutangula, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 126 = *B. acutangula*.

DRYAS, Linn. (Rosac.).

montana, Bub. Fl. Pyren. ii. 633 = *octopetala*.

DRYMARIA, Willd. (Caryoph.).

gracillima, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 132.—Mexic.
confusa, Rose, l. c. 133.—Mexic.
rotundifolia, Hariot, in Journ. de Bot. 1900, 150 (= *Stellaria rotundifolia*, Poir.).—Reg. Magell.
Townsendii, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 58.—Mexic.

DRYMOCALLIS, Fourr. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

arguta, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 192 = *P. arguta*.
ashlandica, Rydb. l. c. 200 = *P. ashlandica*.
convallaria, Rydb. l. c. 193 = *P. convallaria*.
cuneifolia, Rydb. l. c. 204.—Am. bor.
fissa, Rydb. l. c. 197 = *P. fissa*.
glabrata, Rydb. l. c. 201.—Am. bor.
glandulosa, Rydb. l. c. 198 = *P. glandulosa*.

DRYMOCALLIS:—

- glutinosa*, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 196 = *P. glutinosa*.
Hanseni, Rydb. l. c. 200 = *P. Hanseni*.
pseudorupestris, Rydb. l. c. 194 = *P. pseudorupestris*.
reflexa, Rydb. l. c. 203 = *P. reflexa*.
rhomboidea, Rydb. l. c. = *P. rhomboidea*.
wrangelliana, Rydb. l. c. 201 = *P. wrangelliana*.

DRYMONIA, Mart. (Gesnerac.).

- lindmaniana*, Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 5, 16.—Bras.

DRYMOPHLOEUS, Zipp. (Palmae).

- mambare*, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 202.—Austral.
montanus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 207.—N. Guin.
Reinecke, Warb. in Engl. Jahrb. xxv. 590.—Ins. Samoa.
Schumannii, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 207 (= *Actinophloeus Schumannii*).—N. Guin.

DRYPETES, Vahl (Euphorb.).

- Picardae, Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 334.—Ind. occ.

DUGALDIA, Cass. = *Helenium*, Linn. (Compos.).

- Hoopesii*, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 425 = *H. Hoopesii*.

DUGUETIA, A. St. Hil. (Anonac.).

- lucida*, Urb. Symb. Antill. i. 308.—Ind. occ.

DUNBARIA, Wight & Arn. (Legum.).

- bella*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 484.—Ind. or.
discolor, Harms & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 369.—N. Guin.
glandulosa, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 433 (= *Atylosia glandulosa*).—Ind. or.
Scortechinii, Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 44.—Penins. Mal.

DUPATYA, Vell. = *Paepalanthus*, Mart. (Eriocaul.).

- albida*, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 329 = *P. albida*.

DURANDIA, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. (1896)

160. CYPERACEAE.
macrophylla, Boeck. l. c. 173.—Am. cent.

DURANTA, Linn. (Verben.).

- Benthami*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 343.—Bolivia.
serratifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 251 = *Lorenzii*.
Sprucei, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 344.—Ecuador.

DUSENIA, O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed.

- Exp. Magell. iii. v. (1900) 246. COMPOSITAE.
patagonica, O. Hoffm. l. c. 247.—Patag.

DUVERNOYA, E. Mey. = *Adhatoda*, Nees (Acanth.).

- Buchholzii*, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 43 = *A. maculata*.
Dewevrei, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxviii. 102 = *Justicia extensa*.
extensa, Lindau, in Engl. Pf. Ost-Afr. C. 372 = *Justicia extensa*.
haplostachya, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 324.—Afr. trop.
orbicularis, Lindau, l. c. xxii. 123 = *A. orbicularis*.
paniculata, Lindau, l. c. xx. 43 = *Justicia laxa*.
pumila, Lindau, l. c. 44 = *Peristrophe usta*.
pyramidata, Lindau, l. c. xxii. 124 = *Justicia pyramidata*.
salviiflora, Lindau, l. c. xx. 42 = *Justicia salviiflora*.
somalensis, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 81 = *Justicia grisea*.
speciosa, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 129 = *Justicia Rendlei*.
stachytarphetoides, Lindau, in Engl. Pf. Ost-Afr. C. 372 = *Justicia stachytarphetoides*.
Stuhlmannii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 43 = *Justicia extensa*.

DYCKIA, Schult. f. (Bromel.).

- boliviana*, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 524.—Bolivia.
conspicua, Mez, l. c. 513.—Parag.
elata, Mez, l. c. 508.—Bras.
elongata, Mez, l. c. 529.—Bras.
encholirioides, Mez, l. c. 507 = *catharinensis*.
ferox, Mez, l. c. 511.—Parag.
ferruginea, Mez, l. c. 533.—Bras.
gracilis, Mez, l. c. 516.—Bolivia.

DYCKIA:—

- hilaireana*, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 530.—Bras.
kuntzeana, Mez, l. c. 523.—Bras.
meziana, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 302.—Bolivia.
pedicellata, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 515.—Bras.
saxatilis, Mez, l. c. 518.—Bras.
sellowiana, Mez, l. c. 520.—Bras.
tomentosa, Mez, l. c. 515.—Bras.
uleana, Mez, l. c. 517.—Bras.

DYSCHORISTE, Nees (Acanth.).

- capricornis*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 76.—Afr. trop.
cunenensis, C. B. Clarke, l. c. 74.—Afr. trop.
depressa, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 81.—Ind. or.; Afr. trop.

Hildebrandtii, Lindau, ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 74 = *nobilior*.*kilimandscharica*, Lindau, in Engl. Pf. Ost-Afr. C. 367 = *Disperma kilimandscharica*.*linifolia*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 76.—Afr. trop.

- mollis*, C. B. Clarke, l. c. 77.—Afr. trop.
mutica, C. B. Clarke, l. c. 73.—Afr. trop.
nobilior, C. B. Clarke, l. c. 74.—Afr. trop.
nudanthera, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
pedicellata, C. B. Clarke, l. c. 75.—Afr. trop.
radicans, Nees, in DC. Proc. xi. 106.—Afr. trop.
saltuensis, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 92.—Mexic.

somalensis, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 413 = *Phillipsia fruticulosa*.*subquadrangularis*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 79.—Afr. trop.*tanganyikensis*, C. B. Clarke, l. c. 77.—Afr. trop.*tenera*, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 116 = *Hemigraphis tenera*.*tubicalyx*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 74.—Afr. trop.*verticillaris*, C. B. Clarke, l. c. 75.—Afr. trop.*Volkensii*, C. B. Clarke, l. c. 77.—Afr. trop.

DYSODIA, Cav. (Compos.).

- Seleri*, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxv. 314.—Mexic.

DYSOLOBIUM, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi.

- (1897) 425. LEGUMINOSAE.
dolichoides, Prain, l. c. 427 (= *Vigna dolichoides*).—Ind. or. et Malaya.
grande, Prain, l. c. (= *Phaseolus velutinus*).—Ind. or.
luccens, Prain, l. c. (= *Vigna luccens*).—Ind. or.
tetragonum, Prain, l. c.—Ind. or.

DYSOPHYLLA, Blume (Labiata).

- yatabeana*, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898, 55.—Japon.

DYSOXYLUM, Blume (Meliac.).

- alatum*, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 381.—N. Guin.
Bamleri, Harms, l. c. 380.—N. Guin.
biloculare, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 95.—Java.
cerebriforme, F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl. xiv. 7.—Austral.
cochinchinense, Pierre, Fl. Cochinch. t. 350 A.—Cochinch.
Hasseltii, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 64.—Java.
harmandianum, Pierre, Fl. Cochinch. t. 345 B.—Cochinch.
insulare, Pierre, l. c. 347 B.—Cochinch.
leschenaultianum, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 94.—Java.
Loureiiri, Pierre, Fl. Cochinch. t. 352 A = *Epicharis Loureiiri*.
Maota, Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 643.—Ins. Samoa.
perryanum, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 352.—Cochinch.
purpureum, Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xii. 349.—Ind. or.
reticulatum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 114.—Reg. Himal.
rubrocostatum, Pierre, Fl. Cochinch. t. 348 A.—Cochinch.
tpongense, Pierre, l. c. t. 349 B.—Cochinch.
translucidum, Pierre, l. c. 350 B.—Cochinch.
urens, Valet. in Ic. Bogor. t. 12 (= *Didymocheton urens*).—Malaya.
velutinum, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 388, 636.—Celebes.

E

ECBOLIUM, Kurz (Acanth.).

- Anisacanthus*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 238.—Afr. trop.
auriculatum, C. B. Clarke, l. c. 237.—Afr. trop.
Clarkei, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 1032.—Afr. trop.
hamatum, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 239.—Afr. trop.
parvibracteatum, Rendle, in Journ. Bot. 1897, 379.—Afr. austr.
revolutum, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 239.—Afr. trop.
subcordatum, C. B. Clarke, l. c. 237.—Afr. trop.
trinervium, C. B. Clarke, l. c. 239.—Afr. trop.

ECBOLIUM, Riv. = *Justicia*, Linn. (Acanth.).

- chapidense*, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 248.—Bras.
Kuntzei, Kuntze, l. c. = *J. Kuntzei*.
lindavianum, Kuntze, l. c. = *Dianthera hookeriana*.
lorentzianum, Kuntze, l. c. = *J. campestris*.
minimiflorum, Kuntze, l. c. = *J. parviflora*.
oreadum, Kuntze, l. c. = *J. oreadum*.
velascanum, Kuntze, l. c. = *J. velascana*.
xylosteodes, Kuntze, l. c. = *J. xylosteoides*.

ECCOILOPUS, Steud. = *Spodiopogon*, Trin. (Gramin.).

- andropogonoides*, Steud. Syn. Pl. Gram. 124 = *S. cotulifer*.

ECCREMOCARPUS, Ruiz & Pav. (Bignon.).

- lobbianus*, Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xii. 103.—Bolivia.

EODYSANTHERA, Hook. & Arn. (Apocyn.).

- myrtifolia*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 398 (= *Dendrocharis myrtifolia*).—Malaya.
rubescens, Boerl. l. c. (= *Dendrocharis rubescens*).—Malaya.

ECHEVERIA, DC. = *Otyledon*, Linn. (Crassul.).

- Purpusi*, K. Schum. in Wittm. Gartenfl. 1896, 608.—Calif.
velutina, Lem. Pl. Grasses, 46.—Hort.

ECHIDNOPSIS, Hook. f. (Asclep.).

- Golathi*, Schweinf. ex Defters, in Mem. Inst. Egypt, iii. 267 (= *Boucerosia penicellata*).—Afr. trop.
quadrangula, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliiii. 113 (= *Stapelia quadrangula*).—Arab.

ECHINOCACTUS, Link & Otto (Cactac.).

- ambiguus*, Hildm. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 311.—Am. austr.
Anisitsii, K. Schum. in Blühende Kakt. t. 3.—Parag.
chilensis, Hildm. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 423.—Chili.
chrysacanthion, K. Schum. l. c. 396.—Am. austr.
clavatus, Soehrens, in Monatsschr. Kakt. x. 27.—Chili.
Coxii, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 422.—Patag.
durangensis, Runge, ex K. Schum. l. c. 449.—Mexic.
erectocentrus, Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 376.—Am. bor.
Geissei, Pos. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 406.—Am. austr.
glaucus, K. Schum. l. c. 498.—Am. sept.
Hartmannii, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. x. 170.—Parag.
intertextus, Phil. in Linnaea, xxxiii. 81 = *Coxii*.
Krausei, Hildm. ex Mathss. in Monatsschr. Kakt. 1897, 107.—Am. sept.
Leninghausii, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1900, 134.—Hort.
limitus, Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 374.—Am. bor.
megalothelos, Sencke, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 415.—Parag.
microspermus, Weber, in Bois, Dict. Hort. 469.—Reg. Argent.
minusculus, Weber, l. c. 467 = *Rebutia minuscula*.
Nidus, Soehrens, in Monatsschr. Kakt. x. 122.—Chili.
nigricans, Dietr. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 420.—Hab.?
nigrispinus, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1899, 45.—Parag.
pampeanus, Speg. Contrib. Fl. Vent. 27.—Reg. Argent.
Peninsulæ, Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. 361.—Calif.
Philippii, K. Schum. Gesamtb. Kakt. i. 427 (= *Cereus Philippii*).—Chili.
platensis, Speg. Contrib. Fl. Vent. 28.—Reg. Argent.

ECHINOCACTUS :—

schilinzkyanus, Haage, ex K. Schum. in *Monatsschr. Kakt.* 1897, 108.—Parag.
Sileri, Engelm. ex Coult. in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 376.—Am. bor.
tabularis, Cels. ex K. Schum. *Gesamt. Kakt.* i. 389.—Am. austr.

ECHINOCEREUS, Engelm. = *Cereus*, Haw. (Cact.).
Hempelii, F. Fobe, in *Monatsschr. Kakt.* 1897, 187.—Mexic.

leptacanthus, K. Schum. *Gesamt. Kakt.* i. 260 = *C. pentalophus*.
maritimus, K. Schum. l. c. 273 = *C. maritimus*.
Merkeri, Hildm. ex K. Schum. l. c. 277.—Mexic.
salmianus, Hort. ex K. Schum. l. c. 255 = *C. salmdyckianus*.
undulatus, Hildm. ex K. Schum. l. c. 261 = *C. glyci-morphus*.

ECHINOCHELOA, Beauv. = *Panicum*, Linn. (Gramin.).
dubia, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 479 = *P. Crus-galli*.
hirtella, Schult. *Mant.* ii. 269 = *Oplismenus Burmannii*.
scabra, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 479 = *P. stagninum*.
squarrosa, Roem. & Schult. l. c. = *Chamaeraphis spinescens*.
stagnina, Beauv. *Agrost.* 161 = *P. stagninum*.

ECHINOCYSTIS, Torr. & Gray (Cucurb.).
horrida, *Congd.* in *Erythea*, vii. 184.—Am. bor.

ECHINODORUS, Rich. (Alismac.).
Schinzii, Buchenau, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 413 = *Rautanenia Schinzii*.

ECHINOPEPON, Naud. = *Echinocystis*, Torr. (Cucurb.).
confusus, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 115.—Am. bor.
Coulteri, Rose, l. c. 116 = *E. Coulteri*.
floribundus, Rose, l. c. = *E. floribunda*.
jaliscanus, Rose, l. c. 117.—Mexic.
lanatus, Rose, l. c. = *E. lanata*.
longispina, Rose, l. c. = *E. longispina*.
Nelsoni, Rose, l. c.—Mexic.
parvifolius, Rose, l. c. 118.—Mexic.
Pringlei, Rose, l. c. 117.—Mexic.
pubescens, Rose, l. c. 118 = *E. pubescens*.
torquatus, Rose, l. c. = *E. torquatus*.
Wrightii, S. Wats. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1887, 158 = *E. Wrightii*.

ECHINOPS, Linn. (Compos.).
bromeliaefolius, Baker, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2514.—Afr. trop.
foliosus, *Sommier & Levier*, in *Act. Hort. Petrop.* xvi. 248.—Reg. Caucas.
leptymnicus, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 145.—Lesbos.
Philiae, *Candargy*, l. c.—Lesbos.
Stuedneri, O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 476.—Afr. trop.

ECHINOPSIS, Zucc. = *Cereus*, Haw. (Cact.).
catamarcensis, Web. in *Bois, Dict. Hort.* i. 471.—Reg. Argent.
Ducis-Pauli, Foerst. *Handb. Cact.* ed. II. 641.—Am. austr.
rhodotricha, K. Schum. in *Monatsschr. Kakt.* 1900, 147.—Parag.
Schickendantzii, Web. in *Bois, Dict. Hort.* i. 473 = *C. Schickendantzii*.

ECHINOSPERMUM, Sw. (Borag.).
Skorpili, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 206.—Eur.

ECHITES, P. Br. (Apocyn.).
assimilis, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. 724.—Ecuador.
peduncularis, Stadelm. in *Flora*, 1841, t. Beibl. 54 = *Dipladenia pastorum*.
tenuifolia, Mikan, *Del. Fl. et Faun. Bras.* t. 14 = *Dipladenia pastorum*.

ECHIUM, Tourn. (Borag.).
maroccanum, *Murb.* in *Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II. no. 7. (1898) 12.—Afr. bor.

ECKLONEA, Steud. (Cyperac.).
solitaria, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 759.—Afr. austr.

VOL. III.

ECPOMA, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. (1896) 430. **RUBIACEAE.**
apocynaceum, K. Schum. l. c.—Afr. trop.

ECTADIOPSIS, Benth. (Asclep.).
suffruticosa, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 453.—Afr. trop.

ECTEINANTHUS, T. Anders. = *Isoglossa*, Oerst. (Acanth.).
grandiflorus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 233 = *I. grandiflora*.

EDWINIA, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 477. **SAXIFRAGACEAE.**
americana, A. A. Heller, l. c. (= *Jamesia americana*).—Am. bor.
Wrightii, A. A. Heller, l. c. 478.—Am. bor.

EENIA, Hiern & S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 373. **COMPOSITAE.**
damarensis, *Hiern & S. Moore*, l. c.—Afr. trop.

EFULENSIA, C. H. Wright, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2518 (1899). **PASSIFLORACEAE.**
clematoides, C. H. Wright, l. c.—Afr. trop.

EHRETIA, Linn. (Borag.).
Bakeri, *Britten*, in *Journ. Bot.* 1895, 88.—Afr. trop.
coerulea, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 312.—Afr. trop.
corylifolia, C. H. Wright, in *Kew Bull.* 1896, 25.—China.
Goetzei, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 311.—Afr. trop.
longistyla, *Wildem. & Th. Dur.* in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 43.—Afr. trop.
macrophylla, Baker, in *Kew Bull.* 1894, 29 = *Bakeri*.
rosea, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 461.—Afr. trop.
scrobiculata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 716.—Afr. trop.
tetrandra, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 311.—Afr. trop.
uhemensis, *Guerke*, l. c. 462.—Afr. trop.

EHRHARTA, Thunb. (Gramin.).
aemula, Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* iii. 2077 = *bulbosa*.
avenacea, Willd. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1378 = *longiflora*.
capensis, *Thunb.* in *Vet.-Acad. Handl. Stockh.* 1779, 218.—Afr. austr.
cartilaginea, Sm. *Pl. Ic. Ined.* sub t. 33 = *capensis*.
delicatula, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 238.—Afr. austr.
Dodii, *Stapf*, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 670.—Afr. austr.
eckloniana, Schrad. in *Schult. f. Syst.* vii. 1376 = *longiflora*.
erecta, *Lam. Encyc.* ii. 347.—Afr. austr.
Mnemeiteia, Linn. f. *Suppl.* 209 = *capensis*.
nutans, *Lam. Encyc.* ii. 346 = *capensis*.
panicosa, Sm. *Pl. Ic. Ined.* t. 9 = *erecta*.
paniciformis, Nees, ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. v. 64 = *erecta*.
Rehmannii, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 238.—Afr. austr.
Schlechteri, *Rendle*, in *Journ. Bot.* 1899, 380.—Afr. austr.
subpicata, *Stapf*, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 676.—Afr. austr.
tricostata, *Stapf*, l. c. 669.—Afr. austr.
varicosa, Nees, ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. v. 65 = *longifolia*.
versicolor, Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* iii. 2078 = *calycina*.

EICHLERODENDRON, Briq. in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ii. (1898) 77. **BIXACEAE.**
calophyllum, Briq. l. c. (= *Xylosma calophyllum*).—Bras.

EKEBERGIA, Sparrm. (Meliac.).
arborea, *Baker f.* in *Journ. Bot.* 1899, 427.—Afr. trop.
Buchananii, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 164.—Afr. trop.
sclerophylla, *Harms*, l. c. xxviii. 415.—Afr. trop.

ELACHANTHUS, F. Muell. (Compos.).
occidentalis, S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 196.—Austral.

ELACHOLOMA, F. Muell. & Tate, in *Vict. Nat.* xii. (1895) 14; et ex Tate, in *Rep. Horn Exped.* iii. (1896) 190. **SCROPHULARIACEAE.**
Horni, F. Muell. & Tate, l. c.—Austral.

ELAEAGNUS, Tourn. (Elaeagn.).
Bockii, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 482.—China.
Henryi, *Warb.* ex *Diels*, l. c. 483.—China.
lanceolata, *Warb.* l. c.—China.

ELAEOCARPUS, Burm. (Tiliac.).
Bauerleni, *Maiden & R. T. Baker*, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, x. 469.—Austral.

ELAEOCARPUS :—

celebicus, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 366, 641.—Celebes.
fauroensis, *Hemsl.* in *Kew Bull.* 1896, 159.—Ins. Solomon.
floridanus, *Hemsl.* l. c. 158.—Ins. Solomon.
hainanensis, *Oliver*, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2462.—China.
rarotongensis, *Hemsl.* in *Kew Bull.* 1896, 159.—Ins. Cook.
Teysmannii, *Koord. & Valet.* ex *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 368, nomen.—Celebes.

ELAEODENDRON, Jacq. f. (Celastr.).
Azelii, *Loes.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 157.—Afr. trop.
Buchananii, *Loes.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 223 (= *Cassine Buchananii*).—Afr. trop.
lacinulatum, *Loes.* l. c. (= *C. lacinulata*).—Afr. trop.
schlechterianum, *Loes.* l. c. (= *C. schlechteriana*).—Afr. trop.
schweinfurthianum, *Loes.* l. c. (= *C. schweinfurthiana*).—Afr. trop.

Stuhlmannii, *Loes.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 156.—Afr. trop.
subrotundum, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 356.—Penins. Mal.

ELATINE, Linn. (Elatin.).
orientalis, *Makino*, in *Bot. Mag. Tokyo*, xii. (196)—Japon.
rubella, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 260.—Am. bor.
Williamsii, *Rydb.* l. c.—Am. bor.

ELATOSTEMA, Forst. (Urtic.).
ambiguum, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia ambigua*).—Ind. or.
angustifolium, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 621.—Ins. Samoa.
australe, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia australis*).—Ind. occ.
basiantrum, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 622.—Ins. Samoa.
bicuspidatum, *Hallier f.* in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 352.—Java.
brachyurum, *Hallier f.* ex *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 595, nomen.—Celebes.
brevifolium, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia brevifolia*).—China.
burmanicum, *Hallier f.* l. c. (= *Pellionia burmanica*).—Ind. or.
caudatum, *Hallier f.* l. c. 307.—Malaya.
Engleri, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 623.—Ins. Samoa.
falcatum, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 305.—Borneo.
Funkii, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 623.—Ins. Samoa.
Graeffei, *Reinecke*, l. c. 621.—Ins. Samoa.
grandifolium, *Reinecke*, l. c. 620.—Ins. Samoa.
griffithianum, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia griffithiana*).—Ind. or.
helferianum, *Hallier f.* l. c. (= *Pellionia helferiana*).—Ind. or.
heterolobum, *Hallier f.* l. c. (= *Pellionia heteroloba*).—Ind. or.
heyneanum, *Hallier f.* l. c. (= *Pellionia heyneana*).—Ind. or.
insigne, *Hallier f.* l. c. 304.—Malaya.
javanicum, *Hallier f.* l. c. 316 (= *Pellionia javanica*).—Malaya.
Kraemeri, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 621.—Ins. Samoa.
lignescens, *Hallier f.* ex *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 595, nomen.—Celebes.
machaerophyllum, *Hallier f.* in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 355.—Sumatra.
mesargyreum, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 305.—Borneo.
obliquifolium, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 622.—Ins. Samoa.
Paxii, *Reinecke*, l. c.—Ins. Samoa.
pictum, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 300.—Malaya.
pollioneurum, *Hallier f.* ex *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 595, nomen.—Celebes.
puberulum, *Hallier f.* l. c. nomen.—Celebes.
pulchrum, *Hallier f.* in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 316 (= *Pellionia pulchra*).—Cochinch.
radicans, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 624 (non *Wedd.*).—Ins. Samoa.
ramosissimum, *Reinecke*, l. c.—Ins. Samoa.

K

ELATOSTEMA :—

- repens, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitens.* xiii. 316 (= *Polychroa repens*).—Cochinch.
 robustum, *Hallier f. l. c.* 302.—Malaya.
 samoense, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 625.—Ins. Samoa.
 scabrum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitens.* xiii. 316 (= *Pellionia scabra*).—China.
 scandens, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 353.—Java.
 stenocarpum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitens.* xiii. 316 (= *Pellionia stenocarpa*).—Ind. or.
 strictum, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 625.—Ins. Samoa.
 vittatum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitens.* xiii. 303.—Borneo.

ELECTRA, Panz. = **Schismus**, Beauv. (Gramin.).
calycina, Panz. in *Denkschr. Acad. Muench.* iv. 299 = *S. fasciculatus*.

ELEGIA, Linn. (Restiac.).

- ciliata*, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxxvi. 8.—Hab. ?
elongata, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 114.—Afr. austr.
exilis, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxxvi. 7.—Afr. austr.
fastigata, *Mast. l. c.*—Afr. austr.
fusca, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 754.—Afr. austr.
Galpinii, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.
gracilis, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.
membranacea, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 474.—Afr. austr.
obtusiflora, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 112.—Afr. austr.
persistens, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxxvi. 8.—Afr. austr.
Rehmannii, *Mast. l. c.* 7.—Afr. austr.
thyrsifera, *Pers. Syn.* ii. 607.—Afr. austr.

ELEOCHARIS, R. Br. (Cyperac.).

- aciculariformis*, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 566.—Mexic.
alta, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 17.—Java.
ambigua, *Urb. Symb. Antill.* ii. 166 = *subtilis*.
Arechavaletae, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 14.—Urug.
aurea, *Boeck. l. c.* 15.—Mexic.
bahamensis, *Boeck. l. c.* ii. 11.—Ins. Baham.
Berlandieri, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 162.—Ind. occ.
brasilensis, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 13.—Bras.
brehmeriana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 83.—Bolivia.
caduca, *Aschers, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 597 = *capitata*.
campotracha, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 69.—Ind. occ.; Am. sept.
Chaetaria, *Hance, in Journ. Bot.* 1878, 112 = *acicularis*.
costaricensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 84.—Am. cent.
crispovaginata, *Boeck. in Engl. Jahrb.* viii. 206.—Ecuador.
cubensis, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 10.—Cuba.
Durandii, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 84.—Reg. Argent.
dussiana, *Boeck. l. c.* 54.—Ind. occ.
exilis, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 16.—Mexic.
faccida, *Urb. Symb. Antill.* ii. 165 = *ochreatea*.
gableana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 54.—Ind. or.
gahleana, *Auct. in Just, Jahresb.* xxiv. II. 370, sphalm. = *praec.*
gableana, *Auct. l. c.* sphalm. = *gableana*.
glauco-virens, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 13.—Bras.
hyalino-vaginata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 52.—Chili.
Kuntzei, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 14 = *afflata*.
lanceolata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 493.—Am. bor.
lehmanniana, *Boeck. in Engl. Jahrb.* viii. 205.—Ecuador.
lepida, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 349.—Chili.
Lepta, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 758.—Afr. austr.
leptocaulos, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 349.—Chili.
leptostachys, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9. 13.—Bras.
loefgreniana, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 12.—Bras.
Macounii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 497.—Am. bor.

ELEOCHARIS :—

- Mendoncae*, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 12.—Bras.
mesopotamica, *Boeck. l. c.* i. 17.—Reg. Argent.
Minarum, *Boeck. l. c.* ii. 12.—Bras.
minutiflora, *Boeck. in Engl. Jahrb.* vii. 274.—Ind. occ.
monticola, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 496.—Am. bor.
Niederleini, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 13.—Reg. Argent.
oligantha, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 69.—Ind. occ.
pachystyla, *C. B. Clarke, l. c.* 72.—Ind. occ.; Am. trop.
paracicularis, *Boeck. in Engl. Jahrb.* vii. 275, in obs. = *Scirpus paracicularis*.
parvula, *Palla, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 215 = *Scirpus nanus*.
pellucida, *Presl, Rel. Haenk.* i. 196 = *afflata*.
Pittieri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 35.—Am. cent.
punctata, *Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. 464.—Am. cent.
purpureo-vaginata, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 84.—Reg. Argent.
quingularis, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 15.—Reg. Argent.
Reichel, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 54.—Chili.
retroflexa, *Urb. Symb. Antill.* ii. 165 = *E. Chaetaria*.
Schaffneri, *Boeck. in Engl. Jahrb.* vii. 274.—Mexic.
Schenckii, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. 13.—Bras.
Schlechteri, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 758.—Afr. austr.
Sintenisii, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 16.—Ind. occ.
squamata, *Boeck. l. c.* ii. 11.—Bras.
striata, *Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 149 = *palustris*.
thermalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 69.—Am. bor.
Tuerkheimii, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 16.—Am. cent.
univaginata, *Boeck. l. c.* 14.—Chili.
Urbani, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 20.—Bras.
vincentina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 348.—Chili.
viridis, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 17.—Bras.
Vulcani, *Boeck. in Engl. Jahrb.* viii. 206.—N. Granat.
wrightiana, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 12.—Ind. occ.
Wrightii, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 69 = *oligantha*.

ELEOGITON, Link = **Scirpus**, Linn. (Cyperac.).

fascicularis, *Nees, in Linnaea*, x. 165 = *S. fluitans*.

ELEPHANTELLA, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. (1900) 362. **SCROPHULARIACEAE**.
groenlandica, *Rydb. l. c.* 363 (= *Pedicularis groenlandica*).—Am. bor.

ELEPHANTOPUS, Linn. (Compos.).

- multisetus*, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 31.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 540.—Afr. trop.

ELEPHANTORRHIZA, Benth. (Legum.).

suffruticosa, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 117.—Afr. trop.

ELETTARIA, Maton (Scitamin.).

hemisphaerica, *Blume, Enum. Pl. Jav.* 51 = *Amomum hemisphaericum*.

ELETTARIOPSIS, Baker (Scitamin.).

- latifolia*, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 154.—Penins. Mal.
multiflora, *Ridley, l. c.* 157.—Sumatra.
pubescens, *Ridley, l. c.* 155 (= *Amomum eletarioides*).—Penins. Mal.

ELEUSINE, Gaertn. (Gramin.).

- blepharoglumis*, *Ind. Kew. Suppl.* i. 151, errore = *Eragrostis blepharoglumis*.
brevifolia, *R. Br. in Wall. Cat. n.* 3815.—Ind. or.
calycina, *Roxb. Fl. Ind.* i. 347 = *Dinebra arabica*.
cerealis, *Salisb. Prod.* 19 = *indica*.
coracana, *Gaertn. Fruct.* i. 8 = *indica*.
dura, *Lam. Illustr.* i. 203 = *Sclerochloa dura*.
falcata, *Spreng. Syst.* i. 349 = *Harpechloa capensis*.
glaucohylla, *Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. 107 = *aristata*.
Robecchii, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 171.—Afr. trop.

ELEUSINE :—

- somalensis*, *Hack. in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 6.—Afr. trop.
sphaerosperma, *Stokes, Bot. Mat. Med.* i. 149 = *indica*.
stolonifera, *R. Br. in Salt, Abyss. App.* 63 = *flagellifera*.
stricta, *Roxb. Fl. Ind.* i. 344 = *indica*.
Tocussa, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. 141 = *indica*.
Wallichii, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 295 = *brevifolia*.

ELIAEA, Cambess. (Hyperic.).

brevistyla, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1219.—Madag.

ELIONURUS, Humb. & Bonpl. (Gramin.).

- Hensii*, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 326.—Afr. trop.
muticus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 350 (= *Lycurus muticus*).—Am. austr.
pallidus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 326.—Afr. trop.
papuanus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 171.—N. Guin.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 137.—Afr. trop.

ELLIPANTHUS, Hook. f. (Connar.).

- Beccarii*, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 378.—Cochinch.
cinereus, *Pierre, l. c.* t. 378 C.—Cochinch.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 9.—Malaya.
gibbosus, *King, l. c.* 10.—Penins. Mal.
Kingii, *Boerl. & Koord. in Ic. Bogor.* t. 18.—Java.
Scortechini, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 8.—Penins. Mal.
subrufus, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 378 D.—Cochinch.

ELSHOLTZIA, Willd. (Labiata.).

- aquatica*, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 451.—Afr. trop.
barbinervia, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 104 = *Comanthosphace japonica*.
calycocarpa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 560.—China.
Carsonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 450.—Afr. trop.
stellipila, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 103 = *Comanthosphace japonica*.
sublanceolata, *Miq. l. c.* = *Comanthosphace japonica*.

ELYMUS, Linn. (Gramin.).

- alaicus*, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. 77, 102.—Turkestan.
albowianus, *F. Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 383.—Fuegia.
arenicolus, *Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Agrost. Circ.* ix. 7.—Am. bor.
arkansanus, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 45.—Am. bor.
australis, *Scribn. & Ball, l. c.* 46.—Am. bor.
barbatus, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xv. 522.—Reg. Argent.
brachystachys, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 47.—Am. bor.; Mexic.
Brownii, *Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 7.—Am. bor.
capitatus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 55.—Am. bor.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 682.—Patag.
ciliatus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 57.—Am. bor.
diversiglumis, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 48.—Am. bor.
flavescens, *Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 8.—Am. bor.
glabriflorus, *Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 49.—Am. bor.
Hanseni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 56.—Am. bor.
hirsutiglumis, *Scribn. l. c.* 58.—Am. bor.
intermedius, *Scribn. & J. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 38 = *hirsutiglumis*.
jenisseensis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. i. 64 = *dasytachyus*.
lanatus, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. 102.—Turkestan.
leptostachyus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 681.—Patag.
nutans, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 72 = *sibiricus*.

ELYMUS:—

oreophilus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 347.—Chili.
 Palenae, *R. Phil. l. c.* 348.—Chili.
 patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 630.—Patag.
 Pringlei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 30.—Mexic.
 robustus, *Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 37.—Am. bor.
 saxicolus, *Scribn. & F. G. Sm. l. c.* xi. 56.—Am. bor.
 simplex, *Scribn. & Williams, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 57.—Am. bor.
 Spegazzinii, *F. Kurts, in Bol. Acad. Cordoba*, xvi. 259.—Reg. Argent.
 Thompsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 374.—Ind. or. uniflorus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 349.—Chili.
 villosissimus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 326.—Am. bor.
 virescens, *Piper, in Erythea*, vii. 101.—Am. bor.

ELYNANTHUS, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.).
tenerrimus, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 112.—Afr. austr.

ELYTRANTHE, Blume = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).
Adamsii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 126 = L. Adamsii.
Balansae, *Engl. l. c.* (= *Aciella Balansae*).—N. Caled.
Beccarii, *Engl. l. c.* = L. Beccarii.
Casuarinae, *Engl. l. c.* = L. linophyllus.
Colensoi, *Engl. l. c.* = L. Colensoi.
Cumingii, *Engl. l. c.* (= *Amylothea Cumingii*).—Ins. Philipp.
decussata, *Engl. l. c.* = L. decussatus.
Deplanchei, *Engl. l. c.* (= *Aciella Deplanchei*).—N. Caled.
dictyophleba, *Engl. l. c.* = L. dictyophlebus.
evenia, *Engl. l. c.* = L. avenis.
Exocarpi, *Engl. l. c.* = L. Exocarpi.
flavida, *Engl. l. c.* = L. flavida.
formosa, *Engl. l. c.* = L. formosus.
forsteriana, *Engl. l. c.* = L. forsterianus.
Haastii, *Engl. l. c.* = L. Haastii.
Hollrungii, *Engl. l. c.* = L. Hollrungii.
insularum, *Engl. l. c.* = L. insularum.
lanceolata, *Engl. l. c.* (= *Aciella lanceolata*).—N. Caled.
lifuensis, *Engl. l. c.* (= *Aciella lifuensis*).—N. Caled.
Murrayi, *Engl. l. c.* = L. Murrayi.
Pancheri, *Engl. l. c.* (= *Aciella Pancheri*).—N. Caled.
polychroa, *Engl. l. c.* = L. polychrous.
pseudoperfoliata, *Engl. l. c.* = L. pseudoperfoliata.
punctata, *Engl. l. c.* = L. punctatus.
pyramidata, *Engl. l. c.* (= *Aciella pyramidata*).—N. Caled.
Ralphii, *Engl. l. c.* = L. Ralphii.
rubra, *Engl. l. c.* (= *Aciella rubra*).—N. Caled.
signata, *Engl. l. c.* = L. signatus.
sumbawensis, *Engl. l. c.* (= *Amylothea sumbawensis*).—Austral.
tenuifolia, *Engl. l. c.* (= *Aciella tenuifolia*).—N. Caled.
tetrapetala, *Engl. l. c.* = L. tetrapetalus.
triflora, *Engl. l. c.* = L. triflorus.
uniflora, *Engl. l. c.* (= *Peroxilla uniflora*).—N. Zel.
vitiensis, *Engl. l. c.* = L. vitiensis.
Zollingerii, *Engl. l. c.* (= *Amylothea Zollingerii*).—Austral.

ELYTRARIA, Michx. (Acanth.).
acaulis, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 304 (= *Justicia acaulis*).—Am. trop.
carolinensis, *Lindau, l. c.* (= *Anonymos carolinensis*).—Am. bor.
squamosa, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica*, viii. 299 (= *Verbena squamosa*).—Reg. trop.

ELYTROPAPPUS, Cass. (Compos.).
scaber, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 145 = ambigua.

EMBELIA, Burm. f. (Myrsin.).
Mujenja, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 446.—Afr. trop.
pauciflora, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 517.—China.
pellucida, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 390 (= *Pattara pellucida*).—Afr. trop.
Welwitschii, *K. Schum. l. c.* (= *Pattara Welwitschii*).—Afr. trop.

EMERUS, Tourn. = **Coronilla**, Linn. (Legum.).
marginatus, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7. 7 (= *Sesbania marginata*).—Am. trop.

EMICOCARPUS, K. Schum. & Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxix. (1900) Beibl. lvi. 21. **ASCLEPIADA-CEAE.**
fissifolia, *K. Schum. & Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

EMILIA, Cass. (Compos.).
albocostata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 596.—Afr. trop.
basifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 154.—Afr. trop.

EMMENANTHE, Benth. (Hydrophyll.).
salina, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 381.—Am. bor.
scopulina, *A. Nelson, l. c.* 380.—Am. bor.

EMPOGONA, Hook. f. (Rubiace.).
Junodii, *Schins, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 67.—Afr. austr.

EMPUSA, Lindl. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
paradoxa, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 825 = L. nervosa.

ENANTIA, Oliv. (Anonac.).
Kummeria, *Engl. & Diels, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 57.—Afr. trop.

ENARTHROCARPUS, Labill. (Crucif.).
Chevallieri, *Baratte, ex L. Chevall. in Mém. Herb. Boiss.* no. 7, 2.—Afr. bor.

ENCELIA, Adans. (Compos.).
hirsuta, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 145.—Reg. Argent.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 573.—Mexic.
Sodirol, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 48.—Ecuador.
tenuis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 94.—Mexic.

ENCEPHALARTOS, Lehm. (Cycad.).
lemarinelianus, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 80.—Afr. trop.

ENCHOLIRIUM, Mart. = **Dyckia**, Schult. f. (Bromel.).
subsecundum, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 540 = D. spectabilis.

ENDIANDRA, R. Br. (Laurac.).
globosa, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 149.—Austral.
insignis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 80 (= *Cryptocarya insignis*).—Austral.
macrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 136 (= *Dictyodaphne macrophylla*).—Malaya.
micrantha, *Boerl. l. c.* (= *Dictyodaphne micrantha*).—Java.

ENDOSIPHON, T. Anders. (Acanth.).
obliquus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 50.—Afr. trop.

ENDRESSIA, J. Gay = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).
castellana, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1898, 3.—Eur.

ENGLERIA, O. Hoffm. (Compos.).
decumbens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 591 (= *Adenogonum decumbens*).—Afr. trop.

ENGLEROPHOENIX, Kuntze = **Maximiliana**, Mart. (Palm.).
insignis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 322 = M. insignis.

ENHYDRIAS, Ridley, in *Journ. Bot.* 1900, 69. **HYDROCHARIDACEAE.**
angustipetala, *Ridley, l. c.*—Malaya.

ENKIANTHUS, Lour. (Ericac.).
nipponicus, *Palib. Rev. Gen. Enkianthus*, 11.—Japon.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 509.—China.

ENNEAPOGON, Desv. (Gram.).
abyssinicum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii.* 229.—Afr. trop.
benguellense, *Rendle, l. c.* 280.—Afr. trop.
brachystachyus, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 654.—Afr. austr.
dipsaceus, *Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 301 = Pappophorum elegans.
mollis, *Lehm. Pugill.* iii. 40.—Afr. austr.
persicus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 71 = Pappophorum Aucher.
pusillum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii.* 229.—Afr. trop.
scaber, *Lehm. Pugill.* iii. 41.—Afr. austr.
scoparius, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 656.—Afr. austr.

ENSLENIA, Nutt. (Asclep.).
ligulata, *Benth. Pl. Hartw.* 290.—Mexic.
lingulata, *Ind. Kew.* i. 841, sphalm. = praec.

ENTADA, Adans. (Legum.).
arenaria, *Schins, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 118.—Afr. trop.
borneensis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 307.—Malaya.
spiralis, *Ridley, l. c.* 305.—Malaya.

ENTANDOPHRAGMA, C. DC. (Meliac.).
candolleana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II.* i. i. 14.—Afr. trop.
Candollei, *Harms, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 181.—Afr. trop.

ENTEROLOBIUM, Mart. (Legum.).
Saman, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 252 = Pithecolobium Saman.

ENTEROPOGON, Nees (Gramin.).
muticus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 25.—Afr. trop.
ruspolianum, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 72.—Afr. trop.
somalense, *Chiov. l. c.* vi. 170.—Afr. trop.

ENTOPLOCAMIA, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 710 (1900). **GRAMINEAE.**
aristulata, *Stapp, l. c.* 711.—Afr. austr.
benguellensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii.* 228.—Afr. trop.

EPACRIS, Forst. (Epacrid.).
Hamiltoni, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 102.—Austral.

EPHEBOGON, Nees & Meyen = **Pollinia**, Trin. (Gramin.).
gratus, *Nees & Meyen, ex Steud. Nom. ed. II.* i. 556 = P. grata.

EPHEDRA, Tourn. (Gnetac.).
gracilis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 518.—Chili.
nana, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 285.—Reg. Magell.
patagonica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 518.—Chili.

EPICHBARIS, Blume (Meliac.).
hoensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 349 A.—Cochinch.

EPIDENDRUM, Linn. (Orchid.).
altissimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 471 (non Batem.).—N. Granat.
aporoides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 501.—N. Granat.
arundinaceum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 471.—N. Granat.
atrorubens, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 46.—Mexic.
bolbophylloides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 463.—N. Granat.
brachybulbum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—N. Granat.
brassivolaeforme, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 461.—N. Granat.
Buenaventurae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 470.—N. Granat.
calyptratum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 473.—N. Granat.
chondrochilum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 467.—N. Granat.
cirrhochilum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 466.—Ecuador.
condylochilum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 459.—N. Granat.
confusum, *Rolfe, Orchid Review*, 1899, 197.—Guatem.
cornanthera, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 463.—N. Granat.
Cuchibambae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 467.—Ecuador.
cupreum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 476.—Ecuador.
elegantissimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 472.—Ecuador.
englerianum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 466.—Ecuador.
falcisepalum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 474.—Ecuador.
fractiflexum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 468 (non Rodrig.).—Am. cent.
globiflorum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 469.—Ecuador.
gracillimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 473 (non Reichb. f. & Warsc.).—Ecuador.

EPIDENDRUM:

- Harrisii, *Fawcett, in Urb. Symb. Antill.* i. 291.—Ind. occ. intertextum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 466.—Ecuador.
- Latro, *Reichb. f. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 82.—Bras.
- leucopyramis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 459.—Ecuador.
- Loefgrenii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 181.—Bras.
- loxense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 469.—Ecuador.
- macrothyrsis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 472.—Ecuador.
- marcupiale, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 474.—Ecuador.
- Medusae, *Siebert, in Gartensf.* 1900, 516.—Hort.
- modestissimum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 469.—N. Granat.
- Mosenii, *Barb. Rodr. Gen. et Sp. Orch. Nov.* ii. 144.—Rodriguezii.
- Mosquerae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 472.—Ecuador.
- oligophyllum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 477.—N. Granat.
- organense, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 194.—Bras.
- papyrifera, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 548.—Am. cent.
- paulense, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 159.—Bras.
- pendulum, *Cogn. l. c.* 182.—Bras.
- polyphyllum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 470 (non Vell.).—Ecuador.
- popayanense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 475.—N. Granat.
- porquerense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 461.—N. Granat.
- prostratum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 112 (= *Phytinga prostrata*).—Guiana.
- quadridentatum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 459.—N. Granat.
- Rodriguezii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 176.—Bras.
- rolfeanum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 468.—N. Granat.
- rupicolium, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 153.—Bras.
- sophonitoides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 464.—Ecuador.
- sphenoglossum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 460.—Ecuador.
- stanhopeanum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, II. 29.—N. Granat.
- tenuicaule, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 468.—Ecuador.
- Tequendamae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 475.—N. Granat.
- trachypus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 461.—N. Granat.
- xipheroides, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 68.—Bras.
- zosterifolium, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 474.—Ecuador.

EPILOBIUM, Dill. (Onagr.)

- antarcticum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 97 = Lechleri.
- athespermum, *Lév. in Monde des Plantes*, vi. 22 = alpinum.
- benguellense, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 378.—Afr. trop.
- concinnum, *Congd. in Erythraea*, vii. 184.—Am. bor.
- elegans, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 422.—N. Zel.
- Fauriei, *Lév. in Monde des Plantes*, v. 93.—Japon.
- Hammondi, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 224.—Am. bor.
- neriifolium, *Lév. in Monde des Plantes*, vi. 2 = angustifolium.
- occidentale, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 275.—Am. bor.
- perplexum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 170.—N. Zel.
- pictum, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 538.—N. Zel.
- rostratum, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 534.—N. Zel.
- rouyanum, *Lév. in Bull. Acad. Glog. Bot.* 1900, 210.—Japon.
- vermicosum, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 535.—N. Zel.
- wyomingense, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 194.—Am. bor.

EPINETRUM, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. (1896) 21.**MENISPERMACEAE.**

- undulatum, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

EPIPACTIS, Adans. (Orchid.)

- americana, *Lindl. in Ann. Nat. Hist.* iv. 385 = gigantea.
- gigantea, *Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 202.—Am. bor.; As. temp.
- royleana, *Lindl. in Royle, Ill. Bot. Himal.* 368 = gigantea.
- somalensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 189.—Afr. trop.

EPIPHYSTIS, Trin. = **Torulanium**, Desv. (Cyper.)

- ophiuroides, *Trin. Fund. Agrost.* 98 = T. filiforme.

EPIPREMNUM, Schott (Arac.)

- crassifolium, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 12.—Hort.
- Dahlia, *Engl. l. c.* 11.—N. Brit.
- falcifolium, *Engl. l. c.*—Hort.
- foraminiferum, *Engl. l. c.*—Hort.
- mooreense, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1899, 6.—Ins. Societ.

EPISCIA, Mart. (Gesner.)

- longipetiolata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 152.—Am. cent.

EPISTEPHIUM, Kunth (Orchid.)

- Regis-alferti, *Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 291.—N. Caled.

ERAGROSTIS, Host (Gramin.)

- aethiopica, *Chiov. in Robecchi, Somalia*, 726; et in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 173.—Afr. trop.
- agrostioides, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 240.—Afr. trop.
- airaeformis, *Rendle, l. c.* 243.—Afr. trop.
- andongensis, *Rendle, l. c.* 236.—Afr. trop.
- Atherstonei, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 607.—Afr. austr.
- atropurpurea, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 267 = nigra.
- aurea, *Staud. l. c.* = interrupta.
- Barbeyi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 760.—Oriens.
- barbulata, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 319.—Ind. or.
- beroenis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 241.—Afr. trop.
- blepharoglossum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* 113.—Afr. trop.
- blepharostachya, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 386.—Afr. trop.
- brachyphylla, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 327.—Ind. or.
- brevifolia, *Benth. in Hook. Ic. Pl. sub t.* 1368 = Eleusine brevifolia.
- browneana, *Nees, in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. I. 205 = elongata.
- Brownie, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 396 = elongata.
- Burchellii, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 608.—Afr. austr.
- caesia, *Staff, l. c.* 599.—Afr. austr.
- caniflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 232.—Afr. trop.
- Chapelieri, *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 560 = seq.
- Chapelieri, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 392.—Afr. austr.
- coarctata, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 313.—Ind. or.
- Collettii, *Staff, l. c.* 326.—Ind. or.
- Cumingii, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 266 = elongata.
- cylindrispica, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 252.—Afr. trop.
- cynosuroides, *Beauv. Agrost.* 71 = Desmostachya bipinnata.
- densiflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 244 (non Hack.).—Afr. trop.
- dura, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 609.—Afr. austr.
- echinochoidea, *Staff, l. c.* 627.—Afr. austr.
- elata, *Munro, ex Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. 32 = superba.
- elator, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 617.—Afr. austr.
- elegantula, *Nees, ex Miq. Anal. Bot. Ind.* ii. 27 = stenophylla.
- elegantula, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 266.—Ind. or.
- emarginata, *Hack. in Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxx. 238 = porosa.
- enodis, *Hack. l. c.* 148 = cyperoides.
- filiformis, *Nees, in Linnaea*, vii. 330 = curvula.
- flaccida, *Lindl. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 17.—Bras.
- flavicans, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 253.—Afr. trop.
- flexuosa, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 266 = major.

ERAGROSTIS:

- Frederici, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 246.—Afr. trop.
- gangetica, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 266.—As. trop.; Afr. trop. et austr.
- guingensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 254.—Afr. trop.
- habrantha, *Rendle, l. c.* 246.—Afr. trop.
- hararensis, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 163.—Afr. trop.
- heteromera, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 610.—Afr. austr.
- hierniana, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 237.—Afr. trop.
- hirsuta, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 98 (= *Poa hirsuta*, Michx.).—Am. bor.
- Hochstetteri, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 268 = interrupta.
- huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 242.—Afr. trop.
- japonica, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. 405 = interrupta.
- laxa, *Baker, Fl. Maurit.* 456 = tenella.
- laxiflora, *Schrad. in Linnaea*, xii. 451 = aspera.
- Lehmannii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvii. 32.—Ecuador.
- leioptera, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 325.—Ind. or.
- lepidata, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 424 = ciliaris.
- Lindmani, *Hack. ex Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6. 19.—Bras.
- lobata, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. 396 = ciliaris.
- lutescens, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Agrost. Circ.* ix. 7.—Am. bor.
- lusoniensis, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 266 = gangetica.
- Makinol, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 725.—Formosa.
- malayana, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 317.—Ind. or.
- mangalorica, *Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind.* ii. 26 = tenella.
- margaritacea, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 604.—Afr. austr.
- microsperma, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 248.—Afr. trop.
- minutiflora, *J. & C. Presl, Rel. Haenk.* i. 274 = interrupta.
- multiflora, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. 401 = tremula.
- namaquensis, *Nees, Ind. Sem. Vratisl.* 1835.—Afr. austr.
- nardoides, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* i. 415.—Ind. or.
- natalensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 28.—Afr. austr.
- nebulosa, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 603.—Afr. austr.
- mutans, *Nees, ex Staud. Nom. ed. II.* i. 563 = interrupta.
- obtusiflora, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 10 (= *Brisopyrum obtusiflorum*).—Am. bor.
- orientalis, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* iv. II. Suppl. 73 = ferruginea.
- parviglossum, *Hochst. ex Staud. Syn. Pl. Gram.* 267 = tenuifolia.
- passa, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 238.—Afr. trop.
- phleoides, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 313 (non Hillebr.).—Ind. or.
- platyphylla, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 239.—Afr. trop.
- Poa, *Staff, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 605.—Afr. austr.
- procerior, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 235.—Afr. trop.
- pubescens, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 279 = elongata.
- pulchella, *Parl. ex Webb, in Hook. Niger Fl.* 188 = ciliaris.
- pusilla, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 27.—Afr. austr.
- quadriflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 245.—Afr. trop.
- racemosa, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 271 = chalcantha.
- rejuvenescens, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 250.—Afr. trop.
- rigidifolia, *Hochst. ex Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 323 = papposa.
- riparia, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 265 = tenella.
- rotifer, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 242.—Afr. trop.
- Rottleri, *Staff, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 321.—Ind. or.
- rubens, *Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind.* ii. 26 = amabilis.
- sabulicola, *Pilg. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 269, nomen.—Afr. trop.

ERAGROSTIS :—

- secunda, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 264.—Ind. or. sporoboloides, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 607 (non J. G. Sm. et Buch.).—Afr. austr.
stenophylla, Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii. 27.—Ind. or.
stricta, Steud. Syn. Pl. Gram. 264 = interrupta.
subulata, Nees, Fl. Afr. Austr. 399 = curvula.
tenella, Roem. & Schult. Syst. ii. 576.—Ind. or.
tenellula, Steud. Syn. Pl. Gram. 279 = interrupta.
terebinthacea, Kurz, ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 816 = tenella.
thraulostachys, K. Schum. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 325 = bifaria.
thunbergiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 271 = curvula.
unioloides, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 264 = amabilis.
vacillans, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 249.—Afr. trop.
variegata, Welw. ex Rendle, l. c. 251.—Afr. trop.
viscosa, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 51.—Am. bor.
viscosa, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. 397 = tenella.
Walkeri, Stapf, in Trim. Fl. Ceylon, v. 298.—Zeylan.
Welwitschii, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 234.—Afr. trop.
willdenowiana, Nees, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 252 = elongata.
willdenowiana, Nees, in Wight Cat. n. 1779, non alibi.—Ind. or.
Wilmsii, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 606.—Afr. austr.

ERANTHEMUM, Linn. (Acanth.).

- acanthophorum, Roem. & Schult. Syst. i. Mant. 154 = Barleria acanthophora.
ardisioides, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 173.—Afr. trop.
aureo-reticulatum, Hort. in Hook. f. Bot. Mag. t. 7480 = reticulatum.
elegans, Roem. & Schult. Syst. i. 174 = Lankesteria elegans.
Hildebrandtii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 172.—Afr. trop.
hispidum, Nees, in DC. Prod. xi. 456 = Lankesteria parviflora.
Huegelii, Burkill, in Proc. Camb. Phil. Soc. ix. II. 96.—N. Brit.
Lindau, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 173.—Afr. trop.
Mannii, T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c. 172 = ludovicianum.
seticalyx, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
spinosum, Lour. Fl. Cochinch. i. 19 = Barleria acanthophora.
subviscosum, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 173.—Afr. trop.
velutinum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 661 (= Pseud-eranthemum velutinum).—Malaya.

ERECHTITES, Rafin. (Compos.).

- missionum, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxii. no. 5, 73.—Bras.
polypodioides, Greene, Pittonia, iii. 90 (= Senecio gracilipes).—Mexic.

EREMANTHUS, Less. (Compos.).

- Descampsii, Klatt, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. I. t. 50.—Afr. trop.
harmsianus, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 454.—Bras.
mattogrossensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 145.—Bras.
rivularis, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 453.—Bras.

EREMOLEPIS, Griseb. (Loranth.).

- Glaziovii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 138 (= Basicarpus Glaziovii).—Bras.

EREMOPHILA, R. Br. (Myopor.).

- granitica, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 214.—Austral.
Margarethae, S. Moore, l. c. 211.—Austral.
metallicorum, S. Moore, l. c. 213.—Austral.
punicea, S. Moore, l. c. 212.—Austral.

EREMOSEMIUM, Greene, Pittonia, iv. (1900) 225 =

- Grayia, Hook. & Arn. (Chenopod.).
Brandegei, Greene, l. c. = G. Brandegii.
spinosum, Greene, l. c. = G. polygalioides.

EREMURUS, Bieb. (Liliac.).

- Elwesii, Micheli, in Rev. Hort. 1897, 280.—Hort.

ERIA, Lindl. (Orchid.).

- bidens, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 289.—Penins. Mal.
Brandisii, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 589.—Burma.
brunea, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 297.—Penins. Mal.
caespitosa, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 194.—China.
celebica, Rolfe, l. c. 1899, 128.—Celebes.
cepiifolia, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxi. 282.—Borneo.
clausa, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxv. 121.—Ind. or.
crucigera, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxi. 280.—Borneo.
cymbidifolia, Ridl. in Journ. Bot. 1898, 212.—Borneo.
dasystachys, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxi. 296.—Penins. Mal.
densa, Ridl. l. c. 281.—Malaya.
dissitiflora, Ridl. l. c. xxxii. 292.—Penins. Mal.
elongata, Ridl. l. c. xxxi. 284 (non Blume).—Borneo.
Endymion, Ridl. l. c. xxxii. 295.—Penins. Mal.
fibuliformis, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. 336.—Ind. or.
formosana, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 194.—Formosa.
hispidissima, Ridl. in Journ. Bot. 1898, 213.—Malaya.
latibracteata, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 298.—Penins. Mal.
latibracteata, Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag. t. 7605 (non Ridl.).—Borneo.
longerepens, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxi. 282.—Malaya.
lorifolia, Ridl. l. c. xxxii. 296.—Penins. Mal.
megalopha, Ridl. in Journ. As. Soc. Straits, xxxiii. 23.—Borneo.
minutiflora, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 297 = Agrostophyllum pauciflorum.
neglecta, Ridl. l. c. xxxi. 283.—Malaya.
ornithoides, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxv. 606.—Ins. Samoa.
paradoxa, Kraenzl. l. c.—Ins. Samoa.
parviflora, F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl. xiv. 15.—N. Guin.
pensilis, Ridl. in Journ. Bot. 1898, 213.—Sumatra.
pilifera, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 299.—Penins. Mal.
poculata, Ridl. l. c. 305.—Penins. Mal.
Prainii, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 210.—Ind. or.
pudica, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 294.—Penins. Mal.
shanensis, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 589.—Burma.
suaveolens, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 292.—Penins. Mal.
sumatrensis, Ridl. in Journ. Bot. 1898, 212.—Sumatra.
tenuiflora, Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 249, nomen (non Ridl.).—N. Guin.
tenuiflora, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 291.—Penins. Mal.
tricuspidata, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 128.—Celebes.

ERIACHNE, R. Br. (Gramin.).

- ampla, Nees, Fl. Afr. Austr. 277 = Achneria ampla.
assimilis, Steud. Syn. Pl. Gram. 236 = Achneria Ecklonii.
aurea, Nees, Fl. Afr. Austr. 276 = Achneria aurea.
capensis, Steud. in Flora, 1829, 470 = Achneria capensis.
Ecklonii, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 273 = Achneria Ecklonii.
microphylla, Nees, l. c. 277 = Achneria microphylla.
Stuedelii, Nees, l. c. 278 = Achneria capensis.
tuberculata, Nees, l. c. 274 = Achneria setifolia.

ERIANTHUS, Michx. (Gramin.).

- aureus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 412 = Pollinia Cumingii.
elephantinus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 122.—Ind. or.
formosanus, Stapf, in Kew Bull. 1898, 228.—Formosa.
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 122 = Saccharum Sara.
juncus, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 324.—Afr. austr.
laxus, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 344.—Am. bor.
mishmeensis, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 124 = longisetosus.
mollis, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 92 = Pollinia mollis.

ERIANTHUS :—

- nudipes, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 92 = Miscanthus nudipes.
sikkimensis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 123.—Ind. or.
Smallii, Nash, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 429.—Am. bor.
speciosus, Debeaux, in Act. Soc. Linn. Bordeaux, xxxii. 53 = Pollinia speciosa.
Tracyi, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 37.—Am. bor.
tristachyus, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 241 = Pollinia argentea.

ERIBROMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.

- (1896) 1273. STERCULIACEAE.
klaianea, Pierre, l. c. 1275.—Afr. trop.

ERICA, Tourn. (Ericac.).

- aspalathoides, Guthrie & Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 173.—Afr. austr.
ciliata, Bub. Fl. Pyren. ii. 10 = ciliaris.
Maximiliani, Guthrie & Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 173.—Afr. austr.
tenuifolia, Bub. Fl. Pyren. ii. 12 = cinerea.

ERIGERON, Linn. (Compos.).

- accedens, Greene, Pittonia, iv. 155.—Am. bor.
angustifolius, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 295.—Am. bor.
aphanactis, Greene, Fl. Francisc. 389.—Am. bor.
arenarius, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 121.—Am. bor.
arthrotrichus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 547.—Afr. trop.
Blochmanae, Greene, Pittonia, iii. 25.—Am. bor.
cervinus, Greene, l. c. 163.—Am. bor.
condensatus, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 511.—Am. bor.
consobrinus, Greene, Pittonia, iii. 186.—Am. bor.
conspicuus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 400.—Am. bor.
curvifolius, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 396.—Am. bor.
debilis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 408.—Am. bor.
Drummondii, Greene, Pittonia, iii. 295.—Am. bor.
elator, Greene, l. c. 163.—Am. bor.
elatus, Greene, l. c. 164.—Am. bor.
Elmeri, Greene, Fl. Francisc. 398 (= Aster Elmeri).—Am. bor.
Engelmanni, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 247.—Am. bor.
erianthus, Speng. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 530.—Patag.
eximius, Greene, Pittonia, iii. 295.—Am. bor.
flabellifolius, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 545.—Am. bor.
formosissimus, Greene, l. c. 1898, 121.—Am. bor.
frondeus, Greene, Fl. Francisc. 387.—Am. bor.
glaucofolium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 145.—Reg. Argent.
Gormanii, Greene, Pittonia, iv. 156.—Am. bor.
gracilis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 404.—Am. bor.
Grayi, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 628.—Am. bor.
inamoenus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 248.—Am. bor.
jucundus, Greene, Pittonia, iii. 165.—Am. bor.
Kindbergi, Greene, l. c.—Am. bor.
lassenianus, Greene, Fl. Francisc. 389.—Am. bor.
luteus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 33.—Am. bor.
MacDougallii, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 591.—Am. bor.
Macounii, Greene, Pittonia, iii. 162.—Am. bor.
mariposanus, Congd. in Erythraea, vii. 185.—Am. bor.
melanocephalus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 246.—Am. bor.
membranaceus, Greene, Pittonia, iii. 294.—Am. bor.
microlonchus, Greene, l. c. 293.—Am. bor.
minor, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 295.—Am. bor.
montanensis, Rydb. l. c. 296.—Am. bor.
multifidus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 402.—Am. bor.
Nelsonii, Greene, Pittonia, iii. 294.—Am. bor.
Nuttallii, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 628.—Am. bor.

ERIGERON :—

- oblanceolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 294.—Am. bor.
 peregrinus, *Greene, Pittonia*, iii. 166 (= *Aster peregrinus*).—Am. bor.
 pinnatisectus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 246.—Am. bor.
 plantagineus, *Greene, Pittonia*, iii. 292.—Am. bor.
 platensis, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 33.—Reg. Argent.
 porphyreticus, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 33.—Am. bor.
 pulcherrimus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 200.—Am. bor.
 purpuratus, *Greene, Pittonia*, iv. 155.—Am. bor.
 pygmaeus, *Greene, Fl. Francisc.* 390.—Am. bor.
 robertianus, *Greene, Pittonia*, iii. 298.—Am. bor.
 simplex, *Greene, Fl. Francisc.* 387.—Am. bor.
 socorrensis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 4.—Mexic.
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 20.—Ecuador.
 sparsifolius, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 297.—Am. bor.
 spatulifolius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 545.—Am. bor.
 subcanescens, *Rydb. l. c.* 1897, 294.—Am. bor.
 tenuissimus, *Greene, Pittonia*, iii. 25.—Am. bor.
 tetrapleurus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 628.—Am. bor.
 tunariensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 146.—Bolivia.
 weddellianus, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 21.—Ecuador.
 Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 548.—Afr. trop.
 wyomingensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 248.—Am. bor.
 yellowstonensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gas.* xxx. 198.—Am. bor.

- ERIOCARPUM**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
 megacephalum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 107.—Am. bor.
 serratum, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 119.—Am. bor.
 Wootonii, *Greene, l. c.* 120.—Am. bor.

ERIOCAULON, Linn. (Eriocaul.).

- amboense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 35.—Afr. trop.
 andongense, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 100.—Afr. trop.
 Antunesii, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 76.—Afr. trop.
 Bauri, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 54.—Afr. austr.
 bongense, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 75.—Afr. trop.
 Buchanani, *Ruhl. l. c.* 83.—Afr. trop.
 ciliisepalum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 98.—Afr. trop.
 gilgianum, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 84.—Afr. trop.
 Hildebrandtii, *Koernicke, ex Ruhl. l. c.* 78.—Madag.
 huillense, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. l. c.* 78.—Afr. trop.
 huillense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 95.—Afr. trop.
 Johnstonii, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 82.—Ins. Maurit.
 lacteum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 99.—Afr. trop.
 limosum, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 74.—Afr. trop.
 longipetalum, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 96.—Afr. trop.
 mesanthemoides, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 79.—Afr. trop.
 natalense, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10. 76.—Afr. austr.
 piliferum, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 80.—Madag.
 pseudocompressum, *Ruhl. in Urb. Symb. Antill.* i. 492.—Ind. occ.
 Schimperii, *Koernicke, ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 80.—Afr. trop.
 Schlechteri, *Ruhl. l. c.* 78.—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. l. c.* 74.—Afr. trop.
 stoloniferum, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 101.—Afr. trop.
 submersum, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxiii. 291.—Austral.

ERIOCAULON :—

- submersum, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 100.—Afr. trop.
 Teuscii, *Engl. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 77.—Afr. trop.
 transvaalicum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 54.—Afr. austr.
 trilobatum, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 81.—Madag.
 Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 8.—Ind. or.
 Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 97.—Afr. trop.
 Woodii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 57.—Afr. austr.
 zambesense, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxvii. 75.—Afr. trop.

ERIOCEPHALUS, Linn. (Compos.).

- xerophilus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 206.—Afr. austr.

ERIOCHLOA, H. B. & K. (Gramin.).

- annulata, *Kunth, Rév. Gram.* i. 30 = polystachya.
 decumbens, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 234.—Austral.
 Nelsoni, *Scribn. & G. S. M. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 12.—Mexic.
 punctata, *Ham. Prod. Fl. Ind. Occ.* 5 = polystachya.
 succincta, *Kunth, Enum. Pl.* i. 73 = polystachya.
 sundaica, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 606 = polystachya.

ERIOCHRYSIS, Beauv. = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).

- pallida, *Munro, in Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II.* 440 = *S. munroanum*.

ERIOCOMA, Nutt. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).

- caduca, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 25 (= *Stipa caduca*).—Am. bor.

ERIODICTYON, Benth. (Hydrophyll.).

- niveum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III.* i. 130.—Am. bor.
 Traskiae, *Eastw. l. c.* 131.—Am. bor.

ERIOGONUM, Michx. (Polygon.).

- anemophilum, *Greene, Pittonia*, iii. 199.—Am. bor.
 aridum, *Greene, l. c.* 200.—Am. bor.
 Bloomeri, *Parish, in Erythea*, vi. 87.—Am. bor.
 capillare, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 51.—Am. bor.
 clavatum, *Small, l. c.* 50.—Am. bor.
 clavellatum, *Small, l. c.* 48.—Am. bor.
 cognatum, *Greene, Pittonia*, iii. 201.—Am. bor.
 Covillei, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 42.—Am. bor.
 croceum, *Small, l. c.* 43.—Am. bor.
 curvatum, *Small, l. c.* 50.—Am. bor.
 densum, *Greene, Pittonia*, iii. 17.—Am. bor.
 depauperatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 40.—Am. bor.
 dumosum, *Greene, Pittonia*, iii. 199.—Am. bor.
 formosum, *Brandegee, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 456.—Am. bor.
 glaucum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 51.—Am. bor.
 Harfordii, *Small, l. c.* 47.—Am. bor.
 latum, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 121.—Am. bor.
 luteolum, *Greene, Pittonia*, iii. 200.—Am. bor.
 minimum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 47.—Am. bor.
 nodosum, *Small, l. c.* 49.—Am. bor.
 ochroleucum, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 123.—Am. bor.
 pallidum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 49.—Am. bor.
 peninsulare, *Brandegee, in Erythea*, v. 79.—Am. bor.
 Piperi, *Greene, Pittonia*, iii. 263.—Am. bor.
 polyphyllum, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 119.—Am. bor.
 polypodium, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 46.—Am. bor.
 Porteri, *Small, l. c.* 41.—Am. bor.
 pulvinatum, *Small, l. c.* 44.—Am. bor.
 Purpusi, *Brandegee, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 457.—Am. bor.
 ramosissimum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 322.—Am. bor.

ERIOGONUM :—

- rosulatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 46.—Am. bor.
 siskiyuensis, *Small, l. c.* 44.—Am. bor.
 Stokesae, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 39.—Am. bor.
 subalpinum, *Greene, Pittonia*, iii. 18.—Am. bor.
 tenue, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 44.—Am. bor.
 trichotomum, *Small, l. c.* 43.—Am. bor.
 trinervata, *Small, l. c.* 52.—Am. bor.
 turbinatum, *Small, l. c.*—Am. bor.
 vineum, *Small, l. c.* 45.—Am. bor.
 Wetherillii, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 319.—Am. bor.

ERIOPHORUM, Linn. (Cyperac.).

- paucinervum, *Eaton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 341.—Am. bor.

ERIOPHYLLUM, Lag. (Compos.).

- aureum, *Brandegee, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 449.—Am. bor.
 bahiaefolium, *Greene, Fl. Francisc.* 446 (= *Monolopia bahiaefolia*).—Am. bor.
 Congdoni, *Brandegee, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 449.—Am. bor.
 grandiflorum, *Greene, Fl. Francisc.* 443.—Am. bor.
 Heermanni, *Greene, l. c.* 445 (= *Monolopia Heermanni*).—Am. bor.
 integrifolium, *Greene, l. c.* 444 (= *Trichophyllum integrifolium*).—Am. bor.
 leucophyllum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 422.—Am. bor.
 multiflorum, *Rydb. l. c.* (= *Trichophyllum multiflorum*).—Am. bor.
 paleaceum, *Brandegee, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 450.—Am. bor.
 pedunculatum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 270.—Am. bor.
 ternatum, *Greene, Pittonia*, iii. 185.—Am. bor.

ERIOPSIS, Lindl. (Orchid.).

- Helena, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, II. 98.—Peruv.

ERIOSEMA, DC. (Legum.).

- chrysadenum, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 195.—Afr. trop.
 cryptanthum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 264.—Afr. trop.
 Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II.* i. 18.—Afr. trop.
 monticola, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 196.—Afr. trop.
 togense, *Taub. l. c.* 195.—Afr. trop.

ERIOSPERMUM, Jacq. (Liliac.).

- alcicorne, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 377.—Afr. austr.
 bechuanicum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 472.—Afr. trop.
 Burchellii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 372.—Afr. austr.
 cernuum, *Baker, l. c.* 370.—Afr. austr.
 Currori, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 474.—Afr. trop.
 dissitiflorum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 394.—Afr. austr.
 elatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 471.—Afr. trop.
 Fleckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 37.—Afr. austr.
 Galpinii, *Schinz, l. c.* iv. 416.—Afr. austr.
 Haygarthii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 370.—Afr. austr.
 linearifolium, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 473.—Afr. trop.
 luteorubrum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 372.—Afr. austr.
 microphyllum, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
 natalense, *Baker, l. c.* 373.—Afr. austr.
 ophioglossoides, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 283.—Afr. austr.
 patentiflorum, *Schlechter, l. c.* 1898, 27.—Afr. austr.
 Rantanenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 522.—Afr. austr.
 roseum, *Schinz, l. c.* iv. App. III. 38.—Afr. austr.
 Schlechteri, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 534.—Afr. austr.
 somalense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 416.—Afr. trop.

ERIOSPERMUM :—

- sphaerophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 472.—Afr. trop.
sprengerianum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 416.—Hort.
tenellum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 377.—Afr. austr.
thyrsoides, *Baker, l. c.* 375.—Afr. austr.
tulbaghioides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 164.—Afr. trop.
villosum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 371.—Afr. austr.

ERITHALIS, P. Br. (Rubiace).

- acuminata, *Krug & Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 319.—Ind. occ.
quadrangularis, *Krug & Urb. l. c.* 320.—Ind. occ.

ERITRICHUM, Schrad. (Borag.)

- Howardii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 327 (= *Omphalodes Howardii*).—Am. bor.
pampeanum, *Speg. Contrib. Fl. Vent.* 44.—Reg. Argent.

ERODIUM, L'Hérit. (Geran.)

- longirostrum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 208.—Eur.

EROTEUM, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.)

- hirsutum, *G. Maza, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xix. 222.—Ind. occ.

ERUCA, Tourn. (Crucif.)

- aurca, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 247.—Afr. bor.
Eruca, *Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flchl.* 362 = sativa.

ERUCARIA, Gaertn. (Crucif.)

- myagroides, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 123 = *aleppica*.

ERYCIBE, Roxb. (Convolv.)

- albiflora, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 1052.—Ind. or.
macrophylla, *Hallier f. l. c.* 741.—Java.
parvifolia, *Hallier f. l. c.* 739.—Sumatra.
ramiflora, *Hallier f. l. c.* 743.—Sumatra.

ERYNGIUM, Tourn. (Umbellif.)

- amethystinodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 112.—Chili.
chubutense, *Neger, ex P. Duxén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 254.—Patag.
columnare, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2510.—Mexic.
cryptanthum, *Hemsl. l. c.* t. 2509.—Mexic.
elongatum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 53.—Am. bor.
erosum, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 14.—Bras.
Galeottii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2510.—Mexic.
Goldmani, *Hemsl. l. c.* t. 2638.—Mexic.
Goulartii, *Glaz. & Urb. ex Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 14.—Bras.
goyazense, *Urb. l. c.* 13.—Bras.
Jepsoni, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 54.—Am. bor.
leptopodium, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2546.—Mexic.
longipetiolatum, *Hemsl. l. c.* t. 2504.—Mexic.
longistylum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 55.—Am. bor.
minimum, *Coult. & Rose, l. c.* 54.—Am. bor.
oblanceolatum, *Coult. & Rose, l. c.* 56.—Am. bor.
Parishii, *Coult. & Rose, l. c.* 57.—Am. bor.
paucisquamosum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2505.—Mexic.
reptans, *Hemsl. l. c.* t. 2543.—Am. cent.
Rosei, *Hemsl. l. c.* t. 2579.—Mexic.
Schaffneri, *Hemsl. l. c.* t. 2545.—Mexic.
sparganophyllum, *Hemsl. l. c.* t. 2508.—Am. bor.
spiculolum, *Hemsl. l. c.* t. 2507.—Mexic.
synchaetum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 44.—Am. bor.
tenuissimum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2580.—Mexic.
Tournefortii, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 342 = *Bourgati*.

ERYSIMUM, Tourn. (Crucif.)

- Babataghi, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* ix. 413.—Turkestan.
bisaccatum, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 79.—Eur.
hamosum, *Blanche, ex Post, Fl. Syria.* 75.—As. Min.
horizontale, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 154.—Lesbos.
moesiicum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 21.—Eur.
pamiricum, *Korsh. in Mem. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. 88.—Turkestan.

ERYTHRAEA, Rencalm. (Gentian.)

- discolor, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 122.—Eur.
retusa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 38.—Mexic.

ERYTHRINA, Linn. (Legum.)

- comosa, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 52.—Afr. trop.
constantiana, *Micheli, in Rev. Hort.* 1896, 524.—Eur.
Dybowskii, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 52.—Afr. trop.
hypaphorus, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 433.—Celebes.
insularis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 228.—Austral.
lanata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 81.—Mexic.
melanacantha, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma.* vii. 96.—Afr. trop.
phlebocarpa, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 868.—Austral.
Sacleuxii, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 54.—Afr. trop.
sigmoidea, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 327.—Afr. trop.
tholloniana, *Hua, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 53.—Afr. trop.

ERYTHROCEPHALUM, Benth. (Compos.)

- erectum, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 472.—Afr. trop.
Goetzei, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxviii. 508.—Afr. trop.
humile, *O. Hoffm. l. c.* 509.—Afr. trop.
plantaginifolium, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.

ERYTHROPLEUM, Afzel. (Legum.)

- Dinklagei, *Taub. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. 111. 386 = *Calpocalyx Dinklagei*.

ERYTHROXYLUM, P. Br. (Linac.)

- costaricense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 240.—Am. cent.
goyazensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 440.—Bras.
hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. App. i. 15.—Parag.
pauciflorum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club.* vi. 13.—Bolivia.

ERYTROPYXIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.

- (1896) 1265. **STYRACACEAE**.
scandens, *Pierre, l. c.* 1266.—Afr. trop.

ESCALLONIA, Mutis (Saxifrag.)

- aculeata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 81.—Bolivia.
adscendens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club.* vi. 32.—Bolivia.
Bridgesii, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
poasana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 243.—Am. cent.

ESCOBEDIA, Ruiz & Pav. (Scrophul.)

- grandiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 231 = *scabrifolia*.

ESENBECKIA, H. B. & K. (Rutac.)

- acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 111.—Mexic.
cuspidata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 28.—Bras.
Glaziovii, *Engl. l. c.* 27.—Bras.
Hieronymi, *Engl. l. c.*—Bras.
litoralis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 242.—Am. cent.
macrantha, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 111.—Mexic.
venezuelensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 28.—Venez.

ETHULIA, Linn. (Compos.)

- monocephala, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 514.—Afr. trop.

EUCALYPTUS, L'Hérit. (Myrtac.)

- acaciaeformis, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 454.—Austral.
affinis, *Deane & Maiden, l. c.* xxv. 104.—Austral.
aggregata, *Deane & Maiden, l. c.* xxiv. 614.—Austral.
bridgesiana, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 164.—Austral.

EUCALYPTUS :—

- Cambagei, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 106.—Austral.
Campaspe, *S. Moore, in Fourn. Linn. Soc.* xxxiv. 193.—Austral.
camphora, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 298.—Austral.
conica, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 612.—Austral.
corrugata, *Luehm. in Vict. Nat.* xiii. 168.—Austral.
Dawsoni, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 295.—Austral.
delegatensis, *R. T. Baker, l. c.* xxv. 305.—Austral.
dextropinea, *R. T. Baker, l. c.* xxiii. 417.—Austral.
fastigata, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxi. 809.—Austral.
fraxinoides, *Deane & Maiden, l. c.* xxiii. 412.—Austral.
intertexta, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 308.—Austral.
laevopinea, *R. T. Baker, l. c.* xxiii. 414.—Austral.
Macarthuri, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 448.—Austral.
maculosa, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 598.—Austral.
Morrisii, *R. T. Baker, l. c.* xxv. 312.—Austral.
nova-anglica, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 616.—Austral.
oreades, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 596.—Austral.
paludosa, *R. T. Baker, l. c.* xxiii. 167.—Austral.
patentineris, *R. T. Baker, l. c.* xxiv. 602.—Austral.
quadrangulata, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 451.—Austral.
rubida, *Deane & Maiden, l. c.* 456.—Austral.
Smithii, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 292.—Austral.
squamosa, *Deane & Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 561.—Austral.
torquata, *Luehm. in Vict. Nat.* xiii. 147.—Austral.
viridis, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 316.—Austral.
vitrea, *R. T. Baker, l. c.* 303.—Austral.

EUCEPHALUS, Nutt. = **Aster**, Tourn. (Compos.)

- Covillei, *Greene, Pittonia*, iii. 162.—Am. bor.
Engelmannii, *Greene, l. c.* 54 = *A. Engelmannii*.
formosus, *Greene, l. c.* iv. 156.—Am. bor.
glabratus, *Greene, l. c.* iii. 56.—Am. bor.
glaucescens, *Greene, l. c.*—Am. bor.
ledophyllus, *Greene, l. c.* 55.—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* iv. 70.—Am. bor.
nemoralis, *Greene, l. c.* iii. 57 = *A. nemoralis*.
paucicapitatus, *Greene, l. c.* 56 = *A. paucicapitatus*.
serrulatus, *Greene, l. c.* 55.—Am. bor.
tomentellus, *Greene, l. c.* (= *Sericocarpus tomentellus*).—Am. bor.

EUCHAETIS, Bartl. & Wendl. (Rutac.)

- longibracteata, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 438.—Afr. austr.
Schlechteri, *Schinz, in Mem. Herb. Boiss.* no. 20, 19.—Afr. austr.

EUCNIDE, Zucc. = **Mentzelia**, Linn. (Loasac.)

- Watsoni, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 105.—Mexic.

EUCOMIS, L'Hérit. (Liliac.)

- vittata, *Nutt. ex Hook. Cat. Hort. Glasgow* (1825) 26, nomen.—Hort.

EUCRYPTA, Nutt. = **Ellisia**, Linn. (Hydrophyll.)

- chrysanthemifolia, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay*, 253.—Calif.
Torreyi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 7 = *E. Torreyi*.

EUCYPERUS, Rikli, in Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot.

- xxvii. (1895) 568 = **Cyperus**, Mich. (Cyperac.).
alternifolius, *Rikli, l. c.* = *C. alternifolius*.
brunneovaginatus, *Rikli, l. c.* = *C. brunneovaginatus*.
diffusus, *Rikli, l. c.* = *C. diffusus*.
fuscus, *Rikli, l. c.* = *C. fuscus*.
gracilis, *Rikli, l. c.* = *C. gracilis*.
longifolius, *Rikli, l. c.* = *C. longifolius*.
longus, *Rikli, l. c.* = *C. longus*.
Luzulae, *Rikli, l. c.* = *C. Luzulae*.
martianus, *Rikli, l. c.* = *C. martianus*.
pungens, *Rikli, l. c.* = *C. textilis*.
Schaffneri, *Rikli, l. c.* = *C. Schaffneri*.
textilis, *Rikli, l. c.* = *C. textilis*.

EUGENIA, Mich. (Myrtac.).

- aemula, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 76 (= *Fambosa aemula*).—Java.
 Afzelii, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 290.—Afr. trop.
 ampliflora, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 5.—Java.
 angolensis, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 288.—Afr. trop.
 argutata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 146.—Java.
 athropoda, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1222.—Madag.
 attenuata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 121 (= *Fambosa attenuata*).—Java.
 axillaris, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 6.—Java.
 bantamensis, Koord. & Valet. l. c.—Java.
 benguelensis, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 360.—Afr. trop.
 Bernieri, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1221.—Madag.
 brachyandra, Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiii. 15.—Austral.
 Buchholzii, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 291.—Afr. trop.
 bukobensis, Engl. l. c. 289.—Afr. trop.
 Bungadinnia, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. ii. 285.—Austral.
 Chapelieri, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1222.—Madag.
 Clavimyrthus, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 110 = ramosissima.
 Conceptionis, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 359 (= *Myrtus Conceptionis*).—Parag.
 confertiflora, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 106.—Java.
 congolensis, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 124.—Afr. trop.
 corymbifera, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 98 (= *Fambosa corymbosa*).—Java.
 costata, Koord. & Valet. l. c. 162 (= *Fambosa costata*).—Java.
 cuprea, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 6.—Java.
 decipiens, Koord. & Valet. l. c.—Java.
 densepunctata, Koord. & Valet. l. c.—Java.
 Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 125.—Afr. trop.
 discophora, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 6.—Java.
 doligophylla, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 78 (= *Fambosa confusa*).—Arch. Mal.
 Dusenii, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 289.—Afr. trop.
 fastigiata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 104 (= *Caryophyllus fastigiatus*).—Java.
 fibrosa, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 662.—Austral.
 firma, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 163 (= *Fambosa firma*).—Java.
 glomerata, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 7, non alior.—Java.
 guatemalensis, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 245.—Am. cent.
 Hauthalii, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 359 (= *Myrtus Hauthalii*).—Parag.
 Horsfieldii, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 77 (= *Fambosa Horsfieldii*).—Java.
 hypericifolia, Koord. & Valet. l. c. 69 (= *Myrtus hypericifolia*).—Java.
 intermedia, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 7 (non Berg.).—Java.
 jamboloides, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 136 (= *Syzygium racemosum*).—Java.
 javensis, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 7.—Java.
 kameruniana, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 291.—Afr. trop.
 Klampok, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 68.—Java.
 kuranda, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 658.—Austral.
 Laurentii, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 288.—Afr. trop.
 laxiflora, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 139 (= *Calyptanthes laxiflora*).—Malaya.
 Macromyrtus, Koord. & Valet. l. c. 109 (= *Macromyrtus javanica*).—Java.

EUGENIA :—

- magnoliaefolia, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 153 (= *Myrtus magnoliaefolia*).—Java.
 Marquesii, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 290.—Afr. trop.
 masukuensis, Baker, in Kew Bull. 1897, 267.—Afr. trop.
 melanosticta, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 159 (= *Fambosa melanosticta*).—Java.
 microcyma, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 7.—Java.
 mossambicensis, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 289.—Afr. trop.
 myrciopsis, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 359 (= *Myrtus myrciformis*).—Bolivia.
 napiformis, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 7.—Java.
 nodosa, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 290.—Afr. trop.
 nyassensis, Engl. l. c.—Afr. trop.
 opaca, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 94 (non Berg.).—Java.
 pachychlams, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 333.—Am. cent.
 paucipunctata, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 8.—Java.
 Poggei, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 289.—Afr. trop.
 polyneura, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 76 (= *Fambosa polyneura*).—Java.
 punctulata, F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii. 10.—Austral.
 pyriformis, Duthie, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 487 = salaccensis.
 ruminata, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 8.—Java.
 salaccensis, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 144 (= *Syzygium pyriformis*).—Java.
 salamensis, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 333.—Am. cent.
 Scheffleri, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
 sexangulata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. lx. 79 (= *Fambosa sexangulata*).—Java.
 Soyauxii, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 291.—Afr. trop.
 striata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 145 (= *Syzygium truncatum*).—Java.
 subglauca, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 8.—Java.
 suringariana, Koord. & Valet. l. c.—Java.
 symplicipetala, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 161.—Java.
 tenuicuspis, Koord. & Valet. l. c. 129 = cymosa.
 teretiflora, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 9.—Java.
 Teysmannii, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 164.—Java.
 thymifolia, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, ii. 303.—Chili.
 togoensis, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 288.—Afr. trop.
 Tungo, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 362.—Afr. trop.
 umbilicata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 62 (= *Fambosa tetragona*).—Java.
 uninervia, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 36.—Bolivia.
 urophylla, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 360.—Afr. trop.
 virens, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 113 (= *Fambosa virens*).—Java.
 vrieseana, Koord. & Valet. l. c. 75 (= *Fambosa vrieseana*).—Java.
 Zenkeri, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 291.—Afr. trop.
 zippeliana, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 142 (= *Syzygium zippelianum*).—Java.
 zollingeriana, Koord. & Valet. l. c. 71 (= *Fambosa zollingeriana*).—Java.

EULALIA, Trin. = *Miscanthus*, Anderss. (Gramin.).
cotulifera, Munro, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 289 = *Spodiopogon cotulifer*.
nepalensis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 333 = *M. nepalensis*.

EULOPHIA, R. Br. (Orchid.).

- agrostophylla, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. 16.—Austral.

EULOPHIA :—

- antennata, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 334.—Afr. trop.
 antennisepala, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 279 (= *Lissochilus antennisepalus*).—Afr. trop.
 articulata, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 181 = *Lissochilus purpuratus*.
 aurantiaca, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 67.—Afr. trop.
 aurea, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. v. 635.—Afr. austr.
 Bainesii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 65.—Afr. trop.
 bella, N. E. Br. in Gard. Chron. 1889, II. 210 = *Lissochilus milanjanus*.
 bicolor, Reichb. f. & Sond. ex Reichb. in Flora, 1865, 186 = *dichroma* et *Zeyheri*.
 biloba, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 335.—Afr. trop.
 borneensis, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxi. 289.—Borneo.
 brachystyla, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 336.—Afr. austr.
 brevipedala, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 53.—Afr. trop.
 Buchanani, Rolfe, l. c. 64 (non alior.).—Afr. trop.
 Carsoni, Rolfe, l. c.—Afr. trop.
 Coleae, Rolfe, l. c. 56.—Afr. trop.
 collina, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 336.—Afr. trop.
 congoensis, Cogn. in Journ. des Orch. vi. 155; et in Lindenia, xi. 15 = *guineensis*.
 crinita, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 58 (non G. Don).—Afr. trop.
 cyrtosoides, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 279, nomen.—Afr. trop.
 dahliana, Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 243.—N. Brit.
 dichroma, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 62.—Afr. trop.
 dictyostegoides, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 168.—Afr. trop.
 dilecta, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 279 (= *Lissochilus dilectus*).—Afr. trop.
 Elliottii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 54.—Afr. trop.
 Faberi, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 198.—China.
 flavopurpurea, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 65.—Afr. trop.
 galeoloides, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 508.—Afr. trop.
 gastrodoides, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 337.—Afr. trop.
 geniculata, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 337.—Reg. Himal.
 goetziana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 372.—Afr. trop.
 graciliscapa, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 418.—Afr. trop.
 hereroensis, Schlechter, in Bull. Herb. Boiss. iv. 417.—Afr. trop.
 Holubii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 60.—Afr. trop.
 humilis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 337.—Afr. trop.
 Johnstoni, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 66.—Afr. trop.
 junodiana, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. v. 634.—Afr. austr.
 Keithii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxxii. 333.—Penins. Mal.
 Kirkii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 58.—Afr. trop.
 lanceolata, Rolfe, l. c. 60.—Afr. trop.
 lata, Rolfe, l. c. 67.—Afr. trop.
 laurentiana, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 60.—Afr. trop.
 leonensis, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 51.—Afr. trop.
 Leopoldi, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 215.—Afr. trop.
 lindleyana, Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 279 (= *Lissochilus lindleyanus*).—Afr. trop.
 litoralis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 338.—Afr. austr.
 lubbersiana, Laurent & Th. Dur. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 135; et in Rev. Hort. Belg. xxvi. 3.—Afr. trop.
 lujaana, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 217.—Afr. trop.
 macrantha, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 62.—Afr. trop.

EULOPHIA :—

- manganjensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 67.—Afr. trop.
 milaniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 372.—Lissochilus milanjanus.
 monticola, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 60.—Afr. trop.
 Nuttii, *Rolfe, l. c.* 63.—Afr. trop.
 panganiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 169.—Afr. trop.
 papillosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 419 = chrysantha.
 Pentheri, *Schlechter, l. c.* xxvi. 339.—Afr. trop.
 Phillipscae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 56.—Afr. trop.
 martiniana, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 284 = guineensis.
 Smithii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 54.—Afr. trop.
 speciosa, *Rolfe, l. c.* 68 (non Bolus).—Afr. trop.
 stricta, *Rolfe, l. c.* 51 (non Lindl.).—Afr. trop.
 tainoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 339.—Afr. trop.
 Tanganyikae, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 216.—Afr. trop.
 tanganyikensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 59.—Afr. trop.
 tayloriana, *Rolfe, l. c.* 69.—Afr. trop.
 Thomsoni, *Rolfe, l. c.* 66.—Afr. trop.
 tuberifera, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 169.—Afr. trop.
 virilis, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. 132 = lurida.
 Welwitschii, *Hook. f. Bot. Mag.* sub t. 7330 = dichroma.
 wendlandiana, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, II. 262.—Madag.
 Woodfordii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 68.—Afr. trop.
 Zeyheri, *Hook. f. Bot. Mag.* sub t. 7330.—Afr. austr.

EULOPHIELLA, *Rolfe* (Orchid.).

- peetersiana, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, I. 182.—Hab.

EULOPHUS, *Nutt.* (Umbellif.).

- simplex, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 112.—Am. bor.

EUMORPHIA, *DC.* (Compos.).

- sericea, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 488.—Afr. austr.

EUNANUS, *Benth.* = *Mimulus*, *Linn.* (Scrophul.).

- angustatus, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay*, 275.—Calif.
 Bolanderi, *Greene, l. c.* 276.—Calif.
 tricolor, *Greene, l. c.* 275.—Calif.

EUONYMUS, *Linn.* (Celastr.).

- Bockii, *Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 439.—China.
 celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 395, 623 (= *Lophopetalum celebicum*).—Malaya.
 cuspidata, *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 77.—Cochinch.
 dielsiana, *Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 440.—China.
 flavescens, *Loes. l. c.* 437.—China.
 Giraldii, *Loes. l. c.* 442.—China.
 lutchuensis, *Ito, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 372.—Ins. Luchu.
 phellomana, *Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 444.—China.
 Rosthornii, *Loes. l. c.* 437.—China.
 Rothschuhii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxiii. 125.—Am. austr.
 sanguinea, *Loes. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 441.—China.
 Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 344.—Penins. Mal.

EUPATORIUM, *Tourn.* (Compos.).

- adpersum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 279.—Am. cent.
 aegirophyllum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 329.—Mexic.
 amblyolepis, *Robinson, l. c.* 330.—Mexic.
 anomalum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 106.—Am. bor.
 Balansae, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 778.—Parag.

EUPATORIUM :—

- Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 56.—Bolivia.
 barbacense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 750.—Am. austr.
 Blumenavii, *Hieron. l. c.* 784.—Am. austr.
 caaguazuense, *Hieron. l. c.* 760.—Parag.
 capnoresbium, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 331.—Mexic.
 cardiophyllum, *Robinson, l. c.*—Mexic.
 chiapense, *Robinson, l. c.* 332.—Mexic.
 chimborazense, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 7.—Ecuador.
 cochabambense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 745.—Bolivia.
 Commersonii, *Hieron. l. c.* 771 = bacleanum.
 connivens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 57.—Bolivia.
 Conzattii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 574.—Am. cent.
 crassipes, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 780.—Am. austr.
 crassirameum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 332.—Mexic.
 crenaeum, *Robinson, l. c.* 333.—Mexic.
 crenulatum, *Spreng. ex Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 776 (= *Baccharis crenulata*).—Am. austr.
 critoniforme, *Urb. Symb. Antill.* i. 458.—Ind. occ.
 decussatum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 295 (non Sieber).—Am. cent.
 desquamatum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 333.—Mexic.
 Dioscoridis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 629 = Agrimonia.
 Eupatorium.
 entrerriense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 767.—Am. austr.
 eriocarpum, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 42.—Mexic.
 euonymifolium, *Greene, Pittonia*, iii. 31.—Mexic.
 foliatum, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 748 (= *Osmia foliatum*).—Bras.
 gardnerianum, *Hieron. l. c.* 758.—Bras.
 geraniifolium, *Urb. Symb. Antill.* i. 458.—Ind. occ.
 glanduliferum, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 13.—Ecuador.
 glandulosissimum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 40.—Bras.
 grandiflorum, *Andrè, in Rev. Hort.* 1882, 384.—Hab. ?
 Harrisii, *Urb. Symb. Antill.* i. 460.—Ind. occ.
 heterolepis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 335.—Am. cent.
 heydeanum, *Robinson, l. c.*—Am. cent.
 Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 147.—Bolivia.
 Hunzigeri, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 779.—Am. austr.
 inaequidens, *Urb. Symb. Antill.* i. 460.—Ind. occ.
 incisum, *Chapm. Fl. S. U. S. ed. III.* 216 = jucundum.
 itatiayense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 764.—Am. austr.
 jucundum, *Greene, Pittonia*, iii. 180.—Am. bor.
 jujulense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 744.—Am. austr.
 Klattii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 105.—Ind. occ.
 koelliaefolium, *Greene, Pittonia*, iii. 31.—Mexic.
 Kuntzei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 766.—Bolivia.
 lanicaule, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 336.—Mexic.
 lechaeafolium, *Greene, Pittonia*, iii. 177.—Am. bor.
 lilacinum, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 757.—Am. austr.
 lloense, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 11.—Ecuador.
 Loesenerii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 336.—Mexic.
 Lorentzii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 787.—Am. austr.
 mattogrossense, *Hieron. l. c.* 761.—Bras.
 minasgeraense, *Hieron. l. c.* 749.—Bras.
 Nelsonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 337.—Mexic.
 Niederleinii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 763.—Am. austr.
 obscurifolium, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 9.—Ecuador.
 obtusisquamum, *Hieron. l. c.* 14.—Ecuador.
 oreithalium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 308.—Mexic.
 oresbium, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 337.—Mexic.
 oyadense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 755.—Am. austr.

EUPATORIUM :—

- paradanense, *Parish, in Zoe*, v. 75.—Am. bor.
 paraguariense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 752.—Parag.
 paucicapitulatum, *Hieron. l. c.* 756.—Am. austr.
 paulense, *Loefgr. in Bol. Commiss. Geogr. São Paulo*, i. no. 12. 242.—Bras.
 peninsulare, *Brandegee, in Erythea*, vii. 4.—Mexic.
 petalodium, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 492.—Am. bor.
 phoenicolepis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 338.—Mexic.
 photinum, *Robinson, l. c.*—Mexic.
 picturatum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5. 41.—Bras.
 platyphyllum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 339.—Mexic.
 polyodon, *Urb. Symb. Antill.* i. 462.—Ind. occ.
 portoricense, *Urb. l. c.* 459.—Ind. occ.
 pseudoglomeratum, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 8.—Ecuador.
 pseudohirsutum, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 758.—Mexic.
 pseudoriganoides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 10.—Ecuador.
 pteropodium, *Hieron. l. c.* 15.—Ecuador.
 Purpui, *Brandegee, in Erythea*, vii. 3.—Mexic.
 resinifluum, *Urb. Symb. Antill.* i. 461.—Ind. occ.
 rupicola, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 42.—Mexic.
 saltense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 786.—Am. austr.
 santacruzense, *Hieron. l. c.* 762.—Bolivia.
 saucechicoense, *Hieron. l. c.* 775.—Am. austr.
 scabrellum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 339.—Mexic.
 Schickendantzii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 769.—Am. austr.
 selerianum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 340.—Mexic.
 sitiense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 751.—Am. austr.
 Smithii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 340.—Mexic.
 Sodiroy, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 12.—Ecuador.
 squarrosoramosum, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 753.—Am. austr.
 subscaudens, *Hieron. l. c.* 742.—Bolivia.
 tamboense, *Hieron. l. c.* 770.—Am. austr.
 tenuiflorum, *Hieron. l. c.* 772 (= *Mikania tenuiflora*).—Am. austr.
 tequendamense, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 6.—N. Granat.
 tubaraoense, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 784.—Am. austr.
 Ulei, *Hieron. l. c.* 751.—Am. austr.
 venosissimum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 57.—Bolivia.
- EUPHORBIA**, *Linn.* (Euphorb.).
- albicaulis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 266.—Am. bor.
 albiflora, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 442.—Bras.
 alta, *Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 108.—Am. sept.
 Ammak, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. II. 319.—Arab.
 amphophylla, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 186.—Afr. trop.
 Anderssonii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 63.—Ins. Galap.
 andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 943.—Afr. trop.
 Andromedae, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 63.—Ind. occ.
 Anthonyi, *Brandegee, in Erythea*, vii. 7.—Mexic.
 apocynifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 467.—Am. bor.
 arenicola, *Parish, in Erythea*, vii. 93.—Am. bor.
 aspericaulis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 26.—Afr. austr.
 atrococca, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud.* i. 844.—Ins. Sandw.
 Bachmanni, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 535.—Afr. trop.
 balsamea, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 951.—Afr. trop.
 bellica, *Hiern, l. c.* 945.—Afr. trop.
 benguelensis, *Pax, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 741.—Afr. austr.
 Benthami, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 943.—Afr. trop.

EUPHORBIA:—

- bermudiana, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii.* 65.—Ind. occ.
 Buchanani, *Pax, in Engl. Jahrb. xviii.* 27.—Afr. trop.
 chaculana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xvii.* 441.—Am. cent.
 Chimaera, *Lipsky, in Acta Hort. Tiflis, iv.* 444.—Reg. Caucas.
 ciliolata, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 743.—Afr. austr.
 clarionensis, *Brandege, in Erythea, vii.* 7.—Mexic.
 claytonioides, *Pax, in Engl. Jahrb. xxiii.* 533.—Afr. trop.
 coeruleans, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 739.—Afr. austr.
 Coghiani, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 12.—Austral.
 confertiflora, *Volkens, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii.* 266.—Afr. trop.
 cozumelensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii.* 61.—Am. cent.
 crassinodis, *Urb. Symb. Antill. i.* 340.—Ind. occ.
 Durandoi, *Chabert, in Journ. de Bot. 1900,* 70.—Alger.
 Eggersii, *Urb. Symb. Antill. i.* 343.—Ind. occ.
 enterophona, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 307.—Madag.
 eriogonoides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,* 614.—Am. bor.
 Flamandi, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii.* 253.—Afr. bor.
 Fleckii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 738.—Afr. austr.
 fodhiana, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii.* 230.—Arab.
 Galpini, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 742.—Afr. austr.
 Gaumerii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i.* 372.—Mexic.
 glauca, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 737.—Afr. austr.
 glochidiata, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi.* 187.—Afr. trop.
 Goetzei, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii.* 420.—Afr. trop.
 Helleri, *Millsp. in Coult. Bot. Gaz. xxvi.* 268.—Am. bor.
 hirsuta, *Wiegand, in Coult. Bot. Gaz. xxiv.* 50 = *Rafinesquii.*
 huillensis, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii.* 27.—Afr. trop.
 inarticulata, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii.* 324.—Arab.
 Intisy, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1900, 260.—Madag.
 isaloensis, *Drake, l. c.* 1899, 307.—Madag.
 Karoi, *Frey, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 58.—Sibir.
 Kelleri, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 739.—Afr. austr.
 Laro, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 307.—Madag.
 laxiflora, *Kuntze, Rev. Gen. iii.* ii. 286.—Afr. austr.
 lehmanniana, *Pax, in Engl. Jahrb. xxvi.* 508.—N. Granat.
 Lehmbachii, *Pax, l. c.* xxviii. 27.—Afr. trop.
 leiococca, *Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 108.—Am. bor.
 longibracteata, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 742 (non DC.).—Afr. austr.
 Luciismithii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 36.—Mexic.
 lugubris, *Chabert, in Journ. de Bot.* 1900, 71.—Eur.
 macra, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 941.—Afr. trop.
 marilandica, *Greene, Pittonia, iii.* 345.—Am. bor.
 matabelensis, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien, xv.* 51.—Afr. austr.
 mayana, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i.* 304.—Mexic.
 mexicana, *Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 105.—Am. sept.
 moeringioides, *Pax, in Engl. Jahrb. xxvi.* 507.—N. Granat.
 multinodis, *Urb. Symb. Antill. i.* 341.—Ind. occ.
 napoides, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi.* 187.—Afr. trop.
 Nelsii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 737.—Afr. austr.
 Nelsonii, *Millsp. in Coult. Bot. Gaz. xxvi.* 268.—Am. bor.
 nenensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 942.—Afr. trop.
 Nuttallii, *Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii.* 371 = *zygophylloides.*
 oaxacana, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 37.—Mexic.
 olivacea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,* 613.—Am. bor.

EUPHORBIA:—

- opuntioides, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 945.—Afr. trop.
 paricramulosa, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii.* 326.—Arab.
 pergamena, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,* 615.—Am. bor.
 Perieri, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 308.—Madag.
 Pfeilii, *Pax, in Engl. Jahrb. xxiii.* 534.—Afr. trop.
 Phlomos, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii.* 156.—Lesbos.
 pileoides, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii.* 62.—Ind. occ.
 pindicola, *Hauskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s.* xi. 63.—Eur.
 popayanensis, *Pax, in Engl. Jahrb. xxvi.* 507.—N. Granat.
 portoricensis, *Urb. Symb. Antill. i.* 338.—Ind. occ.
 Qarad, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii.* 230.—Arab.
 quinecostata, *Volkens, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii.* 266.—Afr. trop.
 Rafinesquii, *Greene, Pittonia, iii.* 207.—Am. bor.
 Reineckeii, *Pax, in Engl. Jahrb. xxv.* 648.—Ins. Samoa.
 Reinhardtii, *Volkens, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii.* 263.—Afr. trop.
 Riebeckii, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii.* 26.—Arab.
 Rigoi, *Boiss. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 987.—Ins. Cyprus.
 Rivae, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi.* 186.—Afr. trop.
 rivularis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud. i.* 846.—Ins. Sandw.
 Robecchii, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi.* 186.—Afr. trop.
 robusta, *Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii.* 381.—Am. bor.
 Schinzii, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 739.—Afr. austr.
 schizacantha, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi.* 187.—Afr. trop.
 Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii.* 26.—Afr. trop.
 Seleri, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii.* 441.—Am. cent.
 serbica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv.* 283.—Eur.
 Serpicula, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 941.—Afr. trop.
 Sintenisii, *Boiss. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 986.—Eur.
 somalensis, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi.* 187.—Afr. trop.
 sparsiflora, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud. i.* 846.—Ins. Sandw.
 stipitata, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii.* 65.—Ind. occ.
 Stuhlmanni, *Pax, in Engl. Jahrb. xxiii.* 535.—Afr. trop.
 Stuhlmanni, *Schweinf. ex Volkens, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii.* 267 (non Pax).—Afr. trop.
 subcaerulea, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 37.—Mexic.
 subfalcata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 948.—Afr. trop.
 subsalsa, *Hiern, l. c.* 948.—Afr. trop.
 tenella, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 738 (non H. B. & K.).—Afr. austr.
 tetracantha, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 130.—Afr. trop.
 Torralbasii, *Urb. Symb. Antill. i.* 339.—Ind. occ.
 transvaalensis, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 394.—Afr. austr.
 tricolor, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 479.—Mexic.
 Troodii, *Post, in Mém. Herb. Boiss. no.* 18. 100.—Eur.
 uhehensis, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii.* 420.—Afr. trop.
 variegata, *Deflers, Voy. Yemen, 198.*—Arab.
 verticillata, *Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 740.—Afr. austr.
 villosula, *Urb. Symb. Antill. i.* 340 (non Pax).—Ind. occ.
 violacea, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 480.—Mexic.
 xbacensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i.* 374.—Mexic.
 xylopoda, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 480.—Mexic.
 Zenkeri, *Pax, in Engl. Jahrb. xxiii.* 536.—Afr. trop.
 zinnifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,* 615.—Am. bor.

EUPHORANTHUS, Radlk. = *Euphoriopsis*, Radlk. (Sapind.).
obtusatus, Radlk. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 406, nomen.—Celebes.

EUPHRASIA, Linn. (Scrophul.).

- alpina*, *Bub. Fl. Pyren. i.* 275 = *Bartsia alpina*.
americana, *Wettst. Monogr. Euphr. 127.*—Am. bor.
Berggreni, *Wettst. l. c.* 265.—N. Zel.
Bicknelli, *Wettst. in Bickn. Fl. Bordigh. 325.*—Eur.
borealis, *Wettst. Monogr. Euphr. 108.*—Eur.
canadensis, *F. Towns. in Journ. Bot.* 1898, 1.—Am. bor.
Cheesemani, *Wettst. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 381.—N. Zel.
curta, *Wettst. Monogr. Euphr. 128.*—Eur.
debilis, *Wettst. l. c.* 275.—Chili.
Dyeri, *Wettst. l. c.* 267.—N. Zel.
Fagonii, *Bub. Fl. Pyren. i.* 275.—Eur.
flavescens, *Phil. ex Wettst. Monogr. Euphr. 273.*—Chili.
foulaensis, *Towns. ex Wettst. Monogr. Euphr. 139; et in Bot. Centralbl. lxvii.* 326.—Eur.
glacialis, *Wettst. Monogr. Euphr. 259.*—Austral.
hebecalyx, *Brenn. in Bot. Notiser, 1898,* 181.—Eur.
himalayica, *Wettst. Monogr. Euphr. 130.*—Reg. Himal.
Hookeri, *Wettst. l. c.* 268.—Tasman.
insignis, *Wettst. l. c.* 246.—Japon.
italica, *Wettst. l. c.* 242.—Eur. austr.
Jaeschkei, *Wettst. l. c.* 80.—Reg. Himal.
japonica, *Wettst. l. c.* 245.—Japon.
Marchesettii, *Wettst. ex Marchesetti, Fl. Trieste, 411.*—Eur.
marilaunica, *Kern. in Sched. Fl. Austr.-Hung. viii.* 31.—Eur.
mollis, *Wettst. Monogr. Euphr. 141.*—As. bor.; Am. bor.
Muelleri, *Wettst. l. c.* 257.—Austral.
multifolia, *Wettst. l. c.* 126.—Japon.
Oakesii, *Wettst. l. c.* 142.—Am. bor.
occidentalis, *Wettst. l. c.* 135.—Eur.
paucifolia, *Wettst. l. c.* 198.—As. cent.
petiolaris, *Wettst. l. c.* 199.—As. austr.
polonica, *Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1897, 187.—Eur.
pygmaea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi.* 279 (non C. Koch).—N. Zel.
pyrenaea, *Bub. Fl. Pyren. i.* 278.—Eur.
Regelii, *Wettst. Monogr. Euphr. 81.*—As. austr.
rubra, *Bub. Fl. Pyren. i.* 276 = *Bartsia Odontites*.
Schlagintweitii, *Wettst. Monogr. Euphr. 181.*—As. cent.
scottica, *Wettst. l. c.* 170.—Eur.
versicolor, *Bub. Fl. Pyren. i.* 274 = *Bartsia Trixago*.
zelandica, *Wettst. Monogr. Euphr. 264.*—N. Zel.
- EUPRITCHARDIA, Kuntze, *Rev. Gen. iii.* ii. 323 (1898) = *Pritchardia*, Seem. & H. Wendl. (Palm.).
Gaudichaudii, *Kuntze, l. c.* = *P. Gaudichaudii*.
Hildebrandtii, *Kuntze, l. c.* = *P. Hildebrandtii*.
lanigera, *Kuntze, l. c.* = *P. lanigera*.
Martii, *Kuntze, l. c.* = *P. Martii*.
pacifica, *Kuntze, l. c.* = *P. pacifica*.
pericularum, *Kuntze, l. c.* = *P. pericularum*.
remota, *Kuntze, l. c.* = *P. remota*.
Thurstonii, *Kuntze, l. c.* = *P. Thurstonii*.
vluystekeana, *Kuntze, l. c.* = *P. vluystekeana*.
- EUPTELEA, Sieb. & Zucc. (Magnol.).
Delavayi, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1900, 273.—China.
Francheti, *Van Tiegh. l. c.*—China.
- EURYA, Thunb. (Ternstr.).
amplexicaulis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 168.—Ins. Philipp.
Tigang, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 447.—N. Guin.
- EURYOPS, Cass. (Compos.).
decipiens, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii.* 212.—Afr. austr.
Evansii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 501.—Afr. austr.
montanus, *Schlechter, l. c.* 1898, 316.—Afr. austr.
namaquensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii.* 212.—Afr. austr.
Osteospermum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 403.—Afr. trop.
rupestris, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii.* 213.—Afr. austr.
somalensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 459.—Afr. trop.
transvaalensis, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv.* 843.—Afr. austr.
- EURYPTERA, Nutt. = *Peucedanum*, Linn. (Umbellif.).
Hasseli, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii.* 242 = *P. Hasseli*.
Howellii, *Coult. & Rose, l. c.* 243 = *P. Howellii*.

EURYPTERA:—

insularis, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 242 = *P. insulare*.
pallida, Coult. & Rose, l. c. 242.—Am. bor.
parvifolia, Coult. & Rose, l. c. 241 = *P. parvifolium*.

EURYSOLEN, Prain, in Sci. Mem. Medic. Offic. India, xi. (1898) 43. *LABIATAE*.
gracilis, Prain, l. c. 44.—Ind. or.

EUSTACHYS, Desv. = **Chloris**, Sw. (Gramin.).
neglecta, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 450 = *C. neglecta*.

EUTRIANA, Trin. (Gramin.).
abyssinica, R. Br. ex Presen. in Mus. Senckenb. ii. 142 = *Gracilea royleana*.

EVODIA, Forst. (Rutac.).
anisodora, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 374.—N. Guin.
borbonica, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 119 (= *Zanthoxylum borbonicum*).—Ins. Bourbon.
Kingii, Engl. l. c. 121.—Malacca.
macrophylla, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 371, nomen.—Celebes.
Muelleri, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 121.—Austral.
nervosa, Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xvii. 208.—Java.
rubra, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 375.—N. Guin.
tonkinensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 121.—Tonkin.

EVODIANTHUS, Oerst. = **Carludovicia**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
Freyreissii, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvi. no. 8. 9.—Bras.
funifer, Lindm. l. c. 8 = *C. funifera*.

EVOLVULUS, Linn. (Convolv.).
commelinifolius, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 89.—Mexic.
elaegnifolius, Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 38.—Bras.
Glaziovii, Damm. l. c. 37.—Bras.
goyazensis, Damm. l. c.—Bras.
graminifolius, Damm. l. c. 38.—Bras.
hypocrateriflorus, Damm. l. c. 37.—Bras.
mollis, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 285.—Am. bor.
ovatus, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 89.—Am. bor.
rosmarinifolius, Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 38.—Bras.
yemensis, Deflers, *Voy. Yemen*, 175.—Arab.

EXCOECARIA, Linn. (Euphorb.).
Bodenbenderi, K. Schum. in *Fust. Jahresb.* xxvi. i. 349 (= *Sapium Bodenbenderi*).—Reg. Argent.

EXCREMIS, Willd. (Liliac.).
scabra, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. 11. 316.—Bolivia.

EXECHOSTYLUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 67. *RUBIACEAE*.
flaviflora, K. Schum. l. c. 68.—Afr. trop.

EXOCHAENIUM, Griseb. = **Belmontia**, E. Mey. (Gentian.).
debile, Welw. in Trans. Linn. Soc. xxvii. 43 = *B. debilis*.
primulaeflorum, Welw. l. c. 47 = *B. primulaeflora*.

EXOSOLENIA, Baill. ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 46 = **Genipa**, Linn. (Rubiace.).

EXOSTEMMA, Rich. (Rubiace.).
elegans, Krug & Urb. in *Urb. Symb. Antill.* i. 423.—Ind. occ.
Picardae, Krug & Urb. l. c. 422.—Ind. occ.
subcordatum, Krug & Urb. l. c. 421.—Ind. occ.
Wrightii, Krug & Urb. l. c. 424.—Ind. occ.

F

FABIANA, Ruiz & Pav. (Solan.).
patagonica, Speg. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 557.—Patag.

FACELIS, Cass. (Compos.).
capillaris, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 62.—Bolivia.

FADOGIA, Schweinf. (Rubiace.).

humilis, J. M. Wood & Evans, in *Journ. Bot.* 1899, 252.—Afr. austr.
Welwitschii, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 481.—Afr. trop.

FAGARA, Linn. = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).
acuminata, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 593 = *Z. acuminatum*.

acutifolia, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117.—Bras.

Afzelii, Engl. l. c. 118.—Afr. trop.
ailanthoides, Engl. l. c. = *Z. ailanthoides*.
amoyensis, Engl. l. c. 117 = *Z. amoyense*.
angolensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 148.—Afr. trop.
arenaria, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. arenarium*.

articulata, Engl. l. c. = *Z. articulatum*.
Bachmannii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 149.—Afr. trop.
bijuga, Engl. l. c. xxi. Beibl. liv. 23.—Mexic.
bombacifolia, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 567 = *Z. bombacifolium*.

brachycantha, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 119 = *Z. brachycanthum*.

camphorata, Engl. l. c. 117 = *Z. camphoratum*.
caribaea, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 562 = *Z. caribaeum*.

caroliniana, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. caroliniana*.

chalybea, Engl. l. c. 118 = *Z. chalibeum*.

ciliata, Engl. l. c. = *Z. ciliatum*.

cinerea, Engl. l. c. 117.—Bras.
Coco, Engl. l. c. = *Z. Coco*.

coriacea, Engl. l. c. = *Z. coriaceum*.
costaricensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 25.—Am. cent.

crassifolia, Engl. l. c. 21.—Mexic.
cujabensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. cujabense*.

Culantrilo, Schult. Mant. iii. 224 = *Z. Culantrilo*.
cuspidata, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. cuspidatum*.

dimorphophylla, Engl. l. c. = *Z. dimorphophylla*.
Dinklagei, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 147.—Afr. trop.

dipetala, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 119 = *Z. dipetalum*.

dissita, Engl. l. c. 118 = *Z. dissitum*.

diversifolia, Warb. ex Engl. l. c.—Malaya.
domingensis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 586.—Ind. occ.

duplicipunctata, Krug & Urb. l. c. 573 = *Z. duplicipunctatum*.

echinocarpa, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. echinocarpum*.

Ehrenbergii, Engl. l. c. 118.—Mexic.

Eichleri, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 22.—Bras.
elegans, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. elegans*.

elegantissima, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 25.—Mexic.

elephantiasis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 564 = *Z. elephantiasis*.

emarginella, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. emarginellum*.

falcifolia, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 24.—Mexic.

flava, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 571 = *Z. flavum*.

foliolosa, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. foliolosum*.

furfuracea, Engl. l. c. 117 = *Z. furfuraceum*.
Gardneri, Engl. l. c. = *Z. Gardneri*.

glandulosa, Engl. l. c. 119 = *Z. glandulosum*.
glazioviana, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 21.—Bras.

grandifolia, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. grandifolium*.

granulata, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 594.—Ind. occ.

hamiltoniana, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. hamiltonianum*.

Hartii, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 586.—Ind. occ.

hawaiensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 119 = *Z. hawaiense*.

hiemalis, Engl. l. c. 117 = *Z. hyemale*.
Hieronimi, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 24.—Reg. Argent.

juglandifolia, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 587 = *Z. juglandifolium*.

FAGARA:—

juniperina, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. juniperinum*.

kauaiensis, Engl. l. c. 119 = *Z. kauaiense*.
khasyana, Engl. l. c. 118 = *Z. khasianum*.

latespinosa, Engl. l. c. 117 = *Z. latespinosum*.
Leprieurii, Engl. l. c. 118 = *Z. Leprieurii*.

liebmanniana, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 20.—Mexic.

Limoncello, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. Limoncello*.

macrophylla, Engl. l. c. 118 = *Z. macrophyllum*.
macrosperma, Engl. l. c. 117 = *Z. macrospermum*.

mauiensis, Engl. l. c. 119 = *Z. maviense*.
Mayu, Engl. l. c. 118 = *Z. Mayu*.

melanacantha, Engl. l. c. = *Z. melanacanthum*.
melanosticta, Engl. l. c. 117 = *Z. melanostictum*.

micrantha, Engl. l. c. 118 = *Z. micranthum*.
microcarpa, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 570 = *Z. microcarpum*.

minutiflora, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. minutiflorum*.

mollissima, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 22.—Mexic.

monogyne, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. monogynum*.

montana, Engl. l. c. 118 = *Z. montanum*.

multiflora, Engl. l. c. 117.—Bras.

multifoliata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 149.—Afr. trop.

myriacantha, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. myriacanthum*.

Naranjillo, Engl. l. c. 117 = *Z. Naranjillo*.
nemorale, Engl. l. c. = *Z. nemorale*.

Niederleinii, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 24.—Reg. Argent.

nigra, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. nigrum*.

nitida, Engl. l. c. = *Z. nitidum*.
oahuensis, Engl. l. c. 119 = *Z. oahuense*.

obscura, Engl. l. c. 117.—Bras.

olitoria, Engl. l. c. 118 = *Z. olitorium*.
ovalifolia, Engl. l. c. = *Z. ovalifolium*.

ovatifoliolata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 150.—Afr. trop.

parviflora, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 119 = *Z. parviflorum*.

pauciflora, Engl. l. c. 117 = *Z. pauciflorum*.
peckoltiana, Engl. l. c. = *Z. peckoltianum*.

pilosissima, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 26.—Mexic.

pilosiuscula, Engl. l. c. xxiii. 150.—Afr. trop.

pinnata, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 119 = *Z. Blackburnia*.

pistacifolia, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 573 = *Z. pistacifolium*.

podocarpa, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. podocarpum*.

Poggei, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 146.—Afr. trop.

pohliana, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. pohlianum*.

polyacantha, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 148.—Afr. trop.

Pringlei, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117.—Mexic.

pumila, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 21.—Mexic.

quinduensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. quinduense*.

rhoifolia, Engl. l. c. 118 = *Z. rhoifolium*.
riedeliana, Engl. l. c. 117 = *Z. riedelianum*.

rigida, Engl. l. c. = *Z. rigidum*.
rugosa, Engl. l. c. = *Z. rugosum*.

ruisiana, Engl. l. c. = *Z. obscurum*.
sapindoides, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 587 = *Z. sapindoides*.

scandens, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 118 = *Z. scandens*.

schinifolia, Engl. l. c. = *Z. schinifolium*.
serrulata, Engl. l. c. = *Z. serrulatum*.

setosa, Engl. l. c. = *Z. setosum*.
spinosa, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 590 = *Z. emarginatum*.

Sprucei, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 117 = *Z. Sprucei*.

stenophylla, Engl. l. c. 118 = *Z. stenophyllum*.
Stuhlmannii, Engl. l. c. = *Z. Stuhlmannii*.

suberrata, Engl. l. c. 117 = *Z. suberratum*.
Swartzii, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 589 = *Z. emarginatum*.

syncarpa, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. 1v. 116 = *Z. syncarpum*.

- FAGARA**:—
taediosa, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 582 = *Z. taediosum*.
tenuifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. vi. 117 = *Z. tenuifolium*.
tetrasperma, Engl. l. c. 118 = *Z. tetraspermum*.
thomasiana, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 583.—Ind. occ.
thomensis, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 149.—Bras.
torva, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 119 = *Z. torvum*.
tuberculata, Engl. l. c. 117 = *Z. tuberculatum*.
Uhdei, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 22.—Mexic.
usambarensis, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
venenifca, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 119 = *Z. venenificum*.
wolubilis, E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 422.—China.
warmingiana, Engl. in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liv. 23.—Bras.
Welwitschii, Engl. l. c. xxiii. 147.—Afr. trop.
- FAGARAS**, Burm. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 84 (1898) = *Zanthoxylum*, Linn. (Rutac.).
Fagara, Kuntze, l. c. = *Z. Pterota*.
- FAGELLA**, Schwencke = *Caecolaria*, Linn. (Scrophul.).
aquatica, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 231 = *C. aquatica*.
boliviana, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 24.—Am. austr.
falklandica, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 460.—Ins. Falkland.
Grisebachii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 231 = *C. foliosa*.
teucroides, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 24 = *C. teucroides*.
Volkmannii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 232 = *C. Volkmannii*.
- FAGONIA**, Tourn. (Zygophyll.).
Bischarorum, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. II. 276.—Afr. trop.
Flamandi, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. 249.—Afr. bor.
isotricha, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12, (1897) 54.—Afr. bor.
Jolyi, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. 249.—Afr. bor.
Lahovarii, Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis, 204.—Afr. trop.
soturbensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. II. 276.—Afr. trop.
- FAGRAEA**, Thunb. (Logan).
macroscypha, Baker, in Kew Bull. 1896, 25.—Borneo.
Rodatzi, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 499.—N. Guin.
spicata, Baker, in Kew Bull. 1896, 25.—Borneo.
- FAGUS**, Tourn. (Cupulif.).
engleriana, Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 285.—China.
longipetiolata, Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 56.—China.
orientalis, Lipsky, in Acta Hort. Petrop. xiv. 300.—Reg. Caucas.
truncata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 280.—N. Zel.
- FALCATA**, J. F. Gmel. = *Amphicarpaea*, Ell. (Legum.).
ovalifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 63 = *Cologania australis*.
- FARMERIA**, Willis, ex Hook. f. in Trim. Fl. Ceyl. v. 386 (1900). *PODOSTEMACEAE*.
metzgerioides, Willis, l. c.—Zeylan.
- FAROA**, Welw. (Gentian).
axillaris, Baker, in Kew Bull. 1898, 158.—Afr. trop.
- FASCICULARIA**, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. 627 (1894), in nota; et in DC. Monog. Phan. ix. 7 (1896). *BROMELIACEAE*.
bicolor, Mez, l. c. 627; l. c. 9.—Chili.
litoralis, Mez, l. c.; l. c. 8.—Chili.
parviflora, Mez, in DC. Monog. Phan. 12.—Chili
pitcairniifolia, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. 627; et l. c. 10.—Chili.
- FEGIMANRA**, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. 458 (1896). *ANACARDIACEAE*.
africana, Engl. l. c.—Afr. trop.
- FELICIA**, Cass. (Compos.).
amelioides, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 26.—Afr. austr.
bellidioides, Schlechter, l. c. 1897, 219.—Afr. austr.
ciliata, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 201.—Afr. austr.
drakensbergensis, J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1899, 253.—Afr. austr.
lingulata, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. 881.—Afr. austr.
pinnatifida, J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1899, 253.—Afr. austr.
Schenckii, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. vi. 751.—Afr. austr.
- FENDLERELLA**, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 626. *SAXIFRAGACEAE*.
utahensis, A. A. Heller, l. c.—Am. bor.
- FERRARIA**, Linn. (Irid.).
andongensis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 27 = *Moraea andongensis*.
bechuanica, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 344.—Afr. trop.
Candelabrum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 27 (= *Moraea Candelabrum*).—Afr. trop.
glutinosa, Rendle, l. c. (= *Moraea glutinosa*).—Afr. trop.
viscaria, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 10, 77.—Afr. trop.
- FERULA**, Tourn. (Umbellif.).
collina, Freyn, in Mém. Herb. Boiss. no. 13, 25.—Oriens.
Cypria, Post, in Mém. Herb. Boiss. no. 18, 94.—Cyprus.
latisegmenta, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 158.—Lesbos.
- FERULAGO**, Koch = *Ferula*, Linn. (Umbellif.).
kurdica, Post, Fl. Syria, 14.—Syria.
- FESTUCA**, Tourn. (Gramin.).
acuta, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 175.—Chili.
asthenica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 354.—Ind. or.
barbata, Linn. Moen. Acad. iii. 400 = *Schismus fasciculatus*.
Bastia, Ham. ex Wall. Cat. n. 3805 C, D = *Leptochila filiformis*.
breviaristata, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 717.—Ecuador.
bromoides, Linn. Sp. Pl. 75 = *Vulpia bromoides*.
calceolaris, Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 211.—Reg. Caucas.
calycina, Loeffl. It. Hisp. 116 = *Schismus fasciculatus*.
campestris, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 57.—Am. bor.
Cumminsii, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 349.—Ind. or.
dactyloides, Roth, Nov. Pl. Sp. 78 = *Koeleria cristata*.
Davilae, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 176.—Chili.
Deasyi, Rendle, in Journ. Bot. 1900, 429.—Turkestan.
decumbens, Linn. Sp. Pl. 75 = *Danthonia decumbens*.
Duthiei, Hack. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 352 = *altaica*.
filiformis, Steud. Syn. Pl. Gram. 302 = *Tripogon abyssinicus*.
glaucescens, Roth, Nov. Pl. Sp. 78 = *Koeleria cristata*.
glaucophylla, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 178.—Chili.
indica, Retz. Obs. iv. 21 = *Diplachne fusca*.
kashmiriana, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 351.—Ind. or.
leptopogon, Stapf, l. c. 354.—Ind. or.
Levingei, Stapf, l. c. 352.—Ind. or.
longearistata, Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 212 (non Walp.).—Reg. Caucas.
longipes, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 721.—Afr. austr.
lucida, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 355.—Ind. or.
melangaea, Spreng. Syst. i. 352 = *Lasiochloa longifolia*.
monantha, Stapf, in Kew Bull. 1899, 117.—N. Guin.
mucronata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 22 = *Aeluropus villosus*.
mysorensis, Heyne, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 600 = *Tripogon bromoides*.
- FESTUCA**:—
mysurensis, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 287 = *praec.*
natans, Ham. in Wall. Cat. n. 3823 = *Myriostachya wightiana*.
neesiana, Steud. Nomencl. ed. II. i. 631 = *scabra*.
nitidula, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 350.—Ind. or.
orthophylla, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 717.—Peruv.
pampeana, Spag. Contr. Fl. Vent. 73.—Reg. Argent.
papuana, Stapf, in Kew Bull. 1899, 117.—N. Guin.
pascua, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 176.—Chili.
patagonica, R. Phil. l. c. 174.—Chili.
polyclea, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 349.—Ind. or.
pungens, Vahl, Symb. Bot. i. 10 = *Aeluropus villosus*.
pyrogea, Spag. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 97.—Reg. Magell.
rigida, Kunth, Rév. Gram. i. 129 = *Scleropoa rigida*.
scaberrima, Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = *Bromus asper*.
sciuroides, Roth, Bot. Abh. 43 = *Vulpia bromoides*.
Serranoi, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 179.—Chili.
Shuka, Spag. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 95.—Reg. Magell.
spaniantha, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 174.—Chili.
Stuedelii, R. Phil. l. c. 177.—Chili.
Stuebelii, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 717.—Bolivia.
subandina, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 177.—Chili.
sublimis, Pilg. in Engl. Jahrb. xxv. 718.—Ecuador.
undata, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 350.—Ind. or.
valesiaca, Schleich. ex Gaudin, Agrost. Helv. i. 242.—Ind. or.
vallicola, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 57.—Am. bor.
ventanica, Spag. Contr. Fl. Vent. 72.—Reg. Argent.
wightiana, Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = *Bromus asper*.
- FEUILLÉE**, Kuntze = *Fevillaea*, Linn. 1735, gen. collect. (Legum.).
boliviana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 63 = *Calliandra boliviana*.
Feuillei, Kuntze, l. c. = *Inga Feuillei*.
pithecoloboides, Kuntze, l. c. 64 = *Inga pithecoloboides*.
scalaris, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium scalaris*.
- FEVILLEA**, Linn. 1737 (Cucurb.).
Harmsii, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 383 (= *Nhandiroba Harmstii*).—Bolivia.
pergamentea, Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 104.—Bolivia.
- FICALHOA**, Hiern, in Journ. Bot. 1898, 329. *ERICACEAE*.
laurifolia, Hiern, l. c.—Afr. trop.
- FICARIA**, Dill. = *Ranunculus*, Linn. (Ranunc.).
ficarioides, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 26 = *R. ficarioides*.
- FICINIA**, Schrad. (Cyper.).
aphylla, Nees, in Endl. Prodr. Fl. Norf. 23.—Afr. austr.
composita, Nees, in Linnaea, ix. 292 = *brevifolia*.
dasystachys, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 251.—Afr. austr.
gracilis, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 256 = *tenuifolia*.
lateralis, Kunth, l. c. 254 = *aphylla*.
latinus, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 252.—Afr. austr.
Ludwigii, Boeck. in Flora, lxxv. (1882) 15 = *tenuifolia*.
membranacea, Kunth, Enum. Pl. ii. 252 = *Scirpus membranaceus*.
micrantha, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 240.—Afr. austr.
minutiflora, C. B. Clarke, l. c. 759.—Afr. austr.
Poitretii, Kunth, Enum. Pl. ii. 255 = *gracilis*.
rugulosa, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 241.—Afr. austr.
schinziana, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxix. 47 = *Scirpus diabolicus*.
subacuta, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 244.—Afr. austr.

FICUS, Tourn. (Urtic.).

- adelpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 284.—N. Guin.
 Aoa, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 615.—Ins. Samoa.
 arbuscula, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 272.—N. Guin.
 balicum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma balicum*).—Malaya.
 bembicarpa, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 269.—N. Guin.
 brachylepis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 1011.—Afr. trop.
 brevicula, *Hiern, l. c.* 1009.—Afr. trop.
 callescens, *Hiern, l. c.* 1001.—Afr. trop.
 caulothyrus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 286.—N. Guin.
 ceylanica, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 293 = laevis.
 Challa, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 144.—Arab.
 chrysochlamys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 274.—N. Guin.
 chrysolæna, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 279.—N. Guin.
 ciliata, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 615.—Ins. Samoa.
 clethrophylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 1017.—Afr. trop.
 Dahlii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 111.—N. Brit.
 Diepenhorstii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma Diepenhorstii*).—Sumatra.
 Du, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 283.—N. Guin.
 erythroperaia, *K. Schum. & Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 277.—N. Guin.
 Esmeralda, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 452.—Austral.
 eulampra, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 279.—N. Guin.
 Godeffroyi, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 613.—Ins. Samoa.
 Goetzei, *Warb. l. c.* xxviii. 378.—Afr. trop.
 Graeffei, *Warb. l. c.* xxv. 616.—Ins. Samoa.
 Gul, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 278.—N. Guin.
 Henryi, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 299.—China.
 heteromorpha, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2533-4.—China.
 Hollrungii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 287.—N. Guin.
 Hulletii, *King, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 603.—Celebes.
 hylophila, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 283.—N. Guin.
 hypoglauca, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 285.—N. Guin.
 keyensis, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 270.—Malaya.
 kingiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2535.—Formosa.
 Klinckii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 271.—N. Guin.
 Kunthii, *Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 298 = laurifolia.
 lachnocarpa, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 288.—N. Guin.
 lamprophylla, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 270.—N. Guin.
 langkokensis, *Drake, in Journ. de Bot.* 1896, 215.—Tonkin.
 leekensis, *Drake, l. c.* 213.—Tonkin.
 lima, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 269.—N. Guin.
 longecuspadata, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 614.—Ins. Samoa.
 macrorrhyncha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.
 magnolioides, *Borsi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 47.—Hort.
 mangiferifolia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 275.—N. Guin.
 martinicensis, *Willd. Sp. Pl.* iv. 1137 = laurifolia.
 Miquelii, *King, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 605.—Celebes.
 mourilyanensis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 452.—Austral.
 nerifolia, *Reinw. ex Steud. Nom. ed. II.* i. 637 = laurifolia.

FICUS:—

- pachyrrhachis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 282.—N. Guin.
 pachystemon, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 274.—N. Brit.
 palustris, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 288.—N. Guin.
 phaesyce, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 276.—N. Guin.
 polyantha, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 288.—N. Guin.
 portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 472.—Ind. occ.
 praeruptorum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 1004.—Afr. trop.
 pseudoelastica, *Welw. ex Hiern, l. c.* 996.—Afr. trop.
 pseudoribes, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 605.—Celebes.
 pycnoneura, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 275.—N. Guin.
 pygmaea, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 1009.—Afr. trop.
 pyriformis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma pyriformis*).—Java.
 ralumensis, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 112.—Afr. trop.
 Rama-Varmæ, *Bourdillon, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xiii. 155.—Ind. or.
 Reineckei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 617.—Ins. Samoa.
 rhododendrifolia, *Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol.* (1846) 16 = laurifolia.
 Rigo, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 235.—Austral.
 schumanniana, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.
 Schwarzii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 607, 644.—Celebes.
 setistyla, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 286.—N. Guin.
 sidifolia, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 1018.—Afr. trop.
 stenophylla, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2536.—China.
 stenorrhyncha, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.
 stenothyrsus, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 285.—N. Guin.
 subtrinervia, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 271.—N. Guin.
 thynneana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 231.—Austral.
 trachypison, *K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 280.—N. Guin.
 tristipula, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.* 286.—N. Guin.
 tuberculosa, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 999.—Afr. trop.
 tuphapensis, *Drake, in Journ. de Bot.* 1896, 211.—China.
 uniauriculata, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 616.—Ins. Samoa.
 urceolaris, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 1010.—Afr. trop.
 virgata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 369 (= *Urostigma virgatum*).—Java?

FILAGO, Linn. (Compos.).

- minor, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 205 = minima.
 Small, *in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 333 (= *Evax multicaulis*).—Am. sept.

FILIPENDULA, Tourn. = Spiræa, Linn. (Rosac.).

- occidentalis, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 185 = S. occidentalis.

FILLÆOPSIS, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. (1899)

258. LEGUMINOSAE.
 discophora, *Harms, l. c.* 259.—Afr. trop.

FIMBRISTYLIS, Vahl (Cyper.).

- arenaria, *Nees, in Linnaea*, x. 146 = Bulbostylis humilis.
 conspicua, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 56.—Bras.
 glazioviana, *Boeck. l. c.* 77.—Bras.
 glomerata, *Urb. Symb. Antill.* ii. 166 = spathacea.
 Kingii, *Gamble, in Boeck. Cyper. Nov.* ii. 40.—Ind. or.
 Trimeni, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 52.—Zeylan.
 tunquensis, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 56.—Cochinch.
 Woodrowi, *C. B. Clarke, in Kew Bull.* 1898, 227.—Ind. or.

FIRMIANA, Marsigli = Sterculia, Linn. (Sterculiac.).

- affinis, *Terrac. in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 56 = S. affinis.
 linearicarpa, *Terrac. l. c.* = S. linearicarpa.
 populifolia, *Terrac. l. c.* 55 (= *Hildegardia populifolia*).—As. or.
 Wallichii, *Terrac. l. c.* 56 (= *Scaphium Wallichii*).—Ind. or.

FITCHIA, Hook. f. (Compos.).

- temariiana, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1897, 107.—Ind. occ.

FLAVERIA, Juss. (Compos.).

- Bidentis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 148 = contrayerba.
 vaginata, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 48.—Mexic.

FLEMINGIA, Roxb. (Legum.).

- praecox, *C. B. Clarke, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 439.—Ind. or.

FLINDERSIA, R. Br. (Meliac.).

- chatawaiana, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 240.—Austral.
 Mazlini, *F. M. Bailey, l. c.*—Austral.

FLOERKEA, Willd. (Geraniac.).

- Macounii, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. i. 363 (= *Limnanthes Macounii*).—Am. bor.
 occidentalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 268.—Am. bor.

FLORESTINA, Cass. (Compos.).

- platyphylla, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 49 (= *Schkuhria platyphylla*).—Mexic.

FLOSCOPA, Lour. (Commel.).

- beirensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 319.—Afr. trop.

FLUGGEEA, Willd. (Euphorb.).

- capillipes, *Pax, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 427.—China.
 keyensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 277 (= *Securinega keyensis*).—Malaya.

FORCHHAMMERIA, Liebm. (Euphorb.).

- sphaerocarpa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 310.—Ind. occ.
 trifoliata, *Radlk. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 399.—Mexic.

FORCIPPELLA, Baill. (Acanth.).

- cleistochlamys, *Lindau, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 40.—Madag.

FORCIPPELLA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,

150. ILLECEBRACEAE.
 Rugelii, *Small, l. c.* (= *Siphonychia Rugelii*).—Am. bor.

FORESTIERA, Poir. (Oleac.).

- cartaginensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 396.—Am. cent.

FORRESTIA, A. Rich. (Commelin.).

- bicolor, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 360.—Sumatra.
 monosperma, *C. B. Clarke, l. c.* 359.—Penins. Mal.
 Preussii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 344.—Afr. trop.

FORSELLESIA, Greene = Glossopetalon, A. Gray

- (Celastr.).
 arida, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 7.—Am. bor.
 meionandra, *A. A. Heller, l. c.* 8 = G. meionandra.
 nevadensis, *A. A. Heller, l. c.* 7 = G. nevadensis.
 pungens, *A. A. Heller, l. c.* 8 = G. pungens.

FORSKOHLEA, Linn. (Urticac.).

- hereroensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 51.—Afr. trop.

FORSTERA, Linn. f. (Stylid.).

- major, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 272.—N. Zel.

FORSTERONIA, G. F. W. Mey. (Apocyn.).

- myriantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 435.—Am. cent.

- FORSYTHIA**, Vahl (Oleac.).
europaea, *Degen & Baldauci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 406.—Eur.
- FOTHERGILLA**, Murr. (Hamamel.).
monticola, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 374.—Am. bor.
- FOURNIERA**, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. (1897) 7. **GRAMINEAE**.
mexicana, *Scribn. l. c.* 8.—Mexic.
- FRACASTORA**, Adans. = **Sideritis**, Tourn. (Labiata).
aculeata, Bub. Fl. Pyren. i. 455 = *S. spinosa*.
alpestris, Bub. l. c. 456 = *S. hyssopifolia*.
hirsuta, Bub. l. c. 453 = *S. hirsuta*.
linearifolia, Bub. l. c. 457 = *S. pungens*.
scordioides, Bub. l. c. 458 = *S. scordioides*.
spathulata, Bub. l. c. 458 = *S. romana*.
- FRAGARIA**, Tourn. (Rosac.).
bracteata, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 194.—Am. bor.
crinita, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 171.—Am. bor.
firma, *Rydb. l. c.* 184.—Am. bor.
glauca, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 56.—Am. bor.
Helleri, *Holz. in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 36.—Am. bor.
pauciflora, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 183.—Am. bor.
platypetala, *Rydb. l. c.* 177.—Am. bor.
prolifera, *Baker & Rydb. ex Rydb. l. c.* 181.—Am. bor.
pumila, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
sibbaldifolia, *Rydb. l. c.* 176.—Am. bor.
Terrae-Novae, *Rydb. l. c.* 182.—Am. bor.
truncata, *Rydb. l. c.* 177.—Am. bor.
- FRANKENIA**, Linn. (Franken.).
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 497.—Patag.
- FRASERA**, Walt. (Gentian.).
ampla, *Greene, Pittonia*, iv. 186.—Am. bor.
fastigiata, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 312 = *thyrsiflora*.
macrophylla, *Greene, Pittonia*, iv. 186.—Am. bor.
venosa, *Greene, l. c.* 185.—Am. bor.
- FRAXINUS**, Tourn. (Oleac.).
biltmoreana, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 358.—Am. bor.
Eedenii, *Boerl. & Koord. in Natuurr. Tijdschr. Ned.-Ind.* lvi. 185.—Java.
malacophylla, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2598.—China.
- FREYCISETIA**, Gaudich. (Pandanae.).
australiensis, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 32.—Austral.
Beccarii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 166.—Borneo.
candelliformis, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 39.—Celebes.
caudata, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 167.—Ins. Fiji.
Creaghi, *Hemsl. l. c.*—Borneo.
ferox, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 33.—Ins. Philipp.
formosana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 166.—Formosa.
globiceps, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 30.—N. Guin.
Hemsl. l. c. 36.—Borneo.
Hollrungii, *Warb. l. c.* 30.—N. Guin.
humilis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 165.—Ins. Solomon.
Jagorii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 39.—Ins. Philipp.
latispina, *Warb. l. c.* 33.—Celebes.
l. auterbachii, *Warb. l. c.* 34.—N. Guin.
marantifolia, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 164.—Ins. Solomon.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 267, 638.—Celebes.
Naumannii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 32.—N. Guin.
novocaledonica, *Warb. l. c.* 37.—N. Caled.
novoguineensis, *Warb. l. c.* 34.—N. Guin.
papua, *Warb. l. c.* 42.—N. Guin.
philippinensis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 165.—Ins. Philipp.
polystigma, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 42.—N. Guin.
pseudo-insignis, *Warb. l. c.* 33.—N. Guin.
- FREYCISETIA** :—
Reineckeii, *Warb. ex Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 578.—Ins. Samoa.
rigidifolia, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 165.—Borneo.
samoensis, *Warb. ex Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 579.—Ins. Samoa.
Sarasinorum, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 35.—Celebes.
scabripes, *Warb. l. c.* 41.—Ins. Philipp.
sumatrana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 167.—Sumatra.
Vidalii, *Hemsl. l. c.* 166.—Ins. Philipp.
- FREZIERA**, Sw. (Ternstroem.).
Grisebachii, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 542 (= *Eroteum hirsutum*).—Ind. occ.
- FRITILLARIA**, Tourn. (Liliac.).
Alfredae, *Post, in Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 101.—Syria.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 222.—China.
intermedia, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli*, Ser. II. viii. no. 9, 5.—Eur.
nobilis, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7500.—Armenia.
ophioglossifolia, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 183.—As. Min.
pollinensis, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli*, Ser. II. viii. no. 9, 5.—Eur.
Skorpili, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 269.—Eur.
Souliei, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 221.—China.
- FRITSCHIANTHA**, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 241 (1898) = **Seemannia**, Regel (Gesnerac.).
Benaryi, *Kuntze, l. c.* 242 = *S. Benaryi*.
cuneata, *Kuntze, l. c.* = *S. cuneata*.
major, *Kuntze, l. c.* = *S. major*.
nematanthodes, *Kuntze, l. c.* 241.—Bolivia.
purpurascens, *Kuntze, l. c.* = *S. purpurascens*.
silvatica, *Kuntze, l. c.* = *S. silvatica*.
uniflora, *Kuntze, l. c.* 242 = *S. uniflora*.
- FRÖELICHIA**, Moench (Amarant.).
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. i. 63.—Parag.
- FRUMENTUM**, Krause, in *Bot. Centralbl.* lxxiii. (1898) 339 = **Triticum**, Linn. &c. (Gramin.).
arenarium, *Krause, l. c.* = *Elymus arenarius*.
Hordeum, *Krause, l. c.* = *Hordeum vulgare*.
junceum, *Krause, l. c.* = *Agropyron junceum*.
ovata, *Krause, l. c.* = *Triticum ovatum*.
pratense, *Krause, l. c.* = *Hordeum secalinum*.
repens, *Krause, l. c.* 340 = *Agropyron repens*.
sativum, *Krause, l. c.* 339 = *Hordeum vulgare*.
Secale, *Krause, l. c.* = *Secale cereale*.
silvaticum, *Krause, l. c.* = *Elymus europaeus*.
Triticum, *Krause, l. c.* = *Triticum sativum*.
- FUCHSIA**, Plum. (Onagrac.).
juntasensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 97.—Bolivia.
Pringsheimii, *Urb. Symb. Antill.* i. 375.—Ind. occ.
Sanctae-Rosae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 98.—Bolivia.
tunariensis, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
- FUTRENA**, Rottb. (Cyper.).
Buchanani, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 20.—Afr. trop.
moritziana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 77.—Venez.
- FUMARIA**, Tourn. (Papav.).
bicolor, *Somm. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. v. 111.—Eur.
- FUMARIOLA**, Korsh. in *Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* ix. (1898) 403. **PAPAVERACEAE**.
turkestanica, *Korsh. l. c.* 404.—Turkestan.
- FURCRAEA**, Vent. (Amaryll.).
macrophylla, *Baker, in Hook. Ic. Pl.* t. 2501.—Ind. occ.?
- GAGEA**, Salisb. (Liliac.).
Brentae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlv. 88.—Eur.
- GAHNIA**, Forst. (Cyperac.).
boniana, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 141.—Cochinch.
gahniaeformis, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Stud.* i. 802 = *Gaudichaudii*.
stricta, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 142.—Cochinch.
- GAILLARDIA**, Fouger. (Compos.).
multiceps, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 512.—Am. bor.
- GALACTIA**, P. Br. (Legum.).
acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 137.—Mexic.
albiflora, *Urb. Symb. Antill.* ii. 316.—Ind. occ.
bahamensis, *Urb. l. c.* 331.—Ind. occ.
Combsii, *Urb. l. c.* 319.—Ind. occ.
cruelsiana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 437.—Bras.
douradensis, *Taub. l. c.* 438.—Bras.
Eggersii, *Urb. Symb. Antill.* ii. 311.—Ind. occ.
formosana, *Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. 424.—Formosa.
glaucophylla, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 64.—Reg. Argent.
laxifolia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 315.—Ind. occ.
lignosa, *Urb. l. c.* 332 (= *Sweetia lignosa*).—Ind. occ.
minutiflora, *Urb. l. c.* 325.—Ind. occ.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 433.—Bras.
revoluta, *Urb. Symb. Antill.* ii. 333.—Ind. occ.
rubra, *Urb. l. c.* 309 (= *Dolichos rubra*).—Ind. occ.
Schomburgkii, *Urb. l. c.* 328.—Ind. occ.
stenophylla, *Urb. l. c.* 313 (non Hook. & Arn.).—Ind. occ.
striata, *Urb. l. c.* 320 (= *Glycine striata*).—Ind. occ.
tomentosa, *Urb. l. c.* i. 472 (= *Odonia tomentosa*).—Ind. occ.
trinitensis, *Urb. l. c.* ii. 315.—Ind. occ.
uniflora, *Urb. l. c.* 325.—Ind. occ.
- GALAGANIA**, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. (1900) 62. **UMBELLIFERAE**.
fragrantissima, *Lipsky, l. c.* 63.—As. cent.
- GALANTHUS**, Linn. (Amaryll.).
cilicicus, *Baker, in Gard. Chron.* 1897, i. 214.—As. Min.
- GALEANDRA**, Lindl. (Orchid.).
Bouliawongo, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 935 = *Lissochilus Bouliawongo*.
longibracteata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. 133 = *Lissochilus purpuratus*.
- GALEARIA**, Zoll. & Mor. (Euphorb.).
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 584, 626.—Celebes.
filiformis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 282 (= *Benettia filiformis*).—Java.
- GALENIA**, Linn. (Ficoid.).
namaensis, *Schin, in Bull. Herb. Boiss.* v. App. III. 76.—Afr. austr.
- GALEOLA**, Lour. (Orchid.).
Faberi, *Kolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.
- GALEOPSIS**, Linn. (Labiata).
inermis, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* ii. 596.—Eur.
- GALIPEA**, Aubl. (Rutac.).
jasminiflora, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. 1V. 164 = *multiflora*.
- GALIUM**, Linn. (Rubiace.).
arcuatum, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 395.—Am. bor.
Autrani, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 757.—Oriens.
Bailloni, *Brandea, in Anal. Acad. Rom.* Ser. II. ii. 537.—Eur.
cochabambense, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 52.—Bolivia.
cordifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 119 (= *Rubia cordifolia*).—Geront. temp. et trop.
cymosum, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 401.—Am. bor.
Degenii, *Bald. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 632.—Eur.

G

GALIUM :—

- ephedroides, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 119* (= *Rubia ephedroides*).—Bras.
 Heldreichii, *Halacsy, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 94.*—Eur.
 hierochuntinum, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlviii. 596.*—Syria.
 hystricocarpum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 464.*—Mexic.
 kahelianum, *Deflers, Voy. Yemen, 145.*—Arab.
 Kernerii, *Degen & Doerfler, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxiv. 728.*—Eur.
 lanatum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 120* (non Boiss.).—Chili.
 lanuginosum, *Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. 432* = Autrani.
 lovcense, *Urum, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 55.*—Eur.
 Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 460.*—Mexic.
 oresbium, *Greenm. l. c. 462.*—Mexic.
 patagonicum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 120.*—Patag.
 platypodium, *Borbas, ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 310.*—Eur.
 praetermissum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 306.*—Mexic.
 Pringlei, *Greenm. l. c. xxxiii. 458.*—Mexic.
 pseudointricatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 149.*—Lesbos.
 rumelicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 70.*—Eur.
 scabrellum, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 113.*—Afr. trop.
 Seatonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 460.*—Mexic.
 Shepardi, *Post, Fl. Syria, 15.*—Lebanon.
 Watsoni, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 627.*—Am. bor.
- GALLIARIA**, Bub. Fl. Pyren. i. 184 (1897) = **Amaranthus**, Linn. (Amarant.).
 ascendens, Bub. l. c. 186 = A. viridis.
 albida, Bub. l. c. 185 = A. albus.
 patula, Bub. l. c. 187 = A. patulus.
 prostrata, Bub. l. c. 188 = A. deflexus.
 scabra, Bub. l. c. 187 = A. retroflexus.
 sylvestris, Bub. l. c. 186 = A. sylvestris.
- GALPHIMIA**, Cav. (Malpigh.).
 glandulosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 137.*—Mexic.
- GALPINSIA**, Britton = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
 Fendleri, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl. ed. II. 8* = O. Fendleri.
 filifolia, A. A. Heller, l. c.—Am. bor.
 Greggii, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 186* = O. Greggii.
 Toumeyii, Small, l. c. 1898, 317.—Am. bor.
 tubicula, Small, l. c. 1896, 186 = O. tubicula.
- GAMOCARPHA**, DC. = **Boopis**, Juss. (Calycer).
 selliana, *Reiche, in Engl. Jahrb. xxix. 117.*—Patag.
- GAMOSEPALUM**, Hausskn. in *Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi. (1897) 73. CRUCIFERAE.*
 alyssoides, *Hausskn. l. c. 75.*—Oriens.
 confine, *Hausskn. l. c. 74.*—Oriens.
 lepidostellatum, *Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. l. c. 73.*—Oriens.
 paphlagonicum, *Hausskn. l. c. 74.*—Oriens.
- GARCINIA**, Linn. (Guttif.).
 Cherryi, *F. M. Bailey, Queensl. Fl. 103.*—Austral.
 comorensis, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1221.*—Ins. Comor.
 Imberti, *Bourd. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. xii. 349.*—Ind. or.
 kilossana, *Engl. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 189.*—Afr. trop.
 usambarensis, *Engl. l. c. iii. 84, nomen.*—Afr. trop.
 wentzeliana, *Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 435.*—Afr. trop.
- GARDENIA**, Ellis (Rubiace).
 imperialis, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 442.*—Afr. trop.
 Keartlandi, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xxi. 70.*—Austral.
 Lamingtonii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 155.*—N. Guin.

GARDENIA :—

- Lanutoo, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 684.*—Ins. Samoa.
 lateriflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 442.*—Afr. trop.
 leopoldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 28.*—Afr. trop.
 pelenkabuana, *Teysm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 495, nomen.*—Celebes.
 tigrina, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 462.*—Afr. trop.
- GARNOTIA**, Brongn. (Gramin.).
 angustata, *Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 243* = stricta.
 arundinacea, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
 ascendens, *Munro, ex Hook. f. l. c. = stricta.*
 Griffithii, *Munro, ex Hook. f. l. c. = stricta.*
 scoparia, *Stapf, ex Hook. f. l. c. 242.*—Ind. or.
 scoparia, *Thw. Enum. Pl. Zeyl. 363* = Thwaitesii.
 Schmidii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 242.*—Ind. or.
 tectorum, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
 tenuiglumis, *Stapf, ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
 Thwaitesii, *Stapf, l. c. 241.*—Ind. or.
- GARNOTIELLA**, Stapf, in *Hook. Ic. Pl. t. 2494* (1896). **GRAMINEAE.**
 philippinensis, *Stapf, l. c.*—Ins. Philipp.
- GASTERIA**, Duval (Liliac.).
 elongata, *Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 290.*—Afr. austr.
 prolifera, *Lem. Pl. Grasses, 58.*—Hort.
- GASTONIA**, Comm. (Aral.).
 eupteronoides, *Teysm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 490.*—Celebes.
- GASTRIDIVM**, Beauv. (Gramin.).
 oblongum, *Coincy, in Journ. de Bot. 1899, 338.*—Eur.
- GASTROCHILUS**, Wall. (Scitamin.).
 albo-sanguinea, *Ridl. in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 111.*—Penins. Mal.
 angustifolia, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 357.*—Sumatra.
 calophylla, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 115.*—Penins. Mal.
 clivalis, *Ridley, l. c. 114.*—Penins. Mal.
 concinna, *Ridley, l. c. 116* (= *Kaempferia concinna*).—Penins. Mal.
 lancifolius, *Ridley, l. c. 112.*—Penins. Mal.
 longipes, *King & Prain, ex Ridley, l. c. 113.*—Penins. Mal.
 ochroleuca, *Ridley, l. c. 110.*—Siam.
 oculata, *Ridley, l. c. 117.*—Penins. Mal.
 pandurata, *Ridley, l. c. 114.*—Ind. or. ?
 prainiana, *Ridley, l. c. 115* (= *Kaempferia prainiana*).—Penins. Mal.
 Scaphochlamys, *Ridley, l. c. 112* (= *Scaphochlamys malaccana*).—Penins. Mal.
- GASTRODIA**, R. Br. (Orchid.).
 africana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 179.*—Afr. trop.
 dyeriana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. 342.*—Reg. Himal.
 ovata, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl. xiv. 13.*—Austral.
- GASTROLEPIS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1897) 115. OLACACEAE.*
- GASTROLOBIVM**, R. Br. (Legum.).
 Boormani, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiv. 143.*—Austral.
- GAULTHERIA**, Kalm (Eric.).
 calycina, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 274.*—N. Zel.
 glandulosa, *Colenso, l. c. xxviii. 600.*—N. Zel.
 humifusa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 300* = G. Myrsinites.
 laxiflora, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 515.*—China.
- GAURA**, Linn. (Onagr.).
 filiformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 617.*—Am. bor.
 neomexicana, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 307.*—Am. bor.

- GAURELLA**, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 188. ONAGRACEAE.*
 guttulata, *Small, l. c.* (= *Oenothera guttulata*).—Am. bor.
- GAUOPSIS**, Cock. in *Coult. Bot. Gaz. xxx. (1900) 351* = **Gaurella**, Small (Onagr.).
 canescens, *Cock. l. c.* = G. guttulata.
 guttulata, *Cock. l. c.* = G. guttulata.
- GAYLUSSACIA**, H. B. & K. (Vaccin.).
 nana, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 443.*—Am. bor.
- GAZANIA**, Gaertn. (Compos.).
 bracteata, *N. E. Br. in Gard. Chron. 1894, i. 620* = pygmaea.
 canescens, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 478* = pygmaea.
- GEIGERIA**, Griessel. (Compos.).
 Eeuii, *S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 373.*—Afr. trop.
 Helmsiae, *F. M. Bailey, Queensl. Fl. 206.*—Austral.
 hoffmanniana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 572* (= *Thysanurus angolensis*).—Afr. trop.
 linosyroides, *Welw. ex Hiern, l. c. 570.*—Afr. trop.
 pubescens, *S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 374.*—Afr. trop.
 Randii, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.
- GEISSASPIS**, Wight & Arn. (Legum.).
 bifoliolata, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxvi. 58.*—Afr. trop.
 Descampsii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 65.*—Afr. trop.
 drepanocephala, *Baker, in Kew Bull. 1897, 260.*—Afr. trop.
 emarginata, *Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 405.*—Afr. trop.
- GEISSOMERIA**, Lindl. (Acanth.).
 tetragona, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 658.*—Bras.
- GEISSORHIZA**, Ker-Gawl. (Irid.).
 alpina, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. 223* = *Hesperanthe alpina*.
 hesperanthoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 97.*—Afr. austr.
 pallidiflora, *Schlechter, l. c. 98.*—Afr. austr.
 pubescens, *Wolley Dod, in Journ. Bot. 1900, 171.*—Afr. austr.
 rupestris, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 98.*—Afr. austr.
 sulphurea, *Schlechter, l. c. 99.*—Afr. austr.
- GELSEMINUM**, Weinm. = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
 amoenum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 245.*—Bolivia.
 araliacium, *Kuntze, l. c.* = T. araliacea.
 Avellanadae, *Kuntze, l. c.* = *Tabebuia Avellanadae*.
 Caraiba, *Kuntze, l. c.* = *Tecoma Caraiba*.
 chrysotrichum, *Kuntze, l. c.* = T. chrysotricha.
 Garrocka, *Kuntze, l. c.* = T. Garrocka.
 nodosum, *Kuntze, l. c.* = *Tabebuia nodosa*.
 speciosum, *Kuntze, l. c.* = *Tecoma speciosa*.
- GENDARUSSA**, Nees = **Justicia**, Linn. (Acanth.).
 debilis, *Nees, in Linnaea, xvi. 302* = *Monechma bracteatum*.
 variegata, *Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 385* = J. trinervia.
- GENIANTHUS**, Hook. f. (Asclep.).
 Blumei, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 436* (= *Toxocarpus Blumei*).—Java.
 macrophyllus, *Boerl. l. c.* (= *Toxocarpus macrophyllus*).—Java.
- GENIOSPORUM**, Wall. (Labiata).
 congoense, *Guerke, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 312, nomen.*—Afr. trop.
 discolor, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 351.*—Afr. trop.
 indicum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 367* = elongatum.
 Mutamba, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 854.*—Afr. trop.
 paludosum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 352.*—Afr. trop.

GENIOSPORUM :—

paniculatum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 351.—Afr. trop.
strictum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 852.—Afr. trop.

GENIOTOMA, Forst. (Logan).

samoense, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 666.—Ins. Samoa.

GENIPA, Tourn. (Rubiace).

cinerea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 93.—Mexic.
Exosolenia, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 46.—Madag.
lantiana, *Baill. ex Drake, l. c.* 47.—Madag.
lastelliana, *Drake, l. c.*—Madag.
Perieri, *Drake, l. c.* 45.—Madag.
Pervillei, *Drake, l. c.*—Madag.
Poivreii, *Drake, l. c.*—Madag.
ravinensis, *Baill. ex Drake, l. c.* 46.—Madag.
tubulosa, *Baill. ex Drake, l. c.* 47.—Madag.

GENISTA, Linn. (Legum).

arbores, *Rouy, Fl. Fr.* v. 314 (= *Sarothamnus arboreus*).—Afr. bor.
catalaunica, *Rouy, l. c.* iv. 205 (= *Sarothamnus catalaunicus*).—Eur.
flagellaris, *Sommier & Levier, in Acta Hort. Petrop.* xvi. 109.—Reg. Caucas.
gaditana, *Rouy, Fl. Fr.* v. 314 (= *Sarothamnus gaditanus*).—Eur.
hirta, *Rouy, l. c.* iv. 212.—Eur.
minima, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 455 = *sagittalis*.
nitida, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi.* 112.—Eur.
ottomanica, *Form. l. c.* xxxviii. 235.—Eur.
postranensis, *Form. l. c.* 236.—Eur.
triflora, *Rouy, Fl. Fr.* iv. 208 (= *Cytisus triflorus*).—Eur.

GENISEA, A. St. Hil. (Lentibul).

guianensis, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2629.—Guian.

GENTIANA, Tourn. (Gentian).

albido-coerulea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 323.—Bolivia.
anisosepala, *Greene, Pittonia*, iii. 309.—Am. bor.
Bangii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 324.—Bolivia.
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 79 = *albido-coerulea*.
barbeyana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 310.—Peruv.
bellidifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 486.—China.
biloba, *DC. Fl. Fr.* iii. 653 = *Burseri*.
brachysepala, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 328.—Ecuador.
bracteosa, *Greene, Pittonia*, iv. 180.—Am. bor.
Bridgesii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 316.—Bolivia.
calanchoides, *Gilg, l. c.* 330.—Peruv.
campanuloides, *Gilg, l. c.* 320.—Reg. Argent.
centamalemsis, *Gilg, l. c.* 334.—Peruv.
chrysonaura, *Ekslam & Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 124.—N. Zembla.
citrina, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 130.—Am. bor.
claytonioides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 318.—Reg. Argent.
cochabambensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 79.—Bolivia.
connectens, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 131.—Am. bor.
cordisepala, *Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 243.—As. cent.
dacrydioides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 311.—N. Granat.
dasyantha, *Gilg, l. c.* 309.—N. Granat.
dechyana, *Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1896, 77.—Reg. Caucas.
decora, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 131.—Am. bor.
dielsiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 316.—Bolivia.
distegia, *Greene, Pittonia*, iv. 182.—Am. bor.
Duclouxii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. 305.—China.
elegans, *A. Nelson, Bull. Club*, 1898, 276.—Am. bor.
Engleri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 314.—N. Granat.
exacoides, *Gilg, l. c.* 329.—Peruv.
filipes, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 536.—N. Zel.
gageoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 320.—Bolivia.

GENTIANA :—

gentilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 491.—China.
giliooides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 314.—Ecuador.
Gilliesii, *Gilg, l. c.* 317.—Am. austr.
Giulianetti, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 106.—N. Guin.
gynophora, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 305.—Bolivia.
Hedini, *Murb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 241.—As. cent.
helianthemoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 321.—Reg. Argent.
Hieronymi, *Gilg, l. c.* 305.—Reg. Argent.
hypericoides, *Gilg, l. c.* 312.—Am. austr.
inaequicalyx, *Gilg, l. c.* 324.—Bolivia.
interrupta, *Greene, Pittonia*, iv. 182.—Am. bor.
Kuntzei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 326.—Bolivia.
Kusnezowii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 492.—China.
Kusnezowii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 325.—Bolivia.
lancifolia, *Gilg, l. c.* 326.—Bolivia.
lateriflora, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.
Lehmanni, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 310.—Am. austr.
longibarbata, *Gilg, l. c.* 331.—Ecuador.
Macgregorii, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 107.—N. Guin.
maulchanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 488.—China.
major, *Bub. Fl. Pyren.* i. 527 = *lutea*.
Mandoni, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 80 = *inaequicalyx*.
Markowicz, *Kusnez. ex Lipsky, in Acta Hort. Tiflis*, iv. 391.—Reg. Caucas.
multicaulis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 306 = *Pavonii*.
Murbeckii, *Kerner, Sched. Fl. Austr.-Hung.* vii. 73.—Eur.
myrioclada, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 487.—China.
napulifera, *Franch. l. c.* 488.—China.
Neilreichi, *Doerfl. & Wettst. ex Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. Gen. Heft 42.—Eur.
nevadensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 313.—N. Granat.
orobanchoides, *Gilg, l. c.* 333.—Bolivia.
parviflora, *Gilg, l. c.* 321 = *Galanderi*.
pascuorum, *Bub. Fl. Pyren.* i. 535 = *campestris*.
peruviana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 304 (non *Griseb.*).—Peruv.
Phob, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 493.—China.
praticola, *Franch. l. c.* 489.—China.
remota, *Greene, Pittonia*, iv. 182.—Am. bor.
Reussi, *Toel, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxvii. 13.—Eur.
rhodopea, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 20.—Eur.
Riojae, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 319.—Reg. Argent.
sabbatioides, *Gilg, l. c.* 328.—Ecuador.
samolifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 485.—China.
seminuda, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 81 = *gynophora*.
serbica, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 20.—Eur.
silenoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 319.—Bolivia.
solstitialis, *Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat.* lxiv. 337.—Eur.
soratensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 332.—Bolivia.
Souliei, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 491.—China.
speciosissima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 325.—Peruv.
spectabilis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 80 = *dielsiana*.
stenosepala, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 331.—Bolivia.
Stuebelii, *Gilg, l. c.* 317.—Peruv.
sulphurea, *Gilg, l. c.* 308.—Ecuador.
tarapacana, *Gilg, l. c.* 305.—Chili.
tatsienensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 489.—China.
tizuensis, *Franch. l. c.* 494.—China.
tongolensis, *Franch. l. c.* 490.—China.
tradesantiifolia, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 545.—Am. bor.
tricholoba, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 490.—China.
tubulosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxii. 315.—Reg. Argent.
Tupa, *Gilg, l. c.* 333.—Peruv.

GENTIANA :—

virgata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 81 = *Kusnezowii, Gilg*.

GENYORCHIS, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 280 (1900). *ORCHIDAEAE*.
pumila, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

GEOCHORDA, Cham. & Schlecht. (Scrophul).

glechomodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 232 = *cuneata*.

GEONOMA, Willd. (Palm).

altissima, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 6.—Bras.
caudulata, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxi. 423.—Bras.
chapidensis, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 4.—Bras.
pynaertiana, *Sander, in Gard. Chron.* 1898, I. 258.—Arch. Mal.

GEOPHILA, D. Don (Rubiace).

picta, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 18.—Guiana.
renaris, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. I. 29.—Afr. trop.
speciosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 466.—Afr. trop.

GEOSTACHYS, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. (1898) 157. *SCITAMINEAE*.

decurvata, *Ridley, l. c.* 158 (= *Alpinia decurvata*).—Malaya.
elegans, *Ridley, l. c.* 160.—Malacca.
penangensis, *Ridley, l. c.* 159.—Penins. Mal.
rupestris, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
secunda, *Ridley, l. c.* 158 (= *Alpinia secunda*).—Malaya.

GERANIOSPERMUM, Siegesb. Fl. Petrop. (1736); Kuntze, Rev. Gen. i. 93 = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran).

Rehmanni, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 32 = *P. Rehmanni*.
sidifolium, *Kuntze, l. c.* = *P. sidoides*.

GERANIUM, Tourn. (Geran).

acutilobum, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1898, 56.—Eur.
aristatum, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 587.—Eur.
atropurpureum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 195.—Am. bor.
Bicknellii, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 92.—Am. bor.
candidum, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 151.—Turkestan.
Langloisii, *Greene, Pittonia*, iii. 171.—Am. bor.
lemanianum, *Brig. in Ann. Conseru. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 83.—Eur.
molloides, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv.* 343.—Eur.
nemorale, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 222.—Am. bor.
oreganum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 106.—Am. bor.
Parryi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* ed. II. 7.—Am. bor.
robustum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 32.—Afr. austr.
texanum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 198.—Am. bor.
thermale, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 478.—Am. bor.
vagans, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 246.—Afr. trop.
Whytei, *Baker, l. c.* 1898, 302.—Afr. trop.
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 118.—Arab.

GERARDIA, Linn. (Scrophul).

Bangii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 233.—Bolivia.
brevifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 25.—Am. austr.
cereifera, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 98.—Am. cent.
decemloba, *Greene, Pittonia*, iv. 51.—Am. bor.
holmiana, *Greene, l. c.* 52.—Am. bor.
lancifolia, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.
polyphylla, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 618.—Am. bor.
schwackeana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xv. Beibl. lx. 51.—Bras.
splendida, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 234 (= *Esterhazy splendida*).—Bras.
viridis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 619.—Am. bor.

GERARDIINA, Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 507.

SCROPHULARIACEAE.
angolensis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

GERBERA, Gronov. (Compos.).

- Cineraria*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 149 (= *Trichocline cineraria*).—Bras.
crocea, *Kuntze*, l. c. = *Burmanni*.
Galpinii, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 844.—Afr. austr.
Gerbera, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 149 = *aspleniifolia*.
incana, *Kuntze*, l. c. (= *Trichocline incanum*).—Bras.
Lasiopus, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 156.—Afr. trop.
leiocarpa, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 220 (non Sch. Bip.).—Afr. austr.
plicata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 149 (= *Trichocline plicata*).—Chili.
pulvinata, *Kuntze*, l. c.—Reg. Argent.
tuberosa, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 845.—Afr. austr.

GERMAINIA, Balansa & Poitras. (Gramin.).

- lauipeis*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 163.—Ind. or.

GERMANEA, Lam. = **Plectranthus**, L'Hérit. (Labiata).

- andongensis*, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 862 = *P. andongensis*.
concinna, *Hiern*, l. c. 861 = *Coleus concinnus*.
cylindracea, *Hiern*, l. c. = *P. cylindraceus*.
herbacea, *Hiern*, l. c. = *P. herbaceus*.
horrida, *Hiern*, l. c. 863 = *P. horridus*.
laxiflora, *Hiern*, l. c. 861 = *P. laxiflorus*.

GERTRUDIA, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb.

- Fl. Deutsch. Südsee*, 454 (1900). **BIXACEAE**.
amplifolia, *K. Schum. l. c.* 455.—N. Guin.

GESNERIA, Linn. (Gesnerac.).

- acuminata*, *Urb. Symb. Antill.* i. 479.—Ind. occ.
citrina, *Urb. l. c.* 477.—Ind. occ.
incisa, *Urb. l. c.* 479.—Ind. occ.
pauciflora, *Urb. l. c.* 478.—Ind. occ.

GETHYLLIS, Plum. (Amaryll.).

- pusilla*, *Baker*, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 531.—Afr. austr.

GEUM, Linn. (Rosac.).

- andicola*, *Reiche*, *Fl. Chile*, ii. 217 (= *Sieversia andicola*).—Chili.
aucklandicum, *Greene*, *Pittonia*, iv. 225.—N. Zel.
pusillum, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 538.—N. Zel.
oregonense, *Rydb.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 56.—Am. bor.
sericeum, *Greene*, *Pittonia*, iii. 172.—Am. bor.
sericeum, *Kirk*, *Fl. N. Zeal.* 129 = *aucklandicum*.
turbidatum, *Rydb.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 91.—Am. bor.

GEUNZIA, Blume (Verbenac.).

- hexandra*, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 559, nomen.—Celebes.

GHIKAEA, Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des

- Somalis, 214 (1898). **SCROPHULARIACEAE**.
spectabilis, *Volkens & Schweinf. l. c.*—Afr. trop.

GIBBESIA, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, xxv.

- (1898) 621. **ILLECEBRACEAE**.
Rugelii, *Small, l. c.* (= *Forcipella Rugelii*).—Am. bor.

GIGALOBIMUM, P. Br. = **Entada**, Adans. (Legum.).

- abyssinicum*, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 305 = *E. abyssinica*.
scandens, *Hiern*, l. c. = *E. scandens*.

GIGANTHEMUM, Welw. = **Camoensia**, Welw.

- (Legum.).
scandens, *Welw. Apont.* 585 = *C. maxima*.

GIGANTOCHLOA, Kurz (Gramin.).

- albociliata*, *Kurz*, *For. Fl. Brit. Burma*, ii. 555 = *Oxytenanthera albociliata*.
andamanica, *Kurz*, l. c. 556 = *Oxytenanthera nigrociliata*.
Kurzii, *Gamble*, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 65.—Ind. or.
latispiculata, *Gamble*, l. c. 67.—Ind. or.
ligulata, *Gamble*, l. c.—Ind. or.
nigrociliata, *Kurz*, in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 226 = *Oxytenanthera nigrociliata*.
Scortechinii, *Gamble*, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 62.—Ind. or.
Wrayi, *Gamble*, l. c. 64.—Ind. or.

VOL. III.

GILIA, Ruiz & Pav. (Polemon.).

- attenuata*, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 278.—Am. bor.
caespitosa, *A. Nelson*, l. c. 546 = *pungens*.
calcaria, *M. E. Jones*, *Contrib. Western Bot.* viii. 36.—Am. bor.
cephaloidea, *Rydb.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 293.—Am. bor.
ciliata, *Benth.* *Pl. Hartw.* 325 = *Loeselia ciliata*.
Grayi, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 547 = *caespitosa*.
Hallii, *Parish*, in *Erythraea*, vii. 94.—Am. bor.
hispidula, *Piper*, in *Erythraea*, vi. 30.—Am. bor.
klückitatisensis, *Suksd.* in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1900, 133.—Am. bor.
laxiflora, *Osterh.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 51.—Am. bor.
leptalea, *Greene*, in *Erythraea*, iv. 58.—Am. bor.
ochroleuca, *M. E. Jones*, *Contrib. Western Bot.* viii. 35.—Am. bor.
parvula, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 320.—Am. bor.
sedifolia, *Brandeggee*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 451.—Am. bor.
tenuiloba, *Parish*, in *Erythraea*, vii. 95.—Am. bor.

GILIBERTIA, Ruiz & Pav. (Aral.).

- cuneifolia*, *Marchal*, *ex Urb. Symb. Antill.* i. 201 (= *Hedera cuneifolia*).—Ind. occ.
dentigera, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 487.—China.
insularis, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 83.—Mexic.
laurifolia, *Marchal*, *ex Urb. Symb. Antill.* i. 203.—Ind. occ.
nutans, *Marchal*, l. c. 201 (= *Dendropanax nutans*).—Ind. occ.
pendula, *Marchal*, l. c. 200 (= *Dendropanax pendulum*).—Ind. occ.
pruinosa, *Taub.* in *Engl. Jahrb.* xxi. 448.—Bras.
Rothschuhii, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 126.—Am. cent.
samydifolia, *Marchal*, *ex Urb. Symb. Antill.* i. 201 (= *Sciadophyllum samydifolium*).—Ind. occ.

GILLETIELLA, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. (1900) 71. **ACANTHACEAE**.

- congolana*, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 72.—Afr. trop.

GILLETTIA, Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 55. **COMMELINACEAE**.

- sepalosa*, *Rendle*, l. c. 56 (= *Aneilema sepalosum*).—Afr. trop.

GIRALDIA, Baroni, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. iv.

- (1897) 481; et *Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze*, 1896-7, 167. **COMPOSITAE**.
Stapfii, *Baroni*, *ll. cc.*—China.

GISEKIA, Linn. (Ficoid.).

- africana*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 108 = *G. Miltus*.

GITHAGO, Adans. = **Lychnis**, Linn. (Caryoph.).

- thessala*, *Form.* in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 197.—Eur.

GIULIANETTIA, Rolfe, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2616

- (1899). **ORCHIDEAE**.
tennis, *Rolfe*, l. c.—N. Guin.

GLADIOLUS, Tourn. (Irid.).

- andongensis*, *Baker*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. 269 = *G. quartinianus*.
angolensis, *Baker*, l. c. = *G. quartinianus*.
Antunesii, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
aphanophyllus, *Baker*, l. c. 363.—Afr. trop.
aureus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 530.—Afr. austr.
cochleatus, *Baker*, in *Journ. Bot.* 1876, 333 = *G. unguiculatus*.
erectiflorus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 146.—Afr. austr.
Flanagani, *Baker*, l. c. 580.—Afr. austr.
fusco-viridis, *Baker*, l. c.—Afr. austr.
Garnierii, *Klatt*, in *Decken, Reisen Bot.* iii. III. 73 = *Antholyza watsonioides*.
Goetzei, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 365.—Afr. trop.

GLADIOLUS—

- Johnstoni*, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 283.—Afr. trop.
kilimandscharicus, *Pax*, in *Engl. Hochgebirgsl. Trop.* Afr. 175 = *G. quartinianus*.
macrophlebius, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
masukuensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 283.—Afr. trop.
mosambicensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
nyikensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 283.—Afr. trop.
oliganthus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 576.—Afr. trop.
oreocharis, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1896, 504.—Afr. austr.
pallidus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
pretoriensis, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 308.—Afr. austr.
primulinus, *Baker*, in *Gard. Chron.* 1890, II. 122 = *G. quartinianus*.
prismatosiphon, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 102.—Afr. austr.
quillimanensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
saltatorum, *Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. 155 = *G. quartinianus*.
stenophyllus, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. austr.
subulatus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
taubertianus, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 103.—Afr. austr.
taylorianus, *Rendle*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. 405 = *G. quartinianus*.
tritoniaeformis, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 308.—Afr. trop.
nhehensis, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 365.—Afr. trop.
venulosus, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. trop.
vexillare, *Martelli*, *Monocot. Sard.* 101.—Eur.
watsonioides, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. 406 = *Antholyza watsonioides*.
Welwitschii, *Baker*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. 268 = *quartinianus*.
Whytei, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 282.—Afr. trop.

GLECHON, Spreng. (Labiata).

- caparaonensis*, *Taub.* *ex Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 4.—Bras.

GLEDITSCHIA, Clayton (Legum.).

- celebica*, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 438.—Celebes.

GLIRICIDIA, H. B. & K. (Legum.).

- Michelii*, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 22.—Bolivia.

GLOBBA, Linn. (Scitam.).

- albiflora*, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 96.—Malaya.
brachyanthera, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxvii. 329.—Borneo.
calophylla, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 93.—Siam.
elegans, *Ridley*, l. c. 96.—Penins. Mal.
integra, *Ridley*, l. c. 94.—Siam.
Keithii, *Ridley*, l. c.—Siam.
malaccensis, *Ridley*, l. c. 98.—Malacca.
montana, *Ridley*, l. c. 92.—Penins. Mal.
perakensis, *Ridley*, l. c. 98.—Penins. Mal.
violacea, *Ridley*, l. c. 97.—Penins. Mal.

GLOBULARIA, Tourn. (Selag.).

- gracilis*, *Rouy & Richter*, *ex Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 245.—Eur.
majoricensis, *Gandoger*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 134.—Eur.
oscensis, *Coincy*, in *Journ. de Bot.* 1900, 112.—Eur.

GLOCHIDION, Forst. (Euphorb.).

- album*, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 275 (= *Phyllanthus albus*).—Celebes; Ins. Philipp.
borneensis, *Boerl. l. c.* 276 (= *P. borneensis*).—Borneo.
fuscum, *Boerl. l. c.* (= *P. fuscum*).—Sumatra.
Gaudichaudii, *Boerl. l. c.* (= *P. Gaudichaudii*).—Malaya.
glomerulatum, *Boerl. l. c.* (= *P. glomerulatum*).—Sumatra.

M

GLOCHIDION :—

- gracilentum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 276 (= *Phyllanthus gracilentus*).—Java.
hypoleucum, *Boerl. l. c.* 275 (= *P. hypoleucus*).—Sumatra.
Korthalsii, *Boerl. l. c.* 276 (= *P. Korthalsii*).—Borneo.
Muelleri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 225.—Java.
oligotrichus, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 276 (= *P. oligotrichus*).—Java.
quercinum, *Boerl. l. c.* (= *P. quercinum*).—Java.
Reinwardtii, *Boerl. l. c.* (= *P. Reinwardtii*).—Java.
rufoglaucum, *Boerl. l. c.* 275 (= *P. rufoglaucus*).—Java.
Salomonis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 226.—Ins. Solomon.
semicordatum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 276 (= *P. semicordatus*).—Java.
wagapense, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 226 (= *P. wagapensis*).—N. Caled.

GLOCKERIA, Nees (Acanth.).

- monolopha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 439.—Am. cent.
ventricosa, *Donn. Sm. l. c.*—Am. cent.

GLOMERA, Blume (Orchid.).

- papuaana, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 111.—N. Guin.

GLORIOSA, Linn. (Liliac.).

- minor, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 132.—Afr. trop.
virescens, *Lindl. in Bot. Mag.* t. 2539.—Afr. trop.

GLOSSOCALYX, Benth. (Monim.).

- Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 384.—Afr. trop.

GLOSSOLEPIS, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 299. **SAPINDACEAE.**

- macrobotrys, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

GLOSSONEMA, Decne. (Asclep.).

- arabicum, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 110.—Arab.

GLOSSOPETALON, A. Gray (Celastr.).

- pungens, *Brandegee, in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 445.—Am. bor.

GLOSSOPHOLIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 82. **MENISPERMACEAE.**

- jollyana, *Pierre, l. c.* 85.—Afr. trop.
klaianeana, *Pierre, l. c.* 84.—Afr. trop.
macrophylla, *Pierre, l. c.* 82.—Afr. trop.

GLOXINIA, L'Hérit. (Gesnerac.).

- reflexa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 94.—Bolivia.

GLUTA, Linn. (Anacard.).

- cambodiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 368 B.—Cochinch.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 482.—Penins. Mal.

GLYCERIA, R. Br. (Gramin.).

- antarctica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 92.—Reg. Magell.
baltica, *Lindeberg, in Bot. Notiser*, 1898, 152.—Eur.
borealis, *Batchelder, in Proc. Manchester, U. S. A. Inst.* i. 158, fide *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 601 (= *Panicularia borealis*).—Am. bor.
Borreri, *Bab. in English Bot. Suppl.* t. 2797 = *Atropis Borreri*.
Dusenii, *Lindeberg, in Bot. Notiser*, 1898, 153.—Eur.
explanata, *Lindeberg, l. c.* 151.—Eur.
fuegiana, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 91.—Fuegia.
leptostachys, *Speg. l. c.* 94.—Fuegia.
Nesii, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 286 = *Atropis Borreri*.
poeoides, *Staff, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 348.—Ind. or.
reptans, *Krok. in Bot. Notiser*, 1899, 137.—Eur.
rigida, *Sm. Engl. Fl.* i. 120 = *Scleropoa rigida*.
rivularis, *Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 346 = *tonglensis*.
scaberrima, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 316 = *Melica scaber-rima*.
songarica, *Schrenk, Enum. Pl. Nov.* 1 = *Poa persica*.
Thomsoni, *Staff, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 347.—Ind. or.

GLYCINE, Linn. (Legum.).

- Buettneri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 302.—Afr. trop.
digitata, *Harms, l. c.* xxviii. 408.—Afr. trop.
holophylla, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 194 (= *Eriosema holophyllum*).—Afr. trop.
Wilmsii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 302.—Afr. austr.

GLYCOSMIS, Correa (Rutac.).

- Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 115.—Afr. trop.

GLYPTOPETALUM, Thw. (Celastr.).

- quadrangulare, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 345.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.*—Penins. Mal.

GNAPHALIUM, Linn. (Compos.).

- amplum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150 (= *Helichrysum amplum*).—Afr. austr.
andicola, *Kuntze, l. c.* (= *Lucilia chilensis*).—Chili.
Andrewsii, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
angustifolium, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 357.—Am. bor.
anomalum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150 (= *Helichrysum anomalum*).—Afr. austr.
Arnotti, *Kuntze, l. c.* (= *Lucilia argentea*).—Urug.
athrixifolium, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum athrixifolium*).—Afr. austr.
bicolor, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 411 (non Bioletti).—China.
caffrum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 151 (= *Helichrysum longifolium*).—Afr. trop.
chimboraense, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 30.—Ecuador.
chrysocephalum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 412.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 409.—China.
gnaphalioides, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 151 (= *Lucilia gnaphalioides*).—Reg. Argent.
Hoffmannii, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum cephaloideum*).—Afr. austr.
Jamesonii, *Kuntze, l. c.* 152 (= *Lucilia Jamesonii*).—Reg. Argent.
kunthianum, *Kuntze, l. c.* (= *Conyza kunthiana*).—Bolivia.
Kuntzei, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum Kuntzei*).—Afr. austr.
lagopodioides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 416.—Am. bor.
Lessingii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 150 (= *Lucilia nitens*).—Bras.
likiangense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 410.—China.
linearifolium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 308.—Mexic.
mixtum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 152 (= *Helichrysum mixtum*).—Afr. austr.
pellucidum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 411.—China.
plantaginifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 153 (= *Helichrysum plantaginifolium*).—Afr. austr.
pulviniforme, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum pulvinatum*).—Afr. austr.
pusillum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 163.—Eur.
rosulatum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 156.—N. Granat.
sesamodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154 (= *Helichrysum sesamoides*).—Afr. austr.
setosum, *Kuntze, l. c.* (= *Helichrysum setosum*).—Afr. austr.
Simonsii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 157.—N. Granat.
Sodirol, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 30.—Ecuador.
subcordatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154 (= *Helichrysum hypoleucum*).—Afr. austr.
sulphurescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 415.—Am. bor.
Thapsus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 154 (= *Helichrysum Thapsus*).—Afr. austr.
thermale, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gas.* xxx. 121.—Am. bor.
tunariense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 155.—Bolivia.
versatile, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 62.—Bolivia.
virescens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 155 (= *Lucilia Lundii*).—Reg. Argent.

GNAPHALIUM :—

- weddellianum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 155 (= *Gamo-chaeta humilis*).—Bolivia.
yunnanense, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 410.—China.

GNEPHOSIS, Cass. (Compos.).

- intonsus, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 197.—Austral.

GNETUM, Linn. (Gnetac.).

- karstenianum, *Warb. Monsunia*, i. 196.—Ins. Molucc.
Kerstingii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 157.—N. Guin.
philippense, *Warb. Monsunia*, i. 196.—Ins. Philipp.

GNIDIA, Linn. (Thymel.).

- dekintdiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 205.—Afr. trop.
denudata, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 97 (non Lindl.).—Afr. trop.
fruticulosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 207.—Afr. trop.
Gilbertae, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1218.—Madag.
heterophylla, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 98.—Afr. trop.
huillensis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 206.—Afr. trop.
Kuntzei, *Gilg, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 280.—Afr. austr.
Newtonii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 205.—Afr. trop.
Passargei, *Gilg, l. c.* 206.—Afr. trop.
phaeotricha, *Gilg, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 281.—Afr. austr.
polyclada, *Gilg, l. c.*—Afr. austr.
Pretoriae, *Gilg, l. c.*—Afr. austr.
Rendlei, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 924.—Afr. trop.
Rivae, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 98.—Afr. trop.
somalensis, *Gilg, l. c.* (= *Arthrosolea somalensis*).—Afr. trop.
stenophylloides, *Gilg, l. c.* 97.—Afr. trop.
violacea, *Gilg, l. c.* 98.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 923.—Afr. trop.

GOCHNATIA, H. B. & K. (Compos.).

- Smithii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 50.—Mexic.

GOETIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

- bingsensis, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 88.—Am. bor.

GOLDBACHIA, DC. (Crucif.).

- verrucosa, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 78.—Turkestan.

GOMPHANDRA, Wall. (Olac.).

- serrata, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 169.—Ind. or.

GOMPHIA, Schreb. (Ochnac.).

- discolor, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 159.—Afr. trop.

GOMPHICHS, Lindl. (Orchid.).

- alba, *F. C. Lehmann & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 500.—N. Granat.

GOMPHOCARPUS, R. Br. (Asclep.).

- sphacelatus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 233.—Afr. trop.

GOMPHOSTEMMA, Wall. (Labiata.).

- furfuraceum, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 351.—Malaya.
inopinatum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 172.—Ind. or.

GOMPHOSTIGMA, Turcz. (Logan.).

- virgatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 201 = *scoparioides*.

GOMPHERNA, Linn. (Amarant.).

- Caleyii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 216.—Austral.
insignis, *Briq. l. c.* 215.—Austral.

GONGORA, Ruiz & Pav. (Orchid.).

- sanderiana, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, II. 456.—Peruv.

GONGRONEMA, Decne. (Asclep.).

- membranifolium, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 140.—N. Brit.

- GONGROTHAMNUS**, Steetz (Compos.).
angolensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 592.—Afr. trop.
conyzoides, Hiern, *l. c.* 591.—Afr. trop.
- GONIOCHETON**, Blume = **Dysoxylum**, Blume (Meliac.).
insularis, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 347 B = D. insulare.
- GONIOTHALAMUS**, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
fasciculatus, Boerl. in *l. c. Bogor.* t. 59.—Arch. Mal.
grandiflorus, Boerl. *l. c.* i. 136 (= *Beccariodendron grandiflorus*).—N. Guin.
inaequilatera, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 322.—N. Guin.
macranthus, Boerl. in *l. c. Bogor.* i. 137 (= *Melodorum macranthum*).—Burma.
myrmeciocarpa, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 321.—N. Guin.
peduncularis, King & Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 284.—Ind. or.
uniovulatus, Lauterb. & K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 115.—N. Brit.
viridiflora, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 322.—N. Guin.
- GONOCARYUM**, Miq. (Inc. sed.).
monostachyum, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 415.—N. Guin.
- GONOLOBUS**, Michx. (Asclep.).
Brittonii, Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 500.—Am. bor.
chrysanthus, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 299.—Mexic.
ciliatus, Schlechter, in *Urb. Symb. Antill.* i. 282.—Ind. occ.
grisebachianus, Schlechter, *l. c.* 287.—Ind. occ.
macranthus, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. 731 (non Kuntze).—Ecuador.
membranaceus, Schlechter, in *Urb. Symb. Antill.* i. 285.—Ind. occ.
Sintenisii, Schlechter, *l. c.* 288.—Ind. occ.
variifolius, Schlechter, *l. c.* 286.—Ind. occ.
- GONYSTYLUS**, Teijsm. & Binn. (Thymel.).
bancanus, Gilg, in *Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr.* i. 232.—Malaya.
borneensis, Gilg, *l. c.* (= *Asclerum borneense*).—Borneo.
calophyllus, Gilg, *l. c.*—Borneo.
Forbesii, Gilg, *l. c.*—Sumatra.
- GONZALEA**, Pers. (Rubiace.).
ovatifolia, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 336.—Am. cent.
- GOODENIA**, Sm. (Goodeniace.).
glomerata, Maiden & Betche, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 647.—Austral.
horniana, Tate, in *Rep. Horn Exped.* iii. 189.—Austral.
Larupinta, Tate, *l. c.*—Austral.
mimuloides, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1897, 167.—Austral.
- GOODYERA**, R. Br. (Orchid.).
Andersonii, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 127.—Reg. Himal.
fertilis, Lehm. & Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 498.—Ecuador.
grandis, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 284.—Ind. or.
habenarioides, Lehm. & Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 499.—N. Granat.
hemsleyana, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. 342.—Reg. Himal.
Henryi, Rolfe, in *Kew Bull.* 1896, 201.—China.
lehmanniana, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 498.—N. Granat.
ochroleuca, F. M. Bailey, in *Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 15.—N. Guin.
- GOORINGIA**, Williams, in *Bull. Herb. Boiss.* v. (1897) 530. **CARYOPHYLLACEAE.**
Littledalei, Williams, *l. c.* (= *Arenaria Littledalei*).—Tibet.
- GOTHOFREDA**, Vent. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.).
Kuntzei, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 199 = O. Kuntzei.
paraguayensis, Kuntze, *l. c.* = O. paraguayense.
- GOUANIA**, Jacq. (Rhamn.).
andamanica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 382.—Ins. Andaman.
pallida, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 138.—Mexic.
- GOUNIA**, Fourn. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).
latifolia, Scribn. in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 10 (= *Tricuspis latifolia*).—Reg. Argent.
mexicana, Scribn. *l. c.* (= *Leptochloa mexicana*).—Mexic.
virgata, Scribn. *l. c.* = F. fourmieriana.
- GOULARDIA**, Husnot, Gram. Fr. Belg. 83 (1899). **GRAMINEAE.**
biflora, Husnot, *l. c.* (= *Agropyrum biflorum*).—Eur.
canina, Husnot, *l. c.* (= *Agropyrum caninum*).—Eur.
- GOULDIA**, A. Gray (Rubiace.).
arborescens, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Stud.* i. 896 = macrocarpa.
elongata, A. A. Heller, *l. c.* 897.—Ins. Sandw.
lanceolata, A. A. Heller, *l. c.*—Ins. Sandw.
sambucina, A. A. Heller, *l. c.* 898.—Ins. Sandw.
- GOVENIA**, Lindl. (Orchid.).
barbata, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 5 = *Eulophia Woodfordii*.
- GOYAZIA**, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxi. (1896) 451. **GESNERACEAE.**
rupicola, Taub. *l. c.*—Bras.
- GRACILEA**, Koen. (Gramin.).
nutans, Koen. *ex Rottl. in Ges. Nat. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 218.—Ind. or.
royleana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 284.—Ind. or.
- GRADERIA**, Benth. (Scroph.).
speciosa, Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 128.—Afr. trop.
- GRAMMATOPHYLLUM**, Blume (Orchid.).
seegerianum, Hort. in *Hook. f. Bot. Mag. t.* 7507 = *rumphianum*.
- GRANTIA**, Boiss. (Compos.).
flabellata, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 158.—Arab.
- GRATIOLA**, Rupp. (Scroph.).
hispida, Pollard, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 157 = *subulata*.
- GRAVISIA**, Mez = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
brassicoides, Mez, in *DC. Monog. Phan.* ix. 173 = A. *brassicoides*.
- GRENEOCHARIS**, Guerke & Harms, in *Engl. & Prantl. Pflanzenf. Regist.* (1899) 460 = *Krynitzkia*, Fisch. & Mey. (Borag.).
- GREIGIA**, Reg. (Bromel.).
albo-rosea, Mez, in *DC. Monog. Phan.* ix. 47.—Venez.
Pearcei, Mez, *l. c.* 46.—Chilil.
- GREVILLEA**, R. Br. (Proteac.).
aculeolata, S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 222.—Austral.
extorris, S. Moore, *l. c.* 221.—Austral.
Helmsiae, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* iv. 195.—Austral.
helmsiana, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 362.—Austral.
Sarissa, S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 222.—Austral.
- GREWIA**, Linn. (Tiliac.).
albiflora, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 428.—Afr. trop.
avellana, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 94.—Afr. trop.
batangensis, C. H. Wright, in *Kew Bull.* 1896, 158.—Afr. trop.
caducispala, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 428.—Afr. trop.
goetzeana, K. Schum. *l. c.* 430.—Afr. trop.
herbacea, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 96.—Afr. trop.
krebsiana, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 26.—Afr. austr.
lasioclada, Welw. ex Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 94.—Afr. trop.
microcarpa, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 190.—Afr. trop.
microdelphys, K. Schum. in *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 299, nomen.—Afr. trop.
- GREWIA** :—
miniata, Mast. ex Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 95.—Afr. trop.
nagensium, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 168.—Ind. or.
oncopetala, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 429.—Afr. trop.
palustris, K. Schum. *l. c.* 431.—Afr. trop.
platyclada, K. Schum. *l. c.* 430.—Afr. trop.
salicifolia, Schinz, in *Abh. Senckenb. Ges.* xxi. 87.—Ins. Aldabra.
Schlechteri, K. Schum. in *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 299, nomen.—Afr. trop.
- GREWIOPSIS**, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. (1900) 176. **TILIACEAE.**
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. *l. c.* 177.—Afr. trop.
globosa, Wildem. & Th. Dur. *l. c.* 178.—Afr. trop.
- GRINDELIA**, Willd. (Compos.).
boliviana, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 60.—Bolivia.
Brownii, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 315.—Am. bor.
decumbens, Greene, *Pittonia*, iii. 102.—Am. bor.
erecta, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 356.—Am. bor.
fastigiata, Greene, *Pittonia*, iii. 102.—Am. bor.
glandulosa, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 575.—Am. cent.
inornata, Greene, *Pittonia*, iii. 102.—Am. bor.
macrophylla, Greene, *l. c.* 297.—Am. bor.
perennis, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 355.—Am. bor.
platylepis, Greene, *Pittonia*, iii. 297.—Am. bor.
oxylepis, Greene, *l. c.* iv. 42.—Am. bor.
scabra, Greene, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 120.—Am. bor.
stylosa, Eastw. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 293.—Am. bor.
subalpina, Greene, *Pittonia*, iii. 297.—Am. bor.
subincisa, Greene, *l. c.* iv. 154.—Am. bor.
Volkensii, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 156.—Reg. Argent.
- GRISEBACHIA**, Klotzsch (Eric.).
lauterbachiana, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 206.—N. Guin.
- GRONOVIA**, Houst. (Loasac.).
grandiflora, Urb. & Gilg, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 13.—Mexic.
longiflora, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.
- GROSSULARIA**, Tourn. = **Ribes**, Linn. (Saxifr.).
alpestris, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 716 = R. *alpinum*.
petraea, Bub. *l. c.* 717 = R. *petraeum*.
- GRUMILEA**, Gaertn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).
blepharostipula, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 495.—Afr. trop.
catetensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 494.—Afr. trop.
chaunothrysus, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 496.—Afr. trop.
comorensis, K. Schum. *l. c.* 102.—Ins. Comor.
dermatophylla, K. Schum. *l. c.* 101.—Afr. trop.
diplococca, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 583.—N. Guin.
diploneura, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 496.—Afr. trop.
elachistantha, K. Schum. *l. c.* 497.—Afr. trop.
euchrysantha, K. Schum. *l. c.* 496.—Afr. trop.
flaviflora, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 495.—Afr. trop.
Goetsei, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 497.—Afr. trop.
hypoleuca, K. Schum. *l. c.* 102.—Afr. trop.
Lehmbackii, K. Schum. *l. c.* 101.—Afr. trop.
macrantha, K. Schum. *l. c.* 102.—Afr. trop.
malacorrhax, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 582.—N. Guin.
micralabastra, K. Schum. & Lauterb. *l. c.* 580.—N. Guin.
micrococca, K. Schum. & Lauterb. *l. c.* 581.—N. Guin.
moninensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 496.—Afr. trop.
oblanceolata, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 103.—Afr. trop.
pallidiflora, K. Schum. *l. c.* 497.—Afr. trop.
phaeochlamys, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 581.—N. Guin.

GRUMILEA :—

- Portus-Finschii*, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 583.—N. Guin.
pubera, K. Schum. & Lauterb. l. c. 580.—N. Guin.
stricta, K. Schum. & Lauterb. l. c. = *P. stricta*.
subsuccosa, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 495.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 496.—Afr. trop.

GUADUA, Kunth (Gramin.).

- tomentosa*, Hack. & Lindm. ex Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 6, 20.—Bras.

GUARDIOLA, Cerv. (Compos.).

- angustifolia*, Robinson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 235.—Mexic.
arguta, Robinson, l. c. 234.—Mexic.
carinata, Robinson, l. c. 233.—Mexic.
odontophylla, Robinson, l. c. 234.—Mexic.
Rosei, Robinson, l. c. 233.—Mexic.

GUAREA, Allem. (Meliac.).

- glomerulata*, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. 159.—Afr. trop.
leptotricha, Harms, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, i. 265.—Afr. trop.
Rusbyi, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 17 (= *Sycocarpus Rusbyi*).—Am. bor.
Staudtii, Harms, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, i. 180.—Afr. trop.
Zenkeri, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. 158.—Afr. trop.

GUATTERIA, Ruiz & Pav. (Anonac.).

- dolichopoda*, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas. xxiii. 2.—Am. cent.
glazioviana, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 5, 19.—Bras.
longicuspis, R. Fries, l. c. 18.—Bras.
oliviformis, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas. xxiii. 1.—Am. cent.
Pondok, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 380.—Sumatra.
Poudook, Ind. Kew. i. 1070, sphalm. = praec.
sessilis, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 5, 17.—Bras.

GUAZUMA, Plum. (Stercul.).

- Guaizuma*, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 24 = *ulmifolia*.

GUELLENSTAEDTIA, Fisch. (Legum.).

- Giraldii*, Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 413.—China.

GUERKEA, K. Schum. (Apocyn.).

- congolana*, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 94.—Afr. trop.
floribunda, K. Schum. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. iv. II. 180 = *Baissea floribunda*.
gracillima, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 228 = *Baissea gracillima*.
schumanniana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 128.—Afr. trop.
uropetala, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 223 = *Baissea uropetala*.

GUETTARDA, Linn. (Rubiace.).

- albicaulis*, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 47.—Bolivia.
Krugii, Urb. Symb. Antill. i. 431.—Ind. occ.
laevis, Urb. l. c. 433.—Ind. occ.
ovalifolia, Urb. l. c. 432.—Ind. occ.
pungens, Urb. l. c. 434.—Ind. occ.

GUILIELMA, Mart. = *Bactris*, Jacq. (Palm.).

- matogrossensis*, Barb. Rodr. Palm. Matogross. 33.—Bras.

GUIOA, Cav. = *Cupania*, Linn. (Sapind.).

- geminata*, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 420.—N. Guin.

GUIZOTIA, Cass. (Compos.).

- nyikensis*, Baker, in Kew Bull. 1898, 153.—Afr. trop.

GUNNERA, Linn. (Halorag.).

- boliviana*, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 33.—Bolivia.

GURANIA, Cogn. (Cucurb.).

- hirsuta*, Cogn. in Engl. Jahrb. xxiii. 131.—Am. cent.

GUTENBERGIA, Sch. Bip. (Compos.).

- araneosa*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 153.—Afr. trop.
foliosa, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxiv. 462.—Afr. trop.

GUTIERREZIA, Lag. (Compos.).

- Ameghinoi*, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 527.—Patag.
divergens, Greene, Pittonia, iv. 58.—Am. bor.
diversifolia, Greene, l. c. 53.—Am. bor.
fasciculata, Greene, l. c. 56.—Am. bor.
filifolia, Greene, l. c. 55.—Am. bor.
glomerella, Greene, l. c. 54.—Am. bor.
Hoffmannii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 156.—Patag.
juncea, Greene, Pittonia, iv. 56.—Am. bor.
lepidota, Greene, l. c. 57.—Am. bor.
longifolia, Greene, l. c. 54.—Am. bor.
lucida, Greene, Fl. Francisc. 361 (= *Xanthocephalum lucidum*).—Am. bor.
serotina, Greene, Pittonia, iv. 57.—Am. bor.
spathulata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 156 = *Gilliesii*.
tenuis, Greene, Pittonia, iv. 55.—Am. bor.

GUYONIA, Naud. (Melast.).

- intermedia*, Cogn. in Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol. 30.—Afr. trop.

GUZMANIA, Ruiz & Pav. (Bromel.).

- acoriifolia*, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 945 (= *Tillandsia acoriifolia*).—Venez.
andreaana, Mez, l. c. 936 (= *Caraguata andreaana*).—N. Granat.
angustifolia, Mez, l. c. 905 (= *Caraguata angustifolia*).—Am. cent.
Bakeri, Mez, l. c. 933 (= *Caraguata Bakeri*).—N. Granat.
balanophora, Mez, l. c. 918.—Am. cent.
beleana, André, ex Mez, l. c. 944 (= *Caraguata beleana*).—Hort.
berteroana, Mez, l. c. 904 (= *Caraguata berteroana*).—Ind. occ.
brachycephala, Mez, l. c. 902 (= *Tillandsia brachycephala*).—Peruv.
bracteosa, André, ex Mez, l. c. 908 (= *Caraguata bracteosa*).—Ecuador.
calamifolia, André, ex Mez, l. c. 931 (= *Caraguata acoriifolia*).—N. Granat.
calothyrsus, Mez, l. c. 910 (= *Tillandsia calothyrsus*).—Peruv.
Candelabrum, André, ex Mez, l. c. 935 (= *Caraguata Candelabrum*).—N. Granat.
capituligera, Mez, l. c. 926 (= *Tillandsia capituligera*).—Ind. occ.
compacta, Mez, l. c. 947.—Am. cent.
conifera, André, ex Mez, l. c. 911 (= *Caraguata conifera*).—Ecuador.
coriostachya, Mez, l. c. 914 (= *Caraguata coriostachya*).—Venez.
Cornuaulti, André, ex Mez, l. c. 925 (= *Tillandsia Cornuaulti*).—N. Granat.
Dussii, Mez, l. c. 923.—Ind. occ.
Eduardi, André, ex Mez, l. c. 947 (= *Caraguata morreniana*).—Ecuador.
fastuosa, André, ex Mez, l. c. 926 (= *Tillandsia fastuosa*).—N. Granat.
Fawcettii, Mez, l. c. 951.—Ind. occ.
gloriosa, André, ex Mez, l. c. 922 (= *Caraguata gloriosa*).—Ecuador.
goudotiana, Mez, l. c. 942.—N. Granat.
gracillior, Mez, l. c. 937.—N. Granat.
Harrisii, Mez, l. c. 927.—Ind. occ.
hygrometrica, Mez, l. c. 919 (= *Caraguata hygrometrica*).—N. Granat.
insignis, Mez, l. c. 916 (= *Pepinia insignis*).—Am. cent.
lehmanniana, Mez, l. c. 934 (= *Caraguata lehmanniana*).—N. Granat.
lepidota, André, ex Mez, l. c. 941 (= *Caraguata lepidota*).—Ecuador.
Lindeni, Mez, l. c. 933 (= *Caraguata Lindeni*).—Peruv.
lingulata, Mez, l. c. 899 (= *Caraguata lingulata*).—Am. trop.
longipetala, Mez, l. c. 919 (= *Tillandsia longipetala*).—N. Granat.
megastachya, Mez, l. c. 928 (= *Tillandsia megastachya*).—Ind. occ.
minor, Mez, l. c. 901.—Am. cent.
monostachya, Rusby, ex Mez, l. c. 905 (= *Tillandsia monostachya*).—Ind. occ.; Am. cent. et austr.

GUZMANIA :—

- morreniana*, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 932 (= *Caraguata morreniana*).—Ecuador.
Mosquerae, Mez, l. c. 924 (= *Caraguata Mosquerae*).—N. Granat.
mucronata, Mez, l. c. 912 (= *Tillandsia mucronata*).—Venez.
multiflora, André, ex Mez, l. c. 939 (= *Caraguata multiflora*).—N. Granat.
musica, Mez, l. c. 898 (= *Caraguata musica*).—N. Granat.
ororiensis, Mez, l. c. 917.—Am. cent.
osyana, Mez, l. c. 914 (= *Caraguata osyana*).—Ecuador.
palustris, Mez, l. c. 923 (= *Caraguata palustris*).—N. Granat.
Peacockii, Mez, l. c. 915 (= *Caraguata Peacockii*).—Reg. Andin.?
pleiosticha, Mez, l. c. 930 (= *Tillandsia pleiosticha*).—Venez.
Plumieri, Mez, l. c. 950 (= *Pitcairnea Plumieri*).—Ind. occ.
Poortmani, André, ex Mez, l. c. 922.—Ecuador.
Roetzlii, Mez, l. c. 948 (= *Caraguata virescens*).—Guiana.
sanguinea, André, ex Mez, l. c. 901 (= *Caraguata sanguinea*).—N. Granat.
scherzeriana, Mez, l. c. 949.—Am. cent.
Sintensisii, Mez, l. c. 920 (= *Caraguata Sintensisii*).—Ind. occ.
sphaeroidea, André, ex Mez, l. c. 942 (= *Caraguata sphaeroidea*).—N. Granat.
Splitgerberi, Mez, l. c. 931.—Guiana.
straminea, Mez, l. c. 937 (= *Caraguata straminea*).—Hab.?
strobilantha, Mez, l. c. 913 (= *Tillandsia conantha*).—Peruv.
urbaniana, Mez, l. c. 920.—Ind. occ.
Van-volxemi, André, ex Mez, l. c. 938 (= *Caraguata Van-volxemi*).—N. Granat.
ventricosa, Mez, l. c. 929 (= *Tillandsia ventricosa*).—Venez.
virescens, Mez, l. c. 943 (= *Caraguata virescens*).—Peruv.
vittata, Mez, l. c. 946 (= *Caraguata vittata*).—Am. trop.
Wittmackii, André, ex Mez, l. c. 921 (= *Thecophyllum Wittmackii*).—N. Granat.
Zahnii, Mez, l. c. 940 (= *Caraguata Zahnii*).—Am. cent.

GYMINDA, Sarg. = *Myginda*, Jacq. (Celastr.).

- Tondusii*, Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 98.—Am. cent.

GYMNACRANTHERA, Warb. (Myrist.).

- apiculata*, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 359 (= *Myristica apiculata*).—Borneo.
canarica, Warb. l. c. 368 (= *Myristica canarica*).—Ind. or.
contracta, Warb. l. c. 360 (= *Myristica contracta*).—Borneo.
crassinervis, Warb. l. c. 362 (= *Myristica crassinervis*).—Borneo.
farquhariana, Warb. l. c. 365 (= *Myristica farquhariana*).—Malaya.
Forbesii, Warb. l. c. 363.—Malaya.
Murtoni, Warb. l. c. 357 (= *Myristica Murtoni*).—Penins. Mal.
paniculata, Warb. l. c. 370 (= *Myristica paniculata*).—Malaya.
stenophylla, Warb. l. c. 364 (= *Myristica stenophylla*).—Penins. Mal.
suluensis, Warb. l. c. 373 (= *Myristica suluensis*).—Ins. Philipp.
zippeliana, Warb. l. c. 372 (= *Myristica zippeliana*).—N. Guin.

GYMNADENIA, R. Br. = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).

- Bulbinella*, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 560 (= *Brachycorythis Bulbinella*).—Afr. austr.
Gerrardi, Kraenzl. l. c. 562 (= *Brachycorythis Gerrardi*).—Afr. austr.
macrantha, Lindl. Gen. & Sp. Orch. 279 = *Platanthera helleborina*.
rhodopea, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 42.—Eur.
virginica, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 562 (= *Platanthera virginica*).—Afr. austr.
Zeyheri, Kraenzl. l. c. (= *Schizochilus Zeyheri*).—Afr. austr.

GYMNANTHELIA, Anderss. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
lanigera, Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 300 = *A. laniger*.

GYMNANTHERA, R. Br. (Asclep.).
hypoleuca, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 435 (= *Dicerolepis hypoleuca*).—Malaya.

GYMNARTOCARPUS, Boerl. in Icon. Bogor. tt. 24-5 (1897). **URTICACEAE**.
venenosa, Boerl. l. c.—Java.

GYMNOLOMIA, H. B. & K. (Compos.).
annua, Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxix. 93.—Mexic.
cruciata, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. 480.—N. Granat.
hispidula, Robinson & Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxix. 98.—Mexic.
longifolia, Robinson & Greenm. l. c. 92.—Mexic.
megacephala, Robinson & Greenm. l. c. 102.—Mexic.
serrata, Robinson & Greenm. l. c. 99.—Mexic.

GYMNOPOGON, Beauv. (Gramin.).
digitatus, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 713 = *Chloris incompleta*.
rigidus, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 372 = *Dichaetaria Wightii*.

GYMNOSIPHON, Blume (Burmamn.).
squamatum, C. H. Wright, in Kew Bull. 1897, 281.—Afr. trop.

GYMNOSPORA, Benth. & Hook. f. (Celastr.).
Antunesii, Loes. in Engl. Jahrb. xxviii. 152.—Afr. trop.
benguelensis, Loes. l. c. 151.—Afr. trop.
borumensis, Loes. in Bull. Herb. Boiss. iv. 430.—Afr. trop.
botsabelensis, Loes. l. c. 429.—Afr. austr.
Buchananii, Loes. in Engl. Jahrb. xxviii. 153.—Afr. trop.
Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 353.—Siam.
ferruginea, Baker, in Kew Bull. 1897, 247.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 8.—Afr. trop.
harveyana, Loes. in Bull. Herb. Boiss. iv. 430.—Afr. austr.
heterophylla, Loes. l. c. 429 (= *Celastrus heterophyllus*).—Afr. austr.
rubra, Loes. l. c. 430 (= *Celastrus ruber*).—Afr. austr.
senegalensis, Loes. l. c. (= *Celastrus senegalensis*).—Afr. trop.
Trothae, Loes. in Engl. Jahrb. xxviii. 150.—Afr. trop.

GYMNOSTACHYUM, Nees (Acanth.).
Listeri, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxix. 171.—Ind. or.
variegatum, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 209.—Sumatra.

GYMNOSTERIS, Greene, Pittonia, iii. (1898) 303. **POLEMONIACEAE**.
nudicaulis, Greene, l. c. 304 (= *Collomia nudicaulis*).—Am. bor.
pulchella, Greene, l. c.—Am. bor.

GYMNOTRIX, Beauv. = **Pennisetum**, Pers. (Gramin.).
cenchroides, Roem. & Schult. Syst. ii. 499 = *P. macrum*.
hordeiformis, Nees, in Linnaea, vii. 276 = *P. macrum*.
flaccida, Munro, ex Aitchis. Cat. Punjab Pl. 163 = *P. flaccidum*.
longiglumis, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 85 = *P. dichotomum*.
purpurascens, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2072 = *P. Thunbergii*.
nigricans, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 315 = *P. compressum*.
Thouarsii, Steud. Nom. ed. I. 386 = *P. borbonicum*.
Thuarii, Beauv. Agrost. 60 = *P. borbonicum*.

GYNERIUM, Humb. & Bonpl. (Gramin.).
argenteum, Nees, Agrost. Bras. 462 = *Cortaderia argentea*.
columbianum, Pilg. in Engl. Jahrb. xxvii. 31.—N. Granat.
dioicum, Dallière, Pl. Ornam. i. t. 42 = *Cortaderia argentea*.

GYNERIUM :—
jubatum, Lemoine, ex Carr. in Rev. Hort. 1878, 449 = *Cortaderia Quila*.
nanum, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 155.—Chili.
nitidum, Pilg. in Engl. Jahrb. xxvii. 31 (= *Arundo nitida*).—Ecuador.
purpureum, Carr. in Rev. Hort. 1866, 419 = *Cortaderia argentea*.
Quila, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. 153 = *Cortaderia Quila*.
speciosum, Nees, in Meyen, Reise, i. 407 = *Cortaderia speciosa*.

GYNOPOGON, Forst. = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).
olivaeformis, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Stud. i. 877 = *A. olivaeformis*.
torresianus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 504 = *A. torresiana*.

GYNOXYS, Cass. (Compos.).
chimboraensis, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 66.—Ecuador.
corazonensis, Hieron. l. c. 65.—Ecuador.
glabriuscula, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 68.—Bolivia.
Hoffmannii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 156.—Bolivia.
Sodiroy, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 64.—Ecuador.

GYPSOPHILA, Linn. (Caryoph.).
pseudoverticillata, Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb. xxvi. 123.—Turkestan.
tubulosa, Post, Fl. Syria, 5.—Lebanon.

GYRINOPS, Gaertn. (Thymel.).
moluccana, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 111 (= *Lachnolepis moluccana*).—Ins. Molucc.

GYROSTACHIS, Pers. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
Cogniauxii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 299 (= *Stenorhynchus comosus*).—Bolivia.
constricta, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 609.—Am. bor.
Reverchonii, Small, l. c. 610.—Am. bor.
stricta, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 107.—Am. bor.
triloba, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 610.—Am. bor.

H

HAASTIA, Hook. f. (Compos.).
Greenii, Hook. f. ex T. Kirk, Fl. N. Zeal. 296.—N. Zel.

HABENARIA, Willd. (Orchid.).
albo-marginata, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 322.—Ind. or.
ambigua, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 175.—Afr. trop.
antunesiana, Kraenzl. l. c. 174.—Afr. trop.
arabica, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 184.—Arab.
bakeriana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 132.—Reg. Himal.
bambusetorum, Kraenzl. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1897, 107.—Java.
Barbersoni, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 199.—Afr. austr.
biermanniana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. 343.—Reg. Himal.
boiviniana, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 238.—Ins. Comor.
buchwaldiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 503 = *buchananiana*.
byeriana, Auct. ex Just, Jahresb. xxiv. II. 370, sphalm. = *dyeriana*.
calcarata, Benth. ex Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 211.—Afr. trop.
calva, Rolfe, l. c. 226.—Afr. trop.
clarensis, Rolfe, l. c. 216.—Afr. trop.
clavaeformis, Klinge, in Act. Hort. Petrop. xvii. I. 138.—Penins. Mal.
cogniauxiana, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 463.—Am. trop.
Columbae, Ridley, in Gard. Chron. 1900, II. 390.—Siam.

HABENARIA :—
confusa, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 241.—Afr. trop.
conspicua, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 100.—Am. bor.
crocea, Schweinf. ex Reichb. f. in Otia Bot. Hamb. i. 57 = *Platycoryne crocea*.
Cumingii, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 262.—Ins. Philipp.
cumminsiana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. 343.—Reg. Himal.
dahliana, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 466.—N. Guin.
debeerstiana, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 67.—Afr. trop.
delessertiana, Kraenzl. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1897, 108.—Ins. Philipp.
dilatatiformis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 189.—Am. sept.
dyeriana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 133.—Reg. Himal.
Elwesii, Hook. f. Bot. Mag. t. 7478.—Ind. or.
Erythraeae, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 215.—Afr. trop.
Faberi, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 201.—China.
fallax, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 325 (= *Herminium fallax*).—Reg. Himal.
flammea, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 173.—Afr. trop.
Fordii, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 202.—China.
glaucescens, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 412.—Penins. Malay.
goetzeana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 173.—Afr. trop.
Guingangae, Reichb. f. in Flora, xlvi. (1865) 179 = *Platycoryne Guingangae*.
Hancockii, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 202.—China.
Havilandii, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 427.—Borneo.
hawkesiana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 603.—Burma.
helleborina, Nichols. Dict. Gard. ii. 107 = *Platanthera helleborina*.
Henryi, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 202.—China.
hochstetteriana, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 210.—Afr. trop.
Holubii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 249.—Afr. trop.
humidicola, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 202.—China.
incompta, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 462.—Afr. trop.
insignis, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 234 = *mirabilis*.
Johnsoni, Rolfe, l. c. 571.—Afr. trop.
juncea, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 132.—Reg. Himal.
lastelleana, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 357.—Madag.
Lauterbachii, Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 239, nomen.—N. Guin.
leptobrachiata, Ridl. in Journ. Bot. 1886, 293 = *antennifera*.
linearis, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 602.—Burma.
longistigma, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 248.—Afr. trop.
Lugdardii, Rolfe, l. c. 228.—Afr. trop.
lykipiensis, Rolfe, l. c. 243.—Afr. trop.
macrandra, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 139 = *Podandria macrandra*.
Maingayi, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 604.—Singapore.
marmarophila, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 304.—Borneo.
massoniana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 601.—Burma.
mesophylla, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 204.—Austral.
Michaeli, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 306.—Calif.
micholitziana, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 233.—N. Guin.
mirabilis, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 572.—Afr. trop.
monticola, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 413.—Penins. Mal.
mosambicensis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 331.—Afr. trop.
neglecta, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 603.—Ind. or.
Nicholsoni, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 571.—Afr. trop.
omeiensis, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 203.—China.

HABENARIA :—

- paludosa*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 139 = *Platycoryne paludosa*.
paludosa, Reichb. f. in Flora, 1865, 178 = *Platycoryne Protearum*.
pantlingiana, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 892.—Reg. Himal.
platyanthera, Reichb. f. in Linnaea, xxii. 860 = *Roeperocharis platyanthera*.
platantheropsis, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 172.—Ind or.
pleistadenia, Reichb. f. ex Oliv. in Journ. Linn. Soc. xxi. 404 = *Cynorchis Volkensii*.
polytricha, Rolfe, in Hook. Ic. Pl. t. 2496.—Formosa. Prazeri, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 602.—Burma.
Protearum, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. i. 57 = *Platycoryne Protearum*.
psiloceras, Welw. ex Reichb. f. in Flora, 1867, 99.—Afr. trop.
pseudophrys, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 133.—Reg. Himal.
pungens, Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 299.—Bolivia.
Rendlei, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 213.—Afr. trop.
replicata, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 296 = *hochstetteriana*.
rhopalostigma, Rolfe, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 342.—Afr. trop.
Rivae, Kraenzl. l. c. 238.—Ins. Comor.
saundersioides, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. l. c. 181.—Afr. austr.
Schinzii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 219.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. i. 58 = *cirrhatta*.
Selerorum, Schlechter, in Bull. Herb. Boiss. vii. 539.—Am. cent.
singaporensis, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 410.—Penins. Mal.
sondaica, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 382.—Java.
staudtiana, Kraenzl. & Schlechter, in Kraenzl. l. c. 320.—Afr. trop.
Staudtii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 221 = *staudtiana*.
stenoloba, Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped. 274, nomen.—Afr. trop.
stricta, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 189.—Am. bor.
subauriculata, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 34.—Mexic.
tosaensis, Makino, in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 427.—Japon.
trilobulata, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvi. 332.—Afr. trop.
Trimeni, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon. iv. 233.—Zeylan.
villosa, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 228.—Afr. trop.
warburgiana, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 467.—Ins. Philipp.
wilmsiana, Kraenzl. l. c. 464.—Afr. austr.
xanthochila, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 411.—Penins. Mal.

HABRACANTHUS, Nees (Acanth.).

- cyaneus*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 668.—N. Granat.
diversicolor, Lindau, l. c. 669.—Venez.; N. Granat.
macrochilus, Lindau, l. c.—N. Granat.

HABRANTHUS, Herb. = **Hippeastrum**, Herb. (Amaryll.).

- Bakeri*, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 150.—Chili.
flavus, R. Phil. l. c. xxvii. 333 = *H. Solisi*.

HAEMACANTHUS, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 63. **ACANTHACEAE**.

- coccineus*, S. Moore, l. c.—Afr. trop.

HAEMADICTYON, Lindl. = **Prestonia**, R. Br. (Apocynac.).

- Lindmanii*, Malmé, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 10, 31.—Bras.

HAEMANTHUS, Tourn. (Amaryll.).

- brachyandrus*, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 391.—Afr. trop.
Cabrae, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 56.—Afr. trop.
eetveldeanus, Wildem. & Th. Dur. l. c.—Afr. trop.

HAEMANTHUS :—

- Nelsonii*, Baker, in Kew Bull. 1898, 310.—Afr. trop.
Nicholsoni, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 392.—Afr. trop.
zambesiacus, Baker, l. c. 387.—Afr. trop.
HAEMOCHARIS, Salisb. = **Laplacea**, H. B. & K. (Ternstroem.).
alpestris, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 547 = *L. alpestris*.
curtyana, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 430 = *L. curtyana*.
integerrima, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 294 = *Gordonia integerrima*.
portoricensis, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 548 = *L. portoricensis*.
serrata, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 296.—Java.

HAKEA, Schrad. (Proteac.).

- suberea*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 223.—Austral.

HALERPESTES, Greene, Pittonia, iv. (1900) 207. **RANUNCULACEAE**.

- Cymbalaria*, Greene, l. c. (= *Ranunculus Cymbalaria*).—Am. bor.
salsuginosa, Greene, l. c. (= *Ranunculus salsuginosus*).—Am. bor.
tridentata, Greene, l. c. 208 (= *Ranunculus Cymbalaria*).—Am. bor.

HALGANIA, Gaudich. (Borag.).

- rigida*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 204.—Austral.
viscosa, S. Moore, l. c.—Austral.

HALIMUM, Rumpf = **Sesuvium**, Linn. (Ficoid.).

- mesebrianthemoides*, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 413 = *S. crystallinum*.

HALOPYRUM, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2448 (1896). **GRAMINEAE**.

- mucronatum*, Stapf, l. c.—Ind. or.

HALORAGIS, Forst. (Halorag.).

- cartilaginea*, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. 1896, 390.—N. Zel.

HAMADRYAS, Comm. (Ranunc.).

- Delfinii*, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 23.—Chili.

HANSEMANNIA, K. Schum. (Legum.).

- gogolensis*, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 343.—N. Guin.

HAPLOCHILUS, Endl. = **Zeuxine**, Lindl. (Orchid.).

- amboinense*, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 2.—Malaya.

HAPLOCHOREMA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 331. **ZINGIBERACEAE**.

- extensum*, K. Schum. l. c. 333.—Borneo.
gracilipes, K. Schum. l. c. 332.—Borneo.
polyphyllum, K. Schum. l. c.—Borneo.
uniflorum, K. Schum. l. c.—Borneo.

HAPLOPAPPUS, Endl. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- Moyanoi*, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 609.—Patag.
patagonicus, Speg. l. c. 528.—Patag.
Struthionum, Speg. l. c. 529.—Patag.

HARIOTA, Adans. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).

- lindbergiana*, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 107 = *R. lindbergiana*.
sarmentacea, Kuntze, l. c. = *R. sarmentacea*.
tucumanensis, Kuntze, l. c. = *R. tucumanensis*.

HARMANDIA, Pierre (Olac.).

- congoensis*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 570 (= *Lecomtea congoensis*).—Afr. trop.

HARMSIA, K. Schum. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 240 (1897); et in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 35. **STERCULIACEAE**.

- sidoides*, K. Schum. l. c.—Afr. trop.

HARMSIELLA, Briq. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 291 (1897) = **Chartocalyx**, Regel (Labiata.).

- HARMSIOPANAX**, Warb. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 166 (1897) = **Horsfieldia**, Bl. (Aral.).

HARPAECARPUS, Nutt. (Compos.).

- minimus*, Greene, Fl. Francisc. 417 = *Hemizonia minima*.
parvulus, Greene, l. c. 416 = *Hemizonella Durandi*.

HARPALYCE, Moç. & Sesse (Legum.).

- lepidota*, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 436.—Bras.
speciosa, Taub. l. c. 435.—Bras.

HARPECHLOA, Kunth (Gramin.).

- altera*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. 57 = *Microchloa altera*.

HARPULLIA, Roxb. (Sapind.).

- cauliflora*, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 424.—N. Guin.

HARRISONIA, R. Br. (Simarub.).

- occidentalis*, Engl. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. iii. iv. 218.—Afr. trop.

HARTMANNIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).

- speciosa*, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 181 = *O. speciosa*.
tetraptera, Small, l. c. = *O. tetraptera*.

HARVEYA, Hook. (Scrophul.).

- andongensis*, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 780.—Afr. trop.
Bolusii, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 234 = *capensis*.
Buchwaldii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. 517.—Afr. trop.
cathcartensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 234.—Afr. austr.
euryantha, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 184.—Afr. austr.
hirtiflora, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 780.—Afr. trop.
laxiflora, Hiern, ex Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 344.—Afr. austr.
pumila, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 344.—Afr. austr.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol. 35.—Afr. trop.

HASELHOFFIA, Lindau, in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 305 (1897); et in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 316. **ACANTHACEAE**.

- leucophthalma*, Lindau, l. c.—Afr. trop.

HAVILANDIA, Stapf (Borag.).

- papuana*, Hemsl. in Kew Bull. 1899, 107.—N. Guin.

HAWORTHIA, Dunal (Liliac.).

- Cassytha*, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 337.—Afr. austr.
sessiliflora, Baker, l. c. 353.—Afr. austr.
xiphophylla, Baker, l. c. 354; et in Bot. Mag. t. 7505.—Afr. austr.

HAZARDIA, Greene = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- obtusata*, Greene, Fl. Francisc. 375.—Calif.
Whitneyi, Greene, Pittonia, iii. 43 = *A. Whitneyi*.

HEBENSTRETIA, Linn. (Selag.).

- glaucescens*, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 185.—Afr. austr.
Holubii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 266.—Afr. trop.
leucostachys, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 186.—Afr. austr.
macrostylis, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 317.—Afr. austr.
stenocarpa, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 186.—Afr. austr.

HEBESTIGMA, Urb. Symb. Antill. ii. (1900) 289. **LEGUMINOSAE**.

- cubense*, Urb. l. c.—Ind. occ.

HECASTE, Soland. = **Bobartia**, Linn. (Irid.).

- spathacea*, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 309 = *B. indica*.

HECHTIA, Klotzsch (Bromel.).

bracteata, *Mez*, in *DC. Monog. Phan.* ix. 550.—Mexic.
capituligera, *Mez*, l. c. 546.—Mexic.
desmetiana, *Mez*, l. c. 551.—Mexic.
gamopetala, *Mez*, l. c. 549.—Mexic.
montana, *Brandegee*, in *Erythraea*, vii. 9.—Mexic.
morreniana, *Mez*, in *DC. Monog. Phan.* ix. 547.—
Mexic.
podantha, *Mez*, l. c. 549.—Mexic.
sphaeroblasta, *Robinson*, in *Proc. Amer. Acad.* xxxv.
323.—Mexic.
suaveolens, *Morr.* ex *Mez*, in *DC. Monog. Phan.* ix.
550.—Mexic.?

HECKELDORA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii.
(1896) 1286. **MELIACEAE**.
angustifolia, *Pierre*, l. c. 1287.—Afr. trop.
latifolia, *Pierre*, l. c.—Afr. trop.

HEDEOMA, Pers. (Labiata).

bicolor, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 185 = *Poliomintha* bicolor.
blepharodonta, *Greene, Pittonia*, iii. 339.—Am. bor.
coccinea, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A.
295 = *Keithia* coccinea.
denudata, *Briq.* l. c. = *Keithia* denudata.
diffusa, *Greene, Pittonia*, iii. 338.—Am. bor.
glabrescens, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A.
294 = *Poliomintha* glabrescens.
Glaziovii, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 185.—Bras.
gracilis, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A.
295 = *Keithia* gracilis.
Greggii, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 185 = *Poliomintha* Greggii.
longiflora, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A.
294 = *Poliomintha* longiflora.
marifolia, *Briq.* l. c. = *Poliomintha* marifolia.
nana, *Greene, Pittonia*, iii. 339.—Am. bor.
nana, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 294
= thymoides.
nitida, *Briq.* l. c. 295 = *Keithia* nitida.
permixta, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 183.—Mexic.
Pringlei, *Briq.* l. c. 182.—Mexic.
rubiacea, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A.
294 = *Keithia* rubiacea.
sancta, *Small*, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 287.—
Am. bor.
serpyllifolia, *Small*, l. c.—Am. bor.
villosa, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A.
295 = *Keithia* villosa.

HEDEOMOIDES, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.*
iv. III A. 295 (1896). **LABIATAE**.
serpylloides, *Briq.* l. c. (= *Pogogyne serpylloides*).—
Am. sept.
tenuiflora, *Briq.* l. c. (= *Pogogyne tenuiflora*).—Ind.
occ.
ziziphoroides, *Briq.* l. c. (= *Pogogyne ziziphoroides*).
—Calif.

HEDONA, Lour. = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).
Davidi, F. N. Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 433
= L. Davidi.

HEDRAEANTHUS, Griseb. = **EDRAIANTHUS**, A.
DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campan.).
montenegrinus, Horák, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900,
163.—Eur.

HEDYCHIUM, Koen. (Scitamin.).

aureum, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxvii. 340.—Celebes.
collinum, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 103.
—Siam.
denticulatum, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*,
xxxii. 102.—Penins. Mal.
flavescens, *Carey*, ex *Rosc. Scitam.* t. 50.—Zeylan.
macrorrhizum, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*,
xxxii. 102.—Penins. Mal.
microchilum, *Ridley*, l. c. 101.—Java.

HEDYOSMOS, Mitchell = **Cunila**, Linn. (Labiata).
Archevaletae, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 194 = *C. Archevaletae*.

HEDYOSMUM, Sw. (Chloranth.).

maximum, *K. Schum.* in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 345.—
Bolivia.

HEDYPNOIS, Tourn. (Compos.).
annua, Bub. Fl. Pyren. ii. 49 = *Rhagadiolus* Hedypnois.

HEDYSARUM, Tourn. (Legum.).

baldshuanicum, *Fedtsch.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 258.
—Turkestan.
Bellevii, *Bornm.* in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 756 (= *Ono-*
brychis Bellevii).—Afghan.
Brotherusi, *Freyn*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 19.—
Oriens.
candidissimum, *Freyn*, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 607.—
Austria.
candidum, *Freyn et Sint.* in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1892,
80 = *candidissimum*.
carnosulum, *Greene, Pittonia*, iii. 212.—Am. bor.
cinerascens, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 257.
—Am. bor.
cymbostegium, *Freyn*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 13,
22.—Oriens.
ferganense, *Korsch.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.*
iv. no. 4, 93.—Turkestan.
korzinskyanum, *Fedtsch.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 257.
—Turkestan.
lanceifolium, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 256.
—Am. bor.
leucanthum, *Greene, Pittonia*, iii. 213.—Am. bor.
marginatum, *Greene*, l. c. iv. 138.—Am. bor.
occidentale, *Greene*, l. c. iii. 19.—Am. bor.
Poncinsii, *Franch.* in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii.
344.—As. cent.
sulphurescens, *Rydb.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897,
251.—Am. bor.
tanguticum, *Fedtsch.* in *Bot. Centralbl.* lxxxiv. 274.—
China.
tuberosum, *Fedtsch.* l. c. 275.—China.

HEERIA, Meissn. = **Anaphrenium**, E. Mey. (Ana-
card.).
arenophila, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 748.—Afr.
trop.
benguellensis, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 499.—Afr.
trop.
crassinervia, *Engl.* l. c. 500 = *A. crassinervium*.
Schinzii, *Engl.* l. c.—Afr. trop.

HEINSENIA, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. (1897)
453. **RUBIACEAE**.
diervilleoides, *K. Schum.* l. c. 454.—Afr. trop.

HEINZIA, DC. (Rubiace.).
tomentosa, *Welw.* ex *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i.
455.—Afr. trop.

HEISTERIA, Jacq. (Olac.).

biflora, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 18.—
Bolivia.
Silviani, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 3.—Bras.
yapacaniensis, *K. Schum.* in *Just, Jahrb.* xxvi. i.
360.—Bolivia.
Zimmereri, *Engl.* in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii.
288.—Afr. trop.

HEISTERIA, Linn. = **Muraltia**, Neck. (Polygal.).
Heistera, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 10 = *M. Heisteria*.

HEKATEROSACHNE, Steud. = **Oplismenus**, Beauv.
(Gramin.).
elatiar, *Steud.* *Syn. Pl. Gram.* 118 = *O. compositus*.

HELEASTRUM, DC. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
Chapmanii, *Greene, Pittonia*, iii. 49 = *A. eryngiifolius*.
paludosum, *Greene*, l. c. 50 = *A. paludosus*.
spinulosum, *Greene*, l. c. = *A. spinulosus*.

HELENASTRUM, Mill. = **Helenium**, Linn.
(Compos.).
glaucum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 157 = *Cephalophora*
glauc.
rivulara, *Greene*, *Fl. Francisc.* 435.—Am. sept.
tinctarium, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 157 = *Cephalophora*
aromatica.

HELENIUM, Linn. *Syst. ed. I.* (1735) = **Inula**, Linn.
(Compos.).
vulgare, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 546 = *I. Conyza*.

HELEOCHARIS, Lestib. = **Eleocharis**, R. Br.
(Cyperac.).

HELIA, Mart. = **Lisianthus**, Aubl. (Gentian.).
loeseneriana, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxii. 346.—Bras.
micrantha, *Gilg*, l. c. 347.—Parag.

HELIANTHUS, Linn. (Compos.).

campestris, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 157 = *Flourensia*
campestris.
glaucus, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 480.—
Am. bor.
Lehmanni, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 39.
—Ecuador.
polyphyllus, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898,
480.—Am. bor.
pseudoverbesinoides, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.*
xxix. 40.—Ecuador.
riparia, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 157 = *Flourensia*
riparia.
Sodiroyi, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 41.—
Ecuador.
subrhomboideus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i.
419.—Am. bor.
verticillatus, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898,
479.—Am. bor.

HELICHRYSUM, Vaill. (Compos.).

agrostophilum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 833.—
Afr. austr.
amboense, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 561.—Afr.
trop.
amplum, *O. Hoffm.* in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 150.—
Afr. austr.
araneosum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 834.—Afr.
austr.
athrixiifolium, *O. Hoffm.* in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii.
150.—Afr. austr.
Bachmannii, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 459.—Afr.
austr.
benguellense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 564.—Afr.
trop.
calocephalum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 834.—
Afr. austr.
Cassiope, *S. Moore*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 199.—
Austral.
citrinum, Bub. Fl. Pyren. ii. 207 = *H. Stoechas*.
concinnum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* 1897, 269.—Afr.
austr.
confertifolium, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 835.—
Afr. austr.
congolatum, *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.*
324, nomen.—Afr. trop.
Danaë, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1899, 371.—Afr. austr.
elodes, *K. Schum.* in *Just, Jahrb.* xxvi. i. 377, sphalm.
= *helodes*.
floccosum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 836.—Afr.
austr.
glomeratum, *Klatt*, l. c. 460.—Afr. austr.
helodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 561.—Afr. trop.
hoepfnerianum, *Vatke*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 460.—
Afr. trop.
homilochrysum, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1899, 371.—
Afr. austr.
infaustum, *J. M. Wood & Evans*, in *Journ. Bot.* 1897,
351.—Afr. austr.
involutatum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 461.—
Afr. austr.
Kuntzei, *O. Hoffm.* in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 152.—
Afr. austr.
lanceolatum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 811 (= *Osothamnus*
lanceolatus).—N. Zel.
luteo-rubellum, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 149.—Afr.
trop.
marmarolepis, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1899, 370.—
Afr. austr.
Mimetes, *S. Moore*, l. c. 372.—Afr. austr.
mixtum, *O. Hoffm.* in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 152.
—Afr. austr.
monocephalum, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 149.—Afr.
trop.
nanum, *Baker*, l. c. 150.—Afr. trop.
nanum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 461.—Afr.
austr.
nyasicum, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 150.—Afr. trop.
opacum, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 836.—Afr.
austr.
oreophilum, *Klatt*, l. c. 837.—Afr. austr.
patulifolium, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 150.—Afr.
trop.
plantaginifolium, *O. Hoffm.* in *Kuntze, Rev. Gen.* iii.
ii. 153.—Afr. austr.

HELICHRYSUM :—

- poycladum, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. 837.—Afr. austr.
 praecinctum, Klatt, l. c. 838.—Afr. austr.
 pulvinatum, O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 153.—Afr. austr.
 puteale, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 198.—Austral.
 rhodolepis, Baker, in Kew Bull. 1898, 150.—Afr. trop.
 Sibthorpii, Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar. t. 313.—Eur. somalense, Baker f. in Journ. Bot. 1899, 60.—Afr. trop.
 Steetsii, O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter. xiii. 25 = *Achyrocline batocana*.
 stramineum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 563.—Afr. trop.
 sulfureum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 144.—Lesbos.
 sulphureo-fuscum, Baker, in Kew Bull. 1898, 151.—Afr. trop.
 syncephalum, Baker, l. c.—Afr. trop.
 Thapsii, O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 154.—Afr. austr.
 xanthosphaerum, Baker, in Kew Bull. 1898, 151.—Afr. trop.

HELICIA, Lour. (Proteac.).

- grandis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2631.—China.
 incisa, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz. ii. 10; et in Meded. 'S Lands Plantent. xxxiii. 317.—Java.
 lanceolata, Koord. & Valet. l. c. 10; et l. c. 320.—Java.

HELICONIA, Linn. (Scitamin.).

- Sanderi, Sand. in Gard. Chron. 1899. I. 365.—Hort.

HELICOPHYLLUM, Schott (Aroid.).

- hastatum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iv. 179.—As. Min.

HELICTERES, Pluk. (Stercul.).

- coccocarpa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 25 = *Mahernia coccocarpa*.
 erodioides, Kuntze, l. c. = *Mahernia erodioides*.
 natalensis, Kuntze, l. c. = *Mahernia natalensis*.

HELICTONEMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.

- n. s. i. (1898) 73. **CELASTRACEAE**.
 klaineanum, Pierre, l. c.—Afr. trop.

HELIOCARPUS, Linn. (Tiliac.).

- glanduliferus, Robinson, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 127.—Am. cent.
 Nelsoni, Rose, l. c. 128.—Mexic.
 nodiflorus, Donn. Sm. & Rose, ex Rose, l. c. 126.—Am. cent.
 occidentalis, Rose, l. c. 127.—Mexic.
 pallidus, Rose, l. c. 128.—Mexic.
 reticulatus, Rose, l. c.—Mexic.

HELIOPHILA, Burm. f. (Crucif.).

- arabidea, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 133.—Afr. austr.
 arenosa, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 capensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 5 = *callosa*.
 Dodii, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 314.—Afr. austr.
 exilis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 133.—Afr. austr.
 lactea, Schlechter, l. c. 134.—Afr. austr.
 leptophylla, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 linoides, Schlechter, l. c. 135.—Afr. austr.
 macowaniana, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 macra, Schlechter, l. c. 136.—Afr. austr.
 Maximiliani, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 namaquana, Bolus, in Journ. Bot. 1896, 16.—Afr. austr.
 nubigena, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 136.—Afr. austr.
 polygaloides, Schlechter, l. c. 137.—Afr. austr.
 rosea, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 sabulosa, Schlechter, l. c. 138.—Afr. austr.
 sarcostyla, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 scabrida, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 314.—Afr. austr.
 sisymbrioides, Schlechter, l. c. 1897, 340.—Afr. austr.
 squamata, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 139.—Afr. austr.
 stenocarpa, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
 tricuspidata, Schlechter, l. c. 140.—Afr. austr.

HELIOPTROPIUM, Tourn. (Borag.).

- anchusanthum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 718.—Afr. trop.
 axillare, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 483.—Mexic.
 Botta, Deflers, Voy. Yemen, 172, t. 5.—Arab.
 crispiflorum, Urb. Symb. Antill. i. 394.—Ind. occ.
 Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. i. 508 = *europaeum*.
 guanicense, Urb. Symb. Antill. i. 395.—Ind. occ.
 Kuntzei, Guerke, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 205.—Afr. austr.
 mexicanum, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 484.—Mexic.
 reversiferum, Wright, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 433.—Ind. occ.

HELIPTERUM, DC. (Compos.).

- Marlothii, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 430.—Afr. austr.
 microglossum, Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, 151.—Austral.
 oppositifolium, S. Moore, in Journ. Bot. 1897, 165.—Austral.
 verecundum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 200.—Austral.
 Zacchaeus, S. Moore, in Journ. Bot. 1897, 166.—Austral.

HELLMUTHIA, Steud. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

- restioides, Steud. Syn. Pl. Cyp. 90 = *S. membranaceus*.

HELMIA, Kunth = **Dioscorea**, Linn. (Dioscor.).

- dregeana, Kunth, Enum. Pl. v. 437 = *D. dregeana*.
 dumetorum, Kunth, l. c. 436 = *D. dumetorum*.

HELOPUS, Trin. = **Eriochloa**, H. B. & K. (Gramin.).

- acrotichus, Steud. Syn. Pl. Gram. 100 = *E. polystachya*.
 annulatus, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. II. 124 = *E. polystachya*.
 laevis, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 49 = *E. polystachya*.

HELXINE, Bub. Fl. Pyren. i. 76 (1897) = **Parietaria**,

- Tourn. (Urtic.).
 Bocconi, Bub. l. c. 77 = *P. lusitanica*.
 Dioscoridis, Bub. l. c. 76 = *P. officinalis*.

HEMARTHRIA, R. Br. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).

- capensis, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. ii. 248 = *R. compressa*.
 caudiculata, Steud. Syn. Pl. Gram. 359 = *R. compressa*.
 coromandelina, Steud. l. c. 358 = *R. compressa*.
 fasciculata, Kunth, Rév. Gram. i. 153 = *R. compressa*.
 hamiltoniana, Steud. Syn. Pl. Gram. 358 = *R. protensa*.
 laxa, Steud. l. c. = *R. compressa*.
 perforata, Kunth, Rév. Gram. i. 153 = *R. perforata*.
 protensa, Steud. Syn. Pl. Gram. 359 = *R. protensa*.

HEMEROCALLIS, Linn. (Liliac.).

- citrina, Baroni, Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze, (1896-7) 145; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. (1897) 305.—China.

HEMIBOEA, C. B. Clarke (Gesnerac.).

- gracilis, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 124, fide K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. I. 535.—China.

HEMICOA, Auct. in Just, Jahresb. xxiv. II. (1896) 371, sphalm. = seq.**HEMIEVA**, Rafin. = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifrag.).

- violacea, Wheelock, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 71 (= *Suksdorfia violacea*).—Am. bor.

HEMIGENIA, R. Br. (Labiata.).

- exilis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 216.—Austral.
 Macphersoni, Luehmann, in Vict. Nat. xv. 20.—Austral.

HEMIGRAPHIS, Nees (Acanth.).

- abyssinica, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 58.—Afr. trop.
 angustifolia, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 203.—Malaya.
 aspera, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 = *Strobilanthes scaber*.
 bicolor, Boerl. l. c. (= *Ruellia bicolor*).—Java.
 blumeana, Boerl. l. c. = *alternata*.
 borneensis, Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 555.—Borneo.

HEMIGRAPHIS :—

- buruensis, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 204.—Malaya.
 colorata, Hallier f. l. c. 199 (= *Ruellia colorata*).—Java.
 discolor, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 (= *Ruellia discolor*).—Java.
 junghuhniana, Boerl. l. c. (= *Ruellia junghuhniana*).—Java.
 lithophila, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 544.—N. Guin.
 nemorosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 (= *Ruellia nemorosa*).—Java.
 Petola, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 206.—Malaya.
 prostrata, Hallier f. l. c. 202.—Celebes.
 rapifera, Hallier f. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 555.—Celebes.
 ravaccensis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 (= *Ruellia ravaccensis*).—Malaya.
 repanda, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 198 (= *Ruellia repanda*).—Malaya.
 Schweinfurthii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 58.—Afr. trop.
 serpens, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 (= *Ruellia serpens*).—Java.
 stenophylla, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 203.—Malaya.
 sumatrensis, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 (= *Ruellia sumatrensis*).—Sumatra.
 tenera, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 58.—Afr. trop.
 tonkinensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 649.—Cochinch.
 trichotoma, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 658 (= *Ruellia trichotoma*).—Java.

HEMHEISTERIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.

- Fr. xlv. (1897) 126. **OLACACEAE**.
 pentandra, Van Tiegh. l. c. (= *Heisteria pentandra*).—Am. austr.

HEMIMERIS, Linn. f. (Scrophul.).

- gracilis, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 375.—Afr. austr.

HEMIORCHIS, Kurz (Scitamin.).

- Pantlingii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 163.—Reg. Himal.

HEMIPILIA, Lindl. (Orchid.).

- amethystina, Rolfe, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7521.—Burma.
 brevicarata, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 420.—China.
 cruciata, Finet, l. c. 421.—China.
 Henryi, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 203.—China.

HEMIPOGON, Decne. (Asclep.).

- exaltatus, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 7, 18.—Bras.
 laxifolius, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. 20.—Bras.

HEMISACRIS, Steud. = **Schismus**, Beauv. (Gramin.).

- gonatodes, Steud. in Flora, 1829, 490 = *S. fasciculatus*.

HEMITOMES, A. Gray = **Newberrya**, Torr. (Monotrop.).

- spicatum, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = *N. spicata*.
 subterraneum, A. A. Heller, l. c. = *N. subterranea*.

HEMIZONIA, DC. (Compos.).

- clementina, Brandege, in Erythea, vii. 70.—Am. bor.
 Congdonii, Robinson & Greenm. in Coult. Bot. Gaz. xxii. 169.—Am. bor.

HEMIZYGIA, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.

- iv. III A. 368 (1897). **LABIATAE**.
 bracteosa, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 248 = *Ocimum bracteosum*.
 Junodi, Briq. l. c. 249.—Afr. trop.
 teucrifolia, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 369 (= *O. teucrifolium*).—Afr. austr.
 tuberosa, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 852.—Afr. trop.

HENRIETTELLA, Naud. (Melast.).

- tuberculosa, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 335.—Am. cent.

HENSLOWIA, Blume (Santal).
plurinervis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 181.—Arch. Mal.

HEPTACYCLUM, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899) 415. **MENISPERMACEAE**.
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

HEPTAPLEURUM, Gaertn. (Aral.).
affine, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 54.—Malaya.
Curtisii, *King, l. c.* 56.—Malaya.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 307.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 306.—China.
grandifolium, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 40.—Java.
Hullettii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 54.—Malaya.
laeve, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xlii. 42.—Java.
latifoliolatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 51.—Malaya.
lawranceanum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 293.—Ind. or.
luridum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 48.—Malaya.
nervosum, *King, l. c.* 55.—Malaya.
Ridleyi, *King, l. c.* 54.—Malaya.
Scortechinii, *King, l. c.* 49.—Malaya.
subracemosum, *King, l. c.*—Malaya.
triste, *King, l. c.* 48.—Malaya.
Wrayi, *King, l. c.* 55.—Malaya.

HERACLEUM, Linn. (Umbell.).
colchicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 276.—Reg. Caucas.
hemsleyanum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 503.—China.

HERBERTIA, Sweet (Irid.).
Hauthalii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 331.—Parag.

HERMANNIA, Linn. (Stercul.).
adenotricha, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 306.—Afr. austr.
alhiensis, *K. Schum. l. c.* 303.—Afr. trop.
asbestina, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 373.—Afr. austr.
auricoma, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 67 = *Mahernia auricoma*.
brachymalla, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 305.—Afr. austr.
coccocarpa, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 25* = *Mahernia coccocarpa*.
cyclophylla, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 303.—Afr. trop.
depressa, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 245.—Afr. austr.
Dinterii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 748.—Afr. austr.
erecta, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 245.—Afr. austr.
erodiodes, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 25* = *Mahernia erodioides*.
galpiniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 435 = *grandifolia*.
grandistipula, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 63 = *Mahernia grandistipula*.
lanceolata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 436 = *montana*.
macrobotrys, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 51.—Afr. trop.
natalensis, *K. Schum. l. c.* 75 = *Mahernia natalensis*.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 245.—Afr. trop.
parviflora, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 71 = *Mahernia parviflora*.
pedunculata, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 305.—Afr. austr.
Pfeilii, *K. Schum. l. c.* 304.—Afr. trop.
phaulochroa, *K. Schum. l. c.* 303.—Afr. austr.
Rautanenii, *Schinz, ex K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 66.—Afr. trop.
Rehmannii, *K. Schum. l. c.* 76 = *Mahernia Rehmannii*.
saccifera, *K. Schum. l. c.* 71 = *Mahernia saccifera*.
schlechteriana, *Schinz, ex K. Schum. l. c.* 75.—Afr. austr.
staurostemon, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 305.—Afr. austr.
stenopetala, *K. Schum. l. c.* 304.—Afr. trop.
Stuhlmanni, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 50.—Afr. trop.
tephrocapsa, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 304.—Afr. austr.

VOL. III.

HERMANNIA :—
transvaalensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 437.—Afr. austr.
vernicata, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 64 = *Mahernia vernicata*.
violacea, *K. Schum. l. c.* 69 = *Mahernia violacea*.
viscosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 89.—Afr. trop.
Volkensii, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl. v.* 52.—Afr. trop.
Woodii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 437.—Afr. austr.

HERMINIUM, Linn. (Orchid.).
angustilabre, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 131.—Reg. Himal.
cymoidea, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 336, sphalm. = *Cynosorchis sigmoidea*.
gracile, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 131.—Reg. Himal.
jaffreyanum, *King & Pantl. l. c.* 130.—Reg. Himal.
quinquelobum, *King & Pantl. l. c.*—Reg. Himal.
Stuedneri, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 109 = *Peristylus Stuedneri*.

HERMSTAEDTIA, Reichb. (Amarant.).
Welwitschii, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 278.—Afr. trop.

HERNANDIA, Plum. (Laurin.).
drakeana, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1899, 4.—Ins. Societ.
Temarii, *Nadeaud, l. c.* 1897, 114.—Ins. Societ.

HERNIARIA, Tourn. (Illecebr.).
densiflora, *Williams, ex Post, Fl. Syria, 7; et in Bull. Herb. Boiss.* iv. 562.—Syria.
hebecarpa, *Gay, ex Williams, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 563.—Alger.
mauritanica, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 47.—Alger.

HERPESTIS, Gaertn. f. (Scrophul.).
decumbens, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 91.—Mexic.
occultans, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 394.—Afr. trop.

HERSCHELIA, Lindl. = *Disa*, Berg. (Orchid.).
bachmanniana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 805.—Afr. trop.
Baurii, *Kraenzl. l. c.* 804 = *D. Baurii*.
charpentieriana, *Kraenzl. l. c.* 807 = *D. charpentieriana*.
forcipata, *Kraenzl. l. c.* = *D. forcipata*.
hamatopetala, *Kraenzl. l. c.* 803 = *D. hamatopetala*.
lugens, *Kraenzl. l. c.* 806 = *D. lugens*.
purpurascens, *Kraenzl. l. c.* 803 = *D. purpurascens*.
venusta, *Kraenzl. l. c.* 805 = *D. venusta*.

HERTIA, Neck. = *Othonnopsis*, Jaub. & Spach (Compos.).
Kuntzei, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 157.*—Afr. austr.
natalensis, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. austr.

HESPERALOE, Engelm. (Liliac.).
Davyi, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 226.—Calif. ?

HESPERANTHA, Ker-Gawl. (Irid.).
alpina, *Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii.* 703 (= *Geissorhiza alpina*).—Afr. trop.
erecta, *Benth. & Hook. f. l. c.* (= *Geissorhiza erecta*).—Afr. austr.
lutea, *Benth. & Hook. f. l. c.* (= *Geissorhiza lutea*).—Afr. austr.
subexserta, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 62.—Afr. austr.

HESPEREVAX, A. Gray = *Evox*, Gaertn. (Compos.).
acaulis, *Greene, Fl. Francisc.* 402.—Calif.
brevisfolia, *Greene, l. c.*—Calif.
humilis, *Greene, l. c.* 401.—Calif.
sparsiflora, *Greene, l. c.* 402.—Calif.

HESPERIS, Linn. emend. ex Kuntze = gen. collect. *Crucif. florida*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 5* = *Sisymbrium floridum*.
intricatissima, *Kuntze, l. c.* = *Draba intricatissima*.
linearifolia, *Kuntze, l. c.* 6 = *Sisymbrium linifolium*.

HESPEROGENIA, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. *Contrib. Nat. Herb.* v. (1899) 203. **UMBELLIFERAE**.
Stricklandi, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

HESPEROSCORDERUM, Lindl. = *Brodiaea*, Sm. (Liliac.).
hyacinthium, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 1293 = *B. hyacinthina*.
lacteam, *Lindl. l. c. t.* 1639 = *B. hyacinthina*.
Lewisii, *Hook. Fl. Bor. Am. ii.* 185 = *B. hyacinthina*.

HESSEA, Herb. (Amaryll.).
bachmanniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 812.—Afr. austr.
brachyscypha, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 191.—Afr. austr.
Schlechteri, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 310.*—Afr. austr.

HETABERIA, Blume (Orchid.).
alba, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii.* 404.—Penins. Mal.
connata, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 241, nomen.—N. Guin.
nitida, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii.* 404.—Penins. Mal.
samoensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 199.—Ins. Samoa.

HETERANTHERA, Ruiz & Pav. (Ponteder.).
kotschyana, *Fenzl, ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 205.—Afr. trop.

HETERIXIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 177. **LORANTHACEAE**.
amentacea, *Van Tiegh. l. c.* 178 (= *Viscum articulatum*).—N. Caled.
geminata, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. geminatum*).—Borneo.
Lindsayi, *Van Tiegh. l. c.* (= *V. Lindsayi*).—N. Zel.

HETERODRABA, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 14 (1894). **CRUCIFERAE**.
unilateralis, *Greene, l. c.* (= *Draba unilateralis*).—Calif.

HETEROLEPIS, Ehrenb. = *Chloris*, Sw. (Gramin.).
elegans, *Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient.* v. 554 = *C. virgata*.

HETEROLYTRON, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. 676, sphalm. = *HETERELYTRON*, Jungh. = *Anthistiria*, Linn. (Gramin.).

HETEROMELES, M. Roem. = *Photinia*, Lindl. (Rosac.).
arbutifolia, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay,* 111.—Calif.

HETEROMMA, Benth. (Compos.).
simplicifolia, *F. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 488.—Afr. austr.

HETEROPOGON, Pers. = *Andropogon*, Linn. (Gramin.).
acuminatus, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* ii. 254 = *A. melanocarpus*.
Allionii, *Roem. & Schult. Syst. ii.* 835 = *A. contortus*.
contortus, *Beauv. ex Roem. & Schult. Syst. ii.* 836 = *A. contortus*.
firmus, *J. & C. Presl, Rel. Haenk. i.* 334 = *A. contortus*.
glaber, *Pers. Syn. ii.* 533 = *A. contortus*.
grandiflorus, *Rendle, in Cat. Welw. Afr. Pl. ii.* 153 = *A. grandiflorus*.
hirsutus, *Beauv. Agrost.* 134 = *A. contortus*.
hirtus, *Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 310 = *A. hirtus*.
hirtus, *Pers. Syn. ii.* 533 = *A. contortus*.
hispidissimus, *Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 367 = *A. contortus*.
Hohenackeri, *Hochst. ex Miq. Anal. Bot. Ind. ii.* 24 = *A. contortus*.
insignis, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 437 = *A. triticeus*.
melanocarpus, *Benth. in Journ. Linn. Soc. xix.* 71 = *A. melanocarpus*.
messanensis, *Guss. Fl. Sic. Syn. i.* 164 = *A. contortus*.
polystachyus, *Nees, Agrost. Bras.* 364 = *A. contortus*.
polystictus, *Hochst. in Flora,* 1856, 23 = *A. melanocarpus*.
pubescens, *Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 310 = *A. hirtus*.
Roxburghii, *Arn. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i.* 133 = *A. contortus*.
Roylei, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 367 = *A. melanocarpus*.
scrobiculatus, *Fourn. ex Hack. in Mart. Fl. Bras. ii.* III. 268 = *A. melanocarpus*.

N

HETEROPTERIS, H. B. & K. (Malpigh.).
acapulcensis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 139.—Mexic.
acutifolia, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iii. 181.—Urug.
Bellonis, Urb. Symb. Antill. i. 330.—Ind. occ.
corumbensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 28.—Bras.
yucatanensis, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 369.—Am. cent.

HETEROPTERYS, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 139 = praec.

HETEROPYXIS, Harv. (Lythrar.).
transvaalensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 439 = canescens.

HETEROSTEMMA, Wight & Arn. (Asclep.).
chrysanthum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 438 (= *Symphycarpus chrysanthus*).—Java.

HETEROTHALAMUS, Less. (Compos.).
alienus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 158 = brunioides.
tenellus, Kuntze, l. c. = Baccharis tenella.

HEUCHERA, Linn. (Saxifrag.).
caespitosa, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 426.—Calif.
ciliata, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 196.—Am. bor.
cuneata, Howell, Fl. N. W. Amer. 203.—Am. bor.
grossularifolia, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 196.—Am. bor.
macrorhiza, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 466.—Am. bor.
saxicola, E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. 1900, 118.—Am. bor.

HEVEA, Aubl. (Euphorb.).
confusa, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. sub tt. 2573-4.—Guiana.
janeirensis, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 706 = brasiliensis.
minor, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2572.—Bras.
similis, Hemsl. l. c. t. 2576.—Bras.

HEXADESMIA, Brongn. (Orchid.).
boliviensis, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 122.—Bolivia.

HEXAPTERA, Hook. (Crucif.).
Nordenskjoldi, P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 172.—Reg. Magell.

HEXISEA, Lindl. (Orchid.).
tenuissima, Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid. t. 300.—Hab. ?

HIBBERTIA, Andr. (Dillen.).
Bennettii, Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iv. 463.—Austral.
exasperata, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 218 = *Candollea exasperata*.
Pancheri, Briq. l. c. 217 = coriacea.

HIBISCUS, Linn. (Malvac.).
Acetosella, Welw. ex Fic. in Bol. Soc. Geogr. Lisb. Ser. II. 608.—Afr. trop.
andongensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 70.—Afr. trop.
argentinus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 19 (= *Cienfuegosia argentina*).—Reg. Argent.
Carsoni, Baker, in Kew Bull. 1897, 244.—Afr. trop.
celebicus, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 359, 632.—Celebes.
Corneti, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 18.—Afr. trop.
Debeerstii, Wildem. & Th. Dur. l. c. 21.—Afr. trop.
Dinteri, Hochr. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 20, 20; et in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 80.—Afr. trop.
eetveldeanus, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 24.—Afr. trop.
elongatifolius, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 117.—Afr. trop.
fugosioides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 76.—Afr. trop.
haenkeanus, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 152 (= *Abelmoschus haenkeanus*).—Ins. Luzon.

HIBISCUS :—
hereroensis, Hochr. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 20, 20; et in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 164.—Afr. trop.
huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 76.—Afr. trop.
integriifolius, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 135 = semilobatus.
lancibracteatus, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 25.—Afr. trop.
lepidospermus, Mast. in Oliv. Fl. Trop. Afr. i. 197 = squamosus.
liebrectsiianus, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 22.—Afr. trop.
Lindmanii, Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 180.—Parag.
loandensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 69.—Afr. trop.
lobata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 19 = H. Solandra.
mastersianus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 71.—Afr. trop.
masuianus, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 20.—Afr. trop.
papuanus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 438.—N. Guin.
petraeus, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 76.—Afr. trop.
platyklamys, F. Muell. ex Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 71.—Austral.
pseudoferox, Hochr. l. c. 123.—Am. trop.
rhodesicus, Baker f. in Journ. Bot. 1899, 424.—Afr. trop.
saxatilis, J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 350.—Afr. austr.
Schinzii, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 127.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 240.—Afr. trop.
squamosus, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 165.—Afr. trop.
sublobatus, Hochr. l. c. 156 (= *Abelmoschus sublobatus*).—Polynes.
Waimeae, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 851.—Ins. Sandw.
Welwitschii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 75.—Afr. trop.
Zenkeri, Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 241.—Afr. trop.
Zeyheri, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 97.—Afr. austr.

HICORIUS, Rafin. = *Carya*, Nutt. (Jugland.).
pallida, Ashe, in Gard. & For. x. (1897) 304.—Am. bor.

HIDALGOA, La Llave (Compos.).
Wercklei, Hook. f. Bot. Mag. t. 7684.—Ind. occ.

HIERACIUM, Tourn. (Compos.).
Pro speciebus, subspeciebus varietatibusque europaeis perplurimis criticis vide opera infra citata :—
Arv.-Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1897, 90-104; 1899, 27-28.
Arv.-Touv. & Gaut. in Gaut. Fl. Pyren. Or. 272-280.
Arv.-Touv. & Gaut. in Bull. Herb. Boiss. v. 477-480, 717-735, 785-790.
Blocki, in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 175; 1897.
Brenn. in Act. Soc. Faun. Fl. Fenn. xiii. I. 6-65; xvi. I. 6-20; xvi. IV. 252-253.
Briq. & Arv.-Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 126-146.
Dahlst. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxi. no. 1, 17-26.
Dahlst. in Bot. Tidsskr. xx. 355-356.
Dahlst. ex Johanss. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxix. no. 1, 95-104.
Dahlst. ex Jonsson. in Bot. Tidsskr. xxii. 202-205.
Evers. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlvi. (1896) 81-88.
Grecescu. Consp. Fl. Roman. 368-375.
Johanss. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxv. no. 7, 8-61.
Murr. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv. xvi.
Omang. in Nyt Mag. Nat. Christiania, xxxviii. 81-83.
Pernhoffer. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1896, 118, 157, 196-197.
A. Peter. in Nachr. Gesells. Göttingen, 1898, I. 26-46.
Porcius. in Anal. Acad. Roman. Ser. II. xiv. 159-184.
Rehm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1897, 278-311.
Sagorski. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv.
Schur. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 218-271.
Stenström. in Bot. Notiser, 1896, 30-31.
Stenström. in Bot. Tidsskr. xx. 194-229.

HIERACIUM :—
Stenström. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxii. no. 7, 7-38.
anomalum, Pospich. Fl. Oesterr. Küst. ii. 798.—Austria.
argyreaum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 148.—Am. bor.
barbigerum, Greene, Pittonia, iii. 228.—Am. bor.
beckianum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. 669 = *Managettæ*.
boliviense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 159 = *Crepis boliviensis*.
caucasiense, Arv.-Touv. ex Lipsky, in Acta Hort. Tiflis, iv. 375.—Reg. Caucas.
chubutense, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 617.—Patag.
circinatum, Fries, ex Lipsky, in Acta Hort. Tiflis, iv. 375.—Reg. Caucas.
cymbifolium, Purchas, in Journ. Bot. 1899, 421.—Angl.
dollianum, Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr. 1899, 140.—Eur.
dolopiticum, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 785.—Oriens.
ecuadoriense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxi. 376.—Ecuador.
eribobasis, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 787.—Oriens.
euboicum, Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlix. 189.—Graecia.
euchaetiiforme, Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr. 1899, 118.—Eur.
fulvisetum, Bub. Fl. Pyren. ii. 84 = hybridum.
Greenei, Porter & Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1893, 120 = *Traillii*.
griseum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 293.—Eur.
griseum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 464.—Am. bor.
Managettæ, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. vi. 986.—Armen.
narecense, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 51.—Eur.
odorans, Borb. in Baenitz, Herb. Eur. 1896, 2.—Eur.
Ogweni, Linton, in Journ. Bot. 1897, 407.—Angl.
Philippii, Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata, vii. 377.—Fuegia.
Richenii, Jos. Murr, in Jahres-Kat. Wien. Bot. Tauschanst. 1900, 132.—Eur.
rumelicum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvi. 50.—Eur.
sermonikense, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 790.—Oriens.
soratense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxi. 375.—N. Granat.
Stuebelii, Hieron. l. c. 374.—N. Granat.
subgermanicum, Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr. 1899, 117.—Eur.
tacense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxi. 375.—Bolivia.
thessalum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 292.—Eur.
thuringorum, Sagorski, in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 201.—Eur.
Traillii, Greene, in Pittonia, iv. 226.—Am. sept.
trebevicianum, Maly, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegov. 1900, 550.—Eur.
vagense, Ley, in Journ. Bot. 1900, 5.—Angl.
Villarii, Balb. ex Bub. Fl. Pyren. ii. 85 = saxatile.
villosoides, Doerfl. ex Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xviii. Gen. Heft, 40.—Eur.

HIEROCHLOË, S. G. Gmel. (Gramin.).
Clarkei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 223.—Ind. or.
dregeana, Nees, ex Trin. Phalar. 37 = *Anthoxanthum dregeanum*.
Dregii, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 9 = *Anthoxanthum dregeanum*.
Ecklonii, Nees, l. c. 7 = *Anthoxanthum Ecklonii*.
flexuosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 222.—Ind. or.
gracillima, Hook. f. l. c. 223.—Ind. or.
Hookeri, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.—Ind. or.
khasiana, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.—Ind. or.
tenuis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 798 = *Anthoxanthum Tongo*.

HIGINBOTHAMIA, Uline, in Field Columb. Mus. Bot. i. (1899) 414. **DIOSCOREACEAE**.
synandra, Uline, l. c. 415.—Am. cent.

- HILDEBRANDTIA**, Vatke (Convolv.).
obcordata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 406.—Afr. trop.
undulata, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.
- HIMANTOCHILUS**, T. Anders. (Acanth.).
sessiliflorus, T. Anders. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1117 = *Anisotes sessiliflorus*.
sessilifolius, Lindau, in Engl. Ph. Ost.-Afr. C. 372 = *Anisotes sessiliflorus*.
Zenkeri, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 60 = *Anisotes Zenkeri*.
- HIPPEASTRUM**, Herb. (Amaryll.).
Ananuca, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 150.—Chili.
andinum, *R. Phil. l. c.* 158 = *H. Rhodolirion*.
angustifolium, *R. Phil. l. c.*—Chili.
araucanum, *R. Phil. l. c.* 152.—Chili.
Arechavaletae, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 226.—Urug.
bonariense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 311.—Reg. Argent.
Canteral, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* xii. 285.—Urug.
colonium, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 148.—Chili.
consobrinum, *R. Phil. l. c.* 152.—Chili.
gayanum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 311.—Chili.
Harrisoni, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7787 = *Arechavaletae*.
laetum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 151.—Chili.
Moelleri, *R. Phil. l. c.* 154.—Chili.
popetanum, *R. Phil. l. c.* 156.—Chili.
purpuratum, *R. Phil. l. c.*—Chili.
Solisi, *R. Phil. l. c.* 155.—Chili.
splendens, *R. Phil. l. c.* 153.—Chili.
tenuifolium, *R. Phil. l. c.* 154.—Chili.
teretiflorum, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1900, 11. 142.—Urug.
- HIPPIA**, Linn. (Compos.).
cotulodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 159 = *gracilis*.
- HIPPOCRATEA**, Linn. (Celastr.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 359.—Ins. Andaman.
cymosa, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. I.* 67.—Afr. trop.
ferruginea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 357.—Penang.
pauciflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.
seleriana, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 561.—Am. cent.
utilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 197.—Mexic.
- HIPPOCREPIS**, Linn. (Legum.).
cyclocarpa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 80.—Afr. bor.
vulgaris, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 568 = *unisiliquosa*.
- HIRAEA**, Jacq. (Malpigh.).
parviflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 139.—Mexic.
pulcherrima, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. App. 1. 15.—Parag.
- HISINGERA**, Hellen. (Bixin.).
caledonica, *Panch. ex Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 58 = *Myroxylon caledonicum*.
- HITOA**, Nadeaud, in Journ. de Bot. 1899, 2. **RUBIACEAE.**
moorensis, *Nadeaud, l. c.*—Ins. Societ.
- HOFFMANNIA**, Sw. (Rubiace.).
phoenicopoda, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 276.—Am. cent.
tetragigma, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 336.—Am. cent.
- HOFFMANNIELLA**, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 325 (1900). **COMPOSITAE.**
silvatica, *Schlechter, l. c., nomen.*—Afr. trop.
- HOHENBERGIA**, Schult. f. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
antillana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 137 = *A. lingulata*.
eristachya, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 255.—Ind. occ.
Fawcettii, *Mez, l. c.* 254.—Ind. occ.
- HOHENBERGIA** :—
oligosphaera, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 124 = *A. oligosphaera*.
penduliflora, *Mez, l. c.* 135 = *Pitcairnea penduliflora*.
polycephala, *Mez, l. c.* 133 = *A. polycephala*.
portoricensis, *Mez, l. c.* 136.—Ind. occ.
ramageana, *Mez, l. c.* 127.—Bras.
sellowiana, *Mez, l. c.* 132.—Bras.
spinulosa, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 253.—Ind. occ.
urbaniana, *Mez, l. c.*—Ind. occ.
- HOIRIRI**, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 303 (1898) = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).
bromeliaefolia, *Kuntze, l. c.* = *A. bromeliaefolia*.
kuntzeana, *Kuntze, l. c.* = *A. kuntzeana*.
polystachya, *Kuntze, l. c.* = *A. Glaziovii*.
- HOITZIA**, Juss. (Polemon.).
lupulina, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 441 = *Gilia ciliata*.
- HOLARRHENA**, R. Br. (Apocyn.).
congolensis, *Staff, in Kew Bull.* 1893, 306.—Afr. trop.
floribunda, *Durand & Schinz, Etudes Fl. Congo,* 190 = *africana*.
- HOLBOELLIA**, Wall. (Berberid.).
chinensis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 343 = *Parvatia chinensis*.
coriacea, *Diels, l. c.* 342.—China.
- HOLCUS**, Linn. (Gramin.).
asper, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 20 = *Pentastichis aspera*.
caerulescens, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 411 = *Andropogon micranthus*.
Caffrorum, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 20 = *Andropogon Sorghum*.
Calamucha, *Ham. ex Wall. Cat. n.* 8778 F = *Andropogon halepensis*.
Carar, *Ham, l. c. n.* 8792 A = *Andropogon Hamiltonii*.
cernuus, *Arduini, in Saggi Padov.* i. (1786) 128 = *Andropogon Sorghum*.
ciliatus, *Roxb. Fl. Ind.* i. 321 = *Andropogon agrostoides*.
decolorans, *Willd. Sp. Pl.* iv. 931 = *Andropogon halepense*.
Dochna, *Forsk. Fl. Aegypt.-Arab.* 174 = *Andropogon Sorghum*.
Gryllus, *R. Br. Prod.* 199 = *Andropogon Gryllus*.
halepensis, *Linn. Sp. Pl.* 1047 = *Andropogon halepense*.
montanus, *Ham. ex Wall. Cat. n.* 8805 C = *Andropogon intermedium*.
natans, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 62 = *Chamaeraphis spinescens*.
nervosus, *Roxb. Fl. Ind.* i. 320 = *Arundinella brasiliensis*.
pallidus, *R. Br. Prod.* 199 = *Andropogon Gryllus*.
paniciformis, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 82 = *Pennisetum typhoideum*.
parviflorus, *R. Br. Prod.* 199 = *Andropogon micranthus*.
quinqueflorus, *Ham. ex Wall. Cat. n.* 8778 G = *Andropogon serratus*.
racemosus, *Forsk. Fl. Aegypt.-Arab.* 175 = *Pennisetum typhoideum*.
saccharatus, *Linn. Sp. Pl.* i. 1047 = *Andropogon Sorghum*.
setifolius, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult.* 110 = *Achneria scitifolia*.
Sorghum, *Linn. Sp. Pl.* 1047 = *Andropogon Sorghum*.
Virana, *Ham. ex Wall. Cat. n.* 8759 = *Andropogon squarrosus*.
- HOLOCARPHA**, Greene, Fl. Francisc. 426 (1897). **COMPOSITAE.**
macradenia, *Greene, l. c.* (= *Hemizonia macradenia*).—Calif.
- HOLIDISCUS**, Maxim. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
ariaefolia, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 184 = *S. discolor*.
australis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 194.—Am. bor.
dumosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 4 = *S. discolor*.
- HOLESTEUM**, Dill. (Caryophyll.).
praumbellatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 156.—Lesbos.
- HOLOTHRIX**, Rich. (Orchid.).
Buchananii, *Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 447; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 330.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 47.—Afr. trop.
Lastii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 195.—Afr. trop.
- HOLOTHRIX** :—
lithophila, *Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 446; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 331.—Afr. austr.
medusa, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* i. 154.—Afr. trop.
Nyasae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 193.—Afr. trop.
praecox, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 108 = *Deroemera praecox*.
Randii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 208.—Afr. trop.
Richardii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 191.—Afr. trop.
rupicola, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 419.—Afr. austr.
Schimperi, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 108 = *Deroemera Schimperi*.
schlechteriana, *Kraenzl. ex Schlechter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 21; *et in Orch. Gen. et Sp.* i. 588.—Afr. austr.
squamata, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 119 = *Deroemera squamata*.
unifolia, *Reichb. f. l. c.* = *Deroemera unifolia*.
- HOMALANTHUS**, A. Juss. (Euphorb.).
longistilus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 407.—N. Guin.
novoguineensis, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
- HOMALIUM**, Jacq. (Samyd.).
arboreum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 53.—N. Caled.
calodendron, *Gilg, ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 84, nomen.—Afr. trop.
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
decurrens, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 50 (= *Blackwellia decurrens*).—N. Caled.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 126.—Afr. trop.
frutescens, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 22 = *H. Cordylanthus*.
gracile, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 55 = *axillare*.
Guillainii, *Briq. l. c.* 51.—N. Caled.
intermedium, *Briq. l. c.*—N. Caled.
javanicum, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* ii. 11.—Java.
kanaliense, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 53.—N. Caled.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 20.—Malaya.
mathieuanum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 51.—N. Caled.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 624.—Celebes.
montanum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 54.—N. Caled.
myrianthum, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 23.—Borneo.
polystachyum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 54.—N. Caled.
rivulare, *Briq. l. c.*—N. Caled.
sarcopetalum, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 119.—Afr. trop.
undulatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 23.—Malaya.
Vieillardii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 50.—N. Caled.
- HOMALOBUS**, Nutt. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
aboriginorum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 246 = *A. aboriginorum*.
aculeatus, *Rydb. l. c.* 249 = *A. aculeatus*.
Bourgovii, *Rydb. l. c.* 247 = *A. Bourgovii*.
glabriusculus, *Rydb. l. c.* 246 = *A. glabriusculus*.
hypophilus, *Rydb. l. c.* 247.—Am. bor.
montanus, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 306 = *A. Kentrophyta*.
Palliseri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 248 = *A. Palliseri*.
serotinus, *Rydb. l. c.* = *A. serotinus*.
stenophyllus, *Rydb. l. c.* 249 = *A. stenophyllus*.
tenellus, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 305 = *A. multiflorus*.
vexiliflexus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 249 = *A. pauciflorus*.
- HOMALOCENCHRUS**, Mieg. = **Loersia**, Soland. (Gramin.).
lenticularis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* vii. 92 = *L. lenticularis*.

HOMALOMENA, Schott (Aroid.).
pygmaea, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 18 = *Chamaecladon pygmaeum*.

HOMALOPETALUM, Rolfe, in Hook. Ic. Pl. t. 2461 (1896). **ORCHIDEAE**.
jamaicense, Rolfe, l. c.—Jamaica.

HOMALOSTACHYS, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888)
37. **CYPERACEAE**.
sinensis, Boeck. l. c. 38.—China.

HOMERIA, Vent. (Irid.).
brachygyne, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 94.—Afr. austr.
Maximiliani, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
ramosissima, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
rhopalocarpa, Schlechter, l. c. 95.—Afr. austr.
simulans, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 529.—Afr. austr.
tenuis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 95.—Afr. austr.

HOMILACANTHUS, S. Moore = *Isoglossa*, Oerst. (Acanth.).
Gregorii, S. Moore, in Journ. Bot. 1894, 129 = *I. Gregorii*.

HOMOGLOSSUM, Salisb. = *Antholyza*, Linn. (Irid.).
pulchrum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 458.—Afr. austr.

HOMOPLITIS, Trin. = *Pogonatherum*, Beauv. (Gramin.).
crinita, Trin. Fund. Agrost. 166 = *P. crinitum*.

HONDBESSEN, Adans. (Rubiace.).
olens, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 121 = *Lygodisodia foetida*.

HOOKERA, Salisb. = *Brodiaea*, Sm. (Liliac.).
filifolia, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. 133 = *B. filifolia*.
leptandra, Greene, Pittonia, i. 74 = *B. leptandra*.
Orcutti, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. 138 = *B. Orcutti*.
rosea, Greene, l. c. 137 = *B. rosea*.

HOPLESTIGMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1899) 116. **BIXACEAE**.
klaianum, Pierre, l. c.—Afr. trop.

HORDEUM, Tourn. (Gramin.).
apertum, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 345.—Chili.
boreale, Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 24.—Am. bor.
brachyatherum, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 346.—Chili.
caespitosum, Scribn. ex Pammel, in Contrib. Bot. Dep. Iowa, xv. 245.—Am. sept.
capense, Thunb. Prod. Pl. Cap. 23 = *secalinum*.
coleophorum, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 346.—Chili.
decaisneanum, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 372 = *spontanum*.
distichon, Linn. Sp. Pl. 85 = *vulgare*.
heterostachyon, Beauv. Agrost. 114 = *vulgare*.
hexastichon, Linn. Sp. Pl. 85 = *vulgare*.
ithaburense, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 70 = *spontanum*.
nudum, Arduini, ex Schult. Mant. ii. 437 = *vulgare*.
spontanum, C. Koch, in Linnaea, xxi. 430.—Ind. or.

HORKELIA, Cham. & Schlecht. = *Potentilla*, Linn. (Rosac.).
argyrocoma, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 144.—Am. bor.
Baileyi, Rydb. l. c. 154 = *P. Baileyi*.
campestris, Rydb. l. c. 147.—Am. bor.
caruifolia, Rydb. in Howell, Fl. N. W. Amer. i. 181.—Am. bor.
chaetophora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 543.—Am. bor.
Clevelandii, Rydb. l. c. 1898, 54 = *P. Clevelandii*.
Congdonii, Rydb. l. c. 1899, 543.—Am. bor.
daucifolia, Rydb. l. c. 1898, 55 = *P. daucifolia*.
elata, Rydb. l. c. 54 = *P. elata*.
eremica, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 147 = *P. eremica*.
flavescens, Rydb. l. c. 138.—Am. bor.
frondosa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 54 = *P. frondosa*.
Hendersonii, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 180.—Am. bor.
Howellii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = *P. Howellii*.
Kingii, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 148 = *P. Kingii*.
laxiflora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = *P. laxiflora*.

HORKELIA :—
lycopodioides, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 151 = *P. Gordonii*.
Micheneri, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 54 = *P. Micheneri*.
Muirii, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 148 = *P. Muirii*.
mutabilis, Brandege, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 446.—Am. bor.
Parryi, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 129.—Am. bor.
Pickeringii, Rydb. l. c. 145 = *P. Pickeringii*.
pinetorum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55.—Am. bor.
platycalyx, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 131.—Am. bor.
platypetala, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = *P. Parryi*.
pseudocapitata, Rydb. in Howell, Fl. N. W. Amer. i. 180.—Am. bor.
puberula, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55 = *P. puberula*.
pygmaea, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 152 = *P. decipiens*.
saxosa, Rydb. l. c. 155 = *P. saxosa*.
scandularis, Rydb. l. c. 150.—Am. bor.
sericea, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 56.—Am. bor.
sericoleuca, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 144.—Am. bor.
Shockleyi, Rydb. l. c. 153 = *P. nubigena*.
tenella, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 55.—Am. bor.
unguiculata, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. 146 = *P. unguiculata*.
utahensis, Rydb. l. c. 150 = *P. utahensis*.
Webberi, Rydb. l. c. 149 = *P. Webberi*.

HORKELIA, Reichb. = *Wolffia*, Horkel (Lemnac.).
arrhiza, Druce, Fl. Berks. 511 = *W. arrhiza*.

HORMIDIUM, Lindl. (Orchid.).
pseudopygmaeum, Finet, in Bull. Herb. Boiss. vii. 121.—Am. cent.
tripterum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. v. 29 = *uni-florum*.

HORNEMANNIA, Benth. in DC. Prod. x. 428 (1846) = *Moseleya*, Hemsl. (Scrophul.).
pinnata, Benth. l. c. = *M. pinnata*.

HORNEMANNIA, Vahl (Vaccin.).
boliviana, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 191.—Bolivia.

HORNSTEDTIA, Retz. = *Amomum*, Linn. (Scitamin.).
affinis, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 143.—Malaya.
albomarginata, Ridley, l. c. 145.—Penins. Mal.
conica, Ridley, l. c. 142.—Penins. Mal.
fulgens, Ridley, l. c. 149.—Penins. Mal.
grandis, Ridley, l. c. 141.—Penins. Mal.
imperialis, Ridley, l. c. 143 (= *Phaemeria imperialis*).—Penins. Mal.
lycostoma, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 228 = *A. lycostomum*.
macrochilus, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 147 = *A. macrocheilos*.
Maingayi, Ridley, l. c. 150 = *A. Maingayi*.
megalochilus, Ridley, l. c. 146 = *A. megalochilos*.
metriochilus, Ridley, l. c. 147 = *A. metriochilos*.
Ophiuchus, Ridley, l. c. 141 = *A. Ophiuchus*.
pauciflora, Ridley, l. c. 144.—Penins. Mal.
pusilla, Ridley, l. c. 143.—Penins. Mal.
triogyale, Ridley, l. c. 144.—Penins. Mal.
velutina, Ridley, l. c. 146.—Malaya.
venusta, Ridley, l. c. 149.—Penins. Mal.

HORSFIELDIA, Willd. = *Myristica*, Linn. (Myristic.).
amygdalina, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 310 = *M. amygdalina*.
ardisiifolia, Warb. l. c. 274 = *M. ardisiaefolia*.
aruensis, Warb. l. c. 284 = *M. arufensis*.
batjanica, Warb. l. c. 275 = *M. batjanica*.
brachiata, Warb. l. c. 325 = *M. brachiata*.
canarioides, Warb. l. c. 294 = *M. canarioides*.
carnosa, Warb. l. c. 348 = *M. carnosa*.
costulata, Warb. l. c. 350 = *M. costulata*.
crassifolia, Warb. l. c. 323 = *M. crassifolia*.
crassithyrsa, Warb. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 87 = *M. crassithyrsa*.

HORSFIELDIA :—
flocculosa, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 297 = *M. flocculosa*.
glabra, Warb. l. c. 313 = *M. glabra*.
glabrescens, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 325.—N. Guin.
globularia, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 288 = *M. globularia*.
grandis, Warb. l. c. 301 = *M. grandis*.
Hellwigii, Warb. l. c. 343 = *M. Hellwigii*.
Irya, Warb. l. c. 317 = *M. Irya*.
Iryaghedhi, Warb. l. c. 332 = *M. Horsfieldia*.
Kingii, Warb. l. c. 308 = *M. Kingii*.
Labillardieri, Warb. l. c. 283 = *M. Labillardieri*.
laevigata, Warb. l. c. 351 = *M. laevigata*.
Lauterbachii, Warb. l. c. 285.—N. Guin.
lemanniana, Warb. l. c. 326 = *M. lemanniana*.
leptocarpa, Warb. l. c. 346 = *M. leptocarpa*.
macrocoma, Warb. l. c. 299 = *M. macrocoma*.
macrothyrsa, Warb. l. c. 307 = *M. macrothyrsa*.
majuscula, Warb. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 570 = *M. Minabassae*.
Motleyi, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 304 = *M. Motleyi*.
nesophila, Warb. l. c. 282.—Malaya.
novae-lauenburgiae, Warb. l. c. 278.—Malaya.
novoguineensis, Warb. l. c. 271.—Malaya.
oligocarpa, Warb. l. c. 354 = *M. oligocarpa*.
olivaeformis, Warb. l. c. 352 = *M. olivaeformis*.
pachythyrsa, Warb. l. c. 618 = *M. pachythyrsa*.
papillosa, Warb. l. c. 291 = *M. papillosa*.
paucinervis, Warb. l. c. 345 = *M. paucinervis*.
polyantha, Warb. l. c. 281 = *M. polyantha*.
Prainii, Warb. l. c. 292 = *M. Prainii*.
pulverulenta, Warb. l. c. 342 = *M. pulverulenta*.
racemosa, Warb. l. c. 347 = *M. racemosa*.
ralunensis, Warb. l. c. 336.—Malaya.
reticulata, Warb. l. c. 304 = *M. reticulata*.
ridleyana, Warb. l. c. 331 = *M. ridleyana*.
Roxburghii, Warb. l. c. 277 = *M. Roxburghii*.
Smithii, Warb. l. c. 270 = *M. Smithii*.
subglobosa, Warb. l. c. 328 = *M. subglobosa*.
subtilis, Warb. l. c. 286 = *M. subtilis*.
sucosa, Warb. l. c. 322 = *M. sucosa*.
superba, Warb. l. c. 295 = *M. superba*.
sylvestris, Warb. l. c. 337 = *M. sylvestris*.
tomentosa, Warb. l. c. 302 = *M. tomentosa*.
tuberculata, Warb. l. c. 279 = *M. tuberculata*.
valida, Warb. l. c. 349 = *M. valida*.
Wallichii, Warb. l. c. 305 = *M. Wallichii*.

HOSACKIA, Dougl. (Legum.).
oaxacana, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxv. 309.—Mexic.
rosca, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 4.—Calif.
venusta, Eastw. l. c. Ser. III. i. 103.—Am. bor.

HOSTA, Tratt. = *Funkia*, Spreng. (Liliac.).
japonica, Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 183 = *F. subcordata*.
plantaginea, Aschers. l. c. = *F. subcordata*.

HOUSTONIA, Gronov. (Rubiace.).
parviflora, Holzinger, ex Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 284.—Am. sept.
pulvinata, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. i. 289.—Am. bor.
rupicola, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 286.—Am. bor.
saxicola, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 291.—Am. bor.
serpyllacea, C. L. Sm. ex Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 284 = *Hedyotis serpyllacea*.

HOYA, R. Br. (Asclep.).
celebica, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 440 (= *Cyrtoceras micranthum*).—Celebes.
dimorpha, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 156.—N. Guin.
elegans, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 440 (= *Cyrtoceras elegans*).—Borneo.
Hellwigii, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 512.—N. Guin.
Hollrungii, Warb. l. c.—N. Guin.
javanica, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 440 (= *Cyrtoceras laurifolium*).—Java.
Lamchytoniae, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 372, sphalm. = *seq.*

HOYA :—

- Lamingtoniae, *F. M. Bailey*, in *Queensl. Agric. Journ.* iii. 156.—N. Guin.
Lauterbachii, *K. Schum.* in *Monatsschr. Kakt.* 1896, 7.—N. Guin.
megalaster, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 513.—N. Guin.
mucronulata, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
pachyphylla, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
papillantha, *K. Schum.* in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 142.—N. Brit.
pubescens, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 669.—Ins. Samoa.
Sana, *F. M. Bailey*, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 229.—Austral.
upoluensis, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 669.—Ins. Samoa.

HUANACA, Cav. (Umbell.).

Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 113.—Patag.

HUERNIA, R. Br. (Asclep.).

somalica, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* 1898, 309.—Afr. trop.

HUGONIA, Linn. (Linac.).

pentagyna, *K. Schum.* in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 373 = *Ancistrocladus pentagynus*.

HULSEA, Torr. & Gray (Compos.).

carcosa, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 423.—Am. bor.

HUMEA, Sm. (Compos.).

gracillima, *F. Muell. & Tate*, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 367.—Austral.
tenerrima, *F. Muell. & Tate*, l. c. 368.—Austral.

HUNTERIA, Roxb. (Apocyn.).

- ambiens, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 223.—Afr. trop.
breviloba, *Hallier f. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 306, nomen; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 189.—Afr. trop.
camerunensis, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 187.—Afr. trop.
pleiocarpa, *Hallier f. l. c.* 193 (= *Pleiocarpa mutica*).—Afr. trop.
pyncnantha, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 222.—Afr. trop.
rostrata, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 194 (= *Pleiocarpa rostrata*).—Afr. trop.
umbellata, *Hallier f. l. c.* 190 (= *Carpodinus umbellata*).—Afr. trop.

HUTTONAEA, Harv. (Orchid.).

oreophila, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 420.—Afr. austr.

HUTTONELLA, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxix. (1897) 505; et *Fl. N. Zeal.* (1899) 115. **LEGUMINOSAE.**

- compacta, *T. Kirk*, l. c. 507; l. c. 115 (= *Carmichaelia compacta*).—N. Zel.
curta, *T. Kirk*, l. c. 507; l. c. 116 (= *Carmichaelia curta*).—N. Zel.
juncea, *T. Kirk*, l. c. (= *Carmichaelia juncea*).—N. Zel.
prona, *T. Kirk*, l. c. (= *Carmichaelia prona*).—N. Zel.

HYACINTHUS, Tourn. (Liliac.).

Gawleri, *Baker*, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 472.—Afr. austr.

HYALOCYSTIS, Hallier f. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. (1898) 227. **CONVOLVULACEAE.**

viscosa, *Hallier f. l. c.* 228.—Afr. trop.

HYBANTHUS, Jacq. = **Ionidium**, Vent. (Violac.).

- strigoides, *Taub.* in *Engl. Jahrb.* xxi. 445.—Bras.
yucatanensis, *Millsp.* in *Field Columb. Mus. Bot.* i. 404.—Mexic.

HYBOSPERMA, Urb. Symb. Antill. i. 358 (1899).

RHAMNACEAE.
spinosum, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

HYDASTYLUS, Dryand. = **Sisyrinchium**, Linn. (Irid.).

- borealis, *Bickn.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 378.—Am. bor.
brachypus, *Bickn. l. c.* 379.—Am. bor.
cernuus, *Bickn. l. c.* 384.—Mexic.
Elmeri, *Bickn. l. c.* 380 = *S. Elmeri*.
longipes, *Bickn. l. c.* 382.—Am. sept.
parvus, *Bickn. l. c.* 384.—Mexic.

HYDASTYLUS :—

- rivularis, *Bickn.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 381.—Am. bor.
Schaffneri, *Bickn. l. c.* 383 = *S. Schaffneri*.
serrulatus, *Bickn. l. c.* 385.—Mexic.
subcernuus, *Bickn. l. c.*—Calif.
translucens, *Bickn. l. c.* 386.—Calif.

HYDNOCARPUS, Gaertn. f. (Bixac.).

ilicifolia, *King*, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 130.—Malaya.

HYDNORA, Thunb. (Cytin.).

Hanningtoni, *Rendle*, in *Journ. Bot.* 1896, 55.—Afr. trop.

HYDRANGEA, Gronov. (Saxifrag.).

- cinerea, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 148.—Am. bor.
Giraldii, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 373.—China.
hemsleyana, *Diels*, l. c. 376.—China.
mandarinorum, *Diels*, l. c. 372.—China.
Pottingeri, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 290.—Ind. or.
Rosthornii, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 374.—China.
xanthoneura, *Diels*, l. c. 373.—China.

HYDRIASTELE, H. Wendl. & Drude (Palm.).

costata, *F. M. Bailey*, in *Queensl. Agric. Journ.* ii. 129.—Austral.
douglasiana, *F. M. Bailey*, l. c. i. 232.—Austral.

HYDRILLA, Rich. (Hydrochar.).

- dregeana, *Presl*, *Bot. Bemerk.* 112 = *Lagarosiphon muscoides*.
muscoides, *Planch.* in *Ann. Sci. Nat. Sér. III.* xi. 79 = *Lagarosiphon muscoides*.
ovalifolia, *Rich.* in *Mém. Inst. Par.* xii. (1811) II. 76.—Zeylan.

HYDROCHARIS, Linn. (Hydrochar.).

stolonifera, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 297 = *Limnolobium Boscii*.

HYDROCHLOA, Beauv. (Gramin.).

fruitans, *Nash*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 98 = *carolinensis*.

HYDROCOTYLE, Tourn. (Umbell.).

- arbuscula, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 172.—Afr. austr.
australis, *Coult. & Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 28.—Am. bor.
cuneata, *Coult. & Rose*, l. c.—Am. bor.
hydrophila, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxix. 425.—N. Zel.
robusta, *T. Kirk*, *Fl. N. Zeal.* 189.—N. Zel.
ulugurensis, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 444.—Afr. trop.
yucatanensis, *Millsp.* in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 81.—Am. cent.

HYDROLEA, Linn. (Hydrophyll.).

mollis, *Chod.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* i. 78.—Parag.
paraguayensis, *Chod. l. c.*—Parag.

HYDROPHYLLUM, Linn. (Hydrophyll.).

- albifrons, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 267.—Am. bor.
congestum, *Wiegand*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 136.—Am. bor.
tenuipes, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 582.—Am. bor.

HYDROSME, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).

- Baummannii, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxvi. 420.—Afr. trop.
gallaensis, *Engl. l. c.* 422.—Afr. trop.
Goetzei, *Engl. l. c.* xxviii. 355.—Afr. trop.
Hohenackeri, *Engl.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 59 = *Raphiophallus Hohenackeri*.
leonensis, *Engl. l. c.* = *A. leonensis*.
Staudtii, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxvi. 420.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 421.—Afr. trop.

HYDROSTACHYS, Thou. (Podost.).

- angustisecta, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 391.—Afr. trop.
laciniata, *Warm.* in *Danske Vid. Selsk. Skrift.* Ser. VI. ix. 152.—Madag.

HYERONIMA, Allem. (Euphorb.).

Fendleri, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 227.—Venez.

HYGROCHILUS, Pfitzer, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 112 (1897). **ORCHIDEAE.**

Parishii, *Pfitzer*, l. c. (= *Vanda Parishii*).—Burma.

HYGROPHILA, R. Br. (Acanth.).

- abyssinica, *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* vii. 22 = *Hemigraphis abyssinica*.
acutisepala, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 34.—Afr. trop.
brasiliensis, *Lindau*, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 183 = *costata*.
ciliata, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 35.—Afr. trop.
crenata, *Lindau*, in *Engl. Jahrb.* xx. 6 = *Disperma quadrisepalum*.
Gigas, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 36.—Afr. trop.
glandulosa, *Lindau*, in *Engl. Pfl. Ost-Afr. C.* 367 = *Dyschoriste verticillaris*.
gracillima, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 36.—Afr. trop.
lindaviana, *Burkill*, l. c. 509.—Afr. trop.
linearis, *Burkill*, l. c. 35.—Afr. trop.
parviflora, *Lindau*, in *Engl. Jahrb.* xx. 7 = *Disperma parviflorum*.
pilosa, *Burkill*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 35.—Afr. trop.
quadrangularis, *Lindau*, in *Engl. Pfl. Ost-Afr. C.* 367, partim = *Disperma quadrangulare*.
rhodesiana, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1900, 201.—Afr. trop.
subquadrangularis, *Lindau*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 314.—Afr. trop.
Volkenzii, *Lindau*, l. c. xix. *Beibl. xvii.* 46 = *Dyschoriste Volkenzii*.

HYLINE, Herb. (Amaryll.).

Worsleyi, *Mallett*, in *Gard. Chron.* 1899, II. 102.—Bras.

HYMENACHNE, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

interrupta, *Buese*, in *Miq. Pl. Jungh.* 377 = *P. interruptum*.
phalarioides, *Nees*, *Agrost. Bras.* 276 = *P. indicum*.

HYMENAEA, Linn. (Legum.).

chapidensis, *Barb. Rodr. Pl. Matogross.* 23.—Bras.
correana, *Barb. Rodr. l. c.* 21.—Bras.

HYMENANTHERA, R. Br. (Violac.).

chathamica, *T. Kirk*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 514.—N. Zel.

HYMENATHERUM, Cass. (Compos.).

micropoides, *A. A. Heller*, *Cat. N. Am. Pl.* 8 = *H. Gnaphalopsis*.

HYMENOCALLIS, Salisb. (Amaryll.).

cordifolia, *Micheli*, in *Rev. Hort.* 1899, 444.—Mexic.
schizostephana, *Worsley*, in *Gard. Chron.* 1899, I. 386.—Bras.

HYMENOCRATER, Fisch. & Mey. (Labiata.).

Michauxii, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 107.—Persia.

HYMENODICTYON, Wall. (Rubiaca.).

bracteatum, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 424.—Afr. trop.
Perieri, *Drake*, in *Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 48.—Madag.

HYMENOLAENA, DC. = **Pleurospermum**, Hoffm. (Umbell.).

darwasicca, *Lipsky*, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 72.—As. cent.

HYMENOLOPHUS, Boerl. in *Bull. Inst. Buitenz. v.* (1900) 13. **APOCYNACEAE.**

Romburghii, *Boerl. l. c.* 14.—Sumatra.

HYMENOPAPPUS, L'Hérit. (Compos.).

- arenosus, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 200.—Am. bor.
cinereus, *Rydb.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 634.—Am. bor.
gloriosus, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 551.—Am. bor.

HYMENOPAPPUS:

integer, *Greene, Pittonia*, iii. 249.—Am. bor.
ligulaeflorus, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyoming*, 135.—Am. sept.
lugens, *Greene, Pittonia*, iv. 43.—Am. bor.
macroglottis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 636.—Am. bor.
obtusifolius, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 551.—Am. bor.
scaposus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 634.—Am. bor.
tomentosus, *Rydb. l. c.* 633.—Am. bor.

HYMENOSTEGIA, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* I. 193 (1897). **LEGUMINOSAE.** Afzelii, *Harms, l. c.* (= *Cynometra Afzelii*).—Afr. trop. floribunda, *Harms, l. c.* (= *Cynometra floribunda*).—Afr. trop.
laxiflora, *Harms, l. c.* (= *Cynometra laxiflora*).—Afr. trop.

HYOSCYAMUS, Tourn. (Solan.).

leptocalyx, *Stapp, in Hook. Ic. Pl.* t. 2446.—As. cent.
vulgaris, *Bub. Fl. Pyren.* i. 351 = niger.

HYOSERIS, Linn. (Compos.).

radiatifolia, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 50 = radiata.

HYPAELYPTUM, Vahl = **Hypolytrum**, Rich. (Cyper.).

HYPARRHENIA, Anderss. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
finitima, *Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 300 = *A. filipendula*.
umbrosa, *Anderss. l. c.* = *A. Cymbarius*.

HYPERBAENA, Miers = **Pachygone**, Miers (Menisperm.).
angustifolia, *Urb. Symb. Antill.* i. 305.—Ind. occ.
axilliflora, *Urb. l. c.* = *Anomospermum axilliflorum*.
cubensis, *Urb. l. c.* = *P. cubensis*.
laurifolia, *Urb. l. c.* 304 = *Cissampelos laurifolia*.

HYPERICUM, Tourn. (Hyperic.).

apocynifolium, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 616.—Am. bor.
Baldaccii, *Keller, ex Baldacci, in Malpighia*, ix. 68 = Kellerii.
byzantinum, *Asnav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 166.—Turcia.
Crux-Andreae, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 254.—Neog. trop.
Fauriei, *Keller, l. c.* v. 637.—Japon.
flaccidum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 241.—Japon.
galiforme, *Frey, in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 4.—Armen.
galioides, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iii. 103 = galiforme.
glomeratum, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 281.—Am. bor.
ilicianum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 342.—Eur.
insulare, *Foucaud & Mand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 89.—Corsica.
Kellerii, *Baldacci, in Malpighia*, ix. 67.—Ins. Cret.
morananse, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* v. 640.—Japon.
mutiloides, *Keller, l. c.* 638.—Japon.
natalensis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 487.—Afr. austr.
otaruense, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* v. 641.—Japon.
paradoxum, *Keller, l. c.*—Japon.
Piraii, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* x. (Fl. Urug. 108).—Urug.
Plasonii, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 76.—Graecia.
procumbens, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* v. 639.—Japon.
pseudopetiolum, *Keller, l. c.* 638.—Japon.
pumilio, *Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 14.—As. Min.
rivulare, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* x. (Fl. Urug. 109).—Urug.
sikokumontanum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 9.—Japon.
stenocarpum, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1219.—Madag.
ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 434.—Afr. trop.

HYPHAENE, Gaertn. (Palm.).

Goetzei, *Damm. in Engl. Jahrb.* xviii. 354.—Afr. trop.
Wendlandii, *Damm. l. c.* 353.—Afr. trop.

HYPOCHOERIS, Linn. (Compos.).

graminea, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 374.—Peruv.
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 159.—Eur.
Philippii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 159.—Reg. Argent.
setosa, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 164; et in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. (1897) 197.—Eur.
stenocephala, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 160.—Peruv.
Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 373.—Ecuador.
uniflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 160 = taraxacoides.

HYPOCYRTA, Mart. (Gesner.).

maculata, *Fritsch, in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxx. 10.—Bras.

HYPODISCUS, Nees (Restiac.).

alboaristatus, *Mast. in Journ. Linn. Soc.* viii. 255.—Afr. austr.
eximius, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxvi. 17.—Afr. austr.
gracilis, *Mast. l. c.* 16.—Afr. austr.
protractus, *Mast. l. c.* 17.—Afr. austr.
rigidus, *Mast. l. c.* 18.—Afr. austr.
tristachyus, *Mast. l. c.* 17.—Afr. austr.
Zeyheri, *Mast. l. c.*—Afr. austr.

HYPOESTES, Soland. (Acanth.).

adoensis, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 162 = triflora.
annua, *Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed.* II. i. 791 = Forskalei.
callicoma, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 41 = cancellata.
ciliata, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xx. 51 = triflora.
consanguinea, *Lindau, l. c.* 50 = rosea.
glandulosa, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 24, nomen = *Monothecium glandulosum*.
inaequalis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xx. 50 = triflora.
kilimandscharica, *Lindau, l. c.* xix. Beibl. xlvi. 47 = phyllopsoides.
mlanjensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 250.—Afr. trop.
radicans, *Deflers, Voy. Yemen*, 183, t. 5.—Arab.
Rothii, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 49 = Forskalei.
simensis, *Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 111 = triflora.
tanganyikensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 252.—Afr. trop.
uniflora, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 24 = microphylla.
violacetincta, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 323.—Afr. trop.

HYPOLAENA, R. Br. (Restiac.).

Bachmannii, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxi. 15.—Afr. austr.
browniana, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 132.—Afr. austr.
conspicua, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxi. 15.—Afr. austr.
decipiens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 755.—Afr. austr.
diffusa, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 132.—Afr. austr.
foliosa, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxi. 14.—Afr. austr.
hyalina, *Mast. l. c.* 13.—Afr. austr.
incerta, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 133.—Afr. austr.
membranacea, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxi. 14.—Afr. austr.
Schlechteri, *Mast. l. c.* 15.—Afr. austr.
subtilis, *Mast. l. c.*—Afr. austr.

HYPOLYTRUM, Rich. (Cyper.).

berterianum, *Schult. Mant.* ii. 133 = *Rynchospora berterianum*.
Berterii, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 241 = *Rynchospora berterianum*.
buchholzianum, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 22.—Afr. trop.
congenae, *C. B. Clarke, ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 115.—Afr. trop.
heterophyllum, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 22.—Afr. trop.
macrophyllum, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 78.—Bras.
maculata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 335 = *Lipocarpa humboldtiana*.
microstachyum, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 23.—Bras.
oligostachyum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 190.—Ins. Carolin.
parvibractea, *C. B. Clarke, in Kew Bull.* 1899, 114.—N. Guin.

HYPOLYTRUM:

sellowiana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 335 = *Lipocarpa sellowiana*.

HYPOXIS, Linn. (Amaryll.).

brevifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 183.—Afr. austr.
camerooniana, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 577.—Afr. trop.
Flanagani, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 179.—Afr. austr.
Galpini, *Baker, l. c.* 188.—Afr. austr.
gracilipes, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 88.—Afr. austr.
kilimanjarica, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 378.—Afr. trop.
malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 284.—Afr. trop.
Maximiliani, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 89.—Afr. austr.
monophylla, *Schlechter, ex Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 581; et in *Engl. Jahrb.* xxiv. 453.—Afr. austr.
nyasica, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 284.—Afr. trop.
oligophylla, *Baker, l. c.*—Madag.
parvifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 183.—Afr. austr.
rubella, *Baker, l. c.* 531.—Afr. austr.
Schnitzleinia, *Hochst. in Flora*, xxvii. (1844) 31 = *Vellozia Schnitzleinia*.
umbraticola, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 90.—Afr. austr.

HYPTIANDRA, Hook. f. = **Samadera**, Gaertn. (Simarub.).

Bidwillii, *Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* i. 294 = *S. Bidwillii*.

HYPTIS, Jacq. (Labiata).

alopeuroides, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 201.—Am. cent.
amaurocaulis, *Briq. l. c.* 211.—Bras.
axillaris, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.
barbarensis, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 31.—Parag.
Biolleyi, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 200.—Am. cent.
brachiata, *Briq. l. c.* 215.—Am. cent.
celebica, *Zipp. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 561.—Celebes.
chacapoyensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 204.—Peruv.
chapalensis, *Briq. l. c.* 203.—Mexic.
constricta, *Briq. l. c.* 217.—Am. cent.
costulata, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 797.—Bras.
diaphora, *Briq. l. c.* 786.—Bras.
dyscheres, *Briq. l. c.* 794.—Parag.
elata, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 346.—Bras.
elegans, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 19; et in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 335.—Parag.
elliptica, *Briq. l. c.* 25; l. c. 341.—Parag.
floribunda, *Briq. l. c.* 18; l. c. 335.—Parag.
Gardneri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 230.—Bras.
gymnodonta, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 795.—Bolivia.
hygrobia, *Briq. l. c.* 789.—Bras.
idiocephala, *Briq. l. c.* 792.—Bolivia.
Jurgenseni, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 219.—Mexic.
kuntzeana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 787.—Bolivia.
lanceifolia, *Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin.* Pl. 261 = brevipes.
leucochlora, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 196.—Bras.
longifrons, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 793.—Bolivia.
macrosiphon, *Briq. l. c.* 785.—Bras.
macrotera, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 210.—Bras.
macrotricha, *Briq. l. c.* 195.—Bras.
madrensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.
Mariannarum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 343.—Polynes.
Micheli, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 29 = cinerea.
mutabilis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 788 = spicata.
neglecta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 228.—Bras.
Nelsonii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 566.—Mexic.

HYPTIS :—

- paraguayensis, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 30.—Parag.
 penaeoides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 450.—Bras.
 Pittieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 220.—Am. cent.
 plagiosoma, *Briq. l. c.* 197.—Bras.
 poliodes, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 35; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 346.—Parag.
 Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 565.—Mexic.
 rhydiophylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 242.—Bras.
 Rothschuhii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 100.—Am. cent.
 savannarum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 216.—Am. cent.
 sclerophylla, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 340.—Bras.
 siderotricha, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 791.—Bras.
 sidifolia, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 204 = polyantha.
 stereocaulos, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 26.—Parag.
 subnuda, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 231.—Bras.
 subviolacea, *Briq. l. c.* 222.—Bras.
 tenella, *Briq. & Spruce, ex Briq. l. c.* 223.—Peruv.
 trachychoa, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 790.—Bolivia.
 trichocalyx, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 21; *et in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 339.—Parag.
 trichoneura, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 28.—Parag.
 Vauthieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 199.—Bras.
 velascana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 798.—Bolivia.
 venosa, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 344 = neglecta.

HYSSOPUS, Tourn. (Labiata).

vulgaris, Bub. Fl. Pyren. i. 408 = officinalis.

HYSTRINGIUM, Trin. ex Steud. (Nomin. ed. II. ii. 11 (1841) = *Lasiochloa*, Kunth (Gramin.).
acuminatum, Trin. l. c. = *L. ciliaris*.
I**IBERIS**, Dill. (Crucif.).

epirota, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 106.—Graecia.

ICHNANTHUS, Beauv. (Gramin.).

foliolosus, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 61 = *Panicum foliolosum*.
lanceolatus, *Scribn. & G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 36.—Mexic.

ICHTHYOTHERE, Mart. (Compos.).

Ulei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 455.—Bras.

ICOMUM, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii. (1897)

329. *LABIATAE*.
lineare, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 270.—Afr. trop.
paradoxum, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 329.—Afr. trop.
salicifolium, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 270.—Afr. trop.
subcaule, *Burkill, l. c.* 271.—Afr. trop.

IFLOGA, Cass. (Compos.).

pilulifera, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 204.—Afr. austr.

IGUANURA, Blume (Palm.).

speranskyana, *Bois, in Journ. Hort. Soc. Fr.* 1899, 665.—Bras.

ILEX, Tourn. (Ilic.).

amara, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 221.—Bras.
amplifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 20.—Bolivia.
arnhemensis, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 218 = *Byronia arnhemensis*.
Beadlei, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 377.—Am. bor.

ILEX :—

- brasiliensis*, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 220 = *pubiflora*.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 255.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.*—China.
Harrisii, *Loes. in Urb. Symb. Antill.* i. 346.—Ind. occ.
Nemotoi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1900, 33.—Japan.
nipponica, *Makino, l. c.* 34.—Japan.
ovalis, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 219 = *I. Paltoria*.
pseudo-godajam, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 256.—China.
quitensis, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 219 = *bumelioides*.
sandwicensis, *Loes. l. c.* 218 = *Byronia sandwicensis*.
suber, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxi. 443.—Bras.
umbellulata, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 218 = *I. Godajam*.

ILLICIUM, Linn. (Magnol.).

Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 323.—China.

ILLIPE, F. Muell. = *Bassia*, Koenig (Sapotac.).

burckiana, *Koerd. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 518, 640.—Celebes.
May, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 272 = *B. May*.
obovata, *Engl. l. c.* = *B. obovata*.

ILYANTHES, Rafin. (Scrophul.).

andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 765.—Afr. trop.
attenuata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 297.—Am. bor.
dubia, *Barnhart, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 376 = *riparia*.
nana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 505.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.* 504.—Afr. trop.
stictantha, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 765.—Afr. trop.
tridentata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 297.—Mexic.
Welwitschii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxii. 504.—Afr. trop.
Wilmsii, *Engl. l. c.* xxvi. 123.—Afr. austr.

IMHOFIA, Heist. = *Nerine*, Herb. (Amaryll.).

duparquetiana, *Baill. in Bull. Linn. Soc. Par.* ii. 1132 = *N. duparquetiana*.
laticoma, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 46 = *N. lucida*.

IMPATIENS, Riv. (Geran.).

aurantiaca, *Teyssm. ex Koerd. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 369, nomen.—Celebes.
Batesii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 159.—Afr. trop.
blepharosephala, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 455.—China.
Briartii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 185.—Afr. trop.
dolichoceras, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 456.—China.
Flanagananae, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2540.—Afr. austr.
fulvopilosa, *Gilg, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 298, nomen.—Afr. trop.
grandiflora, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2655.—Madag.
Hancockii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 21.—China.
Henryi, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 456.—China.
longialata, *E. Pritz. l. c.* 454.—China.
pallide-rosea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 426.—Afr. trop.
polyantha, *Gilg, l. c.* 425.—Afr. trop.
stenosepala, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 453.—China.
taprobanica, *Hiern, in Journ. Bot.* 1900, 88 = *glandulifera*.
Thonneri, *Wildem. & Th. Dur. in Pl. Thonn. Congol.* 24.—Afr. trop.
Turrialbana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 241.—Am. cent.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.

INDIGOFERA, Linn. (Legum.).

achyranthoides, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 180.—Afr. trop.

INDIGOFERA :—

- ambelacensis*, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 237.—Afr. trop.
antunesiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 285.—Afr. trop.
arenophila, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 524.—Afr. austr.
bella, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 355.—Burma.
Buchneri, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 180.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 11.—Afr. trop.
cuernavacana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
Dewevrei, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 54.—Afr. trop.
Dupuisii, *Micheli, l. c.* 55.—Afr. trop.
Evensii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 429.—Afr. austr.
fruticosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
fuscosetosa, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 256.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 12.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 402.—Afr. trop.
Guthriei, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 22.—Afr. austr.
hamulosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 443.—Afr. austr.
heptaphylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 209.—Afr. trop.
jaubertiana, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 245.—Oriens.
karongensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 255.—Afr. trop.
kisantuensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 13.—Afr. trop.
Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 51.—Afr. trop.
Kurtzii, *Harms, l. c.*—Reg. Argent.
lonchocarpifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 256.—Afr. trop.
Iupulina, *Baker, l. c.* 254.—Afr. trop.
macra, *Baker, l. c.* 255.—Afr. trop.
macrantha, *Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 91.—Afr. trop.
masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 256.—Afr. trop.
microcalyx, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
microscypha, *Baker, l. c.* 255.—Afr. trop.
mischocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 149.—Afr. austr.
natalensis, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 23.—Afr. austr.
nigrescens, *Kurz, ex King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 286.—As. or. extratrop.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 254.—Afr. trop.
oligantha, *Harms, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 291, nomen.—Afr. trop.
patula, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 255.—Afr. trop.
Poggei, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. III. 260; *et in Engl. Jahrb.* xxvi. 284.—Afr. trop.
polysperma, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 14.—Afr. trop.
Preladoi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 284.—Afr. trop.
pretoriana, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 52.—Afr. austr.
psammotropha, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 22.—Afr. austr.
psilocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 148.—Afr. austr.
rostrata, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 23.—Afr. austr.
salmoniflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
sangana, *Harms, in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 292, nomen.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 181.—Afr. trop.
squalida, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 355.—Burma.
tenuisiliqua, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 241.—Afr. trop.
tetraptera, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 181.—Afr. trop.
trimorphophylla, *Taub. l. c.* 182.—Afr. trop.
uhchensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 402.—Afr. trop.
Woodii, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 24.—Afr. austr.

INDOVETHIA, Boerl. in Ic. Bogor. t. 1 (1901).**VIOLACEAE**.

calophylla, *Boerl. l. c.*—Borneo.

INGA, Scop. (Legum.).
 Hartii, *Urb. Symb. Antill.* i. 311.—Ind. occ.
 pallida, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 30.—
 Bolivia.
 pithecoloboides, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II.
 64.—Parag.

INTSIA, Thou. = **Afzelia**, Sm. (Legum.).
 cambodiensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 388 A = *A. cam-*
bodensis.

INULA, Linn. (Compos.).
 ambigua, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi.
 160.—Eur.
 attica, *Halaasy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii.
 718.—Eur.
 barthiana, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi.
 160.—Eur.
 cuanensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 568 = *Porphy-*
rostemma cuanensis.
 engleriana, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 472.—
 Afr. trop.
 Grombczewskiy, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 149.
 —Turkestan.
 huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 567.—Afr. trop.
 Klingii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 472.—Afr. trop.
 magnifica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 282.—Reg.
 Caucas.
 poggeana, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 471.—Afr.
 trop.
 pterocaula, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 383.—
 China.
 saxatilis, *Form. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* xxvii. 194.—
 Eur.
 sericophylla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 383.—
 China.
 Stuhlmannii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 472.—Afr.
 trop.
 subauriculata, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*,
 xxxvi. 161.—Eur.
 vernonioides, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 473.—
 Afr. trop.
 Welwitschii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 25.—
 Afr. trop.

INYONIA, M. E. Jones, *Contrib. Western Bot.* viii.
 (1898) 42. **COMPOSITAE**.
 dysodioides, *M. E. Jones, l. c.*—Am. bor.

IOCHROMA, Benth. (Solanac.).
 flavum, *Andr. in Rev. Hort.* 1898, 360.—N. Granat.

IODANTHUS, Torr. & Gray (Crucif.).
 dentatus, *Greene, Pittonia*, iii. 254 = *Arabis dentata*.

IODES, Blume (Olaçin.).
 ferruginea, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*,
 418.—N. Guin.
 kamerunensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 481.—Afr. trop.
 klaincana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1321.—
 Afr. trop.

IODINA, Hook. & Am. (Santal.).
 bonariensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 283 = *cuneifolia*.

IONACTIS, Greene, *Pittonia*, iii. (1897) 245. **COM-**
POSITAE.
 alpina, *Greene, l. c.* (= *Aster scopulorum*).—Am. bor.
 occ.
 linariifolia, *Greene, l. c.* (= *Aster linariifolius*).—Am.
 bor.
 stenomeris, *Greene, l. c.* 246 (= *Aster stenomeris*).—
 Am. bor. occ.

IONE, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
 Andersoni, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii.
 159.—Ind. or.
 intermedia, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.*
 lxx. 120.—Reg. Himal.
 scabrosa, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 336, sphalm.
 = seq.
 scariosa, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii.
 161 (= *Sunipia scariosa*).—Reg. Himal.; Burma.

IONIDIUM, Vent. (Violac.).
 hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. App. I.
 13.—Parag.
 modestum, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* ix. (Fl.
Urug. 63).—Urug.
 sessiliflorum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 368.
 —Bolivia.

IONOPSISIDIUM, Reichb. = **Cochlearia**, Tourn.
 (Crucif.).
 heterospermum, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii.
 256.—Alger.
 Prolongoi, *Battand. l. c.* 259 (= *Thlaspi Prolongi*).—
 Hispan.

IOXYLON, Rafin. = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).
 Mora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 294 = *M. Mora*.

IPHIGENIA, Kunth (Liliac.).
 bechuanica, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 562.—
 Afr. trop.
 Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 28.—Afr.
 austr.
 strumosa, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 562.—Afr.
 trop.

IPOMOEA, Linn. (Convolv.).
 ampullacea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii.
 89.—Mexic.
 antillana, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 84 =
sidaefolia.
 arenaria, *Steud. Nom. ed. II.* i. 815 = *Stuedeli*.
 astrotichota, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii.
 40.—Bras.
 aurifolia, *Damm, l. c.* 39.—Bras.
 britteniana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 38.—Afr.
 trop.
 calytrata, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii.
 40.—Bras.
 cephalantha, *Damm, l. c.* 39.—Bras.
 chilantha, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. I.
 50.—Parag.
 chondrosepala, *Hallier f. l. c.* 49.—Parag.
 chrysosperma, *Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii.
 234.—Afr. trop.
 citrina, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 547.—Afr.
 austr.
 crinigera, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2437.—Arab.
 dammarana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 36.—Afr.
 trop.
 decasperma, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* v. 386.—
 Mexic.
 decipiens, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 40.
 —Bras.
 dimorphophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii.
 482.—Mexic.
 Donaldsoni, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 37.—Afr.
 trop.
 eriroleuca, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 33.—Afr.
 trop.
 filipedunculata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899,
 150.—Am. austr.
 galactorrhoea, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 33.—
 Afr. trop.
 Ghikae, *Volgens & Schweinf. in Ghika, Paysdes Somalis*,
 209.—Afr. trop.
 Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.*
 Sér. II. i. 36.—Afr. trop.
 Glaziovii, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 40.
 —Bras.
 glutinosa, *Damm, l. c.* 39.—Bras.
 gossypina, *Defters, Voy. Yemen*, 174.—Arab.
 gossypina, *Defters, ex Hallier f. in Ann. Ist. Bot.*
Roma, vii. 231.—Afr. trop.; Arab.
 Greenstockii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 38.—Afr.
 austr.
 hirsuticaulis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 162.
 —Afr. trop.
 hypoleuca, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 449.—Bras.
 lasiophylla, *Hallier f. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii.
 94; et in *Engl. Jahrb.* xxviii. 32.—Afr. trop.
 leucotricha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 10.—
 Am. cent.
 limbata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 511 = *hederacea*.
 longituba, *Hallier f. in Akad. Wiss. Wien*, cvii. (1898)
Abth. I. 1.—Afr. trop.
 macrocalyx, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 51 =
Argyrea Hanningtoni.
 magnifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 84.—
 Bolivia.
 marmorata, *Britten & Rendle, in Journ. Bot.* 1896,
 36.—Afr. trop.
 mattogrossensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I.
 383.—Bras.
 maypurensis, *Spruce, ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss.*
Anst. xvi. 36 (= *Merremia maypurensis*).—Guiana.

IPOMOEA.—
 mesenteroides, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 544.
 —Afr. austr.
 micrantha, *Hallier f. l. c.* 541.—Afr. austr.
 microsticta, *Hallier f. l. c.* vii. 411.—Am. cent.
 neurocephala, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.*
 xvi. 40.—Bolivia.
 nyikensis, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 53.—Afr.
 trop.
 operosa, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 275.—Afr.
 trop.
 opulifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 150.
 —Am. austr.
 Papilio, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 543.—Afr.
 austr.
 Paulitschkei, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des*
Somalis, 210.—Afr. trop.
 perringiana, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiv. 460; et in
Gard. Chron. 1897, II. 410.—Afr. trop.
 populifolia, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 52 = *Ar-*
gyrea populifolia.
 pseudomina, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 388.
 —Bolivia.
 pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 449.—Bras.
 ruber, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 86 = *setifera*.
 saccata, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 48.—Afr. trop.
 spatulata, *Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 234.
 —Afr. trop.
 stenosphon, *Hallier f. in Akad. Wiss. Wien*, cvii.
 (1898) *Abth. I.* 3.—Afr. trop.
 Stuedeli, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 86.—
 Ind. occ.
 Tashiroi, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 75.—Ins.
 Luchu.
 tentaculifera, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii.
 482.—Mexic.
 versicolor, *Meissn. in Mart. Fl. Bras.* vii. 220.—Mexic.

IREGINE, P. Br. (Amarant.).
 arbuscula, *Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz.* xxi.
 350.—Am. cent.
 completa, *Uline & Bray, l. c.* 349.—Am. cent.
 discolor, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 477.—
 Mexic.
 Hartmanii, *Uline, in Field Columb. Mus. Bot.* i. 422.
 —Mexic.
 jaliscana, *Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz.* xxi. 351.
 —Mexic.
 nigra, *Uline & Bray, l. c.* 350.—Am. trop.

IRIS, Tourn. (Irid.).
 albo-purpurea, *Baker, in Bot. Mag. t.* 7511.—Japon.
 erirrhiza, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* i. 269.—Austria.
 fibrosa, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 182.—Persia.
 Heldreichii, *Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t.* 7734 =
stenophylla.
 iyoana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899 (111).—
 Japon.
 Loczyi, *Kan. in Szech. Keletassai Utj.* ii. 843.—China.
 Manissadjiani, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 180.—
 As. Min.
 obtusifolia, *Baker, in Bot. Mag. t.* 7701.—Reg. Casp.
 planifolia, *Fiori & Paoletti, Fl. Ital.* i. 227 = *alata*.
 pseudo-variegata, *Leichtlin, in Garden*, lv. (1899) 418.
 —Hort.
 Purdyi, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 78.—
 Am. bor.
 Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 261.—China.
 sabina, *Terrac. in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. v. 7.—Eur.
 sofarana, *Foster, in Gard. Chron.* 1899, II. 389.—
 Lebanon.
 speciosa, *Terrac. in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. v. 4.
 —Eur.
 stenophylla, *Hauskn. ex Baker, in Gard. Chron.*
 1900, I. 170.—As. Min.
 Straussii, *Leichtlin, ex Micheli, in Rev. Hort.* 1899,
 363.—Persia.
 suaveolens, *Terrac. in Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. v.
 10.—Eur.
 tubergeniana, *Foster, in Gard. Chron.* 1899, I. 225.—
 Hab. ?
 urmiensis, *Hoog, in Gard. Chron.* 1900, II. 378.—
 Persia.
 Watsoniana, *Purdy, in Erythea*, v. 128.—Calif.

IRYANTHERA, Warb. in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii.
 (1897) 126. **MYRISTICACEAE**.
 Hostmanni, *Warb. l. c.* 157 (= *Myristica Hostmanni*).
 —Am. austr. extratrop.

IRYANTHERA :—

macrophylla, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. (1897) 155 (= *Myristica macrophylla*).—Bras.
paradoxa, *Warb. l. c.* 160 (= *Myristica paradoxa*).—Bras.
sagotiana, *Warb. l. c.* 158 (= *Myristica sagotiana*).—Guian.

ISACHNE, R. Br. (Gramin.).

adstans, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 461 = miliacea.
angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 166.—Afr. trop.
brachyglumis, Hochst. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* vii. 271 = *Coelachne pulchella*.
Clarkei, *Hook. f. l. c.* 24.—Ind. or.
elator, *Hook. f. l. c.* 22.—Ind. or.
elegans, *Dalsell, ex Hook. f. l. c.* 23.—Ind. or.
geniculata, Griff. *Notul.* iii. 41 = miliacea.
Hackelii, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 11.—Bras.
himalaica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 23.—Ind. or.
Lisboae, *Hook. f. l. c.* 22.—Ind. or.
menoritana, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 185 = miliacea.
Metsii, Hochst. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* vii. 21 = *kunthiana*.
minutula, Kunth, *Rév. Gram.* ii. t. 117 = miliacea.
multiflora, *Trim. Cat. Ceyl. Pl.* 104.—Ind. or.
obscurans, *Woodrow, in Gard. Chron.* 1898, i. 161.—Ind. or.
polygonoides, Doell. in *Mart. Fl. Bras.* ii. II. 273 = miliacea.
pulchella, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 58 = *Sphaerocaryum elegans*.
scabrosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 23.—Ind. or.
stigmatisata, Griff. *Notul.* iii. 42 = miliacea.
tricarinata, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 57 = *Panicum ovalifolium*.

ISATIS, Tourn. (Crucif.).

Aitchisoni, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VIII. iv. IV. 90.—Turkestan.
arenaria, *Asnau. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 138.—Eur.
hispidata, *Post, Fl. Syria*, 97.—Syria.
turcomanica, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VIII. iv. IV. 89.—Turkestan.

ISCHAEMUM, Linn. (Gramin.).

abbreviatum, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8688 E = *Panicum Crus-galli*.
corrugatum, Ham. *l. c.* n. 8864 E = *rugosum*.
crinitum, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VI. ii. 298 = *Pogonatherum crinitum*.
denticulatum, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8857 = *Apocypis royleanus*.
diplopogon, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 129.—Ind. or.
ensiforme, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8878 = *Vossia procera*.
geniculatum, Roxb. *Fl. Ind.* i. 324 = *ciliare*.
glabrescens, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 31 = *Panicum Crus-galli*.
glauco-stachyum, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 328.—Afr. austr.
hirsutum, Nees, ex *Staud. Syn. Pl. Gram.* 361 = *Elionurus hirsutus*.
involutum, Russ. ex Wall. *Cat. n.* 8794 A = *Apluda varia*.
involutum, Forst. *f. Prodr.* 73 = *Thuarea sarmentosa*.
Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 129.—Ind. or.
leersoides, Munro, in *Proc. Amer. Acad.* iv. 363 = *Eremochloa leersoides*.
Lisboae, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 133.—Ind. or.
mastrucatum, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VI. ii. 298 = *Elionurus hirsutus*.
molle, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 128.—Ind. or.
montanum, Russ. ex Wall. *Cat. n.* 8818 A = *laxum*.
papposum, Rottl. ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 301 = *Pappophorum elegans*.
pectinatum, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VI. ii. 296 = *Eremochloa muricata*.
robustum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 139.—Ind. or.
sparteum, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8845 C = *angustifolium*.
spathiflorum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 138.—Ind. or.
speciosum, Nees, ex *Staud. Syn. Pl. Gram.* 375 = *Rottboellia speciosa*.
tenuis, Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8866 A = *ciliare*.
timorense, Kunth, *Rév. Gram.* i. 369.—Ind. or.; Malaya; Polynes.

ISCHNOCHLOA, Hook. *f. in Hook. Ic. Pl.* t. 2466

(1896). **GRAMINEAE**.
Falconeri, *Hook. f. l. c.*—Reg. Himal.
VOL. III.

ISEILEMA, Anderss. in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. Ser.* III. ii. (1856) 250 (Gramin.).
arguta, Anderss. *l. c.* 252.—Ind. or.
Wightii, Anderss. *l. c.* 251.—Ind. or.

ISERTIA, Schreb. (Rubiace.).

reticulata, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 46.—Bolivia.

ISNARDIA, Linn. = **Ludwigia**, Linn. (Onagrac.).

natans, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 177 = *L. natans*.
spathulata, Small, *l. c.* = *L. spathulata*.

ISOCHORISTE, Miq. (Acanth.).

africana, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1880, 309 = *Asystasia africana*.

ISODENDRION, A. Gray (Violac.).

subsessilifolium, *Heller, in Minnes. Bot. Studies,* i. 856.—Ins. Hawaii.

ISOGLOSSA, Oerst. (Acanth.).

barlerioides, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1877, 70 = *Ecbolium barlerioides*.
flava, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xxii. 125 = *lactea*.
floribunda, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 233.—Afr. trop.
grandiflora, C. B. Clarke, *l. c.*—Afr. trop.
membranacea, C. B. Clarke, *l. c.* 230.—Afr. trop.
mossambicensis, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 324.—Afr. trop.
nervosa, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 229.—Afr. trop.
parvifolia, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 411.—Afr. trop.
somalensis, Lindau, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 82.—Afr. trop.
strigosula, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 231.—Afr. trop.
substrobilina, C. B. Clarke, *l. c.* 232.—Afr. trop.
violacea, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xxii. 125 = *lactea*.

ISOLEPIS, R. Br. = **Scirpus**, Linn. (Cyperac.).

arcuata, Ecklon, ex *Kunth, Enum. Pl.* ii. 254 = *Ficinia aphylla*.
arenaria, Nees, in *Linnaea*, ix. 291 = *Bulbostylis humilis*.
bergiana, Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 120 = *S. dregeanus*.
breviculmis, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 207 = *Bulbostylis breviculmis*.
fascicularis, Kunth, *l. c.* 188 = *S. fluitans*.
filamentosa, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 113 = *Bulbostylis filamentosa*.
humilis, Kunth, *Enum. Pl.* ii. 207 = *Bulbostylis humilis*.
membranacea, Nees, in *Linnaea*, ix. 291 = *S. membranaceus*.
Pseudoschoenus, A. Dietr. *Sp. Pl.* ii. 103 = *Ficinia albicans*.

ISOLOMA, Decne. (Gesnerac.).

flexuosa, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 28.—Am. austr.
parviflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 97.—Bolivia.
patentipilosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 242.—Bolivia.
Sprucei, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 97.—Bolivia.
urticifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 28.—Am. austr.

ISOLONA, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.*

i. 161 (1897). **ANONACEAE**.
Heinsenii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
hexalola, *Engl. l. c.* (= *Monodora hexalola*).—Afr. trop.
madagascariensis, *Engl. l. c.* (= *Monodora madagascariensis*).—Ins. Madag.
Zenkeri, *Engl. l. c.* (= *Monodora Zenkeri*).—Afr. trop.

ISONEMA, R. Br. (Apocyn.).

infandibuliflorum, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 306.—Afr. trop.

ISOPYRUM, Linn. (Ranunc.).

auriculatum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1897, 220.—China.
Delavayi, *Franch. l. c.* 222.—China.
Fargesii, *Franch. l. c.* 194.—China.
Fauriei, *Franch. l. c.* 218.—Japan.

ISOSTIGMA, Less. (Compos.).

foliosum, *Malmé, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 66.—Bras.
Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 160.—Bolivia.

ITEA, Gronov. (Saxifr.).

yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 268.—China.

IWA, Linn. (Compos.).

caudata, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 290.—Am. bor.

IXIA, Linn. (Irid.).

Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 14.—Afr. trop.

IXIOLIRION, Fisch. (Amaryll.).

karateginum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 108.—As. cent.

IXOPHORUS, Schlecht. = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).

Pringlei, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 6.—Mexic.

IXORA, Linn. (Rubiace.).

amplexifolia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 572.—N. Guin.
anemodesma, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 86.—Afr. trop.
asteriscus, *Hallier f. l. c.*—Afr. trop.
coleopoda, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 573.—N. Guin.
erythrocarpa, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 571.—N. Guin.
Grevei, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1308.—Madag.
Hildebrandti, *Drake, l. c.* 1309.—Madag.
Humboldtii, *Drake, l. c.* 1306.—Madag.
Kerstingii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 571.—N. Guin.
linearifolia, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1307.—Madag.
malacophylla, *Drake, l. c.* 1309.—Madag.
microphylla, *Drake, l. c.* 1307.—Madag.
narcissodora, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
orohenensis, *Nadeaud, in Journ. de Bot.* 1897, 106.—Ins. Tahiti.
parvifolia, *Boivin, ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1307 = *microphylla*.
rotundifolia, *Drake, l. c.*—Madag.
spiranthera, *Drake, l. c. n. s. i.* 43.—Madag.
thouarsiana, *Drake, l. c.*—Madag.
uniflora, *Drake, l. c.* 44.—Madag.

J**JABOROSA**, Juss. (Solnac.).

araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 17.—Chili.
magellanica, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 131 = *Himeranthus magellanicus*.

JACARANDA, Juss. (Bignon.).

bracteata, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 369.—Bras.
cauliflora, *Bureau & K. Schum. l. c.* 373.—Peruv.
crystallana, *Bureau & K. Schum. l. c.* 384.—Bras.
cuspidifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 246.—Bolivia.
glabra, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 394 (= *Pteropodium glabrum*).—Bras.
heteroptila, *Bureau & K. Schum. l. c.* 378.—Bras.
lasiogyne, *Bureau & K. Schum. l. c.* 385.—N. Granat.
longiflora, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 73.—Bolivia.
macrocarpa, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 372.—Bras.
Mendoncaei, *Bureau & K. Schum. l. c.* 383.—Bras.
rachidoptera, *Bureau & K. Schum. l. c.* 374.—Peruv.
simplicifolia, *K. Schum. ex Bureau & K. Schum. l. c.* 414.—Bras.
Ulei, *Bureau & K. Schum. l. c.* 383.—Bras.

JACOBINIA, Moric. (Acanth.).

Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 79.—Bolivia.
subrecta, *E. André, in Rev. Hort.* 1900, 210.—Urag.
tenuistachys, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 105.—Bolivia.

JACQUEMONTIA, Choisy (Convolv.).

acuminata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 84.—Bolivia.
densiflora, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 151.—Am. austr.

JACQUEMONTIA :—

- fruticulosa, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. I. 45.*—Parag.
 grandifolia, *Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. Ivii. 41.*—Bras.
 hewittacea, *K. Schum. in Fust. Jahresb. xxvi. I. 383.*—Bras.
 itatiayensis, *K. Schum. l. c.*—Bras.
 Lorentzii, *Peter, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 213.*—Reg. Argent.
 multivalvis, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xv. 42=Convolvulus parviflorus.*
 pedunculata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 85.*—Bolivia.
 rufa, *Damm. in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. Ivii. 41.*—Bras.
 sphaerostigma, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 151=hiruta.*
 uleana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xvi. 31.*—Bras.

JACQUINIA, Linn. (Myrsin.).

- brevifolia, *Urb. Symb. Antill. i. 379.*—Ind. occ.
 brunescens, *Urb. l. c. 378.*—Ind. occ.
 Eggersii, *Urb. l. c. 380.*—Ind. occ.
 incrustata, *Urb. l. c. 377.*—Ind. occ.
 stenophylla, *Urb. l. c. 378.*—Ind. occ.

JAEGERIA, H. B. & K. (Compos.).

- petiolaris, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 316* = *Sabazia glabra*,
 purpurascens, *Robinson, l. c.*—Mexic.

JAMBOSA, DC. = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).

- dolichophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 471.*—N. Guin.
 glabra, *Zoll. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 68=Eugenia Klampok?*
 glomerata, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 470=E. glomerata.*
 hylophila, *K. Schum. & Lauterb. l. c. 471.*—N. Guin.
 Jambos, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 80=Eugenia Jambos.*
 megalosperma, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 472.*—N. Guin.
 pachyclada, *K. Schum. & Lauterb. l. c. 474.*—N. Guin.
 pilgeriana, *K. Schum. & Lauterb. l. c. 473.*—N. Guin.
 pteropoda, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.
 synaptoneura, *K. Schum. & Lauterb. l. c. 475.*—N. Guin.

JANUSIA, A. Juss. (Malpigh.).

- prolixa, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid. iii. 186.*—Urug.

JARACATIA, Marq. (Passifl.).

- corumbensis, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 101.*—Bras.

JASIONE, Linn. (Campan.).

- euphrasiaefolia, *Porta, in Atti Accad. Giati Rovereto, Ser. III. ii. (1896) 214.*—Hispan.

JASMINUM, Tourn. (Oleac.).

- dicanolepidiforme, *Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 450.*—Afr. trop.
 excellens, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. 169.*—Ind. or.
 gilgianum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 496.*—N. Guin.
 Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 534.*—China.
 goetzeanum, *Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 451.*—Afr. trop.
 gratissimum, *Deflers, Voy. Yemen, 162.*—Arab.
 mossamedense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 655.*—Afr. trop.
 nitidum, *Skan, in Kew Bull. 1898, 225.*—Ins. Admir.
 Pospischilii, *Gilg, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin, i. 183.*—Afr. trop.

JATROPHA, Linn. (Euphorb.).

- Batawe, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 420.*—Afr. trop.
 ferox, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 185; et in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 212.*—Afr. trop.
 heterophylla, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 25.*—Afr. trop.
 Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 287.*—Reg. Argent.
 Jurgenseni, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 229.*—Mexic.
 latifolia, *Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. 531.*—Afr. austr.
 mollis, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 184.*—Afr. trop.

JATROPHA :—

- pedatipartita, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 287.*—Bolivia.
 Phillipseae, *Rendle, in Journ. Bot. 1898, 30.*—Afr. trop.
 portoricensis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 59.*—Ind. occ.
 Rivae, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 185; et in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. 212.*—Afr. trop.
 Robecchii, *Pax, l. c. 184; et l. c. 212.*—Afr. trop.
 Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 24.*—Afr. trop.
 Woodii, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 287.*—Afr. austr.
 yucatanensis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1900, 230.*—Mexic.

JAUMEA, Pers. (Compos.).

- congensis, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 33.*—Afr. trop.
 elata, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxviii. 506.*—Afr. trop.
 Johnstoni, *Baker, in Kew Bull. 1898, 153.*—Afr. trop.
 mimuloides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 52.*—Ecuador.

JENMANIA, Rolfe, in *Kew Bull. 1898, 198* = **Rolfea**,

- Zahlbr. (Orchid.).
 elata, *Rolfe, l. c.* = *R. elata*.

JEPSONIA, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 18.*

- SAXIFRAGACEAE.**
 malvaefolia, *Small, l. c. 19* (= *Saxifraga malvaefolia*).—Calif.
 Parryi, *Small, l. c. 18* (= *Saxifraga Parryi*).—Am. bor. occ.

JOLLYDORA, Pierre, ex *Gilg, in Engl. Jahrb. xxiii.*

- (1896) 217. **CONNARACEAE.**
 duparquetiana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1233* (= *Connarus duparquetianus*).—Afr. trop.
 Elimaboura, *Pierre, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxiii. 218, nomen.*—Afr. trop.
 Pierrei, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

JOUEVA, Fourn. (Gramin.).

- pilosa, *Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 143.*—Am. bor.

JRYAGHEDI, Kuntze, *Rev. Gen. iii. II. 275* (1898) =

- Myristica**, Linn. (Myristic.).
 Jryaghedi, *Kuntze, l. c.* = *M. Horsfieldia*.

JUBUBA, Bub. *Fl. Pyren. i. 376* (1897). **RHAMNA-**

- CEAE.**
 mediterranea, *Bub. l. c.* (= *Zizyphus vulgaris*).—Eur.

JUNCCELLUS, C. B. Clarke (Cyperac.).

- minutus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot. 1896, 224.*—Afr. trop.

JUNCUS, Tourn. (Juncac.).

- arizonicus, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 517.*—Am. bor.
 brachyphyllus, *Wiegand, l. c. 519.*—Am. bor.
 Buchenau, *Saedelius, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiii. no. 6, 9.*—Bras.
 Cephalotes, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 66.*—Afr. austr.
 confusus, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, x. 127.*—Am. bor.
 Dudleyi, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 524.*—Am. bor.
 guadeloupensis, *Buchen. & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 496.*—Ind. occ.
 interior, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 516.*—Am. bor.
 Kraussii, *Hochst. in Flora, xxvii. (1845) 342=maritimus.*
 lesbiacus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliv. 1897, 140.*—Lesbos.
 occidentalis, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 521.*—Am. bor.
 oxycarpus, *E. Meyer, ex Kunth, Enum. Pl. iii. 336.*—Afr. austr.
 Schlechteri, *Buchen. in Engl. Jahrb. xxiv. 459.*—Afr. austr.
 setchuensis, *Buchen. l. c. xxix. 238.*—China.
 spreus, *Schult. f. Syst. vii. 1656, in obs.=maritimus.*
 Suksdorfii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 541.*—Am. bor.
 Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 90.*—Am. bor.

JUNGIA, Linn. f. (Compos.).

- coarctata, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 81.*—Ecuador.
 divaricata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 71.*—Bolivia.
 fistulosa, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 83.*—Ecuador.
 pubescens, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 161=floribunda.*
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 82.*—Ecuador.

JUNIPERUS, Tourn. (Conif.).

- Knightii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxv. 198.*—Am. sept.
 monosperma, *Sargent, Silva N. Am. x. 89.*—Am. bor.
 sabinoides, *Sargent, l. c. 91=mexicana.*
 Sanderi, *Bois, in Journ. Hort. Fr. 1899, 665.*—Tibet.

JUNODIA, Pax, in *Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 22.*

- EUPHORBIACEAE.**
 triplinervia, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

JURINEA, Cass. (Compos.).

- kilaca, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 172.*—Turcia.
 polycephala, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 299.*—Eur.

JUSSIEUA, Linn. (Onagrac.).

- Fauriei, *Léveillé, in Monde des Plantes, vi. 51.*—Japon.
 geminiflora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 246.*—Am. cent.
 hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. I. 71.*—Parag.
 japonica, *Léveillé, in Monde des Plantes, vi. 51.*—Japon.
 paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. I. 71.*—Parag.
 Parmentieri, *Léveillé, in Monde des Plantes, vi. 51.*—Japon.
 philippiana, *Léveillé, l. c.*—Japon.

JUSTENIA, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl. i. 451* (1898).

- RUBIACEAE.**
 orthopetala, *Hiern, l. c. 452.*—Afr. trop.

JUSTICIA, Houst. (Acanth.).

- andongensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 185.*—Afr. trop.
 Anisacanthus, *Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. 678=Ecbolium Anisacanthus.*
 anselliana, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 44.*—Afr. trop.
 arenicola, *Engl. in Engl. Jahrb. x. 264=Monechma arenicola.*
 areysiana, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliiii. 225.*—Arab.
 aridicola, *Rendle, in Journ. Bot. 1896, 410.*—Afr. trop.
 asymetrica, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 310.*—Am. cent.
 aurea, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 675=Tetramerium aureum.*
 Balansac, *Lindau, l. c. 671.*—Cochinch.
 baravensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 189.*—Afr. trop.
 Barteri, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 39=Monechma depauperatum.*
 betonicoides, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 184.*—Afr. trop.
 blepharostegia, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 195=Monechma bracteatum.*
 boliviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 104.*—Bolivia.
 bracteata, *Zarb, Cat. Spéc. Bot. Pfund, 32=Monechma bracteatum.*
 breviflora, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 78=Dianthera breviflora.*
 Buettneri, *Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 68=Monechma hispidum.*
 calcarata, *Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 73, in obs.*—Afr. trop.
 calyculata, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliiii. 224.*—Arab.
 ciliaris, *Linn. f. Suppl. 84=Monechma hispidum.*
 ciliata, *Jacq. Hort. Vindob. ii. 47=Monechma hispidum.*
 cleomoides, *S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 313=Monechma cleomoides.*
 Clinopodium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 304.*—Mexic.
 crassiradix, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 210.*—Afr. trop.

JUSTICIA :—

- cynanchifolia*, R. Br. in Salt, Abyss. Append. 63 = cordata.
- debilis*, Vahl, Symb. ii. 15 = Monechma bracteatum.
- depauperata*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 40 = Monechma depauperatum.
- Desertorum*, Engl. in Engl. Jahrb. x. 263 = Monechma Desertorum.
- dyschoristeoides*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 197.—Afr. trop.
- elegans*, Beauv. Fl. Owar. i. 84 = Lankesteria elegans.
- elegantula*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 204.—Afr. trop.
- Elliotii*, S. Moore, l. c. 466.—Afr. trop.
- engleriana*, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 62 = Adhatoda engleriana.
- exigua*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 204.—Afr. trop.
- fasciata*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 160 = flava.
- filibracteolata*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 673.—N. Granat.
- Funcikii*, Lindau, l. c. 674.—Venez.
- Galeopsis*, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 196.—Afr. trop.
- genistifolia*, Engl. in Engl. Jahrb. x. 264 = Monechma genistifolium.
- gesneriflora*, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 414.—Afr. trop.
- gesnerifolia*, Rendle, l. c. 398 = gesneriflora.
- Gilligani*, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 157.—N. Guin.
- glischantha*, Lindau, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. 49.—Bras.
- Goetzei*, Lindau, l. c. xxviii. 484.—Afr. trop.
- Gregorii*, S. Moore, in Journ. Bot. 1894, 138 = Monechma bracteatum.
- grisea*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 205.—Afr. trop.
- hereroensis*, Engl. in Engl. Jahrb. x. 264 = Monechma hereroense.
- hispida*, Willd. Sp. Pl. i. 84 = Lankesteria parviflora.
- interrupta*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 207.—Afr. trop.
- karschiana*, Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. 40 = insularis.
- laetevirens*, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 409 = Fischeri.
- Lindaui*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 199.—Afr. trop.
- linearispica*, C. B. Clarke, l. c. 192.—Afr. trop.
- lolioides*, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 310 = Monechma lolioides.
- longiacuminata*, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 78.—Bolivia.
- Lortea*, Rendle, in Journ. Bot. 1897, 379.—Afr. trop.
- maculata*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 38 = Adhatoda maculata.
- major*, T. Anders. l. c. 39 = flava.
- marginata*, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 73 = Monechma scabridum.
- masaiensis*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 207.—Afr. trop.
- Matthewsii*, Rusby, ex Lindau, in Bull. Herb. Boiss. vi. App. 1. 80.—Parag.
- membranifolia*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 663 (= *Rhaphidospora membranifolia*).—Java.
- metallica*, Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica, viii. 311.—Am. cent.
- minor*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 39 = flava.
- Mollugo*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 200.—Afr. trop.
- monechmoides*, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 311 = Monechma Welwitschii.
- mossamedea*, S. Moore, l. c. 312 = Monechma Nepeta.
- nana*, Ehrenb. ex Hempr. & Ehrenb. Symb. Phys. 39, t. 16.—Arab.
- Nepeta*, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 312 = Monechma Nepeta.
- Nuttii*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 210.—Afr. trop.
- ovata*, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 237 = Dianthera ovata.
- patenti-ciliata*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 673.—Mexic.
- paucinervia*, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 186.—Afr. trop.
- peploides*, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 238 = Dianthera peploides.

JUSTICIA :—

- Phillippsae*, Rendle, in Journ. Bot. 1897, 378.—Afr. trop.
- phyllostachys*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 188.—Afr. trop.
- Physogaster*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 672.—Bras.
- pilosocordata*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 207.—Afr. trop.
- pinguior*, C. B. Clarke, l. c. 197.—Afr. trop.
- Pittieri*, Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica, viii. 312.—Am. cent.
- plicata*, Vahl, Enum. i. 156 = flava.
- polymorpha*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 203 = odorata.
- Preussii*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 204.—Afr. trop.
- pyncophylla*, Lindau, in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. 49.—Bras.
- pyramidata*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 206.—Afr. trop.
- Regnellii*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 672.—Bras.
- reinsensis*, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 79.—Bolivia.
- Rendlei*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 204.—Afr. trop.
- robusta*, T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c. 223 = Adhatoda robusta.
- Romaniae*, Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis, 217.—Afr. trop.
- rostellarioides*, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 69 = insularis.
- rugeliana*, Lindau, in Urb. Symb. Antill. ii. 244 = Dianthera rugeliana.
- ruwenzoriensis*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 185.—Afr. trop.
- Salsola*, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 340 = Monechma Salsola.
- salviiflora*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 205.—Afr. trop.
- Sanctae-Martae*, Lindau, in Engl. Jahrb. xxi. 377.—N. Granat.
- sarothroides*, Lindau, l. c. xxv. Beibl. ix. 50.—Bras.
- scabrida*, S. Moore, in Journ. Bot. 1880, 310 = Monechma scabridum.
- schimperiana*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 38 = Adhatoda schimperiana.
- sexsulcata*, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 67 = Monechma depauperatum.
- shebelensis*, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 409.—Afr. trop.
- simplex*, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 349 = diffusa.
- simplicispica*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 188.—Afr. trop.
- spectabilis*, T. Anders. ex C. B. Clarke, l. c. 204 = Preussii.
- stachytarphetoidea*, C. B. Clarke, l. c. 194.—Afr. trop.
- Steingrooveri*, Schinz, ex Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 349 = Monechma arenicola.
- Stuebelii*, Lindau, in Engl. Jahrb. xxi. 378.—Peruv.
- subsessilis*, Oliv. in Trans. Linn. Soc. xxix. 129 = Monechma subsessile.
- tanaensis*, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 193.—Afr. trop.
- tenella*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii. 663 (= *Rhaphidospora tenella*).—Java.
- thomensis*, Lindau, in Engl. Jahrb. xxii. 126 = J. Galeopsis.
- Tonduzii*, Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geogr. Costa Rica, viii. 313.—Am. cent.
- tristis*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. 38 = Adhatoda tristis.
- tunicata*, Afz. Remed. Guin. iii. 17 = Eranthemum nigrifolium.
- ukambensis*, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 69 = Monechma ukambense.
- uncinulata*, Oliv. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 226 = Rhinacanthus sidorensis.
- versicolor*, C. B. Clarke, l. c. 186.—Afr. trop.
- vittata*, Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur. lxx. 211.—Sumatra.

K

- KADUA**, Cham. & Schlecht. (Rubiaceae).
- elator*, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i. 899.—Ins. Sandw.

KAEMPFERIA, Linn. (Scitamin.).

- aethiopica*, Ridley, in Journ. Bot. 1887, 131.—Afr. trop.
- anomala*, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 357.—Borneo.
- Carsoni*, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 296.—Afr. trop.
- decus-silvae*, Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz. xiii. 321.—Malaya.
- Dewevrei*, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 142.—Afr. trop.
- Ethelae*, F. M. Wood, in Gard. Chron. 1898, t. 94.—Afr. trop.
- glauca*, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 107.—Siam.
- macrosiphon*, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 296.—Afr. trop.
- oligosperma*, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 337.—Borneo.
- pulchra*, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 107.—Siam.
- spectabilis*, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 297 (= *Cadalvena spectabilis*).—Afr. trop.

KALANCHOE, Adans. (Crassul.).

- Cuisini*, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 122.—Afr. trop.
- flammea*, Stapf, in Kew Bull. 1897, 266.—Afr. trop.
- kelleriana*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 814.—Afr. trop.
- Pentheri*, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 341.—Afr. austr.

KALLSTROEMIA, Scop. = **Tribulus**, Linn. (Zygophyll.).

- brachystylis*, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 206.—Am. sept.
- parviflora*, Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 153.—Am. bor.

KALMIA, Linn. (Ericac.).

- microphylla*, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 581.—Am. bor.

KALOPANAX, Miq. = **Acanthopanax**, Decne. (Aral.).

- sciadophylloides*, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 51 = A. sciadophylloides.

KARLEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896)

1271. **STYRACACEAE**.
- berchemioides*, Pierre, l. c.—Afr. trop.

KAYEA, Wall. (Guttif.).

- Curtisii*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 144.—Penang.
- Manii*, King, l. c.—Singapore et Ins. Andaman.

KELLERONIA, Schinz (Zygophyll.).

- Gilletii*, Baker f. in Journ. Bot. 1898, 6.—Afr. trop.

KELSEYA, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i.

- (1900) 207. **ROSACEAE**.
- uniflora*, Rydb. l. c. (= *Eriogynia uniflora*).—Am. sept.

KENNEDYA, Vent. (Legum.).

- exaltata*, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. i. 79.—Austral.

KENOPLURUM, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.

- xliv. (1897) 158. **UMBELLIFERAE**.
- viosum*, Candargy, l. c. 159.—Lesbos.

KENTIA, Blume (Palm.).

- kersteniana*, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1898, II. 357, fig. 113.—Hort.?
- microcarpa*, Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 207.—N. Guin.
- microspadix*, Warb. l. c. 206.—N. Guin.

KENTROCHROSIA, K. Schum. & Lauterb. Fl.

- Deutsch. Südsee, 506 (1900). **APOCYNACEAE**.
- monocarpa*, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

KENTROSPHAERA, Volkens, in Engl. & Prantl,

- Pflanzenf. Nachtr. i. 153 (1897). **AMARANTACEAE**.
- prostrata*, Volkens, l. c.—Afr. trop.

KIBARA, Endl. (Monim.).

- angustifolia*, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. 577.—Arch. Mal.
- macrophylla*, Perkins, l. c. 573.—Java.

KIBARA :—

Perkinsiae, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 380.—N. Guin.
 polyantha, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxv. 575.—Siam.
 serrulata, *Perkins, l. c.*—Java.
 tomentosa, *Perkins, l. c.* 571.—Java.
 trichantha, *Perkins, l. c.* 572.—Java.
 xanthophylla, *Perkins, l. c.* 574.—Ins. Nicobar.

KIBESSIA, DC. (Melast.).

celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 466, 638.—Celebes.

KICKXIA, Blume (Apocyn.).

elastica, *Preuss, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 353.—Afr. trop.
 latifolia, *Staff, in Kew Bull.* 1898, 307.—Afr. trop.
 Scheffleri, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 81.—Afr. trop.
 Wigmani, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 528.—Celebes.
 Zenkeri, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 81.—Afr. trop.

KICKXIA, Dum. = **Linaria**, Tourn. (Scrophul.).

cirrhusa, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 492 = *L. cirrhosa*.
 commutata, *Fritsch, l. c.* = *L. Elatine*.
 lasiopoda, *Fritsch, l. c.* = *L. Elatine*.

KIELMEYERA, Mart. (Ternstroem.).

paniculata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 9.—Bolivia.

KINGIODENDRON, Harms, in Engl. & Prantl,

Pflanzenf. Nachtr. i. 194 (1897). **LEGUMINOSAE**.
 pinnatum, *Harms, l. c.* (= *Hardwickia pinnata*).—Ind. or.

KIRKIA, Oliver (Simarub.).

Wilsnii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 25.—Afr. austr.

KLAINEDOKA, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl,

Pflanzenf. iii. iv. (1896) 227; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1896) 1235. **SIMARUBACEAE**.
 gabonensis, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

KLEINIA, Linn. (Compos.).

Grantii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7691.—Afr. trop.
 pendula, *DC. Prod.* vi. 339.—Afr. trop.; Arab.

KLOTZSCHIA, Cham. (Umbellif.).

Glaziovii, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 12.—Bras.

KNAUTIA, Linn. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

lemniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 109.—Eur.
 midsorensis, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 19.—Eur.
 perfoliata, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 149.—Eur.
 serbica, *Form. in Verb. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 308.—Eur.
 sextina, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 109.—Eur.
 succisoides, *Briq. l. c.* 108.—Eur.

KNEIFFIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrac.).

Alleni, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 177 = *O. fruticosa*.
 longipedicellata, *Small, l. c.* 178.—Am. bor.
 Pilosella, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II*, 8 = *O. fruticosa*.
 spachiana, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 179 = *O. spachiana*.
 subglobosa, *Small, l. c.* 177.—Am. bor.

KNEMA, Lour. = **Myristica**, Linn. (Myristic.).

angustifolia, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 561 = *M. erratica*.
 attenuata, *Warb. l. c.* 590 = *M. attenuata*.
 Cantleyi, *Warb. l. c.* 554 = *M. Cantleyi*.
 cinerea, *Warb. l. c.* 611 = *M. cinerea*.
 conferta, *Warb. l. c.* 578 = *M. conferta*.
 coriacea, *Warb. l. c.* 614 = *M. coriacea*.
 Curtisii, *Warb. l. c.* 587 = *M. Curtisii*.
 elegans, *Warb. l. c.* 615 = *M. elegans*.
 furfuracea, *Warb. l. c.* 581 = *M. furfuracea*.
 geminata, *Warb. l. c.* 604 = *M. geminata*.
 glauca, *Warb. l. c.* 594 = *M. glauca*.

KNEMA :—

globularia, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 601 = *M. microcarpa*.
 heterophylla, *Warb. l. c.* 573 = *M. heterophylla*.
 hookeriana, *Warb. l. c.* 551 = *M. hookeriana*.
 intermedia, *Warb. l. c.* 564 = *M. intermedia*.
 Korthalsii, *Warb. l. c.* 557 = *M. Korthalsii*.
 Kunstleri, *Warb. l. c.* 568 = *M. Kunstleri*.
 latifolia, *Warb. l. c.* 610.—Malaya.
 laurina, *Warb. l. c.* 606 = *M. laurina*.
 lenta, *Warb. l. c.* 584 = *M. lenta*.
 linifolia, *Warb. l. c.* 558 = *M. longifolia*.
 malayana, *Warb. l. c.* 570 = *M. glaucescens*.
 Mandaharan, *Warb. l. c.* 553 = *M. Mandaharan*.
 missionis, *Warb. l. c.* 602 = *M. missionis*.
 oblongifolia, *Warb. l. c.* 586 = *M. oblongifolia*.
 palembanica, *Warb. l. c.* 592 = *M. glaucescens*.
 pectinata, *Warb. l. c.* 556 = *M. pectinata*.
 peltata, *Warb. l. c.* 599 = *M. peltata*.
 Pierrei, *Warb. l. c.* 585.—Cochinch.
 pulchra, *Warb. l. c.* 600 = *M. pulchra*.
 retusa, *Warb. l. c.* 612 = *M. retusa*.
 rufa, *Warb. l. c.* 556 = *M. rufa*.
 stenocarpa, *Warb. l. c.* 577 = *M. stenocarpa*.
 tomentella, *Warb. l. c.* 588 = *M. tomentella*.
 umbellata, *Warb. l. c.* 609 = *M. umbellata*.
 Vidalii, *Warb. l. c.* 615.—Ins. Philipp.
 Wrayi, *Warb. l. c.* 572 = *M. Wrayi*.

KNIPHOFIA, Moench (Liliac.).

Baurii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 281.—Afr. austr.
 Evansii, *Baker, l. c.* 278.—Afr. austr.
 fibrosa, *Baker, l. c.* 533.—Afr. austr.
 Galpini, *Baker, l. c.* 281.—Afr. austr.
 insignis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 131.—Afr. trop.
 Krooki, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 14.—Afr. austr.
 multiflora, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 353.—Afr. austr.
 primulina, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 533.—Afr. austr.
 rufa, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7706.—Afr. austr.
 Schlechteri, *Schinz, in Mem. Herb. Boiss.* no. 20, 10.—Afr. austr.
 Sumarae, *Deflers, Voy. Yemen*, 210.—Arab.
 Thodei, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 533.—Afr. austr.

KNOWLTONIA, Salisb. (Ranuncul.).

filia, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. 11. 12 (= *Anemone filia*).—Afr. austr.
 glabricarpellata, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 423.—Afr. austr.

KOBRESIA, Willd. (Cyperac.).

brunescens, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 40.—Tibet.
 hyalinolepis, *Boeck. l. c.* 39.—Tibet.
 macrantha, *Boeck. l. c.*—Tibet.
 myosuroides, *Fiori & Paoletti, Fl. Ital.* i. 125 = scirpina.
 persica, *Kuek. & Bornm. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 133.—Persia.

KOCHIA, Roth (Chenopod.).

glomerifolia, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 345.—Austral.

KOELERIA, Pers. (Gramin.).

Alopecurus, *Nees, in Linnaea*, vii. 320 = cristata.
 aristata, *Loisel. Fl. Gall. ed. II*, i. 66 = Avena subspicata.
 brevifolia, *Spreng. Pugill.* ii. 21 = Eleusine brevifolia.
 calycina, *DC. Fl. Fr.* vi. 271 = Schismus fasciculatus.
 capensis, *Nees, in Linnaea*, vii. 321 = cristata.
 Gerardi, *Munro, ex Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 1184 = Stilburus alopecuroides.
 glauca, *DC. Cat. Hort. Monsp.* 116 = cristata.
 Kurtzii, *Hack. ex Kurtz, in Bol. Acad. Cordoba*, xvi. repr. 40.—Reg. Argent.
 lagopoides, *Panz. ex Spreng. Syst.* i. 332 = Eleusine brevifolia.
 lobata, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 620 = cristata.
 Rohlfii, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. no. 1, (1900) 16.—Tunis.
 spicata, *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* i. 72 = Avena subspicata.
 subspicata, *Mart. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 49, 140 = Avena subspicata.
 valesiaca, *Gaud. in Alpina*, iii. 47 = cristata.
 valesiana, *Aschers. & Graebn. Mitteleur. Fl.* ii. 354 = valesiaca.

KOELLIA, Moench = **Pycnanthemum**, Mich. (Labi-)

biat.).
 Beadlei, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 470.—Am. bor.
 dubia, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 310 = *P. Tullia*.

KOELREUTERIA, Laxm. (Sapind.).

minor, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2642.—China.

KOENIGIA, Linn. = **Polygonum**, Tourn. (Polygonac.).

fuergiana, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 191.—Reg. Magell.

KOHLERIA, Regel = **Isoloma**, Decne. (Gesner.).

elegans, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 574 = *I. elegans*.
 patentipilosa, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. i. 386 = *I. patentipilosa*.

KOHLERIANTHUS, Fritsch, in Engl. & Prantl,

Pflanzenf. Nachtr. i. 300 (1897). **GESNERACEAE**.
 Fritschii, *Fritsch, l. c.* (= *Fluckigeria Fritschii*).—Bolivia.

KOKOONA, Thw. (Celastr.).

coriacea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 347.—Perak.
 Scortechinii, *King, l. c.*—Perak.

KOLOBOCHILUS, Lindau, in Anal. Inst. Fis.-

Geog. Costa Rica, viii. (1900) 307. **ACANTHACEAE**.
 blepharorachis, *Lindau, l. c.* 309.—Am. cent.
 leiorachis, *Lindau, l. c.* 308.—Am. cent.

KOLOBOPETALUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi.

(1899) 410. **MENISPERMACEAE**.
 auriculatum, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

KOOMPASSIA, Maing. (Legum.).

parvifolia, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 166.—Perak.

KOORDERSIODENDRON, Engl. ex Koord. in

Meded. 'S Lands Plantent. xix. (1898) 410. **ANACARDIACEAE**.
 celebicum, *Engl. l. c.*—Celebes.

KOPSIA, Blume (Apocyn.).

albiflora, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 395 (= *Calpicarpum albiflorum*).—Malaya.

KORSHINSKIA, Lipsky, in Act. Hort. Petrop.

xviii. (1900) 59. **UMBELLIFERAE**.
 Olga, *Lipsky, l. c.*—As. cent.

KORTHALSELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.

Fr. xliii. (1896) 83. **LORANTHACEAE**.
 amentacea, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 138 (= *Heterixia amentacea*).—N. Zel.
 aoraiensis, *Engl. l. c.* (= *Bifaria aoraiensis*).—Ins. Tahiti.
 complanata, *Engl. l. c.* (= *Bifaria complanata*).—Ins. Sandw.
 cylindrica, *Engl. l. c.* (= *Bifaria cylindrica*).—Ins. Sandw.
 dichotoma, *Engl. l. c.* (= *Bifaria dichotoma*).—N. Caled.
 disticha, *Engl. l. c.* (= *Bifaria disticha*).—Ins. Norfolk.
 divaricata, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliiii. 164.—Ins. Sandw.
 geminata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 138 (= *Heterixia geminata*).—Borneo.
 horneana, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliiii. 164.—Ins. Sandw.
 howensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 138 (= *Bifaria howensis*).—Ins. Dom. How.
 Humblotii, *Engl. l. c.* (= *Bifaria Humblotii*).—Ins. Comor.
 japonica, *Engl. l. c.* (= *Bifaria japonica*).—As. or.
 Lindsayi, *Engl. l. c.* (= *Heterixia Lindsayi*).—N. Zel.
 platycaula, *Engl. l. c.* (= *Bifaria platycaula*).—Ins. Tahiti.
 remyana, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliiii. 86.—Ins. Sandw.
 Richardii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 138 (= *Bifaria Richardii*).—Bourbon.
 rubra, *Engl. l. c.* (= *Bifaria rubra*).—Austral.

KORTHALSELLA :—

salicornioides, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 164.—N. Zel.
taenioides, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 138 (= *Bifaria taenioides*).—Bourbon.
vitiensis, *Engl. l. c.* (= *Bifaria vitiensis*).—Ins. Fiji.
Wawrae, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 164.—Ins. Sandw.

KOSTYCZEWA, Korsh. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. iv.* (1896) 91. **LEGUMINOSAE.**
ternata, *Korsh. l. c.* 92.—Turkestan.

KRASCHENINIKOVIA, Turcz. = **Stellaria**, Linn. (Caryophyll.).
himalaica, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix.* (1898) 40.—Reg. Himal.
japonica, *Korsh. l. c.*—Japon.
raphanorhiza, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 42 = *S. raphanorrhiza*.

KRAMERIA, Loeffl. (Polygal.).

Ishamii, *Mills. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 48.—Ind. occ.

KRAUNHIA, Rafin. = **Wistaria**, Nutt. (Legum.).
macrostachys, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 134 = *W. speciosa*.

KUHNTIA, Linn. (Compos.).

Kuhnia, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 28 = *eupatorioides*.

KUHNISTERA, Lam. = **Petalostemon**, Mich. (Legum.).

Gattingeri, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 121 = *P. Gattingeri*.
microphylla, *A. A. Heller, l. c.* 122 = *P. microphyllum*.
obovata, *A. A. Heller, l. c.* = *P. obovatus*.
oligophylla, *A. A. Heller, l. c.* = *P. candidus*.
pulcherrima, *A. A. Heller, Contr. Herb. Franklin & Marshall Coll.* i. 50 = *P. pulcherrima*.
Reverchoni, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 124 = *P. Reverchoni*.
sabinalis, *A. A. Heller, l. c.* = *P. sabinalis*.
tenuis, *A. A. Heller, l. c.* = *P. tenuis*.

KUNDMANNIA, Scop. (Umbellif.).

insulana, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 122.—Eur.

KUNSTLERIA, Prain, ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. (1897) 109. **LEGUMINOSAE.**

Curtisii, *Prain, l. c.* 110.—Penins. Mal.
Derryi, *Prain, l. c.* 112.—Penins. Mal.
Forbesii, *Prain, l. c.* 111.—Penins. Mal.
Kingii, *Prain, l. c.* 110.—Penins. Mal.
Ridleyi, *Prain, l. c.* 111.—Penins. Mal.

KYLLINGA, Rottb. (Cyperac.).

albiceps, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 106.—Afr. trop.
appendiculata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 338.—Afr. trop.
aurata, *Nees, in Linnaea*, x. 139 = *erecta*.
Buchanani, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 155.—Afr. austr.
consanguinea, *Kunth, Enum. Pl.* ii. 135 = *erecta*.
erecta, *Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 42.—Afr. trop. et austr.
macrocephala, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. 225 = *appendiculata*.
parvula, *C. B. Clarke, ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 103.—Afr. trop.
pellucido-albida, *Boeck. Cyper. Nov.* i. 1.—Urug.

L

LACELLIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 396 (1900) = **Laserpitium**, Linn. (Umbellif.).

cuneata, *Bub. l. c.* 400 = *L. gallicum*.
latifoliata, *Bub. l. c.* 398 = *L. latifolium*.
montana, *Bub. l. c.* 399 = *L. Siler*.
Nestleri, *Bub. l. c.* = *L. Nestleri*.
prutenica, *Bub. l. c.* 401 = *L. prutenicum*.

LACHENALIA, Jacq. (Liliac.).

Bowkeri, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 427.—Afr. austr.
rhodantha, *Baker, l. c.* 430.—Afr. austr.
Youngii, *Baker, l. c.* 433.—Afr. austr.

LACHNAEA, Linn. (Thymel.).

Marlothii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 503.—Afr. austr.
micrantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 451.—Afr. austr.

LACHNAGROSTIS, Trin. (Gramin.).

ciliata, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 193 = *Calamagrostis pilosula*.
Griffithiana, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 263 = *Calamagrostis griffithiana*.
hookeriana, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 192 = *Calamagrostis royleana*.

LACIMARIA, Ind. Kew. ii. (1894) 19, sphalm. = **Lacinnaria**, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).

LACINARIA, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).

cymosa, *Nees, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 21.—Am. bor.
fabellata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 472.—Am. bor.
Halei, *Small, l. c.* 1900, 231.—Am. bor.
lancifolia, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 118.—Am. bor.
laxa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 472.—Am. bor.
microcephala, *Small, l. c.* 473.—Am. bor.
platylepis, *Small, l. c.* 1900, 231.—Am. bor.
Regimontis, *Small, l. c.* 1898, 473.—Am. bor.

LACTUCA, Tourn. (Compos.).

agrestis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 113 = *virosa*.
amorgina, *Heldr. & Orph. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. 188.—Graecia.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 622.—Afr. trop.
brachyrrhyncha, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 578.—Am. cent.
campestris, *Greene, Pittonia*, iv. 37.—Am. bor.
chelonifolia, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 47.—Japon.
Deasyi, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 428.—China.
imbricata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 620.—Afr. trop.
macroseris, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.
Morssii, *Robinson, in Rhodora*, 1899, 12.—Am. bor.
multifida, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 484.—Am. bor.
petrensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 619.—Afr. trop.
sagittata, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 213.—Eur.
spicata, *Hitchcock, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 276 = *alpina*.
sylvatica, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 486.—Am. bor.
watsoniana, *Trel. in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1897, 127.—Ins. Azor.
yemensis, *Deflers, Voy. Yemen*, 160.—Arab.

LAELIA, Lindl. (Orchid.).

domingensis, *Mills. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 32 = *Broughtonia lilacina*.
luciana, *Rolfe, in Orchid Rev.* i. 265 = *longipes*.

LAGASCEA, Cav. (Compos.).

tomentosa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 43.—Mexic.

LAGENARIA, Ser. (Cucurb.).

leucantha, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 43 = *vulgaris*.

LAGENOPHORA, Cass. (Compos.).

Barkeri, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 257.—N. Zel.
nudicaulis, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp.* Magell. iii. v. 98 = *Commerstonii*.
purpurea, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 257.—N. Zel.

LAGERSTROEMIA, Linn. (Lythrac.).

Balansae, *Koehne, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 35.—Cochinch.

LAGGERA, Sch. Bip. (Compos.).

alata, *Sch. Bip. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc.* xxix. (1873) 94.—As. et Afr. trop.
arabica, *Deflers, Voy. Yemen*, 149 (= *Conysa arabica*).—Arab.
aurita, *Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 151.—As. et Afr. trop.

LAGOTIS, J. Gaertn. (Selag.).

crassifolia, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 63.—Reg. Himal.
pharica, *Prain, l. c.* 62.—As. cent.

LAGUNA, Cav. = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).

Schinzii, *Guerke, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. 180 = *H. Schinzii*.

LALDA, Bub. Fl. Pyren. ii. 44 (1900) = **Lapsana**, Linn. (Compos.).

communis, *Bub. l. c.* = *L. communis*.

LAMELLISEPALUM, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 229 (1897); et in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 19. **RHAMNACEAE.**

Hildebrandtii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LAMIUM, Tourn. (Labiata.).

vulgare, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 472 = *L. Galeobdolon*.
Wettsteinii, *Rechinger, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 132.—Eur.

LAMOUREUXIA, H. B. & K. (Scrophul.).

Conzattii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 312.—Mexic.

LANDOLPHIA, Beauv. (Apocyn.).

crassifolia, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 370 = *scandens*.
delagoensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 15.—Afr. austr.
eminiana, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 88.—Afr. trop.
Foreti, *Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxiv. 1541.—Afr. trop.
henriquesiana, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 97 (= *Clitandra henriquesiana*).—Afr. trop.
humilis, *K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 306, nomen.—Afr. trop.
Klainii, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 15.—Afr. trop.
ochracea, *K. Schum. ex Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 86.—Afr. trop.
Perieri, *Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxix. 350.—Madag.
polyantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 452.—Afr. trop.
pyramidata, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 89 = *Aphanostylis pyramidata*.
reticulata, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvii. 87.—Afr. trop.
watsoniana, *Vogtherr, in Koehl. Medizinalpfl.* iii. t. 14.—Afr. trop.
Watsonii, *Vogtherr, l. c.* = *praec.*

LANGLOISIA, Greene, *Pittonia*, iii. (1896) 30.

POLEMONIACEAE.

Matthewsii, *Greene, l. c.*—Am. bor. occ.
Schottii, *Greene, l. c.* (= *Gilia setosissima*).—Calif.
setosissima, *Greene, l. c.* (= *Gilia setosissima*).—Calif.

LANIUM, Lindl. (Orchid.).

subulatum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 46.—Bras.

LANKESTERIA, Lindl. (Acanth.).

batangana, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III B. 311 = *Physacanthus inflatus*.

LANNEA, A. Rich. = **Odina**, Roxb. (Anacard.).

Afzelii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 494.—Afr. trop.
alata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 214.—Afr. trop.
ambacensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 497 (= *Colesiam ambacensis*).—Afr. trop.
amboensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 341, sphalm. = *praec.*
antiscorbutica, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiv. 499 (= *Colesiam antiscorbutica*).—Afr. trop.
asplenifolia, *Engl. l. c.* = *O. asplenifolia*.

LANNEA:—

- Barteri*, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 1. 213 = O. Barteri.
Buettneri, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 494.—Afr. trop.
cinerea, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 1. 214.—Afr. trop.
cuneifoliolata, Engl. l. c. —Afr. trop.
discolor, Engl. l. c. 213 = O. discolor.
edulis, Engl. l. c. = O. edulis.
fruticosa, Engl. l. c. = O. fruticosa.
fulva, Engl. l. c.—Afr. trop.
grandis, Engl. l. c. = O. Wodier.
humilis, Engl. l. c. = O. humilis.
nana, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 496.—Afr. trop.
obcordata, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 1. 214.—Afr. trop.
obovata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 496 = O. obovata.
ornifolia, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 1. 213.—Afr. trop.
rubra, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 496 (= *Colesiam rubra*).—Afr. trop.
rufescens, Engl. l. c. 495.—Afr. trop.
Ruspollii, Engl. l. c. 494.—Afr. trop.
Schimperi, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. 1. 213 = O. Schimperi.
Schweinfurthii, Engl. l. c. 214.—Afr. trop.
Stuhlmannii, Engl. l. c.—Afr. trop.
tomentosa, Engl. l. c. 213.—Afr. trop.
triphylla, Engl. l. c. = O. triphylla.
Welwitschii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 498 = *Colesiam Welwitschii*.

LANTANA, Linn. (Verbenac.).

- Czermakii*, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 164.—Bras.
 Reineckii, *Briq. l. c.* 165.—Bras.
 subtracta, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 828.—Afr. trop.

LAPATHUM, Tourn. = Rumex, Linn. (Polygon.).

- alpestre*, Bub. Fl. Pyren. i. 157 = R. montanus.
montanum, Bub. l. c. 156 = R. alpinus.
thyrsoides, Bub. l. c. 158 = R. thyrsoides.
tingitanum, Bub. l. c. 160 = R. tingitanus.

LAPEYROUSIA, Pourr. (Irid.).

- angustifolia*, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 104.—Afr. austr.
arenicola, *Schlechter, l. c.* 105.—Afr. austr.
edulis, *Schinø, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 49.—Afr. austr.
euryphylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 366.—Afr. trop.
graebneriana, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
macrospatha, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 94.—Afr. austr.
Monteiroi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 355.—Afr. trop.
porphyrosiphon, *Baker, l. c.* 353.—Afr. trop.
serrulata, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 432.—Afr. austr.
speciosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 105.—Afr. austr.

LAPHAMIA, A. Gray (Compos.).

- cernua*, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 122.—Am. bor.
fastigiata, *Brandegee, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 451.—Am. bor.
intricata, *Brandegee, l. c.* 450.—Am. bor.

LAPIEDRA, Lag. (Amaryll.).

- chilensis*, *F. Phil. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 144.—Chili.

LAPORTEA, Gaudich. (Urtic.).

- cordata*, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 290.—N. Guin.
giraladiana, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 801.—China.
grossedentata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 474.—China.
longifolia, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. tt.* 2559–60.—N. Guin.
murrayana, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 189.—Ins. Christmas.
pedunculata, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 290.—N. Guin.
sinensis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 474.—China.

LAPPA, Tourn. = Arctium, Linn. (Compos.).

- Palladini*, *Marcowicz, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 220.—Reg. Caucas.

LAPPAGO, Schreb. = Tragus, Hall. (Gramin.).

- decipiens*, Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin, Ser. II. xiv. 389 = T. racemosus.
occidentalis, Nees, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 97 = T. racemosus.
phleoides, Fig. & De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. 373 = T. racemosus.
setacea, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 9, 12 = Lasiochloa longifolia.
setiformis, Spreng. l. c. 9, 11 = Lasiochloa longifolia.

LAPPULA, Moench = Echinosperrum, Sw. (Borag.).

- americana*, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 294.—Am. bor.
caerulescens, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 328.—Am. bor.
cenchrusoides, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 248.—Am. bor.
collina, Greene, Pittonia, iv. 96.—Am. bor.
coronata, Greene, l. c. 94.—Am. bor.
desertorum, Greene, l. c. 95.—Am. bor.
erecta, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 268.—Am. bor.
Fremontii, Greene, Pittonia, iv. 96 = cenchroides.
heterosperma, Greene, l. c. 94.—Am. bor.
leptophylla, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 329.—Am. bor.
montana, Greene, Pittonia, iv. 96.—Am. bor.
occidentalis, Greene, l. c. 97.—Am. bor.
occidentalis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 329 = E. Redowskii.
patula, Aschers. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl. 573 = E. patulum.
texana, Greene, Pittonia, iv. 94 = E. Redowskii.

LAPSANA, Linn. (Compos.).

- olympica*, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 147.—Graecia.

LARIX, Tourn. (Conif.).

- chinensis*, *Beissner, in Mitth. Dendrol. Ges.* 1896, 68.—China.
Potanini, *Batal. in Mitth. Dendrol. Ges.* 1899, 112.—China.
thibetica, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 262.—China.

LARREA, Cav. (Zygophyll.).

- Ameghinoi*, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 499.—Patag.

LASERPITIUM, Linn. (Umbell.).

- glaucum*, *Post, Fl. Syria*, 376.—Syria.

LASIA, Lour. (Aroid.).

- crassifolia*, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 15.—Borneo.
Hermannii, *Schott, in Bonplandia*, v. 125 = aculeata.

LASIAGROSTIS, Link = Stipa, Linn. (Gramin.).

- capensis*, Nees, Fl. Afr. Austr. 167 = S. dregeana.
elongata, Nees, l. c. 168 = S. dregeana.
splendens, Kunth, Rév. Gram. i. 58 = S. splendens.
tremula, Rupr. Sert. Tiansch. 35 = S. purpurea.

LASIANTHUS, Jack (Rubiace.).

- batangensis*, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 107.—Afr. trop.
glomeruliflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Hartii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 209.—China.
lanceolatus, Urb. Symb. Antill. i. 449 = Moralesii.
macrocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 499.—Afr. trop.
microcalyx, *K. Schum. l. c.* 108.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 496, nomen.—Celebes.
tortistilus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 108.—Afr. trop.
xanthospermus, *K. Schum. l. c.* 499.—Afr. trop.

LASIOCHLOA, Kunth (Gramin.).

- adscendens*, Kunth, Enum. Pl. i. 388 = ciliaris.
alopeuroides, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. 393 = Stiburus alopecuroides.
hirta, Kunth, Rév. Gram. ii. 559 = longifolia.
hispidula, Kunth, Enum. Pl. i. 388 = longifolia.
laevis, Kunth, l. c. = Festuca scabra.

LASIOCHLOA:—

- ovata*, Nees, Fl. Afr. Austr. 431 = obtusifolia.
serrata, Kunth, Enum. Pl. i. 388 = Festuca scabra.
ustuloides, E. Meyer, in Drège, Zwei Pfl. Docum. 92 = utriculosa.

LASIOCORYS, Benth. (Labiata).

- Eenii*, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 469.—Afr. trop.
Pechuelii, *Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. 271 = Leucas Pechuelii.

LASIODISCUS, Hook. f. (Rhamnac.).

- marmoratus*, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 248.—Afr. trop.
usambarensis, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

LASIORRHIZA, Lag. = Leuceria, Lag. (Compos.).

- anthemidifolia*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 161 = L. anthemidifolia.*
fuegina, *Kuntze, l. c. = L. fuegina.*
glomerulata, *Kuntze, l. c. = Chili.*
leontopodioides, *Kuntze, l. c. = Patag.*

LASIOSPORA, Cass. = Scorzonera, Tourn. (Compos.).

- eriolana*, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 147.—Lesbos.

LASIOSTELMA, Benth. (Asclep.).

- Gerrardi*, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1899, 61 (= *Bra-chystelmaria Gerrardi*).—Afr. austr.
somalense, *Schlechter, l. c. = Afr. trop.*

LASIURUS, Boiss. = Elionurus, Humb. & Bonpl. (Gramin.).

- hirsutus*, *Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 146 = E. hirsutus.*

LASSA, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 19 = Pavonia, Cav. (Malvac.).

- argentina*, *Kuntze, l. c. = P. argentina.*
cordifolia, *Kuntze, l. c. = P. Mutisii.*
fruticosa, *Kuntze, l. c. = P. Typhalaea.*
glechomodes, *Kuntze, l. c. = P. glechomoides.*
hastata, *Kuntze, l. c. = P. hastata.*
Hieronymi, *Kuntze, l. c. = P. Hieronymi.*
humifusa, *Kuntze, l. c. = P. humifusa.*
leucantha, *Kuntze, l. c. = P. leucantha.*
macrophylla, *Kuntze, l. c. = P. kraussiana.*
microphylla, *Kuntze, l. c. = P. Dregei.*
paniculata, *Kuntze, l. c. = P. paniculata.*
praemorsa, *Kuntze, l. c. = Hibiscus praemorsa.*
ruderalis, *Kuntze, l. c. = P. ruderalis.*
sagittata, *Kuntze, l. c. = P. sagittata.*
sepium, *Kuntze, l. c. = P. sepium.*
sidifolia, *Kuntze, l. c. = P. sidaefolia.*
spinifex, *Kuntze, l. c. = P. spinifex.*

LASTARRIACA, Ind. Kew. ii. 36, sphalm. = seq.

LASTARRIAEA, Remy (Polygon.).

- linearis*, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 501.—Chili.
stricta, *R. Phil. l. c.* 500.—Chili.

LATAE, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. (1896)

274. LILLIACEAE.
Volkmanni, *R. Phil. l. c.*—Chili.

LATHYRUS, Tourn. (Legum.).

- algericus*, *Gins. in Sitz. Acad. Wien*, cv. i. 337.—Reg. Medit.
brachyodon, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, (1897) 77.—Afr. bor.
colchicus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 261.—Reg. Caucas.
dielsianus, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 417.—China.
digitatus, *Fiori & Paoletti, Fl. Ital.* ii. 105.—Ital.
gracillimus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 198.—Chili.
intricatus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 261.—Afr. trop.
laevigatus, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 346 = Orobus laevigatus.
lanceolatus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 158.—Am. bor.
lancifolius, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 198.—Chili.
laurifolius, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. i. 354, sphalm. = praec.
Linnaei, *Rouy, Fl. Fr. v.* 267 = montanus.
malosanus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 261.—Afr. trop.
miniatus, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 162.—Lesbos.
Mulkak, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 49.—As. cent.

LATHYRUS :—

- occidentalis, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 346.—Austria.
 Sandbergi, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 160.—Am. bor.
 Shaffneri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 258.—Am. bor.
 Sibthorpii, Baker, in *Gard. Chron.* 1890, i. 704 = undulatus.
 venetus, *Rouy, Fl. Fr.* v. 274.—Eur.
 vicioides, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 549 = *L. Clymenum*.

- LATOUCHEA**, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. (1899) 212. **GENTIANACEAE**.
 fokiensis, Franch. *l. c.*—China.

LAURENTIA, Michx. (Campan.).

- hedytidea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 197.—Afr. austr.
 micrantha, *Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 386 = *Lobelia parviflora*.
 secunda, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 188 = erinoides.

LAURUS, Tourn. (Laurac.).

- iteophylla, *Borsi, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 43.—Hort.

- LAUTERBACHIA**, Perkins, in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 330 (1900). **MONIMIACEAE**.
 novoguineensis, Perkins, *l. c.* 331.—N. Guin.

LAVALLEOPSIS, Van Tiegh. ex Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 148 (1897). **OLACACEAE**.

- densivenia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
 grandifolia, Van Tiegh. ex Engl. *l. c.* = *Strombosia grandifolia*.
 klaineana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
 longifolia, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 186.—Afr. trop.

LAVANDULA, Tourn. (Labiata.).

- angustifolia, Bub. *Fl. Pyren.* i. 331 = *L. Spica*.
 canescens, *Defflers, Voy. Yemen*, 186.—Arab.

LAVATERA, Linn. (Malvac.).

- bicolor, *Rouy, in Journ. de Bot.* 1897, 86.—Reg. Medit.

LAVAUXIA, Spach = *Oenothera*, Linn. (Onagrac.).

- primiveris, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 182 = *O. primiveris*.
 Wrightii, Small, *l. c.* 183 = *O. Wrightii*.

LAVOISIERA, DC. (Melast.).

- goyazensis, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 447.—Bras.
 Senaei, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* ii. 3.—Bras.
 suberosa, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 447.—Bras.

LEANDRA, Raddi (Melast.).

- depauperata, *Cogn. ex Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 94.—Bras.

LEBECKIA, Thunb. (Legum.).

- leucoclada, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 143.—Afr. austr.
 Iotonoides, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 obovata, *Schins, in Mém. Herb. Boiss.* no. 1, 126.—Afr. austr.
 schlechteriana, *Schins, in Bull. Herb. Boiss.* v. 865.—Afr. austr.

- LEBIANTHUS**, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. (1898) 378, sphalm. = *Helianthus*, Linn. (Compos.).

LECHEA, Kalm (Cistac.).

- juniperina, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 88.—Am. bor.

LECOMTEA, Pierre, ex Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 570. **OLACACEAE**.

- congoensis, Pierre, *l. c.* (= *Harmandia congoensis*).—Afr. trop.

LECYTHIS, Loeffl. (Myrtac.).

- andinus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 37.—Bolivia.

LEEA, Royen (Ampelid.).

- Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 416.—Perak.
 gigantea, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 432.—N. Guin.

LEEA :—

- heterodoxa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 431.—N. Guin.
 macropus, *Lauterb. & K. Schum. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 130.—N. Brit.
 Micholitzii, *Sander, Cat.* 1899, 20.—N. Guin.
 pauciflora, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 412.—Perak.
 Smithii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 622.—Celebes.

LEERSIA, Soland. (Gramin.).

- capensis, C. Muell. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 345 = hexandra.
 ciliaris, Griff. *Notul.* iii. 2 = hexandra.
 ferox, Fig. & De Not. in *Mem. Acc. Torin. Ser. II.* xiv. 319 = hexandra.
 griffithiana, C. Muell. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 345 = hexandra.
 mauritanica, Salzm. ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. v. 174 = hexandra.
 parviflora, Desv. *Opusc.* 61 = hexandra.

- LEIBERGIA**, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. *Contrib. Nat. Herb.* iii. (1896) 575. **UMBELLIFERAE**.

- orogenioides, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

LEICHTLINIA, Ross, Ic. Pl. Hort. Panorm. 7 (1896).

- AMARYLLIDACEAE**.
 protuberans, *Ross, l. c.* 8. t. 3.—Mexic.

LEIOTHYLAX, Warming, in *Danske Vid. Selsk. Skrift. Ser. VI.* ix. (1899) 145. **PODOSTEMACEAE**.

- quangensis, *Warming, l. c.* 147.—Afr. trop.
 Warmingii, *Warming, l. c.* 150 (= *Dicraea Warmingii*).—Afr. trop.

LELEBA, Rumph. ex Teijsm. & Binn. *Cat. Hort. Bogor.* 20 (1866) = *Bambusa*, Schreb. (Gramin.).

- lineata, Rumph. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 393 = *B. lineata*.
 rumphiana, Kurz, ex Teijsm. & Binn. *Cat. Hort. Bogor.* 20 = *B. lineata*.

LEMBERTIA, Greene, *Fl. Francisc.* (1897) 441. **COMPOSITAE**.

- Congdoni, *Greene, l. c.* (= *Eatonella Congdoni*).—Calif.

LEONOTIS, R. Br. (Labiata.).

- africana, Briq. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 246 = pallida.
 Elliottii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 492.—Afr. trop.
 Melleri, *Baker, l. c.* 491.—Afr. trop.
 Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 465.—Afr. trop.
 rugosa, Benth. in *DC. Prodr.* xii. 535 = velutina.

LEONTICE, Linn. (Berberid.).

- robustum, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 337 = *Caulophyllum robustum*.

LEONTODON, Linn. (Compos.).

- arenarium, Alboff, ex Alboff & Kurtz, in *Rev. Mus. La Plata*, vii. 376 = *Hypochoeris arenaria*.
 asperifolius, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 187.—Eur.
 Autrani, *Chabert, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 360.—Ital.
 Bauhini, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 57 = hirtus.
 calvatus, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 189.—Eur.

LEONTONYX, Cass. (Compos.).

- Pumilio, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 162.—Afr. austr.
 ramosissimus, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. austr.

LEONTOPODIUM, R. Br. (Compos.).

- brachyactis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 420.—Reg. Himal.
 gnaphalioides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 29.—Ecuador.

LEONURUS, Linn. (Labiata.).

- ambigium, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899, 319.—Japon.

LEPECHINIA, Willd. (Labiata.).

- coccinea, Briq. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 292 = *Dekinia coccinea*.

LEPERVENCHEA, Cordem. in *Rev. Gén. de Bot.* xi. (1899) 415. **ORCHIDEAE**.

- tenuifolia, *Cordem. l. c.* 416 (= *Angraecum tenuifolium*).—Bourbon.

LEPIAGALIA, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 340 = seq.**LEPIAGLAIA**, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 334 = seq.**LEPIAGLIA**, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 337 = seq.**LEPIDAGLAIA**, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 334 (1896).**MELIACEAE**.

- Bailloni, *Pierre, l. c.* t. 352 B.—Cochinch.
 Montrouzieri, *Pierre, l. c.* 340 A (= *Aglaia Montrouzieri*).—Cochinch.
 pyramidata, *Pierre, l. c.* t. 334 A (= *Aglaia pyramidata*).—Cochinch.
 tetrapetala, *Pierre, l. c.* 337 A (= *Aglaia tetrapetala*).—Cochinch.

LEPIDAGATHIS, Willd. (Acanth.).

- ampliata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 123.—Afr. trop.
 angustifolia, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
 diversa, *C. B. Clarke, l. c.* 126.—Afr. trop.
 fimbriata, *C. B. Clarke, l. c.* 125.—Afr. trop.
 Fischeri, *C. B. Clarke, l. c.* 123.—Afr. trop.
 justicioides, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 76.—Bolivia.
 lanatoglabra, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 124.—Afr. trop.
 longispala, *C. B. Clarke, l. c.* 125.—Afr. trop.
 perglabra, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
 scabra, *C. B. Clarke, l. c.* 129.—Afr. trop.
 sparsiceps, *C. B. Clarke, l. c.* 124.—Afr. trop.

LEPIDESMIA, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. (1896) 479. **COMPOSITAE**.

- squarrosa, *Klatt, l. c.*—Ind. occ.

LEPIDIUM, Linn. (Crucif.).

- acutidens, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 64.—Am. bor.
 Banksii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 35.—N. Zel.
 Eastwoodiae, *Wootton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 258.—Am. bor.
 ferganense, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* ix. (1898) 417.—Turkestan.
 idahoense, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 312.—Am. bor.
 pubicarpum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 189.—Am. bor.
 ramosissimum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 124.—Am. bor.
 ramosum, *A. Nelson, l. c.* 125.—Am. bor.
 reticulatum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 64.—Am. bor.
 simile, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 312.—Am. bor.
 subalpinum, *Kom. in Trav. Soc. Natural. Pétersb.* xxvi. 108.—Turkestan.
 Thurberi, *Wootton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 259.—Am. bor.

LEPIDOPETALUM, Blume = *Ratonia*, DC. (Sapind.).

- micans, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 423.—N. Guin.

LEPIDOPHYLLUM, Cass. (Compos.).

- teretiusculum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 162.—Am. austr.

LEPIDOSPERMA, Labill. (Cyperac.).

- Brehmeri, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 113.—Afr. austr.
 Dregei, *Boeck. l. c.*—Afr. austr.

LEPIRONIA, Rich. (Cyperac.).

- compressa, *Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 78.—Hongkong.

LEPISANTHES, Blume (Sapind.).

- andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 428.—Ins. Andaman.
 Kunstleri, *King, l. c.* 427.—Perak.
 Scortechinii, *King, l. c.* 429.—Perak.

LEPISTEMON, Blume (Convolv.).

- intermedius, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxviii. 31.—Formosa.

LEPTACTINA, Hook. f. (Rubiace.).

- delagoensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 60.—Afr. austr.
 euclinioides, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 431.—Afr. trop.

LEPTACTINA :—

formosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 431.—Afr. trop.
 lanceolata, *K. Schum. l. c.* 433.—Afr. trop.
 latifolia, *K. Schum. l. c.* 432.—Afr. trop.
 liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i.* 27.—Afr. trop.
 oxyloba, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 488.—Afr. trop.

LEPTADENIA, R. Br. (Asclep.).

ephedriformis, *Deflers, Voy. Yemen*, 166.—Arab.

LEPTILON, Rafin. = **Erigeron**, Linn. (Compos.).

canadense, *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 391 = *E. canadensis*.

LEPTOCARPUS, R. Br. (Restiac.).

brachiatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 9.—Afr. austr.
 cymosus, *Mast. l. c.* 10.—Afr. austr.
 divaricatus, *Mast. l. c.* 9.—Afr. austr.
 festucaceus, *Mast. l. c.* 8.—Afr. austr.
 fruticosus, *Mast. l. c.* 9.—Afr. austr.
 rigidus, *Mast. l. c.* 10.—Afr. austr.
 rigoratus, *Mast. l. c.* 9.—Afr. austr.

LEPTOCARYDIUM, Hochst. (Gramin.).

vulpiastrum, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 648.—Afr. austr.

LEPTOCHLOA, Beauv. (Gramin.).

aquatica, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 26.—Mexic.
 bipinnata, *Hochst. in Flora*, xxxviii. 422 = *Eragrostis cynosuroides*.
 chinensis, *Nees, in Syll. Ratisb.* i. 4.—Ind. or.
 falcata, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iii. 386 = *Pogonarthria falcata*.
 filiformis, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 580.—Ind. or.
 filiformis, *Beauv. Agrost.* 71 = *cynosuroides*.
 grandiglumis, *Nees, Fl. Austr.* 252 = *Crossotropis grandiglumis*.
 Halei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 27 = *Diplachne Halei*.
 Marlothii, *Hack. in Engl. Jahrb.* xi. 404 = *Pogonarthria falcata*.
 monostachya, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 580 = *Chloris monostachya*.
 Neesii, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. 108 = *poly-stachya*.
 panicoides, *Wight, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 62 = *Arundinella leptochloa*.
 plumosa, *Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 557 = *Leptocarydium vulpiastrum*.
 spicata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* vii. 229 = *Diplachne simplex*.
 wightiana, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 209 = *Myriostachya wightiana*.

LEPTODERMIS, Wall. (Rubiace.).

mongolica, *Buhse, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. IV. 126, nomen.—Mongol.
 Potanini, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 319.—China.

LEPTOLEPIS, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 31. **CYPERACEAE**.

tibetica, *Boeck. l. c.*—Tibet.

LEPTONYCHIA, Turcz. (Stercul.).

chrysocarpa, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 242.—Afr. trop.
 echinocarpa, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 lasiogyne, *K. Schum. l. c.* 241.—Afr. trop.
 macrantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 multiflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 pallida, *K. Schum. l. c.* 242.—Afr. trop.
 subtomentosa, *K. Schum. l. c.* 241.—Afr. trop.
 usambarica, *Engl. in Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.

LEPTORCHIS, Thou. (Orchid.).

vevillifera, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 300 = *Liparis vexillifera*.

LEPTORHABDOS, Schrenk (Scrophul.).

glutinosa, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* v. 797.—Persia.

LEPTOSPERMUM, Forst. (Myrtac.).

Sinclairii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 158.—N. Zel.

LEPTOSTACHYA, Nees (Acanth.).

virens, *Nees, in DC. Prod.* xi. 378 = *Rhinacanthus communis*.

LEPTOSYNE, DC. (Compos.).

insularis, *Brandege, in Erythraea*, vii. 5.—Mexic.

LEPTOTAENIA, Nutt. = **Ferula**, Tourn. (Umbellif.).

foliosa, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 198.—Am. bor.
 humilis, *Coult. & Rose, l. c.* 200.—Am. bor.
 Leibergii, *Coult. & Rose, l. c.* 202.—Am. bor.
 salmoniflora, *Coult. & Rose, l. c.* 201 (= *Peucedanum salmoniflorum*).—Am. bor.

LEPTURUS, R. Br. (Gramin.).

aciculatus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 357 = *repens*.
 fasciculatus, *Trin. Fund. Agrost.* 123 = *Rottboellia compressa*.

LESPEDEZA, Michx. (Legum.).

diversifolia, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2625.—China.

LESQUERELLA, Wats. (Crucif.).

aurea, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 260.—Am. bor.
 condensata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 288.—Am. bor.
 curvipes, *A. Nelson, l. c.* 1898, 205.—Am. bor.
 ovalifolia, *Rydb. in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 137.—Am. bor.
 prostrata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 124.—Am. bor.
 rosulata, *A. Nelson, l. c.* 1898, 205.—Am. bor.
 spatulata, *Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 486.—Am. bor.
 valida, *Greene, Pittonia*, iv. 68.—Am. bor.

LESSERTIA, DC. (Legum.).

Schlechteri, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. 458.—Afr. austr.
 stipulata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 430.—Afr. trop.

LESSINGIA, Cham. (Compos.).

hololeuca, *Greene, Fl. Francisc.* 377.—Calif.
 parvula, *Greene, l. c.* 376.—Calif.
 pectinata, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 548.—Am. bor.

LEUCADENDRON, Berg. (Proteac.).

aemulum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 113.—Afr. austr.
 schinzianum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 sericocephalum, *Schlechter, l. c.* 114.—Afr. austr.

LEUCADENDRON, Linn. = **Protea**, Linn. (Proteac.).

angolense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 917 = *P. angolensis*.
 conchiforme, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 364 = *P. conchiforme*.
 leucoblepharum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 919.—Afr. trop.
 micans, *Hiern, l. c.* 918 = *P. micans*.
 paludosum, *Hiern, l. c.* 919 = *P. paludosa*.
 petiolaris, *Hiern, l. c.* 920 = *P. petiolaris*.
 Welwitschii, *Hiern, l. c.* 918 = *P. Welwitschii*.
 xanthoconus, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 364 = *P. xanthoconus*.

LEUCAENA, Benth. (Legum.).

brachycarpa, *Urb. Symb. Antill.* ii. 265.—Mexic.
 glabrata, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 140.—Mexic.
 laxifolia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 266.—Mexic.
 microcarpa, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 141.—Mexic.
 stenocarpa, *Urb. Symb. Antill.* ii. 266.—Mexic.
 trichandra, *Urb. l. c.* 267 = *diversifolia*.

LEUCAS, Burm. (Labiata.).

abyssinica, *Briq. ex Guerke, in Engl. Jahrb.* xxii. 136 = *Lasiocorys abyssinica*.
 argyrophylla, *Briq. l. c.* 135 = *Lasiocorys argyrophylla*.
 Bakeri, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 877.—Afr. trop.
 Brownii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 251 = *indica*.
 Carsonii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 487.—Afr. trop.

LEUCAS :—

cephalantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 475.—Afr. trop.
 concinna, *Baker, l. c.* 481.—Afr. trop.
 cuneifolia, *Baker, l. c.* 476.—Afr. trop.
 decurvata, *Baker, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 876.—Afr. trop.
 Descampsii, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 59.—Afr. trop.
 Eenii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 878 = *Lasiocorys Eenii*.
 Elliottii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 477.—Afr. trop.
 fasciculata, *Baker, l. c.* 487.—Afr. trop.
 franchetiana, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxii. 135 = *Lasiocorys argyrophylla*.
 indica, *Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1875, 95 = *soma-liensis*.
 Junodii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 109.—Afr. trop.
 kondowensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 489.—Afr. trop.
 lamioides, *Baker, l. c.* 484.—Afr. trop.
 lanata, *Baker, l. c.* 481.—Afr. trop.
 leucotricha, *Baker, l. c.* 486.—Afr. trop.
 Mackinderi, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 206.—Afr. trop.
 masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 162.—Afr. trop.
 megasphaera, *Baker, l. c.* 163.—Afr. trop.
 menthaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 475.—Afr. trop.
 microscypha, *Baker, l. c.* 477.—Afr. trop.
 mollis, *Baker, l. c.* 489.—Afr. trop.
 myriantha, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 163.—Afr. trop.
 nepetoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 483.—Afr. trop.
 paucicrenata, *Vatke, in Linnaea*, xliii. 98 = *neufuseana*.
 Pechuelii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 477.—Afr. trop.
 Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 464.—Afr. trop.
 royleoides, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxii. 136 = *Lasiocorys arabica*.
 shirensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 483.—Afr. trop.
 stachydiformis, *Briq. ex Guerke, in Engl. Jahrb.* xxii. 136 = *Lasiocorys stachydiformis*.
 stricta, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 484.—Afr. trop.
 velutina, *C. H. Wright, ex Baker, l. c.* 488.—Afr. trop.
 venulosa, *Baker, l. c.* 477.—Afr. trop.
 Whytei, *Baker, l. c.* 489.—Afr. trop.

LEUCELENE, Greene, *Pittonia*, iii. (1896) 147. **COMPOSITAE**.

alpina, *Greene, Fl. Francisc.* 384 = *Aster scopulorum*.
 alsinoides, *Greene, Pittonia*, iv. 99.—Am. bor.
 arenosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 8.—Am. bor.
 ericoides, *Greene, Pittonia*, iii. 148 (= *Aploppus ericoides*).—Calif.

LEUCERIA, Lag. (Compos.).

glomerulata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 378.—Reg. Argent.
 gracilis, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 375.—Fuegia.
 Hoffmanni, *P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 116.—Reg. Magell.
 lanata, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 374.—Fuegia.
 lanigera, *O. Hoffm. ex P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 115.—Reg. Magell.
 leontopodioides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 378.—Patag.
 patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 538.—Patag.
 Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 372.—Peruv.

LEUCOBARLERIA, Lindau = **Neuracanthus**, Nees (Acanth.).

nivea, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 77 = *N. Lindau*.
 polyacantha, *Lindau, l. c.* = *N. polyacanthus*.
 Robecchii, *Lindau, l. c.* 78 = *N. Robecchii*.

LEUCOCORYNE, Lindl. (Liliac.).

appendiculata, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 270.—Chili.
 connivens, *R. Phil. l. c.* 273.—Chili.

LEUCOCORYNE :—

coquimbensis, *F. Phil. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 273.—Chili.
foetida, *R. Phil. l. c.* 272.—Chili.
incrassata, *R. Phil. l. c.*—Chili.
montana, *R. Phil. l. c.* 269.—Chili.
oxypetala, *R. Phil. l. c.* 270.—Chili.
pauciflora, *R. Phil. l. c.* 269.—Chili.
violascens, *R. Phil. l. c.* 271.—Chili.

LEUCONOTIS, Jack (Apocyn.).

crassifolia, *Boerl. in Bull. Inst. Buitens. v.* 9.—Borneo.
gigantea, *Boerl. l. c.* 8.—Borneo.
intermedia, *Boerl. l. c.* 7.—Borneo.
subavenis, *Boerl. l. c.* 9.—Borneo.

LEUCOPHRYS, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl. ii.* 193

(1899). **GRAMINEAE.**
mesocoma, *Rendle, l. c.* 194 (= *Panicum mesocomum*).
—Afr. trop.

LEUCOPOGON, R. Br. (Euphorbiac.).

Fletcheri, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxii. 152.—Austral.
papanuan, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1899, 104.—N. Guin.

LEUCOSPERMUM, R. Br. (Proteac.).

glaberrimum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 111.—Afr. austr.
lemmerzianum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
stenanthum, *Schlechter, l. c.* 112.—Afr. austr.

LEUCOSPHERA, Gilg, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 152 (1897). **AMARANTACEAE.**

Bainesii, *Gilg, l. c.* 153.—Afr. austr.
Pfeilii, *Gilg, l. c.*; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 328.—Afr. austr.

LEUCOSYRIS, Greene, *Fl. Francisc.* 384 (1897).

COMPOSITAE.
carnosa, *Greene, l. c.* (= *Aster carnosus*).—Am. bor. occ.
spinosa, *Greene, Pittonia*, iii. 244 (= *Aster spinosus*).—Am. bor.; Mexic.

LEUCOTHOË, D. Don (Ericac.).

elongata, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 284.—Am. bor.

LEUCOTODON, Auct. in *Just. Jahresb.* xxv. II. (1900)

482, sphalm. = *Leontodon*, Linn. (Compos.).

LEVISTICUM, Riv. (Umbell.).

caucasicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 271.—Reg. Caucas.
persicum, *Freyn & Bornum, in Bull. Herb. Boiss.* v. 619.—Persia.

LEWISIA, Robinson, in *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 1

266 (1897) = *Calandrinia*, H. B. & K. (Portul.).
columbiana, Robinson, l. c. 269 = *C. columbiana*.
Cotyledon, Robinson, l. c. 268 = *C. Cotyledon*.
Howellii, Robinson, l. c. = *C. Howellii*.
leana, Robinson, l. c. 269 = *C. leana*.
nevadensis, Robinson, l. c. 268 = *C. nevadensis*.
oppositifolia, Robinson, l. c. = *C. oppositifolia*.
pygmaea, Robinson, l. c. = *C. pygmaea*, *A. Gray*.
triphylla, Robinson, l. c. 269 = *Claytonia triphylla*.
Tweedyi, Robinson, l. c. 268 = *C. Tweedyi*.

LEYCESTERIA, Wall. (Caprifol.).

sinensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2633.—China.

LIABUM, Adans. (Compos.).

coriaceum, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 58.—Ecuador.
cusalaguense, *Hieron. l. c.* 55.—Ecuador.
fulvotomentosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 163.—Bolivia.
glandulosum, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
Hallii, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 57.—Ecuador.
hirtum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 163.—Bolivia.
nigropilosum, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 59.—Ecuador.
nonoense, *Hieron. l. c.*—Ecuador.
pallatangense, *Hieron. l. c.* 60.—Ecuador.
pichinchense, *Hieron. l. c.* 56.—Ecuador.
pinnatipartitum, *Hieron. l. c.* 62.—Ecuador.
pinnulosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 163.—Bolivia.

VOL. III.

LIABUM :—

Pringlei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 49.—Mexic.
Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 61.—Ecuador.

LIATRIS, Schreb. (Compos.).

flabellata, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvi. I. 378 (= *Lacinaria flabellata*).—Am. bor.
laxa, *K. Schum. l. c.* (= *Lacinaria laxa*).—Am. bor.
microcephala, *K. Schum. l. c.* (= *Lacinaria microcephala*).—Am. bor.
Regimontis, *K. Schum. l. c.* (= *Lacinaria Regimontis*).—Am. bor.

LIBADION, Bub. *Fl. Pyren.* i. 539 (1897) = *Erythraea*,

Renealm. (Gentian.).
maritimum, Bub. l. c. = *E. maritima*.
spiciferum, Bub. l. c. 542 = *E. spicata*.
variabile, Bub. l. c. 540 = *E. Centaurium*.

LICANIA, Aubl. (Rosac.).

araneosa, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 428.—Bras.
Ulei, *Taub. l. c.*—Bras.

LICUALA, Thunb. (Palm.).

Lauterbachii, *Damm. & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 199.—N. Guin.
montana, *Damm. & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.* 200.—N. Guin.
polyschista, *K. Schum. & Lauterb. l. c.* 199.—N. Guin.
robusta, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

LIDBECKIA, Berg. (Compos.).

integrifolia, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 840.—Afr. austr.

LIGHTFOOTIA, L'Hérit. (Campan.).

capitata, *Baker, in Kew Bull.* 1893, 158.—Afr. trop.
corymbosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 188.—Afr. austr.
leptophylla, *C. H. Wright, in Hook. Ic. Pl.* t. 2659.—Afr. trop.

LIGUSTICUM, Linn. (Umbell.).

albomarginatum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 212 = simplex.
apiodorum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 132.—Am. bor.
californicum, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.
Cusickii, *Coult. & Rose, l. c.* 138.—Am. bor.
decipiens, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 205 (= *Angelica decipiens*).—N. Zel.
dissectum, *T. Kirk, l. c.* 202.—N. Zel.
flabellatum, *T. Kirk, l. c.* 205.—N. Zel.
Goldmani, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 146.—Mexic.
Leibergeri, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 134.—Am. bor.
Nelsoni, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* i. 147.—Mexic.
oreganum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 138.—Am. bor.
patulum, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 203.—N. Zel.
politum, *T. Kirk, l. c.* 202.—N. Zel.
Pringlei, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 138.—Am. bor.
purpureum, *Coult. & Rose, l. c.* 137.—Am. bor.
simulans, *Coult. & Rose, l. c.* 135.—Am. bor.

LIGUSTRUM, Tourn. (Oleac.).

delavayanum, *Hariot, in Journ. de Bot.* 1900, 172.—China.
myrianthum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 533.—China.
patulum, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 156.—Korea.

LILAEOPSIS, Greene = *Crantzia*, Nutt. (Umbell.).

carolinensis, *Coult. & Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 48.—Am. bor.
chinensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 114 = *C. lineata*.
occidentalis, *Coult. & Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 48.—Am. bor.
schaffneriana, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.; Chili.

LILIUM, Tourn. (Liliac.).

apertum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 220.—China.
Bakerii, *Purdy, in Erythea*, v. 104.—Am. bor.
Brownii, *Poit. in Rev. Hort. Sér. II.* ii. (1844) 496.—China.
Henrici, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 220.—China.

LILIUM :—

lophophorum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 221 (= *Fritillaria lophophora*).—China.
Masseyi, *Hyams, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 431.—Am. bor.
montanum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 6.—Am. bor.
occidentalis, *Purdy, in Erythea*, v. 103.—Am. bor.
odorum, *Planch. Fl. des Serres, Sér. I.* ix. 53. tt. 876-7 = Brownii.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 243.—China.
rubellum, *Baker, in Gard. Chron.* 1898, II. 321.—Japon.
villosum, *Cavara, in Malpighia*, xii. 445.—Italia.

LILLOA, Speg. *Pl. Nov. Argent.* iii. (1897) 10. **ARACEAE.**

Puki, *Speg. l. c.* 11.—Reg. Argent.

LIMACIA, Lour. (Menisperm.).

funifera, *Th. Dur. & Schins, Consp. Fl. Afr.* i. II. 47 (= *Hysserpa funifera*).—Afr. trop.
monilifera, *Burkill, in Hook. Ic. Pl.* t. 2585.—Ins. Solomon.

LIMACIOPSIS, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899)

414. **MENISPERMACEAE.**
loangensis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LIMEUM, Linn. (Ficoid.).

glaberrimum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 108 (non Pax).—Afr. austr.

LIMNANTHES, R. Br. (Geran.).

floccosa, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 108.—Am. bor.
gracilis, *Howell, l. c.*—Am. bor.
Macounii, *Trel. in Mem. Bost. Soc. Nat. Hist.* iv. 85.—Am. bor.
pumila, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 108.—Am. bor.

LIMNOCHARIS, Humb. & Bonpl. (Alismac.).

mattogrossensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 324.—Bras.

LIMNORCHIS, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i.

(1900) 104. **ORCHIDEAE.**
dilatatifomis, *Rydb. l. c.* 105 (= *Habenaria dilatatifomis*).—Am. bor.
hyperborea, *Rydb. l. c.* 104 (= *Habenaria hyperborea*).—Eur.; Am. bor.
leucostachys, *Rydb. l. c.* 106 (= *Habenaria leucostachys*).—Am. bor. occ.
stricta, *Rydb. l. c.* 105 (= *Platanthera stricta*).—Am. bor.

LIMODORUM, Tourn. (Orchid.).

articulatum, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 399 = *Lissochilus purpuratus*.
bidens, *Afzel. ex Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1800, 248; *Pers. Syn.* ii. 521 = *Listrostachys bidens*.
cristatum, *Afzel. ex Sw. l. c.*; et *Pers. l. c.* = *Lissochilus purpuratus*.
cucullatum, *Afzel. ex Sw. l. c.*; et *Pers. l. c.* = *Lissochilus arenarius*.
emarginatum, *Afzel. ex Sw. l. c.*; et *Pers. l. c.* = *Angraecum imbricatum*.
imbricatum, *Sw. in Schrad. Neues Journ.* i. (1805) 87 = *Mystacidium distichum*.
multiflorum, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 23 (= *Calopogon multiflorus*).—Am. bor.
pallidum, *Mohr, l. c.* (= *Calopogon pallidus*).—Am. bor.

LIMONIA, Linn. (Rutac.).

gabunensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 190.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Preussii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LIMONIUM, Tourn. = *Statice*, Linn. (Plumbag.).

angustatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 488.—Am. bor.
californicum, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 6 = *S. Limonium*.
limbatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 317.—Am. bor.
Nashii, *Small, l. c.* 1897, 491.—Am. bor.

LIMOSELLA, Linn. (Scrophul.).

longiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 235.—Afr. austr.
major, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 122.—Afr. austr.

P

LINARIA, Tourn. (Scrophul.).

- aurata, *Coincy*, in *Journ. de Bot.* 1899, 167.—Hispan.
decipiens, *Battand.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 322.—
Afr. bor.
dolopica, *Form.* in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897,
74.—Turcia.
fragilis, *Bub.* Fl. Pyren. i. 315 = multicaulis.
intricata, *Coincy*, in *Journ. de Bot.* 1900, 109.—Hispan.
Jattae, *Palansa*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* 1899, 131.
—Italia.
joppensis, *Bornm.* in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*,
1898, 612.—Oriens.
minuscula, *Merino*, in *Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* xxviii.
20.—Eur.
odoratissima, *Bub.* Fl. Pyren. i. 323.—Hispan.
olympica, *Förm.* in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv.
315.—Eur.
paradoxa, *Murb.* in *Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd. II.
no. 7 (1898) 19.—Afr. bor.
Pellicieri, *Bub.* Fl. Pyren. i. 313 = pelisseriana.
proxima, *Cointy*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 829.—Hispan.
pseudoviscosa, *Murb.* in *Act. Univ. Lund.* xxxiv. Afd.
II. no. 7 (1898) 21.—Afr. bor.
ruthenica, *Blonski*, in *Wstschschiat*, 1895, 347.—Eur.
segetum, *Bub.* Fl. Pyren. i. 312 = spuria.
thibetica, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 11.—China.
tuzjarensis, *Coincy*, in *Journ. de Bot.* 1897, 46.—
Hispan.

LINDAUEA, Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 411.
ACANTHACEAE.
speciosa, *Rendle*, l. c. 412.—Afr. trop.**LINDERA**, Adans. = **Myrrhis**, Scop. (Umbell.).
odorata, *Aschers.* in *Aschers. & Graebn.* Fl. N. O.
Deutsch. Flachl. 536 = M. odorata.

- LINDERA**, Thunb. (Laurac.).
bibracteata, *Boerl.* *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 146 (= *Daphnidium bibracteatum*).—Java.
caudata, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 352.—China.
cuspidata, *Boerl.* *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Aperula cuspidata*).—Celebes.
densiflora, *Boerl.* l. c. (= *Aperula densiflora*).—Sumatra.
erythrocarpa, *Makino*, in *Bot. Mag. Tokyo*, 1897,
219.—Japan.
gemmiflora, *Boerl.* *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Daphnidium gemmiflorum*).—Java.
grandis, *Boerl.* l. c. 146 (= *Polyadenia grandifolia*).
—Java.
insignis, *Boerl.* l. c. 147 (= *Aperula insignis*).—Sumatra.
lanceolata, *Boerl.* l. c. (= *Aperula lanceolata*).—Java.
lucida, *Boerl.* l. c. (= *Polyadenia lucida*).—Arch.
Mal.
macrophylla, *Boerl.* l. c. (= *Aperula macrophylla*).—
Java.
pedunculata, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 350.—China.
pipericarpa, *Boerl.* *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Polyadenia pipericarpa*).—Sumatra.
polyantha, *Boerl.* l. c. (= *Polyadenia polyantha*).—Java.
puberula, *Boerl.* l. c. (= *Polyadenia puberula*).—Java.
Rosthormii, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 350.—China.
salicifolia, *Boerl.* *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 147 (= *Polyadenia salicifolia*).—Java.
Thunbergii, *Makino*, in *Bot. Mag. Tokyo*, 1900, 184 =
erythrocarpa.

LINDERNIA, All. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).
abyssinica, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 503.—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 27.—Afr.
trop.
montana, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 764.—Afr. trop.
Newtonii, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 503.—Afr. trop.
senegalensis, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 763 = V. senegalensis.
uvens, *Hiern*, l. c.—Afr. trop.**LINDMANIA**, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 535
(1896). **BROMELIACEAE.**
albicans, *Mez*, l. c. 537 (= *Cottendorfia albicans*).—Reg.
Argent.
guyanensis, *Mez*, l. c. (= *C. guianensis*).—Guiana.
neogranatensis, *Mez*, l. c. 538 (= *C. neogranatensis*).—
N. Granat.
Pearcei, *Mez*, l. c. 537 (= *C. Pearcei*).—Am. austr. trop.
weddeliana, *Mez*, l. c. 538 (= *C. weddeliana*).—Bolivia.**LINGOUM**, Adans. = **Pterocarpus**, Linn. (Legum.).
cambodianum, *Pierre*, Fl. Cochinch. t. 383 B = P.
cambodianus.**LINGOUM**—

- dalbergioides*, *Pierre*, Fl. Cochinch. sub t. 383 = P.
dalbergioides.
glaucinum, *Pierre*, l. c. = P. glaucinum.
gracile, *Pierre*, l. c. = P. gracilis.
oblongum, *Pierre*, l. c. = P. oblongum.
parvifolium, *Pierre*, l. c. = P. parvifolius.
pedatum, *Pierre*, l. c. = P. pedatum.

LINNAEA, Gronov. (Caprifol.).

- adenotricha*, *Graebn.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 144 = *Abelia*
adenotricha.
angustifolia, *Graebn.* l. c. 135 = *Abelia angustifolia*.
aschersoniana, *Graebn.* l. c. 139 (sphalm. *aschersoniana*).
—China.
Buchwaldii, *Graebn.* l. c. 133.—Japan.
corymbosa, *Graebn.* l. c. 136 = *Abelia corymbosa*.
Dielsii, *Graebn.* l. c. 140.—China.
engleriana, *Graebn.* l. c. 132.—China.
gymnocarpa, *Graebn.* & *Buchw. ex Graebn.* l. c. 134.—
Japan.
koehneana, *Graebn.* l. c. 132.—China.
macrotera, *Graebn.* & *Buchw. ex Graebn.* l. c. 131.—
China.
onkocarpa, *Graebn.* l. c. 140.—China.
parvifolia, *Graebn.* l. c. 129 = *Abelia parvifolia*.
Schumannii, *Graebn.* l. c. 130.—China.
serrata, *Graebn.* l. c. 133 = *Abelia uniflora*.
spathulata, *Graebn.* l. c. 142 = *Abelia spathulata*.
tereticalyx, *Graebn.* & *Buchw. ex Graebn.* l. c. 130.—
China.
umbellata, *Graebn.* & *Buchw. ex Graebn.* l. c. 143.—
China.
Zanderi, *Graebn.* l. c. 142.—China.

LINNAEOPSIS, *Engl.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. (1900)
483. **GESNERACEAE.**
heckmanniana, *Engl.* l. c.—Afr. trop.**LINOCIERA**, Sw. (Oleac.).

- ferruginea, *Gilg.* ex *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx.
35.—Bras.
Glaziovii, *Gilg.* l. c.—Bras.
pallida, *K. Schum.* & *Lauterb.* Fl. *Deutsch. Südsee*,
497.—N. Guin.

LINOPHYLLUM, *Bub.* Fl. Pyren. i. 125 (1897) =
Thesium, Linn. (Santal.).
alpinum, *Bub.* l. c. = T. alpinum.
Clusii, *Bub.* l. c. 127 = T. intermedium.
divaricatum, *Bub.* l. c. = T. divaricatum.
humifusum, *Bub.* l. c. = T. humifusum.
pratense, *Bub.* l. c. 126 = T. pratense.**LINOSPADIX**, Becc. (Palm.).

- hellwigiana, *Warb.* ex *K. Schum.* & *Lauterb.* Fl.
Deutsch. Südsee, 206.—N. Guin.
petrickiana, *Hort. Sand.* in *Gard. Chron.* 1898, II. 298,
fig. 87.—Hab. ?

LINOSTYLIS, Fenzl = **Dyschoriste**, Nees (Acanth.).
fasciculiflora, *Fenzl*, ex *Sond.* in *Linnaea*, xxiii. 95 = D.
Perrottetii.
ovata, *Sond.* l. c. 94 = D. depressa.**LINUM**, Tourn. (Linac.).

- australe, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898,
627.—Am. bor.
bithynicum, *Aznav.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 167.—
Turcia.
medium, *Britton*, ex *Britton & A. Brown*, Fl. N. U. S.
ii. 349.—Am. bor.
Petryi, *Beyer*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xl. p. xci.—Eur.
puberulum, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*,
1896, 627.—Am. bor.
vernale, *Wootton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 452.—
Am. bor.
Vernalii, *K. Schum.* in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 354,
sphalm. = praec.

LIPARIS, Rich. (Orchid.).

- araneola, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 265.—
Borneo.
assamica, *King & Pantl.* in *Ann. Bot. Gard. Calc.*
viii. 36.—Ind. or.
comosa, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 229.—
Penins. Mal.
furcata, *Ridley*, l. c. 226 = *Microstylis furcata*.
hemipilioides, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 341.—
Afr. trop.

LIPARIS—

- Henryi*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1896, 193.—Formosa.
Maingayi, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 226 =
Microstylis Maingayi.
morobulana, *K. Schum.* in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 337,
sphalm. = seq.
mowbulana, *F. M. Bailey*, in *Queensl. Agric. Journ.*
ii. 197.—Austral.
Nugentae, *F. M. Bailey*, in *Bot. Bull. Dept. Agric.*
Queensl. xiv. 11.—Austral.
odorata, *Lindl.* Gen. & Sp. Orch. 26 = nervosa.
paradoxa, *Reichb. f.* in *Walp. Ann.* vi. 218 = nervosa.
parvula, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 226 =
Microstylis parvula.
pauciflora, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1896, 193.—China.
pectinifera, *Ridley*, in *Journ. Bot.* 1898, 210.—Malaya.
pothoides, *Lehm. & Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* xxvi.
478.—N. Granat.
Prazeri, *King & Pantl.* in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi.
582.—Burma.
pygmaea, *King & Pantl.* in *Ann. Bot. Gard. Calc.*
viii. 34.—Reg. Himal.
rufina, *Reichb. f.* ex *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii.
19.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *Rolfe*, l. c. 20.—Afr. trop.
transtillata, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 225.—
Penins. Mal.
tridens, *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 162.—Afr. trop.

LIPPIA, *Houst.* (Verben.).

- affinis, *Briq.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 339 (non Schau.).
—Urug.
Burtonii, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 281.—Afr.
trop.
caespitosa, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 106.—
Bolivia.
crenata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 251.—Reg. Argent.
floribunda, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1900, 237 (non Phil.).—N. Granat.
geisseana, *Solered.* in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 624 (= *Buddleia geisseana*).—Chili.
globiflora, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 251 = asperifolia.
hypoleia, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1900, 236.—Mexic.
imbricata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 252.—Bolivia.
juncea, *Schau.* in DC. *Prodr.* xi. 573 = *Diostea juncea*.
Jurgenseni, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1900, 239.—Mexic.
lippioides, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 106 =
Lantana Chamissonis.
longepedunculata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 253.—
Parag.
Morongii, *Kuntze*, l. c.—Parag.
myriocephaloides, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard.*
Bot. Genève, 1900, 235.—Mexic.
plicata, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 281.—Afr. trop.
Pringlei, *Briq.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 340.—Mexic.
Radula, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 279.—Afr. trop.
suffruticosa, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 253.—Reg. Argent.
triphylla, *Kuntze*, l. c. = citriodora.
Vauthieri, *Briq.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1900, 234.—Bras.
venezuelana, *Briq.* l. c. 238.—Venez.
villafloredana, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 253.—Parag.

LIQUIDAMBAR, Linn. (Hamamel.).

- Rosthormii*, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 380.—China.

LIRAYEA, *Pierre*, in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii.
(1896) 341. **ACANTHACEAE.**
floribunda, *Pierre*, l. c. 342.—Afr. trop.**LISIANTHUS**, Linn. (Gentian.).

- pulcherrimus, *Donn. Sm.* in *Pittier, Prim. Fl. Costaric.*
ii. 166 (non Mart.).—Am. cent.

LISSOCHILUS, R. Br. (Orchid.).

- amazonicus*, *Rodr.* *Orch. Nov.* i. 89 = *Eulophia Wood-*
fordii.
Bouliawongo, *Reichb. f.* in *Flora*, 1865, 188.—Afr. trop.
candidus, *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 167.—Afr. trop.
Carsoni, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 90.—Afr. trop.
congoensis, *Rolfe*, l. c. 88.—Afr. trop.
elatus, *Rolfe*, l. c. 87.—Afr. trop.
Erythraeae, *Rolfe*, l. c. 91.—Afr. trop.
Holubii, *Rolfe*, l. c. 96.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe*, l. c. 97.—Afr. trop.
Kirkii, *Rolfe*, l. c. 92.—Afr. trop.
Kraenzlinii, *Rolfe*, l. c. 97.—Afr. trop.
latus, *Rolfe*, l. c. 79.—Afr. trop.

LISSOCHILUS—

- Leopoldi, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 61.—Afr. trop.
 Milsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 79.—Afr. trop.
 Monteiroy, *Rolfe, l. c.* 83.—Afr. trop.
 Nyasae, *Rolfe, l. c.* 86.—Afr. trop.
 Rendlei, *Rolfe, l. c.* 96.—Afr. trop.
 Smithii, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
 Thomsoni, *Rolfe, l. c.* 97.—Afr. trop.
 verrucosus, *Rolfe, l. c.* 76.—Afr. trop.
 Volkensii, *Rolfe, l. c.* 94.—Afr. trop.
 Wilsoni, *Rolfe, l. c.* 79.—Afr. trop.

LISTERA, R. Br. (Orchid.).

- alternifolia, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 126.—Reg. Himal.
 auriculata, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 166.—Am. bor.
 brevicaulis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 126.—Reg. Himal.
 caurina, *Piper, in Erythraea*, vi. 32.—Am. bor.
 dentata, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 257.—Reg. Himal.
 grandiflora, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.
 lindleyana, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 258 = *Neottia listeroides*.
 longicaulis, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 126.—Reg. Himal.
 nephrophylla, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 108.—Am. bor.
 reniformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 334 (non D. Don).—Am. bor.
 retusa, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 155.—Am. bor.
 Smallii, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 169.—Am. bor.

LITROSTACHYS, Reichb. f. (Orchid.).

- acuminata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 154.—Afr. trop.
 acuta, *Rolfe, l. c.* 159.—Afr. trop.
 aschantensis, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 908.—Afr. trop.
 Batesii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 167.—Afr. trop.
 bidens, *Rolfe, l. c.* 160.—Afr. trop.
 bistorta, *Rolfe, l. c.* 155.—Afr. trop.
 capitata, *Reichb. f. in Flora*, 1865, 190.—Afr. trop.
 caudata, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 907.—Afr. trop.
 chailluana, *Reichb. f. in Flora*, 1885, 381.—Afr. trop.
 clandestina, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 161.—Afr. trop.
 durandiana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 65.—Afr. trop.
 erythraeae, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 155.—Afr. trop.
 gabonensis, *Rolfe, l. c.* 161.—Afr. trop.
 glomerata, *Rolfe, l. c.* 166.—Afr. trop.
 henriquesiana, *Rolfe, l. c.* 157.—Afr. trop.
 Hookeri, *Rolfe, l. c.* 154.—Afr. trop.
 iridifolia, *Rolfe, l. c.* 167.—Afr. trop.
 Kirkii, *Rolfe, l. c.* 164.—Afr. trop.
 monodon, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 908.—Afr. trop.
 multiflora, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 162.—Afr. trop.
 muscicola, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. trop.
 mystacidoides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 170.—Afr. trop.
 pellucida, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 908.—Afr. trop.
 pertusa, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* x. 930.—Afr. trop.
 pulchella, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 374.—Afr. trop.
 rhipsalisocia, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 158.—Afr. trop.
 Sedeni, *Reichb. f. in Gard. Chron.* 1878, i. 138.—Afr. trop.
 subclavata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 160.—Afr. trop.
 subulata, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 909.—Afr. trop.
 thomensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 163.—Afr. trop.
 thonneriana, *Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 64.—Afr. trop.
 tridens, *Reichb. f. in Flora*, 1865, 190 = *Mystacidium tridens*.
 vagans, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 162.—Afr. trop.

LITROSTACHYS—

- vesicata, *Reichb. f. in Flora*, 1865, 190.—Afr. trop.
 Virgula, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 165.—Afr. trop.
 Whytei, *Rolfe, l. c.* 155.—Afr. trop.
 Wittmackii, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. trop.

LITHOPHILA, Sw. (Amarant.).

- vermiculata, *Uline, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 39 (= *Gomphrena vermicularis*).—Ind. occ.

LITHOPHRAGMA, Torr. & Gray = **Tellima**, R. Br.

- (Saxifr.).
 campanulata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 200.—Am. bor.

LITHOSPERMUM, Tourn. (Borag.).

- albicans, *Greene, Pittonia*, iv. 91.—Am. bor.
 asperum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 244.—Am. bor.
 borneensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 488 (= *Havilandia borneensis*).—Borneo.
 Chazaliei, *H. Boissieu, in Journ. de Bot.* 1896, 220.—Afr. trop.
 ciliolatum, *Greene, Pittonia*, iv. 92.—Am. bor.
 guatemalense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxvii. 436.—Am. cent.
 hancockianum, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2457.—China.
 lanceolatum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 333.—Am. bor.
 laxum, *Greene, Pittonia*, iii. 263.—Am. bor.
 luteum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 151.—Graecia.
 oblongifolium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 300.—Mexic.
 oblongum, *Greene, Pittonia*, iv. 92.—Am. bor.
 Zahnii, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlix. (1899) 190.—Graecia.

LITOSANTHES, Blume (Rubiace.).

- leucocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 586.—N. Guin.

LITSEA, Lam. (Laurac.).

- accedens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 145 (= *Cylicodaphne accedens*).—Borneo.
 areolata, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera areolata*).—N. Guin.
 bancana, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera bancana*).—Ins. Banca.
 bandongana, *Boerl. l. c.* = *Noronhae*.
 borneensis, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera borneensis*).—Borneo.
 brachystachya, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera brachystachya*).—Java.
 Brawas, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera Brawas*).—Sumatra.
 calicaris, *Kirk, For. Fl. N. Zeal.* 15, t. 10 (= *Tetranthera calicaris*).—N. Zel.
 caloneura, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 143 (= *Tetranthera caloneura*).—Java.
 calophyllantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 331.—N. Guin.
 chrysophoena, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 143 (= *Tetranthera chrysophoena*).—Ins. Molucc.
 chrysopleura, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera chrysopleura*).—Java.
 costata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne costata*).—Arch. mal.
 crassifolia, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera crassifolia*).—Borneo.
 cuneata, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera cuneata*).—Celebes.
 cuneata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne cuneata*).—Sumatra.
 cuspidata, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera cuspidata*).—Java.
 flexuosa, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera flexuosa*).—Ins. Molucc.
 Fo, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 332.—N. Guin.
 Forstenii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 142 (= *Tetranthera Forstenii*).—Celebes.
 fusca, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne fusca*).—Sumatra.
 gemelliflora, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera gemelliflora*).—Sumatra.
 grisea, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne grisea*).—Sumatra.
 hirta, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne hirta*).—Java.

LITSEA—

- impressa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 143 (= *Tetranthera impressa*).—Java.
 insignis, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera insignis*).—Sumatra.
 intermedia, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera intermedia*).—Java.
 lucida, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera lucida*).—Java.
 magnifica, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne magnifica*).—Sumatra.
 mappacea, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera mappacea*).—Java; Sumatra.
 Mogol, *Boerl. l. c.* (= *Tetranthera Mogol*).—Java.
 mollis, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera mollis*, Blume).—Java.
 mollis, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne mollis*).—Java.
 neesiana, *Boerl. l. c.* (= *Cylicodaphne neesiana*).—Penins. Mal.
 nigricans, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera nigricans*).—Borneo.
 nitens, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera nitens*).—Java.
 obscura, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera obscura*).—N. Guin.
 obtusata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne obtusata*).—Java.
 obtusifolia, *Boerl. l. c.* 145 = obtusa.
 ochracea, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne ochracea*).—Sumatra.
 pallida, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera pallida*).—Celebes.
 pallida, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne pallida*).—Malaya.
 Pantjara, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera Pantjara*).—Java; Sumatra.
 polyneura, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne polyneura*).—Java.
 propinqua, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera propinqua*).—Sumatra.
 punctata, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne punctata*).—Borneo.
 riparia, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera riparia*).—Ins. Molucc.
 rubiginosa, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne rubiginosa*).—Sumatra.
 Rumphii, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera Rumphii*).—Ins. Molucc.
 sessilis, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne sessiliflora*).—Borneo.
 sumatrana, *Boerl. l. c.* (= *Cylicodaphne sumatrana*).—Sumatra.
 tephrophylla, *Boerl. l. c.* (= *Cylicodaphne tephrophylla*).—Java.
 tuberculata, *Boerl. l. c.* 144 (= *Cylicodaphne tuberculata*).—Sumatra.
 unita, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne unita*).—Ins. Molucc.
 utilis, *Boerl. l. c.* 141 (= *Tetranthera utilis*).—Borneo.
 varians, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera varians*).—Sumatra.
 velutina, *Boerl. l. c.* 145 (= *Cylicodaphne velutina*).—Java.
 virens, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera virens*).—Penins. Mal.
 waitziana, *Boerl. l. c.* 143 (= *Tetranthera waitziana*).—Java; Sumatra.
 xanthophylla, *Boerl. l. c.* 142 (= *Tetranthera xanthophylla*).—Sumatra.

LITTLEDALEA, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2472 (1896). **GRAMINEAE**.
 tibetica, *Hemsl. l. c.*—Tibet.**LITTONIA**, Hook. (Liliac.).

- Lindeni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 566.—Afr. trop.

LIVISTONA, R. Br. (Palm.).

- Woodfordi, *Ridley, in Gard. Chron.* 1898, l. 177.—Polynes.

LLOYDIA, Salisb. (Liliac.).

- Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 193.—China.
 filiformis, *Franch. l. c.* 192.—China.
 oxycarpa, *Franch. l. c.*—China.
 szechenyiana, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* II. 11 = *Gagea pauciflora*.
 yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 192.—China.

LOASA, Adans. (Loasac.)

- acaulis, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 186.—Chili.
 acutiloba, *Urb. & Gilg, l. c.* 160.—Chili.
 alpina, *Urb. & Gilg, l. c.* 173.—*artemisiifolia*.
 alpina, *Urb. & Gilg, l. c.* 197 (non l. c. 173).—Ecuador.
 amabilis, *Urb. & Gilg, l. c.* 176.—Reg. Argent.
 aphanantha, *Urb. & Gilg, l. c.* 137.—Chili.
 argentina, *Urb. & Gilg, l. c.* 174.—Reg. Argent.
 artemisiifolia, *Poepp. ex Urb. & Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. vi. A. 117.—Chili.
 aurantiaca, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 209.—Ecuador.
 bipinnata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 7.—Am. cent.
 Bridgesii, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 165.—Chili.
 carunculata, *Urb. & Gilg, l. c.* 243.—Peruv.
 chillana, *Urb. & Gilg, l. c.* 167.—Chili.
 dolichostemon, *Urb. & Gilg, l. c.* 215.—N. Granat.
 Dyeri, *Urb. & Gilg, l. c.* 242.—Ecuador.
 ferruginea, *Urb. & Gilg, l. c.* 225.—Peruv.
 fulva, *Urb. & Gilg, l. c.* 224.—Peruv.
 gayana, *Urb. & Gilg, l. c.* 242.—Chili.
 grandifolia, *Urb. & Gilg, l. c.* 208.—N. Granat.
 humboldtiana, *Urb. & Gilg, l. c.* 240.—Ecuador.
 inconspicua, *Urb. & Gilg, l. c.* 221.—Peruv.
 karsteniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 244.—N. Granat.
 lehmanniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 213.—N. Granat.
 leirolepis, *Urb. & Gilg, l. c.* 230.—Peruv.
 lindeniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 194.—Venez.
 magnifica, *Urb. & Gilg, l. c.* 204 (non Warscz.)—Peruv.
 paradoxa, *Urb. & Gilg, l. c.* 156.—Chili.
 patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 521.*—Patag.
 patagonica, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 163 (non Speg.)—Patag.
 peltata, *Spruce, ex Urb. & Gilg, l. c.* 205.—Peruv.
 petrophila, *Urb. & Gilg, l. c.* 169.—Reg. Argent.
 poeppigiana, *Urb. & Gilg, l. c.* 159.—Chili.
 poissoniana, *Urb. & Gilg, l. c.* 226.—Peruv.
 sigmoidea, *Urb. & Gilg, l. c.* 155.—Chili.
 speciosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 8.—Am. cent.
 stuebeliana, *Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 228.—Peruv.
 Trianae, *Urb. & Gilg, l. c.* 212.—N. Granat.
 tripartita, *Urb. & Gilg, l. c.* 171.—Chili.
 uleana, *Urb. & Gilg, l. c.* 255.—Bras.
 unguiculata, *Urb. & Gilg, l. c.* 162.—Chili.

LOBELIA, Plum. (Campan.)

- angolensis, *Engl. & Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 114.—Afr. trop.
 benguelensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 626.—Afr. trop.
 bicalcarata, *A. Zahlbr. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 186.—Chili.
 Buchananii, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 156.—Afr. trop.
 capillipes, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 448.—Afr. austr.
 chilawana, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 70.—Afr. austr.
 cochlearifolia, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 117.—Afr. austr.
 decurrentifolia, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 373.—Afr. austr.
 djurensis, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 116.—Afr. trop.
 dobrowskioides, *Diels, l. c.* 117.—Afr. austr.
 douglasiana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* i. 228.—Austral.
 fasciculata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 338.—Am. cent.
 Fawcettii, *Urb. Symb. Antill. i.* 452.—Ind. occ.
 flaccidifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 338.*—Am. bor.
 galeopoides, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 118.—Afr. trop.
 glaucolenca, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 449.—Afr. austr.
 Goetzei, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxviii. 501.—Afr. trop.
 gracillima, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 625.—Afr. trop.
 guadeloupensis, *Urb. Symb. Antill. i.* 454.—Ind. occ.
 hirtella, *Greene, Pittonia, iii.* 349.—Am. bor.
 intertexta, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.

LOBELIA :—

- kauaensis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i.* 911.—Ins. Sandw.
 laurentioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 196.—Afr. austr.
 lythroides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 113.—Afr. austr.
 nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.
 pedicellata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 116.—Afr. trop.
 portoricensis, *Urb. Symb. Antill. i.* 453.—Ind. occ.
 pusilla, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 626 (non aliorum).—Afr. trop.
 spathopetala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 115.—Madag.
 squarrosa, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 157.—Afr. trop.
 stolonifera, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 338.—Am. cent.
 tarsophora, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 489.—Mexic.
 thomensis, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 114.—Afr. trop.
 tortuosa, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, i.* 912.—Ins. Sandw.
 vanreenensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 373.—Afr. austr.
 Welwitschii, *Engl. & Diels, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 116.—Afr. trop.
 wilmsiana, *Diels, l. c.* 115.—Afr. austr.

LOBOGYNE, Schlechter, in Mém. Herb. Boiss. no. 21, 85 (1900). **ORCHIDEAE**.

- bracteosa, *Schlechter, l. c.* (= *Appendicula bracteosa*).—Polynes.

LOBOSTEMON, Lehm. (Borag.)

- sanguineus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 450.—Afr. austr.

LODICULARIA, Beauv. = *Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.)

- capensis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 128 = *R. compressa*.
 fasciculata, *Beauv. Agrost.* 108 = *R. compressa*.
 hamiltoniana, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 358 = *R. protensa*.
 laxa, *Nees, l. c.* = *R. compressa*.
 peruviana, *Meyen, Reise, ii.* 71 = *R. compressa*.

LOESELIA, Linn. (Polemon.)

- cordifolia, *Hemsl. & Rose, in Hook. Ic. Pl. t.* 2551.—Mexic.
 intermedia, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 567.—Am. cent.

LOESENERA, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 197 (1897). **LEGUMINOSAE**.

- kalantha, *Harms, l. c., et in Engl. Jahrb.* xxvi. 268.—Afr. trop.

LOEWIA, Urb. in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. (1896) 189. **TURNERACEAE**.

- glutinosa, *Urb. l. c.*—Afr. trop.
 tanaensis, *Urb. in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 2.—Afr. trop.

LOLIUM, Linn. (Gramin.)

- italicum, *A. Br. in Flora, 1834, 259* = perenne.
 multiflorum, *Lam. Fl. Fr.* iii. 621 = perenne.

LOMATIUM, Rafin. = *Peucedanum*, Tourn. (Umbell.)

- alatum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 228.—Am. bor.
 ambiguum, *Coult. & Rose, l. c.* 212 = *P. ambiguum*.
 anomalum, *Jones, ex Coult. & Rose, l. c.* 237.—Am. bor. occ.
 argense, *Coult. & Rose, l. c.* 234 = *P. argense*.
 Austinae, *Coult. & Rose, l. c.* 236 = *P. Austinae*.
 bicolor, *Coult. & Rose, l. c.* 237 = *P. bicolor*.
 brevifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 232.—Am. bor. occ.
 Canbyi, *Coult. & Rose, l. c.* 210 = *P. Canbyi*.
 caruifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 216 = *P. caruifolium*.
 circumdatum, *Coult. & Rose, l. c.* 213 = *P. circumdatum*.
 Congdoni, *Coult. & Rose, l. c.* 232.—Calif.
 Cous, *Coult. & Rose, l. c.* 214 = *P. Cous*.
 Cusickii, *Coult. & Rose, l. c.* 226 = *P. Cusickii*.
 dasyxanthum, *Coult. & Rose, l. c.* 218 = *P. dasyxanthum*, *Torr. & Gray*.
 daucifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 221.—Am. bor.
 Donnellii, *Coult. & Rose, l. c.* 231 = *P. Donnellii*.
 ellipticum, *Coult. & Rose, l. c.* 217.—Calif.
 farinosum, *Coult. & Rose, l. c.* 210 = *P. farinosum*.
 foeniculaceum, *Coult. & Rose, l. c.* 222 = *P. foeniculaceum*.
 Geyeri, *Coult. & Rose, l. c.* 209 = *P. Geyeri*.

LOMATIUM :—

- giganteum, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 240.—Calif.
 Gormani, *Coult. & Rose, l. c.* 208 = *P. Gormani*.
 Grayi, *Coult. & Rose, l. c.* 229 = *P. Grayi*.
 Hallii, *Coult. & Rose, l. c.* 224 = *P. Hallii*.
 Hendersonii, *Coult. & Rose, l. c.* 209 = *P. Hendersonii*.
 Jonesii, *Coult. & Rose, l. c.* 233.—Am. bor. occ.
 juniperinum, *Coult. & Rose, l. c.* 235 = *P. juniperinum*.
 laevigatum, *Coult. & Rose, l. c.* 225.—Am. bor.
 Leibergeri, *Coult. & Rose, l. c.* 224.—Am. bor. occ.
 Lemmoni, *Coult. & Rose, l. c.* 231 = *P. Lemmoni*.
 leptocarpum, *Coult. & Rose, l. c.* 213.—Am. bor.
 Macdougali, *Coult. & Rose, l. c.* 233.—Am. bor. occ.
 macrocarpum, *Coult. & Rose, l. c.* 217 = *P. macrocarpum*.
 marginatum, *Coult. & Rose, l. c.* 223.—Am. bor.
 Martindalei, *Coult. & Rose, l. c.* 225 = *P. Martindalei*.
 microcarpum, *Coult. & Rose, l. c.* 230 = *P. microcarpum*.
 mohavense, *Coult. & Rose, l. c.* 234 = *P. mohavense*.
 montanum, *Coult. & Rose, l. c.* 214.—Am. bor. occ.
 nevadense, *Coult. & Rose, l. c.* 220 = *P. nevadense*.
 nudicaule, *Coult. & Rose, l. c.* 238 = *P. nudicaule*.
 oreganum, *Coult. & Rose, l. c.* 224 = *P. oreganum*.
 orientale, *Coult. & Rose, l. c.* 220.—Am. bor.
 Parishii, *Coult. & Rose, l. c.* 235 = *P. Parishii*.
 Piperi, *Coult. & Rose, l. c.* 211.—Am. bor. occ.
 platycarpum, *Coult. & Rose, l. c.* 226 = *P. simplex*.
 platyphyllum, *Coult. & Rose, l. c.* 238.—Am. bor. occ.
 Plummerae, *Coult. & Rose, l. c.* 232 = *P. Plummerae*.
 robustius, *Coult. & Rose, l. c.* 228.—Am. bor. occ.
 Sandbergii, *Coult. & Rose, l. c.* 230 = *P. Sandbergii*.
 Sonnei, *Coult. & Rose, l. c.* 236.—Am. bor. occ.
 Suksdorfii, *Coult. & Rose, l. c.* 239 = *P. Suksdorfii*.
 tomentosum, *Coult. & Rose, l. c.* 219 = *P. dasyxanthum*, *Torr. & Gray*.
 Torreyi, *Coult. & Rose, l. c.* 229 = *P. Torreyi*.
 triternatum, *Coult. & Rose, l. c.* 227 = *P. triternatum*, *Nutt.*
 utriculatum, *Coult. & Rose, l. c.* 215 = *P. utriculatum*.
 vaginatum, *Coult. & Rose, l. c.* 223.—Am. bor.
 Vaseyi, *Coult. & Rose, l. c.* 216 = *P. Vaseyi*.
 Watsoni, *Coult. & Rose, l. c.* 211 = *P. Watsoni*.

LONCHOCARPUS, H. B. & K. (Legum.)

- comosus, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 69.—Afr. trop.
 crassifolius, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 299.—Afr. trop.
 deguelioides, *Harms, l. c.* 300.—Afr. trop.
 Dewevrei, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 68.—Afr. trop.
 eetveldeanus, *Micheli, l. c.* 67.—Afr. trop.
 glaucifolius, *Urb. Symb. Antill. i.* 326.—Ind. occ.
 macrothyrsus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 300.—Afr. trop.
 Staudtii, *Harms, l. c.* 301.—Afr. trop.
 Zenkeri, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 193.—Afr. trop.

LONCHOSTOMA, Wikstr. (Bruniac.)

- quadridum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 343.—Afr. austr.

LONICERA, Linn. (Caprifol.)

- adenophora, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 311.—China.
 calcarata, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2632.—China.
 cyanocarpa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 314.—China.
 Delavayi, *Franch. l. c.* 310.—China.
 ebractulata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 372.—Am. bor.
 Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 312.—China.
 formanekiana, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvii. 478.—Maced.
 glaucescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 90.*—Am. bor.
 infundibulum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 315.—China.
 majoricensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 136.—Eur.
 retusa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 313.—China.
 setifera, *Franch. l. c.* 314.—China.
 stenophora, *Franch. l. c.* 318.—China.
 stephanocarpa, *Franch. l. c.* 316.—China.
 tatsienensis, *Franch. l. c.* 313.—China.
 trichopoda, *Franch. l. c.* 317.—China.
 yunnanensis, *Franch. l. c.* 310.—China.

LOPHACME, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 316 (1898).**GRAMINEAE.**

digitata, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2611.—Afr. austr.

LOPHANTHUS, Adans. = *Nepeta*, Linn. (Labiata).
schtschurowskianus, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 93 = *N. schtschurowskiana*.**LOPHANTHUS**, Benth. (Labiata).

Cusickii, Greenm. in *Erythraea*, vii. 119.—Am. bor.
occidentalis, K. Schum. in *Just. Jahresb.* xxvii. i. 387.—Am. bor.

LOPHATHERUM, Brongn. (Gramin.).

dubium, Steud. Syn. Pl. Gram. 800 = *gracile*.
elatum, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 102 = *gracile*.
japonicum, Steud. Syn. Pl. Gram. 800 = *gracile*.
Lehmannii, Nees, ex Steud. l. c. = *gracile*.
multiflorum, Steud. l. c. = *gracile*.
zeylanicum, Hook. f. in *Trim. Fl. Ceylon*, v. 303.—Zeylan.

LOPHOCARPUS, Boeck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1896, 110. **CYPERACEAE.**

Bonia, Boeck. l. c. —Hab.?
bonianus, Boeck. l. c. p. viii = *praec.*
tonquinensis, Boeck. l. c. 111.—Tonkin.

LOPHOPETALUM, Wight (Celastr.).

celebicus, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 351.—Penins. Mal.
oblongifolium, King, l. c.—Penins. Mal.
oblongum, King, l. c. 350.—Penins. Mal.
pachyphyllum, King, l. c. 348.—Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 350.—Penins. Mal.
subobovatum, King, l. c. 349.—Penins. Mal.
toxicum, Loher, in *Ic. Bogor.* t. 16.—Malaya.

LOPHOPHORA, Hennings (Cactac.).

Lewinii, C. H. Thompson, in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 138 (= *Anhalonium Lewinii*).—Mexic.

LOPHOPOGON, Hack. (Gramin.).

Kingii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 149.—Ind. or.

LOPHOSTACHYS, Pohl (Acanth.).

conferta, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club.* vi. 103.—Bolivia.
pubiflora, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 655.—Bras.

LOPHOSTIGMA, Radlk. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. (1897) 228. **SAPINDACEAE.**
plumosum, Radlk. l. c.—Bolivia.**LOPHOTOCARPUS**, Dur. (Alismac.).

californicus, F. G. Sm. in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 146.—Calif.
depauperatus, F. G. Sm. l. c. 148.—Am. sept.
fluitans, F. G. Sm. l. c. 145.—N. Mexic.
spatulatus, F. G. Sm. l. c. 149.—Am. sept.
spongiosus, F. G. Sm. l. c. 148.—Am. sept.

LORANTHUS, Linn. (Loranth.).

acuminatus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Coleobotrys acuminata*).—Java.
acutifolius, Engl. l. c. 127 (= *Neophyllum acutifolium*).—N. Caled.
acutus, Engl. l. c. 128 (= *Stemmatophyllum acutum*).—Ins. Philipp.
adpressus, Engl. l. c. (= *Leucobotrys adpressa*).—Tonkin.
alatus, Engl. l. c. (= *Coleobotrys alata*).—Sumatra.
Albertisii, Engl. l. c. 129 (= *Diplatia Albertisii*).—N. Guin.
Amylo-Zollingerii, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 163 (= *Elytranthe Zollingerii*).—Java.
andamanicus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Phoencanthemum Kingii*).—Ins. Andaman.
arabicus, Deffers, *Voy. Yemen*, 197.—Arab.
aucklandicus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Ilostylus Kirkii*).—N. Zel.
Balansae, Engl. l. c. 128 (= *Dithecina Balansae*).—Tonkin.
balansaeanus, Engl. l. c. 127 (= *Neophyllum Balansae*).—N. Caled.
Bamleri, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 298.—N. Guin.

LORANTHUS :—

Baratra-Beccarii, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 162 (= *Baratranthus Beccarii*).—Borneo.
Baratra-Scortechinii, Boerl. l. c. (= *Baratranthus Scortechinii*).—Penins. Mal.
Barthi, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 129 (= *Candollina Barthi*).—Ind. or.
Beccarii, Engl. l. c. 128 (= *Stemmatophyllum Beccarii*).—Borneo.
berlinicola, Engl. in Engl. *Jahrb.* xxviii. 382.—Afr. trop.
bicolor, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum bicolor*).—N. Caled.
bipindensis, Engl. l. c. 132.—Afr. trop.
blumeanus, Engl. l. c. 128 (= *Lanthorus blumeanus*).—Java.
borneensis, Engl. l. c. (= *Chiridium Beccarii*).—Borneo.
bumbensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 933.—Afr. trop.
capitatus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 131 = *Soyauxii*.
celebicus, Hemsl. in *Kew Bull.* 1896, 39.—Celebes.
cinnameus, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 930.—Afr. trop.
combretoides, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Sycophila combretoides*).—Afr. trop.
Commiphorae, Engl. in Engl. *Jahrb.* xxviii. 380.—Afr. trop.
coronatus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 133 (= *Acrostephanus coronatus*).—Afr. trop.
crassicaulis, Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 30.—Afr. trop.
cubeboides, Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club.* 1900, 135.—Bolivia.
cumingianus, Engl. ex Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Stemmatophyllum Cumingii*).—Ins. Philipp.
Cumingii, Engl. l. c. (= *Lanthorus Cumingii*).—Ins. Philipp.
Deffersii, Engl. l. c. 133 (= *Odontella Deffersii*).—Arab.
Demensii, Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 29.—Afr. trop.
Descampsii, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 132; et ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 25.—Afr. trop.
discolor, Engl. l. c. 131; et ex Th. Dur. & Wildem. l. c. 26.—Afr. trop.
discolor, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 52 (non Engl.).—Afr. trop.
Doberae, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 151.—Arab.
Durandii, Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 27.—Afr. trop.
elegantissimus, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 52.—Afr. trop.
Engleri, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 930.—Afr. trop.
Fleckii, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 53.—Afr. trop.
Ghikae, Volkens & Schweinf. in *Ghika, Pays des Somalis*, 200.—Afr. trop.
grandifolius, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum grandifolium*).—N. Caled.
heckmannianus, Engl. in Engl. *Jahrb.* xxviii. 384.—Afr. trop.
hexasepalus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 131 (= *Thelecarpus hexasepalus*).—Afr. trop.
inaequilaterus, Engl. l. c. 132; et in Engl. *Jahrb.* xxviii. 384.—Afr. trop.
inflatus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Leucobotrys inflata*).—Tonkin.
irregularis, Engl. l. c. (= *Stemmatophyllum irregulare*).—Borneo.
kalachariensis, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 53.—Afr. austr.
Kingii, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 129 = *kingianus*.
kisantuensis, Wildem. & Th. Dur. in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 43.—Afr. trop.
lanceolatifolius, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum lanceolatum*).—N. Caled.
latifolius, Engl. l. c. (= *Neophyllum latifolium*).—N. Caled.

LORANTHUS :—

Laurentii, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 132; et ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 25.—Afr. trop.
Lauterbachii, K. Schum. ex K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 299.—N. Guin.
Lecomtei, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 132 (= *Stephaniscus Lecomtei*).—Afr. trop.
longissimus, Engl. l. c. 128 (= *Chiridium longissimum*).—Sumatra.
Loxa-Beccarii, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 165 (= *Loxanthera Beccarii*).—Borneo.
Lujaci, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 55.—Afr. trop.
lukwangulensis, Engl. in Engl. *Jahrb.* xxviii. 383.—Afr. trop.
Iunduensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 129 (= *Baratranthus acuminatus*).—Borneo.
luteus, Engl. l. c. 127 (= *Neophyllum luteum*).—N. Caled.
micrantherus, Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 28.—Afr. trop.
miniatus, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1897, 170.—Austral.
Nestor, S. Moore, l. c.—Austral.
nodosus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Stemmatophyllum nodosum*).—Ins. Philipp.
orientalis, Engl. l. c. 131 (= *Oliverella Saclouxii*).—trop.
oxycladus, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 298.—N. Guin.
pachypus, Burkill, in *Kew Bull.* 1899, 109.—N. Guin.
Pancheri, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum Pancheri*).—N. Caled.
Pentheri, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1898, 376.—Afr. austr.
perakensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Chiridium verticillatum*).—Penins. Mal.
pilosus, Engl. l. c. (= *Leucobotrys pilosa*).—Java.
polygonifolius, Engl. ex Th. Dur. & Wildem. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 29.—Afr. trop.
raphidophorus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Coleobotrys raphidophora*).—Java.
rosaceus, Engl. l. c.—Afr. trop.
rotundifolius, Engl. l. c. 127 (= *Neophyllum rotundifolium*).—Ins. Loyalty.
ruber, Engl. l. c. (= *Neophyllum rubrum*).—N. Caled.
rubrobrunneus, Engl. l. c. 128 (= *Coleobotrys rubra*).—Java.
Ruspolii, Engl. l. c. 132.—Afr. trop.
Saclouxii, Engl. l. c. 131 (= *Oncella Saclouxii*).—Afr. trop.
salakensis, Engl. l. c. 129 (= *Baratranthus Beccarii*).—Borneo.
samoensis, Reinecke, in *Engl. Jahrb.* xxv. 628.—Ins. Samoa.
scandens, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum scandens*).—N. Caled.
Scortechinii, Engl. l. c. 129 = *L. Baratra-Scortechinii*.
sessilifolius, Engl. l. c. 128 (= *Stemmatophyllum sessilifolium*).—Ins. Philipp.
Stemmato-Beccarii, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 166 (= *Stemmatophyllum Beccarii*).—Borneo.
Sterculiae, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 928.—Afr. trop.
sumbawensis, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 163 (= *Elytranthe sumbawensis*).—Malaya.
tahitensis, En l. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 128 (= *Stemmatophyllum grandifolium*).—Ins. Tahiti.
ternatus, Engl. l. c. (= *Sycophila ternata*).—Afr. trop.
Thonneri, Engl. in Wildem. & Th. Dur. *Pl. Thonn. Congo*, 12.—Afr. trop.
Tieghemii, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum tenuiflorum*).—N. Caled.
uhemensis, Engl. in Engl. *Jahrb.* xxviii. 382.—Afr. trop.
ulugurensis, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 131; et in Engl. *Jahrb.* xxviii. 381.—Afr. trop.
Vieillardii, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 127 (= *Neophyllum Vieillardii*).—N. Caled.
wentzelianus, Engl. in Engl. *Jahrb.* xxviii. 381.—Afr. trop.
xiphostachyus, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 131 (= *Beccarina xiphostachya*).—Borneo.
Zollingerii, Engl. l. c. 128 (= *Coleobotrys Zollingerii*).—Java.
Zygiarum, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 929.—Afr. trop.

LORTIA, Rendle, in Journ. Bot. 1898, 29. *EUPHORBIA*
BIACEAE.
erubescens, Rendle, l. c. 30.—Afr. trop.

LOTONONIS, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
aristata, Schinz in Bull. Herb. Boiss. vii. 32.—fr. austr.
buchenroederoides, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 279.—Afr. austr.
grandifolia, Bolus, in Journ. Bot. 1896, 19.—Afr. austr.
hirsuta, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vii. 33.—Afr. austr.
leptoloba, Bolus, in Engl. Jahrb. xxiv. 457.—Afr. austr.
macra, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 373.—Afr. austr.
maira, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 354, sphalm. = praec.
marginata, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vii. 31.—Afr. austr.
montana, Schinz, l. c. 30.—Afr. austr.
multiflora, Schinz, l. c. 31.—Afr. austr.
procumbens, Bolus, in Journ. Bot. 1896, 18.—Afr. austr.
Schlechterii, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vii. 32.—Afr. austr.
stipularis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 147.—Afr. austr.
Woodii, Bolus, in Journ. Bot. 1896, 19.—Afr. austr.

LOTUS, Tourn. (Legum.).
assakensis, Coss. ex Brand, in Engl. Jahrb. xxv. 199.—Afr. bor.
brandianus, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 401.—Afr. trop.
Chazaliei, H. Boissieu, in Journ. de Bot. 1896, 220.—Afr. trop.
diffusus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 7.—Am. bor.
Fremonti, A. A. Heller, l. c.—Am. bor.
grandiflorus, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxviii. 288.—Eur.
hebraicus, Hochst. ex Brand, in Engl. Jahrb. xxv. 176, 221.—Arab.; Afr. trop.
Jolyi, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 251.—Afr. bor.
lalambensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 235.—Afr. trop.
latifolius, Brand, in Engl. Jahrb. xxv. 202.—Afr. trop.
namulensis, Brand, l. c. 213.—Afr. trop.
nanus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 (= *Hosackia nana*).—Am. bor.
Schoelleri, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 231.—Afr. trop.
varius, Boiss. ex Brand, in Engl. Jahrb. xxv. 181, 220.—As. Min.
venustus, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 7 (= *Hosackia venusta*).—Am. bor.

LOVOA, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. (1896) 307; et in Engl. Jahrb. xxiii. 164. *MELIACEAE*.
trichilioides, Harms, l. c. 308; l. c. 165.—Afr. trop.

LOWIA, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (Oct. 25, 1886) 308 = *Orchidantha*, N. E. Br. (Musac.).
barneensis, Baker, in Bot. Mag. sub t. 7351 = *O. borneensis*.
longiflora, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. 308.—Penins. Mal.
maxillarioides, Baker, in Bot. Mag. sub t. 7351 = *O. maxillarioides*.

LUCHEA, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1899) 483, sphalm. = *Luehea*, Willd. (Tiliac.).
melantha, Auct. l. c., sphalm. = *L. meiantha*.

LUCILIA, Cass. (Compos.).
pusilla, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 29 (= *Conyza kunthiana*).—Ecuador.
subspicata, Hieron. l. c. (= *Belloa subspicata*).—Ecuador.
tunariensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 378 (= *Gnaphalium tunariense*).—Bolivia.

LUCUMA, Molina (Sapot.).
Amorphosperma, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 955 (= *Amorphospermum antilogum*).—Austral.
chartacea, F. M. Bailey, l. c.—Austral.

LUCUMA:—
Eichleri, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 274.—N. Granat.
Gardneri, Engl. l. c. (= *Chrysophyllum Gardneri*).—Bras.
Hartii, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2565.—Ind. occ.
macrocarpa, Huber, in Bol. Mus. Para. iii. 57.—Hort.
Melinoni, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 275 (= *Pseudocladia Melinoni*).—Guiana.
nitidula, Engl. l. c. 274.—Mexic.
Palmeri, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 87.—Mexic.
sagotiana, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 274 (= *Eremoluma sagotiana*).—Guiana.

LUDOLFIA, Willd. (Gramin.).
glaucescens, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. 320 = *Bambusa nana*.

LUDWIGIANTHA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 178. *ONAGRACEAE*.
arcuata, Small, l. c. (= *Ludwigia arcuata*).—Am. bor.

LUEDEMANNIA, Reichb. f. (Orchid.).
sanderiana, Kraenzl. in Gard. Chron. 1897, II. 138 = *Lacaena bicolor*.

LUEHEA, Willd. (Tiliac.).
meiantha, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 394.—Am. cent.
parvifolia, Huber, in Bol. Mus. Para. ii. 507.—Bras.
splendens, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 12.—Bolivia.

LUFFA, Tourn. (Cucurb.).
Batesii, C. H. Wright, in Kew Bull. 1896, 161.—Afr. trop.

LUISIA, Gaudich. (Orchid.).
Hancockii, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 199.—China.
inconspicua, Hook. f. ex King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 203.—Ind. or.
indivisa, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 201.—Ind. or.

LUNASIA, Blanco (Rutac.).
quercifolia, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 376 (= *Androcephalum quercifolium*).—N. Guin.
repanda, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

LUNDIA, DC. (Bignon.).
phaeolifolia, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 99.—Bolivia.
stricta, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 286 (= *Bignonia stricta*).—Guiana.

LUPINUS, Tourn. (Legum.).
aduncus, Greene, Pittonia, iv. 132.—Am. bor.
alpestris, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 127.—Am. bor.
alsophilus, Greene, Pittonia, iv. 135.—Am. bor.
anemophilus, Greene, l. c. 136.—Am. bor.
Bakeri, Greene, l. c. 132.—Am. bor.
Czermakii, Micheli, ex Brig. & Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1899, 154.—Bras.
Elmeri, Greene, Pittonia, iii. 159.—Am. bor.
erectus, Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 343.—Am. bor.
excubitus, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 26.—Am. bor.
fulcratus, Greene, Pittonia, iii. 159.—Am. bor.
geophilus, Greene, l. c. iv. 135.—Am. sept.
gratus, Greene, l. c. iii. 160.—Am. bor.
Helleri, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 265.—Am. bor.
Helleri, Greene, Pittonia, iv. 134.—Am. bor.
humicolus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 204.—Am. bor.
ingratus, Greene, Pittonia, iv. 133.—Am. bor.
magnificus, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 26.—Am. bor.
magnus, Greene, Pittonia, iii. 160.—Am. bor.
monticola, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 232.—Am. bor.
myrianthus, Greene, Pittonia, iv. 134.—Am. bor.
neomexicanus, Greene, l. c. 133.—Am. bor.
oreophilus, Greene, l. c. 135 (non Phil.).—Am. bor.
pinetorum, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 25.—Am. bor.
Princei, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 401.—Afr. trop.

LUPINUS:—
pseudoparviflorus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 232.—Am. bor.
psoraleoides, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington, xiii. 129.—Am. bor.
ramosus, E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 120.—Am. bor.
retrorsus, Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 344.—Am. bor.
rostratus, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 424.—Calif.
sylvestris, E. Drew, in Bull. Torr. Bot. Club, 1889, 150 = Elmeri.
volcanicus, Greene, Pittonia, iii. 308.—Am. bor.

LUZIOLA, Juss. (Gramin.).
leiocarpa, Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 6, 12.—Bras.

LUZULA, DC. (Juncac.).
crenulata, Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 209.—N. Zel.
depauperata, Beyer, in Verh. Bot. Ver. Brand, xli. p. xxvi.—Eur.
haussknechtiana, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iv. 200.—As. Min.
leptophylla, Buchen. & Petrie, ex Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 214.—N. Zel.
micrantha, Buchen. l. c. 166.—N. Zel.
Novae-Cambriae, Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 392.—Austral.
patagonica, Speng. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 577.—Patag.
rhadina, Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 212.—N. Zel.
subsessilis, Buchen. l. c. 290.—Am. bor.
triandra, Buchen. l. c. 210.—N. Zel.
Ulei, Buchen. in Engl. Jahrb. xxvi. 577.—Bras.
Wettsteinii, Buchen. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 213.—N. Zel.

LYCASTE, Lindl. (Orchid.).
dyeriana, Sander, in Kew Bull. 1898, 195.—Peruv.
micheliana, Cogn. in Rev. Hortic. 1900, 264.—Mexic.

LYCHNIS, Tourn. (Caryophyll.).
antarctica, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 14.—Patag.
argentina, Speng. Contr. Fl. Vent. 16.—Reg. Argent.
chubutensis, Speng. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 596.—Patag.
mexicana, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 141.—Mexic.
patagonica, Speng. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 597.—Patag.

LYCIUM, Linn. (Solan.).
acanthocladium, Speng. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 552.—Patag.
Ameghinoi, Speng. l. c. 553.—Patag.
chubutense, P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 250.—Patag.
decumbens, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 752.—Afr. trop.
durispina, P. Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 251.—Patag.
geniculatum, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 566.—Mexic.
microphyllum, Phil. in Anal. Univ. Chil. ii. 196 = *minutifolium*, Phil.
minutifolium, R. Phil. l. c. xci. 27.—Chili.
paucifolium, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 91.—Bolivia.
repens, Speng. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 554.—Patag.
verrucosum, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 111.—Am. bor.

LYCOPUS, Tourn. (Labiata).
angustus, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xi. (382).—Japon.
asper, Greene, Pittonia, iii. 339.—Am. bor.
lacerus, Greene, l. c.—Am. bor.
maackianus, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xi. (382).—Japon.
maritimus, Greene, Pittonia, iii. 340.—Am. bor.

LYCOSERIS, Cass. (Compos.).
Eggerii, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 75.—Ecuador.
Sodiroyi, Hieron. l. c. 76.—Ecuador.

- LYGISTUM**, P. Br. = *Manettia*, Linn. (Rubiaceae).
micans, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 45 =
M. cordifolia.
tenue, Britton, ex Rusby, l. c. —Bolivia.
- LYGODESMIA**, D. Don (Compos.).
ramosissima, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxv. 315.
 —Mexic.
- LYONIA**, Nutt. (Ericaceae).
heptamera, Urb. Symb. Antill. i. 376. —Ind. occ.
- LYONSIA**, R. Br. (Apocyn.).
viridiflora, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.
 iii. 156. —N. Guin.
- LYPERIA**, Benth. (Scrophul.).
breviflora, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 398. —Afr.
 austr.
punicea, N. E. Br. in Kew Bull. 1896, 163. —Afr. austr.
- LYSIAS**, Salisb. = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).
orbiculata, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 103
 = *H. hookeriana*.
- LYSIELLA**, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i.
 (1900) 104. **ORCHIDEAE**.
obtusata, Rydb. l. c. (= *Habenaria obtusata*). —Am.
 bor.
- LYSIMACHIA**, Tourn. (Primul.).
insignis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2634. —China.
paradoxa, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv.
 (1896) 326. —Hybr. ?
polyantha, Fernald, in Rhodora, i. 134. —Am. bor.
producta, Fernald, l. c. —Am. bor.
unguiculata, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 524. —China.
- LYSIMACHIOPSIS**, A. A. Heller, in Minnes. Bot.
 Studies, i. (1897) 874. **PRIMULACEAE**.
daphnoides, A. A. Heller, l. c. 875 (= *Lysimachia*
daphnoides). —Ins. Sandw.
Hillebrandii, A. A. Heller, l. c. (= *Lysimachia Hille-*
brandii). —Ins. Sandw.
Lydgatei, A. A. Heller, l. c. 876 (= *Lysimachia Lyd-*
gatei). —Ins. Sandw.
ovata, A. A. Heller, l. c. —Ins. Sandw.
Remyi, A. A. Heller, l. c. (= *Lysimachia Remyi*). —
 Ins. Sandw.
- LYSIONOTUS**, D. Don (Gesner.).
carnea, Hemsl. in Gard. Chron. 1900, II. 349. —China.
heterophylla, Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.
 1899, 249. —China.
involuta, Franch. l. c. —China.
- LYTHRUM**, Linn. (Lythrac.).
paradoxum, Koehne, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lviii.
 19. —Austral.

M

- MABA**, Forst. (Ebenac.).
coriacea, Cummins, in Kew Bull. 1898, 76. —Afr. trop.
polyantha, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,
 494. —N. Guin.
ramuensis, K. Schum. & Lauterb. l. c. 495. —N. Guin.
 Zenkeri, Guerke, in Engl. Jahrb. xxvi. 63. —Afr. trop.
- MABEA**, Aubl. (Euphorb.).
Trianae, Pax, in Engl. Jahrb. xxvi. 506. —N. Granat.
- MACADAMIA**, F. Muell. (Proteac.).
integrifolia, Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc.
 N. S. Wales, Ser. II. xi. 624. —Austral.
- MACAGLIA**, Rich. = *Aspidosperma*, Mart. & Zucc.
 (Apocyn.).
lanata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 197. —Bras.
- MACAIREA**, DC. (Melast.).
Theresiae, Cogn. in Bot. Centralbl. lxvi. 369. —Bras.
- MACARANGA**, Thou. (Euphorb.).
angustifolia, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee, 398. —N. Guin.
Bachmanni, Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. 525. —Afr.
 austr.
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix.
 626. —Celebes.

- MACARANGA** :—
chrysotricha, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee, 399. —N. Guin.
 Reinecke, Pax, in Engl. Jahrb. xxv. 646. —Ins. Samoa.
rosea, Pax, l. c. xxvii. 328. —Afr. trop.
 Staudtii, Pax, l. c. xxiii. 526. —Afr. trop.
 subpeltata, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee, 400. —N. Guin.
 Zenkeri, Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. 526. —Afr. trop.
- MACARISIA**, Thou. (Rhizoph.).
klaineana, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 75.
 —Afr. trop.
- MACDOUGALIA**, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot.
 Club, 1898, 629. **COMPOSITAE**.
Bigelovii, A. A. Heller, l. c. —Am. bor.
- MACFADYENA**, A. DC. (Bignon.).
Bangii, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 72. —
 Bolivia.
- MACHAERANTHERA**, Nees = *Aster*, Tourn. (Com-
 pos.).
aspera, Greene, Pittonia, iii. 62. —Am. bor.
asteroides, Greene, l. c. 63 = *A. canescens*.
Bigelovii, Greene, l. c. = *A. Bigelovii*.
commixta, Greene, l. c. iv. 71. —Am. bor.
divaricata, Greene, l. c. 23 = *A. canescens*.
incana, Greene, l. c. iii. 62 = *A. incanus*.
inornata, Greene, l. c. = *A. inornatus*.
laetevirens, Greene, l. c. 61. —Am. bor.
leucanthemifolia, Greene, l. c. = *A. leucanthemifolius*.
linearis, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 511.
 —Am. bor.
linearis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 398.
 —Am. bor.
montana, Greene, Pittonia, iii. 60 = *A. canescens*.
mucronata, Greene, l. c. iv. 72. —Am. bor.
oxylepis, Greene, l. c. 25. —Am. bor.
Parthenium, Greene, l. c. 99. —Am. bor.
Pattersonii, Greene, l. c. iii. 62 = *A. Pattersonii*.
pruinosa, Greene, l. c. iv. 157. —Am. bor.
puberulenta, Greene, l. c. 23 = *A. canescens*.
rigida, Greene, l. c. 25. —Am. bor.
sessiliflora, Greene, l. c. iii. 60 = *A. canescens*.
spinulosa, Greene, l. c. iv. 24. —Am. bor.
subalpina, Greene, l. c. 23. —Am. bor.
superba, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 197. —Am.
 bor.
tagetina, Greene, Pittonia, iv. 71. —Am. bor.
tephrodes, Greene, l. c. 24. —Am. bor.
varians, Greene, l. c. 98. —Am. bor.
viscosa, Greene, l. c. 22 = *A. canescens*.
- MACHAERIUM**, Pers. (Legum.).
praecox, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 354 =
 Tipuana praecox.
stygium, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. xxiv. Afd.
 III. no. 7, 20. —Am. austr.
- MACHAONIA**, Humb. & Bonpl. (Rubiaceae).
floribunda, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 488.
 —Mexic.
- MACHILUS**, Nees (Laurac.).
platyphylla, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 348. —China.
- MACLEANIA**, Hook. (Vaccin.).
turrialbana, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 339.
 —Am. cent.
- MACODES**, Lindl. (Orchid.).
celebica, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 132. —Celebes.
sanderiana, Rolfe, l. c. 1896, 47. —Ins. Sunda.
- MACRACHAENIUM**, Hook. f. (Compos.).
foliosum, Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La
 Plata, vii. 375. —Fuegia.
- MACROCARPAEA**, Gilg (Gentian.).
bangiana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxii. 335. —Bolivia.
bogotana, Gilg, l. c. 337. —N. Granat.
calophylla, Gilg, l. c. 339. —N. Granat.
Glaziovii, Gilg, l. c. 335. —Bras.
micantha, Gilg, l. c. 338. —Peruv.
pachyphylla, Gilg, l. c. —Ecuador.
pachystyla, Gilg, l. c. 336. —Peruv.
polyantha, Gilg, l. c. —N. Granat.
sodiroyana, Gilg, l. c. xxv. 724. —Ecuador.

- MACROCARPAEA** :—
stenophylla, Gilg, in Engl. Jahrb. xxii. 337. —Peruv.
- MACROCNEMUM**, P. Br. (Rubiaceae).
Sprucei, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 44. —
 Bolivia.
- MACROCOCULUS**, Becc. (Menisperm.).
tympnopodus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.
 Südsee, 314. —N. Guin.
- MACROLOBIUM**, Schreb. (Legum.).
ferrugineum, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 271. —Afr.
 trop.
Preussii, Harms, l. c. 272. —Afr. trop.
trinitense, Urb. Symb. Antill. i. 314. —Ind. occ.
trunciflorum, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 272. —
 Afr. trop.
 Zenkeri, Harms, l. c. —Afr. trop.
- MACROLOTUS**, Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma,
 vii. (1897) 89. **LEGUMINOSAE**.
Rivaei, Harms, l. c. —Afr. trop.
- MACROMERIA**, D. Don (Borag.).
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 570. —
 Mexic.
- MACRONEMA**, Nutt. = *Chrysopsis*, Ell. (Compos.).
grindelifolium, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i.
 384. —Am. bor.
lineare, Rydb. l. c. —Am. bor.
obovatum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 618.
 —Am. bor.
obtusum, Rydb. l. c. 619. —Am. bor.
- MACROPEPLUS**, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv.
 (1898) 557. **MONIMIACEAE**.
ligustrinus, Perkins, l. c. 558 (= *Mollinedia ligustrina*).
 —Bras.
- MACROPODANDRA**, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii.
 (1899) 114. **EUPHORBIACEAE**.
acuminata, Gilg, l. c. —Afr. trop.
- MACROPSYCHANTHUS**, Harms, in K. Schum.
 & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 366 (1900). **LEGU-**
MINOSAE.
Lauterbachii, Harms, l. c. 367. —N. Guin.
- MACRORUNGLIA**, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop.
 Afr. v. (1900) 254. **ACANTHACEAE**.
formosissima, C. B. Clarke, l. c. 255. —Afr. trop.
macrophylla, C. B. Clarke, l. c. —Afr. trop.
pubinervia, C. B. Clarke, l. c. —Afr. trop.
- MACROSCEPIS**, H. B. & K. (Asclep.).
congestiflora, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxv. 149.
 —Am. cent.
elliptica, N. E. Br. in Kew Bull. 1898, 225. —Bras.
hirsuta, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 265 =
 obovata.
magnifica, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ser.
 II. xxxiv. no. 7, 77. —Bras.
- MACROSIPHONIA**, Muell. Arg. (Apocyn.).
petraea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 198 = verticillata.
- MACROSPHYRA**, Hook. f. (Rubiaceae).
brachystylis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 463. —Afr.
 trop.
- MACROTOMIA**, DC. (Borag.).
grandis, Borum, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 289. —
 Persia.
- MACROTORUS**, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898)
 561. **MONIMIACEAE**.
utriculatus, Perkins, l. c. (= *Mollinedia utriculata*). —
 Bras.
- MACROZAMIA**, Miq. (Cycad.).
Mackenzii, Hort. in Gard. Chron. 1877, i. 665. —
 Austral.
platyrhachis, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.
 iii. 356. —Austral.
- MADARIA**, DC. = *Madia*, Molina (Compos.).
densifolia, Greene, Fl. Francisc. 417 = *M. densifolia*.
polycarpa, Greene, l. c. 418 = *M. polycarpa*.

MADIA, Molina (Compos.).
densifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 167.—Am. bor.
polycarpa, *Greene, l. c.*—Am. bor.
tenella, *Greene, l. c.*—Am. bor.

MAERUA, Forsk. (Capparid.).
angustifolia, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. 48 = *Guerichii*.
angustifolia, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 97 (= *Niebuhrria angustifolia*).—Afr. austr.
aprevaliana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 5.—Afr. trop.
candida, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 96.—Afr. trop.
emarginata, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v.* 857.—Afr. austr.
macrantha, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 95.—Afr. trop.
Paxii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 97.—Afr. austr.
Pirottae, *Gilg, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 96.—Afr. trop.
sessiliflora, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
ternata, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. i. II.* 168 = *triphylloides*, *A. Rich.*
triphylloides, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* (= *Capparis triphylloides*).—Afr. austr.
undulata, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 169.—Afr. austr.
Woodii, *Th. Dur. & Schinz, l. c.*—Afr. austr.

MAESA, Forsk. (Myrsin.).
depauperata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 519.—China.

MAESOBOTRYA, Benth. (Euphorb.).
hirtella, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 21.—Afr. trop.

MAGNOLIA, Linn. (Magnol.).
cubensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 307.—Ind. occ.
splendens, *Urb. l. c.* 306.—Ind. occ.

MAGYDARIS, Koch (Umbell.).
pastinacea, *Fiori & Paol. Fl. Ital.* ii. 205 = *tomentosa*.

MAHONIA, Nutt. = **Berberis**, Linn. (Berberid.).
eurybracteata, *Fedde, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 338.—China.
polyodonta, *Fedde, l. c.* 339.—China.
subtriplinervis, *Fedde, l. c.* 338 = *B. subtriplinervis*.

MAIHUENIA, Phil. in *Gartenfl.* 1883, 260.
CACTEAE.
brachydelphus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 756.—Reg. Argent.
Philippii, *Weber, in Bois, Dict. Hort.* 939.—Chili.
Poepigii, *Weber, l. c.* (= *Opuntia Poepigii*).—Chili.

MAIRANIA, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 6. (1900) = **MAIRRANIA**, Neck. = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).

MAIRIA, Nees (Compos.).
coriacea, *Bolus, in Hook. Ic. Pl.* t. 2541.—Afr. austr.
decumbens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 199.—Afr. austr.
montana, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

MAJORANA, Tourn. = **Origanum**, Tourn. (Labiata).
dubia, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III. A. 307 = *O. dubium*.
majorica, *Briq. l. c.* 308 = *O. majoricum*.
Maru, *Briq. l. c.* 307 = *O. Maru*.
micrantha, *Briq. l. c.* = *O. micranthum*.
Orega, *Briq. l. c.* = *O. Orega*.

MALABAILA, Hoffm. (Umbell.).
erbilensis, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v.* 623.—As. Min.
Hausknechtii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 240 (= *Stenotaenia Hausknechtii*).—Persia.
Kirungae, *Engl. in Goetsen, Durch Afr.* (repr.) 7.—Afr. trop.
lignosus, *Auct. in Just, Jahrb.* xxv. II. 484, sphalm. = *Pterocephalus lignosus*.
nudicaulis, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 240 (= *Stenotaenia nudicaulis*).—Persia.
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 24.—Afr. trop.
tempkyana, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v.* 622.—Graecia.
tordylioides, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 240 (= *Stenotaenia tordylioides*).—Persia.

MALACOCARPUS, Salm-Dyck = **Echinocactus**, Link & Otto (Cact.).
heptacanthus, *Barb. Rodr. Pl. Matogross.* 29.—Bras.

MALACOTHRIX, DC. (Compos.).
implicata, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i.* 113.—Am. bor.
runcinata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 485.—Am. bor.

MALLOSTOMA, Karst. (Rubiace.).
lavarum, *Donn. Sm. Pl. Guatem. v.* 36.—Am. cent.

MALLOTUS, Lour. (Euphorb.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 626.—Celebes.
Preussii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxiii. 525.—Afr. trop.
tenuifolius, *Pax, l. c.* xxix. 429.—China.

MALPIGHIA, Plum. (Malpigh.).
dasycarpa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxiv. 390.—Am. cent.
edulis, *Donn. Sm. l. c.* 391.—Am. cent.
nummulariifolia, *Niedenzu, in Ind. Lect. Lyc. Brunsv.* 1899, aest. 18.—Ind. occ.

MALUS, Tourn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
ioensis, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii.* 235 = *P. ioensis*.
Malus, *Britton, l. c.* 236 = *P. Malus*.
Soulardi, *Britton, l. c.* 235 = *P. Soulardi*.

MALVA, Tourn. (Malvac.).
cuneata, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 144.—Galic.
vivaniana, *Rouy, in Journ. de Bot.* 1897, 82.—Reg. Medit.

MALVASTRUM, A. Gray (Malvac.).
aboriginum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 1. 311.—Am. bor.
Alberti, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 231 (= *Tarasa Alberti*).—Chili.
arcuatum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. i.* 311 = *marrubioides*.
Davidsonii, *Robinson, l. c.* 312.—Am. bor.
dissectum, *Cock, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 87 = *coccineum*.
erodiifolium, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 236 (= *Malva erodiifolia*).—Chili.
greenmanianum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 180.—Mexic.
involucratum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 1. 310.—Am. bor.
megalorrhizum, *Baker f. in Journ. Bot.* 1891, 363.—Chili.
modioliforme, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. I. 355.—Reg. Argent.
nesioticum, *Robinson, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i.* 312.—Am. bor.
saltense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 22, sphalm. = *sajamense*.
scorpioides, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. I. 355.—Bolivia.

MALVAVISCUS, Dill. (Malvac.).
brevibracteatus, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 347.—Am. cent.
cinereus, *Baker f. l. c.*—Mexic.
Jordan-Mottii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 73.—Ind. occ.
lanceolata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 175.—Mexic.
Malvaviscus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 73 = *arborescens*.
Palmanus, *Pittier & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxiii. 238.—Am. cent.
Polakowskyi, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 346.—Am. cent.

MALVEOPIS, Presl (Malvac.).
antofagastana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 20 = *Malvastrum antofagastanum*.
heterophylla, *Kuntze, l. c.* 21 = *Malvastrum heterophyllum*.
modioliformis, *Kuntze, l. c.* = *Malvastrum modioliforme*.
Oriastrum, *Kuntze, l. c.* = *Malva Oriastrum*.
saltense, *Kuntze, l. c.* 22 = *Malvastrum sajamense*.
scorpioides, *Kuntze, l. c.* = *Malvastrum scorpioides*.

MAMBOGA, Blanco = **Mitragyna**, Korth. (Rubiace.).
stipulosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 485 = *M. macrophylla*.

MAMMEA, Linn. (Guttif.).
Ebboro, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1223.—Afr. trop.

MAMMILLARIA, Haw. (Cact.).
arizonica, *Engelm. in S. Wats. Pl. Wheeler*, 9 = *vivi-para*.
armillata, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 7.—Calif.
brachydelphis, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. I. 343, sphalm. = *Maihuenia brachydelphis*.
Brandegei, *Engelm. ex K. Brandegee, in Erythraea*, v. 116 (= *Cactus Brandegei*).—Calif.
Brownii, *Toumey, in Coult. Bot. Gas.* xxii. 253.—Am. bor.
Carretii, *Rebut, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 542.—Hab. ?
confinis, *Hort. ex K. Schum. l. c.* 557 = *discolor*.
cornuta, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 496.—Mexic.
dioica, *K. Brandegee, in Erythraea*, v. 115.—Am. bor.
durangensis, *Rge. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 478.—Mexic.
fertilis, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 530.—Mexic.
gigantea, *Hildm. l. c.* 578.—Mexic.
Goodrichi, *Engelm. in Erythraea*, v. 115 = *dioica*.
guanajuatensis, *Rge. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 578 = *gigantea*.
heeseana, *McDowell, in Monatsschr. Kakt.* 1896, 125.—Mexic.
hirschtiana, *Haage f. in Monatsschr. Kakt.* 1896, 127.—Hab. ?
kleinschmidiana, *Zeissold, in Monatsschr. Kakt.* 1898, 21.—Mexic.
krauseana, *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 595 = *mutabilis*.
Lassonnerici, *Reb. ex K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1897, 29.—Hort. ?
Lesauinieri, *Reb. ex K. Schum. l. c.*—Mexic. ? (sphalmate *Lasaunieri, Lasaunieri, Lassonnerii, Lassonneri, Lassomeri, Lassonieri, Lassonneri, K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1896; 1897).
Macdowellii, *Heese, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 578 = *gigantea*.
Mainae, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 31.—Am. bor.
Nickelsae, *K. Brandegee, l. c.*—Am. bor.
Oettingenii, *Zeissold, in Monatsschr. Kakt.* 1898, 10.—Mexic.
perbella, *Hildm. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 567.—Mexic.
Perringii, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 566 = *celsiana*.
Petterssonii, *Hildm. in Deutsch. Gart. Zeit.* 1886, 185.—Mexic.
plumosa, *Web. in Bois, Dict. Hort.* 804.—Mexic.
senckeana, *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 575 = *seitziana*.
senckeii, *Hort. ex K. Schum. l. c.* = *seitziana*.
Trohartii, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 586.—Mexic.
venusta, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 7.—Calif.
Wilcoxii, *Toumey, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* 545.—Am. bor.
Wissmannii, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 498.—Am. bor.
zeyeriana, *Haage f. ex K. Schum. l. c.* 574.—Mexic.

MANDEVILLA, Lindl. (Apocyn.).
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 76.—Bolivia.
fluminensis, *Donn. Sm. ex Pittier, Prim. Fl. Costaric.* ii. (1898) 162 (= *Echites fluminensis*).—Am. trop.
hirsuta, *Malmé, in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. Afd. III. no. 10, 24 (= *Echites hirsuta*).—Guiana.
lasiocarpa, *Malmé, l. c.* 25 (= *Echites lasiocarpa*).—Bras.
loeseneriana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 725.—Ecuador.
Mandoni, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 496.—Am. bor.

MANETTIA, Mutis (Rubiace.).
hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss. vii. App.* I. 82.—Parag.
paraguariensis, *Chod. l. c.*—Parag.

MANGIFERA, Linn. (Anacard.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 470.—Ins. Andaman.

MANGIFERA:—

campotasperma, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 363 A.—Cochinch.
duperreana, *Pierre, l. c.* t. 362 A.—Cochinch.
khasiana, *Pierre, l. c.* t. 364 C.—Reg. Himal.
longipetiolata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 470.—Penins. Mal.
Reba, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 363 B.—Cochinch.

MANGLIETIA, Blume (Magnol.).

Minahassae, *Koord. & Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 328.—Celebes.

MANIHOT, Tourn. (Euphorb.).

mossamedensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 442.—Bras.

MANILTOA, Scheff. (Legum.).

polyandra, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 194 (= *Cynometra polyandra*).—Ind. or.

MANISURIS, Linn. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).

tessellata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xx. 20 = *R. corrugata*.
tuberculosa, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 430.—Am. bor.

MANISURIS, Sw. (Gramin.).

hirta, *Russ. ex Wall. Cat. n.* 1726 = granularis.

MANOTES, Soland. (Connar.).

Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 62.—Afr. trop.
macrophylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 190.—Afr. trop.
racemosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxiii. 215 (= *Cnestis racemosa*).—Afr. trop.

MANSOA, DC. = **Cuspidaria**, DC. (Bignon.).

acuminatissima, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 200.—Bras.
angustidens, *Bureau & K. Schum. l. c.* = *C. angustidens*.
difficilis, *Bureau & K. Schum. l. c.* 201 = *M. laevis*.
Glasiovii, *Bureau & K. Schum. l. c.* 203.—Bras.
Schwackei, *Bureau & K. Schum. l. c.* 204.—Bras.

MANULEA, Linn. (Scrophul.).

angolensis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 478.—Afr. trop.
atropurpurea, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 235* = *Lyperia atropurpurea*.
campanulata, *Kuntze, l. c.* = *Chaenostoma campanulatum*.
floribunda, *Kuntze, l. c.* = *Chaenostoma floribundum*.
foliolosa, *Kuntze, l. c.* = *Lyperia foliolosa*.
fragrans, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 179.—Afr. austr.
halimifolia, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 235* = *Chaenostoma halimifolium*.
kraussiana, *Kuntze, l. c.* = *Lyperia kraussiana*.
laxa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 179.—Afr. austr.
minor, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 478.—Afr. austr.
multifida, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 236* = *Lyperia multifida*.
polyantha, *Kuntze, l. c.* = *Chaenostoma polyanthum*.
thodeana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 479.—Afr. austr.

MAOUTIA, Wedd. (Urtic.).

rugosa, *Warb. in Engl. Jahrb.* xiii. 289 = *Warburgii*.
samoensis, *Reinecke, in Engl. Jahrb.* xxv. 618.—Ins. Samoa.
Warburgii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 381.—N. Guin.

MAPANIA, Aubl. (Cyperac.).

montana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee,* 189.—N. Guin.

MAPOURIA, Aubl. = **Psychotria**, Linn. (Rubiac.).

pallascens, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi.* 49.—Bolivia.

MARAH, Kellogg = **Echinocystis**, Torr. & Gray

(Cucurb.).
oregana, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 239 = *E. oregana*.

MARCELLIA, Baill. (Amarant.).

denudata, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 41 (= *Sericocoma denudata*).—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 15.—Afr. trop.
splendens, *Schinz, l. c.* 16.—Afr. trop.
Welwitschii, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 40 (= *Sericocoma Welwitschii*).—Afr. trop.

VOL. III.

MARCGRAVIA, Plum. (Ternstroem.).

Browni, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 367.—Ind. occ.
corumbensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 444.—Bras.
crassicastrata, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 27.—Bras.
dasyantha, *Gilg, l. c.* 25.—Bras.
elegans, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 365.—Ind. occ.
evenia, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 518.—Ind. occ.
Hartii, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 366.—Ind. occ.
lineolata, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 517.—Ind. occ.
macrophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 27.—Bras.
mexicana, *Gilg, l. c.* 26.—Mexic.
neurophylla, *Gilg, l. c.* 29.—Bras.
salicifolia, *Gilg, l. c.* 26.—Bras.
Sprucei, *Gilg, l. c.* 28.—Bras.
stenonectaria, *Gilg, l. c.* 30.—Bras.
subcordata, *Gilg, l. c.* 27.—Bras.
urophylla, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 355, sphalm. = neurophylla.
witmackiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 29.—Bras.

MAREYA, Baill. (Euphorb.).

brevipes, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 24.—Afr. trop.

MARGARANTHUS, Schlecht. (Solan.).

sulphureus, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 566.—Mexic.

MARGYRICARPUS, Ruiz & Pav. (Rosac.).

acanthocarpus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 513.—Patag.
Ameghinoi, *Speg. l. c.* 512.—Patag.
patagonicus, *Speg. l. c.*—Patag.
pinnatus, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 77* = setosus.

MARIACANTHA, Bub. Fl. Pyren. ii. 149 (1900) =

Silybum, Vaill. (Compos.).
maculosa, *Bub. l. c.* 150 = *S. Marianum*.

MARICA, Ker-Gawl. (Irid.).

Sabini, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vi. (1826) 75.—Afr. trop.
sabiniiana, *Herb. in Bot. Mag.* sub t. 3809 = Sabini.

MARILA, Sw. (Ternstroem.).

laxiflora, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi.* 9.—Bolivia.

MARILAUNIDIUM, Kuntze = **Nama**, Linn. (Hydro-

phyll.).
tenue, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 142.—Am. bor.

MARINELLIA, Bub. Fl. Pyren. i. 261 (1897) = **Me-**

lampyrum, Tourn. (Scrophul.).
arvensis, *Bub. l. c.* 263 = *M. arvensis*.
cristata, *Bub. l. c.* = *M. cristatum*.
nemorialis, *Bub. l. c.* = *M. nemorosum*.
vulgaris, *Bub. l. c.* 262 = *M. pratense*.

MARISCUS, Gaertn. (Cyper.).

Bolusi, *C. B. Clarke, in Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 585 = umbilensis.
brizaeus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 52.—Ind. occ.
brunens, *C. B. Clarke, in Urb. l. c.* 51.—Ind. occ.
cayennensis, *Urb. l. c.* 165 = flavus.
concinus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 224.—Afr. trop.
confertus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 50.—Ind. occ.
congestus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1897, 72.—Afr. austr.
corrugata, *Auct. in Just, Jahresb.* xxv. II. 484, errore = *Manisuris corrugata*.
cyperoides, *Urb. Symb. Antill.* ii. 164 = sieberianus.
deciduus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 191.—Afr. austr.
dissitiflorus, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 45.—Ind. occ.
elephantinus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 195.—Afr. austr.
filiformis, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 242 = *Torulinium filiforme*.

MARISCUS:—

globifer, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 225.—Afr. trop.
globulosus, *Urb. Symb. Antill.* ii. 165 = echinatus.
Gregorii, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 225.—Afr. trop.
havanensis, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 212 = *Torulinium filiforme*.
hermaphroditus, *Urb. Symb. Antill.* ii. 165 = *Jacquinii*.
incompletus, *Urb. l. c.* = elatus.
laetus, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 11 (= *Cyperus laetus*).—Bras.
ligularis, *Urb. Symb. Antill.* ii. 165 = rufus.
maritimus, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 226.—Afr. trop.
planifolius, *Urb. Symb. Antill.* ii. 165 = purpurascens.
psilostachys, *C. B. Clarke, in Journ. Bot.* 1896, 225.—Afr. trop.
tenuis, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 48.—Ind. occ.
tetragonus, *C. B. Clarke, l. c.* 44.—Ind. occ.
umbilensis, *C. B. Clarke, ex W. Watson, in Gard. Chron.* 1891, II. 190.—Afr. austr.
Urbani, *C. B. Clarke, in Urb. Symb. Antill.* ii. 47.—Ind. occ.

MARKEA, Rich. (Solan.).

verrucosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi.* 92.—Bolivia.

MARLEA, Roxb. (Cornac.).

densiflora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens.* ii. 2.—Java.
javanica, *Koord. & Valet. l. c.*—Java.

MARRUBIUM, Tourn. (Labiata.).

glechomaefolium, *Frey & Conrath, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 136.—Reg. Caucas.
hyperleucum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 149.—Graecia.

MARSDENIA, R. Br. (Asclep.).

bicoronata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 235.—Afr. trop.
celebica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (= *Chlorochlamys celebica*).—Celebes.
Dussii, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 275.—Ind. occ.
efulensis, *N. E. Br. in Hook. Jc. Pl. t.* 2497.—Afr. trop.
floribunda, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 275 = *Stephanotis floribunda*.
latifolia, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 372 = racemosa.
leiocarpa, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 170.—Ind. or.
macroglissa, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 276.—Ind. occ.
montana, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 93.—Bras.
rhynchogyna, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 234.—Afr. trop.
Schenkii, *K. Schum. l. c.* xxv. *Beibl.* lx. 22.—Bras.
suberosa, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 94 (= *Verlotia suberosa*).—Bras.
Taylori, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 100.—Afr. trop.
Teysmanni, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (= *Tetragonocarpus Teysmanni*).—Malaya.
umbellifera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 460.—Afr. trop.
Weddellii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* Ser. II. xxxiv. no. 7, 94 (= *Verlotia Weddellii*).—Bras.

MARSEA, Adans. = **Conyza**, Linn. (Compos.).

aegyptiaca, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 550 = *C. aegyptiaca*.
artemisiaefolia, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546* = *C. artemisiaefolia*.
chilensis, *Kuntze, l. c.* = *C. chilensis*.
cordata, *Kuntze, l. c.* = *C. cordata*.
gnaphaliodes, *Kuntze, l. c.* = *C. gnaphalodes*.
Gouani, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 552 = *C. Gouani*.
ivifolia, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546* = *C. ivaeifolia*, Less.
lyrata, *Kuntze, l. c.* = *C. lyrata*.
notobellidiastrum, *Kuntze, l. c.* = *C. notobellidiastrum*.
obscura, *Kuntze, l. c.* = *C. obscura*.
persicifolia, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 550 = *C. persicaefolia*.
pinnata, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 546* = *C. pinnatilobata*.
podocephala, *Kuntze, l. c.* = *C. podocephala*.

Q

MARSEA :—

- pyrrhopappa*, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 552 = C. pyrrhopappa.
sophiaefolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 546 = C. sophiaefolia.
spartioides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 551 = C. spartioides.
stricta, Hiern, l. c. 552 = C. stricta.
ulmifolia, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 546 = C. incisa.

MARSHALLIA, Schreb. (Compos.).

- lacinarioides*, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 482.—Am. bor.

MARTINELLA, Baill. (Bignon.).

- obovata*, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. 11. 161 = Martinii.

MARTYNIA, Houst. (Pedal.).

- parviflora*, Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 453.—Am. bor.

MASCARENHASIA, A. DC. (Apocyn.).

- caustica*, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 268, sphalm. = elastica.
elastica, K. Schum. l. c. 270.—Afr. trop.
velutina, Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par. cxviii. 1351.—Madag.

MASCHALOCEPHALUS, Gilg & K. Schum. in

- Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 148. **RAPATEACEAE.**
Dinklagei, Gilg & K. Schum. l. c.—Afr. trop.

MASCHALODESME, K. Schum. & Lauterb. Fl.

- Deutsch. Südsee, 561 (1900). **RUBIACEAE.**
arborea, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

MASDEVALLIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).

- antioquiensis*, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 456.—N. Granat.
brachyura, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c. 453.—Ecuador.
chrysochaete, F. C. Lehm. l. c. 452.—N. Granat.
chrysonaura, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c. 453.—N. Granat.
deorsa, Rolfe, in Orchid. Rev. viii. 255.—N. Granat.
Herraduræ, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 455.—N. Granat.
inflata, Reichb. f. in Gard. Chron. 1881, II. 716 = corniculata.
Lima, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 454.—N. Granat.
macropus, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.—Hab. ?
pantherina, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.—N. Granat.
plantaginea, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. 336 = Pleurothallis plantaginea.
sessilis, Barb. Rodr. in Plant. Nov. Jard. Bot. Rio, vi. 17.—Bras.
stenantha, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 455.—N. Granat.
tricarinata, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c. 456.—N. Granat.
Woolwardiæ, F. C. Lehm. ex Kraenzl. l. c. 452.—Ecuador.

MASSONIA, Thunb. (Liliac.).

- angustifolia*, Linn. f. Suppl. 193 = Polyxena angustifolia.
Burchellii, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. 393 = Polyxena Burchellii.
comata, Burch. ex Baker, l. c. 392 = Polyxena comata.
concinna, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 414.—Afr. austr.
Dregei, Baker, l. c. 412.—Afr. austr.
Greenii, Baker, l. c. 413.—Afr. austr.
longipes, Baker, l. c. 411.—Afr. austr.
marginata, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 299 = Polyxena marginata.
namaquensis, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 416.—Afr. austr.
odorata, Hook. f. Bot. Mag. t. 5891 = Polyxena odorata.
rugulosa, Licht. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 299 = Polyxena rugulosa.
undulata, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 420, in syn. = Polyxena marginata.
uniflora, Banks, ex Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 991 = Polyxena uniflora.

MASTIXIA, Blume (Cornac.).

- euonymoides*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. 295.—Ind. or.

MATAYBA, Aubl. = Ratonia, DC. (Sapind.).

- adenanthera*, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. 111. 615.—Bras.
atropurpurea, Radlk. l. c. 617.—Bras.
boliviana, Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 336.—Bolivia.
fallax, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. 111. 612.—Bras.
intermedia, Radlk. l. c. 619.—Bras.
leucodictya, Radlk. l. c. 628.—Bras.
macrolepis, Radlk. l. c. 605.—Bras.
pellens, Radlk. l. c. 628.—Bras.
stendictya, Radlk. l. c. 629.—Bras.
talisoides, Radlk. l. c. 618.—Bras.

MATRICARIA, Tourn. (Compos.).

- Schlechteri*, Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 208.—Afr. austr.

MATTHAEA, Blume (Monim.).

- calophylla*, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. 563.—Borneo.
latifolia, Perkins, l. c.—Penins. Mal.

MATTHIOLA, R. Br. (Crucif.).

- dimolehensis*, Baker f. in Journ. Bot. 1898, 2.—Afr. trop.
integriifolia, Kom. in Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. xxvi. 85.—Turkestan.
perennis, Conti, in Mém. Herb. Boiss. no. 18, 58.—Hispan.; Marocc.
pseudoxyceras, Conti, l. c. 71.—Afr. bor.; Ins. Canar.
Smithii, Baker f. in Journ. Bot. 1896, 50.—Afr. trop.
songarica, Conti, in Mém. Herb. Boiss. no. 18, 42.—As. cent.
spathulata, Conti, l. c. 49.—As. or.
superba, Conti, l. c. 23.—As. cent.

MAURIA, Kunth (Anacard.).

- glauca*, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 5.—Am. cent.

MAXILLARIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).

- Augustae-Victoriae*, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 483.—Ecuador.
chapidensis, Barb. Rodr. Pl. Matogross. 35.—Bras.
chlorochila, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 482.—N. Granat.
dichroma, Rolfe, in Kew Bull. 1893, 197.—Am. austr.
elegantula, Rolfe, l. c. 196.—Am. austr.
guayanensis, Klinge, in Act. Hort. Petrop. xvii. 1. 139.—Guiana.
jucunda, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 484.—Ecuador.
pachyneura, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c. 480.—Ecuador.
scurrilis, Hort. in Orchid. Rev. viii. 234.—Am. cent. ?
stenophylla, F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 481.—N. Granat.
urbaniana, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c. 483.—Ecuador.
vulcanica, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c. 484.—Ecuador.

MAYTENUS, Molina (Celastr.).

- flagellata*, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 20.—Bolivia.
tunarina, Loes. in Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 37.—Bolivia.

MAZAEA, Krug & Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1897,

- 265 = Neomazaea, Urb. (Rubiaceae).
phialanthoides, Krug & Urb. l. c. 266 = N. phialanthoides.

MAZUS, Lour. (Scrophul.).

- macranthus*, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 566.—China.

MECONOPSIS, Vig. (Papav.).

- Delavayi*, Franch. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. 311 (= Cathcartia Delavayi).—China.
grandis, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. 320.—Reg. Himal.
lanceifolia, Franch. ex Prain, l. c. 311 (= Cathcartia lanceifolia).—China.
oliveriana, Franch. ex Prain, l. c. 312.—China.
paniculata, Prain, l. c. 316.—Reg. Himal.
primulina, Prain, l. c. 319.—Reg. Himal.
sinuata, Prain, l. c. 314.—Reg. Himal.
superba, King, ex Prain, l. c. 317.—Reg. Himal.

MEDICA, Tourn. = Medicago, Tourn. (Legum.).

- disciformis*, Bub. Fl. Pyren. ii. 477 = M. disciformis.

MEDICA :—

- hirsuta*, Bub. Fl. Pyren. ii. 477 = M. minima.
littoralis, Bub. l. c. 476 = M. littoralis.
maculata, Bub. l. c. 478 = M. maculata.
maritima, Bub. l. c. 475 = M. marina.
muricata, Bub. l. c. 479 = M. muricata.
orbiculata, Bub. l. c. 474 = M. orbicularis.
pentacycla, Bub. l. c. 475 = M. denticulata.
Pourretii, Bub. l. c. 471 = M. Pourretii.
praecox, Bub. l. c. 477 = M. praecox.
reticulata, Bub. l. c. 480 = M. hispida.
scutellata, Bub. l. c. 474 = M. scutellata.
secundiflora, Bub. l. c. 473 = M. secundiflora.
sphaerocarpa, Bub. l. c. 480 = M. sphaerocarpa.
suffruticosa, Bub. l. c. 472 = M. suffruticosa.
sylvestris, Bub. l. c. 471 = M. falcata.
tribuloides, Bub. l. c. 477 = M. trunculata.
villosa, Bub. l. c. 478 = M. rigidula.

MEDICAGO, Tourn. (Legum.).

- heterocarpa*, Duerrnb. ex Murr. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv. 199 (non Spach).—Hybr.
orbicularioides, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 161.—Graecia.

MEDINILLA, Gaudich. (Melast.).

- africana*, Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 24.—Afr. trop.
Clarkei, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. 63.—Penins. Mal.
heteranthera, King, l. c. 61.—Penins. Mal.
Minahassæ, Koord. in Meded. S Lands Plantent. xix. 633.—Celebes.
mucronata, Koord. l. c. 467, nomen.—Celebes.
Musofu, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 480.—N. Guin.
perakensis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. 64.—Penins. Mal.
scandens, King, l. c. 60.—Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 62.—Penins. Mal.
venusta, King, l. c. 61.—Penins. Mal.

MEDIOCALCAR, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.

- vii. (1900) 3. **ORCHIDEAE.**
bicolor, J. J. Sm. l. c.—Ins. Amboin.

MEHANIA, Britton (Labiata).

- urticifolia*, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1899 (159), sphalm. 'urticifolia' (= Draccocephalum urticaefolium).—China; Japon.

MEGACARPAEA, DC. (Crucif.).

- gracilis*, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 13.—As. cent.

MEGAELINIUM, Lindl. (Orchid.).

- flaccidum*, Hook. Cent. Orch. t. 3 = Lindleyi.
imbricatum, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 37.—Afr. trop.
Lindleyi, Rolfe, l. c. 43.—Afr. trop.
maximum, Lindl. Bot. Reg. t. 1959 (non alibi) = Lindleyi.
Millenii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 40.—Afr. trop.
platyrhachis, Rolfe, l. c. 43.—Afr. trop.
purpuratum, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. 128 = maximum.
strobiliferum, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 38.—Afr. trop.

MEGALOCHLAMYS, Lindau, in Engl. Jahrb. xxvi.

- (1899) 345. **ACANTHACEAE.**
linifolia, Lindau, l. c. 346.—Afr. trop.
Marlothii, Lindau, l. c. 345.—Afr. trop.
strobilifera, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 241.—Afr. trop.

MEGALOPUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii.

- (1900) 491. **RUBIACEAE.**
Goetzei, K. Schum. l. c.—Afr. trop.

MEGAPTERIUM, Spach = Oenothera, Linn. (Onagr.).

- dissectum*, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 184 = O. dissecta.
oklahomense, Norton, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 153.—Am. bor.

MEGASKEPASMA, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v.

- (1897), 666. **ACANTHACEAE.**
erythrochlamys, Lindau, l. c.—Venez.

- MEGASTACHYA**, Beauv. = *Eragrostis*, Beauv. (Gramin.).
polymorpha, Beauv. *Agrost.* 74 = *E. amabilis*.
- MEIBOMIA**, Heist. = *Desmodium*, Desv. (Legum.).
arenicola, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 139 = *D. lineatum*.
huillensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 243 = *D. huillensis*.
incana, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. no. 7, 9.—Am. austr.
longifolia, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 140.—Am. bor.
megalantha, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 243 = *D. megalanthum*.
Michauxii, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 140 = *D. rotundifolium*, DC.
Scalpe, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 66 = *D. Scalpe*.
- MEIOPHYLLIDUM**, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. (1900) 54. *ANONACEAE*.
lepidotum, Engl. & Diels, *l. c.* 55 (= *Uvaria Zenkeri*).—Afr. trop.
- MELAMPODIUM**, Linn. (Compos.).
paludicola, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxi. 455.—Bras.
- MELAMPYRUM**, Tourn. (Scrophul.).
hoermannianum, Maly, in *Wiss. Mitth. Bosn. Hercegov.* 1900, 541.—Eur.
- MELANCRANIS**, Vahl = *Ficinia*, Schrad. (Cyperac.).
Macowanii, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 335 = *F. Macowanii*.
trispicata, Kuntze, *l. c.* = *F. sylvatica*.
- MELANDRIUM**, Roehl. = *Lychnis*, Linn. (Caryophyll.).
caespitosum, F. N. Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 431.—China.
glandulosum, F. N. Williams, *l. c.* 430 = *L. glandulosa*.
kialense, F. N. Williams, *l. c.* 432.—China.
lacerum, F. N. Williams, *l. c.* xxxii. 188 (= *Silene lacera*).—Reg. Caucas.
longicarpophorum, Kom. in *Trav. Soc. Nat. St. Pétersb.* xxvi. 132.—Turkestan.
platypetalum, F. N. Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 431.—China.
plutonicum, Reiche & Johow, *Fl. Chile*, i. 177 (= *Silene plutonica*).—Chili.
Souliei, F. N. Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 429.—China.
terminale, Reiche & Johow, *Fl. Chile*, i. 177 = *L. terminalis*.
- MELANOCENCHRIS**, Nees = *Gracilea*, Koen. (Gramin.).
Jacquemontii, Jaub. & Spach, *Illustr.* iv. 36 = *G. royleana*.
Perrotetii, Jaub. & Spach, *l. c.* 38 = *G. nutans*.
plumosa, Hochst. in *Flora*, xxxviii. 273 = *G. royleana*.
rothiana, Nees, in *Proc. Linn. Soc.* i. 95 = *G. nutans*.
royleana, Nees, *l. c.* = *G. royleana*.
- MELANOCHYLA**, Hook. f. (Anacard.).
bracteata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 506.—Penins. Mal.
densiflora, King, *l. c.* 503.—Penins. Mal.
Kunstleri, King, *l. c.* 504.—Penins. Mal.
nitida, King, *l. c.* 507.—Penins. Mal.
rugosa, King, *l. c.* 505.—Penins. Mal.
- MELANOPHYLLA**, Baker (Cornac.).
crenata, Baker, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2499.—Madag.
- MELANORRHOEA**, Wall. (Anacard.).
aptera, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 487.—Penins. Mal.
inappendiculata, King, *l. c.* 488.—Penins. Mal.
torquata, King, *l. c.* 486.—Penins. Mal.
woodsiana, *Scortech. ex King*, *l. c.* 485.—Penins. Mal.
- MELANOSELINUM**, Hoffm. = *Thapsia*, Linn. (Umbell.).
edule, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 247.—Ins. Mader.
- MELANTHERA**, Rohr (Compos.).
albinervia, O. Hoffm. in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 30.—Afr. trop.
- MELANTHERA** :—
cuanzensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 583.—Afr. trop.
elliptica, O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 474.—Afr. trop.
monochaeta, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 581.—Afr. trop.
scaberrima, Hiern, *l. c.* 582.—Afr. trop.
varians, Hiern, *l. c.* 580.—Afr. trop.
- MELANTHIUM**, Clayt. (Liliac.).
dispersum, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 606.—Am. bor.
tenuis, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* vii. 223 = *Wurmbea tenuis*.
- MELASMA**, Berg (Scrophul.).
atrosanguineum, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 769.—Afr. trop.
dentatum, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 394 (= *Hymenospermum dentatum*).—Afr. trop.
hippocrepandrum, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 768.—Afr. trop.
parviflorum, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 394 (= *Orobanche parviflora*).—Afr. trop.
pictum, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 770.—Afr. trop.
rigidum, Hiern, *l. c.* 767.—Afr. trop.
sessiliflorum, Hiern, *l. c.* (= *Alectra melampyroides*).—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, *l. c.* 769.—Afr. trop.
- MELASTOMA**, Burm. (Melast.).
Godeffroyi, Reinecke, in *Engl. Jahrb.* xxv. 661.—Ins. Samoa.
- MELHANIA**, Forsk. (Stercul.).
agnosta, K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 11.—Afr. austr.
angustifolia, K. Schum. *l. c.*—Afr. trop.
Dehnhardtii, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 302.—Afr. trop.
grandibracteata, K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 15.—Afr. trop.
malacochlamys, K. Schum. *l. c.* 13.—Afr. trop.
Phillipsiae, Baker f. in *Journ. Bot.* 1898, 4.—Afr. trop.
polyneura, K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 8.—Afr. trop.
Randii, Baker f. in *Journ. Bot.* 1899, 425.—Afr. trop.
somalensis, Baker f. *l. c.* 1898, 3.—Afr. trop.
virescens, K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* v. 6.—Afr. trop.
- MELIA**, Linn. (Meliac.).
bogoriensis, Koord. & Valet. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xvi. 18.—Java.
- MELIANTHUS**, Linn. (Sapind.).
insignis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 43.—Afr. austr.
villosus, Bolus, in *Journ. Bot.* 1896, 17.—Afr. austr.
- MELICA**, Linn. (Gramin.).
Bolusii, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 685.—Afr. austr.
caffrorum, Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III. 2073 = *racemosa*.
decumbens, Weber, *Spicil. Fl. Gotting.* 3 = *Danthonia decumbens*.
dendroides, Lehm. *Pugill.* iii. 39 = *decumbens*.
digitata, Roxb. *Hort. Beng.* 82; *Fl. Ind.* i. 326 = *Chloris incompleta*.
longiligula, Scribn. & Kearney, in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 225.—Am. bor.
Matsumurae, Huck. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 706.—Japon.
mollis, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 161.—Chili.
Neesii, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 687.—Afr. austr.
nitida, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 160.—Chili.
Pammelii, Scribn. ex Pammel, in *Contr. Bot. Dep. Iowa*, xv. 240.—Am. sept.
Paulseni, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 159.—Chili.
pumila, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 686.—Afr. austr.
rigida, Wibel, *Prim. Fl. Werth.* 117 = *Danthonia decumbens*.
rimarum, Gandoger, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 124.—Eur.
scaberrima, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 330.—Ind. or.
tortuosa, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciv. 161.—Chili.
- MELICOPE**, Forst. (Rutac.).
Beccarii, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. iv. 122 (= *Tetractomia Beccarii*).—Borneo.
fareana, Engl. *l. c.* (= *Eoodia fareana*).—Austral.
luzonensis, Engl. *l. c.*—Ins. Philipp.
Mahonyi, F. M. Bailey, *Queensl. Agric. Journ.* vi. 287.—N. Guin.
major, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. iv. 122 (= *Tetractomia majus*).—Malaya.
platynema, Engl. *l. c.* (= *Brombya platynema*).—Austral.
Roxburghii, Engl. *l. c.* (= *Tetractomia Roxburghii*).—Malaya.
- MELINIA**, Decne. (Asclep.).
atropurpurea, Malme, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ser. II.* xxxiv. no. 7, 72.—Bras.
urbaniana, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 19.—Bras.
- MELINIS**, Beauv. (Gramin.).
angolensis, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 200.—Afr. trop.
gracilis, Pilger, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 268, nomen.—Afr. trop.
tenuissima, Stapf, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2660.—Afr. trop.
tomentosa, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 201.—Afr. trop.
Welwitschii, Rendle, *l. c.*—Afr. trop.
- MELIOSMA**, Blume (Sabiac.).
cambodiana, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 360A.—Cochinch.
colletiana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 116.—Burma.
ferruginea, Kurz, ex King, *l. c.* (non *aliorum*).—Reg. Himal.
Glaziovii, Urb. *Symb. Antill.* i. 508.—Bras.
harmandiana, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 360.—Cochinch.
Henryi, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 452.—China.
impressa, Krug & Urb. in *Urb. Symb. Antill.* i. 517.—Ind. occ.
Itatiaiae, Urb. *l. c.* 510.—Bras.
levis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 457.—Penins. Mal.
Ridleyi, King, *l. c.* 458.—Singapore.
seleriana, Urb. *Symb. Antill.* i. 507.—Am. cent.
yunnanensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. 465.—China.
- MELISSA**, Tourn. (Labiata).
arvensis, Bub. *Fl. Pyren.* i. 411 = *Calamintha Acinos*.
inodora, Bornm. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlvi. 617 (non Hassk.).—Palaest.
montana, Bub. *Fl. Pyren.* i. 412 = *Calamintha alpina*.
- MELLERA**, S. Moore (Acanth.).
Briartii, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 210.—Afr. trop.
parvifolia, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 814.—Afr. trop.
submutica, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 51.—Afr. trop.
- MELLIHAMPTIA**, Gray (Asclep.).
ligulata, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 425 (= *Ensenia ligulata*).—Mexic.
- MELOCACTUS**, Tourn. (Cact.).
Bradleyi, Suring. in *Verh. Akad. Wet. Amst.* v. III. 23.—Ind. occ.
croceus, Suring. *l. c.* 40.—Ind. occ.
eustachianus, Suring. *l. c.* 37.—Ind. occ.
Hookeri, Suring. *l. c.* 31.—Ind. occ.
Linkii, Suring. *l. c.* 39.—Ind. occ.
- MELOCANNA**, Trin. (Gramin.).
gracilis, Kurz, ex Munro, in *Trans. Linn. Soc.* xxvi. 133 = *Schizostachyum chilanthum*.
Kursii, Munro, *l. c.* 134 = *Bambusa schizostachyoides*.
lutescens, Kurz, ex Gamble, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 414 = *Cephalostachyum flavescens*.
Rheedii, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 332 = *Ochlandra Rheedii*.
tenuispiculata, Kurz, ex Gamble, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 416 = *Schizostachyum Blumei*.
- MELOCHIA**, Dill. (Stercul.).
crinita, R. Br. ex Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 90.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, *l. c.* 91.—Afr. trop.

MELODINUS, Forst. (Apocyn.).

- australis, *Maiden & Betche*, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 647.—Austral.
 australis, *Pierre*, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 103* (= *Chilocarpus australis*).—Austral.
 Beccarii, *Pierre*, l. c. 98 (= *Ancylodadus Beccarii*).—Malaya.
 cambodiensis, *Pierre*, l. c. 103.—Cochinch.
 curvinervius, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz. v. 10.*—Borneo.
 hemsleyanus, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 539.—China.
 landolphioides, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 500.—N. Guin.
 ovalis, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz. v. 12.*—Borneo.
 Pancheri, *Pierre*, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 103.*—N. Caled.
 pulchrinervius, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz. v. 10.*—Borneo.
 rhytidiphyllus, *Boerl. l. c. 11.*—Borneo.

MELOLOBIUM, Eckl. & Zeyh. (Legum.).

- Wilmsii, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 283.—Afr. austr.

MELOTHRIA, Linn. (Cucurb.).

- affinis, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 38.—Malaya.
 crassifolia, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 483.—Am. bor.
 domingensis, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* i. 451.—Ind. occ.
 Nashii, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 483.—Am. bor.

MEMECYLON, Linn. (Melast.).

- andamanicum, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 85.—Ins. Andam. et Nicobar.
 Buchanani, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 40.—Afr. trop.
 calophyllum, *Gilg*, l. c. 42.—Afr. trop.
 candidum, *Gilg*, l. c. 43.—Afr. trop.
 cinereum, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 82.—Penins. Mal.
 cinnamomoides, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 39 (non G. Don).—Afr. trop.
 Cogniauxii, *Gilg*, l. c. 44.—Afr. trop.
 conocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 482.—N. Guin.
 dichotomum, *C. B. Clarke*, ex *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 75.—Penins. Mal.
 epiphyticum, *King*, l. c. 74.—Penins. Mal.
 erubescens, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 41.—Afr. trop.
 eryanthum, *K. Schum.* in *Just. Jahrb.* xxvi. i. 356, sphalm. = seq.
 erythranthum, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 45.—Afr. trop.
 flavovirens, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
 fruticosum, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 74.—Penins. Mal.
 Heinseni, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 42.—Afr. trop.
 heterophyllum, *Gilg*, l. c. 39.—Afr. trop.
 Hullettii, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 76.—Penins. Mal.
 hylophilum, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 42.—Afr. trop.
 jasminoides, *Gilg*, l. c. 39.—Afr. trop.
 Kunstleri, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 76.—Penins. Mal.
 Kurzii, *King*, l. c. 77.—Ins. Nicobar.
 leucocarpum, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 40.—Afr. trop.
 longicauda, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
 Machairacme, *Gilg*, l. c. 42.—Afr. trop.
 Millenii, *Gilg*, l. c. 39.—Afr. trop.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 633.—Celebes.
 myrianthum, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 44.—Afr. trop.
 Poggei, *Gilg*, l. c. 43.—Afr. trop.
 polyneuron, *Gilg*, l. c. 41.—Afr. trop.
 pubescens, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxix. 74.—Penins. Mal.
 pulcherrimum, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pfl.* ii. 41.—Afr. trop.
 purpureo-coeruleum, *Gilg*, l. c. 38.—Afr. trop.
 strychnoides, *Gilg*, l. c. 39 (non Baker).—Afr. trop.
 Zenkeri, *Gilg*, l. c. 43.—Afr. trop.

MEMORA, Miers (Bignon.).

- consanguinea, *Bureau & K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 267 (= *Spathodea consanguinea*).—Am. austr.
 flavida, *Bureau & K. Schum.* l. c. 264 (= *Bignonia flavida*).—Bras.
 involuocrata, *Bureau & K. Schum.* l. c. 271 (= *Phaseophora involuocrata*).—Bras.
 lenta, *Bureau & K. Schum.* l. c. 265 (= *Temnocydia lenta*).—Bras.
 obtusifoliolata, *Bureau & K. Schum.* l. c. 261.—Bras.

MENDONCIA, Vell. (Acanth.).

- crenata, *Lindau*, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 647.—Guiana.
 fulva, *Lindau*, l. c. 646.—Reg. Amazon.
 mollis, *Lindau*, in *Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 44.—Bras.
 obovata, *Lindau*, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 646.—Reg. Amazon.
 Sprucei, *Lindau*, l. c. 647.—Reg. Amazon.

MENKEA, Lehm. (Crucif.).

- coolgardiensis, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1897, 161.—Austral.

MENKENIA, Bub. Fl. Pyren. ii. 556 (1900) = **Lathyrus**, Tourn. (Legum.).

- canescens, *Bub.* l. c. 557 = *L. canescens.*
 ensifolia, *Bub.* l. c. 558 = *L. canescens.*
 lutea, *Bub.* l. c. 559 = *L. montanus.*
 nigrescens, *Bub.* l. c. = *L. niger.*
 saxatilis, *Bub.* l. c. = *L. ciliatus.*
 tuberosa, *Bub.* l. c. 557 = *L. macrorrhizus.*
 verna, *Bub.* l. c. 556 = *L. vernus.*

MENONVILLEA, R. Br. (Crucif.).

- falcata, *Reiche & Johow*, *Fl. Chile*, i. 55.—Chili.

MENTHA, Tourn. (Labiata.).

- Formae novae nonnullae, vide *Braun & Topitz*, in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* xiv. 55, 140.
 cinerea, *Merino*, *Contrib. Fl. Galic.* 114 (non aliorum).—Galic.
 cordata, *Pospich. Fl. Oesterr. Küst.* ii. 534.—Austria.
 paradoxa, *Pospich.* l. c. 543.—Austria.
 romana, *Bub. Fl. Pyren.* i. 385 = *viridis.*
 rubella, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 337.—Am. bor.
 varians, *Debeaux*, in *Magnier, Scrin. Fl. Sel.* (1897) fide *Just. Jahrb.* xxv. ii. 335.—Eur.

MENTZELIA, Plum. (Loasac.).

- andina, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 31.—Chili.
 citrina, *Urb. & Gilg*, l. c. 27.—Reg. Argent.
 compacta, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 275.—Am. bor.
 Conzattii, *Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 298.—Mexic.
 cordifolia, *Dombey*, ex *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 74.—Peruv.
 densa, *Greene*, *Pittonia*, iii. 99.—Am. bor.
 Galeottii, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 69.—Mexic.
 gracilis, *Urb. & Gilg*, l. c. 61.—Mexic.
 Grisebachii, *Urb. & Gilg*, l. c. 48.—Reg. Argent.
 imbricata, *Urb. & Gilg*, l. c. 67.—Mexic.
 incisa, *Urb. & Gilg*, l. c. 59.—Mexic.
 integrifolia, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 271 = *dispersa.*
 Karwinskii, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 65.—Mexic.
 leucophylla, *Brandege*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 448.—Am. bor.
 Lindheimeri, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 54.—Am. bor.; Mexic.
 lutea, *Greene*, *Pittonia*, iii. 99.—Am. bor.
 Orizabae, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 60.—Mexic.
 palmeriana, *Urb. & Gilg*, l. c. 75.—Mexic.
 parviflora, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 199.—Am. bor.
 perennis, *Wooton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 260.—Am. bor.
 pinnatifida, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 356 = *andina.*
 polyantha, *Urb. & Gilg*, l. c. 70.—Mexic.
 pterosperma, *Eastw.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 290.—Am. bor.

MENTZELIA :—

- Rusbyi, *Wooton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 261.—Am. bor.
 sessilifolia, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 57.—Mexic.
 soratensis, *Urb. & Gilg*, l. c. 68.—Bolivia.
 stenophylla, *Urb. & Gilg*, l. c. 80.—Am. bor.
 tenerrima, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 271.—Am. bor.
 texana, *Urb. & Gilg*, in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxxvi. 52.—Am. bor.
 Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 271.—Am. bor.

MEOSCHIUM, Beauv. = **Ischaemum**, Linn. (Gramin.).

- imbricatum, *Munro*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 127 = *I. aristatum.*
 Wightii, *Nees*, in *Wight, Cat. n. 1719* = *I. rugosum.*

MERCIERA, A. DC. (Campan.).

- azurea, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 447.—Afr. austr.

MERCURIALIS, Tourn. (Euphorb.).

- sylvestris, *Bub. Fl. Pyren.* i. 89 = *perennis.*

MERENDERA, Ram. (Liliac.).

- Badghyii, *Korsh. in Mem. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. no. 4, 99.—Turkestan.
 kurdica, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 79.—Oriens.

MERIANDBRA, Benth. (Labiata.).

- dianthera, *Briq.* in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 288 = *benghalensis.*

MERINGURUS, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxvi.

- Afd. II. no. 1 (1900) 27. **GRAMINEAE.**
 africanus, *Murb. l. c.*—Tunis.

MERINTHOPODIUM, Donn. Sm. in Coult. Bot.

- Gaz. xxiii. (1897) 11. **SOLANACEAE.**
 neuranthum, *Donn. Sm. l. c.* 12.—Am. cent.

MEROSTACHYS, Spreng. (Gramin.).

- argyronema, *Lindm. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 22.—Bras.

MEROSTELA, Pierre (Meliac.).

- grandifolia, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 342 = *grandis.*
 grandis, *Pierre*, l. c. sub t. 334, et t. 342.—Cochinch.

MERREMIA, Dennst. = **Convolvulus**, Tourn. (Convolv.).

- Gregorii, *Rendle*, in *Journ. Bot.* 1896, 39.—Afr. trop.
 linearifolia, *Hallier f.* in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xvi. 36, repr.—Guiana.
 Palmeri, *Hallier f.* l. c. 38 = *Ipomoea Palmeri.*
 pes-draconis, *Hallier f.* in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 537.—Afr. trop.
 somalensis, *Hallier f.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 226 = *C. somalensis, Vatke.*

MERTENSIA, Roth (Borag.).

- amoena, *A. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 195.—Am. bor.
 arizonica, *Greene*, *Pittonia*, iii. 197.—Am. bor.
 Bakeri, *Greene*, l. c. iv. 90.—Am. bor.
 brachyloba, *Greene*, l. c.—Am. bor.
 foliosa, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 243.—Am. bor.
 franciscana, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 549.—Am. bor.
 fusiformis, *Greene*, *Pittonia*, iv. 89.—Am. bor.
 intermedia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 335.—Am. bor.
 linearis, *Greene*, *Pittonia*, iii. 197.—Am. bor.
 longiflora, *Greene*, l. c. 261.—Am. bor.
 MacDougalii, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 550.—Am. bor.
 nivalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 336.—Am. bor.
 papillosa, *Greene*, *Pittonia*, iii. 261.—Am. bor.
 platyphylla, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 548.—Am. bor.
 polyphylla, *Greene*, *Pittonia*, iv. 87.—Am. bor.
 pratensis, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 550.—Am. bor.
 punctata, *Greene*, *Pittonia*, iv. 88.—Am. bor.
 strigosa, *Greene*, l. c.—Am. bor.
 subcordata, *Greene*, l. c. 89.—Am. bor.

MERTENSIA :—

- tubiflora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 544.—Am. bor.
 Tweedyi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 336.—Am. bor.
 umbratilis, *Greenm. in Erythraea*, 1899, 118.—Am. bor.
 viridis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 244.—Am. bor.

MERYTA, Forst. (Aral.)

- colorata, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 283.—N. Guin.
 drakeana, *Nad. in Journ. de Bot.* 1897, 105.—Ins. Societ.
 mauransis, *Nad. l. c.* 106.—Ins. Societ.

MESADENIA, Rafin. = **Senecio**, Tourn. (Compos.)

- diversifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 182 = *S. floridanus*.
 floridana, *Greene, l. c.* 183 = *S. floridanus*.
 tuberosa, *Britton, ex Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 474 = *S. Nuttallii*.

MESANTHUS, Nees = **Cannomois**, Beauv. (Restiac.)

- macrocarpus, *Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II.* 451 = *C. Cephalotes*.

MESEMBRYANTHEMUM, Dill. (Ficoid.)

- arenosum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 79.—Afr. austr.
 brevipes, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 126.—Afr. austr.
 calcaratum, *Wolley-Dod, in Journ. Bot.* 1900, 170.—Afr. austr.
 chrysoleucum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 126.—Afr. austr.
 cradockense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 109.—Afr. austr.
 dasyphyllum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 127.—Afr. austr.
 Fenchelii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 79.—Afr. austr.
 grandifolium, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.
 harazianum, *Deflers, Voy. Yemen*, 140.—Arab.
 insigne, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 127.—Afr. austr.
 Kuntzei, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 80.—Afr. trop.
 montanum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 127.—Afr. austr.
 nanum, *Schlechter, l. c.* 128.—Afr. austr.
 nubigenum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 316.—Afr. austr.
 olivaceum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 128.—Afr. austr.
 oxysepalum, *Schlechter, l. c.* 129.—Afr. austr.
 parvulum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 pulvinatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 109.—Afr. austr.
 ramosissimum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 130.—Afr. austr.
 Rehmannii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 80.—Afr. trop.
 sabulosum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 130 (non aliorum).—Afr. austr.
 Schenckii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App.* III. 80.—Afr. austr.
 schoenlandianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 130.—Afr. austr.
 subspinatum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 109.—Afr. austr.
 Urbanianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 445.—Afr. austr.

MESONA, Blume (Labiata.)

- parviflora, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 865 = *wallichiana*.

MESOSPHERUM, P. Br. = **Hyptis**, Jacq. (Labiata.)

- alopecuroides, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 201 = *H. alopecuroides*.
 amaurocaulos, *Briq. l. c.* 211 = *H. amaurocaulos*.
 Biolleyi, *Briq. l. c.* 200 = *H. Biolleyi*.
 brachiatum, *Briq. l. c.* 215 = *H. brachiata*.
 chacapoyense, *Briq. l. c.* 204 = *H. chacapoyensis*.
 chapalense, *Briq. l. c.* 203 = *H. chapalensis*.
 constrictum, *Briq. l. c.* 217 = *H. constricta*.
 costulatum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 797 = *H. costulata*.
 diaphorum, *Briq. l. c.* 786 = *H. diaphora*.
 dyscheres, *Briq. l. c.* 794 = *H. dyscheres*.
 Gardneri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 230 = *H. Gardneri*.

MESOSPHERUM :—

- gymnodontum*, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 795 = *H. gymnodonta*.
 hygrobium, *Briq. l. c.* 789 = *H. hygrobia*.
 idiocephalum, *Briq. l. c.* 792 = *H. idiocephala*.
 Jurgenseni, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 219 = *H. Jurgenseni*.
 Karsteni, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xii. 103.—N. Granat.
 kuntzeanum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 787 = *H. kuntzeana*.
 leucochlorum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 196 = *H. leucochlorata*.
 longifrons, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 793 = *H. longifrons*.
 macrosiphon, *Briq. l. c.* 785 = *H. macrosiphon*.
 macroterum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 210 = *H. macrotera*.
 macrotrichum, *Briq. l. c.* 195 = *H. macrotricha*.
 Pittieri, *Briq. l. c.* 220 = *H. Pittieri*.
 plagiostoma, *Briq. l. c.* 197 = *H. plagiostoma*.
 rugosum, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 156 = *H. radiata*.
 savannarum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 216 = *H. savannarum*.
 siderotrichum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 791 = *H. siderotricha*.
 spicatum, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 83 = *H. spicata*.
 subnudum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 231 = *H. subnuda*.
 subviolaceum, *Briq. l. c.* 222 = *H. subviolacea*.
 tenellum, *Briq. l. c.* 223 = *H. tenella*.
 trachychroma, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 790 = *H. trachychroa*.
 Vauthieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 199 = *H. Vauthieri*.
 velascanum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv.* 798 = *H. velascanum*.

METALASIA, R. Br. (Compos.)

- Massoni, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 372.—Afr. austr.

METASTELMA, R. Br. (Asclep.)

- aemulans, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 252.—Ind. occ.
 atrorubens, *Schlechter, l. c.* 263.—Ind. occ.—
 barbadense, *Schlechter, l. c.* 253.—Ind. occ.
 bonplandianum, *Schlechter, l. c.* 259.—Ind. occ.
 crassiusculum, *Schlechter, l. c.* 261.—Ind. occ.
 decaisneanum, *Schlechter, l. c.* 250.—Ind. occ.
 decipiens, *Schlechter, l. c.* 249.—Ind. occ.
 domingense, *Schlechter, l. c.* 251.—Ind. occ.
 Eggersii, *Schlechter, l. c.* 258.—Ind. occ.
 ephedroides, *Schlechter, l. c.* 262.—Ind. occ.
 fallax, *Schlechter, l. c.* 249.—Ind. occ.
 Fawcettii, *Schlechter, l. c.* 260.—Ind. occ.
 Harrisii, *Schlechter, l. c.* 256.—Ind. occ.
 Hartii, *Schlechter, l. c.*—Ind. occ.
 leptocladum, *Schlechter, l. c.* 261 (= *Vincetoxicum leptocladum*).—Am. austr.; Ind. occ.
 macropoda, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 481.—Mexic.
 martinicensis, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 251.—Ind. occ.
 Mathewsii, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 497.—Bolivia.
 palustre, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 258 (= *Amphistelma salinarum*).—Ind. occ.
 paniciflorum, *Schlechter, l. c.* 260.—Ind. occ.
 Picardae, *Schlechter, l. c.* 248.—Ind. occ.
 Readii, *Schlechter, l. c.* 255.—Ind. occ.
 salinarum, *Wright, in Saww. Fl. Cub.* 120 (= *Amphistelma salinarum*).—Ind. occ.
 stenoglossum, *Schlechter, l. c.* 252.—Ind. occ.
 tylophoroides, *Schlechter, l. c.* 259.—Ind. occ.
 urbanianum, *Schlechter, l. c.* 254.—Ind. occ.

METHONICA, Tourn. = **Gloriosa**, Linn. (Liliac.)

- grandiflora, *Hook. Bot. Mag.* t. 5216 = *G. virescens*.
 Leopoldi, *Van Houtte, ex Lem. in Fl. des Serres*, tt. 163-4 = *G. virescens*.
 petersiana, *Klotzsch, ex Garcke, in Peters, Reise Mossamb.* Bot. 519, t. 54 = *G. virescens*.
 platyphylla, *Klotzsch, l. c.* 520, t. 55 = *G. virescens*.
 virescens, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 277 = *G. virescens*.

METRODORA, A. St. Hil. = **Esenbeckia**, Kunth

- (Rutac.).
 brevifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 29.—Bras.
 selleana, *Engl. l. c.*—Bras.

METROXYLON, Rottb. (Palm.)

- oxybracteatum, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 202.—N. Guin.

MEZONEURUM, Desf. (Legum.)

- furfuraceum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 471.—Ind. or.
 Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 233.—Penins. Mal.

MICHELIA, Linn. (Magnol.)

- celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 681.—Celebes.

MICHELELLA, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.

- iv. HI A. 325 (1897). **LABIATAE**.
 anisata, *Briq. l. c.* (= *Collinsonia anisata*).—Am. bor.
 verticillata, *Briq. l. c.* (= *Collinsonia verticillata*).—Am. bor.

MICONIA, Ruiz & Pav. (Melast.)

- erioneura, *Cogn. ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 38.—Bolivia.
 glomerulifera, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 15.—Bolivia.
 Kuntzei, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 93.—Bolivia.
 lasiocalyx, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 218.—Bolivia.
 micrantha, *Cogn. l. c.* 16.—Bolivia.
 valida, *Cogn. l. c.* 278.—Bolivia.

MICRANTHUS, Wendl. = **Phaylopsis**, Willd.

- (Acanth.).
 glandulosus, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxii. 115 = *P. glandulosa*.
 Hensii, *Lindau, l. c.* 114 = *P. obliqua*.
 imbricatus, *Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, i. 217 = *P. parviflora*.
 lankesterioides, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xx. 9 = *P. lankesterioides*.
 longifolius, *Lindau, in Engl. Pf. Ost.-Afr.* C. 367 = *P. longifolia* et *P. falcisepala*.
 Poggei, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xvii. 108 = *P. Poggei*.

MICROBAMBUS, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv.

- (1897) 336. **GRAMINEAE**.
 macrostachys, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

MICROCHARIS, Benth. (Legum.)

- Galpini, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1897, 258.—Afr. austr.

MICROCHLOA, R. Br. (Gramin.)

- abyssinica, *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) I. Intell. 20; et in *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 404 = *setacea*.
 altera, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 637.—Afr. austr.
 elongata, *R. Br. in Wall. Cat. n.* 3807 = *setacea*.
 ensifolia, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 219.—Afr. trop.

MICROCHONEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.

- n. s. i. (1898) 31. **APOCYNACEAE**.
 lucida, *Pierre, l. c.* 32.—Cochinch.

MICROCOELIA, Lindl. = **Angraecum**, Bory(Orchid.)

- exilis, *Lindl. Gen. & Sp. Orch.* 61 = *A. Chiloschistae*.

MICRODESMIS, Hook. f. (Euphorb.)

- paniculata, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 25.—Afr. trop.
 Zenkeri, *Pax, l. c.* xxiii. 531.—Afr. trop.

MICROGLOSSA, DC. (Compos.)

- Afzelli, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 469.—Afr. trop.

MICROLAENA, R. Br. (Gramin.)

- Giulianettii, *Stapp, in Kew Bull.* 1899, 114.—N. Guin.

MICROLOMA, R. Br. (Asclep.)

- longituba, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss. iv.* 445.—Afr. austr.
 Massonii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 2 = *Astephanus Massoni*.

MICROLONCHOIDES, Candargy, in Bull. Soc.

- Bot. Fr. xlv. (1897) 145. **COMPOSITAE**.
 pinnatum, *Candargy, l. c.* 146.—Graecia.

MICROMERIA, Benth. (Labiata).

- balkanica*, *Vel. Fl. Bulg. Suppl. i. 235*.—Bulgar.
insularis, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 149*.
 —Graecia.
longiflora, *Hochst. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 453*.—Afr. trop.
punctata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 378 = biflora.
Purtschelleri, Guerke, in Engl. Hochgebirgsfl. Trop. Afr. 365 = biflora.
Schimperi, Vathe, in Linnaea, xxxvii. 326 = biflora.
unguentaria, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 124 = longiflora.

MICROSERIS, D. Don (Compos.).

- nigrescens*, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 348*.
 —Am. bor.

MICROSTEMON, Engl. (Anacard.).

- Curtisi*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 498*.—
 Penins. Mal.

MICROSTERIS, Greene, Pittonia, iii. (1898) 300.**POLEMONIACEAE.**

- andicola*, *Greene, l. c. 303*.—Chili.
californica, *Greene, l. c. 302*.—Am. bor.
diffusa, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 313*.—Am. bor.
glabella, *Greene, Pittonia, iii. 301*.—Am. bor.
gracilis, *Greene, l. c. 300*.—Am. bor.
humilis, *Greene, l. c. 301*.—Am. bor.
Mac Dougalii, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 621*.—Am. bor.
micrantha, *Greene, Pittonia, iii. 303*.—Am. bor.
stricta, *Greene, l. c. 302*.—Am. bor.

MICROSTYLIS, Nutt. (Orchid.).

- andamanica*, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 582*.—Ins. Andaman.
aphylla, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 18*.—Ind. or.
cordifolia, *Rolfe, in Kew Bull. 1899, 127*.—Celebes.
elegans, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 264*.—
 Borneo.
laciniosa, *Ridley, l. c.*—Borneo.
maculata, *Ridley, l. c. 263*.—Borneo.
madagascariensis, *Klinge, in Act. Hort. Petrop. xvii. 1. 140*.—Madag.
maximowicziana, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 329*.—Reg. Himal.
mindorensis, *Rendle, in Journ. Bot. 1896, 357*.—Ins. Philipp.
minutiflora, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss. vii. 540*.
 —Am. cent.
moluccana, *J. F. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 2*.—
 Ins. Molucc.
nigrescens, *J. F. Sm. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 324*.—Celebes.
perakensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 222*.—
 Penins. Mal.
platyglossa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 35*.—Mexic.
prasina, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 223*.—
 Siam.
reineckeanana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxv. 600*.—Ins. Samoa.
repens, *Rolfe, in Kew Bull. 1899, 127*.—Celebes.
saprophyta, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 118*.—Reg. Himal.
streptopetala, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 36*.—Mexic.
trigonopetala, *J. F. Sm. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 324*, nomen.—Celebes.

MICROTAENA, Prain (Labiata).

- praineana*, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 556*.—China.

MICROTROPIS, Wall. (Celastr.).

- elliptica*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 340*.—
 Penins. Mal.
filiformis, *King, l. c. 342*.—Penins. Mal.
occidentalis, *Loes. ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 393*.—Am. cent.
schiedeanana, *Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 98*.—Mexic.

MICROULA, Benth. (Borag.).

- Benthami*, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 167* = tibetica.
sikkimensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. sub t. 2562*.—
 Ind. or.
tibetica, *Maxim. Mdl. Biol. x. 682*.—Tibet.

MIEDIEGA, Bub. Fl. Pyren. ii. 504 (1900) = *Dorycnium*, Linn. (Legum.).

- gracilis*, Bub. l. c. 505 = D. herbaceum.
procumbens, Bub. l. c. 506 = *Anthyllis Gerardi*.
suffruticosa, Bub. l. c. 505 = D. suffruticosum.

MIERSIOPHYTON, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 405. **MENISPERMACEAE.**

- nervosum*, *Engl. l. c. 406* (= *Chasmanthera nervosa*).
 —Afr. trop.

MIKANIA, Willd. (Compos.).

- catharinensis*, *Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 796*.—
 Bras.
chimboraensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 15*.—Ecuador.
fragilis, *Urb. Symb. Antill. i. 464*.—Ind. occ.
Gonzalezii, *Robinson & Greenm. in Proc. Bot. Nat. Hist. Soc. xxix. 107*.—Mexic.
lanceolata, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 17*.
 —Reg. Andin.
loensis, *Hieron. l. c. 18*.—Ecuador.
Niederleini, *Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 792*.—Reg. Argent.
odoratissima, *Urb. Symb. Antill. i. 464*.—Ind. occ.
orleansensis, *Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 790*.—
 Bras.
pachyphylla, *Urb. Symb. Antill. i. 463*.—Ind. occ.
porosa, *Urb. l. c. 465*.—Ind. occ.
saltensis, *Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 794*.—Reg. Argent.
Schenkii, *Hieron. l. c. 797*.—Bras.
siambonensis, *Hieron. l. c. 790*.—Reg. Argent.
Sodiroti, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 16*.—
 Ecuador.
tropaeolifolia, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxiv. 468*.—
 Afr. trop.
Ulei, *Hieron. in Engl. Jahrb. xxii. 795*.—Bras.
variifolia, *Hieron. l. c. 793*.—Reg. Argent.

MILTUM, Linn. (Gramin.).

- ascendens*, *Roxb. Hort. Beng. 8* = effusum.
arundinaceum, *Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 45* =
Oryzopsis miliacea.
capillare, *Roth, Nov. Pl. Sp. 39* = *Panicum subeglime*.
Carar, *Ham. ex Wall. Cat. n. 8750 F* = *Eriochloa*
polystachya.
caucasicum, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 209*.—Reg. Caucas.
cimicinoides, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 70*
 = *Arundinella setosa*.
cimicinum, *Linn. Mant. ii. 184* = *Axonopus cimicinus*.
dubium, *Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 235* =
 effusum.
filiforme, *Roxb. Hort. Beng. 8*; *Fl. Ind. i. 314* = *Digitaria*
longiflora.
Laguchinia, *Ham. ex Wall. Cat. n. 8750 G* = *Eriochloa*
polystachya.
laterale, *Regel, in Act. Hort. Petrop. vii. 645* = *Oryzopsis*
lateralis.
minutiflorum, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. 121*
 = *Paspalum Perrottetii*.
multiflorum, *Cav. Desc. 36* = *Oryzopsis miliacea*.
orixense, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 21* =
Eriochloa polystachya.
ovatum, *Heyne, ex Wall. Cat. n. 8752* = *Digitaria*
puberula.
radiatum, *Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 18* =
Digitaria longiflora.
ramosum, *Retz. Obs. vi. 22* = *Eriochloa polystachya*.
tenerum, *Heyne, ex Wall. Cat. n. 3829 B* = *Eragrostis*
pilosa.
triracemosum, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 18*
 = *Digitaria longiflora*.

MILLA, Cav. (Liliac.).

- bonariensis*, *Gilg, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. 382*
 = *Brodiaea uniflora*.
brevipes, *Baker, l. c. 386* = *Brodiaea brevipes*.
hirtella, *Baker, l. c. 385* = *Brodiaea hirtella*.
hyacinthina, *Baker, l. c.* = *Brodiaea hyacinthina*.
patagonica, *Baker, l. c. 382* = *Brodiaea patagonica*.
poepigiana, *Baker, l. c. 383* = *Brodiaea poepigiana*.
sellowiana, *Baker, l. c.* = *Brodiaea sellowiana*.
sessiliflora, *Baker, l. c. 382* = *Brodiaea sessiliflora*.
setacea, *Baker, l. c. 385* = *Brodiaea setacea*.
subbiflora, *Baker, l. c.* = *Brodiaea subbiflora*.
tweediana, *Griseb. in Goett. Abh. xxiv. 319* = *Brodiaea*
uniflora.

MILIA :—

- uniflora*, *R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan. 1833) 174* = *Brodiaea uniflora*.
violacea, *Baker, in Journ. Bot. 1874, 5* = *Brodiaea*
violacea.

MILLEGRANA, Adans. = *Radiola*, Dill. (Linac.).

- Radiola*, *Druce, Fl. Berks. 114* = *R. linoides*.

MILLETIA, Wight & Arn. (Legum.).

- adenopetala*, *Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 184*.—Afr. trop.
albiflora, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 92*.—
 Penins. Mal.
Bockii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 412*.—
 China.
cauliflora, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 94*.—
 Penins. Mal.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 15*; *et in Ann. Mus. Congo, Sér. III. 61*.—
 Afr. trop.
decipiens, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 90*.—
 Penins. Mal.
dielsiana, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 412*.
 —China.
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 287*.—Afr. trop.
goetzeana, *Harms, l. c. xxviii. 404*.—Afr. trop.
hemsleyana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 90*.
 —Penins. Mal.
impresa, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 288*.—Afr. trop.
macroura, *Harms, l. c. 289*.—Afr. trop.
micrantha, *Harms, l. c. 290*.—Afr. trop.
monophylla, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
ocarpa, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 92*.—
 Penins. Mal.
paucijuga, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 287*.—Afr. trop.
pilipes, *F. M. Bailey, Cat. Pl. Queensl. 83*; *Queensl. Fl. 397*.—Austral.
puerarioides, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 358*.—
 Ind. or.
sanagana, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 288*.—Afr. trop.
sericantha, *Harms, l. c. xxviii. 404*.—Afr. trop.
Soyauxii, *Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 185*.—Afr. trop.
stipularis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 363*.—
 Sumatra.
unifoliata, *Prain, l. c. 93*.—Penins. Mal.
wrightiana, *Prain, l. c. 359*.—Burma.
zenkeriana, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 291*.—Afr. trop.

MILNEA, Roxb. = *Aglaiia*, Lour. (Meliac.).

- pirifera*, *Pierre, Fl. Cochinch. t. 339 A* = *A. pirifera*.

MILTONIA, Lindl. (Orchid.).

- Binoti*, *Cogn. in Gard. Chron. 1897, II. 393*.—Bras.

MILULA, Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. (1896) 164.**LILIACEAE.**

- spicata*, *Prain, l. c. 165*.—Ind. or.

MIMOSA, Linn. (Legum.).

- acapulcensis*, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xxviii. 135*.
 —Mexic.
albolanata, *Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 433*.—Bras.
Brandegei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 316*.
 —Calif.
caerulea, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 141*.—Mexic.
calicola, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 325*.
 —Mexic.
Campanoni, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1300*.
 —Madag.
coelocarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 319*.—
 Mexic.
cyclophylla, *Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 429*.—Bras.
Deamii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 324*.—
 Mexic.
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 253*.—Afr. trop.
dolichocephala, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 66*.
 —Parag.
eurycarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 322*.
 —Mexic.
formosana, *Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 433*.—Bras.
gracilipes, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 67*.—
 Parag.
Goldmanii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 308*.
 —Mexic.

MIMOSA :—

- hapaloclada, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 40.—Bras.
 Hildebrandti, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1300.—Madag.
 Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 67.—Bolivia.
 lacerata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 141.—Mexic.
 levenensis, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1300.—Madag.
 longepedunculata, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 432.—Bras.
 longepetiolata, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 38.—Bras.
 Nelsonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 314.—Mexic.
 neptunioides, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 67.—Bolivia.
 paraizensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 430.—Bras.
 psilocarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 325.—Mexic.
 purpurascens, *Robinson, l. c.* xxxiii. 317.—Calif.
 pyreneae, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 430.—Bras.
 Kosei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 317.—Mexic.
 setosissima, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 434.—Bras.
 sicyocarpa, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 313.—Mexic.
 speciosissima, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxii. 431.—Bras.
 Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 254.—Afr. trop.
 tocantina, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 431.—Bras.
 tomentosa, *Taub. l. c.* 434 (non aliorum).—Bras.
 Ulei, *Taub. l. c.* 432.—Bras.
 velascoensis, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 68.—Bolivia.
 Vepres, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 46.—Parag.
 Vilersii, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1299.—Madag.

MIMULOPSIS, Schweinf. (Acanth.).

- arborescens, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 57.—Afr. trop.
 Elliottii, *C. B. Clarke, l. c.* 56.—Afr. trop.
 spathulata, *C. B. Clarke, l. c.* 55.—Afr. trop.
 Thomsoni, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

MIMULUS, Linn. (Scrophul.).

- clivicola, *Greenm. in Erythea*, vii. 119.—Am. bor.
 coccineus, *Congdon, in Erythea*, vii. 187.—Calif.
 corallinus, *Greene, in Erythea*, iv. 21.—Calif.
 jungermannioides, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 154.—Am. bor.
 pilosellus, *Greene, in Erythea*, iv. 22.—Calif.
 serotinus, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xviii. 154.—Am. bor.
 thermalis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 269.—Am. bor.
 Tolmiei, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 351 = nanus, *Hook. & Arn.*
 viscidus, *Congdon, in Erythea*, vii. 187.—Calif.

MIMUSOPS, Linn. (Sapot.).

- andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 646.—Afr. trop.
 Djave, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 279.—Afr. trop.
 frondosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 645.—Afr. trop.
 natalensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 279 (= *Makea natalensis*).—Afr. austr.
 natalensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 441 = marginata.
 obovata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 279 (non Sond.).—Afr. trop.
 penduliflora, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 448.—Afr. trop.
 riparia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

MINA, Cerv. (Convolv.).

- cordata, *Micheli, in Rev. Hort.* 1898, 554; 1899, 308 = lobata.
 lobata, *Cerv. in La Llav. & Lex. Nov. Veg. Descr.* i. 3.—Mexic.

MINKELERSIA, Mart. & Gal. (Legum.).

- multiflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 142.—Mexic.
 pauciflora, *Rose, l. c.*—Mexic.

MINUARTIA, Linn. = *Arenaria*, Rupp. (Caryophyll.).
 peploides, *Hiern, in Journ. Bot.* 1899, 322 = *A. peploides*.
 rubella, *Hiern, l. c.* 320 = *A. verna*.
 sedoides, *Hiern, l. c.* 321 = *A. sedoides*.
 stricta, *Hiern, l. c.* 320 = *A. stricta*.
 tenuifolia, *Hiern, l. c.* 321 = *A. tenuifolia*.
 verna, *Hiern, l. c.* 320 = *A. verna*.

MINURIA, DC. (Compos.).

annua, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxiii. 288 (= *Minuriella annua*).—Austral.

MINURIELLA, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xxiii. (1899) 288. *COMPOSITAE*.
 annua, *Tate, l. c.*—Austral.

MIQUELIA, Arn. & Nees = *Garnotia*, Brongn. (Gramin.).

courtallensis, Arn. & Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. 177 = *G. courtallensis*.
 elata, Arn. & Nees, ex *Miq. Analect. Bot.* ii. 20 = *G. scoparia*.
 Emodi, Arn. & Nees, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. 177 = *G. polygonooides*.

MIRABILIS, Riv. (Nyctag.).

Cervantesii, *Heimerl, in Jahrb. Staats-Oberrealsch.* Fünfhaus, Wien, xxiii. repr. 23 (= *Oxybaphus nyctagineus*).—Am. bor.
 glutinosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 265.—Bolivia.
 prostrata, *Heimerl, in Jahrb. Staats-Oberrealsch.* Fünfhaus, Wien, xxiii. repr. 21 (= *Oxybaphus micranthus*).—Chili.

MIRBELIA, Sm. (Legum.).

microphyloides, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1897, 164.—Austral.

MISCANTHUS, Anderss. (Gramin.).

condensatus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 639.—Japon.
 floridulus, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 166 = japonicus.
 Matsumurae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 640.—Japon.
 oligostachyus, *Stafp, in Kew Bull.* 1898, 227.—Japon.

MITELLA, Tourn. (Saxifr.).

anomala, *Piper, in Erythea*, vii. 162.—Am. bor.
 diversiloba, *Piper, l. c.*—Am. bor.
 integripetala, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 689.—Japon.
 micrantha, *Piper, in Erythea*, vii. 162.—Am. bor.
 stauropetala, *Piper, l. c.* 161.—Am. bor.
 stenopetala, *Piper, l. c.*—Am. bor.
 stylosa, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* v. 688.—Japon.
 violacea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 248.—Am. bor.

MITELLA STRA, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 201 (1898). *SAXIFRAGACEAE*.

caulescens, *Howell, l. c.* (= *Mitella caulescens*).—Am. bor. occ.

MITRACARPUM, Zucc. (Rubiace.).

megapotamicum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 121 = sellowianum.

MITRAGYNA, Korth. (Rubiace.).

diversifolia, *Havil. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 71.—Ind. or.; Malaya.
 hirsuta, *Havil. l. c.* 72.—Cochinch.
 rubrostipulacea, *Havil. l. c.* 73 (= *Adinarubrostipulata*).—Afr. trop.

MITREPHORA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).

chrysocarpa, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. II. 141 (= *Orophea chrysocarpa*).—Borneo.
 ferruginea, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 334.—Celebes.
 glandulifera, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 60.—Hab.?
 Minahassae, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 335.—Celebes.
 mollis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 320.—N. Guin.
 ovata, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. II. 141 (= *Orophea ovata*).—N. Guin.
 oxycarpa, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 335.—Celebes.

MITREPHORA :—

paralleivenia, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 32; et in *Ic. Bogor.* i. II. 140.—Borneo.
 rugosa, *Boerl. ll. cc.* (= *Uvaria rugosa*).—Java.
 rupestris, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 61.—Celebes.
 sumatrana, *Boerl. l. c.* i. II. 141 (= *Orophea sumatrana*).—Sumatra.

MNESITHEA, *Kunth = Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.).
 laevis, *Kunth, Rév. Gram.* i. 154 = *R. perforata*.

MNIOPSIS, Mart. (Podostem.).

crulsiana, *Warm. in Overs. Danske Vid. Selsk. Ser. VI.* ix. 138.—Bras.

MODECCA, Lam. (Passifl.).

celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 638.—Celebes.

MOKOFUA, *Kuntze (Ternstroem.).*

Lorentzii, *Kuntze, l. c.* (= *Taonabo Lorentzii*).—Bolivia.

MOLINIA, Schrank (Gramin.).

japonica, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 704.—Japon.

MOLLERA, O. Hoffm. (Compos.).

huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 569.—Afr. trop.
 punctulata, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

MOLLINEDIA, Ruiz & Pav. (Monim.).

acutissima, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxvii. 672.—Bras.
 aphanantha, *Perkins, l. c.* 658.—Bras.
 argyrogyna, *Perkins, l. c.* 661.—Bras.
 blumenaviana, *Perkins, l. c.* 669.—Bras.
 calodonta, *Perkins, l. c.* 678.—Bras.
 caloneura, *Perkins, l. c.* 663.—Bolivia.
 Canfieldiae, *Perkins, l. c.* 676.—Bras.
 chrysophylla, *Perkins, l. c.* 651.—Bras.
 chrysorrhachis, *Perkins, l. c.* 665.—Bras.
 corcovadensis, *Perkins, l. c.* 666.—Bras.
 cuneata, *Perkins, l. c.* 676.—Bras.
 cyathantha, *Perkins, l. c.* 679.—Bras.
 engleriana, *Perkins, l. c.* 660.—Bras.
 eugeniifolia, *Perkins, l. c.* 661.—Bras.
 fasciculata, *Perkins, l. c.* 671.—Bras.
 fruticulosa, *Perkins, l. c.* 670.—Bras.
 gilgiana, *Perkins, l. c.* 656.—Bras.
 glabra, *Perkins, l. c.* 657 = pellucens.
 Glaziouii, *Perkins, l. c.*—Bras.
 grosseserrata, *Perkins, l. c.* 673.—Peruv.
 guatemalensis, *Perkins, l. c.* 679.—Am. cent.
 heteranthera, *Perkins, l. c.* 655.—Bras.
 howeana, *Perkins, l. c.* 654.—Bras.
 hyliphila, *Perkins, l. c.* 680.—Bras.
 iomalla, *Perkins, l. c.* 663.—Bras.
 lamprophylla, *Perkins, l. c.* 656.—Bras.
 leiantha, *Perkins, l. c.* 657.—Bras.
 longicuspidata, *Perkins, l. c.* 653.—Bras.
 lowtheriana, *Perkins, l. c.* 666.—Bras.
 mexicana, *Perkins, l. c.* 674.—Mexic.
 micrantha, *Perkins, l. c.* 668.—Bras.
 myriantha, *Perkins, l. c.* 655.—Bras.
 obovata, *Perkins, l. c.* 679.—Bras.
 oligantha, *Perkins, l. c.* 653.—Bras.
 oligotricha, *Perkins, l. c.* 658.—Bras.
 Orizabae, *Perkins, l. c.* 674.—Mexic.
 pachypoda, *Perkins, l. c.* 659.—Bras.
 pachysandra, *Perkins, l. c.* 672.—Bras.
 Perkinsiae, *Rusby, ex Perkins, l. c.* 682 = rusbyana.
 pfitzeriana, *Perkins, l. c.* 670.—Bras.
 polyantha, *Perkins, l. c.* 677.—Bras.
 puberula, *Perkins, l. c.* 668.—Bras.
 pyreneae, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 427.—Bras.
 rusbyana, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxvii. 682.—Bolivia.
 salicifolia, *Perkins, l. c.* 659.—Bras.
 schottiana, *Perkins, l. c.* 677 = brasiliensis.
 sphaerantha, *Perkins, l. c.* 660.—Bras.
 stenophylla, *Perkins, l. c.* 669.—Bras.
 uleana, *Perkins, l. c.* 661.—Bras.
 undulata, *Perkins, l. c.* 653.—Bras.
 Warmingii, *Perkins, l. c.* 662.—Bras.

MOLLUGO, Linn. (Ficoid.).

namaquensis, Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 121.—Afr. austr.
tenella, Bolus, l. c. 122.—Afr. austr.

MOLOPOSPERMUM, Koch (Umbell.).

cicutaeifolium, Bub. Fl. Pyren. ii. 414 = *cicutarium*.

MOMORDICA, Tourn. (Cucurb.).

clarkeana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvii. 35.—Penins. Mal.
fasciculata, Cogn. in Bull. Herb. Boiss. v. 636.—Afr. trop.
gracilis, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 25.—Afr. trop.
sessilifolia, Cogn. in Bull. Herb. Boiss. iv. 821.—Afr. trop.

MONACHYRON, Parl. (Gramin.).

roseum, Parl. Fl. Ital. i. 131, in obs. = *Tricholaena rosea*.
tonsum, Parl. l. c. = *Tricholaena rosea*.

MONACTINOCEPHALUS, Klatt, in Bull. Herb.

Boiss. iv. (1896) 474. **COMPOSITAE**.
paniculatus, Klatt, l. c.—Afr. austr.

MONADENIA, Lindl. = **Disa**, Berg (Orchid.).

conferta, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 810 = *D. conferta*.
leydenburgensis, Kraenzl. l. c. 811.—Afr. austr.
sabulosa, Kraenzl. l. c. 814.—Afr. austr.
tenuis, Kraenzl. l. c. 819 = *D. tenuis*.

MONADENIUM, Pax (Euphorb.).

Descampsii, Pax, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. 108.—Afr. trop.
echinulatum, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2666.—Afr. trop.
laeve, Stapf, l. c.—Afr. trop.
simplex, Pax, in Bull. Herb. Boiss. vi. 743.—Afr. trop.

MONANTHEMUM, Scheele, in Flora, 1843, 314 =

MORISIA, J. Gay (Crucif.).
acaule, Scheele, l. c. = *M. hypogaea*.

MONARDA, Linn. (Labiata).

stricta, Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1893, 263.—Am. sept.

MONECHMA, Hochst. (Acanth.).

affine, Hochst. in Flora, 1843, 76 = *bracteatum*.
angustifolium, Nees, in DC. Prod. xi. 412 = *bracteatum*.
arenicola, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 238.—Afr. trop.
bracteatum, Hochst. in Flora, 1841, 375.—Afr. trop.
ciliatum, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 411 = *Echobium Anisacanthus*.
cleomoides, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 220.—Afr. trop.
debilis, Nees, in DC. Prod. xi. 411 = *bracteatum*.
depauperatum, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 217.—Afr. trop.
desertorum, C. B. Clarke, l. c. 218.—Afr. trop.
floridum, C. B. Clarke, l. c. 219.—Afr. trop.
genistifolium, C. B. Clarke, l. c. 218.—Afr. trop.
hereroense, C. B. Clarke, l. c. 220.—Afr. trop.
hispidum, Hochst. in Flora, 1841, 375.—Afr. trop.
lolioides, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 218.—Afr. trop.
marginatum, C. B. Clarke, l. c. 217.—Afr. trop.
Nepeta, C. B. Clarke, l. c. 219.—Afr. trop.
Salsola, C. B. Clarke, l. c. 220.—Afr. trop.
scabridum, C. B. Clarke, l. c. 217.—Afr. trop.
scabrinerve, C. B. Clarke, l. c. 215.—Afr. trop.
spissum, C. B. Clarke, l. c. 219.—Afr. trop.
subsessile, C. B. Clarke, l. c. 216.—Afr. trop.
tettense, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
ukambense, C. B. Clarke, l. c. 220.—Afr. trop.
varians, C. B. Clarke, l. c. 216.—Afr. trop.
Welwitschii, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.

MONNIERA, B. Juss. (Scrophul.).

calycina, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 760.—Afr. trop.
dianthera, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 98.—Ind. occ.
occultans, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 760.—Afr. trop.
Ranaria, Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxiv. no. 5, 10.—Bras.

MONNINA, Ruiz & Pav. (Polygal.).

alatrodrupacea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 10.—Bolivia.
Bangii, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iv. 243.—Bolivia.
chimboraizeana, Chod. l. c. 247.—Ecuador.
clarkeana, Chod. l. c. 246.—Peruv.
Francheti, Chod. l. c. 248.—Am. trop.
gracilis, Chod. l. c. 244.—Bolivia.
guatemalensis, Chod. l. c. 249.—Am. cent.
Laureola, Chod. l. c. 245.—Bolivia.
macrocarpa, Chod. l. c. 252.—Bras.
macroclada, Chod. l. c. 246.—Bolivia.
mucronata, Arech. in Anal. Mus. Montevid. ix. 75.—Urug.
Pearcii, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iv. 243.—Bolivia.
pseudostipulata, Chod. l. c. 245.—Bolivia.
rugosa, Chod. l. c. 251.—Peruv.
Rusbyi, Chod. in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 6.—Bolivia.
subserata, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iv. 250.—Mexic.
weddelliana, Chod. l. c. 244.—Bolivia.

MONOCHILUS, Wall. = **Zeuxine**, Lindl. (Orchid.).

lepidus, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 110 = *Cheirostylis lepidus*.
tetrapterus, Reichb. f. l. c. = *Z. tetraptera*.

MONOCHORIA, Presl (Ponteder.).

vaginialis, Kirk, in Journ. Linn. Soc. viii. 147 = *Heteranthera kotschyana*.

MONODORA, Dun. (Anonac.).

congolana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 13.—Afr. trop.
crispata, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 301.—Afr. trop.
Dewevzei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 11.—Afr. trop.
Junodii, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 301.—Afr. austr.
Preussii, Engl. & Diels, l. c.—Afr. trop.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 12.—Afr. trop.
Zenkeri, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 301.—Afr. trop.

MONOON, Miq. = **Polyalthia**, Blume (Anonac.).

Bemban, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. 45 = *P. Bemban*.

MONOPETALANTHUS, Harms, in Engl. &

Prantl. Pflanzenf. Nachtr. i. 195; et in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 265. **LEGUMINOSAE**.
Pteridophyllum, Harms, l. c. 195; l. c. 266.—Afr. trop.

MONOPHYLLAEA, R. Br. (Gesner.).

hirticalyx, Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 125; *vide* K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 535.—Penins. Mal.

MONOPYRENA, Speg. in Rev. Agron. La Plata,

1897, 559. **VERBENACEAE**.
serpyllifolia, Speg. l. c.—Patag.

MONOSPORA, Hochst. = **Trimeria**, Harv. (Bixac.).

trinervis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 9 = *T. trinervis*.

MONOSTICHE, Koern. (Scitamin.).

Danielli, Horan. Prodr. Scit. 13, t. 3 = *Thaumatococcus Danielli*.

MONOTES, A. DC. (Dipterocarp.).

acuminatus, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 153.—Afr. trop.
caloneurus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 136.—Afr. trop.
glandulosus, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1299.—Afr. trop.
hypoleucus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 134 = *africanus*.
magnificus, Gilg, l. c. 135.—Afr. trop.
rufotomentosus, Gilg, l. c. 138.—Afr. trop.

MONOTHECIUM, Hochst. (Acanth.).

abbreviatum, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 466.—Afr. trop.

MONOTROPA, Linn. (Monotrop.).

multiflora, Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 426 = *Hypopitys multiflora*.

MONOTROPSIS, Schweinf. = **Schweinitzia**, Ell.

(Monotrop.).
Reynoldsiae, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 5 = *S. Reynoldsiae*.

MONTAÑOIA, Cerv. (Compos.).

anomala, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 508.—Mexic.
guatemalensis, Robinson & Greenm. l. c. 514.—Am. cent.
hexagona, Robinson & Greenm. l. c.—Mexic.
macrolepis, Robinson & Greenm. l. c. xxxii. 44.—Mexic.
myriocephala, Robinson & Greenm. l. c. xxxiv. 511.—Mexic.
Palmeri, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 93.—Mexic.
Pittieri, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 517.—Am. cent.
Pringlei, Robinson & Greenm. l. c. 512.—Mexic.
purpurascens, Robinson & Greenm. l. c. 515.—Am. cent.
Rosei, Robinson & Greenm. l. c. xxxii. 45.—Mexic.
Schottii, Robinson & Greenm. l. c. xxxiv. 518.—Am. cent.
seleriana, Robinson & Greenm. l. c. 510.—Mexic.

MONTIA, Mich. (Portul.).

arenicola, Howell, Fl. N. W. Amer. 96 (= *Claytonia arenicola*).—Am. bor.
depressa, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898, 221 (= *Claytonia depressa*).—Am. bor.
flagellaris, Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am. i. i. 276 (= *Claytonia chamissonis*).—Am. bor.
humifusa, Howell, Fl. N. W. Amer. 96.—Am. bor.
interrupta, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898, 222.—Am. bor.
latifolia, Suksd. l. c.—Am. bor.
rosulata, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 79.—Am. bor.
sarmentosa, Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am. i. i. 272 (= *Claytonia sarmentosa*).—Am. bor.
saxosa, Brandegee, ex Robinson, l. c. 274 (= *Claytonia saxosa*).—Am. bor.
washingtoniana, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898, 220 (= *Claytonia washingtoniana*).—Am. bor.

MONTIOPSIS, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 14 (1898).

PORTULACACEAE.
boliviana, Kuntze, l. c. 15.—Bolivia.

MONTOLIVAEA, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd.

(Orchid.).
elegans, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 107 = *H. Montolivaea*.
unalaschensis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 107 = *Herminium congestum*.

MOQUINIA, DC. (Compos.).

mollissima, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxii. no. 5, 76.—Bras.

MORAEA, Mill. (Irid.).

aurantiaca, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 575 (non *aliorum*).—Afr. trop.
bella, Harms, in Engl. Jahrb. xxviii. 364.—Afr. trop.
glauca, J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 352.—Afr. austr.
gracilis, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. 272.—Afr. trop.
gracilis, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 478 = *tenuis*.
kitambensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 575.—Afr. trop.
macra, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 377.—Afr. austr.
macrantha, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 340.—Afr. trop.
montana, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 92.—Afr. austr.
multiflora, Soland. ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 18 = *polystachya*.
Randii, Rendle, in Journ. Bot. 1898, 144.—Afr. trop.
stenocarpa, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 93.—Afr. austr.
sulphurea, Baker, in Bot. Mag. t. 7658.—Afr. austr.
xerospatha, MacOwan, ex Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 529.—Afr. austr.

MORICANDIA, DC. (Crucif.).

tuberosa, Kom. in Trav. Soc. Nat. St. Pétersb. xxvi. 112.—Turkestan.

MORINDA, Linn. (Rubiace.).

Buchii, Urb. Symb. Antill. i. 480.—Ind. occ.

MORISIA, J. Gay (Crucif.).

acaulis, Gay, in Gaz. de Turin, 1829, 24 = *hypogaea*.

- MORMODES**, Lindl. (Orchid.).
oberlanderianum, F. C. Lehm. & Kraenzl. in Gard. Chron. 1900, II. 317.—N. Granat.
- MORONGIA**, Britton (Legum.).
aculeata, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 4 = Schrankia aculeata.
floridana, A. A. Heller, l. c. = Schrankia floridana.
horridula, A. A. Heller, l. c. 5 = Schrankia uncinata.
- MOSCHOPSIS**, Phil. (Calycer.).
monocephala, Reiche, in Engl. Jahrb. xxix. 118 (= *Boopis monocephala*).—Am. austr.
- MOSCHOSMA**, Reichb. (Labiata).
urticifolium, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 358.—Afr. trop.
- MOSCHOXYLUM**, A. Juss. = *Trichilia*, P. Br. (Meliac.).
pachypodium, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 17.—Bolivia.
viride, Rusby, l. c. 18.—Bolivia.
- MOSELEYA**, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2592 (1899) = *Ellisophyllum*, Max. (Hydrophyll.).
pinnata, Hemsl. l. c. = *E. reptans*.
- MOSENODENDRON**, R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. Ser. II. xxxiv. no. 5 (1900) 8. ANONACEAE.
insigne, R. Fries, l. c. 9.—Bras.
- MOSTUEA**, Didr. (Logan.).
angolana, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 700 (= *Coinochlamys angolana*).—Afr. trop.
camporum, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 117.—Afr. trop.
densiflora, Gilg, l. c. xxiii. 198.—Afr. trop.
Dinklagei, Gilg, l. c. xxviii. 116.—Afr. trop.
erythrophylla, Gilg, l. c. 117.—Afr. trop.
Lujaei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxix. 67.—Afr. trop.
neurocarpa, Gilg, in Engl. Jahrb. xxviii. 116.—Afr. trop.
penduliflora, Gilg, l. c. xxiii. 198.—Afr. trop.
ulugurensis, Gilg, l. c.—Afr. trop.
- MOTANDRA**, A. DC. (Apocyn.).
rostrata, K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 307, nomen.—Afr. trop.
- MOURERA**, Aubl. (Podostem.).
glazioviana, Warm. in Overs. Danske Vid. Selsk. Ser. VI. ix. 114.—Bras.
schwackeana, Warm. l. c. 117.—Bras.
- MOUROCOA**, Aubl. (Convolv.).
Hieronymi, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 217.—Am. austr.
Juramenti, Kuntze, l. c. (= *Ipomoea Lorentzii*).—Am. austr.
megapotamica, Kuntze, l. c. (= *Ipomoea megapotamica*).—Am. austr.
Petersi, Kuntze, l. c. 218 (= *Ipomoea sericophylla*, Peter).—Am. cent.
- MOUTABEA**, Aubl. (Polygal.).
silvatica, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 441.—Bras.
- MSUATA**, O. Hoffm. (Compos.).
Buettneri, O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter. xiii. 21, descr.—Afr. trop.
- MUCUNA**, Adans. (Legum.).
Bakeri, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 630.—Celebes.
ericarpha, Barb. Rodr. Pl. Nov. Jard. Bot. Rio, vi. 11.—Bras.
ferruginea, Matsum. ex Ito & Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xii. 422.—Formosa.
mattogrossensis, Barb. Rodr. Pl. Mattogross. 15.—Bras.
pluricostata, Barb. Rodr. Pl. Nov. Jard. Bot. Rio, vi. 9.—Bras.
Poggei, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 194.—Afr. trop.
pulcherrima, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 630.—Celebes.
rhynchosoides, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 194.—Afr. trop.
Warburgii, K. Schum. & Lauferb. Fl. Deutsch. Südsee, 365.—N. Guin.
- MUEHLENBERGIA**, Schreb. (Gramin.).
cincinnata, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 330, sphalm. = seq.
cincinnata, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 356.—Reg. Argent.
densiflora, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 18.—Mexic.
duthiaeana, Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 259 = sylvatica.
flaviseta, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. viii. 11.—Mexic.
ligulata, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 19 = *Chaboissaea ligulata*.
palustris, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 47.—Am. bor.
- MULGEDIUM**, Cass. = *Lactuca*, Tourn. (Compos.).
Velenovskii, Urumoff, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1899, 201.—Bulgar.
- MULLAGHERA**, Bub. Fl. Pyren. ii. 507 (1900) = *Lotus*, Tourn. (Legum.).
communis, Bub. l. c. 509 = *L. corniculatus*,
compressa, Bub. l. c. 510 = *L. ornithopodioides*.
conjugata, Bub. l. c. 575 = *L. conjugatus*.
decumbens, Bub. l. c. 520 = *L. tenuifolius*.
edulis, Bub. l. c. 575 = *L. edulis*.
uliginosa, Bub. l. c. 509 = *L. uliginosus*,
variabilis, Bub. l. c. 508 = *L. angustissimus*.
- MUNROA**, Torr. (Gramin.).
benthamiana, Hack. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 357.—Reg. Argent.
- MUNRONIA**, Wight (Meliac.).
pauciflora, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 282 = *Philastrea pauciflora*.
sinica, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 425.—China.
yunnanensis, Ind. Kew. Suppl. i. 288, sphalm. = *Meliosma yunnanensis*.
- MURALTIA**, Neck. (Polygal.).
alticola, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 391.—Afr. austr.
aspalathoides, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 434.—Afr. austr.
brachyceras, Schlechter, l. c. xxvii. 165.—Afr. austr.
decipiens, Schlechter, l. c. xxiv. 435.—Afr. austr.
Dodii, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 500.—Afr. austr.
empleuridioides, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 435.—Afr. austr.
exilis, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 218.—Afr. austr.
Flanaganii, Bolus, in Journ. Bot. 1896, 17.—Afr. austr.
nepalathoides, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 486, sphalm. = *aspalathoides*.
oxysepala, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 436.—Afr. austr.
pungens, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
- MURUCOA**, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 217 (1898) = *MOUROCOA*, Aubl. = *Maripa*, Aubl. (Convolv.).
- MUSA**, Linn. (Scitamin.).
Bakeri, Hook. f. Bot. Mag. t. 7627.—Cochinch.?
celebica, Warb. ex K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Musac. 22.—Celebes.
elephantorum, K. Schum. & Warb. ex K. Schum. l. c. 14.—Afr. trop.
lanceolata, Warb. ex K. Schum. l. c. 19.—Celebes.
paradisiaca, Linn. Sp. Pl. 1043.—Zeylan.
Schweinfurthii, K. Schum. & Warb. ex K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Musac. 14.—Afr. trop.
tomentosa, Warb. ex K. Schum. l. c. 22.—Celebes.
- MUSCARI**, Tourn. (Liliac.).
apertum, Freyn & Conrath, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iv. 194.—As. Min.
macranthum, Freyn, l. c. 192.—As. Min.
Sintenisii, Freyn, l. c. 193.—As. Min.
- MUSENIOPSIS**, Coult. & Rose (Umbell.).
biennis, Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad. i. 130.—Mexic.
glauca, Coult. & Rose, l. c. 131.—Mexic.
madrensis, Coult. & Rose, l. c. 130.—Mexic.
ovata, Coult. & Rose, l. c. 133.—Mexic.
pubescens, Coult. & Rose, l. c. 134.—Mexic.
purpurea, Coult. & Rose, l. c. 132.—Mexic.
reticulata, Coult. & Rose, l. c. 133.—Mexic.
submontana, Coult. & Rose, l. c. 131.—Mexic.
tenuissima, Coult. & Rose, l. c.—Mexic.
- MUSENIUM**, Nutt. (Umbell.).
vaginatum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 288.—Am. bor.
- MUSSAENDA**, Burm. (Rubiace.).
procera, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 155.—N. Guin.
rivularis, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 452.—Afr. trop.
tristigmatica, Cummins, in Kew Bull. 1898, 74.—Afr. trop.
- MUTISIA**, Linn. f. (Compos.).
Andersoni, Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 80.—Ecuador.
chubutensis, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 612.—Patag.
Moyanoi, Speg. l. c. 613.—Patag.
pulchella, Speg. l. c. 614.—Patag.
Sodiroidi, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 79.—Ecuador.
- MYGINDA**, Jacq. (Celastr.).
Gaumeri, Loes. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 401.—Mexic.
Gommeri, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 345, sphalm. = praec.
- MYOSOTIS**, Tourn. (Borag.).
oreophila, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxviii. 539.—N. Zel.
polyantha, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 275.—N. Zel.
tenuifolia, Colenso, l. c. 276.—N. Zel.
venosa, Colenso, l. c. xxviii. 606.—N. Zel.
- MYOSURUS**, Linn. (Ranunc.).
lepturus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 12.—Am. bor.
major, Greene, Pittonia, iii. 257.—Am. bor.
patagonicus, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 488.—Patag.
tenellus, Greene, Pittonia, iii. 258.—Am. bor.
- MYRCEUGENIA**, Berg = *Myrtus*, Linn. (Myrtac.).
fernandesiana, Johow, Fl. Juan Fernandez, 94 = *M. fernandeziana*.
Schulzei, Johow, l. c. 96.—Ins. J. Fernand.
- MYRCIA**, DC. (Myrtac.).
Bangii, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 36.—Bolivia.
seleriana, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 332.—Am. cent.
- MYRIACHAETA**, Zoll. & Mor. = *Thysanolaena*, Nees (Gramin.).
glauca, Mor. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 404 = *T. Agrostis*.
- MYRIANTHEMUM**, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. (1897) 266. MELASTOMACEAE.
mirabile, Gilg, l. c.—Afr. trop.
- MYRIANTHUS**, Beauv. (Urtic.).
cuneifolius, Engl. Monog. Afr. Pf. i. 40.—Afr. trop.
Holstii, Engl. l. c. 41.—Afr. trop.
- MYRICA**, Linn. (Myricac.).
pumila, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 126.—Am. bor.
- MYRICA**, Bub. Fl. Pyren. ii. 713 (1900) = *Myricaria*, Desv. (Tamarisc.).
pannonica, Bub. l. c. = *M. germanica*.
- MYRIOSTACHYA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 327 (1897). GRAMINEAE.
wightiana, Hook. f. l. c.—Ind. or.
- MYRISTICA**, Linn. (Myristic.).
affinis, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 422.—Celebes.
Albertisii, Warb. l. c. 532.—N. Guin.
amplifolia, Warb. l. c. 517.—Sumatra.
anceps, Warb. l. c. 528.—N. Guin.
apiculata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 88 (= *Gymnocranthera apiculata*).—Borneo.
aruensis, Boerl. l. c. 85 (non *aruana*, Bl.).—Malaya.
Avis-paradisiaca, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 528.—Hab.?
Baeuerlenii, Warb. l. c. 541.—N. Guin.
batjanica, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 85.—Malaya.
Beccarii, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 518.—Borneo.
borneensis, Warb. l. c. 401.—Borneo.
carnosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 87.—Borneo.

MYRISTICA :—

- Chalmersii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 539.—N. Guin.
 contorta, *Warb. l. c.* 507.—Ind. or.
 contracta, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 88 (= *Gymnacranthera contracta*).—Borneo.
 Cookii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 414.—Cochinch.
 coriacea, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 92.—Borneo.
 crassinervis, *Boerl. l. c.* 88 (= *Gymnacranthera crassinervis*).—Borneo.
 crassipes, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 326.—N. Guin.
 crassithyrsa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Celebes.
 Cumingii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 442.—Ins. Philipp.
 elegans, *Pierre, ex Warb. l. c.* 615.—Cochinch.
 euryocarpa, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 327.—N. Guin.
 fallax, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 410.—Borneo.
 garciniifolia, *Warb. l. c.* 525.—N. Guin.
 globosa, *Warb. l. c.* 540.—N. Guin.
 Hollrungii, *Warb. l. c.* 490.—N. Guin.
 impressa, *Warb. l. c.* 537.—Celebes.
 Koordersii, *Warb. l. c.* 619.—Celebes.
 Korthalsii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 90.—Borneo.
 Labillardieri, *Boerl. l. c.* 85.—Java.
 lenta, *Pierre, ex Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 534.—Cochinch.
 leptocarpa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Malaya.
 longipes, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 535.—N. Guin.
 Macgregori, *Warb. l. c.* 479.—N. Guin.
 macrocarpa, *Warb. l. c.* 533.—N. Guin.
 malayana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 91.—Malaya.
 maxima, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 385.—Malaya.
 Minahassae, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Celebes.
 mindanaensis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 497.—Ins. Philipp.
 montanoides, *Warb. l. c.* 514.—Ins. Molucc.
 Motleyi, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Borneo.
 Muelleri, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 502.—Austral.
 neglecta, *Warb. l. c.* 542.—N. Guin.
 oligocarpa, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—Borneo.
 olivaeformis, *Boerl. l. c.*—N. Guin.
 pachythyrsa, *Boerl. l. c.* 86.—Celebes.
 papillosa, *Boerl. l. c.* 85.—Java.
 paucinervis, *Boerl. l. c.* 87.—Borneo.
 pectinata, *Boerl. l. c.* 90.—Borneo.
 polyantha, *Boerl. l. c.* 85.—Malaya.
 pseudo-argentea, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 453.—N. Guin.
 pulverulenta, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 87.—N. Guin.
 resinosa, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 536.—N. Guin.
 reticulata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Borneo.
 Riedelii, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 417.—Sumatra.
 Roxburghii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Malaya.
 rufa, *Boerl. l. c.* 90.—Borneo.
 salomonensis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 527.—Ins. Solomon.
 schumanniana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 328.—N. Guin.
 sericea, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 521.—Malaya.
 Smithii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 85.—Malaya.
 stenocarpa, *Boerl. l. c.* 91.—Ins. Philipp.
 stenophylla, *Boerl. l. c.* 88 (= *Gymnacranthera stenophylla*).—Malay.
 sulcata, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 538.—N. Guin.
 suluensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 88 (= *Gymnacranthera suluensis*).—Ins. Philipp.
 sumbavana, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 529.—Malaya.
 tomentella, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 91.—Malaya.
 tristis, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 444.—N. Guin.
 umbellata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 92.—Borneo.
 villosa, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 419.—Borneo.
 Vordermanni, *Warb. l. c.* 525.—Malaya.

MYRISTICA :—

- wallaceana, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 530.—Malaya.
MYRMECODIA, Jack (Rubiaceae).
 Beccarii, *Hook. f. Bot. Mag. t.* 6883.—Austral.
 Dahlii, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 153.—N. Brit.
 pentasperma, *K. Schum. l. c.* 154.—N. Brit.
MYROBALANUS, Gaertn. = **Terminalia**, Linn. (Combr.)
Balansaei, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 87 = T. Balansaei.
MYROSMA, Linn. f. (Scitum).
 guapilense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 251.—Am. cent.
MYROXYLON, Linn. f. (Legum.).
 caledonicum, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 58.—N. Caled.
 Warburgii, *Brig. l. c.* 60.—Urug.
MYRSINE, Linn. (Myrsin.).
 congesta, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir.* i. 6.—Bras.
 lanceolata, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 873 (non aliorum).—Ins. Sandw.
 papuana, *Hemsl. in Kew Bull.* 1899, 104.—N. Guin.
 tenuifolia, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands. Plantent.* xxxiii. 232.—Java.
 viridis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 74.—Bolivia.
MYRSTIPHYLLUM, P. Br. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).
 cristatum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 493 = P. cristata.
 horisontalis, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 102 = P. horizontalis.
 macrodiscus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 494 = Chasalia macrodiscus.
 nigropunctatum, *Hiern, l. c.* 493 = P. nigropunctata.
 reptans, *Hiern, l. c.* = P. reptans.
MYRTEOLA, Berg = **Myrtus**, Tourn. (Myrtac.).
 leucomyrtillus, *Reiche, Fl. Chile*, ii. 286 = M. leucomyrtillus.
MYRTILLOCACTUS, Console, in *Boll. Ort. Bot. Palermo*, 1897, 8. **CACTACEAE**.
 geometrizans, *Console, l. c.* 10 (= *Cereus geometrizans*).—Mexic.
MYRTILLUS, Gilib. = **Vaccinium**, Linn. (Vaccin.).
 exigua, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 16 = V. Vitis-idaea.
 grandis, *Bub. l. c.* 17 = V. uliginosum.
MYRTOPSIS, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf.* iii. iv. (1896) 137. **RUTACEAE**.
 Novae-Caledoniae, *Engl. l. c.*—N. Caled.
MYRRTUS, Tourn. (Myrtac.).
 arbutifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 92 = Eugenia arbutifolia.
 Chekenilla, *Kuntze, l. c.* 90 = Eugenia apiculata.
 coactanea, *Kuntze, l. c.* 91 = Eugenia coactanea.
 Conceptionis, *Kuntze, l. c.* 91.—Parag.
 Cruickshanksii, *Kuntze, l. c.* = Eugenia Cruickshanksii.
 Guajava, *Kuntze, l. c.* = Psidium Guajava.
 guineensis, *Kuntze, l. c.* = Psidium Araca.
 Hauthalii, *Kuntze, l. c.*—Parag.
 Langsdorffii, *Kuntze, l. c.* = Eugenia Langsdorffii.
 major, *Kuntze, l. c.* 92 = Eugenia capensis.
 montevidensis, *Kuntze, l. c.*—Am. trop.
 moraviana, *Kuntze, l. c.* = Eugenia moraviana.
 myrciopsis, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
 osteomeloides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 36.—Bolivia.
 phillyraefolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 92 = Eugenia phyllireafolia.
 Pitanga, *Kuntze, l. c.* = Eugenia Pitanga.
 rigidifolia, *Kuntze, l. c.* 89 = Eugenia rigidifolia.
 striatula, *Kuntze, l. c.* 92 = Psidium striatulum.
 subglomerata, *Kuntze, l. c.* = Eugenia glomerata.
 thyrsoidea, *Kuntze, l. c.*—Bras.
 Veneris, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 639 = communis.
 Yapacani, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 89.—Bras.
MYSTACIDIUM, Lindl. (Orchid.).
 angustum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 570.—Afr. trop.
 astroarche, *Rolfe, l. c.* 170.—Afr. trop.
 Batesii, *Rolfe, l. c.* 172.—Afr. trop.
 cilaosianum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 424.—Bourbon.

MYSTACIDIUM :—

- clavatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 172.—Afr. trop.
 costatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 425 (= *Angraecum costatum*).—Bourbon.
 crassifolium, *Cordem. l. c.* 422.—Bourbon.
 curvatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 174.—Afr. trop.
 distichum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. 337.—Afr. trop.
 Gravenreuthii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 171.—Afr. trop.
 hariotianum, *Kraenzl. in Journ. de Bot.* 1897, 153.—Madag.
 Hermanni, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 421.—Bourbon.
 infundibulare, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 170.—Afr. trop.
 Keniae, *Rolfe, l. c.* 171.—Afr. trop.
 longicaudatum, *Rolfe, l. c.* 170.—Afr. trop.
 longinode, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 424 (= *Angraecum longinode*).—Bourbon.
 minutum, *Cordem. l. c.* (= *Angraecum minutum*).—Bourbon.
 multiflorum, *Cordem. l. c.* 425 (= *Angraecum multiflorum*).—Ins. Mascar.
 nanum, *Cordem. l. c.* 423 (= *Angraecum nanum*).—Bourbon.
 obversifolium, *Cordem. l. c.* 425 (= *Angraecum obversifolium*).—Bourbon.
 pectinatum, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xviii. 337.—Ins. Mascar.
 pedunculatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 175.—Afr. trop.
 pingue, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 421 (= *Angraecum pingue*).—Bourbon.
 pseudo-petiolum, *Cordem. l. c.* 425 (= *Angraecum pseudo-petiolum*).—Bourbon.
 salazianum, *Cordem. l. c.* 423.—Bourbon.
 Schumanni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 173.—Afr. trop.
 spicatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 423.—Bourbon.
 striatum, *Cordem. l. c.* 422.—Bourbon.
 Tridens, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 174.—Afr. trop.
 undulatum, *Cordem. in Rev. Gén. de Bot.* xi. 425.—Bourbon.
 verrucosum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 171.—Afr. trop.
 Walleri, *Rolfe, l. c.* 172.—Afr. trop.
MYSTACINUS, Rafin. = **Helinus**, E. Mey. (Rhamn.).
 arabicus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 39 = H. arabica.
 brevipes, *Kuntze, l. c.* = H. brevipes.
 lanceolatus, *Kuntze, l. c.* = H. lanceolatus.
 Mystacinus, *Kuntze, l. c.* = H. Mystacinus.
 ovatus, *Kuntze, l. c.* = H. ovatus.
MYSTROXYLON, Eckl. & Zeyh. = **Elaeodendron**, Jacq. (Tiliac.).
 aethiopicum, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 223 = E. aethiopicum.
 comorense, *Loes. l. c.* = Cassine comorenensis.
 englerianum, *Loes. l. c.* = Cassine engleriana.
 Goetzei, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 158.—Afr. trop.
 Holstii, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 223.—Afr. trop.
 Rehmannii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 160 = E. Rehmannii.
 Schlechteri, *Loes. l. c.* 159.—Afr. trop.
MYZODENDRON, Banks (Santal.).
 Commersoni, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 557.—Reg. Magell.
 gayanum, *Van Tiegh. l. c.*—Chili.
 recurvum, *Van Tiegh. l. c.*—Chili.
 rioquinoense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 284.—Chili.

N

- NABALUS**, Cass. = **Prenanthes**, Vaill. (Compos.).
 sagittata, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 463.—Am. bor.
NACREA, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 357. **COMPOSITAE**.
 lanata, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.

- NAJAS**, Linn. (Naiad.).
affinis, *Rendle*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. v. 440.*—Afr. trop.?
brevistyla, *Rendle*, l. c. 418.—Ind. or.
browniana, *Rendle*, l. c. 420.—Austral.
celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 270, 837.*—Celebes.
Kingii, *Rendle*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. v. 415.*—Ins. Andaman.
kurziana, *Rendle*, l. c. 413.—Ind. or.
lacerata, *Rendle*, l. c. 416.—Ind. or.
madagascariensis, *Rendle*, l. c. 402.—Madag.
polonica, *Zalewski*, in *Allg. Bot. Zeitschr. 1897, 110.*—Polonia.
punctata, *Rendle*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. v. 407.*—Am. austr.
setacea, *Rendle*, l. c. 422.—Bourbon.
Welwitschii, *Rendle*, *Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 95.*—Afr. trop.
- NAMA**, Linn. (Hydrophyll.).
Pringlei, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 38.*—Mexic.
pueblense, *Robinson & Greenm. l. c. 39.*—Mexic.
- NANIA**, Miq. = *Metrosideros*, Banks (Myrtac.).
glabrifolia, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies, i. 866.*—Ins. Sandw.
lutea, A. A. Heller, l. c. 867 = *M. villosa*.
petiolata, Valet. ex *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xl. 171.*—Java.
polymorpha, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies, i. 864* = *M. villosa*.
pumila, A. A. Heller, l. c.—Ins. Sandw.
tremuloides, A. A. Heller, l. c. 866.—Ins. Sandw.
- NANOCHILUS**, K. Schum. in *Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 341.* ZINGIBERACEAE.
palembanicum, K. Schum. l. c. (= *Hedychium palembanicum*).—Sumatra.
- NAPEANTHUS**, Gardn. (Gesner.).
andinus, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club, vi. 98.*—Bolivia.
rigidus, *Rusby*, l. c. 99.—Bolivia.
- NARCISSUS**, Tourn. (Amaryll.).
benacensis, *Porta*, in *Fahreskat. Wien. Bot. Tausch-anst. 1897, 69.*—Eur.
ledroensis, *Evers*, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlvii. 88.*—Eur.
pollinensis, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli, Ser. II. viii. no. 9, 10.*—Eur.
tubulosus, *Baldacci*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. vi. 351.*—Eur.
- NARDURUS**, Reichb. = *Festuca*, Tourn. (Gramin.).
Halleri, *Fiori & Paol. Fl. Ital. i. 96* = *F. Poa*.
- NARDUS**, Linn. (Gramin.).
Thomaea, Linn. f. *Suppl. 105* = *Oropetium thomaeum*.
- NARVALINA**, Cass. (Compos.).
corazonensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 49.*—Ecuador.
homogama, *Hieron. l. c. 48.*—Ecuador.
Sodiroi, *Hieron. l. c. 50.*—Ecuador.
- NASSAUVIA**, Comm. (Compos.).
Ameghinoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 542.*—Patag.
bryoides, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 114.*—Reg. Magell.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 615.*—Patag.
Darwinii, *O. Hoffm. & P. Dusén, ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 112* (= *Panargyrus Darwinii*).—Reg. Magell.
heterophylla, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata, vii. 373.*—Reg. Magell.
modesta, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 114.*—Reg. Magell.
Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 165.*—Patag.
Nordenskjöldii, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 113.*—Reg. Magell.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 543.*—Patag.
scleranthoides, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 248.*—Patag.
- NASSELLA**, E. Desv. = *Oryzopsis*, Michx. (Gramin.).
floribunda, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil. xciii. 729.*—Chili.
fuscescens, R. Phil. l. c.—Chili.
longearistata, R. Phil. l. c. 728.—Chili.
obscura, F. Phil. ex R. Phil. l. c. 727.—Chili.
Pugae, R. Phil. l. c. 728.—Chili.
- NASTANTHUS**, Miers = *Boopis*, Juss. (Calycer.).
bellidifolius, Reiche, in *Engl. Jahrb. xxix. 114* = *B. bellidifolia*.
caespitosus, Reiche, l. c. = *B. caespitosa*.
- NASTURTIUM**, Linn. (Crucif.).
Columbiae, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xvi. 211.*—Am. bor.
philippianum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 490.*—Patag.
riparium, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 6.*—Afr. austr.
- NAUCLEA**, Linn. (Rubiace.).
angustifolia, *Havil. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 55.*—Borneo.
celebica, *Havil. l. c. 54.*—Celebes.
elegans, *Teijsm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 498, nomen.*—Celebes.
formosana, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xiv. 127.*—Formosa.
Griffithii, *Havil. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 51* (= *Adina Griffithii*).—Ind. or.
Hagenii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 557.*—N. Guin.
Havilandii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 498.*—Celebes.
media, *Havil. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 56.*—Ins. Philipp.
nicobarica, *Havil. l. c. 59.*—Ins. Nicobar.
nitida, *Havil. l. c. 53.*—Ins. Philipp.
philippinensis, *Havil. l. c. 52* (= *Adina philippinensis*).—Ins. Philipp.
reticulata, *Havil. l. c. 62.*—Ins. Philipp.
tenuis, *Havil. l. c. 55.*—N. Guin.
- NAVARETTIA**, Ruiz & Pav. = *Gilia*, Ruiz & Pav. (Polem.).
klickitensis, *Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1900, 133* = *G. klickitensis*.
- NAVIA**, Schult. f. (Bromel.).
angustifolia, *Mez*, in *DC. Monog. Phan. ix. 553* = *Cryptanthus angustifolius*.
- NAZIA**, Adans. = *Tragus*, Hall. (Gramin.).
aliena, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 28* = *T. racemosus*.
- NECTANDRA**, Roland. (Laurac.).
citrifolia, *Mez & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 115.*—Bolivia.
kuntzeana, *Mez, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 277.*—Bras.
- NEEA**, Ruiz & Pav. (Nyctag.).
buxifolia, *Heimerl, in Engl. Jahrb. xxi. 633* (= *Eggersia buxifolia*).—Ind. occ.
coccinea, *Heimerl, l. c. 635* (= *Pisonia coccinea*).—Ind. occ.
constrictoides, *Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien, xxiii. repr. 37.*—N. Granat.
fagifolia, *Heimerl, l. c. 39.*—Am. cent.
longipedunculata, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 126.*—Bolivia.
macrophylla, *Britton, l. c. (non Poepp. & Endl.)*.—Bolivia.
obovata, *Spruce, ex Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien, xxiii. repr. 38.*—Am. trop.
salicifolia, *Heimerl, l. c. 39.*—Bras.
seloiana, *Heimerl, l. c. 38* (= *Pisonia pubescens*).—Bras.
subpubescens, *Heimerl, l. c. 36.*—Bras.
virens, *Poepp. ex Heimerl, l. c. 38.*—Peruv.
- NEMASTYLIS**, Nutt. (Irid.).
caerulescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 296.*—Mexic.
- NEMATOLEPIS**, Turcz. (Rutac.).
Paxteri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. IV. 145* = *N. Euphemiae*.
- NEMATOPOGON**, Bureau & K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. viii. II. (1897) 395.* BIGNONIACEAE.
densicoma, *Bureau & K. Schum. l. c. 396* (= *Yacaranda densicoma*).—Bras.
laurifolius, *Bureau & K. Schum. l. c. (= Digomphia laurifolia)*.—Guiana.
- NEMESIA**, Vent. (Scrophul.).
Bodkini, *Bolus, in Hook. Ic. Pl. t. 2502.*—Afr. austr.
brevicalcarata, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 174.*—Afr. austr.
capensis, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 237* = *linearis*.
euryceras, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 175.*—Afr. austr.
grandiflora, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii. 473.*—Afr. austr.
macroceras, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 175.*—Afr. austr.
picta, *Schlechter, l. c. 176.*—Afr. austr.
platysepala, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiii. 473.*—Afr. austr.
psammophila, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 176.*—Afr. austr.
- NEMIA**, Berg = *Manulea*, Linn. (Scrophul.).
angolensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 757* = *M. angolensis*.
- NEMOPHILA**, Nutt. (Hydrophyll.).
inconspicua, *Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 349.*—Am. bor.
Kirtleyi, *Hend. l. c. 350.*—Am. bor.
sepulta, *Parish, in Erythraea, vii. 93.*—Am. bor.
- NENAX**, Gaertn. (Rubiace.).
glabra, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 121* = *acerosa*.
- NINGA**, H. Wendl. & Drude (Palm.).
calophylla, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 208.*—N. Guin.
- NEOBECKIA**, Greene, Pittonia, iii. (1896) 95. CRUCIFERAE.
aquatica, *Greene, l. c. (= Nasturtium lacustre)*.—Am. bor.
- NEOCOUMA**, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898) 33.* APOCYNACEAE.
ternstroemiacea, *Pierre, l. c. 34* (= *Tabernaemontana ternstroemiacea*).—Bras.
- NEOCRACCA**, Kuntze, *Rev. Gen. iii. II. 68* (1898). LEGUMINOSAE.
Kuntzei, *Kuntze, l. c. (= Cracca Kuntzei)*.—Bolivia.
- NEOGOETZEA**, Pax, in *Engl. Jahrb. xxviii. (1900) 419.* EUPHORBIACEAE.
brideliifolia, *Pax, l. c.*—Afr. trop.
- NEOJOBERTIA**, Baill. (Bignon.).
candolleana, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 297* = *brasilienis*.
- NEOLAUCHEA**, Kraenzl. in *Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 110.* ORCHIDEAE.
pulchella, *Kraenzl. l. c.*—Hab. ?
- NEOLEHMANNIA**, Kraenzl. in *Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 478.* ORCHIDEAE.
epidendroides, *Kraenzl. l. c. 479.*—Ecuador.
- NEOLINDLEYA**, Kraenzl. *Orch. Gen. et Sp. i. 651* (1899). ORCHIDEAE.
decipiens, *Kraenzl. l. c. (= Platanthera decipiens)*.—As. or. bor.
- NEOMAZAEA**, Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1897, 542.* RUBIACEAE.
phialanthoides, *Krug & Urb. ex Urb. l. c. (= Rondeletia phialanthoides)*.—Ind. occ.
- NEORAUTANENIA**, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss. vii. (1899) 35.* LEGUMINOSAE.
amboensis, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.
- NEOSCHUMANNIA**, Schlechter, *Westaf. Kautschuk-Exped. 810* (1900). ASCLEPIADACEAE.
kamerunensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.
- NEOSPARTON**, Griseb. (Verben.).
aphyllum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 254* = *Verbena aphylla*.

- NEOSTAPFIA**, Davy, in *Erythea*, vii. (1899) 43. **GRAMINEAE**.
colusana, Davy, l. c.—Am. bor.
- NEOWASHINGTONIA**, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. (1898) 38. **PALMAE**.
filamentosa, Sudw. l. c. (= *Washingtonia filifera*).—Am. bor.
robusta, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 3 (= *Washingtonia filifera*).—Am. bor.
Sonorae, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 255 (= *Washingtonia Sonorae*).—Mexic.
- NEPENTHES**, Linn. (Nepenth.).
albolineata, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* iii. 355.—Austral.
Alicae, F. M. Bailey, l. c. 356.—Austral.
Cholmondeleyi, F. M. Bailey, l. c. vii. 441.—Austral.
Jardinei, F. M. Bailey, l. c. i. 230.—Austral.
Moorii, F. M. Bailey, l. c. iii. 355.—Austral.
Rowanae, F. M. Bailey, l. c. i. 231.—Austral.
- NEPETA**, Riv. (Labiata).
adenoclada, Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 243.—Persia.
Amani, Post, *Fl. Syria*, 687.—Syria.
assurgens, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 235.—Persia.
autriana, Bornm. l. c. 248.—Oriens.
Bornmuelleri, Hausskn. ex Bornm. l. c. 237.—Persia.
carmanica, Bornm. l. c. 239.—Persia.
caucasica, Sommier & Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. iv. 208.—Reg. Caucas.
decolorans, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2470.—Tibet.
dshuparensis, Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 244.—Persia.
Ehlersi, Schweinf. in *Engl. Hochgebirgsfl. Trop. Afr.* 368 = *Calamintha simensis*.
eremophila, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 238.—Persia.
exicola, Auct. in *Just. Jahresb.* xxv. II. 488, sphalm. = *oxicola*.
galatica, Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 241.—Oriens.
Haussknechti, Bornm. l. c. 249.—Oriens.
janthinostegia, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 135.—As. Min.
kurdica, Hausskn. & Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 251.—Oriens.
mardinensis, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 159.—Oriens.
Michauxii, Briq. in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 105.—Persia.
oxicola, Franch. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 346.—As. cent.
pamirensis, Franch. l. c. 345.—As. cent.
petitiana, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 460.—Afr. trop.
rivularis, Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 233.—Persia.
scordiifolia, Bornm. l. c. 246 (non *aliorum*).—Oriens.
suavis, Staff, in *Kew Bull.* 1896, 19.—Afghan.
teucroides, Briq. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 236 = *lasiocephala*.
yanthina, Franch. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* iii. 324.—Tibet.
- NEPHELAPHYLLUM**, Blume (Orchid.).
chinense, Rolfe, in *Kew Bull.* 1896, 194.—China.
cristatum, Rolfe, l. c.—China.
- NEPHELIUM**, Linn. (Sapind.).
lauterianum, F. M. Bailey, in *Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 9.—Austral.
winterianum, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* iii. 283.—N. Guin.
- NEPHELOCHLOA**, Boiss. (Gramin.).
altaica, Griseb. in *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 367 = *Poa persica*.
soongorica, Griseb. l. c. = *Poa persica*.
- NEPHRADENIA**, Decne. (Asclep.).
filipes, Malme, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 88.—Bras.
- NEPHROCARYA**, Candargy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. (1897) 150. **BORAGINACEAE**.
horizontalis, Candargy, l. c.—Graecia.
- NEPHROPETALUM**, Robinson & Greenm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxii. (1896) 168. **STERCULIACEAE**.
Pringlei, Robinson & Greenm. l. c.—Am. bor.
- NEPTUNIA**, Lour. (Legum.).
floridana, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 138.—Am. bor.
Lindheimeri, Robinson, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 333.—Am. bor.
- NERINE**, Herb. (Amaryll.).
angustifolia, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 211.—Afr. austr.
brachystemon, Baker, l. c. 212.—Afr. austr.
duparquetiana, Baker, l. c. 214.—Afr. austr.
- NERISYRENIA**, Greene, Pittonia, iv. (1900) 225. **CRUCIFERAE**.
camporum, Greene, l. c. (= *Greggia camporum*).—Am. bor. occ.
linearifolia, Greene, l. c. (= *Greggia linearifolia*).—Am. bor. occ.
- NERTERA**, Banks & Soland. (Rubiace.).
ciliata, T. Kirk, *Fl. N. Zeal.* 247.—N. Zel.
montana, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 595.—N. Zel.
papillosa, Colenso, l. c.—N. Zel.
- NERVILIA**, Comm. = *Pogonia*, Juss. (Orchid.).
crispata, Schlechter, ex K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 240 = *P. crispata*.
- NESAEA**, Comm. (Lythrac.).
Dinteri, Koehne, in *Engl. Jahrb.* xxix. 166.—Afr. trop.
Kuntzei, Koehne, l. c. 167.—Afr. austr.
ondongana, Koehne, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 78.—Afr. trop.
Pringlei, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 198.—Mexic.
Rautanenii, Koehne, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 750.—Afr. trop.
straminea, Koehne, in *Engl. Jahrb.* xxix. 167.—Afr. trop.
- NESLIA**, Desv. (Crucif.).
hispanica, Porta, in *Atti Accad. Agiati Rovereto*, 1896, 212.—Hispan.
- NESODRABA**, Greene, Pittonia, iii. (1897) 252. **CRUCIFERAE**.
grandis, Greene, l. c. 253 (= *Draba grandis*).—Am. bor. occ.
megalocarpa, Greene, l. c.—Am. bor. occ.
siliquosa, Greene, l. c. (= *Cochlearia siliquosa*).—Am. bor. occ.
- NESTLERA**, Spreng. (Compos.).
relhantioides, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 205.—Afr. austr.
- NEUMANNIA**, A. Rich. = *Aphloia*, Benn. (Bixac.).
myrtiflora, Th. Dur. in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl.* Afr. i. II. 218 = *A. myrtiflora*.
- NEURACANTHUS**, Nees (Acanth.).
Lindau, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 139.—Afr. trop.
polyacanthus, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
Robecchii, C. B. Clarke, l. c. 140.—Afr. trop.
spinousus, Defters, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliiii. 222.—Arab.
strobilinus, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 138.—Afr. trop.
ukambensis, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
- NEUROCARPAEA**, R. Br. = *Pentas*, Benth. (Rubiace.).
arvensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 439 = *P. arvensis*.
herbacea, Hiern, l. c.—Afr. trop.
purpurea, Hiern, l. c. 438 = *P. purpurea*.
- NEUROPELTIS**, Wall. (Convolv.).
velutina, Hallier f. in *Bull. Herb. Boiss.* v. 374.—Afr. trop.
- NEUROTHECA**, Salisb. (Gentian.).
congolana, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 98.—Afr. trop.
exacoides, Gilg, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exp.* 304, nomen.—Afr. trop.
- NEVES-ARMONDIA**, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 302 (1897). **BIGNONIA-CEAE**.
cordifolia, K. Schum. l. c. (= *Pithecoctenium cordifolium*).—Bras.
- NEWBERRYA**, Torr. (Monotrop.).
subterranea, Eastw. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* III. i. 80.—Am. bor.
- NEYRAUDIA**, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 305 (1896). **GRAMINEAE**.
madagascariensis, Hook. f. l. c.—As. et Afr. trop.
- NHANDIROBA**, Plum. = *Fevillea*, Linn. (Cucurb.).
Harmsii, Kuntze, *Rev. Gen.* ii. II. 103.—Bolivia.
pergamentacea, Kuntze, l. c. 104 = *F. pergamentacea*.
- NICOLASIA**, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 458. **COMPOSITAE**.
heterophylla, S. Moore, l. c.—Afr. trop.
pedunculata, S. Moore, l. c. 459.—Afr. trop.
- NICOTEBA**, Lindau (Acanth.).
lanceolata, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xx. 38 = *Peristrophe luteoviridis*.
marginata, Lindau, l. c. xxii. 119 = *Monechma marginatum*.
versicolor, Lindau, l. c. 118 = *Justicia versicolor*.
- NICOTIANA**, Linn. (Solan.).
integrifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 223 = *Petunia violacea*.
pampasana, Kuntze, l. c.—Reg. Argent.
Rusbyi, Britton, ex Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 23.—Am. austr.
silvestris, Speg. & Comes, in *Atti Inst. Torino*, Ser. V. i. I. 34.—Reg. Argent.
staticifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 223 = *Bouchetia erecta*.
Stocktoni, Brandegee, in *Erythea*, vii. 6.—Mexic.
uspallatensis, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. 770.—Chili.
- NIDORELLA**, Cass. (Compos.).
malosana, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 149.—Afr. trop.
- NIDULARIUM**, Lem. = *Karatas*, Adans. (Bromel.).
angustifolium, Ule, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xvi. 351.—Bras.
Burchelli, Mez, in *DC. Monog. Phan.* ix. 101 (= *Aechmea Burchellii*).—Bras.
corcovadense, Ule, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. 321.—Bras.
farinosum, Ule, l. c. 319.—Bras.
macahense, Ule, l. c. 318.—Bras.
microcephalum, Ule, l. c. xvii. 4.—Bras.
pauciflorum, Ule, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xvi. 353 (non Lindm.).—Bras.
regelioides, Ule, l. c. 351.—Bras.
rosulatum, Ule, l. c. xviii. 320.—Bras.
terminale, Ule, l. c. xvi. 348.—Bras.
utriculosum, Ule, l. c. 347.—Bras.
- NIEREMBERGIA**, Ruiz & Pav. (Solan.).
patagonica, Speg. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 557.—Patag.
- NIGELLA**, Tourn. (Ranunc.).
bithynica, Aznav. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 165.—Turcia.
- NIGERA**, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 404 (1900) = *Caucalis*, Linn. (Umbell.).
daucoides, Bub. l. c. = *C. daucoides*.
parviflora, Bub. l. c. 405 = *C. leptophylla*.
- NIGRINA**, Linn. (Scrophul.).
melampyroides, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 237 = *Alectra melampyroides*.
orobanchodes, Kuntze, l. c. = *Alectra orobanchoides*.
- NISSOLIA**, Jacq. (Legum.).
diversifolia, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 160.—Mexic.
Dodgei, Rose, l. c. 161.—Mexic.
guatemalensis, Rose, l. c. 162.—Am. cent.
laxior, Rose, l. c.—Mexic.
multiflora, Rose, l. c. 161.—Mexic.
Nelsoni, Rose, l. c. 162.—Mexic.
Pringlei, Rose, l. c. 159.—Mexic.
- NIVENIA**, R. Br. (Proteac.).
laxa, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1897, 282.—Afr. austr.
micrantha, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 107.—Afr. austr.

NOMAPHILA, Blume (Acanth.).
glandulosa, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 198 = *Dyschoriste verticillaris*.
quadrangularis, Klotzsch, l. c. 197 = *Disperma quadrangulare*.

NOMOCHARIS, Franch. (Liliac.).
meleagrina, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 196.—China.

NONNEA, Medic. (Borag.).
heterostemon, Murb. in *Act. Univ. Lund.* xxxiv. Af. II. no. 7, 7.—Afr. bor.

NONPALEA, Salm-Dyck (Cact.).
karwinskiana, K. Schum. *Gesamtb. Kakt.* 752 (= *Opuntia karwinskiana*).—Mexic.
moniliformis, K. Schum. l. c. 750 (= *Cereus moniliformis*).—Ind. occ.

NORANTEA, Aubl. (Ternstroem.).
costaricensis, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* ix. 31.—Am. cent.
macroscypha, Gilg, l. c.—Peruv.
macrostoma, Gilg, l. c. 30.—Bolivia.
microscypha, Gilg, l. c. 32.—Ecuador.
spiciflora, Krug & Urb. in *Engl. Jahrb.* xxi. 520 = *Jussiaei*.
subsessilis, Donn. *Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiv. 390.—Am. cent.

NOTHOPANAX, Miq. = **Panax**, Linn. (Aral.).
Bockii, Harms, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 488.—China.
Davidii, Harms, l. c. = *P. Davidi*.
Rosthornii, Harms, l. c. 487.—China.

NOTHOSCORDERUM, Kunth (Liliac.).
bivalve, Britton, in Britton and A. Brown, *Fl. N. U. S.* i. 415 = *striatum*.
brevispatham, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 268.—Chili.
nidulans, R. Phil. l. c.—Chili.
uniflorum, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 227.—Urug.
vernum, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 267.—Chili.

NOTODON, Urb. *Symb. Antill.* i. (1899) 324. **LEGUMINOSAE**.
gracilis, Urb. l. c.—Ind. occ.

NOTONIA, DC. (Compos.).
Grantii, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 407 = *Kleinia Grantii*.
obesa, Defters, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 108.—Arab.
semperviva, Aschers, in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 152 = *Kleinia Grantii*.
trachycarpa, Klotzsch, in *Sitzb. Acad. Wien. Math.-Nat. II. Abth.* II. 370 = *Kleinia pendula*.
Welwitschii, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 596 (= *Senecio Welwitschii*).—Afr. trop.

NOTOSCEPTRUM, Benth. (Liliac.).
brachystachyum, A. Zahlbr. in *Ann. Hofmus. Wien*, xv. 15.—Afr. austr.
natalense, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 285.—Afr. austr.

NOTOSPARTIUM, Hook. f. (Legum.).
torulosum, T. Kirk, *Fl. N. Zeal.* 117; et in *Trans. N. Z. Inst.* xxix. 507.—N. Zel.

NOUETTEA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* (1898) 29 (Nouetta). **APOCYNACEAE**.
cochinchinensis, Pierre, l. c. 30.—Cochinch.

NYCTERINIA, D. Don = **Zaluzianskya**, F. W. Schmidt (Scrophul.).
microsiphon, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 238.—Afr. austr.

NYMPHAEA, Tourn. (Nymphaeac.).
Brownii, F. M. Bailey, *Queensl. Fl.* 39.—Austral.
fennica, Melz, in *Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xiv. III. 1.—Eur.
macrophylla, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 465.—Am. bor.
orbiculata, Small, l. c. 1896, 128.—Am. bor.

O

OBERONIA, Lindl. (Orchid.).
aurantiaca, Ridley, in *Journ. Bot.* 1898, 210.—Malaya.
auriculata, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 13.—Reg. Himal.
Bertoldi, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 581.—Penins. Mal.
brunescens, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 220.—Penins. Mal.
caudata, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 581.—Penins. Mal.
croftiana, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 7.—Reg. Himal.
dissitiflora, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 218.—Penins. Mal.
emarginata, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 6.—Reg. Himal.
falcata, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 329.—Reg. Himal.
Gammiei, King & Pantl. l. c. lxxvi. 578.—Ind. or.
gardneriana, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 296 = *recurva*.
intermedia, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 579.—Penins. Mal.
kaernbachiana, Kraenzl. in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 242.—N. Guin.
lobulata, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 331.—Reg. Himal.
longilabris, King & Pantl. l. c. 330.—Reg. Himal.
macrostachys, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 263.—Borneo.
micrantha, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 330 (non A. Rich.).—Reg. Himal.
multiflora, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 262.—Borneo.
pachyphylla, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 5.—Reg. Himal.
papuana, F. M. Bailey, in *Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 14.—N. Guin.
parvula, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 330.—Reg. Himal.
porphyrochila, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 220.—Penins. Mal.
prainiana, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 331.—Reg. Himal.
Proudlockii, King & Pantl. l. c. lxxvi. 580.—Ind. or.
Ritaii, King & Pantl. l. c. 579.—Ind. or.
rolfeana, King & Pantl. l. c. 581.—Penins. Mal.
sinuosa, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 263.—Borneo.
stenophylla, Ridley, l. c. xxxii. 218.—Penins. Mal.
subnavicularis, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 579.—Penins. Mal.
subulata, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. I. 337, sphalm. = *lobulata*.
Treubii, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 219.—Java.

OCHLANDRA, Thw. (Gramin.).
Beddomei, Gamble, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 124.—Ind. or.
Brandisii, Gamble, l. c. 126.—Ind. or.
Rheedii, Benth. & Hook. f. ex Gamble, l. c. 121.—Ind. or.
Ridleyi, Gamble, l. c. 127.—Ind. or.
setigera, Gamble, l. c. 128.—Ind. or.

OCHNA, Linn. (Ochnac.).
acutifolia, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 433.—Afr. trop.
arenaria, Wildem. & Th. Dur. in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 7.—Afr. trop.
densicoma, Engl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
gracilipes, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 121.—Afr. trop.
longipes, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.
pygmaea, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 122.—Afr. trop.
Rivae, Engl. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 21.—Afr. trop.
shirensis, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 247.—Afr. trop.
splendida, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 434.—Afr. trop.

OCHOCOA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1896) 1257. **MYRISTICACEAE**.
Gabonii, Pierre, l. c.—Afr. trop.

OCHRADENUS, Delile (Resed.).
somalensis, Baker f. in *Journ. Bot.* 1896, 52.—Afr. or.

OCHROCARPOS, Thou. (Guttif.).
Humboldtii, Drake, in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1220.—Ins. Comor.

OCHROSIA, Juss. (Apocyn.).
citrodora, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 504.—N. Guin.
Cowleyi, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 229.—Austral.
Poweri, F. M. Bailey, in *Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiii. 11.—Austral.

OCHTHOCHARIS, Blume (Melast.).
decumbens, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 15.—Penins. Mal.

OCHTHOCOSMUS, Benth. (Linac.).
congolensis, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 27.—Afr. trop.

OCIMUM, Linn. (Labiata).
andongense, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 850.—Afr. trop.
Balansae, Briq. ex Micheli, in *Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 37.—Parag.
Buchananii, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 348.—Afr. trop.
capitatum, Baker, l. c. 345 (non Roth).—Afr. trop.
Descampsii, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 83.—Afr. trop.
filiforme, Guerde, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 556 = *angustifolium*.
Galpinii, Guerde, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 78.—Afr. austr.
Hanningtonii, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 344.—Afr. trop.
heckmannianum, Guerde, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 472.—Afr. trop.
Hildebrandtii, Briq. in *Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iv. III A. 372 (= *Orthosiphon Hildebrandtii*).—Madag.
huillense, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 851.—Afr. trop.
Johnstonii, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 345.—Afr. trop.
laxiflorum, Baker, l. c. 348.—Afr. trop.
Menyharti, Guerde, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 556.—Afr. trop.
punctatum, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 345 (non *aliorum*).—Afr. trop.
Randii, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 463.—Afr. trop.
roseo-violaceum, Guerde, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 471.—Afr. trop.
Rothii, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 344.—Afr. trop.
rotundifolium, Guerde, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 472.—Afr. trop.
spicatum, Defters, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 226.—Arab.
Stirbeyi, Volkens & Schweinf. in *Ghika, Pays des Somalis*, 213.—Afr. trop.
thymoides, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 344.—Afr. trop.
tortuosum, Baker, l. c. 339.—Afr. trop.
tuberosum, Baker, l. c. 522 (non Roxb.).—Afr. trop.
usaramense, Guerde, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 79.—Afr. trop.
Wilmsii, Guerde, l. c.—Afr. austr.

OCOTEA, Aubl. (Laurac.).
albida, Mez & Rusby, ex Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 114.—Bolivia.
Bangii, Mez & Rusby, ex Rusby, l. c. 115.—Bolivia.
falcata, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. 388.—Ind. occ.
hartiana, Mez, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 251.—Ind. occ.
Zenkeri, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 385.—Afr. trop.

OCTOKNEMA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1897) 1290. **OLACACEAE**.
klaineana, Pierre, l. c. 1293.—Afr. trop.

OCTOLEPIS, Oliver (Thymel.).
decalepis, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 142.—Afr. trop.
Dinklagei, Gilg, l. c. 143.—Afr. trop.
macrophylla, Gilg, l. c. 144.—Afr. trop.
nodosericea, Gilg, l. c. 143.—Afr. trop.

- OCTOLOBUS**, Welw. (Stercul.).
heteromerus, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 306.—Afr. trop.
- OCTOMERIA**, R. Br. (Orchid.).
brevifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 643.—Bras.
decumbens, *Cogn. l. c.* 642.—Bras.
gracilis, *Barb. Rodr. Orch. Nov.* ii. 108 = Rodriguesii.
minuta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 633.—Bras.
pusilla, *Barb. Rodr. Orch. Nov.* ii. 109 = minuta.
Rodriguesii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 629.—Bras.
- ODONTADENIA**, Benth. (Apocyn.).
boliviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 76.—Bolivia.
- ODONTARRHENA**, C. A. Mey. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).
lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 153.—Graecia.
- ODONTELYTRUM**, Hack. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 86. **GRAMINEAE**.
abyssinicum, *Hack, l. c.*—Afr. trop.
- ODONTITES**, Riv. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).
pratensis, *Borbas, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1899, 276.—Eur.
rigida, *Borb. in Termész. Füzetek. Budapest*, xxi. 467.—Eur.
- ODONTOCHILUS**, Blume (Orchid.).
tortus, *King & Panl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 125.—Reg. Himal.
- ODONTOGLOSSUM**, H. B. & K. (Orchid.).
Candelabrum, *Hort. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 7687 = brevifolium.
loxense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 492.—Ecuador.
miniatum, *Hort. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 7687 = brevifolium.
popayanense, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 490.—N. Granat.
- ODONTOSTYLIS**, Breda = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
multiflora, *Breda, Kuhl & Hasselt, Gen. et Sp. Orch.* t. 4 = B. multiflorum.
- ODONTOTECOMA**, Bureau & K. *Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. (1897) 305. **BIGNONIACEAE**.
fulgens, *Bureau & K. Schum. l. c.* 306 (= *Tecoma fulgens*).—Bras.
- ODYENDEA**, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. iv. (1896) 215. **SIMARUBACEAE**.
gabunensis, *Engl. l. c.* (= *Quassia gabonensis*).—Afr. trop.
klainiana, *Engl. l. c.* (= *Quassia klainiana*).—Afr. trop.
- OENANTHE**, Tourn. (Umbell.).
bulgarica, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 127.—Bulg.
japonica, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. viii. 204 = stolonifera.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 498.—China.
subbipinnata, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. viii. 204 = stolonifera.
- OENOCARPUS**, Mart. (Palm.).
discolor, *Barb. Rodr. Palm. Matto-gross.* 8.—Bras.
- OENONEA**, Bub. *Fl. Pyren.* i. 430 (1897) = **Melittis**, Linn. (Labiata).
melissaefolia, *Bub. l. c.* 431 = M. melissophyllum.
- OENOTHERA**, Linn. (Onagr.).
bufonis, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 28.—Am. bor.
formosa, *Leichtl. in Garden*, lvi. (1899) 212.—Hab. ?
gaurodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 99.—Chili.
gigas, *Vries, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxi. 124.—Hort.
heiniana, *Teyber, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xli. 469.—Hybr.
nyctaginiifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 278.—Am. bor.
Punae, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 99.—Bolivia.
- OENOTHERIDIUM**, Reiche, *Fl. Chile*, ii. 256 (1898). **ONAGRACEAE**.
sulphureum, *Reiche, l. c.* (= *Godetia sulfurea*).—Chili.
- OEONIA**, Lindl. = **Aeonina**, Lindl. (Orchid.).
brauniana, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* iii. 172. t. 300.—Madag.
forsythiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 171.—Madag.
- OLAX**, Linn. (Olac.).
autraniana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1295.—Afr. trop.
denticulata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 146; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 286.—Afr. trop.
Durandii, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 286.—Afr. trop.
latifolia, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 284.—Afr. trop.
longiflora, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 284.—Afr. trop.
longifolia, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 285 (non Wall.).—Afr. trop.
macrocalyx, *Engl. l. c.* 285.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 285.—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. l. c.* 146.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 283.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 146; et *l. c.* 284.—Afr. trop.
- OLDENHAMIA**, Auct. in *Just, Jahresb.* xxiv. ii. (1898) 379, sphalm. = seq.
- OLDENLANDIA**, Linn. (Rubiaceae).
acutidentata, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1898, 145.—Afr. trop.
angolensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 412.—Afr. trop.
asperuliflora, *K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 318, nomen.—Afr. trop.
benguellensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 448.—Afr. trop.
crepiniana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 55.—Afr. trop.
cuspidata, *K. Schum. l. c.* xxiii. 413.—Afr. trop.
debeertii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. ii. 27.—Afr. trop.
delagoensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 64.—Afr. austr.
fasciculata, *Hiern, in Journ. Bot.* 1899, 59.—Afr. trop.
geminiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 485 (non Kuntze).—Afr. trop.
golungensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 451.—Afr. trop.
gregaria, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 414.—Afr. trop.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 441.—Afr. trop.
juncoides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 414.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 65.—Afr. austr.
littoralis, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 27.—Am. bor.
luzuloides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 55.—Afr. trop.
megistosiphon, *K. Schum. l. c.* 56.—Afr. trop.
microcalyx, *K. Schum. l. c.* xxiii. 415.—Afr. trop.
microphylla, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. ii. 28.—Afr. trop.
nervosa, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 450.—Afr. trop.
nesaeoides, *Hiern, l. c.* 448.—Afr. trop.
papillosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 416.—Afr. trop.
pellucida, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 448.—Afr. trop.
rosulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 416.—Afr. trop.
sipaneoides, *K. Schum. l. c.* 417.—Afr. trop.
spermaocina, *K. Schum. l. c.* 418.—Afr. trop.
sphaerocephala, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 65.—Afr. austr.
staelioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 418.—Afr. trop.
stellarioides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 447.—Afr. trop.
subverticillata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 419.—Afr. trop.
tardavelina, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 445.—Afr. trop.
thamnoidea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 56.—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 442.—Afr. trop.
- OLDENLANDIA** :—
Wiedenmannii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 57.—Afr. trop.
xestosperra, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 41.—Mexic.
- OLEARIA**, Moench (Compos.).
aggregata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 597.—N. Zel.
Buchanani, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 267.—N. Zel.
consimilis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 596.—N. Zel.
coriacea, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 276.—N. Zel.
laxiflora, *T. Kirk, l. c.* 275.—N. Zel.
parvifolia, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 598.—N. Zel.
quinquefida, *Colenso, l. c.* 596.—N. Zel.
- OLIGOTHRIX**, DC. (Compos.).
Newtonii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 33.—Afr. trop.
xyridopsis, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.
- OLYRA**, Linn. (Gramin.).
brevifolia, *Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 402 = latifolia.
concinna, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7469.—Am. cent.
guineensis, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 37 = latifolia.
heliconia, *Lindm. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 11.—Bras.
- OMPHALANDRIA**, P. Br. = **Omphalea**, Linn. (Euphorb.).
linearibracteata, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 59.—Ind. occ.
- OMPHALEA**, Linn. (Euphorb.).
megacarpa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2537.—Ind. occ.
- OMPHALOGRAMMA**, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xiv. (1898) 178. **PRIMULACEAE**.
Delavayi, *Franch. l. c.* 179 (= *Primula Delavayi*).—China.
Elwesiana, *Franch. l. c.* (= *Primula elwesiana*).—Reg. Himal.
Souliei, *Franch. l. c.* 180.—China.
vincaeflora, *Franch. l. c.* (= *Primula vinciflora*).—China.
- ONAGRA**, Tourn. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
arguta, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club.* 1896, 171 = O. arguta.
cruciata, *Small, l. c.* 169 = O. biennis.
depressa, *Small, l. c.* 170 = O. depressa.
Hookeri, *Small, l. c.* 171 = O. biennis.
Jamesii, *Small, l. c.* = O. Jamesii.
macroscelus, *Small, l. c.* = O. macroscelus.
strigosa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 278.—Am. bor.
- ONCIDIUM**, Sw. (Orchid.).
depauperatum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 496.—Ecuador.
fractiflexum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—Ecuador.
funis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 497.—Ecuador.
godseffianum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, i. 754.—Hab. ?
gracillimum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 197.—Peruv.
polystachyoides, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 495.—Ecuador.
sessile, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* i. 101, t. 21.—Peruv.
- ONCINOTIS**, Benth. (Apocyn.).
axillaris, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 226.—Afr. trop.
Batesii, *Stapp, in Kew Bull.* 1897, 272.—Afr. trop.
campanulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 227.—Afr. trop.
chlorogena, *K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 307, nomen.—Afr. trop.
glabrata, *Stapp, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 674 (= *Motandra glabrata*).—Afr. trop.
inadensis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1899, 254.—Afr. austr.
subsessilis, *K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 307, nomen.—Afr. trop.
tenuiloba, *Stapp, in Kew Bull.* 1898, 307.—Afr. trop.
zygodioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 227.—Afr. trop.

ONCOBA, Forsk. (Bixac.).

- crepiniana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 7.—Afr. trop.
 Demusei, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 54.—Afr. trop.
 eximia, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxviii. 438.—Afr. trop.
 Klainii, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 118.—Afr. trop.
 Laurentii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 1. 8.—Afr. trop.
 spinidens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 39.—Afr. trop.
 spireana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 117.—Afr. trop.

ONCOSPERMA, Blume (Palm.).

- tigillaria, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 173.—Penins. Mal.

ONGOKEA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897)

- 1313; et in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. (1897) 147. **OLACACEAE.**
 Gore, *Pierre, l. c.* 1314; l. c. 147 = klaineana.
 klaineana, *Pierre, ll. cc.* (= *Aptandra Gore*).—Afr. trop.

ONOBRYCHIS, Linn. (Legum.).

- Bellevii, *Prain, in Bull. Herb. Boiss.* v. 75.—Afghan.
 Degeni, *Doerfler, in Denkschr. Acad. Wiss. Wien*, lxiv. 718.—Eur.
 Formaneki, *Heldr. ex Form. in Deutsch. Bot. Monatschr.* 1897, 321 = Heldreichii.
 grandis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 53.—As. cent.
 halacsyana, *Heldr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 711.—Graecia.
 Halacsvi, *Form. in Deutsch. Bot. Monatschr.* 1897, 199 = Heldreichii.
 Heldreichii, *Form. l. c.* 321 (non Bunge).—Thessalia.
 macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 218.—Eur.
 Onobrychis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 256 = viciaefolia.

ONOCHILIS, Mart. = **Nonnea**, Medic. (Borag.).

- lutea, *Bub. Fl. Pyren.* i. 493 = *Alkanna lutea*.
 tinctoria, *Bub. l. c.* 491 = *Alkanna tinctoria*.
 ventricosa, *Bub. l. c.* 492 = *N. alba*.

ONONIS, Linn. (Legum.).

- purpurascens, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 362.—Eur.

ONOPORDON, Linn. (Compos.).

- eriocephalum, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 591.—Eur.
 ferox, *Rouy, l. c.* 592.—Eur.
 Gautieri, *Rouy, l. c.* 587.—Eur.
 laconicum, *Heldr. & Sart. ex Rouy, l. c.* 585.—Eur.
 minus, *Rouy, l. c.* 597.—Afr. bor.
 nervosum, *Gaud. ex Rouy, l. c.* 587 = *Gautieri*.
 spectabile, *Rouy, l. c.* 594.—Eur.

ONOPYXUS, Bub. = **Carduus**, Tourn. (Compos.).

- acanthifolius, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 140 = *C. acanthoides*.
 carlinaefolius, *Bub. l. c.* 142 = *C. carlinaefolius*.
 medius, *Bub. l. c.* 143 = *C. medius*.
 nutans, *Bub. l. c.* 145 = *C. nutans*.
 pycnocephalus, *Bub. l. c.* 139 = *C. pycnocephalus*.
 pyrenaicus, *Bub. l. c.* 141 = *C. carlinoides*.

ONOSMA, Linn. (Borag.).

- asperum, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 199.—Bulg.
 elegans, *Bub. Fl. Pyren.* i. 478 (non Koch).—Pyren.
 exsertum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2639.—China.
 macedonicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 177.—Eur.
 proponticum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 145.—Eur.
 sinicum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 547.—China.
 thracicum, *Vel. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* xxxvii. 8.—Eur.

ONOPSIS, Greene, Pittonia, iii. (1896) 45. **COM-**

- POSITAE.**
 argillacea, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 481.—Am. bor.

ONOPSIS :—

- Engelmanni, *Greene, Pittonia*, iii. 45 (= *Bigelowia Engelmanni*).—Am. bor. occ.
 foliosa, *Greene, l. c.* 46 (= *Aplopappus Fremonti*).—Am. bor.
 multicaulis, *Greene, l. c.* 45 (= *Aplopappus multicaulis*).—Am. bor.
 Wardi, *Greene, l. c.* 46.—Am. bor.

OPHIOCAULON, Hook. f. (Passif.).

- apiculatum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 85.—Afr. trop.
 Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.*—Afr. trop.
 reticulatum, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 86.—Afr. trop.

OPHIPOGON, Ker-Gawl. (Haemodor.).

- bockianus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 254.—China.
 cordylinoides, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 300.—Ind. or.

OPHIORRHIZA, Linn. (Rubiace.).

- fibrillosa, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxiii. 22.—Borneo.
 lawrenceana, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 295.—Ind. or.
 pilcoides, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.
 uniflora, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 150.—N. Brit.

OPHIORRHIZIPHYLLON, Kurz (Acanth.).

- laxum, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 645.—Cochinch.

OPHIURUS, Gaertn. f. (Gramin.).

- laevis, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. 69 = *Rottboellia perforata*.
 perforatus, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* ii. Math. 246 = *Rottboellia perforata*.

OPHYOSPORUS, Meyen (Compos.).

- axilliflorus, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 706 (= *Eupatorium axilliflorum*).—Reg. Argent.
 Charua, *Hieron. l. c.* 705 (= *Mikania Charua*).—Reg. Argent.
 Kuntzei, *Hieron. l. c.* 707.—Bolivia.
 Lorentzii, *Hieron. l. c.* 706.—Reg. Argent.
 origanoides, *Hieron. l. c.* 707 (= *Eupatorium origanoides*).—Peruv.
 saltensis, *Hieron. l. c.* 705.—Reg. Argent.
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 3.—Ecuador.
 solidaginoides, *Hieron. l. c.* 4 (= *Eupatorium solidaginoides*).—Ecuador.

OPHYRS, Linn. (Orchid.).

- litigiosa, *Camus, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 49.—Eur.
 Nicotiae, *Zodda, in Malpighia*, xiv. 183.—Eur.

OPILIA, Roxb. (Olac.).

- Azelii, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 282.—Afr. trop.
 Sadebeckii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

OPIZIA, J. & C. Presl (Gramin.).

- Pringlei, *Hack. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 44 (= *Pringleochloa stolonifera*).—Mexic.

OPLISMENUS, Beauv. (Gramin.).

- africanus, *Beauv. Fl. Owar.* ii. 15.—Afr. et Am. trop.
 brasiliensis, *Raddi, Agrost. Bras.* 40 = africanus.
 bromoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxi. 452 = compositus.
 cuspidatus, *Kunth, Rév. Gram.* i. 45 = *Panicum colonum*.
 dubius, *Kunth, l. c.* 44 = *Panicum Crus-galli*.
 hirtellus, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 481 = africanus.
 loliaceus, *Beauv. Agrost.* 168 = africanus.
 muticus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 714.—Chili.
 oahuensis, *Nees & Meyen, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 220 = africanus.
 scaber, *Kunth, Rév. Gram.* i. 44 = *Panicum stagninum*.
 semialatus, *Desv. Opusc.* 81 = *Axonopus semialatus*.
 simplex, *K. Schum. in Engl. Veg. Usamb.* 48 = africanus.
 stagninus, *Kunth, Rév. Gram.* i. 44 = *Panicum stagninus*.
 Thwaitesii, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 169.—Zeylan.
 velutinus, *Schult. f. Mant.* ii. 271 = africanus.

OPULASTER, Medic. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).

- pauciflorus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 581 = *N. malvacea*.
 pubescens, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 205.—Am. bor.

OPUNTIA, Tourn. (Cact.).

- aquosa, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 165.—Mexic.
 assumptionis, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 153.—Parag.
 australis, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 896.—Patag.
 beckeriana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 722.—Hab. ?
 brachydelphis, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 107 = *Maihuenia brachydelphis*.
 bradtiana, *K. Brandegee, in Erythea*, v. 121 = *Cereus bradtianus*.
 Brandegeei, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 653.—Calif.
 calmalliana, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 453.—Mexic.
 cardiosperma, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 150.—Parag.
 cereiformis, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 897 = *Cereus bradtianus*.
 Ciribe, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 445.—Mexic.
 clavellina, *Engelm. l. c.* 444.—Mexic.
 digitalis, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 898 = *Verschaffelti*.
 Digueti, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 166.—Mexic.
 Ficus-indica, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. no. 2.—Mexic.
 golziana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 654 (= *Pereskia opuntiaeflora*).—Mexic.
 gymnocarpa, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 893 = *O. Ficus-indica*.
 hempeliana, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 690.—Bolivia.
 hyptiacantha, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 894.—Mexic.
 laevis, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 419.—Am. bor.
 Larreyi, *A. Web. ex Coult. l. c.* 423.—Mexic.
 microcarpa, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 714 (non Engelm.).—Ind. occ.
 microdisca, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 896.—Reg. Argent.
 Morenoi, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 107, nomen.—Patag.
 myriacantha, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 894 (non Link & Otto).—Ins. Galap.
 nigripina, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 695.—Bolivia.
 Opuntia, *Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 432 = vulgaris.
 Palmeri, *Engelm. ex Coult. l. c.* 423.—Am. bor.
 pampeana, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 30.—Reg. Argent.
 papyracantha, *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 694 = andicola.
 paraguayensis, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 149.—Parag.
 Philippii, *Haage & Sch. ex Bois, Dict. Hort.* 939 = *Maihuenia Philippii*.
 pilifera, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 894.—Mexic.
 Pititache, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 166 (= *Pereskia Pititache*).—Mexic.
 Porteri, *Brandegee ex A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 899.—Mexic.
 pycnacantha, *Auct. in Just, Jahrb.* xxiv. 11. 380, sphalm. = seq.
 pycnantha, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 423.—Mexic.
 pyrrhacantha, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 694.—Peruv.
 Quimilo, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 107, nomen.—Reg. Argent.
 Quipa, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 894.—Bras.
 quitensis, *A. Web. l. c.*—Ecuador.
 rauppiana, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 118.—Am. austr.
 rhodantha, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 735.—Am. bor.
 rosea, *Phil. ex K. Schum. l. c.* 686 = rosiflora.
 rosiflora, *K. Schum. l. c.*—Chili.
 rotundifolia, *K. Schum. l. c.* 652 (= *Pereskia rotundifolia*).—Mexic.
 rubrifolia, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 424.—Am. bor.
 Scheeri, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 895.—Mexic. ?

OPUNTIA :—

- Schickendantzii, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 898.—Reg. Argent.
 schweriniana, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 148.—Am. bor.
 spathulata, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 165 (= *Pereskia spathulata*).—Mexic.
 Spegazzinii, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 898.—Reg. Argent.
 stenarthra, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1899, 149.—Parag.
 Tapona, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 423.—Mexic.
 Tenajo, *Auct. in Just, Jahresh. xxiv. II.* 380, sphalm. = Tesajo.
 teres, *Cels. ex A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 898.—Bolivia.
 teres, *Hort. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. i.* 683 = Verschaffelti.
 Tesajo, *Engelm. ex Coult. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 448.—Mexic.
 Treleasii, *Coult. l. c.* 434.—Mexic.
 ursina, *A. Web. in Bois, Dict. Hort.* 896.—Am. bor.
 Verschaffelti, *Cels. ex A. Web. l. c.* 898.—Bolivia.
 vulpina, *A. Web. l. c.* 895.—Reg. Argent.
 xanthostemma, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. i.* 735.—Am. sept.

ORANIA, Zipp. (Palm).

- macropetala, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 205.—N. Guin.

ORBIGNYA, Mart. (Palm).

- campestris, *Barb. Rodr. Palm. Mattogross.* 78.—Bras.
 longibracteata, *Barb. Rodr. l. c.* 79.—Bras.
 macrocarpa, *Barb. Rodr. l. c.* 74.—Bras.
 martiana, *Barb. Rodr. l. c.* 68.—Bras.

ORCHIDANTHA, N. E. Br. in Gard. Chron. Oct. 23, 1886, 519. **MUSACEAE**.

- borneensis, *N. E. Br. l. c.*—Borneo.
 maxillarioides, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Musac.* 42.—Penins. Mal.

ORCHIS, Tourn. (Orchid).

- Fauriei, *Finet, in Journ. de Bot.* 1898, 340.—Japon.
 habenarioides, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 302.—Reg. Himal.
 ichneumonea, *Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh.* xxi. (1800) 207 = *Habenaria ichneumonea*.
 mediterranea, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. 1 163 (non aliorum).—Reg. Medit.
 monticola, *Klinge, l. c.* 178.—Eur.; Oriens.
 orientalis, *Klinge, l. c.* 182.—Eur.; As.; Afr. bor.
 puberula, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 304.—Ind. or.
 Ruthi, *Schulze, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 237.—Hab. ?
 subrotunda, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 600.—Burma.
 szechenyiana, *Reichb. f. ex Kan. in Sæch. Keletassiai Utj.* ii. 843.—China.

OREASTRUM, Greene, Pittonia, iii. (1896) 146 =

- Oreostemma**, Greene (Compos.).
 alpigenum, *Greene, l. c.* 147 = *O. alpigenum*.
 Andersonii, *Greene, l. c.* = *O. Andersonii*.
 elatum, *Greene, l. c.* = *O. elatum*.
 Haydeni, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i.* 398 = *O. Haydeni*.

ORELLANA, Ludw. = **Bixa**, Linn. (Bixac).

- Orellana*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II.* 9 = *B. Orellana*.

OREOBAMBOS, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart.

- Berlin, i. (1896) 178. **GRAMINEAE**.
 Buchwaldii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

OREOBROMA, Howell = **Calandrinia**, H. B. & K. et

- Lewisia**, Pursh (Portul.).
 Grayi, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i.* 137 = *Calandrinia Grayi*.
 minima, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 260.—Am. bor.

OREOCARYA, Greene (Borag).

- abortiva, *Greene, Pittonia, iii.* 114.—Am. bor.
 affinis, *Greene, l. c.* 110.—Am. bor.
 Bakeri, *Greene, l. c.* iv. 92.—Am. bor.
 caespitosa, *A. Nelson, in Erythraea, vii.* 65.—Am. bor.
 cinerea, *Greene, Pittonia, iii.* 113.—Am. bor.

OREOCARYA :—

- confertiflora, *Greene, Pittonia, iii.* 112.—Am. bor.
 flava, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 202.—Am. bor.
 flavoculata, *A. Nelson, in Erythraea, vii.* 66.—Am. bor.
 humilis, *Greene, Pittonia, iii.* 112.—Am. bor.
 interrupta, *Greene, l. c.* 111.—Am. bor.
 longiflora, *A. Nelson, in Erythraea, vii.* 67.—Am. bor.
 lutescens, *Greene, Pittonia, iv.* 93.—Am. bor.
 multicaulis, *Greene, l. c.* iii. 114 (= *Eritrichium multicaule*, Torr.).—Am. bor.
 nubigena, *Greene, l. c.* 112.—Am. bor.
 thyrsoflora, *Greene, l. c.* 111.—Am. bor.

OREOCHARIS, Benth. (Gesner).

- fokienensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 212.—China.
 tubicella, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 249.—China.

OREOMYRRHIS, Endl. (Umbell).

- linearis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2590.—N. Guin.

OREOPANAX, Decne. & Planch. (Aral).

- Kuntzei, *Harms, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II.* 116.—Bolivia.
 loesenerianum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 127.—Am. cent.

OREOPOLUS, Schlecht. (Rubiace).

- patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 525.—Patag.

OREORCHIS, Lindl. (Orchid).

- Fargesii, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 697.—China.
 unguiculata, *Finet, l. c.* 698 = *Cremastra unguiculata*.

OREOSOLEN, Hook. f. (Scrophul).

- unguiculatus, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2467.—Tibet.

OREOSTEMMA, Greene, Pittonia, iv. (1900) 224.

- COMPOSITAE**.
 alpigenum, *Greene, l. c.* (= *Aster alpigenus*).—Am. bor.
 Andersonii, *Greene, l. c.* (= *Aster Andersonii*).—Am. bor.
 elatum, *Greene, l. c.* (= *Oreastrum elatum*).—Am. bor.
 Haydeni, *Greene, l. c.* (= *Aster Haydeni*).—Am. bor.

OREOSYCE, Hook. f. (Cucurb).

- Kellerii, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 822.—Afr. trop.

OREOXIS, Rafin. = **Cymopterus**, Rafin. (Umbell).

- alpina, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 144.—Am. bor.
 Bakeri, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

ORICIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1287.

- RUTACEAE**.
 gabonensis, *Pierre, l. c.* 1289.—Afr. trop.
 klaineana, *Pierre, l. c. n. s. i.* 68.—Afr. trop.
 lecomteana, *Pierre, l. c. ii.* 1289; etn. s. i. 68.—Afr. trop.

ORIGANUM, Tourn. (Labiata).

- lirium, *Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlix. 192.—Graecia.

ORMOCARPUM, Beauv. (Legum).

- megalophyllum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 292.—Afr. trop.

ORMOSIA, Jacks. (Legum).

- bancana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 184 = parvifolia.
 dubia, *Prain, l. c.* 182 = inopinata.
 gracilis, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 148.—Penins. Mal.
 Henryi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 180.—China.
 inopinata, *Prain, l. c.* 181.—Ind. or.
 Krugii, *Urb. Symb. Antill.* i. 320.—Ind. occ.
 laxa, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 182.—Ind. or.
 monchiana, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 441.—Celebes.
 nitida, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 149 = polita.
 polita, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 184.—Penins. Mal.
 Ridleyi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 151 = microsperma.
 scandens, *Prain, ex King, l. c.* 147.—Penins. Mal.
 sumatrana, *Prain, ex King, l. c.* 150.—Malaya.
 yunnanensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 183.—China.

ORNITHIDIUM, Salisb. (Orchid).

- Lehmannii, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 486.—N. Granat.
 luteo-rubrum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. l. c.*—Ecuador.
 pfitzerianum, *F. C. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. l. c.*—N. Granat.

ORNITHOCHILUS, Wall. (Orchid).

- Delavayi, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 496.—China.
 Moretoni, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* v. 41.—N. Guin.

ORNITHOGALUM, Tourn. (Liliac).

- ambiguum, *Terrac. in Atti Accad. Sci. Napoli, Ser. II.* viii. no. 9, 7.—Eur.
 Baurii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 504.—Afr. austr.
 bulbelloides, *Baker, l. c.* 509 = *Anthericum ornithogaloides*.
 byzantinum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. 149 (non aliorum).—Eur.
 capillaris, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 490.—Afr. austr.
 cernuum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 547.—Afr. trop.
 elatum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 508 (non Andr.).—Afr. austr.
 euryphyllum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. 1897, 149.—Graecia.
 Flanaganii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 535.—Afr. austr.
 Galpini, *Baker, l. c.* 516.—Afr. austr.
 Galpini, *Baker, l. c.* 536 = subspicatum.
 gambosum, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 547.—Afr. trop.
 gracilentum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 502.—Afr. austr.
 inandense, *Baker, l. c.* 503.—Afr. austr.
 inconspicuum, *Baker, l. c.* 498.—Afr. austr.
 Kirzii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. 279 = *Albucca caudata*.
 leptophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 502.—Afr. austr.
 lineare, *Baker, l. c.* 503.—Afr. austr.
 Melleri, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiii. 280 = *Albucca Melleri*.
 monophyllum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 502.—Afr. austr.
 Monteiroi, *Baker, l. c.* 508.—Afr. austr.
 oliganthum, *Baker, l. c.* 510.—Afr. austr.
 oostachyum, *Baker, l. c.* 502.—Afr. austr.
 pauciflorum, *Baker, l. c.* 498 (non aliorum).—Afr. austr.
 Petheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 23.—Afr. austr.
 polyphlebium, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 507.—Afr. austr.
 praeumbellatum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. 140.—Graecia.
 Rogersii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 501.—Afr. austr.
 Saltmarshei, *Baker, l. c.* 513.—Afr. austr.
 sigmoideum, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 189.—As. Min.
 spirale, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 42 (non Wimm.).—Afr. trop.
 Stapfii, *Schinz, l. c.*—Afr. trop.
 subspicatum, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 164.—Afr. trop.
 tempskyanum, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 188.—As. Min.
 tortuosum, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 510.—Afr. austr.
 tulbaghense, *Baker, l. c.* 504.—Afr. austr.
 xanthochlorum, *Baker, l. c.* 508.—Afr. austr.
- ORNITHOPODIUM**, Tourn. = **Ornithopus**, Linn. (Legum.).
 bracteolatum, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 565 = *O. ebracteatus*.
 egoceraton, *Bub. l. c.* = *O. compressus*.
 missus, *Bub. l. c.* 566 = *O. perpusillus*.
 roseum, *Bub. l. c.* 565 = *O. perpusillus*.
- OROBANCHE**, Tourn. (Orobanch.).
 Cathae, *Desf. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 219.—Arab.
 chassia, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxv. 178; et in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 197.—Eur.
 Cooperi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7* (= *Aphyllon Cooperi*).—Am. bor.
 Paralias, *Corbière, in Bull. Soc. Linn. Norm. Sér. V.* i. 184.—Gallia.
 tuberosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. 7* (= *Aphyllon tuberosum*).—Calif.

- OROBUS**, Tourn. = *Lathyrus*, Tourn. (Legum.).
sessilifolius, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 64 = L. digitatus.
tempsyanus, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 608.—Graecia.
venetus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = L. venetus.
- OROPETIUM**, Trin. (Gramin.).
 capense, *Stapf*, in *Dyer*, Fl. Cap. vii. 742.—Afr. austr.
- OROPHACA**, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 306. **LEGUMINOSAE**.
 caespitosa, Britton, l. c. (= *Astragalus triphyllus*).—Am. bor.
 sericea, Britton, l. c. (= *Astragalus sericoleucus*).—Am. bor.
- OROPHEA**, Blume (Anonac.).
 filipes, *K. Schum.* & *Lauterb.* Fl. Deutsch. Südsee, 319.—N. Guin.
 Minahassae, *Boerl.* ex *Koord.* in *Meded.* 'S Lands Plantent. xix. 386.—Celebes.
- OROPHOCHILUS**, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 657. **ACANTHACEAE**.
 stipulaceus, Lindau, l. c. 658.—Peruv.
- ORTHANTHERA**, Wight (Asclep.).
 stricta, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 694.—Afr. trop.
- ORTHOCARPUS**, Nutt. (Scrophul.).
 columbinus, *M. E. Jones*, Contrib. Western Bot. viii. 37.—Am. bor.
 cuspidatus, *Greene*, Pittonia, iv. 101.—Am. bor.
 mariposanus, *Congdon*, in *Erythraea*, vii. 188.—Calif.
- ORTHOCHILUS**, Hochst. = *Eulophia*, R.Br. (Orchid.).
Mechowii, Reichb. f. in Flora, 1852, 532 = E. *Mechowii*.
renschianus, Reichb. f. l. c. = E. *renschiana*.
Welwitschii, Reichb. f. l. c. 1865, 186 = E. *Welwitschii*.
- ORTHOgoneuron**, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 267 (1897). **MELASTOMACEAE**.
 dasyanthum, Gilg, l. c.—Afr. trop.
- ORTHOPHYTUM**, Beer = *Pitcairnia*, L'Hérit. (Bromel.).
 glabrum, *Mez*, in DC. Monog. Phan. ix. 117.—Bras.
 leprosum, *Mez*, l. c.—Bras.
- ORTHOPOGON**, R. Br. = *Oplismenus*, Beauv. (Gramin.).
 africanus, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 448 = *Oplism.* africanus.
 agrostoides, Trev. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 234 = *Arundinella brasiliensis*.
 albus, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 44 = *Oplism.* Burmannii.
 gonyrrhisus, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 443 = *Oplism.* undulatifolius.
 hirtellus, R. Br. Prod. 194 = *Oplism.* undulatifolius.
Jungkuhnii, Nees, ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 444 = *Oplism.* compositus.
 loliaceus, Spreng. Syst. i. 306 = *Oplism.* africanus.
 squarrosus, Spreng. l. c. 307 = *Chamaeraphis spinescens*.
 stagninus, Spreng. l. c. = *Panicum stagninum*.
 undulatus, Link, Hort. Reg. Berol. i. 203 = *Oplism.* undulatifolius.
 velutinus, Spreng. Syst. i. 306 = *Oplism.* africanus.
- ORTHORAPHIUM**, Nees = *Stipa*, Linn. (Gramin.).
Roylei, Nees, in Proc. Linn. Soc. i. 94 = S. *Orthoraphium*.
- ORTHOSIPHON**, Benth. (Labiata).
 bartsoides, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 367.—Afr. trop.
 brachystemon, *Defflers*, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 228.—Arab.
 bracteosus, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 375.—Afr. trop.
 canescens, *Guerke*, in Bull. Herb. Boiss. vi. 557.—Afr. austr.
 dissitifolius, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 371.—Afr. trop.
 Elliottii, *Baker*, l. c. 376.—Afr. trop.
 heterophyllus, *Guerke*, in Engl. Jahrb. xxvi. 82.—Afr. austr.
- ORTHOSIPHON** :—
 Hildebrandtii, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 372 (non *Vatke*).—Afr. trop.
 Johnstonii, *Baker*, l. c. 373.—Afr. trop.
 Kirkii, *Baker*, l. c. 376.—Afr. trop.
 liebrechtsianum, *Briq.* in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. 84.—Afr. trop.
 longipes, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 373.—Afr. trop.
 macranthus, *Guerke*, in Engl. Jahrb. xxvi. 84.—Afr. austr.
 malosus, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 371.—Afr. trop.
 Marquesii, *Briq.* in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 242.—Afr. trop.
 mombasicus, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 369.—Afr. trop.
 natalensis, *Guerke*, in Engl. Jahrb. xxvi. 82.—Afr. austr.
 nyasicus, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 373.—Afr. trop.
 petrensis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 859.—Afr. trop.
 Pretoriae, *Guerke*, in Engl. Jahrb. xxvi. 81.—Afr. austr.
 Rehmannii, *Guerke*, in Bull. Herb. Boiss. vi. 557.—Afr. austr.
 salagensis, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 368.—Afr. trop.
 serratum, *Schlechter*, in Journ. Bot. 1897, 431.—Afr. austr.
 shirensis, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 368.—Afr. trop.
 stenophyllus, *Guerke*, in Engl. Jahrb. xxvi. 84.—Afr. austr.
 subvelutinus, *Guerke*, l. c. 80.—Afr. austr.
 transvaalensis, *Schlechter*, in Journ. Bot. 1897, 281.—Afr. austr.
 Wakefieldii, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. v. 371.—Afr. trop.
 Wattii, *Prain*, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 520.—Reg. Himal.
 Wilmsii, *Guerke*, in Engl. Jahrb. xxvi. 81.—Afr. austr.
 Woodii, *Guerke*, l. c. 83.—Afr. austr.
- ORTHOSANTHUS**, Sweet (Irid.).
 nigrorhynchus, *Rusby*, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 126.—Bolivia.
 tunarensis, *Kuntze*, Rev. Gen. iii. II. 309.—Bolivia.
- ORYCTANTHUS**, Eichl. = *Loranthus*, Linn. (Loranth.).
Andrieuxii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 135 (= *Cladocolea Andrieuxii*).—Mexic.
 cordifolius, Urb. in Engl. Jahrb. xxiv. 30 (= *Viscum cordifolium*).—Am. cent.
 florulentus, Urb. l. c. 31 = L. florulentus.
 ligustrinus, Urb. l. c. 30 (= *Viscum ligustrinum*).—Mexic.
- ORYPETALUM**, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. (1900) 372, sphalm. = *Oxypetalum*, R. Br. (Asclep.)
- ORYZA**, Linn. (Gramin.).
 ciliata, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8637 B = *Leersia hexandra*.
 granulata, *Nees*, in Wall. Cat. n. 8634.—Ind. or.; Malaya.
 montana, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8633 = *latifolia*.
 officinalis, Wall. Cat. n. 8635 = *latifolia*.
Kidleyi, *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. vii. 93.—Ind. or.
triandra, *Heyne*, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 3 = *granulata*.
- ORYZOPSIS**, Michx. (Gramin.).
 aequiglumis, *Duthie*, Grasses N. W. Ind. 27.—Reg. Himal.
divulsa, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 234 = *Munroi*.
Duthiei, *Hack.* ex Hook. f. l. c. = *aequiglumis*.
effusa, *Hack.* ex Hook. f. l. c. = *lateralis*.
florulenta, *Pilger*, in Engl. Jahrb. xxvii. 26.—N. Granat.
kashmirensis, *Hack.* ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 234 = *Munroi*.
lateralis, *Stapf*, ex Hook. f. l. c.—Ind. or.
Munroi, *Stapf*, ex Hook. f. l. c.—Ind. or.
tiraquensis, *K. Schum.* in Just, Jahresb. xxvi. i. 330 (= *Stipa tiraquensis*).—Bolivia.
- OSBECKIA**, Linn. (Melast.).
 abyssinica, *Gilg*, in Engl. Monog. Afr. Pfl. ii. 8.—Afr. trop.
 albiflora, *Cogn.* ex *Wildem.* & *Th. Dur.* in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 21.—Afr. trop.
 auricola, *K. Schum.* in Just, Jahresb. xxvi. i. 356, sphalm. = *saxicola*.
 calotricha, *Gilg*, in Engl. Monog. Afr. Pfl. ii. 8.—Afr. trop.
 densiflora, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
 drepanosepala, *Gilg*, l. c. 7.—Afr. trop.
 postpluvialis, *Gilg*, l. c. 6.—Afr. trop.
 saxicola, *Gilg*, l. c. 7.—Afr. trop.
- OSCHATZIA**, Walp. = *Azorella*, Lam. (Umbell.).
 cuneifolia, *Drude*, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. viii. 128 = A. cuneifolia.
- OSMANTHUS**, Lour. (Oleac.).
 armatus, *Diels*, in Engl. Jahrb. xxix. 532.—China.
 bracteatus, *Matsum.* in Bot. Mag. Tokyo, 1898, 14.—Japan.
Cooperi, *Hemsl.* in Kew Bull. 1896, 18.—China.
- OSMELIA**, Thw. (Samyd.).
 celebica, *Koord.* in *Meded.* 'S Lands Plantent. xix. 624.—Celebes.
 Maingayi, *King*, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. 19.—Malaya.
- OSMITOPSIS**, Cass. (Compos.).
 nana, *Schlechter*, in Engl. Jahrb. xxvii. 207.—Afr. austr.
- OSSAEA**, DC. (Melast.).
 macrandra, *Mills.* in Field Colum. Mus. Bot. i. 432 (= *Sagraea macrandra*).—Ind. occ.
- OSTEOPHLOEUM**, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 127. **MYRISTICACEAE**.
 platyspermum, Warb. l. c. 162 (= *Myristica platysperma*).—Bras.
- OSTEOSPERMUM**, Linn. (Compos.).
 glaberrimum, *O. Hoffm.* in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 165.—Afr. austr.
 pterigoideum, *Klatt*, in Bull. Herb. Boiss. iv. 471.—Afr. austr.
 riparium, *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. xxiv. 475.—Afr. austr.
- OSTRYOCARPUS**, Hook. f. (Legum.).
 parviflorus, *Micheli*, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxvi. 66.—Afr. trop.
- OSYRIDICARPOS**, A. DC. (Santal.).
 linearifolius, *Engl.* in Engl. Jahrb. xxviii. 385.—Afr. trop.
- OSYRIS**, Linn. (Santal.).
 mediterranea, *Bub.* Fl. Pyren. i. 124 = alba.
- OTANTHERA**, Blume (Melast.).
 oligantha, *K. Schum.* & *Lauterb.* Fl. Deutsch. Südsee, 478.—N. Guin.
- OTHONNA**, Linn. (Compos.).
 ambifaria, *S. Moore*, in Journ. Bot. 1899, 403.—Afr. trop.
 brachyanthera, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 606.—Afr. trop.
 bracteata, *Klatt*, in Bull. Herb. Boiss. iv. 471.—Afr. austr.
 floribunda, *Schlechter*, in Engl. Jahrb. xxvii. 214.—Afr. austr.
 gracilis, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 605.—Afr. trop.
 huillensis, *Welw.* ex *Hiern*, l. c. 603.—Afr. trop.
 humilis, *Schlechter*, in Engl. Jahrb. xxvii. 214.—Afr. austr.
 lepidocaulis, *Schlechter*, l. c. 215.—Afr. austr.
 lobata, *Schlechter*, l. c.—Afr. austr.
 patula, *Schlechter*, in Journ. Bot. 1898, 26.—Afr. austr.
 plantaginea, *Hiern*, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 604.—Afr. trop.
- OTOCHLAMYS**, DC. (Compos.).
 pedunculata, *Schlechter*, in Engl. Jahrb. xxvii. 208.—Afr. austr.
- OTOMERIA**, Benth. (Rubiace.).
 calycina, *Hiern*, in Journ. Bot. 1899, 58.—Afr. trop.
 micrantha, *K. Schum.* in Engl. Jahrb. xxiii. 423.—Afr. trop.

OTOMERIA :—

rupestris, *Hiern, in Journ. Bot.* 1899, 59.—Afr. trop.
speciosa, *Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 437
(= *Pentstemon speciosa*).—Afr. trop.

OTOPETALUM, F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 457. **ORCHIDEAE**.
Tunguraguae, F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.—Ecuador.

OTOPHORA, Blume (Sapind.).
sessilis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 430.—
Penins. Mal.

OTOSTEGIA, Benth. (Labiata).
fruticosa, Briq. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. iv. III A.
258 = scariosa.
Michauxii, Briq. in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 111.—Persia.
modesta, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 65.—Afr. trop.
Olgae, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. no. 4, 96 (= *Chartocalyx Olgae*).—Turkestan.

OTTELLIA, Pers. (Hydrocharid.).
crassifolia, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 2.
—Afr. trop.
halogena, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 56.—Afr. trop.
scabra, Baker, in *Trans. Linn. Soc.* xxix. 151 = *Boottia scabra*.

OURATEA, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).
arnoldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 30.—Afr. trop.
cubensis, Urb. Symb. Antill. i. 362.—Ind. occ.
Guildingi, Urb. l. c. 364 = *G. pyrifolia*.
jamaicensis, Urb. l. c. 362 = *G. guyanensis*.
laevis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 34.—Afr. trop.
laxiflora, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 33.—Afr. trop.
litoralis, Urb. Symb. Antill. i. 363.—Ind. occ.
pellucida, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 35.—Afr. trop.
refracta, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 31.—Afr. trop.
Scheffleri, Engl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
spinulosa, Urb. Symb. Antill. i. 362.—Ind. occ.

OURET, Adans. = **Aerua**, Forsk. (Amarant.).
lanata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 893 = *A. lanata*.
scandens, *Hiern, l. c.* = *A. scandens*.

OURISIA, Comm. (Scrophul.).
cockayniana, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 426.
—N. Zel.
ruelleodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 238 = *magellanica*.

OVILLA, Adans. = **Jasione**, Linn. (Campan.).
amethystina, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 22 = *J. amethystina*.
globulariifolia, *Bub. l. c.* 20 = *J. montana*.
humilis, *Bub. l. c.* 22 = *J. humilis*.
perennis, *Bub. l. c.* 21 = *J. perennis*.

OWATARIA, Matsum. in *Bot. Mag. Tokyo*, 1900, 1. **GUTTIFERAE**.
formosana, *Matsum. l. c.*—Formosa.

OXALIS, Linn. (Geran.).
amblyosepala, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 153.—
Afr. austr.
aurea, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
biloba, *Fredr. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxii.
no. 10, 5.—Parag.
brachycarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 153.—
Afr. austr.
brevipes, *Fredr. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
xxii. no. 10, 8.—Bras.
Bushii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 611.—
Am. bor.
Canterai, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 226.—
Urug.
cymosa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 267.—
Am. bor.
dammeriana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 437.—
Afr. austr.
decipiens, *Schlechter, l. c.* xxvii. 154 (non Prog.).—
Afr. austr.
denticulata, *Wolley-Dod, in Journ. Bot.* 1900, 170.—
Afr. austr.
dumicola, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 231.
—Urug.

OXALIS :—

duriuscula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 437.—
Afr. austr.
engleriana, *Schlechter, l. c.* 438.—Afr. austr.
erythropoda, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 16.
—Bolivia.
filipes, *Small, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.*
ii. 346.—Am. bor.
fontinalis, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 215.
—Urug.
Galpinii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 391.—Afr.
austr.
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 413.—Afr. trop.
gracilipes, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 23.—Afr.
austr.
gracilissima, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii.
224.—Urug.
grandiflora, *Arechav. l. c.* 239 (non Jacq.).—Urug.
guttata, *Arechav. l. c.* 228.—Urug.
halophila, *Arechav. l. c.* 227.—Urug.
hirsuticaulis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898,
611.—Am. bor.
kurziana, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 213.
—Urug.
Leipoldtii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 24.—Afr.
austr.
lindaviana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 154.—
Afr. austr.
longissima, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. I. 360.—
Bolivia.
Macachin, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 219.
—Urug.
macra, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 155.—Afr.
austr.
macrantha, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 268.
—Am. bor.
mattgrossensis, *Fredr. in Bih. Svensk. Vet.-Akad.*
Handl. xxii. no. 10, 9.—Bras.
monticola, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 231.
—Urug.
Osteri, *Arechav. l. c.* 228.—Urug.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 501.
—Patag.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 46.—
Afr. austr.
phloxidiflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 155.—
Afr. austr.
polyadenia, *Schlechter, l. c.* 156.—Afr. austr.
Priceae, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 612.—
Am. bor.
pyrenea, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 439.—Bras.
Reineckii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1899, 155.—Bras.
rivalis, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 230.—
Urug.
salmonicolor, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 156.—
Afr. austr.
sericea, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 223
(non Linn. f.).—Urug.
stenocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 156.—
Afr. austr.
subcorymbosa, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii.
238.—Urug.
trichocalyx, *Phil. Fl. Atacam.* 13 = *atacamentis*.
uhehensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 412.—Afr.
trop.
uliginosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 157.—
Afr. austr.
urbaniana, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
uruguayensis, *Arechav. in Anal. Mus. Montevid.* iii.
220.—Urug.
venustula, *Arechav. l. c.* 216.—Urug.
viscidula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 158.—Afr.
austr.
vulcanicola, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 241.
—Am. cent.
yapacaniensis, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. I. 360.
—Bolivia.

OXYACANTHA, Medic. = **Crataegus**, Tourn. (Rosac.).
amygdalifolia, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 579 = *C. Pyracantha*.
Azarolus, *Bub. l. c.* 578 = *C. Azarolus*.
Dioscoridis, *Bub. l. c.* 575 = *C. Oxyacantha*.
Matthioli, *Bub. l. c.* 576 = *C. Oxyacantha*.

OXYANTHERA, Brongn. (Orchid.).
carinata, *Schlechter, in Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 76
= *decurva*.

OXYANTHUS, DC. (Rubiac.).

Goetzei, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 491.—Afr.
trop.
pallidus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 465.—Afr. trop.
pulcher, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 65.—Afr.
trop.
Schlechteri, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

OXYCHLOË, Phil. = **Distichia**, Nees & Meyen
(Juncac.).

bisexualis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 321.—Reg. Argent.

OXYDECTES, Linn. Syst. ed. I. (1735) = **Croton**, Linn.

(Euphorb.).

argentina, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 288 = *C. argentinus*.

fluminensis, *Kuntze, l. c.* = *C. fluminensis*.

Hauthalii, *Kuntze, l. c.* 289 = *C. Hauthalii*.

Hieronymi, *Kuntze, l. c.* 289 = *C. Hieronymi*.

saltensis, *Kuntze, l. c.* = *C. saltensis*.

sarcopetalata, *Kuntze, l. c.* = *C. sarcopetalus*.

sarcopetalodes, *Kuntze, l. c.* = *C. sarcopetaloides*.

sparsiflora, *Kuntze, l. c.* = *C. sparsiflorus*.

subdioeca, *Kuntze, l. c.* = *C. subdioecus*.

subglabra, *Kuntze, l. c.* 290 = *C. subglaber*.

subpannosa, *Kuntze, l. c.* = *C. subpannosus*.

OXYGONUM, Burch. (Polygon.).

delagoense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 268.—Afr. austr.

OXYLOBIUM, Andr. (Legum.).

graniticum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 185.
—Austral.

OXYMITRA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).

gabonensis, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*,
ii. 297.—Afr. trop.

Staudtii, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.

Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 10.—Afr.
trop.

OXYOTIS, Welw. ex Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v.

395 (1900) = **Aeolanthus**, Mart. (Labiata).

nodosa, *Welw. l. c.* = *A. nodosus*.

sedoides, *Welw. l. c.* = *A. sedoides*.

OXYPETALUM, R. Br. (Asclep.).

aureum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. I. 86.—
Parag.

Balansae, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv.
no. 7, 51.—Bras.

cordifolium, *Schlechter, in Urb. Symb. Antill.* i. 269 =
riparium.

Eklblomii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv.
no. 7, 52.—Bras.

hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. I.
79.—Parag.

Henschenii, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
xxxiv. no. 7, 45.—Bras.

oliganthum, *Malme, l. c.* 46.—Bras.

paraguayense, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. I.
80 (non *Schlechter*).—Parag.

Schenckii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx.
20.—Bras.

stipatum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv.
no. 7, 44.—Bras.

suaveolens, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 43 (non *Fourn.*).
—Reg. Argent.

OXYPOLIS, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).

Fendleri, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897,
478 (= *Archemora Fendleri*).—Am. bor.

occidentalis, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric.*
Contrib. Nat. Herb. vii. 196.—Am. bor.

ternata, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 5 = *P. ternatum*.

OXYPTERYX, Greene, *Pittonia*, iii. (1897) 234.

ASCLEPIADACEAE.

arenicola, *Greene, l. c.* 235 (= *Asclepias arenicola*).—
Am. bor.

OXYSPORA, DC. (Melast.).

acutangula, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 9.—
Penins. Mal.

Curtisii, *King, l. c.*—Penins. Mal.

stellulata, *King, l. c.*—Penins. Mal.

OXYSTIGMA, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.*
Nachr. i. 195 (1897); et in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899)
264. **LEGUMINOSAE**.

Buchholzii, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

Mannii, *Harms, l. c.* (= *Hardwickia Mannii*).—Afr.
trop.

OXYTENANTHERA, Munro (Gramin.).
Bourdillonii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 76.—Ind. or.
parvifolia, *Brandis, ex Gamble, l. c.* 72.—Burma.
sinuata, *Gamble, l. c.* 71.—Penins. Mal.

OXYTRIA, Rafin. = **Schoenolirion**, Torr. (Liliac.).
albiflora, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897,* 406 = S. Elliottii.
texana, *Pollard, l. c.* 407 = S. texanum.

OXYTROPIS, DC. (Legum.).
aculeata, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. no. 4,* 93.—Turkestan.
Cusickii, *Greenm. in Erythraea,* vii. 116.—Am. bor.
Dutreuilii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii.* 322.—Tibet.
Grenardi, *Franch. l. c.*—Tibet.
kermanica, *Frey & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. v.* 606.—Persia.
lutchensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii.* 322.—Tibet.
megalantha, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vi.* 666.—Japon.
nivalis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. iii.* 323.—Tibet.
parviflora, *Franch. l. c.*—Tibet.
Poncinsii, *Franch. l. c.* ii. 343.—As. cent.

P

PACHYGONE, Miers (Menisperm.).
longifolia, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 34.—Austral.

PACHYLOBUS, G. Don (Bursér.).
Afzelii, *Engl. in Engl. Jahrb. xxvi.* 366.—Afr. trop.
Barteri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
edulis, *G. Don, Gen. Syst. ii.* 89.—Afr. trop.
klaianeana, *Engl. in Engl. Jahrb. xxvi.* 366 (= *Santiriopsis klaianeana*).—Afr. trop.
Saphu, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iii.* iv. 243 = edulis.

PACHYLOPHUS, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
montanus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899,* 128 = *O. caespitosa*.

PACHYPODANTHIUM, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. (1900) 55. **ANONACEAE.**
confine, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Unona confine*).—Afr. trop.
Staudtii, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Uvaria Staudtii*).—Afr. trop.

PACHYPODIUM, Lindl. (Apocyn.).
Lamerei, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. v.* 308.—Madag.

PACHYSTELA, Pierre = **Sideroxyton**, Linn. (Sapot.).
cuneata, *Radlk. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. l.* 32.—Afr. trop.

PACHYSTOMA, Blume (Orchid.).
thomsonianum, *Reichb. f. in Gard. Chron. 1879,* ii. 582 = *Ancistrochilus thomsonianus*.

PACOURIA, Aubl. = **Landolphia**, Beauv. (Apocyn.).
crassifolia, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 663 = *L. scandens*.
florida, *Hiern, l. c.* 662 = *L. florida*.
owariensis, *Hiern, l. c.* 661 = *L. owariensis*.
parvifolia, *Hiern, l. c.* 663 = *L. parvifolia*.

PADIA, Zoll. & Mor. = **Oryza**, Linn. (Gramin.).
meyeriana, *Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll.* 103 = *O. granulata*.

PAEDERIA, Linn. (Rubiace.).
cruddasiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii.* 295.—Ind. or.
Grandidieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1305.—Madag.
Grevei, *Drake, l. c.*—Madag.
Pospischilii, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii.* 469.—Afr. trop.

PAEDEROTA, Linn. (Scrophul.).
axillaris, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii.* 20 = *Botryopleuron axillare*.

PAEONIA, Tourn. (Ranunc.).
macrophylla, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis, ii.* 282.—Reg. Caucas.
Mlokozewitschi, *Lomak. l. c.*—Reg. Caucas.

PAEPALANTHUS, Mart. (Eriocaul.).
bulbifer, *Huber, in Bol. Mus. Para. ii.* 499.—Bras. domingensis, *Ruhl. in Urb. Symb. Antill. i.* 435.—Ind. occ.
maracanus, *Huber, in Bol. Mus. Para. ii.* 500.—Bras. Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii.* 102.—Afr. trop.

PAGETIA, F. Muell. (Rutac.).
monostylis, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii.* 7.—Austral.

PAHUDIA, Miq. (Legum.).
cochinchinensis, *Pierre, Fl. Cochinch. t.* 386 A.—Cochinch.
martabanica, *Prain, in Ind. Forest. xxvi.* 312.—Burma.

PALAQIUM, Blanco = **Dichopsis**, Thw. (Sapot.).
leiocarpum, *Boerl. in Bull. Inst. Buitenz. v.* 24.—Borneo.

PALAU, Cav. (Malvac.).
modesta, *Reiche & Johow, Fl. Chile, i.* 215 (= *Sida modesta*).—Chili.

PALIAVANA, Vell. (Gesner.).
racemosa, *Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxx.* 18.—Bras.

PALISOTA, Reichb. (Commelin.).
hirsuta, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv.* 347.—Afr. trop.
Maclaui, *Cornu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliiii.* 30.—Afr. trop.
myriantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv.* 345.—Afr. trop.
pedicellata, *K. Schum. l. c.* 346.—Afr. trop.
Staudtii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

PANAX, Linn. (Aral.).
Ayresii, *Drake, in Journ. de Bot. 1897,* 63 (= *Polyscias Ayresii*).—Maurit.
bakeriana, *Drake, l. c.* 60.—Madag.
Balfouri, *Hort. ex Sand. Cat. 1899,* 24.—N. Caled.
Bernieri, *Drake, in Journ. de Bot. 1897,* 60.—Maurit.
Chapelieri, *Drake, l. c.* 64.—Madag.
Commersoni, *Drake, l. c.* 63.—Maurit.
Cuphocarpus, *Drake, l. c.* 66 (= *Cuphocarpus inermis*).—Madag.
cupularis, *Drake, l. c.* 63 (= *Polyscias cupularis*).—Maurit.
cussonioides, *Drake, l. c.* 62.—Madag.
Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot. 1896,* 305.—China.
dichroostachya, *Drake, in Journ. de Bot. 1897,* 62 (= *Polyscias dichroostachya*).—Maurit.
flexuosa, *Auct. in Just. Jahresh. xxv. II.* 489, sphalm. = seq. floccosa, *Drake, in Journ. de Bot. 1897,* 62.—Madag.
fraxinifolia, *Drake, l. c.* 59 (= *Cussonia fraxinifolia*).—Madag.
Grevei, *Drake, l. c.* 66.—Madag.
Hildebrandtii, *Drake, l. c.* 61.—Madag.
lancifolia, *Drake, l. c.* 65.—Madag.
Lantzii, *Drake, l. c.*—Madag.
lokobensis, *Drake, l. c.* 61.—Madag.
mastersiana, *Sander, ex Masters, in Gard. Chron. 1898,* i. 242.—Ins. Solomon.
neraudiana, *Drake, in Journ. de Bot. 1897,* 62.—Maurit.
nossebiensis, *Drake, l. c.* 61.—Madag.
Oligoscias, *Drake, l. c.* 64.—Madag.
paniculata, *Drake, l. c.* 62 (= *Polyscias paniculata*).—Maurit.
racemosa, *Drake, l. c.* 63.—Maurit.
tafandroensis, *Drake, l. c.* 64.—Madag.

PANCOVIA, Willd. = **Erioglossum**, Blume (Sapind.).
harmsiana, *Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv.* 302.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Gilg, l. c.* 304.—Afr. trop.
macrophylla, *Gilg, l. c.* 303.—Afr. trop.
pedicellaris, *Radlk. & Gilg, ex Gilg, l. c.* 302.—Afr. trop.

PANDA, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1896) 1255. **PANDANACEAE.**
oleosa, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

PANDANUS, Rumph. (Pandanus).
amboinensis, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 83.—Amboin.
Bakeri, *Warb. l. c.* 65.—Madag.
boninensis, *Warb. l. c.* 45.—Ins. Bonin.
borneensis, *Warb. l. c.* 78.—Borneo.
Bullii, *Warb. l. c.* 89.—N. Caled.
canaranus, *Warb. l. c.* 75.—Ind. or.
celebicus, *Warb. l. c.* 80.—Celebes.
Cominsii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2854.—Ins. Solomon.
Dammannii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 49.—Hab. ?
Delessertii, *Warb. l. c.* 55 (= *Eydouxia Delessertii*).—Bourbon.
ellipsoideus, *Warb. l. c.* 81.—Celebes.
flagellifer, *Warb. l. c.* 80.—Penins. Mal.
Forbesii, *Warb. l. c.* 78.—Sumatra.
Goetzei, *Warb. in Engl. Jahrb. xxviii.* 350.—Afr. trop.
Hahnii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 56.—Afr. trop. ?
Heddei, *Warb. l. c.* 46.—Afr. trop.
Hollrungii, *Warb. l. c.* 71.—N. Guin.
indicus, *Warb. l. c.* 56 (= *Roussinia indica*).—Hab. ?
Kaernbachii, *Warb. l. c.* 49.—N. Guin.
kamerunensis, *Warb. l. c.* 66.—Afr. trop.
Lauterbachii, *K. Schum. & Warb. ex Warb. l. c.* 81.—N. Guin.
Lindenii, *Warb. l. c.* 88.—Ins. Mascar.
mauritanus, *Warb. l. c.* 58 (= *Dorystigma mauritanum*).—Maurit.
micracanthus, *Warb. l. c.* 83.—Borneo.
parvus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxiii.* 171.—Ind. or.
Petersii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 66.—Afr. trop.
platycarpus, *Warb. l. c.* 50.—Afr. trop.
pseudolais, *Warb. l. c.* 76.—Java.
Pynaertii, *Warb. l. c.* 88.—Hab. ?
radula, *Warb. l. c.* 76.—Sumatra.
Reineckeii, *Warb. in Engl. Jahrb. xxv.* 581.—Ins. Samoa.
Rumphii, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 84 (non Gaudich.).—Amboin.
samoensis, *Warb. in Engl. Jahrb. xxv.* 580.—Ins. Samoa.
Sanderi, *Hort. Sand. in Gard. Chron. 1898,* i. 243.—Hab. ?
Sarasinorum, *Warb. in Engl. Pflanzenreich, Pandan.* 78.—Celebes.
scopula, *Warb. l. c.* 76.—Ind. or.
setistyla, *Warb. l. c.* 81.—N. Guin.
spinifer, *Warb. l. c.* 57.—Madag.
Stuhlmannii, *Warb. l. c.*—Afr. trop.
terrestris, *Warb. l. c.* 84.—Amboin.
Teuszii, *Warb. l. c.* 67.—Afr. trop.
zeylanicus, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, iv.* 339 = ceylanicus.

PANDIAKA, Benth. & Hook. f. (Amarant.).
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 895.—Afr. trop.
debilis, *Hiern, l. c.* 894 (= *Psilotrichum debile*).—Afr. trop.
ramulosa, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.
Welwitschii, *Hiern, l. c.* (= *Achyranthes Welwitschii*).—Afr. trop.

PANDOREA, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).
amboinensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. ii.* 600 = *T. amboinensis*.
dendrophila, *Boerl. l. c.* = *T. dendrophila*.
leptophylla, *Boerl. l. c.* = *T. leptophylla*.

PANICULARIA, Fabr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).
borealis, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897,* 348.—Am. bor.
brachyphylla, *Nash, l. c.* 349.—Am. bor.
elata, *Nash, ex Rydb, in Mem. N. York Bot. Gard. i.* 54.—Am. bor.
plicata, *Druce, Fl. Berks.* 582 = *G. fluitans*.

PANICUM, Linn. (Gramin.).
acutiglumum, *Steud. Syn. Pl. Gram. 66* = *P. Myurus*.
Addisonii, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,* 83.—Am. bor.
adpressum, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv.* 193 = *Digitaria sanguinalis*.
aegyptiacum, *Retz. Obs. iii.* 8 = *Digitaria sanguinalis*.
aequatum, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 98* = *Isachne miliacea*.
aequiglume, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii.* 44 (non Hack. & Arechav.).—Ind. or.

PANICUM:—

- affine*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 273 = setigerum.
africanum, Poir. l. c. 275 = Oplismenus africanus.
 albomaculatum, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost. xix. 2.—Mexic.
 albomarginatum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 40.—Am. bor.
 ambiguum, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 31 = Digitaria glabra.
 Amlisa, Ham. ex Wall. Cat. n. 8882 C = Thysanolaena Agrostis.
 ammophilum, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = Tricholaena arenaria.
 amphibium, Steud. l. c. 61 = muticum.
 andongense, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 167.—Afr. trop.
 Andrews, Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl. 192.—Ins. Christm.
 angustatum, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. 157.—Ind. or.
 annulum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 58.—Am. bor.
 Anthaenantha, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 = Anthaenantha villosa.
 appendiculatum, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. III. 13 = Setaria appendiculata.
 aquaticum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 373 = repens.
 araneosum, Ind. Kew. ii. 410, errore. = Pennisetum araneosum.
 arborescens, Linn. Sp. Pl. ed. I. 59, partim = ovalifolium.
 arenarium, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 52 = Digitaria glabra.
 arenicolum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 56.—Am. bor.
 argyrograptum, Nees, Fl. Afr. Austr. 27 = Digitaria argyrograpta.
 argyrotrichum, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 548 = Digitaria tenuiflora.
 Ashe, G. Pearson, ex Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 35.—Am. bor.
 asperum, Link, Enum. Hort. Berol. i. 75 = Pennisetum compressum.
 assamicum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 40.—Ind. or.
 atlanticum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 346.—Am. bor.
 Aulaxanthus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 (= Anthaenantha rufa).—Am. bor.
 auraniticum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8714 B = proliferum.
 auritum, Hassk. Pl. Jav. Rar. 22 = P. Myurus.
 badius, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 12.—Mexic.
 balbianum, Schult. Mant. ii. 254 = zizanioides.
 Baldwinii, Nutt. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 43.—Am. bor.
 barbatum, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria barbata.
 barbipulvinatum, Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 21.—Am. bor.
 Baumannii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 331.—Afr. trop.
 Beccabunga, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 179.—Afr. trop.
 bengalense, Spreng. Syst. i. 311 = Arundinella Wallichii.
 Benjaminii, Steud. Syn. Pl. Gram. 96 = Isachne miliacea.
 Bicknellii, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 198.—Am. bor.
 bicornis, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
 bifarium, Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 76.—Bras.
 biforme, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
 biglandulare, Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. iv. 13.—Mexic.
 blephariphyllum, Trim. in Journ. Bot. 1885, 272 = Arundinella blephariphylla.
 bongaeense, Pilger, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 268, nomen.—Afr. trop.
 Braunii, Steud. Syn. Pl. Gram. 93 = Tricholaena rosea.
 brevispicatum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 168.—Afr. trop.
 Brittonii, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 194.—Am. bor.
 brunonianum, Griff. Notul. iii. 29 = Chamaeraphis spinescens.
 Burgu, Cheval. in Compt. Rend. Assoc. Fr. xxx. i. 176; ii. 649.—Afr. trop.
 Bushii, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 568.—Am. bor.
 calliphylum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 31.—Am. bor.

PANICUM:—

- capense*, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 457 = Tricholaena capensis.
 catumbense, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 175.—Afr. trop.
 caudatum, Thunb. Prod. Pl. Cap. 19 = Sporobolus indicus.
 caudiculatum, Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 76.—Bras.
 Ceresia, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 360 = Paspalum membranaceum.
 Chintaman, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8712 D = psilopodium.
 Chlorochloe, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 333.—Afr. trop.
 chrysanthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 50 = Setaria aurea.
 ciliare, Retz. Obs. iv. 16 = Digitaria sanguinalis.
 ciliiferum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 195.—Am. bor.
 ciliosum, Nash, l. c. 1899, 568.—Am. bor.
 cimicinum, Retz. Obs. iii. 9 = Axonopus cimicinus.
 cirrhosum, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. 40 (= Setaria cirrosa).—Mexic.
 Clutei, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 569.—Am. bor.
 Codaea, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8641 A = Setaria glauca.
 columbianum, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. vii. 78.—Am. bor.
 columbiense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 360.—N. Granat.
 Combsii, Scribn. & Ball, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxiv. 42.—Am. bor.
 commelinaefolium, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 29 (non aliorum).—Am. bor.
 commonsianum, Ashe, l. c. 55.—Am. bor.
 commutatum, Nees, in Linnaea, vii. 274 = Digitaria sanguinalis.
 corymbiferum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 76 = deustum.
 Crus-pavonis, Nees, Agrost. Bras. 259.—Afr.; Am. trop.
 curtifolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 569.—Am. bor.
 cuspidatum, Roxb. Fl. Ind. i. 298 = colonum.
 Cuthbertii, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 48.—Am. bor.
 debile, Desf. Fl. Atlant. i. 59 = Digitaria debilis.
 decoloratum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 570.—Am. bor.
 deflexum, Guss. in Ten. Fl. Nap. v. 320 = Ehrharta erecta.
 densepilosum, Steud. Syn. Pl. Gram. 72 = miliaceum.
 diagonale, Nees, Fl. Afr. Austr. 23 = Digitaria diagonalis.
 didactylum, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = Digitaria sanguinalis.
 difforme, Roth, Nov. Pl. Sp. 52 = trigonum.
 dispar, Steud. Syn. Pl. Gram. 96 = Isachne dispar.
 diversinerve, Nees, Fl. Afr. Austr. 23 = Digitaria diversinervis.
 Earlei, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 571.—Am. bor.
 Eatoni, Nash, l. c. 1898, 84.—Am. bor.
 elegans, Wight & Arn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 256 = Sphaerocaryum elegans.
 elegantissimum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 52.—Ind. or.
 elephantipes, Nees, Agrost. Bras. 165 = proliferum.
 Elytropharum, Steud. in Zoll. Syst. Verz. Pfl. Ind. Archip. ii. 54 = Digitaria barbata.
 elytrochaetum, Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr. 1897, 77.—Bras.
 epilfolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 571.—Am. bor.
 equilaterale, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 42.—Am. bor.
 equinum, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 67 = muticum.
 erectifolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 148.—Am. bor.
 eriogonum, Schrad. Pl. Hort. Gotting. fasc. I; ex Schult. Mant. ii. 253 = Digitaria sanguinalis.
 excurrens, Nees, Fl. Afr. Austr. 48 = Setaria sulcata.
 fenestratum, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 361 = Digitaria horizontalis.
 festuciforme, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 332 = Centotheca lappacea.
 filiculme, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 59 (non Hack.).—Am. bor.

PANICUM:—

- filiforme*, Jacq. Obs. iii. 18 = Digitaria sanguinalis.
 fistulosum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 71 = proliferum.
 flaccidum, Koen. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 29 = flavidum.
 flavovirens, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 572.—Am. bor.
 floribundum, Willd. ex Spreng. Syst. i. 306 = Setaria verticillata.
 floridum, Royle, Ill. Bot. Himal. 420 = flavidum.
 forbesianum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 98 = Setaria forbesiana.
 Frederici, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 180.—Afr. trop.
 frumentaceum, Roxb. Fl. Ind. i. 304 = P. Crus-galli.
 Galli, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = stagninum.
 Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 359 = Isachne Gardneri.
 georgianum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 36.—Am. bor.
 giganteum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 360.—Bolivia.
 glabrifolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 196.—Am. bor.
 glabrissimum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 62.—Am. bor.
 globulare, Steud. Nom. ed. II. ii. 257 = Setaria italica.
 gonyrrhizum, Steud. Syn. Pl. Gram. 44 = Oplismenus undulatifolius.
 gracilicaule, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 179.—Afr. trop.
 gracilliflorum, Rendle, l. c. 181.—Afr. trop.
 gracillimum, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 331 (non Scribn.).—Afr. trop.
 gracillimum, Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 146.—Am. bor.
 granulare, Boj. Hort. Maurit. 364 = punctatum.
 Griffithii, Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 15 = Digitaria sanguinalis.
 grossarium, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) 205 = ramosum.
 grossarium, Roxb. Fl. Ind. i. 297 = villosum.
 gyans, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 113.—Am. bor.
 haemacarpum, Ashe, l. c. 55.—Am. bor.
 hagenbeckianum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361.—Am. austr.
 Hamiltonii, Kunth, Enum. Pl. i. 84 = Digitaria horizontalis.
 Hasskarlii, Steud. ex Zoll. Syst. Verz. Pfl. Ind. Archip. ii. 54 = P. Myurus.
 Helli, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 572.—Am. bor.
 Helopus, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 84.—Geront. trop.
 Hensii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 332.—Afr. trop.
 hermaphroditum, Steud. Syn. Pl. Gram. 67 = pilipes.
 heteranthum, Nees & Meyen, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. 174 = Digitaria barbata.
 hirsutulum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 176.—Afr. trop.
 hirtellum, Linn. Amoen. Acad. v. 391 = Oplismenus africanus.
 hochstetterianum, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 369 = P. Helopus.
 holcoides, Roxb. Fl. Ind. i. 285 = Pennisetum setosum.
 holosericeum, Nees, Fl. Afr. Austr. 30 = serratum.
 Holubii, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 394.—Afr. trop. et austr.
 homogynum, Duthie, Grass. N. W. Ind. 4, sphalm. = homonymum.
 hordeoides, Lam. Illustr. i. 170 = Pennisetum parviflorum.
 horizontalis, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 54 = Digitaria horizontalis.
 Huachucae, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 51.—Am. bor.
 huillense, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 174.—Afr. trop.
 humboldtianum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 = Paspalum humboldtianum.
 humidicolum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 169.—Afr. trop.
 imberbe, Poir. Encyc. Suppl. iv. 272 = Setaria imberbis.
 implicatum, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 43.—Am. bor.
 inaequivalve, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 361 = Paspalum inaequivalve.
 inflatum, Scribn. & F. G. Sm. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost. xvi. fide Scribn. l. c. xix. 1.—Mexic.

PANICUM:—

- insigne*, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = *Tricholaena rosea*.
insulicola, Steud. l. c. 78 = auritum.
Ischaemum, Schreb. ex Schweigg. Spec. Fl. Erlang. 16 = *Digitaria glabra*.
javanum, Nees, ex Buese, in Miq. Pl. Jungh. 376 = auritum.
Jurgenseni, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. 40 (= *Setaria Jurgenseni*).—Mexic.
kafuroense, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 334.—Afr. trop.
khasianum, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 54.—Ind. or.
kunthianum, Wight & Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 96 = *Isachne kunthiana*.
Kurzii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 38.—Ind. or.
Lagascacae, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362 = *Paspalum quadrifarium*.
Leibergii, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. viii. 6.—Am. bor.
leiogonum, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 51 = repens.
leiogonum, Sieber, ex Link, Hort. Berol. i. 206 = muticum.
leptochloa, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 62 = *Arundinella leptochloa*.
leucothrix, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 41.—Am. bor.
lindenbergianum, Nees, Fl. Afr. Austr. 47 = *Setaria lindenbergianum*.
Lindheimeri, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 196.—Am. bor.
lineare, Burm. f. Fl. Ind. 25, t. 10, f. 2 = *Cynodon Dactylon*.
lineare, Krock, Fl. Siles. i. 95 = *Digitaria glabra*.
linearifolium, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 42.—Am. bor.
linkianum, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = *Digitaria sanguinalis*.
litorale, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362 = *Paspalum distichum*.
loliaceum, Lam. Encyc. iv. 733, errore 743 = *Oplismenus africanus*.
longiflorum, J. F. Gmel. Syst. 158 = *Digitaria tenuiflora*.
longiligulatum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 574.—Am. bor.
longipes, Wight & Arn. in Wight Cat. n. 1638 = maximum.
lucidum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 47.—Am. bor.
lutense, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 332.—Afr. trop.
macroblepharum, Hack. ex Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 20, 7.—Afr. trop.
maculatum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 44 (non aliorum).—Am. bor.
malaccense, Trin. Gram. Panic. 204 = *Sphaerocaryum elegans*.
malacon, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 197.—Am. bor.
malacophyllum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362 = *Paspalum malacophyllum*.
malacophyllum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 198.—Am. bor.
manatense, Nash, l. c. 42.—Am. bor.
mangaloricum, Steud. Syn. Pl. Gram. 78 = *P. Myurus*.
Matsumurae, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 644.—Japon.
mattamusketense, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 45.—Am. bor.
mattogrossense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 362.—Bras.
mauritanum, Willd. ex Spreng. Syst. i. 305 = flavescens.
megalanthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 93 = *Tricholaena Wightii*.
megaphyllum, Steud. l. c. 53 = *Setaria sulcata*.
melanotylum, Hack. in Engl. Jahrb. xi. 398 = nigropedatum.
meneritana, Spreng. Syst. i. 321 = *Isachne miliacea*.
meridionale, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 59.—Am. bor.
mexicanum, Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xxi. 40 (= *Setaria effusa*).—Mexic.
meyerianum, Nees, Fl. Afr. Austr. i. 32 = muticum.
microphyllum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 61.—Am. bor.
minimum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = *Paspalum minimum*.
minimum, Wall. Cat. n. 8641 B = *Setaria glauca*.

PANICUM:—

- minus*, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 410 (non Nash).—Afr. austr.
monodactylum, Nees, Fl. Afr. Austr. 21 = *Digitaria monodactyla*.
mucronatum, Roth, Nov. Pl. Sp. 45 = punctatum.
multibrachiatum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 74 = *Paspalum Perrottetii*.
multinode, Lam. Encyc. iv. 747 = repens.
multirameum, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost. xix. 2.—Mexic.
Myurus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 98.—As. trop.; Austral.; Amer.
nashianum, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. vii. 79.—Am. bor. et austr.
natans, Koen. ex Trin. Gram. Panic. 237 = proliferum.
nemopanthurum, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 42.—Am. bor.
nepalense, Steud. Syn. Pl. Gram. 49 = *Setaria sulcata*.
nigrirostre, Nees, Fl. Afr. Austr. 55 = *Setaria nigrirostris*.
notabile, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 32.—Ind. or.
numidianum, Hook. Niger Fl. 560 = zizanioides.
numidianum, Lam. Encyc. iv. 739, errore 749 = muticum.
nyanzense, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiv. 333.—Afr. trop.
obliquum, Roth, Nov. Pl. Sp. 51 = patens.
obumbratum, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 401.—Afr. austr.
octonodum, J. G. Sm. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 73.—Am. bor.
orangensis, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 113.—Am. bor.
oryzoides, Sw. Prodr. 23 = zizanioides.
pubulare, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xix. 190 = *Digitaria sanguinalis*.
paludosum, Roxb. Fl. Ind. i. 307 = proliferum.
paniculatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = *Paspalum paniculatum*.
pansum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 177.—Afr. trop.
paractaenoides, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. II. 219 = flavescens.
paraguayense, Steud. ex Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. II. 189 = muticum.
parvispiculum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 347.—Am. bor.
parvulum, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. II. 205 = *Digitaria tenuiflora*.
patentifolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 574.—Am. bor.
paucipilum, Nash, l. c. 573.—Am. bor.
pencanum, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 713.—Chili.
perlaxum, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 400.—Afr. austr.
perlongum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 575.—Am. bor.
pernervosum, Nash, l. c. 576.—Am. bor.
Perrottetii, Kunth, Rév. Gram. ii. 395 = *Paspalum Perrottetii*.
pictigluma, Steud. Syn. Pl. Gram. 73 = muticum.
pictum, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) 204 = colonum.
pictum, Nees, Fl. Afr. Austr. 59 = stagninum.
piluliferum, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 94 = *Isachne rigida*.
platense, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = *Paspalum dilatatum*.
platycaulon, Kuntze, l. c. = *Paspalum platycaulon*.
plicatile, Hochst. in Flora, 1855, 198 = *Setaria sulcata*.
plicatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 363 = *Paspalum undulatum*.
plumosum, Presl, Fl. Sic. p. xliii = *Tricholaena Teneriffae*.
poaeforme, Boj. Hort. Maurit. 365 = *Stenotaphrum glabrum*.
polycaulon, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 200.—Am. bor.
polystachyum, Schult. Mant. ii. 146 = *Pennisetum setosum*.
porranthum, Steud. Syn. Pl. Gram. 42 = *Digitaria horizontalis*.
propinquum, R. Br. Prod. 193 = *Digitaria tenuiflora*.
pruriens, Trin. Gram. Panic. 77 = *Digitaria sanguinalis*.
psammophilum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 576 (non Welw.).—Am. bor.
psammophilum, Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 171.—Afr. trop.

PANICUM:—

- pseudanceps*, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 85.—Am. bor.
pseudopubescens, Nash, l. c. 1899, 577.—Am. bor.
pseudoryzoides, Steud. Syn. Pl. Gram. 75 = zizanioides.
puberulum, Kunth, Rév. Gram. i. 32 = *Digitaria puberula*.
pubifolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 577.—Am. bor.
pubivaginatam, K. Schum. in Engl. Pf. Ost-Afr. C. 102 = deustum.
pulchellum, Spreng. Syst. i. 322 = *Sphaerocaryum elegans*.
punctulatum, Arn. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 62 = muticum.
purpurascens, Opiz, in Flora, v. (1822) 266 = muticum.
pyriforme, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 579.—Am. bor.
racemiferum, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 171 = *Setaria sulcata*.
radicans, Retz. Obs. iv. 18 = patens.
radicosum, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 297 = *Digitaria sanguinalis*.
reimarioides, Anderss. in Peters, Reise Mossamb. Bot. 547 = *Digitaria debilis*.
repens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 360 = proliferum.
respicens, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 52 = *Setaria verticillata*.
Ridleyi, Hack. ex Ridley, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. 400 = zizanioides.
Rivae, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 62.—Afr. trop.
roanokense, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 44.—Am. bor.
roseum, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = *Tricholaena rosea*.
Rottleri, Kunth, Rév. Gram. i. 33 = *Digitaria sanguinalis*.
roxburghianum, Schult. Mant. ii. 245 = repens.
Ruspolii, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 64.—Afr. trop.
saccharoides, Trin. Gram. Panic. 245 = *Tricholaena Teneriffae*.
Sama, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8692 F = flavidum.
sanguinale, Burm. f. Fl. Ind. t. 10, f. 1 (non descr.) = ambiguum.
sanguinale, Linn. Sp. Pl. 57 = *Digitaria sanguinalis*.
sanguinale, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 57 = *Digitaria glabra*.
scabrum, Lam. Illustr. i. 171 = stagninum.
Schaffneri, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 358 = *Paspalum Schaffneri*.
Schlechteri, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 24.—Afr. austr.
scoparioide, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 53.—Am. bor.
segetale, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 32 = *P. Crus-galli*.
semialatum, R. Br. Prod. 192 = *Axonopus semialatus*.
sempervirens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 364.—Bolivia.
serratum, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8699 = *P. Myurus*.
seslerioides, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 174.—Afr. trop.
Sorghii, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 51 = maximum.
sphacelatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 92 = *Tricholaena rosea*.
stagninum, Koen. in Naturf. xxiii. 201.—Ind. or.; Afr. trop. et austr.
stenothyrsus, Pilger, in Engl. Jahrb. xxv. 710.—Ecuador.
strictifolium, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 579.—Am. bor.
strictum, Roxb. Fl. Ind. i. 303 = *Arundinella Wallichii*.
subrepandum, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 178.—Afr. trop.
suffultum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 364 = *Paspalum scoparium*.
sumatrense, Roth, Nov. Pl. Sp. 50 = miliare.
tenesseense, Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xv. 52.—Am. bor.
tenuiflorum, R. Br. Prod. 193 = *Digitaria tenuiflora*.
ternatum, Hochst. in Flora, 1841, i. Intell. 19 = *Digitaria ternata*.
tjicayaense, Steud. Syn. Pl. Gram. 70 = sarmentosum.
tonsum, Steud. l. c. 92 = *Tricholaena rosea*.
trichoglume, K. Schum. in Engl. Glied. Veg. Usamb. 38 = maximum.
trichopus, Hochst. in Flora, 1844, 254.—Afr. trop. et austr.

PANICUM :—

- tridactylum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 712.—Chili.
 trifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 580.—Am. bor.
 tsugetorum, *Nash, l. c.* 1898, 86.—Am. bor.
 tuncumbense, *Turner, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 56.—Austral.
 typhurum, *Staf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 414.—Afr. trop. et austr.
 umbrosum, *Retz, Obs.* iv. 16 = ramosum.
 unguiculatum, *Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI.* iii. ii. 275 = deustum.
 uniglume, *Hochst. in Flora*, 1841, i. Intell. 19 = *Digitaria diagonalis*.
 unispicatum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 14.—Mexic.
 utowanaeum, *Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 25.—Ind. occ.
 velutinum, *G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq.* 51 = *Oplismenus africanus*.
 viaticum, *Griff. Ic. Pl. Asiat.* t. 145, f. 2 = *Axonopus semialatus*.
 villosissimum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 149.—Am. bor.
 viscidellum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xix. 2.—Mexic.
 wallichianum, *Wight & Arn. in Wight Cat. n.* 1607 = *Paspalum Perrottetii*.
 webberianum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 149.—Am. bor.
 wrightianum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 44.—Ind. ooc.
 Zenkeri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 330.—Afr. trop.
 Zeyheri, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 25 = *Digitaria horizontalis*.
 zeylanicum, *Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 76 = *Arundinella leptochloa*.
 zizanioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 100.—Afr. austr.

PANOPSIS, Salisb. (Proteac.).

- Sprucei, *Meissn. ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 116.—Bolivia.

PANTLINGIA, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxx. (1896) 107. **ORCHIDEAE**.
 paradoxa, *Prain, l. c.*—Reg. Himal.
PAPAVER, Tourn. (Papaverac.).

- Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 247.—Am. bor.

PAPAYA, Tourn. = **Carica**, Linn. (Passifl.).

- tunariensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 102.—Bolivia.

PAPHIOPEDILUM, Pfitzer (Orchid.).

- glaucophyllum m, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 1.—Java.
 longifolium, *Pfitzer, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 98 = *Selenipedium longifolium*.

PAPPEA, Eckl. & Zeyh. (Sapind.).

- Radlkoferi, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. ii. 338.—Afr. trop.

PAPPOPHORUM, Schreb. (Gramin.).

- abyssinicum, *Hochst. in Flora*, 1855, 202 = *Enneapogon mollis*.
 Aucheri, *Faub. & Spach, Illustr.* iv. 32.—As. austr.
 brachystachium, *Jaub. & Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xiv. 365; *Illustr.* iv. 34 = *Enneapogon brachystachyus*.
 bulbosum, *Fig. & De Not, in Mem. Acc. Torin. Ser. II.* xii. 254 = *Enneapogon brachystachyus*.
 cenchroides, *Licht. ex Roem. & Schult. Syst.* ii. 616 = *Enneapogon mollis*.
 figarianum, *Fig. & De Not, in Mem. Acc. Torin. Ser. II.* xii. 254 = *Enneapogon brachystachyus*.
 Foxii, *Post, Fl. Syria*, 873.—Syria.
 nanum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 200 = *Enneapogon brachystachyus*.
 pappiferum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 365 = *alopecuroideum*.
 persicum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 200 = *Aucheri*.
 phleoides, *Trin. in Spreng. Neue Entdeck.* ii. 73 = *Enneapogon brachystachyus*.
 robustum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 302 = *Enneapogon mollis*.

PAPPOPHORUM :—

- scabrum, *Kunth, Enum. Pl.* i. 255 = *Enneapogon scaber*.
 senegalense, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 199 = *Enneapogon brachystachyus*.
 turcomanicum, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* i. 27 = *Aucheri*.
 vincentianum, *J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Cap. Verd.* Ins. 144 = *Enneapogon brachystachyus*.

PAPPOSTYLES, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1896) 1268. **STYRACACEAE**.
 neuropetalum, *Pierre, l. c.* 1269.—Afr. trop.
PAPPOSTYLUM, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1896) 1268 = pracc.
PARAGONIA, Bur. = **Bignonia**, Linn. (Bignoniac.).
 schumanniana, *Loesen. in Engl. Jahrb.* xxiii. 130.—Am. cent.
PARAGOPHYTON, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. (1897) 454. **RUBIACEAE**.
 spermacocinum, *K. Schum. l. c.* 455.—Afr. trop.
PARAMERIA, Benth. (Apocyn.).

- angustior, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 399.—Malaya.
 Pierrei, *Seeligm. Cautch. et Gutta*, 22, nomen.—Cochinch.

PARANEPHELIUM, Miq. (Sapind.).

- macrophyllum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 450.—Penins. Mal.
 nitidum, *King, l. c.*—Penins. Mal.

PARARTOCARPUS, Baill. (Urtic.).

- involutrata, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 267 (= *Artocarpus involutrata*).—N. Guin.

PARASIA, Rafin. = **Belmontia**, E. Mey. (Gentian.).

- debilis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 708 = *B. debilis*.
 gracilis, *Hiern, l. c.* = *B. gracilis*.
 grandis, *Hiern, l. c.* 707 = *B. grandis*.
 platyptera, *Hiern, l. c.* 706 = *B. platyptera*.
 primuliflora, *Hiern, l. c.* 707 = *B. primulaeflora*.

PARASYSTASIA, Baill. (Acanth.).

- Kelleri, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 321.—Afr. trop.

PARAVALLARIS, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. (1898) 30. **APOCYNACEAE**.
PARINARIUM, Aubl. (Rosac.).

- congoense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 377 (non *Didr.*).—Afr. trop.
 elatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 280.—Penins. Mal.
 Elliottii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 377.—Afr. trop.
 floribundum, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 265.—Afr. trop.
 heteropetalum, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 283.—Penins. Mal.
 Kunstleri, *King, l. c.* 282.—Penins. Mal.
 Maingayi, *King, l. c.* 280.—Penins. Mal.
 Poggei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 378.—Afr. trop.
 spicatum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 279.—Penins. Mal.
 Whytei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 378.—Afr. trop.

PARIS, Rupp. (Liliac.).

- bockiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 253.—China.
 Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 190.—China.
 Fargesii, *Franch. l. c.*—China.
 Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 252.—China.

PARKIA, R. Br. (Legum.).

- dongnaiensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 393A.—Cochinch.
 Hildebrandtii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 261.—Afr. trop.

PARNASSIA, Tourn. (Saxifr.).

- amoena, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 370.—China.
 chinensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 252.—China.
 cirrata, *Piper, in Erythea*, vii. 128.—Am. bor.
 crassifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 253.—China.
 Delavayi, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 267.—China.
 lutea, *Batal. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 320.—China.
 monochorifolia, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 260.—China.
 percliata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 369.—China.

PARNASSIA :—

- setchuenensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 254.—China.
 yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 266.—China.

PARONYCHIA, Tourn. (Illecebr.).

- chlorothyrsa, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 48.—Afr. bor.
 chorizanthoides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 336.—Am. bor.
 diffusa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 237.—Am. bor.
 scoparia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 335.—Am. bor.

PAROPSIA, Noronha (Passifl.).

- Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 191.—Afr. trop.

PAROSELA, Cav. = **Dalea**, Linn. (Legum.).

- amoena, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 17 = *D. amoena*.
 arborescens, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 5 = *D. arborescens*.
 argyraea, *A. A. Heller, l. c.* = *D. argyraea*.
 arizonica, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 14 = *D. Lumbholtzii*.
 calycosa, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 5 = *D. calycosa*.
 elatior, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 15 = *D. rubescens*.
 Emoryi, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 6 = *D. Emoryi*.
 filiformis, *A. A. Heller, l. c.* = *D. filiformis*.
 Fremontii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 16 = *D. Fremontii*.
 Grayi, *Vail, l. c.* 14 = *D. laevigata, A. Gr.*
 Greggii, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 6 = *D. Greggii*.
 Jamesii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 16 = *D. Jamesii*.
 Johnsoni, *Vail, l. c.* 17 = *D. Johnsoni*.
 Kingii, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 6 = *D. Kingii*.
 lachnostachys, *A. A. Heller, l. c.* = *D. lachnostachys*.
 lasiathera, *A. A. Heller, l. c.* = *D. lasiathera*.
 Lemmoni, *A. A. Heller, l. c.* = *D. Lemmoni*.
 Lumbholtzii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 117 = *D. Lumbholtzii*.
 mollis, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 6 = *D. mollis*.
 neomexicana, *A. A. Heller, l. c.*—Am. bor.
 Ordiae, *A. A. Heller, l. c.* = *D. Ordiae*.
 Parryi, *A. A. Heller, l. c.* = *D. Parryi*.
 polydenia, *A. A. Heller, l. c.* = *D. polydenia*.
 polygonoides, *A. A. Heller, l. c.* = *D. polygonoides*.
 Pringlei, *A. A. Heller, l. c.* = *D. Pringlei*.
 pulchella, *A. A. Heller, l. c.* = *D. pulchella, Moric.*
 ramosissima, *A. A. Heller, l. c.* = *D. ramosissima*.
 scariosa, *A. A. Heller, l. c.* = *D. scariosa*.
 Schottii, *A. A. Heller, l. c.* = *D. Schottii*.
 scoparia, *A. A. Heller, l. c.* = *D. scoparia*.
 spinosa, *A. A. Heller, l. c.* = *Asagraea spinosa*.
 Thompsonae, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 18.—Am. bor.
 thyrsiflora, *Vail, l. c.* 14 = *D. thyrsiflora*.
 Wheeleri, *Vail, l. c.* 17.—Am. bor.
 Wrightii, *Vail, l. c.* 16 = *D. Wrightii*.

PARRYA, R. Br. (Crucif.).

- ramosissima, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* ii. 343.—As. cent.

PARRYELLA, Torr. & Gray (Legum.).

- rotundata, *Woot. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 457.—Am. bor.

PARSONSIA, P. Br. = **Cuphea**, P. Br. (Lythrac.).

- Chapmani, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 5 = *C. aspera*.
 glutinosa, *A. A. Heller, l. c.* = *C. glutinosa*.
 pinto, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 862 = *C. Balsamona*.
 procumbens, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 5 = *C. procumbens, Cav.*

PARSONSIA, R. Br. (Apocyn.).

- burnensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 397 (= *Heligme buruensis*).—Java.

PARSONSIA :—

korthalsiana, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 397 (= *Heligme korthalsiana*).—Malaya.
Minahassae, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 531 (= *Heligme Minahassae*).—Celebes.
nesophila, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 229.—Austral.
Paddisoni, R. T. Baker, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 385.—Austral.

PARTHENIUM, Linn. (Compos.).

aureculatum, Britton, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 521.—Am. bor.

PARTHENOCISSUS, Planch. = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).

Engelmannii, Koehne & Graebn. ex Graebn. in *Gartenfl.* 1900, 285.—Am. bor.
Graebneri, Graebn. l. c. 275.—Hab.?
henryana, Graebn. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 464 = *V. henryana*.
hirsuta, Graebn. in *Gartenfl.* 1900, 274 = *V. hederacea*.
radicantissima, Koehne & Graebn. ex Graebn. l. c. 286 = *V. hederacea*?
Saint-Paulii, Koehne & Graebn. ex Graebn. l. c. 283.—Hort.
sinensis, Diels & Gilg, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 463.—China.
Spaethii, Koehne & Graebn. ex Graebn. in *Gartenfl.* 1900, 274.—Hort.

PASCHANTHUS, Burch. = **Modecca**, Lam. (Passifl.).

Jaeggii, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 23 = *M. Paschanthus*.

PASINA, Adans. = **Horminum**, Tourn. (Labi.).

pyrenaica, Bub. *Fl. Pyren.* i. 396 = *H. pyrenaicum*.

PASPALUM, Linn. (Gramin.).

aegyptiacum, Poir. *Encyc. Suppl.* iv. 314 = *Digitaria sanguinalis*.
ambiguum, DC. *Fl. Fr.* iii. 16 = *Digitaria glabra*.
annulatum, Fluegge, *Gram. Monog.* 133 = *Eriochloa polystachya*.
bicorne, Lam. *Illustr.* i. 176 = *Digitaria sanguinalis*.
bifarium, Edgew. in *Journ. As. Soc. Beng.* xxi. 178 = *Digitaria tenuiflora*.
bifidum, Nash, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 192 (= *Panicum floridanum*).—Am. bor.
blepharophorum, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 292 = *Digitaria sanguinalis*.
brevifolium, Fluegge, *Gram. Monog.* 150 = *Digitaria tenuiflora*.
Chapmani, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 290.—Am. bor.
chinense, Nees, in *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 231 = *Digitaria tenuiflora*.
consanguineum, Kunth, *Enum. Pl.* i. 46 = *Digitaria sanguinalis*.
contractum, Pilger, in *Engl. Jahrb.* xxv. 709.—N. Granat.
corymbosum, Kunth, *Rév. Gram.* i. 25; *Enum. Pl.* i. 48 = *Digitaria sanguinalis*.
debile, Poir. *Encyc.* v. 34 = *Digitaria debilis*.
Digitaria, Poir. *Encyc. Suppl.* iv. 316 = *distichum*.
distans, Nees, ex *Trin. Gram. Panic.* 83 = *Digitaria sanguinalis*.
Eggertii, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 434.—Am. bor.
erianthoides, Lindm. in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 6, 6.—Parag.
filiculme, Nees, ex *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 358 = *Digitaria tenuiflora*.
filiforme, Steud. *Nom. ed. I.* 592 = *Digitaria sanguinalis*.
geminum, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 434.—Am. bor.
glabratum, Mohr, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 21.—Am. bor.
granulare, Trin. in *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 47, partim = *Digitaria tenuiflora*.
heteranthum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 16 = *Digitaria barbata*.
inaequale, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 103 = *Digitaria sanguinalis*.
Iehmannianum, Pilger, in *Engl. Jahrb.* xxv. 709.—N. Granat.
longicilium, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 435.—Am. bor.

PASPALUM :—

longiflorum, Retz. *Obs.* iv. 15 = *Digitaria tenuiflora*.
longipilum, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 435.—Am. bor.
minutiflorum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 17 = *Digitaria tenuiflora*.
mollicomum, Kunth, *Enum. Pl.* i. 47 = *Panicum muticum*.
nematodes, Schult. *Mant.* ii. 171 = *Digitaria tenuiflora*.
oxyanthum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 27 = *Digitaria sanguinalis*.
pennatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 16.—Ind. or.
Perrottetii, Hook. f. l. c. 20.—Ind. or.
Polo, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 234.—Austral.
porrigens, Arn. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 12 = *compactum*.
praecox, Walt. *Fl. Carol.* 75 = *Cynodon Dactylon*.
propinquum, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 291.—Am. bor.
prostratum, Scribn. & Merrill, in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 9.—Mexic.
Pseudo-Durva, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 21 = *Digitaria tenuiflora*.
reimarioides, Brongn. *Bot. Voy. Coquille*, 140, t. 20 = *Digitaria sanguinalis*.
rigidifolium, Nash, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 292.—Am. bor.
Rosei, Scribn. & Merrill, in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xxiv. 9.—Mexic.
royleanum, Nees, ex *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 358 = *Digitaria puberula*.
sanguinale, Lam. *Illustr.* i. 176 = *Digitaria sanguinalis*.
scabrum, Scribn. in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* iv. 36.—Am. cent.
Schaffneri, Scribn. ex *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 24 (non Griseb.).—Am. cent.
Simpsoni, Nash, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 39.—Am. bor.
ternatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 17 = *Digitaria ternata*.
trachyanthum, Nees, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 19 = *Digitaria puberula*.
Trianae, Pilger, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 18.—N. Granat.
umbellatum, Lam. *Illustr.* i. 177 = *Cynodon Dactylon*.
vaseyanum, Scribn. in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 32.—Am. bor.
villosissimum, Nash, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 40.—Am. bor.

PASSERINA, Linn. (Thymel.).

Sanamunda, Bub. *Fl. Pyren.* i. 135 = *Thymelaea Sanamunda*.

PASSIFLORA, Linn. (Passifl.).

australis, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* i. 75.—Parag.
Bigelovii, Small, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 283.—Am. bor.
campestris, Barb. *Rodr. Pl. Mattogross.* 25.—Bras.
chrysophylla, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* i. 75.—Parag.
colimensis, Mast. & Rose, ex *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 181.—Mexic.
curumbaensis, Barb. *Rodr. Pl. Mattogross.* 27.—Bras.
europylla, Mast. in *Gard. Chron.* 1900, II. 350.—Guiana.
franchetiana, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2623.—China.
fuchsiiflora, Hemsl. l. c. t. 2553.—Guiana.
galbana, Mast. in *Gard. Chron.* 1896, II. 555.—Bras.
hassleriana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* i. 74.—Parag.
Henryi, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* sub t. 2623.—China.
Imthurnii, Mast. in *Gard. Chron.* 1898, I. 305.—Guiana.
montana, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 256 = *ovalis*.
Nelsoni, Mast. & Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 142.—Mexic.
paraguayensis, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. *App.* i. 74.—Parag.
parahybensis, Barb. *Rodr. Pl. Nov. Rio*, v. 1.—Bras.
pediculata, Mast. in *Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 247.—Am. cent.
Pittieri, Mast. l. c. 246.—Am. cent.
pruinosa, Mast. in *Gard. Chron.* 1897, II. 393.—Guiana.
Tulae, Urb. *Symb. Antill.* i. 374.—Ind. occ.
urnaefolia, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 42.—Bolivia.
venosa, Rusby, l. c.—Bolivia.

PASTINACA, Linn. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
vulgaris, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 393 = *Peuced. sativum*.

PATAGONIUM, Schrank = **Adesmia**, DC. (Legum.).

adenophorum, Reiche, *Fl. Chile*, ii. 176 = *A. adenophora*.
bijugum, Reiche, l. c. 168 = *A. bijuga*.
calopogon, Reiche, l. c. 123 = *A. calopogon*.
calycosum, Reiche, l. c. 162 = *A. calycosa*.
cespitosum, Reiche, l. c. 117 = *A. caespitosa*.
colinense, Reiche, l. c. 139 = *A. colinensis*.
compactum, Reiche, l. c. 118 = *A. compacta*.
concinnum, Reiche, l. c. 159 = *A. concinna*.
confertum, Reiche, l. c. 165 = *A. conferta*.
crassicaule, Reiche, l. c. 170 = *A. crassicaulis*.
darapskyanum, Reiche, l. c. 142 = *A. darapskyana*.
Dessaueri, Reiche, l. c. 130 = *A. Dessaueri*.
dispermum, Reiche, l. c. 165 = *A. disperma*.
divaricatum, Reiche, l. c. 129 = *A. divaricata*.
dumosum, Reiche, l. c. 121 = *A. dumosa*.
Godoyae, Reiche, l. c. 161 = *A. Godoyae*.
grandidentatum, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 24.—Bolivia.
intricatum, Reiche, *Fl. Chile*, ii. 124 = *A. intricatum*.
Izquierdi, Reiche, l. c. 164 = *A. Izquierdi*.
latistipula, Reiche, l. c. 157 = *A. latistipula*.
leucopogon, Reiche, l. c. 121 = *A. leucopogon*.
maulinum, Reiche, l. c. 145 = *A. maulina*.
Medinae, Reiche, l. c. 144 = *A. Medinae*.
melanocaulon, Reiche, l. c. 130 = *A. melanocaulos*.
melanthes, Reiche, l. c. 120 = *A. melanthes*.
microcalyx, Reiche, l. c. 148 = *A. microcalyx*.
Morenonis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 70 = *A. Morenonis*.
Palenae, Reiche, *Fl. Chile*, ii. 148 = *A. Palenae*.
parviflorum, Reiche, l. c. 173 = *A. parviflora*.
pentaphyllum, Reiche, l. c. 129 = *A. pentaphylla*.
Peraltae, Reiche, l. c. 132 = *A. Peraltae*.
polyphyllum, Reiche, l. c. 118 = *A. polyphylla*.
pusillum, Reiche, l. c. 173 = *A. pusilla*.
Rahmeri, Reiche, l. c. 174 = *A. Rahmeri*.
renjifoanum, Reiche, l. c. 124 = *A. renjifoana*.
resinosum, Reiche, l. c. 166 = *A. resinosa*.
senticula, Reiche, l. c. 126 = *A. senticula*.
sentis, Reiche, l. c. 125 = *A. sentis*.
subumbellatum, Reiche, l. c. 118 = *A. subumbellata*.
tenuicaule, Reiche, l. c. 164 = *A. tenuicaulis*.
torcaea, Reiche, l. c. 176 = *A. torcaea*.
Vallis-pulchrae, Reiche, l. c. 174 = *A. Vallis-pulchrae*.
venosum, Reiche, l. c. 166 = *A. venosa*.
Villanuevae, Reiche, l. c. 127 = *A. Villanuevae*.
villosum, Reiche, l. c. 146 = *A. villosa*.
virens, Reiche, l. c. 127 = *A. virens*.

PATASCOYA, Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiv. (1896) 282. **TERNSTROEMIACEAE**.
Stuebelii, Urb. l. c. 283 (= *Taonabo Stuebelii*).—N. Granat.

PATTARA, Adans. = **Embelia**, Burm. f. (Myrsin.).
pellucida, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 639.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, l. c. 638.—Afr. trop.

PAULLINIA, Linn. (Sapind.).
dasytachya, Radlk. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 337.—Am. austr.

PAULOWILHELMIA, Hochst. (Acanth.).
nobilis, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 53.—Afr. trop.

PAULOWNIA, Sieb. & Zucc. (Scrophul.).
Fargesii, Franch. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1896, 280.—China.

PAURIDIANTHA, Hook. f. (Rubi.).
multiflora, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 60.—Afr. trop.

PAVETTA, Linn. (Rubi.).
andongensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 488.—Afr. trop.
angolensis, Hiern, l. c. 485.—Afr. trop.
brachycoryne, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 81.—Afr. trop.
Buchneri, K. Schum. l. c. 82.—Afr. trop.
catophylla, K. Schum. l. c. 80.—Afr. trop.
comorensis, Vatke, ex K. Schum. l. c. xxiii. 453 = *Cremaspora comorensis*.
flammea, K. Schum. l. c. xxviii. 83.—Afr. trop.
macrostemon, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
melanophylla, K. Schum. l. c. 85.—Afr. trop.

PAVETTA :—

- microlancea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 80.—Afr. austr.
 microthamnus, *K. Schum. l. c.* 84.—Afr. trop.
 nitidula, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 486.—Afr. trop.
 Phillipsiae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 369.—Afr. trop.
 platyclada, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 570.—N. Guin.
 radicans, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 487.—Afr. trop.
 rotundifolia, Boivin, ex Drake, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1807 = *Ixora rotundifolia*.
 sansibarica, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 79.—Afr. trop.
 silvae, *K. Schum. l. c.* 81.—Afr. trop.
 sphaerobotrys, *K. Schum. l. c.* 494.—Afr. trop.
 suffruticosa, *K. Schum. l. c.* 84.—Afr. trop.
 zombana, *K. Schum. l. c.* 85.—Afr. trop.

PAVONIA, Cav. (Malvac.).

- galpiniana, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 434 = *P. Columella*.
 oxyphyllaria, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxiii. 287.—Am. cent.
 urticifolia, *Arceh. in Anal. Mus. Montevid.* x. (Fl. Urug.) 144 (non Presl).—Urug.

PAXIA, Gilg (Connarac.).

- Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 83.—Afr. trop.
 myriantha, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1233 = *Rourea myriantha*.

PAXIODENDRON, Engl. (Laurac.).

- ulugurense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 389.—Afr. trop.

PAYENA, A. DC. (Sapot.).

- dongnaiensis, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 272 (= *Aesandra dongnaiensis*).—As. trop.

PECKIA, Vell. = **Cybianthus**, Mart. (Myrsin.).

- psychotriaefolia, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 75.—Bolivia.

PECTINARIA, Cordem. in *Rev. Gén. de Bot.* xi. (1899) 412. **ORCHIDEAE**.

- Thouarsii, *Cordem. l. c.* 413 (= *Mystacidium pectinatum*).—Ins. Mascar.

PECTIS, Linn. (Compos.).

- ambigua, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 84.—Calif.
 depressa, *Fernald, l. c.* 71.—Mexic.
 grandiflora, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 290.—Am. cent.
 Lessingii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 67.—Am. bor.; Ind. occ.
 Pringlei, *Fernald, l. c.* 76.—Mexic.
 Rosei, *Fernald, l. c.* 77.—Mexic.
 sinaloensis, *Fernald, l. c.* 69.—Mexic.
 stella, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 70.—Bras.
 tenuicaulis, *Urb. Symb. Antill.* i. 468.—Ind. occ.

PEDICELLARIA, Auct. in *Just, Jahresb.* xxv. II. (1900) 491, errore = **POLANISIA**, Rafin. = **Cleome**, Linn. (Cappar.).

- kalachariensis, Auct. l. c. errore = *Polanisia kalachariensis*.
 luederitziana, Auct. l. c. errore = *Polanisia luederitziana*.

PEDICULARIS, Tourn. (Scrophul.).

- albomarginata, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 38.—Am. bor.
 bicolor, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 570.—China.
 Bietii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 34.—China.
 biondiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 571.—China.
 brevibrabis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 33.—China.
 cinerascens, *Franch. l. c.* 30.—China.
 ctenophora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 293.—Am. bor.
 cyathophylla, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 25.—China.
 cypopteridifolia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 365.—Am. bor.
 decora, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 28.—China.
 elegans, *Franch. l. c.* 32 (non aliorum).—China.

PEDICULARIS :—

- Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 26.—China.
 fastigiata, *Franch. l. c.* 25.—China.
 floribunda, *Franch. l. c.* 31.—China.
 fluviatilis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, ii. 33.—Am. bor.
 Hallii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 364.—Am. bor.
 hoermanniana, *Maly, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegov. fide Bot. Centralbl.* lxxxvi. 168.—Eur.
 imperialis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 34.—China.
 Karoi, *Frey, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 26.—Dahuria.
 kialensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 22.—China.
 laxiflora, *Franch. l. c.* 27.—China.
 montanensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 292.—Am. bor.
 Musotti, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 24.—China.
 nasturtifolia, *Franch. l. c.* 28.—China.
 phaceliaefolia, *Franch. l. c.* 27.—China.
 praecleara, *Franch. l. c.* 35.—China.
 Souliei, *Franch. l. c.* 23.—China.
 stenantha, *Franch. l. c.* 36 (non Franch. 1891).—China.
 stenocorys, *Franch. l. c.* 32.—China.
 tibetica, *Franch. l. c.* 24.—China.
 tongolensis, *Franch. l. c.* 29.—China.
 veronicifolia, *Franch. l. c.* 30.—China.

PEDILANTHUS, Neck. (Euphorb.).

- gritensis, *Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xii. 104.—Venez.
 itzaeus, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 305.—Mexic.
 nodiflorus, *Millsp. l. c.*—Mexic.

PEIXOTOA, A. Juss. (Malpigh.).

- cordobensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 28.—Reg. Argent.

PELARGONIUM, L'Hérit. (Geran.).

- caucalidifolium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 150.—Afr. austr.
 Maximiliani, *Schlechter, l. c.* 151.—Afr. austr.
 oppositifolium, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 315.—Afr. austr.
 oreophilum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 151.—Afr. austr.
 rhodanthum, *Schlechter, l. c.* 152.—Afr. austr.
 Whytei, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 246.—Afr. trop.
PELATANTHERIA, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. (1896) 371. **ORCHIDEAE**.
 cristata, *Ridley, l. c.* 373 (= *Cleistostoma cristatum*).—Penins. Mal.
 ctenoglossum, *Ridley, l. c.* 372.—Cochinch.
 insectifera, *Ridley, l. c.* 373 (= *Sarcanthus insectifer*).—Ind. or.

PELEA, A. Gray = **Melicope**, Forst. (Rutac.).

- cruciata, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 839.—Ins. Sandw.
 microcarpa, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.

PELECYPHORA, Ehrenb. (Cact.).

- pectinata, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 603.—Mexic.

PELEXIA, Poit. (Orchid.).

- lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 500.—N. Granat.
 longicomu, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 425.—Bras.
 Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 562.—Mexic.

PELIOSANTHES, Andr. (Haemodor.).

- Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 43.—China.
 grandifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxi. 97.—Penins. Mal.
 lurida, *Ridley, l. c.* 96.—Penins. Mal.
 stellaris, *Ridley, l. c.* 97.—Penins. Mal.

PELLA, Gaertn. = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).

- ribesoides, *Gaertn. Fruct.* i. 143 = *F. Tsjakela*.

PELLACALYX, Korth. (Rhizophor.).

- sympiodiscus, *Stapf, in Kew Bull.* 1898, 224.—Borneo.

PELLETIERA, St. Hil. = **Asterolinon**, Hoffmgg. & Link (Primul.).

- serpyllifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 193 = *A. trinum*.

PELLIONIA, Gaudich. (Urtic.).

- falcata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 375 (= *Elatostema falcatum*).—Borneo.
 insignis, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema insigne*).—Borneo.
 latifolia, *Boerl. l. c.* (= *Procris latifolia*).—Java.
 mesargyrea, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema mesargyreum*).—Borneo.
 picta, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema pictum*).—Borneo.
 robusta, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema robustum*).—Borneo.
 sinuata, *Boerl. l. c.* (= *Elatostema sinuatum*).—Arch. Mal.
 viridis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 481.—China.
 vittata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 375 (= *Elatostema vittatum*).—Borneo.

PELTARIA, Jacq. (Crucif.).

- turkmena, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 8.—As. cent.

PELTODON, Pohl (Labi.).

- repens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 260 = radicans.

PELTOPHORUM, Walp. (Legum.).

- berteroanum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 286.—Ind. occ.
 brasiliense, *Urb. l. c.* 285 = *Linnaei*.
 grande, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 225, 471.—Sumatra.

PEMPHIS, Forst. (Lythrac.).

- punctata, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1222.—Madag.

PENIANTHUS, Miers (Menisperm.).

- klaineanus, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* n. s. i. 76.—Afr. trop.

PENICILLARIA, Willd. = **Pennisetum**, Rich. (Gramin.).

- chinensis, *Nees, ex A. Br. Ind. Sem. Hort. Berol.* (1855) App. 26 = *Pennis. typhoideum*.
 ciliaris, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 8646 = *Pennis. setosum*.
 fallax, *Fig. & De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II.* xii, 371 = *Pennis. typhoideum*.
 nigritarum, *Schlecht. in Linnaea*, xxv. 561 = *Pennis. typhoideum*.
 sieberiana, *Schlecht. l. c.* 565 = *Pennis. typhoideum*.

PENNISETUM, Rich. (Gramin.).

- alopeuroides, *Spreng. Syst.* i. 303 = *typhoideum*, compressum.
 amoenum, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 386 = *pedicellatum*.
 angolense, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 189.—Afr. trop.
 araneosum, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. 180 = orientale.
 asperifolium, *Kunth, Rév. Gram.* i. 49 = orientale.
 barbatum, *Schult. Mant.* ii. 147 = *setosum*.
 borbonicum, *Kunth, Rév. Gram.* i. 259.—Ind. or.; Ins. Bourbon.
 breve, *Nees, Agrost. Bras.* 281 = *setosum*.
 chinense, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 108 = *compressum*.
 ciliares, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 87 = *setosum*.
 ciliatum, *Parl. ex Webb, in Hook. Niger Fl.* 184 = *setosum*.
 Cornucopiae, *Heyne, ex Wall. Cat. n.* 8904 A = *Pommereulla Cornucopiae*.
 cylindricum, *Sw. ex Trin. Diss.* ii. 70 = *typhoideum*.
 cynosuroides, *Wall. Cat. n.* 8653 = *compressum*.
 dasistachyum, *Desv. Opusc.* 76 = *setosum*.
 elatum, *Hochst. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 297 = orientale.
 elegans, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 105 = *setosum*.
 flaccidum, *Griseb. in Goett. Nachr.* (1868) 86.—As. cent. et austr.
 flavescens, *J. & C. Presl, Rel. Haenk.* i. 316 = *setosum*.
 gracile, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 564 = *setosum*.
 Griffithii, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 86 = orientale.
 helvolum, *R. Br. Prodr.* 195 = *Setaria glauca*.
 hirsutum, *Nees, Agrost. Bras.* 284 = *setosum*.
 holcoides, *Schult. Mant.* ii. 148 = *setosum*.
 implicatum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 107 = *pedicellatum*.
 incomptum, *Nees, ex Steud. l. c.* 105 = *cenchroides*.
 intertextum, *Schlecht. in Bot. Zeit.* ix. 878 = *pedicellatum*.
 Kirkii, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 286.—Afr. trop.
 lanuginosum, *Hochst. in Flora*, xxv. Beibl. i. 133 = *pedicellatum*.
 macrostachyum, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. 135 = orientale.

PENNISETUM :—

- megastachyum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 108 = typhoideum.
mutilatum, Hack. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 347 (= *Cenchrus mutilatus*).—Reg. Argent.
myurus, Parl. in Atti 8^a Riun. Sc. Ital. (1846) 586; et in Hook. Niger Fl. 183 = setosum.
natalense, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 435.—Afr. austr.
nigricans, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 781 = typhoideum.
nigricans, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 297 = compressum.
Nigritarum, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 781 = typhoideum.
pallidum, Nees, Agrost. Bras. 285 = setosum.
phalariforme, Steud. Syn. Pl. Gram. 106 = orientale.
Plukenetii, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 782 = typhoideum.
plumosum, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 201 = *Gracilea royleana*.
polycladum, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 167.—Afr. trop.
polystachyum, Schult. Mant. ii. 146 = setosum.
Ruppellii, Steud. Nom. ed. II. ii. 298 = orientale.
sericeum, Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 84 = lanatum.
Sieberi, Kunth, Rév. Gram. i. 50 = setosum.
tenuispiculatum, Steud. Syn. Pl. Gram. 107 = setosum.
Tiberiadis, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 43 = orientale.
typhoides, Trin. Gram. Pan. 71; et in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iii. 184, sphalm. = typhoideum.
yemensis, Defters, Voy. Yemen, 217.—Arab.

PENTACARPAEA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 439 (1898). **RUBIACEAE**.
arenaria, Hiern, l. c.—Afr. trop.

PENTACHONDRA, R. Br. (Euphorbiac.).

rubra, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxviii. 601.—N. Zel.

PENTACLETHRA, Benth. (Legum.).

eetveldeana, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 20.—Afr. trop.

PENTADESMA, Sabine (Guttif.).

leptonema, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 21.—Afr. trop.
maritima, Pierre, l. c. ii. 1226.—Afr. trop.

PENTAGONIA, Heist. ex Fabric. Enum. Pl. Hort. Helmstad. ed. I. (1759) 184 = *Nicandra*, Adans. (Solan.).

physalodes, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 752 = *N. physaloides*.

PENTAMERIS, Beauv. (Gramin.).

airoides, Nees, Sem. Hort. Bot. Vratisl. 1834; et in Linnæa, x. Lit. 118 = *Pentastichis airoides*.
dregeana, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 515.—Afr. austr.
longiglumis, Steud. Nom. ed. II. ii. 299.—Afr. austr.
pallescens, Nees, in Linnæa, vii. 312 = *Pentastichis pallescens*.
papillosa, Nees, l. c. 311, partim = *Pentastichis aspera*.
speciosa, Steud. Nom. ed. II. ii. 299.—Afr. austr.
squarrosa, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 515.—Afr. austr.
Thuarii, Beauv. Agrost. 93, t. 18.—Afr. austr.
tortuosa, Nees, in Linnæa, vii. 311 = *Pentastichis colorata*.

PENTANISIA, Harv. (Rubiace.).

caerulea, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 471.—Afr. trop.

PENTANOPSIS, Rendle, in Journ. Bot. 1898, 28. **RUBIACEAE**.

fragrans, Rendle, l. c. 29.—Afr. trop.

PENTAPANAX, Seem. (Aral.).

Henryi, Harms, in Engl. Jahrb. xxiii. 21.—China.
stellatum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvii. 293.—Ind. or.
warmingianus, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 56 (= *Coemansia warmingiana*).—Am. austr.
yunnanensis, Franch. in Journ. de Bot. 1896, 305.—China.

PENTAS, Benth. (Rubiace.).

Ainsworthii, Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 433.—Afr. trop.
cleistostoma, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 419.—Afr. trop.

VOL. III.

PENTAS :—

Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 198.—Afr. trop.
herbacea, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 392 (= *Neurocarpa herbacea*).—Afr. trop.
ionolaena, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 487.—Afr. trop.
mechowiana, K. Schum. l. c. xxiii. 420.—Afr. trop.
quadrangularis, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 127.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 432.—Arab.
Thomsonii, Scott Elliot, l. c. 435.—Afr. trop.
verticillata, K. Schum. ex Scott Elliot, l. c. 431, nomen.—Afr. trop.
volubilis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 421.—Afr. trop.
Woodii, Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 434.—Afr. austr.

PENTASCHISTIS, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 480 (1899). **GRAMINEAE**.

acinosa, Stapf, l. c. 495.—Afr. austr.
airoides, Stapf, l. c. 511.—Afr. austr.
angustifolia, Stapf, l. c. 502.—Afr. austr.
argentea, Stapf, l. c. 487.—Afr. austr.
aristidioides, Stapf, l. c. 485.—Afr. austr.
aspera, Stapf, l. c. 500.—Afr. austr.
brachyathera, Stapf, l. c. 507.—Afr. austr.
Burchellii, Stapf, l. c. 501.—Afr. austr.
capensis, Stapf, l. c. 494.—Afr. austr.
colorata, Stapf, l. c. 491.—Afr. austr.
curvifolia, Stapf, l. c.—Afr. austr.
densifolia, Stapf, l. c. 506.—Afr. austr.
elegans, Stapf, l. c. 496.—Afr. austr.
eristostoma, Stapf, l. c. 489.—Afr. austr.
euadenia, Stapf, l. c. 510.—Afr. austr.
fibrosa, Stapf, l. c. 492.—Afr. austr.
filiformis, Stapf, l. c. 505.—Afr. austr.
heptamera, Stapf, l. c. 504.—Afr. austr.
heterochaeta, Stapf, l. c. 503.—Afr. austr.
hirsuta, Stapf, l. c. 497.—Afr. austr.
imperfecta, Stapf, l. c. 506.—Afr. austr.
Jugorum, Stapf, l. c. 504.—Afr. austr.
juncifolia, Stapf, l. c. 490.—Afr. austr.
leucopogon, Stapf, l. c. 500.—Afr. austr.
Linia, Stapf, l. c. 496.—Afr. austr.
longipes, Stapf, l. c. 509.—Afr. austr.
natalensis, Stapf, l. c. 493.—Afr. austr.
nutans, Stapf, l. c. 488.—Afr. austr.
pallescens, Stapf, l. c. 486.—Afr. austr.
patula, Stapf, l. c. 510.—Afr. austr.
patuliflora, Rendle, in Journ. Bot. 1899, 381.—Afr. austr.
rupestris, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 498.—Afr. austr.
subulifolia, Stapf, l. c. 499.—Afr. austr.
Thunbergii, Stapf, l. c. 507.—Afr. austr.
tomentella, Stapf, l. c. 502.—Afr. austr.
tortuosa, Stapf, l. c. 488.—Afr. austr.
trisetata, Stapf, l. c. 495.—Afr. austr.
Tysonii, Stapf, l. c. 493.—Afr. austr.
viscidula, Stapf, l. c. 486.—Afr. austr.
Welwitschii, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 213.—Afr. trop.
Zeyheri, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 497.—Afr. austr.

PENTASPADON, Hook. f. (Anacard.).

officinalis, Holmes, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 499.—Penins. Mal.

PENTATROPIS, R. Br. (Asclep.).

hoyoides, K. Schum. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 40.—Afr. trop.

PENTSTEMON, Mitch. (Scrophul.).

arenicola, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 280.—Am. bor.
aridus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 348.—Am. bor.
arizonicus, Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 591.—Am. bor.
Brandegei, Porter, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 343.—Am. bor.
calycosus, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 470.—Am. bor.
caudatus, A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies, ii. 34.—Am. bor.
collinus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 279.—Am. bor.
coloradoensis, Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 355.—Am. bor.

PENTSTEMON :—

Crandallii, Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 354.—Am. bor.
diphyllus, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 349.—Am. bor.
floridus, Brandege, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 454.—Am. bor.
geniculatus, Greene, Pittonia, iii. 310.—Am. bor.
Helleri, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 471.—Am. bor.
incertus, Brandege, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 454.—Calif.
petiolatus, Brandege, l. c. 455.—Am. bor.
pseudohumilis, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 347.—Am. bor.
pseudoprocerus, Rydb. l. c. 346.—Am. bor.
pulchellus, Greene, Pittonia, iii. 310 (non Lindl.).—Am. bor.
Purpusi, Brandege, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 455.—Am. bor.
radicosus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 280.—Am. bor.
riparius, A. Nelson, l. c. 379.—Am. bor.
Rydbergii, A. Nelson, l. c. 281.—Am. bor.
saliens, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 344.—Am. bor.
similis, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 548.—Am. bor.
sudusus, M. E. Jones, Contrib. Western Bot. viii. 37.—Am. bor.
utahensis, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 242.—Am. bor.
Whittdii, Piper, in Coult. Bot. Gaz. xxii. 490.—Am. bor.

PENTZIA, Thunb. (Compos.).

cotuloides, DC. Prod. vi. 138 = *virgata*.
dentata, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 166 = *crenata*.
Fenii, S. Moore, in Journ. Bot. 1899, 401.—Afr. trop.
hereroensis, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. vi. 751.—Afr. trop.
incana, Kuntze, Rev. Gen. iii. 11. 166 = *virgata*.

PEPEROMIA, Ruiz & Pav. (Piperac.).

aceroana, C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 572.—Bolivia.
adenocarpa, C. DC. l. c. 569.—Bolivia.
albovittata, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. iv. 510.—Reg. Andin.
annicola, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 361, sphalm. = *omnicola*.
andicola, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 182.—Peruv.
aphanoneura, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. vi. 507.—Ecuador.
Balbisii, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 164.—Ind. occ.
Baumannii, C. DC. in Engl. Jahrb. xxvi. 360.—Afr. trop.
bavina, C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 287.—Tonkin.
brevispica, C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 670.—Bolivia.
carpinterana, C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 281, repr.—Am. cent.
catharinensis, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 116.—Bras.
chimoana, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. vi. 508.—Ecuador.
Claudii, C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 285.—Peruv.
Cogniauxii, Urb. Symb. Antill. i. 292.—Ind. occ.
corazonicola, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. vi. 520.—Ecuador.
cordigera, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 158.—Bras.
costulata, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. vi. 506.—Ecuador.
crassilimbus, C. DC. l. c. 516.—Ecuador.
crassiuscula, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 33.—Ind. occ.
crinicaulis, C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 286.—Bras.
cuspidata, Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiii. no. 2, 74.—Ind. occ.
decora, Dahlst. l. c. 173.—Bras.
diaphanoides, Dahlst. l. c. 112.—Bras.
disstiflora, C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 279.—Ind. occ.

T

PEPEROMIA:—

- distanis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 146.—Bras.
- Donnell-Smithii, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 291, repr.—Am. cent.
- dumeticola, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 569.—Bolivia.
- ecuadorensis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 507.—Ecuador.
- Eggersii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 282.—Ind. occ.
- emiliana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, iii. 292, repr.—Am. cent.
- enantiochrysa, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 514.—Ecuador.
- filicaulis, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 282, repr.—Am. cent.
- filispica, *C. DC. l. c.* 285, repr.—Am. cent.
- floribunda, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 19=lancifolia.
- fruticetorum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 519.—Ecuador.
- Gayi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 283.—Peruv.
- glaberrima, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 289, repr.—Am. cent.
- glabricaulis, *C. DC. l. c.* 290, repr.—Am. cent.
- glutinosa, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 293.—Mexico.
- goetzeana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 375.—Afr. trop.
- gracilis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 159.—Bras.
- Grisari, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 516.—Ecuador.
- Harmandi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 280.—Cochinch.
- Helleri, *C. DC. l. c.* 283.—Ins. Sandw.
- heterophylla, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 192 (non aliorum).—Bras.
- Hieronymi, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvi. i. 362, errore=Piper Hieronymi.
- hispidosa, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 158.—Bras.
- Hombrovi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 281.—Ind. occ.
- Humboldtii, *C. DC. l. c.* 284.—Ins. Comor.
- hylophila, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 284, repr.—Am. cent.
- inconspicua, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 515.—Ecuador.
- induta, *C. DC. l. c.* 511.—Ecuador.
- irazuana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 293, repr.—Am. cent.
- Johnsonii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 286 (Johnsonii).—Austral.
- Kuntzei, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 272.—Bolivia.
- laeteviridis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 361.—Afr. trop.
- lagartana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 285, repr.—Am. cent.
- lenticularis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 154 (non Parodi).—Am. trop.
- lindmaniana, *Dahlst. l. c.* 44.—Bras.
- lonchophylla, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 255.—Ins. Samoa.
- longispicata, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 284.—Am. cent.
- longicaulis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 517.—Ecuador.
- Lorentzii, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 273.—Reg. Argent.
- macrandra, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 276.—Mexico.
- malmeana, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 169.—Parag.
- megapotamica, *Dahlst. l. c.* 194.—Bras.
- Mocquersyi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 280.—Madag.
- Mosemi, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 115.—Bras.
- multispica, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 571.—Bolivia.
- nemoralis, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 292, repr.—Am. cent.
- nemorosa, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 49=acuminata.
- Niederleinii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 278.—Urug.

PEPEROMIA:—

- nitida, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 92.—Bras.
- nudifolia, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 284.—Bras.
- oajacensis, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 128.—Mexic.
- omnicola, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 507.—Ecuador.
- oxystachya, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 294, repr.—Ind. occ.
- pachydermis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 277.—Bras.
- pachystachya, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 510.—Ecuador.
- papillosa, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 170.—Ind. occ.
- pericellata, *Dahlst. l. c.* 35.—Am. cent.
- peltata, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 277 (non A. Dietr.).—Am. cent.
- peltifolia, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 570.—Bolivia.
- peltigera, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 505.—Ecuador.
- pendula, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 288, repr. (non Willd.).—Am. cent.
- peruviana, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 32=umbilicata.
- petraea, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 519.—Ecuador.
- pilimeria, *C. DC. l. c.* 509.—Ecuador.
- podocarpa, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 280, repr.—Am. cent.
- polystachyoides, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 136.—Bras.
- portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 292.—Ind. occ.
- Pringlei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 287.—Mexic.
- pseudocasaretti, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 291, repr.—Am. cent.
- pseudoestrellensis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 277.—Bras.
- pseudomajor, *C. DC. l. c.* 281.—Ind. occ.
- psiloclada, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 283, repr.—Am. cent.
- pteronura, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 515.—Ecuador.
- punicea, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 135.—Bras.
- Reineckeii, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 254.—Ins. Samoa.
- Remyi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 286.—Ins. Sandw.
- renifolia, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 40.—Bras.
- rhomboides, *Dahlst. l. c.* 190 (non Hook. & Arn.).—Ind. occ.
- Rossi, *Rendle, ex Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 186.—Ins. Christm.
- Rothschuhii, *C. DC. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 87.—Am. cent.
- rotundifolia, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 99=nummularifolia.
- rubropunctulata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 517.—Ecuador.
- rupicola, *C. DC. l. c.* 511.—Ecuador.
- salicifolia, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 281.—Peruv.
- samoensis, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 611.—Ins. Samoa.
- saxatilis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 512 (non A. Dietr.).—Ecuador.
- saxicola, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 571.—Bolivia.
- schenkiana, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 91.—Bras.
- sciaphila, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 279, repr.—Am. cent.
- silvivaga, *C. DC. l. c.* 287, repr.—Am. cent.
- Sodiroidi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 506.—Ecuador.
- soratana, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 569.—Bolivia.
- spathophylla, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 105.—Ind. occ.
- Staudtii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 361.—Afr. trop.
- stenostachya, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 510.—Ecuador.

PEPEROMIA:—

- Stroemfeltii, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 108.—Bras.
- subalata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 508.—Ecuador.
- Sumichrasti, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 278.—Mexic.
- syringifolia, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 514.—Ecuador.
- tablahuasiana, *C. DC. l. c.*—Ecuador.
- tecticola, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 280, repr.—Am. cent.
- tenuicaulis, *C. DC. l. c.* 286, repr.—Am. cent.
- ternata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 509.—Ecuador.
- tominana, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 572.—Bolivia.
- trineuroides, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 198.—Bras.
- trunciseda, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 513.—Ecuador.
- truncivaga, *C. DC. l. c.* 512.—Ecuador.
- tsakiana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 288, repr.—Am. cent.
- Tuerckheimii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 279.—Am. cent.
- tuisana, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 282, repr.—Am. cent.
- turbinata, *Dahlst. in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 2, 88.—Bras.
- Ulei, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxxv. 26.—Bras.
- ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 374.—Afr. trop.
- velutina, *Urb. Symb. Antill.* i. 293 (non Linden & André).—Ind. occ.
- vestita, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 568.—Bolivia.
- Wilmsii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 282.—Afr. austr.
- PEPLIS, Linn. (Lythrac.).
tubulosa, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 160.—Graecia.
- PEPONUM, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 318 (1897)=Peponia, Naud. (Cucurb.).
- PERAMIUM, Salisb. = Goodyera, R. Br. (Orchid.).
tesselatum, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = G. pubescens.
- PERDICIUM, Linn. = Gerbera, Gronov., et Trixis, P. Br. (Compos.).
abyssinicum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 615 = G. abyssinica.
piloselloides, Hiern, l. c. = G. piloselloides.
- PERESKIA, Plum. (Cact.).
Amapola, *Weber, in Bois, Dict. Hort.* 938.—Parag.
argentina, *Weber, l. c.*—Reg. Argent.
Guamacho, *Weber, l. c.*—Venez.
panamensis, *Weber, l. c.* 939.—Am. cent.
Pereskia, *Karst. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 107 = aculeata.
tampicana, *Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1898, 167.—Mexic.
weberiana, *K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 107; *Gesamb. Kakt.* i. 762.—Bolivia.
- PEREZIA, Lag. (Compos.).
cuernavacana, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 50.—Mexic.
elongata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 166.—Bolivia.
foliosa, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 71.—Bolivia.
laurifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 166.—Bolivia.
megalantha, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 540.—Patag.
Nelsonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 342.—Mexic.
oleracea, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 167.—Patag.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 540.—Patag.
sessiliflora, *Speg. l. c.* 542.—Patag.
Stuebelii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 372.—Peruv.
umbratilis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 50.—Mexic.
- PERGAMENA, Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. (1900) 263. ORCHIDEAE.
uniflora, *Finet, l. c.*—Japan.

- PERIBALLIA, Trin. (Gramin.).
minuta, Aschers. & Graebn. Mittel-Eur. Fl. ii. 298 =
Aira minuta.
- PERILOMIA, H. B. & K. (Labiata).
cumanensis, *Brig. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv.
III A. 233 (= *Scutellaria cumanensis*).—Venez.
malvaefolia, *Brig. l. c.* (= *Scutellaria malvaefolia*).—N.
Granat.
volubilis, *Brig. l. c.* (= *Scutellaria volubilis*).—N.
Granat.
- PERINERION, Baill. = *Baissea*, A. DC. (Apocyn.).
Welwitschii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. 758 = B.
Welwitschii.
- PERIPEPLUS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.
(1898) 66. RUBIACEAE.
klaineanus, *Pierre, l. c.*—Hab. ?
- PERIPLUCA, Tourn. (Asclep.).
ephedriformis, Schweinf. ex Defflers, in Mém. Inst.
Égypte, iii. 256 = *Leptadenia ephedriformis*.
- PERIPTERA, DC. (Malvac.).
macrostelis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat.
Herb. v. 174.—Mexic.
Periptera, Rose, l. c. 173 = *Anoda incarnata*.
- PERISTROPHE, Nees (Acanth.).
Deweyi, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc.
Bot. Belg. xxxviii. 103 = *bicalyculata*.
longifolia, *King & Prain, ex Prain, in Journ. As.*
Soc. Beng. lxxix. 171.—Ind. or.
luteoviridis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 243.
—Afr. trop.
usta, *C. B. Clarke, l. c.* 244.—Afr. trop.
- PERISTYLUS, Blume (Orchid.).
arachnoideus, A. Rich. in Ann. Sci. Nat. Sér. II. xiv.
267 = *Holothrix Richardii*.
bilobus, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 132.—Celebes.
Brandisii, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 506 = *Habenaria*
Brandisii.
clavellatus, *Kraenzl. l. c.* 521 = *Habenaria tridentata*.
cubitalis, *Kraenzl. l. c.* 502 = *Habenaria cubitalis*.
Gardneri, *Kraenzl. l. c.* 506 = *Habenaria Gardneri*.
gigas, *Kraenzl. l. c.* 504 = *Habenaria gigas*.
gracillimus, *Kraenzl. l. c.* 513 = *Habenaria gracillima*.
lefebvreanus, *A. Rich. in Ann. Sci. Nat. Sér. II.* xiv.
266.—Afr. trop.
monophyllus, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 516 =
Habenaria monophylla.
niveus, *Kraenzl. l. c.* 520 = *Habenaria nivea*.
Orchidis, *Kraenzl. l. c.* 515 = *Habenaria Orchidis*.
Prainii, *Kraenzl. l. c.* 514 = *Habenaria Prainii*.
Preussii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 199.—Afr.
trop.
secundiflorus, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 518 =
Habenaria secundiflora.
squamatus, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii.*
289 = *Deroemeria squamata*.
stenostachyus, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 502 =
Habenaria stenostachya.
Stuedneri, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 200.—
Afr. trop.
Stocksii, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 513 = *Habenaria*
Stocksii.
tridentatus, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. 221 =
Holothrix tridentata.
unifolius, *Hochst. ex Reichb. f. in Bonplandia*, iii.
213 = *Deroemeria unifolia*.
volkensianus, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 199.—
Afr. trop.
warburgianus, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i.* 519.—
Ins. Philipp.
- PERTHRIX, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.
(1898) 65. ASCLEPIADACEAE.
glabra, *Pierre, l. c.* 66.—Afr. trop.
- PERITOMA, DC. = *Cleome*, Linn. (Cappar.).
inornata, *Greene, Pittonia*, iv. 210 = *C. inornata*.
- PERNETTYA, Gandich. (Ericac.).
buxifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* 1873, 508 = *philip-*
piana.
chubutensis, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897,
618.—Patag.
patagonica, *Speg. l. c.* 547.—Patag.
philippiana, *Speg. l. c.* 548.—Patag.
polyphylla, *Colenso, in Trans. N. Zeal. Inst.* xxxi.
274.—N. Zel.
- PEROSTIS, Beauv. Agrost. 5 (1812) = *Perotis*, Ait.
(Gramin.).
laxifolia, *Beauv. l. c.* 6 = *Perotis latifolia*.
- PEROTIS, Ait. (Gramin.).
cubana, *Wright, in Sauv. Fl. Cub.* 202 = *latifolia*.
hordeiformis, *Nees, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 306 =
latifolia.
longiflora, *Nees, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.*
247 = *latifolia*.
rara, *R. Br. Prod.* 172 = *latifolia*.
scabra, *Willd. ex Trin. Gram. Unifl.* 172 = *latifolia*.
- PERROTTETIA, H. B. & K. (Celastr.).
glabrata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat.*
Herb. v. 110.—Mexic.
longistylis, *Rose, l. c.*—Mexic.
racemosa, *Loes. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.*
I. 224 (= *Celastrus racemosus*).—Japon.
- PERSEA, Plum. (Laurac.).
boliviensis, *Mez & Rusby, ex Rusby, in Mem. Torr.*
Bot. Club, vi. 113.—Bolivia.
Harrisii, *Mez, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 325.—
Ind. occ.
- PERSOONIA, Sm. (Proteac.).
leucopogon, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv.
220.—Austral.
- PERTYA, Sch. Bip. (Compos.).
Fauriei, *Franch. in Mém. Herb. Boiss.* no. 14, 2.—
Japon.
hybrida, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. 144.—Japon.
Macroclinidium, *Makino, l. c.* (= *Macroclinidium*
robustum).—Japon.
rigidula, *Makino, l. c.* (= *Eupatorium rigidulum*).—
Japon.
triloba, *Makino, l. c.* (= *Ainsliaea triloba*).—Japon.
- PERYMENIUM, Schrad. (Compos.).
chalarolepis, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer.*
Acad. xxxiv. 525.—Am. cent.
croceum, *Robinson & Greenm. l. c.* 527.—Am. cent.
Ghiesbreghtii, *Robinson & Greenm. l. c.* 525.—Am. cent.
Klattii, *Robinson & Greenm. l. c.* 523.—Am. cent.
monophyllum, *Robinson & Greenm. l. c.* 527.—Am.
cent.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. l. c.* 529.—Am. cent.
Pringlei, *Robinson & Greenm. l. c.* 526.—Am. cent.
Rosei, *Robinson & Greenm. l. c.* 523.—Am. cent.
rude, *Robinson & Greenm. l. c.* 528.—Am. cent.
subsquarrosum, *Robinson & Greenm. l. c.* 524.—Am.
cent.
- PESCATORIA, Reichb. f. (Orchid.).
schroederiana, *Rolfe, in Orchid Rev.* 1900, 68.—Hort.
- PETALIDIUM, Nees (Acanth.).
canescens, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 92.
—Afr. trop.
Currori, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 226.—Afr.
trop.
englerianum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v.
89.—Afr. trop.
glutinosum, *C. B. Clarke, l. c.* 92.—Afr. trop.
hamatum, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv.
III B. 299 = *Ecbolium hamatum*.
huillense, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 91.—
Afr. trop.
lanatum, *C. B. Clarke, l. c.* 90.—Afr. trop.
latifolium, *C. B. Clarke, l. c.* 88.—Afr. trop.
ovatum, *C. B. Clarke, l. c.* 90.—Afr. trop.
Rautanenii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 33.—
Afr. trop.
spiniiferum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 91.
—Afr. trop.
variabile, *C. B. Clarke, l. c.* 92.—Afr. trop.
- PETALONEMA, Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.
Nachtr. I. 264 (1897). MELASTOMACEAE.
pulchra, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
- PETALOSTEMON, Michx. (Legum.).
Gattingeri, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*,
1899, 593.—Am. bor.
microphyllus, *A. A. Heller, l. c.*—Am. bor.
mollis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 238.—
Am. bor.
oligophyllus, *Rydb. l. c.* 237.—Am. bor.
- PETALOSTEMON:—
pulcherrimus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*,
1899, 593.—Am. bor.
purpureus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 238
= *violaceus*.
tenuis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899,
593.—Am. bor.
- PETASTOMA, Miers = *Bignonia*, Tourn. (Bignon.).
cuneifolium, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.*
viii. II. 77 = *B. cuneifolia*.
discocalyx, *Bureau & K. Schum. l. c.* 80.—Bras.
reticulatum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 82 = *B. reticu-*
lata, *Poepp.*
trachyphyllum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 77.—Bras.
- PETROCOSMEA, Oliver (Gesner.).
iodioides, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2599.—China.
minor, *Hemsl. l. c.* t. 2600.—China.
- PETROPHYTON, Rydb. in Mem. N. York Bot.
Gard. i. (1900) 206. ROSACEAE.
caespitosum, *Rydb. l. c.* (= *Spiraea caespitosa*).—Am.
bor.
elator, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 5.—Am. bor.
- PETROSELINUM, Hoffm. = *Carum*, Linn. (Umbell.).
macedonicum, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 344 = *C. Petroselinum*.
- PEUCEDANUM, Tourn. (Umbell.).
argense, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii. 30.—
Am. bor.
brachystylum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.*
iii. VIII. 237 (= *Lefebvrea brachystyla*).—Afr. trop.
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
confusum, *Piper, in Erythea*, vi. 29.—Am. bor.
crassifolium, *Halascy & Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot.*
Ges. Wien, xlvii. 646.—Austria.
erosum, *Jepson, in Erythea*, v. 1.—Am. bor.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 503.—China.
Gormani, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 252.—Am. bor.
heracleoides, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
insulare, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III.* i. 106.—
Am. bor.
juniperinum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii.
29.—Am. bor.
Lefeburia, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
VIII. 237 (= *Lefebvrea abyssinica*).—Afr. trop.
longipedicellatum, *Drude, l. c.* (= *Lefebvrea longipedi-*
cellata).—Afr. trop.
megarrhiza, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899,
130.—Am. bor.
multiradiatum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.*
iii. VIII. 237 (= *Bubon capensis*).—Afr. austr.
muriculatum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.*
429.—Afr. trop.
narbonense, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 389 = *officinale*.
occidentale, *Bub. l. c.* = *Seseli cantabricum*.
reptans, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 502.—China.
Ruspolii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 23.—Afr.
trop.
scopulorum, *M. E. Jones, Contrib. Western Bot.* viii.
31.—Am. bor.
Stuhlmannii, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
VIII. 237 (= *Lefebvrea Stuhlmannii*).—Afr. trop.
trachystylum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 368,
sphalm. = *brachystylum*.
Upingtoniae, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.*
iii. VIII. 237 (= *Lefebvrea Upingtoniae*).—Afr. austr.
valerianaefolium, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 269.—
Afr. trop.
- PFEIFFERA, Salm-Dyck = *Rhipsalis*, Gaertn. (Cact.).
ianthothele, *Web. in Bois, Dict. Hortie.* 944 = *R.*
cereiformis.
- PHACA, Linn. = *Astragalus*, Linn. (Legum.).
inepta, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 246 = *A.*
lentiginosus.
microcystis, *Rydb. l. c.* 245 = *A. microcystis*, *A. Gray.*
platytropis, *Rydb. l. c.* 246 = *A. platytropis*.
- PHACELIA, Juss. (Hydrophyll.).
alpina, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 324.—
Am. bor.
Bicknellii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 141.
—Am. bor.
biennis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899,
132.—Am. bor.
Boykinii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 136.
—Am. bor.

PHACELIA :—

- campestris, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 242.—Am. bor.
 deserta, *A. Nelson*, l. c. 1898, 277.—Am. bor.
 frigida, *Greene*, *Pittonia*, iv. 39.—Calif.
 intermedia, *Wooton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 457.—Am. bor.
 laxa, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 141.—Am. bor.
 Lyallii, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 325.—Am. bor.
 minutissima, *Hend.* in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 351.—Am. bor.
 mutabilis, *Greene*, in *Erythea*, iv. 55.—Calif.
 Purpusi, *T. S. Brandege*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 451.—Calif.
 virgata, *Greene*, in *Erythea*, iv. 54.—Calif.

PHAEANTHUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
 Schefferi, *Boerl. ex Koord. in Meded.'s Lands Plantent.* xix. 337.—Celebes.

PHAEOCEPHALUS, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 158. **COMPOSITAE**.
 gnidioides, *S. Moore*, l. c.—Afr. austr.

PHAEONEURON, Gilg, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 267 (1897). **MELASTOMACEAE**.
 dicellandroides, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
 Moloneyi, *Stapp*, in *Bot. Mag.* t. 7729.—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Stapp*, l. c. sub t. 7729.—Afr. trop.
 setosum, *Stapp*, l. c. (= *Dicellandra setosa*).—Afr. trop.

PHAGNALON, Cass. (Compos.).
 harazianum, *Defters*, *Voy. Yemen*, 150.—Arab.

PHAIUS, Lour. (Orchid.).
 Mannii, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb.* ii. 118.—Afr. trop.
 pallidus, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 313.—Penins. Mal.

PHALAEENOPSIS, Blume (Orchid.).
 denisiana, *Cogn.* in *Gard. Chron.* 1899, II. 82.—Ins. Philipp.
 Mastersii, *King & Pantl.* in *Journ. As. Soc. Beng.* lvi. 591.—Burma.

PHALANGIUM, Moehr. = **Bulbine**, Linn. (Liliac.).
 altissimum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 317 = *B. longiscapa*.
 tenuifolium, *Kuntze*, l. c.—Afr. austr.

PHALARIS, Linn. (Gramin.).
 caesia, *Nees*, *Fl. Afr. Austr.* 6 = arundinacea.
 dentata, Linn. f. *Suppl.* 106 = *Prionanthium rigidum*.
 intermedia, *Bosc. ex Poir.* *Encyc. Suppl.* i. 300 = arundinacea.
 velutina, *Forsk.* *Fl. Aegypt. Arab.* 17 = *Digitaria sanguinalis*.

PHALERIA, Jack (Thymel.).
 ambigua, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 111 (= *Drimyspermum ambiguum*).—Java.
 longifolia, *Boerl.* l. c. (= *Drimyspermum longifolium*).—Java.
 macrocarpa, *Boerl.* l. c. (= *Drimyspermum macrocarpum*).—N. Guin.
 papuana, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 460.—N. Guin.
 revoluta, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 111 (= *Drimyspermum revolutum*).—N. Guin.
 urens, *Koord. in Meded.'s Lands Plantent.* xix. 577.—Celebes.

PHANERA, Lour. = **Bauhinia**, Linn. (Legum.).
 albolutea, *Miq.* *Fl. Ind. Bat.* i. 1079 = *B. albolutea*.

PHARNACEUM, Linn. (Ficoid.).
 pusillum, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 123.—Afr. austr.

PHARUS, P. Br. (Gramin.).
 ciliatus, *Retz.* *Obs. v. 23* = *Leersia hexandra*.
 urceolatus, *Roxb.* *Hort. Beng.* [104]; *Fl. Ind.* iii. 611 = *Leptaspis urceolata*.

PHASEOLUS, Tourn. (Legum.).
 amboensis, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 36.—Afr. trop.
 macrorhynchus, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 409.—Afr. trop.
 psammodes, *Lindm.* in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 17.—Bras.
 smilacifolius, *Pollard*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxi. 233.—Am. bor.

PHAULOPSIS, Lindau, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 305 (1897) = seq.

PHAYLOPSIS, Willd. (Acanth.).
 falcisepala, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 84.—Afr. trop.
 glandulosa, *C. B. Clarke*, l. c. 87.—Afr. trop.
 Johnstoni, *C. B. Clarke*, l. c. 86.—Afr. trop.
 lankesterioides, *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 305.—Afr. trop.
 longifolia, *Sims*, *Bot. Mag.* t. 2433 = parviflora.
 micrantha, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 85.—Afr. trop.
 microphylla, *T. Anders. ex C. B. Clarke*, l. c.—Afr. trop.
 oppositifolius, *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 305 = parviflora.
 Poggei, *Lindau*, l. c.—Afr. trop.
 silvestris, *Lindau*, l. c. (= *Micranthus silvestris*).—Afr. trop.

PHEBALIUM, Vent. (Rutac.).
 Beckleri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 141 (= *Eriostemon Beckleri*).—Austral.
 squameum, *Engl.* l. c. = *Billardierii*.

PELLANDRIUM, Tourn. = **Oenanthe**, Tourn. (Umbell.).
 Dodonaei, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 368 = *O. fistulosa*.
 Lobelii, *Bub.* l. c. 370 = *O. silaifolia*.
 Mathioli, *Bub.* l. c. = *O. pimpinelloides*.
 Plinii, *Bub.* l. c. = *O. crocata*.
 Tabernaemontani, *Bub.* l. c. 368 = *O. Lachenalii*.

PHELLOPTERUS, Benth. (Umbell.).
 bulbosus, *Coult. & Rose*, in *U.S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 168 (= *Cymopterus bulbosus*).—Am. bor.
 macrorrhizus, *Coult. & Rose*, l. c. 167 (= *Cymopterus macrorrhizus*).—Am. bor.
 multinervatus, *Coult. & Rose*, l. c. 169.—Am. bor.
 purpurascens, *Coult. & Rose*, l. c. 168 (= *Cymopterus utahensis*).—Am. bor.

PHENAX, Wedd. (Urtic.).
 edentatus, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 294 (= *Ramium edentatum*).—Bolivia.
 globulifera, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 120.—Bolivia.

PHIALODISCUS, Radlk. (Sapind.).
 Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 171.—Afr. trop.

PHILADELPHUS, Riv. (Saxifr.).
 argyrocalyx, *Wooton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 452.—Am. bor.
 Billiardi, *Koehne*, in *Gartenfl.* 1896, 508.—Am. bor.?
 caucasicus, *Koehne*, l. c. 619.—Reg. Caucas.
 columbianus, *Koehne*, l. c. 542 (= Hort. ?).—Am. bor.
 incanus, *Koehne*, l. c. 562.—China.
 karwinskyanus, *Koehne*, l. c. 486.—Mexic.
 lancifolius, *Koehne*, l. c. 561.—Reg. Himal.
 matsumuranus, *Koehne*, l. c. 619.—Japon.
 occidentalis, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 374.—Am. bor.
 sericanthus, *Koehne*, in *Gartenfl.* 1896, 561.—China.

PHILIBERTELLA, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 305. **ASCLEPIADACEAE**.
 clausa, *Vail*, l. c. 306 (= *Philibertia viminalis*).—Am. trop.
 crassifolia, *Vail*, l. c. (= *Philibertia crassifolia*).—Mexic.
 crispa, *Vail*, l. c. (= *Philibertia crispa*).—Texas; Mexic.
 cumanensis, *Vail*, l. c. (= *Philibertia cumanensis*).—Mexic.
 cynanchoides, *Vail*, l. c. 307 (= *Philibertia cynanchoides*).—Texas; Mexic.
 elegans, *Vail*, l. c. 310 (= *Philibertia elegans*).—Mexic.
 Hartwegii, *Vail*, l. c. 308 (= *Philibertia linearis*).—Calif.; Mexic.
 hirtella, *Vail*, l. c. 309.—Am. bor.
 Torreyi, *Vail*, l. c. (= *Philibertia Torreyi*).—Texas.

PHILIBERTIA, H. B. & K. (Asclep.).
 bonariensis, *Malme*, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 7, 23 (= *Sarcostemma bonariense*).—Reg. Argent.
 cuspidata, *Malme*, l. c. 24 (= *Sarcostemma cuspidatum*).—Bras.

PHILIPPIELLA, Speg. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 566. **ILLECEBRACEAE**.
 patagonica, *Speg. l. c.*—Patag.

PHILODENDRON, Schott (Arac.).
 acuminatissimum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 543.—Ecuador.
 angustisectum, *Engl.* l. c. 549.—N. Granat.
 bahiense, *Engl.* l. c. 518.—Bras.
 bulaoanum, *Engl.* l. c. 542.—Ecuador.
 cannifolium, *Engl.* l. c. 512 = rudgeanum.
 chimboanum, *Engl.* l. c. 519.—Ecuador.
 coerulescens, *Engl.* l. c. 523.—N. Granat.
 Cooperi, *Engl. ex Donn. Sm. Pl. Guatem.* v. 88, nomen.—Am. cent.
 cymbispathum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 555.—Bras.
 Dussii, *Engl.* l. c. 530.—Ind. occ.
 ecuadorese, *Engl.* l. c. 531.—Ecuador.
 Eichleri, *Engl.* l. c. 556.—Bras.
 graveolens, *Engl.* l. c. 519.—N. Granat.
 gualanum, *Engl.* l. c. 532.—Ecuador.
 guatemalense, *Engl.* l. c. 514.—Am. cent.
 houlettianum, *Engl.* l. c. 550.—Guiana.
 Krugii, *Engl.* l. c. 538.—Ind. occ.
 longipes, *Engl.* l. c. 519.—N. Granat.
 marianum, *Engl.* l. c. 518 = cannaefolium.
 multispadiceum, *Engl.* l. c. 542.—N. Granat.
 Pittieri, *Engl.* l. c. 541.—Am. cent.
 purpureoviride, *Engl.* l. c. 526.—Ecuador.
 quercifolium, *Engl.* l. c. 546 (non Hort.).—Bras.?
 rubrocinctum, *Engl.* l. c. 532.—N. Granat.
 silvaticum, *Engl.* l. c. 513.—Ecuador.
 Smithii, *Engl.* l. c. 540.—Am. cent.
 sodiroanum, *Engl.* l. c. 531.—Ecuador.
 Talamancae, *Engl.* l. c. 511.—Am. cent.
 tobagense, *Engl.* l. c. 524.—Ind. occ.
 viride, *Engl.* l. c. 540.—N. Granat.
 Wallisii, *Regel*, *ex Engl. l. c.* 543.—N. Granat.

PHIPPSIA, R. Br. (Gramin.).
 himalaica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 240.—Ind. or.

PHELEUM, Linn. (Gramin.).
 dentatum, *Pers. Syn.* i. 79 = *Prionanthium rigidum*.
 ovatum, *Jaquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 237 = alpinum.
 subulatum, *Spreng. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 12 = *Lasiachloa longifolia*.

PHLOGACANTHUS, Nees (Acanth.).
 pubiflorus, *Lindau*, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 659.—Cochinch.
 turgidus, *Lindau*, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 211 (= *Cystacanthus turgida*).—Cochinch.

PHLOMIS, Linn. (Labiata).
 Bertrami, *Post*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 98.—Syria.
 Chimerae, *Boissieu*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 290.—Lycia.
 Clusii, *Bub. Fl. Pyren.* i. 461 = *P. Lychnitis*.
 Cypria, *Post*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 99.—Cyprus.
 flavescens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 716 (= *Anthocoma flavescens*).—Malaya.
 medicinalis, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 554.—China.
 stenocalyx, *Diels*, l. c. 555.—China.

PHLOX, Linn. (Polemon.).
 alyssifolia, *Greene*, *Pittonia*, iii. 27.—Am. bor.
 andicola, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 11.—Am. bor.
 aspera, *E. Nelson*, l. c. 34.—Am. bor.
 Brittonii, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 279.—Am. bor.
 cernua, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 22.—Am. bor.
 collina, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 316.—Am. bor.
 condensata, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 13.—Am. bor.
 costata, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 315.—Am. bor.
 Covillei, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 15.—Am. bor.
 diapensioides, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 317.—Am. bor.
 gladiformis, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 21.—Am. bor.
 hirsuta, *E. Nelson*, l. c. 28.—Am. bor.
 lanceolata, *E. Nelson*, l. c. 29.—Am. bor.

PHLOX :—

- multiflora, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 278.—Am. bor.
 Piperi, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 18.—Am. bor.
 scleranthifolia, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 813.—Am. bor.
 Stansburyi, *A. A. Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 478.—Am. bor.
 tenuifolia, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 27.—Am. bor.
 tenuis, *E. Nelson*, l. c. 85.—Am. bor.
 virida, *E. Nelson*, l. c. 24.—Am. bor.
 viscida, *E. Nelson*, l. c.—Am. bor.
 Whitedii, *E. Nelson*, in *Erythraea*, vii. 167.—Am. bor.
 Woodhousei, *E. Nelson*, *Revis. W. N. Am. Phloxes*, 31.—Am. bor.

PHOEBE, Nees (Laurac.).

- falcata, *Mes*, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 251 (= *Ocotea falcata*).—Ind. occ.
 taubertiana, *Mes & Schwacke*, in *Engl. Jahrb.* xxi. 427.—Bras.

PHOENIX, Linn. (Palm.).

- farinifera, *Roxb.* Pl. Corom. i. 53, t. 74 = pusilla.
 melanocarpa, *Naud.* in *E. Sauwaigo*, *Phoenix Cult. Jard. Nice*, l.—Hab. ?

PHOLIDIA, R. Br. (Myopor.).

- caerulea, *S. Moore*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 208.—Austral.
 homoplastica, *S. Moore*, l. c. 207.—Austral.
 interstans, *S. Moore*, l. c. 210.—Austral.
 saligna, *S. Moore*, l. c. 207.—Austral.
 Veronica, *S. Moore*, l. c. 209.—Austral.

PHOLIDOTA, Lindl. (Orchid.).

- caduca, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 288.—Borneo.
 cantonensis, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1896, 196.—China.
 decurva, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 328.—Penins. Mal.
 Wattii, *King & Pantl.* in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 590.—Ind. or.

PHORADENDRON, Nutt. (Loranth.).

- Aequatoris, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 10.—Ecuador.
 anceps, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 40 = hexastichon.
 argentinum, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 14.—Reg. Argent.
 bilineatum, *Urb.* l. c. 5.—Venez.
 Campbellii, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 44.—Ind. occ.
 caracasana, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 4.—Venez.
 carneum, *Urb.* l. c. 1.—Mexic.
 chrysoarpum, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 39.—Ind. occ.
 Crulsii, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 11.—Bras.
 cuneifolium, *Urb.* l. c. 5.—Venez.
 cymosum, *Urb.* l. c. 7.—Venez.
 dichotomum, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 48 = berterianum.
 Eggersii, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 10.—Ecuador.
 Forestierae, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 36.—Mexic.
 fragile, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 13.—Bras.
 gardnerianum, *Urb.* l. c. 11.—Bras.
 Glaziovii, *Urb.* l. c. 12.—Bras.
 Gundlachii, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 44.—Ind. occ.
 Hartii, *Krug & Urb.* l. c. 40.—Ind. occ.
 inaequidentatum, *Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 137.—Bolivia.
 Kuntzei, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 11.—Bolivia.
 longipetiolatum, *Urb.* l. c. 6.—Venez.
 minutifolium, *Urb.* l. c. 2.—Mexic.
 mucronatum, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 35 = emarginatum.
 ovalifolium, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 6.—Venez.
 paradoxum, *Urb.* l. c. 8.—Venez.
 Pearcei, *Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 136.—Bolivia.
 pruinatum, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 14.—Reg. Argent.

PHORADENDRON :—

- quadragulare, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 35 = rubrum.
 racemosum, *Krug & Urb.* l. c. 46 = glandulosum.
 reticulatum, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 12.—Bras.
 rigidum, *Urb.* l. c. 7.—Venez.
 Robinsonii, *Urb.* l. c. 4.—Mexic.
 rugulosum, *Urb.* l. c. 13.—Bras.
 Kusbyi, *Britton*, ex *Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 136.—Bolivia.
 spathulifolium, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 41.—Ind. occ.
 subtrinerve, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 117.—Bolivia.
 tetrapterum, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 35.—Ind. occ.
 tovarense, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 8.—Venez.
 tubulosum, *Urb.* l. c. 5.—Venez.
 tucumanense, *Urb.* l. c. 16.—Reg. Argent.
 Wattii, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 43.—Ind. occ.

PHRAGMITES, Trin. (Gramin.).

- barbata, *Stapf*, in *Dyer*, Fl. Cap. vii. 541 = communis.
 bifaria, *Wight*, ex *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. vii. 304 = Karka.
 Karka, *Trin.* ex *Steud.* *Nom.* ed. II. ii. 324.—As.; Afr.; Austral.
 longivalvis, *Steud.* *Syn. Pl. Gram.* 196 = communis.
 nepalensis, *Nees*, ex *Steud.* l. c. = Karka.

PHREATIA, Lindl. (Orchid.).

- celebica, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1899, 129.—Celebes.
 congesta, *Rolfe*, ex *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxv. 358.—Ins. Christm.
 Koordersii, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1899, 129.—Celebes.
 listrophora, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 307.—Penins. Mal.

PHRYGILANTHUS, Eichl. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

- bolivianus, *Engl.* in *Engl. & Prantl.* Pflanzenf. Nachtr. i. 133.—Bolivia.
 Diguettii, *Engl.* l. c. 134 = Dipodophyllum Diguettii.
 eucalyptifolius, *Engl.* l. c. = L. celastroides.
 mapirensis, *Engl.* l. c. = Struthanthus mapirensis.
 Palmeri, *Engl.* l. c. = L. Palmeri.
 Raoului, *Engl.* l. c. = L. Raoului.
 tenuiflorus, *Engl.* l. c. = L. tenuiflorus.

PHRYNIUM, Loefl. (Scitamin.).

- adenocarpum, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 324.—Afr. trop.
 basiflorum, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 182.—Penins. Mal.
 Benthami, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 323.—Afr. trop.
 bisubulatum, *Baker*, l. c. 325.—Afr. trop.
 corisense, *Baker*, l. c. 322.—Afr. trop.
 cylindricum, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 178 (non Rosc.).—Penins. Mal.
 Guppyi, *K. Schum. & Lauterb.* Fl. Deutsch. Südsee, 239 = Cominsia Guppyi.
 heliconioides, *K. Schum. & Lauterb.* l. c. 238.—N. Guin.
 Hensii, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 323.—Afr. trop.
 hirtum, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 181.—Penins. Mal.
 holostachyum, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 322.—Afr. trop.
 inaequilaterum, *Baker*, l. c. 325.—Afr. trop.
 leiogonium, *Baker*, l. c. 324.—Afr. trop.
 limosum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 318 = Heteranthera limosa.
 macrophyllum, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 323.—Afr. trop.
 malaccense, *Ridley*, in *Journ. As. Soc. Straits*, xxxii. 180.—Penins. Mal.
 monophyllum, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 324 (non C. Koch).—Afr. trop.
 oxycarpum, *Baker*, l. c.—Afr. trop.
 pedunculatum, *Warb.* ex *K. Schum. & Lauterb.* Fl. Deutsch. Südsee, 238.—N. Guin.
 prionogonium, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 325.—Afr. trop.
 reniforme, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 318 = Heteranthera reniformis.
 sulphureum, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 326.—Afr. trop.

PHRYNIUM :—

- velutinum, *Baker*, in *Dyer*, Fl. Trop. Afr. vii. 323 (non Poepp. & Endl.).—Afr. trop.
 villosum, *Benth.* in *Benth. & Hook.* f. *Gen. Pl.* iii. 653 (non Sweet).—Afr. trop.

PHTHEIROSPEPERMUM, Bunge (Scrophul.).

- japonicum, *Makino*, in *Bot. Mag. Tokyo*, 1899, (111) (= *Gerardia japonica*).—Japan.

PHTHIRUSA, Mart. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

- alata, *Engl.* in *Engl. & Prantl.* Pflanzenf. Nachtr. i. 135 (= *Dendropemon alatus*).—Ind. occ.
 bicolor, *Engl.* l. c. (= *Dendropemon bicolor*).—Ind. occ.
 caribaea, *Engl.* l. c. (= *Dendropemon caribaeus*).—Ind. occ.
 Constantiae, *Engl.* l. c. (= *Dendropemon Constantiae*).—Ind. occ.
 jamaicensis, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 15 = L. Theobromae.
 montana, *Engl.* in *Engl. & Prantl.* Pflanzenf. Nachtr. i. 135 = L. parvifolius.
 Picardae, *Engl.* l. c. (= *Dendropemon Picardae*).—Ind. occ.
 purpurea, *Engl.* l. c. = L. uniflorus.
 Seitsii, *Krug & Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 16.—Ind. occ.
 Sintensis, *Engl.* in *Engl. & Prantl.* Pflanzenf. Nachtr. i. 135 (= *Dendropemon Sintensis*).—Ind. occ.

PHYLA, Lour. = **Lippia**, Linn. (Verben.).

- betulaefolia, *Greene*, *Pittonia*, iv. 48 = L. betulaefolia.
 canescens, *Greene*, l. c. = L. canescens.
 cuneifolia, *Greene*, l. c. 47 = L. cuneifolia, *Steud.*
 lanceolata, *Greene*, l. c. = L. lanceolata.
 nodiflora, *Greene*, l. c. 46 = L. nodiflora.
 reptans, *Greene*, l. c. 47 = L. reptans.

PHYLICA, Linn. (Rhamn.).

- aemula, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 166.—Afr. austr.
 altigena, *Schlechter*, l. c. 167.—Afr. austr.
 chionocephala, *Schlechter*, l. c.—Afr. austr.
 chionophila, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1897, 428.—Afr. austr.
 fruticosa, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 168.—Afr. austr.
 glabriflora, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 39.—Afr. austr.
 Maximiliani, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 168.—Afr. austr.
 minutiflora, *Schlechter*, l. c. xxiv. 440.—Afr. austr.
 mucronata, *E. Mey.* in *Drège*, *Zwei Pfl. Docum.* 84 = Stilbe mucronata.
 odorata, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 168.—Afr. austr.
 pulchella, *Schlechter*, l. c. 169.—Afr. austr.
 stenopetala, *Schlechter*, l. c.—Afr. austr.
 tropica, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 302.—Afr. trop.
 tubulosa, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 170.—Afr. austr.

PHYLLACTIS, Pers. (Valerian.).

- carcosa, *Speg.* in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 526 (= *Valeriana carcosa*).—Reg. Magell.
 clarioneifolia, *Speg.* l. c. (= *Valeriana clarioneifolia*).—Chili.

PHYLLAGATHIS, Blume (Melast.).

- Griffithii, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 45 (= *Allomorpha Griffithii*).—Penins. Mal.
 hispida, *King*, l. c. 46.—Penins. Mal.
 Scortechinii, *King*, l. c. 45.—Penins. Mal.
 tuberculata, *King*, l. c. 44.—Penins. Mal.

PHYLLANTHODENDRON, Hemsl. in Hook.

- l. c. Pl. tt. 2563-4 (1898). **EUPHORBIACEAE.**
 mirabilis, *Hemsl.* l. c.—Siam.

PHYLLANTHUS, Linn. (Euphorb.).

- Antunesii, *Pax*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 519.—Afr. trop.
 Avicularia, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 278.—Am. bor.
 Bachmanni, *Pax*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 520.—Afr. trop.
 celebicus, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 588, 627.—Celebes.
 cordobensis, *K. Schum.* in *Just.* *Fahresb.* xxvi. i. 350 (= *Diasperus cordobensis*).—Reg. Argent.
 guineensis, *Pax*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 732.—Afr. trop.
 hodjensis, *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 304.—Arab.
 inaequalis, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 118.—Bolivia.

PHYLLANTHUS :—

- lalambensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. II. 302, descr.—Arab.; Afr. trop.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 588, 627.—Celebes.
 mirabilis, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. II. 355 = *Phyllanthodendron mirabilis*.
 peninsularis, *Brandegee, in Erythea*, vii. 8.—Mexic.
 Pittieri, *Pax, ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 327.—Am. cent.
 polyanthus, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 19.—Afr. trop.
 polycladus, *Urb. Symb. Antill.* i. 333.—Ind. occ.
 popayanensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxvi. 508.—N. Granat.
 Rivae, *Pax, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 182.—Afr. trop.
 subcuneatus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 478.—Mexic.
 submollis, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 390.—N. Guin.

PHYULLOBAEA, Benth. (Gesner.).

- speciosa, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 522.—Malaya.

PHYLLOCACTUS, Link (Cact.).

- acuminatus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 213 (= *Epiphyllum acuminatum*).—Bras.
 Pfersdorffii, *Hort. ex K. Schum. l. c.* 138.—Hab.?
 Pittieri, *Weber, in Bois, Dict. Hort.* 957.—Am. cent.

PHYLLOCOMOS, Mast. in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxvi. 19 (1900). **RESTIACEAE**. insignis, *Mast. l. c.* 20.—Afr. austr.**PHYULLODES**, Lour. = **Phrynium**, Loeffl. (Scitam.).

- adenocarpum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xv. 442 = Phr. adenocarpum.
 bisubulatum, *K. Schum. in Bol. Soc. Broter.* xi. 83 = Phr. bisubulatum.
 leiogonium, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xv. 442 = Phr. leiogonium.
 macrophyllum, *K. Schum. l. c.* 444 = Phr. macrophyllum.
 macrostachyum, *K. Schum. l. c.* 445 = Phr. Benthami.
 monophyllum, *K. Schum. l. c.* 440 = Phr. monophyllum, *Baker*.
 oxycarpum, *K. Schum. l. c.* 443 = Phr. oxycarpum.
 prionogonium, *K. Schum. l. c.* 441 = Phr. prionogonium.
 villosum, *K. Schum. l. c.* 445 = Phr. villosum, *Benth.*

PHYULLODESMIS, Van Tiegh. (Loranth.).

- Kaempferi*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 188 = *Viscum Kaempferi*.

PHYULLODOCE, Salisb. = **Bryanthus**, S. G. Gmel. (Ericac.).

- glanduliflora*, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 299 = B. glanduliflorus.
 hybrida, Rydb. l. c. 298.—Am. bor.
 intermedia, Rydb. l. c. = B. empetrifloris.

PHYULLOPODIUM, Benth. (Scrophul.).

- glutinatum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 220.—Afr. austr.

PHYULLOSMA, Bolus, in Engl. Jahrb. xxiv. 547 (1897). **RUTACEAE**. capensis, *Bolus, l. c.*—Afr. austr.**PHYULLOSTACHYS**, Sieb. & Zucc. (Gramin.).

- Fauriei*, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 718.—Japon.
 Mannii, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 28.—Ind. or.
 Monaii, *Auct. in Just, Jahresb.* xxiv. II. 383, sphalm. = praec.

PHYULLOSTEGIA, Benth. (Labiata.).

- variabilis, *Bitter, in Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xvi. 435.—Ins. Sandw.

PHYULLOTA, Benth. (Legum.).

- humilis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 186.—Austral.
 lycopodioides, *S. Moore, l. c.* 185.—Austral.

PHYULMASPERUM, Less. (Compos.).

- pubescens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 167.—Patag.

PHYSACANTHUS, Benth. (Acanth.).

- cylindricus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 58.—Afr. trop.
 inflatus, *C. B. Clarke, l. c.* 57.—Afr. trop.

PHYSALIDIUM, Fenzl (Crucif.).

- graelisaeifolium, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xviii. 12.—As. cent.

PHYSALIS, Linn. (Solan.).

- acuminata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 311.—Mexic.
 margarantoides, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 197.—Bolivia.
 monticola, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 119.—Am. bor.
 philippensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 568.—Mexic.
 polyphylla, *Greene, Pittonia*, iv. 150.—Am. bor.
 Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 311.—Mexic.
 rigida, *Pollard & Ball, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 134.—Am. bor.
 Rydbergii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 569.—Mexic.
 saltillensis, *Fernald, l. c.* 568.—Mexic.
 sordida, *Fernald, l. c.*—Mexic.
 subintegra, *Fernald, l. c.* 567.—Mexic.

PHYSOPTYCHIS, Boiss. = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).

- Haussknechtii*, *Bormm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii-xiv. 1, descr.—As. Min.

PHYSOSIPHON, Lindl. (Orchid.).

- deregularis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 341 (= *Stelis deregularis*).—Bras.
 echinanthus, *Cogn. l. c.* 338 (= *Pleurothallis echinantha*).—Bras.
 minor, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 275.—Am. cent.
 parahybunensis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 340 (= *Lepanthes parahybunensis*).—Bras.

PHYSOSTEGIA, Benth. (Labiata.).

- digitalis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 613.—Am. bor.
 leptophylla, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 286.—Am. bor.

PHYSOSTEMON, Mart. = **Cleome**, Linn. (Cappar.).

- guyanense*, *Malmé, in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. no. 6, 26 = C. guianensis.

PHYSURUS, L. C. Rich. (Orchid.).

- boliviensis, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 300.—Bolivia.
 chinensis, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 200.—China.
 herpysmoides, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 124.—Reg. Himal.

PHYULOCRENE, Wall. (Olac.).

- Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 629.—Celebes.
 ovalifolia, *Koord. l. c.*—Celebes.
 tinoporifolia, *Koord. l. c.*—Celebes.

PHYULOLACCA, Tourn. (Phytolacc.).

- Goudotii*, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 213.—Madag.
 nova-hispania, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 41 = mexicana.

PICEA, Link (Conif.).

- columbiana, *Lemmon, in Gard. & For.* 1897, 183.—Am. bor.
 rubens, *Sargent, Silva N. Am.* xii. 33 = nigra.

PICRADENIA, Hook. = **Actinella**, Nutt. (Compos.).

- acaulis*, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 449 = A. acaulis.
 biennis, *Greene, Pittonia*, iii. 272 = A. biennis.
 canescens, *Greene, l. c.* 271.—Am. bor.
 Cooperi, *Greene, l. c.* 272 = A. Cooperi.
 floribunda, *Greene, l. c.*—Am. bor.
 Lemmoni, *Greene, l. c.*—Am. bor.
 ligulaeflora, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 378 = pumila.
 linearifolia, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 448 = A. linearifolia.
 macrantha, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 130.—Am. bor.
 multiflora, *Greene, Pittonia*, iii. 273.—Am. bor.
 nudiflora, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 379, sphalm. = praec.
 odorata, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 449 = A. odorata.
 pumila, *Greene, Pittonia*, iii. 271.—Am. bor.
 Rusbyi, *Greene, l. c.* = A. Rusbyi.
 scaposa, *Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 449 = A. scaposa.
 texana, *Greene, Pittonia*, iii. 273 = A. texana.
 Vaseyi, *Greene, l. c.* 271 = A. Vaseyi.

PICRALIMA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1278. **APOCYNACEAE**. klaineana, *Pierre, l. c.* 1279.—Afr. trop.**PICRASMA**, Blume (Simarub.).

- crenata, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 222 (= *Picraena Vellozii*).—Bras.

PICRIDIDIUM, Desf. (Compos.).

- lesbiacum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 147.—Graecia.

PICTETIA, DC. (Legum.).

- aculeata, *Urb. Symb. Antill.* ii. 294 = *Ormocarpum sennoides*.
 sessilifolia, *Wright, ex Combs, in Trans. Acad. Sc. St. Louis*, vii. 411.—Ind. occ.
 spinifolia, *Urb. Symb. Antill.* ii. 295 = *Desvauxii*, &c.

PILEA, Lindl. (Urtic.).

- floribunda, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 280.—Madag.
 Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 379.—Afr. trop.
 Hamaoi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, x. (364).—Japon.
 Harrisii, *Urb. Symb. Antill.* i. 299.—Ind. occ.
 involucrata, *Urb. l. c.* 298 = pubescens.
 Krugii, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
 leptophylla, *Urb. l. c.* 297.—Ind. occ.
 multicaulis, *Urb. l. c.* 295.—Ind. occ.
 nigrescens, *Urb. l. c.* 299.—Ind. occ.
 notata, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 476.—China.
 plataniflora, *C. H. Wright, l. c.* 477.—China.
 rubriflora, *C. H. Wright, l. c.* 478.—China.

PILOCARPUS, Vahl (Rutac.).

- insularis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 80.—Mexic.
 longipes, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 112.—Mexic.

PILOCEREUS, Lem. = **Cereus**, Mill. (Cact.).

- albisetosus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 196 = C. albisetosus.
 chrysacanthus, *Weber, ex K. Schum. l. c.* 178.—Mexic.
 erythrocephalus, *K. Schum. l. c.* 195.—Reg. Argent.
 flavispinus, *Ruempl. in Foerst. Handb. Cact. ed. II.* 659 = C. strictus.
 fulviceps, *Weber, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 176.—Mexic.
 fulvispinosus, *K. Schum. l. c.* 196 = C. Royeni.
 Gounellei, *Weber, ex K. Schum. l. c.* 188.—Bras.
 lanatus, *Weber, in Bois, Dict. Hort.* 965 = C. lanatus.
 lateralis, *Weber, l. c.* 966.—Mexic.
 macrocephalus, *Weber, l. c.*—Mexic.
 marschalleckianus, *Zeissold, in Monatschr. Kakt.* 1898, 34.—Mexic.?
 nobilis, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 189 = C. strictus.
 Pringlei, *Weber, in Bois, Dict. Hort.* 966 = C. Pringlei.
 Schlumbergeri, *Weber, ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 186.—Hab.?
 Sterkmanii, *Hort. ex K. Schum. l. c.* 179 = scoparius.
 Swartzii, *K. Schum. l. c.* 184 = C. lanuginosus.
 Tetazo, *Weber, ex K. Schum. l. c.* 176 = C. Tetazo.
 urbanianus, *K. Schum. l. c.* 193.—Ind. occ.

PIMELANDRA, A. DC. (Myrsin.).

- macrophylla, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 242 (= *Ardisia macrophylla*).—Java.
 myristicaefolia, *Koord. & Valet. l. c.* 241 (= *Ardisia myristicaefolia*).—Malaya.

PIMELEA, Banks & Soland. (Thymel.).

- dasyantha, *Colenso, in Trans. N. Zeal. Inst.* xxviii. 609.—N. Zel.
 montana, *Colenso, l. c.* xxxi. 279.—N. Zel.
 subsimilis, *Colenso, l. c.* xxviii. 609.—N. Zel.
 thesioides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 224.—Austral.

PIMPINELLA, Riv. (Umbell.).

- arguta, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 496.—China.
 Bicknellii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 85.—Ins. Balear.
 cantabrica, *Eub. Fl. Pyren.* ii. 355.—Pyren.
 filicina, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 494 (= *Carum filicinum*).—China.
 Henryi, *Diels, l. c.* 495.—China.
 platyphylla, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 426.—Afr. trop.
 rhomboidea, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 495.—China.
 Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 22.—Afr. trop.

PIMPINELLA :—

Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 495.—China.
Tanakae, *Diels, l. c.* 494 (= *Carum Tanakae*).—China.
trichomanifolia, *Diels, l. c.* 495 (= *Carum trichomanifolium*).—China.
triternata, *Diels, l. c.* 496.—China.

PINDAREA, Barb. Rodr. *Pl. Nov. Rio, v.* (1896)
17. **PALMAE**.
concinna, *Barb. Rodr. l. c.*—Bras.
fastuosa, *Barb. Rodr. l. c.* 23.—Bras.

PINELIA, Lindl. (Orchid.).

lehmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 479.—
N. Granat.

PINGUICULA, Tourn. (Lentibul.).

Hellwegeri, *Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv.
80.—Austria.

PINUS, Tourn. (Conif.).

celakovskiorum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur.*
Fl. i. 230.—Hybr.
heterophylla, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.*
xvii. 19 = cubensis.
mayriana, *Sudw. l. c.* 16.—Am. bor.
scipioniformis, *Mast. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 270.—
China.
scopulorum, *Lemmon, in Gard. & For.* 1897, 183.—
Am. bor.
tenuis, *Lemmon, in Erythraea*, vi. 77.—Am. bor.
yunnanensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1899, 253.—
China.

PIPER, Linn. (Piperac.).

acutiusculum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 259.—Mexic.
antioquiense, *C. DC. l. c.* 260.—N. Granat.
argyreneurum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii.
297.—Borneo.
arieianum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 254, repr.—Am. cent.
articulatum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 267 (= A. Rich.?).—Ind. occ.
asymmetricum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 271, repr.—Am. cent.
atorameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 487.—
Ecuador.
Baclei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 267.—Urug.
bavinum, *C. DC. l. c.* 270.—Tonkin.
biauratum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 240, repr.—Am. cent.
brevicaule, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 272 (non Poir.).—Tonkin.
brevipedunculatum, *C. DC. l. c.* 266.—Am. cent.
brevispica, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 481.—
Ecuador.
brevistylum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 232, repr.—Am. cent.
cabaganum, *C. DC. l. c.* 273, repr.—Am. cent.
Candelarium, *C. DC. l. c.* 258, repr., sphalm. = cande-
larianum.
carpinteranum, *C. DC. l. c.* 251, repr.—Am. cent.
ceibense, *C. DC. l. c.* 245, repr.—Am. cent.
cenocladum, *C. DC. l. c.* 259, repr.—Am. cent.
chandocanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 274.—Cochinch.
Claudii, *C. DC. l. c.* 264.—Peruv.
curtispicum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 266, repr.—Am. cent.
cyphophyllum, *C. DC. l. c.* 257, repr.—Am. cent.
domingense, *C. DC. l. c.* 238, repr.—Am. cent.
dumeticola, *C. DC. l. c.* 247, repr.—Am. cent.
dumetorum, *C. DC. l. c.* 272, repr.—Am. cent.
durameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 484.—
Ecuador.
Elatostema, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii.
295.—Borneo.
Ferrii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 268.—Ins. Luchu.
filistilum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 491.—
Ecuador.
flabellinerve, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxx.
26.—Bras.
frustratum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 73 (= *Cha-
vica frustrata*).—Java.
glabrifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 246, repr.—Am. cent.

PIPER :—

glabrirameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 493.—
Ecuador.
Glaziovii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 265.—Bras.
gracilirameum, *C. DC. l. c.*—Venez.
Graeffei, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxv. 610.—Ins. Samoa.
guadaloupense, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 264.—Ind. occ.
guayasanum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 486.—
Ecuador.
hainana, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. i. 363
(= *Chavica hainana*).—China.
Harmandi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 268.—Cochinch.
Henryi, *C. DC. l. c.* 271.—China.
Hieronymi, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 273.
—Reg. Argent.
Hollrungii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*,
256.—N. Guin.
humile, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxx. 25
(non aliorum).—Bras.
Hydrocladum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 487.
—Ecuador.
hylebates, *C. DC. l. c.* 479.—Ecuador.
hylophilum, *C. DC. l. c.* 484.—Ecuador.
juayasanum, *K. Schum. in Just, Jahrb.* xxvi. i. 363,
sphalm. = guayasanum.
Kerberi, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 258.—Mexic.
Koordersii, *C. DC. ex Koord. in Meded. 'S Lands*
Plantent. xix. 568, nomen.—Celebes.
Kuntzei, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 274.—
Bolivia.
laevifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 263, repr. (non Blume).—Am.
cent.
Langlassci, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 273.—Mexic.
lanuginosum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 233, repr.—Am. cent.
laosanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 269.—Cochinch.
Lauterbachii, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl.*
Deutsch. Südsee, 255.—N. Guin.
leptocladum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 249, repr.—Am. cent.
littorale, *C. DC. l. c.* 252, repr.—Am. cent.
Lolot, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 272.—Tonkin.
longepilosum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 489.—
Ecuador.
longipedunculatum, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb.*
Fl. Deutsch. Südsee, 261 (non D. Dietr.).—Ins. Samoa.
lunulibracteatum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 483.
—Ecuador.
machadoanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 253, repr.—Am. cent.
malacocarpum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.*
Südsee, 259.—N. Guin.
martinicense, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 259.—Ind. occ.
matinanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 266, repr.—Am. cent.
metallicum, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii.
297.—Borneo.
Minahassae, *C. DC. ex Koord. in Meded. 'S Lands*
Plantent. xix. 569, nomen.—Celebes.
minus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*,
258.—N. Guin.
Moreleti, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 256.—Am. cent.
multinodum, *C. DC. in Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxx.
25.—Bras.
nudicaule, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 243, repr.—Am. cent.
nudifolium, *C. DC. l. c.* 269, descr. emend.—Am. cent.
orenocanum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 564.—
Am. trop.
orizabanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 258.—Mexic.
oxystachyum, *C. DC. l. c.* 255.—N. Granat.
pachyphloium, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii.
274.—Bolivia.
pallidirameum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 493.—
Ecuador.
pastroense, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 261.—N. Granat.

PIPER :—

paulownifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst.*
Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 275, repr.—Am. cent.
pilinervium, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 262.—N. Granat.
plagiophyllum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.*
Südsee, 260.—N. Guin.
praecox, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 254.—Bras.
pseudoaduncum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst.*
Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 255, repr.—Am. cent.
pseudobumbratum, *C. DC. l. c.* 270, repr.—Am. cent.
pseudodilatatum, *C. DC. l. c.* 250, repr.—Am. cent.
pseudolanceolatum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard.*
Bot. Genève, 1898, 256.—Bras.
pseudomarginatum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi.
492.—Ecuador.
pseudonigrum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 275.—Tonkin.
pseudobile, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 485.—
Ecuador.
pseudopsis, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 248, repr.—Am. cent.
psilorhachis, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 253.—Am. cent.
regale, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 490.—Ecuador.
riparense, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 274, repr.—Am. cent.
ripense, *C. DC. l. c.* 263, repr.—Am. cent.
ripicola, *C. DC. l. c.* 267, repr.—Am. cent.
Rodatzii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*,
262.—N. Guin.
Rothschuhii, *C. DC. ex Loes. in Engl. Jahrb.* xxix. 86.
—Am. cent.
rubrum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 273 (non Reinw.).—Tonkin.
sagittifolium, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 268, repr.—Am. cent.
Sanctae-Crucis, *C. DC. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii.
274.—Bolivia.
san-marcosanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst.*
Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 231, repr.—Am. cent.
sarapiquinum, *C. DC. l. c.* 254, repr.—Am. cent.
Savagii, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*,
1898, 252.—Am. cent.
saxicola, *C. DC. l. c.* 269 (non Vahl).—Tonkin.
Schumannii, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl.*
Deutsch. Südsee, 256.—N. Britt.
scleromyelum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 256, repr.—Am. cent.
sepium, *C. DC. l. c.* 260, repr.—Am. cent.
silvarum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 486.—Ecuador.
silvicola, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 234, repr.—Am. cent.
silvivagum, *C. DC. l. c.* 242, repr.—Am. cent.
Singkojan, *C. DC. ex Koord. in Meded. 'S Lands*
Plantent. xix. 569.—Celebes.
Sodiroi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 482.—Ecuador.
sphaeroides, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 263.—N. Granat.
squamulosum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 488.—
Ecuador.
stenocarpum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 270.—N. Guin.
stenocladum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 244, repr.—Am. cent.
stenophyllum, *C. DC. in K. Schum. & Lauterb. Fl.*
Deutsch. Südsee, 261.—Sumatra.
stenostachys, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 254.—Peruv.
subaspericaule, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-*
Geog. Costa Rica, viii. 241, repr.—Am. cent.
subbullatum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch.*
Südsee, 262.—N. Guin.
subciliatum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot.*
Genève, 1898, 263.—Guiana.
suberythrocarpum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst.*
Fis.-Geog. Costa Rica, viii. 237, repr.—Am. cent.
subflavirameum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard.*
Bot. Genève, 1898, 255.—Bras.
subglabribracteatum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi.
485.—Ecuador.
substenocarpum, *C. DC. l. c.* 492.—Ecuador.
subtropicum, *C. DC. l. c.* 489.—Ecuador.
Tonduzii, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog.*
Costa Rica, viii. 264, repr.—Am. cent.
trachyphyllum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 482.—
Ecuador.

PIPER—

trichocladum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 256, repr.—Am. cent.
 trichophyllum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 261.—Mexic.
 trichorhachis, *C. DC. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 566.—Bolivia.
 trigonastriifolium, *C. DC. l. c.* 567.—Bolivia.
 trimetrale, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 235, repr.—Am. cent.
 tsakianum, *C. DC. l. c.* 276, repr.—Am. cent.
 tucumanum, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 253.—Reg. Argent.
 tuisanum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 244, repr.—Ind. occ.
 Ulei, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 262.—Bras.
 ulvifolium, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 259.—N. Guin.
 umbraculum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 488.—Ecuador.
 urophyllum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 265, repr.—Am. cent.
 verbenanum, *C. DC. l. c.* 250, repr.—Am. cent.
 virillanum, *C. DC. l. c.* 230, repr.—Am. cent.
 Werneri, *C. DC. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 257.—Bras.
 xanthostachyum, *C. DC. ex Pittier, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 261, repr.—Am. cent.
 xiroresanum, *C. DC. l. c.* 262, repr.—Am. cent.
 zacatense, *C. DC. l. c.* 239, repr.—Am. cent.
 zhorquinense, *C. DC. l. c.* 232, repr.—Am. cent.

PIPTADENIA, Benth. (Legum.).

Elliotii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 260.—Afr. trop.
 Goetzei, *Harms, l. c.* xxviii. 397.—Afr. trop.
 paraguayensis, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 36 (= *Pithecolobium paraguayense*).—Parag.
 Schlechteri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 260.—Afr. trop.

PIPTATHERUM, Beauv. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).

aequiglume, Munro, ex Duthie, in *Atkins. Gaz. N. W. Prov.* 626 = *O. aequiglumis*.
 arisitense, Coste, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliiii. 511.—Eur.
 laterale, Munro, ex Aitch. in *Journ. Linn. Soc.* xviii. 106 = *O. lateralis*.
 miliaceum, Coss. *Notes Crit.* 129 = *O. miliacea*.
 molinoides, Boiss. *Fl. Orient.* v. 509, partim = *O. lateralis*.
 multiflorum, Beauv. *Agrost.* 18 = *O. miliacea*.
 soongaricum, Duthie, in *Atkins. Gaz. N. W. Prov.* 626 = *O. Munroi*.
 strictum, Munro, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 234 = *O. lateralis*.

PIPTOCARPHA, R. Br. (Compos.).

Sodiroy, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 2.—Ecuador.
 tetrantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 457.—Ind. occ.

PIPTOCHAETIUM, J. & C. Presl = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).

angolense, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 734.—Chili.
 brevifolium, R. Phil. l. c. 733.—Chili.
 collinum, R. Phil. l. c.—Chili.
 cuspidatum, R. Phil. l. c. 732.—Chili.
 gibbum, R. Phil. l. c. 731.—Chili.
 granulatum, R. Phil. l. c. 732.—Chili.
 humile, R. Phil. l. c. 730.—Chili.
 macrocarpum, R. Phil. l. c. 735.—Chili.
 Moelleri, R. Phil. l. c. 734.—Chili.
 subnudum, R. Phil. l. c. 731.—Chili.

PIPTOSTIGMA, Oliver (Anonac.).

longepilosum, *Engl. ex Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 297.—Afr. trop.

PIPTOTHRIX, A. Gray (Compos.).

Goldmanii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 328.—Mexic.

PIPTURUS, Wedd. (Urtic.).

kauaiensis, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 815.—Ins. Sandw.
 ruber, *A. A. Heller, l. c.*—Ins. Sandw.

PIQUERIA, Cav. (Compos.).

Sodiroy, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 3.—Ecuador.

PISONIA, Plum. (Nyctag.).

arborescens, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 265 = hirtella.
 boliviana, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 125.—Bolivia.
 calophylla, *Heimerl, in Engl. Jahrb.* xxi. 625.—Ind. occ.
 Cephalotomandra, *Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 34.—N. Granat.
 cuspidata, *Heimerl, in Engl. Jahrb.* xxi. 628.—Ind. occ.
 eggersiana, *Heimerl, l. c.* 627.—Ind. occ.; Guiana.
 ferruginosa, *Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Guian.* 1131, nomen.—Guiana.
 fragrans, *Karst. & Triana, in Linnæa*, xxviii. 429 = *P. Cephalotomandra*.
 Lauterbachii, *Warb. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 307.—N. Guin.
 praecox, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 265.—Parag.
 riedeliana, *Fischer, ex Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 35.—Bras.
 rufescens, *Griseb. ex Heimerl, in Engl. Jahrb.* xxi. 626 = calophylla.
 schomburgkiana, *Heimerl, in Jahresb. Staats-Oberrealsch. Fünfhaus, Wien*, xxiii. repr. 34.—Guiana.
 spathiphylla, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 308.—N. Guin.

PITCAIRNIA, L'Hérit. (Bromel.).

Bakeri, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 460 (= *Quesnelia Bakeri*).—N. Granat.
 Bangii, *Baker, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 124.—Bolivia.
 brittoniana, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 451.—Bolivia.
 caulescens, *C. Koch, ex Mez, l. c.* 425.—Venez.?
 Fendleri, *Mez, l. c.* 387.—Venez.
 gracilis, *Mez, l. c.* 407.—Ind. occ.
 hemsleyana, *Mez, l. c.* 455.—Am. cent.
 klabochiana, *Morr. ex Mez, l. c.* 414.—Ecuador.
 longibracteata, *Bouché, ex Mez, l. c.* 428.—Am. cent.
 lorentziana, *Mez, l. c.* 373.—Reg. Argent.
 multiramosa, *Mez, l. c.* 419.—Bolivia.
 oerstediana, *Mez, l. c.* 448.—Am. cent.
 Pavonii, *Mez, l. c.* 386.—Ecuador.
 penduliflora, *Mez, l. c.* 463 (= *Tillandsia penduliflora*).—Ind. occ.
 platystemon, *Mez, l. c.* 421.—Bolivia.
 pruinosa, *Mez, in Mart. Fl. Bras.* iii. III. 454 = weddelliana.
 pulchella, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 459.—Ecuador.
 pusilla, *Mez, l. c.* 429.—Guiana.
 ruiziana, *Mez, l. c.* 420.—Peruv.
 spectabilis, *Mez, l. c.* 421.—N. Granat.
 spicata, *Mez, l. c.* 392 (= *Bromelia spicata*).—Ind. occ.
 straminea, *Poepp. ex Mez, l. c.* 427.—Peruv.
 sulfurea, *Mez, l. c.* 456 = *Wendlandi*.
 taenipetala, *Mez, l. c.* 382.—Mexic.
 tenuis, *Mez, l. c.* 421.—Venez.
 Theae, *Mez, l. c.* 376.—Am. cent.
 weddelliana, *Mez, l. c.* 434 (non Baker).—Bras.

PITCHIA, Auct. in Just. *Jahresb.* xxv. II. 493, sphalm. = **Fitchia**, Hook. f. (Compos.).**PITHECOLOBIUM**, Mart. (Legum.).

arborescens, *Urb. Symb. Antill.* ii. 259 = filicifolium.
 attopeense, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 396 A.—Cochinch.
 caribaeum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 260.—Ind. occ.
 harmandianum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 394 A.—Cochinch.
 Jupunba, *Urb. Symb. Antill.* ii. 257 = trapezifolium.
 Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. 271.—Penins. Mal.; Borneo.
 malayanum, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 394 B.—Siam.
 mekongense, *Pierre, l. c.* t. 396 B.—Cochinch.
 Minahassae, *Teijsm. & Binn. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 630, descr.—Celebes.
 nervosum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 257.—Ind. occ.
 nicobaricum, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. 267.—Ins. Nicobar.
 oppositifolium, *Urb. Symb. Antill.* ii. 258.—Ind. occ.
 pendulum, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 7, 54.—Am. austr.
 quocense, *Pierre, Fl. Cochinch.* sub t. 396.—Cochinch.
 reductum, *Malmé, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxv. no. 11, 42.—Parag.
 venosum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 29.—Bolivia.

PITTIERA, Cogn. (Cucurb.).

grandiflora, *Cogn. ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 123 (= *Cayaponia grandiflora*).—Am. cent.
 parvifolia, *Cogn. & Rose, ex Rose, l. c.*—Am. cent.

PITTOSPORUM, Banks (Pittospor.).

berberidoides, *Burkill, in Kew Bull.* 1899, 96.—N. Guin.
 comptum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 338.—N. Guin.
 Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 392.—Afr. trop.
 illicoides, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1900 (31).—Japon.
 Kruegeri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 26.—Afr. austr.
 macrophyllum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 338.—N. Guin.
 malosanam, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 244.—Afr. trop.
 microcalyx, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvii. 62.—Java.
 nativitatis, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 171.—Ins. Christm.
 oblongifolium, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 243 = *Alsodeiae* sp.
 pullifolium, *Burkill, in Kew Bull.* 1899, 96.—N. Guin.
 setigerum, *F. M. Bailey, in Agric. Journ. Queensl.* i. 451.—Anstral.
 spathaceum, *Burkill, in Hook. Ic. Pl.* t. 2561.—Ins. Tonga.
 truncatum, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 378.—China.
 zollingerianum, *Binn. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xvii. 53.—Java.

PITURANTHOS, Viv. (Umbell.).

aphylla, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 115.—Afr. austr.

PLACEA, Miqrs (Amaryll.).

amoena, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 145.—Chili.

PLAGIANTHUS, Forst. (Malvac.).

cymosus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 70.—N. Zel.
 repens, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 179.—Austral.

PLAGIOBOTHRYIS, Fisch. & Mey. (Borag.).

asper, *Greene, Pittonia*, iii. 262.—Am. bor.
 colorans, *Greene, l. c.*—Am. bor.
 echinatus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
 parvulus, *Greene, l. c.* 261.—Am. bor.

PLAGIOLYTRUM, Nees = **Tripogon**, Roth (Gramin.).

filiforme, Nees, in *Proc. Linn. Soc.* i. 95 = *T. filiformis*.
 unidentatum, Nees, l. c. = *T. filiformis*.

PLAGIOSIPHON, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 194 (1897); et in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899) 263. **LEGUMINOSAE**.
 discifer, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
PLAGIOSTACHYS, Ridley, in *Journ. As. Soc.*

Straits, xxxii. (1899) 151. **SCITAMINEAE**.
 lateralis, *Ridley, l. c.* 152 (= *Amomum laterale*).—Penins. Mal.
 strobilifera, *Ridley, l. c.* 151 (= *Alpinia strobilifera*).—Borneo.

PLAGIOSTYLES, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii.

(1897) 1327. **EUPHORBIACEAE**.
 klainiana, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

PLANALTOA, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxi. (1896)

454. **COMPOSITAE**.
 salviifolia, *Taub. l. c.*—Bras.

PLANCHONELLA, Pierre (Sapot.).

Koordersii, *Pierre, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 519, nomen.—Celebes.

PLANOTIA, Munro (Gramin.).

ingens, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 721.—N. Granat.
 Stuebelii, *Pilg. l. c.* 720.—N. Granat.
 tessellata, *Pilg. l. c.*—N. Granat.

PLANTAGO, Tourn. (Plantag.).

abyssinica, *Hochst. ex A. Br. in Flora*, 1841, i. 279 = lanceolata.
 angustifolia, *Bub. Fl. Pyren.* i. 209 = maritima.
 argentina, *Pilg. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 263.—Reg. Argent.

PLANTAGO :—

- argyrea, *Morris*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 111.—Am. bor.
 brunnea, *Morris*, l. c. 115.—Calif.
 dura, *Morris*, l. c. 113.—Calif.
 erecta, *Morris*, l. c. 118.—Calif.
 fastigiata, *Morris*, l. c. 116.—Am. bor.
 glabriuscula, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xci. 268.—Chili.
 Helleri, *Small*, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 288.—Am. bor.
 inflexa, *Morris*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 113.—Am. bor.
 insularis, *Eastw.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. III. i. 112.—Am. bor.
 Kuntzei, *Pilg.* in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 263.—Urag.
 lanatifolia, *Small*, ex *Morris*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 114.—Am. bor.
 limarensis, *F. Phil.* ex *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xci. 266.—Chili.
 lubenensis, *Form.* in *Verh. Nat. Ver. Brünn*, xxxviii. 214.—Eur.
 myosuroides, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 369.—Am. bor.
 oligantha, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xci. 270 (non *Roem. & Schult.*).—Chili.
 oxyphylla, *Speg.* in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 565.—Patag.
 scariosa, *Morris*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 117.—Am. bor.
 sodiroana, *Pilg.* in *Engl. Jahrb.* xxv. 733.—Ecuador.
 subverticillata, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. 152.—Graecia.
 tanalensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1897, 276.—Madag.
 tehuelcha, *Speg.* in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 565.—Patag.
 tetrantha, *Morris*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 119.—Am. bor.
 tunetana, *Murb.* in *Act. Univ. Lund.* xxxv. Afd. II. no. 3 (1899) 2.—Afr. bor.

PLATANATHERA, Rich. (Orchid.).

- acuta, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 611 (= *Gymnadenia acuta*).—Cambodia.
 bakeriana, *Kraenzl.* l. c. 632 (= *Habenaria bakeriana*).—Reg. Himal.
 biermanniana, *Kraenzl.* l. c. 636 (= *Habenaria biermanniana*).—Reg. Himal.
 Buchananii, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 420 = *Brachycorythis Buchananii*.
 citrina, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 633 (= *Habenaria citrina*).—Ins. Maurit.
 densa, *Freyn*, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 96 (non *Lindl.*).—Dahuria.
 dyeriana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 636 (= *Habenaria dyeriana*).—Reg. Himal.
 engleriana, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 204.—Afr. trop.
 fuscescens, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 637 (= *Orchis fuscescens*).—As. et Am. bor.
 glaberrima, *Kraenzl.* l. c. 609 (= *Holothrix glaberrima*).—Madag.
 hawkesiana, *Kraenzl.* l. c. 634 (= *Habenaria hawkesiana*).—Burma.
 Helferii, *Kraenzl.* l. c. 611 (= *Gymnadenia Helferii*).—Reg. Himal.
 helleborina, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 204.—Afr. trop.
 Henryi, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 632 (= *Habenaria Henryi*).—China.
 holochila, *Kraenzl.* l. c. 645 (= *Habenaria holochila*).—Ins. Sandw.
 inhambanensis, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 330.—Afr. trop.
 madagascariensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 609 (= *Holothrix madagascariensis*).—Madag.
 manubriata, *Kraenzl. ex Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 265.—China.
 setchuenica, *Kraenzl.* l. c.—China.
 sikkimensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 621 (= *Habenaria sikkimensis*).—Reg. Himal.
 sparsiflora, *Schlechter*, in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 538 (= *Habenaria sparsiflora*).—Am. bor. et cent.
 tenuior, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 205.—Afr. trop.
 unalaskensis, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 631 (= *Spiranthes unalascensis*).—Ins. Aleutian.

VOL. III.

PLATANATHERA :—

- uncata, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 205.—Afr. trop.
 virginea, *Bolus, Orch. S. Afr.* t. 60.—Afr. austr.
 viridimaculata, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 618.—Anglia.

PLATEA, Blume (Olac.).

- parviflora, *Koord. & Valet.* in *Bull. Inst. Buitenz.* ii. 3; et in *Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 155.—Java.

PLATYCLINIS, Benth. (Orchid.).

- bistorta, *Wendl. & Kraenzl.* in *Xenia Orchid.* 169, t. 299.—Malaya.
 globigera, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 266.—Borneo.
 linearifolium, *Ridley*, l. c. xxxii. 231 (= *Dendrochilum linearifolium*).—Penins. Mal.
 linearis, *Ridley*, l. c. 230.—Penins. Mal.
 rufa, *Rolfe*, in *Kew Bull.* 1898, 192.—As. trop.
 sarawakensis, *Ridley*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 267.—Borneo.

PLATYCORYNE, Reichb. f. (Orchid.).

- aurea, *Rolfe*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 256.—Afr. trop.
 buchananiana, *Rolfe*, l. c. 257.—Afr. trop.
 crocea, *Rolfe*, l. c.—Afr. trop.
 Guingangae, *Rolfe*, l. c. 258.—Afr. trop.
 paludosa, *Rolfe*, l. c. 256.—Afr. trop.
 poggeana, *Rolfe*, l. c. 258.—Afr. trop.
 Protearum, *Rolfe*, l. c.—Afr. trop.
 tenuicaulis, *Rolfe*, l. c. 257.—Afr. trop.
 Wilfordii, *Rolfe*, l. c. 256.—Afr. trop.

PLATYMISCIUM, Vog. (Legum.).

- cochabambense, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 26.—Bolivia.

PLATYMITIUM, Warb. = *Dobera*, Juss. (Salvad.).

- loranthifolium, Warb. in *Engl. Pf. Ost-Afr.* C. 279 = *D. loranthifolia*.

PLATYMITRA, Boerl. Cat. Hort. Bogor. (1899) 33.

- ANONACEAE.
 macrocarpa, *Boerl.* l. c.; et in *Ic. Bogor.* t. 62.—Java.

PLATYOSPRION, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxii.

- (1877) 263; *Mél. Biol.* ix. 659. **LEGUMINOSAE.**
 platycarpum, *Maxim.* l. c. (= *Sophora platycarpa*).—Japan.

PLATYSEPALUM, Welw. (Legum.).

- cuspidatum, *Taub.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 187.—Afr. trop.
 ferrugineum, *Taub.* l. c. 186.—Afr. trop.
 hypoleucum, *Taub.* l. c.—Afr. trop.
 Poggei, *Taub.* l. c. 185.—Afr. trop.

PLAZIA, Ruiz & Pav. (Compos.).

- argentea, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 167 = *Hyalis argentea*.
 spartioides, *Kuntze*, l. c. = *Aphyllocladus spartioides*.

PLECTRANTHUS, L'Hérit. (Labiata).

- andongensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 525.—Afr. trop.
 biflorus, *Baker*, l. c. 402.—Afr. trop.
 bongensis, *Baker*, l. c. 410.—Afr. trop.
 brevipes, *Baker*, l. c. 406.—Afr. trop.
 Buchananii, *Baker*, l. c. 402.—Afr. trop.
 calcareatus, *Hemsl.* in *Hook. Ic. Pl.* t. 2671.—China.
 chiradzulensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 412.—Afr. trop.
 deccanicus, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 234.—Ind. or.
 dichromophyllus, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 562.—China.
 fragilis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 407.—Afr. trop.
 fruticosus, *Wight*, ex *Hook.* f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 623 = *deccanicus*.
 fulvescens, *Prairie*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 521.—Burma.
 Galpinii, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1896, 393.—Afr. austr.
 Goetzei, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 469.—Afr. trop.
 grandidentatus, *Guerke*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 554.—Afr. austr.

PLECTRANTHUS :—

- horridus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 416.—Afr. trop.
 hoslundoides, *Baker*, l. c. 418 (non *Scott Elliot*).—Afr. trop.
 insolitus, *C. H. Wright*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 275.—Afr. trop.
 Johnstonii, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 411.—Afr. trop.
 kondowensis, *Baker*, l. c. 417.—Afr. trop.
 Kunstleri, *Prairie*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 521.—Penins. Mal.
 Kuntzei, *Guerke*, in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 260.—Afr. austr.
 Lastii, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 408.—Afr. trop.
 leptobotrys, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 561.—China.
 longipes, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 406.—Afr. trop.
 luteus, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 468.—Afr. trop.
 Malinvaldi, *Brig.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. 125 = *Coleus Malinvaldi*.
 mandalensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 405.—Afr. trop.
 mangajensis, *Baker*, l. c. 406.—Afr. trop.
 Mannii, *Baker*, l. c. 408.—Afr. trop.
 Marquesii, *Guerke*, in *Bol. Soc. Brot.* xvi. 70.—Afr. trop.
 masukensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 405.—Afr. trop.
 matabelensis, *Baker*, l. c. 417.—Afr. trop.
 microphyllus, *Baker*, l. c. 410 = *porpeodon*.
 microphyllus, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 467.—Afr. trop.
 Mocquersii, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 233.—Madag.
 monticola, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 468, descr.—Afr. trop.
 moschosmoides, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 414.—Afr. trop.
 natalensis, *Guerke*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 552.—Afr. austr.
 neochilus, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1896, 394.—Afr. austr.
 nyikensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 416.—Afr. trop.
 paniculatus, *Baker*, l. c. 419 (non *Jacq.*).—Afr. trop.
 parviflorus, *Baker*, in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 261 (non *aliorum*).—Afr. austr.
 pauciflorus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 405.—Afr. trop.
 phryxotrichus, *Brig.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 66.—Afr. trop.
 porpeodon, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 525.—Afr. trop.
 pubescens, *Baker*, l. c. 416 (non *Willd.*).—Afr. trop.
 pyramidatus, *Guerke*, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 552 = *calycinus*.
 Rehmannii, *Guerke*, l. c. 553.—Afr. austr.
 Rosthornii, *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 562.—China.
 rupestris, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 409.—Afr. trop.
 schizophyllus, *Baker*, l. c. 414.—Afr. trop.
 Schlechteri, *Guerke*, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 311, nomen.—Afr. trop.
 sphaerophyllus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 410.—Afr. trop.
 stenophyllus, *Baker*, l. c. 402.—Afr. trop.
 stenosphon, *Baker*, l. c. 415.—Afr. trop.
 Stuhlmannii, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 469.—Afr. trop.
 triflorus, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 417.—Afr. trop.
 Tysoni, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 77.—Afr. austr.
 urticoides, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 412.—Afr. trop.
 Whytei, *Baker*, l. c. 419.—Afr. trop.
 Woodii, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 76 (Wodii).—Afr. austr.
 Zollingeri, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 234.—Java.
 zombensis, *Baker*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 402.—Afr. trop.

PLECTRITIS, DC. = *Valerianella*, Tourn. (Valerian.).

- anomala, *Suksd.* in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 144 = *V. anomala*.
 aphanoptera, *Suksd.* l. c. = *V. aphanoptera*.
 involuta, *Suksd.* l. c.—Am. bor.

U

PLECTRITIS:—

magna, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897, 145 = *V. magna*.
microptera, Suksd. l. c. 119.—Am. bor.

PLECTRONIA, Linn. (Rubiace).

abbreviata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xviii. 73.—Afr. trop.
anomocarpa, *K. Schum. l. c.* xxiii. 459 (= *Canthium anomocarpum*).—Afr. trop.
arnoldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 29.*—Afr. trop.
Barteri, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 33* (= *Canthium Barteri*).—Afr. trop.
brevifolium, *Engl. ex Wildem. & Th. Dur. l. c.* (= *Canthium brevifolium*).—Afr. trop.
calycophila, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 73.—Afr. trop.
Chamaedendrum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 122.—Afr. austr.
chlorantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 458.—Afr. trop.
connata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 201.—Afr. trop.
cuspidata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 74.—Afr. trop.
decidua, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
discolor, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 68.—Afr. trop.
fragrantissima, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 75.—Afr. trop.
golungensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium golungense*).—Afr. trop.
huillensis, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium huillense*).—Afr. trop.
klotzschiana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 460 = spinosa, *Klotzsch*.
kraussioides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium kraussioides*).—Afr. trop.
lactescens, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium lactescens*).—Afr. trop.
Lualabae, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 76.—Afr. trop.
laxiflora, *K. Schum. l. c.* xxiii. 459.—Afr. trop.
locuples, *K. Schum. l. c.* xxviii. 75.—Afr. trop.
lucida, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 33.*—Afr. trop.
macrophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 76.—Afr. trop.
medusula, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium medusula*).—Afr. trop.
Minahassae, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium Minahassae*).—Celebes.
pallida, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 77.—Afr. trop.
Palma, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
platyphylla, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium platyphyllum*).—Afr. trop.
rhamnoides, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium rhamnoides*).—Afr. trop.
silvatica, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium silvaticum*).—Afr. trop.
spinosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 459 (= *Canthium Thonningii*).—Afr. trop.
strychnoides, *K. Schum. in Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped.* 320, nomen.—Afr. trop.
subvenia, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 78.—Madag.
telidosma, *K. Schum. l. c.* xxiii. 460.—Afr. trop.
tenuiflora, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium tenuiflorum*).—Afr. trop.
umbrosa, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium umbrosum*).—Afr. trop.
vanguieroides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 460 (= *Canthium vangueroides*).—Afr. trop.
virgata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 393 (= *Canthium virgatum*).—Afr. trop.
Welwitschii, *K. Schum. l. c.* (= *Canthium Welwitschii*).—Afr. trop.

PLEIOCARPA, Benth. (Apocyn.).

tubicina, *Stapp, in Kew Bull.* 1898, 304.—Afr. trop.
Welwitschii, *Stapp, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 665.—Afr. trop.

PLEIOCARPIDIA, K. Schum. in Engl. & Prantl,

Pflanzenf. Nachtr. I. 814 (1897). RUBIACEAE.
enneandra, *K. Schum. l. c.* (= *Aulacodiscus premnoides*).—Malaya.

PLEIOSPORA, Harv. (Legum.).

holosericea, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 29.—Afr. austr.
obovata, *Schinz, l. c.*—Afr. austr.

PLEIOTAXIS, Steetz (Compos.).

Dewevrei, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 34.—Afr. trop.
fulva, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 611.—Afr. trop.

PLEODENDRON, Van Tiegh. in Journ. de Bot.

1899, 272. CANELLACEAE.
macranthum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Cinnamodendron macranthum*).—Ind. occ.

PLEONOTOMA, Miers = BIGNONIA, Linn. (Bignon.).

Brittoni, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 72.—Bras.
diversifolia, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 274.—Am. trop.
Imperatoris-Maximiliani, *Bureau & K. Schum. l. c.* 279 = B. Imperatoris-Maximiliani.

PLEURANTHODES, Weberbauer, in Engl. & Prantl,

Pflanzenf. iii. v. (1896) 424. RHAMNACEAE.
Hillebrandti, *Weberbauer, l. c.* (= *Gouania Hillebrandti*).—Ins. Sandw.
orbiculare, *Weberbauer, l. c.* (= *Gouania orbiculare*).—Ins. Sandw.

PLEURISANTHES, Baill. (Olac.).

emarginata, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 117.—Guiana.

PLEUROPHORA, D. Don (Lythrac.).

patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 518.—Patag.

PLEUROPLITIS, Trin. = ARTHRAXON, Beauv. (Gramin.).

major, *Regel, in Bull. Acad. Petersb.* x. (1866) 370 = A. ciliaris.

PLEUROSPERMUM, Hoffm. (Umbell.).

Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 492.—China.
laticum, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. viii. 172 (= *Eleutherospermum laticum*).—As. Min.
meoides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 493.—China.

PLEUROSTACHYS, Brongn. (Cyper.).

gracilis, *Boeckl. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 111.—Bras.
longa, *Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 29.—Bras.
spicata, *Boeckl. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 112.—Bras.

PLEUROSTELMA, Schlechter, in Journ. Bot. 1895, 303

= Tacazzea, *Decne. (Asclep.).*

PLEUROTHALLIS, R. Br. (Orchid.).

acutangula, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 298.—Bras.?
armeniaca, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 470 (= *Lepanthes armeniaca*).—Bras.
atropurpurea, *Cogn. l. c.* 588 = teretifolia.
atroviolacea, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 438.—Ecuador.
bicolor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 408 (= *Lepanthes bicolor*).—Bras.
bicornuta, *Cogn. l. c.* 470 (= *Lepanthes bicornuta*).—Bras.
bicristata, *Cogn. l. c.* 459 (= *Lepanthes bicarinata*).—Bras.
Blumenavii, *Cogn. l. c.* 514 (= *Lepanthes Blumenavii*).—Bras.
carinifera, *Cogn. l. c.* 584.—Bras.
catharinensis, *Cogn. l. c.* 579 (= *Specklinia violacea*).—Bras.
chaetocephala, *Cogn. l. c.* 590.—Bras.
chiquindensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 438.—Ecuador.
collina, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 582 (= *Lepanthes montana*).—Bras.
complicata, *Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 121.—Bolivia.
congestiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 591 (= *Lepanthes densiflora*).—Bras.
convergens, *R. Gerard, in Ann. Soc. Bot. Lyon,* xxiv. 83.—Bras.
corazonica, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 443.—Ecuador.
crassicaulis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 450 (= *Lepanthes crassicaulis*).—Bras.

PLEUROTHALLIS:—

crebrifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 482 (= *Lepanthes crebrifolia*).—Bras.
crepiniana, *Cogn. l. c.* 542.—Bras.
cristata, *Cogn. l. c.* 530 (= *Lepanthes cristata*).—Bras.
cryptantha, *Cogn. l. c.* 587 (= *Lepanthes cryptantha*).—Bras.
cuneifolia, *Cogn. l. c.* 441 (= *Lepanthes wawraeana*).—Bras.
daguensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 444.—N. Granat.
densiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 559.—Bras.
depauperata, *Cogn. l. c.* 574.—Bras.
endotrachys, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 439 (non Reichb. l.).—N. Granat.
exigua, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 575.—Bras.
fasciculata, *Cogn. l. c.* 559.—Bras.
ferdinandiana, *Cogn. l. c.* 488 (= *Lepanthes ferdinandiana*).—Bras.
filiformis, *Cogn. l. c.* 453 (= *Lepanthes viridula*).—Bras.
flaccida, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. I. 140.—Hort.
flammea, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 509 (= *Lepanthes flammea*).—Bras.
funerea, *Cogn. l. c.* 567 (= *Lepanthes funerea*).—Bras.
furfuracea, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 441.—Ecuador.
Glaziovii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 546.—Bras.
granulosa, *Cogn. l. c.* 550 (= *Lepanthes granulosa*).—Bras.
guttulata, *Cogn. l. c.* 467 (= *Lepanthes punctata*).—Bras.
hartwegiae-olia, *Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orchid.* t. 296.—Mexic.
hebesepala, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 568.—Bras.
heterophylla, *Cogn. l. c.* 556.—Bras.
kraenzliniana, *Cogn. l. c.* 473.—Bras.
lentiginosa, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 446.—Am. cent.
limbata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 485 (= *Lepanthes marginata*).—Bras.
lindleyana, *Cogn. l. c.* 489.—Am. cent.; Bras.
linearifolia, *Cogn. l. c.* 573.—Bras.
lineolata, *Cogn. l. c.* 456 (= *Lepanthes lineolata*).—Bras.
lobiserrata, *Cogn. l. c.* 438 (= *Lepanthes lobiserrata*).—Bras.
lonchophylla, *Cogn. l. c.* 589 = Warmingii.
marginata, *Cogn. l. c.* 478 = striata, *Focke*.
marmorata, *Cogn. l. c.* 490 (= *Lepanthes marmorata*).—Bras.
melanopus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 443.—Am. cent.?
mentosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 400 (= *Lepanthes yauaperyensis*).—Bras.
microphyta, *Cogn. l. c.* 484 (= *Lepanthes microphyta*).—Bras.
minutiflora, *Cogn. l. c.* 564 (non S. Wats.).—Bras.
modesta, *Cogn. l. c.* 449 (= *Lepanthes modesta*).—Bras.
Mouraei, *Cogn. l. c.* 580.—Bras.
myriantha, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 445.—Am. cent.
nectarifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 560.—Bras.
ophiantha, *Cogn. l. c.* 522 = ophicephala.
osmosperma, *Cogn. l. c.* 563.—Bras.
pellifoloides, *Cogn. l. c.* 515 (= *Lepanthes pellifoloides*).—Bras.
pluriflora, *Cogn. l. c.* 492 (= *Lepanthes plurifolia*).—Bras.
popayanensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 438.—N. Granat.
Pristis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 443.—N. Granat.
pterophora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 583.—Bras.
pulvinata, *Cogn. l. c.* 563.—Bras.
purpureo-violacea, *Cogn. l. c.* 405.—Bras.
quadridentata, *Cogn. l. c.* 454 (= *Lepanthes quadriidentata*).—Bras.
quartzicola, *Cogn. l. c.* 581 (= *Lepanthes quartzicola*).—Bras.
racemosa, *Cogn. l. c.* 554.—Bras.
ramphastorhyncha, *Cogn. l. c.* 458 (= *Lepanthes ramphastorhyncha*).—Bras.
recurvipetala, *Cogn. l. c.* 439 (= *Lepanthes recurvipetala*).—Bras.
renipetala, *Cogn. l. c.* 504 (= *Lepanthes renipetala*).—Bras.
rigidula, *Cogn. l. c.* 572.—Bras.
Rodriguesii, *Cogn. l. c.* 538.—Bras.
rufa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 192.—Mexic.
sarcopetala, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. 516 (= *Lepanthes sarcopetala*).—Bras.

PLEUROTHALLIS:—

- sibatensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 445.—N. Granat.
 simmleriana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 274.—Am. cent.
 stenophylla, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 442.—N. Granat.
 striata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 457 (= *Lepanthes striata*).—Bras.
 strobilifera, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 440.—N. Granat.
 sylvatica, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 455 (= *Lepanthes nemorosa*).—Bras.
 tabacina, *Cogn. l. c.* 517 (= *Lepanthes tabacina*).—Bras.
 tenera, *Cogn. l. c.* 407 (= *Lepanthes tenera*).—Bras.
 tetrapetala, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 446.—N. Granat.
 trachytheca, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 444.—N. Granat.
 trialata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 500 (= *Lepanthes tricarinata*).—Bras.
 tricolor, *Cogn. l. c.* 493 (= *Lepanthes tricolor*).—Bras.
 Tunguraguae, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 439.—Ecuador.
 umbrosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 468 (= *Lepanthes umbrosa*).—Bras.
 unilateralis, *Cogn. l. c.* 592 (= *Lepanthes secunda*).—Bras.
 urosepala, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 442.—N. Granat.

PLOCLOTTIS, Blume (Orchid.).

- foetida, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 319.—Penins. Mal.

PLUCHEA, Cass. (Compos.).

- imbricata, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 108.—Am. sept.
 longifolia, *Nash, l. c.*—Am. sept.
 suaveolens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 168 = *P. Quitoc*.

PLUMERIA, Tourn. (Apocyn.).

- bahamensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 387.—Ind. occ.
 Krugii, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
 portoricensis, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

POA, Linn. (Gramin.).

- acutiglumis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 4.—Am. bor.
 alpicola, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 47.—Am. bor.
 amabilis, *Linn. Sp. Pl.* 68 = *Eragrostis tenella*.
 araucana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 171.—Chili.
 argentina, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 584.—Patag.
 asthenes, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 574 = *Leptochloa chinensis*.
 Atherstonei, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 713.—Afr. austr.
 atropidiformis, *Hack. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 224.—Reg. Magell.
 atropurpurea, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 53.—Calif.
 atroviridis, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3843 A = *Eragrostis elegantula*, *Steud.*
 attenuata, *Trin. in Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt.* 9.—Asia.
 bidentata, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 713.—Afr. austr.
 Blyttii, *Lindeb. in Bot. Notiser*, 1898, 154.—Scand.
 Borchersi, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 172.—Chili.
 Borreri, *Hook. & Arn. Brit. Fl. ed. VIII.* 549 = *Atropis Borreri*.
 brevifolia, *Kunth, Rév. Gram.* i. 111 = *Eleusine brevifolia*.
 brevipaniculata, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 2.—Am. bor.
 Brownei, *Kunth, Rév. Gram.* i. 112 = *Eragrostis elongata*, *Jacq.*
 callosa, *Stapf, in Kew Bull.* 1899, 116.—N. Guin.
 capensis, *Stend. in Flora*, 1829, 488 = *Eragrostis curvula*.
 capillarifolia, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Calif.
 capillaris, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 51 (non aliorum).—Calif.
 charis, *Schult. Mant.* ii. 314 = *Eragrostis elegantula*, *Steud.*
 chinensis, *Burm. f. Fl. Ind.* 27 = *Leptochloa uniflora*.
 chinensis, *Linn. Sp. Pl.* 69 = *Leptochloa chinensis*.

POA:—

- cilianensis, *All. Fl. Pedem.* ii. 246 = *Eragrostis major*.
 Collinsii, *T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 589.—N. Zel.
 contracta, *Retz. Obs.* iii. 11 = *Leptochloa filiformis*.
 corana, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3850 F = *Eragrostis interrupta*.
 curvata, *Heyne, ex Wall. Cat. n.* 3849 = *Eragrostis tremula*.
 decumbens, *Schrad. Fl. Germ.* 305 = *Danthonia decumbens*.
 despiciens, *Link, Enum. Hort. Berol.* i. 88 = *Eragrostis tenella*.
 dialytostachya, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 167.—Chili.
 diandra, *Roxb. Fl. Ind.* i. 337 = *Eragrostis interrupta*.
 diaphora, *Trin. in Bull. Sc. Acad. Pétersb.* i. 69 = *persica*.
 diarrhena, *Schult. Mant.* ii. 616 = *Eragrostis interrupta*.
 dimorphantha, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, 20.—Marocc.
 duplociliaris, *Roxb. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 313 = *Eragrostis ciliata*.
 elegantula, *Kunth, Rév. Gram.* i. 114 = *Eragrostis patagonica*.
 epilis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 5.—Am. bor.
 Falconeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 342.—Ind. or.
 Fauriei, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 711.—Japon.
 filiformis, *Thunb. Prod.* 21 = *Eragrostis curvula*.
 flexuosa, *Wahlb. Fl. Carp.* 22 (non aliorum).—Reg. temp. et arct. bor.
 fuegiana, *Hack. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 225 (= *Festuca fuegiana*).—Reg. Magell.
 gammiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 345.—Ind. or.
 gangetica, *Roxb. Fl. Ind.* i. 341 = *Eragrostis gangetica*.
 glomerata, *Thunb. Prodr.* 22 = *Tetrachne Dregei*.
 Grimburgii, *Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 12.—Coreya.
 Hackeli, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 760.—As. Min.
 hakusanensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 709.—Japon.
 Hanseni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 53.—Calif.
 hirtiglumis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 343.—Ind. or.
 hyemalis, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3850 C = *Eragrostis interrupta*.
 Ibari, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 170.—Patag.
 imeretica, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* iv. 210.—Reg. Cauc.
 incurva, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 6.—Am. bor.
 incurvata, *Rottl. ex Wall. Cat. n.* 5014 = *Eragrostis ciliata*.
 indica, *Koen. ex Rottl. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Neue Schr.* iv. (1803) 194 = *Eragrostis pilosa*.
 invaginata, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 6.—Am. bor.
 japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 51 = *Eragrostis interrupta*.
 juncifolia, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 52.—Am. bor.
 khasiana, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 343.—Ind. or.
 lagopodioides, *Kunth, Rév. Gram.* i. 111 = *Aeluropus villosus*.
 Laha, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3850 B = *Eragrostis interrupta*.
 Laka, *Stapf, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 317 = *Eragrostis interrupta*.
 Leckenbyi, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 2.—Am. bor.
 Leibergii, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 6.—Am. bor.
 limosa, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 5.—Calif.
 longepedunculata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 54.—Am. bor.
 longiligula, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 3.—Am. bor.
 longipila, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 46.—Am. bor.
 malabarica, *Klein, ex Stend. Nom. ed. II.* ii. 30, 360 = *Leptochloa filiformis*.
 malabarica, *Retz. Obs.* v. 19 = *Leptochloa chinensis*.
 massauensis, *Fresen. in Mus. Senckenb.* ii. 143 = *Aeluropus villosus*.
 Matsumurae, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 709.—Japon.

POA:—

- maullinica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 164.—Chili.
 maysorensis, *Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 299 = *Leptochloa obtusiflora*.
 minimiflora, *Stapf, in Hook. Ic. Pl. t.* 2608.—N. Guin.
 multiflora, *Roxb. Fl. Ind.* i. 338 = *Eragrostis amabilis*.
 nudata, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Am. bor.
 nutans, *Retz. Obs.* iv. 19 = *Eragrostis stenophylla*.
 occidentalis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 50 (non Vasey).—Am. bor.
 Olneyae, *Piper, in Erythea*, vii. 101.—Am. bor.
 orthophylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 715.—N. Granat.
 ovina, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 428 = *Eragrostis stenophylla*.
 panicea, *Retz. Obs.* iii. 11 = *Leptochloa filiformis*.
 papillosa, *Schrad. in Goett. Gel. Anz.* 1821, III. 2074 = *Brizopyrum capense*.
 papuana, *Stapf, in Hook. Ic. Pl. t.* 2607.—N. Guin.
 paradoxa, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1841) 864 = *persica*.
 patagonica, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 168.—Patag.
 Phullica, *Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n.* 3829 C = *Eragrostis pilosa*.
 planifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 366.—Am. austr.
 planifolia, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 3 (non Kuntze).—Am. bor.
 plumosa, *Retz. Obs.* iv. 20 = *Eragrostis tenella*.
 polyclea, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 342.—Ind. or.
 polymorpha, *R. Br. Prod.* 180 = *Eragrostis elongata*.
 pratericola, *Rydb. & Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 51 = *arida*.
 procera, *Roxb. Fl. Ind.* i. 334 = *Diplachne fusca*.
 pseudamabilis, *Roxb. ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 317 = *Eragrostis amabilis*.
 pseudopratisensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 340 (non aliorum).—Ind. or.
 pseudopratisensis, *Scribn. & Rydb. ex Rydb. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 531 (non aliorum).—Am. bor.
 pycnantha, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 165.—Chili.
 racemosa, *Thunb. Prod.* 21 = *Eragrostis chalcantha*.
 remotiflora, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. no. 1, 22 (non Rupr.).—Graecia; Alger.
 roxburghiana, *Schult. Mant.* ii. 314 = *Eragrostis major*.
 royleana, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 256 = *annua*.
 rupicola, *Nash, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 49.—Am. bor.
 saxatilis, *Scribn. & Williams, ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 1.—Am. bor.
 scabrifolia, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 310.—Am. bor.
 scabriuscula, *T. A. Williams, in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* x. 4.—Am. bor.
 schoenoides, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 166.—Chili.
 secundaria, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 299 = *Leptochloa chinensis*.
 soongarica, *Boiss. Fl. Or.* v. 611 = *persica*.
 Spillmani, *Piper, in Erythea*, vii. 102.—Am. bor.
 stachyodes, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 168.—Chili.
 sterilis, *Bieb. Fl. Taur. Canc.* i. 62 = *attenuata*, *Trin. subaristata*, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 171 (non Scribn.).—Chili.
 subtilis, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1842, 582 = *persica*.
 Telphulia, *Ham. ex Wall. Cat. n.* 5008 B = *Eragrostis tenella*.
 tenella, *R. Br. Prod.* 181 = *Eragrostis interrupta*.
 tenellula, *Kunth, Enum. Pl. i.* 338 = *Eragrostis interrupta*.
 tenerima, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* ix. 4.—Calif.
 tenuifolia, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 425 = *Eragrostis tenuifolia*.
 tortuosa, *Spreng. Syst. Veg.* i. 345 = *Eragrostis major*.
 trachyphylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxv. 715 (non Hack.).—N. Granat.
 tremula, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 344 (non aliorum).—Ind. or.
 Turneri, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* viii. 5.—Ins. Kurile.

POA :—

Uniolae, Schrad. in Goett. Gel. Anz. 1821, III. 2074 = *Brizopyrum capense*.
vaseyichloa, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost. ix. 1.—Am. bor.
Villaroeli, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 169.—Chili.
viscosa, Retz. Obs. iv. 20 = *Eragrostis tenella*.
yaganica, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 90.—Fuegia.

POAGROSTIS, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 760 (1900).
GRAMINEAE.
pusilla, Stapf, l. c.—Afr. austr.

PODAGRARIA, Hall. = *Aegopodium*, Knaut (Umbell.).
erratica, Bub. Fl. Pyren. ii. 351 = *A. Podagraria*.

PODANDRIA, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 205 (1898). **ORCHIDEAE**.
macrandra, Rolfe, l. c. 206.—Afr. trop.

PODANTHUM, Boiss. = *Phyteuma*, Linn. (Campan.).
serbicum, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv. 288.—Eur.

PODOCARPUS, L'Hérit. (Conif.).
celebica, Hemsl. in Kew Bull. 1896, 39.—Celebes.
celebica, Warb. in *Monsunia*, i. 192 (non Hemsl.).—Celebes.
sutchuenensis, Franch. in *Journ. de Bot.* 1899, 265.—China.

PODOCHILUS, Blume (Orchid.).

albus, Schlechter, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 36 (= *Appendicula alba*).—Java.
anceps, Schlechter, l. c. 33 (= *Appendicula anceps*).—Malaya.
angustifolius, Schlechter, l. c. 28 (= *Appendicula angustifolia*).—Java.
appendiculatus, f. f. Sm. in *Bull. Inst. Buitens.* vii. 2.—Ins. Amboin.
brachiatus, Schlechter, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 38.—Java.
buxifolius, Schlechter, l. c. 52 (= *Appendicula buxifolia*).—Malaya.
calcaratus, Schlechter, l. c. 41 (= *Appendicula calcarata*).—Borneo.
callosus, Schlechter, l. c. 62 (= *Appendicula callosa*).—Malaya.
carnosus, Schlechter, l. c. 29 (= *Appendicula carnosus*).—Java.
congener, Schlechter, l. c. 40 (= *Appendicula congenera*).—Java.
congestus, Schlechter, l. c. 59 (= *Appendicula congesta*).—Borneo.
cornutus, Schlechter, l. c. 34 (= *Appendicula bifaria*).—As. or. austr.
cristatus, Schlechter, l. c. 43 (= *Appendicula cristata*).—Malaya.
distichus, Schlechter, l. c. 57 (= *Appendicula disticha*).—N. Guin.
elegans, Schlechter, l. c. 45 (= *Appendicula elegans*).—Malaya.
floribundus, Schlechter, l. c. 58.—Borneo.
Hasseltii, Schlechter, l. c. 61 (= *Appendicula Hasseltii*).—Malaya.
Hellwigii, Schlechter, l. c. 22.—N. Guin.
hexandrus, Schlechter, l. c. 27 (= *Appendicula Koenigii*).—Ind. or.
lanceifolius, Schlechter, l. c. 51 (= *Appendicula lanceifolia*).—Penins. Mal.
lucidus, Schlechter, l. c. 37 (= *Appendicula lucida*).—Penins. Mal.
micranthus, Schlechter, l. c. 39 (= *Appendicula micrantha*).—Ins. Philipp.
muricatus, Schlechter, l. c. 64 (= *Appendicula muricata*).—Java.
ovalis, Schlechter, l. c. 54.—Sumatra; Java.
pauciflorus, Schlechter, l. c. 30 (= *Appendicula pauciflora*).—Java.
pendulus, Schlechter, l. c. 48 (= *Appendicula pendula*).—Malaya.
penicillatus, Schlechter, l. c. 50 (= *Appendicula penicillata*).—N. Guin.
philippinensis, Schlechter, l. c. 49.—Ins. Philipp.
purpurascens, Schlechter, l. c. 46 (= *Appendicula purpurascens*).—Java.

PODOCHILUS :—

ramosus, Schlechter, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 21, 53 (= *Appendicula ramosa*).—Java.
reflexus, Schlechter, l. c. 31 (= *Appendicula reflexa*).—Malaya.
rupestris, Schlechter, l. c. 56 (= *Appendicula rupestris*).—Penins. Mal.
tortus, Schlechter, l. c. 60 (= *Appendicula torta*).—Malaya.
undulatus, Schlechter, l. c. 42 = *unciferus*.
Vieillardii, Schlechter, l. c. 32 (= *Appendicula Vieillardii*).—N. Caled.
xytriophorus, Schlechter, l. c. 47 (= *Appendicula xytriophora*).—Malaya.

PODOCOMA, Cass. (Compos.).
Reineckii, Hochr. in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 171.—Bras.

PODOGYNIUM, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 173, descr. **LEGUMINOSAE**.
capparidaceum, Taub. l. c., descr.—Afr. trop.

PODONOSMA, Boiss. = *Onosma*, Linn. (Borag.).
Sintenisi, Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlvi. 609.—Syria.

PODOSEMUM, Desv. (Gramin.).
angustum, Nees, Fl. Afr. Austr. 147 = *Agrostis lachnantha*.

PODOSTEMMA, Greene, Pittonia, iii. (1897) 235. **ASCLEPIADACEAE**.
australe, Greene, l. c. 238.—Am. cent.
Emoryi, Greene, l. c. 237.—Am. bor.
Helleri, Greene, l. c. 236.—Am. bor.
leoninum, Greene, l. c. 237.—Mexic.
Lindheimeri, Greene, l. c. 236 (= *Asclepias Lindheimeri*).—Am. bor.
longicornu, Greene, l. c. (= *Asclepias longicornu*).—Calif.
nyctaginifolium, Greene, l. c. 237 (= *Asclepias nyctaginifolia*).—Calif.

PODOSTEMON, Michx. (Podostem.).
glaziovianus, Warming, in *Overs. Danske Vid. Selsk. Ser. VI. ix.* 130.—Bras.
osteniana, Warming, l. c. 127.—Urug.
rutifolius, Warming, l. c. 129.—Bras.
uruguayensis, Warming, l. c. 133 (non Web.).—Urug.

POECILOCHROMA, Miers (Solan.).
albescens, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 91.—Bolivia.

POGA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1254. **PHYTOLACCACEAE**.
oleosa, Pierre, l. c.—Afr. trop.

POGOCYBE, Pierre, Fl. Cochinch. t. 392 B (1899). **LEGUMINOSAE**.
entadoides, Pierre, l. c.—Cochinch.

POGONARTHRIA, Stapf, ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 232 (1899); et in Hook. Ic. Pl. t. 2610 (1899). **GRAMINEAE**.
falcata, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 232.—Afr. trop. et austr.

POGONATHERUM, Beauv. (Gramin.).
crinitum, Kunth, *Enum. Pl.* i. 478.—As. or. austr.
refractum, Nees, ex Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 239 = *crinitum*.

POGONIA, Juss. (Orchid.).
Buchanani, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 187.—Afr. trop.
falcata, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 129.—Reg. Himal.
foliosa, King & Pantl. l. c. lxxvi. 598.—Burma.
hookeriana, King & Pantl. l. c. lxxv. 129.—Reg. Himal.
khasiana, King & Pantl. l. c. lxxvi. 597.—Burma.
lanceolata, Kraenzl. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 267.—China.
parishiana, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 597.—Burma.
pleionoides, Kraenzl. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 267.—China.
prainiana, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 129.—Reg. Himal.

POGONIA :—

shirensis, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 187.—Afr. trop.
yunnanensis, Finet, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliv. 419.—China.

POGONOPSIS, J. & C. Presl = *Pogonatherum*, Beauv. (Gramin.).
tenera, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 333 = *Pogonath. crinitum*.

POGONOSPERMUM, Hochst. = *Monechma*, Hochst. (Acanth.).
ciliare, Hochst. in *Flora*, 1844, Beil. 6 = *M. hispidum*.
hispidum, Hochst. l. c. = *M. hispidum*.

POGOSTEMON, Desf. (Labiata).
formosanus, Oliver, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2440.—Formosa.

POIKILACANTHUS, Lindau (Acanth.).
oncodes, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 48.—Bras.
phyllocalyx, Lindau, l. c.—Bras.

POITEA, Vent. (Legum.).
glycyphylla, Urb. Symb. Antill. i. 321 = *P. Campanilla*.
longiflora, Urb. l. c. ii. 290.—Ind. occ.
multiflora, Urb. l. c. 291 (= *Vilmorinia multiflora*).—Ind. occ.

POLANISIA, Rafin. = *Cleome*, Linn. (Cappar.).
chrysantha, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* i. II. 161 = *C. chrysantha*.
diandra, Th. Dur. & Schinz, l. c. 162 = *C. diandra*.
didynama, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *C. didynama*.
foliosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *C. foliosa*.
kalachariensis, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* v. App. III. 92.—Afr. austr.
luederitziana, Schinz, l. c. 93.—Afr. austr.
Paxii, Schinz, l. c.—Afr. austr.
ramosissima, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* i. II. 163 = *C. ramosissima*.
semitetrandra, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *C. semite-trandra*.

POLEMONIUM, Tourn. (Polemon.).
amoenum, Piper, in *Erythraea*, vii. 174.—Am. bor.
bicolor, Greene, in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 262.—Am. bor.
biflorum, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 202 = *Phlox biflora*.
crassifolium, Kuntze, l. c. 203 = *Gilia crassifolia*.
Drummondii, Kuntze, l. c. = *Phlox Drummondii*.
elegans, Greene, Pittonia, iii. 305.—Am. bor.
eximium, Greene, l. c.—Am. bor.
Haydeni, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 353.—Am. bor.
incisum, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 203 = *Gilia incisum*.
laciniatum, Kuntze, l. c. = *Gilia laciniata*.
luteum, Greene, Pittonia, iv. 100.—Am. bor.
mellitum, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 354.—Am. bor.
Morenonis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 203 = *Collomia gracilis*.

POLIOTHYRSIS, Oliv. (Bixac.).
celebicus, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 476.—Celebes.
Stapfii, Koord. l. c. 474.—Celebes.

POLLINIA, Trin. (Gramin.).
birmanica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 113.—Ind. or.
calochloa, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 167.—N. Guin.
delicatula, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 117.—Ind. or.
eripoda, Hance, in *Journ. Bot.* 1866, 173 = *Ischaemum angustifolium*.
Gryllus, Spreng. Puggill. ii. 10 = *Andropogon Gryllus*.
huillensis, Rendle, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 136.—Afr. trop.
pallida, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 829 = *Andropogon Gryllus*.
pleiostachya, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 168.—N. Guin.
sericea, Chiov. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 59.—Afr. trop.
Stapfii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 115.—Ind. or.
tristachya, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 368 = *ciliata*.
villosa, Munro, ex Benth. *Fl. Hongk.* 420 = *quadrinervis*.

POLYALTHIA, Blume (Anonac.).
Bembau, Boerl. *Cat. Hort. Bogor.* (1899) 18; et in *l.c.* Bogor. i. 103 (= *Monoon Bembau*).—Sumatra.

POLYALTHIA :—

- brevipedunculata, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 18; et in *Ic. Bogor.* i. 104, t. 64.—Hort.
canangioides, *Boerl. l. c.* 19; et *l. c.* 105 (= *Monoon canangioides*).—Malaya.
ceramensis, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 106, t. 65.—Arch. Mal.
chlorantha, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 316.—N. Guin.
costigera, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 106 (= *Monoon costigerum*).—Sumatra.
elegans, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 316.—N. Guin.
gamopetala, *Boerl. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 338.—Celebes.
Gerrardi, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 37 (= *Unona Gerrardi*).—Madag.
glauca, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 18; et in *Ic. Bogor.* i. 104 (= *Monoon glaucum*).—Java.
greveana, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* i. II. 37 (= *Unona greveana*).—Madag.
Havilandii, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 107, t. 66.—Borneo.
littoralis, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 1899, 34; et in *Ic. Bogor.* 145 (= *Guatteria littoralis*).—Java.
micrantha, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. 106, t. 67 (= *Uvaria micrantha*).—Burma; Malaya.
nervosa, *Boerl. l. c.* 108, t. 68.—Borneo.
Pondok, *Boerl. l. c.* 107 (= *Guatteria Pondok*).—Sumatra.
pulchrinervia, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 20; et in *Ic. Bogor.* i. 106.—Borneo.
siamensis, *Boerl. in Ic. Bogor.* i. t. 69.—Siam.
spatulata, *Boerl. l. c.* 108 (= *Guatteria spatulata*).—Sumatra.
Teysmannii, *Boerl. l. c.* 107 (= *Guatteria Teysmannii*).—Sumatra.

POLYASTER, Hook. f. (Rutac.).

- Ehrenbergii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 26.—Mexic.
paucijugus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 331.—Am. cent.

POLYCARENA, Benth. (Scrophnl.).

- filiformis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 478.—Afr. trop.
parvula, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 181.—Afr. austr.

POLYCEPHALIUM, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. I. (1897) 227; et in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) 484. OLACACEAE.

- lobatum, *Pierre, in Engl. l. c.* 485 (= *Chlamydocarya lobata*).—Afr. trop.
Poggei, *Engl. l. c.* 227; *l. c.* 484.—Afr. trop.

POLYCERATOCARPUS, Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. (1900) 56. ANONACEAE. Scheffleri, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.

- POLYCODIUM**, Rafin. = **Vaccinium**, Linn. (Vaccin.).
caesium, Greene, Pittonia, iii. 325 = V. caesium.
elevatum, Greene, l. c. 324 = V. stamineum.
floridanum, Greene, l. c. 325 = V. stamineum.
oblongum, Greene, l. c. = V. oblongum, Greene.
revolutum, Greene, l. c. = V. revolutum.
stamineum, Greene, l. c. 324 = V. stamineum.

POLYECHMA, Hochst. (Acanth.).

- abyssinicum, Nees, in DC. Prod. xi. 83 = Hemigraphis abyssinica.

POLYGALA, Tourn. (Polygal.).

- acutiappendiculata, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 236.—Reg. Argent.
africana, *Chod. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 335.—Afr. trop.
alata, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 200.—Afr. trop.
albicomis, *Arche. in Anal. Mus. Montevide.* ix. (Fl. Urug.) 69.—Urug.
bakeriana, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 199.—Afr. trop.
bangiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234.—Bolivia.
bicarunculata, *Chod. l. c.* 236.—Reg. Argent.
bicornis, *Chod. l. c.*—Afr. austr.
britteniana, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 198.—Afr. trop.
Cabrea, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 838.—Afr. trop.
chodatiana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 45 (non A. W. Bennett).—Afr. trop.
clarkeana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 235.—Afr. trop.
congoensis, *Guerke, in Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped.* 295, nomen.—Afr. trop.
Dodii, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 24.—Afr. austr.

POLYGALA :—

- Edmundi, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 911.—Afr. trop.
Elliotii, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 199.—Afr. trop.
fallax, *Hayek, ex A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien.* xv. 43 (non aliorum).—Afr. austr.
Forbesii, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234.—Hong Kong.
Gerrardi, *Chod. l. c.* 237.—Afr. austr.
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 417.—Afr. trop.
hecatantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 331.—Ind. occ.
Latouchei, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 206.—China.
Lewtonii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 140.—Am. bor.
lindmaniana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 238.—Am. austr.
lonchophylla, *Greene, Pittonia,* iii. 307.—Am. bor.
macroneura, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 418.—Reg. Himal.
macrostachya, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234 (non Hassk.).—Peruv.
natalensis, *Chod. l. c.* 237.—Afr. austr.
paradoxa, *Chod. l. c.* 235.—Am. austr.
pauciflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 164 (non Thunb.).—Afr. austr.
polygoniflora, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 200.—Afr. trop.
pseudolaurifolia, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 235.—Reg. Argent.
pubescens, *Chod. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 331 (non aliorum).—Am. cent.
ruwenzoriensis, *Chod. in Journ. Bot.* 1896, 199.—Afr. trop.
sinuata, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 234.—Bras.
socotrana, *Chod. l. c.* 236.—Socotra.
sumatrana, *Chod. l. c.* 234.—Sumatra.
texensis, *Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 1. 451.—Am. bor.
tristis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 903.—Afr. trop.
Ulei, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 441.—Bras.
uncinata, *Wright, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 429 (non aliorum).—Ind. occ.
wittrockiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 239.—Am. austr.
Woodei, *Chod. l. c.* 237.—Afr. austr.
Zahlbruckneri, *Hayek, ex A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien,* xv. 45.—Afr. austr.

POLYGONATUM, Tourn. (Liliac.).

- Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 247.—China.
Periballanthus, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1898 (228) = involucreatum.

POLYGONELLA, Michx. (Polygon.).

- macrophylla, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 407.—Am. bor.

POLYGONUM, Tourn. (Polygon.).

- constans, *Cummins, in Kew Bull.* 1896, 20.—Reg. Himal.
fallax, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 46.—Bolivia.
Macounii, *J. K. Small, ex Macoun, Fur Seals N. Pacif.* iii. 570.—Am. bor.
nyikense, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 280.—Afr. trop.
pamiricum, *Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII.* iv. no. 4, 98.—Turkestan.
paronychioides, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 130 (non C. A. Mey.).—Am. bor.
Spaethii, *Damm, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* ii. 378.—China.
tibeticum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2471.—Tibet.
tibeticum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1900, 428 (non Hemsl.).—Tibet.
unifolium, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 129.—Am. bor.

POLYMNIA, Linn. (Compos.).

- arborea, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 33.—Ecuador.
laevigata, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 278.—Am. bor.
microcephala, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 33.—Ecuador.

POLYOSMA, Blume (Saxifr.).

- coriacea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 300.—Penins. Mal.

POLYOSMA :—

- laetevirens, *Griff. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 409; et ex *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 303.—Penins. Mal.
longepedicellata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 305.—Sumatra.
longipes, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 391.—Java.
mutabilis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 409 = laetevirens.
parviflora, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 300.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King, l. c.* 304.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 301.—Penins. Mal.

POLYOTHYRSIS, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 474, sphalm. = **Poliothyrsis**, Oliv. (Bixac.).**POLYOTHYRSIS**, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 476, sphalm. = **Poliothyrsis**, Oliv. (Bixac.).**POLYPOGON**, Desf. (Gramin.).

- Adscensionis, *Trin. Agrost.* ii. 11 = tenuis.
brachyatherus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 8.—Chili.
breviaristatus, *R. Phil. l. c.*—Chili.
demissus, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 422 = littoralis.
fugax, *Nees, ex Steud. l. c.* 184 = monspeliensis.
nepalensis, *Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii.* 378 = monspeliensis.
purpurascens, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 9.—Chili.
strictus, *Nees, in Linnaea,* vii. 297 = tenuis.
tenuis, *Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot.* 22.—Afr. austr.; *Ins. Ascens.*
zeylanicus, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 183 = monspeliensis.

POLYSCIAS, Forst. (Aral.).

- Elliotii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 246.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Harms, l. c.* (= *Panax Hildebrandtii*).—Madag.
javanica, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* xliii. 13.—Java.
malosana, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 20.—Afr. trop.
nossibiensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 247 (= *Panax nossibiensis*).—Madag.
polybotrya, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 20.—Afr. trop.
Preussii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 245.—Afr. trop.
Reineckei, *Harms, l. c.* xxv. 663.—Ins. Samoa.
Stuhlmannii, *Harms, l. c.* xxvi. 244.—Afr. trop.

POLYSTACHYA, Hook. (Orchid.).

- bituberculata, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 165.—Afr. trop.
bracteosa, *Lindl. Bot. Reg.* 1840, Misc. 48 = affinis.
calluniflora, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 166.—Afr. trop.
carnea, *Brongn. in Fl. des Serres,* xv. 45 = rhodoptera.
confusa, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 123.—Afr. trop.
crassifolia, *Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped.* 277, nomen.—Afr. trop.
dolichophylla, *Schlechter, l. c.*, nomen.—Afr. trop.
galericulata, *Reichb. f. Ota Bot. Hamb.* 111 = laxiflora.
heckmanniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 371.—Afr. trop.
Holstii, *Kraenzl. in Xenia Orch.* iii. 150, t. 287.—Afr. trop.
hypocrita, *Reichb. f. in Gard. Chron.* 1881, II. 685 = tessellata.
ionocharis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 371.—Afr. trop.
Johnstoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 124.—Afr. trop.
Kraenzlinii, *Rolfe, l. c.* 112.—Afr. trop.
lehmbachiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 166.—Afr. trop.
Mannii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 117.—Afr. trop.
melanantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 341.—Afr. trop.
micropetala, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 131.—Afr. trop.
paniculata, *Rolfe, l. c.* 113.—Afr. trop.
penangensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 344.—Penins. Mal.
plehniana, *Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped.* 277, nomen.—Afr. trop.

POLYSTACHYA :—

- pleistantha, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1897, i. 118.—Borneo?
 quinqueloba, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 141.—Hort.
 Rendlei, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 112.—Afr. trop.
 Ridleyi, *Rolfe, l. c.* 119.—Afr. trop.
 rolfeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 167.—Afr. trop.
 siamensis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 343.—Penins. Mal.
 singapurensis, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
 sulfurea, *Brongn. in Fl. des Serres*, xv. 45 = pyramidalis.
 supfiana, *Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 278, nomen.—Afr. trop.
 tessellata, *Lindl. in Journ. Linn. Soc.* vi. 130.—Afr. trop.
 trigonochila, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 167.—Afr. trop.
 usambarensis, *Schlechter, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 250.—Afr. trop.
 Victoriae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 165.—Afr. trop.
 villosa, *Cogn. in Journ. des Orch.* vii. 139 (non Rolfe).—Madag.
 zanguebarica, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 115.—Afr. trop.

POLYSTEMONANTHUS, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 197 (1897); et in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899) 273. **LEGUMINOSAE**.
 Dinklagei, *Harms, l. c.*; l. c. 274.—Afr. trop.

POLYTOCA, R. Br. (Gramin.).

- barbata, *Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 102.—Ind. or.
 punctata, *Stapf, l. c.*—Ind. or.

POLYXENA, Kunth (Liliac.).

- angustifolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 419.—Afr. austr.
 Burchellii, *Baker, l. c.* 420.—Afr. austr.
 comata, *Baker, l. c.* 419.—Afr. austr.
 marginata, *Baker, l. c.* 420.—Afr. austr.
 rugulosa, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
 uniflora, *Baker, l. c.* 421.—Afr. austr.

POMETIA, Forst. (Sapind.).

- Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 443.—Penins. Mal.
 gracilis, *King, l. c.* 441.—Penins. Mal.
 Ridleyi, *King, l. c.* 443.—Penins. Mal.

PONAEA, Bub. Fl. Pyren. ii. 195 (1900) = *Carpesium*, Linn. (Compos.).

- cernua, Bub. l. c. 196 = *C. cernuum*.

PONERA, Lindl. (Orchid.).

- australis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 9.—Bras.

PONTIA, Bub. = *Chrysanthemum*, Tourn. (Compos.).

- alpina, Bub. Fl. Pyren. ii. 219 = *C. alpinum*.
Barrelieri, Bub. l. c. = *C. coronopifolium*.
corymbosa, Bub. l. c. 220 = *C. corymbosum*.
grandis, Bub. l. c. 222 = *C. maximum*.
heterophylla, Bub. l. c. 224 = *C. heterophyllum*.
Matricaria, Bub. l. c. 220 = *C. Parthenium*.
montana, Bub. l. c. 224 = *C. montanum*.
pallens, Bub. l. c. 223 = *C. pallens*.
vulgaris, Bub. l. c. 221 = *C. Leucanthemum*.

POPOWIA, Endl. (Anonac.).

- cyanocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 317.—N. Guin.

POPULUS, Linn. (Salicac.).

- Fargesii, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1896, 280.—China.

POROPHYLLUM, Vaill. (Compos.).

- brachypodum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 341.—Mexic.
 macrolepidum, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 69.—Bras.
 Millspaughii, *Robinson, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 109.—Am. cent.
 Nelsonii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 32.—Mexic.
 nutans, *Robinson & Greenm. l. c.* 31.—Mexic.
 oblanceolatum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 64.—Bolivia.

POROPHYLLUM :—

- oppositifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 168 (non DC.).—Bras.
 pausodinum, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 32.—Mexic.
 Porophyllum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 168 = rudérale.
 PORPAX, Lindl. = *Eria*, Lindl. (Orchid.).
 fibuliformis, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 114 = *E. fibuliformis*.
 Meirax, *King & Pantl. l. c.* = *E. Meirax*.

PORPHYRANTHUS, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899) 367. **BURSERACEAE**.

Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

PORPHYROGLOTTIS, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1896) 290. **ORCHIDEAE**.
 Maxwelliae, *Ridley, l. c.*—Borneo.**PORTERELLA**, Torr. = *Laurentia*, Neck. (Campan.).

- eximia, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 270.—Am. bor.

PORTULACA, Linn. (Portul.).

- coronata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 126.—Am. bor.
 elongata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 7.—Bolivia.
 Erythraea, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 171.—Afr. trop.
 hereroensis, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 18.—Afr. trop.
 plano-operculata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 16.—Reg. Argent.

POSOQUERIA, Aubl. (Rubiac.).

- calantha, *Barb. Rodr. Pl. Nov. Rio*, v. 5.—Bras.
 multiflora, *Lemaire, Illustr. Hort.* xvi. t. 597 = macropus.

POTAMOGETON, Tourn. (Naiad.).

- alpinus, *Balb. Misc.* 13.—Afr. austr.
 americanus, *Cham. in Linnaea*, ii. 226.—Afr. austr.
 cognatus, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 317.—Hybr.
 cymatodes, *Aschers. & Graebn. l. c.* 337.—Hybr.
 fallax, *Aschers. & Graebn. l. c.* 330.—Hybr.
 Heidenreichii, *Aschers. & Graebn. l. c.* 327.—Hybr.
 huillensis, *Welw. ex Schinz, in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* i. 61 = javanicus.
 natans, *Thunb. Prod.* 32 = americanus.
 Richardi, *Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 194, 292.—Afr. trop. et austr.
 Seemenii, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 335.—Hybr.
 Thunbergii, *Cham. in Linnaea*, ii. 221 = americanus.

POTENTILLA, Linn. (Rosac.).

- ashlandica, *Greene, Pittonia*, iii. 248.—Am. bor.
 atrorubens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 11.—Am. bor.
 atrovirens, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 95.—Am. bor.
 bicrenata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 431.—Am. bor.
 bruginoensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
 candida, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 6.—Am. bor.
 cascadenis, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 109.—Am. bor.
 ciliata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 175 (non Greene).—Am. bor.
 coloradensis, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 115.—Am. bor.
 concinnaeformis, *Rydb. l. c.* 54.—Am. bor.
 Convallaria, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 249.—Am. bor.
 ctenophora, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 75.—Am. bor.
 daonensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 56.—Tyrol.
 decurrens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 396.—Am. bor.
 etomentosa, *Rydb. l. c.* 1897, 8.—Am. bor.
 filicaulis, *Rydb. l. c.* 2.—Am. bor.
 Gardae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 56.—Austria.
 glabrella, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 94.—Am. bor.

POTENTILLA :—

- glomerata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 480.—Am. bor.
 gracilipes, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 392.—Am. bor.
 Hanseni, *Greene, Pittonia*, iii. 20.—Calif.
 Hellwegeri, *J. Murr, in Deutsch. Bot. Monatschr.* xvi. 62.—Austria.
 isosepala, *Blocki, in Allg. Bot. Zeitschr.* ii. 115.—Galicia.
 jucunda, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 32.—Am. bor.
 lactea, *Greene, Pittonia*, iii. 20.—Calif.
 lancifolia, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 7.—Eur.
 lateriflora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 261.—Am. bor.
 litoralis, *Rydb. l. c.* 264.—Am. bor.
 longipedunculata, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 39.—Am. bor.
 loppinensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 59.—Austria.
 lutesericea, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 101.—Calif.
 Macounii, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
 Mandoni, *Foucaud, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 90.—Corsica.
 Mezzocoronae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
 michoacana, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 44.—Mexic.
 micrandra, *Koehne, in Dendr. Ges.* 1896, 48.—Japon.?
 millefolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 433.—Am. bor.
 minutifolia, *Rydb. l. c.* 399.—Am. bor.
 monidensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 266.—Am. bor.
 multisecta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 397.—Am. bor.
 Noarnae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 58.—Austria.
 oaxacana, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 206.—Mexic.
 oblanceolata, *Rydb. l. c.* 53.—Mexic.
 ovina, *Macoun, in Canad. Rec. Sci.* vi. 464.—Am. bor.
 pacifica, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 179.—Am. bor.
 Pari, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
 pectinisecta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 7.—Am. bor.
 permixta, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 8 (non Schur).—Eur.
 pinnatisecta, *A. Nelson, First Rep. Fl. Wyom.* 104.—Am. bor.
 Ponale, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 59.—Austria.
 pseudorupestris, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 250.—Am. bor.
 pseudosericea, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 98.—Am. bor.
 quinquefolia, *Rydb. l. c.* 76.—Am. bor.
 ramulosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 430.—Am. bor.
 reflexa, *Greene, Pittonia*, iii. 19.—Calif.
 rhomboidea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 248.—Am. bor.
 Rivae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 58.—Tyrol.
 rosulata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 542.—Am. bor.
 rupicola, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 256.—Am. bor.
 saximontana, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 399.—Am. bor.
 semipinnata, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 103.—Bulgar.
 Sierrae-Blancae, *Wooton & Rydb. ex Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 57.—Am. bor.
 staminea, *Rydb. l. c.* 67.—Mexic.
 subcoriacea, *Rydb. l. c.* 63.—Mexic.
 subjuga, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 397.—Am. bor.
 tenerrima, *Rydb. l. c.* 398.—Am. bor.
 valida, *Greene, Pittonia*, iii. 20.—Am. bor.
 vasonis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 57.—Austria.
 virgulata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 265.—Am. bor.
 viridescens, *Rydb. in Mem. Columb. Univ.* ii. 69.—Am. bor.

POTENTILLA, —
 viscida, *Evers*, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1896, 58.
 —Tyrol.
 wyomingensis, *A. Nelson*, in *Bull. Torr. Bot. Club*,
 1900, 32.—Am. bor.

POTHOS, Linn. (Arac.).
 Balansae, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 3.—Cochinch.
 Hellwigii, *Engl. l. c.* 2.—N. Guin.
 sumatranus, *Engl. l. c.* 5 (non Miq.).—Sumatra.
 Warburgii, *Engl. l. c.* 2.—Formosa.

POTTINGERIA, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.*
 lxvii. (1898) 291. **SAXIFRAGACEAE**.
 acuminata, *Prain, l. c.*—Ind. or.

POULSENIA, Eggers, in *Bot. Centralbl.* lxxiii. (1898)
 65. **URTICACEAE**.
 aculeata, *Eggers, l. c.* 66.—Ecuador.

POUPARTIA, Comm. (Anacard.).
 Fordii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2557.—China.

POURTHIAEA, Decne. (Rosac.).
 parvifolia, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix.
 389.—China.
 variabilis, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. 1. 76
 (= *Photinia variabilis*).—China; Japon.

POUTERIA, Aubl. (Sapot.).
 Lucuma, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 195 = *Lucuma*
 obovata.
 splendens, *Kuntze, l. c.* = *Lucuma valparadisaea*.

POUZOLZIA, Gaudich. (Urtic.).
 andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 992.—Afr.
 trop.
 denudata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc.*
Bot. Belg. xxxviii. 54.—Afr. trop.
 Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 53.—Afr. trop.
 Erythraea, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App.
 ii. 146.—Afr. trop.
 golungensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 993.—Afr.
 trop.
 huillensis, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix.
 612, nomen.—Celebes.
 papuana, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*,
 294.—N. Guin.
 parasitica, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. ii.
 145 = procridioides.
 Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 476.—
 Mexic.

POZOA, Lag. = **Azorella**, Lam. (Umbell.).
 exigua, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 87 = *A. exigua*.
 Haastii, *Hook. f. l. c.* 88 = *A. Haastii*.
 ranunculacea, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 viii. 129 = *A. dichopetala*.

PRANGOS, Lindl. (Umbell.).
 bucharica, *Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 179.—
 Turkestan.
 heptaptera, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
 viii. 174 = colladonioides.
 tschimganica, *Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 180.—
 Turkestan.

PRASOPHYLLUM, R. Br. (Orchid.).
 fuscoviride, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xiv. 163.—
 Austral.

PREMNA, Linn. (Verben.).
 colorata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 833 = *Vitex*
 sulphurea.
 ferruginea, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 172 = *Mos-*
chosma multiflorum.
 longipes, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 288 = *Hos-*
lundia opposita.
 macrodonta, *Baker, l. c.* 291.—Afr. trop.
 Milnei, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
 nervosa, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.*
 xlii. 186.—Java.
 oligotricha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 292.—
 Afr. trop.
 polita, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 832.—Afr. trop.
 rotundifolia, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands*
Plantent. xlii. 182.—Java.
 somaliensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 289.—
 Afr. trop.

PRESCOTTIA, Lindl. (Orchid.).
 crassicaulis, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi.
 501.—Ecuador.

PRESTONIA, R. Br. (Apocyn.).
 speciosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 435.—
 Am. cent.

PREUSSELLA, Gilg, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.*
 Nachtr. i. 267 (1897). **MELASTOMACEAE**.
 kamerunensis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

PREVOSTEA, Choisy = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).
 Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot.*
Belg. xxxix. 70.—Afr. trop.
 capitata, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 36.
 —Bras.
 micrantha, *Damm, l. c.* 57.—Afr. trop.
 Poggei, *Damm, ex Hallier f. in Bull. Soc. Bot. Belg.*
 xxxvii. 88.—Afr. trop.
 sphaerocephala, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii.
 37.—Bras.

PRIMULA, Linn. (Primul.).
 barbicalyx, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 24.—
 China.
 eximia, *Greene, Pittonia*, iii. 251.—Am. bor.
 Hookeri, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 142
 (non Watt).—As. Min.
 leucophylla, *Pax, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 194.—
 Austria.
 longipes, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 141.
 —As. Min.
 macalliana, *Wieg. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 339.
 —Am. bor.
 Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 251.—Am. bor.
 mucronata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
 Rosthormii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 520.—China.
 Ruprechtii, *Kusnez. ex Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*,
 iv. 386.—Reg. Caucas.
 serra, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 319.—
 Am. bor.
 tenuis, *Small, l. c.* 320.—Am. bor.

PRINGLEOCHLOA, Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xxi.
 (1896) 137. **GRAMINEAE**.
 stolonifera, *Scribn. l. c.* 138.—Mexic.

PRINTZIA, Cass. (Compos.).
 densifolia, *F. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897,
 488.—Afr. austr.

PRIONANTHIUM, Desv. (Gramin.).
 Ecklonii, *Stapp, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 455.—Afr. anstr.
 pholiuroides, *Stapp, l. c.* 456.—Afr. austr.

PRIONITIS, Adans. (Umbell.).
 pastinacifolia, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 410 =
Carum latifolium.

PRIONOPHYLLUM, C. Koch = **Dyckia**, Schult. f.
 (Bromel.).
 maritimum, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 542 = *D.*
maritima.

PRIONOSCIADIUM, S. Wats. (Umbell.).
 acuminatum, *Robinson, ex Coult. & Rose, in Proc.*
Washington Acad. i. 149.—Am. cent.
 cuneatum, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
 dissectum, *Coult. & Rose, l. c.* 151.—Am. cent.
 durangense, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
 filifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 152.—Am. cent.
 macrophyllum, *Coult. & Rose, l. c.* 151.—Am. cent.
 Nelsoni, *Coult. & Rose, l. c.* 149.—Am. cent.
 serratum, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. cent.
 tenuifolium, *Coult. & Rose, l. c.* 152.—Am. cent.

PRISMATOCARPUS, L'Hérit. (Campan.).
 juncus, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 35.—Afr.
 trop.

PRIVA, Adans. (Verben.).
 cuneato-ovata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900,
 80 = laevis.

PROLETOSTEMON, K. Schum. in *Engl. Jahrb.*
 xxiii. (1897) 450. **RUBIACEAE**.
 Elliottii, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

PROCRIS, Comm. (Urtic.).
 lepidotula, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 376 (= *Elato-*
stema lepidotulum).—Sumatra.

PROSOPANCHE, De Bary (Cytin.).
 americana, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 271 = *Burmeisteri*.
 Bonacinaei, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires*, i. 1. 19.
 —Am. austr.

PROSOPIS, Linn. (Legum.).
 Barba-tigridis, *Stuck. in Com. Mus. Buenos Aires*, i.
 66.—Reg. Argent.
 casadensis, *Penzig, in Malpighia*, xii. 408.—Reg.
 Argent.
 Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 71.—
 Bolivia.
 patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 510.
 —Patag.
 velutina, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 456.
 —Mexic.
 Vinalillo, *Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 73.
 —Reg. Argent.

PROSTANTHERA, Labill. (Labiata).
 discolor, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*,
 xxi. 378.—Austral.
 stricta, *R. T. Baker, l. c.* 380.—Austral.

PROSTHECIDISCUS, Donn. Sm. in *Coult. Bot.*
Gaz. xxv. 149 (1898). **ASCLEPIADACEAE**.
 guatemalensis, *Donn. Sm. l. c.* 150.—Am. cent.

PROTAMOMUM, Ridley = **Orchidantha**, N. E. Br.
 (Musac).
 maxillarioides, *Ridley, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii.
 383 = *O. maxillarioides*.

PROTEA, Linn. (Proteac.).
 cedromontana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 109.
 —Afr. austr.
 conchiformis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 278.—Afr. austr.
 lanuginosa, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvi. i. 364.
 —Afr. austr.
 triandra, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 110.—Afr.
 austr.
 uhehensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxviii. 380.—Afr. trop.
 xanthoconus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 278.—Afr.
 austr.

PROTOSCHWENKIA, Solered. in *Ber. Deutsch.*
Bot. Ges. 1898, 243. **SOLANACEAE**.
 Mandoni, *Solered. l. c.* 244.—Bolivia.

PROUSTIA, Lag. (Compos.).
 crassinervis, *Urb. Symb. Antill.* i. 470.—Ind. occ.
 krugiana, *Urb. l. c.* 471.—Ind. occ.

PRUNELLA, Linn. (Labiata).
 angustifolia, *Bub. Fl. Pyren.* i. 422 = *hyssopifolia*.

PRUNUS, Tourn. (Rosac.).
 adenophora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.*
 ii. 10.—Java.
 adenopoda, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands*
Plantent. xxxiii. 347.—Java.
 alabamensis, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 118.
 —Am. bor.
 corymbulosa, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i.
 226.—Am. bor.
 Gravesii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 45.—
 Am. bor.
 guanaiensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 31.—
 Bolivia.
 injuncunda, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 149.
 —Am. bor.
 oregana, *Greene, Pittonia*, iii. 21.—Am. bor.
 Pearcei, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 30.—
 Bolivia.
 sativa, *Rouy & Camus, Fl. Fr.* vi. 4 = *domestica*, etc.
 tatsienensis, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. 322.—
 China.

PSAMMISIA, Klotzsch (Vaccin.).
 turbinata, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvi. i. 384
 (= *Chupalon turbinatum*).—Bolivia.

PSAMMOTROPHA, Eckl. & Zeyh. (Ficoid.).
 frigida, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 500.—Afr.
 austr.

PSEDNOTRICHIA, Hiern, in *Journ. Bot.* 1898, 289.
COMPOSITAE.
 tenella, *Hiern, l. c.* 290.—Afr. trop.

PSEUDANTHISTIRIA, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 219 (1896). *GRAMINEAE*.
burmanica, Hook. f. l. c. 220.—Ind. or.
heteroclita, Hook. f. l. c. 219.—Ind. or.
hispidia, Hook. f. l. c.—Ind. or.
umbellata, Hook. f. l. c. 220.—Ind. or.

PSEUDARTHRIA, Wight & Arn. (Legum.).
crenata, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 245.—Afr. trop.

PSEUDERANTHEMUM, Radlk. = *Eranthemum*, Linn. (Acanth.).
affine, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 546 = *E. hypocrateriforme*.
biceps, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. vii. 576.—Am. cent.
bolivianum, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 77.—Bolivia.
Hildebrandtii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 39 = *E. Hildebrandtii*.
Huegelii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 546 = *E. Huegelii*.
leptorhachis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 664.—Bras.
Uindavianum, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 104.—Afr. trop.
metallicum, Hallier, in Ann. Jard. Buitenz. xv. 26.—Sumatra.

PSEUDIBATIA, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 7 (1900) 78. *ASCLEPIADACEAE*.
ganglinosa, Malme, l. c. 81 (= *Cynanchum ganglinosum*).—Parag.
lanosa, Malme, l. c. 78 (= *Ibatia lanosa*).—Bras.
suberosa, Malme, l. c. 79.—Bras.
surgens, Malme, l. c. 80.—Bras.

PSEUDOBARLERIA, T. Anders. = *Petalidium*, Nees (Acanth.).
canescens, Engl. in Engl. Jahrb. x. 258 = *Pet. canescens*.
engleriana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 197 = *Pet. engleriana*.
glutinosa, Engl. in Engl. Jahrb. x. 259 = *Pet. glutinosum*.
lanata, Engl. l. c. 258 = *Pet. lanatum*.
latifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 197 = *Pet. latifolium*.
Lindaui, Dewèvre, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 104 = *Mellera submutica*.
ovata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. 198 = *Pet. ovatum*.
variabilis, Engl. in Engl. Jahrb. x. 259 = *Pet. variabile*.

PSEUDOBLEPHARIS, Baill. (Acanth.).
Boivini, Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 837 = *Sclerochiton Boivini*.
Dusenii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 34 = *Acanthus Dusenii*.
Heinsenii, Lindau, l. c. xxiv. 320 = *Sclerochiton Boivini*.
Holstii, Lindau, l. c. xx. 35 = *Sclerochiton Vogelii*.
nitida, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 319 = *Sclerochiton nitidus*.
Preussii, Lindau, in Engl. Jahrb. xx. 34 = *Sclerochiton Preussii*.

PSEUDOBRABOVA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. (1899) 155. *AMARYLLIDACEAE*.
densiflora, Rose, l. c. (= *Bravoa densiflora*).—Mexic.

PSEUDOBRAYA, Korsh. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VIII. iv. no. 4 (1896) 88. *CRUCIFERAE*.
Kizylarti, Korsh. l. c.—Turkestan.

PSEUDOBROMUS, K. Schum. (Gramin.).
africanus, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 763.—Afr. austr.

PSEUDOCYOPTERUS, Coult. & Rose (Umbell.).
Hendersoni, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 190.—Am. bor.

PSEUDODRACONTIUM, N. E. Br. (Arac.).
Harmandi, Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 15.—Cochinch.

PSEUDOGARDNERIA, Racib. in Anzeiger Akad. Krakau, April 1896, fide Solered. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. (1897) 282. *LOGANIACEAE*.
angustifolia, Racib. l. c. (= *Gardneria angustifolia*).—Ind. or.
nutans, Racib. l. c. (= *Gardneria nutans*).—Japon.

PSEUDOLACHNOSTYLIS, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. (1899) 19. *EUPHORBIACEAE*.
Dekindtii, Pax, l. c. 20.—Afr. trop.
maprouneaeifolia, Pax, l. c.—Afr. trop.

PSEUDOPANAX, C. Koch (Aral.).
chathamicum, T. Kirk, Fl. N. Zeal. 223.—N. Zel.
Gilliesii, T. Kirk, l. c. 221.—N. Zel.

PSEUDORAPHIS, Griff. = *Chamaeraphis*, R. Br. (Gramin.).
brunoniana, Griff. Notul. iii. 29 = *C. spinescens*.

PSEUDORLAYA, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12 (1897) 86. *UMBELLIFERAE*.
maritima, Murb. l. c. (= *Daucus maritimus*).—Eur. occ.

PSEUDOSMODINGIUM, Engl. (Anacard.).
multifolium, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 143.—Mexic.

PSEUDOSOPUBIA, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. (1897) 28; et in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 511. *SCROPHULARIACEAE*.
Hildebrandtii, Engl. l. c. (= *Sopubia Hildebrandtii*).—Afr. trop.
kituiensis, Engl. l. c. (= *Sopubia kituiensis*).—Afr. trop.
obtusifolia, Engl. l. c.—Afr. trop.

PSEUDOSTACHYUM, Munro (Gramin.).
Helferi, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. 253 = *Teinostachyum Helferi*.

PSIADIA, Jacq. (Compos.).
gnaphaliopsis, Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis, 218.—Afr. trop.
lyciodes, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 553.—Afr. trop.
vernucosa, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vi. 559 (non Steetz).—Afr. trop.

PSIDIUM, Linn. (Myrtac.).
savannarium, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 244.—Am. cent.
thyrsoides, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 359 (= *Myrtus thyrsodea*).—Bras.

PSILANTHELE, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. (1897) 663. *ACANTHACEAE*.
Eggersii, Lindau, l. c. 664.—Ecuador.

PSILOSTACHYS, Hochst. (Amarant.).
filiformis, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 305 = *Dimeria ornithopoda*.
Kirkii, Baker, in Kew Bull. 1897, 279.—Afr. trop.

PSILOTRICHUM, Blume (Amarant.).
angustifolium, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 328.—Afr. trop.
concinnum, Baker, in Kew Bull. 1897, 279.—Afr. trop.
debile, Baker, l. c.—Afr. trop.
Robecchii, Loopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 60; et in Ann. Ist. Bot. Roma, ix. 19.—Afr. trop.
rubellum, Baker, in Kew Bull. 1897, 279.—Afr. trop.
Ruspolii, Loopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 59; et in Ann. Ist. Bot. Roma, ix. 19.—Afr. trop.
trichophyllum, Baker, in Kew Bull. 1897, 279.—Afr. trop.
villosiflorum, Loopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 59; et in Ann. Ist. Bot. Roma, ix. 20.—Afr. trop.

PSITTACANTHUS, Mart. (Loranth.).
amplexifolius, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 136 = *Arthroxon amplexifolium*.
Kerberi, Engl. l. c. = *Loranthus Kerberi*.
Melinonii, Engl. l. c. 137 = *Alveolina Melinonii*.

PSORALEA, Linn. (Legum.).
juncea, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. vi. 286.—Am. bor.
oreophila, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 442.—Afr. austr.
Wilmsii, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 286.—Afr. austr.

PSOROSPERMUM, Spach (Hyperic.).
Humbloti, Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1218.—Madag.
membranaceum, C. H. Wright, in Kew Bull. 1898, 301.—Afr. trop.

PSYCHOTRIA, Linn. (Rubiac.).
adafoana, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 90.—Afr. trop.
aemulans, K. Schum. l. c. 95.—Afr. trop.
albomarginata, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 283.—Malaya.
batangana, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 94.—Afr. trop.

PSYCHOTRIA:—
Binnendijkii, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 501, nomen.—Celebes.
cardiophylla, K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 321, nomen.—Afr. trop.
cataractarum, K. Schum. l. c., nomen.—Afr. trop.
cauliflora, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 574.—N. Guin.
chaunantha, K. Schum. & Lauterb. l. c. 575.—N. Guin.
chlorocalyx, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. 638.—Ins. Samoa.
cyanopharynx, K. Schum. l. c. xxviii. 90.—Afr. trop.
dimorphophylla, K. Schum. l. c. 91.—Afr. trop.
dipteropoda, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 576.—N. Guin.
dolichocarpa, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. 636.—Ins. Samoa.
ebensis, K. Schum. l. c. xxviii. 91.—Afr. trop.
ectasiphylla, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 576.—N. Guin.
erythropus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 92.—Afr. trop.
euchlora, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
geminodens, K. Schum. l. c. xxv. 688.—Ins. Samoa.
gigantopus, K. Schum. l. c. 636.—Ins. Samoa.
globiceps, K. Schum. l. c. xxviii. 93.—Afr. trop.
grayana, K. Schum. l. c. xxv. 685.—Ins. Samoa.
hirta, Heller, in Minnes. Bot. Stud. i. 903 (non H. B. & K.).—Ins. Hawaii.
ischnophylla, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 93.—Afr. trop.
leucococca, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 577.—N. Guin.
luxurians, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 50.—Bolivia.
maleolens, Urb. Sym. Antill. i. 444.—Ind. occ.
maricaensis, Urb. l. c. 447.—Ind. occ.
microthyrsus, K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 321, nomen.—Afr. trop.
minimicalyx, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 94.—Afr. trop.
myrmecophila, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 578.—N. Guin.
oligocarpa, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 95.—Afr. trop.
onocarpa, K. Schum. l. c. xxv. 688.—Ins. Samoa.
ovato-oblonga, K. Schum. l. c. xxviii. 96.—Ins. Comor.
pacifica, K. Schum. l. c. xxv. 687.—Ins. Samoa.
pendula, Urb. Symb. Antill. i. 445 = *parasitica*.
perbrevis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 96.—Afr. trop.
piolampra, K. Schum. l. c. 97.—Afr. trop.
Poggei, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
potamophila, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
pseudocaronis, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 502, nomen.—Celebes.
pygmaeodendron, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 98.—Afr. trop.
refractiflora, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
refractiloba, K. Schum. l. c. 99.—Afr. trop.
Reineckeii, K. Schum. l. c. xxv. 686.—Ins. Samoa.
sadebeckiana, K. Schum. l. c. xxviii. 99.—Afr. trop.
samoana, K. Schum. l. c. xxv. 685.—Ins. Samoa.
Schlechteri, K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 321, nomen.—Afr. trop.
Sintenisii, Urb. Sym. Antill. i. 443.—Ind. occ.
stenocarpa, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. 687.—Ins. Samoa.
stigmatophylla, K. Schum. l. c. xxviii. 100.—Afr. trop.
subrepanda, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 579.—N. Guin.
suerrensis, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 337.—Am. cent.
supfiana, K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 321, nomen.—Afr. trop.
tanarivana, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 100.—Madag.
trivialis, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 50.—Bolivia.
xanthochlora, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. 687.—Ins. Samoa.

PSYLLOCARPUS, Mart. (Rubiac.).
phyllocephalus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. 17.—Bras.
Schwackei, K. Schum. l. c. 18.—Bras.

- PTELEA**, Linn. (Rutac.).
rhombifolia, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 313.—Am. bor.
- PTELEOPSIS**, Engl. (Combret.).
anisoptera, Engl. & Diels, in *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* iv. 4 (= *Combretum anisopterum*).—Afr. trop.
diptera, Engl. & Diels, l. c. 3 (= *Combretum dipterum*).—Afr. trop.
myrtifolia, Engl. & Diels, l. c. 4 = variifolia.
stenocarpa, Engl. & Diels, l. c. 5.—Afr. trop.
- PTERNANDRA**, Jack (Melast.).
Griffithii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. 70.—Penins. Mal.
- PTEROCACTUS**, K. Schum. in *Monatsschr. Kakt.* 1897, 6. **CACTACEAE**.
Kuntzei, K. Schum. l. c.—Reg. Argent.
Kurtzei, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 259.—Reg. Argent.
- PTEROCARPUS**, Linn. (Legum.).
acapulcensis, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.
cambodianus, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 383 B.—Cochinch.
dalbergioides, Roxb. *Hort. Beng.* 53.—Ind. or.
glaucinus, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 383.—Cochinch.
gracilis, Pierre, l. c.—Cochinch.
grandiflorus, Micheli, in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 65.—Afr. trop.
oblongus, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 383.—Cochinch.
paraguayensis, Barb. *Rodr. Pl. Mattogross.* 17.—Bras.
parvifolius, Pierre, *Fl. Cochinch.* sub t. 383.—Cochinch.
pedatus, Pierre, l. c.—Cochinch.
Zenkeri, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 299.—Afr. trop.
- PTEROCARYA**, Kunth (Jugland.).
Delavayi, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 317.—China.
hupehensis, Skan, in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. 493.—China.
- PTEROCAULON**, Ell. (Compos.).
Bakeri, Malme, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 55 (= *Vernonia Pterocaulon*).—Bras.
cordobense, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 169.—Reg. Argent.
lanatum, Kuntze, l. c.—Bolivia.
latifolium, Kuntze, l. c.—Bolivia.
Lorentzii, Malme, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 55.—Bras.
purpurascens, Malme, l. c.—Parag.
subvirgatum, Malme, l. c.—Parag.
- PTEROCELASTRUS**, Meissn. (Celastr.).
Galpinii, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 431.—Afr. austr.
- PTEROCEPHALUS**, Vaill. = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).
grandiflorus, Form. in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxviii. 203.—Eur.
lignosus, Freyn & Bornm. in *Bull. Herb. Boiss.* v. 625.—Persia.
- PTEROCYMBIUM**, R. Br. = *Sterculia*, Linn. (Stercul.).
Beccarii, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiv. Beibl. lviii. 21.—N. Guin.
viridiflorum, Teijsm. & Binn. ex Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 640.—Celebes.
- PTERODISCUS**, Hook. (Pedal.).
kellerianus, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 453.—Afr. trop.
Ruspolii, Engl. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 31.—Afr. trop.
saccatus, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 62.—Afr. trop.
undulatus, Baker f. in *Journ. Bot.* 1899, 62.—Afr. trop.
- PTEROGLOSSASPIS**, Reichb. f. (Orchid.).
Carsoni, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 100.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, Rolfe, l. c.—Afr. trop.
- PTEROLOBIUM**, R. Br. (Legum.).
densiflorum, Prain, ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 236.—Penins. Mal.
Rosthornii, Harms, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 410.—China.
- PTERONEMA**, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1897) 1322. **SIMARUBACEAE**.
laxiflora, Pierre, l. c.—Burma.
- PTERONIA**, Linn. (Compos.).
ambrariifolia, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 198.—Afr. austr.
decumbens, Banks, ex S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 156.—Afr. austr.
- PTEROSTEMMA**, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899) 489. **ORCHIDEAE**.
antioquiense, Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. l. c.—N. Granat.
- PTEROSTYLIS**, R. Br. (Orchid.).
papuana, Rolfe, in *Kew Bull.* 1899, 112.—N. Guin.
subsimilis, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 611.—N. Zel.
trifolia, Colenso, l. c. xxxi. 281.—N. Zel.
venosa, Colenso, l. c. xxviii. 610.—N. Zel.
- PTERYGIELLA**, Oliver, in *Hook. Ic. Pl. t. 2463* (1896). **SCROPHULARIACEAE**.
Duclouxii, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 22.—China.
nigrescens, Oliver, in *Hook. Ic. Pl. t. 2463*.—China.
- PTERYGODIUM**, Sw. (Orchid.).
bicolorum, Schlechter, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 851 (= *Corycium bicolorum*).—Afr. austr.
bifidum, Schlechter, l. c. 856 (= *Corycium bifidum*).—Afr. austr.
biflorum, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 303 = *Disperis crassicaulis*.
cleistogamum, Schlechter, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 816.—Afr. austr.
crispum, Schlechter, l. c. 849 (= *Corycium crispum*).—Afr. austr.
excisum, Schlechter, l. c. 852 (= *Corycium excisum*).—Afr. austr.
Flanagani, Bolus, *Orch. S. Afr.* t. 98.—Afr. austr.
microglossum, Schlechter, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 853 (= *Corycium microglossum*).—Afr. austr.
Newdigatae, Bolus, *Orch. S. Afr.* t. 99.—Afr. austr.
nigrescens, Schlechter, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 847 (= *Corycium nigrescens*).—Afr. austr.
orobanchoides, Schlechter, l. c. 848 (= *Corycium orobanchoides*).—Afr. austr.
penterianum, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 432.—Afr. austr.
tricuspidatum, Schlechter, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 821 (= *Corycium tricuspidatum*).—Afr. austr.
vestitum, Schlechter, l. c. 857 (= *Corycium vestitum*).—Afr. austr.
- PTERYGOSTACHYUM**, Nees = *Dimeria*, R. Br. (Gramin.).
Lehmanni, Nees, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 412 = D. Lehmanni.
- PTERYGOTA**, Schott & Endl. = *Steroulia*, Linn. (Stercul.).
macrocarpa, K. Schum. in *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 135.—Afr. trop.
trivernia, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiv. Beibl. lviii. 20.—Borneo.
- PTERYXIA**, Nutt. (Umbell.).
calcareae, Coult. & Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 173 = C. calcareus.
californica, Coult. & Rose, l. c. 172.—Am. bor.
petraea, Coult. & Rose, l. c. = C. petraeus.
terebinthina, Coult. & Rose, l. c. 171 = C. terebinthinus.
- PTILEPIDA**, Rafin. (Compos.).
grandiflora, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* iii. 570 (= *Actinella grandiflora*).—Am. bor.
- PTILONEILEMA**, Steud. = *Gracilea*, Koen. (Gramin.).
plumosum, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 201 = G. royleana.
- PTILONELLA**, Nutt. = *Blepharipappus*, Hook. (Compos.).
laevis, Greene, *Fl. Francisc.* 433 = B. laevis.
- PTILONEMA**, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 284 (1897), sphalm. = *PTILONEILEMA*, Steud. = *Gracilea*, Koen. (Gramin.).
- PTILORIA**, Rafin. = *Stephanomeria*, Nutt. (Compos.).
filifolia, Greene, *Pittonia*, iii. 311.—Am. bor.
- PTILORIA** :—
neo-mexicana, Greene, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 123.—Am. bor.
ramosa, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 453.—Am. bor.
scabrælla, Greene, *Pittonia*, iii. 311.—Am. bor.
- PTILOTRICHUM**, C. A. Mey. = *Alyssum*, Tourn. (Crucif.).
Baldaccii, Degen, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 413.—Albania.
- PTYCANTHERA**, Decne. (Asclep.).
mollis, Schlechter, in *Urb. Symb. Antill.* i. 280 (= *Ibatia mollis*).—Ind. occ.
oblongata, Schlechter, l. c. (= *Orthosia oblongata*).—Ind. occ.
ovatifolia, Schlechter, l. c. 279 (= *Poicilla ovatifolia*).—Ind. occ.
- PTYCHOPETALUM**, Benth. (Olac.).
acutissimum, Engl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 283.—Afr. trop.
- PTYCHOSPERMA**, Labill. (Palm.).
sanderiana, Ridley, in *Gard. Chron.* 1898, II. 330.—N. Guin.
Warleti, Hort. Sand. in *Gard. Chron.* 1898, I. 242.—Hab. ?
- PTYCHOTIS**, Koch = *Carum*, Rupp. (Umbell.).
saxifraga, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 191 = C. Bunius.
- PTYSSIGLOTTIS**, T. Anders. (Acanth.).
anisophylla, Hallier f. in *Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 289.—Borneo.
auriculata, Hallier f. l. c. 292.—Borneo.
dispar, Hallier f. in *Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 220.—Borneo.
frutescens, Hallier f. l. c. 222.—Borneo.
hirsuta, Hallier f. l. c. 217.—Borneo.
lanceolata, Hallier f. l. c. 221.—Borneo.
leptonœura, Hallier f. l. c. 222.—Borneo.
picta, Hallier f. l. c. 218.—Sumatra.
procrifolia, Hallier f. l. c. 223.—Borneo.
sarmentosa, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 662 (= *Rostellularia sarmentosa*).—Java.
- PTYXOSTOMA**, Vahl = *Lonchostoma*, Wikstr. (Bruniac.).
quadrididum, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 86.—Afr. austr.
- PUBLICARIA**, Desfers, Voy. Yemen, 151 (1889), sphalm. = *Pulicaria*, Gaertn. (Compos.).
- PUCCINELLIA**, Parl. (Gramin.).
Lemmoni, Scribn. in *U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xvii. 276 (= *Poa Lemmoni*).—Calif.
- PUELLIA**, Franch. (Gramin.).
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. II. 77.—Afr. trop.
- PUERARIA**, DC. (Legum.).
bella, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 288.—Ind. or.
Collettii, Prain, l. c. lxxvi. 420.—Burma.
sikkimensis, Prain, l. c. 419.—Reg. Himal.
textilis, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 368.—N. Guin. ; N. Brit.
- PULICARIA**, Gaertn. (Compos.).
antidysenterica, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 247 = dysenterica.
areysiana, Desfers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 108 = leucophylla.
ehrenbergiana, Schultz, in *Desfers, Voy. Yemen*, 152.—Arab.
majoricensis, Gand. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 134.—Eur.
Phillipsiae, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 157.—Afr. trop.
tanganyikensis, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.
- PULMONARIA**, Tourn. (Borag.).
annua, Candargy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 149.—Graecia.
tridentina, Evers, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlv. 74.—Tyrol.
- PULSATILLA**, Tourn. = *Anemone*, Tourn. (Ranunc.).
Duthiei, Gand. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 417.—Reg. Himal.

PULSATILLA :—

glaucofolia, Huth, in Engl. Jahrb. xxii. 588 = *A. glaucifolia*.
ludoviciana, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = *A. patens*.

PULTENAEA, Sm. (Legum.).

acuminata, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxii. 439.—Austral.
Campbelli, Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiv. 144.—Austral.
Deanei, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxii. 438.—Austral.

PUPALIA, Juss. (Amarant.).

huillensis, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 892.—Afr. trop.
Robecchii, Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. 55; et in Ann. Ist. Bot. Roma, ix. 21.—Afr. trop.

PURPURELLA, Naud. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).

cleistopetala, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiv. 163 = *cleistoflora*.

PURPUSIA, Brandege, in Coult. Bot. Gaz. xxvii.

(1899) 446. **ROSACEAE**.
saxosa, Brandege, l. c. 447.—Am. bor.

PUYA, Molina (Bromel.).

Augustae, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 487 (= *Dyckia Augustae*).—Guiana.
berteroniana, Mez, l. c. 477.—Chili.
bicolor, Mez, l. c. 482.—N. Granat.
brachystachya, Mez, l. c. 496 (= *Pitcairnia brachystachya*).—Am. trop.
coquimbensis, Mez, l. c. 492.—Chili.
dyckioides, Mez, l. c. 486 (= *Pitcairnia dyckioides*).—Bolivia.
exigua, Mez, l. c. 495.—Am. trop.
flora, Speg. Pl. Nov. Argent. iii. (1897) 8.—Reg. Argent.
Gaudichaudii, Mez, in DC. Monog. Phan. ix. 496.—Chili.
goudotiana, Mez, l. c. 488.—N. Granat.
humilis, Mez, l. c. 493.—Bolivia.
kuntzeana, Mez, l. c. 490.—Bolivia.
lineata, Mez, l. c. 497.—N. Granat.
mollis, Baker, ex Mez, l. c. 488.—Bolivia.
nitida, Mez, l. c. 491.—N. Granat.
pastoensis, Mez, l. c. 483 (= *Pitcairnia pastoensis*).—N. Granat.
Pearcei, Mez, l. c. 480 (= *Pitcairnia Pearcei*).—Peruv.
ruiziana, Mez, l. c. 491 (= *Pitcairnia lanuginosa*).—Peruv.
Rusbyi, Mez, l. c. 482 (= *Pitcairnia Rusbyi*).—Bolivia.
spathacea, Mez, l. c. 481 (= *Pitcairnia spathacea*).—Reg. Argent.
stenothyrsa, Mez, l. c. (= *Pitcairnia stenothyrsa*).—Bolivia.
tuberosa, Mez, l. c. 483.—Peruv.
tunarensis, Mez, l. c. 498.—Bolivia.
violacea, Mez, l. c. 476 (= *Pitcairnia violacea*).—Chili.
weberiana, Morr. ex Mez, l. c. 492.—Reg. Argent.
weddelliana, Mez, l. c. 475 (= *Pitcairnia weddelliana*).—Bolivia.

PYCNANTHUS, Warb. (Myristic.).

Dinklagei, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxxviii. 258.—Afr. trop.
Kombo, Warb. l. c. 252 (= *Myristica Kombo*).—Afr. trop.
Mechowii, Warb. l. c. 261.—Afr. trop.
Niohue, Warb. l. c. 259 (= *Myristica Niohue*).—Afr. trop.

PYCNARRHENA, Miers (Menisperm.).

grandis, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 313.—N. Guin.

PYCNOCOMA, Benth. (Euphorb.).

dentata, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 933.—Afr. trop.
Thonneri, Pax, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 51.—Afr. trop.
Zenkeri, Pax, in Engl. Jahrb. xxvii. 329.—Afr. trop.

PYCNOSTACHYS, Hook. (Labiata.).

Batesii, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 386.—Afr. trop.
congensis, Guerke, in Bull. Herb. Boiss. iv. 819.—Afr. trop.

PYCNOSTACHYS :—

decussata, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 382.—Afr. trop.
deflexifolia, Baker, l. c. 381.—Afr. trop.
Descampsii, Brig. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxvii. 63.—Afr. trop.
Hanningtonii, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 384.—Afr. trop.
Kirkii, Baker, l. c. 381.—Afr. trop.
leptophylla, Baker, in Kew Bull. 1898, 161.—Afr. trop.
nepetaefolia, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 383.—Afr. trop.
oblongifolia, Baker, l. c. 385.—Afr. trop.
Petherickii, Baker, l. c. 383.—Afr. trop.
remotifolia, Baker, in Kew Bull. 1898, 161.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 384.—Afr. trop.
sphaerocephala, Baker, in Kew Bull. 1898, 162.—Afr. trop.
stenostachys, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 380.—Afr. trop.
Whytei, Baker, l. c. 383.—Afr. trop.

PYCNOSTYLIS, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s.

i. (1898) 82. **MENISPERMACEAE**.
Sacleuxii, Pierre, l. c.—Afr. trop.

PYCREUS, Beauv. (Cyper.).

debilissimus, C. B. Clarke, in Journ. Bot. 1896, 224.—Afr. trop.
deusus, Urb. Symb. Antill. ii. 164 = *helvus*.
fluminalis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 106.—Afr. trop.
helvus, C. B. Clarke, in Urb. Sym. Antill. ii. 19.—Ind. occ.
niederleinianus, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvi. no. 9, 6 (= *Cyperus niederleinianus*).—Bras.
oakfortensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. vii. 159.—Afr. austr.
odoratus, Urb. Symb. Antill. ii. 164 = *polystachyos*.
olferianus, Urb. l. c. = *propinquus*.
unioloides, Urb. l. c. = *angulatus*.

PYGEUM, Gaertn. (Rosac.).

costatum, Hemsl. in Kew Bull. 1899, 98.—N. Guin.
dolichobotrys, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 340.—N. Guin.
grandiflorum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 288.—Penins. Mal.
hookerianum, King, l. c. 293.—Penins. Mal.
intermedium, King, l. c. 288.—Penins. Mal.
ovalifolium, King, l. c. 292.—Penins. Mal.
papanum, Hemsl. in Kew Bull. 1899, 99.—N. Guin.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 290.—Penins. Mal.
stipulaceum, King, l. c. 287.—Penins. Mal.

PYRENACANTHA, Wight (Olacac.).

acuminata, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 483.—Afr. trop.
canaliculata, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1317.—Afr. trop.
Ruspolii, Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 483.—Afr. trop.

PYRETHRUM, Hall. = **Chrysanthemum**, Tourn.

(Compos.).
deserticola, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12, 98.—Afr. bor.

PYROLA, Tourn. (Ericac.).

montana, Bub. Fl. Pyren. ii. 3 = *minor*.
pallida, Greene, Pittonia, iv. 39.—Am. bor.

PYROSTEGIA, Presl = **Bignonia**, Tourn. (Bignon.).

tubulosa, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. ii. 231 = *B. tubulosa*.

PYRROCOMA, Hook. = **Aplopappus**, Cass.

(Compos.).
acuminata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 626.—Am. bor.
ciliolata, Greene, Pittonia, iii. 184.—Am. bor.
Clementis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 625.—Am. bor.
congesta, Greene, Pittonia, iii. 23.—Am. bor.
eripoda, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 549.—Am. bor.

PYRROCOMA :—

erythropappa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 624.—Am. bor.
genusflexa, Greene, Pittonia, iii. 348.—Am. bor.
gossypina, Greene, l. c. 23.—Calif.
longifolia, Greene, l. c. 183.—Am. bor.
Lyallii, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 382 = *A. Lyallii*.
rigida, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 624 (non Phil.).—Am. bor.
solidaginea, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 549.—Am. bor.
subviscosa, Greene, l. c.—Am. bor.
Vaseyi, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 626.—Am. bor.
villosa, Rydb. l. c. 625.—Am. bor.

PYRUS, Tourn. (Rosac.).

austriaca, Kerner, in Sched. Fl. Austro-Hung. vii. 15.—Eur.
matsumurana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1897, 71.—Japan.
Zumi, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, 1899, 1.—Japan.

Q

QUAMASIA, Rafin. = **Camassia**, Lindl. (Liliac.).

azurea, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 547.—Am. bor.
Cusickii, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xi. 64 = *C. Cusickii*.
esculenta, Coville, l. c. 65 = *C. Fraseri*.
Howellii, Coville, l. c. = *C. Howellii*.
hyacinthina, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. i. 423 = *C. Fraseri*.
Leichtlinii, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xi. 63 = *C. Leichtlinii*.
quamash, Coville, l. c. 64 = *C. esculenta*.

QUAMOCLIT, Tourn. = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).

brevipedicellata, Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vii. 416.—Am. cent.
gracilis, Hallier f. l. c.—Mexic.
indivisa, Hallier f. in Engl. Jahrb. xxv. 732 (= *Convolvulus indivisus*).—Ecuador.
Mina, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *Mina lobata*.
Quamoclit, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 22 = *I. Quamoclit*.

QUARARIBEA, Aubl. (Malvae.).

Fieldii, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 309.—Mexic.
platyphylla, Pittier & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 239.—Am. cent.

QUASSIA, Linn. (Simarub.).

gabonensis, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1238.—Afr. trop.
klaineana, Pierre, l. c.—Afr. trop.

QUERCUS, Tourn. (Cupulif.).

acrodonta, Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 48.—China.
amygdalifolia, Skan, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 506.—China.
attenuata, Skan, l. c.—China.
Augustinii, Skan, l. c. 507.—China.
Baronii, Skan, l. c.—China.
Blakei, Skan, in Hook. Ic. Pl. t. 2662.—China.
brevicaudata, Skan, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 507.—China.
bullata, Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 48.—China.
calathiformis, Skan, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 508.—China.
Carlesii, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2591.—China.
clathrata, Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 15.—Java.
cleistocarpa, Seemen, l. c. xxiii. Beibl. lvii. 52.—China.
compta, Seemen, l. c. 53.—Cochinch.
Delavayi, Franch. in Journ. de Bot. 1899, 158.—China.
dielsiana, Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 291.—China.

QUERCUS :—

- dolichocarpa, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl.* lxiv. 14.—Java.
 durifolia, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 95.*—Am. cent.
 Edithae, *Skan, in Hook. Ic. Pl. t. 2661.*—China.
 edulis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xi. (35).*—Japon.
 elaeagnifolia, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 51.*—China.
 ellipsoidalis, *E. F. Hill, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 204.*—Am. bor.
 engleriana, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 47.*—China.
 Fargesii, *Franch. in Journ. de Bot. 1899, 158.*—China.
 fordiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2664.*—China.
 formosana, *Skan, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 513.*—China.
 Franchetii, *Skan, l. c.*—China.
 geminata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 438.*—Am. bor.
 glaucophylla, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 95.*—Am. cent.
 heliciformis, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 15.*—Java.
 Henryi, *Seemen, l. c. xxiii. Beibl. lvii. 50.*—China.
 hypophoenicea, *Seemen, l. c. 52.*—Borneo.
 ilicifolia, *Koord. & Valet. ex Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 18 (non aliorum).*—Java.
 imperialis, *Seemen, in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 263.*—N. Guin.
 Koordersii, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 16.*—Celebes.
 Lauterbachii, *Seemen, l. c. xxiii. Beibl. lvii. 54.*—N. Guin.
 Lycoperdon, *Skan, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 518.*—China.
 minima, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 438.*—Am. bor.
 nerifolia, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 51.*—China.
 obscura, *Seemen, l. c. 49.*—China.
 oligodonta, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 96.*—Am. cent.
 pachyloma, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 54.*—Cochinch.
 pagodaefolia, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 375.*—Am. bor.
 poculiformis, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 13.*—Java.
 Pringlei, *Seemen, ex Loes. in Engl. Jahrb. xxix. 96.*—Am. cent.
 pumila, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 57 = ilicifolia.*
 pyriformis, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 17.*—Java.
 Rex, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2663.*—China.
 spatulata, *Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 49.*—China.
 subimbricaria, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 59.*—Am. sept.
 sutchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot. 1899, 150.*—China.
 Tausini, *Bub. Fl. Pyren. i. 67 = Q. Toza.*
 variolosa, *Franch. in Journ. de Bot. 1899, 156.*—China.
 yunnanensis, *Franch. l. c. 146.*—China.

QUINA, Aubl. (Guttif.).

- Magallano-gomesii, *Schwacke, Pl. Nov. Mineir. i. 6.*—Bras.

QUILLAJA, Molina (Rosac.).

- Poeppigii, *Walp. Rep. ii. 52 = Q. Saponaria.*
Smegmadermis, *St. Laz. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. 133 = Q. Saponaria.*
Smegmadermos, *DC. Prod. ii. 547 = Q. Saponaria.*

QUINARIA, Rafn. = *Vitis*, Tourn. (Ampel.).

- anamalayana, *Gilg, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. 449 = V. anamalayana.*
cuspidifera, *Gilg, l. c. = V. cuspidifera.*
himalayana, *Gilg, l. c. 448 = V. himalayana.*
neilgherriensis, *Gilg, l. c.*—Ind. or.
semicordata, *Gilg, l. c. 449.*—Reg. Himal.

QUINTINIA, A. DC. (Saxifr.).

- acutifolia, *T. Kirk, Fl. N. Zeal. 137.*—N. Zel.

QUISQUALIS, Linn. (Combret.).

- falcata, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 355.*—Afr. trop.

R

RABDOCHLOA, Beauv. (Gramin.).

- Vulpiastrum*, *De Not. Ind. Sem. Hort. Genuens. (1852)* 26 et in *Ann. Sci. Nat. Sér. III. xix. 372 = Leptocarydion Vulpiastrum.*

RADLKOFERA, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiv. (1897) 300. *SAPINDACEAE.*

- Calodendron, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

RADLKOFERELLA, Pierre (Sapot.).

- latifolia, *Fawcett, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 321.*—Ind. occ.

RAINIERA, Greene, Pittonia, iii. (1898) 291. *COMPOSITAE.*

- stricta, *Greene, l. c. (= Prenanthes stricta).*—Am. bor.

RAMIUM, Kuntze = *Boehmeria*, Jacq. (Urtic.).

- edenatum, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 294.*—Bolivia.

RAMONA, Greene = *Audibertia*, Benth. (Labiata).

- capitata, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 287 = A. capitata.*
Clevelandi, *Briq. l. c. = A. Clevelandi.*
Dorrii, *Briq. l. c. = A. Dorrii.*
grandiflora, *Briq. l. c. = A. grandiflora.*
incana, *Briq. l. c. = A. incana.*
nivea, *Briq. l. c. = A. nivea.*
Palmeri, *Briq. l. c. = A. Palmeri.*
stachyoides, *Briq. l. c. = A. stachyoides.*
Vaseyi, *Briq. l. c. = A. Vaseyi.*

RANALISMA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2652 (1900). *ALISMACEAE.*

- rostrata, *Stapf, l. c.*—As. trop.

RANDIA, Houst. (Rubiace.).

- andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 458.*—Afr. trop.
 annulata, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 435.*—Afr. trop.
 canescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 573.*—Am. cent.
 chloroleuca, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 62.*—Afr. trop.
 cladantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 clathrodendron, *K. Schum. l. c. 490.*—Afr. trop.
 congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 28.*—Afr. trop.
 eetveldiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 194.*—Afr. trop.
 engleriana, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 436.*—Afr. trop.
 erythrocarpa, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 425.*—Ind. occ.
 Graeffei, *Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 633.*—Ins. Samoa.
 hispida, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 437.*—Afr. trop.
 jamaicensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 426.*—Ind. occ.
 liebrechtsiana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 193.*—Afr. trop.
 longiflora, *Durand & Schinz, Études Fl. Congo, i. 159 = maculata, DC.*
 lucidula, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 457.*—Afr. trop.
 macromera, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 562.*—N. Guin.
 micrantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 438.*—Afr. trop.
 microphylla, *K. Schum. l. c. xxviii. 64.*—Afr. trop.
 Monteiroae, *K. Schum. l. c. 63.*—Afr. trop.
 myrsiticoides, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 563.*—N. Guin.
 Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiv. 574.*—Mexic.
 ochroleuca, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 438.*—Afr. trop.
 physophylla, *K. Schum. l. c. xxviii. 64.*—Afr. trop.
 psychotrioides, *K. Schum. l. c. xxiii. 439.*—Afr. trop.
 rhacodosepala, *K. Schum. l. c. 440.*—Afr. trop.
 sericantha, *K. Schum. ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84, nomen.*—Afr. trop.
 sphaerocarpa, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 564.*—N. Guin.

RANDIA :—

- streptocaulon, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 440.*—Afr. trop.
 sulphurea, *K. Schum. l. c. 441.*—Afr. trop.
 terniflora, *Ficalho & Hiern, in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 459.*—Afr. trop.
 thourarsiana, *Baill. ex Drake, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 43 = Ixora thourarsiana.*
 troposepala, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 489.*—Afr. trop.
 violascens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 459.*—Afr. trop.

RANUNCULUS, Tourn. (Ranunc.).

- aberrans, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 16 = uniflorus.*
 alpeophilus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 350.*—Am. bor.
 alpinus, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 56.*—Turkestan.
 anemonerhizos, *Coincy, in Journ. de Bot. 1898, 1.*—Hispan.
 apricus, *Greene, Pittonia, iv. 145.*—Am. bor.
 arcuatus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 310.*—Am. bor.
 arnoglossus, *Greene, Pittonia, iv. 143.*—Am. bor.
 aureopetalus, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 55.*—Turkestan.
 Berggreni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 352.*—N. Zel.
 Bovei, *Spæg. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 44.*—Fuegia.
 Brotherusii, *Frey, in Bull. Herb. Boiss. vi. 885.*—Turkestan.
 caespitosus, *Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell. iii. v. 185 (non aliorum).*—Reg. Magell.
 Cheesemannii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal. 17.*—N. Zel.
 ciliolus, *Howell, Fl. N. W. Amer. i. 17.*—Am. bor.
 cuneiformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 276.*—Am. bor.
 doerflerianus, *Gand. in Jahresb. Kat. Wien. Tauschanst. 1899, 133.*—Eur.
 Douglasii, *Howell, Fl. N. W. Amer. i. 18.*—Am. bor.
 Earlei, *Greene, Pittonia, iv. 15.*—Am. bor.
 eremogenes, *Greene, in Erythraea, iv. 121.*—Am. bor.
 flexicaulis, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 55.*—Turkestan.
 foliosus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal. 14.*—N. Zel.
 Francheti, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vii. 591.*—Japon.
 fuegianus, *Spæg. in Anal. Mus. Buenos Aires, v. 43.*—Fuegia.
 fueginus, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 17.*—Fuegia.
 Gormanii, *Greene, Pittonia, iii. 91.*—Am. bor.
 Greenii, *Howell, Fl. N. W. Amer. i. 18.*—Am. bor.
 Hectorsii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal. 16.*—N. Zel.
 Howellii, *Greenm. in Howell, Fl. N. W. Amer. i. 17.*—Am. bor.
 icelandicus, *Davis, in Minnes. Bot. Studies, ii. 472.*—Island.
 inamoenus, *Greene, Pittonia, iii. 91.*—Am. bor.
 intermedius, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 580 (non aliorum).*—Am. bor.
 Jovis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 261.*—Am. bor.
 kindlianus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxviii. 217.*—Eur.
 Kirkii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxxi. 352.*—N. Zel.
 Ledebouri, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis, iv. 207 = ampelophyllus.*
 libanoticus, *Frey, in Mém. Herb. Boiss. no. 13, 2.*—Syria.
 Lobbii, *A. Gray, in Proc. Amer. Acad. xxi. 364.*—Am. bor.
 Lyallii, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 166 = Greenii.*
 madrensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 199.*—Mexic.
 McCallai, *Davis, in Minnes. Bot. Studies, ii. 482.*—Am. bor.
 mexicanus, *Davis, l. c. 487 = geoides.*
 Meyeri, *Lowe, in Hook. Journ. Bot. ix. (1857) 74 (non Harv.).*—As. bor.
 microlonchus, *Greene, in Erythraea, iv. 112.*—Am. bor.
 mississippiensis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 277.*—Am. bor.
 montanensis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 166.*—Am. bor.
 nyssanus, *Leichtl. in Garden, lv. (1899) 418.*—Quid?

RANUNCULUS :—

ocreatus, *Greene, Pittonia*, iv. 15.—Am. bor.
oreganus, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 19.—Am. bor.
Pamiri, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix.* (1898) 400.—Reg. Himal.
pauciflorus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 11 (non Spreng.).—N. Zel.
petiolaris, E. S. Marshall, in *Journ. Bot.* 1892, 289 = scoticus.
pimpinelloides, D. Don, in *Royle, Ill. Pl. Himal.* 53 = *Callianthemum rutaefolium*.
Rattani, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 17.—Am. bor.
recens, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 13.—N. Zel.
rubrocalyx, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 62.—Turkestan.
rufus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 591.—N. Zel.
rutaefolius, *Linn. Sp. Pl.* 552 = *Callianthemum rutaefolium*.
samolifolius, *Greene, Pittonia*, iii. 13.—Calif.
saxicola, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 164.—Am. bor.
scoticus, E. S. Marshall, in *Ann. Scot. Nat. Hist.* 1898, 122.—Brit.
similis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2586.—Tibet.
subaffinis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 246.—Am. bor.
subalpinus, Davis, in *Minnes. Bot. Studies*, ii. 474 = delphinifolius.
tenellus, *Nutt. in Torr & A. Gray, Fl. N. Amer.* i. 23 = Douglasii.
tenuilobus, *Regel, ex Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 59.—Turkestan.
thracicus, *Aënav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvi. 136.—Eur. or.
unguiculatus, *Greene, Pittonia*, iv. 142.—Am. bor.
uniflorus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 267 (non Phil.).—N. Zel.
uniflorus, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, i. 16.—Chili.
valdivianus, *Phil. l. c.* 18.—Chili.
verticillatus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 13.—N. Zel.
vicinalis, *Greene, Pittonia*, iv. 145.—Am. bor.
Winkleri, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 59 (non Freyn).—Turkestan.

RAOULIA, Hook. f. (Compos.).

Brownii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 307.—N. Zel.
Buchanani, *T. Kirk, l. c.*—N. Zel.

RAPHANISTRUM, Tourn. = **Raphanus**, Tourn. (Crucif.).

glaucaum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 154.—Graecia.

RAPHIA, Beauv. (Palm.).

angolensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 83.—Afr. trop.

RAPHIONACME, Harv. (Asclep.).

Loandae, *Schlechter & Rendle, in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 679.—Afr. trop.
Welwitschii, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 97.—Afr. trop.

RAPISTRUM, Tourn. (Crucif.).

macedonicum, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 198.—Eur.

RAPUNCULUS, Tourn. = **Phyteuma**, Linn. (Campan.).

Caesalpini, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 25 = P. Michellii.
ovatus, *Bub. l. c.* 26 = P. Halleri.
Scheuchzeri, *Bub. l. c.* 24 = P. Scheuchzeri.
sylvestris, *Bub. l. c.* = P. orbiculare.

RATIBIDA, Rafn. = **Lepachys**, Rafn. (Compos.).

peduncularis, *Barnh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 411 = L. peduncularis.
pinnata, *Barnh. l. c.* 410 = L. pinnatifida.
Tagetes, *Barnh. l. c.* = L. Tagetes.

RATONIA, DC. (Sapind.).

Nugentii, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xiv. 9.—Austral.

RAUTANENIA, Buchenau, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 854 (1897). **ALISMACEAE**.

Schinzi, *Buchenau, l. c.* 855.—Afr. trop.

RAUWOLFIA, Plum. (Apocyn.).

congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 204.—Afr. trop.
elliptica, *Malmé, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 10, 13.—Bras.
longeacuminata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 205.—Afr. trop.
spectabilis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 393 (= *Cyrtosiphonia spectabilis*).—Malaya.

RAVENIA, Vell. (Rutac.).

Urbani, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxi. 552.—Ind. occ.

REAUMURIA, Linn. (Tamarisc.).

sogdiana, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 159.—Turkestan.

REICHARDIA, Roth = **Picridium**, Desf. (Compos.).

laciniata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 475.—Afr. trop.

REINWARDTIA, Dum. (Linac.).

sinensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t.* 2594.—China.

REINWARDTIODENDRON, Koord. in *Meded.*

'S Lands Plantent. xix. (1898) 389. **MELIACEAE**.
celebicum, *Koord. l. c.*—Celebes.

RELBUNIUM, Benth. & Hook. f. (Rubiace.).

patagonicum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 393.—Patag.
sphagnophilum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 468.—Mexic.

RENANTHERA, Lour. (Orchid.).

alba, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 353 (= *Arachnanthe alba*).—Penins. Mal.
Maincathi, *Auct. in Just, Jahresb.* xxv. II. 496, sphalm. = seq.
Maingayi, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 353 (= *Arachnanthe Maingayi*).—Penins. Mal.
ramuana, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 252.—N. Guin.
Trichoglotis, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 293.—Borneo.

RENANTHERELLA, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. (1896) 354. **ORCHIDACEAE**.

histrionica, *Ridley, l. c.* 355 (= *Renanthera histrionica*).—Malaya.

RENEALMIA, Linn. f. (Scitamin.).

battenbergiana, *Cummins, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 313.—Afr. trop.
bracteata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 79.—Afr. trop.
Cabrea, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* xxxviii. 145.—Afr. trop.
cincinnata, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 312.—Afr. trop.
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 144.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 143.—Afr. trop.
grandiflora, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 313.—Afr. trop.

RENSCHIA, Vatke (Labiata).

heterotypica, *Vatke, in Linnaea*, xliii. 94.—Afr. trop.

RESEDA, Tourn. (Resed.).

bastitana, *Coincy, in Journ. de Bot.* xiii. 303.—Hispan.
Carmen-sylvae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 202.—Afr. trop.
macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 332.—Eur.
othyriana, *Form. l. c.* xxxv. 190.—Eur.
somalensis, *Baker f. in Journ. Bot.* 1896, 51.—Afr. trop.
sudanica, *A. Cheval. in Compt. Rend. Intern. Congr. Bot.* 1900, 278.—Afr. trop.

RESTIO, Linn. (Restiac.).

alboaristatus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 407 = *Hypodiscus alboaristatus*.
ambiguus, *Masters, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 96.—Afr. austr.
arancosus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 3.—Afr. austr.
cirratus, *Mast. l. c.* 5.—Afr. austr.
coactilis, *Mast. l. c.* 3.—Afr. austr.

RESTIO :—

comosus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 753.—Afr. austr.
consimilis, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 4.—Afr. austr.
dimorphostachyus, *Mast. l. c.* 2.—Afr. austr.
distractus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 70.—Afr. austr.
ejuncidus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 2.—Afr. austr.
exilis, *Mast. l. c.* 6.—Afr. austr.
foliosus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 753.—Afr. austr.
garnotianus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 392 = filiformis.
giganteus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 755.—Afr. austr.
gossypinus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 3.—Afr. austr.
implexus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 90.—Afr. austr.
intricatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 1.—Afr. austr.
membranaceus, *Nees, in Linnaea*, v. 657 = *Elegia membranacea*.
multicurvus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 751.—Afr. austr.
oligostachyus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 399 = filiformis.
parviflorus, *Thunb. Diss. Rest.* 13 = *Cannomois scirpoides*.
patens, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 97.—Afr. austr.
penicillatus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 5.—Afr. austr.
pondoensis, *Mast. l. c.*—Afr. austr.
praeacutus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 84.—Afr. austr.
procurrens, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 3.—Afr. austr.
productus, *Mast. l. c.* 5.—Afr. austr.
protractus, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 97.—Afr. austr.
scaber, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 1.—Afr. austr.
scaberulus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 751.—Afr. austr.
scoparius, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 390 = venustus.
Scopula, *Mast. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 96.—Afr. austr.
sejunctus, *Mast. l. c.* 97.—Afr. austr.
sparsus, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 2.—Afr. austr.
spiculatus, *Mast. l. c.* 4.—Afr. austr.
stereocaulis, *Mast. l. c.* 1.—Afr. austr.
strictus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 752.—Afr. austr.
thyrsifer, *Rottb. Progr.* 11 = *Elegia thyrsifera*.
trichocaulis, *Mast. in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 6.—Afr. austr.
virgeus, *Mast. l. c.* 4.—Afr. austr.

RESTREPIA, H. B. & K. (Orchid.).
antennifera, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* i. 367, t. 94.—N. Granat.
sanguinea, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 44.—N. Granat.

REUTERA, Boiss. = **Pimpinella**, Riv. (Umbell.).
caroides, *Freyn & Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 610.—Persia.

REYNOSIA, Griseb. (Rhamn.).
Guama, *Urb. Symb. Antill.* i. 356.—Ind. occ.
Krugii, *Urb. l. c.* 354.—Ind. occ.
reticulata, *Urb. l. c.* 357 (= *Rhamnidium reticulatum*).—Ind. occ.
revoluta, *Urb. l. c.* (= *Rhamnidium revolutum*).—Ind. occ.
septentrionalis, *Urb. l. c.* 356.—Ind. occ.
uncinata, *Urb. l. c.* 355.—Ind. occ.
Wrightii, *Urb. l. c.* 357 (= *Rhamnidium retusum*).—Ind. occ.

RHABDOSTIGMA, Hook. f. (Rubiace.).
Schlechteri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 68.—Afr. austr.

RHACODISCUS, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* v. (1897) 667. **ACANTHACEAE**.
Lindmani, *Lindau, l. c.*—Bras.

RHACOMA, Linn. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).
ilicifolia, *Trelase, in A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. i. 399 = M. ilicifolia.

RHADAMANTHUS, Salisb. (Liliac.).
cyanelloides, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* vi. 444.—Afr. austr.

- RHAGODIA**, R. Br. (Chenopod.).
corallicarpa, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1897, 168.—Austral.
- RHAMNELLA**, Miq. = *Microrhamnus*, A. Gray (Rhamn.).
berchemiaefolia, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo*, xii. 49.—Japan.
- RHAMNUS**, Tourn. (Rhamn.).
adonaeifolia, Auct. in *Just, Jahresb.* xxiv. II. 388, sphalm. = *anonaeifolia*.
alaternoides, Candargy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 156.—Graecia.
anonaeifolia, Greene, *Pittonia*, iii. 16.—Calif.
betulaefolia, Greene, l. c.—Am. bor.
bourgaeanus, Gand. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 135.—Eur.
formosana, Matsum. in *Bot. Mag. Tokyo*, xii. 22.—Formosa.
laetevirens, Kom. in *Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 162.—Turkestan.
Philyca, Bub. Fl. Pyren. i. 371 = R. *Alaternus*.
pirifolia, Greene, *Pittonia*, iii. 15.—Calif.
Rosthornii, E. Pritz. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 459.—China.
Sagorskii, Bornm. in *Bot. Centralbl.* lxxii. 228 = *orbiculata*.
Smithii, Greene, *Pittonia*, iii. 17.—Am. bor.
- RHAPHIDOPHORA**, Hassk. (Arac.).
africana, N. E. Br. in *Kew Bull.* 1897, 286.—Afr. trop.
australasica, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 452.—Austral.
Dahlia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 8.—N. Brit.
formosana, *Engl. l. c.* 10.—Formosa.
geniculata, *Engl. l. c.* 7.—N. Guin.
Graeffei, *Engl. l. c.* 9.—Ins. Samoa.
Koordersii, *Engl. l. c.* 6.—Celebes.
Lovellae, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* i. 453.—Austral.
megasperma, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 8.—Borneo.
novo-guineensis, *Engl. l. c.* 6 = *neo-guineensis*.
peeploides, *Engl. l. c.* 7.—Hort.
pusilla, N. E. Br. in *Kew Bull.* 1897, 286.—Afr. trop.
Reineckei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 9.—Ins. Samoa.
- RHAPHIOSTYLIS**, Planch. = *Apodytes*, E. Mey. (Olacac.).
fusca, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1324 (= *Chelonocarya fusca*).—Afr. trop.
jollyana, Pierre, l. c. 1325.—Afr. trop.
latifolia, Pierre, l. c.—Afr. trop.
scandens, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
- RHAPHIS**, Lour. = *Andropogon*, Linn. (Gramin.).
acicularis, Desv. *Opusc.* 69 = A. *aciculatus*.
ciliolata, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 396 = A. *monticola*.
coerulea, Nees, l. c. 395 = A. *monticola*.
coerulescens, Desv. *Opusc.* 69 = A. *micranthus*.
echinulata, Nees, in Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 417 = A. *Gryllus*.
Gryllus, Desv. *Opusc.* 69 = A. *Gryllus*.
javanica, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 396 = A. *aciculatus*.
microstachya, Nees, l. c. 397 = A. *micranthus*.
orientalis, Desv. *Opusc.* 69 = A. *wightianus*.
repens, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 397 = A. *micranthus*.
royleana, Nees, l. c. = A. *Gryllus*.
stricta, Nees, in Hook. *Kew Journ. Bot.* ii. 99 = A. *intermedius*.
trivalvis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 188, sphalm. = *seq.*
trivialis, Lour. *Fl. Cochinch.* 553 = A. *aciculatus*.
villosula, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 397 = A. *micranthus*.
wightiana, Nees, l. c. 395 = A. *wightianus*.
zeylanica, Nees, l. c. 397 = A. *zeylanicus*.
- RHAPONTICUM**, Vaill. = *Centaurea*, Linn. (Compos.).
nanum, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 80.—As. cent.
- RHAPTOPETALUM**, Oliver (Olacac.).
eetveldeanum, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 121.—Afr. trop.
- RHAPTOSTYLUM**, Humb. & Bonpl. = *Heisteria*, Jacq. (Olac.).
yapacaniense, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 37.—Bolivia.
- RHEEDIA**, Linn. (Guttif.).
lanceolata, Urb. *Symb. Antill.* i. 369.—Ind. occ.
pendula, Urb. l. c. 368.—Ind. occ.
portoricensis, Urb. l. c. (= *Clusia acuminata*, Spreng.).—Ind. occ.
verticillata, Urb. l. c. 370.—Ind. occ.
- RHEXIA**, Linn. (Melast.).
filiformis, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 468.—Am. bor.
- RHIGOZUM**, Burch. (Bignon.).
linifolium, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 172.—Afr. trop.
- RHINACANTHUS**, Nees (Acanth.).
Dewevret, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 105 = *communis*.
gracilis, Klotzsch, in Peters, *Reise Mossamb.* Bot. 218 = *communis*.
parviflorus, T. Anders. ex Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 106 = *communis*.
rotundifolius, C. B. Clarke, in Dyer, *Fl. Trop. Afr.* v. 225.—Afr. trop.
subcaudatus, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
- RHINANTHUS**, Linn. (Scrophul.).
Facchinii, Chab. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 506.—Eur.
goniotrachus, Borb. in *Baenitz, Herb. Eur.* 1896, 2.—Eur.
groenlandicus, Chab. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 515.—Gronia.
Heribaudi, Chab. l. c. 508.—Eur.
italicus, Chab. in *Mém. Herb. Boiss.* no. 8, 13.—Eur.
Kyrollae, Chab. in *Bull. Herb. Boiss.* vii. 511.—Am. bor.
ovifugus, Chab. l. c. 501.—Eur.
Perrieri, Chab. l. c. 510.—Eur.
rigidus, Chab. l. c. 516.—Am. bor.
Songeonii, Chab. l. c. 497.—Eur.
- RHINOPTERYX**, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 352 (1896). MALPIGHIACEAE.
spectabilis, Niedenzu, l. c. 353.—Afr. trop.
- RHIPSALIS**, Gaertn. (Cact.).
bambusoides, A. Web. in Bois, *Dict. Hort.* 1048 = *salicornioides*.
carnosa, Voecht. in *Jahrb. Wiss. Bot. Leipzig*, ix. 401.—Quid?
caripensis, A. Web. ex K. Schum. *Gesamtb. Kakt.* i. 622 = R. *Cassytha*.
chloroptera, A. Web. in Bois, *Dict. Hort.* 1045.—Bras.
foveolata, A. Web. l. c. 1047.—Bras.
gracilis, A. Web. l. c. 1048 = *salicornioides*.
hadrosoma, Lindb. in *Monatsschr. Kakt.* 1896, 96.—Bras.
Lagenaria, Voecht. in *Jahrb. Wiss. Bot. Leipzig*, ix. 422.—Quid?
leucorhaphis, K. Schum. in *Monatsschr. Kakt.* 1900, 125.—Parag.
megalantha, Loefgr. in *Monatsschr. Kakt.* 1899, 134.—Bras.
micrantha, Hort. ex A. Web. in Bois, *Dict. Hort.* 1046 = *sulcata*.
pendula, Voecht. in *Jahrb. Wiss. Bot. Leipzig*, ix. 371.—Quid?
pilosa, A. Web. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. 300 = *madagascariensis*.
prismatica, Ruempl. in *Foerst. Handb. Cact.* ed. II. 884.—Bras.
pterocarpa, A. Web. ex K. Schum. *Gesamtb. Kakt.* i. 641 = *gonocarpa*.
radicans, A. Web. in Bois, *Dict. Hort.* 1047 = *cavernosa*.
robusta, Lindb. in *Monatsschr. Kakt.* 1896, 53 = *hadrosoma*.
suarensis, A. Web. in Bois, *Dict. Hort.* 1046, sphalm. = *suareziana*.
sulcata, A. Web. l. c.—Hab.?
Tonduzii, A. Web. l. c.—Am. cent.
- RHODALSINE**, J. Gay = *Arenaria*, Rupp. (Caryophyll.).
geniculata, Williams, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 7.—Eur.; Afr. bor.
- RHODOCODON**, Baker (Liliac.).
urgineoides, Baker, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2492.—Madag.
- RHODODENDRON**, Linn. (Ericac.).
Annae, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 258.—China.
Bodinieri, Franch. l. c. 257.—China.
brevistylum, Franch. l. c. 261.—China.
chionophyllum, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 512.—China.
coeloneurum, Diels, l. c. 513.—China.
comptum, C. H. Wright, in *Kew Bull.* 1899, 103.—N. Guin.
coriaceum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 258.—China.
crinigerum, Franch. l. c. 260.—China.
detersile, Franch. l. c.—China.
floccigerum, Franch. l. c. 259.—China.
fokiense, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvi. 210.—China.
kingianum, Watt, in *Gard. Chron.* 1899, II. 306 = *arboresum*.
Latoucheae, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvi. 210.—China.
lukiangense, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 257.—China.
lussoniense, Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 356.—Ins. Philipp.
mandarinorum, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 510.—China.
mekongense, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 263.—China.
modestum, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 7686.—Ind. or.
nipponicum, Matsum. in *Bot. Mag. Tokyo*, xiii. 17.—Japan.
nodosum, C. H. Wright, in *Kew Bull.* 1899, 103.—N. Guin.
oxyphyllum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 264.—China.
platypodium, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 511.—China.
pritzelianum, Diels, l. c. 510.—China.
ramosissimum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 264.—China.
Rosthornii, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 509.—China.
saluenense, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 263.—China.
sanguineum, Franch. l. c. 259.—China.
selense, Franch. l. c. 257.—China.
siderophyllum, Franch. l. c. 262.—China.
subsessile, Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 357.—Ins. Philipp.
trinerve, Franch. ex Boissieu, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 920.—Japan.
Vanhoeffeni, *Abromeit*, in *Bibl. Bot.* xlii. 51.—Gronia.
vernicosum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1898, 258.—China.
Whiteheadi, Rendle, in *Journ. Bot.* 1896, 356.—Ins. Philipp.
- RHODOPIS**, Urb. *Symb. Antill.* ii. 804 (1900).
LEGUMINOSAE.
planisiliqua, Urb. l. c. (= *Rudolphiapeltata*).—Ind. occ.
- RHODOSCIADIUM**, S. Wats. (Umbell.).
nudicaule, *Drude*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 223 (= *Deanea nudicaulis*).—Mexic.
tuberosum, *Drude*, l. c. (= *Deanea tuberosa*).—Mexic.
- RHODOSTACHYS**, Phil. (Bromel.).
carneus, Mez, in DC. *Monog. Phan.* ix. 338 = *andina*.
Chamissonis, Mez, l. c. 337.—Chili.
elegans, Mez, l. c. 336 (= *Ochagavia elegans*).—Juan Fernandez.
leiboldianus, Mez, l. c. 338.—Chili.
micrantha, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. 610.—Chili.
- RHOMBOCHLAMYS**, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* v. (1897) 659. ACANTHACEAE.
elata, Lindau, l. c. 661.—N. Granat.
rosulata, Lindau, l. c. 660.—N. Granat.
- RHOPALANDRIA**, Stapf, in *Kew Bull.* 1898, 71.
GRAMINEAE.
Cumminsii, Stapf, l. c.—Afr. trop.
- RHOPALOPILIA**, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1896) 1263. OLACACEAE.
pallens, Pierre, l. c.—Afr. trop.
Poggei, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 143; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 282.—Afr. trop.

RHUS, Tourn. (Anacard.)

- Anchietae, *Ficalho & Hiern, in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 184.*—Afr. trop.
 apiculata, *Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 502.*—Afr. trop. Engleri, *Britten, in Journ. Bot. 1900, 316.*—Afr. austr. Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 432.*—China. heptaphylla, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 185.*—Afr. trop.
 huillensis, *Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 501.*—Afr. trop. incana, *Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 428* = Engleri. Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien, xv. 52.*—Afr. austr.
 perakensis, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 500.*—Penins. Mal.
 rupicola, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 350.*—Afr. austr.
 Ruspolii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 18.*—Afr. trop.
 Rydbergii, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 268.*—Am. bor.
 Schlechteri, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiv. 501.*—Afr. austr.
 sinica, *Diels, l. c. xxix. 432.*—China.
 Steingroeveri, *Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 500.*—Afr. austr.
 trifoliata, *Baker f. in Journ. Bot. 1899, 429* (non aliorum).—Afr. trop.
 villosa, *Engl. in Engl. Jahrb. xxiv. 501* = huillensis. virgata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 184.*—Afr. trop. Wilmsii, *Diels, in Engl. Jahrb. xxiv. 501.*—Afr. austr.

RHYNCHANThERA, DC. (Melast.)

- parvifolia, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 95* (non Naud.).—Bolivia.

RHYNCHANThUS, Hook. f. (Scitam.)

- bluthianus, *Wittm. Gartenfl. 1899, 38.*—Ind. or.

RHYNCHELYThRUM, Nees = **Tricholaena**, Schrad. (Gramin.)

- dregeanum, *Nees, Fl. Afr. Austr. 64* = *T. rosea*.

RHYNCHOPYLE, Engl. (Arac.)

- Grabowskii, *Engl. in Engl. Jahrb. xxv. 20.*—Borneo.

RHYNCHOSIA, Lour. (Legum.)

- Buchananii, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 304.*—Afr. trop.
 Dielsii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 418.*—China.
 divaricata, *Baker, in Kew Bull. 1897, 264.*—Afr. trop. Erythraea, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 258.*—Afr. trop.
 Fischeri, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 305.*—Afr. trop. floribunda, *Baker, in Kew Bull. 1897, 262.*—Afr. trop. glutinosa, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 305.*—Afr. trop. Goetzei, *Harms, l. c. xxviii. 409.*—Afr. trop.
 Hauthalii, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 60.*—Parag.
 Holstii, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 306.*—Afr. trop. imbricata, *Baker, in Kew Bull. 1897, 263.*—Afr. trop. komatiensis, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 306.*—Afr. austr.
 Kuntzei, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 61.*—Bras.
 longipes, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 306.*—Afr. austr. mensensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 256.*—Afr. trop.
 monophylla, *Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 279.*—Afr. austr.
 nyasica, *Baker, in Kew Bull. 1897, 263.*—Afr. trop. nyikensis, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
 ovata, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot. 1897, 350.*—Afr. austr.
 Rivae, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 258.*—Afr. trop.
 Schoelleri, *Schweinf. l. c. 255.*—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 307.*—Afr. trop.
 sphaerocephala, *Baker, in Kew Bull. 1897, 264.*—Afr. trop.
 Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 308.*—Afr. trop.
 teramnoides, *Harms, l. c. 307.*—Afr. trop.

RHYNCHOSTIGMA, Benth. = **Toxocarpus**, Wight & Arn. (Asclep.)

- Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 208.*—Afr. trop.

RHYNCHOSTYLIS, Blume (Orchid.)

- gigantea, *Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 356* (= *Vanda densiflora*).—Burma.

RHYSOPTERUS, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. (1900) 185. **UMBELLIFERAE.**

- corrugatus, *Coult. & Rose, l. c. 187* (= *Cymopterus corrugatus*).—Am. bor.
 Jonesii, *Coult. & Rose, l. c. 186.*—Am. bor.
 plurijugus, *Coult. & Rose, l. c.*—Am. bor.

RHYTACHNE, Desv. (Gramin.)

- benguellensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 138.*—Afr. trop.

RHYTICARPUS, Sond. (Umbell.)

- swillemendensis, *Brig. in Bull. Herb. Boiss. v. 451.*—Afr. austr.

RHYTIDOCARYUM, K. Schum. & Lanterb. Fl. Deutsch. Südsee, 415 (1900) = **Ryticaryum**, Becc. (Teacin.)**RIBES**, Linn. (Saxifrag.)

- acerifolium, *Howell, in Erythea, iii. 34* = Howellii. aridum, *Greene, Pittonia, iv. 35.*—Am. bor.
 binominatum, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5.*—Am. bor.
 Bridgesii, *Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7611* = villosum.
 ciliosum, *Howell, Fl. N. W. Amer. i. 208.*—Am. bor. cognatum, *Greene, Pittonia, iii. 115.*—Am. bor.
 cruentum, *Greene, l. c. iv. 35.*—Am. bor.
 curvatum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 295.*—Am. bor.
 domesticum, *Jancz. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par. cxxx. 589.*—Eur.
 erythrocarpum, *Coville & Leiberger, in Proc. Biol. Soc. Washington, x. 132.*—Am. bor.
 Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. 86.*—China.
 Henryi, *Franch. l. c. 87.*—China.
 Howellii, *Greene, in Erythea, iv. 57.*—Am. bor.
 inerme, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 202.*—Am. bor.
 lasianthum, *Greene, Pittonia, iii. 22.*—Calif.
 Lavalley, *Hort. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7611* = villosum.
 leucoderme, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 93.*—Am. bor.
 lithuanicum, *Jancz. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par. cxxx. 589.*—Eur.
 macrocarpum, *Jancz. l. c.*—Eur.
 mariposanum, *Congd. in Erythea, vii. 183.*—Calif.
 mesclerium, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xiii. 196.*—Am. bor.
 molle, *Howell, Fl. N. W. Amer. i. 209* (non Poepp.).—Am. bor.
 montanum, *Howell, l. c. 210* = binominatum.
 montigenum, *McClatchie, in Erythea, v. 38.*—Calif.
 Munroi, *Douglas, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. 120,* nomen.—Am. bor.
 nitidissimum, *Neger, in Engl. Jahrb. xxviii. 253.*—Am. austr.
 nubigenum, *McClatchie, in Erythea, ii. 80* = montigenum.
 parvulum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 203.*—Am. bor.
 Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 378.*—China.
 saximontanum, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gas. xxx. 119.*—Am. bor.
 spaethianum, *Koehne, in Gartenfl. 1899, 333.*—Am. bor.

RICHARDIA, Kunth (Arac.)

- cruciata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 51.*—Bolivia.
 macrocarpa, *W. Watson, in Gard. Chron. 1892, II. 124* = angustiloba.
 Pentlandii, *Whyte, ex W. Watson, l. c.* = angustiloba.

RICINOCARPOS, Desf. (Euphorb.)

- controversus, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 290.*—Bolivia.
 cordobensis, *Kuntze, l. c. 291* = *Acalypha cordoviensis*.
 depressinervis, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.

RICINODENDRON, Muell. Arg. (Euphorb.)

- Rautanenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vi. 744.*—Afr. trop.
 Staudtii, *Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. 532.*—Afr. trop.

RIDLEYA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. I. (1900) 338, sphalm. = **Risleya**, King & Pantl. (Orchid.)**RINOREA**, Aubl. = **Alsodeia**, Thou. (Violac.)

- congensis, *Engl. in Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 3.*—Afr. trop.
 Deweyi, *Engl. in Wildem. & Th. Dur. l. c. 4.*—Afr. trop.
 Dupuisii, *Engl. in Wildem. & Th. Dur. l. c.*—Afr. trop.
 khutuensis, *Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 436.*—Afr. trop.
 Scheffleri, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 84,* nomen.—Afr. trop.
 viridifolia, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 5.*—Bolivia.

RIOCREUXIA, Decne. (Asclep.)

- longiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 459.*—Afr. trop.
 splendida, *K. Schum. l. c. 460.*—Afr. trop.

RISLEYA, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. (1898) 246. **ORCHIDEAE.**

- atropurpurea, *King & Pantl. l. c. 247.*—Ind. or.
RITALA, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. (1898) 156. **ORCHIDEAE.**
 himalaica, *King & Pantl. l. c. 157* (= *Ceratostylis himalaica*).—Reg. Himal.

RIVEA, Choisy (Convolv.)

- glabra, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss. vi. 715* (= *Argyria glabra*).—Malaya.
 luzonensis, *Hallier f. l. c.*—Ins. Philipp.
 stenosphon, *Hallier f. in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xvi. 15,* repr. (= *Ipomoea stenosphon*).—Afr. trop.

RIVINA, Plum. (Phytolacc.)

- densiflora, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 268.*—Bolivia.
 polyandra, *Loesen. in Engl. Jahrb. xxxiii. 123.*—Am. cent.

ROBINIA, Linn. (Legum.)

- Boyntonii, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc. xiv. 51.*—Am. bor.

ROBINSONELLA, Rose & Baker f. in Gard. & For. x. (1897) 244. **MALVACEAE.**

- cordata, *Rose & Baker f. l. c.*—Mexic.
 discolor, *Rose & Baker f. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 131.*—Mexic.
 divergens, *Rose & Baker f. in Gard. & For. x. 245.*—Am. cent.
 lindeniana, *Rose & Baker f. l. c.* (= *Sida lindeniana*).—Mexic.

RODRIGUEZIA, Ruiz & Pav. (Orchid.)

- juergensiana, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 377.*—Bras.
 obscura, *Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 488.*—N. Granat.

ROELLA, Linn. (Campan.)

- arenaria, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 193.*—Afr. austr.
 compacta, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 lightfootioides, *Schlechter, l. c. xxiv. 445.*—Afr. austr.
 nitida, *Schlechter, l. c. 446.*—Afr. austr.
 psammophila, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

ROEPEROCARIS, Reichb. f. (Orchid.)

- bennettiana, *Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 104.*—Afr. trop.
 platyanthera, *Reichb. f. l. c.*—Afr. trop.

ROLFEEA, Zahlbr. in Journ. Bot. 1898, 493. **ORCHIDEAE.**

- elata, *Zahlbr. l. c.*—Guiana.

ROLLINIA, A. St. Hil. (Anonac.)

- lanceolata, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 5, 49.*—Bras.
 leptopetala, *R. Fries, l. c. 50.*—Bras.
 Warmingii, *R. Fries, l. c. 49.*—Bras.

ROMNEYA, Harv. (Papaverac.)

- trichocalyx, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 133.*—Am. bor.

ROMULEA, Maratti (Irid.)

- hirta, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 91.*—Afr. austr.
 insularis, *Sommier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. v. 132.*—Ital.

ROMULEA :—

- longipes, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1898, 377.—Afr. austr.
 papyracea, *Wolley-Dod*, in *Journ. Bot.* 1900, 170.—Afr. austr.
 tempskyana, *Frey*, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 798.—Cyprus.
 Thodei, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1898, 318.—Afr. austr.
RONDELETIA, Linn. (Rubiaceae).
 Combsii, *Greenm. ex Combs*, in *Trans. Acad. Sci. St. Louis*, vii. 427.—Ind. occ.
 hondurensis, *Donn. Sm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 335.—Am. cent.
 impressa, *Krug & Urb.* in *Urb. Symb. Antill.* i. 412.—Ind. occ.
 inermis, *Krug & Urb.* l. c. 416 = *buxifolia*.
 martinicensis, *Krug & Urb.* l. c. 415.—Ind. occ.
 microcalyx, *Krug & Urb.* l. c. 412.—Ind. occ.
 Nimanima, *Krug & Urb.* l. c. 418.—Ind. occ.
 pachyphylla, *Krug & Urb.* l. c. 419.—Ind. occ.
 portoricensis, *Krug & Urb.* l. c. 414.—Ind. occ.
 subglabra, *Krug & Urb.* l. c. 418.—Ind. occ.

RONNBERGIA, E. Morr. & André (Bromel.).

- maidifolia, *Mes*, in *DC. Monog. Phan.* ix. 158.—N. Granat.
RORIPA, Scop. = *Nasturtium*, R. Br. (Crucif.).
 alpina, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 176.—Am. bor.
 calycina, *Rydb.* l. c. 175 = *N. calycinum*.
 Columbiæ, *Howell*, *Fl. N. W. Amer.* i. 40 = *N. Columbiæ*.
 curvipes, *Greene*, *Pittonia*, iii. 97.—Am. bor.
 multicaulis, *Greene*, l. c.—Am. bor.
 Nuttallii, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 176.—Am. bor.
 occidentalis, *Greene*, *Pittonia*, iii. 97 = *N. occidentale*.
 pacifica, *Howell*, *Fl. N. W. Amer.* i. 40.—Am. bor.
 polymorpha, *Howell*, l. c. 41 = *N. curvisiliqua*.
 trachycarpa, *Greene*, *Pittonia*, iii. 96 = *N. trachycarpum*.
 Walteri, *Mohr*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 23 = *N. tanacetifolium*.

ROSA, Tourn. (Rosac.).

- alpina, *Pall.* *Fl. Ross.* ii. 61 = *acicularis*.
 amiliavensis, *Coste*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 506.—Gallia.
 anotracha, *Piotrowski*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
 Berdau, *Piotrowski*, l. c. p. xxix.—Eur.
 Biondii, *Crépin*, in *Baroni, Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze* (1896-7), 132; et in *Bull. Soc. Bot. Ital.* 1897, 233.—China.
 carelica, *Fries*, *Summa Veg. Scand.* 171 = *acicularis*.
 coccalba, *Kmet*, in *Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 6.—Eur.
 communis, *Rouy*, in *Rouy & Camus*, *Fl. Fr.* vi. 231 = *canina*, etc.
 conspicua, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 302.—Austria.
 Giraldii, *Crépin*, in *Baroni, Ricerche Mus. Ort. Bot. Firenze* (1896-7), 181; et in *Bull. Soc. Bot. Ital.* 1897, 232.—China.
 Gmelini, *Bunge*, in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 228 = *acicularis*.
 grosse-serrata, *E. Nelson*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxx. 119.—Am. bor.
 Macdougali, *Holz*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxi. 36.—Am. bor.
 Macounii, *Greene*, *Pittonia*, iv. 10.—Am. bor.
 manca, *Greene*, l. c. 11.—Am. bor.
 melina, *Greene*, l. c. 10.—Am. bor.
 nevadensis, *Porta & Rgo.* in *Atti Accad. Agiati Rovereto*, Ser. III. ii. 212; fide *Just*, *Jahresb.* xxiv. II. 201, 389.—Hispan.
 nipponensis, *Crépin*, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xiv. 7 = *acicularis*.
 osmoidea, *Oborny*, in *Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 13.—Eur.
 phasianica, *Kmet*, in *Kerner*, l. c. 14.—Eur.
 polonica, *Woloss.* in *Kerner*, l. c. 13.—Eur.
 pratincola, *Greene*, *Pittonia*, iv. 13 (non *H. Braun*).—Am. bor.
 Richter, *H. Braun*, in *Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 12.—Eur.
 sepiodes, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 328.—Austria.
 slawodolica, *Kmet*, in *Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 8.—Eur.
 slopnicensis, *Woloss.* in *Spraw. Kom. Fiz. Krakau*, xxxii. 42.—Eur.

ROSA :—

- soulicana, *Crépin*, in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 21.—China.
 stellata, *Wootton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 152.—Am. bor.
 Stohlii, *Stohl*, in *Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 9.—Eur.
 suffulta, *Greene*, *Pittonia*, iv. 12.—Am. bor.
 svanetica, *Crépin*, ex *Sommier & Levier*, in *Act. Hort. Petrop.* xvi. 138.—Reg. Caucas.
 turcica, *Rouy*, *Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 134.—Eur.
 vistulana, *Piotrowski*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxix.—Eur.
 Wagae, *Piotrowski*, l. c. p. xxviii.—Eur.
 znaimensis, *Oborny & H. Braun*, in *Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 11.—Eur.

ROSEANTHUS, Cogn. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. iii. (1896) 577. CUCURBITACEAE.

- albiflorus, *Cogn.* l. c. 578.—Mexic.
ROSTELLARIA, Nees = *Justicia*, *Houst.* (Acanth.).
 Schimper, *Hochst.* in *Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 24 = *J. calcarata*.
 sexangularis, *Hochst.* l. c. xxv. (1842) Beil. i. 142 = *J. sexangularis*, *Lindau*.

ROSTELLULARIA, Reichb. = *Justicia*, *Houst.* (Acanth.).

- abyssinica, *Nees*, in *DC. Prod.* xi. 372 = *J. diffusa*.
 glandulosa, *Nees*, l. c. 373 = *Monothecium glandulosum*.

ROSTRARIA, Trin. (Gramin.).

- pubescens, *Trin.* *Fund. Agrost.* 150 = *Koeleria phleoides*.
ROOTALA, Linn. (Lythrac.).
 dentifera, *Koehne*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. Beibl. lvii. 17 (= *Ammannia dentifera*).—Am. bor.
 diglossandra, *Koehne*, l. c.—Austral.
 Dinteri, *Koehne*, ex *Schinz*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 24.—Afr. trop.
 Hippuris, *Makino*, in *Bot. Mag. Tokyo*, xii. 81.—Japan.

ROTHIA, Lam. (Compos.).

- degenerica, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 169.—Bolivia.
 intermedia, *Kuntze*, l. c. 170.—Bolivia.
 pinnata, *Kuntze*, l. c. = *Schkuhria abrotanoides*.
 pusilla, *Kuntze*, l. c. = *Schkuhria pusilla*.
ROTHIA, Schreb. = *Andryala*, Linn. (Compos.).
 lanata, *Bub.* *Fl. Pyren.* ii. 80 = *A. integrifolia*.
 lyrata, *Bub.* l. c. 81 = *A. ragusina*.

ROTTBOELLIA, Linn. f. (Gramin.).

- anceps, *Buch.-Ham.* ex *Wall.* *Cat.* no. 8871 = *compressa*.
 angolensis, *Rendle*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 139.—Afr. trop.
 biflora, *Roxb.* *Fl. Ind.* i. 357 = *Lepturus roxburghianus*.
 Cymbachne, *Willd.* *Sp. Pl.* i. 465 = *Andropogon Cymbachne*.
 gibbosa, *Hack.* ex *Lisboa*, in *Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* vi. 194 = *Clarkei*.
 gymnorhiza, *Buch.-Ham.* ex *Wall.* *Cat.* no. 8875 = *exaltata*.
 Helfer, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 158.—Ind. or.
 hirsuta, *Vahl*, *Symb. Bot.* i. 11 = *Elionurus hirsutus*.
 hispida, *Roxb.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 156 = *exaltata*.
 huillensis, *Rendle*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 140.—Afr. trop.
 khasiana, *Munro*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 157 = *striata*.
 laevis, *Retz.* *Obs.* iii. 11 = *perforata*.
 longiflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 154.—Ind. or.
 merguensis, *Hook. f. l. c.* 158.—Ind. or.
 muricata, *Retz.* *Obs.* iii. 12 = *Eremochloa muricata*.
 perforata, *Roxb. Pl. Corom.* ii. 43.—As. austr.; *Malaya*.
 pilosa, *Roth*, ex *Roem. & Schult.* *Syst.* ii. 785 = *Enteropogon melicoides*.
 quaterna, *Buch.-Ham.* ex *Wall.* *Cat.* no. 8871 = *compressa*.
 roxburghiana, *Schult.* *Mant.* ii. 430 = *Lepturus roxburghianus*.
 sanguinea, *Retz.* *Obs.* iii. 25 = *Andropogon hirtiflorus*.
 Talboti, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 155.—Ind. or.
 Talboti, *Lisboa*, in *Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* vi. 195 = *Clarkei*.
 tripsacoides, *Lam.* *Illustr.* i. 205 = *Stenotaphrum glabrum*.

ROTTLERA, Vahl = *Didymocarpus*, *Wall.* (Gesner.).

- aurca, *Franch.* in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 250.—China.

ROTTLERA :—

- Fargesii, *Franch.* in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 251.—China.
 kamerunensis, *Fritsch*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 300 = *D. kamerunensis*.
 mekongensis, *Franch.* in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 252.—China.
 tibetica, *Franch.* l. c. 251.—China.
 uniflora, *Franch.* l. c.—China.
 yunnanensis, *Franch.* l. c. 250.—China.

ROULINIA, Decne. (Asclep.).

- chlorantha, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxv. 729.—Ecuador.

ROUREA, Aubl. (Connar.).

- acropetala, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 379 D.—Cochinch.
 adiantoides, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 213.—Afr. trop.
 anomala, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 11.—Penins. Mal.
 bamangensis, *Wildem. & Th. Dur.* in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 82.—Afr. trop.
 Baumannii, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 211.—Afr. trop.
 cassioides, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 187.—Afr. trop.
 chiliantha, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 212.—Afr. trop.
 Foenum-graecum, *Wildem. & Th. Dur.* in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 18.—Afr. trop.
 Goetzei, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 394.—Afr. trop.
 harmadiana, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 379 E.—Cochinch.
 inodora, *Wildem. & Th. Dur.* in *Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 71.—Afr. trop.
 macrantha, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 393.—Afr. trop.
 nivea, *Gilg*, l. c. 210.—Afr. trop.
 pallens, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 188.—Afr. trop.
 quocensis, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 379 C.—Cochinch.
 radlkofariana, *K. Schum.* in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 342.—N. Guin.
 rubella, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 379 F.—Cochinch.
 strigulosa, *Gilg*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 211.—Afr. trop.
 suerrensensis, *Donn. Sm.* in *Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 5.—Am. cent.
 venulosa, *Hiern*, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 187.—Afr. trop.

ROUREOPSIS, Planch. (Connar.).

- incurva, *Pierre*, *Fl. Cochinch.* t. 379 A.—Cochinch.
 Scortechinii, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 16.—Penins. Mal.

ROUXIA, Husn. Gram. Fr. Belg. 76 (1899). GRAMINEAE.

- hordeoides, *Husn.* l. c. (= *Agropyrum Rouxii*).—Eur.
ROVILLIA, *Bub.* *Fl. Pyren.* i. 182 (1897) = *Polyne-mum*, Linn. (Chenopod.).
 glabra, *Bub.* l. c. 183 = *P. arvense*.

ROYDSIA, *Roxb.* (Cappar.).

- fasciculata, *King*, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 121.—Burma.

ROYENA, Linn. (Eben.).

- Guerke, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 196.—Afr. austr.
 pentandra, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 61.—Afr. trop.
 Simii, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 196.—Afr. austr.
 Wilmsii, *Guerke*, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 60.—Afr. austr.

ROYSTONEA, O. F. Cook, in *Science*, Ser. II. xii. (1900) 479. PALMAE.

- regia, *O. F. Cook*, l. c.—Ind. occ.

RUBIA, Tourn. (Rubiaceae).

- erratica, *Bub.* *Fl. Pyren.* ii. 327 = *peregrina*.

RUBUS, Tourn. (Rosac.).

- adenanthus, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 208.—China.
 alleghaniensis, *Porter*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 153.—Am. sept.
 amoenus, *Portenschl.* ex *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten*, ii. 278.—Eur.
 ampelinus, *Focke*, ex *Diels*, in *Engl. Jahrb.* xxix. 396.—China.
 amphidasys, *Focke*, l. c.—China.
 apenninus, *Evers*, in *Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 63, descr.—Italia.
 arabicus, *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 204.—Arab.
 Aschersonii, *Spreng.* in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 216.—Eur.

RUBUS:

- biformis, *Boulay, in Rouy & Camus, Fl. Fr.* vi. 40.—Eur.
- Blockii, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
- borbasiellus, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 7.—Eur.
- brachyadenes, *Waisb. ex Baenitz, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 25.—Eur.
- brentonicus, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 61.—Eur.
- bruginoensis, *Evers, l. c.* 63.—Eur.
- Bucknalli, *W. White, in Journ. Bot.* 1899, 389.—Brit.
- chaerophylloides, *Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 212.—Eur.
- coculotinus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 24, descr.—Eur.
- cognolensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 62.—Eur.
- collicola, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 87.—Eur.
- erraticus, *Sudre, l. c.* 91.—Eur.
- eugenius, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 393.—China.
- euleucus, *Focke, l. c.* 397.—China.
- euprepes, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen,* xiv. 275.—Eur.
- flagelliflorus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 393.—China.
- giraldianus, *Focke, l. c.* 401.—China.
- Goetzenii, *Engl. in Goetsen, Durch Afr. repr.* 4.—Afr. trop.
- grandis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 606 = rhamnifolius.
- Hassleri, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* vii. App. i. 66.—Parag.
- hesperius, *Piper, in Erythea,* v. 103 (non Rogers).—Am. bor.
- hesperius, *Rogers, in Journ. Bot.* 1896, 504.—Eur.
- Holtanii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 78.—Bolivia.
- humilis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 610 = caesius.
- ilicebrosus, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen,* xvi. 278.—Japon.?
- innoxius, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 395.—China.
- irenaeus, *Focke, l. c.* 394.—China.
- iricus, *Rogers, in Journ. Bot.* 1896, 506.—Eur.
- isticus, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten,* ii. 273.—Eur.
- Jastrzebowskii, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
- kirungensis, *Engl. in Goetsen, Durch Afr. repr.* 5.—Afr. trop.
- kolmarensis, *Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 48.—Eur.
- komoriensis, *Sprub. l. c.* 53.—Eur.
- lancifolia, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 7.—Eur.
- lasquiensis, *Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 214.—Eur.
- litigiosus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 93.—Eur.
- longepetiolatus, *Huels. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xl. p. xxxi.—Eur.
- Maranzae, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 59.—Eur.
- Martrini, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. 95.—Eur.
- mesogaenus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 399.—China.
- modestus, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen,* xiv. 296 = modicus.
- modicus, *Focke, l. c.* xvi. 279.—China.
- montanus, *Porter, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1894, 120 = alleghaniensis.
- niveus, *Thunb. Diss. Rub.* 9 = euleucus.
- obscurissimus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 91.—Eur.
- orthocladus, *Ley, in Journ. Bot.* 1896, 159.—Brit.
- ostroviensis, *Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 49.—Eur.
- pacatus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 395.—China.
- pedemontanus, *Pinkwart, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xvi. 181.—Eur.
- pilifer, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 90.—Eur.
- pinicola, *H. Hofm. in Abh. Isis, Dresden,* 1897, ex *Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. Gen. Heft, 29.—Eur.
- posnaniensis, *Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 49.—Eur.
- pungens, *Utsch, ex Baenitz, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1898, 65 (non Cambess.).—Eur.
- quercetorum, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten,* ii. 272.—Eur.

RUBUS:

- regillus, *Ley, in Journ. Bot.* 1896, 217.—Brit.
- roetensis, *Waisb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 6.—Eur.
- rubelliflorus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 92.—Eur.
- sabinus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 25, descr.—Eur.
- santarosensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 80.—Bolivia.
- sativus, *Brain. in Rhodora,* ii. 26.—Am. bor.
- saxonicus, *H. Hofm. in Abh. Isis, Dresden,* 1897, ex *Schube & Dalla Torre, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. Gen. Heft, 28.—Eur.
- seebergensis, *Pfuhl, ex Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. 51.—Eur.
- sepalanthus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 391.—China.
- Stuhlmannii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 374.—Afr. trop.
- strugensis, *Sprub. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xli. 216.—Eur.
- teledapos, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 398.—China.
- tenebriocosus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 88.—Eur.
- tenellus, *Hayek, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 655 (non Lefev.).—Eur.
- thessalus, *Haldesny, Consp. Fl. Graec.* i. 503.—Eur.
- Timballagravii, *P. J. Muell. ex Rouy & Camus, Fl. Fr.* vi. 97.—Eur.
- trifoliatus, *Pospich. Fl. Oesterr. Küsten,* ii. 270 (non aliorum).—Eur.
- ulugurensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 374.—Afr. trop.
- vejentinus, *Evers, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1896, 26.—Eur.
- vezzanensis, *Evers, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* xlvi. 64.—Eur.
- villipes, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 92.—Eur.
- villosissimus, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
- vulgaris, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 605 = fruticosus.
- Woloszczakii, *Piotrowski, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. p. xxviii.—Eur.
- xanthoneurus, *Focke, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 392.—China.

RUDBECKIA, Linn. (Compos.).

- alpicola, *Piper, in Erythea,* vii. 173.—Am. bor.
- amplectens, *Greene, Pittonia,* iv. 177.—Am. bor.
- divergens, *Greene, l. c.*—Am. bor.
- flava, *Greene, l. c.* 179.—Am. bor.
- flexuosa, *Greene, l. c.* 180.—Am. bor.
- floridana, *Greene, l. c.* 176.—Am. bor.
- longipes, *Greene, l. c.* 178.—Am. bor.
- pinnatifida, *Beadle, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 277.—Am. bor.
- sericea, *Greene, Pittonia,* iv. 178.—Am. bor.
- truncata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 478.—Am. bor.

RUDGEA, Salisb. (Rubiace).

- valida, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 51.—Bolivia.

RUPELLIA, Plum. (Acanth.).

- adenocalyx, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 46.—Bras.
- adenostachya, *Lindau, l. c.* 45.—Bras.
- albiflora, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 92.—Mexic.
- Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 102.—Bolivia.
- batangana, *J. Braun & K. Schum. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb.* ii. 173 = Physacanthus inflatus.
- bignoniiflora, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 198, partim = prostrata.
- Biolleyi, *Lindau, in Anal. Inst. Fis. Geog. Costa Rica,* vii. 301.—Am. cent.
- costata, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* ii. 195 = acuminata.
- elliptica, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 74.—Bolivia.
- elongata, *Beauv. Fl. Owar.* i. 46 = Whitfieldia elongata.
- eumorphantha, *Lindau, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* 1898, 38.—Mexic.
- eurycodon, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 47.—Bras.
- exostemma, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 654.—Venez.

RUPELLIA:

- genduana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 47.—Afr. trop.
- goyazensis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 45.—Bras.
- gracilis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 102.—Bolivia.
- hapalotricha, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 44.—Bras.
- heterotricha, *Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 220.—Arab.
- imbricata, *Forsk. Fl. Aegypt.-Arab.* 113 = Phaylopsis parviflora.
- Lechleri, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 75.—Bolivia.
- leucoderma, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 318.—Afr. trop.
- lindaviana, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 452.—Bras.
- lindmaniana, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxiv. no. 5, 25.—Bras.
- linearibracteolata, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 70.—Afr. trop.
- Loefgreni, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 654.—Bras.
- longicalyx, *Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 219.—Arab.
- malacosperma, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 572.—Am. cent.
- paradoxa, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 69.—Afr. trop.
- Pittieri, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 655.—Am. trop.
- placoides, *Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 414.—Afr. trop.
- prostrata, *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* vii. 24.—Afr. trop.
- prostrata, *Poir, Encyc.* vi. 349 = patula?
- radicans, *Hochst. ex Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 141 = Dyschoriste radicans.
- Ruspolii, *Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma,* vi. 69.—Afr. trop.
- Sclerochiton, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1880, 7 = Paulowilhelmia Sclerochiton.
- Sprucei, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 653.—Mexic.
- Stuebelii, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxi. 377.—N. Granat.
- subringens, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* ii. 194.—Ind. occ.
- tetrastichantha, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica,* viii. 300.—Am. cent.
- Tonduzii, *Lindau, l. c.* 302.—Am. cent.
- trachyphylla, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 46.—Bras.

RUPELLIOPSIS, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop.

- Afr. v. 59 (1899). **ACANTHACEAE.**
- mutica, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
- setosa, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.

RULINGIA, R. Br. (Stercul.).

- coacta, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 180.—Austral.
- procumbens, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,* xxiii. 18.—Austral.
- prostrata, *Maiden & Betche, l. c.*—Austral.

RUMEX, Linn. (Polygon.).

- algeriensis, *Barratte & Murb. ex Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. Afd. II. no. 3 (1899) 6.—Afr. bor.
- crispissimus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 269.—Patag.
- decumbens, *Dusen, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 195.—Reg. Magell.
- densiflorus, *Osterh. in Erythea,* vi. 13.—Am. bor.
- fueginus, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 493.—Chili.
- hellenicus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brunn,* xxxv. 160.—Eur.
- Langloisii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 405.—Am. bor.
- madaio, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* x. 107.—Japon.
- salinus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 549.—Am. bor.
- simpliciflorus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. Afd. II. no. 3 (1899) 11.—Afr. bor.; Ins. Mader.
- tuberosus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 233 = salinus.
- tunetanus, *Barratte & Murb. ex Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. Afd. II. no. 3 (1899) 5.—Afr. bor.
- undulatus, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brunn,* xxxiv. 285 (non aliorum).—Eur.

RUNGIA, Nees (Acanth.).
 congoensis, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 254.—Afr. trop.
 paxiana, C. B. Clarke, l. c. 253.—Afr. trop.

RUPICOLA, Maiden, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. (1898) 774. **EPACRIDAEAE**.
 sprengelioides, Maiden, l. c. 775.—Austral.

RUPPIA, Linn. (Naiad.).
 curvicarpa, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 122.—Am. bor.
 pectinata, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 18.—Am. bor.

RUPRECHTIA, C. A. Mey. (Polygon.).
 fusca, Fernald, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 86.—Mexic.
 Pringlei, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 476.—Mexic.

RUSBYELLA, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. (1896) 122. **ORCHIDEAE**.
 caespitosa, Rolfe, l. c.—Bolivia.

RUSPOLIA, Lindau (Acanth.).
 pseuderanthemoides, Lindau, in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 80, descr.—Afr. trop.

RUSSELLIA, Jacq. (Scrophul.).
 jaliscensis, Robinson, in *Proc. Amer. Acad.* xxxv. 319.—Mexic.
 tepicensis, Robinson, l. c. 321.—Mexic.

RUTA, Tourn. (Rutac.).
 congesta, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. iv. 181 = suaveolens.
 flexuosa, Engl. l. c. (= *Aplophyllum flexuosum*).—Oriens.

RUTHEA, Bolle = *Lichtensteinia*, Cham. & Schlecht. (Umbell.).
 Burchellii, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. viii. 179 = L. Burchellii.
 gummifera, Drude, l. c. (= *Glia gummifera*).—Afr. austr.
 interrupta, Drude, l. c. = L. pyrethriifolia.

RUTIDEA, DC. (Rubiace.).
 albiflora, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 87.—Afr. trop.
 hirsuta, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 491.—Afr. trop.
 lasiosiphon, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 464.—Afr. trop.
 Schlechteri, K. Schum. in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 320, nomen.—Afr. trop.
 tomentosa, K. Schum. l. c. 321, nomen.—Afr. trop.

RUYSCHIA, Jacq. (Ternstroem.).
 platyadenia, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 34.—Bras.

RYDBERGIA, Greene, Pittonia, iii. (1898) 270. **COMPOSITAE**.
 glabrata, Greene, l. c. (= *Actinella Brandegei*).—Am. sept.
 grandiflora, Greene, l. c. (= *Actinella grandiflora*).—Am. sept.

RYLSTONEA, R. T. Baker, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. (1898) 768. **MYRTACEAE**.
 cernua, R. T. Baker, l. c.—Austral.

RYNCHOSPORA, Vahl (Cyper.).
Arechavaletae, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 24 = cyperoides.
 Berterii, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 119.—Ind. occ.
 costaricensis, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 110.—Am. cent.
 durandiana, Boeck. l. c. 94.—Am. cent.
 gracilis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 335 = tenuis.
 grandifolia, Boeck. in *Engl. Jahrb.* xxv. 587.—Ins. Samoa.
 heterolepis, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 94.—Bras.
 hispidula, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. 604 = trichodes.
 juncellus, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 117.—Ind. occ.
 Kuntzei, C. B. Clarke, in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 336.—Bolivia.

RYNCHOSPORA :—
 leucostachys, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 79.—Bras.
 longifolia, Boeck. l. c.—Bras.
 monostachya, Boeck. l. c. 78.—Bras.
 patuligluma, C. B. Clarke, ex Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 25 (= *Mitrospora pallida*).—Bras.
 perrigida, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 93.—Am. cent.
 Pittieri, Boeck. l. c. 109.—Am. cent.
 rostrata, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 27.—Bras.
 seslerioides, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 247 = *Dichromena seslerioides*.
 spicata, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 95 = maculata.
 splendens, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 26.—Bras.
 Sprucei, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 79.—Bras.
 trichodes, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 116.—Ind. occ.
 uleana, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 110.—Bras.

RYPARIA, Blume = *Ryparosa*, Blume (Bixac.).
 javanica, Kurz, in *Journ. Bot.* 1873, 234 = R. javanica.
 longipedunculata, Boerl. *Cat. Hort. Bogor.* (1899) 55 = R. longipedunculata.

RYPAROSA, Blume (Bixac.).
 javanica, Koord. & Valet. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 11; et xl. 185.—Java.
 longipedunculata, Boerl. *Cat. Hort. Bogor.* (1899) 55; et ex Koord. & Valet. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xxxiii. 12.—Java.

RYTICARYUM, Becc. (Icac.).
 longifolium, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 415.—N. Guin.
 oncocarpum, K. Schum. & Lauterb. l. c. 416.—N. Guin.
 oxycarpum, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

S

SABAL, Adans. (Palm.).
 Etonia, Swingle, ex Nash, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 99.—Am. bor.

SABBATIA, Adans. (Gentian.).
 arenicola, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 569.—Mexic.
 decandra, Harper, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 432.—Am. bor.

SABIA, Colebr. (Sabiace.).
 harmandiana, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 360 B.—Cochinch.
 papuana, Warb. in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 425.—N. Guin.
 schumanniana, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 451.—China.

SABICEA, Aubl. (Rubiace.).
 arborea, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 58, descr.—Afr. trop.
 cuneata, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 47.—Bolivia.
 Dinklagei, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 423.—Afr. trop.
 floribunda, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
 speciosa, K. Schum. l. c. 429, descr.—Afr. trop.
 trigemina, K. Schum. l. c. xxviii. 59.—Afr. trop.

SABINEA, DC. (Legum.).
 punicea, Urb. *Symb. Antill.* i. 323.—Ind. occ.

SACCELLIUM, Humb. & Bonpl. (Borag.).
 Oliverii, Britton, ex Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 147.—Am. austr.

SACCHARUM, Linn. (Gramin.).
 Boga, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8854 = spontaneum.
 brevifolium, Buch.-Ham. l. c. n. 3783 B = *Perotis latifolia*.
 Casi, Buch.-Ham. l. c. n. 8854 = spontaneum.
 ciliare, Anders. in *Oeuvres. Vet.-Akad. Handl. Stockh.* (1855) 155 = arundinaceum.
 Glaza, Reinw. ex Blume, *Gew. Buitenz.* 38; ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 119 = spontaneum.

SACCHARUM :—
 grandiflorum, Walp. *Ann.* iii. 792 = *Tricholaena rosea*.
 longifolium, Munro, ex Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. 66 = *Erianthus chrysothrix*.
 Lota, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8854 = spontaneum.
 Modhara, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 120, sphalm. = *seg. Modhua*, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8855 C = fuscum.
 Moonja, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 416 = arundinaceum.
 Munja, Roxb. *Fl. Ind.* i. 246 = arundinaceum.
 Sara, Roxb. l. c. 244 = arundinaceum.
 Sarpata, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8853 D = arundinaceum.
 sphacelatum, Walp. *Ann.* iii. 793 = *Tricholaena rosea*.
 tenuius, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 8854 = spontaneum.
 tridentatum, Spreng. *Syst.* i. 233 = *Lophopogon tridentatus*.

SACCOLABIUM, Blume (Orchid.).
 abyssinicum, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* t. 81 = *Eutophia guineensis*.
 affine, King & Pantl. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 228.—Ind. or.
 Angraecum, Ridley, in *Journ. Bot.* 1898, 214.—Malaya.
 bagnoliana, F. M. Bailey, in *Queensl. Agric. Journ.* vii. 350.—N. Guin.
 coarctatum, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 592.—Burma.
 colletianum, King & Pantl. l. c.—Burma.
 cornigerum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 361.—Penins. Mal.
 cortinatum, Ridley, in *Journ. Bot.* 1898, 215.—Malaya.
 crassilabre, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 593.—Ind. or.
 crassum, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 294.—Borneo.
 fissum, Ridley, l. c. xxxii. 361.—Penins. Mal.
 flaveolum, Ridley, l. c. 360.—Penins. Mal.
 kerstingianum, Kraenzl. in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 251.—N. Guin.
 lancifolium, King & Pantl. in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 122.—Reg. Himal.
 luisifolium, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxii. 360.—Penins. Mal.
 miserum, Ridley, l. c. 359.—Penins. Mal.
 mombasense, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 132.—Afr. trop.
 oeonioides, Kraenzl. ex Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 62.—Afr. trop.
 pachygloum, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 132 (non Lindl.).—Afr. trop.
 pubescens, Ridley, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. 295.—Borneo.
 purpureum, F. G. Sm. in *Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Ins. Amboin.
 radicosum, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 285 = *Angraecum guyanianum*.
 secundiflorum, Ridley, in *Journ. Bot.* 1898, 215.—Malaya.
 undulatum, Ridley, l. c. 1900, 72.—Malaya.

SACOGLOTTIS, Mart. (Humir.).
 Uchi, Huber, in *Bol. Mus. Para.* ii. 489.—Bras.

SAGINA, Linn. (Caryophyll.).
 normaniana, Lagerh. in *Norsk. Vidensk. Selsk.* 1898, no. 1; fide K. Schum. in *Fust. Jahresb.* xxvi. i. 345.—Hybr.

SAGITTARIA, Rupp. (Alismac.).
 brevipedicellata, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 327.—Bras.
 Chapmani, Mohr, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 20.—Am. bor.
 cycloptera, Mohr, l. c.—Am. bor.
 Eatoni, F. G. Sm. in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1900, 150.—Am. bor.
 hebetiloba, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 6.—Am. bor.
 humilis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 326 (= *Echinodorus humilis*).—Afr. trop.
 Mohrii, F. G. Sm. ex Mohr, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 19.—Am. bor.
 ranunculodes, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 326 (= *Echinodorus ranunculoides*).—Eur. et Afr. bor.
 rostrata, Kuntze, l. c.—Am. bor.
 tenella, Kuntze, l. c. (= *Echinodorus tenellus*).—Am. austr.
 viscosa, Mohr, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 19.—Am. bor.

SAGOTANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. (1897) 126. *OLACACEAE*.
Kappleri, Van Tiegh. l. c. (= *Heisteria Kappleri*).—Guiana.

SAINTPAULIA, Wendl. (Gesner.).
goetzeana, Engl. in Engl. Jahrb. xviii. 481.—Afr. trop.
pusilla, Engl. l. c.—Afr. trop.

SAKERSIA, Hook. f. (Melast.).
Laurentii, Cogn. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 23.—Afr. trop.
strigosa, Cogn. l. c.—Afr. trop.

SALACIA, Linn. (Celastr.).
Blainii, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 430.—Ind. occ.
campanuloidea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 363.—Penins. Mal.
congolensis, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. 1. 16.—Afr. trop.
Demeusei, Wildem. & Th. Dur. l. c. Sér. II. i. 11.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 79.—Afr. trop.
Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 368.—Penins. Mal.
Lawsoni, King, l. c. 369.—Penins. Mal.
ovalis, Lawson, in Hook. f. Fl. Br. Ind. i. 627 = Lawsoni.
perakensis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 364.—Penins. Mal.
Schlechteri, Loesen. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 297, nomen.—Afr. trop.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 364.—Penins. Mal.
unguiculata, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 80.—Afr. trop.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 367.—Penins. Mal.

SALDANHAEA, Bureau (Bignon.).
bracteata, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. 11. 253.—Bras.
heterocalyx, Bureau & K. Schum. l. c. 254.—Bras.
pratensis, Bureau & K. Schum. l. c. 256 (= *Bignonia pratensis*).—Bras.

SALICORNIA, Tourn. (Chenopod.).
leptostachya, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iv. 143.—As. Min.
rubra, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 122.—Am. bor.
subterminalis, Parish, in Erythraea, vi. 87.—Am. bor.

SALIX, Tourn. (Salic.).
aemulans, Seemen, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxx. 28.—Am. bor.
aegitriensis, Seemen, l. c. xxi. Beibl. liii. 52.—Japon.
alaxensis, Coville, in Proc. Washington Acad. ii. 280.—Am. bor.
altobracensis, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 511.—Hybr.
amplifolia, Coville, in Proc. Washington Acad. ii. 282.—Am. bor.
atra, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 272.—Am. bor.
Balansaei, Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 44.—Cochinch.
basaltica, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 509.—Hybr.
bella, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 399.—Am. bor.
Bockii, Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 278.—China.
bolanderiana, Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 257.—Am. bor.
crateradenia, Seemen, in Engl. Jahrb. xxvii. Beibl. lxiv. 9.—Afr. trop.
cyclophylla, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 274.—Am. bor.
densifoliata, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 57.—China.
dictyoneura, Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 275.—China.
dodgeana, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 277.—Am. bor.
Fargesii, Burkill, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 528.—China.
foccosa, Burkill, l. c. 529.—China.
glandulosa, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 55.—Japon.
Henryi, Burkill, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 530.—China.

SALIX:—
heterochroma, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 56.—China.
huillensis, Seemen, l. c. xxiii. Beibl. lvii. 45.—Afr. trop.
interior, Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 253.—Am. bor.
labradorica, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 274.—Am. bor.
Lapczynskii, Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr. iii. 111.—Hybr.
lepidostachys, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 51.—Japon.
leucosericea, A. Nelson, First Rep. Fl. Wyoming, 179, nomen.—Am. bor.
Lyallii, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 580.—Am. bor.
Macounii, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 269.—Am. bor.
miyabeana, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 50.—Japon.
nigritina, Seemen, l. c. xxiii. Beibl. lvii. 46.—Afr. trop.
niphoclada, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 272.—Am. bor.
palaoneura, Rydb. l. c. 267.—Am. bor.
parishiana, Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 249.—Am. bor.
petrophila, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 268.—Am. bor.
Pringlei, Rowlee, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 136.—Mexic.
pseudolapponum, Seemen, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxx. 28.—Am. bor.
ramiflora, Seemen, l. c. xxiii. Beibl. lvii. 45.—Afr. trop.
Rosthornii, Seemen, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 276.—China.
rotundata, Rydb. ex J. M. Macoun, Fur Seals N. Pacif. iii. 571.—Am. bor.
Rydbergii, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4 = Macounii.
saximontana, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 261.—Am. bor.
Schatzii, Sagorski, in Deutsch. Bot. Monatsschr. xv. 314.—Eur.
stricta, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 273.—Am. bor.
subcoerulea, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 400.—Am. bor.
subpynostachya, Burkill, in Journ. Linn. Soc. xxvi. 532.—China.
tenerrima, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 4.—Am. bor.
Thurberi, Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 252.—Am. bor.
tonkinensis, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 53.—Tonkin.
Waghornii, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. i. 271.—Am. bor.
Warburgii, Seemen, in Engl. Jahrb. xxiii. Beibl. lvii. 43.—Formosa.
Wilmsii, Seemen, l. c. xxvii. Beibl. lxiv. 9.—Afr. austr.
Woloszczakii, Zalewski, in Allg. Bot. Zeitschr. iii. 111.—Hybr.
Woodii, Seemen, in Engl. Jahrb. xxi. Beibl. liii. 53.—Afr. austr.

SALMIA, Willd. = *Carludovica*, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
laucheana, Hort. in Gard. Chron. 1893, i. 442 = C. laucheana.

SALSOLA, Linn. (Chenopod.).
Atrani, Post, Fl. Syria, 690.—Syria.
Forskalii, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 160.—Oriens.
turcomanica, Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross. ii. 10.—Turkestan.

SALVIA, Tourn. (Labiata).
adenoclada, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 155.—Peruv.
adenophora, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 538.—Mexic.
aequidistans, Fernald, l. c. 512.—Mexic.
amplifrons, Brig. in Bull. Herb. Boiss. iv. 863.—Bolivia.
anaglypha, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 146.—N. Granat.
antennifera, Brig. l. c. 168.—Mexic.
areysiana, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 229.—Arab.

SALVIA:—
atriplicifolia, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 553.—Mexic.
avicularis, Brig. in Bull. Herb. Boiss. iv. 866.—Bolivia.
baldshuamica, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 89.—As. cent.
Battandieri, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia Battandieri*.
bella, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 169.—Am. cent.
bithynica, Brig. & Post, in Bull. Herb. Boiss. vii. 158.—Oriens.
brachyodonta, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 149.—Mexic.
Bridgesii, Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 124.—Bolivia.
calocalicina, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 159.—N. Granat.
caracasana, Brig. l. c. 147.—Venez.
Cataria, Brig. l. c. 142.—Am. cent.
caymanensis, Millsp. & Uline, ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. ii. 94.—Ind. occ.
chapelensis, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 145.—Mexic.
chariantha, Brig. in Bull. Herb. Boiss. iv. 861.—Bolivia.
Chia, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 503.—Mexic.
chiapensis, Fernald, l. c. 544.—Mexic.
chilensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia chilensis*.
cladodes, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 497.—Mexic.
coahuilensis, Fernald, l. c. 520.—Mexic.
cochabambensis, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 108.—Bolivia.
confinis, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 523.—Am. bor.
Conzatii, Fernald, l. c. 526.—Mexic.
cordobensis, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 140.—Mexic.
Coulteri, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 519.—Mexic.
cryptodonta, Fernald, l. c. 507.—Mexic.
cyclophylla, Fernald, l. c. 551.—Mexic.
Despreauxii, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia Despreauxii*.
disjuncta, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 533.—Mexic.
ecuadorensis, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 162.—Ecuador.
eichleriana, Heldr. ex Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlix. 191.—Graecia.
erythradena, Brig. in Bull. Herb. Boiss. iv. 853.—Bolivia.
firma, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 502.—Mexic.
flaccida, Fernald, l. c. 509.—Am. trop.
Fleckii, Guerke, in Bull. Herb. Boiss. vi. 551.—Afr. austr.
fluviatilis, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 516.—Mexic.
fruticosa, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia fruticosa*.
Funkii, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 174.—Venez.
galinsogifolia, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 498.—Mexic.
gasterantha, Brig. in Bull. Herb. Boiss. iv. 858.—Urug.
Ghiesbreghtii, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 511.—Mexic.
Goldmanii, Fernald, l. c. 527.—Mexic.
Gonzalezii, Fernald, l. c. 524.—Mexic.
guadalajarensis, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 132.—Mexic.
heterotricha, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 500.—Mexic.
Hochstetteri, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 459.—Afr. trop.
hypoglaucua, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 136.—Mexic.
iodantha, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 547.—Mexic.
iodochroa, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 161.—Am. cent.
irazuensis, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxv. 540.—Am. cent.
Isabellei, Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 153.—Bras.
jaliscana, Brig. l. c. 141.—Mexic.

SALVIA :—

- jamaicensis, *Fawcett, in Urb. Symb. Antill.* i. 396.—Ind. occ.
- Jurgensenii, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 144.—Mexic.
- kuntzeana, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 859.—Bolivia.
- Labillardieri, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia Labillardieri*.
- lachnaioclada, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 154.—Ind. occ.
- laterifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 494.—Mexic.
- leucocalyx, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 165.—N. Granat.
- lindeniana, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia lindeniana*.
- longemarginata, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 127.—Venez.
- lophanthoides, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 499.—Mexic.
- lupulina, *Fernald, l. c.* 542.—Mexic.
- mandarinorum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 557.—China.
- Mathewsii, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia Matthewsii*.
- mazatlanensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 515.—Mexic.
- melanocalyx, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 862.—Reg. Argent.
- mentiformis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 510.—Am. cent.
- melchiana, *Brig. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 10.—Parag.
- michoacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 548.—Mexic.
- minarum, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 855.—Bras.
- miniata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 545.—Mexic.
- monclovensis, *Fernald, l. c.* 514.—Mexic.
- monochila, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 13.—Am. cent.
- multiramea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 525.—Mexic.
- muscaroides, *Fernald, l. c.* 506.—Mexic.
- Nelsonii, *Fernald, l. c.* 527.—Mexic.
- neo-hispanica, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 137.—hispanica.
- neurepia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 535.—Mexic.
- nitidula, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 152.—Bras.
- oaxacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 536.—Mexic.
- oreopola, *Fernald, l. c.* 517.—Mexic.
- oresbia, *Fernald, l. c.* 536.—Mexic.
- orizabensis, *Fernald, l. c.* 538.—Mexic.
- ourophylla, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 126.—Am. cent.
- oxyphora, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 864.—Bolivia.
- pansamalensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 249.—Am. cent.
- pavoniana, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia pavoniana*.
- perlonga, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 546.—Mexic.
- permixta, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 129.—Am. cent.
- phaenostemma, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 13.—Am. cent.
- platyphylla, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 150.—Mexic.
- podadena, *Brig. l. c.* 131.—Mexic.
- populifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 530.—Mexic.
- pruinosa, *Fernald, l. c.* 526.—Mexic.
- prunifolia, *Fernald, l. c.* 518.—Mexic.
- pseudoavicularis, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 867.—Bolivia.
- pteroura, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 139.—Am. cent.
- puberula, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 539.—Mexic.
- pusilla, *Fernald, l. c.* 495.—Mexic.
- pygmaea, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xi. 70.—Ins. Luchu.
- ramosissima, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 521.—Am. bor.
- retinervia, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 857.—Bolivia.

SALVIA :—

- roscida, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 517.—Mexic.
- Rosei, *Fernald, l. c.* 548.—Mexic.
- rypara, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 850.—Bolivia.
- saltuensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 497.—Mexic.
- savannarum, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 164.—N. Granat.
- Schaffneri, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 535.—Mexic.
- schiedeana, *Stapf, in Kew Bull.* 1896, 19.—Am. austr.
- Seemannii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 516.—Mexic.
- serpyllifolia, *Fernald, l. c.* 521.—Mexic.
- setosa, *Fernald, l. c.* 493.—Mexic.
- similata, *Hauskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xi.* 36.—Graecia.
- sinaloensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 502.—Mexic.
- siphonantha, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 172.—Ecuador.
- sophrona, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 854.—Bolivia.
- Sprucei, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 171.—Ecuador.
- tartanarivensis, *Brig. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 273, sphalm. = *tanarivensis*.
- Tatei, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 135.—Mexic.
- taxifolia, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 389, sphalm. = *Satureia taxifolia*.
- Teresae, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 506.—Mexic.
- tiraquensis, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 851.—Bolivia.
- Tonduzii, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 157.—Am. cent.
- tovariensis, *Brig. l. c.* 130.—Venez.
- trichandra, *Brig. l. c.* 133.—Mexic.
- truxillensis, *Brig. l. c.* 167.—Venez.
- unicostata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 501.—Mexic.
- urophylla, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 388, sphalm. = *ourophylla*.
- venosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 545.—Mexic.
- villosa, *Fernald, l. c.* 518.—Mexic.
- Woodii, *Guerbe, in Engl. Jahrb.* xxvi. 76.—Afr. austr.
- Wunschmanni, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 397.—Ind. occ.
- yunnanensis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 164.—China.
- zacualpanensis, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 166.—Mexic.
- SALVIACANTHUS**, Lindau = *Justicia*, Houst. (Acanth.).
Preussii, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xx. 75 = *J. Preussii*.
- SALVIASTRUM**, Scheele (Labi.).
Engelmannii, *Brig. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 286 (= *Salvia Engelmannii*, A. Gr.).—Am. bor.
- SAMADERA**, Gaertn. (Simarub.).
baileyana, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2450.—Austral.
Bidwillii, *Oliver, l. c.* t. 2449.—Austral.
Harmandii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. iv. 210.—Malaya.
mekongensis, *Engl. l. c.*—Malaya.
- SAMBUCUS**, Tourn. (Caprifol.).
leiosperma, *Leiberg, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xi. 40.—Am. bor.
neomexicana, *Wootton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 309.—Am. bor.
oreopola, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 146.—Am. cent.
sylvestris, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 329 = *racemosa*.
- SAMOLUS**, Tourn. (Primul.).
cuneatus, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 491.—Am. bor.
- SAMYDA**, Linn. (Samyd.).
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 199.—Mexic.
- SANCHEZIA**, Ruiz & Pav. (Acanth.).
peruviana, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 103.—Peruv.
Sprucei, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 648.—Peruv.

SANDORICUM, Cav. (Meliac.).

- Harmandii*, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 353 B.—Cochinch.
- SANGUISORBA**, Rupp. = *Poterium*, Linn. (Rosac.).
mediterranea, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 586 = *P. verrucosum*.
- SANICULA**, Tourn. (Umbell.).
arguta, *Greene, ex Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 36.—Am. bor.
floridana, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 581.—Am. bor.
rugulosa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 491.—China.
Smallii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 578.—Am. bor.

SANSEVIERIA, Thunb. (Haemodor.).

- grandicuspis*, *Haw. Syn. Pl. Succ.* 67.—Afr. trop.
roxburghiana, *Schult. f. Syst.* vii. 357 = *zeylanica*.
Schimperi, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 335.—Afr. trop.
sulcata, *Bojer, ex Baker, in Journ. Linn. Soc.* xiv. 549.—Afr. trop.
zeylanica, *Willd. Sp. Pl.* ii. 159.—Zeylan.

SANTIA, Savi = *Polypogon*, Desf. (Gramin.).

- elongata*, *Parl. ex Webb & Berth. Phyt. Canar.* iii. 393 = *P. littoralis*.
littoralis, *Druce, Fl. Berks*, 563 = *P. littoralis*.

SANTIRIA, Blume (Burser.).

- lineistipula*, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 379.—N. Guin.

SANTIRIDIUM, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1282. BURSERACEAE.**SANTIRIOPSIS**, Engl. (Burser.).

- Ebo*, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1281.—Afr. trop.
klaianeana, *Pierre, l. c.* 1282.—Afr. trop.
obovata, *Pierre, l. c.* 1281.—Afr. trop.

SAPIUM, P. Br. (Euphorb.).

- africanum*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 293 = *Excoecaria africana*.
Bodenbenderi, *Kuntze, l. c.* 292.—Reg. Argent.
cochinchinense, *Kuntze, l. c.* 293 = *Excoecaria cochinchinensis*.
guineense, *Kuntze, l. c.* = *Excoecaria guineensis*.
Jenmanni, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2649.—Guiana.
mannianum, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 986 (= *Excoecaria manniana*).—Afr. trop.
paucinervium, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2648.—Guiana.
Simii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 293.—Afr. austr.
verum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2647.—N. Granat.

SAPONARIA, Linn. (Caryophyll.).

- cyprica*, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 755 = *cypria*.
Dalmasi, *Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 289.—Lycia.
dichotoma, *Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 120.—Turkestan.
Wiemanni, *Fritsch, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 2.—Hybr.

SAPRANTHUS, Seem. = *Porocelia*, Ruiz & Pav.

- (Anonac.).
microcarpus, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5, 12 = *P. microcarpa*.

SAPROSMA, Blume (Rubiac.).

- buxifolia*, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1899, 101.—N. Guin.
nativitatis, *Baker f. in Andrews, Monog. Christmas Isl.* 180.—Ins. Christm.
novo-guineense, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 586.—N. Guin.

SARACA, Linn. (Legum.).

- biglandulosa*, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 387 A.—Cochinch.
bijuga, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 214.—Penins. Mal.
dives, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 386 B.—Cochinch.
griffithiana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 491.—Burma.
harmandiana, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 387 B.—Cochinch.
Hullettii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 492.—Borneo.
Kunstleri, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 213.—Penins. Mal.
latistipulata, *Prain, ex King, l. c.* 217.—Penins. Mal.
thaipingensis, *Cantley, ex King, l. c.* 211.—Penins. Mal.

SARANTHE, Eichl. = *Myrosma*, Linn. f. (Scitam.).
madagascariensis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzent. Nachtr. i. 96 = M. unilaterale.

SARCANTHUS, Lindl. (Orchid.).
bambusarum, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 123.—Reg. Himal.
bracteatus, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 370.—Penins. Mal.
castaneus, Ridley, l. c. 369.—Penins. Mal.
halophilus, Ridley, l. c. 367.—Malaya.
hongkongensis, Rolfe, in Kew Bull. 1898, 198.—China.
Kunstleri, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvii. 594.—Penins. Mal.
pendulus, Klinge, in Act. Hort. Petrop. xvii. i. 141.—Java.
pensilis, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 369.—Penins. Mal.
rolfeanus, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvii. 594.—Burma.
rostellatus, Ridley, in Journ. Bot. 1900, 72.—Malaya.
sacculatus, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 368.—Penins. Mal.
sagittatus, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxvii. 595.—Reg. Himal.

SARCOCAULON, Sweet (Geran.).
mossamedense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 108 (= *Monsonia mossamedensis*).—Afr. trop.
spinosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 33 = Burmanni.

SARCOCEPHALUS, Afzel. (Rubiaceae).
hirsutus, Havil. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 32.—Malaya.
Maingayi, Havil. l. c. 33 (= *Nauclea Maingayi*).—Malaya.
missionis, Havil. l. c. 32 (= *Nauclea missionis*).—Ind. or. pacificus, Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 684.—Ins. Samoa.
parvus, Havil. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 31.—Borneo.
richardianus, Baill. Adansonia, xii. 312 (= *Breonia richardiana*).—Madag.
tenuiflorus, Havil. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. 32.—N. Guin.

SARCOCHILUS, R. Br. (Orchid.).
adnatus, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 373.—Penins. Mal.
bimaculatus, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 340.—Reg. Himal.
biserratus, Ridley, in Journ. Bot. 1900, 78.—Malaya.
carnosus, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 338.—Penins. Mal.
crepidiformis, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 340.—Reg. Himal.
englerianum, Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 252.—N. Guin.
hainanensis, Rolfe, Kew Hand-List Orch. ed. I. 201; Hook. f. Bot. Mag. t. 7489.—China.
pygmaeum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 207.—Ind. or.
sigmoideus, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 298.—Borneo.
Vriesii, Ridley, l. c. 297.—Borneo.

SARCOCOLLA, Linn. (Panaeae).
Sarcocolla, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 281 = squamosa.

SARCOGONUM, G. Don = *Muehlenbeckia*, Meissn. (Polygon.).
chilensis, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 128 = M. chilensis.
tamnifolium, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 111 = M. tamnifolia.

SARCOLOBUS, R. Br. (Asclep.).
multiflorus, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 509.—N. Guin.

SARCOMELICOPE, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iii. iv. 122 (1896). **RUTACEAE**.
sarcococca, Engl. l. c. (= *Evodia sarcococca*).—N. Caled.

SARCOMPHALUS, P. Br. (Rhamn.).
domingensis, Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill. i. 357 (= *Cassine domingensis*).—Ind. occ.
reticulatus, Urb. l. c. (= *Zisypus reticulata*).—Ind. occ.

SARCOSTEMMA, R. Br. (Asclep.).
andongense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 689.—Afr. trop.

Glaziovii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. 19.—Bras.
Welwitschii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 689.—Afr. trop.

SARCOSTIGMA, Wight & Arn. (Olac.).
angustifolia, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1320.—Afr. trop.
paniculata, Pierre, l. c. 1319.—Afr. trop.

SARMASIKIA, Bub. Fl. Pyren. i. (1897) 550 = *Cynanchum*, Linn. (Asclep.).
Dondonaei, Bub. l. c. = C. acutum.
Gesneri, Bub. l. c. = C. acutum.

SATANOCRATER, Schweinf. (Acanth.).
fruticulosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzent. Nachtr. i. 305 = *Phillipsia fruticulosa*.
paradoxa, Lindau, l. c. = somalensis.
Ruspolii, Lindau, l. c. = fellatensis.
somalensis, Lindau, l. c.—Afr. trop.

SATUREIA, Linn. (Labiata).
abyssinica, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 301 (= *Micromeria abyssinica*).—Afr. trop.
acutifolia, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia acutifolia*).—Peruv.
annua, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha annua*).—Rossia.
argentea, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia argentea*).—Peruv.
arkansana, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha Nuttallii*).—Am. bor.
atheniensis, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 192.—Hybr.
baborensis, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 301 (= *Calamintha baborensis*).—Afr. bor.
Battandieri, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 186 (= *Micromeria Fontanesii*).—Afr. bor.
Bentharii, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 299 (= *Micromeria Bentharii*).—Ins. Canar.
betulaefolia, Briq. l. c. 301 (= *Calamintha betulifolia*).—Cilicia.
biflora, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria biflora*).—Ind. or.; Arab.; Afr. trop.
Boissieri, Briq. l. c. 302.—Hybr.
boliviana, Briq. l. c. 300 (= *Micromeria boliviana*).—Bolivia.
bonariensis, Briq. l. c. (= *Micromeria bonariensis*).—Reg. Argent.
bourgaeana, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria bourgaeana*).—Ins. Canar.
breviflora, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia breviflora*).—Peruv.
Brownii, Briq. l. c. (= *Micromeria Brownei*).—Am. bor. et austr.
Buchii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 186 (= *Micromeria Buchii*).—Ins. Canar.
candidissima, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 302 (= *Calamintha candidissima*).—Afr. bor.
capitellata, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria capitellata*).—Ind. or.
caroliniana, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha caroliniana*).—Am. bor.
chilensis, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 191 (= *Gardoquia Gilliesii*).—Chili.
chinensis, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 302 (= *Calamintha chinensis*).—China.
congesta, Briq. l. c. 301 (= *Micromeria congesta*).—As. Min.
cremno-phila, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria cremno-phila*).—Graecia.
cretica, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha cretica*).—Ins. Creta.
croatica, Briq. l. c. (= *Micromeria croatica*).—Croatia.
cymuligera, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria cymuligera*).—As. Min.
Darwinii, Briq. l. c. 300 (= *Micromeria Darwinii*).—Patag.
debilis, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha debilis*).—Sibir.
densiflora, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria densiflora*).—Ins. Canar.
dentata, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha dentata*).—Am. bor.
depauperata, Briq. l. c. 299 (= *Calamintha depauperata*).—Persia.

SATUREIA :—
Despreauxii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 186.—Ins. Canar.
discolor, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 300 (= *Gardoquia discolor*).—N. Granat.
Douglasii, Briq. l. c. 300 (= *Micromeria Douglasii*).—Am. bor.
Edmondi, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 186 = longiflora.
elegans, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 300 (= *Gardoquia elegans*).—Peruv.
elliptica, Briq. l. c. (= *Gardoquia elliptica*).—Peruv.
elliptica, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria elliptica*).—Armenia.
fasciculata, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia fasciculata*).—N. Granat.
flagellaris, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria flagellaris*).—Madag.
florida, Briq. l. c. (= *Calamintha florida*).—As. Min.
foliolosa, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia foliolosa*).—N. Granat.
Fontanesii, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria inodora*).—Afr. bor.
Forbesii, Briq. l. c. (= *Micromeria Forbesii*).—Ins. Cap. Virid.
friwaldskyana, Briq. l. c. 301.—Europ.
fruticosa, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 192 (= *Micromeria marifolia*).—Eur. austr.
Gilliesii, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 300 (= *Gardoquia Gilliesii*).—Chili.
Gilliesii, Briq. l. c. 380 = oligantha.
glabella, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha glabella*).—Am. bor.
glabrata, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia glabrata*).—Ecuador.
Hausknechtii, Briq. l. c. 299 (= *Calamintha Hausknechtii*).—Persia.
helianthemifolia, Briq. l. c. (= *Micromeria helianthemifolia*).—Ins. Canar.
herpyllomorpha, Briq. l. c. (= *Micromeria herpyllomorpha*).—Ins. Canar.
hispidula, Briq. l. c. 303 (= *Calamintha hispidula*).—Hispan.
Hydaspidis, Briq. l. c. 301 (= *Micromeria Hydaspidis*).—Reg. Himal.
hyssopifolia, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 186 (= *Micromeria varia*).—Ins. Canar.
imbricata, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 299 (= *Thymus imbricatus*).—Arab.
incana, Briq. l. c. 301 (= *Calamintha incana*).—Graecia.
Jamesoni, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia Jamesoni*).—Peruv.
julianoides, Briq. l. c. 299.—Ins. Canar.
Kunthii, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia grandiflora*).—Ecuador.
kuntzeana, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 874.—Bolivia.
Labillardieri, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 187.—Syria.
lachnophylla, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 299 (= *Micromeria lachnophylla*).—Ins. Canar.
laxifolia, Briq. l. c. 300, sphalm. = taxifolia.
lepida, Briq. l. c. 299 (= *Micromeria lepida*).—Ins. Canar.
libanotica, Briq. l. c. 301 (= *Micromeria libanotica*).—Syria.
lindeniana, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 191.—N. Granat.
macedonica, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvii. 186.—Eur.
macrostema, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 302 (= *Calamintha macrostema*).—Mexic.
maritima, Briq. l. c. 303 (= *Calamintha maritima*).—Thracia.
Matthewsii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 189.—Peruv.
mexicana, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzent. iv. III A. 300 (= *Gardoquia mexicana*).—Mexic.
micromerioides, Briq. l. c. (= *Gardoquia micromerioides*).—Mexic.
microphylla, Briq. l. c. (= *Gardoquia microphylla*).—Ecuador.
mimuloides, Briq. l. c. 302 (= *Calamintha mimuloides*).—Calif.
multiflora, Briq. l. c. 300 (= *Gardoquia multiflora*).—Chili.
nivea, Briq. l. c. 299 (= *Calamintha nivea*).—As. Min.

SATUREIA :—

- nubigena, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 300* (= *Micromeria nubigena*).—Peruv.
 nummularifolia, *Briq. l. c. 301* (= *Micromeria nummularifolia*).—Syria.
 obovata, *Briq. l. c. 300* (= *Gardoquia obovata*).—Peruv.
 oligantha, *Briq. l. c. 380* (= *Micromeria Gilliesii*).—Chili.
 originifolia, *Briq. l. c. 299* (= *Calamintha originifolia*).—As. Min.
 Palmeri, *Briq. l. c. 303* (= *Calamintha Palmeri*).—Calif.
 pamphylica, *Briq. l. c. 301* (= *Calamintha pamphylica*).—As. Min.
 pavoniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 189* (= *Gardoquia incana*).—Ecuador.
 Perezii, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 299* (= *Micromeria Perezii*).—Ins. Canar.
 persica, *Briq. l. c.* (= *Micromeria persica*).—Persia.
 piperita, *Briq. l. c. 302* (= *Calamintha longicaulis*).—Reg. Himal.
 poliodes, *Briq. l. c. 299* (= *Micromeria polioides*).—Ins. Canar.
 Pomelli, *Briq. l. c. 302* (= *Calamintha nervosa*).—Afr. bor.
 pulchella, *Briq. l. c. 300* (= *Gardoquia pulchella*).—Ecuador.
 Pulegium, *Briq. l. c. 301* (= *Micromeria Pulegium*).—Banat.
 punctata, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *Micromeria biflora*.
 purpurea, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 300* (= *Micromeria purpurea*).—Calif.
 revoluta, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia revoluta*).—Peruv.
 rotundifolia, *Briq. l. c. 302* (= *Calamintha graveolens*).—Reg. Medit.
 rouyana, *Briq. l. c. 301*.—Ins. Balear.
 rugosa, *Briq. l. c. 300* (= *Gardoquia rugosa*).—Peruv.
 sericea, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia sericea*).—Peruv.
 serpyllifolia, *Briq. l. c. 301* (= *Micromeria serpyllifolia*, Boiss.).—Graecia.
 simensis, *Briq. l. c. 303* (= *Calamintha simensis*).—Afr. trop.
 sinaica, *Briq. l. c. 299* (= *Micromeria sinaica*).—Arab.
 Skorpili, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss. 1899, 6*.—Eur.
 staminea, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 299* (= *Calamintha staminea*).—Kurdistan.
 stolonifera, *Briq. l. c. 300* (= *Micromeria stolonifera*).—Mexic.
 striata, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia striata*).—Peruv.
 taxifolia, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 192* (= *Gardoquia taxifolia*).—N. Granat.
 Teneriffae, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 299* (= *Micromeria Teneriffae*).—Ins. Teneriff.
 tenuis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxvii. 185*.—Eur.
 teydensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 299* (= *Micromeria teydensis*).—Ins. Canar.
 thymifolia, *Briq. l. c. 302* (= *Calamintha thymifolia*).—Carniola.
 thymoides, *Briq. l. c. 300* (= *Gardoquia thymoides*).—Ecuador.
 tomentosa, *Briq. l. c.* (= *Gardoquia tomentosa*).—Ecuador.
 vulgaris, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr. 477* (= *Calamintha Clinopodium*).—Reg. bor. temp.
 xalapensis, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 300* (= *Micromeria Brownei*).—Am. bor. et austr.

SATYRIUM, Linn. (Orchid.).

- anomalum, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 424*.—Afr. trop.
 aphyllum, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
 Baronii, *Schlechter, l. c. 423*.—Madag.
 beyrichianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 508*.—Afr. austr.
 breve, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 274*.—Afr. trop.
 Buchanani, *Rolfe, l. c. 270* = speciosum.
 Buchanani, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 422*.—Afr. trop.
 Carsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 265*.—Afr. trop.
 cheirophorum, *Rolfe, l. c.*—Afr. trop.
 densum, *Rolfe, l. c. 270*.—Afr. trop.
 elongatum, *Rolfe, l. c. 268*.—Afr. trop.

SATYRIUM :—

- fischerianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 507*.—Afr. trop.
 goetzenianum, *Kraenzl. l. c. 506*.—Afr. trop.
 Johnsoni, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 265*.—Afr. trop.
 Kirkii, *Rolfe, l. c. 271*.—Afr. trop.
 Kraenzlini, *Rolfe, l. c. 269*.—Afr. trop.
 longissimum, *Rolfe, l. c. 267*.—Afr. trop.
 mechowianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xvii. 65* = Schinzii.
 Mechowii, *Reichb. f. in Flora, 1882, 581*.—Afr. trop.
 minax, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 268*.—Afr. trop.
 monopetalum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 504*.—Afr. austr.
 mystacinum, *Kraenzl. l. c. 506*.—Afr. trop.
 nutans, *Kraenzl. l. c. 507*.—Afr. austr.
 Nuttii, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 273*.—Afr. trop.
 nyassense, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxviii. 178*.—Afr. trop.
 occultum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 273*.—Afr. trop.
 orbiculare, *Rolfe, l. c. 266*.—Afr. trop.
 outeniquense, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 421*.—Afr. austr.
 paludicolum, *Schlechter, ex Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 669*.—Afr. austr.
 pentadactylum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 506*.—Afr. austr.
 rupestre, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 422*.—Afr. austr.
 sacculatum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 266*.—Afr. trop.
 Schinzii, *Th. Dur. & Kraenzl. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 696*.—Afr. trop.
 setchuenicum, *Kraenzl. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 266*.—China.
 shirensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 266*.—Afr. trop.
 speciosum, *Rolfe, l. c. 574*.—Afr. trop.
 tenuifolium, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 505*.—Afr. austr.
 trachypetalum, *Kraenzl. l. c.*—Afr. trop.
 trachyphyllum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. 1. 338, sphalm. = praec.
 triphyllum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 504*.—Afr. austr.
 Volkensii, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 425*.—Afr. trop.
 wilmsianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxiv. 505*.—Afr. austr.
 zombense, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 273*.—Afr. trop.

SAULCYA, Michon = *Odontospermum*, Neck (Compos.).
hierochuntica, Michon, Voy. Relig. Or. ii. 383 = *O. pygmaeum*.

SAURANIA, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. (1899) 499, sphalm. = seq.

SAURAUJA, Willd. (Ternstroem.).

- andreaana, *F. M. Bailey, Queensl. Fl. 106*.—Austral.
 costaricensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas. xxiii. 236*.—Am. cent.
 hoeveniana, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 643*.—Celebes.
 Klinkii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 447*.—N. Guin.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 643*.—Celebes.
 Pittieri, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas. xxiii. 237*.—Am. cent.
 ramiflora, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 278*.—Java.
 Rodatzii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 446*.—N. Guin.
 rosea, *K. Schum. & Lauterb. l. c. (non Jungh.)*.—N. Guin.
 rufa, *Burkill, in Kew Bull. 1899, 97*.—N. Guin.
 Schwazii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 644*.—Celebes.
 squamulosa, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xvi. 268*.—Java.
 trichocalyx, *Koord. & Valet. l. c. 262*.—Java.
 umbellata, *Koord. & Valet. l. c. 256*.—Java.

SAURAUJA :—

- Warburgii, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 644*.—Celebes.
 Waworoentii, *Koord. l. c.*—Celebes.
 Wigmanni, *Koord. l. c.*—Celebes.
 Yasicae, *Loes. in Engl. Jahrb. xxiii. 125*.—Am. cent.

SAUSSUREA, DC. (Compos.).

- brachycephala, *Franch. in Bull. Herb. Boiss. v. 540*.—Japon.
 cinerea, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1897, 324*.—Tibet.
 compta, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 422*.—China.
 dutaillyana, *Franch. l. c. 421*.—China.
 Fauriei, *Franch. in Bull. Herb. Boiss. v. 542*.—Japon.
 hiusiana, *Franch. l. c.* = nipponica.
 lingulata, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 423*.—China.
 masarica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 81*.—As. cent.
 mongolica, *Franch. in Bull. Herb. Boiss. v. 539*.—China.
 oligantha, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 421*.—China.
 Reintii, *Franch. in Bull. Herb. Boiss. v. 539* = scaposa.
 Sagitta, *Franch. l. c. 540*.—Japon.
 spinulifera, *Franch. l. c. 538*.—Japon.
 Wellbyi, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2588*.—Tibet.

SAUVAGESIA, Linn. (Violac.).

- congoensis, *Engl. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped. 301*, nomen.—Afr. trop.

SAVASTANA, Schrank = *Hieracium*, S. G. Gmel. (Gramin.).

- Nashii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 104*.—Am. bor.

SAXIFRAGA, Tourn. (Saxifr.).

- alba, *Bub. Fl. Pyren. ii. 688* = granulata.
 albowiana, *Kurtz, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata, vii. 370*.—Fuegia.
 apetalata, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 393*.—Am. bor.
 aprica, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 25*.—Am. bor.
 aquatica, *Bub. Fl. Pyren. ii. 679* = adscendens.
 austromontana, *Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 389*.—Am. bor.
 chamaepityfolia, *Bub. Fl. Pyren. ii. 679* = ajugifolia.
 chionophila, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 265*.—China.
 claytoniaefolia, *Canby, ex Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 365*.—Am. bor.
 cognata, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gas. xxx. 118*.—Am. bor.
 columbiana, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 393*.—Am. bor.
 Cordi, *Bub. Fl. Pyren. ii. 665* = S. Aizoon.
 Duthiei, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 419*.—Reg. Himal.
 Fagonii, *Bub. Fl. Pyren. ii. 678* = mixta.
 fallax, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 25*.—Am. bor.
 Fauriei, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. v. 687*.—Japon.
 fragosa, *Suksd. ex Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 363*.—Am. bor.
 gemmiger, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 366*.—China.
 gemmipara, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 262*.—China.
 giraladiana, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 365*.—China.
 Grisebachii, *Degen & Doerfl. in Denkschr. Acad. Wiss. Wien, lxiv. 721*.—Eur.
 Hervieri, *Debeaux, in Baenitz, Herb. Eur. 1897, 6*.—Eur.
 hypericoides, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 261*.—China.
 idahoensis, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 394*.—Am. bor.
 japonica, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. v. 687*.—Japon.
 Josephi, *Engl. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 366*.—China.
 likiangensis, *Franch. in Journ. de Bot. 1896, 266*.—China.
 melanocentra, *Franch. l. c. 263*.—China.

SAXIFRAGA :—

- montanensis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 367.—Am. bor.
 napensis, *Small, l. c.* 1898, 316.—Am. bor.
 Nuttallii, *Small, l. c.* 1896, 368.—Am. bor.
 occidentalis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 674 = *S. Geum*.
 oreophila, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 260.—China.
 parvifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 116.—Am. bor.
 phaenophylla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 261.—China.
 plantaginea, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 366.—Am. bor.
 radulina, *Greene, Pittonia*, iii. 308.—Am. bor.
 rhomboida, *Greene, l. c.* 343.—Am. bor.
 rupicola, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 264.—China.
 Rydbergii, *Small, ex Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 194.—Am. bor.
 saximontana, *E. Nelson, in Erythea*, vii. 168.—Am. bor.
 Sierrae, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 366 = oregana.
 subapetala, *E. Nelson, in Erythea*, vii. 169.—Am. bor.
 tennesseensis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 364.—Am. bor.
 umbellulata, *Greene, Erythea*, i. 222 = aprica.
 Van-bruntiae, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 316.—Am. bor.

- SAXIFRAGOPSIS**, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 19. **SAXIFRAGACEAE**.
 fragarioides, *Small, l. c.* 20 (= *Saxifraga fragarioides*).—Calif.

SCABIOSA, *Tourn. (Dipsac.)*.

- calcareo, *Toel. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* xxvii. 9.—Eur.
 cyprica, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 757.—Ins. Cyprus.
 fruticulosa, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 136.—Eur.

SCAEVOLA, *Linn. (Gooden.)*.

- laciniata, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 910.—Austral.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 628.—Celebes.
 similis, *Hemsl. in Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.

- SCALIGERIA**, *DC. = Conopodium, Koch (Umbell.)*.
 allioides, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. viii. 166 = *C. allioides*.
 assyriaca, *Frey, in Borrm. in Bull. Herb. Boiss.* v. 611.—As. Min.
 multijuga, *Borrm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xlviii. 592.—Syria.

SCAPHOPETALUM, *Mast. (Stercul.)*.

- monophysca, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 241.—Afr. trop.
 stipulosum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
 Thonneri, *Wildem. in Bull. Herb. Boiss.* v. 523.—Afr. trop.
 Zenkeri, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 241.—Afr. trop.

- SCAPHYGLOTTIS**, *Poepp. & Endl. (Orchid.)*.
 prolifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 15 (= *Ponera prolifera*).—Bras.

SCHAUERIA, *Nees (Acanth.)*.

- populifolia, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 242.—Afr. trop.

- SCHEDONORUS**, *Beauv. = Festuca, Linn. (Gramin.)*.
 transparentis, *Munro, ex Stapf, in Hook. f. Fl. Brit.* Ind. vii. 355 = *F. sibirica*.

SCHEELEA, *Karst. (Palm.)*.

- anizitziana, *Barb. Rodr. Palm. Matogross.* 63.—Bras.
 kewensis, *Hook. f. Bot. Mag.* tt. 7552-3.—Am. trop.
 quadrisperma, *Barb. Rodr. Palm. Nov. Parag.* 23.—Parag.

SCHIFFLERA, *Forst. (Aral.)*.

- Fargesii, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 486 (= *Heptapleurum Fargesii*).—China.
 Goetzenii, *Harms, in Goetsen, Durch Afr.* repr. 7.—Afr. trop.
 humblotiana, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 3.—Madag.

SCHIFFLERA :—

- megalobotrya, *Harms, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 486.—China.
 myriantha, *Drake, in Journ. de Bot.* 1897, 3 (= *Cussonia myriantha*).—Madag.
 revoluta, *Drake, l. c.* 4.—Ins. Maurit.
 Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 243.—Afr. trop.

- SCHIFFLERODENDRON**, *Harms, ex Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. (1900) 84, nomen. **LEGUMINOSAE**.
 usambarense, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

- SCHICKENDANTZIA**, *Speg. Pl. Nov. Argent.* iii. (1897) 7. **LILLIACEAE**.
 trichosepala, *Speg. l. c.*—Reg. Argent.

SCHIMA, *Reinw. (Ternstroem.)*.

- argentea, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 473.—China.

- SCHIMMELIA**, *Holmes, in Pharmac. Journ. Lond.* lxii. (1899) 53. **RUTACEAE**.
 oleifera, *Holmes, l. c.* (= *Amyris balsamifera*).—Ind. occ.

- SCHINOCARPUS**, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 360, sphalm. = *Selinocarpus*, *A. Gray (Nyctag.)*.

- SCHISMATOGLOTTIS**, *Zoll. & Mor. (Arac.)*.
 celebica, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 19.—Celebes.
 trivittata, *Hallier, in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 324.—Malaya.
 warburgiana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 20.—Ins. Philipp.
 zonata, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitenz.* xiii. 323.—Malaya.

SCHISMUS, *Beauv. (Gramin.)*.

- aristulatus, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 695.—Afr. austr.
 brevifolius, *Nees, Fl. Austr.* 422 = fasciculatus.
 calycinus, *Duval-Jouve, in Billot, Adnot.* 285 = fasciculatus.
 fasciculatus, *Beauv. Agrost.* 74, 177.—Afr. austr.
 koelerioides, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 694.—Afr. austr.
 marginatus, *Beauv. Agrost.* 177, t. 15 = fasciculatus.
 tenuis, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 295 = fasciculatus.

SCHISTOCARPHA, *Less. (Compos.)*.

- eupatorioides, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 63.—Ecuador.
 Hoffmannii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 170.—Bolivia.

SCHISTOGYNE, *Hook. & Arn. (Asclep.)*.

- attenuata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 77.—Bolivia.

SCHISTOSTEPHIUM, *Less. (Compos.)*.

- artemisiaefolium, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 270.—Afr. trop.
 microcephalum, *Baker, l. c.*—Afr. trop.

SCHIZANDRA, *Michx. (Magnol.)*.

- glaucescens, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 323.—China.

SCHIZANTHUS, *Ruiz & Pav. (Solan.)*.

- San Romani, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 126.—Chili.

SCHIZOCARPUM, *Schrad. (Cucurb.)*.

- attenuatum, *Cogn. & Rose, ex Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 124.—Mexic.

SCHIZOCASIA, *Schott (Arac.)*.

- lauterbachiana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxv. 26.—N. Guin.

SCHIZODIUM, *Lindl. = Disa, Berg. (Orchid.)*.

- antenniferum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 426.—Afr. austr.

SCHIZOGLOSSUM, *E. Mey. (Asclep.)*.

- angolense, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 98.—Afr. trop.
 biflorum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 449 = venustum.
 delagoense, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 446.—Afr. austr.
 exile, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 4 (= *Lagarinthus exile*).—Afr. austr.
 fusco-purpureum, *Schlechter & Rendle, in Journ. Bot.* 1896, 98.—Afr. trop.

SCHIZOGLOSSUM :—

- Goetzei, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 455.—Afr. trop.
 lividiflorum, *K. Schum. l. c.* 454.—Afr. trop.
 togoense, *K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 308, nomen.—Afr. trop.
 viridulum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 455.—Afr. trop.

SCHIZONEPETA, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 235 (1896). **LABIATAE**.

- botryoides, *Briq. l. c.* (= *Nepeta botryoides*).—Reg. Himal.
 tenuifolia, *Briq. l. c.* (= *Nepeta tenuifolia*).—China.

SCHIZOPETALON, *Sims (Crucif.)*.

- fuegianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 48.—Fuegia.

SCHIZOSTACHYUM, *Nees (Gramin.)*.

- aciculare, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 117.—Ind. or.
 aviculare, *Auct. in Just, Jahresb.* xxiv. II. 391, sphalm. = praec.
 chilianthum, *Kurb. in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. 88 (= *Chloothamnus chilianthus*).—Sumatra.
 Copelandi, *F. Muell. & Hack. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 241.—N. Guin.
 latifolium, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 117.—Ind. or.
 tenue, *Gamble, l. c.* 114.—Ind. or.

SCHIZOTHECA, *Ehrenb. = Thalassia, Soland. (Hydroch.)*.

- Hemprichii, *Ehrenb. in Abh. Akad. Berl.* i. (1832) 429; et ex *Solms, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 194 = *T. Hemprichii*.

- SCHLECHTERELLA**, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Register*, 462 (1899) = *Tacazzea*, *Decne. (Asclep.)*.

- SCHLECHTERIA**, *Bolus, in Engl. Jahrb.* xxiv. (1897) 455. **CRUCIFERAE**.
 capensis, *Bolus, l. c.*—Afr. austr.

SCHMIDTIA, *Steud. (Gramin.)*.

- bulbosa, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 658.—Afr. austr.

SCHNIZLEINIA, *Steud. ex Hochst. = Vellozia, Vand. (Amaryll.)*.

- amica, *Steud. ex Hochst. in Flora*, 1844, 31 = *V. Schnitzleinia*.

- SCHOENANTHUS**, *Auct. in Just, Jahresb.* xxv. II. (1900) 499, errore = *Ichnanthus*, *Beauv. (Gramin.)*.

- SCHOENEFELDIA**, *Kunth = Chloris, Sw. (Gramin.)*.
 gracilis, *Kunth, Rév. Gram.* 283 = *C. pallida*.
 pallida, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. 183 = *C. pallida*.

SCHOENIDIUM, *Nees = Ficinia, Schrad. (Cyper.)*.

- laterale, *Nees, in Linnaea*, ix. 292 = *F. aphylla*.

SCHOENLANDIA, *Cornu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 21. **PONTEDERIACEAE**.

- gabonensis, *Cornu, l. c.* 24.—Afr. trop.

SCHOENOCAULON, *A. Gray (Liliac.)*.

- Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 295.—Mexic.

SCHOENOCRAMBE, *Greene, Pittonia*, iii. (1896) 124. **CRUCIFERAE**.

- linifolia, *Greene, l. c.* 127 (= *Sisymbrium linifolium*).—Am. bor.
 pinnata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
 pygmaea, *Greene, l. c.* 128 (= *Sisymbrium pygmaeum*).—Am. bor.

SCHOENOPLECTUS, *Palla = Scirpus, Tourn. (Cyper.)*.

- Kalmussii, *Palla, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1900, 215 = *S. Kalmussii*.

SCHOENORCHIS, *Reinw. (Orchid.)*.

- simmleriana, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 654.—Hort.

SCHOENOXIPHIMUM, *Nees (Cyper.)*.

- Buchanani, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 676 = *Carex Buchanani*.

SCHOENUS, Linn. (Cyper.).
antarcticus, *Dunstn. in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 213.—Am. austr.
filiformis, Roem. & Schult. Syst. Mant. ii. 523 = *Ficinia aphylla*.
hexandrus, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xvi. 380.—Austral.
lateralis, Vahl, Enum. ii. 211 = *Ficinia aphylla*.
paludosus, Poir, Encyc. Suppl. ii. 251 = *Costularia paludosa*.
pusillus, Sw. Prod. 20 = *Rynchospora Berterii*.
Rottboellii, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 336 = *Lepidosperma Rottboellii*.

SCHOEPFIA, Schreb. (Olac.).
gibbosa, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 551.—China.
Griffithii, Van Tiegh. l. c. (= *griffithiana*, Valet. ?)—Ind. or.
pallida, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachr.* i. 146.—Ind. occ.

SCHOEFFIOPSIS, Miers = **Schoepfia**, Schreb. (Olac.).
gibbosa, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 551 = *Schoepfia gibbosa*.
Griffithii, Van Tiegh. l. c. = *Schoepfia Griffithii*.

SCHOUWIA, DC. (Crucif.).
purpurea, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 183 = *arabica*.

SCHRANKIA, Willd. (Legum.).
floridana, Chapm. Fl. S. U. S. ed. III. 127.—Am. sept.
huridula, Chapm. l. c.—Am. sept.
portoricensis, Urb. Symb. Antill. ii. 267.—Ind. occ.

SCHREBERA, Roxb. (Oleac.).
goetzeana, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 450.—Afr. trop.
platyphylla, Gilg, l. c. 449.—Afr. trop.

SCHRENKIA, Regel & Schmalh. (Umbell.).
insignis, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 73.—As. cent.

SCHUBEA, Pax, in *Engl. Jahrb.* xxviii. (1899) 22. **EUPHORBIAEAE**.
heterophylla, Pax, l. c. 23.—Afr. trop.

SCHULTESIA, Mart. (Gentian.).
apiculata, Huber, in *Bol. Mus. Para.* ii. 511.—Bras.

SCHUMANNIOPHYTON, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 313 (1897). **RUBIAEAE**.
magnificum, Harms, l. c. (= *Tetrastigma magnificum*).—Afr. trop.

SCHURMANSIA, Blume (Violac.).
Bamleri, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 448.—N. Guin.

SCHWABEA, Endl. (Acanth.).
Anisacanthus, Lindau, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III B. 346 = *Ecbolium Anisacanthus*.
ciliaris, Nees, in DC. Prod. xi. 384 = *Monechma hispidum*.
ecbolioides, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xx. 58 = *Ecbolium Anisacanthus*.
revoluta, Lindau, l. c. 59 = *Ecbolium revolutum*.
spicigera, Nees, in DC. Prod. xi. 384 = *Monechma hispidum*.

SCHWARTZKOPFFIA, Kraenzl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. (1900) 177. **ORCHIDEAE**.
buettneriana, Kraenzl. l. c.—Afr. trop.

SCILLA, Linn. (Liliac.).
alvesiana, Welw. ex Rouy, *Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 171.—Eur.
Baurii, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 484.—Afr. austr.
chlorantha, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 555.—Afr. trop.
cordifolia, Baker, l. c.—Afr. trop.
Curreri, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiii. 249 = *Eriosperrum Curreri*.
diphylla, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 489.—Afr. austr.
Dybowskii, Hua, in *Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 677.—Afr. trop.
edulis, Hua, l. c. 676 (non Engl.).—Afr. trop.
Galpini, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 487.—Afr. austr.

SCILLA :—
globosa, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 484.—Afr. austr.
Hildebrandtii, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 556, descr.—Afr. trop.
hispidula, Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. 248 = *rigidifolia*.
Holzmannia, Helder, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 393.—Graecia.
inandensis, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 483.—Afr. austr.
lachenalioides, Baker, l. c. 482.—Afr. austr.
Leichtlinii, Baker, l. c. 486.—Afr. austr.
leptophylla, Baker, l. c. 483.—Afr. austr.
megaphylla, Baker, l. c. 490.—Afr. austr.
modesta, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 554.—Afr. trop.
Nelsoni, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 488.—Afr. austr.
oostachys, Baker, l. c. 487.—Afr. austr.
oubangluensis, Hua, in *Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, x. 677.—Afr. trop.
palustris, F. M. Wood & Evans, in *Journ. Bot.* 1899, 251.—Afr. austr.
persica, Hausskn. in *Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. x.* 44.—Persia.
Rautanenii, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 857.—Afr. trop.
Rogersii, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 486.—Afr. austr.
setifera, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 549.—Afr. trop.
Sickenbergeri, Diefers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 231.—Arab.
sphaerocephala, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 484.—Afr. austr.
Tysoni, Baker, l. c.—Afr. austr.

SCINDAPSUS, Schott (Arac.).
grandifolius, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxv. 13.—Hort.
sinensis, Engl. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 234.—China.
Treubii, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxv. 13.—Hort.

SCIRPUS, Tourn. (Cyper.).
aegialites, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 477.—Chili.
arenarius, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. 741 = *Bulbostylis humilis*.
atratus, Fernald, in *Rhodora*, ii. 18.—Am. bor.
atrocinctus, Fernald, in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 502.—Am. bor.
breviculmis, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. 742 = *Bulbostylis breviculmis*.
Burkei, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis Burkei*).—Afr. austr.
calolepis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 336 = *Fuirena calolepis*.
campestris, Britton, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* i. 267 (non aliorum).—Am. bor.
camptotrichus, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 173 = *Eleocharis camptotricha*.
chloroticus, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 480.—Chili.
coerulescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 336 = *Fuirena coerulescens*.
constitutionis, Boeckl. ex R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 483.—Chili.
coronatus, Steud. in *Flora*, 1829, 136 = *Ficinia setiformis*.
Desvauxi, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 482.—Chili.
didymostachyus, R. Phil. l. c. 475.—Chili.
dregeanus, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 224.—Afr. austr.
elatus, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. 694 = *Ficinia tenuifolia*.
falsus, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 230.—Afr. austr.
filamentosus, Vahl, Enum. ii. 262 = *Bulbostylis filamentosa*.
floccosus, Griseb. Cat. Pl. Cub. 241 = *Bulbostylis floccosa*.
georgianus, Harper, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 331.—Am. bor.
junciformis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 (= *Bulbostylis junciformis*).—Bolivia.
Kalmusii, Aschers., *Abrom. & Graebn. in Aschers. & Graebn. Fl. N. O. Deutsch. Flachl.* 133.—Eur.
Kirkii, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis Kirkii*).—Afr. austr.
libanoticus, Post, Fl. Syria, 833.—Syria.
macrolepis, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 481 (non Boeckl.).—Chili.

SCIRPUS :—
melanocaulos, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 476.—Chili.
membranaceus, Thunb. Prod. 17.—Afr. austr.
microstachys, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 478 (non Boeckl.).—Chili.
mitratus, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 570 = *Eleocharis mitrata*.
monostachyus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 = *Fimbristylis monostachya*.
Novae-Angliae, Britton, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 509.—Am. bor.
pachystylus, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 174 = *Eleocharis pachystyla*.
paludosus, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 5.—Am. bor.
parvinux, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis parvinux*).—Afr. austr.
pedicellatus, Fernald, in *Rhodora*, 1900, 16.—Am. bor.
pseudoschoenus, Steud. in *Flora*, 1829, 147 = *Ficinia albicans*.
Reichei, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 55; et ex R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 480.—Chili.
Rosthornii, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 228.—China.
rubrotinctus, Fernald, in *Rhodora*, 1900, 20.—Am. bor.
scaber, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 (= *Isolepis scabra*).—Peruv.
scleropus, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. I. 329 (= *Bulbostylis scleropus*).—Afr. austr.
seoanei, Merino, *Contrib. Fl. Galic.* (1897) 173.—Galic.
sessiliflorus, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 479.—Chili.
subtilis, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 54.—Calif.
terminalis, R. Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 479.—Chili.
trachycaulos, R. Phil. l. c. 482.—Chili.
trichocaulos, R. Phil. l. c. 478.—Chili.
triflorus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 = *Fimbristylis tristachya*.
truncatus, Sieber, ex Nees, in *Endl. Prodr. Fl. Norf.* 23 = *Ficinia aphylla*.
uleanus, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 55.—Bras.
umbellatus, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 337 = *Fuirena umbellata*.

SCLERACHNE, R. Br. = **Polytoca**, R. Br. (Gramin.).
punctata, R. Br. in *Benn. Pl. Jav. Rar.* 15 = *P. punctata*.

SCLERIA, Berg. (Cyper.).
boniana, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 158.—Tonkin.
Buchanani, Boeck. *Cyper. Nov.* i. 33.—Afr. trop.
catharinensis, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 158.—Bras.
Clarkei, Lindm. in *Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. no. 9, 32.—Bras.
costaricensis, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 157 = *Liebmanni*.
filiculmis, Boeck. l. c. 158.—Bras.
Grisebachii, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 150.—Ind. occ.
lacunosa, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 160.—Ind. occ.
nana, Boeck. l. c. 158.—Bras.
Pittieri, Boeck. l. c. 159, descr.—Am. cent.
secans, Urb. Symb. Antill. ii. 169 = *S. Flagellum-nigrorum*.
Tonduzi, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 160, descr.—Am. cent.
uleana, Boeck. l. c. 159.—Bras.

SCLEROCHITON, Harv. (Acanth.).
Boivini, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 110.—Afr. trop.
Holstii, C. B. Clarke, l. c. 111.—Afr. trop.
Kirkii, C. B. Clarke, l. c. 110.—Afr. trop.
nitidus, C. B. Clarke, l. c.—Afr. trop.
obtusisepalus, C. B. Clarke, l. c. 111.—Afr. trop.
Preussii, C. B. Clarke, l. c. 110.—Afr. trop.
scissisepalus, C. B. Clarke, l. c. 111.—Afr. trop.
stenostachyus, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xx. 27 = *Crossandra stenostachya*.

SCLEROCHLOA, Beauv. (Gramin.).
angusta, Nees, Fl. Afr. Austr. 381 = *Atripis angusta*.
rigida, Panz. in *Denkschr. Bot. Regensb.* i. II. 180 = *Scleropoa rigida*.

SCLEROLOBIUM, Vog. (Legum.).

Radlkoferi, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 26.—Bolivia.

SCLEROMELUM, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 300 (1900). **SANTALACEAE**. aurancticum, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.**SCLEROPHYLLUM**, Griff. Notul. iii. (1851) 8 = **Oryza**, Linn. (Gramin.). *coarctatum*, Griff. l. c. = *O. coarctata*.**SCLEROPOA**, Griseb. (Gramin.).

rigida, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* ii. 481.—Reg. Medit.; Afr. austr.

SCOLOPIA, Schreb. (Bixac.).

Germaini, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 42.—Cochinch. *trimera*, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 53.—Ins. Bangka.

SCOLOSANTHUS, Vahl (Rubiace.).

acanthodes, *Urb. Symb. Antill.* i. 481 (= *Eranthemum acanthodes*).—Ind. occ. *grandifolius*, *Krug & Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1897, 267, nomen; *Urb. Symb. Antill.* i. 442.—Ind. occ. *multiflorus*, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 443 = *Myonima multiflora*. *sagraeanus*, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* ii. 102 = crucifer.

SCOLYMOCEPHALUS, Weinm. = **Protea**, Linn. (Proteac.).

lanuginosus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 279 = *P. lanuginosa*.

SCOLYMUS, Tourn. (Compos.).

Clusii, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 117 = *maculatus*. *Theophrasti*, *Bub. l. c.* 116 = *hispanicus*.

SCOPARIA, Linn. (Scrophul.).

grandiflora, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 105.—Am. bor. *Grisebachii*, *Fritsch, in Bih. Svensk. Vet.-Akad.* xxiv. no. 5, 15.—Reg. Argent. *millefoliata*, *Fritsch, l. c.* 14.—Parag.

SCORPIOIDES, Bub. Fl. Pyren. ii. 560 (1900) = **Scorpiurus**, Linn. (Legum.).

elegans, *Bub. l. c.* = *Scorpiurus subvillosa*.

SCORZONERA, Tourn. (Compos.).

Doriae, *Degen & Baldacci, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 417.—Albania. *orientalis*, *H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t.* 388 = *Tragopogon orientalis*. *pulchra*, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis*, ii. 289.—Reg. Caucas.

SCOTTELLIA, Oliver (Bixac.).

klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i.* 113.—Afr. trop.

SCROPHULARIA, Tourn. (Scrophul.).

autumnalis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 178.—Eur. *caucasica*, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv.* 204.—Reg. Caucas. *Delavayi*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 15.—China. *diffusa*, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv.* 205.—Reg. Caucas. *diploidonta*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 14.—China. *Fargesii*, *Franch. l. c.* 12.—China. *glandulosissima*, *Franch. & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 49.—As. Min. *lepetymnica*, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 151.—Graecia. *leprella*, *Bicken, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 317.—Am. bor. *lesbiaca*, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 152.—Graecia. *major*, *Bub. Fl. Pyren.* i. 341 = *nodosa*. *Mandarinorum*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 13.—China. *methanaea*, *Hauskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. x.* 57.—Eur. *microdonta*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 11.—China. *mollis*, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv.* 208.—Reg. Caucas.

SCROPHULARIA :—

montana, *Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 308.—Am. bor. *oxyrhyncha*, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1898, 4.—Hispan. *Ruta-canina*, *Bub. Fl. Pyren.* i. 345 = *canina*. *Sintenisii*, *Franch. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 51.—As. Min. *Souliei*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 15.—China. *spicata*, *Franch. l. c.* 14.—China. *spinulescens*, *Hauskn. & Degen, in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. x.* 60.—Eur. *sprengeriana*, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv.* 202.—Reg. Caucas. *tenuis*, *Hauskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. x.* 60.—Eur. *yunnanensis*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 12.—China.

SCUTELLARIA, Riv. (Labiata.).

Altamaha, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 143.—Am. bor. *amoena*, *Wright, in Kew Bull.* 1896, 164.—China. *arenicola*, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 143.—Am. bor. *chalicophila*, *Loesen, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 569.—Am. cent. *cochinchinensis*, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 103.—Cochinch. *Debeerstii*, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 57.—Afr. trop. *distans*, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 562.—Mexic. *multiglandulosa*, *Small, ex Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 339.—Am. bor. *Ocmulgee*, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 142.—Am. bor. *Pedicularis*, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 563.—Mexic. *polyadena*, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxvii. 56.—Afr. trop. *pseudo-coerulea*, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 240.—Mexic. *Rosei*, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 563.—Mexic. *seleriana*, *Loesen, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 568.—Am. cent. *venosa*, *Kearn, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 571.—Am. bor. *virgulata*, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 288.—Am. bor. *zollingeriana*, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 104.—Java.

SCYPHOCEPHALIUM, Warb. in Nov. Act. Nat.

Cur. lxxviii. (1897) 129, descr. **MYRISTICACEAE**. *chrysothrix*, *Warb. l. c.* 247.—Afr. trop. *Kombo*, *Warb. l. c.* 244.—Afr. trop. *Mannii*, *Warb. l. c.* 249 (= *Myristica Mannii*).—Afr. trop. *Ochocoo*, *Warb. l. c.* 244 = *S. Kombo*

SCYPHOSYCE, Baill. (Urtic.).

Zenkeri, *Engl. Monog. Afr. Pfl. i.* 31 = *yathanthus Zenkeri*.

SCYTOPETALUM, Pierre, ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 244 (1897). **OLACACEAE**.

klaineum, *Pierre, l. c.*—Afr. trop.

SEBAEA, Soland. (Gentian.).

affinis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 706.—Afr. trop. *Burchellii*, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 89.—Afr. austr. *caladenia*, *Gilg, l. c.*—Afr. austr. *chironioides*, *Gilg, l. c.* 101.—Afr. trop. *gariepina*, *Gilg, l. c.* 90.—Afr. austr. *hymenosepala*, *Gilg, l. c.* 89.—Afr. austr. *Junodii*, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 442.—Afr. austr. *leiostyla*, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 97.—Afr. trop. *macrantha*, *Gilg, l. c.* 94.—Afr. austr. *macrophylla*, *Gilg, l. c.* 96.—Afr. austr. *macrosepala*, *Gilg, l. c.* 91.—Afr. austr. *macrostigma*, *Gilg, l. c.* 93.—Afr. austr. *mirabilis*, *Gilg, l. c.* 92.—Afr. austr.

SEBAEA :—

natalensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 442.—Afr. austr. *polyantha*, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 95.—Afr. austr. *ramosissima*, *Gilg, l. c.* 91.—Afr. austr. *schinziana*, *Gilg, l. c.* 95.—Afr. austr. *schizostigma*, *Gilg, l. c.* 93.—Afr. austr. *Schlechteri*, *Schinz, in Engl. Jahrb.* xxiv. 454.—Afr. austr. *sedoides*, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxvi. 98.—Afr. austr. *semialata*, *Gilg, l. c.* 97.—Afr. austr. *stricta*, *Gilg, l. c.* 90.—Afr. austr. *thodeana*, *Gilg, l. c.* 96.—Afr. austr. *Woodii*, *Gilg, l. c.* 94.—Afr. austr.

SEBASTIANIA, Spreng. (Euphorb.).

haploclada, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 231.—Peruv.

SECALE, Tourn. (Gramin.).

africanum, *Stapf, in Hook. Ic. Pl. t.* 2601.—Afr. austr.

SECAMONE, R. Br. (Asclep.).

rubiginosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 233.—Afr. trop. *schinziana*, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 449.—Madag. *Whytei*, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1898, 308.—Afr. trop.

SECURIDACA, Linn. (Polygal.).

philippinensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 233.—Ins. Philipp.

SECURINEGA, Comm. (Euphorb.).

Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxviii. 18.—Afr. trop.

SEDDERA, Hochst. (Convolv.).

capensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 529 (= *Evolvulus capensis*).—Afr. austr. *hirsuta*, *Damm, ex Hallier f. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 224.—Afr. trop. *repens*, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 530.—Madag. *schizantha*, *Hallier f. l. c.* 532.—Afr. trop.

SEDUM, Tourn. (Crassul.).

arborescens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 83 = *Crassula arborescens*. *Blockmanae*, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* vi. 422.—Calif. *bonariense*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 83 = *Tillaea peduncularis*. *brachypetalum*, *E. Mey. in Kuntze, l. c.* = *Crassula brachypetala*. *bracteatum*, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 362 (non Viv.).—China. *caffrum*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 83 = *Crassula fruticulosa*. *campestre*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula campestris*. *canescens*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula canescens*. *centauroides*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula centauroides*. *chilonense*, *Kuntze, l. c.*—Bolivia. *ciliatum*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula ciliata*. *ciliosum*, *Howell, Fl. N. W. Amer. i.* 214.—Am. bor. *cogmansense*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 83 = *Crassula cogmansensis*. *Congdoni*, *Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i.* 135.—Am. bor. *corymbulosum*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 84 = *Crassula corymbulosum*. *crassiflorum*, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr. *crenulatissimum*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula crenulata*. *cymosum*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula cymosa*. *decussatum*, *Kuntze, l. c.* = *Cotyledon decussata*. *discolor*, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 235.—China. *dregeanum*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 84 = *Crassula dregeana*. *englerianum*, *Graebn. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 186.—Pyren. *ericodes*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 84 = *Crassula ericoides*. *expansum*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula expansa*. *fasciculare*, *Kuntze, l. c.* = *Cotyledon fascicularis*. *flavum*, *Kuntze, l. c.* = *Crassula flava*. *glaciale*, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 290 (non Clarion).—China. *glaucovirans*, *Haldcsy, Consp. Fl. Graec. i.* 575.—Eur. *harveyanum*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 85 = *Kalanchoe paniculata*.

SEDUM :—

- hemisphaericum*, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Cotyledon hemisphaerica*.
 Henryi, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 361.—China.
lancerottense, Murray, in *Journ. Bot.* 1899, 201.—Ins. Canar.
leucocarpum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 288.—China.
lycopodioides, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Crassula lycopodioides*.
Magnolii, Bub. Fl. Pyren. ii. 698 = *caespitosum*.
mexicanum, Britton, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 257.—Mexic.
muscosum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Crassula muscosa*.
nobile, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 285.—China.
obtusipetalum, Franch. l. c. 289.—China.
orbiculatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Cotyledon orbiculata*.
perfossum, Kuntze, l. c. = *Crassula perfossa*.
platysepalum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 289.—China.
primuloides, Franch. l. c. 287.—China.
proponticum, Asnav. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 169.—Tarcia.
radicans, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *acutifolium*.
ramosum, Kuntze, l. c. = *Crassula ramosa*.
ramuliflorum, Kuntze, l. c. = *Crassula ramuliflora*.
Regelii, Kuntze, l. c. = *Crassula Cooperi*.
rhytidocalyx, Candargy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 157.—Graecia.
Rochea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Rochea coccinea*.
rosthornianum, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 361.—China.
rosulare, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Crassula rosularis*.
rotundatum, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2469.—Tibet.
rubicundum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Crassula rubicunda*.
scabridum, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 284.—China.
scabrum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Crassula scabra*.
sinicum, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 361.—China.
Skorpii, Velen. in *Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1898, 4.—Bulgar.
spiciforme, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 86 = *Crassula spiciformis*.
Stahlil, Solms, in *Saemer. Bot. Gart. Univ. Strassb.* 1900, 4.—Mexic.
subrotundifolium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Kalanchoë rotundifolia*.
suffruticosum, Soland. in *Lowe, Man. Fl. Madeir.* 325 = *nudum*.
tennifolium, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 290.—China.
tetragonum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 85 = *Crassula tetragona*.
transvaalense, Kuntze, l. c. = *Crassula transvaalensis*.
tuberculatum, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.
vaginatum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 86 = *Crassula vaginata*.
valerianoides, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 360.—China.
yunnanense, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 286.—China.
- SEEMANNIA**, Regel (Gesner.).
cuneata, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 96.—Bolivia.
nematanthoides, K. Schum. in *Fust. Jahresb.* xxvi. i. 386.—Bolivia.
regnelliana, Fritsch, in *Engl. Jahrb.* xxix. Beibl. lxx. 13.—Bras.
- SEQUIERIA**, Loefl. (Phytolacc.).
Glaziovii, Briq. in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 214.—Bras.
- SEIDLITZIA**, Bunge (Chenopod.).
lanigera, Post, *Fl. Syria*, 689.—Syria.
- SELAGO**, Linn. (Selag.).
albanensis, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1896, 503.—Afr. austr.
amboensis, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 272.—Afr. trop.
angolensis, Rolfe, l. c. 271.—Afr. trop.

SELAGO :—

- blantyreensis*, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 268.—Afr. trop.
Buchananii, Rolfe, l. c. 269.—Afr. trop.
capitellata, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1897, 345.—Afr. austr.
coerulea, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 267 (non *aliorum*).—Afr. trop.
Dinteri, Rolfe, l. c. 271.—Afr. trop.
Galpinii, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1897, 281.—Afr. austr.
Hoepfneri, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 271.—Afr. trop.
Holstii, Rolfe, l. c. 269.—Afr. trop.
Holubii, Rolfe, l. c. 271.—Afr. trop.
Melleri, Rolfe, l. c. 268.—Afr. trop.
monticola, F. M. Wood & Evans, in *Journ. Bot.* 1897, 489.—Afr. austr.
namaquensis, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 189.—Afr. austr.
Nyasaë, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 270.—Afr. trop.
phyllopodiioides, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 190.—Afr. austr.
tenuicaulis, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 268.—Afr. trop.
thyrsioidea, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 159.—Afr. trop.
viscosa, Rolfe, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 267.—Afr. trop.
- SELINOCARPUS**, A. Gray (Nyctag.).
lanceolatus, Wootton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 304.—Am. sept.
- SELINUM**, Linn. (Umbell.).
validum, Congdon, in *Erythraea*, vii. 185.—Calif.
- SEMECARPUS**, Linn. f. (Anacard.).
caudata, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 369 B.—Cochinch.
congostiflora, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 412.—N. Guin.
Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 509.—Penins. Mal.
lucens, King, l. c. 510.—Penins. Mal.
Prainii, King, l. c. 511.—Ind. or.
subspatulata, King, l. c. 117.—Burma.
Thorelii, Pierre, *Fl. Cochinch.* t. 369 A.—Cochinch.
velutina, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 508.—Penins. Mal.
- SEMPERVIVUM**, Rupp. (Crassul.).
erythraeum, Vel. *Fl. Bulg. Suppl.* i. 111.—Bulgar.
hierrense, R. P. Murray, in *Journ. Bot.* 1899, 395.—Ins. Canar.
percarneum, R. P. Murray, l. c. 201.—Ins. Canar.
- SENECIO**, Tourn. (Compos.).
accedens, Greene, *Pittonia*, iii. 105.—Am. bor.
acutidens, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 180.—Am. bor.
Adamsii, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 536.—N. Zel.
alloeophyllus, O. Hoffm. ex *Dusén*, in *Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 105.—Reg. Magell.
alpicola, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 447.—Am. bor.
altus, Rydb. l. c. 443.—Am. bor.
antennariifolius, Britton, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 478.—Am. bor.
antipodus, T. Kirk, *Fl. N. Zeal.* 341, descr.—N. Zel.
antitensis, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 270.—Madag.
arabidifolius, O. Hoffm. in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 171.—Afr. austr.
arachnoideus, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 442 (non *aliorum*).—Am. bor.
argentiniensis, Speg. in *Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 52.—Reg. Argent.
asperifolius, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 414.—China.
atratus, Greene, *Pittonia*, iii. 105.—Am. bor.
atriapiculatus, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 442 = *columbianus*.
aurellus, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 182.—Am. bor.
auriculatus, Alboff, in *Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata*, vii. 382 (non *aliorum*).—Fuegia.
barbentonius, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 840.—Afr. austr.
Beaufilsii, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 171.—Patag.
bernardinus, Greene, *Pittonia*, iii. 298.—Am. bor.
Bertrami, Post, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 18, 95.—Syria.

SENECIO :—

- biserrifolius*, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 171.—Bolivia.
blattariaefolia, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 415.—China.
blitoides, Greene, *Pittonia*, iv. 123.—Am. bor.
brittenianus, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 601.—Afr. trop.
Buchwaldi, O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* xxiv. 474.—Afr. trop.
cactaeiformis, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 465.—Afr. austr.
camptodontus, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 413.—China.
candidissimus, Greene, *Pittonia*, iv. 110.—Am. bor.
canovirens, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 187.—Am. bor.
carthamoides, Greene, *Pittonia*, iv. 122.—Am. bor.
cathcartensis, O. Hoffm. in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 172.—Afr. austr.
chloranthus, Greene, *Pittonia*, iv. 118.—Am. bor.
cognatus, Greene, l. c. 114.—Am. bor.
colensoensis, O. Hoffm. in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 172.—Afr. austr.
columbianus, Greene, *Pittonia*, iii. 170.—Am. bor.
concinus, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 418.—China.
condensatus, Greene, *Pittonia*, iii. 298.—Am. bor.
corazonensis, Hieron. ex *Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 73.—Ecuador.
Covillei, Greene, *Fl. Francisc.* 469.—Calif.
crocatus, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 299.—Am. bor.
curtophyllus, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 466.—Afr. austr.
Deasyi, Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2587.—Tibet.
densus, Greene, *Pittonia*, iv. 226.—Am. bor.
Dewevrei, O. Hoffm. ex *Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 35.—Afr. trop.
dianthus, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 419.—China.
dimorphophyllus, Greene, *Pittonia*, iv. 109.—Am. bor.
disciformis, Hieron. ex *Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 72.—Ecuador.
discoideus, Britton, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 479 (non Franch.).—Am. bor.
dispar, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 272.—Am. bor.
drakensbergis, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 467.—Afr. austr.
Earlei, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 147.—Am. bor.
Elmeri, Piper, in *Erythraea*, vii. 178.—Am. bor.
epiphyticus, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 173.—Bolivia.
erythrophyllus, Lasaro, in *Anal. Soc. Espan. Hist. Nat.* xxix. 149.—Eur.
Everettii, Hemsl. in *Kew Bull.* 1896, 38.—Celebes.
exsertiflorus, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 154.—Afr. trop.
fedifolius, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 183.—Am. bor.
fibrosus, O. Hoffm. in *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 174.—Afr. austr.
filiferus, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 416.—China.
flavovirens, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 181.—Am. bor.
flavulus, Greene, *Pittonia*, iv. 108.—Am. bor.
Fletcheri, Hemsl. in *Kew Bull.* 1896, 212.—Tibet.
Flettii, Wiegand, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 137.—Am. bor.
floribundus, Hieron. ex *Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 69 (= *Vernonia floribunda*).—Am. trop.
fulgens, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 177 (non Nichols.).—Am. bor.
geminatus, T. Kirk, *Fl. N. Zeal.* 350 (= *Traversia baccharoides*).—N. Zel.
glaucescens, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 442.—Am. bor.
glaucifolius, Rydb. l. c. 448.—Am. bor.
glaucophylla, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 536.—N. Zel.
Goetzei, O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 507.—Afr. trop.
Goetzenii, O. Hoffm. in *Goetsen, Durch Afr.* repr. 10, descr.—Afr. trop.
goringensis, Hemsl. in *Kew Bull.* 1896, 212.—Tibet.
gracilipes, Robinson & Greenm. in *Amer. Journ. Sci. Ser. III.* l. (1895) 156 = *polypodioides*.
Greggii, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 170.—Mexic.
gyrophyllus, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 467.—Afr. austr.

SENECIO:—

- haitiensis, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 469.—Ind. occ.
 hanburianus, *Dinter, in Gard. Chron.* 1898, i. 354.—Afr. austr.?
 hartianus, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 622.—Am. bor.
 Hanthallii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 174.—Patag.
 hoepfnerianus, *Vatke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 841.—Afr. trop.
 Holmii, *Greene, Pittonia,* iv. 120.—Am. bor.
 hydrophiloides, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 441.—Am. bor.
 idahoensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 188.—Am. bor.
 imbricatus, *Greene, Pittonia,* iv. 117 (non Gardn.).—Am. bor.
 indecorus, *Greene, Fl. Francisc.* 470.—Calif.
 invenustus, *Greene, Pittonia,* iv. 124.—Am. bor.
 iscoensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 70.—Ecuador.
 Jonesii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 179.—Am. bor.
 junodanum, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 74.—Afr. austr.
 kialensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 413.—China.
 Kirkii, *Hook. f. ex T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 844.—N. Zel.
 Kuntzei, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 175.—Afr. austr.
 Kurtzii, *Alboff, ex Alboff & Kurtz, in Rev. Mus. La Plata,* vii. 381 (non Phil.).—Fuegia.
 laetiflorus, *Greene, Pittonia,* iii. 88.—Calif.
 Lamberti, *Auct. in Just, Jahresb.* xxiv. II. 392, sphalm.—Lamberti.
 laramiensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 483.—Am. bor.
 latus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 444.—Am. bor.
 launayaeifolius, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 175.—Afr. austr.
 Lamberti, *Greene, Pittonia,* iii. 89.—Calif.
 leptolepis, *Greene, Fl. Francisc.* 468.—Calif.
 leucanthemifolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 495=santiagoensis.
 Iloensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 71.—Ecuador.
 lobatifolius, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xii. 80 (= *Cacalia lobatifolia*).—Japon.
 longipetiolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 176.—Am. bor.
 Iopollensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 601.—Afr. trop.
 lucorum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 415.—China.
 lycopodioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 210.—Afr. austr.
 lygodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 599.—Afr. trop.
 MacDougallii, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 592.—Am. bor.
 Macounii, *Greene, Pittonia,* iii. 169.—Am. bor.
 microdontos, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 479 (non Baker).—Am. bor.
 microglossus, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn,* xxxvi. 183 (non DC.).—Eur.
 milleflorus, *Greene, Pittonia,* iv. 116.—Am. bor.
 millelobatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 171.—Am. bor.
 mochensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 68.—Ecuador.
 mojanensis, *Hieron. l. c.* 67.—Ecuador.
 Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 176.—Patag.
 mutabilis, *Greene, Pittonia,* iv. 113.—Am. bor.
 Nelsonii, *Rydb. ex A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 483.—Am. bor.
 nephrophyllus, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 446.—Am. bor.
 Newcombei, *Greene, Pittonia,* iii. 249.—Am. bor.
 nigrocinetus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 417.—China.
 Nordenskjöldii, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* iii. v. 107.—Reg. Magell.
 nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 271.—Afr. trop.
 nyikensis, *Baker, l. c.* 1898, 154 = subpetitianus.
 oblanceolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 175.—Am. bor.
 obtectus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 176.—Chili.
 occidentalis, *Greene, Pittonia,* iv. 122.—Am. bor.
 ovinus, *Greene, l. c.* 110.—Am. bor.

SENECIO:—

- pachyphyllus*, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xvi. 410 = Adamsii.
 Passus-Crucis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 176.—Reg. Argent.
 patagonicus, *Phil. in Linnæa,* xxxiii. 159 = sericeo-nitens.
 paucicalyculatus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 468.—Afr. austr.
 pendulus, *Sch. Bip. in Flora,* xxviii. (1845) 500 = *Kleinia pendula*.
 pentactinus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 469.—Afr. austr.
 pentecostus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 598.—Afr. trop.
 perennans, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 549.—Am. bor.
 pereziifolius, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 440.—Am. bor.
 pergamentaceus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 154.—Afr. trop.
 perplexus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 271.—Am. bor.
 petraeus, *Klatt. in Abh. Naturf. Ges. Halle,* xv. (1882) 330 = petrocallis.
 petrocallis, *Greene, Pittonia,* iv. 116.—Am. bor.
 petrophilus, *Greene, l. c.* iii. 171 = petrocallis.
 Picardae, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 469.—Ind. occ.
 platylobus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 181.—Am. bor.
 polyodioides, *Greene, Pittonia,* iii. 90.—Mexic.
 polyodioides, *Ind. Kew. Suppl.* i. 393, sphalm. = *gracilipes*, *Robinson & Greenm.*
 Porteri, *Greene, Pittonia,* iii. 186.—Am. bor.
 Pratii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2491.—China.
 Principis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 412.—China.
 prionophyllus, *Franch. l. c.* 420.—China.
 prionopterus, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 49.—Mexic.
 prostratus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 841.—Afr. austr.
 pseudoreus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1897, 298.—Am. bor.
 psidiifolius, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 66.—Bolivia.
 pudicus, *Greene, Pittonia,* iv. 118.—Am. bor.
 pullus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 469 (non *Klatt, 1882*).—Afr. austr.
 Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 402.—Afr. trop.
 rectiramus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
 renifolius, *Porter, in Porter & Coulter, Fl. Colorado,* 83 = Porteri.
 revolutus, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 348.—N. Zel.
 rhizomatus, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 66.—Bolivia.
 robustus, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* vi. 243 = revolutus.
 rosulatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 188.—Am. bor.
 rubricaulis, *Greene, Pittonia,* iii. 89.—Am. bor.
 rugiflandulosis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 599.—N. Zel.
 sagittarioides, *Speg. Contr. Fl. Ventana,* 37.—Reg. Argent.
 salicinus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 186.—Am. bor.
 saliens, *Rydb. l. c.* 1897, 298.—Am. bor.
 sanguisorboides, *Rydb. l. c.* 1900, 170.—Am. bor.
 santiagoensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 177.—Chili.
 saxatilis, *Lomak. in Act. Hort. Tiflis,* ii. 287 (non *Wall.*).—Reg. Caucas.
 scalaris, *Greene, Pittonia,* iv. 108.—Am. bor.
 scaposus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 379 = perennans.
 scopulinus, *Greene, Pittonia,* iv. 117.—Am. bor.
 Scorzonella, *Greene, l. c.* iii. 90.—Calif.
 Scribneri, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 441.—Am. bor.
 scrophulariifolius, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 474.—Afr. trop.
 semplexicaulis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 440.—Am. bor.
 senecioides, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 177 = assuayensis.
 sericeo-nitens, *Speg. in Rev. Agron. La Plata,* 1897, 537.—Patag.
 sericeus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 177 = Neaei.
 seridophyllus, *Greene, Pittonia,* iv. 121.—Am. bor.

SENECIO:—

- shikokianus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xii. 80 (= *Cacalia shikokiana*).—Japon.
 sinapooides, *Kusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 65.—Bolivia.
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 73.—Ecuador.
 Solidago, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 439.—Am. bor.
 solitarius, *Rydb. l. c.* 444.—Am. bor.
 Sonnei, *Greene, Fl. Francisc.* 467.—Calif.
 spathiphyllus, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 416.—China.
 spatuliformis, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1899, 552.—Am. bor.
 sphaerocephalus, *Greene, Pittonia,* iii. 106.—Am. bor.
 stipellatus, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 245.—Patag.
 strictifolius, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 600.—Afr. trop.
 subcoriaceus, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 375.—Afr. austr.
 subcuneatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 179.—Am. bor.
 subpanduratus, *O. Hoffm. ex Dusén, in Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 108.—Reg. Magell.
 subpetitianus, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 303.—Afr. trop.
 subrubriflorus, *O. Hoffm. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 178.—Afr. austr.
 subvulgaris, *Kuntze, l. c.*—Bolivia.
 tabulicola, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 155.—Afr. trop.
 talongensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 419.—China.
 taraxacoides, *Greene, Pittonia,* iv. 119.—Am. bor.
 Toumeyi, *Greene, l. c.* 849.—Am. bor.
 trachylepus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 470.—Afr. austr.
 trachyphyllus, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 211.—Afr. austr.
 tricephalus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 178.—Reg. Argent.
 tridenticulatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1900, 175.—Am. bor.
 trifurcatus, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 842 (non *Less.*).—Afr. austr.
 trigonophyllus, *Greene, Pittonia,* iii. 106.—Am. bor.
 tripetaloides, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 272.—N. Zel.
 tunicatus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 179.—Patag.
 uvens, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 602.—Afr. trop.
 Valerianella, *Greene, Pittonia,* iv. 109.—Am. bor.
 variifolius, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 438 (non DC.).—Am. bor.
 verruculosus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 179.—Patag.
 versicolor, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 597.—Afr. trop.
 viridis, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 350 (non Phil.).—N. Zel.
 Wardii, *Greene, Pittonia,* iv. 116.—Am. bor.
 Welwitschii, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 33.—Afr. trop.
 Wootoni, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 122.—Am. bor.

SENRA, Cav. (Malvac.)

- Zoës, Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis,* 206.—Afr. trop.

SEQUOIA, Endl. (Conif.)

- washingtoniana*, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull.* Forest. xvii. 28 = gigantea.

SERENOA, Hook. f. (Palm.)

- arborescens, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 90.—Am. bor.

SERICOCOMA, Fenzl (Amarant.)

- heterochiton, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 46.—Afr. trop.
 leucoclada, *Lopr. l. c.* 45.—Afr. austr.
 Welwitschii, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 278 = *Sericocomopsis Welwitschii*.
 Welwitschii, *Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 30 = *Marcellia mirabilis*.

SERICOCOMOPSIS, Schinz (Amarant.)

- quadrangula, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 42 (= *Sericocoma quadrangula*).—Afr. trop.
 Welwitschii, *Lopr. l. c.*—Afr. trop.

SERICOREMA, Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 39. **AMARANTACEAE**.
remotiflora, Lopr. l. c. 40 (= *Sericocoma remotiflora*).—Afr. austr.
sericea, Lopr. l. c. (= *Sericocoma sericea*).—Afr. trop.

SERICOSTACHYS, Gilg & Lopr. ex Lopr. in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 50. **AMARANTACEAE**.
scandens, Gilg & Lopr. ex Lopr. l. c. 51.—Afr. trop.
tomentosa, Lopr. l. c.—Afr. trop.

SERICOSTOMA, Stocks (Borag.).
strigosa, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 120.—Arab.

SERIS, Willd. = **Onoseris**, DC. (Compos.).
sagittatus, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 69.—Bolivia.

SERJANIA, Plum. (Sapind.).
adiantoides, Radlk. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 403.—Mexic.
grandiceps, Radlk. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 336.—Bolivia.
laevigata, Radlk. in Urb. Symb. Antill. i. 347.—Ind. occ.

SERPICULA, Linn. f. = **Hydrilla**, Rich. (Hydrochar.).
verticillata, Linn. f. Suppl. 416 = H. verticillata.

SERRAFALCUS, Parl. = **Bromus**, Linn. (Gramin.).
Cavanillesii, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 101 = B. mollis.
Thomini, Stapf, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 360 = B. mollis.

SERRATULA, Dill. (Compos.).
glauca, Bub. Fl. Pyren. ii. 120 = nudicaulis.

SERRURIA, Salisb. (Proteac.).
biglandulosa, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 451.—Afr. austr.
meisneriana, Schlechter, l. c. xxvii. 108.—Afr. austr.
serraria, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 280 = fasciflora.

SERSALISIA, R. Br. (Sapot.).
brevipes, Baillon, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 947 = Sideroxylon brevipes.

SERUNEUM, Kuntze = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).
glaucum, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 179 = W. glauca.

SESAMOTHAMNUS, Welw. (Pedal.).
Rivae, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 30.—Afr. trop.

SESAMUM, Linn. (Pedal.).
digitaloides, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. 454.—Afr. trop.
Dinterii, Schinz, l. c. vii. 65.—Afr. trop.
grandiflorum, Schinz, l. c. iv. 453.—Afr. trop.
lepidotum, Schinz, l. c. 455.—Afr. trop.
mombazense, Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol. 36.—Afr. trop.
pedalioides, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 799.—Afr. trop.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. Pl. Thonn. Congol. 37.—Afr. trop.

SESBANIA, Scop. (Legum.).
atropurpurea, Taub. in Engl. Jahrb. xxiii. 188.—Afr. trop.
mexicana, Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 154 = longifolia.

SESELI, Linn. (Umbell.).
cinereum, Bub. Fl. Pyren. ii. 378 = Athamantia cretensis.
Giraldii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 497.—China.
Lehmanni, Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 121.—Tauria.
massiliense, Bub. Fl. Pyren. ii. 375 = tortuosum.
ponticum, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiv. 269.—Reg. Caucas.
serbicum, Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1898, 122.—Servia.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. ii. 376 = Libanotis.

SESLERIA, Scop. (Gramin.).
budensis, Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. ii. 320.—Eur.
confusa, Coincy, in Journ. de Bot. 1896, 296.—Hispan.
lagopodioides, Spreng. Pugill. ii. 22 = Aeluropus villosus.

SESUVIUM, Linn. (Ficoid.).
hoepfnerianum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. v. App. II, 75.—Afr. austr.

SETARIA, Beauv. (Gramin.).
appendiculata, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 422.—Afr. austr.
aurea, A. Braun, in Flora, 1841, 276.—Geront. trop.; Afr. austr.
Avellae, Auct. in Just. Jahresb. xxiv. II. 393, sphalm. = seq.
Avettac, Pir. in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 159.—Afr. trop.
dasyura, Hort. Hal. ex Schlecht. in Linnaea, xxvi. 463 = glauca.
depauperata, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 715.—Chili.
flabellata, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 425.—Afr. austr.
forbesiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 81.—Ind. or.
Gerrardii, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 424.—Afr. austr.
gracillima, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 81.—Ind. or.
hirta, Kunth, Rév. Gram. i. 47 = Panicum hirtum.
imberbis, Roem. & Schult. Syst. ii. 891.—Afr. trop. et austr.; Am. trop.
intermedia, Roem. & Schult. l. c. 489.—Reg. temp. et trop.
lindenberiana, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 422.—Afr. trop. et austr.
mendocina, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 715.—Chili.
paniciformis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 186.—Afr. trop.
pratensis, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 715.—Chili.
rhachitricha, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 188 (= *Panicum rhachitrichum*).—Afr. trop.
rigida, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 426.—Afr. austr.
rubicunda, Dum. Obs. Gram. Belg. 139 = glauca.
sciuroidea, C. Muell. in Bot. Zeit. 1861, 316 = aurea.
Welwitschii, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 185.—Afr. trop.
Woodii, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 24.—Afr. austr.

SETARIOPSIS, Scribn. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. (1896) 288. **GRAMINEAE**.
auriculata, Scribn. l. c. 289 (= *Setaria auriculata*).—Mexic.
latiglumis, Scribn. l. c. (= *Setaria longiglumis*).—Mexic.

SETILOBUS, Baill. (Bignon.).
Neves-armondii, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vii. II. 205.—Bras.

SEUBERTIA, Kunth = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
obscura, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 18 = B. laxa.

SHOREA, Roxb. (Dipterocarp.).
javanica, Koord. & Valet. in Bull. Inst. Bot. Buitens. ii. 3; et in Meded. 'S Lands Plantent. xxxiii. 121.—Java.
Koordersii, Brandis, ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 356.—Celebes.

SHORTIA, Torr. & Gray (Diapens.).
sinensis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2624.—China.

SHUTERIA, Wight & Arn. (Legum.).
sinensis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2626.—China.

SIBARA, Greene, Pittonia, iii. (1896) 10. **CRUCIFERAE**.
angelorum, Greene, l. c. 11 (= *Cardamine angelorum*).—Calif.
brandegeana, Greene, l. c. (= *Sisymbrium brandegeanum*).—Calif.
filifolia, Greene, l. c. (= *Arabis filifolia*).—Calif.
laxa, Greene, l. c. (= *Nasturtium laxum*).—Calif.
Palmeri, Greene, l. c. 12 (= *Cardamine Palmeri*).—Mexic.
pectinata, Greene, l. c. 11 (= *Arabis pectinata*).—Calif.

SIBBALDIOPSIS, Rydb. in Mem. Columb. Univ. ii. (1898) 187. **ROSACEAE**.
tridentata, Rydb. l. c. (= *Potentilla tridentata*).—Am. bor.

SIBTHORPIA, Linn. (Scrophul.).
pinata, Benth. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 288 = *Ellisophyllum reptans*.
repens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 239 = pichinchensis.

SICYOS, Linn. (Cucurb.).
debilis, Cogn. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 104.—Bolivia.
glaber, Wooton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 310.—Am. bor.
Kuntzei, Cogn. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 104.—Bolivia.

SIDA, Linn. (Malvac.).
argentea, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. i. 78.—Austral.
bakeriana, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 10, descr.—Bolivia.
brachyphylla, K. Schum. in Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exp. 299, nomen.—Afr. trop.
denudata, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 100 = *Anoda denudata*.
gracilipes, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 10.—Bolivia.
Holwayi, Baker f. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 176.—Mexic.
leptophylla, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 468.—Am. bor.
Reichei, Reiche & Johow, Fl. Chile, i. 238 (= *Malva Reichei*).—Chili.
rubromarginata, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 102.—Am. bor.

SIDALCEA, A. Gray (Malvac.).
asplenifolia, Greene, Pittonia, iii. 158.—Am. bor.
favosa, Congdon, in Erythea, vii. 183.—Calif.
montana, Congdon, l. c.—Calif.
nitrophila, Parish, in Erythea, vii. 93.—Am. bor.
reptans, Greene, Pittonia, iii. 159.—Am. bor.
scabra, Greene, l. c. 158.—Am. bor.
valida, Greene, l. c. 157.—Am. bor.

SIDERANTHUS, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
australis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 621 = *Eriocarpum australe*.
glaberrimus, Rydb. l. c.—Am. bor.
grindeloides, Britton, ex Rydb. l. c. 620 = A. Nuttallii.
puberulus, Rydb. l. c. 622.—Am. bor.
rubiginosus, Britton, ex Rydb. l. c. 621 = A. rubiginosus.
turbineus, Rydb. l. c. 622.—Am. bor.

SIDERITIS, Tourn. (Labiata).
Christii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 108.—Eur.
Cypria, Post, in Mem. Herb. Boiss. no. 18, 98.—Cyprus.

SIDEROXYLON, Dill. (Sapot.).
Baillonii, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachtr. I. 277 (= *Lucuma Baillonii*).—N. Caled.
baladense, Engl. l. c. (= *Lucuma baladensis*).—N. Caled.
calophylloides, Engl. l. c. 276 (= *Platyluma calophylloides*).—Guiana.
crebrifolium, Engl. l. c. 277 (= *Lucuma crebrifolia*).—N. Caled.
Dugulla, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. i. 80.—Austral.
eugeniifolium, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachtr. I. 276.—Guiana.
guianense, Engl. l. c. (= *Meioluma guianensis*).—Guiana.
jacquiniifolium, Engl. l. c. 277 (= *Lucuma jacquiniifolia*).—N. Caled.
laetevirens, Engl. l. c. (= *Lucuma laetevirens*).—N. Caled.
novocaledonicum, Engl. l. c. (= *Pichonia elliptica*).—N. Caled.
pinifolium, Engl. l. c. (= *Peuceuma pinifolia*).—N. Caled.
pomiferum, Engl. l. c. (= *Lucuma pomifera*).—Bras.
ralphianum, Engl. l. c. (= *Achras ralphiana*).—Austral.
tabitense, Nadeaud, in Journ. de Bot. 1897, 111.—Ins. Societ.

SIEGLINGIA, Bernh. (Gramin.).
argentina, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 367.—Reg. Argent.
aristulata, Kuntze, l. c. 341 = *Arundinaria aristulata*.
decumbens, Bernh. Syst. Verz. Erf. 20, 44 = *Danthonia decumbens*.
elongata, Nash, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 504 = *Triodia trinerviglumis*.
paraguayensis, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 341 = *Arundinaria paraguayensis*.
pilosa, Nash, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 504 = *Triodia acuminata*.

SIEVEKINGIA, Reichb. f. (Orchid.).
reichenbachiana, Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag. t. 7576.
—Ecuador.

SIEVERSIA, Willd. = **Geum**, Linn. (Rosac.).
pentapetala, Greene, Pittonia, iv. 49 = G. anemonoides.
sericea, Greene, l. c. 50 = G. sericeum.
turbinata, Greene, l. c. = G. turbinatum.

SIGMATOSTALIX, Reichb. f. (Orchid.).
lehmanniana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxvi. 480.—
N. Granat.

SILENE, Linn. (Caryophyll.).
arabica, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxii.
66.—Arab.
attica, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898, 80.—
Graecia.
Behrii, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxii.
180 = verecunda.
bythinica, Post, in Bull. Herb. Boiss. vii. 152.—Oriens.
capraria, Sommer, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.
v. 113.—Ital.
chinensis, Hort. ex Bosse, Blumengärt. iii. 445 = C.
Fortunei.
columbiana, Howell, Fl. N. W. Amer. 78.—Am. bor.
dilatata, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898,
212.—Am. bor.
fissipetala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. II.
371 = Fortunei.
Gormani, Howell, Fl. N. W. Amer. 77.—Am. bor.
Greenii, Howell, l. c. 76.—Am. bor.
heterodonta, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.
xxxii. 89.—Afr. bor.
heterophylla, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 585.—
Persia.
ionica, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 158.—Graecia.
kumaonensis, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.
xxxii. 43.—Reg. Himal.
lesbiaca, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 155.—
Graecia.
longicalycina, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi.
129.—Turkestan.
macrocalyx, Howell, Fl. N. W. Amer. 78.—Am. bor.
mirabilis, Rouy & Foucaud, Fl. Fr. iii. 114.—Gallia.
monerantha, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.
xxxii. 103.—Oriens.
Morganae, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 586.—
Persia.
obtusidens, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897,
198; et in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 196.—
Eur.
opposita, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv.
339.—Eur.
othyra, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1897,
198; et in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 195.—
Eur.
papillifolia, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.
xxxii. 91.—As. Min.
papillosa, Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898,
21 (non Boiss.)—Bulgaria.
praedichotoma, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv.
155.—Graecia.
pseudo-vestita, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv.
236.—Afr. bor.
pteroneura, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc. xxxii.
132.—Reg. Argent.
rectiramea, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xxviii. 134.
—Am. bor.
Reverchoni, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 237.
—Afr. bor.
rohrbachiana, Aschers. ex F. N. Williams, in Journ.
Linn. Soc. xxxii. 126 = Ungeri.
schizopetala, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. vii. 114,
descr.—Oriens.
szechuensis, F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.
xxxiv. 428.—China.
tempkyana, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v.
584.—Graecia.
tetonensis, E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 117.—
Am. bor.
tetragyna, Suksd. in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1898,
212.—Am. bor.
trajectorum, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi.
128.—Turkestan.
tunetana, Murb. in Act. Univ. Lund. xxxiii. no. 12,
81.—Afr. bor.
tymphaea, Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiv.
339.—Eur.

SILENE :—
viscidula, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 129
(= Franch. ?)—Turkestan.

SILPHIUM, Linn. (Compos.).
chichamangense, Canby, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 319.
—Am. bor.
collinum, Greene, Pittonia, iv. 44.—Am. bor.
helianthoides, Greene, l. c. 43 (non Linn.)—Am. bor.
incisum, Greene, l. c. 45.—Am. bor.
lanceolatum, Canby, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 139 =
chichamangense.
Mohrii, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 493.—
Am. bor.
rumicifolium, Small, l. c. 1898, 145.—Am. bor.
Simpsonii, Greene, Pittonia, iv. 44.—Am. bor.
venosum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 478.
—Am. bor.

SIMLERA, Bub. Fl. Pyren. ii. 196 (1900) = **Leontopo-**
dium, R. Br. (Compos.).
alpina, Bub. l. c. 197 = L. alpinum.

SIMPLICIA, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxix.
(1896) 497. **GRAMINEAE**.
laxa, T. Kirk, l. c.—N. Zel.

SINDORA, Miq. (Legum.).
coriacea, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 206
(= *Azofelia coriacea*)—Penins. Mal.
Echinocalyx, Prain, l. c. 204.—Penins. Mal.
galedupa, Prain, l. c. 483.—Arch. Mal.
intermedia, Prain, l. c. 204.—Penins. Mal.
maritima, Pierre, Fl. Cochinch. t. 385 B.—Cochinch.
mucronata, Pierre, l. c. sub t. 385.—Cochinch.
Wallichii, Scortech. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.
lxvi. 205 = intermedia.

SIPHANTHERA, Pohl (Melast.).
paraensis, Huber, in Bol. Mus. Para. ii. 510.—Bras.

SIPHOCAMPYLUS, Pohl (Campan.).
argutus, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 383.
—Bolivia.
aureus, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 72.—Bolivia.
bilabiatus, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897,
378.—Bolivia.
correoides, A. Zahlbr. l. c.—Bolivia.
discolor, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 248.—
Am. cent.
dubius, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 385.
—Bolivia.
flagelliformis, A. Zahlbr. l. c. 380.—Bolivia.
igneus, Urb. Symb. Antill. i. 452.—Ind. occ.
kuntzeanus, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897,
378.—Bolivia.
laciniatus, Urb. Symb. Antill. i. 451 = Lamarckii.
oblongifolius, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 73.
—Bolivia.
radiatus, Rusby, l. c.—Bolivia.
roseus, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 249.—
Am. cent.
tunarensis, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897,
376.—Bolivia.
tunicatus, A. Zahlbr. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 189.
—Bolivia.
vatkeanus, A. Zahlbr. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897,
377.—Bolivia.

SIPHOCODON, Turcz. (Campan.).
debilis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 447.—Afr.
aust.

SIPHONANTHUS, Linn. = **Clerodendron**, Linn.
(Verben.).
assurgens, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 845 = C. carno-
sulum.
botryodes, Hiern, l. c. 843.—Afr. trop.
conglobata, Hiern, l. c. 840 = C. conglobatum.
costulata, Hiern, l. c. 843 = C. kentrocaule.
cuneifolia, Hiern, l. c. 841 = C. cuneifolium.
dumalis, Hiern, l. c. 846 = C. dumale.
formicarum, Hiern, l. c. 843 = C. formicarum.
glabra, Hiern, l. c. 842 = C. glabrum.
myricoides, Hiern, l. c. 844 = C. myricoides.
sanguinea, Hiern, l. c. 839 = C. megasepalum.
splendens, Hiern, l. c. 841 = C. splendens.
stricta, Hiern, l. c. 840 = C. strictum.
volubilis, Hiern, l. c. 842 = C. volubile.
Welwitschii, Hiern, l. c. 839 = C. Welwitschii.

SIPHONODON, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 500,
sphalm. = **Siphocodon**, Turcz. (Campan.).

SIPHONOGLOSSA, Oerst. (Acanth.).
Pringlei, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. v. 663 (= *Car-*
lowrightia Pringlei).—Mexic.

SIPHONYCHIA, Torr. & Gray (Illecebr.).
corymbosa, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 387.
—Am. bor.

SISARUM, Bub. Fl. Pyren. ii. 357 (1900) = **Sium**, Tourn.
(Umbell.).
palustre, Bub. l. c. = Sium latifolium.

SISYMBRIUM, Tourn. (Crucif.).
anomalum, Asnav. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 137 (non
Wedd.)—Eur. or.
consanguineum, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 75.—Chili.
deserticola, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 594.
—Patag.
ferganense, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix.
412.—Turkestan.
glabrescens, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 493.
—Patag.
glanduliferum, Speg. l. c.—Patag.
halictorum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 348,
errore = *Sophia halictorum*.
intricatissimum, Phil. ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II.
5 = *Draba intricatissima*.
iscandericum, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi.
95.—Turkestan.
iskandericum, Kom. in Compt. Rend. Soc. Nat. Pétersb.
xxvi. i. 28 = praec.
japonicum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vii. 794.—
Japon.
laciniatum, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, i. 79.—Chili.
longesiliquosum, Wenk, in Herb. Eur. 1896, 6, nomen.
—Eur.
Maximowiczii, Palib. in Act. Hort. Petrop. xvii. i. 28.
—Corea.
microtites, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 59.—
Mexic.
ochroleucum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. i. 348.
—Am. bor.
patagonicum, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897,
492.—Patag.
pectinatum, Reiche, Fl. Chile, i. 79 (non Fisch.)—Chili.
perenne, Speg. Contr. Fl. Ventana, 14 (non Steud.)—
Reg. Argent.
perplexum, Hend. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 342.
—Am. bor.
sulphureum, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. ix.
410.—Turkestan.
umbrosium, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xxx. 60.—
Mexic.
Wootonii, Robinson, l. c. 59.—Mexic.

SISYRANTHUS, E. Mey. (Asclep.).
macer, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 291 = imberbis.

SISYRINCHIUM, Linn. (Irid.).
alpestre, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 458.—
Am. bor.
angustifolium, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. 627
(non Mill.)—Chili.
apiculatum, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 300.
—Am. bor.
arenicola, Bickn. l. c. 496.—Am. bor.
asheianum, Bickn. l. c. 607.—Am. bor.
atlanticum, Bickn. l. c. 1896, 134.—Am. bor.
campestre, Bickn. l. c. 1899, 341.—Am. bor.
capillare, Bickn. l. c. 608.—Am. bor.
carolinianum, Bickn. l. c. 221.—Am. bor.
corymbosum, Bickn. l. c. 218.—Am. bor.
cryptocarpum, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi.
126.—Bolivia.
dichotomum, Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899,
609.—Am. bor.
Farwellii, Bickn. l. c. 298.—Am. bor.
flagellum, Bickn. l. c. 226.—Am. bor.
flaviflorum, Bickn. l. c. 345.—Am. bor.
flexile, Bickn. l. c. 613.—Am. bor.
floridianum, Bickn. l. c. 222.—Am. bor.
furcatum, Bickn. l. c. 229.—Am. bor.
fuscum, Bickn. l. c. 225.—Am. bor.
graminoides, Bickn. l. c. 1896, 133.—Am. bor.
halophilum, Greene, Pittonia, iv. 34.—Am. bor.

SISYRINCHIUM :—

- hastile, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 297.—Am. bor.
heterocarpum, *Bickn. l. c.* 348.—Am. bor.
idahoense, *Bickn. l. c.* 445.—Am. bor.
implicatum, *Bickn. l. c.* 228.—Am. bor.
incrustatum, *Bickn. l. c.* 606.—Am. bor.
intermedium, *Bickn. l. c.* 498.—Am. bor.
Langloisii, *Greene, Pittonia*, iv. 32.—Am. bor.
Lechleri, *Staud. ex R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 617 = *Solenomelus Lechleri*.
leptocaulon, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 451.—Am. bor.
littorale, *Greene, Pittonia*, iv. 33.—Am. bor.
longifolium, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 627.—Chili.
Macounii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 245.—Am. bor.
membranaceum, *Bickn. l. c.* 1899, 612.—Am. bor.
miamiense, *Bickn. l. c.* 226.—Am. bor.
montanum, *Greene, Pittonia*, iv. 33.—Am. bor.
nanum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 615.—Am. bor.
nanum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 620.—Chili.
Nashii, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 223.—Am. bor.
occidentale, *Bickn. l. c.* 447.—Am. bor.
pauciflorum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. 622.—Chili.
rosulatum, *Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 228.—Am. bor.
rufipes, *Bickn. l. c.* 224.—Am. bor.
sagittiferum, *Bickn. l. c.* 230.—Am. bor.
scabrellum, *Bickn. l. c.*—Am. bor.
scoparium, *Bickn. l. c.* 227.—Am. bor.
segetum, *Bickn. l. c.* 449.—Am. bor.
septentrionale, *Bickn. l. c.* 452.—Am. bor.
solstitiale, *Bickn. l. c.* 219.—Am. bor.
strictum, *Bickn. l. c.* 299.—Am. bor.
tenellum, *Bickn. l. c.* 610.—Am. bor.
tortum, *Bickn. l. c.* 221.—Am. bor.
Tracyi, *Bickn. l. c.* 614.—Am. bor.
versicolor, *Bickn. l. c.* 606.—Am. bor.
xerophyllum, *Greene, Pittonia*, iv. 32.—Am. bor.

- SITANION**, Rafin. = **Elymus**, Linn. (Gramin.).
Brodei, Piper, in *Erythea*, vii. 100.—Am. bor.
flexuosum, Piper, l. c. 99.—Am. bor.
glaber, J. G. Sm. ex Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 329.—Am. bor.
Hansenii, J. G. Sm. l. c. 328 = *E. Hansenii*.
latifolium, Piper, in *Erythea*, vii. 99.—Am. bor.
Leckenbyi, Piper, l. c. 100.—Am. bor.

- SIUM**, Tourn. (Umbell.).
repandum, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 425.—Afr. trop.

- SLOANEA**, Linn. (Tiliac.).
celebica, *Boerl. & Koord. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 642.—Celebes.
dasycarpa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2628.—Reg. Himal.; China.
Dussii, *Urb. Symb. Antill.* i. 361.—Ind. occ.
hanceana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2628.—China.
hongkongensis, *Hemsl. l. c.* t. 2628.—China.
sinensis, *Hemsl. l. c.* sub t. 2628.—China.

- SLOETIA**, Teijsm. & Binn. (Urtic.).
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.

- SMILACINA**, Desf. (Liliac.).
Fargesii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 246 (= *Tovaria Fargesii*).—China.

- SMILAX**, Tourn. (Liliac.).
Bockii, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 259.—China.
brevipes, *Warb. l. c.* 256.—China.
cinerea, *Warb. l. c.* 258.—China.
cinnamomifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 609.—Am. bor.
cocculoides, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 257.—China.
cyclophylla, *Warb. l. c.*—China.
discotis, *Warb. l. c.* 256.—China.
diversifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 607.—Am. bor.
Gaumerii, *Mills, in Field Columb. Mus. Bot.* 357.—Mexic.

SMILAX :—

- glauco-china, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 255.—China.
longipes, *Warb. l. c.* 256.—China.
megacarpa, Morong, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1894, 434 = Morongii.
Morongii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 605.—Am. bor.
polycoclea, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 257.—China.
Pottingeri, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 174.—Ind. or.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 567.—Am. cent.
renifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 608.—Am. bor.
tenuis, *Small, l. c.* 607.—Am. bor.
trigona, *Warb. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 258.—China.
utilis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2589 (non Wright).—Ind. occ.
Willkommii, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 124.—Eur.

- SMITHIA**, Ait. (Legum.).
congesta, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 259.—Afr. trop.
drepanophylla, *Baker, l. c.* 260.—Afr. trop.
megalophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 292.—Afr. trop.
ochreate, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 191.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
sphaerocephala, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 260.—Afr. trop.
Welwitschii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 190, descr.—Afr. trop.

- SMYRNIUM**, Tourn. (Umbell.).
aeolicum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 160.—Graecia.

- SMYTHEA**, Seem. (Rhamn.).
reticulata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 381.—Penins. Mal.

- SOBRALIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.).
Brandtiae, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1896, i. 608.—Hab. luteola, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 199.—Am. trop.

- SODIROA**, André (Bromel.).
Trianae, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 888.—N. Granat.

- SOLANDRA**, Sw. (Solan.).
boliviana, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 199.—Am. austr.

- SOLANUM**, Tourn. (Solan.).
actaeobotrys, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 192.—Bolivia.
arborescens, Teijsm. & Binn. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 547 = *Minahassae*.
asterosetosum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 224.—Bolivia.
astrochlaenoides, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxviii. 476.—Afr. trop.
aureifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 87.—Bolivia.
azureum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 570.—Mexic.
bathocladon, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxviii. 476.—Afr. trop.
clavatum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 87.—Bolivia.
cremastocarpum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 534.—N. Guin.
dammerianum, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 147 (non Regel).—N. Brit.
deflexum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 301.—Mexic.
dejectum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 569.—Mexic.
erythrotrichum, *Fernald, l. c.* 561.—Am. cent.
Goetzei, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxviii. 473.—Afr. trop.
guanicense, *Urb. Symb. Antill.* i. 399.—Ind. occ.
Hadaq, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 122.—Arabia.
Hayesii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 560.—Am. cent.
hibiscifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 88.—Bolivia.
Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 226.—Reg. Argent.

SOLANUM :—

- hyoscyamifolium, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 190.—Bolivia.
jaliscanum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 571.—Am. cent.
Kaernbachii, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 535.—N. Guin.
Kurzii, *Brace, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 541.—Reg. Himal.
laysanense, *Bitter, in Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xvi. 433.—Ins. Sandw.
Lechleri, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 193.—Bolivia.
lignescens, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 91.—Mexic.
lilacinum, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 192.—Bolivia.
Lindenii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 88.—Bolivia.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 209.—Afr. trop.
macrosolum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 570.—Mexic.
madrense, *Fernald, l. c.* 558.—Mexic.
magnusianum, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxviii. 475.—Afr. trop.
Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 547, nomen.—Celebes.
monotanthum, *Damm, in Engl. Jahrb.* xxviii. 474.—Afr. trop.
myrianthum, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 191.—Bolivia.
nakurense, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 275.—Afr. trop.
nocturnum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 570.—Mexic.
nummularium, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 205.—Austral.
ochraceo-ferrugineum, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 560.—Mexic.
oliverianum, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 535.—N. Guin.
physalifolium, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 88.—Bolivia.
plumense, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 569.—Mexic.
psendolycioides, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 193.—Bolivia.
psidiifolium, *Rusby, l. c.* 194.—Bolivia.
Reineckii, *Brig. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1899, 167.—Bras.
Rusbyi, *Britton, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 191.—Am. austr.
sabaeorum, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 122.—Arabia.
scindicum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 542.—Ind. or.
Sembarto, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 227.—Chili.
sidaefolium, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 46.—Reg. Argent.
sodomaeodes, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 227.—Afr. austr.
symmetricum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 89.—Bolivia.
symphyostemon, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 44.—Afr. trop.
tenuisectum, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 227.—Reg. Argent.
togoense, *Damm, in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 312, nomen.—Afr. trop.
tunariense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 228.—Bolivia.
velutissimum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 89.—Bolivia.
volubile, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 194 (non aliorum).—Bolivia.
Worsleyi, *Hort. in Wien. Ill. Gart. Zeit.* 1900, 57.—Bras.
yapacaniense, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 228.—Bolivia.
- SOLDANELLA**, Linn. (Primul.).
Armena, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, iv. 387.—Reg. Caucas.
- SOLENANTHUS**, Ledeb. (Borag.).
lanatus, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiv. Af. ii. no. 7 (1898) 16 (= *Anchusa lanata*).—Afr. bor.
tubiflorus, *Murb. l. c.* 14.—Afr. bor.
- SOLENOMELUS**, Miers (Irid.).
Segethi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 309 = *Lechleri*.

SOLENOPHORA, Benth. (Gesner.).

calycosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 152.—Am. cent.

SOLENOSTEMON, Thonn. (Labiata).

africanus, Briq. in Engl. Jahrb. xix. 181 = *ocymoides*.
bullatus, Briq. l. c. 180 = *Coleus bullulatus*.
calaminthoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 421.—Afr. trop.
cymosus, *Baker, l. c.* 422.—Afr. trop.
decumbens, *Baker, l. c.* 421.—Afr. trop.
Mannii, *Baker, l. c.* 422.—Afr. trop.
monostachyus, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 359 = *ocymoides*.
niveus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 864.—Afr. trop.
robustus, *Hiern, l. c.* 864.—Afr. trop.
zambesiacus, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 421.—Afr. trop.

SOLIDAGO, Vaill. (Compos.).

bellidifolia, *Greene, Pittonia*, iv. 100.—Am. bor.
chrysopsis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 477.—Am. bor.
ciliosa, *Greene, Pittonia*, iii. 22.—Am. bor.
concinna, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 377.—Am. bor.
decumbens, *Greene, Pittonia*, iii. 161.—Am. bor.
delicatula, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 474.—Am. bor.
diffusa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 378 = *pulcherrima*.
dilatata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 196.—Am. bor.
dispersa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 475.—Am. bor.
fasciculata, *Greene, Pittonia*, iii. 101.—Am. bor.
flaccidifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 477.—Am. bor.
Helleri, *Small, l. c.* 619.—Am. bor.
Maxoni, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 132.—Am. bor.
Nashii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 475.—Am. bor.
oreophila, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 387.—Am. bor.
pallescens, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 120.—Am. bor.
plumosa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 476.—Am. bor.
pruinosa, *Greene, Pittonia*, iv. 70.—Am. bor.
pulcherrima, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 549.—Am. bor.
racemosa, *Greene, Pittonia*, iii. 160.—Am. bor.
subviscosa, *Greene, l. c.* 848.—Am. bor.
trinervata, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.

SONCHUS, Tourn. (Compos.).

elliottianus, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 623 = *Lactuca nana*.
macer, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 404.—Afr. trop.
repens, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 110 = *arvensis*.

SONERILA, Roxb. (Melast.).

albiflora, *Stapf & King, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 28.—Penins. Mal.
andamanensis, *Stapf & King, l. c.* 26.—Penins. Mal.
bicolor, *Stapf & King, l. c.* 43.—Penins. Mal.
brachyantha, *Stapf & King, l. c.* 37.—Penins. Mal.
bracteata, *Stapf & King, l. c.* 35.—Penins. Mal.
caesia, *Stapf & King, l. c.* 36.—Penins. Mal.
calaminthifolia, *Stapf & King, l. c.* 23.—Penins. Mal.
calyculata, *Stapf & King, l. c.* 43.—Penins. Mal.
capitata, *Stapf & King, l. c.* 35.—Penins. Mal.
congesta, *Stapf & King, l. c.* 32.—Penins. Mal.
costulata, *Stapf & King, l. c.* 39.—Penins. Mal.
Cyclaminella, *Stapf & King, l. c.* 33.—Penins. Mal.
elatostemoides, *Stapf & King, l. c.* 42.—Penins. Mal.
elliptica, *Stapf & King, l. c.* 30.—Penins. Mal.
epilobioides, *Stapf & King, l. c.* 22.—Penins. Mal.
flaccida, *Stapf & King, l. c.* 25.—Penins. Mal.
glabriflora, *Stapf & King, l. c.* 42.—Penins. Mal.
hyssopifolia, *Stapf & King, l. c.* 23.—Penins. Mal. ♦
lasiantha, *Stapf & King, l. c.* 29.—Penins. Mal.
macrophylla, *Stapf & King, l. c.* 39.—Penins. Mal.
microcarpa, *Stapf & King, l. c.* 38.—Penins. Mal.
mollis, *Stapf & King, l. c.* 28.—Penins. Mal.
muscolata, *Stapf & King, l. c.* 31.—Penins. Mal.
Nidularia, *Stapf & King, l. c.* 37.—Penins. Mal.

SONERILA :—

pallida, *Stapf & King, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxix. 27.—Penins. Mal.
populifolia, *Stapf & King, l. c.* 26.—Penins. Mal.
repens, *Stapf & King, l. c.* 30.—Penins. Mal.
rudis, *Stapf & King, l. c.* 27.—Penins. Mal.
saxosa, *Stapf & King, l. c.* 31.—Penins. Mal.
succulenta, *Stapf & King, l. c.* 30.—Penins. Mal.
suffruticosa, *Stapf & King, l. c.* 29.—Penins. Mal.

SOPHIA, Linn. = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).
filipes, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 311 = *Sis. incisum*.
gracilis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 475.—Am. bor.
Halictorum, *Cock. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 460.—Am. bor.
intermedia, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 184.—Am. bor.
longipedicellata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 56 = *Sis. incisum*.
ochroleuca, *Woot. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 455.—Am. bor.
pinnata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 56 = *Sis. canescens*.
procera, *Greene, Pittonia*, iv. 199.—Am. bor.
Sonnei, *Greene, l. c.* iii. 95.—Am. bor.
Sophia, *Britton, Fl. N. U. S.* ii. 144 = *Sis. Sophia*.
sophioides, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II.* 4 = *Sis. Sophia*.

SOPHORA, Linn. (Legum.).

Bakeri, *C. B. Clarke, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 466.—Ind. or.
Dunii, *Prain, l. c.*—Burma.
Prazeri, *Prain, l. c.*—Burma.

SOPUBIA, Buch.-Ham. (Scrophul.).

argentea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 774.—Afr. trop.
decumbens, *Hiern, l. c.* 772.—Afr. trop.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 462.—Afr. trop.
filiformis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 772 (non *G. Don*).—Afr. trop.
leprosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 468.—Afr. trop.

SORBARIA, A. Br. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

Aitchisoni, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1900, II. 254 = *Sp. Aitchisoni*.

SORBUS, Tourn. (Rosac.).

californica, *Greene, Pittonia*, iv. 131.—Am. bor.
dumosa, *Greene, l. c.* 129.—Am. bor.
scopolina, *Greene, l. c.* 130.—Am. bor.
subvestita, *Greene, l. c.*—Am. bor.
umbellata, *Fritsch, in Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 18 = *Crataegus umbellata*.

SORGHUM, Linn. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

Arduini, *Jacq. Ecl. Gram.* t. 18 = *A. Sorghum*.
asperum, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 839 = *Pentastichis aspera*.
capense, *Heyne, ex Wall. Cat. n.* 8778 C = *A. halepensis*.
dubium, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. 448 = *A. halepensis*.
giganteum, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi. 181 = *A. halepensis*.
halepense, *Pers. Syn.* i. 101 = *A. halepensis*.
Schreberi, *Ten. Fl. Neap. Syll. App.* iv. p. iv = *A. halepensis*.
Usorum, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 87 = *A. Sorghum*.
vulgare, *Pers. Syn.* i. 101 = *A. halepensis*.

SOULIEA, Franch. in Journ. de Bot. 1898, 69.

RANUNCULACEAE.
vaginata, *Franch. l. c.* 70.—China.

SOUROUBEA, Aubl. = **Ruyschia**, Jacq. (Ternstroem.).

didyma, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 33.—Peruv.
pachyphylla, *Gilg, l. c.*—Peruv.
sympetala, *Gilg, l. c.* 32.—Am. cent.

SPARATTANTHELIUM, Mart. (Combret.).

glabrum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 35.—Bolivia.

SPARATTOSPERMA, Mart. (Bignon.).

ellipticum, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 362 = *psammophilum*.

SPARATTOSPERMA :—

neurocalyx, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 361.—Bras.
stenocarpum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 360.—Bras.
vernicosum, *Bureau & K. Schum. l. c.* 359 = *lithon-tripticum*.

SPARGANIUM, Tourn. (Typhac.).

antipodium, *Graebn. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1898, 33.—N. Zel.
asiaticum, *Graebn. l. c.* 32.—Hab. ?
diversifolium, *Graebn. in Schrift. Nat. Ges. Dansig*, ix. 335.—Germania.
englerianum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 287.—Hybr.
microcarpum, *Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1896, 423 = *ramosum*.
polyedrum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* i. 283.—Hybr.

SPARMANNIA, Linn. f. (Tiliac.).

ricinocarpa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 26 = *Urena ricinocarpa*.

SPARTINA, Schreb. (Gramin.).

caespitosa, *Eaton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 338.—Am. bor.
capensis, *Nees, Fl. Afr. Austr.* 260 = *stricta*.
patagonica, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 579.—Patag.

SPATHOGLOTTIS, Blume (Orchid.).

albida, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 107.—N. Britt.
lauterbachiana, *Kraenzl. ex K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 244.—N. Guin.
papuana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 159.—N. Guin.

SPATHOLIRION, Ridley, in Journ. Bot. 1896, 329.

COMMELINACEAE.
ornatum, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

SPATHOLOBUS, Hassk. (Legum.).

bracteolatus, *Prain, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 76.—Penins. Mal.
dubius, *Prain, ex King, l. c.* 78.—Penins. Mal.
Listeri, *Prain, ex King, l. c.* 76, 415.—Penins. Mal.
Maingayi, *Prain, ex King, l. c.* 79.—Penins. Mal.
merguensis, *Prain, ex King, l. c.* 416.—Penins. Mal.
Pottingeri, *Prain, l. c.* lxxvii. 286.—Ind. or.
Ridleyi, *Prain, ex King, l. c.* lxxvi. 80.—Penins. Mal.
riparius, *Prain, ex King, l. c.* 78, 416.—Penins. Mal.
roseus, *Prain, l. c.* 415.—Ind. or.
squamiger, *Prain, l. c.* 414.—Reg. Himal.

SPECULARIA, Heist. (Campan.).

parviflora, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 37 = *hybrida*.

SPERGULA, Linn. (Caryophyll.).

atheniensis, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxii. no. 12, 45 (= *Spergularia atheniensis*).—Graecia.
diandra, *Murb. l. c.* 44 (= *Arenaria salsuginea*).—Graecia.
marginata, *Murb. l. c.* 45 (= *Lepigonum marinum*).—Eur.
mauritanica, *Murb. l. c.* 47.—Alger.
microsperma, *Murb. l. c.* 44 (= *Lepigonum microspermum*).—Afr. trop.

SPERGULARIA, J. & C. Presl (Caryophyll.).

insularis, *Fouc. in Ann. Soc. Sci. Char.-Inf.* xxxii. 211.—Ins. Balear.

SPERMACOCE, Dill. (Rubiace.).

abyssinica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 123.—Afr. trop.
alternans, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
anthospermodes, *Kuntze, l. c.*—Am. austr.
aretiodes, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
argentea, *Kuntze, l. c.*—Bras.
arida, *Kuntze, l. c.*—Ind. occ.
basalis, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
brachystemodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
centranthodes, *Kuntze, l. c.*—Bras.
Chamissonis, *Kuntze, l. c.*—Bras.
cupularis, *Kuntze, l. c.* = *pusilla*.
decipiens, *Kuntze, l. c.*—Bras.
dispersa, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
divaricata, *Kuntze, l. c.*—Ins. Galapag.
dregeana, *Kuntze, l. c.* 124 = *Mitracarpum dregeanum*.
equisetodes, *Kuntze, l. c.* 123.—Bras.
eritrichodes, *Kuntze, l. c.*—Cuba.

SPERMACOCE—

eryngioides, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 123 = diffusa.
eupatorioides, Kuntze, l. c.—Bras.
falcifolia, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
fastigiata, Kuntze, l. c.—Bras.
Hookeri, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
laxa, Kuntze, l. c.—Bras.
leiophylla, Kuntze, l. c.—Bras.
linearifolia, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
manillensis, Kuntze, l. c.—Ins. Philipp.
martiana, Kuntze, l. c.—Bras.
ovalis, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
parvifolia, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
perpusilla, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
Runkii, Kuntze, l. c.—Bras.
scabiosodes, Kuntze, l. c.—Bras.
spruceana, Kuntze, l. c.—Venez.
squamosa, Kuntze, l. c.—Ind. occ.
suaveolens, Kuntze, l. c. = tenella.
suberecta, Kuntze, l. c.—Ins. Galapag.
thalictroides, Kuntze, l. c.—Bras.
thymifolia, Kuntze, l. c.—Ind. occ.
trichantha, Kuntze, l. c.—Guiana.
valerianodes, Kuntze, l. c.—Bras.
verbenodes, Kuntze, l. c.—Bras.
Warmingii, Kuntze, l. c.—Bras.
wyleriana, Kuntze, l. c.—Ind. occ.
Wunschmannii, Kuntze, l. c.—Bras.

SPERMACOCEODES, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 123 (1898) = **Spermacoce**, Dill. (Rubiaceae).
glabrum, Kuntze, l. c. = **Spermacoce glabra**.
tenuior, Kuntze, l. c. = **Spermacoce tenuior**.

SPHACELE, Benth. (Labiata).

affinis, Auct. in Bull. Herb. Boiss. iv. 957, errore = heteromorpha.
Annae, Taub. ex Schwacke, Pl. Nov. Mineir. ii. 4.—Bras.
chamaedryoides, Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. iii. A. 291 = campanulata.
chilensis, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 805 = campanulata.
cochabambana, Briq. l. c. 807.—Bolivia.
confusa, Briq. l. c. 806.—Bolivia.
Gaudichaudii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 182.—Ecuador.
heteromorpha, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 847.—Bolivia.
Hieronymi, Briq. l. c. 804.—Reg. Argent.
inflata, Briq. l. c. 848.—Reg. Argent.
Jamesonii, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 179.—Ecuador.
kuntzeana, Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 805.—Bolivia.
lindeniana, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 180.—Venez.
mandoniana, Briq. l. c. 176.—Bolivia.
pampeana, Speg. Contr. Fl. Ventana, 49.—Reg. Argent.
Sprucei, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 178.—Ecuador.
Urbani, Briq. in Bull. Herb. Boiss. v. 1014.—Ind. occ.

SPHACOPHYLLUM, Benth. (Compos.).

Buchwaldi, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxiv. 473.—Afr. trop.
Candelabrum, O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter. xiii. 27.—Afr. trop.
pinnatifidum, O. Hoffm. l. c. 26.—Afr. trop.
pumilum, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 573.—Afr. trop.
Welwitschii, O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter. xiii. 27.—Afr. trop.

SPHAERALCEA, A. St. Hil. (Malvac.).

arida, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 177.—Mexic.
cuspidata, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. iii. 519.—Am. bor.
lobata, Woot. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 306.—Am. bor.

SPHAERANTHUS, Vaill. (Compos.).

cristatus, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxiv. 470.—Afr. trop.
epigaeus, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. vi. 560.—Afr. austr.

SPHAEROCARPUM, Steud. Nom. ed. II. ii. 256 (1841), sphalm. = **Sphaerocaryum**, Nees (Gramin.).

SPHAEROCARYUM, Nees (Gramin.).

elegans, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 620.—As. or.

SPHAEROPHYLLUM, Auct. in Just. Jahresb. xxiv. ii. (1899) 393, sphalm. = **Sphacophyllum**, Benth. (Compos.).

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

campestre, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 189 = O. campestris.
chamaenerioides, Small, l. c. = O. chamaenerioides.
decorticans, Small, l. c. 191 = O. gauraeiflora.
divaricatum, C. Gay, Fl. Chil. ii. 323 = O. micrantha.
Hilgardi, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 188 = O. Hilgardi.
hirtellum, Small, l. c. 190 = O. hirtella.
minor, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 130.—Am. bor.
nitidum, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 190 = O. nitida.
refractum, Small, l. c. 192 = O. refracta.
rutilla, Parish, in Erythraea, vi. 89 = O. rutilla.
utahense, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 191.—Am. bor.
veitchianum, Small, l. c. = O. bistorta.

SPHAEROTHYLAX, Bisch. (Podost.).

pusilla, Warming, in Danske Vid. Selsk. Ser. VI. ix. 146.—Afr. trop.

SPHAGNETICOLA, O. Hoffm. in Notizbl. Bot.

Gart. Berlin, iii. (1900) 36. **COMPOSITAE**.
Ulei, O. Hoffm. l. c.—Bras.

SPHENANDRA, Benth. (Scrophul.).

coerulea, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 239 = viscosa.

SPHENOCENTRUM, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par.

n. s. i. (1898) 79. **MENISPERMACEAE**.
jollyanum, Pierre, l. c.—Afr. trop.

SPHENOPUS, Trin. (Gramin.).

Ehrenbergii, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xiii. 57.—Eur.

SPHENOSCIADIUM, A. Gray = **Selinum**, Linn.

(Umbell.).
eryngiifolium, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 128 = Sel. eryngiifolium.

SPHENOSTYLIS, E. Mey. = **Vigna**, Savi (Legum.).

Schweinfurthii, Harms, in Engl. Jahrb. xxvi. 309.—Afr. trop.
stenocarpa, Harms, l. c. = V. ornata.

SPHONDYLIIUM, Tourn. = **Heracleum**, Linn. (Um-

bell.).
proticiforme, Bub. Fl. Pyren. ii. 394 = H. Sphondylium.

SPIGELIA, Linn. (Logan.).

Blainii, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 432.—Ind. occ.
elongata, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 542.—Am. bor.
nervosa, Gilg, in Engl. Jahrb. xxv. 782 (non Steud.).—Ecuador.
sessilifolia, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 543.—Am. bor.

SPILANTHES, Jacq. (Compos.).

americana, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 42 = Mutisii.
filipes, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxv. 314.—Mexic.
Sodiroid, Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb. xxix. 42.—Ecuador.

SPINFIFEX, Linn. (Gramin.).

dioicus, Buch.-Ham. ex Pritz. Index Ic. Bot. 1058 = squarrosus.

SPIRAEA, Linn. (Rosac.).

Aitchisoni, Hemsl. in Gard. Chron. 1900, ii. 284.—Afghan.
cinerascens, Piper, in Erythraea, vii. 171.—Am. bor.
Hendersoni, Piper, l. c. 172 (= *Luetkea Hendersoni*).—Calif.
Rosthornii, E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 383.—China.
uniflora, Piper, in Erythraea, vii. 172 (= *Luetkea uniflora*).—Am. bor.

SPIRANTHES, Rich. (Orchid.).

abyssinica, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 289 = *Deroemia squamata*.
constricta, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 339 (= *Gyrostachis constricta*).—Am. sept.
exigua, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 200.—China.
metallica, Rolfe, l. c. 46.—Bras.; Guiana.
Nelsonii, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxv. 307.—Mexic.
oaxacana, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 34.—Mexic.
Reverchonii, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 339 (= *Gyrostachis Reverchonii*).—Am. sept.
tenuiflora, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxv. 308.—Mexic.
triloba, K. Schum. in Just. Jahresb. xxvi. i. 339 (= *Gyrostachis triloba*).—Am. sept.

SPIREA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. i. (1898)

88. **RUBIACEAE**.
montana, Pierre, l. c.—Afr. trop.

SPIRODELA, Schleid. = **Lemna**, Linn. (Lemnac.).

punctata, C. H. Thompson, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1898, 28 = L. punctata.

SPIROPETALUM, Gilg (Connar.).

heterophyllum, Gilg, in Engl. Jahrb. xxiii. 214 (= *Rourea heterophylla*).—Afr. trop.
Solanderi, Gilg, l. c. (= *Rourea Solanderi*).—Afr. trop.

SPODIOPOGON, Trin. (Gramin.).

angustifolius, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. IV. ii. 300 = *Ischaemum angustifolium*.
Beccarii, Stapf, in Kew Bull. 1898, 228.—Sumatra.
depauperatus, Hack. in Bull. Herb. Boiss. vii. 641.—Japon.
laniger, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Ischaemum angustifolium*.
Lehmanni, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 91 = *Ischaemum petiolare*.
notopogon, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 373 = *Ischaemum angustifolium*.
pilosus, Nees, l. c. = *Ischaemum pilosum*.
petiolaris, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. 301 = *Ischaemum petiolare*.

SPONDIAS, Linn. (Anacard.).

lakonensis, Pierre, Fl. Cochinch. t. 375 B.—Cochinch.

SPOROBOLUS, R. Br. (Gramin.).

aciniifolius, Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 581.—Afr. austr.
agrostoides, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 67.—Afr. trop.
andongensis, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 208.—Afr. trop.
arundinaceus, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 369 (= *Diachryum arundinaceum*).—Reg. Argent.
Benthami, F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl. xiii. 16.—Austral.
blephariphyllus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 398 = *discosporus*.
capensis, Kunth, Enum. i. 212 = *indicus*.
copiapinus, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciv. 6.—Chili.
discosporus, Nees, Fl. Afr. Austr. 158 = *coromandehanus*.
distichophyllus, R. Phil. in Anal. Univ. Chil. xciii. 7 (= *Agrostis distichophylla*, Phil.).—Chili.
filiformis, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xvii. 173 (non Rydb.).—Am. bor.
geniculatus, Nees, ex Aitch. Cat. Punjab Pl. 165 = *tremulus*.
Ghikae, Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis, 199.—Afr. trop.
giganteus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 88.—Am. bor.
littoralis, Kunth, Rév. Gram. i. 68 = *virginicus*.
Matrella, Nees, Fl. Afr. Austr. 152 = *virginicus*.
natalensis, Th. Dur. & Schinz, Cónsp. Fl. Afr. v. 822 = *indicus*.
Palmeri, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 48.—Mexic.
podotrichus, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 168.—Afr. trop.
ruppelianus, Hochst. ex Stapf, in Dyer, Fl. Cap. vii. 586 = *indicus*.
sanguineus, Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl. ii. 209.—Afr. trop.

SPOROBOLUS :—

simplex, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 48.—Am. bor.
somalensis, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 169.—Afr. trop.
Sporobolus, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 369 = Sprengelii.
tenuissimus, Kuntze, l. c. = minutiflorus.
Thurberi, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 48.—Mexic.
tremulus, *Kunth, Rev. Gram.* i. 67.—As. or.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 207.—Afr. trop.

STAAVIA, Dahl (Bruniac.).

Dodii, *Bolus, in Hook. Ic. Pl.* t. 2558.—Afr. austr.

STABEROHA, Kunth = **Thamnochortus**, Berg. (Restiac.).

distachya, Kunth, *Enum. Pl.* iii. 444 = T. umbellatus.
imbricata, Kunth, l. c. 442 = T. imbricatus.
stenoptera, Kunth, l. c. 443 = T. imbricatus.

STACHYANTHEMUM, Klotzsch, in Schomb. Reisen Brit. Guiana, iii. 1097 (1848) = **Cyrilla**, Garden (Cyrill.).

Schomburgkii, Klotzsch, l. c. = C. antillana.

STACHYANTHUS, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 227 (1897); et in Engl. Jahrb. xxiv. (1898) 487. **OLACACEAE**.

Zenkeri, *Engl. ll. cc.*—Afr. trop.

STACHYOTHRYSUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. 198 (1897); et in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 277. **LEGUMINOSAE**.

Staudtii, *Harms, ll. cc.*—Afr. trop.

STACHYS, Tourn. (Labiata.).

africana, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 262 = *Ballota africana*.
andongensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 874.—Afr. trop.
aquatia, *Bub. Fl. Pyren.* i. 444 = palustris.
aragonensis, *Lasaro, in Anal. Soc. Espan. Hist. Nat.* xxix. 160.—Eur.
Bachmannii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 75.—Afr. austr.
Bakeri, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 266.—Madag.
boliviana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 871.—Bolivia.
bracteata, *Greene, Pittonia*, iii. 342.—Am. bor.
chrysotrichos, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 316.—Afr. austr.
confusa, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 122.—Am. bor.
Cooleyae, *Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 590.—Am. bor.
debilis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xx. 234 = Bakeri.
dolopica, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 75.—Graecia.
dubia, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 873.—Chili.
Emersoni, *Piper, in Erythea*, vi. 31.—Am. bor.
erectiuscula, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 315.—Afr. austr.
eriphylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 713.—Patag.
Fendleri, *Briq. l. c.* 115.—Venez.
flaccida, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 563.—Mexic.
fragillima, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* vii. 118.—Oriens.
Fuchsii, *Bub. Fl. Pyren.* i. 440 = germanica.
Galanderi, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 870.—Reg. Argent.
hians, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 116.—N. Granat.
hispidia, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 263 = Thunbergii.
huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 875.—Afr. trop.
ingrata, *Greene, Pittonia*, iii. 341.—Am. bor.
Kuntzei, *Guerke, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 262.—Afr. austr.
lanuginosa, *Greene, Pittonia*, iii. 342.—Am. bor.
lasiocalyx, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1898, 317.—Afr. austr.
littoralis, *Greene, Pittonia*, iii. 341 (non Phil.).—Am. bor.
Lorentzii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 869.—Reg. Argent.

STACHYS :—

macedonica, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 189 (non D. Don).—Eur.
macrostachya, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 261 = longifolia.
malacophylla, *Greene, Pittonia*, iii. 343.—Am. bor.
mandoniana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 118.—Bolivia.
Marrubiastrum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 266 = hirta.
miceliiana, *Briq. ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxii. no. 10, 7.—Parag.
minima, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 550 = spatulata.
oaxacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 564.—Mexic.
Ocymastrum, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 291 = hirta.
petiolosa, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 868.—Reg. Argent.
Pichleri, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 137.—Syria.
Pittieri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 119.—Am. cent.
pseudonigrans, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 315.—Afr. trop.
pubens, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 581.—Am. bor.
pusilla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 120.—Am. trop.
recurva, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* vi. 549 = rugosa.
rivularis, *J. M. Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 489.—Afr. austr.
Schlechteri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 74.—Afr. austr.
scopolorum, *Greene, Pittonia*, iii. 342.—Am. bor.
serotina, *Fritsch, Excursionsfl. Oesterr.* 475 = S. betonica.
sessilis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxvi. 74.—Afr. austr.
simplex, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 221.—Afr. austr.
Sprucei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 117.—Ecuador.
striata, *Greene, Pittonia*, iii. 341.—Am. bor.
transvaalensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 316.—Afr. austr.
tucumanensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 872.—Reg. Argent.
velutina, *Greene, in Erythea*, ii. 121 = malacophylla.
venezuelana, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 114.—Venez.

STACHYTARPHETA, Vahl (Verben.).

boliviana, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 396.—Bolivia.

STACHYURUS, Sieb. & Zucc. (Ternstroem.).

chinensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 254.—China.
salicifolius, *Franch. l. c.* 253.—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.*—China.

STACKHOUSIA, Sm. (Stackhous.).

intermedia, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iii. 281.—Austral.

STANHOPEA, Frost (Orchid.).

Fuerstenbergiae, *Kraensl. in Gard. Chron.* 1899, II. 161.—Hort.
impresa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 196.—Reg. Andin.
intermedia, *Klinge, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 142.—Mexic.
madouxiana, *Cogn. in Gard. Chron.* 1898, II. 134.—N. Granat.
stenochila, *F. C. Lehm. & Kraensl. in Gard. Chron.* 1900, II. 369.—N. Granat.

STANLEYA, Nutt. (Crucif.).

bipinnata, *Greene, in Erythea*, iv. 173.—Am. bor.
confertiflora, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 59.—Am. bor.

STAPELIA, Linn. (Asclep.).

anemoniflora, *Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliiii. 118; et in *Mém. Inst. Égypt.* iii. 276.—Arab.
chrysostephana, *Defters, l. c.* 117; et l. c. 274.—Arab.
cupularis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1897, II. 45.—Afr. austr. ?
hanburyana, *Berger & Ruest, in Monatsschr. Kakt.* 1899, 6.—Hort.

STAFFIA, Davy, in *Erythea*, vi. (1898) 109 = **Neostaffia**, Davy (Gramin.).
colusana, Davy, l. c. = N. colusana.

STAPHYLEA, Linn. (Sapind.).

Francheti, *H. Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 221.—Japon.

STAPHYSORA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1233; et ex Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 521. **EUPHORBIACEAE**.

albida, *Pierre, ex Pax, l. c.*, nomen.—Afr. trop.
Dusenii, *Pax, l. c.*—Afr. trop.
klaineana, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* 1233, nomen.—Afr. trop.

STATHMOSTELMA, K. Schum. (Asclep.).

bicolor, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii. 457.—Afr. trop.
odoratum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
pachycladum, *K. Schum. l. c.* 458.—Afr. trop.

STATICE, Tourn. (Plumbag.).

anthericoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxiv. 450.—Afr. austr.
Chazaliei, *H. Boissieu, in Journ. de Bot.* 1896, 220.—Afr. trop.
depressa, *Bub. Fl. Pyren.* i. 194.—Pyren.
Doerfleri, *Halacsy, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1899, 1.—Graecia.
dubyeana, *Bub. Fl. Pyren.* i. 196.—Pyren.
laxissima, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 296.—Eur.
limbata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 390.—Am. bor.
Maurocordatae, *Volkens & Schweinf. in Ghika, Pays des Somalis*, 208.—Afr. trop.
patagonica, *Spig. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 548.—Patag.
setigera, *Bub. Fl. Pyren.* i. 197 = ferulacea.

STAUDIYA, Warb. in Nov. Act. Nat. Cur. lxviii. (1897) 128. **MYRISTICACEAE**.

kamerunensis, *Warb. l. c.* 241.—Afr. trop.
pterocharpa, *Warb. l. c.* 243.—Afr. trop.

STAUANTHERA, Benth. (Gesner.).

argyrescens, *Hallier f. in Ann. Jard. Buitens.* xiii. 286.—Malaya.
chiritaeflora, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2454.—China.
ionantha, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* vi. 286.—Sumatra.

STAUROCHILUS, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. (1896) 351. **ORCHIDEAE**.

fasciatus, *Ridley, l. c.* (= *Trichoglottis fasciata*).—Penins. Mal.

STAUROGYNE, Wall. = **Ebermaiera**, Nees (Acanth.).

diantheroides, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 645.—Bolivia.
ericoides, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. lx. 44.—Bras.
eustachya, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 644.—Bras.
glutinosa, *Lindau, l. c.*—Bras.
macrantha, *Lindau, l. c.* 643.—Bras.

STAUROSTIGMA, Scheidw. (Arac.).

vermicola, *Spig. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 89.—Reg. Argent.

STEGANTHERA, Perkins, in Engl. Jahrb. xxv. (1898) 564. **MONIMIACEAE**.

fengeriana, *Perkins, l. c.* 566.—N. Guin.
hirsuta, *Perkins, l. c.* 567 (= *Kibarahirsuta*).—N. Guin.
oblongiflora, *Perkins, l. c.* 566.—N. Guin.
schumanniana, *Perkins, l. c.* 565.—N. Guin.
thyrsoflora, *Perkins, l. c.*—N. Guin.
Warburgii, *Perkins, l. c.* 564.—Celebes.

STEIRODISCUS, Less. (Compos.).

gamolepis, *Bolus, ex Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 216.—Afr. austr.
Schlechteri, *Bolus, l. c.* 217.—Afr. austr.

STELECHOCARPUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).

Schefferi, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 12; et in *l. c.* Bogor. t. 71 (= *Sageraea cauliflora*).—Sumatra.

STELIN, Bub. Fl. Pyren. i. 128 (1897) = **Viscum**,

Tourn. (Loranth.).
album, *Bub. l. c.* 129 = V. album.

- STELIS**, Sw. (Orchid.).
 furfuracea, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 447.—N. Granat.
 guatemalensis, *Schlechter, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 541.—Am. cent.
 lindleyana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 346.—Peruv.
 micrantha, *Barb. Rodr. Gen. et Sp. Orch.* Nov. ii. 93 = *Rodriguesii*.
 pachypus, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 447.—N. Granat.
 popayanensis, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 448.—N. Granat.
 rhynchanthera, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.* 447.—N. Granat.
 Rodriguesii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. 360.—Bras.
 suaveolehs, *F. C. Lehm. & Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 448.—Ecuador.
 viridi-brunnea, *F. C. Lehm. & Kraenzl. l. c.*—Ecuador.
- STELLARIA**, Linn. (Caryophyll.).
 antillana, *Urb. Symb. Antill.* i. 303.—Ind. occ.
 dichasioides, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 435.—China.
 Henryi, *F. N. Williams, l. c.* 434.—China.
 irazuensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 236.—Am. cent.
 minuta, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 57.—N. Zel.
 nutans, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 434.—China.
 oxyphylla, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 165.—Am. cent.
 palustris, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 87 = *Callitriche verna*.
 Souliei, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 434.—China.
 uda, *F. N. Williams, l. c.* 435.—China.
 washingtoniana, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 166.—Am. cent.
 wushanensis, *F. N. Williams, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 434.—China.
- STELLARIOPSIS**, Rydb. in *Mem. Columb. Univ.* ii. (1898) 155. **ROSACEAE**.
 santalinoidea, *Rydb. l. c.* (= *Potentilla santalinoidea*).—Am. bor.
- STELLINA**, Bub. *Fl. Pyren.* i. 85 (1897) = *Callitriche*, Linn. (Halorag.).
 hamulata, *Bub. l. c.* 87 = *C. hamulata*.
 platycarpa, *Bub. l. c.* 86 = *C. stagnalis*.
 stagnalis, *Bub. l. c.* 85 = *C. stagnalis*.
- STELMAGONUM**, Baill. (Asclep.).
 Holtonii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 424.—N. Granat.
- STEMMADENIA**, Benth. (Apocyn.).
 macrophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 310.—Mexic.
 tomentosa, *Greenm. l. c.*—Mexic.
- STEMODIA**, Linn. (Scrophul.).
 ceratophylloides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. i. 395.—Afr. trop.
 crenatifolia, *K. Schum. l. c.*—Bolivia.
 ericifolia, *K. Schum. l. c.*—Parag.
 tenera, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
- STEMODIACRA**, P.Br. = *Stemodia*, Linn. (Scrophul.).
 ceratophylloides, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 759 = *Stemodia ceratophylloides*.
 crenatifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 239 = *Stemodia crenatifolia*.
 ericifolia, *Kuntze, l. c.* = *Stemodia ericifolia*.
 sessiliflora, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 758 = *Limnophila sessiliflora*.
 tenera, *Hiern, l. c.* 759 = *Stemodia tenera*.
- STEMODIOPSIS**, Engl. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. (1897) 25. **SCROPHULARIACEAE**.
 Rivae, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
- STEMONA**, Lour. (Roxburgh.).
 acuta, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 493.—China.
 australiana, *C. H. Wright, l. c.* 496.—Austral.
- STEMONA** :—
 javanica, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 495.—Java et Austral.
 moluccana, *C. H. Wright, l. c.* 494.—Java.
 parviflora, *C. H. Wright, l. c.* 496.—China.
- STEMONOPORUS**, Thw. = *Vateria*, Linn. (Diptero-carp.).
 lewisianus, *Trim. ex Hook. f. in Trim. Fl. Ceyl.* v. 383.—Zeylan.
 revolutus, *Trim. l. c.* 384.—Zeylan.
- STEMONURUS**, Blume = *Gomphandra*, Wall. et *Lasianthera*, Beauv. (Olac.).
 celebicus, *Valet. ex Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 394.—Celebes.
 puberulus, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 414.—N. Guin.
- STEMOTRIA**, Wettst. & Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Register*, 462 (1899). **SCROPHULARIACEAE**.
- STENANDRIUM**, Nees (Acanth.).
 Wrightii, *Lindau, in Urb. Symb. Antill.* ii. 208.—Ind. occ.
- STENANTHELLA**, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 530. **LILIACEAE**.
 occidentalis, *Rydb. l. c.* 531 (= *Stenanthium occidentale*).—Am. bor.
 sachalinensis, *Rydb. l. c.* 530 (= *Stenanthium sachalinense*).—Ins. Sachalin.
- STENANTHERA**, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. (1900) 57. **ANONACEAE**.
 gabonensis, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra gabonensis*).—Afr. trop.
 hamata, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra hamata*).—Afr. trop.
 myristicifolia, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra myristicifolia*).—Afr. trop.
- STENOCORYNE**, Lindl. = *Bifrenaria*, Lindl. (Orchid.).
 wendlandiana, *Kraenzl. in Xenia Orch.* t. 289.—Bras. ?
- STENOGLOTTIS**, Lindl. (Orchid.).
 zambesiaca, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 190.—Afr. trop.
- STENOLIRION**, Baker, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2493 (1896). **AMARYLLIDACEAE**.
 Elliottii, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
- STENOLOBIUM**, D. Don (Bignon.).
 amoenum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 372 (= *Gelsemium amoenum*).—Bolivia.
- STENOPHRAGMA**, Čelak. (Crucif.).
 virgatum, *Greene, Pittonia*, iii. 138 (= *Sisymbrium virgatum*).—Am. bor.
- STENOPHYLLUS**, Rafin. = *Scirpus*, Tourn. (Cyper.).
 ciliatifolius, *Mohr, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 22 = *Sc. ciliatifolius*.
- STENORYNCHUS**, Rich. = *Spiranthes*, Rich. (Orchid.).
 comosus, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 299.—Bolivia.
- STENOSTEPHANUS**, Nees (Acanth.).
 puberulus, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 670.—N. Granat.
- STENOTOPSIS**, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 617. **COMPOSITAE**.
 interior, *Rydb. l. c.* (= *Stenotus interior*).—Am. bor.
 linearifolia, *Rydb. l. c.* (= *Stenotus linearifolius*).—Am. bor.
- STENOTUS**, Nutt. = *Aplopappus*, Cass. (Compos.).
 Andersonii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 615.—Am. bor.
 falcatus, *Rydb. l. c.* 616.—Am. bor.
- STEPHANIA**, Lour. (Menisperm.).
 cyanantha, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 20.—Afr. trop.
- STEPHANOLEPIS**, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 153. **COMPOSITAE**.
 centauroides, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.
- STEPHANOMERIA**, Nutt. (Compos.).
 lygodesmoides, *M. A. Jones, ex Hend. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 349.—Am. bor.
- STERCULIA**, Linn. (Stercul.).
 ambacensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 83.—Afr. trop.
 cognata, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 285.—Ind. or.
 Garrawayae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* iv. 463.—Austral.
 graciloides, *Boerl. & Koord. in Ic. Bogor.* t. 4.—Sumatra.
 hymenocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. Beibl. lviii. 18.—Tonkin.
 malacophylla, *K. Schum. l. c.* 15.—Malaya.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 640.—Celebes.
 obscura, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. Beibl. lviii. 15.—Borneo.
 pachyclados, *K. Schum. l. c.* 17.—Borneo.
 pedunculata, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 180.—Afr. trop.
 rhinopetala, *K. Schum. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* v. 102.—Afr. trop.
 rhynchophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. Beibl. lviii. 16.—Borneo.
 stapfiana, *K. Schum. l. c.* 19.—Java.
 vitifolia, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 137; et in *Queensl. Agric. Journ.* iv. 464.—Austral.
- STEREOCHILUS**, Lindl. (Orchid.).
 bicuspidatus, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii. 236 (= *Cleisostoma bicuspidatum*).—Reg. Himal.
 Wattii, *King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 595.—Reg. Himal.
- STEREOSANTHUS**, Franch. in *Journ. de Bot.* 1896, 384. **COMPOSITAE**.
 Delavayi, *Franch. l. c.* 385.—China.
 Souliei, *Franch. l. c.*—China.
 yunnanensis, *Franch. l. c.*—China.
- STERIPHOMA**, Spreng. (Cappar.).
 Urbani, *Eggers, in Bot. Centralbl.* lxxiii. 67, errore 51.—Ecuador.
- STERNBERGIA**, Waldst. & Kit. (Amaryll.).
 chusiana, *Boiss. Fl. Or.* v. 148 = *macrantha*.
 grandiflora, *Boiss. ex Baker, in Bot. Mag.* t. 7459 = *macrantha*.
 latifolia, *Boiss. & Haussk. ex Baker, l. c.* = *macrantha*.
 macrantha, *J. Gay, in Boiss. Fl. Or.* v. 148.—Oriens.
 stipitata, *Boiss. & Haussk. in Boiss. l. c.* = *macrantha*.
- STEVIA**, Cav. (Compos.).
 ahalensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 712.—Reg. Argent.
 alternifolia, *Hieron. l. c.* 740.—Bras.
 arachnoidea, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 326.—Mexic.
 Balansae, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 739.—Parag.
 brevipapposa, *Hieron. l. c.* 718.—Bolivia.
 Brunetii, *Hieron. l. c.* 723.—Bras.
 clinopodioides, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 307.—Mexic.
 cochabambensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 726.—Bolivia.
 cruziana, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 33.—Bras.
 decumbens, *Greene, Pittonia*, iii. 32.—Mexic.
 deltoidea, *Greene, l. c.* 31.—Mexic.
 dianthoidea, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 4.—Ecuador.
 diffusa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 307.—Mexic.
 diversipapposa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 708.—Reg. Argent.
 effusa, *Hieron. l. c.* 710.—Reg. Argent.
 entreciensis, *Hieron. l. c.* 739.—Reg. Argent.
 galeopsidifolia, *Hieron. l. c.* 719.—Bolivia.
 grandidentata, *Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 81, nomen; et ex *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 55.—Bolivia.
 grisebachiana, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 716.—Reg. Argent.
 humilis, *Hieron. l. c.* 730.—Bolivia.
 hypericifolia, *Hieron. l. c.* 732.—Bras.

STEVIA :—

- Kuntzei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 733.—Bolivia.
 Lechleri, *Hieron. l. c.* 727.—Peruv.
 mercedensis, *Hieron. l. c.* 735.—Reg. Argent.
 neurophylla, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 327.—Mexic.
 nevadensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 729.—Reg. Argent.
 obovata, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 55.—Bolivia.
 portrerensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 715.—Reg. Argent.
 procumbens, *Hieron. l. c.* 728.—Reg. Argent.
 pubigera, *Hieron. l. c.* 720.—Reg. Argent.
 rosei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 327.—Mexic.
 saltensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 725.—Reg. Argent.
 sanguinea, *Hieron. l. c.* 714.—Reg. Argent.
 santacruzensis, *Hieron. l. c.* 731.—Bolivia.
 Schickendantzii, *Hieron. l. c.* 717.—Reg. Argent.
 Schnltzii, *Hieron. l. c.* 721.—Reg. Argent.
 seleriana, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 327.—Mexic.
 tapacariensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 734.—Bolivia.
 tephra, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 328.—Mexic.
 tunariensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 713.—Bolivia.
 yaconensis, *Hieron. l. c.* 724.—Reg. Argent.

STIBURUS, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 696 (1900). **GRAMINEAE.**

- alopecuroides, *Stapf, l. c.* 697.—Afr. austr.
STICHORCHIS, Thou. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
decurrens, Pfitzer, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 103 = *L. decurrens*.
disticha, Pfitzer, l. c. = *L. disticha*.
latifolia, Pfitzer, l. c. = *L. latifolia*.
pendula, Pfitzer, l. c. = *L. longipes*.

STICTOCARDIA, Hallier f. = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).
Woodii, Hallier f. in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 548 = *I. Woodii*.**STIGMAPHYLLON**, A. Juss. (Malpigh.).

- alulatum, *Niedenzu, in Index Lect. Lyc. Brunsb.* 1900, aest. 16.—Bras.
 coloratum, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 14.—Bolivia.
 cordifolium, *Niedenzu, in Index Lect. Lyc. Brunsb.* 1899, hiem. 8.—Ind. occ.
 grenadense, *Niedenzu, l. c.* 1900, aest. 26.—Ind. occ.
 hirsutum, *Niedenzu, l. c.* 25.—Bras.
 incanum, *Niedenzu, l. c.* 5 = *velutinum*.
 lanuginosum, *Niedenzu, l. c.* 1899, hiem. 9.—Peruv.
 Monacistrum, *Niedenzu, l. c.* 13.—N. Granat.
 ovatum, *Niedenzu, l. c.* 1900, aest. 31 (= *Brachypteryx borealis*).—Am. trop.; Ind. occ.
 psilocardium, *Niedenzu, l. c.* 15.—Bras.
 ruizianum, *Niedenzu, l. c.* 1899, hiem. 10.—Am. trop.
 selerianum, *Niedenzu, l. c.* 1900, aest. 7.—Mexic.
 tiliifolium, *Niedenzu, l. c.* 16.—N. Granat.; Ind. occ.
 tomentosum, *Niedenzu, l. c.* 1899, hiem. 5 = *rotundifolium*.

STILBE, Berg. (Verben.).

- mucronata, *N. E. Brown, in Hook. Ic. Pl.* t. 2526.—Afr. austr.

STIPA, Linn. (Gramin.).

- acrociliata, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xiii. 167.—Austral.
 amphicarpa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 726.—Chili.
 araucana, *R. Phil. l. c.* 717.—Chili.
 argentina, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 67.—Reg. Argent.
 aristoides, *Stapf, ex Lisboa, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* vii. 358 = *Aristida redacta*.
 barbinodis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 721.—Chili.
 basi-plumosa, *Munro, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 229.—Ind. or.
 brevifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 724.—Chili.
 capensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 371 = *dregeana*.
 ceresiensis, *Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.
 collina, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 720.—Chili.

STIPA :—

- concinna, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 230.—Ind. or.
 curicoana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 726.—Chili.
 Duthiei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 232.—Ind. or.
 elongata, *Staud. Syn. Pl. Gram.* 132 = *dregeana*.
 eriocalis, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiii. 401 = *pennata*.
 formosa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 723.—Chili.
 hispida, *R. Phil. l. c.* 719.—Chili.
 Ibari, *R. Phil. l. c.* 716.—Chili.
 Julieti, *R. Phil. l. c.* 719.—Chili.
 juncooides, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 68.—Reg. Argent.
 Lagascae, *Guss. Pl. Rar.* 48 = *capillata*.
 Landbecki, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 718.—Chili.
 latissimifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Reg. Argent.
 litoralis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 717.—Chili.
 longicylindrica, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Urug.
 longifolia, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 725 (non *Borb.*).—Chili.
 Luehmanni, *Reader, in Vict. Nat.* xvi. 158.—Austral.
 macrathera, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 720.—Chili.
 minor, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 46.—Am. bor.
 montana, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 723.—Chili.
 Nelsoni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 46.—Am. bor.
 neomexicana, *Scribn. l. c.* xvii. 132.—Am. bor.
 oregonensis, *Scribn. l. c.* 130.—Am. bor.
 oreophila, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 65.—Reg. Argent.
 pallida, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373 (= *Piptochaetium pallidum*).—Reg. Argent.
 pampeana, *Speg. Contr. Fl. Ventana*, 64.—Reg. Argent.
 patagonica, *Speg. in Agron. La Plata*, 1897, 581.—Patag.
 patulifolia, *Pilger, in Engl. Jahrb.* xxvii. 26.—Ecuador.
 phaeocarpa, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 721.—Chili.
 quadrifaria, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Reg. Argent.
 Readeri, *F. Muell. ex Reader, in Vict. Nat.* xiii. 168 = *acrociliata*.
 saltensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 372.—Reg. Argent.
 stricta, *Vasey, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1883, 42 = *oregonensis*.
 tandilensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373.—Reg. Argent.
 tartarica, *Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 229 = *orientalis*.
 thessala, *Hauskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xiii. 41.—Eur.
 tiraquensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 373.—Bolivia.
 trichocaulos, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciii. 718.—Chili.
 Tweedyi, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.* xi. 47.—Am. bor.
 Williamsii, *Scribn. l. c.* 45.—Am. bor.

STIPAGROSTIS, Nees = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
capensis, *Nees, in Linnæa*, vii. 291 = *A. obtusa*.**STIPTANTHUS**, Briq. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 352 (1897). **LABIATAE.**
polystachyus, *Briq. l. c.* (= *Anisochilos polystachyum*).—Ind. or.**STIRONEURUM**, Radlk. ex *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II.* i. i. (1899) 31. **SAPO-TACEAE.**
stipulatum, *Radlk. l. c.* 32.—Afr. trop.**STIZOLOBIUM**, P. Br. = **Mucuna**, Adans. (Legum.).
mapirensis, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 25.—Bolivia.
Poggei, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 252 = *M. Poggei*.**STIZOPHYLLUM**, Miers = **Bignonia**, Linn. (Bignon.).
inaequilaterum, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 221 = *B. inaequilatera*.**STOEBE**, Linn. (Compos.).
cyathuloides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 201.—Afr. austr.
sphaerocephala, *Schlechter, l. c.* 202.—Afr. austr.**STRAMONIUM**, Tourn. = **Datura**, Linn. (Solan.).
globosum, *Bub. Fl. Pyren.* i. 351 = *D. Metel.***STRAUSSIA**, A. Gray (Rubiace.).
psychotrioides, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 904.—Ins. Sandw.
pubiflora, *A. A. Heller, l. c.* 905.—Ins. Sandw.**STRAUSSIELLA**, *Hauskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xi. (1897) 68. **CRUCIFERAE.**
iranica, *Hauskn. l. c.* 70.—Oriens.**STREBLACANTHUS**, Kuntze (Acanth.).
macrophyllus, *Lindau, in Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 306.—Am. cent.**STREPTANTHUS**, Nutt. (Crucif.).
argutus, *Greene, Pittonia*, iii. 227.—Am. bor.
asper, *Greene, l. c.* 225.—Am. bor.
crassifolius, *Greene, l. c.* 227.—Am. bor.
foliosus, *Greene, l. c.* 226.—Am. bor.
linearis, *Greene, l. c.* 225.—Am. bor.
wyomingensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 126.—Am. bor.**STREPTIA**, *Rich. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 333 (1897) = **Streptogyne**, Beauv. (Gramin.).
crinita, *Rich. l. c.* = *Streptogyne crinita*.
secunda, *Rich. l. c.* = *Streptogyne crinita*.**STREPTOCARPUS**, Lindl. (Gesner.).
chinensis, *Franch. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 252.—China.
pentherianus, *A. Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 71.—Afr. austr.
Wilmsii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 363.—Afr. austr.**STREPTOGYNE**, Beauv. (Gramin.).
gerontogaca, *Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon*, v. 301.—As. et Afr. trop.**STREPTOTRACHELUS**, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. (1897) 298. **APOCYNACEAE.**
Pringlei, *Greenm. l. c.*—Mexic.**STRIGA**, Lour. (Scrophul.).
Barteri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 514.—Afr. trop.
Baumannii, *Engl. l. c.* 515.—Afr. trop.
bilabiata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 240 = *Thunbergii*.
Burteri, *Auct. in Just, Jahresb.* xxv. II. 502, sphalm. = *Barteri*.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 99.—Afr. trop.
glandulifera, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 514.—Afr. trop.
Junodii, *Schinz, in Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 62.—Afr. austr.
Passargei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 515.—Afr. trop.
Rowlandii, *Engl. l. c.* 513.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. l. c.* 514.—Afr. trop.**STRIGINA**, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. (1897) 516. **SCROPHULARIACEAE.**
pusilla, *Engl. l. c.*—Afr. trop.**STROBILANTHES**, Blume (Acanth.).
Balansae, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 652.—Tonkin.
bantonensis, *Lindau, l. c.* 650.—Tonkin.
cystolithigera, *Lindau, l. c.* 651.—Tonkin.
Everettii, *Rolfe, in Kew Bull.* 1896, 39.—Celebes.
gigantodes, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 649.—Tonkin.
isoglossoides, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxiv. 315.—Madag.
mesargyrea, *Hallier f. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxx. 195.—Borneo.
mucronatopunctus, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* v. 650.—Tonkin.
pateriformis, *Lindau, l. c.* 653.—Tonkin.
tonkinensis, *Lindau, l. c.* 651.—Tonkin.**STROBILANTHOPSIS**, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 202. **ACANTHACEAE.**
hircina, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.**STRONGYLOMOPSIS**, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. (1899) 135. **COMPOSITAE.**
fuegiana, *Speg. l. c.*—Fuegia.

STROMBOSIA, Blume (Olac.).

dubia, Vidal, *Sinopsis, Atlas*, 20, t. 30.—Ins. Philipp.
klaineana, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1293 =
Octoknema klaineana.
Scheffleri, Engl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84,
nomen.—Afr. trop.

STROMBOSIOPSIS, Engl. in Engl. & Prantl,
Pflanzenf. Nachtr. i. 148 (1897). OLACACEAE.

congolensis, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 187.—Afr. trop.
tetrandra, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 148.—Afr. trop.

STROPHANTHUS, DC. (Apocyn.).

arnoldianus, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 206.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 11. 40.—Afr. trop.
Nicholsoni, E. M. Holmes, in *Pharm. Journ.* 1897, 209.—Afr. trop.
Schlechteri, K. Schum. in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 308, nomen.—Afr. trop.

STROPHIOBLACHIA, Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. iii. 194, 235 (1900). EUPHORBACEAE.

fimbriicalyx, Boerl. l. c. 236.—Celebes.
STROPHOSTYLES, Eil. = **Phaseolus**, Tourn. (Legum.)
umbellata, Britton, in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S. ii. 339 = *P. helvolus*.

STRUMARIA, Jacq. (Amaryll.).

bidentata, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. App. III. 46.—Afr. austr.

STRUTHANTHUS, Mart. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

Haenkei, Engl. in Engl. & Prantl, *Pflanzenf. Nachtr.* i. 134 = *L. spirostylis*.
interruptus, Engl. l. c. = *L. interruptus*.
Lehmannii, Engl. l. c. = *N. Granat*.
mapirensis, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 117.—Bolivia.
nudipes, Rusby, l. c. 116.—Bolivia.

STRUTHIOLA, Linn. (Thymel.).

tetralepis, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 171.—Afr. austr.

STRYCHNOS, Linn. (Logan.).

acutissima, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 200.—Afr. trop.
Beccarii, Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 267.—Borneo.
blumenaviensis, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 36.—Bras.
brachyura, Gilg, l. c. xxviii. 119.—Afr. trop.
calophylla, Gilg, l. c. xxv. Beibl. ix. 37.—Bras.
Carvalhoi, Gilg, l. c. xxviii. 123.—Afr. trop.
celebica, Koord. in *Meded. S Lands Plantent.* xix. 540, 631.—Celebes.
chlorocarpa, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 120.—Afr. trop.
chrysophylla, Gilg, l. c. 119.—Afr. trop.
cilicalyx, Gilg, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 304, nomen.—Afr. trop.
concinna, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 39.—Bras.
congolana, Gilg, l. c. xxviii. 120.—Afr. trop.
cordifolia, Gilg, l. c. xxv. Beibl. ix. 38.—Bras.
dekindtiana, Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 258.—Afr. trop.
Dewevrei, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 119 (Dewevrei).—Afr. trop.
Dinklagei, Gilg, l. c. 121.—Afr. trop.
erythrocarpa, Gilg, l. c. xxiii. 199.—Afr. trop.
fulvotomentosa, Gilg, l. c. xxv. Beibl. ix. 40.—Bras.
Gerrardi, N. E. Brown, in *Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. austr.
Glaziovii, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 36.—Bras.
Goetzei, Gilg, l. c. xxviii. 123.—Afr. trop.
heterodoxa, Gilg, l. c. 118.—Afr. trop.
Kerstingii, Gilg & K. Schum. in *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 498.—N. Guin.
Kipapa, Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 256; et in *Engl. Jahrb.* xxviii. 118.—Afr. trop.
melastomatoides, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 201.—Afr. trop.

STRYCHNOS :—

Niederleini, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 41.—Am. austr.
oblonga, Gilg, l. c. 37.—Bras.
oligoneura, Gilg, l. c. 41.—Bras.
pauciflora, Gilg, l. c. xxviii. 121.—Afr. austr.
petrophila, Gilg, l. c. xxv. Beibl. ix. 39.—Bras.
pilgeriana, Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 268.—Sumatra.
polytrichantha, Gilg, l. c. 267.—Borneo.
sansibariensis, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 124.—Afr. trop.
Scheffleri, Gilg, ex *Engl. Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 84, nomen.—Afr. trop.
sellowiana, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 41.—Bras.
Solerederi, Gilg, l. c. 40.—Guiana.
Staudtii, Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. 182.—Afr. trop.
urbaniana, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxv. Beibl. ix. 38.—Bras.
xylophylla, Gilg, l. c. xxviii. 122.—Afr. trop.

STRYPHODENDRON, Mart. (Legum.).

goyazense, Taub. in *Engl. Jahrb.* xxi. 434.—Bras.

STUBENDORFFIA, Schrenk (Crucif.).

aptera, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 17.—As. cent.

STYLARTHROPUS, Baill. = **Whitfieldia**, Hook. (Acanth.).

Braszei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 823 = *W. Braszei*.
Laurentii, Lindau, in *Engl. Jahrb.* xxiv. 317 = *W. Laurentii*.
Stuhlmanni, Lindau, l. c. xx. 11 = *W. Stuhlmanni*.
Tholloni, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 823 = *W. Braszei*.

STYLOCHITON, Lepr. (Arac.).

Zenkeri, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. 424.—Afr. trop.

STYLOSANTHES, Sw. (Legum.).

riparia, Kearney, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 565.—Am. bor.

STYRAX, Tourn. (Styrac.).

hemsleyana, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 530.—China.
Ramirezii, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 568.—Am. cent.
shiriana, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 50.—Japan.

SUAEDA, Forsk. (Chenopod.).

Maris-mortui, Post, *Fl. Syria*, 687.—Syria.
patagonica, Speg. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 570.—Patag.

SUCKLEYA, A. Gray (Chenopod.).

suckleyana, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 133 (= *Atriplex suckleyana*).—Am. bor.

SUTERA, Roth = **Chaenostoma**, Benth. (Scrophul.).

aurantiaca, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 757 = *Lyperia multifida*.
corymbosa, Hiern, l. c. = *C. corymbosum*.
fissifolia, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1900, 467.—Afr. trop.
heucherifolia, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 757 = *C. heucherifolium*.
huillana, Hiern, l. c. = *C. huillanum*.

SWAINSONA, Salisb. (Legum.).

Cadelli, F. Muell. in *Moore & Betche, Handb. Fl. N. S. Wales*, 150; et *ex Maiden & Betche*, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 643.—Austral.

SWERTIA, Linn. (Gentian.).

asarifolia, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 311.—China.
calicina, Franch. l. c.—China.
crassiuscula, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 107.—Afr. trop.
decora, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 317.—China.
Delavayi, Franch. l. c. 323.—China.
Engleri, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 108.—Afr. trop.
filicaulis, Gilg, l. c. 109.—Afr. trop.
gentianoides, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 314.—China.
gracilis, Franch. l. c. 321 (non H. B. & K.).—China.

SWERTIA :—

kouitchensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 320.—China.
Leduci, Franch. l. c. 316.—China.
longipes, Franch. l. c. 319.—China.
membranifolia, Franch. l. c.—China.
mitima, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 108.—Afr. trop.
Mussoti, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 316.—China.
nummularifolia, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 274.—Madag.
occidentalis, Greene, *Pittonia*, iv. 184.—Am. bor.
ovalifolia, Greene, l. c. 185.—Am. bor.
oxyphylla, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 473 (= *Ophelia oxyphylla*).—Java.
pleurogynoides, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 153.—Afr. trop.
polyantha, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 109.—Afr. trop.
porphyrantha, Baker, in *Kew Bull.* 1898, 159.—Afr. trop.
pubescens, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 313.—China.
scopolina, Greene, *Pittonia*, iv. 184.—Am. bor.
stricta, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 322 (non Coll. & Hemsl.).—China.
Tashiroi, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo*, 1896, 57.—Japan.
umbellata, Gilg, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 283 (= *Swertopsis umbellata*).—Japan.
Volkensii, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxvi. 108.—Afr. trop.

SWERTOPSIS, Makino, Ill. Fl. Jap. t. 66 (1891).

GENTIANACEAE.
umbellata, Makino, l. c.—Japan.

SWINTONIA, Griff. (Anacard.).

lurida, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 491.—Penins. Mal.
penangiana, King, l. c. 490.—Penins. Mal.

SYMBOLANTHUS, G. Don (Gentian.).

brittonianus, Gilg, in *Engl. Jahrb.* xxii. 342.—Bolivia.
Elisabethae, Gilg, l. c. 340 (= *Leiothamnus Elisabethae*).—Guiana.
latifolius, Gilg, l. c. 342.—Venez.
magnificus, Gilg, l. c. 343.—Am. austr.
pauciflorus, Gilg, l. c. 340.—Peruv.
pulcherrimus, Gilg, l. c. 344 = *Lisianthus pulcherrimus*, Donn. Sm.
rubroviolaceus, Gilg, l. c. 345.—Am. cent.
rusbyanus, Gilg, l. c. 344.—Bolivia.
Stuebelii, Gilg, l. c. 339, descr.—N. Granat.
tricolor, Gilg, l. c. 341.—Venez.

SYMPHIPAPPUS, Klatt, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1896) 462. COMPOSITAE.

dichotomus, Klatt, l. c.—Afr. austr.

SYMPHONIA, Linn. f. (Guttif.).

gabonensis, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1223.—Afr. trop.

SYMPHORICARPOS, Dill. (Caprifol.).

Parishii, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 545.—Am. bor.
utahensis, Rydb. l. c. 544.—Am. bor.
vaccinioides, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 371.—Am. bor.

SYMPHOSTEMON, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 867

(1900) = **Plectranthus**, L'Hérit. (Labiata).
insolitus, Hiern, l. c. = *P. insolitus*.

SYMPHYLLOPHYTON, Gilg, in Engl. & Prantl,
Pflanzenf. Nachtr. i. 283 (1897); et in Engl. Jahrb. xxv. Beibl. ix. (1898) 43. GENTIANACEAE.

caprifolioides, Gilg, l. c.—Bras.

SYMPHYOSTEMON, Miens (Irid.).

biflorus, Dusen, in *Ergebn. Schwed. Exp. Magell.* III. v. 203 = *odoratissimus*.
Lyckholmi, Dusen, l. c. 204.—Reg. Magell.
patagonicus, Speg. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 574.—Patag.

SYMPHYTOSIPHON, Harms, in Engl. & Prantl,
Pflanzenf. iii. iv. 307 (1896); et in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 165. MELIACEAE.

Hildebrandtii, Harms, l. c. 307; l. c. 166.—Madag.

SYMPHYTUM, Tourn. (Borag.).
majus, Bub. Fl. Pyren. i. 501 = officinale.
minus, Bub. l. c. 502 = tuberosum.
sycosumum, Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlv. 150.
 —Graecia.

SYMPLECTOCHILUS, Lindau (Acanth.).
madagascariensis, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1898, 39.—Madag.

SYMPLOCOS, Jacq. (Styrac.).
alata, Brand, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 529.—China.
anomala, Brand, l. c.—China.
Brandisii, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xlii. 157.—Java.
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 641.—Celebes.
Englishii, Hemsl. in Kew Bull. 1899, 105.—N. Guin.
Nageli, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. xlii. 159.—Java.
orbicularis, Hemsl. in Kew Bull. 1899, 105.—N. Guin.
racemosa, Grah. Cat. Bomb. Pl. 104 = Beddomei.
reticulata, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 582, errore = *racemosa*, Grah.
setchuensis, Brand, ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 528.—China.
stellaris, Brand, l. c.—China.

SYNADENIUM, Boiss. (Euphorb.).
Volkensii, Pax, in Engl. Jahrb. xxiii. 536.—Afr. trop.

SYNCOLOSTEMON, E. Mey. (Labiata).
lanceolatus, Guerde, in Engl. Jahrb. xxvi. 77.—Afr. austr.
macrophyllus, Guerde, in Bull. Herb. Boiss. vi. 555.—Afr. austr.

SYNDYOPHYLLUM, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 403 (1900). **EUPHORBIACEAE**.
excelsum, K. Schum. & Lauterb. l. c. 404.—N. Guin.
trinerium, K. Schum. & Lauterb. l. c. 405.—N. Guin.

SYNEDRELOPSIS, Hieron. & Kuntze, in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 180 (1898). **COMPOSITAE**.
Grisebachii, Hieron. & Kuntze, l. c.—Reg. Argent.

SYNGONANTHUS, Ruhl. in Urb. Symb. Antill. i. 487 (1900). **ERIOCAULACEAE**.
androsaceus, Ruhl. l. c. 488 (= *Paepalanthus androsaceus*).—Ind. occ.
lagopodioides, Ruhl. l. c. 489 (= *Paepalanthus lagopodioides*).—Ind. occ.
Schlechteri, Ruhl. in Schlechter, Westfr. Kautschuk-Exped. 272, nomen.—Afr. trop.
umbellatus, Ruhl. in Urb. Symb. Antill. i. 488 (= *Paepalanthus umbellatus*).—Ind. occ.; Am. austr.

SYNNEMA, Benth. (Acanth.).
brevitubum, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 30.—Afr. trop.

SYNTHESISMA, Walt. = *Digitaria*, Heist. (Gramin.).
Bakeri, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 296.—Am. bor.
barbatum, Nash, l. c. 303 = D. barbata.
ciliare, Schrad. Fl. Germ. 160 = D. sanguinalis.
fibriatum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 302 = D. sanguinalis.
glabrum, Schrad. Fl. Germ. 163 = D. glabra.
gracillimum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 295 (= *Panicum gracillimum*, Scribn.).—Am. bor.
Helleri, Nash, in Minnes. Bot. Studies, i. 798.—Ins. Sandw.
humifusum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 469 = D. glabra.
leucocomum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 295.—Am. bor.
setosum, Nash, l. c. 300 = D. horizontalis.
Simpsoni, Nash, l. c. 297 = D. sanguinalis.
vulgare, Schrad. Fl. Germ. 161 = D. sanguinalis.

SYNTHYRIS, Benth. (Scrophul.).
laciniata, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 353.—Am. bor.
reflexa, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. i. 124.—Am. bor.
ritteriana, Eastw. l. c. 123.—Am. bor.

SYNTRIANDRUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 412. **MENISPERMACEAE**.
Dinklagei, Engl. l. c. 413.—Afr. trop.
Preussii, Engl. l. c. 412.—Afr. trop.

SYRINGA, Linn. (Oleac.).
japonica, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. II. ii. 44 = amurensis.
microphylla, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 531.—China.

SYRINGODEIA, Hook. f. (Irid.).
longituba, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 309 = bicolor.
luteo-nigra, Baker, in Kew Bull. 1897, 281.—Afr. austr.

SYZYGIUM, Gaertn. = *Eugenia*, Mich. (Myrtac.).
ellipticum, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 476 (non Wall.).—N. Guin.
floribundum, K. Schum. & Lauterb. l. c. (non F. Muell.).—N. Guin.

T

TABEBUIA, Gomez (Bignon.).
lepidophylla, Greenm. ex Combs, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, vii. 451 (= *Tecoma lepidophylla*, Griseb.).—Ind. occ.
longiflora, Greenm. l. c. (= *Tecoma longiflora*).—Ind. occ.
petrophila, Greenm. l. c.—Ind. occ.
rigida, Urb. Symb. Antill. i. 404.—Ind. occ.
schumanniana, Urb. l. c.—Ind. occ.
sessilifolia, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxv. 156.—Am. cent.

TABERNAEMONTANA, Plum. (Apocyn.).
Alfari, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 396.—Am. cent.
brachypoda, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 223.—Afr. trop.
diclinis, K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 503.—N. Guin.
erythrophthalma, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 224.—Afr. trop.
longipes, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 397.—Am. cent.
monopodialis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 225.—Afr. trop.
penduliflora, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
Smithii, Stapf, in Kew Bull. 1898, 305.—Afr. trop.
Thonneri, Th. Dur. & Wildem. ex Stapf, l. c. 306.—Afr. trop.
utilis, Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. viii. (1830) 319 = *Zschokkea utilis*.

TABERNANTHE, Baill. (Apocyn.).
albiflora, Stapf, in Kew Bull. 1898, 305.—Afr. trop.
tenuiflora, Stapf, l. c.—Afr. trop.

TACCA, Forst. (Taccac.).
abyssinica, Hochst. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 413 = pinnatifida.
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 641.—Celebes.
involutocrata, Schum. & Thonn. Beskr. Pl. Guin. 177 = pinnatifida.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 641.—Celebes.
samoensis, Reinecke, in Engl. Jahrb. xxv. 595.—Ins. Samoa.
viridis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. tt. 2515-6.—Siam.

TACHIADENUS, Griseb. (Gentian.).
elatus, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2554.—Madag.
parviflorus, Baker, in Kew Bull. 1897, 274.—Madag.

TAENIDIA, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 195 (1898). **UMBELLIFERAE**.
integerrima, Drude, l. c. (= *Pimpinella integerrima*).—Am. bor.

TAENIOCHLAENA, Hook. f. (Connar.).
birmanica, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvii. 285.—Burma.

TAENIOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
aphyllum, Makino, Phan. Pter. Japon. Ic. i. t. 11 (= *Sarcochilus aphyllum*).—Japon.
calcaratum, F. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 4.—Ins. Molucc.
celebicum, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 131.—Celebes.
crepidiforme, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 245 (= *Sarcochilus crepidiformis*).—Reg. Himal.

TAENIOPHYLLUM:—
filiforme, F. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 4.—Celebes.
retrospiculatum, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 244 (= *Sarcochilus retrospiculatus*).—As. trop.
rubrum, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 364.—Penins. Mal.

TAFALLA, Ruiz & Pav. = *Hedyosmum*, Sw. (Chloranth.).
maxima, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 275.—Bolivia.

TAGETES, Linn. (Compos.).
Belenidium, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 181 = *Hymenatherum tenuifolium*.
maxima, Kuntze, l. c.—Bolivia.
triradiata, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 310.—Mexic.

TAINIA, Blume (Orchid.).
atropurpurea, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 315.—Penins. Mal.
hongkongensis, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 195.—China.
hookeriana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxix. 336.—Reg. Himal.

TAINIONEMA, Schlechter, in Urb. Symb. Antill. i. 263 (1899). **ASCLEPIADACEAE**.
occidentale, Schlechter, l. c. 264 (= *Secamone occidentalis*).—Ind. occ.

TALAUMA, Juss. (Magnol.).
celebica, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 632.—Celebes.

TALINUM, Adans. (Portul.).
Greenmanii, Harshb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 183.—Mexic.
portulacifolium, Aschers. ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. iv. App. II. 172 = *cuneifolium*.
rugospermum, Holz. in Asa Gray Bull. vii. 115.—Am. bor.

TALISIA, Aubl. (Sapind.).
bullata, Radlk. in Mart. Fl. Bras. xiii. III. 556.—Ecuador.
erecta, Radlk. l. c. 550.—N. Granat. ?
intermedia, Radlk. l. c. 536.—Bras. et Venez.
japurensis, Radlk. l. c. 560 (= *Guarea japurensis*).—Bras.
setigera, Radlk. l. c. 551.—Ecuador.

TAMARIX, Linn. (Tamarisc.).
montana, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. xxvi. 142.—Turkestan.

TANACETUM, Tourn. (Compos.).
simplex, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 484.—Am. bor.

TANAECIUM, Sw. (Bignon.).
cyrtanthum, Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. viii. II. 186 = brasiliense.
nocturnum, Bureau & K. Schum. l. c. (= *Osmydrophora nocturna*).—Bras.
ovatum, Bureau & K. Schum. l. c. 187 (= *Spathodea ovata*).—Guiana.

TAPEINOCHEILOIS, Miq. (Scitam.).
Beccarii, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 348.—N. Guin.
Dahlia, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 101.—N. Brit.
densus, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 349; et in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 235.—N. Guin.
globiceps, K. Schum. l. c. 349; l. c. 234.—N. Guin.
Lauterbachii, K. Schum. l. c. 348; l. c. 233.—N. Guin.
recurvatus, K. Schum. l. c. 349; l. c. 235.—N. Guin.
spectabilis, K. Schum. l. c. 348.—N. Guin.

TAPIRIRA, Aubl. (Anacard.).
Pearcei, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 22.—Bolivia.

TARAXACUM, Linn. (Compos.).
eriphorum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 454.—Am. bor.

TARAXACUM :—

gracile, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvii. 158.—Eur.
 lividum, *A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 480.—Am. bor.
 salinum, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxvi. 201=officinale.
 scopulorum, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i.* 455.—Am. bor.
 tenuisectum, *Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xvi. 294.—Reg. Caucas.

TARAXIA, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Amer. i.* 506 (1840) = *Oenothera*, Linn. (Onagr.).
breviflora, Nutt. l. c. = *O. brevisflora*.
heterantha, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 185 = *O. heterantha*.
longiflora, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Amer. i.* 506 = *O. Nuttallii*.
ovata, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 185 = *O. ovata*.
Palmeri, Small, l. c. 184 = *O. Palmeri*.

TARDAVEL, Adans. = *Spermacoce*, Dill. (Rubiaceae).
andongensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 506.—Afr. trop.
aprica, Hiern, l. c. 505.—Afr. trop.
arvensis, Hiern, l. c. 504.—Afr. trop.
dibrachiata, Hiern, l. c. 507 = *S. dibrachiata*.
huillensis, Hiern, l. c. 503.—Afr. trop.
lancea, Hiern, l. c. 506.—Afr. trop.
ocymoides, Hiern, l. c. 504 = *S. ocymoides*.
scabra, Hiern, l. c. = *S. Ruelliae*.
stricta, Hiern, l. c. 503 = *S. stricta*.
thymioidea, Hiern, l. c. 507.—Afr. trop.
verticillata, Hiern, l. c. 508 = *S. verticillata*.

TARENNA, Gaertn. (Rubiaceae).
platyptera, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 319, nomen.—Afr. trop.
sambucina, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 561 (= *Stylocoryna sambucina*).—Ins. Pacif.

TASHIROEA, Matsum. ex Ito & Matsum. in *Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xii. (1899) 489. *MELASTOMACEAE*.
okinawensis, *Matsum. l. c.* 490.—Ins. Luchu.
yoeyamensis, *Matsum. l. c.* 489.—Ins. Luchu.

TASSADIA, Decne. (Asclep.).
pilosula, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. 726.—Ecuador.
Sprucei, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 498 (non Fourn.).—Bras.

TAUSCHIA, Schlecht. (Umbell.).
filiformis, *Coult. & Rose, in Proc. Washington Acad.* 137 (= *Arracacia filiformis*).—Mexic.
humilis, *Coult. & Rose, l. c.* 138.—Mexic.
linearifolia, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.
madrensis, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.
Nelsoni, *Coult. & Rose, l. c.*—Mexic.
Seatonii, *Coult. & Rose, l. c.* 136 (= *Arracacia nudicaulis*).—Am. bor.
vaginata, *Coult. & Rose, l. c.* 137 (= *Arracacia vaginata*).—Mexic.

TAXOTROPHIS, Blume (Urtic.).
macrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 359 (= *Diplocos macrophylla*).—Java.

TECLEA, Delile = *Toddalia*, Juss. (Rutac.).
Afselii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 153.—Afr. trop.
Bachmannii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
grandifolia, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
suaveolens, *Engl. l. c.* 152.—Afr. trop.

TECOMA, Juss. (Bignon.).
adenophylla, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 412.—Bras.
argentea, *Bureau & K. Schum. l. c.* 332.—Parag.
atractocarpa, *Bureau & K. Schum. l. c.* 326.—Bras.
Bernoullii, *K. Schum. & Loesen. in Engl. Jahrb.* xxiii. 131.—Am. cent.
Billbergii, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 319.—Bras.
capitata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 337.—Bras.
Catinga, *Bureau & K. Schum. l. c.*—Bras.
dentata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 323.—Bras.
Ipe, *Mart. Syst. Mat. Med. Bras.* 55, nomen = *Tabebuia Avellanadae*.

TECOMA :—

longiflora, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 324 (non aliorum).—Bras.
nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 159 = *shirensis*.
odontodiscus, *Bureau & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. ii. 320.—Bras.
papyrophloios, *Bureau & K. Schum. l. c.* 411.—Bras.
pedicellata, *Bureau & K. Schum. l. c.* 336.—Bras.
Whytei, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1897, 275 = *shirensis*.
Ipe, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 245, sphalm. = *T. Ipe*, *Mart.*

TECOMANTHE, Baill. (Bignon.).
dendrophila, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 539 (= *Tecoma dendrophila*).—N. Guin.

TECOMARIA, Spach = *Tecoma*, Juss. (Bignon.).
schirensis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C.* 363 = *Tecoma shirensis*.

TEINOSTACHYUM, Munro (Gramin.).
Dullooa, *Gamble, in Ann. Bot. Gard. Calc.* vii. 101.—Ind. or.
Helferi, *Gamble, l. c.* 102.—Burma.
maculatum, *Trim. in Journ. Bot.* 1885, 273 = *Ochlandra stridula*.
schizostachyoides, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xxxix. 89 = *Bambusa schizostachyoides*.

TELANTHERA, R. Br. (Amarant.).
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 110.—Bolivia.
dolichocephala, *Urb. Symb. Antill.* i. 302.—Ind. occ.
flavogrisea, *Urb. l. c.* 300.—Ind. occ.
mollis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxv. 324.—Mexic.
olivacea, *Urb. Symb. Antill.* i. 303.—Ind. occ.
Sintensisii, *Urb. l. c.* 301.—Ind. occ.

TELLIMA, R. Br. (Saxifr.).
odorata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 199.—Am. bor.

TELOPHYLLUM, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1896) 558. *SANTALACEAE*.
quadriflorum, *Van Tiegh. l. c.* (= *Mysodendron quadriflorum*).—Reg. Magell.

TEMMINCKIA, De Vriese = *Scaevola*, Linn. (Gooden.).
microcarpa, *Nad. in Journ. de Bot.* 1899, 1.—Ins. Societ.
tahitensis, *Nad. l. c.* 1897, 107.—Ins. Societ.

TEMNOCYDIA, Mart. = *Bignonia*, Tourn. (Bignon.).
lenta, *Mart. ex DC. Prod. ix.* 159 = *B. lenta*.

TENORIA, Spreng. = *Bupleurum*, Tourn. (Umbell.).
caricifolia, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 363 = *B. ranunculoides*.
divaricata, *Bub. l. c.* 359 = *B. odontites*.
falcata, *Bub. l. c.* 365 = *B. falcatum*.
glauca, *Bub. l. c.* 359 = *B. glaucum*.
juncea, *Bub. l. c.* 366 = *B. junceum*.
protracta, *Bub. l. c.* 360 = *B. protractum*.
rigida, *Bub. l. c.* 366 = *B. rigidum*.
rotundifolia, *Bub. l. c.* 360 = *B. rotundifolium*.
tenuis, *Bub. l. c.* 358 = *B. tenuissimum*.

TEPHROSIA, Pers. (Legum.).
argyrotricha, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 57.—Afr. trop.
aurantiaca, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 402.—Afr. trop.
Bachmannii, *Harms, l. c.* xxvi. 286.—Afr. trop.
brachystachya, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 353 (non aliorum).—N. Guin.
Carvalhoi, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 188.—Afr. trop.
cephalophora, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxviii. 403.—Afr. trop.
decorticans, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 184.—Afr. trop.
dissitiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 257.—Afr. trop.
encoptosperma, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 246.—Afr. trop.
Harmsii, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1898, 101.—Afr. trop.
megalantha, *Micheli, in Compl. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxvi. 57.—Afr. trop.
melanocalyx, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 258 (non Welw.).—Afr. trop.

TEPHROSIA :—

nyikensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 257.—Afr. trop.
oncotosperma, *Auct. in Just, Jahresb.* xxiv. ii. 396, errore = *encoptosperma*.
periculosa, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 258.—Afr. trop.
Preussii, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 182.—Afr. trop.
Rivaei, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 92.—Afr. trop.
Rugelii, *Shuttlew. ex Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 197.—Am. bor.
sambesiaca, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxiii. 183.—Afr. trop.
schizocalyx, *Taub. l. c.*—Afr. trop.
Smallii, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 198.—Am. bor.
triphylia, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 57.—Afr. austr.
ustulata, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 93.—Afr. trop.
zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 257.—Afr. trop.

TEPHROTHAMNUS, Sweet = *Argyrolobium*, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
aequinoctialis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 204 = *A. aequinoctiale*.
angustifolius, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 72 = *A. angustifolium*.
speciosus, *Kuntze, l. c.* = *A. speciosum*.

TERMINALIA, Linn. (Combret.).
adamanensis, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 11.—Afr. trop.
argyrophylla, *King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 291.—Ind. or.
Balansaei, *K. Schum. in Fust, Jahresb.* xxvi. i. 346.—Parag.
Baumannii, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 14.—Afr. trop.
benguellensis, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 339.—Afr. trop.
bispinosa, *Schweinf. & Volkens, in Ghika, Pays des Somalis*, 207.—Afr. trop.
brachystemma, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i.* 340.—Afr. trop.
brosigiana, *Engl. & Diels, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 191.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 123.—Afr. trop.
dolichocharpa, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 35.—Afr. trop.
Elliotii, *Engl. & Diels, l. c.* 12.—Afr. trop.
hypargyrea, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 467.—N. Guin.
Kelleri, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 24.—Afr. trop.
laxiflora, *Engl. l. c.* 12.—Afr. trop.
Lecardii, *Engl. & Diels, in Engl. l. c.* 15.—Afr. trop.
Manii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 329.—Penins. Mal.
orbicularis, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 26.—Afr. trop.
Passargei, *Engl. l. c.* 16.—Afr. trop.
phanerophlebia, *Engl. & Diels, in Engl. l. c.* 19.—Afr. austr.
phellocarpa, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 330.—Penins. Mal.
polycarpa, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 24.—Afr. trop.
praecox, *Engl. & Diels, l. c.* 27.—Afr. trop.
Randii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1899, 435.—Afr. trop.
riparia, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 35.—Afr. trop.
Ruspolii, *Engl. & Diels, l. c.* 26.—Afr. trop.
Sambesiaca, *Engl. & Diels, l. c.* 13.—Afr. trop.
schimperiana, *Hochst. ex Engl. & Diels, l. c.* 14.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. & Diels, l. c.* 12.—Afr. trop.
somalensis, *Engl. & Diels, l. c.* 24.—Afr. trop.
splendida, *Engl. & Diels, l. c.* 16.—Afr. trop.
stenostachya, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
subspathulata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvi. 332.—Penins. Mal.
superba, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 26.—Afr. trop.
suptiana, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 623.—Celebes.
Thomasii, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 18.—Afr. trop.

TERMINALIA—

togoensis, *Engl. & Diels, in Engl. Monog. Afr. Pfl.* iv. 13.—Afr. trop.
trinervia, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 466.—N. Guin.
triptera, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 291 (non Stapf).—China.

TERNATEA, Tourn. = **Clitoria**, Linn. (Legum.).
Ternatea, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 72 = *C. Ternatea*.

TERNSTROEMIA, Mutis (Ternstroem.).
apleura, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 523.—Ind. occ.
granulata, *Krug & Urb. l. c.* 534.—Ind. occ.
Hartii, *Krug & Urb. l. c.* 532.—Ind. occ.
heptasepala, *Krug & Urb. l. c.* 530.—Ind. occ.
Lehmannii, *Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiv. 42.—Hab. ?
luquillensis, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 531.—Ind. occ.
Maltbya, *Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 78.—Mexic.
microcalyx, *Krug & Urb. in Engl. Jahrb.* xxi. 531.—Ind. occ.
oligostemon, *Krug & Urb. l. c.* 534.—Ind. occ.
pachyphylla, *Krug & Urb. l. c.* 529.—Ind. occ.
parviflora, *Krug & Urb. l. c.* 523.—Ind. occ.
rostrata, *Krug & Urb. l. c.* 533.—Ind. occ.
Stahlii, *Krug & Urb. l. c.* 527.—Ind. occ.

TERNSTROEMIOPSIS, Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiv. (1896) 49. **TERNSTROEMIAEAE**.
sandwicensis, *Urb. l. c.* (= *Eurya sandwicensis*).—Ins. Sandw.

TESSENIA, Bub. = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
alpina, Bub. Fl. Pyren. ii. 264 = *E. alpinus*.
canadensis, Bub. l. c. 267 = *E. canadensis*.
glabrata, Bub. l. c. 265 = *E. glabratus*.
linifolia, Bub. l. c. 266 = *E. linifolius*.
vulgaris, Bub. l. c. = *E. acris*.

TESTUDINARIA, Salisb. (Dioscor.).
montana, Burch. *Trav.* ii. 148 = *T. Elephantipes*.

TETRARPIDIUM, Pax, in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899) 329. **EUPHORBIACEAE**.
Staudtii, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

TETRACERA, Linn. (Dillen.).
calophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* lx. 24.—Bras.
fragrans, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 55.—Afr. trop.
hebecarpa, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 3 (= *Delima hebecarpa*).—Java.
hirsuta, *Boerl. l. c.* (= *Delima hirsuta*).—Java.
Marquesii, *Gilg, in Bol. Soc. Broter.* xvi. 60.—Afr. trop.
masuiana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. 61.—Afr. trop.
obovata, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* (1899) 3 (non aliorum).—Hort.
subcordata, *Boerl. l. c.* 4.—Hort.

TETRACHNE, Nees (Gramin.).
aristulata, Hack. & Rendle, in *Journ. Bot.* 1891, 72 = *Entoplocamia aristulata*.

TETRACMIDION, Korsh. in *Bull. Acad. Pétersb.* Sér. V. ix. (1898) 421. **CRUCIFERAE**.
bucharicum, *Korsh. l. c.*—Turkestan.

TETRADYMIA, DC. (Compos.).
filifolia, *Greene, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 123.—Am. bor.
multicaulis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 482.—Am. bor.

TETRAGONANTHUS, S. G. Gmel. = **Halenia**, Borkh. (Gentian.).
Rothrockii, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 6 = *H. Rothrockii*.

TETRAGONIA, Linn. (Ficoid.).
Kuntzei, *J. Buchw. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 110.—Chili.
macrostylis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 124.—Afr. austr.
namaquensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
rosea, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.
virgata, *Schlechter, l. c.* 125.—Afr. austr.

TETRAITH, Bub. Fl. Pyren. i. 436 (1897) = seq.

TETRAHIT, Adans. = **Galeopsis**, Linn. (Labiata).
pyrenaicum, Bub. Fl. Pyren. i. 438 = *G. pyrenaica*.
vulgare, Bub. l. c. 437 = *G. Ladanum*.

TETRAMERIUM, Nees (Acanth.).
costatum, *Mills. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 320 (= *Henrya costata*).—Mexic.

TETRAMICRA, Lindl. (Orchid.).
Eulophiae, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 439.—Cuba.
parviflora, *Lindl. in Walp. l. c.*—Jamaica.

TETRANEURIS, Greene, Pittonia, iii (1898) 265. **COMPOSITAE**.
acaulis, *Greene, l. c.* (= *Actinella acaulis*).—Am. bor.
angustata, *Greene, l. c.* 267.—Mexic.
argentea, *Greene, l. c.* 269 (= *Actinella argentea*).—Am. bor.
arizonica, *Greene, l. c.* 266.—Am. bor.
brevifolia, *Greene, l. c.*—Am. bor.
depressa, *Greene, l. c.* (= *Actinella depressa*).—Am. bor.
fastigiata, *Greene, l. c.* 268.—Am. bor.
glabra, *Greene, l. c.* (= *Actinella glabra*).—Am. bor.
herbacea, *Greene, l. c.*—Am. bor.
incana, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 128.—Am. bor.
ivesiana, *Greene, Pittonia*, iii. 269.—Am. bor.
lanata, *Greene, l. c.* 265 (= *Actinella lanata*).—Am. bor.
leptoclada, *Greene, l. c.* 269 (= *Actinella leptoclada*).—Am. bor.
linearifolia, *Greene, l. c.* (= *Actinella linearifolia*).—Am. bor.
linearis, *Greene, l. c.* 267.—Am. bor.
mancosensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 129.—Am. bor.
oblongifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 269.—Am. bor.
scaposa, *Greene, l. c.* 266 (= *Actinella scaposa*).—Am. bor.
simplex, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxviii. 127.—Am. bor.
torreyana, *Greene, Pittonia*, iii. 265 (= *Actinella torreyana*).—Am. bor.
trinervata, *Greene, l. c.* 267.—Am. bor.

TETRAPHIS, Auct. in *Just, Jahrb.* xxiv. ii. (1899) 396, errore = **Triraphis**, R. Br. (Gramin.).

TETRAPHYLE, Eckl. & Zeyh. = **Crassula**, Dill. (Crassul.).
quadrangula, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 293 = *C. pyramidalis*.

TETRAPHYLLASTER, Gilg, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 266 (1897). **MELASTOMACEAE**.
rosaceum, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

TETRAPHYLLUM, Griff. (Gesner.).
roseum, *Staff, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 524.—Siam.

TETRAPOGON, Desf. (Gramin.).
flabellatus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 810.—Afr. trop.
tetrastachys, Hack. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 292 = *Chloris montana*.
triangularis, Hochst. ex Hook. f. l. c. 291 = *Chloris tenella*.
villosus, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 389 = *Chloris villosa*.

TETRAPTERIS, Cav. (Malpigh.).
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 143.—Mexic.

TETRARIA, Beauv. (Cyper.).
brevicaulis, C. B. Clarke, in *Du'rand & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 659 = *Costularia brevicaulis*.
ferruginea, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 759.—Afr. austr.
lucida, C. B. Clarke, *l. c.*—Afr. austr.

TETRASTIGMA, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. (1896) 444. **RUBIACEAE**.
hemsleyanum, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 463.—China.
magnificum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 445.—Afr. trop.

TETRASYNANDRA, Perkins, in *Engl. Jahrb.* xxv. (1898) 568. **MONIMIACEAE**.
laxiflora, *Perkins, l. c.* (= *Kibara laxiflora*).—Austral.
longipes, *Perkins, l. c.* (= *Kibara longipes*).—Austral.
pubescens, *Perkins, l. c.* (= *Kibara pubescens*).—Austral.

TEUCRIUM, Tourn. (Labiata).
affine, *Brandege, in Erythea*, vii. 6.—Mexic.
Andrusi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 758.—As. Min.
chamaedryoides, Bub. Fl. Pyren. i. 464 = *Botrys cypricum*, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* v. 759 = *cypricum*.
degenianum, *Aznav. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 147.—Eur. or.
depressum, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 288.—Am. bor.
franchetianum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 551 (non Rouy & Coigny).—China.
majus, Bub. Fl. Pyren. i. 465 = *flavum*.
Picardae, *Krug & Urb. in Urb. Symb. Antill.* i. 396.—Ind. occ.

THALESIA, Rafin. = **Aphyllon**, Mitch. (Orobanch.).
purpurea, A. A. Heller, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 313.—Am. bor.

THALICTRUM, Tourn. (Ranunc.).
akanense, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1069.—Japon.
campestre, *Greene, in Erythea*, iv. 123.—Am. bor.
caulophylloides, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 136.—Am. bor.
confine, *Fernald, in Rhodora*, ii. 232.—Am. bor.
cuernavacanum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 187.—Mexic.
Francheti, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1069.—Japon.
grandiflorum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 188 (non Maxim.).—Mexic.
grandifolium, *Rose, l. c.* 143 = *grandiflorum*, *Rose*.
guatemalense, *C. DC. & Rose, ex Rose, l. c.* 188.—Am. cent.
jaliscanum, *Rose, l. c.* 187.—Mexic.
kamisense, *Franch. ex Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 584.—Japon.
madrense, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 188.—Mexic.
mirabile, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 277.—Am. bor.
nipponense, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1068.—Japon.
pachucense, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 188.—Mexic.
papillosum, *Rose, l. c.* 189.—Mexic.
tenerum, *Huth, in Bull. Herb. Boiss.* v. 1068.—Japon.
trautvetterianum, *Regel, ex Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.* xxvi. 48.—Turkestan.

THAMNOCALAMUS, Munro = **Arundinaria**, Michx. (Gramin.).
Falconeri, Hook. f. ex Munro, in *Trans. Linn. Soc.* xxvi. 34 = *A. Falconeri*.

THAMNOCHORDUS, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 330 = seq.

THAMNOCHORTUS, Berg. (Restiac.).
Bachmanni, *Mast, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 13; et *ex Zahlbr. in Ann. Hofmus. Wien*, xv. 11.—Afr. austr.
canescens, *Mast, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 12.—Afr. austr.
dumosus, *Mast, l. c.* 11.—Afr. austr.
giganteus, *Kunth, Enum. Pl.* iii. 435 = *Restio giganteus*.
maximus, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 330.—Afr. austr.
membranaceus, *Mast, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 11.—Afr. austr.
occultus, *Mast, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 130.—Afr. austr.
paniculatus, *Mast, in Engl. Jahrb.* xxix. *Beibl.* lxvi. 12.—Afr. austr.
pluristachyus, *Mast, l. c.*—Afr. austr.
sulcatus, *Mast, l. c.* 11.—Afr. austr.

THASPIUM, Nutt. (Umbell.).
commutatum, Auct. in *Just, Jahrb.* xxiv. ii. (1899) 396, errore = *Thlaspi commutatum*.

- THEA**, Linn. = *Camellia*, Linn. (Ternstroem.).
celebica, Warb. ex Kochs, in Engl. Jahrb. xxvii. 589.—Celebes.
cuspidata, Kochs, l. c. 586.—China.
iniquicarpa, C. B. Clarke, ex Kochs, l. c. 590.—Ind. or.
laslostyla, Warb. ex Kochs, l. c. 582.—Celebes.
punctata, Kochs, l. c. 584.—China.
speciosa, Kochs, l. c. 597.—China.
spectabilis, Kochs, l. c. 595 = *C. reticulata*.
- THECACORIS**, A. Juss. (Euphorb.).
gymnogyne, Pax, in Engl. Jahrb. xxviii. 20.—Afr. trop.
- THECOSTELE**, Reichb. f. (Orchid.).
secunda, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 299.—Malaya.
- THELASIS**, Blume (Orchid.).
hongkongensis, Rolfe, in Kew Bull. 1896, 199.—Hongkong.
macrobulbon, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 393.—Penins. Mal.
platychila, Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee, 249.—N. Guin.
samoensis, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxv. 607.—Ins. Samoa.
- THELEPODIUM**, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 126 = *Thelypodium*, Endl. (Crucif.).
- THELEPOGON**, Roth (Gramin.).
sanguineus, Spreng. Syst. i. 299 = *Andropogon hirtiflorus*.
- THELESERMA**, Less. (Compos.).
intermedium, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 631.—Am. bor.
marginatum, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 421.—Am. bor.
tenuis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 631.—Am. bor.
- THELYPODIUM**, Endl. (Crucif.).
amplifolium, Greene, in Erythraea, iv. 173.—Am. bor.
anisopetalum, Greene, Pittonia, iii. 247.—Mexic.
crenatum, Greene, l. c. iv. 20.—Am. bor.
paniculatum, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 126.—Am. bor.
sagittatum, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 265 = *Nuttallii*.
simplex, Greene, Pittonia, iv. 200.—Am. bor.
torulosum, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 265 = *sagittatum*, Endl.
- THEMEDA**, Forsk. = *Anthistiria*, Linn. f. (Gramin.).
triandra, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = *A. imberbis*.
- THEOBROMA**, Linn. (Stercul.).
Kalagua, Wildem. in Bull. Herb. Boiss. vii. 957.—N. Granat.
simiarum, Donn. Sm. in Pittier, Prim. Fl. Costaric. ii. 52; et in Coult. Bot. Gaz. xxv. 145.—Am. cent.
- THERMOPSIS**, R. Br. (Legum.).
annulocarpa, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 239.—Am. bor.
arenosa, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxv. 276.—Am. bor.
divaricarpa, A. Nelson, l. c. 275.—Am. bor.
pinetorum, Greene, Pittonia, iv. 138.—Am. bor.
- THEROFON**, Rafin. = *Boykinia*, Nutt. (Saxifr.).
heucheraeforme, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 247.—Am. bor.
Jamesii, Wheelock, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 70 (= *Saxifraga Jamesii*).—Am. bor.
Purpusi, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. Ed. II. 5 = *B. Purpusi*.
rotundifolium, Wheelock, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896, 70 = *B. rotundifolia*.
- THESIUM**, Linn. (Santal.).
abietinum, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 282.—Afr. austr.
affine, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 115.—Afr. austr.
andongense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 937.—Afr. trop.
aristatum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 116.—Afr. austr.
bathyschistum, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
- THESIUM** :—
brachygyne, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 117.—Afr. austr.
brachystegium, Post, Fl. Syria, 714.—Syria.
conostylum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 117.—Afr. austr.
dissitiflorum, Schlechter, l. c. 118.—Afr. austr.
equisetoides, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 937.—Afr. trop.
fallax, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 118.—Afr. austr.
foveolatum, Schlechter, l. c. 119.—Afr. austr.
Galpinii, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 222.—Afr. austr.
hispidum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 452.—Afr. austr.
longirostre, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 345.—Afr. austr.
lopollense, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 937.—Afr. trop.
Maximiliani, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 119.—Afr. austr.
namaquense, Schlechter, l. c. 120.—Afr. austr.
polyanthum, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 27.—Afr. austr.
polyccephalum, Schlechter, in Engl. Jahrb. 120.—Afr. austr.
pycnanthum, Schlechter, l. c.—Afr. austr.
rectangulum, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 936.—Afr. trop.
schumannianum, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxiv. 452.—Afr. austr.
sonderianum, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 376.—Afr. austr.
strigulosum, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 936 (non A. DC.).—Afr. trop.
transvaalense, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 432.—Afr. austr.
ulugurense, Engl. in Engl. Jahrb. xxviii. 385, descr.—Afr. trop.
Welwitschii, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 938.—Afr. trop.
- THESPESIA**, Soland. (Malvac.).
Debeersii, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. II. i. II. 6.—Afr. trop.
trilobata, Baker f. in Journ. Bot. 1897, 52.—Afr. trop.
- THESPESOCARPUS**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1896) 1258. MYRISTICACEAE.
tiliaceus, Pierre, l. c.—Afr. trop.
- THEVETIA**, Linn. (Apocyn.).
spathulata, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 333.—Mexic.
Thevetia, Millsp. l. c. ii. 83 = *neriifolia*.
- THIBAUDIA**, Ruiz & Pav. (Vaccin.).
portoricensis, Urb. Symb. Antill. i. 376.—Ind. occ.
viridiflora, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvi. 1. 385 (= *Chupalon viridiflorum*).—Bolivia.
- THLADIANTHA**, Bunge (Cucurb.).
glabra, Cogn. ex Oliver, in Hook. Ic. Pl. sub t. 2223, nomen.—China.
maculata, Cogn. l. c.—China.
Oliveri, Cogn. l. c.—China.
verrucosa, Cogn. l. c.—China.
- THLADIANTHOPSIS**, Cogn. ex Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 2223 (1892) = *Thladiantha*, Bunge (Cucurb.).
- THLASPI**, Tourn. (Crucif.).
chionophilum, Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires, i. 48.—Reg. Argent.
commutatum, Reiche & Johow, Fl. Chile, i. 69 (non Kochel).—Chili.
epirotum, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 109.—Graecia.
glaucum, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 275.—Am. bor.
Huteri, Kerner, in Sched. Fl. Austro-Hung. vii. 39.—Eur.
japonicum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. vii. 797.—Japan.
parviflorum, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 265.—Am. bor.
subapterum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. v. 583 = *alpestre*.
- THOMANDERSIA**, Baill. (Acanth.).
congolana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 107.—Afr. trop.
Hensii, Wildem. & Th. Dur. l. c. 108 = *laurifolia*.
- THONNINGIA**, Vahl (Balanoph.).
sessilis, Lecomte, in Journ. de Bot. 1896, 234.—Afr. trop.
- THOUINIA**, Poit. (Sapind.).
paucidentata, Radlk. ex Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. i. 403.—Mexic.
- THRINAX**, Linn. f. (Palm.).
acuminata, Griseb. & Wendl. ex Sargent, in Coult. Bot. Gaz. xxvii. 89 (= *Coccothrinax* sp.).—Ind. occ.
floridana, Sargent, l. c. 84.—Am. bor.
keyensis, Sargent, l. c. 86.—Am. bor.
microcarpa, Sargent, in Gard. & For. ix. 162.—Am. bor.
- THRIXSPERMUM**, Lour. = *Sarcophilus*, R. Br. (Orchid.).
borneense, Ridley, in Journ. Linn. Soc. xxxi. 299 = *S. borneensis*.
leucorachne, Ridley, l. c. xxxii. 397.—Penins. Mal.
longicauda, Ridley, l. c. xxxi. 299.—Borneo.
subteres, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. 5.—Ins. Amboin.
- THERYPTOMENE**, Endl. (Myrtac.).
Helmsii, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xvi. 356.—Austral.
- THUNBERGIA**, Retz. (Acanth.).
Bauri, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 312.—Afr. austr.
crispa, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 12.—Afr. trop.
Delamerei, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 205.—Afr. trop.
elegans, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 27.—Hort.
flavohirta, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 311.—Afr. austr.
Galpini, Lindau, l. c. 310.—Afr. austr.
gigantea, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 68.—Afr. trop.
Hanningtonii, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 19.—Afr. trop.
hookeriana, Lindau, in Engl. Jahrb. xvii. Beibl. xli. 38.—Afr. trop.
Kirkii, Hook. f. Bot. Mag. t. 6677 = *hookeriana*.
laborans, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 507.—Afr. trop.
lamellata, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 803.—Afr. trop.
lathyroides, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 24.—Afr. trop.
liebrechtsiana, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 132.—Afr. trop.
longispala, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 129.—Afr. trop.
mellinocaulis, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 23.—Afr. trop.
Randii, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 201.—Afr. trop.
reticulata, Nees, in DC. Prod. xi. 58 = *alata*.
Ruspolii, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 67.—Afr. trop.
sericea, Burkill, in Dyer, Fl. Trop. Afr. v. 14.—Afr. trop.
stellarioides, Burkill, l. c. 26.—Afr. trop.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 41.—Afr. trop.
xanthotricha, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 311.—Afr. austr.
- THUNBERGIANTHUS**, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 509. SCROPHULARIACEAE.
Quintasii, Engl. l. c.—Afr. trop.
- THUNBERGIOPSIS**, Engl. l. c. t. 11, errore = *praec.*
- THUSPEINANTA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 703. LABIATAE.
brahuica, Briq. in Engl. & Prantl, Pflansenf. iv. III A. 229 (= *Tapeinanthus brahuicus*).—Persia.
persica, Briq. l. c. (= *Tapeinanthus persicus*).—Persia.
- THUYA**, Linn. (Conif.).
sutchuenensis, Franch. in Journ. de Bot. 1899, 262.—China.
- THYMELAEAE**, Tourn. ex Adans. = *Daphne*, Tourn. (Thymel.).
odorata, Bub. Fl. Pyren. i. 134 = *D. Cneorum*.

- THYMELAEAE**, Tourn. ex Scop. (Thymel.).
sempervirens, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxv. Afd. II. No. 3 (1899) 14.—Afr. bor.
- THYMUS**, Tourn. (Labi.).
agoutensis, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn.* xxxvii. 182.—Eur.
alsinoides, *Form. l. c.* 184.—Eur.
camarensis, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 508.—Gallia.
candidissimus, *Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 287.—Alger.
carnosulus, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 240.—Bulgar.
Clusii, *Bub. Fl. Pyren.* i. 399 = *T. Zygis*.
dolopicus, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* xv. 75.—Graecia.
pindicola, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn.* xxxiv. 319.—Eur.
remotiflorus, *Form. l. c.* xxxvii. 183.—Eur.
Stribnyi, *Vel. Fl. Bulg. Suppl.* i. 237.—Bulgar.
- THYRSANTHEMA**, Neck. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).
ebracteata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 182.—Bolivia.
- THYRSOSTACHYS**, Gamble, in *Ann. Bot. Gard.* Calc. vii. (1897) 58. **GRAMINEAE**.
Oliveri, *Gamble, l. c.*—Ind. or.
siamensis, *Gamble, l. c.* 59.—Ind. or.
- THYSANACHNE**, Presl = **Arundinella**, Raddi (Gramin.).
scoparia, *Presl, Thysan. Nov. Pl. Gen.* 1829; *Rel. Haenk.* i. 253 = *A. brasiliensis*.
- THYSANOCARPUS**, Hook. (Crucif.).
amplectens, *Greene, Pittonia*, iii. 87.—Am. bor.
emarginatus, *Greene, l. c.* 86.—Am. bor.
filipes, *Greene, l. c.* iv. 200.—Am. bor.
hirtellus, *Greene, l. c.* iii. 86.—Calif.
- TIBOUCHINA**, Aubl. (Melast.).
crassiramis, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxi. 446.—Bras.
membranifolia, *Cogn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 17.—Bolivia.
tetrapetala, *Cogn. l. c.* 276.—Bolivia.
- TILIA**, Tourn. (Tiliac.).
baroniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 468.—China.
goniocarpa, *Borb. in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 24.—Eur.
kiusiana, *Makino & Shiras. ex Shiras. in Bull. Coll. Agric. Tokyo*, iv. 155.—Japon.
maximowicziana, *Shiras, l. c.* 158.—Japon.
perneckensis, *Stohl, in Kerner, Sched. Fl. Austro-Hung.* vii. 25.—Eur.
rubescens, *H. Braun, in Kerner, l. c.* 27.—Eur.
Stohlii, *Stohl, in Kerner, l. c.* 26.—Eur.
- TILIACORA**, Colebr. (Menisperm.).
Dinklagei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 402.—Afr. trop.
Lehmbachii, *Engl. l. c.* 401.—Afr. trop.
odorata, *Engl. l. c.* 400.—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.* 401.—Afr. trop.
- TILLAEA**, Mich. (Crassul.).
acuminata, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xv. 96.—Austral.
acutifolia, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 143.—N. Zel.
exserta, *F. M. Reader, in Vict. Nat.* xiv. 83.—Austral.
Helmshii, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 142.—N. Zel.
pusilla, *T. Kirk, l. c.* 143.—N. Zel.
- TILLANDSIA**, Linn. (Bromel.).
adpressiflora, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 661.—Guiana.
aeris-incola, *Mez, l. c.* 759 (= *Catopsis maculata*).—Bras.
aizoides, *Mez, l. c.* 866.—Reg. Argent.
angulosa, *Mez, l. c.* 868.—Reg. Argent.
Arequitae, *André, ex Mez, l. c.* 814.—Urug.
arhiza, *Mez, l. c.* 855.—Parag.
Bangii, *Baker, ex Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 124.—Bolivia.
calothyrsus, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 704.—Mexic.
caricifolia, *Morr. ex Mez, l. c.* 672.—Mexic.
chaetophylla, *Mez, l. c.* 726.—Mexic.
chlorantha, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 87.—Reg. Argent.
- TILLANDSIA**:—
cinerea, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 679.—Mexic.
clavigera, *Mez, l. c.* 783.—Ecuador.
crispa, *Mez, l. c.* 739.—N. Granat.
dependens, *Hieron. ex Mez, l. c.* 880.—Reg. Argent.
didistichoides, *Mez, l. c.* 778.—Ind. occ.
digitata, *Mez, l. c.* 715.—Am. cent.
exaltata, *Mez, l. c.* 766.—N. Granat.
Fawcettii, *Mez, l. c.* 752.—Ind. occ.
Fendleri, *Griseb. in Goett. Nachr.* 1864, 17 = *panniculata*.
Fendleri, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 741 (= *Catopsis Fendleri*).—Venez.
flexuosa, *Mez, l. c.* 744 (= *Catopsis flexuosa*).—Bolivia.
gracilis, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xviii. 325.—Bras.
Hahnii, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 690.—Mexic.
Hieronymi, *Mez, l. c.* 876.—Reg. Argent.
inflata, *Mez, l. c.* 701 (non Baker).—Mexic.
ingens, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 256.—Ind. occ.
insularis, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 756.—Ins. Galap.
ionochroma, *André, ex Mez, l. c.* 801.—Ecuador.
kegeliana, *Mez, l. c.* 725.—Guiana.
kuntzeana, *Mez, l. c.* 790.—Bolivia.
lilacina, *Mez, l. c.* 806.—Am. cent.
lineatifolia, *Mez, l. c.* 686.—Venez.
lineatispica, *Mez, l. c.* 699.—Ind. occ.
Mandonii, *Morr. ex Mez, l. c.* 871.—Bolivia.
Mezii, *André, ex Mez, l. c.* 738.—Ecuador.
ortgiesiana, *Morr. ex Mez, l. c.* 678.—Mexic.
Pavonii, *Mez, l. c.* 774.—Peruv.
pendulispica, *Mez, l. c.* 745.—Peruv.
platyrhachis, *Mez, l. c.* 848.—N. Granat.
pungens, *Mez, l. c.* 684.—N. Granat.
ruepstris, *Mez, l. c.* 856.—Parag.
Sanctae-crucis, *S. Moore, ex Mez, l. c.* 710.—Bras.
schumanniana, *Mez, l. c.* 740 (= *Catopsis schumanniana*).—N. Granat.
Seemanni, *Mez, l. c.* 787 (= *Gusmania Seemanni*).—Ecuador.
tovarensis, *Mez, l. c.* 769 = *spiculosa*.
trapeziformis, *Mez, l. c.* 737.—N. Granat.
tripinnata, *Mez, l. c.* 745 (= *Catopsis tripinnata*).—Am. trop.
tristis, *Mez, l. c.* 762.—N. Granat.
tucumanensis, *Mez, l. c.* 853.—Reg. Argent.
Uhdei, *Mez, l. c.* 706.—Mexic.
undulifolia, *Mez, l. c.* 740.—N. Granat.
violascens, *Mez, l. c.* 797.—Bolivia.
- TIMONIUS**, Rumph. (Rubiac.).
celebicum, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 503, nomen.—Celebes.
latifolius, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 568.—N. Guin.
pleiomera, *Lauterb. & K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 152.—N. Brit.
- TINNEA**, Kotschy & Peyr. (Labi.).
Barteri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 314.—Afr. trop.
filipes, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 497.—Afr. trop.
heterotypica, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1877, 69 = *Renschia heterotypica*.
physaloides, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 163.—Afr. trop.
vestita, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 498.—Afr. trop.
zambesiaca, *Baker, l. c.* 499.—Afr. trop.
- TINNEA**, Vatke, in *Linnaea*, xliiii. (1880–82) 539 = **Cyclocheilon**, Oliv. (Verben.).
erianthera, *Vatke, l. c.* = *C. eriantherum*.
- TINOSPORA**, Miers (Menisperm.).
Buchholzii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 403.—Afr. trop.
megalobotrys, *K. Schum. & Lauterb. Fl. Deutsch. Südsee*, 311.—N. Guin.
mossambicensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxvi. 404.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
- TIPUANA**, Benth. (Legum.).
praecox, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 72.—Bras.
- TISSA**, Adans. = **Spergularia**, J. & C. Presl (Caryoph.).
angolensis, *Reiche & Johow, Fl. Chile*, i. 202 = *S. angolensis*.
aprica, *Reiche & Johow, l. c.* 201 = *S. aprica*.
araucana, *Reiche & Johow, l. c.* 203 = *S. araucana*.
Borchersii, *Reiche & Johow, l. c.* 199 = *S. Borchersii*.
coquimbensis, *Reiche & Johow, l. c.* 198 = *S. coquimbensis*.
denticulata, *Reiche & Johow, l. c.* 199 = *Arenaria denticulata*.
depauperata, *Reiche & Johow, l. c.* 200 = *Arenaria depauperata*.
fasciculata, *Reiche & Johow, l. c.* 197.—Chili.
floribunda, *Reiche & Johow, l. c.* = *Arenaria floribunda*.
fruticosa, *Reiche & Johow, l. c.* 199 = *S. fruticosa*.
glandulosa, *Reiche & Johow, l. c.* 196 = *S. liebmanniana*.
Larranagae, *Reiche & Johow, l. c.* 202 = *S. Larranagae*.
lignosa, *Reiche & Johow, l. c.* 198 = *Arenaria lignosa*.
media, *Reiche & Johow, l. c.* 201 = *S. remotiflora*.
paradoxa, *Reiche & Johow, l. c.* 196 = *Arenaria lanuginosa*.
Pissisi, *Reiche & Johow, l. c.* 200 = *Arenaria Pissisi*.
platensis, *Reiche & Johow, l. c.* 203 = *S. platensis*.
polyantha, *Reiche & Johow, l. c.* 202 = *S. polyantha*.
polyphylla, *Reiche & Johow, l. c.* 197 = *S. confertiflora*.
stenocarpa, *Reiche & Johow, l. c.* 201 = *Arenaria stenocarpa*.
teretifolia, *Reiche & Johow, l. c.* 198 = *Arenaria teretifolia*.
- TITHYMALUS**, Tourn. = **Euphorbia**, Linn. (Euphorb.).
Caesalpini, *Bub. Fl. Pyren.* i. 112 = *E. pubescens*.
Clusii, *Bub. l. c.* 110 = *E. isatidifolia*.
crebrifoliatus, *Bub. l. c.* 97 = *E. pinea*.
flavicomus, *Bub. l. c.* 108 = *E. flavicoma*.
leptophyllus, *Bub. l. c.* 95 = *E. segetalis*.
longiradiatus, *Bub. l. c.* 106 = *E. longiradiata*.
Matthioli, *Bub. l. c.* 101 = *E. niceensis*.
mucronatus, *Bub. l. c.* 94 = *E. falcata*.
pauciflorus, *Bub. l. c.* 102 = *E. pauciflora*, *Duf.*
Pouzolzi, *Bub. l. c.* 109 = *E. Duvalii*.
pyrenaicus, *Bub. l. c.* 114 = *E. Chamaebuxus*.
serocomans, *Bub. l. c.* 111 = *E. seracomans*.
sulcatus, *Bub. l. c.* 92 = *E. sulcata*.
- TOCOCA**, Aubl. (Melast.).
parvifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 334.—Am. cent.
- TOCOYENA**, Aubl. (Rubiac.).
stipulosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* ix. 18.—Bras.
- TODDALIOPSIS**, Auct. in *Just, Jahresb.* xxiv. II. 397, errore = **TECLEA**, Delile = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
- TOFIELDIA**, Huds. (Liliac.).
brevistyla, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 223.—China.
intermedia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 528.—Am. bor.
iridacea, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 224.—China.
Okuboi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 42.—Japon.
setchuenensis, *Franch. in Journ. de Bot.* 1898, 224.—China.
yunnanensis, *Franch. l. c.* 225.—China.
- TOONA**, M. Roem. = **Cedrela**, P. Br. (Meliac.).
australis, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 270.—Austral.
glabra, *Harms, l. c.* 269.—Ind. or.
microcarpa, *Harms, l. c.* 270.—Ind. or.
serrulata, *Harms, l. c.* 269 = *C. serrulata*.
- TOPOBEA**, Aubl. (Melast.).
boliviensis, *Cogn. in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 94.—Bolivia.
- TORDYLIUM**, Tourn. (Umbell.).
hirtocarpum, *Candargy, in Bull. Soc. Bot.* xlv. 159.—Graecia.
- TORENIA**, Linn. (Scrophul.).
inaequalifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxiii. 502.—Afr. trop.
spicata, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

- TORICELLIA**, DC. (Cornac.).
intermedia, Harms, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 507.—China.
- TORILIS**, Adans. = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).
caerulescens, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 156 = *C. caerulescens*.
Gaillardoti, Drude, l. c. = *C. Gaillardoti*.
nodiflora, Bub. Fl. Pyren. ii. 406 = *C. nodosa*.
stocksiana, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 156 = *C. stocksiana*.
- TORREYA**, Arn. (Conif.).
Fargesii, Franch. in *Journ. de Bot.* 1899, 264.—China.
- TORRICELLIA**, Harms, ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. (1900) 507 = **Toricellia**, DC. (Cornac.).
- TORULINIUM**, Desv. (Cyper.).
confertum, Desv. in *Ham. Prod. Pl. Ind. Occ.* 15.—Ind. occ.
Eggersii, C. B. Clarke, in *Urb. Symb. Antill.* ii. 56.—Ind. occ.
filiforme, C. B. Clarke, l. c. 57.—Ind. occ.
michauxianum, C. B. Clarke, l. c. 56.—Ind. occ.
Vahlilii, C. B. Clarke, l. c.—Ind. occ.
- TOULICIA**, Aubl. (Sapind.).
acuminata, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 505.—Bras.
subsquamulata, Radlk. l. c.—Bras.
- TOURNEFORTIA**, Linn. (Borag.).
andina, Britton, ex Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 148.—Bolivia.
gracilliflora, Britton, l. c.—Bras.
macrophylla, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 520.—N. Guin.
Nelsoni, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 10.—Am. cent.
stenophylla, Urb. *Symb. Antill.* i. 477.—Ind. occ.
subspicata, Donn. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xxv. 151.—Am. cent.
- TOVARIA**, Neck. (Liliac.).
atropurpurea, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 45.—China.
Delavayi, Franch. l. c. 47.—China.
Fargesii, Franch. l. c. 45.—China.
Prattii, Franch. l. c. 46.—China.
Souliei, Franch. l. c. 45.—China.
stenoloba, Franch. l. c. 47.—China.
tatsienensis, Franch. l. c.—China.
yunnanensis, Franch. l. c. 48.—China.
- TOVOMITA**, Aubl. (Guttif.).
alatopetiolata, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 16.—Bolivia.
- TOWNSENDIA**, Hook. (Compos.).
alpigena, Piper, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 394.—Am. bor.
alpina, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 391.—Am. bor.
Bakeri, Greene, *Pittonia*, iv. 157.—Am. bor.
- TOXOCARPUS**, Wight & Arn. (Asclep.).
lineatus, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 436 (= *Secamone lineata*).—Java.
- TRACHELOSPERMUM**, Lem. (Apocyn.).
borneana, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 400 (= *Parachites borneana*).—Borneo.
verrucosa, Boerl. l. c. (= *Tabernaemontana verrucosa*).—Java.
- TRACHYANDRA**, Kunth = **Anthericum**, Linn. (Liliac.).
humilis, Kunth, *Enum. Pl.* iv. 574 = *A. Kunthii*.
Jacquinii, Kunth, l. c. 578 = *A. elongatum*.
- TRACHYMENE**, Rudge (Umbell.).
celebica, Hemsl. in *Kew Bull.* 1896, 37.—Celebes.
juncea, S. Moore, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 194.—Austral.
- TRACHYPHYNIUM**, Benth. (Scitam.).
braunianum, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 319.—Afr. trop.
liebrectsianum, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 147.—Afr. trop.
muricatum, Pierre, in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1233.—Afr. trop.
spinulosum, Pierre, l. c.—Afr. trop.
- TRACHYPOGON**, Nees (Gramin.).
avenaceus, Nees, *Agrost. Bras.* 354 = *Andropogon halepensis*.
fasciculatus, Munro, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 138 = *Ischaemum spathiflorum*.
Schoenanthus, Nees, in *Linnaea*, vii. 281 = *Andropogon Nardus*.
- TRACHYSPERMUM**, Link = **Carum**, Rupp. (Umbell.).
capense, Drude, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 189 = *C. capense*.
carvifolium, Drude, l. c. = *C. carvifolium*.
dichotomum, Drude, l. c. = *C. dichotomum*.
didymum, Drude, l. c. = *C. didymum*.
- TRADESCANTIA**, Rupp. (Commelin.).
acropoda, Auct. in *Just, Jahresb.* xxv. II. 505, errore = *macropoda*.
brachyphylla, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 471.—Mexic.
bracteata, Small, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 510.—Am. bor.
chidophylla, Auct. in *Just, Jahresb.* xxv. II. 505, errore = *orchidophylla*.
comata, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 234.—Am. bor.
foliosa, Small, l. c.—Am. bor.
gigantea, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 205.—Am. bor.
hirsuticaulis, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 233.—Am. bor.
humilis, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 204.—Am. bor.
longifolia, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 471 = *holosericea*.
longifolia, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 233.—Am. bor.
macrophylla, Greenm. in *Proc. Amer. Acad.* xxxiii. 472.—Mexic.
macropoda, Greenm. l. c. xxxii. 295.—Mexic.
occidentalis, Britton, ex Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 87.—Am. bor.
orchidophylla, Rose & Hemsl. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2522.—Mexic.
scopulorum, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 205.—Am. bor.
- TRAGIA**, Plum. (Euphorb.).
Bolusii, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 293.—Afr. austr.
durbanensis, Kuntze, l. c.—Afr. austr.
Okanyua, Pax, in *Bull. Herb. Boiss.* vi. 735.—Afr. trop.
Schinzii, Pax, l. c. 734.—Afr. austr.
Schlechteri, Pax, l. c. 735.—Afr. austr.
Zenkeri, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 523.—Afr. trop.
- TRAGOPOGON**, Tourn. (Compos.).
interjectus, Waisb. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 5.—Hybr.
- TRAGUS**, Hall. (Gramin.).
brevicaulis, Boiss. *Diagn. Ser.* I. xiii. 44 = *racemosus*.
major, Stapf, in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 577.—Afr. austr.
- TRECVLIA**, Decne. (Urtic.).
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. 54.—Afr. trop.
parva, Engl. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 121.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
- TRELESEA**, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. (1899), 207. **COMMELINACEAE**.
brevifolia, Rose, l. c. (= *Tradescantia brevifolia*).—Mexic.
leiandra, Rose, l. c. 208 (= *Commelina leiandra*).—Mexic.
pumila, Greene, *Pittonia*, iv. 225 (= *Zebrina pumila*).—Am. bor.
tumida, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 208 (= *Tradescantia tumida*).—Am. bor.
- TREMA**, Lour. (Urtic.).
acuminatissima, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* iii. 358 (= *Sponia acuminatissima*).—Sumatra.
- TRETOCARYA**, Maxim. = **Microula**, Benth. (Borag.).
pratensis, Maxim. *Mél. Biol.* xi. 272 = *M. tibetica*.
sikkimensis, Oliv. in *Hook. Ic. Pl.* t. 2255 = *M. sikkimensis*.
- TREVOA**, Miers (Rhamn.).
campanulata, Reiche, *Fl. Chile*, ii. 12 (= *Colletia campanulata*).—Chili.
glauca, Reiche, l. c. (= *Retanilla glauca*).—Chili.
patagonica, Speng. in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 503.—Patag.
- TREVORIA**, Lehm. in *Gard. Chron.* 1897, i. 345. **ORCHIDEAE**.
Chloris, Lehm. l. c. 346.—Ecuador.
- TRIACHYRUM**, Hochst. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).
adoense, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 398 = *S. discosporus*.
cordofanum, Hochst. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 176 = *S. coromandelianus*.
discosporum, Steud. l. c. = *S. coromandelianus*.
- TRIADENUM**, Rafin. = **Hypericum**, Tourn. (Hyperic.).
longifolia, Small, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 140.—Am. bor.
petiolatum, Britton, in *Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* ii. 437 = *H. paludosum*.
- TRIANAEA**, Planch. & Linden (Solan.).
speciosa, Soler. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1898, 254 (= *Poortmannia speciosa*).—Ecuador.
- TRIANTHEMA**, Sanv. (Ficoid.).
hereroensis, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* v. App. III. 76.—Afr. trop.
nyasica, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 268.—Afr. trop.
- TRIANThERA**, Wettst. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III B. 55 (1891) = **Stemotria**, Wettst. & Harms (Scroph.).
- TRIASPIS**, Burch. (Malpigh.).
acuminata, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 416.—Afr. trop.
transvalica, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 29.—Afr. austr.
- TRIATHERA**, Desv. (Gramin.).
bromoides, Roth, ex Kunth, *Enum. Pl.* i. 520 = *Tripogon bromoides*.
- TRIBRACHIA**, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).
pendula, Lindl. *Coll. Bot.* sub t. 41 = *B. recurvum*.
- TRIBULUS**, Tourn. (Zygophyll.).
alacranensis, Millsp. in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 54.—Ind. occ.
brachystylis, Robinson, in *Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. I. 354.—Am. bor.
- TRICALYSIA**, A. Rich. (Rubiace.).
andongensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 468.—Afr. trop.
benguellensis, Welw. ex Hiern, l. c. 470.—Afr. trop.
cacondensis, Hiern, l. c. 467.—Afr. trop.
delagoensis, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 67.—Afr. austr.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 200.—Afr. trop.
glabra, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 445.—Afr. trop.
griseiflora, K. Schum. l. c. 446.—Afr. trop.
kraussiana, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 67 = *Kraussia floribunda*.
macrophylla, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 66.—Afr. trop.
mechowiana, K. Schum. l. c. xxiii. 447.—Afr. trop.
oligoneura, K. Schum. l. c. 448.—Afr. trop.
Soyauxii, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
subsessilis, K. Schum. l. c. xxviii. 66.—Afr. trop.
Welwitschii, K. Schum. l. c. xxiii. 449.—Afr. trop.
- TRICHILIA**, P. Br. (Meliac.).
alajuelana, C. DC. ex Donn. *Sm. Pl. Guatem.* v. 13, nomen.—Am. cent.
alata, N. E. Br. in *Kew Bull.* 1896, 160.—Afr. austr.
angustior, Harms, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr.* i. 209.—Bras.
Elliotii, Harms, l. c. iii. iv. 306.—Madag.
emarginata, Scott Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. 11 = *Elliotii*.
gilgiana, Harms, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 161.—Afr. trop.

TRICHILIA :—

- graciliflora, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. iv. 304, fig. 164.—Reg. Argent.
 Humblotii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 163.—Ins. Comor.
 megalantha, *Harms, l. c.* 160.—Afr. trop.
 monacantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 329.—Ind. occ.
 schumanniana, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachtr.* i. 209.—Bras.
 stellatotomentosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 36.—Bolivia.
 Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 162.—Afr. trop.
 taubertiana, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzensf.* iii. iv. 305.—Bras.
 triacantha, *Urb. Symb. Antill.* i. 329.—Ind. occ.
 vestita, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 428.—Afr. trop.
 Zenkeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxiii. 161.—Afr. trop.

TRICHINIUM, R. Br. (Amarant.).

- eremita, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 218.—Austral.

TRICHOCENTRUM, Poepp. & Endl. (Orchid.).

- alatum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1898, 197.—N. Granat.
 Brandtia, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* v. 109.—Hab. ?

TRICHOCHITON, Kom. in Trav. Soc. Nat. Pétersb.

- xxvi. (1896) 113. **CRUCIFERAE.**
 inconspicuum, *Kom. l. c.*—Turkestan.
 tuberosum, *Kom. l. c.*—Turkestan.

TRICHOCLADUS, Pers. (Hamamel.).

- malosanus, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 266.—Afr. trop.

TRICHOCLINE, Cass. (Compos.).

- oblonga, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxi. 370.—Peruv.
 Stuebelii, *Hieron. l. c.* 369.—Peruv.

TRICHOCREPIS, Vis. = **Pterotheca**, Cass. (Compos.).

- nemausensis, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 71 = *P. nemausensis*.

TRICHODESMA, R. Br. (Borag.).

- cardiosepalum, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 2436.—Arab.
 droogmansianum, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 69.—Afr. trop.
 kissenioides, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 119.—Arab.

TRICHOGLOTTIS, Blume (Orchid.).

- calcarata, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 292.—Borneo.
 celebica, *Rolfe, in Kew Bull.* 1899, 130.—Celebes.
 Koordersii, *Rolfe, l. c.*—Celebes.
 oblongifolia, *Rolfe, l. c.*—Celebes.
 scaphigera, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 357.—Penins. Mal.
 tetraceras, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

TRICHOLAENA, Schrad. (Gramin.).

- arenaria, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; et in *Linnaea*, xi. Lit. Ber. 130.—Afr. austr.
 bellespicata, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 196.—Afr. trop.
 capensis, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; et in *Linnaea*, xi. Lit. Ber. 130.—Afr. austr.
 dregeana, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 769 = *rosea*.
 fragilis, *A. Braun, in Flora*, 1841, 275 = *rosea*.
 glabra, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 446.—Afr. austr.
 grandiflora, *Hochst. in Flora*, 1841, i. Intell. 19 = *rosea*.
 micrantha, *Schrad. in Schult. Mant.* ii. 163 = *Teneriffae*, *Wightii*.
 minutiflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 198.—Afr. trop.
 rosea, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; et in *Linnaea*, xi. Lit. Ber. 129.—Afr. trop. et austr.
 ruficoma, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 770 = *rosea*.
 rupicola, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 197.—Afr. trop.
 setifolia, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* vii. 442.—Afr. austr.
 sphacelata, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 559 = *rosea*.
 tanatracha, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 197.—Afr. trop.

TRICHOLAENA :—

- Teneriffae, *Parl. in Webb & Bert. Phyt. Canar.* iii. 425.—Reg. medit.; As. austr.
 tonsa, *Nees, Cat. Sem. Hort. Vratisl.* 1835; et in *Linnaea*, xi. Lit. Ber. 128 = *rosea*.
 tuberculosa, *Hack. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 65 = *Wightii*.
 Wightii, *Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram.* 93.—As. austr. et Ins. atlant.

TRICHONEMA, Ker-Gawl. = **Romulea**, Marat. (Irid.).

- anceps, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* 265.—Galic.
 coronatum, *Merino, l. c.* 266.—Galic.
 viride, *Merino, l. c.* 263.—Galic.

TRICHOON, Roth = **Phragmites**, Trin. (Gramin.).

- Phragmites*, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 218 = *P. communis*.

TRICHOPILIA, Lindl. (Orchid.).

- multiflora, *Kraenzl. in Xenia Orch.* t. 288.—Hort.

TRICHOPTERIX, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii.

- (1897) 69, sphalm. = seq.

TRICHOPTERYX, Nees (Gramin.).

- acuminata, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 297.—Afr. trop.
 ambiens, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiv. 335.—Afr. trop.
 annua, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 298.—Afr. trop.
 camerunensis, *Stapf, l. c.* 296.—Afr. trop.
 densispica, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 214.—Afr. trop.
 flavida, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 298.—Afr. austr.
 gigantea, *Stapf, l. c.* 295.—Afr. trop.
 hordeiformis, *Stapf, l. c.* 297.—Afr. trop.
 nigritiana, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
 pennata, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 69.—Afr. trop.
 ramosa, *Stapf, in Kew Bull.* 1897, 298.—Afr. austr.
 viridis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 216.—Afr. trop.

TRICHOSANTHES, Linn. (Cucurb.).

- papuana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* vii. 349.—N. Guin.
 reineckeana, *Cogn. in Engl. Jahrb.* xxv. 691.—Ins. Samoa.

TRICHOSPORUM, D. Don (Gesner.).

- breviflorum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 173.—Ins. Philipp.
 Forbesii, *S. Moore, l. c.* 172.—N. Guin.
 nummularium, *Burkill & S. Moore, ex S. Moore, l. c.* 173.—N. Guin.

TRICHOSTACHYS, Hook. f. (Rubiace.).

- Lehmbachii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 467.—Afr. trop.
 microcarpa, *K. Schum. l. c.* xxviii. 88.—Afr. trop.
 Soyauxii, *K. Schum. l. c.* 89.—Afr. trop.
 stenostachys, *K. Schum. l. c.* 89.—Afr. trop.

TRICLISIA, Benth. (Menisperm.).

- Welwitschii, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 17.—Afr. trop.

TRICOSTULARIA, Nees (Cyper.).

- paludosa, *Benth. Fl. Austral.* vii. 382 = *Costularia paludosa*.

TRICUSPIS, Beauv. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).

- Langloisii, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* i. 293.—Am. bor.

TRICYRTIS, Wall. (Liliac.).

- lasiocarpa, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, 1897, 79.—Formosa.
 stolonifera, *Matsum. l. c.* 78.—Formosa.

TRIDAX, Linn. (Compos.).

- imbricata, *Schultz Bip. ex Klatt, in Flora*, 1885, 202.—Mexic.
 paraguayensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 182.—Parag.
 petrophila, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 5.—Mexic.
 Pringlei, *Robinson & Greenm. l. c.* 4.—Mexic.
 rosea, *Schultz Bip. ex Robinson & Greenm. l. c.* 6.—Mexic.; Ind. occ.
 Sodiroi, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 51.—Ecuador.
 tuberosa, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 4.—Mexic.

TRIDENS, Roem. & Schult. (Gramin.).

- capensis, *Nees, in Linnaea*, vii. 324 = *Diplachne fusca*.
 indicus, *Nees, in Wight, Cat. n.* 1794 = *Diplachne fusca*.

TRIFOLIUM, Tourn. (Legum.).

- anemophilum, *Greene, Pittonia*, iv. 139.—Am. bor.
 argentinense, *Speg. in Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 49.—Reg. Argent.
 attenuatum, *Greene, Pittonia*, iv. 137.—Am. bor.
 calophyllum, *Greene, l. c.* iii. 214.—Am. bor.
 carteiense, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1899, 163.—Hispan.
 caurinum, *Piper, in Erythea*, vi. 29.—Am. bor.
 chrysanthoides, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 161.—Graecia.
 compactum, *Post, Fl. Syria*, 239.—Syria.
 dianthum, *Greene, Pittonia*, iii. 217.—Am. bor.
 Elmeri, *Greene, l. c.* 223.—Am. bor.
 Fendleri, *Greene, l. c.* 221.—Am. bor.
 geminiflorum, *Greene, l. c.* 216.—Am. bor.
 Goetzenii, *Taub. in Goetzen, Durch Afr.* repr. 5.—Afr. trop.
 Hallii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 135.—Am. bor.
 isodon, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 64.—Afr. bor.
 latifolium, *Greene, Pittonia*, iii. 223.—Am. bor.
 lilacinum, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 547.—Am. bor.
 Loiseleurii, *Rouy, Fl. Fr.* v. 111.—Gallia.
 lupulinum, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 503 = *procumbens*.
 macilentum, *Greene, Pittonia*, iii. 223.—Am. bor.
 majus, *Greene, l. c.* 214.—Am. bor.
 Marshallii, *Rouy, Fl. Fr.* v. 114.—Reg. Cauc.
 minutiflorum, *Greene, Pittonia*, iii. 215.—Am. bor.
 montanense, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 236.—Am. bor.
 nemorale, *Greene, Pittonia*, iv. 136.—Am. bor.
 Ortegae, *Greene, l. c.* iii. 186.—Mexic.
 phaeocephalum, *Greene, l. c.* 216.—Am. bor.
 polyodon, *Greene, l. c.* 215.—Am. bor.
 pusillum, *Greene, l. c.* 217.—Am. bor.
 rodnense, *Porcius, in Anal. Acad. Roman.* Ser. II. xiv. 62.—Eur.
 rostratum, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 547.—Am. bor.
 rumelicum, *Haldscy, Consp. Fl. Graec.* i. 399.—Eur.
 Rydbergii, *Greene, Pittonia*, iii. 222.—Am. bor.
 sefinense, *Frey & Bornm. in Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 5.—Oriens.
 segetum, *Greene, Pittonia*, iii. 221.—Am. bor.
 somalense, *Taub. ex Harms, in Ann. Ist. Bot. Roma*, vii. 90.—Afr. trop.
 squarrosom, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 214 = *Marshallii*.
 subsalinum, *Greene, Pittonia*, iii. 219.—Am. bor.
 trimorphum, *Greene, l. c.* 220.—Am. bor.
 truncatum, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1895 (1896) 546.—Am. bor.
 tunetanum, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxiii. no. 12, 65.—Afr. bor.
 ultramontanum, *Greene, Pittonia*, iii. 218.—Am. bor.
- TRIGLOSSUM**, Fisch. = **Bambusa**, Schreb. (Gramin.).
arundinaceum, *Gamble, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 391 = *B. nana*.
bambusinum, *Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. p. viii*; et ex *Roem. & Schult. Syst.* ii. 846 = *B. nana*.
- TRIGLOTTIS**, Auct. in Just. Jahresb. xxv. II. 505, sphalm. = **Trichoglottis**, Blume (Orchid.).
- TRIGONELLA**, Linn. (Legum.).
 Amara, *Post, Fl. Syria*, 9.—Reg. Levant.
 amandiana, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vi. 143.—Eur.
 caerulescens, *Halácsy, Consp. Fl. Graec.* i. 351 = *azurea*.
- TRIGONIA**, Aubl. (Vochys.).
 thyrsefera, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxiii. 3.—Am. cent.
- TRIGONOCAPNOS**, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. (1899) 131. **PAPAVERACEAE.**
 curvipes, *Schlechter, l. c.* 132.—Afr. austr.
- TRIGONOSPERMUM**, Less. (Compos.).
 tomentosum, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 44.—Mexic.

- TRILLIUM**, Linn. (Liliac.).
crassifolium, *Piper*, in *Erythea*, vii. 104.—Am. bor.
Underwoodii, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897,
172.—Am. bor.
- TRIMERIA**, Harv. (Bixac.).
tropica, *Burkill*, in *Kew Bull.* 1898, 145.—Afr. trop.
- TRIODIA**, R. Br. (Gramin.).
argentina, *K. Schum.* in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 331
(= *Sieglingia argentina*).—Reg. Argent.
capensis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 877 =
Diplachne fusca.
decumbens, Beauv. *Agrost.* 179 = *Danthonia decumbens*.
Drummondii, *Scribner & Kearney*, in *U. S. Dept.*
Agric. Bull. Agrost. iv. 37.—Am. bor.
glaberrima, *Post*, *Fl. Syria*, 874; et in *Bull. Herb.*
Boiss. v. 760.—Syria.
livida, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 877 =
Diplachne fusca.
plumosa, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* xix. 110 = *Lepto-*
carydion Vulpinastrum.
Vulpiastrum, *K. Schum.* in *Engl. Pf. Ost-Afr.* C.
113 = *Leptocarydion Vulpinastrum*.
- TRIOSTEUM**, Linn. (Caprifol.).
Fargesii, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 318.—
China.
- TRIPHELEIA**, Stapf = *Stiburus*, Stapf (Gramin.).
alopecuroides, Stapf, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2612 = *S.*
alopecuroides.
- TRIPLARIS**, Loefl. (Polygon.).
boliviana, *Britton, ex Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*,
1900, 130.—Bolivia.
corylifolia, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. ii. 270 = *Ruprechtia*
corylifolia.
efistulifera, *Britton, ex Rusby*, in *Bull. Torr. Bot. Club*,
1900, 129.—Bolivia.
estriata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 271.—Bolivia.
guanaisensis, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 111.
—Bolivia.
hispidia, *Britton, ex Rusby*, l. c.—Bolivia.
intermedia, *K. Schum.* in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 364,
errore = *Triplasis intermedia*.
polystachya, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 271 = *Ruprechtia*
polystachya.
triflora, *Kuntze*, l. c. = *Ruprechtia triflora*.
weigeltiana, *Kuntze*, l. c. 270 = *surinamensis*.
- TRIPLASANDRA**, Seem. (Aral.).
Waimeae, A. A. Heller, in *Minnes. Bot. Studies*, i.
871 = *Heptapleurum Waimeae*.
- TRIPLASIS**, Beauv. (Gramin.).
intermedia, *Nash*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 564.
—Am. bor.
- TRIPLEUROSPERMUM**, Sch. Bip. = *Matricaria*,
Tourn. (Compos.).
macrocephalum, *Schur*, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*,
xxxvi. 177.—Eur.
- TRIPLOCEPHALUM**, O. Hoffm. (Compos.).
glabrifolium, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 832 =
Geigeria pectidia.
- TRIPLOCHITON**, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii.
(1900) 330. *MALVACEAE*.
scleroxyton, *K. Schum.* l. c. 331.—Afr. trop.
- TRIPLOSTEGIA**, Wall. (Dipsac.).
repens, *Hemsl.* in *Kew Bull.* 1899, 101.—N. Guin.
- TRIPOGON**, Roth (Gramin.).
neesianus, *Wight & Arn.* ex *Wight*, *Cat. n.* 2059 =
bromoides.
pauperulus, *Stapf*, in *Hook. Ic. Pl.* t. 2442.—Ind. or.
submutica, *Hack.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vii. 237
= *Jacquemontii*.
Wightii, *Hook. f.* l. c. 286.—Ind. or.
- TRIPSACUM**, Linn. (Gramin.).
avenacea, *Scribn. & Merrill*, in *U. S. Dept. Agric.*
Bull. Agrost. xxiv. 23 = *mexicana*.
laxa, *Scribn. & Merrill*, l. c. 24.—Mexic.
- TRIPSACUM** :—
pilosum, *Scribn. & Merrill*, in *U. S. Dept. Agric.*
Bull. Agrost. xxiv. 6.—Mexic.
pubescens, *Lichtenst.* ex *Nees*, *Fl. Afr. Austr.* 74 =
Anthephora pubescens.
semiteres, *Wall.* *Cat. n.* 8628 = *Polytoxa semiteres*.
- TRIPTERACHAENIUM**, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 182
= *Tripteris*, *Less.* (Compos.).
humile, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 182 = *Tripteris*
humilis.
scariosum, *Kuntze*, l. c. = *Tripteris flexuosa*.
- TRIPTERIS**, *Less.* (Compos.).
angustissima, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1900, 460.—
Afr. trop.
- TRIRAPHIS**, R. Br. (Gramin.).
Fleckii, *Hack.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. *App.* III. 23.
—Afr. austr.
Hieronymi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 373.—Reg.
Argent.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 227.—
Afr. trop.
- TRIRAPHIS**, *Nees = Pentaschistis*, *Stapf* (Gramin.).
capensis, *Nees*, *Fl. Afr. Austr.* 271 = *P. capensis*.
- TRISETUM**, *Pers.* (Gramin.).
airoides, *Roem. & Schult. Syst.* ii. 666 = *Avena sub-*
spicata.
andinum, *Benth. Pl. Hartw.* 261 = *Avena subspicata*.
andropogonoides, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 228 = *Tri-*
stachya Rehmanni.
antarcticum, *Nees*, in *Linnaea*, vii. 307 = *Avenastrum*
antarcticum.
antarcticum, *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VI. i.
61 = *Avena subspicata*.
aracanthum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 28.
—Chili.
argenteum, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost.*
xi. 49 (non aliorum).—Am. bor.
aureum, *Nees*, ex *Steud. Syn. Pl. Gram.* 225 = *Avena*
aenea.
balearicum, *Gand.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 141.
—Eur.
Brittonii, *Nash*, in *Bull. N. York Bot. Gard.* i. 437.—
Am. bor.
Cavanillesii, *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* VI. i.
63 = *Avena Cavanillesii*.
confertum, *Pilger*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 714.—N.
Granat.
dregeanum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 227 = *Avenastrum*
dregeanum.
erectum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 27.—
Chili.
flavescens, *Beauv. Agrost.* 88 = *Avena flavescens*.
gaudianum, *Boiss. Voy. Bot. Espagne*, ii. 653 = *Avena*
Cavanillesii.
groenlandicum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 228 = *Avena*
subspicata.
imberbe, *Nees*, *Fl. Afr. Austr.* 347 = *Avenastrum*
turgidulum.
koelerioides, *Bornm. & Hack.* in *Verh. Zool.-Bot. Ges.*
Wien, xlviii. 646.—Palaest.
labradoricum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 228 = *Avena*
subspicata.
minutiflorum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 26.
—Chili.
molle, *Kunth, Rév. Gram.* i. 101 = *Avena subspicata*.
nemorosum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 26.—
Chili.
nudum, *Pers. Syn.* i. 97 = *Pentaschistis Thunbergii*.
paradoxum, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 28.—
Chili.
phleoides, *Kunth, Rév. Gram.* i. 101 = *Avena sub-*
spicata.
spiciforme, *Dulac*, *Fl. Hautes-Pyr.* 86 = *Avena sub-*
spicata.
Stuedelii, *Nees*, in *Linnaea*, vii. 308 = *Avenastrum*
quinquesetum.
subspicatum, *Beauv. Agrost.* 88 = *Avena subspicata*.
toluccense, *Kunth, Rév. Gram.* i. 101 = *Avena sub-*
spicata.
valesiaca, *Boiss.* ex *Nym. Consp.* 814 = *Avena Cavanil-*
lesii.
Vidali, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* xciv. 27.—Chili.
virescens, *Nees*, ex *Steud. Syn. Pl. Gram.* 226 = *Avena*
aspera.
- TRISTACHYA**, *Nees* (Gramin.).
biseriata, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 295.—Afr. austr.
bricchettiana, *Chiov.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. 162.
—Afr. trop.
glabra, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 294 = *Rehmanni*.
huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 217.—Afr.
trop.
monocephala, *Hochst.* in *Flora*, 1846, 120 = *leucothrix*.
nodiglumis, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 334.—
Afr. trop.
tuberculata, *Stapf*, in *Kew Bull.* 1897, 294.—Afr. trop.
Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 217.—
Afr. trop.
- TRISTAGMA**, *Poepp.* (Liliac.).
australis, *Neger*, ex *Dusdn*, in *Ergebn. Schwed. Exp.*
Magell. III. v. 207.—Reg. Magellan.
nivale, *Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile*, 9 = *Brodiaea*
nivalis.
- TRISTEMMA**, *Juss.* (Melast.).
angolense, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pf.* ii. 27.—
Afr. trop.
Dusenii, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
fruticulosum, *Gilg*, l. c. 26.—Afr. trop.
grandifolium, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
oreophilum, *Gilg*, l. c. 25.—Afr. trop.
papillosum, *Gilg*, l. c.—Afr. trop.
roseum, *Gilg*, l. c. 24.—Afr. trop.
Schlechteri, *Gilg*, in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-*
Exped. 302, nomen.—Afr. trop.
vincoides, *Gilg*, in *Engl. Monog. Afr. Pf.* ii. 24.—
Afr. trop.
- TRISTIRA**, *Radlk.* (Sapind.).
celebica, *Boerl. & Koord.* ex *Koord. in Meded. 'S*
Lands Plantent. xix. 407, nomen.—Celebes.
- TRITELEIA**, *Dougl. = Brodiaea*, *Sm.* (Liliac.).
Berteri, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 467 = *B. subbiflora*.
bivalvis, *Hook.* in *Lindl. Bot. Reg.* sub t. 1293 = *B.*
bivalvis.
brevipes, *Kuntze*, in *Linnaea*, xx. 9 = *B. brevipes*.
candida, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 139 = *B.*
candida.
conspicua, *Baker*, in *Saund. Refug. Bot.* t. 43 = *B.*
uniflora.
gaudichaudiana, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 467 = *B. bivalvis*.
gracilis, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* (1873) 550 = *B.*
philippiana.
hirtella, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 465 = *B. hirtella*.
poeppigiana, *C. Gay*, *Fl. Chile*, vi. 117 = *B. poeppi-*
giana.
sellowiana, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 466 = *B. sellowiana*.
sessilis, *Phil.* in *Linnaea*, xxix. 72 = *B. sessiliflora*.
uniflora, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1921 = *B. uniflora*.
violacea, *Kunth, Enum. Pl.* iv. 468 = *B. violacea*.
- TRITHRINAX**, *Mart.* (Palm.).
biflabellata, *Rodr. Palm. Nov. Parag.* 2.—Parag.
- TRITICUM**, *Linn.* (Gramin.).
amyleum, *Ser. Mélang. Bot.* i. 124 = *vulgare*.
capense, *Spreng. Pugill.* ii. 23 = *Brizopyrum capense*.
dicoccon, *Schrank, Baier.* *Fl.* i. 389 = *vulgare*.
durum, *Desf. Fl. Atlant.* i. 114 = *vulgare*.
fuegianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, v. 99.
—Fuegia.
magellanicum, *Speg. l. c.* 98.—Fuegia.
Spelta, *Linn. Sp. Pl.* 86 = *vulgare*.
striatum, *Steud. Syn. Pl. Gram.* 346 = *Agropyron*
striatum.
tenax, *Hauskn.* in *Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s.
xiii-xiv. 67.—Graecia.
Zea, *Host*, *Gram. Austr.* iii. 20 = *vulgare*.
- TRUMFETTA**, *Plum.* (Tiliac.).
brachyoceras, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 432.—
Afr. trop.
Junodii, *Schinz*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 10, 49.—
Afr. austr.
nigricans, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 156.—Austral.
soccorsensis, *Brandegee*, in *Erythea*, vii. 1.—Mexic.
- TRIXIS**, *P. Br.* (Compos.).
aggregata, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 71.—
Bolivia.
Grisebachii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. ii. 183.—Reg.
Argent.
hoffmanniana, *Taub.* in *Engl. Jahrb.* xxi. 456.—Bras.
B b 2

TROCHERA, Rich. = *Ehrharta*, Thunb. (Gramin.).
panicea, H. Baill. Hist. Pl. xii. 171 = *E. erecta*.

TROCHOCARPA, R. Br. (Euphorbiac.).
Novae-zealandiae, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.*
xviii. 602.—N. Zel.

TROCHOCODON, Candargy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.*
xliv. (1897) 148. *CAMPANULACEAE*.
spicatus, *Candargy*, l. c.—Graecia.

TROLLIUS, Linn. (Ranunc.).
albiflorus, *Rydb.* in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 152.
—Am. bor.

TROPAEOLUM, Linn. (Geran.).
cuspidatum, *Buchen.* in *Engl. Jahrb.* xxvi. 581.—
Bolivia.
luteum, *Buchen.* l. c. 583.—Chili.
maculatum, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 15.—
Bolivia.
patagonicum, *Speg.* in *Rev. Agron. La Plata*, 1897,
599.—Patag.
Warszewiczii, *Buchen.* in *Engl. Jahrb.* xxvi. 582.—Am.
cent.

TROPHAEUM, Linn. = *Tropaeolum*, Linn. (Geran.).
argentinum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 33 = *Tropaeol.*
argentinum.
Cochabambae, *Kuntze*, l. c. = *Tropaeol. Cochabambae.*
kuntzeanum, *Kuntze*, l. c. = *Tropaeol. kuntzeanum.*
rectangulum, *Kuntze*, l. c. = *Tropaeol. rectangulum.*

TROPIDOCARPUM, Hook. (Crucif.).
macrocarpum, *Hook. & Harv. ex Greene*, in *Proc.*
Acad. Philad. 1895 (1896) 553.—Calif.

TRYMALIUM, Fenzl (Rhamn.).
Myrtillus, *S. Moore*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 183.
—Austral.

TRYMATOCOCCUS, Poepp. & Endl. (Urtic.).
kamerunianus, *Engl. Monog. Afr. Ph.* i. 29 = *Dorstenia*
kameruniana.

TRYPHOSTEMMA, Harv. (Passif.).
pedatum, *Baker f.* in *Journ. Bot.* 1899, 436.—Afr.
trop.

TSUGA, Carr. (Conif.).
heterophylla, *Sargent*, *Silva N. Am.* xii. 73 = *merten-*
siana, *Carr.*
mertensiana, *Sargent*, l. c. 77 = *hookeriana*.

TUBIFLORA, J. F. Gmel. = *Elytraria*, Michx.
(Acanth.).
paucisquamosa, *Wildem. & Th. Dur.* in *Compt. Rend.*
Soc. Bot. Belg. xxxviii. 42.—Afr. trop.

TULBAGHIA, Linn. (Liliac.).
Galpinii, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1897, 282.—Afr.
austr.
leucantha, *Baker*, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 404.—Afr.
austr.

TULIPA, Linn. (Liliac.).
brachyanthera, *Freyn*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 187.—
As. Min.
Callieri, *Halacsy & Levier*, in *Jahres-Kat. Wien.*
Tauschanst. 1897, 69.—Eur.
galatica, *Freyn*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 186.—As.
Min.
heterochroa, *Freyn*, l. c. 184.—As. Min.
lutea, *Freyn*, l. c. 185.—As. Min.
Theophrasti, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv.
143.—Graecia.
Willmottiae, *Freyn*, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 13, 29.—
As. Min.

TUNARIA, *Kuntze*, *Rev. Gen.* iii. II. 228 (1898).
SOLANACEAE.
albida, *Kuntze*, l. c.—Bolivia.

TUNICA, Hall. (Caryophyll.).
pinetorum, *Lara*, in *Soc. Espan. Hist. Nat.* xxv. 197.—
Hispan.

TUPA, G. Don = *Lobelia*, Plum. (Campan.).
portoricensis, *Vatke*, in *Linnaea*, xxxviii. 727 = *L. por-*
toricensis.

TUPISTRA, Ker-Gawl. (Liliac.).
Delavayi, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 40.—
China.
grandis, *Ridley*, in *Journ. Bot.* 1900, 73.—Malaya.
lorifolia, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 41.—
China.
viridiflora, *Franch.* l. c.—China.

TURNERA, Plum. (Turnerac.).
Crusii, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* ix. 6.—Bras.
dasystyla, *Urb.* l. c. 10.—Bras.
foliosa, *Urb.* l. c. 5.—Bras.
goyazensis, *Urb.* l. c. 4.—Bras.
marmorata, *Urb.* l. c. 9.—Bras.
melanorhiza, *Urb.* l. c. 7.—Bras.
Pringlei, *Rose*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat.*
Herb. v. 166.—Mexic.
scabra, *Millsp.* in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 77.—
Ind. occ.
subnuda, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* ix. 8.—Bras.
tenuicaulis, *Urb.* l. c. 7.—Bras.
triglandulosa, *Millsp.* in *Field Columb. Mus. Bot.* ii.
77.—Ind. occ.
venosa, *Urb.* in *Engl. Jahrb.* xxv. *Beibl.* ix. 3.—Bras.

TURRAEA, Linn. (Meliac.).
anomala, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
iv. 284 (= *Quivisia anomala*).—Madag.
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur.* in *Ann. Mus. Congo*,
Sér. I. 31.—Afr. trop.
decandra, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
iv. 284 (= *Quivisia decandra*).—Ins. Mascar.
Goetzei, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 415.—Afr. trop.
grandifolia, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
iv. 284 (= *Quivisia grandifolia*).—Madag.
heterophylla, *Harms*, l. c. (= *Quivisia heterophylla*).
—Ins. Mascar.
Junodii, *Schinz*, in *Mém. Herb. Boiss*, no. 10, 45.—
Afr. austr.
laciniata, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
iv. 284 (= *Quivisia laciniata*).—Ins. Rodrig.
oppositifolia, *Harms*, l. c. (= *Quivisia oppositifolia*).—
Ins. Borbon.
ovata, *Harms*, l. c. (= *Quivisia ovata*).—Ins. Borbon.
Randii, *Baker f.* in *Journ. Bot.* 1899, 427.—Afr. trop.
Sieberi, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii.
iv. 284 (= *Quivisia Sieberi*).—Ins. Maurit.
trichopoda, *Harms*, l. c. (= *Quivisia trichopoda*).—
Ins. Maurit.

TURRAEANTHUS, Baill. (Meliac.).
bracteolatus, *Harms*, in *Engl. Jahrb.* xxiii. 157.—Afr.
trop.
Zenkeri, *Harms*, l. c. 156.—Afr. trop.

TURRAYA, Wall. Cat. no. 8637 D = *Leersia*, Soland.
(Gramin.).
nepalensis, Wall. l. c. = *L. hexandra*.

TYLECARPUS, Engl. (Olacac.).
samoensis, *Reinecke*, in *Engl. Jahrb.* xxv. 650.—Ins.
Samoa.

TYLOGLOSSA, Hochst. = *Justicia*, *Houst.* (Acanth.).
acuminata, *Hochst.* in *Flora*, 1843, 73 = *J. palustris*.
longipes, *Hochst.* ex *Solms-Laub.* in *Schweinf. Beitr.*
Fl. Aethiop. 104 = *Asystasia coromandeliana*.
major, *Hochst.* in *Flora*, 1843, 73 = *J. flava*.
minor, *Hochst.* l. c. = *J. flava*.
Schimperi, *Hochst.* l. c. = *J. calcarata*.

TYLOPHORA, R. Br. (Asclep.).
badia, *Schlechter*, in *Engl. Jahrb.* xxi. *Beibl.* liv. 12
(= *Astephanus badius*).—Afr. austr.
congoensis, *Schlechter*, *Westaf. Kautschuk-Exped.* 309,
nomen.—Afr. trop.
dahomensis, *K. Schum.* ex *Schlechter*, l. c. nomen.—
Afr. trop.
javanica, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 (= *Hy-*
banthera javanica).—Java.
liukiensis, *Matsum.* in *Bot. Mag. Tokyo*, 1898, 40.—
Ins. Luchu.
Miquelii, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 438 = *villosa*.
orthocaulis, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxiii. 235.—
Afr. trop.

TYLOPHOROPSIS, N. E. Brown (Asclep.).
Fleckii, *Schlechter*, ex *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.*
vii. 39.—Afr. austr.

TYLOSTEMON, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxvi. (1899)
389. *LAURACEAE*.
batangensis, *Engl.* l. c. 390.—Afr. trop.
crassifolius, *Engl.* l. c.—Afr. trop.
Dinklagei, *Engl.* l. c. 389.—Afr. trop.

TYNANTHUS, Miens (Bignon.).
Lindmanii, *K. Schum.* ex *Bureau & K. Schum.* in
Mart. Fl. Bras. viii. II. 409.—Bras.
myrianthus, *Bureau & K. Schum.* l. c. 197.—Bras.

TYPHA, Linn. (Typhac.).
argoviensis, *Hauskn.* ex *Aschers. & Graebn. Mitteleur.*
Fl. i. 273.—Hybr.
australis, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 401.—
Afr. trop. et austr.

TYPHONIUM, Schott (Arac.).
inopinatum, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 301.
—Ind. or.
Listeri, *Prain*, l. c. 304.—Ind. or.
Pottingeri, *Prain*, l. c.—Ind. or.

TYSONIA, F. Muell. in *Chem. & Drug. Austral.* Oct.
1, 1896. *COMPOSITAE*.
phyllostegia, *F. Muell.* l. c.—Austral.

U

UAPACA, Baill. (Euphorb.).
Goetzei, *Pax*, in *Engl. Jahrb.* xxviii. 418.—Afr. trop.
Marquesii, *Pax*, l. c. xxiii. 522.—Afr. trop.
microphylla, *Pax*, l. c. 523.—Afr. trop.
Staudtii, *Pax*, l. c. 522.—Afr. trop.

UDORA, Nutt. (Hydroch.).
cordofana, *Hochst.* in *Flora*, 1842, *Beibl.* i. 133 =
Lagarosiphon cordofanum.

ULMUS, Tourn. (Urtic.).
serotina, *Sargent*, in *Coult. Bot. Gaz.* xxvii. 92.—
Am. bor.

UMBILICUS, DC. = *Cotyledon*, Tourn. (Crassul.).
patulus, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 157.—
Graecia.
Rodriguezii, *Gand.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 133.—
Eur.

UNCARIA, Schreb. (Rubiac.).
borneensis, *Havil.* in *Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 84.—
Borneo.
celebica, *Koord.* in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix.
504, nomen.—Celebes.
grandifolia, *Baker*, in *Kew Bull.* 1896, 23.—Borneo.
hirsuta, *Havil.* in *Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 88.—China.
sinensis, *Havil.* l. c. 89 (= *Naucllea sinensis*).—China.
tonkinensis, *Havil.* l. c.—Tonkin.
trinervis, *Havil.* l. c. 80.—Penins. Mal.
velutina, *Havil.* l. c. 84.—Ins. Philipp.

UNCINIA, Pers. (Cyper.).
bracteosa, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 503.—
Chili.
hamata, *Urb.* *Symb. Antill.* ii. 169 = *jamaicensis*.
loliacea, *R. Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xciii. 503.—
Chili.
Negeri, *Kuek.* in *Bot. Centralbl.* lxxvi. 210.—Chili.
triquetra, *Kuek.* l. c. lxxxii. 97.—Fuegia.

UNIOLA, Linn. (Gramin.).
capensis, *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.* Sér. VI. i. 360
= *Brizopyrum capense*.
indica, *Spreng.* *Syst.* i. 349 = *Eragrostis amabilis*.
mucronata, *L. Sp. Pl.* ed. II. 104 = *Halopyrum mucro-*
natum.

UNONA, Linn. f. (Anonac.).
albida, *Engl. ex Engl. & Diels*, in *Notisbl. Bot. Gart.*
Berlin, ii. 297.—Afr. trop.
chrysea, *Boerl.* in *IC. Bogor.* i. 102 (= *Monoon chry-*
seum).—Sumatra.
cleistogama, *Burck.* ex *Boerl.* l. c. 127.—Malaya.
confinis, *Pierre*, ex *Engl. & Diels*, in *Notisbl. Bot.*
Gart. Berlin, iii. 55 (= *Pachypodanthum confine*).
—Afr. trop.
congensis, *Engl. & Diels*, l. c. ii. 296.—Afr. trop.

UNONA :—

elegans, Engl. ex Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 296 (non Thw.).—Afr. trop.
glauca, Engl. & Diels, l. c. (non Zipp.).—Afr. trop.
montana, Engl. & Diels, l. c.—Afr. trop.
Teysmannii, Boerl. in *l. c. Bogor.* i. 103.—Borneo.

UNONOPSIS, R. Fries, in *Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv. no. 5 (1900) 26. **ANONACEAE**.

angustifolia, R. Fries, l. c. (= *Trigynaea angustifolia*).—Venez.
antillana, R. Fries, l. c. 28 (= *Trigynaea antillana*).—Ind. occ.
boliviensis, R. Fries, l. c. (= *Trigynaea boliviensis*).—Bolivia.
galeottiana, R. Fries, l. c. (= *Trigynaea galeottiana*).—Mexic.
grandis, R. Fries, l. c. (= *Trigynaea grandis*).—Venez.
Lindmani, R. Fries, l. c. 27.—Bras.
Matthewsii, R. Fries, l. c. 28 (= *Trigynaea Matthewsii*).—Peruv.
Perrottetii, R. Fries, l. c. 26 (= *Trigynaea Perrottetii*).—Guiana.
rufescens, R. Fries, l. c. 27 (= *Trigynaea rufescens*).—Guiana.
trunciflora, R. Fries, l. c. (= *Xylopia trunciflora*).—Mexic.

URACHNE, Trin. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
parviflora, Trin. *Fund. Agrost.* 110 = *O. miliacea*.**URAGOGA**, Linn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).

ankafinensis, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 106.—Madag.
bicoloriceps, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 584.—N. Guin.
ceratoloba, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 105.—Afr. trop.
chasaliodes, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 124.—Bolivia.
gigantocalyx, Kuntze, l. c. 125.—Bolivia.
hexamera, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 104.—Afr. trop.
lateralis, K. Schum. l. c. 105.—Afr. trop.
melanochlora, K. Schum. l. c. xxiii. 468.—Afr. trop.
scaphus, K. Schum. l. c. xxviii. 104.—Afr. trop.
sphaerocrater, K. Schum. in *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 322, nomen.—Afr. trop.
subipeacuanha, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 106.—Afr. trop.
subsessilifolia, K. Schum. l. c. xxiii. 467.—Afr. trop.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. *Pl. Thonn. Congol.* 46.—Afr. trop.

URALEPSIS, Nutt. (Gramin.).

alba, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 248 = *Diplachne fusca*.
capensis, Kunth, *Enum. Pl.* i. 819 = *Diplachne fusca*.
livida, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 248 = *Diplachne fusca*.
pungens, Kunth, *Rév. Gram.* i. 108 = *Acleropus villosus*.

URARIA, Desv. (Legum.).

Colletii, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 383.—Burma.
gracilis, Prain, l. c.—Burma.
latifolia, Prain, l. c.—Burma.

URCEOLA, Roxb. (Apocyn.).

acute-acuminata, Boerl. in *Bull. Inst. Buitenz.* v. 19.—Borneo.
javanica, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 399; et l. c. 18 (= *Chavannesia javanica*).—Java.
pilosa, Boerl. in *Bull. Inst. Buitenz.* v. 19.—Borneo.

URERA, Gaudich. (Urtic.).

arborea, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 52.—Afr. trop.
chlorocarpa, Urb. *Symb. Antill.* i. 293.—Ind. occ.
congolensis, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 50.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. l. c. 49.—Afr. trop.
Thonneri, Wildem. & Th. Dur. l. c. 48.—Afr. trop.
tuberculata, Urb. *Symb. Antill.* i. 294.—Ind. occ.
Tuerckheimii, Donn. *Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxiii. 14.—Am. cent.

URGINEA, Steinh. (Liliac.).

Burkei, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 469.—Afr. austr.
capitata, Baker, l. c. 465.—Afr. austr.
cepaefolia, Welw. ex *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 60.—Afr. trop.

URGINEA :—

chlorantha, Welw. ex Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. 248 = *angolensis*.
delagoensis, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 467.—Afr. austr.
Dregei, Baker, l. c.—Afr. austr.
echinostachya, Baker, l. c. 468.—Afr. austr.
Forsteri, Baker, l. c. 469.—Afr. austr.
Johnstoni, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 539.—Afr. trop.
kniphofioides, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 469.—Afr. austr.
lilacina, Baker, l. c.—Afr. austr.
mandalensis, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 536.—Afr. trop.
multisetosa, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 468.—Afr. austr.
natalensis, Baker, l. c.—Afr. austr.
pauciflora, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 539.—Afr. trop.
riparia, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 467.—Afr. austr.
rubella, Baker, l. c. 467.—Afr. austr.
rupicola, Trim. ex Hook. f. in *Trim. Fl. Ceylon*, iv. 292.—Zeylan.
tenella, Baker, in *Dyer, Fl. Cap.* vi. 464.—Afr. austr.
virens, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1897, 433.—Afr. austr.
viridula, Baker, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 538.—Afr. trop.

URICOLA, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. (1899) 399
 errore = *Urceola*, Roxb. (Apocyn.).**UROCHLAENA**, Nees (Gramin.).

major, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 382.—Afr. austr.

UROCHLOA, Beauv. (Gramin.).

cimicina, Kunth, *Rév. Gram.* i. 31 = *Axonopus cimicinus*.
semialata, Kunth, l. c. = *Axonopus semialatus*.

UROPETALON, Ker-Gawl. = **Dipcadi**, Medic. (Liliac.).

jesoghense, Solms, in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 204 = *D. fesoghense*.

UROPHYLLUM, Wall. (Rubiace.).

chloranthum, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 57, descr.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. ii. 30.—Afr. trop.
divaricatum, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 427.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 26.—Afr. trop.
liebrechtsianum, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. ii. 29.—Afr. trop.
verticillatum, Wildem. & Th. Dur. l. c. 30.—Afr. trop.
xanthorrhoeum, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 58.—Afr. trop.

UROSPATHA, Schott (Arac.).

Tonduzii, Engl. in *Anal. Inst. Fis.-Geog. Costa Rica*, viii. 364.—Am. cent.

UROSTIGMA, Gasp. = **Ficus**, Tourn. (Urtic.).

Kunthii, Miq. in *Mart. Fl. Bras.* iv. I. 96 = *F. laurifolia*.

UROTHECA, Gilg. in Engl. & Prantl. *Pflanzenf. Nachtr.*

i. 263 (1897). **MELASTOMACEAE**.
hylophila, Gilg, l. c. 264.—Afr. trop.

URTICA, Tourn. (Urtic.).

cardiophylla, Rydb. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 191.—Am. bor.
fissa, E. Pritz. ex *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 301.—China.
intermedia, Form. in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 287.—Eur.
romana, Bub. *Fl. Pyren.* i. 77 = *pilulifera*.

URTICASTRUM, O. Kuntze = **Laportea**, Gaudich. (Urtic.).

carruthersianum, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 987.—Afr. trop.

URUPARIA, Rafin. = **OUROUPARIA**, Aubl. =

Uncaria, Schreb. (Rubiace.).
celebica, K. Schum. in *Just, Jahresb.* xxvi. i. 393 = *Uncaria celebica*.
multiflora, K. Schum. & Lauterb. *Fl. Deutsch. Südsee*, 556.—N. Guin.
Warburgii, K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

URVILLEA, H. B. & K. (Sapind.).

macrolopha, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. 428 (= *Cardiospermum macrolophum*).—Venez.

UTRICULARIA, Linn. (Lentib.).

andongensis, Welw. ex Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 787.—Afr. trop.
brachyceras, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 191.—Afr. austr.
floridana, Nash, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 105.—Am. bor.
Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 40.—Afr. trop.
janthina, Hook. f. *Bot. Mag. t.* 7466.—Bras.
macrorhyncha, Barnh. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 515.—Am. bor.
platensis, Speg. in *Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 81.—Reg. Argent.
Treubi, Kamienski, in *Ann. Jard. Buitenz. Suppl.* II. 143 = *Sandersoni*.
tricornata, Baker, ex Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 785.—Afr. trop.
triphylia, Ule, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xvi. 313.—Bras.
velascoensis, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 240.—Bolivia.

UVARIA, Linn. (Anonac.).

angustifolia, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 295.—Afr. trop.
Baumannii, Engl. & Diels, l. c. 294.—Afr. trop.
bipindensis, Engl. ex Engl. & Diels, l. c. 292.—Afr. trop.
Buchholzii, Engl. & Diels, l. c. 295.—Afr. trop.
crassipetala, Engl. ex Engl. & Diels, l. c. 292.—Afr. trop.
denhardtiana, Engl. & Diels, l. c. 293.—Afr. trop.
Dinklagei, Engl. & Diels, l. c. 294.—Afr. trop.
gabonensis, Engl. & Diels, l. c. 296.—Afr. trop.
gigantea, Engl. ex Engl. & Diels, l. c. 292 (non Wall.).—Afr. trop.
huillensis, Engl. & Diels, l. c. 296.—Afr. trop.
insculpta, Engl. & Diels, l. c. 295.—Afr. trop.
klaineana, Engl. & Diels, l. c. 294.—Afr. trop.
leonensis, Engl. & Diels, l. c. 293.—Afr. trop.
Mocoli, Wildem. & Th. Dur. in *Ann. Mus. Congo*, Sér. II. i. i. 3.—Afr. trop.
mollis, Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 295 (non Wall.).—Afr. trop.
Poggei, Engl. & Diels, l. c.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Engl. & Diels, l. c. 293.—Afr. trop.
Staudtii, Engl. & Diels, l. c. 292.—Afr. trop.
verrucosa, Engl. & Diels, l. c. 294 (non Scheff.).—Afr. trop.
virens, N. E. Br. in *Kew Bull.* 1896, 16.—Afr. austr.
Zenkeri, Engl. ex Engl. & Diels, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, ii. 293.—Afr. trop.

UVARIOPSIS, Engl. ex Engl. & Diels, in *Notizbl.*

Bot. Gart. Berlin, ii. (1899) 298. **ANONACEAE**.
Zenkeri, Engl. l. c.—Afr. trop.

UVIFERA, Linn. Hort. Cliff. 487 (1787) = **Coccoloba**,

Linn. (Polygon.).
meissneriana, Britton, ex Rusby, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 129.—Bolivia.

V

VACCARIA, Medic. = **Saponaria**, Linn. (Caryoph.).
Vaccaria, Britton, in Britton & A. Brown, *Fl. N. U. S.* ii. 18 = *S. Vaccaria*.

VACCINIUM, Linn. (Vaccin.).

antipodium, Reinecke, in *Engl. Jahrb.* xxv. 664.—Ins. Samoa.
caesium, Greene, *Pittonia*, iii. 249.—Am. bor.
erythrococtum, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 301 = *microphyllum*.
globulare, Rydb. l. c. 300.—Am. bor.
lactum, Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 516.—China.
mandarinorum, Diels, l. c.—China.
melanocarpum, Mohr, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 570.—Am. bor.

VACCINIUM :—

microphyllum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1897, 251 (non Reinw.).—Am. bor.
mindorensis, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 355.—Ins. Philipp.
oblongum, Greene, Pittonia, iii. 250.—Am. bor.
oblongum, C. H. Wright, in Kew Bull. 1899, 103.—N. Guin.
poasanum, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas. xxiv. 395.—Am. cent.
revolutum, Greene, Pittonia, iii. 250.—Am. bor.
setosum, C. H. Wright, in Kew Bull. 1896, 24.—China.

VAGNERA, Adans. = **Smilacina**, Desf. (Liliac.).
liliacea, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 101 = S. stellata.
pallens, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 551.—Am. bor.

VAILIA, Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 500, 542. **ASCLEPIADACEAE**.
mucronata, Rusby, l. c. 542.—Am. bor.

VAILLANTIA, Tourn. (Rubiace.).
Crucialis, Bub. Fl. Pyren. ii. 304 = Galium Cruciat.

VALERANDA, Neck. = **Orphium**, E. Mey. (Gentian.).
frutescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 202 = O. frutescens.

VALERIANA, Tourn. (Valerian.).
alophis, Graebn. in Engl. Jahrb. xxvi. 432.—N. Granat.
alpina, Bub. Fl. Pyren. ii. 290 = tripteris.
amphiphis, Graebn. in Engl. Jahrb. xxvi. 433.—Peruv.
catharinensis, Graebn. l. c. 427.—Bras.
columbiana, Piper, in Coult. Bot. Gas. xxii. 439.—Am. bor.
crassiscaposa, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 125.—Patag.
domingensis, Urb. Symb. Antill. i. 450.—Ind. occ.
eichleriana, Graebn. in Engl. Jahrb. xxvi. 434 (= Valerianopsis eichleriana).—Bras.
exigua, Bub. Fl. Pyren. ii. 292 = dioica.
Faber, Graebn. in Engl. Jahrb. xxiv. Beibl. lix. 32.—China.
gilgiana, Graebn. l. c. xxvi. 435 (= Valerianopsis foliosa).—Bras.
gonatolophis, Graebn. l. c. 432.—Ecuador.
Harmsii, Graebn. l. c. xxiv. Beibl. lix. 32.—China.
Hieronymi, Graebn. l. c. xxvi. 431.—Ecuador.
Itatiaia, Graebn. l. c. 435.—Bras.
knautioides, Graebn. l. c. 427.—Mexic.
leptothyrsos, Graebn. l. c. 425.—Bolivia.
lindaviana, Graebn. l. c. 426.—Chili.
micrantha, E. Nelson, in Erythea, vii. 166.—Am. bor.
Moyanoi, Speg. in Rev. Agron. La Plata, 1897, 607.—Patag.
Muelleri, Graebn. in Engl. Jahrb. xxvi. 435 (= Valerianopsis angustifolia).—Bras.
occidentalis, A. A. Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 269.—Am. bor.
Scouleri, Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard. i. 377.—Am. bor.
septentrionalis, Rydb. l. c. 376.—Am. bor.
tuberifera, Graebn. in Engl. Jahrb. xxvi. 428.—Bolivia.
Ulei, Graebn. l. c. 436.—Bras.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. ii. 293 = officinalis.
wyomingensis, E. Nelson, in Erythea, vii. 167.—Am. bor.

VALERIANELLA, Tourn. (Valerian.).
Aralo-caspia, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xviii. 79.—As. cent.
ciliosa, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 548.—Am. bor.
Columnae, Bub. Fl. Pyren. ii. 298 = coronata.
magna, Greene, in Proc. Acad. Philad. 1895 (1896) 548.—Am. bor.

VALERIANOIDES, Medic. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verben.).
boliviana, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 254 = S. boliviana.

VALETONIA, Th. Dur. ex Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. v. (1896) 460. **OLACACEAE**.
brasiliensis, Th. Dur. l. c.—Bras.

VANCLEVEA, Greene, Pittonia, iv. (1899) 50. **COMPOSITAE**.
stylosa, Greene, l. c. 51 (= Grindelia stylosa).—Am. bor.

VANDA, Jones (Orchid.).
celebica, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 131.—Celebes.
hainanensis, Rolfe, l. c. 1896, 199.—China.
Thwaitesii, Hook. f. in Trim. Fl. Ceylon, iv. 193.—Zeylan.

VANGUERIA, Juss. (Rubiace.).
armata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxviii. 69.—Afr. trop.
cana, K. Schum. l. c. xxiii. 456; xxviii. 69.—Afr. trop.
dasynthamnus, K. Schum. l. c. xxviii. 70.—Afr. trop.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxxviii. 92.—Afr. trop.
Junodii, Schinz, in Mém. Herb. Boiss. no. 10, 68.—Afr. austr.
leonensis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 457.—Afr. trop.
lichenoxenos, K. Schum. l. c. xxviii. 70.—Afr. trop.
monantha, K. Schum. l. c. 493.—Afr. trop.
nodulosa, K. Schum. l. c. 71, descr.—Afr. trop.
obtusifolia, K. Schum. l. c. 493.—Afr. trop.
oxyantha, K. Schum. l. c. 72.—Afr. trop.
pygmaea, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 342.—Afr. austr.
rubiginosa, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. 457; xxviii. 72.—Afr. trop.

VANHOUTTEA, Lem. = **Houttea**, Decne. (Gesner.).
calcarata, Lem. in Hort. Univ. vi. 191, 289 = H. pardina.
Gardneri, Fritsch, in Engl. Jahrb. xxix. Beibl. lxx. 14 = H. Gardneri.
lanata, Fritsch, l. c. 16.—Bras.

VANILLA, Plum. (Orchid.).
acuminata, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 456.—Afr. trop.
acuta, Rolfe, l. c. 453.—Guiana.
aphylla, Eggers, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1889) 21 = Eggersii.
borneensis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 460.—Borneo.
carinata, Rolfe, l. c. 468.—Bras.
columbiana, Rolfe, l. c.—N. Granat.
crenulata, Rolfe, l. c. 477.—Afr. trop.
Eggersii, Rolfe, l. c. 472.—Ind. occ.
fimbriata, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 133.—Guiana.
Giulianettii, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. vii. 350.—N. Guin.
Hartii, Rolfe, in Kew Bull. 1899, 133.—Ind. occ.
Hostmanni, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 462.—Guiana.
imperialis, Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 155.—Afr. trop.
madagascariensis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxii. 476.—Madag.
organensis, Rolfe, l. c. 452.—Bras.
ovalifolia, Rolfe, l. c. 457.—Afr. trop.
ovata, Rolfe, l. c. 451.—Guiana.
philippinensis, Rolfe, l. c. 459.—Ins. Philipp.
ramosa, Rolfe, l. c. 457.—Afr. trop.
Sprucei, Rolfe, l. c. 461.—N. Granat.
Vellozii, Rolfe, l. c. 467.—Bras.

VASEYANTHUS, Cogn. (Cucurb.).
Brandegei, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 119 (= Echinocystis Brandegei).—Calif.
insularis, Rose, l. c. 120 (= Echinopepon insularis).—Calif.

VAVAEA, Benth. (Meliac.).
papuana, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. iii. 282.—N. Guin.

VELAEA, DC. (Umbell.).
cordata, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 169 (= Museniopsis cordata).—Mexic.
dissecta, Drude, l. c. (= Museniopsis dissecta).—Mexic.
peucedanoides, Drude, l. c. (= Eulophus peucedanoides).—Mexic.
scabrella, Drude, l. c. (= Museniopsis scabrella).—Mexic.
Schaffneri, Drude, l. c. (= Museniopsis Schaffneri).—Mexic.

VELAEA :—
serrata, Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. VIII. 170 (= Museniopsis serrata).—Mexic.
tenuifolia, Drude, l. c. 169 (= Museniopsis tenuifolia).—Mexic.
tenuissima, Drude, l. c. 170 (= Museniopsis tenuissima).—Mexic.
ternata, Drude, l. c. 169 (= Museniopsis ternatus).—Mexic.
texana, Drude, l. c. (= Eulophus texanus).—Am. bor.
tuberosa, Drude, l. c. (= Museniopsis tuberosa).—Calif.

VELLEIA, Sm. (Gooden.).
cusackiana, F. Muell. in Vict. Nat. xii. 124.—Austral.
rosea, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 202.—Austral.

VELLOZIA, Vand. (Amaryll.).
boliviensis, Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club, vi. 126.—Bolivia.
clavata, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 244.—Afr. austr.
equisetoides, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 411.—Afr. trop.
hereroensis, Baker, l. c.—Afr. trop.
Hildebrandtii, Baker, l. c. 409.—Afr. trop.
macrosiphonia, Taub. in Engl. Jahrb. xxi. 424.—Bras.
retinervis, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 244.—Afr. austr.
scabrida, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 410.—Afr. trop.
Schnitzleinia, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 82.—Afr. trop.
tomentosa, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 412 (non Pohl).—Afr. trop.

VELVITSIA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 177 (1898). **SCROPHULARIACEAE**.
calycina, Hiern, l. c.—Afr. trop.

VEPRIS, Comm. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
angolensis, Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iii. iv. 178.—Afr. trop.
bilocularis, Engl. l. c. = T. bilocularis.

VERATRILLA, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1899) 310. **GENTIANACEAE**.
Bailloni, Franch. l. c. 311.—China.

VERATRUM, Tourn. (Liliac.).
caudatum, Heller, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 588.—Am. bor.
speciosum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 531.—Am. bor.

VERBASCUM, Tourn. (Scrophul.).
acutifolium, Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1898, 136.—Graecia.
adenotrichum, Halacsy, l. c. 130.—Graecia.
agrionoides, Degen & Borb. ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxv. 46.—Eur.
anatolicum, Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 201.—Reg. Cauc.
Baldacii, Degen, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1896, 416.—Albania.
Boissieri, Post, in Bull. Herb. Boiss. v. 758.—Syria.
bracteosum, Grecescu, Consp. Fl. Roman. 424.—Eur.
caudatum, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. 160 = Boissieri.
Chazaliei, Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 289.—Lycia.
cinereum, Bub. Fl. Pyren. i. 334.—Pyren.
dechyanum, Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. iv. 200.—Reg. Cauc.
epirotum, Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1898, 129.—Graecia.
hadschinense, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iv. 45.—As. Min.
hasarense, Freyn & Bornum. in Mém. Herb. Boiss. no. 13, 27.—Persia.
leptophyllum, Bub. Fl. Pyren. i. 340 = Blattaria.
longibracteatum, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 218.—Arab.
majus, Bub. Fl. Pyren. i. 332 = Thapsus.
nobile, Vel. Fl. Bulg. Suppl. i. 209.—Bulgar.
parallelum, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. x. 52.—Hybr.
pelium, Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1898, 131.—Graecia.
pindicolum, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. v. 792.—Graecia.

VERBASCUM:—

piscicidium, *Candargy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 151.—Graecia.
 pseudoflagriforme, *Hauskn.* in *Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 51.—Hybr.
 Reiseri, *Halacsy*, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 182.—Graecia.
 Rostafinskii, *Zaleski*, in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1897, 112.—Hybr.
 Shepardi, *Post*, *Fl. Syria*, 20.—Syria.
 sterile, *Hauskn.* in *Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. x. 57.—Hybr.
 sylvestre, *Bub*, *Fl. Pyren.* i. 386 = *Lychnitis*.
 taygeteum, *Haldcsy*, in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1898, 128.—Graecia.
 tempskyanum, *Freyne & Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 48.—As. Min.
 tymphaeum, *Freyne & Sint.* l. c. v. 795.—Graecia.
 varians, *Freyne & Sint.* l. c. iv. 44.—As. Min.
 Velenovskii, *Horák*, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1900, 208.—Eur.
 viscidulum, *Freyne & Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* v. 792 (non Pers.).—Graecia.

VERBENA, Linn. (Verben.).

Ameghinoides, *Spæg.* in *Rev. Agron. La Plata*, 1897, 561.—Patag.
 aurantiaca, *Spæg.* l. c. 563.—Patag.
 azorelloides, *Spæg.* l. c. 562.—Patag.
 confinis, *Greene, Pittonia*, iv. 152.—Am. bor.
 connatibracteata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 255.—Reg. Argent.
 diversifolia, *Kuntze, l. c.*—Reg. Argent.
 glutinosa, *Kuntze, l. c.* 256.—Reg. Argent.
 Halei, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 617.—Am. bor.
 Hanseni, *Greene, Pittonia*, iii. 308.—Am. bor.
 hystrix, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 15 (non Phil.).—Reg. Argent.
 inconcinna, *Brig.* l. c. 19.—Reg. Argent.
 intricata, *Brig.* l. c. 16.—Reg. Argent.
 Isabellei, *Brig.* l. c. 284.—Bras.
 juncea, *Gill. & Hook.* in *Hook. Bot. Misc.* i. 162 = *Diostea juncea*.
 MacDougalii, *Heller*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 588.—Am. bor.
 microphylla, *Phil.* in *Linnaea*, xxix. 21 = *minutiflora*.
 Morenonis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 256.—Patag.
 nubigena, *Spæg.* in *Comm. Mus. Buenos Aires*, i. 137.—Reg. Argent.
 ochreatea, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 18.—Chili.
 ourostachya, *Brig.* l. c. 20.—Reg. Argent.
 perennis, *Wootton*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 262.—Am. bor.
 robusta, *Greene, Pittonia*, iii. 309.—Am. bor.
 rudis, *Greene, l. c.* iv. 152.—Am. bor.
 sessilis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 257.—Parag.
 succulentifolia, *Kuntze, l. c.*—Patag.
 tampensis, *Nash*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 104.—Am. bor.
 Toninii, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 258.—Patag.
 vulgaris, *Bub*, *Fl. Pyren.* i. 378 = *officinalis*.
 Wilczekii, *Brig.* in *Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1900, 18.—Reg. Argent.

VERBESINA, Linn. (Compos.).

acapulcensis, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 551.—Am. cent.
 caracasana, *Robinson & Greenm.* l. c. 559.—Venez.
 chiapensis, *Robinson & Greenm.* l. c. 554.—Am. cent.
 cinerascens, *Robinson & Greenm.* l. c. 555.—Am. cent.
 cinerea, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 63.—Bolivia.
 crassipes, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 555.—Am. cent.
 fastigiata, *Robinson & Greenm.* l. c. 558.—Am. cent.
 guatemalensis, *Robinson & Greenm.* l. c. 550.—Am. cent.
 Hallii, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 43.—Ecuador.
 hypargyrea, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 556.—Am. cent.
 hypomalaca, *Robinson & Greenm.* l. c. 545.—Am. cent.
 inuloides, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 45.—Ecuador.
 Klattii, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 538.—Am. cent.

VERBESINA:—

lanata, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 558.—Am. cent.
 Lindheimeri, *Robinson & Greenm.* l. c. 541.—Am. bor.
 lloënsis, *Hieron.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 45.—Ecuador.
 Mandonii, *Schultz Bip.* ex *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 547, descr.—Bolivia.
 molinaria, *Robinson & Greenm.* l. c. 553.—Am. cent.
 montanoifolia, *Robinson & Greenm.* l. c. 559.—Am. cent.
 nana, *Robinson & Greenm.* l. c. 543.—Am. bor.
 Nelsonii, *Robinson & Greenm.* l. c. xxxii. 46.—Mexic.
 oreopola, *Robinson & Greenm.* l. c. xxxiv. 550.—Am. cent.
 paniculata, *A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl.* 8 (= *Actinomeris alba*).—Am. bor.
 punctata, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 561.—Am. cent.
 Robinsonii, *Fernald*, ex *Robinson & Greenm.* l. c. 554.—Am. cent.
 Rosei, *Robinson & Greenm.* l. c. 539.—Am. cent.
 Rothrockii, *Robinson & Greenm.* l. c. 541.—Am. cent.
 rumicifolia, *Robinson & Greenm.* l. c. 560.—Am. cent.
 Schaffneri, *Robinson & Greenm.* l. c. 540.—Am. cent.
 semidcurrrens, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 183.—Bolivia.
 Smithii, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxii. 46.—Mexic.
 Sodiroides, *Hieron.* ex *Sod.* in *Engl. Jahrb.* xxix. 44.—Ecuador.
 Soratae, *Schultz Bip.* ex *Robinson & Greenm.* in *Proc. Amer. Acad.* xxxiv. 551, descr.—Bolivia.
 stenophylla, *Robinson & Greenm.* l. c. xxxii. 309.—Mexic.
 trilobata, *Robinson & Greenm.* l. c. 46.—Mexic.
 variabilis, *Robinson & Greenm.* l. c. 47.—Mexic.
 xanthochlora, *Robinson & Greenm.* l. c. xxxiv. 551.—Am. cent.

VERINEA, Merino, in *Anal. Soc. Espan. Hist. Nat.* xxvii. (1899) 8. GRAMINEAE.
 pterostachys, *Merino, l. c.* 9.—Eur.

VERNONIA, Schreb. (Compos.).

amblyolepis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
 Antunesii, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 17.—Afr. trop.
 areysiana, *Deflers*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 104.—Arab.
 armerioides, *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 462.—Afr. trop.
 asclepiadea, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 238.—Madag.
 asterifolia, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
 auriculifera, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 539.—Afr. trop.
 Balansae, *Hieron.* in *Engl. Jahrb.* xxii. 690.—Am. austr.
 Bangii, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 52.—Bolivia.
 Bellinghamii, *S. Moore*, in *Journ. Bot.* 1900, 155.—Afr. trop.
 benguellensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 536.—Afr. trop.
 Bernieri, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 238.—Madag.
 betsilensis, *Drake, l. c.* 243.—Madag.
 brittiani, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 533.—Afr. trop.
 Buchanani, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
 Calulu, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 525.—Afr. trop.
 Camponoti, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 241.—Madag.
 capitata, *Drake, l. c.* 228 (= *Distephanus capitatus*).—Madag.
 cardiopsis, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 12.—Afr. trop.
 carnea, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 526.—Afr. trop.
 cataractarum, *Hieron.* in *Engl. Jahrb.* xxii. 681.—Am. austr.
 Catati, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 243.—Madag.
 catumbensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 524.—Afr. trop.
 caudata, *Drake*, in *Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 103.—Madag.
 centauroides, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 824 (non *Sch. Bip.*).—Afr. austr.
 Chapelieri, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 234.—Madag.

VERNONIA:—

chloropappa, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 146.—Afr. trop.
 chthonocephala, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 17.—Afr. trop.
 clinopodioides, *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 465.—Afr. trop.
 collina, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* 1898, 874.—Afr. austr.
 collina, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 824.—Afr. austr.
 colorata, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 230 = *sene-galensis*.
 costata, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 53.—Bolivia.
 cruda, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 456.—Afr. trop.
 daphnifolia, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 18.—Afr. trop.
 declivium, *Malmé*, in *Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 26.—Bras.
 Dekindtii, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 18.—Afr. trop.
 dumeta, *Klatt*, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 277.—Am. cent.
 Dupuisii, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 825; et in *Th. Dur. & Schinz, Études Fl. Congo*, i. 170.—Afr. trop.
 eremanthifolia, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 15.—Afr. trop.
 eriocephala, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 826.—Afr. trop.
 eriophylla, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 230.—Madag.
 eritreana, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 826.—Afr. trop.
 exsertiflora, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 147.—Afr. trop.
 Fargessii, *Franch.* in *Journ. de Bot.* 1896, 369.—China.
 filipendula, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 536.—Afr. trop.
 flaccidifolia, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 144.—Am. bor.
 flaviflora, *Boiv.* ex *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 231 = *leucolepis*.
 Galpinii, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 827.—Afr. austr.
 glaberrima, *Welw.* ex *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 15.—Afr. trop.
 glanduloso-dentata, *Hieron.* in *Engl. Jahrb.* xxii. 701.—Am. austr.
 goetzeana, *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* xxviii. 503.—Afr. trop.
 Goetzenii, *O. Hoffm.* in *Goetsen, Durch Afr.* repr. 9, descr.—Afr. trop.
 Goudotii, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 239.—Madag.
 Grandidieri, *Drake, l. c.* 240.—Madag.
 Grevei, *Drake, l. c.*—Madag.
 hamata, *Klatt*, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 456.—Afr. trop.
 Hensii, *Klatt, l. c.* 828.—Afr. trop.
 Hieronymi, *K. Schum.* in *Just. Jahresb.* xxvi. i. 382.—Bolivia.
 hispidula, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 236.—Madag.
 huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 526.—Afr. trop.
 Humbloti, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 235.—Madag.
 humilis, *C. H. Wright*, in *Kew Bull.* 1897, 269.—Afr. trop.
 Ikopae, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 244.—Madag.
 interior, *Small*, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 279.—Am. bor.
 jubifera, *Rusby*, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 53.—Bolivia.
 karongensis, *Baker*, in *Kew Bull.* 1898, 147.—Afr. trop.
 Kreismanni, *Welw.* ex *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 517.—Afr. trop.
 Kuntzei, *Hieron.* in *Engl. Jahrb.* xxii. 678.—Bolivia.
 lampropappa, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 14.—Afr. trop.
 lantziana, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 233.—Madag.
 lappoides, *O. Hoffm.* in *Bol. Soc. Broter.* xiii. 19 (non *Baker*).—Afr. trop.
 lasiolepis, *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* xxiv. 464.—Afr. trop.
 Lastellii, *Drake*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 232.—Madag.
 lepidophylla, *Drake, l. c.* 229.—Madag.

VERNONIA :—

- leptolepis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 147 (non O. Hoffm.).—Afr. trop.
 lithospermifolia, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 694.—Bras.
 littoralis, *Brandege, in Erythea*, vii. 3.—Mexic.
 Lorentzii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 674.—Reg. Argent.
 lorentensis, *Hieron. l. c.* 676.—Reg. Argent.
 macrocyanus, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 20.—Afr. trop.
 malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.
 mattogrossensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 696.—Bras.
 maxima, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1900, 280.—Am. bor.
 meiocalyx, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 155.—Afr. trop.
 mumpullensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 530.—Afr. trop.
 myriotracha, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.
 Napus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 463.—Afr. trop.
 niagarensis, *Auct. in Just, Jahresb.* xxv. II. 507, errore = ulugurensis.
 Niederleini, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 681.—Reg. Argent.
 oligocephala, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 458 (non aliorum).—Afr. austr.
 orchidorrhiza, *Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 530.—Afr. trop.
 oreophila, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiii. no. 5, 26.—Bras.
 papillosa, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 368.—China.
 Perrieri, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 229.—Madag.
 Phillipsiae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 154.—Afr. trop.
 phyllodes, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 525.—Afr. trop.
 plantaginoides, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 686 (non DC.).—Urug.
 platylepis, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 236.—Madag.
 polysphaera, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 148.—Afr. trop.
 praecox, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 882 (non Welw.).—Reg. Argent.
 praecox, *Welw. ex O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 16.—Afr. trop.
 pratensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 523 (non Klatt).—Afr. trop.
 propinqua, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 695.—Reg. Argent.
 pseudolinearifolia, *Hieron. l. c.* 679.—Urug.
 pseudonudiflora, *Hieron. l. c.* 703.—Urug.
 pseudosquarrosa, *Hieron. l. c.* 685.—Reg. Argent.
 pulchella, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 145.—Am. bor.
 quangensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 463.—Afr. trop.
 Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 369.—Afr. trop.
 rhodophylla, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 19.—Afr. trop.
 rigescens, *Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxii. no. 5, 27.—Bras.
 rigidifolia, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 535.—Afr. trop.
 robusta, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 54.—Bolivia.
 rufopapposa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 699.—Bras.
 saltensis, *Hieron. l. c.* 691.—Reg. Argent.
 Sanctae-Mariae, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 241.—Madag.
 Sancti Pauli, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 687.—Bras.
 santacruzensis, *Hieron. l. c.* 699.—Bolivia.
 scabra, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvi. I. 382, errore = carnea.
 scabrifoliata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 677.—Bras.
 scariosa, *Baker, in Journ. Bot.* 1882, 169 = lepidophylla.
 scapiformis, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 244.—Madag.
 Schlechteri, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 466.—Afr. austr.
 sclerophylla, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 13.—Afr. trop.
 sculptifolia, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 528.—Afr. trop.

VERNONIA :—

- sericolepis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxix. 466.—Afr. trop.
 setososquamosa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 684.—Reg. Argent.
 Sodiroid, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 1.—Ecuador.
 sordidopapposa, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 697.—Bolivia.
 sphacelata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 828.—Afr. trop.
 stipulacea, *Klatt, l. c.* 457.—Afr. austr.
 Stuhlmannii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 465.—Afr. trop.
 subacuminata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 691.—Bolivia.
 sublanata, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 103.—Madag.
 suprafastigiata, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 458.—Afr. trop.
 tarijensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 682.—Bolivia.
 Taylorii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1900, 154.—Afr. trop.
 temnolepis, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 11.—Afr. trop.
 tenuifolia, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 145.—Am. bor.
 tigna, *Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 829.—Afr. trop.
 trinervis, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 228.—Madag.
 tristis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 683.—Bolivia.
 trixioides, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 54.—Bolivia.
 Ulei, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 686.—Bras.
 ulophylla, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 13.—Afr. trop.
 ulugurensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxiv. 464.—Afr. trop.
 vaginata, *O. Hoffm. in Bol. Soc. Broter.* xiii. 14.—Afr. trop.
 velutina, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxii. 697.—Bras.
 vernicosa, *Klatt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 294.—Am. cent.
 Vilersii, *Drake, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 229.—Madag.

VERONICA, Tourn. (Scrophul.).

- Allenii, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxv. 263.—Am. bor.
 azurea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 277 (non Link).—N. Zel.
 balfouriana, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7556.—N. Zel.
 Barkerii, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 421.—N. Zel.
 coxiana, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 529.—N. Zel.
 dasyphylla, *T. Kirk, l. c.* 519.—N. Zel.
 debilis, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 56.—As. Min.
 erecta, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 517.—N. Zel.
 Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 21.—China.
 filicaulis, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 796 (non Halasy).—Persia.
 Formaneki, *Heldr. in Deutsch. Bot. Monatschr.* 1897, 321.—Graecia.
 Fuchsii, *Bub. Fl. Pyren.* i. 291 = V. Teucrium.
 Gibsii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 524.—N. Zel.
 gilliesiana, *T. Kirk, l. c.* 519.—N. Zel.
 glareosa, *Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* iv. 206.—Reg. Cauc.
 glaucophylla, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 422.—N. Zel.
 Hillii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 606 (non T. Kirk).—N. Zel.
 Hillii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 524.—N. Zel.
 humifusa, *Bub. Fl. Pyren.* i. 294.—Pyren.
 insularis, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxix. 392.—N. Zel.
 latiseptala, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 530.—N. Zel.
 lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 152.—Graecia.
 marginata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 608.—N. Zel.
 miniana, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* 116.—Galic.
 Olsenii, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 607.—N. Zel.

VERONICA :—

- Petriei, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 517.—N. Zel.
 pirolaeformis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 20.—China.
 polyphylla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 277.—N. Zel.
 quadrifaria, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 521.—N. Zel.
 rotundata, *T. Kirk, l. c.* 530.—N. Zel.
 squalida, *T. Kirk, l. c.* 528.—N. Zel.
 subalpina, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 420.—N. Zel.
 subrosulata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 278.—N. Zel.
 subsimilis, *Colenso, l. c.*—N. Zel.
 sumilensis, *Frey & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 55.—As. Min.
 sutchuensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 20.—China.
 thessala, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxv. 181; et in *Deutsch. Bot. Monatschr.* 1897, 197, 321 = Formaneki.
 truncatula, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 276.—N. Zel.
 tumida, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxviii. 521.—N. Zel.
 uniflora, *T. Kirk, l. c.* 522.—N. Zel.

VERTICORDIA, DC. (Myrtac.).

- darwinoides, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxiii. 17.—Austral.
 Helmsii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxiv. 190.—Austral.
 rennicana, *Auct. in Just, Jahresb.* xxiv. II. 400, sphalm. = rennicana.

VIBURNUM, Linn. (Caprifol.).

- ceanothoides, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1896, 23.—China.
 Demetronis, *Deane & Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxii. 167.—Am. bor.
 pallidum, *Franch. in Journ. de Bot.* 1896, 308.—China.
 rufotomentosum, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1896, 410.—Am. bor.
 Sargentii, *Koehne, in Gartenfl.* 1899, 341.—China.
 Treleasei, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 255.—Ins. Azor.

VICIA, Tourn. (Legum.).

- Agerii, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 541 = hybrida.
 brachytrypis, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* 1842, 347.—Sibir. altaic.
 brachitropis, *Kar. & Kir. l. c.* 1841, 412 = praec.
 caespitosa, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 373.—Am. bor.
 ciliata, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. 293 = ciliatula.
 ciliatula, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, iv. 289.—Reg. Cauc.
 communis, *Rouy, Fl. Fr.* v. 208 = sativa, etc.
 eriocarpa, *Haldcsy, Consp. Fl. Graec.* i. 489.—Eur.
 Hugerii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 490.—Am. bor.
 Morenonis, *Harms, in Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 73.—Patag.
 pauciflora, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 365 (non aliorum).—Eur.

VIGNA, Savi (Legum.).

- Buchneri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 310.—Afr. trop.
 Clarkei, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvii. 429.—Reg. Himal.
 Fischeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 310.—Afr. trop.
 Holstii, *Harms, l. c.* 311.—Afr. trop.
 malosana, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 261.—Afr. trop.
 mensensis, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* iv. App. II. 261.—Afr. trop.
 micrantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxvi. 311.—Afr. trop.
 platyloba, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 257.—Afr. trop.
 procera, *Welw. ex Hiern, l. c.* 256.—Afr. trop.
 punctata, *Micheli, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 62.—Afr. trop.

VIGUIERA, H. B. & K. (Compos.).

- chimboensis*, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 38.—Ecuador.
drymonia, *Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxv. 287.—Am. cent.
Nelsonii, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxii. 45.—Mexic.

VILFA, Beauv. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).

- capensis*, Beauv. *Agrost.* 16 = *S. indicus*.
commutata, Trin. *Gram. Unifl.* 156 = *S. coromandelianus*.
discospora, Nees, ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. 59* = *S. coromandelianus*.
geniculata, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 156 = *S. tremulus*.
roxburghiana, Nees, ex Steud. *Nom. ed. II. ii. 768* = *S. coromandelianus*.
Roxburghii, Nees, ex Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. 59* = *S. coromandelianus*.
ruppeliana, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 162 = *S. indicus*.
scabrifolia, Hochst. ex Edgew. in *Journ. Linn. Soc.* vi. 196 = *S. glaucifolius*.
setulosa, Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. v. II. 55* = *Heleochloa dura*.

VILLAMILLA, Ruiz & Pav. (Phytolacc.).

- rosea-ocnia*, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 110 (= *Ledenbergia rosea-ocnia*).—Bolivia.

VILLARESIA, Ruiz & Pav. (Olacac.).

- citriifolia*, Borsari, in *Boll. Ort. Bot. Palermo*, i. 44.—Hort.
engleriana, Loesen. in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 20.—Afr. trop.

VINCENTIA, Gaudich. = **Cladium**, P. Br. (Cyper.).

- macrophylla*, Boeck. in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1896, 112.—Bras.

VINCETOXICUM, Rupp. (Asclep.).

- acuminatum*, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 431 (= *Gonolobus acuminatus*).—Mexic.
adriaticum, R. Beck, in *Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xiii. 30.—Eur.
africanum, Bolus, ex Schlechter, in *Journ. Bot.* 1896, 457 = *pilosum*.
capense, Schlechter, l. c. = *Cynanchum capense*.
crenatum, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 429.—Mexic.
floridanum, Vail, l. c. —Am. bor.
Greggii, Vail, l. c. 430.—Mexic.
intermedium, Taliew, in *Trav. Soc. Nat. Kharkow*, xxxiv. 251.—Eur.
obtusifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. II. 200.—Afr. austr.
productum, Vail, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 431 (= *Gonolobus productus*).—Am. bor.
umbellatum, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 78.—Bolivia.
unguiculatum, Britton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 499.—Bolivia.

VIOLA, Tourn. (Violac.).

- albica*, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 141.—Graecia.
albida, *Palibin, in Act. Hort. Petrop.* xvii. i. 30.—Corea.
alsophila, *Greene, Pittonia*, iv. 7.—Am. bor.
amorphophylla, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 129.—Am. bor.
atlantica, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 92 (non Pomel).—Am. bor.
atriplicifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 88.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* 307.—Am. bor.
Bangii, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 5.—Am. trop.
beckiana, *F. Fiala, ex Beck, in Wien. Ill. Gart. Zeit.* 1896, 197.—Bosnia.
bicolor, *Reiche & Fohow, Fl. Chile*, i. 149 (non Gilib.).—Chili.
brittoniana, *Pollard, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 332.—Am. bor.
Cadevalli, *Pau, in Bol. Acad. Ci. Barcelona*, Ser. III. i. XIII. 62.—Eur.
carolina, *Greene, Pittonia*, iii. 259.—Am. bor.
cognata, *Greene, l. c.* 145.—Am. bor.
communis, *Pollard, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 336.—Am. bor.
commutata, *Waisb. in Baenitz, Herb. Eur.* 1896, 3, nomen.—Eur.
conjugens, *Greene, Pittonia*, iv. 3.—Am. bor.
cuspidata, *Greene, l. c.* iii. 314.—Am. bor.
cyclophylla, *Greene, l. c.* iv. 7.—Am. bor.

VOL. III.

VIOLA :—

- dactylifera*, *Greene, Pittonia*, iii. 317.—Am. bor.
deltoides, *Greene, l. c.* 317 (non Yatabe).—Am. bor.
Dicksonii, *Greene, l. c.* iv. 65.—Am. bor.
Doerfleri, *Degen, in Denkschr. Acad. Wiss. Wien*, lxiv. 710.—Eur.
domestica, *Bickn. in Britton & A. Brown, Fl. N. U. S.* iii. 519.—Am. bor.
elegantula, *Greene, Pittonia*, iv. 66.—Am. bor.
erectifolia, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxix. 148.—Am. bor.
eximia, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxviii. 221.—Eur.
falcata, *Greene, Pittonia*, iv. 3.—Am. bor.
flaccida, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1899 (242).—Japon.
flavovirens, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 405.—Am. bor.
Fletii, *Piper, in Erythea*, vi. 69.—Am. bor.
Hookeri, *Auct. in Just, Jahresb.* xxv. II. 508, errore = *Vicia Hugerii*.
insignis, *Pollard, in Coult. Bot. Gaz.* xxvi. 334 = *vicinialis*.
Langloisii, *Greene, Pittonia*, iii. 87.—Am. bor.
lesbiaca, *Candargy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlv. 154.—Graecia.
leucocentra, *Pinkw. in Baenitz, Herb. Eur.* 1897, 3 = *sylvestris*.
Macounii, *Greene, Pittonia*, iii. 335.—Am. bor.
missouriensis, *Greene, l. c.* iv. 141.—Am. bor.
mistassinica, *Greene, l. c.* 5.—Am. bor.
montanensis, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 263.—Am. bor.
monticola, *Rydb. l. c.* 264 (non Jord.).—Am. bor.
Muretii, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais*, xvi. 262.—Hybr.
nephrophylla, *Greene, Pittonia*, iii. 144.—Am. bor.
nivalis, *Benth. Pl. Hartw.* 160 = *Bangii*.
occidentalis, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 69.—Am. bor.
odontophora, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 264.—Am. bor.
oxyceras, *Greene, Pittonia*, iii. 255.—Am. bor.
pachyrhizonia, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais*, xxvi. 258.—Eur.
pindicola, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxiv. 334.—Eur.
populifolia, *Greene, Pittonia*, iii. 337.—Am. bor.
porteriana, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 404.—Am. bor.
pratincola, *Greene, Pittonia*, iv. 64.—Am. bor.
pruinosa, *Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 130.—Am. bor.
psychodes, *Greene, Pittonia*, iii. 318.—Am. bor.
puberula, *Howell, Fl. N. W. Amer.* 72 (non Lange).—Am. bor.
pulchella, *Leyb. ex Reiche & Fohow, Fl. Chile*, i. 153 (non Salisb.).—Chili.
Rafinesquii, *Greene, Pittonia*, iv. 9.—Am. bor.
retusa, *Greene, l. c.* 6.—Am. bor.
Reverchonii, *Wenk, in Baenitz, Herb. Eur.* 1896, 6 (non Willk.).—Eur.
rhodopenis, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1898, 21.—Bulgar.
riddensis, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais*, xxvi. 260.—Hybr.
Rosthornii, *E. Pritz. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 477.—China.
sarmentosa, *Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am.* i. 80 = *sempervirens*.
sedanensis, *F. O. Wolf, in Bull. Murith. Soc. Valais*, xxvi. 261.—Hybr.
sempervirens, *Greene, Pittonia*, iv. 8.—Am. bor.
septentrionalis, *Greene, l. c.* iii. 334.—Am. bor.
sermenika, *Form. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1897, 75.—Graecia.
Slavikii, *Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxviii. 220.—Eur.
subcordata, *Greene, Pittonia*, iii. 316.—Am. bor.
subsagittata, *Greene, l. c.* 315.—Am. bor.
subsinuata, *Greene, l. c.* iv. 4.—Am. bor.
subvestita, *Greene, in Erythea*, v. 39.—Am. bor.
tenella, *Rafin. in Amer. Monthly Mag.* 1819, 191 = *Rafinesquii*.
Thorii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxx. 193.—Am. bor.
vagula, *Greene, Pittonia*, iv. 67.—Am. bor.
vallicola, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 128.—Am. bor.

VIOLA :—

- venosa*, *Rydb. in Mem. N. York Bot. Gard.* i. 262 = *aurea*.
venustula, *Greene, Pittonia*, iii. 335.—Am. bor.
vicinialis, *Greene, l. c.* iv. 9.—Am. bor.
vilmoriniana, *Delacour & Mottet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 120.—Gallia.
vittata, *Greene, Pittonia*, iii. 258.—Am. bor.
Watsonii, *Greene, l. c.* iv. 5.—Am. bor.

VIRECTA, Afzel. (Rubiac.).

- heteromera*, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxiii. 422.—Afr. trop.
salicoides, *C. H. Wright, in Kerb Bull.* 1898, 302.—Afr. trop.
suffruticosa, *K. Schum. in Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped.* 318, nomen (non Buch-Ham.).—Afr. trop.

VIOLA, Aubl. = **Myristicia**, Linn. (Myristicac.).

- Araujovii*, *Warb. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 208.—Bras.
Bicuhyba, *Warb. l. c.* 194 = *M. Bicuhyba*.
boliviensis, *Warb. l. c.* 184.—Bolivia.
calophylla, *Warb. l. c.* 231.—Bras.
carinata, *Warb. l. c.* 222 = *M. carinata*.
cuspidata, *Warb. l. c.* 176 = *M. cuspidata*.
elongata, *Warb. l. c.* 178 = *M. elongata*.
Gardneri, *Warb. l. c.* 192 = *M. Gardneri*.
Glasiovii, *Warb. l. c.* 219.—Bras.
guatemalensis, *Warb. l. c.* 220.—Bras.
incolor, *Warb. l. c.* 282.—N. Granat.
Mococa, *Warb. l. c.* 183 = *M. Mococa*.
mollissima, *Warb. l. c.* 167 = *M. mollissima*.
officinalis, *Warb. l. c.* 228 = *M. officinalis*.
panamensis, *Warb. l. c.* 185 = *M. panamensis*.
peruviana, *Warb. l. c.* 188 = *M. peruviana*.
rufula, *Warb. l. c.* 181.—Bras.
rugulosa, *Warb. l. c.* 227.—Bras.
Schwackei, *Warb. l. c.* 180.—Bras.
sessilis, *Warb. l. c.* 190 = *M. sessilis*.
subsessilis, *Warb. l. c.* 191 = *M. subsessilis*.
surinamensis, *Warb. l. c.* 208 = *M. surinamensis*.
theiodora, *Warb. l. c.* 187 = *M. theiodora*.
urbaniana, *Warb. l. c.* 168.—Bras.
venezuelensis, *Warb. l. c.* 182.—Venez.
venosa, *Warb. l. c.* 224 = *M. venosa*.

VISCUM, Tourn. (Loranth.).

- Aitchisoni*, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 190.—Afghanistan.
Bakeri, *Van Tiegh. l. c.* 190.—Madag.
bivalve, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 140 (= *Aspidixia bivalvis*).—Afr. austr.
Boivini, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 189.—Madag.
congolense, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 44*.—Afr. trop.
elegans, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 140.—Afr. trop.
Engleri, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 190.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 44*.—Afr. trop.
grandifolium, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 140.—Afr. trop.
Jussodii, *Engl. l. c.*—Afr. austr.
lenticellatum, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 45*.—Afr. trop.
pendulum, *A. A. Heller, in Minnes. Bot. Studies*, i. 817.—Ins. Sandw.
Standtii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 140.—Afr. trop.
subserratum, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 504.—Afr. austr.
Zenkeri, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflansenf. Nachtr.* i. 140.—Afr. trop.

VISNAGA, Gaertn. = **Ammi**, Tourn. (Umbell.).

- vulgaris*, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 350 = *A. majus*.

VITEX, Tourn. (Verben.).

- aesculifolia*, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 325.—Afr. trop.
andongensis, *Baker, l. c.* 329.—Afr. trop.
bantamensis, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* ii. 12.—Java.
barbata, *Planch. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 323.—Afr. trop.

C C

VITEX :—

- celebica, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.
 congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 184.—Afr. trop.
 cuspidata, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 835.—Afr. trop.
 Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 183.—Afr. trop.
 divaricata, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 327 (non Sw.).—Afr. trop.
 diversifolia, *Baker, l. c.* 323 (non Kurz).—Afr. trop.
 Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 464.—Afr. trop.
 golungensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 330.—Afr. trop.
 gomphophylla, *Baker, l. c.* 319.—Afr. trop.
 grisea, *Baker, l. c.* 325.—Afr. trop.
 guerkeana, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 835 = feruginea.
 Hemsleyi, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 347.—Mexic.
 holocalyx, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 322.—Afr. trop.
 holophylla, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 25.—Borneo.
 huillensis, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 837 = grisea.
 iringensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 464.—Afr. trop.
 Kirkii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 321.—Afr. trop.
 laevigata, *Baker, l. c.* 330 (non Herb. Madr.).—Afr. trop.
 Minahassae, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 645.—Celebes.
 oligantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 327.—Afr. trop.
 oxycupis, *Baker, l. c.* 326.—Afr. trop.
 pachyphylla, *Baker, l. c.* 328.—Afr. trop.
 polyantha, *Baker, l. c.* 321.—Afr. trop.
 puberula, *Baker, l. c.* 330.—Afr. trop.
 quadrangulus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxviii. 463.—Afr. trop.
 Rehmanni, *Guerke, in Bull. Herb. Boiss.* iv. 818.—Afr. austr.
 Schweinfurthii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 322.—Afr. trop.
 Schweinfurthii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xviii. 170 = madiensis.
 shirensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 326.—Afr. trop.
 Sprucei, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 346.—Reg. Amazon.
 sulphurea, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 317.—Afr. trop.
 Vogelii, *Baker, l. c.* 319.—Afr. trop.
 Wilmsii, *Guerke, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 76.—Afr. austr.
 zambesiaca, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 322.—Afr. trop.

VITIS, Tourn. (Ampel.).

- alata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 40.—Bolivia.
 andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 393.—Ins. Andaman.
 apodophylla, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 248 = zombensis.
 armata, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 462.—China.
 betulifolia, *Diels & Gilg, l. c.* 461.—China.
 cradockensis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 40.—Afr. austr.
 cuneifolia, *Kuntze, l. c.*—Afr. austr.
 cussonioides, *Kuntze, l. c.* 41.—Afr. austr.
 Gardineri, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 233.—Anstral.
 goyazensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 443.—Bras.
 Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 396.—Penins. Mal.
 Lawsoni, *King, l. c.* 394.—Penins. Mal.
 masukuensis, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 249.—Afr. trop.
 obliqua, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 41.—Peruv.; Bolivia.
 pentagona, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 460 (non aliorum).—China.
 repandospinulosa, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 41.—Afr. austr.
 Scortechini, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 392.—Penins. Mal.
 strigosa, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 231.—Austral.
 Treleasei, *Munson, ex Robinson, in Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. 1. 423.—Am. bor.
 trichoclada, *Diels & Gilg, ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 461.—China.

VITIS :—

- tuberculata, *Lawson, in Hook. f. Fl. Br. Ind.* i. 656 = Lawsoni.
 unifoliata, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 41.—Afr. austr.
 variifolia, *Baker, in Kew Bull.* 1897, 248.—Afr. trop.
 Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 394.—Penins. Mal.
 zombensis, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 302.—Afr. trop.
- VIVIANIA**, Cav. (Geran.).
 elegans, *Reiche & Johow, Fl. Chile,* i. 292.—Chili.
 macrophylla, *Reiche & Johow, l. c.* 293.—Chili.
 microphylla, *Reiche & Johow, l. c.*—Chili.
 viridis, *Phil. ex Reiche & Johow, l. c.* 292.—Chili.

- VLECKIA**, Rafin. = **Lophanthus**, Benth. (Labiata).
 occidentalis, *Piper, in Erythraea,* vi. 31.—Am. bor.

- VOACANGA**, Thou. (Apocyn.).
 angolensis, *Stapp, ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 668.—Afr. trop.
 papuana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 396 (= *Orchippeda papuana*).—N. Guin.

- VOCHISIA**, Juss. (Vochys.).
 douradensis, *Taub. in Engl. Jahrb.* xxi. 440.—Bras.
 Goeldii, *Huber, in Bol. Mus. Para.* ii. 383.—Bras.
 napirensis, *Kusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 7.—Bolivia.
 Radlkoferi, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 12.—Bolivia.

- VOLKENSIOPHYTON**, Lindau = **Lepidagathis**, Willd. (Acanth.).
 neuracanthoides, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xx. 27 = L. scariosa.

- VOLUTARELLA**, Cass. (Compos.).
 albicaulis, *Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 109.—Arab.

- VOSSIA**, Wall. & Griff. (Gramin.).
 cuspidata, *Griff. Ic. Pl. Asiat.* t. 153 = procera.
 speciosa, *Benth. in Journ. Linn. Soc.* xix. 70 = *Rottboellia speciosa*.

- VRIESIA**, Lindl. = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).
 brassicoides, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 598 = T. brassicoides.
 caldasiana, *Mez, l. c.* 607.—Bras.
 dissitiflora, *Mez, l. c.* 604 = T. dissitiflora.
 disticha, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. 11. 304 = T. heliconioides.
 drepanocarpa, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 581 = T. drepanocarpa.
 Gamba, *Fr. Mueller, in Flora,* 1897, 460.—Bras.
 guadaloupensis, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 596 = T. guadelupensis.
 hydrophora, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1899, 2.—Bras.
 laxa, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 578 = T. laxa.
 longibracteata, *Mez, l. c.* 568 = T. longibracteata, *Baker.*
 longiscapa, *Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1900, 323.—Bras.
 macrostachya, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 601 = T. platynema.
 pachyklamys, *Mez, l. c.* 594.—Guiana.
 panniculata, *Mez, l. c.* 614 = T. paniculata.
 paradoxa, *Mez, l. c.* 604.—Bras.
 sceptrum, *Mez, l. c.* 606.—Bras.
 schwackeana, *Mez, l. c.* 590.—Bras.
 siebertiana, *Hort. in Journ. Soc. Hort. Fr.* 1899, 665.—Hab.?
 stenostachya, *Mez, in DC. Monog. Phan.* ix. 564 = T. stenostachya.
 tucumanensis, *Mez, l. c.* 585.—Reg. Argent.
 ventricosa, *Mez, l. c.* 583 = T. corcovadensis.

- VROEDEA**, Bub. Fl. Pyren. i. 230 (1897) = **Glaux**, Tourn. (Primul.).
 maritima, *Bub. l. c.* 231 = G. maritima.

- VRYDAGZYNEA**, Blume (Orchid.).
 lancifolia, *Ridley, in Journ. Linn. Soc.* xxxii. 398.—Penins. Mal.
 tristriata, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

- VULNERARIA**, Tourn. = **Anthyllis**, Riv. (Legum.).
 Caesalpini, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 469 = A. tetraphylla.
 gracilis, *Bub. l. c.* 467 = A. cytisoides.

- VULVARIA**, Bub. Fl. Pyren. i. 174 (1897) = **Chenopodium**, Tourn. (Chenopod.).
 albescens, *Bub. l. c.* 176 = C. album.
 ambrosioides, *Bub. l. c.* 178 = C. ambrosioides.
 Botrys, *Bub. l. c.* 177 = C. Botrys.
 deltoidea, *Bub. l. c.* 176 = C. urbicum.
 opulifolia, *Bub. l. c.* = C. opulifolium.
 polysperma, *Bub. l. c.* 175 = C. polyspermum.
 stramonifolia, *Bub. l. c.* 177 = C. hybridum.
 trachisperma, *Bub. l. c.* = C. murale.
 vulgaris, *Bub. l. c.* 175 = C. Vulvaria.

W

- WACHENDORFIA**, Burm. (Haemodor.).
 hirsuta, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 12 = paniculata.
 tenella, *Thunb. l. c.* = paniculata.
 villosa, *Andr. Bot. Rep. t.* 398 = paniculata.

- WAHLENBERGIA**, Schrad. (Campan.).
 brachycarpa, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 429.—Afr. austr.
 depressa, *Wood & Evans, in Journ. Bot.* 1897, 489.—Afr. austr.
 Galpiniae, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 343.—Afr. austr.
 hederifolia, *Bub. Fl. Pyren.* ii. 18 = hederacea.
 intermedia, *A. Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1900, 518.—Bras.
 luristanica, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* v. 791 (= *Campanula luristanica*).—Persia.
 polytrichifolia, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 392.—Afr. austr.
 psammophila, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 192.—Afr. austr.
 pygmaea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxxi. 273.—N. Zel.
 rivularis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxvi. 111.—Afr. austr.
 schwackeana, *A. Zahlbr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1900, 517.—Bras.

- WALDSTEINIA**, Willd. (Rosac.).
 parviflora, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1898, 137.—Am. bor.

- WALLACEODENDRON**, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix. (1898) 630. **LEGUMINOSAE.**
 celebicum, *Koord. l. c.* 631.—Celebes.

- WALSURA**, Roxb. (Meliac.).
 cochinchinensis, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflansenf.* iii. 1v. 302 (= *Heynea cochinchinensis*).—Cochinch.
 elata, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 355 B.—Cochinch.

- WALTHERIA**, Linn. (Stercul.).
 acapulcensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 184.—Mexic.
 acuminata, *Rose, l. c.* 183.—Mexic.
 calcicola, *Urb. Symb. Antill.* i. 475.—Ind. occ.
 operculata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 183.—Mexic.
 rhombifolia, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gas.* xxiii. 3.—Am. cent.

- WARDENIA**, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. (1898) 60. **ARALIACEAE.**
 simplex, *King, l. c.*—Penins. Mal.

- WAREA**, Nutt. (Crucif.).
 sessilifolia, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1896, 101.—Am. bor.

- WASABIA**, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xiii. (1899) 71. **CRUCIFERAE.**
 hederifolia, *Matsum. l. c.* 72 (= *Eutrema hederifolia*).—Japon.
 pungens, *Matsum. l. c.* 71 (= *Eutrema Wasabi*).—Japon.

- WASHINGTONIA**, Rafin. in *Amer. Monthly Mag.* ii. (1818) 176 = **Osmorhiza**, Rafin. (Umbell.).
 ambigua, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vii. 69 (= *Glycosma ambiguum*).—Am. bor.
 Bolanderi, *Coult. & Rose, l. c.* 68 (= *Myrrhis Bolanderi*).—Calif.

WASHINGTONIA:—

- brachypoda*, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 5 = O. *brachypoda*.
brevipes, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 66.—Calif.
Claytoni, Britton, in Britton & A. Brown, *Fl. N. U. S.* ii. 530 = O. *brevistylis*.
divaricata, Britton, l. c. 581 = O. *nuda*.
intermedia, Rydb. in *Mem. N. York Bot. Gard.* i. 289.—Am. bor.
Leibergeri, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 66.—Am. bor.
longistylis, Britton, in Britton & A. Brown, *Fl. N. U. S.* ii. 530 = O. *longistylis*.
nuda, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 5 = O. *nuda*.
obtusata, Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vii. 64.—Am. bor.
occidentalis, Coult. & Rose, l. c. 67 (= *Myrrhis occidentalis*).—Am. bor.
purpurea, Coult. & Rose, l. c.—Am. bor.

WATSONIA, Mill. (Irid.).

- Ardernei*, Sand. *Cat. 1899*, 44 = W. *Meriana*.
gladioloides, Schlechter, in *Journ. Bot.* 1897, 222.—Afr. austr.
longicollis, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxvii. 106.—Afr. austr.
spectabilis, Schinz, in *Mém. Herb. Boiss.* no. 20, 14.—Afr. austr.

WEDELIA, Jacq. (Compos.).

- albiflora*, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 577.—Afr. trop.
diversipapposa, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1899, 401.—Afr. trop.
huillensis, Hiern, *Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 576.—Afr. trop.
Stirlingi, Tate, *Rep. Horn Exped.* iii. 188, descr.—Austral.
triternata, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 839.—Afr. trop.

WEIHEA, Spreng. (Rhizoph.).

- Flanaganii*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* v. 868.—Afr. austr.
Gerrardii, Schinz, l. c. 867.—Afr. austr.
malosana, Baker, in *Kew Bull.* 1897, 267.—Afr. trop.
rotundifolia, Engl. in *Engl. Jahrb.* xxviii. 440.—Afr. trop.

WEINMANNIA, Linn. (Saxifr.).

- celebica*, Koord. in *Meded. 'S Lands Plantent.* xix. 450, 640.—Celebes.

WELWITSCHIELLA, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 416 = seq.

- WELWITSCHIINA*, Engl. in Engl. Jahrb. xxvi. (1899) 416. **MENISPERMACEAE.**
macrophylla, Engl. l. c. (= *Chondodendron macrophyllum*).—Afr. trop.

WENDLANDIA, Bartl. (Rubiace.).

- arabica*, Defters, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 104.—Arab.

WENDTIA, Meyen (Geran.).

- trigyna*, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 33 = *poeppigiana*.

WERNERIA, H. B. & K. (Compos.).

- boraginifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 184.—Bolivia.
caulescens, Hieron. ex Sod. in *Engl. Jahrb.* xxix. 74 (non Griseb.).—Ecuador.

WHITFIELDIA, Hook. (Acanth.).

- arnoldiana*, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 109.—Afr. trop.
Brazzei, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 67.—Afr. trop.
elongata, C. B. Clarke, l. c. 66.—Afr. trop.
elongata, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 110 = *longifolia*.
Laurentii, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 68.—Afr. trop.
liebrectsiana, Wildem. & Th. Dur. in *Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 111.—Afr. trop.
longiflora, S. Moore, in *Journ. Bot.* 1880, 229 = *subviridis*, *longifolia*.
perglabra, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 66.—Afr. trop.
Preussii, C. B. Clarke, l. c. 67.—Afr. trop.

WHITFIELDIA:—

- Stuhlmanni*, C. B. Clarke, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 68.—Afr. trop.
subviridis, C. B. Clarke, l. c. 66.—Afr. trop.
tanganyikensis, C. B. Clarke, l. c. 67.—Afr. trop.

WIDGRENIA, Malme, in Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxxiv. no. 7 (1900) 69. **ASCLEPIADACEAE.**

- corymbosa*, Malme, l. c.—Bras.
WIKSTROEMIA, Endl. (Thymel.).
Hanalei, Wawra, in *Flora*, 1875, 185.—Ins. Hawaii.
stenophylla, E. Pritz. ex Diels, in *Engl. Jahrb.* xxix. 480.—China.
trichotoma, Makino, *Bot. Notes Fl. Jap.* v. (1898) 5 = *japonica*.

WILKIEA, F. Muell. (Monim.).

- Wardelli*, Perkins, in *Engl. Jahrb.* xxv. 570 (= *Mollinedia Wardelli*).—Austral.

WILLDENOWIA, Thunb. (Restiac.).

- decipiens*, N. E. Br. in *Dyer, Fl. Cap.* vii. 758.—Afr. austr.
fraterna, N. E. Br. l. c. 756.—Afr. austr.
Galpinii, N. E. Br. l. c. 757.—Afr. austr.
peninsularis, N. E. Br. l. c.—Afr. austr.
simplex, N. E. Br. l. c. 756.—Afr. austr.

WILLKOMMIA, Sch. Bip. = Senecio, Tourm. (Compos.).

- Newtonii*, Hack. in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 810.—Afr. trop.

WILLUGBAEYA, Neck. = Mikania, Willd. (Compos.).

- dioscoreoides*, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 58.—Bolivia.
ferruginea, Rusby, l. c.—Bolivia.
longiacuminata, Rusby, l. c.—Bolivia.
phyllopoda, Kuntze, *Rev. Gen.* iii. ii. 184 = M. *phyllopodon*.
ranunculifolia, Millsp. in *Field Columb. Mus. Bot.* ii. 106 = M. *ranunculifolia*.

WILLUGHBEIA, Roxb. (Apocyn.).

- Beccarii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachtr.* ii. 55 (= *Ancylocladus Beccarii*).—Malaya.
curtisiana, K. Schum. l. c.—Penins. Mal.
glaucina, K. Schum. l. c.—Borneo.
minutiflora, K. Schum. l. c.—Borneo.
nodosa, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachtr.* ii. 55.—Borneo.
sarawacensis, K. Schum. l. c.—Borneo.
vrieseana, K. Schum. l. c.—Borneo.

WINDMANNIA, P. Br. = Weinmannia, Linn. (Saxifr.).

- cochabambensis*, Rusby, in *Mem. Torr. Bot. Club*, vi. 33.—Bolivia.
sessilifolia, Rusby, l. c.—Bolivia.

WINKLERA, Regel (Crucif.).

- silaiifolia*, Korsh. in *Bull. Acad. Péters. Sér. V.* ix. 419 (= *Heldreichia silaiifolia*).—As. cent.

WISSADULA, Medic. (Malvac.).

- acuminata*, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 144.—Mexic.
cincta, Rose, l. c. 178 (= *Abutilon cinctum*).—Mexic.
hirsutiflora, Rose, in *U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun.* xiv. 79 (= *Bastardia viscosa*).—Mexic.
paniculata, Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 178.—Mexic.
spicata, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Pflanzensf. Nachtr.* i. 236 (= *Sida spicata*, Cav.).—Ind. occ.
tricarpetata, Robinson & Greenm. ex Rose, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* v. 179.—Mexic.
trilobata, Rose, l. c. 178 (= *Abutilon trilobatum*).—Mexic.
wissaduloides, Robinson & Greenm. ex Rose, l. c. 179 (= *Abutilon wissaduloides*).—Mexic.

WITTMACKIA, Mez (Bromel.).

- Glaziovii*, Mez, in *DC. Monog. Phan.* ix. 142.—Bras.

WOLEFFIA, Horkel (Lemnac.).

- floridana*, O. D. Smith, ex Hegelm. in *Engl. Jahrb.* xxi. 305.—Am. bor.
papulifera, C. H. Thompson, in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 40.—Am. bor.

WOLFFIELLA, Hegelm. in Engl. Jahrb. xxi. (1895)

308. **LEMNACEAE.**
denticulata, Hegelm. l. c. 305 (= *Wolffia denticulata*).—Afr. austr.
floridana, C. H. Thompson, in *Rep. Missouri Bot. Gard.* 1898, 37 (= *Wolffia floridana*).—Am. bor.
gladiata, Hegelm. in *Engl. Jahrb.* xxi. 304 (= *Wolffia gladiata*).—Mexic.
lingulata, Hegelm. l. c. 303 (= *Wolffia lingulata*).—Bras.
oblonga, Hegelm. l. c. (= *Wolffia oblonga*).—Chili.

WOODIA, Schlechter (Asclep.).

- marginata*, Schlechter, in *Engl. Jahrb.* xxi. Beibl. liv. 9 = *trifurcata*.

WOODROWIA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2447 (1896).

- GRAMINEAE.**
diandra, Stapf, l. c.—Ind. or.

WOOTONIA, Greene, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898,

121. **COMPOSITAE.**
parviflora, Greene, l. c. 122.—Am. bor.

WORMIA, Rottb. (Dillen.).

- mollissima*, Boerl. *Cat. Hort. Bogor.* (1899) 5.—Sumatra.

WRIGHTIA, R. Br. (Apocyn.).

- Azelii*, K. Schum. in *Engl. Jahrb.* xxiii. 231.—Afr. trop.

WULFENIA, Jacq. (Scrophul.).

- Baldaccii*, Degen, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* 1897, 408.—Albania.
Bullii, Barnh. in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1899, 378 (= *Synthyris houghtoniana*).—Am. bor.
gymnocarpa, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 282.—Am. bor.
major, A. A. Heller, *Cat. N. Am. Pl.* 7, nomen.—Am. bor.
wyomingensis, A. Nelson, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1898, 281.—Am. bor.

WULFFIA, Neck. (Compos.).

- Sodiroid*, Hieron. ex Sod. in *Engl. Jahrb.* xxix. 34.—Ecuador.

WULFHORSTIA, C. DC. in Mém. Herb. Boiss. no.

- 10 (1900) 77. **MELIACEAE.**
spicata, C. DC. l. c. 78.—Afr. trop.

WYETHIA, Nutt. (Compos.).

- foliosa*, Congdon, in *Erythraea*, vii. 186.—Calif.

WYLIA, Hoffm. = Scandix, Tourm. (Umbell.).

- hispanica*, Bub. *Fl. Pyren.* ii. 408 = S. *macrorhyncha*.
Pecten-Veneris, Bub. l. c. 407 = S. *Pecten-Veneris*.

WYOMINGIA, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,

- 1899, 249. **COMPOSITAE.**
cinerea, A. Nelson, l. c. 250.—Am. bor.
pulcherrima, A. Nelson, l. c. 249 (= *Erigeron pulcherrimus*).—Am. bor.

X

XANTHIUM, Tourm. (Compos.).

- acerosum*, Greene, *Pittonia*, iv. 63.—Am. bor.
acutum, Greene, l. c. 62.—Am. bor.
affine, Greene, l. c. 60.—Am. bor.
californicum, Greene, l. c. 62.—Am. bor.
campestre, Greene, l. c. 61.—Am. bor.
glanduliferum, Greene, l. c.—Am. bor.
palustre, Greene, l. c. 63.—Am. bor.
silphifolium, Greene, l. c. 60.—Am. bor.
speciosum, Kearney, in *Bull. Torr. Bot. Club*, 1897, 574.—Am. bor.
varians, Greene, *Pittonia*, iv. 59.—Am. bor.

XANTHOPHYLLUM, Roxb. (Polygal.).

- amoenum*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iv. 259.—Borneo.
beccarianum, Chod. l. c. 257.—Borneo.
bombayanum, Chod. l. c. 263.—Ind. or.
bracteatum, Chod. l. c. 258.—Ins. Philipp.
citrifolium, Chod. l. c. 255.—Borneo.
densiflorum, Chod. l. c. 256.—Borneo.
discolor, Chod. l. c. 257.—Penins. Mal.

XANTHOPHYLLUM—

ecarinatum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 254.—Borneo.
 gracile, *Chod. l. c.* 256.—Java.
 Havilandii, *Chod. l. c.* 260.—Borneo.
 hebecarpum, *Chod. l. c.* 263.—Ind. or.
 Kingii, *Chod. l. c.* 255.—Borneo.
 macrophyllum, *Baker, in Kew Bull.* 1896, 21.—Borneo.
 microcarpum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iv. 263.—
 Penins. Mal.
 ovatifolium, *Chod. l. c.* 258.—Borneo.
 parvum, *Chod. l. c.* 264.—Borneo.
 philippinense, *Chod. l. c.* 261.—Ins. Philipp.
 robustum, *Chod. l. c.* 262.—Ind. or.
 sarawakensis, *Chod. l. c.*—Borneo.
 Stapfii, *Chod. l. c.* 260.—Borneo.
 velutinum, *Chod. l. c.* 259.—Borneo.
 verrucosum, *Chod. l. c.* 263.—Malaya.

XANTHORRHOEA, Sm. (Juncac.).

Thorntoni, *Tatè, Rep. Horn Exped.* iii. 191, descr.—
 Austral.

XANTHOSTEMON, F. Muell. (Myrtac.).

celebicus, *Koord. in Meded. 'S Lands Plantent.* xix.
 465, 637.—Celebes.

XENOCARPUS, Cass. = **Cineraria**, Linn. (Compos.).

asper, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 184 = *C. aspera*.
geraniifolius, *Kuntze, l. c.* 185 = *C. geraniifolia*.

XENODENDRON, K. Schum. & Lauterb. Fl.

Deutsch. Südsee (1900) 461. **LYTHRACEAE**.
 polyanthum, *K. Schum. & Lauterb. l. c.*—N. Guin.

XEROPHYTA, Juss. = **Vallozia**, Vand. (Amaryll.).

clavata, *Baker, in Journ. Bot.* 1875, 233 = *V. clavata*.
diversifolium, *Auct. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 339,
 errore = *Xiphion diversifolium*.
equisetoides, *Baker, in Journ. Bot.* 1875, 233 = *V.*
equisetoides.
retinervis, *Baker, l. c.* = *V. retinervis*.
Schnitzleinia, *Baker, l. c.* 235 = *V. Schnitzleinia*.
Spekei, *Baker, l. c.* 234 = *V. Spekei*.

XEROSPERMUM, Blume (Sapind.).

Wallichii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 432.—
 Penins. Mal.

XYLIA, Benth. (Legum.).

Perieri, *Drake, in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. 1301.—Madag.

XYLINABARIA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. n. s.

i. (1898) 26. **APOCYNACEAE**.
 minutiflora, *Pierre, l. c.* 28.—As. or. trop.

XYLOBIUM, Lindl. (Orchid.).

longifolium, *Lindl. ex Spreng. Syst. Veg.* iii. 733 =
Eulophia Woodfordii.

XYLOCARPUS, Koen. = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).

mekongensis, *Pierre, Fl. Cochinch.* t. 359 B.—Cochinch.

XYLON, Linn. (Malvac.).

aesculifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 24 (= *Eriodendron aesculifolium*).—Mexic.
Glaziovii, *Kuntze, l. c.* 23 (= *Ceiba Glaziovii*).—Bras.
roseum, *Kuntze, l. c.* 24 (= *Chorisia rosea*).—N. Granat.
tunariense, *Kuntze, l. c.* 23 (= *Ceiba tunariensis*).—
 Bolivia.

XYLOPIA, Linn. (Anonac.).

altissima, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 73.—Arch. Mal.
 Antunesii, *Engl. & Diels, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin,*
 ii. 299.—Afr. trop.
 aurantioidora, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus.*
Congo, Sér. II. i. 1. 4.—Afr. trop.
 Benthami, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxxiv. no. 5, 35.—Venez.
 Bokoli, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,*
 Sér. II. i. II. 2.—Afr. trop.
 carminativa, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxxiv. no. 5, 32 = sericea.
 Dinklagei, *Engl. & Diels, in Notisbl. Bot. Gart.*
Berlin, ii. 298.—Afr. trop.
 glauca, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 74.—Ins. Bangka.
 intermedia, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxxiv. no. 5, 32.—Bras.
 laevigata, *R. Fries, l. c.* 37 (= *Unona laevigata*).—
 Ind. or.
 lanceolata, *R. Fries, l. c.*—Bras.

XYLOPIA—

longipetala, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,*
 Sér. II. i. 1. 4.—Afr. trop.
 mucronata, *Boerl. in Ic. Bogor.* t. 75.—Borneo.
 neglecta, *R. Fries, in Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxxiv.
 no. 5, 31.—Venez.
 Staudtii, *Engl. & Diels, in Notisbl. Bot. Gart. Berlin,*
 ii. 298.—Afr. trop.
 tenuifolia, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
 Wilwerthii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,*
 Sér. II. i. 1. 5.—Afr. trop.

XYLORHIZA, Nutt. = **Aster**, Tourn. (Compos.).

frutescens, *Greene, Pittonia*, iii. 48 = *A. frutescens*.
Orcuttii, *Greene, l. c.* = *A. Orcuttii*.
Parryi, *Greene, l. c.* 47 = *A. Parryi*.
tortifolia, *Greene, l. c.* 48 = *A. tortifolius*.
Wrightii, *Greene, l. c.* 47 = *A. Wrightii*.

XYLOSMA, Forst. f. (Bixac.).

Balansae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,*
 1900, 221.—Parag.
 caledonicum, *Briq. l. c.* 220 (= *Myroxylon caledonicum*).—N. Caled.
 Flanaganii, *Bolus, in Journ. Bot.* 1896, 17.—Afr. austr.
 martinicense, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon martinicense*).—Ind. occ.
 monospora, *Harv. Thes. Cap.* ii. 52 = *Xymalos monospora*.
 oligandrum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 235.
 —Am. cent.
 pachyphyllum, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon pachyphyllum*).—Ind. occ.
 Paliurus, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,*
 1900, 221 (= *Myroxylon Paliurus*).—Hab. ?
 paraguayense, *Briq. l. c.* 222.—Parag.
 schwaneckeanum, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon schwaneckeanum*).—Ind. occ.
 serratum, *Urb. Symb. Antill.* i. 371 (= *Myroxylon serratum*).—Ind. occ.
 Warburgii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,*
 1900, 221 (= *Myroxylon Warburgii*).—Urug.

XYRIS, Gronov. (Xyrid.).

affinis, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 70.—
 Afr. trop.
 angustifolia, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend.*
Soc. Bot. Belg. xxxviii. 149.—Afr. trop.
 anisophylla, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii.
 72.—Afr. trop.
 borneensis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 506.—Borneo.
 decipiens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 3.—Afr.
 austr.
 erubescens, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 73.—Afr. trop.
 extensula, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxiv. no. 3, 15.—Bras.
 fallax, *Malme, l. c.* xxii. no. 2, 12.—Bras.
 fugaciflora, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 71.—Afr.
 trop.
 Gerrardi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* vii. 5.—Afr.
 austr.
 goyazensis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxiv. no. 3, 8.—Bras.
 gracilescens, *Malme, l. c.* 16.—Bras.
 guaranítica, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* vii. 77.—
 Parag.
 huillensis, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 71.—Afr. trop.
 Lobbii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 506.—Java.
 marginata, *Rendle, l. c.* 503.—Austral.
 neocaledonica, *Rendle, l. c.* 507.—N. Caled.
 Nilssonii, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxii. no. 2, 15.—Bras.
 nivea, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 69.—
 Afr. trop.
 Pancheri, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 507.—N. Caled.
 platystachya, *Nilss. ex Malme, in Bih. Svensk. Vet.-*
Akad. Handl. xxiv. no. 3, 17.—Bras.
 pumila, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 70 (non Pohl).
 —Afr. trop.
 radula, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxiv. no. 3, 11.—Bras.
 reptans, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 68.—Afr. trop.
 Ridleyi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 505.—Penins. Mal.
 rigidaeformis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad.*
Handl. xxii. no. 2, 13.—Bras.
 rigidescens, *Welw. ex Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii.
 67.—Afr. trop.
 scabridula, *Rendle, l. c.* 72.—Afr. trop.

XYRIS—

stenocephala, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad.*
Handl. xxii. no. 2, 18.—Bras.
 straminea, *Nilss. in Öfvers. Vet.-Akad. Förhandl.*
 Stockh. 1891, 153 = filiformis.
 subtenella, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxiv. no. 3, 14.—Bras.
 Thompsoni, *Rendle, in Journ. Bot.* 1899, 508.—
 Madag.
 vacillans, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.*
 xxiv. no. 3, 10.—Bras.
 veruina, *Malme, l. c.* 9.—Bras.
 vestita, *Malme, l. c.* 12.—Bras.
 Welwitschii, *Rendle, Cat. Welw. Afr. Pl.* ii. 68.—Afr.
 trop.

XYSMALOBIMUM, R. Br. (Asclep.).

andongense, *Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl.* i. 682.—Afr.
 trop.
 dolichoglossum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxviii.
 456.—Afr. trop.
 obscurum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1896, 162.—Afr. trop.

Y

YEATESIA, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1896,
 410 = *Gatesia*, A. Gray (Acanth.).
laetevirens, Small, l. c. = *G. laetevirens*.

YOANIA, Maxim. (Orchid.).

aberrans, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 274.—
 Afr. bor.
 Prainii, *King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc.* viii.
 175.—Ind. or.

Z

ZALUZANIA, Pers. (Compos.).

anthemidifolia, *Robinson & Greenm. in Proc. Amer.*
Acad. xxxiv. 531.—Am. cent.
 grayana, *Robinson & Greenm. l. c.* (= *Gymnolomia triloba*).—Am. bor.
 nonensis, *Hieron. ex Sod. in Engl. Jahrb.* xxix. 36.—
 Ecuador.
 quitensis, *Hieron. l. c.* 37.—Ecuador.
 Sodiroi, *Hieron. l. c.* 35.—Ecuador.

ZALUZIANSKYA, F. W. Schmidt (Scrophul.).

alpestris, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 480.—Afr. austr.
 crocea, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1897, 221.—Afr.
 austr.
 diandra, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 482.—Afr. austr.
 falciloba, *Diels, l. c.* 481.—Afr. austr.
 gilgiana, *Diels, l. c.* 480.—Afr. austr.
 gilioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 182.—Afr.
 austr.
 goseloides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 480.—Afr. austr.
 inflata, *Diels, l. c.* 481.—Afr. austr.
 microsiphon, *K. Schum. in Just. Jahresb.* xxvi. i. 395
 (= *Nycterinia microsiphon*).—Afr. austr.
 nemesioides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxiii. 482.—Afr.
 austr.
 violacea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 183.—Afr.
 austr.

ZAMIA, Linn. (Cycad.).

Allison-Armourii, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.*
 ii. 23.—Ind. occ.
 portoricensis, *Urb. Symb. Antill.* i. 291.—Ind. occ.

ZANHA, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 128 (1896).

BURSERACEAE.
golungensis, *Hiern, l. c.*—Afr. trop.

ZANNICHELLIA, Mich. (Naiad.).

stylaris, *Presl, Bot. Bemerck.* 112 = palustris.

ZANONIA, Linn. (Cucurb.).

Clarkei, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxvii. 41.—
 Penins. Mal.

- ZANTEDESCHIA**, Spreng. = **Richardia**, Kunth (Arac.).
macrocarpa, Engl. Jahrb. iv. 64 = R. angustiloba.
- ZANTHOXYLUM**, Linn. (Rutac.).
arborescens, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 112.—Mexic.
celebicum, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 689.—Celebes.
citriodorum, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 114.—Afr. trop.
ferrugineum, Radlk. ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiv. 391.—Am. cent.
foetidum, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 112.—Mexic.
insularis, Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun. xxiv. 79.—Mexic.
longipes, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 163.—Mexic.
Minahassae, Koord. in Meded. 'S Lands Plantent. xix. 689.—Celebes.
multifoliolatum, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2595.—China.
Nelsoni, Rose, in U. S. Dept. Agric. N. Am. Faun. xiv. 79.—Mexic.
nitens, Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 112.—Afr. trop.
occidentale, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. 164.—Mexic.
procerum, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxiii. 4.—Am. cent.
thomasianum, Krug & Urb. in Engl. Jahrb. xxi. 583 (= *Fagara thomasiana*).—Ind. occ.
trifoliolatum, Krug & Urb. l. c. 584 = *ternatum*.
Welwitschii, Welw. ex Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 114.—Afr. trop.
- ZEHNERIA**, Endl. = **Melothria**, Linn. (Cucurb.).
ejecta, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 699.—Austral.
- ZENKERELLA**, Taub. (Legum.).
pauciflora, Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 183.—Afr. trop.
- ZENKERINA**, Engl. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 497. **SCROPHULARIACEAE**.
kamerunensis, Engl. l. c. 498.—Afr. trop.
- ZEOCRITON**, Beauv. = **Hordeum**, Tourn. (Gramin.).
distichum, Beauv. Agrost. 115 = H. vulgare.
- ZEPHYRANTHES**, Herb. (Amaryll.).
Conzattii, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 473.—Mexic.
longifolia, Arech. in Anal. Mus. Montevidei. xii. 286 (non Hemsl.).—Urug.
longipes, Baker, in Kew Bull. 1898, 225.—Urug.
Nelsonii, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 473.—Mexic.
stenopetala, Baker, in Kew Bull. 1898, 226.—Urug.
- ZEUGITES**, P. Br. (Gramin.).
Pringlei, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 50.—Mexic.
smilacifolia, Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xxi. 134.—Am. bor.
- ZEUXINE**, Lindl. (Orchid.).
andamanica, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 599.—Ins. Andaman.
Batesii, Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr. vii. 182.—Afr. trop.
glandulosa, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 289.—Ind. or.
pulchra, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 127.—Reg. Himal.
pumila, King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 291 (= *Odontochilus pumilus*).—Reg. Himal.
reflexa, King & Pantl. l. c.—Ind. or.
rolfiana, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 699.—Ins. Andaman.
Whiteheadi, Rendle, in Journ. Bot. 1896, 358.—Ins. Philipp.
- ZEXMENIA**, La Llave (Compos.).
aurantiaca, Klatt, ex Th. Dur. & Pittier, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxv. 296.—Am. cent.
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxiii. 489.—Mexic.
- ZEYHERIA**, Mart. (Bignon.).
Kuntzei, K. Schum. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 246.—Bolivia.
- ZILLA**, Forsk. (Crucif.).
spinosa, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. i. II. 148 (= *Bunias spinosa*).—Arab.; Afr. bor.
- ZINGIBER**, Adans. (Scitam.).
brevifolium, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 268.—N. Guin.
chrysostachys, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 129.—Penins. Mal.
citrinum, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
Kunstleri, King, ex Ridley, l. c. 127.—Penins. Mal.
macradenium, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxvii. 269.—Sumatra.
macrocephalum, K. Schum. l. c. (= *Elettaria macrocephala*).—Java.
puberulum, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxii. 130.—Penins. Mal.
striolatum, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 262.—China.
- ZINNIA**, Linn. (Compos.).
Greggii, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 16.—Mexic.
littoralis, Robinson & Greenm. l. c.—Mexic.
- ZIZIPHORA**, Linn. (Labiata).
alpina, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iv. 134 (non Mill.).—As. Min.
- ZIZYPHUS**, Tourn. (Rhamn.).
Hamur, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 19.—Afr. trop.
Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 373.—Penins. Mal.
- ZOLLIKOFERIA**, DC. = **Launaea**, Cass. (Compos.).
Foxii, Post, Fl. Syria, 19.—Syria.
- ZONANTHEMIS**, Greene, Fl. Francisc. 425 (1897). **COMPOSITAE**.
angustifolia, Greene, l. c. (= *Hemizonia angustifolia*).—Calif.
corymbosa, Greene, l. c. (= *Hemizonia corymbosa*).—Calif.
- ZORNIA**, J. F. Gmel. (Legum.).
reptans, Harms, in Engl. Jahrb. xxvii. 406.—Afr. trop.
- ZOSIMA**, Hoffm. (Umbell.).
suffruticosa, Freyn & Bornum. in Bull. Herb. Boiss. v. 621.—Persia.
- ZOYSIA**, Willd. (Gramin.).
Codia, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 8684 = *Paspalum royleanum*.
tremula, Beauv. Agrost. 148 = *Sporobolus tremulus*.
- ZSCHOKKEA**, Muell. Arg. (Apocyn.).
utilis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2637.—Guiana.
- ZYGADENUS**, Michx. (Liliac.).
acutus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 536.—Am. bor.
coloradensis, Rydb. l. c. 534.—Am. bor.
falcatus, Rydb. l. c. 536.—Am. bor.
gramineus, Rydb. l. c. 535.—Am. bor.
intermedius, Rydb. l. c.—Am. bor.
- ZYGIA**, P. Br. = **Pithecolobium**, Mart. (Legum.).
brevifolia, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 78 = P. *brevifolium*.
flexicaulis, Sudw. l. c. = *Acacia flexicaulis*.
guadalupensis, A. A. Heller, Cat. N. Am. Pl. ed. II. 5 = P. *unguis-cati*.
unguis-cati, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 78 = P. *unguis-cati*.
- ZYGIS**, Desv. = **Micromeria**, Benth. (Labiata).
frivaldszkyana, Degen, in Bull. Herb. Boiss. iv. 523.—Turcia.
- ZYGOPETALUM**, Hook. (Orchid.).
ovatilobum, Klinge, in Act. Hort. Petrop. xvii. i. 144.—Bras.
- ZYGOPHYLLUM**, Linn. (Zygophyll.).
hamiense, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. vii. App. II. 277.—Arab.
Hildebrandtii, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 15.—Afr. trop.
hybridum, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xxiii. 291.—Austral.
Kochii, Tate, l. c.—Austral.
latialatum, Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. 244.—Afr. austr.
Pfeillii, Engl. l. c.—Afr. austr.
Robecchii, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, vii. 14.—Afr. trop.
teretifolium, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxvii. 158.—Afr. austr.
- ZYGOSTATES**, Lindl. (Orchid.).
alleniana, Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, ii. 55.—Parag.

SEQUUNTUR QUAE IN INDICE ET SUPPLEMENTIS EMENDANDA ADDENDA HACTENUS OBSERVAVIMUS

a. = adde. d. = dele. l. = lege.

- PAG.
- ACACIA.**
1². a. glaucophylla, *Lem. Hort. Univ.* ii. 234.—Austral.
2². insere ACANTHOSONCHUS, Don, ex Hoffm. in *Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. v. 371 (1893) = *Sonchus*, Tourn. (Compos.).
- ACHRAS.**
2². a. ralphiana, *F. Muell. in Baill. Hist. Pl.* xi. 230.—Austral.
- ACROPERA.**
3¹. a. *luteola*, Drapiez, in *Lem. Hort. Univ.* ii. 128, 331 (= *Gongora galeata*).—Mexic.
- ADESMIA.**
3². a. darapskyana, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, ii. 142.—Chili.
Vallis-pulchrae, *Phil. l. c.* 174.—Chili.
- AERVA.**
4². a. tomentosa, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. cxxii. 170; *Lam. Encyc.* i. 46.—As. et Afr. trop.
- AMOMUM.**
9². a. eriocarpum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 309 (= *Cardamomum eriocarpum*).—Java.
lycostomum, *Lauterb. & K. Schum. ex K. Schum. l. c.* 305 (= *Hornstedtia lycostoma*).—N. Guin.
9². l. phaeochoanum, *K. Schum.*
a. sulcatum, *Oliv. & Hanb. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 304.—Afr. trop.
tridentatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxvii. 309 (= *Cardamomum tridentatum*).—Java.
- AMPHIDONAX.**
9². l. *bifaria*, Nees, ex Steud. . . . 197.
tenella, Wight & Arn. ex Steud. . . . 197.
- AMYRIS.**
10¹. a. simplicifolia, *Karst. Fl. Columb.* ii. 109, t. 158.—Venez.
- ANDROPOGON.**
10². l. *binatus*, Retz. . . . v.
a. *caerulescens*, Kunth, *Enum. Pl.* i. 504 = *micranthus*.
d. *coerulescens*, Kunth,
10². l. *echinulatus*, Steud. . . . 397.
eriphorus, Willd. . . . iv. 910.
ischyranthus, Steud.
lanceolatus, Baker, . . . 444.
11¹. *lianatherus*, Steud.
linnaeanus, *Scribn. & Kearney, monomeros*, Hochst. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 219.
nigrum, Buch.-Ham. ex Hook. f. l. c. 185.
11². *serratus*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 290.
- ANDROSCEPIA.**
11². *mutica*, Anderss. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 217.

- PAG.
- ANEMONE.**
11². a. *Consiligo*, H. Baill. *Iconogr. Fl. Fr. t.* 327 = *Adonis vernalis*.
- ANGELICA.**
11³. a. *setchuenensis*, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 500.—China.
l. *trifoliata*, *Cockayne, . . . xxxi.*
- ANGRAECUM.**
12¹. l. *flabellifolium*, *Rolfe, macrorhynchium*, *Schlechter, rohlfisianum*, *Kraenzl. in Bot. Zeit.* 1882,
12². a. *xanthopollinium*, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvi. 344 (= *Mystacidium xanthopollinium*).—Afr. trop.
- ANHALONIUM.**
12². a. *kotschoubeyanum*, *Lem. Hort. Univ.* vi. 63.—Mexic.
- ANOGR.**
12². l. *gypsophila*, A. A. Heller,
- ANTENNARIA.**
12³. l. *Farwellii*, *Greene, . . . 347.*
13¹. *media*, *Greene, . . . 286.*
- ANTHEMIS.**
13¹. l. *Gaudium-solis*, *Vel. . . . 152.*
rouyana, *Aznav. . . . xlv. 171.*
- ANTHOLYZA.**
13³. a. *abyssinica*, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iv. 207.—Afr. trop.
- ANTHURIUM.**
13³. a. *cordifolium*, *Lem. Hort. Univ.* v. 356.—Bras.
14¹. l. *lindmanianum*, *Engl.*
longiscuspidatum, *Engl. . . . 415.*
theresiopolitanum, *Engl.*
- ANTIRRHOEA.**
14². l. *radiata*, *Urb. . . . (= Stenostomum radiatum).*
—Ind. occ.
- 14². l. *APHANAMIXIS*, Blume, •
- APHANOPAPPUS.**
14². l. *micranthus*, Heller, in *Minnes. Bot. Studies*, i. 915.
- APHANOPLEURA.**
14². a. *trachycarpa*, Lipsky, in *Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* iv. 375 = *trachysperma*.
- AQUILEGIA.**
15¹. l. *Darwazi*, *Korsh. . . . Sér. V.* ix.
- ARDISIA.**
16¹. a. *brandneriana*, L. Lind. in *Sem. Hort.* 1900, 472 = *Parathesis crenulata*.
l. *diversiflora*, *Koord. & Valet.*

- PAG.
- AREGELIA.**
16¹. l. *leucophoea*, Mez,
- ARENARIA.**
16¹. l. *Baldacii*, *Halacsy, Benthani*, Edgew.
a. *bulica*, *Stapp, ex F. N. Williams in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. 374.—Persia.
glandulosa, *F. N. Williams, l. c.* 431 (= *Odontostemma glandulosum*).—Reg. Himal.
16². *tenella*, *Duthie, ex F. N. Williams, l. c.* 356.—Ind. or.
- ARGYREIA.**
16². a. *choisyana*, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iv. 257.—Ind. or.
- 16². l. **ARGYROCALYMMA**, K. Schum. & Lauterb.
- ARISTEA.**
16². a. *pauciflora*, *Wolley Dod, in Journ. Bot.* 1900, 171.—Afr. austr.
- ARISTIDA.**
16². l. *adscendens*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vii. 225 = *setacea*.
decorata, Steud. . . . 421.
dispersa, Trin. & Rupr. . . . 129.
funicularis, Edgew.
Heymanni, Regel,
Kelleri, *Hack. ex Schinz, . . . 8.*—Afr. trop.
17¹. l. *linearifolia*, Rottl.
- ARMARINTEA.**
17². l. *Morisoni*, Bub.
- ARPOPHYLLUM.**
17². a. *laxiflorum*, *Pfitzer, in Gartenwelt*, iii (1898) 138.—Hab. †
- ARTHATHERUM.**
18¹. l. *ciliatum*, Nees, . . . 289.
- ARUNDINARIA.**
18¹. a. *anceps*, *Mitford, Bamb. Gard.* 181.—Hab. ?
diversifolia, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 19, nomen.—Japon.
Kokantsik, *Kurz, l. c.*—Japon.
Kumasasa, *Kurz, l. c.*—Japon.
18². l. *nobilis*, *Mitford, . . . 178.*
a. *pygmaea*, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 19, nomen.—Japon.
siamensis, *Kurz, l. c.*—Siam.
- ARUNDINELLA.**
18². a. *campbelliana*, *Lisboa, in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* v. 346.—Ind. or.
Ritchei, *Munro, ex Lisboa, l. c.* 343.—Ind. or.
l. *tuberculata*, *Munro, ex Lisboa, l. c.* 344.—Ind. or.

PAG.

ARUNDO.

- 18². a. *barbata*, Burch. Trav. ii. 271 = *Phragmites communis*.
 l. *longifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 303.
 18³. *reynaudiana*, Kunth, . . . 275.
tibialis, Roxb. . . n. 5017 G.
triflora, Roxb. ex Hook. f. Brit. Fl. Ind. vii. 303.

ASARUM.

- 18³. a. *Shuttleworthii*, Britten & Baker f. in Journ. Bot. 1898, 98.—Am. bor.

ASCLEPIAS.

- 18³. a. *acerateoides*, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 454 (= *Gomphocarpus acerateoides*).—Afr. austr.
adscendens, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus adscendens*).—Afr. austr.
affinis, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus affinis*).—Afr. austr.
aurea, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus aureus*).—Afr. austr.
brevipes, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus brevipes*).—Afr. austr.
chloroglossa, Schlechter, l. c. 454 (= *Xysmalobium involucreatum*).—Afr. austr.
concinna, Schlechter, l. c. 456 (= *Gomphocarpus concinnus*).—Afr. austr.
confusa, Schlechter, l. c. 454 (= *Xysmalobium confusum*).—Afr. austr.
cucullata, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus cucullatus*).—Afr. austr.
depressa, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus depressus*).—Afr. austr.
eminens, Schlechter, l. c. 453 (= *Gomphocarpus eminens*).—Afr. austr.
fallax, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus fallax*).—Afr. austr.
Flanaganii, Schlechter, l. c. 454 (= *Gomphocarpus asclepiaceus*).—Afr. austr.
flexuosa, Schlechter, l. c. 453 (= *Gomphocarpus flexuosus*).—Afr. austr.
 l. *foliosa*, Hiern, . . . 686.
 a. *Galpinii*, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 455 (= *Gomphocarpus Galpinii*).—Afr. austr.
geminiflora, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus geminiflorus*).—Afr. austr.
Gerrardii, Schlechter, l. c. 453 (= *Gomphocarpus Gerrardii*).—Afr. austr.
glaucophylla, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus glaucophyllus*).—Afr. austr.
harveyana, Schlechter, l. c. 456 (= *Xysmalobium pedunculatum*).—Afr. austr.
insignis, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus insignis*).—Afr. austr.
linearis, Schlechter, l. c. 453 (= *Gomphocarpus linearis*).—Afr. austr.
Mackenii, Schlechter, l. c. 454 (= *Gomphocarpus M'Kenii*).—Afr. austr.
macra, Schlechter, l. c. 456 (= *Gomphocarpus suaveolens*).—Afr. austr.
macropus, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus macropus*).—Afr. austr.
macrosperma, Eastw. ex Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1898, 172.—Am. bor.
meliodora, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 455 (= *Gomphocarpus meliodorus*).—Afr. austr.
ochroleuca, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus ochroleucus*).—Afr. austr.
orbicularis, Schlechter, l. c. 454 (= *Xysmalobium orbiculare*).—Afr. austr.
oxytropis, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus oxytropis*).—Afr. austr.
pachyglossa, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus pachyglossus*).—Afr. austr.
pachystephana, Schlechter, l. c. 454 (= *Gomphocarpus pachystephanus*).—Afr. austr.
 19¹. *rectinervis*, Schlechter, l. c. 456 (= *Gomphocarpus rectinervis*).—Afr. austr.
rivularis, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus rivularis*).—Afr. austr.
sabulosa, Schlechter, l. c. 454 (= *Gomphocarpus arenarius*).—Afr. austr.
scabra, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus scaber*).—Afr. austr.
scabridifolia, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus ovatus*).—Afr. austr.

PAG.

ASCLEPIAS.

- 19¹. a. *schinziana*, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 455 (= *Gomphocarpus schinzianus*).—Afr. austr.
 l. *schumanniana*, Hiern, . . . 686.
 semiamplectens, Hiern, . . . 685.
 a. *simplex*, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 455 (= *Gomphocarpus simplex*).—Afr. austr.
stockenstromensis, Schlechter, l. c. 454 (= *Xysmalobium stockenstromensis*).—Afr. austr.
sulphurea, Schlechter, l. c. (= *Xysmalobium parviflorum*).—Afr. austr.
 l. *tenuiflora*, Schlechter,
 a. *tenuis*, Schlechter, in Journ. Bot. 1896, 454 (= *Lagarinthus tenuis*).—Afr. austr.
transvaalensis, Schlechter, l. c. 455 (= *Gomphocarpus transvaalensis*).—Afr. austr.
valida, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus validus*).—Afr. austr.
velutina, Schlechter, l. c. (= *Gomphocarpus velutinus*).—Afr. austr.
Woodii, Schlechter, l. c. 456 (= *Gomphocarpus Woodii*).—Afr. austr.

ASPARAGUS.

- 19¹. l. *Lowei*, Kunth, . . . 73.
 19². *spinescens*, Steud. . . 334.
suaveolens, Burch. . . ii. 226.

ASPERULA.

- 19². a. *Sherardia*, H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 320 = *Sherardia arvensis*.

ASPIDIXIA.

- 19². l. *capensis*, Van Tiegh. . . 193.

ASPILIA.

- 19³. l. *monocephala*, Baker,

ASSONIA.

- 19³. l. *huillensis*, Hiern, . . . 85.

ASTER.

- 19³. a. *anethifolius*, Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 129 (= *Haplopappus anethifolius*).—Chili.
 20¹. *sandwicensis*, Hieron. in Engl. Jahrb. xxix. 20.—Ins. Sandw.
 l. *staehelinodes*, Kuntze, subspatulatus, Rydb. . . 395.
 20². d. *Wilsonii*, Greene,
ASTERISCUS.
 20². l. *Morisoni*, Bub.
ASTRAGALUS.
 20¹. l. *akscheherensis*, Freyn & Bornm.
 a. *azureus*, Phil. ex Reiche, Fl. Chile, ii. 91.—Chili.
 20³. d. *cerbicus*, Panç.
 l. *exillifolius*, A. Nelson,
 21¹. *junciformis*, A. Nelson, . . . 9.
 d. *Mulkak*, Lipsky,
 l. *palouensis*, Piper, . . . xxii. 489.
 21². *taldicensis*, Franch.
zebedaniensis, Freyn & Bornm.

- 21³. *insere* ASTROTHERCA, Miers, ex Planch. & Triana, Mem. Guttif. 100 (1862) = ASTROTHERCA, Miers = *Clusia*, Linn. (Guttif.).
cuspidata, Vesque, Epharm. iii. 16, t. 81 = *C. axillaris*.

ATAXIA.

- 21³. l. *Ecklonis*, Nees, . . . 77.
tenuis, Trin. . . 78.
Tongo, Nees, ex Trin. . . 78.

- 21³. l. **ATRACTOGYNE**, Pierre, . . . ii. (1896) 1261.

ATRIPLEX.

- 22¹. l. *kochiana*, Maiden, . . . xxi. 87.

ATTALEA.

- 22¹. d. *Boehmii*, Drude,

ATYLOSIA.

- 22¹. l. *crassa*, King, . . . 45.

- 22¹. l. **AUCOUMEA**, Pierre, . . . ii. (1896) 1241.

AVENA.

- 22². l. *airoides*, Koel. . . 298.

PAG.

AVENASTRUM.

- 22². l. *longum*, Stapf, . . . 473.
quinquesetum, Stapf, . . . 474.

BACCHARIS.

- 23¹. l. *macrocephala*, Sch. Bip. . . 575.—Mexic.

BACTRIS.

- 23¹. l. *lindmaniana*, Drude,

BAHIA.

- 23¹. l. *xylopoda*, Greenm. . . xxxiv. 577.—Mexic.

BAISSEA.

- 23¹. l. *Bailloni*, Hua, . . . n. s. i. 8.
floribunda, Hua, . . . n. s. i. 12.
 23². *micrantha*, Hua, . . . n. s. i. 11.

BALSAMODENDRUM.

- 23². a. *simplicifolium*, Auct. in Kew Bull. 1896, 91 = *C. simplicifolia*.

BAMBUSA.

- 23². l. *auriculata*, Kurs, . . . 286.

BANARA.

- 23². l. *portoricensis*, Krug & Urb. . . Ind. occ.

BARLERIA.

- 24¹. l. *longissima*, Lindau, . . . 73.
 24². *Phillipseae*, Rendle, . . . Afr. trop.
rotundisepala, Rendle, . . . Afr. trop.
 a. *Ruspolii*, Lindau, in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. 74.—Afr. trop.
 l. *Stuedneri*, C. B. Clarke, . . . 153.
waggana, Rendle, . . . Afr. trop.

BASEONEMA.

- 24². l. *Gregorii*, Schlechter & Rendle, . . . Afr. trop.

- 24². l. **BAUERELLA**, Borzi, . . . i. (1898) 153.

BAUHINIA.

- 24³. a. *Kurzii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxvi. 499.—Burma.
 l. *stenostachya*, Baker,

- 24³. l. **BAUMANNIA**, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1897) 455. RUBIACEAE.

BECKWITHIA.

- 25¹. a. *Andersonii*, Jepson, in Erythea, vi. 99.—Calif.
 l. *Austiniae*, Jepson, l. c. 97 = *Andersonii*.

BEGONIA.

- 25¹. l. *Heddei*, Warb. . . Afr. trop.
 a. *lindeniana*, Brongn. in Lem. Hort. Univ. iv. 42.—Mexic.
manicata, Brongn. l. c. 33.—Mexic.
peponifolia, Brongn. l. c. 42.—Mexic.
 l. *Weigallii*, Hemsl. . . 1896, 17.

BELMONTIA.

- 25². l. *primulaeflora*, Schinz, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, xxxvii. 332.

BELOPERONE.

- 25². a. *Matthewsii*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. vi. App. I. 30 (= *Justicia Matthewsii*).—Parag.

BERBERIS.

- 25². l. *haematocarpa*, Wootton, . . . 1898, 304.

BERGIA.

- 25². l. *pentheriana*, Keissl. ex A. Zahlbr.

BERMUDIANA.

- 25³. l. *humilis*, Kuntze, . . . 307.
leucantha, Kuntze, . . . 307.
rigidifolia, Kuntze, . . . 308.

BETONICA.

- 26¹. a. *recta*, H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 208 = *S. recta*.

BIDENS.

- 26¹. l. *Nashii*, Wootton, . . . 1898, 481.

BIFARIA.

- 26¹. l. *albicans*, Van Tiegh. . . Ins. Societ.
 26². *Lepini*, Van Tiegh. . . Ins. Societ.
multicostata, Van Tiegh. . . 167.—Ins. Sandw.

- PAG. **BIFARIA** :—
 26². a. multiramosa, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. 175.—Reg. Himal.
 1. platycaula, *Van Tiegh. . . . Ins. Societ. polystachya, Van Tiegh. rubescens, Van Tiegh. . . . Ins. Societ.*
- BIGNONIA**.
 26². a. chrysophylla, *Klotzsch, in Schomb. Reisen Brit. Guiana*, iii. 969.—Guiana.
 reticulata, *Poepp. ex Bur. & K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* viii. II. 82.—Peruv.
 robusta, *Klotzsch, in Schomb. Reisen Brit. Guiana*, iii. 969.—Guiana.
 stricta, *Klotzsch, l. c.*—Guiana.
 surinamensis, *Klotzsch, l. c.*—Guiana.
 tubulosa, *Klotzsch, l. c.*—Guiana.
- 26³. insere **BLEPHARIDACHNE**, *Hack. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. ii. II. 126 (1887). GRAMINEAE.*
 Bigelovii, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. 261.—Am. bor.
 Kingii, *Hack. l. c.*—Calif.
- BLEPHAROCALYX**.
 26². 1. *angustifolius*, *Berg. . . . 413.*
- BOERHAAVIA**.
 27¹. d. *rufopilosa*, *Kuntze,*
- BOISDUVALIA**.
 27¹. 1. *parviflora*, *A. A. Heller, . . . 1898, 199.*
- 27². 1. **BONNIERA**, *Cordem.*
- BORNMUELLERA**.
 27². 1. *Tymphaea, Hausskn. . . . (= Vesicaria Tymphaea)*,—Gracia.
- BORRERIA**.
 27². 1. *tenella*, *Cham. & Schlecht. . . . 317.*
- BRACHYCHITON**.
 28¹. d. *diversifolius*, *Terr.*
- BRACHYCORYTHIS**.
 28². 1. *briartiana, Kraenzl. Buchanania, Rolfe,*
- BRACHYSTELMA**.
 28². 1. *caffrum*, *Schlechter, in Engl. Jahrb. xviii. Beibl. xlv. 13 = meyerianum.*
- BRACHYSTELMARIA**.
 28². a. *occidentalis, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 293 (= Brachystelma occidentale)*,—Afr. austr.
- BRILLANTAISIA**.
 28³. a. *anomala, Lindau, in Engl. Jahrb. xxiv. 312.*—Afr. trop.
- BRIZOPYRUM**.
 29¹. 1. *capense, Trin. ex Nees, Fl. Afr. Austr. 371. mucronatum, Nees, . . . no. 8898.*
- BRODIAEA**.
 29¹. a. *poepigiana, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. 112.*—Chili.
 uniflora, *Engl. in Engl. & Prantl. Pflanzenf. ii. v. 57.*—Reg. Argent.
- BROMUS**.
 29². 1. *multiflorus, Scribn. . . . xiii. 46. pacificus, Shear, . . . 38.*
- BRONNIA**.
 29². 1. *Digueti, Van Tiegh. Thiebauti, Van Tiegh.*
- 29². 1. **BRUINSMIA**, *Boerl. & Koord. . . . liii. (1893) 68, t. 1.*
- 29². insere **BRUNFELSIOPSIS**, *Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1897) 324. SOLANACEAE.*
americana, Urb. l. c. 325 (= Brunfelsia americana),—Am. trop.
- BUCKLEYA**.
 29². a. *Joan, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xii. (401) (= Calycopteris Joan)*,—Japan.
- PAG. **BUDDLEIA**.
 29². 1. *montana, Britton, . . . 1893, 544.*
- BULBINE**.
 30¹. a. *flexicaulis, Baker, in Dyer, Fl. Cap. vi. 365.*—Afr. austr.
 1. *Zeyheri, Baker, . . . 347.*
- BULBINOPSIS**.
 30¹. a. *bulbosa, Borzi, in Boll. Ort. Bot. Palermo, i. 21.*—Austral.
- BULBOPHYLLUM**.
 30¹. a. *Bakossorum, Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 280, nomen.*—Afr. trop.
 30². 1. *Ridleyi, Kraenzl. . . . Madag. sessiliflorum, Wendl. & Kraenzl. in Xenia Orch. iii. 156, t. 290.*—Afr. trop.
 a. *Taylori, F. Muell. Fragm. viii. 150 = Dendrobium hispidum, A. Rich.*
- BULBOSTYLIS**.
 30². a. *micans, Lindm. in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvi. no. 9, 17.*—Bras.
- BUPLEURUM**.
 30². 1. *thianschanicum, Freyn, . . . Turkestan.*
- BYRSONIMA**.
 31¹. a. *fagifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Pflanzenf. Nachtr. I. 207.*—Bras.
grisebachiana, Niedenzu, l. c.—Bras.
oblanceolata, Niedenzu, l. c.—Bras.
- BYSTROPOGON**.
 31¹. a. *uniflorus, Rusby, ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. iv. 802.*—Bolivia.
- CACALIA**, *Linn.*
 31². 1. *nikomontana, Matsum. . . . 84.*
- CAIOPHORA**.
 31³. a. *cymbifera, Urb. & Gilg, in Nov. Act. Nat. Cur. lxxvi. 281.*—N. Granat.
- CALAMAGROSTIS**.
 31³. 1. *debilis, Hook. f. . . . 262.*
 32¹. a. *vilfaeformis, Kearney, in U. S. Dept. Agric. Bull. Agrost. xi. 20.*—Calif.
- CALAMINA**.
 32¹. 1. *humilis, Presl, Reliq. Haenk. i. 344 = A. varia.*
- CALAMUS**.
 32¹. 1. *Jaboolum, F. M. Bailey, in Bot. Bull.*
- CALANDRINIA**.
 32¹. a. *columbiana, Howell, ex A. Gray, in Proc. Amer. Acad. xxii. 277.*—Am. bor.
 1. *Grayi, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1890, 312.*—Am. bor.
Tweedyi, A. Gray, in Proc. Amer. Acad. xxii. 277.—Am. bor.
- CALEA**.
 32². a. *hypoleuca, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxii. 24.*—Mexic.
- CALOTHECA**.
 32³. 1. *elegans, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. 301, errore = Calotheria elegans.*
 32³. insere **CALOTHERIA**, *Wight & Arn. ex Stend. Syn. Pl. Gram. 199 (1855) = Pappophorum, Schreb. (Gramin.) elegans, Wight & Arn. l. c. = P. elegans.*
- CALPURNIA**.
 33¹. 1. *Woodii, Schinz, . . . 426.*
- CALYCERA**.
 33¹. a. *foliosa, Phil. ex Reiche, in Engl. Jahrb. xxix. 117.*—Reg. Andin.
- CALYSTEGIA**.
 33¹. 1. *discolor, Damm. . . . Beibl. Iviii. 42.*
- CAMAROTIS**.
 33². a. *obliquirostris, Parish, ex King & Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calc. viii. 238 = S. obtusus.*
- PAG. **CAMELLIA**.
 33². a. *Bonnardii, Berlèse, in Lem. Hort. Univ. iii. 161.*—Hort.
- CAMPYLOCENTRON**.
 33³. a. *filiforme, Cogn. in Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 298.*—Reg. Argent.
- CANAVALIA**.
 33³. a. *gaudichaudiana, Lem. Hort. Univ. iv. 129.*—Hab.?
- CANDOLLINA**.
 33³. a. *Barthei, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. 269.*—Ins. Philipp.
- CANTHIUM**.
 33³. a. *anomocarpum, DC. Prod. iv. 475 = P. anomocarpa.*
- CAPSICUM**.
 34¹. a. *albescens, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 218 (= Poecilochroma albescens)*,—Bolivia.
- CARAGUATA**.
 34¹. a. *penduliflora, Wittm. in Engl. Jahrb. xi. 59 (= Tillandsia penduliflora)*,—Ind. occ.
- CARALLUMA**.
 34¹. a. *compta, Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 479 (= Piaranthus comptus)*,—Afr. austr.
decora, Schlechter, l. c. 478 (= Piaranthus decorus),—Afr. austr.
geminata, Schlechter, l. c. (= Piaranthus geminatus),—Afr. austr.
grivana, Schlechter, l. c. 479 (= Piaranthus grivanus),—Afr. austr.
intermedia, Schlechter, l. c. 478 (= Stapelia intermedia),—Afr. austr.
punctata, Schlechter, l. c. (= Piaranthus punctatus),—Afr. austr.
serrulata, Schlechter, l. c. (= Piaranthus serrulatus),—Afr. austr.
- CARDAMINE**.
 34². 1. *Enysii, Cheesem.*
- 34². a. **CARDANTHERA**, *Buch.-Ham. in Voigt, Hort. Sub. Calc. 482 (1845). ACANTH. triflora, Buch.-Ham. l. c.*—Ind. or.; Malaya.
- CARDUUS**.
 34². 1. *leiocephalus, A. A. Heller,*
- CAREX**.
 34³. a. *arizonensis, Kuek. in Engl. Jahrb. xxvii. 549.*—Am. bor.
 1. *Bormuelleri, Kuek.*
 35¹. *Nebularum, R. Phil. Novae-Zelandiae, Petrie, oreocharis, Holm, . . . 1900, t. 358.*
 35². a. *Savatieri, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Par. Sér. III. x. 71.*—Japon.
 1. *Thomsoni, Petrie,*
- CARICA**.
 35². a. *tunariensis, K. Schum. in Fust. Jahrb. xxvi. I. 345 (= Papaya tunariensis)*,—Bolivia.
- CASSYTHA**.
 36². 1. *pondoensis, Engl. . . . Afr. austr.*
- CATTLEYA**.
 37¹. a. *concolor, Drapiez, in Lem. Hort. Univ. ii. 128, 197 = harrisoniana.*
Grossii, Kraenzl. in Gartenf. 1897, 113.—Bras.
harrisoniana, Batem. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1919.—Bras.
- CAYAPONIA**.
 37¹. 1. *dubia, Rose,*
- CENCHRUS**.
 37². 1. *bulbifer, Hochst. . . . 448. frutescens, Sieb. in Flora, 1822, 14.*
 37³. *quinquevalvis, Buch.-Ham. . . . 8654 C.*
- CENTAUREA**.
 37³. a. *laureotica, Heldr. ex Halacsy, in Bull. Herb. Boiss. vi. 590.*—Eur.
 1. *Linaresii, Las. paucijuga, Halacsy, saxifraga, Coincy, in Journ. de Bot. 1897, 45.*

- PAG. **CENTAUROPSIS.**
37³. a. rhaponticoides, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1899, 102 (= *Vernonia rhaponticoides*).—Madag.
- CENTELLA.**
38¹. a. *linifolia*, *Drude, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. VIII. 120 = *H. Centella*.
- CERASTIUM.**
38². l. *sordidum*, *Robinson, . . . xxx.* 58.
- CEREUS.**
38³. a. *andalgalensis*, *Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 168.—Reg. Argent.
l. *Candelabrum*, *Web. ex K. Schum.*
a. *fascicularis*, *K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 57 (= *Cactus fascicularis*).—Peruv. *gladilger, Lem. Hort. Univ.* vi. 60.—Hab. ?
horrens, *Lem. l. c.*—Hab. ?
l. *maritimus*, *Jones, ex Coult.*
a. *monacanthus*, *Cels. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 142 = *Martini*.
monacanthus, *Lem. Hort. Univ.* vi. 60.—N. Granat.
northumberlandianus, *Lambert, in Loudon, Gard. Mag.* (1841) 91; *et in Lem. Hort. Univ.* ii. 318.—Ind. occ.
Pfersdorffii, *Hildm. ex K. Schum. l. c.* 125 = *gummosus*.
l. *sanborgianus*, *Coult. . . .* 391.
a. *Schickendantzii*, *Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt.* i. 238.—Reg. Argent.
- 39¹. l. *thelegonus*, *A. Web.*
- CESTRUM.**
39¹. l. *sparsiflorum*, *Britton,*
- CHAENACTIS.**
39¹. l. *orcuttiana*, *Parish, in Erythea,* vi. 92.
- CHAENOSTOMA.**
39². l. *divaricatum*, *Diels, . . . Afr. austr.*
gracile, *Diels, . . . Afr. austr.*
- CHAETOBROMUS.**
39². l. *interceptus*, *Nees, . . .* 342.
- 39³. l. *CHALMERSIA*, *F. Muell. in Melb. Chem. & Drug. June 1884; et ex S. Moore, in Journ. Bot.* 1899, 174.
- CHAMAERAPHIS.**
40¹. l. *rhachitricha*, *Kuntze,*
- CHEIROSTYLIS.**
40². d. *heterosepala*, *Rolfe,*
a. *lepida*, *Rolfe, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 182.—Afr. trop.
- CHISOCHETON.**
40³. a. *macrophyllum*, *Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IV. 295 (= *Melioschinzia macrophylla*).—N. Guin.
- CHLOROPHYTUM.**
41³. a. *Menyharthii*, *Schins, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* vii. 508.—Afr. trop.
- 41³. l. *CHORISTIGMA*, *Kurtz (Asclep.). stuckertianum, Kurtz,*
- CHRYSASPIS.**
41³. a. *procumbens*, *Greene, Pittonia,* iii. 206 = *T. procumbens*.
- CHRYSOPOGON.**
42¹. l. *asper*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 189 = *Andropogon asper*.
- CHRYSOTHAMNUS.**
42². l. *affinis*, *A. Nelson, . . . xxviii.*
oreophilus, *A. Nelson, . . . xxviii.*
wyomingensis, *A. Nelson, . . . xxviii.*
- CIRRHOPETALUM.**
42³. a. *griffithianum*, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. 153 (Bulbophylli §) = *gamosepalum*.
l. *kamesinum*, *Zahlbr. . . . (1900) 192.*—Madag. ?
a. *merguense*, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. 154 (Bulbophylli §).—Burma.
- PAG. **CLADOCOLEA**, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 166. **LORANTHACEAE.**
Andrieuxii, *Van Tiegh. l. c.* 167.—Mexic.
Grahami, *Van Tiegh. l. c.* 168 (= *Loranthus Grahami*).—Mexic.
Oerstedii, *Van Tiegh. l. c.* (= *Loranthus Oerstedii*).—Am. cent.
tehuacanensis, *Van Tiegh. l. c.* (= *Loranthus tehuacanensis*).—Mexic.
- 43¹. l. **CLADOPUS**, *Moeller.*
- CLAUSENA.**
43². l. *Forbesii*, *Engl. . . .* 188.
- CLEISOSTOMA.**
43². l. *micranthum*, *King & Pantl. . . .* 234.
- CLEOME.**
43². d. *polyandra*, *Rose,*
- CLEOMELLA.**
43². l. *gracilis*, *Brandegge, . . . xxvii.* 444.
- CLITANDRA.**
44². l. *killimandjarica*, *Warb.*
- COCCINIA.**
44². l. *Dinteri*, *André, . . .* 268.
- COCHLIODA.**
44². l. *stricta*, *Cogn. . . .* 1897, II. 410.
- COELACHYRUM.**
44². l. *poaeiflorum*, *Chiov.*
- COELOGYNE.**
45¹. a. *cinnamomea*, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxiv. (1862) 306.—Borneo.
elegans, *Ind. Kew. Suppl. I.* 105, errore = *Cyrtopodium elegans*.
rubens, *Ind. Kew. Suppl. I.* 105, errore = *Calanthe rubens*.
- 45¹. a. **COELONEURUM**, *Radlk. (Solan.). ferrugineum, Urb. Symb. Antill. i.* 380 = *lineare*.
- COIX.**
45¹. l. *Koenigii*, *Spreng. . . .* 239.
Ma-Yü'en, *Romanet, . . . Sér. III.*
- 45². insere **COLEOBOTRYS**, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 482. **LORANTHACEAE.**
acuminata, *Van Tiegh. l. c.* 485.—Java.
alata, *Van Tiegh. l. c.* 542.—Sumatra.
crassisepala, *Van Tiegh. l. c.* 485 (= *Loranthus crassiseptalus*).—Penins. Mal.
cylindrica, *Van Tiegh. l. c.* (= *Loranthus cylindricus*).—Sumatra.
heterantha, *Van Tiegh. l. c.* 484 (= *Loranthus heteranthus*).—Burma; Malaya.
Lobbii, *Van Tiegh. l. c.* 542 = *rubra*.
macklottiana, *Van Tiegh. l. c.* 484 (= *Loranthus macklottianus*).—Sumatra.
raphidophora, *Van Tiegh. l. c.* 485.—Java.
rubra, *Van Tiegh. l. c.* 542.—Java.
Zollingeri, *Van Tiegh. l. c.* 485.—Java.
- COLLEONEMA.**
45². a. *barosmoides*, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxvii. 163, nomen.—Afr. austr.
- COLEUS.**
45³. a. *personatus*, *Lem. Hort. Univ.* vi. 128, 292.—Hab. ?
Schweinfurthii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 432 = *C. Sodalium*.
- COLUMNEA.**
46¹. a. *crassifolia*, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* v. 356; vi. 203.—Mexic.
Lindenii, *Brongn. l. c.* iii. 129.—Mexic.
- COMBRETUM.**
46¹. l. *bongense*, *Engl. ex Engl. & Diels, calobotrys, Engl. & Diels, . . .* 73.
46². *Goetzei*, *Engl. & Diels, . . .* 97.
46³. a. *Teussii*, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pf.* iii. 60 = *Theuschii*.
l. *verticillatum*, *Engl. ex Engl. & Diels,*
- PAG. **COMMIPHORA.**
46³. l. *Antunesi*, *Engl. . . .; et in Engl. Jahrb.* xxvi. 370.
a. *Playfairii*, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. iv. 253 (= *Balsamodendrum Playfairii*).—Afr. trop.
Robecchii, *Engl. l. c.* 252.—Afr. trop.
rostrata, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Roxburghii, *Engl. l. c.* 253 = *C. Mukul.*
simplicifolia, *Schweinf. in Kew Bull.* 1896, 90.—Arab.
- CONANTHUS.**
47¹. l. *pusillus*, *Lemmon, ex A. A. Heller.*
- CONVOLVULUS.**
47². l. *hirsutiflorus*, *Damm. . . . xxiii. Beibl. lvi.* 41.
furamentii, *Kuntze, . . .* 217.
phylosepalus, *Hallier f. Ruspolti, Damm. . . .* vii.
Volkensii, *Kuntze, . . .* 211.
- COPAIBA.**
47². a. *Kuntzei*, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 56 = *Copaifera Kuntzei*.
- COPAIFERA.**
47². l. *Demeusei*, *Harms, . . .; et in Engl. Jahrb.* xxvi. 264.
- CORDIA.**
47³. a. *pauciflora*, *Rusby, in Mem. Torr. Bot. Club,* vi. 83.—Bolivia.
- CORNUS.**
48¹. l. *Bretschneideri*, *L. Henry, quinquenervis, Franch.*
- CORREA.**
48¹. a. *longiflora*, *Paxton, Mag. Bot.* vii. 195.—Hybr.
- CORYDALIS.**
48¹. a. *balsamiflora*, *Praim, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxv. 41.—China.
- COTULA.**
48³. a. *Muelleri*, *T. Kirk, Fl. N. Zeal.* 324.—Ins. Chatham.
- COUSINIA.**
48³. l. *albescens*, *Winkl. & Strauss, . . .* xiv.
a. *Korowiakowi*, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. 226.—Persia.
- CRAMBE.**
49¹. a. *darwasicca*, *Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V.* ix. 423.—Turkestan.
schugnana, *Korsh. l. c.* 422.—Turkestan.
- CRASSULA.**
49¹. a. *Aitoni*, *Britten & Baker f. in Journ. Bot.* 1897, 480.—Afr. austr.
49². *Harveyi*, *Britten & Baker f. l. c.* 479.—Afr. austr.
- CRYPTOLEPIS.**
51². a. *oblongifolia*, *Schlechter, in Journ. Bot.* 1896, 315 (= *Ectadiopsis oblongifolia*).—Afr. austr.
transvaalensis, *Schlechter, l. c.* (= *Ectadiopsis cryptolepioides*).—Afr. austr.
- CYNOSURUS.**
53². a. *paniculatus*, *Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 297 = *Dinebra arabica*.
- CYPHOCARPA**, *Lopr. (Amarant.).*
54¹. a. *angustifolia*, *Lopr. in Engl. Jahrb.* xxvii. 45 (= *Sericocoma angustifolia*).—Afr. austr.
trichinoides, *Lopr. l. c.* (= *Sericocoma trichinoides*).—Afr. austr.
Zeyheri, *Lopr. l. c.* (= *Trichinium Zeyheri*).—Afr. austr.
- DACTYLIS.**
54³. a. *cynosuroides*, *Koen. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. 297 = *Dinebra arabica*.
- DENDROBIUM.**
57¹. a. *speciosissimum*, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1895, 119, 240.—Borneo.

PAG.

DESMODIUM.

- 57³. a. huillensis, *Welw. in Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 243.*—Afr. trop.

DETRIS.

- 57³. a. *fascicularis*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 159 = *F. muricata*.
simulans, S. Moore, l. c. = *Aster simulans*.
tenella, Schlechter, in Journ. Bot. 1899, 370 = *F. fragilis*.

DICHAELIA.

- 58². a. *filiformis*, Schlechter, in Journ. Bot. 1897, 293 = *B. filiforme*.
ovata, Schlechter, l. c. = *B. ovatum*.

DICHOPSIS.

- 58³. a. *oblongifolia*, *Burck, Rapp. Expl. Recherche Gutta-Percha, 17.*—Penins. Mal.

DIOSCOREA.

- 60¹. a. *dejantiana*, *Lem. Hort. Univ. v. 355.*—Bras.
60². *spiralis*, *Lem. l. c. ; vi. 189.*—Bras.

DOMBEYA.

- 62³. a. *arabica*, Baker, in Kew Bull. 1895, 315 = *Glossostemon Bruguieri*.

DRACOCEPHALUM.

- 63². a. *louisianum*, *Hort. in Lem. Hort. Univ. iv. 298.*—Hab. ?

DYSCHORISTE.

- 64². a. *heudelottiana*, *Kuntze, Rev. Gen. ii. 486.*—Afr. trop.
multicaulis, *Kuntze, l. c.*—Afr. trop.
Perrottettii, *Kuntze, l. c.*—Afr. trop.
thunbergii, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 302.*—Afr. trop.
trichocalyx, *Lindau, in Engl. Pf. Ost-Afr. C. 367.*—Afr. trop.

ECHINOCACTUS.

- 65¹. a. *teretispinus*, *Lem. Hort. Univ. vi. 60.*—Mexic.

- 67³. insere EPIDENDROIDES, Soland. in Journ. Bot. (1897) 192 = *Myrmecodia*, Jack (Rubiaceae).
tetrandra, Soland, l. c. = *M. Beccarii*.

EPILOBIUM.

- 68¹. a. *intermedium*, *Bory, in Thore, Promen. Gascogne, 24.*—Gallia.

EPIPHYLLUM.

- 68². a. *purpurascens*, *Lem. Hort. Univ. ii. 349.*—Hab. ?

ERANTHEMUM.

- 69¹. a. *paniculatum*, *Blume, Bijdr. 791.*—Java.

EREMIA.

- 69¹. a. *rhodopis*, *Bolus, in Journ. Bot. 1894, 239.*—Afr. austr.

- 69¹. a. EREMOCHLOE, S. Wats. = *Blepharidachne*, Hack. (Gramin.).
Bigelovii, S. Wats. in Bot. King's Exped. 382 = *B. Bigelovii*.
Kingii, S. Wats. l. c. t. 40 = *B. Kingii*.

ERIA.

- 69². a. *sedifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 786, errore = *dasyphylla*.

ERICA.

- 69³. a. *ramentacea*, *Linn. Mant. i. 65; Syst. Nat. ed. XII. 269.*—Afr. austr.
straminea, *Wendl. Eric. ii. fasc. XXVI-XXVII. 19.*—Afr. austr.

ERIOCAULON.

- 70¹. a. *Brunonis*, *Britten, in Journ. Bot. 1900, 482.*—Austral.
Koernickei, *Britten, l. c. 481.*—Bras.

EUONYMUS.

- 73¹. a. *adenophorus*, Scort. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxv. 351 = *Lophopetalum oblongifolium*.
mammillaris, Scort. l. c. 350 = *Lophopetalum Scortechinii*.

PAG.

FAGELIA.

- 76¹. a. *plantaginea*, S. Moore, in Journ. Bot. 1900, 461 = *C. plantaginea*.

FAGUS.

- 76¹. a. *atropunicea*, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xvii. 50 = *ferruginea*.
sinensis, Oliv. in Hook. Ic. Pl. t. 1936 = *sylvatica*.

FELICIA.

- 76². a. *barbata*, *Schlechter, in Journ. Bot. 1898, 375* (= *Aster barbatus*).—Afr. austr.
natalensis, *Schlechter, l. c. 1897, 220* (= *Aster natalensis*).—Afr. austr.

FICUS.

- 77². a. *stipulata*, *Lem. Hort. Univ. iv. 359.*—China; Japon.

GALEDUPA.

- 78³. a. *cochinchinensis*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 482 = *Sindora cochinchinensis*.
coriacea, Prain, l. c. 206 = *Sindora coriacea*.
Echinocalyx, Prain, l. c. 204 = *Sindora Echinocalyx*.
intermedia, Prain, l. c. 205 = *Sindora intermedia*.
siamensis, Prain, l. c. 481 = *Sindora Wallichii*.
velutina, Prain, l. c. 206 = *Sindora velutina*.
wallichiana, Prain, l. c. 481 = *Sindora Wallichii*.

GASTONIA.

- 79². a. *neraudiana*, *Rich. ex Drake, in Journ. de Bot. 1897, 62* (= *Panax neraudiana*).—Maurit.
racemosa, *Rich. ex Drake, l. c. 63* (= *Panax racemosa*).—Maurit.

GENYORCHIS.

- 80³. a. *micropetala*, *Schlechter, Westaf. Kautschuk-Exped. 280* (= *Bulbophyllum micropetalum*, Lindl.).—Afr. trop.

GESNERIA.

- 81¹. a. *macrantha*, *Lem. Hort. Univ. vi. 127; vii. 202.*—Hab. ?

GIGANTOCHLOA.

- 81¹. a. *aspera*, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. (1866) 20, nomen.*—Java.
wallichiana, *Kurz, l. c.*—Burma.

GONOLOBUS.

- 83¹. a. *volubilis*, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, 428* (= *Nematuris volubilis*).—N. Granat.

- 83². insere GRANDIERA, Lefeb. ex Baill. Adansonia, x. (1871) 104 = *Sindora*, Miq. (Legum.).
cochinchinensis, Lefeb. l. c. = *S. cochinchinensis*.

- 83³. insere GRIFFITHIA, Maing. ex King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iv. (1893) 8. ANONACEAE.
cupularis, *King, l. c. 9.*—Penins. Mal.
fusca, *King, l. c. 10.*—Penins. Mal.
magnoliaepetala, *Maing. ex King, l. c. 9.*—Penins. Mal.

GUZMANIA.

- 84³. a. *Seemannii*, *Baker, Handb. Bromel. 153.*—Ecuador.

HABENARIA.

- 86¹. a. *tricurris*, *Reichb. f. in Bonplandia, iii. 214.*—Afr. trop.

HELIOTROPIUM.

- 88². a. *strictum*, Ehrenb. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 115, in obs. = *strigosum*.

HIPPEASTRUM.

- 91¹. a. *morelianum*, *Lem. Hort. Univ. iv. 37.*—Bras.

HOULLETIA.

- 92². a. *stapeliae*, *Brongn. in Lem. Hort. Univ. iii. 132.*—Bras.
stapelioides, *Brongn. ex Reichb. f. in Regel, Gartenf. (1855) 2 = praec.*

HYOSCYAMUS.

- 94¹. a. *kurdicus*, *Bornm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlviii. (1898) 611.*—Syria.

PAG.

INDIGOFERA.

- 95³. a. *Dyeri*, *Britten, in Journ. Bot. 1897, 453.*—Afr. trop.

INTSIA.

- 96¹. a. *coriacea*, Maing. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxvi. 206 = *Sindora coriacea*.

IPOMOEA.

- 96². a. *Lorentzii*, *Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 217.*—Am. austr.
96³. *sericophylla*, *Peter, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III A. 81.*—Am. cent.
truncata, *Lem. Hort. Univ. ii. 33, t. 49.*—Mexic.

JUNCUS.

- 98². a. *liniger*, *With. Syst. Arr. Brit. Pl. ed. IV. ii. 843* = *Luzula campestris*.

JUSTICIA.

- 99². a. *sexangularis*, *Lindau, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. iv. III B. 349.*—Afr. trop.

KLEINIA.

- 100¹. a. *Mandraliscae*, *Tineo, in Lem. Pl. Grasses, 72.*—Eur.

LAELIA.

- 101². a. *cattleyoides*, *Rich. in Lem. Hort. Univ. v. 206* (non *Rodr.*).—Bras.

LAMIUM.

- 101³. a. *Cardiaca*, *H. Baill. Iconogr. Fl. Fr. t. 270* (= *Leonurus Cardiaca*).—Reg. bor. temp.

LASIOSTELMA.

- 102³. a. *longifolium*, *Schlechter, in Journ. Bot. 1899, 62* (= *Brachystelma longifolia*).—Afr. austr.
macropetalum, *Schlechter, l. c.* (= *Brachystelma macropetala*).—Afr. austr.
ramosissimum, *Schlechter, l. c.* (= *Brachystelma ramosissimum*).—Afr. austr.
subaphyllum, *Schlechter, l. c.* (= *Brachystelma subaphyllum*).—Afr. trop.

LEPIDIUM.

- 103³. a. *riparium*, *Schlechter, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 6 = Nasturtium riparium.*

- 105². a. **LIGEA**, *Poit. (Podost.)*.
Glaziovii, *Warm. in Danske Vid. Selsk. Skrift. iv. (1888) 465.*—Bras.

MELOCACTUS.

- 115³. a. *cephalenoplus*, *Lem. Hort. Univ. ii. 128.*—Venez.

MELOCANNA.

- 115³. a. *Blumei*, *Kurz, in Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor. (1866) 20, nomen.*—Java.
brachyclada, *Kurz, l. c.*—Java.
elegantissima, *Kurz, l. c.*—Java.
hasskarliana, *Kurz, l. c.*—Java.
longespiculata, *Kurz, l. c.*—Java.
serpentina, *Kurz, l. c.*—Java.
tenuispiculata, *Kurz, l. c.*—Java.

MYRMECODIA.

- 122². a. *Beccarii*, *Hook. f. Bot. Mag. t. 6883.*—Austral.

NASTURTIIUM.

- 123². a. *calycinum*, *Engelm. ex Hayden, in Trans. Amer. Phil. Soc. xii. (1863) 184.*—Am. bor.

ONCIDIUM.

- 126³. a. *celsianum*, *Rich. in Lem. Hort. Univ. vi. 113.*—Hab. ?
galeottianum, *Drapiez, in Lem. Hort. Univ. i. 198 = Odontoglossum citrosimum.*
Lindeni, *Hort. ex Reichb. f. in Lindl. Fol. Orch. Oncid. 39; Lodd. ex Lindl. Sert. Orch. sub t. 48, no. 101 = Lindeni, Brongn.*
Lindeni, *Brongn. in Lem. Hort. Univ. iii. 372.*—Mexic.
retemeyerianum, *Reichb. f. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 513 = Lindeni, Brongn.*

PAEONIA.

- 131². a. *Smouthii*, *Hort. in Lem. Hort. Univ. iv. 274.*—Hybr.

PAG.

PHILADELPHUS.

- 140². a. *macranthus*, *Jacques*, in *Lem. Hort. Univ.* ii. 17.
—Hab.?
nivalis, *Jacques*, l. c. 19.—Hab.?

PHILODENDRON.

- 140³. a. *crinipes*, *Brongn.* in *Lem. Hort. Univ.* v. 230.—
Mexic. ; Guiana.

PITCAIRNIA.

- 144². a. *Morelii*, *Lem. Hort. Univ.* vii. 231.—Hab.?
150¹. insere PONTANIA, *Lem. Hort. Univ.* v. (1844)
33 = *Brachysema*, R. Br. (Legum.).
celsiana, *Lem. l. c.* = *B. lanceolatum*.

PRIMULA.

- 151². a. *cottia*, *Widmer*, in *Flora*, 1889, 71.—Eur.

PRUNUS.

- 151³. a. *pendula*, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxix.
(1884) 98; *Mél. Biol.* xi. 690.—Japon.

PAG.

PTEROCARPUS.

- 153¹. a. *echinatus*, *Pers. Syn.* ii. 277.—As. trop.

PYRUS.

- 154³. a. *douxiana*, *Hénon*, in *Lem. Hort. Univ.* iii. 305.
—Hort.

RHODODENDRON.

- 157³. a. *morelianum*, *Lem. Hort. Univ.* iv. 1.—Hybr.

- 158³. insere ROBYNSIA, *Drapiez*, in *Lem. Hort. Univ.*
ii. (1841) 127, 231 = *Bravoa*, *Lex.* (Ama-
ryll.).
geminiflora, *Drapiez*, l. c. = *B. geminiflora*.

RUELLIA.

- 160². a. *Baikiei*, *Woodr. Gard. India*, ed. V. 417 (= *Stc-*
phanophysum Baikiei).—Bras.

SENECIO.

- 169³. a. *Croussei*, *Lem. Hort. Univ.* v. 172.—Hybr.

PAG.

SIPHOCAMPYLUS.

- 172². a. *rugosus*, *Lem. Hort. Univ.* iii. 368.—Hab.?

SPREKELIA.

- 176¹. a. *stenopetala*, *Lem. Hort. Univ.* v. 227.—Hab.?

STANHOPEA.

- 176². a. *calceolata*, *Drapiez*, in *Lem. Hort. Univ.* ii. 127,
264 = *eburnea*.
uncinata, *Drapiez*, l. c. iv. 65 = *martiana*.

TILLANDSIA.

- 184². a. *lorifolia*, *Lem. Hort. Univ.* vi. 316.—Bras.
splendens, *Brongn.* in *Lem. l. c.* 199.—Guiana.
zonata, *Brongn.* in *Lem. l. c.* 90.—Guiana.

TRADESCANTIA.

- 185². a. *punctulata*, *Lem. Hort. Univ.* vi. 125.—Hab.?

ZICHYA.

- 197². a. *Baumannii*, *Lem. Hort. Univ.* vi. 34.—Austral.