

Cranocarpus Benth.

Rubens Teixeira de Queiroz

Universidade Federal da Paraíba; rbotanico@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Cranocarpus*, *Cranocarpus gracilis*, *Cranocarpus martii*, *Cranocarpus mezii*.

COMO CITAR

Queiroz, R.T. 2020. *Cranocarpus* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB18441>.

DESCRIÇÃO

Subarbusto até ca 1,20 m alt. Ramo cilíndrico, rufo-híspido. Estípulas 0,3-1,5 cm compr., persistentes, lineares, maior ou menor que o pecíolo. Folha uni-trifolioladas, pecíolo 0,2-5,3 cm compr.; folíolo 20,2-2 x 7,1-1,5 cm, oval-elíptico, lanceolado, ovado, ápice cuspidado, mucronado, emarginado, margem inteira ou serreada, base arredondada, cordada, obtusa, nervação cladódroma ou craspedódroma, discolor face adaxial cerdosa, pilosa, face abaxial híspida. Inflorescência axilar 1-9,6 cm compr.; flor zigomorfa, monoclina, cálice 0,2-0,5 cm compr., campanulado, as vezes giboso, híspido; corola 0,4-0,9 cm compr., papilionácea, pétalas amarelas. Fruto legume típico, 0,6-1,0 x 0,4-0,7 cm, alado ou não, híspido.

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Carrasco, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Ceará)

Sudeste (Espírito Santo)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Folha trifoliolada; folíolos ovados, tubo do cálice menor que o comprimento dos lacínios
Cranocarpus gracilis
- Folha unifolioladas; folíolos elípticos, lanceolados; tubo do cálice maior que o comprimento dos lacínios
2. Estípula com comprimento maior que o pecíolo; nervação craspedodroma; margem ondulada, fruto alado*Cr. mezii*
- Estípula com comprimento menor que o pecíolo, nervação cladodroma; margem inteira, fruto não alado *Cr. martii*

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Cranocarpus Benth.*



Figura 2: *Cranocarpus Benth.*

BIBLIOGRAFIA

Harley, R. M. 1978. A study of *Cranocarpus* (Leg.) in Brasil. *Bradea*. 2(39): 265—269.

Cranocarpus gracilis Afr.Fern. & P.Bezerra

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) com indumento presente(s). **Folha:** pedicelo(s) foliar(es) longo(s) peciolado(s); **folha(s) composta(s)** trifoliada(s); **estípula(s)** menor que compr. do pedicelo(s); **estípula(s) relação compr. com pecíolo(s)** menor que o pecíolo(s); **forma dos folíolo(s)** ovado(s); **margem(ns) do folíolo(s)** inteira. **Inflorescência:** compr. da inflorescência(s) maior(es) que o compr. da folha(s); **posição da inflorescência(s)** axilar(es); **tipo de inflorescência(s)** racemo(s). **Flor:** cor da corola amarela; **pedicelo(s) floral(ais)** presente(s); **tubo do cálice(s)** longo(s) giboso(s); **tubo do cálice(s)** maior(es) que os lacínias(s); **lacínias(s) do cálice(s)** subulado(s). **Fruto:** fruto(s) sésil(eis); **forma do fruto(s)** orbicular(es)/falcado(s); **estipe(s)** ausente(s); **valva(s) do legume(s)** reticulada(s).

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Carrasco, Floresta Estacional Decidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes, A., 5644, CEPEC, EAC, K

BIBLIOGRAFIA

Fernandes, A. & Bezerra, P. 1979. O gênero *Cranocarpus* (Leguminosae) - uma nova espécie. 2(50): 329--332

Cranocarpus martii Benth.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) com indumento presente(s). **Folha:** pedicelo(s) foliar(es) longo(s) peciolado(s); **folha(s) composta(s)** unifoliolada(s)/trifoliada(s); **estípula(s)** menor que compr. do pedicelo(s); **estípula(s) relação compr. com pecíolo(s)** menor que o pecíolo(s); **forma dos folíolo(s)** oblanceolada(s)/elíptico(s); **margem(ns) do folíolo(s)** inteira. **Inflorescência: compr. da inflorescência(s)** menor que o compr. da folha(s); **posição da inflorescência(s)** axilar(es); **tipo de inflorescência(s)** racemo(s). **Flor:** cor da corola amarela; **pedicelo(s) floral(ais)** presente(s); **tubo do cálice(s)** curto(s) giboso(s); **tubo do cálice(s) maior(es)** que os lacínias(s); **lacínias do cálice(s)** triangular(es). **Fruto:** fruto(s) sésil(eis); **forma do fruto(s)** orbicular(es)/falcado(s); **estipe(s)** ausente(s); **valva(s) do legume(s)** lisa(s).

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S. dos Santos, 1745, CEPEC

BIBLIOGRAFIA

Harley, R. M. 1978. A study of *Cranocarpus* (Leg.) in Brasil. *Bradea*. 2(39): 265—269.

Cranocarpus mezii Taub.

DESCRIÇÃO

Caule: ramo(s) com indumento presente(s). **Folha:** pedicelo(s) foliar(es) subséssil(eis); **folha(s) composta(s)** unifoliolada(s); **estípula(s)** maior(es) que compr. do pedicelo(s); **estípula(s) relação compr. com pecíolo(s)** maior(es) que o pecíolo(s); **forma dos folíolo(s)** oblanceolada(s)/elíptico(s); **margem(ns) do folíolo(s)** serreado(s). **Inflorescência:** compr. da inflorescência(s) menor que o compr. da folha(s); **posição da inflorescência(s)** axilar(es); **tipo de inflorescência(s)** racemo(s). **Flor:** cor da corola amarela; **pedicelo(s) floral(ais)** presente(s); **tubo do cálice(s)** curto(s) giboso(s); **tubo do cálice(s)** menor que os lacínias(s); **lacínias do cálice(s)** triangular(es). **Fruto:** fruto(s) séssil(eis); **forma do fruto(s)** orbicular(es)/falcado(s); **estipe(s)** ausente(s); **valva(s) do legume(s)** lisa(s).

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Espírito Santo)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.M. Harley, 17882, K, CEPEC

BIBLIOGRAFIA

Harley, R. M. 1978. A study of *Cranocarpus* (Leg.) in Brasil. *Bradea*. 2(39): 265—269.