

Dimorphandra Schott

Vinicius Castro Souza

Universidade de São Paulo; vcsouza@usp.br

Alexandre Gibau de Lima

Universidade de São Paulo; alegibau@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Dimorphandra*, *Dimorphandra campinarum*, *Dimorphandra caudata*, *Dimorphandra coccinea*, *Dimorphandra conjugata*, *Dimorphandra cuprea*, *Dimorphandra exaltata*, *Dimorphandra gardneriana*, *Dimorphandra gigantea*, *Dimorphandra ignea*, *Dimorphandra jorgei*, *Dimorphandra macrostachya*, *Dimorphandra mediocris*, *Dimorphandra mollis*, *Dimorphandra multiflora*, *Dimorphandra parviflora*, *Dimorphandra pennigera*, *Dimorphandra polyandra*, *Dimorphandra pullei*, *Dimorphandra unijuga*, *Dimorphandra urubuensis*, *Dimorphandra vernicosa*, *Dimorphandra wilsonii*.

COMO CITAR

Souza, V.C., Lima, A.G. 2020. *Dimorphandra* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB78675>.

DESCRIÇÃO

Árvores inermes. **Folhas** alternas, com estípulas, bipinadas, folíolos subcoriáceos, coriáceos, cartáceo ou membranáceos, nervação broquidódroma. **Inflorescência** paniculada composta de espigas ou racemos. **Flores** bissexuadas, diminutas, numerosas, pediceladas ou sésseis; cálice pentâmero, gamossépalo; corola pentâmera, dialipétala; androceu organizado de duas formas: cinco estames férteis, livres, epipétalos ou cinco estames estéreis, livres ou unidos no ápice, alternipétalos; gineceu formado por um ovário unilocular, plurióvulado, sésstil ou estipitado, estilete terminal curto. **Fruto** legume nucoide.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Campinarana, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra campinarum Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 5/6/7; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/linear(es); **base do foliólulo** truncada(s); **ápice(s) do foliólulo** retuso(s)/obtusos(s); **consistência do foliólulo** cartácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** puberulento(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor laranja; **superfície(s) do cálice(s)** glabro(s)/glabrescente(s); **superfície(s) da corola** glabro(s)/glabrescente(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** pubescente(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 16538

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra caudata Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 6/7; filotaxia das pinas oposta(s); formato do foliólulo oblongo(s)/lanceolado(s); base do foliólulo arredondada(s)/cuneada(s); ápice(s) do foliólulo acuminado(s); consistência do foliólulo cartácea(s)/membranácea(s); superfície(s) abaxial do foliólulo ferrugíneo(s) pubescente(s); superfície(s) adaxial do foliólulo glabro(s); nervura-central abaxial conspícua(s). **Flor:** cor creme; superfície(s) do cálice(s) glabrescente(s); superfície(s) da corola glabro(s); formato do ovário(s) cilíndrico(s)/fusiforme(s); indumento do ovário(s) hispido(s). **Fruto:** consistência coriáceo(s); formato alongado(s) reto(s)/ligeiramente curvado(s); cor quando maduro(s) castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 16866

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra coccinea Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 11/16; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/linear(es); **base do foliólulo** oblíqua(s)/auriculada(s); **ápice(s) do foliólulo** retuso(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabrescente(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor vermelha; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** pubescente(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** tomentoso(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** orbicular(es); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 23968

BIBLIOGRAFIA

Journ. Wash. Acad. Sc. 1935 25: 197.1935 25: 197.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra conjugata (Splitg.) Sandwith

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 1/2/3; **filotaxia das pinas** oposta(s); **formato do foliólulo** oboval(ais); **base do foliólulo** atenuada(s); **ápice(s) do foliólulo** obtuso(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** ferrugíneo(s) tomentoso(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s)/glabrescente(s); **nervura-central abaxial** conspicua(s). **Flor:** cor creme/branco; **superfície(s) do cálice(s)** ferrugíneo(s) tomentoso(s); **superfície(s) da corola** glabro(s)/pubescente(s); **formato do ovário(s)** oblongo(s); **indumento do ovário(s)** hispido(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** alongado(s) reto(s)/falcado(s)/oblongo(s); **cor quando maduro(s)** castanho avermelhado.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra cuprea Sprague & Sandwith

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Dimorphandra cuprea*, *Dimorphandra cuprea* subsp. *cuprea*, *Dimorphandra cuprea* subsp. *ferruginea*, *Dimorphandra cuprea* subsp. *velutina*.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16; **filotaxia das pinas** suboposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/linear(es); **base do foliólulo** truncada(s)/auriculada(s); **ápice(s) do foliólulo** arredondado(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** ferrugíneo(s) pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor vermelha; **superfície(s) do cálice(s)** tomentoso(s); **superfície(s) da corola** tomentoso(s)/pubescente(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** pubescente(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho avermelhado.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Estaminódios unidos, ovário oblongo.....*Dimorphandra cuprea* subsp. *velutina*
- 1'. Estaminódios livres, ovário oboval
 2. Pétala espatulada.....*Dimorphandra cuprea* subsp. *cuprea*
 2. Pétala obovada.....*Dimorphandra cuprea* subsp. *ferruginea*

BIBLIOGRAFIA

Kew Bull. 1932 402.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). Flora. Neotropica. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra cuprea Sprague & Sandwith subsp. *cuprea*

DESCRIÇÃO

Pétalas espatuladas; ovário oval.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 5111, NY, INPA

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra cuprea subsp. *ferruginea* (Ducke) M.F.Silva

Tem como sinônimobasiônimo *Dimorphandra ferruginea* Ducke**DESCRIÇÃO**

Pétala oboval a orbicular; ovário oboval

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição GeográficaOcorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 23969, K

BIBLIOGRAFIASilva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra cuprea subsp. *velutina* (Ducke) M.F.Silva

Tem como sinônimo

basônimo *Dimorphandra ferruginea* Ducke

basônimo *Dimorphandra velutina* Ducke

DESCRIÇÃO

Pétala oboval; ovário oval a oblongo.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pessoal do Museu, s.n., RB, 1095

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra exaltata Schott

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 4/5/6/7/8; filotaxia das pinas oposta(s); formato do foliólulo oblongo(s)/lanceolado(s); base do foliólulo arredondada(s)/obtusada(s); ápice(s) do foliólulo acuminado(s); consistência do foliólulo cartácea(s); superfície(s) abaxial do foliólulo puberulento(s); superfície(s) adaxial do foliólulo glabro(s)/glabrescente(s); nervura-central abaxial conspícua(s). **Flor:** cor creme/amarela; superfície(s) do cálice(s) glabro(s); superfície(s) da corola glabro(s); formato do ovário(s) fusiforme(s); indumento do ovário(s) glabro(s). **Fruto:** consistência lenhoso(s); formato alongado(s) reto(s)/achatado(s); cor quando maduro(s) castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Bahia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.P. Heringer, 2459, NY, RB, UB

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra gardneriana Tul.

Tem como sinônimo

heterotípico *Dimorphandra biretusa* Tul.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 5/6/7/8/9/10; **filotaxia das pinas** alterna(s)/suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/oval(ais); **base do foliólulo** cordada(s); **ápice(s) do foliólulo** retuso(s)/arredondado(s); **consistência do foliólulo** subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabrescente(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor amarela; **superfície(s) do cálice(s)** glabro(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** glabro(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** alongado(s) reto(s)/ligeiramente curvado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Paraíba, Rio Grande do Norte)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Gardner, 1944, K

BIBLIOGRAFIA

Arch. Mus. Par. 4: (1844) 185. 4. (1844) 185.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra gigantea Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 15/16/17/18/19/mais de 20; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s); **base do foliólulo** truncada(s); **ápice(s) do foliólulo** aguda(s)/arredondado(s); **consistência do foliólulo** subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** ferrugíneo(s) pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** inconspícua(s). **Flor:** cor amarela/vermelha; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** pubescente(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** amarelo viloso(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 23789

BIBLIOGRAFIA

Journ. Wash. Acad. Sc. 1935 25: 198.1935 25: 198.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra ignea Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 2/3/4/5; **filotaxia das pinas** oposta(s); **formato do foliólulo** elíptico(s); **base do foliólulo** cuneada(s)/atenuada(s); **ápice(s) do foliólulo** aguda(s)/retuso(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s)/subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabrescente(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor vermelha; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** glabrescente(s)/pubescente(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** pubescente(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho avermelhado.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 23265

BIBLIOGRAFIA

Journ. Wash. Acad. Sc. 1935 25: 196.1935 25: 196.

Silva, M.F. 1986. Dimorphandra (Caesalpinaceae). Flora. Neotropica. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra jorgei M.F.Silva

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 3/4; filotaxia das pinas oposta(s); formato do foliólulo lanceolado(s)/oval(ais); base do foliólulo arredondada(s); ápice(s) do foliólulo acuminado(s)/aguda(s); consistência do foliólulo membranácea(s); superfície(s) abaxial do foliólulo pubérula(s); superfície(s) adaxial do foliólulo glabro(s); nervura-central abaxial conspícua(s). **Flor:** cor amarela/verde; superfície(s) do cálice(s) glabrescente(s); superfície(s) da corola glabro(s); formato do ovário(s) fusiforme(s); indumento do ovário(s) glabro(s). **Fruto:** consistência lenhoso(s); formato alongado(s) reto(s)/ligeiramente curvado(s); cor quando maduro(s) castanho avermelhado.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.A. Mori, 9636, CEPEC, INPA

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra macrostachya Benth.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Dimorphandra macrostachya*, *Dimorphandra macrostachya* subsp. *congestiflora*, *Dimorphandra macrostachya* subsp. *glabrifolia*, *Dimorphandra macrostachya* subsp. *macrostachya*.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14; **filotaxia das pinas** oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s); **base do foliólulo** truncada(s)/oblíqua(s); **ápice(s) do foliólulo** retuso(s); **consistência do foliólulo** membranácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s)/seríceo(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor amarela/vermelha; **superfície(s) do cálice(s)** glabrescente(s)/pubescente(s); **superfície(s) da corola** glabrescente(s)/pubescente(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** ferrugíneo(s) pubescente(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave de Silva (1986) com adaptações

1. Folhas com mais de 10 pares de pinas, face adaxial dos foliólulos glabra a subglabra

2. Foliólulo glabro na face adaxial; cálice campanulado..... subsp. *macrostachya*

2'. Foliólulo subglabro na face adaxial; cálice cupuliforme..... subsp. *glabrifolia*

1'. Folhas com menos de 10 pares de pinas, face adaxial dos foliólulos pubescente...subsp. *congestiflora*

BIBLIOGRAFIA

Hook. Journ. Bot. 2: (1840) 101. 2. (1840) 101.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra macrostachya Benth. subsp. *macrostachya*

DESCRIÇÃO

Folhas com mais de 10 pares de pinas; cálice campanulado.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

C. Ferreira, 1934, INPA

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra macrostachya subsp. *congestiflora* (Spague & Sandwith) M.F. da Silva

DESCRIÇÃO

Folhas com menos de 10 pares de pinas, face adaxial pubescente.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.A. Cid Ferreira, 9357, RB

Dimorphandra macrostachya subsp. *glabrifolia* (Ducke) M.F.Silva

Tem como sinônimo

basiônimo *Dimorphandra glabrifolia* Ducke

DESCRIÇÃO

Folhas com mais de 10 pares de pinas; cálice cupuliforme.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 20203

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra mediocris Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 5/6/7/8; **filotaxia das pinas** alterna(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** lanceolado(s)/oval(ais); **base do foliólulo** arredondada(s); **ápice(s) do foliólulo** acuminado(s); **consistência do foliólulo** cartácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** escabro(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor amarela; **superfície(s) do cálice(s)** glabro(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** glabro(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** alongado(s) reto(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 35071

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra mollis Benth.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 6/7/8/9/10/11/12/13/14; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/oval(ais); **base do foliólulo** oblíqua(s); **ápice(s) do foliólulo** obtuso(s); **consistência do foliólulo** cartácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** pubescente(s); **nervura-central abaxial** inconspícua(s). **Flor:** cor amarela; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** glabro(s). **Fruto:** **consistência** coriáceo(s); **formato** alongado(s) reto(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Pantanal

Tipos de Vegetação

Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)

Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.A. Ratter, 1294, UB, RB, K

BIBLIOGRAFIA

Hook. Journ. Bot. 2: (1840) 102. 2. (1840) 102.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra multiflora Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 4/5; filotaxia das pinas oposta(s); formato do foliólulo oblongo(s)/lanceolado(s); base do foliólulo arredondada(s)/obtusada(s); ápice(s) do foliólulo acuminado(s)/aguda(s); consistência do foliólulo subcoriácea(s); superfície(s) abaxial do foliólulo pubérula(s); superfície(s) adaxial do foliólulo glabro(s); nervura-central abaxial conspícua(s). **Flor:** cor amarela/vermelha; superfície(s) do cálice(s) tomentoso(s); superfície(s) da corola glabro(s); formato do ovário(s) fusiforme(s); indumento do ovário(s) viloso(s). **Fruto:** consistência desconhecida(s); formato desconhecido(s); cor quando maduro(s) desconhecido(s).

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Siqueira, R., s.n., MG, 8798, RB

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra parviflora Spruce ex Benth.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 7/8/9/10/11/12; **filotaxia das pinas** alterna(s)/suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oval(ais)/elíptico(s); **base do foliólulo** cuneada(s)/truncada(s); **ápice(s) do foliólulo** obtuso(s); **consistência do foliólulo** cartácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubérula(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** conspicua(s). **Flor:** cor creme; **superfície(s) do cálice(s)** glabro(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** glabro(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** alongado(s) reto(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

R. Spruce, 1465, RB

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra pennigera Tul.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 12/13/14/15; **filotaxia das pinas** alterna(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/linear(es); **base do foliólulo** truncada(s); **ápice(s) do foliólulo** obtuso(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s)/subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** inconspícua(s). **Flor:** cor branco; **superfície(s) do cálice(s)** glabrescente(s)/tomentoso(s); **superfície(s) da corola** glabrescente(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** híspido(s)/tomentoso(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 20206, K

BIBLIOGRAFIA

Arch. Mus. Par. 4: (1844) 187. 4. (1844) 187.

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra polyandra Benoist

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 4/5; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/oboval(ais); **base do foliólulo** arredondada(s)/obtusada(s); **ápice(s) do foliólulo** retuso(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s)/subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** glabra(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** inconspícua(s). **Flor:** cor branco/rosa; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** cilíndrico(s); **indumento do ovário(s)** tomentoso(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.L. Fróes, 21330, IAN, K, NY

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra pullei Amshoff

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 7/8/9; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/lanceolado(s); **base do foliólulo** arredondada(s)/obtusada(s); **ápice(s) do foliólulo** acuminado(s)/aguda(s); **consistência do foliólulo** cartácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** glabra(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** pubescente(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor creme; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** pubescente(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** alongado(s) reto(s); **cor quando maduro(s)** castanho avermelhado.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amapá, Pará, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

R.L. Fróes, 32951, IAN

BIBLIOGRAFIA

Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht No. 52 8 (193

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpinaceae). *Flora Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra unijuga Tul.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 2; filotaxia das pinas oposta(s); formato do foliólulo lanceolado(s)/oval(ais); base do foliólulo arredondada(s)/atenuada(s); ápice(s) do foliólulo acuminado(s); consistência do foliólulo cartácea(s)/subcoriácea(s); superfície(s) abaxial do foliólulo glabra(s); superfície(s) adaxial do foliólulo glabro(s); nervura-central abaxial conspícua(s). **Flor:** cor amarela; superfície(s) do cálice(s) glabro(s); superfície(s) da corola glabro(s); formato do ovário(s) oblongo(s); indumento do ovário(s) glabro(s). **Fruto:** consistência lenhoso(s); formato alongado(s) reto(s)/ligeiramente curvado(s); cor quando maduro(s) castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, s.n., RB, 23967, K

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra urubuensis Ducke

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 8/9/10/11/12/13/14/15/16; **filotaxia das pinas** oposta(s); **formato do foliólulo** linear(es)/falcado(s); **base do foliólulo** auriculada(s); **ápice(s) do foliólulo** obtuso(s); **consistência do foliólulo** coriácea(s)/subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** estrigoso(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabro(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** cor laranja; **superfície(s) do cálice(s)** glabrescente(s); **superfície(s) da corola** glabro(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** pubescente(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** falcado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Floresta de Igapó

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 814, IAN, K, MG, RB

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra vernicosa Spreng. ex Benth.

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 1/2; filotaxia das pinas oposta(s); formato do foliólulo elíptico(s)/oboval(ais); base do foliólulo arredondada(s)/obtusada(s); ápice(s) do foliólulo retuso(s)/arredondado(s); consistência do foliólulo coriácea(s)/subcoriácea(s); superfície(s) abaxial do foliólulo glabra(s); superfície(s) adaxial do foliólulo glabro(s); nervura-central abaxial conspícua(s). **Flor:** cor verde/branco; superfície(s) do cálice(s) glabro(s); superfície(s) da corola glabro(s); formato do ovário(s) fusiforme(s); indumento do ovário(s) pubescente(s). **Fruto:** consistência lenhoso(s); formato falcado(s); cor quando maduro(s) castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Campinarana, Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Roraima)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 657, IAN

BIBLIOGRAFIA

Gen. 1: 588; et Benth. in Mart. Fl. Bras. 15: II. 249.Ge

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.

Dimorphandra wilsonii Rizzini

DESCRIÇÃO

Folha: pares de pinas 9/10; **filotaxia das pinas** suboposta(s)/oposta(s); **formato do foliólulo** oblongo(s)/elíptico(s); **base do foliólulo** arredondada(s); **ápice(s) do foliólulo** retuso(s)/obtusos(s); **consistência do foliólulo** cartácea(s)/subcoriácea(s); **superfície(s) abaxial do foliólulo** pubescente(s); **superfície(s) adaxial do foliólulo** glabrescente(s)/pubescente(s); **nervura-central abaxial** conspícua(s). **Flor:** **cor** amarela; **superfície(s) do cálice(s)** pubescente(s); **superfície(s) da corola** hispida(s); **formato do ovário(s)** fusiforme(s); **indumento do ovário(s)** glabro(s). **Fruto:** **consistência** lenhoso(s); **formato** alongado(s) reto(s)/ligeiramente curvado(s); **cor quando maduro(s)** castanho escuro.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

Rizzini, C.T., s.n., RB, 138949

BIBLIOGRAFIA

Silva, M.F. 1986. *Dimorphandra* (Caesalpiniaceae). *Flora. Neotropica*. 44 (2): 1-128.