

# *Dracontium L.*

Luana Silva Braucks Calazans

Universidade Federal do Espírito Santo - Vitória; luanasbcalazans@gmail.com

Maria de Lourdes da Costa Soares

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; soares@inpa.gov.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Dracontium*, *Dracontium amazonense*, *Dracontium asperum*, *Dracontium bogneri*, *Dracontium laetum*, *Dracontium longipes*, *Dracontium margaretae*, *Dracontium narae*, *Dracontium nivosum*, *Dracontium peruvianum*, *Dracontium polyphyllum*, *Dracontium prancei*, *Dracontium spruceanum*, *Dracontium ulei*.

## COMO CITAR

Calazans, L.S.B., Soares, M.L. 2020. *Dracontium* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15630>.

## Tem como sinônimo

*Chersydrium* Schott

## DESCRIÇÃO

Ervas perenes ou dormentes sazonais, tuberosas, terrestres, frequentemente gigantes. Túbera hipógea, frequentemente com tubérculos entre as raízes na porção superior. Folhas solitárias ou ocasionalmente mais de uma, emergindo eretas da região apical da túbera, tripartidas, completas; pecíolo longo (1-5 m), liso a marmorado, frequentemente com pequenas projeções espinescentes; bainha curta, restrita a base do pecíolo; lâmina draconcióide (trisecta), ocasionalmente fenestrada, membranácea a levemente coriácea; divisão anterior trisecta da metade do comprimento para o ápice; divisões posteriores bisectas até a metade do comprimento; lobos elípticos a triangulares, irregulares, raramente lineares, ápice arredondado a caudado, base livre ou decurrente à raque, nervuras secundárias paralelas e arqueando no ápice, formando 2 nervuras coletoras marginais. Inflorescência solitária ou ocasionalmente duas, terminal, emergindo da região apical da túbera antes ou depois do aparecimento da folha; pedúnculo curto a alongado, em geral menor que o pecíolo, liso a marmorado; espata estreitamente ovada a naviculada, ereta a arqueada, frequentemente fornicada, formando ou não um tubo na região basal, marcescente a persistente, marrom escura externamente, avermelhada a arroxeadada internamente com região basal geralmente esbranquiçada a translúcida; espádice sésstil a estipitado, mais curto que a espata, às vezes apresentando apêndice na região apical, desenvolvimento basipetalar. Flores bissexuais, perigoniadas, 4-8 tépalas; estames 4-19, livres, exertos durante a antese, anteras poricidas; gineceu ovóide, 2-7-locular, lóculos 1-ovulados, placentação axial a sub-basal, estilete mais longo que as tépalas, persistente ou não fruto, estigma abreviado, 2-4-lobado. Bagas obpiramidais, frequentemente com estilete rudimentar, 1-7-sementes, verdes a vermelhas, arroxeadas, marrons ou laranja; sementes arredondadas, reniformes, triangulares ou alongadas, testa espessada, lisa a verrucosa.

## COMENTÁRIO

Gênero exclusivamente neotropical, com 25 espécies, ocorrendo do México ao Paraguai em florestas tropicais úmidas, frequentemente em margens de matas, áreas perturbadas (clareiras) e áreas sazonalmente alagadas. Dentre as Araceae neotropicais tuberosas, é o gênero com maior número de espécies, sendo também o maior gênero da subfamília Lasioideae. *Dracontium* é um dos gêneros mais antigos da família, descrito por Linnaeus, apesar de sua restrição geográfica à Região Neotropical, pois foi descrito a partir de material mantido em cultivo. A maioria das espécies é mais conhecida nas coleções vivas do que na natureza, uma vez que folhas e inflorescências normalmente se alternam, o que dificulta a preparação de materiais de herbário.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado

### Tipos de Vegetação

Campinarana, Cerrado (lato sensu), Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

### Distribuição Geográfica

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Ceará, Maranhão)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

#### Possíveis ocorrências

Norte (Pará)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Lobos da lâmina foliar lineares; presença de apêndice estéril na região apical do espádice .. *Dracontium margaretae* Bogner
- 1'. Lobos da lâmina foliar irregulares, apêndice estéril na região apical do espádice ausente .. 2
2. Pedúnculo subterrâneo ou muito abreviado (nunca chega a 30 cm acima do solo) .. 3
- 2'. Pedúnculo emergindo 30 a 250 cm do solo .. 11
3. Espata sem clara diferenciação entre tubo e lâmina, cimbiforme .. 4
- 3'. Espata diferenciada entre tubo e lâmina, não cimbiforme .. 10
4. Espádice exposto, visível .. 5
- 4'. Espádice ocultado em sua maior parte ou totalmente pela espata .. 6
5. Pedúnculo 5-18 cm de comprimento, nunca completamente subterrâneo; espata 6-12 cm de comprimento; ovário 3-(4)-locular .. *Dracontium polyphyllum* L.
- 5'. Pedúnculo completamente subterrâneo; espata até 2 cm de comprimento; ovário 2-locular .. *Dracontium bogneri* G.Zhu & Croat
6. Espata maior que 20 cm de comprimento .. *Dracontium nivosum* (Lem.) G.Zhu
- 6'. Espata até 20 cm de comprimento .. 7
7. Zona translúcida na região basal da espata ausente .. *Dracontium bogneri* G.Zhu & Croat
- 7'. Zona translúcida na região basal da espata presente .. 8
8. Zona translúcida na região basal da espata extensa (triangular e cerca de 1,5 vezes o comprimento do espádice) .. *Dracontium laetum* E.G.Gonç. & S.P.Santos
- 8'. Zona translúcida na região basal da espata menos desenvolvida .. 9
9. Espata até 13 cm de comprimento, arqueando no ápice entre 45° e 90° .. *Dracontium amazonense* G.Zhu & Croat
- 9'. Espata maior que 15 cm de comprimento, levemente arqueada no ápice até 45° .. *Dracontium prancei* G.Zhu & Croat
10. Espata 9-11 cm de comprimento com ápice ereto; ovário 2-5-locular .. *Dracontium narae* E.G.Gonç.
- 10'. Espata 6-10 cm de comprimento com ápice cuculado; ovário 3-4-locular .. *Dracontium ulei* K.Krause
11. Espádice exposto, visível, séssil .. *Dracontium asperum* K.Koch
- 11'. Espádice ocultado em sua maior parte ou totalmente pela espata, estipitado .. 12
12. Espata cimbiforme, sem diferenciação entre tubo e lâmina .. *Dracontium spruceanum* (Schott)G.Zhu
- 12'. Espata não cimbiforme, com ápice cuculado ou ereto .. 13
13. Pecíolo 2-6 m de comprimento; espádice 23-25 cm de comprimento; ovário 3-locular; sementes arredondadas .. *Dracontium peruvianum* G.Zhu & Croat
- 13'. Pecíolo 1-2 m de comprimento; espádice 4-5 cm de comprimento; ovário 2-locular; sementes reniformes .. *Dracontium longipes* Engl.

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). Annals of the Missouri Botanical Garden 91(4): 593-667.

# *Dracontium amazonense* G.H.Zhu & Croat

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s)/liso(s) sem ornamentação; **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5; **estame(s)** 6/7 ou mais. **Fruto:** cor das baga(s) desconhecida(s). **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 3.

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espata até 13 cm compr., ápice arqueando entre 45° e 90°.

### Forma de Vida

Ervá

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia

### Tipos de Vegetação

Floresta de Igapó

### Distribuição Geográfica

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará)

## MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 12550, NY,  (NY01073830), Amazonas

T.C. Plowman, 12510, NY,  (NY01073831), Amazonas

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium asperum* K.Koch

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Dracontium asperum*, .

## Tem como sinônimo

homotípico *Dracontium asperum* K.Koch var. *asperum*

heterotípico *Chersydrium jararaca* Schott

heterotípico *Dracontium elatum* Mart.

heterotípico *Dracontium foecundum* Hook.f.

## É sinônimo

basiônimo *Sauromatum asperum* (K.Koch) K.Koch

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) verde claro; lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) emergente(s) 30 a(s) 250 compr. (cm); **ornamentação do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s)/liso(s) sem ornamentação; **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** completamente exposto(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5/6; **estame(s)** 5/6/7 ou mais. **Fruto:** cor das baga(s) cinza a(s) acastanhada. **Semente:** forma arredondada(s)/triangular(es); **número de semente(s)** 2/3.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

## MATERIAL TESTEMUNHO

W. Milliken, 1717, MO, Amazonas

s.c., 12550, K (K001239955), Amazonas

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium bogneri* G.H.Zhu

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** liso(s) sem ornamentação; **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** ausente(s); **espádice(s)** completamente exposto(s)/na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5; **estame(s)** 7 ou mais. **Fruto:** cor das **baga(s)** vermelha a(s) amarelada. **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 4.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

## Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Pará, Tocantins)

Centro-Oeste (Goiás)

Sudeste (Minas Gerais)

## MATERIAL TESTEMUNHO

J. Bogner, 2097, MO, Goiás, **Typus**

G. Zhu, 1510, MO, Minas Gerais

H.S. Irwin, 34730, NY,  (NY01066997), NY,  (NY01066998), UB (UB0001266), Goiás

E.G. Gonçalves, 1131, UB (UB0001155), UB (UB0001154), Pará

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium laetum* E.G.Gonç. & S.P.Santos

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4; **estame(s)** 5/6. **Fruto:** cor das baga(s) desconhecida(s). **Semente:** forma desconhecida(s); **número de semente(s)** desconhecida(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

E.G. Gonçalves, 1010, UB, Amazonas, **Typus**

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES




Figura 1: *Dracontium laetum* E.G.Gonç. & S.P.Santos

# *Dracontium longipes* Engl.

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) emergente(s) 30 a(s) 250 compr. (cm); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** maior(es) que 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5/6; **estame(s)** 7 ou mais. **Fruto:** cor das baga(s) desconhecida(s). **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 1.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)




## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas


Norte (Acre, Amazonas, Pará)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

## MATERIAL TESTEMUNHO

P.J.M. Maas, 13201, NY, 1064628,  (NY01064628), NY, 1064627,  (NY01064627), NY, 1064629,  (NY01064629), Acre

E.H.G. Ule, 5282, B, B 10 0294071,  (B100294071), Amazonas, **Typus**

E.H.G. Ule, 5781, B,  (B100294072), MG (MG005690), Amazonas, **Typus**

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium margaretae* Bogner

## Tem como sinônimo

heterotípico *Dracontium lineare* G.S.Bunting & Tillett

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es)/irregular(es). **Folha:** pecíolo(s) verde claro; lâmina(s) tricotômica(s); lobo(s) da lâmina(s) linear(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** liso(s) sem ornamentação; **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** ausente(s); **espádice(s)** completamente exposto(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** presente(s). **Flor:** tépala(s) 5/6; **estame(s)** 6. **Fruto:** cor das baga(s) vermelha a(s) amarelada. **Semente:** forma reniforme(s)/subglobosa(s); **número de semente(s)** 2/3.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

## Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)


## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas



Norte (Pará, Tocantins)

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

## MATERIAL TESTEMUNHO

E.G. Gonçalves, 97, UFG, 23490,  (UFG0023490), Tocantins

M. Emmerich, 4598, R, 185200,  (R000185200), Mato Grosso, **Typus**

M. Emmerich, 4053, R, 185201a,  (R000185201a), R, 185201,  (R000185201), Mato Grosso, **Typus**



# *Dracontium narae* E.G.Gonç.

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** presente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** ausente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** **tépala(s)** 4; **estame(s)** 7 ou mais. **Fruto:** cor das baga(s) cinza a(s) acastanhada. **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 3.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Campinarana

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

## MATERIAL TESTEMUNHO

N.F.O. Mota, 2342, BHCB, INPA, Roraima, **Typus**

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES




Figura 1: *Dracontium narae* E.G.Gonç.

# *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu

## Tem como sinônimo

basiônimo *Amorphophallus nivosus* Lem.

heterotípico *Amorphophallus papillosus* Raf.

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** maior(es) que 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** ausente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 8 a(s) 25 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 5/6; **estame(s)** 6/7 ou mais. **Fruto:** cor das **baga(s)** vermelha a(s) amarelada. **Semente:** forma reniforme(s)/arredondada(s); **número de semente(s)** 2/3/4.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga

## Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)


## Distribuição Geográfica


### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Ceará, Maranhão)

## MATERIAL TESTEMUNHO

G.A. Black, 47-2084, RB, 102351,  (RB00584814), Pará

I.M. Andrade, 628, UFRN, 5847,  (UFRN00005847), Ceará

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu



Figura 2: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu



Figura 3: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu



Figura 4: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu



Figura 5: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu



Figura 6: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu



Figura 7: *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

Andrade, I.M.; Silva, M.F.S.; Ribeiro, T.A. & Mayo, S.J. 2016. *Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu (Araceae): range extension from Amazonia to a brejo forest refugium in Northeast Brazil confirmed. Check List 12(3): 1908.

# *Dracontium peruvianum* G.H.Zhu & Croat

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) emergente(s) 30 a(s) 250 compr. (cm); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** maior(es) que 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 8 a(s) 25 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 5/6; **estame(s)** 7 ou mais. **Fruto:** cor das baga(s) vermelha a(s) amarelada. **Semente:** forma arredondada(s); **número de semente(s)** 1/2/3.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação



Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

B.A. Krukoff, 4987, NY,  (NY01073833), NY,  (NY01073832), Amazonas

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium polyphyllum L.*

## Tem como sinônimo

heterotípico *Amorphophallus wallisii* Regel  
heterotípico *Dracontium asperum* var. *wallisii* (Regel) Engl.  
heterotípico *Dracontium regelianum* (Engl.) Bogner  
heterotípico *Dracontium surinamense* Engl.  
heterotípico *Dracontium wallisii* (Regel) K.Koch  
heterotípico *Echidnium regelianum* Engl.  
heterotípico *Eutereia nigricans* Raf.

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s)/liso(s) sem ornamentação; **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** completamente exposto(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5; **estame(s)** 5/6/7 ou mais. **Fruto:** cor das **baga(s)** vermelha a(s) amarelada. **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 3.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação



Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

## MATERIAL TESTEMUNHO

T.C. Plowman, 8616, NY,  (NY01181961), NY,  (NY01181960), Pará

J.J. Strudwick, 3987, NY,  (NY01181979), Pará

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium prancei* G.H.Zhu & Croat

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** ausente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 5; **estame(s)** 6/7 ou mais. **Fruto:** cor das baga(s) desconhecida(s). **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 1.

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

Espata 15-20 cm compr., ápice arqueando suavemente até 45°.

### Forma de Vida

Ervá

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia

### Tipos de Vegetação



Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

### Distribuição Geográfica

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Roraima)

## MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 28732, NYBG, 1043288,  (NY01043288), INPA, 132423,  (INPA0132423), Amazonas, **Typus**

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.



# *Dracontium spruceanum* (Schott) G.H.Zhu

## Tem como sinônimo

basiônimo *Echidnium spruceanum* Schott  
homotípico *Cyrtosperma spruceanum* (Schott) Engl.  
heterotípico *Dracontium carderi* Hook.f.  
heterotípico *Dracontium costaricense* Engl.  
heterotípico *Dracontium lorentense* Krause  
heterotípico *Dracontium ornatum* K.Krause  
heterotípico *Dracontium trianae* Engl.

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) emergente(s) 30 a(s) 250 compr. (cm); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** presente(s); **tamanho da espata(s)** maior(es) que 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** presente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5; **estame(s)** 6/7 ou mais. **Fruto:** cor das **baga(s)** vermelha a(s) amarelada. **Semente:** forma arredondada(s)/alongada(s); **número de semente(s)** 1/2.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica


### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas)


### Possíveis ocorrências

Norte (Pará)

## MATERIAL TESTEMUNHO

D.G. Campbell, P21251, INPA, 45230,  (INPA0045230), Amazonas

G.T. Prance, 16400, NY, ,  (NY01073835), Amazonas

O.P. Monteiro, 72-106, INPA, 35928,  (INPA0035928), Amazonas

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.

# *Dracontium ulei* K.Krause

## DESCRIÇÃO

**Raiz:** tubérculo(s) regular(es). **Folha:** pecíolo(s) variegado(s); lâmina(s) tricotômica(s)/sagitada(s)/lobada(s); lobo(s) da lâmina(s) irregular(es). **Inflorescência:** pedúnculo(s) subterrâneo(s) ou muito abreviado(s); **ornamento do pedúnculo(s)** estriado(s) ou maculado(s); **espata(s) com diferenciação em tubo e lâmina(s)** presente(s); **tamanho da espata(s)** até 20 cm compr.; **região translúcida(s) na(s) base da espata(s)** ausente(s); **espádice(s)** na(s) maior parte oculto(s) pela(s) espata(s) e somente parcialmente exposta(s); **tamanho do espádice(s)** 2 a(s) 6 cm compr.; **apêndice(s) no ápice(s) do espádice(s)** ausente(s). **Flor:** tépala(s) 4/5/6; **estame(s)** 5/6. **Fruto:** cor das baga(s) desconhecida(s). **Semente:** forma reniforme(s); **número de semente(s)** 2.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

## Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica


### Ocorrências confirmadas


Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

## MATERIAL TESTEMUNHO

S.R. Lowrie, 592, NY,  (NY01181947), Acre

G.T. Prance, 7925, NY,  (NY01064632), Acre

E. Ule, 9215, MG (MG014072), K,  (K000523904), Acre, **Typus**

## BIBLIOGRAFIA

Zhu, G. & Croat. T.B. 2004. Revision of *Dracontium* L. (Araceae). *Annals of the Missouri Botanical Garden* 91(4): 593-667.