

Macradenia R.Br.

Ana Kelly Koch

Universidade Federal do Mato Grosso; anakbio@gmail.com

Fábio de Barros

Instituto de Botânica de São Paulo; fdebarros@terra.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Macradenia*, *Macradenia grandiflora*, *Macradenia lutescens*, *Macradenia paraensis*, *Macradenia surinamensis*, *Macradenia tridentata*.

COMO CITAR

Koch, A.K., Barros, F. 2020. *Macradenia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB11812>.

Tem como sinônimo

heterotípico *Rhynchadenia* A.Rich.

heterotípico *Serrastylis* Rolfe

DESCRIÇÃO

Plantas epífitas, cespitosas. Rizoma curto entre pseudobulbos. Raízes finas, flexuosas. Pseudobulbos 1-foliados, cilíndricos, cônicos a piriformes, levemente curvados ou eretos. Folhas elípticas, lineares ou lanceoladas, subcoriáceas, verdes, ápice acuminado ou agudo, base conduplicada formando um pseudopécio. Inflorescência em racemo axilar, pendente. Flores 4-30, ressupinadas, variáveis em tamanho, marrons, esverdeadas com máculas purpúreas, vermelhas ou vináceas; sépalas livres; a dorsal elíptica, elíptico-lanceolada, lanceolada a oblanceolada, ápice acuminado, agudo ou cuspidado; as laterais elíptico-lanceoladas, lanceoladas, oblanceoladas a subfalciformes, ápice acuminado, agudo ou cuspidado; pétalas elípticas, elíptico-lanceoladas, falciformes ou lanceoladas, ápice acuminado, agudo ou cuspidado; labelo séssil, 3-lobado, obcordiforme ou orbicular quando distendido, com uma lamela intramarginal achatada próxima à base; lobos laterais falciformes, obliquamente ovados, suborbiculares, subquadrados a triangulares; lobo mediano linear; 1-3 calos longitudinais dispostos na porção central surgindo da base até a inserção do lobo mediano. Coluna subereta, subcilíndrica, levemente alargada no ápice, branca com pontuações ou estrias vermelhas ou arroxeadas; cavidades estigmática em fenda, rostelo alongado e atenuado; clinândrio variável em tamanho, bem desenvolvido, com margem irregularmente serreada ou lacerada. Antera terminal; capa oblongada, inflada na base, branca com pontuações ou estrias vináceas; Polínias 2, obovadas, amarelas. Pedicelo+ovário glabros, sempre verdes. Frutos fusiformes, transversalmente triangulares, verdes.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Várzea, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição GeográficaOcorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescência até 10 flores, raro mais que 10; labelo com 3 calos longitudinais quilhados..... *M. lutescens*
- 1'. Inflorescência com mais de 10 flores; labelo com 1 calo longitudinal quilhado
 2. Lobos laterais do labelo rômbo-ovados ou triangulares
 3. Presença de uma lamela membranácea arqueada disposta transversalmente na largura do labelo..... *M. paraensis*
 - 3'. Ausência de uma lamela membranácea arqueada disposta transversalmente na largura do labelo.....*M. tridentata*
 - 2'. Lobos laterais do labelo ovados ou suborbiculares
 4. Labelo orbicular quando distendido; ápice das sépalas e pétalas cuspidado..... *M. grandiflora*
 - 4'. Labelo obcordiforme quando distendido; ápice das sépalas e pétalas agudo..... *M. surinamensis*

Macradenia grandiflora A.K.Koch, Ilk.- Borg. & Barros

DESCRIÇÃO

Raiz: espessamento(s) **textura** fina(s)/lisa(s). **Caule:** crescimento forma cespitoso(s)/cônico(s)/glabro(s). **Folha:** forma **ápice(s)** lanceolada(s)/acuminada(s) ou aguda(s); **base** conduplicada(s)/formando pseudopecíolo. **Inflorescência:** tipo **número de flor(es)** racemo(s) pendente(s)/muitas flor(es). **Flor:** **posição tamanho** ressupinada(s)/pequena(s); **sépala(s) forma ápice(s)** lanceolada(s)/sépala(s) dorsal(ais) cimbiforme/cuspidado(s); **pétala(s) forma ápice(s)** lanceada(s)/cuspidado(s); **labelo** sempre trilobado(s)/lobo(s) lateral(ais) suborbicular(es)/lobo mediano linear(es)/calo longitudinal(ais) quilhado na(s) porção central(ais)/1; **coluna(s)** subcilíndrica(s) curta(s) subereta(s)/sem lobo(s) estigmático(s)/estigma(s) em fenda(s)/clinândrio muito desenvolvido(s)/margem(ns) lacerada(s)/rostelo proeminente(s) alongado(s); **antera(s)** terminal(ais)/capa alongada(s)/polínia(s) 2; **ovário(s)** cilíndrico(s)/glabro(s). **Fruto:** presença forma **textura** ausente(s). **Semente:** presença forma ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epifítica ca. 27 cm altura. Pseudobulbos cônico-oblongados, não curvados, 4.5–5 cm compr., verdes. Folhas linear-lanceoladas, 22.5–23 × 3 cm, ápice acuminado a agudo. Inflorescência 4–12.5 cm compr., raque 8–10 cm compr., 6–20 flores. Flores 4–4.5 cm diam., cor não vista; pedicelo+ovário 0.8–1.5 cm compr.; sépala dorsal elíptico-lanceolada, cimbiforme, 1.3–1.9 × 0.3–0.4 cm, ápice cuspidado; sépalas laterais lanceoladas, 1.3–1.5 × 0.3–0.4 cm, ápice cuspidado; pétalas lanceoladas, 1.3–1.4 × 0.2–0.3 cm, ápice cuspidado; labelo 3-lobado, orbicular quando distendido, 1.2–1.3 × 0.8–0.9 cm; lobos laterais suborbitulares, ca. 0.7 × 0.4 cm; lobo mediano linear-lanceolado, ca. 0.6 × 0.1–0.2 cm, um calo longitudinal, quilhado. Coluna subcilíndrica, 0.6–1 cm compr.; margem do clinândrio irregularmente lacerada; antera ereta; capa não vista; polínias 2, obovadas, 0.1–0.2 cm compr.; estipe 0.5–0.7 cm compr. Frutos não vistos. Sementes não vistas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Semidecidual

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

s.c., s.n., UEC, 140048,  (UEC034223)

França, G.S. & Raggi, F., 500, BHCB, Minas Gerais, **Typus**

BIBLIOGRAFIA

Koch, A.K., Ilkiu-Borges, A.L. & Barros, F. 2015. *Macradenia grandiflora* (Cymbidieae; Epidendroideae; Orchidaceae), a new species from southeastern Brazil. *Phytotaxa* 204(2): 172-175.

Macradenia lutescens R.Br.

Tem como sinônimo

heterotípico *Macradenia triandra* Lindl.

heterotípico *Rhynchadenia cubensis* A.Rich.

DESCRIÇÃO

Raiz: espessamento(s) **textura** fina(s)/lisa(s). **Caule:** **crescimento forma** cespitoso(s)/cônico(s)/glabro(s). **Folha:** **forma** **ápice(s)** linear(es)/lanceolada(s)/acuminada(s) ou aguda(s); **base** conduplicada(s)/formando pseudopecíolo. **Inflorescência:** **tipo número de flor(es)** racemo(s) pendente(s)/poucas. **Flor:** **posição tamanho** ressupinada(s)/pequena(s); **sépala(s) forma** **ápice(s)** elíptica(s)/lanceolada(s)/sépala(s) dorsal(ais) cimbiforme/acuminado(s); **pétala(s) forma** **ápice(s)** elíptica(s)/lanceolada(s)/acuminado(s); **labelo** sempre trilobado(s)/lobo(s) lateral(ais) suborbicular(es)/lobo mediano linear(es)/calo longitudinal(ais) quilhado na(s) porção central(ais)/3; **coluna(s)** subcilíndrica(s) curta(s) subereta(s)/sem lobo(s) estigmático(s)/estigma(s) em fenda(s)/clinândrio muito desenvolvido(s)/margem(ns) serreada(s)/rostelo proeminente(s) alongado(s); **antera(s)** terminal(ais)/capa alongada(s)/polínia(s) 2; **ovário(s)** cilíndrico(s)/glabro(s). **Fruto:** **presença forma textura** presente(s)/fusiforme(s)/transversalmente triangular(es)/glabro(s). **Semente:** **presença forma** presente(s)/ligulada(s)/extremidade(s) curvada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epifítica 0.8–21 cm altura. Pseudobulbos cônicos a cônico-oblongados, levemente curvados, 0.8–4.6 cm compr., verdes. Folhas linear-oblongadas a linear-lanceoladas, 3.5–17 × 0.5–1.7 cm, ápice acuminado. Inflorescência 3.5–12.5 cm compr., raque 5–10 cm compr., 4–10 flores, raro mais que 10; Flores 1.5–2.5 cm diam.; coloração verde-amarelada com máculas ou pontuações vináceas; pedicelo+ovário 0.8–1.3 cm compr.; sépala dorsal elíptica, elíptico-lanceolada, lanceolada, oblanceolada a ovada, cimbiforme, 0.8–1.2 × 0.2–0.5 cm, ápice acuminado; sépalas laterais elípticas, elíptico-lanceoladas, lanceoladas, oblanceoladas a ovadas, 0.8–1.2 × 0.2–0.5 cm, ápice acuminado; pétalas elípticas, elíptico-lanceoladas, lanceoladas, oblanceoladas a ovadas, 0.8–1 × 0.2–0.4 cm, ápice acuminado; labelo 3-lobado, obcordiforme a suborbicular quando distendido, 0.6–0.9 × 0.5–0.6 cm, branco com nervuras vináceas; lobos laterais suborbitulares, 0.3–0.5 × 0.2–0.4 cm; lobo mediano linear, 0.3–0.5 × 0.1 cm, três calos longitudinais, quilhados. Coluna subcilíndrica, 0.4–0.7 cm compr.; margem do clinândrio reduzida e levemente serreada; antera ereta; capa oblongada, 0.3–0.4 cm compr.; polínias 2, obovadas, 0.1–0.2 cm compr.; estipe 0.4–0.5 cm compr. Frutos fusiformes, 2.5–3 cm compr., verdes. Sementes liguladas.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

A.K. Koch, 719, SP, Mato Grosso

A.K. Koch & M.A.G. Jardim, 572, SP, Pará

A.K. Koch & J.B.F. da Silva, 732, SP, Amazonas
Pessoa, E.M., 687, INPA, 241052,  (INPA0241052), Roraima

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Macradenia lutescens* R.Br.



Figura 2: *Macradenia lutescens* R.Br.



Figura 3: *Macradenia lutescens* R.Br.

Macradenia paraensis Barb.Rodr.

Tem como sinônimo

heterotípico *Macradenia multiflora* (Kraenzl.) Cogn.

DESCRIÇÃO

Raiz: espessamento(s) **textura** fina(s)/lisa(s). **Caule:** crescimento forma cespitoso(s)/piriforme(s)/glabro(s). **Folha:** forma **ápice(s)** lanceolada(s)/acuminada(s) ou aguda(s); **base** conduplicada(s)/formando pseudopécio. **Inflorescência:** tipo **número de flor(es)** racemo(s) pendente(s)/muitas flor(es). **Flor:** **posição tamanho** ressupinada(s)/pequena(s); **sépala(s) forma ápice(s)** elíptica(s)/lanceolada(s)/sépala(s) dorsal(ais) cimbiforme/acuminado(s); **pétala(s) forma ápice(s)** lanceada(s)/linear(es)/falcada(s)/acuminado(s); **labelo** sempre trilobado(s)/triangular(es)/lobo mediano linear(es)/calo longitudinal(ais) quilhado na(s) porção central(ais)/1; **coluna(s)** subcilíndrica(s) curta(s) subereta(s)/sem lobo(s) estigmático(s)/estigma(s) em fenda(s)/clinândrio muito desenvolvido(s)/margem(ns) lacerada(s)/rostelo proeminente(s) alongado(s); **antera(s)** terminal(ais)/capa alongada(s)/polínia(s) 2; **ovário(s)** cilíndrico(s)/glabro(s). **Fruto:** **presença forma textura** presente(s)/fusiforme(s)/transversalmente triangular(es)/glabro(s). **Semente:** **presença forma** presente(s)/ligulada(s)/extremidade(s) curvada(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epifítica 10–25 cm altura. Pseudobulbus cônicos a piriformes, curvados, 2–7 cm compr., verdes. Folhas elípticas, lanceoladas, lineares a linear-lanceoladas, 6.5–20 × 1–3 cm, ápice acuminado, agudo a obtuso. Inflorescência 4–5 cm compr., raque 10–20 cm compr., 10–30 flores; Flores 1.7–2 cm diam.; coloração variada desde verde-acastanhadas a vermelhas; pedicelo +ovário 0.5–1.5 cm compr.; sépalas dorsal elíptica, elíptico-lanceolada, lanceolada a oblanceolada, 1–1.5 × 0.2–0.4 cm, ápice acuminado, atenuado a agudo; sépalas laterais elípticas, elíptico-lanceoladas, lanceoladas a oblanceoladas, 1–1.5 × 0.2–0.4 cm, ápice acuminado a agudo; pétalas lanceoladas, linear-lanceoladas a falcadas, 0.9–1.4 × 0.1–0.4 cm, ápice acuminado a agudo; labelo 3-lobado, subromboide quando distendido, 0.8–1 × 0.6–0.8 cm, branco com manchas vináceas, presença de uma lamela arqueadas disposta transversalmente na largura do labelo; lobos laterais ovados, rombico-ovados a triangulares, divergentes ou não, 0.2–0.3 × 0.2–0.3 cm; lobo mediano linear a linear-obtrulado, 0.4–0.5 × 0.1–0.2 cm, um calo longitudinal, quilhado. Coluna subcilíndrica, 0.4–0.6 cm compr.; margem do clinândrio irregularmente lacerada, 0.4–0.5 cm compr.; antera ereta; capa oblongada, 0.4–0.5 cm compr.; polínias 2, obovadas, 0.1–0.2 cm compr.; estipe 0.5–0.6 cm compr. Frutos fusiformes, 2.5–5 cm compr., verdes. Sementes liguladas.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará, Rondônia, Tocantins)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO

João Aguiar Nogueira Batista, 685, CEN, 26223,  (CEN00026223), Goiás

W.R. Anderson, 7803, NY,  (NY01031996), Goiás
Silva, J.B.F., 3398, MG, Mato Grosso
Hoehne, F. C., 1398, R, Mato Grosso
Hall, C.F., 798, SP, 473756,  (SP032357), Mato Grosso do Sul
Tameirão Neto, E., 2856, BHCB, 54082,  (BHCB001424), Minas Gerais
Silva, J.B.F., 3397, MG, Pará
Piacentini, L.C., PSACF 108, MG, Pará
Oliveira, R.S. et al., s.n., UB, 87399, Tocantins
Martuscelli, P., s.n., SP, 475257, Rondônia

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Macradenia paraensis* Barb.Rodr.



Figura 3: *Macradenia paraensis* Barb.Rodr.

BIBLIOGRAFIA

Koch, A.K., Ilkiu-Borges, A.L. & Barros, F. 2016. Nomenclatural notes on species of *Macradenia* R.Br. (Orchidaceae) described by João Barbosa Rodrigues. *Taxon* 65(2): 349-351.

Macradenia surinamensis Rchb.f. & Wulfschl.

Tem como sinônimo

heterotípico *Macradenia rubescens* Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Raiz: espessamento(s) **textura** fina(s)/lisa(s). **Caule:** crescimento **forma** cespitoso(s)/cilíndrico(s)/glabro(s). **Folha:** **forma** **ápice(s)** linear(es)/acuminada(s) ou aguda(s); **base** conduplicada(s)/formando pseudopecíolo. **Inflorescência:** **tipo** **número de flor(es)** racemo(s) pendente(s)/muitas flor(es). **Flor:** **posição** **tamanho** ressupinada(s)/pequena(s); **sépal(a)s** **forma** **ápice(s)** elíptica(s)/lanceolada(s)/sépal(a)s dorsal(ais) cimbiforme/agudo(s); **pétal(a)s** **forma** **ápice(s)** elíptica(s)/lanceolada(s)/falcada(s)/agudo(s); **labelo** sempre trilobado(s)/lobo(s) lateral(ais) suborbicular(es)/lobo mediano linear(es)/calo longitudinal(ais) quilhado na(s) porção central(ais)/1; **coluna(s)** subcilíndrica(s) curta(s) subereta(s)/sem lobo(s) estigmático(s)/estigma(s) em fenda(s)/clinândrio muito desenvolvido(s)/margem(ns) serreada(s)/rostelo proeminente(s) alongado(s); **antera(s)** terminal(ais)/capa alongada(s)/polínia(s) 2; **ovário(s)** cilíndrico(s)/glabro(s). **Fruto:** **presença** **forma** **textura** ausente(s). **Semente:** **presença** **forma** ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epifítica 0.9–23 cm altura. Pseudobulbos cilíndricos, não curvados, 2.3–5.6 cm compr., verdes. Folhas linear-lanceoladas, 7.5–18 ´ 1.2–2.3 cm, ápice acuminado. Inflorescência 7–9 cm compr., raque 7–8 cm compr., 13–20 flores; Flores 0.2–0.5 cm diam.; coloração vinácea; pedicelo+ovário 0.8–1 cm compr.; sépala dorsal elíptico-lanceolada, cimbiforme, 1.1–1.3 ´ 0.2–0.3 cm, ápice agudo; sépalas laterais elíptico-lanceoladas a lanceoladas, 1–1.2 ´ 0.2 cm, ápice agudo; pétalas elíptico-lanceoladas, 0.9–1.1 ´ 0.1–0.2 cm, ápice agudo; labelo 3-lobado, obcordiforme quando distendido, 0.7–1 ´ 0.4–0.6 cm, branco com nervuras vináceas; lobos laterais suborbitulares, 0.3–0.4 ´ 0.2–0.3 cm; lobo mediano linear, 0.3–0.5 ´ 0.1 cm, um calo longitudinal quilhado. Coluna subcilíndrica, 0.7–1 cm compr.; margem do clinândria levemente serreada, 0.2–0.3 cm compr.; antera ereta; capa oblongada, 0.5–0.6 cm compr.; polínias 2, obovadas, ca. 0.1 cm compr.; estipe 0.4–0.6 cm compr. Frutos não vistos. Sementes não vistas.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Igapó, Floresta de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

J. Barbosa-Rodrigues, s.n., SOF (SOF300574), Pará, **Typus**
V.X. Silveira, 405, RON (RON00002078), Rondônia
Stancik, J.F, 186, INPA, 226223,  (INPA0226223), Amazonas
Silva, J.B.F, 655, MG, Rondônia

Silva, J.B.F., 2169, MG, Pará
Koch, A.K. & Monteiro, R.F., 730, SP, Pará
Wulschlaegel, 1806, GOET, 008580, **Typus**

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Macradenia surinamensis* Rchb.f. & Wulschl.



Figura 2: *Macradenia surinamensis* Rchb.f. & Wulschl.

BIBLIOGRAFIA

- Koch, A.K. 2016. Revisão taxonômica e filogenia do gênero *Macradenia* R.Br. (Oncidiinae-Orchidaceae). Tese de doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo. 153p.il.
- Koch, A.K., Ilkiu-Borges, A.L. & Barros, F. 2016. Nomenclatural notes on species of *Macradenia* R.Br. described by João Barbosa Rodrigues. *Taxon*, 65: 349-351.

Macradenia tridentata C.Schweinf.

DESCRIÇÃO

Raiz: espessamento(s) **textura** fina(s)/lisa(s). **Caule:** crescimento **forma** cespitoso(s)/cônico(s)/glabro(s). **Folha:** **forma** **ápice(s)** linear(es)/acuminada(s) ou aguda(s); **base** conduplicada(s)/formando pseudopecíolo. **Inflorescência:** **tipo** **número de flor(es)** racemo(s) pendente(s)/muitas flor(es). **Flor:** **posição** **tamanho** ressupinada(s)/pequena(s); **sépala(s)** **forma** **ápice(s)** elíptica(s)/lanceolada(s)/sépala(s) dorsal(ais) cimbiforme/agudo(s); **pétala(s)** **forma** **ápice(s)** lanceada(s); **labelo** sempre trilobado(s)/lobo(s) lateral(ais) suborbicular(es)/lobo mediano linear(es)/calo longitudinal(ais) quilhado na(s) porção central(ais)/1; **coluna(s)** subcilíndrica(s) curta(s) subereta(s)/sem lobo(s) estigmático(s)/estigma(s) em fenda(s)/clinândrio muito desenvolvido(s)/margem(ns) serreada(s)/rostelo proeminente(s) alongado(s); **antera(s)** terminal(ais)/capa alongada(s)/polínia(s) 2; **ovário(s)** cilíndrico(s)/glabro(s). **Fruto:** **presença** **forma** **textura** ausente(s). **Semente:** **presença** **forma** ausente(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Planta epifítica 8–28 cm altura. Pseudobulbos cônico-oblongados, não curvados, 2.5–3 cm compr., verdes. Folhas linear-lanceoladas, 8.4–14 × 0.6–1.2 cm, ápice acuminado. Inflorescência 5–8 cm compr., raque 8–10 cm compr., 12–15 flores; Flores 0.2–0.3 cm diam.; coloração verde-acastanhada; pedicelo+ovário 10–13 cm compr.; sépala dorsal lanceolada, cimbiforme, ca. 1.2 × 0.3 cm, ápice acuminado; sépalas laterais elíptico-lanceoladas, 1.2–1.3 × 0.2 cm, ápice agudo; pétalas lanceoladas a subfalcadas, 1–1.2 × 0.2 cm, ápice agudo; labelo 3-lobado, subromboide quando distendido, ca. 0.9 × 0.6 cm, branco com nervuras vináceas; lobos laterais ovados a rombico-ovados, eretos, ca. 0.4 × 0.2 cm; lobo mediano linear, ca. 0.5 × 0.1 cm, um calo longitudinal, quilhado. Coluna subcilíndrica, 0.5–0.7 cm compr.; margem do clinândrio levemente serreada, 0.2–0.3 cm compr.; antera ereta; capa oblongada, 0.5–0.6 cm compr.; polínias não vistas; estipe não visto. Frutos não vistos. Sementes não vistas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

Mexia, I., 365a, UC, **Typus**

D. Daly, 9487, NY,  (NY00472001), Acre

M. de Pardo, 96, NY, 330909,  (NY00330909), Acre

G.T. Prance, 12053, INPA, 30368,  (INPA0030368), Acre

M. Silveira, 1186, NY,  (NY00472217), Acre

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Macradenia tridentata* C.Schweinf.



Figura 2: *Macradenia tridentata* C.Schweinf.