

色羽干纹和轻微的褐色横斑,在腹侧更为显著,在下喉横过一道暗黄色羽,亦有褐色羽干纹,前颈基部白色,很象不明显的喉斑;腿覆羽暗黄色,有十分狭小褐色横斑;脚披羽至趾,但趾羽刚毛状灰白色。

虹膜黄色或深黄色;嘴灰白色或浅紫色,尖端角黄色;爪黑色。

量衡度:

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	50(至额基)	397	210	65
♂♀	41—43(至羽毛)	380—415	205—210	65—70 (Baker, 1927)

亚种分化 乌鸮有 2 个亚种,即指名亚种 *Bubo c. coromandus* 及马来亚种 *Bubo c. klossi* 见于我国的为:

(1) 指名亚种 *Bubo coromandus coromandus* (Latham)

见于我国浙江建德及江西南昌。国外见于印度及孟加拉国。

形态见前文。

Strix coromanda Latham, 1790, Index Orn., 1: 53 (模式产地: 印度科罗曼德尔海滨)。

生态 乌鸮在国内非常罕见,有关它的各种生活习性,至今未见报道。据 Baker (1927),在印度此鸮除中午时间外,白天几乎和黄昏时候一样,都在自由活动和猎食,它常在水源比较丰富的森林地区和荒漠地区活动,以猎捕鸦类、蛙、蛇、蜥蜴为食,也偶食和盗食其它鸟类的蛋,甚至猎食箭猪。在印度,它繁殖期是 11 月至 2 月,少数在 3 及 4 月产卵,占用鹰类旧巢,也在大树的树叉上用树枝营巢,并在巢中不时加上点绿叶和枝条。每窝产卵 2 枚,大小平均为 59.3 × 48.2 毫米。

Strix coromanda Latham, 1790, Index Orn., 1: 53 (模式产地: 印度科罗曼德尔海滨)。

C. 渔鸮属 *Ketupa* Lesson, 1830

形态 属大形鸮类,外形和鸮 *Bubo bubo* 相近,但冠羽长而尖,面盘上部不甚发达,跗蹠披羽或局部披羽,蹠底具细刺突,爪长而弯曲,各爪均具快利的切割边,中爪有尖的脊棱突起,第三、四、五枚初级飞羽的长度几相等,但第四枚稍长。

地理分布 主要分布于亚洲各地。我国见于东北地区及华南。国外见于土耳其南部,巴勒斯坦,伊朗,印度,斯里兰卡,缅甸,泰国,马来西亚,印度尼西亚,中南半岛地区,苏联(西伯利亚东部、沿鄂霍次克海到萨哈林岛),日本及朝鲜。

本属全世界共有 4 种,其中 3 种分布于我国。

渔鸮属分种检索

- 1. 跗蹠全部披羽.....毛腿渔鸮 *K. blakistoni* (182)