

桔艳叶夜蛾 *Eudocima tyrannus* (Guenée) (图版LVI-4)

Ophideres tyrannus Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 110. (印度)

Adris tyrannus: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 362. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363.

翅展 98 mm。头、胸棕褐色；前翅褐色似枯叶，翅脉有成列黑点，内线褐色内斜至 1 脉，一黑褐线自顶角内斜至翅后缘近中部，环纹只现一黑点，肾纹黄绿色，翅中、外及亚端区可见隐约黑棕曲纹；后翅橘黄色，亚端区有巨角形黑带，前端二叉，后半的内外缘均微波浪形，外区 1—4 脉间有一蝌蚪形黑斑；腹部橙黄色。

寄主 通草。成虫吸食多种水果的果汁。

分布 辽宁、河北、山东、江苏、浙江、湖北、台湾、福建、海南、广西、四川、云南；日本，印度。

镶艳叶夜蛾 *Eudocima homaena* (Hübner) (图版LVI-5, 6)

Othreis homaena Hübner, 1823 1816, Verz. bek. Schmett. p. 264. (印度)

Phalaena ancilla Cramer, 1777, Uitl. Kapell. 2: 84.

Ophideres ancilla: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 559. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 362.

Othreis homaena: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 36. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 106.

翅展 65—70 mm。雄蛾头部红褐色；胸部黄褐色，颈板、翅基片带紫灰色；前翅红棕色，有深棕色细纹，基线、内线与中线深棕色，内线、中线间另一棕线，仅后半明显，肾纹水滴形，不明显，外线黑棕色微曲内斜，亚端线褐黄色锯齿形，前端外侧一深棕纹外斜至翅外缘近中部；后翅杏黄色，外区一黑曲条，端区一黑带，外缘一列黄点；腹部杏黄色。雌蛾头、胸及前翅紫棕色，前翅中室后一草绿色宽条伸达外线，内线、中线及外线黑棕色。

寄主 蝙蝠葛、木防己属。

分布 台湾、广西、海南；印度，缅甸，菲律宾，马来西亚等。

暗艳叶夜蛾 *Eudocima cajeta* (Cramer) (图版LVI-7)

Phalaena Noctua cajeta Cramer, 1775, Pap. exot. 1: 48, pl. 30A—C. (印度)

Ophideres muliscripta Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 13: 1226.

Othreis cajeta: Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 106 pl. 35, fig. 1.

翅展 90 mm。头部与胸部红棕色，下唇须第一、二节内侧黄色，触角基节有白点，