

# 1. 黑顶蛙嘴夜鹰 *Batrachostomus hodgsoni* G. R. Gray, 1859

英文名: Hodgson's Frogmouth.

**地理分布** 国内仅见于云南西部潞西(芒市); 国外分布于印度、孟加拉、缅甸、泰国等。

**鉴别特征** 嘴形宽阔而厚, 上嘴甚弯曲, 先端呈钩状; 上体黑色和棕色。

**形态** (据潘清华等, 1964)

**雄性成鸟** 头顶大都黑色, 杂以棕斑; 颈侧和颊均浅棕, 缀以黑斑, 上体包括两翅及尾的表面均棕褐色, 而具黑色横斑, 间杂以一、二大型白色圆斑, 后颈白斑较多, 形成不明显的颈环状; 肩羽及次级飞羽亦有显著白斑; 初级飞羽黑褐, 外羽片有棕白色横斑, 羽端杂以黑色和棕色相间的云石状斑; 尾羽具宽阔的棕色与白色相间的横带, 各带均满杂以黑褐色斑纹, 带间还有黑褐色狭形横斑。喉部大都白色, 羽端缀黑; 胸棕而具黑色狭斑及白色大型圆点; 下体余部白而稍沾棕, 并稍杂以黑点; 尾下覆羽几纯白色; 腋羽黑而端白。

虹膜橙黄色; 嘴呈肉色; 跗蹠与趾亦呈肉红色。

**量衡度** (据杨岚等, 1995; mm, g)

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	52	240	16	131	132	17

**亚种分化** 本种共分化为 2 个亚种, 我国只有 1 个亚种。

## (1) 指名亚种 *Batrachostomus hodgsoni hodgsoni* (G. R. Gray)

仅见于云南西部潞西(芒市)(留鸟)。国外见于锡金到印度阿萨姆和缅甸北部。

*Otothrix hodgsoni* G. R. Gray, 1859, Proc. Zool. Soc., London: 101, 图版 152 (印度: Darjeeling).

*Batrachostomus hodgsoni hodgsoni* Peters, 1949, 4: 178; 郑作新, 1976, 319.

**生态** 单个停息在海拔大约 1250m 的沟谷林中乔木上, 常沿着大树的主轴伏栖着, 体色亦与树枝相仿, 不易被发现。有时以直立的姿态, 栖止在小枝上。食物为鞘翅目昆虫。4 月 7 日采到时, 睾丸已膨大, 大小为 12×3mm。

**经济意义** 此鸟食虫, 对人有益, 但因数量太少, 分布地区又极有限, 故无太大意义。然而, 从保护珍稀动物和生物多样性角度出发, 应该加以保护。

*Otothrix hodgsoni* G. R. Gray, 1859, Proc. Zool. Soc., London: 101, 图版 152 (印度: Darjeeling).