

ก่อขี้รว

Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

วงศ์ FAGACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กาปูน (สตูล) ปัน (ยะลา) เมืองาง (มาเลย์-ปัตตานี) ก่อเนื้อรีว

ไม้ต้น

ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 7-20 ม. อาจพบเป็นไม้เลื้อยในป่าละเมาะ เปลือก สีครีมอมเทาอ่อนถึงน้ำตาล เรียบถึงเป็นเกร็ดหรือ แตกบ้าง เปลือกในสีเหลืองถึงน้ำตาลอมส้ม ใบ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 14-24 ซม. ในต้นที่ยังอ่อน รูปขอบขนานแกมรีถึงไข่กลับหรือใบหอกกลับ ปลายเรียวแหลมหรือแหลมสั้น โคนรูปกลม ใบแก่เนื้อคล้ายแผ่นหนังบาง สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีเขียวอมเทาอ่อน เกือบ เส้นใบ 10-16 คู่ ขนานกัน โค้งและค่อนข้างเชื่อมกัน ใกล้ขอบ เป็นร่องด้านบน นูนมากด้านล่าง เส้นใบย่อยรูปขั้นบันได เห็นชัดด้านล่าง ก้านใบค่อนข้างใหญ่ ยาว 0.8-1.2 ซม. เกือบหุบรูปแถบแคบ กว้างประมาณ 2 มม. ยาว 15-20 มม. ผล กว้าง 1.5-2 ซม. (รวมกาบหุ้มผล) ยาว 2-3 ซม. ออกเป็นช่อเรียวยาว 12-18 ซม. ก้านผลใหญ่ ยาวน้อยกว่า 0.5 ซม. ออกเดี่ยวและห่างกันหรือพบน้อยเป็นกลุ่ม 2-3 ผล กาบหุ้มผลคล้ายจานรองถ้วย ขอบเป็นคลื่น หรือโค้งหุ้มประมาณ 1/4 ของผล บางแข็ง มีเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กซ้อนกัน หรือเชื่อมกันเป็นวงไม่ชิดไปยังโคน มีขนสีน้ำตาลอมเหลือง หรือสีสนิมถึงน้ำตาลเข้มแน่น แก่ไม่แตก ตัวผลกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. รูปไข่ ปลายมียอดคล้ายหัวนม โคนกลม มีรอยแผลเป็นโค้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7-1 ซม. เมื่ออ่อนมีนวล เกือบและสีน้ำตาลมันเมื่อแก่ พบทั่วไปในภาคใต้ ในป่าที่ต่ำ สูงถึง 200 ม. มักพบตามสันเขาใกล้น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินตา สิทธิสุนทร กองกานตา ชยามฤต,
ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คสฟ.
2559 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

