

## Vogels van Suriname

1. Het geheel is gebaseerd op: **O.H.Ottema, J.H.J.M.Ribot en A.L.Spaans: Annotated checklist of the birds of Surinam**; WWF Guianas, Paramaribo, 2009; ISBN 978-99914-7-022-1. Waarnemingen gedaan na het verschijnen van dit boekje komen van [www.surinamebirds.nl/php/listbirds.php](http://www.surinamebirds.nl/php/listbirds.php) (t/m juni 2015). "Kustvlakte", "Noordelijke savanne" e.d. slaan op de leefgebieden genoemd in bovenstaand boekje. Het genoemde leefgebied is dat, of zijn die, waar de meeste kans is de betreffende vogel te zien. (Dat zegt niets over de frequentie waarmee de vogel daar voorkomt).
2. Juveniele vogels worden niet beschreven.
3. De Engelse naam en de wetenschappelijke naam van **niet-zangvogels** komen uit: **J. del Hoyo en N.J. Collar: Illustrated checklist of the Birds of the World**, vol. 1: **Non-passerines**; Lynx editions, Barcelona, 2014. Namen van **zangvogels** komen uit de relevante delen van **J.del Hoyo, A.Elliott en J. Sargatal (Eds): Handbook of the Birds of the World**; Lynx editions, Barcelona, 1992-2011. De vetgedrukte cijferreeks in de beschrijving geeft achtereenvolgens het deel, de bladzijdenummer en het nummer van de beschrijving van de behandelde vogel in het bovengenoemde HBW.
4. De Nederlandse naam komt van **Avibase**: [avibase.bsc.eoc.org/avibase.jsp?lang=NL](http://avibase.bsc.eoc.org/avibase.jsp?lang=NL). Eventuele Engelse en Nederlandse namen van ondersoorten komen daar ook vandaan en worden tussen haakjes vermeld.
5. De illustraties zijn geplukt van het internet en betreffen zo mogelijk de relevante ondersoort.
6. De beschrijvingen stelen op die in: **F.Haverschmidt en G.F.Mees: Birds of Surinam**, Vaco N.V., Paramaribo, 1994, het bovengenoemde **HBW**, diverse veldgidsen en die gevonden op het internet.

**Jan K. Nijhof**

Op pagina 149 volgt een Index.

### Soortbeschrijvingen:

Familie: ***Tinamidae***, **Tinamous**, Tinamoes

Plompe grondbewoners met korte, stevige poten; rudimentaire staart, 15-50 cm.



**Great tinamou**,  
*Tinamus major major*,  
Grote tinamoe  
40-46 cm (Kuifeend 40-47)

Laaglandbos






Licht tot donker olijfbruin met zwarte dwarsstreepjes. Wittig op keel en buik. Kroon en nek roodbruin. Eventueel kuifje roetkleurig. Onderstaart kaneelkleurig. Poten licht blauwgrijs.  
Broedvogel.  
**I.127.4**




**Cinereous tinamou**,  
*Crypturellus cinereus*,  
Grauwe tinamoe  
29-32 cm (Kauw 30-34)

Laaglandbos


Donkerbruin, van onder lichter. Roodbruine kroon en nek. Poten geelbruin.  
Broedvogel.  
**I.128.10**

	<p><b>Little tinamou,</b> <i>Crypturellus soui soui</i>, Kleine tinamoe 22-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Effen bruin, van onder beige, bij ♀ roestbruin. Kop zwartachtig, keel wit. Poten grijs, olijfkleurig of geel. Broedvogel. <b>I.128.11</b></p>
	<p><b>Red-legged tinamou,</b> <i>Crypturellus erythropus erythropus</i>, Roodpoottinamoe 28-32 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Dof bruin met, soms onduidelijke, dwarsstreepjes. Gezicht en onderborst roodbruin waartegen de grijze bovenborst afsteekt. Keel wit. Onder beige met dwarsstrepen op de flanken. Poten roze tot rood. ♀ contrastrijker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>I.131.18</b></p>
	<p><b>Variegated tinamou,</b> <i>Crypturellus variegatus</i>, Bonte tinamoe 28-31 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag- en Hooglandbos</p>	<p>Zwarte kop, witte keel; hals, borst en voorste deel van de rug roodbruin. Rest van de rug zwart met oker dwarsstrepen. Flanken kaneelkleurig, zwart gebandeerd. Buik wit. Snavel geel. Poten olijfkleurig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>I.132.24</b></p>
	<p><b>Rusty tinamou,</b> <i>Crypturellus brevirostris</i> Rosse tinamoe 25-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laagland bos</p>	<p>Donkerbruine kap, bruin gezicht, roodbruine nek en mantel, witte kin. Bovendelen oker en zwart gebandeerd. Borst okerrood, flanken en onderstaart oker, flanken smal zwart gestreept, buik wit. Iris bruin, snavel zwartachtig van boven, onder bleek, poten geelgrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>I.132 25</b></p>
<p><b>Familie: Podicipedidae, Grebes, Futen</b> Watervogels met een scherpe snavel, gelobde tenen en een gereduceerde staart.</p>		
	<p><b>Least grebe,</b> <i>Tachybaptus dominicus brachyrhynchus</i>, Amerikaanse dodaars 21-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Asgrijs met een witte keel. In broedkleed bruingrijs met een zwarte keel en kroon. Korte, puntige, zwarte snavel. Gele iris. Broedvogel. <b>I.190.5</b></p>

	<p><b>Pied-billed grebe,</b> <i>Podilymbus podiceps antarcticus,</i> Dikbekfuut 30-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Bruinachtig grijs met witte keel. In broedkleed zwarte keel en zwarte band om snavel. Snavel dik, stomp, grijsachtig. Iris bruin. Broedvogel. <b>I.190.6</b></p>
--	---	---

**Familie: *Diomedidae*, Albatrosses, Albatrossen**






Grote, zware zeevogels met erg lange vleugels en een lange, zware "buisssnavel".






	<p><b>Atlantic yellow-nosed albatross</b> <i>Thalassarche chlororhynchos,</i> Geelneusalbatros 71-81 cm (Koligans 64-78)</p> <p>Marien</p>	<p>Slank; snavel lang en dun met een smalle gele band langs de bovenkant en rode punt. Zwarte staart. Ondervleugel: zwarte streep langs voorrand, wat breder dan die langs achterrand, zwarte vleugelpunten. Kroon iets witter dan kop. Dwaalgast. <b>I.214.11</b></p>
---	--	--





**Familie: *Procellariidae*, Petrels and Shearwaters, Stormvogels**

Middelgrote tot grote, compact gebouwde zeevogels met lange, smalle vleugels en een "buisssnavel".

	<p><b>Cape Verde petrel,</b> <i>Pterodroma feae,</i> Gon-gon 32-37 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Vliegt snel. Staart puntig, Ondervleugel geheel donker op witte oksel na. Boven grijs met subtiel W-patroon. Bovenstaart effen lichtgrijs. Donkere oogvlek in wit gezicht; dikke, donkere snavel. Zijborst met grijs waas. Dwaalgast. <b>I.243.24</b></p>
	<p><b>Bulwer's petrel,</b> <i>Bulweria bulwerii,</i> Bulwers stormvogel 26-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>Lange, smalle vleugels en lange staart. Effen donker grijsbruin met vaak lichte diagonale armband. Donkere effen ondervleugel. Dikke snavel. Dwaalgast. <b>I.250.46</b></p>

	<p><b>Cory's shearwater,</b> <i>Calonectris borealis,</i> Kuhls pijlstormvogel 45-48 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Lange vleugels, altijd (iets) omlaag gebogen. Lange glijvluchten laag boven het water, onderbroken door 3-4 rustige, soepele vleugelslagen. Handvleugel wordt in een hoek naar achteren gehouden. Bovenzijde bruingrijs, onder witachtig met vuilgrijze zijden van borst, hals en kop. Snavel bleekgeel, donker aan de punt. Brede donkere achterrand aan vleugel, geheel donkere handvleugel. Beetje wit voor donkere staartpunt. Dwaalgast. <b>I.251.53</b></p>
	<p><b>Great shearwater,</b> <i>Ardenna gravis,</i> Grote pijlstormvogel 43-51 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Bovenstaartdekveren duidelijk wit, roetbruine kap met wittige halsband. Donkere vlek op witte zijborst, donkere vlekken en strepen op ondervleugel. Diffuse donkere vlek op buik, grijsbruine onderstaartdekveren. Zwarte snavel. Dwaalgast. <b>I.253.56</b></p>
	<p><b>Manx shearwater,</b> <i>Puffinus puffinus,</i> Noordse pijlstormvogel 30-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Effen zwarte bovenzijde en witte onderkant. Kap reikt tot onder oog en tot over oorstreek; Zijhals donker tot op zijborst. Meestal lichte krul achter oorstreek. Ter hoogte van stuit vertoont het wit een duidelijke inbochting in het zwart. Duidelijk contrast tussen zwart en wit op de ondervleugel. Migrant uit het noorden. <b>I.255.62</b></p>
	<p><b>Audubon's shearwater,</b> <i>Puffinus lherminieri</i> <i>lherminieri,</i> Audubons pijlstormvogel 27-33 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Bovenkant roetzwart; zijkop, onderkant en ondervleugel wit. Poten vleeskleur. Donkere rand om ondervleugel. Dwaalgast. <b>I.256.69</b></p>
<p><b>Familie <i>Hydrobatidae</i>, Storm-petrels, Stormvogeltjes</b> Kleine, lichte "buisneus"-zeevogels met lange poten en afgeronde vleugels of kortere poten en meer puntige vleugels.</p>		
	<p><b>Wilson's storm-petrel</b> <b>(Fuegian storm-petrel),</b> <i>Oceanites oceanicus chilensis,</i> Wilson's stormvogeltje 15-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien</p>	<p>Effen donkere ondervleugel, duidelijke lichte armbaan op bovenzijde. Licht gebogen vleugelvoorrand, geen echte hoek. Tenen steken uit achter staart, lange poten. Witte stuitvlek loopt bijna rondom. Maakt lange glijvluchten op horizontale vleugels, trippelt met vleugels omhoog over wateroppervlak. Dwaalgast. <b>I.267.1</b></p>

	<p><b>Band-rumped storm-petrel,</b> <i>Hydrobates castro</i>, Madeirastormvogeltje 19-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien</p>	<p>Donker met witte stuit. Weinig duidelijke lichte diagonale armbaan, nauwelijks gevorkte staart. Wit van stuit breder dan lang, opvallend zware snavel. Dwaalgast. <b>I.269.11</b></p>
	<p><b>Leach's storm-petrel,</b> <i>Hydrobates leucorhous leucorhous</i>, Vaal stormvogeltje 19-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien</p>	<p>Vleugels lang en smal, scherp gehoekt, vorkstaart. Tamelijk duidelijke armbaan op de bovenvleugel tot aan de voorrand. Donkere middelstreep door witte stuit. Dwaalgast. <b>I.270.13</b></p>
<p><b>Familie: <i>Phaetontidae</i>, Tropicbirds, Keerkringvogels</b> Middelgrote zeevogels met lange smalle vleugels; de middenstaartveren zijn verlengd.</p>		
	<p><b>Red-billed tropicbird,</b> <i>Phaethon aethereus mesonauta</i>, Roodsnavelkeerkringvogel 34-59 + 46-56 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Voornamelijk wit, streep door oog, vleugelpunten, midden van staart en dwarsgolven op de rug zwart. Snavel rood. Dwaalgast. <b>I.288.1</b></p>
<p><b>Familie: <i>Pelecanidae</i>, Pelicans, Pelikanen</b> Grote watervogels met een lange, zware snavel en een enorme, elastische zak aan de ondersnavel.</p>		
	<p><b>(Atlantic) Brown pelican,</b> <i>Pelecanus occidentalis carolinensis</i>, Bruine pelikaan 105-152 cm (Knobbelzwaan 140-160)</p> <p>Marien</p>	<p>Donkerbruin met zwarte poten en witte hals en kop. In broedkleed met gele kop, kastanje nek en zilverig op de rug. Stootduikt. Dwaalgast. <b>I.311.7</b></p>
<p><b>Familie: <i>Sulidae</i>, Gannets and Boobies, Jan-van-genten</b> Flinke zeevogels met lange, smalle snavels en een kegelvormige snavel. Stootduikers.</p>		
	<p><b>Brown booby,</b> <i>Sula leucogaster leucogaster</i>, Bruine gent 64-74 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien</p>	<p>Chocoladebruin, buik en grootste deel van ondervleugel wit. Snavel en voeten geel. Wigstaart. ♂ heeft in de broedtijd een blauw gezicht. Dwaalgast. <b>I.325.9</b></p>

	<p><b>Red-footed booby,</b> <i>Sula sula sula</i>, Roodpootgent 66-79 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien</p>	<p>Erg polymorf. Witte vorm: wit, vaak abrikoos waas, meestal zwarte slagpennen. Ondervleugel met kenmerkende grijszwarte polsvlek. Soms zwarte staart, soms witte staart met geheel zwarte bovenzvleugels en "zadel" Bruine vorm: bruin, vaak kop het bleekst en vleugels en staart het donkerst, sommige achter wit, staart wit. Iris zwartbruin. Snavel grijsblauw, basis rood. Van mondhoek naar keelzak smalle zwarte lijn. Naakte huid om oog blauw. Poten helder rood. ♀♀ wat groter. Dwaalgast. <b>I.324.8</b></p>
	<p><b>Masked booby,</b> <i>Sula dactylatra dactylatra</i>, Maskergent 81-92 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Marien</p>	<p>Grootste gent. Dikke snavel, geheel wit, behalve staart en vleugels, ondervleugeldekveren wit. Iris goudgeel, snavel geel, soms bleek hoornkleurig. Zwarte gezichtshuid (masker). Poten geel. ♀ wat groter, snavel en poten rose. Dwaalgast. <b>I.324.7</b></p>
<p><b>Familie: <i>Phalacrocoracidae</i>, Cormorants, Aalscholwers</b> Watervogels met een langgerekt lijf, een lange hals en een sterke haaksnavel.</p>		
	<p><b>Neotropic cormorant,</b> <i>Phalacrocorax brasilianus</i> <i>brasilianus</i>, Bigua-aalscholwer 58-73 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien</p>	<p>Zwart met een geelbruine keelvlek. Lange staart, houdt hals vaak in een S-vorm. In broedkleed witte pluimpjes opzij van de kop en de keelvlek heeft dan een witte rand. Dwaalgast. <b>I.343.2</b></p>
<p><b>Familie: <i>Anhingidae</i>, Darters, Slangenhalsvogels</b> Grote watervogels met een erg lange, slanke hals en een lange speersnavel.</p>		
	<p><b>Anhinga,</b> <i>Anhinga anhinga anhinga</i>, Amerikaanse slangenhalsvogel 81-91 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Marien, Laaglandbos</p>	<p>Snavel geel, lang, dun en puntig. Nek lang en dun, kop klein. Staart lang en wigvormig. Zilverwitte veren op de rug en in de staart. ♂: Glanzend groenachtig zwart. ♀: Kop, hals en borst bruin, verder bruinzwart. Broedvogel. <b>I.360.1</b></p>

**Familie: *Fregatidae*, Frigatebirds, Fregatvogels**

Lichte zeevogels met lange, puntige vleugels en staart en een lange haaksnavel.



**Magnificent frigatebird,**  
*Fregata magnificens*  
*rothschildi*,  
Amerikaanse fregatvogel  
89-114 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien

♂: Geheel zwart met paarsgroene glans. Rode keelzak.  
♀: Met witte borst, grijzige halsband en enig wit in de oksels.  
Zwaluwstaart.  
Dwaalgast.  
**I.373.3**

**Familie: *Ardeidae*, Herons, Reigers**

Waadvogels met een lange snavel, een lange hals en lange poten.



**Capped heron,**  
*Pilherodius pileatus*,  
Kapreiger  
51-61 cm (Buizerd 48-56)

Laaglandbos

Rug en vleugels bleek parelgrijs. In de broedtijd een beige waas over hals, borst en vleugels. Blauw gezicht, zwart kapje. Twee pluimen aan achterkop.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**I.405.2**



**Cooi heron,**  
*Ardea cocoi*,  
Sokoireiger  
95-127 cm (Blauwe reiger 84-102)

Marien, Kustvlakte,  
Laaglandbos

Zwarte kap, witte nek met soms wat zwarte lengtestrepen. Grijs rug en vleugels. Witte pluimen op de borst. Gele snavel met zwarte basis. Gele ogen en zwartachtige poten.  
In broedkleed met lange, zwarte pluimen met witte punten aan de kap. De snavel heeft dan een roodachtige basis en de poten zijn grijsrose.  
Broedvogel.  
**I.406.5**



**(American great egret) Great white egret,**  
*Ardea alba egretta*,  
Grote zilverreiger  
80-104 (Blauwe reiger 84-102)

Marien, Kustvlakte






Geheel wit met een gele snavel en zwarte poten. In broedkleed met sierveren op de rug, donkerder snavel en het onderste deel van de poten lichter.  
Broedvogel.  
**I.409.13**








**Tricoloured heron,**  
*Egretta tricolor tricolor*,  
Witbuikreiger  
50-76 cm (Kolgans 64-78)






Marien, Kustvlakte


Blauwgrijs met een witte lijn langs de hals en een witte buik. Gele snavel met een zwarte punt en gele poten. In broedkleed hebben ze lange, blauwe, draadvormige veren aan kop en hals. Op de rug hebben ze dan ook dergelijke veren maar die zijn beige.  
Broedvogel.  
**I.410.18**

	<p><b>Little blue heron,</b> <i>Egretta caerulea</i>, Kleine blauwe reiger 51-76 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Blauwgrijs met lichtpaarse hals. In broedkleed met lange blauwe draadveren aan kop en schouders. De poten zijn donkerblauw. De iets gekromde snavel is blauw met zwart. Broedvogel. <b>I.411.21</b></p>
	<p><b>Snowy egret,</b> <i>Egretta thula thula</i>, Amerikaanse kleine zilverreiger 48-68 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Zwarte snavel en poten, met gele voeten. In broedkleed met een koppluim en sierveren op de rug. Het plekje voor de ogen kleurt dan rood. Broedvogel. <b>I.411.22</b></p>
	<p><b>(Western) Cattle egret,</b> <i>Bubulcus ibis ibis</i>, (Westelijke) Koereiger 46-56 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Wit, gedrongen, met korte snavel. In broedkleed met veel beige. Broedvogel. <b>I.415.26</b></p>
	<p><b>Little egret,</b> <i>Egretta garzetta subsp.???</i> Kleine zilverreiger 55-65 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zwarte poten met heldergele tenen, zwarte snavel. Teugel grijs, in paartijd rood. In broedtijd twee fladderende sierveren aan achterhoofd. Dwaalgast. <b>I.412.23</b></p>
	<p><b>Green-backed heron (Striated heron),</b> <i>Butorides striata striata</i> Mangrove-reiger 35-48 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Variabel, zelfs binnen zelfde ondersoort. Blauwgrijze rug en vleugels, wit van onder, een zwarte kap en korte gele poten. <b>Nek, zijkant kop en borst grijs.</b> Broedvogel. <b>I.417.33</b></p>




	<p><b>Green-backed heron (Green heron),</b> <i>Butorides striata virescens</i>, Mangrove-reiger (Groene reiger) 35-48 cm (Kuifeend 40-47) Kust</p>	<p>Variabel, zelfs binnen zelfde ondersoort. Rug grijsgroen. Hals wit met een zwarte middenlijn. Middenborst wit met zwarte strepen. Buik bleek bruin. Kap groenig zwart. <b>Nek, zijkant kop en borst paarsig kastanje.</b> Dwaalgast. <b>I.417.33</b></p>
	<p><b>Agami heron,</b> <i>Agamia agami</i>, Agamireiger 60-76 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Lange, dunne snavel. Nek en onderdelen kastanje, een witte streep in het midden langs de hals, de vleugels zijn groen. Hij heeft sprietige bleekblauwe sierveren aan de kop, de hals en onderaan de rug. Poten, snavel en een kale plek voor het oog zijn matgeel. Broedvogel. <b>I.417.34</b></p>
	<p><b>Yellow-crowned night-heron,</b> <i>Nyctanassa violacea cayennensis</i>, Geelkruinkwak 51-70 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien</p>	<p>Gele kroon, achterhoofd met sierveren en vlek op de wang wit. Rest van de kop en de keel zwart, hals en lijf blauwgrijs. Snavel zwart, poten geel. Broedvogel. <b>I.419.35</b></p>
	<p><b>Black-crowned night-heron,</b> <i>Nycticorax nycticorax hoactli</i>, (Amerikaanse) Kwak 56-65 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Kroon en rug donkergrijs, de onderdelen zijn zuiver wit. Aan het achterhoofd zitten drie lange witte sierveren. De poten zijn bleekgeel en de snavel is donker. Iris rood. Broedvogel. <b>I.419.36</b></p>
	<p><b>(Southern) Boat-billed heron,</b> <i>Cochlearius cochlearius cochlearius</i>, Schuitbekreiger 45-51 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Een nachtreiger. Zwarte kroon met lange pluim en zwarte mantel. De rest van de rug en de vleugels zijn bleekgrijs. Het gezicht, de keel en de borst zijn zuiver wit. De buik is bruin met zwarte flanken. Grote ogen. Broedvogel. <b>I.421.42</b></p>


	<p><b>Fasciated tiger-heron,</b> <i>Tigrisoma fasciatum salmoni</i>, Gestreepte tijgerroerdomp 61-71 cm (Kolgens 64-78) Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon zwart, hals en rug leigrijs met fijne beige kronkelstreepjes. Borst bruin met witte strepen, buik grijsbruin. Deze ondersoort is wat kleiner. Waarschijnlijk broedvogel. <b>I.422.44</b></p>
	<p><b>Rufescent tiger-heron,</b> <i>Tigrisoma lineatum lineatum</i>, Rosse tijgerroerdomp 66-67 cm (Kolgens 64-78)  Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Kop, nek en bovenrug kastanje, rest van de rug dof zwart met fijne, gelige kronkelstreepjes. Er loopt een witte streep langs de hals. De buik is lichtbruin, de flanken zijn zwart-wit gestreept. Broedvogel. <b>I.422.45</b></p>
	<p><b>Zigzag heron,</b> <i>Zebrilus undulatus</i>, Zigzagreiger 28-33 cm (Kauw 30-34)  Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Kroon en (flinke) kuif zwart, gezicht en hals kastanje. Bovendelen zwart met smalle, golvende beige lijnen. Van onderen beige. Waarschijnlijk broedvogel. <b>I.425.48</b></p>
	<p><b>Stripe-backed bittern,</b> <i>Ixobrychus involucris</i>, Gestreepte woudaap 28-33 cm (Kauw 30-34)  Marien, Kustvlakte</p>	<p>Zwaar gestreepte rug. Vleugeltoppen lichtbruin. Van onderen lichtgeel met donkerder strepen. Status onbekend. <b>I.425.49</b></p>
	<p><b>Least bittern,</b> <i>Ixobrychus exilis erythromelas</i>, Amerikaanse woudaap 28-36 cm (Kauw 30-34)  Kustvlakte</p>	<p>De ♂ heeft een glanzende, groenachtig zwarte rug en kroon. Bij de ♀ is dat glanzend bruin. De onderdelen en keel zijn wit met bruine strepen. Het gezicht en de halszijden zijn lichtbruin. Gele ogen en snavel. In vlucht met lichtbruine plekken in de vleugel. Broedvogel. <b>I.425.50</b></p>


	<p><b>Pinnated bittern,</b> <i>Botaurus pinnatus pinnatus</i>, Zuid-Amerikaanse roerdomp 64-76 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Zwarte snorstreep. Kroon zwart; van boven bruin met lichtbruine kronkelstrepen. De keel is wit en de rest van de onderzijde vuilwit met lichtbruine strepen. De staart is zwart bij de man en bruin bij de vrouw. In vlucht vallen de leigrijze slagpennen op. Snavel en iris geel, poten groenachtig geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>I.427.57</b></p>
--	--	---

**Familie: Ciconiidae, Storks, Ooievaars**

Grote waadvogels met lange poten en een lange nek; lange en soms zware snavel.


	<p><b>Wood stork,</b> <i>Mycteria americana</i>, Kaalkopooievaar 83-102 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Marien</p>	<p>Wit met grijszwarte poten en rose voeten. De achterrand van de vleugel en de staart zijn zwart. Snavel, kale kop en nek zijn grijszwart. Broedvogel. <b>I.457.1</b></p>
---	---	--




	<p><b>Maguari stork,</b> <i>Ciconia maguari</i>, Magoeari 97-102 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Wit, met zwarte vleugels en staart. Snavel, gezicht en poten oranjerood. Witte iris, vorkstaart. Status onbekend. <b>I.460.11</b></p>
---	--	--

	<p><b>Jabiru,</b> <i>Jabiru mycteria</i>, Jabiroe 122-140 cm (Ooievaar 95-110)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Wel 1,5 m hoog! De snavel is groot en zwart en iets op gebogen. De vogel is wit maar kop en hals zijn kaal en zwart met een elastische knalrode keelzak. Broedvogel. <b>I.463.16</b></p>
---	--	---

**Familie: Threskiornithidae, Ibises and Spoonbills, Ibissen en Lepelaars**


Waad- en grondvogels met een tamelijk lange nek, poten en snavel. Die laatste is dun en gebogen of breed en plat.

	<p><b>Green ibis,</b> <i>Mesembrinibis cayennensis</i>, Groene ibis 48-58 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Bovenvleugel olijfbrons met groene weerschijn. Pluizige kuif turkooisgroen. Bleekgroene poten en snavel; grijs, kaal gezicht. Broedvogel. <b>I.500.19</b></p>
--	--	--

	<p><b>White ibis</b>  <i>Eudocimus albus ramobustorum</i>  Witte ibis  56-71 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Wit, vleugeltoppen zwart. Gezicht, snavel en poten rood. Snavelpunt zwart in broedkleed.  Dwaalgast.  <b>I.500.21</b></p>
	<p><b>Scarlet ibis,</b>  <i>Eudocimus ruber,</i>  Rode ibis  55-63 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Knalrode vogel, alleen de toppen van de buitenste handpennen zijn zwart. Rose tot rode snavel, in broedkleed is die echter zwart.  Broedvogel.  <b>I.501.22</b></p>
	<p><b>Roseate spoonbill,</b>  <i>Platalea ajaja,</i>  Rode lepelaar  69-87 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Marien</p>	<p>Rose met een grijze, lepelvormige snavel. De kop is groenig, maar in broedkleed deels oranje-geel. Nek, rug en borst zijn wit. (De borst heeft in de broedtijd in het midden een bosje roze veren).  Broedvogel.  <b>I.506.32</b></p>


**Familie: *Phoenicopteridae*, Flamingos, Flamingo's**

Grote watervogels met een lange nek en lange poten; met een unieke, gebogen snavel, gebouwd om voedsel te vergaren door te filteren.

	<p><b>American flamingo,</b>  <i>Phoenicopus ruber,</i>  Caribische flamingo  120-145 cm (Ooievaar 95-110)</p> <p>Marien</p>	<p>Fel oranje met lange roze poten en een lange nek. De snavel is naar beneden gebogen, lichtgeel aan de basis, roze tot oranje in het midden en zwart aan de punt.  Dwaalgast.  <b>I.525.1</b></p>
--	--	---






**Familie: *Anhimidae*, Screamers, Hoenderkoeten**






Grote, zwaar gebouwde watervogels met lange, stevige poten en een kleine kop en kleine snavel.






	<p><b>Horned screamer,</b>  <i>Anhima cornuta,</i>  Anioema  84-94 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Marien</p>	<p>Een lange, witte schacht steekt omhoog uit de kroon: de "hoorn". Kippensnavel. Bovendelen, kop en borst zijn zwart met witte vlekken op kroon, keel en vleugels. De iris is geel tot oranje.  Waarschijnlijk broedvogel.  <b>I.534.1</b></p>
--	--	---

**Familie: Anatidae, Ducks, Geese and Swans, Eenden, Ganzen en Zwanen**

Middelgrote tot grote watervogels met een plomp lijf, korte poten en een platte, afgeronde snavel.

	<p><b>Fulvous whistling-duck,</b> <i>Dendrocygna bicolor,</i> Rosse fluiteend 45-53 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Kop, hals en onderdelen lichtbruin; een zwarte lengtestreep in de nek. Rug donkerbruin, roodbruin gebandeerd. Staartdekveren wit. Verlengde roomkleurige veren in een lijn langs de flank. Snavel grijs, poten blauwgrijs. Status onbekend. <b>I.575.4</b></p>
	<p><b>White-faced whistling-duck,</b> <i>Dendrocygna viduata,</i> Witwangfluiteend 38-48 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Grijze snavel; wit gezicht, kroon en hals. De achterkop is zwart, rug en vleugels zijn donkerbruin en de onderdelen zwart met wit gebandeerde flanken. De hals is kastanje. Lange schouder- en rugveren. Status onbekend. <b>I.576.7</b></p>
	<p><b>(Southern) Black-bellied whistling-duck,</b> <i>Dendrocygna autumnalis autumnalis,</i> (Roodsnavelfluiteend) Zwartbuikfluiteend 43-53 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Rode snavel; grijze kop, borst en mantel; buik en staart zwart. De rug, nek en kap zijn kastanje. Een witte oogring en veel wit in de vleugel. Broedvogel. <b>I.577.9</b></p>
	<p><b>Muscovy duck,</b> <i>Cairina moschata,</i> Muskuseend 66-84 cm (Koligans 64-78)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>De ♂ is zwartachtig met grote witte vleugelvlekken en een kuifje. De snavel is zwart met een donkerrode knobbel. Het kale gezicht is ook rood, de poten zijn zwartachtig. De ♀ is een stuk kleiner en heeft <b>geen</b> kaal gezicht en geen snavelknobbel. Broedvogel. <b>I.594.54</b></p>
	<p><b>American wigeon,</b> <i>Mareca americana,</i> Amerikaanse smient 45-56 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kroon wit, groene streep door oog, in nek bij elkaar komend. Wangen en hals wit met zwarte vlekjes. Bovenrug bruin, met enkele zwarte strepen, lage rug zwart met witte strepen. Borst en zijden bruin. Buik en brede vlek op voorvleugel wit. Spiegel zwart met bronzen weerschijn. Achtereinde en staart zwart. ♀: Kop en hals zwart en wit gespikkeld, donkere vlek om oog. Rug zwart, met lichte veerranden. Borst en zijden oranje beige. Poten van man en vrouw zwart, snavel blauwgrijs met zwarte punt. Dwaalgast. <b>I.601.71</b></p>

	<p><b>Northern pintail,</b> <i>Anas acuta,</i> Pijlstaart 50-65 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Vleugels lang, smal en spits, staart lang en spits, vooral bij de man. Hals lang en smal, kop klein. Broedkleed man: verlengde staart, kop en nek bruin, hals en borst wit, wit loopt als streep door over de zijhals. Spiegel groenzwart. Vrouw: Snavel slank en donkergrijs, kop eenkleurig lichtbruin; grijsbruin, grof geschubd lijf. Spiegel donkerbruin met duidelijke witte achterrand. Buik bruinwit. Dwaalgast. <b>I.608.92</b></p>
	<p><b>White-cheeked pintail,</b> <i>Anas bahamensis bahamensis,</i> Bahamapijlstaart 38-51 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Witte wangen en keel, het overige verenkleed is gelig bruin met een groen glanzende, zwarte tekening. De staart is puntig en lichtbruin. De snavel is blauw met rood aan de basis. De poten zijn loodgrijs. Broedvogel. <b>I.611.94</b></p>
	<p><b>Blue-winged teal,</b> <i>Spatula discors,</i> Blauwvleugeltaling 35-41 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>De ♂ heeft een zwarte kruin en kin, bovendien een opvallende, halvemaanvormige, witte vlek tussen oog en snavel. De rest van de kop is blauwgrijs. De voorvleugel is hemelsblauw tot groen. De onderzijde is okergeel met zwarte vlekjes, de snavel zwart en de poten geel. De ♀ heeft een lichtblauwe voorvleugel en een witte buik. Migrant uit het Noorden. <b>I.612.99</b></p>
	<p><b>Southern Pochard,</b> <i>Netta erythrophthalma erythrophthalma,</i> Bruine krooneend 50-51 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zeer donkerbruin, spiegel wit, snavel grijsblauw met zwarte punt. De brede witte vleugelstreep valt op in vlucht. Het vrouwtje is saaiër bruin. Hals, keel en snavelbasis wit, uitlopend in een beige komma op de kop. Dwaalgast. <b>I.615.108</b></p>
	<p><b>Lesser scaup,</b> <i>Aythya affinis,</i> Kleine topper 38-48 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kop en hals purperachtig zwart, borst bruinzwart. Piepklein kuifje. Buik wit, zijden met bruine kronkeltjes. Rug wit met golvende, smalle dwarsstreepjes. Witte vleugelstreep in vlucht. Snavel grijsblauw. Vrouw: voornamelijk bruin, hals en kop het donkerst. Breed wit rondom snavelbasis. Dwaalgast. <b>I.618.121</b></p>

	<p><b>Masked duck,</b> <i>Nomonyx dominicus</i>, Maskerstekelstaart 30-36 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noor- delijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Een eend met een stijve staart. De broedende ♂ is roestkleurig met een zwart gezicht, gevlekte vleugels. en een blauwe snavel. De ♀ is bruingrijs gebandeerd met twee donkere horizontale strepen in het beige gezicht. Broedvogel. <b>I.626.141</b></p>
<p><b>Familie: <i>Cathartidae</i>, New World Vultures, Gieren van de Nieuwe Wereld</b></p>		
<p>Middelgrote tot grote dagroofvogels met een kale kop, een krachtige haaksnavel en een groot vleugeloppervlak waardoor ze goed kunnen zweven; voornamelijk aaseters.</p>		
	<p><b>(Central American) Turkey vulture,</b> <i>Cathartes aura ruficollis</i>, (Centraal-Amerikaanse) Roodkopgier 64-81 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noor- delijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Bruinzwart met rose tot rode kale kop en hals. Op het achterhoofd een witachtige band. Broedvogel <b>II.39.1</b></p>
	<p><b>Lesser yellow-headed vulture,</b> <i>Cathartes burrovianus urubitinga</i>, Kleine geelkopgier 58-66 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwart. Kale kop en hals geel, soms met oranje en blauw. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.39.2</b></p>
	<p><b>Greater yellow-headed vulture,</b> <i>Cathartes melambrotus</i>, Grote geelkopgier 74-81 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noor- delijke savanne, Laag-, Hoog- landbos</p>	<p>Glanzend zwart. Kale kop heldergeel met een oranje nek en blauwe kroon. Staart langer dan van Kleine. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.39.3</b></p>
	<p><b>American black vulture,</b> <i>Coragyps atratus brasiliensis</i>, Zwarte gier 56-68 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Dof zwart. In vlucht zijn de handpennen van onder lichtgrijs. De kop en de hals zijn kaal en zwart met plooiën en wratten. Broedvogel. <b>II.39.4</b></p>



**King vulture,**  
*Sarcoramphus papa*,  
Koningsgier  
71-81 cm (Kolgens 64-78)  
  
Laag-, Hooglandbos

De rugkleur verloopt van wit naar beige. De vleugels en de dikke kraag zijn zwart. De kale kop is purper, de kroon rood. De kale hals is rood, op de keel naar geel verlopend. De kophuid is sterk geplooid. De oranje washuid heeft een veellobbige lel. Wit oog, rode oogring.  
Broedvogel.  
**II.40.5**

**Familie: Pandionidae, Osprey, Visarend**

Grote, visetende roofvogel.



**(North American) Osprey,**  
*Pandion haliaetus*  
*carolinensis*,  
Visarend  
55-58 cm (Buizerd 48-56)  
  
Marien, Kustvlakte

Een donkere streep door het oog. Een gespikkelde, bruine halsketting. In vlucht lichte ondervleugel met zwarte polsvlekken en zwarte grote dekveren. Houdt de vleugels vanaf de pols teruggebogen in een ondiepe V. De vleugels zijn lang en smal.  
Migrant uit het noorden.  
**II.51.1**

**Familie: Accipitridae, Hawks and Eagles, Havikachtigen**

Kleine tot grote dagroofvogels met een haaksnavel en een vlezige washuid; krachtige poten met scherpe, gekromde klauwen en vaak brede vleugels; scherpe ogen.



Gray-headed Kite

**Grey-headed kite,**  
*Leptodon cayanensis*  
*cayanensis*,  
Grijskopwouw  
(Cayennewouw)  
46-54 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos

Korte, brede vleugels en lange staart. Grijze bivakmuts, zwarte rug, staart zwart met twee zichtbare witte banden en een wit einde. Van onderen grijswit; een zwarte ondervleugel met bleke slagpennen. Ogen, washuid, gezicht en poten blauwgrijs.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**II.108.6**



**Hook-billed kite,**  
*Chondrohierax uncinatus*  
*uncinatus*,  
Langsnavelwouw  
38-42 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Grote, kromme snavel. Variabel.  
♂: Leigrijs van boven, grijze borst die wittig gebandeerd is, staart met 2-3 witte banden.  
♀: Bruin van boven, wangen grijs, bruine kraag, bruine borst die fijn wit gebandeerd is.  
Washuid geelgroen en poten oranjegeel.  
Broedvogel.  
**II.109.8**



American Swallow-tailed Kite

**American swallow-tailed kite,**  
*Elanoides forficatus yetapa*,  
Zwaluwstaartwouw  
56-66 cm (Kolgens 64-78)

Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag- en Hooglandbos

Lange, puntige vleugels en lange, diep gevorkte staart. Zwart met groene weerschijn. Kop, hals en onderzijde zuiver wit. Slagpennen en staart zwart.  
Broedvogel.  
**II.112.16.**








	<p><b>Pearl kite,</b> <i>Gampsonyx swainsonii leonae,</i> Parelwouw 20-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Erg klein, valkachtig. Zwartachtig van boven, meest wit van onder. Zwarte vlekken aan de zijkant van de borst en roodbruine dijen. Op voorhoofd en wangen gelige vlekken. Donker kraagje. Achterrand vleugels wit. Flanken roodbruin, washuid zwart, poten geel. Status onbekend. <b>II.113.18.</b></p>
	<p><b>White-tailed kite,</b> <i>Elanus leucurus leucurus,</i> Amerikaanse grijze wouw 38-43 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Bleek blauwgrijs van boven met een zwarte schouder; van onder wit. Grijze kop; wang, voorhoofd en plek boven oog wit. Donkere vlek bij oog. Oog rood, poten geel. Staart grijs, buitenste pennen wit. Vleugelpunten zwart en zwarte vlek in de vleugel. Broedvogel. <b>II.115.21</b></p>
	<p><b>Snail kite,</b> <i>Rostrhamus sociabilis sociabilis,</i> Slakkenwouw 40-45 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Zeer slanke, sterk gebogen snavel. <b>Rood oog.</b> ♂: Leikleurig met zwarte vleugelpunten. Zwarte <b>staart met witte basis</b> en smalle, witte eindband. Naakte huid oranjerood. ♀: Bruin, van onderen zwaar bruin gestreept. Naakte delen oranjegeel. Broedvogel. <b>II.116.24</b></p>
	<p><b>Slender-billed kite,</b> <i>Helicolestes hamatus,</i> Slanksnavelwouw 37-41 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Zeer slanke, sterk gebogen snavel. <b>Geelwit oog.</b> Leikleurige handpennen en zwarte, relatief korte staart. <b>Staatbasis zwart.</b> Poten en naakte huid oranjerood. Broedvogel. <b>II.117.25</b></p>
	<p><b>Double-toothed kite,</b> <i>Harpagus bidentatus bidentatus,</i> Tandwouw (Tweeandwouw), 33-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Sperwerachtig. Rug bleek grijs, donkere staart met drie grijze banden en grijs einde. Van onder voornamelijk bruin met grijze en witte bandering op de buik. Stuit wit. Kop donkergrijs, keel wit met een donkere middenstreep. Oog rood, washuid en poten geel. ♀: Bruine vleugels en romp. Gebandeerde borst. Bruinrode buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.117.26</b></p>

	<p><b>Rufous-thighed kite,</b> <i>Harpagus diodon</i>, Roodbroekwouw 30-35 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Iris oranje, poten geel. Boven leigrijs, onder bleek grijs met witte anaalstreek. Dijen roodbruin. Tamelijk lange staart met drie smalle grijze dwarsbanden en grijze punt. Keelstreep donker. In vlucht lange, afgeronde vleugels, vleugeldekveren roodbruin. Status onbekend. <b>II.117.27</b></p>
	<p><b>Plumbeous kite,</b> <i>Ictinia plumbea</i>, Donkergrijze wouw 34-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven donker leikleurig, van onder lichtgrijs, evenals de kop. Staart zwart met 2-3 lichte banden aan de onderzijde. Vleugels steken voorbij de staart in zit. In vlucht binnenzijde handpennen bruin. Oog rood, poten geel. Broedvogel. <b>II.118.29</b></p>
	<p><b>Long-winged harrier,</b> <i>Circus buffoni</i>, Buffons kiekendief 48-56 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Zeer lange vleugels en staart. Witte stuit. Vliegt met vleugels in V-vorm. Meer kleurslagen: Normaal: Kop en rug zwart, witte wenkbrauw, witte vlekjes op de keel, van onderen wit met zwarte borstband. Ondervleugel bruingrijs met zwarte bandering en zwarte punten. Bovenvleugel grijs, slagpennen met zwarte punten. Staart grijs met zwarte banden en wit einde. ♀: Bruin van boven, bruine vlekjes op de keel en bruine strepen op de buik. Beige dijen. Poten geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.138.79</b></p>
	<p><b>Grey-bellied goshawk,</b> <i>Accipiter poliogaster</i>, Zuid-Amerikaanse havik 43-50 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Rug en kroon zwart. Wang zwart of grijs. Staart met drie brede, grijze banden en een witte punt. Van onderen vuilwit, ook de staart. Oog en poten geel. Status onbekend. <b>II.145.94</b></p>
	<p><b>Tiny hawk,</b> <i>Accipiter superciliosus</i> <i>superciliosus</i>, Amerikaanse dwergsperwer 24-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Overall</p>	<p>Kroon donkerder dan blauwgrijze rug. Staart donker met drie grijze banden en smal wit einde. Keel wit. Van onder wit, fijn gebandeerd met bruin. Naakte delen geel, oog rood. ♀: Bruiner van boven. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.154.117</b></p>

	<p><b>Bicoloured hawk,</b> <i>Accipiter bicolor bicolor</i>, Roodbroeksperwer 30-42 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Variabel. Leigrijs van boven met soms een parelgrijze kraag. Van onderen grijs tot roodbruin. Staart met 2-4 smalle, wittige banden. Naakte delen geel, ogen oranje. Roodbruine broek. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.161.138</b></p>
	<p><b>Crane hawk (Grey crane hawk),</b> <i>Geranospiza caerulescens caerulescens</i>, Langpootkiekendief 43-51 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Lange poten. Boven blauwgrijs of zwart. Onder een variabel deel wit gebandeerd, soms ook de bovenvleugel. Lange staart met twee witte banden en een smal wit einde. In vlucht een witte halve maan in de handpennen. Ogen felrood, washuid grijs, poten oranje. Broedvogel. <b>II.168.152</b></p>
	<p><b>Black-faced hawk,</b> <i>Leucopternis melanops</i>, Zwartmaskerbuizerd 38-42 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte oogvlek. Kop, mantel en hals wit met zwarte streping. Vleugels en staart zwart, vleugeldekveren wit gevlekt. Twee witte banden in de middenstaart. Van onderen geheel wit. Ogen grijs, naakte huid geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.169.156</b></p>
 <p>White Hawk</p>	<p><b>White hawk (Amazonian white hawk),</b> <i>Pseudastur albicollis albicollis</i>, Grote bonte buizerd 47-51 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zwarte onderrug, slagpennen en staart (deze met een brede, witte eindband). Onderzijde, kop en mantel wit. Donker om oog, grijze washuid, poten geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.169.160</b></p>
	<p><b>Rufous crab-hawk,</b> <i>Buteogallus aequinoctialis</i>, Krabbenbuizerd 43-46 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Kop, keel en hals roetzwart. Veren van vleugel en rug bruin met wat lichtere randen. Staart zwart met een vage smalle band in het midden. Van onderen roestbruin met donkerder dwarsstrepen. Ogen bruin, naakte huid geel. Broedvogel. <b>II.173.163</b></p>






	<p><b>Common black hawk,</b> <i>Buteogallus anthracinus</i> Zwarte buizerd 43-52 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Roetzwart, een brede witte band in het midden van de staart en een wit staarteinde. Gezichtshuid en poten geel. Van onder gezien is de basis van de buitenste slagpennen wit. Dwaalgast. <b>II.173.164</b></p>
	<p><b>Great black hawk,</b> <i>Buteogallus urubitinga</i> Zwarte arendbuizerd 51-64 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Dof zwart. Staart wit met brede, subterminale, zwarte band. Lange, gele poten. Washuid geel, ogen bruin. Broedvogel. <b>II.173.166</b></p>
	<p><b>Savanna hawk,</b> <i>Buteogallus meridionalis</i>, Savannebuizerd 46-60 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Rugveren donkerbruin met roodbruine randen. Kop, hals en onderkant roodbruin tot kaneel. Borst en buik fijn zwart dwars gestreept. Staart zwart met smalle mediane band en smal wit einde. Ogen en naakte huid geel. Broedvogel. <b>II.174.167</b></p>
	<p><b>Black-collared hawk,</b> <i>Busarellus nigricollis</i> Moerasbuizerd 46-50 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Brede vleugels, korte staart. Kop en hals beige. Zwarte band over bovenborst. Verder bruinrood met zwarte streepjes op de rug. Handpennen en staart zwart, staartbasis roodbruin gestreept. Ogen bruin, washuid zwart, poten wit. Broedvogel. <b>II.174.169</b></p>
	<p><b>Grey-lined hawk,</b> <i>Buteo nitidus nitidus</i>, Grijze buizerd 38-43 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Bleek grijs, boven vaag fijn grijs gebandeerd en onder fijn wit. Staart zwart met één tot twee witte banden. Ogen en naakte delen geel. Broedvogel. <b>II.176.173</b></p>

	<p><b>Roadside hawk,</b> <i>Rupornis magnirostris magnirostris</i>, Wegbuizerd 33-41 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>In vlucht een roestbruine vlek aan de basis van de handpennen. Kop, bovenkant en bovenborst grijs. Buik wit, bruin gebandeerd. Staart grijs met 4-5 brede zwarte banden en een wit eind. Ogen en naakte huid geel. Broedvogel. <b>II.179.174</b></p>
	<p><b>Short-tailed hawk,</b> <i>Buteo brachyurus brachyurus</i>, Kortstaartbuizerd 37-46 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Verschillende kleurfasen. Kop en bovenzijde donkerbruin, maar met een wit voorhoofd. Van onderen wit. Staart grijs met meerdere bruine banden en een wit uiteinde. Ogen bruin en naakte huid geel. Donkere vorm: geheel zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.180.179</b></p>
	<p><b>Broad-winged hawk,</b> <i>Buteo platypterus platypterus</i>, Breedvleugelbuizerd 34-44 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Van boven grijsbruin; staart zwart met een wit einde, een brede witte band in het midden en een smallere bij de basis. Keel wit, bovenborst oranjebruin, verder naar onder gelijkmatig roodbruin en wit gebandeerd. Van onder gezien: vleugels witachtig, slagpennen smal grijsbruin gebandeerd, handpennen met zwarte punt. Washuid en poten geel. Migrant uit het noorden. <b>II.180.177</b></p>
	<p><b>White-tailed hawk,</b> <i>Geranoaetus albicaudatus colonus</i>, Witstaartbuizerd 51-61 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Verschillende kleurvormen. Roodbruine schouders; kop, hals, rug asgrijs. Romp wit en staart ook, met een zwarte, subterminale band. Onderzijde, inclusief vleugels, spierwit. Ogen bruin, washuid groen, poten geel. Donkere vorm: Geheel donker, witte staart met donkere band. Broedvogel. <b>II.181.182</b></p>
	<p><b>Zone-tailed hawk,</b> <i>Buteo albonotatus</i>, Bandstaartbuizerd 45-56 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Geheel zwart. Lange staart met drie banden, grijs van boven en wit van onder, met wit uiteinde. In vlucht contrast tussen de grijze slagpennen en de zwarte ondervleugel en het zwarte lijf. Ogen bruin, naakte delen geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.183.186</b></p>

 <p>Fuente: INBio</p>	<p><b>Guiana crested eagle,</b> <i>Morphnus guianensis</i>, Wurgarend 71-84 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Meerdere kleurvormen. Lange, zwarte kuif . Ogen bruin, washuid zwart, poten geel. Bleke vorm: Kop, hals, borst asgrijs. Van boven zwartbruin. Buik en ondervleugel wit met fijne kaneelkleurige dwarsstreepjes. Staart zwart met wit einde en flinke grijze banden. Donkere vorm: Boven bruinzwart en onder zwart, soms met witte dwarsstreepjes. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.191.201.</b></p>
	<p><b>Harpy eagle,</b> <i>Harpia harpyja</i>, Harpij 89-105 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop grijs met een kuif met twee punten. Korte, afgeronde vleugels; lange, zwart-wit gebandeerde staart. Donkere rug en borstband. Witte buik. Dijen fijn zwart gebandeerd. Ogen grijs, washuid zwart, poten geel. Donkere oksels. Broedvogel. <b>II.191.202</b></p>
	<p><b>Black-and-white hawk-eagle,</b> <i>Spizaetus melanoleucus</i>, Zwart-witte kuifarend 51-61 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kop, hals, onderzijde (ook ondervleugel) spierwit. Zwarte oogvlek. Korte, ruige kuif; bovenzijde zwart. Bruine staart met vier zwarte banden en een smal wit einde. Ogen en voeten geel, washuid oranje. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.201.224</b></p>
 <p>Fuente: INBio © Derechos reservados</p>	<p><b>Black hawk-eagle,</b> <i>Spizaetus tyrannus serus</i>, Zwarte kuifarend 58-71 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Glanzend zwart. De ruige kuif is aan de basis wit. Erg brede vleugels. Lange, afgeronde staart met grijs einde en drie grijze banden. Poten, onderstaart, ondervleugel en flanken fijn wit gebandeerd. Ogen oranje, washuid grijs, poten geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.204.234</b></p>
	<p><b>Ornate hawk-eagle,</b> <i>Spizaetus ornatus ornatus</i>, (Tirankuifarend) Bonte kuifarend 58-67 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Laag, Hooglandbos</p>	<p>Kroon met lange pluim zwart. Keel wit met zwarte rand, borst ook wit. Zijkant kop en borst bruin. Van onder, ook tarsi, wit met brede zwarte dwarsstrepen. Rug donkerbruin, staart lang met even brede zwarte en grijsbruine dwarsstrepen. Van onder gezien: vleugel witachtig met smalle zwartige dwarsstrepen, staart grijs met vijf zwarte dwarsbanden. Iris oranje, washuid en voeten geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.205.235</b></p>






Familie: *Falconidae*, **Falcons and Caracaras**, Valkachtigen

Kleine tot middelgrote roofvogels met een haaksnavel en gewoonlijk roofvogelklauwen.


	<p><b>Black caracara,</b> <i>Daptrius ater,</i> Zwarte caracara 41-47 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Glanzend zwart, staartbasis wit, kaal gezicht oranje, kale keel geel. Ogen rood, poten bleekgeel. Broedvogel. <b>II.249.1</b></p>
	<p><b>Red-throated caracara,</b> <i>Ibycter americanus,</i> Roodkeelcaracara 48-61 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voornamelijk glanzend zwart; echter buik, dijen en stuit wit. Staart geheel zwart. Het kale gezicht en de keel zijn rood. Ogen bruin, poten oranje-rood. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.249.2</b></p>
	<p><b>(Northern) Crested caracara,</b> <i>Caracara cheriway,</i> (Noordelijke) Kuifcaracara 49-59 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte kap en kuif. Kaal rood gezicht. Keel en hals wit. Nek, mantel, borst en romp wit met zwarte dwarsstrepen. Rest rug zwart, staart met zwart einde. Stuit roomwit. In vlucht hebben de handpennen van boven gezien een witte vlek aan de basis. Ogen bruin, poten bleekgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.250.7</b></p>
	<p><b>Yellow-headed caracara,</b> <i>Milvago chimachima cordatus,</i> Geelkopcaracara 40-45 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Kop, hals en onderzijde, inclusief ondervleugel, roomgeel. Rug zwart. Lange, afgeronde staart en romp beige met donkere dwarsstrepen, staart met zwarte subterminale band. In vlucht een witte vlek aan de basis van de handpennen. Ogen bruin, geel om oog, poten groenig. Broedvogel. <b>II.251.8</b></p>
	<p><b>Laughing falcon,</b> <i>Herpetotheres cachinnans</i> <i>cachinnans,</i> Lachvalk 45-53 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Korte vleugels, lange staart. De grote kop en de onderzijde zijn geelwit. Een breed, zwart masker loopt van het oog tot de nek. De bovenzijde is donkerbruin. Beige ondervleugels met donkerder gebandeerde slagpennen. De afgeronde staart is zwart en wit gebandeerd, het uiteinde is wit. Broedvogel. <b>II.251.10</b></p>

	<p><b>Barred forest-falcon,</b> <i>Micrastur ruficollis concentricus,</i> Gestreepte bosvalk 33-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Meerdere vormen. Van boven grijszwart tot roodbruin. Keel wit tot roodbruin. Onder wit met een variabel deel zwart of grijs gebandeerd. <b>Staat zwart, nogal lang, met drie smalle witte banden.</b> Gezicht oranjegeel, <b>ogen bruin.</b> Witte vlekken op de romp. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.253.11</b></p>
 	<p><b>Lined forest-falcon,</b> <i>Micrastur gilvicollis,</i> Gebandeerde bosvalk 33-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Lichtgrijze rug. Witte onderzijde met een variabel gebied gebandeerd, van flink tot licht. Donkere, <b>kortere staart</b> met wit einde en <b>een of twee smalle, witte banden.</b> Gezicht oranjerood, <b>ogen wit,</b> poten geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.253.13</b></p>
	<p><b>Slaty-backed forest-falcon,</b> <i>Micrastur mirandollei,</i> Mirandolles bosvalk 40-45 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Van boven leikleurig met een donkerder kroon en staart. <b>Kortste staart, met drie lichte banden</b> en wit einde. Van onder, ook ondervleugels, vuilwit. Gezicht geel, <b>ogen geelbruin,</b> washuid geel, poten felgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.254.14</b></p>
	<p><b>Collared forest-falcon,</b> <i>Micrastur semitorquatus semitorquatus,</i> Grote bosvalk 46-56 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Van boven roetzwart. Een zwarte streep loopt van de kroon over de wang. <b>Lange, afgeronde staart met 4-6 witte banden en een smal wit einde. Ogen bruin,</b> gezicht groen, poten geel. Drie kleurvormen: Bleek: Van onder beige met een witte kraag. Donker: Overal zwart, soms van onder wit gebandeerd. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.254.15</b></p>
	<p><b>American kestrel (Margarita kestrel),</b> <i>Falco sparverius isabellinus,</i> Amerikaanse torenvalk 21-31 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Twee duidelijke, verticale, zwarte strepen; voor en achter het oog. ♂: Blauwe vleugels, rode staart met breed zwart einde. Onder bleek met vlekken. ♀: Bruin, van boven gebandeerd, van onder gestreept en gebandeerd. Status onbekend. <b>II.261.32</b></p>



	<p><b>Aplomado falcon,</b> <i>Falco femoralis femoralis,</i> Aplomadovalk 37-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Lange staart. Donker leikleurig van boven. Brede bruine streep van achter oog tot in roodbruine nek. Witte keel en witte wang gescheiden door donkere snor. Borst beige, donker "vest" met witte dwarsstrepen. Stuit en dij roodbruin. Staart zwart met vijf witte banden en een wit eind. Ogen bruin, naakte delen bleekgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.266.43</b></p>
	<p><b>Merlin,</b> <i>Falco columbarius columbarius,</i> Smelleken 24-33 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zware borst, spitse hand, vrij brede arm en lange staart. Bovenzijde blauwgrijs, staart met brede zwarte eindband. Borst oranje met donkere strepen. Smalle baardstreep. Vrouwtje: Boven grijsbruin, staart met zware donkere bandering. Borst beige met zware donkere strepen. Migrant uit het noorden. <b>II.267.44</b></p>
	<p><b>Bat falcon,</b> <i>Falco rufigularis rufigularis,</i> Vleermuisvalk 24-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Bovenzijde en kop hebben zwarte veren met grijze randen. Keel en borst beigewit met een uitloper naar de nek. Daaronder zwart "vest", fijn wit gebandeerd. Buik, dijen en stuit kastanje. Lange staart zwart met meerdere smalle, grijze banden en witte punt. Ogen bruin, naakte delen geel. Broedvogel. <b>II.267.45</b></p>
	<p><b>Orange-breasted falcon,</b> <i>Falco deiroleucus,</i> Bonte slechtvalk 33-40 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Grote gele voeten. Een smaller zwart vest dat breder wit gebandeerd is dan bij de vorige. Erg donker van boven met een donkere "helm". Keel wit, borst oranje, dijen en stuit oranjebruin, geel om oog. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.268.46</b></p>
	<p><b>Peregrine falcon, (Tundra falcon)</b> <i>Falco peregrinus tundrius,</i> Slechtvalk 34-50 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Vrij bleek, maar kroon en snor donker. Van boven licht blauwgrijs, kan zilverig lijken. Van onder wit met wat beige op de borst, de buik is relatief weinig, zwart, gebandeerd. De snor is smal. Wit voorhoofd en grote witte vlek in de oorstreek. Ogen bruin met geel eromheen. Naakte huid geel. Migrant uit het noorden. <b>II.274.60</b></p>

	<p><b>Peregrine falcon, (Duck hawk),</b> <i>Falco peregrinus anatum,</i> Slechtvalk 34-50 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zalmkleurig waas op de borst die sterker gebandeerd is dan bij <i>tundrius</i>. Zware, brede bakkebaarden, oorvlek juist erg klein. Leigrijze rug donkerder, vooral bovenvleugel en bovenstaart; de lichte borst is gebandeerd en gevlekt. Migrant uit het noorden. <b>II.274.60</b></p>
<p>Familie: <b>Cracidae, Chachalacas, Guans and Curassows, Chachalaca's, Sjakohoenders, Goeans en Hokko's</b> Middelgrote tot grote, hoenderachtige vogels met een lange staart, voornamelijk boombewoners.</p>		
	<p><b>Little chachalaca,</b> <i>Ortalis motmot motmot,</i> Kleine chachalaca (Gevlekte chachalaca), 43-45 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kastanje kop, hals en band langs keel. Rug, vleugels en centrum van de staart bronsbruin, verder kastanje. Van onder grijsachtig, onderstaart roodbruin. Kaal zwart gezicht. Keel en poten rood. Broedvogel. <b>II.345.11</b></p>
	<p><b>Marail guan,</b> <i>Penelope marail marail,</i> Marailsjakohoen 63-68 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven glanzend olijfgroen. Borst dof olijf. Kuifveren grijs gerand, mantel- en borstveren wit gerand. Buik dof bruin, beetje donker gevlekt. Handpennen en staart bruin. Kale rode keel, poten rood. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.348.17</b></p>
	<p><b>Spix's guan (Green-backed guan),</b> <i>Penelope jacquacu granti,</i> Spix' sjakohoen 66-76 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Laag-, Hooglandbos 26</p>	<p>Flinke kuif met grijs gerande veren. Van boven olijfgroen of blauwgroen. Veren van mantel en borst wit gerand. Romp en stuit bruin. Buik roodbruin. Staartmidden zelfde kleur als de rug, buitenzijde donkerder en blauwer. Kale keel knalrood, poten zalm. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.349.23</b></p>
	<p><b>Blue-throated piping-guan (White-headed piping-guan),</b> <i>Pipile cumanensis cumanensis,</i> Blauwkeelgoean 60-69 cm (Kolgens 64-78)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Blauwgroen glanzend zwart. Keelflap kobaltblauw, kaal gezicht wit. Witte snavel met zwarte punt, witte kuif. Witte strepen op borst en rug, bredere op de vleugels en die verenigen zich tot een witte vlek. Ogen zwart, poten oranjeoed. Waarschijnlijk broedvogel. <b>II.353.29</b></p>

	<p><b>Black curassow,</b> <i>Crax alector alector,</i> Zwarte hokko 85-95 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Geheel zwart met een witte buik achter de dij. Kuif met bescheiden krulletjes. Staart ook zwart. Snavel en poten grijs. Washuid geel, soms iets gezwollen. Broedvogel. <b>II.361.47</b></p>
--	---	--


**Familie: *Odontophoridae*; New World Quails; Tandkwartels**

Tamelijk kleine grondvogels met een compact lijf, sterke poten en korte vleugels.

	<p><b>Crested bobwhite (Sonnini's bobwhite),</b> <i>Colinus cristatus sonnini,</i> Kuifbobwhite 18-22 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Duidelijke kuif. Kroon en kuif beige. Overal grijs, bruin en zwart gevlekt. Wangen, keel en oogstreep roodbruin. Nek en nekkring wit met zwarte en kaneelkleurige vlekken. Snavel zwart en poten donkergrijs. Broedvogel. <b>II.427.13</b></p>
	<p><b>Marbled wood-quail,</b> <i>Odontophorus gujanensis gujanensis,</i> Gemarmerde tandkwartel 23-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bruin en grijs, van boven met donkere golfjes, onder met zwarte of witte dwarsstreepjes of vlekjes. Kroon en kuifje roodbruin met donkere golfjes. Kale plek om oog rood of oranje. Wang en keel kastanje, roodbruin of grijs. Snavel en poten blauwzwart. Broedvogel. <b>II.428.14</b></p>


**Familie: *Opisthocomidae*, Hoatzin, Hoatzin**

Grote, in groepen levende boombewoner, met een opvallende kuif, een lange staart en grote vleugels.

	<p><b>Hoatzin,</b> <i>Opisthocomus hoazin,</i> Hoatzin 62-70 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Boven donkerbruin met olijfglans en grote witte strepen. Kop roodbruin met lange, smalle, opzetbare kuif. Onder beige, achter dijen kastanje. Brede vleugels bruin, wit gebandeerd. Staart lang en breed, bruin met beige punt. Ogen rood, kaal gezicht blauw, poten en snavel zwart. Broedvogel. <b>III.32</b></p>
--	---	--

**Familie: *Aramidae*, Limpkin, Koerlan**

Grote, bruine, ralachtige of ibisachtige waadvogel, met een lange snavel, een lange nek en lange poten.

	<p><b>Limpkin,</b> <i>Aramus guarauna guarauna,</i> Koerlan 56-71 cm (Kolgans 64-78)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Donkerbruin, op de hals wit gestreept. Snavel lang, iets gekromd, zwart. Poten donker. Broedvogel. <b>III.95</b></p>
--	--	---

**Familie: *Psophiidae*, Trumpeters, Trompetvogels**

Middelgrote grondbewoners met een tamelijk lange hals en tamelijk lange poten; een korte, stevige snavel en een gebocheld uiterlijk.



**Grey-winged trumpeter,**  
*Psophia crepitans crepitans*,  
Trompetvogel  
45-52 cm (Buiserd 48-56)  
  
Laag-, Hooglandbos

Kop en nek met korte, pluche-achtige zwarte veren, Rest verenkleed zwart, behalve oker band dwars over de rug en asgrijze vlek op de achtervleugel. Lage keel met purper en groene weerschijn, poten grijsgroen.  
Broedvogel.  
**III.106.1**

**Familie: *Rallidae*, Rails, Gallinules and Coots, Rallen**

Kleine tot middelgrote grondbewoners, water- of moerasvogels, met een korte, diepe of een lange, slanke snavel; een matig lange hals, brede vleugels; een korte staart en sterke poten.



**Ocellated crane,**  
*Micropygia schomburgkii schomburgkii*,  
Schomburgks ral  
14-15 cm (Huisemus 14-16)  
  
Zuidelijke savanne

Voornamelijk oker. Kroon zwart met witte stipjes. Op rug, vleugels en zijden witte, zwart omcirkelde vlekjes. Middenbuik wit. Poten oranje.  
Status onbekend.  
**III.151.16**



**Russet-crowned crane,**  
*Rufirallus viridis viridis*,  
Roodkruinral  
16-18 cm (Kwartel 16-18)  
  
Kustvlakte, Noordelijke savanne

Klein met een lange staart. Grijs gezicht met oogstreep en een roodbruine kruin. Van onderen dof roodbruin. Van boven dof olijf, poten oranjerood. De ondervleugel is bruin en roodbruin gevlekt. Bovensnavel zwart, onder blauwgrijs.  
Broedvogel.  
**III.156.26**








**Rufous-sided crane,**  
*Laterallus melanophaius melanophaius*,  
Braziliaanse dwergral  
14-18 cm (Kwartel 16-18)  
  
Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos

Van boven olijfbruin, staart zwart. Wangen, hals en borst oranjebruin; rest onder wit, zwaar met zwart gebandeerd op de flanken. Snavel en poten zandkleurig.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**III.157.28**



**Grey-breasted crane,**  
*Laterallus exilis*,  
Amazonedwergral  
14-16 cm (Kwartel 16-18)  
  
Kustvlakte

Kop, nek en borst grijs, keel wit. Nek en mantel kastanje, rug en vleugels olijfbruin. Vleugel soms wit gebandeerd. Flanken, stuit en staart zwart met witte dwarsstrepen. Snavel kort, groenzwart; poten geelbruin, oog rood.  
Broedvogel.  
**III.158.32**

	<p><b>Mangrove rail,</b> <i>Rallus longirostris longirostris,</i> Grijze ral 31-40 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Groot; met een lange, slanke, iets gekromde snavel. Kroon en nek bruin, wangen grijs. Bruinzwart van boven met lichtere randen aan de veren. Witte keel, grijsbeige borst en hals, lichtgrijze buik. Zwart-wit gebandeerde flanken, witte onderstaart. Bleek oranje-rode poten en zwartig en geeloranje snavel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.167.49</b></p>
	<p><b>Rufous-necked wood-rail,</b> <i>Aramides axillaris,</i> Roodnekbosral 28-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne, Hooglandbos</p>	<p>Kop, hals, borst en flanken roodbruin. Mantel en buik grijs. Rug en vleugels olijfbuin. Stuit, staart, buik en dijen zwart. Ondervleugel zwart-wit gebandeerd. Poten oranje-rood, snavel geelgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.175.68</b></p>
	<p><b>Grey-necked wood-rail,</b> <i>Aramides cajaneus cajaneus,</i> Cayenne-bosral 33-40 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Grijze kop, hals, bovenborst en mantel. Rest borst oranjebruin. Rug en vleugels bruin. Zwarte stuit, staart en buik. Rode poten, geel en groenige snavel. Ondervleugel kaneelkleurig, zwart gebandeerd. Broedvogel. <b>III.176.69</b></p>
	<p><b>Uniform crake,</b> <i>Amaurolimnas concolor castaneus,</i> Effen bosral 20-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Bovendelen, vleugels en staart donker kastanje. Keel crème, verder van onder roodbruin, het donkerst op de flanken. Iris rood, snavel kort en olijfgroen, poten roserood. Status onbekend. <b>III.177.74</b></p>
	<p><b>Ash-throated crake,</b> <i>Porzana albicollis typhoea,</i> Witkeelporseleinhoen 21-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Gezicht, hals en borst grijs. Kroon-, nek- en rugveren zwart, bruin gerand. Zwart-wit gebandeerde flanken en onderstaart. Groengele snavel en poten, rode ogen. Iets wit op keel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.186.91</b></p>
	<p><b>Yellow-breasted crake,</b> <i>Hapalocrex flaviventer flaviventer,</i> Geelbuikporseleinhoen 13-14 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p><b>Donkere kroon en oogstreep met een beige wenkbrauwstreep daartussen.</b> Lichtbruine hals en borst. Zwarte rug met witte strepen; bruine vleugels met zwarte en witte vlekken. Buik, flanken en onderstaart zwart-wit gebandeerd. Gele poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.190.97</b></p>

	<p><b>Paint-billed crake,</b> <i>Neocrex erythrops olivascens</i>, Roodsnavelhoen 18-20 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Kroon, nek en bovenzijde bruin. Gezicht, hals en borst grijs. Zwart-wit gebandeerde flanken en onderstaart. Snavel geel met oranje basis. Rode ogen, oranje poten. Ondervleugel wit, vaak zwart gebandeerd. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.192.102</b></p>
	<p><b>(Southern) Spotted rail,</b> <i>Pardirallus maculatus</i> Gevlekte ral 25-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Kop, hals en mantel wit met zwarte strepen. Rug, vleugel en staart met zwarte, bruin gerande veren, bovendien met fijne witte streepjes. Onderstaart wit. Borst en buik zwart-wit gebandeerd. Groengele snavel met rode basis. Zwarte teugel, oranje ogen en poten. Broedvogel. <b>III.192.103</b></p>
	<p><b>Purple gallinule,</b> <i>Porphyrio martinicus</i>, Amerikaans purperhoen 27-36 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Purper kop met wat blauwere hals, borst en flanken. Rug bronsgroen. Onderstaart wit. Buik zwart. Groengele snavel met rode basis en lichtblauw schild. Gele poten. Broedvogel. <b>III. 198.113</b></p>
	<p><b>Azure gallinule,</b> <i>Porphyrio flavirostris</i>, Azuurpurperhoen 23-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Ziet er verbleekt uit. Kroon, nek, bovenzijde olijfbruin met donkere strepen, overgaand in donkerbruine rug en staart. Bovenvleugel blauwgroen, rest vleugel grijsblauw. Wangen, hals, en borst bleekblauw. Keel, buik en onderstaart wit. Snavel en schild bleek groengeel, poten knalgeel. Broedvogel. <b>III.199.114</b></p>
	<p><b>Common gallinule,</b> <i>Gallinula galeata galeata</i>, Amerikaans waterhoen 30-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Als Europees waterhoentje, maar iets kleiner en meer loodkleurig zwart. Broedvogel. <b>III.200.117</b></p>
<p><b>Familie: <i>Heliornithidae</i>; Finfoots; Fuutkoeten</b> Voornamelijk watervogels. Middelgroot met helder gekleurde, gelobde tenen.</p>		
	<p><b>Sungrebe,</b> <i>Heliornis fulica</i>, Kleine fuutkoet 26-33 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Zwarte kroon en oogstreep, deze loopt door langs de nek. Witte wenkbrauwstreep, keel, hals en halslengtestreep. Kaneelkleurige borst, verder van onderen wit. Rug en staart bruin, staarteinde wit. Tenen gelobd, zwart-geel gebandeerd, poten geel-zwart gestreept. ♂: Snavel boven donker, onder hoornkleurig. ♀: Kaneelkleurige vlek op de wang, rode oogleden en rode bovensnavel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.217.3</b></p>

**Familie: *Eurypygidae*, Sunbittern, Zonneral**

Middelgrote, reigerachtige vogels met een lange snavel en hals en een prachtige tekening op de vleugels.



**(Amazonian) Sunbittern,**

*Eurypyga helias helias*,  
Zonneral

43-48 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte

Lange staart. Zwarte kop met twee horizontale witte lijnen; witte keel. Van boven grijze, bruine, zwarte en beige dwarsgolfjes. Anaalstreek wit, buik lichtbeige. Ogen rood, ondersnavel en poten oranjegeel.

Op de vleugels is een zonnetje afgebeeld.

Broedvogel.

**III.233**

**Familie: *Jacanidae*, Jacanas, Jacana's**

Middelgrote, opvallend gekleurde watervogels, met lange poten, tenen en nagels.



**Wattled jacana, (Chestnut-backed jacana),**

*Jacana jacana jacana*,  
Leljacana

21- 25 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte

Gele snavel, rood tweelobbig schild, twee rode lellen. Zwarte kop, hals en onderzijde. Bovenzijde kastanje; gele slagpennen met zwarte punten. Geelgroene poten met enorme tenen; een gele vleugelspoor.

Broedvogel.

**III.291.8**

**Familie: *Recurvirostridae*, Stilts and Avocets, Stelkluten en Kluten.**

Elegante, overwegend zwart-witte waadvogels met erg lange poten; een lange, omhoog gebogen snavel of een middelmatig lange, rechte snavel.



**Black-winged stilt (Black-necked stilt),**

*Himantopus himantopus mexicanus*,

Steltkluut (Amerikaanse steltkluut)

35-40 cm (Kuifeend 40-47)

Marien

Erg lange, rode poten en een zwarte naaldsnavel. Van boven zwart en van onder wit. Staart wit met grijze dwarsstrepen. Kap tot over oog zwart, doorlopend langs de nek tot de rug. Een witte vlek boven het oog.

Broedvogel.

**III.345.1**

**Familie: *Charadriidae*, Plovers, Plevieren**

Kleine tot middelgrote, rechtopstaande oevervogels, met een ronde kop, grote ogen en een korte puntsnavel.



**Pied lapwing,**

*Hoploxypterus cayanus*,  
Cayennekievit




21-24 cm (Spreeuw 19-22)

Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos






Lange, rode poten. Donkere kroon met wit diadeem; zwart masker doorlopend naar nek, mantel en borstband. Van boven bruin met een zwarte en een witte lengtestreep over de schouder; stuit en bovenstaart wit. Witte keel, hals en onderzijde. Ondervleugel van buiten naar binnen zwart, wit, bruin. Staart met brede zwarte band.






Status onbekend.

**III.419.22**







	<p><b>Southern lapwing, (Cayenne lapwing),</b>  <i>Vanellus chilensis cayennensis,</i>  Chileense kievit  32-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Snavel rood met een zwarte punt. Voorhoofd, snavelbasis, halsstreep en borstband zwart. Witte band over voorkop. Rest van kop zandkleurig, evenals de nek. Zwarte kuif. Bovenzijde bruin, van onder wit, poten rood. Grote dekveren wit, mediane purpergroen, schouder bronskleurig. Stuit wit; staart wit, zwart, wit.  Status onbekend.  <b>III.420.23</b></p>
	<p><b>American golden plover,</b>  <i>Pluvialis dominica,</i>  Amerikaanse goudplevier  24-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Zuidelijke Savanne</p>	<p>Winterkleed: grijsbruin, van boven donkerder dan van onder. In vlucht herkenbaar door het gebrek aan tekening op vleugels en staart.  Migrant uit het noorden.  <b>III.424.28</b></p>
	<p><b>Grey plover,</b>  <i>Pluvialis squatarola cynosurae,</i>  Zilverplevier  27-31 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Winterkleed: In vlucht zwarte oksels, witte vleugelstreep en stuit. Onder witachtig, boven grijszwart met witte randen. Witte wenkbrauw, zwarte poten.  Migrant uit het noorden.  <b>III.424.29</b></p>
	<p><b>Semipalmated plover,</b>  <i>Charadrius semipalmatus,</i>  Amerikaanse bontbekplevier  17-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Als Europese bontbekplevier. Tweekleurige snavel, donkere borstband. bruine rug. Het witte voorhoofd wordt omringd door zwart, de rest van de kop is bruin. Witte halsring en onderzijde. Oranje poten.  Migrant uit het noorden.  <b>III.425.32</b></p>
	<p><b>Wilson's plover,</b>  <i>Charadrius wilsonia wilsonia</i>  Dikbekplevier  17-20 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien</p>	<p>Witte nekring. Langere, zware, zwarte snavel. Poten grijzige vleeskleur. In winter brede bruine borstband, voorkroon ook bruin.. Poten blauwgrijs.  Migrant uit het noorden.  <b>III.426.35</b></p>








	<p><b>Wilson's plover,</b> <i>Charadrius wilsonia cinnamominus,</i> Dikbekplevier 17-20 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien</p>	<p>Dikke, zwarte snavel. Kroon , masker, borstband roodbruin. Masker breed. Wit voorhoofd, wenkbrauwstreep (korter dan bij vorige), keel en nekring. Teugel en voorhoofdsvlak zwart. Donkerbruine rug (donkerder dan <i>wilsonia</i>), onderzijde wit. Buitenste staartveren en staarteinde wit. Ogen zwart, blauwgrijze poten. De borst band van het vrouwtje is zand- of kaneelkleurig en ze heeft geen zwart op de kroon of opzij van de kop. Broedvogel. <b>III.426.35</b></p>
	<p><b>Collared plover,</b> <i>Charadrius collaris,</i> Kraagplevier 14-15 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Marien</p>	<p>Smalle, zwarte borstband. Zwarte dwarsstreep voor de kroon, zwarte teugel. Kroon en rug bruin met kastanje randen. Streep van achter oog naar nek kastanje. Oranjegele poten, zwarte snavel en ogen. Broedvogel. <b>III.433.49</b></p>
<p><b>Familie: Scolopacidae, Snipes, Sandpipers and Phalaropes, Snippen, Strandlopers en Franjepoten</b></p> <p>Kleine tot middelgrote waadvogels met korte tot lange poten; snavel vaak lang, kan recht, neer- of opgebogen zijn.</p>		
	<p><b>Wilson's snipe,</b> <i>Gallinago delicata,</i> Amerikaanse watersnip 25-27 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Buitengewoon lange, rechte, donkere snavel. Van boven bruin met beige strepen op de rug. Onder bleek. Donkere oogstreep met daarboven en daaronder een lichte streep. Korte grijsgroen poten. Vliegt zigzaggend weg en toont dan een korte oranje staart. Dwaalgast. <b>III.496.18</b></p>
	<p><b>South American snipe,</b> <i>Gallinago paraguaiaae paraguaiaae,</i> Bergwatersnip 22-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne en Zuidelijke savanne</p>	<p>Als onze watersnip. Lange snavel; donkere zijkrin, oogstreep en snor. Vuilwit gezicht en keel; beige, donker gevlekte hals. Donkerbruine, wit gerande rugveren, wit gevlekte bruine vleugels. Witte buik, grijs gebandeerde flanken. Witte vleugelachterrand. Grijsge poten. Vleugeluiteinden en staart bruinzwart gebandeerd. Broedvogel. <b>III.496.19</b></p>
	<p><b>Giant snipe,</b> <i>Gallinago undulata undulata,</i> Reuzensnip 40-47 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Groot, met een platte kop. Zeer lange snavel met een brede basis. Flinkte zwarte en kaneel chevrons op een witte ondergrond. Brede, ronde vleugels met gebandeerde slagpennen. Geen wit in staart; beige anaalstreek. Grijsge poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>III.497.21</b></p>



 /	<p><b>Short-billed dowitcher (Eastern dowitcher),</b> <i>Limnodromus griseus griseus</i>, Kleine grijze snip 25-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Bovenzijde en borst effen grijs. Lichte wenkbrauwstreep en donkere oogstreep. Van onder witachtig. Poten geelgroen. Migrant uit het noorden. <b>III.498.25</b></p>
	<p><b>Hudsonian godwit,</b> <i>Limosa haemastica</i>, Rode grutto 36-42 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Lange rechte of iets opgewipte snavel. Zwarte staart met erboven (breed) en eronder (smaller) wit. Ondervleugel zwartachtig. In de winter grijze rug, bleke borst. Grijze poten. Migrant uit het noorden. <b>III.501.29</b></p>
	<p><b>(American) Whimbrel,</b> <i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>, (Amerikaanse) Regenwulp, 40-46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Donkere zijkruintrepen en oogstreep, opvallende lichte wenkbrauwstrepen. Van boven grijsbruin met lichte vlekken. Nek en borst beige met fijne streping. Achterste deel rug en romp bruin. Staart bruin-zwart gebandeerd. Blauwgrijze poten. Bruine ondervleugel. Migrant uit het noorden. <b>III.503.34</b></p>
 34	<p><b>Upland sandpiper,</b> <i>Bartramia longicauda</i>, Bartrams ruiters 26-32 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Korte, gele snavel; groot donker oog, lange nek en ronde kop. Van boven olijfbuin met donkere bandering en beige veerranden. Hals en borst lichtbeige met donkere strepen. Van onderen wit. Zwarte stuit, gele poten. Witachtige ondervleugel, dicht zwart gebandeerd. Migrant uit het noorden. <b>III.506.40</b></p>
	<p><b>Greater yellowlegs,</b> <i>Tringa melanoleuca</i>, Grote geelpootruiter 29-33 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Uiteraard gele poten. Niet broedend: van boven grijsbruin met witte vlekken en veerranden, grijs gestreept op borst en flanken, stuit wit, slagpennen zwartachtig, staart lichtgrijs. Groter en zwaarder dan Lesser yellowlegs, met een langere, stevigere snavel, die soms iets opgebogen is. Migrant uit het noorden. <b>III.511.46</b></p>

	<p><b>Lesser yellowlegs,</b> <i>Tringa flavipes</i>, Kleine geelpootruiter 23-25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Gele poten. Niet broedend: Van boven grijs met wat lichte vlekken, witte stuit, dof wit van onderen, slagpennen zwartachtig, staart lichtgrijs. Kortere, rechte naaldsnavel. Migrant uit het noorden. <b>III.511.47</b></p>
	<p><b>Solitary sandpiper (Pale-dotted sandpiper),</b> <i>Tringa solitaria solitaria</i>, Amerikaanse bosruiter 18-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Van boven grijs met wat witte vlekken, ook op hals en kop. Van onder wit met vage dwarsstrepen op de flanken. Duidelijke witte oogring. Donkere stuit en ondervleugel. Vleugels langer dan staart. Migrant uit het noorden. <b>III.512.49</b></p>
	<p><b>Spotted sandpiper,</b> <i>Actitis macularius</i>, Amerikaanse oeverloper 18-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Als Europese oeverloper. Niet broedend: Van boven bruin; van onder wit, voor de vleugel oplopend in de vorm van een komma. Witte wenkbrauwstreep. Een grijze zweem over hals en borst. Snavel donker bruin, poten gelig. Witte band in vleugel. Houdt zijn achtereind nooit stil. Migrant uit het noorden. <b>III.513.53</b></p>
	<p><b>Willet (Eastern willet),</b> <i>Tringa semipalmata semipalmata</i>, Willet 33-41 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Bruingrijs van boven met smalle witte veerranden. Kop, keel en borst hebben een grijze spoeling. Lange grijze poten, witte oogring. In vlucht duidelijke witte streep over de zwarte vleugel. Migrant uit het noorden. <b>III.514.56</b></p>
	<p><b>Willet (Western willet),</b> <i>Tringa semipalmata inornata</i>, Willet 33-41 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Gemiddeld is deze ondersoort groter, bleker, met een slankere snavel en een langere nek dan de Eastern. Zijn geluid is wat slomer. Migrant uit het noorden. <b>III.514.56</b></p>

	<p><b>(Canadian) Ruddy turnstone,</b> <i>Arenaria interpres morinella,</i> Steenloper 21-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Rug grijsbruin, bruine strepen over kop, bruine "BH". Poten rood. Migrant uit het noorden. <b>III.515.58</b></p>
	<p><b>Red knot (American knot),</b> <i>Calidris canutus rufa,</i> Kanoet 23-25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Grijsbruin met smalle witte randen aan de grotere veren, onder witachtig met wat grijs op hals en borst. Witte stuit, licht gebandeerd. Staart grijsbruin. Smalle witte vleugelstreep. Poten groenachtig. Migrant uit het noorden. <b>III.519.62</b></p>
	<p><b>Sanderling,</b> <i>Calidris alba rubida,</i> Drieteenstrandloper 20-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Vrijwel wit lijkend. Boven bleekgrijs, gezicht en onderzijde wit. Stuit wit met een mediane zwarte streep doorlopend in de verder grijze staart. Snavel en poten zwart. Migrant uit het noorden. <b>III.520.63</b></p>
	<p><b>Semipalmated sandpiper,</b> <i>Calidris pusilla,</i> Grijze strandloper 13-15 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Effen grijs van boven met een donkere kroon en oogstreep. Gezicht, wenkbrauwstreep en onderzijde wit met onduidelijke borstvlakken. Migrant uit het noorden. <b>II.520.64</b></p>
	<p><b>Western sandpiper,</b> <i>Calidris mauri,</i> Alaskastrandloper 14-17 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet-broedend: Effen grijs van boven, met een donker gestreepte kroon en een zwarte oogstreep; hals en zijkant van de borst fijn grijs gestreept; Rest onderzijde wit. Snavel iets neergebogen. Migrant uit het noorden. <b>III.521.65</b></p>
	<p><b>Least sandpiper,</b> <i>Calidris minutilla,</i> Kleinste strandloper 13-15 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Bruingrijs van boven met lichtere veerranden. Keel en borst grijs gestreept met bovendien een grijs waas. <b>Gele poten;</b> onderrug, stuit en centrale staartpennen zwart, buitenkant staart grijs. Wenkbrauwstreep, keel en buik wit. Smalle witte vleugelstreep. Migrant uit het noorden. <b>III.522.70</b></p>






	<p><b>White-rumped sandpiper,</b> <i>Calidris fuscicollis</i>, Bonapartes strandloper 15-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Kop en bovendelen effen bruinachtig met vage strepen en lichte veerranden. Borst bruin met vage grijze strepen. Witte wenkbrauwstreep, buik en stuit. Zwarte poten. Migrant uit het noorden. <b>III.523.71</b></p>
	<p><b>Baird's sandpiper,</b> <i>Calidris bairdii</i>, Bairds strandloper 14-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Vleugels steken uit voorbij staart. Zwarte, korte poten. Saai grijs van boven. Dunne, scherpe, donkere snavel. Borstband scherp gescheiden van witte onderzijde. Dwaalgast. <b>III.523.72</b></p>
	<p><b>Pectoral sandpiper,</b> <i>Calidris melanotos</i>, Gestreepte strandloper 19-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Gestreepte borst scherp afgescheiden van witte onderdelen. Groenachtige poten. Geen vleugelstreep. Rug donker, stuit en middelste staartveren zwart, buitenkant staart donkergrijs. Migrant uit het noorden. <b>III.524.73</b></p>
	<p><b>Stilt sandpiper,</b> <i>Calidris himantopus</i>, Steltstrandloper 18-23cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Bruingrijs van boven met witte veerranden. Van onderen wit met grijze strepen op de onderhals, borst en flanken. Duidelijke witte wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Stuit en bovenkant staart wit. Poten lang, geelachtig groen. Migrant uit het noorden. <b>III.530.81</b></p>
	<p><b>Buff-breasted sandpiper,</b> <i>Calidris subruficollis</i>, Blonde ruiter 18-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Kleine, ronde kop en tamelijk lange nek. Van boven veren met donkerbruine centra en brede bruine randen. Hele onderzijde rosebeige. Staat rechtop. Korte snavel, gelige poten. Geen vleugelstreep, ondervleugel wit. Opvallend donker oog met lichte oogring. Migrant uit het noorden. <b>III.530.82</b></p>

	<p><b>Wilson's phalarope,</b> <i>Steganopus tricolor,</i> Grote franjepoot 22-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>Lange poten, lange hals en lange naaldsnavel. Poten zwart in de zomer, anders geel. In vlucht egaal donkere vleugels, vierkante stuitvlek en voorbij staart uitstekende tenen. In zomer onmiskenbaar, driekleurig. In winter zeer lichtgrijs van boven en wit van onder, vage grijze lengtestreep op zijhals. Dwaalgast. <b>III.531.84</b></p>
<p><b>Familie <i>Stercorariidae</i>, Skuas, Jagers</b> Middelgrote tot grote, meeuwachtige kleptofage en roofzuchtige zeevogels met krachtige snavels. Doorgaans bruin of bruin en wit.</p>		
	<p><b>South polar skua,</b> <i>Catharacta maccormicki,</i> Zuidpooljager 50-55 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Donker, met een korte wigvormige staart en een opvallende witte vleugelvlek. Blonde fase met lichtbruine kop en onderkant. Donkere fase: kop en onderzijde donkerbruin. Krachtige snelle vlucht, valt andere zeevogels lastig. Migrant uit het zuiden. <b>III.569.2</b></p>
	<p><b>Brown skua (Southern skua),</b> <i>Catharacta antarctica antarctica,</i> Subantarctische grote skua 52-64 cm (Buizerd 48-64)</p> <p>Marien</p>	<p>Bruin, maar variabel, meestal vrij effen, bleke vlekken komen echter voor. Grote snavel en stevig lijf. Witte vleugelvlekken. Dwaalgast. <b>III.569.3</b></p>
	<p><b>Pomarine jaeger,</b> <i>Stercorarius pomarinus,</i> Middelste jager 46-51 cm (Buizerd 48-64)</p> <p>Marien</p>	<p>Kap zwart. Bovenzijde en vleugels chocola, een opvallende witte vleugelvlek. Nek opzij geel, hals en onderdelen wit. Band over borst chocola. Middelste staartveren breed, gedraaid en uitstekend met stomp uiteinde. Er is een donkere fase die ook van onder chocoladebruin is. Migrant uit het noorden. <b>III.570.5</b></p>
	<p><b>Arctic jaeger</b> <i>Stercorarius parasiticus,</i> Kleine jager 41-46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Als donkere meeuw met snelle, veerkrachtige vlucht. Lichte handpenvlekken en puntige verlengde middelste staartveren. Meer kleurslagen. Aan basis bovensnavel altijd een kleine lichte vlek. Migrant uit het noorden. <b>III.570.6</b></p>







	<p><b>(Eastern) Long-tailed skua,</b> <i>Stercorarius longicaudus</i> <i>pallescens</i>, Kleinste jager 48-53 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Klein en slank. Vlucht bijna sternachtig. Duidelijke zwarte kopkap, bruingrijze bovendelen en vleugels, maar slagpennen donkerder. Geen lichte vlekken op de vleugel. Zeer lange puntige verlengde middelste handpennen. Dwaalgast. <b>III.571.7</b></p>
<p><b>Familie: Laridae, Gulls, Meeuwen</b> Tamelijk kleine tot grote, zwaarlijvige, langvleugelige zeevogels met een stevige snavel, zwemvliezen en meestal een afgeronde staart; de meeste soorten zijn wit van onder met een lichtgrijze tot zwarte rug en vleugels; sommige met een donkere kap in broedkleed.</p>		
	<p><b>Lesser black-backed gull,</b> <i>Larus fuscus graellsii</i>, Kleine mantelmeeuw 51-61 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Leigrijze bovendelen, gele poten, gele snavel met rode vlek, iris geel met rode oogring. Smalle witte achterrand aan grootste deel vleugel. Dwaalgast. <b>III.611.26</b></p>
	<p><b>Black-headed gull,</b> <i>Larus ridibundus</i>, Kokmeeuw 37-43 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kap donker chocola, achter oog witte halve maantjes, nek en onderdelen wit. Bovenzijde grijs, buitenste handpennen wit met zwarte toppen, witte staart. Snavel en poten donkerrood, oog donker. In winterkleed koptelefoon. In vlucht witte voorrand handvleugel. Dwaalgast. <b>III.615.35</b></p>
	<p><b>Laughing gull,</b> <i>Larus atricilla atricilla</i>, Lachmeeuw 39-46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Witte kop met lichtgrijze nekband. Snavel en poten zwart. Achterrand vleugel wit. Dwaalgast. <b>III.618.43</b></p>
	<p><b>Black-legged kittiwake (Atlantic kittiwake),</b> <i>Rissa tridactyla tridactyla</i> Drieteenmeeuw 38-40 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Witte kop, korte poten, van boven blauwgrijs met duidelijke zwarte vleugeltoppen. Snavel geel, poten zwart, iris donker met rode oogring. Niet broedend met grijze kroonband en nek, meestal een donkerder band over de achterkroon en donkere vlekken om het oog. Dwaalgast. <b>III.622.50</b></p>






## Familie: *Sternidae*, Terns, Sterns






Kleine tot middelgrote, slanke, elegante zeevogels met een lange, gevorkte staart. De meeste soorten zijn grijs van boven met een zwarte kroon, van onder wit.






	<p><b>Gull-billed tern,</b> <i>Gelochelidon nilotica aranea,</i> Lachstern 33-43 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Zwarte meeuwensnavel, donker oog. Iets gevorkte staart, zwarte poten. Kop, hals en onderzijde zuiver wit, behalve een donkere, naar beneden buigende streep achter het oog. Rest bovenzijde zeer lichtgrijs. Migrant uit het noorden. <b>III.645.1</b></p>
	<p><b>Sandwich tern (Cabot's tern),</b> <i>Thalasseus sandvicensis acufavidus,</i> Grote stern 36-46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Gele tot oranje snavel. Korte zwarte poten. Bovenvleugel bleek grijs en bovendien is de onderzijde wit, dus ziet hij er in vlucht zeer wit uit. Zwarte kap met een piekerige kuif, 's winters met wit voorhoofd. Gedurende de zomer worden de handpennen donkerder. Dwaalgast. <b>III.647.5</b></p>
	<p><b>(American) Royal tern,</b> <i>Thalasseus maximus maximus,</i> Koningsstern 45-51 cm (Buiserd 48-56)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Voorhoofd wit, daarachter zwart gestreept. Kuif zwart, naar voren doorlopend en versmallend tot aan oog. Rug en vleugels bleek grijs, onderrug en staart wit, evenals de onderzijde. Sterk gevorkte staart. Snavel geel, poten donker. Dwaalgast. <b>III.647.7</b></p>
	<p><b>(Atlantic) Roseate tern,</b> <i>Sterna dougallii dougallii,</i> Dougalls stern 33-43 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Als visdief maar bleker van boven, met langere witte staartpunten. Zwarte snavel. In rust steken de staartpunten uit voorbij de vleugeleinden. Onderzijde wit. Niet broedend: Zwart en wit gevlekte voorkroon. Dwaalgast. <b>III.651.10</b></p>
	<p><b>Common tern,</b> <i>Sterna hirundo hirundo,</i> Visdief 32-39 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: De bovenzijde heeft aan de voorrand een donkere vlek in de handpennen. Het voorhoofd en de onderzijde zijn wit, de kroon is zwart; de snavel ook, soms met wat rood aan de basis, de poten zijn donkerrood of zwart. De staart is diep gevorkt. Migrant uit het noorden. <b>III.652.14</b></p>








	<p><b>Least tern,</b> <i>Sternula antillarum antillarum,</i> Amerikaanse dwergstern 22-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Grijsz stuit en staart. Wit voorhoofd met een diffuse overgang naar een zwarte kap. Zwarte oogstreep. Zwarte snavel, gelige poten. Wat zwart op de buitenste handpennen. Migrant uit het noorden. <b>III.657.22</b></p>
	<p><b>Yellow-billed tern,</b> <i>Sternula superciliaris,</i> Amazonestern 23 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Voorhoofd en wenkbrauwstreep wit, teugel zwart, kroon zwart met strepen. Van boven bleek grijs, van onder wit. Handpennen zwart. Staart grijs, kort, slechts ondiep gevorkt. Snavel en poten geel. Status onbekend. <b>III.658.23</b></p>
	<p><b>(Atlantic) Bridled tern,</b> <i>Onychoprion anaethetus melanopterus,</i> Brilstern 35-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Voorhoofd en tot achter oog reikende oogstreep wit. Opvallende zwarte oogstreep. Kroon, nek en oorstreek zwart, nekring wit. Rug en staartveren zeer donker op de buitenste na, die zijn wit. Staart diep gevorkt. Van onder wit, snavel en poten zwart. Dwaalgast. <b>III.660.31</b></p>
	<p><b>(Caribbean) Sooty tern,</b> <i>Onychoprion fuscata fuscata,</i> Bonte stern 36-45 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien</p>	<p>Snavel en poten zwart. Lange staartpunten. Kroon, nek en bovendelen zwart met een brede witte vlek op het voorhoofd, reikend tot aan het oog. Buitenvlag van buitenste handpennen wit. Keel, hals en onderdelen wit. Dwaalgast. <b>III.661.32</b></p>
	<p><b>(American) Black tern,</b> <i>Chlidonias niger surinamensis,</i> Zwarte stern 23-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>Niet broedend: Grijs van boven, wit van onder met karakteristieke donkere vlek opzij van de borst. Kop wit met donkere kruinstreep die raakt aan zwarte vlek achter het oog. Ook donkere vlek voor het oog. Rug, vleugels en staart donkergrijs. Snavel zwart, poten bruin. Migrant uit het noorden. <b>III.663.36</b></p>
	<p><b>Large-billed tern,</b> <i>Phaetusa simplex simplex,</i> Grootsnavelstern 38 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Niet broedend: Wit gevlekte kroon. Snavel dik, lang en geel. Wit voorhoofd, hals en onderzijde. Vleugels grijs met een witte baan erover en zwarte handpennen, een zeer opvallend patroon. Korte, ondiep gevorkte staart. Status onbekend. <b>III.664.37</b></p>






	<p><b>(Atlantic) Brown noddy,</b> <i>Anous stolidus stolidus,</i> Noddy 38-45 cm (Kuifeend 40-47 cm)</p> <p>Marien</p>	<p>Donkerbruin met een bleekgrijze kap. Smalle incomplete oogring. Wigvormige staart. Zwarte snavel en poten.. Dwaalgast. <b>III.664.38</b></p>
	<p><b>(Caribbean) Black noddy,</b> <i>Anous minutus americanus,</i> Witkapnoddy 35-39 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien</p>	<p>Overall zwartachtig grijs met een witte kap die naar achter toe steeds minder wit wordt. Witte halve maan onder oog. Staart is wat bleker en contrasteert met de bovendelen. Betrekkelijk lange, scherpe, zwarte snavel en zwarte poten. Dwaalgast. <b>III.665.39</b></p>
<p><b>Familie: <i>Rynchopidae</i>, Skimmers, Schaarbekken</b></p>		
<p>Middelgrote watervogels, vrijwel altijd op de wieden, met lange, puntige vleugels en korte poten; ondersnavel erg smal en veel langer dan bovensnavel.</p>		
	<p><b>Black skimmer (Amazon skimmer),</b> <i>Rynchops niger cinerascens,</i> Amerikaanse schaarbek 41-46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Snavel asymmetrisch, zwart met oranje basis. Kop zwart tot net over oog; verder wit, evenals de onderzijde. Bovenzijde en staart zwart. Ondervleugel grijs. Niet broedend: een witachtige band over de nek. Broedvogel. <b>III.676.1</b></p>
<p><b>Familie: <i>Columbidae</i>; Pigeons and Doves; Duiven</b></p>		
<p>Nogal gedrongen vogels met een kleine kop, een korte snavel en korte poten, goede vliegers.</p>		
	<p><b>Scaled pigeon,</b> <i>Patagioenas speciosa,</i> Geschubde duif 28-34 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Geschubd uiterlijk. Bovenkant kop, vleugels, binnenste staartveren en rug kastanje. Handpennen bruin, staart zwart. Mantelveren goud met een metaalgroene rand. Hals en bovenborstveren wit met metalig purperen rand. Rest borst beige, buik witachtig met donkere veerranden. Anaalstreek wit, oogring en snavel helderrood, snavel met gele punt, poten rood. Broedvogel. <b>IV.122.32</b></p>
	<p><b>Pale-vented pigeon,</b> <i>Patagioenas cayennensis</i> Rosse duif 26-27 cm (Dodaars 23-29) Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Kop grijs, kroon en achterhoofd metaalbronsgroen, keel wit. Nek, mantel en vleugel bruin met purperglans, rug grijs, staart grijsbruin. Hals en borst wat lichter dan rug en zonder glans, rest onderzijde grijs. Oogring rood, snavel zwart, poten purperrood. Broedvogel. <b>IV.127.39</b></p>






	<p><b>Plumbeous pigeon,</b> <i>Patagioenas plumbea wallacei</i>, Loodgrijze duif 34 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos, Hooglandbos</p>	<p>Mantel rosebruin, rug olijfbruin, van onderen lichter, meer rose, met grijs waas. Keel beige, ondervleugel bruin. Snavel zwart, poten donkerrood, oog rood, oogring purperrood. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.128.43</b></p>
	<p><b>Ruddy pigeon (Purple-tinted pigeon),</b> <i>Patagioenas subvinacea purpureotincta</i>, Purperduif 27-33 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Overwegend purperbruin, mantel met metaalviolet; rug, vleugels en staart bronsbruinkaneel, snavel zwart, oogring rood, poten donkerrood. Broedvogel. <b>IV.128.44</b></p>
	<p><b>Mourning dove,</b> <i>Zenaida macroura carolinensis</i>, Treurduif 27-34 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Bruin, kleiner en slanker dan de stadsduif. Gepunte staart met witte punten opzij. Zwarte streep in de oorstreek. Zwarte vlekken op de vleugels. Blauwgrijze achterkroon en nek, bij vrouwtje is de hele kop blauwgrijs. Rose iriserende nekvlek. Onder beigebruin. Dwaalgast. <b>IV.158.109</b></p>
	<p><b>Eared dove,</b> <i>Zenaida auriculata stenura</i>, Geeerde treurduif 22-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Getrapte puntstaart. Bovenkant kop grijs; voorhoofd, wangen en borst rosekaneel. Twee zwarte vlekken op de zijkop. Zijkant metaalpurper met gouden en roze weerkaatsing. Van boven olijfbruin, zwarte vlekken op de vleugel, flanken en ondervleugel lichtblauwgrijs. Staart meerkleurig. Oogring lichtgrijs, snavel donkergroen, poten rood. Broedvogel. <b>IV.159.111</b></p>
	<p><b>Common ground-dove,</b> <i>Columbina passerina griseola</i>, Musduif 16-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien, Noordelijke savanne Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Voorhoofd, wangen en onderzijde roseachtig. Veren van borst en zijhals met donkere centra: lijkt daardoor geschubd. Buik roseachtig, verblekend naar wit op de anaalstreek. Boven grijsbruin, de vleugels met purperzwarte vlekken. Ondervleugel roodbruin, handpennen zwart gepunt. Staart kort en afgerond, de zwarte buitenste veer met een witte punt. Snavel zwart, rose poten. Broedvogel. <b>IV.163.116</b></p>

	<p><b>Plain-breasted ground-dove,</b> <i>Columbina minuta minuta</i>, Dwergrduif 14-16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Effen roseachtige borst, keel, gezicht en hals. Snavel grijsig of bruin. Voorhoofd, kroon en nek blauwgrijs. ♀: Witte buik en keel. Oog geel tot oranje, poten rose tot rood. Broedvogel. <b>IV.163.117</b></p>
	<p><b>Ruddy ground-dove,</b> <i>Columbina talpacoti talpacoti</i>, Steenduif 15-18 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Voorhoofd bleek grijs, overgaand in donkerder kruin. Van boven kaneel, van onder rosekaneel, anaalstreek kastanje. Zwarte vlekken op vleugel. Handpennen bruinzwart, ondervleugeldekveren zwart. Snavel donker, poten rose. Broedvogel. <b>IV.164.119</b></p>
 <p>Blue Ground Dove</p>	<p><b>Blue ground-dove,</b> <i>Claravis pretiosa</i>, Blauwe grondduif 18-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne , Laaglandbos</p>	<p>Boven blauwgrijs, onder bleek grijs. Zwarte vlekken op de vleugel, twee purperzwarte banden over de binnenste slagpennen. Staart in het midden blauwgrijs, de buitenkant zwart. ♀: Heel anders: voornamelijk bruin, van onder bleek grijs. Stuit en middenstaart roodbruin, buitenzijde staart zwart. Vleugelvlekken en -banden purperkastanje, deze banden zijn voorzien van een wit randje aan de achterkant. Broedvogel. <b>IV.165.123</b></p>
	<p><b>White-tipped dove (Brazilian dove),</b> <i>Leptotila verreauxi brasiliensis</i>, Verreaux' duif 24-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop bleek roseachtig, het bleekst op het voorhoofd, verdonkerend tot glanzend licht purperbruin op de kruin. Van boven grijsig olijfbroen, nek en mantel met metaalvioletgroene weerschijn. Middenstaart olijfbroen, de buitenkant zwart met een flink wit einde. De staart is wigvormig. Ondervleugel kastanje. <b>Geen vleugelvlekken.</b> Onder bleek rosegrijs. Oogring blauw, oog geel, poten purperrood. Broedvogel. <b>IV.168.133</b></p>
	<p><b>Grey-fronted dove,</b> <i>Leptotila rufaxilla rufaxilla</i>, Grijskruinduif 28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Voorhoofd grijswit, <b>kruin blauwgrijs</b>, nek en mantel iriserend metaalpurperviolet. Rug en vleugels olijfbroen, <b>geen vleugelvlekken.</b> Van onderen rose wijnkleurig; keel, middenbuik en anaalstreek wit. Middenstaart olijfbroen, buitenstaart zwart met een wit einde, de staart is wigvormig. Oogring rood, oog geel, snavel zwart, poten rood. ♀: Een meer groene weerschijn i.p.v. purper. Broedvogel. <b>IV.169.135</b></p>






	<p><b>Violaceous quail-dove,</b> <i>Geotrygon violacea violacea</i>, Bisschopskwartelduif 21-25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd wit; wangen rosebeige met een lichte streep onder het oog; een purper gouden vlek op het achterhoofd. Nek en rug metaalpurper, naar achter verlopend naar olijf, de veren zijn purper gerand. Stuit purperrood, staart en handpennen kastanje. Keel en buik wit, hals en borst wijnkleurig. ♀: De rug glanst brongroen, de borst is grijzer, de achterhoofdsvlek is brongroen. Oog geel, snavel karmijn, poten koraalrood. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.176.158</b></p>
	<p><b>Ruddy quail-dove,</b> <i>Geotrygon montana montana</i>, Bergkwartelduif 19-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Bovenzijde, vleugels en staart kastanjerood; de rug met een sterke purperen weerschijn. Wangen rosewit met twee kastanjejarige strepen. Hals en keel bleekbeige verlopend naar wijnkleurig op de borst en naar beige op de buik. Ondervleugel kaneelrood. Snavel zwart met een rode basis, oog geel, oogring rood, poten paarsrood. ♀: Bovenzijde en middenstaart olijfbruin, brongroen glanzend, buitenstaart donker olijfbruin. Wangen en voorhoofd dof kaneel. Hals en keel wit, borst kaneel, buik kaneelbeige met wit in het midden, flanken olijfbruin. Broedvogel. <b>IV.176.159</b></p>
<p><b>Familie: <i>Psittacidae</i>, Parrots, Papegaaien</b></p>		
<p>Gedrongen vogels met een grote kop; een krachtige, korte, gebogen, scharnierende snavel; hoog ontwikkelde tong- en kaakspieren; korte poten; veel soorten buitengewoon kleurig.</p>		
	<p><b>Blue-and-yellow macaw,</b> <i>Ara ararauna</i>, Blauwgele ara 86 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Bovenzijde, vleugels en staart blauw, voorhoofd dofgroen. Kaal wit gezicht met zwarte strepen. Oorstreek, hals en onderzijde knalgeel, anaalstreek bleekblauw. Broedvogel. <b>IV.420.189</b></p>
	<p><b>Scarlet macaw,</b> <i>Ara macao macao</i>, Geelvleugelara (Macao), 84-89 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grotendeels rood. Wit, kaal gezicht. Snavel witachtig boven en zwart beneden. <b>Midden van vleugel geel met een groen randje</b>, slagpennen blauw; ondervleugel rood. Stuit bleekblauw, staart rood met blauwe punt. Broedvogel <b>IV.421.193</b></p>
	<p><b>Red-and-green macaw,</b> <i>Ara chloropterus</i>, Groenvleugelara 90-95 cm (Blauwe reiger 84-102)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grotendeels rood. Wit, kaal gezicht met rode lijnen. Snavel witachtig boven en zwart beneden. <b>Midden van vleugel groen</b>, slagpennen van boven voornamelijk bleekblauw, ondervleugel rood. Staart rood met blauwe punt. Broedvogel. <b>IV.422.194</b></p>





	<p><b>Chestnut-fronted macaw,</b> <i>Ara severus</i>, Dwergara 46-51 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Smalle, zwarte voorhoofdband, rest kruin dof turquoise. Kaal, wit gezicht met onderlangs een smalle donkerbruine lijn. Lijf groen met rode schouders, blauwe handpennen en handpendekveren. Anaalstreek turquoise, staart rood met een blauw einde. Broedvogel. <b>IV.425.196</b></p>
	<p><b>Red-bellied macaw,</b> <i>Orthopsittaca manilatus</i>, Roodbuikara 50-51 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Geel, kaal gezicht. Kop en lijf groen, buik roodbruin. Handpennen en handpendekveren van boven blauw. Slagpennen en staart van onder olijfgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.425.197</b></p>
	<p><b>Northern red-shouldered macaw,</b> <i>Diopsittaca nobilis</i>, Roodschouderara 30 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Kaal wit gezicht; zwarte snavel, blauw voorhoofd. Lijf groen met rode vleugelbocht. Vleugel en staart van onder olijfgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.426.201</b></p>
	<p><b>White-eyed parakeet,</b> <i>Psittacara leucophthalmus leucophthalmus</i>, Witoogaratinga 32-35 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Groen met rode vlekken op kop en hals. Kale oogring witachtig. Vleugelrand rood, ondervleugel en staart olijfkleurig. Lichte snavel, grijze poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.430.214</b></p>
	<p><b>Peach-fronted parakeet,</b> <i>Eupsittula aurea</i>, Goudvoorhoofdparakiet 23-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Perzikkleurig voorhoofd; bovendelen, vleugels en staart groen. Achterkroon dof blauw, wangen en onderdelen bleek groenig geel, meer naar achter geler. Slagpennen blauwgroen, oogring bleek oranje, donkere snavel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.435.223</b></p>

	<p><b>Brown-throated parakeet,</b> <i>Eupsittula pertinax surinama</i>, Maïsparkiet 25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Voorhoofd en gezicht oranjegeel, borst olijfgroen, buik geelgroen met oranje vlekken. Kruin en bovendelen groen. Slagpennen en staart met blauw gerande veren, de staart heeft een blauwe punt. Broedvogel. <b>IV.435.224</b></p>
	<p><b>Painted parakeet,</b> <i>Pyrrhura picta picta</i>, Bonte parkiet 22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd blauw, achterhoofd bruin, wang kastanje. Kale oogring grijsachtig, oorstreek wittig. Hals en borst roodbruin met beige randen, dus geschubd lijkend. Bovenkant groen, onderrug rood. Rode pols, blauw in handpennen. Staart groen, naar eind toe kastanje. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.440.235</b></p>
	<p><b>Green-rumped parrotlet,</b> <i>Forpus passerinus passerinus</i>, Groene muspapegaai 12-13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Groen met grijs waas in nek. Handpendekveren, armpennen en ondervleugel blauw. ♀: Geheel groen met een gelig voorhoofd. Broedvogel. <b>IV.449.257</b></p>
	<p><b>Dusky-billed parrotlet,</b> <i>Forpus modestus modestus</i>, Sclaters muspapegaai 13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Donkergroen; stuit, handdekveren en binnenste handpennen blauw. Bij vrouwtje voorkroon, wangen en onderzijde groengeel. Stuit heldergroen. Waarschijnlijk broedvogel' <b>IV.450.260</b></p>
	<p><b>Golden-winged parakeet,</b> <i>Brotogeris chrysoptera chrysoptera</i>, Oranjevleugelparkiet 16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Groen met lichte snavel; smalle, donkerbruine voorhoofdsband; oranjebruine kinvlek. Handpendekveren oranje, blauw in slagpennen. Broedvogel. <b>IV.452.269</b></p>

	<p><b>Lilac-tailed parrotlet,</b> <i>Touit batavicus,</i> Zevenkleurenpapegaai 14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kop geelgroen, nek donker geschubd, rug en vleugels zwart, grote dekveren geelgroen met blauwgroene randen. Pols rood. Staart rozepaars met een zwarte subterminale band. Keel en buik groen, borst en ondervleugel lichtblauw. Broedvogel. <b>IV.455.273</b></p>
	<p><b>Tepui parrotlet,</b> <i>Nannopsittaca panychlora,</i> Tepuiparkiet 14 cm (Huisumus 14-6)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Staart kort en vierkant. Groen, van boven donkerder. Voorhoofd, keel, om het oog en onder de staart geelgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.455.271</b></p>
	<p><b>Scarlet-shouldered parrotlet,</b> <i>Touit huetii,</i> Roodschouderpapegaai 15-16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Voornamelijk groen, onderstaartdekveren geel. Voorste deel kop donkerblauw. Vleugelbocht helderrood, rest vleugel donkerblauw. Oksels en vlek opzij van de borst helderrood. Middenstaartveren groen, de rest fel rood met een smalle zwarte eindband. Het vrouwtje heeft groene buitenste staartveren. Status onbekend. <b>IV.455.274</b></p>
	<p><b>Sapphire-rumped parrotlet,</b> <i>Touit purpuratus purpuratus,</i> Paarsstaartpapegaai 17-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bovenkop en nek olijfbruin, rest van kop en onderzijde groen. De donkerbruine schouderveren vormen een V. Pols violet, stuit paars, centrale staartveren groen, buitenste rood. De staart heeft een zwarte achterrand. Broedvogel. <b>IV.456.277</b></p>
	<p><b>Black-headed parrot,</b> <i>Pionites melanocephalus melanocephalus,</i> Zwartkopcaique 23 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kap zwart, nek beige, teugel groen, wang en hals geel. Rug en vleugels groen, donkerblauwe handpennen, oranje oksels. Buik roomwit; dijen, flanken en anaalstreek abrikooskleurig; staart van boven grijs met een gele punt, van onder olijfgeel. Broedvogel. <b>IV.457.281</b></p>




	<p><b>Caica parrot,</b> <i>Pyrilia caica,</i> Caicapapegaai 23 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kop zwart, oogring grijs; bruine, geschubde nekraag. Lijf groen met blauwe handpendekveren en zwartachtige handpennen. Staart met een blauw einde. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.461.288</b></p>
	<p><b>Blue-headed parrot,</b> <i>Pionus menstruus menstruus,</i> Zwartoormargrietje 24-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Blaue bivakmuts met zwarte oorstreep. Onderzijde groen. Onderstaart rood-groen geschubd. Snavel zwart met wat roodbruin op de bovensnavel. Broedvogel. <b>IV.462.295</b></p>
	<p><b>Dusky parrot,</b> <i>Pionus fuscus,</i> Bruin margrietje 25-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kop dof leiblaauw, zwarte oorstreep, keel- en nekveren met witte toppen, rug donkerbruin. Zwarte snavel met een gele vlek op de bovensnavel. Grijs oogring, een witte streep onder de oorstreep. Vleugel purperblauw. Onderzijde lichtbruin, anaalstreep en stuit dof rood. Staart blauw, poten grijs. Broedvogel. <b>IV.464.301</b></p>
	<p><b>Blue-cheeked amazon,</b> <i>Amazona dufresniana,</i> Blauwwangamazone 34 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd en teugel oranjegeel, kruin vlekkerig geelgroen, wangen en oorstreep blauw. Lijf groen, van boven wat geschubd. Gele spiegel, zwartachtige handpennen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.470.314</b></p>
	<p><b>Yellow-crowned amazon,</b> <i>Amazona ochrocephala ochrocephala,</i> Geelvoorhoofdamazone 35-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Groen. Voorhoofd en kruin geel, witte oogring. Schouder en spiegel rood. Slagpennen met blauwe punten, staart met geel einde. Broedvogel. <b>IV.473.321</b></p>



	<p><b>Orange-winged amazon,</b> <i>Amazona amazonica</i>, Oranjevleugelamazone 31 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Geel voorhoofd, geel beneden oog tot tegen snavelbasis, daartussen blauwe oogvlek. Lijf groen, polsrand geel, spiegel rood. Staart met gele punt, buitenveren met een rode band, de allerbuitenste met een blauwe rand. Broedvogel. <b>IV.474.322</b></p>
	<p><b>Southern mealy amazon,</b> <i>Amazona farinosa</i>, Grote amazone 38-43 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Groen. Achterhoofd en nek geschubd. Bovenzijde met meel bestrooid. Witte oogring, voorhoofd geel. Polsrand en spiegel rood. Blauwe punten aan slagpennen. Staart groen met een brede, gele eindband. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.475.325</b></p>
	<p><b>(Northern) Red-fan parrot,</b> <i>Deroytus accipitrinus</i> <i>accipitrinus</i>, Kraagpapegaai 35-36 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd wit; wangen, achterhoofd en hals donkerbruin met lichtere strepen. Verlengde nekveren en veren aan de onderzijde paarsrood, lichtblauw gerand. Bovenzijde, dijnen en anaalstreek groen. Handpennen en onderzijde van de staart zwart. Bovenkant van de staart groen met blauwe veerranden. Broedvogel. <b>IV.476.331</b></p>
	<p><b>Sulphur-breasted parakeet,</b> <i>Aratinga maculata</i>, Zwavelborstparkiet ca 30 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Geel van voren, de voorste vleugeldekveren ook, maar met groene centra. Overige dekveren groen, slagpennen diep blauw. Staart groen met blauw eind. Bleek groene kroon, oranje boven de snavel, om het oog, op de buik en flanken. Ondervleugel en -staart grijszwart. Iris grijs, oogring blauwgrijs, snavel zwart, poten bruinachtig. Broedvogel. <b>Special vol. 199</b></p>

**Familie: Cuculidae; Cuckoos; Koekoeken**

Kleine tot middelgrote, slanke landvogels; de meeste met een tamelijk smalle snavel en een lange staart; meestal donker boven en lichter onder, een aantal zijn geheel donker.

	<p><b>Yellow-billed cuckoo,</b> <i>Coccyzus americanus</i>, Geelsnavelkoekoek 30 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Van boven bronskleurig, van onder wit. Rode handpennen. Buitenste staartveren zwart met flinke witte punten. Ondersnavel grotendeels geel, oogring ook. Migrant uit het noorden. <b>IV.595.108</b></p>
--	--	---

	<p><b>Pearly-breasted cuckoo,</b> <i>Coccyzus euleri</i>, Witbuikkoekoek 28 cm (Dodaars 23 -29 cm)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven bronskleurig, bovenborst zilver, rest onder wit. Geen rood in vleugel. Buitenste staartveren zwart met flinke witte punten. Ondersnavel grotendeels geel, oogring wit. Status onbekend. <b>IV.596.109</b></p>
	<p><b>Mangrove cuckoo,</b> <i>Coccyzus minor</i>, Mangrovekoekoek 34 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Van boven grijsbruin met een grijze kap. Een brede, zwarte oogstreep. Snavel zwart van boven en geel van onder. Staart zwart met witte ovale vlekken, poten grijs. Lichte vorm: Onderzijde beige tot wit. Donkere vorm: Onderzijde donker kaneel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.596.110</b></p>
	<p><b>Dark-billed cuckoo,</b> <i>Coccyzus melacoryphus</i>, Kleine mangrovekoekoek 27 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kroon en nek donkergrijs, oorstreek zwart, wangen en zijborst zilvergrijs. Rug en vleugels bruin; middenstaartveren bronskleurig met eenzwart einde, de overige zwart met een wit einde. Van onder voornamelijk beigerood. <b>Snavel geheel zwart.</b> Migrant uit het zuiden. <b>IV.597.112</b></p>
	<p><b>Common squirrel cuckoo (Amazonian squirrel cuckoo),</b> <i>Piaya cayana cayana</i>, Eekhoornkoekoek 46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bovenzijde donker roodbruin. wangen, keel en borst beige. Buik asgrijs, onderstaart donkerder. Snavel geel, rode oogring. Staart zwart, lang, met witte vlekken. Broedvogel. <b>IV.601.120</b></p>
	<p><b>Black-bellied cuckoo,</b> <i>Piaya melanogaster</i>, Zwartbuikkoekoek 38 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Bovenzijde verloopt van roestbruin tot kastanje. Grijze kap, keel oranjebeige, borst lichtbruin. Buik en anaalstreek zwart. Staart roestbruin met een subterminale, zwarte band en een brede, witte eindband, bovendien met witte vlekken. Oogring lichtblauw, een gele vlek voor het oog. Snavel rood, poten vrijwel zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IV.601.121</b></p>

	<p><b>Little cuckoo,</b> <i>Coccyua minuta minuta,</i> Kleine eekhoornkoekoek 25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Van boven kastanjebruin. De kleur van keel en borst verloopt van roodbruin tot kastanje. Buik donkergrijs. Staart met witte eindvlekken. Oog en oogring rood. Snavel geel, poten dof blauw. Broedvogel. <b>IV.601.122</b></p>
	<p><b>Greater ani,</b> <i>Crotophaga major,</i> Grote ani 46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Glanzend <b>blauwzwart</b> met bronsgroene veerranden. <b>Witte iris.</b> Snavel zwart, zijdelings samengedrukt met een hoge richel aan de basis van de bovensnavel. Poten zwart. Broedvogel. <b>IV.602.123</b></p>
	<p><b>Smooth-billed ani,</b> <i>Crotophaga ani,</i> Kleine ani 35 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noorderlijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Glanzend <b>zwart.</b> <b>Oogring en oog zwart.</b> Snavel bovenrand sterk gekromd, zijdelings samengedrukt tot een dunne kiel, gezwollen aan de basis, buigt terug naar het voorhoofd. Poten zwart. Broedvogel. <b>IV.602.124</b></p>
	<p><b>Striped cuckoo ,</b> <i>Tapera naevia,</i> Gestreepte koekoek 26-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Bovenzijde bruin, beige en zwart gestreept. Kop met een zwartachtig en roestbruin gestreepte kuif, witte wenkbrauwstreep en een smalle zwarte snor. Opvallende zwarte duimvleugel. Onderzijde witachtig, met op de zijborst een zwarte streep. Oogring geel, snavel bruin van boven, van onder geel, poten donkergrijs. Broedvogel. <b>IV.605.127</b></p>
	<p><b>Pavonine cuckoo,</b> <i>Dromococcyx pavoninus,</i> Pauwkoekoek 28 cm</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Van boven zwart, ook de lange, brede staart. Kroon en kuif bruin, lange oogstreep beige. De staartveren zijn wit getopt. Wat witte dekveerranden in de vleugel. Bovenborst effen roodbruin. Status onbekend. <b>IV.605.129</b></p>

**Familie: *Tytonidae*, Barn-owls, Kerkuilen**

Uilen met een grote kop en een hartvormige gezicht, lange poten met sterke voeten, meestal met flinke klauwen; verenpak doorgaans bruin tot beige en roomkleurig tot wit gespikkeld, gevlekt of gebandeerd.



**Common barn-owl,**  
*Tyto alba helmayri*,  
Kerkuil  
29-44 cm (Kauw 30-34)

Kustvlakte

Bleek. Boven geelachtig met grijsblauwe sluijer. Onder wit tot goud, meest met donkere vlekjes. Lange poten; hartvormig, wit gezicht, ogen donker. Golvende, langzame vlucht met hangende poten. Broedvogel.  
**V.71.10**

**Familie: *Strigidae*, Typical owls, Uilen**

Nachtvogels met een grote kop en een sterke haaksnavel, een rond gezicht; een compact lijf, matig korte staart en sterke voeten met scherpe klauwen; verenpak zacht, met schutkleuren.



**Tropical screech-owl,**  
*Megascops choliba cruciger*,  
Cholibaschreeuwuil  
20-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte

Gezicht lichtgrijs met zwarte rand. Boven (ook kroon) donker gestreept. Schouder met lichte vlekken met een donkere rand. Slagpennen en staart bruin gebandeerd beige. Van onder wit met dunne golflijntjes, zwarte veerschachten en visgraten. Tarsus bevederd, voeten grijsbruin. Ogen geel. Broedvogel.  
**V.175.47**



**(Northern) Tawny-bellied screech-owl,**  
*Megascops watsonii watsonii*,  
Donkerbruine schreeuwuil  
19-24 cm (Dodaars 23-29)

Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos

Gezicht bruin met smalle, zwarte rand. Lange, brede oren, van binnen zwart en met een zwarte punt. Van boven (ook de kroon) donker grijsbruin met zwart en beige. Slagpennen en staart bruin, beige gebandeerd. Borst donkerbruin met beige vlekjes, rest onderzijde bruin met donkere visgraten. Oog oranjebruin, tenen grijs. Waarschijnlijk broedvogel.  
**V.179.56**



**Vermiculated screech-owl (Roraima screech-owl),**  
*Megascops vermiculatus roraimae*,  
Roodwangschreeuwuil  
20-23 cm (Spreeuw 19-22)

Hooglandbos

Bruine morph: Gezicht lichtbruin met donkere ringen. Boven grijsbruin met zwarte golfjes. Schouder met witte vlekken. Slagpennen bruin-wit gebandeerd. Onder wittig met bruin-zwarte golfjes en enkele zwarte schachten. Tarsus bevederd, oog geel, poten grijs. Rode morph: Kop en rug effen helder vosrood. Waarschijnlijk broedvogel.  
**V.180.58**









**Great horned owl (Venezuelan great horned owl),**  
*Bubo virginianus nacurutu*,  
Amerikaanse oehoe  
♀: 60; ♂: 51 cm (Buizerd 48-56)

Kustvlakte, Zuidelijke savanne





Grote, rechtopstaande oorpluimen. Beigebruin, van boven zwart gevlekt en gegolfd, bovendien met dwarse rijen lichte vlekken, van onder donker gebandeerd. Driehoekige, witte keelvlek. Gezicht bruin, witter om de ogen, met zwarte zijrand. Kroon en nek donker. Slagpennen en staart grijs-zwart gebandeerd. Poten bevederd, oog helder geel, donkere klauwen. Broedvogel.  
**V.185.69**

	<p><b>Mottled owl (McCconnell's white-browed wood-owl),</b> <i>Ciccaba virgata macconnelli</i>, Bonte bosuil 29-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Lichte vorm: Bruin gezicht met een witte X er over. Van boven donker met vage witte dwarsstrepen. Witte schouderplekken. Onder wit tot beige, borst met donkere visgraten, rest donker gebandeerd. Tarsus bevederd, oog bruin, tenen grijs. Donkere vorm: donker tot zeer donker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.204.109</b></p>
	<p><b>Black-banded owl,</b> <i>Ciccaba huhula huhula</i>, Zwartgestreepte bosuil 34 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Gezicht zwartachtig met wit gevlekte randen. Van boven bruinzwart met smalle witte dwarsstreepjes. Van onder zwart gebandeerd. Staart zwart met vier smalle witte banden en een breed wit einde. Poten bevederd en gebandeerd. Iris bruin; snavel en tenen oranjegeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.205.111</b></p>
	<p><b>(Southern) Crested owl,</b> <i>Lophotrix cristata cristata</i>, Kuifuil 36-43 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Lichte morph: Gezicht bruin met een witte wenkbrauw die doorloopt in de voornamelijk witte oorpluimen. Van boven donker beige, vleugeldekveren wit gevlekt. Van onder wit, borst wat donkerder. Tarsus bevederd, iris bruin, snavel en tenen geel. Donkere vorm: Boven donker- en onder lichtbruin. Gezicht donker roodbruin met een zwarte rand. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.206.114</b></p>
	<p><b>Spectacled owl,</b> <i>Pulsatrix perspicillata perspicillata</i>, Briluil 43-52 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Gezicht zeer donkerbruin met een wit kruis erover. Witte keel. Van boven donkerbruin, kop en hals bijna zwart. Slagpennen en staart grijs-bruin gebandeerd. Van onder lichtbruin met een brede chocoladebruine borstband. Poten bevederd, oog geel, snavel wit. Broedvogel. <b>V.206.115</b></p>
	<p><b>Amazonian pygmy-owl,</b> <i>Glaucidium hardyi</i>, Hardy's dwerguil 14 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Lichte vorm: Lange vleugels, effen donkere mantel, kroon en achterhoofd bruingrijs met veel witte vlekjes. Op het achterhoofd twee nep-ogen met een witte rand. Kaneelkleurige vlekken op de vleugel. Vijf witte banden in de bovenstaart, van onder met beige banden. Borstzijden en strepen op de onderzijde kaneel. Donkere vorm: Geen witte staartbanden. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.216.134</b></p>

	<p><b>Ferruginous pygmy-owl,</b> <i>Glaucidium brasilianum phalaenoides</i>, Braziliaanse dwerguil 15-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Gezicht bruin met witte vlek en witte wenkbrauwen. Van boven grijsbruin tot roodbruin, kroon en achterhoofd wit gespikkeld. Valse ogen op het achterhoofd met een witte rand. Lange, smalle staart met 5-8 witte bandjes. Ogen citroengeel, snavel en voeten geel, tarsus bevederd. Veel variatie in kleur. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.217.136</b></p>
	<p><b>(Lesser) Burrowing owl,</b> <i>Athene cunicularia minor</i>, Holenuil 19-25 cm (spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, beide savannes</p>	<p>Lange, wit bevederde poten. Grote gele ogen. Van boven bruin, kruin wit gestreept, vleugels wit gestippeld. Van onder beige met onregelmatige bruine vlekken en dwarsstrepen. Voornamelijk overdag actief. Graaft een hol. Status onbekend. <b>V.227.155</b></p>
	<p><b>Striped owl,</b> <i>Asio clamator clamator</i>, Gestreepte ransuil 30-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Gezicht vrijwel geheel wit met zwarte randen en lange zwarte oren. Boven grijsbeige met fijne zwarte golfjes en zware zwarte strepen. Slagpennen en staart met zeer donkere banden. Onder beige met zwarte veerschachten. Ogen donker, snavel grijs. Broedvogel. <b>V.239.182</b></p>
	<p><b>Stygian owl,</b> <i>Asio stygius robustus</i>, Grote ransuil 38-46 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Rug zwartbruin met wat beige vlekken op de kroon en in de nek. Oortjes. Bovenstaartdekveren beige dwarsgestreept. Binnenste slagpennen beige gevlekt. Van onder beige gevlekt en donkerbruin gewolkt. Middelste staartveren zwartachtig met 3 of 4 smalle beige dwarsstrepen, de buitenste met 4 of 5 veel bredere. Status onbekend. <b>V.240.183</b></p>
	<p><b>Short-eared owl,</b> <i>Asio flammeus pallidicaudus</i>, Velduil 37-38 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Donker bruin gestreept bruin, zowel boven als onder. Vleugels en staart donker dwarsgestreept, schouderveren met wit. In vlucht zowel boven als onder een zwarte vlek in de vleugelbocht en een grote bleekbeige vlek aan de basis van de slagpennen aan de bovenkant. Bruin gezicht met een zwarte rand, zwart om het oog, kin en veren aan de snavelbasis wit. Dwaalgast. <b>V.241.187</b></p>
<p><b>Familie: <i>Steatornithidae</i>, Oilbird, Vetvogel</b> Grote vruchtenetende nachtvogels met een haaksnavel, grote snavelopening, lange vleugels en staart en korte poten.</p>		
	<p><b>Oilbird,</b> <i>Steatornis caripensis</i>, Vetvogel 40-49 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Van boven roodbruin met wat zwarte dwarsstreepjes, van onder bruinrose. Kroon met kleine witte stipjes. Op vleugeldekveren ronde witte stippen met een zwarte rand. Buitenste handpennen met witte vlekken. Staart lang, stijf, met smalle zwarte dwarsstrepen, de buitenste veren met witte vlekken. Status onbekend. <b>V.251. 2</b></p>

**Familie: Nyctibiidae, Potoos, Reuzennachtzwaluwen**






Middelgrote nachtvogels met een grote kop, een klein lijf, lange vleugels en staart en erg korte poten.






	<p><b>Great potoo,</b> <i>Nyctibius grandis grandis</i>, Vale reuzennachtzwaluw 45-55 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Grote kop, variabele boomschors- en korstmotekening waardoor hij op een boomstomp lijkt. <b>Iris bruin.</b> Broedvogel. <b>V.299.1</b></p>
	<p><b>Long-tailed potoo,</b> <i>Nyctibius aethereus longicaudatus</i>, Wigstaartreuzennachtzwaluw 46-58 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Laag-,Hooglandbos</p>	<p>Lange, sterk wigvormige staart; roodbruin, vaak met een opvallende bleke schouderplek. Zwart gemarmerd, op de borst en hier en daar op de vleugel zwart gevlekt. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.299.2</b></p>
	<p><b>Common potoo (Grey potoo),</b> <i>Nyctibius griseus griseus</i>, Grijze reuzennachtzwaluw 33-38 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Variabele kleuren van roodachtig bruin tot grijsbruin, zo getekend dat hij op boomschors lijkt. <b>Iris geel.</b> Broedvogel. <b>V.300.4</b></p>
	<p><b>White-winged potoo,</b> <i>Nyctibius leucopterus</i>, Witvleugelreuzennachtzwaluw 24-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon zwaar zwart gevlekt. Brede, witte band op de vleugel. Relatief korte staart, donkerbruin, bleker aan de onderzijde. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.300.6</b></p>



**Familie: *Caprimulgidae*; Nightjars; Nachtzwaluwen**

Kleine tot grote nachtvoegels, onregelmatig gekleurd, met een grote bek, lange vleugels en staart en korte poten.

	<p><b>Semi-collared nighthawk,</b> <i>Lurocalis semitorquatus</i> <i>semitorquatus</i>, Kortstaartnachtzwaluw 19-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven donkerbruin, roodbruin en beige gevlekt. Vleugels in zit langer dan staart. Witte keelvlak. Van onder donkerbruin, witachtig en beige gevlekt. Geen wit in staart of vleugels. Oog bruin, snavel zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.333.1</b></p>
	<p><b>Least nighthawk,</b> <i>Chordeiles pusillus</i> <i>septentrionalis</i>, Kleinste nachtzwaluw 15-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven bruinachtig; grijswit, beige en lichtbruin gevlekt. Kleine, witte vlek laag op de keel. Van onder bruinbeige, gevlekt en gebandeerd, buik wit-bruin gebandeerd. Oog bruin, snavel zwart. ♂: Witte driehoek op de buitenste handpennen, witte vleugelachterraand en witte einden aan de buitenste staartveren. ♀: Alleen een, kleinere, witte vleugelvlak. Status onbekend. <b>V.333.3</b></p>
	<p><b>Lesser nighthawk,</b> <i>Chordeiles acutipennis</i> <i>acutipennis</i>, Texasnachtzwaluw 19-23 cm (Spreeuw 19-23)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven donkerbruin met grijsbruine spikkels en duidelijke zwartbruine vlekken. Witte vlekjes op de vleugels. Bruin gerande, zwarte schouderveren. Onder bruinachtig; grijswit, kaneel, lichtbruin en beige gevlekt en gespikkeld. Buik beige, bruin gebandeerd. Oog bruin, snavel zwart. ♂: Witte keelvlak. Witte band over buitenste handpennen en smalle subterminale, witte band over de buitenste staartpennen. ♀: Beige keelvlak. Vleugelband beige, geen wit in staart. <b>V.334.6</b></p>
	<p><b>(Northern) Nacunda nighthawk,</b> <i>Chordeiles nacunda coryi</i>, Nacundanachtzwaluw 28-32 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven bruin, grijswit en grijsbruin gespikkeld en zwaar zwart gevlekt. Grote witte keelvlak. Onder bruin, beige gevlekt, overgaand in witte buik. Oog en snavel bruin. ♂: Met een witte band over vrijwel alle zwarte handpennen en brede witte einden aan bijna alle buitenste staartveren. ♀: Witte buik bruin dwarsgestreept. Geen wit in staart. Status onbekend. <b>V.336.10</b></p>
	<p><b>Rufous nightjar,</b> <i>Antrostomus rufus rufus</i>, Rosse nachtzwaluw 25-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Van boven lichtbruin; breed zwart gestreept; vleugel roodbruin, beige gespikkeld en flink zwart gevlekt. Smalle witte keelband. Onder lichtbruin, bruin gebandeerd, met vlekken en spikkels in verschillende bruintinten en wit. Geen wit in vleugel. ♂: Zwart gebandeerde staart en grote witte vlek op buitenste staartveren. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.347.27</b></p>

	<p><b>Pauraque,</b> <i>Nyctidromus albicollis albicollis</i>, Pauraque 22-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>In zit reiken de vleugels tot halverwege de staart. Grijsbruin met roodachtig zweem. Van boven met bruine vlekken en grijswitte spikkels. Kruin zwartbruin gestreept. Kleine dekveren kastanje, rest beigegeel. Schouderveren bruin gerand zwart. Beige oogring en mondstreep, bruine wangen, witte keelvlek. Van onder bruine spikkels en golfjes en een beige band over buik en flank.</p> <p>♂: Brede, witte band over zwarte handpennen, buitenste staartpen donker, volgende wit. ♀: Meer beige; een smallere vleugelband en kleine, witte vlekjes aan staarteinde. Broedvogel.</p> <p><b>V.343.18</b></p>
	<p><b>White-tailed nightjar,</b> <i>Hydrosalis cayennensis cayennensis</i>, Witstaartnachtzwaluw 20-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven grijsbruin, zwartbruin gestreept. Brede, lichtbruine nekring. Vleugels zwaar wit en beige gevlekt. Broedvogel.</p> <p>♂: Dunne, witte lijn over voorvleugel; grote, witte keelvlek; beige borst flink wit gevlekt, witte buik, witte keep in buitenste handpennen, vrijwel geheel witte staart. ♀: Onder donkerder, beige keel, geen wit.</p> <p><b>V.353.38</b></p>
	<p><b>Spot-tailed nightjar,</b> <i>Hydrosalis maculicaudus</i>, Vlekstaartnachtzwaluw 19-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven bruin, gebandeerd; kruin donker, beige gevlekt. Beigebruine nekring. Vleugel flink lichter gevlekt. Brede, geelbeige schouderstreep. Brede, beige wenkbrauw, dunne mondstreep en driehoekige, zwarte baardstreep. Kleine, beige keelvlek. Borst bruin met lichtere vlekken. Roodbruine band tussen borst en buik, rest onderkant beige. Geen wit in de vleugel.</p> <p>♂: Witte einden aan buitenste staartveren. Broedvogel.</p> <p><b>V.354.40</b></p>
	<p><b>Blackish nightjar,</b> <i>Nyctipolis nigrescens</i>, Roetnachtzwaluw 20-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven zwartig met lichtere vlekken. Schouderveren zwart met beige randen. Kleine witte vlek aan weerskanten van de keel. Van onder donkerder, met lichte vlekken en dwarsstrepen, buik beige gebandeerd.</p> <p>♂: Kleine witte uiteinden aan buitenste staartveren. Broedvogel.</p> <p><b>V.355.44</b></p>
	<p><b>Ladder-tailed nightjar,</b> <i>Hydrosalis climacocerca schomburgki</i>, Trapstaartnachtzwaluw 24-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Van boven bruin, zwartbruin gestreept. Bruine nekring. Vleugel beige gevlekt. Schouderveren zwart, beige gerand. Witte mondstreep. Staart lang met wimpelveren.</p> <p>♂: Witte keelvlek, witte vlek op de buitenste handpennen en veel wit in staart. ♀: Beige keelvlek en veel smaller wit in de vleugel. Geen wit in staart.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel.</p> <p><b>V.382.84</b></p>



**Scissor-tailed nightjar,**  
*Hydrosalis torquata torquata*,  
Spiesstaartnachtzwaluw  
25-30 cm, (zonder wimpel) (Dodaars  
23-29)

Zuidelijke savanne

Geen wit of beige in de vleugel.  
Man: Lange buitenste staartveren (10-13 cm), laatste derde deel wit. Van boven bruin met beige en witte vlekjes, roestbruine nekvlek en wittige wangstreep. Van onder bruin, donker gebandeerd op borst en buik.  
Vrouw: Een gewoon gevorkte staart zonder wit.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**V.382.85**

**Familie: Apodidae; Swifts; Gierzwaluwen**

Kleine tot middelgrote, altijd vliegende vogels met lange, smalle vleugels en korte, dunne poten, maar met sterke tenen en scherpe klauwen; over het algemeen saai gekleurd.



**White-chinned swift,**  
*Cypseloides cryptus*,  
Witkingierzwaluw  
15 cm (Huisumus 14-16)

Laag-, Hooglandbos

Bruinzwart; kinvlek wit, niet altijd aanwezig en altijd slecht te zien. Tussen snavel en ogen intens zwart, veren aan de zijkant van het voorhoofd met grijzige randen. Staart kort met uitstekende stekels.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**V.421.8**



**White-collared swift,**  
*Streptoprocne zonaris albicincta*,  
Witkraaggierzwaluw  
22 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Groot, met een ondiep gevorkte staart en brede vleugels. Zwartachtig met een duidelijke, brede, witte kraag.  
Broedvogel.  
**V.422.11**



**Band-rumped swift,**  
*Chaetura spinicaudus spinicaudus*,  
Witbandgierzwaluw  
11 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos



Klein, plomp. Korte, rechte staart met stekels. Vleugel gehoekt bij pols, brede middenvleugel, ingeknepen bij lichaam. Van boven bruinzwart, **witte stuit**, effen zwart van onder, keel iets lichter.  
Broedvogel.  
**V.442.57**













**Chapman's swift,**  
*Chaetura chapmani chapmani*,  
Chapmans gierzwaluw  
13-14 cm (Huisumus 14-16)






Laag-, Hooglandbos





Korte, rechte staart met stekels. Vleugel gehoekt bij pols, brede middenvleugel, ingeknepen bij lichaam. Glanzend zwart van boven met **lichtere stuit**. Van onder effen donkerbruin.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**V.444.63**

		<p><b>Short-tailed swift,</b> <i>Chaetura brachyura brachyura,</i> Kortstaartgierzwaluw 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Klein, met een uitstekende kop en een opvallend korte staart (waardoor de vleugels buitengewoon lang lijken). Staartstekels steken 5 mm uit. Vleugel ingesnoerd bij het lichaam, uitbollend in het midden en naar buiten gehoekt. Glanzend purperzwart, vanaf romp naar achter bleek geelbruin. Broedvogel. <b>V.445.64</b></p>
		<p><b>Southern swift,</b> <i>Chaetura meridionalis,</i> Sicks gierzwaluw 13,5 cm (Huismus 14-6)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Korte staart. Zwartbruin met een blekere stuit en keel. Meestal met zijn tweeën of in kleine groepen in "formatie" vliegend. Migrant uit het zuiden. <b>V.445.445.65</b></p>
		<p><b>White-tipped swift,</b> <i>Aeronautes montivagus tatei,</i> Kleine Andesgierzwaluw 13 cm Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Glanzend bruinzwart. Staart zwak gevorkt, zonder stekels, met een wit einde. Keel, borst en streep in het midden van het abdomen vuilwit. Pluimpje zijdeachtige, witte veren op de flanken. Status onbekend. <b>V.447.67</b></p>
		<p><b>Fork-tailed palm-swift,</b> <i>Tachornis squamata squamata,</i> Braziliaanse palmgierzwaluw 13cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Klein met een lange, diep gevorkte staart (meest tot een naald samengevouwen) en lange, smalle vleugels. Bruinzwart van boven. Grote witte keelvlek, gescheiden van witte middenbuik door een smalle, bruine borstband. Rest onderzijde bruin. Bruine vlekken op keel en buik. Broedvogel. <b>V.448.71</b></p>
		<p><b>Lesser swallow-tailed swift,</b> <i>Panyptila cayennensis cayennensis,</i> Cayennegierzwaluw 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zwart met witte kraag, flanken, gezicht en keel. Zeer smalle, puntige vleugels. Lange, diep gevorkte staart. Broedvogel. <b>V.448.73</b></p>


	<p><b>Common swift,</b> <i>Apus apus apus,</i> Gierzwaluw 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Roetzwart, kin en keel wittig, slecht te zien. Lange, sikkelvormige vleugels met een blauwige glans. Staart kort en gevorkt, kleine snavel. Dwaalgast. <b>V.452.79</b></p>
<p>Familie: <b>Trochilidae; Hummingbirds;</b> Kolibries Kleine tot zeer kleine, snel vliegende vogeltjes met intens iriserende veren; vele met een frappant gekleurde keelvlak of kuif; de dunne snavel is buitengewoon variabel, van kort tot ongelooflijk lang, van recht tot flink gebogen; kleine voetjes.</p>		
	<p><b>Rufous-breasted hermit,</b> <i>Glaucis hirsutus hirsutus,</i> Roodborstheremietkolibrie 10-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven donkergroen, onder roodbruin. Iets neergebogen snavel. Buitenste staartveren bruin met een subterminale zwarte band en een witte punt. Vleugels donker. ♀: Wat bleker. Broedvogel. <b>V.538.5</b></p>
	<p><b>Pale-tailed barbthroat,</b> <i>Threnetes leucurus leucurus,</i> Zwartkeelbaardkolibrie 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven groen met grijszwarte vlekken. Snavel zwak gebogen. Witte, naar beige verlopende snor. Zwarte wang. Zwarte keel, daaronder oranje keelband. Iriserende, groene borst, grijze buik. Witte buitenste staartveren. Broedvogel. <b>V.539.8</b></p>
	<p><b>Long-tailed hermit,</b> <i>Phaethornis superciliosus superciliosus,</i> Langstaartheremietkolibrie 14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kap en rug bruinig. Lichtbeige wenkbrauw- en keelstreep. Masker en snor zwart. Onderzijde beige, verlopend naar wit. Staart groenzwart met een witte rand, de centrale veren verlengd met wit aan het eind. Snavel iets gebogen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.541.14</b></p>
	<p><b>Great-billed hermit,</b> <i>Phaethornis malaris malaris,</i> Langsnavelheremietkolibrie 13-17 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kap en rug bronsgroen. Lange, iets gebogen snavel. Beige wenkbrauw- en snorstreep. Zwart masker, donkere keel en beige buik. Zwarte vleugels. Staart groen, daarna zwart, met beige einden, de middelste langere veren wit met twee oker strepen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.543.15</b></p>











	<p><b>Straight-billed hermit,</b> <i>Phaethornis bourcieri</i> <i>bourcieri</i>, Priemsnavelheremietkolibrie 12-13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Van boven olijfgroen, van onder bruiner of grijs. Rechte snavel. Beige wenkbrauw, lichtere snor, donkere baardstreep, zwart masker. Witte keel, donkere vleugels. Staart groenzwart met beige randen; centrale staartveren verlengd en wit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.544.19</b></p>
	<p><b>Sooty-capped hermit,</b> <i>Phaetornis augusti</i> <i>incanescens</i>, Bruinkapheremietkolibrie 14-15 cm (huisumus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kroon donker, rug bronsgroen, bovenstaartdekveren oranjerood. Streep boven oog, snor en keelstreep wit, onderzijde vuilgrijs, onderstaart beige. Middenstaartveren erg lang, kopergroen, eind wit; die ernaast groen, zwart, eind half wit, half zwart; de rest voornamelijk zwart, met brede witte randen en een wit einde. Ondersnavel rood. Status onbekend. <b>V.545.23</b></p>
	<p><b>Little hermit,</b> <i>Phaetornis longuemareus</i>, Kleine heremietkolibrie 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven olijfgroen, van onder okeroranje, witte anaalstreep. Centrale staartveren zijn verlengd en wit. Donkere keel. ♀: Lichtere keel; brede, beige randen aan de staartveren en bruine anaalstreep. Broedvogel. <b>V.545.27</b></p>
	<p><b>Reddish hermit,</b> <i>Phaetornis ruber ruber</i>, Rode heremietkolibrie 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Donkergroene rug, groene staart, daartussen bruin. De staartveren met kleine witte of roodachtige uiteinden. Wenkbrauw- en snorstreep wit. Onder kaneelrood. ♂: Zwarte veren op of zelfs een zwarte band over de borst. ♀: Bleker. Broedvogel. <b>V.546.30</b></p>
	<p><b>Grey-breasted sabrewing,</b> <i>Campylopterus largipennis</i> <i>largipennis</i>, Grijsborstsabelvleugel 13-15 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Rechte snavel. Van boven glanzend donkergroen. Achter het oog een wit vlekje. Van onder effen grijs. Vleugel donker. De afgeronde staart is groen in het midden en heeft aan de buitenzijden een blauwzwarte voorste helft en een witte achterste helft. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.550.40</b></p>








	<p><b>Swallow-tailed hummingbird,</b> <i>Eupetomena macroura macroura</i>, Zwaluwstaartkolibrie 15-17 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Iets gebogen zwarte snavel. Diep violette bivakmuts. Glanzend blauwgroen of bronsgroen. Staart diep gevorkt, blauw. Vleugels zwartig. ♀: Saaier. Broedvogel. <b>V.554.50</b></p>
	<p><b>White-necked jacobin,</b> <i>Florisuga mellivora mellivora</i>, Witnekkolibrie 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Blauwe bivakmuts; brede, witte halvemaan in de nek. Rest bovenzijde heldergroen. Buik wit. Staart grotendeels wit met smalle zwarte randen en zwarte punten. ♀: Zeer variabel. Meestal: bovenzijde groen; blauwgroene, zwaar wittig geschubde borst; buik wit; staarteinde blauw, buitenste pen met een wit einde. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.554.51</b></p>
	<p><b>Brown violet-ear,</b> <i>Colibri delphinae</i>, Bruine violetoorkolibrie 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Voornamelijk grijsbruin, groen glanzend op de rug. Een violette vlek van onder het oog tot over de oorstreek. Teugel en brede snor bijna wit. Stuit donker, met breed kaneelkleurig gerande veren. Staart bronsgroen met een groenzwarte subterminale band en een smalle, okergrijze eindband. Keel in het midden groen, verlopend naar blauw aan de rand. Buik grijsbruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.557.53</b></p>
	<p><b>Green-throated mango,</b> <i>Anthracothorax viridigula</i>, Groenkeelmango 11-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Iets gebogen snavel. Van boven glanzend bronsgroen. Middenborst en buik fluweelzwart. Opzij bronsgroen, dijen en flanken wit. Middenstaart donkerbruin tot groen, de rest glimmend purper, de buitenste veren met een donkerblauw einde. ♀: Van onder voornamelijk wit met fluweelzwarte strepen van de kin tot en met de buik. Staart met een wit einde. Broedvogel. <b>V.558.57</b></p>
	<p><b>Black-throated mango,</b> <i>Anthracothorax nigricollis nigricollis</i>, Zwartkeelmango 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Snavel iets gebogen. Van boven bronsgroen. Middenborst en onderlijf fluweelzwart omgeven door iriserend blauwgroen. Staart overwegend kastanje, purper glanzend, de veren zijn donkerblauw gerand. ♀: Zwarte streep van de kin tot de onderbuik met een witte rand. Staart met brede, subterminale, zwarte band en een wit einde. Broedvogel. <b>V.559.59</b></p>






	<p><b>Fiery-tailed awlbill,</b> <i>Avocettula recurvirostris</i>, Vuurstaartkluutkolibrie 8-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p><b>De snavelpunt wijst omhoog.</b> Van boven, keel en borst glanzend smaragdgroen. Staart bovenkant purperviolet, buitenste staartveren van onder koperkleurig. Abdomen bronsgroen met een zwarte middenstreep.</p> <p>Vrouw: Van boven als het mannetje; van onder wit met een zwarte middenstreep over keel en borst; zijkanten kopergroen. Buitenste staartveren staalblauw met witte einden.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel.</p> <p><b>V.560.64</b></p>
	<p><b>Crimson topaz,</b> <i>Topaza pella pella</i>, Topaaskolibrie ♂: 21-23; ♀: 13-14 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Hooglandbos</p>	<p>Groot. ♂: Snavel recht. Kap fluweelzwart, rug glanzend felrood tot purper. Gouden stuit. Keel heldergroen met gouden weerschijn en een zwarte rand. Onderzijde helderrood, anaalstreek brons. Vleugels bruin. Middenstaart bronsgoudgroen, buitenkant kastanje. Twee staartveren zijn verlengd en kruisen elkaar.</p> <p>♀: Kop en bovenzijde donkergroen. Keel groen met rode vlekken. Van onder groen met goudgroene vlekken. Anaalstreek glanzend groen. Middenstaart bruin, daarnaast violet en buitenzijde kastanje.</p> <p>Broedvogel.</p> <p><b>V.563.65</b></p>
	<p><b>Ruby-topaz hummingbird,</b> <i>Chrysolampis mosquitos</i>, Muskietkolibrie 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Korte, rechte snavel.</p> <p>♂: Kap glanzend rood, rug donkerbruin met olijf weerschijn. Keel en borst glimmend topaasoranje. Staart kastanje met een zwarte punt.</p> <p>♀: Kopergroene rug, van onder licht grijswit. Middenstaart olijfgroen, rest kastanjerood met een purperzwarte subterminale band en een wit einde.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel.</p> <p><b>V.564.68</b></p>
	<p><b>Tufted coquette,</b> <i>Lophornis ornatus</i>, Gekuifde koketkolibrie 7 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Korte, rechte, rode snavel. Voorhoofd iriserend groen; lange, roodbruine kuif. Bovenzijde glanzend lichtgroen. Witte band over onderrug. Stuit purper. De lange waaierveren op de wangen zijn roodbruin met aan het eind groene, iriserende vlekken. Keel glimmend smaragdgroen, rest onderzijde lichtgroen. Staart recht, het midden bronsgroen, rest roodbruin met een bronsgroen einde en bronsgroene veerranden.</p> <p>♀: Zwarte snavel. Geen kuif en waaiers. Rugband beige. Van onder roodbruin met groene flanken.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel.</p> <p><b>V.567.73</b></p>



	<p><b>Racquet-tailed coquette,</b> <i>Discosura longicaudus</i>, Vlagstaartkolibrie ♀: 7-8; ♂: 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Korte, rechte, zwarte snavel. ♂: Kroon iriserend groen, rest bovendelen brongroen. Beigewitte band over onderrug. Keel glanzend smaragdgroen. Onderborst goudkoper. Buik wittig. Staart lang, gevorkt, purper. De schachten van de buitenste twee pennen lopen door en eindigen in een schoppenvormige vlag. ♀: Keel zwart, daaromheen wit. Borst groen, buik beigewit. Staart alleen maar iets gevorkt, grijs, met een purperen, subterminale band. De buitenstaart heeft een wit einde. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.571.87</b></p>
	<p><b>Blue-chinned sapphire,</b> <i>Chlorostilbon notatus notatus</i>, Blauwkeelsaffierkolibrie ♂ 8-9, ♀ 7-8 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Korte, rechte snavel, van boven zwart, van onder rood. ♂: Van boven glimmend brongroen, vleugels zwart met purperglans. Staart gevorkt, staalblauw. Kin en keel iriserend diep helderblauw. Verder van onder glanzend groen. ♀: Van onder wit met glanzend blauwgroene rondjes op keel en borst en smaragdgroene lager. Anaalstreek groen. Broedvogel. <b>V.572.90</b></p>
	<p><b>Blue-tailed emerald,</b> <i>Chlorostilbon mellisugus mellisugus</i>, Blauwstaartsmaragdkolibrie ♂ 8-9, ♀ 7-8 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Korte, rechte, zwarte snavel. ♂: Voorhoofd en kroon iriserend goudgroen. Bovenkant glanzend brongroen. Onder glimmend smaragdgroen. Staart staalblauw. ♀: Voorhoofd en kroon brongroen, zwarte band over oorstreek, daarboven lichtgrijze streep achter het oog. Verder van boven grasgroen. Onder lichtgrijs. Staart blauwgrijs met grijswit eind. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.573.91</b></p>
	<p><b>Fork-tailed woodnymph,</b> <i>Thalurania furcata furcata</i>, Vorkstaartbosnimf ♂ 10-11, ♀ 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Snavel recht en zwart. ♂: Donker brongroen; kroon en nek donker brons. Keel glanzend grasgroen, buik en band over bovenrug violet. Anaalstreek staalblauw met witte veerranden. Staart staalblauw en gevorkt. ♀: Van boven heldergroen met wat meer brons op de kroon. Van onder lichtgrijs. Achterste deel van de staart blauwzwart, buitenste pennen met een wit eind. Broedvogel. <b>V.586.116</b></p>
	<p><b>Rufous-throated hummingbird,</b> <i>Amazilia sapphirina</i>, Roodkeelsaffierkolibrie 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Snavel recht, koraalrood. Van boven donkergroen. Stuit koperviolet. Kin fel roodbruin, keel en borst iriserend blauwviolet. Anaalstreek kastanje. Staart koperkastanje met een grijs einde. ♀: Kin lichtbruin. Van onder grijzig met grote, glimmende, blauwgroene vlekken op keel en borst. Anaalstreek beige. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.589.124</b></p>

		<p><b>White-chinned sapphire</b> (<b>Green-vented sapphire</b>), <i>Hylocharis cyanus viridiventris</i>, Witkinsaffierkolibrie 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Snavel recht en koraalrood. Kop en borst schitterend blauwviolet, een mini wit vlekje op de kin. Van boven goudgroen. Vleugels zwart. Buik smaragdgroen aan de zijden, in het midden grijs. Anaalstreek en staart staalblauw. ♀: Van boven licht goudgroen, romp koperbruin. Keel wittig, borst goudgroen, buik grijs. Anaalstreek donkergroen. Buitenste staartveren met grijs einde. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.589.125</b></p>
		<p><b>White-tailed goldenthrout</b>, <i>Polytmus guainumbi guainumbi</i>, Witstaartgoudkeelkolibrie 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Snavel lang, gebogen, voornamelijk rood. Van boven glanzend goud tot bronsgroen. Grijs vlekken over oog, met daar boven- en onderlangs witte strepen. Van onder iriserend goudgroen. Staart rond, groen, met een wit einde, buitenveren met witte randen. ♀: Strepen in het gezicht beige, evenals de onderzijde. Keel en borst met groene vlekken. Snavel donker. Broedvogel. <b>V.591.130</b></p>
		<p><b>Green-tailed goldenthrout</b>, <i>Polytmus theresiae theresiae</i>, Groenstaartgoudkeelkolibrie 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>♂: Lange, donkere, iets gebogen snavel. Glimmend groen. Klein, wit vlekje achter het oog. Staart afgerond, groen. ♀: Keel en borst wit met veel groene vlekken. Broedvogel. <b>V.591.132</b></p>
		<p><b>Plain-bellied emerald</b>, <i>Amazilia leucogaster leucogaster</i>, Gmelins amazilia 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Snavel recht en zwart. Boven glanzend goudgroen. Onder wit. Staart iets gevorkt. Buitenste staartpenne blauwzwart. Broedvogel. <b>V.597.146</b></p>
		<p><b>White-chested emerald</b> <i>Amazilia brevirostris brevirostris</i>, Witborstamazilia 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Snavel kort, recht en zwart. Kroon en wang iriserend turkoois. Rug glimmend bronsgroen. Stuit meer koper. De onderzijde is in het midden wit, omringd door bronsgroen. Staart van onder zwart, van boven met een subterminale zwarte band. Status onbekend. <b>V.598.149</b></p>





	<p><b>Glittering-throated emerald,</b> <i>Amazilia fimbriata fimbriata</i>, Franjeamazilia 8-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Snavel recht, voornamelijk zwart. Van boven goud/bronsgroen, keel en borst glanzend goudgroen. Midden onder wit. Staart donkerbronsgroen. Broedvogel. <b>V.601.155</b></p>
	<p><b>Green-bellied hummingbird,</b> <i>Amazilia viridigaster viridigaster</i>, Groenbuikamazilia 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop en rug goudgroen, stuit koper. Staartdekveren olijfgroen tot beige of bruinig, bovenstaartdekveren soms purper. Van onder donkerder glanzend groen. Staart iets gevorkt, diepblauw. Snavel recht, ondersnavel vleeskleurig, punt zwart. Vrouw met wit aan keelveren, staartveren brons of bruin gerand. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.604.166</b></p>
	<p><b>Copper-tailed hummingbird,</b> <i>Amazilia cupreicauda cupreicauda</i>, Koperstaartamazilia 9-10 cm (Goudhaan 9-10 cm)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon glanzend goudgroen, van boven brons of koperkleurig, romp soms met purperen weerschijn. Van onder glanzend goudgroen. Staartdekveren, staartbasis en staartmidden vosrood tot kastanjerood. Staartveren breed brons of purper gerand. Snavel recht, ondersnavel vleeskleurig, punt zwart. Vrouw wit aan keelveren, rug en staart met minder contrast. Waarschijnlijk broedvogel <b>V.604.167</b></p>
 	<p><b>Velvet-browed brilliant,</b> <i>Helodoxa xanthogonys xanthogonys</i>, Tepuibriljantkolibrie 10-11 cm (Goudhaan 9-10) Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd en middenkroon goudgroen, wenkbrauw fluweelzwart. Rest kop, nek en rug donker goudgroen, keel turkoois met violette vlek. Buik donker goudgroen, bovenstaartdekveren en middenstaartveren bronsgroen, de rest zwart, onderstaart groen met grijze en roestrode randen. Staart iets gevorkt. Snavel zwart, basis ondersnavel oranje. Vrouw: lichter groen dan de man, geen zwarte wenkbrauw, korte witte snorstreep, onder wit met groene vlekken, onderbuik wit.. Geen violette keelvlek. Ondersnavel oranje. Status onbekend. <b>V.615.189</b></p>
 	<p><b>Black-eared fairy,</b> <i>Heliathryx auritus auritus</i>, Zwartoorfeeënkolibrie 10-14 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Snavel recht, zwart, scherp gepunt. ♂: Van boven glimmend groen. Een driehoek onder het oog naar oorstreek zwart tot glanzend purper. Van onder wit. Staart afgerond, buitenpennen wit, die in het midden donkerblauw. ♀: Zij heeft een zwarte streep onder het oog, zonder purperglans. Op keel en borst grijze vlekjes. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.663.286</b></p>

		<p><b>Horned sunem,</b> <i>Heliactin bilophus</i>, Zonnestraalkolibrie 9,5-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Snavel kort en recht. Man: Glanzend blauwe kroon met korte pieken opzij die rood, blauw en goud schitteren. Van boven bronsgroen. Wangen, keel en borst zwart, hals en onderzijde wit. Staart lang en smal, midden wit. Vrouw: Geen pieken aan of blauw op de kop. Keel grijsig, hals en onder wit, rest groenig. Staart wat korter als bij man. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.663.287</b></p>
		<p><b>Long-billed starthroat,</b> <i>Heliomaster longirostris</i> <i>longirostris</i> Langsnavelsterkeelkolibrie 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Snavel lang, recht en zwart. Kroon glanzend blauw, de rest van de bovenzijde is donker bronsgroen. Een witte band midden over de rug. Staart recht, kort, zwart, wit einde aan buitenste pennen. Kleine, witte vlek achter het oog. Brede, witte snor. Kin zwart. Keelvlak donker metaalpurper. Borst groen. Midden onder wit. Pluimen aan weerszijden van de stuit wit. Anaalstreek grijs. Waarschijnlijk broedvogel. ♀: Kroon groen, keelvlak donkergroen. <b>V.664.290</b></p>
 		<p><b>Amethyst woodstar,</b> <i>Calliphlox amethystina</i>, Amethystboself 6-7 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Snavel recht en zwart. ♂: Boven donker groen. Witte vlek achter het oog. Witte vlek opzij van stuit. Halsvlek iriserend amethyst. Witte band over borst, daaronder groenig met bruine flanken. Staart gevorkt, purperzwart met een groene tip. Eclips: Bleke keel met een paar iriserende vlekjes. ♀: Onder wit, wat groene vlekken op de keel; flanken en anaalstreek roodbruin. Staart kort, meest dofgroen, zwarte subterminale band, wit of beige einde. Waarschijnlijk broedvogel. <b>V.668.301</b></p>

**Familie: Trogonidae, Trogons, Trogons**

Compacte boombewoners met een korte hals; een lange, getrapte staart; korte vleugels en een brede haaksnavel, erg korte poten, fel gekleurd.


		<p><b>Green-backed trogon,</b> <i>Trogon viridis</i>, Groenrugtrogon 25-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Blauwe snavel, blauwe oogring, kop en borst blauwzwart, buik geel. Van boven groen, vleugelvenster fijn zwart-wit (grijs lijkend) gegolfd. Handpennen met een witte buitenvlag. Staart van boven violet met een wit eind, van onder geheel wit. ♀: Borst grijszwart, onderstaart met meerdere, zwarte banden. Broedvogel. <b>VI.112.16</b></p>
		<p><b>Violaceous trogon (Guianan trogon),</b> <i>Trogon violaceus violaceus</i>, Guyana trogon 23-25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Snavel blauw, oogring geel; kop, en borst tot halverwege, violetblauw; masker en keel zwart, witte borstband, rest onderzijde geel. Van boven groen, vleugelvenster zwart-wit gegolfd (lijkt grijs), slagpennen donker, handpennen witte buitenvlag. Staart van boven blauwviolet met een zwart einde, van onder fijn zwart/ wit gebandeerd met drie bredere witte banden. ♀: Kop en borst grijszwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VI.114.20</b></p>

	<p><b>(Southern) Collared trogon,</b> <i>Trogon collaris collaris,</i> Gekraagde trogon 25-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>♂: Gele snavel, oranje-rode oogring, gezicht en keel zwartachtig; kroon, nek, bovendelen en borst groen tot blauwgroen; witte borstband, daaronder verder rood. Vleugelvenster zwart-wit dwarsgestreept, buitenvlaggen van handpennen wit. Staart boven blauwgroen met zwart einde, onder zwart met smalle, witte dwarsstrepen.</p> <p>♀: Donkere bovensnavel; witte, gebroken oogring; bruine kroon, bovendelen en borst; roodbruine bovenstaart; onderstaart wit, donker gevlekt, met smalle zwarte banden.</p> <p>Broedvogel. <b>VI.117.23</b></p>
	<p><b>Black-throated trogon,</b> <i>Trogon rufus rufus,</i> Zwartkeeltrogon 23-25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Snavel groengeel, oogring lichtblauw, gezicht en keel zwart. Kroon, borst en bovendelen metaalolijfgroen. Verder van onder geel. Bovenstaart olijkleurig, zwart einde, onderstaart zwart-wit gebandeerd met drie bredere, witte banden.</p> <p>♀ zwart culmen, gebroken witte oogring, koffiebruine kop, borst en bovendelen, flanken met bruin waas, bovenstaart bruinrood met zwarte tip.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel. <b>VI.118.25</b></p>
	<p><b>Black-tailed trogon,</b> <i>Trogon melanurus melanurus,</i> Zwartstaarttrogon 28-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Gele snavel, oranje-rode oogring, zwartachtig gezicht en keel; kroon, nek en borst groen, daaronder rood. Vleugelvenster zwart-wit gegolfd. Bovenstaart diepblauw, van onder leikleurig.</p> <p>♀: Snavel met zwart culmen. Kroon, nek en bovendelen donkergroen. Borst lichtgroen, buik rood, onderstaart zwart.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel. <b>VI.122.29</b></p>
<p><b>Familie: <i>Alcedinidae</i>, Kingfishers, IJsvogels</b> Kleine tot middelgrote, compacte vogels met een lange, rechte, dolkvormige snavel en korte poten; vaak fel gekleurd.</p>		
	<p><b>American pygmy-kingfisher,</b> <i>Chloroceryle aenea aenea,</i> Groene dwergijsvogel 13 cm (Huisman 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Zwarte teugel met erboven een smalle, roodbruine streep. Een smalle roodbruine kraag. Glimmend donkergroene kop en bovendelen met een gouden waas. Staart blauwgroen. Gouden vlekken op en gouden einden aan vleugeldekveren. Keel, borst en flanken roodbruin. Middenbuik en anaalstreek wit. Snavel zwart met onder een lichtgele basis. Ogen bruin, poten vleeskleur of grijs.</p> <p>♀: Donkergroene borstband met witte vlekken.</p> <p>Broedvogel. <b>VI.242.84</b></p>

	<p><b>Green-and-rufous kingfisher,</b> <i>Chloroceryle inda inda</i>, Groen-bruine ijsvogel 24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>♂: Glanzend donkergroen van boven, smalle roodbruine streep boven teugel. Witte vlekjes in vleugel en staart. Kin gelig, keel beige, daaronder roodbruin. Snavel zwart, de basis van de ondersnavel lichtgeel. Ogen bruin, poten vleeskleurig of grijs. ♀: Brede, witte borstband met groene vlekken. Lichte vlekjes in de vleugel, op de rug, de stuit en het voorhoofd. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VI.243.85</b></p>
	<p><b>Green kingfisher,</b> <i>Chloroceryle americana americana</i>, Groene ijsvogel 20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>♂: Zwarte teugel, witte kraag, rest bovendelen donkergroen. Bronzen reflecties op de kroon. Witte vlekken op de vleugel in een rij. Witte vlekjes in de staart, grotere op de voorste helft van de buitenste veren. Kin en keel wit, borst roodbruin; buik wit met brede, groenzwarte dwarsstrepen aan de zijkant. Anaalstreek donkergroen/wit gebandeerd. Snavel zwart, de ondersnavel met een lichtgele basis. Iris bruin, poten grijs. Broedvogel. ♀: Roomwitte keel en onderborst, bovenborst glanzend goudgroen met witte vlekken. <b>VI.243.86</b></p>
	<p><b>Amazon kingfisher,</b> <i>Chloroceryle amazona</i>, Amazoneijsvogel 30 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>♂: Boven donkerbronsgroen, witte kraag en een kleine, witte vlek voor, en een onder het oog. Keel wit, door smalle groene lijn van kraag gescheiden. Borst roodbruin met donkergroene zijden. Buik wit, flanken donkergroen gestreept. Snavel zwart, ondersnavel met lichtgele onderkant. Iris bruin, poten grijs. ♀: Witte borst met flesgroene zijvlekken die in het midden bijna raken. Broedvogel. <b>VI.244.87</b></p>
	<p><b>Ringed kingfisher,</b> <i>Megaceryle torquata torquata</i>, Amerikaanse reuzenijsvogel 40 cm (Kuifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>♂: Blauwachtige, leigrijze kop, zijborst, mantel, rug en stuit. Wit vlekje op voorhoofd. Brede witte kraag. Handpennen zwart, armpennen en dekveren blauwgrijs met witte stippen. Staartveren zwart met blauwgrijze randen en vijf paar witte vlekken. Borst en buik roodbruin, anaalstreek wit, grijs gebandeerd. Snavel grijszwart met lichtgele ondersnavelbasis. Oog bruin, poten grijs. ♀: Blauwgrijze band over borst, daaronder smalle witte band en dan roodbruine buik. Broedvogel. <b>VI.247.90</b></p>
	<p><b>Belted kingfisher,</b> <i>Megaceryle alcyon</i>, Bandijsvogel 28-33 cm (kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Grote kop en grote snavel, blauwgrijs van boven met een warrige kuif en een brede grijze borstband. Het vrouwtje heeft ook nog een roestbruine borstband. Bidt en duikt dan; ratelt al vliegend. Migrant uit het noorden. <b>VI.248.91</b></p>

**Familie: *Momotidae*; Motmots; Motmots**

Middelgrote boombewoners, met een meer of minder brede, afgeplatte snavel; korte, ronde vleugels en korte poten; de meeste met vlaggen aan het eind van de staart.



**Amazonian motmot (Blue-diademed motmot),**  
*Momotus momota momota*,  
Blauwkapmotmot  
38-43 cm (Kuifeend 40-47)  
  
Laag-, Hooglandbos

Zwarte kroon, daar omheen turkoois en violet. Zwart masker tot over oorstreek eindigend in een scherpe punt, daarboven en daaronder turquoise. Bruinrode nek, groene rug, groenig van onderen met een kaneelkleurig waas. Een of twee zwarte borstvlakken met een turquoise rand. Oog rood, snavel zwart, poten grijs. Lange blauwgroene staart met twee eindvlaggen aan een kale schacht.  
**VI.283.9**  
Broedvogel.


**Familie: *Galbulidae*, Jacamars, Jacamars**

Kleine tot middelgrote vogels met een min of meer vaste zitplaats; kleine poten. ronde vleugels en een erg lange snavel om insecten in de vlucht te vangen; verenkleed varieert van helder gekleurd en iriserend tot tamelijk saai.



**Brown jacamar (Northern brown jacamar),**  
*Brachygalba lugubris lugubris*,  
Bruinkeelglansvogel  
14-18 cm (Huisemus 14-16)  
  
Kustvlakte, Laaglandbos,  
Zuidelijke savanne

Van boven donkerbruin met een groenzwarte glans. Vleugels en staart zwartachtig met een blauwe weerschijn. Keel wittig, borst en flanken donker roodbruin, buik wit, anaalstreek donkerbruin. Snavel slank, recht, zwart. Poten zwart.  
Broedvogel.  
**VII.94.5**



**Yellow-billed jacamar,**  
*Galbula albirostris*,  
Geelsnavelglansvogel  
18-21 cm (Spreeuw 19-22)  
  
Laag-, Hooglandbos,  
Zuidelijke savanne

Kroon met koperglans. Gezicht en bovenzijde glanzend smaragdgroen. Handpennen zwart. Kin beige, keel wit, rest onderzijde kaneelrood. Slanke snavel, lichtgeel, de bovensnavel met een donkere punt. Oogring, teugel en poten geel.  
♀: Ook de keel is kaneelrood.  
Broedvogel.  
**VII.95.8**








**Green-tailed jacamar,**  
*Galbula galbula*,  
Groenstaartglansvogel  
18-22 cm (Spreeuw 19-22)  
  
Kustvlakte, Noordelijke  
savanne, Laaglandbos

Bovenzijde en brede borstband kopergroen, wat blauw op de kroon en aan de kopzijden. Handpennen zwart. Staart metaalblauwgroen, onderzijde zwart met blauwe glans. Keel wit. Borst en ondervleugeldekveren kastanje-rood. Snavel lang, zwart en slank. Poten bruin.  
♀: Keel oranjebeige. Broedvogel.  
**VII.99.11**








**Bronzy jacamar,**  
*Galbula leucogastra*,  
Bronskleurige glansvogel  
19-22 cm (Spreeuw 19-22)  
  
Noordelijke savanne

Kop donker metaalblauwgroen. Bovenborst metaalbrongroen, soms met purper waas, daaronder donkerder. Handpennen zwart. Getrapte staart brongroen van boven, onder donker. Kin zwart; keel, anaalstreek en ondervleugeldekveren wit. Snavel lang, slank, zwart. Poten zwart.  
♀: Keel en buik oker, oogring en teugel zwartgrijs.  
Broedvogel.  
**VII.100.16**






	<p><b>Paradise jacamar,</b> <i>Galbula dea dea,</i> Paradijsglansvogel 26-34 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Slank, lijkt helemaal zwart. Kap bruinig; gezicht, bovendelen, onderzijde glanzend zwart met een blauwe zweem; de vleugeldekveren met een bronsgroene weerschijn. Staart getrapt, erg lang en smal. Kin zwart; keel wit, uitlopend in een halve halsring. Ondervleugeldekveren wit. Snavel lang, slank, zwart. Poten zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.100.17</b></p>
	<p><b>Great jacamar,</b> <i>Jacamerops aureus aureus,</i> Grote glansvogel 25-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kop en bovenzijde iriserend groen met blauwe glans op kop en staart en goud- of koperglans op de mantel. Handpennen zwartachtig. Staart lang en breed, van onder blauwzwart. Witte vlek op keel. Onderzijde roodbruin. Snavel relatief kort, stevig en gebogen, zwart. Poten grijs. ♀: Geen witte vlek op de keel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.101.18</b></p>
<p><b>Familie: <i>Bucconidae</i>, Puffbirds, Baardkoekoeken</b></p>		
<p>Kleine tot middelgrote vogels met een vaste zit- en loerplaats, met een grote kop; korte, ronde vleugels; gedrongen lijf, kleine voeten en een smalle staart; verenpak onopvallend tot contrastrijk.</p>		
	<p><b>Guianan puffbird,</b> <i>Notharchus macrorhynchos,</i> Guyanabaardkoekoek 25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Voornamelijk glanzend zwart van boven. Wit voorhoofd, keel en wang, uitlopend in smalle nekkring. Brede zwarte borstband, witte middenbuik; smal, zwart-wit gebandeerde flanken. Smalle, witte streepjes op de rug. Teugel, poten en snavel zwart; oog rood. Bovensnavelpunt met haak. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.125.1</b></p>
	<p><b>Greater pied puffbird (Spot-crowned puffbird),</b> <i>Notharchus tectus tectus,</i> Bonte baardkoekoek 14-7 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Voornamelijk glanzend zwart boven en wit onder. Witte wenkbrouwstreep. Witte stipjes op de kroon, witte vlekken op de schouders. Wat wit in staart en aan staarteinde. Brede, zwarte borstband, zwarte flankvlekken. Zwarte haaksnavel, poten zwart. Broedvogel. <b>VII.126.5</b></p>
	<p><b>Spotted puffbird,</b> <i>Nystactes tamatia tamatia,</i> Gevlekte baardkoekoek 18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Bovendelen dof donkerbruin met beige schubjes. Voorhoofd en keel roodbruin. Een smalle, witte streep van de ondersnavelbasis onder de ogen langs en dan verder als een lichtbeige halsring. Daaronder grote zwarte wangvlekken, er boven zwart over oog en oor. Vanaf de keel onderzijde wit met veel zwarte vlekken. Haaksnavel, zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.126.7</b></p>






	<p><b>Collared puffbird,</b> <i>Bucco capensis,</i> Gekraagde baardkoekoek 19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon, wangen en mantel donker roodbruin; op mantel en kroon fijne, dwarse streepjes. Zwarte halsband, daarboven in de nek beige. Handpennen donkerbruin met wat roodbruin. Staart kastanjerood met een stuk of tien zwarte dwarsbanden. Boven en onder borstband wit, meer naar onder naar lichtbeige verlopend. Oog en haaksnavel oranje, poten geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.127.9</b></p>
	<p><b>White-chested puffbird,</b> <i>Malacoptila fusca,</i> Witborstbaardkoekoek 18-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bovenzijde, kop, hals, borst en flanken zwartbruin met beige strepen. Witte vlek op de borst. Witte teugel en snor. Middenbuik lichtbeige, eromheen vage strepen en vlekken. Snavel slank, iets gebogen, geel met zwarte punt. Poten licht olijkleurig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.131.17</b></p>
	<p><b>Rusty-breasted nunlet,</b> <i>Nonnula rubecula tapanahoniensis,</i> Roodborstrappist 14-16 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Van boven effen donkerbruin, wat grijzer op de kroon, slagpennen en staart donkerder. Smalle witte oogring,. Teugel, borst, anaalstreek beigebruin, middenbuik vuilwit. Keel wit. Slanke, licht gebogen snavel zwart, basis van ondersnavel en poten geelgrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.135.24</b></p>
	<p><b>Black nunbird,</b> <i>Monasa atra,</i> Zwarte trappist 25-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven glanzend zwart, van onder donkergrijs. Slanke, gebogen snavel helderrood. Kleine vleugeldekveren wit, de grote donkergrijs met witte randen. Poten zwart. Broedvogel. <b>VII.137.31</b></p>
	<p><b>Swallow-winged puffbird,</b> <i>Chelidoptera tenebrosa tenebrosa,</i> Zwaluwbaardkoekoek 14-15 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Roetzwart, van boven blauw iriserend. Stuit, anaalstreek en ondervleugeldekveren wit. Bovenbuik grijsig, onderbuik oranjekaneel. Vleugels afgerond. <b>Niet zwaluwachtig.</b> Staart kort en vierkant. Slanke, iets gebogen, zwarte snavel. Zwarte poten. Brtoedvogel. <b>VII.138.35</b></p>

**Familie: *Capitonidae*; Barbets; Baardvogels**



Kleine tot middelgrote, stevige boombewoners met een sterke snavel en scherpe klauwen.






	<p><b>Black-spotted barbet,</b> <i>Capito niger niger</i>, Zwarte baardvogel 16-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>♂: Voorhoofd en keel felrood. Kroon en achterhoofd geel, donker gestreept. Strogele wenkbrauwstreep. Brede zwarte band van de oorstreek naar de zijhals. Van boven zwart met een lichtgele streep aan weerszijden van de mantel, een lichtgele vleugelstreep en schouderplek. Borst en buik bleekgeel, flanken met zwarte druppels. Snavel zwart, poten grijsgroen. ♀: Wangen met bleekgele strepen, vleugeldekvoren met bleke vlekken en strepen, onderzijde zwaar zwart gevlekt. Broedvogel. <b>VII.215.75</b></p>
<p><b>Familie: <i>Ramphastidae</i>, Toucans, Toekans</b> Middelgrote tot grote, kleurrijke boombewoners met een enorme snavel en een lange staart.</p>		
	<p><b>Tepui toucanet,</b> <i>Aulacorhynchus whitelanus</i> <i>osgoodi</i>, Whitely's arassari 33-41 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Grasgroen. Snavel met haak, zwart onder, bruinrood boven. groeven op de bovensnavel. Witte lijn aan snavelbasis. Keel grijswit. Oogring roodbruin, witte wenkbrauwstreep. Rode staartpunt. Zwarte poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.251.3</b></p>
	<p><b>Guianan toucanet,</b> <i>Selenidera piperivora</i>, Guianapepervreter 33-35 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laag-, Hooglandbostrogon</p>	<p>♂: Snavel rood aan de basis, rest zwart. Bovenzijde groen. Staart groen met een kastanje punt. Anaalstreek rood. Zwart vanaf voorhoofd tot in nek, verbonden met zwarte keel en onderzijde. Gouden dwarsstreep tussen nek en mantel. Grote blauwe oogring. Gouden pluim in de oorstreek. Oog oranje. ♀: Kastanje nek. Van onder grijs, verlopend tot groengeel op de buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.255.7</b></p>
	<p><b>Green araçari,</b> <i>Pteroglossus viridis</i>, Groene arassari 30-39 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Van boven groen, van onder geel, stuit rood. Zwarte kop en hals. Bovensnavel van boven geel, daaronder rood, ondersnavel zwart met rood aan de basis en witte "tanden". Oogring kobaltblauw, een donkerrode vlek boven en achter het oog. Poten groen. ♀: Kastanje kop en hals. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.260.18</b></p>
	<p><b>Black-necked araçari,</b> <i>Pteroglossus aracari</i> <i>atricollis</i>, Zwartnekarassari 43-46 cm (Kuiifeend 40-47)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kop en hals zwart, borst en buik citroengeel met een brede, scharlaken band daartussen. Rug, vleugels en staart groenzwart; stuit scharlaken. Bovensnavel ivoor met zwart culmen, ondersnavel zwart. Oogring blauwgrijs, dij en anaalstreek dofbruin. Poten donkergroen. Broedvogel. <b>VII.263.22</b></p>






	<p><b>Channel-billed toucan,</b> <i>Ramphastos vitellinus vitellinus</i>, Groefsnaveltoekan 46-56 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bovenzijde en buik zwart. Keel geel, bovenborst oranje-rood. Daaromheen wit. Witte wang. Bruinrode bovenstaartdekveren. Anaalstreek rood. "Kanaal" in bovensnavel. Snavel zwart met blauwe basis. Brede oogring en poten blauw. Broedvogel. <b>VII.270.31</b></p>
	<p><b>Toco toucan,</b> <i>Ramphastos toco toco</i>, Reuzentoekean 55-61 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zwart met een witte borstvlek en witte bovenstaartdekveren, anaalstreek rood, keel met een geel waas. Snavel met een hoge kiel, oranje-rood, culmen rood, basis zwart, een zwarte vlek op de punt van de bovensnavel. Gezicht oranje, oogring violet, poten lichtblauw. Broedvogel. <b>VII.270.32</b></p>
	<p><b>Red-billed toucan,</b> <i>Ramphastos tucanus</i>, Roodsnaveltoekan 53-58 cm (Buizerd 48-56)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Voornamelijk zwart. Witte wang, hals en borst, van onderen begrensd door smalle, rode band. Anaalstreek rood, geelwitte stuit. Snavel kastanje met groengeel culmen en basis van de bovensnavel, de ondersnavelbasis is blauw met een smalle zwarte rand. De binnenkant van de snavel is rood. Het gebied om het oog is blauw, evenals de poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.271.33</b></p>






### Familie: *Picidae*; Woodpeckers; Spechten








Kleine tot tamelijk grote vogels met een rechte, middellange snavel; korte poten met vier lange tenen, sommige soorten met maar drie tenen; staart van de meeste lang, met sterke centrale veren en een lange tong met weerhaken aan de punt.






	<p><b>Golden-spangled piculet, (Buffon's piculet),</b> <i>Picumnus exilis buffoni</i>, Kleine dwergspecht 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte kroon tot en met nek en oorstreek, op voorkroon meest rood, daarachter wit gestreept. Roomkleurige teugel, witte streep achter oog. Olijfgroen van boven met zwarte en gele vlekjes. Van onderen gelig met zwarte bandering. Staart zwart, middelste veren deels geelwit. Snavel zwart. ♀: Hele kroon zwart met witte vlekken. Broedvogel. <b>VII.424.7</b></p>
	<p><b>Arrowhead piculet,</b> <i>Picumnus minutissimus</i>, Guyanadwergspecht 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p><b>Endeem</b> Kustvlakte</p>	<p>Voorhoofd rood; achterhoofd, nek en oorstreek zwart met witte streping. Van boven groenbruin, mantel met een paar witte of beige vlekjes. Staart zwart, middelste veren deels wit. Onder vuilwit met zwarte schubben. ♀: Hele kroon zwart met witte streepjes. Broedvogel. <b>VII.427.12</b></p>

	<p><b>White woodpecker,</b> <i>Melanerpes candidus</i>, Witte specht 24-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kop, onderzijde en stuit wit. Van boven, de middenveren van de staart en een streep van oog naar mantel zwart. Buitenstaartveren met een witte basis en een zwart einde waarop een witte vlek. Nek en middenbuik citroengeel. Iris blauwwit, oogring geel, snavel grotendeels zwart, poten grijs. ♀: Geen geel in de nek. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.439.34</b></p>
	<p><b>Yellow-tufted woodpecker,</b> <i>Melanerpes cruentatus</i>, Geelbrauwspecht 19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kop, borst, en vleugels glanzend blauwzwart. Kruin felrood. Brede, geelwitte wenkbrauwstreep, geler naar het eind toe, zich in de nek verenigend tot een ring. Stuit wit. Brede rode vlek op de onderborst en buik. Flanken geel en zwart gebandeerd. Iris geel, een bijna witte oogring, snavel en poten zwart. Er is een vorm met een geheel zwarte kop. ♀: Geen rood op de kop. Broedvogel. <b>VII.443.42</b></p>
	<p><b>Red-crowned woodpecker,</b> <i>Melanerpes rubricapillus</i> Roodkruinspecht 16-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Voorhoofd beige, kruin en nek felrood. Rug en vleugels zwart-wit gebandeerd. Stuit wit. Zijkanten kop en onderzijde lichtbeige, maar middenbuik rood. Staart zwart, middenveren met witte vlekken en dwarsstrepen, buitenste fijn wit/zwart gebandeerd met een wit einde. Donkergrijze oogring, snavel en poten zwart. ♀: Alleen nek rood, kruin bleek grijzig. Broedvogel. <b>VII.447.50</b></p>
	<p><b>Blood-coloured woodpecker,</b> <i>Veniliornis sanguineus</i>, Bloedrugspecht 13 cm (Huisumus 14-16) <b>Suriname en Guiana</b> Kustvlakte</p>	<p>Van boven, inclusief petje: knalrood. Van onderen donkerbruin, wit gebandeerd. Staart zwart, snavel donkergrijs, poten grijszwart. ♀: Petje donkerbruin met bleekbeige vlekjes. Broedvogel. <b>VII.501.129</b></p>
	<p><b>Golden-collared woodpecker,</b> <i>Veniliornis cassini</i>, Goudkraagspecht 16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Felrood petje. Gele band van oog over oorstreek, vormt daarna nekband. Rug en vleugel olijfgeel met geelwitte vlekken op de dekveren. Staart zwart. Van onderen zwart-wit gebandeerd. Snavel bleek grijs, poten donkergrijs. ♀: Petje olijfbrijn. Broedvogel. <b>VII.502.132</b></p>






	<p><b>Yellow-throated woodpecker,</b> <i>Piculus flavigula flavigula</i>, Geelkeelspecht 19-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Pet, nek en snor knalrood; de pet met zwarte vlekjes. Keel en wang goudgeel. Vleugels, rug en stuit helder olijfgroen. Brede, orangerode band over de handpennen. Borst olijfkleurig, wit gevlekt; buik olijf/wit gebandeerd, geeft schub-/golfpatroon. Anaalstreek beige. Ondervleugel kaneelkastanje. ♀: Geen snor. Pet goudgeel, nek wel rood. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.505.139</b></p>
	<p><b>(Guianan) Golden-green woodpecker,</b> <i>Piculus chrysochloros capistratus</i>, Bronsspecht 18-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Pet, nek en snor felrood. Wang en bovenzijde helder olijfgroen. Goudgele streep onder het oog. Ondervleugel kastanje. Staart zwartig. Keel fijn gelig/olijf gebandeerd, rest onderkant wittig/olijf gebandeerd. Iris wit, snavel en poten zwart. ♀: Het rood van de man is hier olijfgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.506.140</b></p>
	<p><b>Golden-olive woodpecker,</b> <i>Colaptes rubiginosus guianae</i>, Olijfrugspecht 18-23 cm (Spreeuw 19-22) <b>Suriname en Guiana</b> Hooglandbos</p>	<p>Pet donkergroen tot zwart, rood achterhoofd. Donkerrode snor. Teugel, wangen en boven oog wit. Boven helder olijfgroen. Slagpennen dof zwart met helder olijfgroene buitenvlaggen. Ondervleugel bleek gelig. Staart zwart, maar basis en buitenveren olijf, vooral van onder. Kin en keel donker olijf en bleekgeel gevlekt. Rest onderzijde donker olijfgroen en groengeel gebandeerd; buik duidelijk geel, met vagere strepen. Snavel zwart, poten grijs. ♀: Geen snor. Broedvogel. <b>VII.509.143</b></p>
	<p><b>Spot-breasted woodpecker,</b> <i>Colaptes punctigula punctigula</i>, Vlekborstgrondspecht 18-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Voorhoofd zwart; achterhoofd, nek en snor felrood. Teugel, wang en boven oog: wit. Van boven donker olijf, donkerder gebandeerd. Stuit saffraan met wat zwarte vlekken. Staart glanzend olijf, vaak met wat rood. Keel zwart, dicht wit gestippeld. Borst met roodachtig waas verlopend naar dof geel op de buik. Borst en flanken met zwarte vlekjes. Snor en poten zwart. ♀: Geen snor. Broedvogel. <b>VII.510.146</b></p>
	<p><b>Campo flicker,</b> <i>Colaptes campestris campestris</i>, Campogrondspecht 28-31 cm</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon en keel zwart; gezicht, hals, nek en borst helder geel. Weinig opvallende snor rood (man) of wit (vrouw) gevlekt. Van boven krachtig zwart-wit dwarsgestreept; van onder wittig, zwart geschubd. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.515.153</b></p>

	<p><b>Waved woodpecker,</b> <i>Celeus undatus undatus</i>, Geschubde specht 23-24cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kop en flinke kuif kaneel met zwarte vlekjes. Felrode snor. Roodbruin met brede, gegolfde, zwarte banden. Van onderen meer en smallere dwarsstrepen. Stuit wat bleker. Staart ook met zwarte dwarsstrepen en een zwarte punt. Snavel geelgroen, poten grijsgroen. ♀: Geen snor. Broedvogel. <b>VII.518.157.</b></p>
 <p>♀ <i>helmayri</i></p>	<p><b>Chestnut woodpecker,</b> <i>Celeus elegans helmayri</i> , <i>Celeus elegans elegans</i>, <b>(Rufous-chested woodpecker),</b> Vaalkuifspecht 26-32 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p><i>C.e.elegans</i>: Kastanje. <b>Pet</b> en lange kuif <b>kaneel, reikt tot aan oog</b>. Brede rode snorvlek. Stuit romig, soms met wat rood. Staart van boven zwart, van onder kastanje. Flanken lichter. Ondervleugel kaneelbeige. Snavel met gebogen culmen en zwarte punt, geelgroen. Oogring blauw, poten olijf. <i>C.e.helmayri</i>: Donkerkastanje. <b>De donker kanelen pet reikt niet tot het oog</b>. Lichte vlekken op de vleugeldekveren. Handpennen roomkleurig-donkerbruin gebandeerd. ♀: Geen snor. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.521.159</b></p>
 <p>78</p>	<p><b>Cream-coloured woodpecker,</b> <i>Celeus flavus flavus</i>, Strogele specht 24-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Lichtgeel met een lange kuif. Handpennen bruinzwart, armpennen kastanje met strogele spikkels. Staart zwart. Felrode snor. Snavel ivoor, poten grijsgroen. ♀: Geen snor. Broedvogel. <b>VII.522.162</b></p>
	<p><b>Ringed woodpecker,</b> <i>Celeus torquatus</i>, Zwartborstspecht 26-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Overall</p>	<p>Kop en lange kuif kaneel. Nek, bovenmantel, borst zwart. Rug lichtkastanje, vleugels en staart licht zwart gebandeerd. Staart met zwarte punt. Rest onderzijde kaneelbeige. Felrode snor. Bovensnavel donkergroen, onder gelig. Poten donkergroen. ♀: Geen snor. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.523.164</b></p>
	<p><b>Lineated woodpecker,</b> <i>Hylatomus lineatus lineatus</i>, Gestreepte helmspecht 30-36 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon, ruige kuif en snor felrood. Teugel goudgeel, overgaand in een witte streep onder oog die langs de hals naar de borst loopt. Boven en onder die streep zwart. Oorstreek donkergrijs. Keel wit, fijn zwart gestreept. Bovenzijde zwart met een duidelijke <b>witte streep op de schouders</b>. Bovenborst zwart, daaronder beigewit met zwarte bandering. Ondervleugel wit. <b>Oog wit</b>, snavel roomwit, poten zwart. ♀: Geen rood. Broedvogel. <b>VII.526.167</b></p>






		<p><b>Red-necked woodpecker,</b> <i>Campephilus rubricollis rubricollis</i>, Roodnekspecht 30-32 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop, hals en bovenborst felrood, meer naar <b>onder roodbruin</b>. Van boven zwart. Zwart-wit rondje op wang. Iris geel, snavel ivoor, poten zwart. ♀: Van snavelbasis naar achter een witte wig met een zwarte rand. Broedvogel. <b>VII.531.174</b></p>
		<p><b>Crimson-crested woodpecker,</b> <i>Campephilus melanoleucos melanoleucos</i>, Zwartkeelspecht 33-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kop en kuif felrood. Zwart-wit rondje op wang. Aan basis snavel een zwarte rand. <b>Witte streep langs hals overgaand in een witte V op de mantel</b>. Bovenzijde zwart. Keel en borst zwart. Meer naar onder zwart-wit gebandeerd. Ondervleugel wit. <b>Gele iris</b>, ivoorkleurige snavel, zwarte poten. ♀: Zeer lichtbeige streep van snavelbasis over wang, overgaand in halsstreep en V op rug. Voorhoofd, kruin en om oog zwart. Broedvogel. <b>VII.532.177</b></p>
<p><b>Familie: <i>Furnariidae</i>, Ovenbirds, Ovenvogels</b></p>			
<p>Kleine tot middelgrote vogels; de meeste met korte, ronde vleugels; vaak sterke poten, vaak een lange staart met enige tot flinke versterking van de schachten; veren meestal een of ander bruin, variërend van grijs- of zwartachtig tot olijf- of roodachtig.</p>			
	<p><b>Pale-breasted spinetail,</b> <i>Synallaxis albescens josephinae</i>, Temmincks stekelstaart 13-16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Staart eindigend in stekels. Voorhoofd grijsbruin, licht kastanje kroon en vleugeldekveren, rest bovendelen grijsbruin. Van onderen grijzig, bruin op de flanken. Staart lang, getrapt, olijfbruin. Keel roomkleurig, snavel zwart en grijs. Broedvogel. <b>VIII.278.77</b></p>	
	<p><b>Ruddy spinetail,</b> <i>Synallaxis rutilans dissors</i>, Rode stekelstaart 13-14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke en Zuidelijkesavanne</p>	<p>Lange en getrapte stekelstaart. Kroon, mantel en staart donker olijfbruin. Vleugeldekveren en slagpenranden kastanje. Voorhoofd, gezicht en groot deel onderzijde kastanjerood, keel zwart, buik olijfbruin. Snavel zwart, poten grijsgroen. Broedvogel. <b>VIII.280.81</b></p>	
	<p><b>McConnell's spinetail,</b> <i>Synallaxis macconnelli obscurior</i>, McConnells stekelstaart 15-17 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Lange, getrapte, dof donker kastanje stekelstaart. Voorhoofd, kroon, nek, vleugeldekveren en randen van slagpennen kastanjerood; slagpennen verder dof zwartbruin, rug donker olijfbruin. Van onderen bruingrijs, kin en keel zwart met wat grijze spikkels. Snavel zwart, poten grijsgroen. Broedvogel. <b>VIII.284.90</b></p>	

	<p><b>Plain-crowned spinetail,</b> <i>Synallaxis gujanensis gujanensis,</i> Cayennestekelstaart 15-17 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Getrapte, roodbruine stekelstaart, Kroon grijsbruin, rug okergrijsbruin, teugel vuilwit, vleugels kaneelrood. Keel wittig, overgaand in beigewitte onderzijde. Snavel zwart met grijs, poten blauwgrijs. Broedvogel. <b>VIII.285.94</b></p>
	<p><b>Speckled spinetail,</b> <i>Cranioleuca gutturata,</i> Gespikkelde stekelstaart 13-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Stekelstaart getrapte, roodbruin. Voorhoofd beige, kroon en buitenranden van armpennen roodbruin, slagpennen verder dof grijszwart. Smalle, witte wenkbrauwstreep, Wangen en oorstreek vuil roomkleurig met grijze streepjes. Keel bleekgeel, verder onderzijde roomwit met veel onduidelijke, grijze vlekken; flanken met wat olijfbuin. Iris bleekgeel, snavel zwart met grijs, poten groen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.298.123</b></p>
	<p><b>Yellow-chinned spinetail,</b> <i>Certhiaxis cinnanomeus cinnanomeus,</i> Geelkeelstekelstaart 13-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Getrapte, bruine stekelstaart. Bovenzijde, inclusief vleugels, kastanje. Keel citroengeel, verder onderzijde wit met zeer lichtbruine borst en flanken. Snavel grotendeels zwart, poten grijs. Broedvogel. <b>VIII.299.125</b></p>
	<p><b>Point-tailed palmcreeper,</b> <i>Berlepschia rikeri,</i> Palmkruiper 18-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Lijkt op een muisspecht. Kop, mantel en keel zwart-wit gestreept. Rest rug en gepunte staart oranjekaneel. Grootste deel slagpennen en dekveren zwart. Van onder stevig zwart-wit gestreept, gaat meer naar achter over in zwart-witte bandering. Snavel blauwgrijs, poten zwartig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.328.182</b></p>
	<p><b>Rufous-tailed foliage-gleaner,</b> <i>Philydor ruficaudatum flavipectus,</i> Roodstaartbladspeurder 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bovendelen voornamelijk olijf, kroon zwak donker geschubd en gelig gestreept. Oker wenkbrauwstreep en oogring. Oorstreek donker olijf met geelbeige strepen. Handpennen donker, binnenvlaggen van de armpennen beige. Staart roodbruin. Van onder dof olijfgeel met vage strepen, meer olijf op de borst en flanken. Snavel grijs, poten groenig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.335.194</b></p>













	<p><b>Rufous-rumped foliage-gleaner,</b> <i>Philydor erythrocerum erythrocerum,</i> Roodstuitbladspeurder 14-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bovendelen voornamelijk olijfbroin, Stuit kastanjerood, staart roodbruin. Oogring en wenkbrauwstreep okerbeige. Vleugels donker olijf. Keel gelig wit, donkerder op borst en middenbuik, flanken met olijf waas. Snavel en poten lichtbruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.335.196</b></p>
	<p><b>Cinnamon-rumped foliage-gleaner,</b> <i>Philydor pyrrhodes,</i> Kaneelstuitbladspeurder 14-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kroon en rug roodachtig olijf, vleugels zwartachtig. Zwakke licht kaneelrode oogstreep. Rest gezicht, onderzijde, stuit en staart oranjebruin. Staart afgerond. Snavel zwart en grijs, poten oranjebruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.338.202</b></p>
	<p><b>Buff-throated foliage-gleaner,</b> <i>Automolus ochrolaemus turdinus,</i> Bruinkeelbladspeurder 18-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Bovendelen aan de voorzijde van de vogel en de vleugels olijfbroin, achter tot en met de staart kastanjerood. Keel wittig, verder onder okerbeuin, wat lichter op de borst, anaalstreek kastanjerood. Oogring licht geelgroen, snavel donkergrijs en geelgrijs, poten groenig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.345.214</b></p>
	<p><b>Olive-backed foliage-gleaner,</b> <i>Automolus infuscatus cervicalis,</i> Olijfrugbladspeurder 18-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kop, rug en vleugels olijfbroin; stuit en staart kastanjerood. Keel witachtig, borstzijden en flanken licht olijf, anaalstreek donkerbruin, het midden van de borst en de buik wittig geel. Snavel grijsgroen, poten loodkleurig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VII.345.215</b></p>
	<p><b>Ruddy foliage-gleaner,</b> <i>Automolus rubiginosus obscurus,</i> Rosse bladspeurder 17-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Bovendelen donker roodbruin, stuit en staart nog donkerder. Teugel beige, oorstreek olijf. Keel en borst roodachtig donkerbruin, lager olijfbroin, in het midden okerbeuin. Snavel zwart, poten donker grijsgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.347.219</b></p>

	<p><b>Chestnut-crowned foliage-gleaner,</b> <i>Automolus rufipileatus consobrinus</i>, Roodkruinbladspeurder 18-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Mantel en vleugels roodachtig bruin; kroon, stuit, staart kastanjerood. Van onderen lichtbruin, keel beige. Klein kuifje. Oog oranje, snavel grijs, poten grijsgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.347.220</b></p>
	<p><b>Tawny-throated leaftosser,</b> <i>Sclerurus mexicanus macconnelli</i>, Bruinkeelbladkrabber 15-17 cm (Huisemus 14-17)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven donkerbruin, stuit donker kastanje, staart zwart. Keel roestbruin, borst roodbruin, buik dof bruin, anaalstreek dof donker kastanje. Snavel recht, slank, zwart; poten zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.351.223</b></p>
	<p><b>Short-billed leaftosser,</b> <i>Sclerurus rufigularis fulvigularis</i>, Kortsnavelbladkrabber 15-16 cm (Huisemus 14-17)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven, ook dekveren en buitenranden van de slagpennen: donkerbruin; stuit donker kastanje, slagpennen dof zwart, staart zwart. Keel dof kaneel, rest van onderzijde donkerbruin, met een kastanje waas op de borst. Bovensnavel zwart, ondersnavel vleeskleurig; poten zwartachtig. Broedvogel. <b>VIII.351.224</b></p>
	<p><b>Black-tailed leaftosser,</b> <i>Sclerurus caudacutus caudacutus</i>, Zwartstaartbladkrabber 16-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p><b>Donker.</b> Van boven donkerbruin, stuit iets roder, staart dof zwart. Keel beige met donkere schubben; wangen en borst met een oranjekastanje tint, bovendien donker geschubd; rest onderzijde donkerbruin. Snavel en poten zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.352.226</b></p>
	<p><b>Rufous-tailed xenops,</b> <i>Xenops milleri</i>, Roodstaartxenops 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon en nek zwartachtig, beige gestreept; beige streep achter het oog; mantel olijfbuin, beige-wit gestreept; stuit en staart roodbruin. Handpennen zwart, binnenste slagpennen met een oker band; armpennen aan de basis en schouderpennen geheel: roodbruin. Van onder roomkleurig met vooral op de borst en flanken brede, vage, grijze strepen. Slanke snavel, ondersnavel iets opgebogen, zwart en lichtgrijs; poten groenig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.354.231</b></p>

	<p><b>Slender-billed xenops,</b> <i>Xenops tenuirostris helmayri</i>, Streepstaartxenops 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon bruin met witte streepjes, beige wenkbrauwstreep, mantel bruin met beige streping, stuit en staart roodbruin, staart met zwarte middenstreep. Buitenste slagpennen zwart met basaal een kaneel band; binnenste schouderveren kaneel. Keel en snorstreep wit, borst en buik grijs met witte strepen, anaalstreek grijs. Beitelvormige snavel meest zwart, poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel <b>VIII.355.232</b></p>
	<p><b>Plain xenops,</b> <i>Xenops minutus ruficaudus</i>, Sparmanns xenops 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon en nek donkergrijsbruin met witte streepjes; lange, beige wenkbrauwstreep en een zilverwitte snor, <b>rug</b> roestbruin, <b>ongestreept</b>. Staart kaneel met twee zwarte lengtestrepen. Buitenste slagpennen zwart met basaal een kaneelkleurige band; binnenste schouderveren kaneel. Keel wit, verder van onder olijfbruin, op de borst wit gestreept. De plumpe, beitelvormige snavel is hoofdzakelijk zwart, poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.355.233</b></p>
<p><b>Familie: <i>Dendrocolaptidae</i>, Woodcreepers, Muisspechten</b> Kleine tot middelgrote vogels met brede, afgeronde vleugels; een lange staart met stijve schachten; buitenste en middelste teen aan elkaar gegroeid en veel langer dan de binnenste teen, de voorste klauwen flink gebogen; meestal bruin, een paar grijs tot zwartachtig, alle met roodbruine vleugels en staart.</p>		
	<p><b>Plain-brown woodcreeper (Line-throated woodcreeper),</b> <i>Dendrocincla fuliginosa fuliginosa</i>, Grijswangmuisspecht 19-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Saai uiterlijk. Vrijwel geen strepen. Roodbruin; keel en oorstreek lichter, lichte streep achter het oog. Vleugels, staart, boven- en onderstaartdekveren kastanjerood. Snavel recht, zwart; poten grijs. Broedvogel. <b>VIII.401.2</b></p>
	<p><b>White-chinned woodcreeper,</b> <i>Dendrocincla merula merula</i>, Witkinmuisspecht 16-21 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Saai uiterlijk. Vrijwel geen strepen. Donkerbruin; vleugels, staart en boven- en onderstaartdekveren donker kastanje. Kin en midden van keel wit. Snavel recht, relatief kort. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.403.5</b></p>
	<p><b>Long-tailed woodcreeper,</b> <i>Deconychura longicauda longicauda</i>, 17-19 cm (Kwartel 16-18) Langstaartmuisspecht</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Bruin. Kroon, nek en oorstreek met beige strepen; smalle, duidelijke, beige wenkbrauwstreep. Koperkleurige vleugels, stuit en staart. Keel beige, borst eerst beige gevlekt, lager beige gestreept. Snavel recht en bruin; de poten bruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.405.7</b></p>

	<p><b>Spot-throated woodcreeper,</b> <i>Deconychura stictolaema clarior,</i> Vlekkeelmuisspecht 16,5-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Klein met lange staart. Donkere kroon nauwelijks gestreept. Smalle beige wenkbrauwstreep. Van boven olijfbroon, donkerder op de rug, vosrode stuit. Keel dof beige. Rechte, slanke, donkere, korte snavel; ondersnavel zilverig. Staart roodachtig tot kastanje. Onder dof olijfbroon, bovenborst met beige streping. Poten grijs. Status onbekend. <b>VIII.405.8</b></p>
	<p><b>Wedge-billed woodcreeper,</b> <i>Glyphorhynchys spirurus spirurus,</i> Wignavelmuisspecht 13-16 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein; met een korte, beitelvormige snavel, zwart. Kroon en mantel bruin; onderrug, stuit, boven-, onderstaartdekveren en staart kastanjerood. Vleugels bruin met een beige band. Keel beigewit, van onder olijfbroon met beige pijlpunten op de borst en vagere strepen lager. Poten rosegrijs. Broedvogel. <b>VIII.407.10</b></p>
	<p><b>Cinnamon-throated woodcreeper,</b> <i>Dendrexetastes rufigula rufigula,</i> Bruinkeelmuisspecht 23-27 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Voornamelijk bruin, blekere onderzijde, vleugels en staart kastanje. Een paar strepen op de rug en meer opvallende op de borst zijn wit met zwarte randen. Op de buik en anaalstreek enige zwarte strepen. Stevige, vrijwel rechte snavel, grijs; poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.411.13</b></p>
	<p><b>Red-billed woodcreeper,</b> <i>Hylexetastes perrotii perrotii,</i> Roodsnavelmuisspecht 25-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, iets gebogen, wijnrode snavel. Kroon donker olijf, teugel en streep beneden het oog witachtig, mantel olijfbroon, stuit en staart kastanjerood. Keelzijden olijfbroon, het midden wittig, lagere onderdelen grijzig olijfbroon, het midden van de buik licht wit en grijs gebandeerd, anaalstreek oker en zwart gebandeerd. Poten olijfgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.412.14</b></p>
	<p><b>Strong-billed woodcreeper,</b> <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus tenebrosus,</i> Reuzenmuisspecht 26-35 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kroon donkerbruin, bleek gestreept. Rug bruin, kruinstrepen lopen nog wat door. Onderrug kastanjerood. Vage lichte streep onder het oog en een donkere snor. Keel wittig, rest onder licht beige gestreept. Vleugels en staart kastanjerood. Snavel beetje gebogen, hoornkleurig. Status onbekend. <b>VIII.415.16</b></p>

	<p><b>Amazonian barred woodcreeper,</b> <i>Dendrocolaptes certhia certhia</i>, Gebandeerde muisspecht 26-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kroon, nek en zijkant van de kop lichtbruin, zwart geschubd. Mantel olijfbruin, vaag zwart dwarsgestreept; stuit, vleugels en staart kastanjerood. Onderdelen licht beigebruin, kin en keel vuilwit, beide zwak zwart gebandeerd. Snavel wat gebogen, grijsbruin tot zwart, poten grijzig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.419.21</b></p>
	<p><b>Black-banded woodcreeper,</b> <i>Dendrocolaptes picumnus picumnus</i>, Blauwsnavelmuisspecht 24-31 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon en mantel bruin met beige strepen; stuit, vleugels en staart kastanjerood. Keel beige, borst bruin, beide met brede, beige strepen; buik bruin met zwarte dwarsstrepen. Stevige, rechte, zwarte snavel, grijsgroene poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.421.23</b></p>
	<p><b>Chestnut-rumped woodcreeper,</b> <i>Xiphorhynchus pardalotus pardalotus</i> Roodkeelmuisspecht 22-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Snavel slank, gebogen, zwart. Kop bruin, smal beige gestreept; beige wenkbrauwstreep, mantel bruin met beige tranen met een zwarte rand. Stuit, vleugels en staart kastanje. Keel en buik kaneelbeige, daartussen olijfbruin met kaneelbruine strepen. Poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.426.28</b></p>
	<p><b>Striped woodcreeper,</b> <i>Xiphorhynchus obsoletus obsoletus</i>, Gestreepte muisspecht 18-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kroon zwartachtig met veel beige tranen, zwartgerand. Rug roodbruin met witte, zwart gerande strepen die ver op rug doorlopen. Keel beigewit, rest onder grijsolijfbruin met witte, zwart gerande strepen. Snavel recht, bruin en grijs; poten grijsgroen. Broedvogel. <b>VIII.428.31</b></p>
	<p><b>Buff-throated woodcreeper,</b> <i>Xiphorhynchus guttatus polystictus</i>, Geelkeelmuisspecht 23-30 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven roodbruin; kroon zwartachtig met beige tranen die strepen worden op de mantel; stuit, vleugels en staart kastanjerood. Keel beige; onderdelen beigebruin, met ronde, beige vlekken die op de buik vrijwel verdwijnen. Lange, flinke snavel, vrijwel zwart; poten grijsgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.429.32</b></p>






	<p><b>Straight-billed woodcreeper,</b> <i>Xiphorhynchus picus picus</i>, Priemsnavelmuisspecht 18-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kroon donkerbruin, wit gevlekt, scherp contrasterend met de kastanjerode rug: de traanvormige vlekken van de kroon bereiken de mantel net. Vleugels en staart roestrood. Keel wit, verder van onder olijfbroen; brede, witte, zwartomrande strepen op de borst, naar achter vervagend. Lichte, rechte snavel; groenige poten. Broedvogel. <b>VIII.435.38</b></p>
	<p><b>Narrow-billed woodcreeper,</b> <i>Lepidocolaptes angustirostris griseiceps</i>, Wenkbrauwmuisspecht 18-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Lange, smalle, gebogen, bleke snavel. Kroon grijsbruin met bleke strepen, flinke wittige wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Van boven roodbruin, van onder roomwit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.439.40</b></p>
	<p><b>Lineated woodcreeper,</b> <i>Lepidocolaptes albolineatus albolineatus</i>, Witstreepmuisspecht 17-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Klein met een slanke, lichte, gebogen snavel. Kop donkerbruin met beige strepen die smaller worden naar de nek en de rug niet halen. Vleugels, stuit en staart kastanje; de vleugels met donkere punten. Keel beige; de overige onderdelen sterk gestreept olijfbroen, die strepen zijn zwart omrand. Poten groenig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.440.42</b></p>
	<p><b>Curve-billed scythebill,</b> <i>Campylorhamphus procurvoides procurvoides</i>, Kromsnavelmuispecht 23-25 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zeer lange, slanke, sterk gebogen, rode snavel. Het donker van de kop verloopt naar bruin op de rug en onderzijde. Vleugels en staart koperrood. Beige strepen op kop en hals. Pijlvormig strepen op de borst die lager vervagen. Keel beige. Poten grijsig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.445.50</b></p>
<p><b>Familie: <i>Thamnophilidae</i>; Typical antbirds; Echte miervogels</b> Kleine tot middelgrote vogels, meestal met nogal korte vleugels, sterke poten; vele met een korte staart maar sommige met een lange, getrapte staart; ze hebben een naar verhouding grote snavel, soms met haak; veren zacht, meestal niet fel gekleurd, maar vele met een heldere of witte vlek op de rug.</p>		
	<p><b>Fasciated antshrike,</b> <i>Cymbilaimus lineatus lineatus</i>, Zebamierklauwier 17-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwartgrijze haaksnavel. Felrood oog. Kap zwart, voor de rest hele vogel smal zwart-wit gebandeerd. Poten blauwgrijs. ♀: Roodbruine kroon en voor de rest donkerbruin/geelbruin gebandeerd. Broedvogel. <b>VIII.533.1</b></p>



	<p><b>Black-throated antshrike,</b> <i>Frederickena viridis,</i> Zwartkeelmierklauwier 19-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwart met grijze klauwiersnavel. Gekuid; leigrijs. Kop, hals en borst zwart. Iris felrood. Poten blauwgrijs. ♀: Kroon, nek, rug, vleugels, flanken roodbruin; de rest zwart-wit gebandeerd. Broedvogel. <b>VIII.537.7</b></p>
	<p><b>Great antshrike,</b> <i>Taraba major semifasciatus,</i> Grote mierklauwier 19-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Zware, vrijwel geheel zwarte klauwiersnavel; kuif, felrood oog. Bovendelen zwart, met kap tot over het oog. Drie witte vleugelstrepen en een witte vlek op de rug. Van onderen wit met grijze flanken. Staart zwart, buitenste veren met witte dwarsstrepen. Poten grijs. ♀: Van boven oranjerood; van onder wit, anaalstreek roodbruin. Broedvogel. <b>VIII.537.9</b></p>
	<p><b>Black-crested antshrike,</b> <i>Sakesphorus canadensis canadensis,</i> Zwartkuifmierklauwier 14-16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel; kuif. Kop en borst zwart, dat zwart eindigend in een punt op de buik. Een witte halsring; de rug bruin; de vleugels zwart, drie witte vleugelstrepen, slagpennen met witte randen. Staart zwart met witte randen en einde. Poten donkergrijs. Van onderen lichtgrijs. ♀: Kroon en kuif helder roodbruin, de rug is doffer roodbruin, de vleugelstrepen zijn beige. De rest van de kop en de keel beigewit; verder van onder kaneelbeige, met zwarte strepen op de borst. Broedvogel. <b>VIII.541.10</b></p>
	<p><b>Black-crested antshrike,</b> <i>Sakesphorus canadensis fumosus,</i> Zwartkuifmierklauwier 14-16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel; kuif. Kop en borst zwart, dat zwart eindigend in een punt. Rug bruinzwart; vleugels zwart, drie witte vleugelstrepen, slagpennen met witte randen, weinig wit in staart. Onder leigrijs. ♀: Als boven maar donkerder en borst zwaar gestreept. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.541.10</b></p>
	<p><b>Band-tailed antshrike,</b> <i>Sakesphorus melanothorax,</i> Bandstaartmierklauwier 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Ravenzwart, met kleine witte schoudervlekken, witte vlekjes op de vleugel in drie rijen en een brede witte eindband aan de staart. ♀: Helder bruinrood. Masker, keel en borst zwart. Broedvogel. <b>VIII.542.14</b></p>

		<p><b>Barred antshrike,</b> <i>Thamnophilus doliatus doliatus,</i> Gebandeerde mierklauwier 15-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Korte kuif, iris strogeel. De hele kop is zwart-wit gestreept, de rest is zwart-wit gebandeerd: gevangenispak. ♀: Bovendelen, vleugels en staart kastanjerood. Kop en hals lichtbeige, zwart gestreept. Keel wit, verder onder kaneelbeige. Broedvogel. <b>VIII.545.17</b></p>
		<p><b>Mouse-coloured antshrike,</b> <i>Thamnophilus murinus murinus,</i> Grijze mierklauwier 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Grijs; van boven donkerder, vleugels bruin met witte vlekjes in rijen, staart donkerder, keel en buik bijna wit. ♀: Oranjebruin, vleugels bruin met beige vlekjes. Keel en buik wit, daartussen olijfbruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.554.32</b></p>
		<p><b>Northern slaty antshrike,</b> <i>Thamnophilus punctatus punctatus,</i> Gevlekte mierklauwier 13-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwarte of blauwe klauwiersnavel. Kroon zwart, rest van kop en lijf grijs. Rug met zwarte vlekken, vleugels zwart met witte vlekken in rijen en witte randen. Staart zwart met witte vlekken en witte einde. ♀: Oranjebruin; gezicht lichter met bruine vlekjes, vleugels donkerbruin met witte vlekken in rijen. Onder wat lichter. Staart voornamelijk kastanje. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.557.35</b></p>
		<p><b>Amazonian antshrike,</b> <i>Thamnophilus amazonicus divaricatus,</i> Amazonemierklauwier 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Lijkt erg veel op vorige: van onder wat donkerder, bovenrug eerder zwart dan grijs. ♀: Van boven als vorige: oranjebruin. Maar van onder okerbruin. Staart zwart. Broedvogel. <b>VIII.559.40</b></p>
		<p><b>Spot-winged antshrike,</b> <i>Pygiptila stellaris occipitalis,</i> Vlekvleugelmierklauwier 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Kroon zwart; rug, vleugels, staart en onderzijde blauwgrijs. Zwarte vlekken op de mantel, drie rijen witte vlekken op de vleugel. Korte staart. ♀: Voorhoofd, gezicht en onderzijde licht oranjebruin, rest blauwgrijs. Vleugels bruin zonder vlekken. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.565.43</b></p>
		<p><b>White-streaked antvireo,</b> <i>Dysithamnus leucostictus tucuyensis,</i> Witstreepmiervireo 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Man donkergrijs, vleugeldekveren met witte toppen in drie lijntjes. Vrouw roodbruin boven, wangen en onderzijde grijs, met witte vlekken en strepen. Flanken en anaalstreek olijf en ongestreept. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.573.55</b></p>







		<p><b>Dusky-throated antshrike,</b> <i>Thamnomanes ardesiacus</i> <i>obidensis</i>, Grijskeelmierklauwier 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Loodgrijs; van onder wat lichter. Keel zwart, staart met een smal wit randje. ♀: Olijfbruin van boven, vleugels en staart iets roder. Keel vuilwit, verder van onder oker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.574.58</b></p>
		<p><b>Cinereous antshrike,</b> <i>Thamnomanes caesius</i> <i>glaucus</i>, Temmincks mierklauwier 14-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zware, zwarte klauwiersnavel. Leigrijs, onder lichter. ♀: Ondersnavel wit. Donkerbruin; stuit, vleugels en staart roodbruin. Keel wit, borst olijfgrijs, rest onder roodbruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.575.60</b></p>
	<p><b>Pygmy antwren,</b> <i>Myrmotherula brachyura</i>, Dwergmiersluiper 8 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein met zeer korte staart. Kroon en mantel zwart-wit gestreept; witte rugvlek, zwarte snorstreep; stuit grijs. Twee witte banden op de zwarte vleugel; slagpennen en staart zwart, de staart met een smal wit randje. Keel wit; rest onder bleekgeel, met zwarte strepen op de zijden van de borst. ♀: Wat wit is bij de man is hier beige; keel en borst beige. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.577.62</b></p>	
		<p><b>Guianan streaked antwren,</b> <i>Myrmotherula surinamensis</i>, Gestreepte miersluiper 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Korte staart. Bovendelen zwart-wit gestreept; stuit grijs, witte schoudervlek. Vleugels zwart met twee witte vleugelstrepen en witte randen aan de slagpennen. Van onderen wit met zwarte strepen. ♀: Kop, hals en onderzijde oranjebruin; kroon en nek zwart gestreept; buik lichter. Broedvogel. <b>VIII.577.64</b></p>
	<p><b>Rufous-bellied antwren,</b> <i>Myrmotherula guttata</i>, Roodbuikmiersluiper 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Korte staart. Hele voorzijde grijs, keel bleker. Anaalstreek roodbruin; stuit kaneelbruin, evenals staartpunt en grote druppels op de zwarte vleugel; slagpennen kaneel gerand. ♀: Van boven grijsbruin, borst olijf. Broedvogel. <b>VIII.583.72</b></p>	
		<p><b>Brown-bellied antwren,</b> <i>Myrmotherula gutturalis</i>, Bruinbuikmiersluiper 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Olijfbruin van boven, vleugels en staart roodbruin. Vleugeldekvoren met kleine witte vlekken. Keel zwart, wit gevlekt; wangen en borst grijs, buik oranjebruin. Iris wit. ♀: Keel lichtbeige, rest onder gelig bruin. Vleugelvlekjes beige. Broedvogel. <b>VIII.584.75</b></p>

	<p><b>White-flanked antwren,</b> <i>Myrmotherula axillaris axillaris</i>, Witflankmiersluiper 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Leigrijs, vleugels zwart met witte vlekjes, staart zwart met smal wit einde, schouder wit. Keel, borst en het midden van de buik zwart; lange, zijdeachtige, witte pluimen aan de flanken. ♀: Olijfbruin boven, beige onder, kleinere flankpluimen. Broedvogel. <b>VIII.590.83</b></p>
	<p><b>Plain-winged antwren,</b> <i>Myrmotherula behni inornata</i>, Behns miersluiper 9,5 cm (9-10 Goudhaan)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Man leigrijs; keel, hals en middenborst zwart, in een punt uitlopend. Vrouw: Van boven roodbruin, onder achterkant olijfbruin, voorkant olijfbeige, keel witachtig. <b>Geen afbeelding gevonden.</b> Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.595.89</b></p>
	<p><b>Long-winged antwren,</b> <i>Myrmotherula longipennis longipennis</i>, Langvleugelmiersluiper 9-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Leigrijs, maar keel en borst zwart; vleugeldekveren zwart met witte banden; staart leigrijs, wit gerand. ♀: Bovendelen olijfbruin; keel en borst beige, lager wit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.596.93</b></p>
	<p><b>Grey antwren,</b> <i>Myrmotherula menetriesii cinereiventris</i>, Bonte miersluiper 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Leigrijs, bleker van onder. Zwarte vleugeldekveren met witte banden; staart met smalle witte randen. ♀: Boven olijfbruin, onder okerbeige. Broedvogel. <b>VIII.597.95</b></p>
	<p><b>Spot-tailed antwren,</b> <i>Herpsilochmus sticturus</i>, Vlekstaartmiersluiper 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Zwarte kroon en oogstreep. Lange witte wenkbrauwstreep tot in de nek. Rug grijs en zwart met een witte schoudervlek. Vleugels zwart met een witte band en witte vlekken op een rij; slagpennen wit gerand. Staart zwart met witte vlekken in het midden, een witte buitenrand en punt. Onder grijs, keel en buikmidden wit. ♀: Kastanje strepen in de kroon; van onderen grijswit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.603.106</b></p>

	<p><b>Todd's antwren,</b> <i>Herpsilochmus stictocephalus,</i> Todds miersluiper 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: In het veld hetzelfde als de vorige. ♀: Kroon zwart met grote witte vlekken. Keel en buik wit, borst en flanken beige. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.607.110</b></p>
	<p><b>Rufous-winged antwren,</b> <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> <i>frater,</i> Roodvleugelmiersluiper 10-12,5 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kastanje randen aan de slagpennen. Kroon en oogstreep zwart, lange wenkbrauwstreep wit. Rug grijs, wat lager zwart. Vleugeldeken zwart met witte randen. Staart zwart met witte rand en tip. Keel wit, verder onder roomwit. Vrouw heeft rode kroon en bruine rug. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.608.113</b></p>
	<p><b>Dot-winged antwren,</b> <i>Microrhophias quixensis</i> <i>microstictus,</i> Spikkelvleugelmiersluiper 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Glanzend zwart. Grote, half verborgen schouderplek; vleugels met kleine witte vlekjes in rijen, staart met wit eind, onderstaartdekveren wit. ♀: Doffer. Van onder roodbruin. Broedvogel. <b>VIII.609.114</b></p>
	<p><b>White-fringed antwren,</b> <i>Formicivora grisea grisea,</i> Witbandmiersluiper 12-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Kroon en bovenzijde donker grijsbruin. Lange, witte wenkbrauwstreep die doorloopt over borst en flanken. Op de flanken bestaat hij uit lange, zijdeachtige veren. Vleugels zwart met drie witte banden. Staart getrapt, zwart, met witte veereinden en buitenrand. Wang, hals, keel en onderdelen zwart. ♀: Wenkbrauw beige. Beige onderdelen, de lange flankveren zijn beigewit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.613.116</b></p>
	<p><b>Rusty-backed antwren,</b> <i>Formicivora rufa chapmani,</i> Roestrugmiersluiper 12-13 cm (Goudhaan 9-10) <b>Vrijwel alleen Suriname</b> Zuidelijke savanne</p>	<p>Lijkt op vorige. Kop en bovenzijde donkerbruin. Lange, witte wenkbrauwstreep die doorloopt over borst en flanken; daar met lange, kaneelkleurige, zijdeachtige veren. Vleugels bruinzwart met witte vlekken. Staart getrapt, zwart, met witte veereinden en buitenrand. Wang, hals, keel en onderdelen zwart. Onderbuik wit. ♀: Vanaf wang naar onderen zwart-wit gestreept, flanken en onderbuik kaneelkleurig. Broedvogel. <b>VIII.615.120</b></p>

	<p><b>Rufous-rumped antwren,</b> <i>Terenura callinota guianensis</i>, Grijswangmiersluiper 10-11 cm (Goudhaan 9-10) <b>Suriname en Guyana</b> Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zwarte kap, witte wenkbrauwstreep, zwarte oogstreep. Rug olijfgroen, stuit roodbruin, staart grijsbruin met olijf veerranden. Kleine, heldergele schouderplek. Vleugels bruingrijs met twee gele vleugelbanden en wittige vlekken, slagpennen met olijf randen. Vanaf wang naar onder lichtgrijs, abdomen citroengeel. ♀: Geen schouderplek. Kap bruingrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.625.133</b></p>
	<p><b>Ash-winged antwren,</b> <i>Terenura spodioptila spodioptila</i>, Grijsvleugelmiersluiper 10-11 cm (Goudhaan 9-10)  Laaglandbos</p>	<p>Kroon en nek zwart; mantel, stuit en staart grijs, daartussen kastanje. Wenkbrauwstreep wit, oogstreep zwart, vleugels grijszwart met twee witte banden. Van onder lichtgrijs, abdomen wit. ♀: Kop en rug bruin. Wenkbrauw, keel en borst beige. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.626.136</b></p>
	<p><b>Blackish antbird,</b> <i>Cercomacra nigrescens nigrescens</i>, Moerasmiervogel 14-15 cm (Huisumus 14-16)  Kustvlakte</p>	<p>Zwartgrijs. Grote, witte middenrugvlek; vleugelbocht wit, piepkleine witte vleugelvlekjes. ♀: Van boven olijfgroen. Voorhoofd, wang en onderzijde oranjebruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.629.137</b></p>
	<p><b>Dusky antbird,</b> <i>Cercomacra tyrannina saturator</i>, Tiranmiervogel 14-15 cm (Huisumus 14-16)  Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Asgrijs. Grote middenschouderplek. Vleugels zwart met smalle witte banden. ♀: Van boven olijfgroen. Wenkbrauwstreep en onderzijde oranjebruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.629.139</b></p>
	<p><b>Grey antbird,</b> <i>Cercomacra cinerascens immaculata</i>, Grijze miervogel 13-14 cm (Huisumus 14-16)  Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Als vorige maar donker blauwgrijs. Staart zwart met smalle witte veereinden. ♀: Van boven olijfgroen; van onder olijfgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.631.142</b></p>

		<p><b>White-browed antbird,</b> <i>Myrmoborus leucophrys angustirostris</i>, Witbrauwmierkruiper 12-13 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Voorhoofd en wenkbrauw wit, verder van boven leigrijs. Wangen en keel zwart. ♀: Voorhoofd en wenkbrauw kaneelkleurig, rest kroon roodachtig bruin. Verder van boven olijfbruin, kleine wittige vlekjes op de vleugel. Wang zwart, verder onder wit, flanken olijf. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.641.153</b></p>
		<p><b>Warbling antbird,</b> <i>Hypocnemis cantator cantator</i>, Orpheusmierkruiper 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon zwart, in het midden met witte strepen; witte wenkbrauw en teugel; zijkant van kop en hals zwart-wit gestreept. Rug olijfgrijs met zwarte vlekken; stuit en staart roodbruin. Vleugeldekveren zwart met witte vlekjes. Onder wit, maar flanken oranjerood; borst met zwarte strepen en schubben. ♀: Kroonstrepen en vleugelvlekjes beige. Broedvogel. <b>VIII.645.157</b></p>
	<p><b>Black-chinned antbird,</b> <i>Hypocnemoides melanopogon melanopogon</i>, Zwartkinmierkruiper 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Blauwgrijs, onder lichter. Keel zwart, Witte vlekjes in drie rijen op de dekveren. Staart zwart met witte randen. Iris lichtblauw. ♀: Van onder wit, flanken olijfgrijs, borst grijs gevlekt. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.646.159</b></p>	
		<p><b>Silvered antbird (Venezuelan silvered antcatcher),</b> <i>Sclateria naevia naevia</i>, Mangrovemiervogel 14-16 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Lange, slanke, zwarte snavel. Leigrijs; witte vlekjes in rijen op de vleugel. Keel wit, onderzijde wit met grijze strepen. Korte staart. ♀: Van boven dof bruin, vlekjes op de vleugel kaneel. Onder wit, stevig gestreept met bruin en beige. <b>VIII.648.163</b></p>
		<p><b>Black-headed antbird,</b> <i>Percnostola rufifrons rufifrons</i>, Roetkopmiervogel 13-16 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Donkergrijs, kroon zwart, kuifje; dekveren zwart met drie smalle, witte bandjes; kin en keel zwart. Iris rood. ♀: Bovendelen donker olijfgrijs. Dekveren met drie kaneelkleurige banden, slagpennen olijfgrijs. Kap zwart; rest van kop, keel en borst kaneelrood, lichter naar achter; flanken olijfgrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.651.164</b></p>

	<p><b>Spot-winged antbird,</b> <i>Percnostola leucostigma leucostigma</i>, Vlekvleugelmiervogel 14-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grijszwart, geen kuif, vleugels en staart zwart. Kleine, ronde, witte vlekken op de dekveren. Gezicht en onderzijde lichter grijs, donkerder wordend naar achter. Poten rose. ♀: Kap donkergrijs, rug donker olijfbruin, vleugels en staart dof zwart, vlekjes kaneelkleurig; rest van de kop lichtgrijs; onderzijde donker kaneelrood. Broedvogel. <b>VIII.652.167</b></p>
	<p><b>White-bellied antbird,</b> <i>Myrmeciza longipes griseipectus</i>, Witbuikmiervogel 14,5-15,5 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Man: Van boven, vleugels en staart donker roodbruin, vlek tussen schouders wit. Grijsz wenkbrauwstreep die zich verbreedt naar de borst; oorstreek, hals en bovenste deel van de borst zwart. Lagere borst en buikzijden grijs, buikmidden wit, flanken en onderstaart kaneelbruin. Poten vleeskleurig. Vrouw: Kroon en nek donkerbruin, wenkbrauw grijs, wangen donker. Vleugeldekveren met een zwarte dwarsstreep. Keel, borst, flanken en anaalstreek kaneel; buik wit. Status onbekend. <b>VIII.655.172</b></p>
	<p><b>Ferruginous-backed antbird,</b> <i>Myrmeciza ferruginea ferruginea</i>, Roodrugmiervogel 14-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Snavel van boven zwart, van onder blauwgrijs. Bovendelen kastanje. Wenkbrauwstreep, gezicht onder het oog, keel en borst zwart. Een lange witte streep achter het oog tot over zijborst. De onderborst is wit met grijze wolkjes, rest onder roodbruin. Dekveren zwart met twee beige banden. ♀: Witte keel. Broedvogel. <b>VIII.657.174</b></p>
	<p><b>Black-throated antbird,</b> <i>Myrmeciza atrothorax atrothorax</i>, Zwartkeelmiervogel 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Donkerbruine kroon en mantel; witte midschouderplek; stuit roetzwart. Vleugels donkerbruin, dekveren met kleine witte stippen met zwarte randen. Staart zwart. Voorhoofd, gezicht en onderzijde donkergrijs; keel, borst en anaalstreek dof zwart. ♀: Stippen groter en beige. Keel wit, overgaand in het kastanjerood van hals en borst; de zijden zijn bleker en het midden van het abdomen is beigewit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.665.189</b></p>

	<p><b>Spot-backed antbird,</b> <i>Hylophylax naevius naevius</i>, Bruinvlekmiervogel 11-12 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kroon bruinzwart; rug bruin, in het midden zwart met beige vlekken. Slagpennen bruin, dekveren zwart met grote witte vlekken. Staart bruin, dan zwart, dan wit. Wang grijs, keel en hals zwart; onder wit met zwarte vlekken op borst en op zijkant; meer naar onder beige. Waarschijnlijk broedvogel. ♀: Keel wit; daarboven een forse zwarte snor die doorloopt tot in hals; onderzijde lichtbeige.</p> <p><b>VIII.667.191</b></p>
	<p><b>Scale-backed antbird,</b> <i>Hylophylax poecilinotus poecilinotus</i>, Schubrugmiervogel 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Loodgrijs; onderrug en vleugeldekveren zwart-wit geschubd. Staart zwart met in het midden witte vlekken en een wit einde. ♀: Kroon, nek, wang en kin okeroranje; rug roodbruin. Onder lichtgrijs, keel wit, flank en anaalstreek beige. Broedvogel.</p> <p><b>VIII.668.193</b></p>
	<p><b>Wing-banded antbird,</b> <i>Myrmornis torquata torquata</i>, Bonte mierlijster 15-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon kastanjebruin; rug grijsbruin, kastanje gevlekt, bovendien een rij zwarte vlekken; onderrug en staart kastanjerood. Vleugels zwart, twee beige banden op de dekveren en een op de handpennen, een witte band over de handpennen (alleen te zien in vlucht). Oorstreek, hals en borstband zwart-wit geschubd; keel zwart; verder naar onder asgrijs, anaalstreek kastanjerood. ♀: Keel oranjerood, alleen de kin zwart. Broedvogel.</p> <p><b>VIII.671.194</b></p>
	<p><b>White-plumed antbird,</b> <i>Pithys albifrons albifrons</i>, Witpluimmiervogel 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kap en wang zwart; een smalle, witte streep achter het oog; rond snavelbasis lange, witte pluimen, die boven de snavel vormen twee horens, die eronder een baard. Rug en vleugels grijs. Onderzijde en hals kastanje. Poten oranje. Broedvogel.</p> <p><b>VIII.671.195</b></p>
	<p><b>Rufous-throated antbird,</b> <i>Gymnopithys rufigula rufigula</i>, Roodkeelmiervogel 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Omberbruin. Voorhoofd en teugel zwart, wang en keel kastanje; rest onder beige, naar achter en opzij olijfbruin. Naakte plek om oog lichtblauw. Waarschijnlijk broedvogel.</p> <p><b>VIII.673.198</b></p>

Familie: *Formicariidae*, **Ground-antbirds**, Mierlijsters

Tamelijk kleine tot middelgrote, plompe, voornamelijk op de grond levende vogels met korte, afgeronde vleugels; lange poten en een korte staart, grote kop en grote ogen; meestal saai gekleurd: roodbruin, olijfgrijs, bruin, zwart en wit domineren.

	<p><b>Rufous-capped antthrush,</b> <i>Formicarius colma colma</i>, 18 cm (Kwartel 16-18) Roodkapmierlijster</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon en nek kastanje. Voorhoofd, teugel, zijkant van de kop, keel en borst zijn zwart. Het zwart van de borst gaat naar onder geleidelijk over in donker olijfgrijs. Rug en vleugels olijfgrijs, vleugelbocht beige, basis van de handpennen kaneel. Lager onder olijfgrijs. ♀: Teugel wit; keel wit, zwart gevlekt. Middenbuik beigewit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.703.1</b></p>
	<p><b>Black-faced antthrush (Venezuelan antthrush),</b> <i>Formicarius analis crissalis</i>, Zwartkeelmierlijster 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Rug en vleugel olijfgrijs, stuit roodbruin, staart olijfgrijs met zwart eind. Handpennen zwart met bruine randen. Witte teugelvlek omringd door zwart, onder het oog zwart, de keel zwart; achter het oog en de hals kaneelrood. Borst en flanken grijs, wit op de buik, anaalstreek kaneel. Kale oogring blauwgrijs. Poten rosegrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.703.3</b></p>
	<p><b>Short-tailed antthrush,</b> <i>Chamaeza campanisona fulvescens</i>, Kortstaartmierlijster 19-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Lijkt een lijster met een korte snavel, staart en poten. Van boven roodbruin, streep achter oog wit; staart met een subterminale zwarte band en een kleine, bijna witte punt. Status onbekend. <b>VIII.705.7</b></p>
	<p><b>Spotted antpitta,</b> <i>Hylopezus macularius macularius</i>, Roodflankmierpitta 14 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Donkergrijze kap tot op oog, bovenzijde olijfgrijs. Dekveren met twee oranjebeige banden, handpennen van buiten en aan de basis oranjebruin. Teugel en oogring oranjebeige, oorstreek olijfgrijs; onder de oorstreek een zwarte streep. Bovendien is er een zwarte snorstreek. Van onder geelwit met veel zwarte strepen op de borst; flanken en anaalstreek oranjebeige. Snavel boven zwart, onder deels lichtrose. Korte staart, hoog op de poten. Broedvogel. <b>VIII.709.13</b></p>
	<p><b>Thrush-like antpitta,</b> <i>Myrmothera campanisoma campanisoma</i>, Lijstermierpitta 15 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Korte staart, hoog op de poten. Bovenzijde, vleugels en staart roodbruin; van onder wit, op de borst grijsbruin gestreept, flanken grijs. Snavel van boven zwart, de helft van de ondersnavel wit; poten grijsrose. Waarschijnlijk broedvogel. <b>VIII.711.21</b></p>





**Variegated antpitta,**  
*Grallaria varia varia*,  
Bonte koningsmierpitta  
18-21 cm (Spreeuw 19-22)

Laag-, Hooglandbos

Korte staart, hoog op de poten. Voorhoofd olijfbruin, kroon en nek grijsblauw, mantel olijfbruin: alle zwart geschubd. Vleugels donkerbruin; handpennen met brede, roodachtige randen; armpennen met olijfbruine randen; staart kastanje. Teugel en snorstreep roomwit; oorstreek olijfbruin met witte strepen; keel donkerbruin met smalle, bleke strepen; tussen keel en borst wat wit; vanaf de borst wordt het bruin lichter tot roomwit, met roomgele strepen die naar achter toe verbreden, op de buik nog wat bruine vlekken; anaalstreek kaneelbeige. Poten rosegrijs. Broedvogel.  
**VIII.715.26**

**Familie: *Conopophagidae*, Gnateaters, Muggeneters**

Kleine, gedrongen vogels met een korte staart; korte, ronde vleugels; naar verhouding lange poten en een platte, zwak gehaakte snavel; de meeste met opvallende, witte pluimen achter de ogen.



**Chestnut-belted gnateater,**  
*Conopophaga aurita aurita*,  
Cayennemuggeneter  
11-13 cm (Goudhaan 9-10)

Laag-, Hooglandbos,  
Zuidelijke savanne

Kap chocoladebruin; een streep van zijdeachtige, lange, witte veren loopt van achter het oog naar de nek; verder van boven olijfbruin, zwart geschubd. Vleugels donkerbruin, dekveren met roodbruine randen, armpennen olijf met beige einden, handpennen met smalle beige randen, staart donkerbruin met een olijf waas. Voorhoofd, teugel tot boven het oog, wangen en keel zwart: masker; borst bruin, flanken olijfbruin; verder onderzijde wit. ♀: Geen zwart masker; zijkant van de kop olijfbruin, kin wit. Poten grijsrose. Waarschijnlijk broedvogel.  
**VIII.745.1**

**Familie: *Cotingidae*, Cotingas, Cotinga's**

Erg kleine tot grote boombewoners, buitengewoon variabel zowel in vorm als in verenpak, de mannen van veel soorten zijn schitterend gekleurd of hebben anderszins opvallende versieringen; ze eten meest, sommige soorten uitsluitend, fruit.



**Sharpbill (Venezuelan sharpbill),**  
*Oxyruncus cristatus hypoglaucus*,  
Scherpsnavel  
17 cm (Kwartel 16-18)

Hooglandbos

Scherpe, donkere snavel; rode kroon; kop wit, zwart geschubd. Van boven olijfgroen met twee onduidelijke gelige vleugelstrepen. Borst grijzig met zwarte schubben, rest onderzijde licht geelgroen met zwarte vlekken, middenbuik roomwit. Iris oranje. Waarschijnlijk broedvogel.  
**IX.73.1**










**Dusky purpleletuft,**  
*Iodopleura fusca*,  
Zwartkapdwegcotinga  
11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos







Zwaluwachtige vleugels, brede snavel. Leizwart van boven, van onder grijs, middenbuik wit. Witte staartbasis. Kleine violette (bij ♀ witte) pluim op flank. Waarschijnlijk broedvogel.  
**IX.87.26**









		<p><b>Screaming piha,</b> <i>Lipaugus vociferans,</i> Schreeuwpiha 24-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Grijs, donkerder op vleugels en staart, onder bleker, vooral keel en buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.89.35</b></p>
		<p><b>Purple-breasted cotinga,</b> <i>Cotinga cotinga,</i> Purperborstcotinga 18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Van boven glanzend kobaltblauw met naar achter wat zwarte vlekken. Purper van keel tot buik. Vleugels en staart zwart, vleugeldekveren blauw gerand. ♀: Van boven bruin, wit geschubd. Onder beige tot wit met donkerbruine vlekken, kin en anaalstreek ongevekt. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.94.46</b></p>
		<p><b>Spangled cotinga,</b> <i>Cotinga cayana,</i> Halsbandcotinga 20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Hooglandbos</p>	<p>Glanzend turkooisblauw met enkele zwarte vlekken. Keel purperrood. Vleugels zwart, veren blauw gerand. Staart en snavel zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.94.48</b></p>
		<p><b>Pompadour cotinga,</b> <i>Xipholena punicea,</i> Pompadourcotinga 19-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Hooglandbos</p>	<p>♂: Brede haaksnavel. Roodpurper, lichter op schouder en stuit, grote dekveren verlengd, vleugels wit, handpennen met zwarte punt. Iris geel. ♀: Asgrijs, lichtere keel en buik, zwarte vleugels (veren wit gerand) en staart. Broedvogel. <b>IX.97.49</b></p>
		<p><b>Bare-necked fruitcrow,</b> <i>Gymnoderus foetidus,</i> Kaalnekvruchtenkraai 34-38 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>♂: Zwart; vleugels zilvergrijs, wang en hals overwegend kaal en blauw, sterk geplooid. ♀: Leigrijs met wat lichtere schubben. Broedvogel. <b>IX.99.56</b></p>
		<p><b>Crimson fruitcrow,</b> <i>Haematoderus militaris,</i> Karmozijnvruchtenkraai 33-35 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Haakvormige, rode snavel. ♂: Glanzend scharlaken, vleugels en staart donkerbruin. ♀: Kop en onderzijde roserood, de rest donkerbruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.101.57</b></p>

	<p><b>Purple-throated fruitcrow,</b> <i>Querula purpurata,</i> Purperkeelvruchtenkraai ♂: 28-30; ♀:25-28 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Stevige, grijze snavel. ♂: Zwart met grote glanzende purperrode of scharlaken keelvlak. ♀: Geheel zwart. Broedvogel. <b>IX.101.58</b></p>
	<p><b>Capuchinbird,</b> <i>Perissocephalus tricolor,</i> Capuchonvogel 35-36 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Stevige, blauwgrijze haaksnavel. Kroon en gezicht kaal: blauwgrijs. Achterhoofdveren dicht geplant en rechtop, okerbruin: de capuchon. Van boven okerbruin, slagpennen en staart zwart. Van onderen wat roder, ondervleugeldekveren wit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XI.103.63</b></p>
	<p><b>White bellbird,</b> <i>Procnias albus albus,</i> Witte klokvogel 28-29 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>♂: Geheel wit. Vanaf de basis van de bovensnavel hangt een langgerekte lel, zwart met wat witte stervormige veren. ♀: Olijfgroen, buik geelwit met olijf strepen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.105.65</b></p>
 	<p><b>Guianan red cotinga,</b> <i>Phoenicircus carnifex,</i> Rode cotinga ♂: 22; ♀: 24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Kroon borstelig, glanzend rood. Onderrug, staart en buik eveneens helderrood; rest zwartachtig tot kastanje. Vleugels roodbruin en de staart heeft een roodbruine eindband. ♀: Voornamelijk olijfkleurig met een dof rode kop en staart en roserode buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.106.68</b></p>
 	<p><b>Guianan cock-of-the-rock,</b> <i>Rupicola rupicola,</i> Oranje rotshaan 27- 32 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>♂: Oranje. Halfcirkelvormige kuif met een subterminale kastanje streep. Vleugels zwart met beige randen, op de handpennen een grote witte spiegel, rugveren met lange zijdeachtige aanhangsels. Staart zwart met oranje eindband. Iris oranje. ♀: Effen donkergrijs, anaalstreek roodbruin. Broedvogel. <b>IX.107.70</b></p>

**Familie: *Pipridae*; Manakins; Manakins**

Kleine, compact gebouwde boombewoners met een korte, tamelijk brede snavel; korte vleugels en, de mannen van een paar soorten uitgezonderd, een korte staart; ze eten voornamelijk kleine vruchten die ze in de vlucht plukken, en daarnaast insecten.

	<p><b>Crimson-hooded manakin,</b> <i>Pipra aureola aureola</i>, Roodkruinmanakin 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Oranjegeel voorhoofd, wang en keel. Rest van de kop, de bovenrug, borst en de anaalstreek scharlakenrood. Verder zwart. Iris wit. ♀: Olijfgroen; met een gelere teugel, keel en vage strepen op de borst; buik grijs. Broedvogel. <b>IX.143.1</b></p>
	<p><b>Golden-headed manakin,</b> <i>Pipra erythrocephala erythrocephala</i>, Goudkopmanakin 8-9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Oranjegele kop tot aan mantel, rest zwart, maar rood-witte dijen. Iris wit. ♀: Olijfgroen, onder wat bleker, geel waas over de buik. Iris grijs. Broedvogel. <b>IX.144.4</b></p>
	<p><b>White-fronted manakin,</b> <i>Lepidothrix serena</i>, Witvoorhoofdmanakin 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>♂: Zwart met wit voorhoofd, azuurblauwe stuit, een oranjegele vlek op de borst en een gele buik. ♀: Meest groen, oogring en gezicht gelig, keel grijs, geelgroene borst, verder naar onder geel. Broedvogel. <b>IX.148.16</b></p>
	<p><b>White-crowned manakin,</b> <i>Dixiphia pipra pipra</i>, Witkruinmanakin 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Witte kap tot aan oog en nek, daar een kuif vormend. Verder zwart. Iris rood. ♀: Groen, grijs op de kop; van onder lichter, vooral keel en buik. Broedvogel. <b>IX.151.17</b></p>
	<p><b>Blue-backed manakin,</b> <i>Chiroxiphia pareola pareola</i>, Prachtmanakin 12-12,5 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne en Zuidelijke savanne</p>	<p>Mannetje zwart met dieprode kroon en bleek azuren mantel. Vrouwje olijf, van onder bleker met gelere buik; onduidelijke, blekere oogring. Beide met oranje poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.152.22</b></p>
	<p><b>White-throated manakin,</b> <i>Corapipo gutturalis</i>, Witkeelmanakin 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>♂: Glanzend blauwzwart, witte keel reikt in een punt tot op borst. Witte vlek op de handpennen in vlucht. Poten purper. ♀: Van boven, onderborst en flanken olijfkleurig. Grijswit van onder. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.155.28</b></p>

 	<p><b>White-bearded manakin,</b> <i>Manacus manacus manacus,</i> Bonte manakin 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p>	<p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Kap, rug, vleugels en staart zwart. Stuit en anaalstreek grijs. Onderzijde en halsring wit. ♀: Olijfgroen, van onder lichter, vooral keel en buik. Broedvogel. <b>IX.157.32</b></p>
 	<p><b>Black manakin,</b> <i>Xenopipo atronitens,</i> Zwarte manakin 12-13 cm (Huisman 14-16)</p>	<p>Noordelijke savanne</p>	<p>♂: Glanzend zwart, vleugels en staart bruiner. ♀: Donker olijfgroen van boven, olijfgroen onder, keel grijs. Broedvogel. <b>IX.160.37</b></p>
	<p><b>Saffron-crested tyrant- manakin,</b> <i>Neopelma chrysocephalum,</i> Geelkruifiranmanakin 13 cm (Huisman 14-16)</p>	<p>Noordelijke savanne</p>	<p>Gouden kroonstreep (vaak onduidelijk), bovenzijde en borst olijfgroen, vleugels en staart met een bruinachtig waas. Keel grijs, gele buik. Iris oranje. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.165.45</b></p>
	<p><b>Pale-bellied tyrant-manakin,</b> <i>Neopelma pallescens,</i> Witbuiktiranmanakin 14 cm (Huisman 14-16)</p>	<p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Weinig tekening. Van boven olijfgroen met een weinig opvallende heldergele kroonstreep (zichtbaar bij baltsen). Van onder olijfgroen, buik wittig roomkleurig. Status onbekend. <b>IX.165.47</b></p>
	<p><b>Tiny tyrant-manakin,</b> <i>Tyrannutes virescens,</i> Kleine tiranmanakin 7-8 cm (Goudhaan 9-10)</p>	<p>Laaglandbos</p>	<p>Klein, saai. Heel korte staart, donker oog. ♂: Meestal verborgen gele kroonvlek, rest kop en bovenkant olijfgroen, keel en borst olijfgroen, buik bleek geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.166.51</b></p>
	<p><b>Wing-barred piprites,</b> <i>Piprites chloris chlorion,</i> Streepvleugelmanakin 13-14 cm (Huisman 14-16)</p>	<p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Oranjegeel voorhoofd, gele oogring en vleugelstrepen, olijfgroene kroon en bovenzijde, nek grijs. Slagpennen en staart met groene randen, roomwitte vlekken op de vleugeldekveren. Van onder geel, op borst olijfgroen gewolkt. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.167.53</b></p>



**Thrush-like mourner,**  
*Schiffornis turdina wallacii*,  
Bronzen schiffornis  
16-17 cm (Kwartel 16-18)  
Laag-, Hooglandbos

Effen, saai. Van boven olijfkleurig, vleugelveren bruin gerand. Onder grijsig, borst wat donkerder. Waarschijnlijk broedvogel.

**Familie: Tyrannidae, Tyrant-flycatchers, Tirannen**

Zeer kleine tot middelgrote vogels, de meeste met veren in combinaties van zwart, bruin, wit, geel en groen; sommige nog minder opvallend, een paar veel feller gekleurd; heel divers wat betreft de proporties van de verschillende lichaamsdelen en de structuur en de vorm van de snavel.



**Sooty-headed tyrannulet,**  
*Phyllomyias griseiceps*,  
Dwergvliegenvikker  
10 cm (Goudhaan 9-10)

Hooglandbos

Soms is de kuif zichtbaar. Van boven olijfgrijs, zwarte kroon, witte wenkbrauwstreep, zwarte teugel, gezicht grijsig. Vleugels donker zonder strepen, veren wel wit gerand. Staart donker. Onder lichtgeel, keel wit. Snavel klein. Waarschijnlijk broedvogel.

**IX.261.8**



**Yellow-crowned tyrannulet,**  
*Tyrannulus elatus*,  
Geelkruinvliegenvikker  
10-11 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos

Petje grijszwart; deels verborgen lange, goudgele kroonkuif; grijze wenkbrauwstreep, zwarte teugel, olijfgroene mantel. Vleugels zwartachtig met twee witte strepen; slagpennen licht gerand, staart donker olijf. Keel en gezicht lichtgrijs, onder lichtgeel, borst wat olijf.

Broedvogel.

**IX.262.13**



**Grey elaenia,**  
*Myiopagis caniceps cinerea*,  
Grijze elenia  
12-12,5cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte, Laaglandbos

Man: van boven blauwgrijs met witte kroonstreep; vleugels zwart met twee duidelijke witte dwarsstrepen en witte veerranden. Keel en borst lichtgrijs, buik grijsig wit.

Vrouw: van boven groen, kop grijzer met een bleekgele kroonstreep. Vleugels zwart met twee duidelijke gele strepen en gele veerranden; van onder bleek geelgroen, het helderst op de buik.

Status onbekend.

**IX.265.15**









**Forest elaenia,**  
*Myiopagis gaimardii guianensis*,  
Boselenia  
12-13 cm (Goudhaan 9-10)





Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos

Kleine, ruige kuif; witte wenkbrauwstreep vanaf snavel, smalle witte oogring, kroon donkergroen met (vaak verborgen) witte vlek. Mantel olijf, vleugels donker met twee gelige strepen, slagpennen geel gerand. Gezicht grijsig, keel wittig, onder lichtgeel, borst olijf gevamd.







Broedvogel.







**IX.265.14**







	<p><b>Yellow-crowned elaenia,</b> <i>Myiopagis flavivertex</i>, Geelkruinelenia 12,5-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Bovenzijde saai olijfkleurig; grote, half verborgen helder gele kroonstreep. Vleugels donker met twee bleekgele strepen en deels gele veerranden. Keel witachtig, borst grijsbruin, buik dof bleekgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.266.18</b></p>
	<p><b>Greenish elaenia,</b> <i>Myiopagis viridicata restricta</i>, Groene elenia 13,5 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon grijsig met een gele streep; korte wenkbrauwstreep en oogring wit; bovenzijde olijf, vleugels donkerder met gelige randen aan de veren (maar geen vleugelstrepen). Keel licht grijsig, borst olijfgrijs, buik bleekgeel. Waarschijnlijk broedvogel. Status onbekend. <b>IX.266.20</b></p>
	<p><b>Yellow-bellied elaenia,</b> <i>Elaenia flavogaster flavogaster</i>, Geelbuikelenia 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, beide savannes</p>	<p>Opvallend ruige kuif met een, meest verborgen, witte vlek. Van boven olijfgrijs, gezicht lichter, zwakke witte oogring, vleugels en staart donkerder, twee witte vleugelstrepen, slagpennen geelwit gerand. Keel wit, borst olijf, buik lichtgeel. Broedvogel. <b>IX.267.22</b></p>
	<p><b>Small-billed elaenia,</b> <i>Elaenia parvirostris</i>, Kortsnavelenia 14,5 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag- en Hooglandbos</p>	<p>Van boven olijf met smalle witte kroonstreep. Geen kuifje, lijkt rondkoppig. Duidelijke witte oogring; vleugels wat donkerder met twee of drie witachtige dwarsstrepen. Keel en borst lichtgrijs, buikmidden witachtig. (De kleine snavel is geen veldkenmerk.) Migrant uit het zuiden. <b>IX.269.26</b></p>
	<p><b>Plain-crested elaenia,</b> <i>Elaenia cristata cristata</i>, Kapelenia 14-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Kuif wijst achterwaarts. Kop en bovenzijde effen olijfgrijs, smalle witte oogring; vleugels donker met twee witte strepen, slagpennen wit gerand. Keel grijswit, overgaand in olijfgrijs op borst en in lichtgeel op de buik. Broedvogel. <b>IX.271.31</b></p>
	<p><b>Lesser elaenia,</b> <i>Elaenia chiriquensis albivertex</i>, Kleine elenia 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Klein kuifje; witte, meestal verborgen, kruinvlek, kop en bovenzijde effen olijfgrijs, smalle witte oogring. Vleugels en staart donker, twee vuilwitte vleugelstrepen, slagpennen wit gerand. Keel witachtig, borst grijs, buik zeer lichtgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.272.32</b></p>

	<p><b>Rufous-crowned elaenia,</b> <i>Elaenia ruficeps,</i> Roodkruinelenia 15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein kuifje, roodbruine kroonvlek, vaak bobbel op het achterhoofd, smalle witte oogring. Kop en bovenzijde olijfbruin, twee wittige vleugelstrepen. Onder lichtgeel; olijfgrijze strepen op de keel, borst en flanken. Broedvogel. <b>IX.272.33</b></p>
	<p><b>White-lored tyrannulet,</b> <i>Ornithion inerme,</i> Witvleugelvliegenvikker 8 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grijze kroon;, witte teugels die elkaar raken boven de snavel, witte oogring: bril. Van boven olijfgrijs, vleugels donker met twee rijen witte stippen, lichte slagpenranden. Gezicht grijs, keel wit, lichtgeel onder. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.274.41</b></p>
	<p><b>Southern beardless tyrannulet,</b> <i>Camptostoma obsoletum napaeum,</i> Geelkeelvliegenpikker 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Saai; ruig, grijs kuifje; van boven olijfbruin, kop grijzer, teugel en oogring wit. Vleugels donker, twee kaneelkleurige vleugelstrepen, slagpen wit gerand. Gezicht en keel grijswit overgaand in zeer lichtgeel onder. Broedvogel. <b>IX.275.43</b></p>
	<p><b>Suiriri flycatcher,</b> <i>Suiriri suiriri affinis,</i> Suiriri-tiran 15,5-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Bovenzijde olijf met een grijzere kop, geelbeige romp en staartbasis; vleugels en staart zwarter, vleugels met gelige strepen en veerranden, staartveren ook geel gerand. Keel en borst bleekgrijs, verder naar onder bleekgeel. Geheel zwarte snavel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.276.44</b></p>
	<p><b>Mouse-coloured tyrannulet (Amazonian mouse-coloured tyrannulet),</b> <i>Phaeomyias murina wagaie,</i> Wenkbrauwvliegenpikker 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Van boven donkergroen, vuilwitte wenkbrauwstreep, wittige oogring, twee witte tot kaneelkleurige vleugelstrepen, binnenste slagpen met kaneelranden. Gezicht en keel witachtig, borst grijs, buik lichtgeel. Broedvogel. <b>IX.286.65</b></p>
	<p><b>Yellow tyrannulet,</b> <i>Capsiempis flaveola cerula,</i> Gele looftiran 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Gele wenkbrauwstreep en oogring; ruig, olijf kuifje. Van boven olijfgroen, vleugels donkerder met twee onduidelijke, gelige strepen. Gezicht en onderzijde geel, hoe lager hoe helderder. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.287.67</b></p>



	<p><b>Bearded tachuri,</b> <i>Polystictus pectoralis brevipennis,</i> Baardtiran 8-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Klein en slank. Man: Bruin van boven, kroon grijs en zwart met een witte kroonstreep; onderzijde gezicht en en keel fijn wit en zwart gestreept (de baard); vleugels donkerder met twee kaneelbeige strepen. Onder witachtig met kaneelglans op borst en flanken. Vrouw: Kroon bruin, geen baard. Status onbekend. <b>XI.288.69</b></p>
	<p><b>Ringed antpiper,</b> <i>Corythopis torquatus anthoides,</i> Geringde piepertiran 14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grondvogel. Grijs kroon, van boven olijfbuin, keel en buik wit, flanken olijf, zwarte borstband met daaronder zwarte strepen. Lange poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.293.78</b></p>
	<p><b>Rufous-sided pygmy-tyrant,</b> <i>Euscarthmus rufomarginatus,</i> Geelbuikdwergtiran 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven bruin; beigewitte wenkbrauwstreep, rode kroonvlek. Vleugels en lange, slanke staart donkerder, vleugels met twee oker strepen en oker veerranden. Keel wit, rest onder bleekgeel, flanken oker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.294.81</b></p>
	<p><b>Slender-footed tyrannulet (Guianan tyrannulet),</b> <i>Zimmerius gracilipes acer,</i> Slankpootvliegenpikker 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Witte wenkbrauwstreep, zwarte oogstreep, grijs voorhoofd en kroon, lichter gezicht. Van boven olijf, vleugels zwartachtig, vleugelveren geel gerand. Keel wit, van onder bleekgeel. Iris grijs. Broedvogel. <b>IX.297.90</b></p>
	<p><b>Olive-green tyrannulet,</b> <i>Phylloscartes virescens,</i> Surinaamse looftiran 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven olijfkleurig, gele oogring, gezicht geelgroen, vleugels donker met twee gele strepen, slagpennen smal geel gerand. Van onder geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.300.97</b></p>
	<p><b>Sepia-capped flycatcher,</b> <i>Leptogon amaurocephalus orinocensis,</i> Bruinkapleptogon 14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kap vrijwel zwart; gezicht grijs, wit gevlekt; zwarte vlek op oor, gelige halve maan daarachter. Twee rijen beige vlekken op vleugel, slagpennen groenig gerand. Keel grijs, zwart gevlekt; van onder geelgrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.307.116</b></p>

	<p><b>Ochre-bellied flycatcher,</b> <i>Mionectes oleagineus</i> <i>oleagineus</i>, Okerbuikpipratiran 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven effen olijfgroen met een oker was; gezicht, vleugels en staart okerolijf. Vleugelveren roodbruin gerand. Onder kaneelbeige, keel en borst meer oker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.309.122</b></p>
	<p><b>McConnell's flycatcher</b> <i>Mionectes macconnelli</i> <i>macconnelli</i>, MacConnells pipratiran 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven effen olijf, vleugels en staart donkerder. Onder donker kaneelbeige, keel en borst met een donker olijfgrijs was. <b>Geen</b> beige punten aan dekveren. Binnenkant snavel zwart. Broedvogel. <b>IX.309.123</b></p>
	<p><b>Northern scrub-flycatcher (Smooth scrub-flycatcher),</b> <i>Sublegatus arenarum glaber</i>, Salvins vliegenpikker 13-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Smalle, witachtige wenkbrauwstreep; grijsbruine kap en bovenzijde. Vleugels donkergrijs met witte vleugelstrepen en slagpenranden. Keel en borst lichtgrijs, rest onder geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.310.125</b></p>
	<p><b>Amazonian scrub-flycatcher,</b> <i>Sublegatus obscurior</i>, Donkere vliegenpikker 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Van boven donker grijsbruin, vleugels met grijze strepen en donkere punten. Keel en borst donkergrijs, buik vuilgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.311.126</b></p>
	<p><b>Southern scrub-flycatcher,</b> <i>Sublegatus modestus brevirostris</i>, Struikvliegenpikker 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Korte zwarte snavel. Bovenkant olijfgroen met een smalle witachtige wenkbrauwstreep, vleugels donkerder met twee duidelijke witte strepen. Keel en borst lichtgrijs contrasterend met de bleekgele buik. Migrant uit het zuiden. <b>XI.311.127</b></p>
	<p><b>Pale-tipped tyrannulet,</b> <i>Inezia caudata caudata</i>, Salvins inezia 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Witte oogring en wenkbrauwstreep tot snavel: bril; kap en bovenzijde olijfgroen. Vleugels donker met twee witte strepen, randen van binnenste slagpennen wit. Staart lang, donker olijf met witachtige buitenrand en punt. Gezicht en keel wittig; onder geel, beige was op borst. Iris wittig. Broedvogel. <b>IX.312.131</b></p>

	<p><b>Short-tailed pygmy-tyrant,</b> <i>Myiornis ecaudatus miserabilis</i>, Kortstaardwergtiran 7 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kleinste zangvogel, lijkt staartloos. Zeer donkergrijze kap, iets lichtere kop, witte vlek boven teugel, witte oogring (bril), zwarte teugel. Dofgroene rug, vleugels donker met helder gele randen en onduidelijke strepen. Van onder wit maar zijborst grijs en anaalstreek geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.316.137</b></p>
	<p><b>Double-banded pygmy-tyrant,</b> <i>Lophotriccus vitiosus guianensis</i>, Dubbelbanddwergtiran 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Lange, zwarte kroonveren met donkergroene rand vormen een kuif die liggend achter de kop uitsteekt. Witachtige teugel. Van boven olijfgroen, vleugels donkerder met twee groengele strepen en dito veerranden. Keel en borst wit, olijf gestreept, rest onder geel. Iris lichtgeel. Broedvogel. <b>IX.318.142</b></p>
	<p><b>Helmeted pygmy-tyrant,</b> <i>Lophotriccus galeatus</i>, Helmdwergtiran 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kuif van lange zwarte veren met olijfgrijze randen steekt in rust achter de kop uit. Witachtige teugel. Van boven olijf, vleugels donkerder met onduidelijke olijf strepen en smalle olijf randen, Staart donker met een olijf rand. Onder witachtig, vaag grijs gestreept. Iris geel. Broedvogel. <b>IX.318.143</b></p>
	<p><b>Boat-billed tody-tyrant,</b> <i>Hemitriccus josephinae</i>, Bootsnaveltodietiran 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kap en bovenzijde effen olijf, teugel en oorstreek lichtgrijs. Keel vuilwit, rest onder lichtgeel. Snavel breed en plat. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.322.150</b></p>
	<p><b>White-eyed tody-tyrant,</b> <i>Hemitriccus zosterops zosterops</i>, Witoogtodietiran 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kap en bovenzijde olijfgroen, witachtige wenkbrauwstreep. Vleugels donker met twee gele strepen en olijfgelge slagpenranden. Keel grijs, donker gestreept; borst en flanken olijf, geel gevamd; buik lichtgeel. Iris grijs of geel. Broedvogel. <b>IX.322.151</b></p>
	<p><b>Pelzeln's tody-tyrant,</b> <i>Hemitriccus inornatus</i>, Pelzeln's todietiran 9 cm (Goudhaan 9-10 cm)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kroon en bovendelen olijfbuin, teugel en smalle oogring witachtig; vleugels en staart donker olijfbuin, smalle witachtige vleugelstrepen en veerranden; van onder wit met onduidelijke grijze strepen. Iris bleek grijs, snavel en poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.324.158</b></p>



**Black-chested tyrant,**  
*Taeniotriccus andrei andrei*,  
Zwartkuiftodietiran  
12 cm (Goudhaan 9-10)

Laaglandbos

Man: Zwarte kroon met kuifje; voorhoofd, keel en wangen kastanjerood, bovendelen en borst zwart. Gele vlek aan de basis van de handpennen en een gele streep daarnaast op de vleugel, de buitenvlag van de tertials is ook bleekgeel. De bleekgrijze buik is scherp afgescheiden van de zwarte borst.  
Vrouw: Kortere kuif, olijf rug, middenbuik witter.  
Status onbekend.  
**IX.328.166**



**Smoky-fronted tody-flycatcher,**  
*Poeciloriccus fumifrons penardi*,  
Grijskapschoffelsnavel  
9 cm (Goudhaan 9-10)  
**Suriname en Frans Guiana**  
Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Voorhoofd rookgrijs, oogstreep witachtig, kap en bovenzijde olijf. Vleugels en staart zwartachtig, twee gele vleugelstrepen, de slagpennen geel gerand. Keel wit, rest onder geel, de borst vaag olijf gestreept.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**IX.331.174**



**Spotted tody-flycatcher,**  
*Todiostrom maculatum maculatum*,  
Gevlekte schoffelsnavel  
9-10 cm (Goudhaan 9-10)

Kustvlakte

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Kop grijs met zwarte en witte kroonstrepen, een witte vlek boven de teugel. Van boven olijf, vleugels bruinzwart met vage strepen, slagpennen met gele randen. Staart bruinzwart met geelwitte buitenrand. Keel en borst wit met smalle zwarte strepen, buik geel, olijf gestreepte flanken. Iris geelachtig.  
Broedvogel.  
**IX.333.179**



**Common tody-flycatcher,**  
*Todiostrom cinereum cinereum*,  
Geelbuikschoffelsnavel  
9-10 cm (Goudhaan 9-10)  
Kustvlakte, beide savannes,  
Laaglandbos







Lange, brede, platte, zwarte snavel. Zwarte voorkroon, teugel en oogstreep; leigrijze achterkroon en mantel overgaand in olijf onderrug. Vleugels zwart, veren met gele randen en punten. Staart zwart, buitenste veren met witte einden. Van onder heldergeel. Iris geel tot wit.  
Broedvogel.  
**IX.334.181**














**Painted tody-flycatcher,**  
*Todiostrom pictum*,  
Witkeelschoffelsnavel  
9-10 cm (Goudhaan 9-10)


Kustvlakte, Laaglandbos

Lange, brede, platte, zwarte snavel. Glanzend zwarte kop, witte vlek boven teugel, lange witte snor, smalle gele nekband. Rest bovenzijde olijf, vleugels zwart met twee gele strepen en gele veerranden. Staart zwart met een olijf buitenrand. Keel witachtig met zwarte strepen, rest onder helder geel met zwarte strepen op de borst.  
Broedvogel.  
**IX.334.183**






	<p><b>Olivaceous flatbill,</b> <i>Rhynchoicyclus olivaceus guianensis</i>, Groene breedbektiran 15cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Brede, platte snavel. Grote, donker olijfgroene kop. Witte oogring om donker oog. Van boven donker olijf, vleugelveren beige of oker gerand (twee vage vleugelstrepen). Staart donker met lichte buitenrand. Keel bleek grijs of lichtgeel, borst olijfgrijs; buik en flanken lichtgeel, olijf gevlamd of gestreept. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.337.187</b></p>
 <p>Photo by Chan Robbins</p>	<p><b>Yellow-olive flycatcher,</b> <i>Tolmomyias sulphurescens cherriei</i>, Groenkapbreedbektiran 13-16cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, beide savannes, Laaglandbos</p>	<p>Olijfgrijze kroon, kleine witte vlek voor het oog, witte oogring, olijf oorstreek. Van boven olijfgroen, vleugel zwart met twee gele strepen en gele veerranden. Grijsgroene keel, borst olijf, olijfgroene flanken, buik dof geel. Snavel breed en plat. Broedvogel. <b>IX.338.190</b></p>
	<p><b>Yellow-margined flycatcher,</b> <i>Tolmomyias assimilis examinatus</i>, Spiegelbreedbektiran 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grote kop met vuilwitte "bril" (smalle oogring). Kroon olijf, nek en wang grijs met olijf waas. Vleugels donker. Opvallende gele randen aan grote dekveren en slagpennen, staart donker. Keel lichtgrijs, olijf borst en flanken, lichtgele buik. Snavel breed en plat. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.339.192</b></p>
	<p><b>Grey-crowned flycatcher,</b> <i>Tolmomyias poliocephalus sclateri</i>, Grijskruinbreedbektiran 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Witte streep voor oog. Kap grijs; van boven dof grijs. Vleugel zwart met twee gele strepen en gele veerranden. Staart donker olijf. Keel lichtgrijs, borst en flanken olijf, buik zeer lichtgeel. Snavel breed en plat. Broedvogel. <b>IX.339.193</b></p>
	<p><b>Yellow-breasted flycatcher,</b> <i>Tolmomyias flaviventris aurulentus</i> Geelbuikbreedbektiran 12-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Teugel okergeel. Effen olijfgroen van boven, vleugel en staart donker, twee geelachtige vleugelstrepen, vleugelveren geel gerand. Van onder helder geel. Snavel breed en plat. Broedvogel. <b>IX.340.194</b></p>
	<p><b>Cinnamon-crested spadebill,</b> <i>Platyrinchus saturatus saturatus</i>, Bruinkopbreedbektiran 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Overall</p>	<p>Zwarte, brede, platte snavel. Saai, bruinig; beige streep voor oog, kop roodbruin met oranje-rode, meestal verborgen, kroonvlek. Van boven donker roodbruin, ook de vleugel; een duidelijke donkere vlek aan de basis van de handpennen. Witte keel, olijfgroen op borst en flanken, iets gelere buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.340.195</b></p>

	<p><b>Golden-crowned spadebill,</b> <i>Platyrinchus coronatus gumia</i>, Geelkapbreedbektiran 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Zwarte, brede, platte snavel. Opvallende gezichtstekening, borstelharen om snavel, lichtbeige wenkbrauwstreep, oogring en oorstreek; zwartbruine teugel, streep achter het oog en streep onder het oog. Rest kop olijf; oranjevlekkige kroonvlek, zwart omrand, mediaan geel. Van boven, vleugel en staart olijf. Keel geelwit, onder helder geel, olijf was op borst. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.341.198</b></p>
	<p><b>White-crested spadebill,</b> <i>Platyrinchus platyrhynchos platyrhynchos</i>, Witkuifbreedbektiran 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Overall</p>	<p>Zeer brede, platte, zwarte snavel. Grote kop, stomp staartje. Kop grijs; half verborgen witte kroonstreep; beige vlek voor het oog. Roodachtig bruin van boven, vleugel en staart donkerbruin. Keel wit, borst en buik effen oker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.342.200</b></p>
	<p><b>Royal flycatcher (Amazonian royal flycatcher),</b> <i>Onychorhynchus coronatus coronatus</i>, Amazonekroontiran 15-18 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grote pluim aan achterhoofd, die meestal plat gehouden wordt. Opgestoken is het een grote, half-cirkelvormige waaier. Borstelharen om snavel. ♂: Waaier scharlaken met aan eind zwart en dan blauw. Van boven donkerbruin, stuit kaneelrood, vleugels met beige stipjes, staart kastanje-rood. Keel wit, rest onder beige, borst donker dwarsgestreept. Snavel lang, plat, tweekleurig, van binnen oranje. ♀: Scharlaken van kuif is geel of oranje. Broedvogel. <b>IX.345.202</b></p>
	<p><b>Bran-coloured flycatcher,</b> <i>Myiophobus fasciatus fasciatus</i>, Roesttiran 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Roodbruine kroon met, meestal verborgen, gele vlek, vuilwitte wenkbrauwstreep; zijkop, nek en bovenzijde roodbruin. Vleugels donkerbruin met twee brede beigewitte strepen, staart donkerbruin. Onderzijde wittig met fijne grijsbruine streping op de borst en de flanken. Broedvogel. <b>IX.348.212</b></p>
	<p><b>Whiskered flycatcher,</b> <i>Myiobius barbatus barbatus</i>, Geelstuittiran 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Grote ogen, lange borstelharen om snavel. Kap, nek, rug olijfgroen; meestal verborgen gele kroonvlek; geelwitte oogring, grijzer gezicht. <b>Stuit zwavelgeel</b>. Vleugel donkerbruin, staart lang en zwart. Keel vuilwit, borst grijs met olijf was, buik lichtgeel. Snavel breed. Broedvogel. <b>IX.351.215</b></p>
	<p><b>Ruddy-tailed flycatcher,</b> <i>Terenotriccus erythrurus erythrurus</i>, Roodstaarttiran 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Klein, roodbruin; grote, zwarte ogen; korte snavel, kroon puntig, borstelharen om snavel. Kop, nek, mantel olijfgrijs; voorhoofd oker, stuit kaneel. Donkere vleugel, veren breed kaneelrood gerand, staart roodbruin. Keel grijs, onder effen kaneelbeige, borst met olijf was. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.352.217</b></p>






	<p><b>Cinnamon tyrant,</b> <i>Neopipo cinnamomea helenae</i>, Kaneelmanakin 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Klein, grote ogen, geen borstelharen om de snavel. Grijs kroon met meestal verborgen gele vlek; dof grijze kopzijden, nek en rug; roodbruine stuit. Vleugels donker met brede roodbruine veerranden. Keel beige overgaand in kaneel aan de onderzijde. Snavel smal. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.352.218</b></p>
	<p><b>Cliff flycatcher,</b> <i>Hirundinea ferruginea</i> <i>ferruginea</i>, Zwaluw-tiran 16-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Lijkt op een zwaluw. Lange, brede puntsnavel; korte poten. Kap en bovenzijde zwartbruin, wang zwart-wit gevlekt; witachtige, korte wenkbrauwstreep. Vleugel zwartachtig met soms roodbruine vlekken. In vlucht slagpennen met roodbruine streep en zwarte punten. Staart van boven zwart en licht roodbruin van onder. Onderzijde effen kaneelrood. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.353.220</b></p>
	<p><b>Euler's flycatcher</b> <b>(Lawrence's flycatcher),</b> <i>Lathrotriccus euleri lawrencei</i>, Eulers tiran 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Overall</p>	<p>Saaï. Olijfbruine kroon, witachtige oogring; wang, nek en rug olijf, stuit bruin. Vleugel donker, twee lichtbeige strepen; arm- en schouderpennen beigebruin gerand; staart donker. Keel grijswit, borst olijfgrijs, buikkleur verloopt van geel naar wit. Iris donker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.354.221</b></p>
	<p><b>Fuscous flycatcher,</b> <i>Cnemotriccus fuscatus</i> <i>fumosus</i>, Vinktiran 14-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kap en bovenzijde effen bruin, witte wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Vleugels donker met twee brede beige strepen. Staart lang, donker met bruine rand. Keel witachtig, borst donkerder grijs, buik lichtgeel. Iris zwart. Broedvogel. <b>IX.356.227</b></p>
	<p><b>Olive-sided flycatcher,</b> <i>Contopus cooperi</i>, Sparrenpiewie 18-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag- en Hooglandbos</p>	<p>Een stevige vogel met een grote kop en een korte staart. Onduidelijke kuif. Bovenzijde grijs met een vaak verborgen witte vlek aan beide kanten van de onderrug. Keel en buikmidden wit, borst wat gestreept, zijden donker olijf. Vleugels en staart donker, binnenste slagpennen met witte randen. Migrant uit het noorden. <b>IX.367.243</b></p>
	<p><b>Tropical pewee,</b> <i>Contopus cinereus</i> <i>surinamensis</i>, Spix' piewie 13-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Puntige kroon met kleine kuif. Van boven grijs, lichtgrijs van onder, borst wat donkerder, keel wit. Iris donker, tweekleurige snavel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.369.250</b></p>

	<p><b>White-throated pewee,</b> <i>Contopus albogularis,</i> Witkeelpiewie 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kroon grijszwart; rest van de kop, de boven- en onderkant roetzwart. Onduidelijke wittige oogring. Vleugels bruinzwart. Keel wit, bovensnavel zwart, ondersnavel geel. Broedvogel. <b>IX.371.255</b></p>
	<p><b>Amazonian black-tyrant,</b> <i>Knipolegus poecilocercus,</i> Amazonemoortiran 12,7-13,5 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Man: Glanzend blauwzwart; vleugels bruinzwart, staart dof zwart. Vrouw: Van boven en de vleugels dof olijfbuin, Twee vleugelstrepen en randen van slagpennen bleek beige. Stuit en binnenvlaggen van staartveren kaneel, onder dof beigegeel met grijze streping, buikmidden effen bleekgeel. Status onbekend. <b>IX.377.268</b></p>
	<p><b>Rufous-tailed tyrant,</b> <i>Knipolegus poecilurus salvini,</i> Roodstaartmoortiran 15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Bovendelen asgrijs, vleugels bruingrijs, twee nauwelijks zichtbare vleugelstrepen, heel weinig rood of kaneel in staart. Witte buik en roodachtige anaalstreek. Status onbekend. <b>IX.378.271</b></p>
	<p><b>Drab water-tyrant</b> <i>Ochthornis littoralis,</i> Vale tapuittiran 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Zandkleurig van boven, stuit bleker, witachtige wenkbrauwstreep. Vleugels en staart donkerbruin. Van onder bleker. Oog donker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.387.288</b></p>
	<p><b>Pied water-tyrant,</b> <i>Fluvicola pica,</i> Bonte watertiran 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Kop wit met zwart achterhoofd, nek en mantel; rest van de rug zwart met witte vlekken. Witte V op mantel, stuit wit, vleugels zwart, staart zwart met smalle witte achterrand. Van onder wit. Oog donker, haaksnavel zwart. Broedvogel. <b>IX.387.290</b></p>
 	<p><b>White-headed marsh-tyrant,</b> <i>Arundinicola leucocephala,</i> Witkopwatertiran 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Kop en keel wit met een nogal ruige kuif, rest vogel zwartachtig bruin. Iris donker. ♀: Wit voorhoofd, wangen en onderzijde; bruin gevlekte borst en flanken. Bruingrijs van boven, donkere vleugels, zwarte staart. Broedvogel. <b>IX.388.293</b></p>













	<p><b>Grey monjita,</b> <i>Xolmis cinereus cinereus</i>, Grijze monjita 23 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Muisgrijs van boven; brede, witte streep boven teugel; smalle witte snor, daaronder bredere zwarte streep. Vleugels zwart met grote witte spiegel aan basis handpennen, dekveren wit gerand. Staart zwart met wit einde. Keel wit, borst asgrijs, buik wit. <b>Iris rood.</b> Broedvogel. <b>IX.393.304</b></p>
	<p><b>Long-tailed tyrant,</b> <i>Colonia colonus poecilonota</i>, Langstaarttiran ♂: 23-28; ♀: 18-22 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Zwart; kap asgrijs met zwarte strepen. Staart met verlengde middenveren die breder worden naar het einde toe. Onregelmatige witte strepen midden op de rug. Donker oog. ♀: Grijs, buik wit gevlekt, rugstrepen grijs. Broedvogel. <b>IX.405.331</b></p>
	<p><b>Piratic flycatcher,</b> <i>Legatus leucophaius leucophaius</i>, Piraattiran 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon zwartachtig met doorgaans verborgen gele vlek; brede witte wenkbrauwstreep die rondom de kop loopt; zwart masker, daaronder wit, dan zwarte snor. Van boven donker grijsbruin met lichtere randen aan de veren, bovenstaartdekveren roodachtig gerand. Vleugels bruinzwart met witte randen aan de dekveren en armpennen. Staart donkerbruin met roodachtige of gele rand. Keel wit; onderzijde geelwit, borst en flanken bruinachtig gestreept. Broedvogel. <b>IX.406.334</b></p>
	<p><b>Rusty-margined flycatcher,</b> <i>Myiozetetes cayanensis cayanensis</i>, Roestvleugeltiran 17-18 cm (Kwartel16-18)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte kap met doorgaans verborgen gele vlek; brede, witte wenkbrauwstrepen die raken op het voorhoofd en net <b>niet</b> in de nek; zwart masker. Van boven olijfbruin, de vleugels ook, meeste slagpennen roodbruin gerand. De staart bruin met een olijfkleurige rand. Broedvogel. <b>IX.406.335</b></p>
	<p><b>Dusky-chested flycatcher,</b> <i>Myiozetetes luteiventris septentrionalis</i>, Kortsnaveltiran 14-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Boven donker olijfbruin, kop donkerder, een meestal verborgen oranjegele kroonvlek. Keel witachtig met wat donkere strepen. Halsring en onderzijde helder geel, borst olijf gestreept en gevlamd. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.408.338</b></p>




	<p><b>Great kiskadee,</b> <i>Pitangus sulphuratus sulphuratus</i>, Grote kiskadie 21-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte kroon met doorgaans verborgen gele vlek, brede witte wenkbrauwring van voorhoofd tot nek, zwart masker. Van boven olijfgroen. Bovenstaartdekveren, staart- en vleugelveren kaneelrood gerand, slagpennen met donkere einden. Keel wit, onder helder geel. Snavel zwaar, recht, zwart. Broedvogel. <b>IX.408.340</b></p>
	<p><b>Lesser kiskadee,</b> <i>Philohydor lictor lictor</i>, Kleine kiskadie 15-18 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Zwarte kroon met half verborgen grote gele vlek, witte wenkbrauwstreep van voorhoofd tot ver in nek, zwart masker. Van boven olijf, vleugelveren met roodachtige randen. Staart grijsbruin met wat kaneelranden. Keel wit, onder helder geel. Snavel lang, slank en zwart. Broedvogel. <b>IX.409.341</b></p>
	<p><b>Yellow-throated flycatcher,</b> <i>Conopias parvus</i>, Geelkeeltiran 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Hooglandbos</p>	<p>Kroon zwart met grote gele vlek, brede witte wenkbrauwstreep als een ring om de kop, zwart masker. Van boven olijfgroen; vleugels donkerder, veerranden witachtig; staart donker grijsbruin. Onderzijde kanariegeel. Snavel lang en zwart. Broedvogel. <b>XI.411.343</b></p>
	<p><b>Streaked flycatcher,</b> <i>Myiodynastes maculatus maculatus</i>, Gestreepte tiran 20-23 cm (Spreeuw 19-22)115</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kaneelkleurige kroon met donkere strepen en doorgaans verborgen helder gele vlek, vuilwitte wenkbrauwstreep, zwart masker; vuilwitte wang, flink zwart gestreept. Rug bruin met donkerder strepen, staart kaneelrood met zwarte strepen. Van onder dof witachtig met zwavelgeel waas, donker gestreept. Broedvogel. <b>IX.414.350</b></p>
	<p><b>Streaked flycatcher,</b> <i>Myiodynastes maculatus solitarius</i>, Gestreepte tiran 20-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Savanne</p>	<p>Als bovenstaande ondersoort, maar: zwartere, meer uitgesproken streping; merendeels witte veerranden, een overheersend zwartachtige staart met slechts zeer smalle kaneelrode randen aan de veren. Migrant uit het zuiden. <b>IX.414.350</b></p>






	<p><b>Boat-billed flycatcher,</b> <i>Megarynchus pitangua pitangua</i>, Bootsnaveltiran 22-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte kroon met meestal verborgen gele vlek; brede witte, ringvormige wenkbrauwstreep, zwart masker. Van boven olijfbruin, vleugelveren met lichtere randen. Staart bruinachtig met kaneelrode randen. Witte keel, verder naar onder helder geel. Snavel zwaar, breed, lang, culmen gebogen, zwart. Broedvogel. <b>IX.415.351</b></p>
	<p><b>Sulphury flycatcher,</b> <i>Tyrannopsis sulphurea</i>, Zwaveltiran 19-20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop donkergrijs met verborgen gele kroonvlek; onduidelijke, lichter grijze wenkbrauwstreep; donkerder oogstreep. Van boven olijfbruin. Keel wittig met opzij grijze strepen, van onder helder geel met een olijf waas aan de zijkanten. Broedvogel. <b>IX.415.352</b></p>
	<p><b>Variegated flycatcher,</b> <i>Empidonomus varius rufinus</i>, Bonte tiran 18-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Zwarte kroon met vaak verborgen gele vlek. Bruine kop; brede, witte wenkbrauwstreep tot in nek; witte wangvlek; smalle, bruine snor. Van boven bruin, lichter gestreept; stuitveren met rode randen, vleugeldekveren wit gerand, slagpennen olijf. Staart donkerbruin, de veren zijn roodbruin gerand. Keel witachtig, verder van onder gelig met vage donkere strepen. Migrant uit het zuiden. <b>IX.416.353</b></p>
	<p><b>White-throated kingbird,</b> <i>Tyrannus albogularis</i>, Witkeelkoningstiran 20-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Lichtgrijze kop met meestal verborgen gelige kroonvlek, zwarte oogstreep. Van boven olijfgroen, vleugels zwartbruin met lichtere randen. Zwarte, gevorkte staart. Keel wit, onderzijde helder geel. Snavel groot, stevig, donker. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.419.356</b></p>
	<p><b>Tropical kingbird,</b> <i>Tyrannus melancholicus melancholicus</i>, Tropische koningstiran 18-24 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Grijze kop met oranje vaak verborgen kroonvlek, donker gezicht. Van boven olijfgrijs; vleugels donkerder, de veren grijs of wit gerand. Staart iets gevorkt, zwart. Witte keel, olijfgrijze borst, rest onder helder geel. Grote, zwarte snavel. Broedvogel. <b>IX.419.357</b></p>

	<p><b>Eastern kingbird,</b> <i>Tyrannus tyrannus</i>, Koningstiran 19-23 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kop zwart, verborgen oranje kroonstreep, vleugels bruinzwart, veren grijswit gerand. Staart zwart met een duidelijke witte eindband. Van onder wit met een grijs waas over de borst. Migrant uit het noorden. <b>IX.422.362</b></p>
	<p><b>Grey kingbird,</b> <i>Tyrannus dominicensis dominicensis</i>, Grijze koningstiran 21-25 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Van boven donkergrijs met een meestal verborgen gele, rode of oranje kroonvlek; donkere oogstreep. Vleugels zwart, veren wit gerand; staart gevorkt, zwart. Keel wit; verder onderzijde witachtig, geler naar buik toe. Snavel lang, groot, glanzend zwart. Migrant uit het noorden. <b>IX.423.363</b></p>
	<p><b>Fork-tailed flycatcher,</b> <i>Tyrannus savana monachus</i>, Vorkstaartkoningstiran ♀: 28-30; ♂: 37-41 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Zwarte kap tot over oog, doorgaans verborgen gele kroonvlek, bovenzijde lichtgrijs. Vleugels zwartbruin, veren grijs gerand. Staart erg lang en gevorkt, zwart met erg verlengde buitenste veren, aan basis wit gerand, soms gebogen of gedraaid. Hele onderzijde wit. Snavel zwart. ♀: Staart korter. Broedvogel. <b>IX.425.367</b></p>
	<p><b>Fork-tailed flycatcher,</b> <i>Tyrannus savana savana</i>, Vorkstaartkoningstiran ♀: 28-30; ♂: 37-41 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Als bovenbeschreven ondersoort, maar rug veel donkerder. Migrant uit het zuiden. <b>IX.425.367</b></p>
	<p><b>Greyish mourner,</b> <i>Rhytipterna simplex frederici</i>, Grijze treurtiran 20-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Effen grijs van boven, vleugels en staart met bruin waas, van onder lichter. Oog donkerrood, zwarte haaksnavel. ♀: Zij heeft bruinachtige vleugelveerranden. Broedvogel. <b>IX.426.368</b></p>
	<p><b>Pale-bellied mourner,</b> <i>Rhytipterna immunda</i>, Vaalbuiktreuriran 19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven olijfbruin, kroon en vleugels donkerder; twee onduidelijke, lichtgrijze vleugelstrepen, slagpennen roodbruin gerand. Bovenstaartdekveren bruin, staart met roodbruine randen. Van onder grijsig, buik gelig. Zwarte haaksnavel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.427.369</b></p>

	<p><b>Sirystes,</b> <i>Sirystes sibilator subcanescens,</i> Sirystestiran 18-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte kap tot aan het oog, gezicht en rug lichter; kleine kuif. Vleugels zwartachtig, veren grijs gerand. Staart zwartachtig, recht. Keel lichtgrijs, witter naar buik toe. <b>Stuit wit.</b> Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.427.371</b></p>
	<p><b>Dusky-capped flycatcher,</b> <i>Myiarchus tuberculifer tuberculifer,</i> Monnikskaptiran 15-17 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Donkere kap tot aan oog, oorstreek iets lichter, rug olijfgrijs, vleugels bruin met twee vage strepen. Staart bruin. Keel en borst grijs, helder gele buik. Donker oog. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.432.377</b></p>
	<p><b>Swainson's flycatcher,</b> <i>Myiarchus swainsoni swainsoni,</i> Swainsons tiran 19,5-29 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Roodachtige ondersnavel, bovensnavel zwart. Bleek olijfgrijs van boven met donkerder kop, keel en borst bleek grijs, buik bleek geel. Buitenvlag van buitenste slagpen smal licht gerand. Twee onduidelijke vleugelstrepen. Staart zwartig met witte buitenste staartveren. Migrant uit het zuiden. <b>IX.432.378</b></p>
	<p><b>Swainson's flycatcher,</b> <i>Myiarchus swainsoni albimarginatus (???)</i>, Swainsons tiran (Spreeuw 19-22) 19,5-29 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p><i>Albimarginatus</i> is een niet erkende ondersoort (volgens het Handbook of the Birds of the World), mogelijk een overgangsvorm tussen de ondersoorten <i>phaeonotus</i> en <i>pelzelni</i>. Ik heb er geen beschrijving van kunnen vinden. Hij heeft in ieder geval een geheel zwarte snavel. Het plaatje hiernaast vond ik op internet onder de naam <i>Myiarchus pelzelni albomarginatus</i>. Er werd niet bij vermeld waar de foto genomen was. Broedvogel. <b>IX.432.378</b></p>
	<p><b>Pelzel's flycatcher,</b> <i>Myiarchus swainsoni pelzelni,</i> Swainsons tiran 19,5-29 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p><i>Pelzelni</i> is olijfgroen van boven en zijn keel en onderdelen zijn bleker dan van de nominaat <i>swainsoni swainsoni</i>. Broedvogel. <b>IX.432.378</b></p>

	<p><b>Short-crested flycatcher,</b> <i>Myiarchus ferox ferox</i>, Kortkuiftiran 18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Mini-kuifje. Van boven, inclusief kop, rookbruin, vleugels effen donkerbruin met licht gerande veren. Keel en borst grijs, van onder geel. Donker oog. Broedvogel. <b>IX.434.381</b></p>
	<p><b>Brown-crested flycatcher,</b> <i>Myiarchus tyrannulus tyrannulus</i>, Cayennetiran 20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien</p>	<p>Grijsbruin. Geen contrast tussen kop en rug. Gezicht iets grijzer. Vleugels zwartachtig met twee witte strepen, handpennen roodbruin gerand, overige slagpennen met een witte rand. Staart donker, de veren met roodbruine randen. Keel en borst lichtgrijs, de buik lichtgeel. Iris donker. Broedvogel. <b>IX.438.388</b></p>
	<p><b>Large-headed flatbill,</b> <i>Ramphotrigon megacephalum venezuelense</i>, Wenkbrauwbredebektiran 12,5-13,2 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Basaal derde deel van ondersnavel vleeskleurig. Van boven olijfbruin, smalle wenkbrauwstreep en oogring wit. Vleugels donkerbruin met twee kaneelbeige strepen, binnenste slagpennen kaneelbeige gerand. Staart donkerbruin, de veren smal kaneel gerand. Keel geelwit, borst olijf met een oker waas en onduidelijke gele streping, buik bleekgeel. Status onbekend. <b>IX.443.397</b></p>
	<p><b>Rufous-tailed flatbill,</b> <i>Ramphotrigon ruficauda</i>, Roodstaartbredebektiran 15-16 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Platte, zwarte snavel. Van boven donker olijf, oogring en streep voor oog witachtig; vleugel donker met twee brede, roodbruine strepen; randen van slagpennen roodbruin. Staart helder bruinrood. Van onder grijsachtig olijf met met lichtgele strepen, de buik lichtgeel met olijf strepen aan de zijkant. Broedvogel. <b>IX.443.398</b></p>
	<p><b>Cinnamon attila,</b> <i>Attila cinnamomeus</i>, Kaneelattila 20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwarte snavel. Rijk roodbruin van boven, zwarte slagpennen, donkere dekveren met brede, rode randen. Onder kaneelrood, geler naar buik toe. Broedvogel. <b>IX.444.401</b></p>

		<p><b>Bright-rumped attila,</b> <i>Attila spadiceus spadiceus</i>, Goudstuitattila 17-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p><b>Polymorf.</b> Altijd twee vleugelstrepen, gele stuit, gestreepte borst, rose ondersnavel. Morf 1: Kop en rug donker olijf, gele streep voor het oog, <b>stuit helder geel</b>, staart bruinrood, vleugels donker met twee rode strepen. Keel en borst olijf met smalle, gele strepen, witte buik, lichtgele anaalstreek. Morf 2: Het olijf is hier roodbruin, geen streep voor het oog, de <b>stuit oranjegeel</b>, de buik kaneel. Morf 3: Rug ook olijf, maar het overige olijf van morf 1 is hier grijs, geen kopstreep, grijze vleugelstrepen.</p> <p>Broedvogel. <b>IX.445.406</b></p>
		<p><b>Cinereous mourner,</b> <i>Laniocerca hypopyrra</i>, Grauwe treurtiran 20-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Donker oog, oranje oogring, donkere haaksnavel; grijs, van onder lichter, twee rijen kaneelkleurige vlekken op de vleugels, (vaak verstopte) oranje of gele pluimen bij vleugelbocht. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.446.407</b></p>
		<p><b>Black-crowned tityra,</b> <i>Tityra inquisitor erythrogenys</i>, Zwartkruintityra 17-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Zwarte kap tot ver over het oog. Van boven lichtgrijs, grootste deel vleugels zwart, staart zwart. Van onder wit. ♀: Beige voorhoofd, zijkant kop roestkleurig, zwarte pet, rug donkerder grijs met bruine strepen en zwarte vlekken. Onder lichtgrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.449.410</b></p>
		<p><b>Black-tailed tityra,</b> <i>Tityra cayana cayana</i>, Zwartstaarttityra 20-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Zwarte kap tot onder oog, kale rode huid om oog en dito teugel. Van boven zilvergrijs, vleugels grotendeels zwart, staart zwart. Van onder wit met wat zwarte strepen op de borst. Stevige haaksnavel, rood met zwarte punt. ♀: Bruine kap, vuilgrijs van boven met donkere strepen, borst donker gestreept. Broedvogel. <b>IX.450.411</b></p>
		<p><b>Green-backed becard,</b> <i>Pachyramphus viridis griseigularis</i>, Groenrugbekarde 14,5-15 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Man: Glanzend zwarte kroon met witte teugel en olijfgele wangen; van boven helder olijf, zwarte band op de buitenste slagpennen. Keel grijs, weinig opvallende gele borstband, buik wittig. Vrouw: Doffer, met een olijf kroon, roodbruine middelste dekveren; vrijwel geen gele borstband. Broedvogel. <b>IX.453.413</b></p>





	<p><b>Cinereous becard,</b> <i>Pachyramphus rufus rufus</i> Grijze bekarde 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Wit voorhoofd en teugel, zwarte vlek voor oog, zwarte kap tot oog. Van boven parelgrijs; vleugels zwart, de veren met witte randen; staart grijs. Keel wittig, onder lichtgrijs. Snavel zwart. ♀: Van boven kaneelrood, teugel grijs, gezicht beigekaneel, vleugels kaneelrood; slagpennen zwart, roodbruin gerand; staart kaneel. Keel kaneelbeige, borst donkerder, onder wit. Broedvogel. <b>IX.455.417</b></p>
	<p><b>White-winged becard,</b> <i>Pachyramphus polychopterus tristis</i>, Witvleugelbekarde 14-16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Kap (tot oog) blauwzwart geschubd. Bovenzijde zwart, stuit donkergrijs. Vleugels zwart, twee witte vleugelstrepen. Staart lang, getrapt, zwart met witte punt. Onder variabel donkergrijs. Snavel zwart. ♀: Van boven olijfbruin, kroon donkerder. Vleugels zwart met een kaneel streep en een witte streep. Staart zwart met kaneel eindvlekjes. Van onder bleekgeel met olijf waas. Broedvogel. <b>IX.456.420</b></p>
	<p><b>Black-capped becard,</b> <i>Pachyramphus marginatus nanus</i>, Zwartkapbekarde 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>♂: Kap tot oog, blauwzwart, geschubd. Mantel donkergrijs gemengd met zwart, rug en stuit grijs. Vleugels en staart zwart, twee witte vleugelstrepen, witte vlekken op de schouder, binnenste slagpennen wit gerand. Gezicht en onderkant lichtgrijs. Dat lichtgrijs verloopt tot wit op de buik. ♀: Petje roodbruin, dat gaat over in het groen van de bovenzijde; een witte vlek voor het oog. Vleugels zwart met twee kaneel strepen. Staart donker, met een subterminale zwarte band en kleine kaneel punten. Van onder lichtgeel; olijf gewolkt in het gezicht, op de borst en de flanken. Waarschijnlijk broedvogel. <b>IX.459.421</b></p>
	<p><b>Glossy-backed becard,</b> <i>Pachyramphus surinamus</i>, Cayennebekarde 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Zwarte kap tot onder oog, glanzend blauwzwart van boven, helder wit onder. ♀: Kap tot boven oog, kastanje met zwarte vlekken, lichte vlek voor het oog, lichtgrijze nek en rug, stuit wit. Vleugels zwart met twee kaneelrode banden en dito veerranden. Zwarte staart met witte einden aan buitenveren. Broedvogel. <b>IX.460.424</b></p>
	<p><b>Pink-throated becard,</b> <i>Pachyramphus minor</i>, Roodkeelbekarde 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Zwart met niet altijd zichtbare rode vlek op de keel, zwarte haaksnavel. ♀: Kap (tot oog), nek en rug grijsbruin; stuit grijsrood. Vleugels en staart roodbruin. Van onder beige. Broedvogel. <b>IX.461.428</b></p>













Familie: *Hirundinidae*, Swallows and Martins, Zwaluwen

Kleine tot middelgrote, zich in de vlucht voedende vogels met lange vleugels en een gestroomlijnd lijf; bij veel soorten is de staart gevorkt.

	<p><b>Collared sand martin,</b> <i>Riparia riparia riparia</i>, Oeverzwaluw 12 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven grijsbruin, ondiep gevorkte staart; onder wit met een brede, bruine borstband. Overwinteraar uit het noorden. <b>IX.647.14</b></p>
	<p><b>White-winged swallow,</b> <i>Tachycineta albiventer</i>, Witbuikzwaluw 14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Voorhoofd tot en met rug glanzend blauwgroen, stuit wit. Vleugels zwart met grote witte vlek; staart zwart, ondiep gevorkt. Van onder wit. Broedvogel. <b>IX.652.23</b></p>
	<p><b>Purple martin,</b> <i>Progne subis subsp. ???</i>, Purperzwaluw 19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Bescheiden zwaluwstaart. Man: Uniform blauwzwart zowel onder als boven. Vrouw: Lichte buik; keel en borst grijzig, vaak met een onduidelijke lichtere nekstreep. Migrant uit het noorden. <b>IX.655.26</b></p>
	<p><b>Caribbean martin,</b> <i>Progne dominicensis</i>, Caribische purperzwaluw 18-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Man: Grotendeels glanzend staalblauw; vleugels en staart zwart, staart bescheiden gevorkt; lage borst en abdomen wit; ondervleugel grijsbruin. Vrouw: Doffer, meer grijsbruin, wat bleker op de keel. Keel, borst en flanken grijs. Migrant uit het noorden. <b>IX.656.28</b></p>
	<p><b>Grey-breasted martin,</b> <i>Progne chalybea chalybea</i>, Grijsborstpurperzwaluw 16-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Overall</p>	<p>Van boven glanzend staalblauw; vleugels en staart zwart, staart iets gevorkt. Keel en zijkant borst grijsbruin, daaronder wit met zwarte streepjes. Broedvogel. <b>IX.656.30</b></p>
	<p><b>Southern martin,</b> <i>Progne elegans</i>, Patagonische purperzwaluw 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Man: Donker glanzend staalblauw, vleugels en staart zwarter, staart diep gevorkt. Vrouw: Doffer van boven, donkerbruin van onder, geschubd. Migrant uit het zuiden. <b>IX.657.33</b></p>

		<p><b>Brown-chested martin,</b> <i>Progne tapera tapera,</i> Bruinborstzwaluw 16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop en bovenzijde zandbruin, vleugels en staart donkerder, staart iets gevorkt. Van onderen wit met een onduidelijke bruine borstband. Onderstaartdekveren lang en wit. Migrant uit het zuiden. <b>IX.657.34</b></p>
	<p><b>Blue-and-white swallow,</b> <i>Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca,</i> Blauw-witte zwaluw 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kop en bovenzijde glanzend staalblauw. Vleugels en staart zwartachtig, staart beetje gevorkt. Van onderen wit, aan de zijanten wat grijzer. Onderstaartdekveren zwart. Migrant uit het zuiden. <b>IX.659.36</b></p>	
	<p><b>White-banded swallow,</b> <i>Atticora fasciata,</i> Witbandzwaluw 15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Diep gevorkte staart. Glanzend blauwzwart. Brede witte borstband. Broedvogel. <b>IX.660.40</b></p>	
	<p><b>Black-collared swallow,</b> <i>Atticora melanoleuca,</i> Zwartkraagzwaluw 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Bovendelen glanzend blauwzwart, onderdelen wit, brede band over borst en anusstreek blauwzwart. Vleugels en staart bruinzwart, staart lang, diep gevorkt. Broedvogel. <b>IX. 660.41</b></p>	
	<p><b>White-thighed swallow,</b> <i>Neochelidon tibialis griseiventris,</i> Witflankzwaluw 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Van boven glanzend bruinzwart met een donkergroen waas, stuit bleek asgrijs. Vleugels en staart bruinzwart. Van onder asgrijs, anusstreek zwartachtig. Witte dijen. Status onbekend. <b>IX.661.42</b></p>	
	<p><b>Southern rough-winged swallow,</b> <i>Stelgidopteryx ruficollis ruficollis,</i> Zuid-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Donkergrijsbruin, vleugels en staart donkerder, geen vorkstaart. Keel kaneel, verder van onderen grijsbruin maar buik witachtig en onderstaartdekveren wit. Broedvogel en migrant uit het zuiden. <b>IX.662.44</b></p>	

	<p><b>Barn swallow (American barn swallow),</b> <i>Hirundo rustica erythrogaster</i>, Boerenzwaluw 18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Diep gevorkte staart. Voorhoofd roodbruin, van boven glanzend staalblauw, vleugels en staart zwart. Witte vensters in staartbasis. Keel roodbruin, blauwe vlekken aan weerskanten van de borst. <b>Van onderen lichter roodbruin</b>, ook alle dekveren. Overwinteraar uit het noorden. <b>IX.665.46</b></p>
	<p><b>Cliff swallow,</b> <i>Petrochelidon pyrrhonota</i> <i>subsp. ???</i> Amerikaanse klifzwaluw 13-15 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Marien, Laaglandbos</p>	<p>Roestkleurige of beige stuit, rechte staart. Wit tot beige voorhoofd, zwarte teugel, glanzende, diep blauwe kroon, bleek grijsbruine nek; mantel en rug glanzend diep blauw, witte strepen op de mantel, vleugels en staart bruinzwart. Wangen en keel kastanje, zwarte vlek op en bovenborst; bovenborst en zijden grijsbruin, rest onderdelen witachtig. Migrant uit het noorden. <b>IX.683.81</b></p>
<p><b>Familie: Motacillidae, Pipits and Wagtails, Piepers en Kwikstaarten</b></p>		
<p>Klein tot middelgrote, meest bodem bewonende zangvogels met een korte hals, lange staart, lange poten en tenen; veren pak meest bruin, vaak gestreept, sommige soorten zwart en wit, sommige geel of oranje.</p>		
	<p><b>Yellowish pipit,</b> <i>Anthus lutescens lutescens</i>, Gele pieper 13 cm (Huisemus14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Nogal lange rose poten. Van boven beige en zwart gestreept bruin; staart donker met witte buitenste staartveren. Van onder beigegeel, slijt tot witter, met, vaak zwakke, donkere borststrepen. Broedvogel. <b>IX.759.25</b></p>
<p><b>Familie: Troglodytidae, Wrens, Winterkoningen</b></p>		
<p>Kleine, meest insectenetende vogels met een fijn gepunte, vaak gebogen snavel; staart varieert van lang en getrapt tot extreem kort; meestal grijs en bruin, vaak met roodbruine tinten.</p>		
	<p><b>Coraya wren,</b> <i>Thryothorus coraya coraya</i>, Corayawinterkoning 15 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Gezicht zwart met witte streepjes, witte wenkbrauwstreep, kroon zwartbruin. Van boven roodbruin, staart bruinzwart met grijsbruine dwarsstrepen. Keel en bovenborst wit, onderborst beige, naar buik toe geleidelijk donkerder. Onderstaartdekveren roodbruin met zwarte dwarsstrepen. Broedvogel. <b>X.423.39</b></p>
	<p><b>Buff-breasted wren,</b> <i>Thryothorus leucotis</i> <i>albipectus</i>, Witoorwinterkoning 14-15 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Witte wenkbrauwstreep, bruine streep door oog, oorstreek grijsbruin met witachtige vlekjes. Kroon en bovenzijde effen grijsbruin, stuit oranjebruin, vleugels zwart gebandeerd, staart roodbruin met zwarte dwarsstrepen. Keel vuilwit, borst beige, buik kaneelkleurig. Broedvogel. <b>X.429.54</b></p>

	<p><b>Southern house wren,</b> <i>Troglodytes musculus clarus,</i> Zuidelijke huiswinterkoning 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>Gezicht beigebruin met donkerder streepjes, vage wenbrauwstreep, kroon en rug grijsbruin, stuit roodbruin. Vleugels bruin met donkere dwarsstrepen; staart roodbruin, donker gebandeerd. Van onder licht beigebruin, donkerder naar onderen toe.</p> <p>Broedvogel. <b>X.435.62</b></p>
	<p><b>White-breasted wood-wren,</b> <i>Henicorhina leucosticta leucosticta,</i> Boswinterkoning 10-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Zwarte oogstreep, lange witachtige wenbrauwstreep, gezicht en hals zwartig met wittige vlekjes, kroon en nek zwart. Van boven warm bruin, vleugels vaag gebandeerd; staart kort, roodbruin, met smalle dwarsstrepen. Keel en borst wit, borstzijanten grijs, buik okerbruin.</p> <p>Broedvogel. <b>X.442.76</b></p>
	<p><b>Wing-banded wren,</b> <i>Microcerculus bambla bambla,</i> Witbandwinterkoning 12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Gehele bovenzijde donkerbruin, witte vleugelstreep, daarvoor witte vlekjes; staart erg kort, zwart. Keel grijs, borst grijsbruin geschubd; buik bruin, vaag gebandeerd.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel. <b>X.446.81</b></p>
	<p><b>Musician wren,</b> <i>Cyphorhinus arada arada,</i> Orpheuswinterkoning 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd roodbruin overgaand in kastanje kroon, streep achter oog wit, oorstreek oranjebruin. <b>Brede bruinzwarte nekkraag met witte strepen.</b> Van boven bruin, vleugels en staart smal donker gebandeerd. Keel en borst oranjebruin, scherpe grens met lichtbeige buik. Flanken en onderbuik oker.</p> <p>Broedvogel. <b>X.447.84</b></p>
	<p><b>Donacobius,</b> <i>Donacobius atricapilla atricapilla,</i> Zwartkopdonacobius 22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kop en bovenzijde glanzend roetzwart; rug met een bruin waas, stuit olijfbruin. Witte vlek op de basis van de handpennen, staartveren zwart met een witte punt. Van onderen beigebruin. Fel geel oog, snavel zwart.</p> <p>Broedvogel. <b>X.447.85</b></p>

Familie: *Mimidae*, **Mockingbirds and Thrashers**, Spotlijsters

Middelgrote, lijsterachtige vogels met korte vleugels, lange poten en een lange staart; meestal onopvallend gekleurd: grijs of bruin, met wat wit of roodbruin.



**Tropical mockingbird,**  
*Mimus gilvus gilvus*,  
Tropische spotlijster  
23-26 cm (Dodaars 23-29)  
**Suriname en Frans Guiana**  
Kustvlakte, Noordelijke  
savanne

Saaï, grijs. Korte, rechte snavel. Vage lichte wenkbrauwstreep, donkergrijze oogstreep. Kroon en bovenkant effen grijs, twee smalle vleugelstrepen, vleugels en staart zwart, buitenste staartveren met wit einde. Van onderen wit, borst met grijs waas. Witachtige ondervleugel. Iris gelig.  
Broedvogel.  
**X.485.11**



**Chalk-browed mockingbird,**  
*Mimus saturninus saturninus*,  
Camposspotlijster  
23,5-26 cm (Dodaars 23-9)  
  
Zuidelijke savanne

Nogal tam. Van boven grijsbruin met donkerder vlekken; een witte "krijt"streep boven het oog en een zwartige oogstreep; de staart is lang met brede witte hoeken. Van onder witachtig, maar dat kan roder lijken door stof.  
Waarschijnlijk broedvogel.  
**X.487.15**

Familie: *Turdidae*, **Thrushes**, Lijsters

Kleine tot middelgrote vogels met een tamelijk sterke snavel, meest een middellange staart; de kleuren variëren van dof grijs of bruin tot zwart en van effen tot gevlekt en gebandeerd; sommige soorten fel gekleurd.



**White-throated thrush**  
**(Grey-flanked thrush),**  
*Turdus albicollis phaeopygus*,  
Witneklijster  
21-26 cm (Dodaars 23-29)  
  
Laag-, Hooglandbos

Kop en bovenzijde zeer donker bruin, oogring geel. Zwart gestreepte witte keel, daaronder witte halve maan. Grijs borst, witte buik.  
Broedvogel.  
**X.663.65**



**Black-billed thrush,**  
*Turdus ignobilis arthuri*,  
Zwartsnavellijster  
22-24 cm (Dodaars 23-29)  
  
Noordelijke savanne

Donkerbruin van boven. Grijs gestreepte, witte keel; grijze borst en flanken, middenbuik wit. Zwarte snavel en poten.  
Broedvogel.  
**X.664.68**







**Pale-breasted thrush,**  
*Turdus leucomelas albiventer*,  
Vaalborstlijster  
  
23-27 cm (Dodaars 23-29)  
  
Kustvlakte, Noordelijke  
savanne

Bovenzijde en kop grijs, oorstreek met witte streepjes. Witachtige keel met vage, bruine strepen, borst en flanken grijsbeige, buik witachtig. Oranje ondervleugeldekveren, snavel groengeel.  
Broedvogel.  
**X.665.70**

	<p><b>Cocoa thrush,</b> <i>Turdus fumigatus fumigatus,</i> Cacaolijster 22-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Van boven vosbruin, van onder lichter. Vaag donker gestreepte, beigewitte keel; onderbuik wit. Ondervleugeldekveren oranje, snavel en poten bruingrijs. Broedvogel. <b>X.667.76</b></p>
	<p><b>Spectacled thrush,</b> <i>Turdus nudigenis nudigenis,</i> Naaktooglijster 23-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Van boven olijfbruin, van onderen lichter. Donker gestreepte witte keel, buik witachtig. Brede oranjegele oogring. Snavel geel, poten olijf. Broedvogel. <b>X.671.79</b></p>
 	<p><b>Pale-eyed thrush,</b> <i>Turdus leucops,</i> Taczanowski's lijster 18-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Man: Geheel glanzend blauwzwart, iris lichtblauw, geen oogring, snavel oranje, poten geel. Vrouw: Van boven donker olijfbruin, vleugels en staart donkerder. Keel, borst en zijden bruin, lichter dan de rug, zijkant van het lijf iets roodachtig, rest van onderkant bleek grijs. Iris bruin, snavel zwart. Status onbekend. <b>X.672.85</b></p>
 	<p><b>Black-hooded thrush,</b> <i>Turdus olivater roraimae,</i> Kapucijnerlijster 23-24 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kop en keel zwart, niet al te duidelijk afgescheiden van de rest van het lichaam. Rug olijfgrijs. Onder licht beigegrijs, keel olijfbruin met zwarte strepen. Snavel, poten en smalle oogring geel. Het vrouwtje heeft geen zwarte kap en een zwarte snavel, beige vlekjes op de keel en een lichtere buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>X.677.95</b></p>
	<p><b>Rufous-brown solitaire,</b> <i>Cichlopsis leucogenys gularis,</i> Roodbruine solitaire 20-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Van boven roodbruin. Keel oranjerood, zijden, het lagere deel van de hals en de borst oranjebeige met een olijf waas, buik grijzig, anaalstreek oker. Korte, brede snavel, korte poten. Waarschijnlijk broedvogel. <b>X.697.138</b></p>
	<p><b>Grey-cheeked thrush,</b> <i>Catharus minimus subsp.???</i> Grijswangdwerglijster 17-18,5 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven, vleugels en staart olijf. Kin wit, wangen <b>zonder</b> een beige waas, keel en borst met grote zwarte vlekken in rijen. Zijden grijs, buikmidden en onderstaartdekveren wit. Snavel donker met onder een rose basis. Migrant uit het noorden, <b>X.702.150</b></p>


**Familie: *Poliptilidae*, Gnatcatchers, Muggenvangers**

Erg kleine insekteneters met een slanke, puntige snavel en een lange, getrapte staart, meestal met een wit einde of een witte rand; veren overwegend grijsig, bij de meeste soorten zit er wat zwart op de kop van de man in broedkleed; een paar soorten hebben een erg lange, slanke snavel; een nogal korte, overeind staande staart en deze soorten zijn bruingrijs.

	<p><b>Collared gnatwren,</b> <i>Microbatas collaris torquatus</i>, Zwartborstmuggensluiper 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Lange, slanke snavel en opgestoken staart. Van boven bruin; witte wenkbrauwstreep, wang en keel. Zwarte oog- en snorstreep. Vleugels olijfbroin. Van onder roomwit met een brede, zwarte borstband; olijfbroine flanken en anaalstreek. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XI.369.1</b></p>
	<p><b>Long-billed gnatwren,</b> <i>Ramphocaenus melanurus albiventris</i>, Zwartstaartmuggensluiper 12-13 cm (Huisman 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Erg lange, dunne snavel, steekt staart omhoog of gaat er mee heen en weer. Beige oogstreep, witte oogring, Wang wit, halszijden lichtbeige. Witte keel met donkere vlekken, onder beige, flanken grijs. Van boven bruin; staart getrap, zwartachtig, buitenveren met een wit einde. Broedvogel. <b>XI.369.3</b></p>
	<p><b>Tropical gnatcatcher,</b> <i>Poliptila plumbea plumbea</i>, Amazonemuggenvanger 10-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Spitse haaksnavel. ♂: Glanzend zwarte kap tot aan oog contrasterend met grijsblauwe nek, rug en stuit. Slagpennen zwart, grijs gerand. Schouderpennen wit gerand. Staart zwart, buitenzijde wit. Onder wit, grijs getint op borst en aan de zijkanten. ♀: Kap even grijsblauw als de bovenzijde. Broedvogel. <b>XI.373.10</b></p>
	<p><b>Guianan gnatcatcher,</b> <i>Poliptila guianensis</i>, Guyanamuggenvanger 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Witte wenkbrauwstreep vanaf snavel, witte oogring. Kop, rug en borst muiskgrijs. Vleugels zwart, grijs gerand. Staart zwart met witte buitenkant. Keel en buik wit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XI.374.12</b></p>

**Familie: *Corvidae*, Crows, Kraaien**

Middelgrote tot grote vogels met een sterke snavel, stevige poten; veel soorten zwart, grijs of zwart/wit, vaak met metaalglans; of ze zijn groen, geel, blauw, violet of bruin.

	<p><b>Cayenne jay,</b> <i>Cyanocorax cayanus</i>, Cayennegaai 33 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Op voorhoofd een korte kuif van stijve veren. Voorkroon, gezicht, en hals zwart, in een punt uitlopend op de borst. Achterkroon en nek wit met een blauw waas. Een witte vlek boven het oog, een tweede eronder en een snorvlek. Rug, vleugels en staart indigo. Staart met wit einde. Onder gelig wit. Ondervleugel met zwarte slagpennen en witte dekveren. Iris bleek. Broedvogel. <b>XIV.583.31</b></p>
--	---	--

**Familie: *Passeridae*, Old World Sparrows, Mussen**

Een familie uit de Oude Wereld. De huismus is van daar geïmporteerd.



**House sparrow,**  
*Passer domesticus domesticus*,  
Huisumus  
16-18 cm  
Kustvlakte

Stevige vogel met een grote kop en een dikke snavel. Zwaar met zwart gestreepte bruine mantel. Man: Zwarte bef en teugel en zwart rond oog. Kruin grijs en daaronder bruin. Halszijden wittig, wangen grijs. Brede witte vleugelstreep. Vrouw: Duidelijke vuilbeige wenkbrauwstreep. Broedvogel  
**XIV.793.2**

**Familie: *Vireonidae*; Vireos; Vireo's**

Kleine vogels met een korte, robuuste snavel die aan de punt enigszins gehaakt is.



**(South American) Rufous-browed peppershrike,**  
*Cyclarhis gujanensis gujanensis*,  
Roodbrauwpeperklauwier  
14-16 cm (Huisumus 14-16)

Laaglandbos, Zuidelijke savanne

Kop grijs, wenkbrauwstreep vanaf snavel: kastanje. Bovenzijde en staart olijfgroen. Keel en borst citroengeel, buik lichtgrijs. Iris oranjegeel tot rood. Haaksnavel tweekleurig. Waarschijnlijk broedvogel.  
**XV.415.1**



**Slaty-capped shrike-vireo,**  
*Vireolanius leucotis leucotis*,  
Grijskapklauwievireo  
14-15 cm (Huisumus 14-16)

Laaglandbos

Kroon blauwgrijs; voorhoofd, wenkbrauwstreep en vlek onder oog geel; oogstreep zwart, snorstreep grijs, er tussenin wit. Van boven en staart olijfgroen. Onderzijde citroengeel. Waarschijnlijk broedvogel.  
**XV.417.6**



**Red-eyed vireo,**  
*Vireo olivaceus vividior*,  
Roodoogvireo  
14-16 cm (Huisumus 14-16)

Kustvlakte, Laag-,  
Hooglandbos, Zuidelijke savanne

Lichtgrijze kroon met zwarte rand, brede witte wenkbrauwstreep, zwarte oogstreep, oorstreek groenig. Nek en bovenzijde groen, vleugels donkerder, staart groen. Onder grijswit. Iris donkerrood. Broedvogel.  
**XV.430.33**








**Black-whiskered vireo,**  
*Vireo altiloquus altiloquus*,  
Baardvireo  
15-16,5 cm (Huisumus 14-16)

Noordelijke savanne, Laag-,  
Hooglandbos


Grijze kap contrasteert met olijf rug. Duidelijke beige wenkbrauwstreep met zwarte rand boven en onder. Smalle zwarte snorstreep. Migrant uit het noorden.  
**XV.432.36**




	<p><b>Lemon-chested greenlet,</b> <i>Hylophilus thoracicus</i> <i>griseiventris</i>, Geelborstvireo 12 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd olijf, kroon grijs, gezicht groenachtig. Bovenzijde en staart groen. Keel grijswit, borst geel, buik lichtgrijs. Ondervleugeldekveren citroengeel. Iris strogeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XV.435.40</b></p>
	<p><b>Ashy-headed greenlet,</b> <i>Hylophilus pectoralis</i>, Grijskopvireo 12 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>Kop grijs; wenkbrauwstreep en wang iets lichter. Bovenzijde groen. Keel wit met grijze vlekjes, borst groengeel, buik wit. Broedvogel. <b>XV.436.42</b></p>
	<p><b>Tepui greenlet,</b> <i>Hylophilus sclateri</i>, Tepuivireo 12 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kroon en nek blauwgrijs, scherp contrasterend met de olijfgroene rug, voorhoofd en teugel beige; vleugels en staart grijs. Keel wit, borstband lichtgeel, flanken dof bleekgroen, rest onder wit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XV.436.43</b></p>
	<p><b>Buff-cheeked greenlet,</b> <i>Hylophilus muscicapinus</i> <i>muscicapinus</i>, Bruinwangvireo 12 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kopzijden en wenkbrauwstreep oranjebruin, voorhoofd grijsbruin, kroon en nek blauwgrijs. Bovenzijde groen, slagpennen grijszwart met brede groene randen, staart groen. Keel vuilwit, borst oranjebruin, buik grijswit. Donker oog. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XV.437.48</b></p>
	<p><b>Tawny-crowned greenlet,</b> <i>Hylophilus ochraceiceps</i> <i>luteifrons</i>, Okerkapvireo 11-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Voorhoofd geelbeige, kroon olijf, oorstreek grijs. Bruingroen van boven, staart bruin. Keel wit met grijze vlekjes; borst oker, verlopend naar geel op middenbuik, geelbruin aan de zijkanten. Anaalstreek en ondervleugeldekveren beigebruin. Oog donker. Broedvogel. <b>XV.438.51</b></p>









**Familie: *Parulidae*; New World Warblers; Amerikaanse zangers**



Kleine tot erg kleine vogels, de meeste met een korte en nogal slanke snavel; staart nogal kort tot middellang en vaak getrapt; vaak helder gekleurd, de tropische soorten zijn relatief saai.





	<p><b>Tropical parula,</b> <i>Parula pitiayumi roraimae</i>, Maskerparulazanger 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kop en bovenzijde blauwgrijs met zwarte teugel en oorstreek. Olijfgroene vlek op de mantel en twee witte vleugelstrepen. Witte vlek in de buitenstaart. Keel en borst oranje, buik geel, anaalstreek wit. Snavel gelig met zwart culmen. Poten gelig. Broedvogel. <b>XV.743.12</b></p>
--	--	---

	<p><b>Yellow warbler,</b> <i>Dendroica petechia subsp.???</i>, Gele zanger 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Voorhoofd en zijkant van de kop goudgeel, voorkroon oranje; kroon, mantel en rug olijfgroen. Vleugels zwartbruin, met groengele veerranden. De staart is bruinzwart, staartveren met gele binnenvlaggen. Van onder goudgeel, borst en flanken met roodbruine strepen. Oog donker, snavel zwart. ♀: Geen oranje voorkroon; nek en oorstreek geelgroen, van onder zwak gestreept. Overwinteraar uit het noorden. <b>XV.745.13</b></p>
	<p><b>Blackburnian warbler,</b> <i>Dendroica fusca</i>, Sparrenzanger 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Man: Oranjegele kroonvlek, wenkbrauwstreep, zijkant hals, keel en bovenborst; rest onderdelen gelig wit, de zijden met zwarte strepen, rest kroon, teugel en wangen zwart; vleugels zwart met een duidelijke witte streep; staartmidden zwart, buitenzijde wit; rug (grijs)zwart met een witte streep. Vrouw: Lichter. Migrant uit het noorden. <b>XV.753.24</b></p>
	<p><b>Blackpoll warbler,</b> <i>Dendroica striata</i>, Zwartkopzanger 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Oorstreek, ooggebied, keel en borst geel getint. Buik en onderstaartdekveren wit. Kruin, mantel, rug en onduidelijke oogstreep vaal olijfgroen; mantel met vrij dunne, donkere strepen. Vleugel donker met twee scherp afgetekende, smalle witte strepen en witte zomen aan de tertials. Borst en flanken meestal fijn gestreept. Voeten geelbruin. Onderstaart met lichte vlekken. Migrant uit het noorden. <b>XV.759.37</b></p>
	<p><b>American redstart,</b> <i>Setophaga ruticilla</i>, Amerikaanse roodstaart 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Marien, Laag-,Hooglandbos</p>	<p>Een lange staart die vaak wordt opgericht en gespreid, waarbij hij de vleugels laat afhangen. Grijs kop, groengrijze mantel en vleugels, vuilwitte onderdelen, grote gele vlekken op staart, gele vleugelvlek en een (oranje)gele diffuse vlek op de zijborst bij de vleugelbocht. Migrant uit het noorden. <b>XV.761.44</b></p>
	<p><b>Prothonotary warbler,</b> <i>Protonotaria citrea</i>, Citroenzanger 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Marien</p>	<p>Kop en onderdelen geel, nauwelijks lichter dan rug. Rug licht olijfgroen. Vleugels en stuit grijs, staart voornamelijk grijs. Onderstaartdekveren wit. Vrouw: Saaier. Migrant uit het noorden. <b>XV.764.45</b></p>
	<p><b>Northern waterthrush,</b> <i>Seiurus noveboracensis ssp.?</i> Noordse waterlijster 15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Marien</p>	<p>Kwikt met staart. Kop en bovenzijde olijfgroen. Lange, lichtbeige wenkbrauwstreep. Zeer lichtbeige van onder met een gelig waas en donkere strepen op borst en flanken, fijnere strepen op de keel. Iris donker. Overwinteraar uit het noorden. <b>XV.766.49</b></p>






	<p><b>Masked yellowthroat,</b> <i>Geothlypis aequinoctialis aequinoctialis</i>, Zuid-Amerikaanse maskerzanger 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Grijs voorhoofd en kroon; zwart masker vanaf het voorhoofd door en onder het oog naar de nek. Nek en bovenzijde olijfgroen. Van onder geel. Donker oog. ♀: Kroon en oorstreek olijf met grijs waas. Lichtgele streep voor het oog en gele oogring. Broedvogel. <b>XV.773.62</b></p>
	<p><b>Riverbank warbler,</b> <i>Basileuterus rivularis mesoleucus</i>, Vloedboszanger 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Staart voortdurend in beweging. Kroon en nek leigrijs, lichtbruine wenkbrauwstreep, zwarte oogstreep, oorstreek lichtbruin. Van boven olijfbraun. Van onder wit, met een beige waas. Oog donker, snavel zwart, poten vleeskleurig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XV.797.110</b></p>
	<p><b>Rose-breasted chat,</b> <i>Granatellus pelzelni pelzelni</i>, Roze granaatzanger 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Staart vaak opgestoken en/of gespreid. ♂: Zwarte kop, witte streep achter oog. Van boven blauwgrijs, staart zwart. Keel wit, begrensd door een smalle zwarte band; daaronder roserood met witte flanken. ♀: Kroon, nek en bovenzijde blauwgrijs; beige voorhoofd en gezicht. Keel en buik wit, beige flanken. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XV.800.115</b></p>
<p><b>Familie: <i>Thraupidae</i>, Tanagers, Tangaren</b> Kleine tot middelgrote vogels met middellange vleugels, staart en poten; de veren zijn zacht, dicht geplant en pluche-achtig; veel soorten zijn kleurrijk, vaak met complexe patronen.</p>		
	<p><b>Black-faced tanager,</b> <i>Schistochlamys melanopis melanopis</i>, Sluiertangare 17-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne</p>	<p>Voorhoofd, gezicht en een gebied dat in een punt uitloopt op de borst: zwart; oorstreek lichtbruin; rest grijs. Op de vleugelbocht wat wit. Van onder lichter grijs overgaand in wit op de buik. Iris roodbruin, dikke kegelsnavel blauwgrijs met zwarte punt; poten zwart. Broedvogel. <b>XVI.157.3</b></p>
	<p><b>Magpie tanager.</b> <i>Cissopis leverianus leverianus</i>, Ekstertangare 25-26 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Kop, keel, mantel en borst glanzend blauwzwart (bij beide in een punt uitlopend) . Schouders, middenrug en stuit wit. Staart lang, getrapt, zwart met een wit eind van onder. Vleugels zwart met witte vlekjes en dwarsstrepen; schouderveren breed wit gerand. Rest onder wit. Iris geel; snavel kort, dik, zwart; poten zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.158.4</b></p>
	<p><b>White-banded tanager,</b> <i>Neothraupis fasciata</i>, Witbandtangare 16 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Als een klapekster. Van boven grijs met een fors masker. Daar boven een dun wit streepje. Vleugel zwart met witte streep, staart grijs. Keel en buik wit, daartussen grijs. Stevige snavel blauwgrijs Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.158.5</b></p>

	<p><b>Red-billed pied tanager,</b> <i>Lamprospiza melanoleuca,</i> Roodsnaveltangare 17-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Glanzend blauwzwart, witte vlekken op zij van de borst begrensd door een zwarte band van het borstmidden naar opzij. Onder wit, dij zwart. Oog donker, snavel dik en rood, poten zwart. ♀: Nek, rug en stuit grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.160.8</b></p>
	<p><b>Hooded tanager,</b> <i>Nemosia pileata surinamensis,</i> Kaptangare 12 cm (Huisemus 14-16) <b>Suriname en Guyana</b> Kustvlakte</p>	<p>Kroon, zijkant kop, zijhals en smalle band naar de zijkant van de borst: zwart. Boven teugel wit. Nek, bovenzijde en staart donker blauwgrijs. Handdekveren grijs, slagpennen zwart met blauwgrijze randen. Van onder wit met een blauw waas. Iris geel; snavel flink en zwart; poten oranjegeel. ♀: Geen zwart op kop of borst maar alles grijsblauw zoals de rug. Broedvogel. <b>XVI.161.11</b></p>
	<p><b>White-rumped tanager,</b> <i>Cypsnagra hirundinacea pallidigula,</i> Witstuittangare 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Bovenzijde zwart, op de kop tot net over het oog; beige streep voor het oog, witte stuit. Witte vlek op basis handpennen, buitenste handpennen met flinke witte rand. Okerbeige keel, onderzijde wit. Oog donker, snavel stevig en zwart, poten donkergrijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.173.39</b></p>
	<p><b>Grey-headed tanager,</b> <i>Eucometis penicillata penicillata,</i> Amazonetangare 16-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Grijze kop met ruige kuif waarin (doorgaans verborgen) wit. Bovenzijde olijfgeel. Keel witachtig, onderzijde geel. Iris roodbruin, snavel zwartig, poten grijsrose. Broedvogel. <b>XVI.177.42</b></p>
 	<p><b>Flame-crested tanager,</b> <i>Tachyphonus cristatus intercedens,</i> Vuurkuiftangare 15 cm (Huisemus 14-16) 132</p> <p>Beide savannes, Hooglandbos</p>	<p>♂: Glanzend zwart met een brede, platte, oranje kuif; stuit geel; witte vlek (meestal verborgen) op de schouder. Middenkeel geel, ondervleugeldekveren wit. Oog roodbruin; snavel dik, kort, zwart. ♀: Olijf bovenzijde, okergeel onder. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.177.43</b></p>
 	<p><b>Fulvous-crested tanager,</b> <i>Tachyphonus surinamus surinamus,</i> Goudkuiftangare 15-17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Beide savannes</p>	<p>♂: Glanzend zwart, een (verstopte) geelbeige kroonvlek: opzetbare kroon. Stuit beige, witte vleugelbocht. Een meestal verborgen beige vlek opzij van de borst; de iets uitstekende flankveren zijn karmijnrood. Ondervleugeldekveren wit. ♀: Grijze kop, geel om oog, verder bovenkant groen. Keel en borst beige, buik okergeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.178.45</b></p>






	<p><b>White-shouldered tanager,</b> <i>Tachyphonus luctuosus luctuosus</i>, Witschoudertangare 13-14 cm (Huisumus 14-6)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>♂: Glanzend zwart, witte vlek op de schouder. Ondervleugeldekveren wit. ♀: Grijs kop, van boven groen, keel grijswit, van onder geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.179.46</b></p>
	<p><b>White-lined tanager,</b> <i>Tachyphonus rufus</i>, Zwarte tangare 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>♂: Glanzend blauwzwart, klein wit vlekje op vleugelbocht. Witte ondervleugeldekveren. Iris donker. ♀: Effen roodbruin, van onder iets lichter. Broedvogel. <b>XVI.181.49</b></p>
	<p><b>Red-shouldered tanager,</b> <i>Tachyphonus phoenicius</i>, Roodschoudertangare 15 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>♂: Glanzend blauwzwart, klein rood- wit vlekje op de vleugelbocht. Witte ondervleugeldekveren. ♀: Kroon en nek donker bruingrijs; masker vanaf snavel tot onder oog naar wang, contrasterend met witachtige keel. Van boven donker grijsbruin, witte keel gaat over in vuilwitte borst en zijden, buik vuil roomwit. Broedvogel. <b>XVI.181.50</b></p>
	<p><b>Fulvous shrike-tanager,</b> <i>Lanio fulvus fulvus</i>, Bruine klauwiertangare 15-17 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Zwarte haaksnavel. ♂: Kop, hals, vleugels en staart zwart, bovenzijde geel, borstvlek lichtbruin, verder naar onder oker, anaalstreek kaneel. Oog donker. ♀: Grijsbruine kop, warm bruin van boven, staart oker tot roodbruin. Keel grijsig, borst okerolijf, oranjebeige buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.182.51</b></p>
	<p><b>Silver-beaked tanager,</b> <i>Ramphocelus carbo carbo</i>, Fluweeltangare 16-17 cm (Kwartel 16-8)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Bovensnavel blauwgrijs, ondersnavel glanzend zilverwit. De vogel zelf is grotendeels donker karmijnrood. Slagpennen en staart zwartachtig. Borst en kop meer dieprood. Iris donker. ♀: Minder felgekleurd, donkerder. Broedvogel. <b>XVI.186.59</b></p>






	<p><b>Blue-grey tanager,</b> <i>Thraupis episcopus episcopus,</i> Bisschopstangare 16 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop en onderzijde lichtgrijs met een blauw waas, van boven donkerder. Middenstaartveren blauw, naar buiten toe minder blauw. Vleugels blauw met witte schouderstrepen. Iris donker, snavel zwart. Broedvogel. <b>XVI.191.65</b></p>
	<p><b>Palm tanager,</b> <i>Thraupis palmarum melanoptera,</i> Palmtangare 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Saaï. Grotendeels olijfgrijs met een bruin waas, kroon lichtgeel, vleugeldekveren lichtgeel, buik wat lichter. Donkere slagpennen; onduidelijke, gele vleugelstreep. Broedvogel. <b>XVI.193.71</b></p>
	<p><b>Blue-backed tanager,</b> <i>Cyanicterus cyanicterus,</i> Siertangare 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>♂: Zwarte snavel met gebogen bovenrand, van boven zwart, van onder grijs. Kop, hals, borst, vleugeldekveren en staart helder blauw; op keel en borst meer violet. Slagpennen donker, blauw gerand. Onderzijde goudgeel, dij donkerblauw. Iris oranje tot rood, poten geel. ♀: Blauwgrijze kroon, nek, rug, vleugeldekveren. Gezicht beigegeel naar onder verlopend naar helder geel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.196.75</b></p>
	<p><b>Turquoise tanager,</b> <i>Tangara mexicana mexicana,</i> Turkooistangare 14 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Middenkroon, nek en bovenzijde fluweelzwart, glanzend lichtblauwe stuit met zwarte vlekjes, staartveren zwart met blauwe randen. Zwarte ring om snavelbasis, zwarte oogring. Voorkroon, zijkant kop en keel glanzend kobaltblauw met zwarte vlekjes. Turkoois vlekje op schouder, rest vleugeldekveren blauw gerand evenals de zwarte slagpennen. Buik bleekgeel, aan zijkant blauw met zwarte schubben. Iris donker, snavel en poten zwart. Broedvogel. <b>XVI.213.105</b></p>
	<p><b>Paradise tanager,</b> <i>Tangara chilensis paradisea,</i> Paradijstangare 12-13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Veelkleurig, contrastrijk. Kroon en kopzijden lichtgroen. Zwarte ring om snavel en een om oog. Nek, rug, grootste deel vleugel en staart fluweelzwart. Onderrug rood, stuit geel. Violette vlek op de schouder, keel glanzend violet. Borst en buik glanzend turkoois, middenbuik en onderstaartdekveren zwart. Iris donker, snavel en poten zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.214.109</b></p>










	<p><b>Dotted tanager,</b> <i>Tangara varia,</i> Stippentangare 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Man: Grasgroen; mantel, gesloten vleugel en staart blauwgroen, keel en borst zwart gestippeld. Vrouw: Geheel groen, middenbuik groengeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.226.126</b></p>
	<p><b>Spotted tanager,</b> <i>Tangara punctata punctata,</i> Druppeltangare 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein, merendeels groen, donker gevlekt. Voorste deel vogel met donkere, groengeel gerande veren, op kroon en rug zijn ze groen gerand. Stuit groen. Staartveren zwart, groen gerand. Zwartgevekte keel en borst, flanken en anaalstreek groengeel, middenbuik wit. Iris donker, snavel en poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.225.124</b></p>
	<p><b>Speckled tanager,</b> <i>Tangara guttata guttata,</i> Spikkeltangare 12 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Klein, voornamelijk groen; gelig gezicht, dicht zwart gevlekt. Teugel zwart, rondom oog geel; rest kop en bovenzijde groen, zwart gevlekt en geschubd. Stuit groen, staart zwartachtig groen, vleugelveren lichtblauw of groen gerand. Keel en borst wit, zwart gevlekt; middenbuik wit, flanken en anaalstreek geelgroen. Iris donker, snavel zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.225.125</b></p>
	<p><b>Bay-headed tanager,</b> <i>Tangara gyrola gyrola,</i> Okerkaptangare 12 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Kop bruin, daarachter smalle gouden streep in nek, rest van de vogel merendeels groen. Smalle, blauwe strepen over het midden van borst en buik, beige dij. Iris en snavel donker, poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.226.128</b></p>
	<p><b>Burnished-buff tanager,</b> <i>Tangara cayana cayana,</i> Sabeltangare 13-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Kroon bruinrood, zwart masker tot over oorstreek, bovenzijde geelbeige, staart zwartachtig blauw. Vleugeldekveren voornamelijk blauwgroen, slagpennen zwart met blauwgroene randen. Van onder glanzend beige met een violetgrijs waas op keel en borst. Iris donker, snavel zwart, poten donkergrijs. ♀: Kroon kopermaisgeel, rug grijsgroen, stuit lichtgelig groen, staart groenig (<b>niet blauw</b>). Keel en borst grijs, buik groenbeige. Broedvogel. <b>XVI.228.130</b></p>
	<p><b>Opal-rumped tanager,</b> <i>Tangara velia velia,</i> Opaalstuittangare 12-14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Kroon, nek, rug en schouder zwart; stuit lijkt geel, strogeel of groen, staart zwart met blauwe veerranden. Vleugelveren meest zwart met blauwe randen. Voorhoofd, zijkop en hals blauw, zwarte halvemaan op borst; borst voor de rest, evenals de zijden, violetblauw, middenbuik kastanje. Iris donker, snavel zwart, poten grijs. Broedvogel. <b>XVI.241.152</b></p>







	<p><b>Swallow tanager</b> <i>Tersina viridis occidentalis</i>, Zwaluwtangare 14 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Brede, platte snavel. ♂: Van voorhoofd om oog naar keel zwart masker. Rest vogel voornamelijk glanzend turkoois; vleugelveren en staartveren zwart, met turkoois randen. Middenborst wit, uitlopend in een punt naar boven, buik ook wit; turkoois flanken, zwart gebandeerd. Iris roodbruin, snavel zwart, poten grijs. ♀: Voornamelijk grasgroen, rond oog en keel vuilwit, keel met wat donkere schubjes. Slagpennen zwart, groen gerand. Middenborst en buik bleekgeel, groen gebandeerd. Broedvogel. <b>XVI.242.154</b></p>
	<p><b>Black-faced dacnis,</b> <i>Dacnis lineata</i>, Zwartmaskerpitpit 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Snavel dun en scherp gepunt, zwart. Kroon, stuit en onderzijde turkoois. Zwart masker vanaf voorhoofd over oog via nek naar zwart van rug, vleugel en staart. Middenborst, buik en ondervleugeldekveren wit. Iris geel, poten zwart. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.245.156</b></p>
	<p><b>Blue dacnis,</b> <i>Dacnis cayana cayana</i>, Blauwe pitpit 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Dunne, scherpe, donkere snavel, snavelbinnenkant rose. ♂: Zwarte oogstreep; smalle, zwarte vlek op keel. Rest kop, hals en onderzijde blauw. Mantel, vleugel en staart zwart, schouder en stuit turkoois, vleugelveerranden blauw. Iris donker, poten rose. ♀: Voornamelijk groen, lichtblauwe kop, grijzige keel, wat blauw op schouder. Broedvogel. <b>XVI.247.162</b></p>
	<p><b>Short-billed honeycreeper,</b> <i>Cyanerpes nitidus</i>, Kortsnavelsuikervogel 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein; slanke, gebogen, zwarte snavel. ♂: Vlek vanaf snavel om oog zwart, zwarte vlek op keel, zich verbredend op borst. Rest van vogel purperblauw. Vleugels zwart, oog donker, poten rose. ♀: Teugel en korte oogstreep donker, daarboven en daaronder een turkoois streepje. Kop en rest van het lijf groen; slagpennen zwart, groen gerand. Keel beigegeel, borst en zijden groen, wit gestreept. Poten rose. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.251.165</b></p>
	<p><b>Purple honeycreeper,</b> <i>Cyanerpes caeruleus</i> <i>caeruleus</i>, Purpersuikervogel 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein; lange, slanke, gebogen, zwarte snavel. ♂: Voornamelijk knalblauw. Vanaf snavel over oog tot achter oog zwarte streep. Smalle keelvlak, vleugelveren en korte staart zwart. Iris donker, poten geel. ♀: Van boven groen, slagpennen donker, groenig gerand. Kroon gemengd grijsgroen; teugel, zijkop en oogring beige; zijkop met witte en donkere strepen. Smalle lichtblauwe snorstreep. Keel en onderkant beige met blauwgroene strepen, middenbuik geel. Gelige ondervleugeldekveren, poten groenig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XIV.251.167</b></p>



	<p><b>Red-legged honeycreeper,</b> <i>Cyanerpes cyaneus cyaneus</i>, Blauwe suikervogel 11-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Lange, slanke, gekromde, zwarte snavel, rode poten. ♂: Voornamelijk purperblauw met azuur kroon. Teugel en vlek om oog zwart. Zwarte mantel met blauwe halve maan; vleugel zwart, onder geel. Iris donker. ♀: Boven olijfgroen. Vuilwitte wenkbrauwstreep, donkere oogstreep. Staart en vleugel donker met olijf randen. Zijden van kop geel; smal groen en donker gestreept. Keel wittig; onderzijde geel, zwak groen gestreept. Broedvogel. <b>XIV.252.168</b></p>
	<p><b>Green honeycreeper,</b> <i>Chlorophanes spiza spiza</i>, Groene suikervogel 13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Lange, gebogen puntsnavel, donker boven, onder geel. ♂: Zwarte kap over oog, uitlopend in een punt op de wang. Verder glanzend turkoois, vleugels en staart zwart met groene veerranden. Roetzwarde ondervleugeldekveren en dijen. Iris donkerrood, poten grijs. ♀: Voornamelijk groen, keel en middenbuik gelig. Iris rood(-bruin). Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.253.169</b></p>
	<p><b>Guira tanager,</b> <i>Hemithraupis guira nigrigula</i>, Guiratangare 13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>♂: Kroon, nek en bovenzijde olijfgroen, gezicht en keel roetzwart (tot net over oog). Van voorhoofd om masker naar keel gele streep. Oranjerode stuit en borstband. Staart donker olijf. Van onder geel met grijze flanken. Iris bruin, snavel geel, poten grijs. ♀: Effen olijfgroen van boven, geel van onder, flanken grijs. Broedvogel. <b>XIV.257.173</b></p>
	<p><b>Yellow-backed tanager,</b> <i>Hemithraupis flavicollis flavicollis</i>, Geelstuittangare 13 cm (Huisumus 14-16)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>♂: Bruinzwart van boven, helder gele onderrug. Vleugels en staart zwartig, wit vierkantje op de basis van de handpennen. Keel en hals geel, van onder wit, zijden grijs, anaalstreek geel. Iris donker, bovensnavel donker, ondersnavel rose tot geel, poten grijs. ♀: Boven olijfgroen, vleugelveren donkerder met groene randen. Van onder geel met een olijf waas op de flanken. Broedvogel. <b>XVI.258.175</b></p>
	<p><b>Chestnut-vented conebill,</b> <i>Conirostrum speciosum amazonum</i>, Roodbuikspitssnavel 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Kop en bovenzijde donker grijsblauw. Handpendekveren en handpennen donker met blauwe veerranden. Van onder lichter, middenbuik grijswit, onderstaartdekveren kastanje. Iris roodbruin, snavel zwart, poten grijs. ♀: Blaugroene kroon en nek; gezicht beige, donker gestreept. Vleugeldekveren, staart en bovenzijde groen. Van onder grijsbeige, wat geler op de buik. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.261.178</b></p>



	<p><b>Bicoloured conebill,</b> <i>Conirostrum bicolor bicolor</i>, Tweekleurige spitsnavel 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Marien</p>	<p>Saai. Bovenzijde, kroon, nek, vleugeldekveren en staart blauwgrijs. Slagpennen donker, blauwgrijs gerand. Teugel en gezicht lichtgrijs, onderzijde vuil grijsbeige. Iris oranje tot donkerrood, snavel blauwgrijs, poten grijsroze. Broedvogel. <b>XVI.261.180</b></p>
	<p><b>Golden-rumped euphonia,</b> <i>Euphonia cyanocephala cyanocephala</i>, Goudstuitorganist 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein, blauwe kap, gouden stuit. ♂: Vanan voorhoofd tot net over oog, oorstreek en keel zwart. Kroon, nek en gepunte vlek op de hals turkoois. Bovenzijde zwart met purper glans, onderrug goud tot oranjegeel. Staart zwart, vleugels overwegend zwart. Van onder geel. Iris donker, snavel zwart, poten grijs. ♀: Voorhoofd geel, kap als man, bovenzijde groen, vleugels en staart donkerder, gezicht olijfgroen, van onder olijfgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.282.211</b></p>
	<p><b>Plumbeous euphonia,</b> <i>Euphonia plumbea</i>, Grijze organist 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Man: Van boven, keel en zijkop glanzend donker blauwgrijs. Onder geel. Vleugels en staart zwartachtig, grijs gerand. Vrouw: Kop en bovenrug donkergrijs, rest rug olijf. Keel wittig, rest onder olijfgroen, overgaand in geel op de middenbuik en onderstaartdekveren. Vleugels en staart olijf gerand. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.283.214</b></p>
	<p><b>Purple-throated euphonia,</b> <i>Euphonia chlorotica chlorotica</i>, Purperkeelorganist 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Overall</p>	<p>Klein; korte, dikke, blauwgrijze snavel. ♂: Geel voorhoofd en -kroon; rest van de kop, de bovenzijde en de keel glanzend blauwzwart met een violette glans. Slagpennen zwart met blauwe randen, een deel van deze pennen met een witte binnenvlag. Van onder helder geel. Ondervleugeldekveren wit. Flink wit ovaal aan weerskanten onder de staart. Iris donker, poten grijs. ♀: Van boven olijf met een grijs waas, teugel donker, van onder olijfgroen. Middenborst en buik witachtig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.285.217</b></p>
	<p><b>Finsch's euphonia,</b> <i>Euphonia finschi</i>, Finsch' organist 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Overall</p>	<p>♂: Voorkroon geel, hele bovenzijde en keel glanzend purperzwart. In vlucht witte streep in vleugel. Bovenstaart staalblauw. Van onder oranje, onderstaart beige. Iris bruin, snavel blauwgrijs, poten grijs. ♀: Gelige voorkroon, donker om oog, olijf van boven, olijfgroen van onder, middenbuik geler. Geen wit in stuit en vleugel. Broedvogel. <b>XVI.287.221</b></p>









		<p><b>Violaceous euphonia,</b> <i>Euphonia violacea violacea</i>, Violette organist 10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>♂: Voorkroon tot net boven de voorkant van het oog oranjegeel. Kop en bovenzijde blauwzwart met purperglans. Keel en borst oranjegeel overgaand in heldergele buik. Ondervleugeldekveren wit. Onderstaart grijs met twee grote witte ovale vlekken. Iris donker, snavel zwartachtig met wat blauwgrijs, poten grijs. ♀: Olijf van boven, vleugel donker, onder olijfgeel, buik geel. <b>XVI.289.222</b></p>
		<p><b>White-lored euphonia,</b> <i>Euphonia chrysopasta nitida</i>, Goudbuikorganist 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Klein, saai; grote snavel met kromme rand, zwartachtig. ♂: Gebied voor oog tot en met kin asgrijs, daarboven donkere streep. Voorhoofd, rest van het gezicht en onderzijde geel. Kroon en achterhoofd grijs. Van boven olijfgroen met blauwgroene glans, slagpennen donker met olijf randen. Van onderen grotendeels geel, vaag olijf geschubd. Iris donker, poten grijs. ♀: Van boven als man, van onder grijs met zijden en anaalstreek olijfgeel. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.291.229</b></p>
		<p><b>White-vented euphonia,</b> <i>Euphonia minuta minuta</i>, Witbuikorganist 9 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Erg klein, compact, witte onderstaart. ♂: Voorhoofd geel, kap tot op keel en bovenzijde glanzend blauwzwart. Slagpennen donker, donkerblauw gerand. Onderzijde knalgeel, middenbuik en anaalstreek wit, ondervleugeldekveren ook. Ovale witte vlekken aan weerszijden op de onderstaart. Iris donker, snavel zwart, poot grijs. ♀: Kop en bovenzijde olijf, keel vuilwit, borst en zijden olijfgeel. Midden van borst en buik wit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.294.231</b></p>
		<p><b>Golden-sided euphonia,</b> <i>Euphonia cayennensis</i>, Cayenneorganist 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Donker glanzend staalblauw. Slagpennen en staart donker. Bij vleugelbocht een lange gouden pluim. Iris bruin, snavel zwart en blauwgrijs, poten grijs. ♀: Van boven olijf, van onder grijs, met olijfgeel op de zijden. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.297.236</b></p>
		<p><b>Highland hepatic-tanager (Blood-red tanager),</b> <i>Piranga lutea haemalea</i>, Bloedrode tangare? 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Stevige, tweekleurige snavel. ♂: Kastanjerood, donkere teugel, van onder karmijnrood. Oog donker, poot grijs. ♀: Gelig groen van boven, olijfgeel van onder, keel en het midden van de buik geel. Status onbekend <b>XVI.310.2</b></p>

		<p><b>Lowland hepatic-tanager,</b> <i>Piranga flava macconnelli</i>, Laaglandlevertangare 18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Man: Geheel oranje, mantel iets donkerder en vleugels en staart nog meer. Vrouw: Geel. Iets donkerder teugel, wangen en mantel. Vleugels en staart nog donkerder. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.310.255</b></p>
		<p><b>Summer tanager,</b> <i>Piranga rubra rubra</i>, Zomertangare 17-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Van boven gelig olijf, onder geel. Snavel bleek gelig bruin. De man kan roserood gespikkeld zijn. De vrouw heeft een gele oogring. Migrant uit het noorden. <b>XVI.311.256</b></p>
		<p><b>Scarlet tanager,</b> <i>Piranga olivacea</i>, Zwartvleugeltangare 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien</p>	<p>Man winter: Van boven olijf, van onder geel. Zwarte vleugels en staart. Vrouw: Vleugel- en staartveren olijf gerand. Noordelijke migrant. <b>XVI.313.258</b></p>
		<p><b>Bananaquit,</b> <i>Coereba flaveola minima</i>, Suikerdiefje 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Overall</p>	<p>Van boven donkergroen met een veel lichtere stuit. Opvallende, witte wenkbrauwstreep. Kleine witte vlek aan de basis van de slagpennen. Keel grijs, onderzijde heldergeel, buik witachtig. Broedvogel. <b>XVI.328.283</b></p>

### Familie : *Cardinalidae*, Cardinals, Kardinalen






Kleine tot middelgrote vogels met een kegelsnavel, die soms erg groot en vinkachtig is; mannetjes vaak prachtig gekleurd, met rood en blauw; de vrouwen meestal onopvallender.










		<p><b>Dickcissel,</b> <i>Spiza americana</i>, Dickcissel 16 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Man: Kroon, nek en wang grijs, teugel, vlek onder snor en wenkbrauw geel. Mantel zandkleurig en zwart gestreept, lager is hij effen grijsbruin. Schouder, buitenvlag van dekveren, vleugels en staart donkerbruin, die laatste grijs gerand. Kin en zijhals wit, keel zwart in een punt uitlopend op de borst. Zijborst geel, rest onder wittig. Vrouw: van boven als man maar bruiner. Onder vuilwit tot beige met vage donkere strepen. Geen borstvlak, lagere borst gelig. Migrant uit het noorden. <b>XVI.405.1</b></p>
--	---	--	--






		<p><b>Yellow-green grosbeak,</b> <i>Caryothraustes canadensis canadensis</i>, Geel-groene kardinaal 17-19 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Bovenkant kop en bovenzijde geelgroen. Teugel en daaronder tot op keel zwart. Van onder geel, borst en zijden groenig. Iris zwart, grote kegelsnavel zwart, poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.413.12</b></p>
		<p><b>Red-and-black grosbeak,</b> <i>Periporphyrus erythromelas</i>, Rood-zwarte kardinaal 21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Hooglandbos</p>	<p>Zwartachtige, forse kegelsnavel. ♂: Kop tot over nek en keel zwart. Rode halsring en onderzijde. Van boven meer donkerrood. Iris donker, poten grijs. ♀: Kop als mannetje. Van boven groen en van onderen geelgroen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.414.15</b></p>
		<p><b>Slate-coloured grosbeak,</b> <i>Saltator grossus grossus</i>, Witkeelkardinaal 19-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>Enorme (oranje-)rode snavel. ♂: Voornamelijk leiblaauw. Teugel, deel oorstreek onder oog, zijhals en borstband aaneengesloten zwart. Keel wit, vleugels en staart zwart. Ondervleugeldekveren wit. Iris bruin, poten donker. ♀: Donkergroen, keel grijswit. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.414.16</b></p>
		<p><b>Buff-throated saltator,</b> <i>Saltator maximus maximus</i>, Bontkeelsaltator 21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Laaglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>Kop grijs; bovenzijde, vleugels en staart groen. Wenkbrauwstreep grijswit, flinke zwarte snor. Kin wit, keel beige, borst en buik grijs, onderbuik kaneel. Iris donker, snavel grijszwart, poten grijs. Broedvogel. <b>XVI.415.19</b></p>
		<p><b>Greyish saltator,</b> <i>Saltator coerulescens olivascens</i>, Grijze saltator 21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Kop en bovenzijde olijfgrijs, vuilwitte wenkbrauwstreep, zwarte snorstreep. Keel vuilwit, borst en buik grijs, onderbuik kaneelkleurig. Iris bruin, snavel groot en zwartachtig, poten grijs. Broedvogel. <b>XVI.417.22</b></p>
		<p><b>Blue-black grosbeak,</b> <i>Cyanocompsa cyanoides rothschildii</i>, Blauwrugbisschop 17-19 cm (Kwartel16-18)</p> <p>Laag-, Hooglandbos</p>	<p>♂: Helder blauw, stuit lichter. Voorhoofd, snorstreep en schouder hemelsblauw. Kin zwart; vleugelveren ook, maar met blauwe randen. Iris bruin. Stevige, kegelvormige snavel, evenals poten: grijszwart. ♀: Bruin. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.423.33</b></p>

**Familie: *Emberizidae*; Buntings and New World Sparrows; Gorzen**












Zeer kleine tot middelgrote vogels met een kegelsnavel; vele met eenvoudige kleurpatronen in bruin, zwart, grijs, geel en wit; vaak bruin of grijs gestreept, sommige kleurrijker en/of opvallender getekend.

	<p><b>Rufous-collared sparrow,</b> <i>Zonotrichia capensis roraimae</i>, Roodkraaggors 12-13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon wat hoekig. Kop grijs, zwarte zijkroonstreep, zwarte oogstreep, zwarte streep onder oor. Nek en zijhals roodbruin (halve halsring) tot op borst. Zwarte vlek opzij van borst. Van boven bruinzwart gestreept, staart bruin. Twee witte vleugelstrepen, keel wit, borst grijzer, buik witter, flanken beige. Iris bruin, snavel grijs, poten rose.</p> <p>Broedvogel. <b>XVI.545.58</b></p>
	<p><b>Grassland sparrow,</b> <i>Ammodramus humeralis humeralis</i>, Graslandgors 13 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Kroon bruin, zwart gestreept met mediaan een witte streep. Grijsbruin gezicht, witte oogring, gele vlek voor oog, daarachter lichtgrijze wenkbrauwstreep, donkere streep achter oog. Nek en rug grijs, donker gestreept; stuit effen bruin, staart bruin. Vleugels bruin met twee vage strepen, dekveren zwart met kaneel randen. Gele vlek in vleugelbocht. Keel wittig, borst en flanken beige, onder vuilwit. Iris donker, snavel en poten roze.</p> <p>Broedvogel. <b>XVI.556.77</b></p>
	<p><b>Pectoral sparrow,</b> <i>Arremon taciturnus taciturnus</i>, Olijfruggors 15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Noordelijke savanne, Laag-, Hooglandbos, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Zwarte kop met grijze kroonstreep en witte wenkbrauwstreep. Grijze halsring die op de borst overgaat in een zwarte borstband. Keel wit. Van boven olijfgrijs, schouder geelgroen. Van onder wit, grijze flanken. Iris donker, snavel zwart, poten grijs. ♀: Saaier. Keel beigegeel, borstband grijs, onderzijde grijswit.</p> <p>Broedvogel. <b>XVI.572.106</b></p>
	<p><b>Stripe-tailed yellow-finch,</b> <i>Sicalis citrina browni</i>, Witstaatsaffraangors 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Korte, blauwgrijze snavel. ♂: Kop en onderzijde geel. Van boven olijfgeel met donkere strepen, stuit effen. Vleugel donker, veren geel gerand; staart donker met witte einden aan de buitenveren. ♀: Bruin van boven, fijn gestreept van kroon tot stuit. Onder lichtgeel, bruin gestreept op borst en flank. Vleugelveren bruin met gele randen. Snavel donker.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.631.224</b></p>
	<p><b>Saffron finch,</b> <i>Sicalis flaveola flaveola</i>, Saffraangors 13,5-15 cm (Huismus 14-16)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne</p>	<p>Man: Boven olijfgeel, voorhoofd en deel kroon oranje, kop met oranje waas. Donkere streping op de rug. Onder geel met niet al te duidelijke olijf strepen. Vrouw: Boven bruin, wang grijs, vleugelveren deels donker, olijf gerand, stuit olijfgeel. Onder geelgrijs, brede borstband, dijen en anaalstreek olijfgeel.</p> <p>Status onbekend. <b>XVI.633.232</b></p>

		<p><b>Grassland yellow-finch,</b> <i>Sicalis luteola flavissima</i>, Graslandsaffraangors, 10-13 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Gevorkte staart. Kroon olijf met streepjes, gezicht olijfgrijs, gele oogring, gele wenkbrauwstreep, geel op zijhals; gele, smalle snorstreep. Nek en bovenzijde olijfbroen, zwaar donker gestreept; stuit olijfgeel. Vleugel en staart bruin. Keel en onderzijde geel, op de zijden een olijf waas. Iris donker, snavel grijs, poten rose.</p> <p>Broedvogel. <b>XVI.637.233</b></p>
		<p><b>Wedge-tailed grass-finch,</b> <i>Emberizoides herbicola sphenurus</i>, Wigstaartgrasgors 20 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Flinke, van boven gekromde, gele snavel, met zwart culmen. Lange, getrapte puntstaart. Kroon fijn zwart gestreept; gezicht lichtbruin, lichte teugel, witte oogring. Bovenzijde beige, stevig zwart gestreept, stuit effen, vleugel bruinachtig, veren olijfgroen gerand. Middelste staartveren donker, de buitenveren grijsbruin. Keel grijswit, rest onder beige. Iris bruin, poten roze.</p> <p>Broedvogel <b>.XVI.638.236</b></p>
		<p><b>Red-crested finch,</b> <i>Coryphospingus cucullatus cucullatus</i>, Rode kroongors 13,5 cm (Huisemus 14-16)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>Man: Korte, meest plat gehouden, zwarte kuif met rode streep in het midden. Grijs gezicht met witte halve maantjes boven en onder oog. Nek en bovendelen warm bruin, vleugel en staart wat donkerder. Keel en rest onderzijde rood.</p> <p>Vrouw: Geen zwart en rode kuif. Bruin van boven, onder lichter, rood waas over borst en stuit. Wel halve maantjes.</p> <p>Status onbekend. <b>XVI.640.244</b></p>
		<p><b>Red-capped cardinal,</b> <i>Paroaria gularis gularis</i>, Zwartkeelkardinaal 17 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Laaglandbos</p>	<p>Kop en kin rood, zwarte oogstreep en vlek om oog. Keel zwart, uitlopend in een punt op de borst. Nek en bovenzijde zwart. Van onder sneeuw wit met een uitloper onderlangs het rood van de kop. Iris oranjerood, bovensnavel zwartachtig, ondersnavel geelachtig, poten zwart.</p> <p>Broedvogel. <b>XVI.644.251</b></p>
		<p><b>Blue-black grassquit,</b> <i>Volatinia jacarina splendens</i>, Jacarinagors 9-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Kegelsnavel, van boven zwart, van onder grijs.</p> <p>♂: Zwart met blauwe weerschijn. Oog bruin, poten grijs, ondervleugel zwart. Ze vliegen omhoog, roepen <i>sriio</i> en komen terug waar ze begonnen.</p> <p>♀: Bruin, van onder lichter. Kroon en rug vaag gestreept. Borst en flank bruin gestreept</p> <p>Broedvogel. <b>XVI.644.253</b></p>
		<p><b>Slate-coloured seedeater,</b> <i>Sporophila schistacea longipennis</i>, Leigrijs loodbekje 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Noordelijke savanne, Laaglandbos</p>	<p>Grote, geeloranje snavel.</p> <p>♂: Grijs. Witte oogring. Witte handpenvlek, witte vleugelstreep. Witte halvemaaan onder wang. Buik wit. Oog donker, poten grijs.</p> <p>♀: Olijfbroen, lichter aan de onderzijde, middenbuik beige, snavel bruinachtig.</p> <p>Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.649.256</b></p>

	<p><b>Plumbeous seedeater,</b> <i>Sporophila plumbea whiteleyana</i>, Loodgrijs dikbekje 11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>Dikke, zwarte snavel. ♂: Loodgrijs van boven, vaag gestreept; effen stuit, staart zwartachtig. Vleugel zwart met grijze randen, wit vierkant op de handpennen. Een witte halve oogring, een wit vlekje onder het oog en een wit vlekje onder de ondersnavel. Borst lichter dan bovenkant, dat verloopt tot wit op buik. Ondervleugel grijs. Oog donker, poten zwart. ♀: Onopvallend. Bruinachtig van boven en bruinbeige van onder, verlopend naar wit nabij de staart. Snavel donker, onder lichter. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.649.257</b></p>
	<p><b>Wing-barred seedeater,</b> <i>Sporophila americana americana</i>, Bont dikbekje 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Savanne</p>	<p>Grote, korte, diepe, zwarte snavel. ♂: Kop en bovenzijde zwart. Van onder wit, ook de kin, onder de wang en de halve halsring. Stuit wit met zwarte spikkels. Vleugels zwart met twee witte strepen, wit vierkant op basis handpennen. Zwarte borstband of zwarte wiggen wijzend naar het midden van de borst. Iris bruin, poten zwart. ♀: Onopvallend. Beigebruin, kaneelbruin op keel, borst en flanken, buik lichter beige. Broedvogel. <b>XVI.650.260</b></p>
	<p><b>Lesson's seedeater,</b> <i>Sporophila bouvronides</i>, Lessons dikbekje 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Dikke, korte, diepe, zwarte snavel. Kop, keel en bovenzijde matzwart, witte driehoek tussen keel en wang. Witte band over stuit, wit vierkantje op handpennbasis. Borst wit, zwart geschubd; naar onder toe witter. Iris donkerbruin, poten zwart. ♀: Onopvallend. Olijfbruin boven, lichter onder, roomwitte keel, beige borst. Bovensnavel donker, onder hoornkleurig. Broedvogel. <b>XVI.653.264</b></p>
	<p><b>Lined seedeater,</b> <i>Sporophila lineola</i>, Witsterdikbekje 10-11 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Kustvlakte, Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Snavel kort, dik, diep, zwart. Witte kroonstreep, grote witte vlek onder oog, daaronder zwarte streep van zwarte keel naar zwarte kop. Witte band op stuit, wit vierkant op basis handpennen. Dij zwart, oog bruin, poten zwart. ♀: Onopvallend. Olijfbruin boven, beige onder, roomwitte keel. Bovensnavel donker, onder hoornkleurig. Migrant uit het zuiden. <b>XVI.653.265</b></p>
	<p><b>Yellow-bellied seedeater,</b> <i>Sporophila nigricollis nigricollis</i>, Geelbuikdikbekje 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Snavel kort, dik, diep, grijsblauw. Kop, nek en keel zwart. Bovenkant dof olijf, vleugels en staart bruinachtig, olijf gerand. Van onder lichtgeel, wat zwart op flanken. Ondervleugel lichtgeel, iris bruin, poten zwart. ♀: Geen kenmerken. Beigebruin, buik wat lichter. Snavel zwartachtig. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.654.267</b></p>



		<p><b>White-bellied seedeater,</b> <i>Sporophila leucoptera mexicanae</i>, Witbuikdikbekje 12-12,5 cm (Huisumus 14-16)</p>	<p>Man: Snavel dof tot rosegeel, kort en diep. Tweekleurig. Grijs van boven met een duidelijke witte spiegel. Uniform wit onder. Vrouw: Donker beigebruin boven, lichter van onder. Snavel zwartachtig. Status onbekend. <b>XVI.655.271</b></p>
		<p><b>Capped seedeater,</b> <i>Sporophila bouvreuil bouvreuil</i>, Oranje dikbekje 10 cm(Goudhaan 9-10)</p>	<p>Man: Zwarte kap tot aan oog; gezicht, nek, rug en van onderen kaneel, dij zwart. Vleugel en staart zwart, witte spiegel, zwarte poten en snavel. Vrouw: Olijfbruin van boven en okerbeige van onder. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.657.276</b></p>
		<p><b>Ruddy-breasted seedeater,</b> <i>Sporophila minuta minuta</i>, Dwergdikbekje 9-10 cm (Goudhaan 9-10)</p>	<p>♂: Kroon, gezicht en rug grijs, onderrug en stuit roodbruin. Wit vlekje aan basis ondersnavel Vleugel zwartbruin met grijze randen, wit vierkant op basis handpennen. Staart zwartachtig met olijf randen. Grijs van wang scherp gescheiden van roodbruin van snorstreek en rest onderzijde. Iris bruin, snavel grijsig, poten zwartachtig. ♀: Geen kenmerken. Van boven warm beige, borst en flanken ook, keel en buik lichter. Snavel donker. Broedvogel. <b>XVI.658.277</b></p>
		<p><b>Chestnut-bellied seedeater,</b> <i>Sporophila castaneiventris</i>, Roodbuikdikbekje 10 cm (Goudhaan 9-10)</p>	<p>Hele bovenzijde , inclusief flanken blauwgrijs, onderzijde kastanje. Wit vlekje aan basis ondersnavel. Vleugelveren zwartachtig met grijze randen. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.660.282</b></p>
		<p><b>Chestnut-bellied seed-finch,</b> <i>Oryzoborus angolensis torridus</i>, Zwartkopzaadkraker 11-12 cm (Goudhaan 9-10)</p>	<p>Zeer zware snavel. ♂: Kop tot op borst, bovenzijde, vleugels en staart zwart. Wit vlekje op basis handpennen. Scherpe grens op borst tussen het zwart en het kastanje daaronder. Dij zwart. Ondervleugel spierwit. Iris, snavel en poten zwart. ♀: Geen kenmerken. Warm bruin boven, lichtkaneel onder. Broedvogel. <b>XVI.663.286</b></p>
		<p><b>Large-billed seed-finch,</b> <i>Oryzoborus crassirostris crassirostris</i>, Dikbekzaadkraker 14-15 cm (Huisumus 14-16)</p>	<p>Enorme snavel, lijkt daardoor platkoppig. ♂: Zwart. Witte vlek aan basis handpennen. Witte ondervleugel. Iris donker, snavel glanzend ivoor, poten zwart. ♀: Warm bruin boven, beigebruin onder. Snavel zwartachtig. Broedvogel. <b>XVI.663.288</b></p>

**Familie: Icteridae, New World Blackbirds, Troepialen**

Nogal kleine tot grote vogels met een puntige snavel, meest donker, vaak glanzend, veel soorten met heldere kleurvlekken, sommige rijk gekleurd.



**Red-rumped cacique,**  
*Cacicus haemorrhous*  
*haemorrhous*,  
Roodstuitbuidelspreeuw  
♂: 29; ♀: 25 cm (Dodaars 23-29)

Noordelijke savanne,  
Laaglandbos

♂: Glanzend zwart. Helderrode onderrug en stuit.  
Iris lichtblauw, snavel ivoor, poten zwart.  
♀: Doffer. Iris bruinblauw.  
Broedvogel.



**Yellow-rumped cacique**  
**(Trinidad yellow-rumped**  
**cacique)**  
*Cacicus cela cela*,  
Geelstuitbuidelspreeuw  
♂: 28; ♀: 23 cm (Dodaars 23-29)

Marien, Kustvlakte,  
Noordelijke savanne,  
Laaglandbos, Zuidelijke  
savanne


♂: Voornamelijk zwart met een blauwe glans.  
Onderrug, stuit, onderbuik en streep in vleugel geel.  
Bovenstaart zwart met geel aan de buitenkant van de  
staartbasis, onderstaart geel. Iris blauw, snavel ivoor,  
poten zwartachtig.  
♀: Duffer.  
Broedvogel.  
**XVI.749.10**



**Crested oropendola,**  
*Psarocolius decumanus*  
*decumanus*,  
Kuiforopendola  
♂: 47; ♀: 37 cm (Kuifeend 40-47)

Kustvlakte, Noordelijke  
savanne, Laaglandbos

♂: Zwart. Stuit en staartdekveren kastanje. Een paar  
dunne veren wapperen aan het achterhoofd. Staart  
geel, de middenveren zwart. Iris blauw. Snavel met  
"helm" (casque), ivoor tot bleekgeel, poten zwart.  
♀: Zwartbruin, doffer, geen kuif.  
Broedvogel.  
**XVI.754.18**







**Green oropendola,**  
*Psarocolius viridis*,  
Groene oropendola  
♂: 49; ♀: 37 cm (Kuifeend 40-47)

Noordelijke savanne, Laag-,  
Hooglandbos

♂: Kop, rug en grootste deel van de onderzijde  
olijfgeel. Paar dunne veren aan achterhoofd bij wijze  
van kuif. Het kale gebied van de teugel en om het  
oog rose tot oranje. Vleugel donker olijf. Stuit, buik,  
dij en anaalstreek donker olijf. Iris lichtblauw.  
Snavel erwtengroen met oranje rode punt. Poten  
zwartachtig.  
♀: Geen kuif.  
Broedvogel.  
**XVI.754.19**

	<p><b>Yellow oriole,</b> <i>Icterus nigrogularis nigrogularis,</i> Gele troepiaal 20-21 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>♂: Zwarte teugel, zwart om oog en smalle zwarte vlek van kin tot op borst. Verder oranjegeel, vleugels en staart zwart, kleine en middendekveren geel. Grote dekveren met witte punten: vleugelstreep. Meeste slagpennen met witte randen. Iris bruin, snavel zwart met blauwgroene ondersnavelbasis, poten grijs. ♀: Olijf waas. Broedvogel. <b>XVI.764.34</b></p>
	<p><b>Moriche oriole,</b> <i>Icterus chryscephalus,</i> Geelkaptroepiaal 22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Savanne</p>	<p>Voornamelijk zwart. Gouden kroon, nek, stuit, epaulet en dij. Ondervleugeldekveren citroengeel, binnenvlaggen van de slagpennen wit. Iris bruin, snavel zwartachtig, poten donkergrijs. Broedvogel. <b>XVI.773.56</b></p>
	<p><b>Epaulet oriole,</b> <i>Icterus cayanensis,</i> Roodboegtroepiaal 22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Noordelijke en Zuidelijke savanne</p>	<p>Zwart. Gele epaulet en gele dij. Iris roodbruin, snavel zwartachtig, poten grijs. Waarschijnlijk broedvogel. <b>XVI.773.57</b></p>
	<p><b>Carib grackle,</b> <i>Quiscalus lugubris lugubris,</i> Caribische troepiaal ♂: 26; ♀: 22 cm (Dodaars 23-29)</p> <p>Marien</p>	<p>♂: Zwart met violette glans. Staart bootvormig. Iris geel, snavel en poten zwart. ♀: Dof donkerbruinachtig, normale staart. Broedvogel. <b>XVI.779.65</b></p>
	<p><b>Giant cowbird,</b> <i>Molothrus oryzivorus oryzivorus,</i> Grote koevogel ♂: 34; ♀: 29 cm (Kauw 30-34)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Groot, lange vleugels, lange staart. Zwart. Veren van nek kunnen recht op gezet: kraag. Vliegt golvend. ♂: <b>Weerschijn brons tot blauw</b>, verborgen helm (casque), flinke kraag. Iris geel tot oranjegeel, snavel en poten wit. ♀: Kleiner en doffer, kleinere kraag. Broedvogel. <b>XVI.785.72</b></p>
	<p><b>Shiny cowbird,</b> <i>Molothrus bonariensis minimus,</i> Glanskoevogel 17-22 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>♂: Glanzend zwart met een <b>purperen weerschijn</b>. Iris bruin, snavel en poten zwartgrijs. ♀: Donker bruinachtig grijs van boven, van onder lichter. Soms even zwart als man, maar dan dof. Broedvogel. <b>XVI.786.76</b></p>

	<p><b>Yellow-hooded blackbird,</b> <i>Chrysomus icterocephalus icterocephalus,</i> Geelkaptroepiaal 17-19 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Marien, Kustvlakte</p>	<p>♂: Kop, nek, keel en bovenborst heldergeel. Zwarte teugel, rest lijf glanzend zwart. Iris bruin, snavel en poten zwart. ♀: Wenkbrauwstreep en keel geel, rest van kop citroengeel. Van boven olijfgrijs met donkere strepen. Onder olijf, meer olijfbroin, op buik met vage olijf strepen. Broedvogel. <b>XVI.798.94</b></p>
 <p>man                      vrouw</p>	<p><b>Bobolink,</b> <i>Dolichonyx oryzivorus,</i> Bobolink 16-18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte, Laaglandbos</p>	<p>Man in winter: Kop overwegend bleek beige, ook brede wenkbrauwstreep. Daaronder donkere streep achter het oog en erboven een donkere kroonstreep. Er is een beige kroonstreep in het midden. Van boven beige met donkere strepen, vleugel donkerbruin, veren licht gerand. Staart donkergrijs. Keel wit, onder romig beige, lager met donkere strepen. Vrouw in winter: Als man maar helderder, de veren boven hebben oranjebeige tot oranje randen, gezicht en onderzijde met oranjebeige waas. Migrant uit het noorden. <b>XVI.803.103</b></p>
	<p><b>Red-breasted blackbird,</b> <i>Sturnella militaris,</i> Zwartkopsoldatenspreeuw ♂: 19; ♀: 18 cm (Kwartel 16-18)</p> <p>Kustvlakte</p>	<p>♂: Zwart. Keel en borst helder karmozijnrood, rode vlek in vleugelbocht. Iris zwartbruin, snavel zwart. ♀: Kop en bovendelen zwartachtig en beige. Beige wenkbrauwstreep en kroonstreep. Enig rood bij vleugelbocht. Van onder beige, donker gestreept op borst en flanken. Midden onder rose. Onderstaartdekveren fijn zwart gestreept. Snavel hoornkleurig. Broedvogel. <b>XVI.804.104</b></p>
	<p><b>Eastern meadowlark,</b> <i>Sturnella magna praticola,</i> Witkaakweidespreeuw 20-24 cm (Spreeuw 19-22)</p> <p>Zuidelijke savanne</p>	<p>♂: Kroon zwart, lichtbeige tot witte middenkroonstreep; lange wenkbrauwstreep beigewit, het deel voor het oog geel. Oorstreek grijsbruin, zwarte oogstreep, witte snorstreep. Van boven en vleugels beige, zwart gestreept. Middelste veren van staart zwart gebandeerd, wat wit in buitenste veren. Van onder knalgeel met een V-vormige zwarte borstband. Donker gestreepte beige flanken en onderbuik. Iris bruin, snavel grijs. ♀: Duffer. Broedvogel. <b>XVI.806.110</b></p>

**Index:**

<b>A</b>	<i>accipitrinus, Deroptyus</i>	50	<i>aethereus, Nyctibius</i>	56
Aalscholver, bigua-	6 <i>Actitis macularius</i>	35	, <i>Phaethon</i>	5
Aalscholvers	6 <i>acuta, Anas</i>	14	<i>affinis, Aythya</i>	14
<i>Accipiter bicolor</i>	19 <i>acutipennis, Chordeiles</i>	57	Agami heron	9
<i>poliogaster</i>	18 <i>aenea, Chloroceryle</i>	69	<i>Agamia agami</i>	9
<i>superciliosus</i>	18 <i>aequinoctialis, Buteogallus</i>	19	Agamireiger	9
<i>Accipitridae</i>	16-22                      , <i>Geothlypis</i>	131	<i>ajaja, Platalea</i>	12
	<i>Aeronautes montivagus</i>	60	Alaskastrandloper	36

<i>alba</i> , <i>Ardea</i>	7	Amazoneijsvogel	70	Amerikaanse kwak	9
, <i>Calidris</i>	36	Amazonekroontiran	110	oehoe	53
, <i>Tyto</i>	53	Amazonemierklauwier	88	oeverloper	35
Albatros, geelneus-	3	Amazonemoortiran	112	regenwulp	34
Albatross, Atlantic yellow-nosed	3	Amazonemuggenvanger	127	reuzenijsvogel	70
Albatrossen	3	Amazonestern	41	roodstaart	130
Albatrosses	3	Amazonetangare	132	schaarbek	42
<i>albescens</i> , <i>Sunalaxis</i>	79	<i>amazonia</i> , <i>Thamnophilus</i>	88	slangenhalsvogel	6
<i>albicaudatus</i> , <i>Geranoaetus</i>	21	Amazonian antshrike	88	smient	13
<i>albicineta</i> , <i>Tachycineta</i>	121	barred woodcreeper	85	steltkluut	31
<i>albicollis</i> , <i>Nyctidromus</i>	58	black tyrant	112	torenvalk	24
, <i>Porzana</i>	29	motmot	71	watersnip	33
, <i>Pseudastur</i>	19	mouse-coloured tyrannulet	104	woudaap	10
, <i>Turdus</i>	125	pygmy-owl	54	zangers	129-131
<i>albifrons</i> , <i>Pithys</i>	95	royal flycatcher	110	Amethystboself	68
<i>albimarginatus</i> , <i>Myiarchus swainsoni</i>	117	scrub-flycatcher	106	Amethyst woodstar	68
<i>albirostris</i> , <i>Galbula</i>	71	squirrel cuckoo	51	<i>amethystina</i> , <i>Calliphlox</i>	68
<i>albiventer</i> , <i>Tachycineta</i>	121	sunbittern	31	<i>Ammodramus humeralis</i>	142
<i>albogularis</i> , <i>Contopus</i>	112	white hawk	19	<i>anaethetus</i> , <i>Onychoprion</i>	41
, <i>Tyrannus</i>	115	<i>amazonica</i> , <i>Amazona</i>	50	<i>analis</i> , <i>Formicarius</i>	96
<i>albolineatus</i> , <i>Lepidocolaptes</i>	86	<i>amazonicus</i> , <i>Thamnophilus</i>	88	<i>Anas acuta</i>	14
<i>albonotatus</i> , <i>Buteo</i>	21	American barn swallow	123	<i>bahamensis</i>	14
<i>albus</i> , <i>Eudocimus</i>	12	black tern	41	<i>Anatidae</i>	13-15
, <i>Procnias</i>	99	black vulture	15	<i>anatum</i> , <i>Falco peregrinus</i>	26
<i>Alcedinidae</i>	69-70	flamingo	12	Andesgierzwaluw, kleine	60
<i>alcyon</i> , <i>Megaceryle</i>	70	golden plover	32	<i>andrei</i> , <i>Taeniotriccus</i>	108
<i>alector</i> , <i>Crax</i>	27	great egret	7	<i>angolensis</i> , <i>Oryzoborus</i>	146
<i>altiloquus</i> , <i>Vireo</i>	128	kestrel	24	<i>angustirostris</i> , <i>Lepidocolaptes</i>	86
<i>amaurocephalus</i> , <i>Leptogon</i>	105	knot	36	<i>Anhima cornuta</i>	12
<i>Amaurolimnas concolor</i>	29	osprey, North	16	<i>Anhimidae</i>	12
<i>Amazilia brevirostris</i>	66	pygmy kingfisher	69	<i>Anhinga</i>	6
, <i>cupreicauda</i>	67	redstart	130	<i>Anhinga anhinga</i>	6
, <i>fimbriata</i>	67	royal tern	40	<i>Anhingidae</i>	6
, <i>leucogaster</i>	66	snipe, South	33	<i>ani</i> , <i>Crotophaga</i>	52
, <i>sapphirina</i>	65	swallow-tailed kite	16	Ani, greater	52
, <i>viridigaster</i>	67	wigeon	13	, grote	52
Amazilia, franje-	67	whimbrel	34	, kleine	52
, groenbuik-	67	<i>americana</i> , <i>Chloroceryle</i>	70	, smooth-billed	52
, Gmelins	66	, <i>Mareca</i>	13	Anioema	12
, koperstaart-	67	, <i>Mycteria</i>	11	<i>Anous minutus</i>	42
, witborst-	66	, <i>Spiza</i>	140	<i>antarcica</i> , <i>Catharacta</i>	38
Amazon kingfisher	70	, <i>Sporophila</i>	144	Antarctische grote skua, Sub-	38
skimmer	42	<i>americanus</i> , <i>Coccyzus</i>	50	Antbird, black-chinned	93
, blue-cheeked	49	, <i>Ibycter</i>	23	, black-headed	93
, orange-winged	50	Amerikaans purperhoen	30	, black-throated	94
, southern mealy	50	Amerikaans waterhoen	30	, blackish	92
, yellow-crowned	49	Amerikaanse bontbekplevier	32	, dusky	92
<i>Amazona amazonica</i>	50	bosruiter	35	, ferruginous-backed	94
, <i>dufresniana</i>	49	dodaars	2	, grey	92
, <i>farinosa</i>	50	dwergsperwer	18	, rufous-throated	95
, <i>ochrocephala</i>	49	dwergstern	41	, scale-backed	95
<i>amazona</i> , <i>Chloroceryle</i>	70	fregatvogel	7	, silvered	93
Amazone, blauwwang-	49	goudplevier	32	, spot-backed	95
, geelvoorhoofd-	49	grijze wouw	17	, spot-winged	94
, grote	50	havik, Zuid-	18	, warbling	93
, oranjevleugel-	50	kleine zilverreiger	8	, white-bellied	94
Amazonedwergal	28	klifzwaluw	123	, white-browed	93

Antbird, white-plumed	95	Ara, geelvleugel-	45	<i>Atticora melanoleuca</i>	122
, wing-banded	95	, groenvleugel-	45	<i>Attila cinnamomeus</i>	118
Antbirds, ground-	96-97	, macao-	45	<i>spadiceus</i>	119
Antbirds, typical	86-95	, roodbuik-	46	<i>Attila, bright-rumped</i>	119
Antcatcher, Venezulean silvered	93	, roodschouder-	46	, cinnamon	118
<i>anthracinus, Buteogallus</i>	20	<i>aracari, Pteroglossus</i>	74	, goudstuit	119
<i>Anthracothonax nigricollis</i>	63	Araçari, black-necked	74	, kaneel-	118
<i>viridigula</i>	63	, green	74	Audubon's shearwater	4
<i>Anthus lutescens</i>	123	<i>arada, Cyphorhinus</i>	124	Audubons pijlstormvogel	4
<i>antillarum, Sternula</i>	41	<i>Aramidae</i>	27	<i>augusti, Phaetornis</i>	62
Antpipit, ringed	105	<i>Aramides axillaris</i>	29	<i>Aulacorhynchus whitelianus</i>	74
Antpitta, spotted	96	<i>cajaneus</i>	29	<i>aura, Cathartes</i>	15
, thrush-like	96	<i>Aramus guarauna</i>	27	<i>aurea, Eupsittula</i>	46
, variegated	97	<i>ararauna, Ara</i>	45	<i>aureola, Pipra</i>	100
<i>Antrostomus rufus</i>	57	Arassari, groene	74	<i>aureus, Jacamerops</i>	72
Antshrike, Amazonian	88	, Whitely's	74	<i>auriculata, Zenaida</i>	43
, band-tailed	87	, zwartnek-	74	<i>aurita, Conophaga</i>	97
, barred	88	<i>Aratinga maculata</i>	50	<i>auritus, Heliothryx</i>	67
, black-crested	87	Aratinga, witoog-	46	<i>Automolus infuscatus</i>	81
, black-throated	87	Arctic jaeger	38	<i>ochrolaemus</i>	81
, cinereous	89	<i>Ardea alba</i>	7	<i>rubiginosus</i>	81
, dusky-throated	89	<i>cocoi</i>	7	<i>rufipileatus</i>	82
, fasciated	86	<i>Ardeidae</i>	7-11	<i>autumnalis, Dendrocygna</i>	13
, great	87	<i>Ardenna gravis</i>	4	Avocets & Stilts	31
, mouse-coloured	88	<i>ardesiacus, Thamnomanes</i>	89	<i>Avocettula recurvirostris</i>	64
, northern slaty	88	<i>Arenaria interpres</i>	36	Awlbill, fiery-tailed	64
, spot-winged	88	<i>arenarum, Sublegatus</i>	106	<i>axillaris, Aramides</i>	29
Anthrush, black-faced	96	Arend, bonte kuif-	22	, <i>Myrmotherula</i>	90
, rufous-capped	96	, tirankuif-	22	<i>Aythia affinis</i>	14
, short-tailed	96	, wurg-	22	Azure gallinule	30
, Venezuelan	96	, zwart-witte kuif-	22	Azuurpurperhoen	30
Antvireo, white-streaked	88	, zwarte kuif-	22	<b>B</b>	
Antwren, ash-winged	91	Arendbuiserd, zwarte	20	Baardkoekoek, bonte	72
, brown-bellied	89	<i>Arremon taciturnus</i>	142	, gekraagde	73
, dot-winged	91	Arrowhead piculet	75	, gevlekte	72
, grey	90	<i>Arundinicola leucocephala</i>	112	, Guyana-	73
, Guianan streaked	89	Ash-throated crane	29	, witborst-	73
, long-winged	90	Ash-winged antwren	92	, zwaluw-	73
, plain-winged	90	Ashy-headed greenlet	129	Baardkoekoeken	72-73
, pygmy	89	<i>Asio clamator</i>	55	Baardkolibrie, zwartkeel-	61
, rufous-bellied	89	<i>flammeus</i>	55	Baardtiran	105
, rufous-rumped	91	<i>stygius</i>	55	Baardvireo	128
, rufous-winged	91	<i>assimilis, Tolmomyias</i>	109	Baardvogel, zwarte	74
, rusty-backed	91	<i>ater, Daptrius</i>	23	Baardvogels	74
, spot-tailed	90	<i>Athene cucularia</i>	55	Bahamapijlstaart	14
, Todd's	91	Atlantic bridled tern	41	<i>bahamensis, Anas</i>	14
, white-flanked	90	brown noddy	42	Baird's sandpiper	37
, white-fringed	91	pelican	5	<i>bairdii, Calidris</i>	37
Aplomado falcon	25	kittiwake	39	Bairds strandloper	37
Aplomadovalk	25	roseate tern	40	<i>bambla, Microcerculus</i>	124
<i>Apodidae</i>	59-61	yellow-nosed albatross	3	Bananaquit	140
<i>Apus apus</i>	61	<i>atra, Monasa</i>	73	Band-rumped storm-petrel	5
<i>Ara ararauna</i>	45	<i>atratus, Coragyps</i>	15	swift	59
<i>chloropterus</i>	45	<i>atricapilla, Donacobius</i>	124	Band-tailed antshrike	87
<i>macao</i>	45	<i>atricilla, Larus</i>	39	Banded woodcreeper, black-	85
<i>severus</i>	46	<i>atronitens, Xenopipo</i>	101	Bandijsvogel	70
Ara, blauw-gele	45	<i>atrothorax, Myrmeciza</i>	94	Bandstaartbuiserd	21
, dwerg-	46	<i>Atticora fasciata</i>	122	Bandstaartmierklauwier	87

<i>barbatus, Myiobius</i>	110	Black hawk, common	20	Bladkrabber, kortsnavel-	82
Barbet, black-spotted	74	, great	20	, zwartstaart-	82
Barbets	74	hawk-eagle	22	Bladspeurder, bruinkeel-	81
Barbthroat, pale-tailed	61	manakin	101	, kaneelstuit-	81
Bare-necked fruitcrow	98	noddy	42	, olijfrug-	81
Barn swallow	123	, Caribbean	42	, roodkruin-	82
, American	123	nunbird	73	, roodstaart-	80
Barn-owl, common	53	skimmer	42	, roodstuit-	81
Barn-owls	53	tern	41	, rosse	81
Barred antshrike	88	, American	41	Blauw-witte zwaluw	122
forest-falcon	24	vulture, American	15	Blauwe grondduif	44
piprites, wing-	101	Black-and-white hawk-eagle	22	pitpit	136
woodcreeper, Amazonian	85	Black-backed gull, lesser	39	reiger, kleine	8
<i>Bartramia longicauda</i>	34	Black-banded owl	54	suikervogel	137
Bartrams ruiters	34	woodcreeper	85	Blauwgele ara	45
<i>Basileuterus rivularis</i>	131	Black-bellied cuckoo	51	Blauwkapmotmot	71
Bat falcon	25	whistling-duck,	13	Blauwkeelgoean	26
<i>batavicus, Touit</i>	48	southern	13	Blauwkeelsaffierkolibrie	65
Bay-headed tanager	135	Black-billed thrush	125	Blauwbrugbisschop	141
Bearded tachuri	105	Black-capped becard	120	Blauwsnavelmuisspecht	85
Beardless tyrannulet, southern	104	Black-chested tyrant	108	Blauwstaartsmaragdkolibrie	65
Becard, black-capped	120	Black-chinned antbird	93	Blauwvleugeltaling	14
, Cayenne-	120	Black-collared hawk	20	Blauwwangamazone	49
, cinereous	120	swallow	122	Bloedrode tangare?	139
, glossy-backed	120	Black-crested antshrike	87	Bloedrugspecht	76
, green-backed	119	Black-crowned night-heron	9	Blonde ruiters	37
, pink-throated	120	tityra	119	Blood-coloured woodpecker	76
, white-winged	120	Black-eared fairy	67	Blood-red tanager	139
<i>behni, Myrmotherula</i>	90	Black-faced antthrush	96	Blue dacnis	136
Behns miersluiper	90	dacnis	136	Blue ground-dove	44
Bekarde, Cayenne-	120	hawk	19	Blue heron, little	8
, grijze	120	tanager	131	Blue-and-white swallow	122
, groenrug-	119	Black-headed antbird	93	Blue-and-yellow macaw	45
, roodkeel-	120	gull	39	Blue-backed manakin	100
, witvleugel-	120	parrot	48	tanager	134
, zwartkap-	120	Black-hooded thrush	126	Blue-black grassquit	143
Bellbird, white	99	Black-legged kittiwake	39	grosbeak	141
Belted gnateater, chestnut-	97	Black-necked araçari	74	Blue-cheeked amazon	49
kingfisher	70	stilt	31	Blue-chinned sapphire	65
Bergkwartelduif	45	Black-spotted barbet	74	Blue-diademed motmot	71
Bergwatersnip	33	Black-tailed leaftosser	82	Blue-grey tanager	134
<i>Berlepschia rikeri</i>	80	tityra	119	Blue-headed parrot	49
<i>bicolor, Accipiter</i>	19	trogon	69	Blue-tailed emerald	65
, <i>Conirostrum</i>	138	Black-throated antbird	94	Blue-throated piping-guan	26
, <i>Dendrocygna</i>	13	antshrike	87	Blue-winged teal	14
Bicoloured conebill	138	mango	63	Boatbilled heron	9
hawk	19	trogon	69	, southern	9
<i>bidentatus, Harpagus</i>	17	Black-tyrant, Amazonian	112	flycatcher	115
Bigua-aalscholver	6	Black-whiskered vireo	128	tody-tyrant	107
<i>bilophus, Heliactin</i>	68	Black-winged stilt	31	Bobolink	148
Bisschop, blauwbrug-	141	Blackbird, red-breasted	148	Bobwhite, crested	27
Bisschopskwartelduif	45	, yellow-hooded	148	, kuif-	27
Bisschopstangare	134	Blackbirds, New World	146-149	, Sonnini's	27
Bittern, least	10	Blackburnian warbler	130	Boerenzwaluw	123
, pinnated	11	Blackish antbird	92	Bonapartes strandloper	37
, stripe-backed	10	nightjar	58	<i>bonariensis, Molothrus</i>	147
Black caracara	23	Blackpoll warbler	130	Bont dikbekje	144
curassow	27	Bladkrabber, bruinkeel-	82	Bontbekplevier, Amerikaanse	32

Bonte baardkoekoek	72	Breedbektiran, spiegel-	109	Buff-throated foliage-gleaner	81
Bonte bosuil	54	, wenkbrauw-	118	saltator	141
Bonte buizerd, grote	19	, witkuif-	110	woodcreeper	85
Bonte koningsmierpitta	97	Breedvleugelbuizerd	21	Buffon's piculet	75
Bonte kuifarend	22	<i>brevirostris</i> , <i>Amazilia</i>	66	<i>buffoni</i> , <i>Circus</i>	18
Bonte manakin	101	, <i>Crypturellus</i>	2	Buffons kiekendief	18
Bonte mierlijster	95	Bridled tern	41	Buidelspreeuw, geelstuit-	146
Bonte miersluiper	90	, Atlantic	41	, roodstuit	146
Bonte parkiet	47	Bright-rumped attila	119	Buizerd, bandstaart-	21
Bonte slechtvalk	25	Briljantkolibrie, tepui-	67	, breedvleugel-	21
Bonte stern	41	Brilliant, velvet-browed	67	, grijze	20
Bonte tinamoe	2	Brilstern	41	, grote bonte	19
Bonte tiran	115	Briluil	54	, kortstaart-	21
Bonte watertiran	112	Broad-winged hawk	21	, krabben-	19
Bontkeelsaltator	141	Bronskleurige glansvogel	71	, moeras-	20
Boobies & Gannets	5-6	Bronsspecht	77	, savanne-	20
Booby, brown	5	Bronzen schiffornis	102	, weg-	21
, masked	6	Bronzy jacamar	71	, witstaart-	21
, red-footed	6	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	47	, zwarte	20
Bootsnaveltiran	115	Brown booby	5	, zwarte arend-	20
Bootsnaveltodietiran	107	jacamar	71	, zwartmasker-	19
<i>borealis</i> , <i>Calonectris</i>	4	, northern	71	Bulwer's petrel	3
Boselenia	102	noddy	42	<i>Bulweria bulwerii</i>	3
Boself, amethist-	68	, Atlantic	42	Bulwers stormvogel	3
Bosnimf, vorkstaart-	65	pelican	5	Burnished-buff tanager	135
Bosral, Cayenne	29	skua	38	<i>burrovianus</i> , <i>Cathartes</i>	15
, effen	29	violet-ear	63	Burrowing owl	55
, roodnek-	29	woodcreeper, plain-	83	, lesser	55
Bosruiter, Amerikaanse	35	Brown-bellied antwren	89	<i>Busarellus nigricollis</i>	20
Bosuif, bonte	54	Brown-chested martin	122	<i>Buteo albonotatus</i>	21
, zwartgestreepte	54	Brown-crested flycatcher	118	<i>brachyurus</i>	21
Bosvalk, gebandeerde	24	Brown-throated parakeet	47	<i>Buteo nitidus</i>	20
, gestreepte	24	<i>browni</i> , <i>Sicalis citrina</i>	143	<i>platypterus</i>	21
, grote	24	Bruin margrietje	49	<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	19
, Mirandolles	24	Bruine gent	5	<i>anthracinus</i>	20
Boswinterkoning	124	klauwiertangare	133	<i>meridionalis</i>	20
<i>Botaurus pinnatus</i>	11	krooneend	14	<i>urubitinga</i>	20
<i>bourcieri</i> , <i>Phaetornis</i>	62	pelikaan	5	<i>Butorides striata</i>	8,9
<i>bouvreuil</i> , <i>Sporophila</i>	145	violetoorkolibrie	63	<b>C</b>	
<i>bouvronides</i> , <i>Sporophila</i>	144	Bruinborstzwaluw	122	Cabot's tern	40
<i>Brachygalba lugubris</i>	71	Bruinbuikmiersluiper	89	Cacaolijster	126
<i>brachyura</i> , <i>Chaetura</i>	60	Bruinkapheremietkolibrie	62	<i>cachinnans</i> , <i>Herpetotheres</i>	23
, <i>Myrmotherula</i>	89	Bruinkapleptogon	105	<i>Cacicus cela</i>	146
<i>brachyurus</i> , <i>Buteo</i>	21	Bruinkeelbladkrabber	82	<i>haemorrhous</i>	146
Bran-coloured flycatcher	110	Bruinkeelbladspuurder	81	Cacique, red-rumped	146
<i>brasilianum</i> , <i>Glaucidium</i>	55	Bruinkeelglansvogel	71	, Trinidad yellow-rumped	146
<i>brasilianus</i> , <i>Phalacrocorax</i>	6	Bruinkeelmuispecht	84	, yellow-rumped	146
Braziliaanse dwergal	28	Bruinkopbreedbektiran	109	<i>caerulea</i> , <i>Egretta</i>	8
dwerguil	55	Bruinvlekmiervogel	95	<i>caerulescens</i> , <i>Geranospiza</i>	19
palmgierzwaluw	60	Bruinwangvireo	129	<i>caeruleus</i> , <i>Cyanerpes</i>	137
Brazilian dove	44	<i>Bubo virginianus</i>	53	<i>caesius</i> , <i>Thamnomanes</i>	89
Breedbektiran, bruinkop-	109	<i>Bubulcus ibis</i>	8	Caica parrot	49
, geelbuik-	109	<i>Bucco capensis</i>	73	<i>caica</i> , <i>Pyrilia</i>	49
, geelkap-	110	<i>Bucconidae</i>	72-73	Caicapapegaaï	49
, grijskruin-	109	Buff tanager, burnished	135	Caique, zwartkop-	48
, groene	109	Buff-breasted sandpiper	37	<i>Cairina moschata</i>	13
, groenkap-	109	wren	123	<i>cajaneus</i> , <i>Aramides</i>	29
, roodstaart-	118	Buff-cheeked greenlet	129	<i>Calidris alba</i>	36



<i>Calidris bairdii</i>	37	<i>carbo</i> , <i>Ramphocelus</i>	134	<i>Celeus torquatus</i>	78
<i>canutus</i>	36	Cardinal, red-capped	143	<i>undatus</i>	78
<i>fuscicollis</i>	37	<i>Cardinalidae</i>	141-142	Centraal-Amerikaanse roodkopgier	15
<i>himantopus</i>	37	Cardinals	141-142	Central American turkey vulture	15
<i>mauri</i>	36	Carib grackle	147	<i>Cercomacra cinerascens</i>	92
<i>melanotos</i>	37	Caribbean black noddy	42	<i>nigrescens</i>	92
<i>minutilla</i>	36	Caribbean martin	121	<i>tyrannina</i>	92
<i>pusilla</i>	36	Caribbean sooty tern	41	<i>certhia</i> , <i>Dendrocolaptes</i>	85
<i>subruficollis</i>	37	Caribische flamingo	12	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	80
<i>callinota</i> , <i>Terenura</i>	92	purperzwaluw	121	Chacalaca, gevlekte	26
<i>Calliphlox amethystina</i>	68	troepiaal	147	, kleine	26
<i>Calonectris borealis</i>	4	<i>caripensis</i> , <i>Steatornis</i>	55	, little	26
<i>campanisoma</i> , <i>Chamaeza</i>	96	<i>carnifex</i> , <i>Phoenicircus</i>	99	Chachalaca's, Sjakohoenders,	
, <i>Myrmothera</i>	96	<i>Caryothraustes canadensis</i>	141	Goeans & Hokko's	26-27
<i>Campephilus melanoleucos</i>	79	<i>cassini</i> , <i>Veniliornis</i>	76	Chacalacas, Guans &	
<i>rubricollis</i>	79	<i>castaneiventris</i> , <i>Sporophila</i>	145	Curassows	26-27
<i>campestris</i> , <i>Colaptes</i>	77	<i>castro</i> , <i>Hydrobates</i>	5	<i>Chaetura brachyura</i>	60
Campo flicker	77	<i>Catharacta antarctica</i>	38	<i>chapmani</i>	59
Campogrondspecht	77	<i>maccormicki</i>	38	<i>meridionalis</i>	60
Campospotlijster	125	<i>Cathartes aura</i>	15	<i>spinicaudus</i>	59
<i>Camptostoma obsoletum</i>	104	<i>burrovianus</i>	15	Chalk-browed mockingbird	125
<i>Campylopterus largipennis</i>	62	<i>melambrotus</i>	15	<i>chalybea</i> , <i>Progne</i>	121
<i>Campyloramphus procurvoides</i>	86	<i>Cathartidae</i>	15-16	<i>Chamaeza campanisoma</i>	96
<i>canadensis</i> , <i>Sakesphorus</i>	87	<i>Catharus minimus</i>	126	Channel-billed toucan	75
, <i>Caryothraustes</i>	141	Cattle egret	8	Chapman's swift	59
Canadian ruddy turnstone	36	, western	8	<i>chapmani</i> , <i>Chaetura</i>	59
<i>candidus</i> , <i>Melanerpes</i>	76	<i>caudacutus</i> , <i>Sclerurus</i>	82	Chapmans gierzwaluw	59
<i>caniceps</i> , <i>Myiopagis</i>	101	<i>caudata</i> , <i>Inezia</i>	106	<i>Charadriidae</i>	31-33
<i>cantator</i> , <i>Hypocnemis</i>	93	<i>cayana</i> , <i>Cotinga</i>	98	<i>Charadrius collaris</i>	33
<i>canutus</i> , <i>Calidris</i>	36	, <i>Dacnis</i>	136	<i>semipalmatus</i>	32
Cape Verde petrel	3	, <i>Piaya</i>	51	<i>wilsonia</i>	32,33
<i>capensis</i> , <i>Bucco</i>	73	, <i>Tangara</i>	135	Chat, rose-breasted	131
, <i>Zonotrichia</i>	142	, <i>Tityra</i>	119	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	73
<i>Capito niger</i>	74	<i>cayanensis</i> , <i>Icterus</i>	147	<i>cheriway</i> , <i>Caracara</i>	23
<i>Capitonidae</i>	74	, <i>Leptodon</i>	16	Chestnut woodpecker	78
Capped becard, black-	120	, <i>Myiozetetes</i>	113	Chestnut-backed jacana	31
cardinal, red-	143	<i>cayanus</i> , <i>Cyanocorax</i>	127	Chestnut-bellied seedeater	145
flycatcher, dusky-	117	, <i>Hoploxypterus</i>	31	seed-finch	145
, sepia-	105	Cayenne jay	127	Chestnut-belted gnateater	97
heron	7	lapwing	32	Chestnut-crowned foliage-gleaner	82
seedeater	145	Cayenne-bosral	29	Chestnut-fronted macaw	46
shrike-vireo, slaty-	128	Cayennebekarde	120	Chestnut-rumped woodcreeper	85
<i>Caprimulgidae</i>	57-59	Cayennegaai	127	Chestnut-vented conebill	138
<i>Capsiempis flaveola</i>	104	Cayennegierzwaluw	60	Chileense kievit	32
Capuchinbird	99	Cayennekievit	31	<i>chilensis</i> , <i>Tangara</i>	135
Capuchonvogel	99	Cayennemuggeneter	97	, <i>Vanellus</i>	32
<i>Caracara cheriway</i>	23	Cayenneorganist	139	<i>chimachima</i> , <i>Milvago</i>	23
Caracara, black	23	Cayennestekelstaart	80	<i>chiriquensis</i> , <i>Elaenia</i>	103
, crested	23	Cayennetiran	118	<i>Chiroxiphia pareola</i>	100
, geelkop-	23	Cayennewouw	16	<i>Chlidonias niger</i>	41
, kuif-	23	<i>cayennensis</i> , <i>Euphonia</i>	139	<i>chloris</i> , <i>Piprites</i>	101
, noordelijke kuif	23	, <i>Hydropsalis</i>	58	<i>Chloroceryle aenea</i>	69
, northern crested	23	, <i>Mesembrinibis</i>	11	<i>amazona</i>	70
, red-throated	23	, <i>Panyptila</i>	60	<i>americana</i>	70
, roodkeel-	23	, <i>Patagioenas</i>	42	<i>inda</i>	70
, yellow-headed	23	<i>cela</i> , <i>Cacicus</i>	146	<i>Chlorophanes spiza</i>	137
, zwarte	23	<i>Celeus elegans</i>	78	<i>chloropterus</i> , <i>Ara</i>	45
Caracaras	23-26	<i>flavus</i>	78	<i>chlororhynchos</i> , <i>Thalassarche</i>	3

<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	65	Cocoa thrush	126	Cormorant, neotropic	6
<i>notatus</i>	65	Cocoi heron	7	Cormorants	6
<i>chlorotica</i> , <i>Euphonia</i>	138	<i>cocoi</i> , <i>Ardea</i>	7	<i>cornuta</i> , <i>Anhima</i>	12
<i>choliba</i> , <i>Megascops</i>	53	<i>Coereba flaveola</i>	140	<i>coronatus</i> , <i>Onychorhynchus</i>	110
Cholibaschreeuwuil	53	<i>coerulescens</i> , <i>Saltator</i>	141	, <i>Platyrrinchus</i>	110
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	16	<i>Colaptes campestris</i>	77	<i>Corvidae</i>	127
<i>Chordeiles acutipennis</i>	57	<i>punctigula</i>	77	Cory's shearwater	4
<i>nacunda</i>	57	<i>rubiginosus</i>	77	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	143
<i>pusillus</i>	57	<i>Colibri delphinae</i>	63	<i>Corythopsis torquatus</i>	105
<i>chrysocephalum</i> , <i>Neopelma</i>	101	<i>Colinus cristatus</i>	27	<i>Cotinga cayana</i>	98
<i>chrysocephalus</i> , <i>Icterus</i>	147	Collared forest-falcon	24	<i>cotinga</i>	97
<i>chrysochloros</i> , <i>Piculus</i>	77	gnatwren	127	Cotinga, Guianan red	99
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	64	hawk, black	21	, halsband-	98
<i>Chrysomus icterocephalus</i>	148	plover	33	, pompadour(-)	98
<i>chrysopasta</i> , <i>Euphonia</i>	139	puffbird	73	, purperborst-	98
<i>chrysoptera</i> , <i>Brotogeris</i>	47	sand martin	121	, purple-breasted	98
<i>Ciccaba huhula</i>	54	swallow, black-	122	, rode	99
<i>virgata</i>	54	trogon	69	, spangled	98
<i>Cichlopsis leucogenys</i>	126	, southern	69	, zwartkapdwerg-	98
<i>Ciconia maguari</i>	11	<i>collaris</i> , <i>Charadrius</i>	33	Cotinga's	97-99
<i>Ciconiidae</i>	11	, <i>Microbates</i>	127	Cotingas	97-99
<i>cinerascens</i> , <i>Cercomacra</i>	92	, <i>Trogon</i>	69	<i>Cotingidae</i>	97-99
Cinereous antshrike	89	<i>colma</i> , <i>Formicarius</i>	96	Cowbird, giant	147
becard	120	<i>Colonia colonus</i>	113	, shiny	147
mourner	119	<i>columbarius</i> , <i>Falco</i>	25	Crab-hawk, rufous	19
tinamou	1	<i>Columbidae</i>	42	<i>Cracidae</i>	26-27
<i>cinereum</i> , <i>Todirostrum</i>	108	<i>Columbina minuta</i>	44	Crake, ash-throated	29
<i>cinereus</i> , <i>Contopus</i>	111	<i>passerina</i>	43	, grey-breasted	28
, <i>Crypturellus</i>	1	<i>talpacoti</i>	44	, ocellated	28
, <i>Xolmis</i>	113	Common barn-owl	53	, paint-billed	30
<i>cinnamomea</i> , <i>Neopipo</i>	111	black hawk	20	, rufous-sided	28
<i>cinnamomeus</i> , <i>Attila</i>	118	gallinule	30	, russet-crowned	28
, <i>Certhiaxis</i>	80	ground-dove	43	, uniform	29
<i>cinnamominus</i> , <i>Charadrius wilsonia</i>	33	potoo	56	, yellow-breasted	29
Cinnamon attila	118	squirrel cuckoo	51	Crane hawk	19
tyrant	111	swift	61	Crane hawk, grey	19
Cinnamon-crested spadebill	109	tern	40	<i>Cranioleuca gutturata</i>	80
Cinnamon-rumped foliage-gleaner	81	tody-flycatcher	108	<i>crassirostris</i> , <i>Oryzoborus</i>	145
Cinnamon-throated woodcreeper	84	<i>concolor</i> , <i>Amaurolimnas</i>	29	<i>Crax alector</i>	27
<i>Circus buffoni</i>	18	Conebill, bicoloured	138	Cream-coloured woodpecker	78
<i>Cissopis leverianus</i>	131	, chestnut-vented	137	Creeper, Amazonian barred wood-	85
<i>citrea</i> , <i>Protonotaria</i>	130	<i>Conirostrum bicolor</i>	138	, black-banded wood-	85
<i>citrina</i> , <i>Sicalis</i>	143	<i>speciosum</i>	137	, buff-throated wood-	85
Citroenzanger	130	<i>Conopias parvus</i>	114	, chestnut-rumped wood-	85
<i>clamator</i> , <i>Asio</i>	55	<i>Conopophaga aurita</i>	97	, cinnamon-throated wood-	84
<i>Claravis pretiosa</i>	44	<i>Conopophagidae</i>	97	, line-throated wood-	83
Cliff flycatcher	111	<i>Contopus albugularis</i>	112	, lineated wood-	86
Cliff swallow	123	<i>cinereus</i>	111	, long-tailed wood-	83
<i>climacocerca</i> , <i>Hydropsalis</i>	58	<i>cooperi</i>	111	, narrow-billed wood-	86
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	111	Coots, Rails & Gallinules	28-30	, plain-brown wood-	83
<i>Coccyua minuta</i>	52	Copper-tailed hummingbird	67	, point-tailed palm-	80
<i>Coccyzus americanus</i>	50	Coquette, racket-tailed	65	, red-billed wood-	84
<i>euleri</i>	51	, tufted	64	, spot-throated wood-	84
<i>melacoryphus</i>	51	<i>Coragyps atratus</i>	15	, straight-billed wood-	86
<i>minor</i>	51	<i>Corapipo gutturalis</i>	100	, striped wood-	85
<i>Cochlearius cochlearius</i>	9	<i>Coraya coraya</i>	123	, strong-billed wood-	84
Cock-of-the-rock, Guianan	99	Coraya wren	123	, wedge-billed wood-	84
		Corayawinterkoning	123	, white-chinned wood-	83

Creepers, wood	83-86	Cuckoos	50-52	Dikbekje, dwerg-	145
<i>crepitans</i> , <i>Psophia</i>	28	<i>Cuculidae</i>	50-52	, geelbuik-	144
Crested antshrike, black-	87	<i>cucullatus</i> , <i>Coryphospingus</i>	143	, Lessons	144
bobwhite	27	<i>cumanensis</i> , <i>Pipile</i>	26	, loodgrijs	144
caracara	23	<i>cunicularia</i> , <i>Athene</i>	55	, oranje	145
, northern	23	<i>cupreicauda</i> , <i>Amazilia</i>	67	, roodbuik-	145
eagle, Guiana	22	Curassow, black	27	, witbuik-	145
elaenia, plain-	103	Curassows, Chacalacas & Guans		, witster-	144
finch, red-	143		26-27	Dikbekplevier	32,33
flycatcher, brown-	118	Curve-billed scythebill	86	Dikbekzaadkraker	145
, short-	118	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	137	<i>diodon</i> , <i>Harpagus</i>	18
oropendola	146	<i>cyaneus</i>	137	<i>Diomedeidae</i>	3
owl	54	<i>nitidus</i>	136	<i>Diopsittaca nobilis</i>	46
, southern	54	<i>cyaneus</i> , <i>Cyanerpes</i>	137	<i>discors</i> , <i>Spatula</i>	14
spadebill, cinnamon-	109	<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	134	<i>Discosura longicauda</i>	65
, white-	110	<i>cianocephala</i> , <i>Euphonia</i>	138	<i>Dixiphia pipra</i>	100
tanager, flame-	132	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	141	Dodaars, Amerikaanse	2
, fulvous-	133	<i>Cyanocorax cayanus</i>	127	<i>doliatus</i> , <i>Thamnophilus</i>	88
tyrant-manakin, saffron-	101	<i>cyanoides</i> , <i>Cyanocompsa</i>	141	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	148
woodpecker, crimson-	79	<i>cyanoleuca</i> , <i>Notiochelidon</i>	122	<i>domesticus</i> , <i>Passer</i>	128
Crimson fruitcrow	98	<i>cyanus</i> , <i>Hylocharis</i>	66	<i>dominica</i> , <i>Pluvialis</i>	32
topaz	64	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	128	<i>dominicensis</i> , <i>Progne</i>	121
Crimson-crested woodpecker	79	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	86	, <i>Tyrannus</i>	116
Crimson-hooded manakin	100	<i>Cyphorhinus arada</i>	124	<i>dominicus</i> , <i>Nomonyx</i>	15
<i>cristata</i> , <i>Elaenia</i>	103	<i>Cypseloides cryptus</i>	59	, <i>Tachybaptus</i>	2
, <i>Lophostrix</i>	54	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	132	Donacobius	124
<i>cristatus</i> , <i>Colinus</i>	27	<b>D</b>		<i>Donacobius atricapilla</i>	124
, <i>Oxyruncus</i>	97	<i>Dacnis cayana</i>	136	Donacobius, zwartkop-	124
, <i>Tachyphonus</i>	132	<i>lineata</i>	136	Donkerbruine schreeuwuil	53
<i>Crotophaga ani</i>	52	Dacnis, black-faced	136	Donkere vliegenpikker	106
<i>major</i>	52	, blue	136	Donkergrijze wouw	18
Crow, bare-necked fruit-	98	<i>dactylatra</i> , <i>Sula</i>	6	Dot-winged antwren	91
, crimson fruit-	98	<i>Daptrius ater</i>	23	Dotted tanager	135
, purple-throated fruit-	98	Dark-billed cuckoo	51	Double-banded pygmy-tyrant	107
Crowned flycatcher, grey-	109	Darters	6	Double-toothed kite	17
foliage-gleaner, chestnut-	82	<i>dea</i> , <i>Galbula</i>	72	<i>dougallii</i> , <i>Sterna</i>	40
greenlet, tawny-	129	<i>Deconychura longicauda</i>	83	Dougalls stern	40
puffbird, spot-	72	<i>stictolaema</i>	84	Dove, blue ground-	44
spadebill, golden-	110	<i>decumanus</i> , <i>Psarocolius</i>	146	, Brazilian	44
tityra	119	<i>deiroleucus</i> , <i>Falco</i>	25	, common ground-	43
Crows	127	<i>delicata</i> , <i>Gallinago</i>	33	, eared	43
<i>cruentatus</i> , <i>Melanerpes</i>	76	<i>delphinae</i> , <i>Colibri</i>	63	, grey-fronted	44
<i>Crypturellus brevirostris</i>	2	<i>Dendrexetastus rufigula</i>	84	, mourning	43
<i>cinereus</i>	1	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	83	, plain-breasted ground-	44
<i>erythropus</i>	2	<i>merula</i>	83	, ruddy ground-	44
<i>soui</i>	2	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	85	, ruddy quail-	45
<i>variegatus</i>	2	<i>picumnus</i>	85	, violaceous quail-	45
<i>cryptus</i> , <i>Cypseloides</i>	59	<i>Dendrocolaptidae</i>	83-86	, white-tipped	44
Cuckoo, Amazonian squirrel	51	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	13	Doves & Pigeons	42-45
, black-bellied	51	<i>bicolor</i>	13	Dowitcher, eastern	34
, common squirrel	51	<i>viduata</i>	13	, short-billed	34
, dark-billed	51	<i>Dendroica fusca</i>	130	Drab water-tyrant	112
, little	52	<i>petechia</i>	130	Drieteenmeeuw	39
, mangrove	51	<i>striata</i>	130	Drieteenstrandloper	36
, pavonine	52	<i>Deropterus accipitrinus</i>	50	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	52
, pearly-breasted	51	Dickcissel	140	Druppeltangare	135
, striped	52	Dikbekfuut	3	Dubbelbanddwergtiran	107
, yellow-billed	50	Dikbekje, bont	144	Duck hawk	26

Duck, black-bellied whistling-	13	Eagles & Hawks	16-22	Elf, amethystbos-	68
, fulvous whistling-	13	Eared dove	43	<i>Emberizidae</i>	142-146
, masked	15	Eastern dowitcher	34	<i>Emberizoides herbicola</i>	143
, Muscovy	13	kingbird	116	Emerald, blue-tailed	65
, southern black-bellied whistling-		long-tailed skua	39	, glittering-throated	67
....., white-faced whistling-	13	meadowlark	148	, plain-bellied	66
Ducks, Geese and Swans	13-15	willet	35	, white-chested	66
<i>dufresniana, Amazona</i>	49	<i>ecaudatus, Myiornis</i>	107	<i>Empidonomus varius</i>	115
Duif, bergkwartel-	45	Echte miervogels	86-95	Epaulet oriole	147
, bisschopskwartel-	45	Eekhoornkoekoek	51	<i>episcopus, Thraupis</i>	134
, blauwe grond-	44	, kleine	52	<i>erythrocephala, Pipra</i>	100
, dwerg-	44	Eend, bruine kroon-	14	<i>erythrocercum, Philydor</i>	81
, geoorde treur-	43	, muskus-	13	<i>erythromelas, Periporphyrus</i>	141
, geschubde	42	, roodsnavelfluit-	13	<i>erythrophtalma, Netta</i>	14
, grijskruin-	44	, rosse fluit-	13	<i>erythropus, Neocrex</i>	30
, loodgrijze	43	, witwangfluit-	13	<i>erythropus, Crypturellus</i>	2
, mus-	43	, zwartbuikfluit-	13	<i>erythrurus, Terenotriccus</i>	110
, purper-	43	Eenden & Ganzen & Zwanen	13-15	<i>Eucometis penicillata</i>	132
, rosse	42	Effen bosral	29	<i>Eudocimus albus</i>	12
, steen-	44	Egret, American great	7	, <i>ruber</i>	12
, treur-	43	, cattle	8	Euler's flycatcher	111
, Verreaux'	44	, great white	7	<i>euleri, Coccyzus</i>	51
Duiven	42-45	, little	8	, <i>Lathrotriccus</i>	111
Dusky antbird	92	, snowy	8	Eulers tiran	11
parrot	49	, western cattle	8	<i>Eupetomena macroura</i>	63
purpletuft	97	<i>Egretta caerulea</i>	8	<i>Euphonia cayennensis</i>	139
Dusky-billed parrotlet	47	<i>garzetta</i>	8	, <i>chlorotica</i>	138
Dusky-capped flycatcher	117	<i>thula</i>	8	<i>Euphonia chrysopasta</i>	139
Dusky-chested flycatcher	113	<i>tricolor</i>	7	, <i>cianocephala</i>	138
Dusky-throated antshrike	89	Ekstertangare	131	, <i>finschi</i>	139
Dwergara	46	<i>Elaenia chiriquensis</i>	103	, <i>minuta</i>	139
Dwergcotinga, zwartkap-	97	, <i>cristata</i>	103	, <i>plumbea</i>	138
Dwergdikbekje	145	, <i>flavogaster</i>	103	, <i>violacea</i>	139
Dwergduif	44	, <i>parvirostris</i>	103	Euphonia, Finsch's	138
Dwergijsvogel, groene	69	, <i>ruficeps</i>	104	, golden-rumped	138
Dwerglijster, grijswang-	126	Elaenia, forest	102	, golden-sided	139
Dwergmiersluisper	89	, greenish	103	, plumbeous	138
Dwergral, Amazone-	28	, grey	102	, purple-throated	138
, Braziliaanse	28	, lesser	103	, violaceous	139
Dwergspecht, Guyana-	75	, plain-crested	103	, white-lored	139
, kleine	75	, rufous-crowned	104	, white-vented	139
Dwergsperwer, Amerikaanse	18	, small-billed	103	<i>Eupsittula aurea</i>	46
Dwergstern, Amerikaanse	41	, yellow-bellied	103	, <i>pertinax</i>	47
Dwergtiran, dubbelband-	107	, yellow-crowned	103	<i>Eurypyga helias</i>	31
, geelbuik-	105	<i>Elanoides forficatus</i>	16	<i>Eurypygidae</i>	31
, helm-	107	<i>Elanus leucurus</i>	17	<i>Euscarthmus rufomarginatus</i>	105
, kortstaart-	107	<i>elatus, Tyrannulus</i>	102	<i>exilis, Ixobrychus</i>	10
Dwerguil, Braziliaanse	55	<i>elegans, Celeus</i>	78	, <i>Laterallus</i>	28
, Hardy's	54	, <i>Progne</i>	121	, <i>Picumnus</i>	75
Dwergvliegenpikker	102	Elenia, bos-	102	<b>F</b>	
<i>Dysithamnus leucostictus</i>	88	, geelbuik-	103	Fairy, black-eared	67
<b>E</b>		, geelkruin-	103	<i>Falco columbarius</i>	25
Eagle, black hawk-	22	, grijze	102	, <i>deiroleucus</i>	25
, black-and-white hawk-	22	, groene	103	, <i>femoralis</i>	25
, Guiana crested	22	, kap-	103	, <i>peregrinus</i>	25,26
, harpy	22	, kleine	103	, <i>ruficularis</i>	25
, ornate hawk-	22	, kortsnavel-	103	, <i>sparverius</i>	24
		, roodkruin-	104	Falcon, aplomado	25

Falcon, barred forest-	24	<i>flaviventris</i> , <i>Tolmomyas</i>	109	Foliage-gleaner, rufous-rumped	81
, bat	25	<i>flavivertex</i> , <i>Myiopagis</i>	103	, rufous-tailed	80
, collared forest-	24	<i>flavus</i> , <i>Celeus</i>	78	Forest elaenia	102
, laughing	23	Flicker, campo	77	Forest-falcon, barred	24
, lined forest-	24	<i>Florisuga mellivora</i>	63	, collared	24
, orange-breasted	25	Fluiteend, roodsnavel-	13	, lined	24
, peregrine	25,26	, rosse	13	, slaty-backed	24
, slaty-backed forest-	24	, witwang-	13	<i>forficatus</i> , <i>Elanoides</i>	16
, tundra	25	, zwartbuik-	13	Fork-tailed flycatcher	116
<i>Falconidae</i>	23-26	<i>Fluvicola pica</i>	112	palm-swift	60
Falcons & Caracaras	23-26	Fluweeltangare	134	woodnymph	65
<i>farinosa</i> , <i>Amazona</i>	50	Flycatcher, Amazonian royal	110	<i>Formicariidae</i>	96-97
<i>fasciata</i> , <i>Atticora</i>	122	, Amazonian scrub-	106	<i>Formicarius analis</i>	96
, <i>Neothraupis</i>	131	, boat-billed	115	<i>colma</i>	96
Fasciated antshrike	86	, bran-coloured	110	<i>Formicivora grisea</i>	91
tiger-heron	10	, brown-crested	118	<i>rufa</i>	91
<i>fasciatum</i> , <i>Tigrisoma</i>	10	, cliff	111	<i>Forpus modestus</i>	47
<i>fasciatus</i> , <i>Myiophobus</i>	110	, common tody-	108	<i>passerinus</i>	47
<i>faae</i> , <i>Pterodroma</i>	3	, dusky-capped	117	Franjeamazilia	67
Feeënkolibrie, zwartoor-	67	, dusky-chested	113	Franjepoot, grote	38
<i>femoralis</i> , <i>Falco</i>	25	, Euler's	111	Franjepoten, Snippen & Strandlopers	33-38
<i>ferox</i> , <i>Myiarchus</i>	118	, fork-tailed	116	<i>Frederickena viridis</i>	87
<i>ferruginea</i> , <i>Hirundinea</i>	111	, fuscous	111	<i>Fregata magnificens</i>	7
, <i>Myrmeciza</i>	94	, grey-crowned	109	<i>Fregatidae</i>	7
Ferruginous pygmy-owl	55	, Lawrence's	111	Fregatvogel, Amerikaanse	7
Ferruginous-backed antbird	94	, McConnell's	106	Fregatvogels	7
Fiery-tailed awlbill	64	, northern scrub-	106	Frigatebird, magnificent	7
<i>fimbriata</i> , <i>Amazilia</i>	67	, ochre-bellied	106	Frigatebirds	7
Finch, chestnut-bellied seed-	145	, olive-sided	111	Fruitcrow, bare-necked	98
, grassland yellow-	143	, painted tody-	108	, crimson	98
, large-billed seed-	145	, Pelzeln's	117	, purple-throated	99
, red-crested	143	, piratic	113	Fuegian storm-petrel	4
, saffron	142	, royal	110	<i>fulica</i> , <i>Heliornis</i>	30
, stripe-tailed yellow-	142	, ruddy-tailed	110	<i>fuliginosa</i> , <i>Dendrocincla</i>	83
, wedge-tailed grass-	143	, rusty-margined	113	Fulvous shrike-tanager	133
Finfoots	30	, sepia-capped	105	whistling-duck	13
Finsch' organist	139	, short-crested	118	Fulvous-crested tanager	133
Finsch's euphonia	139	, smoky-fronted tody-	108	<i>fulvus</i> , <i>Lanio</i>	133
<i>finschi</i> , <i>Euphonia</i>	139	, smooth scrub-	106	<i>fumifrons</i> , <i>Poecilotriccus</i>	108
Flame-crested tanager	132	, southern scrub-	106	<i>fumigatus</i> , <i>Turdus</i>	126
<i>flammeus</i> , <i>Asio</i>	55	, spotted tody-	108	<i>fumosus</i> , <i>Sakesphorus canadensis</i>	87
Flamingo, American	12	, streaked	114	<i>furcata</i> , <i>Thalurania</i>	65
, Caribische	12	, suiriri	104	<i>Furnariidae</i>	79-83
Flamingo's	12	, sulphury	115	<i>fusca</i> , <i>Dendroica</i>	130
Flatbill, large-headed	118	, Swainson's	117	, <i>Iodopleura</i>	97
, olivaceous	109	, variegated	115	, <i>Malacoptila</i>	73
, rufous-tailed	118	, whiskered	110	<i>fuscata</i> , <i>Onychoprion</i>	41
<i>flava</i> , <i>Piranga</i>	140	, yellow-breasted	109	<i>fuscatus</i> , <i>Cnemotriccus</i>	111
<i>flaveola</i> , <i>Capsiempis</i>	104	, yellow-olive	109	<i>fuscicollis</i> , <i>Calidris</i>	37
, <i>Coereba</i>	140	, yellow-margined	109	Fuscous flycatcher	111
, <i>Sicalis</i>	142	, yellow-throated	114	<i>fuscus</i> , <i>Larus</i>	39
<i>flavicollis</i> , <i>Hemithraupis</i>	137	Flycatchers, tyrant-	102-120	, <i>Pionus</i>	49
<i>flavogaster</i> , <i>Elaenia</i>	103	<i>foetidus</i> , <i>Gymnoderus</i>	98	Futen	2-3
<i>flavigula</i> , <i>Piculus</i>	77	Foliage-gleaner, buff-throated	81	Fuut, dikbek-	3
<i>flavipes</i> , <i>Tringa</i>	35	, chestnut-crowned	82	Fuutkoet, kleine	30
<i>flavirostris</i> , <i>Porphyrio</i>	30	, cinnamon-rumped	81	Fuutkoeten	30
<i>flaviventer</i> , <i>Hapalocrex</i>	29	, olive-backed	81		
		, ruddy	81		

<b>G</b>					
Gaai, Cayenne-	127	Gekuijde koketkolibrie	64	Glanskoevogel	147
<i>gaimardii</i> , <i>Myiopagis</i>	102	Gele looftiran	104	Glansvogel, bronskleurige	71
<i>Galbula albirostris</i>	71	Gele pieper	123	, bruinkeel-	71
<i>dea</i>	71	specht, stro-	78	, geelsnavel-	71
<i>galbula</i>	71	troepiaal	147	, groenstaart-	71
<i>leucogastra</i>	71	zanger	130	, grote	72
<i>Galbulidae</i>	71-72	<i>Gelochelidon nilotica</i>	40	, paradijs-	72
<i>galeata</i> , <i>Gallinula</i>	30	Gem, horned sun-	68	<i>Glaucidium brasilianum</i>	55
<i>galeatus</i> , <i>Lophotriccus</i>	107	Gemarmerde tandkwartel	27	<i>hardyi</i>	54
<i>Gallinago delicata</i>	33	Gent, bruine	5	<i>Glaucis hirsutus</i>	61
<i>paraguaiae</i>	33	, masker-	6	Glittering-throated emerald	67
<i>undulata</i>	33	, roodpoot-	6	Glossy-backed becard	120
<i>Gallinula galeata</i>	30	Geoorde treurduif	43	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	84
Gallinule, azure	30	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	131	Gmelins amazilia	66
, common	30	<i>Geotrygon montana</i>	45	Gnatcatcher, Guianan	127
, purple	30	<i>violacea</i>	45	, tropical	127
Gallinules, Coots & Rails	28-30	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	21	Gnatcatchers	127
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	17	<i>Geranospiza caerulescens</i>	19	Gnateater, chestnut-belted	97
<i>garzetta</i> , <i>Egretta</i>	8	Geringde piepertiran	105	Gnateaters	97
Gebandeerde bosvalk	24	Geschubde duif	42	Gnatwren, collared	127
mierklauwier	88	Geschubde specht	78	, long-billed	127
muispecht	85	Gespikkelde stekelstaart-	80	Godwit, Hudsonian	34
Geel-groene kardinaal	141	Gestreepte bosvalk	24	Goean, blauwkeel-	26
Geelborstvireo	129	helmspecht	78	Goeans, Hokko's, Chacalaca's &	
Geelbrauwspecht	76	koekoek	52	Sjakohoenders	26-27
Geelbuikbreedbektiran	109	miersluiper	89	Golden plover, American	32
Geelbuikdikbekje	144	muisspecht	85	Golden-collared woodpecker	76
Geelbuikdwergtiran	105	ransuil	55	Golden-crowned spadebill	110
Geelbuikekenia	103	tiran	114	Golden-green woodpecker	77
Geelbuikporseleinhoen	29	strandloper	37		, Guianan
Geelbuikschoffelsnavel	108	tjgerroerdomp	10		77
Geelkapbreedbektiran	110	woudaap	10	Golden-headed manakin	100
Geelkaptroepiaal	148	Gevlekte baardkoekoek	72	Golden-olive woodpecker	77
Geelkeelmuispecht	85	chacalaca	26	Golden-rumped euphonia	138
Geelkeelspecht	77	mierklauwier	88	Golden-sided euphonia	139
Geelkeelstekelstaart	80	ral	30	Golden-spangled piculet	75
Geelkeeltiran	114	schoffelsnavel	108	Golden-winged parakeet	47
Geelkeelvliegenpikker	104	Giant cowbird	147	Goldenthrout, green-tailed	66
Geelkopcaracara	23	snipe	33	, white-tailed	66
Geelkopgier, grote	15	Gier, grote geelkop-	15	Gon-gon	3
, kleine	15	, kleine geelkop-	15	Gors, grasland-	142
Geelkruinelenia	103	, konings-	16	, graslandsaffraan-	143
Geelkruinkwak	9	, zwarte	15	, jacarina-	143
Geelkruinvliegenpikker	102	, roodkop-	15	, olijfrug-	142
Geelkuiifiranmanakin	101	Gieren van de Nieuwe Wereld	15-16	, rode kroon-	143
Geelneusalbatros	3	Gierzwaluw	61	, roodkraag-	142
Geelpootruiter, grote	34	, Braziliaanse palm-	60	, saffraan-	142
, kleine	35	, Cayenne-	60	, wigstaartgras-	143
Geelsnavelglansvogel	71	, Chapmans	59	, witstaartsaffraan-	142
Geelsnavelkoekoek	50	, kleine Andes-	60	Gorzen	142-146
Geelstuitbuidelspreeuw	146	, kortstaart-	60	Goshawk, grey-bellied	18
Geelstuittangare	137	, Sicks	60	Goudbuiorganist	139
Geelstuittiran	110	, witband-	59	Goudkeelkolibrie, groenstaart-	66
Geelvleugelara	45	, witkin-	59	, witstaart-	66
Geelvoorhoofdamazonie	49	, witkraag-	59	Goudkopmanakin	100
Gekraagde baardkoekoek	73	Gierzwaluwen	59-61	Goudkraagspecht	76
trogon	69	<i>gilvicolis</i> , <i>Micrastur</i>	24	Goudkuiftangare	133
		<i>gilvus</i> , <i>Mimus</i>	125	Goudplevier, Amerikaanse	32

Goudstuitattila	119	Greenlet, lemon-chested	129	<i>griseus, Limnodromus</i>	34
Goudstuitorganist	138	, tawny-crowned	129	, <i>Nyctibius</i>	56
Goudvoorhoofdparkiet	46	, tepui	129	Groefsnaveltoekan	75
<i>gracilipes, Zimmerius</i>	105	Grey antbird	93	Groen-bruine ijsvogel	70
Grackle, Carib	147	antwren	90	Groenbuikamazilia	67
<i>Grallaria varia</i>	97	crane hawk	19	Groene arassari	74
Granaatzanger, roze	131	elaenia	102	breedbektiran	109
<i>Granatellus pelzelni</i>	131	kingbird	116	dwergijsvogel	69
<i>grandis, Nyctibius</i>	56	monjita	113	elenia	103
Grasgors, wigstaart-	143	plover	32	ibis	11
Graslandgors	142	potoo	56	ijsvogel	70
Graslandsaffraangors	143	Grey-breasted crake	28	muspapegaai	47
Grass-finch, wedge-tailed	143	Grey-bellied goshawk	18	oropendola	146
Grassland sparrow	142	Grey-breasted crake	28	reiger	9
Grassland yellow-finch	143	martin	121	suikervogel	137
Grassquit, blue-black	143	sabrewing	62	Groenkapbreedbektiran	109
Grauwe tinamoe	1	Grey-cheeked thrush	126	Groenkeelmango	63
treurtiran	119	Grey-crowned flycatcher	109	Groenrugbekarde	119
<i>gravis, Ardenna</i>	4	Grey-flanked thrush	125	Groenrugtrogon	68
Great antshrike	87	Grey-fronted dove	44	Groenstaartglansvogel	71
black hawk	20	Grey-headed kite	16	Groenstaartgoudkeelkolibrie	66
egret, American	7	Grey-headed tanager	132	Groenvleugelara	45
horned owl	53	Grey-lined hawk	20	Grondduif, blauwe	44
, Venezuelan	53	Grey-necked wood-rail	29	Grondspecht, campo	77
jacamar	72	Grey-winged trumpeter	28	, vlekborst	77
kiskadee	114	Greyish mourner	116	Grootsnavelstern	41
potoo	56	saltator	141	Grosbeak, blue-black	141
shearwater	4	Grijsborstpurperzwaluw	121	, red-and-black	141
tinamou	1	Grijsborstsabelvleugel	62	, slate-coloured	141
white egret	7	Grijskapklauwiervireo	128	, yellow-green	141
Great-billed hermit	61	Grijskapschoffelsnavel	108	<i>grossus, Saltator</i>	141
Greater ani	52	Grijskeelmierklauwier	89	Grote amazone	50
piepuffbird	72	Grijskopvireo	129	ani	52
yellow-headed vulture	15	Grijskopwouw	16	bonte buizerd	19
yellowlegs	34	Grijskruinbreedbektiran	109	bosvalk	24
Grebe, least	2	Grijskruinduif	44	franjepoot	38
, pied-billed	3	Grijsvleugelmiersluiper	92	geelkopgier	15
Grebes	2-3	Grijswangdwerlglijster	126	geelpootruiter	34
Green araçari	74	Grijswangmiersluiper	92	glansvogel	72
heron	9	Grijswangmuisspecht	83	kiskadie	114
honeycreeper	137	Grijze bekarde	120	koevogel	147
ibis	11	buizerd	20	mierklauwier	87
kingfisher	70	elenia	102	pijlstormvogel	4
oropendola	146	koningstiran	116	ransuil	55
Green-and-rufous kingfisher	70	mierklauwier	88	skua, subantarctische	38
Green-backed becard	19	miervogel	93	stern	40
guan	26	monjita	113	tinamoe	1
heron	8,9	organist	138	zilverreiger	7
trogon	68	ral	29	Grondduif, blauwe	44
Green-bellied hummingbird	67	reuzennachtzwaluw	56	Grondspecht, campo-	77
Green-rumped parrotlet	47	saltator	141	, vlekborst-	77
Green-tailed goldenthrout	66	snip, kleine	34	Ground-antbirds	96-97
jacamar	71	strandloper	36	Ground-dove, blue	44
Green-throated mango	63	treurtiran	116	, common	43
Green-vented sapphire	66	wouw, Amerikaanse	17	, plain-breasted	44
Greenish elaenia	103	, donker-	18	, ruddy	44
Greenlet, ashy-headed	129	<i>grisea, Formicivora</i>	91	Grutto, rode	34
, buff-cheeked	129	<i>griseiceps, Phyllomyias</i>	102	<i>guainumbi, Polytmus</i>	66

Guan, blue-throated piping-	26	<i>Harpia harpya</i>	22	Hermit, great-billed	61
, green-backed	26	Harpij	22	, little	62
, marail	26	Harpy eagle	22	, long-tailed	61
, Spix's	26	Harrier, longwinged	18	, reddish	62
, white-headed piping-	26	Havik, Zuid-Amerikaanse	18	, rufous-breasted	61
Guans, Curassows & Chacalacas	26-27	Havikachtigen	16-22	, sooty-capped	62
<i>guarauna, Aramus</i>	27	Hawk, Amazonian white	19	, straight-billed	62
Guiana crested eagle	22	, bicoloured	19	Heron, agami	9
trogon	68	, black-collared	20	, black-crowned night-	9
Guianan cock-of-the-rock	99	, black-faced	19	, boat-billed	9
gnatcatcher	127	, broad-winged	21	, capped	7
golden-green woodpecker	77	, common black	20	, cocoi	7
puffbird	72	, crane	19	, fasciated tiger-	10
red cotinga	99	, duck	26	, green	9
streaked antwren	89	, great black	20	, green-backed	8,9
toucanet	74	, grey crane	19	, little blue	8
trogon	68	, grey-bellied gos-	18	, rufescent tiger-	10
tyrannulet	105	, grey-lined	20	, southern boat-billed	9
Guianapepervreter	74	, roadside	21	, striated	8
<i>guianensis, Morphnus</i>	22	, rufous crab-	19	, tricoloured	7
, <i>Polioptila</i>	127	, savanna	20	, yellow-crowned night-	9
Guira tanager	137	, short-tailed	21	, zigzag	10
Guiratangare	137	, tiny	18	Hérons	7-11
<i>guira, Hemithraupis</i>	137	, white	19	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	23
<i>gujanensis, Cyclarhis</i>	128	, white-tailed	21	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	91
, <i>Odontophorus</i>	27	, zone-tailed	21	<i>stictocephalus</i>	91
, <i>Synalaxis</i>	80	Hawk-eagle, black	22	<i>sticturus</i>	90
<i>gularis, Paroaria</i>	143	, black-and-white	22	Highland hepatic tanager	139
Gull, black-headed	39	, ornate	22	<i>Himantopus himantopus</i>	31
, laughing	39	Hawks & Eagles	16-22	<i>himantopus, Calidris</i>	37
, lesser black-backed	39	<i>Heliactin bilophus</i>	68	<i>hirsutus, Glaucis</i>	61
Gull-billed tern	40	<i>heliactis, Eurypyga</i>	31	<i>hirundinacea, Cypsnagra</i>	132
Gulls	39	<i>Helicolestes hamatus</i>	17	<i>Hirundinea ferruginea</i>	111
<i>guttata, Myrmotherula</i>	89	<i>Heliomaster longirostris</i>	68	<i>Hirundinidae</i>	121-123
, <i>Tangara</i>	135	<i>Heliornis fulica</i>	30	<i>Hirundo rustica</i>	123
<i>guttatus, Xiphorhynchus</i>	85	<i>Heliornithidae</i>	30	<i>hirundo, Sterna</i>	40
<i>gutturalis, Corapipo</i>	100	<i>Heliothrix auritus</i>	67	Hoatzin	27
, <i>Myrmotherula</i>	89	<i>helayri, Celeus elegans</i>	78	<i>hoazin, Opisthocomus</i>	27
<i>gutturata, Cranioleuca</i>	80	Helmdwertiran	107	Hoen, Amerikaans purper-	30
Guyanabaardkoekoek	72	Helmeted pygmy-tyrant	107	, Amerikaans water-	30
Guyanadwergspecht	75	Helmspecht, gestreepte	78	, azuurpurper-	30
Guyanamuggenvanger	127	<i>Helodoxa xanthogonys</i>	67	, geelbuikporselein--	29
Guyanatrogon	68	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	137	, marailsjako-	26
<i>Gymnoderus foetidus</i>	98	<i>guira</i>	137	, roodsnavel-	29
<i>Gymnopathys rufigula</i>	95	<i>Hemitriccus inornatus</i>	107	, Spix sjako-	26
<i>gyrola, Tangara</i>	135	<i>josephinae</i>	107	, witkeelporselein-	29
<b>H</b>		<i>zosterops</i>	107	Hoenderkoeten	12
<i>haemastica, Limosa</i>	34	<i>Henicorhina leucosticta</i>	124	Hokko, zwarte	27
<i>Haematoderus militaris</i>	98	Hepatic tanager, highland	139	Hokko's, Chacalaca's, Sjakohoenders &	
<i>haemorrhous, Cacicus</i>	146	, lowland	140	Goeans	26-27
<i>haliaetus, Pandion</i>	16	<i>herbicola, Emberizoides</i>	143	Holenuil	55
Halsbandcotinga	98	Heremietkolibrie, bruinkap-	62	Honeycreeper, green	137
<i>hamatus, Helicolestes</i>	17	, kleine	62	, purple	137
<i>Hapalocrex flaviventer</i>	29	, langsnavel-	61	, red-legged	137
Hardy's dwerguil	54	, langstaart-	-61	Hooded blackbird, yellow-	148
<i>hardyi, Glaucidium</i>	54	, priemsnavel-	62	manakin, crimson-	100
<i>Harpagus bidentatus</i>	17	, rode	62	tanager	132
<i>diodon</i>	18	, roodborst-	61	thrush, black-	126



Hook-billed kite	16	<i>Icterus, cayanensis</i>	147	<i>josephinae, Hemitriccus</i>	107
<i>Hoploxypterus cayanus</i>	31	, <i>chrysocephalus</i>	147	<b>K</b>	
Horned owl, great	53	, <i>nigrogularis</i>	147	Kaalkopoeivaar	11
, Venezuelan great	53	<i>Ictinia plumbea</i>	18	Kaalnekvruchtenkraai	98
screamer	12	<i>ignobilis, Turdus</i>	125	Kaneelattila	118
sungem	68	IJsvogel, Amazone-	70	Kaneelmanakin	111
Honeycreeper, green	137	, Amerikaanse reuzen-	70	Kaneelstuitbladspeurder	81
, purple	136	, band-	70	Kanoet	36
, red-legged	137	, groen-bruine	70	Kapbekarde, zwart-	120
, short-billed	136	, groene	70	Kapbreedbektiran, geel-	110
House sparrow	128	, groene dwerg	69	, groen-	109
wren, southern	124	IJsvogels	69-70	Kapdwergcotinga, zwart-	97
Hudsonian godwit	34	<i>immunda, Rhytipterna</i>	116	Kapelenia	103
<i>huetii, Touit</i>	48	<i>inda, Chloroceryle</i>	70	Kapklauwiervireo, grijs	128
<i>huhula, Ciccaba</i>	54	<i>inerme, Ornithion</i>	104	Kapleptogon, bruin-	105
Huismus	128	<i>Inezia caudata</i>	106	Kapreiger	7
Huiswinterkoning, zuidelijke	124	<i>Inezia, Salvins</i>	106	Kapschoffelsnavel, grijs-	108
<i>humeralis, Ammodramus</i>	142	<i>infuscatus, Automolus</i>	81	Kaptangare	132
Hummingbird, copper-tailed	67	<i>inornata, Tringa semipalmata</i>	35	, oker-	136
, green-bellied	67	<i>inornatus, Hemitriccus</i>	107	Kaptiran, monniks-	117
, ruby-topaz	64	<i>inquisitor, Tityra</i>	119	Kapstroepiaal, geel-	148
, rufous-throated	65	<i>interpres, Arenaria</i>	36	Kapvireo, oker-	129
, swallow-tailed	63	<i>involucris, Ixobrychus</i>	10	Kapucijnerlijster	126
Hummingbirds	61-68	<i>Iodopleura fusca</i>	97	Kardinaal, geel-groene	141
<i>Hydrobates castro</i>	5	<i>Ixobrychus exilis</i>	10	, rood-zwarte	141
<i>leucorhous</i>	5	<i>involucris</i>	10	, witkeel-	141
<i>Hydrobatidae</i>	4-5	<b>J</b>		, zwartkeel-	143
<i>Hydropsalis cayennensis</i>	58	Jabiroe	11	Kardinalen	141-142
<i>climacocerca</i>	58	Jabiru	11	Karmozijnvruchtenkraai	98
<i>maculicaudus</i>	58	<i>Jabiru mycteria</i>	11	Keerkringvogel, roodsnavel-	5
<i>torquata</i>	59	Jacamars	71	Keerkringvogels	5
<i>Hylatomus lineatus</i>	78	, brown	71	Kerkuil	53
<i>Hylexetastes perrotii</i>	84	, great	72	Kerkuilen	53
<i>Hylocharis cyanus</i>	66	, green-tailed	71	Kestrel, American	24
<i>Hylopezus macularius</i>	96	, northern brown	71	, Margarita	24
<i>Hylophilus muscicapinus</i>	129	, paradise	72	Kiekendief, Buffons	18
<i>ochraceiceps</i>	129	, yellow-billed	71	, langpoot-	19
<i>pectoralis</i>	129	Jacamar	71-72	Kievit, Cayenne	32
<i>sclateri</i>	129	<i>Jacamersops aureus</i>	72	, Chileense	32
<i>thoracicus</i>	129	<i>Jacana jacana</i>	31	King vulture	16
<i>Hylophylax naevius</i>	95	Jacana, chestnut-backed	31	Kingbird, eastern	116
<i>poecilnotus</i>	95	, lel-	31	, grey	116
<i>Hypocnemis cantator</i>	93	, wattled	31	, tropical	115
<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	93	Jacana's	31	, white-throated	115
<i>hypopyrra, Laniocerca</i>	119	Jacanas	31	Kingfisher, Amazon	70
<b>I</b>		<i>Jacanidae</i>	31	, American pygmy-	69
<i>ibis, Bubulcus</i>	8	<i>jacarina, Volatinia</i>	143	, belted	70
Ibis, green	11	Jacarinagors	143	, green	70
, groene	11	Jacobin, white-necked	63	, green-and-rufous	70
, rode	12	<i>jacquacu, Penelope</i>	26	, ringed	70
, scarlet	12	Jaeger, arctic	38	Kingfishers	69-70
, white	12	, pomarine	38	Kiskadee, great	114
, witte	12	Jager, kleine	38	, lesser	114
Ibises & Spoonbills	11-12	, kleinste	39	Kiskadie, grote	114
Ibissen & Lepelaars	11-12	, middelste	38	, kleine	114
<i>Ibycter americanus</i>	23	, Zuidpool-	38	Kite, American swallow-tailed	16
<i>Icteridae</i>	146-149	Jagers	38-39	, double-toothed	17
<i>icterocephalus, Chrysosomus</i>	148	Jan-van-genten	5-6	, grey-headed	16

Kite, hook-billed	16	Knot, red	36	Koningstiran, vorkstaart-	116
, pearl	17	Koekoek, bonte baard-	72	, witkeel-	115
, plumbeous	18	, eekhoorn-	51	Koperstaartamazilia	67
, rufous-thighed	18	, geelsnavel-	50	Kortkuiftiran	118
, slender-billed	17	, gekraagde baard-	72	Kortsnavelbladkrabber	82
, snail	17	, gestreepte	52	Kortsnavelelenia	103
, white-tailed	17	, gevlekte baard-	72	Kortsnavelsuikervogel	136
Kittiwake, Atlantic	39	, Guyanabaard-	72	Kortsnaveltiran	113
, black-legged	39	, kleine eekhoorn-	52	Kortstaartbuizerd	21
Klapperral	29	, kleine mangrove-	51	Kortstaartdwergtiran	107
Klauwier, Amazonemier-	88	, mangrove-	51	Kortstaartgierzwaluw	60
, bandstaartmier-	87	, pauw-	52	Kortstaartmierlijster	96
, gebandeerde mier-	88	, witborstbaard-	72	Kortstaartnachtzwaluw	57
, gevlekte mier-	88	, witbuik-	51	Kraagzierzwaluw, wit-	58
, grijskeelmier-	89	, zwaluwbaard-	73	Kraagzwaluw, rood-	142
, grijze mier-	88	, zwartbuik-	51	Kraagpapegaai	50
, grote mier-	87	Koekoeken	50-52	Kraagplevier	33
, roodbrauwpeper-	128	Koereiger	8	Kraagspecht, goud-	88
, Temmincks mier-	89	Koereiger, westelijke	8	Kraagzwaluw, zwart-	122
, vlekvlugelmier-	88	Koerlan	27	Kraai, kaalnekvruchten-	98
, zebamier-	86	Koevogel, grote	147	, karmozijnvruchten-	98
, zwartkeelmier-	87	, glans-	147	, purperkeelvruchten-	99
, zwartkuifmier-	87	Koketkolibrie, gekuifde	64	Kraaien	127
Klauwiertangare, bruine	133	Kokmeeuw	39	Krabbenbuizerd	19
Klauwiervireo, grijskap	128	Kolibrie, blauwkeelsaffier-	65	Kromsnavelmuispecht	86
Kleine Andesgierzwaluw	60	, blauwstaartsmaragd-	65	Krooneend, bruine	14
ani	52	, bruine violetoor-	63	Kroongors, rode	143
blauwe reiger	8	, bruinkapheremiet-	62	Kroontiran, Amazone-	110
chacalaca	26	, gekuifde koket-	64	Kuhls pijlstormvogel	4
dwergspecht	75	, groenstaartgoudkeel-	66	Kuifarend, bonte	22
eekhoornkoekoek	52	, kleine heremiet-	62	, tiran-	22
elenia	103	, langsnavelheremiet-	61	, zwart-witte	22
fuutkoet	30	, langsnavelsterkeel-	68	, zwarte	22
geelkopgier	15	, langstaatheremiet-	61	Kuifbobwhite	27
geelpootruiter	35	, muskiet-	64	Kuifbreedbektiran, wit-	110
grijze snip	34	, priemsnavelheremiet-	62	Kuifcaracara	23
heremietkolibrie	62	, rode heremiet-	62	, noordelijke	23
jager	38	, roodborstheremiet-	61	Kuifmierklauwier, zwart-	87
kiskadie	114	, roodkeelsaffier-	65	Kuiforopendola	146
mangrovekoekoek	51	, tepuibriljant-	67	Kuifspecht, vaal-	78
mantelmeeuw	39	, topaas-	64	Kuiftangare, goud-	133
tinamoe	2	, violetoor-	63	, vuur-	132
tiranmanakin	101	, vlagstaart-	65	Kuiftiran, kort-	118
topper	14	, vuurstaartkluit-	64	Kuiftiranmanakin, geel-	101
zilverreiger	8	, witkinsaffier-	66	Kuiftodietiran, zwart-	108
, Amerikaanse	8	, witnek-	63	Kwak	9
Kleinste jager	39	, witstaartgoudkeel-	66	, Amerikaanse	9
nachtzwaluw	57	, zonnestraal-	68	, geelkruin-	9
strandloper	36	, zwaluwstaart-	63	Kwartel, gemarmerde tand-	27
Klifzwaluw, Amerikaanse	123	, zwartkeelbaard-	61	Kwartelduif, berg-	45
Klokvogel, witte	99	, zwartoorfeeën-	67	, bisschops-	45
Kluten	31	Kolibries	61-68	Kwartels, tand-	27
Kluut, Amerikaanse stelt-	31	Koningsgier	16	<b>L</b>	
, stelt-	31	Koningsmierpitta, bonte	97	Laaglandlevertangare	140
Kluutkolibrie, vuurstaart-	64	Koningsstern	40	Lachmeeuw	39
<i>Knipolegus poecilocercus</i>	112	Koningstiran	116	Lachstern	40
<i>poecilurus</i>	112	, grijze	116	Lachvalk	23
Knot, American	36	, tropische	115	Ladder-tailed nightjar	58

<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	132	Lesser swallow-tailed swift	60	Lined forest-falcon	24
Langpootkiekdief	19	yellow-headed vulture	15	hawk, grey-seedeater	144
Langsnavelhermietkolibrie	61	yellowlegs	35	tanager, white-	132
Langsnavelsterkeelkolibrie	68	Lesson's seedeater	144	<i>lineola, Sporophila</i>	144
Langsnavelwouw	16	Lessons dikbekje	144	<i>Lipaugus vociferans</i>	98
Langstaarthermietkolibrie	61	<i>leucocephala, Arundinicola</i>	112	Little blue heron	8
Langstaartmuispecht	83	<i>leucogaster, Amazilia</i>	66	chachalaca	26
Langstaarttiran	113	, <i>Sula</i>	5	cuckoo	52
Langvleugelmiersluiper	90	<i>Leucogastra, Galbula</i>	71	egret	8
<i>Lanio fulvus</i>	133	<i>leucogenys, Cichlopsis</i>	126	hermit	62
<i>Laniocerca hypopyrra</i>	119	<i>leucomelas, Turdus</i>	125	tinamou	2
Lapwing, Cayenne	32	<i>leucophaeus, Legatus</i>	113	<i>littoralis, Ochthornis</i>	112
, pied	31	<i>leucophtalmus, Psittacara</i>	46	Long-billed gnatwren	127
, southern	32	<i>leucophrys, Myrmoborus</i>	93	starthroat	68
Large-billed seed-finch	145	<i>leucops, Turdus</i>	126	Long-tailed hermit	61
tern	41	<i>leucoptera, Sporophila</i>	145	potoo	56
Large-headed flatbill	118	<i>Leucopternis melanops</i>	19	skua	39
<i>largipennis, Campylopterus</i>	62	<i>leucopterus, Nyctibius</i>	56	, eastern	39
<i>Laridae</i>	39	<i>leucorhous, Hydrobates</i>	5	tyrant	113
Lark, eastern meadow-	148	<i>leucosticta, Henicorhina</i>	124	woodcreeper	83
<i>Larus atricilla</i>	39	<i>leucostictus, Dysithamnus</i>	88	Long-winged antwren	90
<i>fuscus</i>	39	<i>leucostigma, Percnostola</i>	94	harrier	18
<i>ridibundus</i>	39	<i>leucotis, Thryothorus</i>	123	<i>longicauda, Bartramia</i>	34
<i>Laterallus exilis</i>	28	, <i>Vireolanius</i>	128	, <i>Deconychura</i>	83
<i>melanophaeus</i>	28	<i>leucurus, Elanus</i>	17	<i>longicaudus, Discosura</i>	65
<i>Lathrotriccus euleri</i>	111	, <i>Threnetes</i>	61	, <i>Stercorarius</i>	39
Laughing falcon	23	<i>leverianus, Cissopsis</i>	131	<i>longipennis, Myrmotherula</i>	90
gull	39	Levertangare, laagland	140	<i>longipes, Myrmeciza</i>	94
Lawrence's flycatcher	111	<i>lherminieri, Puffinus</i>	4	<i>longirostris, Heliomaster</i>	68
Leach's storm-petrel	5	<i>lictor, Philohydor</i>	114	, <i>Rallus</i>	29
Leaf-tosser, black-tailed	82	Lijster, bonte mier-	95	Long-tailed hermit	61
, short-billed	82	, cacao-	126	potoo	56
, tawny-throated	82	, grijswangdwerg-	126	skua	39
Least bittern	10	, kapucijner-	126	, eastern	39
grebe	2	, kortstaartmier-	96	tyrant	113
nighthawk	57	, naaktoog-	126	woodcreeper	83
sandpiper	36	, noordse water-	130	Long-winged antwren	90
tern	41	, roodflankmier-	96	<i>longipennis, Myrmotherula</i>	90
<i>Legatus leucophaeus</i>	113	, roodkapmier-	96	<i>longuemareus, Phaetornis</i>	62
Leigrijs loodbekje	143	, Taczanowski's	126	Loodbekje, leigrijs	143
Leljacana	31	, vaalborst-	125	Loodgrijs dikbekje	144
Lemon-chested greenlet	129	, witnek-	125	Loodgrijze duif	43
Lepelaar, rode	12	, zwartkeelmier-	96	Looftiran, gele	104
Lepelaars & Ibissen	11-12	, zwartsnavel-	125	, Surinaamse	105
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	86	Lijstermierpitta	96	<i>Lophornis ornatus</i>	64
<i>angustirostris</i>	86	Lijsters	125-126	<i>Lophostrix cristata</i>	54
<i>Lepidothrix serena</i>	100	, mier-	96-97	<i>Lophotriccus galeatus</i>	107
<i>Leptodon cayanensis</i>	16	Lilac-tailed parrotlet	48	<i>vitiosus</i>	107
<i>Leptogon amaurocephalus</i>	105	<i>Limnodromus griseus</i>	34	Lowland hepatic tanager	140
Leptogon, bruinkap-	105	<i>Limosa haemastica</i>	34	<i>luctuosus, Tachyphonus</i>	133
<i>Leptotila rufaxilla</i>	44	Limpkin	27	<i>lugubris, Brachygalba</i>	71
<i>verreauxi</i>	44	Line-throated woodcreeper	83	, <i>Quiscalus</i>	147
Lesser black-backed gull	39	<i>lineata, Dacnis</i>	136	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	57
burrowing owl	55	Lineated woodcreeper	86	<i>lutea, Piranga</i>	139
elaenia	103	Lineated woodpecker	78	<i>luteiventris, Myiozetetes</i>	113
kiskadee	114	<i>lineatum, Tigrisoma</i>	10	<i>luteola, Sicalis</i>	143
nighthawk	57	<i>lineatus, Cymbilaimus</i>	86	<i>lutescens, Anthus</i>	123
scaup	14	, <i>Hylatomus</i>	78		

<b>M</b>					
Macao	45	Manakin , witbuiktiran-	101	Meeuw, kleine mantel-	39
<i>macao, Ara</i>	45	, witkeel-	100	, kok-	39
Macaw, blue-and-yellow	45	, witkruin-	100	, lach-	39
, chestnut-fronted	46	., witvoorhoofd-	100	Meeuwen	39
, northern red-shouldered	46	, zwarte	101	<i>megacephalum, Ramphotrigo</i>	118
, red-and-green	45	Manakins	100-102	<i>Megaceryle alcyon</i>	70
, red-bellied	46	Mango, black-throated	63	<i>torquata</i>	70
, scarlet	45	, green-throated	63	<i>Megascops choliba</i>	53
MacConnell's pipratiran	106	, groenkeel-	63	<i>vermiculatus</i>	53
<i>macconnelli, Mionectes</i>	106	, zwartkeel-	63	<i>Megascops watsonii</i>	53
<i>macconnelli, Synalaxis</i>	79	Mangrove cuckoo	51	<i>Megarynychus pitangua</i>	114
<i>maccormicki, Catharacta</i>	38	rail	29	<i>melacoryphus, Coccyzus</i>	51
<i>macrorhynchus, Notharchus</i>	72	Mangrovekoekoek	51	<i>melambrotus, Cathartes</i>	15
<i>macroura, Eupetomena</i>	63	, kleine	51	<i>melancholicus, Tyrannus</i>	115
, <i>Zenaida</i>	43	Mangrovemiervogel	93	<i>Melanerpes candidus</i>	76
<i>macularius, Actitis</i>	35	Mangroveveiger	8,9	<i>cruentatus</i>	76
, <i>Hyllopezus</i>	96	Mantelmeeuw, kleine	39	<i>rubricapillus</i>	76
<i>maculata, Aratinga</i>	50	<i>maguari, Ciconia</i>	11	<i>melanocephalus, Pionites</i>	48
<i>maculatum, Todirostrum</i>	108	<i>manilatus, Orthopsittaca</i>	46	<i>melanocoryphus, Coccyzus</i>	51
<i>maculatus, Myiodynastes</i>	114	Manx shearwater	4	<i>melanogaster, Piaya</i>	51
, <i>Pardirallus</i>	30	Marail guan	26	<i>melanoleuca, Atticora</i>	122
<i>maculicaudus, Hydrophalus</i>	58	<i>marail, Penelope</i>	26	, <i>Lamprospiza</i>	132
Madeirastormvogeltje	5	Marailsjakohoen	26	, <i>Tringa</i>	34
<i>magna, Sturnella</i>	148	Marbled wood-quail	27	<i>melanoleucos, Campephilus</i>	79
<i>magnificens, Fregata</i>	7	<i>Mareca americana</i>	13	, <i>Lamprospiza</i>	132
Magnificent frigatebird	7	Margarita kestrel	24	<i>melanoleucus, Spizaetus</i>	22
<i>magnirostris, Rupornis</i>	21	<i>marginatus, Pachyramphus</i>	120	<i>melanophaius, Laterallus</i>	28
Magoeari	11	Margrietje, bruin	49	<i>melanopsis, Schistochlamys</i>	131
Magpie tanager	131	, zwartoor-	49	<i>melanopogon, Hypocnemoides</i>	93
Maguari stork	11	Marsh-tyrant, white-headed	112	<i>melanops, Leucopternis</i>	19
<i>maguari, Ciconia</i>	11	Martin, brown-chested	122	<i>melanothorax, Sakesphorus</i>	88
Maïsparkiet	47	, Caribbean	121	<i>melanotos, Calidris</i>	37
<i>major, Crotophaga</i>	52	, collared sand	121	<i>melanurus, Ramphocaenus</i>	127
, <i>Taraba</i>	87	, grey-breasted	121	, <i>Trogon</i>	69
, <i>Tinamus</i>	1	, southern	121	<i>mellisugus, Chlorostilbon</i>	65
<i>Malacoptila fusca</i>	73	, purple	121	<i>mellivora, Florisuga</i>	63
<i>malaris, Phaetornis</i>	61	<i>martinicus, Porphyrio</i>	30	<i>menetriesii, Myrmotherula</i>	90
<i>Manacus manacus</i>	101	Martins & Swallows	121-123	<i>menstruus, Pionus</i>	49
Manakin, black	101	Masked booby	6	<i>meridionalis, Buteogallus</i>	20
, blue-backed	100	duck	15	, <i>Chaetura</i>	60
, bonte	101	yellowthroat	131	Merlin	25
, crimson-hooded	100	Maskerbuizerd, zwart-	19	<i>merula, Dendrocincla</i>	83
, geelkuiftiran-	101	Maskergent	6	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	11
, golden-headed	100	Maskerparulazanger	129	<i>mexicana, Tangara</i>	134
, goudkop-	100	Maskerpitpit, zwart-	136	<i>mexicanus, Sclerurus</i>	82
, kaneel-	100	Maskerstekelstaart	15	<i>Micrastur gilvicollis</i>	24
, kleine tiran-	111	Maskerzanger, Zuid-Amerikaanse	131	<i>mirandollei</i>	24
, pale-bellied tyrant-	101	<i>mauri, Calidris</i>	36	<i>ruficollis</i>	24
, pracht-	100	<i>maximus, Saltator</i>	141	<i>semitorquatus</i>	24
, roodkruin-	100	, <i>Thalasseus</i>	40	<i>Microbates collaris</i>	127
, saffron-crested tyrant-	101	McConnell's flycatcher	106	<i>Microcerculus bambla</i>	124
, streepvleugel-	101	spinetail	79	<i>Micropygia schomburgkii</i>	28
, tiny tyrant-	101	white-browed wood-owl	54	<i>Microrhopias quixensis</i>	91
, white-bearded	101	McConnells stekelstaart	79	Middelste jager	38
, white-crowned	100	Meadowlark, eastern	148	Mierklauwier, Amazone-	88
, white-fronted	100	Mealy amazon, southern	50	, bandstaart-	87
, white-throated	100	Meeuw, drieteen-	39	, gebandeerde	88
				, gevlekte	88

Mierklauwier, grijskeel-	89	<i>minor, Coccyzus</i>	51	Muggenvanger, Amazone-	127
, grijze	88	, <i>Pachyramphus</i>	120	, Guyana-	127
, grote	87	<i>minuta, Coccyzua</i>	52	Muggenvangers	127
, Temmincks	89	, <i>Columbina</i>	44	Muisspecht, blauwsnavel-	85
, vlek vleugel-	88	, <i>Euphonia</i>	139	, bruinkeel-	84
, zebra-	86	, <i>Sporophila</i>	145	, gebandeerde	85
, zwartkeel-	87	<i>minutilla, Calidris</i>	36	, geelkeel-	85
, zwartkuif-	87	<i>minutissimus, Picumnus</i>	75	, gestreepte	85
Mierkruiper, orpheus-	93	<i>minutus, Anous</i>	42	, grijswang-	83
, witbrauw-	93	, <i>Xenops</i>	83	, kromsnavel-	86
, zwartkin-	93	<i>Mionectes macconelli</i>	106	, langstaart-	83
Mierlijster, bonte	95	, <i>oleagineus</i>	106	, priemsnavel-	86
, kortstaart-	96	<i>mirandollei, Micrastur</i>	24	, reuzen-	84
, roodkap-	96	Mirandolles bosvalk	24	, roodkeel-	85
, zwartkeel-	96	Mockingbird, chalk-browed	125	, roodsnavel-	84
Mierlijsters	96-97	, tropical	125	, vlekkeel-	84
Mierpitta, bonte konings-	97	Mockingbirds & Thrashers	125	, wenkbrauw-	86
, lijster-	96	<i>modestus, Forpus</i>	47	, wigsnavel-	84
, roodflank-	96	, <i>Sublegatus</i>	106	, witkin-	83
Miersluiper, Behns	90	Moerasbuiserd	20	, witstreep-	86
, bonte	90	Moerasmiervogel	92	Muisspechten	83-86
, bruinbuik-	89	<i>Molothrus bonariensis</i>	148	<i>murina, Phaeomyias</i>	104
, dwerg-	89	, <i>oryzivorus</i>	148	<i>murinus, Thamnophilus</i>	88
, gestreepte	89	<i>Momotidae</i>	71	Mus, huis-	128
, grijsvleugel-	92	<i>Momotus momota</i>	71	<i>muscicapinus, Hylophilus</i>	129
, grijswang-	92	<i>monachus, Tyrannus savana</i>	116	Muscovy duck	13
, langvleugel	90	<i>Monasa atra</i>	73	<i>musculus, Troglodytes</i>	124
, roestrug-	91	Monjita, grey	113	Musduif	43
, roodbuik-	89	Monjita, grijze	113	Musician wren	124
, roodvleugel-	91	Monnikskaptiran	117	Muskietkolibrie	64
, spikkelvleugel-	91	<i>montana, Geotrygon</i>	45	Muskuseend	13
, Todds	91	<i>montivagus, Aeronautes</i>	60	Muspapegaai, groene	47
, vlekstaart-	90	Moortiran, Amazone-	112	, Sclaters	47
, witband-	91	, roodstaart-	112	Mussen	128
, witflank-	90	Moriche oriole	147	<i>Mycteria americana</i>	11
Miervireo, witstreep-	88	<i>Morphnus guianensis</i>	22	<i>mycteria, Jabiru</i>	11
Miervogel, bruinvlek-	95	<i>moschata, Cairina</i>	13	<i>Myiarchus ferox</i>	118
, grijze	92	<i>mosquitus, Chrysolampis</i>	64	, <i>swainsoni</i>	117
, mangrove-	93	Motmot, Amazonian	71	, <i>tuberculifer</i>	117
, moeras-	92	, blauwkap-	71	, <i>tyrannulus</i>	118
, roetkop-	93	, blue-diademed	71	<i>Myiobius barbatus</i>	110
, roodkeel-	95	<i>motmot, Ortalis</i>	26	<i>Myiodynastes maculatus</i>	114
, roodrug-	94	<i>Motacillidae</i>	123	<i>Myiopagis caniceps</i>	102
, schubrug-	95	Motmots	71	, <i>flavivertex</i>	103
, tiran-	92	Mottled owl	54	, <i>gaimardii</i>	102
, vlek vleugel-	94	Mourner, cinereous	119	, <i>viridicata</i>	103
, witbuik-	94	, greyish	116	<i>Myiophobus fasciatus</i>	110
, witpluim-	95	, pale-bellied	116	<i>Myiornis ecaudatus</i>	107
, zwartkeel-	94	, thrush-like	102	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	113
Miervogels, echte	86-95	Mourning dove	43	, <i>luteiventris</i>	113
<i>militaris, Haematoderus</i>	98	Mouse-coloured antshrike	88	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	94
, <i>Sturnella</i>	148	, tyrannulet	104	, <i>ferruginea</i>	94
<i>milleri, Xenops</i>	82	, Amazonian	104	, <i>longipes</i>	94
<i>Milvago chimachima</i>	23	Muggeneter, Cayenne-	97	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	93
<i>Mimidae</i>	125	Muggeneters	97	<i>Myrmornis torquata</i>	95
<i>Mimus gilvus</i>	125	Muggensluiper, zwartborst-	127	<i>Myrmothera campanisoma</i>	96
, <i>saturninus</i>	125	, zwartstaart-	127	<i>Myrmotherula axillaris</i>	90
<i>minimus, Catharus</i>	126			, <i>behni</i>	90

<i>Myrmotherula brachyura</i>	89	Nightjar, blackish	58	<i>Nyctipolis nigrescens</i>	58
<i>guttata</i>	89	, ladder-tailed	58	Nymph, fork-tailed wood-	65
<i>gutturalis</i>	89	, rufous	57	<i>Nystactes tamatia</i>	72
<i>longipennis</i>	90	, scissor-tailed	59	<b>O</b>	
<i>menetriesii</i>	90	, spot-tailed	58	<i>obscurior, Sublegatus</i>	106
<i>surinamensis</i>	89	, white-tailed	58	<i>obsoletum, Camptostoma</i>	104
<b>N</b>		Nightjars	57-59	<i>obsoletus, Xiphorhynchus</i>	85
Naaktooglijster	126	<i>nigrescens, Cercomacra</i>	92	<i>occidentalis, Pelecanus</i>	5
Nachtzwaluw, grijze reuzen-	56	, <i>Nyctipolis</i>	58	<i>Oceanites oceanicus</i>	4
, kleinste	57	<i>nigricollis, Anthracothorax</i>	63	Ocellated crane	28
, kortstaart--	57	, <i>Busarellus</i>	20	<i>ochraceiceps, Hylophilus</i>	129
, nacunda-	57	, <i>Sporophila</i>	144	Ochre-bellied flycatcher	106
, roet-	58	<i>nigrogularis, Icterus</i>	147	<i>ochrocephala, Amazona</i>	49
, rosse	57	<i>nilotica, Gelocheilidon</i>	40	<i>ochrolaemus, Automolus</i>	81
, spiesstaart-	59	Nimf, vorkstaartbos-	65	<i>Ochthornis littoralis</i>	112
, Texas-	57	<i>nitidus, Buteo</i>	20	<i>Odontophoridae</i>	27
, trapstaart-	58	, <i>Cyanerpes</i>	136	<i>Odontophorus gujanensis</i>	27
, vale reuzen-	56	<i>nobilis, Diopsittaca</i>	46	Oehoe, Amerikaanse	53
, vlekstaart-	58	Noddy	42	Oeverloper, Amerikaanse	35
, wigstaartreuzen-	56	, Atlantic brown	42	Oeverzwaluw	121
, witstaart-	58	, black	42	Oilbird	55
, witvleugelreuzen-	56	, brown	42	Okerbuikpipratiran	106
Nachtzwaluwen	57-59	, Caribbean black	42	Okerkaptangare	135
, reuzen-	56	, witkap-	42	Okerkapvireo	129
Nacunda nighthawk	57	<i>Nomonyx dominicus</i>	15	Old World Sparrows	128
Nacunda nighthawk, northern	57	<i>Nonnula rubecula</i>	73	<i>oleagineus Mionectes</i>	106
<i>nacunda, Chordeiles</i>	57	Noordelijke kuifcaracara	23	Olijfrugbladspeurder	81
Nacundanachtzwaluw	57	Noordse pijlstormvogel	4	Olijfruggors	142
<i>naevia, Sclateria</i>	93	waterlijster	130	Olijfrugspecht	77
, <i>Tapera</i>	52	North American osprey	16	<i>olivacea, Piranga</i>	140
<i>naevius, Hylophylax</i>	95	Northern brown jacamar	71	Olivaceous flatbill	109
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	48	crested caracara	23	<i>olivaceus, Rhynchocyclus</i>	109
Narrow-billed woodcreeper	86	nacunda nighthawk	57	, <i>Vireo</i>	128
<i>Nemosia pileata</i>	132	pintail	14	<i>olivater, Turdus</i>	126
<i>Neochelidon tibialis</i>	122	red-fan parrot	50	Olive-backed foliage-gleaner	81
<i>Neocrex erythrops</i>	30	red-shoulderd macaw	46	Olive-green tyrannulet	105
<i>Neopelma chrysocephalum</i>	101	scrub-flycatcher	106	Olive-sided flycatcher	111
<i>pallescens</i>	101	slaty antshrike	88	<i>Onychoprion anaethetus</i>	41
<i>Neopipo cinnamomea</i>	111	tawny-bellied screech-owl	53	<i>fuscata</i>	41
<i>Neothraupis fasciata</i>	131	waterthrush	130	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	110
Neotropic cormorant	6	<i>notatus, Chlorostilbon</i>	65	Ooievaar, kaalkop	11
<i>Netta erythrophtalma</i>	14	<i>Notharchus macrorhynchos</i>	72	Ooievaars	11
New World Blackbirds	146	<i>tectus</i>	72	Opaalstuittangare	136
Quails	27	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	122	Opal-rumped tanager	136
Sparrows & Buntings	142-146	<i>noveboracensis, Seiurus</i>	130	<i>Opisthocomidae</i>	27
Vultures	15-16	<i>nudigenis, Turdus</i>	126	<i>Opisthocomus hoazin</i>	27
Warblers	129-131	<i>Numenius phaeopus</i>	34	Orange-breasted falcon	25
<i>niger, Capito</i>	74	Nunbird, black	73	Orange-winged amazon	50
, <i>Chlidonias</i>	41	Nunlet, rusty-breasted	73	Oranje dikbekje	145
, <i>Rynchops</i>	42	<i>Nyctanassa violacea</i>	9	Oranje rotshaan	99
Night-heron, black-crowned	9	<i>Nyctibius aethereus</i>	56	Oranjevleugelamazone	50
, yellow-crowned	9	<i>grandis</i>	56	Oranjevleugelparkiet	47
Nighthawk, least	57	<i>griseus</i>	56	Organist, Cayenne-	139
, lesser	57	<i>leucopterus</i>	56	, Finsch'	139
, nacunda	57	<i>Nyctibiidae</i>	56	, goudbuik-	139
, northern nacunda	57	<i>Nycticorax nycticorax</i>	9	, goudstuit-	138
, semi-collared	57	<i>Nyctidromus albicollis</i>	58	, grijze	138
				, purperkeel-	138

Organist, violette	139	<i>Pachuramphus surinamus</i>	120	Parrot, black-headed	48
, witbuik-	139	<i>viridis</i>	119	, blue-headed	49
Oriole, epaulet	147	Paint-billed crane	30	, caica	49
, moriche	147	Painted parakeet	47	, dusky	49
, yellow	147	tody-flycatcher	108	, northern red-fan parrot	50
Ornate hawk-eagle	22	Pale-bellied mourner	116	, red-fan parrot	50
<i>ornatus</i> , <i>Lophornis</i>	64	tyrant-manakin	101	Parrotlet, dusky-billed	47
, <i>Spizaetus</i>	22	Pale-breasted spinetail	79	, green-rumped	47
<i>Ornithion inerme</i>	104	thrush	125	, lilac-tailed	48
Oropendola, crested	146	Pale-dotted sandpiper	35	, sapphire-rumped	48
, green	146	Pale-eyed thrush	126	, scarlet-shouldered	48
, groene	146	Pale-tailed barbthroat	61	, tepui	48
, kuif-	146	Pale-tipped tyrannulet	106	Parrots	45-50
Orpheusmierkruiper	93	Pale-vented pigeon	42	<i>Parula pitiayumi</i>	129
Orpheuswinterkoning	124	<i>pallescens</i> , <i>Neopelma</i>	101	Parula, tropical	129
<i>Ortalis motmot</i>	26	Palm tanager	134	Parulazanger, masker-	129
<i>Orthopsittaca manilatus</i>	46	Palm-swift, fork-tailed	60	<i>Parulidae</i>	129-131
<i>oryzivorus</i> , <i>Dolichonyx</i>	148	<i>palmarum</i> , <i>Thraupis</i>	134	<i>parvirostris</i> , <i>Elaenia</i>	103
, <i>Molothrus</i>	147	Palmcreeper, point-tailed	80	<i>parvus</i> , <i>Conopias</i>	114
<i>Oryzoborus angolensis</i>	146	Palmgierzwaluw, Braziliaanse	60	<i>Passer domesticus</i>	128
<i>crassirostris</i>	146	Palmkruiper	80	<i>Passeridae</i>	128
Osprey	16	Palmtangare	134	<i>passerina</i> , <i>Columbina</i>	43
, North American	16	<i>Pandion haliaetus</i>	16	<i>passerinus</i> , <i>Forpus</i>	47
Ovenbirds	79-83	<i>Pandionidae</i>	16	<i>Patagioenas cayennensis</i>	42
Ovenvogels	79-83	<i>panychlora</i> , <i>Nannopsittaca</i>	48	<i>plumbea</i>	43
Owl, Amazonian pygmy-	54	<i>Panyptila cayennensis</i>	60	<i>speciosa</i>	42
, black-banded	54	<i>papa</i> , <i>Sarcoramphus</i>	16	<i>subvinacea</i>	43
, burrowing	55	Papegaai, caica-	49	Patagonische purperzwaluw	121
, common barn-	53	, groene mus-	47	Pauraque	58
, crested	54	, kraag-	50	Pauwkoekoek	52
, ferruginous pygmy-	55	, paarsstaart-	48	Pavonine cuckoo	52
, great horned	53	, roodschouder	48	<i>pavoninus</i> , <i>Dromococcyx</i>	52
, lesser burrowing	55	, Sclaters mus-	47	Peach-fronted parakeet	46
, McConnell's white-browed wood-	54	, zevenkleuren-	48	Pearl kite	17
	54	Papegaaien	45-50	Pearly-breasted cuckoo	51
, mottled	54	Paradijsglansvogel	72	Pectoral sandpiper	37
, northern tawny-bellied screech-	53	Paradijstangare	135	sparrow	142
	53	Paradise jacamar	72	<i>pectoralis</i> , <i>Hylophilus</i>	129
, Roraima screech-	53	tanager	135	, <i>Polystictus</i>	105
, short-eared	55	<i>paraguaiae</i> , <i>Gallinago</i>	33	Pelican, Atlantic brown	5
, southern crested	54	Parakeet, brown-throated	47	, brown	5
, spectacled	54	, golden-winged	47	<i>Pelecanidae</i>	5
, striped	55	, painted	47	<i>Pelecanus occidentalis</i>	5
, stygian	55	, peach-fronted	46	Pelicans	5
, tawny-bellied screech-	53	, sulphur-breasted	50	Pelikaan, bruine	5
, tropical screech-	53	, white-eyed	46	Pelikanen	5
, Venezuelan great horned	53	<i>parasiticus</i> , <i>Stercorarius</i>	38	<i>pella</i> , <i>Topaza</i>	64
, vermiculated screech-	53	<i>pardalotus</i> , <i>Xiphorhynchus</i>	85	Pelzeln's flycatcher	117
, tropical screech-	53	<i>Pardirallus maculatus</i>	30	tody-tyrant	107
Owls, barn-	53	Parelwouw	17	<i>pelzelni</i> , <i>Granatellus</i>	131
, typical	53-55	<i>pareola</i> , <i>Chiroxiphia</i>	100	, <i>Myiarchus swainsoni</i>	117
<i>Oxyruncus cristatus</i>	97	Parkiet, bonte	47	Pelzelns todietiran	107
<b>P</b>		, goudvoorhoofd-	46	<i>Penelope jacquacu</i>	26
Paarsstaartpa pegaai	48	, maïs-	47	<i>marail</i>	26
<i>Pachyramphus marginatus</i>	120	, oranjevleugel-	47	<i>penicillata</i> , <i>Eucometis</i>	132
<i>minor</i>	120	, tepui-	48	Peperklauwier, roodbrauw	128
<i>polychopterus</i>	120	, zwavelborst-	50	Pepervreter, Guiana-	74
<i>rufus</i>	120	<i>Paroaria gularis</i>	143	Peppershrike, rufous-browed	128

Peppershrike, South American		<i>Picus chrysochloros</i>	77	<i>Piranga lutea</i>	139
rufous-browed	128	<i>flavigula</i>	77	<i>olivacea</i>	140
<i>Percnosta leucostigma</i>	94	<i>Picumnus exilis</i>	75	<i>rubra</i>	140
<i>rufifrons</i>	93	<i>minutissimus</i>	75	Piratic flycatcher	113
Peregrine falcon	25,26	<i>picumnus, Dendrocolaptes</i>	85	<i>pitangua, Megarynchus</i>	115
<i>peregrinus, Falco</i>	25,26	<i>picus, Xiphorhynchus</i>	86	<i>Pitangus sulphuratus</i>	114
<i>Periporphyrus erythromelas</i>	141	Pied lapwing	31	<i>Pithys albifrons</i>	95
<i>Perissocephalus tricolor</i>	99	puffbird, greater	72	<i>pitiayumi, Parula</i>	129
<i>perrotii, Hylexetastes</i>	84	tanager, red-billed	132	Pitpit, blauwe	136
<i>perspicillata, Pulsatrix</i>	54	water-tyrant	112	, zwartmasker-	136
<i>pertinax, Eupsittula</i>	47	Pied-billed grebe	3	Pitta, bonte koningsmier-	97
<i>petechia, Dendroica</i>	130	Pieper, gele	123	, lijstermier-	96
Petrel, band-rumped storm-	5	Piepers & Kwikstaarten	123	, roodflankmier-	97
, Bulwers	3	Piepertiran, geringde	105	, spotted ant-	96
, Cape Verde	3	Piewie, sparren-	111	, thrush-like ant-	97
, Fuegian storm-	4	, Spix'	111	, variegated ant-	97
, Leach's storm-	5	, witkeel-	112	Plain xenops	83
, Wilson's storm-	4	Pigeon, pale-vented	42	Plain-bellied emerald	66
Petrels & Shearwaters	3-4	, plumbeous	43	Plain-breasted ground-dove	44
Petrels, storm-	4-5	, purple-tinted	43	Plain-brown woodcreeper	83
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	123	, ruddy	43	Plain-crested elaenia	103
Pewee, tropical	111	, scaled	42	Plain-crowned spinetail	80
, white-throated	112	Pigeons & Doves	42-45	Plain-winged antwren	90
<i>Phaeomyias murina</i>	104	Piha, schreeuw-	98	<i>plancus, Polyborus</i>	23
<i>phaeopus, Numenius</i>	34	Piha, screaming	98	<i>Platalea ajaja</i>	12
<i>Phaethon aethereus</i>	5	Pijlstaart	14	<i>platypterus, Buteo</i>	21
<i>Phaetontidae</i>	5	, Bahama-	14	<i>platyrhynchus, Platyrinchus</i>	110
<i>Phaetornis augusti</i>	62	Pijlstormvogel, Audubons	4	<i>Platyrinchus coronatus</i>	110
<i>bourcieri</i>	62	, grote	4	<i>platyrhynchus</i>	110
<i>longuemareus</i>	62	, Kuhls	4	<i>saturatus</i>	109
<i>malaris</i>	61	, Noordse	4	Plevier, Amerikaanse bontbek-	32
<i>ruber</i>	62	<i>pileata, Nemosia</i>	132	, Amerikaanse goud-	32
<i>superciliosus</i>	61	<i>Pilherodius pileatus</i>	7	, dikbek-	32,33
<i>Phaetusa simplex</i>	41	Pink-throated becard	120	, kraag-	33
<i>Phalacrocoracidae</i>	6	Pinnated bittern	11	, zilver-	32
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	6	<i>pinnatus, Botaurus</i>	11	Plevieren	31-33
Phalarope, Wilson's	38	Pintail, northern	14	Plover, American golden	32
Phalaropes, Snipes & Sandpipers	33-38	, white-cheeked	14	, collared	32
<i>Philidor erythrocerum</i>	81	<i>Pionites melanocephalus</i>	48	, grey	32
<i>pyrrhodes</i>	81	<i>Pionus fuscus</i>	49	, semipalmated	32
<i>ruficaudatum</i>	80	<i>menstruus</i>	49	, Wilson's	32, 33
<i>Philohydor lictor</i>	114	<i>piperivora, Selenidera</i>	74	Plovers	31-33
<i>Phoenicircus carnifex</i>	99	<i>Pipile cumanensis</i>	26	<i>plumbea, Euphonia</i>	138
<i>phoenicius, Tachyphonus</i>	133	Piping-guan, blue-throated	26	, <i>Ictinia</i>	18
<i>Phoenicopteridae</i>	12	, white-headed	26	, <i>Patagioenas</i>	43
<i>Phoenicopus ruber</i>	12	Pipit, ringed ant-	105	, <i>Polioptila</i>	127
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	102	, yellowish	123	, <i>Sporophila</i>	144
<i>Phylloscartes virescens</i>	105	Pipits & Wagtails	123	Plumbeous euphonia	138
<i>Piaya cayana</i>	51	<i>Pipra aureola</i>	100	kite	18
<i>melanogaster</i>	51	<i>erythrocephala</i>	100	pigeon	43
<i>pica, Fluvicola</i>	112	<i>pipra, Dixiphia</i>	100	seedeater	144
<i>Picidae</i>	75-79	Pipratiran, MacConnells	106	<i>Pluvialis dominica</i>	32
<i>picta, Pyrrhura</i>	47	, okerbuik-	106	<i>squatarola</i>	32
<i>pictum, Todirostrum</i>	108	<i>Pipridae</i>	100-102	Pochard, southern	14
Piculet, arrowhead	75	<i>Piprites chloris</i>	101	<i>podiceps, Podilymbus</i>	3
Piculet, Buffon's	75	Piprites, wing-barred	101	<i>Podicipedidae</i>	2-3
, golden-spangled	75	Piraattiran	113	<i>Podilymbus podiceps</i>	3
		<i>Piranga flava</i>	140	<i>poecilinotus, Hylophilax</i>	95



<i>poecilocercus, Knipolegus</i>	112	Puffbird, spot-crowned	72	<b>R</b>	
<i>Poecilotriccus fumifrons</i>	108	, spotted	72	Racquet-tailed coquette	65
<i>poecilurus, Knipolegus</i>	112	, swallow-winged	73	Rail, grey-necked wood-	29
Point-tailed palmcreeper	80	, white-chested	73	, mangrove	29
Polar skua, south	38	Puffbirds	72-73	, rufous-necked wood-	29
<i>poliocephalus, Tolmomyias</i>	109	<i>Puffinus lherminieri</i>	4	, southern spotted	30
<i>poliogaster, Accipiter</i>	18	<i>puffinus</i>	4	, spotted	30
<i>Polioptila guianensis</i>	127	<i>puffinus, Puffinus</i>	4	Rails, Gallinules & Coots	28-30
<i>Polioptila plumbea</i>	127	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	54	Ral, Amazonedwerg-	28
<i>Poliptilidae</i>	127	<i>punctata, Tangara</i>	135	, Braziliaanse dwerg-	28
<i>Polyborus plancus</i>	23	<i>punctatus, Thamnophilus</i>	88	, Cayenne-bos-	29
<i>polychopterus, Pachyramphus</i>	120	<i>punctigula, Colaptes</i>	77	, effen bos-	29
<i>Polystictus pectoralis</i>	105	<i>punicea, Xipholaena</i>	98	, gevlekte	30
<i>Polytmus guainumbi</i>	66	Purperborstcotinga	98	, grijze	29
<i>theresia</i>	66	Purperduif	43	, klapper-	29
Pomarine jaeger	38	Purperhoen, Amerikaans	30	, roodkruin-	28
<i>pomarinus, Stercorarius</i>	38	, azuur-	30	, roodnekbos-	29
Pompadour cotinga	98	Purperkeelorganist	138	, Schomburgks	28
Pompadourcotinga	98	Purperkeelvruchtenkraai	99	Rallen	28-30
<i>Porphyrio flavivirostris</i>	30	Purpersuikervogel	137	<i>Rallidae</i>	28-30
, <i>martinicus</i>	30	Purperzwaluw	121	<i>Rallus longirostris</i>	29
Porseleinhoen, geelbuik-	29	, Caribische	121	<i>Ramphastidae</i>	74-75
, witkeel-	29	, grijsborst-	121	<i>Ramphastos toco</i>	75
<i>Porzana albicollis</i>	29	, Patagonische	121	<i>tucanus</i>	75
Potoo, common	56	Purple gallinule	30	<i>vitellinus</i>	75
, great	56	Purple honeycreeper	137	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	127
, grey	56	Purple martin	121	<i>Ramphocelus carbo</i>	134
, long-tailed	56	Purple-breasted cotinga	98	<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	118
, white-winged	56	Purple-throated euphonia	138	<i>ruficauda</i>	118
Potoos	56	fruitcrow	99	Ransuil, gestreepte	55
Prachtmanakin	100	Purple-tinted pigeon	43	, grote	55
<i>pretiosa, Claravis</i>	44	Purpletuft, dusky	97	<i>Recurvirostridae</i>	31
Priemsnavelheremietkolibrie	62	<i>purpurata, Querula</i>	99	<i>recurvirostris, Avocettula</i>	64
Priemsnavelmuisspecht	86	<i>purpuratus, Touit</i>	48	Red cotinga, Guianan	99
<i>Procellariidae</i>	3-4	<i>pusilla, Calidris</i>	36	knot	36
<i>Procnias albus</i>	99	<i>pusillus, Chordeiles</i>	57	Red-and-black grosbeak	141
<i>procurvoides, Campylorhamphus</i>	86	<i>Pygiptila stellaris</i>	88	Red-and-green macaw	45
<i>Progne chalybea</i>	121	Pygmy antwren	89	Red-bellied macaw	46
<i>dominicensis</i>	121	Pygmy-kingfisher, American	69	Red-billed pied tanager	132
<i>elegans</i>	121	Pygmy-owl, Amazonian	54	toucan	75
<i>subis</i>	121	, ferruginous	55	tropicbird	5
<i>tapera</i>	122	Pygmy-tyrant, double-banded	107	woodcreeper	84
<i>promeropirhynchus, Xipholaptes</i>	84	, helmeted	107	Red-breasted blackbird	148
<i>Protonotaria citrea</i>	130	, rufous-sided	105	Red-capped cardinal	143
Prothonotary warbler	130	, short-tailed	107	Red-crested finch	143
<i>Psarocolius decumanus</i>	146	<i>Pyrilia caica</i>	49	Red-crowned woodpecker	76
<i>viridis</i>	146	<i>pyrrhodes, Philydor</i>	81	Red-eyed vireo	128
<i>Pseudastur albicollis</i>	19	<i>pyrrhonota, Petrochelidon</i>	123	Red-fan parrot	50
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	46	<i>Pyrrhura picta</i>	47	, northern	50
<i>Psittacidae</i>	45-50	<b>Q</b>		Red-footed booby	6
<i>Psophia crepitans</i>	28	Quail, marbled wood-	27	Red-legged honeycreeper	137
<i>Psophiidae</i>	28	Quail-dove, ruddy	45	tinamou	2
<i>Pterodroma feae</i>	3	, violaceous	45	Red-necked woodpecker	79
<i>Pteroglossus aracari</i>	74	Quails, New World	27	Red-rumped cacique	146
<i>viridis</i>	74	<i>Querula purpurata</i>	99	Red-shouldered macaw, northern	46
Puffbird, collared	73	<i>Quiscalus lugubris</i>	147	tanager	133
, greater pied	72	<i>quixensis, Microrhoptias</i>	91	Red-throated caracara	23
, Guianan	72			Reddish hermit	62

Redstart, American	130	Roodborsttrappist	73	Rosse fluiteend	13
Regenwulp	34	Roodbrauwpeperklauwier	128	nachtzwaluw	57
, Amerikaanse	34	Roodbroeksperwer	19	tijgerroerdomp	10
Reiger, agami	9	Roodbroekwouw	18	tinamoe	2
, Amerikaanse kleine zilver-	8	Roodbruine solitaire	126	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	17
, groene	9	Roodbuikara	46	Rotshaan, oranje	99
, grote zilver-	7	Roodbuikdikbekje	145	Rough-winged swallow, southern	122
, kap-	7	Roodbuikmiersluiper	89	Royal flycatcher	110
, kleine blauwe	8	Roodbuikspitssnavel	137	, Amazonian	110
, kleine zilver-	8	Roodflankmierpitta	96	tern	40
, koe-	8	Roodkapmierlijster	96	, American	40
, mangrove-	8,9	Roodkeelbekarde	120	Roze granaatzanger	131
, schuitbek-	9	Roodkeelcaracara	23	<i>rubecula</i> , <i>Nonnula</i>	73
, sokoi-	7	Roodkeelmiervogel	95	<i>ruber</i> , <i>Eudocimus</i>	12
, westelijke koe-	8	Roodkeelmuispecht	85	, <i>Phaetornis</i>	62
, witbuik-	7	Roodkeelsaffierkolibrie	65	, <i>Phoenicopterus</i>	12
, zigzag-	10	Roodkopgier	15	<i>rubiginosus</i> , <i>Automolus</i>	81
Reigers	7-11	, Centraal-Amerikaanse	15	, <i>Colaptes</i>	77
Reuzenijsvogel, Amerikaanse	70	Roodkraaggors	142	<i>rubra</i> , <i>Piranga</i>	140
Reuzenuispecht	84	Roodkruinbladspeurder	82	<i>rubricapillus</i> , <i>Melanerpes</i>	76
Reuzennachtzwaluw, grijze	56	Roodkruinelenia	104	<i>rubricollis</i> , <i>Campephilus</i>	79
, vale	56	Roodkruinmanakin	100	Ruby-topaz hummingbird	64
, wigstaart-	56	Roodkruinral	28	Ruddy foliage-gleaner	81
Reuzennachtzwaluw, witvleugel-	56	Roodkruinspecht	76	ground-dove	44
Reuzennachtzwaluwen	56	Roodnekbosral	29	pigeon	43
Reuzensnip	33	Roodnekspecht	79	quail-dove	45
Reuzentoekan	75	Roodoogvireo	128	spinetail	79
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	109	Roodpootgent	6	turnstone	36
<i>Rhytipterna immunda</i>	116	Roodpoottinamoe	2	, Canadian	36
<i>simplex</i>	116	Roodrugmiervogel	94	Ruddy-breasted seedeater	145
<i>ridibundus</i> , <i>Larus</i>	39	Roodschouderara	46	Ruddy-tailed flycatcher	110
<i>rikeri</i> , <i>Berlepschia</i>	80	Roodschouderpapegaai	48	<i>rufa</i> , <i>Formicivora</i>	91
Ringed antpipit	105	Roodschoudertangare	133	<i>rufaxilla</i> , <i>Leptotila</i>	44
kingfisher	70	Roodsnavelfluiteend	13	Rufescent tiger-heron	10
woodpecker	78	Roodsnavelhoen	29	<i>ruficauda</i> , <i>Ramphotrigon</i>	118
<i>Riparia riparia</i>	121	Roodsnavelkeerkringvogel	5	<i>ruficaudatum</i> , <i>Philidor</i>	80
<i>Rissa tridactyla</i>	39	Roodsnavelmuisspecht	84	<i>ruficeps</i> , <i>Elaenia</i>	104
Riverbank warbler	131	Roodsnaveltangare	132	, <i>Stelgidopteryx</i>	122
<i>rivularis</i> , <i>Basileuterus</i>	131	Roodsnaveltoekan	75	<i>rufifrons</i> , <i>Pernostola</i>	93
Roadside hawk	21	Roodstaart, Amerikaanse	130	<i>rufifigula</i> , <i>Dendrexetastes</i>	84
Rode cotinga	99	Roodstaartbladspeurder	80	, <i>Gymnopathys</i>	95
grutto	34	Roodstaartbreedbektiran	118	<i>rufifigularis</i> , <i>Falco</i>	25
heremietkolibrie	62	Roodstaartmoortiran	112	, <i>Sclerurus</i>	82
ibis	12	Roodstaarttiran	110	<i>rufimarginatus</i> , <i>Herpsilochmus</i>	91
kroongors	143	Roodstaartxenops	82	<i>rufipileatus</i> , <i>Automolus</i>	82
lepelaar	12	Roodstuitbladspeurder	81	<i>Rufirallus viridis</i>	28
stekelstaart	79	Roodstuitbuidelspreuw	146	<i>rufomarginatus</i> , <i>Euscarthmus</i>	105
Roerdomp, gestreepte tijger-	10	Roodvleugelmiersluiper	91	Rufous crab-hawk	19
, rosse tijger-	10	Roodwangschreeuwuil	53	nightjar	57
, Zuid-Amerikaanse	11	Roetkopmiervogel	94	Rufous-bellied antwren	89
Roestrugmiersluiper	91	Roraima screech-owl	53	Rufous-breasted hermit	61
Roesttiran	110	Rose-breasted chat	131	Rufous-browed peppershrike	128
Roestvleugeltiran	113	Roseate spoonbill	12	, South	
Roetkopmiervogel	93	tern	40	American	128
Roetnachtzwaluw	58	, Atlantic	40	Rufous-brown solitaire	126
Rood-zwarte kardinaal	141	Rosse bladspeurder	81	Rufous-capped anthrush	96
Roodboegtroepiaal	147	duif	42	Rufous-chested woodpecker	78
Roodborstheremietkolibrie	61				

Rufous-collared sparrow	142	Salvins inezia	106	Scissor-tailed nightjar	59
Rufous-crowned elaenia	104	vliegenvikker	106	<i>sclateri</i> , <i>Hylophilus</i>	129
Rufous-necked wood-rail	29	Sand martin, collared	121	<i>Sclateria naevia</i>	93
Rufous-rumped antwren	92	Sanderling	36	Sclaters muspapegaai	47
foliage-gleaner	81	Sandpiper, Baird's	37	<i>Sclerurus caudacutus</i>	82
Rufous-sided crake	28	, buff-breasted	37	<i>mexicanus</i>	82
pygmy-tyrant	105	, least	36	<i>ruficularis</i>	82
Rufous-tailed flatbill	118	, pale-dotted	35	<i>Scolopacidae</i>	33-38
foliage-gleaner	80	, pectoral	37	Screamer, horned	12
tyrant	112	, semipalmated	36	Screamers	12
xenops	82	, solitary	35	Screaming piha	98
Rufous-thighed kite	18	, spotted	35	Screech-owl, northeren tawny-bellied	
Rufous-throated antbird	95	, stilt	37		53
hummingbird	65	, upland	34	, Roraima	53
Rufous-winged antwren	91	, western	36	, tawny-bellied	53
<i>rufus</i> , <i>Anrostomus</i>	57	, white-rumped	37	, tropical	53
, <i>Pachyramphus</i>	120	Sandpipers, Phalaropes & Snipes	33-38	, vermiculated	53
, <i>Tachyphonus</i>	133	<i>sandvicensis</i> , <i>Thalasseus</i>	40	Scrub-flycatcher, Amazonia	106
, <i>Trogon</i>	69	Sandwich tern	40	, northern	106
Ruiter, Amerikaanse bos-	35	<i>sanguineus</i> , <i>Veniliornis</i>	76	, smooth	106
, Bartrams	34	Sapphire, blue-chinned	65	, southern	106
, blonde	37	, green-vented	66	Scythebill, curve-billed	86
, grote geelpoot-	34	, white-chinned	66	Seedeater, capped	145
, kleine geelpoot-	35	Sapphire-rumped parrotlet	48	, chestnut-bellied	145
<i>Rupicola rupicola</i>	99	<i>sapphirina</i> , <i>Amazilia</i>	65	, Lesson's	144
<i>Rupornis magnirostris</i>	21	<i>Sarcoramphus papa</i>	16	, lined	144
Russet-crowned crake	28	<i>saturatus</i> , <i>Platyrinchus</i>	109	, plumbeous	144
<i>rustica</i> , <i>Hirundo</i>	123	<i>saturninus</i> , <i>Mimus</i>	125	, ruddy-breasted	145
Rusty tinamou	2	<i>savana</i> , <i>Tyrannus</i>	116	, slate-coloured	143
Rusty-backed antwren	92	Savanna hawk	20	, white-bellied	145
Rusty-breasted nunlet	73	Savannebuizerd	20	, wing-barred	144
Rusty-margined flycatcher	113	Scale-backed antbird	95	, yellow-bellied	144
<i>ruticilla</i> , <i>Setophaga</i>	130	Scalé-pigeon	42	Seed-finch, chestnut-bellied	145
<i>rutilans</i> , <i>Synalaxis</i>	79	Scarlet ibis	12	, large-billed	145
Ruwvleugelzwaluw, Zuid-Amerikaanse	122	macaw	45	<i>Seiurus noveboracensis</i>	130
	42	tanager	140	<i>Selinidera piperivora</i>	74
<i>Rynchopidae</i>	42	Scarlet-shouldered parrotlet	48	Semi-collared nighthawk	57
<i>Rynchops niger</i>	42	Scaup, lesser	14	<i>semipalmata</i> , <i>Tringa</i>	35
<b>S</b>		Schaarbek, Amerikaanse	42	Semipalmated plover	32
Sabeltangare	135	Schaarbekken	42	sandpiper	36
Sabelvleugel, grijsborst-	62	Scherpsnavel	97	<i>semipalmatus</i> , <i>Charadrius</i>	32
Sabrewing, grey-breasted	62	<i>Schiffornis turdina</i>	102	<i>semitorquatus</i> , <i>Lurocalis</i>	57
Saffierkolibrie, blauwkeel-	65	Schiffornis, bronzen	102	, <i>Micrastur</i>	24
, roodkeel-	65	<i>schistacea</i> , <i>Sporophila</i>	143	Sepia-capped flycatcher	105
, witkin-	66	<i>Schistochlamys melanopis</i>	131	<i>serena</i> , <i>Lepidothrix</i>	100
Saffraangors	142	Schoffelsnavel, geelbuik-	108	<i>Setophaga ruticilla</i>	130
, grasland-	143	, gevlekte	108	<i>severus</i> , <i>Ara</i>	46
, witstaart-	142	, grijskap-	108	Sharpbill	97
Saffron finch	143	, witkeel-	108	, Venezuelan	97
Saffron-crested tyrant-manakin	101	<i>schomburgkii</i> , <i>Micropygia</i>	28	Shearwater, Audubon's	4
<i>Sakesphorus canadensis</i>	87	Schomburgks ral	28	, Cory's	4
<i>Saltator coerulescens</i>	141	Schreeuwpiha	98	, great	4
<i>maximus</i>	141	Schreeuwuil, choliba-	53	, Manx	4
<i>grossus</i>	141	, donkerbruine	53	Shearwaters and Petrels	3-4
Saltator, bontkeel-	141	, roodwang-	53	Shiny cowbird	147
, buff-throated	141	Schubrugmiervogel	95	Short-billed dowitcher	34
, greyish	141	Schuitbekreiger	9	honeycreeper	136
, grijze	141			leaf-tosser	82

Short-crested flycatcher	118	Sluiper, gestreepte mier-	89	Southern lapwing	32
Short-eared owl	55	, grijsvleugelmier-	92	martin	121
Short-tailed anthrush	96	, grijswangmier-	92	mealy amazon	50
hawk	21	, langvleugelmier-	90	pochard	14
pygmy-tyrant	107	, roestrugmier-	91	rough-winged swallow	122
swift	60	, roodbuikmier-	89	scrub-flycatcher	106
Shrike-tanager, fulvous	133	, roodvleugelmier-	91	skua	38
Shrike-vireo, slaty-capped	128	, spikkelvleugelmier-	91	spotted rail	30
Shrike, rufous-browed pepper-	128	, Todds mier-	91	swift	60
, South American rufous-browed		, vlekstaartmier-	90	Spadebill, cinnamon-crested	109
pepper-	128	, witbandmier-	91	, golden-crowned	110
<i>sibilator, Sirystes</i>	117	, witflankmier-	90	, white-crested	110
<i>Sicalis citrina</i>	142	Small-billed elania	103	<i>spadiceus, Attila</i>	119
<i>flaveola</i>	142	Smaragdkolibrie, blauwstaart-	65	Spangled cotinga	98
<i>luteola</i>	143	Smelleken	25	Sparmanns xenops	83
Sicks gierzwaluw	60	Smient, Amerikaanse	13	Sparrenpiewie	111
Siertangare	134	Smoky-fronted tody-flycatcher	108	Sparrenzanger	130
Silver-beaked tanager	134	Smooth scrub-flycatcher	106	Sparrow, grassland	142
Silvered antbird	93	Smooth-billed ani	52	, house	128
Silvered antcatcher, Venezuelan	93	Snail kite	17	, pectoral	142
<i>simplex, Phaetusa</i>	41	Snip, Amerikaanse water-	33	, rufous-collared	142
, <i>Rhytipterna</i>	116	, bergwater-	33	Sparrows, New World & Buntings	142-146
Sirystes	117	, kleine grijze	34	Sparrows, Old World	128
<i>Sirystes sibilator</i>	117	, reuzen-	33	<i>sparverius, Falco</i>	24
Sirystestiran	117	Snipe, giant	33	<i>Spatula discors</i>	14
Sjakohoen, marail	26	, South American	33	Specht, blauwsnavelmuis-	85
, Spix'	26	, Wilson's	33	, bloedrug-	76
Sjakohoenders, Goeans, Hokko's &		Snipes, Sandpipers & Phalaropes	33-38	, brons-	77
Chacalaca's	26	Snippen, Strandlopers & Franjepoten	33-38	, bruinkeelmuis-	84
Skimmer, Amazon	42	Snowy egret	8	, campogron-	77
, black	42	<i>sociabilis, Rostrhamus</i>	17	, gebandeerde muis-	85
Skimmers	42	Sokoireiger	7	, geelbrauw-	76
Skua, brown	38	Soldatenspreeuw, zwartkop-	148	, geelkeel-	77
, eastern long-tailed	39	Solitair, roodbruine	126	, geelkeelmuis-	85
, long-tailed	39	, rufous-brown	126	, geschubde	78
, south polar	38	<i>solitaria, Tringa</i>	35	, gestreepte helm-	78
, southern	38	<i>solitarius, Myiodynastes maculatus</i>	114	, gestreepte muis-	85
Skuas	38-39	Solitary sandpiper	35	, goudkraag-	76
Slakkenwouw	17	Sonnini's bobwhite	27	, grijswangmuis-	83
Slangenhalsvogel, Amerikaanse	6	Sooty tern	41	, Guyanadweg-	75
Slangenhalsvogels	6	, Caribbean	41	, kleine dwerg-	75
Slankpootvliegenpikker	105	Sooty-capped hermit	62	, kromsnavelmuis-	86
Slanksnavelwouw	17	Sooty-headed tyrannulet	102	, langstaartmuis-	83
Slate-coloured grosbeak	141	<i>soui, Crypturellus</i>	2	, olijfrug-	77
seedeater	143	South American rufous-browed		, priemsnavelmuis-	86
Slaty antshrike, northern	88	peppershrike	128	, reuzenmuis-	84
Slaty-backed forest-falcon	24	South American snipe	33	, roodkeelmuis-	85
Slaty-capped shrike-vireo	128	polar skua	38	, roodkrui-	76
Slechtvalk	25,26	Southern beardless tyrannulet	104	, roodnek-	79
, bonte	25	black-bellied whistling-duck	13	, roodsnavelmuis-	84
Slender-billed kite	17	boat-billed heron	9	, strogele	78
xenops	83	collared trogon	69	, vaalkuif-	78
Slender-footed tyrannulet	105	crested owl	54	, vlekborstgron-	77
Sluierangare	131	house wren	124	, vlekkeelmuis-	84
Sluiper, Behns mier-	90			, wenkbrauwuis-	86
, bonte mier-	90			, wigsnavelmuis-	84
, bruinbuikmier-	89			, witkinmuis-	83
, dwergmier-	89				

Specht, witstreepmuis-	86	Spotlijster, tropische	125	Stilt sandpiper	37
, witte	76	Spotlijsters	125	Stilt, black-necked	31
, zwartborst-	78	Spotted antpitta	96	, black-winged	31
, zwartkeel-	79	puffbird	72	Stilts & Avocets	31
Spechten	75-79	rail	30	Stippentangare	135
Spechten, muis-	83-86	sandpiper	35	<i>stolidus</i> , <i>Anous</i>	42
<i>speciosa</i> , <i>Patagioenas</i>	42	tanager	135	Stork, maguari	11
<i>speciosum</i> , <i>Conirostrum</i>	138	tody-flycatcher	108	, wood	11
Speckled spinetail	80	Spreeuw, geelstuitbuidel-	146	Storks	11
tanager	135	Spreeuw, roodstuitbuidel-	146	Storm-petrel, band-rumped	5
Spectacled owl	54	, zwartkopsoldaten-	148	, Fuegian	4
thrush	126	, witkaakweide-	148	, Leach's	5
Sperwer, Amerikaanse dwerg-	18	<i>squamata</i> , <i>Tachornis</i>	60	, Wilson's	4
, roodbroek-	19	<i>squatarola</i> , <i>Pluvialis</i>	32	Storm-petrels	4-5
Spiegelbreedbektiran	109	Squirrel cuckoo, Amazonian	51	Stormvogel, Audubons pijl-	4
Spiesstaartnachtzwaluw	59	, common	51	, Bulwers	3
Spikkeltangare	135	Starthroat, long-billed	68	, grote pijl-	4
Spikkelvleugelmiersluiper	91	<i>Steatornis caripensis</i>	55	, Kuhls pijl-	4
Spinetail, McConnell's	79	<i>Steatornithidae</i>	55	, Noordse pijl-	4
, pale-breasted	79	Steenduif	44	Stormvogels	3-4
, plain-crowned	80	Steenloper	36	Stormvogeltje, Madeira-	5
, ruddy	79	<i>Steganopus tricolor</i>	38	, vaal	5
, speckled	80	Stekelstaart, Cayenne	80	, Wilsons	4
, yellow-chinned	80	, geelkeel-	80	Stormvogeltjes	4-5
<i>spinicaudus</i> , <i>Chaetura</i>	59	, gespikkelde	80	Straight-billed hermit	62
<i>spirurus</i> , <i>Glyphorhynchus</i>	84	, masker-	15	woodcreeper	86
Spitssnavel, roodbuik-	137	, McConnells	79	Strandloper, Alaska-	36
, tweekleurig	138	, rode	79	, Bairds	37
Spix' piewie	111	, Temmincks	79	, Bonapartes	37
sjakohoen	26	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	122	, drieteen-	36
Spix's guan	26	<i>stellaris</i> , <i>Pygiptila</i>	88	, gestreepte	37
<i>Spiza americana</i>	140	Steltkluten & Kluten	31	, grijze	36
<i>spiza</i> , <i>Chlorophanes</i>	137	Steltkluut	31	, kleinste	36
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	22	, Amerikaanse	31	, stelt-	37
<i>ornatus</i>	22	Steltstrandloper	37	Strandlopers, Franjepoten & Snippen	33-38
<i>tyrannus</i>	22	<i>Stercorariidae</i>	38-39	Streaked antwren, Guianana	89
<i>spodioptila</i> , <i>Terenura</i>	92	<i>Stercorarius longicaudus</i>	39	Streaked flycatcher	114
Spoonbill, roseate	12	<i>parasiticus</i>	38	Streepstaartxenops	83
Spoonbills & Ibises	11-12	<i>pomarinus</i>	38	Streepvleugelmanakin	101
<i>Sporophila americana</i>	144	Sterkeelkolibrie, langsnavel-	68	<i>Streptoprocne zonaris</i>	59
<i>bouvreuil</i>	145	Stern, Amazone-	41	<i>striata</i> , <i>Dendroica</i>	130
<i>bouvronides</i>	144	, Amerikaanse dwerg-	41	, <i>Butorides</i>	8,9
<i>castaneiventris</i>	145	, bonte	41	Striated heron	8
<i>leucoptera</i>	145	, bril-	40	<i>Strigidae</i>	53-55
<i>lineola</i>	144	, Dougalls	41	Stripe-backed bittern	10
<i>minuta</i>	145	, grootsnavel-	40	Stripe-tailed yellow-finch	142
<i>nigricollis</i>	144	, grote	40	Striped cuckoo	52
<i>plumbea</i>	144	, konings-	40	owl	55
<i>schistacea</i>	143	, lach-	40	woodcreeper	85
Spot-backed antbird	95	, zwarte	41	Strogele specht	78
Spot-breasted woodpecker	77	<i>Sterna dougallii</i>	40	Strong-billed woodcreeper	84
Spot-crowned puffbird	72	<i>Sterna hirundo</i>	40	Struikvliegenpikkerer	106
Spot-tailed antwren	90	<i>Sternidae</i>	40-42	<i>Sturnella magna</i>	148
nightjar	58	Sterns	40-42	<i>militaris</i>	148
Spot-throated woodcreeper	84	<i>Sternula antillarum</i>	41	Stygian owl	55
Spot-winged antbird	94	<i>superciliaris</i>	41	<i>stygius</i> , <i>Asio</i>	55
antshrike	88	<i>stictocephalus</i> , <i>Herpsilochmus</i>	91	Subantarktische grote skua	38
Spotlijster, campossotlijster	125	<i>stictolaema</i> , <i>Deconychura</i>	84		

<i>subis, Progne</i>	121	Swift, lesser swallow-tailed	60	Tanager, white-rumped	132
<i>Sublegatus arenarum</i>	106	, short-tailed	60	, white-shouldered	133
<i>modestus</i>	106	, southern	60	, yellow-backed	137
<i>obscurior</i>	106	, white-chinned	59	Tanagers	31-140
<i>subruficollis, Calidris</i>	37	, white-collared	59	Tandkwartel, gemarmerde	27
<i>subvinacea, Patagioenas</i>	43	, white-tipped	60	Tandkwartels	27
Suikerdiefje	140	Swifts	59-61	Tandwouw	17
Suikervogel, blauwe	137	<i>Synalaxis albescens</i>	79	<i>Tangara cayana</i>	135
, groene	137	<i>gujanensis</i>	80	<i>chilensis</i>	135
, kortsnavel-	136	<i>macconnelli</i>	79	<i>guttata</i>	135
, purper-	136	<i>rutilans</i>	79	<i>gyrola</i>	135
Suiriri flycatcher	104	<b>T</b>		<i>mexicana</i>	134
<i>Suiriri suiriri</i>	104	<i>Tachornis squamata</i>	60	<i>punctata</i>	135
Suiriri-tiran	104	Tachuri, bearded	105	<i>varia</i>	135
<i>Sula dactylatra</i>	6	<i>Tachybaptus dominicus</i>	2	<i>velia</i>	135
<i>leucogaster</i>	5	<i>Tachycineta albiventer</i>	121	Tangare, Amazone-	132
<i>sula</i>	6	<i>Tachyphonus cristatus</i>	132	, bisschops-	134
<i>Sulidae</i>	5-6	<i>fulvus</i>	133	, bloedrode	139
Sulphur-breasted parakeet	50	<i>luctuosus</i>	133	, bruine klauwier-	133
<i>sulphuratus, Pitangus</i>	114	<i>phoenicius</i>	133	, druppel-	135
<i>sulphurea, Tyrannopsis</i>	115	<i>rufus</i>	133	, ekster-	131
<i>sulphurescens, Tolmomyias</i>	109	<i>surinamus</i>	132	, fluweel-	133
Sulphury flycatcher	115	<i>taciturnus, Arremon</i>	142	, geelstuit-	137
Summer tanager	140	Taczanowski's lijster	126	, goudkuif-	132
Sunbittern	31	<i>Taeniotriccus andrei</i>	108	, guira-	137
, Amazonian	31	Taling, blauwvleugel-	14	, kap-	132
Sungem, horned	68	<i>talpacoti, Columbina</i>	44	, laaglandlever-	140
Sungrebe	30	<i>tamatia, Nystactes</i>	72	, okerkap-	135
<i>superciliaris, Sternula</i>	41	Tanager, bay-headed	135	, opaalstuit-	135
<i>superciliosus, Accipiter</i>	18	, black-faced	131	, palm-	134
, <i>Phaetornis</i>	61	, blood-red	139	, paradijs-	134
Surinaamse looftiran	105	, blue-backed	134	, roodschouder-	133
<i>surinamensis, Myrmetherula</i>	89	, blue-grey	134	, roodsnavel-	132
<i>surinamus, Pachyramphus</i>	120	, burnished-buff	135	, sabel-	135
, <i>Tachyphonus</i>	132	, dotted	135	, sier-	134
<i>swainsoni, Myiarchus</i>	117	, flame-crested	132	, sluier--	131
<i>swainsonii, Gampsonyx</i>	17	, fulvous shrike-	133	, spikkel-	135
Swainson's flycatcher	117	, fulvous-crested	133	, stippen-	135
Swainsons tiran	117	, grey-headed	132	, turkoois-	134
Swallow tanager	136	, guira	137	, vuurkuif-	132
Swallow, American barn	123	, highland hepatic	139	, witband-	131
, barn	123	, hooded	132	, witschouder-	133
, black-collared	122	, lowland hepatic	140	, witstuit-	132
, blue-and-white	122	, magpie	131	, zomer-	140
, cliff	123	, opal-rumped	135	, zwaluw-	136
, southern rough-winged	122	, palm	134	, zwarte	133
, white-banded	122	, paradise	134	, zwartvleugel-	140
, white-thighed	122	, red-billed pied	132	Tangaren	131-140
, white-winged	121	, red-shouldered	133	<i>Tapera naevia</i>	52
Swallow-tailed hummingbird	63	, scarlet	140	<i>tapera, Progne</i>	122
kite	16	, silver-beaked	133	Tapuittiran, vale	112
swift, lesser	60	, speckled	135	<i>Taraba major</i>	87
Swallow-winged puffbird	73	, spotted	135	Tawny-bellied screech-owl	53
Swallows & Martins	121-123	, summer-	140	, northern	53
Swift, band-rumped	59	, swallow	136	Tawny-crowned greenlet	129
, Chapman's	59	, turquoise	134	Tawny-throated leaftosser	82
, common	61	, white-banded	131	Teal, blue-winged	14
, fork-tailed palm-	60	, white-lined	133		

<i>tectus</i> , <i>Notharchus</i>	72	Thrush, grey-cheeked	126	Tiran, grauwe treur-	119
Temmincks mierklauwier	89	, grey-flanked	125	, grijskruinbreedbek-	109
stekelstaart	79	, northern water-	130	, grijze konings-	116
<i>tenebrosa</i> , <i>Chelidoptera</i>	73	, pale-breasted	125	, grijze treur-	116
<i>tenuirostris</i> , <i>Xenops</i>	83	, pale-eyed	126	, groene breedbek-	109
Tepui greenlet	129	, rufous-capped ant-	96	, groenkapbreedbek-	109
parrotlet	48	, short-tailed ant-	96	, helmdwerg-	107
Tepuibriljantkolibrie	67	, spectacled	126	, konings-	116
Tepuiparkiet	48	, Venezuelan ant-	96	, kortkuif-	118
Tepuitoucanet	74	, white-throated	125	, kortsnavel-	113
Tepuivireo	129	Thrushes	125-126	, kortstaartdwerg-	107
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	110	<i>Thryothorus coraya</i>	123	, langstaart-	113
<i>Terenura callinota</i>	92	<i>leucotis</i>	123	, MacConnells pipra-	106
<i>spodioptila</i>	92	<i>thula</i> , <i>Egretta</i>	8	, monnikskap-	117
Tern, American black		<i>tibialis</i> , <i>Neochelidon</i>	122	, okerbuikpipra-	106
, American royal	40	Tiger-heron, fasciated	10	, Pelzels todie-	107
, Atlantic bridled	41	, rufescent	10	, piraat-	113
, Atlantic roseate	40	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	10	, roest-	110
, black	41	, <i>lineatum</i>	10	, roestvleugel-	113
, bridled	41	Tijgerroerdomp, gestreepte	10	, roodstaart-	110
, Cabot's	40	, rosse	10	, roodstaartbreedbek-	118
, Caribbean sooty	41	<i>Tinamidae</i>	1-2	, roodstaartmoor-	112
, common	40	Tinamoe, bonte	2	, sirystes	117
, large-billed	41	, grauwe	1	, spiegelbreedbek-	109
, least	41	, grote	1	, suiriri-	104
, gull-billed	40	, kleine	2	, Surinaamse loof--	105
, roseate	40	, roodpoot-	2	, Swainsons	117
, royal	40	, rosse	2	, tropische konings-	115
, Sandwich	40	Tinamoes	1-2	, vaalbuiktreur-	116
, sooty	41	Tinamou, cinereous	1	, vale tapuit-	112
, yellow-billed	41	, great	1	, vink-	111
Terns	40-42	, little	2	, vorkstaartkonings-	116
<i>Tersina viridis</i>	136	, red-legged	2	, wenkbrauwbreedbek-	118
Texasnachtzwaluw	57	, rusty	2	, witkeelkonings-	115
<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	3	, variegated	2	, witkopwater-	112
<i>Thalasseus maximus</i>	40	Tinamous	1-2	, witkuifbreedbek--	110
<i>sandvicensis</i>	40	<i>Tinamus, major</i>	1	, witoogtodie-	107
<i>Thalurania furcata</i>	65	Tiny hawk	18	, zwaluw-	111
<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	89	Tiny tyrant-manakin	101	, zwartkuiftodie-	108
<i>caesius</i>	89	Tiran, Amazonekroon-	110	, zwavel-	115
<i>Thamnophilus amazonicus</i>	88	, Amazonemoor-	112	Tirankuifarend	22
<i>doliatus</i>	88	, baard-	105	Tiranmanakin, geelkuif-	101
<i>murinus</i>	88	, bonte	115	, kleine	101
<i>punctatus</i>	88	, bonte water-	112	Tiranmanakin, witbuik-	101
<i>Thamnophilidae</i>	86-95	, bootsnavel-	115	Tiranmiervogel	92
<i>theresia</i> , <i>Polytmus</i>	66	, bootsnaveltodie-	107	Tirannen	102-120
<i>thoracicus</i> , <i>Hylophilus</i>	129	, bruinkopbreedbek-	109	<i>Tityra cayana</i>	119
<i>Thraupidae</i>	131-140	, Cayenne-	118	<i>inquisitor</i>	119
<i>Thraupis episcopus</i>	134	, dubbelbanddwerg-	107	Tityra, black-crowned	119
<i>palmarum</i>	134	, Eulers	111	, black-tailed	119
<i>Threnetes leucurus</i>	61	, geelbuikbreedbek-	109	, zwartkruin-	119
<i>Threskiornithidae</i>	11-12	, geelbuikdwerg-	105	, zwartstaart-	119
Thrush-like antpitta	96	, geelkapbreedbek--	110	Toco toucan	75
mourner	102	, geelkeel-	114	<i>toco</i> , <i>Ramphastos</i>	75
Thrush, black-billed	125	, geelstuit-	110	Todd's antwren	91
, black-faced ant-	96	, gele loof-	104	Todds miersluiper	91
, black-hooded	126	, geringde pieper-	105	Todietiran, bootsnavel-	107
, cocoa	126	, gestreepte	114	, Pelzels	107

Todietiran, witoog-	107	<i>Trochilidae</i>	61-68	Turnstone, Canadian ruddy	36
, zwartkuif-	108	Troepiaal, Caribische	147	, ruddy	36
<i>Todirostrum cinereum</i>	108	, geelkap-	147	Turquoise tanager	134
<i>maculatum</i>	108	, gele	147	Tweekleurige spitsnavel	138
<i>pictum</i>	108	, roodboeg	147	Tweetandwouw	17
Tody-flycatcher, common	108	Troepialen	146-149	Typical antbirds	86-95
, painted	108	<i>Troglodytidae</i>	123-124	Typical owls	53-55
, smoky-fronted	108	<i>Troglodytes musculus</i>	124	<i>Tyrannetes virescens</i>	101
, spotted	108	<i>Trogon collaris</i>	69	<i>Tyrannidae</i>	102-120
Tody-tyrant, boat-billed	107	<i>melanurus</i>	69	<i>tyrannina, Cercomacra</i>	92
, Pelzeln's	107	<i>rufus</i>	69	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	115
, white-eyed	107	<i>violaceus</i>	68	Tyrannulet, Amazonian mouse-	
Toekan, groefsnavel-	75	<i>viridis</i>	68	coloured	104
, reuzen-	75	Trogon, black-tailed	69	, Guianan	105
, roodsnavel-	75	, black-throated	69	, mouse-coloured	104
Toekans	74-75	, collared	69	, olive-green	105
<i>Tolmomyias assimilis</i>	109	, gekraagde	69	, pale-tipped	106
<i>flaviventris</i>	109	, green-backed	68	, sepia-capped	105
<i>poliocephalus</i>	109	, groenrug-	68	, sooty-headed	102
<i>sulphurescens</i>	109	, Guianan	68	, slender-footed	105
Topaaskolibrie	64	, Guyana	68	, southern beardless	104
Topaz, crimson	64	, southern collared	69	, white-lored	104
Topaz hummingbird, ruby-	64	, violaceous	68	, yellow	104
<i>Topaza pella</i>	64	, zwartkeel-	69	, yellow-crowned	102
Topper, kleine	14	, zwartstaart-	69	<i>tyrannulus, Myiarchus</i>	118
Torenvalk, Amerikaanse	24	<i>Trogonidae</i>	68-69	<i>Tyrannulus elatus</i>	102
<i>torquata, Hydropsalis</i>	59	Trogons	68-69	<i>Tyrannus albogularis</i>	115
, <i>Megaceryle</i>	70	Trompetvogel	28	<i>dominicensis</i>	116
, <i>Myrmornis</i>	95	Trompetvogels	28	<i>melancholicus</i>	115
<i>torquatus, Celeus</i>	78	Tropical gnatcatcher	127	<i>savana</i>	116
, <i>Corythopsis</i>	105	kingbird	115	<i>tyrannus</i>	116
Toucan, channel-billed	75	mockingbird	125	<i>tyrannus, Spizaetus</i>	22
, red-billed	75	parula	129	, <i>Tyrannus</i>	116
, toco	75	pewee	111	Tyrant-flycatchers	102-120
Toucanet, Guianan	74	screech-owl	53	Tyrant-manakin, pale-bellied	101
, tepui	74	Tropicbird, red-billed	5	, saffron-crested	101
Toucans	74-75	Tropicbirds	5	, tiny	101
<i>Touit batavicus</i>	48	Tropische koningstiran	115	Tyrant, Amazonian black-	112
<i>huetii</i>	48	spotlijster	125	, black-chested	108
<i>purpuratus</i>	48	Trumpeter, grey-winged	28	, boat-billed tody-	107
Trappist, roodborst-	73	Trumpeters	28	, cinnamon	111
, zwarte	73	<i>tuberculifer, Myiarchus</i>	117	, double-banded	107
Trapstaartnachtzwaluw	58	<i>tucanus, Ramphastos</i>	75	, drab water-	112
Treurduif	43	Tufted coquette	64	, helmeted pygmy-	107
, geoorde	43	Tundra falcon	25	, long-tailed	113
Treurtiran, grijze	116	<i>tundrius, Falco peregrinus</i>	25	, Pelzeln's tody-	107
, grauwe	119	<i>Turdidae</i>	125-126	, pied water-	112
, vaalbuik-	116	<i>turdina, Schiffornis</i>	102	, rufous-sided pygmy-	105
<i>tricolor, Egretta</i>	7	<i>Turdus albicollis</i>	125	, rufous-tailed	112
, <i>Perissocephalus</i>	99	<i>fumigatus</i>	126	, short-tailed pygmy-	107
, <i>Steganops</i>	38	<i>ignobilis</i>	125	, white-eyed tody-	107
Tricoloured heron	7	<i>leucomelas</i>	125	, white-headed marsh-	112
<i>tridactyla, Rissa</i>	39	<i>leucops</i>	126	<i>Tyto alba</i>	53
<i>Tringa flavipes</i>	35	<i>nudigenis</i>	126	<i>Tytonidae</i>	53
<i>melanoleuca</i>	34	<i>olivater</i>	126	<b>U</b>	
<i>semipalmata</i>	35	Turkey vulture	15	Uil, bonte bos-	54
<i>solitaria</i>	35	, Central American	15	, Braziliaanse dwerg-	55
Trinidad yellow-rumped cacique	146	Turkooistangare	134	, bril-	54



Uil, cholibaschreeuw-	53	<i>verreauxi</i> , <i>Leptotila</i>	44	Vlekvleugelmierklauwier	88
, donkerbruine schreeuw-	53	Vetvogel	55	Vlekvleugelmiervogel	94
, gestreepte rans-	55	<i>viduata</i> , <i>Dendrocygna</i>	13	Vliegenpikker, donkere	106
, grote rans-	55	Vinktiran	111	, dwerg-	102
, Hardy's dwerg-	54	<i>violacea</i> , <i>Euphonia</i>	139	, geelkeel-	104
, holen-	55	, <i>Geotrygon</i>	45	, geelkruin-	102
, kerk-	53	, <i>Nyctinassa</i>	9	, Salvins	106
, kuif-	54	Violaceous euphonia	139	, slankpoot-	105
, roodwangschreeuw-	53	quail-dove	45	, struik-	106
, veld-	55	trogon	68	, wenkbrauw-	104
, zwartgestreepte bos-	54	<i>violaceus</i> , <i>Trogon</i>	68	, witvleugel-	104
Uilen	53-55	Violet-ear, brown	63	Vloedboszanger	131
, kerk-	53	Violetoorkolibrie, bruine	63	<i>vociferans</i> , <i>Lipaugus</i>	98
<i>uncinatus</i> , <i>Chondrohierax</i>	16	Violette organist	139	<i>Volatinia jacarina</i>	143
<i>undatus</i> , <i>Celeus</i>	78	<i>Vireo altiloquus</i>	128	Vorkstaartbosnimf	65
<i>undulata</i> , <i>Gallinago</i>	33	olivaceus	128	Vorkstaartkoningstiran	116
<i>undulatus</i> , <i>Zebrilus</i>	10	Vireo's	128-129	Vruchtenkraai, kaalnek	98
Uniform crake	29	Vireo, baard-	128	, karmozijn-	98
Upland sandpiper	34	, black-whiskered	128	, purperkeel-	99
<i>urubitinga</i> , <i>Buteogallus</i>	20	, bruinwang-	129	Vulture, American black	15
<b>V</b>		, geelborst	129	, Central American turkey	15
Vaal stormvogeltje	5	, grijskapklauwier-	128	, greater yellow-headed	15
Vaalborstlijster	125	, grijskop-	129	, king	16
Vaalbuiktreurtiran	116	, okerkap-	129	, lesser yellow-headed	15
Vaalkuifspecht	78	, red-eyed	128	, turkey	15
Vale reuzennachtzwaluw	56	, roodoog-	128	Vultures, New World	15-16
tapuittiran	112	, slaty-capped shrike-	128	Vuurkuiftangare	132
Valk, Amerikaanse toren-	24	, tepui-	129	Vuurstaartkluutkolibrie	64
, aplomado-	25	, white-streaked ant-	88	<b>W</b>	
, bonte slecht-	25	, witstreepmier-	88	Warbler, blackburnian	130
, gebandeerde bos-	24	<i>Vireolanus leucotis</i>	128	, blackpoll	130
, gestreepte bos-	24	<i>Vireonidae</i>	128-129	, prothonotary	130
, grote bos-	24	Vireos	128-129	, riverbank	131
, lach-	23	<i>virescens</i> , <i>Butorides striata</i>	9	, yellow	130
, Mirandolles bos-	24	, <i>Phylloscartes</i>	105	Warblers, New World	129-131
, slecht-	25,26	, <i>Tyranneutes</i>	101	Warbling antbird	93
, vleermuis-	25	<i>virgata</i> , <i>Ciccaba</i>	54	Waterhoen, Amerikaans	30
Valkachtigen	23-26	<i>virginianus</i> , <i>Bubo</i>	53	Waterlijster, noordse	130
<i>Vanellus chilensis</i>	32	<i>viridicata</i> , <i>Myiopagis</i>	103	Watersnip, Amerikaanse	33
<i>varia</i> , <i>Grallaria</i>	97	<i>viridigaster</i> , <i>Amazilia</i>	67	, berg-	33
, <i>Tangara</i>	135	<i>viridigula</i> , <i>Anthracothorax</i>	63	Waterthrush, northern	130
Variëgate antpitta	97	<i>viridis</i> , <i>Frederickena</i>	87	Watertiran, bonte	112
flycatcher	115	, <i>Pachyramphus</i>	119	, witkop-	112
tinamou	2	, <i>Psarocolius</i>	146	Water-tyrant, drab	112
<i>variegatus</i> , <i>Crypturellus</i>	2	, <i>Pteroglossus</i>	74	, pied	112
<i>varius</i> , <i>Empidonomus</i>	115	, <i>Rufirallus</i>	28	<i>watsonii</i> , <i>Megascops</i>	53
Velduil	55	, <i>Tersina</i>	136	Wattled jacana	31
<i>velia</i> , <i>Tangara</i>	136	, <i>Trogon</i>	68	Waved woodpecker	78
Velvet-browed brilliant	67	Visarend	16	Wedge-billed woodcreeper	84
Venezuelan antthrush	96	Visdief	40	Wedge-tailed grass finch	143
great horned owl	53	<i>vitellinus</i> , <i>Ramphastos</i>	75	Wegbuiserd	21
sharpbill	97	<i>vitiosus</i> , <i>Lophotriccus</i>	107	Weidespreeuw, witkaak	148
silvered antcatcher	93	Vlagstaartkolibrie	65	Wenkbrauwbreedbektiran	118
<i>Veniliornis cassini</i>	76	Vleermuisvalk	25	Wenkbrauwmuisspecht	86
<i>sanguineus</i>	76	Vlekborstgrondspecht	77	Wenkbrauwvliegenpikker	104
Vermiculated screech-owl	53	Vlekkeelmuisspecht	84	Westelijke koereiger	8
<i>vermiculatus</i> , <i>Megascops</i>	53	Vlekstaartmiersluiper	90	Western cattle egret	8
Verreaux' duif	44	Vlekstaartnachtzwaluw	58	sandpiper	36

Western willet	35	White-throated pewee	112	Witkeelschoffelsnavel	108
Whimbrel	34	thrush	125	Witkingierzwaluw	59
, American	34	White-tipped dove	44	Witkinmuisspecht	83
Whiskered flycatcher	110	swift	60	Witkinsaffierkolibrie	66
vireo, black-	128	White-vented euphonia	139	Witkopwatertiran	112
Whistling-duck, black-bellied	13	White-winged becard	120	Witkraaggierzwaluw	59
, fulvous	13	potoo	56	Witkruinmanakin	100
, southern black-		swallow	121	Witkuifbreedbektiran	110
bellied	13	<i>whitelianus, Aulacorhynchus</i>	74	Witnekkbaardkoekoek	72
Whistling-duck, white-faced	13	Whitely's arassari	74	Witnekkolibrie	63
White bellbird	99	Wigeon, American	13	Witnekklijster	125
White egret, great	7	Wigsnavelmuisspecht	84	Witoogaratinga	46
White hawk	19	Wigstaartgrasgors	143	Witoogtodietiran	107
, Amazonian	19	Wigstaartreuzennachtzwaluw	56	Witoorwinterkoning	123
ibis	12	Willet	35	Witpluimmiervogel	95
woodpecker	76	, eastern	35	Witschoudertangare	133
White-banded swallow	122	, western	35	Witsnavelmuisspecht	84
tanager	131	Wilson's phalarope	38	Witstaartboudkeelkolibrie	21
White-bearded manakin	101	Wilson's plover	32,33	Witstaartnachtszwaluw	58
White-bellied antbird	94	Wilson's snipe	33	Witstaartsaffraangors	142
seedeater	145	storm-petrel	4	Witsterdikbekje	144
White-breasted wood-wren	124	<i>wilsonia, Charadrius</i>	32,33	Witstreepmiervireo	88
White-browed antbird	93	Wilson's stormvogeltje	4	Witstreepmuisspecht	86
wood-owl,		Wing-banded antbird	95	Witstuittangare	132
McConnell's	54	wren	124	Witvleugelbekarde	120
White-cheeked pintail	14	Wing-barred piprites	101	Witvleugelmierenpikker	104
White-chested emerald	66	seedeater	144	Witvleugelreuzennachtzwaluw	56
puffbird	73	Winterkoning, bos-	124	Witvoorhoofmanakin	100
White-chinned sapphire	66	, coraya	123	Witwangfluiteend	13
swift	59	, Orpheus-	124	Witte ibis	12
woodcreeper	83	, witband-	124	Witte klokvogel	99
White-collared swift	59	, witoor-	123	Witte specht	76
White-crested spadebill	110	, zuidelijke huis-	124	Wood-owl, McConnell's white-	
White-crowned manakin	100	Winterkoningen	123-124	browed	54
White-eyed parakeet	46	Witbandgierzwaluw	59	Wood stork	11
tody-tyrant	107	Witbandmiersluiper	91	Wood-quail, marbled	27
White-faced whistling-duck	13	Witbandtangare	131	Wood-rail, grey-necked	29
White-flanked antwren	90	Witbandwinterkoning	124	, rufous-necked	29
White-fringed antwren	91	Witbandzwaluw	122	Wood-wren, white-breasted	124
White-fronted manakin	100	Witborstamazilia	66	Woodcreeper, Amazonian barred	85
White-headed marsh-tyrant	112	Witborstbaardkoekoek	73	, black-banded	85
piping-guan	26	Witbrauwmierkruiper	93	, buff-throated	85
White-lined tanager	133	Witbuikdikbekje	145	, chestnut-rumped	85
White-lored euphonia	139	Witbuikkoekoek	51	, cinnamon-throated	84
tyrannulet	104	Witbuikmiervogel	94	, line-throated	83
White-necked jacobin	63	Witbuikorganist	139	, lineated	86
White-plumed antbird	95	Witbuikreiger	7	, long-tailed	83
White-rumped sandpiper	37	Witbuiktiranmanakin	101	, narrow-billed	86
tanager	132	Witbuikzwaluw	121	, plain-brown	83
White-shouldered tanager	133	Witflankmiersluiper	90	, red-billed	84
White-streaked antvireo	88	Witflankzwaluw	122	, spot-throated	84
White-tailed goldenthrout	66	Witkaakweidespreeuw	148	, straight-billed	86
hawk	21	Witkapnoddy	42	, striped	85
kite	17	Witkeelkardinaal	141	, strong-billed	84
nightjar	58	Witkeelkoningstiran	115	, wedge-billed	84
White-thighed swallow	122	Witkeelmanakin	100	, white-chinned	83
White-throated kingbird	115	Witkeelpiewie	112	Woodcreepers	83-86
manakin	100	Witkeelporseleinhoen	29		

Woodnymph, fork-tailed	65	Wren, white-fringed ant-	91	Yellowish pipit	123
Woodpecker, blood-coloured	76	, wing-banded	124	Yellowlegs, greater	34
, chestnut	78	Wrens	123-124	, lesser	35
, cream-coloured	78	Wulp, Amerikaanse regen-	34	Yellowthroat, masked	131
, crimson-crested	79	, regen-	34	<b>Z</b>	
, golden-collared	76	Wurgarend	22	Zaadkraker, dikbek-	145
, golden-green	77	<b>X</b>		, zwartkop-	145
, golden-olive	77	<i>xanthogonys, Helodoxa</i>	67	Zanger, citroen-	130
, Guianan golden-green	77	<i>Xenopipo atronitens</i>	101	, gele	130
, lineated	78	<i>Xenops milleri</i>	82	, maskerparula-	129
, red-crowned	76	<i>minutus</i>	83	, roze granaat-	131
, red-necked	79	<i>tenuirostris</i>	83	, sparren-	130
, ringed	78	Xenops, plain	83	, vloedbos-	131
, rufous-chested	78	, roodstaart-	82	, Zuid-Amerikaanse masker-	131
, spot-breasted	77	, rufoustailed	82	, zwartkop-	130
, waved	78	, slender-billed	83	Zangers, Amerikaanse	129-131
, white	76	, Sparmanns	83	Zebraamierklauwier	86
, yellow-throated	77	, streepstaart-	83	<i>Zebrilus undulatus</i>	10
, yellow-tufted	76	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	84	<i>Zenaida auriculata</i>	43
Woodpeckers	75-79	<i>Xipholaena punicea</i>	98	<i>macroura</i>	43
Woodstar, amethyst	68	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	85	Zevenkleurenpapegaaï	48
Woudaap, Amerikaanse	10	<i>obsoletus</i>	85	Zigzag heron	10
, gestreepte	10	<i>pardalotus</i>	86	Zigzagreiger	10
Wouw, Amerikaanse grijze	17	<i>picus</i>	113	Zilverplevier	32
, Cayenne-	16	<i>Xolmis cinereus</i>		Zilverreiger, grote	7
, donkergrijze	18	<b>Y</b>		, Amerikaanse kleine	8
, grijskop-	16	Yellow oriole	147	, kleine	8
, langsnavel-	16	Yellow tyrannulet	104	<i>Zimmerius gracilipes</i>	105
, parel	17	Yellow warbler	130	Zomertangare	140
, roodbroek-	18	Yellow-backed tanager	138	<i>zonaris, Streptoprocne</i>	59
, slakken-	17	Yellow-bellied elaenia	103	Zone-tailed hawk	21
, slanksnavel-	17	Yellow-bellied seedeater	144	Zonneral	31
, tand-	17	Yellow-billed cuckoo	50	Zonnestraalkolibrie	68
, tweetand-	17	, jacamar	71	<i>Zonotrichia capensis</i>	142
, zwaluwstaart-	16	, tern	41	<i>zosterops, Hemitriccus</i>	107
Wren, ash-winged ant-	92	Yellow-breasted crane	29	Zuid-Amerikaanse havik	18
, brown-bellied ant-	89	, flycatcher	109	Zuid-Amerikaanse maskerzanger	131
, buff-breasted	123	Yellow-chinned spinetail	80	roerdomp	11
, collared gnat-	127	Yellow-crowned amazon	49	ruwvleugel-	
, coraya	123	, elaenia	103	zwaluw	122
, dot-winged ant-	91	, night-heron	9	Zuidelijke huiswinterkoning	124
, grey ant-	90	, tyrannulet	102	Zuidpooljager	38
, Guianan streaked ant-	89	Yellow-finch, grassland	143	Zwaluw, Amerikaanse klif-	123
, long-billed gnat-	127	, stripe-tailed	142	, blauw-witte	122
, long-winged ant-	90	Yellow-green grosbeak	141	, boeren-	123
, musician	124	Yellow-headed caracara	23	, Braziliaanse palmgier-	60
, plain-winged ant-	90	, vulture, greater	15	, bruinborst-	122
, pygmy ant-	8	, lesser	15	, Caribische purper-	121
, rufous-bellied ant-	89	Yellow-hooded blackbird	148	, Cayennegier-	60
, rufous-rumped ant-	92	Yellow-margined flycatcher	109	, Chapmans gier-	59
, rufous-winged ant-	91	Yellow-nosed albatross, Atlantic	3	, gier-	61
, rusty-backed ant-	91	Yellow-olive flycatcher	109	, grijsborstpurper-	121
, southern house	124	Yellow-rumped cacique	146	, grijze reuzennacht-	56
, spot-tailed ant-	90	, Trinidad	146	, kleine Andesgier-	60
, Todd's ant-	91	Yellow-throated flycatcher	114	, kortstaartgier-	60
, white-breasted wood-	124	, woodpecker	77	, oever	121
, white-flanked ant-	90	Yellow-tufted woodpecker	76	, Patagonische purper-	121

Zwaluw, purper-	121	Zwarte caracara	23	Zwartkopdonacobius	124
, Sicks gier-	60	gier	15	Zwartkopdwegcotinga	98
, vale reuzennacht-	56	hokko	27	Zwartkopsoldatenspreeuw	148
, wigstaatreuzennacht-	56	kuifarend	22	Zwartkopzaadkraker	145
, witband-	122	manakin	101	Zwartkopzanger	130
, witbandgier-	59	stern	41	Zwartkraagzwaluw	122
, witbuik-	121	tangare	133	Zwartkruintityra	119
, witflank-	122	trappist	73	Zwartkuifmierklauwier	87
, witkingier-	59	Zwartborstmuggensluiper	127	Zwartkuiftodietiran	108
, witkraaggier-	59	Zwartborstspecht	78	Zwartmaskerbuizerd	19
, witvleugelreuzennacht-	56	Zwartbuikfluiteend	13	Zwartmaskerpitpit	136
, Zuid-Amerikaanse		Zwartbuikkoekoek	51	Zwartnekarassari	74
ruwvleugel	122	Zwartgestreepte bosuil	54	Zwartoorfeeënkolibrie	67
, zwartkraag-	122	Zwartkapbekarde	120	Zwartoormargrietje	49
Zwaluwbaardkoekoek	73	Zwartkapdwegcotinga	97	Zwartsnavellijster	125
Zwaluwen	121-123	Zwartkeelbaardkolibrie	61	Zwartstaartbladkrabber	82
Zwaluwstaartkolibrie	63	Zwartkeelkardinaal	143	Zwartstaartmuggensluiper	127
Zwaluwstaartwouw	16	Zwartkeelmango	63	Zwartstaarttityra	119
Zwaluwtangare	136	Zwartkeelmierklauwier	87	Zwartstaarttrogon	69
Zwaluwtiran	111	Zwartkeelmielijster	96	Zwartvleugeltangare	140
Zwart-witte kuifarend	22	Zwartkeelmiervogel	94	Zwavelborstparkiet	50
Zwartbuikfluiteend	13	Zwartkeelspecht	79	Zwaveltiran	115
Zwarte arendbuizerd	20	Zwartkeeltrogon	69		
baardvogel	74	Zwartkinmierkruiper	93		
buizerd	20	Zwartkopcaique	48		