

# Bažanti stříbrní a tmaví rodu *Lophura*

Nejpočetnějším rodem bažantů je rod *Lophura* čítající 10 druhů. Dva z těchto druhů, a to *Lophura nycthemera* (stříbrní) a *Lophura leucomelana* (tmaví) bych chtěl nyní trochu přiblížit. Některé z poddruhů patří k nejčastěji chovaným, ale zároveň také paradoxně i velmi málo známým, řekl bych v čistokrevné formě až raritně chovaným druhům. Mnozí si jistě řeknou, že stříbrný bažant je snad nejznámějším a hojně chovaným druhem, a mají jistě pravdu. Každá mince má však i svou druhou stranu. A to tu, že zde jsou chováni v naprosté většině případů různí kříženci. V čistokrevné formě jsou opravdu velmi vzácní.

 WPA CZ – SK  
World Pheasants Association Czech Republic and Slovakia

**Bažanti stříbrní** *Lophura nycthemera* tvoří 15 poddruhů, jsou to: *Lophura nycthemera nycthemera*, *jonesi*, *occidentalis*, *fokiensis*, *omeiensis*, *rongjiangensis*, *whiteheadi*, *berliozii*, *beaulieui*, *lewisi*, *annamensis*, *engelbachi*, *beli*, *rufipes*, *ripponi*.

V evropských chovech se můžeme vzácně setkat s těmito čtyřmi poddruhy: bažant stříbrný - *Lophura nycthemera nycthemera*, bažant Jonesův - *Lophura nycthemera jonesi*, bažant Berliozův - *Lophura nycthemera berliozii*, bažant Lewisův - *Lophura nycthemera lewisi*.


Druhým druhem jsou **bažanti tmaví** - *Lophura leucomelanos* - označování též jako bažanti Kalij. O kterých se zmíním v příštím článku.

Oba druhy žijí v Asii a jejich teritorium se táhne od Himálaje až po jih Vietnamu. Od sebe je dělí řeka Irrawaddy (Ayeyarwady), která teče od severu k jihu Myanmaru. Všechny 15 poddruhů bažantů stříbrných se nachází východně, zatímco všichni tmaví Kalij bažanti se vyskytují západně od této řeky.

Jednotlivé poddruhy v rámci druhu mají mnohdy velmi podobné zbarvení, což především u slípek vede k záměnám. To je také jedním z důvodů, proč je jejich čistokrevná populace v zajetí tak malá. Je to škoda, jak podle přiložených fotografií zjistíte, jedná se o velmi zajímavé a krásné ptáky, přičemž některé druhy mají i slípky velmi atraktivně zbarvené. Je tudíž škoda, že si mezi chovateli nenalezly více příznivců. Poddruhy chované v evropských chovech lze chovat v našich podmínkách bez temperovaného zimoviště. Stran chovu bažantů stříbrných a tmavých jsem neshledal nějaká zvláštní specifika. Choval a odchoval jsem 3 poddruhy, a to bažanta stříbrného, nepálského a bělochocholátého.

## Krmivo

Ideální je podávat kvalitní



1-L. *l. hamiltoni*; 2-L. *l. leucomelanos*; 3-L. *l. melanota*; 4-L. *l. moffitti*; 5-L. *l. lathamii*; 6-L. *l. williamsii*; 7-L. *l. oatesii*; 8-L. *l. lineata*; 9-L. *L. crawfurdi*; 10-L. *n. lewisi*; 11-L. *n. annamensis*; 12-L. *n. engelbachi*; 13-L. *n. neli*; 14-L. *n. berliozii*; 15-L. *n. rufipes*; 16-L. *n. occidentalis*; 17-L. *n. ripponi*; 18-L. *n. jonesi*; 19-L. *n. beaulieui*; 20-L. *n. nycthemera*; 21-L. *n. rongjiangensis*; 22-L. *n. fokiensis*; 23-L. *n. whiteheadi*; 24-L. *n. omeiensis*.

granule pro bažanty, které obsahují vyvážený poměr živin vitaminů a minerálů doplněných o ovoce a zeleninu, dle ročního období. Já svým chovancům od dubna do října podávám vše, co mi poskytuje zahrada, jablka, rajčata, okurky, cukety, salát, bezinky,

smetanku. V době zimní jablka, zelí, čínské zelí a naklíčený ječmen, který podávám především v únoru a březnu před snáškou. Živočišné krmivo jako moučné červy nebo zophobasy přijímají velmi rádi. Ideální je krmít každý den, já bohužel nebývám každý den doma, a tak používám automatická krmítka a automatické napáječky. Do vody přidávám přípravek na okyselení vody Fortikoat NL, který zabraňuje tvorbě řasy ve vodě a zároveň jím upravená voda zvyšuje odolnost bažantů proti některým chorobám.

## Chovné zařízení

Chovné zařízení by mělo svými rozměry odpovídat počtu a velikosti chovaných ptáků, samozřejmě čím větší, tím lepší. Rozměr pro pár by měl být alespoň 8-10 m<sup>2</sup>. Voliéra by měla mít závětrí a být zčásti zastřešená. Důležité je, aby ve voliére byla



Detail slípky *Lophura n. Berliozii* a *Jonesi*

část, kde se ptáci mohou schovat, nejsou rušení a cítí se bezpečně. Samozřejmostí by mělo být místo na popelení, dále pak osázení rostlinami, které slouží jako kryt, a také několik bidel na hřadování.

Bažanty stříbrné od tmavých rozeznáme podle toho, že bažanti stříbrní mají červené (případně načervenalé) nohy a vybarvují do šatu dospělých druhým rokem. Bažanti tmaví mají nohy šedivě, šedohnědé či šedožluté a do šatu dospělých vybarvují prvním rokem. Samozřejmě i zde je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Jedná se o bažanta Crawfordova - *Lophura leucomelanos crawfordi* - který je řazen do skupiny bažantů tmavých, ale jeho nohy jsou červené.

### Bažanti stříbrní *Lophura Nycthemera*

Jsou to většinou polygamní ptáci vybarvující se až druhým rokem. Nohy mají červené zbarvení. Spodek těla je černý s modrým leskem. Vrch těla je bílý s černou kresbou různé intenzity. Na hlavě mají černou chocholku s modrým leskem. Okolí oka je lysá kůže rudé barvy, která v toku nabývá značné velikosti. Kroužek se používá velikosti 14. Jsou to převážně pozemní ptáci. Obývají více otevřené oblasti, na lesních okrajích, a jen zřídka v hustých lesích. Převážně se zdržují na zemi, kde si vyhledávají potravu. Jen při vyrušení létají. Bažanti stříbrní jsou všežravci, jejich jídelníček se skládá z různých trav, semen, plodů a různého hmyzu. Většina z poddruhů má v přírodě stabilní populaci a nehrozí jim bezprostřední nebezpečí, ale poddruhy *annamensis*, *whiteheadi*, *engelbachi* a *lewisi* jsou zranitelné a ohrožené. Trpí velmi ztrátou svého přirozeného biotopu.

Délka: kohout 80-125 cm (z toho 60-65 cm ocas),

slípka 56-71 cm (24-32 cm ocas).

Hmotnost: kohout 1 130-2 000 g,

slípka 1 150-1 300 g.

### *Lophura nycthemera nycthemera* (Linnaeus, 1758) bažant stříbrný

**Výskyt:** jihovýchodní Čína

Nominální, jeden z nejznámějších bažantů a nejhojněji chovaný poddruh bažantů stříbrných v zájmovém chovu, bohužel tak jako u jiných druhů v čistokrevné formě je velmi vzácný, neboť většina chovatelů neví, jak má čistokrevná forma vypadat, a proto chovají různé křížence.

**Kohout** má modročernou, velmi bohatou chocholku, okolo očí lysou kůži červené barvy, která v toku nabývá značné velikosti a sytosti. Dolní část těla od zobáku přes krk, prsa a břicho má černou barvu s modrým leskem. Krk bílý, zbytek těla je bílý s jem-



*Lophura nycthemera nycthemera* - pár - bažant stříbrný

nou černou kresbou. Ocas je dlouhý, bílý a široký, pouze krajní ocasní pera, která jsou o polovinu kratší, mají černou kresbu.

**Slípka** má celkově olivově hnědé zbarvení, pouze krajní ocasní pera mají černé, hnědé a bílé skvrnky. Jakákoli kresba na těle je známkou hybridizace. To je bohužel situace, která v chovech převládá, a čistokrevných jedinců je poskrovnu. Chov je polygamní, 3 či 4 slípky u kohouta nejsou problém. Kohouti, tak jako i u jiných druhů rodu *Lophura* jsou nezřídka agresivní i vůči svému chovateli. Jinak se jedná o snadno chovaný druh bažanta, který je i velmi vhodný i pro začátečníky. Doba snášky se liší podle místa chovu. V našich podmínkách snáší slípka v dubnu. Na zem, si v krytu vytočí důlek, do kterého snáší 6-9, někdy až 12 vajec. V zajetí inkubace trvá asi 25-26 dní. Odchov kuřat není obtížný a kuřata rychle rostou a jsou značně odolná.

### *Lophura nycthemera jonesi* (Oates, 1903)

#### bažant Jonesův

**Výskyt:** Thajsko Myanmar, 1 200-2 000 m

**Kohout** je podobný bažantu stříbrnému, má velkou a bohatou černou chocholku. Černá kresba na těle je výraznější, vrch ocasních per je bílý, spodek je černě pruhovaný.

**Slípka** je olivově hnědá, spodní část těla má černobílou kresbu do tvaru V.

Tento poddruh je sporadicky chován

v evropských chovech.

### *Lophura nycthemera omeiensis* (Cheng, Chang & Tang, 1964) bažant sčchuanský

**Výskyt:** východní S-čchuan, 1 000 m

**Kohout** je velmi podobný bažantu stříbrnému, střední ocasní pera má velmi dlouhá a bílá, ostatní ocasní pera černě pruhovaná.

**Slípka** je tmavě hnědá ocasní pera má načernalá.

V evropských chovech se nevyskytuje.

### *Lophura nycthemera fokiensis* (Delacour, 1948)

#### bažant fokienský

**Výskyt:** jihovýchodní Čína, poměrně vzdáleně od ostatních poddruhů

**Kohout** je celkově shora s jemnou kresbou. Střední ocasní pera jsou svrchu bílá, spodek je vlnitě pruhovaný.

**Slípka** je olivově hnědá s nestejně černobílou kresbou.

V evropských chovech se nevyskytuje.

### *Lophura nycthemera occidentalis* (Delacour, 1948)

#### bažant stříbrný západní

**Výskyt:** severovýchodní Yunnan a severovýchodní Myanmar

**Kohout** je podobný *L. n. jonesi*, jen má rovnější kresbu.



*Lophura nycthemera jonesi* - pár - bažant Jonesův



*Lophura nycthemera berliozii* - pár - bažant Berliozův



*Lophura nycthemera lewisi* -pár - bažant Lewisův

**Slípka** je olivově hnědá, spodek těla má hnědavě skvrnitý.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera rongjiangensis***  
(Tan & Wu, 1981)  
**bažant kuej-čouský**

**Výskyt:** Čína, provincie Kuej-čou, 400-1 000 m

O tomto poddruhu je velmi málo informací, je údajně velmi podobný poddruhu *Lophura nycthemera beaulieui*.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera whiteheadi***  
(Ogilvie-Grant, 1899)  
**bažant hainanský**

**Výskyt:** ostrov Hainan

**Kohout** je podobný bažantu stříbrnému,

černé lemování jeho peří je směrem od krku k ocasu mnohem řidší, ale výrazně širší.

**Slípka** je olivově svrchu hnědá. Hrdlo má světlé a krk a břicho má bílou kresbu.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera berliozii***  
(Delacour & Jabouille, 1928)  
**bažant Berliozův**

**Výskyt:** centrální Vietnam, 700-1 300 m

**Kohout** je velmi podobný nominátnímu poddruhu, kresba na krku je světlejší.

**Slípka** je olivově hnědá a na spodku má černobílou kresbu do tvaru V, ocasní pera má černobíle pruhovaná.

V evropských chovech se vzácně vyskytuje.

***Lophura nycthemera beaulieui***  
(Delacour, 1948)



*Lophura nycthemera anamensis* - pár - bažant annámský

**bažant laoský**

**Výskyt:** severní Laos

**Kohout** je na horní části těla kromě krku a ocasu slabě černě pruhovaný, spodek je černý.

**Slípka** je hnědá, na spodku těla s kresbou do V.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera lewisi***  
(Delacour & Jabouille, 1928)  
**bažant Lewisův**

**Výskyt:** Kambodža a Thajsko

**Kohout** má kresbu ve tvaru V na horní části těla, ta je tmavší širší než u nominátního poddruhu.

**Slípka** je hnědá se střídajícími se světlejšími skvrnami.

V evropských chovech se chová vzácně.

***Lophura nycthemera annamensis***  
(Ogilvie-Grant, 1906)  
**bažant annámský**

**Výskyt:** Vietnam, 500-1 100 m

**Kohout** je podobný *L. n. lewisi*, vrch těla s kresbou je od černého spodku těla oddělen širokým bílým pruhem táhnoucím se po stranách těla od světlejší hlavy přes krk až po boky.

**Slípka** je celá olivově hnědá, velmi podobná nominátnímu poddruhu.

V evropských chovech se nevyskytuje. Chován a odchováván je v zoo v Hanoji.

***Lophura nycthemera engelbachi***  
(Delacour, 1948)  
**bažant bolovenský**

**Výskyt:** jižní Laos, 500-1 300 m

**Kohout** má na horní části těla širokou černou kresbu. Spodek těla je černý s modrým leskem.

**Slípka** je svrchu hnědá se světlou kresbou, na spodku těla má bílou kresbu.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera belli***  
(Oustalet, 1898)  
**bažant Belův**

**Výskyt:** centrální Vietnam, 1 000-2 000 m

**Kohout** je podobný *L. n. lewisi*, je o něco světlejší a má delší ocas.

**Slípka** je kaštanově hnědá se světlejším břichem.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera rufipes***  
(Oates, 1898)  
**bažant rudonohý**

**Výskyt:** Myanmar, 100-1 500 m

**Kohout** má na horní části těla stejnoměrně černobíle pruhovaná střední ocasní pera, svrchu bílý spodek je černě pruhovaný.

**Slípka** je olivově hnědá a na spodku těla

má žlutohnědou kresbu ve tvaru V. Ocasní pera jsou pruhovaná.

V evropských chovech se nevyskytuje.

***Lophura nycthemera ripponi***  
**(Sharpe, 1902)**  
**bažant Ripponův**

**Výskyt:** severní Myanmar, 1 300–2 500 m

**Kohout** má krk bílý, horní část těla je jemně černě proužkovaná, střední ocasní pera bílá, zbytek ocasních per je jemně černě pruhován.

**Slípka** je olivově hnědá, na spodku těla má výraznou černobílou kresbu.

V evropských chovech se nevyskytuje.  
(Dokončení příště - Bažanti tmaví)

text: *Míla Stehlík*, [www.tragopan.wz.cz](http://www.tragopan.wz.cz),  
00420 723 442 917, [infotragopan@email.cz](mailto:infotragopan@email.cz),

foto: *Manfred Prasch, Tomáš Najer,*  
*Martin Veles jun., Míla Stehlík*