

Phatak S.R., Materia Medica de Medicinas Homeopaticas (ptk2)

Materia Medica de Medicinas Homeopaticas

Por

Dr. S. R. Phatak, M.
B.B.S.

Autor del Repertorio Conciso Homeopático (Inglés)
Autor del Repertorio de Remedios Bioquímicos (Inglés)
Autor de Materia Médica y Repertorio de
Medicinas Homeopáticas en Marathi.

B. JAIN PUBLISHERS P. LTD.

Traducido al Español por

MARTHA TAYLOR DE ZORRILLA

Homeópatas Hahnemann,
Guadalajara, México.

C 1977, Dr. S.R.Phatak

11, New Bhatwadi

Bombay 400 004

Publicado por primera vez

Septiembre 1977

Reimpreso 1982

Precio : Rs. 60.00

© Derechos de autor con el editor.

Editado por :

B. Jain Publishers Pvt. Ltd.

1921, Street No. 10, Chuna Mandi,
Paharaganj New Delhi - 110 055 (INDIA)

Impreso en India por :

J. J. Offset Printers

Kishan Kunj, Delhi - 110 092

Prefacio

Los estudiantes de la Homeopatía que leen diferentes Materias Médicas escritas por varios autores deben haber observado que algunos síntomas que se dan bajo un remedio en particular en una materia médica, no se dan en otra. El Dr. Boger ha seleccionado los síntomas más importantes de varias materias médicas y las ha incluido en su Llave Sinóptica. Pero mientras presente estos síntomas, ha usado en ocasiones tales palabras que a menos que el estudiante tenga la habilidad de leer entre líneas, ignorará su significado oculto. Lo que es más, el Dr. Boger ha omitido muchos síntomas importantes dados por otros autores. Daré algunos ejemplos para ilustrar este punto. El Dr. Boericke ha dado “Retención de orina después de una operación” bajo “Causticum”. Boger no ha dado este síntoma. El Dr. Boger ha dado “Distensión de abdomen después de una operación” bajo “Carbo animalis” que no dan otros autores. El Dr. Kent no menciona ninguno de esos dos síntomas en su Repertorio. Pero estos dos síntomas me dieron la oportunidad de quitar ambas condiciones tan penosas con éxito. El Dr. Boger ha dado un síntoma muy curioso “Respira como a través de un tubo metálico” -Merc. Cor. El significado es obvio. Si una persona viene y dice que mientras defeca u orina o aún hablando ejecuta estas funciones como a través de un tubo, Merc. Cor. es el medicamento adecuado para ser usado. Yo tuve en una ocasión que dar este remedio a una persona que hablaba como a través de un tubo.

Si se entiende bien, la Materia Médica del Dr. Boger así como su repertorio son suficientes para la mayoría de los casos. Pero no poseemos ni su intelecto, ni su perspicacia.

Al compilar esta Materia Médica, he dado todos los síntomas que el Dr. Boger dá. He tratado de simplificar muchas de sus palabras ambiguas, explicando sus significados. Más aún, he hecho acopio de síntomas clínicos y otros síntomas de diferentes materias médicas (que no dió el Dr. Boger) y los he incluido aquí.

La presentación de la Materia Médica tiene una base esquemática acostumbrada. Bajo generalidades, el perfil de el remedio se dá con la región o regiones sobre las que actúa y cómo lo hace, las enfermedades que es capaz de curar y provocar. Luego modalidades generales del remedio, después síntomas regionales con sus modalidades particulares.

Yo creo que el Dr. Boger deseaba compilar un repertorio conciso y ordenado alfabéticamente en lugar de uno regional. De igual manera sería la materia médica concisa, en la que los síntomas relevantes pertenecientes a cada remedio se darían. El ha dado claves en su Llave Sinóptica para recopilar tales libros. Con mi pobre intelecto y limitado conocimiento de la homeopatía, he tratado de llevar a cabo ese deseo. Qué tanto éxito logre en mi empeño, sólo el tiempo lo dirá.

Doy gracias a mi amiga la Dra. Homai Merchant por mecanografiar este manuscrito dos veces sin una sola queja. También doy gracias a mi hijo el Dr. D.S. Phatak por corregir de principio a fin las pruebas varias veces y por hacer arreglos para imprimir el libro con el Buró de Impresión Mouj. Al Sr. Datay quien hizo la composición y al Sr. M.R.Sane quien diseñó el libro a mano. A todos, mi agradecimiento. Se solicita a los lectores que den una vista a “Indicaciones para los principiantes” y al Indice de Remedios Quirúrgicos.

Finalmente estoy muy agradecido con Dios por guardarme a pesar de mi enfermedad cardíaca y mi avanzada edad, para ver este libro terminado. He hecho todo lo que podría hacer. Los homeópatas capaces, deberán ampliar este trabajo.

Julio de 1977.

S.R. PHATAK

INDICACIONES PARA LOS PRINCIPIANTES

La Materia Médica y el Repertorio son los pilares sobre los que descansa la práctica exitosa. Ambos se complementan mutuamente. Ninguno está completo por sí mismo.

El estudio de la Materia Médica es un esfuerzo fatigoso. No existe un camino fácil ni corto hacia el éxito.

Los medicamentos deberán ser sus amigos. Usted identifica a su amigo por la forma como pulsa el timbre, toca o abre la puerta, sube los peldaños de una escalera, etc. De manera similar, debería conocer al medicamento aún cuando lo haya visto sólo parcialmente.

Las marcas de identificación del medicamento se encuentran en Generalidades, Modalidades, (por ejemplo: agravación o mejoría) y en Mente. Una comprensión total de estos encabezados le ayuda a identificar al medicamento en relación con el paciente.

Para lograr esto, cuando lea sobre un medicamento, cada rúbrica debería ser buscada en su Repertorio. La importancia relativa de este medicamento deberá ser grabada en su memoria comparándola con otros medicamentos que se encuentren bajo la misma rúbrica. Esto aparentemente es tedioso. Pero la imagen del medicamento lentamente se afianza y establece claramente en su mente.

La cosa más difícil en homeopatía es la interpretación de los síntomas. Cuando el paciente está contando su historia en sus propias palabras, usted debería fijarlas o grabarlas en términos de las rúbricas dadas en el Repertorio. Si usted ha comprendido la Materia Médica bien, algunas medicinas vendrán automáticamente a su mente. Verifíquelas en el Repertorio. Causa y modalidades son más importantes. El síntoma peculiar -al cual la patología clínica no puede explicar- muchas veces apunta al medicamento más conveniente.

Cuando una taza está medio llena, también está medio vacía. Mientras interpreta los síntomas, trate de ver la misma cosa desde varios aspectos.

Mientras lea la Materia Médica, también trate de recordar las cosas peculiares en un medicamento. Las descargas blandas de Pulsatilla, “No puede desprenderse de las cosas” de Zincum Met., “Gran variedad de síntomas” de Mercurius, etc. Como ya dije antes, estas son las marcas de identificación del medicamento.

< significa agravación por o después de: > mejoría o mejorado por. (;) punto y coma se usa en este libro con cuidado. Por ejemplo en Calcarea Carb. bajo el título Mente, usted encontrará Miedos: enfermedad; pobreza; desastre; insanía; de ser envenenado. Esto significa (1) a la enfermedad, (2) a la pobreza, (3) a un desastre, (4) a la insanía y miedo de ser observado. En Phosphorus bajo generalidades, “Malos efectos por la cólera; miedo; pesar; preocupación; exposición a una mojada por lluvia; por lavar ropa; tabaco; etc.” deberá interpretarse igual. Combinaciones apropiadas pueden hacerse con provecho.

Se usan tres tipos en este libro para mostrar grados. Se da una relativa importancia a diferentes síntomas con esto. Pero en un paciente en particular, un síntoma de grado bajo puede resultar ser el más importante. Así es que no se deje influenciar por esta graduación.

Dé el debido respeto a las autoridades en homeopatía en lo que dicen. Pero si su experiencia es contraria a lo que las autoridades dicen, no se deje dominar por esas opiniones. A fin de cuentas, su experiencia es la mejor autoridad en lo que a usted concierne.

S.R. PHATAK.

NOTA DE LOS EDITORES

Este libro fué prometido para fines de 1963. Ofrecemos disculpas por la demora.

Para ese tiempo, no se había escrito nada, ni una sola línea. El autor estaba renuente a escribir. Tomó más de 3 años tener el libro en borrador para su revisión. Por lo que las revisiones y adiciones se continuaron. Para 1970 el libro estaba listo para imprimirse.

“Repertorio Conciso de Homeopatía” por el mismo autor fué bien recibido. Pero el almacenamiento de libros es un problema real en Bombay. Por lo que tuvimos que negociar con otros para poder publicar el libro.

Se tuvieron negociaciones con dos o más grupos diferentes. Se prolongaron y al final fallaron.

Decidimos publicarlo y el libro se fué a prensas en Agosto de 1974. Después de 3 largos años, se presenta a los amantes de la Homeopatía.

No podemos culpar a nadie, excepto a nosotros mismos. No pretendemos defendernos, pero dependió de muchos factores.

Hemos publicado dos libros de Homeopatía escritos por el Dr. S. R. Phatak. Tenemos confianza que la mayoría de nuestros casos diarios se resolverán con la ayuda de estos dos libros. Le pedimos que los use con paciencia, inteligencia y diligencia. Entre más los use, más útiles los encontrará.

Los Editores.

Indice

(Medicamentos de utilidad para los Cirujanos)

Cuando este libro estaba en prensa, algunos cirujanos sugirieron que debería haber un libro pequeño que mostrara los medicamentos más usuales para condiciones pre y post-operación quirúrgica. No existe tal cosa en Homeopatía como remedios quirúrgicos. Sin embargo, ciertas drogas son útiles pre y post cirugías. Uno nunca debe perder de vista el hecho de que la Homeopatía está tratando individuos y no enfermedades.

La siguiente lista no es exhaustiva. Estos remedios son los de más utilidad en diferentes ramas de la medicina mencionada.

Nombre Del Remedio	Encabezado	Donde Es Util
ABROTANUM	Generalidades Hombres	Pediatría Cirugía
ACETIC ACID	Generalidades	Cirugía
ACONITO	Generalidades Urinario	Cirugía Obstetricia
AETHUSA	Generalidades Estómago, cuello y espalda	Pediatría
AGARICUS	Generalidades	Pediatría
ALOE	Generalidades Abdómen	Cirugía
ALUMEN	Ojos	Cirugía del Ojo
ALUMINA	Mujeres	Ginecología
AMBRA GRISEA	Trismo del recién nacido	

ARNICA MONTANA	Generalidades Mujeres Ojos	Cirugía Obstetricia Cirugía del Ojo
ARSENIC ALBUM	Urinario	Obstetricia
BELLIS PERENNIS	Generalidades	Cirugía
BERBERIS VULGARIS	Generalidades Cuello y espalda	Cirugía
BORAX	Mujeres	Ginecología
CALCAREA CARB	Femenino	Ginecología
CALCAREA FLUOR	Generalidades	Cirugía
CALENDULA	Generalidades Femenino	Cirugía Obstetricia
CANTHARIS	Generalidades	Cirugía
CAUSTICUM	Urinario Mujeres	Cirugía Ginecología
CHAMOMILLA	Generalidades, Ojos, femenino	Obstetricia Pediatria.
CHIMAPHILA	Urinario	Cirugía
CICUTA	Agravación Urinario	Cirugía
COLLINSONIA	Abdómen Mujeres	Cirugía Obstetricia
CONIUM	Femenino	Obstetricia
CROCUS SATIVA	Estómago Femenino	Cirugía Obstetricia
CYCLAMEN	Femenino	Obstetricia
DULCAMARA	Urinario	Cirugía
ECHINACEA	Generalidades Cirugía	Cáncer
ERIGERON	Femenino	Ginecología
EUPHRASIA	Ojos	Cirugía del Ojo
FRAXINUM	Ginecología	
GELSEMIUM	Ojos Mujeres	Cirugía del Ojo
HAMAMELIS	Generalidades	Cirugía
HEPAR SULPH	Ojos Generalidades Cirugía del Ojo	Cirugía del Ojo Cirugía Ojos Urinario
HYOSCYAMUS	Urinario Mujeres	Obstetricia
HYPERICUM	Cirugía	
IRIS VERSICOLOR	Estómago	Pediatria
JABORANDI	Ojos Estómago	Cirugía del Ojo Obstetricia
KALI BROM	Mujeres	Ginecología
LACHESIS	Generalidades	Cirugía
LEDUM PALUSTRE	Generalidades	Cirugía

LEPTANDRA	Abdómen	Cirugía
LILIUM TIGRINUM	Generalidades	Obstetricia y Pediatria
	Urinario	
	Mujeres	
LYCOPODIUM	Urinario	Cirugía
	Hombres	
MAGNESIA MUR	Generalidades	Obstetricia
	Mujeres	
MAGNESIA PHOS	Generalidades	Cirugía
	Urinario	
MERCURIUS	Generalidades	Cirugía
	Abdómen	
	Urinario, Hombres	
MEZEREUM	Ojos	Cirugía del Ojo
MILLEFOLIUM	Generalidades	Cirugía
	Mujeres	Obstetricia
MURIATIC ACID	Abdómen	Cirugía
	Urinario	
NAPHTALINE	Cirugía del Ojo	
NATRUM MUR	Mujeres	Ginecología
NATRUM SULPH	Mente	Cirugía
NITRIC ACID	Abdómen	Cirugía
	Mujeres	Ginecología
NUX MOSCHATA	Mujeres	Ginecología
NUX VOMICA	Abdómen	Pediatria
OPIUM	Cabeza, abdómen	Cirugía
	Urinario	
PARIS QUADRIFOLIA	Generalidades	Cirugía
PETROLEUM	Abdómen	Cirugía
	Urinario	
	Mujeres	Ginecología
PETROSELINUM	Pediatria	
PHOSPHORICUM ACID	Generalidades	Cirugía
	Agravación	
PHOSPHORUS	Generalidades	Cirugía
	Estómago	
	Abdómen	
	Mujeres	Ginecología
PHYSOSTIGMA	Ojos	Cirugía del Ojo
PHYTOLACCA	Mujeres	Ginecología
PLATINUM	Generalidades	Ginecología
	Mente Mujeres	
PLUMBUM	Abdómen	Cirugía
	Urinario	
	Mujeres	Ginecología
PSORINUM	Mujeres	Obstetricia
PULSATILLA	Mujeres	Ginecología

	Obstetricia	
RATANHIA	Generalidades	Obstetricia
	Abdómen	Cirugía
	Mujeres	Ginecología
RHEUM	Generalidades	Pediatría
RHODODENDRON	Hombres	Cirugía
RHUS TOX	Abdómen	Cirugía
SABAL SERRULATA	Generalidades	Cirugía
SAMBUCUS	Hombres	Cirugía
SECALE	Urinario	Cirugía
	Mujeres	Obstetricia
SENEGA	Generalidades Ojos	Cirugía del Ojo
SEPIA	Generalidades	Ginecología
	Mujeres	Cirugía
	Ginecología	
	Obstetricia	
SILICEA	Generalidades	Cirugía
	Ojos	Cirugía del Ojo
	Hombres	Urinario Cirugía
	Mujeres	Cirugía
	Mujeres	Ginecología
SPIGELIA	Ojos	Cirugía del Ojo
STANNUM	Mujeres	Ginecología
STAPHYSAGRIA	Generalidades	Cirugía
	Mujeres	Ginecología
SULPHURICUM ACID	Generalidades	Cirugía
	Urinario	
	Ojos	Cirugía del Ojo
	Abdómen	Cirugía
SYMPHYTUM	Generalidades	Cirugía
SYPHILINUM	Ojos	Cirugía del Ojo
	Mujeres	Obstetricia
	Extremidades	Cirugía
TABACUM	Generalidades	Cirugía
	Abdómen	
TARENTULA CUBENSIS	Generalidades	Cáncer
TARENTULA HISPANIA	Generalidades	Cirugía
	Mujeres	Ginecología
	Cuello y espalda	Cirugía
TELLURIUM	Generalidades	Cirugía
	Ojos	Cirugía del Ojo
	Cuello y espalda	Cirugía
	Extremidades	
TEREBINTHINA	Mujeres	Ginecología
THUJA	Ojos	Cirugía del Ojo
	Abdómen	Cirugía
	Mujeres	Obstetricia
THYROIDINUM	Generalidades	Cirugía
TRILLIUM	Mujeres	Obstetricia
	Ginecología	

USTILAGO	Mujeres	Ginecología
VERBASCUM	Neuralgia Trigémico	
VIBURNUM	Mujeres	Obstetricia
XANTHOXYLLUM	Mujeres	Ginecología
ZINCUM MET	Concusión del cerebro	
	Abdómen	Cirugía
	Urinario	

ABIES CANADENSIS

GENERALIDADES:

Afecta las membranas mucosas y los nervios. En el estómago causa una condición catarral que incrementa el hambre del paciente y su ansia por comidas pesadas como los pepinillos, rábanos, nabos, etc. El paciente quiere acostarse todo el tiempo debido a una debilidad nerviosa y siente que se va a desmayar. En las mujeres, causa desplazamiento uterino debido a una nutrición defectuosa y debilidad. Sus sensaciones peculiares son - el pulmón derecho y el hígado se sienten duros y pequeños; el útero se siente suave. Permanece acostado con las piernas estiradas hacia arriba.

MENTE:

Fácilmente irritable o quieto y ausente, negligente.

CABEZA:

Siente como si estuviera ligera o como si flotara.

ESTOMAGO:

Apetito voraz. Tendencia a comer más allá de su capacidad de digestión. Distensión del abdomen y del estómago con palpitaciones.

MUJERES:

Sensación de útero inflamado > por la presión. Utero como si estuviera blando y débil.

FIEBRE:

Estremecimientos fríos como si la sangre fuera agua helada.

PIEL:

Húmeda y pegajosa.

ABIES NIGRA

GENERALIDADES.

Este es un remedio útil en muchas condiciones morbosas cuando están asociadas con síntomas gástricos. Causa dispepsia con síntomas funcionales del corazón especialmente en ancianos. También es útil en indigestión de aquellos que abusan del té, de fumar y masticar tabaco. El síntoma principal en la dispepsia es una sensación como de un huevo duro que se ha atorado en el extremo cardíaco del estómago. Los pacientes describen esta sensación como de un bulto duro que se siente en el hueco del estómago o en el pulmón y que se quiere desalojar tosiendo.

AGRAVACION:

Después de comer.

MENTE:

Deprimido, incapaz de pensar o estudiar.

ESTOMAGO:

Pérdida total del apetito en la mañana pero ansía comer en la noche o a mediodía. Dolor en el estómago que viene siempre después de comer.

PECHO:

Respiración difícil < acostándose. Acción cardíaca pesada y lenta, puede haber taquicardia o bradicardia.

ABROTANUM

GENERALIDADES:

Afecta los nervios causando entumecimiento, debilidad, temblores y condiciones paréticas. Es el remedio para marasmo en los niños cuando la nutrición está afectada. A pesar del buen apetito los niños se emacian especialmente de las extremidades inferiores. Causa una verdadera condición metastásica. Reumatismo que aparece después de suprimir una diarrea. Reaparece la gota y otros problemas posteriores. Tiene tendencia exudativa. El exudado puede ocurrir como una condición metastásica o de otra manera en la pleura, articulaciones, etc. También causa condiciones alternantes, una condición morbosa desaparece pero otra aparece, por ejemplo: hemorroides que alternan con reumatismo. Es apropiada para niños recién nacidos, especialmente niños que sufren de hidrocele, epistaxis; elimina la debilidad que queda después de la influenza. Emanaciones de sangre y humedad en el ombligo del recién nacido. Vómito de grandes cantidades de fluido maloliente. Afecciones que permanecen después de una operación del pecho.

AGRAVACION:

Por el aire frío; por la humedad.- Secreciones suprimidas; especialmente diarrea. Noche. Niebla.

MEJORIA:

Evacuaciones sueltas. Movimiento.

MENTE:

Gran ansiedad y depresión. Travieso e irritable (niños con marasmo) Dificultad para pensar; pérdida de la comprensión; Inhumano; le gustaría hacer algo malo, cruel.

CABEZA:

No puede sostener la cabeza erguida debido a la debilidad de su cuello. El cerebro se siente cansado después de una conversación o un esfuerzo mental. Las venas se distienden en la frente.

OJOS:

Círculos azules alderredor de los ojos. Sumidos.

NARIZ:

Sangramiento en los niños varones.

CARA:

Seca, fría, arrugada como de viejo en marasmo: Acné con emaciación. Angioma de la cara. Pálida, ojos sumidos.

ESTOMAGO:

Emaciación progresiva con buen apetito. La comida pasa indigerida. Deseo de pan hervido en leche. Dolores cortantes, arañantes, quemantes en el estómago por la noche en la gastralgia. Siente como si el estómago flotara en agua; con frialdad.

ABDOMEN:

Bultos duros que se sienten en diferentes partes del abdómen. Está inflado. Peritonitis tuberculosa. Sensación de debilidad y hundimiento en los intestinos. Hemorroides procidentes con ardor por el contacto. Frecuentes deseos de defecar, pero sólo pasa un poco de sangre.

HOMBRES:

Hidrocele en niños.

MUJERES:

Dolor punzante en el ovario izquierdo. Menstruación suprimida.

RESPIRATORIO:

Tos seca que sigue a la diarrea. Permanece una sensación opresiva después de la Pleuresía, en el lado afectado, impidiendo una respiración libre.

ESPALDA:

Dolor súbito en la espalda < por la noche > por el movimiento. Dolor en el sacro debido a las hemorroides. Espalda débil con dolores ováricos.

EXTREMIDADES:

Dolor en los hombros, brazos, muñecas y tobillos. Piernas muy emaciadas. Dedos de las manos y pies fríos, entumidos y punzantes. Incapacidad de mover las piernas debido al reumatismo. Contracción de las piernas por calambres o después de un cólico.

PIEL:

Floja y frágil. La piel se vuelve purpúrea después de la supresión de erupciones. Sabañones picantes, con comezón.

SIGUEN BIEN:

Aco y Bry en la pleuresía.

RELACIONES:

Agar; Chin; Led; Nux v.

ABSINTHIUM

GENERALIDADES:

Causa convulsiones precedidas por temblores. El paciente se muerde la lengua, espuma por la boca y hace muecas. El temblor es una característica marcada, temblor de la lengua y el corazón. Vértigo súbito y severo; convulsiones epileptiformes, delirio con alucinaciones y pérdida de la conciencia. Los ataques se producen en rápida sucesión. Es un remedio útil para el nerviosismo, excitación y falta de sueño en los niños. Corea. Opistótonos.

MENTE:

Vértigo con tendencia a caer hacia atrás. Olvida lo que pasó recientemente antes y después de la convulsión. No quiere saber nada de nadie. Insanía brutal. Cleptomanía.

OIDO:

Descarga; después de dolor de cabeza.

CARA:

Torcimientos espasmódicos faciales. Mirada estúpida.

ORINA:

Orina muy fuerte, de color amarillo intenso.

CORAZON:

Acción tumultuosa, los latidos se oyen en la espalda.

MUJERES:

Menopausia prematura.

RELACIONES:

Artem-v; Cic; Cina; Hidro-ac.

ACETIC ACID

GENERALIDADES:

Los síntomas guía de este medicamento son: anemia profunda, con aspecto céreo de la cara; emaciación excesiva; gran debilidad; desmayos frecuentes; respiración difícil; corazón débil; orina, vómito y sudor profusos. Antidota los efectos de los vapores anestésicos. En las convulsiones, los pacientes brincan de la cama como locos y se arrastran en el suelo. Es un remedio para la anasarca general y afecciones hidrópicas. Hemorragias; por la nariz, estómago, recto, pulmones, úlceras, etc. El niño quiere ser cargado en brazos. Naevi; verrugas, callos.

MENTE:

Se queja por su enfermedad y de sus niños. Preocupado por sus asuntos de negocios. Se aflige sin motivo. Desconoce a sus propios hijos. Olvida lo acontecido recientemente.

CABEZA:

Dolores, por abuso de narcóticos, tabaco. El niño no permite que le toquen la cabeza.

CARA:

Mejilla izquierda roja durante la fiebre. Pálida, cérea, emaciada.

NARIZ:

Sangramiento especialmente por golpe o caída.

GARGANTA:

Niño sediento, pero traga con dificultad, aún una cucharada. (Difteria).

ESTOMAGO:

Ausencia de sed con fiebre. Gran sed con hidropesía. Violento dolor quemante en el estómago y el pecho, seguido por frialdad de la piel y sudor frío en la frente. Vómito después de cualquier tipo de alimento. Úlcera, cáncer del estómago. Las bebidas frías y los vegetales, a excepción de las papas (patatas), desagradan. Aversión por el pan y la mantequilla.

ABDOMEN:

Timpánico. Ascites. Hemorragia de los intestinos. Diarrea crónica de los niños emaciados. Escirro del píloro.

ORGANOS URINARIOS:

Grandes cantidades de orina pálida. Diabetes con mucha sed y debilidad.

MUJERES:

Metrorragia con mucha sed; después del parto. Absceso amenazante del seno. Leche pobre, azulosa, agria; pezón caído; piel flácida; marasmo.

RESPIRATORIO:

Tos al inhalar. Respiración rápida y laboriosa. Estertor en el pecho.

ESPALDA:

Dolor (mielitis) aliviado sólo por permanecer sobre el abdomen; orina profusa.

EXTREMIDADES:

Hinchazón edematosa de los pies y las piernas con diarrea.

PIEL:

Sensibilidad disminuída de todo el cuerpo. Piel seca quemante.

FIEBRE:

Héctica; con sudores nocturnos abundantes; sudor profuso y frío.

RELACIONES:

Sigue a China después de hemorragias.

ACONITO

GENERALIDADES.

La rapidez de acción de Acónito determina su sintomatología. Sus síntomas son agudos, violentos y dolorosos. Aparecen súbitamente, permanecen por un lapso corto como una gran tormenta, que pronto se desvanece. La mente se vé afectada por factores emocionales tales como Miedo; Shock; Vejación. Los nervios están excitados y el paciente permanece bajo una tensión emocional y nerviosa. Los dolores neurálgicos son muy intensos. El miedo es intenso, tanto que el paciente se vuelve frenético, grita, gime, roe sus puños, muerde sus uñas, quiere morir. El miedo por el susto permanece. Miedo que acompaña los eventos más intrascendentes. La circulación del corazón y arterial se afecta fuertemente produciendo congestión en la cabeza (con frecuencia apoplética) y en el pecho. Es el remedio para la inflamación aguda y la congestión. Las hemorragias son de un rojo brillante. Los dolores son punzantes, razgantes. Sensación de ardor, adormecimiento, picazón, punzadas u hormigueo. Las partes se sienten grandes o deformadas. Inflamación externa con pesadez interna. Pérdida súbita de fuerza - colapso. Sentidos especialmente agudos. Las partes permanecen enrojecidas o adormecidas, después de los dolores. Convulsiones. Desmayos. Los niños ponen sus manos sobre las partes afectadas. Enfermedades causadas por exposición al tiempo frío y seco, especialmente afecciones respiratorias. Perturbaciones gastro-intestinales causadas por una exposición a tiempo muy caliente. Está adaptado a personas de constitución robusta. Afecciones después de un shock quirúrgico o heridas, o sudoración suprimida. Efectos posteriores a un susto. Grita y se toca los genitales. Crepitación.

AGRAVACION:

Emociones violentas. Susto; Shock; Vejación; Escalofrío por Frío; tiempo seco; mientras suda. Presión, contacto. Noche, en la cama por la noche. Permaneciendo sobre un lado. Ruido. Luz. Dentición. Durante la menstruación. Durmiendo bajo el sol. Música. Humo del tabaco. Inspirando.

MEJORIA:

Al aire libre. Por el reposo, Por sudor tibio.

MENTE:

Gran Ansiedad; Miedo agonizante e Inquietud, acompañan cada indisposición aún la más trivial. Miedo a la muerte, las multitudes, a cruzar las calles, del futuro, de tocar a otros al pasar. Impaciente; además de él con otros; frenético; por la intensidad de los dolores. Con miedo, grita, gime, se muerde los puños, roe sus uñas; quiere morir. Miedo de salir de su casa. Presentimientos, predice la hora de su muerte. El terror lo paraliza. La música lo pone triste. Clarividencia. Siente que lo que acaba de hacer es un sueño. Delirio. Caracter caprichoso; ríe, canta y luego está triste y temeroso. Ansioso, excitado, nervioso, afiebrado. Imagina que alguna parte de su cuerpo está deformada. Se imagina que lo que piensa viene del estómago.

CABEZA:

Pesada, caliente,estallante. Ardiente; sensación ondulante en la cabeza. Como con una banda caliente alderredor de la cabeza o calor hirviendo en el cerebro. Apretón violento o crujiente en la frente o los ojos. Cefalea con incremento de secreción de orina. Vértigo < al incorporarse o con cualquier movimiento de la cabeza o del cuerpo. Como si el pelo fuera jalado o estuviera suspendido de él. Crujido en la cabeza. Latidos en la frente. Golpeteo en la cabeza.

OJOS:

Se sienten secos y calientes como con arena en ellos. Párpados; hinchados, duros y rojos. Dolor punzante en los globos oculares. No puede soportar la reflexión del sol en la nieve. Conjuntivitis por cenizas o cualquier otro objeto extraño. Ojos, brillantes, luminosos. Aversión o deseo de luz.

OIDOS:

Muy sensibles al ruido. La música es intolerable. Como una gota de agua dentro del oído.

NARIZ:

Adormecida con epistaxis. Olfato agudamente sensible. Dolor en la raíz de la nariz. Nariz seca, tapada o con descarga acuosa, caliente y escasa.

CARA:

Expresión ansiosa; se torna pálida y roja alternativamente. Mejillas rojas y calientes. Cara roja que se vuelve intensamente pálida al incorporarse o se siente confuso. Una mejilla roja y caliente y la otra fría. Neuralgia con inquietud, picazón y adormecimiento. Labios negros, secos, despellejados. Sensación de pesantez en toda la cara.

BOCA:

Dolor de dientes en dientes sanos. Latidos en dientes y cabeza. Rechinamiento de dientes. Encías calientes e inflamadas. La lengua se siente hinchada. Todo sabe amargo excepto el agua que tiene mal sabor. Temblores y tartamudeo temporal. Boca y lengua adormecidas; calor seco y ardiente en la boca. Picazón al toser y tragar. Movimiento de masticación de la quijada inferior.

GARGANTA:

Roja, seca, caliente, obstruída, se cierra al deglutir. Anginas inflamadas y secas.

ESTOMAGO:

Vómito con miedo, calor, sudor profuso y orina incrementada. Sed intensa y ardiente. Deseo de cerveza, ácidos, bebidas amargas. Sed < después de bebidas heladas. Hambre. Aversión a la leche. Vómito de proyectil. Vómito violento bilioso o sanguinolento. Presión en el estómago con disnea. El vino generalmente >. Náusea y sudor antes y después de evacuaciones flojas.

ABDOMEN:

Sensible al contacto. Cólico que ninguna posición mejora. Caliente, distendido. Ictericia; del recién nacido; por susto. Hernia estrangulada. Evacuaciones; de pura sangre; delgadas, verdes como pasto o blancas < en días calientes y noches frías. Disentería. Diarrea líquida en niños durante días calientes, lloran, están inquietos y sin sueño. Comezón y punzadas en el ano; como un líquido caliente que se escapara de él.

URINARIO:

Orina escasa, roja, caliente, dolorosa. Retención o supresión de la orina; en el recién nacido; debido a exposición al frío, con tocamiento de genitales. Disuria agonizante. Cistitis. Calosfrío uretral.

HOMBRES:

Orquitis, los testículos se sienten duros e inflamados.

MUJERES:

Supresión de menstruación por susto o frío, en pacientes pletóricas. Después de dolores con inquietud y miedo. Furia maníaca, al aparecer los períodos. Hemorragia uterina activa. Ovaritis por interrupción súbita del flujo menstrual. Vagina caliente, seca y sensible. Fiebre de leche con delirio. Aumento de leche en el pecho.

RESPIRATORIO:

Tos seca ronca, cruposa y dolorosa o como de ladrido, corta, repiqueteante o silbante < por cada inspiración, por la noche, al beber; se agarra la garganta. Tos > por permanecer sobre la espalda. Respiración corta durante el sueño; se sienta erguido. Laringitis. Crup con fiebre. Congestión violenta de sangre en el pecho. Neumonía. Opresión del pecho cuando se mueve rápido o asciende; en enfermedad cardíaca. La sangre sale al carraspear. Los pulmones se sienten calientes. Punzadas en el pecho. Pleuresía. Picazón en el pecho después de toser.

CORAZON:

Se siente inflamado -carditis. Palpitación, con ansiedad, desmayo y comezón en los dedos, dolor que baja por el brazo izquierdo. Dolores cardíacos en el hombro izquierdo, < sentarse erecto. Taquicardia. Pulso rápido, saltón, batiente, fuerte y tumultuoso o vibrante, muy irritable. Tensión arterial.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la espalda que impide hacer inspiraciones profundas. Dolor de magulladura entre los hombros y el sacro.

EXTREMIDADES:

Los brazos cuelgan sin fuerza. Adormecimiento en el brazo izquierdo, picazón en los dedos. Punta de los dedos rojas. Manos calientes y pies fríos. Hinchazón roja y brillante de las articulaciones. Eminencias hipotenares rojo brillante. Piernas sin fuerza; se sienten cansadas durante el reposo. Sensación de gotas de agua que corren por las caderas. Espasmo muscular del lado o brazo izquierdo. Palmas de las manos calientes.

PIEL:

Seca, Caliente o como si tuviera agua helada. Erupciones miliares. Comezón > por estimulantes.

SUEÑO:

Pesadillas. Sueños ansiosos. Insomnio con inquietud, agitación; causada por susto, miedo o ansiedad. Insomnio de los ancianos.

FIEBRE:

El escalofrío recorre como oleadas. Escalofrío o frialdad alternando con calor. Fiebres altas; calor seco y quemante; en párpados, nariz, boca, garganta, pulmones y palmas, debe descubrirse. Sudor que empapa, quiere descubrirse. Sudor en partes descubiertas o afectadas.

COMPLEMENTARIO:

Coff; Sul.

RELACIONES:

Bell; Cham; Coff:.

ACTEA SPICATA

GENERALIDADES:

Actúa especialmente sobre los articulaciones, principalmente las pequeñas. Aunque afecta las coyunturas de la muñeca; otras articulaciones como tobillo y dedos también se afectan.

Causa dolores rasgantes y picantes. Las coyunturas están inflamadas y los dolores < por el contacto y el movimiento. Una fatiga ligera causa inflamación de las articulaciones. Causa debilidad paralítica de las partes afectadas. Los síntomas son susceptibles de aparecer por susto y fatiga. Respiración corta por exponerse al frío. Ancianos. Hipersensibilidad al frío. Debilidad.

AGRAVACION:

Cambio de tiempo, ejercicio ligero, frío; noche; contacto.

OJOS:

Los objetos se ven azules.

OIDOS:

Dolor crispante al estornudar o limpiarse la nariz.

COMPLEMENTARIO:

Caul; Colo; Sabi; Stict; Vio-o.

ADONIS VERNALIS

GENERALIDADES:

Actúa predominantemente sobre el corazón cuando éste se afecta después de un reumatismo, influenza o nefritis, cuando los músculos del corazón están en la etapa de degeneración grasosa. Regula el pulso, aumenta el poder de contracción del corazón, con incremento de secreción urinaria. Es valioso en la hidropesía cardíaca, hidrotorax; ascites y anasarca. Los dolores pasan de un lugar a otro. Arritmia. No tiene acción acumulativa. Hipertrofia compensatoria del corazón en la estenosis cardíaca y regurgitación mitral.

AGRAVACION:

Frío. Acostado.

MEJORIA:

Ejercicio.

MENTE:

Vértigo < al levantarse, por volver la cabeza rápidamente o permaneciendo acostado; con palpitación. Dolor desde el occipucio hacia alderredor de los ojos. El cráneo se siente tieso.

BOCA:

Lengua enrojecida, se siente escaldada. No hay sed.

ESTOMAGO:

Sensación desfalleciente en la región del epigastrio con vértigo > al aire libre.

ABDOMEN:

Sensación de peso; los intestinos parecen quebrarse < por agacharse.

URINARIO:

Urgencia de orinar. Albuminuria; orina escasa, película grasosa en la orina.

RESPIRATORIO:

Deseo frecuente de hacer inspiraciones profundas. Disnea < tocando la espalda. Tos cardíaca seca y cosquilleante.

CORAZON:

Débil, grasoso, arrítmico. Dolor precordial, palpitación y disnea. Pulso rápido, irregular.

ESPALDA:

Espina y cuello tiesos, adolorimiento con sensación de cansancio.

PIEL:

Vesículas en la piel.

SUEÑO:

Insomnio con pensamientos divagantes o sueños horribles.

RELACIONES:

Bufo.

COMPARACIONES:

Conval; Cratae; Dig; Strop.

DOSIS:

5 a 10 gotas de tintura.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

GENERALIDADES:

Tiene una acción marcada en las venas de los intestinos inferiores y los órganos pélvicos causando hemorroides congestionadas. Venas del sistema porta también congestionadas que producen hinchazón y plenitud del hígado y abdomen. Muchos de los síntomas que Aesc. produce se deben a un desarreglo del hígado, o a un reflejo de las hemorroides. Causa una estasis venosa general, poniendo las partes púrpura y abotagadas, las venas varicosas se vuelven purpúreas. Todo se vuelve lento, la digestión, corazón, intestinos. Además de la sensación de plenitud en las partes internas, produce una sensación de Calor, Resequedad, Envaramiento y Aspereza en la garganta, nariz, ano, etc. Hay un dolor de espalda característico que inhabilita al paciente para trabajar. Los dolores son punzantes o vuelan de una parte a otra, calientes como un relámpago.

AGRAVACION:

Por la mañana al despertar. Por cualquier movimiento. Acostado, agachándose; después de evacuar; por orinar. Aire frío, y después de lavarse. Invierno. Permaneciendo de pie.

MEJORIA:

En el fresco; al aire libre; bañándose. Por el sangramiento (hemorroides); arrodillándose. Ejercicio continuo. Verano.

MENTE:

Pesimista e irritable; incapaz de fijar su atención. Despierta con la mente confusa; desatinado, especialmente con los niños.

CABEZA:

Dolor magullante desde el occipucio hasta la región frontal, con bochornos de calor sobre el occipucio, cuello y hombros.

OJOS:

Los globos se sienten pesados, embotados, calientes y enrojecidos con lagrimeo. Vasos sanguíneos dilatados.

NARIZ:

Sensible al aire fresco inspirado, que causa ardor, ulceración y coriza fluída con estornudos. Obstrucción de la nariz debido a desórdenes hepáticos. Catarro congestivo.

BOCA:

Sensación de escaldadura en la lengua y la boca. Lengua con cubierta gruesa. Salivación. No puede controlar la lengua para formar palabras apropiadamente. Gusto dulce, amargo, metálico. Dientes como cubiertos por grasa.

GARGANTA:

Faringitis folicular, conectada con una congestión hepática. Sensación de aspereza, sequedad, punzada o ardor como fuego al deglutir. Dolor neurálgico en las fauces. Carraspeo de moco tenaz y de gusto dulzón.

ESTOMAGO:

Presión como de una piedra, con dolor arañante, cerca de tres horas después de los alimentos. Agruras y regurgitación de alimentos después de comer. Deseo de vomitar con angustia y ardor.

ABDOMEN:

Palpitación profunda en el abdomen (hipogastrio y pelvis). Sensibilidad y plenitud en la región del hígado. Ictericia.

RECTO:

Evacuaciones, secas, duras: de varios colores. Siente que está lleno de pequeñas astillas. Hemorroides con dolores agudos y punzantes que suben por la espalda; transparentes y sangrantes; purpúreas, dolorosas, externas; < por permanecer de pie o caminando. Constipación; evacuaciones duras, secas, nudosas, blancas. Dolores largo tiempo después de la evacuación. Como un insecto que reptara dentro del ano. Evacuaciones en que la primera parte es dura y negra, luego blanca y suave. Ardor en el ano, con ardor que sube y baja por la espalda. Constricciones dolorosas; como de una navaja que cortara arriba y abajo. Hemorroides < durante el climaterio.

URINARIO:

Micción frecuente y escasa, orina lodosa, oscura y caliente.

HOMBRES:

Descarga de fluido prostático en cada evacuación o micción.

MUJERES:

Palpitación constante detrás de la sínfisis púbica. Leucorrea con debilidad de la espalda a través de la coyuntura sacro-ilíaca y dolorimiento en las rodillas. Leucorrea; oscura, amarilla, pegajosa, corrosiva < después de los períodos.

PECHO:

Siente comprimido, sensación caliente. Tos que depende de desórdenes hepáticos. Dolor alderredor del corazón en sujetos hemorróicos. Palpitación audible cuando la pulsación se extiende a las extremidades.

ESPALDA:

Débil, dolor lumbar sordo. La parte baja de la espalda no se soporta. Dolores como si se fuera a romper, tiene que hacer varios esfuerzos para poder levantarse. < caminando o estando de pie. Dolor magullante que afecta al sacro y las caderas.

EXTREMIDADES:

Dolor e inflamación de las extremidades. Pesadez paralítica, de brazos, espina, pies. Las manos y pies se hinchan y se vuelven rojas después de lavarse. La espina se siente débil.

SUEÑO:

Disposición a estirarse y bostezar.

COMPLEMENTARIOS:

Carb-v; Lach; Mur-ac.

RELACIONES:

Alo; Coll: Pul.

AETHUSA CYNAPIUM

GENERALIDADES:

Afecta el Cerebro y el sistema nervioso conectado con perturbaciones gastro-intestinales. Violencia es una de las claves de su acción. Violentos; vómitos; convulsiones; dolores, delirio. Por otra parte hay una postración profunda y estupor, falta de reacción, y aún falta de habla. La mente y el cuerpo se vuelven débiles. Es especialmente útil en niños durante la dentición y enfermedades durante el verano, cuando angustia, llanto y expresiones de inquietud y descontento, están presentes. Conforme la enfermedad avanza, el niño se pone más y más retraído en su disposición y más inclinado a llorar. En los espasmos epileptiformes, los dedos pulgares están cerrados, la cara se pone roja, los ojos volteados hacia abajo, las pupilas dilatadas y brillantes y con espuma en la boca. Los pacientes no se pueden sentar o mantener la cabeza erecta. Debilidad nerviosa y postración por exceso de trabajo. Chochez. Dolores lancinantes. Las partes se sienten como atornilladas unas a otras. Bebés alimentados inapropiadamente. Niños que carecen de la fuerza para mantener sus cabezas erguidas, sin una enfermedad particular, algunas veces ni siquiera pueden sostener ningún peso sobre sus extremidades.

AGRAVACION:

De 3 a 4 a.m. y por la noche. Por el calor; tiempo caliente. Leche. Dentición. Por comer con frecuencia. Exceso de ejercicio.

MEJORIA:

Al aire libre, por caminar al aire libre. Por la conversación.

MENTE:

Inhabilidad para pensar o fijar su atención, por exceso de estudio. Delirio, vé gatos, perros, ratas, etc. Idiocia alternada con furor. Quiere saltar de la cama o de una ventana. Miedo a los exámenes por una simple sensación de incapacidad. Niños idiotas. Retraso.

CABEZA:

Dolores desesperantes del occipucio y parte alta del cuello y la espina > por acostarse y por la presión. Los síntomas de la cabeza > por pasar flatos y por evacuar. El cabello se siente restirado. Vértigo; con somnolencia, con palpitación, con debilidad. No puede levantar la cabeza. Cabeza caliente después del vértigo. Cefalea agobiante con vértigo. < al caminar y por mirar hacia arriba. Aturdido y amodorrado.

OJOS:

Fotofobia (crónica). Ojos brillantes y protuberantes. Ojos tirados hacia abajo. Córnea sumida. Los objetos se ven más grandes o dobles. Inflamación de las glándulas de Meibomio. Rotación de ojos al caer dormido.

OIDOS:

Como algo caliente que fluyera hacia afuera. Se siente obstruído; > por insertar los dedos y apartando las partes.

NARIZ:

Erupción herpética en la punta de la nariz. Deseo frecuente e ineficaz de estornudar. Alas nasales jaladas hacia adentro.

CARA:

Hundida; pálida, abotagada, manchada, roja. Línea nasal marcada. Sombra blanqui-azul alderredor de los labios. Aspecto mortecino. La barbilla y las comisuras labiales se sienten frías.

BOCA:

La lengua parece muy larga. Aftas en la boca. Habla lenta y confusa. Mudez. Sabor amargo; de cebollas; de queso; dulzón por la mañana.

ESTOMAGO:

Solo pica para comer. Intolerancia a la leche. Vómito súbito y violento de leche tan pronto como se toma o en grandes cuajos. Hambre después del vómito. Debilidad y Sueño Profundo Después del Vómito. Nausea Mortal. Regurgitación de alimentos mucho después de haber comido. Vómito de materia espumosa blanca como leche; o un fluido amarillo. El estómago se siente como volteado hacia afuera. Digestión afectada por cansancio cerebral. Arqueos.

ABDOMEN:

Inflamación negro-azulosa del abdomen, frialdad del abdomen, subjetiva y objetiva, con frialdad de piernas, con dolorimiento en los intestinos > por aplicaciones tibias. Cólico seguido por vómito, vértigo y debilidad. Sensación de burbujeo alderredor del ombligo.

EVACUACIONES:

Diarrea viscosa amarillo verdosa. Evacuaciones indigeridas. Constipación obstinada, con sensación como si toda la acción de los intestinos se hubiera perdido. Afecciones coléricas en los ancianos.

URINARIO:

Dolor cortante de la vejiga con urgencia frecuente.

HOMBRES:

Testículo derecho retraído con dolor en el riñón.

MUJERES:

Menstruación acuosa. Inflamación de las glándulas mamarias con dolores lancinantes. Barritos en las partes externas; pruriginosas al calentarse.

RESPIRATORIO:

Respiración corta interrumpida por hipo. El sufrimiento deja al paciente sin habla. Calambres constrictivos en el pecho. La tos causa dolor de cabeza. Punzadas en el lado izquierdo del pecho.

CORAZON:

Palpitación violenta, con vértigo, cefalea e inquietud. Pulso rápido, duro, pequeño y arrítmico.

CUELLO Y ESPALDA:

Ausencia de fuerza para mantener la cabeza erguida. Espalda baja como atornillada. Hinchazón de las glándulas que rodean el cuello como un rosario. Sensación de que el dolor en la espalda podría > por estirarse y inclinarse hacia atrás rectamente.

EXTREMIDADES:

Los dedos y pulgares doblados hacia adentro o engarruñados. Sensación de que los brazos se han acortado mucho. Adormecimiento de manos y pies. Pesadez, debilidad, contracción de los dedos. Excoriación de los muslos al caminar.

PIEL:

Glándulas linfáticas inflamadas como un collar de cuentas. Piel fría y cubierta con sudor frío y pegajoso. Erupciones; pruriginosas; alderredor de las coyunturas > por el calor. Equimosis. Anasarca: Todo el cuerpo puede estar azul o negro.

FIEBRE:

Mucho calor sin sed. Debe cubrirse durante la transpiración. Sudoración al menor esfuerzo.

SUEÑO:

Perturbado por despertares violentos y/o por transpiración fría. Somnoliento después de vomitar o defecar. Rotación de los ojos o convulsión ligera al dormirse.

COMPLEMENTARIO:

Calc.

RELACIONES:

Ant-c; Cic.

AGARICUS MUSCARIUS

GENERALIDADES:

Este hongo venenoso, actúa en el Eje Cerebro Espinal. Su acción en el cerebro produce más vértigo y delirio. La afección al cordón espinal, nervios y médula, produce Movimientos Irregulares, Angulares, Inciertos y Exagerados; el paciente se estira mucho hacia arriba, se tambalea o dá pasos muy altos, tira las cosas, etc. Los síntomas aparecen lentamente. El paciente sufre Muchos y Diversos Síntomas. Temblores; Torciones; Crispaduras, o espasmos fibrilares aquí y allá. Los Párpados y la lengua están especialmente afectados. Los síntomas aparecen diagonalmente como brazo derecho y pierna izquierda. Estremecimientos. Nerviosismo e inquietud. Corea > durante el sueño. Sensación de ser picado por agujas frías, o calientes, o una gota fría o peso frío en las partes. Estremecimientos dolorosos, luego las partes se ponen tiasas y frías. En la epilepsia y las convulsiones, la fuerza se incrementa, puede levantar grandes pesos. El estremecimiento desaparece durante el sueño. Convulsiones después del coito; por supresión de la leche; después de haber sido regañado; o castigado. Mujeres histéricas, jóvenes y recién

casadas que se desmayan después del coito. Niños que caminan y hablan tarde debido a problemas cerebrales. Bostezo antes de enfermarse.

AGRAVACION:

Aire frío. Aire helado. Antes de una tormenta. Cansancio mental. Coito. Libertinaje. Alcohol; Presión en la espina. Contacto. Por la mañana. Durante la menstruación. Por el sol. Susto.

MEJORIA:

Movimiento ligero.

MENTE:

Canta, habla incoherentemente, salta rápidamente de un tema a otro pero no contesta. Locuacidad. Indisposición a efectuar ninguna clase de trabajo especialmente mental. Audacia. Hace versos. Hilaridad. Abraza y besa las manos. Egoísta. Indiferente. Amodorrado y torpe como embriagado. Lento, terco, caprichoso; lento para aprender a caminar y a hablar. Retrasado, torpe. No conoce a nadie; tira cosas. La presión en la espalda causa risa involuntaria. No puede hacer nada nuevo, no puede hacer un trabajo rutinario o hace lo contrario.

CABEZA:

Vértigo; por la luz solar. Cefalea sorda, debe mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Cefalea > después de evacuar u orinar; cefalea con sangramiento nasal o descarga gruesa de moco. Dolor como de un clavo en el lado derecho de la cabeza. La cabeza está en movimiento constante. Cabeza jalada hacia los hombros.

OJOS:

Dificultad para leer, las letras parecen moverse, flotar. Visión doble, globos oculares oscilatorios. Exudado en los cantos. Moscas volantes; cafés. Estremecimiento de los párpados. Estrechamiento de espacio entre los párpados. Nistagmo; bizcos. Párpados gruesos, secos, ardientes.

OIDOS:

Comezón en los oídos con enrojecimiento y dolor ardiente como si estuvieran congelados. Estremecimiento de los músculos cerca de los oídos. Ruidos.

NARIZ:

Estornudos frecuentes, sin coriza. Flujo de agua clara, sin coriza. Estornudos después de toser. Comezón interna y externa. Descarga fétida sanguinolenta y oscura. Epistaxis; en ancianos. Enrojecimiento. Obstrucción al agacharse.

CARA:

Los músculos faciales se sienten rígidos; estremecimiento. La cara pica y arde. Dolor en las mejillas, como por astillas. Neuralgia como si agujas heladas corrieran por los nervios. Muecas. Expresión idiota. Espuma en la boca. Encías inflamadas y sangrantes con dolor.

GARGANTA:

Se siente contraída. Arroja bolas sólidas de flema sin toser. Resequedad con dificultad para tragar. Sensación de rasguño al intentar cantar.

ESTOMAGO:

Siempre sediento. Eructos; vacíos; sabor de manzanas; o de huevos podridos. Eructos que alternan con hipo. Como con un bulto en el epigastrio. Perturbaciones gástricas, con dolores punzantes en la región del hígado. Vómitos; amargos, con postración, con punzadas en el recto y las ingles.

ABDOMEN:

Rugido y fermentación de intestinos. Flatos profusos e inodoros. Diarrea con muchos flatos con olor a ajos. Diarrea, de niños, con evacuaciones biliosas de color verde pasto. Flatos calientes. Sensación de retortijones. Punzadas en la región esplénica; en corredores.

URINARIO:

Orina, profusa, sin color, clara, color limón. Mucosidad viscosa, pegajosa de la uretra. Micción frecuente. Orina fría. La orina fluye lentamente o en gotas; tiene que presionar para que pase.

HOMBRES:

Incremento del deseo sexual. Gran debilidad después del coito, sudor profuso, ardor y comezón en la piel; tensión y presión bajo las costillas. Descarga seminal caliente. Palpitación durante el coito; depresión posterior (en ambos sexos). Eyaculación precoz. Testículos dolorosamente retraídos. Indisposiciones después de libertinaje sexual.

MUJERES:

Dolor en el bajo vientre especialmente después de la menopausia. Excitación sexual. Reglas muy profusas. Pezones con prurito, ardor, parecen rojos; durante el embarazo. Indisposiciones que siguen al parto y el coito. Metástasis por supresión de leche; al cerebro, problemas abdominales, etc. Leucorrea, oscura, sanguinolenta, excoriante, la paciente está inhabilitada para caminar. Comezón, con deseo sexual.

RESPIRATORIO:

Ataques aislados de tos, luego estornudos. La tos viene como de la espina. Expectoración fácil de bolas de moco. Respiración laboriosa y opresiva. El pecho parece muy estrecho.

CORAZON:

Palpitación durante el coito. Palpitación irregular, tumultuosa; con enrojecimiento de la cara, > por el tabaco. Presión o punzadas ardientes del corazón a la escápula izquierda. Angina de pecho, solamente con dolor excesivo. Sacudidas; en la región del corazón, por un ruido súbito, por eructar o toser.

ESPALDA:

Vértebra sensible al calor. Dolor como de fatiga. Debilidad dolorosa y enrojecimiento. Espina sensible al contacto; por todos lados del cuerpo. Punzadas ardientes a lo largo de la espina. La espina parece corta. Dolor en la región lumbar y el sacro, una especie de crujido en la espalda que se extiende a la

base del cuello < al agacharse. Lumbago < al aire libre; < sentándose. Espasmo de músculos cervicales. Comezón a lo largo de la espina. Los músculos de la espalda se sienten rígidos, como si se fueran a romper al doblarse. Como si aire fresco se expandiera a lo largo de la espalda, como un aura.

EXTREMIDADES:

Brazos inquietos. Ardor y comezón en ambas manos como si estuviesen congeladas. Temblor de las manos. Mano derecha inquieta mientras escribe; el brazo se siente paralizado por escribir mucho. Paso incierto. Comezón en los dedos de los pies como si estuviesen congelados. Calambres en las plantas y los pies. Dolor en la barbilla. Violento dolor en los muslos al cruzarlos. Parálisis de las extremidades inferiores, con ligeros espasmos de los brazos. Adormecimiento de las piernas por cruzarlas. Nalgas frías. Dolor en las caderas < acostándose. Los dedos vuelan espasmódicamente mientras se sostienen cosas. Piernas que se sienten pesadas. Siente como que sus piernas no le pertenecen.

PIEL:

Ardiente, pruriginosa; enrojecimiento e inflamación. Como si estuviera Congelada. Sabañones. Comezones que cambian de lugar al rascarse. Dolores en la piel cuando se enfría. Edema angio-neurótico. Erupción miliar con ardor y comezón intolerable. Comezón sobre la parte afectada. El golpe más leve provoca equimosis.

SUEÑO:

Bostezos; frecuentes, antes de los dolores o espasmos; como un concomitante. Bostezos seguidos de risa involuntaria. Al caer dormido, se sobresalta, se retuerce, despierta con frecuencia.

FIEBRE:

Fácilmente se escalofría, fácilmente suda, sudor en lados alternantes. Sudores nocturnos.

COMPLEMENTARIOS:

Calc.

RELACIONES:

Phys.; Tub.

AGNUS CASTUS

GENERALIDADES:

Produce sus efectos principales en los Organos Sexuales de los dos sexos, también hay síntomas característicos en la Esfera Mental. Disminuye la vitalidad sexual con depresión mental correspondiente y pérdida de energía nerviosa. Hay una gran tristeza, con ideas fijas de muerte cercana. Influye sobre los dos sexos, pero su influencia es más pronunciada sobre los hombres. Impotencia y Vejez Prematura, por abuso del poder sexual. Historia de gonorrea repetitiva. Autodesprecio por abuso sexual. Debilidad nerviosa en personas célibes. Un remedio prominente en torceduras y esguinces. Comezón roente en todas partes, especialmente en los ojos. Taquicardia causada por el tabaco en hombres jóvenes

neuróticos. Libertinos. Agns.se usó anteriormente tanto por hombres como mujeres para suprimir el deseo sexual.

AGRAVACION:

Excesos Sexuales. Esguinces por sobrecarga.

MENTE:

Distraído. Tristeza con desesperación con impresión de una muerte pronta. Incapaz de recoger cosas. Falta de valor. Dice que va a morir pronto y por eso no vale la pena hacer nada. Ilusión de olores-arenques, almizcle. Mala Memoria.

CABEZA:

Dolor como por haber estado en una habitación con ambiente denso por humo, > por mirar hacia un sólo punto.

OJOS:

Pupilas dilatadas. Comezón roente en los ojos.

NARIZ:

Olores imaginarios- arenques, almizcle. Dolor duro en el dorso de la nariz > por la presión.

CARA:

Comezón corrosiva en las mejillas. Formicación en las mejillas. Desgarrante, rasgante, bajo los alvéolos de la mandíbula inferior derecha.

BOCA:

Ulceras en la boca y las encías. Los dientes duelen al ser tocados por agua o alimentos tibios.

ESTOMAGO:

Náusea con sensación de que los intestinos son presionados hacia abajo, quiere sostenérselos con las manos. Solo la comida sencilla agrada. Eructos que huelen a orina.

ABDOMEN:

Rugido del abdomen mientras duerme. Bazo inflamado y dolorido. Flatos con olor a orina, permanecen largo tiempo en la ropa. Fisuras profundas en el ano. Sensación de ulceración subcutánea cerca del ano, solamente al caminar. Intestinos como caídos, tiene que sostenérselos con las manos.

URINARIO:

Pasa más orina, frecuentemente.

HOMBRES:

Deseo sexual casi perdido. Testículos; fríos, inflamados, duros, pene pequeño, flácido. Espermatorrea; con impotencia. Pérdida de fluido prostático en esfuerzos. Descarga amarilla de la uretra.

MUJERES:

Una descarga leucorréica transparente pasa imperceptiblemente por los genitales muy relajados. Aversión al coito. Leucorrea que mancha de amarillo. Agalactia con tristeza. Reglas suprimidas; con dolores abdominales. Palpitación histérica con sangramiento nasal. Esterilidad; con supresión de reglas y sin deseo sexual. Emoción sexual ausente por masturbación excesiva.

RELACIONES:

Old.; Pho-ac.

AGRAPHIS NUTANS

GENERALIDADES:

Relaja el sistema completo. El paciente está predispuesto a enfriarse por exposición a vientos fríos. Adenoides con anginas crecidas. Sordera por problemas de garganta. Diarrea mucosa que sigue a un catarro suprimido. Mudez en la infancia sin conexión con sordera.

AILANTHUS GLANDULOSA

GENERALIDADES:

Actúa sobre la Sangre; desorganizándola y produciendo condiciones como fiebres bajas: tipos bajos de enfermedades eruptivas y diatesis hemorrágicas. Afecta la Garganta causando difteria y tonsilitis folicular. Infección por Estreptococos. La piel parece lívida y purpúrea. La postración es rápida. Lividez, Estupor, foetor y Malignidad son las condiciones marcadas. Las descargas son delgadas y ácidas. Sepsis. Rash que con frecuencia vuelve cada año. Es adecuada para personas sensibles y nerviosas. Temperamentos biliosos, personas robustas y gordas.

AGRAVACION:

Supresiones. Levantándose o sentándose. Vista de los alimentos. Movimiento, caminando.

MEJORIA:

Bebidas calientes, acostándose sobre el lado derecho.

MENTE:

Estupor; o indiferencia estóica, con suspiros. Embotamiento, debe leer la misma cosa varias veces o contar una y otra vez. Todos los antecedentes se olvidan. Murmuración constante, delirio; con insomnio e inquietud. Delirio furioso con ojos brillantes.

CABEZA:

Dolor frontal con somnolencia y cara roja y caliente; no se puede sentar. Desvanecimiento al levantarse, o vértigo < acostándose.

OJOS:

Saturados y congestionados; mirada brillante cuando es despertado. Pupilas dilatadas. Fotofobia.

OIDOS:

Dolor al deglutir. Glándulas parótidas sensibles y crecidas.

NARIZ:

Descarga nasal delgada, copiosa, sanguinolenta e icorosa. Nariz seca. Comezón y sensación de incomodidad cerca de la nariz.

CARA:

Color caoba; oscura e hinchada. Cara moteada o crónicamente manchada; una especie de acné. Labios hinchados y agrietados.

BOCA:

Dientes cubiertos de fulinginocidades. Lengua; seca y café; parchada y agrietada.

GARGANTA:

Seca, fauces fétidas. Garganta oscura e hinchada. Anginas tachonadas con muchas úlceras profundas. (< izquierda), con descarga pultácea y floja. Gran hinchazón interna y externa. Tonsilitis lacunar. Comezón e irritación de la faringe posterior. Difteria.

ESTOMAGO:

Vómito súbito y violento cuando se sienta. Sensación peculiar de vacío.

ABDOMEN:

Diarrea, disentería con gran debilidad. Evacuaciones delgadas, acuosas, ofensivas con paso involuntario de orina. Solitaria. Sensación de inseguridad en evacuaciones u orina, etc.

URINARIO:

Orina escasa, suprimida; pasa inconscientemente.

MUJERES:

Fiebre puerperal maligna.

RESPIRATORIO:

Respiración irregular y rápida. Tos seca. Pulmones inflamados y cansados.

CORAZON:

Pulso rápido, pequeño y débil.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello sensible y muy inflamado.

PIEL:

Erupciones en parches obscuro y ralos.; aparecen lentamente; desaparecen a la presión, pero regresan lentamente. Piel moteada. Grandes ampollas llenas de líquido obscuro. Escarlatina maligna. Petequia. Hormigueo por todo el cuerpo.

SUEÑO:

Somnolencia, inquietud.

FIEBRE:

Fiebre adinámica con corazón débil. Sudor frío.

RELACIONES:

Aru-t; Bap; Lac-c.

ALETRIS FARINOSA

GENERALIDADES:

Afecta los órganos femeninos. Es un remedio para mujeres anémicas, debilitadas, tranquilas que siempre se sienten cansadas y sufren de prolapso, leucorrea y problema rectal. Muchos de los síntomas aparecen debido a desórdenes uterinos. Las partes se sienten pesadas. Adecuada para jóvenes anémicas y mujeres embarazadas. Personas débiles y emaciadas. Hemorragias.

AGRAVACION:

Pérdida de fluidos.

MEJORIA:

Pasando flatos. Doblándose hacia atrás.

MENTE:

Sentimiento de confusión. No puede concentrar su mente.

CABEZA:

Pesadez en el occipucio; como si se tirara la cabeza hacia atrás. Vértigo con desmayo, somnolencia, vómito purga.

OIDOS:

Sensación como si hubiera una abertura entre los dos oídos.

BOCA:

Mucha saliva espumosa.

ESTOMAGO:

Pérdida de apetito; disgusto por la comida. El mínimo alimento produce incomodidad. Vómito obstinado en el embarazo. Dispepsia nerviosa. Náusea > por el café, en la cena; con presión en la frente.

ABDOMEN:

Cólico que se sitúa en la parte inferior > al pasar flatos; evacuaciones escasas y diarréicas, dolor > estirándose hacia atrás. Dolor temeroso al paso de evacuaciones, como forzando el paso para salir. Evacuaciones grandes, duras, difíciles. Constipación como por atonía rectal.

URINARIO:

Micción involuntaria al caminar rápido o al estornudar.

MUJERES:

Reglas tempranas y profusas, con dolores de parto. Menorragia profusa, negra, con coágulos. El útero se siente pesado. Leucorrea blanca, hebrosa, debido a debilidad y anemia. Tendencia habitual al aborto. Dolores musculares durante el embarazo. Reglas copiosas seguidas por rezumamiento líquido copioso entre los períodos.

RESPIRATORIO:

Tos antes de las reglas.

CUELLO Y ESPALDA:

Sensación de que la espalda se quebrara justo arriba de la cintura. Dolor de espalda que se prolonga hacia la región del sacro, con leucorrea filamentosa e incolora.

EXTREMIDADES:

Pierna (Derecha) se siente paralizada debajo de la rodilla; entumecida, no puede soportar ningún peso.

RELACIONES:

Chin; Helo; Tril.

ALFALFA

Este medicamento influye favorablemente en la nutrición, y se considera como un tónico. El apetito y la digestión mejora, el vigor físico y mental regresa, con aumento de peso. Es un remedio útil para la neurastenia, melancolía, nerviosismo e insomnio. Aumenta la grasa, corrige el desgaste de tejido. Aumenta la calidad y cantidad de la leche en madres lactantes. Clínicamente influye favorablemente en

una diabetes insípida y fosfaturia. Calma la irritabilidad vesical en la hipertrofia prostática. Debe darse 5 a 10 gotas varias veces al día.

ALLIUM CEPA (Cebolla roja)

GENERALIDADES:

Afecta las membranas mucosas de la Nariz, Ojos, laringe e intestinos, causando incremento en la secreción. Ardor y punzadas marcadas en los ojos, nariz, boca, garganta, vejiga y piel. La secreción nasal es acre: la secreción de los ojos es blanda. Los dolores neurálgicos son punzantes, tan finos como una cuerda, y que siguen a heridas a los nervios o amputación y otras operaciones quirúrgicas. Neuritis traumática crónica. Los síntomas van de izquierda a derecha. Coriza de los cantantes. Neuroma. Gangrena senil. Sensación de calor encendido en diferentes partes del cuerpo.

AGRAVACION:

Cuarto Caliente. Pies húmedos. Por cantar. En tiempo húmedo. Primavera. Tarde. Por comer pescado estropeado; pepinos; ensaladas.

MEJORIA:

Aire libre fresco. Por el baño. Movimiento.

MENTE:

Miedo de que el dolor no se pueda soportar. Melancolía.

CABEZA:

Dolorimiento en la frente, que se extiende a los ojos y la cara > al liberarse una coriza o las reglas; regresa cuando el flujo cesa. Shock eléctrico que pasa por la cabeza. Huesos de la cabeza con sensación de adormecimiento.

OJOS:

Mucho ardor, escozor; lagrimeo profuso y suave < por toser, quiere frotárselos. Objetos cercanos parecen distantes al bostezar.

OIDOS:

Dolor que se extiende a la garganta.

NARIZ:

Estornudos Violentos, Frecuentes: Coriza; con descarga Fluída y Acre, con ardor y picor en la nariz. La nariz gotez. Sensibilidad a los olores; de flores y la piel de los duraznos. Descarga acre al cantar.

CARA:

Parálisis; lado izquierdo, también las piernas de ese lado.

GARGANTA:

Ulceración de la garganta. Dolor que se extiende a los oídos. Goteo de la úvula. Sensación de un tapón en la garganta o que se tiene que tragar un bulto grande.

ESTOMAGO:

Deseo de cebollas crudas que gustan. Dolor en la región del píloro. Sudoración punzante en el vértice < después de cada alimento. Apetito voraz con sed. Náusea. Eructos.

ABDOMEN:

Flatos ruidosos y ofensivos. Cólico flatulento < por sentarse, por el movimiento. Calor radiante en el recto.

HOMBRES:

Dolor en la vejiga y glándula prostática después del coito.

MUJERES:

Flegmasia alba dolens; después de un parto instrumental.

URINARIO:

Micción copiosa; con coriza. Estranguria después de mojarse los pies. Goteo de orina en personas ancianas.

RESPIRATORIO:

Tos ronca, incesante, cosquilleante < por inspirar aire frío; con sensación de laringe dividida y desgarrada; debe agarrársela con las manos. La tos es tan problemática que se quiere contener. La laringe es dolorosa al hablar. Bronquitis en ancianos.

EXTREMIDADES:

Las coyunturas se sienten doloridas; Ulceras, piel que se frota por los zapatos, especialmente en los talones. Extremidades, especialmente los brazos doloridos y cansados. Pies inflamados por caminar mucho.

PIEL:

Rayas rojas que corren hacia arriba; panadizo: de mujeres postradas.

SUEÑO:

Bostezos; en sueño profundo o con dolor de cabeza y embotamiento, y con calambres en el estómago.

COMPLEMENTARIOS:

Pho; Pul; Ther.

RELACIONES:

Euphr; Gel; Kali-io.

ALLIUM SATIVUM (Ajo)

GENERALIDADES:

Actúa en las membranas mucosas intestinalea, incrementando la peristalsis. Está adaptado a personas gruesas acostumbradas a la buena vida y que sufren de dispepsia y afecciones catarrales. Pacientes que comen mucho, especialmente carne. Comen más que beben. La digestión se altera por el mínimo error en la dieta. Tiene propiedades vasodilatadoras. Actúa mejor en los comedores de carne que en los estrictamente vegetarianos. El niño está amodorrado, exánime, extremadamente pálido, con intestinos torpes, no camina y las piernas no crecen tan rápidamente como el resto del cuerpo.

AGRAVACION:

Cambios de temperatura. Tarde y noche. Caminando. Presión. Bebiendo agua impura. Glotonería.

MEJORIA:

Sentándose doblado.

MENTE:

Miedo; que no se aliviará; no poder soportar los medicamentos; de ser envenenado. Quiere muchas cosas pero nada le place.

CABEZA:

Vértigo al leer. Cabeza que duele antes de las reglas, cesa durante ellas < después. Caspa.

CARA:

Manchas. Labios secos.

BOCA:

Mucha saliva dulzona, después de los alimentos y por la noche. Sensación de cabello en la lengua o la garganta. Lengua pálida, papilas rojas.

ESTOMAGO:

Apetito voraz. Deseo de mantequilla. Enfermedades por agua insalubre. El mínimo error en la dieta perturba al estómago. Sensación de algo frío o caliente que asciende por el esófago.

MUJERES:

Reglas profusas. Inflamación de la vulva y los muslos. Mamas hinchadas y sensibles; durante las reglas. Hinchazón del seno después del destete.

RESPIRATORIO:

Tos en la mañana, con expectoración difícil. Tos por fumar. Bronquiestasia con esputo fétido. Hemoptisis.

EXTREMIDADES:

Dolor en las caderas; dolor en los músculos psoas e ilíacos, < cruzando las piernas.

COMPLEMENTARIO:

Ars.

ALOE

GENERALIDADES:

Afecta las Venas Abdominales. causando relajamiento en el Recto; hígado, colon, y pelvis. Establece el equilibrio fisiológico cuando la enfermedad y los síntomas medicamentosos están muy mezclados. Cefalea periódica que alterna con lumbago. Es un remedio para los malos efectos por hábitos o vida sedentaria. Adaptada para personas cansadas, ancianos y antiguos bebedores de cerveza. Hay una sensación de plenitud en las partes. Pesadez, Lentitud para caminar, como cargando una peso. Fatiga, sensación de hundimiento. Descargas; gelatinosas; post nasales; evacuaciones, etc. Sensación de inseguridad. Debilidad general y cansancio. Calor interno y externo. Niños muy excitados, parlanchines y risueños.

AGRAVACION:

Calor, tiempo caliente y húmedo; verano. Temprano por la mañana. Después de una disentería. Por bostezar o masticar. caminando con fuerza. Por la tarde. Después de comer y beber.

MEJORIA:

Al aire libre y fresco. Aplicaciones frías. Pasando flatos. Cerrando los ojos. Tomando té o estimulantes.

MENTE:

Insatisfecho y enojado consigo mismo. Aversión al trabajo mental. Aborrece a la gente, repele a todos. Mal humor < en tiempo nublado o con constipación. Piensa que morirá en una semana. La vida es una carga. Temblor por sonidos musicales u otros ruidos. Imagina que la gente camina muy fuerte o rápidamente.

CABEZA:

Dolores sobre la frente, con pesadez en los ojos, debe cerrarlos parcialmente. Vértigo con sensación de inseguridad. Síntomas de cabeza que alternan con síntomas abdominales o lumbares > cerrando los ojos. Presión fuerte en el vertex. Tintineo como de cristal muy delgado que se extiende a los oídos.

OJOS:

Dolor profundo en las órbitas. Parpadeo, temblor momentáneo. Cierra los ojos parcialmente por el dolor en la frente.

OIDOS:

Crujido al masticar.

NARIZ:

Punta fría. Sangramiento nasal después de despertar, en la cama.

CARA:

Labios de rojo marcado, secos, agrietados; sangrantes. Dolor al bostezar o masticar.

BOCA:

Gusto amargo o agrio. Lengua y boca seca.

GARGANTA:

Carraspeo con moco grueso gelatinoso. Sensación de ulceración e inflamación.

ESTOMAGO:

Deseo de cosas jugosas, frutas, especialmente manzanas, comida salada. Dolor en el hueco al hacer un paso en falso. Aversión a la carne. Eructos con opresión en el estómago. Hambre después de evacuar.

ABDOMEN:

Se siente; lleno, pesado, caliente, inflado. Dolor del ombligo al recto. Sensación de un bulto entre la sínfisis púbica y el cóccix, con necesidad de evacuar. Pesadez; in el hipogastrio; en recto; hundimiento del abdomen. Prolapso rectal. Ruidos, gorgoteos en intestinos; urgencia súbita; Sensación de Inseguridad luego pasa precipitadamente una evacuación acuosa y borbollante. Duda de qué se arroje, gas o excremento. Diarrea; con dolor en el recto después de evacuar; lientérica. Ano Débil, rezuma moco. Excremento que escapa con un flato o cuando se orina. Evacuaciones; pulposas, aterronadas; acuosas, gelatinosas; sanguinolentas; evacuaciones sólidas que pasan involuntariamente, urgencia de evacuar con emisión de flatos solamente. Hemorroides, como un racimo de uvas, prolapsadas > por baños fríos. Ardor y punzadas en el ano y recto, por las hemorroides, y que impiden dormir. Evacuaciones y flatos calientes. Ardor en el recto. Pulsación en el recto después de comer. El niño anda por la casa dejando excremento redondo como canicas. Diarrea; después de comer ostras (ostiones); en tiempo caliente o en bebedores de cerveza. Pasa una gran cantidad de moco con dolor en el recto, después de evacuar. Evacuaciones pastosas, acuosas.

URINARIO:

Incontinencia en los ancianos. Próstata crecida. Sensación de que se escapará una evacuación ligera cada vez que se orina. Orina caliente.

HOMBRES:

Irritabilidad sexual, después de comer; después de despertar (en los niños). Emisiones involuntarias durante la siesta.

MUJERES:

Utero congestionado y pesado con dolores como de parto que se siente en las ingles y caderas < por permanecer de pie y durante las reglas. Hemorragia climatérica. Reglas adelantadas y prolongadas. Leucorrea de moco sanguinolento precedido por cólico. Disentería después del parto.

RESPIRATORIO:

Tos en invierno con comezón. Respiración difícil con punzadas del hígado al pecho. Tos al sentarse, permanecer de pie, al levantarse, después de sentarse, con lágrimas.

CUELLO Y ESPALDA:

Lumbago que alterna con cefalea y hemorroides. Dolor en el sacro < mientras está sentado, > moviéndose.

EXTREMIDADES:

Dolor tirante en las coyunturas. Debilidad en todas las extremidades. Plantas de pie dolorosas cuando se camina sobre pavimento.

SUEÑO:

Sueños de que se ensucia él mismo.

FIEBRE:

Calor interno.

COMPLEMENTARIO:

Sul.

RELACIONES:

Lil-t; Podo; Sep; Sul.

ALUMEN (Alum)

GENERALIDADES:

Causa debilidad paralítica de los músculos de todas las partes del cuerpo. Tendencia muy marcada a la induración de glándulas y otros tejidos. La lengua, recto, útero, etc. están endurecidas; úlceras con base indurada. Adaptado a ancianos que sufren de catarro bronquial. Sensación de resequeza y de

constricción. Constipación de la clase más grave, como en cancer de útero y recto. Hemorragias; por mordida de sanguijuela, con grandes coágulos. Sensible al frío; exposición al aire que causa aspereza y grietas en las mejillas. Util después de operaciones en los ojos y los dientes. Descargas suaves y amarillas. Sensación de constricción, como de un cordón o banda alderredor de las extremidades, en estados paralíticos. Relajamiento de los músculos.

AGRAVACION:

Durante el sueño; acostándose sobre el lado derecho; frío. Malas noticias.

MENTE:

Temblores nerviosos, por malas noticias. Personas irresolutas. Lectofobia.

CABEZA:

Dolor ardiente, como de un peso en la cima de la cabeza > presionando con mano fría. Vértigo con debilidad en el hueco del estómago > abriendo los ojos > volteándose hacia el lado derecho. Cefalea > tomando agua fría.

OJOS:

Prolapso del iris, después de una operación de cataratas. El ojo derecho se tuerce hacia la nariz.

OIDO:

Escucha todos los sonidos durante el sueño. Otorrea purulenta.

GARGANTA:

Anginas grandes e induradas por resfríos frecuentes. Uvula elongada, relajada. Raspadura de la garganta con tos. Espasmo del esófago, los líquidos se pueden tragar difícilmente. Afonía completa.

ABDOMEN:

Constipación obstinada; sin deseo de defecar por días. Paso de evacuaciones duras como canicas, pero el recto se siente lleno. Dolor que perdura mucho después de las evacuaciones con dolor punzante en el recto. Hematemesis de los bebedores. Paso de grandes coágulos del recto.

MUJERES:

Induración; del cervix uterino; glándulas mamarias. Descarga vaginal amarilla y crónica. Reglas acuosas. Manos débiles, deja caer las cosas durante las reglas.

RESPIRATORIO:

Expectoración filamentosas, copiosa por la mañana en ancianos. Catarro del pecho; pecho débil; hemoptisis; y moco expelido con dificultad.

CORAZON:

Palpitación; < permaneciendo sobre el lado derecho, por pensar en su enfermedad.

PIEL:

Eczema en el dorso del pene y escroto. Alopecia.

ALUMINA

GENERALIDADES:

Afecta el Eje Cerebro Espinal causando disturbios en la coordinación y efectos paréticos. En la esfera mental la conciencia de la realidad y juicio están perturbados. Es adecuada para ancianos con falta de calor vital, o vejez prematura con debilidad. Causa Resequedad de la piel y membranas mucosas; ojos, garganta, recto, etc. o irritabilidad y relajamiento. Descarga mucosa profusa. Las descargas son delgadas, acres y escasas. Tendencia a la induración. Las funciones son lentas, las acciones se retardan, por ejemplo; el pinchazo de una aguja se sentirá con retardo, las impresiones alcanzan la conciencia lentamente. El paciente es delgado, inactivo, quiere acostarse, pero esto incrementa su fatiga. Es útil en niños delicados, producto de alimentación infantil artificial. Las palpitaciones se sienten en varias partes: los dolores van hacia arriba. El paciente se mejora completamente por un tiempo, pero luego inexplicablemente empeora. Cronicidad. Fatiga; después de hablar; después de la menstruación. Degeneración el cordón espinal. Incapaz de caminar, con ojos cerrados. Movimiento involuntario de partes individuales. Jovencitas secas y arrugadas durante la pubertad. Malos efectos de la desilusión. Sensación de constricción. Temblor, movimientos convulsivos, con lágrimas, risas o ambas alternadas.

AGRAVACION:

Calor de una Habitación; de la cama. Alimentos; artificiales, papas (patatas), almidón, sal. Hablando, Tiempo seco, Temprano al despertar. Sentado. Después de las reglas. Periódicamente; en días alternos. Coito. Humo del Tabaco. Elevación. Ejercicio. Luna llena o nueva.

MEJORIA:

Por la tarde. Al aire libre. Ejercicio y temperatura moderada. Tiempo húmedo, baño frío.

MENTE:

Ilusiones; de ser más grande; entumecimiento; suavidad; pesadez. Apresurado pero lento en ejecutar, de allí que comete errores al hablar y escribir. Estados mentales depresivos. Atemorizado. Miedos; de sus propios impulsos; a la vista de una navaja, de la sangre, temor de perder la razón. Cuando ve o hace alguna cosa, tiene la sensación de que es otra la persona que lo ha hecho o de que se ha apropiado del ser de otra persona y solo así puede actuar. El tiempo pasa lentamente. Siempre gimiendo, quejándose, preocupándose, irritándose. Mala memoria, carácter variable. Deprimido al despertar. Irritable. Todo se vé por el lado triste. Humor alternante. Sensación de que caerá hacia adelante, lo que teme grandemente. Las cosas parecen irreales. Rie y habla entre paroxismos y espasmos. Se mofa o desprecia todo. Gruñón. Tendencia suicida al ver un cuchillo o sangre.

CABEZA:

Vértigo < por hablar, cerrar o abrir los ojos, antes del desayuno. Vértigo; con destellos blancos delante de los ojos, cuando los ojos de pronto pierden su foco; tiene que esperar para que la visión se normalice, > restregándose los ojos. Punzadas violentas en el cerebro con náusea. Cefalea como si se

estuviera suspendido por los cabellos. Caída del cabello; el cráneo pica y está adormecido. Cefalea > permaneciendo quieto en la cama. Pelo seco.

OJOS:

Estrellas blancas delante de los ojos con vértigo. Párpados; débiles, caídos, engrosados, secos, ardientes, punzantes. Estrabismo < durante la dentición. Los objetos se ven amarillos. Ojos; inflamados, ardientes; aglutinación por la noche, lagrimeo durante el día. Los ojos se sienten fríos.

OIDOS:

Calor y enrojecimiento de un oído. El tubo eustaquiano parece estar obstruido. Crujidos y zumbidos en los oídos cuando se mastica o se deglute.

NARIZ:

Alas inflamadas y rojas. Punta de la nariz agrietada. Escamas con moco amarillo y grueso.

CARA:

Parece anciano; arrugada. Como con una telaraña o clara de huevo que cubriera la cara. Ampollas con sangre y espinillas. Torcimiento espasmódico e involuntario de la mandíbula inferior. La coyuntura maxilar se siente rígida al masticar o abrir la boca.

BOCA:

Olor mohoso y fétido. Dientes; se sienten largos; dolor que se extiende a otras partes más bajas como la laringe, cuello, hombros. La boca se siente seca con incremento de saliva. Lengua picante con comezón.

GARGANTA:

Seca, se siente llena de astillas constreñida, el alimento no puede pasar. Garganta inflamada por comer cebollas. Inclinación constante a aclarar la garganta. La úvula cuelga. Deglución dolorosa, < por sólidos > por tragar en vacío, o bebidas tibias. Rigidez desde la faringe hacia el estómago como si la comida no pudiera pasar; puede deglutir pero sólo unas cuantas migajas a la vez. Garganta inflamada de los clérigos. Siente alimento que llena totalmente el esófago.

ESTOMAGO:

Apetito anormal; por alimentos burdos; yeso; carbón; comida seca, trapos limpios, té o asientos de café, frutas, vegetales, arroz seco y cosas indigestas. Constricción del esófago. El dolor dura hasta 3 horas después de los alimentos. Niños con estómagos grandes. Aversión a las papas (patatas), a la carne, que desagrada.

ABDOMEN:

Problemas abdominales del lado izquierdo. Presión en ambas ingles, hacia los órganos sexuales. Dolores del recto al tobillo. Recto inactivo, aún la evacuación más suave, pasa con dificultad, las evacuaciones duras causan heridas severas. Evacuaciones de bolitas, duras, nudosas o de coágulos de sangre brillante. La evacuación es precedida por una urgencia dolorosa, mucho antes de evacuar, luego estreñimiento. Contipación; de lactantes; ancianos y mujeres de hábitos sedentarios. Puede pasar evacuaciones sólo estando de pie.

URINARIO:

Músculos de la vejiga paréticos debe hacer esfuerzo para defecar, para poder orinar. Dolores renales < por bailar. Deseo frecuente de orinar en los ancianos; flujo lento. Temor de mojar la cama. Retención con goteo. Dolor vivo al orinar. Sensación de debilidad en vejiga y genitales.

HOMBRES:

Deseo sexual incrementado. Prurito voluptuoso o picoteo en genitales. Emisión involuntaria; al forzar la evacuación, seguido por síntomas antiguos. Dolor en el perineo durante el coito o mientras la erección continúa. Priapismo por la noche.

MUJERES:

Reglas adelantadas, cortas, escasas, pálidas seguidas por gran fatiga. Leucorrea; acre, profusa, corre hacia los pies < durante el día; antes de las reglas > por bañarse con agua fría. Dolor intolerable en bajo vientre. Los pezones dan comezón, arden, se ven irritados (durante el embarazo) Comezón y picoteos en los genitales; con deseo muy fuerte de abrazar. Le toma mucho tiempo a una mujer recuperarse de un período menstrual al siguiente.

RESPIRATORIO:

Tos, constante, seca, carraspeo que interrumpe la respiración, con estornudos; < después de caminar por la mañana; por úvula elongada; por condimentos, o comiendo alimentos irritantes, hablando o cantando. Pérdida súbita de la voz; por resfriarse. El pecho se siente constreñido, < sentándose o doblándose. Inflamación del pecho; por hablar; o levantar algo.

CORAZON:

Palpitaciones o shocks en el corazón. Despierta a las 4 o 5 a.m. con ansiedad en el corazón > por levantarse.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la espalda, como si se introdujeran hierros calientes a lo largo de la espina baja. Punzadas violentas en la espalda. La espalda se siente amarrada por una cuerda.

EXTREMIDADES:

Dolor en los brazos y los dedos, como si penetrara un hierro caliente. Brazos; se sienten pesados, como paralizados; cortos; al ir a dormir. Extremidades inferiores pesadas. Paso tambaleante. Las piernas se sienten dormidas, especialmente cuando se sienta con las piernas cruzadas. Los talones se sienten adormecidos, al caminar. Precipitación. Ataxia locomotriz. Uñas quebradizas y gruesas. Uñas roídas. Incapacidad para caminar excepto cuando los ojos están abiertos o durante el día. Tambaleo si se tienen los ojos cerrados. Plantas; dolorosas, por caminar, como si estuvieran muy suaves; calambres al cruzar las piernas. Los huesos se sienten apretados.

PIEL:

Prurito intolerable al calentarse en la cama. Piel seca, áspera, agrietada. Comezón, ardor sobre el lugar del dolor. Debe rascarse hasta que sangra. Eczema. La más pequeña herida en la piel duele y se inflama. Síntomas en la piel < en invierno, luna nueva o llena.

SUEÑO:

Ansioso, inquieto, con sueños confusos; sobre ladrones, fantasmas o embarcaciones que se hundan.

FIEBRE:

Escalofrío > al aire libre. Calor con comezón.

COMPLEMENTARIO:

Bry.

RELACIONES:

Bry; Plb.

ALUMINA SILICATA

GENERALIDADES:

Afecta el cordón espinal. La constricción es un marcado síntoma general. Constricción de orificios. Comezón y adolorimiento de la espina. Hormigueo, adormecimiento y dolor en las extremidades. Convulsiones epileptiformes. Frío durante los dolores.

AGRAVACION:

Aire frío; después de comer; por permanecer de pie.

MEJORIA:

Calor; comiendo; descansando en la cama.

AMBRA GRISEA

GENERALIDADES:

Afecta los Nervios causando nerviosismo, crispaduras y espasmos. Se adapta a; sujetos histéricos; mujeres delgadas huesudas, pacientes debilitados por la edad o el exceso de trabajo; a los ancianos con deterioro de todas sus funciones. Los pacientes están desgastados, pero sobre-impresionados. Choque debido a fracaso de negocios o debido a una muerte tras otra de seres queridos. Debilidad de la parte superior del cuerpo con temblor de la parte baja. Cosas ligeras o inusuales < la respiración, < el corazón, inician las reglas, etc. Incomodidades de un solo lado del cuerpo. Síntomas que repentinamente cambian de lugar. Sensación de frialdad, entumecimiento, en puntos, o en lugares

aislados, dedos, brazos, etc. con espasmo. Prurito, temblor y ebullición. Pulsación general. Entumecimiento y torpor del cuerpo entero, especialmente por la mañana. Frialdad del cuerpo con espasmo. Efectos por choques domésticos, preocupaciones de negocios. Pérdida de parientes cercanos. Ilusiones. Jovencitas de la sociedad moderna.

AGRAVACION:

Música. Presencia de otros. Vergüenza. Agitación; preocupación; pensando en ello. Sobrepeso. Por cualquier cosa desusual. Por la mañana. Calor. Leche tibia.

MEJORIA:

Movimiento lento, al aire libre. Permaneciendo sobre partes dolorosas. Bebidas frías.

MENTE:

Memoria deteriorada; comprensión lenta. Soñador. Ideas volátiles o fantasías fijas y desagradables. Imagina caras diabólicas, las ve. Melancolía; se sienta por días llorando. Retrasado. Jovenes de la sociedad moderna; frívolas, de conversación superficial y vana. Pavor de la gente. Deseo de estar sólo. No puede entender lo que lee. Triste. Tímido; se sonroja con facilidad. Escuchar a otros cuando platican o cuando habla él mismo, lo afecta. El tiempo pasa con lentitud. Aversión a reír. Salta de un asunto a otro, nunca espera oír la contestación a lo que ha preguntado. La música le causa llanto y temblor.

CABEZA:

Vértigo; senil, con debilidad en cabeza y estómago. Dolor rasgante en la parte superior del cerebro. El cerebro se siente suelto, como que se va a caer para el lado donde está acostado. El pelo se cae. Confusión en el occipucio, también sensación de que está torcido. Cefalea < por limpiarse la nariz.

OJOS:

Punzadas en los párpados como si se estuviera formando una perrilla. Párpados; pesados, no puede abrirlos aunque esté despierto. Manchas que vuelan ante los ojos después de coser.

OIDOS:

Dureza para oír, con sensación fría en el abdomen. Sordera en uno, rumor y silbidos en el otro.

NARIZ:

Sangra mientras se lava la cara en la mañana. Epistaxis; durante las reglas. Obstrucción principalmente por la noche, debe respirar por la boca, con coriza crónica.

CARA:

Espasmo de los músculos de la cara. Calambres en los labios; labios calientes. Mejilla izquierda roja. Bochornos en la cara, color ictérico. Mirada vergonzante. Tétanos del recién nacido.

BOCA:

Sangrado profuso de las encías; aliento ofensivo. Ránula. Boca agria < después de la leche. Salivación con tos.

GARGANTA:

Sensación de bulto en la garganta, con dificultad para tragar. Irritada, ulcerada por exposición al aire < por movimiento de la lengua.

ESTOMAGO:

Después de comer; tos y deseos de bostezar y sensación de que la comida no va al estómago. Eructos con tos violenta y convulsiva. Agruras por beber leche. Distensión del estómago, después de medianoche. Ausencia de sed.

ABDOMEN:

Flatulencia, no puede orinar y defecar en presencia de otros; < durante el embarazo. Sensación de frialdad en el abdomen. Constipación durante el embarazo y después del parto. Dolorimiento en un punto pequeño en la región del hígado > presión. Gran flujo de sangre con evacuaciones. Sudor en el abdomen y muslos. Urgencia frecuente e inútil de evacuar.

URINARIO:

Dolor en la vejiga y recto al mismo tiempo. No puede orinar en presencia de otros. Sensación en la uretra como de gotas que pasaran. Orina; turbia aún durante la emisión, formando un sedimento café. Orina más de lo que bebe. Orina ácida, durante la tosferina. Ardor, dolor agudo, comezón en vulva durante la micción.

HOMBRES:

Excitación voluptuosa en genitales, así como prurito. Partes entumecidas externamente; arden internamente. Erecciones sin sensación voluptuosa. Impotencia.

MUJERES:

Prurito en partes pudendas con enrojecimiento e inflamación. Prurito en los labios. Descarga de sangre entre períodos, en pequeños accidentes, después de evacuaciones duras, caminando un poco más, etc. Leucorrea de moco azuloso; profusa < por la noche. Deseo sexual incrementado. Permanecer acostado < síntomas uterinos. Reglas muy adelantadas y profusas.

RESPIRATORIO:

Respiración asmática; en ancianos; < por el coito. Tos hueca, espasmódica, viene de la parte más profunda del pecho, luego eructos. Expectoración azulosa, blanca. Tos; < música; en presencia de mucha gente; hablando, leyendo en voz alta, levantando un peso. Pérdida de aliento por la tos. Tos con emaciación.

CORAZON:

Palpitación con presión en el pecho como por un bulto atorado; o como si el pecho estuviese obstruido. Palpitación con cara pálida. Ansiedad en el corazón.

EXTREMIDADES:

Calambres en las manos y los dedos < agarrando algo. La pierna izquierda se vuelve completamente azul, durante las reglas. Torción de miembros, con frialdad del cuerpo, durante el sueño. Calambres, en piernas y pantorrillas. Las extremidades se entumen con facilidad. Uñas de los dedos quebradizas. Tira lo que lleva en las manos. Frialdad en la mano izquierda con cefalea. Ulceración y enrojecimiento entre los muslos.

SUEÑO:

No puede dormir por la preocupación, debe levantarse. Se acuesta cansado, desvelado en cuanto toca la almohada.

PIEL:

Comezón y enrojecimiento especialmente cerca de los genitales.

FIEBRE:

Frecuentes bochornos de calor a intervalos cortos. Sudoración al menor ejercicio especialmente en abdomen y muslos.

RELACIONES:

Bar-c; Ign.

AMBROSIA

GENERALIDADES:

Un remedio para la fiebre del heno, con lagrimeo y prurito intolerable en los párpados. Sangramiento nasal. Sensación de atascamiento en la nariz y la cabeza.

RELACIONES:

Ars-io; Saba.

AMMONIUM BROMATUM

GENERALIDADES:

Está indicado en catarro laríngeo y faríngeo. Tos súbita estrangulante y sofocante. Sensación de sofoco antes de la epilepsia. Sensación irritante en las uñas de los dedos > por mordérselas.

AMMONIUM CARBONICUM

GENERALIDADES:

Afecta al Corazón; circulación y sangre. El corazón se vuelve débil, colapso. La circulación se vuelve lenta y la baja oxigenación de la sangre produce Palidez, Debilidad y amodorramiento. La Vitalidad se vuelve baja y hay falta de reacción. Se adapta a pacientes gordos, con corazón débil, con sensación de sofoco y resuello; a mujeres corpulentas que siempre están cansadas y aburridas, se resfrían con facilidad y sufren de síntomas similares al cólera antes de las reglas; y que llevan una vida sedentaria. Muy sensible al aire frío. Gran aversión al agua, no soportan ni siquiera tocarla. Pesadez en todos los órganos. Suciedad en hábitos corporales. Los dolores son magullantes y penosos. Hay un ardor ulceroso interior. Las descargas son calientes, acres, adherentes. Hemorragias, oscuras, delgadas. Malignidad. Postración por minucias. Estados escorbúticos. Ancianos. Permanece acostado por debilidad o adolorimiento del cuerpo entero. Malos efectos de emanaciones de carbón.

AGRAVACION:

Frío; Días Nublados. Frío Húmedo. Al aire libre frío y crudo. Al quedarse dormido; 3-4 a.m. Durante las reglas. Movimiento. Masticar. Presionando los dientes. Doblándose hacia abajo. Luna nueva.

MEJORIA:

Presión; comiendo; por permanecer sobre el abdomen. Tiempo seco. Acostándose sobre el lado derecho.

MENTE:

Activa, pero pronto exhausta. Olvidadizo. Mal-humorado, pesimista; durante las tormentas. Desatento e ingobernable. Deprimido con debilidad del intelecto. Mente vacía. Pérdida de la memoria < por vejación. Oyendo a otros que hablan u oyéndose asimismo hablar lo afecta. Aversión al trabajo. Displaciente, agitado, como si se hubiera cometido un crimen. Disposición a llorar. Tendencia a cometer errores al hablar, escribir y calcular.

CABEZA:

Choques a través de la cabeza, ojos, oídos y nariz al morder. Cefalea violenta; llena, estallante en la frente. El cerebro parece estar suelto.

OJOS:

Ardientes y secos. El uso prolongado de los ojos causa astenopía; con aparición de manchas amarillas al mirar objetos blancos. Flujo de lágrimas. Grandes manchas negras flotan después de coser. Dolor en los ojos > por un sueño en la tarde.

OIDOS:

Dureza de oído. Comezón arriba de los oídos y se esparce al cuerpo entero. Inflamación dura de las glándulas parótidas y cervicales.

NARIZ:

Obstrucción nasal, por la noche, con coriza larga y continua, debe respirar a través de la boca. Estornudos de los niños. Sangramiento nasal; si las manos o la cara se lavan, después de comer o al caminar. Necesidad continua de estornudar. Coriza profusa y acuosa. Catarro que se inicia en la nariz. Forúnculo en la punta. Inhabilidad para sonarse la nariz en niños.

CARA:

Forúnculos y pústulas durante las reglas. Las comisuras labiales están enrojecidas, agrietadas y ardientes. Grietas y ardor en los labios. Inflamación dura de la mejilla.

BOCA:

Encías dolorosas y sangrantes . La presión de los dientes envía un sacudida eléctrica a través de la cabeza, ojos, oídos y nariz. Lengua y garganta seca. Dientes flojos o despuntados. Vesículas en la lengua. Ardor, que impide comer y hablar. Dientes doloridos, durante las reglas. Inflamación interna de las mejillas.

GARGANTA:

Amígdalas crecidas, así como las glándulas del cuello. Ulceración gangrenosa de las amígdalas. Difteria, cuando la nariz se obstruye, la membrana se extiende al labio superior.

ESTOMAGO:

Dolor en el hueco del estómago, con agruras, náusea, salivación y calosfrío. Dispepsia flatulenta. Apetito prontamente saciado.

ABDOMEN:

Hemorroides sangrantes < durante las reglas. Descarga de sangre antes y después de las evacuaciones. Hemorroides procliventes < después de evacuar o sin hacerlo > acostándose, no puede caminar. Diarrea obscura y acre. Cólico con dolor entre las escápulas. Constipación; evacuaciones duras y secas.

URINARIO:

Deseo frecuente. Orina; blanca, sanguinolenta, arenosa, copiosa, turbia y fétida. Micción involuntaria, hacia la mañana.

HOMBRES:

Erección persistente, sin deseo o violento deseo sexual sin erección. Emisiones seminales frecuentes después del coito.

MUJERES:

Síntomas tipo cólera sin reglas. Reglas; demasiado frecuentes, profusas, tempranas, con coágulos, negras, con dolores cólicos y evacuaciones difíciles y duras, con fatiga, especialmente de muslos. Bostezos y escalofríos. Las reglas fluyen más por la noche, luego disnea o debilidad. Leucorrea copiosa, ardiente, acre, acuosa. Irritación del clítoris.

RESPIRATORIO:

Dificultad incrementada para respirar, lo despierta, > por el aire fresco. Mucha opresión al respirar < con cada esfuerzo, entrando a un cuarto caliente. Enfisema. Estertores en el pecho, pero expectora poco. Ronquera. Edema pulmonar. Tos, después de influenza. Congestión hipostática de los pulmones. Expectoración; de pura sangre, después de toser.

CORAZON:

Débil. Despierta con respiración difícil y palpitación. Palpitación; audible con miedo, sudor frío y lagrimeo, inhabilidad para hablar y manos temblorosas. Angina de Pecho. Corazón débil que causa éstasis.

EXTREMIDADES:

Las partes que descansan se entumen. Calambres, en las pantorrillas y plantas del pié. Dedos y manos hinchadas, cuando los brazos cuelgan. Inclinación a estirar las extremidades. Panadizos. Dolores rasgantes > por el calor del lecho. Pie derecho entumecido. Ganglión. Dolorimiento en los huesos > por cambio de tiempo. Brazo derecho pesado y débil.

PIEL:

Piel roja o moteada. Erisipela; en ancianos. Escarlatina maligna.

SUEÑO:

Somnolencia durante el día. Despierta con sensación de estrangulamiento. Entre más temprano vaya a la cama, mejor duerme.

FIEBRE:

Frialdad. Sudor ardiente con sed.

RELACIONES:

Ant-t; Carb-v; Glo; Lach; Mur-ac.

AMMONIUM MURIATICUM

GENERALIDADES:

Afecta las Membranas Mucosas incrementando su secreción pero reteniéndola especialmente en el Pecho y conductos biliares. Causando circulación irregular, la sangre parece estar en disturbio constante, causando ebullición, ardores y pulsación localizada. Muchos grupos de síntomas; se acompañan de tos o Profusas descargas de moco; con problemas hepáticos. Tensión y rigidez, como si los músculos y tendones estuviesen demasiado cortos. En las ingles, glúteos, región lumbar, etc. Causa ulceración, o dolores ulcerativos o enconados. Dolores neurálgicos en muñones de miembros amputados. Hemorragias. Sensación de hervor. Se adapta a pacientes gordos, fofos y perezosos, con miembros delgados, que siempre se sienten cansados y adoloridos. Efectos de una pena.

AGRAVACION:

Por la mañana - síntomas de pecho y cabeza. Por la tarde - síntomas abdominales. Por la noche - piel, fiebre y síntomas en las extremidades. Torceduras crónicas. Caminando erecto. Periódicamente. Por la madrugada de 2 a 4 a.m.

MEJORIA:

Al aire libre. Por movimiento rápido; caminando encorvado.

MENTE:

Deseo de llorar, pero no puede. Aversión involuntaria a ciertas personas. Melancolía y aprensión; como por una pena interna. Parálisis cerebral.

CABEZA:

Pesadez en la frente; dolor presivo hacia la raíz de la nariz, con una sensación como si el cerebro estuviese desgarrado. Caída del cabello, con comezón y caspa.

OJOS:

Niebla delante de los ojos en luz brillante. Moscas voladoras, manchas amarillas delante de los ojos. Catarata incipiente, catarata capsular.

NARIZ:

Coriza acre, caliente y líquida; obturando un poro. Pérdida del olfato. Sensación de taponamiento obstructivo; con deseo de destaparlo. Como con un cuerpo áspero que obstruye los poros superiores. Nariz dolorida al contacto. Estornudos; la despierta de su sueño; con dolor tirante desde la base del cuello hasta los hombros. Coriza en niños, con descarga azulosa.

CARA:

Pálida. Labios ardiente como con fuego. Labios secos, agrietados y marchitos, debe humedecerlos con la lengua. Erupción ardiente que > con aplicaciones frías.

BOCA:

Delgada. Ampollas ardientes en la punta de la lengua.

GARGANTA:

Angosta. Latidos e inflamación en las amígdalas. Inflamación interna y externa de la garganta, con moco pegajoso. Estrechamiento del esófago.

ESTOMAGO:

Sed por limonada. Náusea con salivación amarga, < comiendo, con estremecimiento. Ardor mordiente, punzante en el estómago que se extiende a la axila dercha y parte superior del brazo . Cáncer del estómago. Sensación de vacío, pero no hay deseo de comer nada. Diarrea y vómito durante las reglas.

ABDOMEN:

Punzadas en el bazo, al comer, con dificultad para respirar. Tos con síntomas hepáticos. Depósitos excesivos de grasa alrededor del abdomen. Evacuaciones escasas, duras, cambiantes de color y consistencia. Sangre del ano, o diarrea durante las reglas. Hemorroides, después de leucorrea suprimida. Ardor en el recto, durante y por horas, después de evacuar. Sensación de tensión rígida en las ingles; debe caminar doblado. Las ingles se sienten inflamadas y doloridas.

URINARIO:

Micción frecuente y profusa. Urgencia, y sin embargo sólo unas gotas pasan, hasta la siguiente evacuación que es cuando descarga libremente. Orina profusa y de olor amoniacal.

MUJERES:

Reglas tempranas con dolor en el abdomen y parte baja de la espalda; fluye más por la noche. Prolapso del útero. Leucorrea como de clara de huevo, con dolor cerca el ombligo < después de cada micción.

RESPIRATORIO:

Ronquera y ardor de la laringe. Tos con salivación profusa o con síntomas hepáticos. No puede respirar por la tos. Moco ruidoso, estertoroso y tenaz en el pecho. Latidos, puntos ardientes en el pecho. Tos < por permanecer sobre la espalda o el lado derecho.

CUELLO Y ESPALDA:

Glándulas cervicales hinchadas. Torcedura dolorosa o frialdad de hielo entre las escápulas, no mejorada por el calor. Lumbago. Dolor magullante en el coccix al sentarse. Inflamación gras-osa de la nuca que se extiende de una a otra oreja.

EXTREMIDADES:

Sensación de torcedura tensa en las ingles, debe caminar encorvado. Contracción de los tendones en los glúteos. Ciática (I) < sentándose, > acostado. Dolor de ulceración en la punta de los dedos. Dolor y/o úlcera en los talones. Dolor en los pies durante las reglas. Dolor tirante en la escápula < por respirar. Nalgas grandes. Ligamentos de la pierna como muy cortos, dolor al caminar.

SUEÑO:

Sueños eróticos. Dolores ansiosos y amenazantes. Despierta de su sueño.

PIEL:

Erupciones sangrantes. Despellejamiento entre los dedos y muñecas. Prurito en varias partes del cuerpo, especialmente por la noche.

FIEBRE:

Escalofrío tan pronto como se despierta. Sensación de calor; > al aire libre, alternando con escalofrío. Escalofrío por la tarde después de haber estado acostado. Sudor nocturno profuso. Suda con cada movimiento.

RELACIONES:

Cal; Caust; Seneg.

AMYL NITROSUM

GENERALIDADES:

Los nervios vaso-motores se ven afectados por Amy. Nit., causando dilatación de las arteriolas y los capilares, por lo que hay bochorno en la cara, con calor y pulsaciones en la cabeza. Calores bochornosos; seguidos de sudores copiosos (unilaterales) son síntomas marcados. Venas cerebrales dilatadas. Bocio exoftálmico por penas. Inconciencia, con inhabilidad para deglutir. Latidos especialmente en la cabeza. Débil, emaciado, con paso vacilante, inclinado a irse hacia un lado al caminar. No puede sentarse quieto.

AGRAVACION:

Climaterio. Causas simples. Emociones. Calor. Cuarto cerrado.

MEJORIA:

Al aire libre, por ejercitarse en. Agua fría.

MENTE:

Ansiedad, como si algo fuera a suceder; debe tener aire fresco.

CABEZA:

Aflujo de sangre a la cabeza; con cara de rojo intenso. Migraña con palidez.

CARA:

Rubor fácil o coloración de la cara, por la más ligera emoción. Movimiento de masticación de la mandíbula inferior. Chasquido de los labios como en el acto de paladear.

GARGANTA:

Sensación de estrangulamiento en la garganta; el cuello parece muy apretado.

ESTOMAGO:

Hipo con bostezo y estiramiento.

MUJERES:

Hemorragias, con rubores faciales. Neuralgia durante las reglas. Bochornos climatéricos, con dolor de cabeza, ansiedad y palpitación. Convulsión inmediatamente después del parto.

PECHO:

Dolor y constricción alderredor del corazón. Palpitación del corazón a la menor excitación. Palpitación tumultuosa. Angina de Pecho con gran ansiedad. Pulso lleno y suave. Dolorimiento en la parte posterior de la costilla flotante izquierda.

SUEÑO:

Bostezo constante en coma. Bosteza profunda y repetidamente. Se estira casi constantemente, es casi imposible satisfacer este deseo. Estiramiento y bostezo con hipo.

FIEBRE:

Sudor anormal después de la influenza.

RELACIONES:

Glo; Lach.

ANACARDIUM

GENERALIDADES:

Los pacientes Anac. son neurasténicos. Se afecta la Mente, nervios, músculos y articulaciones. Hay una Falta de Poder física y mental. Sentidos especiales débiles, vista, oído, tacto, etc. Sensación de un tapón en varias partes; o como una Presión Sorda que se repite de tiempo en tiempo. Sensación como de una banda o aro. Intermitencia en los síntomas. Miedo a los exámenes en los estudiantes. Temblor; al menor ejercicio, < rodillas y brazos. Condición paralítica. Quiere sentarse o acostarse continuamente. El comer mejora temporalmente sus síntomas. Fatiga nerviosa por exceso de estudio. Paresis de músculos sujetos a la voluntad. Tendones lastimados. Articulaciones contraídas. Ancianos. Niños de naturaleza enfermiza. Mujeres nerviosas e histéricas. Enfermedades del cordón espinal. Pesadez y plenitud de todo el cuerpo después de tocar piano.

AGRAVACION:

Por Ejercicio Mental. Emociones. Ira. Susto. Ansiedad. Mortificación. Por dar pasos fuertes. Movimiento. Corrientes de aire, al aire libre y frío. Mucho después de comer. Por frotarse. Rascarse. Hablar. Mañana. De la tarde hasta la medianoche. Erupciones suprimidas. Olores fuertes.

MEJORIA:

Por comer. Acostándose de lado. Masaje. Calor; baño caliente. En el sol.

MENTE.

Ideas fijas; piensa que está poseído por dos personas o dos voluntades. Ilusión de dualidad, que otros están presentes; detrás de ella., etc. Que su esposo no es su esposo, sus hijos no son de ella. No hay realidad en nada, todo pasa como en un sueño. Todo lo vuelve problemático. Plática sin sentido. Grita fuerte; como si llamara a alguien. Manía religiosa. Mala Memoria. De pronto olvida los nombres, aquellos que están a su derredor, o lo que ha visto. Aversión a trabajar, Falta de autoconfianza. Deseo

de jurar y maldecir. Miedo a la parálisis. Desesperanza de aliviarse. Impulsos contradictorios- se ríe de cosas serias y permanece serio cuando algo risible ocurre. Cobarde. Indeciso. En contra de sí mismo. Melancolía. Malvado. Profano. Habla mal de todo. Distraído; como en sueños. Clariaudiente- oye voces de lejos, de muertos. Tendencia suicida disparándose. Ve la cara de todos en el espejo, menos la de él. Duro de corazón, cruel. Duda; con frecuencia no hace nada. Insociable. Neurótico. Suspica. Se ofende fácilmente. Demencia senil. Se resiste a comer por temor a ser envenenado.

CABEZA:

Vértigo < por caminar; agachándose y levantándose después de agacharse; los objetos le parecen distantes. Dolor presivo como por un tapón; en las sienas; occipucio; frente y vértice, > durante las reglas; al dormirse; < por toser, por respirar profundamente. Comezón y pequeñas ampollas en el cuero cabelludo. Cefaleas gástricas y nerviosas. Cefalea por olores fuertes.

OJOS:

Dolor presivo como de un tapón en la órbita superior. Líneas y puntos negros delante de los ojos. Los objetos parecen muy lejanos. Visión imprecisa. Vista corta.

OIDOS:

Dureza de oído. Dolor presivo como de un tapón. Imagina que le susurran al oído.

NARIZ:

Sentido del olfato; pervertido; perdido o agudo. Olores ilusorios. Estornudos frecuentes, seguidos de coriza y lagrimeo. Coriza violenta con palpitación, especialmente en ancianos.

CARA:

Pálida, mirada macilenta. Círculos azules alderredor de los ojos. Eczema de la cara y cuello. Inexpresiva, salvaje, infantil.

BOCA:

Mal aliento y gusto. Vesículas dolorosas en la boca. La lengua se siente hinchada y rígida- impidiendo hablar y moverla; con mucha saliva en la boca. Ausencia de gusto.

ESTOMAGO:

Sensación de vacío en el estómago. Digestión débil. La respiración se corta al comer o beber. Dolor gástrico > por comer, pero < otra vez después de 2 o 3 horas. Bebe de prisa y traga la comida. Vómito >. Pérdida del apetito, alternando con hambre violenta.

ABDOMEN:

Dolor como si un tapón sordo estuviera presionando en el intestino. Dureza del abdomen. Cólico flatulento, con ruido, picoteo y retortijón. El recto se siente obstruido y sin fuerza; no puede evacuar ni siquiera excremento suave. Deseo inefectivo. Prurito del ano; humedad del recto.

URINARIO:

Descarga frecuente y de orina líquida y clara; depósitos turbios, de sedimento color ladrillo. Sensación de ardor en el glande durante y después de la micción.

HOMBRES:

Comezón voluptuosa del escroto, que excita el deseo sexual. Emisiones seminales sin sueños. Descarga prostática durante la evacuación. Gozo ausente.

MUJERES:

Leucorrea, con prurito y excoriación de las partes. Reglas frecuentes pero escasas; con dolor espasmódico en el abdomen. Náusea durante el embarazo > por comer.

RESPIRATORIO:

La respiración se para al toser o tragar. Tos, excitada por hablar, después de comer con vómito de alimento, dolor en el occipucio; en niños, después de un coraje. Tose, luego bostezo y se duerme. Asma, histérica, termina con flujo de lágrimas.

CORAZON:

Punzada doble en el corazón, que se va a la región lumbar. Palpitación con coriza, en ancianos.

CUELLO Y ESPALDA:

Presión sorda o como con una carga pesada en los hombros. Rigidez, de la nuca y el cuello; hacia abajo, y dolor < por el movimiento.

EXTREMIDADES:

Neuralgia del pulgar. Las rodillas se sienten paralizadas o vendadas. Manos secas. Calambres en las pantorrillas < por caminar o levantándose del asiento. Dolor en el tobillo, como si estuviera torcido < caminando. Golpeteo doloroso en la parte media superior del brazo (I). Calambres; desde el dedo hasta el empeine; desde el talón hacia la pantorrilla. Verrugas en las palmas y las manos. Calambre de los escritores.

SUEÑO:

Conatos de insomnio, que duran varias noches. Sueños ansiosos.

PIEL:

Piel sensible; prurito < rascándose. Dermatitis. Eczema, neurótico. Vesículas amarillas. Verrugas en palmas y manos. Urticaria. Promueve la expulsión de astillas.

FIEBRE:

Fácilmente calosfriado > a la luz del sol. Sudor pegajoso en las palmas, especialmente la izquierda. Calor desde las 4 p.m. hasta la noche, se pasa hasta después de la cena.

RELACIONES:

Ign; Lyc; Plat; Rhus-t.

ANTHRACINUM

GENERALIDADES:

Este nosode es un remedio valioso en inflamaciones malignas o sépticas del tejido conectivo o celular. Produce ampollas o erupciones como ampollas; carbúnculos; úlceras malignas; abscesos; bubones, donde hay un foco purulento. Hemorragias; son espesas, negras, como el alquitrán, por cualquier orificio. Glándulas inflamadas; tejido celular edematoso e indurado. Hay un ardor terrible con gran postración. Ampollas negras y azules. Gangrena, heridas durante una disección. Malos efectos por inhalar olores fétidos. Absceso del tabique. Esquinencia. Ampollas frecuentes. Hinchazón con dureza de piedra en la mandíbula inferior izquierda y glándula submaxilar.

RELACIONES:

Ars; Tarn-c.

ANTIMONIUM CRUDUM

GENERALIDADES:

La opción por este remedio está determinada por los síntomas que se desarrollan en la esfera mental y gástrica. Como lo indica la última palabra que su nombre implica, el paciente de Ant-c es crudo mental y físicamente. El paciente es un Comedor grueso - un glotón: come más allá de su capacidad digestiva o sin discriminación; así que sus síntomas mentales y de piel se deben a Perturbaciones Gastro-Intestinales. Produce efectos pesados; las evacuaciones son acuosas, conteniendo grumos grandes; la leucorrea es líquida, mezclada con grumos gruesos; protuberancias que aparecen sobre la piel; uñas que se vuelven gruesas, deformadas y abultadas. Hay una tendencia a formar grietas - en los bordes; las alas nasales, los ángulos de la boca. Mentalmente el paciente es sentimental, especialmente a la luz de la luna y el crepúsculo, durante la diarrea y antes de las reglas; o malhumorado y sensible. Produce una extraña ausencia de dolor, donde podría esperarse, por ejemplo por úlceras por la cama. Es adecuado para infantes y niños; también para ancianos y personas jóvenes con tendencia a engordar. Cuando un grupo de síntomas aparecen, tienden a cambiar de lugar o ir de un lado a otro; aparecen cada cinco, seis o doce semanas. La gota desaparece y el estómago se afecta. Síntomas nerviosos tales como la inquietud, espasmos en los músculos y disposición a despertar por el ruido más ligero, también están presentes. Malos efectos por desilusión amorosa y supresión de erupciones. Enfermedades crónicas que tienen su origen en una supresión de erupciones o úlceras. Anasarca. Marasmo. Problemas por nadar o caer en el agua. Artritis reumatoide. Siempre está somnoliento y cansado.

AGRAVACION:

Por Baño Frío; Humedad fría; Agua Fría (en la cabeza). Ácidos. Dulces. A la luz de la luna. Levantándose. Ascendiendo escaleras. Contacto. Calor del Verano, del sol. Calor radiado. Sobrecalentamiento. Excesos nocturnos, después de embriagarse. Vinagre. Puerco. (Cerdo).

MEJORIA:

Al aire libre; durante el descanso; humedad tibia. Estando acostado.

MENTE:

Gran ansiedad sobre su destino; inclinación a pegarse un tiro. Irritable, malhumorado y displaciente; Grita si se le mira o toca o baña, especialmente niños; los adultos están enfurruñados, no quieren hablar con nadie. Aburrimiento; de la vida; de la comida; del baño, etc. Amor extasiado y exaltado. Soñador, sentimental. Molesto por la más pequeña atención. Enfermo de amor. Está tan ocupado que se olvida de orinar y evacuar, come solamente cuando se le pide. Excitabilidad. Mujeres y jóvenes nerviosas e histéricas, que se rinden a la luz suave de ventanas con vitrales. Habla en rimas o versos; taciturno.

CABEZA:

Dolores por bañarse en agua fría o por desórdenes estomacales, < dulces o vinos ácidos, frutas, grasas, ascendiendo escaleras. Tendencia a enfriarse la cabeza. Pesadez en la frente con vértigo, náusea y sangramiento nasal. Prurito de la cabeza, con caída de cabello. Cefalea después de interrumpir una coriza.

OJOS:

Bordes; ulcerados, agrietados, rojos y húmedos. Pústulas en los márgenes de los párpados, blefaritis crónica. Párpados rojos e inflamados. El mirar el fuego causa tos. Enrojecimiento crónico de los ojos en los niños. Fotofobia.

OIDOS:

Tintineo y sordera. Erupciones húmedas alderredor de las orejas. Otorrea. Sordera, como si estuviera vendado o tuviera una hoja dentro.

NARIZ:

Poros costrosos, enrojecidos y agrietados. La nariz sangra después de una cefalea. Eczema de los poros. Sensación de frialdad al inhalar.

CARA:

Cetrina, ojerosa o triste. Barros, pústulas o ampollas en la cara. Erupciones de costras amarillas en las mejillas y la barbilla. Grietas en las comisuras de la boca. Gránulos pequeños, rojos, color miel en la barbilla.

BOCA:

Lengua Con Cubierta Blanca Gruesa. Como Pintada de Blanco. Dolor de dientes en dientes cariados, el dolor se extiende a la cabeza, < tocando el diente con la lengua, > caminando al aire libre. Rechinamiento de dientes cuando se duerme en posición sentada. Ulceras gangrenosas. Dolor de dientes antes de las reglas. Barros alrededor de la boca. Aftas. Encías que sangran fácilmente. Gusto amargo. Salivación con gusto salado.

GARGANTA:

Mucho moco grueso amarillento posterior. Voz ronca por exceso de uso. Ronquera después de un baño con agua fría. Sensación de cuerpo extraño que estuviera atorado, con deseo constante de tragar.

ESTOMAGO.

Pérdida de apetito, con disgusto por la comida. Sin sed. Deseo de ácidos, pepinillos. Eructos con sabor de lo ingerido; la comida deja su sabor o causa constante regurgitación. Digestión que se desordena fácilmente. Vómitos < por comer o beber; sin náusea o alivio. El estómago está dolorido a la presión. Metástasis gotosa al estómago y los intestinos. Salivación dulzona. Hinchazón después de comer. El niño vomita su leche en cuajos, después de mamar, y rehusa volver a hacerlo (lo contrario de Aeth). El apetito no regresa después de una severa enfermedad. Vómito, con miedo, con convulsiones, que nada puede detener. Gran deseo de comer, pero no hay fuerza para hacerlo (niños). El puerco disgusta. El estómago parece estar siempre sobrecargado.

ABDOMEN.

Diarrea, alternando con constipación especialmente en ancianos. Evacuaciones, papescientes o acuosas mezcladas con masas. Hemorroides mucosas- punzantes y ardientes con descarga continua de moco por el ano, y que mancha de amarillo. Proctitis catarral. Plenitud del abdomen. Hemorragia; con excremento sólido, hemorroides. Evacuaciones enteramente mucosas. Diarrea; verano, después de mamar.

URINARIO:

Dolor cortante en la uretra mientras orina. Micción; frecuente, profusa, con ardor y dolor de espalda. Micción involuntaria, al toser. Olor fétido.

HOMBRES:

Atrofia del pene y testículos. Prurito mordiente del escroto con erupciones. Deseo sexual excitado, con inquietud en todo el cuerpo.

MUJERES:

Reglas; suprimidas por baño frío; con sensibilidad de los ovarios, presión en el vientre como si algo se fuera a salir, durante la menstruación. Ninfomanía por reglas suprimidas. Leucorrea, acuosa, conteniendo masas. Náusea, vómito y diarrea, durante el embarazo. Ovarios dolorosos en jóvenes enamoradas.

RESPIRATORIO:

Tos < entrando a un cuarto tibio; con ardor en el pecho. El primer ataque de tos es siempre más severo, los ataques subsecuentes se vuelven más y más débiles. El mirar el fuego < la tos. Dolor en el pecho con calor. Voz; falta de control, áspera; baja de tono > por usarla. Afonía por sobrecalentamiento. Prurito en el pecho. Expectoración de grandes cantidades de moco que agotan al paciente.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor violento en la espalda baja cuando se levanta > caminando. Prurito de cuello y espalda. Cocix pesado.

EXTREMIDADES:

Dolor artrítico en las coyunturas de los dedos. Uñas hendidas y córneas; uñas que crecen despacio; deformadas; crecimiento córneo bajo la uña. Verrugas córneas en manos y plantas. Inflamación dolorosa del tendón de los codos con mucho enrojecimiento y curvatura de los brazos. Codos brillantes. Pies muy sensibles; plantas sensibles al caminar. Callosidades en las plantas. La piel de las plantas está ajadas debido a la sudoración. Debilidad y temblor de las manos al escribir, seguida de flatos ofensivos. Espasmo de los músculos. Sacudida en brazos. Pies lisiados. Crecimiento bajo las uñas.

PIEL:

Eczema con desarreglos gástricos. Tendencia eruptiva de barros, vesículas y pústulas. Urticaria; blanca; con areola roja; prurito salvaje. Erupción sarampionosa. Verrugas córneas. Gangrena seca. Comezón al calor de la cama. Callosidades por la presión más ligera.

SUEÑO:

Somnolencia y debilidad. Ancianos amodorrados. Sueño profundo pero no confortante.

FIEBRE:

Gran calor por poco ejercicio, especialmente al sol. Calor y sed después de sudar. Perturbaciones del estómago durante la apirexia en fiebres intermitentes.

RELACIONES:

Sul.

COMPLEMENTARIO:

Scil.

ANTIMONIUM TARTARICUM

GENERALIDADES:

Hay algo de similaridad en los síntomas de Ant-c y Ant-t especialmente en la esfera mental y digestiva. Ant-t afecta las Membranas Mucosas especialmente Bronquios y Pulmones causando una Gran

Acumulación de Moco con estertores gruesos; así que la respiración se haya impedida y la acción cardíaca se vuelve laboriosa; por lo que aparece una oxigenación defectuosa en la circulación de la sangre. Todas estas condiciones causan cianosis y depresión de la fuerza vital. El paciente se Debilita Paulatinamente, Suda, Se pone Amodorrado y Relajado con Falta de Reacción. Es adecuada en ancianos y niños; sujetos gotosos y alcohólicos, con afecciones gástricas. Temblores de todo el cuerpo, gran postración y desvanecimiento. Sensación de peso en varias partes; cabeza, occipucio, coccix, extremidades. Espasmos convulsivos. Irritabilidad, quejidos y llanto, antes del ataque de la enfermedad. Temblor crónico de la cabeza y las manos (como en parálisis agitante). Escalofríos y contracturas, dolor en los músculos. Edema de la membrana sinovial. Convulsiones cuando las erupciones no aparecen. El niño constantemente quiere ser llevado en brazos levantado sin que lo vean o lo toquen. Indisposiciones en la esfera digestiva. Efectos de cólera y vejación. Postración de mente y cuerpo. Los lactantes dejan el pezón para gritar como si les faltara la respiración. Malos efectos de la vacunación cuando Thuja falla y Silicea no está indicada. Convulsiones en niños si no se les pone atención. Sensación de frialdad en los vasos sanguíneos. El niño se cuelga de su nana o de quién lo atiende.

AGRAVACION:

Calor; cuarto, abrigos, tiempo. Ira. Acostándose. Por la mañana. Exceso de calor. Frío; humedad. Sentándose, estando sentado, levantándose del asiento. Movimiento, Cosas ácidas. Leche.

MEJORIA:

Expectoración. Sentándose derecho. Movimiento. Vómito. Eructos. Acostado sobre el lado derecho.

MENTE:

Miedo de estar solo. Mal Humor. Desanimado. Asustado, por cosas triviales. Delirio musitante. Estúpido al despertar. Apático, o fácilmente molesto, quiere que lo dejen solo. Displiscente; quejumbroso y gemebundo. Desesperanza por su recuperación. Se cuelga de sus cuidadores. Conciencia que mengua al cerrar los ojos. Melancólico; se queja de muchos sufrimientos.

CABEZA:

Sensación de vendaje en la frente. Cabeza caliente y sudorosa. Temblor de la cabeza al toser. Vértigo; con pesadez y confusión; alternando con somnolencia. Como con un bulto en la cabeza. Vértigo por levantar la cabeza de la almohada. Conato de vértigo con centelleo ante los ojos. Cabeza > al aire libre, bañándose con agua fría y por el movimiento. Cabeza doblada hacia atrás.

OJOS:

Ojos semi-cerrados anegados en lágrimas. Mucosidad en los márgenes de los párpados (en la Neumonía). Un ojo cerrado. Erupciones pustulares en la conjuntiva. Moscas voladoras; centelleo delante de los ojos. Ojos brillantes.

NARIZ:

Aguda. Alas dilatadas, negras. Fuelleo de las alas.

CARA:

Enferma, sumida. Pálida, azulosa o crispada, con tos. Cubierta de sudor frío. Temblor incesante de la barbilla y quijada inferior. Labio superior retraído. Ansiosa, desesperada. Pústulas que dejan cicatrices azulosas muy feas.

BOCA:

Aflujo de saliva; durante el embarazo. Lengua; gruesa, pastosa y blanca; muy roja o con franjas rojas; seca en el medio; las papilas se destacan sobre la cubierta blanca. La boca permanece abierta después de bostezar. Gusto; amargo, sin gusto. Lengua; flácida, seca. Impresión de los dientes en el borde de la lengua.

GARGANTA:

Mucho moco en la garganta con respiración corta. Deglución dolorosa o imposible.

ESTOMAGO:

Desea manzanas, frutas o ácidos que no le caen bien. Náusea; viene en oleadas; con debilidad y sudor frío; Disgusto, ansiedad o miedo, seguido por cefalea, con bostezos y lagrimeo y vómito. Vómito forzado, luego fatiga y sueño. Arcadas violentas. Estómago hundido. Vómitos con mucho esfuerzo. Sed por agua fría poca y seguido. Eructos como huevos podridos. Vómitos > acostándose sobre el lado derecho. Aversión por la leche, por toda clase de nutrición. Sin sed.

ABDOMEN:

Se siente como lleno de piedras. Cólico violento con amodorramiento. Diarrea, de enfermedades eruptivas. Evacuaciones -moco, como pasto verde. Dolor en las ingles y hormigueos fríos antes de las reglas. Palpitaciones durante la evacuación.

URINARIO:

Ardor en la uretra durante y después de la micción. La última gota es sanguinolenta, con dolor en la vejiga.

HOMBRES:

Dolor en los testículos después de la supresión de una gonorrea. Orquitis. Verrugas en el glande.

MUJERES:

Leucorrea, de agua sanguinolenta < sentándose. Convulsiones puerperales > después de que el niño nace.

RESPIRATORIO:

Respiración irregular; respiración abdominal. Respiración Corta y Sofocante; antes de la tos o alternando con ella. Parece como si una hojuela cerrara la tráquea. Tos Aspera, Floja, Cascabeleante. El pecho parece estar lleno, sin embargo cada vez expectora menos y menos. Tos seguida de vómito o sueño < por ira. Debe sentarse para respirar o toser. Alternancia de tos y bostezos. Expectoración

gruesa. Asfixia del recién nacido, niño pálido y que no respira al nacer. Parálisis de los pulmones, con edema. Tos y disnea > acostándose sobre el lado derecho, por eructos, < bebidas tibias. Bronquitis capilar; pleuro-neumonía. Enfisema. Sensación de terciopelo en el pecho. El niño se arquea hacia atrás al toser.

CORAZON:

Gran ansiedad precordial, con vómito de moco y bilis. Palpitación con una sensación caliente incómoda. Depresión paralítica del corazón. Pulso débil y rápido. Sensación de frialdad en las venas. Palpitaciones con evacuaciones flojas.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor violento en la región sacro-lumbar, el mínimo esfuerzo por moverse puede causar arcadas y frío, sudor pegajoso < efectuando algún levantamiento. Sensación de una carga pesada que estuviera colgando del cóccix, que se jalara hacia abajo todo el tiempo. Las vértebras parece que se friccionaran unas con otras.

EXTREMIDADES:

Temblor de las manos. Puntas de los dedos heladas, o como muertas, dormidas, secas y duras. Brazos inquietos. Los pies se entumen al sentarse. Edema de las piernas; de la articulación de la rodilla (izquierda). Tensión de los tendones de la pierna cuando camina. Sinovitis. Coyunturas hinchadas. Espasmo de las extremidades durante el sueño, con evacuaciones flojas.

PIEL:

Erupción pustular que deja marcas rojo azulosas. Erupciones gruesas como cacarañas. Barba sicótica. Viruela. Impétigo. Eruciones retardadas o recesivas. Erupciones azules.

SUEÑO:

Gran amodorramiento; con toda las enfermedades, o por el calor. Bostezo con muchas enfermedades. Temblores al caer dormido. Grita durante el sueño con ojos fijos y temblando. Duerme sobre la espalda con la mano izquierda colocada bajo la cabeza.

FIEBRE:

Sudor Copioso, Pegajoso y Frío. Frialidad, temblor y escalofrío. Sensación ardiente. Calor que viene del corazón. Escalofrío frío antes de las reglas.

COMPLEMENTARIO:

Bar-c; Ip; Op.

RELACIONES:

Aesc; Am-c; Ip; Lob; Op.

APIS MELLIFICA

GENERALIDADES:

Los efectos bien conocidos del piquete de una abeja; dolor ardiente, punzante, penetrante, aguijoneante, lancinante, con hinchazón excesiva; son los síntomas guía para la selección de este remedio. Actúa en el Tejido Celular especialmente de los ojos, cara, garganta, ovarios, causando edema de la piel y membranas mucosas. En las Membranas Serosas del corazón, cerebro, pleura, etc. produce inflamación con efusión. Varias partes están inflamadas, Hinchadas; se ponen edematosas y de color rojo-rosa lustroso. El ardor es como de agujas calientes. Hay mucha debilidad como si hubiera trabajado demasiado; esta obligado a acostarse. Los síntomas se desarrollan rápidamente. Los dolores son súbitos, fuerzan a gritar. Grito Intempestivo en hidrocefalia y meningitis. Sensibilidad excesiva al contacto y Dolorimiento como de magulladura marcado: de cerebro; Abdómen; ovarios; vejiga. Sensación de constricción. Sensación de rigidez o como de algo desgarrado dentro del cuerpo. Mucha inquietud y nerviosismo. Temblores, espasmos y contracturas. Una parte del cuerpo espasmódica, la otra dolorida o paralizada. Neuralgia de la boca, lengua, encías. Gran debilidad aún para desmayarse. Infecciones. Malos efectos de una pena; susto; ira; celos; por oír malas noticias; choque mental; erupciones suprimidas. El lado derecho está más afectado. Síntomas que van de derecha a izquierda. Entumecimiento. Trombosis. Linfangitis. Inflamación de riñones, vejiga. Edema; de párpados; labios; rojos, gruesos. Ardores - comezón. Parálisis después de la difteria y otras enfermedades severas.

AGRAVACION:

Calor de una habitación; en tiempo; de fuego; bebidas calientes, baños, cama. Contacto, aún del cabello. Presión. Después del sueño. Acostado. Erupciones suprimidas. 4 p.m.

MEJORIA:

Aire fresco; baño fresco; por descubrirse. Expectoración ligera. Movimiento. Sentándose erecto.

MENTE:

Celoso. con habla obscena. Quisquilloso y nervioso; difícil de complacer. Torpe - deja caer las cosas y se ríe, ya sea por su nerviosismo o distraimiento. Tontamente suspicaz. Comportamiento infantil y absurdo en mujeres, después del parto. Irritable, excitable. Actividad infructuosa. Frívolo, alegre. Gimoteo constante en los niños. Mucho llanto, no puede ayudar el llanto, llora día y noche sin causa alguna. Manía sexual que alterna con estupor (en mujeres). Indiferencia, dice que nada le puede ayudar. No puede concentrar la mente en lo que lee o escribe. (Jovencitas histéricas durante la pubertad). No soporta que lo dejen solo. Nada parece satisfacerlo. Se preocupa por todo. Miedo de ser envenenado.

CABEZA:

El cerebro se siente muy cansado. Vértigo con estornudos < acostándose o cerrando los ojos. Sensación de puñalada súbita en la cabeza o como un golpe < occipicio, con Chillidos agudos ocasionales. Cefalea con cansancio y entumecimiento > por la presión. Flujo de lágrimas con cefalea. Rotación de la cabeza de un lado a otro en la hidrocefalia; hundimiento de la cabeza en la almohada en la meningitis. Fontanelas hundidas. Cabello dolorido. Sudor mohoso en la cabeza. Incapacidad de sostener la cabeza en la meningitis. La cabeza se siente inflamada. Caída del cabello; placas de calvicie.

OJOS:

Abotagados; párpados o conjuntiva rojos; edematosos como sacos de agua; rojos, quemosis. Lagrimeo caliente. Ojos brillantes. Dolor ardiente, aguijoneante, tirante. Estafiloma de cornea. Inflamación como de bolsa bajo los ojos. Fotofobia, pero no se puede cubrir. Ceguera > por evacuar. Estrabismo. Miopía. Abotagamiento o enrojecimiento alrededor de los ojos. No puede mirar fijamente ningún objeto; o no puede leer en luz artificial. Cornea opaca. Perrillas - previene su recurrencia. Ulcera perforante de la córnea.

OIDOS:

Oído externo rojo e inflamado. Alza su mano hacia atrás de la oreja con cada grito. Otitis de la Escarlatina.

NARIZ:

Hinchada, roja, y edematosa. Nariz y punta frías. Forúnculo en las alas > por el frío. Coriza con sensación de inflamación en la nariz.

CARA:

Expresión: feliz, asaltada por el terror, o apática. Cara, roja, caliente, hinchada y edematosa con dolores perforantes; o cerosa y pálida y edematosa. Labios; azulosos, edematosos: superior. Quijadas rígidas, con rigidez de la lengua. Parálisis del lado derecho, con ojo derecho cerrado. Deseo de lavarse la cara con agua fría. Hormigueo y picoteos en la cara.

BOCA:

Lengua; roja o con vesículas en los bordes; hinchada, ulcerada; se siente como quemada; como de madera; enrojecida, rígida. Rechinamiento de los dientes. Boca brillante como barnizada. La lengua cuelga fuera de la boca; o no puede ser sacada. Mordida involuntaria y súbita de dientes.

GARGANTA:

Arenosa, lustrosa o translúcida > frío, hinchada por dentro y fuera. Garganta púrpura. Amígdalas; inflamadas, de un rojo intenso; con dolores aguijoneantes al deglutir, > bebidas frías. Angina. Difteria con cada postración; membrana sucia, edema de la úvula. Garganta dolorida, deglución dolorosa < sólidos, sustancias ácidas o calientes.

ESTOMAGO:

Sin sed, con edema. Deseo de cosas ácidas, de leche que >. El niño mama de día pero reusa hacerlo por la noche. Náusea. Vómito. Dolorimiento en el hueco del estómago cuando se toca. No come ni bebe; por semanas. Eructos con sabor de lo ingerido < bebiendo agua; aflujo de agua.

ABDOMEN:

Se siente rígido, como si se quebrara, al hacer esfuerzos por evacuar. Dolorido; con magullamiento a la presión, al estornudar. Hidropesía. Peritonitis. Diarrea: acuosa, amarilla, amarillo-naranja o como salsa de tomate. Evacuaciones; inodoras u ofensivas, involuntarias < movimiento. Ano: enrojecido; hinchado, por hemorragia profusa; permanece abierto; prolapso del ano. Descargas eléctricas en el recto antes de la urgencia por evacuar. Dolor ardiente y sensibilidad en el epigastrio. Dolor bajo las costillas que va hacia arriba. Ardor o sensibilidad bajo las costillas.

URINARIO:

Micción ardiente. Disuria con dolores aguijoneantes. Orina; escasa, fétida, altamente coloreada; la última gota arde y pica; lechosa en la hidrocefalia. Albuminuria. Micción profusa, orina más de lo que bebe. Sedimento como asientos de café. Incontinencia de orina < noche, por toser. No puede orinar sin evacuar. Nefritis. Cistitis. Retención de orina en el recién nacido. Micción frecuente, difícil o lenta, debe presionar para orinar, en afecciones de próstata.

HOMBRES:

Edema del escroto. Hidrocele en quistes multiloculares. Afecciones de la glándula prostática.

MUJERES:

Amenorrea de la pubertad. Ovarios; entumidos o congestionados, con reglas suprimidas. Quistes ováricos. Edema de los labios. Dolores ardientes, aguijoneantes en ovarios o útero. Dismenorrea con descarga escasa de sangre o con dolor en ovarios. Menorragia con aborto. Leucorrea; profusa, acre, verde. Dolores ardientes y aguijoneantes en mamas. Tumores o cancer en mamas. Aborto durante los primeros meses. Hidropesía en la última etapa del embarazo, con convulsiones puerperales. Manía en mujeres por excesos sexuales o reglas suprimidas. Dolores en ovarios < coito. Reglas que duran un día o aparecen a intervalos de un día. Ulceración del ombligo en el recién nacido.

CORAZON:

Golpea, agita todo el cuerpo. Punzadas del corazón que van hacia atrás desde el ápice. Palpitación del corazón por secreción escasa de la orina. Pulso: duro, pequeño, intermitente y rápido y débil. Insuficiencia de las válvulas mitrales. Enfermedad orgánica del corazón.

RESPIRATORIO:

Respiración jadeante, siente que cada respiración será la última. Hambre de aire. Edema de la laringe. Dolores ardientes y punzantes a través de la parte anterior del pecho. Hidrotórax después de pleuresía. El pecho se siente como golpeado o magullado. Descarga dolorosa en la cabeza y el pecho después de toser. Asma, de las celdillas > por pequeñas cantidades de esputo. Laringe atascada. Ronquera. Expectoración dulzona.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez de la parte posterior del cuello. Dolor reumático en la espalda. Presión ardiente del cóccix < al sentarse. Espalda cansada y dolorida. Bocio vascular.

EXTREMIDADES:

Entumecimiento de las manos y punta de los dedos. Palmas calientes. Edema de las manos. Panadizo incipiente con dolores ardientes, punzantes, aguijoneantes. Piernas; inmóviles, pesadas, dormidas. Pies dormidos y rígidos. Piernas y pies cerosos, pálidos, inflamados, edematosos. Temblor de manos y pies. Las uñas se sienten flojas. Hemiplejía, por un shock mental severo. Se tambalea cuando los ojos están cerrados.

PIEL:

Rojo rosácea, sensible, dolorida. Erupciones ásperas o punzantes como manchas en la piel. Urticaria extensa. Piel seca, caliente, alternando con bochornos de calor. Inflammaciones edematosas. Erisipela. Escarlatina. Carbúnculos.

SUEÑO:

Gran Inclinación a Dormir: pero no puede hacerlo por su inquietud nerviosa. Amodorramiento durante la fiebre. Gritos; durante el sueño y despertares súbitos al dormir. Patea las cubiertas durante el sueño. Sueños llenos de aprensión y fatiga.

FIEBRE.

Escalofrío; anticipados, con disnea, urticaria, deseo de descubrirse; alternando con calor. Calor Ardiente, pero se escalofría al moverse. Ausencia de sed durante la fiebre. Calor en una parte con frialdad en otra. Sudor en chuchos, parcial. El sudor irrumpe y se seca frecuentemente. Sed durante el escalofrío.

COMPLEMENTARIO:

Arn; Ars; Hell; Merc-cy; Nat-m; Pul.

RELACIONES:

Ars; Canth; Grap; Iod; Lyc; Puls; Stram; Sul, Urt-u.

APOCYNUM CANNABINUM

GENERALIDADES:

Este remedio actúa sobre los Organos Urinarios, produciendo diuresis y removiendo los efusiones hidrópicas. La acción del corazón está deprimida. La digestión está perturbada. Es un remedio muy útil para hidropesías generales, con o sin enfermedad orgánica. Hinchazón de cada parte del cuerpo con orina escasa y sudor, siente que si pudiese sudar se pondría bien. Las hidropesías están acompañadas usualmente por perturbaciones digestivas - náuseas, vómitos y mucha sed; amodorramiento y dificultad para respirar, pueden ser síntomas acompañantes. En la hidrocefalia aguda, el niño yace en estupor, con movimiento automático de un brazo y pierna. Parálisis del lado izquierdo; un ojo inmóvil y el otro rotando. Debilidad marcada. Edema; después de hemorragia; quinina. Hemorragia uterina. Descargas escasas.

AGRAVACION:

Frío; tiempo, bebidas. Descubierta. Acostado. Después de dormir.

MEJORIA:

Por el calor.

MENTE:

Desanimado, nervioso y aturdido. No puede pensar. Se desvanece cuando se levanta de la almohada.

CABEZA:

Cefalea sorda. Hidrocefalia con pérdida de visión y frente abombada.

OJOS:

Calientes y rojos; como con arena. Un ojo inmóvil y el otro rotando.

NARIZ:

Llena de moco espeso amarillo, en la mañana, estornudos en los infantes. Se resfría fácilmente.

CARA:

Hinchazón < acostándose, desaparece después de sentarse. Cara pálida, cubierta con sudor frío, en la diarrea. Resequedad; labios, boca.

ESTOMAGO:

Nausea con somnolencia. Sed, pero hay disgusto por el agua, vomita cada bebida o alimento de una vez, (hidropesía). Sensación de hundimiento en el hueco del estómago; después de una micción profusa - diabetes insípida. Vómito urémico.

ABDOMEN:

Ascitis. Diarrea, con hidropesía; amarilla, indolora, ruidosa, evacuaciones borbollantes. Sensación de que el ano está abierto y las evacuaciones se escapan.

URINARIO:

Retención de orina, con parálisis de los miembros inferiores. Orina; copiosa; escasa. Mojadura de la cama en ancianos.

HOMBRES:

Hidropesía de pene y escroto. Aumento de la glándula prostática.

MUJERES:

Amenorrea en las jóvenes, con abdomen y piernas hinchados. Hemorragia uterina, sangre que se emite con coágulos grandes, o algunas veces en estado líquido, en la menopausia. Tumor ovárico. Tos durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Respiración corta e insatisfactoria, difícil. Opresión del pecho. Tos corta, seca, suspirante. Hidrotórax.

CORAZON:

Pulso lento, palpitante, irregular o intermitente. Regurgitación mitral y tricúspide.

PIEL:

Aspera; seca. No puede transpirar.

SUEÑO:

Somnoliento. Mucha inquietud y poco sueño.

RELACIONES:

China-ar; Nux-v.

ARALIA RACEMOSA

GENERALIDADES:

Este remedio afecta la respiración causando una condición asmática con tos, < acostándose. El paciente está débil, relajado y exhausto. Biliosidad. Secreción de moco acre.

AGRAVACION.

Después de una siesta corta. Corrientes de aire. 11 p.m. (tos).

MEJORIA:

Yaciendo, con la cabeza alta. Sentándose.

MENTE:

Miedo a una enfermedad del pulmón; no puede ser sacudido.

NARIZ:

Estornudos < a la corriente de aire más ligera, con descarga nasal copiosa, acuosa, excoriante. Fiebre de heno, con estornudos frecuentes.

BOCA:

Aftas. Como con un cuerpo extraño en la garganta. Náusea en la garganta.

ABDOMEN:

Dolor del hígado a la escápula derecha.

RESPIRATORIO:

Disnea o tos violenta después del primer sueño > con una expectoración ligera. Sensación ulcerosa y ardiente detrás del esternón. Respiración silbante. Expectoración salada; siente la boca caliente.

COMPLEMENTARIO:

Lob.

ARANEA DIADEMA

GENERALIDADES:

Este veneno de araña es el remedio para las constituciones que favorecen el envenenamiento malárico. El paciente siente frío hasta los huesos, no puede calentarse suficientemente. Hay una susceptibilidad anormal a la humedad y al frío. Imposibilidad de vivir cerca de agua fresca, ríos, lagos, etc. o en lugares de humedad helada. Afecta los nervios; causando dolores neurálgicos, que son violentos y súbitos y aparecen a la misma hora cada día, cada tercer día, semana, mes o a períodos regulares. Sensación como de un Agrandamiento Enorme; o entumecimiento de partes < al caminar o despierta con esta sensación. Es un remedio hemorrágico. Afecta los huesos, causando periostitis. Heridas punzantes. Muchos síntomas aparecen sobre el lado derecho. Los dolores son como descargas eléctricas. Gran deseo de yacer acostado. Sensación como de hormigas que anduvieran recorriendo todo el cuerpo.

AGRAVACION:

Periodicidad exacta. Frío. Humedad. Baño frío. Durante las lluvias.

MEJORIA:

Por fumar tabaco. Al aire libre. Presión. Verano.

CABEZA:

Dolor > fumando y saliendo al aire libre. Vértigo, con moscas voladoras delante de los ojos.

OJOS:

Calor y resplandores delante de los ojos; antes de la cefalea.

CARA:

Neuralgia del trigémino. Las mejillas se sienten hinchadas durante el dolor de muelas.

BOCA:

Violento dolor en todos los dientes superiores al mismo tiempo, al irse a la cama. Gusto amargo > fumando.

ESTOMAGO:

Epigastrio doloroso a la presión. Calambres, después de comer un poco.

ABDOMEN:

Bazo crecido. Cólico que aparece a la misma hora. Dolor > por el frotamiento.

MUJERES:

Reglas muy adelantadas; muy copiosas. Neuralgia lumbo-abdominal; con vómito y bostezos; durante el ciclo menstrual.

RESPIRATORIO:

Hemóptisis rojo brillante. Neuralgia intercostal que se extiende a la espina.

EXTREMIDADES:

Huesos doloridos. Dolor en el calcáneo, > por movimiento continuo. Entumecimiento de las partes suministradas por el nervio ulnar. Brazos y piernas adormecidos. Huesos fríos como si fueran de hielo. Ulcera en el talón. Los miembros se sienten pesados.

SUEÑO:

Inquieto y despertando, como si las manos y los antebrazos estuviesen hinchados y pesados.

FIEBRE:

Escalofrío; con dolor en los huesos largos y sensación de una piedra en el abdomen. Sin sudor.

COMPLEMENTARIOS:

Ced.

ARGENTUM METALLICUM

GENERALIDADES:

La plata afecta los Nervios, causando efectos convulsivos y espasmódicos. Actúa en las coyunturas y sus elementos constituyentes, huesos, cóndilos, cartílagos y ligamentos. La secreción de las membranas mucosas es Espesa, gris o tenaz; o como almidón hervido. Engruesa el tejido, especialmente cartílagos, tarsos, la Laringe también está prominentemente afectada. Los síntomas aparecen insidiosamente; lentamente, demorada, pero progresivamente, penetrando profundamente. Los dolores aumentan gradualmente, se vuelven violento y súbitamente cesan, < por contacto. Los dolores se acompañan de poliuria. Espasmos indoloros, o descargas tipo eléctricas. Pérdida del control sobre la Mente y cuerpo. Calambres en los músculos; los miembros se sienten sin fuerzas. En la epilepsia, los ataques son seguidos por una cólera delirante, saltando y golpeando a quienes están cerca. Artralgia. Huesos; dolorosos, sensibles. Está adaptada a personas altas, delgadas e irritables. Exóstosis del cráneo. Malos efectos por onanismo e insolación. Ulceración dolorosa. Permanece acostado debido a cansancio y debilidad. Emaciación. Caries.

AGRAVACION:

Usando la voz. Hablando, cantando. Esfuerzo mental. Mediodía. Humedad fría. 3 a 6 p.m. Contacto, presión. Por pasear en carro. Yacendo sobre la espalda. Por sentarse. Al entrar a una habitación caliente. Sol.

MEJORIA:

Movimiento. Café. Abrigándose.

MENTE:

Pérdida del poder mental. Olvidadizo. Apresurado; engañoso. Locuaz, o no quiere hablar en sociedad; cambia los temas. Inquietud ansiosa, que lo hace cambiar de lugar. El tiempo pasa con lentitud. Excluye toda simpatía por sus amigos. Se cumple toda clase de caprichos, con frecuencia hace cosas extrañas e inexplicables. Ansiedad por su salud.

CABEZA:

Vértigo; todo dá vueltas; < por mirar agua corriente, o al entrar a una habitación caliente. Vacío y hormiguelo en la cabeza. Cuero cabelludo muy sensible al tacto.

OJOS:

Comezón en los párpados y bordes. Descarga abundante y purulenta. Constricción del lagrimal. Los párpados se vuelven gruesos.

OIDOS:

Coriza violenta y fluída, con estornudos frecuentes, causando fatiga. Sangramiento nasal, con cosquilleo; < sonándose la nariz.

CARA:

Pálida, ojerosa, con debilidad. Roja. Calor súbito, con palpitación.

GARGANTA:

Se siente áspera y adolorida, durante la expiración o cuando se deglute o tose. Moco víscido, gris gelatinoso, que es fácilmente expectorado; en la mañana. Tensión en la garganta; < bostezando. Expectoración. Fauces entumecidas.

ESTOMAGO:

Ardor en el estómago, que sube hacia el pecho. Ansiedad y presión en el hueco del estómago. Apetito aumentado, o repugnancia por todos los alimentos. Hipo por fumar. Náusea en sueños.

ABDOMEN:

Gruñidos fuertes en el abdómen con hambre. Sensibilidad dolorosa del abdómen < paseando en carro. Vómito durante la evacuación.

URINARIO:

Micción copiosa y frecuente. Diabetes; si hay hinchazón de los tobillos. Orina; como suero de leche, de olor dulce. Uretritis crónica.

HOMBRES:

Dolor de aplastamiento en el testículo (derecho). La ropa aumenta el dolor al caminar. Emisiones seminales sin excitación sexual y erección. Descarga verde-amarillenta.

MUJERES:

Dolor en el ovario izquierdo. Los ovarios se sienten muy grandes. Prolapso del útero con dolor en el ovario izquierdo y parte baja de la espalda, extendiéndose hacia el frente y hacia abajo. Cérvix erosionado y esponjoso. Escirro del útero. Hemorragia climatérica. Leucorrea; fétida, sanguinolenta, como agua, excoriente. Quistes de ovario, tumores. Palpitaciones durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Ronquera y afonía < usando la voz. Pérdida total de la voz en cantantes profesionales. La laringe se siente adolorida y ulcerosa. Tos < por reír. Expectorcación fácil de moco gris, gelatinoso o como engrudo. Sensación de un punto ulceroso cerca de la fosa supraesternal. Gran debilidad del pecho (izquierdo) con punzadas que impiden la respiración, mientras lee en voz alta o habla. Forúnculo cerca de la última costilla. Dolores neurálgicos a lo largo de la orilla de la costilla inferior izquierda.

CORAZON.

Se detiene, luego tiembla, luego late, > inspirando. Palpitación con inquietud cardíaca, > acostándose en el lado izquierdo. Palpitaciones durante el embarazo; > inspiración profunda. Pulso intermitente y muy irregular, durante la palpitación.

CUELLO Y ESPALDA:

Severo dolor de espalda, debe caminar encorvado. Sensación de frío helado cerca del sacro.

EXTREMIDADES:

Los miembros superiores se sienten sin fuerza. Piernas débiles y temblorosas < descendiendo escaleras. Las pantorrillas se sienten como muy cortas al bajar escaleras. Hinchazón de los tobillos,(diabetes). Contracción de los dedos, con parálisis parcial del antebrazo. Calambre de los escritores. Las piernas se sienten entumidas o rígidas. Ardor en los callos.

PIEL:

Comezón nerviosa; hormigueo; cosquilleo en varias partes.

SUEÑO:

Descargas eléctricas al caer dormido. Náusea en sueños.

FIEBRE:

Fiebre hética a mediodía. Suda solamente en el abdomen y el pecho.

RELACIONES:

Calc; Pul; Sele; Sep; Stan; Zin.

ARGENTUM NITRICUM

GENERALIDADES:

Este medicamento afecta la Mente, causando efectos neuróticos, por su acción en nervios Cerebro-espinales. Produce incoordinación, pérdida de control y pérdida de balance mental y físicamente. Las membranas mucosas están inflamadas y ulceradas, causando descargas muco-purulentas y Dolores como de astillas. Es un remedio útil para aquellas personas que son secas, marchitas y prematuramente avejentadas, con temblores y debilidad. Personas histérico-nerviosas. Emaciación progresiva. Parálisis ascendente. Las partes parecen Agrandadas o apretadas. Dolores Violentos; Como de Astillas Profundamente Enterradas; o agudos, tirantes como un relámpago, mordientes o irradianes; produciendo sobresaltos; y que se extienden hacia abajo o a las piernas. Los dolores aumentan y disminuyen gradualmente. Ulceración con mucho pus sanguinolento y amarilllo. Es un remedio convulsivo; ataques de epilepsia; por susto < durante las reglas, por la noche; las pupilas están siempre dilatadas por uno o dos días antes del ataque, y seguido por inquietud y temblor de manos. Temblor periódico del cuerpo. Pérdida del movimiento voluntario. Paraplejía. Hundimiento hacia atrás de la cabeza. Mielitis. Esclerosis diseminada del cerebro y cordón. Sensación de pinchazo súbito. Malos efectos de: comer helados, onanismo. Tabaco. Síntomas que aparecen sobre el lado izquierdo. Síntomas conjuntos mentales y digestivos. Incapaz de caminar con los ojos cerrados. Los dolores causan sobresalto. Adecuado para hombres de negocios, estudiantes e intelectuales. Miedo a los exámenes. Deseo de hablar. Anemia. Errores de percepción. Perversión de los sentidos.

AGRAVACION:

Emociones. Ansiedad, aprensión, miedo o susto, suspenso. En habitación; en cuartos cerrados. Esfuerzo mental y preocupación. Azúcar. Yaciendo sobre el lado derecho. Viendo hacia abajo. Bebiendo. Entre multitudes. Calor en cualquier forma. Alimentos fríos; helados. Antes y durante las reglas. Paseando. Pensando intensamente.

MEJORIA:

Aire Fresco; al aire libre. Baño frío. Presión fuerte. Movimiento. Eructos. Doblándose en dos.

MENTE:

Atormentado por ideas extrañas y emociones. Impulsivo, nervioso y apresurado, aunque tímido y ansioso. Miedoso. Terror a las pruebas. Miedo de un mal inminente, de multitudes, pasando por cierto lugar, de los edificios altos, de la obscuridad. Vacilante; balbuceos al hablar; al caminar, erecciones, etc. Pérdida de ambición. Cree que es despreciado por su familia; que todo lo que emprenda fallará. Desalentado. Melancolía. Impulso de brincar al cruzar un puente; o de una ventana. Cerebro cansado. Pérdida de la memoria. El tiempo pasa lentamente; el tiempo parece corto, quiere hacer todo rápido, debe caminar rápido, etc. Lloro, dice que está lejos de toda esperanza. Todo parece cambiado. Irracional; hace cosas extrañas y llega a conclusiones extrañas: hace tonterías. Habla infantil. Habla sobre sus sufrimientos. Permanece en cama, por las indisposiciones más insignificantes.

CABEZA:

Cefalea nerviosa; con frialdad y temblor < por fatiga mental, por bailar > vendage apretado. Cabeza como atornillada. Dolor compresivo o profundo en la cabeza. Pierde sus sentidos. Dolor presivo en la

eminencia frontal izquierda. Migraña. La cabeza se siente agrandada. Vértigo; antes de epilepsia; < noche, con ceguera momentánea, < cerrando los ojos. Prurito, sensación hormigueante en el cráneo. Como si los huesos de la cabeza estuvieran separados. El dolor de cabeza termina con un vómito. Cefaleas de mujeres jóvenes histéricas; de personas delicadas e intelectuales.

OJOS:

Los globos se sienten grandes. Oftalmía violenta y purulenta; oftalmía neonatorum. Blefaritis, costras gruesas en los párpados. Pupilas dilatadas. Carúnculas inflamadas; fotofobia. Ulceración de la córnea. Quemosis. Conjuntivitis granular aguda. Los síntomas de los ojos < síntomas abdominales. Opacidad de la córnea. Pterigión de color rosa.

OIDOS:

Zumbidos en los oídos, con vértigo. Tintineo con sordera.

NARIZ:

Pérdida del olfato. Comezón violenta. Coriza con escalofrío, lagrimeo y cefalea. Comezón violenta, se frota la nariz.

CARA:

Enfermiza, sumida, grisácea, color turbio. Aspecto de anciano. Los labios tiemblan al hablar. Labios azules.

BOCA:

La punta de la nariz está roja y dolorida. Papilas resaltadas y erguidas. Lengua cubierta con orillas limpias. Aftas en la orilla de la lengua. Gusto astringente, ácido o ácido-amargo. Dolor de muelas < masticando cosas frías; cosas ácidas. El alimento escapa de la boca al masticar. No puede hablar; espasmos de los músculos de la lengua y la garganta. Tartamudeo.

GARGANTA:

Moco grueso y tenaz en la garganta que causa carraspera. Uvula y fauces rojo oscuro. Sensación de una astilla que estuviera atorada en la garganta < al deglutir, respirar o mover el cuello > bebidas frescas. La comida se detiene en la faringe. Catarro de los fumadores, con sensación de cabello en la garganta. Sensación de estrangulamiento.

ESTOMAGO:

Desea azúcar, que le cae mal. Deseo de queso. Pérdida de apetito. Buen apetito, pero todo alimento desagrada. Vómito astringente, ácido, o ácido-amargo. Gastritis alcohólica. Las sustancias vomitadas tiñen de negro las ropas de cama. Gastralgia; dolor que aparece en un punto pequeño, de donde irradia a todas direcciones, < mínima presión. Hinchazón dolorosa del epigastrio. Ulceración del estómago < alimentos frescos. Comer > náusea, pero < dolor de estómago. Cosas ácidas > náusea. Eructos sabor de alimentos ingeridos. Los gases presionan hacia arriba, pero el esófago parece cerrado espasmódicamente. Temblor y latidos en el estómago.

ABDOMEN:

Flatulencia; causa distensión y sensación de que va a reventar el abdomen. Eructos fuertes y explosivos se descargan por arriba y abajo. Diarrea; emocional; ruidosa < inmediatamente después de comer y

beber, después de dulces. Los flúidos van justo hacia allí. Evacuaciones; desmenuzadas, mucosas, se vuelven verdes, como espinacas picadas. Prurito en el ano. Estremecimiento en los intestinos; se extienden hacia la espalda. Diarrea, nerviosa, después de dulces; de niños, después del destete. Constipación; < cada indisposición; alterna con diarrea.

URINARIO:

Dolor violento del riñón a la vejiga (Nefralgia), < contacto, movimiento, inspiración profunda. Incontinencia de orina día y noche. Necesidad de orinar, la orina pasa menos fácil y libremente. Ardor cortante en la uretra, con erección dolorosa. Chorro dividido. Gonorrea amarillo-sanguinolenta; etapa primaria. Orina; altamente coloreada, rojo oscuro; con albúmina. Retención de orina.

HOMBRES:

Impotencia; erección, pero falla cuando se intenta el coito. Coito doloroso - uretra como constreñida o sensible en el orificio. Chancro como úlceras, en el prepucio. Testículos muy retraídos hacia arriba.

MUJERES:

Coito doloroso, seguido de sangrado. Prolapso, con ulceración del cuello. Metrorragia, con eretismo nervioso en el cambio de vida; también de viudas jóvenes y mujeres sin hijos. Ovarios dolorosos con dolores que irradian al sacro y los muslos. Reglas; irregulares, muy adelantadas, muy retrasadas o que duran solamente un día. Dolor en el estómago o contracción espasmódica del pecho antes de las reglas. Reglas escasas; con disnea. Los niños mueren pronto, después del parto. Leucorrea; profusa con erosión del cérvix.

RESPIRATORIO:

Laringitis crónica de los cantantes, alzar la voz provoca tos, las notas altas provocan tos. Aspreza, adolorimiento, en la tráquea superior < tosiendo. La multitud reunida en una habitación le impide respirar. Deseo de hacer inspiraciones profundas que < su disnea. Disnea, nerviosa o flatulenta, < dolores gástricos. Tos; < reír, agacharse, fumar, ascender escaleras antes de las reglas. El pecho se siente como si una barra lo rodeara. Como con el peso de una piedra a la mitad del esternón. Desea aire fresco. Pérdida de la voz. Dolor en el pecho al ponerse las botas. Asma; < en verano, en tiempo frío o resfriándose.

CORAZON:

Palpitación; con náusea, < yaciendo sobre el lado derecho, paseando en carro; > presionando con la mano. Sensación no placentera de plenitud alrededor del corazón < al aire libre y fresco. Pulso irregular intermitente. Ansiedad, con palpitación y latidos a través de todo el cuerpo.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la parte baja de la espalda < levantándose de estar sentado > levantándose y caminando. Glándulas del cuello induradas. Latidos en la espina, o espina débil.

EXTREMIDADES:

Temblor de manos, no puede escribir. Adormecimiento de las puntas de los dedos; dedos anular y meñique. Dedos parcialmente engarruñados, no pueden separarse. Lasitud y cansancio del antebrazo y piernas, con temblor. Debilidad, rigidez y espasmo en las pantorrillas. Parálisis con síntomas mentales

y abdominales. No puede caminar con los ojos cerrados. Camina y se para tambaleándose < cuando no es observado. Como con un peso que colgara del cóccix. Convulsiones como en la corea; piernas contraídas, brazos volteados hacia afuera y hacia arriba. Neuralgia periférica. Edema de las piernas. Los pies se sienten como si fueran de madera o acolchados. Paraplejia, después de causas debilitantes.

PIEL:

Café, estirada y dura. Ulceras; irritadas, profundas, con orillas duras. Granulaciones verrugosas. Costras adherentes.

SUEÑO:

Sueños horribles de serpientes y gratificación sexual.

FIEBRE:

Escalofrío estando descubierto, pero se sofoca al cubrirse. Escalofrío con náusea.

COMPLEMENTARIOS:

Calc; Nat-m; Pul; Sep.

RELACIONES:

Lyc; Pul.

ARNICA MONTANA

GENERALIDADES:

Es un remedio traumático por excelencia. Trauma en todas sus variedades - mental o físico y sus efectos recientes o remotos se encuentran en este remedio. Afecta la Sangre, causando condiciones pútridas y sépticas. Los Vasos Sanguíneos están relajados, causando equimosis, manchas azul-negro; con Tendencia a la Hemorragia; epistaxis, etc. Actúa sobre los nervios causando neuralgia. Los Músculos se sienten Muy Inflamados, Dolorosos, Magullados; por todos lados. Las partes se inflaman, después de los dolores, o después de sangrados. Es un profiláctico en la formación de pus. Acumulación de pus. Tiene una acción absorbente. Emaciación progresiva. Gran postración; sensación de cansancio. Las descargas son Fétidas; aliento, gusto, flatos, evacuaciones, etc. Dolor aplastante. La Cama se Siente Dura, o llena de bultos. Evacuaciones involuntarias. Abscesos que no maduran. Los dolores son paralíticos; súbitos, dolores cambiantes de articulación en articulación. Actúa mejor en personas pletóricas, de pelo oscuro, músculos rígidos, de naturaleza nerviosa y sanguínea. Actúa, pero débilmente en personas que están positivamente debilitadas, con empobrecimiento de sangre y carnes blandas. Compone fracturas. Espasmo en tendones, músculos. Osteomielitis. Malos efectos de un susto, pérdidas financieras, ira, arrepentimiento; excesivo uso de cualquier órgano, vaginitis en mujeres, e impotencia en hombres por una indulgencia sexual excesiva. Fatiga de cualquier clase. Alternancia de síntomas mentales y uterinos. Enfermedades por un exceso de preocupación. Apoplejía. Fiebres sépticas, tifoidéicas. Furúculos recurrentes. Operaciones quirúrgicas. Picadura de insectos. Astillas. Trombosis.

AGRAVACION:

Heridas- caídas, golpes. Contusiones; shocks, sacudidas: después del parto; exceso de ejercicios; torceduras. Contacto. Después del sueño. Movimiento. Ancianos. Frío húmedo. Gas de Carbón. Yaciendo sobre el lado izquierdo.

MEJORIA:

Permaneciendo acostado y permaneciendo con la cabeza baja o estirada.

MENTE:

Miedo: de ser golpeado o tocado; o que alguien se acerque; de enfermedad; de una muerte instantánea; con angustia cardíaca en la noche; del espacio; al despertar; de las multitudes, de espacios públicos. Hosco. Arrepentimiento. Mentalmente postrado y apático, pero físicamente inquieto; dice que nada lo ayuda. Cuando se le habla, contesta lentamente con esfuerzo. Se siente bien en casos graves. Olvidadizo, lo que lee rápidamente se desvanece en su memoria. Después de arranques de ira, prorrumpe en llanto y hace exclamaciones. Desesperanza: indiferente. Ataques violentos de angustia- Angina de Pecho. Delirium tremens. Un miedo súbito que lo despierta de su sueño por la noche especialmente después de un accidente. Gran deseo de arañar; araña paredes, la cama, la cabeza, etc. Coma. Delirio musitante. Sensación de ser un bueno para nada. Fácilmente asustado, nimiedades inesperadas le causan sobresalto. Se sienta en actitud pensativa.

CABEZA:

Cerebro; se siente cansado, con ardor. Vértigo; crónico; de los ancianos; con náusea, vómito y diarrea; los objetos giran < caminando. Vértigo < caminando, sentándose erecto, cerrando los ojos. Cefalea como de un clavo. Cabeza caliente y cuerpo frío. Punto frío en la frente, puntos calientes en el vértice. Meningitis por herida en la cabeza. La cabeza se cae hacia atrás mientras camina.

OJOS:

Derrame sanguíneo. Hemorragia retiniana. Fotofobia. Se siente cansado y pesado, después de estar viendo películas. Los objetos altos parece que se doblan y están por caer. El ojo derecho resalta, parece más grande que el izquierdo.

OIDOS:

Dureza de oído; ruidos en los oídos. Sangre de los oídos. Dolor magullante en oídos externos. Oído disminuído por herida en la cabeza. Sensibilidad a sonidos agudos.

NARIZ:

Sangramiento; después de cada acceso de tos; después de lavarse la cara. Estornudos violentos por levantar cosas pesadas. Nariz; se siente dolorida, fría. Descarga retro-nasal. Ardor en la fiebre tifoidea.

CARA:

Rubicunda. Congestionada, rojo-azulada; en apoplejía, fiebres. Sumida, pálida. Labios: ardor, hinchados y agrietados. El labio inferior tiembla mientras come. Mandíbula inferior cuelga, parálisis. Acné doloroso. Mejillas hinchadas; rojas.

LABIOS:

Aliento fétido. Seca, con mucha sed. Gusto; como de huevos podridos, después de una operación-etc. Rojo brillante, fauces hinchadas. Lengua; seca, casi negra. La deglución es impedida por una clase de náusea como si la comida no pudiera bajar.

ESTOMAGO:

Eructos; sabor de huevos podridos; después de toser. Pérdida de apetito en el día, pero hambre canina antes de medianoche. Náusea. Vómito de sangre oscura, roja, coagulada. Sensación como si el estómago estuviera pasando contra la espina. Vómito fétido. Como con un bulto detrás del estómago. Aversión a la leche y la carne. Deseo de vinagre. Constante deseo de beber, pero no sabe qué, ya que todas las bebidas le resultan desagradables.

ABDOMEN:

Calambres desde el epigastrio hacia los intestinos, luego evacuaciones ofensivas. Dolores agudos de un lado a otro. Evacuaciones; sanguinolentas, espumosas, purulentas, acres; involuntarias; durante el sueño. Disentería; con disuria, todo el verano y el otoño. Calambres en el recto, mientras está de pie. Flatos con olor a huevos podridos. Debe permanecer acostado después de cada evacuación. Prolapso del ano < después de caminar por pocos minutos sólo > lavándose todo el cuerpo.

URINARIO:

Dolor cortante en los riñones. Retención de orina en la vejiga, por exceso de ejercicio, después del parto. Goteo involuntario, con deseo constante de orinar. Debe esperar mucho tiempo para que la orina pase. La vejiga se siente llena y adolorida; la presión de la orina lo lastima.

HOMBRES:

Impotencia por exceso o abuso. Fimosis, por fricción. Emisiones seminales durante las caricias. Hematocele.

MUJERES:

Dolores < al succionar. Sensibilidad de las partes después del parto. Sensación como que el feto estuviera acostado cruzado. No puede soportar los movimientos del feto; causa náusea y vómito. Hemorragia después del coito. Pezones doloridos. Los niños pierden la respiración cuando están enojados. Mastitis. Amenaza de aborto por caídas, et. Parto, débil y suspendido. Reglas; adelantadas, calientes, profusas. Dolorimiento de todo el cuerpo durante el embarazo. Tumores de mamas por heridas. Fiebre puerperal.

RESPIRATORIO:

Ronquera; < ejercicio, gripas, o por mojarse. Tos durante el sueño sin despertar. Tos producida por bostezar, llorar o lamentarse. La tos causa hemorragias en los ojos o epistaxis. Tos cardíaca. Disnea con hemoptisis. Tos violenta y espasmódica, con herpes facial. Los huesos y cartílagos del pecho están adoloridos < movimiento, respirando o tosiendo. Pecho bajo pesado. Dolores punzantes en el pecho, impidiendo la respiración; > presión. Voz áspera por abuso.

CORAZON:

Los latidos agitan todo el cuerpo. Dolor súbito como si el corazón fuera exprimido o ha recibido un choque, dolor que se siente en el codo izquierdo (angina de pecho). Tensión del corazón por correr violentamente. Hidropesía cardíaca. Hipertrofia del corazón. Corazón grasoso. Dolores cordiales; que van de izquierda a derecha. Pulso débil e irregular. Músculos cardíacos debilitados. Horror constante a la muerte, con angustia cardíaca por la noche. Palpitación por cualquier ejercicio.

CUELLO Y ESPALDA:

Músculos del cuello débiles, la cabeza cae hacia atrás o cualquier lado. Espalda adolorida. Vértebras cervicales sensibles.

EXTREMIDADES:

Las extremidades duelen como si estuvieran golpeadas. Dolor en los brazos > colgando. Falta de fuerza en las manos al empuñarlas. Calambres en los dedos- calambre de los escritores. Venas de las manos distendidas. No puede caminar derecho debido a un dolor magullante en la región pélvica. Higroma patelar. Gota. Articulaciones de la rodilla que súbitamente se doblan hacia atrás al estar de pié. Pies adormecidos.

PIEL:

Somnolencia comatosa; se queda dormido tan pronto como contesta. Sueños; de muerte, cuerpos mutilados, ansiosos y terribles, despierta aterrizado, luego insomnio. Fatiga severa que causa inquietud e insomnio.

FIEBRE:

Escalofríos con calor y enrojecimiento en una mejilla. Cabeza o cara sola caliente, cuerpo frío. Frialidad sobre la parte donde se descansa. Sed durante el escalofrío. Debe descubrirse pero le causa escalofrío. Fiebres intermitentes, tifoideas, sépticas, traumáticas.

COMPLEMENTARIOS:

Aco; Calc; Nat-s; Psor; Rhus-t; Sul-ac.

RELACIONES:

Bels; Echi; Hyper; Rhus-t.

ARSENICUM ALBUM

GENERALIDADES:

Un remedio de acción muy profunda, que afecta todo órgano y tejido. Mentalmente el paciente es extremadamente nervioso; inquieto y ansioso. Descarga de Membranas Mucosas acres, delgadas y escasas: coriza, saliva, sudor, etc. La sangre está desorganizada, causando tipos perniciosos de anemia y severas condiciones sépticas. Hemorragias negras, ofensivas. Debilidad y emaciación rápidas. La

postración parece estar fuera de proporción al resto de su enfermedad. Los dolores son enloquecedores; Arden como fuego; agujas calientes o alambres, > calor. Los dolores se sienten aún durante el sueño; despiertan al paciente. Los dolores causan respiración cortada o escalofrío. Dolores que alternan entre cabeza, estómago o cuerpo. Actúa en los nervios produciendo neuralgias inveteradas y neuritis múltiples > por el calor. Desmayos frecuentes. Temblores, contracturas, convulsiones y espasmos coréicos. Efectos súbitos intensos; Gran debilidad súbita por causas triviales. Mucha inquietud; inquietud aún en partes afectadas; aún el estupor es interrumpido por accesos de inquietud, con gemidos ansiosos. Pérdida de peso gradual. Olores pútridos y cadavéricos. Emaciación. Parálisis. Procesos destructivos - carbúnculos, gangrena, cancer; malignidad. Hidropesía; pálida, abotagada, abolsamientos. Inflamación. Bazo crecido en fiebre malárica, kala-azar. Niño > por cargarlo y mecerlo rápidamente. Malos efectos por comer hielos; dieta pobre, frutas, especialmente las acuosas, tabaco, quinina, baños de mar y viajes, ascensión de montañas. Ansiedad, pena, susto, envenenamiento por ptomaína, disección de heridas. Es un profiláctico para la fiebre amarilla. Ardores agudas y crónicas. Epilepsia; súbitamente inconsciente, con convulsiones, inquietud; luego se vuelve amodorrado.

AGRAVACION:

Periódicamente; Medianoche; después de medianoche; Después 2 a.m.; 14 días; cada año. Frio; Hielos; Alimentos Fríos; Aire frío, frío y húmedo. Vegetales; frutas jugosas. Bebiendo líquidos, Alcoholismo. Infecciones. Carne en mal estado, alimentos. Erupciones no desarrolladas o suprimidas. Quinina. Yaciendo sobre el lado afectado. Ejercicio. Tabaco, mascando. Orilla del mar.

MEJORIA:

Caliente; Aplicaciones (secas); Alimentos; bebidas. Cubiertas tibias. Movimiento. Caminando. Acostándose, con la cabeza elevada. Sentándose erecto. Compañía. Sudando. Al aire libre.

MENTE:

Hipersensibilidad. Ansioso. Fastidioso. Buscando la falta. Angustia; Desesperanza de recuperarse. Exigente. Miedo agonizante a la muerte; pero cansado de vivir, < por la noche. Miedo; de morir por inanición; pérdida financiera. Violencia; auto-tortura; se jala el cabello; muerde sus uñas; rasga su propio cuerpo. Suicida; impulsos; manía. Inquietud; cambia lugares constantemente, quiere ir de una cama a otra; niños caprichosos; quieren ser cargados; quiere ir del padre a la madre, la nodriza. Melancolía: Vé gusanos; avienta insectos por puños. Suspica. Miedo de que lo dejen solo, temor de hacerse daño él mismo. Teme haber matado a alguien. Avaro, malicioso, egoísta. Falta de valor. Irritable; incrementándose. Sensible al desorden. Delirium tremens. Chochez. Ideas fijas; alucinaciones: Imagina la casa llena de ladrones; salta y se esconde. Apresurado. Vé fantasmas día y noche. Gruñe, gime y llora, durante las reglas. Sus deseos exceden sus necesidades. No quiere encontrarse a sus conocidos; piensa que los ha ofendido.

CABEZA:

Dolor, congestivo > frío. Cabeza inquieta, está en constante movimiento. Dolor sobre el ojo izquierdo. Hemicrania, con sensación helada. Vértigo; con pérdida de la conciencia, durante los accesos de tos, en asmáticos, antes de la epilepsia. Cuero cabelludo muy sensible; no puede cepillarse el cabello. El pelo se vuelve gris prematuramente; caída del cabello. Caspa. Erupciones crónicas llenas de pus. Dolor que alterna entre cabeza, estómago o cuerpo < cuando la gente habla. Camina con la cabeza echada hacia atrás.

OJOS:

Sumidos o resaltados. Ardor en ojos, con lagrimación acre. Edema alrededor de los ojos. Fotofobia intensa. Párpados granulados. Espasmos de los párpados. Todo parece verde; vé como a través de una gaza blanca. Conjuntiva; inyectada; amarilla. Oftalmía escrofulosa. Párpados rojos y ulcerados. Caída de pestañas. Párpados edematosos.

OIDOS:

Descarga delgada, ofensiva, excoriante. Rugido en los oídos, durante el dolor. Dureza de oído, a la voz humana.

NARIZ:

Descarga, delgada, acuosa, excoriante. La nariz se siente obstruída, con coriza fluída. Los catarrros nasales descienden al pecho. Inflamaciones frías; en la nariz. Estornudos sin alivio. No puede soportar la vista ni el olor de los alimentos. Hinchazón nudosa de la nariz. Nariz afilada. Acné de la nariz. Nariz sangrante, después de un acceso de coraje o por vómito. Disnea que se siente en la nariz. Estornudos con coriza acuosa y mordiente.

CARA:

Pálida; ansiosa, hundida, ojerosa o distorsionada, hipocrática, cubierta con sudor frío. Mirada de viejo; en niños. Inflamación edematosa de la cara. Dolores quemantes, punzantes como por agujas al rojo vivo. Labios; negros, lívidos. Erupción en los labios. Cáncer de labios. Manchas negras, acné.

BOCA:

Lengua; seca, limpia y roja; azulosa, blanca. Orilla de la lengua roja, con la impresión de los dientes. Dolor ardiente de la lengua. Lengua; ardiente, temblorosa; rígida; cubierta, blanca, amarillenta; café; negra. Inflamación cerca de la raíz de la lengua. Neuralgia de los dientes; se sienten largos; > calor; < noche. Encías inflamadas y sangrantes, dolorosas al tacto. Rechinido de los dientes durante el sueño. Muerde los vasos al beber. Resequedad de la boca. Aftas en la boca. Mal aliento. Trago de agua ardiente. Gusto; amargo del agua; después de comer y beber; agrio, fétido, salado, dulce en la mañana. Saliva sanguinolenta. Habla rápida con ceceo.

GARGANTA:

Inflamada, edematosa, constreñida, ardiente, inhabilidad para deglutir. Todo lo que se deglute parece quedarse en el esófago.

ESTOMAGO:

No soporta la vista, olor o pensar en alimentos. Sed Intensa, Inextinguible, Ardiente; Bebe poco y con frecuencia; Desea Agua Helada, que Afecta el Estómago y es Vomitada Inmediatamente. Pérdida del apetito; con sed; con náusea. Náusea, arcadas y vómitos, después de comer y beber. Ansiedad que se siente en el hueco del estómago. Dolor ardiente en el estómago > por la leche dulce. Agruras, deglución de agua ardiente. Vómito y purga. Hipo; frecuente; también cuando la fiebre debe aparecer; con eructos. Aversión a los dulces, mantequilla, grasas; carne. Gastritis. Bebe Poco y con Frecuencia, come de vez en cuando y mucho. Vómito. Deseo de cosas ácidas, brandy, café, leche. Gastralgia, por la más pequeña porción de alimento o bebida. Vómito negro.

ABDOMEN:

Induración y crecimiento del bazo y del hígado. Dolores violentos en el abdomen, con angustia. No tiene descanso, en ningún lado, se revuelca en el suelo y se desespera de la vida. Epigastrio inflamado, sensible. Evacuaciones; como agua de arroz, fétidas, pocas, involuntarias, acres, ardientes, negras, con moco, lientéricas < bebidas frías, con mucha postración. Úlcera sobre el ombligo. Disentería, cólera, en niños. Ano; rojo y doloroso, ardiente. Prolapso agudo del ano. Prolapso de hemorroides, con ardor > aplicaciones calientes. Prurito y erupciones eczematosas alderredor del ano. Peritonitis. Ascitis.

URINARIO:

Orina; escasa, ardiente, involuntaria. Sensación de debilidad en el abdomen después de la micción. Atonía de la vejiga, en ancianos. Uremia. Albuminuria. Diabetes. Retención de orina, como si la vejiga estuviese paralizada, después del parto. Orina negra como mezclada con estiércol. Disuria.

HOMBRES:

Escroto edematoso. Emisiones durante evacuaciones diarreicas. Inflamación erisipelatosa del escroto. Úlceras sifilíticas, con ardor, punzadas.

MUJERES:

Leucorrea, profusa, acre, amarillenta, espesa < de pié, pasando flatos. Cáncer del útero. Ardor en la región ovárica. Dolor presivo, punzante en el ovario, y hacia los muslos, que se sienten entumecidos y doloridos < movimiento o doblándose. Menorragia con sangre negra. Ardor en las mamas > movimiento. Incremento del deseo sexual durante las reglas. Reglas suprimidas, en mujeres débiles, cansadas, angustiadas. Punzadas en el recto durante las reglas. Dismenorrea > calor.

RESPIRATORIO:

Respiración Cortada; incapaz de acostarse, debe sentarse, < olores, reírse, ascender, voltearse en la cama o por erupciones que se retiran, > café o agua dulce. Respiración silbante, resollante. Asma < por resfriarse, a la mitad del verano. Tos seca que alterna con tos floja, seca por la noche > sentándose < bebiendo. Expectoración escasa, espumosa. Gran disnea; en la nariz; cara cianótica; cubierta con sudor frío, gran ansiedad. Afonía. Enfisema: Edema pulmonar. Ardor y frialdad en el pecho. Tos excitada por fumar. Sensación como de vapores de azufre en la laringe. Tos, con esputo sanguinolento. Hemoptisis; ardor por todos lados, o con dolor entre las escápulas, en bebedores; reglas suprimidas. Gangrena de los pulmones. Dolor punzante a través del primer tercio del pulmón derecho. Manchas amarillas en el pecho.

CORAZON:

Débil, tiembla. Palpitación, con angustia < yaciendo sobre la espalda, ascendiendo escaleras, por las causas más sencillas. Dolores cardíacos en el cuello y occipucio, con ansiedad, respiración difícil, desvanecimientos en serie. Angina de Pecho. Pulso más rápido por la mañana. Hidro-pericardio. Palpitación, con debilidad tremula después de evacuar. Latidos audibles. Pulsaciones visibles.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez de la espalda que asciende del cóccix a la nuca. Hormigueos fríos en la espalda. Como si una corriente de aire tibio subiera por la espina a la cabeza. Dolor magullante en la espalda baja. Región lumbar débil.

EXTREMIDADES:

Espasmos, sacudidas, temblores, sobresaltos violentos durante el sueño. Dolor tirante del codo a la axila. Debilidad de las extremidades. Temblor de las manos, de los brazos. Comezón en los dedos. Los dedos no se pueden extender. Uñas; azules, descoloridas. Ulceras en las puntas de los dedos con dolores ardientes. Pies; débiles, cansados y entumecidos, edematosos. Ulceras en las plantas y dedos. Sensación como si las plantas fueran de madera. Inflamación dolorosa en la yema de los dedos, al caminar. Inquietud en las extremidades inferiores, debe mover los pies constantemente o caminar. Hinchazón de los pies. Extremidades pesadas. Pies inquietos. Ciática > caminando y por las aplicaciones calientes. Paraplejía con atrofia. Parálisis, con contracción de extremidades.

PIEL:

Seca, áspera, sucia, escamosa, marchita. Se ve marchita. Eczema. Erupciones agudizadas. Descamación. Urticaria < por comer mariscos. Ulceras; crónicas, con ardor, con dolores quemantes y descargas sanguinolentas. Gangrena. Fagedena. Carbúnculos. Psoriasis. Piel como parchada. Síntomas de piel que alternan con afecciones internas. Manchas; azules, negras, blancas. Espinillas, vesículas, ardores violentos.

SUEÑO:

Perturbado, ansioso, inquieto. Estremecimientos al dormirse. Sueños; de muertos, llenos de angustia; aflicción, y miedo. Duerme con las manos sobre la cabeza. Bostezos con estiramiento de miembros. Enfermedad del sueño. Habla en sueños. Despierta por los dolores.

FIEBRE:

Frío externo, con calor ardiente interno. Frialdad: en puntos. Sensible al frío, pero > al aire libre. Escalofríos irregulares, lo sacuden; desea bebidas calientes durante el escalofrío; disnea durante el escalofrío. Calor como de agua caliente en las venas; o arden como líneas de fuego. Fiebres altas, fiebre hética. Sudores con mucha sed, disnea o fatiga. Sudor frío. Olas de frialdad helada en las venas o de intenso calor hirviente. Fiebre intermitente, fiebre amarilla.

COMPLEMENTARIOS:

All-s; Carb-v; Lach; Nat-s; Pho; Puls; Sul; Thu.

RELACIONES:

Sul-ac; Ver-s.

ARSENICUM IODATUM

GENERALIDADES:

Debería pensarse en este medicamento cuando las descargas de las Membranas Mucosas son persistentemente acres, profusas, espesas, pegajosas, amarillas como miel, en afecciones crónicas; y delgadas en condiciones agudas. Las descargas causan Ardor en la parte donde fluyen. Los síntomas son muy similares a los síntomas en etapas tempranas de la tuberculosis, con temperaturas que se

elevan por las tardes. En estados inflamatorios crónicos de los pulmones y tubos bronquiales, la espectoración es amarillo-grisácea, como pus, con respiración corta, y hay una postración profunda, emaciación, fiebre recurrente, sudores y tendencia a la diarrea. Es un remedio para corazón senil y miocarditis y degeneración grasosa del corazón. Corazón debilitado por afecciones crónicas del pulmón. Sensación de pesadez que aparece en varias partes. Tumores axilares. Eretismo debilitante; debilidad.

AGRAVACION:

Tiempo seco, frío. Tiempo ventoso, nublado. Ejercicio. En una habitación. Humo del tabaco.

MEJORIA:

Al aire libre.

MENTE:

Incapaz de estudiar, el estudio causa dolor de cabeza.

CABEZA:

Vértigo con sensación temblorosa, especialmente en ancianos. Cefalea sorda y pesada, a través de la frente u occipucio. El estudio causa cefalea. Dolor sobre la raíz de la nariz; como si se volviera tonta.

OJOS:

Los globos se sienten pesados.

OIDOS:

Otorrea fétida. Tímpano engrosado. Hipertrofia del tubo eustaquiano; sordera por.

NARIZ:

Gotea agua que es caliente, verde, acre, y enrojece el labio superior. Estornudos persistentes pero insatisfactorios. Comezón en la nariz con deseo constante de estornudar. Coriza con disnea. Catarro post-nasal. Fiebre de Heno. Influenza. Catarros con hambre.

CARA:

Dolorimiento de los huesos maxilares. Cáncer de los labios.

GARGANTA:

Ardor vivo, tonsilas inflamadas. Faringitis folicular crónica. Bocio.

ESTOMAGO:

Sed intensa, con deseo de agua fría que es arrojada inmediatamente. Vómito una hora después de los alimentos. Náusea incomodante.

ABDOMEN:

Diarrea y disentería; evacuaciones rosantes, blancas y transparentes. Glándulas mesentéricas crecidas. Inflamación dolorosa en la ingle derecha que se extiende a la pierna.

MUJERES:

Bulto en las mamas < contacto. Pezón retraído. Leucorrea fétida, sanguinolenta, amarilla irritante, con inflamación de los labios. Emaciación de las mamas.

RESPIRATORIO:

Respiración corta; necesidad de aire. Tos seca. Expectorcación amarillo-verde, fétida. Asma en ptisis. Neumonía que no se aclara. Calor ardiente en el pecho. Pleuresía tubercular. Ronquera. Afonía.

CORAZON:

Irritable, débil. Pulso rápido, irritable.

CUELLO Y ESPALDA:

Calor ardiente en la región lumbar, como si las ropas estuvieran ardiendo.

EXTREMIDADES:

Dolor en el húmero < escribiendo. Ropa que se siente fría > caminando.

PIEL:

Seca, áspera, polvosa. Psoriasis. Ictiosis. Exfoliación marcada de la piel en escamas grandes que dejan una superficie exudada por debajo. Acné duro, como municiones. Bubo venéreo. Eczema de la barba < lavándose.

FIEBRE:

Fiebre recurrente con sudor. Sudores nocturnos empapantes, con debilidad. Escalofrío, no puede soportar el frío.

COMPLEMENTARIO:

Kali-io.

RELACIONES:

Kali-bi.

ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM

GENERALIDADES:

La leucoderma se supone estar favorablemente influenciada por este remedio. Hay mejoría por el vapor o por agua caliente.

ARTEMISA VULGARIS

GENERALIDADES:

Tiene un lugar predominante en enfermedades convulsivas de la infancia y niñas en la pubertad. El paciente está irritable y excitable antes del ataque de epilepsia. Epilepsia; sin aura; después de un susto o pena; después de un golpe en la cabeza; con perturbaciones menstruales. Ataques que se acompañan o están seguidos por un sudor profuso y ofensivo con olor de ajo; y emisiones seminales. Sonambulismo. Se levanta por la noche y trabaja pero no recuerda nada por la mañana. Corea con incapacidad de deglutir. Lado derecho convulsionado, izquierdo paralizado. La luz de color produce somnolencia. Petit Mal (Pequeño Mal). Camina por la calle, de pronto se detiene, mira fijamente el espacio, con frecuencia musita unas pocas palabras, recupera la normalidad, y no recuerda nada. Inclinación a robar.

ARUM TRIPHYLLUM

GENERALIDADES:

Es un veneno irritante que causa excitabilidad mental e irritabilidad corporal. Las Membranas Mucosas de la boca, Garganta y Laringe, están afectadas prominentemente. Las Descargas son Acres, causando Inflamación Dolorosa, Aspereza y Ardor de las partes. Aspereza con comezón. Dolor punzante y espasmódico. Los niños pierden el apetito, no quieren jugar; pierden carnes; tienen cefaleas.

AGRAVACION:

Abuso de la voz. Hablando, cantando. Frío, humedad; vientos fríos. Calor. Acostándose.

MENTE:

Excesivamente travieso y terco. Nervioso. Escarbamiento Persistente de la Nariz; o rascado de los labios, dedos, en un punto hasta que lo enrojece y sangra, especialmente en niños.

CABEZA:

La hunde en la almohada. El niño pone las manos detrás de la cabeza y grita durante la cefalea. Cefalea < ropas tibias y café caliente.

OJOS:

Temblor del párpado superior (izquierdo). Pesados, somnolientos.

NARIZ.

Coriza acre y fluída. Nariz tapada, debe respirar por la boca. Obstrucción con descarga fétida, estornudos < por la noche.

CARA:

Labios; secos, hinchados, ardorosos, agrietados; Comisuras de los labios doloridas.

BOCA:

Sensación de ulceración en el velo del paladar. Boca con ulceración dolorosa, inflamada. Aftas. Saliva profusa y acre. Lengua agrietada y sangrante. Lengua de fresa.

GARGANTA:

En carne viva, enrojecida, dolorosa al aclararla, o toser, aún así trata de agarrársela, y arañarla. Hinchazón de las glándulas de la garganta y cuello.

ABDOMEN:

Diarrea. Evacuaciones como harina de maíz. Evacuaciones delgadas, que escapan por el ano y mantienen las partes ulceradas y ardientes.

URINARIO:

Secreción de orina muy escasa. Uremia.

RESPIRATORIO:

Voz, ronca, chillona o quebrada. Garganta inflamada de los clérigos. Sensación de carne viva en el pecho. Asma de Heno.

PIEL:

Comezón de dedos y dedos del pié. Las erupciones dejan una marca rojo brillante. Pénfigo. Impétigo contagioso.

COMPLEMENTARIO:

Nit-ac.

RELACIONES:

Ars; Merc-c.-

ASAFOETIDA

GENERALIDADES:

Manifestaciones histéricas e hipocondríacas están cubiertas por este remedio. Aunque el paciente es de complejión fuerte y aspecto robusto, es intolerablemente nervioso e Hipersensible. En el tracto digestivo produce flatulencia y contracciones espasmódicas del estómago y esófago, con peristalsis invertida, todo se sale, nada entra. Afecta huesos y periostio; caries de huesos y ulceraciones profundas se ven favorablemente influenciadas por el remedio. Accesos de latidos duros y violentos. Los dolores son presivos, agudos, punzantes se extienden hacia afuera; asociados con entumecimientos; cambian de lugar y se > por el contacto. Dolor fastidioso de los huesos. Recaídas fáciles. Azulosidad. Secreciones fétidas, delgadas y acres. Como un clavo o algo punzante que se introdujera. Torceduras y convulsiones en los músculos. Fístulas con pus fétido. Todas las glándulas en el cuerpo están calientes y laten. Dolores tirantes y sacudientes. Niños torpes. Obesidad. Síntomas del lado izquierdo. Músculos

ondulantes y que se tuercen. Malos efectos de erupciones suprimidas en la piel, o descargas suprimidas. Neuralgia de muñón, después de una operación. Desórdenes nerviosos por erupciones de piel suprimidas.

AGRAVACION:

Noche; en una habitación. Descanso. Comiendo. Supresiones. Mercurio. Ruido. Sentándose. Cubiertas tibias.

MEJORIA:

Movimientos al aire libre. Presión; contacto. Por rascarse.

MENTE:

Inconstante, no puede perseverar en nada. Hoy quiere una cosa, luego otra, camina aquí y allá. Magnífica sus síntomas. Desea simpatía. Histeria por supresión súbita de descargas. Desvanecimientos durante el dolor. Se desvanece cuando cree que ha tomado medicina. Desmayos; casi sin causa, en un cuarto cerrado, excitación o perturbación, después de emisiones. Histeria con mucho problema alderredor de la garganta o el esófago, se cierra la garganta. Insatisfecho consigo mismo. Se queja de sus problemas. Modo cambiante; accesos de alegría, con estallidos de risa.

CABEZA:

Duele en la región occipital > evacuar.

OJOS:

Dolor de latido en y alderredor de los ojos < por la noche. Neuralgia orbital > presión y descanso. Párpados pegados a los globos. Entumecimiento cerca de los ojos; ulceración de la córnea. Iritis sifilítica.

OIDOS:

Otorrea purulenta y ofensiva, con dureza de oído. Dolor en el mastoides con sensación de empuje hacia afuera.

NARIZ:

Descarga ofensiva por la nariz. Ozena. Caries de los huesos nasales. Tensión sobre los huesos nasales, con adormecimiento.

CARA:

Abotagada, púrpura como con calor. Tubérculos pequeños sobre las mejillas. Hinchazón del labio superior. Entumecimiento de los huesos.

BOCA:

Gusto grasoso, rancio. Masticación constante, con saliva espumosa de la boca; corea.

GARGANTA:

Todo presiona en la garganta. Globo - bola que sube por la garganta. Espasmo del esófago y estómago.

ESTOMAGO:

Eructos explosivos con olor como ajo y gusto rancio. Regurgitación de líquidos. Pulsación en el hueco del estómago; perceptible en la mano y aún visible. Disgusto por todo alimento.

ABDOMEN:

Flatulencia; súbita, empuja hacia arriba, histérica, cólico ventoso, con latidos abdominales. Los intestinos parecen anudados. Diarrea, evacuaciones oscuras, acuosas con olor nauseabundo. Solo pasa moco. Flatos que salen hacia arriba, ninguno por abajo. Calor en el bazo y el abdomen.

URINARIO.

Orina café y de olor picante. Espasmos en la vejiga durante y después de la micción.

HOMBRES:

Punzadas como de aguja en el pene. Desvanecimientos después de emisiones seminales.

MUJERES:

Mamas turgentes con leche, cuando no está embarazada. Leche deficiente con hipersensibilidad. Pesadez en los genitales especialmente mientras se pasea en carro. Reglas; muy adelantadas; muy escasas. duran por un corto tiempo. Leucorrea; profusa, verdosa, delgada; ofensiva.

RESPIRATORIO:

Rigidez espasmódica del pecho, como si los pulmones no pudieran expandirse totalmente. Ataques asmáticos por lo menos una vez al día < ejercicios corporales, coito, satisfaciendo comidas. Espasmos de la glotis, alternando con contracción de dedos de manos y pies.

CORAZON:

Palpitaciones como temblores. El corazón parece lleno, distendido. Síntomas reflejos del corazón de origen nervioso.

EXTREMIDADES:

Dolor y sensibilidad en la tibia; intolerable < noche. No puede trabajar debido al dolor de espalda. Inflamación fría alrededor de los tobillos. Temblores convulsivos > sosteniéndolos.

PIEL:

Erupciones de vesículas llenas de aire. Ulceras azulosas, con orillas extremadamente sensibles > rascándolas. Viejas cicatrices que se vuelven purpúreas y ulceradas. Acumulamiento de pus fétido.

COMPLEMENTARIOS:

Caus.Pul.

RELACIONES:

Aur; Chin; Lach; Merc; Sumb; Val.

ASARUM EUROPOEUM

GENERALIDADES:

Asarum produce un notable estado de HIPERSENSIBILIDAD DE LOS NERVIOS: no puede soportar el rasguño en seda, lino, o crujido del papel, no sólo eso, aún la idea de que alguien pueda hacerlo con el dedo o la uña, produce un estremecimiento desagradable a través de todo el cuerpo. Temblores fríos por cualquier emoción es también un síntoma marcado. Presión, tensión y sensación contractiva, también son rasgos sobresalientes; el paciente piensa que todo su cuerpo, o partes individuales están siendo presionadas unas con otras. Es adecuada para hombres intelectuales de hábitos sedentarios que se estremecen con el frío o siempre tienen frío. Descargas Mucosas son espesas. Ligereza como si se flotara. Bebedores.

AGRAVACION:

Sonidos Penetrantes. Tiempo frío y seco. Emociones. Arcadas, (excepto la cabeza).

MEJORIA:

Baños fríos; de la cara. Tiempo húmedo, humedad.

MENTE:

Desvanecimiento gradual de los pensamientos. Sensación estúpida en la cabeza > arcadas. Sensación de ligereza como si flotara, caminando al aire libre.

CABEZA:

Cefalea compresiva. Tensión del cuero cabelludo; no soporta peinarse.

OJOS:

Ardor y acuosidad en los ojos. Astenopía. Dolores punzantes en el ojo; después de operaciones.

OIDOS:

Escucha dolorosamente sensitiva. Sensación de taponamiento; con coriza. Sensación de que la piel estuviera estirada sobre el oído externo (D).

NARIZ:

Coriza con estornudos.

CARA:

Sensación tibia sobre la cara > agua fría.

BOCA:

Acumulación de saliva líquida fría en la boca con náusea. El tabaco sabe amargo cuando se fuma. Lengua limpia. Sabor desagradable.

ESTOMAGO:

Arcadas vacías y violentas < todos los síntomas, (excepto los de la cabeza). Vómito violento con diarrea y cólico violento. Deseo de bebidas alcohólicas. Sensación horrible en el epigastrio al caminar en la mañana; bebedores.

ABDOMEN:

Filamentos de moco amarillo inodoro que pasan por los intestinos. Evacuaciones indigeridas. Evacuaciones < después de comer y beber. Moco filamentososo o gelatinoso en las evacuaciones; colitis mucosa.

MUJERES:

Violento dolor en la espalda baja en la aparición de las reglas, permitiendo escasamente la respiración, < movimiento. Leucorrea tenaz y amarilla. Amenaza de aborto por excesiva sensibilidad de los nervios. Reglas muy adelantadas y muy largas, sangre negra.

RESPIRATORIO:

Tos seca nerviosa. Respiración asmática < olores y frío. Ambos pulmones como apretados por un alambre. Punzadas en la laringe > tos.

EXTREMIDADES:

Ligereza de las extremidades. Sensación de gorgoteo en la patela. Debilidad con tambaleo.

SUEÑO:

Bostezos frecuentes; mucha somnolencia.

FIEBRE:

Escalofrío, partes aisladas se ponen heladas. Sensación fría no > por cubrirse, o por el calor de la habitación. Sudor; agrio, fácilmente excitado.

COMPLEMENTARIOS:

Caus; Puls; Sil.

RELACIONES:

Arg-n; Castor; Ther.

ASCLEPIAS TUBEROSA

GENERALIDADES:

Incrementa las SECRECIONES DE LA PIEL; de las membranas serosas y mucosas - causando sudoración profusa, en pleuro-neumonía, diarrea o condiciones reumáticas, en estados colicuativos. (producen emaciación). Causa dolores agudos, punzantes, hormigueantes < movimiento. Debilidad

excesiva, caminar parece imposible. Adormecimiento de todo el cuerpo. Influenza con pleuresía. Sensibilidad al tabaco. Debilidad y languidez como si se hubiera estado enfermo largo tiempo. Ineptitud para los negocios por dolor en los intestinos y evacuaciones frecuentes.

AGRAVACION:

Movimiento. Respiración profunda. Acostándose. Tabaco. Al levantarse. Por toser.

MENTE:

Memoria débil.

CABEZA:

Dolor > después de un baño de pies.

NARIZ:

Descarga nasal amarilla y pegajosa. Estornudos en niños.

BOCA:

Cubierta gruesa y amarilla de la lengua. Gusto pútrido, de sangre.

ABDOMEN:

Evacuaciones que huelen a huevos podridos; o arden como fuego. Disentería catarral, con dolores reumáticos por todos lados. Evacuaciones con sensación de una corriente de fuego que pasara a través del abdómen.

HOMBRES:

Genitales flojos.

RESPIRATORIO:

Tos seca, con constricción en la garganta. Dolores de pecho > doblándose hacia adelante, < acostándose, respirando. Respiración corta, y débil al caminar. Pleurodinia. Efusión pericardial. Pleuresía. Dolor detrás del pezón izquierdo, con palpitación.

RELACIONES:

Ant-t.

ASTACUS FLUVIATILIS

(Ver CANCER FLUVIATILIS)

ASTERIAS RUBENS (PEZ ESTRELLA ROJA)

GENERALIDADES:

Este remedio produce perturbaciones de la circulación, con pulsaciones y congestión, en cabeza, vientre, pecho, etc. Afecciones nerviosas que incluyen neuralgia, corea, histeria y epilepsia. Tiene una acción decisiva en los órganos femeninos. La epilepsia está precedida por contracciones de todo el cuerpo. Sensación de estiramiento hacia atrás en los ojos, pezones, etc. Cáncer; de mamas. Constitución linfática floja. Corea, quietud solamente cuando las manos están dentro de los bolsillos. Síntomas del lado izquierdo.

AGRAVACION:

Calor. Reglas. Contradicción. Tiempo frío y húmedo. Café. Noche.

MENTE:

Fácilmente excitado por cualquier emoción, especialmente la contradicción; epilepsia. Lloro por la menor emoción. Alucinaciones; oye voces; alejado; entre extraños. Sensación de una desgracia inminente. Temor de malas noticias.

CABEZA:

Oleadas de sangre a la cabeza, con latidos. Calor en la cabeza como si estuviese rodeado de aire caliente. Golpeteo en el cerebro.

OJOS:

Están jalados hacia atrás. Guiños de los párpados.

CARA:

Roja, cara sonrojada. Espinillas a los lados de la nariz, barba y boca. Acné.

ABDOMEN:

Constipación pertinaz. Diarrea; agua café, evacuaciones borbotantes que salen en chorro.

HOMBRES:

Deseo sexual incrementado.

MUJERES:

Deseo sexual violento y constante no > por coito, con agitación nerviosa, con disposición a llorar. El seno izquierdo se siente como si estuviera empujado hacia adentro. Neuralgia dolorosa y sorda en las mamas. Mamas con nudosidades e induraciones; pezones retraídos; cáncer aún en etapa ulcerativa; dolores agudos y lancinantes; glándulas axilares inflamadas, duras y nudosas. Vagina húmeda con sensación de descarga. Torcimiento o incomodidad en el útero.

EXTREMIDADES:

Adormecimiento de las manos y los dedos - lado izquierdo. El dolor de las mamas se extiende a la parte interior del brazo hasta la punta del dedo meñique. Paso inseguro, los músculos se rehúsan a obedecer.

PIEL:

Acné - punto negro, base roja. Psoriasis. Herpes zoster.

RELACIONES:

Murx; Sep.

AURUM METALLICUM

GENERALIDADES:

El oro produce una profunda impresión en la MENTE, ocasionando depresión mental aguda, desesperanza y pérdida del amor a la vida. LA CIRCULACION ESTA PERTURBADA; toda la sangre parece fluir desde la cabeza a las extremidades inferiores. Orgasmos, como si la sangre estuviese hirviendo en todas las venas. Ebulliciones erráticas. Congestión venosa - más a la cabeza y el pecho. Caries de los huesos, especialmente de la nariz; palatino y mastóides. Los dolores de los huesos son taladrantes y cortantes. Los dolores son vagos, obligando a moverse, finalmente atacan al corazón. Hinchazones glandulares e induraciones. Exóstosis, osteítis. Esclerosis de las arterias; coronarias, del hígado, cerebro. Síntomas extremadamente violentos. Discrasia mercuríca, sífilítica. Cronicidad de las enfermedades. El corazón se siente flojo al caminar. Como aire que soplara en las partes. Está adaptado a mujeres nerviosas e histéricas; jovencitas en la pubertad; niños desfallecientes; ancianos con enfermedades del corazón; a personas bajas de espíritu, sin vida, memoria débil; y sensibles al dolor; que los lleva a la desesperación. Malos efectos de una pena, susto, ira, desilusión amorosa, contradicción, disgusto reservado. Ansiedad prolongada; responsabilidad fuera de lo usual. Pérdida de propiedades. Desesperado con enfermedad del corazón; esperanzado con enfermedad de pulmón. Ulceras cancerosas. Necrosis. Hidropesía.

AGRAVACION:

Emociones. Depression; afectos desordenados. Fatiga Mental. Frío, tiempo. Noche - Desde la puesta del sol hasta su salida. Mercurio, Alcohol. Yoduro de Potasio. Tiempo nublado. Invierno.

MEJORIA:

Fresco; Aire libre. Baños fríos. Calentándose. Música. Caminando. A la luz de la luna.

MENTE:

Depresión intensa y desesperanzada; disgusto por la vida. Habla de cometer suicidio. Angustia suicida. Enojado y vehemente a la menor contradicción o alegre, alternadamente. Melancolía incubada; alternando con irritabilidad y malhumor. Sentimiento de condenación y total falta de autoaprecio. Llora, reza y se autoreprocha, por enfermedad de corazón. Locuacidad. Cuestionamiento rápido, sin esperar una respuesta. Teme el mínimo ruido. Memoria débil. Disposición molesta. Histeria violenta; con

acciones desesperadas; se azota asimismo, etc. Autoreproches; autocrítica. Humor cambiante. Hace todo mal y piensa que ha descuidado algo; sus amigos; sus deberes. Indisposición a hablar. Odioso y regañón. Ve el futuro negro. Gruñón.

CABEZA:

Dolor violento en la cabeza causando confusión. Cefalea de los estudiantes, con ansiedad precordial y oleadas de calor a la cabeza. Cabeza caliente y llena. Exóstosis con dolor taladrante. Vesículas en el cuero cabelludo. Bultos bajo el cráneo. Calvicie por sífilis. Como aire que pasara por el cerebro.

OJOS:

Fotofobia. Hemiofía; mitad superior de los objetos es invisible. Las órbitas se sienten dolorosas. Glaucoma. Pupilas; irregulares. Cuerpos amarillos crecientes flotando oblicuamente hacia arriba. Puntos negros, flamas, destellos, ante los ojos. Todo parece azul.

OIDOS:

Caries del mastoides. Otorrea obstinada fétida. Sordera nerviosa con habla difícil. Hipersensibilidad al ruido pero > música.

NARIZ:

Ulcerada, inflamación dolorosa - caries; descarga fétida, purulenta, sanguinolenta. Punta de la nariz roja, protuberante. Ozena, respingada.

CARA:

Congestionada, rojo-azulosa. Parótidas inflamadas, dolorosas al tacto. Dolor en el cigoma. Erupción fina en los labios, cara o frente.

BOCA:

Olor ofensivo; en jovencitas durante la pubertad. Lengua como cuero, dura. Gusto lechoso o dulce, malo incluso con el agua. Verrugas en la lengua. Caries de los dientes. Ulceras en el paladar. Encías inflamadas, oscuras, rojas, sangrantes.

GARGANTA:

Punzadas al deglutir. Caries del paladar. Las bebidas se vuelven por la nariz.

ESTOMAGO:

Ardor en el estómago, con agruras calientes. Deseo de leche y café. Pérdida de apetito en niños lánguidos. Sed. Apetito voraz.

ABDOMEN:

Región del hígado caliente y dolorosa. Hepatitis. Ictericia; de embarazo. Hígado con síntomas de corazón. Ascitis, con afecciones cardíacas. Constipación > durante las reglas. Evacuaciones, nudosas, duras, grandes. Verrugas cerca del ano. Gruñidos y retumbos en. Hernia inguinal en los niños.

URINARIO:

Orina turbia, como mantequilla. Dolorosa, retención paralítica.

HOMBRES:

Dolor e inflamación de los testículos-orquitis. Atrofia de los testículos en jóvenes. Hidrocele; en niños. Induración crónica de testículos. Sarcocele. Epididimitis.

MUJERES:

Esterilidad sífilítica; también en aquellas mujeres deprimidas mentalmente debido a su esterilidad. Utero grande y prolapsado. Rezumamiento constante de la vulva. Vaginismo. Dolores de parto que la desesperan. Problemas uterinos, < estirándose con los brazos en alto. Induración y ulceración del vientre por abortos repetidos. Leucorrea < caminando. Amenorrea con mucha tristeza. Reglas atrasadas y escasas.

RESPIRATORIO:

Peso aplastante bajo el esternón < ascendiendo. Disnea < por reír, en la noche. Tos seca, nerviosa, espasmódica, peculiar en las mujeres, desde la puesta del sol hasta el amanecer. Siempre hace inspiraciones profundas, y no puede tomar suficiente aire.

CORAZON:

Sensación como si el corazón dejara de latir, inmediatamente seguido por un rebote fuerte. Opresión en el corazón. Palpitaciones violentas; en la pubertad. Hipertrofia cardíaca. Angina de Pecho. Enfermedad de las aortas. Arterias carótidas y temporales laten visiblemente. Pulso rápido, débil, irregular. Presión sanguínea alta. Se siente flojo al caminar. Palpitaciones que lo obligan a detenerse. Corazón magullado, adolorido < por supresión de sudor en los pies.

CUELLO Y ESPALDA:

Glándulas cervicales hinchadas, como cuerda nudosa. Como si la espina baja se abultara hacia atrás. Músculos lumbares dolorosamente rígidos, los muslos no se pueden elevar. Enfermedad de Pott.

EXTREMIDADES:

Dolores nocturnos de las piernas. Se sostiene el brazo izquierdo durante un ataque de palpitaciones. Rodillas débiles. Sensación paralítica en las piernas. Uñas que se vuelven azules. Dolores en las dos rodillas, como si estuvieran fuertemente vendadas. Pies temblorosos. Plantas calientes y magulladas por la noche. Sudor de pies frío y fétido.

SUEÑO:

Inquietud, con sueños ansiosos y espantosos. Solloza fuerte en sueños. Perturbado por excitación sexual.

PIEL:

Lipoma. Verrugas. Acné.

FIEBRE:

Sensibilidad dolorosa al frío. Estremecimientos en la cama. Frío y húmedo todo. Sudor cerca de los genitales.

RELACIONES:

Merc.

AURUM MURIATICUM

GENERALIDADES:

Es un remedio sicótico, causa que las descargas suprimidas reaparezcan. Afecciones catarrales y glandulares están marcadas. Degeneraciones escleróticas y exudativas del sistema nervioso. Valioso en hemorragias del útero en el climaterio. Verrugas que aparecen en varias partes; en la lengua, en genitales. Cáncer de la lengua. Lengua tan dura como el cuero. Desea compañía, si se le deja solo, no piensa más que en sus propias enfermedades y se pone de peor humor. Hipertrofia de todos los dedos. Malos efectos por disgustos, susto, vejación.

AGRAVACION:

Ascendiendo escaleras. Calor.

MEJORIA:

Frío; tiempo, baños.

AVENA SATIVA

GENERALIDADES:

Avena Sativa (avena común) mejora la nutrición del cerebro y el sistema nervioso. Es útil pues, en la fatiga nerviosa, debilidad sexual; debilidad después de enfermedades extenuantes. Temblores nerviosos de los ancianos, parálisis agitante, corea y epilepsia. Incapacidad de mantener la mente fija en algún asunto, especialmente cuando se debe a masturbación. Malos efectos del hábito de la morfina. Insomnio.

DOSIS:

10 a 30 gotas de tintura deberán darse en agua caliente.

BACILLINUM

GENERALIDADES:

Este nosode está preparado de un esputo tuberculoso. Está indicado en condiciones catarrales crónicas, de los pulmones cuando la broncorrea y la disnea están presentes. Disposición constante a resfriarse. Meningitis tuberculosa. Eczema de los párpados. Tiña, pitiriasis. Las glándulas del cuello están crecidas y sensibles. Util como un remedio intercurrente.

AGRAVACION.

Por la noche y temprano por la mañana. Aire frío.

COMPLEMENTARIO:

Calc-p; Kali-c; Lach.

BADIAGA

GENERALIDADES:

Badiaga es el nombre ruso de la esponja de río. Provoca dolorimiento en los músculos y la piel < movimiento, y fricción de las ropas. Las glándulas están inflamadas. Paresis general. Bubas; chancros. Carcinoma, de los senos. Sífilis infantil.

AGRAVACION.

Frío; aire. Tiempo tormentoso. Presión. Contacto.

MEJORIA:

Calor; habitación tibia.

MENTE:

Después de emociones placenteras - palpitaciones.

CABEZA:

Como crecida y llena. Dolor en la frente y las sienas que se extiende a los globos. Cráneo dolorido. Caspa. Cefalea, con inflamación de los ojos.

OJOS:

Neuralgia de los globos oculares que se extiende a las sienas. Espasmo de párpado (izquierdo),

OIDOS:

Los sonidos ligeros están muy acentuados.

NARIZ:

Coriza, estornudos, descarga acuosa, con respiración asmática y tos sofocante.

BOCA:

Caliente. Mucha sed, Aliento caliente.

GARGANTA:

Tonsilas inflamadas, abultadas < tragando sólidos.

ESTOMAGO:

Dolores lancinantes en el hueco del estómago que se extiende a las vértebras, y escápula.

HOMBRES:

Sífilis en infantes. Chancros. Bubas.

MUJERES:

Carcinoma de las mamas. Metrorragia < noche, con sensación de cabeza crecida.

RESPIRATORIO:

Tos < por la tarde > habitación caliente; tos excitada por dulces, azúcar, etc. Expectoración vuela desde la boca y las alas de la nariz.

CORAZON:

Palpitación trémula. Los latidos del corazón se sienten desde el pecho al cuello < acostándose sobre el lado derecho. Incomodidad; dolorimiento, dolor cerca del corazón, punzadas por todos lados.

PIEL:

Sensible al tacto. Pecas. Cicatrices elevadas y descoloridas.

COMPLEMENTARIOS:

Iod; Merc; Sul.

BAPTISIA TINCTORIA

GENERALIDADES:

Indigo Salvaje de América, tiene su reputación como un remedio de la fiebre tifoidea. Afecta la SANGRE, causando condiciones sépticas, fiebre baja y envenenamiento malárico. Sensación de ADOLORIMIENTO, PESADEZ E INFLAMACION DE MUSCULOS muy marcada. La Postración es rápida; la cama se siente muy dura debido al dolorimiento de los músculos, pero se siente muy débil para moverse. Las Membranas Mucosas se vuelven oscuras. Descargas; evacuaciones; hemorragias, etc. son de color oscuro. Manchas oscuras que aparecen sobre el cuerpo. FETIDEZ; olor del cuerpo;

aliento; de excreciones; evacuaciones; sudor, orina, etc. Café; fuliginosidades, evacuaciones, reglas. Ulceras por decúbito. Influenza. Toxemia intestinal crónica en los niños, con excrementos y eructos fétidos. Cuerpo inanimado pero mente inquieta. Insensible al dolor. Las partes se sienten dormidas o muy grandes. Inquietud, siempre se frota las manos, histérico. En baja potencia incrementa el poder de resistencia del cuerpo contra la tifoidea. Malos efectos de las inyecciones de suero antitifoideo.

AGRAVACION:

Calor húmedo. Niebla. En una habitación. Presión. Caminando. Al despertar. Aire libre. Viento frío. Otoño. Tiempo caliente.

MENTE:

Sensación de DUALIDAD. Aversión por ejercicio físico y mental. Piensa que está quebrado o es doble. LAS PARTES SE SIENTEN SEPARADAS o dispersas. Se revuelca en la cama tratando de juntar las piezas. Desesperanza de recuperarse; y seguro de su muerte. Torpe y confundido. Cae dormido mientras contesta o no completa lo que va a decir. Titubeante, balbuceante, delirio. Indiferencia absoluta. Perplejo. Imagina que sus miembros se platican entre sí.

CABEZA:

La siente muy grande, pesada, dormida. Como por un golpe o dolor pesado en el occipucio. Vértigo con sensación de debilidad especialmente en los miembros inferiores y rodillas. El vértice se siente como si fuera a volar. Cerebro con sensación de dolor.

OJOS:

Párpados pesados. Los ojos se sienten hinchados. Medio cerrados.

OIDOS:

Primero sordera en condiciones tipo tifoidea.

NARIZ:

Dolor en la raíz. Epistaxis de sangre obscura. Ilusión de olor como de plumas quemadas.

CARA:

OBSCURA, EMPAPADA, IDIOTIZADA, estúpida. Músculos de la quijada rígidos. Labios agrietados, sangrantes.

BOCA:

Franjas café en el centro de la lengua. La lengua se siente quemada. Aliento fétido. Habla farragosa. Ulceras en la boca. Gusto insípido, amargo. Boca obscura, roja, tumefacta. Lengua; agrietada; sangrante; se siente gruesa o está fuertemente cubierta. Caída de la mandíbula inferior. Saliva viscosa. Boca inflamada. Tonsilas y paladar hinchados.

GARGANTA:

Roja, oscura, tumefacta. Adormecida en el interior, pero sensible al exterior. Sólo puede pasar líquidos, el mínimo alimento sólido provoca náusea. Constricción del esófago en el orificio cardíaco. Ulceras rasgadas en la garganta. Espasmos del esófago.

ESTOMAGO:

Sensación de hundimiento en el estómago. Vómito fácil. Dolor en la región epigástrica. Sensación de una sustancia dura. Ataques súbitos de vómito y diarrea, con fiebre. Fiebre gástrica. Todos los síntomas son < por la cerveza.

ABDOMEN:

Región ilíaca derecha sensible. Adolorimiento de la vesícula biliar, con diarrea. Diarrea - súbita, horriblemente fétida, musgosa, indolora, oscura, laminada, o sanguinolenta. Disentería - de los ancianos; con dolor en las piernas, espalda baja y estremecimientos. Disentería indolora; con fiebre. Toxemia intestinal de los niños, con evacuaciones fétidas y eructos. Estrechez por hemorroides.

URINARIO:

Orina; escasa, rojo oscura, alcalina; fétida, verde claro. Uremia.

HOMBRES:

Orquitis. Dolor presivo en los testículos como retorcidos.

MUJERES:

Amenaza de aborto, por choque mental, depresión, fiebres bajas. Reglas; muy adelantadas, muy profusas. Loquios; acres, fétidos. Fiebre puerperal. Estomatitis de las madres que amamantan.

RESPIRATORIO:

Respiración difícil por debilidad del pecho < al caminar, > estando de pié. Desea aire. Asma bronquial. Los pulmones se sienten tensos y comprimidos. Miedo de dormir debido a la sensación de sofoco y las pesadillas.

CORAZON:

Pulso primero acelerado, luego lento y desvaneciente.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello cansado, no puede mantenerse fácilmente en ninguna posición. Dolor en el sacro cerca de las caderas y piernas. Espalda adolorida y magullada. Se siente como acostado en una tabla. Los síntomas irradian desde la espalda baja.

EXTREMIDADES.

Rigidez y dolor, adolorimiento y tirones en brazos y piernas.

SUEÑO:

Somnoliento, estúpido y lánguido; se escurre de la cama. Pesadillas, y sueños horrorosos. Yace enroscado como perro sobre un lado.

PIEL:

Manchas lívidas en todo el cuerpo y las extremidades.

FIEBRE:

Hiperpirexia. Fiebres adinámicas, tifoidéicas; fiebre de abordo. El sudor mejora. Influenza gástrica.

RELACIONES:

Arn; Gel; Hyo; Lach; Mur-ac; Op; Rhus-t.

BARYTA CARBONICA

GENERALIDADES:

Tiene una marcada influencia en el CRECIMIENTO, especialmente de los niños y los ancianos, que se vuelven infantiles. En los niños el crecimiento está retardada; se vuelven enanos, mental y físicamente; los niños se tardan en llegar a ser útiles, tomar sus responsabilidades y hacer su trabajo. Torpes, apáticos; o marásmicos. Hay una tendencia al crecimiento de glándulas, con induraciones, especialmente anginas, cervicales y próstata. Postración; cansancio; inclinación constante a acostarse, sentarse, o recargarse en algo. La parte superior del cuerpo se siente rígida y entumida. Demasiado cansado aún para comer. Es un remedio para la senilidad precoz y cuando cambios degenerativos en los ancianos empiezan en el corazón, cerebro y sistema vascular. Tendencia a resfriarse, y cada vez, las anginas se inflaman. Efectos paralíticos. Los síntomas aparecen en partes aisladas, como parálisis, entumecimientos, ardores. Sensación como de estar forzado a pasar por partes estrechas, es muy peculiar. Reblandecimientos vasculares y dilataciones, aneurisma, rupturas, apoplejía. Malos efectos de una supresión de sudor de pies. Quistes. Sarcoma con ardor. Lipoma. Emaciación de personas que estuvieron bien nutridas. Somnolencia y cansancio al menor ejercicio.

AGRAVACION.

Compañía. Pensando en sus síntomas. Humedad fría. Frío en la cabeza o los pies. Yaciendo sobre la parte dolorosa; lado izquierdo. Olores. Calor del sol, de una estufa. Levantando los brazos. Comiendo.

MEJORIA:

Alimentos fríos. Cubiertas tibias. Estando solo.

MENTE:

Comprensión lenta; tonto; absurdo y retrasado. Comportamiento infantil e impensado. Tímido. Cobarde. Rezonga por todo. Humor quejumbroso. Debilidad mental creciente. Mente omnubilada. Mala memoria. Olvida sus recados, o la palabra en su boca. Irresoluto. Desconfiado. Tímido ante los extraños. Piensa que sus piernas están cortadas y camina sobre sus rodillas. El niño no quiere jugar y se sienta en una esquina sin hacer nada. Los niños no pueden recordar ni aprender. Pena por nimiedades.

Piensa que se están riendo y burlándose de él. Se esconde detrás de los muebles y pone sus manos sobre su cara, atizbando por entre los dedos. Siempre se preocupa. Pérdida de auto-confianza. Manía de hablar; durante las reglas, en jovencitas. Idiocia.

CABEZA:

Vértigo- de los ancianos; con náusea < agachándose; cuando se levantan los brazos. El cerebro se siente suelto, > al aire libre. Calvicie en el vértice. Lobanillos en el cráneo. Presión dura sobre los ojos. Erupciones secas o costras húmedas en el cuero cabelludo. Dolores punzantes estando bajo el sol.

OJOS:

Pupilas dilatadas y contraídas rápidamente. Presión profunda en los ojos > viendo hacia abajo. La luz deslumbra. Córnea opaca. Párpados; granulares; engrosados. Destellos fuertes delante de los ojos, en la obscuridad.

OIDOS:

Ruidos crujientes; < deglutiendo, caminando. Las glándulas cercanas al oído están dolorosas e hinchadas. Erupción en los lóbulos de las orejas. Dureza de oído. Sonidos al estornudar.

NARIZ:

Seca, < sonándola. Coriza, con hinchazón del labio superior y la nariz (niños con abdomen grande). Sensación de humo en la nariz. Descarga de moco espeso amarillo; costras alrededor de las alas nasales. Epistaxis.

CARA:

Pálida, abotagada; sensación como de una tela de araña. Labio superior hinchado. Labios colgantes.

BOCA:

Lengua; débil, paralizada, dura en ancianos, no puede hablar. Dolorimiento ardoroso o vesículas en la punta o bajo la lengua. Dolor de muelas < antes de las reglas. La boca se siente entumida. Toda la boca llena de vesículas-especialmente dentro de las mejillas. La saliva corre mientras está dormido. Mal aliento, desapercibido por él. Sangramiento considerable y frecuente de las encías.

GARGANTA:

Las anginas se ven afectadas por cada resfrío, o < reglas. Sinanquia crónica. Anginas crecidas. Espasmos del esófago, tan pronto como la comida llega a él, causando arcadas y atragantamiento. Dolor en la garganta, < deglutiendo en vacío. Solo puede tragar líquidos. Aflujo de agua; súbito. Glándulas submaxilares hinchadas. Mucho ardor en la garganta. Problema de garganta por abuso de la voz.

ESTOMAGO:

Punto doloroso en el estómago. Hambriento pero rehúsa el alimento. Aversión a las cosas dulces, frutas, especialmente ciruelas. Desagrado súbito mientras come. Dispepsia de jóvenes que se masturban o con emisiones seminales. Dolor mientras ayuna y después de comer. Digestión débil en ancianos, con malignidad posible, > por alimentos fríos.

ABDOMEN:

Duro y tenso, sensible, distendido, con emaciación del cuerpo. Diarrea con dolor lumbar. Como si los intestinos cayeran a un lado y otro, al voltearse en la cama. Evacuaciones; duras, nudosas. Hemorroides procliventes, al orinar. Hormigueo en el recto. Rezumamiento en el ano. Cólico habitual en niños que no prosperan, y que estando aparentemente hambrientos, rehusan comer. Glándulas mesentéricas duras e inflamadas.

URINARIO:

Urgencia de orinar, no puede retener la orina. Ardor en la uretra, mientras orina. Micción frecuente. Orina; café oscura, escasa.

HOMBRES:

Genitales flácidos. Glándula prostática crecida. Testículos indurados. Impotencia. Emisiones prematuras. Erecciones mientras maneja. Se queda dormido durante el coito. Los genitales se sienten entumidos. Nódulos dolorosos en las mamas, en hombres gordos y viejos.

MUJERES:

Reglas escasas, duran solamente un día. Antes de las reglas, dolor en el estómago y región lumbar. Genitales entumecidos. Disminución de ovario y glándula mamaria. Amenorrea. Leucorrea inmediatamente antes de las reglas.

RESPIRATORIO:

Afonía parálitica. Asma; de los ancianos, < mojándose, aire tibio. La laringe se siente como si se hubiese inhalado aire. Los pulmones se sienten llenos de humo. Tos < en presencia de extraños, comiendo alimentos tibios. Bronquitis crónica. Tos seca sofocante en ancianos, llenos de moco pero sin fuerza para expectorar.

CORAZON:

Síntomas cardíacos después de la supresión de transpiración de pies o después de la masturbación. El corazón se siente magullado y adolorido. Palpitación e incomodidad en la región del corazón yaciendo sobre el lado izquierdo. Palpitaciones que se sienten en la cabeza. Aneurisma. Pulso; lento, pequeño. Alta presión sanguínea. Arterioesclerosis.

CUELLO Y ESPALDA:

Glándulas del cuello y occipucio hinchadas. Tortícolis crónica. Espina débil. Pulsaciones en la espalda; después de una emoción mental. Tumores grasos sobre el cuello.

EXTREMIDADES:

Dedos entumidos. Miembros que se sienten adormecidos. Temblores de los pies, y de las manos mientras escribe. Plantas del pie que se sienten calientes o magulladas por la noche, durante el sueño. Entumecimiento de las rodillas al escroto > al sentarse. Sudor frío, fétido de los pies.. Dolor en el deltoides < elevando los brazos. Dolor en las rodillas, al hincarse.

PIEL:

Verrugas. Acné. Lipoma. Quistes. Sarcoma ardiente.

SUEÑO:

Habla en sueños (ancianos). Suda partes aisladas, una mano, un pie, un lado del cuerpo, la cara; mal olor de los pies, < en presencia de extraños.

COMPLEMENTARIOS:

Ant-t; Dul; Psor; Sil.

RELACIONES:

Kali-p; Lyc; Med; Pul; Sep; Sil; Tub.

BARYTA IODATA

GENERALIDADES:

Este remedio se usa clínicamente para las glándulas crecidas e induradas, especialmente anginas y pechos. Leucocitosis.

AGRAVACION:

Por caminar.

MEJORIA:

Al aire libre frío.

BARYTA MURIATICA

GENERALIDADES:

Como Bar-c, esta sal también es útil en la ancianidad y la infancia, cuando el enanismo mental y físico está presente. Causa degeneración vascular, causando hipertensión cuando la presión alta sistólica con comparativamente baja tensión diastólica están presentes, con síntomas cerebrales y cardíacos. Es un remedio convulsivo. Ataques convulsivos se presentan periódicamente, con sobresalto y agitación excesiva. Choques eléctricos, con convulsiones. Manía en todas las formas, cuando el deseo sexual está incrementado. Crecimiento de las glándulas e induración, anginas, páncreas. Esclerosis múltiple del cerebro y cordón. Frialdad de hielo del cuerpo, con parálisis. Poder muscular voluntario inefectivo, pero perfectamente sensible. Niños que deambulan con la boca abierta y que hablan a través de la nariz. Gran debilidad, quiere estar acostado. Leucocitosis. El niño yace sobre su abdomen todo el tiempo, para esquivar la luz. Apariencia estúpida. Dureza de oído.

MENTE:

Idiocia. Manía sexual.

CABEZA:

Vértigo debido a anemia cerebral y ruidos en los oídos. Pesadez de la cabeza (ancianos):

OIDOS:

Ruidos; al masticar y deglutir, estornudar. Dolor de oído > sorbiendo agua fría. Otorrea ofensiva.

NARIZ:

Estornudos mientras duerme, sin despertar.

GARGANTA:

Uvula elongada. Anginas crecidas. Se siente muy abierta. Deglución difícil. Espasmos del esófago en el extremo cardíaco, dolores inmediatamente después de comer, con tenesmo en el epigastrio.

ESTOMAGO:

Sensación de vacío en el epigastrio. Sensación de calor que sube a la cabeza.

ABDOMEN.

Latidos incómodos en el abdomen -aneurisma. Induración del páncreas.

URINARIO:

Gran incremento del ácido úrico.

MUJERES:

Ninfomanía. Tumor o atrofia de los ovarios. Esterilidad.

RESPIRATORIO:

Afecciones bronquiales de los ancianos, con dilatación cardíaca; la expectoración es fácil.

EXTREMIDADES:

Calambre en los dedos; mejoran estirando los miembros. Fatiga de las piernas, como si se hubiera caminado mucho, con rigidez de las articulaciones.

BELLADONNA

GENERALIDADES:

Belladonna actúa sobre los centros nerviosos, produciendo espasmos, convulsiones y dolor. Su acción sobre el cerebro, causa excitación furiosa y perversión de sentidos especiales. La circulación en los vasos sanguíneos y capilares se vuelve activa, causando congestión, latidos y dilatación de arterias. Las membranas mucosas se ponen secas. Sus efectos son súbitos y violentos. **ARDOR, CALOR, ENROJECIMIENTO BRILLANTE Y RESEQUEDAD**, están muy marcados. Calientes; cuerpo, partes,

descargas, etc. El enrojecimiento se presenta en rayas. DOLOR NEURALGICO SEVERO, que viene y va súbitamente. PLENITUD, CONGESTION, especialmente a la cabeza e INFLAMACION, son otros rasgos característicos. LOS DOLORES SON PULSATILES; AGUDOS; CORTANTES; TIRANTES; o desgarrantes, de una severidad enloquecedora; yendo y viniendo en ataques repetidos. Las descargas son calientes y escasas. ESPASMOS; CHOQUES; TORCIMIENTOS Y CONTRACTURAS. CONSTRICCIONES que se presentan en partes del cuerpo como garganta, vagina, etc., o en todo el cuerpo. Sensibilidad a la Luz, Ruido; Sonidos. Los ataques epilépticos son seguidos por náusea y vómito. Las convulsiones empiezan en un brazo. Espasmos seguidos por una inconciencia prolongada. El cuerpo se lanza hacia atrás y hacia adelante; corea. Actúa como un profiláctico en la fiebre escarlatina. Bocio Exoftálmico, con toxemia extrema de la tiroides. Hidrofobia. Util en el mareo en viajes por aire. Su influencia es más sensible en personas inteligentes y pletóricas que son joviales y entretenidas cuando están bien, pero violentas cuando enferman, por lo tanto, un excelente remedio para niños. Malos efectos por cortarse el cabello, o por mojarse la cabeza. Salchichas. Sol. Caminando en el viento o corrientes de aire. Hemorragias, calientes. Calor en el cuerpo; las partes están calientes, hinchadas y secas. Síntomas del lado derecho.

AGRAVACION:

Calor del sol; si está acalorado. Corrientes -en la cabeza; corte de cabello; lavándose la cabeza. Después de enfriarse. Luz; ruido; traqueteos. Sudor suprimido, Contacto. Compañía. Presión. Movimiento. Dejando colgar la parte afectada. Por la tarde. Acostándose. Mirando objetos brillantes o agua corriente.

MEJORIA:

Cubriendo la luz. Doblándose hacia atrás, semi-erecto. Descanso en cama. Estando de pié. Recargando la cabeza contra algo. Doblando o volteando la parte afectada.

MENTE:

Agudeza de los sentidos. DELIRIO FURIOSO, excitación furiosa; ruidosa; grita. Habla rápido. Muy inquieto. Muerde, golpea; manía destructiva. Escupe a la cara de otras personas. Ve monstruos, caras escondidas. Miedo de cosas imaginarias. Deseo de escapar, o de esconderse. Perversidad, con lágrimas (niños). Excitable, llora fácilmente. Regañón. Tendencia a bailar, reír, cantar, silbar. Se estremece asustado cuando se le acerca alguien. Gemidos constantes. Deseo de aspirar rapé. Un angel cuando está sano, un demonio estando enfermo. Se sienta y rompe palitos. Síntomas mentales > comiendo alimentos ligeros. El paciente vive en su propio mundo.

CABEZA:

CEFALEA, PULSANTE, MARTILLANTE, < sienes; < movimiento; > con el pelo suelto; poniendo la mano sobre la cabeza; doblando la cabeza hacia atrás. Sensación en el cerebro como chapoteo de agua. Se levanta y cae en olas. Sensación fría en la cabeza a la mitad de la frente. Vértigo < agachándose y levantándose de estar agachado. Hidrocefalia, con hundimiento de la cabeza en la almohada. Los cabellos se dividen, están secos y caen. Rueda la cabeza. Se jala el cabello. Meningitis. Insolación. Los dolores van hacia abajo a partir de la cabeza. Cabeza sensible a las corrientes de aire y al frío, o al lavar el cabello.

OJOS:

PUPILAS DILATADAS.

Ojos centelleantes, prominentes, brillantes. Conjuntiva roja. Alucinaciones fieras, rojas, vívidas; aún al cerrar los ojos. Ataques de ceguera, luego visión amarilla. Ve destellos rojos antes de la visión. FOTOFOBIA. Diplopía. Triplopía. Ceguera a la luz de la luna. Sensación de que los ojos están medio cerrados. Párpados; se sienten inflamados, congestionados y adoloridos. Exoftalmía. Lagrimeo como salmuera. Las líneas aparecen torcidas cuando se lee.

OIDOS:

El dolor causa delirio; el niño grita en sueños. Otitis media. Autofonía - escucha su propia voz en los oídos. Hematoma. Ruidos en los oídos.

NARIZ:

Roja; hinchada. Olores imaginarios; olor de tabaco intolerable. Sangramiento nasal, con cara abochornada.

CARA:

Fiera; ROJA; turgente y caliente; o se pone pálida y roja alternativamente. Hinchazón semilateral de la cara. Distorsión espasmódica de la boca (risa sardónica). Movimiento convulsivo de los músculos de la cara. Neuralgia facial, con torcimiento de músculos y cara abochornada. Mandíbula inferior como jalada hacia atrás.

BOCA:

SECA;

CALIENTE. Lengua; roja, caliente, hinchada. Orillas de la lengua rojas. Lengua de fresa. Línea roja a la mitad de la lengua, más ancha en la punta. Rechinamiento de dientes. La lengua cuelga fuera de la boca (niños). Parte delantera de la lengua fría y seca. Dolor de dientes > por morder. Movimientos de masticación de la boca, como si estuviera masticando o mamando. Tartamudeo. Trismo. Aliento caliente.

GARGANTA:

SECA Y CALIENTE.

Anginas crecidas. Amigdalitis < lado derecho. Necesidad de deglutir, con atragantamiento. La garganta se siente constreñida. Deglución difícil. Bebe en sorbitos. Debe tomar agua para pasar alimento sólido. Cuando traga, mueve la cabeza hacia atrás y levanta las rodillas. Aprieta fuerte, durante la epilepsia.

ESTOMAGO.

Deseo de limonada o limones (que caen bien). Disgusto por carne, ácidos, café, leche, cerveza. Vomita todo, con palidez y debilidad. Gran sed por agua fría. Horror a beber. Hipo espasmódico, con sudor y convulsiones. Dolor en el estómago que se extiende a los hombros y garganta < presión.

ABDOMEN;

Distendido, caliente < tacto de las ropas de cama. Dolor cortante en el epigastrio > doblándose hacia atrás. Colon transversal distendido y prominente, como un cojincillo, durante el cólico abdominal. Calambre y cólico, como si una mano estuviese apretando alguna parte. Dolor agudo en la región del hígado, extendiéndose al hombro y cuello < yaciendo sobre él. Dolor desgarrante alrededor del ombligo. Forzamiento hacia abajo del abdomen, como si las vísceras pudieran salirse por los genitales.

Prolapso agudo del ano. Evacuaciones; verdes, disintéricas o conteniendo bultos como tiza. Evacuaciones involuntarias. Hemorroides, con dolores de espalda como si se rompiera. Dolor en la región esplénica < estornudando, tosiendo o al contacto.

URINARIO:

Micción involuntaria, estando acostado; o al ponerse de pié, o por la noche; durmiendo, durante el día. Retención de orina, con parálisis de la vejiga; post-parto. Orina rojo intenso; micción profusa y frecuente. Hematuria sin condiciones patológicas. Sensación en la vejiga como si un gusano se moviera dentro, sin deseo de orinar.

HOMBRES:

Testículos duros, tirados hacia arriba, inflamados. Sudor en los genitales. Tumor en el glande, suave e indoloro.

MUJERES:

Reglas; brillantes, rojas, con coágulos, muy adelantadas, muy profusas, calientes, borbulleantes, ofensivas. Metritis. Rigidez de los ovarios. Presión violenta en el vientre hacia los genitales, como si todo se fuera a salir, > estando de pié y sentándose erecta < acostándose. Mastitis: dolor de latido, enrojecimiento, líneas que radian desde los pezones. Busto; pesado, duro y rojo. Loquios; disminuídos, calientes, ofensivos. Útil en confinamiento de mujeres que tienen su hijos tarde en su vida. Leucorrea, con cólico. Dolores de parto vienen y se van súbitamente, o cesan.

RESPIRATORIO:

Tos cosquilleante, corta, seca < noche. Laringe muy dolorosa, se siente un cuerpo extraño en ella, con tos. Tos < polvo fino en el aire. El niño llora antes de la tos. Tos < bostezando. Voz de punto alto. Tos o voz ladrante. Tosferina, con dolor en el estómago antes del ataque; con hemoptisis. Respiración de Cheyne-stokes. Gemido en cada respiración. Respiración difícil, corta y rápida. Asma en tiempo caliente y húmedo.

CORAZON:

Latido en las arterias carótida y temporal. Pulso lleno, duro y tenso. Palpitación violenta, con respiración laboriosa. Burbujeo en la región del corazón.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez de cuello y hombro (derecho). Hinchazón de las glándulas de la nuca y el cuello. La espalda se siente quebrada. Lumbago con dolor en las caderas y los muslos.

EXTREMIDADES:

Torcimiento o espasmo de los miembros. Articulaciones inflamadas, rojas, brillantes; con líneas rojas radiantes. Pesadez y sensación paralítica en miembros. Extremidades frías. Cojera involuntaria. Flegmasia alba dolens. Temblor de las extremidades. Debilidad y paso tambaleante. Se acuesta o sienta con los pies cruzados, no puede descruzarlos.

PIEL:

BRILLANTE, ROJA, barnizada. Seca y caliente. Palidez y enrojecimiento de piel alternando. Dermatitis intensa. Escarlatina. Erisipela. Furúnculos que reaparecen cada primavera.

FIEBRE:

Somnoliento, pero no puede dormir. Gime y se revuelca en sueños. ESPASMOS DURANTE EL SUEÑO. Sueños horrorosos de pleitos, fuego, ladrones, asesinos. Ve visiones horribles al cerrar los ojos. Duerme con las manos bajo la cabeza. Sueño pesado con piel caliente.

COMPLEMENTARIO:

Bor; Calc; Hep; Merc; Nat-m.

RELACIONES:

Glo; Hyo; Stram.

BELLIS PERENNIS

GENERALIDADES:

Bellis es conocida comunmente como una hierba para heridas, de allí que como Arnica, sea un gran remedio traumático. Es especialmente útil en trauma profundo, o heridas sépticas de órganos abdominales y pélvicos; después de operaciones quirúrgicas mayores. Remueve los malos efectos de un auto-traumatismo, - excesos de masturbación. Afecta los VASOS SANGUINEOS, causando estasis y venas varicosas. Heridas en los nervios, con dolor intenso > baño frío. Músculos que se vuelven ADOLORIDOS Y MAGULLADOS. Los dolores son duros, molestos, estrujantes, o de latido. Elimina la exudación de hinchazones de muchas clases, debido a una herida. Es un remedio adecuado para viejos trabajadores y agentes viajeros. Los pacientes se sienten cansados y omnubilados, con deseo de acostarse. Furúnculos dondequiera. Efectos inmediatos y remotos; de golpes, caídas, accidentes, púas. Malos efectos por bebidas frías, estando muy caliente; mojándose, o escalofriándose estando muy agitado. Hemorragias. Pus acre que destruye el cabello. Dolor intolerable que lleva a la distracción, < calor > frío. Esguinces y torceduras. Tumores por herida.

AGRAVACION:

HERIDAS;

esguinces. CONTACTO. Baños fríos, o bebidas. Enfriándose estando muy caliente. Baños calientes; calor de la cama. Antes de las tormentas. Operaciones quirúrgicas.

MEJORIA:

Movimiento continuo. Frío (localmente)

CABEZA:

Vértigo; en personas grandes (estasis cerebral). Cefalea desde el occipucio al vértice, o sincipucio. Dolores tirantes.

ESTOMAGO:

Efectos de bebidas frías o heladas estando acalorado.

ABDOMEN:

Adolorimiento de las paredes abdominales. Plenitud alderredor del bazo, y punzadas. Diarrea fétida, indolora, amarilla < por la noche.

MUJERES:

Senos y útero congestionados; el útero se siente estrujado, adolorido. Incapacidad para caminar durante el embarazo. Venas varicosas durante el embarazo.

ESPALDA:

Caídas sobre el cóccix.

EXTREMIDADES:

Dolor en la parte baja anterior de los muslos. Las muñecas se sienten apretadas como por una banda elástica.

PIEL:

Forúnculos por todas partes. Equimosis, inflamaciones sensibles al tacto.

SUEÑO:

Despierta muy temprano, 3 a.m. y no puede dormir otra vez.

RELACIONES:

Am.

BENZENUM

GENERALIDADES:

El Benzol afecta la sangre causando decrecimiento de células rojas e incremento de células blancas, de allí que debería ser usado en la Leucemia. Los pacientes están cansados y nerviosos. Alucinaciones como de una mano muy grande y blanca que se le apareciera en la obscuridad. El dolor viaja de abajo hacia arriba. Sensación de caída de la cama al piso. Ataques epileptiformes, coma y anestesia.

AGRAVACION:

Noche. Lado derecho.

BENZINUM NITRICUM

GENERALIDADES:

Produce desvanecimientos, hundimiento, convulsiones, torcimientos y sopor. Labios, cara y uñas azules. Cabeza tirada hacia atrás, y hacia la izquierda en los espasmos. Rotación de globos oculares en su eje vertical, es un rasgo prominente. Pupilas dilatadas. Nistagmo. Respiración lenta, difícil, suspirante. Evacuación involuntaria. Parálisis de todos los miembros. Las secreciones tienen un fuerte olor a almendras amargas.

BENZOIC ACIDUM

GENERALIDADES:

Es un remedio para la diatesis ácido úrica. La orina está altamente coloreada, muy ofensiva y con síntomas gotosos. Micción profusa y escasa, alternativamente. Los pacientes despiden un fuerte olor a orina. Los dolores súbitamente cambian su localización, pero se sienten más en la región del corazón o se alternan con síntomas urinarios. Dolores que alternan con síntomas de corazón. Insuficiencia renal. Gota y asma. Higroma, juanetes. Enfermedad de Menier. Nódulos gotosos dolorosos. Olor de orina altamente intensificado como un concomitante en cualquier condición de enfermedad. Los síntomas fluctúan de acuerdo a la fluctuación de la orina.

AGRAVACION:

Aire libre. Frío. Tiempo cambiante. Movimiento. Por descubrirse.

MEJORIA:

Calor. Micción profusa.

MENTE:

Inclinado a vivir cosas desagradables. Omite palabras al escribir. Niño travieso, quiere ser alimentado en los brazos y no permite que lo bajen. Estremecimientos si vé algo deformado.

CABEZA:

Duele, cuando la orina se torna escasa. Vértigo con inclinación a caer a los lados.

OIDOS:

Ruidos, como de voces confusas en los oídos < deglutiendo o caminando al aire libre.

NARIZ:

Parece que huele calabazas, polvo, o algo nauseabundo. Comezón en el septo.

CARA:

Manchas color cobre en la cara. Mordida involuntaria del labio inferior mientras come.

BOCA:

Lengua; esponjosa en la superficie, con grietas profundas y úlceras esparcidas. Síntomas de boca y garganta que > comiendo. Dolor de muelas < acostándose.

GARGANTA:

Sensación como de un bulto, inflamación y constricción > comiendo.

ESTOMAGO:

Vómito de substancia salada o amarga. Sudor mientras come.

ABDOMEN:

Sensación cortante alderredor del ombligo > evacuar. Punzadas en la región del hígado. Evacuaciones copiosas grisáceas, como espuma de jabón; de un olor de orina picante; muy fétidas; blancas.

URINARIO:

ORINA, CALIENTE; CAFE OBSCURA; FUERTE, de amoníaco fétido; o con olor a orina de caballo. Enuresis; goteo de orina ofensiva en los ancianos. Las sábanas están muy manchadas de café en la enuresis. Retención de orina en los infantes.

MUJERES:

Prolapso del útero, con orina fétida.

RESPIRATORIO:

Tos, dura, seca; seguida de expectoración de moco verde. Asma con molestias reumáticas. No puede tolerar la presión de las ropas en el pecho. Tos < noche, acostándose sobre el lado derecho.

CORAZON:

Los dolores cambian de lugar, pero son de lo más constante cerca del corazón. Despierta después de medianoche, con pulsaciones violentas o ardor en el corazón.

ESPALDA:

Frialdad en el sacro. Dolor sordo en la región de los riñones; rigidez de los lomos. Temblor en la región lumbar.

EXTREMIDADES:

Crujidos en las articulaciones: en la rodilla. Ganglión de la muñeca. Juanete del dedo gordo del pié. Dolor en el tendón de Aquiles, en los huesos calcáneos, con dolor en el corazón, cuando se dá el paso.

PIEL:

Manchas rojas. Comezón con sensación agradable por ser rascado, pero dejando ardor.

FIEBRE:

Sudor profuso, sin alivio. Sudores nocturnos. Manos, pies, espalda, rodillas, frías, como por viento frío. Sudor con olor aromático.

RELACIONES:

Calc.

BERBERIS AQUIFOLIUM

GENERALIDADES:

Afecta la piel que se vuelve seca, áspera, escamosa, granulosa. Erupciones en el cuero cabelludo que se extiende a la cara y el cuello. Acné. Psoriasis. Eczema seco. Aclara el color. Debería darse en tintura madre y de preferencia en dosis considerables.

BERBERIS VULGARIS

GENERALIDADES:

Actúa sobre los órganos urinarios, cuando hay una tendencia a la formación de cálculos y litemia. Afecta marcadamente al hígado - promueve el flujo de bilis, de allí que es un remedio para personas entradas en carnes con buenos hígados, pero con poca fortaleza. Con frecuencia es útil en afecciones artríticas y hepáticas, con problemas urinarios, hemorroidales o menstruales. Estasis venosa que se presenta en la región pélvica, causando hemorroides. El paciente está física y mentalmente cansado - inclinado a no hacer nada. Mujeres y hombres prematuramente envejecidos y acabados. Los dolores cambian rápidamente su localización y carácter. Rápida alternancia de síntomas, la sed alterna con ausencia de sed; hambre que alterna con pérdida de apetito, etc. Dolores: que irradian; de un punto a otro; tirantes hacia afuera o por todos lados; clavantes; ardientes- punzantes, dolorimiento. Adormecimiento; insensible a calor y frío extremos. Sensación gorgoteante o burbujeante. Membranas mucosas que se ponen secas - boca, vagina, etc. Descargas o piel de color gris sucio. Sensación fría en los huesos, ojos, oídos, etc. El pecho se afecta después de operaciones - hemorroides, fistulas, etc. Ve cosas en el crepúsculo.

AGRAVACION:

Movimiento; sacudidas; por pisar fuerte. Levantándose de estar sentado. Por ponerse de pie. Fatiga. Orinando. Crepúsculo.

MENTE:

Trabajo mental, que requiere pensamiento concentrado, muy difícil, la menor interrupción rompe la cadena del pensamiento. Apático, indiferente. Los objetos se ven dos veces más grande que lo normal. Ve apariciones aterradoras en el crepúsculo; especialmente los niños.

CABEZA:

Sensación como si la cabeza creciera. Sienes frías. Vértigo, con ataques de desvanecimiento. Sensación como de un gorro muy apretado en la cabeza.

OJOS:

Secos. Como con arena en los párpados y ojos. Ojos que se sienten fríos, como por viento frío, con lagrimeo al cerrarlos. Temblor de los párpados al leer. Ojos sumidos; con círculos azul oscuro alderredor.

OIDOS.

Sensación de obstrucción con presión. Nódulos en el pabellón. Tumor detrás de la oreja. Sensación de frialdad y burbujeo dentro.

NARIZ:

Seca. Hormigueo, comezón en los fuelles.

CARA:

Gris sucio, enfermiza. Biliosa. Acné supurante. Sensación como de gotas frías que resbalaran en la cara cuando va al aire libre.

BOCA:

Pegajosa. Saliva viscosa, espumosa, algodonosa. Lengua; se siente escaldada; ampollas dolorosas en la punta. Encías de un gris sucio. Pequeños nódulos blancos en las encías. Los dientes se sienten como muy grandes, o muy largos. Sabor amargo.

GARGANTA:

Sensación de un bulto en el lado de la garganta que está reseco.

ESTOMAGO:

Náusea; antes del desayuno; después de la cena. Dolores que van del estómago a la espalda; o al revés. Náusea antes del desayuno > después.

ABDOMEN:

Sensación de desgarró en el epigastrio. Dolor cólico, de la vesícula al estómago < presión. Cálculos biliares. Evacuaciones; gris sucio, punzantes, tenaces; acuosas con ictericia. Fístula en el ano; con comezón; con molestias en el pecho. Cólico, biliar o urinario que impide la respiración.

URINARIO.

Dolor desde el riñón que se extiende a lo largo de la uretra, o al hígado, estómago, bazo; impidiendo la respiración. Cólico renal. Ardor, adolorimiento o burbujeo en la región del riñón. Descarga clara que viene del meato antes de orinar. Orina; espesa, turbia, amarilla; roja, harinosa, arenosa, o con sedimento limoso. Sensación de que algo de orina quedó después de la micción. La uretra arde cuando no se orina. Dolores en cadera y muslos al orinar. Glándula prostática crecida, con presión en el perineo. Disuria.

HOMBRES:

Neuralgia de los testículos y cordón espermático. Testículos contraídos. Dolores que cambian de lugar. Genitales fríos y sudorosos. Prepucio y glande, fríos y entumecidos. Pene duro y contraído, se dobla hacia arriba.

MUJERES:

Reglas; muy ligeras; de sangre acuosa o café, o gris mucosa, que reemplaza las reglas. Vagina sensible; dolor cortante durante el coito; vaginismo. Placer ausente durante el coito. Neuralgia de ovarios y vagina. Dolores que cambian de lugar. Postración después del coito. Dismenorrea, con sangre que parece suero gris. Síntomas urinarios, con reglas y leucorrea.

RESPIRATORIO:

Ronquera; pólipos de laringe. Obstrucción de la respiración cuando se levantan los brazos. Tos seca y corta, con punzadas en el pecho.

CORAZON:

Punzadas alrededor del corazón. El pulso se pone muy lento.

CUELLO Y ESPALDA:

Punzadas en cuello y espalda < al respirar. Dolor de espalda con postración severa < sentándose o acostándose. Punto doloroso bajo la escápula (D). Punzadas demoledoras, dolor paralizante en la región lumbar. Dolor sobre la cresta ilíaca hacia abajo frente a los muslos; al orinar. Dolor post-operatorio en la región lumbar.

EXTREMIDADES:

Neuralgia, bajo las uñas de los dedos, con inflamación en la coyuntura de los dedos. Parte externa de los muslos fríos, dolor ulcerativo en los talones. Dolor en los talones al caminar. Cansancio intenso y adolorimiento de piernas después de caminar una distancia corta. Punzadas entre los huesos metatarsales como por un clavo < de pié.

PIEL:

Verrugas planas. Comezón, ardor y estremecimientos < rascándose > por aplicaciones frías. Eczema de ano y manos. Las erupciones dejan una mancha café.

FIEBRE:

Escalofrío. Sensación de frialdad en varias partes como si se le rociara agua fría. Partes bajas de la espalda, cadera, muslos, calientes. Cualquier cosa excita el sudor.

COMPLEMENTARIO:

Mag-m.

RELACIONES:

Benz-ac; Coc-c; Kali-bi; Lyc; Pul.

BISMUTHUM

GENERALIDADES:

Bism. ejerce su mejor acción en el estómago y canal alimentario, causando inflamación catarral. Los dolores son desgarrantes, punzantes, ardientes, como enterrando un tornillo. Sensación de pesadez en las partes internas. Postración. Afecciones después de operaciones abdominales.

AGRAVACION.

Por comer; por excederse en la comida.

MEJORIA:

Frío; bebidas; aplicaciones. Doblándose hacia atrás. Movimiento.

MENTE:

Apático. Descontento; se queja de su condición. Deseo de compañía; los niños se toman de la mano de sus madres. Angustia; nunca está mucho tiempo en un lugar o posición. Mente inconstante.

CABEZA:

Presión y sensación cortante arriba sobre la órbita (derecha) que se extiende hacia el occipucio < comiendo > frío; alternando con dolores gástricos. La cefalea reaparece en invierno.

OJOS.

Globos doloridos. Moco espeso en los bordes.

NARIZ:

Sangrado, sangre obscura. Pesadez en la raíz de la nariz.

CARA:

Terrosa; azul alderredor de los ojos. Dolor en los huesos de los pómulos > dejando correr y manteniendo el agua fría en la boca. Cara pálida y fría. Dolor en la cara que alterna con dolores gástricos.

BOCA.

Encías hinchadas. Dolor de muelas > agua fría en la boca < cuando se pone tibia. Gusto; dulzón, agrio o metálico. Apariencia negra gangrenosa en el dorso y los lados de la lengua.

GARGANTA.

Dificultad para tragar fluidos, que regresan por la nariz.

ESTOMAGO.

Desea bebidas frías, que son vomitadas inmediatamente, o en grandes cantidades cuando el estómago está lleno; a intervalos de días. Vomita líquidos solamente. Ardor, acalambamiento, sensación de un

peso en el estómago. Digestión lenta, con eructos fétidos. Vómito bilioso después de comer. EL alimento presiona como un peso en un punto. Dolores de estómago > doblándose hacia atrás. Cáncer del estómago, vómito de agua cafésosa. Gastralgia, no asociada con ningún catarro o síntoma de indigestión. Agua fría >. Atrofia de estómago. Estómago que cuelga; bultos duros que se sienten bajo el ombligo.

ABDOMEN:

Flatulencia. Postración; después de evacuar. Diarrea indolora, con sed y vómitos frecuentes y micción. Descarga indolora de sangre por el recto. Cólera infantil, cuando el cuerpo permanece tibio.

URINARIO.

Orina; frecuente, copiosa; pálida, supresión de.

CORAZ_N: Palpitaciones violentas del corazón.

EXTREMIDADES, Palmas y plantas secas. Desgarros bajo las uñas. Miembros fríos. Color azul del antebrazo y muslos.

PIEL:

Úlceras; gangrenosas, negras, azules.

SUEÑO:

Inquietud debido a sueños voluptuosos; con y sin emisiones.

RELACIONES;

Ars; Cadm.

BORICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

Afecta la piel causando dermatitis exfoliativa extensa. Edema alrededor de los ojos. Es útil en los bochornos climatéricos. Vagina fría, como envuelta en hielo. Frialdad; de saliva, vagina. Diabetes; lengua seca, roja y agrietada. Dolor a lo largo de los ureteres, con micción frecuente.

MEJORIA:

Caminando al aire libre.

BORAX

GENERALIDADES:

Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS, causando condiciones aftosas y catarrales. Las descargas son espesas, calientes, mordientes. Excesivamente nervioso; fácilmente asustado, sensible a los ruidos intempestivos. Calor en partes aisladas, boca, vagina, palmas, etc. Dolores punzantes o tirantes; internos, intercostales, plantas, etc. Niños; pobremente nutridos, débiles y flojos. Las partes que normalmente son rojas se vuelven blancas. Sensación de una tela de araña en manos, cara. Personas ansiosas. La piel y membranas mucosas se marchitan. Inquietud por la tarde. Emaciación general. Marasmo. Eructos, cuando las partes doloridas son presionadas. Favorece la concepción. Infantes cianóticos por nacimiento. Valioso en epilepsia.

AGRAVACION:

MOVIMIENTO HACIA ABAJO O HACIA ARRIBA.

Ruidos súbitos. Frío; humedad; la menor cubierta. Fruta. Lactancia; niños. Fumando. Tiempo tibio. Después de las reglas. Meciéndose; por colgarlo y moverlo hacia arriba y abajo.

MEJORIA:

11 p.m. Presión. Noche. Tiempo Frío.

MENTE:

Nervioso; Ansioso; inquieto, veleidoso. Teme al movimiento hacia abajo. Sobresaltado, o temeroso por cada ruido o ruido intempestivo, o por bagatelas. Irritable antes de defecar, alegre y feliz después. Los niños lloran y gritan al ser amamantados, o antes de evacuar u orinar. Miedo a los truenos. Niños que despiertan súbitamente, gritan, se sostienen de los lados de la cuna, sin una causa aparente. Criticón. No desea hacer nada. Todos los síntomas mentales > a las 11 p.m. Cambia de un asunto a otro, de un cuarto a otro. Teme ser infectado por una enfermedad contagiosa.

CABEZA:

Vértigo < ascendiendo escaleras o cualquier elevación. Cefalea, con náusea y temblor de todo el cuerpo. Cabeza caliente en los bebés. Pelo enmarañado en las puntas, se pega y no puede ser separado.

OJOS:

Párpados pegajosos, costrosos, gomosos. Enrojecimiento alderredor de los ojos. Entropión. Orillas ulceradas. Párpados granulares.

OIDOS.

Sensibles al ruido más ligero, no muy perturbado por algunos ruidos más sonoros. Como si el oído estuviera abierto y cerrado.

NARIZ:

Coriza acre. Costra seca dentro. Nariz roja en mujeres jóvenes. Inflamación roja y brillante de la nariz con latido y sensación de tensión. Obstrucción de la fosas alternativamente; con lagrimeo.

CARA:

Pálida, sucia. Cara abotagada; azulosa en infantes. Ansiosa, durante el movimiento hacia abajo. Sensación de telaraña. Como de un insecto que se arrastrara sobre los labios.

BOCA:

Seca, caliente, sensible, aftosa; después de tomar alimentos ácidos o salados. Boca agrietada: o lengua hinchada, con la huella de los dientes. Dolor de diente < tiempo húmedo > por fumar. Paladar duro, y arrugado; como quemado; dolores al masticar; al amamantarse, en niños. Flemón doloroso. Sabor amargo, aún la saliva. Ulceras que sangran por comer o al tocarlas.

ESTOMAGO:

Eructos, al presionar partes dolorosas. Náusea; cuando se piensa con fuerza; con temblor del cuerpo y debilidad en las rodillas. Deseo de cosas agrias. Dolor en la región del estómago, después de levantar algo pesado - punzadas- que se extienden a la parte baja de la espalda. Sudor en el estómago. Vómito después de beber; de moco ácido. Gastralgia, reflejo de problemas uterinos.

ABDOMEN:

Ventre suave, lacio, sumido. Distensión - flatulenta después de cada comida. Dolor como si fuera a dar diarrea. Evacuaciones; se vuelven verdes, o persistentemente verdes; como harina hervida. Diarrea mucosa luego debilidad. Evacuaciones flojas, papescientes, fétidas. Evacuaciones delgadas. Se agarra las ingles al toser. Estirón del bazo al pecho. Dolores punzantes en las ingles antes y durante las reglas. Ardor en el recto durante la evacuación.

URINARIO:

Orina caliente, acre, punzante, de olor picante. El niño grita antes de que pase la orina. Frecuente, cada 10 o 15 minutos. Pequeñas partículas rojas en el pañal. Nefritis. Cistitis.

HOMBRES:

Indiferencia al coito.

MUJERES:

Indiferencia al coito. Reglas muy adelantadas, muy profusas, se presentan con cólico y náusea. Leucorrea-albuminosa, clara, caliente, pastosa con sensación como de agua caliente que escurriera por las piernas. Dismenorrea membranosa. Sensación de vacío en las mamas, después de que el niño mama, con punzadas > comprimiendo. Al amamantar, dolor en el pecho contrario. Trabajo de parto con eructos frecuentes. La leche materna es gruesa y sabe mal. Sensación de distensión en el clítoris, con picazón. Esterilidad. Facilita la concepción.

RESPIRATORIO:

Dolor punzante en el pecho (intercostal) < tosiendo, inspirando, bostezando o por cualquier ejercicio físico. Respiración corta < ascendiendo escaleras; punzadas al hablar. Tos seca y violenta; expectoración rayada de sangre o enmohecida. Dolor en el pecho > yaciendo sobre la espalda,

lavándose con agua fría, o por la presión. Detenimiento de la respiración cuando se acuesta, debe saltar para recuperar el resuello.

CORAZON:

Siente como si estuviera en el lado derecho; y fuera estrujado. Infantes cianóticos al nacer. Palpitaciones violentas.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la espalda, inhabilidad para agacharse.

EXTREMIDADES:

Los miembros tiemblan a las 10 a.m. Sensación de telaraña en las manos. Punzadas en las plantas del pié. Debilidad en las pantorrillas. Dolor en el talón. Eczema en los dedos y dedos gordos del pié con pérdida de uñas. Como agua tibia que corriera por los muslos. Palmas calientes. Comezón en el dorso de las manos. Falta de fuerza, especialmente en coyunturas.

PIEL:

SECA;

se ulcera fácilmente, y no cicatriza. Psoriasis. Erupción cambiante en dedos y manos, eccema pruriginoso y punzante. Piel marchita y arrugada. Ampollas blanquecinas, con areola. Ulceración en los pies por frotamiento del zapato o botas.

SUEÑO:

Sueños voluptuosos; sueño de coito. Grita en sueños, como aterrorizado (niños). No puede dormir debido a calor excesivo, especialmente en la cabeza. Despierta sobresaltado de un sueño profundo, como si se fuera a caer.

FIEBRE:

Bochornos de calor.

RELACIONES:

Bell; Bry; Calc; Nux-v; Sul-ac.

BOTHROPS LANCIOLATUS

GENERALIDADES:

El veneno de esta víbora es muy coagulante, por lo que se espera sea útil en trombosis y afecciones trombóticas como la hemiplejía. Afasia, sin la afección de la lengua. Temblor nervioso. Gran lasitud e indolencia. Ceguera por hemorragia en la retina. Ceguera diurna - escasamente puede ver su camino después de la salida del sol. Parálisis de un brazo, o una pierna, solamente. Estremecimiento ligero,

seguido por sudor profuso. Dolor intolerable en el dedo gordo del pié. Hueso que se desnuda por la gangrena y se vuelve necrótico. Peor el lado derecho.

AGRAVACION :

Lado derecho.

BOVISTA

GENERALIDADES:

Este hongo comunmente llamado borla de polvos, ejerce su influencia en la CIRCULACION, causando relajamiento del sistema capilar, produciendo una diátesis hemorrágica. En la piel causa erupciones herpéticas. Hay una hinchazón general; condición abotagante en la superficie corporal, que produce una indentación fácil con instrumentos despuntados (tijeras, etc). Laxitud, sentida más especialmente en las articulaciones que parecen flojas. Sensación de crecimiento o inflamación en la cabeza, corazón, etc. Está adaptado a mujeres viejas, con palpitación; y en niños balbuceantes. Neuritis múltiple, con adormecimiento y hormigueo. Asfixia debido a humos de carbón. Efectos de una sobre-ejercitación, y aplicaciones de alquitrán localmente. Articulaciones nerviosas y débiles.

AGRAVACION:

Reglas. Luna llena. Tiempo caliente. Tomando calor .Alimentos fríos. Vino. Café.

MEJORIA:

Doblándose en dos. Alimentos calientes. Comiendo.

MENTE:

Torpe en el habla y la acción; deja caer las cosas, tartamudea, etc. No es afectuoso. Distraído. Memoria débil. Irritable, toma todo a mal. Ríe y llora alternadamente. Mirada vacía en el espacio. Triste si está solo. Regañón.

CABEZA:

Confusión al despertar. Sensación como si la cabeza estuviera creciendo. Como si una cuña apretara en el occipucio. Tambaleante, confusión y entumecimiento en la cabeza, después del coito. Comezón en el cuero cabelludo < calor.

OJOS:

Los objetos parecen estar más cerca de lo que realmente están. Mirada vacía hacia un punto. Pérdida de visión por parálisis del nervio óptico.

OIDOS:

Forúnculo en el oído derecho, con dolor < deglutir. Descarga de pus fétido. Escucha indistinta, malinterpreta mucho de lo que le hablan.

NARIZ:

Descarga filamentosas y gruesas por la nariz. Nariz tapada, no puede respirar < acostándose. Costras cerca de las alas. Sangrados temprano por la mañana, (durante el sueño); se escapan algunas gotas al estornudar.

CARA:

Mejillas y labios inflamados. Costras cerca de las comisuras de la boca. Acné < en verano o por el uso de cosméticos. Torcedura de músculos antes del asma. Labios agrietados, costrosos.

BOCA:

Entumida. Incremento de saliva. Encías que sangran fácilmente, al chupárselas. Dolor cortante en la lengua; antes del asma.

ESTOMAGO:

Sensación como de un pedazo de hielo. Náusea > desayuno. Vomita fluidos acuosos.

ABDOMEN:

Cólico, con orina rojo brillante > por comer y doblarse en dos. Diarrea < durante y antes de las reglas. No puede soportar ropas ceñidas alrededor de la cintura. Punzadas a través del perineo hacia el recto y los genitales. Diarrea crónica de los ancianos < noche, temprano por la mañana. La primera porción de los excrementos es dura, luego parte delgada y acuosa.

URINARIO:

Deseo frecuente de orinar, aún inmediatamente después de la micción.(Diabetes Mellitus).

HOMBRES:

Tambaleo y confusión en la cabeza después del coito. Deseo sexual incrementado.

MUJERES:

Sensación voluptuosa. Reglas; adelantadas, rezumantes, cada dos semanas, más por la noche; menos, mientras se mueve. Aparición ocasional entre períodos. Quiste parovárico. Leucorrea espesa, acre, amarillo-verdosa, dejando manchas verdes en la ropa < mientras camina; después de las reglas. Ictericia del recién nacido.

RESPIRATORIO:

Respiración corta, moviendo los brazos. Expectoración viscosa. Risa y llanto espasmódicos, con asma.

CORAZON:

Palpitaciones visibles del corazón; de mujeres viejas. Palpitación como si el corazón trabajara en agua. Palpitación, con temblor de manos, < por el baño, excitación.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la espalda, con pesadez, después de agacharse. Comezón en el cóccix.

EXTREMIDADES:

Gran debilidad de todas las coyunturas. Debilidad; torpeza con sus manos. Piernas pesadas y dolorosas. Inflamaciones edematosas del pié (derecho), aún años después de un esguince. Sudor en las axilas; como cebolla. Edema de las articulaciones después de una fractura. Manos débiles.

PIEL:

Instrumentos despuntados dejan una impresión profunda. Erupciones pruriginosas; rezumamiento; formando gruesas costras, con pus bajo ellas. Dolor tirante en callos y verrugas. Urticaria que cubre todo el cuerpo, con diarrea o metrorragia. Pelagra. Eczema.

FIEBRE:

Escalofrío con dolor.

RELACIONES:

Ap; Cal; Rhus-t; Sep; Ust.

BROMIUM

GENERALIDADES:

Los efectos marcados de la Bromina se ven en el TRACTO RESPIRATORIO; especialmente la LARINGE y tráquea. Es útil en niños escrofulosos, con glándulas crecidas; parótidas, tiroides, ovarios y glándulas mamarias, que son especialmente afectadas, y que están hinchadas e induradas; pero rara vez supuran. Constricciones y formaciones membranosas que aparecen en la laringe y se esparcen hacia arriba. El paciente está débil y fácilmente acalorado, luego sudoroso y sensible a las corrientes. Rubios. Temblores por todos lados. Desvanecimientos. Emaciación. Dolores taladrantes en huesos. Cáncer.

AGRAVACION:

CALOR;

HUMEDAD CALIENTE; acaloramiento; habitación tibia. Enfriamiento mientras está caliente. Baños de mar. Corrientes de aire. En la noche hasta medianoche. Yaciendo sobre el lado izquierdo.

MEJORIA:

Sangramiento nasal > (vértigo, cabeza, pecho). En el mar. Movimiento. Afeitándose. Paseando.

MENTE:

Siente que personas extrañas ven sobre el hombro del paciente; o de que verá a alguien al voltearse, como si alguien estuviese a sus espaldas. No toma interés en quehaceres de la casa. Humor alegre, desea un trabajo mental. Triste. Indiferente. Decaído, inconsolable. No se siente normal; pero no sabe por qué. Se sienta sola en su habitación sin hacer nada; mira constantemente en una dirección, sin decir nada.

CABEZA:

Vértigo < en un puente, viendo agua corriente. Cabeza congestionada, teme una embolia. Cefalea < bebiendo leche, agachándose. Cefalea en el sol, se pasa en la sombra. Cefalea profunda en el vértice, con palpitaciones.

OJOS:

Lagrimo, con inflamación de las glándulas lagrimales. Pupilas dilatadas. Ojos protuberantes. Destellos delante de los ojos.

OIDOS:

Hinchazón dura de la glándula parotídea, tibia al tacto, después de fiebres eruptivas.

NARIZ:

Coriza acre y ardiente, con estornudos violentos y adolorimiento de la nariz. Cosquilleo picante como de una telaraña. Nariz sangrante. Movimiento de fuelle en las alas. Coriza larga, obstinada y continua.

CARA:

Sensación de una telaraña. Parece jalada hacia un punto de la nariz. Gris ceniza. Pálida y roja alternativamente.

BOCA:

Seca y parchada. Aftas, con afección de ojos. El agua sabe salada.

GARGANTA:

Anginas; hinchadas, rojo obscuro, con red de vasos sanguíneos dilatados, dolor < al tragar líquidos más que sólidos. Aún una pequeña papera oprime. Glándulas de una dureza de piedra, hinchadas. Difteria.

ESTOMAGO:

Ardor agudo desde la lengua al estómago. Presión como de una piedra. Gastralgia > comiendo. Las cosas ácidas disgustan. Vómitos; como asientos de café; moco sanguinolento. Aversión a fumar el tabaco acostumbrado.

ABDOMEN:

Timpánico, distendido. Diarrea, después de comer ostras, y cosas ácidas. Hemorroides, sangrantes, intensamente dolorosas, < por aplicaciones de agua fría o tibia. Bazo crecido, indurado.

URINARIO:

Orina altamente coloreada.

HOMBRES:

Inflamación e induración de los testículos < ligera sacudida.

MUJERES:

Flatos por la vagina; ruidosos. Dismenorrea. Hinchazón de ovarios. Curiosa sensación de enfermedad pocos días antes de la menstruación. Tumor en mama, dolores punzantes del pecho a la axila. Reglas, con jirones membranosos. Comezón en vagina. Supresión de reglas, en scirro de mama.

RESPIRATORIO:

El aire inhalado parece humo, frío o crudo. Tos seca, con ronquera y dolor ardiente detrás del esternón. Deseo de tomar una inspiración profunda, pero excita la tos. Accesos sofocantes; se sobresalta con una tos que atraganta, cruposa o de resuello ruidoso o con palpitaciones. Asma. Espasmos de la glotis. Asma de los marineros que van a tierra. Ronquera profunda si se acalora. Los pulmones se sienten cubiertos con vello. Laringe fría. Resfrío que se inicia en la laringe, y va hacia arriba y abajo. Expectoración espesa y blanca. Disnea, con mucha hinchazón.

CORAZON:

Hipertrofia; por gimnasia, con palpitación. Dolor cortante que va hacia arriba, enfermedad del corazón. Palpitaciones violentas < yaciendo sobre el lado izquierdo. Palpitaciones nerviosas; con náusea; con cefalea.

CUELLO Y ESPALDA:

Glándulas crecidas, tumores císticos en ambos lados del cuello.

EXTREMIDADES:

Antebrazos con frialdad de hielo, manos frías. Dolores taladrantes en una o en ambas tibias. Brazo izquierdo dolorido, en afecciones cardíacas.

PIEL:

Forúnculos en brazos y cara. Acné, espinillas y pústulas.

SUEÑO:

Bostezos continuos, con problema respiratorio, con somnolencia. Mucha somnolencia cuando se lee.

RELACIONES:

Lach; Samb.

BRYONIA ALBA

GENERALIDADES:

Bryonía desarrolla una acción marcada en todas las MEMBRANAS SEROSAS y las vísceras que contienen, causando INFLAMACION y exudación. Desordena la circulación produciendo congestión; altera la sangre, dando paso a fiebres tipo tifoidéico, bilios, reumático y remitentes. AVERSION AL MINIMO MOVIMIENTO, aún de partes distantes, se debe a su acción sobre los nervios y músculos. Las Membranas Mucosas se vuelven secas, de allí que sus descargas sean escasas y adherentes. Las enfermedades se desenvuelven lentamente, pero con fuerza. Los dolores son ESTALLANTES;

PUNZANTES o dolorimientos pesados; van hacia atrás. Los efectos son muy dolorosos; al toser, se sostienen los lados, pecho, cabeza. Articulaciones dolorosas. Rayas en color rojo - linfangitis. Constituciones gastro-biliares-reumáticas. Cada punto en el cuerpo duele a la presión. Hinchazones hidrópicas que aumentan gradualmente conforme el día pasa y desaparecen durante la noche. A los niños no les gusta que los carguen o levanten. Debilidad física; al menor ejercicio; todo se convierte en apatía. Malos efectos; del coraje, miedo; disgusto. Supresión de descargas y erupciones. Alcohol. Glotonería. Heridas. Enfermedades por tomar bebidas frías, en tiempo caliente. Con frecuencia indicada en golpes en las articulaciones cuando Arnica falla. Los músculos se ponen duros, después de la neuralgia. Resequedad dondequiera, de la boca, garganta, etc. Está adaptada a personas nerviosas, esbeltas y secas. Efectos del lado derecho. Sangramiento vicariante.

AGRAVACION:

MOVIMIENTO-EL MINIMO; LEVANTANDOSE; AGACHANDOSE; TOSIENDO; FATIGA; RESPIRACION PROFUNDA. Calor o frío seco. ACALORANDOSE EN UNA HABITACION. Tiempo caliente. Bebiendo; estando caliente. Comiendo: vegetales. Acidos. Calomel. VEJACION. PRESION. Supresiones. Resfriándose. Temprano a.m.

MEJORIA:

PRESION;

YACIENDO SOBRE LA PARTE DOLOROSA. Por vendarse. AL AIRE LIBRE Y FRESCO. QUIETO. Días nublados y húmedos. Retrayendo las rodillas. Calor en las partes inflamadas. Descendiendo. Sentándose. Bebidas y alimentos fríos.

MENTE:

Muy irritable y de carácter feo. Determinado. Taciturno. Delirio, quiere ir a su casa, piensa que no está allí. Habla de sus negocios. Quiere estar sólo. Deseo de cosas que luego rechaza cuando se le ofrecen. Torpe. Aprensión y terror por el futuro. Desesperanza de ser curado, con miedo a morir.

CABEZA:

ATURDIDO O DESVANECIENTE AL LEVANTARSE.

Vértigo que se siente en el occipucio. Cefalea ESTALLANTE; APLASTANTE Y PESADA, COMO FRACTURADA; fronto-occipital < moviendo los ojos, tosiendo, haciendo esfuerzos para defecar, etc. Vértigo; como si todos los objetos giraran, o como si se sumiera profundamente en la cama, > frío. Dolor sobre el ojo izquierdo, presivo, yendo al occipucio, de allí se esparce por todo el cuerpo. Cráneo muy sensible, no puede soportar ni un cepillo suave, cada cabello duele. Pelo grasoso. Cefalea; por planchar; estando constipado.

OJOS:

Globos oculares adoloridos; dolor detrás de los globos. Glaucoma. Lagrimeo, duranate el día, especialmente en el sol. Párpados hinchados y abotagados.

OIDOS:

Vértigo aurial. Campanilleo, murmullos en los oídos. Sangramiento vicariante de los oídos.

NARIZ:

Sangramiento nasal; vicariante; cuando deberían aparecer las reglas; en el embarazo. Inflamación de la punta de la nariz, se siente como si estuviese ulcerada, al contacto. Forúnculos. Catarros descendentes.

CARA:

Obscura, roja, caliente, inflada. Movimientos de masticación, en afecciones cerebrales, de los niños. Labios; secos, como quemados, parchados, agrietados, quiere humedecerlos. Ardor del labio inferior en fumadores viejos. Despellejamiento de los labios.

BOCA:

Seca. Lengua; muy seca, áspera, cubierta en el centro; roja en la base. Gusto AMARGO, no puede tragar la comida, > bebidas frías. Dolor de muelas > agua fría, < cepillándose los dientes. Dolor de muelas estrujante cuando fuma o mastica tabaco. Acumulación de saliva jabonosa, espumosa.

GARGANTA:

Escupe bolas café, con esfuerzo. Garganta; seca, arañada, con aspereza. La parte posterior de la garganta parece hinchada. Parches aftosos; recurrentes.

ESTOMAGO:

SED: POR GRANDES CANTIDADES DE AGUA FRIA, también por bebidas tibias que >. Desea lo que no puede comer. Detesta la comida. Náusea < levantándose, yaciendo sobre el lado derecho. Vómito amargo; de bilis y agua, inmediatamente después de comer. Vomita sólo comida sólida. Carga pesada en el estómago < comiendo. Estómago sensible al tacto. Gran deseo de café, vino y bebidas ácidas. Aversión a la leche, pero cuando la toma le gusta. Eructos insaboros. Vomita bebidas tibias. Bebe apresurada y fervientemente.

ABDOMEN:

Epigastrio; sensible, con latido. Hígado, pesado, adolorido, inflamado > yaciendo sobre él. Pared abdominal muy sensible. Apendicitis. Peritonitis. Evacuaciones; GRANDES, SECAS, MUY DURAS, como quemadas; flojas, indoloras, indigeridas, involuntarias, durante el sueño. Constipación. Diarrea; farfullante < en la mañana, al levantarse, por comer calabaza. Diarrea; en tiempo caliente, después de bebidas frías. Bultos de moco grueso, después de evacuar. Ardor en el ano, con evacuaciones. Evacuaciones amarillas, musgosas. Ictericia. Ingles doloridas antes de las reglas. Problemas por levantar pesos excesivos, concusiones.

URINARIO:

Orina; roja, café como cerveza; escasa, caliente. Inclinación a orinar, con respiración suspendida al levantar pesos. Micción involuntaria, durante el ejercicio. Ardor en la uretra, cuando no se orina.

MUJERES:

Reglas; suprimidas con descargas vicariantes o cefaleas de estallido. Dolor en el busto en el período menstrual. Pecho; caliente y doloroso, duro. Fiebre de leche. Dolor intermenstrual, con gran inflamación abdominal y pélvica. Mastitis, mama con dureza de piedra. Absceso en mama. Ovaritis. Boca inflamada del infante; el niño no quiere sostenerse del pecho, pero luego que la boca se humedece, mama bien. Reglas; oscuras, fétidas. Punzadas en los ovarios al tomar una respiración profunda. Sangramiento nasal frecuente en la aparición de las reglas.

RESPIRATORIO:

Tos; SECA, DURA, MUY DOLOROSA, por la noche, como si viniera del estómago, debe sentarse, < por comer y beber. Quiere hacer una inspiración profunda, pero no puede, porque esto excita la tos. Expectoración; mohosa, rayada de sangre o tenaz. Bronquitis. Asma. Neumonía. Punzadas agudas en el pecho o en la escápula derecha < por respirar profundamente y toser. Pleuresía. Entrar a una habitación tibia excita la tos. Se sostiene el pecho o presiona el esternón cuando tose. Sonido de fricción seca. Tos, con estornudos.

CORAZON:

Punzadas en la región cardíaca. Pulso: LLENO, RAPIDO, áspero.

CUELLO Y ESPALDA:

Entumecimiento intraescapular, o dolor que va hacia el epigastrio o de la escápula izquierda, al corazón. Rigidez dolorosa del cuello. Dolor en la espalda baja < caminando o volteando. Punzadas y rigidez en la espalda baja. Lumbago < agachándose.

EXTREMIDADES:

Articulaciones rojas, hinchadas, calientes. Sensación de alfileres y agujas en las plantas que impiden caminar. Movimiento constante del brazo y pierna izquierdos, con suspiros. Inflamación del codo. Las rodillas se tambalean y doblan al caminar. Tendencia a correr hacia atrás. Ciática > yaciendo quietamente y sobre el lado doloroso.

PIEL:

Desarrollo lento o retroceso súbito de un salpullido, en fiebres eruptivas. Sarampión no desarrollado. Piel; amarilla, pálida, inflamada, hidrópica.

SUEÑO:

Sueños; de trabajo pesado; sobre asuntos domésticos, de negocios del día, en delirio. Somnoliento. Sobresalto al caer dormido. Camina dormido.

FIEBRE:

Escalofrío con cabeza caliente, y cara roja; < en habitación caliente. Calor seco y ardiente; con < de todos los síntomas. La sangre parece caliente. Fiebres dolorosas y continuas. Sudor; agrio y aceitoso.

COMPLEMENTARIOS:

Abro; Alu; Kali-c; Lyc; Nat.m; Rhus-t; Sep; Sul.

RELACIONES:

Phyt; Rhus-t.

BUFO

GENERALIDADES:

El veneno de este sapo tiene una acción muy marcada en el sistema nervioso, y los órganos sexuales. Hace aflorar las pasiones más bajas; el paciente no es solamente de mente débil, sino que desarrolla un tipo bajo de enfermedades. Es el remedio para depravaciones, debido a una mala herencia. Quebrantamiento adelantado, personas prematuramente seniles. Afecta la circulación, causando ebulliciones de calor, bochornos; ardor en diferentes partes. Rezumamiento sanguinolento; de los pezones, saliva, etc. Temblor como de parálisis agitante. Choques como eléctricos, que se sienten a través de todo el cuerpo. Todo el cuerpo se siente como hinchado; en a.m. Sensación de úlcera. Cae inconsciente con un grito aterrador. Obesidad. Ataques epilépticos; ocurren durante la noche; conectados con la esfera sexual; en las reglas, en mujeres cuando se excita el deseo sexual; en hombres jóvenes debido al onanismo o durante el coito, los ataques van seguidos de cefalea. Como con una estaca en las articulaciones. Hidropesía. Parálisis. Cáncer. Carbúnculo. Bubones. Linfangitis séptica, debido a heridas, cuando el dolor corre en líneas. Espasmos en niños, después de ser amamantados por una madre colérica o asustada. Puntos anestésicos en la piel. Aversión a ver objetos brillantes. Variedad de síntomas que aparecen antes de espasmos epilépticos. La mente permanece infantil, solamente el cuerpo crece. Descargas y exhalaciones fétidas. Convulsiones por condiciones supurativas.

AGRAVACION:

Habitación tibia. Excitación sexual. Masturbación. El menor movimiento. Heridas.

MEJORIA:

Por sangramiento. Aire fresco. Baño fresco. Con los pies en agua caliente.

MENTE:

Depravación moral. Idiocia; aninado, tonto, ríe disimuladamente. Mente débil. Miedo; animales, estraños. Habla sin sentido, luego se enoja si es malinterpretado. Camina por el suelo y se retuerce las manos. Deseo de soledad, para practicar la masturbación. Inclinado a morder. Engañoso. La música le es intolerable.

CABEZA:

Como un vapor caliente que le subiera a la cima de la cabeza. Cerebro entumecido. La almohada lastima el occipucio.

OJOS:

La vista de objetos brillantes se hace intolerable. Los objetos parecen torcidos. Párpado izquierdo paralizado. Pupilas dilatadas. Ojos sumidos.

OIDOS:

El menor ruido incomoda. La música es intolerable.

NARIZ:

Epistaxis con cara abochornada y dolor en la frente.

CARA:

Inflamada y distorsionada. Bañada en sudor (en espasmos). Labios negros.

BOCA:

Parálisis de la lengua, movimientos de lametada con la lengua. Saliva sanguinolenta. Tartamudeo. Deseo de bebidas dulces. Lengua; agrietada, negro azulosa. Convulsiones, después de extracción de dientes.

ABDOMEN:

Como de bolas frías que corrieran a través de los intestinos. Bubas en las ingles. Movimientos convulsivos, después de espasmos. Vómito después de beber. Fluído amarillo en vómito. Vómitos de sangre y bilis.

HOMBRES:

Espasmos, durante el coito. Inclinação a tocarse el órgano. Inclinação a masturbarse. Impotencia.

MUJERES:

Epilepsia al tiempo de las reglas. Reglas; muy adelantadas y muy copiosas. Leche sanguinolenta. Cáncer de la glándula mamaria. Tumores y pólipos en el útero; úlceras del cérvix. Ardor en ovarios y útero. Inflamación como de un cordón que va desde la ingle a la rodilla. Dolor violento en las mamas < por la noche. Hidatismo en ovarios. Leucorrea ofensiva y purulenta.

RESPIRATORIO:

Ardor como de fuego en los pulmones. Tos sofocante. Asma.

CORAZON:

Parece flotar en agua o aire. Acción rápida del corazón, en exoftalmos. Se siente muy grande. Palpitación; con cefalea, durante las reglas.

CUELLO Y ESPALDA:

Contracturas en la nuca, antes de los espasmos. Lumbago < levantándose o al menor movimiento.

EXTREMIDADES:

Temblor de las extremidades. Calambres. Pasos tambaleantes. Sensación como de una estaca que se introdujese en las articulaciones. Piernas, se vuelven rígidas, entumidas.

PIEL:

Estrías rojas bajo la piel. Linfangitis. Panadizo. Burbujas amarillas. Fluído amarillento, corrosivo rezumante. Horripilación. (Piel de gallina).

SUEÑO:

Comatoso, después de los espasmos.

COMPLEMENTARIO:

Calc.

RELACIONES:

Bar-c; Grap; Tarn.

BURSA PASTORIS

GENERALIDADES:

Es un remedio para la diátesis de ácido úrico y hemorrágica. Remueve los malos efectos de la supresión de hemorragias o descargas vaginales del útero.

AGRAVACION:

Cada tercer mes.

MEJORIA:

Baño. Humedad. Movimiento rápido.

MENTE:

Impulso de caminar lejos.

CABEZA:

Dolor desde arriba de los ojos hacia la cabeza y nuca.

NARIZ:

Sangramiento en operaciones nasales.

CARA:

Abotagamiento de ojos y cara.

BOCA:

Sabor como de huevos podridos.

ESTOMAGO:

Desea leche amantecuada. Flatulencia. Descargas de sangre o mucopurulentas después de evacuar.

URINARIO:

Hematuria. Descarga copiosa de arena en la orina. Disuria; de ancianos, con goteo después de un parto por forceps. Cólico renal. La orina corre en pequeños chorros. Sedimentos como polvo de ladrillo. Albuminuria durante el embarazo.

MUJERES:

Metrorragia, con cólico violento uterino; cada tercer período muy profuso. Fibromas uterinos con calambres y expulsión de coágulos. Dolor molesto en el vientre < al levantarse. Las reglas o la leucorrea deja una mancha fija. La leucorrea excita la comezón. Agua lechosa que corre del pezón derecho. Escasamente se recupera de una regla cuando ya se presenta la siguiente.

ESPALDA:

Debilidad entre las escápulas.

RELACIONES:

Sep.

CACTUS GRANDIFLORA

GENERALIDADES:

La acción principal de Cactus, se centra alderredor del CORAZON Y CIRCULACION. Afecta los músculos de la circulación, así que produce CONSTRICCIONES; del corazón, garganta, pecho, vejiga, recto, vagina, cuello. La Circulación se vuelve irregular, causando congestión violenta o pulsaciones localizadas, detrás del estómago, y en lugares particulares. Es un remedio HEMORRAGICO, favorece la formación rápida de coágulos. Dolores constrictivos o espasmódicos, que arranca gritos. La periodicidad es marcada y los dolores neurálgicos aparecen periódicamente. El cuerpo se siente atado o vendado. Borbollones calientes que se sienten en el pecho. Bocio tóxico con síntomas cardíacos. Debilidad general y postración. Desmayos. Afecciones hidrópicas. Malos efectos del sol, humedad, decepción amorosa. Muchas enfermedades se asocian con afecciones del corazón. Falta de pulso, jadeo y postración. Baja presión arterial, por debilidad del corazón.

AGRAVACION:

Acostándose, sobre el lado izquierdo, en el occipucio. Periódicamente. Ejercicio. 10-11 a.m. o 11 p.m. Noche. Caminando. Subiendo escaleras. Ruido. Luz. Calor del sol.

MEJORIA:

Al aire libre. Presión en el vértice.

MENTE:

Taciturno. Solloza, no sabe por qué < por el consuelo. Cree que su enfermedad es incurable. Triste. Mal humorado. Se asusta fácilmente. Alegre. Miedo; de la muerte, de que algo sucederá.

CABEZA:

Dolor pesado como de una carga en el vértice > presión < por hablar, por la luz fuerte. Cefalea < por ver ópera; por saltarse una comida, ruido, luz, periódico, compresivo, pulsante. Vértigo < por respirar profundamente, ejercicio.

OJOS:

Disminución de la visión. Ojos con golpe de sangre. Bocio exoftálmico.

OIDOS:

Pulsaciones en los oídos. Cantos, timbrazos en los oídos.

NARIZ:

Epistaxis profusa, pero cesa pronto.

CARA:

Prosopalgia del lado derecho < por saltarse comidas. Cara; roja, abotagada, pálida, emaciada.

GARGANTA:

Constricción del esófago, debe beber para deglutir. Constricción sofocante, con latidos llenos en las carótidas.

ESTOMAGO:

Pulsación en la arteria celiaca, detrás del estómago. Vómito de sangre. Nausea en la mañana-continúa todo el día. Pérdida de apetito. Aversión a la carne de la cual era muy afecto.

ABDOMEN:

Ardor intenso en el estómago. Como con un peso en el ano. Picoteos como por un alfiler en el ano, > con una fricción ligera. Fístula en el ano, con palpitación violenta de corazón. Hígado atascado debido a una enfermedad cardíaca. Dolor agudo que se dispara a través del diafragma hacia el pecho. Como si un cordel se apretara más y más alderredor del enlace del diafragma, quitandole la respiración.

URINARIO:

Constricción del cuello de la vejiga, causando retención de orina. Orina suprimida en fiebres. Hematuria; micción impedida por coágulos, en vagina en las mujeres.

MUJERES:

Reglas; con bultos; negra; demasiado tempranas, cesan al acostarse. Constricción de la vagina que impiden el coito; vaginismo. Reglas dolorosas, que provocan gritos fuertes. Desórdenes menstruales, con síntomas cardíacos. Pulsaciones en la región ovárica. Infantes cianóticos.

RESPIRATORIO:

Opresión de la respiración, subiendo escaleras. Tos por afecciones cardíacas. Estertores continuos de moco en el pecho. Constricción del pecho, como si estuviera ligado; respiración obstruída. Sofoco

periódico, con desmayo, sudor en la cara y pérdida del pulso. Hemoptisis, con tos convulsiva. Inflamación del diafragma, con dificultad para respirar.

CORAZON:

SE SIENTE SUJETO Y LIBERADO ALTERNATIVAMENTE COMO POR UNA BANDA DE HIERRO, o como si se expandiera y contrajera; como si se volteara. Endocarditis, con insuficiencia mitral. Palpitaciones < yaciendo sobre el lado izquierdo; cuando se acercan las reglas; durante el día mientras camina; por decepción amorosa. Punzadas en el corazón. Murmullo endocárdico. Hipertrofia. Baja presión arterial. Pulso; irritable, intermitente, débil. Acción irregular e intermitente, después de un alumbramiento con fórceps. Enfermedad del corazón, con edema de la mano izquierda. Como si el corazón fuera a volar en pedazos al sostener el aliento. Pulsaciones incrementadas al sostener el aliento. Aneurisma de las grandes arterias y el corazón. Corazón del fumador.

EXTREMIDADES:

Brazo izquierdo dormido. Comezón en los dedos. Manos heladas como hielo. Edema de la mano (izquierda) con enfermedad del corazón; y de pies que se extiende a las rodillas. Manos suaves, pies crecidos. Dolor en el brazo izquierdo que baja a los dedos.

SUEÑO:

Insomnio, debido a pulsaciones fuertes en diferentes partes. Sueños; de caídas; atemorizantes, lascivos. Despierta asustado.

FIEBRE:

Escalofrío no < por cubrirse. Temperatura subnormal persistente.

RELACIONES:

Aco; Coc-c; Dig; Lach; Nux-v; Sul.

CADMIUM SULPHURATUM

GENERALIDADES:

Su acción principal se centra en el estómago y la respiración. Hay una fatiga extrema y postración, con vómitos. El paciente debe permanecer completamente quieto. Frialdad de hielo aún cerca del fuego. Una forma baja de enfermedad que corre tras la muerte. Debilidad que permanece después de ataques epilépticos, de un brazo y una pierna. Hormigueo entre la piel y el tejido profundo. Entumecimiento; de partes, nariz, cabeza, etc. Partes paralizadas doloridas o con hormigueos.

AGRAVACION:

Levantándose. Por el mínimo movimiento. Levantando cargas pesadas. Después de dormir. Estimulantes. Al aire libre. Frío. Luz del sol. Caminando. Subiendo escaleras. Vejaciones. Deglutiendo.

MEJORIA:

Por comer. Descanso.

MENTE:

Horror a la soledad y al trabajo.

CABEZA:

Desmayos al levantarse. Vértigo; la habitación y la cama parecen girar.

OJOS:

Opacidad de la cornea; por heridas o inflamación. Ceguera nocturna. Lágrimas calientes. No puede leer tipos pequeños.

NARIZ:

Ocena. Pólipos. Forúnculos en la nariz. Naríz entumida.

CARA:

Distorsión de la boca; por parálisis facial. Temblor de la mandíbula inferior. Parálisis facial, lado izquierdo; < por el aire libre; no puede cerrar los ojos, dificultad para hablar y deglutir.

ESTOMAGO:

Desea bebidas pequeñas de agua fría que son vomitadas inmediatamente. Ardor y dolor cortante; arcadas y náuseas intensas. Vómito > estando quieto. Vómito negro. Vómito como asientos de café. Cáncer del estómago. La menor causa que toque los labios excitará la náusea y el vómito. Disfagia. Síntomas estomacales < por levantar cargas pesadas.

URINARIO:

Orina mezclada con pus y sangre.

RESPIRATORIO:

Sofocos al caer dormido. Pecho oprimido con asma. Síntomas de pecho < por acucillarse.

PIEL:

Azul, amarilla, escamosa. Horripilación < después de beber, con manos calientes, y agruras. Cloasma < por exposición al sol.

SUEÑO:

La respiración se detiene al ir a dormir. Teme volver a dormirse. Insomnio prolongado. Duerme con los ojos abiertos.

FIEBRE:

Fiebre amarilla. Cuerpo helado como hielo.

RELACION:

Zinc.

CALADIUM SEGUINUM

GENERALIDADES:

Tiene una acción especial en los ORGANOS GENITALES, de los dos sexos. Masturbación y sus resultados en hombres; prurito vulvar en mujeres; que en ocasiones se deben a lombrices que se introducen por la vagina, induciendo la masturbación y aún una ninfomanía. Hay un gran deseo de acostarse y aversión al movimiento; pero si hace un esfuerzo, tiene suficiente fuerza. Ataques como desmayos, después de escribir o pensar; al acostarse o cuando se levanta. RESEQUEDAD de partes que usualmente son húmedas. Sensación de resequedad. Modifica el deseo de tabaco. Corazón del fumador de tabaco. Asma que alterna con erupción pruriginosa. Lascivo, mira con deseo a las mujeres en las calles; pero es impotente. Incapaz de caminar con los ojos cerrados. Piquetes de mosquito que arden y dan comezón intensamente.

AGRAVACION:

Excesos sexuales. Movimiento. Ruidos súbitos. Al caer dormido. Tabaco.

MEJORIA:

Aire frío. Sueño corto. Sudando.

MENTE:

Muy cuidadoso con su salud. Inquieto no puede controlarse después de fumar. Rehusa tomar medicina. Olvidadizo. Excitación nerviosa. Temor a enfermarse. Temor de su propia sombra. Imprudencia tonta.

CABEZA:

Vértigo; como si fuera mecido, < cerrando los ojos y acostándose. Adormecimiento de un lado de la cabeza.

OJOS:

Cerrados, aún caminando al aire libre.

OIDOS:

Sensibles al ruido; el ruido más ligero lo sobresalta de su sueño.

NARIZ:

Descarga de moco sanguinolento, al sonarse la nariz.

CARA:

Sensación como de una telaraña o algo reptante.

BOCA:

El alimento que se come parece muy seco; debe beber para tragarlo. Centro de la lengua; rojo, rayado, se amplía hacia la punta. Saliva como la clara de un huevo. La leche sabe ácida.

ESTOMAGO:

Se siente lleno de comida seca (con asma). Ardor. < por respirar profundamente; tomando té o chocolate. Sensación de aleteo. Tolera solamente las bebidas tibias. Come sin hambre y bebe sin sed. Ausencia de sed por días.

ABDOMEN:

Sensación como de una lombriz larga que se retorciera en el colon transversal.

URINARIO:

Orina; ofensiva, escasa.

HOMBRES:

Genitales flácidos, sudorosos. Impotencia. Prurito. Impotencia, después de gonorrea; con depresión mental. Los órganos parecen más grandes, como inflados. Glande como un trapo. Polución atónica. Prepucio retraído, después del coito. Genitales fríos.

MUJERES:

PRURITO VULVAR, induciendo la masturbación, con ardor; por lombrices; durante el embarazo. Eretismo sexual violento o neurastenia.

RESPIRATORIO:

Asma catarral, moco no sacado con facilidad, pero > expectoración. Tos dura, con asma. Respiración suspirante.

EXTREMIDADES:

Débiles, no puede salir de la cama. Manos dormidas. No puede caminar o mantenerse en pié, con ojos cerrados.

SUEÑO:

Gime y se queja ansiosamente; fuertemente en sueños. Sueños vívidos.

PIEL:

Se siente áspera y seca. Ardor en puntos; debe tocar la parte, pero no puede rascarse.

FIEBRE:

Partes aisladas frías; pies. Sudor de olor dulzón, que atrae las moscas. Fiebres bajas. Se duerme durante la fiebre, despierta cuando la fiebre cesa.

COMPLEMENTARIOS:

Nit-ac.

RELACIONES:

Caps.

CALCAREA ARSENICA

GENERALIDADES:

Este remedio se encontró útil clínicamente, en enfermedades de mujeres obesas cercanas al climaterio; cuando las emociones más ligeras causan palpitación. En niños con hígado y bazo crecidos; en enfermedades de bebedores después de la abstinencia. Nefritis, albuminuria e hidropesía. En epilepsia con aflujos de sangre a la cabeza; aura que se siente en la región del corazón. Epilepsia, con enfermedad cardíaca. Sensación de volar o de flotar, como si los pies no tocaran el suelo.

AGRAVACION:

Ejercicio ligero. Errores en la dieta. Aire frío.

MENTE:

Depresión y ansiedad. Deseo de compañía.

CABEZA:

Aflujo de sangre a la cabeza con vértigo. Cefaleas semanales > yaciendo sobre el lado doloroso. Cefalea, con palpitación, que aumentan y disminuyen juntas.

ABDOMEN:

Hígado y bazo crecidos, en malaria crónica; en niños. Enfermedad pancreática. Mejora el dolor ardoroso en cáncer. Diarrea < por el camote (batata) o boniato. Glándulas inguinales hinchadas, con dolor desgarrante en las piernas.

URINARIO:

Región renal sensible a la presión. Pasa la orina cada hora.

MUJERES:

Leucorrea sanguinolenta y ofensiva. Cáncer del útero. Ardor en el útero y vagina.

RESPIRATORIO:

Calor ardiente en el pecho. Sensación como si se fuera a sofocar con palpitación. Siente como si lo jalaran con una cuerda desde la laringe hacia atrás.

CORAZON:

Palpitación y dolores del corazón antes de un ataque epiléptico. Pulso intermitente - cada 4° latido regularmente.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor y rigidez cerca de la nuca. Violento dolor de latido, lo saca de la cama.

EXTREMIDADES:

Debilidad y dolorimiento de las extremidades inferiores. Remueve productos inflamatorios en las venas de las extremidades inferiores.

FIEBRE:

Malaria marcada. Friolento.

CALCAREA CARBONICA

GENERALIDADES:

Calc-carb es el representante principal de los componentes cálcicos. El metabolismo del calcio está activo durante la infancia y se vuelve defectuoso después de la mediana edad. La asimilación inapropiada del calcio da paso a una NUTRICION defectuosa de las GLANDULAS (cervicales y mesentéricas en los niños); HUESOS Y PIEL. Altera la SANGRE causando anemia. INFLAMACION GLANDULAR bajo la mandíbula inferior y el cuello; desarrollo defectuoso de los huesos. FONTANELAS ABIERTAS. Curvatura; exóstosis; raquitismo. Gordura, pero no fuerza. Los músculos y la piel se vuelven laxos y débiles. SUDOR FACIL; parcial - en la Cabeza; Pecho; Durante el sueño. DESCARGAS PROFUSAS; con frecuencia ACIDAS, sudor, evacuaciones, olores del cuerpo; saliva, etc. Enfermedades por dentición en los niños - convulsiones, diarrea agria; dentición tardía y caminado tardío - los niños no sientan los pies sobre el suelo. Niños emaciados, con cabeza grande y estómagos pronunciados. Los pacientes son susceptibles al FRIO. El aire húmedo y frío, enfría más y mas; se resfría con facilidad; especialmente el pecho. Tendencia a esguinces de músculos fácilmente. Las partes quietas se entumescen. Tendencia a la formación de cálculos. Desnutrición. Atrofia muscular. Etapa temprana de la tuberculosis de pulmones; con tos cosquilleante; dolores del pecho fugaces; náusea; acidez y desagrado por las grasas. Una etapa de cansancio físico y mental debido a exceso de trabajo. Calambres en los músculos que contraen las extremidades. Abscesos profundos de los músculos. Pólipos; nasales, uterinos, etc. quistes. En los pacientes Calc bajos de estatura, se describen como gordos, fofos, blancos, fuertes, sudorosos, fríos y húmedos. En la epilepsia, el aura se esparce por el plexo solar o como un ratón que corriera por el brazo o hacia abajo del epigastrio al útero o las piernas. Temblor de contractura, corea; neuralgias, fantasías horribles, parálisis están entre los efectos de Calc. Venas varicosas; ardor en las venas. Osteomielitis. Malos efectos del alcohol pérdida de fluidos vitales; libido excesivo; masturbación; esguinces; por cargar pesos grandes; sudor suprimido, erupciones, reglas; miedo, egoísmo. Afecciones de los cortadores de piedra. Niños con letargo y somnolencia que no quieren jugar. Disfunción de tiroides y pituitaria. Diarrea, temblores, después de quemarse.

AGRAVACION:

FRIO;

AIRE CRUDO; BAÑO. Refrescándose. Cambio de clima a frío. EJERCICIO -físico, mental. Ascendiendo. Extrabismo. DENTACION. Pubertad. PRESION DE LA ROPA. LECHE. Ansiedad. Despertando. Luna llena. Por estar de pié. Por mirar hacia arriba. Climaterio. Volviendo la cabeza.

MEJORIA:

Clima y tiempo seco. Acostándose, sobre el lado doloroso, sobre la espalda. Estornudando (Cefalea). Frotamiento, rascándose. Frotando o calmando las manos. Después del desayuno. Oscuridad.

MENTE:

Olvidadizo; aprende pobremente. Deprimido. Melancólico o de Humor Cavilante. Miedos; enfermedad, miseria, desastre, falta de salud; de ser observado. Miedo excitado por reporte de crueldades. Cautó. Confundido, equivoca palabras y se expresa equivocadamente. Triste. Apático. Taciturno. Indolente; súbitamente. Visiones; de fuego, muerte, ratas y ratones, en delirio. Melancolía; deseo de llorar, de ir a su casa. Desesperanza de aliviarse. Suspicious; piensa que la gente lo mira con suspicacia y a su vez, el los mira suspicazmente. Incapacidad de aplicarse por sí mismo. Se sienta y piensa en nimiedades, que no llevan a ningún lado. Se siente y rompe ramitas, etc. todo el día. Imagina que alguien camina detrás de ella. Siente que va a correr allá y acá gritando. Se asusta fácilmente o se ofende. Niños obstinados. Niño que se asusta con todo lo que vé. Travieso. Terco. Irritable, grita por tonterías; se preocupa por todo.

CABEZA:

Vértigo; con muchas condiciones, < ascendiendo o volteando la cabeza, rascándose la cabeza; después de epilepsia. Aflujo de sangre a la cabeza. Frialdad de hielo en y sobre la cabeza; mucho sudor < occipucio; moja la almohada. se rasca la cabeza; al caminar. Profundos dolores de cabeza, golpeantes, agitantes < viento, > oscuridad; cerrando los ojos, presión; con eructos. Cefalea por levantar cargas pesadas o por otros esfuerzos musculares. Costras de leche gruesas y fétidas; con glándulas cervicales hinchadas. CABEZA GRANDE CON ABDOMEN CRECIDO Y DURO. VÉRTICE HELADO. Cabeza caliente con ejercicio mental. Puntos fríos en la cabeza. Hidrocefalia; crónica. Ardor en el vértice; después de penas. Sudor con palpitaciones. Caída de cabello.

OJOS:

DILATACION DE LAS PUPILAS.

Vé; visiones al cerrar los ojos; fuera del campo de visión. Puntos y úlceras en córnea. Fístula supurante; lagrimeo. Gran fotofobia. Comezón. No puede leer a la luz del gas. Sensación como de bizqueo. Oftalmia; en el recién nacido; después de resfriarse. Visión disminuída por lectura y escritura constantes, etc. Fatiga fácil de los ojos. Úlcera de córnea. Opacidades de la córnea.

OIDOS:

Sordera; por trabajar en agua o por quinina. Perversión de la escucha. Pólipos se sangrado fácil. Dolorimiento, cuando se suena la nariz y tosiendo. Descarga purulenta y ofensiva con glándulas crecidas. Ruidos ilusorios, al tragar, masticar. Dolor de latido, con sensación de que algo quiere salir.

NARIZ:

Poros; secos, irritados, ulcerados. Coriza con poliuria. Olor ofensivo en la nariz; descarga amarilla, ofensiva. Hinchazón de la nariz y LABIO SUPERIOR, en niños. Pólipos con pérdida del olfato. Catarro senil. Estornudos, frecuentes, sin resfrío. Epistaxis en niños con propensión a la gordura. Obstrucción en la nariz.

CARA:

Pálida, abotagada, pastosa. Vieja, arrugada. Inflamación del labio superior en la mañana; con grietas y sangrado. Glándulas submaxilares inflamadas. Mastica y traga en sueños; niños. Erupciones pruriginosas en la barbilla.

BOCA:

Gusto ácido. La boca se llena de agua ácida. Ránula bajo la lengua. Epulis; suave, indoloro. Lengua seca, por la noche, no le gusta hablar. La punta de la lengua se siente escaldada < alimentos calientes. Dolor en las muelas < aire frío o cosas calientes.

GARGANTA:

Inflamación de las anginas. Bocio. Fístula parotídea. Dolor punzante al tragar. Ulceras pequeñas que se esparcen por el paladar. Uvula; inflamada, edematosa. Expectora moco salado.

ESTOMAGO:

Anorexia por exceso de trabajo. Desea cosas indigestas- gis, carbón, lápices, también huevos, helados, sal y dulces. Aversión por la carne, leche, cosas hervidas, grasa. Eructos ácidos, vómito ácido de leche en cuajos. Pérdida del apetito, pero cuando empieza a comer, disfruta. Sed por agua fría por la noche. Inflamación de la boca del estómago, como una vasija invertida. Hiper-cloridia. EL agua bebida, aún poca, causa náusea, pero no si está helada. La leche disgusta. Sensación como de algo que se elevara hacia la cabeza.

ABDOMEN:

GRANDE Y DURO.

Cólico con frialdad en los muslos; después de una coriza suprimida; o con sensación de fialdad en abdómen. Flatulencia encarcerada. Distendido > a la menor presión. Región del hígado dolorosa < agachándose. Cólico de la vesícula. Peritonitis cuando el dolor > por aplicaciones frías. Retortijones o calambres en la región umbilical. Ombligo; irritado, excrescencias como carnosidad en infantes. Glándulas inguinales y mesentéricas inflamadas y dolorosas. Evacuaciones como yeso, gris o verdes, acuosas. Diarrea de los niños con apetito voraz. Evacuaciones; primero duras, luego pastosas y luego líquidas. Prolapso del ano, sensación reptante en el recto. Hemorroides, dolorosas al caminar > sentándose. Evacuaciones < comer y beber. Evacuaciones indigeridas- las substancias comidas pasan sin cambio. Se siente mejor estando constipado. Tenesmo persistente después de disentería. Lombrices; solitaria, oxiuros. Diarrea; crónica, después de quemaduras.

URINARIO:

Orina; oscura; café, ácida, fétida o de olor fuerte. Sedimento urinario blanco, con orina lechosa. Orina sanguinolenta. Pólipos de la vejiga. Cólico renal. Enuresis; en cama; al caminar.

HOMBRES:

Deseo sexual incrementado, con erecciones retardadas. Emisiones frecuentes. Ardor con emisión seminal. Coito; seguido de debilidad profunda, vértigo, irritabilidad, dolor de espalda y rodillas, cefalea y sudor. Comezón y ardor en genitales. Impotencia, por abuso sexual o indulgencia. Descarga seminal prematura. Hidrocele en niños.

MUJERES:

Reglas muy tempranas (en niñas); muy profusas; muy largas; con vértigo, dolor de muelas y pies fríos y húmedos. Leucorrea espesa, lechosa, borbollante y amarilla, < durante la micción, con ardor y comezón. Pechos sensibles e hinchados, antes de las reglas. Leche abundante, pero desagradable para el bebé. Leche deficiente. Esterilidad; con reglas copiosas. Pólipos uterinos. Pezones; agrietados, ulcerados; muy sensibles. La excitación mental trae dismenorrea o causa que las reglas reaparezcan. Calambres en los dedos gordos de los pies, o en las plantas, durante el embarazo. Reglas tardías en jóvenes gordas y fofas; con palpitación, disnea y cefalea. Coito seguido de sudor y postración. Ardor y comezón en genitales. Ausencia de reglas en mujeres pletóricas; por susto. Torpe, retrasada y cansada durante el embarazo. Punzadas severas en las mamas al amamantar.

RESPIRATORIO:

Ronquera indolora < mañana. Todo le provoca respiración corta. Enfisema. Tos cosquilleante como por polvo o una pluma en la garganta. Tos; < inspiración, tocando piano, comiendo. Dolores agudos en el pecho que van hacia atrás. Expectoración purulenta, floja y dulce. Pecho muy sensible al tacto, percusión o presión. Accesos de sofoco. Sensación de debilidad en el pecho, no puede ni siquiera hablar. Ulceras o abscesos en los pulmones. Tos habitual.

CORAZON:

Débil. Palpitación, con sensación de frialdad, con opresión inquieta del pecho.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolores del cuello < levantándolo. Dolor en la espalda como si estuviera torcida, escasamente puede levantarse de su asiento. Dolor entre los hombros impidiendo la respiración. Nuca rígida y tiesa. No puede sentarse erecto en la silla por la debilidad de la espalda. Vértebras; se sienten flojas; dolorosas a la presión.

EXTREMIDADES:

PIES FRIOS Y HUMEDOS.

Siente como si estuviera usando medias húmedas. Manos frías, sudorosas; rodillas. Calambres en las pantorrillas al estirar las piernas, por la noche. Ardor en las plantas de los pies. Plantas ulceradas. Brazos; débiles doloridos. Manos entumidas, al engarruñarlas. Necesidad de mover los dedos. Sensación de un ratón que corriera por las piernas. Manos agrietadas. Torpe, lerdo, fácilmente se cae. Debilidad de los tobillos en los niños, se tuercen hacia adentro, al caminar. Cansado por caminatas cortas. Hinchazón de coyunturas, especialmente las rodillas. Debilidad y temblor de piernas. Nudosidades artríticas, deformadas.

PIEL:

Fría, como una culebra; flácida, insana. Las heridas pequeñas no sanan rápidamente. Psoriasis. Urticaria > en aire fresco. Temblor de piel visible, de la cabeza a los pies, seguido por vértigo. Forúnculos sangrantes recurrentes. Manchas lechosas, blancas. Erupciones petequiales. Sabañones. FRIALDAD DE HIELO; en el vértice. Puntos fríos en la cabeza o frialdad; de cabeza, manos, rodillas, pies, o partes afectadas.

SUEÑO:

Insomnio por aflujo de ideas; alguna idea desagradable aparece siempre por un sueño corto. Pesadillas; los niños gritan después de la medianoche y no pueden ser apaciguados. Sueños terroríficos y fantásticos. Visiones horribles al cerrar los ojos.

FIEBRE:

Friolento con sed. Frialdad: de hielo en diferentes partes del cuerpo; de la parte afectada. Calor interno con frialdad externa y sudor. Fiebre con sudor. Sudor frío; parcial. Calor; por la noche, durante las reglas.

COMPLEMENTARIO:

Bar-c; Lyc; Sil.

CALCAREA FLUORICA

GENERALIDADES:

Esta sal tisular relaja las Fibras Elásticas, especialmente de venas y glándulas. Las glándulas crecen y se vuelven DURAS COMO PIEDRA. Las venas se dilatan y se vuelven varicosas, inflamadas. Dispersa crecimientos óseos, osteo-sarcoma, exóstosis; después de heridas o golpes. Céfalohematoma. Esmalte deficiente de los dientes. Remueve la tendencia a adherencias después de operaciones. Induraciones con dureza de piedra: anginas; tumores, cuello, después de heridas; márgenes de úlceras, etc. Aneurisma. Induraciones que amenazan supuración. Arterioesclerosis. Fístula. Catarata. Descargas que se vuelven verdes como pasto. Rigidez general. Debilidad, en la mañana. Sensación de fatiga todo el día. Adormecimiento en diferentes partes. Amenaza de apoplejía. Temperamento indolente. Uñas hipertrofiadas. Quemaduras por Rayos X. Pus de mal olor. Periostitis de la mandíbula inferior, costillas, etc. Sífilis congénita que se manifiesta por sí misma en ulceraciones de la boca y garganta. Nódulos en el pecho.

AGRAVACION:

Empezando a moverse. Frío; húmedo. Corrientes; tiempo cambiante. Torceduras.

MEJORIA:

Movimiento continuo. Aplicaciones calientes. Calor. Frotando.

MENTE:

Indecisión. Temor infundado a pérdida financiera. Miedo a la pobreza.

CABEZA:

Ruido crujiente en la cabeza, perturbando el sueño. Cefalohematoma, de infantes recién nacidos.

OJOS:

Adolorimiento en los ojos > presionando y cerrando. Destellos y moscas volantes delante de los ojos. Keratitis flictenular. Quistes subcutáneos palpebrales. Catarata. Cornea opaca, en puntos.

OIDOS:

Otorrea crónica. Depósitos calcáreos en tímpano.

NARIZ:

Descarga copiosa, amarillenta, espesa, grumosa, ofensiva. Ocená.

CARA:

Inflamación dura en la mandíbula. Hinchazón dura en la mejilla, con dolor o dolor de muelas. Ulceras pequeñas, duras, frías en los labios.

BOCA:

Flemón con inflamación dura de la quijada. Dientes flojos. Lengua; indurada, dura. Dolor de diente, si cualquier alimento lo toca. Periostitis de la mandíbula inferior.

GARGANTA:

Anginas; ásperas y desgarradas: formando tapones de moco. Dolor y ardor > bebidas tibias.

ESTOMAGO:

Vómitos; de alimento indigerido, en infantes. Indigestión aguda por fatiga y cansancio cerebral; en niños agotados. Hipo, cuando se trata de expectorar moco.

ABDOMEN:

Flatulencia; en el embarazo. Evacuaciones; barbellantes, acuosas de olor fétido. Hemorroides sangrantes; con dolor en el sacro. Fisuras. Fístula.

HOMBRES:

Hidrocele. Testículos indurados.

MUJERES:

Nudos duros en el seno. Favorece el parto.

RESPIRATORIO:

Tos, con expectoración de bolas pequeñas, tenaces, amarillas. Ronquera, después de reír o leer en voz alta. Dificultad para respirar como si la epiglotis estuviera casi cerrada.

CORAZON:

Depósitos fibroides cerca del endocardio. Enfermedad valvular.

CUELLO Y ESPALDA:

Bocio. Lumbago; por torcedura > movimiento y calor. Dolor de espalda después de un paseo largo. Crecimiento raquíptico del fémur en infantes.

EXTREMIDADES:

Tumores enquistados en el dorso de la muñeca. Bursitis. Sinovitis crónica; de la rodilla. Muñecas y tobillos fríos. Inflamación e induración alrededor de los tendones y coyunturas. Fibromas recurrentes en el hueso de la rodilla. Enfermedad de la coyuntura de la cadera. Cuerpos como arroz en las articulaciones.

PIEL:

Agrietada, seca, dura y con una blancura de alabastro. Marcas de nacimiento. Ulceras con orillas duras. Crecimientos verrugosos.

SUEÑO:

Sueños vívidos, con llanto. Salta de la cama en sueños.

COMPLEMENTARIOS:

Rhus-t.

RELACIONES:

Graph; Hekla.

CALCAREA HIPOPHOSPHOROSA

GENERALIDADES:

El Hipofosfato de Calcio está indicado en aquellas personas que se vuelven pálidas, débiles, con violentos sudores que empapan, rápidamente emaciadas, con debilidad extrema, debido a pérdidas vitales o abscesos continuos que les han reducido la vitalidad. Emaciación en niños.

AGRAVACION:

Pérdidas vitales.

MENTE:

Excitable nervioso e insomne. Habla rápidamente y se enoja con facilidad.

OIDO:

Sonido de algo que se fríe o sisea en el oído.

ESTOMAGO:

Hambre insaciable < 2 horas después de los alimentos > cuando el estómago está lleno. Pérdida del apetito.

ABDOMEN:

Pulsación dolorosa en el bazo. Tuberculosis mesentérica. Diarrea; de tisis.

RESPIRATORIO:

Dolor agudo en el pecho. Tos; de tisis. Sangramiento de los pulmones. Asma. Bronquitis.

CORAZON:

Angina de Pecho. Las venas se salen como tralla.

EXTREMIDADES:

Extremidades frías habitualmente.

SUEÑO:

Se sobresalta en sueños.

PIEL:

Sudor nocturno exhaustivo. Acne pustuloso por todo el cuerpo.

RELACIONES:

Chin.

CALCAREA IODATA

GENERALIDADES:

Es usualmente usada en la induración de glándulas, sugerida por sus dos componentes. Puede ser administrada en el crecimiento de las anginas llenas con pequeñas cavernas. Crecimiento de Tiroides cerca del tiempo de la pubertad. Adenoides. Niños débiles propensos a las gripas. Descargas profusas y amarillas. Ulceras indolentes que acompañan las venas varicosas. Cefalea mientras se pasea con vientos fríos. Crecimiento indurado en mamas, movable, doloroso a la presión, y el movimiento del brazo. Sudor profuso.

CALCAREA PHOSPHORICA

GENERALIDADES:

Este remedio tisular recuerda en muchos aspectos a Calc-Carb., sin embargo tiene sus propios síntomas característicos. Afecta a NUTRICION de huesos y glándulas; los huesos se vuelven blandos, delgados y quebradizos; promueve la osificación de los huesos en fracturas de no unión. Las glándulas están hinchadas. Tiene una afinidad especial donde los huesos forman suturas o sínfisis; dolor ardiente a lo largo de las suturas. Los pacientes, especialmente niños, son delicados, altos, delgados o huesudos; con piel sucia cafésosa. Anemia, después de enfermedades agudas, o enfermedades desgastantes crónicas. Temblor o manos temblorosas; con dolor u otros malestares. Frialdad o dolencia en puntos; vértice, globos oculares, punta de la nariz, dedos, etc. Sensación de hormigueo y entumecimiento; después de malas noticias. Niños anémicos que son quisquillosos, flojos, tienen extremidades frías y digestión débil; se sobresaltan convulsivamente yaciendo sobre sus espaldas, > yaciendo sobre un lado. Pierden su respiración cuando son levantados. Sus descargas son albuminosas. Dolores repentinos. Artritis. Reumatismo. Mala asimilación. Raquitismo. Enfermedad de Addison. Malos efectos del sobre crecimiento. Elevándose. Exceso de estudio. Excesos sexuales o irregularidades. Pena. Decepción amorosa. Noticias desagradables. Operaciones por fistula. Mojándose. Jovenes tardías en su maduración. Efectos de enfriamiento durante las primeras reglas. Osificación lenta; los huesos no se unen. Idiocia en niños. Diabetes, con afecciones pulmonares.

AGRAVACION:

Exposición a cambios de tiempo. Corrientes. Frío; derretimiento de nieve. Dentición. Fatiga mental. Pérdida de fluidos. Pubertad. Frutas, cidra. Movimiento. Pensando en sus síntomas. Elevándose. Ascendiendo.

MEJORIA:

En el verano. Tiempo tibio y seco. Acostándose.

MENTE:

Quisquilloso, inquieto y irritable. Olvidadizo. Siempre quiere ir a algún lado; estando lejos de casa, quiere ir allí, y estando en casa, quiere ir a otro lado. Idiocia, cretinismo ágil.

CABEZA:

Dolor; en el occipucio; hacia abajo de la espina > por baños frescos o estornudando. Cefalea de niños estudiantes; con diarrea. Ardor; < cerca de la región de suturas. Como si el cerebro fuera presionado contra el cráneo. Cerramiento o dilatación tardado de fontanelas. Cráneo blando y delgado, cruje como

papel, < en el occipucio. Vértice frío o adolorido. Cabeza caliente, con punzada en la raíz del cabello. Como con un hielo en el occipucio. No puede mantener la cabeza erguida, se inclina.

OJOS:

Sensación fría detrás de los ojos. Como con algo dentro. < pensando en ello. Opacidad difusa de la cornea. No puede usar los ojos a la luz de gas.

OIDOS:

Inflamación súbita del oído externo. Sensación de frío; ruidos después de defecar.

NARIZ:

Punta con frío de hielo. Pólipos; grandes, pedunculados. Coriza con salivación.

CARA:

Pálida, amarilla, terrosa; llena de barro. Sudor frío en la cara. Labio superior hinchado.

BOCA:

Dentición tardía. Dientes; blandos, se pudren fácilmente. Malestares durante la dentición; convulsiones sin fiebre. Dientes sensibles al masticar. Gusto desagradable < en la mañana: al despertar; amargo, con cefalea.

GARGANTA:

Dolor ulceroso en la garganta; se siente vacía. Dolor al abrir la boca. Anginas crecidas. Crecimiento de las adenoides.

ESTOMAGO:

Los niños quieren amamantarse todo el tiempo y vomitan fácilmente. Deseo de; alimentos crudos, salados, jamón, carne salada o ahumada o tocino. Digestión débil; cada mordida lastima el estómago. Vómitos de leche persistentes; del seno u otra. Deseo de fumar tabaco que > cefalea. Vómitos; mientras se expectora moco, con temblor de manos.

ABDOMEN:

Cólico, en cada intento de comer; por tomar helados, agua fría o frutas. ABDOMEN FLOJO Y HUNDIDO. Rezumamiento de fluido sanguinolento del ombligo en infantes. Ombligo ulcerado. Evacuaciones; fétidas, calientes, lientéricas, farfollantes, acuosas, verdes, delgadas, indigeridas; con flatos fétidos. Como si tuviera algo vivo dentro. Fístula en ano, alternando con síntomas de pecho. Fisura del ano, en niños altos y esbeltos. Hemorroides, rezumando fluido sanguinolento todo el tiempo.

URINARIO:

Incremento de orina, con sensación de debilidad. Dolor en la región de los riñones < sonándose la nariz o elevándose. Dolor en la vejiga < estando vacía.

HOMBRES:

Punzadas en el perineo extendiéndose al pene. Erecciones mientras pasea en carruaje, sin desearlo. Sensación débil en los órganos sexuales, después de evacuar.

MUJERES:

Reglas; adelantadas, escasas; cada dos semanas, excesivas, brillantes; en jóvenes; muy atrasadas, con sangre oscura. Deseo sexual aumentado; antes de las reglas, durante la lactancia. Deseo vehemente durante el embarazo. Leucorrea ardiente; albuminosa, de un período al otro, seguido de dolor en el abdomen. Hormigueos; voluptuosos en genitales. Prolapso; en mujeres debilitadas, < mientras orinan o evacúan; con reglas; con dolores reumáticos. El niño rehusa el pecho; la leche sabe salada. Utero; pesado, débil o adolorido. Erupción < durante las reglas. Reglas tardías, con cefalea violenta. Tumores en mama (izquierda), hombres, dolorosos a la presión. Mamas; doloridas, se sienten grandes.

RESPIRATORIO:

El niño pierde su respiración cuando es levantado. Tos > acostado; durante la dentición. Suspiros involuntarios. Tisis; con cavidades; con sudores nocturnos; expectoración amarilla. Dolor en el pecho por corrientes de aire. Debe aclarar la laringe de mucosidades antes de cantar o hablar. Tosferina, obstinada.

CORAZON:

Hidropesía por enfermedad cardíaca. Palpitación, con debilidad temblorosa en las pantorrillas.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello adolorido por corrientes de aire. Cuello débil, delgado; la cabeza se inclina. Curvatura de la espina hacia la izquierda. Dolor violento < al mínimo esfuerzo, con dolor. Sacro entumido y dolorido. Vertebrae lumbares que se doblan hacia la izquierda. Espina bífida. Enfermedad de Pott.

EXTREMIDADES:

Reumatismo en estación fría. Punta de los dedos ulceradas. Como con una astilla bajo las uñas. Nalgas entumidas. Debilidad a través de la cadera. Enfermedad de la coyuntura de la cadera. Miembros fríos con problemas digestivos. Dolor, ardiente a lo largo de las orillas de las uñas. Bultos duros y azulosos en las axilas. Temblor de brazos y manos, con muchos malestares. Ulceras fistulosas en la coyuntura del tobillo.

SUEÑO:

Estiramiento y bostezos constantes. Niños que gritan en sueños. No puede despertarse temprano por la mañana.

PIEL:

Obscura, café, amarilla. Cicatriz por amputación, ulcerada. Ulceraciones por cataplasma de mostaza.

FIEBRE:

Se enfría fácilmente. Friolento con dolores. Se enfría la espalda, pero está caliente la parte baja. Sudor mórbido pegajoso < cabeza y garganta; por la noche.

COMPLEMENTARIO:

Hep; Rut.

RELACIONES:

Carb-an; Chin; Fer-p; Nat.m.

CALCAREA SULPHURICA

GENERALIDADES:

Este es un REMEDIO CONECTIVO del Dr. Schussler. Afecta las glándulas, membranas mucosas, huesos, y piel. Hinchazones glandulares tópidas. Tumores enquistados. Fibromas. Tendencia a la supuración, después que el pus ha encontrado su salida, cae dentro del rango de este remedio. La pus es espesa, amarilla, grumosa, sanguinolenta. Descargas mucosas; amarillas, espesas y grumosas. ABSCESOS recurrentes o durables. Ulceras; malignas, corneales, profundas. fístula. Los dolores son cortantes. Reacciones pobres. Niños; con coriza sanguinolenta, diarrea o eczema. Ardores o escaldaduras después de que la supuración se inicia. Crecimiento maligno después de que la ulceración se ha establecido.

AGRAVACION:

Corrientes; Contacto; Frío; húmedo. Calor de la habitación.

MEJORIA:

Al aire libre. Baño. Por comer. Calor (Local). Descubriéndose.

MENTE:

Apresurado. Desprecia a aquellos que no concuerdan con él. Se queja de que no es reconocida su valía, por otros. Se sienta y medita sobre infortunios imaginarios.

CABEZA:

Cabeza escaldada de los niños; con descarga amarilla purulenta.

OJOS:

Conjuntivitis con descarga de materia espesa amarilla. Extremo rojo y pruriginoso.

OIDOS:

Flujo de cera oscura. Barros alderredor de las orejas. Otitis después de una bofetada.

NARIZ:

Coriza sanguinolenta; infantes. Estornudos > al aire libre.

CARA:

Barros y pústulas en la cara.

BOCA:

Lengua floja. Gusto de jabón.

ABDOMEN:

Diarrea; de niños con descarga de pus o pus sanguinolenta. Evacuaciones, cubiertas de blanco. Absceso doloroso cerca del ano, en algunos casos, de fístula. Diarrea, después de azúcar de maple.

URINARIO:

Pielitis. Nefritis crónica.

MUJERES:

Leucorrea espesa, blanca. Dolor cortante en el ovario (derecho). Reglas; tardías, durante largo tiempo.

RESPIRATORIO:

Crup sofocante. Empiema.

EXTREMIDADES:

Sudor de pies fétido, frío. Plantas ardorosas y pruriginosas.

PIEL:

Insana; cortadas, heridas, etc. no sanan. Eczema seco < en infantes.

SUEÑO:

Sobresalto en sueños, como con deseo de aire.

FIEBRE:

Fiebre héctica causada por la formación de pus. Aversión a cubrirse, estando frío. Calor seco por la noche. Sudoración fácil < tosiendo.

RELACIONES:

Hep; Sil.

CALENDULA

GENERALIDADES:

Actúa en los MUSCULOS; espina, hígado y es un agente notorio de cicatrización, en heridas abiertas, desgarradas, cortadas, laceradas, rasgadas o supurantes; el dolor es excesivo y fuera de toda proporción a la herida. Hemorragias; en heridas del cuero cabelludo; después de una extracción dental. Disposición a resfriarse. Evita la piemia. Sensible a la humedad, o al aire libre. Cancer, como un remedio

intercurrente. La aplicación de una esponja saturada con una solución caliente de Caléndula, después del parto, da un gran confort a la paciente. Parálisis después de una apoplejía. Promueve una granulación sana y cicatrización rápida en primera instancia. Evita la gangrena.

AGRAVACION:

Tiempo húmedo, nublado. Durante el escalofrío.

MEJORIA:

Caminando, o yaciendo perfectamente quieto.

MENTE:

Extremadamente nervioso, fácilmente asustado, se sobresalta con miedo.

CABEZA:

Peso en el cerebro.

OJOS:

Blenorrea del saco lagrimal; visión amarilla.

OIDOS:

Oye mejor en un tren y sonidos distantes. Oído agudo.

NARIZ:

Coriza; en un poro; con mucha descarga verde.

GARGANTA:

Hinchazón dolorosa de la glándula submaxilar < moviendo la cabeza.

ESTOMAGO:

Agruras con horripilación. Náusea en el pecho. Hipo, al fumar.

ABDOMEN:

Distensión epigástrica. Evacuaciones como cuajos. Ictericia. Tirones y estorbos en las ingles.

HOMBRES.

Excoriación del prepucio después del coito.

MUJERES:

Verrugas en el cérvix; ovarios más abajo de lo normal. Utero hipertrofiado. Menorragia. Descarga profusa y ofensiva después de un parto por fórceps.

ESPALDA:

Dolor de magulladura en el ángulo de la escápula derecha. Manos frías.

PIEL.

Amarilla. Horripilación.

FIEBRE:

Frialdad, gran sensibilidad al aire libre. Estremecimientos en la espalda, con piel tibia. Calor en la noche.

RELACIONES:

Arn; Bellis.

CAMPHORA

GENERALIDADES:

Frialdad, calambres y convulsiones con angustia mental, son los signos marcados para la indicación de Camphora. Convulsiones con labios azules, espuma en la boca y trismo. Es un remedio para el colapso súbito, por influencias dominantes que actúan en los centros nerviosos. El paciente se pone HELADO: Y AUN ASI TIENE AVERSION A LAS CUBIERTAS y quiere quitárselas; y luego alternativamente aparece un calor ardiente interno y ansiedad. Repentina; debilidad; amagos de desmayo que se vuelven peor. Colapso seco, con poco vómito y purga; en cólera. Espasmos tetánicos con exhibición de dientes, con retracción de labios, seguido por estupor, con frialdad. Trismo del recién nacido. Frío al inicio de catarros. Descargas escasas o retenidas. Muy sensible al aire frío o a resfriarse. Erupciones suprimidas. Retraso. Partes blandas que se retraen. Malos efectos de choque; por heridas; operaciones; insolación. Vejación. Corrige casos echados a perder y antidota la mayoría de las medicinas (especialmente del reino vegetal). TRACTO DIGESTIVO; Nervios del Cerebro-Espinal, órganos urinarios y nariz, son afectados principalmente. Sensación de oleadas calientes, durante el dolor, con inquietud.

AGRAVACION:

Frío; corrientes. Estando medio dormido. Fatiga mental. Estado de shock. SUPRESIONES. Falta de atención. Movimiento. Noche.

MEJORIA:

Descargas libres. Sudor. Pensando en su mal. Por beber agua fría.

MENTE:

Insensibilidad, desvanecimiento de todos los sentidos o ansiedad. Torpeza. Pérdida de la memoria. Delirio. Manía: religiosa, puerperal. Quiere brincar de la cama o de la ventana. No quiere a nadie cerca de sí. Nada le satisface. Excitado, habla constantemente, regaña, en lenguaje indecente. Siente que va a morir, descansa, cuando se sabe viva. Ataques de angustia por la noche. Estado de frenesí, histérico; rasca, escupe, muerde, rompe sus ropas. Grita y pide auxilio. Cierra sus ojos y no contesta preguntas.

CABEZA:

La siente anudada. Occipucio; pulsante, sincronizado con los latidos. > de pié; estando privado de relaciones sexuales. Punzadas intempestivas en las sienas y órbitas. La cabeza está jalada hacia un lado (en espasmos). El dolor corre de la cabeza a la punta de los dedos.

OJOS:

Los objetos parecen demasiado brillantes; o los mueve a un lado con un torcimiento. Fijos, brillantes, volteados hacia arriba o hacia afuera. Pupilas dilatadas. Ojos procidentes con manía. Ojos profundamente sumidos.

OIDOS:

Lóbulos calientes y rojos.

NARIZ:

Fría y contraída. Coriza; en ancianos. El aire inhalado parece frío. Epistaxis persistente, con piel de gallina.

CARA:

Macilenta, pálida, azulosa, vieja, contraída. Pálida y roja por turnos. Sudor frío. Labio superior retraído. Trismo. Distorsionada. Muecas. Espuma en la boca.

BOCA:

Lengua azulosa. Temblor, frío. Voz; quebrada, débil, ronca. Aliento frío. El té hirviendo parece frío. Dolor de muelas > cerveza.

ESTOMAGO:

Sed ardiente. Ardor; en estómago, en abdomen. Cólera asiática. Poco vómito y purga; con colapso seco. Evacuaciones como agua de arroz. Vómito por la mañana; bilioso, ácido.

URINARIO:

Estranguria. Hematuria. Retención.

HOMBRES:

Excitación sexual. Satiriasis. Priapismo, durante el sueño. Impotencia.

MUJERES:

Deseo sexual incrementado. Bochornos calientes con frialdad del abdomen y extremidades, en climaterio. Constantemente se descubre el pecho: manía.

RESPIRATORIO:

Asfixia del recién nacido. Voz ronca, de chillido. Aliento frío. Respiración suspendida. Ataques violentos de tos seca.

CORAZON:

Pulso: débil, no perceptible, frecuente, pequeño. Palpitación después de comer.

EXTREMIDADES:

Los pulgares están contraídos hacia atrás. Calambres en las pantorrillas. Crujidos en las articulaciones. Frío, adormecimiento, hormigueo. Pies fríos, dolores como de torcedura.

PIEL:

Seca; lívida, azul, fría, no soporta estar cubierto. Erisipelas. Todas las secuelas del sarampión.

SUEÑO:

Insomnio con miembros fríos. Muy inquieto. Sueño comatoso.

FIEBRE:

Frío tiritante, con piel fría; quiere cubrirse durante la etapa caliente solamente. Fiebres inflamatorias súbitas, con alternancia rápida de calor y frío; seguidas por postración rápida. Sudor o calor > cubiertas. Frío; debajo de la escápula; antes de los catarros. Suda estando cubierto; el cuerpo se pone frío, estando descubierto.

COMPLEMENTARIO:

Canth.

RELACIONES:

Carb-v; Cup; Op; Sec-c.

CANCER FLUVIATILIS (Astacus Fluviatilis)

GENERALIDADES:

Conocido comúnmente, como el cangrejo del río. La tintura se prepara con el animal completo. Afecta marcadamente el hígado y las glándulas linfáticas. Produce URTICARIA con malestares del hígado; ictericia en niños. Comezón en varias partes. Costra de leche, con glándulas linfáticas crecidas. Crecimiento de glándulas en el cuello en niños y ancianos. Dolores punzantes que se sienten en varias partes. Frío interno o estremecimientos. Hormigueos nerviosos en todo el cuerpo. Erisipelas, con irritación. Calambres en la región del hígado, hígado inflamado < presión. Tos > al caminar pero regresa tan pronto como se sienta. Fiebre violenta, con cefalea; cara roja resplandeciente. Constriñe y puede cerrar completamente el duodeno y especialmente la apertura de la vesícula al duodeno.

AGRAVACION:

Aire. Descubriéndose.

RELACIONES:

Calc; Rhus-t.

CANNABIS INDICA Y SATIVA

GENERALIDADES:

Cannabis Indica se usa como un intoxicante. Produce sus efectos más marcados en la MENTE y las EMOCIONES; que están EXALTADAS INTENSAMENTE y en las cuales las CONCEPCIONES Y PERCEPCIONES ESTAN EXAGERADAS al nivel más alto. El paciente experimenta las más hermosas alucinaciones e imaginaciones; se siente muy feliz y contento; o en ocasiones las alucinaciones suelen ser terroríficas y de un dolor agonizante. El sentido de proporción o de espacio está perdido. Manía de grandeza. Levitación. Alegría; risa incontrolable. Violencia. Delirium tremens. Se siente débil y como que todo se va a la nada. Bocio exoftálmico. Catalepsia. Cuando los síntomas URINARIOS y de la gonorrea aguda están más marcados, Cann sat. deberá ser utilizada de preferencia a Cann. Ind. Sensación de escurrimiento, como si agua caliente fuera vertida sobre él, o como si gotas de agua fría estuviesen cayendo; en la cabeza, desde el ano, desde el corazón, todas estas, las encontramos en Cann. sat. Parálisis, con cosquilleo de la parte afectada.

AGRAVACION.

ORINANDO (Cann. Sat.). OBSCURIDAD. Fatiga. Hablando. Caminando. Café. Licor. Tabaco. Acostado y subiendo escaleras. (Cann. Sat.)

MEJORIA:

Aire fresco. Agua fría. Descanso.

MENTE:

Locuacidad. Muy olvidadizo no puede terminar la frase. El tiempo parece muy largo. Distancias que parecen inmensas. Desea luz. Lectofobia; (Cann.sat.) miedo de ir a la cama. Se ríe inmoderadamente; de cosas serias, o de simples naderías. Ríe y llora. Extasis, celestial. Escucha; voces, campanas, música. Ideas fijas, extrema movilidad física. Piensa que todo es irreal. Clarividencia. Cuando habla, parece que es otro el que está hablando. Gemidos y llanto.

CABEZA:

Cefalea violenta; con alucinaciones. El vértice parece que se abre y se cierra, < ruido. La cabeza parece que está separada del cuerpo. Sacudida involuntaria de la cabeza. Choques a través del cerebro.

OJOS:

Mirada fija. Las letras parece que pasan juntas al leer. Visión débil. Ve los objetos fuera del campo visual. Opacidad de la córnea. (Cann. sat.).

OIDOS:

Ruido como de agua hirviendo.

CARA:

La piel de la cara parece restirada. Abatida y rendida. Labios pegados. Barbilla jalada hacia el esternón.

BOCA:

Rechinamiento de dientes en sueños. Saliva; blanca, espesa, espumosa. Tartamudeo y balbuceo. Cada partícula de la comida es extremadamente paladeable. Aversión a la carne de la cual era muy afecta. (Cann.sat.)

ABDOMEN:

Como con algo vivo en el abdomen. Sensación en el ano, como sentado en una pelota. Latidos aquí y allá.

URINARIO:

Dolor en el riñón; al reír. Debe hacer esfuerzos para orinar; debe esperar un tiempo antes de que la orina fluya, goteo, antes de que la orina cese. ORINA ESCASA ARDOROSA QUE PASA GOTA A GOTA; con dolor que va hacia atrás (a la vejiga). Estado agudo de la gonorrea - uretra sensible; camina con las piernas abiertas (Cann. sat.) Cólico nefrítico. Carúnculo irritable.

HOMBRES:

Prepucio inflamado. Aumento del deseo sexual. Priapismo. Erección sin pensamientos amorosos.

MUJERES:

Reglas profusas; con violento cólico uterino; con disuria. Aumento del deseo sexual en mujeres estériles o con dismenorrea. Amenaza de aborto; por relaciones sexuales frecuentes o complicada con gonorrea.(Cann. sat.) Leucorrea infantil (Cann. sat.)

RESPIRATORIO:

Asma húmeda. Dificultad para respirar con palpitación > de pié. (Cann. Sat.) No puede controlar la voz. Ataques sofocantes.

CORAZON:

Las palpitaciones lo despiertan. Pulso lento. Sensación como de gotas que cayeran desde el corazón. (Cann. Sat.)

ESPALDA:

Dolor a través del hombro y espina, debe inclinarse; no puede caminar erecto. Tortícolis, barbilla jalada hacia el esternón.

EXTREMIDADES:

Dolor en las extremidades < respiración profunda. Parálisis total de las extremidades inferiores. Contracción de los dedos, después de una torcedura (Cann. Sat.) Se siente muy fatigado después de una caminata corta. Como si unas garras de pájaro le estuvieran apretando las rodillas. Dislocación de la patela al subir escaleras. (Cann. Sat.)

SUEÑO:

Sueños; eróticos, de muertos. Somnoliento, pero no puede dormir.

ANTIDOTO:

Ap.

CANTHARIS

GENERALIDADES:

Conocido comúnmente como la Mosca Española, ataca los ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES; pervirtiendo sus funciones, y estableciendo una inflamación violenta, causando delirio frenético. Su acción es rápida e intensa. Las INFLAMACIONES SON VIOLENTAMENTE AGUDAS, o rápidamente destructivas; en las membranas mucosas y serosas. Los DOLORES SON CORTANTES, PENETRANTES O ARDIENTES - MORDIENTES o como de úlcera, causando excitación mental. Las descargas son sanguinolentas, acres, acuosas, tenaces. Ataques súbitos de debilidad que hacen que la voz se vaya. Efusiones serosas. Nefritis; aguda parenquimatosa. Expulsa lunares, fetos muertos, placenta; promueve la fecundidad. Hemiplejía de lado derecho con afasia. En cualquier condición en que la orina es escasa, cortante y ardiente, Canth. debería considerarse. Convulsiones con disuria y síntomas hidrofóbicos. Excitación, durante los dolores. Remedio muy valioso para quemaduras y escaldaduras. Micción dolorosa, como un concomitante en cualquier condición de enfermedad.

AGRAVACION:

ORINANDO.

Por beber; frío. Objetos brillantes. Sonido de agua. Tocando especialmente la laringe. Café.

MEJORIA:

Calor. Descanso. Frotando.

MENTE:

Frenesí amoroso. Manía aguda; de tipo sexual. Deseo sexual excesivo; no > por el coito. Paroxismos de furia con llanto, ladrado, mordeduras y < por objetos brillantes; por tocar la laringe, bebiendo agua fría. Pérdida súbita de la conciencia, con cara roja. (dentición) Intentos constantes de hacer algo, pero no hace nada. Canta canciones obscenas. Parlotea sobre genitales, orina, heces. Insolente, humor contradictorio.

CABEZA:

Sensación de ardor o como de agua hirviendo en el cerebro. Cabeza pesada; dolores por bañarse o lavarse. Caída del cabello cuando se peina.

OJOS:

Los objetos se ven amarillos. Centelleos fieros, mirada brillante.

OIDOS:

Sensación como de viento que saliera de los oídos o de aire caliente.

CARA:

Pálida, miserable, como de muerto. Expresión de sufrimiento extremo, terror o desesperanza. Caliente y roja. Vesículas pruriginosas en la cara. Mandíbulas fuertemente cerradas; manía aguda.

BOCA:

Rechinamiento de dientes, con trismo. Ardor en la boca, faringe o garganta. Lengua trémula e inflamada; orillas desolladas. Saliva desagradablemente dulce.

GARGANTA:

Como en fuego. Dolorosamente constreñida; gran dificultad para tragar líquidos. Llena de ampollas.

ESTOMAGO:

Sed ardiente; pero aversión a todos los líquidos. Eructos y vómitos violentos. Sensibilidad sobre el estómago; la mínima presión produce convulsiones. Agravación por beber café, aún en pequeña cantidad. Aversión a todo.

ABDOMEN.

Violento dolor ardiente a través de todo el tracto intestinal; con sensibilidad dolorosa al tacto. EVACUACIONES DESMENUZADAS Y ARDIENTES, con tenesmo de recto y vejiga; con estremecimientos después de evacuar. Disentería o diarrea, con disuria. Dolor cortante en el recto, parcialmente > por flatos, enteramente por la evacuación. Constipación, con retención de orina. Deseo de evacuar mientras orina.

URINARIO:

Región de los riñones muy sensible. ORINA; ARDIENTE; ESCALDANTE; CON URGENCIA CORTANTE E INTOLERABLE Y TEMOR AL TENESMO O GOTEO. Estranguria. Disuria. Orina sanguinolenta. Apretón en la vejiga. Nefritis aguda; cólico nefrítico, cistitis. Hidropesía. Cólico renal > de alguna manera por presionar el glande del pene. Atonía de la vejiga, por retener largo tiempo la orina.

HOMBRES:

Inflamación dolorosa de los genitales. Priapismo. Tirón del pene. Deseo sexual aumentado no > por el coito. Semen sanguinolento. Poluciones. Gonorrea. Ardor en la uretra, después del coito.

MUJERES:

Ninfomanía. Ardor cortante en ovarios; ovaritis. Reglas, muy adelantadas; muy profusas; sangre negra o escasa. Senos; dolorosos, con disuria. Expele lunares, fetos muertos y placenta. Prurito con fuerte deseo sexual; en climaterio. Leucorrea, con excitación sexual, causando comezón y masturbación.

RESPIRATORIO:

Voz ronca, débil. Moco tenaz en los pasajes de aire. Accesos de tos seca y corta. Pleuresía con exudado. Dolores de pecho > eructos. Ardor en el pecho. Punzadas en el esternón.

CORAZON:

Tendencia al síncope. Pericarditis con efusión. Pulso; débil, irregular.

ESPALDA:

Emprostótonos y opistótonos. Dolor en los lomos con deseo frecuente de orinar.

EXTREMIDADES:

Las rodillas tiemblan al ascender escaleras. Dolor ulcerativo en las plantas, no puede caminar.

PIEL:

Erupción vesicular; volviéndose negra; con ardor y comezón. Erisipelas; vesicular. Quemaduras y escaldaduras > con agua fría. Tendencia a la gangrena. Erupciones que arden al tocarlas.

FIEBRE:

Frío; como agua fría que se vertiera sobre él; durante la evacuación. Manos y pies fríos. Sudor de orines; en genitales.

COMPLEMENTARIO:

Ap.

RELACIONES:

Ap; Ars; Merc-c.

CAPSICUM

GENERALIDADES:

Actúa con gran intensidad en las Membranas Mucosas; y también en los huesos especialmente Mastoides. Las membranas mucosas se vuelven oscuras, rojas, esponjosas y rezuman moco sanguíneo. Los dolores son ARDIENTES- AGUDOS, PUNGENTES o estrangulantes, como cuerdas, < por agua fría. Sensación de DESOLLADURA y constricción. Parece adecuado para aquellas personas que son de fibras laxas, débiles, perezosas, indolentes, obesas, coloradas, torpes, desmañadas y de hábitos poco higiénicos. Tales personas se oponen al ejercicio físico, salirse de su rutina y sienten nostalgia con facilidad. Ancianos que han agotado su vitalidad especialmente por trabajo mental y una vida pobre. Las personas reaccionan pobremente, y tienen temor al frío. Abstemios que acostumbraban el alcohol. Descargas fétidas. Mialgia. Neuralgia. Abscesos profundos. La circulación es lenta y la partes pellizcadas permanecen en posición elevada por un largo tiempo. Estremecimientos, durante el dolor o por beber.

AGRAVACION:

CORRIENTES LIGERAS;

aún tibias. AIRE FRIO; agua. Por descubrirse. Humedad. Por el baño. Por tragar en vacío. Bebiendo < garganta o excita la micción. Después de comer. Borrachines.

MEJORIA:

Movimiento continuo. Calor. Mientras come.

MENTE:

Caprichoso y de humor cambiante. Nostalgia con cara roja e insomnio, y propensión al suicidio. Malhumorado, irritable, enojón, fácilmente se ofende. Desmañado. Torpe; se mete en todo. Refractario, especialmente con los niños. Dipsomanía. Jocosos y cantador, pero a la menor causa se vuelve irascible. Siempre se cuida de los insultos. Si desea algo, se opone si lo propone alguien más. Ríe y llora alternadamente.

CABEZA:

Cefalea ardiente < por toser; > calor; movimiento, manteniendo la cabeza en alto.

OJOS:

Los objetos parecen negros. Ojos prominentes; con ardor y lagrimeo; durante la tos.

OIDOS:

Se afectan alternadamente. Inflamación y dolor detrás de los oídos. Mastoiditis. Sensibilidad sobre los huesos petrosos. Oídos calientes. Otagia; luego sordera. Afecciones del oído durante el embarazo. Tímpano perforado.

NARIZ:

ROJA PERO FRÍA;

punta muy caliente. Sangramiento nasal, en la mañana, en la cama.

CARA:

ROJA PERO FRÍA o pálida y roja alternadamente. Dolor en línea fina cursando a lo largo del nervio. Labios; hinchados, agrietados, ardientes.

BOCA:

Vesículas o aftas planas y dolorosas. Estomatitis. Olor fétido de la boca. LENGUA VERDOSA EN LA BASE. Encías: calientes, esponjosas, retraídas. Ardor - despellejamiento en la punta de la lengua. Aumento de saliva. Gusto; fétido, como agua podrida; agrio en los alimentos.

GARGANTA:

Ardor picante en la garganta. Constricción de la garganta con deseo de tragar. Garganta irritada de los fumadores y bebedores. Dolor y resequedad que se extiende a los oídos. Uvula: hinchada; elongada,

con sensación como si algo duro la presionara. Aire caliente y pungente que viene de la garganta, con gusto fétido al toser. Dolores por toser. Disfagia paralítica.

ESTOMAGO:

Desea estimulantes, cosas picantes; quiere un trago de licor. Mucha sed pero beber le causa estremecimientos. Aflujo de agua. Despepsia ácida; ardor o temblor en el estómago, o frialdad de hielo o como agua helada. Deseo de café, pero produce náuseas. Los vegetales causan flatulencia.

ABDOMEN:

Cólico flatulento. Cólico cerca del ombligo con evacuaciones mucosas. Evacuaciones pequeñas, calientes, ardientes, sanguíneas, mucosas; con tenesmo de recto y vejiga, luego sed < bebiendo. Hemorroides ardientes; sangrantes, con rozadura del ano. Disentería. Pulsación violenta de las arterias del abdomen. Diarrea mucosa.

URINARIO:

Urgencia frecuente y casi ineficaz de orinar. Estranguria. Orificio ardiente. La orina viene primero en gotas, luego en chorros. Descarga espesa, blanca, cremosa de la uretra; gonorrea. Beber excita la micción y evacuación. Meato evertido.

HOMBRES:

Escroto frío y arrugado. Atrofia, reblandecimiento de los testículos, con pérdida de la sensibilidad; cordón espermático marchito. Dolor ardoroso y excesivo en la próstata; gonorrea. Temblor de todo el cuerpo durante el escarceo amoroso. Prepucio hinchado. Calambres en los testículos; después de emisiones.

MUJERES:

Climaterio; perturbaciones, con ardor en la punta de la lengua. Sensación de apretón o punzada en la región ovárica (I), con desórdenes menstruales. Menorragia, con náusea.

RESPIRATORIO:

Quiere hacer respiraciones profundas, pensando que con esos sus síntomas se mejorarán. La tos causa dolores distantes; en la vejiga, oído, piernas, etc. o saca aire fétido, > bebiendo agua fría. Demasiado débil para toser expectorar. Constricción del pecho que impide la respiración. Ronquera; en cantantes y predicadores. Asma con enrojecimiento de la cara, < ascendiendo. Las costillas parecen dislocadas. Gangrena del pulmón.

ESPALDA:

Dolor lumbar después de evacuaciones. Dolor en el sacro con hemorroides y disentería. Dolor en la espalda mientras bebe agua. Sensación como de agua fría que gotea en la espalda.

EXTREMIDADES:

Crujido de coyunturas; rigidez; dolor al empezar a moverse; dolor como si estuviese paralizado. Dolor de las caderas a los pies < tosiendo. Ciática < doblándose hacia atrás y tosiendo. Pierna (izquierda) atrofiada, con dolor violento. Tambaleos al caminar.

SUEÑO:

Insomnio; por emociones; por nostalgia; por tos. Somnolencia después de las comidas. Como si cayera de gran altura durante el sueño. Bostezos durante el día.

PIEL:

Ardor. Abotagada, floja.

FIEBRE:

Escalofríos, con los dolores. El escalofrío se inicia en la espalda, con sed violenta, pero se estremece con cada bebida; con dolor de espalda estrujante. Escalofrío que alterna con calor; se va hacia la cabeza; luego suda. Frialidad de la parte afectada. Suda fácilmente. Sudor frío en los muslos. Fiebres; después de emociones; con nostalgia.

COMPLEMENTARIO:

Nat-m.

RELACIONES:

Canth.

CARBO ANIMALIS

GENERALIDADES:

Carb-an. o carbón animal, está hecho por óxido carbonizado, contiene Calc-p. en pequeña cantidad. Es adecuado para personas ancianas de constitución débil o para aquellas personas cuya vitalidad viene a menos debido a condiciones serias de enfermedades profundamente asentadas, o por pérdida de fluidos. Los pacientes son susceptibles a los catarrros y se tuercen fácilmente. Se afectan demasiado por pequeñas pérdidas vitales. Debido a estasis venosos, la piel se pone azul. Glándulas que crecen lentamente, dolorosas y que se vuelven induradas. Ardor como de fuego. Tendencia a la malignidad. Ulceraciones, descomposiciones. Las descargas son acres y fétidas. Sensación; de laxitud; hormigueo como de insectos. Bubones descuidados. Debilidad de las mujeres lactantes, sollozan mientras comen, incapaces de caminar ni siquiera a través de la habitación. Punzadas que permanecen después de la pleuresía. Hemorragias. Erupciones color cobre. Procesos lentos, duros, dolorosos. Actúa más profundamente que Carb-veg. Malos efectos de comer pescado podrido o vegetales pasados.

AGRAVACION:

Causas leves; pequeñas pérdidas de fluidos vitales, torceduras, levantamientos. Cogiendo frío. Aire frío y seco. Después de las reglas. Razurándose. COMIENDO; mientras.

MEJORIA:

Por poner la mano sobre la parte afectada.

MENTE:

Quejumbroso. Deseo de estar solo. Triste y abstraído. Evita la conversación. Lloro durante las comidas. Fácilmente asustado. Nostálgico. Miedo de la obscuridad, < cerrando los ojos.

CABEZA:

El cerebro se siente flojo < movimiento y por toser. Como si el cráneo hubiera estallado en pedazos; debe presionarlo con las dos manos, > comiendo. Cefalea pulsátil después de las reglas. Vértigo seguido de sangramiento nasal. Vértigo; después de rasurarse, > tambaleándose.

OJOS:

Dolores que bajan a través del globo (d). Sensación como si algo estuviera sobre los ojos, de manera que no puede ver hacia arriba. Como si los globos oculares estuvieran flojos en las órbitas. Los objetos parecen distantes. Disminución de la visión al leer, > frotando los ojos. Catarata senil.

OIDOS:

No sabe de qué dirección proviene el sonido. Repiqueteo en los oídos, al sonarse la nariz. Glándulas parótidas hinchadas. Dolores lancinantes. Otorrea, con inflamación de mastoides.

NARIZ:

Dura, roja, hinchada, caliente con espinillas pruriginosas y descamación. Línea café a través de la nariz. Tumores en la punta de la nariz duros y azulosos. Coriza fluída; con pérdida del olfato; con bostezos y estornudos.

CARA:

Mejillas y labios azulosos. Erupciones color cobrizo. Acné. Gran número de espinillas.

BOCA:

Induraciones nudosas en la lengua. Se muerde las mejillas al comer. Dientes flojos < masticando y al mínimo frío. Dolor de muelas < comiendo cosas saladas.

GARGANTA:

Sensación de desolladura como agruras, > comiendo.

ESTOMAGO:

Comer causa fatiga. Agua salobre que corre de la boca. Eructos; vómito; hipo; cáncer. Sensación de vacío en el estómago no > por comer; en madres que amamantan. Todo alimento descompone el estómago. Náusea por fumar, que causa aversión al tabaco. Digestión débil. Náusea < por la noche; en embarazo. Sensación de frialdad alrededor del estómago > frotando y presionando.

ABDOMEN:

Gran distensión; después de una operación. Como de un cuerpo duro en la ingle (izquierda) < sentándose > presión y pasando flatos. Bubones descuidados. Ano desollado. Humedad; rezumando del ano; y en perineo. Sensación de frialdad que se eleva hacia la garganta. Induración del páncreas.

HOMBRES:

Sífilis. Bubones.

MUJERES:

Reglas; oscuras, con coágulos, pútridas, fluyen solamente por la mañana; seguidas de gran fatiga; tan débil que apenas puede hablar. Ovario derecho que parece una pelota pesada. Leucorrea; acuosa, ardiente, mordiente, < caminando o estando de pié; mancha de amarillo la ropa. Cáncer del útero; dolor ardiente en los muslos; dolor en los huesos pélvicos al sentarse. Ovarios indurados con ardor. Dolores punzantes en las mamas, al amamantar, impidiendo la respiración. Induración dolorosa en el seno (derecho). Nódulos duros y dolorosos en el pecho. Hemorragia uterina, con afección de glándulas. Loquios; que duran mucho, delgados, ofensivos, con miembros entumecidos.

RESPIRATORIO:

Sofocación al cerrar los ojos. Disnea nerviosa. Ulceración de pulmones con sensación de frialdad en los pulmones. Tos con descarga de pus verdosa. Punzadas que permanecen después de pleuresía. Esputos; oscuros, café, tenaces, como sirope.

CORAZON:

Palpitación al oír cantos en el templo, o en lugares públicos. Frialdad en la región precordial, con horripilación.

ESPALDA:

El cóccix se siente magullado, arde al tocarlo < por sentarse o acostándose. Frialdad y adolorimiento en la región lumbar con tos.

EXTREMIDADES:

Glándulas axilares hinchadas; induradas. Tobillos que se doblan fácilmente. Manos dormidas, con afecciones de pecho. Coyunturas débiles, dislocaciones fáciles.

PIEL:

Azulosa; de la parte afectada. Ulceras esponjosas. Erupciones de color cobrizo. Cicatrices repugnantes por erupciones.

SUEÑO:

Lleno de fantasías vívidas; habla, gime, derrama lágrimas, en sueños.

FIEBRE:

Oleadas o bochornos calientes. Sudor; fétido, exhaustivo, por la noche, mancha de amarillo.

COMPLEMENTARIO:

Calc-p.

RELACIONES:

Calc-fl; Grap.

CARBO VEGETABILIS

GENERALIDADES:

Carb-veg. o carbón, es un producto de una oxidación imperfecta, de allí que la oxidación imperfecta y la desintegración son la nota guía de este remedio. Contiene pequeñas cantidades de Kali-carb. Sus propiedades desodorantes, desinfectantes y antisépticas están más resaltadas al potentizarse. Actúa sobre la CIRCULACION VENOSA especialmente los capilares, donde la sangre parece estancarse, causando una azulosidad, frialdad y equimosis. La fuerza vital se vuelve baja, por pérdida de flúidos vitales; por enfermedades graves o serias; por efecto de drogas y enfermedad o por complicaciones obstinadas. Es adecuado para condiciones atónicas donde hay una falta de reacción. El típico paciente Carb-veg. es gordo, indolente, flojo y tiene tendencia a la cronicidad de enfermedades. Enfermedades de los ancianos. Personas que nunca se han recuperado totalmente por los efectos de enfermedades previas. Estado de colapso; en cólera, tifoidea y otra enfermedad grave, cuando el paciente está casi sin vida, cuerpo frío, respiración fría, pulso imperceptible, respiración rápida, debe ser abanicado muy fuerte, pero la cabeza permanece caliente. HEMORRAGIAS: de sangre oscura, rezumante, por shock, después de operaciones quirúrgicas, persistiendo por horas o días. Entumecimiento de las partes donde se acuesta. Ardor; sensación de peso o dolor pesado en los huesos, úlceras, etc. DEBILIDAD, FLATULENCIA, PESTILENCIA, O NECESIDAD DE AIRE, están presentes en la mayoría de las enfermedades. Tembloroso. Siempre DEBIL, ENFERMO Y EXHAUSTO; pero esos estados aparecen súbitamente. Accesos de desmayos. Descargas espesas y acres. Frío; pero quiere aire, y ser abanicado, o sed por agua fría. AZULOSIDAD y descomposición. Condiciones sépticas. Sensación de plenitud. Estasis venosos. Ulceraciones, aftosas. Magulladura general y adolorida, catarros viejos. Niños y niñas escolares que son indolentes, lentos para aprender, sufren de terrores nocturnos, no duermen solos o no van a la cama en la obscuridad. Falta de reacción; después de un ataque violento, shock violento, sufrimiento profundo. Nunca bien desde. Glándulas linfáticas; inflamadas; induradas o supurantes. Gangrena, húmeda, senil.

AGRAVACION:

CALOR.

AGOTAMIENTO. Refrescándose. ENFERMEDADES AGOTANTES. ALTO ESTANDAR DE VIDA. COMIDA RICA; alimentos en mal estado; aves. DISIPACION. Levantando cargas pesadas. Caminando al aire libre. Presión de la ropa. Tiempo; temperaturas extremas, aire frío en la noche,

heladas, humedad, viento en la cabeza. Supresiones. Ancianos. Leyendo en voz alta. Cantando. Bebidas heladas.

MEJORIA:

ERUCTOS.

Aire fresco. Por ser abanicado. Elevando los pies.

MENTE:

Pensamiento lento. Indolente. Ansioso. Irritable. Afligido. Infeliz. Indiferencia, escucha todo sin placer o dolor. Aversión a la obscuridad. Miedo a los fantasmas. Pérdida súbita de la memoria. Indolente, estúpido, flojo. Fácilmente asustado o sobresaltado.

CABEZA:

Cefalea sorda, presiva, pesada; < occipucio; < por sobrecalentarse, yaciendo, o por presión del sombrero, por sobre-pasarse. Vértigo; con náusea y tinitus. Punzadas en el cuero cabelludo al calor de la cama. Cabello; dolorido, se cae fácilmente, en puños, después de una enfermedad severa, después del parto. Sudores fríos en la frente. Cabeza caliente; con extremidades frías. Coge frío en la cabeza con facilidad.

OJOS:

Como con un peso grande en los ojos. Hemorragias en los ojos con congestión en la cabeza. Visión de manchas negras flotantes. Ardor en los ojos. Dolor en los músculos oculares al ver hacia arriba. Pupilas que no reaccionan a la luz.

OIDOS:

Algo pesado parece estar en los oídos. Sordera y otorrea, que sigue a un exantema. Cera deficiente o de mal olor y amarilla. Paperas con metástasis.

NARIZ:

Estornudos por irritación de la laringe; < sonándose la nariz. Deseo ineficaz de estornudar. Espistaxis en ataques diarios, con cara pálida. Catarros descendentes. Roja. Rosa y fría; asma de heno. Estornudos frecuentes, con coriza. Estornudos < estornudando.

CARA:

AFILADA, HIPOCRATICA o obscura. Cara fría, con sudor frío. Torciendo el labio superior. Aspecto café o negruzco, labios agrietados. Gran palidez de la cara.

BOCA:

Aliento frío. Lengua; fría, negra; hinchada, cubierta con moco blanco-amarillo, café. Aftas; azulosas, úlceras negruzcas, con ardor. Dientes flojos. Encías escorbúticas. Sangre que rezuma de las encías al lavarse los dientes. Piorrea. Gusto amargo, agrio. Mal olor. Saliva aumentada. Encías dolorosas al masticar. Encías negras. Dolor en los dientes al comer cosas calientes o frías.

GARGANTA:

Sensación como si estuviese cerrada. Aftosa, desollada. Expectoración de moco sanguíneo y negro. Dolorosa al tragar comida.

ESTOMAGO:

Digestión lenta, la comida se convierte en gas. Aversión a la carne cosas grasosas, leche, que causa flatulencia. Abomina aún de pensar en comida. Desea cosas saladas, acidas o dulces, café. Náusea por las mañanas. ERUCTOS; RANCIOS; fuertes; sin >; con tos. Pesadez, plenitud y somnolencia después de los alimentos. Dolor constrictivo que se extiende al pecho. Ardor en el estómago que se extiende a la espalda a lo largo de la espina, con frialdad. Gastralgia de madres que amamantan. Dispepsia. Aversión a los alimentos más digeribles y de la mejor clase. Vómito de sangre; úlceras, cáncer.

ABDOMEN:

FLATULENCIA EXCESIVA;

grandemente distendido el abdomen especialmente la parte superior < yaciendo. Flatulencia obstruída, con malestares que surgen de esto. La parte más simple o pequeña de comida < los sufrimientos del estómago. Cólico que fuerza al paciente a doblarse en dos. Región epigástrica muy sensible. Dolor en el hígado. No soporta la ropa ajustada alderredor de la cintura. El abdomen se siente como si colgara; camina doblado. Ardor en el recto. Comezón en el ano. Flatos; calientes, húmedos, ofensivos. Humedad acre del recto. Humedad del perineo. Hemorroides azulosas, blancas, ardientes, con dolor después de evacuar. Cólico que aparece por pasear en carros, > pasando flatos. Diarrea dolorosa en los ancianos. Evacuaciones; pútridas, inefectivas, urgentes; aún las suaves pasan con dificultad. Heces que escapan con los flatos. Ictericia; por comer en exceso o por comer alimentos demasiado ricos.

URINARIO:

Albúmina en la orina. Nefritis; séptica o por alcohol. Orina; copiosa, de color amarillo claro o espesa y blancuzca - diabetes. Moja la cama por la noche. Micción: suprimida en cólera; y retenida por permanecer en pavimentos fríos.

HOMBRES:

Descargas seminales demasiado adelantadas, durante el coito, seguidas de rugidos en la cabeza. Descarga de fluido prostático, al hacer esfuerzos para evacuar. Comezón y humedad en los muslos cerca del escroto. Inflamación de los testículos por metástasis de paperas.

MUJERES:

Menorragia, ardor a través del sacro, fluido pasivo. Vulva irritada, caliente, con comezón, hinchada. Leucorrea; espesa, verdosa, lechosa, causando comezón y ardor, < antes de las reglas. Bultos en mamas, con induración de glándulas axilares. Mamas; duras, hinchadas, con absceso inminente. Siente en el pecho cuando tiene una descarga de leucorrea. Reglas demasiado adelantadas. Varices en partes pudendas y vulva, con ardor, úlceras azulosas. Postración después de amamantar. Fístula vaginal, dolores ardientes.

RESPIRATORIO:

Voz ronca por la noche. Tos con comezón en la laringe. Ataques de tos atormentante, hueca o sofocante con cefalea y vómito, ardor en el pecho < bebidas frías y en la cama. Aspereza en la laringe, con voz profunda y áspera. Expectorcación con arqueos. Tosferina; con cara azul y sus complicaciones. Pecho pesado, irritado o débil; al despertar. Respiración; laboriosa, rápida y corta, < por caminar. Asma; en ancianos con piel azul; > verano. Respiración de Cheyne-Stokes en enfermedad cardíaca orgánica. Quiere hacer inspiraciones profundas. Ardor en el pecho; con hemoptisis. Manchas café y amarillas en el pecho. Enfermedades destructivas de los pulmones. Costillas doloridas. Expectorcación; espesa, tenaz, amarillenta y profusa.

CORAZON:

Palpitación continua y ansiosa; < comiendo, estando sentado. Pulso; como hilo, débil y pequeño, intermitente. Ardor alrededor del corazón. Pulsación a través del cuerpo.

ESPALDA:

Severo dolor en la espalda baja, con sensación de un tapón; incapaz de sentarse; tiene que poner un cojín abajo cuando se sienta. Ardor detrás del hombro.

EXTREMIDADES:

Pesadas, rígidas, se sienten paralizadas. Adormecidas cuando se está sobre ellas. Debilidad parálitica de la muñeca y de los dedos, al agarrar cualquier cosa. Brazos cansados al escribir. Calambres en las plantas. Pies entumidos y sudorosos. Frío desde las rodillas hacia abajo. Gangrena senil de los dedos y dedos de los pies, con vesículas fieramente ardorosas, rezumando agua sanguinolenta. Sudor de pies fétido, < caminando.

PIEL:

Desollada, moteada, azul, fría, con equimosis. Ulceras; fétidas, ardientes y sangrantes. Ulceras varicosas. Carbúnculos. Gangrena senil que se inicia en los dedos de los pies. Ulceras por decúbito que sangran fácilmente. Venas varicosas durante el embarazo. Heridas que cicatrizan y se vuelven a abrir. Ardor en varias partes. Color azul. Erupción fina y húmeda con ardor. Ulceras; varicosas, que sangran fácilmente, pus que huele a asafétida; cicatrizan y se revientan otra vez.

SUEÑO:

Horror durante el sueño. Despierta con frecuencia, con miembros fríos, especialmente las rodillas. No reparador. Sueño comatoso, con estertor en la garganta. Bostezos frecuentes, y estiramientos que parecen >.

FIEBRE:

Alternan escalofrío y calor. FRIALDAD DE HIELO: unilateral; de la lengua; rodillas; piernas, pie, por la noche. Cabeza caliente y miembros fríos. Calor interno y ardiente; en el corazón, pecho; con piel helada y sudor frío. Suda fácilmente. Sudor agrio, frío, < por toser; en la cara. Fiebre amarilla.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Chin; Kali-c; Lach; Pho.

RELACIONES:

Am-c; Ars; Colch; Grap; Lyc.

CARBOLICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

Carbolic Acid, es un poderoso antiséptico, irritante y anestésico. Afecta las membranas mucosas; corazón, sangre y respiración. Es un remedio lánguido, indoloro, fétido y destructivo. La POSTRACION está muy marcada; aún paralítica, con pérdida de sensibilidad y movimiento. Las descargas son fétidas y ardientes. Dolores terribles que vienen y se van súbitamente. Agudeza de olfato es una síntoma guía muy fuerte. Sensación de hormigueo y ardor. Condiciones sépticas y malignas. Fatiga física que trae abscesos en algún lado. En el cólera cuando Verat-alb está indicado, pero falla. Colapso. Exudaciones sanguíneas. Incapacitado para el estudio, ya que leer < todos los síntomas. Temblor; camina tambaleándose, inseguro.

AGRAVACION:

Sacudidas. Lectura. Embarazo. Peinando el cabello.

MENTE:

Languidez mental y corporal, desinclinado a estudiar o hacer cualquier trabajo físico.

CABEZA:

Sensación de algo apretado, como comprimido por una banda de hule > por tomar té verde o fumar. Como con una bola caliente en la frente. Cuero cabelludo sensible. Cefaleas que aparecen en el momento de las reglas.

OJOS:

Neuralgia orbital severa sobre el ojo derecho.

NARIZ:

Olfato muy agudo. Ocena con gran fetidez y ulceración.

CARA:

PALIDA ALDERREDOR DE LA NARIZ Y LA BOCA.

Cara oscura.

BOCA:

Aliento intensamente fétido, con constipación. Ardor desde la boca hasta el estómago.

GARGANTA:

Barnizada. Uvula blanqueada y marchita. Difteria - aliento fétido, regurgitación al deglutir líquidos, pero con poco dolor.

ESTOMAGO:

Nausea con vómito; de embarazo, mareo, cáncer, obscuro, verde olivo. Agruras. Estómago dolorido. Dispepsia fermentativa con mal aliento y gusto. Deseo de estimulantes o de fumar.

ABDOMEN:

Flatulencia. Constipación con retracción de abdomen. Evacuaciones fragmentadas. Pasa moco del ano al orinar. Diarrea; agua como de arroz, fétida.

URINARIO:

Orina, escasa, verde u oscura, casi negra. Micción frecuente por la noche en ancianos. Diabetes. Albuminuria.

MUJERES:

Leucorrea; espesa, causando comezón. Severo dolor de espalda a través de los lomos, que se prolonga hacia los muslos; desplazamiento uterino. Descargas fétidas y acres; erosión del cérvix.

CORAZON:

Pulso de cordel.

ESPALDA:

Adolorimiento entre las escápulas.

PIEL:

Vesículas y pústulas, ardientes con comezón. Las quemaduras tienden a ulcerarse. Erisipelas. Vesículas sanguinolentas o pústulas.

SUEÑO:

Muy somnoliento.

FIEBRE:

Sudor frío profuso.

RELACIONES:

Kre.

CARBONEUM SULPHURATUM

GENERALIDADES:

Tiene una afinidad específica con los ojos. Es útil en la pérdida de visión; progresiva, con escotoma central. Ceguera a los colores- rojo y verde, no por el blanco. Malos efectos del gas de carbón.

CARCINOSIN

GENERALIDADES:

Un nosode preparado a partir del Carcinoma, se considera que actúa favorablemente, modificando los casos en los cuales hay una historia de carcinoma, o la enfermedad en sí, existe. Puede usarse como un remedio intercurrente junto con el indicado.

CARDUUS MARIANUS

GENERALIDADES:

Es primeramente un remedio de hígado y bazo y por hemorragias debidas a la afección de tales órganos, a los cuales proporciona alivio. Actúa en venas causando estasis sanguínea, venas varicosas y úlceras. Enfermedades de los mineros asociadas con dificultad para respirar. Condiciones hidrópicas que dependen de congestión portal y congestión de órganos pélvicos. Abuso de cerveza. Debilidad. Fatiga; < por comer y pasear a caballo, con bostezos frecuentes. Dolores punzantes, tirantes y ardientes. Afecciones del hígado, asociadas con afecciones de pulmón.

AGRAVACION:

Yaciendo sobre el lado izquierdo. Cerveza. Por comer. Contacto. Movimiento. Sótanos.

MEJORIA:

Por sangrados.

MENTE:

Olvida lo que acaba de tratar de hacer. Hipocondríaco. Desanimado. Falto de alegría.

CABEZA:

Cefalea frontal sorda. Vértigo con tendencia a caer hacia adelante > por sangramiento nasal.

OJOS:

Ardor y presión en los globos.

NARIZ:

Epistaxis, habitual en personas jóvenes psóricas.

CARA:

Terrosa, amarillo-grisácea o florida. Labio superior débil.

BOCA:

La lengua tiene el centro blanco, con orillas rojas con huella de los dientes. Lengua débil. Gusto amargo.

ESTOMAGO:

Poco apetito. Náusea, arcos y vómito de líquido verde y ácido, o sangre. Aversión a las carnes saladas.

ABDOMEN:

Hígado congestionado, hinchazón lateral dolorosa a la presión. Ictericia, Punzadas cerca de la región esplénica < al inspirar, al agacharse. Punzadas en el hígado < yaciendo sobre el lado izquierdo. Afecciones del hígado que causan enfermedades en el pulmón, provocando hemoptisis. Piedras en vesícula. Cirrosis, con hidropesía. Distensión del abdomen, con rugido. Diafragma alto. Evacuaciones duras, difíciles, nudosas, aldrilladas. Hemorroides hemorrágicas. Diarrea profusa debido a cancer rectal. Melena. Sensación de movimiento en los intestinos al expirar, alderredor del ombligo.

URINARIO:

Orina; turbia; amarillo dorada.

MUJERES:

Hemorragia uterina crónica, con desarreglo portal.

RESPIRACION:

Dolor en el pecho, que va a los hombros, espalda, lomos y abdomen, con urgencia de orinar. Respiración asmática. Tos; con punzadas en los lados del pecho, con esputo sanguíneo.

EXTREMIDADES:

Dolor en la coyuntura de la cadera que se extiende a las nalgas y hacia los muslos, < agachándose con dificultad para levantarse. Pies débiles; al sentarse. Dolor tirante en toda la espalda.

PIEL:

Venas rotas o trombos duros. Ulceras varicosas.

FIEBRE:

Frío y fiebre, con ictericia.

RELACIONES:

Calc; Sang.

CASTOR EQUI

GENERALIDADES:

Las trituraciones se hacen con escamas de la Pezuña Rudimentaria del caballo. Actúa sobre la piel - causando su engrosamiento, en uñas, que se vuelven quebradizas y se caen. Huesos, en especial tibias y cóccix - están adoloridos. Es un remedio altamente útil en pezones agrietados y ulcerados de las mujeres que amamantan, excesivamente sensibles, no soportan el roce de la ropa. Pechos hinchados, sensibles < descendiendo escaleras. Comezón en los senos, areola enrojecida. Pezones casi colgando. Verrugas en la frente y las mamas. Psoriasis de la lengua.

CASTOREUM

GENERALIDADES:

La tintura se prepara de la secreción encontrada en el saco prepucial del castor. Es adecuado para mujeres nerviosas, histéricas, con calambres, dolores, debilidad después de una enfermedad severa. Mujeres nerviosas que no se recuperan totalmente, pero están continuamente irritadas, y sufren de sudores debilitantes. Debilidad y falta de reacción. Efectos de reflejos uterinos; nerviosos y espasmódicos. Contracturas fibrilares. Pesadez del cuerpo entero. Bostezo continuo. Corea. Epilepsia. Palpitación nerviosa.

AGRAVACION:

Emociones. Frío. Durante las reglas. Enfermedades debilitantes.

MEJORIA:

Presión.

MENTE:

Irritabilidad. Vierte lágrimas con facilidad. Melancólico y lleno de anhelos ansiosos.

OJOS:

Ceguera diurna. No soporta la luz.

BOCA:

Lengua; hinchada; temblorosa. Elevación redonda, como chícharo en el centro de la lengua, con enrojecimiento alrededor. Lengua sensible al tacto o la comida, con dolor tirante hacia el hueso hioides.

ABDOMEN:

Cólico u otros malestares abdominales, que se acompañan de bostezos. Cólico con debilidad > presión. Diarrea de verano con evacuaciones mucosas verdes. Sed violenta; parece que no bebe suficiente.

MUJERES:

Cólico violento y cortante, dismenorréico, con pocas gotas de sangre, luego sudor frío. Amenorrea, con timpanismo doloroso.

SUEÑO:

Bostezos constantes como síntoma acompañante Sueño inquieto, con sueños atemorizantes y despertares. Bosteza en sueños.

FIEBRE:

Escalofrío con frialdad de hielo, en la espalda. Sudores exhaustivos, después de fiebres.

RELACIONES:

Mos. Val.

CAULOPHYLLUM

GENERALIDADES:

Es un remedio para la mujer, así como reumático, especialmente actuante en las pequeñas articulaciones. Causa DOLORES ERRATICOS que vuelan de un lugar a otro, tirantes, de acalambramiento, clavantes, de carácter reumático; que terminan en el cuello con rigidez. Muchos de estos malestares se deben a desórdenes uterinos. Temblores internos, con debilidad. Falta de tonicidad en el vientre. Espasmos histéricos o epileptiformes en la pubertad, durante la dismenorrea. Paraplejía, después del nacimiento. Fatiga. Debilidad general. Corea en la pubertad.

AGRAVACION:

Embarazo. Reglas suprimidas. Al aire libre. Café.

MENTE:

Irritable y miedoso. Nervioso. Excitable. Fácilmente disgustado.

CABEZA:

Dolores por problemas uterinos o espinales, con presión detrás de los ojos, < agachándose, por la luz, desde mediodía hasta la noche.

CARA:

Manchas moteadas; en la frente, con leucorrea. Labio superior pesado, tiene que levantarlo con sus dedos; leucorrea.

BOCA:

Aftas.

ESTOMAGO:

Frecuente engullimiento de fluido agrio, amargo, con vértigo. Vómito de origen uterino.

MUJERES:

Dolores violentos, intermitentes, acalambantes, con poco flujo; dismenorrea - útero retrovertido. DOLORES COMO DE PARTO, SE DESPLAZAN CERCA DEL SENO. En el parto, los dolores son DEBILES O IRREGULARES, cesan por fatiga, o son demasiado dolorosos; falsos dolores de parto. Facilita el parto; cuando la paciente está exhausta por un trabajo de parto muy prolongado. Abortos habituales; por falta de tonicidad del útero. Después de los dolores; después de dolores prolongados y parto extenuante. Ovarios rígidos, dolores como de agujas en cérvix. Leucorrea profusa y acre; con frecuencia en niñas pequeñas. Reglas tardías. Vagina irritable, con dolores espasmódicos intensos. Menorragia; después de un parto apresurado, flujo muy profuso. Loquios, profusos y prolongados.

CUELLO:

Rígido. Cabeza jalada hacia la izquierda.

EXTREMIDADES:

Nudos dolorosos en las coyunturas de los dedos. Reumatismo de las pequeñas articulaciones. Dolores cortantes en las articulaciones de los dedos, al cerrar las manos. Inflamación dolorosa de los miembros inferiores, antes de las reglas. Paraplejía después del nacimiento de un niño.

PIEL:

Cloasma; en el cuello.

FIEBRE:

Como sobre-congestionado de sangre. Fiebre alta.

RELACIONES:

Cimi; Puls; Sep.

CAUSTICUM

GENERALIDADES:

La composición química de Causticum es todavía incierta, aunque se considera que es hidrato de potasio o potasa cáustica. Es un gran policresto, que actúa sobre los NERVIOS, motores y sensoriales y sobre los MUSCULOS voluntarios e involuntarios; de la VEJIGA, laringe y extremidades. Debilidad progresiva; pérdida de la fuerza muscular, causando un incremento de inseguridad de control sobre los músculos, finalmente terminando en PARALISIS; de órganos o partes aisladas. Parálisis; por exposición al frío; post-diftérica; por plomo. Afecciones por reumatismo crónico causando contracción de tendones y deformidades alderredor de las articulaciones. Los dolores son desgarrantes, clavantes,

ardientes, de la parte que abarca la mano. Adolorimiento, ulceración. Temblor, convulsiones, corea, en jóvenes nerviosas < durante las reglas. Contracturas simpáticas, torciones, sobresaltos e inquietud, son otros síntomas característicos. Calambres aquí y allá. Emaciación; debida a enfermedad, susto, preocupación, pena, y de enfermedades prolongadas. Los niños son lentos para aprender a hablar y caminar. Anestesia. Epilepsia, corre en círculos, luego se cae; en la pubertad. El paciente es susceptible tanto al frío como al calor. Coyunturas rígidas. Está adaptado a personas acabadas, gastadas, seniles, o a personas de complexión oscura y fibra rígida. Inquietud por la noche, especialmente de las piernas que constantemente se mueven. Malos efectos de quemaduras y escaldaduras, susto, sufrimiento, preocupación, pena, guardias nocturnas. Ulceras mal tratadas con plomo. Verrugas. El agua fría tonifica la parálisis. Fisuras; a la menor provocación, cerca de las alas de la nariz, labios, ano. etc. Movimiento como de coito; corea. Torpe al hablar, masticar, caminar. Efectos mentales; convulsiones, por supresión de erupciones. Como si agua fría corriera de la clavícula hacia los dedos de los pies.

AGRAVACION:

FRIO SECO o aire crudo. Vientos. Corrientes. Extremos de temperaturas. Agacharse. Erupciones suprimidas. Café. Grasas. 3-4-a.m. o NOCHE. Ejercicio. Cambio de tiempo. Después de evacuar. Movimiento de un carruaje. Penumbra. Oscuridad. Agarrándose de cualquier cosa. Cosas ácidas. Por bañarse en un río durante el verano.

MEJORIA:

BEBIDAS FRIAS (aún heladas). Tiempo húmedo. Lavándo. Calor: de la cama. Movimiento suave.

MENTE:

Desesperanzado, abatido, quiere morir. Sin ambición. Fatiga mental. Presentimientos ansiosos < crepúsculo. Reticente. Demasiado compasivo. El niño no quiere ir a la cama solo; la menor cosa lo hace llorar. Piensa en malestares < especialmente hemorroides. Llorar, ríe; corea. Ríe antes, con o después de espasmos. Conciencia conmocionada, como si hubiera cometido un crimen. Tristeza. Modo quejumbroso. Suspica, desconfiado; distraído. Ve el lado oscuro de las cosas. Falta de control, balance. Confunde letras y sílabas. Molesto por preocupaciones de negocios.

CABEZA:

Conmoción indolora en la cabeza entera. Sensación como de un espacio vacío entre la frente y el cerebro, > por aplicaciones calientes. Movimientos hacia adelante y hacia atrás, o voltea hacia la derecha. Cuero cabelludo apretado. Punzadas en las sienes, en ejercicio mental. Náusea y vómito o ceguera durante la cefalea; luego parálisis. Vértigo; durante el sueño; por la noche; en la mañana, mientras está acostado, al agacharse; en la menstruación; viendo hacia arriba. Nódulos suaves, redondos, pequeños en el cuero cabelludo.

OJOS:

Destellos y manchas oscuras delante de los ojos. Parálisis de un párpado (d). Pesadez de los párpados. Ptosis. Debilidad de los músculos rectos - diplopía > viendo hacia arriba. Dolor continuo del ojo con inclinación a tocarlo y frotarlo, lo que parece mejorar la presión en él. Visión oscurecida como por una gasa; al sonarse la nariz. Los objetos se ven grandes. Lágrimas profusas y acres. Catarata. Rotación de ojos; epilepsia. Temblor de los párpados. Verrugas en las cejas. Fisuras en las orillas. Ojos que permanecen abiertos; sin parpadear; parálisis.

OIDOS:

Repiqueteos, rugidos, latidos; con sordera. Las palabras y las pisadas hacen eco en los oídos. Ardor en oídos, se vuelven rojos. Mucha cera fétida; café. Enfermedad de Menier. Descarga espesa, pegajosa, purulenta.

NARIZ:

Coriza con ronquera. Espinillas en la punta de la nariz. Verrugas viejas. Estornudos en las mañanas. Descarga espesa, amarilla o verde-amarillenta. Sangramiento nasal, durante espasmos.

CARA:

Prosopalgia > agua fría. Parálisis facial (d) < abriendo la boca. Dolor en la quijada, no puede abrir la boca. Cara amarilla, con apariencia de enferma. Calambre en los labios. Se siente peluda. Erupción.

BOCA:

Muerde el interior de las mejillas, al masticar. Parálisis de la lengua, con habla ininteligible, las palabras parecen salir a tirones. Inflamación en la raíz de la lengua. Encías que sangran con facilidad. Abscesos recurrentes en las encías - fistula dental. Gusto grasoso. Encías esponjosas, recesivas. Dientes; se sienten flojos, alargados; adoloridos; < por calor o frío. Hinchazón de la parte interna de la mejilla; o induración. Lengua; roja en la mitad, cubierta a los lados. Vesículas dolorosas en la punta.

GARGANTA:

Necesidad de tragar continuamente como si la garganta estuviera muy estrecha. Deglute por el lado equivocado, o se viene por la nariz. Síntomas de la garganta < agachándose. Dificultad para tragar por parálisis de la garganta; incapaz de expectorar moco, lo traga. Ardor como araño, ulceración en garganta.

ESTOMAGO:

Grasoso; gusto; eructos. Aflujo de agua; salada. Aversión a los dulces. Siente como si estuviera ardiendo cal en el estómago. Dolor en el estómago por agua helada. Sensación como de una bola que se eleva en la garganta. Vómito ácido seguido de eructos ácidos. La carne fresca causa náusea; le gustan las carnes ahumadas. Se siente hambriento pero el apetito se desvanece en cuanto ve la comida, con pensar u olerla, durante el embarazo. Vómito de sangre por la noche. Dispepsia ácida.

ABDOMEN:

Crecido en niños. Cólico, espasmódico. Dolor que irradia a la espalda y pecho, > doblándose en dos, < con el menor alimento. Evacuaciones; duras, tenaces, cubiertas de moco, brillan como grasa; suaves y pequeñas. La evacuación pasa fácilmente cuando está de pie. Calambres en el recto al agacharse, con deseo de orinar. El ano se prolapsa al toser. Comezón en el ano > agua fría. Pústulas pequeñas, duras, alrededor del ano. Hemorroides grandes con evacuaciones inminentes < al caminar, de pie y cuando se piensa en ellas. Fístula; con pulsación y dolor en el perineo. Recto insensible a las evacuaciones sólidas. Diarrea por frío. Hinchazón dolorosa del ombligo. Constipación con necesidad urgente e ineficaz.

URINARIO:

Parálisis de la vejiga, por retención de orina prolongada, e incontinencia subsecuente, (como en sueños, o en niñas estudiantes). PASAJE INVOLUNTARIO DE ORINA; AL TOSER, por caminar, sonarse la nariz, estornudando. Retención de orina; después del parto, después de operaciones quirúrgicas. Ardor en la uretra al orinar, < después del coito. Orina que gotea o pasa lentamente. Insensibilidad de la uretra, al pasar orina. Orina que pasa mejor por sentarse. Enuresis durante el primer sueño, por la noche. Orina; negra, turbia, blanca. Comezón en el meato.

HOMBRES:

Aumenta de esmegma alrededor del glande. Semen sanguinolento, durante el coito. Manchas rojas en el pene. Dolor magullante en testículos.

MUJERES:

Aversión al coito. Reglas; que fluyen solamente durante el día, con coágulos; escasa, con prosopalgia. Leucorrea; profusa, fluye durante la noche, con mucha debilidad. Inercia uterina durante el parto. Punzadas en partes pudendas después de la micción. Pezones; irritados, agrietados, circundados por herpes. Leucorrea que huele como las reglas. Desaparición de leche; por fatiga, vigiliadas nocturnas o ansiedad. Dismenorrea, con dolores desgarrantes en la espalda y muslos. Ansiedad, tristeza y debilidad, durante las reglas. Sueños durante las reglas. Reglas tardías y profusas. Dolores clavantes bajo la mama izquierda; dismenorrea. Comezón violenta cerca de las mamas en mujeres que amamantan.

RESPIRATORIO:

Afonía; o ronquera; con dolor en el pecho; < a.m. de los oradores, cantantes < agachándose, > por hablar. Tos; hueca, dura, seca, durante el embarazo, por cosquilleo en el hueco de la garganta o laringe; incesante; seca, noche y mañana; < agachándose, calor de la cama, aire frío, > por sorbos de agua fría. No puede toser con suficiente profundidad; expectoración; se regresa de nuevo; escasa, grasosa, hebrosa, como espuma de jabón, debe tragarse. Raya adolorida en la laringe. Pecho apretado y dolorido, los vestidos parecen apretados. Respiración corta, antes de toser. Ronroneo en el pecho. Dolores erráticos en el pecho > presión, < estornudando. Dolor en la laringe, < sonándose la nariz. Respiración opresiva mientras habla o camina. Estiramiento o raspadura en el pecho.

CORAZON.

Palpitación, con dolor en pecho, ardor y languidez.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez del cuello, o la espalda al levantarse de un asiento. Cuello rígido, puede escasamente mover la cabeza. Dolor de espalda que va hacia adelante o a los muslos. Dolor en la espina < por deglutir. Dolor en las caderas < tosiendo. Tortícolis. Dolores magullantes, punzantes cerca del cóccix. Calambres en la región lumbar y nalgas.

EXTREMIDADES:

Sensación paralítica en la mano derecha, con parálisis de la lengua. Parálisis del deltoidees, no puede levantar la mano a la cabeza. Temblor de manos. Calambre de los escritores. Adormecimiento de las manos. Plenitud de las manos al tratar de agarrar algo. Reventamientos en las puntas de los dedos, verrugas. Calambres en las pantorrillas, pies, dedos y tendón de aquiles. Pasos inciertos y caídas fáciles; en niños. Tobillos débiles. Dolor desgarrante, reumático en los miembros > calor; de cama. Crujido y

tensión en las rodillas. Propensión a estirarse, doblar o tronar las articulaciones. Rigidez en el hueco de las rodillas, < por sentarse > caminando continuamente. Ardor en coyunturas. Tendones contraídos. Torceduras y contracturas de los miembros; corea. Artritis deformante. Crujido de las rodillas < al caminar y descender. Piernas inquietas por la noche. Dolor como de choques eléctricos en las piernas. No puede sostenerse sobre sus talones. Uñero en los dedos gordos.

PIEL:

Grietas, úlceras. Ulceración en pliegues de la piel. Verrugas; llena de granos, grandes, dentadas, sangrando fácilmente, ulceradas; en la punta de los dedos, nariz, párpados, cejas. Comezón. Quemaduras profundas y sus efectos. Cicatrices re-abiertas. Piel propensa a intertrigo durante la dentición.

SUEÑO:

Movimientos frecuentes de brazos y piernas durante el sueño. Ríe y llora en sueños. Muy somnoliento, se mantiene despierto con dificultad. Bostezos y estiramientos. Insomnio nocturno con calor seco, inquietud. Despierta al menor ruido. Bostezos; al escuchar o poner atención a otros.

FIEBRE:

Frialdad no > por el calor. Sudor alderredor de las 4 a.m., profuso, al menor ejercicio, al aire libre. Calor de 6 a 8 p.m.. Frialdad; del lado izquierdo, de las partes enfermas, con dolor. Bochornos de calor que siguen al frío.

COMPLEMENTARIO:

Carb-v; Grap; Lach; Stan; Stap.

RELACIONES:

Gel; Kali-bi; Pho; Rhus-t; Sep.

CEANOTHUS

GENERALIDADES:

Este remedio tiene una afinidad especial con el bazo, que crece enormemente. Dolor en el hipocondrio izquierdo; con disnea, diarrea, reglas profusas o suprimidas, leucorrea. Reglas cada dos semanas. Pacientes anémicos, donde el hígado y el bazo fallan. Leucemia. Crecimiento del hígado. Orina verde, espumosa. Neuralgia periódica.

AGRAVACION:

Tiempo frío. Yaciendo sobre el lado izquierdo. Movimiento.

COMPLEMENTARIO:

Nat-m.

RELACIONES:

Chin.

CEDRON

GENERALIDADES:

Neuralgias que aparecen con una PERIODICIDAD EXACTA, es el signo más marcado de este remedio. Se adapta a personas de disposición voluptuosa, y de temperamento nervioso excitable. Antidota el efecto de mordida de víboras y ponzoña de insectos. Indisposiciones después del coito - corea en mujeres: neuralgia en hombres. Temblor. Adormecimiento de todo el cuerpo. Afecciones maláricas de lugares húmedos, tibios y marismas. Convulsiones durante las reglas. Lectofobia.

AGRAVACION:

Periódicamente; a la misma hora. Al aire libre. Por acostarse. Antes de una tormenta. Después de dormir.

MEJORIA:

Por mantenerse erecto.

CABEZA:

Neuralgia orbital. Sensación loca por dolor que atraviesa la frente. Todo el cuerpo se siente entumecido, durante la cefalea. Balbuceo después del coito. La cabeza se siente como inflamada.

OJOS:

Ardor como de fuego. Dolor severo en los globos, con dolores que irradian alderredor de los ojos; lagrimeo escaldante. Iritis. Coroiditis. Ojos rojos. Dolor sobre el ojo < coito. Los objetos parecen rojos por la noche y amarillos durante el día.

EXTREMIDADES:

Dolor súbito y agudo en la yema del pulgar derecho que sube por el brazo hasta el hombro, lo mismo pasa en el pié derecho hacia la rodilla, causando que se caiga hasta el suelo.

FIEBRE.

Excitación antes del frío. Malaria.

RELACIONES:

Aran.

CEPA (Ver Allium Cepa)

CHAMOMILLA

GENERALIDADES:

Es un remedio altamente EMOCIONAL; TEMPERAMENTAL Y DE HIPERSENSIBILIDAD, hipersensibilidad por abuso de café y narcóticos. Es particularmente adecuado en enfermedades de mujeres embarazadas, nodrizas y NIÑOS pequeños. Mal temperamento; irritabilidad frenética e instantaneidad. El dolor es intolerable; se pone loco con el dolor, o magnifica sus dolores y se postra, con dolor. Muy travieso, no puede ser apaciguado. Se revuelca. Grita o se arrastra por el suelo. Demanda un alivio inmediato de sus sufrimientos; preferiría morir que sufrir. Síntomas físicos y mentales que aparecen en paroxismos; irritabilidad, inquietud. COLICO; tos, etc. Entumecimiento; después del dolor; al despertar. Espasmos que se repiten; de cara, brazos, piernas, etc. Cólico, diarrea, ictericia, contracturas y convulsiones, después de corajes. Diátesis reumáticas o gotosas. Calambres; con vómitos biliosos; de músculos. Convulsiones durante la dentición. Caliente y sediento. Sudor caliente con dolores. El opio de la Homeopatía. Malos efectos de un mal temperamento. Durante la convulsión, el cuerpo se pone rígido, con opistótonos; ojos que giran, cara que se tuerce; pulgares volteados hacia dentro.

AGRAVACION:

IRA.

NOCHE. DENTICION. Aire frío, aire húmedo. Viento. Resfriándose. CAFE. Narcóticos. Alcohol. Acostándose en la cama. Música. Eructos. Calor. Comida caliente, cubriéndose. Contacto. Por mirarlo.

MEJORIA:

POR SER TRANSPORTADO EN BRAZOS.

Tiempo templado. Calor. Sudando. Aplicaciones frías.

MENTE:

HORRIBLE en su comportamiento; TRAVIESO E INCIVILIZADO. REGAÑON. Ofendido por nimiedades. Brusco. Aversión a que se le hable o se le toque; o aún a que lo miren. Los niños QUIEREN SER LLEVADOS EN BRAZOS, y acariciados. Quiere muchas cosas, pero las rechaza cuando se le dan. Gemido quejumbroso porque no puede tener lo que quiere. Aversión a hablar. Omite letras cuando escribe o habla. Las mujeres de pronto se vuelven caprichosas, regañones, obstinadas, antes de las reglas. Apresurado. No soporta a nadie cerca de él.

CABEZA:

Cefalea de latido en una mitad del cerebro; inclinación a echar la cabeza hacia atrás. Como si el cabello se espeluznara, con estremecimientos. Sudor caliente y pegajoso en la frente y el cuero cabelludo, durante el sueño, mojando el pelo. Cefalea de mujeres muy fatigadas. Cefalea > cuando la mente está embebida. Cefalea < por la mañana y las 9 p.m.

OJOS.

Conjuntiva amarilla. Cerramiento espasmódico de los párpados. Agua sanguinolenta que sale de los ojos en los bebés recién nacidos.

OIDOS:

Sensibles al viento frío, cerca de las orejas, o al ruido. Dolor de oído punzante > calor. Los oídos se sienten obstruidos. Escucha voces de personas ausentes, por la noche. Repiqueteo después de hemorragias. Rugido en los oídos como de agua que se precipita. La música es insoportable. Como agua caliente que saliera de ellos.

NARIZ:

Extremadamente sensible a los olores. Coriza caliente, con obstrucción de la nariz; inhabilidad para dormir. Piel arrugada. Hormigueos, hasta que los ojos se humedecen.

CARA:

Hinchazón o ENROJECIMIENTO DE LAS MEJILLAS. Una mejilla roja y caliente, la otra pálida y fría. Cara pálida, sumida, distorsionada por el dolor. Neuralgia de la cara, con sudor caliente cerca de la cabeza; dolor que se extiende dentro del oído. Torcimiento de músculos faciales. Mandíbulas que se sienten cansadas. Sudor después de comer o beber.

BOCA:

Dolor de diente < después de bebidas calientes; durante el embarazo, café. Torcimiento de la lengua. Cubierta gruesa blanca en la lengua. Salivación nocturna de sabor dulzón. Aliento malo y agrio. Gusto amargo. Los dientes se sienten alargados.

GARGANTA:

Incapacidad para deglutir alimento sólido cuando está acostado. Sensación de constricción, como por un tapón.

ESTOMAGO:

Eructos como huevos podridos. Vómito severo, amargo y bilioso con asimiento. Vómito después de morfina. Gastralgia como por una piedra en el estómago. Sudores después de comer y beber. Sed: por agua fría; bebidas ácidas. Aversión al café. Arcadas violentas antes del vómito.

ABDOMEN:

Distendido. CONATOS DE COLICO; de tiempo en tiempo. Dolor de un lado a otro; o yendo hacia arriba; después de coraje. Cólico de viento cortante < noche; < orinando, > aplicaciones calientes. EVACUACIONES; AGRIAS; VERDES COMO PASTO; DELGADAS; CORTADAS; LIENTERICAS; calientes, amarillas, con olor a huevos podridos, verdes. Hemorroides, con fisuras dolorosas. Diarrea; durante la dentición, por frío, por ira. Ictericia; después de ira. La mejilla se vuelve roja durante el cólico, con sudor caliente. Ano hinchado y excoriado. Como si los intestinos estuviesen anudados y el abdomen vacío.

URINARIO:

Orina caliente y amarillenta. Punzadas en la uretra.

MUJERES:

Dolores como de parto irregular; van hacia arriba; hacia abajo a la parte interna de los muslos; con descarga profusa de coágulos; sangre oscura. Convulsiones puerperales, después de ira. Incomodidad después de dolores. Senos hinchados, pezones inflamados y muy sensibles. Pechos de los niños muy sensibles. Calambres cuando el niño mama. Leucorrea amarilla, oscura, grumosa y acre. Dismenorrea membranosa, especialmente en la pubertad. La leche está estropeada y el niño no mama. Dismenorrea; por ira o emociones en aquellas mujeres que no la sufren, con deseo sexual. Rezumamiento de sangre fétida y oscura, con flujo ocasional de sangre roja y brillante. Menorragia, con coágulos negros, profusos, con frialdad de extremidades y mucha sed. Dolores de parto intolerables; envían al doctor y enfermera que se salgan y luego los vuelven a llamar. Loquios muy profusos y sangrantes o suprimidos.

RESPIRATORIO:

Tandas de tos cosquilleante y seca. Asma; por ira, < tiempo seco > doblando la cabeza hacia atrás. Estertor de moco en el pecho del niño. Coraje que provoca la tos; en niños. Tosferina, sofocante, luego vómito. Tos < 9 a 12 p.m.; durante el sueño; el niño no se despierta.

ESPALDA:

Dolores severos en los lomos y caderas, opuestos a aquel lado en el cual el paciente está acostado. Lumbago.

EXTREMIDADES:

Adormecimiento y rigidez de manos, cuando agarra objetos. Calambres en pantorrillas. Dolor reumático violento que lo sacan de la cama, por la noche; lo obligan a caminar alderredor. Ardor en las plantas, por la noche. Los talones se vencen por la tarde. Sensación como de que está caminando sobre los extremos de los huesos de sus piernas. Pies como paralizados, no puede mantenerse sobre ellos, por la noche. Palmas secas.

SUEÑO:

Somnolencia, con gemidos; llantos y lamentos en sueños. El dolor perturba el sueño. Insomnio por abuso de narcóticos. Duerme con los muslos separados. Somnoliento pero no puede dormir.

PIEL:

Erupción en infantes y de madres lactantes. Ictericia. Ardor, punzadas en úlceras, por la noche. Piel insana, toda herida supura.

FIEBRE:

Escalofriado, pero se acalora muy pronto; luego se resfría. Frialdad de una parte con calor en otra < descubriéndose. Se alterna escalofrío y calor. Afiebrado por descargas suprimidas. Sudor en la cabeza. Sed durante la fiebre.

COMPLEMENTARIO.

Bell; Mag-c; Sanic.

RELACIONES:

Nux-v; Stap.

CHELIDONIUM

GENERALIDADES:

Este es un remedio del lado derecho predominantemente. Actúa sobre el hígado; sistema portal; lado derecho del abdomen y parte inferior del pulmón derecho. Está relacionado muy de cerca con Lyc.; cuando Lyc. parece estar indicado, pero falla, Chel. debería prescribirse. AMARILLEZ y perturbaciones biliosas, son signos muy marcados. Dolor constante en el ángulo inferior de la escápula derecha es la indicación principal. Los dolores se disparan hacia atrás o en todas direcciones. Dolores punzantes debido a efusiones serosas. Sensación pesada, rígida, adolorida, paralizada, dislocativa o de algo roto. Adormecimiento. Hay un gran letargo general e indisposición para hacer algún esfuerzo. Horror al movimiento. Se siente cansado al menor ejercicio. Complicaciones biliosas; durante la gestación, afección de los pulmones. Ictericia.

AGRAVACION:

Movimiento. Tos. contacto. Cambio de temperatura. Viento del noreste. 4 a.m. y 4 p.m. Viendo hacia arriba.

MEJORIA:

Alimentos calientes. Por comer. Cena. Leche. Presión. Baño caliente. Doblándose hacia atrás. Yaciendo sobre el abdomen.

MENTE:

Aversión al ejercicio mental o conversación. Abatido. Ansiedad, como si hubiese cometido un crimen; temor de volverse loco. Tiene deseos de llorar con mal humor o sin alguna razón. Inquietud; agilidad.

CABEZA:

Vértigo; se siente en el vértice; < cerrando los ojos, con vómito bilioso y dolor en el hígado. Cefalea que se extiende hacia atrás. El occipucio se siente pesado como de plomo; frialdad de hielo del occipucio desde la nuca al cuello. Neuralgia sobre el ojo derecho, pómulo derecho, y oído derecho, con lagrimeo excesivo. El cráneo se siente muy pequeño.

OJOS:

Color amarillo sucio de conjuntivas. Irritación de los ojos < viendo hacia arriba. Mancha deslumbrante delante de los ojos. Lacrimación; mirando intensamente, con dolor en los ojos, o por cosquilleo en la laringe. Mucosidad en los ojos. No puede abrir los ojos, con prosopalgia.

OIDOS:

Sensación en los dos oídos, como de aire que saliera, o algo que reptaba dentro de ellos. Pérdida del oído durante la tos.

NARIZ:

Roja. Batimiento de las alas nasales. Obstrucción, con malestares del hígado. Punta de la nariz ulcerada y roja. Resequedad.

CARA:

Rojo oscuro o cetrina, sumida. Amarilla, especialmente la frente, nariz y mejillas. El pómulo derecho se siente como hinchado, con dolor desgarrante. Bochornos de calor. Erupción nodular.

BOCA:

Gusto amargo. Lengua; amarilla, con impresión de los dientes; grande, floja. Aliento ofensivo. Lengua con punta estrecha. Salivación con náusea, vértigo. Agua amarga que se junta en la boca.

GARGANTA:

Estrangulación; < respirando, como por una deglución apresurada, o como si se hubiese tragado un bocado muy grande. Bocio del lado izquierdo.

ESTOMAGO:

Desea leche, picantes o alimento y bebida caliente. Náusea > bebiendo leche. Vómito > agua muy caliente. Dolores gástricos, atenazantes, arañantes > COMIENDO. Como con un tapón en el estómago. Aversión a la carne, café, queso. Pérdida de apetito.

ABDOMEN:

Región epigástrica sensible. DOLORES DEL HIGADO QUE VAN HACIA ATRAS; o se fijan en el ángulo de la escápula derecha. Hígado crecido, dolorido. Cálculos biliares. Constricción a través del estómago, como por una cuerda. Evacuaciones; pastosas, pálidas, amarillo brillante, aladrilladas, o bolas duras. Alternancia de diarrea y constipación. Ascitis, con palmas amarillas. Hormigueo y comezón en el recto. Como un animal que se retorciera en el epigastrio. Ombligo sumido durante el cólico.

URINARIO:

Espuma profusa, orina amarilla como cerveza. Dolor espasmódico en el riñón derecho, y el hígado. La orina mancha el pañal de amarillo oscuro.

HOMBRES:

Erecciones frecuentes, aún durante el día. Dolor en el glande. Comezón hormigueante en el escroto y glande.

MUJERES:

Reglas muy tardías y muy profusas. Anhelos de elementos inusuales de alimento, durante el embarazo. Leucorrea; blanca, mancha la ropa de amarillo. Ardor en vagina, aparece a la misma hora durante el día.

RESPIRACION:

Respiración corta, y pecho apretado, la ropa parece demasiado estrecha; > respiración profunda. Disnea < orinando. Dolor presivo en el pecho al inspirar profundamente. Tos; como de polvo; con mucho estertor; pero poca expectoración o se escapa de la boca. Neumonía biliosa. Síntomas respiratorios, con síntomas de hígado. Presión en la laringe como si el aire no pudiese pasar. Punzadas en el pecho.

CORAZON:

Palpitación violenta, con presión en el pecho. Palpitación periódica.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor fijo bajo el ángulo interior e inferior de la escápula derecha; que puede extenderse al pecho y estómago, causando náusea o vómito. Dolor del cuello a la sien; (D) Dolor presivo en las vértebras < doblándose hacia atrás y hacia adelante. Occipucio pesado con dolor en el lado derecho de la espalda. Como por una cuerda, alderredor del cuello. Neuralgia cervico-braquial.

EXTREMIDADES:

Muy dolorosas al tacto. Puntas de los dedos frías. Dolor en los talones como si fueran apretadas por zapatos muy angostos. Ardor y rigidez de la rodilla derecha < moviéndose. Los miembros se sienten paralizados. Miembros inferiores pesados. Tobillos rígidos. Edema alderredor de los tobillos y pies. Paresis de las piernas, con rigidez de músculos. Un pié frío, el otro caliente.

PIEL:

Amarilla. Comezón > por comer. Espinillas y pústulas dolorosas. Piel arrugada.

SUEÑO:

Letárgico. AMODORRAMIENTO y frío. Sueño de muertos y funerales. Somnolencia, sin capacidad para dormir. Se duerme mientras habla.

FIEBRE:

Calor ardiente que se esparce desde las manos a todo el cuerpo. Sudoroso, con aversión a descubrirse y sin alivio. Sudor; durante el sueño, después de medianoche, por el mínimo ejercicio. Temperatura fluctuante. Fiebre alta.

COMPLEMENTARIO:

Lyc; Merc-d.

RELACIONES:

Bry; Kali-bi; Merc: Op.

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

GENERALIDADES:

Así como Chel. causa un dolor sordo bajo el ángulo derecho de la escápula derecha, pero más cerca de la espina. Causa apoplejía y por consecuencia hemiplejía derecha con afasia. Respiración estertorosa

con traqueteo como una bola suelta que rodara en la tráquea. Respiración pesada con batimiento de las mejillas. Repite la misma acción una y otra vez. Sordera progresiva para la voz humana o sonidos distantes. Parálisis; con espasmos de los antebrazos y manos en flexión; contracción de miembros. Ictericia. Vértigo aurial. Enfermedad de Menier. Orina; profusa, espumosa, amarilla, ardorosa.

CHIMAPHILLA UMBELATTA

GENERALIDADES:

Actúa principalmente en los riñones y la vejiga; produciendo piedras en los riñones y catarro agudo y crónico de la vejiga (cistitis). También actúa en las glándulas, mesentéricas, próstata, mamarias e hígado. Útil en hidropesías hepáticas y renales. Mujeres con pechos grandes; o mujeres pletóricas con disuria. Catarata incipiente y progresiva.

AGRAVACION:

Humedad fría. De pie. Sentándose: en piedras frías. Al empezar a orinar.

MEJORIA:

Caminando.

CABEZA:

Dolor en la eminencia frontal.

OJOS:

Halo alrededor de la luz. Dolor de puñalada en el ojo izquierdo, con lagrimeo.

BOCA:

Las mandíbulas se sienten rígidas, no puede cerrar la boca por la noche; duerme con la boca abierta. Dolor de muelas si son gentilmente movidas < después de comer y el ejercicio, > por agua fría.

URINARIO:

Orina; HEBROSA, o muco-purulenta; fétida, escasa, espesa, turbia. Debe hacer esfuerzo antes de que la orina fluya. Prostatitis aguda con retención y disuria, y sensación de una bola en el perineo; como si se sentara en una pelota. Prostatitis gonorréica. Aleteo en la región de los riñones. Tenesmo vesical < sentándose > por caminar. No puede pasar orina sin estar de pie con las piernas separadas y el cuerpo inclinado hacia adelante. Inflamación aguda del tracto urinario. Supresión de orina en infantes. Coágulos de sangre que pasan con la orina.

MUJERES:

Tumor doloroso en mamas; con secreción indebida de leche; en mujeres de senos grandes; dolor agudo a través de las mamas. Atrofia rápida de los pechos.

COMPLEMENTARIO:

Kali-m.

RELACIONES:

Berb; Coc-c; Sabal.

CHINA OFFICINALIS

GENERALIDADES:

Este fué el primer remedio probado por el Dr. Hahnemann. Afecta la sangre, volviéndola más delgada y empobrecida. Debilita el corazón y deteriora la CIRCULACION, produciendo congestión y HEMORRAGIAS; anemia, completa relajación y colapso. La debilidad en China, se debe a DESCARGAS PROFUSAS, EXHAUSTIVAS; pérdida de fluídos vitales, supuraciones excesivas, diarrea, hemorragias, etc. Periodicidad INTERMITENTE es un signo muy marcado en fiebre y neuralgia. El paciente se vuelve débil, hipersensible y nervioso; todo lo incomoda; la luz, ruido, olores, dolor, etc. Dolor de estallido. Neuralgia. Amodorrado, después de pérdida de fluídos, hemorragias. Emaciación especialmente en niños. Anemia. Hinchazón dura. Reumatismo. Sepsis. Inflamación de órganos sangrantes, después de hemorragias, y la parte se pone negra rápidamente. Convulsiones, durante las hemorragias. Hemorragias, profusas; con pérdida de la vista, desmayo, y repiqueteo en los oídos. Dolores post operativos por gas no > por expulsarlo. Malos efectos de; masturbación, vejación, frío, coriza suprimida, té, mercurio, alcohol. Absceso del Psoas. Es adecuado para personas de constitución delgada, seca y biliosa. Las heridas se vuelven negras y gangrenosas. Epilepsia; corea; parálisis; por pérdida de fluídos.

AGRAVACION:

PERDIDAS VITALES, CONTACTO. Sacudidas. ruido. PERIODICIDAD; Cada tercer día. Frío. Vientos, corrientes. Al aire libre. Por comer. Frutas. Leche. Agua impura. Pescado, carne, echados a perder. Té. Ejercicio mental. Durante y después de la evacuación. Por fumar. Otoño. Verano.

MEJORIA:

Presión dura. Ropas flojas. Por doblarse en dos. En una habitación; tibia.

MENTE:

Desobediente; terco; desprecio por todo. Ideas fijas, que es infeliz, perseguido por enemigos. Disposición a herir los sentimientos de otros. Miedo de los perros y otros animales; por la noche. Grito súbito y agitación, cuando está contento. Mal humor < acariciándolo y mimándolo. Disgusto por todo trabajo mental y físico. Castillos en el aire. Indiferencia, tristeza, no tiene deseo de vivir. Quiere cometer suicidio pero le falta valor. Renuente a hablar. Errores al hablar y escribir. Pérdida del control sobre la mente.

CABEZA:

Dolor de estallido, pulsante, con latido de carótidas. Sensación como si el cerebro se batiera hacia adelante o hacia atrás, causando dolor; dolor magullante en el cerebro, < sienes. Vértigo; cae hacia atrás; mientras camina. Punzadas de sien a sien. Cráneo dolorido y sensible <tacto o peinando el

cabello. Cefalea < en el sol > por mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, por la presión dura, masajeándola. Suda al caminar al aire libre. Cabeza pesada.

OJOS:

Color azul al derredor de los ojos. Ceguera nocturna debido a una retina anémica. Lagrimas irritantes. Presión en los ojos como por amodorramiento. Manchas negras delante de los ojos. Pupilas dilatadas. Neuralgia ciliar intermitente. Ardor como por sal. Punzadas como por arena. Ojos dolorosos al leer y escribir.

OIDOS.

Rojos, calientes. Repiqueteo en los oídos; con cefalea. Tinnitus; luego vértigo. Punzadas en los oídos. Dureza de oído. Descarga purulenta fétida y sanguinolenta.

NARIZ:

Malos efectos de una coriza suprimida; cefalea. Sangramiento habitual fácil por la nariz, especialmente en la mañana al levantarse. Olfato muy agudo. Sudor frío cerca de la nariz. Nariz; caliente, roja. Estornudos violentos y secos.

CARA:

Terrosa, enferma, pálida; hipocrática, azulosa al derredor de los ojos. Cara; abotagada, roja. Labios; secos, negruzcos y marchitos. Hinchazón de venas. Cara roja caliente, con manos frías. Abochornada después de una hemorragia; excesos sexuales o pérdida de fluidos vitales, en coma.

BOCA:

Dolor de dientes mientras el niño mama; > por presionar los dientes juntos firmemente, y por el calor. Color de muela con sudor. La comida sabe amarga, aún el agua, o muy salada. Lengua; gruesa, con cubierta sucia; la punta arde, seguida por salivación. Gusto amargo; salado o agudo. Encías hinchadas.

ESTOMAGO:

Eructos amargos o ácidos, después de la leche. Anhelos de; cosas sabrosas; ácidas o dulces, alimentos muy sazonados, desea varias cosas pero no sabe qué (niños). Rápida saciedad. Anorexia, se siente saciado todo el tiempo, aversión a toda la comida, al pan, mantequilla, café. Apetito voraz en niños emaciados. Eructos fuertes sin alivio. Digestión lenta. La leche disgusta. Pesadez después de comer pequeñas cantidades de alimento. Malos efectos del té. Sensación fría en el estómago. Sed por agua fría que < diarrea. Latidos y ruido en epigastrio. Vómitos frecuentes. Hipo. Hematemesis. Estómago dolorido. Fermentación después de comer frutas. Sed: durante la apirexia; antes del frío. Hambre y aún falta de apetito; solamente cuando come, algo de apetito y gusto natural por la comida aparece.

ABDOMEN:

Hígado y bazo crecidos. Hinchazón flatulenta; > movimiento. Cólico > doblándose en dos. Dolores por gasificación post-operativa, no mejorados por expulsarlos. Calor en abdomen como agua caliente que corriera hacia abajo. Síntomas hepáticos periódicos. Dolor del recto a los genitales. Cólico por cálculos biliares. Ictericia; después de leucorrea, masturbación, excesos sexuales, diarrea. EVACUACIONES;

LIENTERICAS; oscuras, fétidas; acuosas; SANGUINOLENTAS; indoloras; < por comer; por la noche; por comer frutas; leche, cerveza, durante el tiempo caliente. Diarrea; después del destete, en niños; crónica en niños; que se vuelven amodorrados, con pupilas dilatadas, el cuerpo se pone frío, especialmente la barbilla, nariz con respiración rápida. Evacuaciones involuntarias.

URINARIO:

Micción frecuente. Ardor en el meato < frotamiento de la ropa. Orina turbia, oscura, escasa. Sedimento rosáceo. Hematuria. Enuresis, de niños débiles.

HOMBRES:

Impotencia, o deseo sexual mórbido, con fantasías lascivas. Emisiones frecuentes seguidas por una gran debilidad. Inflamación de los testículos y cordón espermático - después de gonorrea. Orquitis. Deseo sexual, con necesidad de golosinas.

MUJERES:

Ovaritis por excesos sexuales. Deseo muy fuerte en mujeres que guardan cama. Reglas; muy adelantadas, oscuras, profusas, con coágulos, con distensión abdominal. Leucorrea sanguinolenta; parece que toma el lugar de la descarga menstrual normal. Metrorragia; sangre oscura, con desvanecimiento, convulsiones. Asfixia del recién nacido debido a una gran pérdida de sangre de la madre. Induración dolorosa en la vagina.

RESPIRATORIO:

Hemoptisis. Respiración jadeante, estertorosa, catarro sofocante; no puede respirar con la cabeza baja. Asma; < tiempo húmedo, otoño o después de agotamiento. Cada movimiento provoca palpitación y lo deja sin aliento. Pecho dolorosamente sensible; con adolorimiento entre las escápulas, no soporta la percusión o auscultación. Tisis supurativa. Paroxismos de tos después de comer o reír, < tarde, noche. Quiere ser abanicado pero no demasiado fuerte, porque ésto le impide respirar.

CORAZON:

Cada movimiento provoca palpitaciones.

CUELLO Y ESPALDA:

Presión como por una piedra entre las escápulas. Espina intra-escapular dolorosa. Dolores agudos a través de los riñones < movimiento, por la noche. Dolores como puñaladas alderredor de la espalda. Presión fuerte en el sacro. Dolor de espalda como si se hubiese sentado doblado por largo tiempo. Lumbago < por movimiento leve.

EXTREMIDADES:

Como con una peso fuerte en los hombros. Estiramientos espasmódicos de brazos, con dedos engarruñados. Manos que tiemblan, (al escribir). Rodillas que se tuercen. Como con una banda alderredor de las piernas o brazos. Una mano helada y la otra tibia. Hinchazón de venas de las manos. Uñas azules. Dolor en las piernas y coyunturas como si estuviesen torcidas < tocarlas ligeramente; > presión fuerte. Cansancio de las articulaciones < mañana, sentándose. Dolor en la médula. Caries de huesos con sudor profuso.

PIEL:

Sensibilidad extrema al contacto; la presión fuerte alivia. Dermatitis. Gangrena húmeda. Color amarillo.

SUEÑO:

Amodorramiento. Ronquidos fuertes en sueños; especialmente en niños. Sueños ansiosos y terroríficos; el miedo de los sueños permanece. Insomnio como un pródromo.

FIEBRE:

Pródromo marcado. Etapas de frío, calor y sudor muy marcadas. Frío, luego sed, luego calor, luego sed. El frío se inicia en el seno. Cara roja y caliente, con manos frías. Fiebre héctica. SUDORES QUE EMPAPAN; POR LA NOCHE; al menor movimiento; por debilidad. por agotamientos, etc. Fiebres tropicales. Sepsis.

COMPLEMENTARIOS:

Carb-v; Fer; Kali-c.

RELACIONES:

Carb-v.

CHININUM ARSENICOSUM

GENERALIDADES:

Debilidad, cansancio, postración y aversión al trabajo mental, son síntomas marcados de este remedio. La irritabilidad precede a la cefalea. Ataques súbitos de vértigo < mirando hacia arriba. Hemicránea (I) por susto. Anorexia. Los huevos y el pescado producen diarrea. Respiración corta por ascender. Disnea cardíaca; degeneración temprana del miocardio, después de infecciones agudas. Palpitación. Sensación como si el corazón se hubiese detenido. Ataques periódicos de asma, con gran postración. Insomnio, debido a causas nerviosas. Frialdad; de manos y pies; rodillas y piernas. Fiebres continuas; con temperaturas oscilantes. Sudor; profuso, exhaustivo; por la noche. Malos efectos del tabaco. Presión en el plexo solar con sensibilidad. Hiperacidez que alterna con decrecimiento de acidez.

AGRAVACION:

Descanso. En la a.m. Cuando el estómago está vacío.

MEJORIA:

Movimiento.

CHININUM SULPHURICUM

GENERALIDADES:

El sulfato de quinina actúa en los NERVIOS, causando gran sensibilidad a las influencias externas y neuralgia periódica. En la SANGRE, causa disminución rápida de glóbulos rojos y reducción de hemoglobina; con tendencia a la leucocitosis. Débil y nervioso, un pequeño ejercicio causa palpitación. Neuritis retro-bulbar, con pérdida súbita de la vista. Incapacidad para permanecer de pie. Se cae en las calles. Quiere permanecer acostado. Enfermo de muerte, y desvanecido; siente como si se sumiera en la cama.

AGRAVACION:

PERIODICIDAD EXACTA.

Frío, 10-11 a.m. Contacto.

MEJORIA:

Bostezando. Presión. Doblándose hacia adelante.

MENTE:

Nervioso. Pérdida de la facultad de nombrar los objetos.

CABEZA:

Dolor de origen malárico que crece gradualmente a mediodía, < en el lado izquierdo. vértigo con tinitus; con torcimiento de los párpados; con cefalea pulsátil. Neuralgia orbital.

OJOS:

Una malla, niebla o mancha delante de los ojos. Puede ver los objetos solamente si los vé de reojo. Estrabismo cada tercer día (en niños).

OIDOS:

Tinnitus. Sordera. Enfermedad de Menier.

CARA:

Dolores neurálgicos que regresan con mucha regularidad > por la presión. Frente afiebrada. Cara pálida y ansiosa.

URINARIO:

Depósito de sedimento amarillo paja, granular o rojo ladrillo. Orina sanguinolenta.

ESPALDA:

La espina cervico-dorsal duele, o está muy sensible; con respiración oprimida.

EXTREMIDADES:

Reumatismo articular agudo. Coyunturas muy sensibles.

PIEL:

Comezón. Petequia. Urticaria.

FIEBRE:

Fríos anticipantes. Sed en todas las etapas. Delirio durante el calor. Fiebres que aumentan, y postración, con profusos sudores nocturnos. Sudor profuso > pero extenua. Apirexia clara. Malaria típica. Temperaturas subnormales.

RELACIONES:

Chin.

CHIONANTHUS

GENERALIDADES:

Tiene una acción poderosa sobre el HIGADO y en la cabeza, donde es útil para la neurastenia; periódica; cefalea que enferma, menstrual o biliosa. Sensibilidad, magullante que se siente en varios órganos; hígado; globos oculares, etc. Los dolores se van hacia arriba, de la frente, estómago, etc. Ictericia que aparece cada verano.

AGRAVACION:

Sacudidas. Movimiento. Frío.

MEJORIA:

Por acostarse sobre el abdomen.

MENTE:

Se siente rendido. Ningún deseo de hacer nada; quiere estar solo.

CABEZA:

Severas cefaleas; biliosas-enfermantes > por agacharse, movimiento, sacudidas.

OJOS:

Los globos se sienten magullados. Conjuntiva amarilla.

NARIZ:

Presión en la raíz de la nariz, o como estrujada en el puente.

BOCA:

Seca, no > por agua. Lengua; ancha, con cubierta gruesa, amarillo-verdosa; se siente contraída. Salivación.

ESTOMAGO:

Gusto amargo, caliente; bilioso; vómito de chorro, filamentoso; dentera. Vómitos; con cólico y sudor frío en la frente y dorso de las manos.

ABDOMEN:

Hígado crecido enormemente; con dolor que incomoda e ictericia. Apretón en el ombligo. Como una cuerda que tuviera lazos los intestinos; como si fuera apretada de pronto y aflojada gradualmente. Colecistitis. Cólico biliar. Ictericia, con detención de las reglas. Debilidad en el hipogastrio. Evacuaciones; como brea; color arcilla o indigeridas. Sudor frío en la frente y dorso de las manos durante la evacuación. Afecciones del páncreas.

URINARIO:

Orina; color amarillo naranja; espesa, negra, como sirope. Bilis y azúcar en la orina. Diabetes Mellitus. Alta gravedad específica.

RESPIRATORIO:

Expectoración astringente.

PIEL:

Amarilla toda. Ictericia; crónica; aparece cada verano; causada por beber mucha sidra.

FIEBRE:

Calor con aversión a descubrirse. Sudor frío en el dorso de las manos.

RELACIONES:

Bry; Iris; Lept; Merc.

CHLORAL HYDRATE

GENERALIDADES:

Esta droga afecta el cerebro causando excitación cerebral con alucinaciones y terrores nocturnos en los niños. El corazón está dilatado o debilitado con una plenitud peculiar y ligereza en el pecho y sensación de vacío en el estómago. Postración muscular. Corea; de curso largo, obstinada; el paciente no puede acostarse ni estar de pie.

AGRAVACION:

Alcohol. Por la noche. Ejercicio. Acostándose. Por bebidas calientes. Estimulantes.

MEJORIA:

Al aire libre. Por ser abanicado.

MENTE:

Melancolía; idiocia e insanidad. Apresurado y excitado; camina arriba y abajo de la habitación, conversando con personajes imaginarios, o consigo mismo.

CABEZA:

Como con una banda caliente de una sien a otra.

OJOS:

Globos oculares; se sienten muy crecidos; golpe de sangre y acuosos. Los objetos se ven blancos; ceguera a los colores. Párpados pesados, escasamente puede abrirlos.

OIDO:

Escucha voces.

CARA:

Cara y párpados hinchados, a duras penas vé, urticaria.

EVACUACIONES:

Sin bilis.

URINARIO:

Enuresis; pasa agua en la cama copiosamente sin saberlo, durante la última parte de la noche.

RESPIRATORIO:

Disnea. Como con un peso sobre el pecho. Inspira a través de la nariz, expira por la boca estando acostado sobre la espalda.

CORAZON:

Débil y dilatado.

PIEL:

Urticaria; < por la noche, desaparece en el día; aparece súbitamente por frío, > por calor; < alcohol. Piel fría como piedra.

SUEÑO:

Insomnio por fatiga. Sueños horribles.

RELACIONES:

Ap; Canc-fl.

CHLORUM

GENERALIDADES:

Este gas se ha probado en la forma de agua clorinada. Tiene una acción marcada en los órganos respiratorios, produciendo espasmos de la glotis. Sensación de constricción, es otro signo marcado. Los pacientes se emacian rápidamente. Las membranas mucosas están inflamadas y ulceradas.

AGRAVACION:

Expiración. Después de media noche. Yaciendo.

MEJORIA:

Al aire libre. Movimiento.

MENTE:

Teme la locura o perder la razón. Olvida nombres y personas.

OJOS:

Protuberantes.

NARIZ:

Ahumada o como con ollín. Coriza; acre; con cefalea, de pronto corren gotas, con lagrimeo.

CARA:

Hinchada con ojos saltones.

BOCA:

Olor pútrido de la boca. Aftas pútridas. Lengua; seca, negra.

GARGANTA:

Sensación asfixiante, incapacidad para deglutir. Adolorimiento, cosquilleo o silbido en el hueco de la garganta.

RESPIRATORIO:

DISNEA súbita por espasmos de las cuerdas vocales, con ojos protuberantes, cara azul, sudor frío. Inspiración libre, pero NO PUEDE EXHALAR. Laringitis. Laringismo estriduloso. Asma de fiebre de heno. Como si se forzara la entrada de aire en la parte superior del pecho.

PIEL:

Sensible, seca, amarilla, marchita.

FIEBRE:

Sudor fácil.

RELACIONES:

Ars-io; Iod; Meph; Merc.

CHOLESTERINUM

GENERALIDADES:

Esta sustancia se encuentra en abundancia en la bilis y los cálculos biliares. Es un remedio valioso para congestión hepática obstinada; para cáncer del hígado; para cólicos biliares obstinados; para opacidades vitreas e ictericia obstinada.

AGRAVACION:

Contacto o sacudidas. Acostándose de lado. Doblándose o por movimiento súbito.

CICUTA VIROSA

GENERALIDADES:

Comúnmente conocida como cicuta de agua, ejerce su influencia principal en CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO, produciendo efectos espasmódicos violentos. Convulsiones, trismo, tétano, hipo. Espasmos; de cabeza, y torcimientos de varias partes; de brazos y dedos. Contorsiones atemorizantes. Espasmos que se mueven hacia abajo, con violencia terrífica, con sacudidas súbitas a través del cuerpo o la cabeza, luego rigidez o gritos; luego inconciencia prolongada; OPISTOTONOS, y distorsiones faciales atemorizantes; con espuma sanguinolenta de la boca, luego postración absoluta; espasmos que se renuevan por el contacto, ruido, habla en voz alta. Epilepsia. Espasmos de diafragma, hipo; de esófago. Los músculos se ponen rígidos. Meningitis cerebro-espinal. Concusión de cerebro. Problemas que surgen de afeitarse. Catalepsia. No recuerda lo que ha sucedido, no reconoce a nadie pero contesta bien.

AGRAVACION:

LESION AL CEREBRO;

en el esófago, por esquivas, en la carne. Sacudida. Ruido. Contacto. Frío. Dentición. Erupciones suprimidas. Corrientes. Humo del tabaco. Volteando la cabeza.

MEJORIA:

Pensando en el dolor. Calor.

MENTE:

Comportamiento infantil. Canta, baila, grita. Gime, aúlla y llora. Excesivamente afectado por historias tristes. Recela y esquiva a los hombres. Desprecia a otros. Confunde el presente con el pasado. Manía con danza, risa y gestos ridículos. Siente como si estuviera en un lugar extraño. Todo parece extraño y terrible. Violento. Salpullido. Delirio. Triste cuando ve a otros felices. Memoria en blanco por horas o días. Caer al suelo y se revuelca con o sin convulsiones. Se siente ella misma insegura; sobre-estimación de sí mismo. No recuerda qué ha pasado, no reconoce a nadie pero contesta bien.

CABEZA:

Torcida o volteada hacia un lado (espasmo). Tuerce la cabeza. Congestión de cabeza con vómito y purga. Vértigo; los objetos se mueven de un lado a otro o se acercan y retroceden. Sacudidas súbitas y violentas a través de la cabeza. Síntomas de la cabeza > por pensar en ellos, por sentarse erecto y pasando flatos. Costras gruesas y amarillas en la cabeza. Sudor durante el sueño. Meningitis. Vértigo con gastralgia y espasmos musculares. Cabeza retraída, espina rígida.

OJOS:

Pupilas dilatadas en concusión cerebral; contraídos en espasmos. Las letras van hacia arriba y hacia abajo o desaparecen, al leer. Cuando se está viendo cualquier objeto o sentado en sueño aparente, la cabeza se inclina hacia adelante. Bizquera-periódica, espasmódica, después de una caída o golpe. Efectos por exposición a la nieve. Los objetos parecen dobles y negros. Rotación de ojos, torcimiento y mirada fija. Los párpados tiemblan.

OIDOS:

Sangrantes; en problemas cerebrales. Detonación repentina especialmente al tragar. Oídos calientes o fríos.

NARIZ:

Tocarla ligeramente produce sangrado. Estornudos frecuentes sin coriza.

CARA:

Roja; o pálida y tirante, sudorosa; distorsionada horrible o ridículamente. Trismo. Pústulas confluentes que forman costras gruesas. Epitelioma de labios.

BOCA:

Espuma en y alderredor. Rechinido de dientes, con trismo. Hinchazón de la lengua; habla difícil. Se muerde la lengua.

GARGANTA:

La siente cerrada o adherida. Espasmos de esófago, no puede deglutir; por lesión; o una espina de pescado, etc. Efectos por tragarse espinas de pescado agudas. Estrictura del esófago.

ESTOMAGO:

Desea carbón, yeso y muchos otros artículos extraños por incapacidad para distinguir entre lo comestible y aquello que no se puede comer, etc. Hipo audible; con llanto; alternando con espasmos torácicos. Vómito de bilis, de sangre al agacharse, al levantarse; en el embarazo. Latidos en el hueco del estómago con destensión. Aflujo de agua; saliva que fluye de la boca, con calor por todos lados.

ABDOMEN:

Cólico con convulsiones, con vómito. Flatulencia con ansiedad y malhumor.

URINARIO:

Micción involuntaria en los ancianos. Orina que pasa haciendo un gran esfuerzo. Estrictura de la uretra; después inflamación; gonorrea. Parálisis de la vejiga.

HOMBRES:

Testículos jalados para arriba, hacia los anillos abdominales externos.

MUJERES:

Estados espasmódicos cuando las reglas no aparecen. Cóccix doloroso durante las reglas. Convulsiones puerperales.

RESPIRATORIO:

El pecho se siente tirante, difícilmente puede respirar. Sensación de frío o calor en el pecho.

CORAZON:

Palpitación temblorosa del corazón. Siente como si el corazón dejara de latir; con sensación de desmayo.

CUELLO Y ESPALDA:

Espasmos y calambres en los músculos del cuello, cabeza tirada hacia atrás. Opistótonos. Torcimientos en el cóccix durante las reglas.

EXTREMIDADES:

Torcimiento y contracturas en los brazos y dedos. Sacudida del brazo izquierdo todo el día. Temblor de la pierna izquierda. Siente que se inclina hacia adentro al caminar. Los pies se voltean hacia adentro y los dedos hacia arriba en los espasmos. Piernas curvadas no puede enderezarlas; ni estirar las que están dobladas. Balancea los pies en semi-círculos al caminar.

SUEÑO:

Se muerde la lengua en sueños. Sueño profundo. Sueños vívidos, pero no recordables.

PIEL:

Pústulas que se unen en costras masivas gruesas y amarillas; < cabeza y cara. Impétigo. Eczema sin comezón. Erupciones suprimidas que causan enfermedad cerebral. Comezón del barbero y del panadero.

RELACIONES:

Cup; Strych.

CIMICIFUGA (Actea Racemosa)

GENERALIDADES:

Este remedio tiene una acción amplia en los NERVIOS Y MUSCULOS. Causa depresión de la mente con abatimiento; y fatiga junto con hipersensibilidad, especialmente al dolor. Es un gran remedio

femenino. Mujeres regordetas, delicadas, sensibles, nerviosas, friolentas que se quejan de dolores en la espalda, cuello, aquí, y allá; muchas de las quejas dependen de una irritación utero-ovárica. Sensación de malestar general; con agotamiento. Muchos de los síntomas son irregulares, cambiantes o se alternan en grupos; alternando con efectos físicos y mentales. Alternan síntomas mentales y reumáticos. Los dolores son violentos, dolorosos, tirantes, aparecen aquí y allá, como sacudidas; con llantos, desmayos, etc. van hacia arriba o de un lado a otro - hacia el cuello; alderredor de la garganta; de un ovario a otro. Los músculos del abdomen se sienten magullados, irritados, pesados, adoloridos. Temblores, sacudidas en varios órganos o en partes donde se apoyan. Dolores presivos. Convulsiones histéricas y epilépticas al tiempo de las reglas. Alternancia de espasmos clónicos y tónicos. Adolorimiento y sensibilidad a lo largo del trayecto del dolor. Estremecimientos nerviosos. Dado antes del término, facilita la labor del parto, cura la náusea del embarazo, previene los dolores posteriores al parto. También ha garantizado partos de productos vivos, en mujeres que anteriormente sólo habían parido productos muertos sin ninguna causa perceptible. (Deberá darse en dosis diarias en potencia Ix dos meses antes del término). Mialgia. Ovaralgia. Lumbago. Espasmo de fiebre cerebro espinal. Influenza. Corea; en la pubertad; con reglas retrasadas; cardíaca. Malos efectos de la ansiedad; susto, decepción amorosa; sobre-agotamiento; fracasos de negocios; embarazo. Niños durante la dentición.

AGRAVACION:

Menstruación; suprimida. Durante el parto. Emociones. Alcohol. Por la noche. Cambio de clima. Frío y calor. Sentado. Pubertad y climaterio. Movimiento. Aire húmedo y frío. Vino. Corrientes.

MEJORIA:

Por cubiertas calientes. Al aire libre. Presión. Comiendo. Movimiento continuo. Agarrando cosas.

MENTE:

Deseo de moverse de un lugar a otro. Melancolía. Agitación. Nervioso, agitado, excitable e inquieto. Irritable; la mínima cosa que sale mal, la vuelve loca. Deprimida y locuaz; cambia constantemente de tópico. Suspica. Presagios pesimistas; de muerte: de locura; de males por venir, etc. Piensa que se volverá loca. Siente un vacío en el epigastrio al encontrarse a un amigo. Miedo de viajar en un carro cerrado. Teme, que los que viven en su casa la matarán. Terror mortal a las ratas. Visión de ratas, ratones, varios colores y formas. Manía; antes de las reglas; alcohólica; trata de lastimarse a sí mismo; puerperal; consecuente a la desaparición de neuralgias. Voluntad débil. No tiene interés en el quehacer de su casa. Indiferente. Deprimido, siente que está bajo una nube pesada y negra. Suspica; no quiere tomar la medicina. Se sienta y se entrega a la melancolía con mucha tristeza; cuando se le pregunta, rompe en llanto. Los síntomas mentales > por diarrea o reglas; < después de reumatismo.

CABEZA:

Sensación salvaje o de ondulación en el cerebro. Cabeza retraída. (Meningitis) Dolores pulsátiles, punzantes, después de una preocupación mental, por exceso de estudio o por un reflejo de enfermedad uterina > al aire libre. La cabeza o el cerebro se sienten muy grandes. Sensación de apertura y cerramiento en el cerebro. El vértice se siente como si fuera a estallar < ascendiendo escaleras, o como si fuera abierto y dejado al aire libre, como aire frío que estuviese soplando en el cerebro o con calor. Sensación como de golpe o de un tornillo que fuera enterrado desde el occipucio hacia el vértice y luego a los ojos. (Izquierda). Cefalea de los estudiantes.

OJOS:

Dolorimiento intenso en los globos y detrás de ellos, > presión < el movimiento más leve. Dolor de los ojos al vértice. Los ojos se sienten grandes; con mirada salvaje. Ve destellos rojos con orillas oscuras. No puede tolerar la luz artificial. Como si se introdujera una aguja en los globos, < cerrando los ojos. Neuralgia ciliar.

OIDOS:

Tinnitus. Sensible al menor ruido; con trabajo de parto espasmódico. Ruidos violentos en los oídos con sordera.

NARIZ:

Sensible al aire frío; cada inhalación parece traer aire frío en contacto con el cerebro.

CARA:

Pálida, caliente. Neuralgia que afecta los huesos malares, > noche, reaparece el día siguiente. Frente fría. Manchas faciales en las mujeres jóvenes. La frente se siente fría. Expresión de temor salvaje.

BOCA:

Saliva gruesa. Gusto de cobre. Escupe moco tenaz, de sabor de cobre. Temblor de la lengua. Moco espeso en los dientes. No puede pronunciar una palabra aunque trate de hacerlo. La lengua y la boca se sienten tibias. Lengua hinchada.

GARGANTA:

Ardor. La tiroides duele antes de la menstruación.

ESTOMAGO:

Náusea; en la mañana; de embarazo; por alcoholismo; se siente en los intestinos; < presión en la espina y región cervical. Vomita substancia verde, gime, se enfurece y presiona la cabeza con las manos para sentirse mejor. Epigastrio hundido, al encontrar un amigo. Eructos; con náusea, vómito y cefalea (mujeres).

ABDOMEN:

Cólico > doblándose en dos y después de evacuar. Evacuaciones frecuentes, delgadas, oscuras y ofensivas. Diarrea matutina de los niños. Dolores agudos a través del hipogastrio. Se alterna diarrea y constipación.

URINARIO:

Orina profusa y clara; causa debilidad; con arena amarilla. Micción nerviosa.

MUJERES:

Reglas; profusas, oscuras, coaguladas, escasas con dolor de espalda, nerviosismo; irregulares en tiempo y cantidad; más flujo, más dolor. Gran debilidad entre las reglas. Neuralgia ovárica; dolor a través de la pelvis, de un ovario a otro, o va de arriba hacia abajo a través de los muslos. Reglas suprimidas; por emociones, por frío. Espasmos epilépticos o histéricos al momento de las reglas. Atonía uterina. Se presiona los pechos como si le dolieran. Manía. Ardor en las mamas. Dolores de parto lentos, con estremecimientos nerviosos. Dolores posteriores al parto intolerables < en las ingles.

Leucorrea; con sensación de peso en el útero. Neuralgia cardíaca, en el parto. Dolores inframamarios < lado izquierdo. Loquios suprimidos por frío o emociones. Nervioso al toser u orinar. Estremecimientos.

RESPIRATORIO:

Tos cosquilleante, corta, seca, constante < por la noche, al hablar. Punzadas agudas en el lado izquierdo del pecho, el movimiento provoca gritos. Pleurodinia. Tos nerviosa.

CORAZON:

Como si estuviese hinchado, dolorido o crecido. Dolores como provocados por agujas. Angina de Pecho - el dolor se esparce por todo el pecho y la espalda y luego hacia el brazo izquierdo que se siente dormido y como ligado a un lado. La acción cardíaca cesa de pronto provocando sofocos. Pulso débil, irregular, tembloroso; cesa cada 3er. o 4º latido.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor de cuello, tira la cabeza hacia atrás. Cuello rígido, dolor < moviendo las manos. Cuello retraído. Espina, cervix y parte dorsal superior muy sensible < presión que causa náusea y arqueos. Sensibilidad de todos los músculos. Cuello y espalda rígidos y contraídos. Dolor en el ángulo de la escápula izquierda. Dolor lumbar pesado y pulsátil, atraviesa la cadera y vá hacia los muslos.

EXTREMIDADES:

Sensación de inquietud y malestar en los miembros. El brazo izquierdo se siente como atado hacia un lado; movimiento constante e irregular del brazo izquierdo (Corea). Las manos tiemblan mientras escribe. Calambres en las piernas, en pantorrillas. Tendón de Aquiles rígido y contraído. Plantas con comezón. Sudor frío en las manos y los pies. Alternancia de síntomas reumáticos y mentales. Temblor de piernas; apenas puede caminar. Adormecimiento de los miembros.

SUEÑO:

Comatoso; como de borracho. Insomnio. Duerme; con los brazos sobre la cabeza o bostezando.

RELACIONES:

Bap; Caul; Gel; Ign; Pul.

CINA

GENERALIDADES:

Cina es la fuente del alcaloide Santónico. Síntomas mentales NERVIOSOS y corporales que son producidos por esta droga pueden deberse a la presencia de lombrices o ser reflejo de irritación abdominal, y afecciones del tracto digestivo. Es un remedio para niños; niños que son grandes, gordos, rosados y escrofulosos; se ponen rígidos; cuando se les mira; durante la tos, o cuando se enfadan. El niño es inquieto, agitado. Torcimientos. Espasmos; debido a lombrices; unilaterales. En los espasmos; los niños avientan los brazos de un lado a otro. Todo el cuerpo está dolorosamente sensible al movimiento y contacto; adolorimiento magullante. Los niños están hambrientos, entre más grande el hambre, más grande la emaciación. Malestares concomitantes al bostezo, que aparece cada vez que

alguien bosteza. Olor agrio del cuerpo, especialmente en niños. Estremecimientos como por dolor. El paciente brincaré de pronto como si hubiera sentido un dolor. Temblores, con estremecimientos, al bostezar. Convulsiones, con conciencia. Paraplejía, con hambre no natural. Corea.

AGRAVACION:

CONTACTO.

Lombrices. Vejación. Por ser mirado. DURANTE EL SUEÑO. Por ver fijamente. Bostezando. Luna llena. En el sol, verano. Mirando fijamente cualquier objeto.

MEJORIA:

Yaciendo sobre el abdómen. Enjugándose los ojos. Movimiento. Batiendo la cabeza. Meciéndolo.

MENTE:

MUY SENTIDO;

malhumorado, travieso; petulante e insatisfecho. Los niños no quieren ser tocados o cargados, quieren ser mecidos; desean muchas cosas, pero las rechazan cuando les son ofrecidas; difícil y afligido todo el tiempo. Nervioso. Sentimiento irreal de haber hecho algo equivocado. Convulsiones en niños cuando son regañados o castigados. Niños a prueba de cualquier caricia. Niños de buen talante que se vuelven muy malhumorados.

CABEZA:

Adolorida, alterna con dolor en el abdómen > por agacharse. Dolor en la cabeza al leer o mirar con atención. El niño inclina su cabeza a los lados todo el tiempo. Voltea la cabeza de un lado a otro. Las mujeres deben soltar su cabello mientras les duele la cabeza. Los niños no pueden tener el cabello peinado. Cefalea, antes y después de ataques epilépticos.

OJOS:

Pupilas dilatadas. Pulsaciones en los músculos super-ciliares. Las cejas tiemblan al mirar cualquier objeto, vé como a través de un velo > enjugándose los ojos. Fatiga de los ojos. Visión; amarilla, azul, violeta o verde. Bizcos; por lombrices. Círculo oscuro alrededor de los ojos. Vista débil por masturbación.

NARIZ:

Comezón; SE PICA Y ESCARBA LA NARIZ, hasta que sangra; quiere frotársela. Estornudos, con tosferina. Ventanas nasales retraídas.

CARA:

Pálida, con apariencia enferma; durante la tos. BLANCO AZULOSA ALDERREDOR de la boca. Cara alternadamente pálida y fría o roja y caliente. Movimientos coréicos de la cara y manos.

BOCA:

RECHINA LOS DIENTES;

por la noche, durante el sueño. Mastica y traga en sueños. Lengua limpia.

GARGANTA:

Dificultad para deglutir líquidos; deglución ruidosa. Ruido de cloqueo de la garganta al estómago; después de toser o de convulsionar. Movimiento constante de deglución, involuntario.

ESTOMAGO:

Hambre; voraz, después de comer; después de vomitar; con sensación mordiente en el estómago; alternando con pérdida de apetito; antes del escalofrío o siguiendo el sudor; en paraplejía. Deseo de muchas cosas diferentes; deseo de dulces, de pan. Vómito con lengua limpia. Vómito y diarrea inmediatamente después de comer y especialmente después de beber. Aversión a la leche materna.

ABDOMEN:

Dolor de retorcimiento alrededor del ombligo > presión. Distendido y duro. Dolor cortante y punzante por lombrices. Evacuaciones; blancas y acuosas. Comezón en el ano. Sensación de calor no placentera.

URINARIO:

Enuresis < cada luna llena. Orina; turbia; BLANCA; LECHOSA; o se vuelve lechosa.

HOMBRES:

Malos efectos del onanismo; debilidad de la vista.

MUJERES:

Hemorragia uterina antes de la pubertad. El niño rehusa el pecho. Reglas; muy adelantadas y profusas.

RESPIRATORIO:

Tos recurrente regularmente, sofocante con estornudos. Tos violenta que trae lágrimas y dolores de esternón; siente como si algo se desgajara. Gorgoteo de la garganta al estómago después de toser. El niño permanece quieto y no quiere moverse ni hablar por temor a la tos. Esternón como si permaneciera muy cerca de la espalda. La tos termina en un espasmo. Ataques de sofoco. Expectoración difícil.

EXTREMIDADES:

Avienta los brazos de un lado a otro (niños). Contractura súbita de los dedos de la mano derecha, hacia adentro. Estira los pies espasmódicamente (niños). Torcimiento y contractura de miembros. Pie izquierdo en constante movimiento espasmódico. Paraplejía; súbita, con hambre anormal.

SUEÑO:

Inquieto. Se pone sobre las manos o rodillas o sobre el abdomen en sueños. Terrores nocturnos en los niños. Grita, chilla, despierta aterrado. Chilla y habla en sueños.

FIEBRE:

Con cara pálida y fría y manos calientes. Mucha fiebre; lengua limpia durante la fiebre. Sudor frío en la frente, nariz y manos. Hambre antes del escalofrío y después del sudor.

COMPLEMENTARIO:

Calc; Dros; Rat.

RELACIONES:

Cham; Nat-p.

CINNABARIS

GENERALIDADES:

El Sulfato de Mercurio es un remedio anti-sicótico y anti-sifilítico. Indolencia e indisposición al trabajo mental. Sensibilidad general al tacto; huesos, cráneo, etc. Mientras yace sobre el lado derecho, siente como si los contenidos del cuerpo fuesen arrastrados hacia ese lado.

AGRAVACION:

Contacto. Luz. Humedad. Por caminar.

MEJORIA:

Al aire libre. Claridad del sol. Después de la cena.

OJOS:

Dolor externo a lo largo de las cejas; circundando los ojos, o como con una silla en la raíz de la nariz. Enrojecimiento del ojo completo.

NARIZ:

Presión fuerte en la raíz de la nariz.< presión de los lentes. Descarga de la nariz acre, fétida, ardiente, acuosa o con grumos oscuros.

BOCA:

Boca y garganta seca, despierta del sueño; debe enjuagar la boca. Expectoración moco filamentoso de la garganta; o moco en bolas que cae hacia la parte posterior. Catarro naso-faríngeo.

ABDOMEN:

Hormigueo en el ano; como por una lombriz grande. Disentería sangrante. Evacuaciones delgadas y blancas. Diarrea de moco verde, que mancha la piel alrededor del ano y escroto, de un color cobre.

HOMBRES:

Torcimiento del pene; durante el sueño. Sudor fétido y acre entre el escroto y los muslos. Verrugas en el prepucio, especialmente en forma de abanico. Espinillas pequeñas y rojas en el glande. Chancros duros y antiguos. Comezón en la cabeza del pene. Enrojecimiento e hinchazón del prepucio.

MUJERES:

Descarga leucorréica con sensación de presión en la vagina.

CORAZON:

El corazón aletea, luego llegan aflujos de sangre a la cabeza.

EXTREMIDADES:

Nódulos en las espinillas. La pierna izquierda se siente más corta que la derecha al caminar. Calambres en las pantorrillas después de caminar. Dolor en el tendón de Aquiles y los huesos calcáneos al caminar. Rodillas frías; o articulaciones. Dolor desde el codo hacia las manos.

PIEL.

Ulceras de un rojo fiero en piel y membranas mucosas. Erupciones rojas. Comezón violenta y punzante. Sudor en la nariz. Ulceras tipo colmena.

COMPLEMENTARIO:

Thu.

RELACIONES.

Merc.

CISTUS CANADENSIS

GENERALIDADES:

Comúnmente conocida como Rosa de las Rocas, es un remedio antiguo para la escrofulosis. Afecta las GLANDULAS especialmente las naso-faríngeas; cuello y mama (izquierda). También produce erupciones herpéticas, estados escorbúticos, inflamaciones crónicas y ulceraciones gangrenosas. El paciente está dolorosamente sensible al frío; al aire frío inspirado. Sensación de frialdad en varias partes; de lengua, saliva, en garganta; eructos, en estómago; < sudando; aún las descargas. Descargas mucosas que son espesas, amarillas, fétidas; dejando una ulceración dolorosa. Supuraciones. Comezones internas y externas. Hormigueo a través de todo el cuerpo, con respiración ansiosa y difícil. Enfermedades malignas de las glándulas del cuello. Heridas venenosas, mordidas, úlceras fagedénicas. Ardores. Induraciones. Callosidades, con grietas.

AGRAVACION:

Frío; tomando; corrientes; aire inspirado. Agua fría. Agotamiento mental; excitación. Contacto. Movimiento.

MEJORIA:

Por comer. Expectoración.

MENTE:

Malos efectos de una vejación. Miedo.

CABEZA:

Le duele cuando se salta una comida, > comiendo. Cabeza jalada hacia un lado por hinchazón del cuello.

OJOS:

Sensación como de algo que pasa alderredor de los ojos. Orillas agrietadas.

OIDOS:

Descarga de pus acuoso y fétido; después de enfermedades eruptivas. Empeines en y alderredor del oído que se extiende al meato externo.

NARIZ.

Sensación de frío o ardores. Punta dolorosa. Eczema de la nariz. Como con un bulto en la naso-faringe. Catarro nasal crónico, estornudos frecuentes y violentos. Dolor presivo en la raíz de la nariz, con cefalea.

CARA:

Comezón, ardor y costras en cigoma. Caries de la mandíbula inferior, con supuración de las glándulas del cuello. Cáncer abierto sangrante en el labio inferior. Labios agrietados.

BOCA:

Encías escorbúticas, retraídas, con sangramiento fácil; repugnantemente pútridas. La lengua se siente fría. Saliva fría. Duele al sacar la lengua. Piorrea.

GARGANTA:

El frío afecta la garganta; que se siente fría. Sensación de suavidad y esponjosidad; comezón en la garganta. Se vuelve sensible al inhalar el mínimo aire frío. Punto seco en garganta > por sorber agua. Dolores al toser. Glándulas hinchadas y supurantes. Bocio, con diarrea frecuente.

ESTOMAGO:

Sensación fría; antes y después de comer. Deseo de queso; de cosas picantes. Eructos fríos.

ABDOMEN:

Sensación de frío en todo el abdomen. Diarrea; por café y frutas, con bocio, con náusea. Evacuaciones apresuradas y delgadas, en la mañana.

HOMBRES:

Comezón en escroto.

MUJERES:

Induración e inflamación de las mamas (izquierda). Sensibilidad al aire frío. Cáncer. Leucorrea de mal olor.

RESPIRATORIO:

Laringe y tráquea con sensación de frialdad al inhalar aire frío. Frialdad en el pecho. Expectoración de cantidades de moco tenaz al acostarse. La tráquea se siente estrecha y la respiración se vuelve difícil, precedida de hormigueo. El pecho se siente ulcerado, después de la expectoración.

CUELLO Y ESPALDA:

Glándulas duras e hinchadas en el cuello. Dolor ardiente y magullante en el cóccix que impide sentarse, < contacto.

EXTREMIDADES:

Pies fríos. Punta de los dedos agrietadas, sensibles al frío. Los trabajadores desarrollan un punto duro en sus manos, con grietas.

PIEL:

Dura, gruesa, seca, agrietada. Comezón, sensación de hormigueo en toda la piel, sin erupciones.

FIEBRE:

Escalofrío. Sudores fáciles; por la noche.

RELACIONES:

Calc; Helod; Hep.

CLEMATIS ERECTA

GENERALIDADES:

Afecta las membranas mucosas de los ojos, la uretra y de las GLANDULAS, especialmente TESTICULOS, mamarias, ovarios; que se vuelven MUY DUROS Y DOLOROSAMENTE hinchados. Dolores neurálgicos en varias partes. Ardores, comezón, punzadas, hormigueos. Gran debilidad. Músculos flácidos o torcidos. Sensación vibrante a través de todo el cuerpo después de acostarse. Emaciación. Aversión a lavarse. Pacientes reumáticos, gonorréicos y sifilíticos. Estricturas orgánicas.

AGRAVACION:

GONORREA.

Calor de la cama. NOCHE. Lavado frío. Aire frío. Luz. Luna < y >. Mercurio.

MEJORIA:

Sudor. Al aire libre.

MENTE:

Indiferencia. Miedo de estar solo, pero no predispuesto a tener aún una compañía agradable. Malestares por nostalgia. Irritable, insatisfecho sin causa. Melancólico.

CABEZA:

Sentimiento de confusión > aire libre. Erupciones; en el occipucio, en la base del pelo, húmedas, pustulares, sensibles, pruriginosas.

OJOS:

Iritis. Conjuntivitis crónica. Lagrimeo. Sensibles al aire, debe cerrarlos. Malestares por luz del sol brillante. Ardor, como si saliera fuego de los ojos, con escozor < cerrándolos.

OIDOS:

Tintineo como de campanas.

CARA:

Dolor en el lado derecho de la cara, hacia el ojo, oído y sien > por mantener agua fría en la boca. Hinchazón de las glándulas sub-maxilares, con tubérculos duros, con latido < tacto. Cáncer del labio.

BOCA:

Los dientes duelen < por la noche y por el tabaco; > jalando aire, agua fría. Aliento ofensivo a otros.

ESTOMAGO:

Debilidad en todos los miembros después de comer, con pulsación en las arterias. Náusea al fumar tabaco, con debilidad en las piernas. Sensación desagradable de frialdad en el estómago.

ABDOMEN:

Dolor desde el abdomen al pecho < respirando y durante la micción. Hinchazón de las glándulas inguinales, con dolores de torción; con cirro, gonorrea suprimida, reumatismo de las articulaciones.

URINARIO:

La orina se detiene y empieza, o gotea después de orinar. Debe hacer esfuerzo para pasar unas pocas gotas, luego aparece el chorro. Estrictura de la uretra. La uretra se siente como una tralla dolorosa al presionar. Ardor en uretra durante la micción. Incapacidad para evacuar toda la orina a la vez. La última gota causa un ardor violento.

HOMBRES:

Aversión al coito. Testículos indurados, con sensación de magulladura. Orquitis. Los testículos cuelgan pesadamente o están retraídos. Inflamación del cordón espermático, con ardor y sensibilidad, que se extiende al abdomen. Ardor en el pene durante descargas seminales en el coito. Hinchazón de la mitad derecha del escroto. Erecciones violentas con punzadas en la uretra.

MUJERES:

Pechos llenos, pesados y sensibles; con punzadas hacia afuera. Hinchazón e induración de las glándulas mamarias. Cáncer de los senos con punzadas en los hombros y útero. Reglas muy adelantadas. Dolor tirante en el pecho < micción.

RESPIRATORIO:

Respiración deteriorada < ascendiendo una colina, o caminando sobre un camino desigual. Tos seca, ladrante, con punzadas en el pecho.

CORAZON:

Punzadas agudas en el corazón de adentro hacia afuera.

EXTREMIDADES:

Debilidad en las extremidades después de comer; o con náusea al fumar tabaco. Glándulas axilares hinchadas.

PIEL:

Comezón violenta con descamación profusa < lavándose con agua fría. Vesículas, pústulas. Erupciones corrosivas que terminan en úlceras carcomidas planas, con costras gruesas y eczema < occipucio y parte inferior de las piernas. Úlceras varicosas. Herpes zoster.

SUEÑO:

Somnolencia. Sueños inquietos con sensación vibrante en todo el cuerpo.

COMPLEMENTARIO:

Merc.

RELACIONES:

Pho; Rhod; Step.

COCA

GENERALIDADES:

La Coca es la fuente del alcaloide Cocaína, es un anestésico local. Es el remedio para el agotamiento del CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO; por esfuerzo físico y mental y para aquellos que sufren por desvanecimientos, disnea y agotamiento al ir a grandes altitudes, escalamiento de montañas, aeroplanos, vuelos, etc. Una sensación característica es como un gusano o pequeños cuerpos extraños que estuvieran bajo la piel, moviéndose cuando se le toca; si este síntoma está asociado con cualquier condición de enfermedad, la coca está indicada. Adecuada para ancianos. Gente con respiración corta, débil, nerviosa, obesa, pletórica. Niños con marasmo. Agotamiento muscular.

AGRAVACION:

Ascendiendo. Grandes altitudes. Frío. Agotamiento mental. Por caminar. Sentándose. Alimentos salados.

MEJORIA:

Movimientos rápidos, paseando al aire libre. Después de la puesta del sol. Yaciendo sobre la cara.

MENTE:

Postración mental, alternando con alegría. Tímido, vergonzoso, se siente mal en sociedad; desea estar solo y en la obscuridad. Sensación de muerte inminente. Alucinaciones de oído; desagradables sobre sí mismo. Excitación locuaz con visiones de gloria. Alegría; antes de las reglas. Desaparición del sentido de orientación (derecha e izquierda). Descuido de la apariencia personal.

CABEZA:

Dolor con vértigo, precedido de destellos de luz ante los ojos. Sacudimientos que vienen del occipucio, con vértigo. Migraña < por toser; > comiendo; a la puesta del sol.

OJOS:

Parpadeos. Manchas blancas, oscuras y brillantes ante los ojos. Pupilas dilatadas. Diplopía.

OIDOS:

Ruidos en los oídos. Tinnitus.

NARIZ:

Sentido del olfato gravemente disminuído.

BOCA:

Caries de los dientes. Lengua cubierta. Sensación de pimienta en la boca.

GARGANTA:

Eructos; salen con ruido y violencia, como si fuesen a hendir el esófago.

ESTOMAGO:

Mucha saciedad por largo tiempo. Retrasa el hambre y la sed. Deseo de alcohol y tabaco. No hay apetito, excepto por dulces. Aversión por la comida sólida.

ABDOMEN:

Disentería en las grandes altitudes. Abdómen distendido.

HOMBRES:

Sensación de que el pene está ausente. Diabetes con impotencia.

MUJERES:

Las reglas fluyen en borbotones, la despiertan de su sueño.

RESPIRATORIO:

Pérdida de la voz (5 o 6 gotas cada 1/2 hora antes de cuando se espera usar la voz). Asma senil. Enfisema. Falta de respiración, respiración corta especialmente en atletas ancianos. Ronquera < al hablar.

CORAZON:

Palpitación; con sonrojo, pulso excesivamente rápido, con sudoración violenta.

EXTREMIDADES:

Hormigueo, adormecimiento de los brazos. Al caminar, involuntariamente dá pasos muy rápidos, la cabeza inclinada hacia adelante con vértigo.

PIEL:

Como con un gusano bajo la piel que se retirara al tocarlo.

SUEÑO:

Insomnio. No puede descansar en ningún lado pero está somnoliento. Despierta por una sacudida en el cerebro.

RELACIONES:

Cann.

COCAINA

GENERALIDADES:

Los síntomas de Coca y Cocaína son de lo más similares. Las sensaciones de un pequeño cuerpo extraño o de un gusano bajo la piel, la vista y sensación de insectos en su propia persona y en sus ropas, y como si partes de su cuerpo estuviesen ausentes, están más pronunciados en cocaína. El sentido moral está embotado. Alucinaciones persecutorias aterradoras. Apariencia personal descuidada. Cree oír señalamientos desagradables sobre sí mismo. Celos irracionales. Deseo constante de hacer algo maravilloso; de acometer hazañas inmensas de fuerza. Corea. Parálisis agitante. Temblor alcohólico o senil.

COCCULUS INDICUS

GENERALIDADES:

Es un veneno estupefaciente, de allí que cause perturbaciones del sensorio y afecciones del eje cerebroespinal; produciendo relajamiento muscular paralítico, con pesadez. El paciente es muy susceptible al miedo, furia, pena y todas las perturbaciones mentales. Está demasiado débil para mantener su cabeza, estar de pié o aún hablar. Parálisis - de la cara; lengua, faringe, paraplejía, con entumecimiento y hormigueo. Adecuado para personas de pelo claro, tímidas, nerviosas; ratas de biblioteca; solteras; infantiles; y jóvenes sensibles y románticas. Histeria. Entumecimientos. Sensación de VACIO O

HUECO; cabeza, pecho, abdomen. Como si partes aisladas se hubieran ido a dormir. Estremecimientos. Contracción dolorosa de las extremidades y el tronco. Temblores; de la cabeza, quijada inferior; por excitación, fatiga, dolor. Temblores intencionales. Calambres; en músculos; en los maseteros; en abdomen; dismenorrea, en el corazón. Espasmos, a través del cuerpo como descargas eléctricas. Convulsiones; por la no aparición o suspensión súbita de las reglas. Síntomas alternantes. Malos efectos de la ira, susto, pena, ansiedad, desengaños. Por veladas nocturnas. Un sobre esfuerzo mental y físico. Por viajar. Sol. Beber té. Sensibilidad al frío. Cae súbitamente al suelo inconsciente. Sentidos agudos. Mareos por viaje en tren o por barco. Lentitud; al moverse; en contestar; quiere mucho tiempo para hacer cada cosa. Afecciones unilaterales. Crispaduras de grupos aislados de músculos.

AGRAVACION:

Movimiento; de un BOTE; CARROS; nadando. Pérdida del sueño. Ruido. Contacto. Sacudidas. Emociones. Por arrodillarse. Agachándose. En las reglas. Comiendo. Por ansiedad. Frío. Al aire libre. Por esfuerzos. Dolor.

MEJORIA:

Sentándose. En una habitación. Acostándose de lado.

MENTE:

Ofuscado. Tristeza profunda. Pensamientos fijos en algún tópico desagradable, se sienta como absorto en pensamientos profundos y tristes y no observa nada alderredor de ella. Gran ansiedad súbita. Las cosas parecen irreales. Asimiento lento. Fácilmente ofendido, no soporta la contradicción. Extremadamente triste, taciturno y malhumorado. Toma todo a mal. El tiempo pasa demasiado rápido. Borrachos; bamboleantes, estruendosos, regañones, cantadores. Muy ansioso sobre la salud de otros. Platicador, gracioso, chistoso, bailador, gesticulador. Vé algo vivo en las paredes, pisos, sillas, etc. Vacilante, no cumple nada en su trabajo. Teme la muerte y los peligros desconocidos.

CABEZA:

VERTIGO;

con náusea; con palpitación < en a.m.; levantando la cabeza; se siente en la frente. Cabeza pesada. Dolor en el occipucio y nuca < acostándose sobre; > doblándola hacia atrás, < café. No puede acostarse sobre la espalda durante la cefalalgia. Sensación de algo que se abre y se cierra < occipucio. Temblor convulsivo de la cabeza por debilidad del músculo del cuello. Calambres en los músculos temporales izquierdos.

OJOS:

Dolor como si los sacaran de la cabeza (con cefalalgia). Ojos cerrados, con los globos constantemente rotando; en espasmos. Ojos saltones. Pupilas; contraídas o dilatadas. Los objetos se ven moverse hacia arriba y hacia abajo. Estremecimiento de los párpados.

OIDOS:

Sensibilidad al escuchar; teme los ruidos inesperados. Los siente cerrados (D). Ruidos como de agua corriente. Dureza de oído.

NARIZ:

Sentido del olfato muy agudo.

CARA.

Parálisis de un lado. Calambres en los músculos maseteros < abriendo la boca. Prosopalgia, con dolor de radiación amplia a los dedos. Temblor de la quijada inferior, y castañeteo de dientes, al tratar de hablar. Abotagada, distorsionada y fría al contacto.

BOCA:

Lengua; como paralizada, habla difícil; o apresurada; dolores en la base cuando se saca. Gusto metálico. La comida sabe como si le faltara sal; el tabaco sabe amargo. Dolor en los dientes > al morder, con boca vacía. Los dientes se sienten fríos.

GARGANTA:

Parálisis que evita la deglución. Cosquilleo en la garganta, con lagrimeo. Esófago seco, ardiente. Constricción de la garganta; con dificultad para respirar e inclinación a toser.

ESTOMAGO:

Disgusto por toda comida y bebida. Náusea; que va hacia la cabeza o se siente en la cabeza. Arqueos. Vómito; con flujo profuso de saliva; con cefalalgia, dolor en los intestinos; por enfriarse; de olor agrio, amargo, malo. Como si se moviera un gusano dentro. Hipo y bostezos espasmódicos. Disgusto por el olor de los alimentos. Vómito con síncope. Vómitos por tumor cerebral; por oír hablar en voz alta. Deseo de cerveza. Sensación como de que ha estado un largo tiempo sin comida, hasta que el hambre se va.

ABDOMEN:

Inflado. Parece lleno de piedras agudas; con cada movimiento; con diarrea > acostándose sobre los lados. Cólico; con viento, de torcedura, histérico, nervioso, con desmayo, con salivación. Calambres en el epigastrio, con dificultad para respirar. Hígado más doloroso, después de ira < a la menor sacudida. Músculos abdominales débiles. Dolor en el anillo abdominal como si algo se forzara a entrar.

URINARIO:

Frecuente deseo de orinar, con descarga pequeña, en mujeres embarazadas. Orina acuosa.

HOMBRES:

Dolor tirante y penoso, en testículos cuando se tocan. Genitales sensibles, con deseo de coito.

MUJERES:

Reglas; tempranas, profusas, muy frecuentes, brota en chorro al levantarse sobre la punta de los pies. Muy débil durante las reglas, escasamente puede mantenerse de pie. Leucorrea purulenta, borbollante, entre las reglas; o en lugar de ellas; debilitante; escasamente puede hablar. Dismenorrea seguida de hemorroides. Apretón en el útero. Estremecimientos sobre las mamas. Leucorrea de chorro, al acuclillarse y agacharse; durante el embarazo; con frecuente urgencia de orinar.

RESPIRATORIO:

Sensación de vacío o de calambres en el pecho. Asma histérica. Tos por atragantamiento en la garganta. Retumbo audible en el pecho (i) como por vacío < al caminar.

CORAZON:

Palpitación < por el movimiento rápido, excitación mental; con vértigo y desmayo, luego estiramiento de brazos, con los pulgares retraídos hacia adentro.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello débil, no puede mantener la cabeza erguida. Dolor en el cuello o crujido en las vértebras cervicales al mover la cabeza y al bostezar. Debilidad de la espina; en la región lumbar; < al caminar. Dolor paralítico en la parte baja de la espalda.

EXTREMIDADES:

Dolor en el hombro y los brazos como magulladura. Manos; entumecidas; o calientes y frías alternadamente; se vuelve entumida al agarrar objetos; tiembla al comer. Toma las cosas de una manera torpe y las deja caer. Las piernas se duermen. Temblor y dolor en las piernas. Rodillas débiles; crujidos al moverse. Paraplejía. Alternancia entre los brazos. Piernas estiradas dolorosas cuando se flexionan o viceversa. Caminado torpe. Edema de los pies con parálisis de los miembros inferiores. El húmero se siente quebrado. Plantas dormidas; mientras está sentado. Movimiento involuntario del brazo derecho y la pierna derecha > durante el sueño.

SUEÑO:

Insomnio por fatiga mental o física. Somnolencia constante; después de una noche en vela; por amamantar. Bostezos espasmódicos, con hipo. Sueños ansiosos y atemorizantes.

PIEL:

Mucha comezón < al desvestirse; en una cama de plumas. Ulceras muy sensibles al contacto.

FIEBRE:

Escalofrío, con sudoración y calor de la piel. Escalofrío que alterna con calor. Forma nerviosa de fiebre baja; por accesos de coraje. Escalofrío con cólico, náusea, vértigo. Sudor; por el mínimo ejercicio, en la parte afectada.

COMPLEMENTARIO:

Petr.

RELACIONES:

Gel; Ign.

COCCUS CACTI

GENERALIDADES:

Este es un insecto que infesta la planta del cacto. La tintura se prepara con los cuerpos desecados de las hembras. Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS causando una condición catarral e irritación de la garganta, y órganos respiratorios y génito-uritarios. Las DESCARGAS SON FILAMENTOSAS; incluyendo hemorragias, que aparecen en grandes coágulos negros. Intolerable comezón interna, ardorosa como por pimienta. Pulsación en diferentes órganos. Sensación como de un fluido que forzara su salida durante el dolor. Espasmos. Acido úrico; diátesis gotosa y reumática. Anuria. Ansarca. Ascites. Lasitud general.

AGRAVACION:

Periódicamente. Calor. Acostándose. Exposición al frío. Al despertar. Contacto. Presión de las ropas. Cepillando los dientes. A la mínima fatiga. IRRITACION DE LA GARGANTA. Enjuagándose la boca.

MEJORIA:

Lavándose con agua fría. Por caminar. Bebidas frías.

MENTE:

Tristeza, temprano por la mañana al caminar, o después de mediodía. 2-3 p.m.

CABEZA:

Dolor de latido con sensación de un fluido que quisiera salir.

OJOS:

Sensación de un cuerpo extraño entre el párpado superior y el globo del ojo.

OIDOS:

Crujido en los oídos, al deglutir.

NARIZ:

Ardor como de pimienta en las alas. Acumulación de moco espeso y tenaz en la nasofaringe.

CARA:

Sensación de hormigueo, Se pone púrpura, roja < al toser.

BOCA:

Hablar en voz alta o cepillarse los dientes provoca la tos. Punta de la lengua arde como pimienta. Gusto dulzón, metálico. Salivación, constante deseo de escupir.

GARGANTA:

Acumulación de mucho moco tenaz; tratar de escupirlo, provoca la tos, arcos y vómito. Sensación como de una cuerda que colgara en la parte posterior de la garganta. Cualquier irritación en la garganta provoca tos, arcos y vómitos. Garganta constreñida; o como con un tapón atorado allí. Descarga post-nasal profusa. Sensación como de úvula crecida, causando carraspera constante.

ESTOMAGO:

Irritación de garganta, carraspera, cepillado de dientes, causa arqueos y vómito. Sed; bebe agua con frecuencia y grandes cantidades.

ABDOMEN:

Dolor excruciante de la región ilíaca izquierda, extendiéndose hacia las ingles y hasta la mitad de los muslos; como si un fluido tratara de salir por allí.

URINARIO:

Dolor lancinante, violento desde los riñones a la vejiga; con disuria. Cólico nefrítico. Necesidad constante de orinar, > después de pasar coágulos de sangre por la vagina en mujeres. Dolor punzante a lo largo de los ureteres. Orina; escasa, espesa, pesada, agria; sedimento; arenoso, oscuro, rojo, café o blanco; moco sanguinolento. Nefritis.

HOMBRES:

Pulsación en el glande.

MUJERES:

Vulva sensible < al orinar. Reglas muy adelantadas, profusas, negras y espesas, coágulos oscuros, con disuria. Grandes coágulos salen por la vagina al pasar orina, al estar quieta o al levantarse. Reglas; intermitentes, fluyen sólo en la tarde o por la noche.

RESPIRATORIO:

PAROXISMOS REGULARES DE COSQUILLEO VIOLENTO, TOS AGOBIANTE QUE TERMINA EN VOMITO O QUE SACA MUCHO MOCO CLARO Y FILAMENTOSO, que cuelga de la boca, con cara púrpura, roja y calor interno. Bronquitis crónica complicada. Tosferina. Tos; periódica, se incrementa lentamente y gradualmente decrece en intensidad, > por aire frío o bebidas frías. Al caminar contra el aire corta la respiración. Dolor o punzadas en ápices de los pulmones. Respiración corta. Tos en bebedores.

CORAZON:

Sensación como si todo fuese presionado contra el corazón.

ESPALDA:

Frialdad. Región de los riñones dolorosa a la presión.

EXTREMIDADES:

Sensación como de una astilla fina que se introdujera bajo las uñas de los dedos.

FIEBRE:

Ardorosa; como de pimienta.

RELACIONES:

Ap; Berb; Lach; Pho.

COFFEA CRUDA

GENERALIDADES:

No hay diferencia entre los síntomas del café tostado y el café crudo. Se creó que el café antidota casi todos los medicamentos homeopáticos; pero hay duda de que esto sea así, especialmente cuando los remedios se dan en potencia alta (Clark). La experiencia muestra que seleccionado correctamente el remedio homeopático, actúa a pesar de la ingesta de café. El café incrementa la sensibilidad de los NERVIOS; VOLVIENDOLOS HIPEREXCITABLES E HIPERSENSIBLES; los sentidos especiales se vuelven SOBRE AGUDOS; las emociones especialmente la alegría y sorpresas agradables, producen síntomas peligrosos. El dolor, contacto, ruido, y los olores se vuelven intolerables. Actividad desusual de mente y cuerpo. Convulsiones en niños durante la dentición, con rechinado de dientes y enfriamiento de extremidades. Convulsiones por exceso de juegos o risa en niños debilitados. Se adapta a personas altas, esbeltas, encorvadas, con complexión obscura; de temperamento colérico. Malos efectos del miedo, susto, decepción amorosa, exceso de fatiga; risa excesiva, viajes largos. Sensación de calor. Gran agitación nerviosa e inquietud. Histeria; gritos, llantos. Dolores intolerables que llevan a la desesperación.

AGRAVACION:

Ruido. Contacto. Olores. Aire; libre, frío. ventoso. Fatiga mental; emociones. Exceso de comida. Alcohol. Noche. Narcóticos. Olores fuertes.

MEJORIA:

Acostándose. Sueño. Calor.

MENTE:

Extasis; lleno de ideas, rápido en acción, así pues, desvelado. Lloro, se lamenta y se revuelca; por nimiedades. Lloro y se ríe fácilmente; mientras llora, de pronto ríe completamente feliz y finalmente llora otra vez. Ahora lleno de alegría, luego abatido. Se resiente por la compasión. Se desmaya fácilmente. Irritable y desvelado. Susto por una sorpresa agradable inesperada. Temblores. Arroja las cosas.

CABEZA.

Parece que el cerebro explotará en pedazos, haciéndose astillas o aplastado. Como si se introdujese un clavo en la cabeza. Clavo. Dolor tirante. La cabeza se siente muy pequeña. Siente y oye un crujido en el vértice. Siens palpitanes, con ardor en los ojos.

OJOS:

Puede leer las impresiones finas con más precisión. Pupilas dilatadas. Ojos brillantes.

OIDOS:

El ruido es doloroso. La escucha es más aguda; escucha aún sonidos distantes. Dureza de oído, con zumbidos como un enjambre de abejas.

NARIZ.

Olfato agudo, sensible. Sangramiento nasal; con pesadez de la cabeza, y mal humor; durante el esfuerzo para evacuar.

BOCA:

Dolor de muelas; > manteniendo agua helada en la boca; < conforme se calienta, se extiende hacia los brazos hasta la punta de los dedos; durante las reglas. Gusto delicado. Salivación; durante el embarazo.

CARA:

Dolor (derecha) radiando. Seca, caliente, con mejillas rojas.

GARGANTA:

Dolor como por un tapón, con constante deseo de tragar. Uvula muy larga.

ESTOMAGO:

Hambre inmoderada; come y bebe con precipitación. El estómago se siente sobrecargado; durante el cólico.

ABDOMEN:

Las ropas oprimen. Dolores abdominales con desesperación (mujeres). Diarrea; en amas de casa por demasiada preocupación por problemas domésticos; durante la dentición.

URINARIO.

Supresión de orina. Micción frecuente, profusa, de orina incolora.

HOMBRES:

Genitales calientes y con comezón.

MUJERES.

Reglas; muy adelantadas y de larga duración. Dismenorrea, grandes coágulos de sangre negra. Comezón voluptuosa en la vulva, pero la vagina y la vulva están demasiado sensibles para frotar o rascar, aversión al coito, por eso. Dolores posteriores al parto. Dolor de muelas; durante las reglas. Dolores severos posteriores al parto (entuetos); con miedo de morir. Ninfomanía.

RESPIRATORIO:

Tos corta, seca, con carraspera constante; por sarampión; en niños nerviosos y delicados.

CORAZON:

Palpitaciones nerviosas, con temblor en las extremidades < por asolearse; después de una alegría excesiva o sorpresa. Elevación súbita de la presión sanguínea.

EXTREMIDADES:

Temblor de manos, no puede mantener una pluma. Neuralgia ciática o crural < movimiento > presión. Torcimiento de las piernas.

PIEL:

Dolorosamente sensible. Comezón- se rasca hasta que sangra.

SUEÑO:

INSOMNIO NERVIOSO; por aflujo de ideas, actividad mental; despierta por, o escucha cada sonido; después de excitación placentera.

FIEBRE:

Afiebrado, con dolor y siempre dispuesto a llorar. Fiebre traumática.

COMPLEMENTARIO.

Aco.

RELACIONES:

Coca; Ign.

COLCHICUM AUTUMNALE

GENERALIDADES:

Afecta marcadamente los MUSCULOS; tejido fibroso, membranas serosas; COYUNTURAS, especialmente las pequeñas. Causa extrema relajación de los músculos; la cabeza cae hacia adelante o hacia atrás cuando el paciente es levantado de su almohada; los brazos caen impotentes. El paciente está DEBIL, FRIO,(internamente), PERO SENSIBLE E INQUIETO. Los dolores son desgarrantes, clavantes, tirantes. Los dolores < por fatiga mental y emociones, el mínimo contacto y vibraciones. Muchas articulaciones están afectadas al mismo tiempo. Areas pequeñas de severo dolor, que cambia rápidamente, pero muy poco inflamadas. Cosquilleo, hormigueo. Afecciones cardio-artríticas. Hidropesía. Hidropericardio, hidrotórax; ascites, hidrometría. Tendencia al colapso; colapso húmedo; debido a deshidratación, por ejemplo, después de vómitos repetidos o purgas. Choque como por electricidad a través de la mitad del cuerpo; < movimiento. Malos efectos de una pena; mal comportamiento de otros; por mojarse; sudor suprimido; noches en vela; estudios pesados. Irritable y sensible a las impresiones, olores fuertes, etc. Hundimiento rápido. Hormigueo. Cualquier pequeña lesión duele terriblemente. Los tropezones sobre los dedos duelen excesivamente. Parálisis después de una súbita supresión de sudor, especialmente de los pies, por mojarse.

AGRAVACION:

Movimiento. Contacto. Noche. Tropezando con los dedos de los pies. Vibraciones. TIEMPO, frío, húmedo. En una habitación húmeda. Por cambios de tiempo. Otoño. La mínima fatiga (mental o corporal). Por estirarse. Por supresión de sudor. Desde la puesta del sol hasta su salida. Pérdida de sueño. Olor de alimentos.

MEJORIA:

Calor. Descanso. Por doblarse en dos. Sentándose. Después de las evacuaciones. Agachándose.

MENTE:

Deprimido; irritable y sensible. Puede leer, pero no comprende un párrafo corto. Memoria débil. Impresiones extremas como una luz brillante, olores fuertes, contacto, las fechorías de otros lo sacan de sus casillas.

CABEZA:

Hormigueo en la frente. Cefalalgia presiva > cena, calor, acostado y quieto.

OJOS.

Pupilas desiguales. Dolor en y alrededor del globo ocular, hacia el occipucio. Lágrimas acres. Variación en agudeza visual. Ojos medio abiertos. Contracción visible del párpado inferior. Disminución de la visión después de leer.

OIDOS.

Oído muy agudo. Comezón en los oídos. Los siente tapados.

NARIZ:

Alas secas y negras. OLFATO MORBIDAMENTE AGUDO; los olores causan náuseas, tanto que lo desmayan. Coriza obstinada.

CARA:

Contraída. Sumida. Hinchazón cosquillante y edematosa; mejillas rojas, calientes y sudorosas. Dolor detrás del ángulo de la mandíbula inferior.

BOCA:

Lengua; roja brillante, pesada, rígida y adormecida, la saca con dificultad. Glositis. Gusto; plano, amargoso. La boca cuelga abierta. Aflujo de saliva con sensación de sequedad. Calor en la boca con sed. Dolor de dientes < frío y calor.

GARGANTA:

Mucho moco verdoso y delgado en la garganta; se viene involuntariamente a la boca.

ESTOMAGO.

Sediente, pero ABORRECE EL OLOR O LA VISTA DE LA COMIDA; > por yacer quietamente. NAUSEA; arcos. Ardor o frialdad de hielo en el estómago; con cólico. Deseo de varias cosas pero aversión a ellas en cuanto las huele. Desea agua serena o bebidas efervescentes. Disgusto por los huevos. Náusea y propensión a vomitar, causada por tragar saliva.

ABDOMEN:

Distendido; se contrae cuando se toca; con incapacidad para estirar las piernas. Ascites, con doblez sobre la región púbica. Diarrea, luego efectos de gota. Evacuaciones; muy dolorosas, ofensivas, coléricas; de moco fragmentado, sanguinolento, gelatinoso, luego tenesmo o espasmos del ano. Colitis mucosa; después de disentería. Disentería otoñal. Dolores cólicos. Dolor de agonía que permanece después de evacuar.

URINARIO:

Entre más necesidad, más descarga de orina. Orina; caliente, altamente coloreada, acuosa, frecuente; sanguinolenta, negra, casi como tinta; sedimentos negros. Albuminuria, diabetes. Nefritis.

HOMBRES:

Edema del escroto.

MUJERES:

Frialdad de los muslos; después de las reglas. Sensación de inflamación en la vulva y el clítoris. Inquietud enfebrecida en el último mes del embarazo.

RESPIRATORIO:

El pecho se siente como retorcido por una mano. Tos nocturna, con salida de orina involuntaria. Gran disnea.

CORAZON:

Punzadas o sensación cortante en el corazón; corazón débil. Enfermedad del corazón; que sigue al reumatismo. Hidropericardio. Disnea cardíaca. Pericarditis. Presión y opresión en la región del corazón > caminando. Pulso, como de hilo, imperceptible.

ESPALDA:

Adolorida > presión y descanso. Tensión en los músculos cervicales que se siente aún por tragar. Dolor violento en la región de los riñones > acostándose sobre la espalda solamente.

EXTREMIDADES:

Miembros fríos. Agujas y alfileres en las manos, y las muñecas; puntas de los dedos entumecidos. Articulaciones rojas, calientes e inflamadas; rígidas; reumatismo cambiante; < por la noche. Inflamación del dedo gordo. No soporta que se lo toquen. Cosquilleo en las uñas de los dedos. Coyunturas de los dedos atrofiadas, dedos flexionados pero en movimiento constante. Las rodillas se golpean una con otra, difícilmente puede caminar. Hinchazón edematosa y frialdad en los pies y las piernas. Nalgas calientes.

PIEL.

Manchas rosa en la espalda, abdómen y pecho. Urticaria. Piel seca, sudor suprimido o profuso.

SUEÑO:

Se duerme mientras lee. Duerme sobre la espalda.

FIEBRE:

Sudor copioso y agrio, que de pronto aparece y se desaparece; reumatismo. Cuerpo caliente, miembros fríos. Sudor frío en la cara. Sudor agrio; nocturno.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Spig.

RELACIONES:

Ars; Carb-v; Ver-a.

COLLINSONIA

GENERALIDADES:

Este remedio produce congestión en los órganos pélvicos, especialmente ano, recto y útero; que termina en hemorroides y constipación especialmente en mujeres. Es útil en afecciones debido a hemorroides o que alternan con hemorroides, principalmente el corazón. Congestión del sistema portal que causa catarro crónico nasal, gástrico y faríngeo. Constipación en los niños por atonía intestinal. Sensación de constricción y sensación de crecimiento que se senten en varias partes y órganos del cuerpo. miembros, vulva, clítoris, etc. Cuando se dá antes de una operación por enfermedad rectal, está indicado para reducir las complicaciones posteriores. Hidropesía por enfermedad cardíaca.

AGRAVACION:

Hemorroides; durante o suprimidas. Noche. Embarazo. Frío. Excitación.

MEJORIA:

Calor. Mañana.

MENTE:

Pesimista.

CABEZA:

Cefalalgia frontal sorda, con constipación o hemorroides o por descarga hemorroidal suprimida.

BOCA:

Lengua amarilla, con gusto amargo.

GARGANTA:

Garganta inflamada de los oradores.

ABDOMEN:

Incomodidad sorda en la región del hígado. Dolor clavante pesado en la pelvis. Diarrea; acre, destruye el cabello. Evacuaciones; de color ligero, grumosas, con mucho esfuerzo. Evacuaciones de moco o negras. Constipación, o hemorroides en el embarazo. Recto; dolorido, arde, parece seco y lleno de astillas o arena; con dolor cardíaco. Hemorroides; sangrantes, crónicas, alternando con síntomas cardíacos, de pecho o reumáticos. Prolapso del ano. Constipación que alterna con diarrea. Diarrea crónica de los niños. Diarrea, después del parto. Constipación obstinada, con hemorroides y evacuaciones duras.

HOMBRES.

Varicocele; con síntomas rectales.

MUJERES:

Prolapso del útero; con hemorroides. Comezón en vulva; con hemorroides; durante el embarazo. Sensación de inflamación de los labios y el clítoris. Dismenorrea; con hemorroides, membranosa. Sensación de frío en los muslos, después de las reglas.

RESPIRATORIO:

Tos por el uso excesivo de la voz. Espujo de sangre después de supresión de hemorroides. Dolores del pecho que alternan con hemorroides.

CORAZON:

Palpitación en sujetos con hemorroides. Después de síntomas de corazón, se mejoran las hemorroides o las reglas regresan.

EXTREMIDADES:

Sensación como si las extremidades estuviesen crecidas. Los miembros inferiores no parecen pertenecerle.

FIEBRE:

Bochornos de calor; con respiración opresiva; con hemorroides.

RELACIONES:

Lycops; Nux-v; Sul.

COLOCYNTHIS

GENERALIDADES:

En la práctica ordinaria, colocynthis se usaba como un purgativo drástico. En la homeopatía no sólo es útil en las afecciones agudas del TRACTO DIGESTIVO E INTESTINOS; sino que también tiene una

acción duradera en los NERVIOS (largos), especialmente TRIFACIALES; CIATICOS y espinales. En el abdómen, produce CALAMBRES SUBITOS Y ATROCES; dolores atenazantes, desgarrantes, que hacen que el paciente se RETUERZA; y grite; o se remueva para mejorarse, o se doble; el paciente presiona algo duro contra el abdómen, los dolores se acompañan de náusea y diuresis y el paciente vomita por el dolor tan intenso. Dolores neurálgicos que son CORTANTES; punzantes, mordientes, desgarrantes y clavantes, seguidos de entumecimiento.; > por la presión. Calambres y retortijones; acortamiento de los músculos; o las partes se sienten muy cortas. Constricciones. Es adecuado para las personas fácilmente encolerizables e irritables; con tendencia a la corpulencia. Para las mujeres de hábitos sedentarios con menstruaciones copiosas. Cisto-espasmos después de operaciones en orificios. Malos efectos de enojos, indignación, disgustos; pena, enfriamientos. Vehemencia excesiva. Torcimientos convulsivos y constricciones, durante el dolor. Sensación de ser enredado en una banda de fierro, y exprimido. Latidos a través de todo el cuerpo. Ardores. Postración, como si toda su fuerza fallara. Desmayos; con dolor y frialdad. Hormigueo en las partes afectadas.

AGRAVACION:

EMOCIONES;

VEJACION; disgustos. Ira. Acostándose sobre el lado no doloroso. Noche, en cama. Corrientes de aire. Por resfriarse. Antes y después de orinar.

MEJORIA:

PRESION DURA;

de canto. Calor. Descanso. Movimiento suave. Después de evacuar o expeler flatos. Doblándose.

MENTE.

Grandemente afectado por las desgracias de otros. Ira, fácilmente vejado durante el dolor. Necesidad de sentimiento religioso. Grita en dolor; quiere caminar, no quiere hablar, contestar. Impaciente. No quiere encontrarse a los amigos. Hosco, se ofende por todo.

CABEZA:

Vértigo cuando voltea rápidamente la cabeza; hacia la izquierda. Dolores en la cabeza < por agacharse, acostándose sobre la espalda y moviendo los párpados, con náusea y vómito. Raíces del cabello dolorosas. Cabeza caliente.

OJOS:

AL agacharse, sensación como de que los ojos se caerán. Dolores violentos antes del desarrollo del glaucoma; los ojos se vuelven duros como piedras. Dolor y estremecimiento de los párpados. Párpados ardorosos.

OIDOS:

Sonido de eco en los oídos. Hormigueo, comezón, punzadas, dolor > por ponerse los dedos dentro del oído.

CARA:

Prosopalgia; con síntomas de ojos o que alternan con dolor en la región celiaca, con escalofrío. Cara distorsionada. Mejillas frías. Dolor en cualquier parte que se refleja en la cara.

BOCA:

Gusto amargo persistente. Ardor en la punta de la lengua. Sensación de escaldadura de la lengua. Los dientes se sienten muy largos.

GARGANTA:

Calambres en el esófago, con eructos vacíos y palpitación en el corazón.

ESTOMAGO.

Vómitos por dolor. Sensación en el estómago como si algo no pudiera pasar; dolor cortante en el estómago. Muy sediento. Vómito de agua amarga. Dolor en el estómago, con dolor en los dientes y cabeza. Disgusto por las papas y alimentos harinosos. Café > cólico.

ABDOMEN:

DOLORES VIOLENTOS, CORTANTES, ATENAZANTES, MORDIENTES, IRRADIANTES, COLICOS; VIENEN EN OLAS; > DOBLANDOSE EN DOS; POR LA PRESION FUERTE; < por el mínimo alimento; o bebida, excepto el café y fumando tabaco. Cólico, con calambre en las pantorrillas, por beber estando acalorado. Dolor cortante en los intestinos, a nivel del ombligo. Presión > el dolor en el abdomen en estado agudo pero cuando el dolor permanece por largo tiempo, las partes se vuelven sensibles y luego la presión < el dolor. Evacuaciones; espumosas, acuosas, fragmentadas, amarillas, ácidas o gelatinosas; con flatulencia y dolor. Evacuaciones disintéricas, renovadas cada vez por la mínima comida o bebida. Burbujas resbalozas que escapan del ano. Durante el cólico los niños permanecen sobre su abdomen y gritan cuando se les mueve levemente. Diarrea acuosa crónica < en la mañana. Diarrea; por dolor, por ira con indignación.

URINARIO:

Ardor a lo largo de la uretra, durante las evacuaciones. Dolor al orinar sobre todo el abdomen. Cólico renal, con diuresis. Cisto-espasmo después de operación en los orificios. Orina; gelatinosa, pegajosa, filamentosa. Cristales rojos, duros, que se adhieren a las vasijas. Orina, lechosa, blanca, se coagula al permanecer; diabetes.

HOMBRES:

Sensación como si todo fluyera hacia los genitales, por ambos lados del abdomen, causando emisiones seminales. Parafimosis.

MUJERES:

Dolor desgarrante en la región ovárica > doblándose en dos, con inquietud. Dismenorrea < comiendo y por beber. Quistes ováricos con dolor > flexionando los muslos contra la pelvis. Supresión de reglas o loquios por indignación. Reglas copiosas en mujeres de hábitos sedentarios. Nódulos dolorosos en las mamas. Tumores ováricos, quistes.

RESPIRATORIO:

Tos corta al fumar tabaco. Dificultad para respirar durante las reglas; tumores ováricos.

CORAZON:

Se siente empujado hacia arriba por un estómago distendido. Latidos fuertes en todas las venas.

ESPALDA:

Dolor bajo la escápula derecha; > presión. Dolor lumbar > presión. Dolores como calambres en las caderas > yaciendo sobre la parte afectada. Cuello rígido < moviendo la cabeza. Como con un peso fuerte en la región lumbo-dorsal > por acostarse sobre el lado izquierdo.

EXTREMIDADES:

Contracción de músculos. Dolor ciático, tirante, como por una banda, clavante > presión, calor; < al mínimo movimiento, rotación, por la noche. Miembros recogidos como erizo. Calambres en los músculos durante el coito. Dolor en el deltoides (d). Las rodillas se sienten rígidas, frías. Pies fríos, con cólico.

SUEÑO:

Insomnio e inquietud, con dolores; después de disgustos.

FIEBRE:

Frialdad en las manos y plantas, resto del cuerpo tibio. Escalofríos y estremecimientos con dolores. Sudores; por la noche, fríos, con olor a orina.

COMPLEMENTARIO:

Caust.

RELACIONES:

Sta.

COMOCLADIA

GENERALIDADES:

Es un veneno irritante como Rhus-t. que causa inflamaciones malignas de la piel, con hinchazón enorme o EDEMA; de la pierna izquierda y pie. Ardor, comezón de los ojos, que se sienten muy grandes. Ojo derecho muy adolorido, se siente grande, más salido que el izquierdo. Neuralgia ciliar. Comezón ardiente de la nariz con estornudos violentos. Dolor bajo el pecho izquierdo o el pezón que se extiende hacia la escápula izquierda, al toser. Dolores reumáticos errantes. Ulceras profundas con orillas duras. Lepra. Piel roja por todas partes. Eczema recurrente.

AGRAVACION:

Contacto. Calor. Descanso. Noche.

MEJORIA:

Al aire libre. Movimiento. Por rascarse.

CONIUM MACULATUM

GENERALIDADES:

Este es el veneno que se supone fué dado al filósofo griego Sócrates para causarle la muerte. Afecta los NERVIOS Y MUSCULOS, causando incoordinación y parálisis; caminado inseguro, habla difícil; el paciente se vuelve gradualmente DEBIL. Acción irregular; desarrollo de síntomas. Pérdida súbita de la fuerza mientras camina. Temblor de todos los miembros. Súbitamente enfermo y débil; con entumecimiento. Util en la ancianidad para aquellas personas que se vuelven viejas pronto; para solteras viejas, para solteros, para jóvenes que sufren los malos efectos de la masturbación. Se afectan principalmente las glándulas, especialmente MAMARIAS y los ovarios con plenitud e INDURACION DE PIEDRA. Sensación como de un tapón; en el cerebro; en el epigastrio. Síntomas ascendentes; parálisis; después de difteria. Dolores desgarrantes, como puñaladas. Neoformaciones. Arterioesclerosis. Neuritis múltiple. Diátesis cancerosa. Pacientes que se < estando ociosos. Paroxismos de histeria e hipocondría por abstinencia sexual o excesos sexuales. Convulsiones histéricas. Malos efectos de contusiones, golpes, sobre-esfuerzos, exceso de trabajo. Pena. Fácilmente intoxicado. Mujeres desgastadas, cansadas de vivir, desanimadas; que sienten como si fueran a llorar; y tragan y se atragantan con un como tapón en la garganta. Debilidad progresiva. Cronicidad. Afligido por las ropas. Desvanecimiento al defecar. Sensación como de un hierro, o banda o algo que aprieta alderredor de alguna parte.

AGRAVACION:

POR VER OBJETOS EN MOVIMIENTO.

ALCOHOL. Por levantar los brazos. Después de fatiga - corporal o mental. Heridas. Abuso sexual o exceso. Continencia. Frío; enfriándose. Vejez. Por acostarse; con la cabeza baja. Volteándose en la cama. Presión de ropa apretada. Sacudidas. Noche. Por estar de pié. Antes y durante las reglas. Aire seco, caliente. Primavera.

MEJORIA:

Dejando que la parte afectada cuelgue hacia abajo. Por agacharse. Moviéndose. Caminando. En el sol. Oscuridad. Presión. Caminando doblado. Por sentarse. Ayunando.

MENTE:

Deprimido, tímido, aversión a la sociedad, pero teme estar solo. Lento para comprender; comprensión difícil. Memoria débil. No hay inclinación para estudiar o los negocios. Indiferente. Dificultad para entender lo que está leyendo. Supersticioso. Incapaz de mantener un esfuerzo mental. Insanía periódica, de tipo alternante. Mientras camina, quiere sujetar a alguien y abusar de él. Las nimiedades le parecen importantes. Piensa que los animales brincan en su cama. Triste; insatisfecha con ella misma y con los que la rodean. No puede pensar después de usar los ojos. Se preocupa poco por las cosas; hace compras innecesarias, las malgasta y se arruina. Le gusta usar sus mejores ropas. Tristeza < por la compasión.

Como si una grave falta pesara sobre él. Temor al estar solo, pero teme a los extraños o la compañía, durante las reglas.

CABEZA:

VERTIGO;

girando; < acostándose; por voltearse en la cama, al menor movimiento de los ojos o cabeza; de ancianos. Puntos calientes en la cabeza. Siens comprimidas < después de las comidas. Sensación como de un bulto en la mitad derecha del cerebro. Cefalalgias enfermantes, con incapacidad para orinar. Dolor en la cabeza desde el sincipucio al occipucio > por agacharse y por mover la cabeza. Sensación de plenitud, estallido en el cerebro durante la cefalalgia. Un lado entumido y el otro frío.

OJOS:

Los siente cruzados. Párpados; pesados, caídos < superficie. Fotofobia y lagrimeo excesivo; sin inflamación o por la más ligera abrasión o ulceración del ojo. Ardor en los ojos. Visión coloreada; roja. Como una franja que cayera sobre los ojos. Visión disminuída en luz artificial. Catarata después de lesión en el ojo. Ptois de los párpados. Sudores al cerrar los ojos. Diplopía. Manchas negras ante los ojos, con vértigo. Miopía. La visión se vuelve borrosa cuando es vejado.

OIDOS:

Acumulación de cerumen como pulpa de papel; o cera dura rojo sangre, causando dureza de oído. Hipersensibilidad al ruido. Glándula parótida hinchada y dura. Los oídos se siente tapados al sonarse la nariz.

NARIZ:

Olfato agudo. Sangramiento fácil, se pica la nariz constantemente. Pólipos. Estornudos frecuentes. Obstrucción tenaz de la nariz.

CARA:

Herpes húmedo y difundido en la cara. Cáncer del labio (por presión de la pipa). Glándulas sub-maxilares hinchadas y duras.

BOCA:

Dolor de muelas < comida fría, no por bebidas frías. Habla difícil por parálisis de la lengua. Cáncer de la lengua. Saliva agria. Deformación de lengua y boca.

GARGANTA:

Como con un cuerpo redondo que ascendiera del estómago (globo). La comida se va por el lado equivocado y se detiene al deglutirla. Paresia del esófago. Inclinación constante a tragar como por un bulto en la garganta < por caminar al aire libre. Amígdalas crecidas.

ESTOMAGO:

Acedías y eructos agrios < al acostarse. Distensión del estómago después de tomar leche. Dolor en el estómago > comiendo pero < pocas horas (2 o 3) después de comer, > en la posición de rodillas-pecho.

Náusea y vómito durante el embarazo. Desea café, sal, cosas ácidas. Aversión al pan. Vómito; de asientos de café, tapones color chocolate o agua ácida y clara. Cáncer, úlcera.

ABDOMEN:

Distensión < después de tomar leche. Dolor cortante antes de pasar flatos. Adolorimiento severo en y alrededor del hígado. Ictericia crónica y dolor en el hipocondrio derecho. Temblor de todo el abdomen. Abdomen duro y distendido. Debilidad trémula, palpitación del corazón después de cada evacuación. Evacuación involuntaria; durante el sueño. Frío; flatos, evacuación. Constipación cada tercer día. Ardor o frialdad en el recto. Dolor hipogástrico que baja a las piernas. Necesidad ineficaz de evacuar.

URINARIO:

Micción interrumpida, la orina se detiene y empieza; > por estar de pié. Goteo en ancianos. Dolor cortante y ardor después de orinar. Dificultad para pasar la orina en el inicio aún estando de pié, luego fluye libremente. La orina se siente caliente.

HOMBRES:

Testículos crecidos. Erecciones imperfectas y de muy corta duración. Descarga seminal, provocada por la mera presencia de una mujer o por tocarla. Nerviosismo sexual, abatimiento; después del coito. Malos efectos de apetito sexual suprimido. Dolor cortante en la uretra mientras el semen pasa. Goteo de líquido prostático < por evacuar, emociones, etc. Comezón en el prepucio. Deseo sexual sin erección. Impotencia.

MUJERES:

Reglas; irregulares; muy tardías; escasas. Dismenorrea, con tirantez en los muslos. Senos crecidos que se vuelven dolorosos antes y durante las reglas, < por cada pisada. Quiere presionar el pecho duro con la mano. Mamas laxas y sumidas con o sin deseo sexual. Tumores duros en las mamas; con punzadas y dolores penetrantes. Cáncer. Punzadas en las mamas y los pezones, al hacer inspiraciones profundas o caminando. Mucha leche antes de las reglas. Leucorrea; blanca, acre; precedida por apretones en el abdomen; después de orinar. Dolor cortante en los ovarios y el útero. Ovarios crecidos e indurados; dolores lancinantes. Ovaritis. Miedo estando sólo, pero teme a los extraños y estar acompañada durante las reglas. Malos efectos de la supresión del deseo sexual, o reglas suprimidas. Movimiento doloroso del niño durante el embarazo. Prolapso del útero por esfuerzos en una evacuación dura. Comezón profunda en la vagina.

RESPIRATORIO:

Tos constante, atormentante, por un punto seco en la laringe o por cosquilleo en el pecho y el hueco de la garganta, < al acostarse, por reírse, hablando y durante el embarazo, tiene que sentarse. La tos parece venir del abdomen. Tos floja sin expectoración, tiene que tragarse lo que tose. Caries del esternón. Necesidad de respirar < mínima fatiga. Las ropas caen como un peso en el pecho y los hombros. Tos al respirar profundamente. Entesamiento del pecho > por toser. Dolor agudo del esternón a la espina.

CORAZON:

Palpitación, < fatiga, bebiendo, por evacuar, etc. Pulso desigual, irregular.

ESPALDA:

Dolor entre los hombros. Lesiones en la espina. Dolores penetrantes en las vértebras lumbares < por estar de pié. Coccigodinia. Tumores pediculares en el centro de la espalda. Cuello frío. Alargamiento del cuello. Crecimientos pequeños, planos como verrugas en las nalgas.

EXTREMIDADES:

Los hombros se sienten magullados; las ropas caen como un peso en ellos. Manos; cansadas, pesadas, temblorosas, inestables. Glándulas axilares crecidas. Uñas amarillas. Dedos y dedos de los pies entumidos. Talones como si un hueso los atravezara. Punzadas en los talones. Sudoración de las manos. Miembros inferiores débiles, como paralizados. Crujidos en las articulaciones de las rodillas. Puede caminar derecho y seguro con los ojos cerrados, pero con los ojos abiertos, se tambalea, se pone mareado y con náuseas.

SUEÑO:

Somnolencia durante el día. Duerme después de medianoche. Pesadillas en sueños.

PIEL:

Verdosa, como por una lesión antigua. Manchas rojas que se vuelven amarillas o verdes. Urticaria por ejercicio corporal violento. Erupciones fétidas o eczematosas. Ulceras gangrenosas. Petequia en ancianos. Anestesia o inactividad de la piel. Espinillas, pequeñas, rojas, ardientes que aparecen con reglas escasas y desaparecen después de las reglas.

FIEBRE:

Frialdad de la nuca, de las pantorrillas, etc. Bochornos calientes; o sudor al caer dormido, o aún cuando apenas se cierran los ojos. Sudor; bajo los ojos, en la barbilla, en el poplíteo; frío en la nuca y palmas; ofensivo, causando picoteos en la piel.

COMPLEMENTARIO:

Pho.

RELACIONES:

Arn; Bar-c; Calc-fl; Caus, Gel; Iod.

CONVALLARIA MAJALIS

GENERALIDADES:

Es útil en las afecciones del corazón. Dilatación del corazón sin hipertrofia compensatoria; cuando la estasis venosa está marcada. Incrementa la acción del corazón, la vuelve más regular. Adolorimiento de la región uterina, con palpitación del corazón. Sensación como si el corazón dejara de latir, luego inicia muy de pronto. Movimiento en el abdomen como por patadas de un niño. Disnea; hidropesía; tendencia anúrica. Corazón del tabaquismo.

AGRAVACION:

Acostado sobre la espalda. Habitación caliente.

MEJORIA:

Al aire libre

COPAIVA

GENERALIDADES:

Actúa sobre las MEMBRANAS MUCOSAS del tracto genito-urinario, y los tubos bronquiales; produciendo descargas excesivas. Supuración FETIDA, BLENORREA; broncorrea.

AGRAVACION:

Mañana. Enfriándose.

MENTE:

Llora al oír un piano.

CABEZA:

Cefalalgia occipital > por la presión leve de la mano. Bochornos de sangre a la cabeza y cara.

OIDOS:

Sensibilidad excesiva a los sonidos agudos.

NARIZ:

Ardiente y seca. Epistaxis, que dura varios días en niños pequeños. Descarga profusa, espesa, fétida.

CARA:

Acné. Desfigura la cara. Cara roja, abochornada.

BOCA:

Catarro crónico de la garganta. Dientes fríos.

ESTOMAGO Y ABDOMEN:

La comida sabe muy salada. Evacuaciones de masas de moco o cubierta con moco. Colitis mucosa.

URINARIO:

Pulsación en el pene. La uretra se siente completamente abierta. Orina acre, escasa, sanguinolenta; olor a violetas. disuria. Catarro de la vejiga. Supuración que asciende por el tracto urinario. Gonorrea purulenta o lechosa y acre.

RESPIRATORIO:

Tos; con esputo profuso, gris, purulento, verdoso y ofensivo. Bronquiestasis. Tos dolorosa, con calor y opresión en el pecho. Ardor en pulmones. Expectorcación fétida y sanguinolenta.

PIEL:

Urticaria, con fiebre y constipación. Urticaria crónica en los niños.

COMPLEMENTARIO:

Sep.

RELACIONES:

Terb.

CORALLIUM RUBRUM

GENERALIDADES:

El coral rojo contiene carbonato de calcio, y óxido de hierro. Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS especialmente de los ORGANOS RESPIRATORIOS; produciendo ulceraciones y descargas filamentosas. Sensación como si aire frío estuviera evaporándose a través del cráneo y los pasajes de aire. El paciente está demasiado frío estando descubierto y demasiado caliente al cubrirse > por calor artificial. Adecuado para personas nerviosas; sífilis y psora.

AGRAVACION:

Inhalando aire; cambios de aire; comiendo. Hacia la mañana.

MENTE:

Irritable, predisuesto a regañar y maldecir por sus dolores.

CABEZA:

Como si la frente estuviese aplanada. Cefalalgia con dolor severo atrás de los globos oculares, < inhalando aire frío. La cabeza se siente grande, vacía, hueca. Como aire frío que soplara a través, cuando la cabeza se mueve despacio o se sacude.

OJOS:

Calientes y dolorosos; bañados en lágrimas al cerrarlos.

NARIZ:

Secreción profusa de moco que cae a través de las coanas posteriores, causando carraspera frecuente. Catarro post-nasal. El aire se siente frío. Epistaxis.

CARA:

Se pone púrpura y negra, con la tos.

BOCA:

La comida sabe como aserrín. El pan sabe a paja. La cerveza sabe dulce. Deseo de sal.

RESPIRATORIO:

Paroxismo casi constante de tos violenta y espasmódica; que se inicia con respiración entrecortada y acompañada de cara púrpura, seguida de vómito de moco filamentosos y fatiga. Tos reverberante tipo pistolita. Tos tan pronto como come. Tos continúa e histérica; o tos cuando el paciente tiene tos aislada a intervalos regulares a lo largo de todo el día. Los pasajes de aire se sienten fríos al hacer inspiraciones profundas. Tosferina.

PIEL:

Ulceras venéreas rojas y planas en el glande y bajo la superficie del prepucio. Psoriasis de las palmas y las plantas. Manchas suaves de color rojo muy profundo; cambiando a color cobrizo.

SUEÑO:

Duerme con la cabeza bajo las cubiertas.

COMPLEMENTARIO:

Sulph.

RELACIONES:

Coc-c.

CORNUS CIRCINATA

GENERALIDADES:

Remedio para la malaria antigua. El paciente está débil y deprimido. Síntomas hepáticos con globos oculares adoloridos. Evacuaciones fétidas, oscuras, con ardor en el ano. Diarrea, ofensiva, oscura, biliosa con complexión cetrina. Eczema vesicular de infantes con boca enrojecida por mamar. Somnoliento antes del escalofrío con calor; después de los alimentos.

AGRAVACION:

Enfriándose. Por la noche.

CRATAEGUS

GENERALIDADES:

Actúa en los músculos del corazón y es un tónico cardíaco; no produce acción acumulativa. El paciente está débil y exhausto, algunas veces, de pronto se pone débil. Casos cardio-hemorrágicos o litémicos. Presión arterial alta. Arterioesclerosis. Colapso por tifoidea. Hemorragia de los intestinos. Disnea. Hidropesía.

AGRAVACION:

Habitación tibia.

MEJORIA:

Descanso. Quietud. Aire fresco.

MENTE:

Irritabilidad, malhumor y melancolía; desesperanza.

URINARIO:

Diabetes, especialmente en niños.

RESPIRATORIO:

Tos con expectoraciones albuminosas.

CORAZON:

DEBIL, con opresión, punzadas e insomnio. Disnea cardíaca. Miocarditis. Válvulas incompetentes. Dilatación cardíaca. Angina de Pecho. Hidropesía cardíaca. Pulso rápido, irregular y pequeño, intermitente. Dolor bajo la escápula izquierda; y bajo la clavícula izquierda.

PIEL:

Erupción ardiente, picante en el dorso del cuello, axilas y barbilla; < calor y sudor > lavándose. Dedos y dedos de los pies, azules.

FIEBRE:

Sudoración excesiva. Palmas sudorosas.

RELACIONES;

Apoc; Strop.

CROCUS SATIVA

GENERALIDADES:

El azafrán afecta los NERVIOS Y LA MENTE, produciendo disposiciones mentales que cambian rápidamente o alternantes; opuestas unas a otras; la ira y la violencia seguidas rápidamente de arrepentimiento abyecto; risa seguida rápidamente de lágrimas. Los síntomas cambian de lugar rápidamente, o los síntomas mentales y físicos se alternan. Contracciones espasmódicas y de tirón de un grupo aislado de músculos. Corea e histeria. Corea cada siete días, con hilaridad y bailes. Postración, debilidad, desvanecimiento; con epistaxis, metrorragia. Somnolencia; > por ocupación literaria. Sensación de cosquilleo, hormigueo, picazón y comezón. Sensación como de algo viviente que se moviera internamente, en el abdomen, pecho, etc. con náusea, desvanecimiento y estremecimiento; o salto en varias partes. HEMORRAGIA -obscura, viscosa, coagulante, que se convierte en cuerdas negras que cuelgan de los orificios sangrantes. Adecuado para personas histéricas. Tumores. Lipomas. Encefaloma. Efecto de lesiones.

AGRAVACION:

Movimiento. Pubertad. Embarazo. Calor. Ayuno. Acostándose. Por leer. Durante la luna nueva y llena. Mirando fijamente.

MEJORIA:

Después del desayuno. Al aire libre. Bostezando.

MENTE:

Impresionable; cariñoso y caprichoso. Vacilante. Disposición cambiante. Manía de reírse. Salta, baila, se ríe, silba, quiere besar a todos. Canta al oír el sonido de una sola nota. Risa y llanto involuntarios; < por la música.

CABEZA:

Latidos, cefalalgia pulsante en el período climatérico, durante las reglas o en lugar de las reglas; > presión.

OJOS:

Secos, ardientes como después de haber llorado; como si aire frío pasara a través de los ojos. Los ojos se sienten como con humo. Debe parpadear y restregarse los ojos constantemente, como si tuviera una película de moco sobre ellos; debe cerrar los ojos fuertemente. Sensación como si viera a través de unos gemelos muy nítidos. Destellos eléctricos o puntos que brincan ante los ojos. Lagrimeo al leer. Espasmos de los párpados superiores.

OIDOS:

Ruidos en los oídos con dureza de oído, < agachándose.

NARIZ:

Nariz sangrante; filamentos de sangre oscura que cuelgan de la nariz; con desmayos y sudor frío en la frente. Epistaxis en la pubertad; de jovencitas.

CARA:

Caliente, roja o alternando con palidez.

BOCA:

Calor inusual en la boca. Gusto ácido. Olor fétido.

GARGANTA:

Sensación como si la úvula estuviese alargada, durante y cuando no se traga; en histeria. Sensación de náusea en garganta y pecho.

ESTOMAGO Y ABDOMEN:

Sed excesiva por bebidas frías. Sensación como si algo vivo brincara en el estómago y abdomen (lado izquierdo). Las heces contienen filamentos de sangre oscura. Constipación obstinada; de infantes. Hormigueo y punzadas en el ano. Problemas gástricos, hinchazón, eructos, vómitos, etc. después de operación de hemorroides.

HOMBRES:

Excitación del deseo sexual.

MUJERES:

Reglas; oscuras, fétidas y filamentosas. Amenaza de aborto. Hemorragias uterinas < al menor movimiento; < durante la luna llena o nueva. Metrorragia. Dolor que brinca en el pecho izquierdo, como si lo jalaran hacia atrás; como algo vivo que brincara en el pecho derecho. Falso embarazo. Movimientos de feto violentos y dolorosos.

RESPIRATORIO:

Tos seca > poniendo la mano sobre el hueco del estómago. Expectorcación filamentosa como cuerda. Pesadez en el pecho, debe respirar profundamente.

CORAZON:

Sensación de calor que asciende al corazón impidiendo la respiración > bostezando. Punzadas sordas en el pecho izquierdo. Palpitación ansiosa < por ascender escaleras.

ESPALDA:

Sensación súbita de frialdad, como si se arrojara agua fría sobre él.

EXTREMIDADES:

Crujido en la articulación de la cadera y las rodillas, < por agacharse. Frías como hielo; metrorragia, epistaxis.

PIEL:

Comezón y hormigueo. Enrojecimiento escarlata en manchas sobre la piel; cicatrices antiguas que se abren y supuran. Tumores dispersos. Lipoma. Encefaloma.

SUEÑO:

Sueño profundo. Canta en sueños.

FIEBRE:

Bochornos de calor interno, con comezón y hormigueo en la piel. Sudor sólomente en la parte inferior del cuerpo. Sudor continuo de olor fétido, < por debilidad; hemorragias después del parto.

RELACIONES:

Ign; Tarn.

CROTALUS HORRIDUS

GENERALIDADES:

El veneno de la víbora de cascabel afecta la SANGRE; corazón; hígado. Produce un choque nervioso profundo; con enfermedad mortal, temblores y postración. Se cansa fácilmente por el mínimo esfuerzo. Parálisis; post-diftérica, de los insanos. Causa desorganización de sangre y tejidos. HEMORRAGIAS que son lentas, rezumantes, de sangre delgada y oscura que no coagula; por todos los orificios; y superficies, especialmente de la laringe. Sudor de pus sanguinolento. Los tejidos se descomponen rápidamente produciendo CONDICIONES MALIGNAS y pútridas. Partes azulosas u oscuras. Condiciones sépticas, anginas; bocio, úlceras, abscesos, diviesos sangrantes. Petequia. Gangrena. Neuralgia como secuela de una sepsis. Biliosidad crónica, condiciones climatéricas. Desmayos. Convulsiones; epilepsia; con temblor de miembros, espuma en la boca, gritos violentos, delirio. Peste. Fiebre amarilla. Ictericia. Ardor general. Olores rancios; de secreciones. Esclerosis; múltiple, lateral. Atrofia muscular progresiva. Adecuado para constituciones enfermizas y problemas nutricionales de los ancianos. Malos efectos de un susto; sol; rayos; agua descompuesta; efluvios nocivos. Afecta el lado derecho. Edema general o de la parte afectada.

AGRAVACION:

Por acostarse sobre el lado derecho. Al caer dormido. Por el tiempo templado. Primavera. Húmedo y mojado. Anualmente. Sacudidas. Al despertar.

MEJORIA:

Luz. Movimiento.

MENTE:

Humor llorón. Memoria débil; no se puede expresar correctamente. Habla quejumbrosa. Tímido. Temor al mal. Errores al escribir. Delirio; murmuración; masculla; se confunde y tropieza con sus palabras; tremens. Melancolía. Tristeza. Pensamientos que hacen hincapié en la muerte. Demencia senil;

incipiente, olvida, números, nombres y lugares, o sospecha de sus amigos, o piensa que está rodeado de enemigos o animales que se esconden. Antipatía por su familia. Irritable y malhumorado.

CABEZA:

Vértigo con desvanecimiento; debilidad; temblores. Dolor en el occipucio; como por un golpe; en oleadas desde la espina. Dolor severo al centro de la frente. Cefalalgia, con dolor en el corazón al acostarse sobre el lado izquierdo. Cefalalgia < por sacudidas, debe caminar sobre la punta de sus dedos.

OJOS:

Ardorosos, rojos; con lagrimeo. Color amarillo del ojo. Neuralgia como si se hubiese hecho un corte alderredor del ojo. Absorbe la hemorragia intraocular especialmente la no inflamatoria; retinal. Ambliopía, por pena o por uso excesivo de la visión.

OIDO:

Vértigo auditivo. Sangre rezumante del oído.

NARIZ:

Epistaxis especialmente durante la difteria; u otras enfermedades sépticas. Ozena; sifilítica; por exantemata. Punta de la nariz azul y roja.

CARA:

Desfigurada al despertar. Labios; hinchados; rígidos y adormecidos. Cara oscura, embrutecida. Cara amarilla; palidez como de muerte. Trismo. Acné; de masturbadores o borrachos; con reglas retrasadas.

BOCA:

Aliento rancio. Rechina los dientes; por la noche. Lengua; amarilla, hinchada, salida; a la derecha. Se llena de saliva. Saliva sanguinolenta, espumosa. Cáncer; de la lengua, con hemorragia. Paladar rígido. No puede hablar debido a la sensación de constricción alderredor de la lengua y garganta.

GARGANTA:

Seca y con sed. Constricción sólida. Dificultad para deglutir cualquier sólido. Garganta gangrenosa, hinchada.

ESTOMAGO:

Desea; puerco, estimulantes, azúcar. Vómitos; biliosos; verdes como pasto; no puede retener nada. No puede soportar las ropas alderredor de su estómago. Vómito, purga y micción simultáneamente. Cáncer, úlcera, del estómago; vómitos al acostarse sobre el lado derecho. Vómitos de sangre; negra. Náusea y vómito mensuales; después de las reglas.

ABDOMEN:

Hinchado, caliente, sensible. Peritonitis. Glándulas inguinales crecidas. Sangramiento del ano al estar parado y caminando. Heces; negras, delgadas, ofensivas. Absceso perineal. Ictericia; hemática, maligna. Frialdad en el estómago o abdomen como por un pedazo de hielo. Dolor en el hígado y punta de los hombros. Hemorragia intestinal.

URINARIO:

Orina oscura, sanguinolenta; albuminosa; escasa, amarillo-verdosa. Hematuria, con cáncer de vejiga o próstata.

MUJERES:

Dismenorrea, con dolor en el hipogastrio, hacia los muslos, con adolorimiento en la región del corazón. Sensación como si el útero se cayera. Fiebre puerperal. Loquios ofensivos. Flegmasía alba dolens < contacto.

RESPIRATORIO:

Respiración ansiosa, trabajosa. Tos, con esputo sanguinolento de olor rancio. Opresión en los ancianos.

CORAZON :

Débil, tiembla; flojo, se voltea. Palpitación durante las reglas. Corazón sensible al acostarse sobre el lado izquierdo.

EXTREMIDADES:

Brazos y piernas que se ponen entumidos; primero uno y luego el otro. Dolor en la punta de los hombros. Parálisis del lado derecho. Parálisis de la pierna y mano izquierdos. Al coser, la mano se siente como muerta. No puede mantener las piernas quietas.

PIEL:

Amarilla; ictericia, septicemia. Púrpura hemorrágica. Diviesos sangrantes, carbúculos; felones. Cicatrices antiguas se abren nuevamente. Edema alderredor de la parte afectada. Piel; fría y seca. La piel muestra cada tinte de color.

SUEÑO:

Somnoliento, pero no puede dormir. Insomnio por agitación nerviosa. Sueños horribles, de muertos. Despertar sofocante después.

FIEBRE:

Fiebres malignas, fiebres altas; fiebre amarilla; meningitis cerebro-espinal. Fiebre de agua negra. Sudor frío; sanguinolento.

COMPLEMENTARIO:

Lycops.

RELACIONES:

Lach; Sul-ac.

CROTON TIGLIUM

GENERALIDADES:

Fué usado como un poderoso purgante e irritante de la piel en la práctica ordinaria; así es que afecta las membranas mucosas del intestino, causando descargas acuosas. Están especialmente afectadas la piel de la CARA y el escroto. Tiene una sensación peculiar como si las partes estuviesen jaladas hacia atrás, ojos, pezones, etc. Los síntomas de piel se alternan con síntomas internos, diarrea, etc. La piel se siente restirada.

AGRAVACION:

POR BEBER;

el mínimo alimento. Por bañarse. Verano. Contacto. Movimiento. Erupciones que retroceden.

MEJORIA:

Después del sueño. Por frotarse con suavidad.

MENTE:

Sentimiento de ansiedad; como si un infortunio personal pendiera sobre él. No dispuesto a trabajar. No puede pensar nada fuera de sí mismo. Se siente gastado. Hosco, insatisfecho.

CABEZA:

El peso del sombrero le causa dolor de cabeza. Vértigo < por beber.

OJOS:

Oftalmía purulenta; apariencia roja y como en carne viva. Pústulas en la córnea, con erupción alderredor de los ojos. Los ojos se sienten jalados hacia atrás. Dolor de tensión sobre las órbitas (derecha).

OIDOS:

Otorrea, cuando hay mucha comezón.

CARA:

Erupción pustular en la cara. Como si insectos reptaran sobre ella.

BOCA:

Neuralgia de la lengua. Ardor en el esófago.

ESTOMAGO:

Náusea excesiva, con desvanecimiento de la vista.

ABDOMEN:

La presión en el ombligo causa dolor en el recto y necesidad de evacuar. Dolor en el ano como si un tapón se forzara a salir. Gorgoteo o chapoteo como de agua en los intestinos; SEGUIDO DE EVACUACIONES SUBITAS PROFUSAS BORBOLLANTES DE AGUA AMARILLA, < por beber la mínima cantidad o mientras se come; luego postración. Diarrea de verano. Cólera infantil. Cólico > por la leche caliente.

URINARIO:

Micción nocturna; espumosa, de color naranja oscuro, turbia, al estar de pié, con partículas grasosas que flotan en la superficie. La orina de día es pálida con sedimento blanco.

HOMBRES:

Eczema del escroto. Erupciones vesiculares en el escroto, y pene. Testículo izquierdo retraído, el derecho cuelga.

MUJERES:

Comezón intensa en los genitales > por una frotación suave. Dolor del pezón a la espalda cuando el niño se amamanta. Nódulos en las mamas; con dolor del pezón a la escápula. Seno duro, hinchado. Pezones muy sensibles al contacto.

RESPIRATORIO:

Tos tan pronto como toca la almohada, debe sentarse. Siente como si no inhalara suficientemente profundo. No puede expandir los pulmones.

EXTREMIDADES:

Cuello y hombros dolorosos.

PIEL:

La siente restirada, tensa. Comezón violenta, ardiente, piel roja; adolorida si se rasca > frotando suavemente. Erupciones pustulares, ampollas, en racimos; que se revientan y forman costras < genitales, sienes, vértice. Herpes-zoster. Eczema.

RELACIONES:

Rhus-t.

CUBEBA

GENERALIDADES:

Produce catarro de las membranas mucosas de la URETRA; vejiga; vagina. Ardor como de carne viva que se siente en la garganta, el estómago, abdomen, recto, uretra, fosa navicular. Descargas; espesas, acres, amarillas, como de pus, verdes, ofensivas, después de inflamación violenta. Adecuada para personas de constitución biliosa, con tendencia a la constipación.

AGRAVACION:

Por la noche, en la cama.

MEJORIA:

Levantándose y caminando.

CABEZA:

Las venas de la frente y sienes están distendidas.

BOCA:

Al tratar de sonreír o hablar, la boca parece torcerse hacia un lado.

GARGANTA:

Traga saliva constantemente para mejorar el ardor y la resequedad de la garganta. Catarro.

ESTOMAGO:

Deseo de naranjas, cebollas, almendras y nueces.

ABDOMEN:

Ardor en el estómago y abdomen. Heces; gelatinosas de moco transparente, mezcladas con partículas como arroz, blanquizas, brillantes < noche en la cama > levantándose y caminando. Heces frías.

URINARIO:

Calambres, dolor cortante y ardiente en la uretra, después de orinar. Cistitis. Prostatitis con descarga espesa amarilla. Gonorrea filamentosa.

MUJERES:

Uretro-vaginitis, crónica, con descarga profusa. Leucorrea acre en niños.

RESPIRATORIO:

Catarro de la nariz y garganta con expectoración fétida.

RELACIONES:

Cist. Cop.

CULEX MUSCA (Mosquito)

GENERALIDADES:

Produce vértigo al sonarse la nariz. Sensación como de aire frío que soplara a través de un agujero en las ropas en el pecho o la espalda. Las reglas manchan indeleblemente. Dolor atroz bajo las caderas, luego al vientre. Inflamaciones edematosas.

CUNDURANGO

GENERALIDADES:

La planta del Cóndor fué introducida como un remedio canceroso. Grietas dolorosas en las comisuras labiales es un síntoma guía en condiciones cancerosas o sifilíticas. Tumores; estricturas del esófago. Cáncer del estómago, con ardor constante y vómito; el alimento parece adherirse detrás del esternón. Cáncer de las mamas con retracción de los pezones, con dolores lancinantes que emanan de un tumor que está sobre todo el seno. Ulceras dentadas de la lengua. Este remedio conviene probarlo cuando otros aparentemente indicados fallan.

RELACIONES:

Ast-r; Con; Hyds.

CUPRUM ACETICUM

GENERALIDADES:

La cabeza se tambalea cuando se está en un cuarto de techo alto. Neuralgia facial en el pómulo, mandíbula superior y detrás del oído > por masticar; presión y aplicaciones calientes. Corea; periódica, con melancolía y temor a la sociedad. Psoriasis crónica y erupciones de tipo leproso sobre todo el cuerpo, en manchas de varios tamaños, sin comezón. En epilepsia, el aura se inicia en la rodilla y asciende al hipogastrio. Parto prolongado.

AGRAVACION:

Calor. Movimiento. Emociones mentales. Contacto.

MEJORIA:

Por masticar. Presión. Calor.

CUPRUM ARSENICUM

GENERALIDADES:

Produce inflamación del TRACTO DIGESTIVO; con cólico violento, vómito, diarrea y uremia; calambres en el pecho, dedos, pantorrillas, dedos, etc. Neuralgia visceral- dolores abdominales agudos y tirantes. Heces como agua de arroz; cólera infantil. Corazón débil. Sudor frío, pegajoso, intermitente. Convulsiones; urémicas; o precedidas de síntomas gastro-intestinales. Calambres de la pierna >

presionando el pié en el suelo. Sensación de entumecimiento paralizante en las piernas. Corea después de susto. Temblor de todo el cuerpo al intentar caminar. Orina de olor a ajo.

AGRAVACION:

Contacto. Presión. Humedad. Movimiento.

CUPRUM METALLICUM

GENERALIDADES:

El cobre metálico es uno de los remedios más importantes, cuando la condición de enfermedad "Golpea" debido a la no aparición o supresión de erupciones y descargas. Afecta los NERVIOS, del eje cerebro-espinal y músculos, causando EFECTOS ESPASMODICOS; convulsiones y calambres de forma violenta. Las convulsiones pueden ser tónicas o clónicas; inician en las rodillas, dedos de los pies o de las manos y radían a todo el cuerpo; con gritos agudos, torcimiento de la cabeza hacia un lado; trismo, seguido de cefalalgia, risa espasmódica, estremecimientos, fatiga mortal, sudoración fría, etc. epilepsia; por la noche, durante las reglas. En la epilepsia, el paciente cae con un grito, orina y defeca; el dolor de cabeza sigue después de espasmos o un grupo de síntomas seguidos a la apariencia de que el paciente está muerto o en un estado de éxtasis. Convulsiones de niños, durante la dentición; niños que se acuestan sobre el abdomen y levantan las nalgas. Espasmos, con cara azul y pulgares encogidos. Los calambres pueden aparecer en el pecho; (angina de pecho) detrás del esternón, dedos de pies, dedos de manos, pantorrillas - donde los músculos están anudados > estirando la pierna hacia afuera; en las plantas, etc. gritos fuertes. Espasmos; durante el sueño. Dolores < contacto y movimiento. Los dolores son presivos; como por un golpe, con quebradura; punzadas atormentantes a través de todo el cuerpo. Corea por susto; periódica. Los síntomas aparecen en grupos; periódicamente o recurren a intervalos cortos. Molestias que inician sobre el lado izquierdo. Temblor nervioso, con sentidos agudos. Debilidad continua. Reacción pobre. Latencia. Malos efectos de fatiga mental o corporal; pérdida del sueño. Azulosidad. Recaídas fáciles. El paciente es hipersensible; cada droga sobre-actúa sin curar. Colapso. Parálisis de músculos aislados. Mujeres que han dado a luz muchos niños (entuerteros).

AGRAVACION:

Emociones; ira, susto. Supresiones. Fatiga mental y corporal. Movimiento. Contacto. Pérdida de sueño. Clima caliente. Vómitos. Levantando los brazos. Antes de las reglas. En la luna nueva.

MEJORIA:

Por ser magnetizado, por poner la mano sobre la parte afectada. Por bebidas frías. Presión sobre el corazón.

MENTE:

Nervioso. Inquieto. Dice palabras sin intención. Chillidos agudos. Gime violentamente. Risa convulsiva. Delirio; sudor frío. Miedo a la sociedad; esquiva a todos. Confusión; miedo de todo aquél que se le acerca. Locuaz; luego melancolía; con ratos de miedo a la muerte. Sensación de perder la

conciencia. Ataques de rabia; quiere morder a los que lo rodean. Hosco; tramposo; alterna consentimiento con testarudez. Malicioso. Manía; muerde, golpea, rompe las cosas. Imita; hace mímica.

CABEZA:

Vértigo: con temblores internos, la cabeza se hunde hacia adelante sobre el pecho > evacuar; acostándose, < mirando hacia arriba. No puede mantener la cabeza erecta o la entierra en la almohada; meningitis. Cosquilleo extraño, hormigueo en el vértice (reglas suprimidas). Sensación de vacío, con dolor. Cefalalgia después de epilepsia. Sensación como si se vertiera agua sobre la cabeza, con cefalalgia. Se jala el cabello. Agita la cabeza de un lado a otro.

OJOS:

Fijos, brillantes, hundidos, resplandecientes, volteados hacia arriba. Globos que rotan rápidamente detrás de párpados cerrados, o rotan de un lado a otro. Dolor magullante en las órbitas < por mover los ojos. Párpados cerrados espasmódicamente. Torcimiento de los párpados (i) y fotofobia.

CARA:

Azul, lívida; pálida o distorsionada; hundida, contraída. Frialdad de hielo. Labios azules. Trismo. Movimiento de masticación de la mandíbula inferior.

BOCA:

Cerrada firmemente o abierta, con lengua que entra y sale como una serpiente (en convulsión). Rechina los dientes. Gusto viscoso, o de dulzor metálico. Pérdida del habla; tartamudeo; parálisis de la lengua. Espuma de la boca. El alimento sabe como agua clara.

GARGANTA:

Incapaz de hablar debido al espasmo de la garganta. Ruido de gorgoteo al tragar líquidos.

ESTOMAGO:

Deseo de bebidas frías. La leche provoca aflujo de agua. Hipo; antes de vomitar; convulsiones o asma. Náusea, más pronunciada. Vómito; violento, atormentante; con cólico de agonía; diarrea; estremecimientos o convulsiones; > bebidas frías. Presión acalambante y dolorosa en el epigastrio < contacto y movimiento. Se acuesta sobre el estómago y levanta las nalgas (cólico, convulsión). Vómitos siempre al despertar por la a.m. Vómitos por el menor movimiento. Ataques periódicos de vómito. Como si hubiera algo amargo.

ABDOMEN:

Tenso, contraído, caliente y sensible al tacto. Cólico atemorizante, con contracción del abdomen. > presión; < levantando los brazos. Intususcepción; con vómito fecal. Diarrea; profusa; sale a chorros; de agua verde. Cólera; diarrea de verano en los niños. Lombrices; redondas, tenias, intestinales. Constipación, con gran calor del cuerpo. Movimientos espasmódicos, de los músculos abdominales. Cirrosis del hígado.

URINARIO:

Supresión de la orina (en cólera); urémica. Pasa orina de agua clara durante o después de los espasmos.

HOMBRES:

Calambres en las pantorrillas que impiden el coito, especialmente en ancianos o hombres jóvenes y nerviosos.

MUJERES:

Reglas ausentes debido a supresión de sudor de pies. Calambres violentos en el abdomen que se extiende al pecho antes o durante las reglas; o por supresión de reglas; convulsiones antes de las reglas. Convulsiones puerperales con boca abierta y opistótonos. Entuertos de lo más angustiosos, especialmente en mujeres que han tenido muchos niños.

RESPIRATORIO:

Espasmo de la glotis. Disnea - no puede soportar nada cerca de la boca < tosiendo, riéndose, doblándose hacia atrás, antes de las reglas. Asma; hipo; antes; alternando con vómito espasmódico. Tos, en paroxismos violentos. Tose hasta quedarse sin respiración; con calambres, lagrimeo; toserina. Constricción dolorosa del pecho (bajo). Estertores ruidosos en el pecho. Temblores después de toser y por permanecer quieto. Ronquera < respirando aire frío. Afonía intermitente en cantantes profesionales.

CORAZON:

Angina, con síntomas asmáticos y calambres. Palpitación antes de las reglas. Pulso lento, duro, lleno y rápido.

CUELLO Y ESPALDA:

Parálisis de todos los músculos hasta el cuello.

EXTREMIDADES:

Torcimiento en las manos y pies. Encogimiento de los pulgares hacia las palmas. Calambres en las palmas, pantorrillas y plantas. Articulaciones contraídas. Tobillos con pesadez dolorosa. Rodillas; el aura se inicia allí; se sienten como rotas. Anquilosis de la articulación del hombro. Las rodillas se doblan involuntariamente al caminar, tirándolo.

PIEL:

Erupciones suprimidas o no desarrolladas. Ulceras; puntos y barros pruriginosos en el pliegue de las articulaciones. Comezón severa sin erupciones. Erupciones escamosas amarillas (en el doblar del codo). Psoriasis crónica. Lepra.

SUEÑO:

Sueño profundo; con estremecimientos en el cuerpo. Rugido constante del abdomen durante el sueño.

FIEBRE:

Frialdad de hielo en la piel. Frío. Sudor; frío, pegajoso, por la noche; olor agrio, después de las convulsiones.

COMPLEMENTARIO:

Calc.

RELACIONES:

Ver-a.

CURARE

GENERALIDADES:

Es un veneno muscular; causa parálisis de los músculos sin sensaciones de deterioro y con conciencia. Sensación como si el cerebro estuviese lleno de líquido. Las descargas son fétidas. Parálisis; facial, bucal, amenazando la respiración; pseudo-hipertrófica. Diabetes mellitus. Catalepsia. Lepra. Como si un peso grande colgara de las partes- brazos, piernas, etc.

AGRAVACION:

Movimiento. Humedad. Clima frío. 2 a.m. Lado derecho.

CYCLAMEN

GENERALIDADES:

Afecta el tracto digestivo y los órganos sexuales femeninos; produciendo perturbaciones en la VISION o vértigo, debido a desórdenes gástricos o menstruales. Personas anémicas. No inclinadas a trabajar y que se fatigan fácilmente. Teme al aire libre. Dolores presivos en los huesos cubiertos ligeramente. Dolores punzantes. Malos efectos de una pena interna y terror de conciencia.

AGRAVACION:

Frío. Tarde. Sentándose. Por estar de pié. Aire fresco. Grasas.

MEJORIA:

Movimiento. Durante las reglas. Por frotar. Habitación tibia. Limonada. Llorando. Lavando la parte.

MENTE:

Torpe, somnoliento y malhumorado. Sensación de alegría que alterna con irritabilidad. Auto-reproches. Tristeza, como si hubiese cometido un acto reprobable o no hubiese hecho su deber. Llanto silencioso. La habitación parece muy pequeña. Alucinaciones, como si dos personas estuviesen acostadas en su cama. Lloroso y preocupado por penas imaginarias. Piensa que está sóla y perseguida.

CABEZA:

Vértigo - los objetos giran en círculos o parecen pálidos, < al aire libre; > en una habitación, y sentándose. El cerebro se siente como envuelto en una ropa. Cefalalgias, con destellos delante de los ojos, > por agua fría. Dolor en la sien izquierda. Migraña prolongada. Como si el cerebro se tambaleara al caminar; reglas ausentes o escasas.

OJOS:

Visión disminuída, con cefalalgia. Flamas, resplandores o manchas negras, bizqueo especialmente conectado con irregularidades menstruales. Bizqueo convergente, después de convulsiones; el ojo izquierdo está tirado hacia adentro. Vé infinidad de estrellas. Diplopía. Hemiofía.

OIDOS:

Comezón en los oídos, con cerumen aumentado.

NARIZ.

Estornudos con comezón en el oído. Pérdida del olfato.

CARA:

Pálida, anémica. Labio superior como entumido o indurado.

BOCA:

Gusto perdido o salado, que se extiende a todos los alimentos. La comida sabe demasiado salada. Saliva salada.

ESTOMAGO:

Saciedad después de pocos bocados; aversión y náusea por el mínimo alimento después. Pérdida del apetito después de tomar caldo de res o una taza de té. Eructos hiposos. Hipo; < embarazo; con bostezos. Náusea que se siente en la garganta. Hiperémesis; del embarazo. Deseo de limonada; de cosas incomibles. El puerco desagrada. Deseo de sardinas. Aversión al pan, mantequilla, carne grasas y cerveza.

ABDOMEN:

Diarrea < café. Movimientos en los intestinos como si hubiera algo vivo. Dolor cerca del ano y perineo como si un punto supurara < por caminar o sentarse.

URINARIO:

Orina profusa, acuosa y frecuente.

HOMBRES:

El prepucio y la corona del pene se siente dolorida después de un ligero frotamiento. Punzadas y presión en la próstata, con necesidad de evacuar y orinar.

MUJERES:

Reglas; profusas, negras, cambiantes, membranosas, con coágulos, muy adelantadas, con dolores como de parto, desde la espalda al pubis, menor cuando se mueve. Dismenorrea. Hemorragia post-parto

dolorosa > después de un borbotón de sangre. Reglas suprimidas. Hinchazón del seno, con secreción de leche después de las reglas. Parece como si saliera un flujo de aire de los pezones. Leche en seno virgen, en mujeres no embarazadas. Supresión de reglas después de bailar en exceso o por haberse sobre-acalorado. Leucorrea con reglas retardadas o escasas.

RESPIRATORIO:

Tos sin despertar.

CORAZON:

Palpitación frecuente por reglas suprimidas.

EXTREMIDADES:

Dolores en las partes donde los huesos están cercanos a la superficie. Tobillos sensibles y ardientes, > por caminar < por sentarse, o estando de pié. Debilidad de las rodillas. Calambres como contracciones lentas del dedo pulgar derecho o del índice; deben estirarse por la fuerza. Espasmo de los escritores.

SUEÑO:

Soñador; atemorizante; lascivo.

PIEL:

Acné en mujeres jóvenes. Prurito > por rascarse y a la aparición de las reglas, < por la noche en cama.

FIEBRE:

Escalofrío por todos lados, no > por cubrirse. Sudor ofensivo.

RELACIONES:

Pul.

DAPHNE INDICA

GENERALIDADES:

Actúa en los tejidos inferiores - músculos, huesos y piel. Torcimientos súbitos relampagueantes en diferentes partes del cuerpo. Deseo de tabaco. Las partes del cuerpo se sienten separadas. Dolores magullantes. Descargas fétidas - aliento, orina, sudor. Fatiga. Exóstosis, con dolores punzantes, presivos o sordos < por la noche.

AGRAVACION.

Aire frío. Luna menguante. Por la tarde, en la cama.

MENTE:

Triste. Ausencia de mente e indecisión. Abatido. Agitado.

CABEZA:

Como separada del cuerpo, la siente grande. Hinchazones nodulares suaves en los huesos cerca del vértice, dolor < por la noche y al contacto.

BOCA:

Lengua cubierta en un lado solamente. Saliva; caliente, de olor fétido.

ABDOMEN:

Evacuaciones escasas, sangrantes, al final.

URINARIO:

Orina; espesa, turbia, amarilla, fétida como de huevos podridos.

HOMBRES:

Prostatorrea < tabaco. Erección durante dolor de muelas. Dolor de muelas después del coito.

EXTREMIDADES:

Dolores tirantes que cambian rápidamente; hacia arriba al abdomen y corazón. Nalgas frías.

SUEÑO:

Insomnio por dolorimiento de los huesos. Sueños de gatos negros.

FIEBRE:

Sudor pegajoso; ofensivo.

RELACIONES:

Rhus-t.

DICTAMNUS

GENERALIDADES:

Actúa en los órganos femeninos. Las secreciones están incrementadas. Sensación como de un tapón que subiera hasta la garganta. Emisiones frecuentes de flatos copiosos y ofensivos. Secreción de orina aumentada. Prolapso con vómito violento < por permanecer de pié. Reglas; tempranas con coágulos negros; precedidas de ceguera. Sensación de leche que fluyera hacia las mamas. Calambres de los

muslos exteriores hacia el útero antes de las reglas. Leucorrea profusa y corrosiva con tenesmo. Sonambulismo. Sueños de que une piezas de los cuerpos de sus niños.

AGRAVACION:

De pié.

RELACIONES:

Pul.

DIGITALIS

GENERALIDADES:

El Digital es un remedio para el corazón. Afecta también el hígado, pulmones, estómago y órganos genito-urinaros. Debería tomarse en cuenta en todas las enfermedades donde el corazón está involucrado principalmente, con pulso anormalmente LENTO, irregular o intermitente, junto con síntomas indefinidos y sin causa. GRAN DEBILIDAD, apenas puede hablar; hundimiento de fuerza, desvanecimiento; frialdad de la piel y respiración irregular son otros síntomas de problemas orgánicos del corazón. Hipertrofia del hígado, con induración e ictericia, pide Dig. cuando el pulso característico está presente. El pulso es lento en una posición reclinada, y rápido en movimiento; irregular y dicrótico al sentarse. Pulso lento después de abuso sexual o en la pubertad. Debe caminar por allí, con ansiedad precordial; con necesidad de orinar. Cianosis. Hidropesía, con supresión de la orina. Como choques eléctricos que pasaran por el cuerpo. Postración por el mínimo ejercicio. Malos efectos del buen vivir. Abuso o exceso sexual. Alcohol.

AGRAVACION:

Ejercicio. Levantándose. Yaciendo sobre el lado izquierdo. Movimiento. Olor de la comida. Frío; bebidas, alimento, clima. Calor. Abuso o exceso sexual. Música.

MEJORIA:

Descanso. Aire fresco. Acostado sobre la espalda. Estómago vacío. Sentándose derecho.

MENTE:

Ansioso por el futuro. Tristeza; con insomnio, por un amor infeliz; por la música. Pensamientos lascivos en ancianos, con próstata crecida. Temeroso. Siente que podría volar en pedazos. Temor de sofocarse por la noche. Desea estar solo. Abatido. Cualquier golpe lo siente en el epigastrio. Gran ansiedad, como por problemas de conciencia.

CABEZA:

Vértigo; al caminar, o montar, con temblor, < al levantarse; por afecciones hepáticas o cardíacas. Cefalalgia frontal hacia la nariz, después de beber bebidas frías o comer helados. Estallidos en la cabeza al caer dormido. Entierra la cabeza en la almohada; se jala el cabello. Hemicrania espástica. La cabeza cae hacia atrás mientras está sentado o al caminar.

OJOS:

Amarillentos, rojos. Lagrimeo < en luz brillante o aire frío. Los objetos parecen ya verdes, ya amarillos. Los dos ojos están volteados hacia la izquierda. Desprendimiento de retina. Pupilas irregulares. Diplopía. Párpados azules. Venas distendidas en los ojos.

OIDOS:

Silbido en el oído como de agua hirviendo. Venas distendidas en los oídos.

NARIZ:

Dolor en la raíz de la nariz, después de vomitar.

CARA:

Pálida, azulosa; labios azules. Venas distendidas. Labios secos.

BOCA:

Lengua azul; limpia, con náusea y vómito. Lengua gruesa y floja. Gusto amargo. Gusto dulzón; con salivación: después de fumar tabaco. Venas distendidas en la lengua.

ESTOMAGO:

Mucha sed, pero poco apetito. Náusea mortal; no > por vomitar o con vacío desfalleciente en el hueco del estómago. Náusea persistente y vómito, con lengua limpia. La sola vista u olor del alimento provoca la náusea. Región epigástrica dolorida. Dolor neurálgico en el estómago no relacionado con alimento. Bebe mucho y come poco. Deseo de cosas amargas. Náusea antes y después de orinar.

ABDOMEN:

Hígado; crecido, dolorido, duro y sensible. Heces blancas como gis, cenicientas, pastosas. Diarrea, durante la Ictericia. Ascites.

URINARIO:

Sensación de plenitud después de la micción. Necesidad continua; orina; gotea; (próstata crecida) caliente, ardiente con dolor de latido, dolor en el cuello de la vejiga; como si una paja se introdujera hacia adelante y atrás. Orina; suprimida; difícil. Uremia; riñones contraídos.

HOMBRES:

Emisiones atónicas nocturnas; después del coito. Gonorrea; balanitis, con edema del prepucio. Próstata crecida; senil. Hinchazón edematosa de los genitales. Testículos hinchados. Hidrocele. Descarga gonorréica profusa, gruesa, amarilla blanca. Erecciones temprano por la mañana. Deseo amoroso sin capacidad. Como si algo saliera de la uretra después de las emisiones.

MUJERES:

Dolores como de parto en el abdomen y espalda antes de las reglas. Reglas vicariantes de los pulmones.

RESPIRATORIO:

Deseo de hacer inspiraciones profundas; con disnea. Respiración lenta, < hablando, caminando, bebiendo cosas frías. La tos causa dolor en los hombros, y brazos, o sensación de ardor y adolorimiento en el pecho. Expectoración; dulzona, como de almidón hervido mezclado con moco sanguinolento.

Hemoptisis; con corazón débil o por bronquitis crónica; antes de las reglas. Neumonía senil No puede expectorar sin vomitar. Gran debilidad en el pecho, no puede hablar. Se sofoca cuando cae dormido; de allí su temor a sofocarse por la noche. Tos por reglas suprimidas.

CORAZON:

Débil, siente que se pudiera detener si se mueve, debe sostener la respiración y mantenerse quieto. El menor movimiento causa palpitación. Punzadas frecuentes en el corazón. Ataques de angina < levantando los brazos. Corazón cansado; después de esfuerzos. Corazón dilatado. Hipertrofia con dilatación. Hidropesía cardíaca. Palpitación; con depresión; por pena. Pulso; lento, débil, irregular, intermitente.

EXTREMIDADES:

Adormecimiento; pesadez o debilidad paralítica < brazo izquierdo. Los dedos se duermen fácil y frecuentemente. Los dedos se hinchan por la noche. Frialdad de las manos y los pies. Sensación en las piernas como si alambres al rojo vivo de pronto se lanzaran a través de ellas. Uñas azules. Una mano caliente y la otra fría.

PIEL:

Azulosa. Hidrópica. Fría. Erupciones sarampionosas en la espalda. Hormigueo dondequiera: Angina de Pecho.

SUEÑO:

Sobresalta de su sueño con alarma, siente que se cae de una altura; en un sueño. Somnoliento.

FIEBRE:

Bochornos de calor, luego gran debilidad nerviosa, en el período climatérico. Escalofrío y estremecimientos de todo el cuerpo. Sudor frío y pegajoso.

RELACIONES:

Glo; Spig.

DIOSCOREA

GENERALIDADES:

Es un remedio para muchas clases de dolores y cólicos. Actúa en NERVIOS; abdominales; ciáticos y en el cordón espinal. LOS DOLORES SON INSOPORTABLES, AGUDOS; CORTANTES; DE TIRON, ATENAZANTES, TRITURANTES, que se lanzan o radian a partes distantes; se presentan en paroxismos, cesan de pronto en una parte, y luego empiezan en otra. Estremecimientos nerviosos; por dolor. Es adecuado para personas con un poder digestivo débil; exceso al comer o errores de la dieta

que fácilmente los afecta. Malos efectos de beber té en exceso. Ayuno. Masturbación. Corea, con emisiones seminales.

AGRAVACION:

Acostándose; doblándose en dos. Té. Comiendo. Por la tarde. Noche.

MEJORIA:

Estirándose; o doblándose hacia atrás. Movimiento; al aire libre. Presión dura. Parándose erguido.

MENTE:

Llama a las cosas con nombres equivocados. Se siente disgustado, nervioso y fácilmente perturbado. Deprimido, después de emisiones seminales.

CABEZA:

Dolor sordo en ambas sienas; o como apretado con un tornillo, > presión, pero < después. Sensación como si la cabeza fuera aplastada. Confundido, cabeza plena.

OJOS:

Como con una bola o una estaca en el ojo. Aire caliente que evapora de ellos.

OIDOS:

Dolor < sonándose la nariz o tosiendo. Náusea. Pequeñas bolas de cerúmen que caen de ellos.

NARIZ:

Cualquier mal olor permanece en la nariz por largo tiempo.

BOCA:

Amarga y seca por la mañana. Se muerde la lengua cuando no está comiendo o bebiendo. Cerramiento espasmódico de la quijada.

ESTOMAGO:

Eructos; con hipo. Dolor agudo y de acalambramiento en el hueco del estómago, luego eructo, hipo y paso de flatos; > permaneciendo erguido. Gastrodinia.

ABDOMEN:

Dolores agudos en el hígado que se extienden a los pezones. Cólico biliar- dolor que se extiende al pecho, espalda y brazos. Dolor que se dispara de pronto hacia diferentes partes, aparece en sitios remotos como dedos de las manos y pies. Cólico renal, dolor que se extiende a los testículos y las extremidades. Flatulencia. Hemorroides como un racimo de cerezas, con dolores lancinantes del ano al hígado. Diarrea matutina que lo saca de la cama, causando debilidad. Deseo apresurado de evacuar. Las evacuaciones no mejoran el dolor en el abdomen. Punzada del ano al hígado. Adolorimiento constante, cortante, atrozante, en y alrededor de la región umbilical.

HOMBRES:

Erecciones que duran toda la noche. Organos sexuales fríos y relajados. Emisiones seminales sin erección; luego debilidad, especialmente en las rodillas. Sudor de olor fuerte en escroto y pubis.

MUJERES:

Dismenorrea violenta- los dolores radian desde el útero; alternando con calambres en los dedos de manos y pies.

RESPIRATORIO:

El pecho parece no expandirse al respirar. Los dolores de pecho radian a ambos brazos. Disnea por el mínimo ejercicio.

CORAZON:

Dolor detrás del esternón hacia los brazos; angina de pecho; con respiración laboriosa y acción débil del corazón.

ESPALDA:

Adolorida < agachándose.

EXTREMIDADES:

Panadizo - al inicio cuando el hormigueo se siente o cuando los dolores son agudos y agonizantes. Las extremidades se sienten débiles, especialmente las rodillas; después de emisiones seminales. Dolor ciático (d) que se dispara hacia los muslos, con ardor o entumecimiento < movimiento, sentándose; > por estar de pié sobre los dedos, o acostado y quieto. Tendón que se siente corto. Uñas quebradizas.

FIEBRE:

Suda fácilmente cuando está escalofriado. Sudor; frío, pegajoso; o de olor fuerte, en genitales.

RELACIONES:

Colo; Mag-c.

DIPHThERINUM

GENERALIDADES:

Las potencias de este nosode están preparadas ya sea por el virus Diftérico o con membranas. Es útil como profiláctico en la difteria, o complicaciones postdiftéricas, parálisis, etc. cuando se usa toxina anti-diftérica. En la difteria, la malignidad está presente desde el inicio. El paciente está muy postrado pero inquieto; sin ningún dolor. Quiere ser sostenido. Torcimiento de músculos aislados. Temblor interno. Retraimiento de músculos y salto súbito. Afecciones catarrales de los pasajes respiratorios. Descargas ofensivas. Carfología. Recaída en la difteria.

AGRAVACION:

Acostado.

MEJORIA:

Frío. Tomando leche en sorbitos.

MENTE:

Carfología. Vé objetos imaginarios.

CABEZA:

Humedad en el margen del cabello.

OJOS:

Ve visiones.

NARIZ:

Abanicamiento de las alas nasales con ronquido. Descarga nasal amarilla y espesa. Epistaxis.

CARA:

Sonrojada, centro de las mejillas púrpura.

BOCA:

Lengua húmeda, con punta roja; o punto rojo obscuro atrás de la punta. Papilas rojas.

GARGANTA:

Obscura. Membrana gruesa y gris; sobre la tonsila (izquierda). Difteria indolora, traga sin dolor pero los líquidos son vomitados o regresan a través de la nariz. Recaída en difteria. Tonsilitis obstinada. Quiere aire frío dentro de la garganta o desea bebidas frías.

ESTOMAGO:

Desfallecimiento; > por traguitos de leche.

PIEL:

Seca, palmas calientes; las siente aplastadas. Piel seca.

SUEÑO:

Habla en sueños, con ojos abiertos.

FIEBRE:

Escalofrío, luego caliente. Temperatura baja.

RELACIONES:

Carb-ac.

DOLICHOS

GENERALIDADES:

Comezón intensa en la piel sin la aparición de erupción o inflamación. Manchas amarillas por todos lados. Comezón excesiva; por la noche; ictericia. Neuralgia que sigue al herpes zoster. Agua fría > la comezón pero pone la piel ardorosa y causa temblores.

DROSERA

GENERALIDADES:

Afecta marcadamente los ORGANOS RESPIRATORIOS produciendo efectos espasmódicos, catarrales y hemorrágicos. Tiende a elevar la resistencia contra la tuberculosis; de modo que es un remedio muy útil para la tuberculosis de los pulmones, laringe y huesos; de articulaciones. Glándulas tuberculares. Dolores constrictivos en la garganta, laringe, estómago, etc. Dolores apuñalantes, lancinantes. Convulsiones seguidas por hemoptisis y sueño. Hemorragias de sangre roja brillante, de la nariz, boca, evacuaciones, etc.

AGRAVACION:

Después de medianoche. Al acostarse. Calor. Hablando. Alimentos fríos. Por reírse. Después de sarampión. Por cantar. Agachándose. Vomitando. Por cosas ácidas.

MEJORIA:

Presión. Al aire libre.

MENTE:

Fácilmente se encoleriza; una nimiedad lo saca de sus casillas. Inclínación a ahogarse. No puede concentrarse en una cosa, debe cambiar, cambia a otra cosa. Teme estar solo y es suspicaz con sus amigos. Delirio de persecución. Inquietud. Ansiedad estando solo. Extremadamente inquieto. Imagina que fué engañado por gente rencorosa y envidiosa.

CABEZA:

Pesada, dolor presivo. Vértigo cuando camina al aire libre.

OJOS:

Se vuelven saltones, por toser, durante el sarampión, en convulsiones.

NARIZ:

Sensible a los olores agrios. Estornudos dolorosos. Sangrados; por toser; agachándose.

CARA:

Lado izquierdo frío, lado derecho caliente; con dolores clavantes. Cara caliente, con manos frías.

BOCA:

Sabor pútrido. Saliva sanguinolenta. Dolor de muelas por bebidas calientes. Hinchazón pequeña, redonda, indolora, en la mitad de la lengua.

ESTOMAGO:

Náusea después de alimentos grasosos. Aversión al puerco y alimentos ácidos; que desagradan. Dificultad para deglutir alimentos sólidos.

ABDOMEN:

Doloroso después de alimentos ácidos.

MUJERES:

Leucorrea, con dolores como de parto.

RESPIRATORIO:

ACCESOS PERIODICOS DE TOS RAPIDA, COMO DE LADRIDO PROFUNDO O DE AHOGO PROLONGADO E INCESANTE. La tos parece venir del abdomen; quita la respiración; obliga a sostenerse los flancos, seguida de arqueos, vómitos, primero de lo ingerido, luego de moco; la nariz sangra; sudor frío y locuacidad. Tosferina. Cosquilleo como de una pluma o una migaja en la laringe. Voz profunda y ronca, requiere un esfuerzo el hablar. Voz hueca, sin tono. Expectoración sanguinolenta, purulenta y amarilla. Constricciones del pecho < por hablar o cantar. Asma cuando se habla, con contracción de la garganta con cada palabra pronunciada. Punzadas bajo las axilas. Hemoptisis después de convulsiones. Concomitantes a la tos. Raspadura en la laringe y tos después de comer. Dolores punzantes en el pecho al estornudar o toser. Tos hostigante, tan pronto como la cabeza toca la almohada por la noche, no durante el día. Tos < cantando, hablando.

EXTREMIDADES:

Los dedos se contraen espasmódicamente con rigidez al agarrar cualquier cosa. Calambre de los escritores. Adolorimiento en la articulación de la cadera y el muslo derechos con dolor en el tobillo; debe cojear cuando camina. Las piernas se sienten doloridas; la cama se siente dura. Dolor en los huesos largos. Dolor en los húmeros por la noche solamente.

PIEL:

Comezón; > por frotarse con la mano < al desvestirse.

FIEBRE:

Siempre demasiado frío, aún en cama. Fiebre con tosferina. Se estremece estando descansando > por moverse. La cara se vuelve caliente y las manos frías, con estremecimientos. Sarampión.

COMPLEMENTARIO:

Sul.

RELACIONES:

Coc-c; Cor-r.

DULCAMARA

GENERALIDADES:

Este remedio es útil para aquellas personas que están predispuestas a afecciones catarrales, reumáticas y herpéticas, debido a la exposición al frío y la humedad. Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS produciendo secreciones excesivas, especialmente de los bronquios, vejiga, y ojos. Rigidez, adormecimiento, dolorimiento e irritación de los músculos por cada exposición al frío, especialmente la ESPALDA Y LOS LOMOS. Pueden presentarse afecciones de la piel antes de las reglas. Efectos paralíticos; de partes aisladas, cuerdas vocales, lengua, etc. Partes paralizadas con frialdad de hielo. Dolores desgarrantes. Atenazamiento de los intestinos cerca del OMBLIGO; en testículos. Espasmos de un lado con pérdida del habla. Glándulas crecidas. Cada catarro se establece en los ojos; garganta o afecta la vejiga, respiración o intestinos. Hidropesía. Malestares de los trabajadores de una fábrica de hielo. Hombres que están expuestos a constantes cambios de temperatura (aire acondicionado). Glándulas; hinchadas, induradas. Hidropesía; anasarca. Exóstosis. Hemorragias; sangre acuosa o rojo brillante.

AGRAVACION:

POR HELARSE - ESTANDO CALIENTE. Cambios súbitos de temperatura. HUMEDAD FRIA. Bebidas frías, helados. Sótanos, camas, bodegas húmedas. Frío en los pies. Descargas suprimidas; erupciones, sudores, etc. Otoño. Noche. Descanso. Lesiones. Antes de las tormentas. Mercurio. Por descubrirse. Días calientes, y noches frías.

MEJORIA:

Por moverse. Calor. Tiempo seco.

MENTE:

Confusión, no puede encontrar la palabra apropiada, no puede concentrarse en sus pensamientos. Depresión. Regaña sin estar enojado. Rechaza las cosas que pidió. Fácilmente se vuelve delirante; con dolor. Habla difícil.

CABEZA:

El occipucio se siente grande; frío. Sensación como de una tabla que estuviese presionando contra la frente. Cefalalgia > por la conversación. Tiña del cráneo. Cabeza escaldada; costras gruesas y cafés, sangrando cuando se las rasca, provocando caída del cabello. Como si pendiera del cabello.

OJOS:

Adoloridos cuando lee. Oftalmía por resfriarse. Parálisis del párpado superior. Descarga espesa y amarilla. Espasmos de los párpados en aire frío.

OIDOS:

Dolor; con náusea; toda la noche, impidiendo dormir. Inflamación de las parótidas; después de sarampión. Zumbidos en los oídos.

NARIZ:

Adolorida. Coriza seca o profusa. Se tapa en lluvia fría. Catarros de verano; con diarrea. El mínimo aire frío obstruye la nariz. Quiere mantenerla tibia, con ropas calientes y húmedas. Sangramiento nasal; en lugar de reglas. Coriza del recién nacido.

CARA:

Costras gruesas, café, amarillas. Desgarramientos en las mejillas que se extienden a los oídos, órbitas, mandíbulas, precedidas de frialdad de las partes y que se presentan con hambre canina. Neuralgia facial < a la mínima exposición al frío. Ulceras frías en los labios. Verrugas y erupciones en la cara. Espasmos de los labios en aire frío.

BOCA:

Distorsionada, jalada hacia un lado. Lengua; hinchada; habla impedida; paralizada; habla inarticulada o difícil. Saliva; tenaz; filamentosa; con dolor de dientes.

GARGANTA:

Presión como si la úvula estuviese muy larga. Anginas por cada cambio frío.

ESTOMAGO:

Aversión a la comida. Gran sed por bebidas frías. Náusea con deseo de evacuar. Estremecimientos mientras vomita. Eructos con estremecimientos.

ABDOMEN.

Dolor cortante en el ombligo seguido por evacuaciones verdes, dolorosas, verdes y lamosas. Diarrea. Heces agrias y acuosas, < noche, en el verano, en tiempo frío y húmedo. Intestinos fríos. Erupciones o dolor alrededor del ombligo.

URINARIO.

Micción frecuente. Cistitis. Estranguria. Retención de orina, por bebidas frías o por frío. Micción involuntaria por parálisis de la vejiga. Orina; turbia, lamosa o fétida. Nefritis por frío. Pared de la vejiga engrosada.

HOMBRES:

Testículos crecidos; con dolor de apretón. Impotencia. Herpes prepucial.

MUJERES:

Reglas acuosas. Erupción que aparece en la piel antes de las reglas. Dismenorrea, con manchones dondequiera. Herpes en las mamas en mujeres que amamantan. Reglas, lechosas, loquios suprimidos por el frío. Mamas; llenas, duras, dolorosas, con ausencia de reglas o leucorrea. Erupciones en la piel después del destete.

RESPIRATORIO:

Tos; causada por un cosquilleo en la parte posterior de la garganta; en accesos prolongados; con mucha expectoración floja y fácil, después de fatiga física. Tos de invierno. Dolor en el pecho izquierdo como si el pulmón se moviera en olas.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido. Dolor en la parte baja de la espalda como cuando se agacha por largo tiempo. La región lumbar y sacra se siente fría.

EXTREMIDADES:

Exóstosis en brazos después de una comezón suprimida. Palmas sudorosas. Temblor en el brazo (d), con dificultad para orinar. Síntomas reumáticos que alternan con diarrea o erupciones agudas. Verrugas en manos y dedos. Inflamación de la pantorrilla.

PIEL.

Erupciones; escamosas, gruesas, costrosas, húmedas, sangrantes o herpéticas < antes de las reglas. Urticaria > por el frío < estómago ácido. Verrugas grandes, suaves, carnosas, planas. Prurito. Erupción del recién nacido. Tiña en el pelo; en niños. Eczema en infantes. Pequeños furúnculos en partes que duelen. Costras gruesas sobre todo el cuerpo.

FIEBRE:

Frialdad; en diferentes partes, frialdad de hielo en partes paralizadas; con dolor. El frío se inicia en la espalda y no > por el calor, < por la noche. Frío con necesidad de evacuar y orinar. Sudor maloliente.

COMPLEMENTARIOS:

Bar-c; Nat-s.

RELACIONES:

Rhus-t.

ECHINACEA

GENERALIDADES:

Este remedio corrige las discracias sanguíneas; por eso es útil en todos los tipos de envenenamientos de la sangre. Condiciones auto-infecciosas, sépticas, mordeduras de animales ponzoñosos, linfangitis, gangrena, vaccinosis, etc. Los síntomas tienden hacia la malignidad en desórdenes agudos y subagudos. El paciente se siente débil y cansado, con adolorimiento en los músculos. Lentitud en toda acción - habla lentamente, contesta lentamente, camina lentamente. La debilidad se siente más en el estómago,

intestinos; en el corazón, en las rodillas; con vértigo. Reumatismo. Mitiga los dolores de cáncer en la última etapa. Descargas fétidas. Valioso como un limpiador local y lavado antiséptico.

AGRAVACION:

Por comer. Lesión. Operaciones. Aire frío.

MEJORIA:

Por acostarse. Descanso.

MENTE:

Deprimido y malhumorado. Se vuelve iracundo cuando es corregido; no quiere ser contradicho. Mal humor. No puede ejercitar la mente. No quiere estudiar ni pensar.

CABEZA:

Vértigo, con debilidad. Cefalalgia, con cara ruborizada. Dolor agudo y profundo en el cerebro ; que parece muy grande. Latidos a través de las sienes. Frente caliente y ardorosa.

OJOS:

Las cejas se tuercen. Los siente calientes al cerrarlos.

NARIZ:

Descarga maloliente. La siente obstruída. Sangramiento por el poro derecho.

CARA:

Azulosa.

BOCA:

Moco espumoso; lo saca de la garganta. Lengua, labios y fauces pican con sensación de miedo cerca del corazón. Lengua; dormida, con sabor a pimienta. Aftas. Dientes sensibles a las corrientes de aire.

ESTOMAGO:

Náusea con escalofrío. Vómitos agrios, sanguinolentos, como asientos de café.

ABDOMEN:

Como con un peso en la parte posterior del hígado. La sangre fluye después de evacuar.

HOMBRES:

Emisiones seminales.

MUJERES:

Septicemia puerperal; descargas suprimidas. Abdómen sensible y distendido.

RESPIRATORIO:

Dolor como con un tapón bajo el esternón. Ardor bajo la escápula izquierda.

CORAZON:

Sensación de miedo cerca del corazón. Pulso incrementado pero variable.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento en las extremidades. Manos, dormidas, que alternan con inquietud; al despertar.

PIEL:

Diviesos recurrentes. Carbúnclos.

SUEÑO:

Sueños de dificultades; laboriosos o de riñas.

FIEBRE:

Irregular; escalofrío; elevación de temperatura y sudor. Escalofrío que se siente en el occipucio. Sudor en las partes superiores, en la frente.

RELACIONES:

Am; Pyro; Rhus-t.

ELAPS CORALLINUS

GENERALIDADES:

Como todos los otros venenos de serpientes; el veneno de la serpiente Coral desorganiza la sangre, produciendo descargas negras especialmente hemorragias. Sensación de frialdad interna en pecho, estómago < después de bebidas frías. Sepsis adinámica. Espasmos, luego parálisis. Movimientos oscilatorios. El lado derecho se siente débil, insensible o paralizado. Las membranas mucosas se arrugan. Como una carga pesada o peso en la parte afectada. Sensación de torcedura.

AGRAVACION:

Cercanía de tormentas. Frío; bebidas, alimento, aire. Humedad. Noche. En una habitación. Contacto. Calor de la cama. Frutas.

MEJORIA:

Descanso. Caminando > el sangramiento de la nariz y el dolor en el pecho y el abdomen.

MENTE:

Horror a la lluvia. Miedo; cuando se le deja solo; causa castañeteo de dientes y temblor. Estremecimiento por la mínima contradicción, con hormigueo. Imagina que oye a alguien hablando; Pavor a ser dejado solo. Puede hablar pero no puede entender el habla. Enojado consigo mismo, no quiere que le hablen.

CABEZA:

Vértigo - cae hacia adelante. Peso y dolor en la frente. Aflujos de sangre a la cabeza. Desmayos, con vómito o al agacharse.

OJOS:

Círculos negros ante los ojos (izquierdo). Manchas grandes de rojo intenso ante los ojos.

OIDOS:

Cerúmen negro y duro. Sordera nocturna súbita, con rugido, crujidos en los oídos. Ilusiones de oído. Otorrea; ofensiva, acuosa; con sordera, comezón.

NARIZ:

Naso-faringe obstruída. Catarro nasal crónico; con olor fétido y costras verdosas. Dolor desde la nariz hasta los oídos, al tragar. Ozena. Sangramiento nasal, negro como tinta; después de un golpe.

CARA:

Manchas rojas en la cara. Abotagada. Color amarillento opaco.

GARGANTA:

Contracciones espasmódicas del esófago y laringe; la comida y los líquidos son súbitamente detenidos y luego caen pesadamente en el estómago. Sensación como de una esponja en el esófago. Deglución dolorosa, difícil para sólidos y líquidos. Parálisis del esófago.

ESTOMAGO:

Las bebidas y frutas se sienten como hielo en el estómago, y causan frialdad en el pecho. Deseo de leche amantequillada dulce. Sensación como si la comida girara como tirabuzón al deglutirla. Sed.

ABDOMEN:

Los intestinos se sienten torcidos y juntos como nudo. Evacuaciones de sangre negra y espumosa.

URINARIO:

Orina roja. Descarga de moco por la uretra.

MUJERES:

Dismenorrea con sangre negra. Sensación como si algo estallara en el vientre, luego flujo continuo de sangre coloreada de oscuro, > al orinar. Descarga de sangre negra entre las reglas.

RESPIRATORIO:

Hambre de aire. Frialdad en el pecho después de beber. Punzadas en el ápice del pulmón derecho. Tos, con dolor terrible a través de los pulmones. Los pulmones se sienten separados por la fuerza. Hemóptisis; negra, como tinta y acuosa.

EXTREMIDADES:

Brazos débiles. Brazos y manos hinchados y azulosos. Las articulaciones de las rodillas se sienten torcidas. Hormigueo bajo las uñas. Despellejamiento de las palmas y puntas de los dedos. Pies fríos como hielo.

SUEÑO:

Sueños de negocios; de personas muertas. Se muerde las manos durante el sueño.

FIEBRE:

Sudoración fría por todos lados. Piel caliente, seca.

RELACIONES:

Crot-h; Helod.

ELATERIUM

GENERALIDADES:

Es un remedio valioso para ciertas formas de hidropesía, especialmente Beriberi. Produce vómito violento y purga, con evacuaciones copiosas, acuosas, forzadas, verde oliva, biliosas o espumosas. Cólera. Diarrea infantil. Ictericia del recién nacido, con heces biliosas, orina que mancha el pañal. Deseo irresistible de vagar de casa en casa. Frío con muchos bostezos y estiramientos. Urticaria > por frotarse.

AGRAVACION:

Clima húmedo. Permaneciendo en sótanos húmedos.

EPIPHEGUS

GENERALIDADES:

El uso de este remedio está exclusivamente confinado a los dolores de cabeza de tipo neurasténico, especialmente en mujeres, y que aparecen o empeoran por cualquier esfuerzo inusual, por ir de compras, tensión nerviosa, etc. Dolor presivo, como si puntas de dedos presionaran en las sienas hacia adentro; o dolor presivo que vá hacia atrás < hasta las 4 p.m. luego >; con escupidura de saliva viscosa

y náusea. Cefalalgias semanales. Cefalalgias precedidas de hambre. Sarro en los dientes. Neurastenia. Confusión.

AGRAVACION:

Fatiga - nerviosa; por ir de compras. Vista fatigada.

MEJORIA:

Por dormir.

RELACIONES:

Ign; Iris.

EQUISETUM

GENERALIDADES:

Actúa principalmente en el tracto genito-urinario. Vejiga adolorida, llena y sensible; no > después de orinar. Constante deseo de orinar y pasa grandes cantidades de orina clara, de color ligero sin alivio. Dolor hormigueante, ardiente, cortante en la uretra al orinar. Cistitis. Disuria. Enuresis NOCTURNA; de niños, sin causa, excepto el hábito. Retención y disuria en el embarazo y después del parto. Orina en gotas; en mujeres ancianas, con evacuación involuntaria. Mucho moco en la orina.

AGRAVACION:

Al terminar de orinar. Por la presión. Movimiento. Sentándose.

MEJORIA:

Después de mediodía. Por acostarse.

COMPLEMENTARIO:

Sil.

RELACIONES:

Canth.

ERIGERON

GENERALIDADES:

Un remedio hemorrágico, especialmente cuando las hemorragias son profusas, rojo brillante y en chorro. Actúa también en los órganos genito-uritarios; gonorrea crónica. Congestionaciones - agudas, ardientes. Dolorimientos fuertes.

AGRAVACION:

Clima lluvioso. Ejercicio.

CABEZA:

Congestionada, cara roja. Naríz sangrante.

OJOS:

Punzantes, ardientes. Equimosis alderredor, por un golpe.

ESTOMAGO:

Ardor en el estómago y abdomen. Vómitos o evacuaciones de sangre pura. Abdomen distendido. El ano se siente rasgado. Hemorroides.

URINARIO:

Hemorragias persistentes de la vejiga. Disuria; durante la dentición; llanto al orinar. Adolorimiento en la vejiga. Retención de orina. Tenesmo vesico-rectal, con metrorragia.

HOMBRES:

Sudor pegajoso en los genitales. Gonorrea. Manchas azules y negras en los genitales.

MUJERES:

Metrorragia; con tenesmo vesico-rectal; después del aborto, con diarrea o disentería; después del menor movimiento. Leucorrea, con irritabilidad urinaria. Aborto causado por esfuerzo.

RESPIRATORIO:

Tos, expectoración sanguinolenta. Tisis incipiente.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento fuerte en todos los miembros.

PIEL:

Equimosis.

RELACIONES:

Canth; Terb.

EUCALYPTUS

GENERALIDADES:

Es un antiséptico y desinfectante poderoso. Afecta las membranas mucosas, produciendo descargas catarrales profusas; que son acres, y fétidas; con adolorimiento, rigidez y cansancio como cuando se

resfría. Malaria. Influenza. Dolores de tirón clavantes por la noche. Agotamiento con toxemia y hemorragia. Reumatismo. Se dice que es un preventivo de la influenza.

AGRAVACION:

Periódicamente. Noche.

MENTE:

Regocijo mental. Deseo de moverse por allí.

CABEZA:

Cefalalgias congestivas. Migraña. Vértigo durante las etapas de la fiebre.

OJOS:

Punzantes y ardorosos.

OIDOS:

Tinnitus.

NARIZ:

Coriza acuosa. Sensación de obstrucción. Descarga fétida, crónica y purulenta. Tensión a través de la nariz.

BOCA:

Lengua pastosa. Aftas; la boca arde, se siente llena.

GARGANTA:

Aftas, con ardor. Sensación de moco constante en la garganta.

ESTOMAGO:

Digestión lenta, con gas pútrido. Latidos en el estómago. Náusea y vómito con frío. Vómitos de sangre y fluidos ácidos. Cáncer.

ABDOMEN:

Como con un peso en los intestinos. Diarrea aguda; heces delgadas, acuosas, precedidas por dolores agudos. Disentería con calor en el recto.

URINARIO:

Nefritis aguda, que complica la influenza. Diuresis. Catarro de la vejiga. Carbunclo uretral. La orina tiene olor de violetas.

MUJERES:

Pequeño nódulo bajo el pezón (derecho) con dolor apuñalante como de dardo.

RESPIRATORIO:

Asma bronquial. Expectoración profusa, ofensiva, de moco-pus. Broncorrea; senil. Tos de influenza.

EXTREMIDADES:

Hormigueo seguido por adolorimiento en las extremidades.

FIEBRE:

Con adolorimiento. Frío, luego náusea y vómito. Fiebres tipo tifoidea continuas. Vértigo en todas las etapas de la fiebre malárica.

RELACIONES:

Chin; Dul; Echi.

EUONYMUS

GENERALIDADES:

Afecta el hígado y los riñones. Hormigueo en la espalda. Vértigo; en la frente, como si estuviese jalada y echada hacia adelante. Cefalalgias biliosas; presión sobre las cejas, ojos comprimidos. Hígado congestionado. Cálculos biliares. Dolor alderredor del ombligo. Evacuaciones profusas; variantes o de varios colores. Albuminuria.

AGRAVACION:

Comiendo; Tarde.

MEJORIA:

Aire fresco. Presión.

RELACIONES:

Rhe.

EUPATORIUM PERFOLIATUM

GENERALIDADES:

La característica más importante es ADOLORIMIENTO VIOLENTO, DOLORES COMO DE HUESOS QUEBRADOS. Los músculos del pecho, espalda y extremidades se sienten magullados, dolorimiento de inflamación. Afecta el hígado, produciendo efectos biliosos. El paciente está inquieto,

escalofriado y con náusea. Resfriados. Influenza. Dengue. Lentitud de todos los órganos y sus funciones. Util en constituciones quebrantadas de los ebrios. Debilidad.

AGRAVACION:

AIRE FRIO.

PERIODICAMENTE;

de 7 a 9 p.m.; cada 3er. o 4º día. Acostado sobre una parte. Tosiendo. El olor o la vista de los alimentos. Movimiento.

MEJORIA:

Vomitando bilis. Por sudar. Acostándose sobre la cara. Conversación.

MENTE:

Gime con dolor machacante.

CABEZA:

Vértigo; sensación de caída hacia la izquierda; < acostado sobre el lado derecho; > vomitando. Dolor de latido; en occipucio, después de acostarse, con sensación de peso. La cabeza duele alternando con dolores gotosos. Sensación como de una gorra de metal en la cabeza. Cefalalgias > por vómitos de bilis, por la conversación. Dolores enfermantes cada 3er. y 7º día. Se levanta la cabeza con las manos durante la cefalalgia.

OJOS:

Dolor penoso en los globos; con cefalalgia. Amarillos.

NARIZ:

Coriza con estornudos, con adolorimiento de todos los huesos.

CARA:

Contracción súbita de los músculos de la mejilla derecha. Amarilla.

BOCA:

Lengua amarilla. Gusto amargo. Fisuras en las comisuras de los labios.

ESTOMAGO.

Sed por agua fría, pero después de beberla hay estremecimientos y vómitos de bilis. Náusea con el olor o la vista de los alimentos. Deseo de helados, de bebidas ácidas. Hipo. Dolor angustioso en el estómago no > hasta que todo es vomitado. La ropa ceñida oprime. Arqueos y vómito de bilis. Sed antes de vomitar.

ABDOMEN:

Hígado inflamado. Evacuaciones blanquecinas o frecuentes, verdes y acuosas.

URINARIO:

Orina alternante profusa y escasa.

HOMBRES:

Comezón en el Monte de Venus.

RESPIRATORIO:

Ronquera < mañana. Tos; con dolorimiento en el pecho, por cosquilleo en la laringe; molesta la cabeza y debe sostenerse el pecho > por ponerse sobre las manos y rodillas. Pecho como en carne viva, no inflamado y bronquios < por la inspiración.

CORAZON:

Presión como si el corazón estuviese en una espacio demasiado pequeño.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor atrás del cuello y entre los hombros. Intenso dolor de espalda, como si hubiese sido golpeada; dolor ascendente. Temblores en la espalda durante la fiebre.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento de huesos con inflamación de músculos, de las extremidades inferiores. Dolor magullante en las pantorrillas. Edema de las piernas, pies y tobillos. Nódulos gotosos dolorosos, asociados con cefalalgia.

FIEBRE:

Sed o náusea, luego escalofrío violento y sacudiente; empieza en la espalda baja. Vómito amargo después del escalofrío o durante el calor. Calor ardiente. Sudor; que mejora todos los síntomas excepto la cefalalgia. Sudor escaso.

COMPLEMENTARIO:

Nat-m; Sep.

RELACIONES:

Bry; Nux-v.

EUPATORIUM PURPUREUM

GENERALIDADES:

Los dolores de quebradura de huesos y otros síntomas de fiebre son similares a Eup-Perf; pero menos pronunciados: tiene muchos más síntomas que se refieren a los órganos urinarios y sexuales, especialmente en mujeres.

AGRAVACION:

Movimiento. Por cambiar de posición.

MENTE:

Nostalgia; aún estando en casa y entre su familia. Suspiros.

CABEZA:

Cefalalgia del lado izquierdo; con vértigo, como si cayera hacia el lado izquierdo.

ESTOMAGO:

Quiere limonada o bebidas frías durante el escalofrío. Cólico en todo el abdomen después de evacuar orina.

URINARIO:

Deseo constante; aún después de orinar frecuentemente, la vejiga se siente llena. Cistitis en mujeres embarazadas al pasear por carreteras ásperas; disuria. Irritabilidad vesical en mujeres. La orina huele dulce. Flujo urinario empujado. Diabetes insípida.

MUJERES:

Dolor espasmódico rápido en el ovario izquierdo. Leucorrea profusa. La vulva se siente como mojada. Esterilidad por atonía ovárica.

RESPIRATORIO:

Disnea con hidropesía.

ESPALDA:

Como con un peso y pesadez en la espalda y lomos.

EUPHORBIVM

GENERALIDADES:

Irrita las membranas mucosas y la piel, causando mucha secreción con sensación de sequedad. Ardor interno, en los huesos, por la noche. Dolores de cáncer. Inflamaciones lentas. Ampollas. Gangrena en ancianos. Caries. Debilidad parálitica de articulaciones. Todo parece más grande de lo que es en realidad.

AGRAVACION:

Por sentarse. Descanso. Al empezar a moverse. Mercurio. Contacto.

MEJORA:

Aplicación de aceite. Aplicaciones frías. Movimiento.

OJOS:

Ve a la misma persona caminando en frente y detrás de él. Diplopía.

NARIZ:

Muchos estornudos abortados. Coriza con inflamación. Ozena acre.

CARA:

Ampollas amarillas. Ardor en las mejillas. Inflamación roja de las mejillas.

BOCA:

Los dientes como si estuviesen atornillados juntos, quebradizos, desmenuzados; caries. La boca se siente cubierta con grasa rancia. Saliva profusa; salada. Sed por agua fría. Ardor como fuego en el estómago y abdomen.

RESPIRATORIO:

Tos, con punzadas en el hueco del estómago, hacia el lado del pecho, día y noche; con asma.

ESPALDA:

Dolor en el cóccix < al levantarse luego de estar sentado, < después de evacuar.

PIEL:

Erisipelas; de las membranas mucosas. Ulceras tórpidas, indolentes. Erisipelas vesiculares. Vesículas llenas con linfa amarilla o líquido. Como si un fino cordón estuviese bajo la piel.

FIEBRE:

Alta.

RELACIONES:

Nit-ac; Sul.

EUPHRASIA**GENERALIDADES:**

El nombre común “Ojo Brillante”, da la indicación de uso de este remedio. Afecta las MEMBRANAS MUCOSAS; DE OJOS, nariz y pecho, produciendo catarro agudo, con secreciones sueltas, acres y acuosas. Las lágrimas son acres; las descargas nasales blandas. Pus acre.

AGRAVACION:

LUZ DEL SOL.

VIENTO. Calor. En habitación. Por la tarde.

MEJORIA:

Al aire libre. Por parpadear y frotar los ojos.

CABEZA:

Cefalalgia catarral con descarga profusa por la nariz y los ojos. Cefalalgia de estallido con deslumbramiento de ojos.

OJOS:

OJOS ACUOSOS;

como bañados en lágrimas. Como con un cabello delante de ellos; quiere restregarlos. LAGRIMAS PROFUSAS, CALIENTES O ACRES > al aire libre, por acostarse, o tosiendo; dejando una marca como de barniz. Lagaña pegajosa. Fotofobia, con espasmos de los párpados. Dolores presivos, cortantes en los ojos. Descarga espesa, acre y amarilla de los ojos. Conjuntivitis, con inyección violenta; del sarampión; en lugar de las reglas. Ojos enrojecidos crónicos. Opacidades de la córnea; después de una lesión. Tarsos rojos, ardientes, con comezón. Catarata, con ojos acuosos. Dolor en el ojo, que alterna con dolor en el abdomen.

NARIZ:

Coriza profusa, blanda, fluída; con tos y mucha expectoración, menos cuando está acostado. Cáncer plano en el lado derecho de la nariz.

CARA:

Rigidez de la mejilla izquierda; de la lengua. Labio superior rígido como hecho de madera.

ESTOMAGO:

Vómito por moco expectorado.

HOMBRES:

Prostatitis. Irritabilidad nocturna de la vejiga, goteo de orina.

MUJERES:

Reglas; dolorosas, el flujo dura solamente una hora o un día. Amenorrea, con oftalmía y úlcera en el lado derecho de la nariz. Dolores punzantes y comezón al caminar al aire libre.

RESPIRATORIO:

Tos con expectoración fácil, durante el día solamente; menos al acostarse; por la noche.

SUEÑO:

Bostezos al caminar al aire libre.

RELACIONES:

Cepa.

EUPION

GENERALIDADES:

Es un aceite volátil y ligero obtenido por destilación de alquitrán de madera. Tiene síntomas femeninos marcados, con dolor de espalda. Reglas; demasiado adelantadas y copiosas; irritable y poco inclinada a hablar durante las reglas. Leucorrea amarilla, que mancha de amarillo la prenda, con severo dolor de espalda, después de las reglas; cuando el dolor de la espalda cesa, la leucorrea brota. Ardor en el ovario derecho. Dolores del sacro como si estuviese roto; el dolor de espalda se extiende a la pelvis > por recostarse contra cualquier cosa para apoyarse o doblándose hacia atrás. Calambres en las pantorrillas por la noche. Sensación en los pies como si se caminara sobre agujas. Desplazamientos uterinos. Sensación como si todo el cuerpo estuviera hecho de gelatina. Sudor profuso por el menor ejercicio.

RELACIONES;

Grap; Kre; Lach.

FAGOPYRUM

GENERALIDADES:

Conocido comúnmente como trigo sarraceno (alforfón), actúa sobre la piel y los órganos digestivos. La comezón es marcada y se siente en diferentes partes del cuerpo, ojos, coanas posteriores; ano; profundamente en las manos; piernas, etc. Pulsaciones visibles de las carótidas y otras arterias. Las descargas son ofensivas. Dolor en franjas. Prurito senil.

AGRAVACI_N: Por rascarse. Luz del sol. Movimiento.

MEJORIA:

Aplicaciones frías. Presión. Café.

MENTE:

Incapacidad para estudiar, o recordar. Deprimido. Irritable. Excesivamente feliz.

CABEZA:

Dolor profundo en la cabeza con presión hacia arriba. Cefalalgia con cuello cansado, > doblándose hacia atrás.

OJOS:

Comezón en los ojos. Como si los globos fuesen empujados hacia afuera. Dolor a lo largo del conducto lagrimal. Hinchados, rojos, calientes.

OIDOS:

Comezón en y alderredor.

NARIZ:

Enrojecida, inflamada. Coriza fluída, con estornudos.

GARGANTA:

Comezón en las coanas posteriores. Catarro post-nasal.

ESTOMAGO:

Eructos escaldantes, calientes, agrios. Náusea persistente > por comer.

ABDOMEN:

Comezón en el ano.

MUJERES:

Prurito vulvar con leucorrea amarilla, < por el descanso.

CORAZON:

Dolor alderredor del corazón que se extiende al hombro y brazo izquierdo > yaciendo sobre la espalda.

CUELLO Y ESPALDA:

Sensación de rigidez y magulladura en los músculos del cuello, con sensación como si la nuca no pudiera soportar la cabeza.

EXTREMIDADES:

Dolor en los hombros, con dolor a lo largo de los dedos. Comezón en brazos y piernas. Comezón profunda en las manos. Pies entumecidos con hormigueo. Dolores en franjas en brazos y piernas.

PIEL:

Comezón > por baño fresco < por rascarse, al contacto y restirando. Eczema. Eritema. Itértrigo. Carbunclos ciegos. Piel caliente, hinchada.

RELACIONES:

Puls.

FERRUM IODATUM

GENERALIDADES:

Este es un remedio útil para los crecimientos glandulares; crecimientos nuevos y desplazamientos uterinos especialmente retroversión. Debilidad que sigue al drenado de fuerzas vitales.

AGRAVACION:

Movimiento. Noche. Contacto.

MEJORIA:

Al aire libre.

OJOS:

Bocio exoftálmico; después de reglas suprimidas.

OIDOS:

Rugidos.

NARIZ:

Gruesa.

ESTOMAGO:

El alimento parece empujar hacia arriba de la garganta, como si no hubiese sido tragado.

ABDOMEN:

Sensación de atascamiento, como si no pudiese inclinarse hacia adelante. Hormigueo en el recto. Como si una cuerda estuviese jalada, conectando el ombligo con el ano.

URINARIO:

Hormigueo en la uretra. Orina, de olor dulzón, de color oscuro; depositando sedimento blanco y espeso.

MUJERES:

Pesadez constante. Sensación como si algo presionara hacia arriba en la vagina al sentarse. Retroversión del útero. Leucorrea; como almidón hervido cuando los intestinos se mueven. Reglas; ausentes con bocio exoftálmico. Prolapso, dificultad para retener la orina.

FERRUM METALLICUM

GENERALIDADES:

El hierro está presente en cantidades considerables en la sangre; también en muchos artículos de la alimentación diaria. Afecta la CIRCULACION, produciendo distribución irregular de la sangre; congestiones, oleadas irregulares, etc. y pulsaciones. Relaja los vasos sanguíneos causando hemorragias que son brillantes o con coágulos pequeños especialmente en el crecimiento rápido de la juventud; o las venas se dilatan, durante la neuralgia, reglas o fiebre. Se adapta a personas jóvenes; anémicas; pseudo-pletóricas, quienes, aunque se ven fuertes, son tan débiles que son incapaces de hablar, o caminar y quieren estar acostadas. Palidez de la piel y membranas mucosas, que alternan con bochornos.

Resequedad; de boca; vagina; etc. Anemia de personas jóvenes con mejillas sonrojadas pero labios pálidos; niñas delicadas, constipadas y decaídas. Músculos flojos y relajados. Hidropesía o parálisis después de pérdida de fluidos vitales; hemorragias, etc. Ancianos de cara roja. Emaciación rápida. Dolores nocturnos que obligan a mover la parte. Presión; en el pecho, estómago, etc. Mente y cuerpo irritables. Caquexia. Crujido de articulaciones. Reblandecimiento de huesos. Las partes rojas se vuelven pálidas. Catalepsia. Bocio, exoftálmico por reglas suprimidas. El bazo, la digestión y el deltoides izquierdo también están afectados.

AGRAVACION:

NOCHE.

Emociones; enojo. Ejercicio violento. Por comer. Por beber. Pérdida de fluidos vitales, sudores. Huevos. Calor y frío. Movimiento repentino. Levantando los brazos. Té.

MEJORIA:

Movimiento ligero. Por un sangramiento ligero. Inclinando la cabeza en algo.

MENTE:

Siempre en lo cierto; sensible y excitable, < a la menor contradicción. Ríe y llora inmoderadamente. Nervioso, histérico. El menor ruido es intolerable. Ansiedad como después de cometer un crimen. Desalentada; después de las reglas.

CABEZA:

Vértigo; < levantándose súbitamente, al cruzar un puente sobre el agua. Niebla cerebral. Cefalalgia de latido, martilleante, se inicia en las sienas y se extiende al occipucio, < tos, por agacharse, descendiendo escaleras; > dejando el pelo suelto. Dolor repentino sobre el ojo izquierdo. Cabeza caliente, pies fríos. Escribir provoca que reaparezca el dolor de cabeza. Vértigo durante el dolor de cabeza.

OJOS:

Por la noche puede ver en la obscuridad, histeria. Ataques de ceguera. Las letras corren juntas al leer o escribir. Párpados abotagados. Dolor sobre los ojos (izquierdo). Bocio exoftálmico, después de la supresión de reglas.

OIDOS:

Hipersensible a los ruidos. Ruido en los oídos > por inclinar la cabeza sobre la mesa. Repiqueteos en los oídos < antes de las reglas.

NARIZ:

Sangramiento; en pacientes anémicos; que alterna con hemóptisis.

CARA:

Palidece o se sonroja o enrojece por el mínimo dolor, emociones, o ejercicio. Florida; la siente como inflada. Labios pálidos. Neuralgia, después de baño frío y acaloramiento, < acostándose; > por sentarse.

BOCA:

Dolor de dientes > por agua helada. Sabor de sangre o de huevos podridos. Boca seca, la comida parece demasiado seca.

GARGANTA:

Como si algo rotara en la garganta y la cerrara como una válvula. Bocio exoftálmico. Sensación como de un tapón (i) < por tragar en vacío, únicamente.

ESTOMAGO.

Aumento y disminución del apetito alternadamente. El estómago no tolerará ningún alimento, porque causa distensión y presión. Aversión; a la carne, huevos, frutas ácidas, a su tabaco y cerveza acostumbrados. Deseo de pan, tomates crudos. Escupe la comida por bocados. Vómitos; fáciles, sin náusea; inmediatamente después de comer; después de medianoche; durante el embarazo. Ardor. Vómito después de huevos.

ABDOMEN:

Duro, distendido, adolorido, magullado al caminar. Los intestinos se sienten doloridos al contacto. Diarrea; indolora, < al comer; (el tratar de comer provoca la diarrea); nocturna; en borbotón, salpicante; de alimentos indigeridos; que alterna con constipación; < si está nervioso o cansado. Evacuaciones; duras, difíciles, seguidas de dolor de espalda, o calambres en el recto; prolapso del recto. Comezón en el ano debido a ascárides; en niños. Heces indigeridas. Diarrea de verano.

URINARIO:

Albuminuria. Nefritis crónica. Micción involuntaria, especialmente durante el día; al estar de pié; por movimientos repentinos, caminando; en niños. Micción copiosa, con nerviosismo. Orina caliente; con menorragia.

HOMBRES:

Emisiones; nocturnas; con dolor de espalda; después de un exceso de ejercicio.

MUJERES:

Vagina muy seca; duele como excoriación; o insensible durante el coito. Reglas; pálidas, acuosas; muy adelantadas, muy profusas y prolongadas; intermitentes; con dolores como de parto. Leucorrea; lechosa, acre, acuosa, en la pubertad. Tendencia al aborto. Prolapso de la vagina. Comezón en vulva.

RESPIRATORIOA:

Voz, ronca o cambiante. Tos seca, cosquilleante < por moverse; > acostándose. Escupidura de sangre; en los masturbadores, en consunción. Brotes de sangre al pecho. Disnea > caminando lentamente, y hablando. Tos con dolor en el occipucio. Aliento caliente. Pleuro-neumonía descuidada, absorbe el exudado.

CORAZON:

Palpitación < mínimo movimiento; > caminando lentamente; de los masturbadores; después de pérdida de líquidos. Latido en todas las venas. Pulso lleno, suave, rendido.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello y hombro doloroso. Lumbago toda la noche, se va al levantarse.

EXTREMIDADES:

Calambres súbitos o dolores desgarrantes en las extremidades, al escribir, las manos tiemblan > al escribir rápido. Deseo irresistible de doblar el brazo, con dolor intenso. Manos y pies hinchados. Dolor en los talones < acostándose sobre la espalda. Articulaciones crujientes. Omodinia. Contracción de miembros.

PIEL:

Pálida. Se ruboriza fácilmente; se marca un hueco al presionarla. Manchas negras o violeta obscuro.

SUEÑO:

Se cae dormido; por debilidad; mientras cose, estando sentado o estudiando. Insomnio.

FIEBRE:

Frío con cara roja y sed. Calor con venas distendidas. Extremidades frías; cabeza y cara calientes. Sudor; pegajoso, amarillo, frío, acre o debilitante.

COMPLEMENTARIO:

Chin.

RELACIONES:

Arn; Mang.

FERRUM PHOSPHORICUM

GENERALIDADES:

Como Ferr., Fer-ph. afecta la circulación venosa causando congestiones locales pasivas y hemorragias debido a hiperemia; así que las descargas con rayadas de sangre o como sanguaza. Es apropiado para las personas (rubias) nerviosas, sensibles, anémicas. Es un remedio muy útil en exacerbaciones agudas de la tuberculosis, reumatismo, etc. Emaciación. Se resfría fácilmente. Magullamiento doloroso; pecho; hombros; músculos, inflamación de partes blandas. Ulceración ardorosa. Malos efectos de un sudor suprimido; lesiones mecánicas. Etapas primarias de fiebre e inflamación. Gran postración, difícilmente puede moverse.

AGRAVACION:

Noche. 4-6 a.m. Movimiento. Ruido. Sacudidas. Aire frío. contacto. Sudor suprimido. Bebidas frías y alimentos ácidos. Carne. Arenques. Café. Pasteles.

MEJORIA:

Aplicaciones frías. Sangramientos. Acostándose.

MENTE:

Muy locuaz, hilarante y excitado. Se mantiene quieto. Enojos. Manía transitoria por irritación cerebral. Indiferente a las cosas placenteras. Aversión a la compañía. Temor de andar entre una multitud.

CABEZA:

Cefalalgia de latido con cráneo sensitivo. Dolor de cabeza tirante, con adolorimiento desde el vértice hacia los lados de la cabeza; con dolor de oído; > por sangramiento nasal, aplicación fría. Malos efectos del calor del sol. La cabeza se siente con frecuencia como empujada hacia afuera mientras camina; con vértigo. Sensación de vacío en la cabeza, durante las reglas.

OJOS:

Rojos, inflamados con sensación ardorosa. Sensación de una partícula pequeña en el párpado superior. Tumores enquistados de los párpados. Ojos bañados en lágrimas no puede ver al agacharse.

OIDOS:

Violento dolor en los oídos; otitis media aguda, cuando Bell falla. Sordera; por resfríos, < durante las reglas. Tinnitus < acostándose.

NARIZ:

Epistaxis. Sangre roja brillante; en niños. Controla el adolorimiento y el sangrado después de las operaciones.

CARA:

Palidez y enrojecimiento alternantes. Mejillas calientes con dolor de dientes.

BOCA:

Caliente. dolor de muelas > frío.

GARGANTA:

Anginas rojas e inflamadas. Garganta dolorida de los cantantes. Dolor < por deglutir en vacío. Adolorimiento posterior a las operaciones.

ESTOMAGO:

Vómitos; de lo ingerido; a tiempos irregulares; de alimentos indigeridos; materia verde. Hematemesis. Eructos ácidos. Aversión a la carne y a la leche. Deseo de cosas ácidas.

ABDOMEN:

Distendido; intolerancia a las ropas. Diarrea crónica. Evacuaciones de agua sanguinolenta; de agua amarilla. Disentería con fiebre. Diarrea de verano.

URINARIO:

Enuresis diurna > acostándose. La orina chorrea, con cada tos. Orina después de cada bebida. Orina retenida en niños, durante la fiebre.

MUJERES:

Reglas; adelantadas; cada tres semanas, con dolor pesado en el vértice. Vagina seca y caliente. Dolor durante el coito. Vaginismo.

RESPIRATORIO:

Laringitis; con ronquera; de los cantantes. Tos corta, dolorosa, cosquilleante, machacante, atormentadora, espasmódica < por la mañana y en la tarde. Hemóptisis; de pura sangre; en la neumonía; después de una concusión o caída. Pecho pesado, adolorido o congestionado. Pleuresía; dolores punzantes < tosiendo y por respirar profundamente.

CORAZON:

Palpitación; con pulso rápido. Pulso lleno, rápido, flotante.

CUELLO Y ESPALDA:

Tortícolis en cuello y espalda.

EXTREMIDADES:

Reumatismo que ataca una articulación tras otra; < por el mínimo movimiento. Dolor penoso magullante en los hombros que se extiende al pecho y la muñeca. La muñeca duele con pérdida de poder al agarrar. Palmas calientes; en los niños. Contractura de los miembros. Omodinia. Esguinces en los codos. Manos hinchadas y dolorosas.

PIEL:

Sarampión. Acné.

SUEÑO:

Somnolencia. Inquietud e insomnio.

FIEBRE:

Frío, con deseo de estirarse; a la 1 p.m. Calor con manos sudorosas. Fiebres; continuas; infecciosas, neumonía; intermitentes; sarampión; hemorrágicas.

COMPLEMENTARIO:

Kali-m.

RELACIONES:

Gel.

FERRUM PICRICUM

GENERALIDADES:

Es un remedio muy útil para la hipertrofia senil de la glándula prostática; con micción frecuente por la noche, con sensación de plenitud y presión en el recto. Punzadas en el cuello de la vejiga y el pene. Retención de orina.

FLUORICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

La destrucción es la clave de este ácido. Produce efectos destructivos lentos y profundos, caries de los huesos; ulceraciones; úlceras por decúbito; venas varicosas. Es adecuado para los malestares de los viejos o los prematuramente envejecidos. Pacientes pálidos, miserables, caquéticos, débiles y quebrantados. Se siente siempre muy caliente; quiere bañarse en agua fría. Los tejidos están hinchados, indurados, y fistulosos. Las descargas son delgadas; fétidas, acres o saladas, causando comezón. Edema. Panadizos. Nevus. Sífilis secundaria. Capacidad aumentada de ejercitar sus músculos sin fatiga, sin importar el calor más excesivo del verano o frío en invierno. Entumecimiento; de las partes sobre las que no se descansa; en enfermedades del cerebro, afecciones de la espina. Degeneración calcárea. Nevus, plano. Sufrimiento si el aviso para defecar no es atendido inmediatamente. Hidropesía; con o sin entumecimiento. Bocio.

AGRAVACION:

CALOR;

de la habitación. Noche. Alcohol. (Vino rojo) Alimentos ácidos.

MEJORIA:

BAÑO FRESCO. Movimiento rápido. Sueño corto. Doblando la cabeza hacia atrás. Por comer.

MENTE:

Impulso de caminar rápido; necesidad de estar siempre moviéndose. Aversión, a su propia familia, a aquellos a quienes ama más; se interesa y conversa plenteramente con extraños. Incapacidad para responsabilizarse. Depresión de mente. Se para en las calles para mirar a las mujeres que pasan, así de grande es su lujuria. Regocijado y festivo. Se sienta en silencio, no pronuncia una sola palabra, no contesta cuando se le pregunta.

CABEZA:

Cefalalgia aturdidora, > por orinar. Presión en el occipucio. Dolor a lo largo de las suturas. Caída del cabello, después de fiebres. Pelo quebradizo, enmarañado.

OJOS:

Sensación como de viento frío que soplara a través de los ojos. Fístula lacrimal. Como con algo en los ojos, que no pudiera ser quitado; debe parpadear. Ojo izquierdo más pequeño que el derecho.

OIDOS:

Sordera > doblando la cabeza para atrás.

NARIZ:

Coriza fluída; durante el sueño. Estornudos con salivación.

CARA:

Calor en la cara, quiere lavarla con agua fría. Pálida.

BOCA:

Dientes; que se carían con rapidez; < en las raíces; se sienten tibios. Esmalte delgado. Fístula dental. Lengua; fisurada en todas direcciones, dolorosa al hablar. Dentición tardía. Ulcera sobre y bajo la lengua.

ESTOMAGO:

Deseo de alimentos picantes, condimentados, altamente sazonados; agua fría; las bebidas tibias provocan diarrea. Hambre mordiente; siempre está comiendo y esto le alivia temporalmente. Eructos rancios. Vómitos biliosos en el error más ligero de la dieta. Síntomas estomacales > con ropas ajustadas. Aversión al café.

ABDOMEN:

Adolorimiento sobre el hígado. Las bebidas tibias y el salmón producen diarrea. Comezón y ardor en el ano. Sensación de vacío en la región del ombligo, con deseo hacer una respiración profunda > por vendarse. Ascites; por desórdenes hepáticos; induración, crecimiento y congestión portal.

URINARIO:

Estiramiento hacia arriba de la uretra. Orina; escasa; oscura. La orina aumenta en la hidropesía.

HOMBRES:

Deseo sexual aumentado; en los ancianos. Erecciones violentas por la noche. Sudor aceitoso y picante en los genitales. Edema del escroto. Varicocele. Se para en las calles mirando lascivamente a las mujeres cuando pasan, tan grande es su lujuria. Gozo excesivo.

MUJERES:

Reglas; demasiado adelantadas; copiosas, frecuentes, muy largas. Metrorragia, con dificultad para respirar. Leucorrea copiosa y excoriante. Ninfomanía. Pezones adoloridos, agrietados. Siente incomodidad si el flujo se retarda ligeramente.

RESPIRATORIO:

Opresión en el pecho > doblándose hacia atrás. Hidrotórax. Dificultad para respirar; con o alternando con metrorragia.

EXTREMIDADES:

Panadizo. Como con una astilla bajo la uña. Uñas distorsionadas, desmenuzadas, crecen rápidamente. Hidropesía de los miembros en las constituciones viejas y debilitadas. Sensación de un cabello en la

parte posterior de los dedos. Enrojecimiento constante de las manos, especialmente las palmas. Ulceras sobre las tibias. Palmas calientes y sudorosas. Ulceración entre los dedos. Callos adoloridos.

PIEL:

Venas varicosas. Siente como si vapor caliente fuera despedido por los poros. Piel seca, áspera, con comezón y agrietada. Cicatrices; rodeadas de granos; se vuelve roja en los bordes. Queloides.

SUEÑO:

Sensación de que se está durmiendo sobre el lado que no es.

FIEBRE:

Ebullición de calor con dolor en los huesos. Sudor acre, erosionante; excita la comezón. Sudor en manos y pies. Fiebres nocturnas que aparecen periódicamente. Un lado suda (i). Sudor sobre la parte enferma.

COMPLEMENTARIO:

Sil.

RELACIONES:

Calc-s; Puls; Sul-ac.

FORMICA RUFA

GENERALIDADES:

La tintura se prepara con hormigas rojas vivas y machacadas. Es un remedio para la artritis; para dolores reumáticos o gotosos súbitos. Tuberculosis. Malestares por sobre-cargas. Impide la formación de pólipos. Atrofia de heridas. Se resfría fácilmente. Carcinoma. Afecta la espina; hígado; riñones y lado derecho. Sudor de pies suprimido; por corea.

AGRAVACION:

Frío; mojado. Movimiento. Antes de una tormenta de nieve.

MEJORIA:

Por frotamiento. Peinándose el cabello. Presión. Calor. Después de la medianoche.

MENTE:

Alegre; después del dolor. Olvidadizo por la noche. Malhumorado; temeroso.

CABEZA:

El cerebro se siente demasiado pesado y grande. Cefalalgia > después de peinarse el cabello. Como burbujas que reventaran en la frente.

OJOS:

Dolor en los ojos al caminar, > lavándose.

OIDOS:

Crujidos en los oídos, con cefalalgia. Pólipos. Las partes alderredor de los oídos se sienten hinchadas.

NARIZ:

Coriza, y sensación de obstrucción. Pólipos.

GARGANTA:

Dolor en el cuello al carraspear o hacer gárgaras.

ESTOMAGO:

El dolor se dispara del estómago al vértice. El agua sabe dulzona.

ABDOMEN:

Dolor tirante alderredor del ombligo antes de las evacuaciones. Evacuaciones ligeramente espumosas.

URINARIO:

Cantidad de orina incrementada al doble. Orina como azafrán.

MUJERES:

Quistes ováricos que contienen agua o sangre.

RESPIRATORIO:

Asma nerviosa. Tos más frecuente por la noche.

CUELLO:

Dolor en el cuello al masticar, especialmente al cerrar las quijadas.

EXTREMIDADES:

Dolores reumáticos súbitos con inquietud. Debilidad de las extremidades inferiores. Paraplejía. Los músculos se sienten estirados y desgarrados de su unión. Manos dormidas. Nudos duros alderredor de las coyunturas dentro y fuera.

PIEL:

Roja, con comezón y ardorosa. Urticaria en placas planas. Heridas que se atrofian.

FIEBRE:

Sudor profuso sin alivio.

RELACIONES:

Rhus-t; Urt.

FRAXINUS

GENERALIDADES:

Es un tónico uterino para mujeres nerviosas. Es un útil remedio para todo tipo de desplazamientos uterinos y fibroides. Se dice que es un pesario médico del primer orden.

AGRAVACION.

Lesiones. Estiramientos. Levantamientos.

MENTE:

Depresión con inquietud nerviosa y ansiedad. Debe hablar.

CABEZA:

Punto caliente o resequedad en el vértice. Dolor de latido en el occipucio.

ABDOMEN:

Pesadez que se extiende a los muslos, o con sensación de caída; con fibroides.

MUJERES:

Utero crecido; pesado, prolapsado. Dismenorrea. Reglas profusas o leucorrea. Subinvolución. Ovario sensible (izquierdo).

EXTREMIDADES:

Calambres en los pies, después de medianoche.

FIEBRE:

Estremecimientos fríos y bochornos calientes.

PIEL:

Eczema infantil.

DOSIS:

De diez a quince gotas de tintura 3 veces al día.

GAMBOGIA

GENERALIDADES:

La acción de este medicamento está confinada al estómago e INTESTINOS. Ardor en diferentes órganos es lo principal. El cuerpo se siente todo adolorido.

AGRAVACION:

Movimiento al aire libre. Después de evacuar.

MEJORIA:

Después de evacuar.

MENTE.

Alegre y locuaz. Irritable.

OJOS:

Ardor en los ojos; comezón en los párpados; los frota; párpados que se pegan; con estornudos.

NARIZ:

Estornudos violentos crónicos; durante el día solamente.

BOCA:

Sensación de frialdad, en la orilla de los dientes. Ardor, punzadas y resequedad de la lengua y la garganta.

ABDOMEN:

Ardor en el hígado. Pellizcamiento y gorgoteo en los intestinos; luego EVACUACIONES DELGADAS QUE SE VIENEN en chorros prolongados, verdes o amarillas; con ardor en el ano; y mucho alivio. Vómito y purga con desvanecimiento.

ORINA:

La orina huele a cebollas.

RELACIONES:

Crot-t.

GELSEMIUM

GENERALIDADES:

Gels. centra su acción sobre los MUSCULOS Y LOS NERVIOS MOTORES. En los músculos causa DOLORIMIENTO; CANSANCIO; PESADEZ; DEBILIDAD; dominante, que se siente especialmente en los músculos de las extremidades. Afección de los nervios motores que producen todos tipos de parálisis funcional - de los ojos, garganta, laringe, ano, vejiga, etc. La circulación se vuelve lenta, causando congestión arterial y venosa pasiva; con sensación de plenitud y pesadez en diferentes órganos; corazón, hígado, etc. Catarro de las MEMBRANAS MUCOSAS causando una descarga acuosa. Estado general de paretis, mental y corporal. Relajación y postración absoluta. Quiere estar acostado quietamente; medio reclinado, quiere ser sostenido. Torpeza; amodorramiento, confusión; ojo o efectos visuales; temblores; y poliuria: uno o dos de estos síntomas con frecuencia acompañan muchas de las condiciones de enfermedad en las cuales Gels está indicado. Incoordinación de los músculos, que no obedecen a la voluntad. Corea en el embarazo. Convulsiones; histéricas. Afecciones nerviosas de los que hacen cigarros. El cuerpo se siente ligero en los onanistas o sujetos histéricos. Influenza. Sarampión. Pelagra. Parálisis post-diftérica. Parálisis agitante. Malos efectos de susto, miedo, emociones depresivas, enojo, malas noticias, sorpresas desagradables. Masturbación, choque traumático. Se alternan síntomas pélvicos con síntomas en la cabeza. Personas débiles, cansadas, delicadas, tímidas, excitables, fáciles de enojar, niños y adolescentes. Nunca bien desde una gripe. Coma y apoplejía; sub-aracnoide.

AGRAVACION.

EMOCIONES;

ESPANTO. Shocks. Pruebas rigurosas. Movimiento. Sorpresa. Clima - HUMEDO; PRIMAVERA; neblinoso. Calor del sol; verano. Periódicamente. Tabaco. Tormentas de rayos. Clima - frío y húmedo. Dentición. Cuando piensa en sus malestares.

MEJORIA:

Micción profusa; sudor. Batimientos. Bebidas alcohólicas. Esfuerzos mentales. Por doblarse hacia adelante. Movimiento continuo. Por las tardes. Reclinado con la cabeza en alto.

MENTE:

Confusión; actúa como un loco. Aturdido. apático. Deseo de estar quieto o que lo dejen solo. Quiere lanzarse desde una altura. TEMOR; de caerse; de una prueba rigurosa, muerte, dolor. Indiferencia relativa a su enfermedad. Contesta con lentitud. Inmovilidad cataléptica, con pupilas dilatadas, ojos cerrados pero consciente. El niño se sobresalta, agarra a la nodriza y grita como temeroso de caerse. Poder de discernimiento lento. Efectos de una pena, no puede llorar; medita sobre su pérdida.

CABEZA:

VERTIGO;

se difunde desde el occipucio; como si estuviese borracho, con síntomas visuales. Cefalalgia sorda PESADA o como de banda; alrededor del occipucio; hacia arriba de los ojos; < con una gorra apretada; > sacudiéndola; permaneciendo acostado con la cabeza alta; después de una micción profusa. Sensación de hinchazón en la cabeza. Meningitis - etapa congestiva, dolor atrás de la cabeza y pupilas dilatadas. Dolor de presión desde el vértice hasta los hombros. Dolor en las sienas que se extiende al oído, alas de la nariz y mentón. Adolorimiento del cráneo. Apoplejía; sub-aracnoide. La sangre se agolpa desde el occipucio a la frente. Caliente con extremidades frías. La migraña empieza a las 2 o 3 a.m. > después de mediodía. No puede mantenerla erecta. Las fontanelas pulsan fuertemente.

OJOS:

Pupilas dilatadas. LOS PARPADOS CAEN PESADAMENTE. Diplopía; cuando ve hacia los lados, durante el embarazo. Ceguera momentánea. La vista se disminuye o está anegada. Fotomanía. Afecciones de la visión antes de la migraña. Ojos; rojos, irritados, doloridos; anegados. Desprendimiento de retina; por lesión o miopía. Glaucoma. Neuralgia orbital con contracción y torcimiento de músculos. Amaurosis por masturbación. Ambliopía histérica. Los dolores de ojos se extienden al occipucio. Retinitis. Nublamiento. Corrige la incomodidad de los ojos aún después de haber sido ajustados los lentes con exactitud. Humor vítreo brumoso.

OIDOS:

Pérdida súbita del oído por períodos cortos. Dolor al deglutir. Escucha deteriorada por el frío.

NARIZ:

Obstruída. Coriza con descarga delgada, acuosa y acre. Sensación de agua caliente que fluyera de las ventanas. Catarro de verano. Estornudos temprano por la mañana.

CARA:

Caliente, pesada, llena, rojo terroso; estúpida o sin expresión. La barbilla tiembla. Mandíbula inferior caída. La mandíbula inferior se menea hacia los lados. Parálisis.

BOCA:

Lengua; pesada, entumida, parcialmente paralizada; habla espesa, como si estuviese tomado, difícilmente puede hablar. Saliva coloreada de amarillo como de sangre. Lengua adormecida, tiembla al sacarle. Cubierta gruesa amarilla en la lengua. Los músculos alderredor de la boca parecen contraídos.

GARGANTA:

Deglución difícil. Disfagia parálítica, especialmente < por alimentos tibios. La deglución causa dolor dentro del oído. Sensación de un tapón doloroso en la garganta que no puede ser tragado, en mujeres histéricas. Dolor desde la garganta al oído. Amigdalitis. Parálisis post-diftérica. Garganta ulcerada durante las reglas. Disfagia parálítica después de apoplejía cerebral.

ESTOMAGO.

Usualmente sin sed; pero sediento con sudoración. Poco apetito pero puede tomar alimentos o bebidas. Sensación de vacío o debilidad en el estómago o los intestinos. Calambres en el estómago, < paseando o sentado derecho. Hipo, < por la noche.

ABDOMEN:

Congestión pasiva del hígado. Retortijón en la vesícula biliar. Cólico periódico. Evacuaciones copiosas amarillas. Diarrea; indolora; en personas nerviosas; después de emociones súbitas como pena, susto, malas noticias, anticipación de un acontecimiento inusual. Evacuaciones color crema; verde té. Parálisis del esfínter anal. Prolapso o dolores rectales después del parto. Evacuaciones involuntarias.

URINARIO:

Orina profusa, clara, acuosa; con frío y temblores, > cefalalgia. Incontinencia por excitación; por parálisis del esfínter. Alternan disuria y enuresis. Chorro intermitente. Retención. Micción constante; histérica.

HOMBRES:

Emisiones involuntarias sin erecciones. Genitales fríos, relajados. Dolor prolongado en los testículos. Sudor profuso y caliente en el escroto. Poder sexual agotado, la caricia más ligera provoca una emisión.

MUJERES:

Utero pesado y adolorido; se siente como exprimido (antiflexión). Dismenorrea; con flujo escaso; el dolor se extiende a la espalda y las caderas. Dolores de parto; van hacia atrás o hacia los muslos. Leucorrea amarillo profundo; con adolorimiento en la parte baja de la espalda. Falsos dolores de parto. Amenaza de aborto por emociones depresivas súbitas. Como una ola desde el útero a la garganta con sensación de ahogo- que impide la labor de parto. Fríos nerviosos- primera etapa del parto. Coito difícil por contracción de los músculos vaginales. Convulsiones epileptiformes en el período menstrual o por reglas suprimidas. Torcedura de músculos de todo el cuerpo con somnolencia, antes de convulsiones puerperales. Severos entuertos.

RESPIRATORIO:

Ronquera; durante las reglas; en histeria o después de emociones deprimentes. Respiración cansada, lenta. Como un tapón detrás del pecho. Espasmos de la glotis; inspiración larga y graznante, expiración súbita y forzada. Tos seca, con pecho adolorido y coriza fluída. Ardor en la laringe y pecho, al toser.

CORAZON:

Dolorido. Sensación como de que el corazón dejara de latir, si ella no se mueve. Pulso, lento, suave, débil, lleno y flotante. Pulso débil y lento; de los ancianos. Dolor en el corazón al levantarse del asiento.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello se siente magullado, incapaz de sostener la cabeza. Dolor sordo arriba y abajo en la espina; > al caminar; con dolores occipitales. Dolores bajo la escápula.

EXTREMIDADES:

Dolorimiento fuerte en el húmero (D). Manos; secas, calientes, adormecidas especialmente las palmas. Quiere tener las manos en agua fresca. Calambres en los músculos del antebrazo. Neurosis profesional. Calambre de los escritores. Extremidades inferiores pesadas. Temblor excesivo y debilidad de los miembros. Rodillas débiles < descendiendo; paso vacilante; no puede dirigir sus piernas. Frialdad de las muñecas y las manos. Sensación de luxación parcial de la rótula al caminar.

SUEÑO:

AMODORRAMIENTO. Se sobresalta al caer dormido. Sueño pesado y estúpido. Somnolencia de los estudiantes. Insomnio por excitación mental; por pensar o por el tabaco.

PIEL:

Caliente, seca; húmeda; amarilla.

FIEBRE:

Frío con adolorimiento y lasitud; mezcaldado con calor o alternando con calor; frío que sube y baja por la espalda. Manos y pies fríos. Calor-y amodorramiento. SED AUSENTE; con temblor. Sudor frío. Fiebres biliosas que remiten; maláricas; tifoidéicas; cerebro-espinales. Sarampión. Frío nervioso, estremeciente; precedido por perturbaciones visuales.

COMPLEMENTARIO.

Arg-n; Sep.

GLONONIN

GENERALIDADES:

La Nitro-glicerina es una substancia explosiva, de allí que su acción es rápida y violenta; con estallido y expansión; un remedio tempestuoso. Actúa sobre la CIRCULACION donde causa PULSACIONES VIOLENTAS, EBULLICIONES y congestiones irregulares. LA SANGRE SE AGOLPA HACIA ARRIBA. Pulsaciones generales con entumecimiento. Sensación de estallido, expansión o crecimiento (o aún de ser más pequeño) en diferentes órganos; ojos; cabeza; lengua, etc. Dolores que sobrevienen mucho después de las lesiones. Convulsiones; epileptiformes, por congestión cerebral o reglas suprimidas. Ardor en pequeñas áreas o partes aisladas. Perturbaciones climatéricas. La ropa parece ceñida. Malos efectos del calor solar, nieve brillante; calor de fuego; susto o miedo. Cicatrices viejas que se abren otra vez. Insolación. Apoplejía. Por trabajar bajo luz eléctrica o de gas. Eclampsia. Mareo en el mar. Camina por la sombra o bajo una sombrilla.

AGRAVACION:

CALOR - EN LA CABEZA; DEL SOL. Acaloramiento. CLIMA CALIENTE. MOVIMIENTO. SACUDIDAS. CHOQUES. Doblando la cabeza hacia atrás. Lesiones. Reglas suprimidas. Frutas. Peso de un sombrero. Vino. Luz de gas. Por cortarse el cabello. Duraznos.

MEJORIA:

Al aire libre. Por elevar la cabeza. Cosas frías; aplicaciones frías.

MENTE:

Pierde los sentidos, se hunde en la inconsciencia. Confundido; aturdido; se pierde en lugares bien conocidos. Frenético, con dolor, trata de correr o saltar de una ventana. Se estremece y llora durante los intermedios de dolor. Teme ser envenenada. Choques, ataques súbitos de terror, no se atreve a salir a la calle. No reconoce a nadie; siente repulsión por su esposo e hijos. No dado a hablar.

CABEZA:

DOLOR DE CABEZA EN ONDAS TERRIBLES, DE ESTALLIDO, MACHACANTES; con sensación como si estuviese parado sobre la cabeza; con sensación de contracción y expansión, o como si la sangre fluyese hacia atrás y hacia adelante en la cabeza; desde las carótidas hasta el corazón; > vomitando, alternando entre las sienas < luz del sol, en días húmedos. Crujidos, chasquidos, choques, explosiones o adolorimiento profundo en el cerebro. Cabeza pesada, pero no puede acostarse sobre una almohada. Cefalalgia antes, durante y después o en lugar de las reglas. Vértice adormecido; adolorido; caliente. Las venas de las sienas están hinchadas. Cefalalgia > por un sueño largo. Se sostiene la cabeza apretándola. Como si el cráneo estuviese muy pequeño para el cerebro.

OJOS:

Rojos, parte baja de los globos o los párpados. Ojos protuberantes, mirada salvaje. Ojos volteadas hacia arriba o rotados hacia afuera y hacia arriba, en convulsiones. Vé todo medio iluminado y medio oscuro. Los párpados se pegan al globo. Lapsos de ceguera. Ojos secos. Párpados rojos. Puntos negros, destellos, luces ante los ojos. Las letras parecen más pequeñas.

OIDOS:

Latido; cada latido del corazón se oye en los oídos. Punzadas penetrantes detrás de los oídos. Mastoiditis. Sordera; parálisis del nervio auditivo.

NARIZ:

Sangramiento por salir al calor del sol.

CARA:

Azulosa. Abochornada, caliente. Dolor en la raíz de la nariz. La barbilla se siente muy larga. Dolor en los huesos malos, que termina en cefalalgia. El labio inferior se siente hinchado o entumido. Mandíbulas trabadas en insolación.

BOCA:

Dolor de latido en los dientes; los dientes se sienten alargados. Lengua; pesada; no la puede sacar derecho conversación que se dificulta con ideas confusas. Saliva; incrementada; espesa, en la mañana. Espuma en la boca.

GARGANTA:

Se siente hinchada; los cuellos deben abrirse.

ESTOMAGO:

Náusea y vómito. Horrible sensación de vacío en el hueco del estómago; con latido. Rugido en el epigastrio especialmente < acostándose sobre el lado izquierdo. Diarrea, con detención súbita de las reglas.

URINARIO:

Orina profusa, pálida y albuminosa; más frecuente por la noche.

MUJERES:

Bochornos climatéricos. Cefalalgia después de reglas profusas. Detención repentina de las reglas con congestión de la cabeza. Eclampsia. Dolor de latido que empieza en el seno (i), se dispara de pronto hacia la cabeza < movimiento.

RESPIRATORIO:

Respiración pesada y laboriosa. Como con un peso en el pecho. Hace inspiraciones profundas. Suspiros. El entumecimiento se mueve hacia arriba en el pecho y baja por el brazo izquierdo. Opresión en el pecho que alterna con cefalalgia.

CORAZON:

Palpitación violenta; latido en carótidas. El corazón parece lleno, tiembla. Pulsación en todo el cuerpo y la punta de los dedos. Sonido de ronroneo en la región del corazón. Dolor cardíaco que irradia a todas partes, hacia los brazos < recargándose hacia atrás o tomando vino. Pulso tenso y lleno. Pulso venoso. Sensación de hervor en la región.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello se siente lleno y rígido; débil y cansado; no puede soportar la cabeza. Sensación caliente hacia la espalda baja; a lo largo de la espina; ardor entre las escápulas.

EXTREMIDADES:

Manos temblorosas. Las rodillas se doblan. Muslos y rodillas débiles y se golpean una con otra, durante la cefalalgia. Paso inseguro. Los dedos de manos y pies se abren y apartan durante las convulsiones. Ciática > flexionando las piernas sobre el abdomen.

PIEL:

Comezón en todas partes, < extremidades.

SUEÑO:

Despierta con miedo de apoplejía.

FIEBRE:

Calor con sudor caliente. Como si agua caliente corriera hacia arriba de la nuca del cuello. Bochornos de calor.

COMPLEMENTARIO:

Bell.

RELACIONES:

Amy-n; Bell.

GNAPHALIUM

GENERALIDADES:

Este remedio es usado principalmente en las afecciones del nervio Ciático; pero también tiene algun uso en síntomas abdominales y femeninos. Diarrea ofensiva con cólico < mañana. Peso y pesadez en la pelvis. Dismenorrea, con reglas escasas y muy dolorosas el primer día. Dolor ciático intenso; alternando con o seguido por entumecimiento < acostándose, por el movimiento, al dar un paso; > por flexionar los miembros contra el abdomen, por sentarse en una silla. Lumbago con entumecimiento de la parte y peso y pesadez en la pélvis. Neuralgia anterior crural. Dolor en coyunturas como si les faltara aceite.

AGRAVACION:

Por caminar. Acostándose. Frío húmedo.

MEJORIA:

Flexionando los miembros. Sentándose; en una silla.

RELACIONES:

Colo.

GOSSYPIUM

GENERALIDADES:

En la práctica ordinaria fué usado como un poderoso emenagogo; pero en homeopatía corresponde a muchas condiciones reflejas que dependen de funciones uterinas perturbadas y el embarazo. Náusea; con flujo de saliva y propensión a vomitar, por la mañana, antes del desayuno, con región uterina sensible. Estómago sensible con mucho gas. Vómitos por movimiento o levantándose. Hiperemesis. Dolor intermitente en los ovarios; que se extienden hacia el útero. Torpor uterino, y esterilidad por. Vientre sensitivo. Reglas; tardías, escasas, acuosas. Sub-involución. Fibroides. Tumores en el seno con hinchazón de las glándulas axilares. Dolor en el cuello. Reglas tardías, con sensación que el flujo está por llegar, pero no lo hace.

AGRAVACION:

Movimiento.

RELACIONES:

Senec; Ust.

GRAPHITES

GENERALIDADES:

Es un carbón mineral en el cual hay un pequeño porcentaje de hierro. Afecta la nutrición de una forma peculiar; es un remedio para aquellas personas que tienen tendencia a una gordura insana o para

aquellas que empiezan a emaciarse. La circulación se vé afectada, causando una distribución irregular de la sangre, produciendo agolpamientos de sangre especialmente a la cabeza; bochornos o palidez de la piel y las membranas mucosas. Su acción principal está en al PIEL especialmente en los pliegues o dobleces de la piel, uniones muco-cutáneas; detrás de las orejas. Produce un ENGROSAMIENTO E INDURACION de la piel; glándulas, filos, uñas, cicatrices. Costras gruesas se forman en la piel. Tendencia a las callosidades. Tiene una tendencia a producir EXCORIACIONES; GRIETAS O FISURAS; en las uniones muco-cutáneas; de los ojos, las ventanas nasales, boca, ano, pezones, punta de los dedos, pliegues de la piel. El paciente es usualmente gordo, relajado; friolento. Las descargas son delgadas, fétidas, escasas y acres. Acidez; del gusto, eructos, evacuaciones, orina, sangre cerca de los dientes, etc. Las hemorragias son acuosas. Emaciación; de las partes dolientes. Sensación de ardor; entumecimiento e inercia. Los dolores se van hacia las partes donde no se está apoyando. Sensación general de inquietud, tremor; que ocasiona gemidos. Hundimiento repentino de fuerza. Con frecuencia se siente desmayar con pérdida parcial de los sentidos. Ayuda a la absorción de los tejidos cicatriciales. Erradica la tendencia a la erisipela. Contracción; de músculos. Malos efectos de pena, susto, levantamiento de cargas pesadas. Condiciones catalépticas; conciencia pero no tiene poder para moverse o hablar. Infiltraciones. Calambres y ardor en diferentes partes. Alternan síntomas digestivos y de piel. Supersensible al frío. Frío, que < los dolores de huesos; coriza y estómago. Diatesis cancerosa; en cicatrices antiguas. Parálisis o sensación de parálisis. Tendencia al crecimiento de quistes y tumores; lobanillos. Hidropesía; edemas.

AGRAVACION:

Frío; corrientes. Luz. Durante y después de las reglas. Movimiento. Supresión; de erupciones; de secreciones. Deglución en vacío. Grasas. Bebidas calientes. El calor de la cama. Noche. Pies húmedos. Por rascarse.

MEJORIA:

Al aire libre; después de caminar al. Bebidas calientes, especialmente leche. Por comer. Eructos. Contacto.

MENTE:

Triste; temeroso; irresoluto, cavila ante nimiedades. Impulso a gemir. Tímido. Horror al trabajo. Agitado mientras está sentado y trabajando. Se siente miserable e infeliz. Llora; sin causa, por la música. Olvidadizo, comete errores al hablar y escribir. Niño imprudente, latoso, se ríe cuando se le regaña. No piensa en nada, sino en la muerte. Recuerda todos los eventos en su juventud, y los actuales los olvida. Fatiga por trabajo científico.

CABEZA:

Vértigo < mirando hacia arriba, leyendo o cosiendo. Aflujo de sangre a la cabeza, con cara sonrojada y sensación de calor. El cerebro se siente entumido. La cabeza se siente entumida. La piel de la frente está arrugada como en pliegues. Como con una telaraña en la frente. Pesadez o presión sorda en el occipucio; como si la cabeza fuera jalada hacia atrás. Dolor presivo o punto ardoroso en el vértice. Cefalalgia con náusea, durante las reglas. Cabello opaco, quebradizo o que se cae < vértice y los lados. Costras de leche. Eczema capitis; costras dolorosas al tacto. Puntos de calvicie.

OJOS:

Rehúye la luz del sol. Fotofobia. Oftalmía. Párpados rojos e hinchados. Cantos exteriores ulcerados o agrietados. Pestañas que crecen hacia adentro. La vista se desvanece durante las reglas. Tarsos inflamados o secos, escamosos o pálidos. Queratitis recurrente. Párpados fisurados; eczema de. Flictena. Lágrimas calientes. Párpados pesados y caídos. Las letras parecen dobles, al escribir; se ven juntas al leer. Tumores enquistados en los párpados.

OIDOS:

Resequedad del oído interno. Membrana que recubre el tímpano delgada, blanca, escamosa. Humedad y erupciones detrás de los oídos. Otorrea como salmuera. Como con un cuerpo duro detrás de la oreja. Sordera - escucha mejor en el ruido. Tinnitus - siseo, detonación como de una pistola. Los siente obstruidos en luna llena. Como con aire adentro; como llenos de agua. Chasquido después de cada eructo.

NARIZ:

Resequedad; con pérdida del olfato. La nariz sangra con aflujo de sangre a la cabeza; < antes de las reglas. Resfríos en las reglas. Olfato agudo; no puede soportar el aroma de las flores. Coriza con obstrucción. Costras y fisuras en las alas. Estornudos al abrir los ojos. Coriza por frío. Dolor interno. Catarro crónico. Descarga ofensiva especialmente después de las reglas. Excoriada.

CARA:

Como con una telaraña en la cara. Pálida, abotagada, ojerosa, sonrojada. Acné antes de las reglas. Labios agrietados y ulcerados. Eczema húmedo alderredor de la boca y la nariz. Comezón del barbero. Parálisis facial con distorsión de los músculos y lenguaje difícil. Hormigueo en los labios, durante las reglas. Nódulos dolorosos en la mandíbula inferior. Caída del cabello de la barbilla.

BOCA:

Comisuras de los labios ulceradas. Gusto; ácido; como de huevos podridos. El aliento huele a orina. Puntos de cobertura blanca y gruesa en la lengua. Ampollas ardorosas en la lengua. Sangramiento fácil e hinchazón de las encías. Olor agrio y fétido de la boca. Sangre de los dientes, sabe ácida. Salivación: por la noche. Dientes destemplados.

GARGANTA:

Bocio nodular. Sofocación; al deglutir, por bocio. Como con un tapón en la garganta < por deglutir en vacío; necesidad de tragar; por espasmos constantes. Garganta ulcerada crónica. Anginas crecidas. Como si la comida no corriera hacia abajo, por espasmos.

ESTOMAGO:

Aversión a la carne, pescado, alimentos cocinados, sal, dulces. Desagrado por las bebidas calientes. Hambre excesiva o falta de apetito; peor estando hambriento. Eructos ácidos o fétidos. Ardor en el estómago; que causa hambre; > por comer; bebidas calientes especialmente leche; por acostarse. Náusea matutina durante las reglas. Vómitos ácidos; de alimentos. Gastralgia periódica, con vómitos inmediatamente después de haber comido, estómago < por frío. Cáncer del píloro. Vómito y purga, sudor helado, con cefalalgia.

ABDOMEN:

Flatulencia. No soporta llevar ropa ceñida alderredor de la cintura. Abdómen distendido, como por flatos encarcelados. Dolor como calambre en el abdómen, con secreción deficiente de orina; por la noche. Dolor como si el intestino estuviese torcido. Evacuaciones; grandes, nudosas, difíciles; filamentosas; cubiertas de lama; o flojas, café, lientéricas y muy fétidas. Torpor intestinal; constipación por días. Fisuras del ano; dolor cortante durante la evacuación, seguido de constricción y adolorimiento por varias horas; sangrante y ulcerado. Evacuaciones o masas de moco; heces suaves, pastosas. Prolapso fácil del recto. Hemorroides; dolor < al sentarse o al dar un paso largo. Comezón en el ano y parte pudenda, antes de las reglas. Dolor punzante y ulceroso en el ano al limpiarlo. Diarrea, por la más ligera indiscreción al comer. Lombrices.

URINARIO:

Orina; de olor ácido; turbia; chorro delgado: Dolor en el sacro o huesos del cóccix al orinar. Estrictura de la uretra.

HOMBRES:

Debilidad sexual con deseo aumentado. Aversión al coito. Eyaculación; muy adelantada o faltante durante el coito. Falta de gozo sexual. Hidrocele. Priapismo. Calambres en las pantorrillas durante el coito. Impotencia por indulgencia excesiva o masturbación.

MUJERES:

Gran aversión al coito. Reglas; tardías, escasas, pálidas, irregulares, dolorosas. Hinchazón y dureza del ovario (izquierdo) < después de las reglas. Induración de ovarios y mamas. Ronquera, coriza, tos, mareo matutino y sudores, hinchazón de pies o cefalalgia durante las reglas. Leucorrea; pálida, delgada, profusa, excoriante, en chorros, con debilidad en la espalda; < antes y después de las reglas. Leucorrea en lugar de las reglas. Cáncer de las mamas, por cicatrices antiguas; permaneciendo después de abscesos mamarios. Pezones; adoloridos, agrietados y ampollados. Dolor en el útero al estirar los brazos para alcanzar algo. Retroversión del útero; pesadez en el hipogastrio con dolor cortante en los muslos: el útero se siente que va a salir por la vagina. Vagina; seca, caliente, o fría. Erupción eczematosa alrededor de la vulva.

RESPIRATORIO:

Constricción del pecho, como si estuviese muy estrecho, como si se fuese a sofocar al ir a dormir; salta de la cama, se sostiene de algo y debe comer algo. < después de medianoche. Calambres en el pecho. La voz carece de control > por usarla. Ronquera tan pronto como se empieza a cantar. Voz ronca. No hay control en la modulación de la voz > al continuar hablando. Asma; espasmódica, paroxismos sofocantes, que lo despierta de estar dormido > comiendo. Tos seca problemática, con sudor en la cara. Lagrimeo al hacer respiraciones profundas.

CORAZON:

Como con un choque eléctrico del corazón al cuello. Pulsaciones fuertes en todo el cuerpo. Palpitación del corazón, con ansiedad; y sangramiento nasal. Sensación fría en el precordial. Pulso lento durante el día, rápido por la mañana.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la nuca y hombros < mirando hacia arriba y agachando la cabeza. Dolores en el sacro con hormigueo. Entumecimiento del sacro, que baja a las piernas. Dolor en la región lumbar como si las vértebras estuviesen rotas.

EXTREMIDADES:

Ardores; calambres, espasmos. Presión ardorosa bajo el hueco del brazo. Brazos y piernas que se duermen. Brazos y piernas ya calientes ya frías. Sensación paralizante en los miembros. Edema de las piernas. Uñas; gruesas; ásperas; dañadas; desmenuzadas; creciendo hacia adentro. Callosidades córneas en las manos; con grietas. Dolor en la coyuntura del pulgar como si estuviese torcido. No puede estirarlas bien. Excoriación de los muslos al caminar. Grietas y fisuras en las puntas de los dedos. Juanetes < por el calor del fuego > por la presión. Ardor en las plantas de los pies y los talones. Pies fríos, húmedos. Los pies se ponen fríos, con sudor fétido, excoriente < por la noche. Los dedos se ponen mojados por el sudor.

PIEL:

Ulceración en los pliegues de la piel. Erupciones; agrietadas, húmedas y que sangran con facilidad, < en la cabeza; detrás de las orejas. Piel SECA, áspera, irritable; que se abre con facilidad y exuda una humedad pegajosa, < en los pliegues, y tarda en cicatrizar. Erupciones HUMEDAS, COSTROSAS. Eczema; anal, crural, palmar. Erisipelas recurrentes o cambiantes. Sudor fétido, acre, de los pies; irrita los dedos. Erupciones que < por el calor. Cicatrices antiguas que se ulceran. Ardor en cicatrices antiguas. Cicatrices antiguas, con bases y márgenes indurados, con ardor.

SUEÑO:

Excesivamente cansado y somnoliento. Insomnio hasta medianoche. Somnoliento durante el día. Sueños horribles. No se siente descansado por la mañana.

FIEBRE:

Suda con frecuencia el frente del cuerpo solamente. Sudor; ofensivo; ácido, mancha de amarillo, y frío. Incapacidad absoluta para sudar. Fiebre recurrente periódica. Frío en la noche < comiendo > al aire libre y por beber agua. Quiere cubrirse en todas las etapas de la fiebre.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Caust; Fer; Hep; Lyc; Sul.

RELACIONES:

Calc-fl; Carb-an; Carb-v; Kali-bi; Pul.

GRATIOLA

GENERALIDADES:

Aunque este remedio actúa especialmente en el tracto gastro-intestinal; tiene también algunos síntomas mentales y sexuales. Dolores paráliticos y sensación de frialdad especialmente en el abdomen, son síntomas marcados. Neuralgia debido a abuso de café. Efectos mentales por orgullo presuntuoso. Postración nerviosa.

AGRAVACION:

Comiendo. Bebiendo mucha agua fría o caliente. Verano. Movimiento. Abuso de café. Cena.

MEJORIA:

Al aire libre.

MENTE:

Voluntad débil. Mal humor; cansado de la vida, falta de perseverancia. Aprensión por el futuro. Histeria. Ninfomanía. Hipocondriasis.

CABEZA:

Aflujo de sangre, con desvanecimiento de la vista. Vértigo, durante o después de los alimentos. Frente arrugada durante la cefalalgia. Sensación de que el cerebro estuviese contraído y la cabeza se volviera más pequeña.

OJOS:

Todos los objetos parecen blancos, aún los árboles verdes.

ESTOMAGO:

Vacío después de comer. Como agua fría o una carga pesada en el estómago. No desea nada, excepto pan.

ABDOMEN:

Diarrea profusa, amarillenta, verde, en chorro, acuosa o espumosa, agotante, con frialdad en el abdómen, seguida de adolorimiento o ardor en el ano. Diarrea de verano, por beber agua en exceso.

HOMBRES:

Rigidez dolorosa del pene, después de emisiones seminales; nocturna.

MUJERES:

Tendencia a la masturbación; ninfomanía. Reglas; demasiado profusas; prematuras y muy largas. Leucorrea, persistente. Dolor punzante en mamas (d) al agacharse, durante las reglas.

CORAZON:

Palpitación; después de evacuaciones, con opresión en el pecho.

ESPALDA:

Dolor en el cóccix, después de evacuar. Cuello como sujetado por las manos.

EXTREMIDADES:

Las extremidades se doblan con dolor ciático.

RELACIONES:

Mag-c.

GRINDELIA

GENERALIDADES:

Produce paresia del nervio neumo-gástrico, interfiriendo con la respiración y produciendo secreción profusa de los tubos bronquiales. Sofocación al caer dormido o al despertar. Asma y enfisema con corazón dilatado. Respiración cascabeleante. Broncorrea con expectoración tenaz y blanquizca. No puede respirar al acostarse. Dolor cortante en la región del bazo, extendiéndose a las caderas. Bazo crecido. Respiración de Cheyne-Stroke.

AGRAVACION:

Al caer dormido. Movimiento. En la obscuridad.

RELACIONES:

Lach.

GUAIACUM

GENERALIDADES:

Actúa principalmente en el tejido fibroso de las articulaciones, un remedio útil para la diátesis artrítica. Los músculos y tendones se retraen dando como resultado rigidez dolorosa e hinchazón de las coyunturas. Secreciones fetidas y fáciles: expectoración, sudor, etc. Apresura la supuración en los abscesos. Amigdalitis con reumatismo. Calor ardiente; en la parte afectada. Dolores royentes o punzantes; en el pecho. Los músculos parecen demasiado cortos - párpados, espalda, muslos, etc. o se sienten adoloridos. Contracciones entre las escápulas; palmas, etc. causando distorsiones; e inmovilidad. Dolores crecientes. Tendones cortos. Nódulos. Olor de desaseo del cuerpo. La ropa se siente húmeda. Los dolores con frecuencia terminan en punzadas, especialmente en la cabeza. Los huesos se vuelven esponjosos o supuran. Emaciación progresiva. Sensación de que debe bostezar, estirarse, con un sensación de incomodidad en todo el cuerpo. Exóstosis.

AGRAVACION:

Calor. Contacto. Movimiento. Ejercicio. Crecimiento rápido. Mercurio. 6 p.m. a 4 a.m. Pubertad. Clima frío y húmedo.

MEJORIA:

Frío (localmente). Manzanas. Bostezando y estirándose.

MENTE.

Olvidadizo especialmente de los nombres. Deseo fuerte de criticar y desdeñar todo. Mirada fija y vacía, sin pensamientos. Indolente, obstinado, irritable.

CABEZA:

Los dolores se extienden al cuello; con frecuencia terminan en punzadas. El cerebro se siente flojo. Cefalalgia > por caminar, presión; < sentándose o estando de pié.

OJOS:

Los globos se sienten demasiado grandes para ser cubiertos por los párpados. Espinillas duras alderredor de los ojos. Exoftalmos.

CARA:

Neuralgia del lado izquierdo de la cara diariamente desde las 6 p.m. a las 4 a.m. Cara como de una persona anciana.

GARGANTA:

Seca, ardorosa; dolorosa al contacto, amigdalitis aguda. Punzadas agudas hacia el oído al deglutir; no puede tragar sin una bebida; amigdalitis recurrente; luego reumatismo.

ESTOMAGO:

Cubierta gruesa blanca de la lengua: Aversión a la leche; a toda la comida; no puede comer nada. Deseo de manzanas, que mejoran los síntomas gástricos. Ardor en el estómago. Vomita una masa de moco acuoso, luego se fatiga. Las afecciones estomacales regresan cada verano.

ABDOMEN:

Sensación de constricción u obstrucción en el epigastrio; causando tos, disnea, etc. Cólera infantil, cara como de viejo, emaciación. Distensión, flatulencia.

URINARIO:

Necesidad continua aún después de orinar. Punzadas agudas mientras o después de la micción.

HOMBRES:

Emisiones seminales sin sueños. Descarga de la uretra.

MUJERES:

Ovaritis en personas reumáticas, con reglas irregulares, y dismenorrea con vejiga irritable. Hormigueo frío sobre las mamas. Estremecimiento en las mamas con horripilación.

RESPIRATORIO:

Se siente sofocado por obstrucción en el epigastrio, causando tos seca, frecuentemente repetida hasta que la expectoración aparece. Aliento fétido después de toser. Punzadas pleuríticas < por una respiración profunda. Pleuresía recurrente. Punzadas en el ápice del pulmón (izquierdo). Tisis. Dolor en el pecho mientras se pasea al aire libre, > presión y caminando, < sentándose o estando de pié.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido y hombros adoloridos. Rigidez de un sólo lado de la espalda desde el cuello hasta el sacro. Dolor constrictivo entre las escápulas.

EXTREMIDADES:

Músculos de los muslos cortos y tensos > por sentarse. Picoteos en los glúteos, como si estuviese sentado en agujas. Dolor desde los tobillos hacia arriba. Artritis deformante. Ardor en el miembro afectado. Tendones cortos de la pantorrilla.

SUEÑO:

Bostezo y se estira para mejorar una sensación general de malestar. Despertares frecuentes del sueño, como si se cayera.

FIEBRE:

Sudor profuso en partes aisladas, cara, etc. Sudores nocturnos. Fiebre con frío en la noche. Ardor en el cuerpo. Palmas calientes. Fiebre ardorosa con cara caliente y tos seca.

RELACIONES:

Fer; Kali-bi; Kre; Pho-ac; Phyt.

GYMNOCLADUS

GENERALIDADES:

Causa entumecimiento y azulosidad especialmente en la lengua.

AGRAVACION:

Frío. Caminando.

MEJORIA:

Descanso. Recargándose en algo. Frotando los ojos.

MENTE:

Olvida todo. Empuñamiento lento; no puede pensar, comprender o estudiar.

CABEZA:

Sensación de algo apretado, como ligado.

OJOS:

Como si fuesen empujados hacia afuera; quiere frotarlos. Dolor bajo las cejas hacia dentro de la nariz.

CARA:

Hormigueo como de moscas sobre la cara. Hinchazón erisipelatosa.

BOCA:

Dientes sensibles al aire frío. Lengua azulosa, blanca.

ESTOMAGO:

Eructos calientes ácidos. Punto ardoroso en el estómago.

EXTREMIDADES:

Dolor violento en el antebrazo (izquierdo), en el radio, como si los huesos estuviesen machacados.

RELACIONES:

Op.

HAMAMELIS

GENERALIDADES:

La acción principal de esta droga está en las Venas, especialmente del recto; genitales, miembros y garganta; produciendo congestión venosa; venas varicosas, hemorroides y hemorragias. También es un remedio valioso para heridas abiertas y dolorosas y quemadas del primer grado como una aplicación local. Produce Adolorimiento magullante; de la parte afectada; de donde brota sangre; en los vasos sanguíneos; en abdomen, etc. Sensación tensa de reventamiento; en hemorroides, articulaciones y miembros inferiores. Plenitud congestiva. Venas; ulceradas, dolorosas, cortantes, hinchadas; inflamadas. Nudosas, duras, dolorosas; varicosas. Hemorragias; capilares, oscuras, fluídas mejoran o causan debilidad indebida. Dolores picantes, punzantes; en venas, músculos, piel. Mejora el dolor después de operaciones.

AGRAVACION:

Lesiones. Magulladuras. Presión. Aire; libre; húmedo, frío. Sacudidas. Movimiento. Contacto. Durante el día (dolores).

MENTE:

Olvidadizo. No desea estudiar ni trabajar. Necesidad de que se le muestre “el respeto que se me debe”. Irritable. Hemorragias con mente tranquila.

CABEZA:

Dolor de cabeza martillante; < sien izquierda. Sensación estúpida en la cabeza. Como si un perno traspasara de una sien a la otra. Cefalalgia después de emisión.

OJOS:

Se sienten como forzados a salir, > por la presión de un dedo. Ojos con derrame. Dolor ulceroso en los ojos. Apresura la absorción de hemorragia intraocular. Efectos traumáticos, iritis, conjuntivitis, etc.

NARIZ:

Mal olor de la nariz. Epistaxis, flujo pasivo no coagulable, con tirantez en el puente de la nariz. Nariz sangrante; en hemiplejía; en ancianos.

BOCA:

Hemorragia pasiva de las encías, después de extracción dental, con ulceración de las encías. Gusto sanguinolento. La lengua se siente quemada. Quemaduras de lengua y labios.

GARGANTA:

Ulcerada, con venas distendidas. Dolor punzante, cortante, en la úvula, al toser.

ESTOMAGO:

Dolor y pesadez detrás del estómago. Vómito de sangre negra. Aversión al agua, lo pone enfermo pensar en ello. Náusea por puerco.

ABDOMEN:

Hemorragias; sangrando profusamente, con ulceración. Grandes cantidades de sangre como breca en las evacuaciones. Disentería sangrante. Venas varicosas en el abdomen.

URINARIO:

Hematuria, con deseo aumentado de orinar. Dolor sordo alderredor de los riñones.

HOMBRES:

Dolor neurálgico severo en el cordón espermático y testículos, con náusea. Orquitis < contacto. Varicocele. Emisión por la noche sin darse cuenta. Hematocele.

MUJERES:

Reglas; oscuras, profusas, con adolorimiento del abdomen. Metrorragia, a la mitad de los períodos menstruales; sólo durante el día. Ovaritis; después de un golpe; después de un aborto, con adolorimiento en todo el abdomen. Pezones ulcerados, sangrantes. Durante el embarazo, las piernas se ponen dolorosas, no puede estar de pié ni caminar. Leucorrea; sanguinolenta, con ulceración en la vagina. Vagina; ulcerada, sensible, vanigismo. Las sacudidas hacen aparecer las reglas.

RESPIRATORIO:

Hemóptisis, tos cosquilleante, con sabor de sangre.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor de ulceración en las vértebras cervicales. Dolor de espalda de quebradura. Escápulas dolorosas. Dolor sordo alderredor de los riñones.

EXTREMIDADES:

Sensación de estallido tenso en los miembros y las coyunturas.

PIEL:

Flebitis. Equimosis. Ulceras varicosas con bases sangrantes. Quemaduras.

COMPLEMENTARIO:

Fer; Flu-ac.

RELACIONES:

Am; Pul; Vip.

HEKLA LAVA

GENERALIDADES:

Tiene una acción marcada en la mandíbula inferior, y tiene el poder de detener muchas formas de enfermedad de los huesos, osteo-sarcoma, osteítis, caries y necrosis; exóstosis, que son sensibles y dolorosas al contacto. Neuralgia facial por dientes cariados y después de extracciones.

HELLEBORE

GENERALIDADES:

Se conoce comúnmente como Rosa de Navidad o heléboro negro. Si la abreviación “Hell” y el adjetivo negro se recuerdan, muchas de sus síntomas serán comprendidos. Es un remedio para estados de vitalidad baja y enfermedades serias, cuando todo alderredor del paciente parece negro. La cara del paciente, labios, manos, etc, se ponen negros, alas nasales como tiznadas (hollín); por lo que es un remedio obscuro o polvoriento. Afecta la Mente y el Cerebro; los sentidos se embotan y las respuestas son lentas; vé, oye, gusta, imperfectamente. Los músculos no obedecen la voluntad, por lo que trastabillea, tira las cosas, etc. Debilidad muscular que termina en una parálisis absoluta. Convulsión y contractura de músculos; actos automáticos; movimiento automático de un brazo y pierna. El establecimiento de la enfermedad es gradual con debilidad progresiva. Permanece sobre la espalda, con las rodillas recogidas, o con las piernas separadas, apartadas una de otra. Inflamaciones hidrópicas. Epilepsia; con conciencia, seguida de sueño profundo. Convulsiones, con frialdad extrema; en los lactantes. El ruido detiene el paroxismo de las convulsiones. Malos efectos de exantemas suprimidos; golpes, decepciones amorosas. Débil y delicado. Un lado está paralizado, y el otro mantiene movimientos automáticos. Efusiones serosas. Las partes usualmente rojas se vuelven blancas.

AGRAVACION:

Aire libre. Dentición. Pubertad. Supresiones. Ejercicio. Por la tarde de 4 a 8 p.m. Contacto. Por agacharse.

MEJORIA:

Pensando en ello o cuando la mente está distraída.

MENTE:

Inconsciencia absoluta. Inatención. Torpe, estúpido, lento en la percepción o apático. Pesimista. Tenebroso; desesperado; vacío. Envidioso cuando vé a otros felices. Mirada vacía. Manía histérica, por auto-acusación. Suspiro involuntario. Irritable < consolación; no quiere ser molestado. No habla ni come. Ideas fijas. Melancolía; durante la pubertad. Las cosas parecen nuevas. Se pica los labios y la ropa. Piensa que está equivocada, piensa que va a morir en un día determinado; solo se sienta sin decir nada, ni hacer nada. Idiocia después de apoplejía.

CABEZA:

Cefalalgia estupefaciente < por agacharse. Dolores que se disparan causando gritos súbitos. Rota la cabeza constantemente con gemidos; (hidrocefalia) o la entierra en la almohada para aliviarse. (Meningitis). Como si hubiese agua chapaleando dentro. El dolor de cabeza finaliza en vómito. Sacude la cabeza. La frente se frunce en pliegues (afecciones cerebrales). En concusiones cerebrales por golpe en la cabeza, después de que Arnica ha fallado. Choques eléctricos pasan a través del cerebro, antes de los espasmos.

OJOS:

Medio abiertos; sumidos, volteados hacia arriba; bizqueo. Mirada vacía y estúpida o mirada cansada. Ceguera nocturna. Fotofobia, sin inflamación.

NARIZ:

Olfato disminuído. Alas; tiznadas, dilatadas. Nariz afilada, la frota.

CARA:

Pálida; edematosa; roja, caliente o fría. Neuralgia, incapaz de masticar. Movimiento constante de masticación de la mandíbula inferior, cuelga y está abierta. Sudores fríos.

BOCA:

Rechina los dientes. Olor horrible de la boca. Lengua; entumida, seca, temblorosa; o cubierta con úlceras amarillas. Ptialismo, con comisuras ulceradas. Aftosa, lienteria. Gusto amargo en la garganta < al comer.

ESTOMAGO:

Aversión a los vegetales, carne, col agria. Ansiosamente traga agua fría, muerde la cuchara, pero hay inconciencia (hidrocefalia). Los niños se amamantan con glotonería. Vómito de substancia negro-verdoza, con cólico. Anorexia con malestares cerebrales. Sed ausente en la mayoría de los malestares, o sed con disgusto por las bebidas. Ardor intenso, que se extiende al esófago, durante el embarazo.

ABDOMEN:

Gorgoteo como si los intestinos estuviesen llenos de agua. Distendido. Evacuaciones; flojas, acuosas, o blancas gelatinosas como moco; involuntarias. Ascites.

URINARIO:

Orina; suprimida, escasa, con hojuelas oscuras o sedimento; retenidas; vejiga sobre-distendida; durante el embarazo. Nefritis. Uremia. Hidropesía. Necesidad frecuente de orinar con descarga escasa.

HOMBRES:

Hidrocele por erupción suprimida, en cualquier lado.

MUJERES:

Supresión de reglas por frío o decepción amorosa. Hidropesía uterina con dolor perforante en los miembros. Convulsiones puerperales; detenidas por un ruido súbito. Dolor por todo el cuerpo que la obligan a reglar.

RESPIRATORIO:

Respiración suspiriosa. Pecho comprimido. Trata de alcanzar la respiración, con la boca abierta, apoyándose en la cama (hidrotórax). Tos, seca < por la noche; por fumar, o aparece súbitamente mientras fuma.

CORAZON:

Pulso lento, pequeño, suave.

CUELLO Y ESPALDA;

Cuello rígido; (meningitis).

EXTREMIDADES:

Movimiento automático de un brazo y una pierna, excepto cuando está dormido. Los pulgares están retraídos hacia las palmas. Piernas retraídas con cada intento de cambiar de posición. Miembros estirados. Edema de las piernas.

SUEÑO:

Sopor; no puede ser totalmente despertado. Sueño soporífero, con sacudidas y despertares. Músculos se tuercen durante el sueño.

PIEL:

Pálida. Anasarca. El pelo y las uñas se caen. Edema angio-neurótico.

FIEBRE:

El frío se expande desde los brazos. Horripilación. Frío; con fiebre; con sudor; con aversión a estar descubierto. Frialdad; de sudor.

COMPLEMENTARIO:

Zinc

RELACIONES:

Bry; Op; Zin.

HELODERMA

GENERALIDADES:

El veneno de este lagarto que es conocido como el Monstruo de Gila, causa una parálisis adormeciente, como parálisis agitante y ataxia locomotriz. El síntoma más peculiar de este veneno es la frialdad de hielo intensa; como si estuviese congelado; de dentro hacia afuera. Respiración y lengua frías; sensación de frío en pulmones y pecho, frialdad a través de la escápula; ardor en la espina. Anillo frío y hormigueante alrededor del cuerpo. Además el paciente trastabillea mientras camina. Dá pasos muy altos y pisa fuerte con el talón; sensación como si caminara sobre esponja o como si tuviese los pies hinchados. Se voltea hacia la derecha al caminar.

AGRAVACION:

Después de dormir; por la noche.

MEJORIA:

Estirándose. Por el calor.

HELONIAS

GENERALIDADES:

Este es un remedio para Mujeres; que están Indebidamente exhaustas por embarazos frecuentes, abortos; enervadas por la indolencia y el lujo o por trabajo doméstico; y que siempre se quejan de un dolor de espalda por cansancio y sensación de cansancio. Músculos; pesados, adoloridos, ardorosos. Adolorimiento constante y sensibilidad sobre los riñones. Diabetes insípida y mellitus. Anemia. Reflejos uterinos. Hidropesía después de hemorragia uterina.

AGRAVACION:

Fatiga. Embarazo. Por agacharse. Presión de las ropas. Movimiento.

MEJORIA:

Si está ocupada. Por diversión. Sosteniéndose el abdomen.

MENTE:

Extremadamente pesimista. Melancolía. Irritable; no puede soportar la menor contradicción. Encuentra falta en todos. Desea que la dejen sola. Conversación desagradable. Siempre mejor cuando está haciendo algo; cuando la mente está ocupada.

CABEZA:

Calor o presión hacia arriba en el vértice, como si el cráneo estuviera muy lleno.

BOCA:

Salivación de mujeres embarazadas y niños en dentición. Aftas; durante el embarazo. Sabor amargo temprano en a.m.

URINARIO:

Dolor sordo y calor en la región de los riñones; en lugar de las reglas. Orina; profusa, clara; albuminosa; sacarina; fosfática. Nefritis; del embarazo; con vómitos obstinados. Con frecuencia descarga involuntaria de orina, después de que la vejiga se siente vacía.

MUJERES:

Reglas; muy frecuentes, muy profusas. Hemorragia; por atonía; de sangre oscura y fétida. Utero; pesado, adolorido, sensible, ulcerado o prolapsado o con otras indisposiciones. Estorbo pesado en la pelvis. Reglas suprimidas, riñones congestionados. Conciencia del vientre. Leucorrea fétida, grumosa o con bultos. Estorbo en la región sacra, con prolapso. Prurito vulvar. Vulva; aftosa, inflamada. Senos hinchados. Pezones dolorosos y sensibles < presión de las ropas.

RESPIRATORIO:

Pecho como exprimido.

ESPALDA:

Dolor y peso en la espalda. Adolorimiento entre las escápulas. Cansada y débil. Debilidad, peso y sensación de algo que cuelga en el sacro, bajo los glúteos.

EXTREMIDADES:

Dolor ulceroso en la parte exterior de los muslos. Sensación como si aire frío soplara en las pantorrillas. Los pies se sienten entumidos, estando sentado.

FIEBRE:

Se siente caliente cuando está cansado.

RELACIONES:

Senec; Sep; Tril.

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

GENERALIDADES:

Un sulfato impuro de calcio. Afecta los Nervios, haciendo al paciente Hipersensible a todas las impresiones; al frío; al dolor; contacto, ruido, olores, las corrientes de aire; el mínimo dolor causa desvanecimiento. El paciente es de un carácter indolente; y de músculos débiles; rubios. El Tejido Conectivo se afecta, produciendo la tendencia a la supuración; que está muy marcada. Tiene una especial afinidad a las Membranas Mucosas Respiratorias produciendo secreciones profusas. Todas las descargas son profusas; fétidas; como queso viejo; ácidas; evacuaciones, olor del cuerpo, sudor, etc. Suda fácil y profusamente; pero no se atreve a descubrirse; sudores sin alivio. Glándulas inflamadas; se hinchan y supuran. El paciente es Friolento; usa un sobretodo aún en clima caliente. Como viento que soplara en las partes. Se resfría por exposición a clima húmedo y frío. Los dolores son ulcerosos, Punzantes; como astillas puntiagudas. La piel de los pliegues está por lo general afectada; Cada Herida se Ulcera. Abscesos; amenazantes; mucha pus espesa. Establece la supuración y remueve cuerpos extraños. Amarillo; expectoración, esclerótica, sudor, etc. Mastoiditis. El lugar donde se está acostado por la noche, se pone gradualmente muy doloroso; debe voltearse. Pelagra. Nódulos duros y ardorosos. Mental y físicamente sentido. Malos efectos de lesiones; erupciones suprimidas; mercurio. Debilidad temblorosa después de fumar tabaco. Dolor en los huesos; caries. Espasmos después de lesiones.

AGRAVACION:

Aire Frío y Seco. Invierno. Corrientes- de Aire Frío. La parte que se vuelve fría. Por descubrirse- mínimamente: Contacto. ruido, fatiga. Estando acostado sobre la parte dolorida. Mercurio. Noche.

MEJORIA:

Calor. Por cubiertas calientes - en la Cabeza. Calor húmedo. Clima húmedo.

MENTE:

Abatido y triste. Debilidad de la memoria súbita. Quisquilloso; mental y físicamente; fácilmente. Regañón, difícil de llevarse bien con él, nada le place, siente disgusto por personas, lugares; se pone enfadado y violento. Irritable o Insatisfecho, consigo mismo o con otros. Fiero; quiere matar a quien lo ofende; quiere prender fuego a las cosas. Impulsos horribles. Apresurado; en el lenguaje, y al beber. Las palabras se arrollan unas detrás de las otras. Niños traviesos. El niño no ríe, ni se divierte solo. Se sienta silencioso y sin hablar en un rincón.

CABEZA:

Vértigo < paseando en un carro o sacudiendo la cabeza. Cefalalgia fastidiosa en la sien derecha y en la raíz de la nariz, < movimiento; agachándose. El cabello se cae; en placas, después del dolor de cabeza. Cuero cabelludo adolorido y sensible. Nudosidad dolorosa en la cabeza. Sudor frío en la cabeza. Dolor constante y presivo en la mitad del cerebro como por un tapón.

OJOS:

Ulceras de la cornea o la mácula. Hipopión. Los objetos parecen rojos y muy grandes. Pequeños granos alderredor del ojo inflamado. Fotofobia. Campo de la visión a la mitad. Anestesia de la retina, por mirar un eclipse.

OIDOS:

Dolor punzante en los oídos. Aumento de cerúmen. Perforación del tímpano. Otorrea fétida. Mastoiditis. Costras en y detrás de las orejas.

NARIZ:

Obstrucción o estornudos y secreción de la nariz cada vez que sale al aire frío y seco. La nariz sangra; después de cantar. Dolor ulceroso en la raíz de la nariz. Obstrucción dolorosa de la nariz. Olor como de queso viejo. Fiebre de Heno. Catarros maduros y viejos. Estornudos con cada viento frío.

CARA:

Amarilla, con círculos azules alderredor de los ojos. El labio inferior está agrietado en la mitad. Huesos dolorosos al tacto. Punzada en la mandíbula inferior al abrir la boca. Ulceras en las comisuras de los labios. La mandíbula superior se proyecta. Herpes que sigue el curso del nervio supra-orbital. Granos en la frente que desaparecen al aire libre. Hinchazón dura de la mejilla; con un crecimiento duro en ella.

BOCA:

Dientes flojos. Los dientes cariados se sienten muy grandes. Las encías sangran fácilmente. Ulceras del paladar suave que cubren la úvula. Aliento ofensivo. Pústulas aftosas en los labios internos y mejillas.

GARGANTA:

Inflamación de las anginas y glándulas del cuello. Cinganquia. Sensación como si una espina o astilla estuviese clavada en la garganta, y se extiende a los oídos al bostezar. Sensación de un tapón. Escupe moco. Bocio (d) con dolores dentro de la cabeza. Punzadas que se extienden al oído cuando deglute. Amigdalitis crónica, con dureza de oído.

ESTOMAGO:

Deseo de ácidos, condimentos y estimulantes; vinagre. Estómago débil; ardor y pesadez en el estómago, después de una comida ligera, fácilmente indispuerto. Sensación constante de ácido que sube por el esófago. Comer restaura, pero causa pesadez. Bebe con avidez. Aversión a los alimentos grasosos. En ocasiones desea algo, pero cuando lo obtiene no lo quiere. Dolor al caminar, como si pendiera flojo.

ABDOMEN:

Punzadas en la región del hígado < por caminar, toser, respirar o tocarlo. Heces suaves pero expelidas con dificultad. Abdómen; distendido y tenso. Moco fétido que sale del ano. Sangrado del recto, con heces suaves. Diarrea después de beber agua fría. Hepatitis. Absceso hepático. Heces; ácidas, blancas. Hemorroides.

URINARIO:

La orina pasa lentamente; con dificultad; cae perpendicularmente. Debe esperar para orinar. Paso de sangre o pus después de orinar. Nefritis, después de exantema. Parece que siempre permanece algo de orina en la vejiga, después de orinar.

HOMBRES:

Chancro como úlceras en el prepucio. Flujo de líquido prostático después de orinar, durante la evacuación. Condiloma, fétido. Gonorrea obstinada. La piel de los pliegues entre el escroto y los muslos se vuelve húmeda y ulcerada. Glande e ingles supuran.

MUJERES:

Descarga de sangre del útero durante o después de evacuar. Leucorrea muy fétida, caliente, membranosa, purulenta; huele como a queso viejo. Absceso de los labios con gran sensibilidad. Comezón en los pezones y parte pudenda < en las reglas. Cáncer, con ulceración. Coito muy doloroso por útero crecido y antevertido, con congestión de ovarios.

RESPIRATORIO:

Laringe; sensible al aire frío; dolorosa. Pérdida de voz, y tos al exponerse al viento seco y frío. Tos por descubrirse una mínima parte. Ronquera; crónica; de los cantantes. Respiración silbante, sofocante, debe doblar la cabeza hacia atrás. Tos sofocante, ladrante < por bebidas frías o en a.m.; expectorante; como por una pluma. Debilidad y Mucho cascabeleo en el pecho; expectoración Floja; pero no puede expectorar; rigidez en aire frío. Mucha expectoración espesa, amarilla. Bronquitis recurrente, por cada resfrío. Sensación como de gotas de agua caliente en el pecho. Asma; después de supresiones. Lloro antes de toser. Afonía. Tos < por la noche hasta medianoche.

CORAZON:

Palpitación con punzadas.

ESPALDA:

Hormigueo en la escápula derecha.

EXTREMIDADES:

Tumores enquistados en la punta del codo. Panadizo. Uña del dedo gordo, dolorosa a la mínima presión. Dislocación fácil de las coyunturas de los dedos. Dolor dolorido en la articulación de la cadera < caminando. Inflamación de la rodilla, tobillo y pié. Dolores perforantes en las piernas. Absceso en axila. Hinchazón de pies cerca de los tobillos, con respiración difícil.

PIEL:

Sensible al aire fresco. Erupciones húmedas y fétidas en los pliegues. Úlceras tórpidas y pulsátiles, circundadas por unas más pequeñas o por granos o forúnculos. Piel; agrietada, grietas profundas en manos y pies. Úlceras frías muy sensibles. Urticaria crónica y recurrente. Edema angio-neurótico. El cuerpo exhala un olor fétido. Impétigo. Granulación pobre.

SUEÑO:

Insomnio; sueños ansiosos de fuego. No restaurador. Despierta en la noche, con erección y deseo de orinar.

FIEBRE:

Fiebre baja; hética. Sudor profuso; con el mínimo ejercicio; día y noche; ácido, pegajoso; ofensivo. Sudores nocturnos.

COMPLEMENTARIO:

Iod; Sil.

RELACIONES:

Merc.

HYDRASTIS

GENERALIDADES:

Actúa en las Membranas Mucosas, causando proceso Catarral, con tendencia a hemorragia y ulceración; el catarro puede ser en cualquier parte - garganta, estómago, útero, uretra; que se caracteriza por descarga espesa, amarilla, acre, filamentosa; se puede encontrar moco en las heces, en la orina, al carraspear, de allí que puede ser llamado un remedio mucoso. Produce condiciones atónicas, caquéticas, degenerativas, por lo que es adecuado en personas ancianas, fácilmente cansadas, débiles, con gran debilidad, y emaciación. Sensación de ulceración ardorosa. Cáncer, y estados pre-cancerosos. Bocio de la pubertad y embarazo. Modifica el curso de la viruela cuando se dá internamente y se aplica en el exterior. Conatos frecuentes de desmayo con sudoración profusa. Ulceras superficiales. Heridas pequeñas que sangran y supuran. La ropa se siente incómoda cerca de las ingles.

AGRAVACION:

Inhalando aire. Aire frío. Vientos secos. Al aire libre. Por un ligero sangrado. Por lavarse. Contacto. Ancianos. Movimiento.

MEJORIA:

Presión.

MENTE:

Depresión; está seguro de su muerte y la desea. Olvidadizo.

CABEZA:

Neuralgia en el cráneo y cuello. Eczema en la frente y a lo largo de la línea del cabello < después de lavarse.

OJOS:

Oftalmía, descarga de moco espeso. Amarillos.

OIDOS:

Otorrea; descarga de moco espeso. Rugido. Sordera; por catarro eustaquiano.

NARIZ:

Ulcerada, sangra; costras sanguinolentas. Ozena. Goteo post-nasal. El aire se siente frío en la nariz. Se suena todo el tiempo. Sinusitis después de coriza.

CARA:

Delgada, amarilla, sumida. Cáncer en los labios.

BOCA:

Lengua; blanca, amarilla, sucia, hinchada, grande, floja, estrecha, con huella de los dientes; se siente como escaldada. Estomatitis; de las madres que amamantan, o niños débiles. Gusto, amargo. Aftas. Crecimientos cancerosos sangrantes y dolorosos, en el paladar duro.

GARGANTA:

Faringitis folicular. Escupe moco amarillo y tenaz.

ESTOMAGO:

Digestión débil. Sensación de hundimiento en el estómago con aversión por los alimentos, o como un tapón agudo en el estómago. Ulceras y cáncer. Tumores epigástricos dolorosos, con pulsación. Vomita todo alimento, retiene solamente leche, o agua, mezcladas. No puede comer pan o vegetales.

ABDOMEN:

Dolor cortante desde el hígado a la escápula derecha < yaciendo sobre la espalda o lado derecho. Atrofia; cáncer, de hígado. Ictericia. Evacuaciones nudosas, cubiertas o mezcladas con moco. Hemorroides - aún el más ligero sangrado agota. Constipación obstinada; en el embarazo; después de purgantes. Punzadas ulcerantes en el recto durante las evacuaciones, permanecen mucho tiempo después. Dolor en las ingles, como si estuviesen torcidas.

URINARIO:

Moco en la orina. Descarga espesa, amarilla. Olor pútrido de la orina.

MUJERES:

Erosión del cérvix. Leucorrea espesa, acre; amarilla; filamentosa. Prurito vulvar, con leucorrea profusa; con excitación sexual. Cáncer del seno; pezones retraídos; ulcerados, agrietados en mujeres que amamantan. Menorragia y metrorragia; con fibromas. Remueve la tendencia a placenta adherente habitual. Vagina dolorosa durante el coito; sangrando después. Dolor en el seno (d) al estornudar. Descarga del útero, caliente, acuosa.

RESPIRATORIO:

Bronquitis de los viejos agotados. Tos floja; sanguinolenta o espesa, esputo amarillo y tenaz; saca mucho moco. Respiración difícil < yaciendo sobre el lado izquierdo.

CORAZON:

Palpitación, por debilidad lenta y progresiva.

CUELLO Y ESPALDA:

Neuralgia del cuello. Dolor sordo, penetrante y pesado a través de la región lumbar; usa sus brazos para poder levantarse de su asiento.

PIEL:

Erupciones; como de viruela. Ulceras, cancerosas. Ulceras atónicas, que siguen a una remoción de tumores.

FIEBRE:

Calor que alterna con escalofrío. Tendencia a sudar profusamente.

RELACIONES:

Ars; Kali-bi; Pul.

HYDROCOTYLE

GENERALIDADES:

Conocida como la Hierba India del Centavo (Karivna). Produce hipertrofia e induración del tejido conectivo. Engrosamiento excesivo, y exfoliación marcada de la piel. Se supone que tiene influencia sobre la lepra, elefantiasis, lupus; erupciones color cobre en varias partes. Comezón intolerable, especialmente de las plantas, vagina. No puede permanecer derecho.

HYDROCYANIC ACID

GENERALIDADES:

Es un veneno mortal de la acción más rápida; produce convulsiones, parálisis, colapso, calambres dondequiera. Los efectos son súbitos; espasmos, colapso, apoplejía. Falta de reacción. Contracturas como de relámpago, desde la cabeza a los pies. Las evacuaciones se suspenden de pronto, y se sume en la inconsciencia. Desmayos prolongados. Azulosidad. Ataques epilépticos precedidos de náusea y vómitos o aflujo de agua en la boca. Catalepsia. Frialdad intensa.

AGRAVACION:

Luna llena. Supresiones. Tormentas.

MENTE:

Inconsciencia. Temor de problemas imaginarios; de muerte, desplome de casas, caballos, carros, etc. de cruzar las calles, aunque el vehículo se encuentre a una distancia considerable. Gritos fuertes e involuntarios; antes de las convulsiones.

CABEZA:

Congestión cerebral intensa; el cerebro se siente como en fuego. Como si una nube estuviese sobre su cerebro.

OJOS:

Distorsionados y medio abiertos. Globos oculares fijos.

CARA:

Pálida, o azulosa; parece viejo. Calambres en los maseteros, quijadas apretadas en espasmo rígido. Labios pálidos o azules. Espuma en la boca. Contorsión atemorizante en los músculos.

BOCA:

Seca. Gusto; como de pus, metálico, astringente. Lengua fría.

GARGANTA:

Deglución ruidosa; la bebida retumba por la garganta y estómago. Espasmo o parálisis del esófago.

ESTOMAGO.

Gran hundimiento en la boca del estómago. Anorexia. Cólera. Ardor desde el ombligo al esófago; dispepsia crónica.

RESPIRATORIO:

Respiración lenta, irregular, entrecortada. Asfixia. Tos seca, nocturna, cosquilleante. Asma; con sofoco en la garganta. Convulsiones con tosferina.

CORAZON:

Apretones en el corazón como con angustia. Falla cardíaca; compresión en el corazón. Pulso; decayente, débil, irregular, desigual, con latido ocasional fuerte. Venas distendidas; con retorcimiento. Angina, con dolor severo.

ESPALDA:

Los músculos de la región dorsal, están contraídos. Manos heladas.

PIEL:

Erupciones azulosas.

SUEÑO:

Bostezos, con estremecimientos. Somnolencia. Coma.

FIEBRE:

Frialdad de hielo; < manos.

RELACIONES:

Agar; Cup; Laur.

HYDROPHOBINUM (Ver Lyssin)

HYOSCYAMUS

GENERALIDADES:

Conocida comúnmente como Matagallinas o Matapuercos, perturba la Mente; sistema nervioso y cerebro profundamente. Una fuerza diabólica parece tomar posesión del cerebro impidiendo sus funciones. Causa un perfecto retrato de manía, de naturaleza lasciva y pendenciera. Convulsiones; temblores, sacudidas; torcimientos, calambres, son muchos rasgos marcados. Manía activa o convulsiones, que alternan con, o terminan en un sopor profundo. Los movimientos de los brazos son de apretón o angulares; avienta los brazos, falla al tratar de tomar algo que quiere alcanzar; trastabillea al caminar. Parálisis después de espasmos. Epilepsia; vértigo antes del ataque. Cae de pronto al piso y grita. Carfología, escarba las ropas de cama; los dedos. Estando acostado sobre la espalda, de pronto se sienta y luego se acuesta otra vez. El niño llora y grita sin despertarse. Eclampsia. Substultus; durante la fiebre. Fiebres sépticas. Se resbala en la cama. Malos efectos de loquios o leche suprimidos. Miedo, decepción amorosa. Corea; local, torcimiento de músculos aislados; bizqueo, tartamudeo. Adecuado para personas nerviosas; irritables; excitables. Sensación de que camina en y a través de aire.

AGRAVACION:

Emociones; celos; susto; amor desdichado. Antes y durante las reglas. Contacto. Frío. Sueño. Acostado.

MEJORIA:

Por sentarse. Movimiento. Calor. Agachándose.

MENTE:

Muchas aberraciones desatinadas. Manía. Erótismo; (mujeres) expone sus genitales; canta canciones amorosas. Hace cosas tontas, se comporta como un loco. Se ríe, canta, habla, balbucea, regaña. Manosea sus genitales. Celoso. Suspica. Teme; estar solo, ser perseguido; agua; ser envenenado; ser mordido, etc. Se ríe de todo; tontamente. Inquietud; salta de la cama; quiere escapar. Pronuncia cada palabra fuerte. Rabia; con deseo de golpear, morder, pelear, insultar, regañar y matar. Gritos quejumbrosos al menor contacto, aún en estupor. Inconsciencia, apenas puede ser levantado. Murmuración, delirio. Piensa que no está en casa. Sin habla por miedo. Confusión. Primero no puede pensar, luego apenas puede ser levantado. Habla con personas imaginarias, con los muertos. Imagina que las cosas son animales. Temor de ser mordido por bestias. Juega con los dedos. Tonto; hace actos cómicos. Vé sus manos que le parecen demasiado grandes. Sifilofobia.

CABEZA:

Oleadas de pulsaciones en la cabeza. Cefalalgia pulsátil. Vértigo, antes de espasmos, por el olor de las flores, gas, etc. Rota o sacude la cabeza hacia adelante y atrás; cuando se dobla hacia adelante; en estupor; después de concusión cerebral. El cerebro se siente suelto. Como agua que chapotea en la cabeza.

OJOS:

Aversión a la luz. Ojos abiertos pero no pone atención. Cerramiento espasmódico de los párpados. Los ojos rotan alrededor de las órbitas. Bizqueo. Mirada fija y constante en los objetos circundantes. Objetos; se ven rojos, grandes, o con los bordes coloreados (amarillo).

OIDOS:

Sordera, por parálisis del nervio auditivo.

NARIZ:

Alas como con hollín, ahumadas. Estremecimientos súbitos de la raíz de la nariz. Pérdida de olfato y gusto.

CARA:

Pálida, sonrojada, rojo obscuro. Los músculos se estremecen. Muecas, hace gestos ridículos. Caída de la mandíbula inferior. Los músculos se estremecen, al sacar la lengua. Trismo.

BOCA:

Fuliginosidades en los dientes; los aprieta fuertemente. Espuma en la boca. Saca la lengua con dificultad, difícilmente la puede retraer. Lenguaje; defectuoso, perdido por miedo. Lengua rígida, oscura, roja, agrietada, parece como cuero quemado. Se muerde la lengua al hablar. Lengua, seca, tabletea en la boca. Rechina los dientes, durante la convulsión, niños. Los dientes se sienten flojos al masticar; también muy largos. Dolor violento en los dientes, con estremecimiento de los músculos de las manos, cara, etc.

GARGANTA:

Elongación de la úvula. Constricción de la garganta, incapacidad para deglutir líquidos; sólidos y alimentos tibios >. Los líquidos se devuelven por la nariz, o se van por la laringe.

ESTOMAGO:

Hipo; por concusión del cerebro; de niños que se amamantan. Vómito con convulsiones. Calambres en el estómago > después de vomitar; < después de alimentos irritantes. Aversión por el agua.

ABDOMEN:

Cólico, como si el abdomen fuera a estallar. Cólico; con vómito, eructos, hipo y chillidos. Manchas rojas en el abdomen. Ombligo abierto, con orina rezumante. Evacuaciones; involuntarias, sanguinolentas, amarillas, acuosas o duras, < por excitación mental, durante el sueño; durante fiebres; al orinar. Gastritis o peritonitis con hipo. Diarrea después del parto.

URINARIO:

Micción frecuente, escasa, dolorosa, nocturna; o retención de orina; después del parto; parálisis de la vejiga. Micción involuntaria.

HOMBRES:

Lascivos; exponen sus genitales, juega con ellos, durante la fiebre.

MUJERES:

Lascivas; descubre sus partes sexuales. Ninfomanía. Espasmos histéricos o epilépticos antes de las reglas. Temblor convulsivo de las manos y pies durante las reglas. Enuresis, durante las reglas. Diarrea indolora en mujeres después del parto. Fríos que se establecen en el vientre y traen dolores como de parto. Convulsiones durante el embarazo. Leche y loquios suprimidos.

RESPIRATORIO:

Tos espasmódica, seca, cortante; por un punto seco en la laringe; por la noche; < estando acostado, por comer, beber, hablar, cantar, > sentándose. Hemoptisis-rojo brillante; con espasmos. Espasmos del pecho con respiración corta, forzándolo a doblarse en dos. Tos fatigante, con sudor.

CUELLO:

Rígido, contraído hacia un lado.

EXTREMIDADES:

Temblor de manos y pies. Dedos contraídos espasmódicamente mientras camina o al subir escaleras. Puños engarruñados con retracción de los pulgares (en convulsiones).

SUEÑO:

Desvelo nervioso. Cae dormido mientras contesta. Se sobresalta de su sueño; asustado. Se sienta y luego se duerme otra vez. Sueño profundo. Se ríe en sueños.

FIEBRE:

Fiebre baja con piel caliente y pálida. Sudor caliente.

RELACIONES:

Bell; Pho; Stram.

HYOSCYAMINE HYDROBROMATE

GENERALIDADES:

Esta droga alivia los temblores de la esclerosis diseminada y la parálisis agitante. Insomnio y agitación nerviosa.

HYPERICUM

GENERALIDADES:

Un remedio excelente para la lesión de partes ricas en filetes nerviosos, especialmente dedos, dedos de los pies, matriz de las uñas. Laceraciones; cuando el dolor es intolerable, violento, punzante, lancinante y que muestra que los nervios están severamente involucrados. Lesiones en el cerebro y el cordón espinal o malos efectos de tales lesiones. Espasmos después de cada lesión. Partes muy dolorosas e irritadas, occipucio, cóccix, etc. El dolor se extiende hacia el tronco o para abajo hacia los lados con hormigueo y entumecimiento. Neuritis; de la cabeza o el pecho; en epigastrio; espina intra-escapular; puntas de los dedos, etc. Punzadas desde las partes afectadas. Cosquilleo, ardor y entumecimiento, con neuritis. Neuralgia del muñón. Estremecimientos. Previene el tétanos, y alivia el dolor después de operaciones. Las articulaciones se sienten magulladas. Convulsiones después de haberse golpeado el cuerpo contra algo. Contractura de las extremidades. Heridas punzantes o penetrantes, muy sensibles al tacto. Malos efectos de un susto, mordidas, choques. Las heridas están más sensibles que lo que aparentan. Se acuesta sobre la espalda, torciendo la cabeza hacia atrás. Dolor en cicatrices antiguas.

AGRAVACION:

Lesiones. Sacudidas. Concusiones; de la espina, cóccix. Choques. Magulladuras. Contacto. Ejercicio. Cambio de clima. Nieblas. Frío, húmedo. Movimiento. Después de un parto por fórceps, como complicación de una lesión.

MEJORIA:

Yaciendo sobre la cara. Doblándose hacia atrás. Frotando.

MENTE:

Comete errores al escribir; olvida lo que quiere decir. Se siente elevado en el aire o ansiedad, no sea que caiga de una altura. Melancolía.

CABEZA:

Pesadez u hormigueo en el cerebro. El cerebro se siente flojo. La cabeza se siente como si fuese tocada con manos heladas. La cabeza se siente más grande, como jalada hacia un punto. Latido en el vértice. Caída de cabello; después de una lesión.

CARA:

Abotagada, caliente. Eczema de la cara; las erupciones parecen estar bajo la piel. Comezón intensa. Dolor de muelas > yaciendo sobre el lado afectado y quietamente.

GARGANTA:

Sensación como de un gusano que se moviera allí. Elevaciones calientes en el esófago después de un susto o con sensación ansiosa. Lengua blanca atrás, punta limpia. Deseo de vino, con sensación de calor en la boca.

ESTOMAGO:

Sed, con sensación de calor en la boca. Náusea. Eructos mientras bebe agua. Deseo de pepinillos, bebidas tibias, vino.

ABDOMEN:

Burbujeo en el ombligo. Distensión timpánica > después de evacuar (después de laparotomía). El recto se siente seco. Diarrea de verano con erupciones en la piel. Hemorroides con dolor, sangramiento y sensibilidad, (uso interno y externo).

MUJERES:

Entuertos violentos en sacro y caderas, con cefalalgia severa; después de un parto con fórceps.

RESPIRATORIO:

Conatos de tos corta y ladrante. Asma < en clima neblinoso y > por una expectoración profusa.

CORAZON:

Se siente como si se fuese a caer.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la nuca. Presión sobre el sacro. Consecuencias de una concusión espinal. Cóccix doloroso, dolor que irradia hacia arriba a la espina, y hacia abajo a las piernas. Espina dolorosamente sensible. Dolor en las caderas; espalda baja y cóccix después de parto.

EXTREMIDADES:

Los miembros se sienten desprendidos. Presión a lo largo del lado ulnar del brazo. Hormigueo en mano y pies. Dolorimiento del nervio ciático (izquierdo) después de estar sentado por un tiempo prolongado. Las manos y pies se sienten como aterciopelados, o los huesos adoloridos. Dolor violento e incapacidad de caminar o agacharse después de una caída sobre el cóccix.

PIEL:

Cicatrices dolorosas en los tejidos ricos en nervios. Heridas abiertas. Piel áspera como llena de pequeños nudos. Dolor en cicatrices antiguas.

SUEÑO:

Somnolencia constante. Sueños laboriosos.

FIEBRE:

Estremecimientos sobre todo el cuerpo con deseo de orinar.

RELACIONES:

Arn; Led; Rhus-t.

IBERIS

GENERALIDADES:

Este remedio tiene una acción marcada en el corazón; y es útil en enfermedades cardíacas. Hipertrofia cardíaca, con engrosamiento de las paredes del corazón. Debilidad cardíaca después de influenza. Región del hígado plena y dolorosa. Palpitación; con vértigo y sofoco en la garganta; < con el mínimo ejercicio, risa, tos. Dolores punzantes a través del corazón. Entumecimiento y cosquilleo en la mano y brazo izquierdos.

AGRAVACION:

Acostándose; sobre el lado izquierdo. Movimiento; esfuerzo. Habitación caliente.

IGNATIA

GENERALIDADES:

Las semillas de Ignatia contienen una proporción más grande de estricnina que las de Nux vómica, pero aún así existe una gran diferencia entre los rasgos característicos de las dos drogas. Aunque afecta la Mente; el elemento Emocional está profundamente influenciado y la coordinación de las funciones está interferida; causando Efectos erráticos; que cambian rápidamente, y se oponen unos a otros. El Sistema Nervioso está afectado, causando Efectos espasmódicos; con frecuencia violentos con rigidez, estremecimientos y temblores. Se adapta a personas de temperamento nervioso, especialmente a mujeres de naturaleza sensible, fácilmente excitada, disposición dócil, rápidas en percibir y rápidas en ejecutar. Sensación de un bulto, cuerpo extraño o presión aguda. Los estremecimientos recorren todo el cuerpo. Tendencia a sobresaltarse. Globo. Clavo. Histeria. Corea; después de un susto, una pena < después de comer, > acostándose sobre la espalda. Convulsiones en los niños; durante la dentición; después de un castigo; después de un susto o miedo; aparece a la misma hora todos los días. Espasmos con gritos o risa involuntaria. Espasmos tónicos de partes aisladas, con espuma en la boca. Espasmos que alternan con respiración opresiva. Dolor en un punto < por poner atención. Hipersensible al dolor. El dolor cambia su localización, viene gradualmente, cesa de pronto, o viene y vá súbitamente. Los síntomas pasan después de una micción profusa. Peste; preventiva y curativa. Estremecimientos nerviosos ; con dolor. Parálisis; después de grandes emociones mentales y velas nocturnas, en el cuarto del enfermo. Adecuado para personas hambrientas ya sea por carencia u otras causas. Malos efectos de penas, sustos, preocupaciones, decepciones amorosas; celos; lesiones espinales antiguas. Catalepsia con opistótonos. (Nat-mur. debe seguir en condiciones crónicas).

AGRAVACION:

Emociones. Penas. Disgustos. Preocupaciones. Susto; shocks después de haber perdido personas u objetos que fueron muy queridos. Aire; libre, frío. Olores. Contacto. Café. Tabaco. Bostezos. Agachándose, caminando; de pié. Cosas ácidas.

MENTE:

Alerta; Hipersensible y Nerviosa. Altamente emocional. Melancólica. Medita sobre su Pena. Silenciosa y triste. Suspira, llora o se ríe por turnos, ríe cuando debiera estar seria. Caracter cambiante. Amor desafortunado. Llanto interno; goza estando triste. Enojado consigo mismo. Deseo de estar solo. Todo la molesta. Intolerante a la contradicción; a las reprimendas. Angustia; grita para pedir ayuda. Caprichosa. Delicadeza de conciencia. Temor; de los ladrones; de cosas nimias, de cosas que suceden a su alderredor. Introvertida. Se desmaya con facilidad, jovencitas que se desmayan cada vez que van al

templo: o que se enamoran de hombres casados. Sensación de que ha ayunado por largo tiempo. Apresurada durante las reglas; nadie hace las cosas con suficiente prontitud. Busca alderredor de la cama como si quisiera encontrar algo. Se deleita haciendo escándalo, y producir alarma o una escena. Piensa que ha descuidado sus quehaceres. Llantos y suspiros. No se comunica. Temor de ladrones por la noche.

CABEZA:

Dolor como si un clavo fuese introducido a los lados; termina con un bostezo y vómito; se alterna con dolor de espalda. Cefalalgia < o > por agacharse. Echa la cabeza hacia atrás; como por un peso en el occipucio; o durante espasmos. Vértigo con destellos ante los ojos. El habla en voz alta < la cefalalgia. Dolor de cabeza; por abuso de rapé, humo de tabaco, café, por fijar la atención.

OJOS:

Astenopía; con espasmos de los párpados, y dolores neurálgicos alderredor de los ojos. Ráfagas de luz, por tos violenta. Los párpados parecen secos. Moscas volantes y zigzags delante de los ojos.

OIDOS:

Rugido > por música. Un oído rojo y caliente. Sordera, excepto para la voz humana.

NARIZ:

Sensible al aire inspirado. Dolor sobre la raíz de la nariz. Ataques de estornudos. Fría, con rodillas calientes.

CARA:

Estremecimientos de los músculos de la cara y los labios. Enrojecimiento y calor de una mejilla; roja y pálida alternadamente. Maseteros rígidos y duros. Trismo emocional. Cambia color con frecuencia estando en reposo. Músculos faciales distorsionados al tratar de hablar.

BOCA:

Cerramiento espasmódico de las mandíbulas; se muerde el interior de las mejillas o la lengua al hablar o masticar. Las comisuras se tuercen. Gusto ácido. Dolor de muelas < después de beber café y fumar. Ataques súbitos de salivación.

GARGANTA:

Anginas inflamadas, hinchazón dura, con pequeñas úlceras en ellas. Tonsilitis folicular. Sensación como de un bulto cuando no deglute o que no puede ser tragado; > comiendo sólidos. Tendencia al atragantamiento - Globo histérico. Punzadas que se extienden al oído; entre actos de deglución. Glándulas submaxilares dolorosas al mover el cuello. Calambres en el esófago. Bocio.

ESTOMAGO:

Hambre con náusea. Desea cosas crudas o indigestas; cosas ácidas, pan, especialmente de centeno. Apetito por varias cosas, pero cuando se le ofrecen, el apetito desaparece. Aversión por los alimentos tibios, carne, alcohol, tabaco. Vacío y hundimiento o dolor espasmódico en el estómago no > por

comer; > por hacer respiraciones profundas. Hipo; con eructos vacíos o amargos; después de comer, beber, fumar. Náusea o vómito > cosas indigestas.

ABDOMEN:

Dolor cólico y de apretón en uno o los dos lados del abdomen: Heces - dolorosas, difíciles aunque estén suaves. Dolor constrictivo y ulceroso en el recto, como por hemorroides ciegas, permenece una o dos horas después de defecar. Constipación de los neurasténicos. El dolor se dispara hacia arriba en el recto. Hemorroides > sentándose; < tosiendo. Prolapso del recto; por esfuerzo moderado en la evacuación. Presión como de un instrumento agudo de dentro hacia afuera. Contracción indolora del ano. Hemorragia y dolor < cuando la evacuación es floja. Constipación por resfriarse; por pasear en carro; necesidad de evacuar con erección.

URINARIO:

Orina frecuente, profusa, acuosa. Necesidad de orinar, con incapacidad para pasar la orina.

HOMBRES:

Erección durante la evacuación. Sudor en el escroto. Pene; contraído, se pone pequeño.

MUJERES:

Reglas; irregulares; negras; muy adelantadas, muy profusas, o escasas; suprimidas por penas. Leucorrea crónica, con deseo sexual. Frigidez sexual.

CORAZON:

Palpitación durante las reglas. Sensación de ansiedad en la región.

RESPIRATORIO:

Hace inspiraciones profundas; para mejorarse. Sofocos; por espasmo de la glotis. Tos seca, cortante, espasmódica, en choques rápidos y sucesivos; cortando la respiración; tos como por polvo o humos de azufre. La tos aumenta el deseo de toser. Tos, cada vez que se detiene durante una caminata. Constricción del pecho, lo siente demasiado pequeño. Voz susurrante, no puede hablar en voz alta. Somnolencia después de la tos. Punzadas en los pezones al inspirar con profundidad.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez de la nuca. Doblamiento convulsivo de la espalda hacia atrás.

EXTREMIDADES:

Sacudidas en los miembros. Sudor tibio en las palmas. Calambres en las pantorrillas. Pies pesados. Dolor de dislocación en las coyunturas. Las rodillas involuntariamente se encogen hacia arriba al caminar. Temblor de las manos al escribir en presencia de alguien. Ardor en los talones al ponerlos uno cerca del otro, cuando se juntan, están fríos al contacto; < por la noche. Ciática < en invierno; > en verano. Callos dolorosos como ulcerados. Rodillas calientes con nariz fría. Como si la carne se aflojara de los huesos por un golpe.

PIEL:

Dolorosa > presión. Urticaria sobre todo el cuerpo con comezón violenta (durante la fiebre).

SUEÑO:

Bostezos violentos y espasmódicos, con lagrimeo de los ojos. Sueño ligero; cada sonido lo despierta. Estremecimiento de las extremidades al dormirse. Sonambulismo por orgullo herido. Sueños; los mismos sueños horribles se repiten una y otra vez. El niño despierta de su sueño con gritos agudos y temblando. Hipo, movimientos de masticación al dormir (niños).

FIEBRE:

Frío con cara roja. Escalofrío que sacude con sed. Sudor < al comer; con frecuencia en un pequeño punto en la cara. Calor, con aversión a descubrirse pero sin sed. Escalofrío, durante los dolores. Sensación como de que aparecerá un sudor, lo que no sucede.

COMPLEMENTARIO:

Aur; Nat-m; Pho-ac; Sep.

RELACIONES:

Cimi; Nux-v; Sep.

INDIGO

GENERALIDADES.

Tiene una reputación en el tratamiento de la epilepsia, cuando los ataques están precedidos por una disposición de furia excitable, seguida de melancolía, timidez y sumisión, o hay una sensación peculiar de ondulación en el cerebro con oscurecimiento de la vista; o como si el cerebro estuviese congelado, antes del ataque. Dolor en las extremidades < después de cada alimento. Ciática - dolor desde la mitad de los muslos hasta la rodilla.

AGRAVACION:

Sentándose. Descanso.

MEJORIA:

Masajeando. Presión. Por caminar.

IODIFORMUM

GENERALIDADES:

Un remedio muy útil para condiciones tuberculosas, especialmente la meningitis tuberculosa; y por la falla en la vista debido a una neuritis retro-bulbar, escotoma central, atrofia parcial del disco óptico. Sueño interrumpido por suspiros y gritos. Pupilas dilatadas; contracción desigual. Diarrea crónica, evacuaciones; verdosas, acuosas, indigeridas, con temperamento irritable, debido a una sospecha de tuberculosis. Glándulas mesentéricas crecidas. No puede estar de pié o caminar con los ojos cerrados.

AGRAVACION:

Por la noche. Calor. Contacto. Movimiento.

IODUM

GENERALIDADES:

El Yodo tiene una acción absorbente que es rápida e intensa; los músculos, grasa, tejidos y glándulas se gastan y el resultado es una emaciación general. Las glándulas Tiroides, testículos, mesentéricas y mamarias, primero se ponen Hinchadas, Duras, luego pesadas, y luego empiezan a consumirse. Nuevos crecimientos e hiperplasias se ponen bajo su acción cuando su crecimiento es rápido. Temblor de los miembros o de todo el cuerpo. Pérdida rápida de carne y debilidad; aún con buen apetito. Siempre se siente muy caliente. Gran debilidad, el menor esfuerzo produce sudoración; no puede hablar, subir escaleras le corta la respiración. Exacerbación aguda de inflamaciones crónicas. Deformaciones artríticas con articulaciones hinchadas; después de un ataque agudo de reumatismo. Las secreciones son calientes, acres o acuosas, persistentes o saladas. Catarro agudo de las membranas mucosas, especialmente la Laringe y los pulmones, neumonía con extensión rápida. Vasoconstricción, causando edema, equimosis, hemorragias. Degeneración vascular. Atrofia o induración de los testículos, ovarios, útero. Enfermedades desgastantes de pacientes escrofulosos. Adenoides. Bocio. Enfermedades pancreáticas. Afecciones artríticas. Tuberculosis. Afecciones del tejido conectivo, con torpeza y poco pus. Pulsación general o latidos locales en los trayectos largos de las arterias. Ardores. Infiltración. Cosquilleo interno. Malos efectos de un shock nervioso, decepción amorosa. Exudación plástica. Parálisis facial o epilepsia, por supresión del bocio. Emaciación con crecimiento glandular. Sólo se siente bien cuando está comiendo; en muchas condiciones de enfermedad. Reacción tardada, por eso la cronicidad de muchas afecciones. Adecuado para niños crecidos en demasía, con pecho débil y para ancianos.

AGRAVACION:

Calor de; habitación; aire; cubiertas. Esfuerzo; subiendo, hablando. Ayuno. Noche. Descanso. Contacto. Presión.

MEJORIA:

Frío; Aire; baño. Caminando al aire libre. Comiendo. Sentándose.

MENTE:

Ansiedad; sobre el presente (no hay referencia hacia el futuro); estando quieto. Abatido, con tendencia a llorar o intolerablemente Travieso e inquieto. Excitado. Impulso súbito a correr y provocar violencia, pero el movimiento < y fatiga, > si está ocupado. Piensa que está bien. Temor; a las personas; a los

doctores; huye de todos. Tendencia suicida. Irritable; olvida lo que va a decir o hacer, no sabe qué. No entiende por qué ha hecho cierta cosa en particular. Tendencia a hacer algunas cosas extrañas sin causa, matar a alguien, suicidarse. El corazón palpita cuando piensa en errores reales o imaginarios.

CABEZA:

Reverberación de la cabeza. Aflujo latente de sangre y sensación de una banda apretada. Vértigo; congestivo y crónico. Cefalalgias de los ancianos, < en aire caliente, fatiga, caminando con rapidez, paseando en carro. Cerebro como si fuese batido con una cuchara.

OJOS:

Saltones. Movimientos convulsivos y bizqueo de los ojos; de los párpados inferiores. Lagrimeo profuso. Dacriocistitis aguda. Mirada fija con ojos muy abiertos; los párpados parecen contraídos.

OIDOS:

Sordera crónica con adhesión en el oído medio. Catarro eustaquiano.

NARIZ:

Dolor en la raíz de la nariz y senos frontales. Coriza < al aire libre. Nariz roja e hinchada; estornudos, muchos y frecuentes, con goteo de agua caliente. Congestión nasal aguda, asociada con presión arterial alta. Alas como abiertas y separadas. Resfríos descendentes.

CARA:

Blanquiza, cafésosa, cetrina o polvorosa; mirada miserable. Frialdad de la cara en niños gordos. Parálisis facial después de la reducción del bocio.

BOCA:

Saliva profusa, fétida, jabonosa. Gusto metálico. Úlceras fétidas; aftas. Olor ofensivo de la boca. Lengua; hipertrofiada, dolorosa, nodular o fisurada.

GARGANTA:

Constricción, impide la deglución. Ardor y raspadura en la garganta. Bocio; duro, con sensación de constricción. Uvula hinchada. Glándulas submaxilares hinchadas.

ESTOMAGO:

Hambre voraz; pero emaciación; o apetito variable; con sed. Se vuelve ansioso o mortificado si no come. Beber leche fría > la constipación. Pulsación en el hueco del estómago. Gusto amargo del alimento sólido, no de las bebidas. Hipo. Eructos vacíos.

ABDOMEN:

Hígado y bazo crecidos y adoloridos. Evacuaciones; espumosas, como suero de leche, grasosas, como queso o lientéricas; afecciones pancreáticas. Temblor del abdomen. Diarrea matutina crónica de niños emaciados y escrofulosos. Ictericia; ojos, piel, uñas amarillas. Hinchazón de las glándulas mesentéricas.

URINARIO:

Micción frecuente y copiosa; orina obscura, amarillo-verde, lechosa con película variada en su superficie. Sedimento como pimienta roja. Incontinencia en los ancianos, con crecimiento prostático. Fluído blanco y lechoso que corre de la uretra después de evacuar.

HOMBRES:

Testículos hinchados e indurados. Sacudimientos en el cordón espermático. Atrofia de los testículos; con pérdida del poder sexual. Sarcocele. Hidrocele.

MUJERES:

Gran debilidad durante las reglas. Reglas; café; reaparecen después de cada evacuación. Mamas disminuídas y flojas. Dolor como de cuña del ovario al útero. Nudosidades en la piel de las mamas con puntos negros. Leucorrea acre, erosiona los muslos y la ropa; < durante las reglas. Mamas pesadas; como si fuesen a caer. Esterilidad por atrofia de ovarios y mamas.

RESPIRATORIO:

Ronquera dolorosa y sofocante; el niño se agarra la garganta al toser. Laringitis. Difteria. Tos seca, cosquilleante, cruposa. Respiración corta, especialmente al subir escaleras. Edema de la glotis. Expectorcación de depósitos en la laringe; o de moco rayado de sangre. Voz áspera. Cosquilleo en todo el pecho. Bronquios ulcerados. Congestión pulmonar violenta. Neumonía, hepatización que se expande rápidamente con temperaturas altas y ausencia de dolor. Efusión pleurítica. Asma, respira pesadamente estando en paz. Comezón bajo los pulmones detrás del esternón.

CORAZON:

Lo siente como exprimido; como con una banda de hierro, seguido por gran debilidad y desmayo. Palpitación < por el mínimo esfuerzo. Sensación de vibración o ronroneo en el corazón. Taquicardia. Miocarditis. Pulsación en tramos largos de las arterias.

CUELLO Y ESPALDA:

Hinchazón del cuello al hablar; se pone grueso.

EXTREMIDADES:

Afecciones crónicas; artríticas; rigidez y crecimiento de articulaciones. Sinovitis. Manos y pies fríos. Sudor acre en el dorso de los pies. Edema de los pies. Dorso de las manos; cafés, como hinchadas; dolorosas al voltearlas, no al cerrar los dedos. Callos dolorosos.

PIEL:

Caliente, seca, con manchas cafés. Nudosidades en la piel. Anasarca de enfermedad cardíaca. Comezón y granos con comezón en cicatrices antiguas. Las cicatrices se abren.

SUEÑO:

Inquietud en la sangre, no deja dormir.

FIEBRE:

Hiperpirexia; o frialdad externa con ansiedad y estupor. Fiebre hética. Bochornos de calor por todo el cuerpo; el calor se va a la cabeza. Sudor fácil. Sudor temprano por la mañana >.

COMPLEMENTARIO:

Lyc; Sil.

RELACIONES:

Ars; Flu-ac; Pho; Spo.

IPECACUANHA

GENERALIDADES:

Actúa principalmente en el nervio neuro-gástrico; produciendo perturbaciones gastro-intestinales; y Afecciones Respiratorias con Náusea continua. Las descargas son espumosas y profusas. Hemorragias borbollantes de rojo brillante; con náusea. Náusea y respiración corta, usualmente acompañan la mayoría de los malestares. Convulsiones; infantiles; cuerpo rígido, estirado, seguido por sacudidas espasmódicas de los brazos uno contra el otro. Torpe, se tropieza contra todo. Espasmos tetánicos por tragar tabaco. Convulsiones; en tosferina; por exantema suprimido; por comida indigesta. Está indicado en niños gordos y adultos que son débiles y se resfrían en clima tibio y húmedo. Malos efectos de vejación, disgusto reservado. Lesiones, erupciones suprimidas. Quinina; morfina; alimentos indigestos; pérdida de sangre. Hipersensible al calor y al frío. Opistótonos y emprostótonos.

AGRAVACION:

Calor; húmedo; de una habitación. Comer en demasía. Hielos, puerco, ternera, alimentos ricos o mezclados; dulces, frutas; pasas, ensaladas, cáscara de limón. Bayas. Periódicamente. Calor y frío. Vómitos. Movimiento. Acostado.

MEJORIA:

Al aire libre. Descanso. Presión. Cerrando los ojos. Bebidas frías.

MENTE:

Sostiene todo y lo contempla y desea que otros hagan lo mismo. Lloro, grita, aúlla y es difícil de complacer (niños). Lleno de deseos, pero no sabe de qué. Triste. Se desmaya de pronto; en el verano y en habitación caliente.

CABEZA:

Duele como magullada o aplastada, el dolor va hacia la raíz de la lengua. Migraña, con náusea y vómito. Dolor en el occipucio < vomitando; durante el escalofrío. Sudor frío en la frente.

OJOS:

Inflamados, rojos; conjuntivitis. Chorro profuso de lágrimas; con náusea. Dolores punzantes a través de los globos. Náusea por mirar objetos en movimiento.

OIDOS:

Frío (derecho) durante la fiebre. No soporta el menor ruido.

NARIZ:

Sangra, sangre roja y brillante. Coriza con obstrucción de la nariz y náusea. Estornudos.

CARA.

Pálida; azul alderredor de los ojos y los labios; línea nasal blanca. Neuralgia periódica orbital, con lagrimación, fotofobia y párpados punzantes.

BOCA:

El niño se clava los puños en la boca y grita. Lengua limpia o roja y puntiaguda. Aumento de saliva. Dolor de diente con sacudidas que radian a las sienes; > al comer. Lengua; limpia, amarilla, o blanca, pálida. Gusto; amargo, dulzón, sanguinolento.

ESTOMAGO:

Deseo de golosinas; dulces. Lo siente miserable o hundido y relajado como si estuviese colgado. Náusea horrible, no > por el vómito. Vomita; sangre, bilis, alimentos, moco; < agachándose. Aversión a los alimentos. Sin sed. Vómito de infantes al amamantarse.

ABDOMEN:

Dolor atroz, tirante, cortante alderredor del ombligo < movimiento > por el reposo; se extiende hacia el útero. Evacuaciones; café, como pasto o amarillo-verde, espumosas, como melaza o sanguinolentas; delgadas. Disentería; con cabeza caliente y piernas frías. Bultos de moco en las heces.

URINARIO:

Necesidad de orinar ineficaz. Hematuria, con náusea y dolor cortante de abdomen y uretra, con opresión en el pecho y respiración corta. Punzada desde el riñón, hacia los muslos y las rodillas.

MUJERES:

Hemorragias uterinas, profusas, brillantes, flujo constante o de chorro; con náusea y respiración cortada, con cada chorro de sangre. Dolor cortante en el útero de izquierda a derecha. Punzadas desde el ombligo al útero. Reglas; demasiado adelantadas y muy profusas. Vómitos durante el embarazo. Prolapso del útero < durante las reglas. Hemorragia de placenta previa. Flujo fijo de sangre roja brillante, que no coagula. Gran debilidad con reglas escasas.

RESPIRATORIO:

Ronquera indolora al final de un resfrío. Constricción constante en el pecho y la laringe, < al menor movimiento. Espasmo de las cuerdas vocales. Respiración entrecortada. Asma. Tos incesante y violenta, con cada respiración. Paroxismos de tos sofocante, con vómito; el niño se pone rígido, se vuelve roja o azul su cara y finalmente hay náusea; arqueo; y vómito > caminando al aire libre, > por el calor y el reposo. Tosferina, con sangramiento nasal y de la boca. Cascabeleo flojo en el pecho sin

expectoración. Bronconeumonía. Hemoptisis < por el menor esfuerzo. Asma acompañada de enfermedad de la piel. Ataques sofocantes por substancia extraña en el conducto de aire.

CUELLO Y ESPALDA:

Espasmos tetánicos de la espalda que la dobla hacia atrás o hacia adelante. Punzadas desde la región del riñón, hacia los muslos. Calambres entre las escápulas durante el movimiento.

EXTREMIDADES:

Frialdad de una mano, la otra caliente. Fémur como dislocado al sentarse. Dolor como de magulladura en todos los huesos.

SUEÑO:

Sacudidas en los miembros al dormirse. Ojos medio abiertos durante el sueño, con gemidos y gruñidos. Pérdida del sueño que causa náusea y fatiga.

PIEL:

Comezón, con náusea, se rasca hasta que vomita.

FIEBRE:

Frío corto con calor prolongado. Escalofrío que alterna con calor. Calor sin sed. Intermitentes suprimidas o mixtas; náusea en todas las etapas. Fiebres catarrales o gástricas. Las manos y los pies gotean sudor frío. Fiebres infantiles remitentes.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Cup.

RELACIONES:

Ant-t; Lob.

IRIS VERSICOLOR

GENERALIDADES:

Iris actúa poderosamente en las Membranas Mucosas Gastro-Intestinales; en las glándulas salivales, Hígado y páncreas; produciendo secreciones profusas; que son ácidas, acres y ardientes. Naríz grasosa; gusto y evacuaciones grasosos son otras características. Promueve el flujo de bilis. Los síntomas se establecen repentinamente, acompañados por una eliminación rápida. Cólera morbus y jaqueca con náuseas.

AGRAVACION:

Periódicamente. Semanalmente; 2-3 a.m.; Primavera y Otoño; después de medianoche. Fatiga mental. Clima caliente.

MEJORIA:

Por movimiento suave.

MENTE:

Abatido. Temor de que aparezca una enfermedad. Embotamiento de las facultades mentales.

CABEZA:

El dolor se inicia con ardor de ojos. Jaquecas con náuseas, con diarrea. Punzadas en las sienas; con sensación de cuero cabelludo contraído. Cefalalgia fastidiosa, con fatiga mental (por estudio, por coser) < tosiendo, aire frío; > movimiento suave.

OJOS:

Hundidos. Dolores supraorbitales violentos. Perturbaciones visuales periódicas, ceguera, hemiopía, etc. con cefalalgia.

OIDOS:

Vértigo aural, con ruidos intensos en los oídos.

NARIZ:

Grasosa. Estornudos constantes.

CARA:

Neuralgia < después del desayuno, involucrando toda la cara; con orina copiosa y necesidad de evacuar.

BOCA:

La siente grasosa, quemada o escaldada. La lengua arde o se siente fría. Gusto dulzón o grasoso. Saliva profusa, filamentosa; gotea al hablar.

GARGANTA:

Calor y punzadas en la garganta. Ardor desde las fauces al estómago; > inhalando aire fresco o bebiendo agua fría. Bocio.

ESTOMAGO:

Eructos agrios y amargos. Ardor en todo el canal alimentario, no > por las bebidas frías. Náusea continua; Vómitos amargos, acres, acuosos, ácidos con ardor, agua dulzona. Apetito deficiente. Accesos de vómito periódicos, cada mes, seis semanas, que duran por dos o tres días.

ABDOMEN:

Hígado adolorido. Dolor cólico antes de cada acceso de vómito y purga. Evacuaciones; biliosas, acres, acuosas, arden como fuego. Cólera morbus indolora. Necesidad de evacuar con cefalalgia, neuralgia facial y dolor en los dientes. Evacuaciones grasosas. El ano se siente ulcerado o como con astillas de puntas agudas.

URINARIO:

Orina profusa, clara, con cefalalgia. Ardor a lo largo de la uretra, después de la micción. Diabetes.

MUJERES:

Náusea prolongada y vómito durante el embarazo; flujo profuso de saliva.

EXTREMIDADES:

Las caderas se sienten como torcidas. Dolores punzantes y dolorosos a lo largo de las extremidades; ciática.

PIEL:

Herpes zoster; con desarreglos gástricos; lado derecho. Psoriasis, manchas irregulares con escamas brillantes. El sudor huele a vinagre.

RELACIONES:

Ars; Merc; Pho.

JABORANDI

GENERALIDADES:

El pilocarpó es un poderoso estimulante glandular; produce hipersecreción del tracto respiratorio superior; glándulas salivales y sudores anormales. Además produce infecciones oculares muy importantes. Tendencia a resfriarse y a sudar. Bochornos calientes, náusea, salivación y sudoración profusas. Limita la duración de las paperas. Estados colicuativos. Bocio esoftálmico.

AGRAVACION:

Inicio de reglas. Frío. Fatiga.

MENTE:

Muy nervioso y tembloroso; tiene la idea fija de que asesinará a toda su familia con una hacha.

CABEZA:

Perturbaciones visuales. Los ojos se cansan fácilmente por el uso más ligero. Las imágenes retinianas permanecen largo tiempo después del uso de los ojos. Manchas blancas ante los ojos. Párpados temblorosos. Dolor punzante en los ojos. Miopía. Pupilas contraídas. Exoftalmos. Bizqueo convergente; después de una operación. Opacidades vítreas.

OIDOS:

Sordera nerviosa; > en ruido. Tinnitus. Exudación serosa dentro de la cavidad timpánica. Paperas; especialmente cuando hay metástasis a los testículos.

BOCA:

Salivación; saliva viscosa - como clara de huevo. Tensión en las glándulas salivales.

GARGANTA:

Bocio exoftálmico, con acción del corazón aumentada; pulsación en arterias, temblores y nerviosismo.

ESTOMAGO:

Náusea al usar los ojos o mirando objetos en movimiento. Vómito terco del embarazo. Diarrea, con cara abochornada y sudoración profusa.

HOMBRES:

Orquitis; metástasis de paperas.

MUJERES:

Reglas, se inician con frialdad, latidos en la cabeza y pelvis y dolor de espalda.

CORAZON:

Ebulliciones violentas al corazón y pecho. Afecciones cardíacas nerviosas.

RESPIRATORIO:

Mucha inclinación a toser, con respiración difícil. Edema de los pulmones. Expectoración espumosa o profusa, delgada y serosa.

PIEL:

Roja. Sudores; con palpitación, pulsaciones generales y temblores. Sudores nerviosos. Sudor unilateral.

RELACIONES:

Agar; Ant-t; Ip.

JALAPA

GENERALIDADES:

Es un purgativo poderoso, de allí que afecte los intestinos y el estómago. El niño es bueno todo el día, pero grita y se revuelca toda la noche; o el niño puede estar inquieto y causar problemas día y noche; con cualquier malestar. Cólico. Evacuaciones; acuosas, limosas o agrias; sanguinolentas. Diarrea infantil, con frialdad general, azulosidad de la cara.

AGRAVACION:

Noche. Eructos.

RELACIONES:

Colo.

JATROPHA

GENERALIDADES:

Es también un purgante activo, por lo que afecta estómago e intestinos. Vómito; fácil, albuminoso. Hipo seguido por vómitos copiosos. Gorgoteo ruidoso, como agua que sale de una piqueta en el abdomen; luego evacuaciones profusas y en chorro. Sed insaciable. Evacuaciones como agua de arroz. Calambres violentos que retráen los músculos de las pantorrillas. Frialdad de hielo de todo el cuerpo; especialmente miembros inferiores.

AGRAVACION:

Cubriéndose. Mañana. Verano.

RELACIONES:

Crot-t.

JUSTICIA

GENERALIDADES:

Un remedio muy útil, para condiciones catarrales agudas del tracto respiratorio. Accesos de estornudos con lagrimeo y pérdida de olfato y gusto. Coriza; fluída, acre, con estornudos violentos, tos, o ataques asmáticos. Tos con pecho apretado, como si fuese a estallar; con estertor bronquial; obstrucción de la respiración y estornudos. Rigidez, temblor y convulsiones, con tos o fiebre. Tosferina. Expectoración difícil. Manos y pies hinchados en a.m. Escalofrío. Sensibilidad.

AGRAVACION:

Habitación cerrada. Polvo. Ruido. Comiendo.

RELACIONES:

Ip; Dros; Puls.

KALI ARSENICUM

GENERALIDADES:

Es un remedio valioso para enfermedades de la piel inveteradas y cuando la condición del paciente tiende a la malignidad. Todos los sufrimientos son < por la noche. Ruidos súbitos o contacto pone todo

el cuerpo a temblar. Lengua; ardorosa, entumida, neuralgia de. Palpitación; con nefritis. Ardor en la lengua. Adolorimiento del estómago. Pasa muchos gases, luego diarrea. Excrescencias como coliflor, en útero, con dolores rápidos; descargas de olor fétido, y presión bajo la pelvis. Comezón intolerable < al desvestirse, caminando, por el calor. Eczema crónico. Psoriasis. Numerosos nódulos pequeños bajo la piel. Ulcera negra en la pierna con supuración sanguinolenta, agua fétida, con comezón cortante, ardiente y disnea. Escalofriado y sensible al frío. No puede obtener suficiente calor aún en verano.

AGRAVACION:

Contacto. Ruido. Pies fríos. 1-3 a.m.

MEJORIA:

Días lluviosos.

KALI BICHROMICUM

GENERALIDADES:

El bicromato de potasio afecta especialmente las Membranas Mucosas de los pasajes de aire; Nariz; faringe, estómago y duodeno, produciendo descargas tenaces, grumosas, o gruesas, Adhesivas, pegajosas, filamentosas. Las condiciones de enfermedad progresan lenta pero profundamente; causando gran debilidad cercana a la parálisis pero con poca fiebre. Exudaciones plásticas o fibrosas se esparcen hacia abajo. Se adapta a personas gordas, blancas, carnosas, de complexión ligera, sujetas a catarros o con historia sifilítica o escrofulosa. Los dolores aparecen en pequeños puntos o se mueven rápidamente de un lugar a otro; y finalmente atacan el estómago. Se alternan síntomas reumáticos y gástricos. Dolores diagonales. Síntomas ascendentes, dolores gástricos, fríos, calor, etc. Formación de costras en la membrana mucosa y piel. Ulceras; con puntos oscuros; profundas; perforantes; redondas, como sacabocados; con bordes irregulares o costras gruesas. Ulceras de tabique o pépticas. Sensación de pesadez en diferentes partes. Como con un pelo en la lengua, etc. Dolores agudos y punzantes. Comezón interna en la vagina, oído, pulmones, etc. Crujido de las articulaciones. Reacción indolente o retardada en muchas condiciones, úlceras, inflamaciones, etc. Afecciones de la raíz de la nariz, lengua, pene, etc. Supuraciones tercas. Tapones de pus; filamentosos. Malos efectos por el exceso de cerveza y licores de malta. Neuralgia diaria a la misma hora. Enfermizo, escalofriado y caquético. Mordidas como de insecto. Las membranas parecen aterciopeladas. Los dolores aparecen y desaparecen súbitamente. Epilepsia; hilos de saliva de la boca durante la convulsión. Debilidad y cansancio; después de los dolores.

AGRAVACION:

Frío; húmedo. Aire libre. Primavera. Desvestiéndose. Mañana, después de dormir. 2-3- a.m. Sacando la lengua. Clima caliente. Alcohol; cerveza. Catarro suprimido. Agachándose. Sentándose.

MEJORIA:

Calor. Movimiento. Presión.

MENTE:

Indiferente. Indolente - aversión al trabajo mental y corporal. Antropofobia, evita la sociedad humana.

CABEZA:

Vértigo con náusea, al levantarse del asiento. Ceguera seguida por un violento dolor de cabeza; sobre las cejas o hacia afuera, a lo largo de las cejas; < frío > presionando la raíz de la nariz, por una sopa caliente. Adolorimiento y plenitud en la coronilla. Cefalalgias periódicas. Migraña; en puntos pequeños y por catarras suprimidos. Los huesos de la cabeza están adoloridos; punzadas agudas en los huesos. Como con un bloque sólido en la frente.

OJOS:

Ulceras en la córnea, sin dolor o fotofobia. Conjuntiva; amarilla, inflamada, cubierta con puntos amarillo-café. Descargas filamentosas y amarillas. Ceguera, antes de una dolor de cabeza. La visión parece cruzarse > mirando con un solo ojo. Párpados; hinchados; parpadeantes durante la convulsión, pruriginosos, granulares. Opacidades densas de la córnea. Fotofobia solamente por la luz del día. Los párpados tiemblan al abrirlos.

OIDOS:

Punzadas agudas en los oídos (izquierdo). Descargas espesas, amarillas, fétidas. Cosquilleo violento en los oídos. Tímpano perforado.

NARIZ:

Dolores en el puente o raíz. Presión u obstrucción en la raíz de la nariz. Estornudos, especialmente en los niños gorditos. Descargas; espesas, filamentosas, verdosas, amarillas, acres. Tapones elásticos, tenaces, dejan una superficie ulcerada. El aire que expira se siente caliente. Olor fétido por retención de descarga en la nariz. Cosquilleo como por un cabello en el poro izquierdo. Coriza con obstrucción de la nariz. Estornudos violentos < por la mañana. Inflamación crónica del los senos frontales con sensación de taponamiento. Tabique ulcerado. Absceso. Ozena. Difteria nasal. Huesos flojos, como si se frotaran al sonarse la nariz. Pérdida del olfato. Nariz; se siente pesada; seca. Pólipos nasales.

CARA:

Pálida, amarilla. Manchada, roja; florida. Paperas sobre el lado derecho. Sudor en el labio superior.

BOCA:

Dolor de dientes; radiante con inflamación de las glándulas. Lengua; brilla, agrietada, suave o pesada; seca, roja, amarillo limón, aterciopelada; en disentería. Dolores de la lengua cuando la saca; en la raíz. Boca pegajosa. Gusto dulce, metálico. Lengua; cubierta espesa, ancha, plana; con la huella de los dientes. Ulceras aftosas con corrosión profunda. Como con un cabello en la parte posterior de la lengua, no > por comer o beber. Boca seca > por bebidas de agua fría.

GARGANTA:

Carraspea moco grueso, debe aclararla. Uvula; edematosa, relajada como vejiga. Faringe agrietada. Seca, ardorosa. Como con algo pegado; con dolor en el cuello y los hombros. Dolores de garganta sacando la lengua. Aftas. Difteria. Anginas inflamadas con sordera, en niños.

ESTOMAGO:

Deseo de: cerveza, bebidas ácidas. Desagrado por la carne, el agua. Vomita más de lo que bebe, agua amarillo brillante. Regurgita líquidos. Ulcera redonda del estómago. Síntomas gástricos > por comer. Punto doloroso en el estómago o la comida cae como un peso. Nausea con calor en el cuerpo > comiendo y al aire libre. Nausea con ardor en el ano y erecciones.

ABDOMEN:

Sensación de constricción desde el hígado al hombro (derecho). Punzadas en el bazo que se extienden a la región lumbar. Ulceración intestinal crónica con vómito y emaciación. Evacuaciones; gelatinosas, como jalea, o chorros de agua espumosa y café; luego ardor y tenesmo < después de levantarse por la mañana. Disentería periódica - cada año, en verano. Diarrea o disentería después del reumatismo. Sensación como de un tapón en el ano. Como algo que está comiendo en los intestinos.

URINARIO:

Riñones pesados. Como una gota de orina que hubiese permanecido, después de orinar, y que no puede ser expulsada. Nefritis con orina escasa y albuminosa. Orina sanguinolenta con dolor en la espalda. Hematoquilia.

HOMBRES:

Dolor constrictivo en la raíz del pene, por la noche, después de despertar. Los chancros ulceran profundamente. Meato con descarga filamentosa, profusa o como gelatina; obstruyendo la uretra. Deseo sexual ausente en las personas gordas. Punzadas en la próstata al caminar, debe pararse.

MUJERES:

Reglas; con supresión de orina, u orina roja. Leucorrea; acre, amarilla, como hilos; con dolor a través del sacro y pesadez en el hipogastrio. Prolapso del útero < en clima caliente. Leche; filamentosa, acuosa. Ardor con comezón de la vulva con excitación sexual. Vómitos en el embarazo.

RESPIRATORIO:

Voz ronca < por la noche. Laringitis. Cosquilleo en la laringe con tos < por comer, con eructos > calor; luego vértigo. Ulceración, bajo el esternón; dolores a través de la espalda y hombros, al toser. Expectoración; amarilla, en hilos; profusa, con tos profunda. Como con una barra que atraviesa el pecho. Asma < por coito. Tos > expectoración. Tos seca, metálica, cortante.

CORAZON:

Dilatado, con lesiones de riñón, insuficiencia de las válvulas aórticas. Sensación de frialdad alderredor. Corazón débil. Las pulsaciones se sienten en todas las arterias.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez del cuello < doblando la cabeza hacia adelante. Dolor cortante a través de los lomos; no puede caminar. Dolor en el cóccix < caminando, sentándose y tocándola; se extiende hacia arriba y abajo. Dolores del cóccix antes de orinar, > después. Como si algo crujiera a través del sacro < agachándose.

EXTREMIDADES:

Debilidad paralítica de las manos. Ciática > movimiento y flexionando la pierna, < de pié, sentado o acostado en la cama. Dolor a lo largo del borde del pie. Dolores erráticos a lo largo de los huesos. Dolores reumáticos < comiendo. Tendón de Aquiles hinchado y sensible. Huesos de la barbilla dolorosos; periostitis por golpe.

PIEL:

Pústulas, con puntas negras. Piel; caliente, seca y roja > al aire libre. Manchas cafés. Ampollas en las plantas. Cicatrices hundidas, redondas, después de la cicatrización de erupciones o úlceras.

SUEÑO:

No reparador; se sienten débiles las extremidades.

FIEBRE:

Bochornos calientes; luego sudor pegajoso, luego frío. Sudor frío de las manos y pies. Escalofrío con sudor.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Pho; Psor.

RELACIONES:

Kali-c; Merc; Phyt; Puls.

KALI BROMATUM

GENERALIDADES:

El bromuro de potasio afecta la Mente y Nervios, produciendo fallas en el poder mental; entumecimiento general y anestesia de las membranas mucosas, especialmente de ojos, garganta y piel. Su acción sobre la esfera sexual es muy grande; el paciente es sensual, con fantasías lascivas; satiriasis y ninfomanía. La epilepsia está asociada, con excesos sexuales o abuso, en hombres; y en las mujeres aparecen accesos durante las reglas; los accesos aparecen generalmente durante la luna nueva y están seguidos por cefalalgias. El establecimiento de la condición enferma es lento; sin ningún dolor. Parálisis. Debilita el corazón y baja la temperatura. Malos efectos de las preocupaciones, pérdidas en los negocios, reputación y vergüenza. Excesos sexuales, enfermedad o muerte de un amigo cercano. Corea por susto. Parálisis agitante.

AGRAVACION:

Fatiga mental. Emociones - enojo, susto, preocupación. Pena. Periódicamente; noche, 2 a.m. Verano; luna nueva. Exceso sexual. Pubertad. Deseo sexual insatisfecho.

MEJORIA:

Estando ocupado mental y físicamente.

MENTE:

Depresión depresiva; piensa que es perseguido; que será envenenado; que cometerá un gran crime, que matará a sus hijos o esposo. Nervioso. Niebla cerebral, por pena o ansiedad. Suspica; mira por todos lados; teme a las personas, pero no puede estar solo, en la obscuridad. Inquieto, manos ocupadas, titubeante. Mueve los brazos alocadamente. Pérdida absoluta de la memoria, olvida como hablar, se le debe decir la palabra antes de que la pronuncie. Afasia amnésica. Melancolía, muy preocupado sobre la salud, se queja sin razón. Remordimientos; se estruja las manos; estalla en lágrimas. Lento, duda, omite o mezcla las palabras al hablar o escribir. Indiferencia profunda y disgusto por la vida. Imagina que no puede pasar de un cierto punto. Derrama lágrimas con frecuencia. Terrores nocturnos en niños, se despiertan gritando, inconscientes, no reconocen a nadie; seguido por bizqueo. Reblandecimiento senil del cerebro. Manía suicida con temblor.

CABEZA:

Sensación de entumecimiento en la cabeza, < occipucio. Vértigo, vacilación y trastabilleo al caminar, < agachándose. Síntomas de apoplejía. Cefalalgia violenta o entumecimiento que se siente en el occipucio; por concusión cerebral.

OJOS:

Hundidos; los globos se mueven en todas direcciones. Bizqueo después de terrores nocturnos, en los niños.

OIDOS:

Dureza de oído. Oye el eco en los oídos. Rugido sincronizado con el pulso; por la noche.

NARIZ:

Olfato defectuoso. Coriza que desciende a la laringe.

CARA:

Sonrojada; amarilla, caquética. Inexpresiva. Acné en la cara.

BOCA:

Lenguaje difícil; tartamudeo. Aliento fétido. Entumecimiento. Saca la lengua con una sacudida. Corea.

GARGANTA:

Entumida. Disfagia de líquidos (niños), sólo puede tragar sólidos.

ESTOMAGO:

Vómito; con sed intensa; después de cada alimento; histérico; después de emociones excitantes. Hipo persistente.

ABDOMEN:

Espasmos, con retracción de las paredes. Como si los intestinos se cayeran. Cólico cortante. Frialidad interna. Evacuaciones acuosas verdes, con colapso rápido. Cólera infantil, con sacudidas y contracturas de los músculos y retracción del abdomen. Pólipos rectales; diarrea persistente, expele mucha sangre.

URINARIO:

Diabetes mellitus. Goteo de orina al iniciar la evacuación. Uretra entumida. Enuresis.

HOMBRES:

Deseo sexual excesivo, con erecciones constantes, por la noche. Deseo disminuído, aún impotencia. Impotencia; con melancolía; epilepsia, postración nerviosa.

MUJERES:

Ninfomanía; durante la etapa puerperal. Esterilidad por indulgencia sexual excesiva. Neuralgia ovárica por deseo sexual insatisfecho. Tumores quísticos de los ovarios. Flujo en mujeres jóvenes con deseo sexual. Menorragia, por deseo sexual fuerte. Fibromas. Subinvolución. Sensación sexual ausente, aversión al coito.

RESPIRATORIO:

Tos cruposa. Tos refleja, durante el embarazo. Aliento caliente; apresurado. Asma, con tos seca, mueve los brazos frenéticamente.

EXTREMIDADES.

Manos y dedos en movimiento constante. Se tuerce los dedos. Temblor de manos durante el movimiento voluntario. Paso inseguro. No puede permanecer erguido, piernas débiles.

PIEL:

Acné. Eczema húmedo de las piernas. Psoriasis. Piel fría; entumida. Cicatrices que permanecen después de erupciones.

SUEÑO:

Somnolencia; con frecuencia rota por sobresaltos. Insomnio, debido a preocupaciones, pena y exceso sexual. Terrores nocturnos. Sonambulismo en niños.

FIEBRE:

Bochornos dolorosos de la cara, durante el climaterio.

RELACIONES:

Calc; Con; Op; Stram.

KALI CARBONICUM

GENERALIDADES:

La debilidad causada por todas las sales de potasio es más pronunciada en este grupo típico de sales de potasio. Debilidad; de los músculos; del corazón; de la espalda; de los miembros; debilidad del intelecto. Tejido fibroso; ligamento de las articulaciones; del útero y de la espalda lumbar, están particularmente afectados- produciendo relajamiento; las articulaciones se salen; la espalda se siente como rota; el paciente se siente obligado a estar acostado o recargado en algo. Sudor, dolor de espalda y debilidad, son los tres síntomas característicos de Kali-carb. Se adapta a personas en carnes, de edad, suaves, de sangre ligera y frías; sensibles a los cambios atmosféricos, a toda corriente de aire, siempre escalofriadas, con tendencia paralítica e hidrópica. El aire frío se siente caliente. Aquellos que tienen síntomas vagos o retenidos. Punzadas agudas; dolores apuñalantes o pegajosos que se sienten en varias partes del cuerpo - articulaciones; pecho; músculos, cabeza, estando acostado sobre la parte, etc; o con cualquier afección. Dolores de latido; adormecimiento y frialdad de partes aisladas; abdomen, dedos. Las partes sobre las que se está están dolorosas o se entumen. Las descargas son profusas y acres. Las convulsiones; parece que se pasan al eructar. Inconsciencia súbita. Sacudida de los músculos; rigidez y atonía de los músculos. Todo el cuerpo se siente como hueco. Degeneración grasosa. Diátesis tuberculosa. Hipotiroidismo. Como si la cama se hundiera bajo ella. Nunca bien, desde una neumonía. Ardores; como de fuego. Tendencia a sobresaltarse, con gritos fuertes; al ser tocado, aún ligeramente, especialmente las plantas de los pies, que produce un estremecimiento por todo el cuerpo. Los dolores van hacia la parte descubierta, sobre la que no se está recargado. Malos efectos de supresión de erupciones en la infancia. Cerramiento de úlceras o aberturas fistulosas; resfriándose o por un sobre-esfuerzo. Estados debilitantes después de un aborto y parto. Propensión a la flebitis.

AGRAVACION.

Frío -Aire; corrientes; agua; después de acaloramientos; después de ejercicio. Invierno. 2-3 a.m. Antes de las reglas. Acostado sobre el lado doloroso o lado izquierdo. Pérdida de fluidos. Después de un parto; aborto. Agachándose. Por un movimiento súbito e inesperado. Cambio de clima. Después del coito. Contacto. Movimiento.

MEJORIA:

Calor. Sentado con los codos sobre las rodillas. Durante el día. Al aire libre. Movimiento.

MENTE:

Displiscente. Sobresaltado con facilidad; se sobresalta al ser tocado, especialmente en los pies; al caer dormido. Ansiedad, con miedo estando solo. La ansiedad se siente en el estómago. No sabiendo como decir lo que desea. Muy irritable. Lloro mucho. Hipersensible al dolor, ruido, contacto. Nunca quieto o contento. Temor; del futuro; de fantasmas; de la muerte. Ansioso sobre su propia enfermedad. Se pelea con su familia por su pan y mantequilla. Siente como que la cama se hunde bajo de él.

CABEZA:

Dolor en los ojos < movimiento del carro, estornudando, tosiendo; agachándose, bostezando; > al levantar la cabeza y presionándose la frente. Sensación constante de que tiene algo flojo en la cabeza, volteándose y torciéndose hacia la frente. Despierta por el dolor de cabeza. Cabello; seco, se cae; de las cejas; sienes y barba. Tumores dolorosos en el cuero cabelludo.

OJOS:

Débiles; después del coito; después de sarampión; después de un aborto. Visión manchada - destellos brillantes, manchas azules, verdes; gotas ante los ojos. Angulos internos de los párpados hinchados; o inflamación como de bolsas entre los párpados superiores y las cejas. Sensación dolorosa de luz que penetra el cerebro, al cerrar los ojos. Párpados fríos.

OIDOS:

Punzadas en los oídos de dentro hacia afuera. Crujido en los oídos. Oído derecho caliente, izquierdo pálido y frío. Ruidos en los oídos; con cefalalgia.

NARIZ:

Coriza descendente. Hinchada, dura, roja. Obstrucción > por caminar al aire libre. Descarga fétida, amarillo-verdosa o costrosa. La nariz sangra al lavarse la cara en la mañana. Alas ulceradas. Nariz roja, cubierta de granos. Catarro crónico. Respira por la boca.

CARA:

Abotagada. Pálida, desmejorada, cetrina, con ojos hundidos. Pecas. Inflamación de la mandíbula inferior y glándulas sub-maxilares. Calambres en las mandíbulas.

BOCA:

Dolor de dientes; alternan con dolores punzantes en el seno izquierdo, sólo al comer. Boca delgada. Lengua; gris-blanca. Las encías se separan de los dientes. Comezón en las encías; pus que rezuma de ellas. Piorrea. Aftas; mucha salivación. Ardor, ulceración o granos dolorosos en la punta de la lengua.

GARGANTA:

Carraspea moco espeso en a.m. Dificultad para deglutir; el alimento desciende lentamente; permanece a la mitad del esófago, con arcos y vómito; estrictura del esófago. Partículas pequeñas de alimento se van con facilidad al tubo respiratorio. Dolor punzante como por una espina de pescado.

ESTOMAGO:

Regurgitación salada, ácida. Vómito de moco ácido. Deseo de dulces, ácidos. Estómago distendido y sensible. Plenitud aún después de beber o comer poco. La leche y el alimento caliente desagradan. Sensación como de que el estómago estuviese lleno de agua. Sensación como de un tapón, dentro y profundo en el epigastrio, sensible al contacto. Latidos detrás del estómago. Dolores gástricos que van hacia la espalda, pecho, miembros, etc. Quiere comer con frecuencia, pero el menor alimento la oprimen. Vómito nocturno de alimento. Náusea > acostándose. Eructos ácidos. Se siente somnoliento y cansado mientras come, no puede terminar su comida. Estando hambriento, se siente ansioso, con náuseas, nervioso, con estremecimientos, palpitaciones, etc.

ABDOMEN:

Distendido, duro, timpánico y frío. Latidos en el ombligo. Sensación como de un fluido frío que pasara por los intestinos, durante las reglas. Flatulencia. Punzadas en o hígado adolorido. Dolor desde el hipocondrio izquierdo a través del abdomen; debe voltearse al lado derecho antes de levantarse. Dolor cortante como si los intestinos estuviesen partidos en pedazos. Evacuaciones; difíciles, de bultos grandes y duros; luego ardor y sensación de desgarradura. Hemorroides; inflamadas, sangrantes, descienden al orinar o toser; > por montar a caballo. Punzadas como de finas agujas; durante el

embarazo; o como un hurgón caliente al rojo en el recto > baño fresco. Prolapso fácil del recto. Diarrea crónica o dispepsia; durante el día solamente. Constipación, después o durante las reglas. Sensación como de un tapón que rotara y se elevara desde el abdomen (derecho) hasta la garganta y bajara otra vez, al toser. Fístula anal. Hidropesía. Ictericia. Constipación que alterna con diarrea.

URINARIO:

Ardor en el riñón izquierdo. Enuresis nocturna de adultos; < por toser, estornudar. Orina; espumosa; con sedimento rojo espeso. Dolores punzantes en los riñones que van de los glúteos a los muslos. Presión en la vejiga mucho antes de orinar; entre más se presiona, menos orina fluye. Micción lenta con ardor en la uretra. Nefritis, por exposición al frío o lesión.

HOMBRES:

Malestares después del coito. Poluciones copiosas y dolorosas, con erecciones subsecuentes dolorosas. Postración después del coito; frecuentemente con estremecimientos. Insomnio e inquietud por 2 o 3 días después del coito. Aversión al coito. Sensación extraña y molesta en genitales. Gonorrea crónica; descarga escasa y dolorosa; ardor durante y después de orinar.

MUJERES:

Primeras reglas retrasadas; con síntomas en el pecho y ascites. Amenorrea. Reglas; muy tardadas; acres, profusas. Dolores cólicos violentos, antes de las reglas que son irritantes y de olor picante. Punzadas finas en las mamas. Leucorrea; con dolores como de parto causando comezón y ardor en partes pudendas; > bañándose. Dolores de parto ineficaces; se sienten en la espalda, hacia las caderas y muslos. Malestares después de parto y aborto. Hemorragias, después de curaciones y otras clases de tratamiento. Eclampsia > por eructos. Fiebre puerperal con dolor cortante en el hipogastrio, con orina negra y escasa. Tumores uterinos, quistes. Menorragia > por tomar un baño. Adolorimiento en genitales durante el coito y durante las reglas. Reglas; adelantadas, con descarga profusa; tardías con descarga escasa y pálida. Severos espasmos uterinos sin aparición de reglas, con sensación de calor e inquietud.

RESPIRATORIO.

Afonía catarral; con estornudos violentos. Respiración difícil, asmática < mínimo movimiento o caminando; alternando con diarrea; con vértigo. Arqueos incesantes, duros sofocantes, tos fútil; luego vómitos. Tosferina. Los pulmones parecen estar pegados a las costillas. Dolores apuñalantes en el pecho. Hidrotórax. Todo el pecho está muy sensible, durante la tos. Tos con úvula relajada. Frialidad del pecho. Expectoración; difícil, o de pequeñas bolas redondas que vuelan de la boca sin esfuerzo; saladas, espesas, sanguinolentas, amarillentas, verdosas, ofensivas y profusas; gusto ácido o picante.

CORAZON:

Parece que cuelga de un hilo. Palpitación; luego debilidad; en enfermedad valvular; cuando se enoja. Ardor en la región del corazón. Dolores de corazón que se extienden a la escápula izquierda. Pulso; pequeño, suave, variable; intermitente o dicrótico. Arritmia. Degeneración cardíaca. Palpitaciones violentas, sacuden todo el cuerpo; latidos que se extienden a las puntas de los dedos y dedos de los pies.

CUELLO Y ESPALDA:

Todo afecta la espalda baja o los dolores empiezan allí. El cuello se siente largo. Dolor de espalda; con sensación de vencimiento; debe acostarse; como si estuviese quebrada. Espalda baja que se siente débil. Lumbago; con dolores agudos súbitos que se extienden arriba y abajo a los muslos. Dolor de espalda después de parto o aborto. Espina dolorosa al comer. Ardor en el lado derecho de la espina.

EXTREMIDADES:

Debilidad de los brazos, los diente entumidos, fríos. Picoteo adormeciente en brazo (izquierdo). Ardor como de fuego en los dedos. Las piernas se vencen; se sienten pesadas. Punta de los dedos de pies y manos dolorosas. Edema del pié izquierdo. Plantas muy sensibles. Dolor de la cadera a la rodilla. Rodillas dolorosas < bajando o subiendo escaleras. Sacudidas de los miembros especialmente cuando los pies son tocados. Ciática, dolor desgarrante en los muslos, con sacudida de músculos.

PIEL:

Sensible, seca. Ardorosa como con cataplasma de mostaza. Comezón general, o urticaria durante las reglas. Comezón en verrugas. Tensión, presión, desgarramiento en cicatrices.

SUEÑO:

Se duerme mientras come. Habla en sueños. Despierta alderredor de las 2 a.m. a 4 a.m. con casi todos los malestares. Despierta a la 1 o 2 a.m. y no puede dormirse otra vez. Bosteza; con cefalalgia, etc.

FIEBRE:

Escalofrío; con manos calientes; y somnolencia; al aire libre. Ardor interno. Sudor escaso, fétido en pies. Suda con el mínimo esfuerzo; en partes dolorosas, en partes afectadas.

COMPLEMENTARIO.

Ars-io; Carb-v; Nit-ac; Nuc-v; Pho.

RELACIONES:

Ars; Calc-hypo; Flu-ac; Lyc; Pho; Sep; Sul.

KALI CHLORICUM

GENERALIDADES:

Este remedio desorganiza la sangre y afecta la boca, riñones y recto. Postración profunda; frialdad, en diferentes partes del cuerpo y órganos, aún en sangre y hemorragias fáciles; sangramiento nasal, evacuaciones sanguinolentas, etc. escorbuto; son los síntomas más marcados. Las descargas son fétidas. Exudados blancos, gris, plásticos. Degeneraciones lardáceas y grasosas del hígado, bazo y riñones, y otros órganos sólidos. Toxemia del embarazo.

AGRAVACION:

Frío. Mercurio. Sacudidas. Tos. Estornudos.

MEJORIA:

Sangrado nasal (Síntomas mentales).

NARIZ:

Sangrante; por la noche; solamente por el poro derecho.

CARA:

Hinchada; difícilmente puede ver por la mañana. Dolores neurálgicos < por hablar; comer, o al toque más ligero seguido por entumecimiento.

BOCA:

Fetor. Ulceración aguda y estomatitis folicular; aftosa y gangrenosa. Noma. Lengua; hinchada; fría. Escorbuto. Salivación.

ESTOMAGO:

Frialdad en. Vómitos súbitos, incesantes; de todo el alimento; de moco verde oscuro ofensivo. Garganta fría.

ABDOMEN:

Cólico atenzante, con flatulencia cambiante y diarrea; seguido de dolor rectal continuo. Disentería - mucha sangre que pasa con moco, profuso, verdoso, grita con dolores cortantes violentos en el recto en la disentería y diarrea.

URINARIO:

Nefritis. Orina albuminosa, escasa, suprimida. Hematuria.

RESPIRATORIO:

Constricción del pecho; como por vapores de azufre.

CORAZON:

Frialdad, en la región precordial. Pulso derecho lleno; izquierdo pequeño. Frialdad en la sangre.

EXTREMIDADES:

Tobillos hinchados en la noche. Brazos y pies fríos.

PIEL:

Fría. Granos entre los labios y la barbilla.

KALI CYANATUM

GENERALIDADES:

Esta droga de lo más venenosa debería ser recordada en las neuralgias agonizantes, especialmente orbital y supramaxilar, con gritos y pérdida de la consciencia. Cáncer de la lengua, con bordes indurados. Sensación súbita de hundimiento. Pérdida del poder de lenguaje, pero inteligencia intacta. Ciática, paso vacilante.

AGRAVACION:

4 a.m. a 4 p.m.

MEJORIA:

Movimiento al aire libre.

KALI IODATUM

GENERALIDADES:

El Yoduro de Potasio fué usado como un remedio anti-sifilítico. Actúa con preeminencia en los tejidos fibroso y conectivo, produciendo infiltraciones, edema. Las glándulas están hinchadas; o atrofiadas. Las exóstosis, hinchazón de huesos, raquitismo, púrpura y diátesis hemorrágica, caen bajo su influencia. Diversidad de lesiones, diversidad de agravaciones, con muchos síntomas fastidiosos, sin que haya alguno que se destaque, llaman a este remedio. Diátesis reumática - gotosa - sifilítica. Cronicidad tenaz. Se siente acabado. Dolores aplastantes o punzantes y agudos. Las descargas son copiosas, acuosas, acres, saladas; espesas; verdes o fétidas. Inflamación difusa; después del parto; o en partes afectadas. Dolores mucho después de las lesiones. Debilidad, emaciación. Arterioesclerosis. Desea moverse al aire libre. Caquexia. Contracción de músculos y tendones, artritis crónica, con anquilosis espúrea. Actinomicosis. Frialdad; de la parte dolorosa; en los huesos. Enfermedades fungoideas. Hidropesía, por presión, por glándulas hinchadas.

AGRAVACION:

Calor. Presión. Contacto. Noche. Humedad. Mercurio. Clima cambiante. Sacudimientos. Alimentos fríos, especialmente la leche. Desde la puesta del sol, hasta su salida.

MEJORIA:

Movimiento. Aire fresco. Al aire libre.

MENTE:

Irritable. Irascible, especialmente hacia sus niños; su familia. Temperamento rudo y cruel. Los detalles triviales de la vida le parecen insoportables. No puede pensar. Desalentado. Mal carácter. Abusivo. Nervioso, debe hablar. Locuaz, propenso a bromear.

CABEZA:

Vértigo en la obscuridad; < viajando en tren. Cefalalgias violentas como si estuviese atornillado, en los lados de la cabeza < calor y presión. Bultos duros y dolorosos en el cráneo; con cefalalgias. Dolor en el cuero cabelludo al rascarse, como si estuviese ulcerado. Cabeza grande y mandíbulas pequeñas -raquitismo. El cerebro se siente aumentado. El cabello cambia de color y se cae. Cefalalgias bilaterales. Cuero cabelludo fisurado, y adolorido. Puntos sensibles en la cabeza.

OJOS.

Abotagados, ardorosos, acuosos; conjuntiva roja. Iritis sifilítica. Oscilación constante de los globos. Quemosis. Edema alrededor. Los párpados inferiores tiemblan.

OIDOS:

Tinnitus. Dolores penetrantes en los oídos. Sordera.

NARIZ:

Roja, hinchada. Coriza; descendente, profusa, acre, caliente, descarga acuosa < en aire fresco; con salivación y disnea. Tirantez en la raíz de la nariz. Ocena con tabique perforado. Descarga fresca, verdosa, irritante, de la nariz. Ardor y latido en la nariz y senos. Estornudos violentos. Se resfría con cada día húmedo.

CARA:

Neuralgia. Dolor tirante en los cigomas. Moco glutinoso en los labios por a.m.

BOCA:

Dolor de dientes importunante, como si un gusano excavara en ellos. Gusto amargo; al despertar; salado. Salivación. Saliva sanguinolenta, con gusto dulzón o desagradable en la boca. Dolor severo en la raíz de la lengua, por la noche. Ulceras en la boca, parece como si estuviera cubierta con leche.

GARGANTA:

Ulceración de los oradores. Bocio sensible al contacto. Seca. Tonsilas crecidas.

ESTOMAGO:

Alimentos y bebidas frías, especialmente leche fría <. Mucha sed. Sensación como si hubiera un aflujo de agua. Latidos, ardor doloroso. Aversión a toda la comida; a los caldos.

ABDOMEN:

Flatulencia, con hiperventilación. Ruido como chillido o cloqueo. Diarrea; con dolor en la región lumbar, como si estuviese rota, o como si fuera a aparecer la regla. Diarrea de tisis, temprano por la mañana. Evacuaciones frecuentes. Ano fisurado; de infantes.

URINARIO:

Micción frecuente, de orina copiosa, clara; < antes de las reglas, por la noche.

HOMBRES:

Atrofia de los testículos. Gonorrea crónica; descarga espesa, verde. Excoriación a la mínima fricción.

MUJERES:

El útero se siente como retorcido, durante las reglas. Leucorrea; corrosiva, como carne lavada. Atrofia de las mamas. Reglas retardadas y profusas.

RESPIRATORIO:

La laringe se siente ulcerada. Hiperventilación con flatulencia; por a.m.; despierta como estrangulado. Respiración asmática y sibilante. Pasajes de aire ulcerados. Bronquitis seca. Expectoración espumosa, vercosa, como espuma de jabón. Efusión pleurítica. Neumonía. Dolores del pecho que van hacia la espalda. Dolor desde el esternón hasta la espalda.

CORAZON:

Palpitación y dolores punzantes < al caminar. Aneurisma.

CUELLO Y ESPALDA:

Parte baja de la espalda como atornillada. Dolor magullante en la región lumbar < sentándose doblado. Dolor en el cóccix como por una caída.

EXTREMIDADES:

Dolor en las caderas, forzando a cojear. Ciática < acostándose; sobre la parte afectada; sentándose, de pié; lo despierta por la noche; > caminando y flexionando las piernas. Reumatismo de la rodilla, con efusión. Punta del dedo del pié, se ulcera y se vuelve amarilla.

PIEL:

Acné. Urticaria gigante. Pequeñas ampollas, que dejan marcas. Nódulos ásperos por todos lados.

SUEÑO:

Llora en voz alta durante el sueño, pero no está consciente de ello.

FIEBRE:

Frialdad helada en los huesos; en partes dolorosas. Calor en la noche. Se descubre y luego se hiela. Alternan calor y frío. Calor con estremecimientos. Calor y resequedad, luego sudores que empapan. Sudores nocturnos profusos que >.

RELACIONES:

Iod; Sul: Syph.

KALI MURIATICUM

GENERALIDADES:

El Cloruro de Potasio es uno de los remedios tisulares del Dr. Schuessler. Causa condición catarral, produciendo descargas Blanco lechosas, víscidas, pegajosas, espesas; delgadas o grumosas. Exudados tenaces, plásticos, fibrinosos. Depósitos duros. Hinchazón glandular. Dolores ulcerativos, cortantes, o clavantes, fugaces. Hormigueo. Adormecimiento. Malos efectos de la vacunación. Torceduras. Quemaduras. Golpes, cortadas. Embolismo. Síntomas cruzados. Reacción lenta. Infiltraciones obstinadas.

AGRAVACION:

Al aire libre. Bebidas frías. Corrientes. Calor, de la cama. Acostado. Noche. Humedad. Movimiento. Torceduras. Grasas; alimentos ricos. Durante las reglas.

MEJORIA:

Bebidas frías. Frotándose. Dejando el pelo suelto.

MENTE:

Descontento, desalentado. Teme al mal. Se sienta en silencio. Imagina que debe morir de hambre. Pérdida de apetito habitual, o rehusa la comida. Irritable y enojado; por nimiedades.

CABEZA:

Choque aturdidor o una carga pesada como de plomo que se siente en el occipucio > dejando el pelo suelto y por el calor. El cerebro se siente flojo. Caspa copiosa y blanca. Sudoración de la cabeza. Costra de leche.

OJOS:

Pústulas en la córnea. Catarata. Tracoma. Opacidades córneas. Cintilación al toser. Exudación en retina.

OIDOS:

Sordera; por condición catarral y oclusión de las Trompas de Eustaquio. Ruidos y crujidos al sonarse la nariz o trabar. Tronidos, comezón o como un tapón en los oídos. Las glándulas alderredor de los oídos están hinchadas. Ulceración de la Trompa de Eustaquio.

NARIZ:

Catarro constipado. Descarga blanca, espesa. Carraspeo de moco por las coanas posteriores.

CARA:

Azulosa; hundida. Mejillas hinchadas y dolorosas. Parálisis que sigue a un dolor en la cara. Los músculos de la cara se tuercen y tiemblan < comiendo, hablando o tosiendo. Paperas sin fiebre.

BOCA:

Erupciones alderredor de la boca. Aftas. Ulceras blancas en la boca. Encías escorbúaticas. Lengua; mapeada; gris o blanca; en la base. Gusto; salado, amargo, con frialdad en la lengua. Sensación como si un tumor estuviese creciendo en la lengua.

GARGANTA:

Blanca-grisásea, ulcerada; garganta con ulceración crónica. Tonsilas crecidas; inflamadas; hace la deglución excesivamente dolorosa, escasamente puede respirar. Carraspea moco espeso blanco; caseoso.

ESTOMAGO:

Los alimentos grasosos o ricos causan indigestión, los aborrece. Náusea; con estremecimientos. Estómago pesado, por la noche. Vómito de alimentos. El hambre desaparece después de beber agua.

ABDOMEN:

Plenitud después de comer. Pálido, duro o heces flocculentas. Ano ulcerado < caminar o evacuar. Comezón u hormigueo en ano, después de las evacuaciones. Hemorroides - sangrantes; sangre obscura y espesa.

URINARIO:

Micción en gotas. Cistitis. Descarga de moco blanco y espeso.

MUJERES:

Reglas; obscuras, con coágulos, negras como alquitrán; excesivas. Leucorrea; lechosa y blanca, espesa, blanda. Nódulos suaves y sensibles en las mamas. Mamas dolorosas antes o durante las reglas.

RESPIRATORIO:

Respiración difícil u oprimida. Bronquitis. Expectoración pegajosa, lechosa, o vuela de la boca. Ardor en el pecho. Aflujo de calor en el pecho.

CORAZON:

Frialdad en el corazón.

CUELLO Y ESPALDA:

Pesadez bajo el hombro derecho. Zumbido bajo la escápula derecha. Dolor de espalda > acostándose. Dolores relampagueantes desde la espalda baja a los pies. Debe salir de la cama y sentarse.

EXTREMIDADES.

Manos frías y pies. Las manos se ponen rígidas mientras escribe o teje. Calambres en los miembros; en las piernas. Sacudidas en los muslos. Tensión en las piernas que alterna con tensión en brazos. Sudor frío de los pies. Dolor cortante en huesos. Exudación e hinchazón alderredor de las coyunturas. Crujido en tendones; dorso de las manos.

PIEL:

Furfurácea. Bursitis. Erupciones conectadas con desórdenes estomacales o menstruales.

SUEÑO:

Sueños ansiosos.

COMPLEMENTARIO:

Calc-s.

RELACIONES:

Bry; Fer-p; Pul.

KALI NITRICUM

GENERALIDADES:

El Nitrato de Potasio afecta los órganos respiratorios, riñones, corazón y vasos sanguíneos. Las secreciones se incrementan, dentro de las cavidades. Hinchazones hidrópicas súbitas en todo el cuerpo. Con frecuencia está indicado en nefritis supurativa, asma y asma cardíaca. Los dolores son sordos y punzantes; latidos. Como madera, entumecimiento. Recaída de tisis. Muy débil. Tendencia hemorrágica.

AGRAVACION:

Caminando. Frío. Humedad. Resfriándose. Comiendo ternera. Por acostarse con la cabeza baja. Por respirar.

MEJORIA:

Movimiento suave. Tomando agua en sorbitos.

MENTE:

Cansancio mental por falta de ocupación o interés. Desánimo y miedo de morir.

CABEZA:

Accesos de desmayo, con vértigo en la mañana < estando de pié, > sentándose. Dolores en el occipucio > dejando el cabello suelto. Dolor de cabeza > movimiento de un carro. Como si el pelo fuese jalado durante el dolor.

OJOS:

El ángulo externo del ojo derecho tiembla < masticando.

OIDOS:

Sordera crónica por parálisis del nervio auditivo. Vértigo y tinitus.

NARIZ:

Sensación de hinchazón < poro derecho. Punta roja y con comezón. Pólipo.

BOCA:

Lengua, roja y con ampollas ardorosas.

ESTOMAGO:

Náusea, como si fuese a vomitar < por la noche. Dolores epigástricos y subesternales que van hacia la axila.

ABDOMEN:

Diarrea por comer ternera. Evacuaciones delgadas, oscuras, sanguinolentas.

URINARIO:

Emisiones de orina clara frecuentes y profundas. Diabetes insípida. Dolores de riñón sordos.

MUJERES:

Reglas profundas, negras, como tinta.

RESPIRATORIO:

Respiración rápida, entrecortada; se sienta derecho. Disnea violenta; con ardor en el pecho; punzadas sordas y náusea; sólo puede beber en sorbitos, aún estando sediento. Congestión del pulmón derecho. Asma. Expectoración fácil y agria, que dá alivio.

CORAZ_N: Palpitación < acostado.

ESPALDA:

Los dolores se extienden dentro del pecho.

EXTREMIDADES:

Las manos y los dedos se sienten hinchados.

FIEBRE:

Frialdad externa; barbilla; piel. Ardor interno.

RELACIONES:

Cam; Glo.

KALI PHOSPHORICUM

GENERALIDADES:

Otro gran remedio del Dr. Schuessler, para condiciones que surgen por falta de poder en los nervios. El paciente está Nervioso; Sensible, débil y se cansa fácilmente; por causas ligeras, como dolor, preocupaciones, fatiga mental, etc. Neurastenia. Parálisis; infantil; durante la dentición. Debilidad parálitica; o dolor, con sensación de parálisis. También es útil en estados de adinamia y decaimiento;

condiciones gangrenosas; sospecha de tumores malignos. Olor de las secreciones pútrido, como carroña; olor fétido del cuerpo. Las secreciones son amarillo dorado. Dolores punzantes. Después de una operación, cuando se inicia el proceso de cicatrización, la piel está jalada y tirante sobre la herida, especialmente en cáncer. Malos efectos de lesiones mecánicas, pena, vejación, etc. Excitación sexual por indulgencia o supresión. Reglas irregulares, pulso, etc. Dolor pequeño. Emaciación; por enfermedades desgastantes. Estados sépticos y fiebres sépticas. Carbunclos. Hemorragias. Atrofia muscular progresiva. Mareo, sin náusea.

AGRAVACION:

Causas leves; excitación, preocupación; fatiga mental o física. Contacto. Dolor. Frío. Aire seco. Pubertad. Comiendo. Coito.

MEJORIA:

Sueño. Por comer. Movimiento suave. Recargándose sobre algo.

MENTE:

Tímido - espanto nervioso; se sobresalta fácilmente. El trabajo más ligero parece una carga muy pesada. Mal dispuesto a conocer gente, o a hablarles. Deprimido; pesimista. Enojado. Afecciones pervertidas, aversión a sí misma; cruel con el esposo; con su bebé. Irritable, los niños gritan y lloran, se enojan, pueden articular difícilmente. Aprensivo, sobre su futuro, su salud. Temor a las multitudes, a la muerte, etc. Olvidadizo. Terrores nocturnos. Melancolía religiosa.

CABEZA.

Vértigo cuando se encara el sol; < mirando hacia arriba, estando de pié, por sentarse. Cefalalgia; de los estudiantes; < antes y durante las reglas; > por movimientos suaves. Niebla cerebral. Anemia cerebral. Hambre con cefalalgia.

OJOS:

Ardor, punzadas; bañados en lágrimas. Secreción amarillo-gris, lechosa. Los párpados se caen (izquierdo). Retinitis. Debilidad de los ojos. Pérdida del poder perceptivo. Bizqueo; después de enfermedades cerebrales. Manchas oscuras delante.

OIDOS:

Zumbidos y murmullos en los oídos. Escucha sensible, no soporta los ruidos. Sordera, por condición atrófica del nervio.

NARIZ:

Comezón en las coanas posteriores. Estornudos violentos con síntomas de resfrío reciente; a las 2 a.m. Fiebre del heno; como un profiláctico.

CARA:

Aspecto de tristeza y descuido. Franja café en la orilla del cabello. Neuralgia > por aplicaciones frías.

BOCA:

El paladar se siente grasoso. Lengua; amarilla, como mostaza líquida. Aftas. Aliento fétido. Boca excesivamente seca; como si la lengua estuviese adherida al paladar. Encías; esponjosas, retraídas, sangrantes; con dolor de dientes. Lenguaje lento, se vuelve inarticulado. Parálisis progresiva de la lengua. Nervioso, castañeteo de dientes. Noma.

ESTOMAGO:

Desea agua helada, vinagre, dulces. Hambriento; tan pronto como acaba de comer. Náusea; > eructos, < tosiendo. Sensación nerviosa de hundimiento en el hueco del estómago > comiendo. Aversión a los alimentos, pan, carne. No hay apetito, excepto por los dulces.

ABDOMEN:

Diarrea; fétida, de olor pútrido; caliente; evacuaciones amarillo dorado; indoloras; por susto; seguidas de debilidad. Dolor cortante en el abdomen. Disentería - las evacuaciones consisten de pura sangre. Evacuaciones como agua de arroz - cólera. Condición parética del recto y colon, después de la eliminación de hemorroides. Entero-colitis. Se siente frío > cubriéndose.

URINARIO:

Orina de color amarillo azafrán o lechosa. Enuresis nocturna; obstinada, en niños nerviosos, excitables; en ancianos. Sangrado por la uretra. La orina se detiene y se inicia de nuevo.

HOMBRES:

Excitación sexual; pero postración y visión débil después del coito; o después de emisiones nocturnas.

MUJERES:

Reglas; irregulares, demasiado tardías; demasiado escasas. Leucorrea horriblemente fétida. Descarga periódica de fluido copioso de color anaranjado proveniente de la vagina y recto. Dolores de parto débiles e ineficaces. Deseo sexual intenso por 4 o 5 días después de las reglas. Reglas dilatadas, con depresión.

RESPIRATORIO:

Afonía; por parálisis de las cuerdas vocales. Asma nerviosa < con el mínimo alimento. Respiración corta < subiendo escaleras. Tos, con esputo amarillo.

CORAZON:

Pulso irregular. Palpitación < con el movimiento más leve o ascendiendo escaleras.

CUELLO Y ESPALDA:

Adolorimiento paralítico de la espalda; debe recargarse en una silla. Sudor axilar que huele a cebollas. Irritación espinal. Sensación de escalofrío y dolor intenso a lo largo de la espina, que mejora una cefalalgia.

EXTREMIDADES:

Cosquilleo en las manos y pies. Punta de los dedos adormecidas. El pié se siente helado. Dolor en las plantas. Debilidad paralítica de las extremidades. Pies inquietos.

PIEL:

Manchas azules en la piel. Piel inactiva. Fría. Ictérica.

SUEÑO:

Terrores nocturnos; de los niños. Amodorrado. Bostezos. Sonambulismo. Insomnio por preocupación, problemas de negocios, etc. Sueños amorosos; inquietud y calor durante el sueño.

FIEBRE:

Temperatura sub-normal.

RELACIONES:

Caus; Coel; Pic-ac; Zin.

KALI SULPHURICUM

GENERALIDADES:

Este remedio tisular del Dr. Schuessler afecta las membranas mucosas respiratorias y la piel donde causa descamación. Las Descargas son Profusas y de un Amarillo Profundo, delgadas o pegajosas. Los procesos son de naturaleza tórpida. Supuraciones. Dolor punzante, desgarrante, ulceroso, que cambia de lugar. Falta de reacción. Cáncer; epitelial. Malos efectos de un enfriamiento estando acalorado. Lesiones. Crecimiento de las uñas que se interrumpe.

AGRAVACION:

Calor; de la habitación, aire. Ruido. Consolación. Noche.

MEJORIA:

Aire fresco. Caminando. Ayunando.

MENTE:

Apresurado. Irritable. Deseo de estar acostado pero hacerlo <, así que debe caminar para encontrar alivio. Asustado por nimiedades. Desea y rechaza las cosas.

CABEZA:

Caspa amarilla; húmeda; pegajosa. Irritación en el cráneo. Calvicie en placas (después de una gonorrea).

OJOS:

Oftalmía del recién nacido. Moco purulento y amarillo en enfermedad de ojos.

OIDOS.

Sordera eustaquiana. Descarga acuosa, pegajosa, delgada, amarilla; ofensiva; con pólipos.

NARIZ:

Engrosamiento de las membranas mucosas nasales y laríngeas, con respiración por la boca, ronquidos, etc. después de haber removido las adenoides.

CARA:

Dolorosa en cuartos calientes. Epitelioma.

BOCA:

Lengua amarilla y viscosa. Pérdida de olfato y gusto.

ESTOMAGO:

Como con una carga pesada en el estómago. Pavor por las bebidas calientes. Desea dulces.

ABDOMEN:

Lo siente frío, durante el cólico. Duro, timpánico, en la tosferina. Sensación de vacío en el hipogastrio > pasando flatos.

URINARIO:

Oxaluria. Pielitis.

HOMBRES:

Gonorrea; descarga viscosa, amarillenta, verde.

MUJERES:

Reglas; con una sensación de peso en el estómago. Leucorrea; amarillenta, acuosa.

RESPIRATORIO:

Ronquera, estertor en el pecho. Ronquera cruposa. Bronquitis. Asma; con expectoración fácilmente expelida, amarilla; viscosa.

EXTREMIDADES:

Dolores cambiantes, errantes. Reumatismo < calor. Nódulos artríticos.

PIEL:

Amarilla-ictérica. Descamación abundante. Ulceras, que rezuman Agua Amarilla delgada. Psoriasis. Urticaria. Piel seca. Eczema; intértrigo.

FIEBRE:

Sudor profuso y fácil. Fiebre intermitente; elevación de la temperatura por la noche.

RELACIONES:

Pul; Tub.

KALMIA LATIFOLIA

GENERALIDADES:

Kalmia afecta los Nervios, Corazón, circulación. Los dolores son neurálgicos, con cosquilleo, adormecimiento; temblores o debilidad paralítica. Los dolores cambian rápidamente; se disparan hacia afuera a lo largo de los nervios; con mucha náusea y pulso lento. Sensación dolorosa, de rigidez magullante. Dolor sordo, rasgante, aplastante, que se mueve hacia abajo; dolores que alternan con síntomas cardíacos, o entre los miembros superiores e inferiores. Reumatismo, sifilítico. Neuralgia, después de la desaparición de erupciones herpéticas. El movimiento hace que aparezcan los achaques. Albuminuria. Agachándose. Durante la leucorrea.

AGRAVACION:

Movimiento. Acostándose sobre el lado izquierdo. Doblándose hacia adelante. Mirando hacia abajo. Calor; del sol. Enfriándose. Con el sol. Desde la salida del sol hasta su puesta. Agachándose. Durante la leucorrea.

MEJORIA:

Comiento. Clima nublado. Movimiento continuo. Posición recostada.

MENTE:

La memoria y las facultades mentales están perfectas estando en posición reclinada.

CABEZA:

Vértigo; con cefalalgia, ceguera, dolores en los miembros y cansancio; < agachándose; mirando hacia abajo. Crujido de la cabeza -que lo asusta, envía un sonido a los oídos como el soplido de un cuerno. Cefalalgia < y > con el sol. Punzadas desde la nuca al vértica y la cara. Dolor supra-orbital enloquecedor; (d).

OJOS:

Sensación de tirantez rígida cuando mueve los ojos. La visión se vuelve negra al mirar hacia abajo. Iritis. Escleritis. Párpados rígidos. Retinitis albuminúrica especialmente durante el embarazo.

OIDOS:

Sonido como el soplido de un cuerno.

NARIZ.

Coriza; con incremento del sentido del olfato.

CARA:

Bochorno con vértigo. Neuralgia < lado derecho; por exposición al frío; > alimento. Punzadas y dolor desgarrante en las quijadas. Labios; rígidos, secos, hinchados.

BOCA:

Punzadas en la lengua. Cosquilleo en las glándulas salivales. Gusto amargo, con náusea > comiendo. Sensación de cansancio en los músculos masticadores.

ESTOMAGO:

Dolor en el hueco del estómago < doblándose hacia adelante > sentándose erecto. Sensación como de algo que presionara bajo el epigastrio. Veno > el vómito.

URINARIO:

Albuminuria; con dolores en los miembros inferiores. Micción frecuente de grandes cantidades de orina amarilla; > cefalalgia.

MUJERES:

Reglas suprimidas, con severos dolores neurálgicos a través de todo el cuerpo. Leucorrea; una semana después de las reglas; síntomas < durante la leucorrea.

CORAZON:

Aleteo del corazón con ansiedad. Dolores; agudos, ardientes, como puñaladas, que radian a la escápula y brazo izquierdos; quitan la respiración, con pulso lento. Palpitación < doblándose hacia adelante; va hacia la garganta, después de ir a la cama, temblor visible por todos lados; < acostándose sobre el lado izquierdo; > acostándose sobre la espalda. Hipertrofia; insuficiencia valvular. Obstrucción aórtica. Corazón tabáquico. Pulso lento, débil, trémulo.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor desde el cuello hacia abajo del brazo; braquialgia. Dolor bajo la espalda como si se fuese a romper. Dolor lumbar de origen nervioso; con calor y ardor.

EXTREMIDADES:

Reumatismo del deltoides derecho. Los dolores afectan una gran parte del miembro. Debilidad, adormecimiento, cosquilleo y sensación de frialdad en las extremidades. Hormigueo y entumecimiento del brazo izquierdo (dolores cardíacos). Dolores a lo largo del nervio ulnar que van hacia el dedo pequeño o anular. Coyunturas, rojas, calientes, hinchadas.

PIEL:

Tiesa; seca.

SUEÑO:

Insomnio; se voltea con frecuencia; despierta muy temprano por la mañana.

FIEBRE:

Fiebres prolongadas y continuas, con timpanitis.

COMPLEMENTARIO:

Benz-ac; Spig.

RELACIONES:

Aco; Dig; Rhus-t; Spig.

KOBALTUM

GENERALIDADES:

Este metal afecta la espina (región lumbar); genitales, riñones y huesos; y es útil para los estados neurasténicos de origen espinal; con perturbaciones sexuales. Descargas espumosas. Ulceración. Adolorimiento en los huesos. Agrio; gusto, estómago, sudor de pies, etc. Fatiga.

AGRAVACION:

Pérdidas sexuales. Sentándose. Calor de la cama o del sol. Mañana.

MEJORIA:

Carraspeando mucosidades. Movimiento continuo.

MENTE:

Sentimiento de culpa. Toda excitación mental < sufrimientos. Piensa demasiado poco en sí mismo.

CABEZA:

Vértigo, con sensación como si la cabeza se agrandara, < evacuaciones. Cafalalgia < agachándose. Sensación como si el cerebro se fuera hacia arriba y hacia abajo, al dar el paso.

OJOS:

Fotofobia en la primavera. Catarro de primavera. Dolor punzante en los ojos al salir a la luz del sol.

CARA:

Propensión a mantener las quijadas firmemente cerradas.

BOCA:

Los dientes se sienten muy largos. La lengua está cubierta de blanco. Grietas a través de la mitad de la lengua. Gusto ácido.

ESTOMAGO:

Agua agria o amarga que sube produciendo dolor en el estómago.

ABDOMEN:

Punzadas desde la región del hígado hacia las caderas. Sensación de vacío en el ombligo. Deseo de evacuar; mientras camina, < al estar de pie; seguido de diarrea. Goteo constante de sangre por el ano; no hay sangrado en las evacuaciones. Manchas amarillas. Dolores punzantes en la región del hígado y dolores agudos en la región del bazo < haciendo respiraciones profundas.

URINARIO:

Albuminuria. Punzadas en el meato al final de la micción. La orina tiene un fuerte olor picante.

HOMBRES:

Dolor en el testículo derecho > después de orinar. Emisiones nocturnas frecuentes; con sueños lascivos, cefalalgia y dolor de espalda. Manchas amarillo-cafés en los genitales. Descargas de semen sin erecciones. Impotencia.

RESPIRATORIO:

Tos con moco copioso, espumoso, dulzón y blanco, con grumos.

ESPALDA:

Dolor dolorido en el area lumbar; < coito; sentándose, > al levantarse, caminando o acostándose; con rodillas débiles; no puede enderezarse. Debilidad y dolor de espalda después de emisiones. Dolor a lo largo de la espina, y desde el sacro a través de las piernas hasta los pies.

EXTREMIDADES:

Punzadas en las caderas desde el hígado. Rodillas débiles. Bochornos de calor a lo largo de las piernas. Temblor de extremidades, especialmente piernas, con dolores al sentarse. Sudor en los pies principalmente entre los dedos, con olor ácido. Hormigueo y cosquilleo en los pies. Debilidad súbita en la cadera izquierda < caminando.

SUEÑO:

Desvelado; puede pasarla con poco sueño. Perturbado por sueños lascivos. Somnoliento, y difícilmente tiene suficiente sueño.

PIEL:

Granitos en la barbilla, cuero cabelludo. Comezón en todos lados al calentarse en la cama.

RELACIONES:

Eup-perf.

KREOSOTUM

GENERALIDADES:

Este medicamento es una mezcla de fenoles obtenidos por destilación de alquitrán de madera. Afecta las membranas mucosas del Tracto Digestivo; genitales femeninos; desorganiza la Sangre. Excoriaciones. Ardores como de fuego. Descargas Acres, Calientes, Fétidas profusas; eructos, esputo, etc. enrojecen la parte. Descargas grumosas; reglas, etc. Hemorragias; pasivas, cafés, oscuras; por pequeñas heridas. Tumefacción. Plenitud. Pesadez. Escorbuto. Afecciones cancerosas. Gangrena. Gran debilidad, con sensación miserable. Es adecuado para personas magras, mujeres viejas (enfermedades post-climatéricas); niños crecidos y deficientemente desarrollados; marasmo. Ennegrecimiento, de dientes, leucorrea, loquios, etc. Emaciación rápida. Desarreglos acompañados por bostezos. Niños que no duermen a menos que se les acaricie y mime. Pulsaciones por todo el cuerpo. Severas neuralgias antiguas. Sífilis congénita.

AGRAVACION:

Dentición. Embarazo. Descanso. Frío. Por comer. Acostándose. Verano. Malos olores. Durante el embarazo. 6 p.m. a 6 a.m. Coito. Contacto. Torceduras.

MEJORIA:

Calor. Comida caliente. Movimiento. Presión. Después de dormir.

MENTE:

Insatisfecho, con todo; quiere cosas que luego avienta y quiere algo más. Gritos por la noche. (niños). La música causa llanto y palpitación. Temor por pensar en el coito en mujeres. Travieso; testarudo y obstinado. Estúpido. Desea la muerte. El niño gime constantemente o dormita con los ojos abiertos o está irritable e insomne durante la dentición.

CABEZA:

Dolor sordo como si una tabla presionara contra la frente. Zumbido en la cabeza. Cráneo sensible < por peinarse el cabello. Caída del cabello.

OJOS:

Calientes, lágrimas acres y picantes. Párpados rojos e hinchados. Sufrimiento de ojos que alterna con el de las extremidades. Parpadeo constante.

OIDOS:

Dificultad para oír durante y antes de las reglas.

NARIZ:

Olor y descarga ofensivos. Catarro crónico de los ancianos.

CARA:

Palidez con erupciones rojas; durante el escalofrío o calor. Expresión rígida de sufrimiento; niños con mirada de viejos. Dolores ardientes < hablando o por esfuerzos; > acostándose sobre la parte afectada. Labios rojos, sangrantes. Se humedece los labios constantemente sin estar sediento.

BOCA:

Pudrimiento rápido de los dientes; con olor pútrido de la boca. Manchas negras en los dientes. Encías esponjosas, azulosas, sangrantes. Dolores intolerables de los dientes durante el embarazo. Dentición muy dolorosa. Aftas, o salivación durante el embarazo. Gusto amargo bajo la garganta. Aliento fétido. Dientes como clavijas.

GARGANTA:

Sensación ardorosa y sofocante. Gusto amargo, al tragar la comida, después de beber agua.

ESTOMAGO:

Eructos; calientes; espumosos. Náusea; vómito; de alimentos varias horas después de haberlos comido; de agua dulzona en la mañana; en el embarazo; de alimentos indigeridos; de úlcera uterina; cáncer del estómago. Frialdad de hielo. Hematemesis. Desea alimentos ahumados. Alimentos fríos <. Ayuno <, no se atreve a permanecer en ayunas. Disgusto por los alimentos durante la convalecencia. Punto duro y doloroso en el estómago.

ABDOMEN:

Distendido. Diarrea; sanguinolenta, oscura, café, lientérica; heces ofensivas. Evacuaciones verdes durante la dentición. El niño lucha y grita durante la evacuación, como si se encolerizara. Dolor ulceroso < por respirar profundamente. Constricción del recto, con cancer uterino.

URINARIO:

Como si un bulto presionara en la vejiga. Micción; apresurada; involuntaria al estar acostado, al toser. Puede orinar solo cuando está acostado. Sueños de que está orinando. Enuresis en la primera parte de la noche. Orina ofensiva. Micción frecuente con orina copiosa, durante el día. Diabetes. Bebe mucho pero pasa poco a la vez.

HOMBRES:

Ardor en los genitales durante el coito, por ponerse en contacto, con descarga vaginal acre, el pene se inflama el día siguiente. Prepucio, negro azuloso, con hemorragias y gangrena.

MUJERES:

Reglas; profusas, grumosas; intermitentes; < acostándose; > sentándose o por caminar. Leucorrea borbollante; como agua sanguinolenta; ofensiva; corrosiva; causando comezón; manchando la ropa de amarillo; con malestares acompañantes; blanca, con olor de maíz verde. Dolor violento durante el coito; ardor en partes, seguido por descarga de sangre oscura el siguiente día. Comezón violenta de la vulva y vagina < durante la micción. Loquios, grumosos, ofensivos, intermitentes. Cáncer, erosión del cérvix. Caída de las mamas con bultos duros y dolorosos en ellas. Reglas < por levantar algo, por exceso de esfuerzos. Punzadas en la vagina, que la despiertan.

RESPIRATORIO:

Ronquera con dolor en la laringe, > estornudando. Tos; con poca expectoración o expectoración copiosa y purulenta, después de cada tosida; después de la influenza. Tos de invierno en los ancianos, con presión pesada en el esternón. Dolor profundo en el pecho. Ardor como de un carbón encendido en el pecho. Gangrena de los pulmones. Hemoptisis periódica. Tisis descuidada.

CORAZON:

Punzadas en la región del corazón. Pulsación en todas las arterias estando en descanso.

ESPALDA:

Dolor clavante en la espalda que se extiende a los genitales y hacia los muslos; como si todo se fuese a salir (en mujeres), con necesidad de evacuar y orinar, con leucorrea. Ardor en el sacro, escápulas como magulladas.

EXTREMIDADES:

Dolor en la articulación de la cadera (izquierda) con sensación como si la pierna estuviese demasiado larga al pararse. Dolor en el dedo pulgar como si estuviese torcido.

PIEL:

Eczema húmedo, con comezón violenta en párpados, cara, coyunturas, dorso de las manos. Heridas pequeñas que sangran fácilmente. Ulceras que se abren y cicatrizan; sangrando después de un coito. Urticaria, después de las reglas.

SUEÑO:

Perturbado, a causa de una inquietud de todo el cuerpo o con sensación de fatiga y dolores en todas las extremidades. Se revuelca toda la noche sin una causa aparente. Sueños de micción.

FIEBRE:

Sudor frío.

COMPLEMENTARIO:

Sul.

RELACIONES:

Ars; Aru-t; Carb-ac; Grap; Nit-ac; Psor.

LAC CANINUM

GENERALIDADES:

La leche de perra actúa sobre Garganta, Nervios y órganos genitales femeninos. Causa hipersensibilidad de los Nervios produciendo inquietud, nerviosismo, postración y sensaciones anormales; no soporta que una parte de su cuerpo toque la otra; debe mantener sus dedos separados. Los síntomas alternan lados.

Los síntomas van de derecha a izquierda luego se regresan otra vez o se revierten; garganta, ovarios, problemas de piel, etc. Partes resplandecientes; infaladas, úlceras, etc. Seca la leche en mujeres que no pueden amamantar a su bebé. Difteria y parálisis diftérica. Ocen. Dolores erráticos; o predisposición de síntomas. Consecuencias de caídas.

AGRAVACION:

Contacto. Sacudida. Durante las reglas. Aire frío; viento o corrientes. La mañana de un día y la noche del siguiente. Después del sueño.

MEJORIA:

Al aire libre. Bebidas frías.

MENTE:

Lleno de fantasías; hórridas; de víboras; lombrices. Muy olvidadizo; comete errores al hablar y escribir. Cada síntoma parece una enfermedad establecida; que es incurable. Miedo a las enfermedades; de caer por las escaleras. Niño travieso e irritable, grita todo el tiempo, especialmente por la noche. Abatido. Ataques de furia. Histeria en el clímax del orgasmo sexual. Siente como si caminara por el aire o no tocara la cama cuando está acostado. Siente que no vale nada. Mente ausente. Imagina que usa la nariz de otra persona. Piensa que todo lo que dice es una mentira. Accesos; de llanto. Desagrado por su propio cuerpo.

CABEZA:

Los dolores cambian de lugar. Visión borrosa. Náusea y vómito en el clímax de un ataque de cefalalgia, que es < por el ruido, por hablar > estando quieto. Como si el cerebro se contrajera y relajara alternadamente.

OJOS:

Vé rostros delante de sus ojos < en la obscuridad. Vé lombrices, cosas reptantes. Párpados pesados.

OIDOS:

Ruido en los oídos. Reverberación de la voz, como si hablara en un cuarto muy amplio y vacío. El sonido se escucha como que proviniera de muy lejos. Sordera por sífilis hereditaria.

NARIZ:

Coriza - un poro tapado, y el otro abierto y con escurrimiento. Descarga nasal nocturna y profusa, purulenta, manchando la almohada de verde-amarillo. Los flúidos se salen de la nariz mientras bebe. Grietas en las alas nasales. El aroma de las flores le producen escalofríos.

CARA:

Pálida, ansiosa, fatigada. Las mandíbulas crujen cuando come.

BOCA:

Lengua cubierta de blanco, con orillas de un rojo brillante. Gusto pútrido < dulces. Lenguaje difícil, habla por la nariz (afecciones nerviosas de la garganta). Babeo en difteria (la saliva se escurre). Lengua

rígida. Grietas en las comisuras de la boca. Tartamudea cuando habla rápido; tiene que hablar lentamente. Salivación.

GARGANTA:

Ulcerada; tiene parches brillantes de una blancura de porcelana; o rojo brillante; tonsilitis y difteria; los síntomas cambian repetidamente de lado a lado; > por bebidas frías o bebidas tibias, pero < por tragar en vacío. Garganta ulcerada que inicia y finaliza con la menstruación. Deglución difícil < sólidos; el dolor se extiende hasta los oídos.

ESTOMAGO.

Desea; leche y bebe mucha; alimentos altamente sazonados. Aversión a los líquidos, especialmente agua; cualquier cosa dulce. Hundimiento en el epigastrio con náusea. La comida salada sabe natural. Náusea > eructos. Todo, a excepción del pescado, la pone peor.

URINARIO:

Orina escasa, infrecuente. Orina sólo una vez en 24 horas, luego copiosamente pero con algo de dificultad y ligera irritación. Enuresis nocturna (específico). La vejiga parece llena después de orinar.

MUJERES:

Reglas; barbellantes; calientes como fuego; demasiado adelantadas; de un rojo brillante; profusas; verdes; o con olor amoniacal. Pechos hinchados, dolorosos < a la menor sacudida; tiene que sostenerlos firmemente cuando va arriba y abajo; antes de las reglas; > al aparecer la menstruación. Dolor constante en los pezones. Flatos por la vagina. Seca la Leche. Galactorrea. Leche escasa. Leucorrea; profusa; durante el día, nada por la noche; < de pie o caminando. Organos sexuales extremadamente excitados, < poniendo la mano sobre el seno; por presionar la vulva al sentarse, o la más ligera fricción al caminar.

RESPIRATORIO:

Ronquera durante la menstruación. Tos por cosquilleo constante en la garganta. Clavículas doloridas al tacto.

CORAZON:

Dolor al subir y bajar escaleras.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez del cuello. La espina duele desde la base del cráneo hasta el cóccix; muy sensible al tacto o presión. Estremecimiento frío a lo largo de la espalda. Calambres en los pies.

EXTREMIDADES:

Ciática. Piernas frías hasta la rodilla. Dolor constante en la cadera derecha. Dolores reumáticos que se disparan de un lado al otro. Talores adoloridos.

SUEÑO:

Sueño de serpientes. Yace con una pierna flexionada y la otra estirada. Sueños de micción. Despierta por la noche con la sensación de que la cama se mueve.

RELACIONES:

Lach; Lyss; Pul.

LAC DEFLORATUM

GENERALIDADES:

La leche desnatada es útil en enfermedades con Nutrición defectuosa; y condición anémica de la sangre. Se siente completamente extenuado, ya sea que haga algo o no; gran fatiga al caminar. Sensación de aire frío que sopla sobre ella, aún estando cubierta; como si las sábanas estuviesen húmedas. Sufrimientos por falta de sueño. Somnoliento; por enfermedad orgánica del corazón; y por afecciones crónicas del hígado. Personas o niños que se ponen enfermos por tomar leche. Obesidad.

AGRAVACION:

Frío; por la corriente más ligera. Mojándose. Por meter las manos en agua fría. Leche. Pérdida de sueño. Semanalmente. En lugares cerrados.

MEJORIA:

Descanso. Presión de un vendaje. Conversación.

MENTE:

Abatido; > conversación; no le importa vivir, no tiene miedo a la muerte pero está segura de que va a morir. Horror por los lugares cerrados. (Claustrofobia).

CABEZA:

Vértigo; < acostándose sobre el lado izquierdo; moviendo la cabeza en la almohada, volteándose estando acostada; debe sentarse. Ceguera, luego cefalalgia frontal con latido, con mucha orina pálida, < ruido, luz, movimiento, durante las reglas; > por vendarse, conversación. Migraña; cesa al ponerse el sol. Incomodidad en la cabeza después de lesión. Desmayo por extender los brazos sobre la cabeza. El cráneo se siente jalado. Cefalalgias persistentes, por años. La cabeza duele al toser.

OJOS:

Fotofobia; aún la luz de vela es insoportable. Como si los ojos estuviesen llenos de pequeñas piedras, durante la cefalalgia.

CARA:

Apariencia pálida y enfermiza. Inflamación indolora de la cara.

ESTOMAGO:

Aversión a la leche. Náusea y vómito, con sensación de mareo mortal. Vómito incesante sin relación con lo comido, primero de alimentos no digeridos; agrio; luego de agua amarga; en el embarazo. Los niños sufren de coriza por tomar leche.

ABDOMEN:

Constipación, con deseo ineficaz. Evacuaciones grandes y duras; con mucho esfuerzo; con ano lacerado. Constipación persistente > sólo con purgantes o enema con ataques violentos de jaqueca con náuseas.

URINARIO:

Dolor penetrante, ulcerado en los riñones. Micción frecuente y profusa, con cefalalgia u otros dolores. Micción involuntaria, mientras camina en aire frío, mientras monta, o cuando se apresura a alcanzar un tren, y falta de sensación cuando la vejiga está llena.

MUJERES:

Reglas; retardadas, en niñas que toman mucha leche; suprimidas por poner las manos en agua fría. Flujo escaso de leche; restablece la leche.

EXTREMIDADES:

Puntas de los dedos heladas, resto de las manos tibias.

PIEL:

Muy sensible al frío. Parches simétricos, causando comezón y ardor después de rascarse. Piel engrosada en las orillas de los pies.

SUEÑO:

Inquietud por pérdida de sueño.

FIEBRE:

Siempre tiene frío.

RELACIONES:

Nat-m.

LACHESIS

GENERALIDADES:

El nombre nativo americano de esta serpiente es surukuku - (amo de los matorrales); y el veneno de esta víbora fué probado por primera vez por el Dr. Hering. Como el veneno de otras víboras, descompone la Sangre; afecta el Corazón y la Circulación. Los Nervios se vuelven muy sensibles, especialmente los Cutáneos y Vaso-motores. Sensibilidad excesiva de la superficie con intolerancia al

contacto o constricción; irritabilidad nerviosa intensa, inquietud, agitación, movimiento. Los síntomas aparecen en el Lado izquierdo; luego van hacia la derecha - Garganta, Ovarios, Gran remedio femenino. Establecimiento intensamente rápido de la enfermedad con gran postración. Estados malignos o sépticos; difteria, gangrena, diabética; traumática; senil; carbunco; erisipelas, caen bajo su influencia. Hemorragias; son delgadas, conteniendo partículas oscuras como paja quemada; vicariante, sangramiento nasal, orina sanguinolenta, etc. Heridas pequeñas que sangran mucho. Azulosidad: de las partes afectadas; de las manos. Descargas; acres, Ofensivas. Sensación ascendente; en la garganta; fríos. Bochornos de calor; aflujos de sangre. Sensación de un Bulto, en garganta, abdómen, hígado, recto, etc. rueda cerca de la vejiga. Adolorimiento excesivo; de la garganta; úlceras; manchas en el cuerpo. Sensación de constricción; en la garganta; en la cabeza - como por un casquete; del ano; tirantez; vértice a mandíbulas; en el recto, etc. Gran debilidad física y mental. Temblores; de todo el cuerpo; de las manos, lengua, etc. Latidos duros, o dolores martilleantes; Dolores neurálgicos que cambian de localización con palpitación. Epilepsia; viene durante el sueño; por celos; onanismo; pérdida de fluidos. Parálisis del lado izquierdo; después de una apoplejía; o fatiga cerebral. Desmayos; con dolor en el corazón, náusea, cara pálida, vértigo. Corea, por perforarse los oídos. Paso vacilante; lado izquierdo débil. Hidropesía; por enfermedades de hígado o bazo; después de escarlatina. Celulitis; con ardor y color azul de la piel. Púrpura. Peste bubónica. Cáncer. Parálisis diftérica; y otras afecciones. Portadores de difteria. Malos efectos de lesiones; heridas punzantes. Pena, susto. Vejación; ira. Celos; decepción amorosa, masturbación; torceduras (azulosidad de las partes). Nunca bien desde el climaterio. Los síntomas se desarrollan en el sueño y el paciente se despierta por los síntomas; en cualquier tiempo, día o noche. Histeria. Catalepsia. Como si una cuerda tirara de la parte o la esparciera.

AGRAVACION:

Sueño; Después de dormir. Mañana. Calor.; del Verano: Primavera; de una habitación; del sol. Deglutiendo; en vacío; líquidos. Ligero toque o presión. Presión de las ropas; alderredor del cuello; cintura. Descargas retardadas. Al inicio y fin de la menstruación. Climaterio. Alcohol. Clima nublado. De pié o agachándose. Movimiento. Cerrando los ojos. Bebidas calientes.

MEJORIA:

Al aire libre. Descargas abundantes. Eructos. Presión dura. Bebidas frías. Bañando la parte afectada. Sentándose doblado. Comiendo; especialmente frutas. Aplicaciones calientes.

MENTE:

Nervioso; excitable. Locuacidad; divagante; frecuentemente saltando de un asunto a otro, luego tristeza; o repite la misma cosa. Obligando a engañar; se siente bajo un control super humano; que ella está muerta y están preparando su funeral; se siente perseguida, odiada y despreciada. Ideas eróticas persistentes, sin capacidad. Celos insanos. Suspica. Triste por la mañana; sin deseo de mezclarse con el mundo. Malicia. Travesura. Manía por exceso de estudio. Delirio; tremens; por exceso de velación; por exceso de fatiga; pérdida de fluidos; exceso de estudio. Se siente lleno de veneno. Temor; al irse a dormir; acostándose; o de que el corazón se va a detener. Inquietud; no quiere atender su negocio; quiere estar fuera, en algún lugar, todo el tiempo. Desarreglo del sentido del tiempo. Aversión de las mujeres a casarse. Insanía religiosa. Habla, canta, silba; hace movimientos raros. Se burla. Se arrastra por el suelo; con frecuencia escupe; se esconde, ríe o está enojado; durante los espasmos. Memoria débil. Comete errores al escribir o hablar. Mente < después del sueño. Predice el futuro correctamente. Orgulloso y flojo. Odioso.

CABEZA:

Vértigo; < volteándose hacia la derecha; cerrando los ojos; mirando a un sólo objeto; por caminar al aire libre. Cefalalgia; pesada; ardorosa; bajo la nariz, el lado (derecho) se siente cortado. Migraña, dolor que se extiende al cuello y hombros. Peso, presión o ardor en el vértice. Cefalalgias por el sol, con visión trémula. Caída del cabello principalmente durante el embarazo. Tumor perforante del cráneo. Adormecimiento, cosquilleo (izquierdo). No quiere que le toquen el cabello.

OJOS:

Los siente pequeños o como si los jalaran juntos por cuerdas, que estuviesen atadas con un nudo en la raíz de la nariz. Ceguera con afecciones de pulmón o corazón. Ojos húmedos, por dolor. Fístula lagrimal; con erupción en la cara. Hemorragias intra-oculares. Siente como si los ojos estuviesen forzados a saltar al presionar la garganta. Visión disminuía. Mirada inestable, los ojos rotan vagamente.

OIDOS:

Dureza de oído; con falta de cera. Cera demasiado dura, pálida, seca. Dolor de oído con garganta ulcerada. Pulsación en. Cerúmen como papel masticado. Estrictura de la trompa de Eustaquio.

NARIZ:

Coriza obturante. Descarga, con cada tos. Nariz sangrante con amenorrea; al sonarse la nariz. Sangre y pus por la nariz. Paroxismos de estornudos en asma de heno. Puntos rojos en la nariz (flores de ron); de los borrachines. No soporta nada delante de la nariz.

CARA:

Púrpura, moteada; terrosa, durante el calor. Redes de venas en la cara. Neuralgia (lado izquierdo); el calor se eleva hacia la cara. La mandíbula inferior se cae (coma). Paperas sépticas. Bochornos de calor. Hinchazón enorme de los labios.

BOCA:

Encías; azulosas, hinchadas, sangrando fácilmente. Lengua; hinchada; tiembla cuando la saca; se atora en los dientes; cuelga; roja, seca; agrietada en la punta. Mal olor de la boca. Aftas y zonas denudadas, con ardor y ulceración. Saliva, mucha, gruesa, pastosa. Lenguaje disparatado, farragoso; no puede abrir la boca con amplitud. Gusto a pimienta; agrio. No soporta nada delante de la boca. Los dientes duelen y el dolor se extiende a los oídos. Castañeteo de dientes. Los dientes se sienten muy largos. Protusión y retracción de la lengua, súbita y forzada.

GARGANTA:

Como con un bulto en la garganta; asciende y es tragado de nuevo. Como un tapón caliente o cuerpo suave o como morusas de pan. El dolor de la garganta se extiende a los oídos. Atragantamiento. Deglución dolorosa; por el lado equivocado; se regresa por la nariz; < en vacío, menor por los líquidos y > por los sólidos. Sensibilidad excesiva de la garganta a la presión externa; debe aflojar el cuello. Difteria laríngea. Tonsilitis. Esquinencia. Carraspea partículas fétidas de la garganta, en ulceración crónica de la garganta; o moco grueso que no puede ser forzado a ir hacia arriba o hacia abajo. El hueco de la garganta se siente hinchado o como con un punto ulcerado en la parte posterior del hueco. Constricción > comiendo. No puede deglutir cosas dulces o ácidas.

ESTOMAGO:

Deseo; de alcohol, ostras, café que agrada. Hambriento, no puede esperar por la comida, o pérdida de apetito alternamente. Sediento, pero teme beber. Presión como de tenaza en el estómago > comiendo, pero regresa en pocas horas (cáncer), adolorimiento o calambres en el epigastrio. Vómitos durante las reglas con cefalalgia. Eructos; antes de la epilepsia; en las reglas. Náusea; viene, antes de ir a la cama; después de beber agua helada.

ABDOMEN:

Ulceración dolorosa, latido profundo en el hígado; no soporta nada alderredor de la cintura. Inflamación del hígado y absceso. Vejiga séptica. Dolor cortante en el lado derecho del abdomen causando desmayo. Hinchazón de la región cecal, debe acostarse sobre la espalda, con las rodillas dobladas; apendicitis. Dolor desde el ano al ombligo. Abdomen caliente, sensible, dolorosamente rígido desde el lomo hasta los muslos. Constipación del embarazo. El ano se siente estirado. Dolores en el recto cada vez que tose o estornuda. Hemorragias de los intestinos conteniendo partículas como achicharradas. Hemorroides; salidas, dolorosas, < tosiendo o estornudando. Necesidad constante en el recto, y no por evacuar. Evacuaciones fétidas. Golpeteo en el ano como por martillos; con las reglas. Como una bola que rodara al voltearse. Diarrea por frutas y ácidos.

URINARIO:

Como una bola que rodara en la vejiga cuando se voltea. Orina sanguinolenta. Orina, frecuente, espumosa, oscura. Tumores pequeños en la uretra causando retención. No orina, no evacuación.

HOMBRES:

Deseo sexual fuerte, sin fuerza física. Durante el coito, la emisión es tardía o no aparece para nada. Ideas lascivas sin erección del pene. Prepucio engrosado. Semen con olor picante. Malos efectos de la masturbación. Alegre después de emisiones nocturnas.

MUJERES:

Ovario izquierdo hinchado, indurado, doloroso, debe levantar las cubiertas. Reglas; negras, escasas; con coágulos, acres, vicariantes, por la nariz. Dolores uterinos y ováricos > por el flujo de sangre. El útero se siente como abierto. Mamas; inflamadas; azulosas. Pezones hinchados, erectos, dolorosos al contacto. Leche; delgada, azul. Leucorrea; copiosa, punzante, manchando y endureciendo las ropas de verde. Problemas del climaterio; palpitaciones, bochornos de calor, hemorragias, etc. Ninfomanía. Entre menos flujo hay, mayor es el dolor. Tumores ováricos. Dismenorrea el primer día. Deseo de ir al aire libre y correr, antes de las reglas.

RESPIRATORIO:

Sofocos y estrangulación, al acostarse; al caer dormido; debe saltar de la cama y correr a abrir la ventana. Siente que debe hacer inspiraciones profundas. Necesidad de aire. Tos cosquilleante, sofocante < tocandose el cuello o el canal auditivo; > sacando un poco de expectoración. Tos durante el sueño sin estar consciente de él. Como una piel que colgara en la laringe o como una válvula en ella. Como un tapón que se moviense hacia arriba y abajo con tos. Laringe dolorosa al tacto. Ultima etapa de la neumonía. Absceso de los pulmones. Expectoración; espumosa, purulenta, difícil, sanguinolenta con

sudoración excesiva. Pérdida de la voz; por parálisis de las cuerdas vocales o edema. Tos como si un líquido se hubiese ido por el lado equivocado; más durante el día.

CORAZON:

Palpitación, con accesos de desmayo. Inquietud, temblores, ansiedad cerca del corazón. Corazón; débil; se voltea, o como si estuviera muy grande, o como si colgara de una cuerda. Pulso; débil, intermitente; lento; irregular. Cianosis neonatorum. Carditis; metastásica. Arterioesclerosis senil.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello sensible a la mínima presión. Cuello rígido; mueve las quijadas con dificultad. Neuralgia del cóccix < levantándose del asiento, siente como si estuviera sentado en algo agudo. Sensación como cuerdas que jalaran desde la espalda, los brazos, piernas, ojos.

EXTREMIDADES:

Glándulas hinchadas en axila. Brazo izquierdo dormido; puntas de los dedos entumidas. Temblor de manos (en borrachos). Sudor de axila con olor a ajos. Panadizo, con inflamación azulosa. Cosquilleo, piquetes en la mano izquierda. Grietas en la piel en las orillas de las uñas. Rodillas frías; o como si soplara aire caliente a través de ellas. Sudor de pies fétido o frío. Ciática; debe acostarse; < por el mínimo movimiento. Tendones contraídos. Los dedos se siente quebrados. Dolor en la barbilla, en afecciones de la garganta. Calambres en las pantorrillas, por temor. Flegmasía alba dolens.

PIEL:

Marmoleada o lívida; marcas oscuras; úlceras; comiendo, sobre las piernas; con areolas azulosas y purpúreas. Úlceras fungoideas. Úlceras varicosas. Carbulclos, ampollas, con areolas azulosas. Úlceras por decúbito con orillas negras. Celulitis. Erisipelas; de los ancianos. Púrpura con postración intensa. Cicatrices; enrojecidas, que duelen, se abren y sangran. Capilares dilatados. Pequeñas heridas que sangran mucho.

SUEÑO:

Duerme al agravarse. Insomnio; por irritación cerebral; de los borrachos. Sueños atemorizantes; de serpientes. Los niños se revuelcan llorando en sueños. Somnolencia, pero no puede dormir.

FIEBRE:

Frío < bebiendo; con sudor. Calor; en el vértice; en bochornos; caminando, o cayendo dormido. Sudor; cerca del cuello; durante el sueño; en axilas; sanguinolento, manchante, negruzco, amarillo; como ajo. Pies helados.

COMPLEMENTARIO:

Lyc; Pho; Zin-io.

RELACIONES:

Caust; Sep; Zin.

LACHNANTES

GENERALIDADES:

Un remedio para la tortícolis y síntomas reumáticos cerca del cuello. Burbujeo y hervor cerca del corazón, levantando la cabeza. Rigidez del cuello, jalado hacia un lado, en ardor de garganta. Dolor en la nuca como si estuviese dislocada, al voltear el cuello, o doblando la cabeza hacia atrás. El puente de la nariz se siente pellizcado. Sensación de frialdad de hielo en la región escapular media.

LACTICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

Este ácido se encuentra en la leche de mantequilla y es un remedio valioso para la náusea matutina, diabetes, afecciones reumáticas; problemas de mamas. Es adecuado para mujeres anémicas y pálidas. Náusea; al despertar > comiendo; en diabetes o embarazo. Sed. Apetito voraz. Plenitud o como un tapón que atascara la garganta. Dolores en los senos con crecimiento de las glándulas axilares. Dolor que se extiende a la cabeza. Dolores reumáticos en las articulaciones; rodillas; < por el movimiento. Dolores errantes en las piernas. Temblor de todo el cuerpo, mientras camina. Paso frecuente de grandes cantidades de sacarina en la orina. Eructos calientes y acres < fumando. Salivación - aflujo de agua. Pies sudorosos.

LACTUCA VIROSA

GENERALIDADES:

Este remedio parece ser un verdadero galactogogo; aumenta la leche en el seno. La orina huele a violetas. Sensación de una gota que continuamente pasara a lo largo de la uretra cuando está sentada.

LAPIS ALBUS

GENERALIDADES:

Es un Silico-fluoruro de Calcio: un remedio para crecimientos nuevos y afecciones glandulares. Los dolores son ardorosos, punzantes, agudos. Uterinos; carcinoma; tumores fibroides, con dolores ardorosos intensos y hemorragias profusas. Dolores menstruales severos que causan desmayos. Crecimiento de las glándulas, especialmente cervicales que son elásticas y flexibles más que con dureza de piedra. Lipoma. Hinchazones glandulares en donde usualmente no hay glándulas.

LAPPA

GENERALIDADES:

Este remedio afecta principalmente la piel; hígado, coyunturas y útero. Dolorimiento pesado, ulceroso; como si yaciera incómodamente. Entumecimiento; región lumbar, de pantorrillas doloridas. Constricción.

AGRAVACION:

Frío; mojado. Sacudidas. Acostado sobre el lado derecho. Ejercicio violento.

MEJORIA:

Clima nublado.

CABEZA:

Vértigo, con náusea y vómito. Peso en el vértice.

OJOS:

Enrojecimiento. Perrillas; aflorantes.

NARIZ:

Enrojecimiento.

CARA:

Acné inveterado; < contacto.

ESTOMAGO:

Acidez; gusto ácido en la carne; toda la comida se vuelve ácida, la vomita. Diarrea que alterna con síntomas reumáticos.

URINARIO:

Micción profusa y frecuente, lechosa, fosfaturia.

MUJERES:

Sensación de magulladura dolorosa, pesada; con gran relajamiento del tejido vaginal. Desplazamiento uterino < estando de pié, caminando, o por una sacudida causada por un traspies.

PECHO:

Temblores en.

EXTREMIDADES:

Frente de los muslos débil. Ulceras antiguas cerca de las coyunturas.

PIEL:

Erupciones; pegajosas en la cabeza, cara, etc. Eczema fétido y húmedo; de los infantes. Muchas ampollas pequeñas y dolorosas. Sudor axilar frío; corre por el pecho; fétido.

COMPLEMENTARIO:

Mag-c.

LATHYRUS

GENERALIDADES:

Afecta las columnas anteriores y laterales de la columna, causando muchas afecciones paralíticas de las extremidades inferiores. Atetosis; parálisis infantil. Util en enfermedades desgastantes y fatigantes cuando hay mucha debilidad y pesadez; y una recuperación lenta de la fuerza nerviosa. Reflejos incrementados.

AGRAVACION:

Clima frío y húmedo.

MENTE:

Deprimido.

CABEZA:

Vértigo, estando de pié y con los ojos cerrados.

BOCA:

Ardor en la punta de la lengua. Lengua como escaldada. Lengua y labios entumidos.

URINARIO:

Micción involuntaria, apresurada.

EXTREMIDADES:

Paso titubeante, inseguro. Rigidez excesiva de las piernas; paso espástico. Las rodillas se golpean una con otra al caminar. Las rodillas se tuercen con exageración. No puede extender o cruzar las piernas al estar sentado. Los talones no tocan el suelo al caminar. Se sienta doblado hacia adelante, se endereza con dificultad. Músculos glúteos y los músculos de los miembros inferiores están emaciados. Rigidez y adolorimiento de los tobillos y rodillas. Los pies se arrastran o los baja súbita y forzadamente mientras camina. Sensación de un paño húmedo alderredor de la cintura. Las piernas están frías durante el día, se ponen calientes y arden por la noche > descubriéndolas. Mientras está acostado, las piernas pueden ser movidas hacia los lados, pero no pueden ser levantadas.

SUEÑO:

Bostezos continuos con insomnio.

LATRODECTUS MACTANS

GENERALIDADES:

El veneno de esta araña (viuda negra) afecta el Corazón, produciendo el retrato típico de la angina de pecho. La sangre se vuelve delgada, acuosa. Efectos tetánicos que duran varios días. Inquietud, con dolores cardíacos y postración.

AGRAVACION:

Al menor movimiento; aún de las manos. Fatiga.

MENTE:

Ansiedad. Grita temerosamente con dolor; exclamando que perderá la respiración y morirá.

ESTOMAGO:

Náusea, luego dolores abdominales. Vómito de vómito negro. Transfijación del dolor o hundimiento del epigastrio.

RESPIRATORIO:

Respiración entrecortada; miedo de perder la respiración y morir. Apnea.

CORAZON:

Dolores cardíacos violentos; agudos, extendiéndose a los hombros o a ambos brazos, a los dedos; con entumecimiento. Ansiedad precordial. Inquietud; con dolor cardíaco; y postración. Pulso rápido, débil, como cuerda.

EXTREMIDADES:

Dolor en el brazo izquierdo; lo siente paralizado. Dolor duro en la axila. Parestesia de los miembros inferiores.

PIEL:

Fría como mármol.

SUEÑO:

Sueños de vuelo.

RELACIONES:

Tam.

LAUROCERASUS

GENERALIDADES:

La pequeña cantidad de Acido Hidrociánico que este medicamento contiene, produce síntomas acompañados de Debilidad súbita; y falta de reacción, especialmente en afecciones de pecho y corazón. Afecta Mente y Cerebro causando embotamiento de sentidos especiales. Cianosis. Frialidad no > por el calor. Esfínteres débiles. Desmayos de larga duración. Sensación de caída; en el cerebro, en abdómen; en corazón, etc. Epilepsia; espasmos clónicos de todos los miembros, con debilidad paralítica. Sacudidas. Corea; emocional; con sacudidas constantes, no puede mantenerse quieto; lenguaje confuso, después de cada excitación, con respiración entrecortada. Boqueadas - antes, durante y después de espasmos. Colapso nervioso. Apoplejía. Ardor interno. Hemorragias; de sangre delgada y brillante; mezclada con coágulos gelatinosos. Efectos de miedo. Niños azules, asfixia del recién nacido. Antidota el efecto de Digitalis dado en dosis excesivas. Los remedios bién elegidos no actúan.

AGRAVACION:

Incorporándose. Esfuerzo. Frío. Susto. Agachándose.

MEJORIA:

Acostado con la cabeza baja. Comiendo. Sueño. Al aire libre.

MENTE:

Pérdida de conciencia, con pérdida de lenguaje y movimiento. Miedo y ansiedad por maldades imaginarias. Pérdida súbita de la memoria; por susto, dolor, etc. Embotamiento de sentidos especiales. Se enoja cuando no lo entienden.

CABEZA:

Vértigo con somnolencia. Dolor de cabeza < 11 a.m. a 1 p.m. Desgarramiento nocturno en el vértice. Como si un viento frío soplara sobre su cabeza. Como si se cayera el cerebro. El cerebro se siente contraído y doloroso.

OJOS:

Saltados, fijos, abiertos. Los objetos parecen más grandes.

CARA:

Azul; con respiración entrecortada. Como si moscas y arañas reptaran sobre su piel. Trismo. Torcimiento de los músculos de la cara.

BOCA:

Espuma en la boca; convulsiones. Mudez por dolor en estómago. Lengua; rígida; fría, quemada o entumida.

GARGANTA:

Contracción espasmódica de la garganta y el esófago. Las bebidas resbalan ruidosamente a lo largo del esófago y los intestinos.

ESTOMAGO:

Hipo persistente. Eructos amargos. Vómitos de alimentos durante la tos. Disgusto por la comida durante el embarazo. Dolor violento en el estómago con pérdida del habla. Dolores estomacales durante la micción. Náusea cerca de una estufa caliente.

ABDOMEN:

Sensación de caída de un bulto en el abdomen desde arriba del ombligo hasta la parte baja de la espalda < por hablar o por exceso de esfuerzo. Flatulencia gorgoteante. Dolor en el hígado como si se estuviese formando un absceso. Hígado; indurado; atrofiado; nuez moscada. Parálisis del esfínter del ano; evacuaciones involuntarias. Cáncer del recto; con sangramiento de sangre roja y brillante.

MUJERES:

Dolor en el útero, con cáncer; con rezumamiento de sangre brillante, con coágulos gelatinosos; > por dormir. Desmayos con frialdad durante las reglas. Ardor y punzadas en y bajo las mamas.

URINARIO:

Orina; retenida, suprimida, involuntaria; con palpitación y sofocación, luego desmayo.

RESPIRATORIO:

Laringe y tráquea ulceradas. Sofocación; trata de alcanzar aire; al incorporarse. Respiración poco profunda. Disnea; con sensación de que es incapaz de levantar las paredes del pecho; > acostándose. Tos; cosquilleante, espasmódica, nocturna; de tisis; corta, seca de origen cardíaco; < acostándose. Sanguinolenta, o esparcida con puntos sanguinolentos; expectoración gelatinosa. Asfixia del recién nacido. Ardor en pecho al hacer inspiración. Voz baja.

CORAZON:

Sostiene sus manos sobre el corazón; como si hubiese un problema allí < por cualquier esfuerzo. Palpitación. Regurgitación mitral. Dolores en la región del corazón. Pulso, débil, variable, lento, o irregular.

EXTREMIDADES:

Dedos engarrñados. Las uñas de los dedos de pies y manos se vuelven nudosas. Venas de las manos distendidas. Pies fríos y pegajosos hasta la rodilla; en coréa, enfermedades del corazón. Pies entumidos al cruzar las piernas.

PIEL:

Fresca; lívida.

SUEÑO:

Ansiedad temerosa e inquietud; no puede dormirse. Coma vigil.

RELACIONES:

Am-c; Gel; Hyd-ac; Prus-sp.

LECITHIN

GENERALIDADES:

Se prepara con la yema del huevo y cerebros de animales - un complejo orgánico corporal que contiene fósforo. Mejora la nutrición especialmente de la sangre, de allí que es muy útil en la anemia, convalecencia, neurastenia e insomnio. Excelente galactogogo, hace que la leche sea más nutritiva. Cansancio, debilidad, respiración corta; pérdida de carne, síntomas de quebrantamiento general. Debilidad sexual. Insuficiencia ovárica.

LEDUM PALUSTRE

GENERALIDADES:

Este remedio afecta el tejido fibroso, de las Articulaciones especialmente las pequeñas; tobillos; tendones; talones y Piel; por lo que puede ser llamado un remedio reumático, cuando el reumatismo se inicia en los pies y viaja hacia arriba. Las partes afectadas se vuelven purpúreas, hinchadas; y luego se emacian. El paciente siempre está friolento, las partes afectadas están frías; pero hay aversión al calor externo. Hay una falta general de calor vital. Coyunturas dolorosas, frías, edematosas. Dolores cambiantes, desgarrantes. Debilidad y entumecimiento de las partes afectadas. Torpidez de tegumentos especialmente después de supresión de descargas de los ojos, oídos y nariz. Hemorragias; de sangre brillante y espumosa, Hidropesía. Petequia. tétanos con sacudidas de músculos cercanos a la herida. Malos efectos del alcohol, corte de cabello; descargas suprimidas, heridas punzantes, lesiones recientes o crónicas, mordeduras, agujijones, magulladuras. Borrachos. Aflujos de sangre. Abscesos y condiciones sépticas > por el frío. Si se dá Ledum inmediatamente después de una herida punzante, previene el tétanos. Hypericum cuando se ha desarrollado tétanos. Está adaptado a pacientes pletóricos, llenos de sangre, robustos o pálidos y delicados.

AGRAVACION:

Calor; de cubiertas, estufa, aire. Lesión. Movimiento (articulaciones). Noche. Huevo. Vino. Escupiendo.

MEJORIA:

Frío; baño; aire. Reposando.

MENTE:

Enojado, sin humor. Insatisfecho, odia a sus semejantes, evita su compañía.

CABEZA:

Cefalalgia rabiosa, pulsante < mínima cubierta. Afectada después de mojarse. Un tropiezo causa concusión en el cerebro. Comezón como por piojos. Ampollas de sangre en la frente.

OJOS:

Golpe de sangre o magulladura. Lágrimas acres; ulceran el párpado inferior y la mejilla. Hemorragia en la cámara anterior después de una iridectomía. Ptosis del ojo (derecho), por lesión.

OIDOS:

Dureza de oído; como si los oídos estuviesen tapados con algodón; < por cortarse el cabello, mojándose la cabeza.

NARIZ:

Sangramiento nasal persistente; ulceración de la nariz con ardor violento.

CARA:

Moteada. Granitos rojos en la frente y las mejillas; punzantes cuando se tocan. Glándulas submaxilar hinchadas. Erupciones costrosas alderredor de la nariz y la boca.

BOCA:

Gusto amargo en la boca; mohoso al toser. Aflujo súbito de saliva acuosa, durante el cólico.

ESTOMAGO:

Náusea al escupir.

RECTO:

Fisura anal. Hemorroides ciegas y punzantes.

URINARIO:

Mucho ácido úrico y arena en la orina. La orina con frecuencia se detiene durante el flujo. Orina copiosa, clara, incolora, deficiente en sales.

HOMBRES:

Poluciones de semen sanguíneo o seroso.

MUJERES:

Fibromas sangrantes. Gran frialdad durante las reglas, pero aún así desea aire frío.

RESPIRATORIO:

Tos; atormentante; por cosquilleo en la laringe; con epistaxis; luego respiración suspirosa, < por erupciones que retroceden. Inspiración doble. Hemoptisis, que alterna con reumatismo; o coxalgia. Espujo amarillo y purulento. El pecho duele cuando se le toca.

CUELLO Y ESPALDA:

Espalda rígida; con calambres; por levantarse estando sentado. Lumbago.

EXTREMIDADES:

Calambres sobre la articulación de la cadera. Piernas hinchadas, manchadas y equimóticas, así como los pies. Talones doloridos. Plantas dolorosas, difícilmente puede dar paso. Manos temblorosas al moverlas o al agarrar cualquier cosa. Torcedura de tobillos; fácil. Pies (dorso) con comezón por la noche y rígidos por la a.m. Yemas de los dedos gordos hinchadas. Los pies se pegan a la tierra como por un imán, al tratar de moverlos. Dolor en los hombros al levantar el brazo.

PIEL:

Heridas punzantes; temblores; por clavos, astillas, etc. pus fétida. Erupciones solamente en partes cubiertas. Hinchazones edematosas. Manchas rojas y erupción.

FIEBRE:

Frialdad; de las partes; < miembros; con el dolor; durante la fiebre; como si estuviese en agua fría. Sudor fétido. Sudor nocturno profuso.

RELACIONES:

Arn; Bry; Rhus-t; Sec.

LEPTANDRA

GENERALIDADES:

Afecta el lado derecho y el hígado; causando hemorragias debido a afecciones hepáticas. Ardores; en la región hepática. Estados biliosos. Debilidad, difícilmente puede estar de pie o caminar. Ictericia.

AGRAVACION:

Bebidas frías. Movimiento. Periódicamente. Clima húmedo.

MEJORIA:

Yaciendo sobre el abdomen; de lado.

MENTE:

Desesperanza; abatido y somnoliento; con afecciones hepáticas.

OJOS:

Punzadas y adolorimiento de los ojos.

BOCA:

Lengua, amarilla, o negra en la parte central inferior.

ESTOMAGO:

Deseo de bebidas frías, que < el ardor y dolorimiento del estómago. Vómito bilioso. Hundimiento en el hueco del estómago. La carne y los vegetales disgustan.

ABDOMEN:

Adolorido o torpe, dolor ardoroso sobre el hígado o cerca de la vesícula, extendiéndose hacia los intestinos sobre el ombligo o hacia la escápula izquierda, o a lo largo de la espina, que se siente escalofriada. El hígado se inflama transversalmente. Condiciones agudas del hígado. Piedras en la vesícula. Constante adolorimiento sordo en la región umbilical. Evacuaciones; fangosas, acuosas; < mañana. Alquitranosas o negras; fétidas. Filamentosas, como cera o en chorro repentino, por la mañana; con dolor en el ombligo. Disentería; después de diarrea. Hemorroides prolapsadas; con hemorragias. Ictericia, con evacuaciones color ladrillo. Sensación como de algo que sale del recto.

URINARIO:

Orina roja o de color anaranjado, con dolor sordo en la región lumbar.

MUJERES:

Reglas; suprimidas o retrasadas, con afecciones del hígado. Leucorrea; caliente, acuosa; corre a lo largo de las piernas, por ulceración.

CORAZON:

Adolorimiento. Pulso lento y lleno.

EXTREMIDADES:

Dolor en el nervio ciático (izquierdo); < al sentarse. Uñas muy delgadas, suaves y hendidas.

FIEBRE:

Escalofrío a lo largo de la espina y bajo el brazo.

COMPLEMENTARIO:

Pho.

RELACIONES:

Bap; Card-m; Chio.

LILIUM TIGRINUM

GENERALIDADES:

Manifiesta su acción principal sobre la Circulación Venosa; del corazón y los órganos femeninos, ovarios y útero; y es útil para muchas condiciones reflejas que dependen de alguna condición patológica de estos órganos. También afecta el recto y la vejiga y el lado izquierdo. Con frecuencia indicada en mujeres solteras. Sensación llena, pesada y que fuerza a salir ; en útero, ovarios, corazón, etc. Aflojamiento útero-ovárico. Dolores cambiantes, relampagueantes, o dolores de abrir y cerrar; irradiantes; de un ovario al corazón, al pecho izquierdo; hacia las piernas, etc. Dolores que van hacia atrás; cerca de los ojos; al occipucio; de los pezones a través del pecho; del corazón a la escápula izquierda. Dolor en pequeños puntos. Pulsaciones; ebulliciones; burbujes y ardores. Temblores nerviosos; en hipogastrio; en la espina, rodillas, etc. Congestión venosa. Descargas acres. Nervioso; histérico. Se desmaya en habitación caliente o después de haber estado de pié por largo rato. Mujeres fatigadas por excesos sexuales. Síntomas por excitación sexual. Reumatismo. Alternancia de síntomas mentales y uterinos o/y cardíacos.

AGRAVACION:

Calor; de un cuarto. Movimiento. Aborto. Por caminar. De pié. Consuelo. Presión de ropas de cama. Sacudidas.

MEJORIA:

Fresco; aire; libre. Estando ocupada. Yaciendo sobre el lado izquierdo. Atardecer. Presión. Soporte. Cruzando las piernas. Frotando.

MENTE:

Apresurada. Nerviosa. Mordaz. Deprimida. Erótica. Actividad infructuosa. Abatida. Dispuesta a renegar, golpear. Pavor; a la insanía; a ser incurable. Desea adornarse. Sensación salvaje, alocada. Inclínación a llorar; llora mucho; es muy tímida e indiferente a cualquier cosa que se hace por ella. Insatisfecha con sus propias cosas; envidia a otros. Demencia por preocupaciones de negocios y exceso sexual; se jala el cabello. Se siente apresurada, camina rápido, no sabe por qué. Quiere hablar, pero teme decir algo, por temor a decir algo equivocado. El consuelo < . Se sienta en soledad y rumia problemas imaginarios. Excitación sexual que alterna con preocupación por ideas religiosas. Prefiere la compañía.

CABEZA:

Sensación salvaje en la cabeza, como si se fuera a volver loca. Cefalalgia ardorosa; depende de desórdenes uterinos, < antes y después de las reglas; > al ponerse el sol. Cefalalgia sobre el ojo izquierdo y el vértice; con vértigo y efectos visuales.

OJOS:

Los siente torcidos; como que muerden y arden < por leer. Mirada salvaje. Astigmatismo miópico, tiene que torcer la cabeza hacia los lados para ver con claridad. Dolor en los ojos que se extiende hacia atrás de la cabeza. Debilidad de los músculos ciliares.

OIDOS:

Sonidos de precipitación en el oído después de ir a la cama.

NARIZ:

Estornudos; > el dolor en la cabeza y los ojos.

BOCA:

Lengua: cubierta amarillenta, o blanca en parches. Gusto dulce - en la parte posterior de la boca; fetidez > comiendo.

GARGANTA:

Carraspeo de moco, con náusea constante.

ESTOMAGO:

Deseo de carne, o de golosinas ácidas o dulces. Aversión por el café; pan. Hambre; como desde la espina. Sed, antes de síntomas severos. Como un cuerpo duro que rodara por el estómago, durante el día solamente. Vómitos por desplazamiento del útero.

ABDOMEN:

La piel del abdomen se siente estirada y rígida. Distendido, adolorido; no soporta el peso de cubiertas después de las reglas. Sensación trémula y débil que se extiende al ano. Sensación de peso inmenso en todo el contenido abdominal que se extiende a los órganos del pecho; debe sostenerse el abdomen; con disuria. Presión en el recto con deseo constante de evacuar > con la micción, < estando de pié. Dolores agudos > con un frotamiento suave, con la mano tibia. Diarrea temprano por la mañana, después de levantarse, la necesidad no puede esperar ni un momento; evacuaciones; pequeñas, frecuentes, con tenesmo. Disentería < con el cambio de vida en mujeres pletóricas. Dolores agudos > doblándose en dos. Tenesmo del recto y la vejiga. Hemorroides; después del parto.

URINARIO:

Presión constante en la vejiga; con deseo constante de orinar; con sensación de una bola en el recto. Orina; lechosa, escasa, caliente. Si el deseo no es atendido de inmediato; hay sensación de congestión en el pecho.

MUJERES:

Sensación de peso, o presión externa en la pelvis, con disuria; como si los órganos fuesen a escapar por la vagina; debe sostenérsela. Reglas; adelantadas, escasas, oscuras, con coágulos, ofensivas. Fluye solamente cuando se mueve. Dolor ovárico (izquierdo) que se extiende a los muslos; o hacia arriba por debajo del seno izquierdo. Leucorrea; delgada, café, acre; mancha de café, < después de las reglas. Dolores neurálgicos en el útero, no soporta la presión de las ropas. Prolapso o anteversión del útero. Sub-involución. Deseo sexual aumentado; obsceno; debe mantenerse ocupada. Como con un remache o bola bajo la mama (izquierda). Como un cuerpo duro que presionara el recto y los ovarios, > caminando.

RESPIRATORIO:

Peso opresivo en el pecho; necesidad de aire; hace inspiraciones profundas. Como con un tapón en el centro del pecho que se mueve hacia arriba y abajo al tragar en vacío. Se sofoca en una habitación caliente o repleta, teatro o templo.

CORAZON:

Lo siente apretado; lleno como si fuese a reventar; frío; débil, como colgando de un hilo. Angina de pecho, con dolor en el brazo derecho < agachándose; yaciendo sobre el lado derecho; > frotando o presionando. Palpitación. Pulso irregular, muy rápido. Pulsación en todo el cuerpo.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello duele, < estando cansado. Sensación de rotura entre las escápulas. Sensación de algo que empujara hacia arriba desde la punta del cóccix.

EXTREMIDADES:

Dolor de un lado a otro de la cadera. No puede caminar sobre un suelo irregular. Las piernas duelen; no puede mantenerlas quietas. Como si un viento fresco soplara en las piernas. Ardor en palmas y plantas. Temblor de rodillas. Picoteo en dedos. Rigidez parálitica de los dedos. Paso vacilante; no puede caminar derecho. Las coyunturas se siente secas.

PIEL:

Cosquilleo, hormigueo, ardor en varias partes.

SUEÑO:

Incapaz de dormir debido a una sensación frenética en la cabeza.

FIEBRE:

Frío al aire libre; de otra manera >.

RELACIONES:

Alo; Plat; Pul; Spig.

LITHIUM CARBONICUM

GENERALIDADES:

Este remedio afecta notablemente la cabeza; ojos; corazón; articulaciones pequeñas; y órganos urinarios. Reumatismo conectado con lesiones de corazón y ojo. Todo el cuerpo se siente Adolorido y pesado. Puntos magullados por caídas o golpes. Dolores lancinantes violentos, como por agujas al rojo vivo. Presión como desde dentro de la cabeza hacia afuera, anillo abdominal; perineo; pecho. Dolor como de un punto sordo. Diatesis de ácido úrico. Rigidez parálitica de todo el cuerpo. Postración. Acidez. Incremento de volúmen y peso. Gota. Efectos por caídas o heridas.

AGRAVACION:

Noche. Reglas; después de; o suprimidas.

MEJORIA:

Por comer. Orinando. Movimiento.

MENTE:

Inclinación a llorar por su condición de soledad. Dificultad para recordar nombres.

CABEZA:

Dolor > comiendo; pero regresa y permanece hasta que se vuelve a tomar alimento. Vértigo con tintineo en los oídos. Cefalalgia por supresión súbita de las reglas. La cabeza se siente muy grande.

OJOS:

Se siente secos y con dolor < leyendo. Hemiopía vertical; la mitad derecha de los objetos es invisible, < durante la menstruación. La luz del sol lo enceguece.

NARIZ:

Hinchada; y roja especialmente el lado derecho. Coriza; escurrimiento de la nariz al aire libre.

OIDOS:

Dolor detrás del oído (derecho), que se extiende al cuello.

CARA.

Ambas mejillas están cubiertas por escamas secas como de salvado.

GARGANTA:

Tapones de moco caen en la garganta. Adolorimiento que se extiende hacia los oídos.

ESTOMAGO:

Dolor royente en el estómago; con dolor en la sien izquierda; > comiendo. Acidez. No soporta la mínima presión de la ropa; por plenitud en el hueco del estómago.

ABDOMEN:

Dolor en el anillo abdominal (izquierdo) como por presión que viniera de dentro hacia afuera. Diarrea, después de frutas o chocolates.

URINARIO:

Dolor en la región de la vejiga, que se extiende al cordón espermático después de la micción. Orina escasa; con mucha sed; con sedimento café rojizo. Menor orina a pesar de tomar bebidas normalmente.

HOMBRES:

Erección después de micciones copiosas.

MUJERES:

Dolor en las glándulas mamarias que se extiende a los brazos y dedos.

RESPIRATORIO:

El aire se siente frío al inspirar, aún dentro de los pulmones. Constricción del pecho.

CORAZON:

Dolor, ulceración, con síntomas en ojos; que se van hacia la cabeza; con dolor en la vejiga; < doblándose hacia adelante; antes de las reglas; > orinando. Temblor y aleteo del corazón < vejación.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento de los dedos > agarrando. Coyuntura del tobillo que duele al caminar. Dolor en las articulaciones que mejora por agua muy caliente.

PIEL:

Erupción de la barbilla. Piel seca, áspera. Eczema.

RELACIONES:

Lyc; Nat-p; Sul-ac.

LOBELIA INFLATA

GENERALIDADES:

Estimula los nervios vaso-motores, causando un incremento de secreciones; Relajamiento; y debilidad; con sudor; con náusea mortal absoluta; con respiración estertorosa opresiva. Se sienta con los codos sobre las rodillas. Cosquilleo por todos lados. No soporta el olor del tabaco aunque sea un adicto a su uso. Náusea y vómito con casi todos los problemas respiratorios o afecciones gástricas.

AGRAVACION:

Por baño frío. Supresiones. Sueño; después. Tabaco. Té. Cuerpos extraños. El mínimo movimiento.

MEJORIA:

Por caminar rápido. Comiendo un poquito.

MENTE:

Abatido. Llora como un niño.

CABEZA:

Dolor sordo y pesado. Vértigo con temor a morir.

OIDOS:

Sordera debido a descargas suprimidas (otorrea) o eczema.

CARA.

Bañada en sudor frío. Neuralgia de la cara (izquierda) con reglas retardadas.

BOCA:

Aflujo profuso de saliva; con arqueos, hipo; disnea; con buen apetito.

GARGANTA:

Como con un tapón en la garganta; impidiendo la deglución.

ESTOMAGO:

Como con un tapón. Náusea mortal; con vértigo; > por un poco de bebida o alimento; < noche y temprano por la mañana. Náusea y vómito; con sudor profuso; en la cara (frío); con síntomas respiratorios. Desfallecimiento y debilidad en el epigastrio. Gusto ácido y ardiente.

URINARIO:

Orina rojo profundo; con sedimento rojo. Orina suprimida o infrecuente.

MUJERES:

Náusea matutina; desaparece súbitamente > por un poco de alimento o bebida. Dolores de parto con respiración corta. Dolor en el sacro y sensación de peso en sus genitales.

RESPIRATORIO:

Disnea; nerviosa; con dolores de parto; como con una cuña en la laringe; con cosquilleo general, > por caminar rápidamente. Asma. Tos espasmódica, con estornudos; eructos; o dolor gástrico. Estertores en el pecho pero no expectora. Constricción o plenitud opresiva en el pecho. Enfisema senil.

CORAZON:

Siente como si se fuera a detener. Pulso; débil o suave, flotando.

ESPALDA:

Dolor en el sacro; no soporta el mínimo tocamiento; se sienta recargándose hacia adelante.

PIEL:

Placas de edema; con equimosis. Cosquilleo y comezón, con náusea.

RELACIONES:

Ant-t; Ip; Tab.

LOLIUM TEMULENTUM

GENERALIDADES:

Este remedio es útil en condiciones paralíticas. Temblores y convulsiones; parálisis agitante. Postración e inquietud.

AGRAVACION:

Humedad; estación húmeda.

MENTE:

Ansioso y deprimido.

CABEZA:

Vértigo; debe cerrar los ojos. Cabeza pesada.

BOCA:

Lengua trémula. Lenguaje difícil; no puede pronunciar la palabra completa.

ESTOMAGO:

Náusea; vómito. Purga severa.

EXTREMIDADES:

Paso vacilante: Temblor de todos los miembros; no puede escribir; no puede sostener un vaso con agua. Espasmos de brazos y piernas. Dolor violento en las pantorrillas; como si estuviese ligado por una cuerda.

FIEBRE:

Rigores fríos por todos lados especialmente las piernas.

RELACIONES:

Lathy; Sec.

LYCOPERSICUM

GENERALIDADES:

El tomate tiene una acción marcada en los músculos deltoides y pectorales; el dolor es > levantando el brazo hacia arriba y hacia afuera. Dolores que quedan después de la influenza.

CABEZA:

El dolor de cabeza se inicia en el occipucio y se extiende hacia toda la cabeza y se establece con gran violencia en las sienas, < humo del tabaco.

RELACIONES:

Sang.

LYCOPodium

GENERALIDADES;

Se le nombra el Azufre vegetal. Afecta la Nutrición; Debido a debilidad de la digestión. Actúa sobre los Organos Urinarios y la mayoría de los síntomas se desarrollan sobre el Lado derecho y van hacia la izquierda; Garganta; pecho, ovario. Los achaques se desarrollan gradualmente; debilitando el poder funcional; la función del hígado está seriamente perturbada. Enfermedades crónicas de establecimiento profundo y progresivo. Síntomas que se repiten o alternan; un escalofrío detrás de otro, bochorno, luego palidez; flexión y luego extensión; actos automáticos. Condiciones de recaída. Postración de cuerpo y mente. Se adapta a personas ancianas; o aquellas que envejecen temprano, donde la piel muestra manchas amarillentas; o niños debilitados precozmente. Los pacientes Lyco. son intelectualmente agudos pero de poder muscular débil; carecen de calor vital; circulación pobre; parece que está estancada; con extremidades frías y entumidas, o el entumecimiento aparece en puntos. Síntomas súbitos, los dolores aparecen y se van de pronto; o causan ira, estremecimientos, etc. El paciente es delgado, marchito y Lleno de gas. Acidez; agrio, gusto, eructos, etc. Síntomas descendentes, resfríos, emaciación, etc. Cálculos; vesiculares. Hidropesía; ascites en enfermedades del hígado. Frialdad; parcial, cabeza, garganta, etc. Resequedad; de palmas, plantas, vagina, piel, etc. Ulceración; en los dobleces, ano, pezones, etc. Hormigueo de los miembros afectados. Parálisis. Carcinoma. Inflamación de huesos, principalmente los extremos; reblandecimiento y caries de los huesos. Espasmos con gritos, espuma en la boca; lanzando los brazos. Hipersensibilidad al dolor; el paciente está fuera de sí. Sensación de parálisis interna. Diatésis de ácido lítico. Malos efectos de sustos, temor, ira, ansiedad, fiebres, disgustos; levantamiento de cargas pesadas; masturbación; paseos en carruaje. Mascando tabaco. Vino. Un lado del cuerpo hipertrofiado en el cambio de vida de la mujer. Atrofia de los infantes. Hemorragias; de sangre oscura. Tumores eréctiles. Forúnculos recurriendo periódicamente. Emaciación y debilidad por pérdida de flúidos.

AGRAVACION:

Presión de la ropa. Calor. Despertando. Viento. Por comer; aún un poquito; o hasta saciarse; ostras. Indigestión. 4 a 8 p.m. Clima húmedo, tiempo tempestuoso. Presión. Antes de o por supresión de reglas. Leche. Vegetales, calabacitas, frijoles; pan, pastas.

MEJORIA:

Bebidas calientes; alimento. Aplicaciones frías. Movimiento. Eructos. Orinando. Después de medianoche.

MENTE:

Confusión sobre los asuntos diarios. Mentalmente activo pero de desarrollo débil. Melancolía; miedo de estar sólo; de los hombres; de su propia sombra. Sensible, llora cuando se le agradece; o al encontrarse a un amigo. Temeroso; pavor de los hombres; presencia de personas nuevas, de todo, aún del timbre de la puerta. Pérdida de la auto confianza; por anticipación; aversión a enfrentar cosas nuevas; aún cuando esas cosas las pueda desempeñar con facilidad y confort. Despierta; iracundo, triste y ansioso. Vehemente; testarudo. Dominante; exigente; reservado o desesperado. Pronuncia o escribe palabras y sílabas equivocadas. No soporta ver nada nuevo. No puede leer lo que escribe. Apresurado al comer. Parálisis incipiente del cerebro. Lloro todo el día. Triste al oír música distante; o alegre y feliz. Odioso. Estrafalario. Avaro. Niebla mental; después de la influenza. Pensamientos ansiosos como si fuera a morir. Indecisión. Timidez. Resignación. Misántropo; huye aún de sus propios hijos. Apasionado. Desconfiado; crítico. Suspica.

CABEZA:

Sacude la cabeza sin motivo aparente; o involuntariamente, primero con lentitud, luego rápido. Vértigo al mirar algo que está girando. Cabeza fría. Dolor en las sienes como si estuviesen atornilladas, < reglas. El dolor empieza en un lado y va hacia otro en donde se empeora. Cefalalgia < si no come a sus horas; acostado, agachándose. > por descubrirse. Dolor pulsante en el occipucio; por la noche, < estando caliente. Caída del cabello, se vuelve gris prematuramente. Calvicie prematura; después de afecciones abdominales; parto. Arrugas profundas en la frente en afecciones abdominales, pulmonares y cerebrales; y en avaros. Caspa. Hidrocefalia. Meningitis; tubercular. Cefalalgia catarral < cuando la descarga nasal es descuidada. Pulsación después de cada acceso de tos; dolores cuando se hace esfuerzo por defecar.

OJOS:

Medio abiertos. Hemiofía. Ceguera diurna principalmente. Destellos ante los ojos; en la obscuridad. Perrillas en los párpados hacia el canto interno. Pólipo en la orilla externa. Catarata; con supresión de reglas. Se siente fríos, calientes, parecen muy grandes.

OIDOS:

Zumbidos y rugidos; con dureza de oído; cada ruido causa un eco peculiar en el oído. Descarga espesa, amarilla, ofensiva, con sordera. Eczema alderredor y detrás de los oídos. Como si sangre caliente afluyera dentro de los oídos.

NARIZ:

Nariz tapada; estornudos; respira a través de la boca; el niño despierta de su sueño frotándose la nariz. Movimiento de fuelle de las alas nasales; en problemas cerebrales, de pulmón y abdominales. Sensación de resequedad en la parte posterior. Ocena; acre. Coriza crónica; se suena la nariz con frecuencia. Problemas nasales desde la infancia. Olfato agudo.

CARA:

Amarillenta; pálida; gris; con círculos azules alderredor de los ojos. Cara marchita, crispada y emaciada. Bochornos de calor. Contracturas. La boca cuelga abierta. Labios ulcerados. Tuerce la boca y la cara. Expresión estúpida.

BOCA:

Dolor de muelas, con inflamación de la mejilla > aplicaciones calientes. Lengua; seca; negra; agrietada, rígida y pesada; hinchada, la mueve hacia adelante y hacia atrás o la lanza como dardo con rapidez; temblorosa; úlcera dolorosa en la punta o bajo la lengua. Lenguaje ininteligible; musita la última palabra. La saliva se seca en el paladar y los labios. Resequedad sin sed. La mandíbula inferior cuelga; en la fiebre. Dientes amarillos. La boca se hace agua. Las encías sangran al tocarlas o al limpiarse los dientes. Gusto; demasiado agudo; agrio, amargo, mohoso. Pequeños tumores en la boca en varias partes.

GARGANTA:

Sensación como de un cuerpo duro en el esófago. Una bola se eleva y se pega en la garganta. Garganta ulcerada; < bebidas frías. Hinchazón y supuración de las anginas. Crecimiento crónico de las anginas. Difteria - los depósitos se esparcen de derecha a izquierda. Alimento y bebidas se regresan por la nariz; al deglutir. Garganta fría. Como si una bola se elevara. Sensación de constricción provocando deglución constante.

ESTOMAGO:

Digestión débil. Pérdida de apetito. Hambre, pero pronta saciedad. El comer tan sólo un bocado crea llenura. Hipo. Eructos ardientes e incompletos; se elevan sólo hasta la faringe y luego arden por horas. Los alimentos harinosos y flatulentos, como la calabaza, frijoles y ostras caen mal. Sensación como de que se ayuna después de comer, pero sin hambre. Deseo de cosas dulces. Aversión a la sopa, al pan. Hambre canina; entre más come, más desea hacerlo. Despierta por la noche con sensación de hambre. Vómitos; de comida y bilis; sangre coagulada; masas oscuras y verdosas, después de comer y beber. Cáncer; úlcera perforada. Sensación de revoltura. Retortijones en el estómago > bebiendo agua caliente. Deseo de dulces, golosinas, galletas, etc. La comida sabe ácida. Le gustan los alimentos y bebidas calientes. Frialdad en el estómago. Malos efectos de las cebollas.

ABDOMEN:

Epigástrica; ansiedad, presión. Como con una banda alderredor de la cintura. Flatulencia; mucha; ruidosa, presionando; > los intestinos bajos. Hígado sensible y congestionado. Hepatitis crónica; atrófica; hígado de nuez moscada. Sensación de algo que se mueve hacia arriba y abajo; o como un cuerpo duro que rodara, al voltearse hacia la derecha. Ascitis; por enfermedades del hígado. Adolorimiento < hipogastrio; alternando lados. Manchas café. Cólico en los bebés < noche. Constipación; de niños; necesidad ineficaz por contracción de los esfínteres; sensación como si permaneciera una gran cantidad de heces sin pasar. Heces; conteniendo arena, pequeñas, difíciles, la primera parte dura, es difícil de expeler, la última parte delgada o suave y en chorro; seguida de debilidad y desmayo. Hemorroides; dolorosas; dolorosas al tacto > por baños calientes. Se alternan diarrea y constipación. Ulceración del ano. Constipación estando fuera de su casa o viajando. Frialdad en el recto antes de las evacuaciones. Extreñimiento o diarrea durante el embarazo. Gastro-enteritis por susto. Diarrea por bebidas frías. Ardor continuo en el recto.

URINARIO:

Necesidad constante de orinar > paseando en carro. Cólico renal desde el ureter (derecho) hasta la vejiga. Orina; escasa; grita o llora antes de orinar; (especialmente niños que se despiertan por el dolor, con gritos e inquietud de las piernas); arena roja en la orina; lenta para bajar; debe hacer esfuerzo; suprimida; retenida. Orina; lechosa, turbia. Poliuria, durante la noche. Hematuria. Micción involuntaria

(especialmente en la fiebre) o por susto durante el coito. Orina sanguinolenta; con paraplejía o en ocasiones con estreñimiento. Orina caliente y ardorosa.

HOMBRES:

Fatiga sexual; impotencia; erecciones débiles; se duerme durante el coito. Tumor amarillo detrás de la corona del glande. Poluciones fatigantes. Próstata crecida. Emisiones seminales prematuras.

MUJERES:

Reglas; de coágulos y suero; descarga de sangre por los genitales durante las evacuaciones. Vagina; seca; ardiente < durante y después del coito. Leucorrea; acre; periódica; lechosa; < antes de la luna llena. Fisometra. Dolor cortante del ovario derecho al izquierdo, ováricos; tumores; hidropesía. Hidropesía del útero. Nudosidades duras y ardientes en las mamas con dolores punzantes y ulceración. Rozadura de los pezones; adoloridos, agrietados, que sangran fácilmente. El feto parece que se voltea dando saltos mortales. Dismenorrea; violenta, con desmayos. Reglas; suprimidas; por meses. Reglas retardadas con mamas sub-desarrolladas durante la pubertad. Leche en mamas sin estar embarazada. El niño vomita sangre después de mamar pezones sangrantes.

RESPIRATORIO:

Desea aire pero lo escalofría. Respiración corta, estertorosa < yaciendo sobre la espalda. Tos; seca, cosquilleante, latosa; en niños débiles con emaciación; día y noche; hueca y profunda; como por humos de azufre, < descendiendo; con emaciación; < por tratar en vacío, forzando la garganta; por respiración profunda. Expectoración salada, amarillo-verdosa, grumosa o fétida. Neumonía no resuelta. Manchas cafés y amarillas en el pecho. Abscesos de los pulmones, tuberculosis. Respiración difícil debido a hidrotórax y/o hidropericardio, con batimiento de las alas nasales. Sensación de restiramiento en el pecho con ardor.

CORAZON:

Aneurisma. Enfermedad aórtica. Palpitación, con batimiento de las alas nasales por la noche < yaciendo sobre el lado derecho; con cara y pies fríos. Pulso; rápido < después de comer; por la noche. Sensación como si la circulación se detuviera. Hipertrofia.

CUELLO Y ESPALDA:

Una parte del cuello rígida y la otra hinchada. Ardor como por carbones ardientes entre las escápulas. Dolor en la espalda y el lado derecho por congestión del hígado. Dolor en la parte baja de la espalda; < sentándose derecho; > orinando. Espalda rígida. Emaciación alderredor del cuello. Sensación de burbujeo. Lumbago < por el menor movimiento (después de Bry).

EXTREMIDADES:

Absceso axilar (derecho). Manos y pies entumecidos; calambres en manos y pies. Los dedos se crispan durante el sueño. Sudores pegajosos en los dedos. El dolor tuerce las piernas hacia arriba. Calambre en las pantorrillas, al caminar; por la noche. Un pié caliente y el otro frío, o sudor frío en los pies. Calor molesto constante en las manos. Ciática del lado derecho < presión; no puede acostarse sobre el lado dolorido, > por aplicaciones calientes y caminando. Calambres en los dedos gordos de los pie; por la noche. Dolor en los talones al dar la pisada como por piedritas. Talones entumidos. Palmas secas. Venas varicosas en las piernas. Edema de los pies, se eleva hasta que se forma ascitis. Dolor en los

huesos por la noche. Curvatura y caries de los huesos. Emaciación de una mano o una pierna. Las manos y pies se vuelven pesados, relajados, tiemblan > por el movimiento. Callos dolorosos en las plantas. Dedos gordos y dedos de las manos contraídos. Los dedos gordos se doblan al caminar. Sudor profuso y fétido de los pies.

PIEL:

Seca; rozada en los pliegues. Abscesos bajo la piel. Urticaria; crónica < calor. Tumores eréctiles < antes de las reglas. Diviesos sangrantes. Forúnculos que no maduran pero permanecen azules. Los lugares de forúnculos y pústulas antiguas se induran y forman nódulos que permanecen largo tiempo. Hinchazones vesiculares. Eczema asociado con desórdenes urinarios, gástricos y hepáticos. Psoriasis. Ulceras fistulosas. Costras que no se separan. Sudor víscido y ofensivo.

SUEÑO:

Somnoliento durante el día; al caminar, el niño despierta, se vuelve muy travieso, patéa, grita y o se agarra de su madre. Despierta aterrorizado. Sueños ansiosos de accidentes fatales. el niño duerme todo el día y grita toda la noche. Se ríe y llora en sueños.

FIEBRE:

Frialdad; helado, parcial; de la cabeza, abdomen, estómago, garganta, etc. < tosiendo. El cuerpo se vuelve frío durante la tos. Se siente como si estuviese acostado en hielo. Escalofrío; seguido por otro escalofrío; luego vomita; después del primer sueño. Sudor víscido; axilar, de los pies; como de cebollas. Fiebre, continua, remitente, intermitente.

COMPLEMENTARIOS:

Calc; Iod; Kali-c; Lach; Pul; Sul.

RELACIONES:

Carb-v; Sil.

LYCOPUS VIRGINICUS

GENERALIDADES:

Un remedio del corazón; baja la presión arterial, reduce la velocidad del corazón y aumenta la extensión de la sístole. Corazón con muchos síntomas laterales o asociados con Latidos rápidos, tumultuosos. Hemorragias debido a enfermedades valvulares; o pasivas por la nariz, hemorragias, pulmones, etc. Dolores cambiantes, del corazón a los ojos; cabeza a corazón; del corazón a la muñeca, etc. Bocio tóxico. Malos efectos de flujo hemorroidal suprimido.

AGRAVACION:

Excitación. Fatiga. Calor. Después del sueño. Yaciendo sobre el lado derecho. Abuso de remedios para el corazón. Supresiones. Pensando en ello.

MENTE:

Nervioso, apresurado y trémulo. Comprensión lenta.

OJOS:

Saltones (bocio exoftálmico); con acción tumultuosa del corazón. Dolor supra-orbital (derecho) con adolorimiento de los testículos (izquierdo).

CARA:

Café-amarillenta; sin expresión; durante las reglas; abotagada.

ESTOMAGO:

Eructos con gusto de té. Diarrea en ictericia, por debilidad del corazón.

URINARIO:

Bebe grandes cantidades de agua y pasa grandes cantidades de orina; con irritabilidad del corazón. La vejiga se siente distendida estando vacía.

HOMBRES:

Dolor neurálgico en los testículos con dolor supra-orbital.

RESPIRATORIO:

Sofocación estando acostado. Tos con hemoptisis y corazón débil. Tos cardíaca. Tos profunda y violenta en la tarde y noche sin despertarlo. Expectoración dulzona.

CORAZON:

Acción tumultuosa, violenta; excesivamente rápida, tormentosa. Corazón laborioso por la noche. Palpitación e incomodidad cardíaca < pensando en ella. Opresión del corazón; dolores; ulceración; constricción. Pulso; largo, lleno, suave, débil, lento, irregular, intermitente; no está sincronizado con el corazón.

ESPALDA:

Caliente, dolor bajo la escápula (derecha).

FIEBRE:

Frialdad.

RELACIONES:

Cact; Coll; Cratae.

LYSSIN

GENERALIDADES:

Este nosode está preparado con la saliva de un perro rabioso. Afecta el sistema nervioso, garganta y órganos sexuales. Los sentidos se vuelven hiperagudos. Convulsiones, espasmos que aparecen por una luz deslumbrante o por la vista de agua corriente. Adolorimiento de los huesos. Malestares por un deseo sexual anormal. Malos efectos de la mordedura de un perro. Decoloración azulosa de las heridas. Sensación de temblor o temblores a través de todo el cuerpo.

AGRAVACION:

Ruido de o vista de agua corriente. Calor del sol. Objetos brillantes. Vientos, corrientes. Pensando en líquidos. Agachándose. Malas noticias. Emociones mentales. Paseando en carro.

MEJORIA:

Doblándose hacia atrás. Frotamiento suave. Baños de vapor o agua caliente.

MENTE:

Temor a volverse loco. Ira. Lenguaje rápido. Impaciente. Temperamento violento; lo obligan a hacer cosas temerarias; como tirar a un niño a través de una ventana. Vaga por los alrededores. Caprichos y preocupaciones extrañas; durante el embarazo. Rudo, abusivo, muerde y golpea. Siente que físicamente no puede soportar sus temores por más tiempo.

CABEZA:

Dolor; por mordedura de perro, sea o no rabioso. < por el sonido de agua corriente, luz brillante. Hecha la cabeza hacia atrás al estornudar. El pelo seco se vuelve grasoso.

BOCA:

Saliva; tenaz, filamentosa, viscosa, espumosa; escupe constantemente. Lenguaje difícil por espasmo de la garganta.

GARGANTA:

Ulcerada; deseo constante de deglutir; que es difícil; arqueos al deglutir agua, por espasmo del esófago.

URINARIO:

Deseo de orinar o defecar por ver agua corriente; o no puede orinar a menos que oiga el ruido del agua.

HOMBRES:

Deseo sexual anormal. Erección dolorosa del pene y emisiones seminales frecuentes. El semen es descargado demasiado tarde o no lo es durante el coito.

MUJERES:

Consciencia del útero. Vagina sensible, volviendo el coito doloroso. Desplazamiento uterino. Leucorrea; profusa, corre hacia abajo de las piernas. Deseos extraños, caprichos, durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Tos ladrante.

CORAZON:

Punzadas, al oír el sonido de una campana. Dolores como si corrieran agujas hacia el corazón.

CUELLO:

Dolor en el cuello > doblando la cabeza hacia atrás.

SUEÑO:

Bostezos frecuentes sin sueño especialmente al oír a otros.

RELACIONES:

Lac-c; Lach.

MAGNESIA CARBONICA

GENERALIDADES:

Este remedio produce una condición catarral del estómago y los intestinos, con acidez marcada; agrio; olor del cuerpo, especialmente niños); vómitos; regurgitación; evacuaciones, etc. Afecta los nervios (facial y dental), causando dolores agudos y punzantes a lo largo de ellos; debe caminar por ahí. Entumecimiento y sensación de distensión en varias partes. Afección de los huesos malares. Todo el cuerpo se siente cansado y adolorido, especialmente piernas y pies. Es un auxiliar adecuado para personas indispuestas, acabadas, nerviosas, flatulentas y débiles, principalmente mujeres, niños y nodrizas. Sensibles a las causas más leves. Emaciación. Marasmo; niños que no progresan a pesar de los alimentos y las medicinas. No soporta llevar las manos cubiertas, pero se escalofría al descubrirse. Espasmos. Ataques epilépticos; mientras camina o está de pié, con frecuencia cae de improviso, con conciencia. Malos efectos de choques, golpes, angustia mental, vejación, accesos de pasión, embarazo, exceso de cuidados y preocupación. Dentición, alimentación impropia; leche. Resequedad; de las membranas mucosas, de la piel. Niños; predispuestos a los forúnculos. Glándulas crecidas.

AGRAVACION:

Frío; viento; corrientes. Cambio de clima. Noche. Alimento farináceo; leche. Descanso. Causas ligeras, contacto, etc. Por descubrirse. Cada tercer día; cada tres semanas.

MEJORIA:

Movimiento. Caminando por allí; al aire libre. Aire tibio.

MENTE:

Temblores; angustia y miedo como si pudiera suceder un accidente; todo el día; > al irse a la cama. El mínimo toque causa sobresalto. Triste y taciturno. Sensación de aturdimiento; empaca y desempaca sus ropas, sin conciencia de estarlo haciendo.

CABEZA:

Vértigo < al arrodillarse. Dolor en la cabeza; como si el cabello fuese jalado, < por fatiga mental, agachándose. Comezón en el cráneo < en clima húmedo. Cerebro pesado. Hundimiento del hueso occipital en niños marásmicos.

OJOS:

Motas negras ante los ojos. Globos oculares que se sienten crecidos y sensibles a la presión. Opacidad de la córnea. Catarata lenticular.

OIDOS:

Sordera que viene de pronto y varía. Sensación de distención, en el oído medio. Oídos entumecidos. Sordera; al resfriarse; al salir la muela del juicio.

NARIZ:

Coriza y tapamiento nasal antes de la menstruación. Coriza seca; respira por la boca. Afecciones crónicas de la nariz.

CARA:

Dolor rasgante, excavante, punzante en un lado; debe caminar. Dolor e hinchazón de los huesos malares, < en viento frío. Tumores del hueso malar. Palidez de cera. Expresión desaliñada. Tensión, como de una clara de huevo que se hubiese secado sobre la cara.

BOCA:

Dolor de muelas rasgante, excavante, ardiente, < durante el embarazo; movimiento de un carruaje; con el frío y estando quieto. Molestias por la salida de las muelas del juicio. Los dientes se sienten muy largos. Boca seca, por la noche. Gusto; amargo; ácido. Lenguaje tartamudeante con frecuencia y de súbito.

GARGANTA:

Garganta ulcerada; < antes de las reglas. Carraspea masas caseosas de la garganta. Dolor punzante en la garganta < hablando o deglutiendo.

ESTOMAGO:

Deseo de carne; frutas, ácidos; vegetales. Apetito de pellizcos. Eructos ácidos. Agruras. Vómitos; de leche no digerida o de agua amarga. Sed violenta. Aversión a los alimentos verdes. Calabazas y papas disgustan. La leche es rechazada o si la toma, le causa dolor en el estómago.

ABDOMEN:

Retortijón; atenzante; cólico presivo, seguido de evacuaciones verdes y delgadas, que <. Evacuaciones espumosas; Verdosas, como agua, como la nata de un estanque de ranas. La leche pasa indigerida en niños lactantes. Evacuaciones ácidas. Extreñimiento después de un choque mental o esfuerzo nervioso. Heces; lientéricas; con masas gelatinosas y grasosas; verde pasto; o secas, duras, desmoronadas, como arcilla blanca, como masilla. Cólico seguido de leucorrea. Retortijón alderredor del ombligo > pasando flatos.

URINARIO:

Micción involuntaria mientras camina o al levantarse de su asiento.

HOMBRES:

Descarga de líquido prostático al pasar flatos.

MUJERES:

Reglas; como melaza espesa y oscura; alquitranadas; víscidas; demasiado retardadas; o escasas; fluyen solo durante el sueño; por la noche y al levantarse después de estar acostada; cesan al caminar o por la presión del abdomen o por agacharse. Deja una mancha fija. Leucorrea; acre y blanca, precedida de cólico, regularmente después de las reglas. Cae en un desfallecimiento mortal en cada período menstrual.

RESPIRATORIO:

Desea aire fresco. Tos, paroxística, con expectoración difícil, delgada y salada, sanguinolenta. Pecho adolorido, comprimido. Tos por cosquilleo en la laringe, por la noche.

EXTREMIDADES:

Pesadas, pies inquietos. Hombro derecho doloroso; no puede levantarlo. No soporta tener las manos cubiertas, pero se escalofría al descubrirlas. No puede apoyar el pie izquierdo al caminar. Hinchazón en la vena poplítea.

SUEÑO:

No reparador; más cansado por la mañana que cuando se acostó. Despierta a las 2 o 3 de la mañana y no puede dormirse de nuevo. Somnolencia durante el día, insomnio por la noche.

PIEL:

Ulcerada, seca, sensible al frío. Nudosidades bajo la piel. Cabello y uñas insanas.

FIEBRE:

Escalofrío; se resfría; antes de las reglas. Fiebre por la noche. Sudor ácido, aceitoso, indeleble.

RELACIONES:

Rhe.

MAGNESIA MURIATICA

GENERALIDADES:

La acción de este remedio se centra alderredor del Hígado y los Nervios; útero y recto, así es que se adapta a mujeres nerviosas, que sufren de padecimientos útero-hepáticos o síntomas cardíacos; o para aquellas que han padecido de indigestión y biliosidad por largo tiempo; para hombres con un hígado desordenado y desórdenes sexuales; para niños no desarrollados y raquíticos, durante la dentición.

Malestares histéricos, espasmódicos. Globo. Este es un remedio para después de comer, para muchos malestares como desfallecimientos, accesos, disnea, náusea y temblores, etc. que ocurren después de comer; > por eructos. Los dolores son taladrantes, espasmódicos, contractivos, acalambantes, punzantes. Ardores. Cronicidad. Malos efectos de baños de mar, especialmente debilidad. Sacudidas a través del cuerpo, como toques eléctricos cuando se está completamente despierto. Perversiones del gusto y olfato. Adolorimiento general y sensibilidad a los ruidos.

AGRAVACION:

Por acostarse sobre el lado derecho. Ruido. Noche. Por comer. Alimentos salados. Leche. Contacto. Por baños de mar. Fatiga mental.

MEJORIA:

Por la presión dura. Yaciendo doblado. Colgando; la parte afectada. Movimiento suave. Al aire libre y fresco.

MENTE:

Intranquilidad; excitabilidad nerviosa con tendencia a llorar con facilidad. Siente como si alguien estuviese leyendo a sus espaldas y ella debe leer más y más rápido. No propenso a hablar.

CABEZA:

Cefalalgia estallante; < movimiento, al aire libre; > por la presión dura, arropándose con algo caliente. Mucho sudor en la cabeza. Como si estuviese hirviendo agua sobre el lado sobre el que se está acostado. Como si el cabello fuese jalado.

OJOS:

Lagrimo y ardor de los ojos cuando está mirando cualquier cosa a plena luz del día. Esclerótica amarilla. Tiña ciliar.

OIDOS:

Sensibles a los ruidos. Pulsación en los oídos.

NARIZ:

Roja, hinchada. Ocena acre y costrosa. Pérdida del olfato y gusto, seguido de o con coriza. Obstrucción nocturna de la nariz, debe respirar por la boca.

CARA:

Pálida, amarilla. Barritos en la cara y frente con comezón < noche; en una habitación caliente y antes de las reglas. Ampollas en los labios.

BOCA:

Dolor de dientes < si el alimento toca el diente. La lengua se siente quemada, la boca escaldada. Aflujo continuo de espuma blanca en la boca. Pérdida del gusto. Lengua ancha, amarilla, escaldada.

GARGANTA:

Como con una bola que se eleva por la garganta > por los eructos.

ESTOMAGO:

Desea dulces, golosinas. Hambre, pero no sabe de qué. Regurgitación mientras camina. Leche; alimentos salados, <. Eructos como de huevos podridos; le gustan las cebollas. Hipo, durante y después de comer, causando vómito.

ABDOMEN:

Hígado crecido, adolorido; con abdomen inflado; < acostándose sobre el lado derecho; estorba se se acuesta sobre el lado izquierdo. Calambres en la vesícula > por comer. Flatulencia. Evacuaciones; Secas; nudosas, como pequeñas pelotas, como el excremento de las ovejas; gris, se desmorona en el ano. Ausencia del deseo de evacuar. Ictericia. Lombrices. Cólico; histérico, seguido por leucorrea. Dolor desde el hígado hacia la espina o el epigastrio.

URINARIO:

La orina puede pasar sólo si se se hace esfuerzo con los músculos abdominales. Uretra entumida. En la obscuridad, no puede decir se está pasando o no la orina. Estrictura después de la dilatación. La orina pasa en gotas, algunas parece que se quedan.

HOMBRES:

Dolor en los testículos y el cordón < después del coito; o después de excitación sexual no correspondida. Ardor en la espalda después del coito.

MUJERES:

Reglas; profusas, oscuras, grumosas, como brea; con calambres, dolor de espalda y dolores en los muslos; más copiosa cuando está sentada que cuando camina. Dismenorrea > por la presión en la espalda, o acostada en una almohada dura. Chorros de leucorrea, seguido de cólico en abdomen, espasmos uterinos; después de cada evacuación, histérica. Metrorragia de mujeres viejas, con sangre coagulada.

RESPIRATORIO:

Tos seca y espasmódica < la primera parte de la noche. Espujo sanguinolento o congestión y excoiación en el pecho; después de bañarse en el mar. Respiración oprimida, globo histérico.

CORAZON:

Palpitación y dolor cardíaco mientras está sentado; > por caminar o acostándose sobre el lado izquierdo. Afecciones cardíacas funcionales, con crecimiento del hígado.

CUELLO Y ESPALDA:

Latido bajo la escápula izquierda. Ardor o magulladura en caderas; o en la espalda después del coito (hombres). Calambres en la espalda < caminando.

EXTREMIDADES:

Calambres en los muslos < sentándose. Muslos y pantorrillas tensos; debe mover las piernas. Punta de los dedos entumidas. Tobillos fríos o nerviosos < noche. Dolor cortante en los talones. Pies sudorosos.

PIEL:

Hormigueo por todo el cuerpo. Absceso; amarillo, delgado, con pus fétida. Ictericia. Sudor en cabeza y pies.

SUEÑO:

Ansiedad e inquietud del cuerpo tan pronto como cierra los ojos; por calor del cuerpo o por sacudidas. Sueño no reparador, cansancio por la mañana.

FIEBRE:

Escalofrío, aún estando cerca de una estufa; > al aire libre.

RELACIONES:

Nat-m; Pul; Sep.

MAGNESIA PHOSPHORICA

GENERALIDADES:

El remedio del Dr. Schuessler para calambres, convulsiones, dolores neurálgicos y efectos espasmódicos; mostrando su influencia en los Nervios y músculos. Adecuado para personas altas, esbeltas, oscuras y neuróticas; o sujetos cansados, lánguidos y exhaustos. Nerviosos, tensos, y sujetos a paroxismos súbitos y violentos de dolores neurálgicos; agudos, fugaces como relámpagos, cambiando de lugar; irradiantes, penetrantes, constrictivos; provocadores de gritos; causando inquietud y postración, etc. Sacudidas. Tics. Efectos espasmódicos; hipo, bostezos, corea; calambres de los escritores, intérpretes de piano, violín, etc. Mucho dolor. Malos efectos de permanecer en agua fría, baños fríos; por trabajar con arcilla fría; cateterismo; dentición; estudio. Malestares de niños cortando dientes. Corea > durante el sueño < por evacuar y por emociones. Perlesía, parálisis agitante.

AGRAVACION:

Frío; Aire, corrientes, descubriéndose, agua. Acostándose sobre el lado derecho. Contacto. Periodicidad. Noche. Leche. Fatiga.

MEJORIA:

Calor. Baños calientes. presión. Doblándose. Frotando.

MENTE:

Siempre hablando de sus dolores. No dispuesto a estudiar; al trabajo mental. Somnolencia cada vez que trata de estudiar. Se habla a sí mismo constantemente, o se sienta en silencio, o lleva cosas de un lado a otro incesantemente.

CABEZA:

Duele después de trabajos mentales; > por el calor. Sensación de que su contenido fuese líquido; como si las partes del cerebro cambiaran lugares; como con una gorra en la cabeza. Como con toques eléctricos en la cabeza que van a todas partes del cuerpo.

OJOS:

Dolores supra-orbitales > calor. Temblores de los párpados. Ojos; caliente, adoloridos; cansados. Nistagmo; estrabismo, ptosis. Fotofobia.

OIDOS:

Severos dolores neurálgicos < yendo hacia el aire frío; lavándose la cara y el cuello con agua fría; peor detrás del oído derecho.

CARA:

Neuralgia < cuando el cuerpo se enfría; por lavarse o estando en agua fría, o al abrir la boca para comer o beber.

BOCA:

Grietas en las comisuras labiales. Dolor de diente > calor y líquidos calientes. Lengua; limpia; con cólico. Contracción dolorosa de la articulación de la mandíbula con torcimiento hacia atrás. Gusto de plátanos (bananas). La comida no sabe bien. Tartamudeo espasmódico.

GARGANTA:

Rígida, excoriada; las partes parecen infladas (derecha) con escalofríos y adolorimiento general. Angina nerviosa.

ESTOMAGO:

Hipo día y noche. Dolor ardiente, vómito e hipo > con bebidas calientes; cáncer del estómago. Sed por bebidas muy frías.

ABDOMEN:

Enteralgia; cólico flatulento; > doblándose en dos; frotando; por el calor; presión; con eructos que pueden o no aliviar. Sensación de llenura y de abdomen inflado; debe aflojar su vestido; caminar, y pasar flatos constantemente. Dolor cortante que va hacia los muslos. Abdomen contraído. Cesa la diarrea; pero espasmos u otros problemas cerebrales aparecen.

URINARIO:

Enuresis nocturna por irritación nerviosa. Neuralgia vesicular después del uso de cáteter.

MUJERES:

Cólico menstrual > por el flujo. Dismenorrea membranosa. Reglas; muy adelantadas, oscuras, filamentosas, alquitranadas, fluyendo por la noche, dejan una mancha fija. Neuralgia ovárica. Vaginismo.

RESPIRATORIO:

Tosferina espasmódica > en aire fresco. Asma nerviosa espasmódica.

CORAZON:

Angina de pecho. Pulso irritable. Palpitación nerviosa.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez del cuello y la espalda. Calambres. Una vértebra parece estar ausente.

EXTREMIDADES:

Piel de los dedos restirada. Dolor en los miembros inferiores; se alternan los lados. Parálisis agitante. Temblor de las manos. Calambres de los escritores, ejecutantes. Calambres por esfuerzos prolongados, por uso prolongado de herramientas. Contracciones acalambrantes de los dedos. Ciática con pies sensibles.

PIEL:

Prurito de la barbilla. Erupciones herpéticas con escamas blancas.

SUEÑO:

Somnoliento cuando trata de estudiar. Bostezos espasmódicos como si se le dislocara la mandíbula, con lágrimas.

FIEBRE:

El escalofrío corre hacia arriba y abajo por la espalda, con estremecimientos seguido de sofocación.

RELACIONES:

Colo; Dios.

MAGNESIA SULPHURICA

GENERALIDADES:

Los síntomas de piel, urinarios y femeninos están marcados. Diarrea con diuresis. Orina verdosa con sedimento rojo. Reglas profusas, oscuras, intermitentes. Leucorrea espesa, tan profusa como las reglas. Como con un tapón entre los hombros. La espalda se siente rota. Brazo y pié izquierdo, se sienten dormidos. Hormigueo en las puntas de los dedos. Pequeños granitos en todo el cuerpo, con comezón violenta. Verrugas; grandes, suaves.

AGRAVACION:

Mañana; al despertar.

MEJORIA:

Frotando. Caminando.

RELACIONES:

Nat-s.

MAGNETIS POLUS AUSTRALIS

GENERALIDADES:

El polo sur de un imán es útil para uñas del dedo gordo enterradas, con dolor excoriante en el lado interno de la uña del pie < caminando o al más ligero toque.

MALANDRINUM

GENERALIDADES:

Este nosode se prepara con el virus de Grease - una enfermedad de caballos. Es de protección muy eficaz contra la viruela y para los malos efectos por la vacunación. Liquida los remanentes de depósitos cancerosos.

MANCINELLA

GENERALIDADES:

Este remedio produce síntomas marcados en piel, garganta y mentales, especialmente estados depresivos en la pubertad y el climaterio, con sexualidad exaltada. Acre. Ardor, dolor vivo, en varias partes. Favorece la cicatrización rápida de las heridas.

AGRAVACION:

Frío; bebidas; pies. Ira. Humedad. Por comer. Contacto. Pubertad, climaterio.

MENTE:

Desvanecimiento súbito de pensamientos; olvida lo que iba a hacer enseguida; su recado. Temor a la insania, de los malos espíritus. Depresión con eretismo sexual. Tímido. Melancolia. Nostalgia.

CABEZA:

Se siente vacía, con vértigo, mientras camina por allí. El cabello cae después de una enfermedad aguda.
Dolor en el vértice < acostado.

OJOS:

Párpados pesados; y adoloridos. Ojos fijos o ardorosos al cerrarlos. Dolor sordo detrás de los ojos.
Inflamación intensa, con pérdida de la visión (por algunos días). Fotofobia.

NARIZ:

Ilusión de olfato; de pólvora, estiércol, etc.

CARA:

Hinchada, manchada. Herpes en los labios.

BOCA:

Saliva profusa, fétida, amarilla. Ardor y picor en la boca, no > por agua fría.

GARGANTA:

Dolores cortantes < bebidas frías. Sensación de sofocación que se eleva por la garganta cuando habla, impidiendo beber aunque esté sediento. Difteria. Anginas hinchadas.

ESTOMAGO:

Desea agua fría. Epigastrio abultado. Vómito de alimento seguido por cólico severo y diarrea profusa.
Aversión a la carne, pan, vino. Como una flama que se elevara. Vómito verde repetido.

ABDOMEN:

Intestinos adoloridos y ardorosos. Cólico < bebidas frías.

RESPIRATORIO:

Tos < bebidas frías. Adolorimiento detrás del esternón.

CORAZON:

Pulso débil, muy largo y suave. Punzadas como de agujas en el corazón.

EXTREMIDADES:

Vesículas mordientes en las plantas; descamación y resequedad de las plantas. Dolor en el pulgar.
Sudor acre, pegajoso, en los pies.

PIEL:

Vesículas. Ampollas grandes como por escaldadura. Costras café. Pénfigo. Dermatitis; con vesiculación extensa, rezumamiento de suero pegajoso y formación de costras.

RELACIONES:

Aru-t; Canth; Rhus-t.

MANGANUM

GENERALIDADES:

Mang. está asociado cercanamente con el hierro, y como el hierro, Mang. causa anemia con destrucción de los corpúsculos rojos de la sangre. Lo que es más, tiene una especial afinidad con el Oído medio; laringe, tráquea; periosteo de la barbilla. Coyunturas. Tobillos y extremidades inferiores. Parálisis motora ascendente. La parálisis agitante y la paraplejía caen bajo su influencia. Los huesos están muy sensibles. Adolorimiento profundo y doloroso de todo el cuerpo; cada parte del cuerpo se siente dolorida al tocarla; oídos, articulaciones, piel. El dolor se extiende al oído, desde otras partes. Todo afecta al oído. Dolores en diagonal. Descargas amarillo-verde nudosas o sanguinolentas. Artritis crónica, con articulaciones brillantes e infiltradas. Articulaciones débiles. Festinación; camina hacia atrás. Dolores crecientes y tobillos débiles. Atrofia muscular progresiva. Celulitis; etapa sub-cutánea. Supuración de la piel alderredor de las coyunturas. Personas asmáticas que no pueden acostarse sobre almohada de plumas. Degeneración grasosa. Quiere estar acostado en la cama lo que > todos sus problemas. Fiebre tifoidea; después, casos mal tratados, con convalecencia prolongada. Valioso para muchachos y muchachas cuyas voces están cambiando. Necrosis y caries de los huesos. Ulceras malignas con bordes azules, y que siguen a una lesión leve.

AGRAVACION:

Cambio de clima. Contacto. Frío. Humedad. Noche. Hablando. Cama de plumas. Riendo. Movimiento. Doblándose hacia atrás.

MEJORIA:

Acostándose. Al aire libre. Música triste. Por comer. Al deglutir. Cambio de clima.

MENTE:

Gemidos y quejidos constantes. Débil y nervioso. Ansiedad y miedo. Risa y llanto involuntarios. Ansiedad y temor moviéndose en una habitación > por acostarse. Ansiedad como si algo malo fuese a suceder. Triste, lloroso, silencioso. Todas las condiciones mentales se > acostándose. No disfruta de la música alegre, pero se afecta inmediatamente con la triste.

CABEZA:

La siente pesada; le parece más grande. Los dolores van desde arriba hacia atrás > esforzándose por evacuar, por sacudidas, al dar el paso.

OJOS:

Campo de la visión contraída. Adolorimiento en los ojos, por coser, leer letras finas.

OIDOS:

Todo afecta a los oídos; el dolor se extiende al oído, viniendo de otras partes. Los oídos se sienten tapados. Sordera en clima húmedo. Tinnitus. Hinchazón de las glándulas parótidas, en fiebres. Sonándose la nariz > la sordera. Punzadas en los oídos, por hablar, reír, deglutir. Crujidos, < sonándose la nariz y al deglutir.

NARIZ:

El sonado es doloroso. Dolores calambroides en la raíz de la nariz. Coriza seca, con obstrucción completa. Obstrucción de la nariz y coriza fluída que se alternan.

CARA:

Pálida, enfermiza; como una máscara estólida. Contracturas, dolor de torcedura desde la mandíbula inferior a las sienes < por reír.

BOCA:

Nódulos en el paladar y sobre la lengua. Dolor de dientes < por lo frío o por mamar, yéndose hacia los oídos. Aflujo de saliva; mientras habla; con cólico, parálisis, etc. Gusto aceitoso.

GARGANTA:

Tos fingida y carraspera todo el tiempo; y molestando a todo mundo.

ABDOMEN:

Crecimiento crónico del hígado. Ictericia. Como si los intestinos estuvieran flojos y se sacudieran cuando camina. Dolor y constricción en el ombligo. Pasa muchos gases con las evacuaciones. Los intestinos están irregulares, se tiene constipación o diarrea. Calambres en el ano mientras está sentado, > acostándose. Retortijón en la región umbilical < al hacer aspiraciones profundas.

URINARIO:

Punzadas en la uretra al pasar flatos.

MUJERES:

Las primeras reglas están retrasadas. Reglas; adelantadas, escasas, pálidas en pacientes anémicos. Bochornos climatéricos. Descarga de la sangre entre períodos.

RESPIRATORIO:

Ronquera crónica; voz áspera; < a.m.; > por la expectoración de masas de moco verdosas o amarillas o por fumar. Tos > acostándose; < leyendo, riéndose; con afonía. Cada resfrío trae consigo la bronquitis. Afonía; por tuberculosis laríngea. Laringe seca e irritada.

EXTREMIDADES:

Piernas débiles e inestables. No puede caminar hacia atrás sin caerse. Camina agachado hacia atrás. Paso hacia atrás. Camina sobre la articulación metatarso-falangiana; camina hacia atrás. Tendencia a caer hacia atrás. Inflamación de huesos y coyunturas, con dolores taladrantes nocturnos; en la barbilla. Tobillos inflamados. Los niños son incapaces de caminar debido a la afección de sus tobillos. Parálisis con inclinación a correr hacia atrás si trata de caminar. Dolor en las rodillas y comezón. Las manos cuando se doblan o estiran, se sienten hinchadas.

PIEL:

Aspera, agrietada (doblec), azulosa. Supuración de la piel alderredor de las articulaciones. Manchas rojas y elevadas. Eczema crónica con amenorrea, < reglas o menopausia. Ulceras secas y duras. Prurito de la diabetes. Erupciones crónicas, inveteradas como la psoriasis.

SUEÑO:

Muchos sueños vívidos que se recuerdan bien. Muchos bostezos.

FIEBRE:

Bochornos súbitos de calor en la cara, en pecho y sobre la espalda.

RELACIONES:

Chin; Psor.

MARUM VERUM (TEUCRIUM)

GENERALIDADES:

Los síntomas Nasales y Rectales están muy marcados. Hipersensibilidad y excitación; por abuso de medicinas y cuando los remedios fallan en su acción. Delicados y sensibles; ancianos y niños. Temblores internos; < excitación. Deseo de estirarse. Helmintiasis. Pólipos; nasales, vaginales, en el oído, etc. Tumores fibrosos.

AGRAVACION:

Clima- cambiante; humedad; frío. En cama. Contacto. Agachándose. Sentado. Sobre el lado en el que se yace. Frotando suavemente.

MEJORIA:

Al aire libre. Sudor.

MENTE:

Deseos de cantar. Excitación mental y locuacidad. Muy indolente, no quiere hacer ningún tipo de trabajo mental o físico.

CABEZA:

Dolor frontal < agachándose.

OJOS:

Dolor vivo en los cantos. Párpados rojos y abotagados. Tumores tarsales.

OIDOS:

Sonido de siseo cuando se pasa la mano sobre el oído, al hablar o inspirando con fuerza a través de la nariz. Comezón en. Pólipos.

NARIZ:

Cosquilleo; debe picársela, con lagrimeo y estornudos, taponamiento de la nariz < en el lado sobre el que se yace, al leer en voz alta. Catarro crónico; atrófico; descarga de mucosidades largas, grumosas, irregulares. Pérdida del olfato. Pólipos mucosos. Tapones sólidos de las coanas posteriores.

BOCA:

Comezón en el paladar.

GARGANTA:

Gusto mohoso en la garganta al carraspear o toser. Faringitis folicular.

ESTOMAGO:

Hipo constante; espasmos en niños emaciados después de amamantarse; con punzadas desde el estómago hacia la espalda. Vómito de grandes cantidades de masas verde oscuro.

ABDOMEN:

Comezón en el ano; impide el sueño. Parásitos.

RESPIRATORIO:

Tos seca; < tosiendo.

EXTREMIDADES:

Uñas enterradas en los dedos gordos de los pies; con ulceración > movimiento. Ardor en las puntas de los dedos. Trastabilleo, caminando, coloca un pié delante del otro.

SUEÑO:

Insomnio después de excitación; por comezón en el ano; de la piel, que dura toda la noche.

COMPLEMENTARIO:

Calc.

RELACIONES:

Cina; Sil.

MEDORRHINUM

GENERALIDADES:

Este nosode está preparado a partir de un virus gonorréico; un medicamento de acción profunda y poderosa; indicado para enfermedades crónicas debido a gonorrea suprimida. Afecta la mente; nervios; membranas mucosas; es útil en desórdenes crónicos de la pelvis en mujeres; para niños diminutos, no desarrollados, con olor agrio. Descargas profusas y acres, que causan comezón. Olores como de pescado en las secreciones. Olores ofensivos del cuerpo, especialmente en niños y mujeres. Reacción pobre debido a miasma sicótico. Muchas y diferentes clases de dolor; rigidez, adolorimiento; inflamación, edema de miembros; hidropesía de los sacos serosos. Emaciación. Temblor en todos lados (subjetivo); nerviosismo intenso y fatiga profunda. Entumecimiento; hormigueo interno. Artrítico; dolores reumáticos. Enfermedades del cordón espinal, aún las lesiones orgánicas terminan en parálisis. Crecimiento de las glándulas linfáticas en todo el cuerpo; con calor e inflamación. Pérdida de fuerza en las articulaciones; las coyunturas se sienten flojas. Ardor. Aftas muy pequeñas e inflamadas; ampollas. Estados de colapso, quiere ser abanicado todo el tiempo. Tumores; cáncer, escirros, etc. con historia de sicosis. El cuerpo le huele muy mal, y no puede lavarse.

AGRAVACION:

Humedad; frío. Durante el día; de la salida del sol hasta su puesta; 3-4 a.m. Después de orinar. Contacto, aún muy leve. Habitación cerrada. Antes de las tormentas.

MEJORIA:

Acostándose sobre el abdomen. Doblándose hacia atrás; estirándose. Aire fresco. Por ser abanicado. Frotamiento duro. A la orilla del mar. Humedad. Puesta del sol. Clima húmedo.

MENTE:

Memoria débil. No se puede concentrar. Olvida nombres, palabras, sus recados. No puede terminar las frases. Pérdida del hilo de la conversación. Sensación salvaje. Las cosas le parecen extrañas. No puede hablar sin llorar; cuenta algo una y otra vez. Apresurado y ansioso; irritable. El tiempo pasa lentamente. Miedo en la obscuridad, y de alguien detrás de ella; murmurándole. Sensible; nervioso, impulsivo; abrupto, rudo, cruel, ruin. Aprensivo; teme los acontecimientos. Se siente alejado; como si las cosas hechas hoy hubieran ocurrido hace una semana. Muchas ideas; pero inseguridad de su ejecución. Triste; mirada lúgubre > llorando. Ideas persistentes; estados alternantes o erráticos. Travieso durante el día, alegre por la noche. Temor de decir cosas erróneas. Todo la sobresalta. No confiable. Pensamientos suicidas. Teme volverse loco. Siente la vida irreal, todo le parece irreal. Desesperado. Triste; temeroso y lloroso.

CABEZA:

Vértigo; < en el vértice y al agacharse. Dolores en la cabeza, con sensación de tirantez < sacudiendo los oídos; se jala el cabello. Ardor en el occipucio; los dolores occipitales van hacia atrás de los ojos. Cabello enmarañado. Ardor profundo en el cerebro. Cabeza pesada y jalada hacia atrás. Comezón; caspa.

OJOS:

Siente como si se quedara viendo todo. Como si los párpados estuviesen pegados. Ptosis de los párpados. Caída de las pestañas, los objetos parecen dobles o pequeños. Hinchazón bajo los ojos. Vé objetos imaginarios. Párpado superior duro, como si tuviese cartílago en él.

OIDOS:

Sordera parcial o total. Conducto auditivo inflamado y unido. Pulsación en oídos. Dolores punzantes y rápidos. Escucha voces.

NARIZ:

Coriza, con pérdida del olfato y gusto. Estornudos en niños, no mejorados por otros remedios. Epistaxis. Descarga post-nasal, espesa y amarilla. Exhalación caliente. Fiebre de heno. Naríz sucia (niños). Punta de la nariz fría. Comezón intensa de la punta. Coriza > por baños de mar. Catarro nasal que escurre por la garganta.

CARA:

Grisásea, grasosa, verdosa; amarilla en los límites del cabello. Redecillas de vasos rojos en la cara. Acné en la cara < después de las reglas. Pequeñas ampollas que se abren durante las reglas. Labios engrosados, por respirar por la nariz.

BOCA:

Aftas muy pequeñas e inflamadas. Ampollas en la superficie interna de los labios y las mejillas. El agua sabe a perfume. Dientes aserrados, suaves, desmenuzados; amarillos. Lengua cubierta; café y gruesa.

ESTOMAGO:

Deseo de licores, que anteriormente no le gustaban; sal, dulces, naranjas; hielos; cosas ácidas, frutas verdes, cosas refrescantes. Vómitos del embarazo; perniciosos. Náusea matutina. Sed excesiva, sueños de agua que se bebe. Apetito insaciable, hambre después de comer.

ABDOMEN:

Abdomen inferior pesado. Cólico calambroides > por abrazarse las piernas; acostándose sobre el abdomen. Puede evacuar solamente si se inclina muy hacia atrás, luego estremecimientos. Ardor en epigastrio. Flatulencia con entumecimiento. Rezumamiento obscuro y fétido del ano; con olor a salmuera de pescado. Ano de un rojo subido, húmedo con comezón violenta. Cólera infantil, con opistótonos. Dolores agonizantes en el plexo solar, pone su mano derecha sobre el estómago y la izquierda en la región lumbar.

URINARIO:

Enuresis nocturna. Orina caliente y amoniacal. Dolor en la región del riñón > por una micción profusa, con deseo de hielo. Burbujeo en la región renal. Flujo lento.

HOMBRES:

Pesadez de la próstata; dolorosa y crecida con micción frecuente y dolorosa. Impotencia. Postración después de emisiones seminales. Pesadez en el perineo. Descarga persistente de espermatozoides amarillos.

MUJERES:

Cólico menstrual intenso > presionando los pies contra un apoyo. Reglas; profusas, oscuras, coaguladas, fétidas; manchas que se dificulta lavar; con micción frecuente. Mamas; frías; inflamadas. Rezumamiento, inflamación o frío helado en los pezones, durante las reglas. Leucorrea que ampolla;

delgada, de olor a pescado. Utero sensible; ulcerado. Pecho inflamado en los períodos no menstruales. Tirantez de los ovarios > presión. Esterilidad sicótica. Pecho frío, helado, resto del cuerpo caliente.

RESPIRATORIO:

Necesidad de aire. Tos > acostándose sobre el estómago, > por cosas dulces. Disnea, no puede exhalar. Asma; sicótica; infantil. Los pulmones se sienten atascados como por algodón. Como con un hueco en el pecho. Frialdad en el pecho.

CORAZON:

Sensación de un hueco donde debiera estar el corazón.

ESPALDA:

Espina inflamada y sensible. Calor ardiente en la espina. Dolor cortante, ardiente, hormigueo sobre la escápula izquierda. Dolor desde el hombro izquierdo al derecho. Lumbago por levantar pesos.

EXTREMIDADES:

Brazos velludos. Se muerde las uñas. Ardor de manos y pies. Piernas pesadas; duelen toda la noche no puede mantenerlas quietas. Calambres en las piernas > por estirarlas. Talones, plantas sensibles y con comezón; no puede caminar sobre ellas, ha tenido que caminar sobre las rodillas. Puntas de los dedos agrietadas y ardientes. Tobillos fácilmente doblados al caminar. Hinchazón de las piernas. Uñas deprimidas, como si estuviesen dobladas. Edema de los pies seguido y > por diarrea.

PIEL:

Comezón; inflamación. Nódulos rojos sicóticos. Manchas de rojo profundo. Condilomata. Amarilla. Comezón continua < pensando en ella. Piel fría pero siente como si la sangre estuviese caliente. Manchas de color cobre; que permanecen después de una erupción. Manchas coloreadas de amarillo cobre.

SUEÑO:

Un corto sueño parece largo y >. Duerme en posición mahometana (boca abajo, con las rodillas dobladas y la cara hundida en la almohada). Sueños de algo que se bebe.

FIEBRE:

Piel fría pero la sangre se siente caliente. Calor ardiente con sudor; quiere descubrirse; pero se escalofría. Suda fácilmente; hacia la mañana. Fiebre de heno. Los miembros se vuelven fríos.

RELACIONES:

Bar-c; Nat-m; Psor; Thu.

MELILOTUS

GENERALIDADES:

Esta medicina produce congestiones especialmente en la Cabeza; y hemorragia profusa, rojo brillante que proporciona alivio. Espasmos infantiles. Epilepsia por golpe en la cabeza. Dolor con debilidad. Sensación de carne viva.

AGRAVACION:

Climaterio. Por caminar. Clima - cambiante; tormentoso, lluvioso.

MEJORIA:

Sangramiento. Micción profusa. Vinagre (aplicaciones).

MENTE:

Quiere correr y esconderse. Temor de un peligro, y a ser arrestado, o de hablar en voz alta, ella susurra. Memoria traicionera. Piensa que todos la miran. Quiere matarse a sí mismo; o amenaza de matar a quien se le acerca. Melancolía religiosa. Llanto.

CABEZA:

Aflujos de sangre a la cabeza. Dolores de cabeza Violentos; Con latidos; congestivos; nerviosos, periódicos; amenazan su raciocinio; > por sangramiento nasal; flujo menstrual; aplicaciones de vinagre. Plenitud en toda la cabeza. Dolor de cabeza que alterna con dolor en la espalda.

OJOS:

Calientes, pesados, quiere cerrarlos fuertemente para aliviarse. Como si estuviesen muy grandes.

NARIZ:

Seca, debe respirar por la boca. Epistaxis frecuente y profusa, con > general.

CARA:

Intensamente roja; y sonrojada con carótidas pulsantes y cefalalgia. Roja antes de las hemorragias por nariz, pulmones, útero.

URINARIO:

Micción frecuente y profusa que mejora el dolor de cabeza.

MUJERES:

Dolores punzantes y agudos, recurrentes en vagina y vulva al término de las reglas.

RESPIRATORIO:

Siente como si se ahogara; < por caminar rápido. Como si las ropas estuviesen muy ceñidas a través del pecho.

PIEL:

Seca.

RELACIONES:

Bell: Calc; Glo.

MENYANTHES

GENERALIDADES:

Produce frialdad de hielo; de partes prominentes; aisladas o afectadas; nariz; oídos, dedos, rodillas, abdomen, etc. Dolores tensivos y compresivos. Contracturas espasmódicas y sacudidas visibles; con neuralgia. Mujeres asustadizas, inquietas con problemas urinarios.

AGRAVACION:

Caminando; aún ligeramente. Ascendiendo. Descanso. Luz. Ruido. Sacudida.

MEJORIA:

Presión dura. Al atardecer. Colocándose sobre la mano. Agachándose.

CABEZA:

Cefalalgia estallante; el dolor asciende desde la nuca, > agachándose, sentándose doblado. Presión dura en el vértice > por presionar fuertemente con la mano. Como con un peso en la nuca. Cabeza fría, como si soplara aire frío en ella.

OJOS:

Visión brumosa.

OIDOS:

Tinnitus, al masticar.

NARIZ:

Fría. Olor nauseabundo en la nariz, como de huevos podridos.

CARA:

Sacudidas visibles de los músculos faciales, < descanso.

ESTOMAGO:

Frialdad que se extiende hacia el esófago. Deseo de carne. Aversión al pan y la mantequilla.

ABDOMEN:

Frialdad; < presionando con la mano.

URINARIO:

Deseo frecuente de orinar; con orina escasa.

CORAZON:

Ansiedad; como si algo malo fuese a suceder. Un ligero esfuerzo causa acción irregular.

ESPALDA:

Pesadez en la escápula (izquierda). Dolor de magulladura en el sacro < agachándose, caminando.

EXTREMIDADES:

Calambres en la parte posterior de los muslos < sentándose. Calambres desde el tobillo a la pantorrilla (derecha). Frialdad de hielo en las manos y pies. Las piernas se tuercen y sacuden; < acostándose.

PIEL:

Se siente estirada.

SUEÑO:

Sueños vívidos, con sueño agitado.

FIEBRE:

Escalofríos con bostezos. Malaria quartana.

RELACIONES:

Ver-a.

MEPHITIS

GENERALIDADES:

Las diluciones de esta medicina se preparan con el líquido contenido en las glándulas anales del zorrillo. Produce efectos espasmódicos y es un gran remedio para la tosferina. Deberá darse en las bajas diluciones. Agotamiento nervioso. Debilidad después de una enfermedad severa. Quiere bañarse en agua helada. Temblores y sacudidas, con exoftalmos. Vibraciones finas, que causan una gran inquietud.

AGRAVACION:

Acostado. Noche. Después de las reglas.

MEJORIA:

Frío; baño; helado; o clima.

MENTE:

Excitable; llena de fantasías. Locuaz. No proclive a trabajar, con propensión a estirarse.

CABEZA:

Vértigo violento < sentándose, agachándose, al voltearse en la cama. Como si un dedo presionara el occipucio. Dolor de cabeza por movimiento de automóvil.

OJOS:

Calientes, rojos y dolorosos. Incapacidad para leer letra pequeña.

CARA:

Abotagada.

BOCA:

Aliento fétido.

GARGANTA:

El alimento se va por el lado equivocado. Se atraganta con facilidad, al beber o hablar.

ESTOMAGO:

Vomita alimento, horas después de haberlo comido. Deseo de comida salada.

RESPIRATORIO:

Disnea; no puede exhalar. Asma, < por agua helada. Tos espasmódica o tosferina; con pocos paroxismos durante el día pero muchos por la noche. Tos- violenta, sofocante, espasmódica, nerviosa < hablando o bebiendo. Expectoración maloliente. Asma de los tísicos o borrachos.

SUEÑO:

Corto, parece que refresca. Despierta por la noche con aflujo de sangre a las piernas.

RELACIONES:

Cor-r; Mos.

MERCURIUS

GENERALIDADES:

Las potencias se preparan por óxido negro soluble de Mercurio (preparado originalmente por el Dr. Hahnemann), o por puro Mercurio metálico. No hay diferencia entre los síntomas de estas preparaciones; pero parece que cuando merc. sol. falla estando indicado, merc. vivus actúa. El Merc. afecta más o menos cada órgano y tejido del cuerpo; la sangre se descompone produciendo anemia profunda; Las glándulas linfáticas están crecidas, la actividad glandular, especialmente de las glándulas salivales y mucosas se incrementa. Las secreciones son libres; delgadas, babosas, acres, ardientes, fétidas o gruesas amarillo-verdosas. Ulceración; de las membranas mucosas, especialmente de boca y garganta. Manifestaciones de sífilis hereditaria; burbujas; abscesos; marasmo; moco o inflamación destructiva de los huesos, tejidos celulares; las coyunturas están bajo este orden. El paciente sufre de una gran variedad de síntomas; es incierto en su comportamiento físico y mental; tembloroso, sudoroso

y débil. Hinchazones edematosas; exudaciones continuas. Enrojecimiento. Congestiones lívidas. Los dolores se clavan en un punto. Supuraciones; pus; sangrantes, delgadas, verdosas. Fetidez; de secreciones; del aliento; del cuerpo. Amarillez; de ojos, dientes, descargas nasales; biliosidad; ictericia. Las partes están muy hinchadas, con sensación de carne viva. Sensibilidad al calor y frío; un barómetro humano. Todo parece muy corto. Débil, exhausto y listo para hundirse, < después de evacuar. Reumatismo. Emaciación. Salados - labios, gusto, expectoración, etc. Respiración oleosa. Sífilis, sycosis, escrófula. Convulsiones. Rigidez cataléptica del cuerpo. Parálisis agitante; paraplejía. Contracción de las articulaciones. Malos efectos del susto; gonorrea suprimida; sudor de pies. Como si el cuerpo estuviese hecho de dulces. Dolores punzantes, ardientes. Temblores, sacudidas, movimientos desordenados; de partes paralizadas. Estricturas después de inflamación. Induraciones. Exóstosis; dolorosas. Reblandecimiento de los huesos.

AGRAVACION:

Noche; aire. Sudando. Acostado sobre el lado derecho. Estando acalorado; por la cama o fuego. Corrientes, en la cabeza. Clima - cambiante; nublado; húmedo y frío. Resfriándose. Calor y frío. Pies mojados. Luz de fuego. Antes de evacuar. Durante y después de orinar. Tocando cualquier cosa fría.

MEJORIA:

Temperatura moderada. Coito. Descanso.

MENTE:

Apresurado; en el lenguaje. Tartamudo, nervioso, con temblores. Impulsos violentos, horribles; homicida; suicida. Inquietud con sudor. Cambia de lugar constantemente. Miedo con deseo de escapar. Deseo incontrolable de viajar muy lejos. Indiferencia por todo; ni siquiera se preocupa por comer. Inclínación a cogerles la nariz a los extraños que pasan. Sucio de mente y cuerpo; hace acciones tontas, dañinas, asquerosas. Lento para contestar preguntas. Cansado de la vida. Pensamientos suicidas durante las reglas > llorando. Piensa que está perdiendo la razón. Memoria débil; olvida todo. Pérdida del poder de la voluntad. Siente un peligro inminente. Precoz. Lloro y gime. Suspica. El tiempo pasa lentamente.

CABEZA:

Vértigo < acostándose sobre la espalda; como en una hamaca. Sensación de una banda alderredor de la cabeza. Cafalgia con dolor de oído y dientes. Exóstosis con sensación de inflamación. Cuero cabelludo tenso, sudor oleoso en la cabeza. Meningitis. Hidrocefalia. El niño voltea la cabeza de un lado a otro y llora. Cabeza externa dolorosa al contacto. Cefalohematoma. Caída de cabello de los lados y las sienas.

OJOS:

Párpados; rojos, gruesos, hinchados; bordes hinchados y con caspa. Descarga escasa o profusa, ardiente y acre. Los ojos se juntan. Puntos negros, flamas, destellos delante de los ojos. Fotofobia < calor y luz intensa, de fuego; de los fundidores. Arco senil. Iritis; con hipopión. Keratitis. Lagrimeo profuso, ardoroso y acre. Conjuntivitis por enfriarse. Párpados espasmódicamente cerrados. Pérdida de la vista periódica. Afección del nervio óptico y ojo en aquellos que trabajan en fundidoras. Visión neblinosa.

OIDOS:

Dolores que se extienden al oído; desde los dientes, garganta, etc. Otorrea - con descarga espesa, amarilla, fétida y sanguinolenta. Sordera al acalorarse; > al deglutir y sonarse la nariz. Ampollas en el canal externo. Como si agua fría escurriera desde el oído. Sensación de frialdad en los oídos; durante el embarazo.

NARIZ:

Muchos estornudos. Estornudos a la luz del sol. Fuelles nasales; en carne viva, ulcerados. Los resfríos van hacia arriba, o atacan los ojos. Coriza; acre, purulenta; demasiado espesa para escurrir. Nariz pesada. Nariz en los niños roja, ulcerada, sucia. La nariz sangra, al toser; durante el sueño, la sangre cuelga en cuerdas coaguladas y oscuras. Estornudos frecuentes, sin coriza. Sinusitis.

CARA:

Pálida, amarilla, de aspecto sucio; abotagamiento bajo los ojos. Mejillas; hinchadas rojas, calientes. Dolor en las mandíbulas. Paperas. Labios; salados, secos, agrietados; en los ángulos (dercho); arden al tocarlos. Músculos maseteros contraídos. Parálisis facial por frío.

BOCA:

Ofensiva, olor pútrido de la boca. Encías sangrantes, dolorosas, cortadas, hinchadas. Flemón. Dientes; huecos, negros; dolor < calor y frío, noche; pies sensibles y alargados. Aftas. Saliva; aumentada; fluye durante el sueño; amarilla; sanguinolenta, de mal sabor, ofensiva. Lengua; ancha, floja, amarilla, indentada; con picoteos como de aguja en la punta. Cubierta a través de la parte superior de la lengua; con pinchazos. Dulzona. Gusto metálico. Lenguaje difícil por temblor de la lengua. Pérdida del habla, contesta con señas y gestos. Tartamudeo. Ránula con salivación y encías hinchadas. Comezón en el paladar. Ulceras detrás de la lengua. Anginas crecidas. Como algo que se elevara en la garganta, con deseo de tragarlo. Gusto dulzaino; el pan sabe dulce. Estomatitis por masticar chicle.

GARGANTA:

Inflamada; en carne viva, con punzadas, ardiente, como si vapores calientes ascendieran. Como con un corazón de manzana, una pera que atragantara, o algo que colgara. Ulceras en las tonsilas, en la faringe. Cinanquia con dificultad para deglutir, después de que se ha formado pus. Punzadas en los oídos, al tragar. Carraspea grandes bultos de la garganta. Inclinación constante a deglutir. Lo que bebe se regresa por la nariz.

ESTOMAGO:

Sed intensa por bebidas frías y cerveza. Digestión débil con hambre constante. Se siente lleno y constreñido. Aversión a la carne, café, mantequilla y cosas grasosas. Hay disgusto por la leche y las cosas dulces, aunque las desea. Eructos rancios. Hipo frecuente. Agruras.

ABDOMEN:

Hígado; crecido e inflamado; indurado. Ictericia. Los intestinos se sienten débiles, los tiene que sostener. Los intestinos se sienten magullados al acostarse sobre el lado derecho, o como si se cayeran hacia un lado sobre el que se está acostado. Glándulas inguinales hinchadas o supurantes. Evacuaciones; dolorosas; escasas; sangrantes; limosas y verdes; cenizas, blancas, acres; luego tenesmo o escalofrío; sensación de nunca terminar. Tenesmo rectal, con tenesmo de vejiga. Apendicitis, >

acostándose sobre la espalda. Prolapso del ano después de evacuar. Hinchazón de glándulas inguinales al resfriarse. Disentería. Abdomen externo frío al contacto.

URINARIO:

Necesidad frecuente de orinar día y noche, con orina copiosa o escasa. La orina causa comezón. Orina más de lo que bebe. Albuminuria; orina negra, sanguinolenta. Ardor después de la micción. El chorro de la orina es muy pequeño. Disuria. Hematuria, indolora.

HOMBRES:

Glande y prepucio inflamado e hinchado; fimosis. Testículos; hinchados, duros, con escroto rojo brillante. Los niños y adultos se jalen y rascan los genitales; por un tipo de comezón que los obliga a hacerlo. Emisiones sanguinolentas. Gonorrea. Meato rojo. Vesículas, úlceras, chancros suaves. Herpes prepucial. Hinchazón de los vasos linfáticos a lo largo del pene.

MUJERES:

Colapso y desvanecimiento al inicio de las reglas. Reglas; profusas con dolores abdominales. Los genitales se sienten en carne viva. Leucorrea; espesa, blanca, al orinar; > coito. Comezón < orinando > lavándose con agua fría. Prolapso del útero con vagina > coito. Mamas dolorosas y llenas de leche durante las reglas. Esterilidad, con reglas demasiado profusas. Coito fácil con concepción segura. Dolores punzantes en el ovario. Dolor bajo la mama (derecha) que atravieza la escápula. Tendencia al aborto por debilidad ligera. Los abscesos aparecen dondequiera en el cuerpo durante las reglas y desaparecen después de ellas. Leucorrea en niñas pequeñas, causando postración. Mamas hinchadas, se vuelven duras con dolores ulcerativos durante las reglas. Cáncer de mama y útero. Comezón en la vulva. Leche podrida. Leche en pechos de niños; y en niñas en lugar de las reglas.

RESPIRATORIO:

Voz ronca y áspera. Tos; en ataque doble; seca por la noche; esputo amarillo verde durante el día. Respiración difícil < acostada sobre el lado izquierdo pero tos < acostándose sobre el lado derecho. Punzadas desde el lado inferior derecho del pecho a la espalda, < estornudando o tosiendo. Sensación de burbujas o como de vapor caliente en el pecho. Epistaxis durante la tosferina. Tos < por fumar. Ictericia; en la neumonía. Respiración corta al ascender escaleras o caminar rápidamente. Asma > por el humo del tabaco y el aire frío.

CORAZON:

Palpitación por esfuerzo ligero. Despierta con temblor cardíaco. Pulso irregular, rápido, fuerte e intermitente o suave y tembloroso.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido; glándulas cervicales crecidas. Dolor ardoroso en la espalda < por emisiones. Dolor desgarrante en el cóccix < presionando el abdomen. Dolor hacia adelante desde la escápula derecha.

EXTREMIDADES:

Debilidad y temblor de los miembros; especialmente de las manos. Dedos entumidos. Sudor frío en los pies por la mañana; en la cama. Flegmasia alba dolens. Hinchazones hidrópicas de los pies y las piernas. Manos con frío helado después de una emisión. Dolores óseos - profundos o cercanos a la

superficie < por la noche; debe levantarse y caminar. Tobillos fríos. Sensación de que las rodillas fueran más grandes.

PIEL:

Tendencia general a la transpiración fácil, pero no mejora al paciente; piel siempre húmeda. Piel; amarilla; sensible, excoriada, como carne cruda. Erupciones costrosas y húmedas. Ulceras; irregulares, difundidas; superficiales; sangrantes; con carnosidad y cortadas. Granitos alderredor de la erupción principal. Ampollas y abscesos que se forman al tiempo de las reglas. Amarilla. Ictericia con comezón en el abdómen. Comezón por la noche en cama. Eczema húmedo. Insensible.

SUEÑO:

Insomnio por la noche; por ebullición de la sangre (en pecho y cabeza); por excitabilidad nerviosa; por dolor y otros problemas.

FIEBRE:

Escalofriado fácilmente o sobrecalentado. Alternan frío y calor. Escalofríos reptantes. Escalofrío dentro de los abscesos. Fiebres catarrales, gástricas y biliosas. Sarampión. Fiebre después de supresiones. Sudoración fácil y profusa sin alivio; durante el sueño; con dolores; oleosa; fétida; ácida o con un olor fuerte dulzón y penetrante; en la cabeza; en el pecho; marca de amarillo indeleble.

COMPLEMENTARIOS:

Bell; Sil.

RELACIONES:

Kali-io.

MERCURIUS CORROSIVUS

GENERALIDADES:

Merc.Cor. es un desinfectante poderoso y tiene una rapidéz de acción muy grande; causando efectos violentos. Causa tenesmo del Recto junto con tenesmo de la vejiga. Inflamación con hinchazón y sensación de constricción; ardor interno; en la garganta, estómago, recto, cuello de la vejiga, riñones, etc. constricción de; garganta, recto, vejiga, etc. Descargas acres, lágrimas, descarga nasal, etc. Grietas en las palmas, plantas, comisuras labiales. Fagedena. Sífilis. Albuminuria al inicio del embarazo (Phos. más tarde o al término). Gonorrea. Yace sobre la espalda con las rodillas encogidas.

AGRAVACION:

Después de la micción y evacuaciones. Hinchazones. Noche. Frío. Otoño. Días calientes y noches frescas. Acidos.

MEJORIA:

Con el reposo.

MENTE:

Ansioso e inquieto; se mece con fuerza. Mira fijamente a las personas que le hablan pero no les entiende. Pensamiento difícil. Lenguaje desordenado. Estúpido.

CABEZA:

Dolor en las sienes < mirando hacia los lados. Vértigo con sordera al agacharse.

OJOS:

Fotofobia excesiva y lagrimeo acre. Ardor, enrojecimiento de los ojos. Iritis. Keratitis. Retinitis; albuminúrica; hemorrágica. Oftalmía del recién nacido. Párpados edematosos, rojos, excoriados. Los objetos parecen más pequeños; o visión doble.

OIDOS:

Pulsación violenta en los oídos. Pus fétido.

NARIZ:

Coriza fluída y acre. Océna con perforación del tabique. Descarga nasal pegajosa. Nariz hinchada y roja.

CARA:

Pálida alrededor de la boca. Grietas en los ángulos de la boca. Hinchazón edematosa de la cara. Labios; negros, rojo oscuro, hinchados. Labio superior hinchado y volteado hacia arriba. Mandíbulas rígidas.

BOCA:

Lengua; parchada, hinchada e inflamada. No puede sacarla. Salivación con gusto salado. Piorrea. Encías; púrpura, abultadas con dolor en los dientes; esponjosas. Aftas; úlceras. Ardor, sensación de escaldadura en la boca. Dientes flojos, con dolor nocturno. Gusto; astringente; salado, amargo. Necrosis de la mandíbula inferior.

GARGANTA:

Uvula; roja, hinchada, alargada. Abultamiento doloroso, inflamada, roja < calor; dolores agudos en los oídos, < presión. Dolor ardiente y gran inflamación < por la presión más leve. Todas las glándulas cercanas a la garganta están inflamadas. Anginas inflamadas, cubiertas con úlceras. Dificultad para tragar; constricción espasmódica al tratar de deglutir una gota de líquido.

ESTOMAGO:

Sed insaciable, por bebidas frías. Distensión e inflamación del hueco del estómago; calambres en el epigastrio < al más leve toque. Vómito de moco y sangre. Gastritis. Regurgitaciones, astringentes. Gran deseo de alimentos fríos.

ABDOMEN:

Hinchado, doloroso al menor toque. Cólico de retortijón; bajo el ombligo. Flatulencia dolorosa. Apendicitis. Necesidad constante de evacuar y orinar. Sensación de nunca haber terminado. Evacuaciones; sanguinolentas; fragmentadas; delgadas; calientes con tenesmo atormentante. Pasa pura sangre o agua sanguinolenta. Disentería. Espasmos del recto durante el coito. Sudores antes y después de evacuar.

URINARIO:

Ardor intenso en la uretra. Orina; Caliente, ardorosa, pasa gota a gota, escasa, suprimida, sanguinolenta, frecuente; en gotas < por sentarse. Uretra que sangra después de orinar. Tenesmo de la vejiga; con tenesmo de recto. Nefritis. Albuminuria; del embarazo. Cistitis. Gonorrea. Parafimosis. Riñones sangrantes. Sudores después de la micción.

HOMBRES:

Pene y testículos enormemente hinchados. Chancros duros. Gonorrea, descarga espesa y verdosa.

MUJERES:

Leucorrea; amarillo pálido, con olor dulzón y nauseabundo. Hinchazones glandulares cerca de los pezones. Los pezones se agrietan y sangran; dolor < al amamantar. Reglas; demasiado tempranas y demasiado profusas.

RESPIRATORIO:

Respira como a través de un tubo metálico. Constricción del pecho, respira a través de los músculos pectorales. Dolor cortante en la laringe. Punzadas frecuentes que se disparan a través del tórax.

CORAZON:

Palpitación durante el sueño.

ESPALDA:

Enfermedad de Pott, yace sobre su espalda con las rodillas encogidas.

EXTREMIDADES:

El deltoides se siente relajado. Como si las piernas se hubiesen dormido. Calambres en las pantorrillas; en la disentería. Parálisis de los miembros; temblores. Pies helados. Exóstosis; en la barbilla; esternón, costillas.

PIEL:

Fría. Ulceras; perforantes; esparciéndose; serpiginosas. Uñas de color gris.

SUEÑO:

Hipo violento durante el sueño.

FIEBRE:

Escalofrío; después de evacuar. Suda; por cualquier movimiento; parcial < en la frente y las partes inferiores; fétido; por la noche. Calor al agacharse y frialdad al levantarse.

RELACIONES:

Ars; Canth.

MERCURIUS CYANATUS

GENERALIDADES:

Un remedio valioso para la toxemia de infecciones agudas; enfermedades especialmente la difteria cuando hay una postración temprana y extrema; con cianosis; frialdad y temblores. Afecta con más prominencia boca, garganta y laringe. Destrucción local y rápida. Putrefacción. Hemorragias de sangre líquida oscura. Sacudidas y torcimiento de los músculos. Profiláctico eficiente en la difteria.

AGRAVACION:

Deglutiendo. Al hablar. Al comer.

MENTE:

Gran excitación; accesos de pasión. Furia. Locuacidad.

CABEZA:

Cefalalgias atroces < por la noche.

OJOS:

Sumidos; fijos.

NARIZ:

Epistaxis profusa varias veces al día.

BOCA:

Cubierta con ulceraciones; con membrana gris. Salivación fácil. Aliento fétido.

GARGANTA:

Dolores cortantes, al tragar. Membrana muy gruesa y grisácea en la garganta. Parece carne viva en puntos, especialmente en los oradores públicos. Tonsilas crecidas. Destrucción necrótica de las partes blandas del paladar y las fauces. Difteria séptica.

ESTOMAGO:

Anorexia que principia, absoluta. Hipo incesante. El pensamiento de la comida causa arqueos. Leche >.

ABDOMEN:

Diarrea frecuente precedida de cólico severo. Evacuaciones; ofensivas, verdes, delgadas, sanguinolentas, negras.

URINARIO:

Orina; albuminosa, amarillo ámbar, escasa; suprimida.

RESPIRATORIO:

Dolor cortante en la laringe. Ronquera; el hablar es doloroso. Tos cruposa; causa sofocación.

CORAZON:

Débil.

EXTREMIDADES:

Venas varicosas con gran sensibilidad de la pierna (izquierda). Miembros fríos.

PIEL:

Húmeda y fría. Sudoración.

RELACIONES:

Lach.

MERCURIUS DULCIS

GENERALIDADES:

El calomel produce inflamación catarral del oído y es útil en el catarro de la Trompa de Eustaquio y la sordera. Inflamación con exudados plásticos; peritonitis; meningitis; pleuresía; tiene una acción reabsorbente. Membranas mucosas pálidas. Biliosidad; fiebres biliosas remitentes. Palidez; abotagamiento, flojedad. Niños pálidos y escrofulosos, que tienen hinchazones de las glándulas cervicales y otras. Hidropesías debido a enfermedades combinadas renales y cardíacas, especialmente con ictericia. Estasis biliar.

AGRAVACION:

Acidos.

MEJORIA:

Bebidas frías.

CABEZA:

Cráneo doloroso.

OJOS:

Parpadeo rápido. Conducto lagrimal cerrado. Ojos; rojos, secos, pegajosos.

OIDOS:

Cerramiento de las trompas de Eustaquio. Membrana timpánica retraída, engrosada. Sordera; por cada gripe; de los ancianos. Aleteo súbito.

NARIZ:

Se suena masas de moco de la nariz.

CARA:

Pálida.

BOCA:

Lengua; indentada; indurada; negra. Aflujo constante de saliva obscura y pútrida. Mal aliento.

GARGANTA:

Anginas inflamadas (derecha); > bebidas frías. Disfagia. Faringitis granular.

ESTOMAGO:

Vómito cíclico de los infantes.

ABDOMEN:

Hinchado, caliente, doloroso. Diarrea de niños acre, verde como pasto. Ano excoriado y ardoroso. Cirrosis hipertrófica del hígado (use 1x).

HOMBRES:

Inflamación aguda de la próstata; después de una gonorrea suprimida.

RESPIRATORIO:

Espujo delgado, purulento. Pleuresía.

PIEL:

Floja, y mal nutrida. Erupciones de color cobrizo.

FIEBRE:

Fiebres biliosas remitentes. Sudoración.

RELACIONES:

Kali-m.

MERCURIUS IODATUS FLAVUM (Mercurio Protoiodado)

GENERALIDADES:

Este remedio tiene una afinidad muy fuerte con las glándulas de la Garganta, linfáticas y mamarias. El lado derecho es por lo general el más afectado y como Lyc. los síntomas van de derecha a izquierda. Sífilis. Tumores mamarios. Dolores óseos profundos especialmente por la noche.

AGRAVACION:

Olores. Levantándose. Por bebidas calientes. Acostándose sobre el lado izquierdo. Clima frío y húmedo. Contacto.

MEJORIA:

Al aire libre.

MENTE:

Vivaz, alegre, platicador.

CABEZA:

Desvanecimiento o desmayo al levantarse de la silla, o cuando está leyendo. Cefalalgia frontal sorda con dolor en la raíz de la nariz; > cuando la mente y el cuerpo están ocupados. El dolor de cabeza sigue al dolor de corazón.

OJOS:

Keratitis; la córnea luce rayada o como rasguñada por una uña. Fotofobia. Círculos oscuros alrededor de los ojos. Inflamación bajo el ojo derecho.

OIDOS:

Dolor agudo súbito en los oídos < contacto.

NARIZ:

El moco desciende a través de las coanas posteriores hacia la garganta, causando carraspera.

BOCA:

Deseo de apretar los dientes; la mandíbula está cansada y rígida; dolor por rechinar los dientes; durante la noche. Los dientes se sienten destemplados < calor, frío y dulces. Los dientes se sienten demasiado largos; no puede comer. Piorrea. Lengua cubierta de una cubierta húmeda o de una cubierta espesa y amarilla en la base; la punta y las orillas están rojas. Dolor de dientes después de empastes.

GARGANTA:

Inflamada (derecha, luego izquierda). Inclinación constante a deglutir. Anginas inflamadas; > bebidas frías. Tonsilitis lacunar. Bocio con sofocación. Glándulas cervicales hinchadas. Adenitis.

ESTOMAGO:

Sensación de vacío y debilidad en el estómago. Náusea a la vista y el olor de los alimentos. Sed por bebidas ácidas.

ABDOMEN:

Dolor en el abdomen con dolor en el corazón. Sensación de desfallecimiento en el hipogastrio antes de evacuar. Descargas negras con o sin evacuaciones.

URINARIO:

Orina; copiosa, oscura roja y escasa.

HOMBRES:

Chancros duros; indoloros; con glándulas inguinales crecidas; no propensas a la supuración. Sueños de micción seguidos de emisiones seminales de las cuales no tiene conocimiento.

MUJERES:

Leucorrea; amarilla; de niñas muy pequeñas. Tumores mamarios; con nudos en las axilas; azulosidad de las partes; sudoración caliente y perturbaciones gástricas.

CORAZON:

Dolor precedido de dolor de cabeza. Palpitación con disnea < acostándose sobre la espalda. Sensación como si el corazón saltara de su lugar.

EXTREMIDADES:

Rodillas dormidas. Dolor dolorido en el brazo derecho < al escribir. Dolor en el antebrazo derecho, con dolor en la cadera izquierda.

PIEL:

Verrugas planas.

RELACIONES;

Lyc; Merc.

MERCURIUS IODATUS RUBER (Mercurius Bin Iodatus)

GENERALIDADES:

Como Merc-Io-Fl. esta sal afecta también las glándulas linfáticas; Garganta, pero el lado izquierdo. Actúa sobre el tejido celular también; tiene dolores reumáticos erráticos con cansancio. Casos de inicio de catarro especialmente en niños. Para en seco los ataques de asma cuando se dá en 2x o 3x o previene su desarrollo durante la noche si se dá al momento de acostarse. Gran hinchazón glandular y dura. Bubas crónicas y supurantes. Hinchazones.

AGRAVACION:

Por deglutir en vacío, o deglutiendo alimentos. Después del sueño. Cambios climáticos. Lavando el piso. Por mojarse. Al contacto y la presión. Después de la comida.

MENTE:

Mal humor. Disposición al llanto.

CABEZA:

Occipucio dolorosamente pesado. Región frontal como si estuviese atada con un cordón.

OJOS:

Párpados granulares. Tracoma.

OIDOS:

Obstrucción de las trompas de Eustaquio; se abren con un estallido. Sordera > después de calentarse al caminar.

NARIZ:

Coriza con lado derecho de la nariz caliente e inflamado.

CARA:

Inflamación dolorosa de los huesos maxilares. Labios viscosos y pegajosos al despertar. Eczema de la barbilla.

BOCA:

Lengua; agrietada; rígida en la base; dolores al moverla.

GARGANTA:

Fauces rojo obscuro. Garganta Inflamada (de izquierda a derecha). Anginas y glándulas grandemente hinchadas. Disposición a carraspear, con sensación de tapón en la garganta. Rigidez de los músculos de la garganta y el cuello. Carraspea mucho moco de las coanas posteriores. Úvula crecida. Difteria; glándulas sub-maxilares crecidas y dolorosas.

ESTOMAGO:

Desea los alimentos más salados.

URINARIO:

Uretra indurada.

HOMBRES:

Chancros duros. Bubas supurantes y tenaces. Sarcocoele de los testículos (izquierdo).

MUJERES:

Leucorrea profusa, acre y verde. Fibromas con dureza de piedra.

RESPIRATORIO:

Asma. Ronquera al mojarse ligeramente. Dolor pegajoso bajo el pecho derecho, con respiración opresiva. Tos por úvula crecida, con garganta inflamada.

CUELLO:

Rígido. Adenitis cervical.

EXTREMIDADES:

Dolores reumáticos erráticos, especialmente musculares. Húmero medio como si se fuese a romper. Dolor desde la pantorrilla hasta el sacro.

PIEL:

Pequeñas fisuras y grietas. Grietas húmedas en las palmas.

FIEBRE:

Escalofríos intensos seguidos por febrícula. Sudor nocturno, caliente.

RELACIONES:

Lach.

MEZEREUM

GENERALIDADES:

Afecta la Piel; huesos, nervios y membranas mucosas de la boca y el estómago. Produce ardor violento, punzante, como de fuego en los músculos. Irritación, ardor, comezón; o ardor penetrante en la piel; dolores clavantes y ardientes en los huesos, especialmente los largos; y neuralgia; de los dientes y cara, y después de zona. Dolores súbitos de varias clases, seguidos por escalofrío, adormecimientos e inflamación. Lagrimeo con dolores. Las partes afectadas se ponen frías, o se emacian. Síntomas de un solo lado; parciales o totales. Malos efectos de un eczema capilar suprimido; vacunación y mercurio. Discrasia gotosa-reumática; sifilítica. Excesiva sensibilidad al aire, aún al de un ventilador. Como si una brisa fresca soplara en la parte. Ardor interno con comezón violenta externa, en pequeñas áreas, o en partes aisladas. Caries, exóstosis, de huesos. Periostitis. Los huesos parecen crecer. Secreciones acres, pus, leucorrea, etc. Ulceras. Sacudidas; de párpados, lado derecho de la cara, etc. Convulsiones > por un agarre apretado. Osteoma quístico. abscesos de partes fibrosas o tendones. El cuerpo se siente ligero.

AGRAVACION:

Noche. Supresiones. Calor de la cama; de fuego, etc. Frío; aire; corrientes; humedad. Movimiento. Contacto. Mercurio. Vacunación.

MEJORIA:

Arropándose. Calor de la estufa (Prosopalgia). Comiendo. Al aire libre.

MENTE:

Indiferencia a todo y a todos; mira a través de una ventana por horas sin estar consciente de los objetos que lo rodean. Aprensión que se siente en el hueco del estómago cuando espera alguna información desagradable, o dolor o sacudida. Olvidadizo. Melancolía religiosa y financiera. Aversión a hablar; le parece un trabajo muy pesado pronunciar una palabra. Reprocha o regaña a otros.

CABEZA:

El dolor se extiende a los ojos, huesos malares, cuello, etc. con lagrimeo; > agachándose; < hablando, por enojo. Adormecimiento de un lado del cráneo, o la cima de la cabeza. Costra de leche. Cráneo doloroso. Escamas blancas. El cabello cae por puñados; caspa; blanca, seca.

OJOS:

Dolor exterior a lo largo de las cejas. Resequedad de los ojos; se sienten muy grandes. Neuralgía ciliar; después de una operación sobre los ojos; removimiento de un globo. Disposición a parpadear; espasmos de los párpados. Sensación de frialdad, con dolor en los globos.

OIDOS:

Se sienten muy abiertos; como si el tímpano estuviese expuesto al aire fresco y éste soplara dentro del oído. Sordera, después de supresión de una erupción capilar. Deseo de introducir los dedos dentro. Engrosamiento del tímpano.

NARIZ:

Temblores visibles en la raíz de la nariz. Estornudos frecuentes con dolor de excoiación en el pecho. Adenoides post-nasales.

CARA:

Dolor neurálgico que viene y se va rápidamente, y deja la parte entumida < por comer > cerca de una estufa caliente. Erupciones alderredor de la boca, con coriza. Grietas en las comisuras labiales. Temblores de los músculos (derecho).

BOCA:

Ardor en la lengua que se extiende al estómago. El aliento huele a queso podrido. Raíz de los dientes cariada. Dolor de dientes hasta las sienas > con la boca abierta, y por aspirar el aire. Los dientes se sienten crecidos y romos. Boca seca, rojo oscuro. Mitad de la lengua agrietada. La boca se hace agua. Lengua cubierta de un lado solamente. Ránula < hablando y masticando, lanza un líquido acuoso.

GARGANTA:

Obscura, roja, ardorosa, inflamada < invierno. Náusea que se siente en la garganta, > comiendo.

ESTOMAGO:

Deseo constante de comer. Gusto amargo, ácido; la cerveza sabe amarga, y es vomitada. Deseo de jamón, grasa, café y vino. Dolor gástrico; ardiente, corrosivo > leche y por comer. Úlcera gástrica. Vómito de una sustancia color chocolate; con náusea. Aflujo de agua. Gastritis crónica. Úlcera; induración del estómago.

ABDOMEN:

Constipación después de parto. Prolapso del recto; y constricción del ano, alrededor del prolapso, que dificulta el reacomodo. Diarrea; las evacuaciones contienen partículas centelleantes. Evacuaciones; duras, grandes, como si fuesen a partir el ano. Contracción del diafragma. Hinchazón de glándulas con abdomen grande en niños.

URINARIO:

Hematuria; caliente, precedida de calambres en la vejiga: Pocas gotas de sangre pasan después de la micción. Película roja en la orina.

HOMBRES:

Inflamación indolora del pene y escroto. Testículos crecidos. Gonorrea, con hematuria. Glande con comezón.

MUJERES:

Leucorrea tenaz, albuminosa, serosa, corrosiva. Ulceración obstinada de la vagina y el cérvix. Reglas; escasas, frecuentes, profusas, de larga duración; con dolor en la cara.

RESPIRATORIO:

Tos seca, cosquilleante; hasta vomitar < con cosas calientes. El pecho se siente muy ceñido al agacharse. Ronquido en los niños.

ESPALDA:

Cóccix doloroso, después de una caída.

EXTREMIDADES:

Dolor y comezón en las corvas. Dolor y ardor en la tibia y los huesos largos. Una mano caliente. Las piernas se sienten frías; y como acortadas. Parálisis de los flexores de los dedos, no puede sostener nada.

PIEL:

Comezón intolerable; < por un baño caliente; cambia de lugar al rascarse; frialdad después. Prurito senil. Erupciones; rezumantes, acres, húmedas y pegajosas; forman costras gruesas, con pus debajo; o blancas como gis. Úlceras profundas, duras, dolorosas < al contacto y por el calor.

FIEBRE:

Frío de partes aisladas, como si fuesen rociadas con agua fría.

COMPLEMENTARIOS:

Merc.

RELACIONES:

Ars; Guai; Kali-io; Merc.

MILLEFOLIUM

GENERALIDADES:

Este remedio afecta los Capilares de los Pulmones; nariz y útero. Causa una inflamación magullante; congestiones y es un remedio muy valioso para hemorragias profusas, indoloras, rojo brillante, fluidas; sangramientos nasales, hemoptisis, rezumamiento de sangre por las orillas de heridas cerradas, por un sobre esfuerzo, etc. Descargas profusas de moco. Espasmos o convulsiones especialmente después de la supresión de hemorragias - reglas, loquios, leche, etc. Malos efectos por operaciones de piedras, biliares, renales, etc., caídas desde alturas, torceduras. Venas varicosas durante el embarazo. Estocadas de dolor perforante.

AGRAVACION:

Lesiones. Esfuerzo violento. Agachándose. Café.

MEJORIA:

Sangrados. Descargas. Vino.

MENTE:

Parece haber olvidado algo; no sabe qué está haciendo, o quiere hacer. Niños llorones. Tristeza. Aversión al trabajo.

CABEZA:

Dolores perforantes como estocadas, se golpea la cabeza contra la pared; cefalalgias < agachándose.

OJOS:

Punzadas hacia adentro, presión en la raíz de la nariz. Visión nebulosa, con contorsión de músculos faciales.

OIDOS:

Sensación de aire fresco que pasara a través de los oídos.

NARIZ:

Sangramiento, con congestión a la cabeza y el pecho.

ESTOMAGO:

Hematemesis. Calambres en el estómago, con sensación como si un líquido flotara desde los intestinos al ano.

ABDOMEN:

Cólico ventoso. Hemorragias desde los intestinos después de mucho esfuerzo. Disentería sanguinolenta.

URINARIO:

Orina sanguinolenta. Piedra en la vejiga con retención de orina. Descarga como pus después de litotomía.

HOMBRES:

La descarga seminal falla en el coito. Heridas y lesiones del pene.

MUJERES:

Hemorragia uterina, rojo brillante y fluída. Várices dolorosas durante el embarazo. Util en el sangrado prolongado de un parto difícil. Curativo de una hemorragia post-parto. Esterilidad por reglas profusas.

RESPIRATORIO:

Opresión del pecho, con expectoración sanguinolenta o palpitación. Tos con esputo sanguinolento, en reglas suprimidas, o hemorroides.

CORAZON:

Palpitación, con esputo sanguinolento.

FIEBRE:

Fiebre alta continua.

RELACIONES:

Am; Led.

MOSCHUS

GENERALIDADES:

El almizcle es un perfume bien conocido, que produce un desvanecimiento en algunos por sólo olerlo; de allí que sea su principal indicación cuando hay un desvanecimiento fácil en cualquier condición de enfermedad. Es adecuado para personas de naturaleza sensible, mujeres y hombres histéricos. Efectos espasmódicos, nerviosos con sensación de frialdad. Se desmaya fácilmente; mientras come; durante las reglas; por enfermedad cardíaca, etc. Temblores; atragantamiento; globo histérico, que termina en inconsciencia. Como con un viento fresco que soplara sobre la parte. Tensión en los músculos, piel, mente. Nerviosos; sacudidas, risas, hipo, etc. Sensaciones como de zumbidos, apretones, tapones. Reacción pobre; enfermedades que no siguen su curso normal. Quejas sin saber qué le molesta. Epilepsia, con temblores como rigor o escalofrío. Catalepsia. Enfermedades imaginarias. Niñas que son egoístas, obstinadas, voluntariosas y muy mimadas; recurren a toda clase de artimañas para lograr lo

que quieren. Frialdad; general o de partes aisladas. Las partes sobre las que se apoya, se sienten dislocadas o torcidas.

AGRAVACION:

Frío. Excitación. Supresiones; reglas, etc. Sobre el lado en que se apoya. Durante o después de un alimento. Presión. Movimiento.

MEJORIA:

Al aire libre. Frotando. El olor del almizcle.

MENTE:

Apresurada; temblorosa y desmañada; actividad bullente, con debilidad; de modo que todo se le cae de las manos. Ira violenta; habla con excitación, grita, regaña, hasta que la boca se vuelve seca, los labios azules, los ojos fijos y cae inconsciente. Teme el ruido, moribundo; teme acostarse, no sea que vaya a morir. Sufrimientos imaginarios. Risa incontrolable. Hipocondria sexual. Siente como si fuese volteado rápidamente. Se habla a sí mismo y gesticula. Pérdida súbita de la memoria.

CABEZA:

Vértigo con desvanecimiento; como si cayera de una altura; < agachándose > levantándose. Cefalalgia con frialdad, desmayos, evacuaciones involuntarias, y poliuria. Escalofríos en el cráneo.

OJOS:

Volteados hacia arriba, fijos y brillantes.

OIDOS:

Sonidos como el estruendo de un cañón. Sonido de agolpamiento, efímero. Sordera nerviosa.

NARIZ:

Sangrante, con sacudidas espasmódicas de los músculos.

CARA:

Una mejilla roja pero fría, la otra pálida y caliente. Labios azules. Movimiento de masticación de la mandíbula inferior.

ESTOMAGO:

Deseo de café negro, cerveza o brandy. Todo es insaboro. Eructos violentos. Hipo nervioso y espasmódico. Aversión a la comida. Se desmaya mientras come. Náusea al ver o pensar en alimentos.

ABDOMEN:

Tensión en el abdomen como si las ropas estuviesen muy ceñidas. Retención de flatos. Evacuaciones de olor dulzón. Las evacuaciones pasan involuntariamente durante el sueño.

URINARIO:

Orina líquida y copiosa. Diabetes. Orina normal durante el día, pero roja oscura, ofensiva por la noche.

HOMBRES:

Deseo sexual aumentado; con cosquilleo insoportable en las partes, y dolor tensivo en el pene. Impotencia por diabetes. Náusea y vómito después del coito. Emisiones sin erección. Erección con deseo de orinar.

MUJERES:

Deseo sexual aumentado, con titilación intolerable en las partes (en mujeres viejas). Dismenorrea, con desvanecimiento.

RESPIRATORIO:

Sofocación súbita y nerviosa; quiere respirar con profundidad; < por enfriarse; > vomitando. Pecho oprimido; espasmos histéricos del pecho. La tos cesa; y el moco no puede ser expectorado. Tos, con dolor bajo el pecho izquierdo. Asma.

CORAZON:

Palpitación ansiosa; con temor a morir, dice “moriré”. Histérica. Temblor alderredor del corazón.

CUELLO Y ESPALDA:

Tensión en la espalda, antes de las reglas.

EXTREMIDADES:

Una mano caliente y pálida, la otra fría y roja. Piernas; tensas, se sienten demasiado cortas. Frialdad en la tibia. Inquietud; dolorosa.

SUEÑO:

Somnoliento en el día; insomne por la noche, se despierta con frecuencia.

FIEBRE:

Sensible al aire frío; que lo hace temblar. Piel fría. Calor ardiente con inquietud. Sudor que huele a almizcle.

RELACIONES:

Carb-v; Castor; Ign; Nux-m; Val.

MUREX

GENERALIDADES:

Como Sepia, el jugo del pez púrpura afecta los Organos Sexuales Femeninos preferentemente. Se adapta a mujeres sensibles, nerviosas, vivaces, apasionadas, que están cansadas, débiles y deterioradas; deben acostarse, lo que las <. Los dolores son diagonales, ovario a pecho opuesto. Padecimientos del climaterio.

AGRAVACION:

Contacto. En el sol. Sentándose. Acostadas. Después de dormir.

MEJORIA:

Antes de las reglas. Por comer. Presión y apoyo. Echando la cabeza hacia atrás.

MENTE:

Gran depresión de espíritu, un tipo de estado hipocondríaco profundo. Ansiosa; aprehensiva; > leucorrea. Memoria débil, no puede encontrar la palabra correcta al tratar de expresarse.

CABEZA:

Apretón en la parte posterior de la cabeza > poniendo la mano allí, o echando la cabeza hacia atrás.

NARIZ:

Frialdad incómoda de la nariz todo el día.

ESTOMAGO:

Hambre violenta aún después de comer. Hundimiento - sensación de vacío.

ABDOMEN:

Cansancio doloroso de los lomos. Peso en el hipogastrio.

URINARIO:

Necesidad frecuente de orinar. La orina huele a valeriana. Descarga ligera de sangre mientras se orina.

MUJERES:

Punzadas dolorosas en los genitales; van hacia arriba, al abdómen; y luego hasta los senos. Utero inflamado y doloroso; conciencia del vientre. Sensación como si algo presionara en un punto doloroso en la pelvis > sentándose. Deseo sexual violento y nervioso; ninfomanía; por el contacto más leve con las partes. Dolores de pesantez del bajo vientre; debe mantener las piernas fuertemente cruzadas. Reglas copiosas con coágulos grandes. Leucorrea; espesa; amarilla; sanguinolenta; que alterna con síntomas mentales. Dolor en las mamas durante las reglas. Dificultad para caminar, todas las coyunturas están débiles durante el embarazo. Prolapso y crecimiento del útero. Descarga de sangre a través de la vagina o leucorrea sanguinolenta, durante las evacuaciones. Como si los huesos de la pelvis estuviesen flojos.

ESPALDA:

Dolor lumbar que obligan a caminar, lo cual >.

PIEL:

Seca, como si estuviese pronta a agrietarse. Urticaria.

RELACIONES:

Lil-t, Plat; Sep.

MURIATIC ACID

GENERALIDADES:

El ácido clorhídrico tiene una afinidad electiva por la Sangre, produciendo condiciones sépticas similares a las que se encuentran en las fiebres bajas, con altas temperaturas y gran postración. Los Músculos están afectados, especialmente el Corazón; de la vejiga, ano, lengua, etc. causando paresia. Las Membranas Mucosas; de la boca, y el tracto digestivo; están secas, sangrantes, agrietadas y profundamente ulceradas. Dolencia del cuerpo causando Inquietud; frecuentemente cambia de posición, pero pronto se vuelve lánguido y muy debilitado; quiere acostarse; se resbala de la cama; los ojos se cierran; la mandíbula inferior se cae. Azulosidad; de la lengua, hemorroides, úlceras. Ardores. Dolores lacerantes. Hemorragias violentas. Estados escorbúticos. Pulsaciones en partes aisladas. Las partes están secas, profundamente ulceradas, sangrantes o agrietadas. Membranas mucosas sangrantes. Agotamiento muscular. Inflammaciones hidrópicas.

AGRAVACION:

Contacto. Clima húmedo. Por caminar. Frío, bebidas, baños. Sentándose. Con la voz humana. Sol.

MEJORIA:

Movimiento. Calor. Acostándose sobre el lado izquierdo.

MENTE:

Introvertido. Triste y taciturno. Sufre en silencio. Irritable. Murmurante. Gemido persistente y alto.

CABEZA:

Vértigo < moviendo los ojos, ligeramente; acostándose sobre el lado derecho, o sobre la espalda. Dolores occipitales, llevan a la pesadez; < mirando intensamente un objeto. El cerebro se siente magullado; con cefalalgia, el sonido de la voz es intolerable. Dolor periódico sobre el ojo izquierdo; con adormecimiento bajo el brazo derecho y afasia. Cabello como si estuviese parado en la cabeza.

OJOS:

Hemiopía vertical. Ojo cerrado al sentarse; por agotamiento.

OIDOS:

Sordera. La voz distante (hablando) causa cefalalgia. Dolor cortante desde el mastoides hasta la nuca. Cosquilleo, hormigueo, dolor frío que corre hacia el vértice.

NARIZ:

Sangra; muchos estornudos.

CARA:

Obscura o cara roja y brillante; con manos frías; pero sin sed. Labios inflamados, agrietados y costrosos. Mandíbula inferior caída. Pecas debido a exposición al sol.

BOCA:

Seca. Lengua; azulosa, pesada, rígida; impide el habla, de aspecto marchito y quemado. Aftas. Dientes < ácidos y dulces. Fuliginosidades sobre los dientes. Encías hinchadas, sangrantes, ulceradas. Bultos duros en la lengua. Labios; ardidos, pesados, abotagados. Todo sabe dulce. La cerveza sabe a miel. Cáncer de la lengua.

GARGANTA:

Seca; con ardor en el pecho. El tratar de deglutir produce espasmos y atragantamiento. Deglución involuntaria.

ESTOMAGO:

Aversión a la carne. Aclorhidria. El estómago no tolera ni digiere el alimento.

ABDOMEN:

Plenitud y distensión en abdómen por pequeñas cantidades de alimento. Una sensación de vacío en el estómago también en el abdómen despues de evacuar; y por la a.m. Heces involuntarias o prolapso del recto; al orinar o pasando flatos. Hemorroides muy sensibles; > calor; < durante el embarazo; protuberantes como un racimo de uvas. Ano sensible durante las reglas. Hígado crecido, doloroso. Ascitis, por cirrosis de hígado.

URINARIO:

Atonía de la vejiga; debe esperar largo tiempo antes de que la Orina pase; o tiene que presionar tan fuerte que el ano se prolapsa. No puede orinar sin evacuar. orina; roja, violeta, lechosa, copiosa, día y noche; escapa por pasar un aire.

MUJERES:

Leucorrea, con dolor de espalda. Picoteo en la vagina. Genitales muy sensibles, no puede soportar el más ligero toque.

CORAZON:

Grande, pleno y con pulso suave. El pulso se cae cada 3er. latido. Pulso débil, rápido y pequeño. Palpitación que se siente en la cara.

EXTREMIDADES:

Dedos rojos, hinchados y ardorosos, así como dedos de los pies. Muslos débiles. Trastabillea al caminar, por debilidad de las caderas y las rodillas. Eczema del dorso de las manos. Calambres en la yema del dedo pulgar (derecho) al escribir, se va cuando lo mueve. Dolor en el tendón de Aquiles. Antebrazos pesados.

PIEL:

Ulceras que laten al caminar. Fiebre escarlata, lívida con petequia.

FIEBRES:

Frío en cama, temprano por la mañana. Calor intenso y ardiente; con aversión a cubrirse. Fiebres adinámicas; tifoideas; sépticas, etc.

RELACIONES:

Bap; Bry.

MYGALE LASIODORA

GENERALIDADES:

El principal uso clínico del veneno de esta araña es en la corea, especialmente de las partes superiores. Sacudidas y contracción de los músculos faciales y cabeza; que es torcida hacia el lado derecho. La boca y los ojos se abren en rápida sucesión. Las palabras salen de tirón en el esfuerzo por hablar. Náusea, con palpitación y disminución de la vista. Erecciones violentas. Paso inestable; los miembros se arrastran al caminar. Movimientos convulsivos incontrolables de brazos y piernas. Movimiento constante de todo el cuerpo. Líneas de rojo intenso a lo largo de los linfáticos.

AGRAVACION:

Comiendo. Por sentarse. Por la mañana.

MEJORIA:

Durante el sueño.

RELACIONES:

Agar; Tarn.

MYRICA CERIFERA

GENERALIDADES:

Tiene una acción marcada sobre el hígado; y corazón. Las descargas mucosas son ofensivas, tenaces y difíciles de despegar. Afecciones combinadas de hígado y corazón.

AGRAVACION:

Calor de la cama. Después de dormir. Mañana. Movimiento.

MEJORIA:

Al aire libre. Por comer, desayuno.

MENTE:

Abatido, desalentado. Irritable.

CABEZA:

Adolorimiento y pesadez sorda en la frente y sienas al caminar por la mañana.

OJOS:

Esclerótica amarilla. Párpados muy rojos.

CARA:

Amarilla; icterica.

BOCA:

Seca; el agua mejora sólo parcialmente. Lengua; gruesa, amarillenta, oscura. Moco tenaz, espeso, nauseoso en la boca y la garganta. Gusto amargo. Aliento ofensivo.

ESTOMAGO:

Imagina que no puede comer; tal es la fetidez del gusto. Pérdida del apetito; aborrecimiento de la comida. Deseo de cosas ácidas. Hundimiento en el epigastrio < comiendo, > por una caminata rápida.

ABDOMEN:

Dolor sordo en el hígado; con dolor bajo cualquier escápula. Afecciones del hígado; con indisposiciones del corazón; con urticaria; con ictericia. Ictericia; de infantes; de cáncer del hígado; con piel bronce-amarilla. Plenitud y ardor en la vesícula biliar. Moco adhesivo en las evacuaciones. Pasan flatos continuamente mientras camina. Necesidad de evacuar pero pasa sólo una gran cantidad de flatos. Heces; fétidas, pastosas, de color gris.

URINARIO:

Orina color cerveza, con espuma amarillenta.

MUJERES:

Leucorrea; acre, fétida, espesa, amarilla, de larga duración.

CORAZON:

Pulso; lento, débil, irregular.

ESPALDA:

Dolor bajo las escápulas con malestar en el hígado.

PIEL:

Comezón por ictericia.

SUEÑO:

Amodorramiento. Sueños espantosos.

COMPLEMENTARIO:

Dig; Kali-bi.

RELACIONES:

Chel.

NAJA

GENERALIDADES:

La acción del veneno de la cobra se establece alderredor del Corazón; hipertrofia y enfermedad valvular. Afecta la médula y el cerebelo; respiración, garganta, ovario. Síntomas del lado izquierdo. Nervioso, excitado, y tembloroso, con afección cardíaca; con frecuencia de reflejo. Sensación de intoxicación; pérdida de la fuerza sobre los miembros; sobre los esfínteres; incapaz de hablar. Accesos de desmayos. Sensación de consumirse. Las partes parecen estar pegadas juntas. Constricciones; en el pecho; garganta, etc. Ardores como de hierros calientes. Muchos dolores. Sensación de atornillamiento. Colapso. Sepsis. Malos efectos de una pena. Lado derecho insensible. Afecciones del corazón con pocos síntomas.

AGRAVACION:

Acostándose sobre el lado izquierdo. Después de dormir. Después de las reglas. Aire frío; corrientes. Presión de la ropa. Alcohol. Contacto.

MEJORIA:

Caminando o paseando en carruajes abiertos. Estornudando. Por fumar.

MENTE:

Medita constantemente sobre problemas imaginarios; y se hace miserable a sí mismo. Suicidio; medita sobre; insanía. Deprimido, con inquietud en sus órganos sexuales; > por la noche. Aversión a hablar. Teme ser dejado sólo. Temor de la lluvia. Como si todo estuviese hecho equivocadamente y no pudiera ser rectificado.

CABEZA:

Dolor en la sien izquierda y región orbital izquierda, extendiéndose hacia el occipucio con náusea y vómito, > fumando. Toda la cabeza se siente hueca. Como con un golpe en el occipucio. Vértice sensible al frío. Cefalalgias después de la terminación de las reglas. Dolor en la frente y las sienes, con síntomas de corazón.

OJOS:

Mirada fija. Ptosis de ambos párpados. Dolor caliente en la parte posterior de los globos.

OIDOS:

Ruido en los oídos, con gusto nauseoso en la boca. Descarga negra, oliendo a salmuera de arenque.

NARIZ:

Escurremientos de agua por la nariz; luego estornudos intensos que > la respiración. Asma de heno.

BOCA:

Abierta completamente; con escurrimiento de saliva. Lengua fría. Pérdida del habla.

GARGANTA:

Como con un tapón en la garganta. Atragantamiento sofocante, se agarra la garganta. Estrictura del esófago, deglución difícil o imposible.

ESTOMAGO:

Deseo de estimulantes que <. Eructos con sabor a agua de cebada; o calientes, fétidos.

MUJERES:

Dolor desde el ovario izquierdo hasta el corazón, < una semana antes de las reglas. Dolor obscuro en la ingle izquierda; post-operatorio.

RESPIRATORIO:

Respiración de resoplido. Asma cardíaca; o tos. Sensación de resequedad o vacío en el pulmón izquierdo. Las costillas se sienten rotas. Peso opresivo en el pecho; como un hierro caliente. Asma precedida de coriza < acostándose; > sentándose.

CORAZON:

Debilidad en. Dolor violento, que se dispara hacia la escápula izquierda, hombro o cuello; mantiene su mano sobre él, < después de pasear en carruaje. Palpitación visible; hipertrofia. Endo-cardítis, séptica. Corazón dañado después de enfermedades infecciosas. Pulso lento, (hacia 45) irregular, débil, tembloroso; cambia su fuerza. Palpitación crónica nerviosa; < después de predicar. Sofoco. Tensión baja.

EXTREMIDADES:

Calambres en los hombros, nuca o caderas. Brazo izquierdo entumido. Estirones violentos en la médula de las caderas Manos y pies hinchados o sudorosos; con tos. Dolor agudo bajo la uña del pulgar izquierdo que corre hacia arriba del brazo. Pérdida de fuerza.

PIEL:

Prurito, cicatrices.

SUEÑO:

Profundo, comatoso; con respiración estertorosa.

FIEBRE:

Sudor en la parte lumbar y tobillos.

RELACIONES:

Cimi; Lach; Laur; Spig.

NAPHTHALINE

GENERALIDADES:

Un producto del alquitrán de carbón que tiene una afinidad especial con los ojos. Produce desprendimiento de retina, depósitos y exudación en la retina. Opacidad de la córnea; catarata; ambliopía.

NATRUM ARSENICUM

GENERALIDADES:

Nat-ars. es un remedio valioso para el asma de los mineros; por el polvo del carbón. Tos agobiante con expectoración profusa y verdosa. Opresión del pecho y alrededor del corazón. Los pulmones se sienten como si se hubiese inhalado humo. Se siente cansado. Como si la glándula tiroides estuviese oprimida por el pulgar.

NATRUM CARBONICUM

GENERALIDADES:

El carbonato de sodio afecta la digestión y los nervios. El paciente es hipersensible al aire libre; a la música, al ruido, a los errores en la dieta. Gran debilidad; por cualquier esfuerzo; por el calor del verano. Hinchazón. Relajamiento; dislocación fácil. Los dolores causan temblores, sudor frío, ansiedad, etc. Sacudidas en los músculos y miembros. Contracción de los músculos, tendones. Emaciación. Anemia. Malos efectos de una insolación (crónica); exceso de estudio; torceduras. Niños que no toleran la leche pero que prosperan con cereales. Niños que estando despiertos, saltan, lloran, se agarran de la madre, se sobresaltan, niños nerviosos. Hinchazones e induraciones de glándulas.

AGRAVACION:

Calor - del sol; clima (cuerpo). 5 a.m. Música. Esfuerzo mental o corporal. Onanismo. Leche. Errores en la dieta. Corrientes. Tormentas con truenos. Días alternos. Luna llena. Dieta vegetariana; alimentos farináceos. Bebidas frías estando acalorado.

MEJORIA:

Por comer. Frotándose. Movimiento. Presión. Frotando con la mano. Rascando la nariz u oídos con los dedos. Sudando.

MENTE:

Travieso e irritable. Aversión a la sociedad; aún a los de su propia familia; su esposo. Pesimista. Animado; locuaz. Ansioso y temeroso < tormentas con truenos; no por timidez, sino por los cambios eléctricos en la atmósfera. El tocar el piano causa ansiedad y temblor. Sensible a la presencia de ciertas personas. Comprensión difícil y lenta. La música causa una tendencia al suicidio; tristeza; insanía religiosa. Ocupado con pensamientos tristes. Indiferente.

CABEZA:

Vértigo por vino; esfuerzo mental; por exposición al sol. Cafalalgia; en clima caliente; por el más ligero esfuerzo mental. Por trabajar bajo la luz de gas. Los dolores de cabeza que parecen salir por los ojos; cabeza doblada hacia atrás. La siente muy grande. Caída del cabello.

OJOS:

Destellos deslumbrantes o estrellas delante de los ojos; al despertar. Disminución de la vista, tiene que restregarlos con frecuencia. No puede leer impresiones pequeñas.

OIDOS:

Sordera; con dolor de oído recurrente; con amenorrea. Como si una burbuja estallara dentro. Como algo que se moviera en los oídos al deglutir.

NARIZ:

Hinchada o despellejada. Nariz roja con ampollas blancas. Catarro, fétido, espeso, o descarga amarilla o verde. Coriza < por la mínima corriente, en días alternos. Obstrucción por la noche. Estornudos violentos. Descarga post-nasal.

CARA:

Pálida, marchita, abotagada. Pecas; manchas amarillas; espinillas. Labios hinchados.

BOCA:

Seca. Gusto amargo en la boca; el alimento sabe amargo. Vesículas y úlceras suaves en la boca con ardor; boca abierta. Dolor de muelas < carnes dulces y frutas. Gusto pervertido; demasiado sensible. Afecciones de la capa interna de la lengua. Lengua pesada, abultada, el paciente tiene dificultad para hablar.

GARGANTA:

Carraspea mucho moco de la garganta. Debe beber para tragar sólidos, por aspereza y resequedad del esófago y garganta. Garganta dolorosa al bostezar y tragar.

ESTOMAGO:

Digestión débil, < por los más leves errores en la dieta. Acidez. Aversión a la leche; la cual causa diarrea. Dispepsia ácida con regurgitación y reumatismo, > por galletas de soda. Glotón, siempre anda pellizcando. Dolores gástricos > comiendo. Hambre a las 5 a.m. Siempre anda eructando. Malos efectos de beber agua fría estando acalorado. Aflujo de agua a la boca. Agruras después de grasas.

ABDOMEN:

Los flatos cambian de lugar, el abdomen se abulta aquí y allá. Epigastrio doloroso al tacto y cuando habla. Diarrea por almidones, leche. Heces; como pulpa de naranja; en mujeres al cambio de vida. Necesidad súbita de defecar, sin resultado o las heces se escapan con prisa y ruido. Heces; negras, duras, suaves, desmenuzadas. Cólico con retracción del ombligo y dureza de la piel.

ORINA:

Orina de color amarillo brillante u oscuro. La orina huele como la orina del caballo, por dieta de vegetales o leche. Ardor en la uretra durante y después de la micción.

HOMBRES:

Deseo sexual aumentado con priapismo y poluciones dolorosas. Coito incompleto. El glande fácilmente se inflama. Emisiones nocturnas. Sudores después del coito. Descarga de fluido prostático al evacuar y mientras orina; afecciones prostáticas.

MUJERES:

Induración del cérvix. Esterilidad por falta de retención del semen. Descarga leucorréica; ofensiva, irritante, espesa, amarilla, filamentosa, precedida de cólico. Reglas tardías y escasa, como sanguaza. Movimiento como de feto en el útero. Facilita la concepción.

RESPIRATORIO:

Tos; seca, cosquilleante < al entrar a una habitación caliente; de 9 a 11 a.m. Hueca, floja, con esputo salado, purulento, verdoso. Tos, con frialdad del lado izquierdo del pecho.

CORAZON:

Palpitación; por ruido, arrugamiento de un papel, etc; al ir escaleras arriba; cuando la atención se dirige a algo; cuando se está acostado sobre el lado izquierdo.

CUELLO Y ESPALDA:

Crujidos en las vértebras cervicales, al mover el cuello. Dolor taladrante en la punta de la escápula izquierda. Frío entre las escápulas. Bocio; duro, con dolor presivo. Cosquilleo en la espalda.

EXTREMIDADES:

Pesadez de las piernas y los pies, con tensión en ellos, al sentarse o caminar. Tobillos débiles. Paso incierto. Dislocación o torcedura de los tobillos. Un pequeño estorbo en el pavimento causa su caída o cae sin causa aparente. Muñecas y tobillos ardorosos. Ataxia locomotriz, dolores fulgurantes > por comer. Plantas sensibles; como con agujas; arden al caminar. Sacudida de las manos, al empezar a dormir. Calambres desde los tobillos hasta los dedos. Contracción de los dedos. Región poplítea dolorosa al caminar. Dobleces de los dedos de manos y pies excoriados.

PIEL:

Seca, áspera; lechosa, acuosa. Ampollas en las coyunturas pequeñas; puntas de los dedos de los pies o manos. Erupciones pustulosas. Suda fácilmente. Hormiguelo.

SUEÑO:

Amodorrado; durante el día; después de los alimentos. Se despierta demasiado temprano por la mañana. Sueños amorosos. Duerme con la boca abierta.

FIEBRE:

Sudoración fácil.

COMPLEMENTARIO:

Sep.

RELACIONES:

Lyc; Nat-m.

NATRUM MURIATICUM

GENERALIDADES:

La sal común, afecta profundamente la nutrición. Su consumo excesivo produce síntomas de retención de sal, como las hidropesías y edema; pero también afecta la sangre causando anemia y leucocitosis. Mente, corazón, hígado y bazo caen bajo su influencia. El paciente es delgado, sediento, nutrido pobremente debido a sus perturbaciones digestivas y su Comportamiento mental y síntomas físicos son de desesperanza o de naturaleza torpe. Emaciación; descendiente, de cuello o abdomen. Las membranas mucosas y piel pueden estar secas, o pueden producir descargas espesas, blancas o líquidas, claras y acres. Resequedad de la boca, garganta, recto, vagina, etc. Entumecimiento de un lado; sobre las partes en que se está apoyado; con parálisis; dedos, las partes parecen muy cortas. Fatiga fácil. Contracción de músculos, tendones. Dolores neurálgicos con lágrimas. Temblores. Postración. Debilidad histérica. Emaciación aunque se viva bien. Gran debilidad y cansancio. Tendencia a resfriarse. Frialdad. Los niños hablan tardíamente; son traviesos, irritables, lloran por las causas más nimias. Caquexia; malárica. Hipersensibilidad a toda clase de influencias. Bocio; hipertiroidismo. Enfermedad de Addison. Diabetes. Sacudida de músculos. Sobresaltos frecuentes de la parte superior del cuerpo. Corea; saltante; después de un susto. Malos efectos de desengaños; susto; pena; accesos de pasión; pérdida de fluidos, masturbación; lesiones en la cabeza; sales de plata; sal. Las jovencitas se sienten abandonadas y se enamoran de hombres casados. Parálisis; por emociones, excesos sexuales. Le gusta ser cubierta, pero eso no la >. Temblores de todo el cuerpo por fumar tabaco.

AGRAVACION:

Periodicidad exacta. de 9 a 11 a.m.; con el sol. Días alternos. Después de las reglas. Calor; del sol; verano; humedad. Esfuerzos - de los ojos, mentales, por hablar, leer, escribir. Emociones violentas. Consuelo. Pubertad. Quinina. Pan, grasa, comida ácida. Coito. A la orilla del mar. Torceduras crónicas. Ruido; música. Contacto. Presión. Luna llena.

MEJORIA:

Al aire libre. Baño fresco. Por sudar. Descanso. Por comer a deshoras. Ropa ceñida. Respiración profunda. Antes del desayuno. Por frotarse. Acostado sobre el lado derecho. Por hablar mucho.

MENTE:

Odioso; con las personas que lo han ofendido. Detesta el consuelo o que le hagan alharaca. Triste; durante las reglas; sin causa. Reservado. Se enoja fácilmente < si es consolado. La compañía lo incomoda. Hipocondríaco. Lloro amargamente; o quiere estar solo para llorar. Lloro involuntariamente, sin causa, o no puede llorar. Alegre, se ríe, canta, baila, alterna con la tristeza. Aflicción ruidosa. Medita sobre recuerdos pasados desagradables. Ansiedad. Aprensión. Temor o sueño de ladrones. Torpe; para hablar; apresurado; tira las cosas por debilidad nerviosa. Mente ausente. Pensamientos dispersos. Vengativo. Piensa que se le tiene lástima por su infortunio y llora. Risa inmoderada con lágrimas. Abrupto. Se pega de una idea y eso le impide dormir, le inspira venganza. Condiciones mentales alternantes. Extremadamente olvidadizo. Aversión a los hombres (mujeres).

CABEZA:

Vértigo; como si se cayera; < estando de pie junto a una ventana, o al cerrar los ojos; > acostándose, con la cabeza alta. Cefalalgia; estallante; al toser; enloquecedora; martillante; pesada; sobre los ojos; en el vértice; con adormecimiento parcial o visión perturbada; < al despertar; desde la salida del sol hasta su puesta; durante, antes o después de las reglas; movimiento; aún de los ojos; con fruncimiento del entrecejo, leyendo; > por dormir; presión en los ojos, acostándose con la cabeza alta, sentándose quieto. Movimientos de inclinación de la cabeza. Cefalalgias de niños escolares. Migraña. Caída del cabello. Parte lesionada sensible al tacto.

OJOS:

Dolorosos, al mirar hacia abajo. Las letras se corren juntas mientras se leen. Estrictura del ducto lagrimal, escape de mucosidad al presionar el saco. Lagrimeo; con enrojecimiento; ardor; acre; del lado afectado; por estornudar; toser; reírse, etc. Los ojos se sienten como jalados juntos. Arden y dan comezón, debe frotarlos. Ptosis al estar acostado. Visión empañada, oscilante. Hemiofía, luego cefalalgia. Los párpados se cierran con el dolor de cabeza; espasmódicamente. No puede leer con luz artificial. Destellos, puntos negros, zigzag brillantes ante los ojos. Catarata incipiente. Ojos saltados; debido al bocio. Las imágenes retinianas duran largo tiempo. Los ojos se cansan al leer o escribir.

OIDOS:

Ruidos, zumbidos, murmullos, retínes. Crujidos dolorosos, en los oídos al masticar. Comezón detrás de los oídos.

NARIZ:

Coriza fluída violenta; dura de uno a tres días, luego se obstruye la nariz en lo alto, haciendo la respiración difícil. Estornudos temprano por la mañana. Se alterna coriza fluída y seca; el resfrío se inicia con estornudos; escurrimiento de líquido. Pequeñas úlceras en la nariz. Un lado entumido. Pérdida del gusto y olfato. La nariz sangra; al agacharse o al toser, por la noche.

CARA:

Pálida, oscura, o brillante como engrasada. Herpes; alderredor de los labios, o en el margen del cabello; nacarado. Grieta en la mitad del labio inferior. Los labios cosquillean, se duermen. Latido en la mandíbula inferior < mordiendo; calor y frío. Hay abatimiento en la cara en la histeria, pero pasa tan pronto como el paciente mejora. Labio superior hinchado. Prosopalgia. Caída de bigotes y barba.

BOCA:

Lengua mapeada; burbujas de saliva o franjas a lo largo de las orillas. Aftas. Pérdida del gusto y olfato. Entumecimiento y rigidez de un lado de la lengua. Cosquilleo de la lengua. Lengua pesada; dificultad para hablar. Los niños aprenden a hablar lentamente. Fístula dental. Epulis o pequeños tumor en las encías. Sensación de un cabello en la lengua. La lengua se siente seca, pero no está seca. Vesículas y úlceras en la boca y la lengua, se estremece y arde cuando es tocada por el alimento. Dientes sensibles al aire o al contacto; dolor < al masticar. Dolor de dientes con lágrimas o salivación.

GARGANTA:

Carraspea mucho moco, amargo, salado. La úvula cuelga hacia un lado. Un punto seco, ulcerado en la garganta, cosquillea y causa tos, etc. El alimento se vá por el lado equivocado; parálisis post-diftérica. Sólo se puede deglutir líquidos. Los sólidos alcanzan un cierto punto y luego son violentamente expulsados. La garganta brilla. Bocio exoftálmico. Garganta inflamada; con sensación de que se tiene que tragar sobre un bulto. Como con un tapón en la garganta. Garganta de los fumadores de tabaco.

ESTOMAGO:

Deseo; de sal, cosas amargas; de cosas ácidas, alimentos farináceos, ostras, pescado, leche. Sediento, bebe grandes cantidades de agua. Mucha hambre, pero emaciación; con mente deprimida. Aversión al pan, carne, café, tabaco. Hambre sin gusto. Hipo. Eructos ardorosos, después de comer. Aflujo de algo dulce desde el estómago durante las reglas. Ansiedad en el estómago que vá hacia la cabeza. Aflujo de agua. Suda mientras come; en la cara. Moco blanco y limoso que vomita sin alivio. Agruras con palpitación. Se siente mejor con el estómago vacío.

ABDOMEN:

Pulsaciones epigástricas. Epigastrio hinchado y doloroso. Distensión súbita. Abdómen tenso < ingles. Dolor en el anillo abdominal al toser. Rigidez del lado izquierdo. Cólico con náusea > flatos. Heces; secas, duras, desmenuzadas; desgarran el ano y causan ardor. Heces, cubiertas con moco brillante. Constipación en días alternos, por inactividad. Diarrea acuosa indolora; crónica; por la mañana al moverse; por abuso de opio. Constricción del recto. Herpes alderredor del ano. Vísceras abdominales flojas como cuando se camina. Manchas rojas en el epigastrio. Herpes anal.

URINARIO:

Micción involuntaria; al toser; reír; estornudar; caminar, sentarse. Poliuria, sed por grandes cantidades de agua. Tiene que esperar mucho para orinar, al estar en presencia de otros. Orina clara con sedimento rojo. Debe esperar antes de que la orina fluya. Dolor justo después de orinar.

HOMBRES:

Dolor de espalda y piernas débiles; con depresión después del coito. Polución inmediatamente después del coito. Deseo sexual, con debilidad física. Gonorrea suprimida. Debilidad, y aún parálisis, después de excesos sexuales. Pérdida de pelo púbico.

MUJERES:

Aversión al coito; que es doloroso por la resequeza de la vagina. Escozor ardiente en vagina durante el coito. Primeras reglas tardías. Dismenorrea con convulsiones. Esterilidad; con reglas demasiado tempranas, demasiado profusas. Leucorrea debilitante; espesa, blanca, en lugar de las reglas. Prolapso del útero con adolorimiento en la región lumbar o con picadura en la uretra; < en la mañana, > acostándose sobre la espalda. Caliente durante las reglas. Glándulas mamarias emaciadas. La leucorrea blanca se vuelve verde gradualmente. Pérdida del cabello en los niños o durante la lactancia. Punzadas bajo los pezones.

RESPIRATORIO:

Tos por cosquilleo en el hueco del estómago; con asma o palpitación; < invierno. Catarro respiratorio después de sudores suprimidos. Punzadas en el hígado mientras tose. Disnea al ascender. Tosferina; con lagrimación. Aliento; caliente, ofensivo. Fatiga de los brazos > respirando.

CORAZON:

Palpitación, sacudiendo el cuerpo o alternando con batimientos en la cabeza. Aleteo en el corazón, con sensación de debilidad y desfallecimiento < acostándose. Palpitación; ansiosa < esfuerzo; emoción; acostándose sobre el lado izquierdo. Pulso; lleno y lento o débil y rápido; intermitente cada tercer latido; < acostándose. Frialdad, adolorimiento en el corazón.

CUELLO Y ESPALDA:

Rigidez dolorosa del cuello. Dolor de espalda como magulladura, temprano por la a.m.; < tosiendo; después del coito; > acostándose sobre la espalda, o algo duro; o presionándola. Puede agacharse rápidamente, pero duele al enderezarse. Nalgas emaciadas en el infante.

EXTREMIDADES:

Temblor de las manos al escribir. Punta de los dedos agrietada. Padrastrós. Palmas calientes y sudorosas. Los tendones de las corvas parecen cortos, dolorosos, encogidos. Adormecimiento y cosquilleo en los dedos y extremidades inferiores. Dolores de tirón en las rodillas. Rodilla de las criadas. Crujido en las articulaciones al caminar. Tobillos débiles, se tuercen fácilmente. Piernas frías. Sacudidas convulsivas de los miembros al caer dormido. Caspa, escamas en las axilas. Se dificulta doblar las coyunturas de los dedos. Los niños no aprenden a caminar. Excoriación de los dedos gordos y entre los dedos.

PIEL:

Aceitosa, seca, áspera, malsana o amarilla. Agrietamientos de erupciones herpéticas < en los pliegues de flexión o alrededor de los nudillos. Erupciones cerca en los márgenes del cabello. Verrugas en las palmas y manos. Urticaria, blanquecina, < fatiga. Callos. Cicatrices; dolorosas. Enrojecimiento de viejas cicatrices.

SUEÑO:

Solloza durante el sueño. Se despierta sintiéndose débil. Sueños de ladrones. Sonambulismo; se levanta y se sienta en la habitación. Se sobresalta y habla en sueños.

FIEBRE:

Frialdad de muchas partes, manos, pies, corazón. Escalofrío matutino con sed. Friolento, pero < en el sol. Sudor, escaso, en el margen del cabello, en la nariz, en la cara mientras come.

COMPLEMENTARIO:

Ign; Sep.

RELACIONES:

Pul.

NATRUM PHOSPHORICUM

GENERALIDADES:

Este remedio es útil para condiciones que aparecen por exceso de ácido láctico, como resultado de demasiada azúcar. Afecta el duodeno; los ductos biliares, glándulas mesentéricas y genitales. Acidez; eructos, vómitos, estómago, evacuaciones, leucorrea; expectoración, sudores, etc. Malestares con exceso de acidez. Infantes que han sido alimentados en exceso, con leche y azúcar. Descargas amarillo profundo; cremosas. Debilidad. Sensación de pellizco. Tirantez de músculos y tendones. Ictericia (1x Trit.) Oxaluria. Lombrices. Hinchazón de glándulas linfáticas. Malos efectos de fatiga mental o vicios sexuales, o ambos. Marasmo de los niños alimentados con botella. Temblores y palpitación por tormentas con truenos. Crujido de las articulaciones. Nerviosismo; sensación de cansancio. Leucocitosis.

AGRAVACION:

Azúcar. Leche. Fatiga mental. Tormentas con truenos. Luz de gas. Coito. Caminando escalera arriba. Alimentos amargos. Comida grasosa.

MEJORIA:

Frío.

MENTE:

Debilidad mental. Miedo < por la noche; que algo pasará. Imagina que las piezas del mobiliario son personas; oye pisadas en la habitación contigua. Nervioso, olvidadizo. Triste por la música. Indiferente a todo; a su familia. Se sienta quietamente por largo tiempo. Fácilmente asustado.

CABEZA:

Siente embotamiento por la mañana. Dolor cortante en las sienas (derecha) mientras está estudiando. Presión y calor en la cima de la cabeza como si ésta se abriera.

OJOS:

Materia cremosa, amarillo-dorada, saliendo de los ojos. Esclerótica amarillo sucio. Ojos débiles < luz de gas. Bizqueo por lombrices. Una pupila dilatada.

OIDOS:

Un oído rojo, caliente, con comezón, se rasca hasta que sangra; con afecciones gástricas y acidez. Como si cayera agua en él, desde una altura.

NARIZ:

Con comezón. Olor ofensivo ante la nariz. Moco amarillo, espeso, ofensivo. El niño se rasca la nariz. Picoteo; con lagrimeo.

CARA:

Comezón alderredor de la boca. Pálida, o roja en lados alternos. Florida.

BOCA:

Ampollas en la punta de la lengua. Cubierta amarillo cremoso en la base de la lengua; en anginas, o paladar. Cubierta delgada y húmeda en la lengua. Como con un cabello en la lengua. Rechinamiento de dientes; niños. Picoteo, entumecimiento de toda la boca.

GARGANTA:

Como con un bulto; que impide el habla. Deglución difícil. Cubierta amarilla en las anginas.

ESTOMAGO:

Eructos ácidos. Vómito de masas caseosas ácidas. Deseo de cosas con sabor fuerte; huevos, pescado frito, cerveza que >. Aversión por el pan y la mantequilla.

ABDOMEN:

Mientras evacúa, sensación de una canica que cayera al colon descendente. Flatulencia ruidosa. Plenitud del abdomen < estando de pie o mientras come un poco. Catarro gastro-duodenal. Ictericia. Necesidad de evacuar y orinar después del coito (hombres). Evacuaciones cortadas. Diarrea vercosa. Comezón en el ano. Teme pasar flatos no sea que salgan las heces. Esclerosis del hígado y forma hepática de diabetes, especialmente cuando hay una sucesión de forúnculos. Oxiuros y lombrices.

URINARIO:

Necesidad de orinar y ardor y comezón en el meato después del coito. Debe esperar que la orina salga.

HOMBRES:

Semen; acuoso, delgado, huele como a orina vieja. Emisiones seguidas de espalda débil y temblor de rodillas. Comezón del escroto, prepucio.

MUJERES:

Esterilidad; con secreciones ácidas de la vagina. Leucorrea, ácida, cremosa, color miel o ácida y acuosa. Náusea matutina, con vómito ácido. Durante las reglas, los pies están helados durante el día; pero arden por la noche en la cama.

RESPIRATORIO:

Respiración difícil. Tos < sentándose. El pecho se siente vacío después de comer. Dolor en el pecho < por hacer inspiraciones profundas y por la presión.

CORAZON:

Temblor cerca del corazón < subiendo escaleras; después de las reglas. Sensación como si una burbuja saliera del corazón y fuera forzada a ir por las arterias. Los dolores del corazón > cuando duele el dedo gordo del pié. Los dolores del corazón alternan con dolores reumáticos. Palpitaciones ansiosas después de tormentas con truenos.

CUELLO Y ESPALDA:

Debilidad después del coito. Como un estorbo pesado en la espalda. Hinchazón de las glándulas del cuello que se extiende al pecho. Bocio con sensación de presión.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento en las muñecas y coyunturas de los dedos. Temblor de las piernas después del coito. Reumatismo. Pies helados durante el día, pero ardientes por la noche. Crepitación sinovial. Calambres en las manos mientras escribe. Las piernas se doblan al caminar.

PIEL:

Comezón en varias partes, especialmente en tobillos, erupciones eczematosas. Urticaria. Piel suave, roja, brillante.

SUEÑO:

Somnolencia matinal, pero insomnio antes de medianoche. Sueños; ansiosos, amorosos, de personas muertas. Muy amodorrado; se duerme mientras está sentado.

FIEBRE:

Pies helados durante el día, arden por la noche.

RELACIONES:

Cina; Kali-s; Kre.

NATRUM SALICYLICUM

GENERALIDADES:

Produce un efecto marcado sobre el oído interno; con vértigo, sordera, ruidos en los oídos, con pérdida de conducción ósea; de allí que es útil en el síndrome de Meniere. Vértigo cuando los objetos parecen moverse hacia la derecha; < al levantarse de estar acostado. Temperatura sub-normal con pulso lento. Postración después de la influenza.

NATRUM SULPHURICUM

GENERALIDADES:

El sulfato de sodio o Sal de Glauber, es un remedio para las constituciones hidrogenoides; donde los malestares se deben a vivir en casas húmedas; sótanos; áticos; el paciente no puede ni siquiera comer plantas que crezcan cerca del agua, ni pescado. Afecta especialmente el Occipucio y el Hígado, Páncreas. Efectos súbitos y violentos; en pacientes achacosos. Dolores perforantes; en las costillas cortas (izquierda); en cadera (izquierda) < levantándose o sentándose. Secreciones amarillas; acuosas, evacuaciones, piel, vesículas, etc. Pus espeso, amarillo, verde. Plenitud. Acido, bilioso y litémico. Sycosis. Dolores < por pensar en ellos. Epilepsia o Pequeño Mal, después de lesiones en la cabeza. Gonorrea suprimida. Hidropesía. Abscesos fistulosos. Problemas mentales que aparecen por una caída u otras lesiones en la cabeza. Temblores.

AGRAVACION.

Humedad; clima; aire nocturno. Sótanos. Acostándose sobre el lado izquierdo. Lesiones; en la cabeza. Por levantar pesos. Contacto. Presión. Viento. Luz. Música. Luz suave. Tarde por la noche. Vegetales, frutas. Bebidas y alimentos fríos. Permaneciendo largo tiempo en una posición.

MEJORIA:

Al aire libre; aire seco y tibio. Cambios de posición. Desayuno. Acostándose sobre la espalda.

MENTE:

Sensible y suspicaz. Tristeza < música o luz tenue; sentándose cerca de una ventana con vitrales. Temor a la multitud, al mal. Impulsos suicidas; tiene que usar su autocontrol para evitar darse un tiro. Melancolía. Alegre después de evacuar. Problemas mentales a consecuencia de una lesión en la cabeza o malos efectos de caídas. Ataques intermitentes de manía. No quiere hablar, y siente que nadie debería hablarle.

CABEZA:

Aplastamiento o apretón en el occipucio. Cefalalgias < por ruido, agacharse; durante las reglas; luz, por comer; > en habitación oscura; por vomitar. Salivación con dolor de cabeza. Vértigo; > con sudor de la cabeza. Meningitis, espinal. Cuero sensible, el peinar el cabello es doloroso. Vértice caliente. El cerebro se siente flojo, al agacharse. La cabeza de tuerce a un lado (derecho).

OJOS:

Párpados granulares. Fotofobia; al caminar en la mañana. Párpados pesados. Conjuntiva amarilla. Hormigueo. Ojos como si estuviesen calientes.

OIDOS:

Punzadas perforantes en los oídos; < clima húmedo.

NARIZ:

Escurre agua por la noche. Nariz sangrante, antes y durante las reglas, se detiene y vuelve con frecuencia. Estornudos, con coriza fluída. Descarga espesa y amarilla.

CARA:

Amarilla; pálida, enfermiza. Comezón en la cara.

BOCA:

Con moco baboso, espeso, tenaz, blanco. Gusto amargo. Lengua sucia, café, o verde-amarillenta, espesa, pastosa, especialmente en la base. La punta de la lengua se siente quemada. Dolor de muelas > por mantener agua fría en la boca. Las encías arden como fuego. Salivación durante la cefalalgia. Ampollas en el paladar. Ardor en la boca como por pimienta.

GARGANTA:

Moco espeso y amarilla cae de las coanas posteriores. Deglución impedida. Ardor en faringe durante las reglas.

ESTOMAGO:

Deseo de hielo y agua helada. Sed al inicio de la fiebre, solamente. Aversión a la carne y el pan. Digestión lenta. Concomitantes con la náusea. Vómito verde bilioso. Dispepsia ácida con agruras y flatulencia. Los alimentos farináceos, leche y papas (patatas) caen mal.

ABDOMEN:

Región del hígado adolorida y sensible, < por respirar profundamente; al dar el paso; sacudida; pesadez, < acostándose sobre el lado izquierdo. Desgarramiento en la vesícula biliar. Hepatitis; catarro duodenal. Como con un bulto bajo el hígado. Cólico > por frotarse o sobando el abdomen, acostándose de lado. Calambres en el ombligo. Flatulencia; retenida; dolorosa; empuja aquí y allá; lado derecho del abdomen. Rugidos, gorgoteos en los intestinos, luego evacuaciones súbitas, ruidosas, farfullantes; después de levantarse por la a.m.; o lo saca de la cama. Diarrea espumosa o amarilla; mezclada con baba verde. Evacuaciones involuntarias, al pasar flatos, etc. Evacuaciones flojas, matutinas. Gran tamaño de la masa fecal. Ictericia, después de un coraje.

URINARIO:

Micción frecuente. Diabetes; sedimento como polvo de ladrillo, blanco o arenoso. Poliuria.

HOMBRES:

Gonorrea; crónica; descarga espesa, verdosa; pequeño dolor. Condilomata. Comezón en el glante o pene, del escroto.

MUJERES:

Vulvitis herpética. Leucorrea; verde amarillenta, sigue a la gonorrea; con ronquera. Pezones retraídos.

RESPIRATORIO:

Disnea. Asma, sycótica; en niños como un remedio constitucional, < temprano por la mañana. Tos floja pero violenta; > sentándose; debe sostener el pecho por los flancos. Dolor, perforante, a través de la parte baja izquierda del pecho. Cada enfriamiento o esfuerzo desusual, trae consigo un ataque de asma. Respiración corta mientras camina; deseo constante de hacer inspiraciones, respiraciones largas. Asma, con diarrea temprano por la mañana. Expectoración, verdosa, copiosa.

ESPALDA:

Dolores punzantes entre las escápulas. Dolor agudo y cortante en la espalda que se expande hacia arriba como un abanico. Dolores violentos en la parte posterior del cuello y base del cerebro. Dolores en la región lumbar si trata de retener la orina.

EXTREMIDADES:

Inflamación alderredor de la raíz de las uñas. Despellejamiento. Padrastrós. Dolor en la articulación de la cadera < al levantarse o sentarse. Ciática al levantarse por estar sentado o al voltearse en la cama; no hay alivio en ninguna posición. Latido y dolor penetrante en los talones. Vesículas en las plantas. Ardor abajo de las rodillas. Edema de pies. Temblor de las manos al despertar y también mientras escribe.

PIEL:

Comezón mientras se desviste. Ampollas amarillas acuosas, pequeños bultos rojos como verrugas en todo el cuerpo.

SUEÑO:

Sueños de pelea; de agua corriente. Despierta; por dolor, por flatulencia.

FIEBRE:

Friolento, no puede calentarse ni en la cama. Calor con aversión a cubrirse. Sudor axilar fétido.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Thu.

RELACIONES:

Colo; Glo; Med; Puls.

NICCOLUM

GENERALIDADES:

El níquel es un remedio para cefalalgias nerviosas periódicas; con astenopía, digestión débil, constipación; de personas literarias y debilitadas. Debe sentarse y sostenerse la cabeza con las manos o debe ponerse los brazos en los muslos al toser; < noche. Hipo violento; con sed. Debe sostenerse al niño durante la tos, de otra forma sería sacudido por los espasmos.

AGRAVACION:

Periódicamente; cada dos semanas; cada año.

NITRICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

Este ácido tiene una afinidad marcada por los Márgenes de los orificios de salida, especialmente de la garganta, ano y boca; además afecta las glándulas - hígado; próstata y salivales. Causa hemorragias; fáciles, brillantes, de agua sanguinolenta. Los pacientes están grandemente debilitados, tiritantes, sensibles y adoloridos. Los dolores son punzantes como astillas o royentes y ulcerativos. Un dolor ligero lo afecta violentamente. Las descargas son Acres, delgadas, sucias o café; causan enrojecimiento y destruyen el cabello. Fetidez; oca, pies o sudores nocturnos. Las membranas mucosas están oscuras, suaves. Los orificios están rojos, inflamados y agrietados. Como con una banda alderredor o un peso que colgara de la parte. Adolorimiento y rigidez durante los dolores. Exudados duros, arenosos. Articulaciones crujientes. Los dolores vienen y se van rápidamente. Adecuado para morenas, amarillas; de hábitos sobrios, o personas que sufren de enfermedades crónicas, con tendencia a resfriarse o a la diarrea. Caquexia. Sangrado después de un curetaje. Malignidad. Fagedena. Fístula. Sífilis. Sycosis. Cáncer. Supuración obstinada. Huesos inflamados y dolorosos. Convulsiones, epileptiformes, por la noche y al ir a la cama, durante el día vértigo frecuente, > por pasear en carro. Malos efectos por la pérdida de sueño, por alimentar a un enfermo. Dolores como si la carne estuviese arrancada de los huesos. Caries y exóstosis de los huesos. Sensible a las medicinas dadas en altas potencias. Como un ratón que corriese arriba y abajo del lado izquierdo.

AGRAVACION:

Causas leves - Contacto; sacudidas; ruido, cosquilleo, movimiento. Leche. Alimento grasoso. Después de comer. Frío - aire, humedad. Noche. Tarde. Cambio de clima. Calor de la cama. Fatiga mental o choque. Mercurio. Pérdida del sueño.

MEJORIA:

Movimiento de deslizamiento. Paseando en carro. Clima templado. Presión uniforme.

MENTE:

Irritable, odioso, vengativo. Tan enojado que tiembla. Profano, maldiciente, usa lenguaje vulgar. Delirio de regañar; habla a los espíritus en otra lengua. Confusión. Los pensamientos se desvanecen, después de esforzar la mente. Tristeza. Abatimiento. Taciturno. Rehúsa el consuelo, por su infortunio. Ansiedad por su enfermedad, temor al cólera; a la muerte. Piensa constantemente en sus problemas pasados. No hay disposición para trabajar, ni llevar a cabo un negocio serio. Desesperanza. Lloro por su descontento de sí mismo. Fácilmente asustado.

CABEZA:

Dolores de cabeza de aplastamiento < presión de un sombrero; por el ruido de la calle. Como con una banda alderredor de la cabeza. Cráneo adolorido. Hinchazón de abotagamiento en el cuero cabelludo. Caída del cabello, desde el vértice.

OJOS:

Agua tibia fluyendo sobre los ojos; > por agua fría, o sensación de agua corriendo de los ojos. La conjuntiva está manchada. Diplopía. Pestañas; rígidas, todas apuntan hacia la nariz (derecha). Parálisis del párpado superior. Fístula lacrimal.

OIDOS:

Sordera; > ruido, en trenes, paseando en carro; por anginas crecidas e induradas; después del sarampión. Crujido en los oídos al masticar. Se oye uno mismo al hablar. Caries del mastoide. Tumores quísticos en los lóbulos de las orejas.

NARIZ:

Sangramiento; obscuro, coagulado; con afecciones del pecho, < por llorar. Goteo de la nariz; por difteria. Estornudos; frecuentes, sin coriza; durante el sueño. Coriza con respiración corta. Punta roja, costrosa. Dolor cortante en la nariz; caries de los huesos. Descarga fétida y amarilla. Ocená. Depósitos verdes de la nariz cada mañana.

CARA:

Amarilla; enfermiza. Despellejamiento de los labios. Angulos de los labios escoriados, agrietados o costrosos. Crujido de las mandíbulas al masticar.

BOCA:

Dientes flojos. Encías; hinchadas, excoriadas, flojas, sangrantes; por el lado interno. Lengua húmeda, fisurada o mapeada. Lengua limpia, roja con cubierta central. Paladar excoriado. Ulceras en el paladar suave, con dolor agudo como de astilla. Salivación; sangrante; con cubierta verde en la lengua. Mal aliento. Ránula. Se muerde la lengua y las mejillas. Dientes; amarillos, caries de los dientes. Los dientes están como suaves y esponjosos.

GARGANTA:

Dolor punzante como por astillas; dentro de los oídos; < deglutiendo. Anginas; rojas, hinchadas, desiguales; con pequeñas úlceras sobre ellas. No puede tragar ni siquiera una cucharada de té; deglución difícil. Carraspea moco de las coanas posteriores.

ESTOMAGO:

Deseo de grasas, sal, cosas indigestas, yeso, tierra, etc. Hambre con gusto dulzón. La leche cae mal. Náusea; con vómito ocasional, > paseando en carro. No le gusta la carne, cosas endulzadas con azúcar, pan. Náusea; con eructos; no puede tomar alimento.

ABDOMEN:

Evacuaciones que desgarran el ano, aún las suaves. Dolor prolongado después de evacuar; camina en agonía. El recto se siente desgarrado; fisuras en el recto. Hemorroides dolorosas, sangrando fácilmente. Cólico > apretándose la ropa. Ano; con comezón, eczematoso o rezumando humedad. Ulceraciones después de disentería que ha sido mal tratada. Como con un trapo seco y caliente. Hernia inguinal; de los niños. Ardor en el recto; después de la micción. Hemorragias del recto después de quitar hemorroides.

URINARIO:

Orina; fuerte, como la de un caballo; u ofensiva; fría cuando pasa; alternadamente profusa o escasa. La orina contiene ácido oxálico, ácido úrico y fosfatos. Hematuria; con estremecimientos a lo largo de la espina. Como con un alambre caliente en la uretra. Calambres del riñón a la vejiga. Nefritis infecciosa. Chorro delgado, como por estrictura. Manchas rojas costrosas en el prepucio o sobre la corona del glande. Retención indolora o incontinencia de orina. Riñón contraído.

HOMBRES:

Prepucio con comezón, ardoroso. Chancros; fagedénico. Prepucio edematoso. Fimosis. Estricturas por gonorrea o sífilis.

MUJERES:

Comezón voluptuosa en vagina después del coito. Agua sanguinolenta desde la vagina; o hemorragias por exceso. Reglas; irregulares; adelantadas, profusas, como agua lodosa. Metrorragia; después del parto; después de una curación. Leucorrea; café; color carne, acuosa o filamentosa; mancha de amarillo o deja manchas con orilla negra. Nódulos duros o atrofia de las mamas. Dolor en la espalda, glúteos y caderas durante las reglas.

RESPIRATORIO:

Tos agitante; por un punto seco en la laringe; con dolor punzante en la región lumbar < frío, invierno. Respiración corta al subir escaleras. Tos en sueños sin despertar. Expectoración; muco-purulenta, amarilla, amarga, ofensiva; embarrante; acompañada de sudor. Empiema. Hemoptisis. Tisis cavernosa. Respiración corta por desplazamiento uterino. Congestión en el pecho con palpitación y temor. Picadura en la laringe. Respiración jadeante al leer o al agacharse.

CORAZON:

Palpitación y angustia al subir escaleras. Pulso; intermitente al cuarto latido; irregular. Palpitación nerviosa causada por una ligera excitación mental.

ESPALDA:

Dolor punzante en la espalda lumbar al toser. Punzadas en y entre las escápulas; cuello rígido. Dolor en la espalda por la noche > acostándose sobre el abdomen.

EXTREMIDADES:

Articulaciones de los dedos hinchadas. Verrugas en la parte posterior de las manos. Herpes entre los dedos. Sudor de pies fétido, causando excoiación en los dedos. Manchas blancas en las uñas. Tibia adolorida. Dolor en la rótula, impidiendo caminar. Sabañones de los dedos. Sudor de palmas, manos, frío. Uñas azules. Tobillos débiles; crujen al caminar. Uñas encarnadas con ulceración y sensación de una astilla < contacto. Uñas distorsionadas, decoloradas, amarillas, curvas.

PIEL:

Seca; erosionada; agrietada en cada ángulo. Manchas cobrizas; en la barbilla. Piel que dá comezón al desvestirse. Se forman costras y caen. Ulceras rápidas, en carne viva; rasgadas con bordes irregulares o tapones de pus. Supuraciones obstinadas. Pus encapsulada. Verrugas grandes, dentadas, sangran al contacto o al lavarse. Condilomata. Viejas cicatrices que se vuelven dolorosas en clima frío.

SUEÑO:

Sacudidas al dormirse. Los dolores vienen durante el sueño. Sueño ansioso, no reparador, con sueños atemorizantes.

FIEBRE:

Frialdad de hielo; de las plantas. Friolento - continuamente. Suda con facilidad; luego se resfría. Sudores exhaustivos, profusos (como orina), en la mañana; en las axilas, los pies, y las manos (lesiones espinales). Sudores nocturnos en la parte sobre la que se yace.

COMPLEMENTARIO:

Calc; Thuj.

RELACIONES:

Ars; Kali-c; Kre; Merc.

NITRO-MURIATIC ACID

GENERALIDADES:

Este remedio se prepara mezclando 18 partes de Acido Nítrico con 82 partes de Acido Clorhídrico. Es casi un específico para la oxaluria.

NUX MOSCHATA

GENERALIDADES:

La nuez moscada es una medicina doméstica popular, para posponer los períodos menstruales, deshacerse de ellos, o también para producirlos, y también para la diarrea. Perturba profundamente el Sensorio; mente y nervios; causando exaltación de los sentidos y sensibilidad nerviosa. La digestión está perturbada. Afecta los órganos femeninos. Cuando cualquier malestar causa somnolencia; o está acompañado por somnolencia; y además hay escalofrío o frialdad y ausencia de sed; Nux Mos. deberá ser considerada y administrada. Resequedad; como una sensación, o de verdad, es otro síntoma característico; de boca, lengua, ojos, etc. pero sin sed. Pesadez; de ojos, lengua, etc. Tendencia marcada a ataques de desvanecimiento; con falla cardíaca; < por evacuar, en las reglas, con dolor ligero, por la vista de sangre, mientras se está de pié (vistiéndose). Hemorragias oscuras. Dolores fugaces. Es útil en

mujeres flacas, delicadas, histéricas que tienen senos pequeños y quienes ríen y lloran por turnos. Como con un bulto duro; en estómago, hígado, garganta. Histeria. Manía. Automatismo. Las partes sobre las que se está, se sienten adoloridas. Se siente como borracho; trastabillea al tratar de caminar. Catalepsia. Espasmos de los niños con diarrea. Epilepsia con consciencia. Dolor pequeño. Abotagamiento. Clarividencia. Parálisis con espasmos; y temblor; de la lengua, párpados, esófago. Depresión mental por pena. Malos efectos de un susto; fatiga mental; erupciones suprimidas. Murmullo, zumbido, sensación chistosa del cuerpo. Marasmo de niños pequeños. Las partes duras se sienten suaves.

AGRAVACION:

Frío;- baño; humedad: viento; corrientes. Niebla. Pies fríos. Embarazo. Cambios de estación. Emociones: excitación. Esfuerzo. Menstruación. Sacudida. Magulladuras. Causas leves. Fatiga mental o shock. Verano, clima caliente. Movimiento. Acostándose sobre el lado dolorido. Acaloramiento. Leche. Sacudiendo la cabeza.

MEJORIA:

Calor húmedo. Habitación caliente. Clima seco.

MENTE:

Soñador. Estados de clarividencia. Voluble, ríe y llora. Aturdido; los objetos parecen cambiados de lugar o han crecido. Los pensamientos se desvanecen de pronto, mientras está hablando, leyendo o escribiendo. Usa palabras equivocadas (durante la cefalalgia). Ideas lentas. Se habla a sí mismo en voz alta. Sensación de dualidad; piensa que tiene dos cabezas; piensa que es dos personas. Inconstante y veleidoso en sus compromisos. Pérdida total de la memoria de su vida pasada. Sensación de una disolución inminente. Manía; con discursos necios y gestos ridículos. Burlesco. Se ríe. Gesticula. Su derredor parece cambiado; no reconoce calles bien conocidas. Falto de vivacidad, indiferente. Contesta con irrelevancias. Un tiempo corto le parece muy largo. Sensación de levitación. Hace sus quehaceres domésticos automáticamente, no recuerda lo que acaba de hacer.

CABEZA:

Adolorimiento; de estallido en las sienes > presión dura. Vértigo como si estuviese borracho, trastabilleo al caminar al aire libre. La cabeza se siente llena como si se expandiera. Congestión cerebral. El cerebro se siente suelto, golpeando los lados, al moverse. Pulsación indolora en la cabeza, en un punto pequeño. Movimientos convulsivos de la cabeza, no debe hablar o deglutir. Levantar la cabeza de la almohada causa náusea mortal. La cabeza cae hacia adelante estando sentado.

OJOS:

Objetos; se ven más grandes, o demasiado pequeños, muy distantes, oblicuos; demasiado juntos; se desvanecen, rojos. Ceguera luego desvanecimiento. Los ojos parecen secos, lo que impide los movimientos de los párpados. Pterigión sobre la córnea.

OIDOS:

Escucha hipersensible; los sonidos distantes se incrementan.

NARIZ:

Hipersensibilidad del olfato. Sangramiento nasal obscuro. Seca; obstruída; debe respirar por la boca.

CARA:

Pálida. Labios retraídos. Expresión estúpida, infantil, mueca diabólica. Mandíbulas como paralizadas, no puede cerrarlas. Labios; hinchados; juntos, pegados.

BOCA:

Los dientes parecen empujados. Boca; seca; desaparece cuando entra a su casa; sin sed. Saliva espesa como algodonosa. Lengua entumida, paralizada, lenguaje difícil. Gusto de tiza. Dolor de dientes de la mujer embarazada > calor, < al contacto o aspirando el aire. Los dientes parecen flojos. Saliva disminuída, se siente como algodón en la boca.

GARGANTA:

Seca. Deglución difícil; por parálisis de músculos.

ESTOMAGO:

Deseo de alimentos altamente sazonados- que sólo así son digeridos. Aversión al comer o pensar en alimentos. Digestión débil; todo el alimento se convierte en gas. Náusea y vómito por irritación de pesario uterino. Dispepsia flatulenta. Comer poco, o demasiado, causa dolor de cabeza. Hipo.

ABDOMEN:

Excesivamente inflado. Cólico flatulento. Como con una tabla que cruzase el hipogastrio. Ombligo adolorido; excoriado, ulcerado. Evacuaciones; blandas; pero incapaz de expelerlas; pútridas; brillantes; amarillas y lientéricas, < por la noche. Desvanecimiento durante o después de evacuar. Diarrea de verano; por bebidas frías; leche hervida. Recto inactivo.

URINARIO:

Disuria; por cerveza o vino; en histeria; con dismenorrea; después de comer; por malestares uterinos. La orina huele a violetas.

MUJERES:

Reglas; irregulares, en tiempo y cantidad; espesa, oscura. Leucorrea; lodosa, sanguinolenta; reemplaza las reglas. Mamas demasiado pequeñas. Pezones retraídos. Flatos desde la vagina. Dolor en el útero por pesario. Reglas suprimidas. Dolores de parto insuficientes. Flujo continuo y obstinado.

RESPIRATORIO:

Voz ronca al caminar contra el viento; histérica. Tos, < al calentarse en la cama. Disnea; con sensación de peso en el pecho; asma histérica, inhalación difícil. Pérdida del aliento al estar en el agua.

CORAZON:

Temblores, alateos; como por susto, miedo o tristeza. Palpitación > caminando, bebiendo agua caliente. Como latiendo en vacío. Sensación como de algo que empuñara el corazón. El pulso se detiene un intervalo largo; excitando el temor a la muerte. Pulso débil, irregular.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello tan débil, que la cabeza cae hacia adelante sobre el pecho. Dolor en la espalda, ahora en el sacro, luego en la región lumbar. Dolor a lo largo de la espina. Dolor de espalda y neuralgia del sacro y cóccix, paseando en carro. Como si una pieza de madera estuviera atravesando el sacro; < antes de las reglas.

EXTREMIDADES:

Fatiga al menor esfuerzo. Como si los miembros flotaran en el aire. Reumatismo; dolores tirantes, erráticos < en aire frío y húmedo, por ropa mojada y fría, > calor. Palmas secas. Parálisis histérica. Plantas siempre húmedas. Siente como si caminara sobre cuentas duras. Pies fríos al aparecer las reglas.

PIEL:

Seca, fría. Manchas azules.

SUEÑO:

Ataques de sueño; súbitos, con vértigo. Gran somnolencia con todos los malestares. Sueños; de caídas desde lugares altos; de ser perseguido.

FIEBRE:

Alternan frío y calor. Frío con estupor. Sudor; rojo, o sanguinolento o ausente.

COMPLEMENTARIO:

Calc; Lyc.

RELACIONES:

Cann; Croc; Gel; Mos; Op; Rhus-t.

NUX VOMICA

GENERALIDADES:

Nux-v. es un remedio cotidiano. Corresponde a muchas condiciones de enfermedad a las cuales, el hombre moderno está predispuesto. Es útil para aquellas personas que llevan una vida sedentaria, haciendo mucho trabajo mental; o a aquellas que se mantienen bajo estrés y tensión por trabajo de oficina prolongado, cuestiones y preocupaciones por negocios. Tales personas, para olvidar sus angustias suelen propasarse en vino, mujeres, estimulantes y alimentos fuertes y drogas sedantes; y suelen sufrir por los malos efectos que se derivan de eso. El típico paciente Nux. es de preferencia delgado, enjuto, rápido, activo, nervioso e irritable. Afecta los nervios, causando hiper-sensibilidad, y una sobre-impresionabilidad mental y física. Produce Perturbaciones Digestivas; congestión parcial y estados hipocondríacos. Personas dispépticas que siempre seleccionan sus alimentos para experimentar, eso que digieren poco. Está sujeto a espasmos, convulsiones y desmayos. El paciente siente que

siempre está fuera de sintonía; La acción es violenta, con frecuencia irregular, caprichosa o ineficiente. Sacudidas y torcimientos. Espasmos, tetánicos; con conciencia; < por el mínimo contacto, pero > por asirlos fuertemente, o cuando el codo es estirado. Sensación de contracción tensa. Dolores como de relámpago. Neuralgia; prodrómica. Sensación como de un cuerpo áspero internamente. Sensación de pesadez o ligereza que se alternan. Adolorimiento magullante; del Abdomen, cerebro, etc. Sensación de excoiación interna, de ulceración; en garganta, laringe. Se resfría. Desmayos, después de evacuar, vomitar; después de labores de parto, etc. Biliosidad. Hemorragias. Excesos; pacientes muy drogados. Temblores. Epilepsia durante la evacuación. Parálisis por apoplejía, en vividores; parcial, con vértigo y náusea; con dolores punzantes. Reflejos aumentados. Morenas de fibra firme. Perístole revertida. Malos efectos; de la masturbación, excesos sexuales. Venas varicosas, con tortuosidad; cordones duros y negros; por estar mucho de pié, o por hábitos sedentarios.

AGRAVACION:

Temprano por la mañana. Frío; al aire libre (seco), corrientes; asientos; viento. Por descubrirse. Alto estándar de vida; café; condimentos, licores, drogas, purgantes, exceso en el comer. Hábitos sedentarios. Libertinaje. Mental; esfuerzo; fatiga; vejación. Sueño perturbado. Causas ligeras; enojo; ruido; olores; contacto; Presión; de la ropa en la cintura. Bostezando. Tabaco. Música. Decepción en la ambición. Honor herido. Shock mental.

MEJORIA:

Descargas libres. Siestas. Arropándose la cabeza. Por descansar. Bebidas calientes. Leche. Grasas. Aire húmedo. Acostado sobre los costados.

MENTE:

Activa. Enojado e impaciente; no soporta el dolor; tan rabioso que llora. Celoso; temperamento ardiente. Nervioso y excitable. Aversión a trabajar. Teme la pobreza. Hundido. Despechado. Regañón. Violento. Malhumorado; impulsos suicidas, homicidas. Teme los cuchillos por temor a que se mate o mate a otros. Criticón. Reprocha a otros. Terriblemente aprehensivo, por casarse, (muchachas). El tiempo pasa demasiado lentamente. Habla sobre su propia condición. Aún el más pequeño malestar le afecta grandemente. Hipocondria. Melancolía. Delirium tremens. No soporta el ruido, luz, olores, contacto, música, etc. No soporta la conversación o la lectura. Enojado cuando se le consuela. Testarudo y voluntarioso.

CABEZA:

Vértigo; el cerebro y otros objetos dan vueltas; con pérdida temporal del conocimiento; con momento obscuro; con estómago vacío. Sensación de magulladura en el cerebro. Mareado y desfalleciente en una multitud o donde arden muchas luces. Cefalalgia a la luz del sol. Cráneo sensible. Frente hinchada. La cabeza parece más grande que el cuerpo. Se resfría > arropándose la cabeza con algo caliente. Migraña. Cefalalgia frontal con deseo de recostarse sobre algo.

OJOS:

Golpe de aire. Lagrimeo en el lado afectado. Atrofia del nervio óptico. Fotofobia. Paresia de los músculos oculares. Parte baja del globo amarilla. Pérdida de la visión debido al alcohol y tabaco. Exudación de sangre de los ojos. Conjuntivitis primaveral.

OIDOS:

Comezón del oído a través de la trompa de Eustaquio. Canal externo seco y sensible. Dolor; punzante al deglutir. Los sonidos altos son dolorosos.

NARIZ:

Sensible a los olores fuertes; llega al desmayo. Nariz obstruída, pero con escurrimiento de agua; en un lado. Sorbidos del recién nacido. La nariz sangra durante el sueño; por flujo suprimido de las hemorroides, por toser. Estornudos; abortados; violentos; por un cosquilleo intenso en el poro (izquierdo). Coriza, fluída durante el día, y al aire libre, seca por la noche. Olor delante de la nariz, como de queso viejo, de azufre quemado. Olfato agudo. La nariz se vé puntiaguda.

CARA:

Roja, hinchada, o amarillenta < alderredor de la nariz y la boca. El angulo izquierdo de la boca se cae. Neuralgia intra-ocular; con hinchazón de la mejilla, intermitente; > al acostarse en la cama. Mandíbulas; cerradas de golpe; rígidas. Acné por comer queso. Espinillas por el uso excesivo de licores. El niño pasa su mano constantemente sobre su cara (enfermedad cerebral).

BOCA:

Los dientes castañetean. Dolor de dientes > bebidas calientes. Mal aliento; ácido. Ulceras pequeñas aftosas en la boca. Gusto amargo; ácido, malo, en a.m. baja por la garganta. Paladar con comezón; trompa de Eustaquio. Encías; hinchadas, blancas y sangrantes. Picoteos en las orillas de la lengua < después de comer; lavándose la cara en agua fría.

GARGANTA:

Aspera, excoriada; como rasguñada. Gusto pútrido; al toser. Pequeñas úlceras en la garganta; dolor < durante una deglución en vacío. Punzadas en los oídos.

ESTOMAGO:

Desea alimentos picantes; cerveza, comida grasosa, tiza; estimulantes. Hipo; por exceso en el comer; por frío o bebidas calientes. Regurgitación violenta < carraspeando. Eructos, ácidos. Agruras. La boca se hace agua. Náusea; > si sólo pudiese vomitar...Vómitos violentos; biliosos, ácidos, quiere vomitar pero no puede. El alimento permanece en el estómago como un nudo pesado. Gastralgia; el dolor va al pecho y la espalda; > vomitando y por bebidas calientes, < por la comida. Indigestión. Hambre; pero aversión a la comida. Eructos; difíciles; ácidos; amargos. Dolor severo en el estómago por lesión, < por el mínimo alimento.

ABDOMEN:

Como con una mano sobre la cintura, la ropa la oprime. Adolorimiento magullante de la pared abdominal. Hígado inflamado, crecido, dolor punzante. Cólico biliar. Ictericia; por enojo. Los intestinos se aprietan aquí y allá. Intestinos adoloridos < por toser y al caminar. Hernia; infantil; por constipación o por llorar; umbilical. Cólico flatulento. Necesidad difícil, caprichosa e inefectiva para que los intestinos actúen; > evacuar. Constipación: Peristalsis inactiva. Se esfuerza para defecar; sensación de que una parte permanece sin salir; pasa pequeñas cantidades en cada intento. Espasmos del recto; flatos retenidos; inquietud constante. Hemorroides pruriginosas, ciegas, sangrantes, > por baño frío. Disentería; evacuaciones > dolores por un tiempo. Diarrea; con ictericia; después de libertinaje, durante las fiebres. Cólico en infantes que se amamantan por alimentos estimulantes tomados por la madre.

Cólicos por fluido hemorroidal suprimido. Primera parte de la evacuación suave, la última dura. Prolapso del recto por diarrea. Tirantez en el ano cuando no evacúa. Sensación de vacío en las ingles.

URINARIO:

Cólico renal (derecho) que se extiende a los genitales y piernas, con goteo de orina; > acostándose sobre la espalda. Necesidad dolorosa e ineficaz de orinar. Estranguria espasmódica. Hematuria por flujo hemorroidal o menstrual suprimido. Estrictura uretral espasmódica. Parálisis de la vejiga; la orina gotea; en ancianos, con próstata crecida o gonorrea. Micción involuntaria al reír, toser, estornudar.

HOMBRES:

Deseo fácilmente excitado. El pene se relaja durante un abrazo. Malos efectos del onanismo; exceso sexual. Eyaculación prematura. No puede estar en compañía femenina sin tener emisiones. Aumento de esmegma.

MUJERES:

Deseo demasiado fuerte; con ardor en la vulva. Reglas; profusas; adelantadas y prolongadas; intermitentes; de sangre oscura y granulosa; irregular; con ataques de desvanecimiento. Dismenorrea; calambres que se extienden a todo el cuerpo; con necesidad constante de evacuar. Leucorrea; fétida; manchando de amarillo. Labores de parto ineficaces; se desmaya con cada dolor de parto. Sangramiento profuso después de un aborto. Prolapso del útero; por esfuerzo o levantamiento de peso. Todos los síntomas antiguos < después de las reglas. Loquios escasos, ofensivos. Pezones; excoriados; con mancha blanca en el centro. Dolor tensivo al amamantar. Recolección de leche en el pecho por no amamantar, pero indolora.

RESPIRATORIO:

Tos; violenta; haciendo que se caiga el paciente; paroxística; tosferina; con dolor de cabeza estallante; tiene que sostener su cabeza. Respiración superficial. Respiración opresiva. Asma; por desórdenes estomacales; con plenitud del estómago. Ronquera, con aspereza dolorosa en laringe y pecho. Tos; con sensación como de algo que se aflojara en el pecho. Neuralgia intercostal < acostándose sobre el lado doloroso. Asma; con sensación como si la ropa estuviese muy ceñida, > vomitando. Deseo de comer algo durante la tos.

CORAZON:

Palpitación al acostarse. El corazón se siente cansado. Angina de pecho; el paciente yace sobre sus rodillas con el cuerpo recostado hacia atrás.

CUELLO Y ESPALDA:

Neuralgia cérvico-braquial; cuello dolorosamente rígido; dolores bajo el hombro (derecho) < contacto. Cuello torcido por frío o shock nervioso. Dolor lumbar, como si estuviese roto; debe sentarse para poder voltearse en la cama. Hormigueo a lo largo de la espina. Lumbago agudo. Región sacra como tullida; después del parto.

EXTREMIDADES:

Los brazos se duermen, entumen, sensación de rigidez. Calambre tenso en las pantorrillas y las plantas, debe estirar los pies; o pararse mientras camina. Los pies se sienten aporreados y excoriados. Punzadas

desde los dedos gordos hasta los muslos; < después de evacuar. Encoge los pies mientras camina, (corea); las piernas tiemblan; paso vacilante. Las rodillas se juntan como si estuviesen secas; crujidos durante el movimiento. Parálisis de los miembros inferiores por esfuerzo excesivo o por haber sido mojadas. Movimientos automáticos de las manos (derecha) hacia la boca (apoplejía). Piernas rígidas.

PIEL:

Piel de gallina. Piel roja y manchada. Urticaria con desarreglos estomacales. Manchas azulosas.

SUEÑO:

Bostezos. Somnoliento en la noche o insomne por aflujo de ideas. Despierta demasiado temprano, no puede dormir otra vez; finalmente se duerme pero despierta sintiéndose miserable. Mejora después de un sueño corto, a menos que se le despierte. Pesadillas. Sueños; ansiosos; persecución por animales, perros y gatos; amorosos. Solloza y habla en sueños.

FIEBRE:

Friolento y con sed, y acalorado sin sed. Facilmente se enfría, pero no se cubre, < movimiento; bebiendo aún durante el calor. Cuerpo caliente, ardiente, especialmente la cara, pero incapaz de moverse o cubrirse sin sentir frío. Rigor excesivo con uñas de las manos azules. Sudor; ácido; de un lado; caliente en la parte más alta del lado, al acostarse.

COMPLEMENTARIO:

Kali-c; Pho; Sul.

RELACIONES:

Ign; Lyc.

OCIMUM CANUM

GENERALIDADES:

Este remedio es útil en enfermedades de los riñones, útero, vejiga y uretra. Síntomas de cólico renal, especialmente del lado derecho, són más pronunciados. Dolor penoso en los uréteres. Cólico renal con hematuria y vómito violento; con retorcimiento de manos, gemidos y llanto todo el tiempo. Arena roja en la orina; que puede ser color azafrán y olor como de almizcle. Glándulas inguinal y mamas inflamadas. Pezones dolorosos al mínimo contacto. Prolapso vaginal. Orina escasa; que <.

OENANTHE CROCATA

GENERALIDADES:

Es un remedio convulsivo muy valioso; útil en convulsiones epileptiformes puerperales y urémicas. Epilepsia; con priapismo; < durante las reglas o en lugar de ellas; embarazo. Cae hacia atrás y lanza un grito fuerte antes de caer. Estados epilépticos. Como un insecto que reptara bajo la piel cerca de la cintura; < al contacto de la ropa. Insanía; alucinaciones. Cara hinchada; sacudidas convulsivas de los músculos faciales; espuma en la boca, trismo. Tendencia a llorar por cosas pequeñas. Manchas rosadas y rojas en la cara y el pecho, brazos, abdomen. Calor ardiente < cabeza y garganta. Sudor profuso y ofensivo. Vómito obstinado por días no mejorada por nada.

AGRAVACION:

Lesión. Perturbaciones sexuales y menstruales. Agua.

RELACIONES:

Bell; Cic.

OLEANDER

GENERALIDADES:

Tiene una acción marcada sobre el sistema nervioso; corazón, piel y tracto digestivo. Condiciones paralíticas, con calambres como contracciones de las extremidades superiores. Paresia después de parálisis infantil. Calambres generalizados. Entumecimiento. Debilidad, con temblores en mujeres que amamantan. Sensación de vibraciones. Vacío en el estómago y pecho después de comer, > brandy. Hemiplejía. Rigidez paralítica. Sopor. Incapaz de hablar o habla con dificultad. Descargas involuntarias.

AGRAVACION:

Frotamiento. Por desvestirse. Después de mamar. Mirando hacia los lados. Fricción de la ropa.

MEJORIA:

Mirando hacia los lados. Brandy.

MENTE:

Tristeza, con pérdida de confianza y poder. Malhumorado. Quisquilloso; distracción. Comprensión lenta.

CABEZA:

Vértigo; < mirando fijamente un objeto o viendo hacia abajo, volteando a cualquier lado de la cama; con diplopía. Cefalalgia > mirando cruzado, a los lados o bizqueando. Vértigo por largo tiempo antes de la parálisis. Sensación de mordedura y comezón en el cuero cabelludo. Costras húmedas de leche < occipucio. Comezón corrosiva en la frente y los lados del cabello; < calor.

OJOS:

Como si estuviesen jalados hacia dentro de la cabeza. Puede ver los objetos solamente si los ve de lado. Diplopía. Lagrimeo; al leer.

CARA:

Pálida. Hundida. Labio superior entumido. La mandíbula inferior tiembla al bostezar.

BOCA:

Dolor de muelas solo mientras mastica. Lengua dormida. Pérdida del lenguaje.

GARGANTA:

Como un viento fresco que soplara en la garganta (izquierda).

ESTOMAGO:

Sensación de vacío aún después de comer > brandy; por amamantar. Hambre canina con alimentación apresurada. Latidos en el hueco. Desea agua fría. Aversión al queso. Debilidad extrema del poder digestivo.

ABDOMEN:

Pasa alimentos no digeridos, en la mañana, que comió el día anterior. Evacuaciones; delgadas, lientéricas; involuntarias; escapa con flatos; en niños.

URINARIO:

Micción involuntaria.

MUJERES:

Temblores después de amamantar; tan débil que escasamente puede cruzar la habitación.

CORAZON:

Palpitación con debilidad y sensación de vacío en el pecho, > con el brandy. Dolores al agacharse.

EXTREMIDADES:

Contracción de calambre en los miembros inferiores; en parálisis. Adormecimiento de los miembros. Debilidad de las extremidades inferiores. Parálisis indolora. Las venas de las manos están hinchadas. Las manos tiemblan, mientras escribe. Temblor de las rodillas al estar de pié. Los pies están constantemente fríos. Dedos rígidos y dedo gordo volteado hacia la palma. Miembros rígidos y fríos.

PIEL:

Sensible, se irrita y rezuma o sangra. Erupciones con comezón, mordedura como de piojos. Piel adormecida.

SUEÑO:

Sopor. Bostezo con temblor de la quijada inferior.

FIEBRE:

Calor por fatiga mental.

RELACIONES:

Anac; Chin.

OLEUM ANIMALE

GENERALIDADES:

Este aceite volátil fué preparado por Dippel primero por destilación de un cuerno de ciervo macho. Afecta los Nervios especialmente el nervio neumo-gástrico; órganos digestivos. Los síntomas aparecen aquí y allá o en partes aisladas. Las partes afectadas se sienten adoloridas. Debilidad temblorosa; de manos, rodillas, pies, etc. Dolor en puntos. Punzadas; dolores ardorosos, como de agujas al rojo. Dolores empujados hacia arriba y de atrás para adelante; en huesos malares, testículos; mamas, etc. Frialdad de hielo; desde las puntas de los dientes, en la garganta, estómago, etc. Camina arrastrando los pies. Como de orina; eructos, leucorrea, etc. La carne se siente arrancada de los huesos. Malos efectos de supresiones, especialmente del sudor de pies. Neurastenia.

AGRAVACION:

Frío. Por comer. Supresiones. Reglas. Bebidas calientes. Ruido. de 2 a 9 p.m.

MEJORIA:

Por frotar. Presión. Estirándose. Al aire libre. Cambiando de posición. Eructos.

MENTE:

Indolente; inclinado a sentarse. Irritabilidad nerviosa. Triste; introvertido; absorto en sí mismo; habla en susurros. Pensamientos que se desvanecen. Desfallecimiento; de origen gástrico.

CABEZA:

Dolor en puntos. Migraña con poliuria. Vértigo de origen gástrico, > doblando la cabeza hacia atrás.

OJOS:

Cuerpos brillantes delante de los ojos. Lagrimeo al comer. Un pedazo de piel parece caer sobre los ojos. Sacudida de los párpados.

CARA:

Hueso malar se siente empujado. Labios temblorosos. Los labios parecen estar cubiertos de clara de huevo seca. Hinchazón detrás de la mandíbula inferior derecha.

BOCA:

Dolor de dientes > presionando unos con otros, con sensación de frialdad que viniera desde las puntas. La boca se siente grasosa. Saliva blanca como nieve y algodonosa. La lengua arde como si estuviese escaldada. Se muerde las mejillas mientras come.

GARGANTA:

Arde, seca; constreñida; el deglutir en vacío es difícil, sin embargo el alimento y la bebida pasan fácilmente. Como si aire frío penetrara a la garganta. Carraspea bultos gomosos, cafés. Vapor acre o una rascadura ardorosa en la garganta; < por tos.

ESTOMAGO:

Aflujo de agua; > por masticar tabaco. Pulsación o como agua en el estómago. Sensación de frialdad (como un bulto de hielo), ardorosa, de constricción; > eructos. Eructos como de orina.

ABDOMEN:

Flatulencia y rugidos.

URINARIO:

Orina profusa, pálida; de olor como pescado en salmuera; < histeria; migraña. Orina frecuente y escasa, luego cefalalgia. Orina verdosa. Flujo pequeño de orina.

HOMBRES:

Pérdidas seminales; al esforzarse para evacuar. Testículos; hinchados, alternadamente; los siente jalados forzados hacia arriba y sujetados. Neuralgia del cordón espermático. Presión en el perineo. Hipertrofia de la próstata.

MUJERES:

Reglas; tempranas, escasas; flujo negro. Mamas doloridas antes de las reglas; punzadas hacia arriba en los pezones; en escirros. Punzadas en los senos de atrás para adelante. Leucorrea como orina.

RESPIRATORIO:

Asma por sudor de pies suprimido. Punzadas en la clavícula.

CORAZON:

Palpitación ansiosa. Pulso lento.

ESPALDA:

Escápula adolorida (derecha) > presión. Sensación de torcedura en el sacro. Paso inseguro. Crujido en las vértebras cervicales al levantar la cabeza.

PIEL:

Excoriación en los pliegues de flexión.

FIEBRE:

Alternan frío y calor. Sudor de pies fétido y frío; como de pescado en los talones.

RELACIONES:

Sul; Tell.

OLEUM JECORIS

GENERALIDADES.

El aceite de hígado de bacalao es un nutriente y afecta el pecho, hígado, pancreas y tendones. Diatesis tísica y escrofulosa. Adolorimiento. Ardor en puntos. Nutrición defectuosa. Infantes atrofiados; niños que no toleran la leche. Emaciación; manos y cabeza calientes. Lasitud. Descargas amarillas. Siempre resfriándose.

AGRAVACION:

Leche. Frío húmedo, aire o lugares. Movimiento.

CARA:

Crecimiento de cabello corto y grueso en la barbilla y labio superior en mujeres.

ABDOMEN:

Adolorimiento y pesadez en la región del hígado; < ejercicio.

MUJERES:

Establece las reglas. Leucorrea, amarilla, con espalda débil.

RESPIRATORIO:

Ronquera. Tos seca, cosquilleante, cortante; > tan pronto como la fiebre aparece. Tisis temprana. Adolorimiento o punzadas en el pecho. Hemoptisis. Espujo amarillo. Tos con palpitación.

ESPALDA:

Frío o estremecimiento desde el sacro, sube por la espalda hasta el occipucio.

EXTREMIDADES:

Reumatismo crónico con músculos y tendones rígidos. Palmas calientes; hacia la noche.

PIEL:

Amarilla. Costras de leche. Tiña (aplicación local). Abscesos fríos.

FIEBRE:

Héctica. Sudores nocturnos.

RELACIONES:

Pho.

ONOSMODIUM

GENERALIDADES:

Este remedio actúa sobre los nervios y músculos. Causa pérdida del poder de concentración y coordinación; y perturbaciones en el sentido de la proporción. Adolorimiento, inflamación y rigidez de los músculos; después del dolor. Postración, debilidad y cansancio; actúa como si hubiese nacido cansado. Parece que pisa sobre algodones. Trastabilleo. Dolores neurálgicos. Neurastenia; sexual; por pérdida del deseo sexual en ambos sexos.

AGRAVACION:

Torceduras. Esfuerzo con los ojos. Excesos sexuales. Obscuridad. Ropa ceñida. Calor. Aire húmedo. Sacudidas.

MEJORIA:

Descanso. Sueño. Por comer. Bebidas frías. Por desvestirse.

MENTE:

Irresoluto. Confundido. Olvidadizo. Pensamiento lento. Afasia. Temor de caer al ir subiendo o bajando escaleras.

CABEZA:

Migraña. Cefalalgia por forzar la vista y debilidad sexual < obscuridad. Vértigo con cefalalgia; < acostándose sobre el lado izquierdo; levantando las manos sobre la cabeza. Dolor de cabeza occipital como si fuese exprimida; < por forzar la vista y acostándose. Dolor que sube y baja del occipucio (izquierdo) al hombro < esfuerzo. Pesadez sorda que oprime el occipucio.

OJOS:

Doloridos, pesados, cansados y rígidos. Los ojos se combinan con síntomas ováricos. Malinterpreta las distancias. Visión borrosa. Ceguera para los colores rojo y verde.

GARGANTA:

Seca y rígida; todos los síntomas son > por bebidas frías y por comer.

ABDOMEN:

Sensación de distensión > aflojando la ropa. Evacuaciones amarillas, pulposas que lo sacan con rapidez de la cama por la mañana. Deseo de agua helada y bebidas frías.

URINARIO:

Micción; frecuente, escasa. Orina aromática.

HOMBRES:

Pérdida del deseo sexual. Impotencia psíquica. Emisiones rápidas, erecciones deficientes. Excitación sexual. Erecciones constantes y severas.

MUJERES:

Deseo sexual completamente destruido. Los dolores se alternan entre los ovarios. Dolores uterinos > desvestiéndose y acostándose sobre la espalda. Inflamación de ovarios con recto. Siente como si las reglas fuesen a aparecer. Leucorrea; excoriante; amarillente, ofensiva, profusa, corre por las piernas. Mamas hinchadas, dolorosas. Comezón en los pezones.

RESPIRATORIO:

Tos cortante, con esputo blanco y pegajoso > bebiendo agua fría.

ESPALDA:

Sensación de cansancio en la parte baja de la espalda.

EXTREMIDADES:

Cansadas y sensación de adormecimiento en las piernas y corvas.

RELACIONES:

Cimi; Hyper; Lil-t; Rhus-t.

OPIUM

GENERALIDADES:

El opio contiene cerca de diez y ocho alcaloides de los cuales la Apomorfina, Morfina y Codeína son bien conocidos. Afecta los Nervios, Mente y Sentidos, produciendo insensibilidad de los nervios; Ausencia de dolor, depresión; estupor, adormecimiento; torpidez e indolencia general de función y ausencia de reacción vital; una especie de estado negativo. Las excreciones, a excepción de la piel, están frenadas. Los movimientos voluntarios están disminuídos. Pérdida de poder; de concentración; auto control y juicio. Parálisis; indolora; del cerebro, lengua, intestinos, etc. Temblores, sacudidas, estremecimientos durante el sueño. Convulsiones; < calor; de la habitación o el baño. La cama parece caliente; busca un lugar frío. Caliente; sudor; mano. Sueño estúpido; acompaña todos los malestares; durante los espasmos; frío violento, etc. Epilepsia; en sueños; por el acercamiento de un extraño (en niños); por susto; < brillo de una luz; por enojo; insulto. Lanza las extremidades o estira los brazos al ángulo derecho del cuerpo; estupor entre espasmos. Falta de susceptibilidad a los medicamentos aunque estén bien indicados. Se desmaya cada quince minutos. Sensación de bienestar corporal; gran felicidad. Ulceras indoloras. Supuración. Hinchazón hidrópica de todo el cuerpo. Resequedad interna. Malos efectos del miedo, susto, enojo, vergüenza, alegría súbita; humos de carbón, sol. Los malestares aparecen con sudor. Idiocia completa por masturbación.

AGRAVACION:

Emociones; Miedo, susto; vergüenza; alegría. Olores. Alcohol. Sueño. Descargas suprimidas. Erupciones que retroceden. Si está acalorado. Insolación.

MEJORIA:

Frío. Descubriéndose. Por caminar constantemente.

MENTE:

Pérdida completa de la conciencia. Estados apopléticos. Placidez. No quiere nada; dice que no le inquieta nada. Exaltación de la mente; imaginaciones vívidas. Viveza. Platicador. Erupción. Imprudente; valor aumentado. Soñador. Indolente. Torpe. Estúpido. No tiene poder de voluntad. Tendencia a mentir. Miedos; después de un susto; que permanece. Delirium; tremens; con terror. Quiere irse a su casa, pensando que no está en ella. Carfología. Indiferente al dolor y al placer. Ve visiones terroríficas; ratones, escorpiones, etc. Engañoso; visión, gusto, contacto; perversión de todos los sentidos. Imagina que partes de su cuerpo son muy grandes. Nervioso, irritable; tendencia a sobresaltarse.

CABEZA:

Vértigo; después de susto; de los ancianos; con ligereza de la cabeza; por lesiones en la cabeza. Occipucio pesado. Parálisis del cerebro. Cabeza caliente, con sudor caliente.

OJOS:

Vidriosos, fijos; inmóviles. Pupilas contraídas, dilatadas, insensibles a la luz. Medio cerrados. Volteados hacia arriba. Ptosis. Alucinaciones visuales. Rojos, protuberantes. Embolia de la arteria central de la retina.

OIDOS:

Agudeza de oído. Un reloj que suena a gran distancia lo mantiene despierto.

NARIZ:

Pérdida del olfato.

CARA:

Obscura, turgente, sudorosa, o roja y caliente o pálida y roja, alternadamente. Congestionada. Las comisuras de los labios se tuercen. Temblores; contracturas de los músculos de la cara, mirada de viejo; después de cólera infantil; de un lactante de 3 o 4 semanas de nacido. Caída de la mandíbula inferior. Trismo. Labios hinchados y protuberantes.

BOCA:

Lengua; paralizada; la saca hacia el lado derecho; negra, seca, lenguaje difícil. Espuma sanguinolenta. Boca seca.

GARGANTA:

Seca. Incapacidad para tragar. Al deglutir alimentos se va hacia el lado equivocado, o se regresa por la nariz.

ESTOMAGO:

Hambriento; pero no desea comer. Vómito; en peritonitis; de materia fecal o de orina. Muy sediento. Arqueos por emociones.

ABDOMEN:

Duro, timpánico. Como con un peso en el abdomen. Los intestinos se sienten completamente obstruidos. Atonía parálitica de los intestinos; después de una laparotomía. Cólico de plomo. Hernia umbilical o inguinal estrangulada. Constipación obstinada. Evacuaciones de bolas negras y duras. Moco sanguinolento que rezuma de un ano abierto. Retención de heces por íleo. Evacuaciones involuntarias; después de un susto. Dolor violento en el recto como si fuese presionado en dos. Emisión difícil de flatos. Espasmos intestinales, el niño llora día y noche.

URINARIO.

Atonía parálitica de la vejiga; después de una laparotomía. Retención de orina; en niños por lactar de una nodriza enojada; por espasmos del cuello de la vejiga; por susto. Orina lenta para bajar; flujo débil. Involuntaria por susto. Cólico renal; el dolor radia a la vejiga y los testículos.

HOMBRES:

Estrictura espasmódica por beber licores pobremente fermentados; y en borrachos.

MUJERES:

Dismenorrea; forzándola a doblarse en dos; con necesidad de evacuar. Amenorrea por susto. Reblandecimiento del útero. Movimientos fetales muy vivos o violentos. Convulsiones puerperales. Amenaza de aborto, y supresión de loquios por susto. Convulsiones que vienen por detener los dolores de parto. Prolapso por susto. Hipo durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Respiración desigual y estertorosa. Estertor suspiroso, de ronquido, continuo. Tos; cosquilleante con disnea y cara azul; o sudor profuso en todo el cuerpo, > bebiendo agua. Calor en el pecho. La respiración se detiene al empezar a dormir y no se inicia a menos que se mueva al paciente. Hemoptisis. Afonía por susto. Bostezos después de la tos.

CORAZ_N: Ardor alrededor del corazón. Débil. Pulso lleno, lento. Palpitación después de eventos alarmantes, susto, pena, pesar, etc.

ESPALDA:

Opistótonos. Arterias pulsátiles y venas hinchadas en el cuello.

EXTREMIDADES:

Temblor de las piernas después de un susto. Parálisis indolora. Estremecimientos y movimientos espasmódicos de los miembros. Venas de las manos distendidas. Siente como si los miembros inferiores estuviesen separados y pertenecieran a otra persona. Adormecimiento; debilidad. Paso tembloroso y arrastrante. Uno u otro brazo se mueve convulsivamente de acá para allá.

PIEL:

Hormigueo aquí y allá. Comezón general. Aspera y sucia. Seca. Ulceras indoloras e indolentes. Todo el cuerpo se vé rojo. Manchas azules.

SUEÑO:

Somnolencia. Sueño pesado y estúpido; de los ancianos. Cansado e insomne; borrachos. Insomnio por agudeza de oído. Coma vigil. Somnoliento, pero no puede dormirse. Sueños de gatos, perros, formas negras.

FIEBRE:

Temperatura general baja, con predisposición al estupor. Caliente, sudoroso y amodorrado; con miembros fríos. Sudor caliente sobre todo el cuerpo a excepción de los miembros inferiores. Sudores; sin alivio.

COMPLEMENTARIO:

Alu; Bar-c; Pho; Plb.

RELACIONES:

Arn; Nux-m.

ORIGANUM

GENERALIDADES:

El orégano dulce, afecta fuertemente los órganos sexuales femeninos. Incrementa el deseo de coito. Eroto-manía; con inclinación a cometer suicidio. Gran excitación sexual que la lleva a la masturbación. Ideas lascivas; impulsos, sueños. Hinchazón y comezón de los pezones y dolor en el seno.

Pensamientos de matrimonio; que disipan la tristeza. Deseo de ejercicios activos, que la obligan a correr.

RELACIONES:

Canth; Hyo; Plat.

OSMIUM

GENERALIDADES:

Este metal se encuentra asociado con el platino. Afecta el tracto respiratorio; especialmente la tráquea. Aunque las secreciones son fétidas, la orina huele a violetas; eructos como rábanos y el sudor axilar a ajo. Hormigueo en la espalda y los hombros. Los dolores van arriba y abajo. Causa la adhesión del pliegue de la uña.

AGRAVACION:

Por toser. Hablando.

MENTE:

Humor lagrimoso, gritos con tos.

OJOS:

Color del arcoíris o verdoso alderredor de la luz. Glaucoma; con visión iridiscente.

NARIZ:

Coriza, fluída con sensación de obstrucción. Sorbidos.

ESTOMAGO:

Lo siente lleno de piedras quebradas o bultos. Eructos que huelen como a rábanos.

URINARIO:

Orina; albuminosa; con olor a violetas.

HOMBRES:

Dolor fijo en el glande. Dolor en los testículos y cordón espermático.

RESPIRATORIO:

Tos espasmódica; suena como si tosiera dentro de un tubo vacío; con sensación de desgarramiento y esputo tenaz. Hablar causa dolor en la laringe. Pasajes de aire sensibles.

ESPALDA:

Hormigueo en espalda y hombros.

EXTREMIDADES:

Sudor axilar con olor a ajo. Torcimiento de los dedos con tos espasmódica. El pliegue de la piel permanece adherido al crecimiento de la uña.

PIEL:

Eczema. Granitos con comezón.

RELACIONES:

Ars; Iod; Pho.

OXALICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

A pesar de que los oxalatos se encuentran en ciertos vegetales ácidos que se comen, el ácido en si mismo es un veneno muy violento, que no sólo produce gastro-enteritis; sino que también afecta lo nervios y la médula espinal, causando parálisis motora. El paciente se vuelve débil, frío, lívido y con entumecimiento general < miembros inferiores. Dolores excruciantes; como relámpagos; en líneas; en puntos; ardorosos, etc. Los síntomas < por movimiento y pensando en ellos, no sólo eso, sino que pensar en ellos trae condiciones que no están presentes en el momento. Reumatismo del lado izquierdo. Neurastenia. Neuralgia. Parálisis; del lado izquierdo; por meningitis espinal. Afecciones periódicas.

AGRAVACION:

Pensando en ello. Frío. Contacto. Razurándose. Esfuerzo mental. Movimiento. Fresas, frutas ácidas, uvas.

MEJORIA:

Después de evacuar.

MENTE:

Nervioso e insomne. Muy regocijado; muy rápido de acción y pensamiento. Todas las condiciones se agravan por pensar en ellas.

CABEZA:

Vértigo; sensación de flotación al acostarse, mientras mira fuera de la ventana. Sensación como de una banda alderredor de la cabeza; como un tornillo detrás de cada oreja, > después de evacuar. Picoteo entumecedor en el occipucio. Punto doloroso y sensible en el cráneo.

OJOS:

Los objetos pequeños y especialmente los planos aparecen más grandes y más distantes de lo que en realidad están. La vista se desvanece con epistaxis. Hiperestesia de la retina.

CARA:

Pálida, fría, lívida. Sensación de calor.

BOCA:

Gusto ácido; eructos; con deglución difícil.

ESTOMAGO:

Vacío con compulsión atrozante a comer. Dolor ardiente que vá hacia arriba < el mínimo contacto; azúcar. No puede comer fresas. El azúcar, café y vino caen mal.

ABDOMEN:

Cólico alderredor del ombligo; o heces involuntarias, lodosas, cafés > acostándose. Los flatos pasan con dificultad. Dolores punzantes en el hígado > por respirar profundamente. Desvanecimiento y vómito durante la evacuación. Diarrea por café. Inflamación crónica de los intestinos.

URINARIO:

El pensar en la micción causa una necesidad de orinar. Dolores en el pene al orinar. Oxaluria.

HOMBRES:

Dolores neurálgicos en el cordón espermático; < por el mínimo movimiento. Los testículos laten o se sienten aplastados.

RESPIRATORIO:

Voz baja. Ronquera con desarreglos cardíacos. Afonía por parálisis de las cuerdas vocales. Disnea; cada noche. Inspiración corta, sacudiente, y expiración súbita y forzada. Dolor de la parte baja del pecho (izquierdo) hasta el epigastrio. Pecho fijo. Pulmón izquierdo doloroso. Voz alterada.

CORAZON:

Punzada aguda en el corazón y pulmón izquierdo que se extiende al epigastrio, impidiendo la respiración; se sienta erguido con los brazos cruzados y doblados sobre el pecho. Palpitación < acostándose. Angina de pecho. Los síntomas de corazón se alternan con afonía. Los latidos del corazón se detienen cuando se piensa en ellos. Corazón aleteante.

ESPALDA:

Hormigueo entumido en la espalda. La espalda se siente muy débil para sostener el cuerpo. Frío que repta por la espalda.

EXTREMIDADES:

Debilidad temblorosa en manos y pies. Dolores lancinantes, tirantes que se disparan hacia abajo a las extremidades. Miembros inferiores azules, fríos, insensibles; inmóviles. El entumecimiento se extiende desde los hombros a las puntas de los dedos. Manos frías como de muerto. Muñeca (derecha)

constantemente dolorosa, como torcida, quiere estirarla; no puede sostener nada. Dolor en la parte carnosa del dedo gordo (derecho).

PIEL:

Sensible, inflamada, punzante < por rasurarse. Suda fácilmente. Moteada en parches circulares.

RELACIONES:

Arn; Pic-ac.

OXYTROPIS

GENERALIDADES:

Comúnmente conocido como Loca o semilla loca, tiene una acción marcada en el sistema nervioso, produciendo un caminado vacilante, trastabillante o hacia atrás. Gran depresión mental. Necesidad de orinar al pensar en ello. Temblores y sensación de vacío.

AGRAVACION:

Pensando en ello. Cada tercer día.

MEJORIA:

Después de dormir.

PAEONIA

GENERALIDADES:

Los síntomas anales y de piel están marcados. La piel está muy sensible; ulceraciones; por presión; por botas muy ajustadas, úlceras por decúbito, etc. Dolores como de astillas o punzantes. Venas varicosas. Se revuelca en el suelo por el dolor.

AGRAVACION:

Contacto o presión. Noche. Movimiento. Evacuar.

MENTE:

Muy afectado por malas noticias.

RECTO:

Dolores excruciantes en el ano; continúan mucho tiempo después de que se evacuó; debe levantarse y caminar por allí; por la noche. Fisuras o fístula en ano. Hemorroides- grandes, ulceradas. Ulcera dolorosa, rezumante, humedad ofensiva en el perineo. Ano cubierto de costras.

SUEÑO:

Pesadillas aterradoras.

PIEL:

Sensible. Ulceras por presión, por decúbito. Juanetes.

RELACIONES:

Rat.

PALLADIUM

GENERALIDADES:

Este metal está asociado muy de cerca al Platino y al Oro. Afecta los ovarios especialmente el derecho; útero y mente. Dolores fugaces; transitorios. Debilidad, aversión al ejercicio. Dolorimiento magullante. Malestares por malas noticias.

AGRAVACION:

Emociones; festivo; disgustos. Funciones sociales. Por estar de pié. Esfuerzo.

MEJORIA:

Contacto. Presión. Diversión. Frotamiento. Después; sueño; evacuaciones.

MENTE:

Deseo de aprobación; busca la buena opinión de otros y les dá gran importancia. Fácil presa de los menosprecios, reales o imaginarios; orgullo herido y descuidos imaginarios; en ocasiones da libre curso a expresiones violentas. Las noticias deprimentes < todos los síntomas. El tiempo pasa demasiado lentamente. Se mantiene muy vivaz en compañía, pero muy extenuado después.

CABEZA:

Siente como que oscila hacia adelante y hacia atrás. Cefalalgia que atraviesa por encima de la cabeza, de oreja a oreja, > fijando la atención en ello.

CARA:

Azul, cetrina.

GARGANTA:

Como con morusas de pan que se hubiesen atorado allí; como algo que colgara del hueso hioides. Moco tenaz de la garganta.

ABDOMEN:

Dolor tirante del ombligo a los senos o pelvis; > después de evacuar. Oquedad en las ingles. Como si los intestinos fuesen mordidos. Tos, estornudos < el dolor del abdomen. Evacuaciones; blancas, constipado.

URINARIO:

Dolor cortante en la vejiga > evacuar. La vejiga se siente llena, pero pasa poca orina.

MUJERES:

Prolapso uterino o retroversión. Peritonitis pélvica sub-aguda. Dolores de bajo vientre > frotando. Dolor cortante en el útero > después de evacuar. Descarga menstrual mientras amamanta. Leucorrea tenaz, amarilla, antes y después de las reglas. Pelvis cargada y pesada, < estando de pié. Dolor ovárico > presión. El abdomen se siente adolorido, después de las reglas y con aprensión por algo horrible que parece que sucederá.

ESPALDA:

Sensación de cansancio en la parte baja de la espalda.

EXTREMIDADES:

Dolores neurálgicos fugaces en varias partes del cuerpo. Dolores punzantes desde los dedos de los pies hasta las caderas.

PIEL:

Comezón en todo el cuerpo, después de desvestirse.

RELACIONES:

Asaf; Plat.

PAREIRA BRAVA

GENERALIDADES:

Los órganos genito-urinarios y el lado izquierdo se ven afectados por este remedio. Urgencia constante de orinar; dolor violento en el glande y bajo las caderas durante los esfuerzos para orinar; debe apoyarse en rodillas y manos presionando la cabeza firmemente al suelo para orinar. Induración cartilaginosa de las membranas mucosas de la uretra y la vejiga. Cólico renal; próstata crecida; con retención de la orina y catarro de la vejiga. Disuria. La orina contiene moco espeso, filamentoso, blanco o arena roja. Edema de los miembros inferiores.

RELACIONES:

Berb; Med.

PARIS QUADRIFOLIA

GENERALIDADES:

Afecta la cabeza, espina, ojos y un lado. Sensación de pesadez; adormecimiento; las partes se sienten demasiado grandes o pegadas. Desórdenes del sentido del tacto; los objetos se sienten ásperos. Frialidad del lado derecho del cuerpo mientras que el izquierdo está caliente. Todo el cuerpo adolorido especialmente cuando se le toca. Secreciones mucosas que son verdes y tenaces. Sensibilidad a los olores ofensivos. Sensación de rotura; de las articulaciones. Malos efectos de lesiones; supresiones.

AGRAVACION:

Pensando. Esfuerzo visual. Contacto.

MEJORIA:

Presión. Eructos.

MENTE:

Locuacidad garrafosa. Conducta tonta. Manía locuaz. Inclinação a tratar a otros con rudeza y desprecio.

CABEZA:

Vértigo al leer en voz alta. Cefalalgia < por pensar. La cabeza se siente grande, expandida. Cefalalgia occipital con sensación de peso. La cabeza duele como si estuviese jalando una cuerda desde los ojos hacia el occipucio. Cráneo sensible, no puede peinar su cabello. Lado izquierdo entumido. Cefalalgias crónicas.

OJOS:

Los globos parecen jalados hacia atrás o se sienten muy grandes, y pesados.

OIDOS:

Dolor como si los oídos fuesen presionados hacia afuera, o como si fuesen separados con una cuña < al deglutir.

NARIZ:

Olores fétidos imaginarios. El pan, pescado, leche, huelen a podrido.

CARA:

Parece jalada hacia la raíz de la nariz. Neuralgia; punzadas calientes en los huesos malos.

BOCA:

Y lengua secas; al despertar. La lengua se siente muy grande.

GARGANTA:

Expele moco verde tenaz. Como con una pelota en la garganta. Ardor, al comer y beber.

ESTOMAGO:

Pesado como por una piedra, > por eructos. Digestión débil. Línea curva y roja sobre el ombligo.

RESPIRATORIO:

Ronquera periódica indolora.

CUELLO:

Peso y cansancio en la nuca. Punzadas en el cóccix al sentarse. Dolor violento en ambos lados del cuello, extendiéndose a los dedos < esfuerzo mental.

EXTREMIDADES:

Los dedos se sienten entumidos. Todo se siente áspero. Articulaciones; se sienten rotas, hinchadas o dislocadas con cada movimiento.

PIEL:

Dolorosamente sensible.

FIEBRE:

Frialdad unilateral o calor. Calor descendiente hacia la espalda desde el cuello.

RELACIONES:

Bell; Nux-v.

PASSIFLORA INCARNATA

GENERALIDADES:

Tiene un efecto sedante en el sistema nervioso; de allí que sea un remedio antiespasmódico eficiente. Convulsiones de niños; durante la dentición. Rompe el hábito de la morfina. Insomnio de infantes y de ancianos y personas mentalmente preocupadas y con exceso de trabajo. Tétanos. Histeria. Convulsiones puerperales. Asma (10 a 30 gotas). Condiciones atónicas generales. (30 a 60 gotas repetidas varias veces).

PETROLEUM

GENERALIDADES:

Aceite de piedra, actúa principalmente en la piel, especialmente pliegues, cuero cabelludo; cara y genitales. Produce condición catarral de las membranas mucosas, de estómago e intestinos. Es adecuado para enfermedades de largo curso, desgastantes y de asiento profundo; malestares que siguen a estados mentales, susto, vejaciones, etc. prolongando problemas gástricos e intestinales. Debilidad temblorosa. Se siente enfermo internamente. Comezón interna. Temor al aire libre; con estremecimientos cuando se expone a él. Resequedad; en oídos, nariz, etc. Las descargas son espesas, purulentas y amarillo-verdosas. Hemorragias, sangre rojo pálido; < levantando pesos o paseando. Ardores. Sacudidas, catalepsia. Hidropesía. Uno de los primeros remedios para mareos por pasear en carros, trenes o por mar. Malos efectos de torceduras; erupciones suprimidas. Sensación como de torpeza. Emaciación, especialmente del pecho. Frialdad; en puntos; en el abdomen, corazón, después de rascarse. Adolorimiento magullante < en las articulaciones. Glándulas crecidas. Grietas. Granulaciones insanas después de quemadas severas. Miedo, prolongado.

AGRAVACION:

Movimiento; de carros; carruajes; barcos. Clima-frío; invierno; cambiante; tormentas con rayos. Por comer. Vejación. Calabazas (chauchas). Coito. Contacto, aún el de la ropa.

MEJORIA:

Aire tibio. Clima seco. Acostado con la cabeza alta.

MENTE:

Excitado, irritable, después del coito; con inclinación a enojarse y a regañar. Irresoluto. Sensación de dualidad, piensa que es doble o que alguien está acostado a su lado o que una de sus miembros es doble. La muerte parece cercana y debe apresurarse para arreglar sus asuntos. Se preocupa pero no sabe por qué. Pierde su camino en la calle; pérdida de memoria. Miedoso.

CABEZA:

Vértigo, como el producido por un movimiento de balanceo; lo siente en el occipucio. Occipucio; doloroso, pesado. Cefalalgia < sacudiendo, mientras tose, debe sostenerse las sienes para mejorarse. Caída del cabello. Erupciones húmedas en el cráneo < occipucio y orejas. La cabeza se siente entumida como hecha de madera. Como si soplara aire frío en la cabeza.

OJOS:

Angulo de los párpados inflamados. Pérdida de pestañas. Fístula lagrimal (de origen reciente). Bordes fisurados.

OIDOS:

Sordera; con ruidos en los oídos en ancianos. El ruido que producen varias personas hablando es insoportable. Resequedad de las orejas. Descarga de pus y sangre de los oídos. Puntos húmedos detrás de las orejas. Comezón profunda en los oídos, en los tubos eustaquianos. Externamente doloroso.

NARIZ:

Seca. Alas; ulceradas, agrietadas, arden. Ocena; descarga purulenta. La punta de la nariz produce comezón.

CARA:

Seca; como cubierta por albúmina. Pálida o amarilla, caliente después de comer. Dislocación fácil de la mandíbula.

BOCA:

Seca. Olor ofensivo como de ajo. Ulceras en la mejilla interna, dolorosa cuando cierra los dientes. Adolorimiento mientras mastica. Lengua; blanca, en el centro, rayas oscuras a lo largo de los bordes.

GARGANTA:

Moco fétido en la garganta. Carraspera por la mañana. Seca.

ESTOMAGO:

Hambre; causando náusea; lo despierta por la noche, después de evacuar. Eructos picantes y acres. Sed por cerveza. Deseo de golosinas. Aversión a la carne, grasas, alimentos cocinados o calientes. Vómito de substancia verde y amarga. Náusea; por mareo en tren o barco; durante el embarazo, debe agacharse.

ABDOMEN:

Inflado; frío. Diarrea o disentería durante el día solamente; < calabaza (chauchas); luego sensación de vacío miserable. Comezón en el ano, después de evacuar. Cólico pellizcante > doblándose en dos. Ombligo ulcerado en los infantes. Hemorroides y fisuras en el ano; con gran comezón. Herpes en el perineo.

URINARIO:

Orina involuntaria al levantarse. Estrictura por uretritis crónica. Enuresis, por la noche. Necesidad aguda y súbita, que si no se atiende rápidamente causa dolor severo. Cistitis, uretritis. Goteo de orina después de la micción.

HOMBRES:

Herpes con comezón y ardor; en el escroto; entre el escroto y las caderas; en el perineo. Genitales sudorosos (ambos sexos).

MUJERES:

Aversión al coito. El flujo menstrual causa comezón. Irritación y humedad en genitales con comezón violenta. Leucorrea; albuminosa, profusa, con sueños lascivos. Comezón y recubrimiento harinoso sobre los pezones. Erupciones secas obstinadas. Prolapso del útero por diarrea constante.

RESPIRATORIO:

Tos, que viene desde lo profundo del pecho; despertando al paciente, por la noche (en niños y niñas). Tos por la noche solamente o < entonces; siente que la cabeza le estalla > presionando. Opresión del pecho por aire frío.

CORAZON:

Sensación fría alderredor del corazón. Desvanecimiento con ebulliciones, calor y palpitaciones.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido; crujidos cuando lo mueve. Dolor en la espina y en todo el cuerpo con ciática. Cóccix doloroso al sentarse. Dolor en el sacro < estando de pié y erguido. Dolores agudos que se disparan por la espina dorsal al occipucio; parto.

EXTREMIDADES:

Crujido en articulaciones. Coyunturas rígidas. Los miembros se duermen. Manos y dedos rajados cortados, sangrando; en las criadas. Psoriasis de las palmas. Punzadas; ampollas en los talones.

PIEL:

Sucia, Dura, Aspera, Engrosada; como parchada; se pone excoriada, las heridas no sanarán; < en los pliegues. Grietas profundas; en los ángulos, pezones, puntas de los dedos. Manchas cafés. Erupciones con costras gruesas, duras, húmedas y amarillo verdosas; en el occipucio; en los genitales < frío. Eczema. Herpes. Vesículas. Comezón; en orificios, con ardor. Puntos fríos. Todas las erupciones dan comezón violenta y uno debe rascarse hasta que la piel sangra; la parte se pone fría después del rascado. Sabañones que producen comezón, arden y se vuelven purpúreos.

SUEÑO:

Inquieto, con sueños pavorosos.

FIEBRE:

Frío con boca seca. Palmas y plantas calientes. Sudor en puntos; fétido en los pies y las axilas. Bochornos de calor en todo el cuerpo, que se presentan frecuentemente durante el día.

COMPLEMENTARIO:

Sep.

RELACIONES:

Grav; Sep.

PETROSELINUM

GENERALIDADES:

Este remedio tiene influencia en la esfera genito-urinaria. Necesidad súbita, irresistible de orinar, con tirantez, cosquilleo, hormigueo y comezón en el perineo y a través de toda la uretra. Gonorrea; descarga lechosa o amarilla. Disuria; con crecimiento prostático. Dificultad para orinar en los bebés. Micción muy dolorosa, causando estremecimiento y poniéndolo a danzar por la habitación con angustia.

PELLANDRIUM

GENERALIDADES:

Produce condiciones catarrales del tracto respiratorio. Tisis. actúa en las mamas y nervios. Sensación de cansancio mientras camina. Como si las venas estuviesen en movimiento vibratorio.

AGRAVACION:

Aire; frío, libre. Usando los ojos.

MEJORIA:

Mientras amamanta.

MENTE:

Arrogancia displiscente.

CABEZA:

Sonido resonante, como golpeando metal, en el cerebro, que lo despierta. Peso en el vértice; con dolor y ardor en las sienes y sobre los ojos.

OJOS:

Neuralgia ciliar < tratando de usar los ojos. Intolerancia a la luz. Sólo abiertos a medias y parecen como si se hubiese llorado toda una semana.

CARA:

Rojo pálido por la noche.

ESTOMAGO:

Eructos con olor a chinches. Todo sabe dulce. Desea cosas ácidas; leche o cerveza. Aversión al agua.

MUJERES:

Dolor en los pezones cada vez que se acerca al niño; hacia el abdomen. Dolor intolerable en los ductos de leche; entre una y otra amamantada.

RESPIRATORIO:

Expectoración; horriblemente ofensiva (como de chinche); floja, profusa, embarrante, causando disnea. La tos lo obliga a sentarse. Dolor punzante que atraviesa desde el borde izquierdo del seno derecho, hasta entre los hombros. Los dolores van hacia atrás a través del pecho.

SUEÑO:

Tan somnoliento; que caería dormido mientras está trabajando.

RELACIONES:

Asaf.

PHOSPHORICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

Pho-ac. afecta la Mente especialmente su Lado Emocional; además influencia los nervios sensorios; sistema sexual y huesos. La Debilidad y Enflaquecimiento común a todos los ácidos, están muy marcados en este ácido; con secreciones abundantes; micción profusa; pérdida de fluídos; sudores, etc. excepto con la diarrea. La debilidad mental aparece primero, luego la física. Lentitud mental, y en los sentidos especiales. Los dolores van a la parte sobre la que se apoya. Sensible a la luz, sonidos y olores, que le quitan la respiración. Sensación de presión; como causada por un peso; en la frente, el esternón, el vértice; en ojos, ombligo, pechos, etc. Hormigueo; en la raíz del cabello; a lo largo de la espina; miembros. Util para aquellos jóvenes que crecen rápidamente y que tienen una sobrecarga mental y física; cuando el sistema tiene estragos por enfermedades agudas; excesos venéreos; pesares, pérdida de fluídos vitales, el remedio es este ácido. Adolorimiento magullante; como dolores crecientes. Hemorragias, sangre oscura. Enfermedad de los huesos. Osteítis. Periosteítis. Caries. Raquitismo. Diabetes. Neurosis del muñón después de amputaciones, > por una respiración profunda. Mejora los dolores del cancer. Frialidad; de las partes. Malos efectos de malas noticias; decepciones amorosas, pesar; disgustos, lesiones; shock. Desfallecimiento; con emaciación. Neurastenia. Formación de abscesos después de fiebre. Dolor mordiente en los huesos. Coyunturas flojas. Las partes externas se vuelven negras; gangrena senil.

AGRAVACION:

Pérdida de fluídos. Excesos sexuales. Fatiga. Convalecencia después de fiebres. Emociones; pesar; disgustos. Choque mental. Nostalgia. Amor desdichado. Corrientes; frías. Música. Por hablar. Por sentarse. De pié. Por cargar cosas pesadas. Operaciones. Miedo (crónico).

MEJORIA:

Calor. Sueño corto. Evacuando.

MENTE:

Quieto; no quiere hablar, o habla impulsivamente. Indiferente; a todo. Apático; por una lucha desigual con circunstancias adversas, mentales y físicas; obtuso o tórpe; con tendencia a la diarrea o sudoración. Comprensión lenta. No puede reunir sus ideas; busca las palabras. Memoria pobre. Se establece la desesperación. Aversión a hablar. Contesta lentamente o a fuerza, en forma corta o incorrectamente. Histeria por cambio de vida. Nostalgia con inclinación a llorar. Delirio leve; aparece fácilmente. Niebla mental. Teme al futuro; medita sobre su propia condición.

CABEZA:

Peso aplastante en el vértice; dolor en las sienas, como si estuviesen aplastadas; < sacudiendo la cabeza o por el ruido. Vértigo; como si flotara en el aire, mientras está acostado en su cama, con tintineo en los

oídos y ojos vidriosos; < de pié o caminando. El cabello se adelgaza, se vuelve gris prematuramente. Caída del cabello. Cefalalgia de las estudiantes; por uso excesivo de los ojos. Cefalalgia; después del coito.

OJOS:

Sin brillo; vidriosos; fijos; hundidos; con anillos azules alderredor. Dolor en los globos como si fuesen apretados juntos e introducidos en la cabeza. Los globos se sienten muy grandes. Manchas amarillas en la conjuntiva. Pérdida de la visión por masturbación. Vé arcoiris. Fotofobia.

OIDOS:

Intolerancia al ruido esp. la música, que causa punzadas aún cuando esté cantando él mismo. Sordera nerviosa después de fiebres tipo tifoidea. Cada sonido se recrea fuertemente en el oído. Sonido chillón en los oídos al sonarse la nariz. Ilusión de oído; oye campanas repicando. Dolor de oído al sonarse la nariz.

NARIZ:

Sangrante. Con comezón; introduce los dedos en la nariz. Naríz hinchada, con parches rojos o espinillas en la punta de la nariz.

CARA:

Pálida, enfermiza. Tensa, como si una clara de huevo se hubiese secado sobre ella. Un lado frío. Acné por onanismo. El pelo de la barba se cae.

BOCA:

Sangrando, encías hinchadas, retraídas de los dientes. Los dientes se ponen amarillos y se sienten romos. Lengua limosa. Línea roja en la mitad de la lengua. Se muerde los lados de la lengua involuntariamente; en sueños. Boca seca. Labios secos, agrietados. Nudosidades dolorosas en las encías. Gusto a huevos podridos.

GARGANTA:

Expele moco tenaz. Resequedad del paladar.

ESTOMAGO:

Desea cosas refrescantes y jugosas; leche fría. Acidez. Los alimentos y bebidas ácidas caen mal. Presión como de un peso. Pérdida de apetito.

ABDOMEN:

Adolorimiento en la región umbilical. Distensión y fermentación. Rugido audible. Frío. Evacuaciones profusas; sucias; de agua blanca o lientéricas; pero poca debilidad. Heces involuntarias; escapan con los flatos; al moverse, en los niños. Evacuaciones sin olor. Hígado; parece estar muy pesado; doloroso; durante las reglas. Flatos ofensivos con olor a ajos.

URINARIO:

Orina; frecuente, profusa, acuosa. Lechosa. Diabetes. Fosfaturia. Ardor en la región del riñón. Enuresis en el primer sueño. Suero de leche como orina, poco antes de las reglas.

HOMBRES:

Genitales débiles y relajados; súbitamente durante el coito, impidiendo la emisión. Debilidad y poluciones después del coito. Emisiones nocturnas; con sueños lascivos. Los testículos están sensibles e hinchados. Prostatoreas al pasar heces suaves. Herpes prepucial. Eczema de escroto. Excrecencias sicóticas.

MUJERES:

Utero inflado, como lleno de aire. Reglas, demasiado adelantadas y demasiado profusas; con dolor en el hígado. Leucorrea amarilla con comezón, después de las reglas. La salud se deteriora por el amamantamiento. Presión aguda en la mama izquierda. Los infantes vomitan la leche constantemente. Disuria durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Sensación débil en el pecho < por hablar, toser o sentarse; > caminando. Se resfría; > corrientes en el pecho. Tos con cosquilleo espasmódico. Presión o retorcimiento detrás del esternón; volviendo la respiración difícil. Expectoración salada.

CORAZON:

Palpitación; en niños y personas jóvenes que crecen demasiado rápido; después de pesares; después de auto-abuso. Pulso irregular; intermitente.

CUELLO Y ESPALDA:

Debilidad parálitica a lo largo de la espina. Hormigueo a lo largo de la espina. Espondilitis de las vértebras cervicales. Región lumbar pesada, que incrementa el dolor en las piernas. Ardor a lo largo de la espina. Punzadas finas en cóccix y esternón. Forúnculos en los gluteos.

EXTREMIDADES:

Antebrazos pesados. Lobanillos en las manos entre los huesos metacarpianos. Hormigueo en los miembros. Dolores por la noche como si los huesos estuviesen raspados. Se tropieza con facilidad y dá pasos en falso. Ardor bajo la cintura. Presión como calambres en brazos, manos y dedos. Entumecimiento a lo largo del nervio radial.

PIEL:

Arrugada. Espinillas, acné, ampollas de sangre. Tendencia a formar abscesos después de fiebres. Ulceras indoloras con pus de mal olor. Hormigueo en varias partes.

SUEÑO:

Somnoliento en el día; caliente y desvelado por la noche. Sueño profundo, pero se despierta totalmente consciente; durante la fiebre. Sueño corto > la debilidad.

FIEBRE:

Partes frías; un lado de la cara; abdómen, etc. Calor con sudor. Sudor profuso; < por la noche; como una secuela. Fiebres indoloras indolentes.

COMPLEMENTARIOS:

Chin.

RELACIONES:

Gel.

PHOSPHORUS

GENERALIDADES:

Phos. causa inflamación y degeneración de las Membranas mucosas; de estómago e intestinos; inflama la médula espinal y los Nervios; causando parálisis; desorganiza la sangre; causando degeneración grasosa de los vasos sanguíneos y de los tejidos y órganos del cuerpo; de allí que produzca una imagen de metabolismo destructivo. Es adecuado para personas jóvenes, que crecen rápidamente y están propensas a encorvarse. Corea de niños que crecen demasiado rápido. Personas altas, sensibles, de temperamento sanguíneo; personas nerviosas, débiles y delicadas a quienes les gusta ser magnetizadas. Establecimiento insidioso, aumentando gradualmente la debilidad, finalizando en una enfermedad rápida o severa. Hemorragias; recurrentes, vicariantes; las pequeñas heridas sangran mucho. Descargas rayadas de sangre. Púrpura hemorrágica. Efectos recurrentes, resfríos, crups, etc. Gran susceptibilidad a las impresiones externas, luz, sonido, olor, tacto; cambios eléctricos, etc. Aparición repentina de síntomas; postración, desmayos, súbitos; ataques de debilidad, sudoración, dolores fulgurantes. Actos involuntarios e inciertos. Vacío; en pecho, estómago, etc. Tirantez; en pecho, tos, etc. Dolor o inflamación en puntos. Parálisis; pseudo-hipertrófica de los músculos; de los insanos, interna; garganta, recto. Comezón interna; cosquilleo; latidos aquí y allá. Entumecimiento. Ardores. Sacudidas; localizadas; subsultus. Articulaciones; rígidas, con pequeño dolor; torceduras; dislocaciones fáciles; ataques de debilidad en las coyunturas, < fatiga. Síntomas debidos a afecciones cardíacas y pulmonares. Caries; de los huesos; espina; mandíbula superior. Hinchazones duras aquí y allá. Osteomielitis. Exóstosis. Fragilidad ósea. Pólipos; con sangramiento fácil. Ictericia, como un concomitante, hematógena. Hemofilia. Policitemia. Tumores eréctiles. Piemia. Acidosis. Hábito tísico. Emaciación. Espasmos del lado paralizado. Epilepsia con consciencia. Pequeño mal. Tropezones al caminar. Barómetro humano. Músculos blandos. Malos efectos del enojo, miedo, pena; preocupación; exposición a lluvias empapantes; lavando ropa; tabaco; por cortarse el cabello. Por uso excesivo de la sal. Las heridas ya cicatrizadas se vuelven a abrir y sangran. Lipoma. Cáncer.

AGRAVACION:

Estando acostado; lado doloroso; Lado izquierdo; causas simples; emociones; por hablar; contacto; olores; luz. Frío; aire libre. Poniendo las manos en agua fría. Por ingestiones calientes. Pubertad. Sal. Excesos sexuales. Pérdida de fluídos. Clima; por cambios súbitos de; ventoso; frío; tormentas; rayos. Mañana y noche. Fatiga mental. Penumbra. Por rasurarse.

MEJORIA:

Por comer. Dormir. Frío; alimentos, agua, lavando la cara con agua fría. Frotamiento; magnético. Por sentarse. Oscuridad.

MENTE:

Amatavo; descubre su cuerpo y expone sus genitales. Excitable, se enoja fácil y vehementemente por lo que sufre después. Ansioso; teme estar solo en la penumbra; teme a los fantasmas; su futuro; las tormentas, como algo que reptara y saliera de los rincones. Se postra fácilmente por las impresiones desagradables. Tímido e irresoluto. Melancolía; no inclinado a trabajar, estudiar, conversar. Cansancio de la vida. Prorrumpe en llanto o tiene ataques de risa involuntaria. Destruye todo, escupe a la enfermera, besa a quien esté más cerca de ella. Apatía; indiferencia aún hacia sus propios hijos. Insanía; con ideas exageradas de su propia importancia; grandeza. Cualquier impresión vívida es seguida de calor, como si fuese inmerso en agua caliente. Clarividencia. Lloro antes de las reglas. Quiere consuelo. Se ríe de cosas serias. Ansioso, inquieto, el paciente no puede permanecer sentado o parado por un momento, especialmente en la oscuridad o la penumbra.

CABEZA:

Vértigo; acompaña a muchos síntomas; de los ancianos; flotando; al caminar; girando; > evacuar. Cabeza; pesada; duele; sobre un ojo; con hambre; < niños; < acostándose sobre el lado derecho; > lavando la cara con agua fría. Niebla mental; con frialdad en el occipucio. Sienes ardorosas. Vértice; con latidos, calientes, después de una pena. Reblandecimiento del cerebro, con hormigueo, entumecimiento de los miembros, arrastra los pies. Congestión en la cabeza. Caspa; copiosa. Comezón en el cráneo. Caída del cabello en grandes manojos; en manchas. Occipucio; frío; con choques; epilepsia. Siente como si le jalaran el cabello.

OJOS:

Lagrimo; en viento. Fotofobia. Visión; destellos; halos; rojos; verdes; negros; > haciendo sombra con las manos. Campo de visión estrecho. Los globos se sienten muy grandes; rígidos. Visión de colores luego migraña. Glaucoma. Cambios degenerativos en las celdas retinianas. Retinitis albuminúrica. Pérdida parcial de la vista por abuso del tabaco, excesos sexuales, relámpago. Atrofia óptica. Coroiditis. Pestañas largas y curvadas. Amarillos. Cataratas. Ojos hundidos, con anillos azules a su alrededor. Opacidades vítreas. Las letras parecen rojas cuando se leen. Sensación como si todo estuviese cubierto de neblina; polvo o un velo o como con algo que jalara fuertemente los ojos. Ojos volteados hacia afuera.

OIDOS:

Audición difícil; de la voz humana. Ecos y reverberación de los sonidos; especialmente la música. Pólipos en los oídos. Otitis; media. Mastoiditis. Audición apagada después de la tifoidea. Como con cuerpos extraños que estuviesen atorados. Algo parece estar constantemente en frente de los oídos.

NARIZ:

Movimiento nerviosos de aleteo de las alas nasales. Coriza; alternadamente, fluída y seca; en lados alternos. Epistaxis; en lugar de las reglas; de las jóvenes, luego neumonía; con tos, durante la evacuación. Nariz hinchada. Caries. Ulceras en la nariz. Pólipos nasales, que sangran fácilmente.

Catarro crónico, sale sangre de la nariz. Estornudos; < olores, humos, etc. con disnea, causando dolor en la garganta. Catarros nasales descendentes. Hipersensibilidad de olfato. Estornudos y coriza al poner las manos en agua. Hinchada, roja, brillante. Malos olores.

CARA:

Pálida alderredor de la nariz y boca; macilenta; cambiando de color. Necrosis de la mandíbula inferior. Calor ardiente y enrojecimiento de las mejillas. Labios; azules, secos, agrietados, tiznados, costrosos. Piel como muy estirada.

BOCA:

Dientes entumidos. Dolor de dientes por lavar ropa; por tener las manos en agua fría o caliente. Encías; sangrantes; excoriadas detrás de los incisivos centrales. Lengua seca, suave, roja. Comezón en el paladar. Abscesos del paladar duro. Gusto ácido; después de la leche; amargo; dulzón al toser. Boca jalada hacia la izquierda. Lenguaje difícil, tartamudea. Salivación; salada o dulzona. Boca excoriada del lactante, con senos excoriados.

GARGANTA:

Seca; brillante. Como si un algodón o algo colgara allí. Ardor en el esófago. Estrictura del esófago. Anginas y úvula hinchadas; úvula alargada.

ESTOMAGO:

Desea bebidas frías; que > pero son vomitadas un poco después, cuando se calienten en el estómago. Vómito post-operatorio después de cloroformo. Regurgita lo comido en bocanadas. Dolor en el estómago > bebidas frías. Hambre; voraz; nocturna; antes de un ataque de náusea. Aflujo de agua en la boca. La comida que escasamente se acaba de tragar se devuelve; espasmos del esófago en la terminación cardíaca. Vómito; de bilis, sangre, residuos de café. Úlcera del estómago. Ardor en el estómago < por comer. Desea; sal, ácidos y cosas condimentadas; que se rehúsan al ser ofrecidas. Sensación de un hueco vacío en el estómago; como si colgara < emociones. Temblores; algo que aleteara o rodara por el estómago. Incapaz de beber agua; durante el embarazo, la vista del agua la hace vomitar, tiene que cerrar los ojos al bañarse. Náusea al poner las manos en agua caliente. Estómago frío, como si estuviese congelado.

ABDOMEN:

Presión sobre el epigastrio. Punto doloroso en el hueco del estómago. Lo siente frío. Se frota el estómago para aliviarse. Heces; como sagú cocinado; granular, delgadas, tenaces. Heces y flatos muy fétidos. Diarrea indolora; copiosa; gris; azulosa; acuosa; que se escapa; nerviosa; involuntaria, después de un susto; debilitante. Diarrea y constipación alterna en ancianos. Disentería. Ano abierto; prolapsado. Estrictura del recto; heces aplanadas. Ardor en el recto. Ictericia; con neumonía o enfermedad cerebral; durante el embarazo; por excitación nerviosa; maligna; hematogénea. Atrofia del hígado aguda y amarilla. Hepatitis aguda. Manchas grandes y amarillas en el abdomen. Excoriación del ano > con ropa caliente. Descarga de sangre por el recto, durante la evacuación. Cólico flatulento < bebidas calientes. Necesidad de evacuar, al acostarse sobre el lado izquierdo.

URINARIO:

Micción profusa, pálida, acuosa; luego debilidad. Película en la orina. Hematuria; en nefritis aguda; con ictericia. Albuminuria; periódica. Vejiga llena sin necesidad de evacuar.

HOMBRES:

Deseo irresistible; pero impotencia. Lascivia; se desnuda; manía sexual. Erecciones débiles o inexistentes. Descarga constante de fluido incoloro, delgado, débil, por la uretra.

MUJERES:

Reglas; demasiado adelantadas, escasas, no profusas pero prolongadas. Leucorrea; profusa, punzante, corrosiva, en lugar de las reglas. Ninfomanía. Esterilidad; por voluptuosidad excesiva; o con reglas profusas, o muy tardías. Sangramiento uterino frecuente y profuso; o corto entre los períodos; en mujeres que amamantan. Cáncer del útero. Amenorrea; con esputos de sangre; sangramiento del ano o hematuria o con sangre en el seno. Supuración en las mamas; con úlceras fistulosas. Cáncer del seno. Pólipos uterinos. Dolores infra-mamarios izquierdos. Vagina entumida durante el coito, a pesar de la excitación sexual. Violento deseo sexual durante el embarazo y lactancia. Pezón caliente y excoriado.

RESPIRATORIO:

Respiración opresiva; < al mínimo movimiento. Respiración sofocante y tirante; < tos. Laringe; excoriada, adolorida; con cubierta; dolorosa al hablar. Voz; baja; ronquera < mañana y noche; cruposa, luego bronquitis. Tos; dura, silbante; seca, violenta, dolorosa, cosquilleante; con carraspera, fatigante; con arcadas; causa dolor en el abdomen; ardor en los pasajes de aire y temblor, < por leer en voz alta; cambios de clima; ante los extraños; riéndose, por ejercicio, cantando. Espujo; fácil, espumoso, mohoso, azulado, salado, ácido, dulzón, o frío. Neumonía; del pulmón izquierdo inferior; secundaria, con sopor. Pecho; lleno; pesado; con dolores en la garganta o el brazo derecho; o alternando lados; punzadas en el pecho superior izquierdo; estertor < bebidas frías. Sensación seca, caliente en el pecho; con tos; primero seca, luego floja. Asma después de tos. Hemoptisis repetitiva. Tuberculosis, en personas altas; esbeltas, de crecimiento rápido. Congestión de los pulmones. Como con un pellejo en la laringe.

CORAZON:

Palpitación violenta con ansiedad; por la mínima cosa; durante el bocio. Dolores que van al brazo derecho. Dilatación del corazón por degeneración grasosa o endo-carditis. Corazón débil. Pulso rápido, pequeño, suave. Sensación de calor en el corazón. Manchas amarillas en el pecho.

CUELLO Y ESPALDA:

La espalda duele como si estuviese rota, impidiendo todo movimiento. Calambres; ardores; entre las escápulas. Irritación espinal < por el calor. Dolor hacia adelante, desde la escápula izquierda. Punto ardoroso en la región lumbar > frotando. Dolor en el sacro después del parto. Dolor punzante desde el cóccix sube por la espina hacia el occipucio < durante la evacuación.

EXTREMIDADES:

Parálisis sensoria y motora ascendente desde la punta de los dedos y dedos de los pies. Escasamente puede sostener algo con las manos. Desgarramiento del hombro izquierdo por la noche.

Entumecimiento; brazos; manos; dedos y dedos de los pies. Las palmas arden. Manos y brazos fríos durante la diarrea. Punzadas paralizantes en las caderas; luego suben por la espalda. Dolores en las tibias; periostitis. Tobillos; como si se fueran a romper; se dislocan fácilmente. Trastabilleo; se tropieza con facilidad. Sudor de pies suprimido. Pies helados. Calambres en los dedos de los pies. Las coyunturas se doblan con facilidad. Contracción periódica de los dedos como calambre. Debilidad y temblores de las extremidades con cada esfuerzo. Parálisis post-diftérica, con hormigueo en manos y pies. Rodillas frías; en la cama. Piernas pesadas, pies como pegados al piso. Camina con las piernas apartadas (como pato); se para con las piernas ampliamente separadas.

PIEL:

Las heridas pequeñas sangran mucho; cicatrizan y se vuelven a abrir y a sangrar. Manchas cafesosas o rojo sangre aquí y allá. Equimosis. Púrpura hemorrágica. Fungus hematode. La piel arde al rasurarla. Quistes grasosos. Pus delgada, fétida, sanguinolenta. Ulceras que sangran durante las reglas.

SUEÑO:

Amodorramiento; coma vigil. Somnolencia de día; insomnio antes de medianoche. Insomnio; no puede cerrar los ojos; por calor interno. Siestas cortas y despertares frecuentes. Sonambulismo. Sueños de fuego; lascivos; de hemorragia. Por la mañana siente que no durmió suficiente.

FIEBRE:

Frío en habitación caliente, en la espalda baja. Desea hielos durante el frío. Calor ardiente; local, sube por la espalda. Héctica. Sudor; temprano por la mañana; pegajoso; sin alivio. Fiebres indoloras.

COMPLEMENTARIO:

Lyc; Sang; Sep-

RELACIONES:

Bry; Caus; Con; PUI; Rhus-t; Sil.

PHYSOSTIGMA

GENERALIDADES:

Los nervios motores que terminan en la espina dorsal se afectan con este remedio; causando temblores como aleteos en los músculos; no responden a la voluntad; o se encogen en nudos; aún los intestinos se ven torcidos en nudos. Irritación espinal; vértebras sensibles, debilidad de los miembros inferiores; que vienen de un punto entre las caderas. Pérdida de sensibilidad al dolor. Debilidad; seguida de parálisis completa, a pesar de que la contractilidad de los músculos no está deteriorada. Rigidez de los músculos. Horror al agua fría; de beber o para bañarse; el agua fría se siente demasiado fría. Aversión al baño. Estremecimientos < con cada corriente. Sensación de flotación. Dolor punzante aquí y allá. Bochornos de calor < palmas. Paso atáxico, dolores tirantes hacia las piernas. Tétanos. Trismo. Temblores. Malos efectos de las emociones; penas. Lesiones, golpes. Parálisis muscular progresiva. Parálisis general de los insanos.

AGRAVACION:

Cambios de temperatura. Esfuerzos visuales. Por bañarse. Calor y frío. Descendiendo. Movimiento. Al dar el paso. Sacudidas, trastabilleo.

MEJORIA:

Yaciendo sobre el abdomen, o con la cabeza baja. Por un esfuerzo de la voluntad. Cerrando los ojos. Sueño.

MENTE:

Activa, aún durante el sueño. Nada parece correcto; demasiadas cosas en la habitación; las cuenta constantemente. Estado paralítico de la mente y el cuerpo, por penas.

CABEZA:

Cerebro; cae hacia el lado sobre el que se yace; ondulación. Vértigo, se tropieza al ascender o descender escaleras. Dolor desde la frente hacia la nariz. Como con una venda alrededor de la cabeza, como con una gorra apretada en la cabeza. Los latidos del corazón se sienten en la cabeza al acostarse. Temblores en la cabeza.

OJOS:

Sacudidas de los músculos de los ojos. Dolor sobre las órbitas; no soporta levantar los párpados. Acomodación afectada; astigmatismo. Glaucoma; especialmente después de lesión. Pupilas contraídas. Parálisis post-diftérica del ojo. Párpados tensos; no los puede cerrar o abrir. Golpe de aire en el ojo; con ardor. Ceguera nocturna. Moscas volantes; destellos de luz. Miopía creciente. Visión temblorosa.

OIDOS:

Dolor súbito de la garganta al oído medio < eructos. Dolor en el oído (derecho) al escribir.

NARIZ:

Sacudidas de los músculos de la nariz.

CARA:

Labios entumidos; los lame. Trismo.

BOCA:

Los dientes se sienten ásperos. Lengua; se siente aceitosa, escaldada, hinchada; en corea. Piel floja que se siente en el paladar. Saliva espesa como correosa.

GARGANTA:

Como una bola que subiera por la garganta. Latidos cardíacos fuertes que se sienten en la garganta. Parece que se tragó una pieza grande de comida; la siente en el epigastrio.

ESTOMAGO:

Hipo; con respiración corta, > sueño.

ABDOMEN:

Ombigo, excoriado, inflado, rojo. Hipogastrio adolorido, inflado < de pié. Retortijón en el hipocondrio derecho. Dolor en las ingles que se alterna. Dolores de cólico < diarrea; > estirando las piernas.

MUJERES:

Entumecimiento del vientre; con dolor en la espalda. Leucorrea < durante el día cuando se ejercita. Suspiros < cuando la leucorrea es peor. Reglas, irregulares; con palpitación.

CORAZON:

Parece aletear en la garganta o en todo el cuerpo, o en la cabeza.

CUELLO Y ESPALDA:

Entumecimiento hormigueante desde el occipucio hacia abajo por la espina. Espina sensible.

EXTREMIDADES:

Espasmos en los miembros. Olor ofensivo de las manos. Dolor en el deltoides (derecho) > movimiento violento. Dolor en el espacio poplíteo derecho. Bochornos de calor en las palmas.

SUEÑO:

Ataques de somnolencia incontrolables; con sensación de que se pierde la consciencia.

FIEBRE:

Todo movimiento y corriente, causa estremecimientos. Sudoración fácil; con excitación.

RELACIONES:

Agar; Gel; Nux-v.

PHYTOLACCA

GENERALIDADES:

Este remedio de duración larga y profunda, afecta predominantemente las glándulas, esp. mamarias; anginas; además tiene una poderosa acción sobre los músculos; del cuello y espalda; tejido fibroso; tendones y coyunturas, tejidos óseos, periosteo, garganta; tracto digestivo y lado derecho. Excoriación; dolorimiento fuerte; inquietud y postración, son los síntomas guías. Adolorimiento de todo el cuerpo, súbito; de los globos oculares; riñones; cuello; hombros; espalda; antebrazos; abajo de las rodillas. Partes rojo-azulosas; garganta; glándulas, etc. Dolores que se extienden. El dolor viene y se va repentinamente, cambia de lugar; reumatismo; después de amigdalitis. Las descargas son fragmentadas; filamentosas; evacuaciones; reglas, etc. Nódulos duros y dolorosos. Dolores óseos sifilíticos. Tétanos;

rigidez muscular general; alterna con espasmos y relajamiento muscular. Apresura la supuración. Pus - acuosa, fétida, icorosa. Obesidad. Dentición retardada. Todo afecta a las mamas.

AGRAVACION:

Exposición a clima húmedo y frío o cambios de clima. Levantándose. Movimiento. Tragando bebidas calientes; calor. Noches frías. En las reglas. Lluvia. Dando un paso fuerte al bajar un escalón alto.

MEJORIA:

Acostándose sobre el abdomen; o el lado izquierdo. Descanso. Clima seco.

MENTE:

Pérdida de la delicadeza personal; completa desvergüenza e indiferencia a la exposición de su propia persona. Indiferente a la vida. Siente desvanecerse al levantarse. Rehúsa el alimento, a pesar de que se le insiste constantemente. Gran temor; está segura que morirá. Aversión a los negocios.

CABEZA:

Vértigo al levantarse. Dolor en la región frontal que vá hacia atrás. El cerebro se siente adolorido; la cabeza como si hubiese sido golpeada. El dolor aparece cada vez que llueve. Náusea y cefalalgia > comiendo, pero regresa pronto con vómito que < la cefalalgia, pero > la náusea.

OJOS:

Lagrimo caliente y profuso. Dolor punzante. Visión verde. Fístula lagrimal. Los globos duelen al leer y escribir. Movimiento de un sólo ojo, independiente del otro. Celulitis orbital. Párpados como de fuego.

OIDOS:

Dolor en ambos oídos, < por deglutir.

NARIZ:

La siente pesada. Flujo por un poro mientras el otro está tapado; alternadamente. Coriza acre. Obstrucción mientras pasea.

CARA:

Amarillenta, enfermiza. Dolorimiento de los huesos malares. Glándulas inflamadas en el ángulo de la mandíbula. Las mandíbulas duelen como en las paperas. Labios volteados hacia afuera y duros. La barbilla está jalada hacia el esternón. Paperas.

BOCA:

Predisposición a morder los dientes unos con otros. Dentición difícil > al morder algo duro. Lengua; rojo fuerte en la punta, se siente quemada o dolores en la raíz; resaltada. Mucha saliva filamentosa. Pequeñas úlceras muy dolorosas a los lados de la mejilla; no puede morder de ese lado. Sensación de resequedad, con tos.

GARGANTA:

Rojo obscuro o rojo azulado. Manchas blanco-gris en las fauces. Excoriada, muy dolorosa al deglutir; obscura, hinchada; ardorosa, como pinchada. Como con una bola caliente o bulto. Anginas hinchadas; como con una membrana obscura sobre las tonsilas. Latidos fuertes en la angina derecha. Cinanquia. Difteria. No puede tragar nada caliente. Faringitis folicular. Ronquera y garganta excoriada después de la difteria.

ESTOMAGO:

Vómito violento; con arqueos; desea morir, para mejorar el vómito; cada pocos minutos. Hambre poco después de comer. Vómito fácil, sin náusea. Dolor < por respirar con profundidad.

ABDOMEN:

Dolor severo en el hipocondrio < acostándose sobre el lado afectado, > leucorrea. Hepatitis crónica. Necesidad continua de defecar; aún en sueños. Disentería; pasa solamente moco y sangre, o como raspadura de los intestinos. Descargas sanguinolentas, con calor en el recto. Cáncer del recto. Constipación de los ancianos; y aquellos con corazón débil. Diarrea después de beber limonada.

URINARIO:

Dolor fuerte en el riñón; con orina escasa y suprimida. Orina rojo obscuro; sedimento como yeso. Albuminuria; después de difteria, escarlatina. La orina mancha la ropa de amarillo.

HOMBRES:

Cordón espermático adolorido. Punzadas a lo largo del perineo hacia el pene. Induración dolorosa de los testículos.

MUJERES:

Reglas; con flujo de saliva y lágrimas. Mamas pesadas, con dureza de piedra, duras, hinchadas o sensibles; con dolor al amamantar; que se extiende a todo el cuerpo. Nódulos duros en el seno; con glándulas axilares crecidas. Pezones; agrietados, muy sensibles, invertidos. Seno irritable antes y durante las reglas. Dismenorrea; en mujeres estériles; con erosión del cérvix; membranosa. Galactorrea. Descarga acuosa, sanguinolenta, de las mamas. Afección de viejas cicatrices en las mamas.

RESPIRATORIO:

Respiración sofocante. Ronquera. Tos con ardor en la tráquea.

CORAZON:

Choques de dolor en la región cardíaca. El dolor deja al corazón y se vá dentro del brazo derecho. Como si el corazón brincara dentro de la garganta. Corazón grasoso.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido. Dolor achacoso en la región lumbar y región sacra. Dolor fulgurante arriba y abajo de la espina.

EXTREMIDADES:

Brazo derecho dormido y velloso. Dolor y rigidez en el hombro (derecho); con incapacidad para levantar el brazo. El dolor vuela como una descarga eléctrica. Las caderas y muslos duelen con el cambio de clima. Dolor y debilidad en el húmero (derecho) < movimiento y extensión. Tibias dolorosas. Talones dolorosos > elevando los pies. Neuralgia de los dedos gordos. Dolores agudos cortantes, punzantes en la cadera; las piernas se encogen, no puede tocar el suelo. Articulaciones de los dedos dolorosas, duras, hinchazones brillantes.

PIEL:

Seca, áspera, marchita. Predisposición a los forúnculos. Bubas venéreas. Verrugas. Lipoma. Callos. Comezón de la barbilla. Tiña.

COMPLEMENTARIO:

Sil.

RELACIONES:

Bry; Kali-bi; Kali-io; Merc; Rhus-t.

PICRIC ACID

GENERALIDADES:

Este ácido actúa sobre el cerebro; médula espinal; región lumbar; occipucio; riñones y órganos sexuales. Debilidad; sensación de pesadez, cansancio; en cuerpo y mente. Degeneración de la médula espinal; con parálisis. Espasmos; por mielitis. Postración fácil. Anemia progresiva y perniciosa. Picoteo como por agujas. Ardores en muchas partes; a lo largo de la espina; en las piernas. Caquexia. Personas desgastadas, mental y físicamente. Entumecimiento. Hormigueo. Neurastenia. Parálisis aguda y ascendente. Uremia; con anuria completa. Perlesía del mecanógrafo.

AGRAVACION:

Fatiga mental; física. Pérdidas seminales. Calor; del verano. Fatiga. Estudio. Choque mental.

MEJORIA:

Descanso. Frío. Por vendarse. En el sol.

MENTE:

Falta de poder de la voluntad para hacer cualquier cosa. Temor a fallar, en un examen; después de un esfuerzo mental prolongado y ansiedad. Como si las escaleras o el suelo se levantaran hacia él. Pensamientos lascivos en presencia de cualquier mujer. Aunque goza de la compañía de los hombres, la idea del matrimonio le es insoportable. Se sienta quieta e indiferente, no toma interés en lo que le rodea.

CABEZA:

Occipucio pesado; baja por la espina y los miembros inferiores. Dolor de cabeza < fatiga mental > sangramiento nasal; vendándose; con excitación sexual y erecciones violentas. Niebla cerebral. Cefalalgia durante el día > en sueños. Cefalalgia; de los hombres de negocios, maestros y estudiantes; por penas y otras emociones depresivas.

OJOS:

Amarillos. Conjuntivitis crónica, con descarga amarilla espesa.

OIDOS:

Forúnculos dolorosos en el meato.

ESTOMAGO:

Gusto amargo; con sed. Aversión por el alimento. Vomita súbitamente, sin aviso; vómito amargo, amarillo brillante.

ABDOMEN:

Evacuaciones grasosas y ardorosas. Diarrea por fatiga mental. Ardor en el recto mientras evacúa. Heces delgadas, amarillas. Ictericia con comezón.

URINARIO:

Orina amoniacal, por gotas. Uremia; con anuria absoluta. Diabetes, albuminuria. Crecimiento de la glándula prostática.

HOMBRES:

Pensamientos lascivos en presencia de cualquier mujer. Priapismo, pene distendido. Erecciones duras, con dolor en los testículos, que sube al cordón espermático. Postración extrema por emisiones seminales frecuentes. Impotencia, con tendencia a forúnculos y carbunclos.

MUJERES:

Extenuación extrema en sus períodos menstruales.

CUELLO Y ESPALDA:

Forúnculos dolorosos en la base del cuello. Dolor de espalda con languidez; el paciente es incapáz de sentarse derecho; con ardor a lo largo de la espina; < estudiar. Mantiene las piernas separadas aparte al estar de pié. Adolorimiento; piernas cansadas. Calambre de los escritores o perlesía. La espalda parece estar vendada, también los miembros. Anestesia de las piernas como si uno se hubiese puesto medias elásticas. Piernas débiles, pesadas como plomo, las levanta con dificultad.

PIEL:

Ictericia. Forúnculos pequeños, dolorosos e inflamados especialmente en el cuello.

SUEÑO:

Somnolencia. Sueño profundo pero no reparador. Somnoliento durante el día e insomne por la noche.

RELACIONES:

Gel; Ox-ac; Pho; Pho-ac.

PILOCARPUS (Ver JABORANDI)

PIPER METHYSTICUM

GENERALIDADES:

Kava-Kava es una bebida alcohólica que produce vivacidad e inclinación a hacer más trabajo sin fatiga. Todos los síntomas, especialmente los dolores se > por un tiempo al distraer la atención, cambiando de posición o de tema.

PLANTAGO MAJOR

GENERALIDADES:

Afecta los nervios, causando neuralgia de oídos, dientes, cara; zona. Los dolores son agudos, cambiantes; van entre el oído y los dientes. Inflamación. Produce disgusto por el tabaco; en masticadores y fumadores. Piorrea. Malos efectos de magulladuras, quemadas, cortaduras, heridas punzantes, mordidas de serpientes. Puede ser aplicado localmente para la neuralgia. Como con un cuerpo extraño entre los oídos; en las ingles, etc.

AGRAVACION:

Noche. Habitación caliente.

MEJORIA:

Sueño. Por comer.

CABEZA:

Como si tuviese el cerebro volteado. Cefalalgia con dolor de muelas. Sensación de algo que está asentado en la cabeza, atravezando de un oído al otro.

OJOS:

Dolores agudos en los ojos, reflejo de dientes cariados. Como con un cabello delante del ojo (izquierdo).

OIDOS:

Dolor de oído neurálgico que va de un oído al otro, a través de la cabeza. Dolor de oído con dolor de dientes. Escucha más aguda, los sonidos fuertes lo atraviezan a uno. Como con un cuerpo entre los oídos.

NARIZ:

Descarga súbita de agua colo amarillo de la nariz.

CARA:

Prosopalgia periódica < 7 a.m. a 2 p.m. con lagrimeo, fotofobia, dolor que radia a las sienes y la mandíbula inferior.

BOCA:

La saliva fluye con los dolores. Los dientes se sienten demasiado largos. Dolor de dientes > comiendo. Gusto sucio.

ABDOMEN:

Los intestinos parecen fríos. Cólico > comiendo. Diarrea; con heces café, espumosas, acuosas. Hemorroides dolorosas, apenas puede mantenerse en pié.

URINARIO:

Paso frecuente de gran cantidad de orina pálida < por la noche; con sed. (Diabetes). Enuresis.

MUJERES:

Neuralgia de los pezones.

ESPALDA:

Latidos entre las escápulas. Sudor frío en el sacro.

EXTREMIDADES:

Piernas temblorosas y entumidas.

PIEL:

Comezón y ardores. Sensible.

SUEÑO:

Sueños lóbregos que excitan las lágrimas.

RELACIONES:

Arn; Fer-p; Pul.

PLATINUM

GENERALIDADES:

Este metal soberbio, es un remedio para la Mujer, especialmente para las solteras estiradas. Muchos y variados síntomas que reflejan desde los ovarios y el útero u órganos sexuales. Afecta los nervios. Vago, sensorio y trifácico, causando acalambamientos violentos, dolores de apretón, como puñaladas, entumecientes; luego espasmos. Espasmos que alternan con disnea. Mente y nervios hipersensibles. Frialdad localizada; de partes aisladas, ojos, oídos, etc., o entumecimiento; del cuero cabelludo, cara, cóccix, pantorrillas, etc. Hemorragias; con coágulos negros con fluído. Temblores; dolorosos. Espasmos irregulares; congestión de sangre. Se alternan síntomas mentales y físicos o síntomas sexuales. Los dolores aumentan y disminuyen gradualmente. Sensación como de vendajes. Descargas filamentosas; lágrimas, evacuaciones, reglas, etc. Espasmos histéricos. Catalepsia durante las reglas. Espasmos tónicos y clónicos, con risa. Malos efectos de un susto; vejación; despojo; accesos de pasión; excesos sexuales; hemorragias prolongadas; masturbación (antes de la pubertad). Sensación de picoteo. Choques violentos, como por dolor. Contorsión de los miembros. Epilepsia; catalepsia. Deseo sexual pervertido.

AGRAVACION:

Emociones; sexual, coito, disgusto. Contacto. Fatiga nerviosa. Por el ayuno. Durante las reglas. Por sentarse. De pié. Doblándose, hacia atrás.

MEJORIA:

Caminando al aire libre. Luz del sol. Estirándose.

MENTE:

Se ríe en momentos equivocados. Despiadada; ruda y regañona. Sentido de la proporción desordenado; los objetos se ven más pequeños; estraños, atemorizantes. Sensación de terror y horror; teme la muerte; que parece estar muy cercana. Grita por ayuda. Modo cambiante; ríe y llora alternadamente. Contenta. Altanera; mira con desdén sobre todo y sobre todos. Se siente alta y majestuosa. Orgullosa y erótica. Impulso de matar a su propio hijo; a su esposo (al ver un cuchillo) quien secretamente le disgusta, o a quien ama apasionadamente. Silba, canta, baila. El orgullo herido o la excitación sexual hace que aparezcan los síntomas mentales. Lloro con los dolores. Cree que no pertenece a su propia familia; todo le parece cambiado. Sentimiento de soledad, desolación. Mal humor; pero llora. Piensa que su marido jamás regresará; que algo le pasará. Criticona. Plática no casta. Problemas mentales > en el crepúsculo y por reglas suprimidas. Seria sobre materias que no son serias; irritable con cosas triviales. Se sienta en un rincón, medita, pero no dice nada.

CABEZA:

Dolor tenso, presivo. Entumecimiento con dolor de cabeza. Clavo. Cráneo tenso. Cefalalgia con leucorrea. Como con agua en la frente.

OJOS:

Los siente fríos. Estremecimiento de los párpados. Los objetos parecen más pequeños de lo que son.

OIDOS:

Sensación de frialdad; los siente entumidos; extendiéndose a las mejillas y los labios.

NARIZ:

Dolor acalambante en la raíz de la nariz; con enrojecimiento de la cara. Naríz entumida.

CARA.

Frialdad, hormigueo y adormecimiento de todo un lado de la cara (derecho). Muecas. Dolor taladrante en las mandíbulas. Calambres en las mandíbulas. Trismo. Huesos malares entumidos.

BOCA:

Dolores pulsantes en los dientes. Como si la lengua estuviese escaldada. La boca se siente fría. Gusto dulce en la punta de la lengua.

ESTOMAGO:

Repugnancia por los alimentos debido a tristeza. Hambre voraz. Come apresuradamente, come todo o detesta todo lo que la rodea. Pérdida del apetito después del primer bocado.

ABDOMEN:

Cólico del pintor. Dolor en la región umbilical que se extiende hacia la espalda, se voltea y se retuerce en todas las posiciones posibles. Evacuaciones duras, negras; pasan en pequeñas porciones; con gran esfuerzo; se adhieren al recto como arcilla suave. Constipación; de los turistas; del embarazo. Hormigueo, comezón en el ano por la noche. Comezón voluptuosa.

HOMBRES:

Hormigueo voluptuoso; cosquilleante; pruriginoso; con deseo sexual excesivo. Malos efectos de la masturbación antes de la pubertad. Deseo sexual pervertido.

MUJERES:

Genitales dolorosamente sensibles; con comezón, hormigueo o cosquilleo. Deseo sexual excesivo especialmente en vírgenes; que la llevan a la masturbación. Ninfomanía < en estados puerperales. Reglas; negras, espesas, profusas, coaguladas, demasiado adelantadas; demasiado cortas; con punzadas; después de abortos. Ovaritis; con dolores ardorosos; con esterilidad. Dismenorrea, con chillidos y sacudidas. Vaginismo; por sensibilidad excesiva de los órganos sexuales, el coito es imposible. Prurito vulvar; con cosquilleo voluptuoso. Prolapso del útero. Induración; cáncer del útero. Fibroma. Leucorrea como la clara de un huevo, sólo durante el día, < después de orinar; levantándose de su asiento. Esterilidad por excitación sexual excesiva. Erotomanía. Sensación frecuente de que las reglas van a aparecer. Amenorrea en las emigrantes.

ESPALDA:

Dolor de espalda magullante < presión, al doblarse hacia atrás. Sacro y cóccix entumecidos; como por un golpe.

EXTREMIDADES:

Calambre en las pantorrillas. Caderas apretadas como si estuviesen vendadas. Dedos distorsionados. Entumecimiento del dedo meñique, o de los otros dedos. Los miembros se sienten cansados, entumidos. Debilidad paralítica.

PIEL:

Hormigueo, cosquilleo, picoteo, comezón.

SUEÑO:

Bostezos espasmódicos. Duerme sobre la espalda con las rodillas encogidas y separadas; quiere estar completamente descubierto.

RELACIONES:

Cup; Ign; Pul; Stan.

PLUMBUM METALLICUM

GENERALIDADES:

El plomo produce una condición general de esclerosis. Afecta los Nervios; músculos; médula espinal; abdomen; ombligo, riñones; venas y sangre. Los síntomas aparecen lentamente; insidiosamente; progresivamente; frecuentemente con violentos efectos colaterales de carácter muy cambiante e incoherente; sobreviniendo en partes aisladas, etc. Parálisis; histérica; infantil; de partes aisladas, (la muñeca cae), flácida; con hiperestesia; < contacto. Temblor convulsivo y sacudida de los miembros. Emaciación; de los miembros, con cuerpo rechoncho; de partes paralizadas, de partes aisladas; después de neuralgia. Impulso a estirarse con incomodidad abdominal. Retracción; del abdomen; ano; testículos; ombligo, etc. La anestesia está tan marcada como la hiperestesia excesiva. Contracción violenta. Retracción; sensación de una cuerda que lo jalara hacia la espalda. Exagera su condición. Dolores fulgurantes que lo obligan a gritar. Convulsiones; epilepsia crónica, con aura marcada; con hemorragias. Dolores penetrantes; calambres. Atrofia muscular progresiva. Esclerosis múltiple; esclerosis espinal. Constricción en órganos internos. Anemia; ictericia; arterio-esclerosis; hipertensión. Pequeños aneurismas en todo el cuerpo. Hinchazones hidrópicas. Gota. Malos efectos de erupciones repelidas. Excesos sexuales. Marasmo de infantes en casos aparentemente desesperados, abdomen crecido y duro, y constipación severa. Percepción lenta, comprensión difícil. Temblores, seguidos por parálisis. Artralgia.

AGRAVACION:

Tiempo despejado. Al aire libre. Fatiga. Movimiento. En compañía, en una habitación llena. Al empuñar objetos lisos. Contacto.

MEJORIA:

Presión dura. Frotando. Estirando los miembros.

MENTE:

Taciturno. Tímido, inquieto y ansioso. Frenético; muerde, golpea. Quieto y melancólico. Temor a; ser asesinado; de ser envenenado; piensa que todos los que la rodean son asesinos. Estúpido; imbecil. Delirio; nocturno; alternando con cólico o dolor en los miembros. Afasia amnésica. El trabajo físico extenua su mente. Percepción lenta. Debilidad, o pérdida de la memoria. Lentitud creciente y apatía. Dispuesto a defraudar y engañar. Finge enfermedades o exagera su condición. Histéricas, solo cuando son observadas. Grita de tiempo en tiempo. Miedo sin causa. Delirio por oír música.

CABEZA:

Dolor, como si una bola ascendiera por la garganta y se introdujera en la cabeza. Pelo; seco, se cae de la barba. Desvanecimiento en habitación llena de gente, o al ir de un cuarto a otro.

OJOS:

Amarillos o esclerótica de un rojo-azuloso profundo. Neuritis óptica; escotoma central. Parálisis del párpado superior. Pérdida súbita de la vista después de un desmayo. Pupilas contraídas. Glaucoma; por afecciones medulares. Lagrimeo profuso y caliente.

OIDOS:

Tinnitus. Sordera ocasional repentina. Escucha música con delirio temeroso.

NARIZ:

Pérdida del olfato, con epilepsia. Nariz fría.

CARA:

Pálida y caquética. Sacudida de un lado de la cara (derecho). Mejillas hundidas. Piel; grasosa; brillante. Hinchazón de la cara, un lado.

BOCA:

Amarillo en el interior de la boca. Línea azul que se distingue a lo largo del margen de la encía. Encías; pálidas, hinchadas. Lengua; temblorosa; parece paralizada. Tubérculos duros en las encías. Saliva pegajosa. Gusto dulce. Aftas; úlceras fétidas. Movimiento fuerte de la mandíbula inferior y rechinar de los dientes. Saliva azul.

GARGANTA:

Disfagia; los líquidos pueden ser tragados, los sólidos se regresan a la boca. Estrictura del esófago, por espasmos. Parálisis del esófago, con incapacidad para deglutir. Globo histérico.

ESTOMAGO:

Eructos fétidos o fecales. Vómito de materia fecal, con cólico y constipación. Gastralgia, > por la presión dura; doblándose hacia atrás. Vómito persistente periódico de alimentos. Vómito de líquido café-negro, o de moco verde.

ABDOMEN:

El ombligo se siente retraído. Cólico; que acompaña todos los síntomas. Dolores abdominales que irradian a todas las partes del cuerpo. Punzadas, o como si fuese forzado a pasar por un lugar estrecho. Hernia en el ombligo. Abdomen tenso o retraído. El ano se siente jalado o dolorosamente contraído. Evacuaciones; granulares; de bolas duras negras; como excremento de borrego; que pasan con necesidad y calambre en el ano. Constipación tenaz o cólico de infantes. El abdomen está lleno de bultos desiguales. Intususcepción. Neuralgia del recto. Prolapso del ano, con parálisis.

URINARIO:

Orina profusa pero fluye lentamente; gota a gota. Nefritis crónica intersticial. Riñón contraído. Parálisis de la vejiga, micción difícil o retención; supresión. Uremia. Albuminuria. Diabetes mellitus.

HOMBRES:

Testículos encogidos; los siente constreñidos. Pérdida del poder sexual. Poluciones frecuentes.

MUJERES:

Vaginismo. Induración de las glándulas mamarias. Tendencia al aborto; por útero sub-desarrollado. Sensación de falta de espacio para el feto en el útero. El seno se pone momentaneamente duro o más pequeño con cólico. Menorragia, con sensación de una cuerda que jalara el abdomen hacia la espalda. Dolor ovárico > estirando las piernas. Vulva y vagina hipersensibles. No puede pasar orina en el embarazo, por falta de sensibilidad o parálisis.

CORAZON:

Débil. Pulso vibrante, lento, se hunde hasta 40. Constricción dolorosa de las arterias periféricas.

EXTREMIDADES:

La muñeca se cae. Debilidad y cansancio doloroso de los brazos y manos. Dolor en los miembros atrofiados, alternando con cólico. Dolor en el dedo gordo del pié derecho. Parálisis de los miembros inferiores; después de un parto. Dolores como de relámpago > por la presión. Ciática; con atrofia muscular. Como si los pies estuviesen hechos de madera. Los brazos se sacuden al tratar de usarlos.

PIEL.

Azulosa; manchas rojas. Amarilla. Seca. Hipersensible, al aire libre. Ulceras por decúbito. Ulceras secas, ardorosas. Gangrena. Las heridas pequeñas se inflaman y supuran fácilmente. Piel, arrugada, marchita y jalada hacia los huesos. Ampollas; callos, juanetes.

SUEÑO:

Toma posiciones raras durante el sueño. Cae dormido mientras está hablando.

FIEBRE:

Frialdad por fatiga. Sudores generales fríos durante las evacuaciones. Pies fríos cuando camina solamente.

COMPLEMENTARIO:

Rhus-t; Thall.

RELACIONES:

Op.

PODOPHYLLUM

GENERALIDADES:

Considerado como un mercurio vegetal, este es un remedio para la constitución biliosa. Afecta principalmente el duodeno; hígado; intestinos; Recto; lado derecho; ovario, escápula, garganta. Condiciones alternantes; diarrea que alterna con constipación; dolor de cabeza que alterna con diarrea. Muchos problemas durante el embarazo. Choques repentinos por dolores de tirón. Mucho amodorramiento y deseo de estirarse. Esfínteres relajados.

AGRAVACION:

Temprano por la mañana. Por comer. Clima caliente. Dentición. Por beber. Frutas ácidas. Leche. Antes, durante y después de evacuar. Movimiento. Mercurio.

MEJORIA:

Por masajear o golpear el hígado. Acostándose sobre el abdomen.

MENTE:

Quejumbroso. Locuacidad durante el escalofrío y la fiebre; después de eso olvida lo que ha pasado. Imagina que va a morir o que está muy enfermo. Agitado e inquieto; no puede permanecer sentado.

CABEZA:

Rota la cabeza de un lado a otro, con quejidos; durante la dentición; por preocupaciones de negocios. Dolor de cabeza que alterna con o > por la diarrea. Dolor punzante en la frente; debe cerrar los ojos.

OJOS:

Párpados medio cerrados. Ictericia.

CARA:

Mejillas calientes y arreboladas; durante la diarrea. Ictérica.

BOCA:

Olor ofensivo. Lengua ardorosa, áspera o flácida, con la huella de los dientes. Deseo intenso de presionar una encía con la otra; rechinando los dientes; por la noche. Gusto amargo. Lengua; ancha,

grande, húmeda; cubierta como con una capa de mostaza. Pérdida del gusto, no puede distinguir entre ácido y dulce. Todo sabe ácido o pútrido.

GARGANTA:

Como con un bulto en el esófago.

ESTOMAGO:

Desea ácidos que le caen mal. Vómito; de espuma caliente, leche (en infantes). Eructos calientes y ácidos; con olor a huevos podridos. Arqueos constantes. Sed por grandes cantidades de agua fría. Arqueos en diarrea infantil.

ABDOMEN:

El hígado y toda víscera abdominal están inflamados < durante el vómito; diarrea; antes y durante las reglas. Hígado inflamado y doloroso > por masajearlo. Sensación de debilidad, vacío, hundimiento y enfermedad; después de evacuar. Se frota para obtener alivio. Gorgoteo a través de los intestinos, luego evacuaciones pútridas y profusas que salen a borbotones sin dolor. Evacuaciones; blancas, como agua; espumosas; con alimento como sedimento; se salen a través del pañal; luego debilidad. Diarrea de verano. Evacuaciones; involuntarias, durante el sueño, al pasar flatos. Diarrea que alterna con otros síntomas; constipación. Evacuaciones pálidas, duras, como tiza. Ictericia, con cálculos. Recto; excoriado, adolorido, débil; prolapsado; antes de evacuar; después del parto; durante el embarazo, al vomitar, al estornudar; por excitación mental. Hemorroides húmedas y fétidas. Diarrea matutina. Diarrea > acostándose sobre el abdomen; < mientras se está bañando o se está lavando (en niños), comiendo frutas enlatadas, frutas ácidas, leche.

URINARIO:

Micción frecuente; por la noche, durante el embarazo. Enuresis. Diabetes mellitus e insípida.

HOMBRES:

Enfermedad de la glándula prostática asociada con problemas rectales.

MUJERES:

Dolor en la región de los ovarios (derecho), y que baja hacia el nervio crural < estirando las piernas. Tumor ovárico, con dolor que se extiende al hombro. Prolapso del útero al esforzarse o levantar algo pesado; después del parto. Como si los genitales se fuesen a salir durante la evacuación. Puede estar acostado confortablemente sólo sobre el abdomen durante los primeros meses del embarazo. Menorragia por esfuerzo. Hinchazón de los labios durante el embarazo.

CORAZON:

Palpitación; con sensación de cloqueo, que se eleva hacia la garganta, por las emociones.

EXTREMIDADES:

Dolor en la región inguinal derecha, se dispara hacia la parte interna del muslo y hacia la rodilla. Debilidad parálitica del lado izquierdo. Calambres en las pantorrillas, con evacuaciones. Dolor a lo largo del nervio ulnar de ambos brazos.

PIEL:

Húmeda; tibia; icterica.

SUEÑO:

Gemidos y llanto durante el sueño. Somnoliento después de paroxismos de malaria.

FIEBRE:

Escalofrío a las 7 a.m. Locuacidad durante la fiebre. Sudor; profuso, con sueño; ofensivo.

COMPLEMENTARIO:

Nat-m.

RELACIONES:

Alo; Chi; Merc.

POLYGONUM**GENERALIDADES:**

Actúa sobre los órganos genito-urinaros y los intestinos; causando dolores cortantes; a lo largo de los uréteres; de los ductos ováricos; sobre la espina; con pesadez. Dolores pulsátiles; fugaces; erráticos; en la próstata. Frialdad que alterna o coincide con calor en la misma u otra parte; ardor en el pecho con sensación de frío en el hueco del estómago, etc. Descargas picantes.

AGRAVACION:

Frío; húmedo. Presión de las ropas.

CABEZA:

Dolores agudos y pulsátiles en las sienas.

OJOS:

Abotagamiento alderredor de los ojos (derecho). Los párpados se sacuden cuando se cierran o estando acostado.

OIDOS:

Dolor agudo, al doblar la cabeza hacia abajo > doblándola hacia atrás.

CARA:

Frialdad en el lado derecho de la cara, cuando el dolor es más severo en el lado izquierdo.

BOCA:

Comezón; ardor en el paladar; quiere rascárselo. La lengua se siente hinchada.

ABDOMEN:

Sensación de frialdad en el estómago, con ardor en el pecho. La náusea se siente allí. Dolores cortantes con gran ruido; como si todo el contenido intestinal estuviese en estado líquido. El interior del ano está tachonado con eminencias pruriginosas. Hemorroides, con comezón.

URINARIO:

Cólico nefrítico; con dolor de ombligo mordiente, atezante, cortante. Dolor cortante a lo largo de los uréteres. Orina escasa; por gotas; con sedimento obscuro, calcáreo o adherente. Nefritis; supurativa. Cistitis.

HOMBRES:

Escroto excoriado. Dolor pulsante, ardiente en la próstata al orinar. Dolor en los testículos, y cordón espermático al orinar.

MUJERES:

Dolor cortante a lo largo de las trompas de Falopio, con sensación de pesantez. Como si las caderas estuviesen pegadas juntas. Metrorragia; amenorrea, en jovencitas. Dolores punzantes a través de los senos.

EXTREMIDADES:

Miembros inferiores adoloridos. Dolores de inflamación en los talones. Pies alternadamente fríos y calientes.

PIEL:

Urticaria. Ulceras superficiales en las piernas; en el climaterio.

RELACIONES:

Calc.

PHOTOS FOETIDUS

GENERALIDADES:

Un remedio para malestares asmáticos < por la inhalación de polvo y se mejoran por evacuar. Ausencia de mente. Cefalalgia en pequeños puntos, con latido en las arterias temporales. Hinchazones rojas que cruzan la nariz. Dolor en la garganta mientras estornuda. Lengua dormida. Abdómen distendido. Dolores erráticos, espasmódicos.

MEJORIA:

Al aire libre.

PRUNUS SPINOSA

GENERALIDADES:

Este remedio actúa especialmente en los nervios; respiratorios; orbitales; y sobre los órganos urinarios. Los dolores son punzantes; con presión hacia afuera; como relámpagos; erráticos; Causando respiración corta. Neuralgia. Calambres. Edema. Dolores después de zona. Parálisis de los nervios. Efectos compensatorios. Malos efectos del sol; torceduras; levantamiento de cosas pesadas. Hidropesía causada por un corazón defectuoso.

AGRAVACION:

Tacto; presión. Movimiento. Sacudida. Agachándose. Ascendiendo.

MEJORIA:

Doblándose en dos.

MENTE:

Inquietud; camina constantemente por ahí; no puede permanecer en un sólo lugar.

CABEZA:

Punzada desde el hueso frontal (derecho) a través del cerebro hacia el occipucio. Dolor de cabeza por el calor del sol.

OJOS:

Neuralgia ciliar; dolor en lo globos como si fuesen a estallar; o los presionaran y apartaran; > lagrimeo.

BOCA:

Los dientes se sienten empujados hacia afuera. Dolor de dientes > por morder unos dientes con otros.

URINARIO:

Calambres en la vejiga; por presión de flatos; debe doblarse en dos para orinar. Deseo urgente de orinar; la orina alcanza el glande y luego se regresa; con dolor violento y espasmo y tenesmo en el recto. Disuria neurálgica. Dolores del glande al orinar. Debe presionar largo tiempo antes de que la orina aparezca. Partes pudendas pulsantes. El chorro de la orina es delgado como una cuerda o bifurcado.

HOMBRES:

Pulsación en el glande, por sacudida al caminar.

MUJERES:

Leucorrea; acre, acuosa, purulenta, manchando de amarillo. Reglas; delgadas, acuosas, demasiado adelantadas, demasiado copiosas, con dolor en el sacro.

RESPIRATORIO:

Respiración corta; con dolores. Sensación como si el aire inhalado no alcanzara el hueco del estómago; tiene que bostezar y tratar de hacer una inspiración profunda para forzar al aire a llegar a ese punto. Hambre de aire.

CORAZON:

Hipertrofiado. Golpeo del corazón, con respiración laboriosa < mínimo movimiento. Hidropesía cardíaca. Latido en las arterias carótidas.

Angina de pecho.

ESPALDA:

Como con un bulto bajo la escápula izquierda.

EXTREMIDADES:

Edema de los pies. Comezón en la punta de los dedos como si estuviesen congelados. El dedo pulgar parece estar torcido, impide escribir.

PIEL:

Herpes zoster. Hidropesía.

FIEBRE:

Sudor nocturno.

RELACIONES:

Laur.

PSORINUM

GENERALIDADES:

El Dr. Hahnemann preparó este nosode de la materia sero-purulenta de una vesícula de sarna. El campo de acción terapéutico se encuentra en las llamadas manifestaciones psóricas, en donde hay una falta de

reacción en las enfermedades crónicas; cuando los remedios bien relacionados fallan en aliviar o mejorar permanentemente; también cuando Sulphur parece estar indicado pero falla en aliviar. Aclara casos confusos. Afecta principalmente la Piel; pliegues de; glándulas sebáceas; oídos; intestinos; respiración y lado derecho. Se adapta a personas sucias, con olor corporal sucio aún después de bañarse; niños pálidos, enfermizos, delicados de apariencia insana; que tienen un olor desagradable que los rodea; nerviosos; personas inquietas que se estremecen fácilmente. Postración. Se siente todo enfermo. Recurrencias. Fétidos; descargas; olores del cuerpo, evacuaciones, erupciones, sudor, sudor de pies tenaz. Secreciones espesas. Débil, sensible y delgado. Se resfría fácilmente; escalofriado. La ropa parece grande, o él se siente como aplastado cuando camina en el sol. Hambriento, o inusualmente bien, antes de un ataque. Quiere lavar sus partes. Debilidad; que permanece después de enfermedades agudas o independientemente de cualquier enfermedad orgánica; después de pérdida de fluidos. Se siente bien y mal por lapsos. Malos efectos de enfermedades infecciosas que duran años; emociones; levantamiento de cosas pesadas; lesiones, golpes, torceduras, dislocaciones. Flojedad; de articulaciones, de dientes, etc. Erupciones que desaparecen en el verano, para aparecer en invierno. Usa ropa caliente aún en verano. Lava sus manos y pies constantemente. Los niños enfermos no duermen durante el día ni por la noche, pero se angustian, quejan y lloran; o se portan bien y juegan todo el día, pero gritan y causan problemas por la noche. Dificultad para respirar al estar al aire libre, quiere ir a su casa y acostarse.

AGRAVACION:

Frío. Aire libre; lavándose. Clima, cambiante; tormentoso. Calor; de la cama; de cosas de lana, de ejercicio. Supresiones. El contacto de sus propios miembros. Periódicamente; cada año. Luna llena.

MEJORIA:

Acostado con la cabeza baja, o quietamente. Por comer. Por lavarse. Sangramiento nasal. Presión dura. Sudor profuso.

MENTE:

Ansiedad. Presentimiento. Desesperanza de recuperarse; gran abatimiento; desesperanzado. Gozoso. Melancolía, religiosa; pesimista. Pensamientos horribles; tendencia suicida. Se siente pobre; sus negocios van a fracasar; a pesar de todo, es próspero. Temor al fuego; de estar solo, o de volverse loco, etc. Aversión al trabajo. Los niños están muy inquietos día y noche. Displaciente, irritable, ruidoso; se estremece fácilmente. Malestares severos por las emociones más ligeras. Mente torpe, omnubilada. Pensamiento difícil. Se siente inquieto por días antes de una tormenta con truenos.

CABEZA:

Adolorida, como por un golpe fuerte, con reglas suprimidas; le sigue perturbaciones visuales; alterna con otras indisposiciones, > con un sangramiento nasal. La cabeza se siente separada del cuerpo. Sensible a la corrientes alderredor de la cabeza; quiere cubrísela, en clima caliente. Sacudidas en las sienes. Cabello seco, enmarañado. Erupciones húmedas en el cuero cabelludo. Migraña. Manchas de piel blanca, con mechón blanco de pelo.

OJOS:

Legañosos. Párpados volteados hacia afuera. Sensación como si algo se moviera o uno estuviese jugando con sus dedos delante de los ojos. Oftalmía crónica recurrente. Los objetos tiemblan, luego se oscurecen. Oscuridad ante los ojos.

OIDOS:

Excoriados, rojos, rezumantes; con costras alderredor de las orejas. Heridas húmedas; detrás de las orejas. Otorrea pútrida. Cerúmen rojo. Comezón intolerable. Otorrea, con dolor de cabeza; con diarrea ofensiva y acuosa. Ruidos ilusorios; como si él oyese con oídos que no son propios.

NARIZ:

Fiebre de heno. Espinillas pequeñas y rojas. Catarros recurrentes.

CARA:

Pálidoa, enfermiza, sucia, polvorienta o abotagada. Espinillas rojas y pequeñas. Acné rosáceo. Hinchazón del labio superior. Cara abatida.

BOCA:

Los dientes se sienten flojos, luego dolor < al contacto. La punta de la lengua se siente escaldada. Gusto sucio. Encías; sangrantes, esponjosas, se separan de los dientes. Piorrea. Grietas obstinadas en las comisuras labiales. Gusto amargo > comiendo o bebiendo.

GARGANTA:

Expele masas fétidas y caseosas. Esquinencia recurrente. Como con un tapón en la garganta que impide carraspear.

ESTOMAGO:

Pérdida del apetito; después de una enfermedad; con gran sed. Muy hambriento, siempre; durante los dolores de cabeza, debe tener algo para comer; a mitad de la noche. Eructos; ácidos, rancios, con sabor y olor a huevos podridos. Apetito voraz, pero crece delgado. Desea; cerveza, ácidos. Aversión al puerco. Vómitos del embarazo cuando ningún otro medicamento proporciona alivio. Aflujo de agua a la boca cuando se está acostado.

ABDOMEN:

Flatulencia, con desórdenes del hígado. Cólico > comiendo y pasando flatos fétidos. Flatos como de huevos podridos. Dolor en el hígado < estornudando. Evacuaciones; oscuras; cafés; horriblemente pútridas; gorgoteantes; de olor penetrante; que se esparce por toda la casa. Cólera infantil. Constipación del infante. Las evacuaciones son suaves, pero difíciles. Evacuaciones involuntarias durante el sueño. Hemorragias del recto en mujeres viejas. Tiene que ir varias veces al baño para pasar evacuaciones normales. Diarrea crónica; temprano por la mañana; urgentes. Ardor en el recto.

URINARIO:

Moja la cama < en luna llena; obstinado. Tiene que pasar orina varias veces; por debilidad de la vejiga.

HOMBRES:

Genitales ofensivos. Retortijón en los testículos. Gonorrea crónica; descarga indolora por la uretra, manchando de amarillo. Aversión

al coito. Ausencia de; gozo; de emisiones durante el coito.

MUJERES:

Leucorrea; en borbollón, con grumos, fétida; con dolor violento en el sacro y debilidad. Dismenorrea; cerca del climaterio. Reglas; adelantadas y profusas. Vómito obstinado durante el embarazo. El feto se mueve demasiado violentamente. Cuando, después de un aborto, la mujer se pone en pié, el flujo empieza de nuevo. Senos hinchados; pezones rojos. Espinillas ardorosas y con comezón alderredor de los pezones. Erupción en las mamas causando excoiación.

RESPIRATORIO:

Disnea < sentándose > acostándose y manteniendo los brazos separados. Sensación de ulceración bajo el esternón. La tos regresa cada invierno. Fiebre de heno regularmente, regresando cada año. Expectoración sanguinolenta; con sensación caliente en el pecho. Tos < acostándose, bebiendo. Dolor en el pecho que se extiende al hombro < bebidas frías.

CORAZON:

Gorgoteo en el corazón, < acostándose. Murmullos cardíacos, regurgitación mitral. Pericarditis. Pulso débil, irregular.

ESPALDA:

Dolor lumbar < estando de pié o caminando.

EXTREMIDADES:

Las articulaciones se sienten flojas, como si no se pudiesen mantener juntas. Erupciones alderredor de las uñas. Plantas calientes y pruriginosas. Sudor de pies fétido. Las erupciones alderredor de las coyunturas hace el caminado difícil.

PIEL:

Sucia; áspera; costrosa, grasosa; se abre en los pliegues. Comezón intolerable < calor de la cama; se rasca hasta que se excorúa o hasta que sangra. Urticaria < ejercicio. Las excresencias desaparecen durante el verano, sólo para aparecer nuevamente en invierno. Piojos en el cuerpo que aparecen constantemente. Condilomata en las orillas de la piel. Glándulas crecidas. Piel grasosa.

SUEÑO:

Sueños vívidos, continúan después de despertar.

FIEBRE:

Calor, con sudor vaporizante. Sudor; fácil, profuso < noche; frío, en las palmas.

COMPLEMENTARIO:

Sep; Sul; Tub.

RELACIONES:

Graph; Mang; Pho; Sul.

PTELEA

GENERALIDADES:

Adecuado en afecciones de hígado y estómago. Los síntomas del hígado y del estómago se asocian con dolor; en los miembros. Gusto amargo, y eructos ya sea amargos o como huevos podridos. Adolorimiento y pesantez en la región del hígado < acostándose sobre el lado izquierdo. Se mejora comiendo cosas ácidas. Respiración caliente, quema los poros. Edema de los pies y piernas con afecciones de hígado.

AGRAVACION:

Queso, carne, pudines.

PULEX

GENERALIDADES:

La pulga común tiene marcados síntomas urinarios y femeninos. No puede retener la orina, debe atender su llamado inmediatamente. Las manchas de leucorrea y las reglas son muy difíciles de lavar. Como con una bola de algodón dentro de la vagina.

AGRAVACION:

Lado izquierdo. Moviéndose.

MEJORIA:

Sentándose o acostándose.

MENTE:

Muy impaciente, irritable.

OJOS:

Los ojos se sienten como crecidos.

CARA:

Arrugada como en un anciano.

GARGANTA:

Como con una cuerda que colgara de ella.

ESTOMAGO:

Sed especialmente durante el dolor de cabeza.

URINARIO:

El flujo de orina se detiene de pronto seguido de dolor. Orina escasa con necesidad frecuente con presión en vejiga y tenesmo en uretra.

MUJERES:

Salivación durante las reglas. Reglas retardadas. Ardor intenso en la vagina.

FIEBRE:

Siente como un resplandor por todos lados, como si estuviese cubierta de vapor. Frío mientras está sentado a un lado del fuego.

PULSATILLA

GENERALIDADES:

Debido a sus Síntomas cambiantes, variantes este remedio es conocido como el remedio de la veleta. Afecta la Mente; venas; membranas mucosas; respiración y un lado. Los síntomas se elevan a un cierto grado, luego súbitamente cesan. Es un remedio para mujeres, de disposición suave, gentil, pletórica, dócil, sometida, que gritan fácilmente y lloran cuando hablan. Los síntomas aparecen en un lado o se van hacia el lado sobre el que se yace. Ausencia de sed; escalofríos y respiración corta; con desórdenes digestivos o menstruales. Escalofrío; con dolores pero ardorosos, con dolores punzantes; con entumecimiento. Las descargas mucosas son profusas; suaves; espesas; amarillo-verdosas. Síntomas cambiantes o contradictorios; que no tienen pies ni cabeza. Alternancias. Metástasis. Hemorragias; pasivas; vicariosas; de sangre oscura que coagula fácilmente. Venocidad, venas varicosas. Pesadez. Dolores de rascadura, de tirón, desgarrantes, ulcerantes; erráticos. Entumecimiento; parcial; manos, pies, etc. de la parte sobre la que se yace; de las partes afectadas. Malos efectos de las supresiones; otorrea; reglas, loquios, leche, etc. Por comer helados; puerco, grasas; pastelería; dietas mixtas. Escalofrío, pero desea aire. Rubias pálidas, friolentas. Anemia. Nunca bien, desde la pubertad. Corea; por amenorrea o dismenorrea. Entre más tiempo se está acostado por la mañana, más tiempo se quiere estar en la cama. No puede permanecer acostado con la cabeza baja. El niño quiere que se le lleve en brazos lentamente. Síntomas en partes distantes del cuerpo, causan disnea. Sensación de distensión en tamaño, como si una o todas las partes estuviesen creciendo demasiado; durante el dolor. Sensación de vendaje. El uso de franelas o ropas de lana causan comezón y erupciones. Profiláctico del sarampión. Epilepsia con reglas ausentes o irregulares. Emaciación de partes afectadas. Pulsación a través de todo el cuerpo.

AGRAVACION:

Calor del aire; de la habitación; ropa; cama. Por mojarse los pies. Noche. Descanso. Al iniciar el movimiento. Acostado; en un lado (izquierdo). Comiendo; mucho tiempo después. Alimentos condimentados, grasas, hielos, huevos. Pubertad. Embarazo. Antes de las reglas. Hierro. Quinina. Dejando que los miembros cuelguen. Té. Tormentas con rayos. Sol. Crepúsculo.

MEJORIA:

Frío; aire fresco y libre; alimentos, bebidas. Por descubrirse. Movimiento suave. Postura erguida. Movimiento continuo. Después de una buena llorada. Cambiando de lugar. Presión. Por frotarse. Acostada con la cabeza alta.

MENTE:

Dócil, tímida, emocional y llorosa. Todo le disgusta. Desanimada. Se ofende fácilmente. Quejumbrosa. Desea simpatía. A los niños les gustan los mimos y carantoñas. Temor mórbido al sexo opuesto; el matrimonio; cree que el acto sexual es un acto pecaminoso. Se da a extremos de dolor y placer. Fácilmente se conmueve y llora o se ríe; después de comer. Melancolía religiosa. Temor; a estar sola; a la obscuridad, a los fantasmas por la noche, por lo que desea correr o esconderse. Caprichosa. Avara. Suspica. Muy irritable, sentida; se siente menospreciada o teme el menosprecio. Contesta si, o no, moviendo la cabeza. Imagina que ciertos artículos alimentarios no son buenos para la raza humana. Triste por noticias desagradables. Manía por reglas suprimidas.

CABEZA:

Adolorida; por exceso de trabajo; excitación sexual suprimida; indigestión; se inicia en el vértice. Dolor occipital < tosiendo. Cefalalgias semilaterales, pulsantes, de estallido; con lagrimeo quemante del lado afectado. vértigo; < sentándose; mirando hacia arriba; con náusea y perturbaciones gástricas o menstruales; antes, durante y después de/o reglas suprimidas. Sudor profuso en el cráneo. Cefalalgia de las niñas escolares durante la pubertad. Cefalalgia > por caminar al aire libre. La cabeza parece pesada, no puede mantenerla erguida, no puede levantarla.

OJOS:

Disminución de la visión, con sensación como de algo que estuviese cubriendo los ojos y que el paciente quiere quitar o borrar; < viento. Descarga espesa, amarilla, profusa y suave. Oftalmía; del recién nacido; gonorréica; por amenorrea. Fístula lagrimal que descarga pus al presionar. Lagrimeo acre. Perrillas; recurrentes. Blefaritis. Conjuntivitis por resfríos. Ataques de ceguera, antes de las reglas. Amaurosis, parálisis del nervio óptico. Comezón y ardor en los ojos, causando frotamiento. Ojos llorosos.

OIDOS:

Dolor < noche. Sordera como si los oídos estuviesen tapados; puede escuchar mejor en un carro; y en una habitación tibia. Otorrea; descarga de pus, de sangre; humor espeso, amarillo, ofensivo; después de exantemata. Oído externo rojo e hinchado se siente como algo que se empujara para salir del oído. Paperas, especialmente metastásicas al seno o testículos. Lóbulo de los oídos hinchados.

NARIZ:

Pérdida del olfato, con catarro. Descarga u olor fétido de la nariz. Coriza; obstrucción de la nariz < acostado o en una habitación; > saliendo al aire libre. Descarga nasal verde; de color anaranjado, fétida, urinosa; descarga crónica suave y amarilla. La nariz sangra, antes, durante y por reglas suprimidas.

CARA:

Pálida. Neuralgia con lagrimeo profuso, < masticando, hablando, o con cosas calientes o frías en la boca. Labios agrietados; despellejados; hinchados. Se lame los labios. Grieta en el centro del labio inferior. Acné en jovencitas.

BOCA:

Aliento ofensivo. Seca o babosa; sin sed. Dolor de dientes taladrante > frío. Gusto; malo en a.m.; pérdida del; por coriza; grasoso; sanguinolento; dulce; alternante. Lengua; amarilla; blanca; la siente escaldada. Mucha saliva dulce. Alimentos; deja una porción. Gusto amargo, especialmente por el pan. Gusto disminuído hacia toda la comida. Saliva; tenaz; espumosa, como algodón.

GARGANTA:

La comida se atora. Seca; excoriada, con sensación de disfagia. Sensación de un gusano que se anduviese retorciendo. Como vapores de azufre al toser.

ESTOMAGO:

Aversión; al agua; las grasas, puerco, pan, leche, fumar, alimentos y bebidas calientes. Desea; ácidos o lo que le cae mal; cosas refrescantes, cosas picantes, arenques, queso. La comida sabe muy salada. Las cebollas caen mal. Abominación súbita; < comiendo. Eructos, el sabor de los alimentos permanece por largo tiempo. Náusea. Agruras. Ausencia de sed; con casi todos los malestares. Vómito de alimentos comidos con mucha anterioridad. Pulsación visible en el hueco del estómago. Dolores punzantes < por caminar o dar un paso en falso. Peso como por una piedra. Estómago desarreglado; lo siente pesado. Hipo al fumar tabaco. Hambre; pero no sabe de qué.

ABDOMEN:

Retortijón; pulsación en el epigastrio. Doloroso, distendido; con ruidos fuertes. Presión como por una piedra. Sensación de entumecimiento. El dolor se extiende a las ingles. Evacuaciones; cambiantes, no hay dos evacuaciones iguales; verdes, biliosas; < después de medianoche. Dos o tres evacuaciones normales diariamente. Hemorroides ciegas, < raglas, acostándose. Bultos duros y dolorosos en las ingles. Diarrea en ictericia, con sensación de calor. Descarga de sangre por el recto aunque no evacúe. Diarrea después de un susto.

URINARIO:

Micción; involuntaria al acostarse, riéndose, tosiendo; por estornudar; por oír un ruido repentino; después de una sorpresa agradable; de una impresión; pasando flatos; durante el sueño, especialmente en niñas pequeñas. Hematuria después de orinar. Presión fuerte o calambre en la vejiga, después de orinar. Sensación como si una piedra rodara en la vejiga. La orina gotea estando enojado. Necesidad de orinar cuando se yace sobre la espalda. Estrictura de la uretra, la orina aparece en gotas, o se inicia y se detiene.

HOMBRES:

Ardor que baja por la izquierda del cordón espermático. Prostatitis aguda; próstata crecida. Orquitis; gonorréica; o por sentarse en piedras frías. Epididimitis. Los testículos cuelgan bajos. Emisiones sangrantes. Descarga espesa, amarilla, estado tardío de la gonorrea.

MUJERES:

Amenorrea; por mojarse los pies; debilidad nerviosa o anemia. Siente como si estuviera menstruando. Reglas; oscuras, espesas. Demasiado tardías; escasas; después de bañarse; coaguladas, cambiantes, intermitentes, irregulares, vicariantes; retrasadas en la pubertad. Dismenorrea. Leucorrea; lechosa, espesa como crema, con dolor en la espalda y agotamiento, acre. Dolores de parto débiles. Pesantez del bajo vientre al acostarse. Entuertos; demasiado largos y demasiado violentos. Mamas; inflamadas; dolorosas; con bultos; en niñas antes de la pubertad. Líquido delgado y lechoso que escapa de las mamas en las vírgenes; antes de la pubertad. Leche; suprimida; escasa. Hemorragias secundarias post-parto por placenta retenida. Lloro siempre que se le pone el niño al pecho. Hinchazón de los senos después del destete. Galactorrea. Secreción de leche durante las reglas. Mala posición del feto.

RESPIRATORIO:

Respiración corta < estando acostada sobre la izquierda; sensación sofocante al estar acostada; < si está caliente, al aire libre. Tos; floja en la mañana, seca en la tarde y por la noche; debe sentarse en la cama para obtener alivio. Expectoración; espesa, purulenta, babosa; dulce, salada, amarga cuando se afloja. Tos seca, cortante por cosquilleo en el epigastrio. Pecho oprimido; como por un peso. Adolorimiento o punzadas bajo las clavículas. Ronquera que viene y se va. Asma por supresiones. Tos después de sarampión.

CORAZON:

Palpitación; < acostándose sobre la izquierda, ansiosa; con amenorrea; por emociones; después de la cena. Dolores pegajosos con respiración corta > por la presión de una mano y caminando.

ESPALDA:

Como si se vertiera agua fría en la espalda. Dolor en la espalda y parte baja como por un encorvamiento prolongado. Curvatura de la parte superior de la espina. Dolor punzante en la nuca y espalda. Dolor de espalda < acostándose sobre la espalda, > acostándose sobre los lados o cambiando de posición, especialmente durante el embarazo. La espalda se siente vendada. Dolor en el sacro al sentarse.

EXTREMIDADES:

Dolores erráticos y fulgurantes en los miembros. Los brazos se sienten como rotos y dislocados. Codos entumidos. Articulaciones; hinchadas; rojas. Dorso del pié hinchado, edematoso. Dolores que bajan por los miembros inferiores, alternando lados. Piernas pesadas. Punzadas en la tibia < acostándose > al aire libre y caminando. Sudor frío en las piernas. Sudor de pies fétido. Venas llenas, varicosas, dolorosas. Flebitis. Periostitis. Hinchazón blanca de la rodilla. Inclinación a estirar los pies. Adormecimiento de las piernas al permanecer de pié por largo rato.

PIEL:

Glándulas hinchadas. Ulceras; con areolas duras, rojas, brillantes. Varicosa. Da comezón cuando empieza a calentarse. Urticaria; después de alimentos condimentados; con diarrea; por reglas retardadas; después de desvestirse. Sarampión.

SUEÑO:

Gran somnolencia durante el día, se despierta confundido; lánguido, no reparador. Yace; con las manos sobre la cabeza, o cruzadas sobre el abdomen, y los pies estirados. Sueños; atemorizantes, voluptuosos, desagradables, confusos; de gatos, etc. Platica en sueños. Habla, se queja o grita durante el sueño.

FIEBRE:

Friolento; pero odia el calor; en habitación calineta, con dolor; al acostarse por la noche. Frialidad unilateral con entumecimiento. Dolores durante el sudor. Una mano fría. Sudor parcial. Afiebrado, caliente, temperatura del cuerpo normal. Temperatura errática en las fiebres.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Kali-bi; Sep; Sil; Zin.

RELACIONES:

Ap; Cimi; Grap; Ham; Kali-bi; Kali-s; Nat-s.

PYROGEN

GENERALIDADES:

Este nosode está preparado a partir de un trozo de vaca descompuesto, expuesto al sol por dos semanas, o por pus séptica. Por lo tanto es un remedio para todos los tipos de estados sépticos cuando la sangre está desorganizada, el corazón se pone débil y los músculos postrados. Adolorimientos, inflamación, magullamiento y postración, pero inquieto. Las descargas son horriblemente fétidas, el gusto, olor del cuerpo, reglas, sudor, vómitos, etc. Rayas rojo-rosáceas; linfangitis. Dolor en los huesos. Abscesos; recurrentes; con dolor y ardor violentos. Malestares crónicos que datan de una condición séptica; heridas por disección, envenenamiento por gas de cloacas, envenenamiento por ptomaína; fiebre puerperal; efectos posteriores a un aborto; efectos remotos de una fiebre de tifoidea; difteria, malaria crónica, donde los remedios mejor seleccionados fallan en curar o proporcionar una mejora permanente, especialmente en procesos piogénicos latentes.

AGRAVACION:

Frío, humedad. Movimiento. Por sentarse. Moviendo los ojos.

MEJORIA:

Calor. Caliente; baños, bebidas. Presión. Por estirarse. Cambiando de posición. Por mecerse duro. Caminando.

MENTE:

Cerebro activo; escribe discursos o artículos toda la noche. Locuaz; piensa y habla más rápido que nunca. Sensación de que abarca toda la cama. Siente, estando acostado, a su lado a una persona, y a otra persona al voltearse, en el otro lado. Sensible, ansioso; confundido. Sensación de dualidad; siente como

atestado con manos y pies. Alucinaciones, que es muy rico. Lleno de ansiedad y nociones insanas. La cama se siente dura. Habla o se susurra a sí misma; en sueños.

CABEZA:

Latidos indoloros. Cefalalgia con latidos violentos > vendándose. Rota la cabeza de un lado a otro. Sensación de un gorro en la cabeza. Sudor frío en la frente.

OJOS:

Globos inflamados (izquierdo) < mirando hacia arriba y moviendo los ojos. Fotofobia.

OIDOS:

Rojos, fríos. Tintineos como de una campana.

NARIZ:

Fría. Movimiento de fuelle en las alas nasales. Disgusto por su propio olor corporal. Estornuda cada vez que saca las manos de las cubiertas.

CARA:

Sonrojo héctico de 3 a 4 p.m.; que dura hasta la medianoche; luego se cubre de gotas grandes de sudor frío.

BOCA:

Lengua rojo intenso; raya café que corre por el centro; blanda; grande, floja. Gusto dulzón; terriblemente fétido. Aliento horriblemente ofensivo.

GARGANTA:

Seca. Difteria con extremo hedor.

ESTOMAGO:

Vómito; persistente; cafésoso; como asientos de café; ofensivo, fecal, con intestinos impactados u obstruidos. Vomita agua luego que se calienta en el estómago. Náusea > bebidas muy calientes; y vómito. Gran sed por pequeñas cantidades de bebidas frías, pero el mínimo líquido es instantaneamente arrojado.

ABDOMEN:

Evacuaciones involuntarias horriblemente ofensivas, negro-café, indoloras. Constipación con inercia completa. Heces grandes, negras, bolas pequeñas negras; muy ofensivas.

URINARIO:

Sedimento adherente, rojo, limoso. Orina dos veces al día; escasa. Necesidad de orinar antes de la fiebre. Orina clara como agua. Tenesmo de la vejiga y recto.

HOMBRES:

Testículos que cuelgan relajados; escroto que parece y se siente delgado.

MUJERES:

Infección séptica puerperal. Fiebre en cada período menstrual. Reglas, horriblemente ofensivas. Celulitis pélvica. Prolapso del útero > sosteniendo la cabeza y haciendo un esfuerzo. Loquios suprimidos, seguidos de fiebre, frío y sudor profuso y fétido. Dolores en la región del pezón izquierdo.

RESPIRATORIO:

Dolor en el pulmón (dercho) < toser, hablar. Neumonía descuidada. Tos > sentándose, < acostado.

CORAZON:

Ronroneo. Siente; como cansado, grande o lleno. Conciencia del corazón. El latido se siente en la cabeza y los oídos, impidiendo el sueño. Pulso rápido, fuera de toda proporción a la temperatura. O por el contrario. Corazón con falla que amenaza en estados sépticos y zimóticos.

CUELLO Y ESPALDA:

Latido en las venas del cuello. Sensación de debilidad en la espalda.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento en todos los miembros y huesos. Las uñas amenazan con despegarse o se sienten flojas. Movimiento automático de brazo y pierna (derechos). Dolor en el hombro (derecho) < tosiendo, hablando.

PIEL:

Pálida. Fría. Varicosis obstinada. Ulceras ofensivas de los ancianos. Decúbito rápido de origen séptico. Un corte pequeño en una herida se inflama e hincha demasiado.

SUEÑO:

Susurra en sueños. Insomnio por actividad cerebral.

FIEBRE:

Friolento, quiere para respirar el calor de un fuego. Los escalofríos inician entre las escápulas; se siente en los huesos, con sudor; por la noche. Tisis que avanza lentamente. Sudores, sin alivio. Frío; calor. Temperatura que oscila rápidamente.

RELACIONES:

Anth; Ars; Rap; Echi.

RADIUM

GENERALIDADES:

Se ha encontrado que el bromuro de radio es efectivo en afecciones de la piel; reumatismo y gota; los nervios están afectados, causando dolores que cambian súbitamente o eléctricos; debe acostarse. Dolores sordos, de adolorimiento duro en todos lados; profundo en las articulaciones; muy inquieto; tiene que estarse moviendo alderredor. Calor seco y ardiente, como de fuego, a través de todo el cuerpo; desea aire fresco. Sacudidas eléctricas que atraviesan el cuerpo, durante el sueño. Debilidad, lasitud, cansancio. Latencia aparente de los síntomas. Constricción; en pecho, corazón, etc. con necesidad de aire. Entumecimiento < estirando la parte. Cambios necróticos. Efectos por las quemaduras de Rayos X. Remueve nevus pequeños, lunares, úlceras. Cáncer. Tejido linfático.

AGRAVACION:

Movimiento. Por rasurarse. Lavándose. Por fumar. Al levantarse.

MEJORIA:

Al aire libre. Baños calientes. Bebidas frías. Movimiento continuo. Después de dormir. Presión. Comiendo.

MENTE:

Temor a estar sólo; de la obscuridad; quiere tener a alguien cerca. Travieso. Fácilmente vejado.

CABEZA:

Dolor sobre el ojo izquierdo que se extiende hacia el occipucio y en el vértice, > calor. Vértigo con dolor en occipucio. Dolor en el vértice y occipucio, con severo adolorimiento en la región lumbar.

OJOS:

Rojos, punzantes < al leer. Sensación como si hubiese pedazos de algodón en los ojos, > al frotarlos.

NARIZ:

Comezón y resequedad de las cavidades nasales. Ardor.

CARA:

Arrebolada. Dolor achacoso en el ángulo de la mandíbula inferior derecha. Violenta neuralgia del trigémino. Acné rosáceo.

BOCA:

Excoriada, inflamada con dolor de oído. Sensación en la boca como si hubiese comido pimienta.

ESTOMAGO:

Desea cerdo. Aversión a los dulces; a los helados de crema, a los que es muy afecta a comer. No gusta comer los alimentos que acostumbra; las cosas ácidas le saben bien.

ABDOMEN:

Se alternan síntomas con los de pecho u oído. Náusea que > por comer. Cólico > doblándose en dos y pasando evacuaciones. Recto inflamado, prolapsado. Heces a medio día; suaves, oscuras u ofensivas, color pizarra.

URINARIO:

Disuria, luego erección. Nefritis, con reumatismo.

HOMBRES:

Eczema del pene y superficie interna de los muslos. Comezón.

MUJERES:

Adolorimiento sobre el pubis durante las reglas. Seno derecho inflamado, > por un frotamiento duro. Comezón en genitales. Las reglas duran un día; luego leucorrea sanguinolenta. Hemorragia uterina, cuando Ipecac. falla. Loquios pútridos, escasos o suprimidos. Leucorrea; blanca y escasa; cuajada y caseosa.

RESPIRATORIO:

Tos persistente por cosquilleo en el hueco de la garganta < acostado; fumando; > comiendo y al aire libre; sentándose erecto; por el ejercicio. Tirantez en el pecho; lo siente como si no pudiese obtener suficiente aire. Dolor de pecho que alterna con indigestión y sensación de llenura.

CORAZON:

Constricción. Despierta con palpitaciones. Pulso, rápido, irregular, aleteante. Presión arterial baja.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor y cansancio en las vértebras cervicales < dejando caer la cabeza hacia adelante > por ponerse de pie y sentándose erguido. Debilidad entre las escápulas. Dolor lumbar ascendente > por el ejercicio, caminando. Dolores del hueso lumbo-sacro, > por un baño caliente, < subiendo escaleras.

EXTREMIDADES:

Dolor profundo en las articulaciones; rodillas y tobillos. Las piernas se sienten duras y frágiles, como si se fueran a romper. Reumatismo de las manos. Frías. Adormecidas.

PIEL:

Irritable, gruesa, ardorosa; con comezón; húmeda como rasguñada; < cara y genitales. Costras escamosas. Costras; sobre las orejas. Eczema. Psoriasis. Esclero-derma. Callosidades. Cáncer. Dermatitis.

SUEÑO:

Despierta jadeando; con palpitaciones. Sueños vívidos; de fuego; parecen verdaderos.

FIEBRE:

Sensación de frío interno con castañeteo de dientes.

RELACIONES:

Pho; Puls; Rhus-r.

RANUNCULUS BULBOSUS

GENERALIDADES:

Es un remedio doloroso, que afecta los Nervios; músculos; ojos; membranas serosas; Pecho; piel; dedos, dedos de los pies y el lado izquierdo. Los Dolores son punzantes; como puñaladas; punzantes; arrancan lágrimas; con estremecimientos; no puede descansar en ninguna posición. Adolorimiento como de una ulceración profunda; ardoroso; mordiente. Puntos dolorosos. Neuralgia. Debilidad súbita y desfallecimiento. Temblor; por enojo. Sensación de distensión. Sensible al aire y el contacto. Ardor en puntos pequeños; por vida sedentaria. Descargas por todo el cuerpo. Ciática crónica. Malos efectos del alcohol; lesión; susto, vejación. Pacientes debilitados y trastabillantes, resultado de uso prolongado de whisky, brandy u otros estimulantes alcohólicos. Epilepsia; de los borrachos. Como con un lienzo húmedo y frío especialmente sobre el pecho < al ir al aire frío.

AGRAVACION:

Aire-húmedo; frío; libre, corrientes. Cambio; de temperatura; de posición. Alcohol. Movimiento; de los brazos. Por respirar. Contacto. Comiendo. Susto, vejación, enojo. Clima lluvioso y tormentoso. Estando de pié.

MEJORIA:

De pié. Sentándose doblado hacia adelante.

MENTE:

Gran miedo a los fantasmas por la noche, no se atreve a estar solo. Regañón. Depresión de espíritu, y deseo de morir. Delirium tremens, con hipo.

CABEZA:

Como muy grande y distendida. Adolorimiento en la frente y vértice como dividida en dos; con náusea y adormecimiento. Sensación de cosquilleo en el cráneo. Tic (derecho) a la oreja.

OJOS:

Picor como por humo. Globos adoloridos al moverlos. Ceguera diurna y nocturna. Herpes en la córnea con dolor intenso, fotofobia y lagrimeo. Hemipiopía; durante el embarazo. Los párpados arden.

NARIZ:

Cosquilleo y comezón en los poros, en las coanas posteriores. Trata de aliviarlo carraspeando y sonándose la nariz.

BOCA:

Cosquilleo en el paladar; quiere rascárselo. Calambres, espasmos de los labios. Saliva aumentada. La mantequilla sabe demasiado dulce.

GARGANTA:

Excoriación, ardor que baja por la garganta.

ESTOMAGO:

Hipo espasmódico; de los borrachos.

ABDOMEN:

Hipocondrio magullado. Sensibilidad a la presión. Cólico punzante; que alterna con dolores del pecho. Ictericia; comezón del cuerpo, especialmente las palmas.

RESPIRATORIO:

Respiración ansiosa, opresiva; con deseo de hacer una respiración profunda. Disnea, por enojo. Punto pequeño y doloroso como por una ulceración sub-cutánea en el pecho. Punzadas agudas, cortantes en el pecho; bilaterales. Frío en el pecho al caminar al aire libre; al respirar aire frío. Pleurodinia. Pleuresía; adherencias después de neuralgia intercostal.

ESPALDA:

Dolor muscular a lo largo de la orilla interna de la escápula izquierda por sentarse doblado; por un trabajo de agujas, por escribir en máquina, por tocar el piano; extendiéndose a través de la mitad inferior izquierda del pecho. Escápula adherente. Músculos del cuello contraídos rígidamente, puede hablar solamente moviendo los hombros hacia arriba y hacia abajo.

EXTREMIDADES:

Cosquilleo y comezón en los dedos. Comezón en las palmas. Sacudidas súbitas, dolor punzante en el antebrazo (derecho) mientras escribe. Dolor en los talones como si le apretasen las botas.

PIEL:

Vesículas azulosas. Ardor y comezón intensa < al contacto. Zona. Pémfigo. Costras córneas. Icor corrosivo. Ulceras planas, ardorosas y punzantes. Callos, que punzan o arden < al contacto.

FIEBRE:

Frialdad, < al aire libre.

RELACIONES:

Canth; Rhus-t.

RANUNCULUS SCLERATUS

GENERALIDADES:

Más acre e irritante que Ran-b; causa excoriación; dolores ardorosos-punzantes, royentes, taladrantes corroyentes. Pecho; piel; vértice y lado derecho están especialmente afectados. Los dolores causan desfallecimiento o cortan la respiración. Siente adolorido todo. Afecciones periódicas. Sacudidas convulsivas. Sensación como de un tapón.

AGRAVACION:

Movimiento. Tarde. Respiración profunda. Contacto. Dejando que los miembros cuelguen. Después de medianoche.

MEJORIA:

Dolores, después de medianoche.

MENTE:

Indolencia y aversión a ocupación mental.

CABEZA:

Dolor royente en un pequeño punto en el vértice; o en cualquiera de las sienas. Comezón, mordiente en el cráneo.

NARIZ:

Coriza fluída con estornudos; con micción ardorosa.

CARA:

Como cubierta por una tela de araña.

BOCA:

Dientes romos; con dolor de dientes. Lengua mapeada. Ardor y excoriación en la lengua; parches denudados. La lengua se agrieta y se pela.

GARGANTA:

Excoriación ardiente en la garganta.

ESTOMAGO:

Náusea < después de medianoche. Dolor, con desfallecimiento.

ABDOMEN:

Como con un tapón detrás del ombligo. Dolor sobre la región del hígado como si se fuese a tener diarrea.

RESPIRATORIO:

Punzadas en los músculos del pecho; el pecho y el esternón están sensibles al contacto. Como con un tapón que fuese forzado entre las costillas, < por respirar profundamente. Ardor doloroso detrás del esternón.

CORAZON:

Como con un tapón en el corazón.

EXTREMIDADES:

Gota en dedos y dedos de los pies. Dolor royente en la rodilla y palma izquierdas. Callos con adolorimiento ardoroso < dejando que los pies cuelguen. Punzadas súbitas en los dedos gordos, pasando a arder.

PIEL:

Vesículas amarillas. Burbuja; con contenidos acres. Pémfigo.

SUEÑO:

Sueños pavorosos; de cuerpos muertos, serpientes y peleas.

RELACIONES:

Ars; Aru-t.

RAPHANUS

GENERALIDADES:

El rábano salvaje produce síntomas histéricos, mentales y uterinos. Entumecimiento, cambiando de lugar. Globo; como un globo caliente que vá del útero hacia la garganta. Bebe más de lo que orina. Flatulencia retenida; no puede pasar hacia arriba o hacia abajo; dolores por gas, después de una operación. Ninfomanía; con aversión a su propio sexo e hijos, especialmente niñas. Insomnio sexual. Vómitos de materia fecal. Frialdad de un pié. Epilepsia, refleja, por remoción de un prepucio adherido, la cicatrización se retarda por priapismo furioso. Orina espesa como leche.

RATANHIA

GENERALIDADES:

Los síntomas anales y rectales están muy marcados; afecta dientes y pezones. Dolores aquí y allá. Sensación de constricción. Hemorragias; pasivas. Lombrices. Personas oscuras, delgadas, huesudas.

Grietas; fisuras. Actúa como un tónico en mujeres delicadas y nerviosas para prevenir abortos, en aquellas que nunca han podido llegar a buen término.

AGRAVACION:

Noche. Ansiedad, inquietud mental. Fatiga. Contacto. Haciendo esfuerzos para defecar.

MEJORIA:

Baño frío. Baño caliente. Caminando al aire libre. Ejercicio.

CABEZA:

Dolores a la mitad de la frente como si el cerebro fuera a caerse. Dolor de cabeza estallante, al hacer esfuerzos para evacuar, o después de las evacuaciones.

OJOS:

Los párpados se sienten rígidos. Sacudidas muy rápidas de los párpados. Pterigión.

BOCA:

Como si saliera aire fresco de los dientes. Dolor de dientes < por la noche; debe ponerse a caminar. Como con una telaraña alderredor del lado derecho de la boca.

ESTOMAGO:

Dolor cortante o atenazante > eructos. Hipo violento y doloroso.

ABDOMEN:

Constricción o como agujas punzantes de vidrio cortado en el recto; la evacuación sale con mucho esfuerzo y seguido de un ardor-dolor prolongado: > agua caliente. Fisura del ano, con gran constricción y ardor como de fuego. Ano seco y con comezón. Ascárides. Descarga de sangre del recto con o sin evacuaciones.

MUJERES:

Metrorragia. Grieta en los pezones, en mujeres que amamantan. Se obliga a levantarse por la noche y caminar durante el embarazo, con dolor de dientes.

PECHO:

Dolor en las costillas al dar el paso.

RELACIONES:

Nit-ac; Paeon.

RHEUM

GENERALIDADES:

El ruibarbo es un remedio para lactantes y niños, especialmente durante la dentición; y adecuado para mujeres embarazadas y mujeres que amamantan. Afecta el hígado, duodeno; ductos biliares e intestinos. Acidez es un síntoma muy marcado; todo el niño huele agrio; el lavado no quita el olor. Niños coliquientos que siempre están gritando y llorando. Agrio; gusto, vómito, evacuaciones, sudor, etc. Dentición difícil. Requiere poco sueño y no mucho alimento. Sensación de crepitación.

AGRAVACION:

Dentición. Por comer; ciruelas. Verano. Mujeres que amamantan. Movimiento. Antes, durante y después de las evacuaciones.

MEJORIA:

Calor. Por envolverse. Yaciendo doblado. Posiciones raras.

MENTE:

Impaciente; el niño pide cosas diferente vehementemente, con llanto, pero le desagradan aún sus cosas favoritas. Deseo impetuoso de objetos particulares. Inquietud; con llanto.

CABEZA:

Sudor en cuero cabelludo; pelo; húmedo, empapado.

OJOS:

Débiles al mirar fijamente cualquier objeto. Sacudidas convulsivas de los párpados.

CARA:

Sudor frío; especialmente alderredor de la nariz y boca; en el labio superior. Frente arrugada. Sacudidas.

BOCA:

Moco ofensivo en la boca; después del sueño. Aliento agrio. Salivación; con cólico o diarrea. La comida sabe amarga, aún las cosas dulces. Los dientes se sienten fríos.

ESTOMAGO:

Deseo de varias cosas, pero no puede comerlas. Se harta después del primer bocado. Las ciruelas y pasas caen mal. Requiere poco alimento.

ABDOMEN:

Cólico, con gritos, > doblándose en dos, < por descubrir cualquier parte; luego evacúa heces papescentes, ácidas, cafés, verdes, fermentadas, delgadas o acres; < por comer fruta no madura; < en la noche. Escalofríos con evacuaciones. Diarrea sólo cuando camina. Ictericia por comer frutas verdes, con diarrea blanca.

URINARIO:

Ardor en la vejiga y riñones, antes y durante la micción. Necesidad ineficaz de orinar, antes de evacuar.

MUJERES:

Malestares urinarios después del aborto. Leche en mujeres lactantes amarilla y amarga; el niño rehúsa el pecho. Diarrea, después de parto.

ESPALDA:

Rigidez en el sacro y caderas, no puede caminar derecho. Sensación de herida en la región lumbar < después de evacuar.

EXTREMIDADES:

El miembro sobre el que se yace se duerme. Sacudidas en los brazos, manos y dedos. Sensación de burbujeo en la articulación del codo, desde el doblar de la rodilla hasta los talones. Debilidad de la muñeca y rodilla, después de torceduras y dislocaciones.

SUEÑO:

Inquieto; con llanto y gemidos. Sacudida de la cara y dedos. Requiere muy poco sueño y no mucho alimento.

FIEBRE:

Sudor en el cráneo, alrededor de la boca; nariz; labio superior.

COMPLEMENTARIO:

Mag-c.

RELACIONES:

Cham.

RHODODENDRON

GENERALIDADES:

Comunmente conocido como la rosa de nieve amarilla, es un remedio gotoso y reumático; afecta los tejidos fibrosos; antebrazo; extremidades inferiores, pequeñas coyunturas; huesos; genitales; nervios; partes aisladas. Sensible al clima ventoso y tormentoso, húmedo; aún estando en la casa; personas nerviosas que tienen temor a los truenos. Dolores desgarrantes; en zig-zag; paráliticos; agudos, cambiando rápidamente, descendentes. Gran debilidad después de un esfuerzo ligero. Hormigueo; con sudor. Corea antes de una tormenta. Síntomas alternantes. Sensación ondulante.

AGRAVACION:

Antes de las tormentas; Clima; áspero, ventoso; frío, húmedo; cambiante, nublado. Noche. Mitad del verano. Vino. Descanso. Por comer fruta. Por mojarse. Por resfriarse.

MEJORIA:

Después de que una tormenta se desencadena. Calor; en el sol, cuando éste brilla. Movimiento, al moverse. Arropándose la cabeza.

MENTE:

Confusa y estúpida. Olvida de lo que está hablando; omite palabras enteras al escribir. Temor a los truenos en personas nerviosas. Aversión a sus negocios. Fácilmente afectado por el vino.

CABEZA:

Dolor < temprano por la mañana > comiendo. Latidos en el lado derecho de la cabeza. Tirantez, desgarramiento bajo el cráneo. Vértigo, al estar acostado en la cama, > moviéndose. El cabello se eriza como electrizado.

OJOS:

Neuralgia ciliar, que involucra la órbita, globo ocular y cabeza < antes de una tormenta. Calor en los ojos al usarlos. Como si agujas calientes se dispararan desde dentro del ojo.

OIDOS:

Sensación como de un gusano. Sordera; mucho después de levantarse (la escucha mejora en la mañana). Los sonidos aparecen después de que el paciente se ha levantado, unas pocas horas. Tinnitus con vértigo.

NARIZ:

Los poros nasales se obstruyen alternadamente; con coriza fluída; > al aire libre.

CARA:

Prosopalgia; dolores violentos, desgarrantes, sacudientes > por comer y por el calor.

BOCA:

Dolor de dientes > por comer y calor. El dolor de dientes cesa súbitamente; < nuevamente en dos o tres horas.

ESTOMAGO:

Presión dura por bebidas frías. Se siente lleno después de poco alimento. Vómito verde, amargo, después de beber agua fría.

ABDOMEN:

Cólico a la altura del ombligo. Dolor desde el recto a los genitales. Los flatos se sienten en la espalda. Diarrea < frutas; no debilita. Dolor molesto en el bazo al caminar rápido. Sensación ondulante que sube.

URINARIO:

Necesidad frecuente de orinar con tirantez en la región de la vejiga. Dolor en la uretra como por una ulceración subcutánea. Orina; profusa; fétida, verdosa.

HOMBRES:

Tirantez desde el cordón espermático hacia dentro del abdomen y muslos. Testículos; hinchados, dolorosos, jalados hacia arriba, los siente aplastados. El glande se siente aplastado. Testículos indurados; con dolor que alterna. Orquitis. Escroto arrugado, con comezón, sudoroso. Hidrocele; de jóvenes; desde el nacimiento.

MUJERES:

Reglas suprimidas. Fiebre; con dolor de cabeza, en cada período menstrual. Quistes serosos en la vagina. Ardor en la región uterina, después del parto, que alterna con dolor en las extremidades, dedos flexionados espasmódicamente.

RESPIRATORIO:

Sensación de magullamiento y torcedura en el pecho. Sin respiración y sin habla, por dolores pleuríticos violentos, correa hacia el pecho anterior.

CORAZON:

Ondulación caliente en el corazón. Latido del corazón fuerte.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello y nuca rígidos. Dolores del sacro < sentándose.

EXTREMIDADES:

Sensación de magullamiento y torcedura en la muñeca. Las manos se sienten calientes con clima frío. Piernas; frías con piel arrugada, se sienten como dormidas. Como si un peso colgase de los pies. Desgarramiento reumático en todos los miembros. Tirantez y dolor en el periostio de los huesos largos. Reumatismo de clima caliente. Pies fríos, aún en cuarto caliente, aún en la cama. Dolor en el tendón de Aquiles al dar el paso.

SUEÑO:

No puede dormir a menos que las piernas estén cruzadas. Despierta como si lo hubiesen llamado.

FIEBRE:

Hormigueo, y comezón de la piel con sudor.

RELACIONES:

Rhus-t.

RHUS TOXICODENDRON

GENERALIDADES:

Este remedio es un agente irritante a la Piel especialmente de la cara, cráneo, genitales; afecta el tejido fibroso, ligamentos y articulaciones causando Síntomas reumáticos; es un agente infeccioso que produce Fiebres tipo tifoidea. Afecciones de los Nervios y médula espinal que dan paso a efectos paréticos. Las glándulas están hinchadas, calientes y dolorosas; induradas; supurantes. Los síntomas aparecen en el lado izquierdo y van de izquierda a derecha. Los dolores son desgarrantes, punzantes, fugaces; < por la noche; no puede descansar; en ninguna posición. Las partes se sienten inflamadas, magulladas y rígidas. Los dolores son como si la carne fuese desprendida de los huesos. Sensación de dislocación. Los músculos se sacuden. Hormigueo. Entumecimiento; de partes paralizadas. Temblores. Ardor, hinchazón y lividez. Las descargas mucosas son acres; de un rojo mohoso, como sanguaza; mohosa; causando erupciones. Infecciones; septicemia, carbunclos en etapa temprana. Celulitis. Inflamación e hinchazón de los huesos largos; sensación de rasgamiento; apretón y desgarre en el periostio. Reumatismo en estación fría. Complicaciones post-operatorias. Hemiplejía, del lado derecho; sensación de que se está dormido. Parálisis infantil; por exposición a frío húmedo. Influenza. Viruela. Estricturas, después de inflamación. Inflamación de la proyección prominente de los huesos. parálisis; después de ejercicio habitual; después del parto. Ampollas, abscesos.

AGRAVACION:

Exposición a la humedad; frío; aire; corrientes; heladas; estando caliente o sudoroso. Descubiertas; partes, cabeza, etc. Al iniciar el movimiento. Descanso. Antes de tormentas. Torceduras. Exceso de ejercicio. Después de medianoche. Golpes; sacudidas. Por montar. Bebidas heladas. El lado sobre el que se yace.

MEJORIA:

Movimiento continuo. Calor. Baño caliente; si está acalorado. Cubiertas calientes. Frotando. Sangramiento nasal. Por sostener la parte afectada, abdomen, cabeza, etc. Estirando los miembros. Cambio de posición. Clima caliente y seco.

MENTE:

Tristeza ansiosa; desvalimiento y abatimiento profundo. Delirio leve y bajo; lenguaje incoherente, contesta correctamente pero con lentitud, o enfadado y renuente. Predisposición a llorar < por la noche; sin saber por qué; con deseo de soledad. Temor a ser envenenado. Saciedad de la vida; pensamientos suicidas, quiere ahogarse él mismo. Olvidadizo, no se acuerda de los eventos más recientes. Temor < por la noche, no puede acostarse en la cama. Confusión. Ansiedad, respecto a sus propios hijos.

CABEZA:

Vértigo; en los ancianos; con giro; luego dolor de cabeza. Sensación de que el cerebro se rompe en pedazos, o está suelto < por sacudidas. Sensación de una tabla atada a través de la frente. Cefalalgia pasmante; debe acostarse < por el mínimo disgusto. Cráneo dolorosamente rígido < acostándose sobre él. Cabeza pesada.

OJOS:

Dolor detrás de los ojos < movimiento. Párpados; rígidos; aglutinados; secos; firmemente cerrados. Chorro profuso de lágrimas calientes al abrir los párpados. Inflamación pustulosa. Conjuntiva sacular. Fotofobia. Iritis. Ptosis. Parálisis de cualquiera de los músculos del globo ocular. Diplopía vertical. Celulitis orbitaria. Afecciones de la superficie interna de los párpados.

OIDOS:

Parotitis (izquierda) con fiebre. Lóbulos hinchados. Dolor en el oído con sensación de que hay algo dentro: Descarga de pus sanguinolenta.

NARIZ:

Punta roja y sensible; gotea agua. Estornudos, coriza fluída. Sangramiento nasal; < por la noche, agachándose, al evacuar, en fiebres, lo que dá un gran alivio. Dolorimiento violento en los huesos de la nariz. Aliento caliente, quema las alas nasales.

CARA:

Las mandíbulas crujen al masticar. Coyunturas dolorosas. Neuralgia facial con escalofrío. Dislocación fácil de las mandíbulas. Pómulos dolorosos. Manchas rojas en la mejilla izquierda. Cara rígida e hinchada. Labios secos, cafés, agrietados, en las comisuras; costrosos. Herpes en los labios. Costra de leche. Acné rosáceo.

BOCA:

Fuliginosidades en los dientes. Los dientes se sienten flojos y largos. Saliva sanguinolenta que corre durante el sueño. Lengua; seca, con centro rojo; agrietada, rígida, inflamada, tiene un triángulo rojo en la punta ; cubierta en diagonal o solamente un lado. Sensación como si la lengua estuviese cubierta con piel. Gusto cobrizo, o a hierbas o amargo. El pan sabe amargo.

GARGANTA:

Fauces rojas, esponjosas, con comezón. Tonsilas cubiertas con membrana amarilla. Garganta inflamada, con glándulas inflamadas. Deglución difícil; de sólidos, como por contracción; de saliva. Esofagitis por deglución de materias corrosivas.

ESTOMAGO:

Desea bebidas frías, aunque ellas < la tos, el frío, etc. Deseo; de leche fría; dulces; ostras. Vómito; por tos; estando acostado sobre la espalda; fecal. Náusea; < por helados; después de comer. Gran sed < por la noche. Amodorramiento después de comer. Mucha sed, pero no hay apetito para ninguna clase de comida. Dolor en el estómago después de agua helada.

ABDOMEN:

Inflamado. Sensación como de chapaleo de agua; o como con un tapón. Cólico que obliga a caminar doblado, > acostándose sobre el abdomen. Síntomas ileo-cecales; apendicitis. Heces; acuosas; espumosas; o sanguinolentas; fétidas; como sanguaza; limosa, gelatinosa; involuntaria; en sueños, por la noche; o con tenesmo; < bebiendo. Diarrea disentérica. Hemorroides < levantándose. Tenesmo doloroso sin evacuaciones. Contracción de reloj de arena. Colitis mucosa.

URINARIO:

Incontinencia de orina < acostándose, por la noche o sentándose; en muchachos. Nefritis. Orina; oscura, turbia, altamente coloreada, escasa. Micción frecuente, profusa, día y noche.

HOMBRES:

Escroto grueso, hinchado, edematoso. Prepucio edematoso. Comezón intensa en genitales. Hidrocele; por levantar un peso excedido. Metástasis de paperas a los testículos.

MUJERES:

Hinchazón; con intensa comezón en vulva. Reglas; demasiado adelantadas, profusas y prolongadas. Amenorrea; por mojarse; con leche en los senos. Metritis; séptica. Loquios; delgados, prolongados, ofensivos, disminuidos con punzadas que van hacia la vagina. Prolapso del útero por levantar pesos grandes o por esfuerzos excesivos. Entuertos frecuentes. Dolor violento en la vulva durante las reglas. Vagina inflamada.

RESPIRATORIO:

Dolores de pecho < usando los brazos. Cosquilleo detrás del esternón superior; causando tos seca, ronca, desgarrante, atormentante, con gusto de sangre.; < durante el escalofrío; o cuando se sacan las manos de la cama, después de medianoche y hacia la mañana. Ronquera por exceso de esfuerzo al usar la voz. Hipostasis súbita o edema de pulmones. Pleurodinia; dolores de pecho que se dispara hacia los hombros. Hemoptisis; por exceso de ejercicio por soplar instrumentos de viento; sangre brillante. Espujo color herrumbre. Laringe fría al respirar. Aire caliente de la tráquea.

CORAZON:

Hipertrofia no complicada por ejercicio violento. El corazón se siente cansado; los dolores bajan por el brazo izquierdo. Palpitación < estando sentado y quieto; > caminando. Temblor en el corazón, > caminando. Pulso; rápido, débil, irregular, intermitente, con adormecimiento del brazo izquierdo. El brazo izquierdo duele con enfermedad cardíaca.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido, con tensión dolorosa; al moverse. Dolor Inter-escapular < al deglutir. Dolor de espalda contractivo o de quebradura > presión dura; acostándose sobre algo duro; caminando o doblándose hacia atrás. lumbago. Adolorimiento del cóccix hasta los muslos.

EXTREMIDADES:

Entumecimiento, y picoteo en los miembros. Brazos nerviosos y con sacudidas (izquierdo). Dolores paráliticos en los codos. Erupciones en el dorso de las manos. Palmas; secas, calientes, agrietadas e inflamadas; el lavado causa ardor. Dolores que bajan por los muslos < con las evacuaciones; ciática. Las piernas se sienten muertas, como de madera. Calambres en las pantorrillas. Cojera involuntaria. Inflamación de los cóndilos de los huesos. Miembros rígidos, paralizados. Hinchazón caliente y dolorosa de las coyunturas. Picoteo como de alfileres en la punta de los dedos y palmas al agarrar. Dolores a lo largo del nervio ulnar. Ulceras; en las piernas; gangrenosas; corre agua sanguinolenta; en piernas hidrópicas. Comezón en piernas y pies. Tobillos hinchados después de estar sentado por largo rato; los pies se hinchan por la noche. Paraplejía; después del parto; excesos sexuales; fiebres. Como si caminara sobre alfileres. Abscesos axilares, después de un parto.

PIEL:

Rígida, gruesa, seca, caliente, ardorosa; con comezón, < partes velludas. Piel sensible al aire frío. Erupciones; finas, vesiculares; costrosas; eczematosas: húmedas o erisipelatosas < genitales; alternando con disentería. La pus corroe el cabello. Vesículas sobre abscesos. Costras de leche. Comezón del panadero. Urticaria; por mojarse; con reumatismo o durante los escalofríos y fiebre. Zona.

SUEÑO:

Se despierta cansado y nervioso. Sueños; de gran ejercicio; de sangre; de fuego. Bostezos; frecuentes, violentos, espasmódicos; sin inclinación a dormir; con estiramientos. Inquieto, revolcándose.

FIEBRE:

Se enfría fácilmente < al menor descubrimiento, con dolor en los miembros. Frío como si fuese rociado con agua fría, o con agua fría en las venas; precedido de tos; alternando con calor. Escalofrío en partes aisladas. Calor con delirio ocupado. Tifoidea. Sudor; < durante el dolor; con somnolencia. Urticaria durante la fiebre. Quiere bostezar y estirarse durante el escalofrío.

COMPLEMENTARIO:

Bry; Calc. Magn-c; Med; Phyt.

RELACIONES:

Am; Bry; Dul.

ROBINIA

GENERALIDADES:

Acridez y acidez son acciones marcadas de este remedio. Por eso es útil para la hipercloridia, cuando los eructos y el gusto son ácidos y el vómito es tan ácido que destiempla los dientes, o los entume. Niños ácidos; con olor agrio del cuerpo; heces ácidas y vómitos de leche agria. Dispepsia ácida. Dolor de cabeza sordo y constante < movimiento y por leer. Náusea con vómito ácido. Aflujo de agua en la boca. Ardor en el estómago y entre las escápulas. Flatulencia. Como algo que exprime el estómago. Agruras y acidez < acostándose especialmente por la noche.

AGRAVACION:

Por comer. Noche. Grasas. Calabazas (chauchas). Nabos. Fruta cruda. Helados.

RELACIONES:

Iris; Mag-c.

RUMEX CRISPUS

GENERALIDADES:

Afecta los nervios, causando numerosos y variados dolores; ni fijos ni constantes en ningún lado; dolores punzantes; neuralgias. Las membranas mucosas de laringe, tráquea, intestinos y el hueco de la garganta, están afectados, produciendo resequeidad y sensibilidad. Actúa en coyunturas, especialmente los tobillos; piel, lado izquierdo; pecho. Las secreciones mucosas decrecen causando viscosidad, con ardor. Obesidad. Crecimientos linfáticos y secreciones pervertidas. Cada resfrío afecta las articulaciones.

AGRAVACION:

Aire fresco; inhalando; aire libre; cambio; de caliente a frío; de frío a caliente. Descubriéndose. Noche. Presión; en la tráquea. Por hablar. Respirando profundamente o respiración irregular. Movimiento. Por comer; después de los alimentos.

MEJORIA:

Cubriendo la boca. Arropándose.

MENTE:

Deprimido; con expresión seria de la cara. Indiferente a lo que lo rodea.

CABEZA:

Dolor agudo y punzante en el lado izquierdo.

OJOS:

Arden; en el interior; abotagados en la mañana.

NARIZ:

Sensación de resequeidad en las coanas posteriores. Ataques de estornudos; coriza fluída. Comezón que se extiende desde el final de la nariz hasta la faringe.

CARA:

Aterronada. Pálida mientras está de pié.

BOCA:

Dolor de todos los dientes > después de la cena; enjuagando la boca con agua fría.

GARGANTA:

Carraspea mucho moco tenaz. La garganta se siente hueca. Tapón no > por carraspear, desciende y se eleva otra vez después de deglutir.

ESTOMAGO:

Apetito voraz. Como de una sustancia dura en el hueco del estómago. Dolor en el seno izquierdo después de las comidas. El hablar < los síntomas del estómago. Gastralgia; adolorimiento a través de la espalda, obligando a respirar profundamente. Dolor fijo, sufocante y pesado en el epigastrio, a la espalda; la ropa se siente apretada. El comer carne causa eructos y prurito. Náusea > por eructos.

ABDOMEN:

Hormigueo cerca del ombligo > por la descarga de flatos ofensivos. Evacuaciones; súbitas; profundas; fétidas; indoloras; café-negras, o de agua delgada, que lo sacan de la cama; en la mañana (de 5 a 9 a.m.); en tisis, después de catarro. Comezón en el ano con sensación como de una barra en el recto. Flatulencia ruidosa molesta en mujeres.

URINARIO:

Necesidad súbita; involuntaria con tos.

MUJERES:

Dolor en el ovario derecho hacia la espalda.

RESPIRATORIO:

Cada respiración de aire frío, causa cosquilleo, como de una pluma o polvo en el hueco de la garganta, con tos continua, > cerrando o cubriéndose la boca o la cabeza, < tocándose el hueco de la garganta; acostándose sobre el lado izquierdo. Tos seca y molesta que impide el sueño. Expectoración profusa, espumosa, delgada. Los esputos se vienen en bocanadas. Disnea el acostarse. Atragantamiento sofocante. Respiración < en el viento. Tos provocada por cambiar habitación, por cambio de frío a calor, o de calor a frío. Dolor, excoriación o ardor bajo la clavícula como si el aire penetrase por allí, < carraspeando. Dolor; bajo el esternón; bajo el pezón derecho. Dolor ardoroso y punzante en el pecho izquierdo cerca del corazón, < respiración profunda. Tos ladrante. Tos que viene regularmente a las 11 p.m., 2 y 5 a.m.; niños. Tos únicamente durante el día. Tos < durante el inicio del embarazo y que puede causar un aborto. Dolor clavicular < carraspeando.

CORAZON:

Se siente como si se detuviera súbitamente seguido de latidos fuertes a través del pecho.

ESPALDA:

Dolor bajo la escápula; derecha.

EXTREMIDADES:

Dolor en el hombro izquierdo al toser, al levantar los brazos. Manos frías al toser. Calambres espasmódicos en los tobillos y los pies.

PIEL:

Comezón intensa < miembros inferiores; < por exponerse al aire frío o al desvestirse. Acné vulgar en la espalda.

SUEÑO:

Somnolencia repentina.

FIEBRE:

Sudor al despertar de un sueño profundo.

RELACIONES:

Caus; Seneg.

RUTA GRAVEOLENS

GENERALIDADES:

Este remedio tiene una afinidad especial para los tejidos fibrosos; tendones flexores; coyunturas; tobillos; muñecas; cartílagos; periosteo; útero y piel. Es un remedio principal para los huesos lesionados o magullados: por lo que los dolores son de magulladura; inflamación dolorosa con inquietud. Sensación de un cansancio intenso y doloroso. Pesadez; como con un peso en la frente o colgando de los pies; de los miembros inferiores. Como de una clavija roma y áspera en partes, cabeza, nariz, etc. Rigidez paralítica. Distorsiones. Dolores atrozantes, ardorosos, neuralgia. Reumatismo. Formación de depósitos o nódulos en el periosteo, tendones, y alrededor de las articulaciones, especialmente muñecas. Malos efectos de lesiones, fracturas; por levantar pesos excesivos. Cojera después de torceduras. Huesos quebradizos. El yacer sobre algunas partes las inflama; aún en la cama. Sensación de lasitud intensa, debilidad y desesperanza.

AGRAVACION:

Exceso de esfuerzo, lesión; torceduras. Esfuerzo visual. Frío; aire; húmedo, viento; mojado. Acostándose. Por sentarse. Presión en una orilla. Agachándose. Durante las reglas. Alimentos no cocinados o indigestos. Ejercicio; ascendiendo y descendiendo escaleras.

MEJORIA:

Acostándose sobre la espalda. Calor. Movimiento. Frotándose. Rascando.

MENTE:

Insatisfecho consigo mismo y con otros, y con disposición a llorar. Suspica, imagina que siempre es engañado. Irritable, regaña y contradice.

CABEZA:

Duele como si se introdujera un clavo en ella. Punzadas < por leer.

OJOS:

Rojos, calientes y dolorosos, por leer letra fina, coser. Visión disminuída. Lagrimeo. Comezón en el canto interno. Astenopía. Espasmos del párpado inferior, cuando cesa, se inicia el lagrimeo.

OIDO:

Dolor como por un pedazo de madera roma.

NARIZ:

Sudor. Dolor presivo en la raíz de la nariz; con epistaxis.

BOCA:

Calambre en la lengua, causando lenguaje confuso. Gusto de madera.

ESTOMAGO:

Náusea súbita mientras come; con vómito de alimento. Dolor ardoroso y atenazante. Dispepsia por levantar peso excesivo. Sed violenta por agua helada. Nausea que se siente en el recto. Tensión en el estómago > bebiendo leche.

ABDOMEN:

Necesidad de evacuar, pero solamente se prolapsa el recto. Prolapsos del recto al agacharse; después de un parto, durante las evacuaciones duras o suaves. Las heces con frecuencia se escapan al agacharse. Inflamación dolorosa del bazo. Cáncer del intestino inferior. Estrictura del recto.

URINARIO:

Presión constante de la vejiga como si estuviese llena o se moviese arriba y abajo. Necesidad constante, difícilmente puede retener la orina, si la retiene por la fuerza, después es posible que no la puede pasar, con dolor severo.

MUJERES:

Leucorrea corrosiva después de reglas irregulares o suprimidas.

RESPIRATORIO:

Respiración corta, con tiesura del pecho. Sensación débil en el pecho, después de un esputo espeso, amarillo. Punto doloroso en el esternón. Malos efectos de lesiones mecánicas en el pecho.

CUELLO Y ESPALDA:

Débil, sensación de magulladura en la espalda baja, caderas y miembros inferiores, en la mañana. Frialdad de la espina, que baja. Dolor de espalda > acostándose sobre la espalda y con la presión.

EXTREMIDADES:

Los muslos se siente quebrados < cuando estira las piernas. Tendones inflamados. Se tropieza; trastabillea fácilmente. Dolores como profundos en los huesos largos; debe moverse. Nódulos en las palmas. Ganglión en la muñeca. Dolor en los huesos de los pies, no puede pisar fuerte sobre ellos. Contracciones; de los dedos; de los pies y dedos de los pies. Los tendones se sienten cortos. Crujido en las articulaciones < caminando al aire libre. Ciática; < acostándose, por la noche > durante el día. Las piernas flaquean cuando se intenta levantar de un asiento, tiene que hacer varios intentos antes de tener éxito. Debilidad parálitica de las piernas, después de torcerse la espalda. Las piernas se sienten débiles, las rodillas se doblan, mientras sube y baja escaleras. Tobillos inflamados.

PIEL:

Fácilmente rozada; por caminar, montar; también en los niños. Comezón erosionante. Verrugas planas, suaves y dolorosas; en las palmas. Comezón después de comer carne.

SUEÑO:

Despierta con frecuencia; sueños vívidos, confusos. Bostezo, se estira y extiende las manos.

FIEBRE:

Ataques frecuentes de bochornos rápidos de calor. Calor reluciente en la cara, piel, etc.

COMPLEMENTARIO:

Calc-p.

RELACIONES:

Am; Phyt; Ran-sc; Symp.

SABADILLA

GENERALIDADES:

Las membranas mucosas de la nariz; glándulas lagrimales; ano y tracto digestivo están afectados por este remedio. Los nervios están afectados, produciendo debilidad, nerviosismo; se sobresalta con facilidad. Los síntomas nerviosos son reflejo de lombrices; sacudidas, temblores convulsivos o catalepsia. Hormigueo. Se alternan síntomas corporales y nerviosos. Histeria, después de un susto. Malos efectos de un susto; fatiga mental; por pensar. Lombrices; causando convulsiones, ninfomanía, etc. Enfermedades imaginarias. Dolores cortantes en los huesos.

AGRAVACION:

Frío- aire; bebidas. Periódicamente; cada semana, dos semanas. Cuatro semanas; a la misma hora; en la mañana; en luna nueva y llena. Olores; exantema no desarrollado. Fatiga mental.

MEJORIA:

Al aire libre. Calor. Por comer. Deglutir. Movimiento rápido de la parte afectada.

MENTE:

Achacoso. Tímido. Fácilmente sobresaltado. Ideas erróneas (fijas) acerca de sí mismo; imagina que está muy enfermo; que algunas partes están hundidas; que los miembros están torcidos, la barbilla alargada; un lado más grande que el otro; que tiene cáncer o está embarazada. No responde a preguntas, pérdida de la conciencia, luego brinca y corre atolondradamente por la habitación. Rabia. Manía > lavándose la cabeza con agua fría.

CABEZA:

Vértigo con sensación como que todas las cosas estuviesen girando unas alderredor de otras; súbitamente al despertar por la noche; o levantándose al estar agachado; con visión negra y sin

desmayarse, > descansando la cabeza sobre una mesa. Dolores de cabeza unilaterales; o alternando lados; < por pensar. > comiendo. Ardor, comezón, hormigueo en el cuero cabelludo > rascándose. Dolor de cabeza en las escolares.

OJOS:

Párpados rojos, ardorosos. Lagrimeo; < durante el dolor; estornudando, tosiendo, bostezando; al caminar al aire libre; durante el escalofrío.

OIDOS:

Dificultad para escuchar, como si trajera un vendaje sobre la oreja.

NARIZ:

Estornudos violentos, abortivos, persistentes. Comezón; cosquilleo; se frota y rasca la nariz. Nariz seca. Hormigueo en la nariz que se esparce hacia todo el cuerpo, luego hay disnea. Fiebre de Heno. Influenza. Olfato sensible. Uno y el otro poro tapados. Coriza fluída; la descarga se agrava por el olor de las flores, aún el pensar en ellas incrementa la descarga. No puede tolerar el olor del ajo. Coriza obcecada, prolongada. Expectoración sangre roja brillante de la nasofaringe.

CARA:

La siente caliente, roja ardiente. Labios calientes que arden como si estuviesen escaldados. Crujido de la articulación de la mandíbula al abrir con amplitud la boca.

BOCA:

Y lengua como si estuvieran quemadas. Comezón del paladar blando. Gusto dulzaino. No soporta nada caliente o frío en la boca.

GARGANTA:

No puede sacar la lengua con garganta inflamada. Como con un bulto, una morusa, un hilo o piel que colgara en la garganta, con inclinación constante a tragar. Garganta inflamada; de izquierda a derecha < deglutiendo en vacío > bebidas frías. Amigdalitis después de una coriza.

ESTOMAGO:

Desea; cosas calientes, dulces, leche. No hay gusto por la comida hasta que toma los primeros bocados, luego come muy bien; durante el embarazo. Hambre canina, por dulces y alimentos farináceos. Sin sed. Frialdad o sensación de vacío. Aversión a todos los alimentos, carne, cosas ácidas, café y ajo.

ABDOMEN:

Los intestinos se sienten anudados. Como con un bulto o hilo que se moviera rápidamente. Heces ardorosas, espumosas, flojas, cafés, flotantes. Hormigueo, comezón, en el ano; se alterna con comezón en la nariz o los oídos. Lombrices.

MUJERES:

Ninfomanía por lombrices. Reglas; demasiado tardías, vienen como ataques y sobresaltan; intermitentes; algunas veces más fuertes; algunas veces más débiles.

RESPIRATORIO:

Ataques de tos violenta; amortiguada, < enojo; con lagrimeo. Respiración asmática con comezón en la piel, nariz y ano. Manchas rojas en el pecho. Pleuresía con gran debilidad paralítica.

CORAZON:

Palpitación, con pulsación a través de todo el cuerpo.

EXTREMIDADES:

Sacudidas de los brazos hacia arriba. Crujidos entre y bajo los dedos de los pies. Dolores cortantes en los huesos. Uñas gruesas, deformadas y córneas. Manchas rojas en los brazos y manos. Manchas amarillas en los dedos. Hinchazón de pies, con plantas dolorosas.

PIEL:

Comezón con respiración asmática. Seca en parches.

SUEÑO:

Viene cuando se está pensando, meditando, leyendo.

FIEBRE:

Escalofríos como un concomitante. Sed después de frío, solamente. Frío de abajo hacia arriba. Lagrimeo con frío.

COMPLEMENTARIO:

Sep.

RELACIONES:

Ars; Pul; Urt-u.

SABAL SERRULATA

GENERALIDADES:

Influencia principalmente los órganos genito-urinaros, especialmente próstata, ovarios; mamas, vejiga y uretra. Es un calmante de las membranas mucosas y un tónico, nutritivo y estimulante de un cerebro sobre-trabajado (use 1x). Dolores agudos, punzantes, erráticos. Un cáteter homeopático para la retención de orina debido a crecimiento de próstata. Mujeres nerviosas y ancianos. Debilidad. Irritabilidad nerviosa, con pérdida del apetito sexual en ambos sexos. Neuróticos sexuales.

AGRAVACION:

Clima- frío, húmedo, nublado. Consuelo. Antes de las reglas.

MEJORIA:

Después de un sueño.

MENTE:

Irritabilidad y depresión; el consuelo le provoca enojo. Rumia sus propios sufrimientos o síntomas. Apatía. Indiferencia. Teme dormirse por cree que algo pasará. Se sobresalta con miedo cuando está en dormitando.

CABEZA:

Dolores agudos, punzantes aquí y allá que vienen y se van súbitamente. El dolor corre por la nariz y se centra en la frente. Cefalalgia de personas débiles.

OJOS:

Iritis cuando la glándula prostática está involucrada.

OIDOS:

Escucha disminuída; las voces parecen lejanas.

ESTOMAGO:

Deseo constante de leche; que usualmente no gusta. Acidez. Eructos.

ABDOMEN:

Dolor que va hacia los muslos; irradiando en diferentes direcciones, estableciéndose en los ovarios.

URINARIO:

Deseo constante de pasar agua por la noche. Enuresis, por cualquier ejercicio, levantamiento, risa, etc. Micción difícil; punzante, ardorosa en la uretra. Sedimento urinario limoso. Dolor pesado y sensación de frialdad en la vejiga que se extiende a los genitales externos. Cistitis por hipertrofia prostática.

HOMBRES:

Testículos retraídos; dolorosamente. Genitales fríos. Próstata crecida o congestionada; senil. Desgaste de testículos y pérdida del poder sexual. Erección o emisión de semen dolorosos, durante el coito. Neurastenia sexual. Epididimitis. Impotencia. Semen espeso, causa una sensación caliente a lo largo del cordón.

MUJERES:

Ovarios sensibles y crecidos; dolores ováricos que corren hacia los muslos. La vulva se siente abierta. Neurastenia sexual femenina, inclinación sexual suprimida o perversa. Mamas, inflamadas, sensibles y llenas < con baño frío; o pequeñas y sub-desarrolladas. Genitales fríos. Una mama más pequeña que la otra. Pasión sexual furiosa.

RESPIRATORIO:

Expectoración profusa con descarga de la nariz. Crónica. Bronquitis. Tos ruidosa peor acostándose, hasta las 6 a.m.

ESPALDA:

Adolorida; después del coito. Dolor en la región sacra antes del inicio de las reglas.

SUEÑO:

Temor a caer dormido, por temor a que algo pase; se sobresalta con susto cuando dormita.

RELACIONES:

Sep: Sil.

SABINA

GENERALIDADES:

Los órganos pélvicos femeninos y el útero están sumamente afectados por este remedio. Además afecta el tejido fibroso; de las articulaciones pequeñas; membranas serosas y talones. Es adecuado para mujeres de sangre caliente con diatesis gotosa reumática; y tendencia hemorrágica; epistaxis, hematuria, etc. Tendencia al aborto especialmente en el tercer mes. Pulsaciones violentas; quiere las ventanas abiertas. Pesadez e indolencia del cuerpo, quiere acostarse. Hinchazón roja y brillante de las partes afectadas. Nódulos artríticos agudamente inflamados. Sensación de llenura. Crecimientos como verrugas. El dolor se incrementa súbitamente y decrece lentamente.

AGRAVACION:

Noche. Calor: de la cama; habitación; ejercicio. Ambarazo. Climaterio. Clima brumoso. Agachándose. Dejando que los miembros cuelguen. Haciendo una respiración profunda. Música.

MEJORIA:

Frío. Fresco. Al aire libre. Exhalando.

MENTE:

La música es intolerable; produce nerviosismo. Melancolía. Triste.

CABEZA:

Cefalalgia estallante; aparece súbitamente y disminuye lentamente, regresa con frecuencia. Vértigo con reglas suprimidas.

BOCA:

Dolor de dientes < solamente cuando mastica. Dolor taladrante en los músculos de las mandíbulas. Gusto amargo; a los alimentos, especialmente leche o café.

ESTOMAGO:

Deseo de limonada. Agruras. Dolor desde el epigastrio hacia la espalda.

ABDOMEN:

Pletórico. Temblor como si hubiera algo vivo, parecen movimientos fetales. Hemorroides con descarga de sangre roja y brillante, causando dolor del sacro al pubis. Las hemorroides se alternan con dolor en las piernas.

URINARIO:

Irritabilidad vesical; con diatesis gotosa. Orina sanguinolenta con mucha necesidad. Latidos, ardor en la región de los riñones.

HOMBRES:

Deseo sexual incrementado, con erecciones continuas y violentas. Excresencias sicóticas, con inflamación ardorosa. Hinchazón dura del dorso del pene.

MUJERES:

Comezón en genitales; deseo casi insaciable de coito. Reglas; demasiado profusas; demasiado adelantadas; chorros de sangre caliente, brillante, acuosa; mezclada con coágulos oscuros, < al mínimo movimiento, pero frecuente > por caminar; con dolor en las coyunturas; Con dolor del sacro al pubis o al revés; con dolor que se dispara hacia la vagina. Sangramiento entre períodos; con excitación sexual. Leucorrea; fétida, acre, espesa, amarilla, por reglas suprimidas, o reglas copiosas; con comezón en pubis; durante el embarazo. Prurito del embarazo. Placenta retenida. Entuertos severos. Promueve la expulsión de lunares. Hormigueo en los pezones. Hemorragias después de aborto. Ovaritis y metritis después de aborto. Parto prematuro. Dismenorrea > acostándose extendido sobre la espalda, con piernas extendidas. Comezón voluptuosa en los pezones.

CORAZON:

Pulsación violenta en las venas de todo el cuerpo.

ESPALDA:

Dolor de la región lumbar al pubis o al revés.

EXTREMIDADES:

Hinchazón, enrojecimiento y punzadas en el dedo gordo derecho. Punzadas en los talones. Disminuye los nudos, crecimientos y várices en las venas. Adolorimiento intermitente en la parte solar de los talones.

PIEL:

Verrugas, vegetaciones húmedas, fétidas, con comezón y ardor. Poros negros en la piel, especialmente cara.

FIEBRE:

Calor ardiente intolerable de todo el cuerpo, con gran inquietud.

COMPLEMENTARIO:

Thu.

RELACIONES:

Ars; Caul; Pul.

SALICYLICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

En la práctica ordinaria se usa como un remedio reumático agudo. En Homeopatía es útil en la enfermedad de Meniere. Rugido y tintineo en los oídos. Sordera con vértigo. Efectos por sudor de pies suprimido.

AGRAVACION:

Movimiento. Noche. Aire frío.

SALIX NIGRA

GENERALIDADES:

Reduce la irritabilidad de los órganos sexuales de ambos sexos. Satiriasis y erotomanía. Emisiones seminales en presencia de mujeres o cuando habla con ellas. Pensamientos libidinosos, así como sueños. Use dosis materiales de tintura. 30 gotas.

SAMBUCUS NIGRA

GENERALIDADES:

Actúa sobre los órganos respiratorios, riñones y la piel. Sudor profuso o cortedad en la respiración; acompañan muchos síntomas. Hinchazones edematosas; en varias partes del cuerpo, especialmente piernas, empeine y pies. Sorbidos en los niños que le impiden respirar y alimentarse. Temblor general con ansiedad. Malos efectos de un susto; pena; ansiedad; indulgencia sexual excesiva. Adecuada para personas anteriormente robustas y con carnes, y que de pronto se vuelven emaciadas.

AGRAVACION:

Aire frío y seco. Bebidas frías, mientras está acalorado.
Cabeza baja. Comiendo frutas. Acostándose. Descanso.

MEJORIA:

Presionando sobre una orilla aguda. Movimiento. Abrigándose. Sentándose erecto en la cama.

MENTE:

Irritación constante. Fácilmente asustado. Susto seguido por ataques de sofoco. Vé imágenes al cerrar los ojos.

OJOS:

Medio abiertos en sueño. Fotofobia.

NARIZ:

Coriza seca, con sorbidos; en infantes.

BOCA:

Medio abierta, en sueño.

CARA:

Pálida, azulosa, abotagada < tosiendo. Caliente; con pies helados.

URINARIO:

Nefritis aguda. Síntomas hidrónicos con vómito de bilis y desarreglo en estómago después de comer. Micción profusa con sensación de calor en el cuerpo. Orina frecuente y escasa.

HOMBRES:

Hidrocele por lesión.

MUJERES:

Sudores debilitantes, después de dar a luz.

RESPIRATORIO:

Sofoco súbito, o tos estrangulante al caer dormido; o lo despierta a media noche con sudor violento; < susto. Respiración sibilante, espasmos de la glotis. Voz chillona. Crup. Accesos de tos; antes de la fiebre.

EXTREMIDADES:

Pies helados. Las manos se ponen azul. Edema de las piernas y pies.

FIEBRE:

Calor seco y ardiente durante el sueño, pero sudor copioso al despertar. Sudor con tos. Sudor debilitante; < noche.

RELACIONES:

Bell; Brom

SANGUINARIA CANADENSIS

GENERALIDADES:

Comúnmente conocida como raíz de sangre, es un remedio del Lado derecho; que afecta la cabeza, hígado; pecho y deltoides. Produce perturbaciones vaso-motoras, como se ven en un enrojecimiento circunscrito de las mejillas, abdomen, lengua, etc. congestión de sangre a la cabeza, pecho, abdomen, etc.; bochornos de calor y pulsación general. Calor ardiente y ebulliciones. Las membranas mucosas se ponen secas. Ardores; en la garganta, bajo el esternón; puntos o punzadas en el pecho; palmas y plantas. Sensación de quemadura; en la lengua. Los síntomas ascienden o terminan con un vómito bilioso. Excoriación interna. Descarga acre, rayada de sangre o fétida. Se acuesta sobre la espalda con la cabeza elevada. Desórdenes climatéricos. Biliosidad. Los dolores aumentan y disminuyen con el sol. Detención súbita de catarro del tracto respiratorio seguida de diarrea. Pólipos, nasales, uterinos. Excrecencias fungosas. Náusea y desfallecimiento por el olor de las flores. Dolor en los lugares donde los huesos están menos cubiertos.

AGRAVACION:

Periódicamente - con el sol; semanalmente; por la noche. Climaterio. Olores. Sacudidas. Dulces. Movimiento. Mirando hacia arriba. Contacto. Levantando los brazos.

MEJORIA:

Sueño. Acostándose sobre la espalda. Vómito. Aire fresco. Pasando flatos. Cosas ácidas. Acostándose sobre el lado izquierdo.

MENTE:

Irritable, malhumorado. Quejumbroso. Busca problemas. Lasitud, indispuerto a moverse o hacer un esfuerzo mental.

CABEZA:

Dolor sobre el ojo derecho o ascendiendo desde el occipucio hacia arriba del ojo derecho. Hemicrania, aumenta y disminuye con el sol. Distensión de las venas en las sienas. Dolor en el occipucio como un destello de relámpago. Dolor de cabeza si no toma alimento. Vértigo < mirando hacia arriba y moviendo la cabeza con rapidez. Cefalalgia > sueño, vomitando y pasando un flujo copioso de orina.

OJOS:

Ardor. Los globos duelen al moverlos. Hinchazón dura sobre las cejas. Lagrimeo con coriza, lágrimas calientes.

OIDOS:

Ardor. Dolor de oído con cefalalgia. Zumbidos y rugidos en los oídos; dolorosamente sensibles a los sonidos, en climaterio.

NARIZ:

Dolor en la raíz de la nariz. Coriza; cesa, luego aparece la diarrea. Pólipos nasales. Catarro y asma subsecuente. Sensible a los olores. Pérdida o perversión del sentido del olfato, olor en la nariz como de cebollas asadas.

CARA:

Enrojecimiento y ardor en las mejillas. Sonrojamiento héctico, mejillas rojas. Neuralgia en la mandíbula superior; radiante, > por arrodillarse y presionar la cabeza fuertemente contra el suelo. Plenitud y sensibilidad detrás del ángulo de la mejilla.

BOCA:

Sensación de quemadura en la lengua. La parte anterior de la lengua parece roja como carne cruda. Las cosas dulces saben amargas. El paladar se siente escaldado. Dolor de dientes por picárselos.

GARGANTA:

Inflamada, hinchada (derecha); dolores al oído y pecho. Ardor < comiendo cosas dulces. Resequedad en los cantantes.

ESTOMAGO:

Desea; especias; no sabe qué. Aversión a la mantequilla. Náusea; con salivación; < estornudando o sonándose la nariz, > comiendo; seguido de urticaria. Escupe bilis; catarro gastroduodenal. Dolores estomacales hacia el hombro derecho.

ABDOMEN:

Tensión en el epigastrio. Sensación como de agua caliente que fuese vertida desde el seno hacia el abdomen, seguido de diarrea. Heces biliosas, líquidas en chorro. Distensión flatulenta, con escape de flatos por la vagina. Ictericia. Cáncer del recto.

URINARIO:

Orina oscura, amarilla, con ictericia. Copiosa y frecuente, clara < por la noche.

MUJERES:

Desórdenes climatéricos; especialmente bochornos de calor y leucorrea acre y fétida. Inflamación bajo el pezón (derecho). Reglas; ofensivas y profusas. Pólipos uterinos. Mamas inflamadas; y crecidas; en el climaterio.

RESPIRATORIO:

Laringe, llena y seca; en cantantes. Tos; saca aire fétido; seco; por cosquilleo detrás del esternón; debe sentarse en la cama; pasa flatos al toser; > por pasar flatos por arriba y abajo. Expectoración; tenaz, de color moho, purulenta; que <. Ardor en el pecho; como por un vapor caliente que se extendiese al abdomen, con tos. Tos, después de influenza o toserina; regresa después de cada resfrío. Dolor en el pecho derecho (desde el seno) hacia el hombro. Neumonía. Tisis. Asma; por digestión perturbada, con eructos acres.

CORAZON:

Sensación débil; acción irregular.

EXTREMIDADES:

Comezón en la axila < antes de las reglas. Dolor cortante o rigidez en el deltoides derecho < elevando o volteando los brazos. Reumatismo del hombro derecho y articulación izquierda de la cadera. Dolor en el hombro que < por la noche. Dolor en hueso cercano a la superficie. Neuritis > por tocar la parte. Ardor en palmas y plantas, < cubriéndose; en el climaterio. Palmas arrugadas. Adolorimiento e hinchazón de la yema del dedo pulgar (derecho). Dolor en el brazo > balanceando el brazo adelante y atrás.

PIEL:

Seca; de ictericia. Acné; con reglas escasas. Calor picoso que se expande por el cuerpo.

FIEBRE:

Bochornos de calor, que se elevan hacia la cabeza y cara; con dolor de cabeza. Sudor; ardiente, escaso.

COMPLEMENTARIO:

Ant-t; Pho.

RELACIONES:

Bell; Pho.

SANICULA (Aqua)

GENERALIDADES:

Esta agua mineral de manantial afecta la nutrición; órganos femeninos, recto, cuello y piel. Los pacientes son delgados y parecen viejos, especialmente los niños. Marasmo. El cuerpo huele como a queso viejo. El niño patea las mantas por la noche y se descubre; quiere acostarse sobre algo duro, aunque es delgado. La ropa las siente frías, húmedas. Sensación de crecimiento; en la garganta, vagina, etc. Pus espesa, acre y amarilla. No soporta que una parte toque a la otra; o no puede permanecer cerca de otra persona. Sensación de estallido; en perineo, intestinos, vejiga; vértice, pecho. Náusea en carro o en el mar. Dolores cambiantes.

AGRAVACION:

Esfuerzo. Movimiento; elevando los brazos; poniendo las manos detrás. Descendiendo. Viento frío en el occipucio o cuello. Sacudidas.

MEJORIA:

Al aire libre. Calor. Vómito.

MENTE:

Testarudo, obstinado, sentido; niños. Deseo constante de ver hacia atrás. Irritable- la menor palabra o acción lo incomodan. Desconfía de todo. Primero malhumorado, luego juguetón; en niños. Temor al movimiento hacia atrás. Miedo a lo obscuro. No desea ser tocado. Deseo inquieto de ir de un lugar a otro. Inestabilidad de propósitos.

CABEZA:

No soporta el aire frío en el occipucio y cuello. Sudor profuso en el occipucio y cuello < durante el sueño. Espeluznamiento eléctrico del cabello, al peinarlo. Caspa escamosa y profusa; caída del cabello. Sensación de estallido en el vértice. Como con una ropa fría alderredor del cerebro. Pequeñas ampollas en la cabeza que no maduran.

OJOS:

Párpados pegados a los globos. Lagrimeo en aire libre y frío o aplicaciones frías. Caspa de las cejas.

NARIZ:

Coriza fluída < comiendo. El agua huele como agua de lluvia enmohecida.

BOCA:

Lengua; grande, floja; ardorosa, debe sacarla para mantenerla fresca; tiña en la lengua. Boca y paladar cubiertos con úlceras; aftas blancas. Los lados de la lengua se voltean hacia arriba. La lengua se adhiere al paladar.

GARGANTA:

Fría, sensación de hielo; como menta; la siente muy grande. Puede deglutir sólidos mejor que los líquidos.

ESTOMAGO:

El niño quiere amamantarse todo el tiempo, y aún así pierde carne. Desea; sal, tocino, o leche helada. Poca sed y frecuente; el agua es vomitada tan pronto como llega al estómago. Vómito de leche cuajada. Cae dormido después de vomitar. Comer provoca necesidad de evacuar, debe abandonar la mesa.

ABDOMEN:

Gorgoteo audible; niños con estómago como vasija. Evacuación; de una masa grande y pesada; fétida como queso podrido, pequeñas bolas secas, deben ser removidas, o se desmoronan en la orilla del ano. Dolor de estallido en el perineo, durante la evacuación. Heces; deformes, cambiables, involuntarias.

URINARIO:

El niño llora antes de orinar; hace esfuerzo por orinar mientras evacúa. Orina como salmuera, salobre. Sensación de estallido en la vejiga con llamado urgente para orinar. Micción súbita, frecuente y profusa; la necesidad cesa si se resiste al deseo. La orina mancha el pañal de rojo.

HOMBRES:

Olor salobre de los genitales; pocas horas después del coito.

MUJERES:

Leucorrea; con fuerte olor a pescado en salmuera < al evacuar. Pesadez como si el contenido pélvico pudiera escaparse; < sacudidas, caminando. Sostiene las partes relajadas poniendo la mano contra la vulva, > descanso. La vagina se siente crecida, la menstruación no se detiene. Sensación de que el cérvix está abierto y dilatado.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello débil y emaciado; el niño no puede sostener su cabeza, dolor de espalda, rigidez < al mínimo voltear, levantar los brazos o poner las manos detrás de él; debe voltear todo el cuerpo para mirar a su alrededor, se sienta, hace la cabeza hacia adelante para mejorar el dolor. Espina lumbar fría. Lumbago; > acostándose sobre el lado derecho. Vértebras lumbares como dislocadas, o como si se deslizaran sobre las otras. Como si la espalda estuviera rota en dos partes. Como con una ropa húmeda en el sacro.

EXTREMIDADES:

Dolor en los hombros < levantando los brazos o poniéndolos detrás en la espalda. Manos y pies fríos y pegajosos. Ardor en palmas y plantas. Calambres en los pies. Sudor de pies fétido; irrita los dedos, destruye los zapatos o entiesa las calcetas. Pies como en agua fría. Las manos se ponen sudorosas al ponerlas juntas.

PIEL:

Seca, cafésosa, fofa < cuello. Manos y dedos fisurados. La piel alderredor del cuello está arrugada y cuelga en pliegues. Tendencia a pequeñas ampollas que no maduran.

SUEÑO:

Al despertar el niño se frota los ojos y la nariz con la muñeca. Sueño de ladrones.

FIEBRE:

Sudor pegajoso.

RELACIONES:

Lyc; Psor; Sul.

SANTONINUM

GENERALIDADES:

El antielmítico favorito produce ceguera al color y visión amarilla.

SARSAPARILLA

GENERALIDADES:

Este remedio fué usado como un restaurador y purificador de la sangre después de un curso exhaustivo de mercurio. Este se encuentra con las constituciones sifilíticas, sicóticas y psóricas. Su centro de acción principal está sobre los órganos genito-urinarios; piel; huesos; extremidad inferior derecha. Se adapta a personas delgadas; frágiles; escalofriadas, de apariencia vieja, especialmente niños con abdomen crecido. Marasmo; emaciación. Las partes se sienten como atornilladas. Dolores óseos nocturnos. El dolor se dispara en diferentes direcciones y se acompaña de depresión y ansiedad. Como si se pusiera sal sobre la herida. Diatesis lítica, erupciones pruriginosas; que siguen a un clima caliente y vacunaciones. Nódulos gotosos muy dolorosos. Reumatismo. Aclara la tez.

AGRAVACION:

Al terminar la micción. Primavera. Frío, húmedo. Mercurio. Noche. Gonorrea suprimida. Bostezo. Movimiento. Subiendo y bajando escaleras.

MEJORIA:

Descubriéndose el cuello y el pecho. Por estar de pié.

MENTE:

Depresión y ansiedad por dolor. Pensar en la comida que ha comido, le causa náuseas. Fácilmente ofendido. Taciturno. Abatido, pesimista, sin causa alguna.

CABEZA:

Dolores desde el occipucio a los ojos, o a la raíz de la nariz. Como si una pelota hubiese golpeado la cabeza al hablar. Como con una banda dolorosamente apretada alderredor de la cabeza, se quita el sombrero involuntariamente, sin mejoría.

OJOS:

Visión nublada < emisiones seminales. Comezón como de erupciones en los párpados.

OIDOS:

Las palabras reverberan dentro.

NARIZ:

Tapada por años. Hinchazón en la raíz de la nariz.

CARA:

Erupciones en la cara y labio superior; < durante las reglas. Amarilla, arrugada, apariencia vieja.

BOCA:

Aftas; salivación. Aliento ofensivo. Dolor en la mandíbula < doblando la cabeza hacia atrás.

ESTOMAGO:

Después del alimento, sensación de vacío, como cuando ayuna o también náusea o disgusto al pensar en lo que se ha estado comiendo. El beber agua causa vómito.

ABDOMEN:

Cólico y dolor de espalda al mismo tiempo, con diarrea. Retumbo con sensación de vacío. Arena en las evacuaciones. Erupciones húmedas e inflamación en las ingles antes de las reglas. Cólera infantil. Constipación obstinada con deseo frecuente de orinar.

URINARIO:

Micción dolorosa, arranca gritos < al terminar de orinar. Puede orinar únicamente estando de pié: durante el día, pero por la noche la orina fluye libremente en la cama; gotea mientras está sentado. Necesidad de orinar antes de las reglas. Pasa gotas de sangre o materia blanca y acre al terminar de orinar. Arenilla en el pañal. Pasa aire por la vejiga durante la micción. Sedimento urinario costroso. Dolor en la uretra que regresa al abdomen. Sacudida a lo largo de la uretra. Cólico renal (derecho). Pus en la orina.

HOMBRES:

Genitales húmedos y ofensivos. Semen sanguinolento. Cordón espermático, doloroso después de la emisión; hinchado después de excitación sexual no correspondida. Herpes prepucial. Comezón en el escroto y perineo.

MUJERES:

Pezones retraídos o agrietados, pequeños y marchitos. Reglas tardías y escasas. Dismenorrea, caracterizada por pezones retraídos, o seno inflamado.

CUELLO Y ESPALDA:

Emaciación del cuello. Dolor desde la espalda baja hacia el cordón espermático; después de una emisión. Dolor de espalda con cólico.

EXTREMIDADES:

Corte bajo las uñas. Grietas profundas en los dedos y dedos de los pies < a los lados. Punta de los dedos ulceradas. Afecciones de todas clases en general, en la extremidad inferior derecha.

PIEL:

Emaciada, marchita, permanece en pliegues; manchada, dura. Puntos escamosos con comezón. Pus irritante. Erupciones color cobre. Equimosis, en los ancianos. Edema. La piel nueva se agrieta y arde.

SUEÑO:

Bostezo; malestares concomitantes al bostezo.

COMPLEMENTARIO:

Merc; Sep.

FIEBRE:

El escalofrío se inicia desde la región de la vejiga, hacia la espalda.

RELACIONES:

Calc; Petr.

SCILLA MARITIMA (Scilla)

GENERALIDADES:

La cebolla roja de mar afecta las membranas serosas y mucosas del tracto digestivo y respiratorio y actúa sobre los riñones, corazón y bazo. Es un medicamento de acción lenta y es útil en aquellas condiciones que requieren varios días para alcanzar su máximo. Exudaciones y secreciones profusas. Hidropesías; con orina profusa. Gorgoteos. Efectos cardio-urinarios. Su acción es justamente como la de Digitalis; y sigue a Digitalis cuando este falla en mejorar las condiciones hidrópicas.

AGRAVACION:

Temprano por la mañana. Movimiento. Por descubrirse. Inspiración. Ancianos. Tosiendo.

MEJORIA:

Descanso. Sentándose. Expectorando, aún una pequeña cantidad.

MENTE:

Disgustado por naderías. Aversión al trabajo mental y corporal.

OJOS:

El ojo izquierdo parece mucho más pequeño que el derecho. El niño se frota mucho los ojos y la cara, como para mejorar la comezón; en afecciones cerebrales; sarampión. Como si nadara en agua fría. Lágrimas con tos. Mirada fija, ojos muy abiertos.

NARIZ:

Estornudos violentos, con coriza fluída y acre. Estornudos durante la tos. Escurrimiento copioso < por la mañana.

CARA:

El niño frota su cara, con los puños durante la tos. Labios; se tuercen, cubiertos con costra amarilla; negros y agrietados.

BOCA:

Manchas negras en los dientes. Gusto; dulce; en el alimento, especialmente sopa y carne; amargo en el pan. Sed por bebidas frías. Bebe en sorbitos durante la disnea.

ESTOMAGO:

Presión como por una piedra. Dolores > acostándose sobre el lado izquierdo.

ABDOMEN:

Retumbo y gorgoteo en paroxismos sobre la región púlica. > comiendo. Adolorimiento en el hipocondrio. Enfermedad dolorosa del bazo. Heces; oscuras, café, espumosas, muy ofensivas. Ascites con orina escasa.

URINARIO:

Necesidad súbita y frecuente de orinar; pasa mucha orina. Micción involuntaria al toser. Orina sanguinolenta. Las heces escapan al orinar.

HOMBRES:

Poluciones eróticas.

RESPIRATORIO:

Tos; terca, seca, cascabeleante; perturba el sueño; con estornudos; coriza; lagrimeo; emisión de orina; o heces; o calor; termina en arqueos; < bebidas frías; inspirando. El niño se frota la cara y ojos, durante la tos. Tos < por la mañana y noche. Tos seca, siempre seguida de necesidad de aclarar la nariz. Expectorcación; fácil, pesada; difícil; en pequeñas bolas redondas; de gusto dulzón; blancas o rojizas; ofensivas. Disnea; con dolor punzante en el pecho y calambres en los músculos abdominales. En el asma, bebe en sorbitos; y punzadas en el pecho (izquierdo). Tos, con bazo crecido o con dolor en la región. La tos floja de la mañana es más severa que la tos seca de la noche. Pleuresía. Bronconeumonía.

CORAZON:

Estimulante cardíaco. Pulso pequeño y lento; ligeramente duro.

CUELLO Y ESPALDA:

Burbujeo debajo de la escápula.

EXTREMIDADES:

Las uñas se vuelven quebradizas y se rompen. Los pies duelen por estar de pié. Pies sensibles de las jóvenes dependientas. Manos y pies fríos, cuerpo caliente.

PIEL:

Pequeñas manchas rojas en todo el cuerpo con dolor picante.

FIEBRE:

Calor con aversión a descubrirse. Sudor ausente.

COMPLEMENTARIO:

Ant-c.

RELACIONES:

Ars; Bar-c; Nux-v; Rhus-t; Sil.

SCOPARIUS

GENERALIDADES:

Es un tónico cardíaco; afecta los riñones; espina; músculos y lado izquierdo. Aumenta la resistencia del corazón, reduce la presión sanguínea. Acción irregular del corazón por influenza o alguna otra enfermedad infecciosa. Mejora la congestión de los riñones capacitándolos para eliminar y mejorar la indisposición por el corazón. Adolorimiento pesado.

AGRAVACION:

Volteándose sobre el lado izquierdo.

MEJORIA:

Aire fresco. Movimiento rápido. Pasando flatos.

ABDOMEN:

El estómago y los intestinos parecen estar llenos de piedras, o están como una masa firme. Flatulencia; con mucha depresión mental. Cólico, luego evacuaciones de espuma brillante y acre seguidas de ardor en el ano.

URINARIO:

Orina espumosa y brillante muy profusa, luego ardor en las partes genitales externas.

CORAZON:

Opresión ansiosa, radiando hacia el hombro izquierdo y el cuello. Palpitación con congestión a la cabeza. Angina de pecho. Corazón tabáquico.

EXTREMIDADES:

Brazo y dedos derechos como muertos.

PIEL:

Comezón punzante.

RELACIONES:

Pho.

SECALE CORNUTUM

GENERALIDADES:

Un nosode vegetal llamado ergotina, el cual contráe los músculos de la sangre, venas y útero; descompone la sangre; produciendo hemorragia que es delgada, fétida, acuosa, negra, y que rezuma continuamente. Sacudidas; espasmos, con dedos que se abren y separan. Retortijones y calambres; con rigidez; en partes aisladas o después de los dolores. Entumecimiento. Comezón insufrible, hormigueo; sobresalto de la cara; o espalda; en los miembros; en las puntas de los dedos, > frotándolos. Sensación de ardor en todo el cuerpo o como chispas callendo en él, o aquí y allá; como fuego. Las descargas son oscuras, delgadas, fétidas y exhaustivas. Espasmos tetánicos con absoluta conciencia. Emaciación rápida; de partes paralizadas; o con mucho apetito y sed excesiva. Pérdida del poder del movimiento voluntario. Siente como si caminara sobre terciopelo. Frialdad; pero no quiere ser cubierto. Sacudidas convulsivas y sobresaltos en los miembros paralizados. Neuralgia causada por presión de venas distendidas. Varicosas. Trombosis. Tumores linfoides. Sensación de muerte; en cualquier parte. Gangrena; traumática; por aplicación de sanguijuelas o mostaza, > frío. Es adecuado para sujetos pletóricos e irritables; o para mujeres delgadas, huesudas de apariencia caquéctica; y personas muy viejas y decrepitas. Petequia. Pequeñas heridas que sangran mucho. Todo se siente flojo y abierto. Arteriolas contraídas. Dolores crónicos, agudos, punzantes, neurálgicos, que arden como fuego > aplicaciones de calor. Parálisis; con miembros distorsionados; de las extremidades inferiores; de un lado; de un brazo y una pierna; con picazón, entumecimiento y hormigueo. Parálisis después de espasmos. Inquietud, debilidad extrema; y postración. Colapso.

AGRAVACION:

Calor. Justo antes o durante las reglas. Embarazo. Pérdida de fluidos. Cubiertas. Contacto. Por comer. Excesos sexuales. Después del aborto. Fumadores.

MEJORIA:

Frío- baños; descubriéndose, abanicándose. Balanceándose. Estiramiento forzado. Yaciendo acostado y doblado en la cama. Después del vómito.

MENTE:

Debilidad; después de espasmos; después de un coito agotador. Locura, inclinado a morder o ahogarse asimismo. Temor maníaco; o deprimido por miedo. Manía puerperal, expone su cuerpo, se rasga los genitales, inserta su dedo en la vagina y la rasga hasta que sangra; perdida toda idea de pudor. Se ríe, palmea su mano sobre su cabeza, parece fuera de sí mismo.

CABEZA:

La siente ligera o pesada con picoteo en las piernas. Tuerce la cabeza hacia un lado y otro. Caída de cabello.

OJOS:

Destellos delante de los ojos. Catarata senil e incipiente especialmente en mujeres. Ojos hundidos; rodeados de anillos azules. Parálisis del párpado superior; por gas de carbón. Lágrimas suprimidas. Visión doble o triple. Ceguera. Retinitis diabética.

OIDOS:

Dureza de oído, después de cólera.

NARIZ:

Sangra persistentemente; sangre; oscura; con gran postración; en ancianos; bebedores o mujeres jóvenes.

CARA:

Distorsionada o sumida, pálida, afilada. Mirada salvaje. Picoteo o sacudidas en la cara; que se esparce por todo el cuerpo. Trismo.

BOCA:

Lengua; seca, agrietada, exuda sangre negra como tinta; rígida; con picoteo en la punta; la siente paralizada; tartamudea, lenguaje ininteligible.

GARGANTA:

Picoteo doloroso; ardoroso. Parálisis post-diftérica.

ESTOMAGO:

Sed; inextinguible. Apetito voraz no natural; desea cosas ácidas y limonada. Vómito; de fluido oscuro y café, como asientos de café. Eructos vacíos. Ardor. Náusea, con vómito fácil. Hematemesis.

ABDOMEN:

Excesivamente inflado y apretado; quiere estar descubierto. Sensación de vacío en hipogastrio; o de pesadez; debe permanecer acostado en la cama y doblado. Heces en chorro, ofensivas; indoloras; acuosas; verde-olivo; o sanguinolentas; con colapso; frialdad de hielo e intolerancia a estar cubierto. El ano se siente flojo y ampliamente abierto; las heces pasan involuntariamente. Torcedura de los músculos abdominales. Formación de bultos grandes e hinchazón en el abdomen.

URINARIO:

Enuresis en ancianos. Orina sanguinolenta, con depósitos blancos y caseosos. Orina; suprimida, pálida, acuosa. Retención, con necesidad ineficaz.

MUJERES:

Reglas; irregulares, copiosas, oscuras, con rezumamiento continuo de sangre acuosa y fétida; hasta el siguiente período. Utero inerte, o pesadez con frialdad. Utero contraído; contracción de reloj de arena. Leucorrea cafésosa, ofensiva y continua. Amenaza de aborto; en el tercer mes. Loquios oscuros, ofensivos y verdes. Placenta séptica. Metritis. Gangrena de los órganos femeninos. Severos entuertos.

Supresión de leche, con picoteo en las mamas. Nunca bien después de un aborto. Vagina caliente o fría. Fiebre puerperal. Prolapso del útero después de un alumbramiento por fórceps.

RESPIRATORIO:

Dolor a través del pecho, al presionar la espina. Ardor en los pulmones.

CORAZON:

Palpitación del corazón después de un exceso sexual; en hombres. Pulso intermitente.

CUELLO Y ESPALDA:

Picoteo en la espalda que se extiende a los dedos de manos y pies. La presión en la parte afectada causa dolor allí así como a través del pecho. Mielitis.

EXTREMIDADES:

Miembros fríos. Dedos azulosos de manos y pies. Calambres en las manos; piernas y pies. Los dedos se abren y separan, se doblan hacia atrás o se engarruñan, parecen empapados en agua. Los dedos se sienten como velludos; de los fumadores. Calambres en pantorrillas. Temblor y trastabilleo o paso inestable, como si los pies estuviesen jalados juntos. Los dedos de los pies se engarruñan. Ataxia locomotriz. Paraplejia. Las manos y pies están fríos y secos, en los fumadores.

PIEL:

Ampollas con pus verde; maduran lentamente. Ampollas sanguinolentas. Piel fría y seca, arrugada o azulosa; < sobre la parte afectada. Enfermedad de Raynaud. Edema del neonato. Ulceras fétidas, indolentes; varicosas. Sacudidas o estremecimiento en la piel Hormigueo bajo la piel.

SUEÑO:

Insomnio de los consumidores de drogas y licores. Profundo, letárgico.

FIEBRE:

Interna, ardiente; con frialdad de hielo externamente, pero se niega a ser abrigado < abdómen. Calor como en chispas. Erisipelas. Sudor frío o fétido que destruye el calzado.

COMPLEMENTARIO:

Ars; Thu.

RELACIONES:

Chin; Merc; Nux-m; Puls; Ust.

SELENIUM

GENERALIDADES:

Este elemento se encuentra asociado con Azufre y Tellurium y es un constituyente constante de los huesos y dientes. Tiene efectos marcados sobre los nervios de los órganos génito-uritarios y supra orbitales (izquierdo); laringe e hígado también se ven afectados. El paciente se vuelve fácilmente debilitado por el calor o el clima caliente; una pequeña fatiga mental o física lo pone somnoliento. Debilidad después de enfermedades agotadoras; después de fiebres. Senilidad; temprana. Emaciación; de partes aisladas, cara, manos, muslos, etc. Pulsación en todo el cuerpo, especialmente el abdomen; a por comer. Calambres; luego rigidez. Picaduras; aquí y allá. Malos efectos del libertinaje, té, azúcar, sal, limonada, pérdida de fluidos vitales, masturbación, excesos sexuales, exceso en estudios. Problemas en general que acompañan a un escape de semen, principalmente al hacer esfuerzo para evacuar.

AGRAVACION:

Días calientes. Pérdida de sueño; velas nocturnas. Contacto. Después de dormir. Por cantar. Corriente de aire, aunque sea tibia. Después de evacuar. Coito. Vino.

MEJORIA:

Después de la puesta del sol. Inhalando aire fresco. Por beber agua fría.

MENTE:

Total inhabilidad para cualquier tipo de trabajo. Olvidadizo en los negocios; recuerda en sueños todo lo que ha olvidado. Locuaz, estando excitado; tartamudea, pronuncia algunas palabras incorrectamente. Tristeza. Dificultad para comprender. Olvidadizo cuando se despierta, y sueña sobre ello cuando está medio dormido. Pensamientos lascivos, con impotencia. Imagina corrientes o aire. Falla en comprender lo que oye o lee. Aversión a las corrientes de aire, tibias, frías o húmedas. Temor a la sociedad.

CABEZA:

Dolor sobre el ojo izquierdo < caminando bajo el sol; olor fuerte como el almizcle, rosa o té, con aumento de secreción de la orina. Cefalalgias nerviosas. El cráneo se siente como recogido. Caída del cabello; de las cejas, barbas, patillas, bigotes, y genitales. No quiere que le toquen el cabello. Dolor en el cráneo como si le jalaran el cabello.

OIDOS:

Sordera por cerúmen endurecido.

NARIZ:

Coriza que termina en diarrea. Inclinación a picarse la nariz con los dedos. Obstrucción de la nariz; crónica. Llena de moco espeso, como engrudo.

CARA:

Emaciada. Comedones. Grasosa, brillante.

BOCA:

Dolor de dientes, por beber té; con una sensación de frialdad > por tomar agua fría o aire en la boca.

ESTOMAGO:

Ausencia de sed. Desea estimulantes, brandy, té, etc. Aversión a los alimentos salados. Pulsación en todo el cuerpo especialmente el abdomen, después de comer, lo que impide el sueño. Gusto dulzón. Deseo irresistible de emborracharse.

ABDOMEN:

Afecciones crónicas del hígado. Hígado crecido, con dolor punzante < inspiración y un salpullido fino sobre la región del hígado. Evacuaciones; muy grandes, impactadas, tan duras que requieren ayuda mecánica. Filamentos como cabellos en las heces.

URINARIO:

Orina; involuntaria, goteando; al caminar; después de la micción; y después de evacuar. Arena gruesa en la orina. Como una gota mordiente que forzara su salida al exterior.

HOMBRES:

Lascivo pero impotente. Deseo incrementado, habilidad disminuída. El semen gotea durante el sueño. Pérdida fácil del semen; durante el coito, con erección débil, pero con emoción voluptuosa de larga duración; durante las evacuaciones. Semen líquido, sin olor. Espermatorrea crónica. Rezumamiento de fluido prostático durante el sueño, mientras está sentado, caminando o al evacuar. Hidrocele.

MUJERES:

Reglas copiosas de color obscuro. Latido en el abdomen durante el embarazo, < por comer.

RESPIRATORIO:

Voz ronca, - tan pronto como empieza a cantar, hablar o leer; afectada por cada resfrío. La voz cascabelea. Nódulos en las cuerdas vocales. Carraspea moco claro; en la mañana. Necesidad frecuente de aclarar la garganta; en los cantantes. Hace respiraciones profundas. Laringitis tuberculosa. Tos seca, martillante < por la mañana. Expectoración de masas de moco sanguinolento. Sensación débil en el pecho.

CUELLO Y ESPALDA:

La espalda se vuelve casi paralítica después de una enfermedad temporal. Las glándulas del cuello están grandes y duras. Dolor paralítico en la espalda baja > acostándose sobre el abdomen.

EXTREMIDADES:

Emaciación de las manos; de piernas. Dolor ciático repentino (izquierdo) que deja adolorida la parte de atrás.

PIEL:

Comezón alderredor de los tobillos y alderredor de los pliegues de la piel. Grasosa. Permanece húmeda después de rascarse. Puntos ardorosos. Erupciones costrosas en las palmas. Psoriasis de las palmas. Acné.

SUEÑO:

Es impedido por pulsaciones en todo el cuerpo, principalmente en el abdomen. Se despierta temprano y a la misma hora.

FIEBRE:

Sudor profuso; amarillo, deja depósitos salados; rigidiza la tela o pone el cabello rígido y como alambre; < genitales.

RELACIONES:

Cal-c; Merc; Nat-m; Nux-v; Sep; Sul.

SENECIO

GENERALIDADES:

En la práctica ecléctica se considera un regulador de la función menstrual; de allí que tenga su acción marcada en los órganos urinarios femeninos, especialmente la vejiga. La afección de las glándulas mucosas causa condición catarral de la membrana mucosa principalmente de la vagina, vejiga y tracto respiratorio. Falta de reacción en el tracto génito-urinario. Descargas debilitantes o vicariantes. Apretadura de la nariz, garganta, etc. Los músculos se contraen como un nudo. Globo. Malos efectos de reglas suprimidas o retardadas; heridas. Mujeres nerviosas, pálidas; débiles histéricas e insomnes. Tendencia hemorrágica; de otros órganos, especialmente con reglas suprimidas o retardadas. Hidropesía, después de hemorragia.

AGRAVACION:

Pubertad. Excitación sexual, Humedad. Aire libre y frío. Estando sentado, debe moverse por allí (mente).

MEJORIA:

Menstruación.

MENTE:

Muy irritable, malhumorado. Inhabilidad para fijar la atención sobre cualquier objeto en particular. Egoísta. Alterna tristeza y regocijo.

CABEZA:

Mareo con sensación de ondulación desde el occipucio hasta el vértice. Dolor agudo sobre el ojo izquierdo y a través de la sien izquierda. Cefalalgia que precede a la leucorrea e irritación en la vejiga.

OJOS:

Lágrimas que causan comezón.

OIDOS:

Comezón en las trompas de Eustaquio.

NARIZ:

Ardor en los poros. Estornudos con ardor en la nariz. Rigidez del pasaje nasal. Epistaxis o catarro nasal en lugar de las reglas cuando se suprimen por cualquier causa. Coriza con sangramiento nasal.

CARA:

Temblores cerca de la boca.

GARGANTA:

La siente seca y rígida, quiere deglutir; pero le es doloroso.

ESTOMAGO:

Aversión a todo alimento, especialmente dulces y café al que era muy afecta. Náusea y vómito de origen renal. Sensación de una bola que se eleva desde el estómago a la garganta.

ABDOMEN:

Dolor cerca de la región umbilical, que se extiende en todas direcciones, > evacuar; doblándose en dos. Ascitis por reglas suprimidas. Evacuaciones; delgadas, acuosas, mezcladas con bultos duros de heces; o delgadas, oscuras, sanguinolentas con tenesmo.

URINARIO:

Calor en el cuello de la vejiga; y necesidad constante con olor renal. Orina; sanguinolenta; muy caliente o con mucho sedimento mucoso. Cólico renal (derecho). Nefritis. Disuria, en mujeres con dismenorrea, o desplazamiento uterino y en niños, con cefalalgia.

HOMBRES:

Sueños lascivos; con emisiones involuntarias. Glándula prostática crecida, la siente dura e hinchada al tacto.

MUJERES:

Amenorrea funcional de jovencitas con dolor de espalda. Reglas; retardadas; suprimidas, con síntomas concomitantes; hidropesía, tos, dolor de espalda, etc. Flujo profuso de moco desde la vagina, por excitación sexual. Irritación sexual que causa comezón, ardor e hinchazón de los labios. Dolores desde los ovarios hacia los senos. Leucorrea; espesa, amarilla, profusa, fluye hacia los muslos. Siente como si las reglas pudieran aparecerse. Ardor en el pezón izquierdo. Menorragia, con flujo copioso que continúa hasta que se vuelve anémica. Dismenorrea; después de aborto.

RESPIRATORIO:

Tos cosquilleante con esputo rayado de sangre; con reglas suprimidas. Hemoptisis con reglas suprimidas. Tos floja con expectoración copiosa de moco y respiración laboriosa.

ESPALDA:

Dolor de espalda lumbar, como si se fuese a quebrar; con amenorrea. Enfermedad renal.

EXTREMIDADES:

Dolores reumáticos erráticos; periódicos. Pies fríos en la cama. Uñas quebradizas.

PIEL:

Seca.

SUEÑO:

Muchos sueños; eróticos. Mujeres insomnes con problemas uterinos y amenorrea. Somnoliento durante el día.

FIEBRE:

Fiebre hética, con anorexia.

RELACIONES:

Pul; Sep.

SENEGA

GENERALIDADES:

Conocida como la raíz de la serpiente, afecta las membranas mucosas, causando síntomas catarrales, especialmente del tracto respiratorio; y vejiga. Ojos; membranas serosas del pecho; músculos y lado izquierdo también se ven afectados. Se adapta a personas pletóricas; o personas que tienden a la obesidad; altas, esbeltas, mujeres alegres; ancianos y niños gordos rechonchos. Estados paréticos, especialmente músculos oculares y síntomas distintos del ojo. Manchas circunscritas al lado izquierdo del pecho después de una inflamación. La debilidad parece originarse en el pecho. Desvanecimiento al caminar al aire libre. Ardor en los pasajes de aire. Relajamiento de tejidos. Secreciones profusas y albuminosas. Malos efectos de mordeduras ponzoñosas. Torceduras. Sensación de temblor, sin un temblor visible.

AGRAVACION:

Aire- inhalando, libre; frío; viento. Contacto. Presión. Descanso. Mirando fijamente. Caminando al aire libre; (disnea, tos). Frotando.

MEJORIA:

Doblando la cabeza hacia atrás, (visión). Sudor. Caminando al aire libre; (dolores).

MENTE:

Ansiedad; con respiración apresurada. Se ofende fácilmente.

CABEZA:

Dolor estallante en la frente, que vá hacia dentro de los ojos; > por aire libre y fresco.

OJOS:

Los globos se sienten como bolas de fuego. Temblor y lágrimas al mirar fijamente o leer. Los objetos parecen sombreados. Lagrimeo, ptosis y diplopía, > doblando la cabeza hacia atrás. Blefaritis, párpados secos y costrosos. Parálisis oculomotora. Absorbe fragmentos de lentes después de operaciones. Parpadeos, debe frotar sus ojos con frecuencia. Opacidades del humor vítreo. Iritis. Manchas sobre la córnea. Punzadas en el ojo (derecho) < al toser.

OIDOS:

Adolorimiento en el oído al masticar.

NARIZ:

Estornuda con tanta frecuencia y tan violentamente que la cabeza se siente con vértigo y pesada. Los poros se sienten picosos como con pimienta.

CARA:

Parálisis del lado izquierdo. Granitos en las comisuras de los labios con ardor.

BOCA:

Raspadura seca en la boca, < hablando. Gusto; metálico; como de orina.

GARGANTA:

Raspadura seca < por hablar. Expectoración moco pegajoso en pequeños coágulos que se despegan.

ESTOMAGO:

Asco y náusea; con disposición para vomitar.

URINARIO:

Orina; espumosa, acre, aumentada o disminuída en cantidad; con fragmentos de moco. Escaldadura antes y después de la micción.

RESPIRATORIO:

Raspadura seca en el pecho < por hablar. Voz ronca inconstante < por hablar y por pérdidas sexuales, intempestivamente cuando se lee en voz alta. Tos incesante, sofocante, violenta, sacudiente, asfixiante que termina en un estornudo, < acostándose sobre el lado derecho o por la noche. Cascabeleo flojo en el pecho; pero el esputo es claro, profuso, tenaz y se devuelve de nuevo. Esputo albuminoso o rayado de sangre. Pecho; adolorido, por toser, presión, estornudar o moviendo los brazos, en puntos; como

magullado; dolores cambiantes al agacharse. Como con un peso aplastante o debilidad que se inicia en el pecho; el pecho se siente demasiado estrecho. Exudación de la pleura. Hidrotórax. Ardor en el pecho antes y después de toser. Bronquitis asmática de los ancianos con nefritis crónica o enfisema. Cuerdas vocales parcialmente paralizadas. Pleuro-neumonía.

RELACIONES;

Calc-c; Caus; Hep; Lyc; Pho; sul.

SEPIA

GENERALIDADES:

La tinta jugosa de la jibia, conocida como la tinta India, se supone que es un remedio pre-eminentemente femenino, a pesar de que los primeros síntomas los encontró el Dr. Hahnemann siendo probados accidentalmente en un artista masculino. Afecta la circulación venosa, especialmente de los órganos pélvicos femeninos; del sistema portal y del tracto digestivo. Estasis venosa y por ende ptosis de vísceras, es un rasgo muy marcado. Se adecúa a personas jóvenes de los dos sexos, de constitución nerviosa y delicada, que están predispuestos a la excitación sexual o están exhaustos por excesos sexuales. Niños que se resfrían con facilidad cuando cambia el clima. Mujeres pletóricas y relajadas. Madres débiles barrigonas, con tez amarilla. Afecciones en mujeres embarazadas. Mujeres decaídas por un exceso de trabajo, pérdida de fluidos vitales, excesos en indulgencia sexual, que están sujetas a prolapsos, problemas uterinos. Los síntomas se establecen en la espalda, en la región ileo-cecal, ovarios, etc.; o van hacia la cabeza; pesadez en la región pélvica. Estremecimientos por el dolor. Postración repentina. Sensación de vacío y debilidad en el epigastrio, pecho, músculos, espalda lumbar, caderas, rodillas, etc. o sensación de plenitud. Como un bulto o algo rodara internamente. Ebulliciones violentas de sangre con pulsación a través de todo el cuerpo. Accesos de incomodidad y espasmos histéricos. Espasmos clónicos, tónicos, catalépticos. Una caminata corta fatiga mucho. Sacudida de los músculos. Dolores ardorosos en diferentes partes del cuerpo. Sangramientos. Secreciones de leche. Accesos de desvanecimientos. Nerviosa. Tendencia al aborto; desde el 5°-7° mes. Pacientes tuberculosos con problemas hepáticos crónicos y reflejos uterinos. Siente frío aún en un cuarto caliente. Malos efectos de disgusto y vejaciones; golpes; lesiones; pesos excesivos; caídas; sacudidas; por mojarse; por trabajo de lavandería; leche hervida; grasas; puerco; tabaco. Se desmaya cuando está arrodillada en el templo. Condiciones de enfermedad que se prolongan, tardan. Crecimientos verrugosos. Atrofia de los niños, la cara parece la de un anciano, con estómago grande, piel floja. Reumatismo, casos crónicos o remanencias agudas obstinadas.

AGRAVACION:

Frío; aire; viento del norte; aire helado de nieve; caídas de nieve; húmedo. Excesos sexuales. Antes de las reglas. Embarazo. Aborto. Mañana y noche. Después del primer sueño. Al caer dormido. Por sentarse, estar de pié. Arrodillado. Por sacudidas. Agachándose. Coito. Antes de una tormenta con rayos. Contacto. Ascendiendo. Frotando. Levantando cargas. Por rascarse. Lavando ropa.

MEJORIA:

Movimiento violento. Calor; de la cama. Presión. Aplicaciones calientes. Por cruzar o recoger los miembros. Después del sueño. Bebidas frías; baño frío; al aire libre.

MENTE:

Enojada; sensible; irritable; fácilmente ofendida; y avara. Quiere suicidarse. Nerviosa, tanto que quiere agarrarse de algo o grita. Hace y dice cosas extrañas. Nadie sabe que hará en seguida. Miedo ansioso; por naderías. Aversión; a la familia, a aquellos que ama más; al consuelo; a la compañía; pero teme estar sola. Repugnancia por los negocios acostumbrados; disgusto por la vida. Relaciones apagadas. Memoria pobre. Comete errores al escribir o leer. Triste. Irritabilidad que alterna con indiferencia o enfurruñamiento. Triste por su salud y asuntos domésticos. Se preocupa constantemente, se queja y llora por su enfermedad real o imaginaria. Mente sexual. Lloro cuando cuenta sus síntomas. Avaricia. Estúpida, quiere irse. Indiferencia. Halla placer en estar molestando a otros. Se siente desafortunada sin razón. Se sienta quietamente y contesta con un sí o un no. Las mujeres odian a los hombres y los hombres odian a las mujeres. Rompe en accesos de llanto.

CABEZA:

Ataques de vértigo < caminando al aire libre, al mínimo movimiento de los brazos; o con la sensación de algo que rodara por la cabeza. Dolor de cabeza; tirante, punzante; de adentro hacia afuera, o hacia arriba; sobre el ojo izquierdo; pesadez en el vértice, alternando lados del occipucio; < acostada sobre el lado doloroso, en el interior; con náusea y vómito. Cefalalgia en choques terribles durante el tiempo de la menstruación; con flujo escaso; con deseo de coito. Sacudida de la cabeza hacia atrás y hacia adelante; involuntaria; con fontanelas abiertas en los niños; histérica o por dolor. Caída del cabello; después de cefaleas crónicas, durante el climaterio. Raíz del cabello sensible al peinarlo. Granitos en la frente a lo largo del margen del cabello. Vértice frío y pesado. Hemicrania. Ictericia, con cefalalgia. Grita de dolor. Cefalalgia < por ir de compras, trabajo mental, > comidas.

OJOS:

Caída de los párpados. Vé; manchas negras, velos, puntos, destellos, relámpagos, zigzags y rayas de luz ante los ojos; luego se colapsa. Orilla; roja, con comezón; cáncer. Desvanecimiento de la vista durante las reglas > acostándose. Tumores tarsales. Visión disminuída; por excesos sexuales, masturbación y enfermedades uterinas. No soporta la luz reflejada. Detiene la catarata en mujeres. Sensación de caída en los ojos. Epitelioma de los párpados. Ojos rojos con perrillas.

OIDOS:

Herpes; detrás de las orejas; en el lóbulo de las orejas; en la nuca. Hipersensible al ruido; esp. a la música. Sordera repentina; como causada por un tapón en los oídos. Descarga; espesa, de pus amarillo, ofensiva. Hinchazón y erupción en el oído externo.

NARIZ:

Gran sensibilidad a los olores; que son repulsivos; al olor de alimentos cocinados. Dolor presivo en la raíz. Banda café; amarilla; cruzando la nariz. Descarga espesa verdosa; espesa, fétida en tapones y costras. Descarga post nasal pesada y en bultos, debe expectorarlos desde la boca. Epistaxis; cuando la nariz ha sido golpeada por algo aunque sea ligero; durante las reglas; durante el embarazo; con hemorroides. Ocena. Resfríos que ascienden a la garganta. Dolor en el occipucio con retracción de brazos y piernas durante el frío.

CARA:

Color cambiante. Círculos oscuros bajo los ojos. Cloasma. Acné < antes de las reglas. Huesos malares entumidos. Labio inferior hinchado y agrietado. Cáncer de los labios, epitelioma. Vieja, arrugada, con manchas. Sacudida de músculos faciales mientras habla. Verrugas.

BOCA:

Y lengua con sensación de quemadura. Gusto; caseoso; de pescado, amargo, ácido, pútrido, ofensivo. Expectoración granos caseosos fétidos en la mañana. Todo sabe muy salado. Dientes dolorosos, durante el embarazo, reglas y durante un resfrío, < acostándose. Lengua sucia, se vuelve limpia durante las reglas.

GARGANTA:

Sensación de un tapón. Dolor como si estuviese excoriada. Fríos que ascienden por la garganta. Presión en la garganta, siente la ropa muy ajustada en el cuello. Expectoración moco fétido o bolas por la mañana.

ESTOMAGO:

Náusea; por pensar u oler comida; en a.m.; por pensar en el coito. Vómito; de alimento sólido solamente o de fluidos lechosos; durante el embarazo, por la mañana; enjuagándose la boca. Deseo de vinagre; ácidos y pepinillos, dulces. Sensación de hundimiento en el epigastrio; no > por comer; o como con un bulto allí. Ardor en el hueco del estómago. La leche hervida disgusta. Acidez. Dispepsia por levantar cargas fuertes; por tabaco. Apetito voraz o ausencia de él. Deseo súbito, saciedad súbita. Sensación de algo que se retorciera en el estómago y se elevara por la garganta. Incomodidad o dolor en el estómago < vómito. Eructos; lechosos, ácidos, amargos, rancios; de moco tenaz y espumoso.

ABDOMEN:

Dolor en la región del hígado o vesícula < agachándose. Hígado inflamado y doloroso > acostándose sobre el lado derecho. Caída, o sensación de pesadez en hipogastrio > sujetándolo o cruzando las piernas. Madres barrigonas. Constipación obstinada, sin necesidad por días. Evacuaciones grandes y duras, sensación de una bola en el recto. Recto constreñido y sin fuerza, rezumamiento casi constante del ano. Diarrea; verdosa, infantil; por leche hervida, con agotamiento rápido. Hemorroides; prolapsadas; < caminando, sangran mientras camina, con dolor punzante; del embarazo. Evacúa, luego arroja moco gelatinoso. Dolores que se disparan hacia arriba en el recto. Manchas cafés en el abdomen. Las heces pasan después de un esfuerzo prolongado, seguidas de mucosidad como gelatina amarillo-blanca, muy ofensiva. Prolapso del recto después de fumar. Sensación de peso o una pelota en el ano no > por evacuar.

URINARIO:

Micción involuntaria durante el primer sueño; < por toser, estornudar; reír; por escuchar un ruido repentino, miedo o inatención, esp. en mujeres, etc. Micción lenta con sensación de pesadez sobre el pubis. Orina; espesa, fétida; blanca, arenosa o con sedimento adherente rojo y arenoso. Orina débil, lenta. Dolor cortante en la vejiga antes de orinar. Orina; sangrante; lechosa. Estremecimientos mientras siente la necesidad de orinar y no se atiende.

HOMBRES:

Deseo sexual aumentado. Malestares después del coito. Sudoración ofensiva en el escroto. Genitales fríos. Condilomata que rodea la cabeza del pene. Impotencia.

MUJERES:

Sensación débil, de arrastre o pesadez, como si todo pudiese escapar por la vulva; debe cruzar las piernas o sostenerse la parte para impedir la salida. Ardor, punzada o retortijón en el útero. Coito; doloroso; por resequedad de la vagina; con sangramiento posterior. Resequedad de la vagina y vulva; después de las reglas; causando una sensación desagradable al caminar. Aversión al coito o malestares posteriores. Reglas; ausentes; en la pubertad; después del destete. Reglas; muy retardadas y escasas; irregulares; adelantadas y profusas. Labios hinchados; con abscesos. Leucorrea; amarilla, verdosa, lechosa, en bolas grandes, en niñas pequeñas; en lugar de reglas, fétida; gonorréica; con punzadas en la vagina desde el útero hacia el ombligo; durante el día. Pezones agrietados a través de la corona. Placenta retenida; después de aborto. Sub-involución. Agotamiento después del coito. Náusea e irritabilidad al pensar en el coito. Amenorrea. Metritis con dolor en la región lumbar y micción frecuente. Movimiento del feto que es intolerable. Metrorragia al tiempo del climaterio. Bochornos repentinos de calor, con debilidad y sudor durante el climaterio. Tendencia al aborto; del 5° al 7° mes. Comezón severa en la vulva que causa aborto. Esterilidad. Manía por reglas profusas.

RESPIRATORIO:

Tos seca, fatigante, como si viniera del estómago; < cambio rápido de temperatura; con esputo fétido. Tosferina que cansa. Disnea, < después del sueño > movimiento rápido. Sensación de vacío en el pecho. Pleuritis hipostática. Manchas café sobre el pecho. Gusto a huevos podridos al toser. Asma. Síntomas del pecho > por la presión de la mano. Neumonía descuidada.

CORAZON:

Circulación irregular; parece que se estanca. Palpitación; visible, asciende al occipucio. Un brinco ocasional y fuerte del corazón. Pulsación general. Ebulliciones nocturnas. Venas sobrecargadas de sangre. Despierta con palpitations violentas del corazón. Sensación trémula con bochornos. Palpitations nerviosas > caminando rápidamente; < acostándose sobre el lado izquierdo.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello se siente rígido. Adolorimiento intra-escapular o de la región lumbar; parálitico; quiere presionarla. Dolor repentino de la espalda como si hubiera sido golpeada con un martillo < agachándose; arrodillándose. Dolor de la espalda > eructos, por presionar la espalda contra algo duro. Debilidad en la espalda baja al caminar; por enfermedad uterina. Todo afecta la espalda. Frialdad de hielo entre las escápulas. Calambres en los glúteos al estirar las piernas.

EXTREMIDADES:

Manos púrpura. Manos frías en cuarto caliente. Tensión en los miembros como si fuesen demasiado cortos. Miembros inquietos, se tuercen y sacuden día y noche. Rodillas y talones fríos. Ciática > durante el embarazo; crónica, localizada en los talones. Sensación de un ratón que corriera en las extremidades inferiores. Una caminata corta fatiga mucho. Uñas quebradizas. Manos calientes y pies fríos o viceversa. Manos sudorosas. La piel de las manos se despelleja.

PIEL:

Manchada; excoriada, áspera, dura o agrietada; < pliegues. Ampollas en las axilas. Costras gruesas en los codos. Ulceras en las articulaciones pequeñas. Epitelioma; en párpados, labios. Piel color vino. Manchas en la piel. Tiña < cada primavera. Vesículas con comezón. Urticaria < al aire libre > en

habitación tibia. Costras gruesas que se forman sobre las articulaciones. Induraciones por presión constante; con color púrpura.

SUEÑO:

Habla en voz alta durante el sueño. Sueños < si duerme sobre su lado izquierdo. Despierta con frecuencia como si lo hubiesen llamado.

FIEBRE:

Fácilmente calosfriado. Escalofrío; con hambre de aire. Frío en puntos; en el vértice; entre las escápulas; pies, en la cama. Bochornos calientes ansiosos, que preceden una debilidad repentina. Sudor; fácil; ofensivo, con orgasmos; en genitales, en axilas; o espalda; entre reglas. Fiebres irregulares. Calor que asciende como si se vertiera agua caliente sobre él.

COMPLEMENTARIO:

Nat-m; Nux-v; Pho; Psor; Pul; Sabad; Sul.

RELACIONES:

Calc-c; Caus; Con; Gel; Lil-t; Lyc; Mur-x; Nat-c; Nat-m; Pul.

SILICEA

GENERALIDADES:

Las trituraciones se preparan con pedernal puro. Produce una Nutrición defectuosa, esp. en niños; debido a una asimilación defectuosa. afecta los Nervios; aumentando su susceptibilidad causando estados neurasténicos y reflejos exagerados. Enfermedades de huesos y cartílagos; caries y necrosis; reblandecimiento de huesos. Exóstosis. Las Glándulas están crecidas. Niños raquíuticos, escrofulosos; con cabeza grande, fontanelas abiertas; abdomen distendido caliente y duro, lentos para caminar y desgaste en el cuerpo, especialmente las piernas. Los niños se arrastran nerviosamente; o se acurrucan en los brazos de sus madres; al correr se ponen pálidos. Procesos supurativos; tercos; aperturas fistulosas; abscesos. Inflamación lenta e incompleta, de las glándulas, tejido celular y piel; luego induración. Vivamente sensible al ruido, dolor, frío, quiere abrazar el fuego, quiere mucha ropa abrigadora; odia las corrientes. Pacientes caquéticos y seniles; personas de tez clara y fina. Los dolores son violentos y punzantes; se localizan en los oídos, garganta, úlceras, etc. Tendencia al agotamiento fácil, y a sudores anormales. Necesidad de calor vital aún cuando se ejercite. Espasmos, epilepsia; sensación de frialdad antes del ataque. Histeria, parálisis y neuralgias obstinadas causadas por la disipación, trabajo duro, con confinamiento encerrado. Mala-nutrición. Desarrollo detenido. Emaciación. Necesidad de un freno; moral y físico. Carnosidad. Cicatrices; induradas, duras, nodulares, brillantes, vidriosas, tiernas, con dolores punzantes. Queloides. Edema en a.m. Cáncer. Esfínteres contraídos. Efectos ascendentes. Postración de mente y cuerpo. Reblandecimiento cerebral. Inquietud, nerviosismo, se sobresalta al menor ruido. Las partes sobre las que yace se entumen. Remueve objetos extraños. Ataxia locomotriz progresiva. Sensación como si estuviese dividido en mitades y el lado izquierdo no perteneciera a ella. Sensación de un cabello sobre la lengua; en la tráquea. Malos efectos de la vacunación; cortadores de piedra; pérdida de fluídos vitales; lesiones; torceduras, astillas.

Intolerancia a los estimulantes alcohólicos. Afecciones nerviosas después de lesión en la espina, esp. cuando la presión sobre la espina causa dolor en partes alejadas. Convulsiones; inician en el plexo solar; después de vacunaciones. Epilepsia; aura en el plexo solar, hormigueo dentro del pecho y el estómago. Piel insana; toda herida supura. Descargas ofensivas, pus, sudor, evacuaciones, etc.

AGRAVACION:

Frío; Aire; Corrientes; humedad; descubriéndose, bañándose. Sudor suprimido esp. de los pies. Excitación nerviosa. Luz. Ruido. Sacudidas; de la espina. Cambios de la luna. Noche. Fatiga mental. Alcohol. Contacto. Presión. Cambio de clima. Por peinarse el cabello.

MEJORIA:

Cubiertas tibias; en la cabeza. Verano. Clima húmedo. Micción profusa. Magnetismo y electricidad.

MENTE:

Rendida; ánimo desfalleciente. Humor sensible y llorón. Obstinado, terco, testarudo; niños. Llora cuando se le habla con amabilidad. Ideas fijas, piensa solamente en alfileres, les teme, los busca y los cuenta. Agudeza mental, con debilidad física y torpidez. Hundido. Cargo de conciencia por nimiedades. Pérdida de la auto-confianza; teme el fracaso, pero sin fundamento. Se sobresalta por sonidos ligeros. Grita violentamente; gime; epilepsia. Indiferente a la religión. Desesperanzado. Triste. Disgusto por la vida; desea ahogarse. Niebla mental. No puede expresarse correctamente. Nervioso. Malestares por anticipación.

CABEZA:

Vértigo; asciende desde la región dorsal < mirando hacia arriba, cerrando los ojos, acostándose sobre el lado izquierdo. Dolores occipitales ascendientes > presión. Cefalalgias periódicas. Cefalalgia, luego ceguera. Protuberancias en el cráneo. Sudor profuso en la cabeza. El vértice late. Fontanelas abiertas, con abdomen distendido. Inflamación de la coronilla. Cefalohematoma. Micción profusa > el dolor de cabeza. El lado derecho como paralizado < coito. Dolor de cabeza < por el ejercicio, estudio, ruido, movimiento, sacudida, luz, aire frío, hablando y haciendo esfuerzo para defecar y > por envolverse la cabeza abrigándola y por la presión. Erupciones costrosas y húmedas en el cuero cabelludo. Hinchazón llena de fluido grumoso entre el cuero cabelludo y el hueso. Dolor de cabeza mientras se ayuna o cuando no se come en el tiempo debido. Migraña. Cefalalgia crónica desde alguna enfermedad severa. Caída del cabello, calvicie prematura.

OJOS:

Afecciones del canto; en la región del ducto lagrimal; hinchazón de la fistula lagrimal; estrictura del ducto lagrimal. Visión con puntos. Los objetos parecen pálidos. Aversión a la luz del día; ésta deslumbra. Queratitis; pustular; perforante. Inflamación de los ojos. Hipopión. Opacidades de la córnea; después de viruela (use la potencia 30 por meses). Catarata en trabajadores de oficina, después de supresión de sudor de pies. Perrillas; para prevenir su recurrencia. Tumores enquistados de los párpados. Las letras corren mientras se les lee.

OIDOS:

Rugido en los oídos. Silbidos. Tímpano perforado. Comezón. Caries del mastoide. Sordera, escucha nuevamente con una detonación fuerte o al sonarse la nariz, y toser; < en luna llena. Descarga fétida.

Sensible al ruido. Sensación de taponamiento en el oído > cuando se bosteza o deglute. Formaciones costrosas en los oídos. El niño se pica dentro de los oídos mientras está dormido.

NARIZ:

Descarga nasal espumosa. Coriza con epistaxis. Perforación del tabique. Costras secas y duras; sangran cuando se aflojan. Estornudos por la mañana. Comezón en la punta. Hueso adolorido. Nariz; seca, obstruída con pérdida del olfato. Epistaxis en infantes. Ventanas perforadas. Catarros obstinados; con afecciones del oído. Nariz fría.

CARA:

Pálida, caquética; cerosa. Parótidas crecidas. Grietas; en labios; en la piel de la cara. Erupciones en la barbilla. Hinchazón de las glándulas maxilares. Fisuras induradas en las comisuras labiales. Cáncer del labio inferior.

BOCA:

Como con un cabello en la lengua. Absceso en la raíz de los dientes. Ampollas en las encías. Piorrea. El agua sabe mal; la vomita después de beberla. Dientes; se rompen, pierden su esmalte, se vuelven ásperos, cariados. Lengua; café. Los dientes se sienten demasiado largos y demasiado grandes para la boca. Un lado de la lengua está hinchado.

GARGANTA:

Gusto amargo. Amígdalas crecidas, supurantes. El alimento es arrojado a través de la nariz, al deglutirlo. Dolor picante como por un alfiler, en la tonsila. Expectora grumos fétidos. Hinchazón dolorosa, difícil; histérica.

ESTOMAGO:

Aversión a la comida y carne calientes y cocinadas; a la leche materna; la vomita. Le gustan los helados, agua helada, se siente confortable cuando ésta está en el estómago. El agua tiene mal sabor; la vomita después de beberla. Induración del píloro. Aflujo de agua a la boca con escalofríos. Apetito voraz, pero desaparece cuando trata de comer, o aborrece la comida. Eructos ácidos después de comer. Vómito ácido. Dolor mordiente, de retortijón en el epigastrio < por la presión. Como si tuviese una pidera fría en el estómago.

ABDOMEN:

Dolor pulsante ulcerativo en la región del hígado; absceso del hígado. Dolor cólico, cortante; con manos amarillas y uñas azules. distendido, duro y caliente, con piernas delgadas, esp. en niños. Dolor cortante y calambroideo en el recto que se extiende a los testículos < coito. Constipación < antes y durante las reglas. Esfuerzos con evacuaciones suaves, con agotamiento. Ano húmedo; flatos fétidos. Evacuaciones; salen con dificultad, cuando han sido expelidas parcialmente, se regresan de nuevo; son retenidas por temor al dolor. Grietas en la pared abdominal. Fisuras, fistulas en ano, con síntomas en el pecho. Espasmos dolorosos de esfínter. Hemorroides intensamente dolorosas, se salen durante la evacuación. Diarrea maloliente. Necesidad infructuosa de defecar. Diarrea crónica. Heces ofensivas,

indoloras, lientéricas. Lombrices. Diarrea después de tomar leche. Tumor herniado sensible. Ascitis; con gran efusión; con ataques frecuentes de diarrea.

URINARIO:

Micción profusa > cefalalgia. Micción frecuente con tenesmo. Enuresis nocturna; en niños; por lombrices. Uretritis crónica; descarga fétida desde la uretra, espesa, cuajada, purulenta, sanguinolenta. Pus en la orina. Incontinencia nocturna, después de un golpe en la cabeza. Cálculos renales y vesicales.

HOMBRES:

Descarga uretral gonorréica fétida. Después del coito, sensación de que el lado derecho de la cabeza está como paralizado. Manchas húmedas y pruriginosas en el escroto. Hidrocele. Emisiones nocturnas. Apetito sexual incrementado o disminuído. Prostatoreea < por esforzarse para evacuar. Uretritis crónica con dolor retorciente. Elefantiasis del escroto. Agotamiento extremo después del coito; le toma de 8 a 10 días volver a la condición normal. Erupciones dolorosas en el monte de venus.

MUJERES:

Reglas aumentadas con paroxismos de frialdad de hielo sobre todo el cuerpo. Dolor cortante hacia arriba en la vagina < por orinar. Leucorrea lechosa, acre, en chorros, < durante la micción. Comezón en la vulva y vagina que está muy sensible. Descarga sanguinolenta < al amamantar; entre períodos. Pezones; retraídos como un embudo, doloridos. Protuberancias duras, fístula en mamas. Quiste seroso en vagina; abertura fistulosa y absceso alderredor de la vulva. Amenaza de absceso en mamas. Escirro con comezón. Dolores agudos en las mamas y el útero. Reglas; adelantadas, escasas. Amenorrea por meses. Movimientos del feto demasiado violentos. Absceso fistuloso o aberturas fistulosas en o alderredor de la vagina con descarga espesa, cuajada. Salpingitis, con acumulación de pus o suero con escape desde el útero de tiempo en tiempo. Dolor cortante alderredor del ombligo con leucorrea. Descarga acuosa en lugar de reglas. Aborto por debilidad y no concibe por debilidad. Nausea durante el coito. Descarga sanguinolenta entre períodos. Esterilidad. Ninfomanía. Comezón en pudendum.

RESPIRATORIO:

Tos que produce arqueos, sacude, < por bebidas frías; hablando, acostándose y después de despertar. Disnea; por enfriamiento en la nuca; catarros crónicos que se establecen en el pecho y traen ataques asmáticos; después de haberse sobrecalentado o ejercitado. Asma sicótica. Espujo profuso, fétido, amarillo, grumoso; granular; ofensivo al romperse. El resfrío no cede. Recuperación lenta de la neumonía. Cortedad en la respiración, por trabajo manual; por caminar rápido. Afección de los cortadores de piedra. Enfisema después de pleuresía. Neumonía descuidada. Latido indoloro en el esternón.

CORAZON:

Palpitación en todo el cuerpo, al sentarse o mientras se está en movimiento. Latido; mientras está sentado, con temblor en la mano. Problema de corazón por agotamiento nervioso.

CUELLO Y ESPALDA:

Espina; débil, muy sensible a las corrientes en la espalda. Espina bífida. Caries de las vértebras. Absceso de los psoas. Cóccix doloroso. Dolor de espalda como si se hubiese paseado en carro por largo

tiempo. Ardor en la espalda, cuando el cuerpo está acalorado después de haber caminado al aire libre. Cuello rígido; con dolor de cabeza. Adolorimiento en la región del sacro.

EXTREMIDADES:

Glándulas axilares hinchadas y crecidas. Punta de los dedos dolorosa, seca como hecha de papel; por la noche. Pies helados y sudorosos. Sudor de los pies fétido; comezón, acre, destruye los zapatos; suprimida. Dolor sensible en el arco del pié. Uñas de los pies distorsionadas, encarnadas, amarillas. Tobillos y pies débiles. Pantorrillas tensas y contraídas. Panadizos, con dolor de asiento profundo. Atrofia y entumecimiento; de los dedos. Las partes sobre las que se yace se duermen. Juanetes. Inflamación de los huesos. Temblor de las manos al tratar de hacer algo. Antebrazo adolorido. Las piernas se sienten paralizadas, temblorosas mientras camina. Cosquilleo voluptuoso en las plantas. Sensación de magullamiento en todo el cuerpo después del coito o de emisiones. Calambres en las rodillas. Callos blandos entre los dedos. Uñas; ásperas, amarillas, estropeadas, quebradizas, con manchas blancas, azules en la fiebre. Úlceras alderredor de las articulaciones, con descarga delgada, fétida, sanguinolenta, purulenta o con partículas cuajadas. Paso desaliñado. Reumatismo, esp. de las plantas, no puede caminar. Calambres en las pantorrillas y plantas. Torcidos durante la convulsión. El brazo (izquierdo) se sacude antes de la epilepsia.

PIEL:

Remojada, marchita. Erupciones agrupadas. Las cicatrices de pronto se vuelven dolorosas. Queloides. Cualquier pequeña herida supura. Nódulos leprosos. Manchas cobrizas. Carbúnclos. Úlceras; dolorosamente sensibles, fétidas; esponjosas; en pies, dedos, uñas > calor. Abscesos de las articulaciones. Erupciones que dán comezón durante el día o por la noche sólomente. Forúnculos y pústulas en todos lados. Sensación de frialdad en las úlceras. Crecimientos verrugosos. Manchas de color rosado. Elefantiasis.

SUEÑO:

Sonambulismo. Sueños terroríficos que lo despiertan en cuanto cae dormido. Sueño inquieto. Sueños; lascivos o de eventos pasados. Se despierta asustado, de su sueño con temblor en todo el cuerpo. Habla en sueños en voz alta, se queja o se ríe. Bostezos violentos. Somnoliento, pero no puede dormir. Sueño no reparador.

FIEBRE:

Friolento; < acostado en la cama; ejercicio. Frialdad; de la parte dolorosa. Fríos helados. Sudor; profuso; en la parte superior del cuerpo; cabeza o partes afectadas; en la noche; fétido; fácil; acre; tan pronto como cae dormido. Fiebre héctica.

COMPLEMENTARIO:

Flu-ac; Pho; Thu.

RELACIONES:

Calc; Hep; Kali-p.

SOLIDAGO VIRGA

GENERALIDADES:

Enfermedades que surgen de o se complican con una función defectuosa de los riñones son muy propensas a beneficiarse con este remedio. Afecta el tracto digestivo, los miembros inferiores y la sangre. Sensación de debilidad; frío, que alterna con calor. Hemorragias. Se resfría fácilmente. Nefritis crónica. Asma urémica.

AGRAVACION:

Presión.

MEJORIA:

Micción profusa.

OJOS:

Rojos con glándula prostática crecida.

NARIZ:

Paroxismos de estornudos, con abundante descarga mucosa.

BOCA:

Gusto amargo continuo. Lengua cubierta fuertemente, se aclara cuando la orina se normaliza.

ABDOMEN:

Heces mucosas, profusas e involuntarias.

URINARIO:

Orina; oscura y escasa o clara, de muy mal olor, vaciada con dificultad; albuminosa; mucosa, fosfática. Afecciones de cualquier parte u órgano complicado con estos síntomas encontrarán probablemente su remedio en Solidago. Riñones; adoloridos y sensibles; duelen; se sienten distendidos. Dolor en los riñones que se extienden hacia adelante, al abdomen, vejiga, y hacia abajo a los muslos. Nefritis crónica. Cistitis. Glándula prostática crecida; con obstrucción de flujo o inflamación.

MUJERES:

Crecimiento uterino, el órgano presiona hacia abajo sobre la vejiga. Tumores fibrosos.

RESPIRATORIO:

Bronquitis, tos con mucha expectoración purulenta, rayada de sangre; con respiración opresiva. Disnea continua. Asma con disuria nocturna.

ESPALDA:

Dolor lumbar; la hace sentirse mal toda.

PIEL:

Petequia; en los miembros inferiores; con edema; y comezón. Gangrena; diabética. Eczema < orina suprimida.

SPIGELIA

GENERALIDADES:

Conocida como la raíz rosa, afecta marcadamente los Nervios; trigémino; corazón; ojos, dientes, tejido fibroso y lado izquierdo. Produce síntomas combinados de corazón y ojo o el último como acompañamiento. Los dolores son violentos; ardorosos, como de agujas o alambres calientes, sacudientes, desgarrantes, punzantes; radiando a otras partes. Neuralgia. Dolores por el sol. Se adapta a sujetos anémicos, debilitados, reumáticos y escrofulosos. Muy sensibles al contacto; las partes tocadas o lastimadas se sienten frías o causa cosquilleo o estremecimientos a través del cuerpo. Los niños aquejados con lombrices; se refieren al ombligo como la parte más dolorosa. El cuerpo se siente ligero al caminar; pesado y adolorido cuando se levanta de su asiento.

AGRAVACION:

Contacto. Movimiento. Sacudida. Periódicamente; con el sol. Tabaco. Coito. Levantando los brazos. Después de comer. Pensando en ello. Agachándose. Sonándose la nariz. Expirando.

MEJORIA:

Acostándose sobre el lado derecha con la cabeza alta. Inspirando. Con presión fija. Mientras come.

MENTE:

Temor de las cosas agudas; alfileres, agujas. Inquieto y ansioso. Se sienta como perdido en sus pensamientos; se fija en un solo objeto. Humor triste y suicida. Fácilmente ofendido.

CABEZA:

Dolor desde el occipucio izquierdo hacia encima del ojo izquierdo, < agachándose; dando un paso en falso, abriendo la boca. Vértigo; como si los pies estuviesen más altos que la cabeza; < mirando hacia abajo, debe mirar justo hacia adelante, < de pié, caminando. Neuralgia supra-orbital. La siente muy grande.

OJOS:

Los siente muy grandes. Dolor severo en y alderredor de los ojos, que se extiende muy profundo en las cuencas, < por pensar en él. Bizqueo por lombrices. Ojos; rojos; inflamados, con dolor penetrante; anillos amarillos alderredor. Como se se le clavaran agujas. Lagrimeo, profuso, desde el lado afectado; lágrimas acres. Dificultad para levantar los párpados con sensación dolorosa de rigidez. Propensión a

parpadear. Dificultad para adaptarse lentes, no enfoca, no fija la visión; errores latentes de visión. Eso y exoforia. Picoteo en los párpados. Párpados volteados hacia afuera.

OIDOS:

Sordera periódica; los oídos los siente tapados.

NARIZ:

Catarro crónico con escurrimiento post-nasal. Cosquilleo y comezón en la nariz. Resequedad anterior. Flujo de agua durante la prosopalgia.

CARA:

Prosopalgia que involucra ojo, cigoma, mejilla, dientes; sienes < contacto, agachándose; desde la mañana hasta la puesta del sol; por tomar té; viene y se vá de pronto.

BOCA:

Aliento ofensivo. Dolor de diente < después de comer y por el fio; cuando piensa en él > por el humo del tabaco. Lengua; cubierta de amarillo o blanco; ardor y punzadas; agrietada.

ESTOMAGO:

Aversión al humo del tabaco y rapé. Hambre voraz. Náusea con sensación de un gusano que se elevara por la garganta.

ABDOMEN:

Cólico, con dolores punzantes en la región umbilical. Evacuaciones; de bultos grandes de moco solamente. Comezón, cosquilleo en ano y recto. Lombrices. Flatos muy ofensivos. Desvanecimiento al evacuar.

URINARIO:

Orina copiosa, con necesidad frecuente, principalmente por la noche.

RESPIRATORIO:

Disnea < moviéndose en la cama; levantando los brazos; debe permanecer sobre su lado derecho, con la cabeza alta. Hidrotórax. Enfermedad del corazón. Punzadas en el pecho < al mínimo movimiento o cuando respira. Temblor en el pecho.

CORAZON:

Palpitación; violenta, audible; atendiendo otros síntomas. Cosquilleo violento o dolores compresivos, radiando a la garganta; brazos, escápula, < mínimo movimiento, o doblándose en dos. Palpitación con mal olor de la boca. Adolorimiento, ronroneo; crujido en la región del corazón. Pericarditis. Angina de pecho con deseo de agua caliente que <. Carditis reumatoide. Pulso; intermitente, con palpitación nerviosa; débil, trémulo, irregular. Latido de carótidas y arterias subclavias.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido; dolores que van a la sien derecha o dolor desde el hombro izquierdo al cuello. Dolor cortante alderredor de la clavícula izquierda.

EXTREMIDADES:

Brazo izquierdo entumido. Pulsación en el omóplato.

FIEBRE:

Calor; bochornos por la noche; en la espalda. Sudor ofensivo; en la parte superior del cuerpo; en manos, frío.

COMPLEMENTARIO:

Calc.

RELACIONES.

Cact.

SPONGIA

GENERALIDADES:

La esponja tostada contiene un pequeño porcentaje de Iodo. Afecta al Corazón, esp. válvulas; laringe; tráquea y glándulas, especialmente las cerradas. Es adecuada para mujeres y niños de cabellos claros, de fibras laxas, de constitución floja y escrofulosa. Agotamiento y pesadez del cuerpo, con un ligero ejercicio; debe acostarse; con orgasmos de sangre en el pecho, cara, etc. Se siente atascado. Hinchazones duras; de glándulas (cerradas). Entumecimiento de la mitad inferior del cuerpo. Resequedad; de las membranas mucosas; de la lengua; laringe; tráquea; garganta. Siente la ropa incómoda. Ansiedad, con dolor en la región del corazón con disnea. Rigidez, sin capacidad para moverse. Desvanecimiento cuando pierde la respiración al levantar las manos sobre la cabeza.

AGRAVACION:

Frío, seco; viento. Levantado de su sueño. Después de dormir. Ejercicio. Levantando los brazos. Antes de las 12 p.m. En luna llena. Por los dulces.

MEJORIA:

Acostándose con la cabeza baja. Por comer o beber; un poco. Cosas calientes. Descendiendo.

MENTE:

Deseo irresistible de cantar; con regocijo excesivo; seguido de tristeza. Miedo al futuro; cansado de la vida. Ansiedad, miedo a la muerte; con sofoco. Timidez, temor y terror. Lloro; con sus sueños; con tosferina; con calor, con sudor. Abatido por pérdida de poder sexual. Comportamiento obstinado e impropio.

CABEZA:

Como si el cabello estuviese parado, en el vértex.

OJOS:

Saltados; fijos. Diplopía > acostándose. Rojos, con lagrimeo y ardor.

NARIZ:

Coriza seca; la nariz se siente tapada. Naríz afilada; fría. Alas nasales muy abiertas; con movimiento de abanico.

CARA:

Expresión ansiosa; aterrorizada. Labios azules. Pálida por el ejercicio en lugar de estar rubicunda y brillante. Sudor frío en la barbilla. Barbilla entumecida.

BOCA:

Lengua; seca, café. Gusto dulzaíno.

GARGANTA:

Gusto amargo. Glándula tiroides hinchada; aún hasta la barbilla. Inflamación de la garganta < comiendo cosas dulces. Aclara la garganta constantemente. Síntomas de garganta > acostándose sobre la espalda. Bocio; con accesos de sofoco; < tocándose el cuello, o presionándolo; o duele con el corazón. Deglute agua en pequeñas cantidades y con dificultad. Entumecida externamente.

ESTOMAGO:

Sed con hambre. No puede soportar ninguna ropa en su derredor. El estómago se siente flácido como si estuviese abierto. Deseo de golosinas. Ansia en el estómago; antes de las reglas.

ABDOMEN:

Acción violenta de los músculos abdominales durante la inspiración. Vísceras jaladas contra el diafragma. Dolor en el abdómen en lugar de reglas.

HOMBRES:

Hinchazón dolorosa del cordón espermático y testículos. Punzadas, retortijones, opresiones en el cordón y testículos. Testículos duros e hinchados. Genitales calientes. Aperturas fistulosas en el escroto con pequeña descarga espesa y blanca.

MUJERES:

Despierta con ataques de sofoco durante las reglas. Asma con reglas ausentes. Hambre y palpitación del corazón antes de las reglas. Dolor en el sacro antes de las reglas o en lugar de ellas.

RESPIRATORIO:

Ronquera; con muchos malestares; tos, coriza, etc. Laringe; dolorosa, seca, constreñida < contacto, cantando, hablando o deglutiendo, se la agarra. Sofoco como por un tapón, válvula o una hoja en la laringe; lo despierta; con palpitación violenta y dolorosa y labios azules; con sudor fuerte. Inspiración ruidosa, silbante al caer dormido. Respiración ansiosa, entrecortada. Tos; hueca; ladrante; graznante; aserrante o apretada; cruposa; lo despierta; luego ardor en el pecho y garganta < bebidas frías o excitación; dulces, bebiendo leche fría, > por beber o comer, esp. cosas calientes. La voz se va cuando canta o habla. Siente que debe respirar a través de una esponja seca. Pecho débil; escasamente puede hablar; sofoco al caer dormido. Asma. Difteria. Crup. Expectoración profusa de moco; dificultad para sacarlo; lo traga de nuevo; huele como a leche. Tuberculosis que se inicia en el ápex. Plenitud en el pecho. Opresión al respirar > comiendo un poco. Asma, debe dejar caer la cabeza hacia atrás; empeora en luna llena. Como si pasara aire en las glándulas del cuello al respirar. Bocio.

CORAZON:

Palpitaciones violentas con disnea; se despierta de pronto en la noche con dolor y sofoco, con miedo y terror. Sangre que sube hacia el cuello, cabeza y cara; con cerramiento de párpados y lágrimas. Insuficiencia valvular. Aneurisma de la aorta. Endocarditis reumatoide. Hipertrofia del corazón con síntomas asmáticos. Pulso frecuente, duro, lleno o débil. Angina de pecho.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello se siente como si tuviese un cordón alderredor. Dolor en el sacro, en lugar de reglas.

EXTREMIDADES:

Punta de los dedos entumecida. Entumecimiento de la parte media baja del cuerpo. Muslos entumecidos y fríos. Dolor en las rodillas cuando se levanta después de estar arrodillado. Engrosamiento de las articulaciones después de una fiebre reumática.

PIEL:

Hinchazón en induración de glándulas. Comezón mordiente en todo el cuerpo.

SUEÑO:

Despierta con miedo y se siente como si fuera a sofocarse; con terror y miedo.

FIEBRE:

Calor; en flujos; con ansiedad; dolor cardíaco, preferiría morir; con muslos húmedos y fríos; < pensando en ello. Calor y debilidad súbita después de caminar al aire libre, debe acostarse.

COMPLEMENTARIO:

Hep.

RELACIONES:

Iod; Led.

STANNUM

GENERALIDADES:

La acción principal del Estaño se centra sobre el Sistema nervioso, causando Debilidad extrema que se siente especialmente en el Pecho; garganta; estómago; parte superior de los brazos y muslos; el paciente está inhabilitado aún para caminar; se deja caer en la silla en lugar de sentarse; tiembla al moverse. La debilidad se siente mucho más al bajar las escaleras que al subirlas. Pesadez o debilidad paralítica. Espasmos; histéricos; con dolor en el abdomen y diafragma; epilépticos; con movimiento de miembros, engarrñamiento de dedos, opistótonos, inconciencia y complicaciones sexuales. Las afecciones de las Membranas mucosas producen secreciones muco-purulentas amarillas. Los dolores aumentan gradualmente y desaparecen gradualmente. Dolores presivos y tirantes. Neuralgia, diafragmática; suprimida. Calambres. Histeria. Emaciación. Ataques pequeños y repetidos. Malos efectos de emociones; susto; masturbación; dentición; uso de la voz. Sensación de ceñido con el bostezo. El niño quiere ser cargado sobre los hombros. Tiembla más con un movimiento o ejercicio lento. Parálisis; por lombrices, después de espasmos, emociones, onanismo. Hemiplejía; la parte está constantemente húmeda.

AGRAVACION:

Por el uso de la voz. Frío. 10 A.M. Acostándose sobre el lado derecho. Después de un movimiento ligero. Movimiento. Bebidas calientes. Durante las evacuaciones. Bajando escaleras. Ascendiendo. Contacto.

MEJORIA:

Presión dura sobre una orilla. Tosiendo, expectoración. Movimiento rápido. Acostándose sobre algo duro. Doblándose en dos.

MENTE:

Muy sensible sobre lo que otros dicen de ella. Ansiosa; nerviosa, triste < antes de las reglas. Desgraciada y falta de valor. No se puede deshacer de una idea cuando ésta se ha fijado en su mente. Taciturna, le disgusta la sociedad. Accesos súbitos de pasión. Olvidadizo y con mente distraída. Inquieto, no sabe que hacer consigo mismo. Desesperanzado, abatido; siente que llora todo el tiempo, pero llorar lo <.

CABEZA:

Constricción severa y dolorosa en la frente y sienes. Dolor de cabeza presivo y estupefaciente. Las sacudidas al caminar resuenan dolorosamente en la cabeza. Migraña de origen cerebral > por vomitar. Dolores violentos, ardientes, batientes, como si la cabeza fuese a estallar, con golpes hacia adentro. Vértigo; todos los objetos se ven muy alejados.

OJOS:

Sumidos, pesados. Ptosis; regresa cada semana.

OIDOS:

Crujidos, ruido como chillido en el oído cuando se suena la nariz. Ulceración en el agujero del arete.

NARIZ:

Hipersensibilidad del olfato.

CARA:

Pálida. Prosopalgia. Neuralgia malar; en las reglas.

BOCA:

Cosquilleo en la raíz de la lengua. Gust ácido, dulce, amargo, a todo el alimento, excepto el agua.

GARGANTA:

Los esfuerzos que hace para despegar un moco adherente, le causa náusea. Dolor cortante cuando traga. Náusea. Seca. Punzante.

ESTOMAGO:

El olor de la comida causa náusea y vómito. Vómito; violento; de sangre; de bilis; temprano por la mañana; con olor de lo que ha ingerido. Sensación de vacío en el estómago. Sensación de inquietud.

ABDOMEN:

Ardor en el hígado. Neuralgia diafragmática; histérica. Cólico punzante, cortante; con hambre y diarrea, que agota; > presión dura. Expulsa lombrices. Dolor espasmódico del abdomen; histérico. Cólico en niños > por cargarlos sobre los hombros. Constipación; heces secas, duras, nudosas, insuficientes y verdes. Constipación de los lunes, por ejemplo; las que suceden después de días de trabajo.

URINARIO:

Insensibilidad de la vejiga; solamente la sensación de llenura indica la necesidad de orinar. Atonía de la vejiga.

HOMBRES:

Excitación sexual. Sensación voluptuosa en los genitales que termina con emisión; que agota.

MUJERES:

Deseo sexual aumentado; orgasmo fácil. El rascado de partes distantes (de los brazos) producen una intolerable sensación de placer en los órganos genitales que provocan orgasmo. Pesadez en la región uterina. Prolapso de útero y vagina < al evacuar. Olor fuerte del cuerpo durante las reglas. Reglas, adelantadas y profusas. Manía erótica, antes de las reglas. Leucorrea, en chorro con mucha debilidad; de moco amarillo-blanco o transparente. El niño rehúsa la leche materna. Síntomas uterinos con una sensación de debilidad y contracción en el pecho. Dolor en la vagina hacia arriba y hacia atrás a la espina.

RESPIRATORIO:

Voz; hueca, profunda, ronca, > expulsando moco. Mucho moco en la tráquea. Tos; < por toser, cantar, hablar; acostándose sobre el lado derecho. Expectoración; fácil; cantidades de moco dulce, salado, ácido, pútrido o de pus amarillo brillante o en bolas. Respiración corta por cada esfuerzo; debe aflojar las ropas. Hace inspiraciones profundas. El pecho se siente en carne viva o hueco. Hemoptisis; con expectoración copiosa. Punzadas; en el lado izquierdo el pecho, al respirar o acostándose sobre ese lado; como con una navaza bajo la axila izquierda. Tisis catarral. Bronquiectasia: Arqueos con tos. No puede caminar, no puede hacer nada sin toser.

EXTREMIDADES:

Hinchazón de las manos y tobillos. Debilidad parálitica; deja caer las cosas. Miembros que de pronto fallan al tratar de sentarse. Rodillas temblorosas. Los dedos se sacuden al sostener una pluma. Neuritis. Parálisis de los mecanógrafos. Contracción de los dedos; retracción de los pulgares. Calambres en las manos, no puede sostener una escoba. El uso de la voz o el canto causan debilidad en la parte superior del brazo; que se extiende a todo el cuerpo. Adolorimiento del deltoides por leer.

SUEÑO:

Gemidos, llantos y lamentaciones quejumbrosas durante el sueño. Duerme con una pierna contraída, la otra estirada.

FIEBRE:

Frío a las 10 a.m. con puntas de los dedos entumidas. Palmas y plantas ardientes. Héctica. Debilitante, sudor mohoso a las 4 a.m.

COMPLEMENTARIO :

Pul.

RELACIONES:

Calc; Kali-c; Lach; Nat-m; Pho; Sul.

STANNUM IODIDE

GENERALIDADES:

Es muy valioso en las enfermedades crónicas del pecho, caracterizadas por cambios plásticos del tejido e inclinación persistente a toser; excitada por un cosquilleo, en un punto seco de la garganta, (aparentemente en la raíz de la lengua), iniciando con una tos que suena débil con respiración corta, luego coge fuerza y sonido y causa la salida de expectoración libre, copiosa, pálida amarillenta que al principio alivia pero pronto es seguida por una sensación de resequedad, debilidad en el pecho y garganta y se incrementa la opresión. Está indicado en casos de “apaga-fuegos” y necesidad de una alternativa. Use potencia baja - 2x o 3x.

STAPHYSAGRIA

GENERALIDADES:

Las afecciones nerviosas con temblor son un rasgo marcado de este remedio. Produce perturbaciones sexuales tanto físicas como morales, provoca exceso de apetito sexual irregular y una tendencia a la masturbación y a un estado físico correspondiente al efecto de ese hábito. Actúa sobre los dientes; órganos urinarios; tejido fibroso; de los párpados, bordes; piel; glándulas y deltoides derecho. Sensibilidad mórbida; la palabra más inocente la hiere mucho; los sentidos especiales se vuelven irritables, no puede soportar; contacto; olor; ruido; gusto, todo es sentido dolorosamente. Dolores constrictivos, punzantes, penetrantes; como de cortadura. Dolores que se van dentro de los dientes. Esfínteres; lacerados y estirados. Tejido lacerado; perineo, etc. Dolores en las puntadas, que permanecen después de una operación. Malos efectos de un disgusto e insultos; reservado; ira; lesiones, caídas; heridas de corte limpio; operaciones; sexual; abuso, exceso; dentición, tabaco, mercurio. Hinchazón dolorosa de las glándulas. Nudosidades artríticas en las articulaciones. Hinchazón y supuración de huesos; de periostio. Exóstosis. Verrugas. Condilomata. Hemiplegia después de un disgusto. Rigidez y sensación de fatiga en todas las coyunturas. Todo el cuerpo adolorido con sensación de debilidad.

AGRAVACION:

Emociones-desazón; vejación; indignación; peleas. Excesos sexuales. Onanismo. Contacto. Bebidas frías. Laceraciones. Partes estiradas. Coito. Después de orinar; cuando no orina. Noche. Luna nueva, antes de la luna llena.

MEJORIA:

Calor. Descanso. Desayuno. Coito.

MENTE:

Estallidos violentos de pasión. Siempre enojado. Pesimista y petulante; tira las cosas. El niño llora por muchas cosas y luego las rehúsa cuando se le ofrecen. Memoria pobre. Medita en asuntos sexuales. Necesidad sexual insatisfecha; en viudas. Mordaz; sensible mental y físicamente. Hipocondriasis. Imagina insultos. Irritable, nervioso, excitable y violento. Mucha indignación acerca de cosas hechas por otros o por sí mismo; se lamenta por las consecuencias. Cree que perderá su fortuna, que su esposa lo abandonará. Enfermedades por disgusto reservado. Muy sensible a lo que otros dicen de ella. Tristeza sin causa; con irritabilidad. Malos efectos después de un regaño o castigo; en niños. Carencia de auto control Temor; miedo de su sombra.

CABEZA:

Dolor de cabeza presivo, estupefaciente > bostezando mucho; recargando la cabeza contra algo. El cerebro se siente exprimido o desgarrado. Como con un peso fuerte o de una bola que rodara en la frente. Costras de leche húmedas, fétidas erosivas < occipusio. Caspa. Piojos. Caída del cabello. Vértigo > por caminar por allí en círculos, o volteando rápidamente sobre sus talones. El cerebro se siente entumecido y el occipusio se siente hueco. Caída del cabello del occipusio y alrededor de las orejas.

OJOS:

Se sienten secos, con lagrimeo. Nódulos en los párpados. Perrillas; recurrentes. Blefaritis. Dolor de estallido, ardoroso en los globos oculares, de iritis sifilítica. Hundidos; con círculos azules alderredor. Lágrimas calientes que corren de los ojos (izquierdo) al mirar el sol.

OIDOS:

Dureza de oído por amígdalas crecidas; en niños con adenoides.

NARIZ:

Coriza ahora espesa, luego delgada; con ulceraciones. Estornudos frecuentes sin coriza.

CARA:

Enfermiza, nariz puntiaguda. Neuralgia por caries; los dolores van hacia dentro de los ojos. Glándulas sub-maxilares dolorosas con o sin hinchazón; absceso. Prosopalgia, el dolor empieza en los labios y se extiende a la cara < masticando.

BOCA:

Dientes; flojos; negros; desmoronándose; muestran estrías oscuras; < por comer y durante las reglas > por la presión dura y el calor. Encías pálidas y sangrantes. Piorrea. Gusto mohoso. Dientes cariados y excesivamente sensibles; al ser empastados. Dientes cariados tan pronto como brotan. Fístula dental. Tialismo.

GARGANTA:

Deglute continuamente mientras habla. Tonsilas hinchadas; punzadas que corren hacia el oído al deglutir. Induración e hipertrofia de las tonsilas, con voz nasal.

ESTOMAGO:

Hambre; aún con estómago lleno. Deseo de pan, estimulantes, tabaco, leche. Como si el estómago colgara, relajado. Náusea, especialmente después de operaciones.

ESTOMAGO:

Sensación de debilidad en el abdomen, como si se fuese a caer, quiere sostenérselo. Dolor severo después de operaciones abdominales. Hinchado (en niños) con muchos flatos. Cólico; biliar; después de un disgusto. Flatos calientes, huelen como a huevos podridos. Evacuaciones disintéricas < después del mínimo alimento o bebida. Diarrea por beber agua fría. Hemorroides muy sensibles < por el tacto. Disentería en niños débiles, enfermizos de estómago abultado.

URINARIO:

Necesidad frecuente de orinar; con descarga escasa o profusa o acuosa; orina en chorro delgado o gota por gota. Sensación de una gota de orina que rodara continuamente por la uretra; < después de caminar o montar; > orinando. Ardor en la uretra cuando no orina. Necesidad ineficaz de orinar en mujeres recién casadas; en el embarazo. Después de la micción, necesidad, como si la vejiga no se hubiese vaciado. Cistocele.

HOMBRES:

Medita persistentemente en materia sexual. Neurastenia sexual. Priapismo. Emisiones seminales seguidas de gran postración. Disnea, < durante o después del coito. Comezón voluptuosa en el escroto. Prostatitis, el dolor se extiende desde el ano hasta la uretra. Excrecencias húmedas y suaves, detrás de la corona del penne. Próstata crecida con hemorroides. Orquitis; por paperas. Atrofia de los testículos.

MUJERES:

Deseo sexual aumentado, la mente medita demasiado sobre asuntos sexuales. Sensibilidad dolorosa de los órganos genitales < sentándose. Dolores ováricos que van hacia los muslos < presión; coito. Salpingitis. Amenorrea por indignación. Vegetaciones granulares en la vagina. Vagina con comezón o sensibilidad. Reglas; regulares, con adolorimiento alrededor de las caderas y pérdida de fuerza en las piernas. El primer coito muy doloroso, causando un sufrimiento agudo mental y corporal.

RESPIRATORIO:

Disnea con constricción, al terminar el coito o después de emisión seminal. Tos < al limpiarse los dientes; humo del tabaco, comiendo carne o que alterna con ciática.

CORAZON:

Palpitación tremulenta al escuchar música.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor en la espalda baja como después de levantar un peso grande, < coito, en la mañana y al levantarse del asiento.

EXTREMIDADES:

Puntas de los dedos finamente rasgadas o adormecidas. Huesos de los dedos desarrollados imperfectamente; osteítis de los dedos. Nódulos artríticos en las articulaciones de los dedos. Neuralgia crural. Pies que se sacuden y duelen. Rodillas débiles. Paso arrastrante. Los glúteos duelen mientras se está sentado.

PIEL:

Dolor que precede a la zona. Los síntomas de piel se alternan con dolor en las articulaciones. Comezón mordiente, como de sabandijas; que cambia de lugar al rascarse. Eczema con costras delgadas, con comezón violenta. Verrugas secas y pedunculadas. Ulceras, crecimientos nuevos extremadamente sensibles; el tocarlos puede producir convulsiones.

SUEÑO:

Bostezar y estirarse violentamente trae lágrimas a los ojos. El niño se despierta, empuja todo y quiere que todos se vayan; llama a su madre con frecuencia. Sueños amorosos con emisiones. Somnoliento todo el día, despierto toda la noche. El cuerpo duele todo.

FIEBRE:

Quiere descubrirse. Sudor; profuso, frío, con olor a huevos podridos, con deseo de descubrirse. Incapacidad para sudar.

COMPLEMENTARIO:

Caus; Colo.

RELACIONES:

Cham; Merc.

STICTA

GENERALIDADES:

Comúnmente conocida como Planta del pulmón, es un remedio para la coriza, catarro bronquial y perturbaciones reumáticas y nerviosas. Hay una sensación general de torpeza y lasitud como cuando se inicia el resfrío. Rigidez reumática. Nervioso, sensación de levitación de diferentes partes. Membranas mucosas secas y dolorosas. Dolores en diagonal. Histeria; corea; después de pérdida de sangre. Malos efectos de caídas, hemorragias.

AGRAVACION:

Noche. Acostándose. Movimiento. Cambio de temperatura.

MEJORIA:

Descargas. Al aire libre.

MENTE:

Siente como que debe de hablar, acerca de todo y de nada; sea o no escuchada. Vivaz, patea con sus talones. Siente como que flota en el aire.

CABEZA:

Duele antes de que la descarga catarral aparezca. Pesadez; frontal.

OJOS:

Ardor de los párpados con adolorimiento de los globos oculares al cerrar los párpados o voltear los ojos.

NARIZ:

Plenitud, atascamiento o presión en la raíz de la nariz. Necesidad constante de sonarse la nariz, pero no saca nada. Sequedad dolorosa de las membranas mucosas. Coriza que se seca pronto, formando costras difíciles de despegar. Fiebre de heno, estornudos constantes.

GARGANTA:

Seca; escurrimiento de moco posterior.

ESTOMAGO Y ABDOMEN:

Diarrea espumosa, en la mañana.

URINARIO:

Micción profusa, con vejiga sensible y dolorosa.

MUJERES:

Ausencia de leche después del parto.

RESPIRATORIO:

Cosquilleo en la parte alta de la faringe. Tos incesante, seca, martillante que impide dormir, < tosiendo, inspirando; hacia la noche y cuando está cansado; después de sarampión, resfríos; influenza; tosferina. Pasajes de aire entumidos. Pulsación desde el lado derecho del esternón, baja hacia el abdomen. Bronquitis. Dolor del esternón a la espina < movimiento.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido y dolorido; dolores que van al hombro. Manos y pies inquietos. Las piernas parecen flotar en el aire. Reumatismo. Manchas rojas en las articulaciones afectadas. Bursitis, esp. alrededor de la rodilla. Miembros húmedos y fríos. Sudor profuso de las manos. Corea como espasmos.

SUEÑO:

Insomnio por nerviosismo; por tos; después de operaciones quirúrgicas.

RELACIONES:

Elap; Guai; Sang; Thu.

STRAMONIUM

GENERALIDADES:

La Manzana Espinosa o Datura extiende su fuerza de acción sobre el Cerebro, produciendo un desorden marcado y persistente de las facultades mentales; alucinaciones; fijación de caprichos, terror, delirio, etc. Así que es un remedio para los Terrores; pero en sus efectos ordinarios, no produce dolor real. Las secreciones están suprimidas, no pasa orina ni evacuaciones. Los nervios de la garganta, piel y espinales están afectados también. Incrementa la movilidad de los músculos de expresión y locomoción; los movimientos pueden ser llenos de gracia, rítmicos, o desordenados, de cabeza y brazos. Temblor de los miembros. Parkinsonismo. Temblores; nerviosos. Convulsiones, espasmos < por la noche; después de masturbarse. Parálisis de un lado, convulsiones del otro, o parálisis unilateral, con estremecimientos. Corea, epilepsia; por susto. Histeria, llanto, risas, con excitación sexual. Catalepsia, los miembros pueden ser movidos por otros. Espasmos clónicos y tónicos alternadamente. Neuritis traumática. Parálisis general de los insanos. Malos efectos de un shock, susto; sol; nacimiento de un niños; supresiones. Hidrofobia. Ilusiones en tamaño y distancia. Sensación como si los miembros estuvieran separados del cuerpo.

AGRAVACION:

Por los objetos brillantes; (espejo, superficie del agua). Susto. Después de dormir. Oscuridad. Días nublados. Por deglutir. Supresiones. Intemperancia. Contacto.

MEJORIA:

Luz. Compañía. Calor.

MENTE:

Se despierta aterrorizado, no conoce a nadie, grita con susto, se cuelga de los que estén cerca (niños). Temor a la oscuridad y tiene horror de los objetos brillantes. Reza, canta devotamente; suplica, ruega; habla incesantemente. Alucinaciones atemorizantes que aterrorizan al paciente; vé aparecidos, fantasmas vívidamente brillantes u ocultos, animales; que brincan a su lado o corren hacia él. Excitación salvaje; como en noches de terror. Hace toda clase de cosas raras. Delirio activo y variable; delirium tremens. Manía furiosa; con sudor frío. Insanía religiosa. La plática de otros le es intolerable. Se acusa a sí mismo. Pérdida de la razón o del habla. Piensa ideas absurdas y extrañas, piensa que él es alto, doble, que yace cruzado, una mitad del cuerpo está cortada, etc. Desea compañía; tímido, se esconde o trata de escapar. Habla en idioma extranjero. Se ríe por la noche, llora durante el día. Orgullosa, altanero, exaltación alegre. Conversación lasciva. Siente que sus miembros están separados del cuerpo. Miedo y ansiedad al oír el agua correr. Aversión a todos los líquidos. Maníaco, maldice, se desgarrar la ropa con los dientes. Lenguaje violento. Expone su persona. Estúpido; imbécil. Se sienta en silencio con los ojos en el suelo y se pellizca la ropa. Quiere matar gente o matarse él. Ansiedad al ir pasando por un túnel. Estados exaltados que alternan con melancolía fija. Todo y todos parecen nuevos. La esposa cree que el esposo la descuida, el hombre cree que su esposa le es infiel.

CABEZA:

Vértigo < caminando en la oscuridad o con los ojos cerrados. Levanta la cabeza de la almohada y la deja caer de nuevo; durante la inconsciencia; delirio; fiebre puerperal, etc. Cefalalgia con tendencia a hablar incoherencias. Cabeza doblada hacia atrás; en el vértigo, se sostiene la cabeza con las manos mientras la dobla o levanta; después de una insolación. Meningitis; por descarga de oído suprimida. Dolor de cabeza por el sol.

OJOS:

Fijos, brillantes, mirada fija, muy abiertos. Bizqueo. Medio abiertos en sueños. Diplopía. Lagrimeo; con dolor de cabeza, fiebre, otalgia. Ceguera nocturna. Visión verde. Alucinaciones en las cuales todo parece un revoltijo. Todos los objetos parecen negros; torcidos, pequeños, grandes. Bizqueo; en afecciones cerebrales, durante las convulsiones, < terror, susto. Vista obscurecida. Pupilas dilatadas.

OIDOS:

Sensación como de aire que saliese de los oídos. Sordera. Alucinaciones auditivas.

NARIZ:

Alas nasales blancas.

CARA:

Roja, abotagada, caliente. Expresión que cambia rápidamente; ahora ruborizada, luego pálida; sonrisa sardónica; luego expresión de terror. Frente arrugada; entrecejo fruncido; en enfermedad cerebral. Piensa que tiene la cara alargada. Labios; secos; pegados juntos. Movimiento de masticación. Trismo.

BOCA:

Puntos finos rojos en la lengua. Lengua; seca, parchada, hinchada; cuelga fuera de la boca. Gusto amargo; en el alimento. Tartamudeo. Afasia. Constantemente escupe saliva. Goteo de saliva viscosa. Rechina los dientes.

GARGANTA:

Seca con mucha sed; pero aún así teme el agua, lo atraganta. Movimientos hacia arriba y abajo de la laringe, como en la deglución. Como si agua en ebullición subiera por la garganta. Deglución; difícil; apresurada.

ESTOMAGO:

La comida sabe como paja. Vómito de substancia verdosa. Gran deseo de ácidos; jugo de limón >. Hipo obstinado.

ABDOMEN:

Diarrea pútrida, obscura, involuntaria, con bizqueo y cara pálida. Cólera infantil. Evacuaciones suprimidas.

URINARIO:

Supresión de orina; esp. durante la tifoidea, vejiga vacía. Pérdida de fuerza de la vejiga en los ancianos; el chorro fluye lentamente, no lo puede apresurar. Rigor durante la micción.

HOMBRES:

Pasión sexual exaltada; con lenguaje y acción indecentes. Las manos constantemente sobre los genitales.

MUJERES:

Ninfomanía; plática lasciva; canta canciones obscenas. Reglas excesivas, precedidas de excitación sexual. Locuacidad y cantos durante las reglas. Las reglas tienen un fuerte olor a semen. Puerperio; convulsiones, manía; con síntomas mentales y sudor profuso. Manos constantemente sobre los genitales. Llora y gime después de las reglas. Flujo menstrual excesivo.

RESPIRATORIO:

Inspiración lenta, expiración rápida. Tos espasmódica; de los bebedores; muy fuerte. Voz ronca y graznante; de pronto cae en tonos más altos. Espasmos, crispaduras de la laringe. Asma nerviosa. Tos < mirando la luz, fuego u objetos brillantes. Tos con sacudida de los miembros inferiores, al estar sentado.

CORAZON:

Débil; pulso irregular. Afecciones cardíacas, con constricción del pecho y síntomas mentales.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello rígido, no puede doblarlo hacia atrás. Dolor punzante en la espalda. Espina sensible; la presión más ligera causa gritos y furia. Opistótonos.

EXTREMIDADES:

Movimientos graciosos y rítmicos. Aplauda con las manos sobre la cabeza. Abre y cierra las manos. Se retuerce las manos. Paso incierto. Pierde el paso al bajar las escaleras. Violento dolor en la cadera. Temblor de piernas. El interior del muslo está rojo e hinchado. Absceso de la articulación de la cadera izquierda con dolor violento. Hemiplejía, con convulsiones en las partes no paralizadas. Los talones están entumidos, en ocasiones dolorosos.

PIEL:

Hormigueo como por muchos insectos. Exantemata que no aparece. Sonrojo rojo y brillante. Abscesos crónicos, fístulas. Parches de rojo encendido en la piel. Abscesos y tumores con dolor severo. Arde y escuece.

SUEÑO:

Comatoso. Llanto en sueños. Despierta asustado o gritando. Yace sobre su espalda con los muslos y rodillas flexionados. Insomne en la obscuridad. Sueños pavorosos. Ríe, grita, se sobresalta durante el sueño.

FIEBRE:

Sudor profuso que no alivia. Fiebre violenta. Sudor frío; durante los espasmos.

RELACIONES:

Bell; Hyo; Op.

STRONTIUM CARBONICUM

GENERALIDADES:

Afecta la circulación, causando una sensación de tensión congestiva. Se afectan; el corazón, riñones, la médula, tobillos, y el lado derecho. Los dolores son cambiantes; difícilmente puede decir en donde están, parecen sentirse en la médula de los huesos; aumentan y disminuyen gradualmente o hacen que el paciente se desvanezca y se sienta todo enfermo. Ardor, retortijón. Sobresaltos violentos e involuntarios del cuerpo. Inmovilidad; de un lado. Sensación de debilidad parálitica. Emaciación. Postración por shock, después de una operación quirúrgica. Entumecimiento. Adolorimiento. Hormigueo, en los miembros. Edema; esp. alderredor de los tobillos como un concomitante. Alta presión arterial; arterioesclerosis. Afecciones de los huesos, esp. del fémur. Secuela crónica de las hemorragias. Dolores reumáticos. Torceduras crónicas. Estenosis; del esófago. Neuritis, < frío. Frialdad en puntos; en las pantorrillas. Dolor y comezón alternados.

AGRAVACION:

Frío; descubriéndose. Caminando. Torceduras. Sangrados. Noche. Cambio de clima. Agachándose. Contacto. Frotándose.

MEJORIA:

Calor y luz. Sol. Abrigo. Baño caliente.

MENTE:

Olvido excesivo. Aprensión hasta por mala conciencia. Depresión de espíritu. Irritable; de pronto se enoja, golpea todo lo que se atraviesa en su camino.

CABEZA:

Duele dentro de la mandíbula inferior, con vértigo y náusea. Dolor violento en la nuca que se extiende hacia arriba > abrigándose. Presión distendida en toda la cabeza. Adolorimiento de las cejas.

OJOS:

Ardorosos y rojos. Fotofobia, permanece después de una operación, esp. cuando los objetos parecen cubiertos con sangre. Manchas verdes ante los ojos en la obscuridad. Dolor y lagrimeo al usar los ojos, con danza y alternancia de color de los objetos que se están viendo.

NARIZ:

Comezón, enrojecimiento y ardor en la nariz. Costras sangrantes.

CARA:

Roja con calor ardiente o muy pálida; cada vez que el paciente camina.

BOCA:

La siente entumida y seca en a.m.; al despertar. Los dientes como si estuviesen atornillados unos con otros.

ESTOMAGO:

Presión en el estómago durante la digestión. El hipo causa dolor en el pecho. El alimento sabe insípido. Deseo de pan y cerveza. Aversión a la carne.

ABDOMEN:

Cólico en la región umbilical. Evacuaciones duras, nudosas, se evacúan lentamente y con mucho esfuerzo; luego el ano arde por largo tiempo. Diarrea < por la noche; con necesidad constante; exhaustiva, de agua amarilla; con retortijón, > hacia la mañana. Diarrea periódica.

URINARIO:

Orina pálida con fuerte olor a amoníaco.

RESPIRATORIO:

Presión como por una carga en el pecho. Dolor en el seno izquierdo con opresión < después de sarampión.

CORAZON:

El corazón se siente sofocado. Corazón obstruido.

EXTREMIDADES:

Manos entumecidas. Calambres en las pantorrillas y plantas. Tobillos torcidos o hinchados; como una concomitante. Espasmos crónicos esp. de las coyunturas de los tobillos. Ciática con edema del tobillo. Inmovilidad de los miembros, de un lado solamente, como parálisis. Retortijón como en la médula de los huesos. Diarrea durante el reumatismo.

PIEL:

Erupciones húmedos, ardorosas y pruriginosas > al aire libre, esp. en la luz de sol tibia.

FIEBRE:

Bochornos de calor; en la cara; pero aversión a descubrirse. Sudoración profusa por la noche; climatérica.

RELACIONES:

Calc; Rhus-t.

STROPHANTUS HISPIDUS

GENERALIDADES:

Se usa como un veneno para flechas, aumenta el poder contráctil de todos los músculos estriados esp. del Corazón; aumentando la sístole y disminuyendo la rapidez. Puede ser usado ventajosamente para tonificar el corazón y eliminar las efusiones hidrópicas. No tiene acción acumulativa; es seguro para personas de edad, corpulentas y con arterias rígidas. Perturbaciones funcionales del corazón por alcohol, tabaco; té. Regurgitación mitral. Arterio-esclerosis. Sacudidas de los músculos. Dolores punzantes. Sensación undulantes en todo el cuerpo. Latidos. Alternancias rápidas de síntomas con pulso lento. Desvanecimiento. Anemia con palpitación y ausencia de respiración. Bocio, exoftálmico. Secreciones aumentadas. Elimina el gusto por el alcohol.

AGRAVACION:

Ejercicio. Tabaco. Té. Alcohol.

MENTE:

Temor a las pruebas. Se siente elevado, durante el sueño. Niños; precozmente locuaces.

CABEZA:

Vértigo; con visión giratoria; senil. Ondulaciones en la cabeza.

OJOS:

Visión vislumbrante. Pupilas que se dilatan y contraen rápidamente cada pocos minutos. Brillantes.

CARA:

Sonrojada; manchas rojas. Labios escarlata.

GARGANTA:

Parece constreñida. Degluciones ardorosas, obligadas y en vacío.

ESTOMAGO:

Deseo de café. Pérdida de apetito. Náusea con disgusto por el alcohol. Aversión a la comida, seguida de atagantamiento y vómito después de comer.

ABDOMEN:

Retumbo y pellizco en el ombligo. Diarrea con ardor y tenesmo en ano.

URINARIO:

Secreción de orina aumentada; o escasa, albuminosa.

CORAZON:

Débil, adolorido o con angustia. Sensación de acción vivaz. Palpitación nerviosa y respiración entrecortada crónicas. Punzadas y sacudidas en el ápex del corazón. Pulso; rápido, alternando con lento; débil, pequeño e irregular. Disnea cardíaca.

EXTREMIDADES:

Pesadez y dolor en el antebrazo y dedos. Comezón y punzadas en ambos pies.

PIEL:

Urticaria, crónica, retrocedente.

RELACIONES:

Apo; Glo; Ign; Spi.

STRYCHNINUM

GENERALIDADES:

La rigidez espasmódica es la nota clave de este alcaloide obtenido de las semillas de la Nux Vomica. Los síntomas característicos son; convulsiones tetánicas con opistótonos; tétanos; sacudidas violentas; estremecimientos y temblor. Incapacidad para hacer respiraciones profundas; fijación de las paredes del pecho. Atetosis. La espina está fría. Sudor extremoso de cabeza y pecho.

AGRAVACION:

Contacto. Ruido. Movimiento.

MEJORIA:

Acostándose sobre la espalda.

SUCCINUM

GENERALIDADES:

Una resina fósil conocida como Ambar; produce síntomas nerviosos e histéricos. Temor al tren y lugares cerrados.

SULPHONAL

GENERALIDADES:

Un producto del alquitrán de carbón que produce síntomas atáxicos; paso trastabillante; anestesia de las piernas con ausencia de espasmo muscular en las rodillas.

SULPHUR

GENERALIDADES:

El azúfre es un producto de erupciones volcánicas, se encuentra libre en la naturaleza y fué usado en tiempos remotos para remover afecciones de la piel; por lo que es un gran remedio anti-psórico. Causa una distribución irregular de la Circulación; provocando Ardor local; pulsaciones; o Congestión; bochornos de calor; aflujos de sangre a la cabeza, pecho, corazón. Enrojecimiento de los orificios o de partes aisladas, es otro rasgo prominente debido a circulación irregular; Labios, oídos, nariz, párpados, ano, vulva. La Nutrición está afectada debido a una asimilación defectuosa, a pesar de un apetito voraz, el paciente se emacia (especialmente niños). Los niños parecen secos, como pequeños ancianos; cabeza grande, estómago grande, con miembros emaciados. Con frecuencia es de mucho uso al iniciar el tratamiento de enfermedades crónicas, y al finalizar el de las agudas; o cuando la reacción es deficiente; cuando el remedio cuidadosamente elegido falla al actuar. Las descargas mucosas y exhalaciones son acres, rayadas de sangre, ofensivas, y causan comezón. Efusiones serosas o depósitos que se absorben con lentitud. Tiene una afinidad electiva por la Piel en la cual produce calor y ardor con comezón. Los pacientes están imposibilitados para caminar erectos. Hombros encorvados, sucios, altos y delgados;

desaliñados; y con mal olor del cuerpo a pesar de bañarse. Aversión a ser lavados; siempre < después del baño. Personas sucias, puercas, predispuestas a las afecciones de la piel. Indisposiciones que se repiten. Hinchazones glandulares, induradas que supuran. Ataques de debilidad y desmayo, frecuentes, durante el día, después de amamantar; o por velas nocturnas; con mucha somnolencia. Sensación de hundimiento, vacío. Sensación de llenura, aspereza; o entumecimiento. Epilepsia con sensación de un ratón que corriera por los brazos hacia la espalda, antes del acceso. El niño brinca, se sobresalta y grita con temor. Efectos ascendentes, aflujos de sangre, bochornos de calor, vértigo, etc. Filósofo harapiento; personas de aspecto sucio que siempre están especulando sobre materias religiosas o filosóficas. Todo les afecta el epigastrio. Ardor en Vértex y plantas. Reumatismo. Escrófula. Psora. Alcoholismo crónico; hidropesía y otros malestares de los borrachos. Malos efectos de caídas, golpes, torceduras, sol. Siempre desea mantener sus intestinos limpios. La presión ligera les causa dolor, inflamación y supuración. Induración de tejidos por presión constante, callos, llagas, etc. Juanetes. Nunca bien después de problemas de pecho. Como si la cama estuviese demasiado pequeña para contenerlo. Como si nadara o estuviese en un piso ondulante. Afecciones de los mineros de carbón. Corea; crónica; después de erupciones suprimidas.

AGRAVACION:

Supresiones. Baño. Leche. Acalorado; por exceso de ejercicio; en la cama; por objetos de lana, etc. Cambios atmosféricos. Hablando. Periódicamente; 11 a.m. Climaterio. Luna llena. Por estar de pie, agachándose. Tratando de alcanzar algo alto. Dulces. Mirando hacia abajo. Por cruzar agua corriente. Vacunación. Hemorroides suprimidas.

MEJORIA:

Al aire libre. Movimiento. Por encoger los miembros afectados. Sudando. Clima caliente y seco. Acostándose sobre el lado derecho. Caminando. Calor seco.

MENTE:

Torpe, pensamiento difícil; equivoca o no puede encontrar las palabras apropiadas; al hablar o escribir. Flojo, hambriento y siempre cansado. Displiscencia infantil en gente adulta. Soñadores esperanzados. Andrajoso. Rezador. Fácilmente excitado. Felicidad y orgullo tontos; piensa que es poseedor de cosas preciosas, todo le parece hermoso, el paciente lo considera lujoso; aún los harapos le parecen bellos o inmensamente valiosos. Muy orgulloso; no tiene consideración por los demás. Demasiado flojo para levantarse por sí mismo y demasiado infeliz para vivir. Fuerte tendencia a ensueños religiosos y filosóficos con ideas fijas. Disgusto, aún náuseas por cualquier efluvio que mana de su propio cuerpo. Obstinado. Le molesta tener a alguien cerca de él. Cansado de la vida. Fuerte tendencia impulsiva al suicidio por ahogo o saltando de una ventana (en los ataques epilépticos < durante las reglas). Aversión a hacer trabajo físico o mental; haraganea. Piensa que le está dando cosas equivocadas a las personas, causándoles la muerte. Criticón. Aversión a los negocios. Melancolía. Tristeza. Mente ausente. Sensación de desgracia; después del parto. Desea tocar algo; con incapacidad para hacerlo. Manía filosófica, quiere saber quién hizo esto o eso y cómo; quiere razonar sin ninguna esperanza de descubrir una respuesta posible. Se imagina a sí mismo como un gran hombre, aunque sea un ignorante desprecia a los literatos y educadores. Lloro sin causa, o a la menor provocación < consuelo.

CABEZA:

Vértigo; en la frente; < al cruzar un río; agachándose; con dolor de cabeza. Vértex; caliente, late, pesado, adolorido. Dolor, frío, presión, etc. ascienden desde la nuca al vértex. Jaqueca con náusea

recurrente, periódicamente; cada Domingo; precedida por fotopsia. Como con una banda alderredor o dolor profundo en el cerebro. Cabeza caliente con pies fríos. Cabello; seco, frío, duro; cayéndose, < por lavarlo. Cuero cabelludo sudoroso. Las fontanelas permanecen abiertas por largo tiempo. Hidrocefalia; con convulsiones, cara roja y pupilas dilatadas. La cabeza se dobla hacia atrás al caminar.

OJOS:

Ardorosos. Escozor como por arena. Dolor de estallido en los globos. Temblor de ojos; temblor de los párpados. Los objetos se ven más distantes de lo que están. Halo alderredor de la luz. Obscurecimiento de la visión como por un velo negro ante los ojos. Retinitis causada por un uso extremo de los ojos. Inflamación dolorosa del ojo por la presencia de un cuerpo extraño. Fotofobia. Keratitis; córnea como un posos de vidrio. Aglutinación de los párpados. Lágrimas aceitosas. Perrillas y tumores tarsales. Eczema de los párpados. Tracoma. Opacidades del vítreo.

OIDOS:

Sordera precedida de una hipersensibilidad de oído, < después de comer o sonarse la nariz. Chapaleo como de agua. Otorrea ofensiva, purulenta; descarga catarral cada octavo día. Orejas muy rojas; en niños. Como si los sonidos no viniesen a través del oído, sino de la frente.

NARIZ:

Obstruída en lados alternos. Coriza fluída y ardiente < fuera de la habitación; se tapa en el interior. Punta de la nariz o alas nasales rojas; hinchadas < frío. Olor delante de la nariz como de un catarro viejo. Epistaxis < por la noche, acostándose sobre el lado derecho. Sensibilidad de olfato. Olores imaginarios. Pecas y poros negros en la nariz. Estornudos frecuentes.

CARA:

Pálida, enfermisa. Aspecto viejo. Enrojecimiento circunscrito de las mejillas. Pecosa, manchada. Labios; rojo brillante; hinchados (el superior), secos, ásperos, agrietados, ardorosos; temblores o estremecimientos. Venas de la frente hinchadas. Acné. Paperas.

BOCA:

Dientes; sensibles, doloridos. Estremecimientos, punzadas, latidos, dolores en los dientes. Rechinido de dientes. Encías; hinchadas, sangrantes. Lengua; seca, tremulosa; con punta y bordes rojos. Gusto; ácido, dulzón, fétido, amargo, en la mañana. Saliva; profusa, con gusto nauseoso. Boca inflamada del lactante. El alimento sabe o como paja, o muy salado. Aftas; tialismo.

GARGANTA:

Sensación; como de un tapón, pelo o astilla, o como de vapor elevándose por ella. La manzana parece subir y tapar la faringe. Enrojecimiento externo. Como si estuviese hinchada. Seca, provocando tos.

ESTOMAGO:

Bebe mucho, come poco. Eructos con sabor a huevos podridos < comiendo o por la noche. Pérdida completa del apetito o apetito voraz. Se siente hambriento, pero cuando se acerca a la mesa, aborrece la comida, y se aleja de ella. Come cualquier cosa y de todo. Aversión a la carne. Deseo de dulces, o alimentos crudos. La comida sabe muy salada. La leche causa un gusto ácido y eructos ácidos. Hambre

repentina y debilidad a las 11 a.m.; sensación de debilidad y vacío en el epigastrio. Eructos por presionar sobre el estómago. Dolor de cabeza, o sensación de cansancio si no come con frecuencia. vómito de alimento no digerido o vómito ácido. Náusea durante el embarazo. Disgusto por los dulces. Pesadez en el estómago.

ABDOMEN:

Adolorido muy sensible a la presión. Punzadas en la región del bazo < por toser o haciendo inspiraciones profundas. Punzadas en la región del hígado. Cólico biliar; y crónico o recaída en ictericia. Los intestinos se sienten como amarrados en nudos < doblándose hacia adelante. Abdómen pesado, como por una hinchazón. Como algo vivo que se moviera; como por los puños de un niño. Cólico después de comer o beber, obligándolo a doblarse en dos < cosas dulces. Pesades contra el recto. Dolor, necesidad y comezón en el recto. Hemorroides habituales; durante el embarazo. Hemorroides externas e internas, en racimos que son dolorosas, sensibles, como en carne viva, arden, sangran y punzan. Retiene las evacuaciones por dolor. Diarrea; apresurada; temprano por la mañana; cambiante; mohosa; fétida; indolora; acuosa; grisácea, espumosa < leche. Diarrea que alterna con constipación. Constipación habitual. El olor de la defecación lo persigue como si se hubiese ensuciado. Enrojecimiento alderredor del ano, con comezón. Diarrea; de infantes con cara pálida, sudor profuso, amodorramiento, ojos medio abiertos, supresión de orina, espasmo de los miembros y el niño despierta gritando. Bebés coliquientos. Evacuaciones involuntarias al estornudar o reír, con emisión de flatos. (Niños) de estómago prominente y extremidades emaciadas. Eczema alderredor del ombligo. Heces planas y delgadas.

URINARIO:

Comezón y ardor en la uretra, durante la micción, permanece por largo tiempo. Llamado súbito a orinar, debe darse prisa. Micción frecuente esp. por la noche. Enuresis esp. en niños escrofulosos y desaseados. Moco y pus en la orina. Grandes cantidades de orina incolora; partículas grasosas flotando. Micción involuntaria mientras pasa flatos; o al toser. Esfuerzos ineficaces y dolorosos para orinar; retención; cada resfrío se establece en la vejiga. Chorro delgado, intermitente.

HOMBRES:

Los testículos cuelgan bajo. Emisiones seminales, con ardor en la uretra. Pene frío. Poder sexual débil; impotencia. Induración de los testículos. Sudor fétido en los genitales. Agotamiento en la mañana después de emisiones seminales. Dolor de espalda y debilidad de los miembros después del coito con tristeza e irritabilidad. Descarga de fluido prostático después de orinar y evacuar. Emisiones seminales al tocar a una mujer. Semen; sin olor, acuoso. Hidrocele. Prepucio rígido, duro como cuero, con esmegma copioso y fétido; causa comezón.

MUJERES:

Vulva y vagina ardorosas, con comezón y sensibilidad < al sentarse; escasamente se puede mantener quieta. Sensación de adolorimiento en la vagina durante el coito. Pesadez en pelvis hacia los genitales < por estar de pié. Reglas; irregulares, muy tardías, cortas, escasas, espesas, fétidas, negras, acres, haciendo que las partes se inflamen. Leucorrea; de moco amarillo, ardoroso y excoriante. Comezón molesta en la vulva con ampollitas alderredor. Ardor agudo en las mamas. Dolor cortante en el útero durante las reglas. Sensación de debilidad en los genitales. Pezones; agrietados, alderredor de la base, con punzadas, ardor, sangrado; después de amamantar, el dolor se extiende a la espalda. Sepsis puerperal, con fiebre alta, sudor profuso de todo el cuerpo, sensibilidad del abdómen y

amodorramiento. Genitales ofensivos, con sudor ofensivo en los muslos. Supresión de reglas por la menor excitación física o mental. Amenorrea. Prolapso del útero por estirarse a alcanzar algo fuera del alcance de la mano. Cáncer del seno, o útero. El seno y el útero se desarrollan imperfectamente.

RESPIRATORIO:

Respiración difícil; quiere que abran las ventanas; necesidad de aire nocturna, con sofoco. Respiración irregular. Voz ronca y profunda. Tos; violenta, en dos o tres accesos incompletos; cosquilleo como de “abajo” de la laringe. Mucho estertor de moco y calor en el pecho < 11 a.m. Dolor hacia atrás del pezón izquierdo. Como por una banda o carga en el pecho. Manchas rojas, cafés en el pecho. Exudación pleurítica. Neumonía. Expectoración verdosa, dulzaina, purulenta. Sensación de ardor o frialdad en el pecho; se extiende a la cara. Asma precedida de frío cada vez. Sensación de debilidad en el pecho mientras habla. Tos violenta con dolor de cabeza < acostándose sobre la espalda. Como piquete a través del tercio superior izquierdo del pulmón. Dolores punzantes en el pecho que se extienden a la espalda < tosiendo, acostándose sobre la espalda y por hacer respiraciones profundas. Neumonía descuidada.

CORAZON:

Se siente demasiado grande. Palpitación < acostándose; por la noche; en la cama, por ascender. Pulso más rápido por la mañana que por la noche. Pericarditis con efusión. Dolores agudos que van a través del pecho a entre los hombros.

CUELLO Y ESPALDA:

Los músculos del cuello están débiles; el niño no puede sostener su cabeza. Forúnculos en el cuello. Cuello rígido. Sensación de que una vértebra se deslizara sobre la otra, o crujido al doblar hacia atrás. Adolorimiento entre las escápulas. Dolores lumbares; hacia el estómago; camina doblado; por el dolor en la espalda, solo se puede enderezar después de moverse. Sostiene el peso sobre las manos cuando se sienta. Dolor en el cóccix durante las evacuaciones. Adolorimiento en la espalda baja < al orinar. Curvatura de la espina.

EXTREMIDADES:

Hombros pesados. Sudor en el hueco de la axila con olor a ajo. Brazo izquierdo entumido < acostándose. Dedos entumecidos. Palmas secas, ardorosas, agrietadas, peladas, eczema; verrugas. Tendones tensos (izquierda). Calambres en las pantorrillas (izquierda). Plantas; arden; quiere destapárselas; por la noche; frías en la cama; secas. Manos sudorosas y calientes. Sensación de pesadez parética en los miembros. Una pierna se sacude cuando cae dormido. Corva fija al agacharse. Hinchazón de las articulaciones con hidrartrosis. Articulaciones rígidas. Sensación tremulante en las manos, al escribir. Tuberculosis de las articulaciones de rodilla y cadera. Ulceras alderredor de las uñas. Panadizos; con hinchazón rápida del dedo, enrojecimiento, rigidez y ardor excesivo con punzadas. Contracción involuntaria de las manos como si fuese a agarrar algo. Paso inseguro.

PIEL:

Erupciones casi de cualquier tipo. Piel; seca, áspera; arrugada, escamosa. Comezón; voluptuosa; violenta, < por la noche; en la cama; rascándose y lavando. Insana; se abre; se ulcera y no cicatriza. Arde cuando se rasca; dolorosamente sensible al aire, viento, lavado, etc. Las erupciones se alternan con otras indisposiciones, asma, etc. Grupos de ampollas. Dan comezón. Forúnculos. Eczema. Ulceras. Erisipelas hormigueantes. Excoriaciones en los pliegues. Supuración con burbujas de aire. Venas varicosas; se ulceran, rompen y sangran.

SUEÑO:

Pesado, no reparador. Amodorramiento; luego migraña. Duerme en siestas de gato. Amodorado durante el día, desvelado por la noche. Habla, se mueve y brinca durante el sueño. Se despierta con sobresalto y gritos. Canta estando dormido o se despierta cantando. Sueños vívidos, la impresión permanece en la memoria.

FIEBRE:

Escalofrío que se esparce por la espalda. Bochornos de calor. Se siente demasiado caliente. Calor con batimientos generalizados; entre las escápulas. Sudor en partes aisladas; en axilas; manos, y pies. Sudor profuso por la noche con olor a azufre. Sudor sin alivio. Fiebre remitente. Fiebre; séptica, puerperal.

COMPLEMENTARIO:

Aco; Alo; Bell; Cal; Merc; Nux-v; Pul; Pyro; Rhus-t; Sep; Sul-io.

RELACIONES:

Graph; Psor; Sele; Syph.

SULPHURICUM ACIDUM

GENERALIDADES:

El debilitamiento o debilidad común a todos los ácidos se siente más por la acción de este ácido, esp. en el Tracto digestivo, dando una sensación de mucho relajamiento en el estómago, con deseo de estimulantes. El debilitamiento está fuera de proporción a la enfermedad; por una discrasia de asiento muy profundo. Afecta la sangre, las venas, causando hemorragias; violentas, de sangre delgada y negra por todos los orificios. Las venas (de los pies) están distendidas. Púrpura hemorrágica. Quita manchas negras y azules que han estado por mucho tiempo, con adolorimiento y rigidez de la parte, después de un trauma; sigue a Arnica. Temblor interno; quiere ser sostenido. Acidez; del cuerpo; del estómago. Adecuado para borrachines; ancianos, esp. mujeres; en los años climatéricos; niños débiles que no tienen otro malestar. Descargas profusas y acres o filamentosas. La parte se siente rígida y apretada. Los dolores aumentan gradualmente pero cesan de pronto. Como por un tapón romo que fuese introducido. Gran adolorimiento. Los dolores se sienten durante el sueño, desaparecen al despertar. Dolores de retortijón. Envenenamiento por plomo. Gangrena que sigue a lesiones mecánicas. Dolores ardientes, punzantes. Shocks como por dolor. Las úlceras se ponen rojas y azules y se vuelven dolorosas. Calambre de los escritores.

AGRAVACION:

Al aire libre. Frío. Alcohol. Lesiones; operaciones quirúrgicas. Concusión del cerebro. Olor del café. Climaterio. Hacia la noche. Calor o frío excesivos. Contacto. Presión. Torceduras. Levantando los brazos. Bebiendo agua fría.

MEJORIA:

Bebidas calientes. Las manos cerca de la cabeza. Temperaturas moderadas. Calor.

MENTE:

Debe hacerlo todo apresuradamente. Hundido, impaciente, enojado porque las cosas se mueven lentamente. Enojadizo e irritable; por la causa más ligera, fatiga nerviosa y tendencia a asustarse. Vacilante y lento. Sin voluntad para contestar preguntas; dice sí o no, con dificultad. Llanto constante o lamentos. Nadie hace nada que le plazca. Seriedad que alterna con bufonería.

CABEZA:

El cerebro se siente suelto; en la frente, cayendo a uno y otro lado < caminando al aire libre, > sentándose quietamente en una habitación. Dolor presivo en el occipucio > sosteniendo la mano cerca de la cabeza. Pellizcos en las sienas, como si se estuviese introduciendo un tapón. Choques como eléctricos; en la frente y sienas. Cabello; se cae y se pone gris.

OJOS:

Hemorragia intra-ocular, después de un trauma. Dificultad para abrir los párpados. Como si se tuviese un tapón en el canto del párpado; se mueve al extremo interior al cerrar los ojos y se regresa al abrirlos. Ojos; punzan, arden, y hay lagrimeo, mientras se lee.

OIDOS:

Sensación como de una hoja que permaneciera en el oído.

NARIZ:

Rezumamiento de sangre oscura, delgada < por el olor del café; en ancianos.

CARA:

Mortalmente pálida o arrugada. Siente como si la clara de un huevo se hubiese secado sobre la cara.

BOCA:

Aftas; durante una enfermedad prolongada, esp. en niños con marasmo. Las encías sangran fácilmente. Aliento ofensivo. Piorrea. Destrucción de los dientes en diabetes mellitus. Saliva sanguinolenta de la boca. Ulceras que se extienden con rapidez.

GARGANTA:

Inflamada. Moco filamentosos amarillo limón que cuelga de las coanas posteriores; en la difteria. Apariencia blanca como lavada. Los líquidos son regurgitados al deglutir.

ESTOMAGO:

Agruras. Eructos ácidos; destiemplan los dientes. Deseo de brandy y frutas. Hipo; de los borrachos; náusea; con estremecimientos. Vómito ácido; de los borrachos; < acostándose sobre el lado izquierdo. Sensación de debilidad y relajamiento en el estómago < después de evacuar. Las bebidas enfrían el

estómago y son rechazadas, a menos que se mezclen con licor. Vomita moco en lugar de alimento. Tos; antes del vómito, durante el embarazo. Sudor después de comer; esp. alimento caliente. Aversión al olor del café.

ABDOMEN:

Cólico, con sensación como de una hernia que se saliera. Bazo; crecido, duro, doloroso; al toser. Diarrea; muy fpetida, verde, negra o de evacuaciones picadas; anaranjadas, amarillas; por fruta no madura y ostras; por la mínima indigestión. Hemorroides que rezuman humedad. El recto se siente como si tuviera una pelota grande; tumores hemorroidales que impiden la evacuación. Sensación de hundimiento en el abdómen después de evacuar.

URINARIO:

Dolor en la vejiga si la necesidad de orinar no es atendida. Hematuria.

MUJERES:

Pesadillas angustiantes antes de las reglas, o después de ellas. Erosión del cérvix; en mujeres de edad; con sangramiento fácil. Bochornos de calor, seguidos de sudor y sensación de temblores en todo el cuerpo; durante el climaterio. Reglas; demasiado adelantadas y demasiado profusas. Leucorrea acre, ardorosa. Gangrena de la vagina después de prolapso. Prolapso de vagina y útero por debilidad.

RESPIRATORIO:

Tos, luego eructos o vómito. Expectoraciones sangrantes; durante la crisis. La laringe se mueve hacia arriba y hacia abajo violentamente y con movimiento rápido de las alas nasales durante la disnea > dejando colgar las piernas.

ESPALDA:

Debilidad de la espina, no se puede sentar ni mantenerse de pié. Absceso grande en el lado derecho del cuello.

EXTREMIDADES:

Los dedos saltan mientras escribe. Calambre de los escritores. Rodillas dolorosamente débiles. Tobillos débiles, no puede caminar. Sacudida de los dedos durante el sueño. Sacudida de los tendones.

PIEL:

Las cicatrices se vuelven rojas y azules y se ponen dolorosas. Equimosis. Carbunclos, ampollas, gangrena. Comezón en todo el cuerpo. Urticaria nodular. Ulceras por decúbito; abscesos.

FIEBRE:

Bochornos calientes; luego temblor; o sudor frío < después de ingerir algo caliente; < partes superiores; > movimiento. Sudores que empapan. Debilidad desproporcionada durante las fiebres, como (la tifoidea).

COMPLEMENTARIO:

Pul.

RELACIONES:

Ars; Lach; Sep.

SULPHUR IODATUM

GENERALIDADES:

Afecciones obstinadas de la piel; crecimientos indoloros de las glándulas e infiltración de los tejidos con engrosamiento e induración después de una inflamación, son los rasgos más marcados en este medicamento. Debilidad; como por la influenza. Postración y sensibilidad por todo. Desfallecimiento y náusea. Ardor interno y excoriante con frialdad externa. Descargas acres. Las partes aisladas, dedos, etc. se ponen blancos e insensibles. Supuración. Favorece la reabsorción.

AGRAVACION:

Ejercicio; aún el más ligero. Calor. Acostándose sobre el lado derecho. Antes de las tormentas. Noche. Agachándose.

MEJORIA:

Aire fresco. De pié. Expectoración. Invierno.

MENTE:

Temor al ejercicio. Dubitativo. Apresurado, impaciente, triste.

CABEZA:

Adolorimiento que > al bajar el sol. El cabello parece erizado. Vértigo < agachándose, atándose el cabello, por ayunar, antes y durante las reglas.

OJOS:

Zigzags delante de la visión.

CARA:

Acné supurante. Hipertrofia parotídea; después de paperas.

BOCA:

Los dientes se sienten suaves. Lengua; barnizada, engrosada después de una inflamación. Excoriada, seca, quiere humedecerla. Llagas frías en los labios.

GARGANTA:

Excoriada; seca; dolorosa al deglutir. Uvula y tonsilas crecidas y rojas.

ESTOMAGO:

Anorexia. Temblores en el epigastrio al ejercitarse. Apetito aumentado en niños con marasmo.

ABDOMEN:

Enfermedad mesentérica. Constipación obstinada. Evacuaciones amarillo brillante. Descarga anal fétida.

URINARIO:

Orina; escasa, purulenta; café con arena. La orina huele como a frambuesas. Estrictura después de gonorrea, micción dolorosa, chorro torcido. Ardor en la punta del pene, dolor sordo en la próstata.

HOMBRES:

Testículos blandos. Erecciones deficientes. Prepucio agrietado. Hidrocele de los niños pequeños.

MUJERES:

Reglas irregulares; y leucorrea copiosa, espesa, ardiente < antes y después de las reglas.

RESPIRATORIO:

Respiración asmática; irregular, estertorosa y sofocante. Tos < a.m.; espasmódica. Expectoración verdosa, purulenta, copiosa, viscosa y amarilla. Pecho constreñido, hidropesía de la pleura y erupciones en el pecho.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento e inflamación bajo las rodillas. Las plantas de los pies duelen, arden y se llagan, al estar de pié.

PIEL:

Comezón. Ulceras. Eczema húmedo. Acné, supurante. Prurito del barbero.

SIGUE BIEN:

Sul.

SUMBUL

GENERALIDADES:

La raíz del almizcle, como su nombre implica, recuerda vivamente en su olor al almizcle, por lo que, como Moschus, este es un remedio para las afecciones histéricas y nerviosas. Afecta el corazón, causando palpitaciones nerviosas. El paciente es nervioso, irritable e insomne. Tendencia a desmayarse por la causa más ligera. Corea; con sacudidas constantes de la cabeza y miembros con protrusión de la lengua. Como agua caliente que fluyera a través de la parte. Descargas tenaces amarillas. Entumecimiento; al enfriarse, del lado izquierdo. Neuralgia. Senilidad temprana. Arterias esclerosas. Bochornos, climatéricos.

AGRAVACION:

Movimiento. Climaterio. Música. Frío. Pensando en sus síntomas. Inspiración.

MEJORIA:

Movimiento suave. Calor.

MENTE:

Emocional y nervioso. Llora y ríe por turnos. Desvanecimiento por oír música. Miedo de volverse loco.

NARIZ:

Moco tenaz y amarillo de la nariz.

CARA:

Como con un cabello o tela de araña en la cara. Neuralgia. Expresión idiota.

BOCA:

La lengua se siente áspera como raspada.

GARGANTA:

Constricción sofocante; deglución constante; histérica.

ESTOMAGO:

Aflujo de agua ardiente.

ABDOMEN:

Lleno, distendido y doloroso.

MUJERES:

Excitabilidad sexual. Neuralgia ovárica. Sensación como de una cuerda que jalara el seno (derecho). Bochornos climatéricos. Dolor de torsión en la región del útero (lado izquierdo).

URINARIO:

Película oleosa en la orina.

RESPIRATORIO:

Respiración corta con cualquier esfuerzo. Asma; cardíaca; histérica. Estrechez opresiva en el lado izquierdo del pecho, como si estuviese atascado.

CORAZON:

Palpitación nerviosa; en sujetos histéricos o en el climaterio; < por el esfuerzo más mínimo y pensando en ello. Como si el corazón palpitara en agua. Neuralgia alderredor del seno izquierdo, simulando angina de pecho. Asma cardíaca. Alta presión arterial debido a arterioesclerosis.

ESPALDA:

Como escurrimiento a lo largo de la espalda.

EXTREMIDADES:

Brazo izquierdo, dolorido, pesado, entumecido y cansado.

PIEL:

Pálida; fría. Comezón interna.

SUEÑO:

Sueño de caída; de coito; seguido de emisión profusa y súbita.

COMPLEMENTARIO:

Lact-v.

RELACIONES:

Asaf: Mosc.

SYMPHORICARPUS RACEMOSA

GENERALIDADES:

Remedio altamente recomendable para el vómito persistente durante el embarazo. Aversión a todo alimento. Náusea < durante las reglas; por cualquier movimiento. Mejoría por acostarse sobre la espalda. El olor y pensamiento de la comida repugnan.

SYMPHYTUM

GENERALIDADES:

Nombre común, Soldador de huesos, o Fijador de hueso, es lo que dá la indicación de este remedio. Lesiones en Cartílagos; periosteo; con dolor excesivo. Lesiones antiguas dolorosas. Fracturas conminutas. Dolores punzantes y agujoneantes; que permanecen después de que una herida ha cicatrizado, < contacto. Muñón o raigón irritable después de operaciones. Fracturas que no sueldan. Heridas penetrantes en el perineo. Callo deficiente. Afecta las articulaciones. Artralgia; de la rodilla. Su aplicación externa deshace una hinchazón, debida a lesión u otro crecimiento. Absceso del psoas. Tumores sarcomatosos.

AGRAVACION:

Lesiones. Golpes por instrumentos despuntados. Contacto. Exceso sexual.

CABEZA:

Dolor que cambia de lugar.

OJOS:

Lesiones en los ojos; por instrumentos despuntados; golpes, trompadas, etc. ojos que se cierran espasmódicamente.

CARA:

Lesiones en la cara. Crecimientos malignos del antrum derecho.

ESTOMAGO:

Ulceras del estómago. Dolor alderredor del ombligo < sentándose.

ESPALDA:

Dolores de espalda por indulgencia sexual excesiva o por luchar; por movimiento violento. Caries de las vértebras.

PIEL:

Fría.

RELACIONES:

Arn; Calc-p.

SYPHILINUM

GENERALIDADES:

Un nosode preparado con virus sifilítico. Afecta las membranas mucosas, nervios y huesos. En casos crónicos, cuando la reacción es pobre y el remedio indicado da un alivio parcial, esp. cuando hay una tendencia hereditaria al alcoholismo o hay historia de miasma sifilítico. Gran debilidad con muy pocos síntomas; o total postración y debilidad; en la mañana; al caminar. Síntomas multifacéticos. Ulceraciones; tercas. Bebés y niños empequeñecidos, enjutos y arrugados, con aspecto de ancianos, cabeza calva, labios de puchero y estómagos abultados. Olor fétido del cuerpo. Dolores violentos o lineales. Sucesión de abscesos. Pus fétido o verde. Nudos en los músculos. Dolores u otras condiciones < y > gradualmente. Epilepsia < después de sarampión. Descargas fétidas. Dolores persistentes en cualquier parte del cuerpo. Dolor frío. Infantes llorones; que empiezan a llorar inmediatamente después de su nacimiento. Hemiplejía de lento avance. Como con agua caliente en las venas. Huesos; inflamados, cariados, curvatura de. Exóstosis. Glándulas crecidas. Enfermedad de Hodgkin. Dolores aserrantes en los huesos.

AGRAVACION:

Noche. Desde que se pone el sol hasta que sale. Humedad. Frío y calor extremos. Cada tercer luna llena. Durante las tormentas de rayos. En cualquier posición. Movimiento. Levantando los brazos lateralmente. Acucillándose. Invierno. Verano. A la orilla del mar. Sacando la lengua.

MEJORIA:

Movimiento lento o continuo. Cambiando posiciones. Altitudes grandes. Aplicando calor. durante el día.

MENTE:

Desesperanza sobre su recuperación. Antisocial. Depresión horrible. Malhumorado, irritable, displiscente. Siente que se va a volver loco o que se va a paralizar. Un sentimiento lejano -dice que él no es él mismo, y que no puede sentir como él, con apatía e indiferencia por el futuro. Impulso de lavarse las manos. Temor terrible a la noche. Pérdida de la memoria, no recuerda caras, nombres, hechos, lugares, etc. pero recuerda todo lo anterior a su enfermedad. Muy nervioso, ríe y llora sin causa. No quiere ser calmado. Delirio nocturno. Insania sifilítica. Aversión a la compañía. Triste y lamentándose.

CABEZA:

Dolores profundos de aplastamiento en la cabeza cruzan la base de las sienas. Dolores lineales en la cabeza. Golpea la cabeza contra la pared. La siente jalada hacia atrás. Reblandecimiento cerebral. El pelo se cae profusamente. Vértex como si fuese a estallar. Tubérculos en todo el cráneo.

OJOS:

Keratitis filicteular crónica y recurrente > con baños fríos; con fotofobia intensa y lagrimeo. Oftalmía; del recién nacido. Visión ténue. Diplopía vertical. Ptosis. Sensación de aire frío que soplara sobre los ojos. Bizqueo. Amaurosis; atrofia del nervio óptico. Manchas en la córnea.

OIDOS:

Sordera; sin ninguna causa conocida; nerviosa, con caquexia. Depósitos calcáreos en el tímpano. Absceso del oído medio.

NARIZ:

Ocena; ofensiva, espesa, con descarga amarillo-verde. Dolorosa al inhalar aire. Sinuses dolorosas. Masas verdes de la coanas posteriores. Sorbidos. Caries de los huesos. Septum perforado. Mancha que cruza el puente de la nariz, tan oscura que la mancha de Sepia parece una sombra. Ataques de coriza fluída. Comezón en los poros nasales.

CARA:

Pálida, arrugada; de aspecto como viejo. Sacudida de los músculos. Dolor sobre los ojos (derecho) < sacando la lengua. Parálisis de un lado, con lenguaje difícil, masticación y estremecimiento de los ojos y párpados.

BOCA:

Los dientes se sienten pegajosos; como con un gusano en ellos. Dientes ahuecados, en niños. Sensación como si los dientes estuviesen fuera de su lugar. Dientes que se pudren en el filo de las encías. Lengua; cubierta, con la huella de los dientes, grietas profundas, longitudinales a lo largo del centro, úlceras que punzan y arden. Gusto pútrido; antes de un ataque epiléptico. Flujo excesivo de saliva; escurre de la boca durante el sueño. Afasia. Parálisis de la lengua. Dolor de dientes > presionándolos, < con cosas calientes o frías.

GARGANTA:

Inflamada, de derecha a izquierda < bebidas frías. Hipertrofia crónica de las anginas, con miasma sifilítico.

ESTOMAGO:

Apetito caprichoso. Desea licores, alcohol. Aversión a la carne. Pérdida total del apetito por meses. Ningún alimento gusta, o satisface. Vómitos por semanas o meses.

ABDOMEN:

Constipación obstinada. El recto parece estar amarrado con estricturas. Fisuras en el ano y el recto. El agua de un enema escapa con dolor. Diarrea; biliosa; indolora < a la orilla del mar, lo saca de la cama alderedor de las 5 a.m.

URINARIO:

Orina espumosa; escasa, amarilla. Enuresis nocturna. Pasa orina mejor mientras está de pié. Orina solamente una vez cada 24 horas, pero profusamente.

HOMBRES:

Formación nodular en los testículos, cordón espermático y escroto. Chancros. Adolorimiento de los genitales, no puede sentarse quieto.

MUJERES:

Reglas con olor a carne pútrida. Leucorrea acre, tan profusa que se escapa a través de las toallas y corre hasta los talones; amarilla, ofensiva; con dolor ovárico; en mujeres enfermizas y nerviosas; con comezón en los genitales. Aborto habitual. Mamas; sensibles al contacto; se sienten adoloridas, durante las reglas y en otro tiempo. Ulceras en la vulva con dolor ovárico; sensible al contacto. Dolor cortante en el ovario durante el coito, en el momento del orgasmo.

RESPIRATORIO:

Tos seca < acostándose sobre el lado derecho; por la noche. Afonía antes de las reglas. Asma crónica; < en el verano, durante una tormenta con rayos, por la noche y en clima húmedo. Dolor continuo en la laringe < al contacto.

CORAZON:

Dolor desde la base hasta el apex del corazón. Pulso largo y suave. Como agua caliente que fluyese por las venas.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello se siente corto. Dolor en la espalda en la región del riñón < después de orinar. Dolor en el cóccix con sensación como de que estuviese hinchado < sentándose.

EXTREMIDADES:

Dolor en la inserción del deltoides < levantando los brazos lateralmente, o al frente. Afección de los dedos medios. Osteo-sarcoma; en el centro de la tibia. Erupciones pruriginosas alrededor de los codos. Dolor frío en las piernas. Festinación. Dolor en los huesos como si los hubieran aserrado. Exóstosis bilateral inflamada y dolorosa. Huesos de la barbilla dolorosos > derramando agua fría sobre ellos. Ciática < por la noche. Músculos anudados; en reumatismo. Plantas dolorosas con sensación de contracción < estando de pié sobre ellas. No puede sentarse en una silla baja o acuclillarse.

PIEL:

Hinchada y manchada. Mordeduras como de insectos. Erisipelas erráticas. Costras cónicas. Bullas. Cicatrices y marcas (cacarañas) blancas. Uñas distorsionadas. Manchas cobrizas.

SUEÑO:

Insomnio.

FIEBRE:

Frío. Sudores por la noche, con agotamiento.

RELACIONES:

Aur; Kal-io; Merc; Nit-ac.

TABACUM

GENERALIDADES:

El tabaco, aunque se usa ampliamente aspirado, fumado y masticado, se usa en medicina únicamente en homeopatía. Se afectan principalmente los nervios Vago; simpáticos; cerebro-espinales y el Corazón. Produce una postración absoluta de todo el sistema muscular; con secreciones abundantes, vómito; sudores profusos; lagrimeo, salivación, etc. Constricción de los músculos de órganos huecos, garganta, vejiga, recto, pecho, etc. Calambres, luego parálisis, de los intestinos, corazón, etc. Convulsiones, con la cabeza firmemente jalada hacia atrás. Sacudidas a través del cuerpo. Temblores. Desvanecimientos. Casos peligrosos y atormentantes con cambios rápidos. Dolores que < con el calor. Emaciación excesiva esp. en los músculos de la espalda y mejillas. Paso lento y arrastrante, inseguro, con dificultad para ascender escaleras. Angina de pecho con esclerosis coronaria y tensión alta. Sensación de mareo. Tétanos. Parálisis de los esfínteres. Se escurre en la cama. Efectos de una insolación. Paliativo de los piquetes de abeja y mordeduras de mosquito.

AGRAVACION:

Movimiento; de un bote, por andar en carruaje. Acostado; sobre el lado izquierdo. Abriendo los ojos. Noche. Extremos de calor y frío.

MEJORIA:

Frío; aplicación de. Aire fresco. Crepúsculo. Descubriéndose el abdomen. Llorando. Vomitando.

MENTE:

Muy abatido. Indiferente. Hosco; sensación de miseria extrema. Olvidadizo; percepción lenta. Confusión. Neblina mental. Idiota; idiocia epiléptica. Plática tonta. Siente que alguien viene a arrestarlo o a matarlo.

CABEZA:

Vértigo excesivo; con sudor copioso (frío) < al abrir los ojos. Dolor repentino como si fuese golpeado con un martillo < mientras pasa orina. Sensación de atadura, como por una banda. Jaqueca con náuseas periódica.

OJOS:

Pérdida de la vista al mirar fijamente cualquier objeto. Pérdida súbita de la visión sin lesión, seguida de atrofia del nervio óptico. Escotoma central. Visión disminuida, vé a través de un velo. La retina retiene la imagen largo tiempo.

OIDOS:

Escuchar música, causa dolor en los oídos. Síndrome de Meniere con sensación de mareo.

NARIZ:

Secreción aumentada.

CARA:

Mortalmente pálida; azul; afilada; sumida. Cubierta con sudor frío. Una mejilla caliente y brillante, la otra pálida. Espasmos de la mandíbula inferior. Dolor en la articulación maxilar < por reír. Labios retraídos. Emaciación de la cara.

BOCA:

Salivación. Escupe moco; con otros malestares. Lenguaje difícil.

GARGANTA:

Constricción violenta de la garganta; en angina de pecho.

ESTOMAGO:

Náusea mortal y vómito violento, < al menor movimiento; > descubriéndose el abdomen; con mucha esputación; durante el embarazo. Mareo. Desvanecimiento terrible, sensación de hundimiento en el hueco del estómago. Vómito de materia fecal. Arqueos. Acidez.

ABDOMEN:

Presión en la región hepática, como por un cuerpo pesado. Quiere descubrirselo; esto mejora la náusea, el vómito y otras incomodidades. Cólico horrible; debe gritar, con debilidad. Evacuaciones involuntarias líquidas o espesas y cuajadas; como leche agria. Cólera infantil. Obstrucción intestinal. Hernia estrangulada. Sensación de hundimiento en el epigastrio, con sensación de desvanecimiento espantoso. Retracción del ombligo; músculos abdominales contraídos. Constipación habitual.

URINARIO:

Cólico renal, con sudor frío y náusea mortal. Parálisis de esfínteres; la orina gotea. Enuresis.

HOMBRES:

Emisiones nocturnas. Impotencia. Hiperestesia y neuralgia del pene.

MUJERES:

Mareo matutino. En período climatérico y durante las reglas, sensación miserable exagerada. Leucorrea, de líquido seroso < después de las reglas. Comezón severa de todo el cuerpo durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Constricción violenta del pecho. Tos; seca, molesta, debe tomar un sorbo de agua fría; seguida de hipo, o con hipo.

CORAZON:

Palpitación violenta < acostándose sobre el lado izquierdo. Sacudida alderredor del corazón. Angina de pecho, con náusea, sudor frío y colapso. Ritmo cardíaco inestable. Dilatación aguda causada por shock o ejercicio físico. Pulso como hilo, intermitente; como cuerda dura; imperceptible.

CUELLO Y ESPALDA:

Cabeza jalada hacia atrás en convulsiones. Cuello rígido. Emaciación de los músculos de la espalda. Dolor en la parte baja de la espalda < acostándose; > mientras camina. Calor que baja por la espina.

EXTREMIDADES:

Puntas de los dedos como vellosas. Calambres en dedos aislados < lavándolos. Manos y piernas heladas. Hormigueo.

PIEL:

Comezón como por piquete de pulgas.

SUEÑO:

Insomnio con corazón dilatado. Pesadillas. Sueño estupefaciente por la noche.

FIEBRE:

Piel helada. Calor que baja por la espina; de una mejilla; interno. Sudores fríos repentinos; con frío; angina de pecho; cólico renal, etc.

COMPLEMENTARIO:

Op.

RELACIONES:

Ars; Gel; Ver-a.

TARAXACUM

GENERALIDADES:

Afecta el hígado; es un remedio biliar. Sensación de enfermedad y agotamiento; inclinado a sentarse o acostarse. Dolores punzantes. Ictericia, cálculos biliares, hígado indurado y crecido.

AGRAVACION:

Descanso. Sentándose. De pié. Acostándose.

MEJORIA:

Caminando. Contacto.

MENTE:

Depresión. Murmuración constante a sí mismo. Rehúye las labores, pero luego que las inicia trabaja bien. Inclinado a hablar, reír y estar contento.

CABEZA:

Dolor debido a perturbaciones gástricas. El vértex se siente muy caliente.

BOCA:

Lengua; cubierta, con parches excoriados; mapeada. Gusto; amargo; ácido. Salivación, con sensación como de que la laringe está presionada y cerrada.

GARGANTA:

Expectora moco ácido.

ESTOMAGO:

Ataques gástricos biliosos. Pérdida del apetito. Eructos amargos.

ABDOMEN:

Sensación de burbujas que estallaran en los intestinos. Timpanitis; histérica. Hígado crecido e indurado. Diarrea biliosa. Evacuaciones blancas. Ictericia. Dolor en la región del hígado y bazo.

URINARIO:

Necesidad de orinar indolora; descarga frecuente y copiosa.

MUJERES:

Reglas suprimidas.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolores desgarrantes desde el oído hasta el cuello. Músculo esternomastoideo muy doloroso al contacto.

EXTREMIDADES:

Miembros inquietos. Puntas de los dedos frías (un síntoma guía). Dolor sacudiente en las pantorrillas (derecha) > al contacto. Dolores desgarrantes en los miembros. Neuralgia de la rodilla > presión. Dedos de los pies ardorosos.

FIEBRE:

Escalofrío después de comer; esp. después de las bebidas. Sudores nocturnos profusos.

RELACIONES:

Nux-v.

TARENTULA CUBENSIS

GENERALIDADES:

El veneno de esta araña afecta los tejidos celulares. Es un medicamento toxémico, útil en condiciones sépticas; cuando la incubación es lenta, pero el progreso posterior rápido; con postración alarmante, ardores atroces o dolores agudos y punzantes; dureza de la parte afectada como de tabla y sudores copiosos. Difteria; con fiebre intensa y dolorimiento entumecido. Malignidad. Carbúnclo. Abscesos azulosos; abscesos dolorosos. Panadizos. Remedio para el dolor de muerte; calma la última agonía. Parálisis luego convulsiones. Peste bubónica. Gangrena.

AGRAVACION:

Bebidas frías. Ejercicio. Noche.

MEJORIA:

Fumando tabaco.

MENTE:

Inquietud nerviosa.

CABEZA:

Plenitud en la cabeza. Meningitis.

ESTOMAGO:

Tendencia al vómito.

URINARIO:

No puede detener la orina cuando tose. Retención de orina. Orina caliente, espesa.

MUJERES:

Prurito vulvar.

RESPIRATORIO:

Dificultad espasmódica para respirar. Tos desesperante; pertusis.

EXTREMIDADES:

Manos temblorosas. Pies inquietos. Paso inseguro.

PIEL:

La siente toda hinchada. Decoloración purpúrea. Ardor punzante. Ulceras seniles.

SUEÑO:

Amodorramiento. Impedido por una tos áspera.

FIEBRE:

Calor punzante de la superficie.

RELACIONES:

Anthx; Latro.

TARENTULA HISPANIA

GENERALIDADES:

El "Tarentismo" es el término aplicado a la manía danzante que se establece en una persona mordida por la tarántula; la cura es música y danza. Estos síntomas dan la indicación clave del remedio. Afecta los Nervios que están altamente tensos; produciendo síntomas nerviosos muy marcados; histeria; corea; muchas veces son reflejo de la esfera generativa. Están prominentemente afectados el Corazón; la espina; la respiración y el lado derecho. Los síntomas aparecen de pronto; con violencia. El paciente está inquieto, nervioso, apresurado; en movimiento constante, aunque el caminar lo <. Rueda en el suelo de un lado a otro, o golpea vehementemente con sus pies; o gira la cabeza, se la frota; para mejorar su malestar. Temblor; sacudidas; espasmos, contracturas. Sinalgias o dolores asociados; dolor de cabeza con dolor en el útero, dolor de garganta con dolor de ojo; dolor de cara con dolor de estómago; dolor en el oído con hipo; etc. o dolores por excitación sexual. Dolores violentos, neuralgias, como de miles de agujas que estuvieran picando. Condiciones sépticas profundas; abscesos, evacúa la pus rápidamente. Noma. Emaciación < cara. Malos efectos de amor no correspondido; malas noticias; regaños; castigos; caídas; sepsis. Puede correr mejor que caminar. Movimientos irregulares. Entumecimiento con hormigueo. Emaciación, como si la carne se desprendiera de los huesos. Cáncer; tumores fibrosos. Su acción es similar a la de Ars. en muchos síntomas, de allí que, cuando Ars. parece indicado pero falla, es mejor dar Tarn.

AGRAVACION:

Periódicamente; cada año; a la misma hora. Contacto. Frío. Ruido. Humedad. Noche. Después de las reglas. Coito. Lavándose la cabeza. Por ver a otros en problemas. Manos en agua fría. Música.

MEJORIA:

Relajamiento. Frotando. Sudando. Por fumar. Música. Al aire libre. Paseando en un carro. En el sol. Colores brillantes.

MENTE:

Aversión a los colores, negro, rojo, amarillo, verde. Baila arriba y abajo. Ataques de risa nerviosa luego gritos. Cambios súbitos de humor, fantasías o fuerza. Carece de control. Errático. Impulsivo. Depravación moral. Hábil, industrioso. Egoísta. Destructiva, destruye todo lo que cae en sus manos, desgarrar sus ropas, etc. Odiosa. Diestra. Tira las cosas lejos de sí. Se finge enfermo; cuando no hay testigos, no hay histeria; cuando la atención está puesta en ella, se empieza a torcer, finge desmayos, insensibilidad, pero mira hacia los lados para ver el efecto que causa en los que la rodean. Deseo de golpear a sí mismo o a otros. Ríe, se mofa, danza, gesticula, hace chistes, llora, canta hasta que enronquece o se agota. Cleptomanía. Desesperanza con ira. Agonía de muerte. Ingrato. Melancólico. Descontento. Síntomas mentales > p.m., después de comer.

CABEZA:

Vértigo; < un peso sobre la cabeza; luego espasmos. Como agujas que picaran dentro del cerebro. Dolor pesado en las sienas, extendiéndose a la cara y cuello, con náusea e impaciencia. Cefalalgias con aplastamiento violento, como acompañamiento. Como si agua fría fuese vertida en la cabeza y el cuerpo. Vértigo; noche; cuando descende escaleras.

OJOS:

Comezón en los ojos con lágrimas espesas. Punzadas en los ojos como arena o espinas. Fotofobia. Una pupila dilatada y la otra contraída. Ojos muy abiertos, espasmódicamente; fijos. Vé fantasmas, caras, destellos.

OIDOS:

Estallidos; crujidos en los oídos (derecho) con dolor e hipo. Ruidos; tintineo como de campanas < al despertar, por la mañana.

NARIZ:

Epistaxis > con latido en las carótidas y plenitud en la cabeza.

CARA:

Rojo fiero, abotagada. Expresión de terror. Arrugada.

BOCA:

Y dientes secos. Lengua jalada hacia atrás que impide el habla.

ESTOMAGO:

Deseo de arena o alimentos crudos. Aversión a la carne, al pan. Perturbaciones gástricas que se acompañan de dolores simpáticos en la cabeza, cara, dientes, etc. Sed por agua fría. Eructos amargos; histéricos. Vomita todo el alimento ingerido.

ABDOMEN:

Ardor en el hipogastrio con un gran peso, interfiere al caminar. Evacuaciones; aceitosas, negras, ofensivas, excitadas por lavarse la cabeza. Constipación severa, no mejorada por purgantes o enemas. Constipación; con paso involuntario de orina al toser o cualquier esfuerzo.

URINARIO:

Orina fétida, con sedimento arenoso. Incontinencia al toser, reír, etc. Diabetes Melitus. Poliuria.

HOMBRES:

Excitación sexual extrema. Lascivia, casi rayando en la insanía; < coito. Indisposiciones prostáticas después de masturbación. Emisiones seminales calientes, sanguinolentas. Genitales sensibles. Tumor indolente en los testículos.

MUJERES:

Ninfomanía violenta < coito. Vulva y vagina secas, calientes, excoriadas, con comezón < por rascarse. Prurito vulvar después de las reglas. Reglas profusas, con espasmos eróticos. Reglas adelantadas.

Sensación de movimiento en el útero como un feto o ardor. Angustia e indisposición en los órganos sexuales. Expulsión de gas que proviene del útero. Cáncer del cérvix. Leucorrea de grumos claros, acres, pegajosos. Ovarios sensibles a la presión.

RESPIRATORIO:

Ataques de sofocación con llanto, gritos e inquietud; debe tener aire fresco; < tosiendo. Tos, arqueos, al expectorar, fatigante, < después del coito, ruido; > fumando.

CORAZON:

Sacudidas alderredor; hace saltos repentinos. Temblor y latidos pesados como cuando se reciben malas noticias o hay un susto. Enfermedades del corazón < por mojarse las manos en agua fría. Corea cordial, con síntomas en el brazo. Pulso duro, infrecuente, irregular.

CUELLO Y ESPALDA:

Espina dolorosamente sensible, el contacto excita los dolores en el pecho, corazón, etc. Coccigodinia > por estar de pié < con el mínimo movimiento o contacto. Tumores alderredor de la columna vertebral.

EXTREMIDADES:

Brazos inquietos; mantiene las manos ocupadas; se pica los dedos. Piernas inquietas; impulso de caminar. Festinación. Puede correr mejor que caminar. Pies y manos húmedos y fríos. Plantas con comezón. Dolores de huesos cortantes. Contracciones y movimientos extraordinarios; erráticos. Piernas débiles; no puede plantarse sobre ellas firmemente; no obedecen su voluntad. Dificultad para arrodillarse.

PIEL:

Purpúrea. Manchas equimóticas. Puntos fríos o como materia fría que fluyera o goteara en la parte. Carbunco. Abscesos profundos. Ayuda a la evacuación de pus. Eczema seco (después del fracaso de Ars. y Sul.) comezón; como de insectos que hormiguearan o se arrastraran.

SUEÑO:

Insomnio antes de medianoche, por excitación. Sueños tristes; con sollozos.

FIEBRE:

Frío y calor que se alternan. Calor general con pies fríos. Fiebre séptica. Sudor profuso; excoriante.

COMPLEMENTARIO:

Ars.

RELACIONES:

Agar; Mygl.

TELLURIUM

GENERALIDADES:

Este metal irrita la piel, afecta la espina dorsal, oídos y ojos; produce dolores neurálgicos, especialmente ciática. Las descargas son acres, excitan la comezón, vesícula cualquier parte de la piel que toca. El olor del cuerpo y del sudor es ofensivo y como de ajo; la descarga del oído es como de pescado en salmuera. Salado; gusto, moco de la garganta, pus, etc. Dolores agudos y rápidos luego inflamación. Entumecimiento. Sensación de retención. Periosteítis. Dolores lineales. Malos efectos de lesiones; espinales. Caídas.

AGRAVACION:

Contacto. Yaciendo sobre la parte afectada. Frío. Deglución en vacío. Lesiones en la espina. Semanalmente. Clima frío. Fricción. Agachándose. Riendo. Por la tos. Haciendo esfuerzo para evacuar.

MENTE:

Temor de ser tocado en los lugares sensibles. Descuidado y olvidadizo.

CABEZA:

Vértigo; < cuando cae dormido; > acostándose perfectamente quieto. Dolores de cabeza lineales.

OJOS:

Párpados engrosados, inflamados, con comezón. Pterigión. Ojos acuosos. Catarata, que sigue a una lesión ocular. Con las pestañas del párpado inferior torcidas hacia adentro.

OIDOS:

Inflamados; azulosos; hinchados. Deficiencia para escuchar por lesión en la membrana timpánica. Otorrea; de olor a pescado en salmuera. Eczema detrás de las orejas, con costras gruesas. Comezón, hinchazón, latido en el meato. Dolor profundo y constante en el oído.

NARIZ:

Coriza fluída con lagrimeo y ronquera < cuando camina al aire libre, pero > después de estar en el aire libre después de un tiempo. Expectoración moco salado de las coanas posteriores.

BOCA:

El aliento tiene olor a ajo.

GARGANTA:

Dolorida al deglutir en vacío > después de comer o beber.

ESTOMAGO:

Deseo de manzanas. Eructos rancios. La arcada termina en bostezo. Vómito después de comer arroz. Sensación de debilidad o vacío.

ABDOMEN:

Pellizcadura. Flatos de olor ofensivo. Comezón del ano y perineo después de cada evacuación.

RESPIRATORIO:

Dolor en los músculos del pecho, como de torcedura, < levantando los brazos. La tos causa dolor en la espalda baja. Dolor en la región de la clavícula. Burbujeo en los pulmones (derecho).

CORAZON:

Dolor sordo sobre el corazón > acostándose sobre la espalda.

CUELLO Y ESPALDA:

Entumecimiento en la nuca y occipucio. Sensibilidad dolorosa de la espina (desde la última vértebra cervical, hasta la quinta dorsal). Dolor en el sacro que pasa hacia dentro del muslo derecho; < por toser, reír; presionando para evacuar.

EXTREMIDADES:

Dolor ciático profundo < por toser, estornudar; esforzándose para evacuar; acostándose; con espina sensible. Contracción de tendones en el doblar de la rodilla. Sudor de pies fétido. Sudor en axila que huele a ajo.

PIEL:

Lesiones; erupciones circulares. Tiña; cubre el cuerpo entero; los miembros inferiores; en partes aisladas, escroto, perineo, etc. Comezón, pellizcadura; como por insectos. Ardor en cicatrices viejas. Erupción de barbero. Comezón < en aire fresco.

SUEÑO:

Bostezos después de eructar o con arcadas. Amodorrado después de las comidas.

FIEBRE:

Frío, con dolor. Estremecimientos que bajan por la espina acostándose sobre la espalda. Sudor en puntos; con comezón.

RELACIONES:

Cep; Sele.

TEREBINTHINA

GENERALIDADES:

El aceite de turpentina tiene una afinidad selectiva por las membranas mucosas de los riñones; vejiga; respiración; bronquios; corazón y sangre. Hemorragias; pasivas; negras, ofensivas, rezumando por las membranas mucosas. Afección de los riñones, con reumatismo. Inflamación, adolorimiento y rigidez de los músculos. Púrpura hemorrágica. Dolor; excita la micción; a lo largo de los nervios largos, con sensación de frialdad en los nervios; o ocasionalmente como agua caliente que corriera a través de un tubo. Ardor; en varias partes, punta de la lengua; epigastrio, espalda baja; riñones. útero, etc. Agotado; sensible y cansado. Sentido del equilibrio perturbado. Malos efectos del alcohol, caídas, torceduras, extracción dentaria. Cada nimiedad lo contusiona.

AGRAVACION:

Humedad. Frío. Noche. Acostándose. Presión.

MEJORIA:

Movimiento. Agachándose.

MENTE:

Concentración difícil. Irritabilidad intensa; niños que pierden el control fácilmente; durante la dentición. Coma.

CABEZA:

Como con una banda alderredor de la cabeza. Cefalalgia sorda con cólico.

OJOS:

Ceguera por alcohol. Abre los ojos al deglutir; en coma. Ojos rojo oscuro; cara roja en el lado afectado.

OIDOS:

Su propia voz suena innatural. Sensación en los oídos como el golpeteo de un reloj. El hablar en voz alta es muy doloroso.

NARIZ:

Epistaxis pasiva, en niños. Descarga de suero sin coriza.

CARA:

Pálida; terrosa; sumida. Bochornos calientes seguidos de sudor.

BOCA:

Lengua; suave; barnizada; inflamada, roja; ardiente en la punta. Aftas desde la boca hasta el ano. Aliento frío, fétido.

ESTOMAGO:

Náusea y vómito; con ardor intenso. Ardor en la región del epigastrio. Náusea > con una evacuación floja. Aversión a la carne.

ABDOMEN:

Adolorimiento de magulladura. Flatulencia. Timpanitis. Ascitis. Evacuaciones de moco profusas; acuosas, verdes, fétidas. Evacuaciones sanguinolentas. Lombrices. Sangramiento de úlceras en el intestino. Los intestinos parecen jalados hacia la espina. Diarrea, con espasmos tetánicos.

URINARIO:

Dolores ardientes, tirantes, en la región del riñón. Ardor o dolor a lo largo de los uréteres. Estranguria, con orina sanguinolenta. Orina; ahumada; con asientos cafés; o sedimento espeso, amarillo, limoso, como lodo; con olor a violetas. Nefritis; después de exantema; con bronquitis violenta. Cistitis. Vejiga sangrante. Dolores que se alternan entre el ombligo y la vejiga, > caminando. Orina escasa; suprimida, durante la dentición.

MUJERES:

Ardor intenso en la región uterina; con metrorragia. Metritis. Enfermedades uterinas después de usar pesarios.

RESPIRATORIO:

Ardor y tirantez que cruza el pecho. Asma o catarro bronquial; con expectoración profusa. Hemoptisis. Expectoración sanguinolenta. Bronquitis en los niños con amodorramiento y retención de orina. Disnea.

CORAZON:

Pulso; rápido, pequeño como hilo; intermitente.

ESPALDA:

Dolor de espalda y adolorimiento en afecciones del riñón.

EXTREMIDADES:

Las manos se sienten hinchadas. Calambres en las rodillas. Dolor intenso a lo largo de los nervios largos; < clima húmedo. Se para con los pies separados; no tiene poder para balancear su cuerpo. Músculos, rígidos. Camina doblado como un anciano. Neuralgia braquial o sub-escapular. Como si se lanzara hacia adelante al caminar.

PIEL:

Púrpura hemorrágica; avanzando. Sensibilidad general aumentada. Sabañones no abiertos; con comezón y pulsaciones excesivas.

SUEÑO:

Amodorramiento; con retención de orina, etc.

FIEBRE:

Calor bajo la piel. Sudor frío en las piernas.

RELACIONES:

Canth; Erig; Pho.

THALLIUM

GENERALIDADES:

Este raro metal es útil para los dolores neurálgicos, espasmódicos, tirantes, más horribles. Dolores como de sacudidas eléctricas. Entumecimiento y hormigueo que empiezan en los dedos de las manos y los pies, y se extienden hacia arriba de los miembros inferiores y hacia abajo a los pies, involucrando el bajo vientre y el perineo. Parálisis de los miembros inferiores. Ataxia locomotriz. Temblores. Caída del cabello con gran rapidez; después de enfermedades agudas o agotantes. Atrofia muscular.

THERIDION

GENERALIDADES:

El veneno de esta araña anaranjada produce hipersensibilidad de los nervios; esp. al ruido; que penetra el cuerpo; afecta los dientes; causa náusea, fríos y dolores en todas partes; percute en las partes dolorosas, etc. Causa irritación espinal, y afecta los huesos causando caries, necrosis. Diatesis tuberculosa. Cuando el mejor remedio falla en su acción; esp. en caries y necrosis. Raquitismo. Los huesos se sienten quebrados. Ptisis. El agua se siente demasiado fría. Respingo interno; como de un niño. Dolores ardientes. Mareo. Sensación de dualidad. Efectos de una insolación. Histeria; durante la pubertad y en el climaterio. Atrofia infantil; glándulas crecidas; con marasmo. Nódulos en varias partes del cuerpo, esp. en glúteos.

AGRAVACION:

Ruido. Contacto. Cerrando los ojos. Al menor movimiento. Ejercicio. Sacudidas. Paseando. frío. Lavando ropa. coito. Insolación.

MEJORIA:

Descanso; en posición horizontal. Calor.

MENTE:

El tiempo pasa demasiado rápido. Se estremece por la menor cosa. Actividad infructuosa; no encuentra placer en nada. Histeria. Locuacidad e hilaridad. Falta de auto-confianza.

CABEZA:

Vértigo con náusea < agachándose; al mínimo movimiento; Cerrando los ojos; arrodillándose. Dolor de cabeza que se siente durante el sueño < sacudiéndola; con náusea y vómito, en el climaterio. La cabeza se siente gruesa, piensa que pertenece a otra persona; que se la puede despegar; o que le gustaría

quitársela. Migraña. Dolor de cabeza < después de evacuar. Alegre durante la cefalalgia. No puede acostarse con cefalalgia. Desmayo después de lavar ropa.

OJOS:

Visión brillante; al agacharse. Vibraciones luminosas ante los ojos, visión empañada; luego afecciones de la cabeza y debilidad.

OIDOS:

El menor ruido, cualquier sonido penetra por todo el cuerpo, esp. los dientes. Rugido en ambos oídos, como una catarata.

NARIZ:

Dolor sobre la raíz de la nariz. Catarro crónico; descarga amarillo-verde, espesa, ofensiva. Oena. Catarro post-nasal.

CARA:

Pálida. Mandíbulas inmóviles; en la mañana.

BOCA:

Permanece abierta involuntariamente; no la puede cerrar. Espuma en la boca con frío que estremece. Los dientes se sienten como si el agua estuviese demasiado fría. La boca se siente aterciopelada, entumida. Trismo matutino al despertar. Se muerde la punta de la lengua; durante el sueño.

ESTOMAGO:

Deseo constante de comer y beber, pero no sabe qué. Desea naranjas y plátanos (bananas), fumar tabaco, vino; frutas y bebidas ácidas. Náusea < mínimo movimiento; mirando fijamente un objeto; por ruido. Náusea y arqueos > bebiendo agua tibia.

ABDOMEN:

Ardor violento en la región del hígado. Absceso del hígado. Dolor en la ingle; después del coito; movimiento y encogiendo las piernas.

URINARIO:

Micción aumentada; por la noche, no pasa mucho durante el día.

HOMBRES:

Emisión seminal, durante un sueño por la tarde. Gonorrea. Próstata crecida, sensación de un tapón y pesadez en el perineo, < por cada paso que se dá.

MUJERES:

Histeria; durante la pubertad; en el climaterio. Reglas suprimidas.

RESPIRATORIO:

Dolor en el extremo de la costilla flotante izquierda. Tos, se sacude el cuerpo junto con la cabeza que se hace hacia adelante y las rodillas hacia arriba. Parece que entra demasiado aire al pecho. Punzadas en la parte alta del pecho; baja por el apex del pulmón izquierdo. Ptisis. Respiración difícil al subir y bajar escaleras; histeria.

CORAZON:

Ansiedad alrededor del corazón; dolor agudo que radia al brazo y hombro izquierdo. Pulso lento, con vértigo.

CUELLO Y ESPALDA:

La espina está sensible a la presión y sacudidas; se sienta de lado en una silla, para evitar la presión.

EXTREMIDADES:

Ardor en la parte superior del brazo. Sensación de inquietud en las manos; se las estruja. Punzada desde el codo hasta el hombro. Se acuesta o se sienta con los pies cruzados, no los puede descruzar.

PIEL:

Las punzadas apuñalan la piel. Comezón.

FIEBRE:

Espuma en la boca con frío que sacude. Frialdad interna. Sudor frío; fácilmente excitado.

RELACIONES:

Asar; Sil.

THIOSINAMINUM

GENERALIDADES:

Um químico derivado del aceite de la mostaza, actúa como un resolvente externo e interno para las cicatrices, adherencias, estricturas; tumores, glándulas crecidas. Debería darse en dosis de medio grano diariamente 2 o 3 veces al día, atenuación 2x.

THUJA OCCIDENTALIS

GENERALIDADES:

El Dr. Hahnemann encontró que Thuja es un antídoto para el miasma sicótico. Actúa principalmente sobre las membranas mucosas del tracto génito-urinario; intestinos; piel; mente; nervios; glándulas,

occipucio y lado izquierdo. Es el remedio para el tejido suave; exuberante; fungoide; pólipos, condilomas, verrugas; pediculadas, negras, suprimidas. Constitución hidrogenoide o linfática. Gran prostración y emaciación rápida. El paciente está agotado y flojo, el cuerpo se siente delgado y delicado, frágil. Mortandad de la parte afectada. Las descargas son fétidas, acres, mohosas, rancias o de olor dulzón. Goteo; en la uretra. Dolores ardorosos, punzantes, entumecedores, tirantes o erráticos < calor. Aceitosos; evacuaciones, piel, sudor. La carne se siente como despegada de los huesos. Edema alderredor de las coyunturas. Sacudidas; de la parte superior del cuerpo; de origen espinal; corea. Sensación de ligereza del cuerpo al caminar. Vaccinosis; nunca bien desde que lo vacunaron; neuralgia, problemas de piel, etc. Niños llorones; con una mancha sicótica de su padre; por hernia inguinal congénita. Los dolores se mantienen extendiéndose desde su sitio original. Neurastenia; prostática. Reumatismo. Parálisis. Gonorrea suprimida. Malos efectos del tabaco. Sicosis suprimida, verrugas en forma de higo. Aneurisma por anastomosis; hinchazón de las venas. Dolores punzantes, desgarrantes en las glándulas como si hubiesen sido rasgadas en pedazos.

AGRAVACION:

Frío; humedad; calor; de la cama. Periódicamente - 3 a.m. y 3 p.m. Cada año. En luna creciente. A la luz de la luna. Durante las reglas. Orinando. Té. Café. Dulces. Comida grasosa. Cebollas. Sol. Masticando. Luz brillante. Mercurio. Sífilis. Estirándose. Coito. Cerrando los ojos.

MEJORIA:

Calor: arropándose; aire, viento. Secreciones abundantes. Estornudando. Movimiento. Cruzando las piernas. Contacto. Encogiendo las piernas. Frotando. Rascándose.

MENTE:

Ideas fijas; como si estuviera una persona extraña a su lado; como si el cuerpo y el alma estuvieran separados; como si el cuerpo fuese frágil, hecho de vidrio; como con una cosa viva internamente; como si estuviera en las manos de un poder más fuerte. Apresurado, con mal humor; habla de prisa; se traga palabras. Triste. Aversión a la vida. Sobre-excitado, enojado y ansioso por nimiedades. La música le causa llanto y temblor de pies. Nervioso; empieza a temblar cuando se le aproxima un extraño. No se puede concentrar. Mujeres insanas que no se dejan tocar ni que se les acerquen. Temor, al ver unas líneas verdes. Habla con lentitud, busca las palabras. Irritable, celosa, regañona, con su esposo o su madre, se controla a sí misma estando entre extraños y doctores. Cretinismo. Depresión mental después del parto. Camina en círculos en una habitación.

CABEZA:

Vértigo como por el movimiento de balanceo; todo parece saltar; al cerrar los ojos, mirando hacia arriba o a los lados. Dolor como pinchado por un clavo. Cefalalgia < exceso sexual; por té; > doblando la cabeza hacia atrás. Dolor desgarrante, violento. Caspa escamosa blanca. Cabello seco, partido; caída. Sudor que huele a miel.

OJOS:

Rojos como sangre; llenos de lágrimas; permanecen abiertos. Párpados pesados como de plomo. Iris mellado. Iritis. Perrillas y tumores tarsales. Siente como aire frío que fluyera de la cabeza a través del ojo > cuando está cubierto y caliente. Fotopsias, más allá del campo visual. Líneas (verdes) flotantes. Exoftalmos; por tumores detrás del globo ocular.

OIDOS:

Otorrea; acuosa, purulenta; pútrida. Crujido al deglutir en vacío. Ruido en el oído como de agua hirviendo.

NARIZ:

Costras sangrantes; u olor de salmuera en la nariz. Sopla moco espeso, verde. Epistaxis < después de haberse acalorado.

CARA:

Pálida, cerosa, brillante; obscura bajo los ojos. Como tejida por venas como tela de araña. Dolor taladrante en los huesos malares (izquierdo) > por el contacto. Piel grasosa. Neuralgia; por gonorrea suprimida o eczema del oído. Tumor en la mejilla.

BOCA:

Dientes; se pudren en la orilla de la encía, se desmenuzan; se vuelven amarillos. Dolor retorciente en los dientes < frío, té y sonándose la nariz. Piorrea. ránula. Venas varicosas en la lengua y la boca. Aftas; úlceras en la boca. Ampollas blancas en los lados cercanos a la raíz de la lengua, dolorosamente inflamadas. Mordidas frecuentes de la lengua, por inflamación. Gusto dulzón; con gonorrea. Se vuelve seca mientras mastica alimentos.

GARGANTA:

Mucha mucosidad en la garganta que se expectora con dificultad.

ESTOMAGO:

Deglución ruidosa; eructos fuertes. Eructos rancios o grasosos. Aversión a las papas (patatas) y carne fresca, las cebollas caen mal. Dispepsia de los bebedores de té. Incapaz de desayunarse. Desea bebidas frías y sal.

ABDOMEN:

Grande, abultado; se proyecta aquí y allá como por el brazo de un feto; movimiento como de algo vivo (en mujeres viejas). Induración del abdomen. Retumbos, flatulencia; parte superior encogida. Adolorimiento en el ombligo. Hipogastrio como cortado, exprimido. Ileo. Gorgoteo en los intestinos; luego evacuaciones indoloras, acuosas, verde pasto. Las evacuaciones gorgotean o estallan < desayuno. Heces; duras; aceitosas; negras; pedazos; mezcladas con agua en chorro; apresuradas, explosivas, gaseosas, que rocían. Dolor cortante, exprimiente en las ingles. Hemorroides hinchadas, dolorosas. Ano fisurado; verrugoso; con rezumamiento. Perineo húmedo. Tenesmo con rigidez del pene. Fístula perineal.

URINARIO:

Retorcimiento cortante en la vejiga y uretra. La vejiga se siente paralizada, debe esperar para orinar. Necesidad; frecuente, apresurada; con dolor en otras partes; con flujo profuso. Orina; arde, gotea, fétida. Siente como una gota que recorriera la uretra hacia abajo; después de orinar. Picadura hacia adelante en la uretra al orinar. El chorro de orina está dividido y pequeño. Dolores desde el riñon izquierdo hacia el epigastrio < movimiento. Litemia. Diabetes mellitus. Micción involuntaria por la noche, cuando tose. Orina espumosa.

HOMBRES:

Gonorrea, escaldante, al orinar. Reumatismo por gonorrea suprimida. Crecimiento prostático. Genitales ofensivos; con olor dulzón del sudor en el escroto. Los testículos se sienten magullados; el izquierdo está encogido. Hinchazón del prepucio. excresencias del prepucio y glande. Semen ofensivo.

MUJERES:

Vagina; muy sensible, impide el coito; comezón. Ovario izquierdo inflamado, con dolor rasgante < reglas. Leucorrea, profusa, espesa, verdosa, de un período a otro. Erosión del cérvix. El feto se mueve violentamente, y la despierta. Aborto en el 3er. mes. Excresencias como coliflor sangrando fácilmente. Fistula recto-vaginal. Organos sudorosos antes de las reglas. Pezones retraídos. Reglas muy adelantadas, demasiado cortas.

RESPIRATORIO:

Respiración corta y difícil < por hacer inspiraciones profundas y por hablar. Tose solamente durante el día o < tan pronto como come o bebe cualquier cosa fría. Expectoración; fácil cuando está acostado; verde, sabe como a queso viejo. Pólipos en las cuerdas vocales. En el asma, si Ars. falla en curar, aún cuando parece estar indicado, Thu. y Nat-sul. harán el trabajo y completarán la curación.

CORAZON:

Palpitaciones ansiosas; al despertar; en la mañana.

CUELLO Y ESPALDA:

Pulsación en la espalda. Dolor presivo sobre la región del riñón. Atrofia de los músculos largos. Espina curvada. Al estar de pié, se inclina hacia adelante. Forcúnculos sangrantes.

EXTREMIDADES:

Crujido en las articulaciones al estirarlas. Dedos fríos, entumidos, como muertos, al despertar por la noche. Hormiguelo o inflamación en dedos o puntas de los dedos de los pies. La articulación de las caderas fallan al caminar. Los miembros se sienten como si estuviesen hechos de madera o vidrio y parece que se quiebran fácilmente. Los miembros se sienten paralizados. Rodillas inquietas. Uñas; dolorosas; quebradizas, desmoronándose; decoloradas, distorsionadas; acanaladas, suaves. Coxalgia, con plantas sensibles. Sudor de pies acre, fétido. Uñas de los pies encarnadas.

PIEL:

Café; manchada; sucia; velluda. Erupciones que dan comezón o arden violentamente < baño frío. Pólipos húmedos y fétidos. Nevi. Erupciones solo en partes cubiertas. Ulceras planas, con fondo azulado. Sensación de punzadas, lanzadas hacia afuera. Pústulas fétidas con ápices hundidos. Crecimiento de pelo abundante en partes que usualmente no están cubiertas de cabello. Herpes zoster.

SUEÑO:

Insomne cuando duerme sobre el lado izquierdo. Insomnio persistente. Sueños de muerte; de caída desde una altura.

FIEBRE:

Frío que sacude; con bostezos; < orinando, no > por el calor. El calor sube desde el pecho; con manos heladas; la nariz sangra o hay tos. Sudor sólo en partes descubiertas; con calor seco al cubrirse; con manos frías > lavándose. Sudor profuso en los genitales; en chorro < compañía; fétido, aceitoso, picante, dulzón, en ocasiones con olor a ajo y manchando de color amarillo.

COMPLEMENTARIO:

Med; Nat-m; Nat-s; Nit-ac; Puls; Sabi; Sil.

RELACIONES:

Asaf; Calc-c; Ign; Kali-c; Lyc; Merc.

THYMOL

GENERALIDADES:

Se considera como un específico para enfermedad por anquilostoma. Neurastenia sexual.

THYROIDINUM

GENERALIDADES:

Un sarcode preparado a partir de glándula seca de Tiroides de una oveja o ternero. La tiroides tiene una relación cercana con el Corazón; aún más, ejercita una influencia general de regulación en el mecanismo de los órganos de la nutrición; crecimiento y desarrollo. Afecta el Sistema Nervioso Central, piel y lado izquierdo. Hay un estado de abotagamiento y obesidad. Se siente cansado y enfermo, se fatiga con facilidad, quiere estar acostado. Ataques de desvanecimiento, temblores nerviosos; de cara y extremidades. Sensación de apuñalamiento, división, apretón. Estrangulación. Emaciación rápida. Bocio. Cosquilleo. Mixoedema, con pérdida de cabello; y cretinismo. Desarrollo detenido de los niños. Desgaste infantil. Testículos no descendidos en los niños. La debilidad tiroidea causa una necesidad patente de grandes cantidades de azúcar. Acromegalia; unión de fracturas retardada. Tétanos, < frío. Insantáneo. Histero-epilepsia. Como un viento frío que soplara sobre el cuerpo. Artritis reumatoide. Edema. Tumores mamarios. Baja presión arterial.

AGRAVACION:

Al menor ejercicio o frío. Encorvándose.

MEJORIA:

Acostándose sobre el abdomen o en posición reclinada.

MENTE:

Estupor que alterna con melancolía inquieta. Llora, se desviste. Tendencia homicida. Suspica. Idea de persecución. Mal temperamento < contradicción; arrebatos de rabia por nimiedades. Refunfuña; continuamente. Ríe de una forma peculiar a ella misma.

CABEZA:

Sensación de ligereza en el cerebro. Dolor de cabeza frontal persistente; pesadez sobre los ojos. Caída del cabello.

OJOS:

Bocio exoftálmico. Pérdida de la visión progresiva con escotoma central.

OIDOS:

Esclerosis de los huesecillos.

NARIZ:

Seca; en el interior; escurre en el exterior.

CARA:

Abochornada. Labios; secos, rojos, arden; con despellejamiento abundante.

BOCA:

Lengua con cubierta gruesa; gusto metálico en la punta.

GARGANTA:

Seca, ardorosa. Como con una astilla atorada en la garganta.

ESTOMAGO:

Deseo de dulces y sed por agua fría. Vómito en el embarazo.

ABDOMEN:

Cólico en el hígado < respiración profunda. Flatulencia rodante con gorgoteo, luego evacuaciones gaseosas y flojas. Pesadez y adolorimiento que va hacia abajo a través de la pelvis hacia dentro de los muslos.

URINARIO:

Flujo de orina incrementado. Diabetes mellitus. La orina huele a violetas. Enuresis de niños débiles.

MUJERES:

Amenorrea. Retorcimiento en el útero. Agalaccia. Vómito del embarazo. Fibromas uterinos. Tumores mamarios. Puerperio; convulsiones; insanía.

RESPIRATORIO:

Laringe seca. Tos seca y dolorosa al entrar a una habitación caliente, viniendo de aire fresco. Incapacidad para respirar > en una posición reclinada.

CORAZON:

Palpitación < mínimo ejercicio; martilleo; el latido se siente en el oído. Taquicardia. Los dolores cordiales se radian hacia la axila; dolores de apretón, constrictivos, < acostándose; causan respiración corta. Hipertrofia después de un trabajo duro. Como si la sangre estuviese precipitándose hacia abajo, a través del cuerpo. Sensación de salto en el corazón. Venas grandes en brazos y manóñs. Enfeemedad valvular del corazón.

EXTREMIDADES:

Temblor de miembros; sacudidas. Adormecimiento de los dedos izquierdos, luego de la pierna derecha. Mano izquierda helada. Manos frías y pegajosas. Crecimiento anormal de los miembros debido a un ejercicio excesivo.

PIEL:

Muy seca. Comezón sin erupciones. Psoriasis con adiposidad. Ictiosis. Comezón con ictericia. Despellejamiento de los miembros inferiores. Hinchazón muscular. Erupciones serpiginosas simétricas.

FIEBRE:

Bochornos calientes; luego frío, o sudores que empanan. Sudor aceitoso, mohoso.

RELACIONES:

Calc; Glo.

TILIA EUROPA

GENERALIDADES:

Causa debilidad de los músculos y afecta los órganos genitales y urinarios femeninos. Adolorimiento intenso; del abdomen; útero, etc. Dolores con pesadez en la región genito-urinaria y rectal. La cama se siente muy dura. Edema. Neuralgia. Reumatismo. Hemorragia, de sangre delgada y pálida. Entre más suda, más grande es el dolor.

AGRAVACION:

Por el sudor. Corrientes. Por hablar. Después del sueño. Por caminar. Estornudando.

MEJORIA:

En una habitación fresca. Caminando al aire libre.

MENTE:

Enamorado. Temor a la sociedad.

CABEZA:

Neuralgia (derecha, luego izquierda); con velo ante los ojos.

OJOS:

Como con una gasa delante de los ojos. Como si una pieza de fierro frío presionara a través del ojo derecho causando ardor.

NARIZ:

Muchos estornudos con coriza fluída. Epistaxis.

ABDOMEN:

Adolorimiento con sudor caliente que no alivia. Peritonitis.

URINARIO:

Dolor arrastrante y pesado en la uretra. Orina escasa.

MUJERES:

Sensación de inflamación intensa alderredor del útero, pesadez del bajo vientre con sudor caliente; sin alivio. Inflamación y enrojecimiento de los genitales externos. Metritis puerperal.

RESPIRATORIO:

Tos por cosquilleo en la garganta.

PIEL:

Urticaria. Comezón intensa y ardor como de fuego después de rascarse.

SUEÑO:

Somnoliento; < durante el dolor.

FIEBRE:

Sudor profuso y caliente; tan pronto como cae dormido; sin alivio.

RELACIONES:

Ap; Calc; Lil-t.

TRIFOLIUM PRATENSE

GENERALIDADES:

Sensación en los pulmones como si respirara aire caliente; como si el aire estuviese lleno de impurezas. Preventivo en las paperas. Retarda el progreso de los tumores cancerosos antes de que la ulceración se haya establecido. Use Tintura madre.

TRILLIUM

GENERALIDADES:

El nombre común es Raíz del parto, que dá indicaciones para su uso. Es un remedio hemorrágico, hemorragias de todas clases; antes del parto; post-parto; en climaterio; tumores fibrosos; borbollantes; de sangre roja y brillante; con mucho desvanecimiento y vértigo. Relajamiento de la región pélvica.

AGRAVACION:

Movimiento. Climaterio. Sentándose erguido.

MEJORIA:

Ejercicio al aire libre. Por un vendaje apretado. Doblándose hacia adelante.

CABEZA:

Dolor sordo < ruido, caminando, tosiendo; > doblándose hacia adelante.

OJOS:

Los siente muy grandes como si se fueran a salir de las órbitas. Todo se vé azul.

NARIZ:

Sangramiento profuso de la nariz.

BOCA:

Sangramiento después de una extracción dentaria.

ABDOMEN:

Desmayo y hundimiento en el estómago. Diarrea crónica con descarga sanguinolenta. Disentería con paso de casi pura sangre.

MUJERES:

Hemorragias uterinas, con sensación como de que los huesos de las caderas, espalda y muslos fueran forzados a apartarse o caer en piezas, > por un vendaje apretado; con desvanecimiento y hundimiento en el estómago. Reglas cada dos semanas. Várices del embarazo. Goteo de orina después del parto. Descarga de loquios profusos, sanguinolentos por largo tiempo. Leucorrea; profusa, amarilla, pegajosa.

COMPLEMENTARIO:

Calc-p.

RELACIONES:

Sabi.

TROMBIDIUM

GENERALIDADES:

Tiene un lugar específico en el tratamiento de la disentería < por comer y beber. Evacuaciones café, delgadas, sanguinolentas, con mucho dolor antes y después de evacuar. Evacuaciones sólo después de comer. Descarga mucosa de la nariz al tomar su cena.

TUBERCULINUM

GENERALIDADES:

Este nosode está preparado ya sea por un absceso tuberculoso o por un extracto glicerinoso de un cultivo puro de bacilos tuberculosos. Afecta la mente; pulmones; cabeza, occipucio; glándulas y laringe. Es muy valioso en el tratamiento de una tuberculosis incipiente. Los síntomas están cambiando constantemente- empiezan y terminan súbitamente; o son de naturaleza obscura y los remedios bien seleccionados fallan en procurar remedio. Debilidad, emaciación y buen apetito. Los pacientes se resfrían fácilmente a la menor exposición; que luego termina en diarrea. Muy susceptibles a los cambios de clima. Recaídas. Siempre cansado; el movimiento causa intensa fatiga. Agotamiento incrementado y vitalidad disminuía. Abatimiento rápido. Adaptado a sujetos de complexión ligera, de pecho estrecho. Escrófula; crecimiento de las glándulas. Adenoides. Miasma Tuberculoso. Estremecimientos. Niños mentalmente deficientes. Epilepsia. Neurastenia. Muy sensibles mental y físicamente. Debilidad nerviosa. Temblores. La ropa se siente húmeda. Cuando Tub. falla, Syph. con frecuencia le sigue favorablemente, produciendo una reacción. Este remedio debería darse cuando el corazón está débil. Dolores magullantes a través de todo el cuerpo. Huesos dolorosos. Hormigueo. Desvanecimientos.

AGRAVACION:

Habitación cerrada. Movimiento. Ejercicio. Clima; cambiante; humedad; fría. Corrientes. Despertando. Ruido. Pensando en ello. Excitación mental. Música. Presión de una banda en la cintura. De pie. Periódicamente.

MEJORIA:

Viento fresco. Al aire libre. Movimiento.

MENTE:

Sensible; a la música; toda nimiedad irrita; < al despertar. Accesos de temperamento violento; quiere pelear; tira todo a todos; aún sin causa. Insatisfecho; siempre quiere un cambio, quiere viajar; no quiere permanecer en un sitio por largo tiempo, quiere hacer algo diferente, aún, encontrar un nuevo doctor, cansancio de la vida. Aversión al trabajo mental. Descuidado. Temor a los animales; a los perros. Se queja y gime con cualquier indisposición. Deseo de usar lenguaje grosero, maldice y jura. Humor cambiante. Confusión; todo en la habitación parece extraño. Alucinaciones nocturnas; se despierta atemorizado. Los niños se despiertan gritando con inquietud. Ansioso. Desesperanzado. Locuaz; durante la fiebre. Contradictorio; manía y melancolía; insomnio con estupor.

CABEZA:

Dolor de cabeza profundo y violento; se arranca el cabello o golpea su cabeza con los puños o contra la pared o piso, < movimiento. Punzada desde arriba del ojo (derecho) atraviesa la cabeza hacia la parte posterior del oído (izquierdo) o desde la protuberancia frontal derecha a la región occipital derecha. El cerebro se siente suelto. Meningitis. Cráneo sensible. Plica polónica (por ejem. cabello enmarañado). Cefalalgias periódicas.

OJOS:

Eczema en los márgenes de los párpados. Globos oculares adoloridos como magullados < volteándolos. Meningitis con bizqueo.

OIDOS:

Otorrea persistente y ofensiva. Perforación del tímpano con orillas razgadas.

NARIZ:

Grupos de pequeñas ampollas, muy dolorosas que aparecen sucesivamente en la nariz; pus verde y fétido. Sudor. Catarros que terminan en diarrea.

CARA:

Vieja, edematosa, pálida. Adolorimiento en los huesos malares.

BOCA:

Sensación como si los dientes estuviesen apeñuscados o fuesen demasiados para la cabeza. Dientes sensibles al aire. Dentición retardada. Resequedad, pegajosa. Ampollas negras en los labios.

GARGANTA:

Expectora moco después de comer. Adenoides. Resequedad de las coanas posteriores. Amígdalas crecidas.

ESTOMAGO:

Desea leche fría o dulces. Aversión a la carne, a toda la comida. Sensación de hambre, que lo obliga a comer.

ABDOMEN:

Diarrea súbita temprano por la mañana. Evacuaciones; cafés; fétidas; acuosas; descargadas con mucha fuerza. Tabes mesentérica. Diarrea de los niños que escurre por semanas; con desgaste; agotamiento y palidez azulosa. Desgarramiento en el recto al toser. Glándulas inguinales induradas y visibles. Abdomen timpánico. Diarrea crónica con sudor excesivo. Constipación; evacuaciones grandes y duras, luego diarrea. Región del bazo protuberante; dolor punzante en los lados después de correr.

URINARIO:

Debe hacer esfuerzo para evacuar y pasar agua. Enuresis. Sedimento urinario pegajoso.

MUJERES:

Reglas; poco después de dar a luz; demasiado adelantadas, demasiado profusas, duran largo tiempo. Dismenorrea; el dolor aumenta con el flujo. Tumores mamarios; benignos. Retracción de pezones. Amenorrea. Dolor severo en el seno al empezar las reglas.

RESPIRATORIO:

Sensación de sofoco, aunque haya mucho aire fresco; suspira por aire frío. Ronquera > por hablar. Tos; seca; dura, más durante el sueño; < disnea; con frío y cara roja > noche; < levantando los brazos. Estertor mucoso en el pecho; sin expectoración. Punto doloroso en el pecho. Asma. Neumonía; después de influenza. Expectoración profusa. Esputo espeso, amarillo o amarillo verde.

CORAZON:

Pesadez y presión sobre el corazón. Palpitación; al tomar una respiración profunda; después del alimento de la noche.

CUELLO Y ESPALDA:

Tensión en la nuca. Dolor en la espalda, con palpitación. Frío entre los hombros o la espalda superior.

EXTREMIDADES:

Manos y brazos que se sienten cansados; incapaz de escribir o elevar una taza o un vaso. Punta de los dedos cafés. Sensación de fatiga en los miembros. Pies fríos; en cama. Los miembros se sienten débiles o como paralizados < cena. Reumatismo articular agudo. Dolores en el nervio ulnar.

PIEL:

Seca; áspera; sensible, fácilmente bronceada; comezón en aire fresco. Escamas como de salvado. Psoriasis. Eczema crónico. La comezón cambia de lugar al frotar.

SUEÑO:

Sueños; vívidos; de vergüenza; atemorizantes. Despierta con horror. Sensación de estremecimiento al caer dormido. Inquietud por la noche y gritos en sueños.

FIEBRE:

Escalofriado, al empezar a dormir pero quiere aire fresco. Calor en la mejilla; o el lado afectado; en puntos. Bochornos de calor < por comer. Ardor en genitales. Sudor; fácil; frío; pegajoso; en las partes superiores; en las manos; < toser; mancha de amarillo. Quiere cubrirse en todas las etapas.

COMPLEMENTARIO:

Bell; Cal; Kali-s; Psor; Sep; Sul.

RELACIONES:

Bar-c; Calc-p; Pho; Puls; Sil.

URANIUM NITRICUM

GENERALIDADES:

Un remedio para la glicosuria y orina aumentada. Sed excesiva, náusea; vómito, apetito excesivo; diabetes mellitus e insípida. Gran emaciación. Debilidad, tendencia a la ascitis e hidropesía general. Nefritis. Presión arterial alta. Ardor en el estómago; úlcera gástrica. Incontinencia de orina. Ardor en la uretra mientras pasa orina. Impotencia con emisiones nocturnas. Reglas suprimidas durante la diabetes.

AGRAVACION:

Por la noche.

MEJORIA:

Respirando profundamente.

URTICA URENS

GENERALIDADES:

Como su nombre común, ortiga picante, lo indica, produce dolores aguijoneantes, o aguijoneantes-ardorosos. Afecta las glándulas mamarias; órganos genito-uritarios; hígado y bazo. Olor de orina en el cuerpo. Diatesis de ácido úrico. Urticaria asociada o alternando con reumatismo. Hemorragias. Malos efectos de quemaduras; aguijones de abejas, por comer mariscos; leche suprimida; urticaria. Edema angio-neurótico.

AGRAVACION:

Aire de nieve; aire fresco y húmedo. Baño fresco. Cada año. Contacto. Acostándose sobre el brazo.

CABEZA:

Dolor de cabeza, con punzadas en el bazo.

ABDOMEN:

Evacuaciones; pequeñas, dolorosas, con moco mezclado con materia blanca como la clara cocida de un huevo. Comezón intensa del ano; por lombrices. Vómito por supresión de urticaria.

URINARIO:

Orina acre causando comezón. Toxemia de ácido úrico. Orina suprimida.

HOMBRES:

Comezón, ardiente de genitales; del escroto; lo mantiene despierto.

MUJERES:

Prurito vulvar; comezón, aguijoneante; y edema de las partes. Secreción disminuída de leche; después del parto. Hinchazón del seno; con dolores aguijoneantes, ardientes. Detiene el flujo de leche después del destete.

RESPIRATORIO:

Hemoptisis; después de ejercicio violento.

EXTREMIDADES:

Dolor continuo en el deltoides (derecho) rotando el brazo hacia adentro; no se puede poner un saco. Gota aguda.

PIEL:

Comezón, parches rojos, elevados. Rash irritante; < cada año en la misma estación. Calor picante. Urticaria; elevada; con reumatismo; después de mariscos; con lombrices. Vesículas. Quemaduras y escaldadura del primer grado; con ardor intenso, comezón; se aplica localmente.

FIEBRE:

Sudoración: por la noche; con vértigo; con latidos en todo el cuerpo.

RELACIONES:

Form; Nat-m; Oci-c.

USTILAGO MAYDIS

GENERALIDADES:

El hongo negro del maíz afecta los órganos sexuales femeninos; piel, pelo y uñas. Sangramientos lentos congestivos, pasivos o en coágulos; sangre oscura, pero acuosa. Hemorragias oscuras. Como un nudo; en el útero, intestinos, garganta, etc. Pérdida del cabello y uñas. Postración por abuso sexual. Adaptado a mujeres altas, delgadas, en el climaterio.

AGRAVACION:

Climaterio. Contacto. Movimiento.

MENTE:

Gran depresión de espíritu. Lloro frecuentemente.

CABEZA:

Secreción pegajosa que pegostea el cabello. Costras de leche. Vértigo; con manchas blancas ante los ojos; en el climaterio; con reglas profusas. Dolores de cabeza nerviosos por irregularidades menstruales.

ABDOMEN:

Dolor como si los intestinos estuviesen amarrados en un nudo, con dolor cólico > por evacuaciones duras, o por constipación.

HOMBRES:

Deseo irresistible de masturbarse. Fantasías eróticas. Emisiones; cada noche y aún cuando está hablando con una mujer.

MUJERES:

Menstruación vicariante, por pulmones e intestinos. Reglas; medio líquidas, medio coaguladas; rojo brillante; < por la mínima provocación. Menorragia; del climaterio; después de abortos. Rezumamiento de sangre oscura; coagulada, formando hebras largas y negras. Cérvix esponjoso, con sangramiento fácil. Dolor de ovario agudo (izquierdo). Incomodidad ardorosa en los ovarios (derecho). Inflamación del útero y ovario (izquierdo). Dolor que se dispara hacia los muslos. Leucorrea fétida, amarilla o café. Dolor bajo el seno izquierdo; en la orilla de las costillas, entre los períodos; constante. Hipertrofia del útero; sub-involución. El útero se siente como amarrado en un nudo. Dolores de bajo vientre cuando el niño amamanta. Fibromas. Se ha notado que los tumores desaparecen después de su uso. Reglas suprimidas, sin causa, con síntomas acompañantes.

ESPALDA:

Sensación de agua hirviendo que fluyera a lo largo de la espalda.

EXTREMIDADES:

Contracciones musculares; de los miembros inferiores.

PIEL:

Seca, caliente.

RELACIONES;

Asaf; Bov; Sec.

VACCININUM

GENERALIDADES:

Un nosode preparado con materia vacuna. Un remedio útil para los estados mórbidos crónicos conocidos como Vaccinosis. Neuralgia; erupciones de piel inveterada; crecimientos nuevos; condiciones sicóticas.

RELACIONES:

Maland; Thu.

VALERIANA

GENERALIDADES:

Produce una hipersensibilidad de Los nervios; espinales; génito-urinaros. Afecta la mente; músculos, pantorrillas, talones; tendón de Aquiles. La disposición física y mental cambia de pronto; y va a extremos. Los dolores son como dardos, desgarrantes; se mueven hacia afuera; se sienten aquí y allá o vienen y se van; brincan de un lugar a otro. Ilusiones; de la visión; de calor; olores; o gusto. Sensación de flotación, de dualidad; de una pelota o un tapón. Falta de reacción. Síntomas que se alternan. Agitación de todos los nervios, sacudidas, contracturas, temblores. Inquietud; impulso a moverse; no puede mantenerse quieto. Débil; partes aisladas; ojos; brazos, muñecas; poplíteo, etc. Globo. Sensación de una cuerda que colgara hacia abajo desde el esófago. Mujeres histéricas, nerviosas, irritables y débiles en quienes las facultades intelectuales predominan y que sufren de neuralgia. Las partes rojas se vuelven blancas. Las lesiones ligeras causan espasmos. Llagas por decúbito tempranas. Accesos de epilepsia. Parálisis y contracción de miembros; histéricos. Calor e inquietud constantes.

AGRAVACION:

Descanso. De pie. Excitación. Noche. Al aire libre; corrientes de aire. Ayunando. Oscuridad. Agachándose.

MEJORIA:

Cambiando de posición. Dando un paseo. Masajeando. Después de dormir. Comidas. Desayuno.

MENTE:

Perturbaciones mentales que pasan de un extremo emocional a otro; desde la alegría más grande al pesar más profundo; de la dulzura al enfurruñamiento. Impaciencia; pasa rápidamente de un asunto a otro. Ideas erróneas; piensa que ella es otra persona; como si todos los que le rodearan fueran extraños y desagradables. Se retuerce. Ira. Predispuesto a desmayarse. Histeria; teme estar sola, especialmente en la oscuridad. Enojado; furioso, renegón. Vé, imagina animales, hombres.

CABEZA:

Duele con espasmos; > paseándose < a la luz del sol. Frialdad en la parte alta de la cabeza. Vértigo; al agacharse; se siente ligero, como flotando.

OJOS:

Brillo y luz ante los ojos en una habitación oscura; visión aguda. Los objetos parecen demasiado cerca de los ojos. Mirada salvaje.

OIDOS:

Ilusión de oído, imagina que oye campanas sonar. Otagia; < corrientes y frío.

CARA:

Dolor que aparece de pronto con espasmo. Los músculos se sacuden. Mejillas rojas y calientes al aire libre.

BOCA:

Gusto grasoso y rancio. Náusea que se siente en la garganta. Lengua con cubierta gruesa.

GARGANTA:

Como con un hilo en la garganta; con salivación y vómito.

ESTOMAGO:

Eructos como de huevos podridos. Hambre con náusea; como si viniera del ombligo. El niño vomita leche cortada en grandes cuajos después de amamantar; después de un disgusto de su madre. Sensación de algo caliente que se eleva desde el estómago, causando sofocación. Calambres en el estómago.

ABDOMEN:

Inflado. Calambres. Flatulencia; histérica. Diarrea delgada, acuosa; con coágulos de leche cortada; con gritos violentos en los niños. Calambres, después de comer, en la cama por la noche. Retrae el abdomen, involuntariamente.

URINARIO:

Orina aumentada y más frecuente; en mujeres nerviosas.

RESPIRATORIO:

Atragantamiento en la garganta al caer dormido. Despierta como si se sofocara. Asma espasmódica.

CORAZON:

Punzadas en el corazón, con pulso rápido, pequeño y débil.

EXTREMIDADES:

Dolor de calambre, eléctrico como choques en el húmero (izquierdo), lo despierta de su sueño. Dolor de talones cuando se sienta o constantemente. Dolor de ciática < estando de pie, sentado o descansando > al caminar o masajeando. Sacudidas constantes. Dolor tensivo en las pantorrillas > cruzando las piernas. Calambres en los bíceps (derecho) mientras escribe. Calambre en las manos y pies que impiden el sueño. dolor desde la pantorrilla hasta los talones. Ciática; < estirando los miembros, mientras está de pie. Las piernas se sienten ligeras después de caminar.

SUEÑO:

Insomnio con comezón nocturna y espasmos musculares; por excitación nerviosa.

FIEBRE:

El frío empieza y corre hacia abajo de la espalda desde el occipucio. Fiebre compuesta solamente de calor desagradable. Chorros súbitos de sudor; principalmente en la frente. Cuerpo helado; con náusea y vómito.

RELACIONES:

Asaf; Ign; Pul.

VANADIUM

GENERALIDADES:

Un remedio para condiciones degenerativas del hígado y arterias. Degeneración grasosa del corazón y el hígado. Arterio-esclerosis. Parches en la frente profundamente pigmentados en afecciones del hígado. Debilidad profunda.

VARIOLINUM

GENERALIDADES:

Nosode preparado con linfa de pústulas de varicela, (viruela) que ha probado su eficiencia preventiva contra el contagio de la varicela e infecciones por vacuna. Modifica y ayuda en la cura de la viruela. Adolorimiento general en los músculos < en la espalda; occipucio y piernas. Depósitos calcareos en las venas, médula espinal, etc.

AGRAVACION:

Movimiento. Vacunación.

MENTE:

Miedo mórbido a la viruela.

CABEZA:

Sensación rara en el cerebro. Cefalalgia con frialdad de hielo de pies y manos.

OJOS:

Visión verde, al levantarse.

BOCA:

La lengua se sale mientras está dormido. Gusto fétido, metálico. Boca ofensiva.

ESTOMAGO:

Todo olor causa náusea. Necesidad de regurgitar la comida. Vómito de leche inmediatamente después de beberla.

ABDOMEN:

Timpanitis; muy abultado; parece que está embarazada.

ESPALDA:

Dolor de espalda con sensación de rotura. Dolor desde la espalda que se dispara hacia el abdomen.

PIEL:

Como si insectos corrieran bajo la piel. Eczema de las palmas. Erupciones pustulares; fétidas. Zona, y dolor que sigue. Ulceras que parecen huecas.

FIEBRE:

Como agua fría que corriera a lo largo de la espalda. Frío violento. Fiebre con ardor intenso. Sudor maloliente.

RELACIONES:

Ant-t; Cimi; Malan.

VERATRUM ALBUM

GENERALIDADES:

El heléboro blanco afecta profundamente la mente; Nervios; abdominales; corazón; sangre, venas; respiración; vértex y sistema digestivo. Evacuaciones profusas; vómito, purga, salivación sudor, orina, con postración profunda; frialdad; azulosidad; y colapso, son rasgos característicos. Los efectos son violentos y repentinos. Es un gran remedio para el desvanecimiento; desmayos por emociones; por el mínimo esfuerzo; lesiones leves, con hemorragia; después de evacuar, vómitos. Transpiración fría en la frente en todos los malestares. Frío; como hielo; aliento; lengua. Espasmos tónicos o calambres; en pecho; intestinos; manos, dedos; dedos de los pies; plantas de los pies; con diarrea. Debilidad progresiva y emaciación en enfermedades agudas; tosferina, fiebre cuartana; etc. Hundimiento repentino de fuerzas. Parálisis después de pérdidas debilitantes. Convulsiones causadas por excitación religiosa; también de niños. Shock post-operativo. Resequedad excesiva de todas las membranas mucosas. Ardores. Los niños sienten mejoría cuando se les pasea en brazos, rápidamente. La sangre parece que corre fría; sepsis sanguínea, piemia. Carfología. Malos efectos de un susto; decepción amorosa, orgullo u honor heridos; exantema suprimido, opio, tabaco, alcohol.

AGRAVACION:

Fatiga. Bebiendo; bebidas frías. Susto. Durante el dolor. Clima húmedo, frío; cambio de clima. Antes y durante las reglas. Antes, durante y después de evacuar. Tacto; presión. Honor y orgullo herido. Por comer opio. Masticando tabaco.

MEJORIA:

Calor, cubriéndose. Por hacer un paseo caminando. Bebidas calientes. Acostándose. Por comer carne. Leche.

MENTE:

Indiferencia sombría. Amativo. Arrogancia. Delirio; temprano; con violencia, locuacidad o lascivia; durante el dolor. Melancolía, la cabeza cuelga, se sienta meditando en silencio; quiere estar solo. Reza, maldice, chilla, en secuencia. Deseo de cortar y desgarrar cosas. Manía que alterna con taciturnidad. Insanía. Remordimiento. Ilusión de un infortunio inminente. Inquietud al ocuparse. Dirección errática en casa. Mentiroso, nunca dice la verdad. Besa a todos; antes de las reglas. Desesperado por el lugar que ocupa en la sociedad; se siente muy desafortunado. Canta, silba, se ríe. Corre de un lugar a otro. Se finge enferma, piensa que está embarazada. Manía puerperal. Ninfomanía; abraza a todos, aún a objetos. Manía religiosa. Habla sobre las faltas de otros y regaña. Angustia, miedo a morir. Desesperado por su salvación. Imagina que el mundo se está incendiando. Se traga su propio excremento. Extravagante, ideas y actos altaneros. Enfermedades imaginarias.

CABEZA:

Sudor frío en la frente; en todos los malestares. Dolor violento que lo lanza a la desesperación, > frío. Sensación de un trozo de hielo en el vértex. Dolor de cabeza; con náusea, vómito, cara pálida, diarrea, diuresis. Se frota la frente. Cabello quebradizo, doloroso. Como si aire frío soplara a través de la cabeza. El vértex produce comezón durante la cefalalgia.

OJOS:

Rodeados de anillos oscuros. Volteados hacia arriba. Lagrimeo con enrojecimiento. Párpados secos, pesados.

NARIZ:

Olor delante de la nariz. Punta helada. Nariz afilada. Epistaxis por el poro derecho, solamente por la noche en sueños.

CARA:

Mortalmente pálida; al levantarse; azulosa; afilada o distorsionada; ceño fruncido; fría; apariencia aterrorizada. Mejilla roja (izquierda) como si quemara. Calambres en la mandíbula al masticar. Trismo. Labios azules; cuelgan.

BOCA:

Dolor de dientes; los dientes se sienten como llenos de plomo. Rechinamiento de dientes. Lengua; fría, pálida, sensación fresca como de menta. Gusto como de menta. Lenguaje con ceceo, tartamudeo o como si la lengua estuviese demasiado pesada. Boca; seca, saliva salada. El agua sabe amarga.

GARGANTA:

Seca; rascadura o aspereza. Cuando bebe agua parece correr por afuera, no parece irse por el esófago.

ESTOMAGO:

Sed ardiente. Desea agua helada; que es vomitada tan pronto como la deglute; quiere todo frío; o bebidas ácidas, frutas jugosas y sal. Vómitos y eructos espumosos. Vómito excesivo con purga; arcadas violentas: Hipo, después de bebidas calientes. Náusea mientras come, no puede pasar la comida sin sentir arqueos. Vómito < bebiendo y con el mínimo movimiento. Aflujo de agua frío. Todas las frutas caen mal causando distensión dolorosa. Hambre atroz a pesar de la náusea y el vómito. Apetito voraz. Las papas (patatas) y los vegetales verdes caen mal. El comer carne y beber leche >.

ABDOMEN:

Retracción dolorosa del abdomen durante el vómito. Hueco del estómago doloroso y ardiente. Sensación de hundimiento y vacío. Sensación ardorosa o fría. Evacuaciones acuosas, verdes, inodoras, o incoloras (como agua de arroz), o en masas grandes; con esfuerzo, hasta la exhaustión, con sudor frío. Diarrea por beber agua fría en días calientes. Peritonitis. Intususcepción. Acción peristáltica revertida. Cólico cortante; como si los intestinos estuviesen amarrados en nudos, con calambres en los miembros y postración rápida. Cólera morbus, infantil. Epigastrio doloroso. Como con carbones calientes. Constipación de infantes amamantados o por clima frío. Heces; delgadas como listón, planas.

URINARIO:

Orina; escasa, rojo-café. Espesa, verdosa, suprimida; involuntaria, durante la tos.

MUJERES:

Ninfomanía; antes de las reglas, por decepción amorosa; pasión insatisfecha; en mujeres enfermas en cama. Dismenorrea con prolapso; con frialdad del cuerpo; diarrea; sudor frío y desmayo por el mínimo movimiento. Eclampsia. Manía puerperal. Reglas; demasiado adelantadas; demasiado profusas, suprimidas. Menorragia; con náusea, vómito, diarrea.

RESPIRATORIO:

El aire parece demasiado caliente. Asma < en clima fría y húmedo > doblando la cabeza hacia atrás. Cosquilleo en la parte baja de la garganta, hacia los pulmones. Tos violenta y continua; con arqueos; < bebidas frías. Estertor en el pecho. Tosferina no cuidada; con complicación. Tos ladrante con eructos < en habitación caliente, micción involuntaria con tos. Pérdida de la voz. Tos al entrar a un cuarto caliente viniendo de aire frío.

CORAZON:

Débil; con dolor cortante. Palpitación visible; con corea. Pulso intermitente; débil, lento; como cuerda. La sangre corre como agua fría a través de las venas.

CUELLO Y ESPALDA:

El cuello está tan débil, que el niño apenas lo puede mantener erecto < tosferina. Dolor de acalambramiento entre las escápulas > movimiento. Sensación de magulladura en la región sacra.

EXTREMIDADES:

Neuralgia braquial, con dolor paralítico y magullante en los brazos. Ardor fino en los brazos, de derecha a izquierda. Los brazos se sienten llenos e hinchados. Cosquilleo en manos y dedos. Calambres en las pantorrillas, durante la evacuación. Sacudidas eléctricas en las piernas; debe sentarse y dejar que las piernas cuelguen de la cama. Dificultad para caminar como parálisis; por debilidad. Dolor en los pies o rodillas como si piedras pesadas estuviesen atadas a las partes, debe caminar. Pies helados.

PIEL:

Arrugada. La siente chamuscada. Azul, fría.

SUEÑO:

Despierta por la noche temblando. Despierta como asustado y sobresaltado.

FIEBRE:

Frialdad general; como hielo; en el vértex; nariz, lengua, boca, miembros, sudor. Calor interno con superficie fría, al estar bebiendo. Las fiebres muestran una frialdad externa solamente. Frío congestivo; con sed.

COMPLEMENTARIO:

Carb-v.

RELACIONES:

Ars; Cam; Cup; Cyanides; Tub.

VERATRUM VIRIDE

GENERALIDADES:

El heléboro verde americano produce condiciones violentas y congestivas; base del cerebro; médula; pulmones; con náusea y vómito y debilidad. Estómago, corazón y capilares también están afectados. Sensación marcada de inquietud en todo el cuerpo. Sacudidas y convulsiones; aquí y allá; durante el sueño; contracciones y temblores, amenazando con convulsiones. Postración muscular; parálisis muscular pseudo-hipertrófica. Pulsaciones generales. Movimiento errático; trastabilleo. Espasmo; con chillidos violentos; opistótonos; antes y después de las reglas. Ardor en diferentes partes; lengua; faringe; cogote; de la piel que está fría; con pellizcos. Uremia. Eclampsia. Efectos súbitos. Desvanecimientos, postración, náusea. Entumecimiento. Como con ropa húmeda en brazos y piernas, o como si la ropa no le quedara bien, siente como si le estuviesen rascando en algún lado. Adecuado para personas pletóricas y sanguíneas. Efectos de una insolación. Reduce la presión sanguínea. Los niños tiemblan como asustados y al borde del espasmo. Corea, sacudidas, contorsiones, no afectados por el sueño, saliva alderredor de los labios. Sacudidas continuas de la cabeza; excitación sexual. Yace con la cabeza baja.

AGRAVACION.

Levantándose. Movimiento. Frío. Acostándose sobre la espalda. Después de un confinamiento. Insolación.

MEJORIA:

Frotándose. Acostado con la cabeza baja. Comiendo.

MENTE:

Locuacidad, con exaltación de ideas. Regañón. Delirio; furioso, gritos, aullidos, golpes, murmullo incesante. Manía; puerperal. Carfología. Temor; de ver a su médico; de ser envenenado. Suspica.

CABEZA:

Vértigo con náusea y postración súbita, > cerrando los ojos y descansando la cabeza. Cabeza retraída. Sacudida constante o movimiento de la cabeza (corea); latidos al levantarse. Adolorimiento del vértex y entre los ojos. Dolor en la parte superior del occipucio con visión disminuída y pupilas dilatadas. Meningitis, bacilar. Apoplejía.

OJOS:

Visión; de manchas rojas; púrpuras; al cerrar los ojos; inestable. Pupilas dilatadas. Vista fija, salvaje, durante el delirio. Inyectado de sangre.

OIDOS:

Sordera, por movimiento rápido con desmayo. Fríos y pálidos.

NARIZ:

Afilada y azul. Estornudos rápidos y continuos con sensación de calor picante en la boca.

CARA:

Abochornada. Lívida e hinchada; pero se vuelve descolorida al sentarse. Tensión que cruza los huesos malares. Sacudidas convulsivas de los músculos faciales. Movimiento de masticación de la mandíbula.

BOCA:

Jalada de una comisura. Lengua; blanca como si estuviese blanqueada; seca; con raya roja que baja por el centro. Gusto como con olor a semen. Olor de la boca como cloroformo o éter. Maloliente. La boca se siente como escaldada.

GARGANTA:

Ardor en el esófago, esofagitis. Como con una bola que subiera por el esófago.

ESTOMAGO:

Muy sediento; bebe poco, lo que > por un corto período. Hipo; doloroso, violento; constante, con espasmos del esófago. Náusea, con vómito y purga, la más pequeña cantidad de bebida o alimento

inmediatamente es rechazada. Vómito; violento, sin náusea. El estómago parece presionar contra la espina. Gastritis.

ABDOMEN:

Dolor y sensibilidad que cruza justo arriba de la pelvis. Dolor cortante desde el ombligo a la ingle. Dolor en los intestinos que corre hacia dentro del escroto. Tenesmo y ardor en el recto > durante y después de evacuar. Enteritis con fiebre alta.

URINARIO:

Orina escasa con sedimento turbio. Cistitis con fiebre.

MUJERES:

Dismenorrea con estranguria. Reglas suprimidas con congestión de la cabeza. Puerperal; fiebre, convulsiones; con manía, o manía que continúa después de que las convulsiones han cesado.

RESPIRATORIO:

Congestión de los pulmones. Respiración lenta y pesada; como con un peso sobre el pecho. Disnea. Tos violenta por cada sobresalto. Neumonía. Ardor en el pecho.

CORAZON:

Dolor sordo; con ardor. Pulso; lleno, largo, suave o lento; con latidos cardíacos fuertes o violentos. Pulsación a través de todo el cuerpo, más en el muslo derecho.

CUELLO Y ESPALDA:

Cuello y hombros adoloridos. No puede sostener la cabeza levantada. Opistótonos.

EXTREMIDADES:

Calambres en las piernas; pies, plantas, dedos, dedos de los pies. Vesículas en las manos. Como choques eléctricos violentos en los miembros. Sacudidas convulsivas. Dolor alrededor de los cóndilos. Pulsación que se siente en los muslos. Manos inquietas, durante el delirio.

PIEL:

Hormigueo y picoteo en la piel. Comezón en diferentes partes > frotando. Fría, pegajosa, azulosa. Erisipelas, con síntomas cerebrales.

SUEÑO:

Coma. Insomnio. Sueños de ahogados; de estar en el agua.

FIEBRE:

Hiperpirexia u oscilación rápida de la temperatura con sudor. Sudor frío y pegajoso o caliente. Fiebre cerebro-espinal; supurativa; reumática y aguda. Fiebre alta en la noche, más abajo de lo normal por la mañana.

RELACIONES:

Aco; Gel.

VERBASCUM

GENERALIDADES:

Se prepara un aceite a partir de unas flores llamadas Mulinias, aceite que se ha encontrado útil localmente en casos de sordera o dolor de oído. Este remedio tiene un efecto marcado sobre los nervios, esp. de la rama maxilar inferior del quinto nervio; oídos; tracto respiratorio, vejiga y lado izquierdo. Calma la irritación nerviosa bronquial y urinaria. Produce catarros y resfríos; efectos espasmódicos y neuralgias. Dolores desgarrantes, punzantes, acalambrantes; de apretón, aplastantes, paralizantes.

AGRAVACION:

Corrientes. Cambio de temperatura. Con cada resfrío. 9 a.m. a 4 p.m. Dos veces al día, a la misma hora. Hablando. Estornudando. Contacto.

MEJORIA:

Inspiración profunda.

OJOS:

Dolor en los ojos como por constricción de las órbitas.

OIDOS:

Sordera. Dolor de oído. Sordera por entrada de agua, como cuando se nada o como tapado por una válvula. Entumecimiento (izquierdo).

NARIZ:

Coriza, con lagrimeo caliente.

CARA:

Prosopalgia < presionando los dientes unos con otros, al menor movimiento; en los huesos malares.

BOCA:

Abundante agua salada en la boca.

ABDOMEN:

Como con un tapón o retorcadura alderredor del ombligo. Hemorroides; que obstruyen la evacuación, inflamadas.

URINARIO:

Enuresis; por la noche; < al toser.

RESPIRATORIO:

Ronquera; la voz suena como una trompeta. Ataques frecuentes de tos hueca y profunda, con sonido como de trompeta, > por respirar profundamente. Tos; nerviosa; sin despertar.

RELACIONES:

Aco; Plat; Sep.

VESPA CRABRO

GENERALIDADES:

Como la avispa, produce dolores punzantes, ardorosos como pinchado como por agujas al rojo vivo. Convulsiones, pérdida de la conciencia, no responde cuando se le habla, mira a la distancia, no tiene recuerdo del ataque.

AGRAVACION:

Cerca de una estufa caliente, o en una habitación cerrada.

MEJORIA:

Lavando las manos en agua fría.

VIBURNUM OPULUS

GENERALIDADES:

El nombre común: Corteza del calambre, muestra cómo actúa este remedio. Es un remedio para calambres en general. Efectos violentos, espasmódicos, nerviosos, esp. en mujeres dependiendo de un origen ovárico o uterino. Los dolores la ponen tan nerviosa, que no se puede mantener quieta. Hemorragias. Adecuado para sujetos altos, esbeltos, de cabello claro y oscuro, histéricos. Síntomas del lado izquierdo. Se siente mal totalmente, en malestares pélvicos. Condiciones paralíticas; después de convulsiones.

AGRAVACION:

Susto. Antes de las reglas. Aire helado, como de nieve. Acostándose sobre el lado izquierdo. Sacudida súbita. En una habitación cerrada.

MEJORIA:

Descanso. Presión. Al aire libre.

MENTE:

Muy nervioso e irritable.

CABEZA:

Vértigo < descendiendo escaleras. Se siente desvanecer al sentarse erecto. Dolor terrible aplastante < región parietal izquierda con sensación como si la cabeza se abriera y cerrara.

OJOS:

Sensación dolorosa en los globos oculares.

CARA:

Abochornada y caliente.

ESTOMAGO:

Náusea constante > por comer. No hay apetito.

ABDOMEN:

Dolor acalambante, agudísimo, cólico o adolorimiento pesado en hipogastrio; > reglas.

URINARIO:

Micción frecuente y profusa; durante la cefalalgia; reglas; hemorragias, etc. No puede detener el agua al toser o caminar. Disuria, espasmódica.

MUJERES:

Reglas; demasiado atrasadas, escasas, durando sólo unas horas, ofensiva. Dismenorrea; con flatulencia; eructos fuertes y nerviosismo; espasmódica; membranosa. Sensación de adolorimiento fuerte o calambres agudísimos; en la pelvis; > reglas. Aborto frecuente y muy temprano; causando aparente esterilidad. Dolores de falso parto. Entuertos violentos y persistentes. Hemorragia uterina. Leucorrea; espesa, blanca, rayada de sangre < durante la evacuación. Conciencia de los órganos sexuales internos. Impide el aborto cuando se dá antes que las membranas se rompan. Dolores uterinos que se esparcen alderredor de la pelvis, con frecuencia extendiéndose hacia los muslos. Organos pélvicos que se voltean alrevés.

RESPIRATORIO:

Ataques de sofoco por la noche < frío, húmedad. Asma infantil.

CUELLO Y ESPALDA:

Dolor de espalda con cansancio > presión. Lumbago > caminando con un bastón apretado, y los brazos cruzados sobre la espalda. Dolores en la espalda que terminan en un calambre de útero o baja hacia los muslos.

EXTREMIDADES:

Calambres en las pantorrillas, antes de las reglas.

PIEL:

Empeines en mejillas, brazos, etc.

RELACIONES:

Caul; Pul; Sep.

VINCA MINOR

GENERALIDADES:

Afecta la piel y el cabello y es efectivo en hemorragias uterinas. Debilidad y postración, acompañando muchos sufrimientos; debilidad y desvanecimiento como si fuese a morir. La fatiga mental causa una sensación de temblor y tendencia a sobresaltarse.

AGRAVACION:

Después de deglutir. Enojo. Agachándose. Caminando.

CABEZA:

Puntos en el cráneo que rezuman una humedad maloliente, pegosteando el cabello. Comezón corrosiva en el cráneo. Plica polónica (cabello apelmazado). Manchas de calvicie cubiertas con un cabello lanoso y corto. El cabello se cae y es reemplazado por cabello gris.

NARIZ:

Se pone roja al mínimo enojo. Llagas en la nariz. Sangramiento nasal frecuente.

GARGANTA:

Picadura en el esófago bajo; que provoca la deglución.

MUJERES:

Reglas; profusas, fluyendo como un chorro; sin interrupción; con gran debilidad; en el climaterio. Hemorragia uterina pasiva, mucho después del climaterio. Fibromas sangrantes.

PIEL:

Muy sensible, se vuelve roja e inflamada por el mínimo frotamiento. Eczema rezumante mezclado con costras gruesas y fétidas. Prurito corrosivo.

RELACIONES:

Ust.

VIOLA ODORATA

GENERALIDADES:

La violeta dulce produce gran debilidad nerviosa. Afecta los oídos, ojos, muñecas (derecha) y piel. Combina síntomas de ojo, oído y riñón. Afecciones por lombrices en niños. Tensión. Adecuado para muchachas altas, esbeltas, nerviosas. Actividad nerviosa, luego agotamiento repentino.

AGRAVACION:

Clima nublado. Aire frío. Música. Pubertad. Descargas suprimidas.

MENTE:

Propenso a llorar, sin saber por qué. Aversión a la música, especialmente a la de violín. Comportamiento infantil; abatido; rehúsa comer; habla en voz baja y suave.

CABEZA:

Tensión en el cráneo que se extiende a la parte superior de la cara. Cefalalgia que cruza la frente, sobre las cejas; debe fruncir las cejas. Ardor en la frente.

OJOS:

Dolor desde los ojos (izquierdo) hasta el vértex < tos; coroiditis. Ilusión óptica; círculos serpentinos, ardientes. Calambres en los ojos. Los párpados tienden a cerrarse sin somnolencia física.

OIDOS:

Afección, con dolor en los globos oculares. Otorrea; recurrente; desde el nacimiento. Sordera.

NARIZ:

Punta adormecida; como por un golpe.

ESTOMAGO:

Desea carne.

ABDOMEN:

Comezón en el ano. Lombrices.

URINARIO:

Orina lechosa con olor fuerte. Enuresis; en niños nerviosos.

MUJERES:

Disnea, durante el embarazo.

RESPIRATORIO:

Opresión en el pecho; como con un peso. Respiración difícil, ansiedad y palpitación. Ataques de tos de larga duración durante el día solamente; con disnea.

EXTREMIDADES:

Hombros fríos. Reumatismo de los músculos deltoides y muñeza (derecha) esp. en mujeres. Temblor de miembros. Dolor presivo en los huesos de los dedos.

PIEL:

Seca, con palmas húmedas.

SUEÑO:

Bostezo y estiramiento sin somnolencia.

RELACIONES:

Pul; Spig.

VIOLA TRICOLOR

GENERALIDADES:

Piel; del cráneo y órganos urinarios son los centros de acción principales de este remedio. Síntomas combinados urinarios con afecciones de piel. Paroxismos nerviosos después de haber suprimido una costra de leche; eczema.

AGRAVACION:

Presión en el lado opuesto al lado doloroso. Invierno. Aire frío.

CABEZA:

Costras agrietadas, gomosas, en el cráneo, exudando un fluido tenaz y amarillo que pega el cabello; con hinchazón de glándulas cervicales. Costras de leche.

URINARIO:

Orina ofensiva, oliendo como la orina de los gatos. Enuresis.

HOMBRES:

Emisiones seminales; con sueños vívidos; al evacuar. Hinchazón del prepucio con comezón.

EXTREMIDADES:

Reumatismo, articular, comezón en algo como erupciones alderredor de las articulaciones.

PIEL:

Eczema; de la infancia. Impétigo. Ampollas grandes en todo el cuerpo; en niños escrofulosos.

RELACIONES:

Rhus-t.

VIPERA

GENERALIDADES:

El veneno de la Serpiente alemana común afecta la sangre y los vasos sanguíneos, esp. las Venas; causando inflamación de las venas y tendencia hemorrágica. Parálisis; ascendiente; paraplejía; del pié. Neuritis múltiple. Poliomiélitis. Sensación de estallido. Afecciones climatéricas. Bocio.

AGRAVACION:

Dejando colgar las piernas. Cada año. Frío. Contacto. Cambio de clima.

NARIZ:

Epistaxis; con vértigo; mientras amamanta al niño.

BOCA:

Lengua hinchada; café-negrucza, procidente. Labios; azules; hinchados. Lenguaje difícil. Cara hinchada.

GARGANTA:

Hinchada como en el bocio. Edema de la glotis.

ABDOMEN:

Dolor agudísimo en el epigastrio < presión. Dolor violento en hígado crecido que se extiende al hombro y la cadera; ictericia, con fiebre.

URINARIO:

Hematuria.

MUJERES:

Hemorragia climatérica; flujo rojo con coágulos rojos; no profusa pero continua; con postración y desvanecimiento; por amamantar al niño.

EXTREMIDADES:

Plenitud y dolor insoportable en la pierna como si fuese a estallar; debe sostener las partes elevadas; sentarse con los pies altos. Calambres; o miembros inferiores azules. Paso arrastrante causado por parálisis; del pié. Venas varicosas y flebitis aguda.

PIEL:

Ulceras. Gangrena. Ampollas. Carbunclos, con sensación de estallido. Despellejamiento en placas grandes. Linfangioma.

RELACIONES:

Elaps.

VISCUM ALBUM

GENERALIDADES:

El muérdago afecta los nervios y órganos sexuales femeninos. Temblor general como si todos los músculos estuvieran en contracción fibrilar. Neuralgia. Corea por susto. Dolores espinales debidos a causas uterinas. Epilepsia, siente como un resplandor que se eleva desde los pies hasta la cabeza. Malestares gotosos y reumáticos. La sangre no coagula y las heridas no cicatrizan. Ciática con otorrea.

AGRAVACION:

En invierno; clima frío y tormentoso. Movimiento. Acostándose sobre el lado izquierdo. Por enfriarse estando caliente.
Supresión de reglas.

MENTE:

Temor al teléfono.

CABEZA:

Vértigo; persistente; después de un ataque epiléptico. Latidos súbitos en el vértex.

ABDOMEN:

Siente como si algo estuviese arrastrándola hacia abajo, a partir de la cintura. Adolorido alderredor de la cintura.

URINARIO:

Orina lechosa; después de estar de pié.

MUJERES:

Metrorragia; sangre parcialmente brillante y parcialmente coagulada y oscura.

RESPIRATORIO:

Sensación de sofoco estando acostado sobre el lado izquierdo. Asma bronquial, conectada con gota o reumatismo.

CORAZON:

Palpitación, durante el coito, en hombres. Hipertrofia. Presión baja.

EXTREMIDADES:

Dolores desgarrantes, tirantes, en ambos muslos y extremidades superiores. Ciática; con otorrea. Sensación como de una araña que reptara sobre el dorso de la mano y el pié. Como si se aplicara un carbón al rojo vivo en el talón. Sensación de un resplandor desde el pié a la cabeza. Lumbago por frío, quiere que alguien le presione la espalda.

RELACIONES:

Buf.

XANTHOXYLUM

GENERALIDADES:

Comúnmente conocido como Ceniza picante, ejerce su influencia en los nervios; órganos sexuales femeninos; respiración y lado izquierdo. Parálisis de miembros aislados; hemiplejía. Dolores mordientes, tirantes, radiantes, súbitos; neuralgia. Pacientes neurasténicos que son delgados; emaciados, por mala asimilación, con insomnio. Sensación picante; choques como de electricidad. Adormecimiento del lado izquierdo. Las membranas mucosas pican como por pimienta. Como si el piso estuviese suave como lana, al caminar. Lesión en los nervios.

AGRAVACION:

Por dormir. Humedad. Por mojarse los pies. Reglas suprimidas.

MEJORIA:

Vomitando. Acostándose. Bebiendo agua helada.

MENTE:

Sensación atemorizante y nerviosa. No le importa si vive o muere.

CABEZA:

Cefalalgia con latido; dolor como si la cima de la cabeza fuese a volar. Como si la cabeza estuviese dividida en dos partes. Como con una banda alderredor de la cabeza.

GARGANTA:

Gusto a pimienta en la boca y garganta. La siente hueca.

ESTOMAGO:

Dispepsia por comer y beber en exceso.

MUJERES:

Neuralgia ovárica con dolor en las caderas y vientre. Dolor violento, de agonía, dismenorréico, mordiente, no > en ninguna posición; los dolores van a los muslos o radian a todo el cuerpo, aún al corazón. Entuertos con loquios; con dolores característicos. Reglas; demasiado adelantadas, y profusas; sangre espesa, casi negra. Leucorrea, que reemplaza las reglas. Amenorrea.

RESPIRATORIO:

Deseo constante de hacer una inspiración profunda. Opresión del pecho. Tos seca constante, día y noche.

EXTREMIDADES:

Adolorimiento de los muslos antes de las reglas. Dolores tirantes, neurálgicos en los miembros. Hemiplejía (izquierda). Ciática < en verano. Cóccix; muy sensible; parece alargado.

SUEÑO:

Sueño de vuelo.

RELACIONES:

Ars; Lach.

ZINCUM METALLICUM

GENERALIDADES:

Este remedio corresponde al envenenamiento de Nervios y Cerebro. Los nervios y cerebro están cansados; los tejidos se desgastan antes de que sean reparados; causando depresión y enervación. No puede desprenderse de las cosas; no puede desarrollar un exantema o descargas. Períodos de depresión en la enfermedad. Anemia marcada; debilidad incrementada; < comiendo; con inquietud. Envenenamiento por descargas y erupciones suprimidas. Efectos aislados; hormigueo. Una parte entumida, la otra sensible, una parte caliente, la otra parte fría. Dolor en puntos; entre la piel y la carne. Temblor; interno. Sacudidas o contracturas convulsivas < por la noche, durante el sueño, espasmos; por lesiones espinales. Pies inquietos y otros movimientos automáticos de boca, brazos y manos. Siente entumecimiento en todos lados, al acostarse. Neuralgia después de zona > contacto. Dolor transversal; dolores tirantes. Parálisis descendente. Dolores óseos inhabilitantes. Panadizos; azulosidad de la superficie. Descargas sangrantes. Malos efectos de la pena; enojo; susto; veladas; operaciones, estudio excesivo. Corea por susto o por erupciones suprimidas, < durante el sueño, los pies están especialmente afectados. Malos efectos de concusión cerebral.

AGRAVACION:

Agotamiento; mental o físico. Ruido. Contacto. Vino. Después de haberse calentado. Erupciones suprimidas; reglas; descargas. Cosas dulces. Leche. Después de comer.

MEJORIA:

Movimiento. Presión dura. Al aire libre y tibio. Descargas abundantes; reglas, etc. Frotando, rascando. Comiendo.

MENTE:

Repite todas las preguntas antes de contestarlas. Teme ser arrestado por un supuesto crimen. Irritable, cosijoso; grita, si lo molestan o mueven; durante el sueño (niños). Sobresaltado fácilmente; excitado o intoxicado. Olvidadizo. Grita por el dolor. Aversión a la conversación; al trabajo. Sensible a la conversación de otros o al ruido. Se sobresalta como asustado al despertar y rota la cabeza de un lado a otro. Confundido. Niebla mental. Lloro cuando está enojado. Letárgico. Piensa sobre la muerte calmadamente.

CABEZA:

Vértigo violento con estupor. Cefalalgia de intensidad variable. Dolor presivo en el vértex; en la raíz de la nariz; se extiende a los ojos; con visión débil < calor > presión fuerte; al aire libre. Dolor pesado y adolorido en las sienas < mordiendo. Cansancio que baja desde el occipucio; como por un golpe en el occipucio luego hay debilidad en las piernas. Estallido en la cabeza, al caer dormido. Rota la cabeza; la entierra en las almohadas y rechina los dientes. Occipucio caliente, frente fría. El cabello del vértex se cae. Cabello quebradizo, se parte, sensible. Parálisis del cerebro. Vértex calvo con inflamación del cráneo. Dolores de cabeza, de niños escolares abrumados; por tomar pequeñas cantidades de vino. Dolores de cabeza con visión disminuída < calor. Meningitis. Hidrocefalia después de cólera infantil o diarrea.

OJOS:

Con comezón e inflamación de los párpados y ángulos internos. Conjuntivitis < canto interno. Los siente jalados juntos. Lagrimación al comer. Pterigión. Rotación de ojos. Bizqueo. Vé cuerpos luminosos o hay un ardor intenso después de una operación.

OIDOS:

Punzadas frecuentes y agudas; en niños (hombrecitos). Otorrea de pus fétido. Comezón > metiendo los dedos.

NARIZ:

Hinchada. Presión sobre la raíz. Seca, adolorida.

CARA:

Pálida; alternando con enrojecimiento. Azulosa; miserable. Labios; pegajosos, secos, agrietados.

BOCA:

Rechina los dientes. Encías sangrantes. Lenguaje como con eco, (repite). Herpes en la boca por baños en el mar. Gusto amargoso o de sangre.

GARGANTA:

Dolor en los músculos de la garganta externamente, mientras deglute. Dolor en las fauces al bostezar. Gusto amargo.

ESTOMAGO:

Hambre voraz alderredor de las 11 a.m. Agruras < por el azúcar. Gran apresuramiento cuando come o bebe. Parece no comer demasiado rápido. Pérdida de apetito con lengua limpia. Como con un gusano que se arrastrara hacia la garganta viniendo del hueco del estómago: causando tos. Reflujo dulzón que vá a la garganta. Globo histérico que se eleva desde el hueco del estómago. Aversión a la carne, especialmente a la ternera; dulces; alimentos cocinados o calientes. Vino <. Los líquidos son vomitados inmediatamente después de beberlos.

ABDOMEN:

Como con un tapón en la región del hígado o en el ombligo. Flatulencia hipogástrica. Hígado crecido, duro y adolorido. Síntomas reflejos por riñones flotantes. Hemorragias tiradas hacia abajo > calor; < caminando. Evacuaciones; grandes, secas, difíciles, seguidas de micción involuntaria. Comezón en el ano durante la evacuación. Ulceración de las hemorroides. Diarrea tipo cólera en los infantes. Diarrea nerviosa. Afecciones cerebrales por una detención súbita de la diarrea; constipación del recién nacido. Flatos calientes y pútridos. Neuralgia; del bazo; intercostal. Estremecimientos desde las ingles al pene.

URINARIO:

Necesidad violenta, pero orina sólomente en posiciones raras; doblándose hacia atrás, cruzando las piernas, etc. Retención histérica. Sangrado después de orinar. Picaduras presivas alderredor de los riñones. Incapaz de retener la orina, a menos que los pies estén en movimiento constante. Riñón flotante. Micción involuntaria cuando camina, tose o estornuda. Sangramientos vicariantes por reglas suprimidas.

HOMBRES.

Excitación sexual fácil; emisión demasiado rápida o difícil durante el abrazo. Descarga de fluido prostático sin causa. Se agarra los genitales; con tos, etc. Caída de pelo púbico. Tristeza después de la emisión. Hinchazón de testículos con retracción. Neuralgia de los testículos < al caminar.

MUJERES:

Excitación sexual incrementada. Deseo de masturbarse, durante las reglas. Ninfomanía en mujeres en cama; por loquios suprimidos. Reglas profusas y en pedazos. El flujo menstrual es mayor por la noche. Comezón en la vulva durante las reglas; causando masturbación. Venas varicosas durante el embarazo. Senos dolorosos, pezones inflamados. Todos los malestares mejoran durante el flujo menstrual. Dolor en el ovario (izquierdo). Inquietud, tristeza, frialdad del cuerpo, sensibilidad de la espina y pies

inquietos, todos estos síntomas se encuentran en los malestares de las mujeres. Mamas y genitales dolorosos, con reglas suprimidas.

RESPIRATORIO:

Disnea < flatulencia > expectoración. Tos espasmódica, debilitante, < comiendo cosas dulces. Pecho constreñido. Tos seca, antes y durante las reglas. Manosea sus genitales mientras tose, especialmente niños.

CORAZON:

Como con una cubierta sobre el corazón. Latido cardíaco duro. Acción irregular y espasmódica del corazón; salto ocasional y violento. Pulsación violenta durante el calor.

CUELLO Y ESPALDA:

La nuca se siente cansada por escribir o por cualquier esfuerzo mental. El cuello se siente adolorido, luego hay estupor. Ardor a lo largo de toda la espina < sentándose. Adolorimiento en la espina; parte baja de la espalda < volviéndose en la cama; sentándose o en el acto se sentarse o agacharse. Espina sensible, no soporta ser tocado. Dolor cortante en la región intra-escapular < eructos. Dolor sordo alderredor de la última vértebra dorsal y la primera lumbar. Debilidad de la región lumbar < estando de pié.

EXTREMIDADES:

Dolores en los miembros al empezar a acalorarse. Debilidad y temblor de las manos; al escribir; durante las reglas. Eczema de las manos. Dolor transversal, especialmente en los miembros superiores. No puede mantener quietos los pies ni las piernas; calambres, estando frío. Dedos de los pies; los siente hinchados, adoloridos; las puntas duelen. Plantas sensibles. Los huesos de los pies se sienten quebrados. Paso trastabillante, traspies; se tropieza cuando camina, especialmente en la oscuridad y cerrando los ojos. Venas varicosas dolorosas; crónicas. Dolores como de relámpago de ataxia locomotriz; pies sudorosos con dedos inflamados. Hormigueo de pies y piernas como si insectos reptaran por toda la piel, impide el sueño, > masajeando y presionando. Contracciones histéricas, engarrñamiento de los dedos que los tuerce. Ardor en la tibia. Parálisis de los pies. Dolor ulcerativo en talones < caminando. Dolor en el deltoides < levantando el brazo.

PIEL:

Comezón en los muslos y las corvas. Eczema; en los anémicos y neuróticos; de manos. Venas varicosas de piernas y órganos genitales. Hormigueo de pies y piernas como de un insecto que se arrastrara sobre la piel, impidiendo dormir.

SUEÑO:

Roto, no reparador. Gritos fuertes en sueños sin ser conciente de ello. Sacudidas y sobresaltos al caer dormido. Sonambulismo después de emociones suprimidas.

FIEBRE:

Escalofrío en la espalda; como si fuese a aparecer fiebre. Las manos y piernas se ponen frías. Sudor profuso por la noche. Pies sudorosos.

COMPLEMENTARIOS:

Puls; Sep; Sul.

RELACIONES:

Hep; Ign; Kali-p; Lach; Pic-ac.

ZINC ARSENICAL

GENERALIDADES:

Involucra la región lumbar y miembros inferiores. Corea. Agotamiento profundo al mínimo esfuerzo. Dolor occipital. Visión azul. Ardor en la vejiga. Brazo derecho entumido, luego el izquierdo, > escribiendo. Dolor lumbar < fatiga; sentándose; por una sacudida o estando de pié. Las plantas duelen estando cansado > presión.

AGRAVACION:

10 a.m. y 3 p.m. Esfuerzo ligero.

ZINC CROMATO

GENERALIDADES:

Actúa sobre los oídos; nariz; garganta; y lado izquierdo. Dolor mordiente, de apretón, o errático; en choques. Punzadas repentinas que impiden el movimiento.

AGRAVACION:

Movimiento. Acostándose sobre la espalda. Lavándose la cabeza.

MENTE:

Aversión al trabajo; no puede hacerlo.

CABEZA:

Presión hacia adentro; en punto sobre el bregma (sincipucio). Latidos en las sienas.

BOCA:

Gusto metálico.

ESTOMAGO:

Deseo indefinido; no sabe por qué. Aversión aún al pensar en comida.

ABDOMEN:

No puede tolerar las manos sobre su abdomen.

MUJERES:

Resequedad de la vagina con sensación de náusea inminente; 10 a 12 a.m.

RESPIRATORIO:

Tos por cosquilleo en el hueco de la garganta. Expectoración floja, dulce; pero tiene que ser deglutida, o tenaz; con escupidas constantes. Punzada desde la laringe (izquierda) hacia arriba a las tonsilas y luego adentro del oído.

CORAZON:

Picadura en el ápex; por la noche.

ESPALDA:

Picazón roedora abajo y arriba de la escápula izquierda.

EXTREMIDADES:

Pies adoloridos. Calambres con dolor picante y roedor; en los dedos de los pies; por la noche.

RELACIONES:

Puls.

ZINC IODADO

GENERALIDADES:

El corazón; válvulas y nervios están afectados. Dolores de torcedura; punzantes; como por astilla. Sensación de flotación. Dolor ondulante.

AGRAVACION:

Acostado sobre el lado izquierdo. Calor.

MENTE:

Difícil recordar lo que lee.

CABEZA:

Vértigo < acostándose sobre el lado izquierdo.

NARIZ:

Obstruída; por la noche. Se suena bolas espesas; amarillas.

Caliente y seca.

GARGANTA:

Bocio presionando hacia adentro. Dolores como de astilla.

ESTOMAGO:

Frialdad en el estómago e intestinos con tendencia a sudar.

RESPIRATORIO:

Cosquilleo en la garganta; entre más tose, más cosquilleo siente. Dolor ondulante en el borde de las costillas flotantes derechas.

CORAZON:

Palpitación estando acostado sobre el lado izquierdo. Agotamiento miocardial.

EXTREMIDADES:

Los miembros inferiores se sienten como si flotaran; < acostándose sobre el lado izquierdo. Calambres en las pantorrillas, tobillos > presionando los pies contra el piso.

RELACIONES:

Stic.

ZINC FOSFATADO

GENERALIDADES:

Un remedio para la depresión mental; fatiga; niebla mental de los hombres de negocios. Excitación sexual e insomnio. Nerviosismo. Parálisis. Epilepsia. Abuso de bromatos. Olvidadizo, indolente, aprehensivo < la tarde y noche. Hormigueo en todo el cuerpo. Vértigo nervioso > acostándose.

ZINC SULFATADO

GENERALIDADES:

Aclara la opacidad de la córnea. Temblores y convulsiones.

ZINC VALERIANADO

GENERALIDADES:

Afecta los nervios; ovarios y espina. Efectos nerviosos dolorosos. Neuralgia. Hipersensibilidad; nervioso e insomne. Histeria. Hipo obstinado. Epilepsia sin aura.

MEJORIA:

Masajeando.

MENTE:

Excitable. Mentalmente angustiado. Miedo sin fundamento.

CABEZA:

Cefalalgia neurálgica, violenta e intermitente.

OIDOS:

Cosquilleo sobre el oído izquierdo.

CARA:

Prosopalgia.

BOCA:

Gusto ácido en la mañana. Se sofoca al tratar de comer.

ABDOMEN:

Dolores calambroides por flatulencia; en el hipogastrio. Colitis mucosa.

MUJERES:

Ovaralgia; el dolor se dispara desde el abdomen hasta los muslos y luego a los pies; durante y después de las reglas. Dismenorrea; dolores que bajan a los muslos.

ESPALDA:

Adolorida en la parte superior.

FIEBRE:

Frío después de excitación mental o fatiga. Partes frías, arden cuando se les arropa.

ZINGIBER

GENERALIDADES:

Afecta el tracto digestivo. Malestares por comer melón y beber agua impura. Asma de origen gástrico; sin ansiedad < hacia la mañana. Supresión de la orina después de la tifoidea. Tos seca con expectoración profusa en la mañana. Todas las articulaciones se sienten débiles. Los talones duelen después de permanecer de pie por largo tiempo.

ZIZIA

GENERALIDADES:

Movimientos espasmódicos de los músculos de la cara y las extremidades. Sacudidas coléricas durante el sueño. Hipocondriasis, deseo de cometer suicidio.

RELACIONES:

Stic.

Materia Medica de Medicinas Homeopaticas

**Dr. S. R. Phatak, M.
B.B.S.**

Julio de 1977

TABLA DE CONTENIDO

PREFACIO	2
INDICACIONES PARA LOS PRINCIPIANTES.....	3
NOTA DE LOS EDITORES.....	4
INDICE.....	4
ABIES CANADENSIS	9
ABIES NIGRA.....	9
ABROTANUM.....	10
ABSINTHIUM.....	12
ACETIC ACID.....	13
ACONITO.....	14
ACTEA SPICATA.....	17
ADONIS VERNALIS.....	18
AESCULUS HIPPOCASTANUM.....	19
AETHUSA CYNAPIUM.....	22
AGARICUS MUSCARIUS.....	24
AGNUS CASTUS.....	27
AGRAPHIS NUTANS.....	29
ALETRIS FARINOSA.....	31
ALFALFA.....	32
ALLIUM CEPA (CEBOLLA ROJA).....	33
ALLIUM SATIVUM (AJO).....	35
ALOE.....	36
ALUMEN (ALUM).....	38
ALUMINA.....	40
ALUMINA SILICATA.....	43
AMBRA GRISEA.....	43
AMBROSIA.....	46

AMMONIUM BROMATUM.....	46
AMMONIUM CARBONICUM.....	47
AMMONIUM MURIATICUM.....	49
ANACARDIUM.....	53
ANTHRACINUM.....	56
ANTIMONIUM CRUDUM.....	56
ANTIMONIUM TARTARICUM.....	59
APIS MELLIFICA.....	63
APOCYNUM CANNABINUM.....	66
ARALIA RACEMOSA.....	68
ARANEA DIADEMA.....	69
ARGENTUM METALLICUM.....	70
ARGENTUM NITRICUM.....	73
ARNICA MONTANA.....	76
ARSENICUM ALBUM.....	79
ARSENICUM IODATUM.....	83
ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM.....	85
ARUM TRIPHYLLUM.....	86
ASAFOETIDA.....	87
ASARUM EUROPOEUM.....	90
ASCLEPIAS TUBEROSA.....	91
ASTACUS FLUVIATILIS.....	93
AURUM METALLICUM.....	94
AURUM MURIATICUM.....	97
AVENA SATIVA.....	97
BACILLINUM.....	98
BADIAGA.....	98
BAPTISIA TINCTORIA.....	99
BARYTA CARBONICA.....	102

BARYTA IODATA.....	105
BARYTA MURIATICA.....	105
BELLADONNA.....	106
BELLIS PERENNIS.....	110
BENZENUM.....	111
BENZINUM NITRICUM	112
BENZOIC ACIDUM.....	112
BERBERIS AQUIFOLIUM.....	114
BERBERIS VULGARIS.....	114
BISMUTHUM.....	117
BORICUM ACIDUM.....	118
BORAX.....	119
BOTHROPS LANCIOLATUS.....	121
BOVISTA.....	122
BROMIUM.....	124
BRYONIA ALBA.....	126
BUFO.....	130
BURSA PASTORIS.....	132
CACTUS GRANDIFLORA.....	133
CADMIUM SULPHURATUM.....	135
CALADIUM SEGUINUM.....	137
CALCAREA ARSENICA.....	139
CALCAREA CARBONICA.....	140
CALCAREA FLUORICA.....	144
CALCAREA HIPOPHOSPHOROSA.....	146
CALCAREA IODATA.....	147
CALCAREA PHOSPHORICA.....	148
CALCAREA SULPHURICA.....	151
CALENDULA.....	152

CAMPHORA.....	154
CANCER FLUVIATILIS (ASTACUS FLUVIATILIS).....	156
CANNABIS INDICA Y SATIVA.....	157
CANTHARIS.....	159
CAPSICUM.....	161
CARBO ANIMALIS.....	164
CARBO VEGETABILIS.....	167
CARBOLICUM ACIDUM.....	171
CARBONEUM SULPHURATUM.....	172
CARCINOSIN.....	173
CARDUUS MARIANUS.....	173
CASTOR EQUI.....	175
CASTOREUM.....	175
CAULOPHYLLUM.....	176
CAUSTICUM.....	177
CEANOTHUS.....	181
CEDRON.....	182
CEPA (VER ALLIUM CEPA)	183
CHELIDONIUM.....	186
CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM.....	188
CHIMAPHILLA UMBELATTA.....	189
CHINA OFFICINALIS.....	190
CHININUM ARSENICOSUM.....	193
CHININUM SULPHURICUM.....	193
CHIONANTHUS.....	195
CHLORAL HYDRATE.....	196
CHLORUM.....	197
CHOLESTERINUM.....	199
CICUTA VIROSA.....	199

CIMICIFUGA (ACTEA RACEMOSA).....	201
CINA.....	204
CINNABARIS.....	207
CISTUS CANADENSIS.....	208
CLEMATIS ERECTA.....	210
COCA.....	212
COCAINA.....	214
COCCULUS INDICUS.....	214
COCCUS CACTI.....	217
COFFEA CRUDA.....	220
COLCHICUM AUTUMNALE.....	222
COLLINSONIA.....	225
COLOCYNTHIS.....	226
COMOCLADIA.....	229
CONIUM MACULATUM.....	230
CONVALLARIA MAJALIS.....	233
COPAIVA.....	234
CORALLIUM RUBRUM.....	235
CORNUS CIRCINATA.....	236
CRATAEGUS.....	237
CROCUS SATIVA.....	238
CROTALUS HORRIDUS.....	240
CROTON TIGLIUM.....	243
CUBEBA.....	244
CULEX MUSCA (MOSQUITO).....	245
CUNDURANGO.....	246
CUPRUM ACETICUM.....	246
CUPRUM ARSENICUM.....	246
CUPRUM METALLICUM.....	247

CURARE.....	250
CYCLAMEN.....	250
DAPHNE INDICA.....	252
DICTAMNUS.....	253
DIGITALIS.....	254
DIOSCOREA.....	256
DIPHOTHERINUM.....	258
DOLICHOS.....	260
DROSERA.....	260
DULCAMARA.....	262
ECHINACEA.....	264
ELAPS CORALLINUS.....	266
ELATERIUM.....	268
EPIPHEGUS.....	268
EQUISETUM.....	269
ERIGERON.....	269
EUCALYPTUS.....	270
EUONYMUS.....	272
EUPATORIUM PERFOLIATUM.....	272
EUPATORIUM PURPUREUM.....	274
EUPHRASIA.....	276
EUPION.....	278
FAGOPYRUM.....	278
FERRUM IODATUM.....	279
FERRUM METALLICUM.....	280
FERRUM PHOSPHORICUM.....	283
FERRUM PICRICUM.....	285
FLUORICUM ACIDUM.....	286
FORMICA RUFA.....	288

FRAXINUS.....	290
GAMBOGIA.....	291
GELSEMIUM.....	291
GLONOIN.....	295
GNAPHALIUM.....	297
GOSSYPIUM.....	298
GRAPHITES.....	298
GRATIOLA.....	302
GRINDELIA.....	304
GUAIACUM.....	304
GYMNOCLADUS.....	306
HAMAMELIS.....	307
HEKLA LAVA.....	309
HELLEBORE.....	309
HELODERMA.....	312
HELONIAS.....	312
HEPAR SULPHURIS CALCAREUM.....	313
HYDRASTIS.....	317
HYDROCOTYLE.....	319
HYDROCYANIC ACID.....	319
HYDROPHOBINUM (VER LYSSIN).....	321
HYOSCYAMUS.....	321
HYOSCYAMINE HYDROBROMATE.....	323
HYPERICUM.....	323
IBERIS.....	325
IGNATIA.....	326
INDIGO.....	329
IODOFORMUM.....	329
IODUM.....	330

IPECACUANHA.....	333
IRIS VERSICOLOR.....	335
JABORANDI.....	337
JALAPA.....	338
JATROPHA.....	339
JUSTICIA.....	339
KALI ARSENICUM.....	339
KALI BICHROMICUM.....	340
KALI BROMATUM.....	343
KALI CARBONICUM.....	345
KALI CHLORICUM.....	349
KALI CYANATUM.....	351
KALI IODATUM.....	351
KALI MURIATICUM.....	353
KALI NITRICUM.....	356
KALI PHOSPHORICUM.....	357
KALI SULPHURICUM.....	360
KALMIA LATIFOLIA.....	362
KOBALTUM.....	364
KREOSOTUM.....	366
LAC CANINUM.....	368
LAC DEFLORATUM.....	371
LACHESIS.....	372
LACHNANTES.....	377
LACTICUM ACIDUM.....	377
LACTUCA VIROSA.....	377
LAPIS ALBUS.....	377
LAPPA.....	378
LATHYRUS.....	379

LATRODECTUS MACTANS.....	380
LAUROCERASUS.....	381
LECITHIN.....	383
LEDUM PALUSTRE.....	383
LEPTANDRA.....	385
LILIUM TIGRINUM.....	386
LITHIUM CARBONICUM.....	389
LOBELIA INFLATA.....	391
LOLIUM TEMULENTUM.....	393
LYCOPERSICUM.....	393
LYCOPODIUM.....	394
LYCOPUS VIRGINICUS.....	398
LYSSIN	399
MAGNESIA CARBONICA.....	401
MAGNESIA MURIATICA.....	403
MAGNESIA PHOSPHORICA.....	406
MAGNESIA SULPHURICA.....	408
MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.....	409
MALANDRINUM.....	409
MANCINELLA.....	409
MANGANUM.....	411
MARUM VERUM (TEUCRIUM).....	413
MEDORRHINUM.....	414
MELILOTUS.....	417
MENYANTHES.....	419
MEPHITIS.....	420
MERCURIUS.....	421
MERCURIUS CORROSIVUS.....	425
MERCURIUS CYANATUS.....	428

MERCURIUS DULCIS.....	429
MERCURIUS IODATUS FLAVUM.....	430
MERCURIUS IODATUS RUBER (MERCURIUS BIN IODATUS).....	432
MEZEREUM.....	434
MILLEFOLIUM.....	437
MOSCHUS.....	438
MUREX.....	440
MURIATIC ACID.....	442
MYGALE LASIODORA.....	444
MYRICA CERIFERA.....	444
NAJA.....	446
NAPHTHALINE.....	448
NATRUM ARSENICUM.....	448
NATRUM CARBONICUM.....	448
NATRUM MURIATICUM.....	451
NATRUM PHOSPHORICUM.....	455
NATRUM SALICYLICUM.....	457
NATRUM SULPHURICUM.....	458
NICCOLUM.....	460
NITRICUM ACIDUM.....	461
NITRO-MURIATIC ACID.....	464
NUX MOSCHATA.....	464
NUX VOMICA.....	467
OCIMUM CANUM.....	472
OENANTHE CROCATA.....	472
OLEANDER.....	472
OLEUM ANIMALE.....	474
OLEUM JECORIS.....	476
ONOSMODIUM.....	477

OPIUM.....	478
ORIGANUM.....	481
OSMIUM.....	482
OXALICUM ACIDUM.....	483
OXYTROPIS.....	485
PAEONIA.....	485
PALLADIUM.....	486
PAREIRA BRAVA.....	487
PARIS QUADRIFOLIA.....	488
PASSIFLORA INCARNATA.....	489
PETROLEUM.....	490
PETROSELINUM.....	492
PELLANDRIUM.....	493
PHOSPHORICUM ACIDUM.....	494
PHOSPHORUS.....	497
PHYSOSTIGMA.....	501
PHYTOLACCA.....	503
PICRIC ACID.....	506
PILOCARPUS (VER JABORANDI).....	508
PIPER METHYSTICUM.....	508
PLANTAGO MAJOR.....	508
PLATINUM.....	509
PLUMBUM METALLICUM.....	512
PODOPHYLLUM.....	515
POLYGONUM.....	517
PHOTOS FOETIDUS.....	518
PRUNUS SPINOSA.....	519
PSORINUM.....	520
PTELEA.....	524

PULEX.....	524
PULSATILLA.....	525
PYROGEN.....	529
RADIUM.....	532
RANUNCULUS BULBOSUS.....	534
RANUNCULUS SCLERATUS.....	536
RAPHANUS.....	537
RATANHIA.....	537
RHEUM.....	538
RHODODENDRON.....	540
RHUS TOXICODENDRON.....	543
ROBINIA	546
RUMEX CRISPUS.....	547
RUTA GRAVEOLENS.....	549
SABADILLA.....	551
SABAL SERRULATA.....	553
SABINA.....	555
SALICYLICUM ACIDUM.....	557
SALIX NIGRA.....	557
SAMBUCUS NIGRA.....	557
SANGUINARIA CANADENSIS.....	559
SANICULA (AQUA).....	561
SANTONINUM.....	563
SARSAPARILLA.....	564
SCILLA MARITIMA (SCILLA).....	566
SCOPARIUS.....	568
SECALE CORNUTUM.....	569
SELENIUM.....	571
SENECIO.....	574

SENEGA.....	576
SEPIA.....	578
SILICEA.....	582
SOLIDAGO VIRGA.....	587
SPIGELIA.....	588
SPONGIA.....	590
STANNUM.....	593
STANNUM IODIDE.....	595
STAPHYSAGRIA.....	596
STICTA.....	599
STRAMONIUM.....	600
STRONTIUM CARBONICUM.....	603
STROPHANTUS HISPIDUS.....	605
STRYCHNINUM.....	606
SUCCINUM.....	607
SULPHONAL.....	607
SULPHUR.....	607
SULPHURICUM ACIDUM.....	612
SULPHUR IODATUM.....	615
SUMBUL.....	616
SYMPHORICARPUS RACEMOSA.....	618
SYMPHYTUM.....	619
SYPHILINUM.....	620
TABACUM.....	623
TARAXACUM.....	625
TARENTULA CUBENSIS.....	626
TARENTULA HISPANIA.....	628
TELLURIUM.....	631
TEREBINTHINA.....	632

THALLIUM.....	635
THERIDION.....	635
THIOSINAMINUM.....	637
THUJA OCCIDENTALIS.....	637
THYMOL.....	641
THYROIDINUM.....	641
TILIA EUROPA.....	643
TRIFOLIUM PRATENSE.....	645
TRILLIUM.....	645
TROMBIDIUM.....	646
TUBERCULINUM.....	646
URANIUM NITRICUM.....	649
URTICA URENS.....	649
USTILAGO MAYDIS.....	650
VACCININUM.....	652
VALERIANA.....	652
VANADIUM.....	654
VARIOLINUM.....	654
VERATRUM ALBUM.....	655
VERATRUM VIRIDE.....	658
VERBASCUM.....	661
VESPA CRABRO.....	662
VIBURNUM OPULUS.....	662
VINCA MINOR.....	664
VIOLA ODORATA.....	665
VIOLA TRICOLOR.....	666
VIPERA.....	667
VISCUM ALBUM.....	668
XANTHOXYLUM.....	669

ZINCUM METALLICUM.....	670
ZINC ARSENICAL.....	674
ZINC CROMATO.....	674
ZINC IODADO.....	675
ZINC FOSFATADO.....	676
ZINC SULFATADO.....	676
ZINC VALERIANADO.....	676
ZINGIBER.....	677
ZIZIA.....	678