


54.452

Molleres de *Scirpus cespitosus*, àcides, pirinenques

Mollera en un planell de la vall Fosca. A. Petit

Aspecte

Gespes més o menys denses, sempre xopes, formades per herbes vivaces, en què destaquen les motes rígides, a manera de raspall, de *Scirpus cespitosus*. Hi criden l'atenció algunes plantes insectívores que les clapegen amb les seves petites rosetes foliars llefiscoses o apegaloses. Presenten una certa diversitat, des de les gespes denses amb orquídies i liliàcies de fulles ensiformes, pròpies de la zona altimontana, fins a les comunitats obertes de l'estatge alpi, en què hi ha molt poques plantes de mollera i, en canvi, hi sol abundar la petita *Primula integrifolia*, bona indicadora de la breu durada del període vegetatiu.

Gespa de *Scirpus cespitosus* a la vall de Peguera (Pallars Sobirà). A. Ferré

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges altimontà, subalpi i alpi.

Ambients que ocupa – Vores de rierols, de basses i d'estanyols, roques per on llisca l'aigua i, en general, terrenys xops o molt humits, ocasionalment eixuts un temps curt.

Clima – Medieuropeu subatlàntic, subalpi o alpi.

Substrat i sòl – Roques i materials quaternaris de caràcter àcid. Sòls sorrencs o llimosos, amb aigua que s'hi estanca o hi circula lentament; generalment amb un horitzó orgànic poc desenvolupat, torbós, i amb mala disponibilitat de nutrients.


Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<i>Scirpus cespitosus</i>	•			•
<i>Pinguicula vulgaris</i> (viola d'aigua)				•
<i>Drosera rotundifolia</i> (herba de la gota)				•
<i>Narthecium ossifragum</i>				•
<i>Carex nigra</i>				•
<i>Leontodon duboisii</i>				•
<i>Tofieldia calyculata</i>				•
<i>Pedicularis mixta</i>				•
<i>Sphagnum subnitens</i> (esfagne)				•
<i>Pedicularis pyrenaica</i>				•

Sintaxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Narthecio-Scirpetum cespitosi Br. Bl. 1948

Caricetum fuscae Br. Bl. 1915

*Narthecium ossifragum*. J.L. Benito

Distribució dins el territori català

Pirineus. De 1.600 m en amunt; pot arribar fins a 2.850 m d'altitud.

Gestió, usos i problemes de conservació

Relativament freqüentat pel bestiar (vaques i egües) quan cerca aigua o indrets frescals. La dependència d'aquest hàbitat d'un nivell freàtic superficial el fa vulnerable a qualsevol actuació que el desequilibri (drenatges, barratges que modifiquen la capacitat dels estanyols, aprofitaments hidroelèctrics que alteren el cabal d'aigua dels rierols, etc.).

Indicadors d'interès de conservació

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| Distribució general dins Europa | ▶ ⑤ | espai iberooccità localitzat (Pirineus) |
| Freqüència dins el territori català | ▶ ④ | rar |
| Forma d'implantació territorial | ▶ ④ | superfícies exigües |
| Diversitat florística | ▶ ② | mitjana; conté un bon nombre de plantes rares a Catalunya o molt lligades a aquest hàbitat (<i>Calycocorsus stipitatus</i> , <i>Drosera longifolia</i> , <i>Narthecium ossifragum</i> , <i>Pedicularis mixta</i> , <i>Carex demissa</i> ...) |
| Grau de maduresa | ▶ ③ | madur (topoclimàtic) |
| Amenaça | ▶ ③ | amenaçat |

Tipus d'hàbitats d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Cap.

Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

54b Molleres de *Carex nigra*, poc o molt àcides, dels Pirineus

