


第364圖

おほぼこ科




たうおほぼこ

Plantago japonica
Franch. et Sav.

海邊ニ近キ地ニ生ズル多年生草本。葉ハ大ニシテ根生シ、長サ30cmヲ超エ、長葉柄アリ、卵狀橢圓形ニシテ毛ナク、數條ノ縱脈アリ。夏秋ノ候、葉間ニ長葶ヲ抽キ、葉ヨリ高ク瘦穂ヲ成シテ多數ノ白色風媒花ヲ密着ス。四片ノ綠萼アリテ一片ノ苞之レヲ承ク。花冠ハ膜質ニシテ四裂シ、四雄蕊アリ。蒴ハ蓋ヲ以テ開キ中ニ十箇内外ノ種子アリ。變種ニヤツまたおほぼこアリテ花莖ノ上部數枝ニ分岐ス。和名ハ唐大葉子ノ意ナレドモ、固ヨリ我日本産ナリ。

第365圖

おほぼこ科



へらおほぼこ

Plantago lanceolata L.

歐洲原産ノ多年生無莖草本。葉ハ叢生シ狭長ニシテ30cmニ及ビ、下部ハ漸次ニ狭窄シ、縦通セル葉脈著シ。初夏、葉間ヨリ高ク數條ノ花莖ヲ抽キ、短キ穗狀花ヲソノ頂ニ着ク。風媒花ニシテ、萼四片。花冠ハ白色、四裂シ、四雄蕊アリテ長ク花冠上ニ出ヅ。果實ハ蓋ヲ以テ開キ、中ニ二種子アリ。滿洲ニテハ婆々丁花ト云フ。我邦ニテハ諸處ニ野生ノ状態ヲ呈ス。和名竈大葉子ハ葉形ニ基ク。

第366圖

おほぼこ科



えぞおほぼこ

Plantago kamtschatica Link.

東北竝ニ北海道地方ニ普通ナル多年生草本ニシテ特ニ海ニ近キ地ニ多シ。葉ハ數片根生シテ地面ニ擴ガリ、無柄ニシテ長橢圓形ヲ成シ、底部楔形ヲ呈シ、兩面ニ毛多ク、數脈縦通ス。夏時、葉中高サ20cm内外ノ葶ヲ抽キ、多數ノ白色花ヲ單穗狀ニ綴ル。萼片四。膜質ノ花冠四裂シ、超出セル四雄蕊アリ。花後蓋開スル蒴果ヲ結ビ、四種子ヲ容ル。和名ハ蝦夷大葉子。

はくさんおほぼこ

Plantago Mohnikei
(= *P. hakusanensis* Koidz.)

中部及北部ノ高山帶多濕ノ地ニ自生スル多年生草本。根莖ハ短大ニシテ直立ス。葉ハ根生束出シ、倒卵狀橢圓形ニシテ葉柄アリ、深綠色ヲ呈シ齒牙狀ノ少數鋸齒ヲ有シ、主脈三乃至五ハ入シ、大ナル者ハ15cm許ニ及ビ、乾ケバ暗色ヲ呈ス。七八月ノ候、數本ノ花梗ヲ抽テ葉ヨリ高ク其長サ10-15cm、上部ニ穗狀花序ヲ成シテ小花ヲ疎着シ、苞ハ短闊ナリ。萼ハ四片、橢圓形、鈍頭。花冠ハ少シク萼ヨリ超出シ高脚盆形ニシテ白色ヲ呈シ、絨部ハ四裂シ裂片ハ銳頭ノ三角狀卵形ヲ成ス。雄蕊ハ四箇、花絲長ク花外ニ挺出スルコト1cmニ近ク、葯ハ暗紫色ヲ呈スルヲ以テ顯著ナリ。果實ハ蓋果ニシテ卵狀橢圓體ヲ成シ、熟スレバ蓋狀ヲ成セル上半部脱落シ、内ヨリ長橢圓形ノ一種子ヲ出ダス。和名ハ白山おほぼこノ意ニシテ加賀白山ニ多産スルヨリ名ヅク。

第367圖

おほぼこ科



はひごくさう

Phryma leptostachya L.

山野ノ林間藪陰ニ生ズル多年生草本。根ハ鬚狀ヲ成シ、莖ハ直立シ、高サ60cm内外、節間ノ下部膨腫ス。葉ハ有柄、對生シ、卵圓形或ハ長橢圓形ニシテ邊緣ニ鋸齒アリ。葉面ニ細毛ヲ布ク。夏日莖梢並ニ葉腋ニ細長ノ花軸ヲ出シ、唇形無柄ノ淡紫色細花ヲ對生シ瘦長ナル穗狀ヲ成シテ下ヨリ順次ニ咲キ上ル。萼ハ筒狀、上唇ノ刺狀三裂片ハ後チ鉤曲ス。花冠ハ下唇大ナリ。二強雄蕊、一雌蕊アリ。花後花體下ニ向ヒ其狀ハのこづちニ似タリ。蒴ハ宿存萼内ニ熟シ、一種子ヲ容ル。根ハ時ニ蠅ヲ殺スニ用ウ、故ニ蠅毒草ノ和名アリ。蠅ノハヘラ今故ラニハヒトス。

第368圖

はひごくさう科



はまぢんちゃう

一名 もくべんけい・きんぎょしば
Myoporum bontioides A. Gray.

九州・琉球・臺灣ニ見ル常綠灌木ニシテ特ニ海濱ニ生ズ。高サ1.5m内外ニシテ、枝ヲ分チ、葉ハ互生シ、廣キ倒披針形ニシテ葉柄アリ、全邊或ハ時ニ多少低齒アリテ質厚ク、毛ナク、葉脈分明ナラズ。初夏ノ候、紫色ノ有梗花ヲ葉腋ニ出シ、傍ニ向テ開ク。花徑凡ソ3cm許アリ。萼ハ五裂シテ宿存シ、花冠ノ下部ハ筒ヲ成シ、邊緣ハ五裂シテ略ボ唇形ヲ呈ス。二強雄蕊、一雌蕊アリ。核果ハ球形ニシテ尖リ、直徑1cm許、核ハ堅厚、果中ニ數種子アリ。臺灣ニテ苦檻藍ト云フ。和名ハ濱沈丁ニテ、沈丁ハぢんちゃうげノ略ナリ。

第369圖

はまぢんちゃう科

