


第 1492 圖

べんけいさう科



つめれんげ

Sedum japonicola Makino.

(=Cotyledon japonica Maxim.;  
Orostachys japonicus Berger.)

山地ノ岩上ニ生ズ又屋上ニ見ラルル多年生草本ニシテ株ノ短傍枝ヲ出シテ仔苗ヲ生ズ。多肉ノ葉ヲ簇生スルコトいはれんげニ似ストモ細小ナリ。脚葉ハ狭筒状ヲ成シテ葉頭ニ一刺アリ、莖葉ハ細長ク披針形ヲ呈シ先端鋭尖頭ヲ成ス。若緑色ニシテ往々紫色ヲ帯ビ又粉白色ヲ呈スル者アリ。晩秋長キハ15cmニ達スル總狀花序ヲ頂生シ極メテ密ニ白色ノ小花ヲ生ズ。苞ハ披針形ニシテ尖頭、各花ノ小花梗ハ短シ。萼片ハ五箇、披針形淡綠色。花瓣モ五箇アリテ披針形ヲ呈シ鋭頭、長サ6mm許。雄蕊ハ十本アリテ花瓣ヨリ稍長シ。子房ハ五箇、先端細キ花柱ト成リ、鱗片ハ微小ナリ。和名爪蓮華はいはれんげニ似、其葉細長ニシテ尖リ宛モ獸爪ノ如クナレバ云フ。漢名 昨葉荷草 (誤用、此品ハ Sedum spinosum=Cotyledon spinosa L. 即チたうつめれんげナリ)

第 1493 圖

べんけいさう科



べんけいさう

古名 いきくさ

Sedum alboroseum Baker.

山地向陽ノ草地ニ野生スレドモ又観賞品トシテ栽植セララルル多年生草本ニシテ莖ハ圓柱形ヲ成シテ直立シ、高サ50cm内外アリ。全株粉白色ヲ呈シ、葉ハ或ハ對生シ或ハ互生シ、短キ柄ヲ有シ、橢圓形或ハ倒卵形ニシテ邊緣ニ淺キ波状ノ鋸齒アリ、肉質ニシテ通常上面凹ミ稍扁舟様ヲ成ス。秋日莖頂ニ繖房狀聚繖花序ヲ成シ多數ノ小花ヲ攢簇ス。萼片ハ白綠色ニシテ五箇アリ長三角形ヲ呈シ、花瓣モ五箇、披針形ヲ呈シ白色ニシテ紅暈アリ長サ5mm許アリ。雄蕊ハ十本、花瓣ト略同長ナリ。雌蕊ハ五箇、淡紅色ヲ帯フ。和名辨慶草ハ之レヲ折リ取り樽ニ倒懸スルモ日ヲ經テ凋マズ復ビ之レヲ地ニ挿セバ又能ク活着スルヲ以テ其強健ノ狀ヲ勇士ノ辨慶ニ比セシモノナリ。いきくさは生き草ニテ此容易ニ枯死セザレバ云フ。漢名 景天 (誤用、此品ハ支那産ノおほべんけいさうヲ指ス)

第 1494 圖

べんけいさう科



おほべんけいさう

Sedum spectabile Boreau.

支那ノ原産ニシテ蓋シ大正年間ニ我邦ニ入りシ多年生草本、高サ30-45cm許、全草強壯ニシテ白綠色ヲ呈シ、地下ニ集合セル塊状ノ根アリテ其根頭ヨリ數本ノ直立莖ヲ叢生ス。莖ハ圓柱形、滑澤無毛、肉質、敢テ分枝セズ。葉ハ開出シ、或ハ對生シテ十字様ヲ呈シ、或ハ三葉輪生シ、肉質柔厚ニシテ卵形・倒卵形或ハ筒形ヲ成シ、全邊或ハ多少ノ波状齒アリ、長サ8-10cm許、幅5-6cm許アリ。秋月開花ス。花序ハ莖頂ニ大ナル繖房花叢ヲ成シ分梗シテ多數ノ紅紫花(株ニ由リ時ニ花色濃淡アリ)ヲ着ケ密集ス。花ハ徑1cm許、小梗ヲ有シ上向シテ開ク。萼片五、淡白色、線狀披針形、花瓣ヨリ短カシ。花瓣五、基部微ニ連合シ、披針形、鋭尖頭。雄蕊十、明ニ花瓣上ニ超出シ、約ハ柑色。子房五、上部狹尖シ花柱ト成リ、子房下鱗片ハ微小ナリ。蓇葖ハ五、直立シテ尖レリ。本種ハ絶テ我邦ニ野生無ク、今ハ花草トシテ栽植セララル。べんけいさうニ類似スト雖モ全草壯大、花色紅紫、花上ニ超出セル雄蕊等ニ由テ直ニ識得スベシ。和名ハ大辨慶草ノ意ニシテ之レヲべんけいさうニ比スレバ壯大ナレバズク云ヘリ。

きりんさう

Sedum kamtschaticum Fisch.

山地ノ岩上等ニ生ズル多年生草本ニシテ太キ根莖ヨリ莖ヲ簇生シ、莖ハ下部斜上シ高サ5-30cm許、綠色ニシテ圓柱形ヲ呈ス。葉ハ概ネ互生シ、倒卵形或ハ長橢圓形ニシテ先端稍圓ク底部楔形ヲ成シ殆ド無柄、邊緣ニハ鈍鋸齒アリ、綠色ニシテ肉質ナリ。六月、莖頂ニ平面ナル繖房狀聚繖花序ヲ成シテ多數ノ黄花ヲ開ク。萼片ハ五箇、披針狀線形ニシテ鈍端、綠色ヲ呈ス。花瓣ハ五箇ニシテ披針形ヲ呈シ鋭頭、長サ5mm許。雄蕊ハ十本、花瓣ヨリ短シ。雌蕊ハ五箇。蓇葖ハ五箇アリテ星狀ニ駢レ開裂ス。和名麒麟草ハ何ノ意予之レヲ解セズ。漢名 費菜 (誤用、此品蓋シ同屬ノ一種ニシテ支那ニ産シきりんさうヨリハ弱小ナリ)

第 1495 圖

べんけいさう科



ほそばのきりんさう

Sedum Aizoon L.

山地ノ草中ニ生ズル多年生草本ニシテ莖ハ通常簇生セズ、圓柱形ニシテ直立シ高サ40cm内外アリ、上部淡綠色ニシテ基部ハ褐色ヲ呈ス。葉ハ互生シ、披針形或ハ倒卵狀披針形ニシテ鋭頭或ハ鈍頭、底部ハ楔形ヲ成シ、邊緣ニきりんさうニ比スレバ尖レル鋸齒ヲ有シ、綠色ニシテ肉質ナリ。七月ノ候莖頂ニ平面ナル繖房狀聚繖花序ヲ成シ、密ニ多數ノ黄花ヲ開ク。萼片ハ五箇アリ綠色ヲ呈シ披針狀線形、鈍端。花瓣モ五箇、披針形ニシテ鋭頭、長サ6mm許。雄蕊ハ十本、花瓣ヨリ短シ。雌蕊ハ五箇。果實ハ蓇葖ヲ成シ五箇アリ。きりんさうニ比スレバ花密ニシテ葉狭ク鋸齒尖キノ異アリ。

第 1496 圖

べんけいさう科



いはべんけいさう

一名 いはきりんさう

Sedum Rhodiola DC.

var. Tachiroei Franch. et Sav.

中部高山ノ岩石地ニ見ル多年生草本。根莖ハ短厚ニシテ分枝ハ多數ノ鱗片ニテ被ハル。莖ハ簇生シ高サ30cm内外、聚リテ球狀ノ集團ヲ成スコト多シ。葉ト共ニ強キ霜白色。葉ハ莖上多數相層リテ互生開出シ、上半ハ其表面凹ミテ曲ル。倒卵狀橢圓形ニシテ長サ2cm内外、扁平、而モ多肉、鋭頭或ハ稍鈍頭ニシテ上半ニ鈍鋸齒アリ、表面平坦ニシテ脈條外ニ顯ハレズ。梢部ニ至レバ恰モ花下苞葉ノ觀アリ。七月、莖頂ニ密集セル聚繖花序ヲ着ケ平頂ヲ成セル球様ヲ呈シ淡黄花ヲ開ク。雌雄異株。花瓣ハ瘦細ニシテ四或ハ五、雄花ニ在リテハ平開シテ顯著ナレド雌花ニ在リテハ短クシテ著シカラズ。雄花ニハ雄蕊八乃至十箇。雌花ニハ心皮四或ハ五。蓇葖ハ獸角狀ニシテ四或ハ五箇並立シ、熟スレバ腹面ニ於テ縱裂シ細種子ヲ出ダス。

第 1497 圖

べんけいさう科

