

Quercus x coutinhoi Samp.

Q. faginea ssp. *broteroi* x *Q. robur*

Exemplar proveniente das matas do Vimeiro,
plantado em 1931

Um carvalho adulto deverá sequestrar cerca de 4 kg de CO₂ por ano.

Acer pseudoplatanus L.

plátano-bastardo

C e S da Europa e SW da Ásia

Espécie que produz madeira clara, ligeira e fácil de trabalhar, apreciada para trabalhos de tornearia e marcenaria. Ocorre naturalmente nos bosques caducifólios do litoral setentrional português (e na Serra de Sintra).

Exemplar Comemorativo do Dia Mundial da Árvore (21 de Março) de 2007

Olea europaea L.

oliveira

Região Mediterrânica

Espécie cultivada em toda a região Mediterrânica para produção de azeitona, consumida em crú (após tratamento) ou utilizada na produção de azeite.

Persea indica (L.) K. Spreng.

vinhático

Região Macaronésica

Espécie apreciada pela sua madeira de cor avermelhada, fácil de trabalhar e polir, outrora muito utilizada em trabalhos de marcenaria. Ocorre naturalmente nos bosques de Laurissilva dos arquipélagos da Madeira e das Canárias, ambos classificados como património da Humanidade.

Exemplar Comemorativo do Dia Mundial da Árvore (21 de Março) de 2007

Quercus suber L.

sobreiro

Região Mediterrânica Ocidental

Espécie florestal explorada geralmente em regime de montado. A sua casca (cortiça) é amplamente utilizada pelas suas características isolantes.

Ceratonia siliqua L.

alfarrobeira

Região Mediterrânica

Espécie utilizada no Sul de Portugal, designadamente para aproveitamento do fruto para alimentar o gado e como espessante utilizado na alimentação humana. A sua casca era utilizada na curtição de peles.

Celtis australis L.

lódão-bastardo

S da Europa, W da Ásia e N de África

Espécie cultivada frequentemente como ornamental ou árvore de arruamento.

Exemplar Comemorativo do Dia Mundial da Árvore (21 de Março) de 2007

Quercus rotundifolia Lam.

azinheira

S da Europa

Produz bolota doce para alimentar as varas de porcos.