

Psammotopa Pennak

Pennak 1942, p. 283, Genotype: *P. vulgaris*, ♀♂
Woods Hole, Mass.

- MIELKE 1990c: 74-75, DISCUSSES APPROPRIATE
FAMILY (NO CONCLUSION)

Psammotopa biarticulata Mielke, 1990

-- Mielke 1990c: 69-75, Figs. 1-14, n. sp. female +
male, Pacific coast of Panama

PSAMMOTOPHA CHAPPUISI

NOODT, 1955

-- 1955, p. 103.

--, WELLS & RAO, 1976: TAB. 1

-- MIELKE 1990C: 69

PSAMMOTOPA PHYLLOSETOSA

NOODT, 1952

— US 1952, P. 18. - N. SEA. 123-127, FIG. 53-67

— — 1955, P. 152-53. FRANCE.

— — NOODT, 1956, P. 59, - N. SEA

--, WELLS, 1970: 265

--, NOODT, 1952: 123 = PROTOLEPTASTACUS

--, WELLS & RAO, 1976: TAB. 1

--, BODIN 1968: p. 281.

— Mielke, 1975: 60-61, fig. 37

— Mielke, 1976: 38

-- MIELKE 1990c: 69

PSAMMOTOPA POLYPHYLLA NOODT

-- 1955, P. 102, figs. 83-94.

-- 1955, P. 152-53.

--, WELLS & RAO, 1976: TAB. 1

-- MIELKE 1990C: 69

Psammotopa vulgaris Pennak

①

— — Pennak 1942, p. 283, Pl. II, figs. 13-24, ♀♂,
Woods Hole, Mass.

— —, Chappuis, 1954, p. 270. Mediterranean. Believes Canetia
fodica Chappuis & Protoleptastacus phyllosetosus Noodt are synonyms.

— —, Noodt, 1955, p. 103

— —, Wells, 1963 p. 22

--, Masr4, 1970: 244-246 ♀♂; Fig. 9

--, Wells & Rao, 1976: TAB. 1

--, Lindgren, 1975, p. 450, fig. 4, 5

Psammotopa vulgaris Pennak, 1942

card 2

-- Mielke 1990c: 69, 75

-- PENNAK 1951: 462 -, NORFOLK BEACH, WOODS HOLE,
MASSACHUSETTS.