



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

***Psathyrella lutensis*** (Romagn.) Watling & Richardson

Nom français : Psathyrelle des boursiers

Dans les lieux humides. Chapeau brun rouge sombre à brunâtre terne. Marge voilée. Stipe guirlandé de blanchâtre, parfois avec zone cortiniforme. Microscopie présentant des cystides dont l'exsudat se teinte de vert dans l'ammoniaque.

Nous observons cette espèce dans différentes stations, toujours en milieu humide, entre les mois de mai et octobre. Notre collègue Robert Lagarde, sur ses stations en Charente, l'observe également assez régulièrement. Les cystides observées présentent toujours des dépôts mucoïdes verdissant dans l'ammoniaque (cf. photographie ci-contre). Il est à noter que de nombreux spécimens présentent une zone cortiniforme sur le stipe. Nous avons envisagé *Psathyrella sphagnicola*, mais cette espèce se trouve dans une autre écologie et surtout, elle présente un véritable anneau et une microscopie légèrement différente. Nous avons été conforté dans notre détermination par l'iconographie de ce taxon réalisée par Erhart Ludwig où un exemplaire possède ce caractère.

Biblio : littérature courante.

*Fiche réalisée en mai 2011 par Patrice TANCHAUD*





