

# กะพ้อลีลิบ

*Licuala distans* Ridl.

วงศ์ ARECACEAE

**ต้นปาล์ม** ลำต้นเดี่ยว อาจสูงได้ถึง 8 ม. ผ่านศูนย์กลางต้น 10 ซม. มีรอยกาบใบจางที่คอต้นมีกาบใบเก่าๆติดอยู่ เป็นไม้พื้นล่างของป่า



**ใบ :** ใบประกอบแบบนิ้วมือ แผ่ออก 13 ทาง กาบใบแยกออกจากกัน ขอบกาบใบมีใยสานกันเป็นตาข่ายและมีปลอกสีน้ำตาลยาวถึง 80 ซม. หุ้มอยู่ ก้านใบยาว 2.5 ม. ขอบใบประมาณ 2/5 จากโคนจะมีหนามรูปสามเหลี่ยม สีดำ ยาว 2 ซม. อยู่ห่างกันเป็นระยะ ใบกลม ขนาด 1.20 ม. ฉีกเป็น 35 แฉก ขนาด 5-8x90 ซม. และมีก้านใบย่อยติดก้านใบ ยาว 15 ซม. ปลายตัดและหยักไม่เท่ากัน

**ดอก :** ช่อดอกห้อยโค้งงออยู่ใต้ใบ ออกระหว่างกาบใบ 4-5 ช่อ ช่อดอกรวมยาว 2.80 ม. แดกกิ่ง 8 กิ่ง แต่ละกิ่งแตกกิ่งย่อย ยาว 40 ซม. และแตกกิ่งแขนงย่อยเป็นก้านแข็งอีก 3 กิ่ง ยาว 18-30 ซม.



**ผล :** รูปไข่ ขนาด 1-1.2 x 1.5-1.7 ซม. สีชมพู ผลแก่เดือน มิ.ย. - ก.ค.

นิเวศวิทยา เป็นปาล์มเฉพาะถิ่น มักพบอยู่บนที่สูงลาดเอียง ตามไหล่เขาในป่าขึ้นทางภาคใต้ตอนบน ที่ความสูง 300-500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง

ข้อสังเกต กะพ้อลีลิบเป็นปาล์มที่มีลำต้นผอมเรียว และรับน้ำหนักของใบที่มีขนาดใหญ่ เรือนยอดประกอบด้วยใบจำนวนมาก แต่ละใบมีรูปทรงกลมแบน ก้านใบยาว ช่อดอกโค้งลง ประกอบกับผลสีชมพูสวยงามมาก ทำให้กะพ้อลีลิบนั้นต่างไปจากชนิดอื่นๆ กะพ้อลีลิบเป็นกะพ้อชนิดเดียวที่ผลแก่จะเป็นสีชมพู

อ้างอิงข้อมูล : ปาล์มและปรงในป่าไทย (ผู้แต่ง : พูนศักดิ์ วัชรการ) (หน้า 110)

ภาพประกอบ : N-pic Surat, <http://www.pacsoa.org.au>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)