

Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ex Marchand.

ลูกดำ

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น สูงถึง 25 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลอมเทาเข้ม เรียบถึงค่อนข้างขรุขระหรือแตกเป็นแผ่นบาง ค่อนข้างเปราะ เปลือกในสีชมพูอมส้มอ่อน มีน้ำเลี้ยงสีครีม ถูกอากาศเปลี่ยนเป็นสีดำ ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกกว้าง 3-7 ซม. ยาว 10-18 ซม. ปลายเรียวแหลมสั้น โคนแหลมถึงรูปลิ้นแฉก ขอบเรียบมักเป็นคลื่น ใบอ่อนสีเขียวอมเหลืองอ่อน ใบแก่คล้ายแผ่นหนังแข็ง สีเขียวเข้ม เกือบเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อนออกเทา มีปุ่มเล็กๆ เส้นใบ 15-30 คู่ ไม่มีเส้นใบสั้นแซมระหว่างคู่ใบ โคนงและใบเชื่อมที่ใกล้ขอบเป็นเส้นขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได (บางส่วน) ละเอียดแต่นูนชัดทั้งสองด้าน ก้านใบเรียวยาว 1.2-2 ซม. เป็นร่องด้านบน กิ่งสีน้ำตาลเข้ม เกือบ มีช่องอากาศเล็กนูน ดอก เล็ก ยาวประมาณ 0.3 มม. สีขาวออกขาวหรือสีเหลืองอ่อน ดอกแยกเพศ มีดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกันหรือคนละต้นกัน (บางทีคล้ายเป็นดอกสมบูรณ์เพศ) ออกเป็นช่อไม่แตกแขนงหรือแตกแขนงบ้าง ยาว 1-8 ซม. มักออกดอกที่ปลายกิ่งหรือหลังใบ แกนกลางช่อมีขนสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงปลายมีพู่รูปสามเหลี่ยม 5 พู่ ยาวประมาณ 0.5 มม. กลีบดอกรูปไข่ 5 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 มม. ปลายหุบหรือแหลม โคนซ้อนกัน เนื้อบางมีเส้นชัด เกือบ มีขนกระจายตามขอบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาวประมาณ 1.2 มม. ค่อนข้างเท่ากัน ติดสลับกับกลีบดอก รอบจานฐานดอกใหญ่และเกือบ รั้งไขได้วงกลีบ(เป็นหมันในดอกเพศผู้) มี 1 ช่อง เกือบ ก้านเกสรเพศเมียสั้นมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 3 อัน ผล รูปไข่เบี้ยวหรือรูปไข่ ยาว 1.5-2 ซม. มักแบนข้าง ปลายมีส่วนของดอกติดอยู่ เที่ยวย่นตามยาว สีเขียวอ่อน มีจุดสีครีมเล็กๆ เมื่ออ่อนสุกสีอมเหลือง ต่อไปสีแดง ภายในมีน้ำยาง มี 1 เมล็ด พบน้อยตามชายป่าดิบ ตามหินใกล้น้ำ จังหวัด พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช



อ้างอิง: การ์ดเนอร์, โชนอน ดินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ซาฮาดู ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ ภาพประกอบ: <http://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir&v=Pentapanax%20racemosus&list=species&lg=en>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

