

Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson.

สังหยุดอกแดง

ANNONACEAE

ไม้ต้น สูง 8 -20 ม. เปลือกสีดำอมเทา ใบ : ใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-9 ซม. ยาว 12-27 ซม. ปลายเรียวแหลม ส่วนล่างแคบ โคนกลมเบี้ยว ใบอ่อนสีแดงอมชมพู ใบแก่คล้ายหนังบาง เกี้ยงและมัน ด้านบน มีขนสีสนิมบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบละเอียด 11-14 คู่ ค่อยๆ โค้งแตกแขนงและเป็น 2 วงห่างจากขอบใบ เป็นร่องด้านบน ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นตาข่ายเปิด งามด้านบน ฐานด้านล่างก้านใบยาว 0.5 ซม. มีขนสีสนิม กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม สีสนิมแล้วเกี้ยง ผล : รูปลูกแพร์ปลายทู่ มีขนสีสนิมแน่นกว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ต่อไปเกี้ยงนุ่ม เมื่ออ่อน ก้านผลสั้น ยาวประมาณ 0.3 ซม. มีหลายผลอยู่บนก้านรวม ช่อผล มี 2-3 เมล็ด ดอก : สีแดงชุ่น ออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก บนปุ่มสั้น แข็งตาม กิ่งใต้ใบ ก้านดอกยาวน้อยกว่า 0.5 ซม. มีขนสีสนิม ใบประดับ รูปสามเหลี่ยมยาว 2 มม. ที่โคนกลับเฉียงรูปไข่ ยาว 6 มม. ปลายแหลม มีขนสีสนิมแน่นด้านบน มีขนนุ่มถึงเกี้ยงด้านใน กลีบดอกกว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 6-9 ซม. หรือกลีบวงนอกยาว กว่าวงในเล็กน้อย คล้ายสายเข็มขัดหรือแถบแคบ ค่อยๆแคบแหลม ไปยังปลาย และโคนขอบมักม้วน มีเส้นขีด มีขนละเอียด ด้านนอกและส่วนบนด้านใน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาว 1 มม. แกนอับเรณูยอดแบนหรือค่อนข้างนูน เกสรเพศเมียมี 4-7 อัน ยาว 3 มม. มีขน ยอดเกสรเพศเมีย รูปไข่กลับมี 4 ออวูล พบในป่าดิบสูง 200-500 ม. จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา



ข้อมูลอ้างอิง : โชนอน การ์เดนเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คป.2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : www.flickr.com by Ahmad Fuad Morad



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

