

**PROCESO INFLAMATORIO.** Preguntas de correlación.

1-( ) ÚLCERA

2-( ) TEJIDO DE GRANULACIÓN

3-( ) ABSCESO

4-( ) EMPIEMA

5-( ) EXUDADO SEROSO



**Facultad de Ciencias Médicas**  
Universidad Nacional de Rosario  
Argentina



**Cátedra de Anatomía y  
Fisiología Patológicas**

*A- Cavidad neoformada con contenido purulento. Es generado por bacterias piógenas.*

*B- Presencia de exudado puriforme en una cavidad preformada. Es frecuente en la cavidad pleural, secundaria a un proceso inflamatorio pulmonar como una neumonía.*

*C- Tejido conectivo laxo, edematoso que contiene numerosos vasos de neoformación ( angiogénesis ) y algunas células inflamatorias.*

*D- Exudado que se caracteriza por la salida de un fluido ligero y transparente, pobre en proteínas, procedente del suero o de las secreciones de las células mesoteliales.*

*E- Proceso inflamatorio caracterizado por un infiltrado de células mononucleares como linfocitos y plasmocitos y zonas de fibrosis.*

*F- Excavación localizada en la superficie de un órgano, secundario al desprendimiento del tejido inflamatorio necrótico*

*G- Exudado que se caracteriza por la salida de proteínas de gran peso molecular debido a un mayor incremento de la permeabilidad vascular.*

*Microscópicamente se lo identifica como hilos o una malla de fibrillas eosinófilas.*

*H- Proceso inflamatorio crónico caracterizado por un cúmulo o agregado de células epitelioides rodeado por un collar de linfocitos y algunos plasmocitos . A veces presentan necrosis central .*