

### Caso\_43\_3.

Mujer de 25 años de edad, nació y ha residido en el Caribe hasta hace dos años. Nos consulta por el tumor plano que se aprecia en el labio superior de unos dos años de evolución y crecimiento excéntrico y asimétrico. Se inició por una pequeña mácula de color marrón que se fue extendiendo por los bordes y haciéndose más oscura en algunas zonas. No le ha producido ninguna sintomatología en toda la evolución. No ha hecho ningún tratamiento.



### ¿Cuál sería el diagnóstico más probable ?.

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.- Queratoma actínico pigmentado    | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 2.- Queratosis seborreica            | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 3.- Melanoma                         | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 4.- Carcinoma basocelular pigmentado | <a href="#">RESPUESTA</a> |
| 5.- <b>Lentigo solar</b>             | <a href="#">RESPUESTA</a> |

Respuesta INCORRECTA.

1.- Los lentigos consisten en el aumento de melanocitos normales en la juntura dermoepidérmica. Pueden presentarse de dos formas:

- El Lentigo simple, propio de gente joven y casi siempre aislado o en número escaso.
- Los lentigos solares, siempre múltiples y más frecuentes en personas que se han expuesto al sol y se han quemado con frecuencia.



En ambos casos la pigmentación es regular y siempre son planos en toda su extensión.

2.- Por el contrario el Lentigo Melanoma ya es maligno de entrada (Melanosis precancerosa de Dubreuil o peca maligna de Hutchinson) y está formado por melanocitos atípicos dispuestos a lo largo y ancho de la juntura dermoepidérmica. Su evolución natural, generalmente lenta, es hacia la forma invasora, el Lentigo Maligno Melanoma (LMM)