

LEUCÉMIE AIGÜE ET CHRONIQUE

Mots clés : Leucémie, Hémopathie, LLC, Comorbidité, Rémission, Immunité, Vaccination

L'existence d'une hémopathie maligne (maladie cancéreuse du sang) est susceptible d'entraîner un risque en voyage quel que soit le moyen de transport utilisé puisqu'elle s'accompagne d'un dysfonctionnement médullaire dont l'origine est soit liée à la maladie elle-même soit secondaire à son traitement : anémie, neutro-lymphopénie et thrombopénie.

Une leucémie sanguine se caractérise par un nombre important de globules blanc plus ou moins matures dans le sang.

La valeur normale haute du nombre de Globules Blancs est de 11 000/mcL.

Leucémie et voyage

La découverte d'une leucémie sur l'analyse sanguine réalisée devant une fatigue anormale, l'apparition de ganglions ou d'une infection sévère (etc.) ne permet pas de voyager. Son traitement médical est une urgence.

L'avis du médecin traitant est incontournable pour tout vol ou voyage.

Un nombre de globules blanc supérieur ou égal à 100 000 contre-indique un voyage et un vol compte tenu des conséquences physio-pathologiques cérébrales de cet excès.

Seule la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) autorise un voyage et en avion malgré le nombre parfois important de Lymphocytes (100 000 voire plus) donc de globules blancs. Il est important d'apprécier le risque infectieux des personnes traitées pour LLC avant de se prononcer.

Quel que soit le type de leucémie et le mode de présentation (ganglions, anomalies sanguines), il faut aussi éliminer les comorbidités associées pouvant être responsables d'un incident en vol ou en voyage.

Les personnes en rémission peuvent envisager un voyage sous réserve de l'accord de leur hémato-cancérologue. L'intérêt de vérifier la numération formule sanguine est évident comme celui d'éliminer toute autre comorbidité



pouvant être la cause d'un incident en voyage. La passation de l'auto-questionnaire d'aptitude en fonction de son âge est de ce fait incontournable.

Les personnes en rémission (greffés et autres) présentant un déficit immunitaire : hypogammaglobulinémie et lymphopénie doivent vérifier auprès de leur médecin traitant leur carnet de vaccination. Toutes les vaccinations sont recommandées à l'exception des vaccins à virus vivant atténué.

voyage-aptitude-senior.fr©création décembre 2007

Mise à jour 2022 © Dr Ghislain Haicault de La Regontais