



CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D'INDUSTRIE
DE LA GUYANE

INSTITUT FRANCAIS RECHERCHE
EXPLOITATION DE LA MER

LES POISSONS DE GUYANE

OCTOBRE 1992

Vous trouverez dans ce document les 24 poissons les plus courants de Guyane (sur un nombre d'espèces approchant les 200) avec leurs principales caractéristiques, leurs noms scientifiques, français, anglais et espagnol et leurs photographies.

Ils sont classés, de l'acoupa au vivaneau ti yeux, par ordre alphabétique.

Si vous ne trouvez pas de chiffres sur la production de telle ou telle espèce, c'est parce qu'ils n'existent pas, mais aussi et surtout parce qu'ils ne signifieraient rien, les ressources étant abondantes et les productions pouvant se faire quasiment à la demande.

Pour conclure, il convient d'ajouter que la Guyane se situerait au niveau du 5ème port national en valeur débarquée (entre le 4ème et le 6ème selon les années, que sa position géographique, sa zone économique exclusive de 130.000 km² et ses eaux riches en sels minéraux et en planctons la dotent de ressources de pêche inépuisables.

ACOUPA

Cynoscion similis

famille des *sciaenidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique d'acoupa

Nom F.A.O : (Fr) acoupa tonquiche
: (En) tonkin weakfish
: (Sp) corvineta tonquicha

Poisson de prises accessoires des chalutiers crevettiers, dans les sondes de 30 à 50 m


Peu commercialisé localement

Taille moyenne d'environ 30 cm

Poids moyen de 0,8 Kg

Comercialisé entier, en filet

Chair très fine et blanche, pouvant s'apparenter au merlan



Cynoscion similis

ACOUPA AIGUILLE

Cynoscion steindachneri

famille des *sciaenidae*

Nom officiel : acoupa ti dent ou courbine

Nom F.A.O : (Fr) acoupa ti dent
: (En) smalltooth weakfish
: (Sp) corvineta pescada

Pêche au filet en estuaire et dans la bande côtière sur des fonds inférieurs à 20 m ; présent également dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers

Commercialisé localement éviscéré


Taille moyenne d'environ 80 cm

Poids moyen de 3 Kg

Convient en darne, en filet

Chair fine et fragile, pouvant s'apparenter au merlu

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées :
Cynoscion virescens, *Cynoscion microlepidotus*



Cynoscion steindachneri

ACOUPA CELESTE

Nebris microps

famille des *sciaenidae*

Nom officiel : aucun dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82

Nom F.A.O : (Fr) courbine ti yeux
: (En) smalleye croaker
: (Sp) corvina ojo chico

Pêche au filet en estuaire, dans la bande côtière sur des fonds inférieurs à 20 m, présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers


Commercialisé localement éviscéré

Taille moyenne d'environ 25 cm

Poids moyen de 0,5 Kg

Comercialisé entier

Chair très fine et blanche, pouvant s'apparenter au merlan



Nebris microps

ACOUPA ROUGE

Cynoscion acoupa

famille des *sciaenidae*

Nom officiel : acoupa ou courbine

Nom F.A.O. : (Fr) acoupa toeroe
: (En) acoupa weakfish
: (Sp) corvineta amarilla

Pêche au filet en estuaire et dans la bande côtière sur des fonds inférieurs à 20 m


Commercialisé localement éviscéré ; parfois étêté

Taille moyenne d'environ 1 mètre

Poids moyen de 8 Kg

Convient en darne (pour les petits individus), en filet

Chair fine et légèrement rosâtre, pouvant s'apparenter au bar



Cynoscion acoupa

BARRACUDA

Shyraena guachancho

famille des *sphyraenidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de bécune

Nom F.A.O : (Fr) bécune guachanche
: (En) guachanche barracuda
: (Sp) picuda guachanche

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les sondes de 30 à 80 m


Commercialisé non éviscéré

Taille moyenne d'environ 30 cm

Poids moyen de 0,8 Kg

Convient en filet

Chair fine et blanche



Shyraena guachancho

CARANGUE

Caranx hippos

famille des *carangidae*

Nom officiel : carangue crevalle

Nom F.A.O : (Fr) carangue crevalle
: (En) crevalle jack
: (Sp) jurel comun

Poisson de prises accessoires des chalutiers crevettiers, dans les sondes de 20 à 50 m, pêche saisonnière au filet dans la bande côtière, pêche à la ligne (pêche sportive)

Peu commercialisé localement

Taille moyenne d'environ 70 cm


Poids moyen de 7 Kg

Convient en filet, fumé

Chair grasse et rouge se dégradant rapidement en conservation par le froid

Autres espèces pouvant commercialement être assimilées :

Caranx crysos



Caranx hippos

CROUPIA

Lobotes surinamensis

famille des *Lobotidae*

Nom officiel : croupia roche

Nom F.A.O. : (Fr) croupia roche
: (En) atlantic tripletail
: (Sp) dormilona

Pêche au filet dans la bande côtière

Commercialisé entier éviscéré, parfois étêté

Taille moyenne de 50 à 60 cm

Poids moyen de 3 Kg

Convient en filet, difficile à mettre en darne de par sa forme

Chair fine, légèrement grasse de couleur rosâtre, pouvant s'apparenter à celle du cabillaud

Lobotes surinamensis

GORETTE

Haemulon aurolineatum

famille des pomadasydae

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de gorette

Nom F.A.O. : (Fr) gorette tomtate
: (En) tomtate grunt
: (Sp) bomco jeniguano

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les sondes de 30 à 70 m

Commercialisé non éviscéré


Taille moyenne d'environ 25 cm

Poids moyen de 0,6 Kg

Peut être commercialisé entier

Chair fine et blanche

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées :
haemulon flavolineatum, *haemulon plumieri*



Haemulon flavolineatum

GRONDÉ

Arius grandicassis

famille des *Ariidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de machoiran

Nom F.A.O : (Fr) machoiran grondé
: (En) thomas sea catfish
: (Sp) bagre tomas

Pêche au filet dans la bande côtière sur des sondes inférieures à 25 mètres, présent en quantité importante dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers


Commercialisé entier non éviscéré en petites quantités sur le marché local

Taille comprise entre 40 et 50 cm

Poids moyen de 1,5 Kg

Peut convenir en filet, salé, boucané, fumé

Chair ferme et élastique, proche du congre



Arius grandicassis

LOUBINE

Centropomus undecimalis

famille des *Centropomidae*

Nom officiel : aucun dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82

Nom F.A.O. : (Fr) crossie blanc
: (En) common snook
: (Sp) robelo blanco

Pêche au filet en estuaire et dans la bande côtière sur des fonds inférieurs à 15 m

Commercialisé entier éviscéré, parfois étêté


Taille moyenne de 80 cm

Poids moyen de 4 Kg

Convient en darne et en filet

Chair fine et blanche pouvant s'apparenter au bar

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées :
Centropomus pellegrini, *Centropomus ensiferus*



Centropomus undecimalis

MACHOIRAN BLANC

Arius proops

famille des *Ariidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de machoiron

Nom F.A.O : (Fr) machoiron crucifix
: (En) crucifix sea catfish
: (Sp) bagre crucifijo

Pêche au filet et à la ligne en estuaire et dans la zone de balancement des marées

Actuellement commercialisé éviscéré et étêté


Taille de 50 à 60 cm entier, d'environ 40 cm sous forme étêtée

Poids moyen de 3 Kg

Convient en darne, filet, brochette, salé, boucané, fumé

Chair ferme et légèrement élastique se rapprochant de celle du congre

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées : *Arius passany* (passani), *Arius herzbergii* (pémécou)



Arius proops

MACHOIRAN JAUNE

Arius parkeri

famille des *Ariidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de machoiron

Nom F.A.O : (Fr) machoiron jaune
: (En) gillback sea catfish
: (Sp) bagre amarillo

Pêche au filet et à la ligne en estuaire et dans les fonds inférieurs à 15 m.


Commercialisé éviscéré ; les plus gros individus sont étêtés

Taille moyenne de 80 cm, présent à une taille supérieure à 1 m

Poids moyen de 10 Kg, pouvant atteindre 30 Kg

Convient en darne, en filet et en brochette

Chair ferme, légèrement grasse et jaunâtre, se rapprochant de la lotte



Arius parkeri

PALIKA

Megalops atlanticus

famille des *Megalopidae*

Nom officiel : tarpon argenté

Nom F.A.O. : (Fr) tarpon argenté
: (En) tarpon
: (Sp) tarpon

Pêche saisonnière au filet en estuaire ; à la ligne dans la bande côtière sur des fonds inférieurs à 20 m, (essentiellement en pêche sportive)


Peu commercialisé localement

Taille moyenne d'environ un mètre

Poids moyen de 8 Kg

Convient sous forme de chair à farce pour les plats cuisinés

Chair fine, avec de nombreuses arrêtes pouvant s'apparenter à l'alose



Megalops atlanticus



IFREMER

fiche 9.10.92/jr

PETITE GUEULE

Arius rugispinis

famille des *Ariidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de machoiran

Nom F.A.O : (Fr) machoiran petite gueule
: (En) softhead sea catfish
: (Sp) bagre tumbelo

Pêche au filet dans la bande côtière sur des sondes inférieures à 15 mètres, présent également dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers


Commercialisé entier non éviscéré en petites quantités sur le marché local

Taille comprise entre 20 et 30 cm

Poids moyen de 1 Kg

Peut convenir en filet, salé, boucané, fumé

Chair ferme et élastique, proche du congre



Arius rugispinis

PORTUGUAISE

Chaetodipterus faber

famille des *Ehipidae*

Nom officiel : aucun dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82

Nom F.A.O : (Fr) disque portugais
: (En) atlantic spadefish
: (Sp) paguala

Pêche au filet et à la ligne dans la bande côtière, sur des fonds inférieurs à 20 m, principalement autour des zones rocheuses, peut être présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers

Non commercialisé actuellement

Taille moyenne de 40 cm

Poids moyen de 3 Kg

Chair très fine et blanche



Chaetodipterus faber

RAIE

Dyasatidae americana

famille des *dyasatidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de pastenague

Nom F.A.O : (Fr) pastenague américaine
: (En) southern stingray
: (Sp) raja latino americana

Pêche au filet dans la bande côtière, présente en abondance dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers

Commercialisé en aile


Taille moyenne d'un aileron : environ 50 cm

Poids moyen de l'aile 3 Kg

Peut être commercialisé épluché, boucané

Chair rosâtre

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées :
Dyasatis guttata, *dyasatis sayi*



Dyasatis americana

REQUIN

Carcharhinus oxyrhincus

famille des *carcharhinidae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être dénommé sous le nom générique de requin tigre

Nom F.A.O : (Fr) requin becune
: (En) doggernose shark
: (Sp) gazon picudo

Pêche au filet dans la bande côtière

Commercialisé étêté, éviscéré


Taille moyenne 60 cm, dépassant fréquemment 1 m

Poids moyen 3 Kg

Commercialisé en darne, en filet, en brochette, fumé

Chair ferme, peau grise

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées :
Carcharhinus leucas, *Carcharhinus limbatus*, *Carcharhinus porosus*



Carcharhinus oxyrhincus

REQUIN MARTEAU

Sphyrna tiburo

famille des *sphyrnidae*

Nom officiel : aucun dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82

Nom F.A.O : (Fr) requin marteau tiburo
: (En) bonnethead
: (Sp) musola dentuda

Pêche au filet dans la bande côtière

Commercialisé étêté, éviscéré


Taille moyenne 60 cm, dépassant fréquemment 1 m

Poids moyen 3 Kg

Commercialisé en darne, en filet, en brochette, fumé

Chair ferme, peau jaunâtre

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées :
Sphyrna tudes, *Sphyrna mokkaran*



Sphyrna tiburo

ROUGET

Upeneus parvus

famille des *mullidae*

Nom officiel : aucun nom dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82

Nom F.A.O : (Fr) rouget souris mignon
: (En) dearf goatfish
: (Sp) salmonete rayuelo

Présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers sur les fonds supérieurs à 35 m


Pas commercialisé

Taille moyenne 10 cm

Poids moyen 0,03 Kg

Commercialisé en l'état

Chair fine et blanche



Upeneus parvus

fiche 23.10.92/jr

SOLEIL

Priacanthus arenatus famille des *priacanthidae*

Nom officiel : aucun nom dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82

Nom F.A.O : (Fr) beauclaire soleil
: (En) atlantic bigeye
: (Sp) catalafa toro

Présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers sur les fonds supérieurs à 35 m


Pas commercialisé

Taille moyenne 20 cm

Poids moyen 0,5 Kg

Commercialisé en l'état

Chair fine et blanche



Priacanthus arenatus



IFREMER

fiche 24.10.92/jr

THAZARD

Scomberomorus maculatus

famille des *Scombridae*

Nom officiel : aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom générique de thazard

Nom F.A.O : (Fr) thazard tacheté
: (En) spotted spanish mackerel
: (Sp) carite pintado

Pêche saisonnière au filet, à la ligne dans la bande côtière sur des fonds inférieurs à 15 m, présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers toute l'année


Commercialisé entier éviscéré, parfois étêté

Taille moyenne de 80 à 100 cm

Poids moyen de 6 Kg

Convient en darne, filet, fumé

Chair ferme à fine texture, grisâtre pouvant s'apparenter au maquereau



Scomberomorus maculatus

VIVANEAU RAYE

Lutjanus synagris

famille des *lutjanidae*

Nom officiel : vivaneau gazou

Nom F.A.O : (Fr) vivaneau gazou
: (En) lane snapper
: (Sp) pargo biajaiba

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les sondes de 30 à 70 m, en grande quantité


Commercialisé non éviscéré

Taille moyenne d'environ 30 cm

Poids moyen de 0,8 Kg

Convient en filet

Chair fine et blanche, pouvant se rapprocher du sebaste et de la daurade



Lutjanus synagris

VIVANEAU ROUGE

Lutjanus purpureus

famille des *lutjanidae*

Nom officiel : vivaneau rouge

Nom F.A.O. : (Fr) vivaneau rouge
: (En) southern red snapper
: (Sp) pargo colorado

Pêche à la ligne sur les sondes de 30 à 90 m, près des zones rocheuses ; présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers


Commercialisé éviscéré

Taille moyenne d'environ 50 cm

Poids moyen de 4 Kg

Convient en darne, en filet

Chair fine et blanche, pouvant se rapprocher du sebaste et de la daurade



Lutjanus purpureus

fiche 15.10.92/jr

VIVANEAU TI YEUX

Rhomboplites aurorubens

famille des *lutjanidae*

Nom officiel : vivaneau ti yeux

Nom F.A.O : (Fr) vivaneau ti yeux
: (En) vermillon snapper
: (Sp) pargo cunaro

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les sondes de 60 à 80 m


Commercialisé non éviscéré

Taille moyenne d'environ 25 cm

Poids moyen de 0,6 Kg

Convient en filet

Chair fine et blanche, pouvant se rapprocher du sebaste et de la daurade



Rhomboplites aurorubens