







5,159/B

42580

ANTONII GOÜAN,

Doctoris Medici Monspeliensis, Regiæ Societatis
Scientiarum Socii,

HORTUS REGIUS
MONSPELIENSIS,
SISTENS PLANTAS TUM INDIGENAS
TUM EXOTICAS N°. MM. CC.

A D

GENERA RELATAS,

C U M

NOMINIBUS SPECIFICIS,

SYNONYMIS SELECTIS,

NOMINIBUS TRIVIALIBUS,

HABITATIONIBUS INDIGENARUM,


HOSPITIIS EXOTICARUM,

S E C U N D U M

SEXUALEM METHODUM

D I G E S T A S.

In gratiam Philiatrorum Monspeliensium.




LUGDUNI,

Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

M. D C C. L X I I.





ILLUSTRISSIMO
NOBILISSIMOQUE VIRO
D. D.
JOANNI EMMANUELI
DE GUIGNARD,

Equiti , Vice-Comiti de St. Priest , Regi à
Consiliis , Libellorum Magistro Honorario ,
Rei Judiciariæ & Ærariæ , necnon Disci-
plinæ Politicæ in Occitania , & Horti Regii
Monspeliensis Præfecto .


VIR ILLUSTRISSIME ,

*MÆCENATEM ambierunt te plurimi ,
habuerunt hacenūs nulli , laudibus meritissi-
mis in tabulâ tibi nuncupatâ necessario cumu-
ñ ij*

landis tuâ se semper subripiente modestiâ. Si ergo in lucem prodit tuo nomine insignitum tentamen hocce , nihil inde nobis accedit superbiæ probè consciis tanti favoris copiam fecisse operis materiem , non dignitatem. Eccui consecranda veniebat Horti Regii Monspe- liensis descriptio , nisi Horti ejusdem PRÆ- FECTO VIGILANTISSIMO , qui benefico afflau Floram nostratrem exsuscitavit languidam , marcescentem ab interitu penè vindicavit ? Hic tantum Botanici partes ago. Quid sū Civis ! quid si Occitani ! Verba profectò defi- cerent , non dico extollendis , verum etiam enar- randis virtutibus eximiis paria , quibus & Urbem & Provinciam beas. Bona dum poti- mur adeò multigena , anxia nos tenet cura ne- citò è manibus effluant. Ad majora te vocant , VIR ILLUSTRISSIME , Regis dilectissimii perspicacia , æquitas , in populos amor. Quæ- cumque te maneant grandia regni munia , uu- diu sospes & incolumis vivas vehementissimè exoptat Occitania , & ut ipsi , quod haçenùss fecisti , in posterum favere pergas enixè rogat ,

VIR ILLUSTRISSIME ,

Devotissimus tui nominis cultor
ANTONIUS GOÜANI



PHILIATRIS AMANTISSIMIS A U C T O R.

JAM dudum in describendis Faunæ Monspeliacæ animalibus occupatus , in vestrorum gratiam à primario labore recessi ; & ut votis vestris annuerem curas potiores habuit Flora tantisper excussa. Proprias de Plantis observationes publicæ ventilationi exponere profecto non ausus essem , nisi vobis potius quàm mihi consultum iri voluisssem , & laboris suscipiendi Auctores fuissent *Linnæus* (a) & *Sauvagesius* nulli non suspiciundi rei Botanicæ principes , qui ætate licet & scientiâ longè imparem suâ me amicitiâ beare non dignati sunt : palam hic profiteri juvat quàm urbanos in libris communicandis , in exhibendis speciminibus vivis aut exsiccatis faciles , in dubiis explicandis benignos sese præbuerint. Neque illaudatos dimittam clarissimos Viros *Seguierium* , *Bauxium* Nemauenses , & *Cussonium* & *Batignium* Doctores Medicos Monspelienses oculatissimos , quibus similia officiorum genera accepta referre non piget.

(a) Egregiè me herclè tui characteres ex habitu adjecti fructificationi placent , cùm pandant viam ad ordines naturales , & explicit faciem Plantarum. *Linnæi* , Epist. 15. Dec. 1761.

Memori etiam animo prosequar *Imberii* ; Universitatis Monspeliacæ Cancellarii amplissimi , humanitatem , quo annuente plantas in horto regio hospites nullâ horâ , nullo tempore examinare non licuit.

His auxiliis suffulto , tantâ locupletato specierum ac varietatum supellestile animus primum fuerat Plantas Monspelienses novâ methodo distributas exhibere. Attributum sane primarium ad classes condendas suppeditabant organa Plantarum fœminea , secundarium verò ad ordines instituendos virilia : quam haec tenus licet intentatam systematicam divisionem valere jussi , ne methodum sexualem frustraneè inversam proponerem & in simiam propriam tandem incideret egregius Linnæus..

Potuisse etiam Tournefortianam methodum cum Linnæana maritare , desumptis scilicet à corollæ figurâ ac regularitate classibus , ordinibus verò à staminibus ; aut vice versa..

Neque deficiebant aliæ fructificationis partes quæ in classium atque ordinum attributum inito novo foedere cedere nobis valebant. Verum eas omnes methodos missas volumus probè consciī quantum illas perfectissimè licet elaboratas vincat sistema sexuale.

Itaque consilia in melius referens methodum Linnæanam elegi ut potè vobis dilectionem , magis absolutam , pleniorem , nitidissimam , genera & species rigorosius , perfectius sistentem. Charakter Plantarum genericus est primarius vel secundarius. Primarium subministrant calyx , corolla , stamina , pistill

lum , fructus. Genera omnia charactere hujuscemodi egregiè donavit illustris *Linnæus* , cui vos volumus amandatos. Secundarium suppeditant placentatio , radicatio , caulescentia , foliatio , inflorescentia , fulcratio. Hunc à Linnæo excogitatum , à nemine tentatum in hoc opere proponimus , omissâ placentatione circâ quam nondum nobis suppetit observationum sufficiens numetus. Notas secundarias omnibus generis cujusque speciebus communes in medium proferre vehementer exoptassemus. Obstat Plantarum plurium cognitarum quidem , ast in horto regio nondum hospitantium defectus. Characteres igitur juxta species à nobis enumeratas dirigere coacti fuimus. Nomena specifica à Linnæo mutuatis sumus , mutatis paucis. Species plures in agro Monspessulano nondum detectas , aut quasdam tum indigenas tum exoticas Linnæo ignotas addidimus. Synonymias à Tournefortio , Magnolio , Sauvagesio , Bauhinis , Seguierio , desumsimus. Nomena Gallica & vernacula adjecimus. Habitationes indigenarum & hospitia exoticarum assignavimus. Plantarum icones duas minus accuratas , duasque novas sculpendas curavimus. Pollicemur fore ut quondam opus istud incudi reddamus additis characteribus secundariis , placentatione , Fauna insectorum Monspeliensi , & virtutibus Plantarum usualium probatissimis. Interim his fruimini quantulacumque sint. Valete.

*Dabam Monspelii , die 9^a.
mensis Januarii 1762.
á iiii*

A U C T O R E S.

- B**auh. *Pin.* Caspari Bauhini pinax. 1. vol. in-4°.
Bauh. prod. ejusdem prodromus. 1. vol. in-4°. cum figuris.
J. B. hist. Joannis Bauhini historia Plantarum. 3. vol. in-fol. cum figuris.
Dod. Pempt. Dodonæi pemptades. 1. vol. in-fol. cum figuris.
Corn. Can. Jacobi Cornuti historia Canadensis. 1. vol. in-8°. cum figuris.
Bot. Mons. Petri Magnolii Botanicum Monspeliense, cum figuris. 1. vol. in-12.
Hort. Mons. ejusdem Hortus Monspeliensis. 1. vol. in-4°. cum figuris.
Gen. pl. ejusdem genera Plantarum. 1. vol. in-4°.
Tour. Tournefortii Institutiones rei Herbariæ. 3. vol. in-4°. cum figuris.
T. cor. ejusdem Corollaria. 1. vol. in-4°.
Barr. ic. Barrelieri icones. 1. vol. in-fol. cum figuris.
Lob. ic. Lobelii icones Plantarum. 1. vol. in-8°.
Linn. Syst. nat. Linnæi systema naturæ. 2. vol. in-8°.
Edit. 10^a. 1759.
Linn. gen. Linnæi genera Plantarum. 1. vol. in-8°. Edit. 4^a. 1752.
Linn. sp. pl. ejusdem species Plantarum. 2. vol. in-8°.
Linn. hort. Ups. ejusdem hortus Upsaliensis. 1. vol. in-8°.
Linn. hort. Cliff. ejusdem hortus Cliffortianus. 1. vol. in-fol.
Linn. amæn. Acad. ejusdem amænitates Academicæ. 5. vol. in-8°.
Linn. fl. Suec. ejusdem flora Suecica. 1. vol. in-8°.
Seg. ver. Seguieri Nemausensis Plantæ Veronenses. 3. vol. in-8°.
Sauv. Sauvagesii methodus foliorum. 1. vol. in-8°.
Mich. gen. Michelii nova genera Plantarum. 1. vol. in-fol. cum figuris.



EXPLICATIO TABULARUM.

TABULA PRIMA.

RADICATIO.

RADIX seu truncus in terram descendens, ex ipsa alimentum hauriens.

Fig. 1. Perpendicularis. Napus, brassica, umbelliferæ ferè omnes.

2. Horizontalis. Auricula muris, aquaticæ plantæ plures.

Repens....

Stolonifera; caulinos vel scapos hinc indè reptando exferens, viola, auricula muris, passiflora.

3. Fusiformis seu napiformis; altero apice attenuato. Carota.

Tereti-attenuata; eadem sed in gradu minimo. Thesum.

1. Simplex.

2. Ramosa.

Lignosa; propria fruticibus arboribusque.

4. Fibrosa; constat radiculis capillaceis fasciculatis. Musci, gramina.

Rapacea; à figura rapæ, carnosa subglobosa. Geranium, rapa.

3. Tuberosa constat carne dura. Geranium, ranunculus.

6. Tuberosa pendula - filipendula.

7. Tuberosa fasciculata; tuberibus simul pluribus approximatis, ex eodem punto enatis. Ranunculus, pæonia. Dicitur etiam grumosa. Species plurimæ ranunculi, leontodon tuberosum.

4. Bulbosa; constat carne pulposa. Cepa, allium, lilium.

E X P L I C A T I O

- Fig.* 4. Bulbosa tunicata, membranis se invicem tegentibus. *Cepa.*
5. Bulbosa squamosa, squamis imbricatis. *Lilium.*

T A B U L A S E C U N D A.

F U L C R A T I O.

FULCRA seu varia adminicula plantæ.

1°. STIPULÆ. Foliola ad basim foliorum enata.

Fig. 9. 10. 11. 12. A.

Fig. 9. 10. Laterifoliæ. *Trifolium, lotus, medicago.*

12. Oppositifoliæ. *Coronilla minima.*

9. 10. Geminæ.

12. Solitariæ. *Coronilla minima, ornithopus scorpioides.*

11. Interfoliaceæ. *Geranium, zygophyllum.*

9. Solutæ seu liberæ, nec petiolo nec sibi invicem adnatæ. *Lotus.*

10. Adnatæ. Prioribus opponuntur. *Trifolium, medicago.*

2°. BRACTEÆ. Foliola ad apicem peduncolorum vel ad basim florum sita.

Fig. 13. Ovatæ. *Geranium.*

Subulatæ. *Medicago.*

Setaceæ.

Solitariæ.

Binæ.

13. Ternæ. *Lotus.*

Quaternæ.

13. Integerrimæ. *Trifolium.*

Serratæ. *Medicago.*

Palmatæ. *Anthyllis.*

Involucriformes, plures simul involucrum mentientes. *Androsace.*

3°. FILUM. Appendix setacea flexilis ad apicem peduncolorum, saepius solitaria simplissima.


Fig. 14. A. *Ononis, medicagine plures.*


TAB. I

post Praefat.



TAB. 2.





T A B U L A R U M.

4°. CIRRHUS. Appendix filiformis contorta rigida.

Fig. 15. A. B.

Fig. B. Solitarius. Passiflora.

Geminus. Smilax.

B. Petiolaris. In ipsomet petiolo.

Laterifolius, ad latera petioli vel folii sessilis.

Axillaris, ex eorum ala.

A. Terminalis, ad apicem petioli.

B. Simplex.

A. Ramosus.

Diphyllus; foliola duo terminans.

Tetraphyllus; foliola bijuga terminans.

Lathyrus clymenum.

Polyphyllus; foliola plura. Vicia, ervum.

*Aphyllus; è medio stipularum prodit,
foliolis destitutus, lathyrus aphaca.*

5°. GLANDULÆ. Vasa excretoria plantæ. *Fig. 16. C.B.*

Fig. B. Sessiles, pedunculo nullo.

C. Pedunculatæ. Passiflora.

C. Petiolares, in ipsomet petiolo.

B. Epiphyllæ; in superiori foliorum pagina.

Hypophyllæ; in inferiori. Laurus, padus.

Stipulares, stipulis insidentes.

Calycinæ, calycibus. Plumbago, hypericum.

Bracteales, bracteis. Sigesbeckia.

Pedunculares, pedunculis.

Solitariæ.

Geminæ.

Concavæ. Mimosa, laurus.

Capitatæ. Plumbago.

6°. SPINÆ. *Fig. 16. A. Expansio substantiæ lignosæ.*

7°. ACULEI. *Fig. 16. B. Expansio substantiæ corticalis.*

8°. TUBI. *Fig. 17. Conici inversi, vaginantes radicularum apicem; lemna minor, lemna trisulca.*

EXPLICATIO

TABULA TERTIA.

FOLIATIO SIMPLEX ET FLORESCENTIA.

FOLIA simplicia sic dicuntur cum petiolus simplex unicum gerit foliolum.

- Fig.* A. Radicalia, è radice prodeunt.
 Caulina, è caule.
 Ramea, è ramis.
 Primordialia, è gemmis primo vere.
 Seminalia, è semine.

C. C. E. Alterna. *Achillea*.

D. D. Opposita. *Leonturus*, *phlomis*.

I. Verticillata, eaque diversimodè.

Terna, *erica*.

Quaterna.

Quina.

Sena, *gallium*, *crucianella*.

Octona, *gallium*.

C. D. K. Sessilia, seu petiolo destituta. *Draba incana*.

L. X. Z. R. Petiolata. *Oxalys*.

 E. Perfoliata. *Gentiana perfoliata*.

 F. Amplexicaulia. *Thlaspi montanum*.

 G. Vaginantia, caulem instar vaginæ ambient.

 H. Connata, occurrunt in foliis oppositis.

X.O.N.Q.S. Integra, ad margines crenata, ferrata, ciliata vel dentata.

D. I. M. E. F. Integerrima, marginibus prorsus intactis.


T. X. Z. Incisa.

 T. Triloba.

 X. Partita.

 M. Dolabriformalia.





T A B U L A R U M.

Fig. O. Præmorsa.

N. Deltoidea.

L. Serrata.

S. Obversè-ovata.

S. Crenata.

K. Geminata.

Radicantia ; foliorum pagina altera
radices agit. *Marchantia*.

F L O R E S C E N T I A.

FLORES. 1. 2. 7. 8. Axillares.

Ramei, è ramis.

Caulini, è caule.

Radicales, è radice.

Terminales, ad apicem ramorum aut
caulis.

Aggregati, plures simul ex eadem plan-
tæ regione, ut ex ala, apice rami aut
caulis vel folii.

2. { Solitarii.

3. { Sessiles, pedunculo nullo donati.

1. { Solitarii.

{ Pedunculati.

K. I. Interfoliacei, occurunt in foliis oppo-
sitis vel geminatis. *Atropa*, *physalis*.

3. Verticillati. *Phlomis*, *salvia*.

Laterifolii ; ad latera petiolorum vel
folii sessilis. *Boerhavia*.

4. Thyrfoidei. *Syringa lilac*.

6. Racemosi. *Phytolacca*.

6. Corymbosi. *Spireæ species*.

7. Paniculati, } Propria graminibus.

8. Spicati, } Propria graminibus.

9. Umbellati. *Daucus*, *euphorbia*.

10. Capitati. *Lotus*, *trifolium*.

6. Oppositifolii. *Geranium vitifolium*,
phytolacca.

Fasciculati plures sibi invicem approxi-
mati. *Dianthus barbatus*.


EXPLICATIO TABULARUM.


TABULA QUARTA.

FOLIA COMPOSITA.

FOLIA sic dicta constant foliolis plurimis communis petiolo affixis, sessilibus vel petiolatis.

- Fig.* 1. Binata, } foliolis basi adnatis, sessilibus.
2. Ternata, }
3. Ternata, foliolis liberis petiolatis. *Trifolium*.
4. Digitata, foliolis quinis, septenis. *Potentilla*, *quinquefolium*.
5. Pedata. *Helleborus*.
6. Impari-pinnata, foliolis petiolatis.
7. Abruptè seu pari-pinnata, foliolis sessilibus,
oppositis; dicuntur etiam conjugata.
Orobus, *vicia*, *lathyrus*.
8. Eadem foliolis alternis.
9. Impari & interruptè-pinnata. Solani spe-
cies 9^a.
10. Abruptè-pinnata & cirrho terminata. *Vicia*,
ervum.
11. Binata & cirrho terminata. Propria *lathyris*.
12. Decursivè-pinnata, } Foliolis sibi invicem
13. Articulatè-pinnata, } adnatis. Ad simplicia
14. Lyrato-pinnata, } *pinnatifida* accedunt.
15. Biternata.
16. Abruptè-bipinnata. *Mimosa*, *poinciana*.
17. Duplicato-ternata.
18. Abruptè-tripinnata.
19. Impari-tripinnata.





EXTRAIT DES REGISTRES *de la Société Royale des Sciences.*

Du 11. Mars 1762.

MRS. DE SAUVAGES, CUSSON & BATIGNE, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. GOÜAN, qui a pour titre : *Hortus Monspeliensis sistens Plantas exoticas & indigenas secundum sexualem Methodum digestas, &c.* en ayant fait leur rapport, la Compagnie a jugé que dans le grand nombre de Plantes qu'a décris M. Goüan, il y en avoit plusieurs de nouvelles, & d'autres qu'on n'avoit désignées jusques ici que fort confusément ; que les caractères secondaires tirés heureusement du port de la Plante & de ses différentes parties, à l'exception des Fleurs & des Fruits, pouvoient être d'un grand secours pour hâter les progrès de la Botanique ; qu'à l'aide de ces caractères il seroit sur tout très-facile d'acquerir en peu de temps la connoissance des Plantes des environs de Montpellier, en suivant d'ailleurs la méthode de M. LINNÆUS, adoptée par l'Auteur ; & qu'en général l'Ouvrage étoit utile & méritoit l'impression. En foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Montpellier, ce 11. Mars 1762.

DE RATTÉ, Sécrétaire perpétuel
de la Société Royale des Sciences.

APPROBATION

De Messieurs les Docteurs ordinaires en l'Université des Médecins de Montpellier.

NOS CLAUDIO CHAPTAL, PETRUS CUSSON, FRANCISCUS GOUTAUDIER, ET GASPARDUS JOANNES RENÉ, in Almâ & Regiâ Monspeliensium Medicorum Universitate Doctores ordinarii, unanimi Doctorum omnium Congregatorum consensu designati & præpositi examinando Libro cui titulus est : ANTONII GOUAN, *Doctoris Medici, &c Hortus Regius Monspeliensis sistens Plantas tum exoticas tum indigenas, &c.* Existimamus opus hocce non Philiatris solum verum etiam omnibus Rei herbariæ genuinis cultoribus iudicium admodum atque utile futurum esse ; & Præfatum virum magna promereti encomia, qui rem laboris plenam & haec tenus intentatam confecit ; ad methodum naturalem viam expedivit ; Botanici Monspeliensis pioneria pluribus additis Plantarum speciebus antea prætervisis, propulsavit ; frugem Botanicam Medicinæ studioris ab aliquot annis denegatam laute porrigit ; & floram nostratem iqualidum, Marcescentem, inter mortuam imminentem letho eripit : in cuius Rei fidem litteras has testimoniales propriâ Syngraphâ roboratas dedimus. Actum Monspelii die 18. mensis Martii anni 1762.

CHAPTAL. CUSSON. GOUTAUDIER. RENÉ.



PRIVILEGE GÉNÉRAL.

LOIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE :
A nos amés & Féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris,
Baillijs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers, qu'il
appartiendra : S A L U T. Notre bien-amée la SOCIETE ROYALE des SCIENCES de
Montpellier, Nous a fait exposer qu'elle auroit besoin de nos Lettres de Privilége
pour la réimpression de ses Ouvrages. A CES CAUSES, voulant favorablement
traiter notre dite Société, Nous lui avons permis, & permettons par ces Présentes,
de faire réimprimer par tel Imprimeur qu'elle voudra choisir, tous les Ouvrages
qu'elle voudra faire imprimer en son nom, et tels volumes, forme, marge, caractères,
conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de les
faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de vingt années
consécutives, à compter du jour de la date des Présentes ; sans toutefois qu'à l'occasion
des Ouvrages ci-dessus spéciés il puisse en être réimprimé d'autres qui ne soient pas de
notredite Société ; faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de
quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire de réimpression étrangere
dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi de réimprimer, faire réimprimer,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d'en faire aucun
Extraits sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par
écrit de ladite Société ou de ceux qui auroient droit d'elle, à peine de confiscation
des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contre-
venans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, & l'autre tiers à ladite
Société ou ceux qui auront droit d'elle, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.
A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Régistre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que la réimpression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Règlemens de la Librairie ; qu'avant de les exposer en vente, les Manuscrits & Imprimés qui auront servi de copie à la réimpression desdits Ouvrages, seront remis ès mains de notre très-cher & fidèle Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & fidèle Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Société & ses ayant cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour duëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos Amés & Féaux Conseillers Secrétaires, soit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre Permission, & nonobstant Clause de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. DONNE à Versailles, le vingt-unième jour du mois d'Août, l'an de Grace mil sept cent soixante, & de notre Règne le quarante-cinquième.

Par le Roi en son Conseil. Signé LE BEGUE, & scellé du grand Sceau
de cire jaune.

Régiistré sur le Régistre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires &
Imprimeurs de Paris, No. 112. fol. 113. conformément au Règlement de 1722.
qui fait défenses, Art. 41. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles
soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher
aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou
autrement, & à la charge de fournir à la susdite Chambre neuf Exemplaires
prescrits par l'Art. 108. du même Règlement. A Paris ce quinze Octobre 1760.

Signé, VINCENT, Adjoint.

Classis

Classis I.

MONANDRIA MONOGYNA.

C A N N A.

Character primarius. Vide Linnæi genera plantarum I.

Character secundarius. *Radicatio* bulbiformis carnosa nodosa horizontalis. *Caulescentia* culmosa solida foliosa simplex. *Foliatio* simplex alterna vaginans integerrima. *Florescentia* subspicata terminalis simplex liliacea. *Fulcratio* nulla.

- I. CANNNA foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *India.*
Linn. sp. Pl. pag. 1. Syst. nat. 1759. Tom. 2. p. 843.

Cannacorus latifolius vulgaris. Tourn. pag. 367.

- β. Cannacorus flore luteo punctato. *Tourn. ibid.* & amplissimo folio flore rutilo. *Ibid.*

Le Balisier.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Floret maio, augusto & julio; floribus varians coccineis & luteis.

- β. Floribus duplo minoribus gaudet quam 1^a. species.

B O E R H A V I A.

Char. prim. vid. Lin. gen. pl. 38.

Char. sec. *Radic.* fibrosa. *Caulesc.* herbacea, ramosa foliosa. *Foliat.* opposita petiolata simplex integerrima. *Floresc.* laterifolia ramosa pedunculata. *Fulcr.* nulla.

- I. BOERH. floribus umbellatis, seminibus fusiformibus truncatis, apice tuberculatis. *Scandens.*

Boerhavia (*scandens*) caule scandente. *Linn. sp. pl. pag. 3. Syst. nat. 1759. T. 2. p. 843.*

La Boerhave.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Caulis scandens, glaber, cylindricus. Folia subcordata, glabra; petioli

foliis duplo breviores. Flores diandri umbellati. Corollæ plicatæ campanulatae, viridescentes. Pedunculi ad latus foliorum, ipsis triplo fere longiores. Involucrum umbellulæ ex foliolis minimis deciduis 5-6. Floret vere, æstate & autumno.

- Erecta.* 2. BOERH. floribus paniculatis, feminibus pentagonis truncatis.

Boerhavia (*erecta*) caule erecto. Linn. sp. pl. 3. Syst. nat. 1759. T. 2. pag. 843.

Boerhavia (*angustifolia*) foliis lanceolatis. Sauv. p. 108. HOSPITATUR sub dio. Annua. Folia ovata, subtus incana. Corollæ minimæ dilute purpurascens. Petioli foliorum subrubri, breves. Floret æstate.

Obs. Species omnes glutinosæ admodum, præsertim semina speciei primæ.

S A L I C O R N I A.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 8.

Char. sec. Radic. ramosa. Caulesc. articulata succulenta ramis oppositis. Fol. nulla. Floresc. in articulis. Fulcr. nulla.

- Europæa.* 1. SALIC. articulis apice crassioribus obtusis. Linn. sp. pl. 3. Syst. nat. 1759. T. 2. p. 843.

Annua. Salic. geniculata annua. Tourn. cor. 51.

Kali geniculatum annum. Bauh. pin. 289. Magnol. Bot. mons. 147.

Salicornia annua. Sauv. pag. 7.

Kali geniculatum. Barr. icon. 192.

- Perennis.* 2. Salic. geniculata sempervirens. Tour. cor. 51.

Salic. sempervirens. Sauv. 7.

Kali geniculatum majus. Bot. mons. 147.

Salicor. vernaculè sonfouire.

HABITAT in toto tractu Monspeliensi, ad mare & stagna: floret julio & augusto.

H I P P U R I S

Char. prim. Linn. gen. pl. 9.

Char. sec. Radic. articulata horizontalis radiculis perpendicularibus. Caulesc. articulata herbacea.

Fol. verticillata ad articulos. Floresc. axillaris, sessilis, Fulcr. nulla.

i. HIPP. Linn. sp. pl. 4. Sauv. 159. Linn. syst. nat. 1759. *vulgaris.*
T. 2. p. 843. *equisetum palustre*, brevioribus foliis
polyspermum. B. pin. Mag. Bot. 89.

Polygonum fœmina semine vidua. Lob. icon. 792.

Limnopeuce, Seg. Fl. Ver. Tom. I. tab. 2. pag. 103. &
 Tom. III. p. 64.

La pesse d'eau.

HABITAT in humidis; à *Lattes*, *Selleneuve*, *Castelnau*.

Obs. Articuli digito compressi, cum strepitu dissiliunt;
 quâ notâ ab equisetis facile dignoscitur.

DIGYNIA.

C O R I S P E R M U M.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 10.

Char. sec. Radic. fibrosa. Caulesc. herbacea ra-
 mosâ. Foliat. simplex alterna. Floresc. axillaris
 alterna. Fulcr. nulla.

i. CORISP. floribus lateralibus. Linn. sp. pl. 4. Sauv. 52. *Hissopifolium*
Linn. hort. upf. 2. hort. cliff. 3.

HABITAT in maritimis; à *Agde* & au-delà de *Cette*
 vers *Meze*.

Annuum vidimus in aliis locis frigidioribus.

Caulis scaber perennis villosus diffusus.

B L I T T U M.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 11.

Char. sec. Radic. ramosa. Caulesc. herbacea ra-
 mosâ. Foliat. simplex, sparsa. Floresc. axillaris
 glomerata. Fulcr. nulla.

i. BLITT. capitulis sessilibus, lateralibus sparsis. Linn. *virgatum.*
sp. pl. 4. Syst. nat. 844.

Variat foliis lanceolatis integerrimis.

HABITAT in Hispania. Annuum est.

C A L L I T R I C H E.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 1074.

Char. sec. Radic. fibrosa. Caulesc. herbacea filiformis ramosa. Fol. sessilis opposita simplex integerrima. Floresc. axillaris pedunculata, solitaria vel geminata. Fulcr. nulla.

Autumnalis. 1. CALL. floribus hermaphroditis.

Call. foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Linn. syst.* 644.

Call. (*Bifida*) *Linn. sp. pl.* 969. & (*natans*) *ibid. Sauv.* 123. *n°. 2. & 3.*

HABITAT in aquis laterensibus; ubi & foliis omnibus linearibus, vel inferioribus linearibus, superioribus ovatis occurrit; à *Lattes & Caunele.*

Verna. 2. CALL. floribus androgynis.

Call. foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Linn. syst.* 644.

Call. (*Palustris*) *Linn. sp. pl.* 969. & (*minima*) *ibid.*

Lenticula palustris bifolia fructu tetragono. *Bot. mons.* 300.

HABITAT Monspelii cum priori, sed rarer. Ludit utraque foliis linearibus bifidis, superioribus quoque vel ovatis linearibusque; unde demptâ florescentia vix dignoscendæ. Frequentior in aquis *au Pont de Salaison & à Lunel.* Pedunculi bini axillares, altero unifloro brevi, altero longiore bifloro.



Classis II.

DIANDRIA MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 12.

Char. sec. Radic. ramosa. Caulesc. fruticosa. Foliat.
opposita simplex integerrima. Floresc. terminalis.
ramea. Fulcr. nulla.

1. NYCT. caule fruticoso diffuso, foliis inferioribus
cordatis obtusis, superioribus ovatis acutis. Linn.
sp. pl. 6. Syst. nat. 1759. T. 2. p. 847.

Nyct. caule volubili, foliis subovatis acutis. Linn.
Sauv. p. 137.

Le Jasmin d'Arabie.

HABITAT in Indiis.

HOSPITATUR hyeme in caldario; æstate sub dio; flo-
rens, semina nunquam maturans; semper virens.

JASMINUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 13.

Char. sec. Radic. ramosa lignosa. Caulesc. fruticosa,
ramosa. Foliat. opposita vel alterna, simplex vel
ternata, aut impari pinnata. Floresc. ramea, ter-
minalis. Fulcr. nulla.

1. JASM. foliis oppositis pinnatis. Linn. sp. pl. 7. Sauv. Officinale.
221. Linn. Syst. nat. 1759. 847.

Jasm. vulgatus flore albo. Tour. Inst. 597.

2. Jasm. Hispanicum flore majore externe rubente. Tour.
597. Jasmin d'Espagne.

Le Jasmin ordinaire, vernaculè lou Jaoüsemin.

HABITAT & colitur in hortis.

HOSPITATUR sub dio, in frigidario & tepidario.

3. In caldario. Frutex, perennis, semina rarò maturans.
Obs. Foliolum terminale sæpiùs lanceolatum, longius.

- Azoricum.* 2. JASM. foliis oppositis ternatis. *Linn. sp.* 7. *Sauv.* 174.
Linn. Syst. nat. 1759. pag. 847.
Jasm. azoricum trifoliatum flore albo. *Tour. Inst.* 597.
 HABITAT in Indiis.
 HOSPITATUR in caldario, nunquam semina maturans,
 frutex, semper virens; variat foliolo terminali (ma-
 jori) cordato.
- Fruticans.* 3. JASM. foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis an-
 gulatis. *Linn. sp.* 7. *Sauv.* 174. *Linn. Syst. nat.*
 1759. pag. 847.
Jasm. luteum, vulgo dictum Bacciferum. *Bot. Mons.*
 139. *Tour. Inst.* 597.
Le Jasmin jaune, vernaculè *Jaoüsemín jaoüne*.
 HABITAT Monspelii ad margines agrorum, ubique fru-
 tex perennis. Floret etiam autumno. Lineæ duæ ele-
 varæ ad basim petiolorum, decurrent in caulem.
- Humile.* 4. JASM. foliis alternis pinnatis, vel ternatis. *Linn. sp.*
 pag. 7. *Sauv.* pag. 222.
 HABITAT cum prioribus.

LIGUSTRUM.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 14.
 Char. sec. *Radic.* ramosa, lignosa. *Caulesc.* fruti-
 cosa. *Foliat.* opposita, simplex integerrima. *Flo-
 resc.* racemosa; ramea, terminalis. *Fulcr.* nulla.
- Vulgare.* 1. LIG. *Linn. sp.* pag. 7. *Sauv.* 130. *Linn. Syst.* 1759.
Seguier. *Tom. II.* pag. 274. *Tour.* 596.
Ligustrum Germanicum. *Bot. Mons.* 154.
Le Troène, vernaculè *Troëne*.
 HABITAT in variis locis vicinis, *auprès de la Verune*,
Montferrier, *Selleneuve*.
 HOSPITATUR sub dio. Arbuscula semper virens. Folia
 ovata, petiolo brevi. Flores albi graveolentes. Race-
 mus conicus, terminans ramos.

PHILLYREA.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 15.
 Char. sec. *Radic.* ramosa lignosa. *Caulesc.* arborea.
Foliat. opposita, simplex. *Floresc.* axillaris, ag-
 gregata. *Fulcr.* nulla.

- Angustifolia.* 1. PHILL. foliis lanceolatis subintegerrimis. *Linn. sp.*
 pag. 7. *Syst. nat.* 1759. pag. 847.

- Phill. foliis lanceolatis vix crenatis. *Linn. cliff. Sauv. 130.*
 Phill. folio Ligustri. *Tour. 596. Bot. Mons. 202.*
 $\beta.$ Phill. foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. sp. pag. 8.*
Sauv. 130.
 Phill. angustifolia prima. *Bot. Mons. 202. Tour. 596.*
Le Filaria ou Filaris, vernaculè Alader māle.
 HABITAT ad mare versus *Maguelonne, Villeneuve.* $\beta.$ à
Montferrier.
 HOSPITATUR sub dio. Arbor semper virens.
 $\gamma.$ PHILL. foliis cordato-ovatis, ferratis. *Linn. sp. pag. 8. Latifolia.*
Sauv. pag. 136.
 Phill. latifolia spinosa. *Tour. 596. Seguier, Tom. II.*
pag. 273.
 Phill. folio ilicis. *Bot. Mons. 202.*
 HABITAT Monspelii, à *Montferrier, Rouquet, Valene.*
 HOSPITATUR sub dio. Perennis, semper virens.

OLEA.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 16.*
 Char. sec. *Radic. lignosa ramosa. Caulesc. arborea.*
Foliat. opposita simplex integerrima. Floresc.
axillaris solitaria (in unâ specie racemosa.)
Fulcr. nulla.

1. OLEA foliis lanceolatis. *Linn. sp. pag. 8. Sauv. 58. Linn. Europæa.*
Syst. nat.
 Olea sativa. *Bot. Mons. 189. Tour. Inst. 599.*
 Olea sativa major oblonga, angulosa amygdali formâ.
Tourn. inst. 599. Bot. 189. Hort. Mons. 146.
L'Olivier.
 Obs. Hujus quamplurimæ varietates occurunt in agro
 Monspeliensi. Sativa vocatur *Amellaoü.*
 $\beta.$ Olea media oblonga angulosa. *Bot. Mons. 189. Hort.*
147. Ouliviere.
 $\gamma.$ Olea media oblonga, fructu corni figurâ. *Bot. 189.*
Hort. 147. Tour. 599. Courniaooü.
 $\delta.$ Olea minor oblonga. *Bot. 189. Hort. 147. Pichouline.*
 Olea fructu oblongo minore. *Tour. 599.*
 $\epsilon.$ Olea major subrotunda. *Bot. 189. Ampoulaoü.*
 Olea maxima subrotunda. *Hort. Mons. 147. Tour. 599.*
 $\zeta.$ Olea media rotunda viridior. *Bot. 190. Hort. 147.*
Tour. 599. Verdale.

S DIANDRIA MONOGYNIA.

- 1. Olea media rotunda, præcox. Bot. 190. Hort. 147.
Tour. 599. Mouraoii.
- 2. Olea minor rotunda, racemosa. Bot. 190. Hort. 147.
Tour. 599. Bouteillaoii.
- 3. Olea minor rotunda rubro-nigricans. Bot. 190. Hort.
147. Tour. 599. Salierne.
- 4. Olea minor rotunda ex rubro & nigro variegata. Bot.
190. Hort. 147. Tour. 599. Pigaoii.
- 5. Olea sylvestris. Bot. Mons. 189. & folio duro subtus in-
cano. B. Pin. 472. Tour. 599. Olivier sauvage.
Hæc species inculta, passim provenit ad margines
sepium, fructus ferè nunquam profert.
HABITAT in toto agro Monspeliensi. Arbor sempervi-
rens, florens mediæ æstate. Fructus maturans hyeme.
HOSPITATUR sub dio. Perennis.

SYRINGA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 18.

Char. sec. Radic. lignosa ramosa. Caulesc. fruticosa.
Foliat. opposita simplex. Floresc. terminalis ra-
cemosa. Fulcr. nulla.

- | | |
|-------------------|---|
| <i>vulgaris.</i> | 1. SYR. foliis ovato-cordatis. Linn. sp. pag. 9. Sauv. 136.
Lilac Math. Tour. 601.
<i>Le Lilac. Monspelii, lou Lilla.</i>
HABITAT in Oriente.
HOSPITATUR & colitur in hortis sub dio. Arbuscula
perennis, florens maëo, racemi florum compacti. |
| <i>Perfusa.</i> | 2. SYR. foliis lanceolatis. Linn. sp. pag. 9. Sauv. (inge-
gris) 130. Linn. Syst. 1759. pag. 848.
Lilac Ligustri folio. Tour. Inst. 602. |
| <i>Laciniata.</i> | 3. Syr. foliis lanceolatis, integris & pinnatifidis. Linn. sp.
pag. 9. Sauv. 221. Linn. Syst.
Lilac folio laciniato. Tour. Inst. 602.
<i>Le Lilac de Perse.</i>
HOSPITATUR sub dio. Occurrit solummodo in horto
regio. Flores laxè racemosi, minores quam in priori
specie. |

CIRCÆA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 19.

Char. sec. Radic. ramosa. Caulesc. sæpius simplex
herbacea. Foliat. opposita, petiolata simplex in-
tegra. Floresc. racemosa, terminalis. Fulcr. nulla.

1. CIRC. caule erecto racemis pluribus. *Linn. sp. p. 9.* *Lutetiana;*
Sauv. 151.
 Circ. foliis longioribus obiter crenatis. *Sauv. 151.*
 Circ. Lutetiana. *Tour. 301.*
2. Circ. Canadensis latifolia, flore albo. *Tour. 301.*
La Circée, ou herbe de St. Etienne.
 HABITAT à Joyeuse, ad margines viarum.
 HOSPITATUR in frigidario. Luxuriat in Labyrintho
 horti regii.
 Descr. Radix perennis. Caulis pedalis, villosum erexit, sæpius glaber. Folia opposita, nervosa, subcordata, acuminata, dentata, petioli foliis subæquales. Flores laxè racemosi nudi; racemus terminalis longior; laterales breviores; Corollæ 2 petalæ; Calyx 2 phillus; coloratus; petala inter foliola calycina, corollam simulant tetrapetalam. Capsula infera hispida, compressa. Floret in Labyrintho junio & augusto, semina maturans.

VERONICA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 20.*

Char. sec. *Rad. fibrofa. Caul. ramosa, repens vel erecta. Fol. simplex integra, opposita, terna vel alterna. Flor. axillaris, solitaria vel terminalis strictius laxiusve spicata. Fulc. nulla.*

* *Spicatæ.*

1. VER. spicis terminalibus, foliis ternis lanceolatis æqualiter ferratis. *Linn. sp. 10.* *spuria.*

Ver. mas surrecta elatior. *Barr. Icon. 391. & 681.*

Ver. spicata angustifolia. *Tour. 143. & longifolia, ibid.*

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Variat foliis oppositis, vel summis alternis.

2. VER. spicâ terminali, foliis oppositis, crenatis, obtusis, caule ascendentे simplicissimo. *Linn. sp. pl. 10. Syst. nat.* *spicata.*

Ver. foliis oppositis lanceolatis, caule spicâ terminato. *Sauv. 131.* absque varietate.

Ver. spicata minor. *Tour. 144. Seg. ver. 1. p. 234.*

HABITAT Monspelii; circà Selleneuve, la Verune & Lattes.

HOSPITATUR sub dio.

3. VER. spicis lateralibus pedunculatis, foliis ovatis oppositis ferratis, caule procumbente. *Linn. sp. pl. 11.* *Officinalis.* *Syst. nat.*

Ver. mas supina & vulgatissima. *Tour. 143. Bot. Mons. 275. Seg. ver. T. I. p. 233.*

Le Thé de l'Europe. La Véronique.

HABITAT Monspelii, abundat à Merviel, à l'Esperou, à Valene.

HOSPITATUR sub dio. In frigidario.

Descr. Caules humifusi villosi, stoloniferi; folia sessilia serrata, ad basim sèpè integra; racemi infernè nudi axillares solitarii. Foliola calycina æqualia.

* *Racemosæ.*

Alpina. 4. VER. foliis oppositis lanceolatis, serrulatis; caule frutescente. *Sauv. 131.*

Ver. corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispidis. *Linn. sp. pl. 11.*

Ver. Alpina frutescens. *Tour. 144. Seg. ver. T. I. p. 235.*

HABITAT à l'Esperou.

HOSPITATUR sub dio. In frigidario. Variat foliis integrimis, ovatis, calycibus lèvibus.

Serpentifolia. 5. VER. foliis imis oppositis ovatis, summis alternis lanceolatis, racemo terminali.

Ver. floribus solitariis. *Sauv. 134. n°. 98.*

Ver. pratensis serpentifolia. *Tour. 144.*

Ver. racemo terminali subspicato, foliis ovatis, crenatis, glabris. *Linn. sp. p. 12.*

Chamædris spuria angustifolia. *Bot. Mons. 59.*

HABITAT à l'Esperou & au Puits de S. Loup, au-delà des Mateles.

HOSPITATUR sub dio.

Becabunga. 6. VER. racemis lateralibus, foliis oppositis planis, caule repente. *Linn. sp. p. 12.*

Ver. aquatica { major, folio subrotundo. *Tour. p. 145.*
minor,

Seg. ver. T. I. p. 239.

Ver. foliis oppositis ovalibus, petiolatis, floribus laxè spicatis lateralibus. *Sauv. 134.*

Anagallis aquatica minor folio subrotundo. *Bot. Mons. 18.*

Le Cresson de fontaine.

HABITAT Monspelii in aquis; à la Fontputanelle, à Selleuve, à Lattes.

Anagallis. 7. VER. racemis lateralibus, foliis oppositis lanceolatis, ferratis; caule erecto. *Linn. sp. p. 12.*

- Ver. aquatica { minor, folio oblongo. *Tour.* 145. &
major, folio oblongo. *Bot.* 18.
minor *Seg. ver. T. I. p. 240.*
- Anagallis aquatica major folio oblongo. *Bot.* 18.
- Ver. foliis oppositis ensiformibus, floribus laxe spicatis
lateralibus. *Sauv.* 131.
- HABITAT cum præcedenti. Utraque exsiccatur difficil-
limè.
8. VER. racemis lateralibus, foliis ovatis, sessilibus, **Chamædrys.**
dentatis; foliolis calycinis linearibus inæqualibus.
- Ver. racemis lateralibus, foliis rugosis, ovatis, denta-
tis; caule debili. *Linn. sp. p. 13.*
- Ver. minor foliis imis rotundioribus. *Tour.* 144. *Seg.*
ver. T. I. p. 236.
- Chamædrys spuria angustifolia.** *Bot. Mons.* 59.
- Ver. foliis cordatis, summis majoribus acutioribus ex
alis racemosa. *Sauv.* 135.
- Vernaculè, *lou pichot Chaine.*
- HABITAT copiosè Monspelii, à la Pinede de la Valette,
& au Terrail.
- HOSPITATUR sub dio. Folia sæpè ad basim integra.
9. VER. racemis lateralibus, foliolis calycinis ovatis inte- **Latifolia.**
gerrimis.
- Ver. racemis lateralibus, foliis cordatis, rugosis, den-
tatis; caule stricto. *Linn. sp. p. 13.*
- Ver. maxima. *Tour. p. 144. Seg. ver. Tom. I. p. 236.*
- Ver. foliis oppositis plicatis, dentatis, scapis ex alis
superioribus laxè spicatis. *Sauv.* 135.
8. **Chamædrys spuria minor angustifolia.** *B. Pin.* 249.
- Ver. foliis ovalibus serratis oppositis, spicis laxis ad
alas superiores oppositis. *Sauv.* 134.
- HOSPITATUR sub dio. Folia subsessilia. Pedunculi
florum longiores; racemi inferne nudi.
* *Pedunculis unifloris.*
10. VER. floribus pedunculatis axillaribus, foliolis caly- **Agrestis.**
cinis ovatis subæqualibus.
- Ver. floribus solitariis, foliis cordatis, incisis pedun-
culo brevioribus. *Linn. sp. p. 13.*
- Ver. flosculis pediculis oblongis insidentibus. *Tour.* 145.
Seg. ver. T. I. p. 237.
- Alsine chamædryfolia, flosculis oblongis pediculis
insidentibus. *B. pin. Bot. Mons.* 12.

Ver. foliis cordatis, crenatis oppositis, floribus solitariis pedunculatis. *Sauv.* 114.

HABITAT in hortis mixta cum sequenti.

HOSPITATUR sub dio.

Obs. (apud nos) datur foliis dentatis & ferratis.

Arvensis.

11. VER. floribus axillaribus, foliolis calycinis lanceolatis inæqualibus.

Ver. floribus solitariis, foliis cordatis, incisis, pedunculo longioribus. *Linn. sp. p. 13.*

Ver. flosculis caulinis adhærentibus. *Tour. 145. Seg. ver. T. I. p. 237.*

Alsine veronicæ folio, flosculis caulinis adhærentibus. *Bot. Mons. 12.*

Ver. foliis oppositis, cordatis, crenatis; floribus solitariis, sessilibus. *Sauv. 135.*

Ver. foliis oppositis, ovatis, crenatis; foliolis calycinis, inæqualibus. *Sauv. ibid.*

HABITAT ubique Monspelii. Priori magis villosa; folia superiora sæpè lanceolata integerrima. Petiolus folii multò brevior quam in antecedenti: variat foliis alternis.

Hederafolia.

12. VER. floribus pedunculatis axillaribus, foliis cordatis, planis, quinquelobis. *Linn. sp. p. 13.*

Ver. cimbalariae folio verna. *Tour. 145.*

Alsine hederae folio. *Bot. Mons. 12.*

Ver. foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. *Sauv. 114.*

HABITAT Monspelii copiosè; à la Verune, & alibi.

HOSPITATUR in frigidario.

Triphyllos.

13. VER. floribus solitariis pedunculatis axillaribus, foliis inferioribus 3 partitis; summis 3 partitis. *Linn. Hort. clif. 9. Sauv.*

Alsine parva recta. *Lob. Icon. 464.*

Ver. verna 3 fido vel 3 fido folio. *Tour. 145.*

Alsine 3 phyllos cærulea. *Bot. Mons. 12.*

Ver. floribus solitariis, foliis digitato 3 partitis, pedunculo brevioribus. *Linn. sp. p. 14.*

HABITAT Monspelii; A Selleneuve, & dans les prés de Caunelles.

HOSPITATUR sub dio.

JUSTICIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 22.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* opposita simplex integerrima petiolata. *Flor.* spicata axillaris. *Fulc.* bractea triplex ad basim singuli floris.

1. JUST. arborea foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis persistentibus 5nerviis, galea corollarum concava. *Linn. sp. p. 15. Sauv. app. 307.*

Adhatoda.

Adhatoda Zeylanensium. Tour. 175.

Le Noyer de Zeylan.

HOSPITATUR sub dio aestate; in caldario hyeme.

Descr. Arbor sempervirens. Folia opposita lanceolato-ovata integerrima; petiolo brevi. Florum spicæ axillares, solitariæ, inferne nudæ; corollæ albæ; labio superiore concavo incurvo emarginato; inferiore 3fido, laciniis æqualibus, intermediâ lineis rubris striatâ. Bracteæ ad basim florum, 3nerviæ, 5nerviæ vel 7nerviæ, ovatæ. Altera exterior & inferior, laterales & superiores duæ minores. Floret sæpè apud nos, vere, aestate, & autumno; præsertim in meo hortulo ubi fructus protulit, calceoli formam æmulantes.

GRATIOLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 25.

Char. sec. *Rad.* horizontalis nodosa fibrosa. *Caul.* angulata herbacea. *Fol.* sessilis opposita simplex integra. *Flor.* petiolata solitaria axillaris. *Ful.* bractea linearis duplex, ad basim cujuslibet floris.

1. GRAT. foliis ovato-lanceolatis superne serratis, bracteis geminis linearibus, calyce longioribus.

Officinalis.

Grat. floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis.

Linn. sp. p. 17. Sauv. 137.

Digitalis minima Gratiola dicta. *Tour. 165.*

Grat. centauroïdes. *Bot. Mons. 123.*

La Gratirole, ou l'herbe au pauvre homme.

HABITAT Monspelii; *Au bois de Gramont dans le pré à gauche.*

HOSPITATUR in frigidario. Floret maïo & junio. Folia sessilia semi-amplexicaulia, ferrata, ferraturis parvis

remotis; inferne integra; pedunculi axillares solitarii uniflori, foliis breviores; ad basim cujuslibet calycis, bracteæ duæ lineares calyce longiores.

UTRICULARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 24.

Char. sec. Rad. fibrosa horizontalis stolonifera.

Caul. geniculata. Fol. simplex capillacea multifida vesiculata opposita. Flor. nuda axillaris. Ful. nulla.

Vulgaris. 1. UTRIC. nectario conico, pedunculis squamosis.

Linn. sp. p. 18. Sauv. 222.

Lentibularia Rivini. Seg. ver. T. I. p. 128.

Linariæ affinis millefolii folio lenticulato, flore luteo.

Hort. Mons. 120.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato. Bot.

Mons. app. 302. Lob. Icon. 791.

HABITAT Monspelii; A Lattes, à Maupas; in aquis.

HOSPITATUR in frigidario. Floret julio & augusto.

Flores maximi. Folia multifida, lacinulis capillari- bus. Pedunculi squamis vestiti, axillares, multi- flori. Pedunculus partialis uniflorus, ex axilla squamæ concavæ bracteæ-formis, floribus longior.

VERBENA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 26.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. tetragona articulata ramosa. Fol. opposita simplex integra vel incisa.

Flor. spicata terminalis & axillaris. Fulc. nulla.

Nodiflora. 1. VERB. tetrandra, spicis capitato conicis axillaribus, foliis ovatis serratis, caule glabro repente. Linn.

sp. pag. 20.

Verb. nodiflora capite oblongo, seu Verbenaca nodi- flora Imperati. Barr. Icon. 855.

2. Verb. nodiflora iulo longiore. Barr. Icon. 854.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Pedunculi foliis lon- giores. Semina maturat autumno (sed raro.) Variat foliis cuneiformibus ad basim integris & caule obtuse angulato.

Bonariensis. 2. VERB. tetrandra, spicis oblongis axillaribus terminali- busque, caule frutescente bicanaliculato.

Verb. spicis fasciculatis; foliis lanceolatis amplexicauli- bus. Linn. sp. p. 20.

HOSPITATUR sub dio. Caulis perennis, altitudinem humanam superat, hirsutus, pilis patentibus, acute tetragonus; latera opposita alternatim canaliculata. Alibi herbacea annua.

3. VERB. tetrandra, spicis filiformibus longis, foliis hastatis. *Linn. sp. p. 20.* *Hastata.*

Verbena americana altissima, spicâ multiplici, foliis urticæ angustissimis. *Tour. 200.*

- Et { floribus cæruleis. *Tour. ibid.*
floribus purpureis.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Priori humilior.

Variat foliis omnibus lanceolatis.

4. VERB. tetrandra, spicis paniculatis filiformibus, foliis ovatis, serratis petiolatis. *Linn. sp. p. 20.* *Urticæfolia.*

Verb. urticæfolia Canadensis. *Tour. 200.*

Verb. lamiifolio. *Barr. Icon. 1146.*

HABITAT in Canada.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Petioli hirsuti, breves. Folia sæpè duplicato-serrata.

5. VERB. tetrandra, spicis paniculatis, foliis multifidis, caule solitario. *Linn. sp. 20.* *Officinalis.*

Verb. foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. *Sauv. 279.*

Verb. communis flore cæruleo. *Bot. Mons. 275.* *Tour. 200.*

La Verveine ou Verbene. Vernaculè *Bermene.*

HABITAT Monspelii ubique.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Caulis glaber sæpè scaber, debilis.

Variat foliis 3 partitis dentatis, foliisque summis lanceolato-oblongis integerrimis.

LYCOPUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 27.

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. tetragona ramosa.*

Fol. opposita, simplex incisa. Flor. axillaris verticillata. Fulc. nulla.

1. LYC. foliis ovatis sessilibus, basi sinuato-pinnatifidis superne serratis. *Palustris.*

Lycopus foliis sinuato-serratis. Linn. sp. p. 21.

Lyc. Sauv. 148.

Marrubium Palustre glabrum hirsutum. Bot. Mons. 174.
Lyc. palustris glaber villosus. Tour. 191.
Le Pied de loup.
HABITAT Monspelii; au Verdanson, Selleneuve, Lattes,
le long du Lés.
HOSPITATUR sub dio. Perennis.

ZIZIPHORA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 28.

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. obtuse tetragona,*
ramosissima. Fol. opposita, simplex integra. Flor.
verticillata, axillaris. Fulc. nulla.

Tenuior. 1. **ZIZIPH.** floribus verticillatis pedunculatis, foliis lanceolatis, ciliatis subintegerrimis.

Ziziph. floribus lateralibus, foliis lanceolatis. Linn.
sp. p. 21.

Clinopodium orientale hirsutum, foliis inferioribus ocytum, superioribus hyssopum referentibus. *Tour. Cor. 12.*

HABITAT in Mediâ.

HOSPITATUR sub dio, annua; caulis erectus, teres, obtuse 4angulus, pubescens, semipedalis. Ramî debiles, diffusi. Folia saepius integerrima; petiolo ipsis duplo breviore.

Flores axillares saepè 3. vel quatuor pedunculati. Calyces hirsuti, striati, acuminati. Corollæ dilute violaceæ, fauce notatâ punctis purpureis. Semina matuранs.

MONARDA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 32.

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. tetragona ramosa articulata. Fol. opposita, simplex integra. Flor.*
verticillata. Ful. nulla.

Fistulosa. 1. **MON.** verticillis capitatis subsolitariis terminalibus, foliis ovatis sessilibus.

Mon. capitulis terminalibus, caule obtus-angulo. Linn.
sp. p. 22.

Leonurus Canadensis origani folio. Tour. 187.

Origanum Canadense, fistuloso flore purpureo. Barr.
Icon. 1221.

HABITAT

HABITAT in Canadâ.

HOSPITATUR sub dio, hyeme in hybernaculo, perennis, vix bipedalis. Variat foliis integerrimis.

R O S M A R I N U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 31.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticosa ramosa articulata. Fol. opposita simplex, integerrima. Flor. axillaris. Fulc. nulla.

1. ROSM. foliis sessilibus, linearibus, margine revolutis. *Officinalis.*

Rosm. Linn. sp. p. 23. Sauv. 141.

Rosm. coronarius fruticosus. Bot. Mons. 223.

Rosm. spontaneus latiore folio. Tour. 195.

2. Rosm. hortensis angustiore folio. Tour. ibid.

Le Romarin. Monspelii ou Roumanis.

HABITAT Monspelii ubique; à la Garrigue de la Verne, du Terrail, de Montferrier, &c.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

S A L V I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 30.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea, ramosa, articulata tetragona. Fol. opposita simplex, integrâ vel incisa, inferior petiolata, superior sessilis. Flor. verticillata terminalis. Fulc. bracteæ ad basim verticillorum.

1. SALV. foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea brevissima. *Lyrata.* Linn. sp. p. 23. Syst. nat. p. 853.

HABITAT in Virginiam.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis; semina raro maturat.

2. SALV. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Officinalis.* Linn. sp. p. 23. Syst. nat. p. 853. Sauv. 143.

Salvia major. Bot. Mons. 228. Tour. 181.

3. Salvia minor aurita & non aurita. Tour. ibid.

La Sauge. Monspelii, la Saoubie ou Savubie.

HABITAT Monspelii circâ Grabels, St. George.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Flores laxe spicati.

4. SALV. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. *Pomifera.* Linn. sp. p. 24. Syst. nat. p. 853.

Salv. cretica frutescens pomifera, foliis longioribus
incanis & crispis. *Tour. Cor.* 10.

Salv. Cretensis baccifera. *Lob. Icon.* 554.

HABITAT in Cretâ.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Petioli folio-
rum longissimi; raro semina proferens, nec florens
quolibet anno.

Urticifolia. 4. SALV. foliis ovato-oblongis duplicato-serratis, caly-
cibus 3dentatis, laciniâ summâ 3dentatâ. *Linn. sp.*
p. 24. Syst. nat. p. 853.

HABITAT in Virginîâ.

HOSPITATUR sub dio, valde hirsuta. Variat labio
calycis superiori integro.

5. SALV. foliis oblongis crenatis, corollarum galeâ se-
mi-orbiculatâ, calycibus fructiferis reflexis. *Linn.*
sp. p. 24. Syst. nat. 853. Sauv. 143.

Horminum comâ viridi. *Tour. 178.*

HOSPITATUR sub dio. Bracteæ virides (summæ.)

Horminum. 6. SALV. foliis obtusis crenatis, bracteis summis steri-
libus coloratis *Linn. sp. p. 24.*

Salv. foliis obtusis crenatis, spicis colorato-comosis.
Sauv. 146.

Horminum sativum comâ purpuro - violaceâ. *Tour.*
178.

Horminum creticum comâ purpuro - violaceâ. *Barr.*
Icon. 1233.

L'Ormin. Vernaculè, *lou Prud'homme.*

HOSPITATUR sub dio. Floret absque fructu, vix ses-
quipedalis.

Sylvestris. 7. SALV. foliis cordato-lanceolatis acutis, bracteis co-
loratis, flore brevioribus. *Linn. sp. p. 24. Syst. nat.*
p. 854.

Sclarea folio salviæ major maculata. *Tour. 179.* Minor
sive glabra. *Tour. 180.*

HABITAT....

HOSPITATUR sub dio.

Pratensis. 8. SALV. foliis cordato-oblongis crenatis: summis am-
plexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galeâ
glutinosis. *Linn. sp. p. 25. Syst. nat. p. 854.*

Sclarea pratensis folio ferrato. *Tour. 179.* flore căru-
leo, albo, & suave rubente.

Horminum pratense foliis serratis. *Bot. Mons.* 133.

- Salvia** foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis. *Linn.* *Sauv.* p. 146.
- HABITAT Monspelii; à Jouvinac, St. George, & près le Puits de St. Loup. Perennis.
9. **SALV.** foliis serratis sinuatis, corollis calyce angustioribus. *Linn.* sp. p. 25. *Sauv.* 278. *Linn.* *Syst. nat.* p. 854. *Verbenaca.*
- Horminum sylvestre lavendulæ flore. *Bot. Mons.* 133. *Tour.* 178.
- Horminum sylvestre inciso folio, parvo flore Italicum. *Barr. Icon.* 208. 220.
- Monspelii *Prud'homme.*
- HABITAT Monspelii ubique; præsertim au bord du Lès. Perennis, vix pedalis.
10. **SALV.** foliis ovatis, basibus mucronato-tuberosis, spicis imbricatis, calycibus trifidis. *Linn.* sp. p. 25. *Hispanica.* *Syst. nat.* p. 854.
- HABITAT in Italia & Hispania.
- HOSPITATUR sub dio. Hyeme in hybernaculo.
11. **SALV.** foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio inferiore incumbente. *Linn.* sp. p. 26. *Syst. nat.* p. 854. *Verticillata.*
- Horminum sylvestre latifolium verticillatum. *Tour.* 178.
12. Horminum sylvestre hirsutum lampsanæ folio, flore cæsio. *Barr. Icon.* 199.
- HOSPITATUR sub dio. Perennis. Florens æstate & autumno.
- Variat foliis lyratis vel cordato-sagittatis in eadem plantâ.
12. **SALV.** foliis cordato-sagittatis ferratis acutis. *Linn.* *Glutinosa.* sp. p. 26. *Syst. nat.* p. 854. *Sauv.* p. 146. I.
- Salv. glutinosa maxima foliis hormini. *Tour.* 180.
- Orvala tertia. *Dod. Pempt.* 294.
- La Sauge de montagne.*
- HABITAT Monspelii; à l'Esperou.
- HOSPITATUR in frigidario. Perennis. Folia inferiora palmaria.
13. **SALV.** foliis hastato-triangularibus oblongis, obtusis crenatis. *Linn.* sp. p. 26. *Syst. nat.* p. 854. *Canariensis.*
- Sclarea folio triangulari, caule tomentoso. *Tour.* 180,
- HABITAT in Canariis,

HOSPITATUR sub dio. Versus meridiem, subfruticosa, sempervirens, bicubitalem superans altitudinem. Semina raro maturans.

Sclarea. 14. SALV. foliis rugosis oblongo-cordatis ferratis, floribus calyce longioribus concavis acuminatis. Linn. sp. p. 27. Sauv. 146. Linn. Syst. nat. p. 854.

Sclarea tabernæ. Tour. 179.

Horminum sclarea dictum. Bot. Mons. 133.

La Toute bonne Monspelii.

HABITAT Monspelii; aux prairies de Lattes; humana superans altitudinem. Folia maxima rugosa cordata. Bracteæ coloratæ.

Ceratophylla. 15. SALV. foliis rugosis pinnatifidis, lanatis. Linn. sp. p. 27. Syst. nat. p. 854.

Sclarea rugoso verrucoso & laciniato folio. Tour. 180.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme apricatur. Nuper periit; nondum floruerat.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 35.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata; simplicissima. Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. spicata terminalis nuda. Ful. nulla.

Odoratum. 1. ANTH. spicâ ovato-oblongâ, flosculis subpedunculatis aristâ longioribus. Linn. sp. p. 28. Syst. nat. p. 855. Sauv. p. 26. & 35.

Gramen anthoxanthum spicatum. Tour. 518.

Gramen pratense spicâ flavescente. B. pin. 3.

Gramen alopecurum spicâ glumosâ luteâ, villis crispis. Barr. Icon. 124. n°. 1.

HABITAT Monspelii ubique in pratis.

Semina calycibus duplo minora atro-purpurea. Arista altera brevis recta, altera longior fusca vel nigricans geniculata. Spica, vigente florescentiâ, virescens, absoluta verò, flavescentia.

Classis III.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 37.

Char sec. *Rad. fibrosa, tuberosa. Caul. articulata, herbacea, fistulosa, simplex ramosa vel dichotoma. Fol. opposita simplex, integra vel composita, imò utraque in eadem specie. Flor. terminalis corymbosa. Fulc. nulla.*

1. VAL. floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. sp. pl. pag. 31. Sauv. 138. Linn. Syst. nat. pag. 860.* *Rubra.*
Val. rubra. Tour. 131.
Valer. rubra angustifolia. Tour. 131. Bot. Mons. 273.
Val. foliis lanceolatis integerrimis, floribus caudatis monandris. Sauv. 131.
La Valériane rouge.
HABITAT Monspelii; au Mont St. Loup, à l'Esperou.
HOSPITATUR in frigidario, sub dio. Perennis. β . sem-perflorens, foliis lanceolatis. Prior floret tantum æstate; folia (summa) cordata.
2. VAL. floribus monandris, foliis pinnatifidis. *Linn. sp. p. 31. Syst. nat. p. 860. Sauv. pag. 275.* *Calcitrapa.*
Val. foliis calcitrapæ. Tour. 133. Bot. Mons. 273.
HABITAT Monspelii, versùs Grabels. Rarò vidimus in locis notatis à Magnolio in *Bot. Mons.*
HOSPITATUR sub dio.
3. VAL. floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Officinalis.*
Linn. sp. p. 31. Syst. p. 860.
Val. sylvestris major. Tour. 132. Dod. pempt. 349.
La grande Valériane.
HABITAT
HOSPITATUR in frigidario.
4. VAL. floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radi- *Ebis.*
B iii

calibus indivisis. *Linn. sp. p. 32. Sauv. 221. Linn. Syst. p. 860.*

Val. Phu folio olusatri. Tour. p. 132.

Val. hortensis. Dod. pempt. 346.

HABITAT à Fougere.

HOSPITATUR in frigidario ; sempervirens. Variat foliis radicalibus lyratis.

***Tripteris.* 5. VAL. floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, caulinis ternatis lanceolatis serratis. Linn. sp. p. 32. Syst. p. 860.**

Val. foliis radicalibus cordatis erosis, caulinis sèpè ternatis, floribus zantheris. Sauv. 134.

Val. floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis. Sauv. 276.

Val. alpina 1^a. Tour. 131. & altera, ibid.

Val. alpina minor. Bot. Mons. 307.

HABITAT à l'Esperou & aux Capouladoux, à la Serane. Copiosissimam vidi à la Malou près de Beziers.

HOSPITATUR in frigidario. Folia caulina non præcise ternata, sed 3 fida laciniâ intermediâ majore.

Locusta. 6. VAL. floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. Linn. sp. p. 33. Syst. p. 860.

Val. foliis linearibus integris, seminis apice cochleato, caule dichotomo. Sauv. 131.

Valerianella semine umbilicato oblongo nudo. Bot. Mons. 274. Tour. 133.

Vernaculè, la Chuguette; apud rusticos usui est loco acetarii. Vix palmaris. Folia ad basim uno altero ve denticulo.

Olitoria. 2. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu simplici. Sauv. 131. Linn. sp. 33.

Valerianella arvensis præcox, humilis, semine comppresso. Moris. Tour. 132.

Coronata. 3. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu 6dentato. Linn. sp. pag. 34. Sauv. pag. 131.

Valerianella semine stellato. Bot. Mons. 273. Tour. 133.

Vernaculè, lous Passerous.

Dentata. 4. Valeriana caule dichotomo, foliis oblongis subserratis, seminis coronâ 3dentatâ. Linn. sp. pag. 34. Sauv. 130. n°. 62. & pag. 276. n°. 50.

Valerianella cornu-copioïdes echinata Column. Bot.

Mons. 273. Tour. 133.

Valeriana (echinata) floribus 3andris fructu linearis 3dentato extimo denticulo majore recurvato
Linn. Syst. nat. pag. 861. A.

Valeriana echinata Bauh. pin. 165.

Vernaculè las Ampouletes

8. Val. caule dichotomo foliis imis dentatis, summis Multifida.
linearibus multifidis Sauv. 131.

Valerianella semine umbilicato rotundo nudo. Bot.

Mons. 273. Tour. 132.

Phu minimum. Lob. icon. 716.

HABITAT Monspelii versus *Lavanet*, *Boutonet* & alibi.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Varietates α β γ . semi-pedalem attingunt altitudinem : δ , vix 3 pollicaris.

7. VAL. floribus triandris, caule quadridido, foliis imis bipinnatifidis, seminis pappo plumoso. Linn.
sp. p. 34. Sauv. 275. Linn. Syst. nat. p. 861.

Mixta.

HABITAT Monspelii in saxosis, à la *Colombiere*. Copiosiorem vidi ultra pontem Castrinovi ad lèvam,
vers *Salaison*, mixtam cum cochleariâ faxatili.

HOSPITATUR sub dio. Sæpius rami quatuor oriuntur ex ipsâ radice, absque caule.

C N E O R U M.

Char prim. Vid. Linn. gen. pl. 39.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. subfruticosa ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris, solitaria. Fulc. nulla.

1. CNEOR. foliis oblongis sessilibus integerrimis, pendunculis solitariis unifloris.

Tricoccus.

Cneor. Linn. sp. p. 34. Syst. nat. p. 861. Sauv.

Chamælea tricoccus. Bot. Mons. 59. Tour. 651.

La Camelée.

HABITAT Monspelii ad dexteram viae quâ itur ad pagum dictum *Montferrier*, derrière le *Martinet de M. Boulet*, le long du Lés dans le bois; & in monte *Cetio*, ut notat *Magnolius* in Bot. Mons.

HOSPITATUR sub dio in frigidario: sempervirens, florens vere & æstate. Frutex.

M E L O T H R I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 43.

Char. sec. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbacea ramosa volubilis. *Fol.* simplex petiolata alterna incisa. *Flor.* axillaris simplex pedunculata. *Ful.* cirrosa laterifolia.

Pendula. 1. MEL. foliis cordatis palmato-angulatis petiolatis, pedunculis axillaribus i floris.

Mel. Linn. sp. p. 35. Syst. nat. p. 861. Sauv.

Bryonia canadensis folio angulato, fructu nigro. Tour. 102.

HABITAT in Canadâ.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Annua. Petioli & pedunculi subæquales.

P O L Y C N E M U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 44.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* ramosa, repens.

Fol. alterna subulata simplex integerrima. *Flor.* axillaris. *Fulc.* stipulæ subulatæ solitariæ.

Arvensis. 1. POLYC. Foliis stipulisque subulatis.

Chenopodium humifusum annum folio breviori & capillaceo. Tour. 506. Seg. ver. t. 1. pag. 93.

Champhoratae congener, Bot. Mons. pag. 47. hort. pag. 40.

Herniaria foliis longis angustis acuminatis, glabris. Mag. char. p. 51.

HABITAT Monspelii, præsertim occurrit in viâ quâ itur ad Gramuntianum lucum. Perenne.

C R O C U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 45.

Char. sec. *Rad.* Bulbosa. *Caul.* nulla. *Fol.* tereti-subulata vaginans radicalis. *Flor.* radicalis, sessilis liliacea. *Ful.* nulla.

Sativus. 1. CROC. spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo. Linn. sp. p. 36. Sauv. 19.

Croc. sativus. Tour. 350.

Le safran.

HOSPITATUR in frigidario, floret autumno. Bulbi alii aliis impositi.

IXIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 46.

Char. sec. *Rad.* horizontalis, tereti - carnosa nodosa. *Caul.* simplex. *Fol.* ensiformis simplex integerrima alterna amplexicaulis. *Flor.* ramosa liliacea terminalis. *Fulc.* nulla.

1. IXIA foliis ensiformibus, floribus remotis. *Linn. sp. Chinensis.*
pl. 36. Syst. nat. p. 862. hort. upf. p. 16.

La Bermudienne.

HABITAT in Indiâ & Chinâ.

HOSPITATUR sub dio. Radix Perennis; floret augusto; semina semper maturans. Antheræ sæpius filamentis longiores. Stamina pistillo breviora.

GLADIOLUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 47.

Char. sec. *Rad.* Bulbosa, solida. *Caul.* herbacea simplex. *Fol.* ensiformis alterna amplexicaulis, simplex integerrima. *Flor.* terminalis subspicata alterna. *Fulc.* nulla.

1. GLAD. foliis ensiformibus, floribus distantibus. *Communis.*
Linn. sp. p. 36.

Glad. floribus unoversu dispositis, *Bot. Mons.* 109.
Tour. 365. sp. 3 - 9.

2. Glad. utrinque floridus. *Bot. Mons.* 110. *Tour. 366.*
Le Glayeul.

HABITAT Monspelii ubique in segetibus.

Radix Perennis. Spatha inferior sæpius corollâ longior. Bulbi alii aliis impositi.

IRIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 49.

Char. sec. *Rad.* horizontalis, tereti - carnosa, nodosa vel tuberosa. *Caul.* - simplex foliosa, in unâ specie scaposa. *Fol.* ensiformis alterna amplexicaulis; in unâ specie tetragona radicalis. *Flor.* liliacea sparsa terminalis. *Fulcr.* nulla.

* *Barbatæ.*

1. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multi- *Germanica.*
floro. *Linn. sp. p. 38. Sauv. 40.*

Iris vulgaris violacea sive purpurea sylvestris, J. B.
Bot. Mons. 141. Tour. 358.

Iris hortensis latifolia Tour. 358. seu *iris nostras.*
La Flambe. Monspelii Coutele.

HABITAT Monspelii ubique ad margines sepium.
HOSPITATUR sub dio. Perennis.

Florentina. 2. *IRIS corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro,*
floribus sessilibus. Linn. Syst. nat. p. 863. A.
Iris alba Florentina B. pin. 31. Tour. 358.
L'Iris de Florence.

HABITAT . . .

HOSPITATUR sub dio, in frigidario. Perennis. Stigma
 tis lacinia subtus exserit denticulum unicum
 bifidum.

Pumila. 3. *IRIS corollis barbatis, caule foliorum longitudine*
unifloro. Sauv. 40. n°. 108. & 109.
Iris corollis barbatis, caule foliis breviore. Linn. sp.
 p. 38. Syst. nat. 863.
Iris perpusilla à caulis ferme saxatilis. Bot. Mons. p.
 141.

Iris humilis saxatilis gallica. Tour. 362.

HABITAT Monspelii in saxosis, à Montferrier, vul-
 gatior à Salaison.

HOSPITATUR sub dio.

* * * *Imberbes.*

Pseudoxcornus 4. *IRIS corollis imberibus, petalis interioribus stig-*
mate minoribus, foliis ensiformibus. Linn. sp. pl.
 p. 38.

Iris corollis imberibus, foliis ensiformibus, petalis
internis stigmate minoribus. Sauv. 41.

Iris palustris lutea sive acorus adulterinus. Bot.
 Mons. 142. Tour. 360. B.

HABITAT Monspelii ubique in aquis.

HOSPITATUR in frigidario. Lacinia unica stigmatis
 ad basim denticulum filiformem exserit.

Fætidissima. 5. *IRIS corollis imberibus, petalis internis longitudine*
stigmatis, foliis ensiformibus. Linn. sp. pl. p. 39.
 Sauv. p. 41.

Iris sylvestris seu Xyris. Bot. Mons. p. 142.

Iris fætida seu Xyris. Tour. p. 360.

Le Glayeul puant.

HABITAT Monspelii ad margines sepium.

6. IRIS corollis imberibus, foliis tetragonis. Linn. sp. *Tuberosa*.

p. 40. Sauv. pag. 43.

Hermodactylus folio quadrangulo. Tour. cor. 50.

Dodon. pempt. 249.

Les hermodactes.

HOSPITATUR in frigidario. Radix perennis. Floret autumno & hyeme. Stigmata à latere exteriori foliola duo gerunt, instar squamæ nectariferos.

7. IRIS corollis imberibus, foliis subulato-canaliculatis *Xiphium*. caule brevioribus. Linn. sp. p. 40.

Iris caulescens, foliis margine conniventibus, corollis imberibus. Sauv. p. 43.

Xiphion latifolium caule donatum. Tour. 363.

HOSPITATUR sub dio. Bulbosa, floret maio.

C O M M E L I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 50.

Char. sec. *Rad* fibrosa. *Caul*. articulata radicans ramosa. *Fol*. alterna simplex integerrima vaginans. *Flor*. liliacea terminalis. *Ful*. nulla.

1. COMM. corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, Caule procumbente glabro. Linn. sp. Communis. pl. pag. 40. Sauv. 43.

HOSPITATUR sub dio. Floret æstate. Folia ovata acuminata vaginantia Caulem. Pedunculi bini, eadem spathâ vaginati; alter uniflorus tenuis longus; alter brevior sub 4florus crassior; capsulæ maturæ lacrifcentes.

S C H Æ N U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 52.

Char. sec. *Rad*. fibrosa. *Caul*. culmosa solida teres foliosa vel nuda. *Fol*. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor*. terminalis spiculis capitatis. *Ful*. bracteæ binæ vel ternæ subulatæ foliaceæ.

NOTA. In generibus Schoenii, Cyperi & Scirpi, foliola floralia quæ *involucra* clarissimo Linnæo dicuntur, non pro calyce communi; sed pro genuinâ fulcratione haberi debent, & *bractearum* nomine insignienda. Idem intelligendum de generi-

bus graminum & plantarum sequentibus, quæ Autori prælaudato *involucris*, nobis vero *Bracteis* pariter donantur.

1. SCHœNUS culmotereti, foliis margine dorsoque aculeatis. *Linn. sp. pl. 42. Sauv. 23.*

Gramen cyperoides altissimum, foliis & carinâ serratis. *Bot. Mons. 117.*

Scirpus palustris altissimus, foliis & carinâ serratis. *Tour. 528.*

Gramen cyperoides. Boccon. 72.

HABITAT Monspelii ad stagnorum ripas.

HOSPITATUR sub dio. In frigidario. Perennis. Altitudo bicubitalis. Folia ad margines & nervum ferrato-ciliata; pedunculi axillares, alterni, multiflori, ramosi.

- Mucronatus.* 2. SCHœNUS culmo teretî nûdo, spicis fasciculatis, divaricatis, involucro subulato triphylo. *Linn. sp. pl. 42.*

Schœnus culmo tereti, foliis tribus patulis, flosculisque aggregatis terminato. *Sauv. 9.*

Juncus maritimus capite glomerato. Tour. 528.

Gramen cyperoides maritimum. Bot. Mons. 118.

Juncus maritimus paniculâ subrotundâ glumosâ. Barr. Icon. 203. n°. 1.

HABITAT Monspelii cum priori.

HOSPITATUR in frigidario, sub dio. Perennis.

- Nigricans.* 3. SCHœNUS culmo tereti nudo, capitulo ovato: involucri diphylli valvula altera subulata longa. *Linn. sp. p. 43.*

Schoenus flosculis spicatis. *Sauv. 9.*

Gramen spicatum junci facie lithospermi semine. Tour. 518.

Juncus lithospermi semine. Bot. Mons. Icon. pag. 145.

HABITAT Monspelii ultra pontem Sallenovæ; *au-dessus de Caunelles*; ubi abundat.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

C Y P E R U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 53.

Char. sec. Rad. tuberosa vel fibrosa. Caul. culmosa solida, teres vel triquetra, nuda aut foliosa. Fol. graminea vaginans simplex inte-

gerrima, alterna vel radicalis. *Flor.* spicata, spiculis compressis in umbellas congestis. *Fulc.* Bracteæ ternæ, quaternæ & subulatæ, umbellis sæpe longiores.

1. CYP. culmo folioso triquetro, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis, *Linn. sp. 45. Sauv. 21.* *Longus.*

Cyperus odoratus radice longa, seu *cyperus officinarum*. *Bot. Mons. 84. Tour. 527.*

Le Souchet.

HABITAT Monspelii, à Gramont, au Lés, à Lattes & ubique in locis aquaticis vicinis.

HOSPITATUR in frigidario; altissimus; involucra longissima.

2. CYP. culmo nudo triquetro, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanceolatis. *Linn. sp. p. 46.* *Flavescens.*

Cyperus culmo triquetro spicis sessilibus confertis distichis apici trifoliato insidentibus. *Sauv. 21.*

Cyperus minimus panicula sparsa flavescente. *Tour. 527.*

HABITAT Monspelii in herbidis ante pontem pratorum laterensium. *A la campagne des Jésuites.*

Obs. Variat. Vix palmaris, spiculis conglomeratis ovatis; vel cubitatis, floribus pedunculatis, spiculis oblongis.

3. CYP. culmo nudo triquetro, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus atris. *Linn. sp. p. 46.* *Fuscus.*

Cyp. minimus panicula sparsa nigricante. *Tour. 527.*

Gramen cyperoïdes paniculâ sparsâ minus *Bot. Mons. 118.*

HABITAT cum præcedenti. Raro ad semipedalem crescit altitudinem.

HOSPITATUR in frigidario. Perennis.

S C I R P U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 54.

Char. sec. Rad. fibrosa. *Caul.* culmosa solida, teres vel tiquetra, nuda vel foliosa. *Fol.* graminea vaginans. Simplex integerrima, al-

terna vel radicalis. *Flor.* terminalis vel lateralis, spiculis teretibus. *Fulg.* Bracteæ ut in prioribus; raro nullæ.

* *Spica unica.*

Palustris. 1. SCIRP. culmo nudo tereti, spica subovata imbricata. *Linn. sp. p. 47.*

Scirp. culmo nudo, spica terminatrice subovata. *Sauv. 8.*

Juncus palustris equiseti capitulo majore. *Bot. Mons. 145.*

Scirp. equiseti capitulo majore. *Tour. pag. 529.*
Le jonc à masse.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, & alibi in humidis.
HOSPITATUR in frigidario.

Flinitans. 2. SCIRP. culmis teretibus alternis nudis, caule folioso flaccido. *Linn. sp. p. 48.*

Scirp. caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis. *Sauv. 9.*

Scirp. capitulis equiseti minor. *Tour. 528.*
HABITAT cum priori.

* * *Culmo tereti polyftachio.*

Lacustris. 3. SCIRP. culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pendunculatis terminalibus. *Linn. sp. p. 48.*

Scirp. teres panicula sub apice culmi ramosa. *Hall.*
Sauv. p. 8.

Juncus maximus, seu scirpus major. *Bot. Mons. 143.*
Scirpus palustris altissimus. *Tour. 528.*

HABITAT Monspelii, à Selleneuve, à Castelnau, in aquis.

HOSPITATUR in frigidario. Spiculæ oblongæ.

Holoscanus. 4. SCIRP. culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inæquali mucronato. *Linn. sp. p. 49.*

Scirp. maritimus, capitulis rotundis glomeratis. *Tour. 528.*

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *Bot. Mons. 143.*

HABITAT Monspelii ubique, à Castelnau, Lattes.
HOSPITATUR in frigidario.

Romanus. 5. SCIRP. culmo tereti nudo, capitulo lateralí conglobato bractea reflexa. *Linn. sp. p. 49.*

- Scirp. capitulo singulari, radice tomentosa. *Barr. Icon.*
255. fig. 3.
- HABITAT Monspelii aux prairies d'Arenes, à la Mouson, à la Mer.
- HOSPITATUR in frigidario. Perennis.
6. SCIRP. culmo nudo setaceo, spicis lateralibus sub-
sessilibus subsolitariis. *Linn. sp. p. 49.*
- Scirp. omnium minimus, capitulo breviore. *Tour.*
528.
- Juncellus inutilis, seu chamæschænos, *B. Pin.* 12.
- Juncus gramineus minimus, capillari folio, capite
squamoso. *Barr. Icon.* 118. n°. 2.
- HABITAT Monspelii, à Balaruc & à Bouzigues. Junio
copiosum, florentem vidi.
- HOSPITATUR in frigidario. Vix palmaris. Spicæ vix
lentem magnitudine adæquant. Bractea spicis subæ-
qualis.
- *** Culmo triquetro, panicula nuda.
7. SCIRP. culmo triquetro nudo acuminato, panicula *Mucronatus.*
conglomerata nuda. *Linn. sp. pag. 50.*
- Cyperus maritimus capitulis glomeratis. *Tour.* 527.
- Juncus acutus maritimus caule triangulo. *Bot. Mons.*
143.
- HABITAT Monspelii ad mare & stagna, ubique.
- HOSPITATUR in frigidario.
- *** Culmo triquetro, panicula foliacea.
8. SCIRP. culmo triquetro, panicula conglobata folia-
cea, spicularum squamis trifidis, intermedia subu-
lata. *Linn. sp. p. 51.*
- Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea pedun-
culis simplicissimis spicis confertis. *Sauv.* 20.
- Cyperus rotundus vulgaris. *Bot. Mons.* 83.
- Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Tour.* 527.
8. Gramen cyperoïdes panicula sparsa majus. *Bot. Mons.*
118.
- Cyperus vulgatior panicula sparsa. *Tour.* 527.
- HABITAT Monspelii; abundat in Urbis fossis cum
alopecuro aristato, vers l'Hôpital Général, & in hu-
midis. s. Au fond du Lés.
9. SCIRP. culmo triquetro folioso, umbella foliacea,
pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis.
Linn. sp. p. 51.
- Setaceus.*
- Maritimus.*
- Sylvaticus.*

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis nudis supra-decompositis, spicis confertis. Roy. Sauv. 21.

Gramen cyperoides miliaceum. Bot. Mons. 118.

Cyperus gramineus. Tour. 527.

HABITAT Monspelii in Ledo amne.

ERIOPHORUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 55.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa foliosa.

Fol. (graminea) vaginans simplex integerrima.

Flor. terminalis spicata, nunc paniculata. Fulcr. bracteæ.

Vaginatum. 1. ERIOPH. culmis vaginatis teretibus, spica paleacea.

Linn. sp. 52.

Eriophorum foliis teretibus, spica unica subrotunda.

Sauv. 9.

Linagrostis panicula minore. Tour. 664.

HABITAT à l'Esperou, à Rouquet, Valene, in pratis humidis.

HOSPITATUR in frigidario; spica magnitudine spicularum scirpi maritimi, erecta.

Polystachion. 2. ERIOPH. culmis teretibus, floribus paniculatis nuntantibus.

Erioph. spicis pendulis. *Sauv. 9.*

Erioph. culmis teretibus, foliis planis, spiculis pendunculatis. *Linn. sp. p. 52.*

Linagrostis panicula ampliore. Tour. 664.

Gramen pratense junceum, nutante ampla sparsa & bombycina sericea panicula. *Barr. Icon. 12.*

HABITAT cum praecedenti. Squamæ spicularum pellicidæ membranaceæ.

NARDOUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 57.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa solidâ foliosa articulata. Fol. linearis (graminea) simplex integerrima. Flor. spicata terminalis. Fulc. nulla.

stricta.

1. NAR. spica secunda linearis recta, compacta.

Nar. spica setacea recta. *Linn. sp. pl. p. 53.*

Gramen

Gramen sparteum juncifolium. *Scheuchz.* *Agros.* pag. 90. tab. 11. fig. 10. Icon optima.

Gramen loliaceum minimum, folio junceo, panicula unam partem spectante. *Tour.* 517.

HABITAT Monspelii in sterilibus, circa *Montferrier à gauche.*

HOSPITATUR in frigidario. Palmaris; glumæ calycinae lanceolatæ, in setas desinentes, acuminatæ.

2. NAR. spica incurva æquali, calycina gluma extiore aristato-acuminata longissima, floribus distantibus alternis. An nardus spica incurva? *Linn. sp. pl. 53.* *Sauv. p. 26.* & 35.

Incurva.

Gramen junceum nodosum minimum capillare. *Barr. Icon. 117. n°. 1.*

Gramen exile arundinaceum minimum acumine reflexo. *B. Scheuchz. p. 41. tab. 1. fig. 7. litt. K.* Icon optima.

Le Nard.

Luxuriabat in aridis circa Caunelles, anno præterito, mixtam cum limonio foliis bullatis ipsam vidi bipedalem, fragilissimam, floribus culmo arcte adpresso.

P H A L A R I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 59.*

Char. sec. Rad. bulbosa solida, vel fibrosa. Caul. culmosa simplex foliosa articulata. Fol. (graminea) subulata simplex integerrima. Flor. terminalis paniculata. Fulc. nulla.

1. PHALARIS panicula subovata spiciformi glumis *Canariensis.* carinatis. *Linn. sp. p. 54.*

Phal. radice annua. *Sauv. 37.*

Phal. major semine nigro & albo. *Bot. Mons. 201.*

Gramen spicatum semine miliaceo albo & nigro. *Tour. 518.*

2. Phal. radice perenni bulbosa. *Sauv. 37.*

Gramen phalaroides verius bulbosa radice. *Barr. Icon. 9. n°. 2.*

La graine de Canari.

HABITAT Monspelii in maritimis.

2. PHAL. panicula cylindrica spiciformi. *Linn. sp. p. 55.* *Phleoides.* Gramen typhoides asperum primum. *Bot. Mons. 114.*

Gramen spicatum spica cylindracea tenuiori longa.
Tour. 520.

Gramen cum cauda muris minus. *J. Bauh. tom. 2.*
p. 471.

HABITAT Monspelii in segetibus; copiosam vidi à la
Garrigue du Terrail.

Descr. Altitudo sesquipedalis. Spiculæ alternæ, disti-
chæ, imbricatæ, culmo appressæ; panicula ad al-
terutrum latus flexa seu arcuata, in lobos dividitur
spiculas distinguentes.

Arundinaceæ 3. PHAL. panicula oblonga ramosissima ventricosa.
Linn. pag. 55.

Phal. panicula oblonga. *Sauv. pag. 311.*

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Tour. 523.*
Bot. Mons. app. 397.

Gramen aquaticum phalaridis semine paniculatum.
Tour. 523.

3. Gramen paniculatum folio variegato. *Bot. Mons. 113.*
Tour. 523.

HABITAT Monspelii in humidis, à Lattes.

P A N I C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 62.

Char. sec. Rad. farmentosa, perpendicularis, vel
horizontalis. Caul. culmosa radicans articulata.
Fol. (graminea) vaginans subulata simplex
integerrima. Flor. terminalis, spicata vel pani-
culata. Fulc. nulla.

* *Spicata.*

Italicum. 1. PAN. spica composita, spiculis glomeratis fetis im-
mixtis, pedunculo hirsuto. *Linn. sp. pl. p. 56.*

Pan. italicum sive panicula majore. *Tour. 515.* & pa-
nicula minore. *Bot. Mons. 197.*

Pan. spica composita aristis gluma brevioribus. *Sauv.*
34.

Le Panis.

HABITAT Monspelii in urbis fossis, & circa Molen-
dinas.

Annum. Altitudo bipedalis. Variat colore & magni-
tudine spicæ.

Crus galli. 2. PAN. spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis,
glumis aristatis. *Linn. sp. pl. 56.*

Pan. vulgare spica multiplici, longis aristis circumval-
lata. *Tour.* 515.

Gramen paniceum spica divisa, aristis longis armata.
Bot. Mons. 116.

Gramen palustre arundinaceum milii panicula, semine
phalaridis. *Barr. Icon.* 8.

HABITAT Monspelii ubique in satis. Variat aristis lon-
gissimis aut brevissimis.

3. PAN. spicis aggregatis, basi interiore nodosis, flo-
culis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Sanguinale.*
Linn. sp. p. 57.

Gramen dactylon folio latiore. *Bot. Mons.* 112. *Tour.*
520.

Ischænum vulgare. *Lob. Icon.* 24.

Panicum spicis alternis oppositis linearibus patentif-
simis muticis, flosculis alternatim binis, alterutro
pedunculato. *Roy. Sauv.* 34.

HABITAT Monspelii passim.

* * *Paniculata.*

4. PAN. spicis digitatis patentibus: basi interiore villo-
sis, floribus solitariis, sarmentis reptantibus. *Dactylon.*
Linn. sp. p. 58.

Gramen dactylon radice repente, sive Officinarum.
Tour. 520.

Gramen legitimum Clusii. *Bot. Mons.* 111.

Ischænum foliis rigidis spicis glabris. *Sauv.* 34.

Gramen crucis, seu cruciatum tetradactylon. *Barr.*
Icon. 753. n°. 1.

Le Chiendent; Monspelii lou Gramenas.

HABITAT Monspelii; sponte provenit in hortis &
incultis.

HOSPITATUR sub dio. Perenne.

5. PAN. panicula laxa flaccida foliorum vaginis pubef-
centibus. *Linn. sp. p. 58. Sauv.* 35. *Miliaceum.*

Milium semine luteo & albo. *Bot. Mons.* 117. *Tour.*
514.

Le Millet, Monspelii lou Pichot-mil.

HABITAT Monspelii circa urbem.

HOSPITATUR sub dio. Annum. Panicula valde nu-
tans flaccida.

6. PAN. spiculis alternis solitariis muticis secundis li-
nearibus. *Ægyptiacum.*

Gramen paniceum minimum humi-stratum, spica divisa mutica, foliis variegatis. *Sloan. jam. Raj. tom. 3. p. 600.*

HABITAT in Aegypto.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Annum (apud nos.) Cauliculi è geniculis radices agunt. Altitudo pedalis. Folia maculis nigris duabus tribusve supra nervum insignita.

PHLEUM.

Char. prim. Linn. gen. pl. 60.

Char. sec. Rad. fibrosa vel bulbosa; bulbi alii aliis superimpositi. Caul. culmosa articulata radicans. Fol. (graminea) subulata vaginans simplex integerrima. Flor. terminalis spicata. Fulcr. nulla.

Schœnoides. 1. PHLEUM spica cylindrica longissima. *Linn. sp. p. 59. Syst. nat. p. 871. Sauv. 34.*

Gramen spicatum spica cylindrica longissima. *Tour. 519. S.*

Gramen typhinum paniceum utriculatum, ample utriculo. *Barr. icon. 28. n°. 2.*

HABITAT Monspelii. Frequens à Selleneuve. Altitudo sesquipedalis.

2. PHLEUM spicis ovatis obvolutis, foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus. *Linn. sp. pl. p. 60. Syst. pag. 871.*

HABITAT Monspelii in humidis, vers la source du Lés, Prades & Montferrier. Vix palmare. Rami plurimi axillares, foliis duobus tribusve brevibus vestiti, articuloque uno aut altero articuli in totâ plantâ vix semipollucem distantes à se invicem.

Bulbosum. 3. PHLEUM spica ovato-oblonga, basi sterili, culmo sub-recente, radice bulbosâ. *Linn. Syst. nat. pag. 871. A.*

Phleum radice bulbosa & nodosa. *Sauv. pag. 26. & 34.*

Gramen spicatum spica cylindracea brevi, radice nodosa. *Tour. 520.*

Gramen nodosum spica parva. *Bauh. Pin. 2. prodr.*
3. Bot. Mons. 114.

Gramen typhoïdes asperum alterum. *Scheuchz. agros.*
p. 63. Bauh. theat. 52.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, & dans les fossés
 autour de la Peissine.

ALOPECURUS. Queue de Renard.

Char. prim. Vid. Linn. gen. plant. 61.

Char. sec. Rad. fibrosa vel bulbosa. Caul. cul-
 mosa articulata. Fol. (graminea) subulata va-
 ginans simplex integerrima Flor. terminalis,
 spicata vel paniculata. Ful. stipula in una spe-
 cie ad oras vaginæ foliorum.

1. ALOP. culmo spicato erecto, radice bulbosa.

Bulbosus.

Gramen typhinum phalaroïdes, pilosa spica, aqua-
 ticum bulbosum, *Barr. Icon. 699. n°. 1.*

Gramen typhinum &c. *Barr. Icon. 680. n°. 1. & 2.*

HABITAT Monspelii: frequens in pratis, vers la
 Peissine, & à la descente de la Portaliere pour aller
 à Selleneuve, & dans les prés de Lattes.

Descr. Culmus erectus glaber sesquipedalis teretius-
 culus. Aristæ calycibus duplo longiores. Foliæ an-
 gusta plana. Spica cylindrica. Radix constat bul-
 bis 3-4 sibi invicem incumbentibus. Ex spicâ si-
 milis alopecuro pratensi; ex radice phleum bulbo-
 sum refert. Variat magnitudine culmi & crassitie
 spicæ.

2. ALOP. panicula erecta ovata, glumis calycinis ova-
 tis aristatis, oris vaginæ foliorum stipulatis.

Alop. altera paludosa anglica maxima seu gra-
 men alopecuroïdes maximum. *J. B. Hist. Tom. 2.*
p. 474.

Gramen spicatum spica cylindrica molli & densa. *T.*
Sauv. append.

Alop. majus spica virescente divulsa, pilis longiori-
 bus. *Barr. Icon. 115. n°. 2. Scheuchz. agr. p. 155.*

β. Gramen alopecurum minus spica virescente di-
 vulsa. *Barr. icon. 115. n°. 1.*

Gramen alopecuros minus spica longiore. *Scheuch.*
pag. 154. corollis muticis.

Alop. Monspeliensis. *Linn. p. 61.*

HABITAT Monspelii, dans les fossés de la Ville, vers l'Hôpital général.

Descr. Altitudo bicubitalis. Culmus erectus pennæ anserinæ crassitiem adæquans. Folia longa glabra. Stipula lata membranacea rigida ad oras vaginæ foliorum. Panicula ovata erecta rufa tripollicaris, in medio ovi gallinacei molem superans: calyces minimi semilineam longi ovati vix lineæ quartam partem lati. Aristæ infra apicem glumarum calycis, ipsis triplo longiores. Corollæ arista brevissima. Floret Junio & Julio.

Obs. Ipsum habui variantem in solo arido & macro, ita abnormem, ut degener videretur; vix palmaris; culmus crassitiem æquabat aciculæ. Panicula nutans, vix ovulo passeris major; sed adhibitâ attentione, nullam prorsus (exceptâ mole) inventi differentiam.

Pratenſis. 3. ALOP. culmo spicato erecto. *Linn. sp. pl. 60. Sauv. 34. & 309. n°. 6.*

Gramen spicatum spica cylindracea, longioribus villis donata. *Tour. 520.*

Gramen phalaroides majus sive italicum. *Bot. Mons. 115.*

β. Gramen spicatum, spica cylindracea tenuissima longiore *Tour. 520.*

HABITAT Monspelii in pratis.

Geniculatus. 4. ALOP. culmo infracto spicato. *Linn. sp. pl. 60. Sauv. p. 309. n°. 7. pag. 34.*

Gramen spicatum aquaticum spica cylindracea brevi. *Tour. 520.*

Gramen typhoides culmo reclinato. *B. pin. 4.*

HABITAT frequens Monspelii, in pratis laterensibus.

M I L I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 63.*

Char. sec. Rad. fibrofa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) subulata vaginans simplex integrerrima. Flor. paniculata terminalis. Ful. nulla.

Paradoxum. 1. MIL. floribus paniculatis aristatis. *Linn. Syst. nat. p. 872.*

Agrostis (paradoxa) flosculis aristatis gemellis: altero sterili, terminalibus ternis. *Sauv.* 35. *Linn.* *sp. pl. pag.* 62.

HABITAT frequens in horti regii ambulacris. Altitudo cubitalis; glumæ glabræ; aristæ calycibus triplo longiores. Panicula laxa.

A G R O S T I S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 65.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integrerrima. *Flor.* terminalis paniculata. *Ful.* nulla.

* Aristatæ.

- AGR. calycibus inferne ventricosis, valvula exteriore acuminata longitudine aristæ. *Tab. 1.* *Ventricosa.*

HABITAT Monspelii, au Puy de St. Loup & à droite au-delà de Prades.

Descr. Radix fibrosa; culmus aciculæ majoris crassitatem adæquans, erectus, pedalis, vel paulo altior. Folia angusta subulata. Articuli vix pollicem distantes à se invicem excepto supremo qui pollices circiter tres à paniculâ distat. Panicula coarcta spicata virescens, vel argentea vel (matura) rufescens, sesquipollicem longa; calyces inferne ventricosi; valvula altera brevis, altera longior acuminata; arista longitudine valvulæ calycinæ longioris, terminans semen minimum, villosum, in infimâ calycis parte ventricosâ reconditum. In solis locis designatis occurrit.

- AGR. panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato, apice aristato, culmo ramoso. *Linn. Syst. nat. pag. 872. Tom. 2.* *Calamagrostis.*

Gramen arundinaceum, panicula densa, viridi-argentea, splendente, aristata. *Scheuchz. agr. 146. Tab. 3. fig. 11. A, C. It. Alp. 1709.*

HABITAT Monspelii; derriere le Mont St. Loup & à l'Espérou ubi altior. Facies avenæ flavescentis. Altitudo bipedalis. Icon *Scheuchz.* optima. Descrip-
tio exactissima.

- AGR. petalo exteriore, arista recta stricta longissima, panicula patula. *Linn. Syst. nat. pag. 876. sp. pl. pag. 61. Sauv. 35. n°. 44.* *Spica ventosa.* *C. iiiij.*

Gramen capillatum paniculis viridantibus & rubentibus *B. hist.* *Tour.* 524. & segetum panicula arundinacea. *Tour. ibid.*

HABITAT Monspelii. Frequentior praecedenti. Vidi in sterilibus, à *Bouzigues*, à *Balaruc*; & etiam cum priori in iisdem locis.

Rubra. 4. AGR. panicula parte florente patentissima, petalo exteriore glabro terminato aristा tortili recurva. *Linn. Syst. nat. p. 876. sp. pl. p. 62.*

Panicum serotinum arvense spica pyramidata. *Tour. 515.*

HABITAT Monspelii cum prioribus, & à *Lattes*.

Canina. 5. AGR. calycibus coloratis, petalorum aristা dorsali recurva. *Linn. sp. pl. 62. Syst. nat. p. 872.*

HABITAT Monspelii cum prioribus & à *Cauelles*, *Gramont*.

* *Muticæ.*

Stolonifera. 6. AGR. panicula ramis divaricatis muticis, culmo repente, calycibus æqualibus, *Linn. sp. pl. pag. 62. Syst. nat. 872.*

Agr. culmo repente foliis radicalibus breviore, folii suprema vagina ventricosa, flosculis muticis. *R. Sauv. pag. 34.*

Gramen caninum supinum Monspeliense. *Bot. Mons. 123.*

Gramen caninum supinum minus *Bauh. pin. 1. Theat. 13.*

HABITAT Monspelii, frequens à *Gramont*; le long du Lés. Articuli radices agunt.

Capillaris. 7. AGR. panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. *Linn. sp. p. 62. Syst. nat. p. 872. Sauv. 34.*

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore. *Tour. 524.*

HABITAT Monspelii, à *Castelnau*, le long du Lés, *Gramont, Selleneuve.*

Minima. 8. AGR. panicula mutica filiformi. *Linn. sp. pl. pag. 63. Syst. nat. 872.*

Poa panicula lanceolata vix ramosa, floribus alternis antrorsum versis. *Sauv. 37.*

Gramen minimum paniculis elegantissimis. *Bot. Mons. 114.*

Gramen loliaceum minimum elegantissimum. *Tour.*

517.

HABITAT Monspelii, passim in vineis, arvis. Vix pollicaris vel bipollicaris, purpurascens.

A I R A. *Foin.*

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 68.

Char. sec. Rad. fibrosa. Cau. culmosa articulata. Fo!. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. terminalis spicata vel paniculata. Ful. nulla.

* *Aristatæ.*

1. AIRA foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis & aristatis: arista recta brevi. *Linn. sp. p.* *Cespitosa.*

64. Syst. nat. p. 873. Sauv. 36.

Gramen segetum panicula arundinacea. *B. pin. Tour. 522.*

Gramen miliaceum majus nutante panicula arundinaceum. *Barr. Icon. 754.*

HABITAT Monspelii in pratis. Arista longitudine glumarum vel brevior ad basim germinis.

2. AIRA foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. *Linn. sp. pl. pag. 65. Syst. nat. p. 873.* *Montana.*

Aira panicula rara calycibus fuscis. *L. Sauv. 36.*

Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis. *Tour. 524.*

Gramen avenaceum paniculatum, foliis capillaceis brevibus, loculis purpuro-argenteis splendentibus & aristatis. *Scheuchz. Tab. IV. tota planta, & tab. IV. fig. 16. locustæ.*

HABITAT Monspelii, luxuriat in sterilibus, à St. George & vicinis. *Au Puy de St. Loup, Rouquet.* Vidi quandoque prope le Terrail. Rami longiores quam in praecedenti; item locustæ duplo majores. Arista calycibus longior

3. AIRA foliis setaceis, summo paniculam inferne obvolvente. *Linn. sp. pl. 65. Sauv.* *Canescens.*

Gramen loliaceum maritimum biunciale. *Tour. 517.*

Gramen sparteum variegatum.

Gramen foliis junceis radice jubata. *Baub. pin. 5.*

HABITAT Monspelii, in ioco Gramuntio abundat. Altitudo semipedalis.

Caryophyl- 4. AIRA foliis setaceis, panicula divaricata, floribus distantibus, *Linn. sp. pl.* 66.

Aira foliis subulatis, aristis à basi flosculorum tortilis, flosculo altero pedunculato. *Roy. Sauv.* 36.

Gramen paniculatum minimum molle. *Bot. Mons.* 296. *Tour.* 523.

Caryophillus arvensis glaber minimus. Bot. Mons. 54.

Gramen phalaroides sparsa brisæ panicula minimum angustifolium. *Barr. Icon.* 44. n°. I.

HABITAT Monspelii cum præcedenti.

Flexuosa. 5. AIRA foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. *Linn. sp. pl.* 65. *Syst. nat.* p. 873.

Aira panicula rara calycibus albis. *Sauv.* 36.

Gramen avenaceum capillaceo folio, panicula ampliore, locustis splendentibus. *Tour.* 525.

HABITAT frequenter in pratis laterensibus; ipsam etiam vidi à Montferrier, sed rariorem.

* *Muticæ.*

Cristata. 6. AIRA panicula spicata, floribus muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *Linn. sp. pag.* 63. *Sauv.* 36.

Gramen spica cristata subhirsutum. *Tour.* 519.

HABITAT rarius cum prioribus. Ipsam habui saepe, à Caunelles & la Verune.

Aquatica. 7. AIRA foliis planis, panicula patente, floribus muticis lœvibus calyce longioribus. *Linn. sp. pl.* p. 64.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus lœvibus. *Sauv.* 36.

HABITAT Monspelii in Ledo amne, en allant à Mont-ferrier; ipsam saepius vidi à Prades & à la Source du Lès.

M E L I C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 64.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* paniculata. *Ful.* stipulata.

utans. 1. MEL. petalis imberibus, panicula nutante simplici

- Linn. sp. pl. pag. 66. Sauv. 35.* floribus pendulis.
Gramen montanum avenaceum locustis rubris. Tour. 524. Bot. Mons. 122.
HABITAT Monspelii; frequens in horto regio.
HOSPITATUR in frigidario; stipula ad oras vaginæ foliorum, saepe lineas tres longa subulata colorata.
2. *MEL. petalis exterioribus ciliatis. Linn. sp. pl. pag. Ciliata: 66. Sauv. 35.*
Gramen montanum avenaceum lanuginosum. Bot. Mons. 122. Tour. 524.
 3. *Mel. spica erecta simplici, floribus alternis solitariis pedunculatis.*
Gramen montanum avenaceum lanuginosum, glumis rarioribus. Bot. Mons. 122. Tour. 524.
HABITAT ubique à la Verune, à Caunelles & in aliis locis urbi vicinis.
Obs. Prima species variat itidem, culmo spicato, pedunculis solitariis alternis.

P O A.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 69.*
- Char. sec. Rad. bulbosa vel fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. subulata (graminea) vaginans simplex integerrima. Flor. terminalis paniculata. Fulc. nulla.*
1. *POA panicula diffusa, spiculis 6floris linearibus. Aquatica. Linn. sp. pl. 67.*
Gramen majus aquaticum. Lob. Icon. 4.
Gramen majus aquaticum L. J. Bauh. tom. 2. p. 481.
HABITAT Monspelii au Verdanson, au Lés, à Gramont.
 2. *POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris basi Trivialis. pubescentibus, culmo erecto tereti. Linn. sp. pl. p. 67. Sauv. 37.*
Poa spiculis trifloris basi pubescentibus. Linn. Syst. nat. p. 874. (trivialis)
Gramen pratense paniculatum medium. Tour. 521.
HABITAT in pratis; à Lattes, à Caunelles, aux prés d'Arenes.
 3. *POA panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescen- tibus, culmo erecto tereti. Linn. sp. pl. p. 67. Syst. nat. pag. 874.*
Angustifolia.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Tour.* 522.

HABITAT Monspelii cum priori, sed multo altior.

Pratensis. 4. POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Linn. Syst. nat. pag.* 874.

Poa (pratensis) spiculis trifloris glabris. *Linn. sp. pl. pag.* 67. *Sauv. pag.* 36.

Gramen pratense vulgatus. *Bot. Mons.* 113.

Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio. *Tour.* 521.

HABITAT ubique in pratis.

Annua. 5. POA panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Linn. sp. pl. pag.* 68. *Sauv.* 36. & 37. n°. 58.

Gramen pratense paniculatum minus album, vel rubrum. *Tour.* 521. *Bot. Mons.* 113.

HABITAT Monspelii à Selleneuve, & aux prés d'Arénes.

Eragrostis. 6. POA panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis ferratis decemfloris. *Linn. sp. pl. pag.* 68. *Syst. nat. pag.* 874.

Poa panicula ramosa spiculis multifloris. *Sauv.* 37. absque Synommiā.

Gramen paniculis elegantissimis minimum. *Tour.* 522.

Gramen Phalaroides sparsa brizæ panicula, minus. *Tour.* 522. *Barr. Icon.* 44. fig. 2.

HABITAT Monspelii ubique in satis; variat numerus flosculorum uti in congeneribus.

Compressa. 7. POA panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. *Linn. sp. pag.* 69. *Sauv. p.* 311.

Gramen murorum radice repente B. prod. 2.

HABITAT Monspelii passim in viis & arvis.

Nemoralis. 8. POA panicula attenuata, spiculis sub-bifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Linn. sp. pl. pag.* 69. *Syst. nat. p.* 874.

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, &c. *Scheuchz. tab.* 2. *Icon optima*; tota planta.

8. Gramen cirrhosa & villosa spongia ad singula genicula donatum, paniculatum, minimum alpinum. *Bocc. mus.* 2. *p.* 70. *tab.* 59.

HABITAT Monspelii.

Hanc primò videram à Prades, & au Puy de Saint Loup; Æstate proxime elapsa Botanophili à monte

l'Esperou eandem inscii attulere pulchre ad nodum quemlibet villis rufescentibus implicatis revinctam. Scire cupiens undenam proveniret fasciculus ille, scalpello detexi nodos plures & vidi incisuram linearem ex internodii parte infima ad usque nodum seu articulum subjacentem productam; diductis incisuræ labiis in conspectum venit larva insecti mortua oblonga, mihi nondum visa, crudelique fato in omnibus speciminibus quæ allata fuerant ne unam quidem vivam reperire datum est.

9. POA panicula secunda patentiuscula, spiculis quadri-floris. *Linn. sp. pl. p. 70.*

Gramen paniculatum proliferum. *Tour. 523.*

Gramen arvense panicula crispa. *Bot. Mons. 113.*
Bauh. prod. 6.

HABITAT Monspelii ubique.

Obs. Variat sæpiissime numerus flosculorum in hocce genere. Species aliæ calycibus trifloris, quadri-floris, &c.

B R I Z A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 70.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata;*
Fol. (graminea) vaginans subulata simplex,
integerrima. Flor. terminalis spicata vel pani-
culata. Ful. nulla.

1. BRIZA spica nutante simplici, spiculis alternis pe-dunculatis subsolitariis ovatis, calycibus quinque-floris. *Monspeffulana*

Gramen tremulum minus panicula magna. *Bot. Mons. 113.*

Gramen tremulum maximum. *Bauh. prod. 5. Icon optima.*

Gramen paniculatum minus locustis magnis tremulis.
Tour. 523.

Gramen phalaroïdes tremulum. *Barr. Icon. 23. n°.*
1. & 2. non male representat.

HABITAT Monspelii in luco Gramuntio. Planta vix palmaris. Pedunculi vix pollicis quartam partem longitudine adæquant, alterni, raro bini, ad sum-mum tres quatuor vel quinque in unico culmo. Calyces vero septemflori. Folium supremum sæpius

inferne involvens spicam; quandoque illam superans; spiculæ ovatae nec compressæ ut in Briza: hanc cettè diversissimam credo à Brizâ maximâ *Linn. sp. pag. 70.* tum ratione magnitudinis proportione & numero flosculorum in quolibet calyce.

Eragrostis. 2. BRIZA spiculis lanceolatis, flosculis viginti. *Linn. sp. pl. p. 70.*

Briza seu Gramen paniculis elegantissimis, sive eragrostis majus. *Sauv. app. 310.*

Gramen paniculosum phalaroides. *Bot. Mons. 114.*

Gramen paniculis elegantissimis sive eragrostis majus. *Tour. 522.*

HABITAT Monspelii ubique. Variat calycibus 7-20 floris, sed semper facile dignoscenda. Spica matura nigricat vel fuceficit.

Minor. 3. BRIZA spiculis triangulis, calyce flosculis (7) longiore. *Linn. sp. p. 70. Sauv. 37.*

Gramen tremulum minus, panicula parva. *Bot. Mons. 114.*

Gramen paniculatum minus, locustis parvis tremulis. *Tour. 524.*

HABITAT Monspelii in pratis; à *Selleneuve, Caunelles;* omnium rarior.

Media. 4. BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis (7) breviore. *Linn. sp. pag. 70. Sauv. 37.*

Gramen paniculatum tremulum majus locustis candidatis. *Tour. 523.*

Gramen tremulum majus. *Bot. Mons. 113.*

Les Amourettes tremblantes; Monspelii las Amouretas.

HABITAT aux prés d'Arenes; le long du Lés. Panicula ramosissima.

Maxima. 5. BRIZA spica nutante simplici, spiculis alternis subfolidariis, pedunculis simplicibus bifidisque, calycibus quindecimfloris.

Briza spiculis cordatis, flosculis septemdecim. *Linn. sp. pl. 70. Syst. nat. p. 875.*

Briza spiculis ovatis, flosculis septemdecim. *Sauv. 37.*

Gramen paniculatum locustis maximis tremulis candidatis. *Tour. 523.*

HABITAT Monspelii; à Gramont; le long du Lés.

Variat flosculis purpureis rufis, ferrugineis, quinde-

cim, sexdecim, septemdecim & viginti. Pedunculi alterni sæpiissimè solitarii semper ferè simplicissimi; raro bifidi; unde potius spicæ nomen meretur quam paniculæ.

D A C T Y L I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 67.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) subulata vaginans, simplex integerrima. Flor. paniculato-gloemerata, terminalis. Fulcr. nulla.

1. DAC. vagina foliorum ancipiti.

Glomeratus.

Dac. panicula secunda glomerata. Linn. sp. pl. 71.

Cynosurus panicula secunda glomerata. L. Sauv. app. 310.

Gramen paniculatum spicis crassioribus & brevioribus.

Tour. 521.

Gramen spicatum folio aspero. Bot. Mons. 114.

Gramen spicatum folio aspero, spica grumosa longa vel breviore. Barr. Icon. 26. n°. 1. & 2.

HABITAT Monspelii ubique.

C Y N O S U R U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 72.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans, subulata, simplex integerrima. Flor. terminalis spicata vel paniculata. Fulcr. bracteæ integræ vel incisæ.

1. CYN. bracteis pinnatifidis. Linn. sp. pl. pag. 72. *Cristatus.*
Sauv. 37.

Gramen pratense cristatum, seu spica cristata lœvi.
Bot. Mons. 114.

Gramen spicatum glumis cristatis. Tour. 519.

HABITAT Monspelii; à Gramont; spicula oblonga cylindrica; bracteæ flosculis majores. Altitudo bipedalis.

2. CYN. bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Linn. sp. pl. *Echinatus.*
pag. 72. Sauv. 38.

Gramen alopecuroïdes spica aspera. Bot. Mons. 116.

Gramen spicatum echinatum locustis unam partem spectantibus. Tour. 519.

HABITAT Monspelii; derriere Boutonel, près de l'Aire qui est à gauche. Spica secunda glomerata.

Indicus. 3. CYN. spicis digitatis linearibus, floribus ovato-lanceolatis. *Linn. sp. pl. pag. 72.*

Gramen dactylon Americanum. Minus. *Scheuch. p. 107.*

HABITAT in Indiis. Involucra integerima. Spicæ secundæ. Calyces sub-quadriflori alterni imbricati. Spicæ maturæ introrsum convolvuntur.

Paniceus. 4. CYN. Panicula subspicata, flosculis simplicibus biafristatis. *Linn. sp. pl. pag. 73.*

Gramen paniceum spica aspera. *Bot. Mons. 116.*

Panicum vulgare simplici, spica aspera. *Tour. 515.*

Panicum vulgare spica composita, aristis spica longioribus. *Sauv. 34.*

La Panisse. Monspelii lous Rats.

HABITAT Monspelii ubique. Viret in hortis & agris.

FESTUCA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 74.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) subulata vaginans simplex integerima. Flor. terminalis paniculata, paniculæ æquali vel secunda, nutante vel erecta. Ful. nulla.

* *Panicula secunda.*

Ciliata. 1. FEST. foliis & valvulâ corollarum interiore ciliatis, spiculis alternis solitariis sessilibus, panicula stricta simplici secunda.


Gramen festuceum myurum elatius, spica heteromalla gracili. *Barr. Icon. 99. f. 2. Scheuch. Gram. 293.* idem nomen.

Fest. (incrassata) *Linn. sp. pl. pag. 75.* an *Bromus (ciliatus)* *Linn. sp. pag. 76?* vel potius, *Bromus distachyos* Cent. 11^a.

HABITAT Monspelii; vers la Peissine; in fossis; & autour de la Ville.

Obs. Icon Barrelieri nullo modo repræsentat Gramen istud. Descriptio Scheuchzeriana optima; Icon bona; folia ciliata pilis rigidis; quandoque superficies foliorum itidem pilosa. Summo culmo insident. Spiculæ sessiles, alternæ, solitariæ compressæ, glabræ 7-8floræ; glumæ externæ omnes (corollarum) terminatæ





terminatæ aristæ longissima; glumæ interiores obtusæ ciliatæ.

Apud nos raro datur culmo ramoso seu paniculato; denominatio Linnæana festucæ incrassatæ non convenit huic gramine, etenim pedunculi nulli & spicæ sessiles.

Denominatio 2^a. (*Bromus ciliatus*) potius conveniret, sed remanet difficultas altera; nam aristæ corollarum terminant valvulas, non autem infra apices earum, ergo nec *Bromus ciliatus*.

2. FEST. panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo foliis setaceis. *Linn. sp. pl. 73.*

Gramen loliaceum minus capillaceo folio, spica Brizæ longissima. Tour. 517.

HABITAT Monspelii; frequens à la Colombiere, la Valette.

3. FEST. panicula secunda, scabra, spiculis 6floris, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Linn. sp. pl. pag. 74.*

HABITAT Monspelii in satis. Altitudo bipedalis.

4. FEST. paniculâ spicatâ nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris. *Linn. sp. pl. p. 74.*

Gramen festuceum myurum, minori spica heteromalla. Scheuch. pag. 294. tab. VI. fig. 12.

HABITAT Monspelii; à gauche de Boutonet, in rupibus, cum valantiâ murali.

5. FEST. paniculâ secundâ; spiculis erectis, calycis altera valvula acuminata, altera integra. *Linn. sp. pl. p. 75.*

Gramen paniculatum bromoïdes minus, paniculis unam partem spectantibus. Scheuch. gram. 297. tab. VI. fig. 14. Tour. 524.

HABITAT cum præcedenti. Multum affines.

* *Panicula æquali.*

6. FEST. paniculâ ramosâ erectâ, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Linn. sp. pl. pag. 75.*

Gramen aquaticum fluitans multiplici spica. Bot. Mons. 119.

Gramen paniculatum aquaticum fluitans. Tour. 521.

Gramen aquaticum miliaceum semine rufo. Barr. Icon. 7.

HABITAT Monspelii in aquis. *Dans le Verdanson, aux prés de Lattes & d'Arene,*

B R O M U S.

Char. prim. Vid Linn. gen. pl. 73.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integrerrima. *Flor.* spicata vel paniculata. *Fulc.* nulla.

Secalinus. 1. BROM. panicula patente erecta, spiculis ovatis : aristis rectis. *Linn. sp. pag. 76.*

Festuca culmo paniculato, spicis compresso ovatis. *Sauv. 38.*

Festuca graminea glumis glabris. *Bauh. pin. 9. Scheuch. gram. pag. 251. tab. V. fig. 10.*

Gramen Gros Montbelgard. *Bot. Mons. 121.*

Gramen avenaceum locustis glabris purpurascenscentibus & aristatis. *Tour. 525.*

β. Gramen ad gramen du Gros accedens. *Bot. Mons. 121.*

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus. *Tour. 526.*

Festuca graminea glumis hirsutis. *Scheuch. gram. 250. tab. V. fig. 9.*

HABITAT Monspelii ubique. β. in urbis fossis copiosè reperitur prope hortum regium. Variat spiculis glabris hirsutis ; culmo spicato indiviso palmari, spiculis alternis sessilibus.

Squarrosum. 2. BROM. panicula patula nutante, spicis ovatis, aristis divaricatis. *Linn. sp. pl. p. 76.*

Brom. seu festuca graminea glumis vacuis. *Sauv. 38.*

Bauh. pin. 9. prodr. 19. n°. 64. Bot. Mons. 121.

Gramen avenaceum locustis amplioribus glabris candidantibus aristatis. *Tour. 525.*

Gramen phalaroides acerosum, erecta parva panicula. *Barr. Icon. 9. n°. 1.*

HABITAT Monspelii à Castelnau près de la métairie de Mr. Viala & à Gramont. Variat ut prior spiculis alternis, &c. ad summum 4. in uno culmo.

Sterilis. 3. BROM. panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Linn. sp. pl. pag. 77.*

Brom. culmo paniculato, spicis compressis. *Sauv. 38.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majoribus aristatis. *Tour. 526.*

HABITAT Monspelii ubique.

4. BROM. panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. *Linn.* *Arvensis.*
sp. pl. pag. 77.
 Brom. panicula diffusa spiculis teretibus. *Sauv.* 38.
Festuca graminea nemoralis latifolia mollis. B. pin. 10.
Gramen pratense paniculatum altissimum. Tour. 524.
 HABITAT Monspelii passim in arvis.
5. BROM. panicula nutante, spiculis linearibus. *Linn.* *Tectorum.*
sp. pl. pag. 77.
Festuca graminea hirsutis brizæ glumis compactior.
Barr. Icon. 83. n°. 1. & glumis non hirsutis. *Barr.*
Icon. 73. n°. 1.
Gramini murali Dalechampii simile si non idem. J.
Bauh. 2. p. 438.
 HABITAT ubique Monspelii.
6. BROM. spica stricta disticha, spiculis alternis solitariis *Pinnatus.*
sessilibus decemfloris oblongis, corollis subaristatis.
 Brom. culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus te-
 retibus. *Linn. sp. pl. p. 78.*
Festuca culmo alternatim spicato, spicis teretibus.
Sauv. 38. & 39. n°. 85.
Gramen spica Brizæ majus. Bot. Mons. 121. &
 minus. *Ibid.*
Gramen loliaceum altissimum, spica brizæ prælonga,
aristis brevibus donatum. Tour. 517.
Gramen sparteum spicata brizæ panicula, cornicula-
tum. Barr. Icon. 25. *Bona.*
 HABITAT Monspelii ubique; variat altitudine pedali
 & bipedali; calycibus vel decem vel 15 floris;
 glumis arista brevissima donatis vel muticis.

S T I P A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articu-
 lata. *Fol.* (graminea) subulata vaginans sim-
 pllex integerrima. *Flor.* terminalis paniculata.
Ful. nulla.

1. STIPA aristis lanatis. *Linn. sp. pl. pag. 78.* *Pennata.*
Festuca aristis paniculæ circiter longitudine plumosis
R. Sauv. 38.
Gramen sparteum pennatum majus. Barr. Icon. 46.
Bona.

Grauen spicatum aristis pennatis. Bot. Mons. 119.

Tour. 518. Scheuch. tab. 3. fig. 13.

HABITAT Monspelii, versus Montferrier à droite & aux environs. Au Puy de Saint Loup. A Valene, à l'Esperou & à la mer vers Cette.

Juncea. 2. STIPA aristis nudis, calycibus semine longioribus Linn. sp. pag. 78.

Festuca aristis nudis. Roy. Lugd. 68.

Grauen sive festuca junceo folio longissimis aristis. Bot. Mons. 122. Scheuch. 151. tab. III. fig. 13. A.

HABITAT Monspelii cum priori à l'Esperou & au Puy de Saint Loup.

A V E N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 75.

Char. sec. Rad. bulboſa vel fibroſa. Caul. culmoſa articulata. Fol. (graminea) vaginans ſubulata ſimplex integerrima. Flor. ſpicata vel paniculata terminalis. Fulc. nulla.

Obs. In hoc genere occurunt species polygamæ.

Bromoïdes. 1. AV. panicula subſpicata ſtricta ſpiculis binatis, altera pedunculata, altera ſeffili; aristis divaricatis; calycibus octofloris.

Grauen alpinum avenaceum glabrum anguſtifolium locuſtis aristatis in ſpicam dispositis. Scheuch. gram. pag. 228. tab. IV. fig. 21. & 22. icon & descriptio exactæ.

HABITAT Monspelii ultra pontem Sallenovæ ad dexteram, mixta cum junco lithospermī ſemine, cum limonio bulbatis foliis, & in locis vicinis; Jouvignac & Caunelles.

Descr. Altitudo bipedalis. Culmus teres vix aciculæ crassitiem adæquans. Spiculæ teretes ſæpius binatæ (altera ſeffili, altera pedunculata) erectæ, albican-tes, veluti argenteæ, quandoque etiam ſolitariæ, alternæ, ſeffiles vel pedunculatæ. Calyces 4. 5. 6. 7. ſæpius octoflori; aristæ è medio dorſo tortiles, di- varicatae: facies bromi ſquareoſi.

Miror unde nullus Botanicus hanc in agro Monspes- fulano detexerit.

2. AV. calycibus diſpermis, ſeminibus laxeibus, Linn. sp. pl. pag. 79. Sauv. 38.

- Av. nigra & alba. *Tour.* 514. *Bot. Mons.* 35. *L'Avoine*, *Monspelii Civada*, *civade*.
HABITAT in arvis.
3. AV. calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito muc-
tico, masculo aristato. *Linn. sp. pag.* 79. *Elatior.*
AV. panicula nutante, calycibus bifloris altero aristato. *R. Sauv.* 38.
3. Gramen nodosum avenacea panicula, radice tuber-
bus praedita. *Tour.* 525.
Gramen bulbosum nodosum. *Lob. Icon.* 23.
HABITAT Monspelii passim in arvis, vineis. Variat
flosculis duobus aristatis; arista flosculi hermaphro-
diti brevissima infra apicem glumæ ut in bromis.
Arista flosculi masculi, multo longior, ad basim
fere dorsi; variat etiam aristis æqualibus.
4. AV. panicula patente, calycibus trifloris, flosculis
basi pilosis. *Linn. sp. pl. pag.* 80. *Fatua.*
Av. seminibus basi hirsutis. *L. Sauv.* 38.
Gramen sive festuca dumetorum, utriculis lanugine
flavescens. *Bot. Mons.* 121.
Gramen avenaceum locustis lanugine flavescens.
Barr. Icon. 75. n°. 2. *Tour.* 525.
- Monspelii *Civade Couguouile*.
HABITAT ubique in satis. Panicula (matura) valde
nutans. Aristæ ad basim aciculæ majoris crassitier
æquant.
5. AV. panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flos-
culis omnibus aristatis. *Linn. sp. pl. pag.* 80. *Flavescens.*
Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flaves-
cente, locustis parvis. *Tour.* 525.
HABITAT Monspelii. Vulgatissima à la Verune, à
Bione-la-Mouson.
Panicula densissima; spiculæ vix æquant molem spi-
cularum poæ pratensis.
6. AV. spicata, flosculis subquaternis calyce longiori-
bus. *Linn. sp. pag.* 80. *Fragilis.*
Gramen loliaceum spurium hirsutum; aristis genicu-
latis. *Barr. icon.* 905. fig. 1. 2. 3.
HABITAT Monspelii. Frequens cum avena Bromod.
n°. 1. à Cannelles après Selleneuve.
7. AV. calycibus quinquefloris, panicula spicata. *Linn.*
sp. pl. pag. 80. *Pratensis.*

Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis. *Tour.* 525.

b. Gramen avenaceum glabrum panicula purpuro-argentea splendente. *Tour.* 525.

HABITAT Monspelii. Ipsam vidi pulchrè pictam in pratis: *au-delà de Montferrier, vers la source du Lés.* Rara in pratulis *au-delà de Caunelles.* Variat calycibus trifloris & 7floris, argenteis nec variegatis. Culmo itidem spicato nec paniculato.

L A G U R U S.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 66.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* glomerata terminalis. *Fulc.* nulla.

Ovatus. I. LAG. spica ovata. *Linn. sp. pl. pag. 81. Sauv. 38.*

Gramen alopecuroïdes spicâ rotundiore. *Bot. Mons. 115.*

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. *Tour.* 517.

Gramen alopecuroïdes molle spica incana acuta minus & obtusa majus. *Barr. icon. 116. n°. 1. & 2.*

Monspelii & Cetiis, *Coüeta de lapin.*

HABITAT Monspelii in toto tractu maritimo, & ad stagnorum ripas. Spica incana, mollis, folia lanugine quâdam obsita, flexilia; floret Augusto.

A R U N D O.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 76.

Char. sec. *Rad.* horizontalis articulata bulbosa solida nodosa. *Caul.* culmosa articulata fistulosa. *Fol.* graminea vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* paniculata terminalis. *Fulc.* nulla.

Donax. I. AR. calycibus trifloris panicula diffusa. *Linn. sp. pl. pag. 81. Sauv. 38.*

Ar. sativa quæ donax Dioscoridis. *Bot. Mons. 29. Tour. 526.*

Le Roseau. Monspelii la Cana, cane.

- HABITAT ubique in hortis, ad margines agrorum.
2. AR. calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Linn.* *Phragmites*.
sp. pl. pag. 81.
Ar. vulgaris seu phragmites. *Bot. Mons.* 29. *Tour.* 526.
HABITAT Monspelii in pratis laterensibus ubi floret
in fine Septembris. Variat calycibus 2floris, triflo-
ris vel quinquefloris.
3. AR. calycibus unifloris; culmo ramoso. *Linn. sp. pl. Calam agrosti*
pag. 82. Sauv. 38.
Gramen plumosum Vulgi. *Lob. icon.* 6.
Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea.
Tour. 523.
Gramen sparteum bromoïdes panicula spicata ma-
joribus utriculis. *Barr. icon.* 18. *fig. 1.*
HABITAT cum prioribus.
4. AR. calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-
pungentibus. *Linn. 82.* *Arenaria.*
Gramen foliis junceis convolutis ac pungentibus. *Bot.*
Mons. 120.
Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis lon-
gioribus. *Bot. Mons. 119.*
Gramen secalinum, spicatum, maritimum, maxi-
mum spica longiore. *Tour. 518.*
Gramen loliaceum maritimum foliis pungentibus.
Tour. 516.
HABITAT Monspelii ad stagna.

L O L I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 77.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.*

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex
integerrima. Flor. spicata terminalis. Fulc. brac-
tea monophylla ad basim spicularum.

1. LOL. spica mutica. *Linn. sp. pl. pag. 83.*

Gramen loliaceum angustiore folio & spica, seu phœ-
nix Dioscoridis. *Bot. Mons. 120. Tour. 516.*

Fausse Ivraye Monspelii *lou Margal.*

HABITAT ubique.

2. LOL. spica aristata. *Linn. sp. pl. pag. 83.*

Gramen loliaceum spica longiore seu lolium Diosco-
ridis. *Bot. Mons. 120.*

Perenne.

Temulentum

Gramen loliaceum spica longiore aristas habens.
Tour. 516.

L'Ivraye. Monspelii, *lou Giol.*

HABITAT ubique. Calix sæpius quadriflorus, corollis fere longior & latior. Floculus ultimus sæpe abortiens marcescens.

ELYMUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1075.

Char. sec. Rad. horizontalis fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. (graminea) subulata vaginans simplex integerrima. Flor. spicata. Fulc. bractea duplex.

Arenarius.

1. ELY. foliis mucronato-pungentibus. *Linn. sp. pl. p. 83.*
Triticum foliis acuminato-pungentibus. *Sauv. 39.*
Secale spiculis geminatis. *Sauv. 311.*
Gramen loliaceum radice repente maritimum. *Tour. 516.*
Elymus spica erecta, arcta, calycibus tomentosis, floculis longioribus. *Linn. Syst. nat. pag. 879.*
HABITAT Monspelii ad mare.

SECAL E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 79.

Char. sec. Rad. horizontalis fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. spicata terminalis. Fulc. bractea duplex.

Cereale.

1. SEC. glumarum ciliis scabris. *Linn. sp. pl. 84.*
Secale hybernum majus & vernum minus. *Tour. 515.*
Bot. Mons. 235.
Le Seigle, Monspelii *la Seia.*

HABITAT ubique.

Villosum.

2. SEC. glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. *Linn. sp. pag. 84.*
Gramen spicatum fecalimum, glumis villosis in aristas terminatis. *Tour. 518.*
HABITAT Monspelii, aux Mateles, & à l'entrée du bois de Valenc près de Rouquet; sed frequentissimum aux bains de Lamalou près de Beziers.

TRITICUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 78.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. spicata terminalis. Fulc. nulla.

* Annua.

1. TRIT. glumis ventricosis glabris imbricatis aristatis. *Linn. sp. p. 85.* *Aestivum.*

Trit. radice annuâ spica glabra aristata. *Sauv. 39.*

Trit. aristis circumvallatum. *Tour. 512.*

HABITAT Monspelii.

2. TRIT. glumis ventricosis lævibus imbricatis submuticis. *Linn. sp. pag. 86.* *Hybernum.*

Trit. radice annuâ spicâ muticâ. *Sauv. 39.*

Trit. hybernum aristis carens. *Bot. Mons. 271. Tour. 512.*

Monspelii la Touzella ou Rascalade.

3. TRIT. calycibus truncatis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis, intermedio neutro. *Linn. pag. 86.* *Spelta.*

Hordeum flosculis lateralibus muticis involucro defitutis. *Sauv. 39.*

Fausse Epaule.

HABITAT à Alais, Castres.

4. TRIT. involucris unifloris, floribus aristatis, spicâ disticha. *Linn. sp. 86. Sauv. 39.* *Monococcum.*

Zea briza dicta seu monococcus germanica. *Bot. Mons. 282.*

Hordeum distichum seu briza. *Tour. 513.*

L'Epaule; Monspelii la Speouita.

HABITAT Monspelii.

* Perennia.

5. TRIT. calycibus subulatis trifloris acuminatis. *Linn. sp. pag. 86.* *Repens.*

Trit. radice repente, foliis viridibus. *Sauv. 39.*

Gramen loliaceum radice repente seu gramen Officinalium. *Tour. 516.*

6. Gramen latifolium & angustifolium spicâ triticeâ compactâ. *Baub. pin. 8. Prod. 13.*

Le Chiendent; Monspelii lou Gramenas.

Caninum. 6. HABITAT Monspelii ubique. *B.* Calycibus 7-8floris. TRIT. calycibus subulatis æqualibus quadrifloris aristatis. *Linn. sp. pag. 86.*

Gramen loliaceum radice repente, seu gramen officinarum longioribus aristis donatum. *Tour. 516.*

HABITAT frequens in maritimis.

Obs. Variat in ipsis generibus numerus flosculorum in quolibet calyce; idem evenit in poâ, briza.

H O R D E U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 80.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Fulc.* bractea 6phylla.

Vulgare. 1. HOR. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *Linn. sp. pag. 84.*

Hor. polystichon vernum. *Tour. 513.*

L'Orge. Monspelii *t'Ordi.*

HABITAT in arvis.

Distichon. 2. HOR. flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. *Linn. sp. p. 85.* Hor. distichon, quod spica binos habeat ordines. *Tour. 513.*

Monspelii *la Pauimoule.*

HABITAT in arvis.

Murinum. 3. HOR. flosculis lateralibus masculis aristatis. *Linn. sp. pag. 85.*

Gramen hordaceum minus & vulgare. *Bot. Mons. 121.*

Gramen vulgare spicatum secalinum *Tour. 517.*

HABITAT Monspelii ubique in arvis & sepibus.

TRIGYNA.

POLYCARPON.

Char. prim. Vid. Linn. *Syst. pl. p. 881.*

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea, ramosa.

Fol. verticillata sessilis simplex integerrima.

Flor. terminalis paniculata dichotoma. *Fulc.* stipula opposita bina interjecta pedicellis.

Tetraphyllum 1. POL. foliis quaternis ovatis, panicula dichotoma. *Linn. Syst. nat. tom. 2. pag. 881.*

TRIANDRIA TRIGYNIA. 59

Mollugo tetraphylla. Linn. sp. pl. pag. 89. Sauv. 164.
Anthyllis marina incana alsinefolia Narbonensium.

Bot. Mons. 22. Lob. icon. 468.

Herniaria alsines folio. Tour. 507.

HABITAT ubique Monspelii. Caulis glaber viridis vix
semipalmarem excedens altitudinem.

B U F O N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1034.

Char. sec. Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea
teres articulata ramosa. Fol. opposita (grami-
nea) subulata simplex integerrima subconnata.
Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. nulla.

1. BUF. Sauv. 141. Linn. sp. 123.

Tenuifolia.


Herniaria angustissinio & gramineo folio. Hort. Mons.
97. tab. 97.

Polygonum angustissimo & gramineo folio. Bot. Mons.
211.

Alchimilla gramineo folio flore minore. Tour. 508.

La Buffon.

HABITAT à Castelnau, Boutonet, Caunelles, & in sa-
xosis circa Montferrier. Foliola calycis margine mem-
branacea, folia inferiora internodiis æqualia vel lon-
giora, basi connata subvaginantia. Variat stamini-
bus duobus, tribus, vel etiam pistillis binis tribusve.



Classis IV.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

Character primarius. Vide Linnæi genera plantarum 88.

Char. sec. Rad. simplex, tenuis vel ramosa.

Caul. herbacea vel fruticosa, simplex vel ramosa. Fol. alterna sessilis integra. Flor. capitata terminalis. Fulcr. nulla.

Alypum. 1. GLOB. caule fruticoso foliis lanceolatis tridentatis integrisque. *Linn. sp. pl. pag. 95.*

Globularia fruticosa myrtifolio tridentato. *Tour. 467.*

Alypum montis Ceti Bot. Mons. 8.

Thymelæa foliis acutis capitulo succisæ. *Bot. Mons. 253.*

HABITAT Monspelii in monte Ceti.

Vulgaris. 2. GLOB. caule herbaceo, foliis radicalibus dentatis, caulinis lanceolatis. *Linn. sp. pl. pag. 96.*

Globularia vulgaris. *Tour. 467.*

Bellis cærulea caule folioso. *Bot. Mons. 37.*

La Globulaire.

HABITAT Monspelii, à Castelnau & in pinetis, à la Valete & au Martinet de Mr. Boulet.

DIPSACUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 89.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. angulata ramosa. Fol. opposita connata simplex, integræ vel incisa. Flor. capitata terminalis. Fulc. aculei caulinæ, & epiphylli.

Fullonum. 1. DIP. foliis sessilibus serratis, *Linn. sp. pl. pag. 97.*
Dipsacus foliis connato-perfoliatis, aristis fructus rectis. *Sauv. 156.*

Dipsacus sylvestris sive labrum veneris. *Bot. Mons.* 86.

Dipsacus sylvestris aut virga pastoris major. *Tour.* 466.

§. Dipsacus aristis fructus hamatis. *Sauv.* 156.

Dipsacus sativus. *Tour.* 466.

Le Chardon à bonnetier, ou Chardon à foulon.

HABITAT Monspelii, frequens au Verdanson; à Lavanet. Foliola perianthii communis, capitulis duplo longiora, aculeata. β. Foliola capitulis breviora subinermia.

2. DIP. foliis connatis sinuatis. *Linn. sp. pl. pag.* 97. *Laciniatus.*

Dipsacus folio laciniato. *Tour.* 466.

Le Chardon à bonnetier, à feuilles découpées.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana; laciniæ foliorum laterales obtusæ dentatæ, terminales acuminatæ.

SCABIOSA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 90.

Char. sec. Rad. fibrosa vel ramosa. Caul. herbaea vel subfruticosa, simplex ramosa, dichotoma (in una specie) Fol. opposita, inferior petiolata, superior sessilis amplexicaulis, nunc simplex integerrima, integra incisa, nunc impari pinnata. Flor. terminalis aggregata capitata. Fulc. saepius nulla; aculei in una specie ad apicem denticulorum calycis.

* *Corollulis 4fidis.*

1. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, floribus cernuis, foliis pinnatis, foliolis ferratis lanceolatis *Linn. sp. pl. pag.* 98. *Alpina.*

Scabiosa alpina foliis centaurii majoris. *Tour.* 464.

Scabiosa alpina maxima. *Lob. It.* 537.

HOSPITATUR sub dio. Perennis, valde hirsuta. Folia pinnata ex foliis subæqualibus ferratis acuminatis, quorum superiora seu terminalia ad basim coadununtur. Squamæ calycinæ acuminatæ extus villosæ.

2. SCAB. corollulis quadrifidis æqualibus, squamis calycinis ovatis obtusis. *Linn. sp. pl.* 98. Foliis pinnatifidis. *Sauv.* 241. *Leucantha,*

62 TETRANDRIA MONOGYNYA.

Scabiosa montana calidarum regionum. Bot. Mons. 231. Lob. Ic. 538.

Scabiosa flore globoso niveo. Tour. 464. & fruticans angusti-folia alba ibid.

HABITAT Monspelii ubique in sterilibus & saxosis, à Castelnau, Selleneuve, &c.

Succisa. 3. SCAB. corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. sp. pl. pag. 98.*

Scabiosa folio integro hirsuto. Tour. 466. & glabro ibid. Succisa seu morsus diaboli. Bot. Mons. 247.

HABITAT Monspelii in pratis laterensibus à Selle-neuve, à Montferrier. Variat corollis quinquefidis, foliis glabris denticulatis acuminatis.

Syriaca. 4. SCAB. corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus aristatis caule dichotomo, foliis lanceolatis. *Linn. sp. pl. 98.*

Scabiosa fruticans latifolia alba. Tour. 464.

HOSPITATUR sub dio; folia serrata. Caulis inferne glaber, superne aculeis brevibus.

Integrifolia. 5. SCAB. corollulis quadrifidis, foliis omnibus lanceolatis serratis. *Linn. sp. pl. 99. Sauv. 156.*

Scabiosa annua integrifolia seu folio bellidis. Bot. Mons. 231. Tour. 465.

HABITAT Monspelii; le long du Lés à Castelnau, à Montferrier, à la Colombiere.

Arvensis. 6. SCAB. corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido. *Linn. sp. pl. p. 99.*

Scabiosa major hirsuta folio laciniato. Bot. Mons. 230.

Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum. Bauh. pin. 26. Tour. 464.

Scabiosa corollulis quadrifidis, squamis calycinis ovatis acutis, flore duplo brevioribus, foliis pinnatifidis, caule hirsuto subnudo. Sauv. pag. 241.

HABITAT Monspelii frequens au Mont S. Loup. A Viols, à S. Martin; caulis sæpius simplicissimus semipedalis, perfoliis æmulans cardunculum montis Lupi; folia (apud nos) lyrato-pinnatifida.

Gramun-siana. 7. SCAB. corollulis trifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. *Sauv. 268.*

Scabiosa triandra. Linn. sp. pl. 99. f. *Gramuntiana.*

Syst. nat. pag. 889.

Scabiosa capitulo globoso, foliis in tenuissimas la-
cinias divisis Bot. Mons. 231.

Scabiosa capitulo globoso minor. Bauh. pin. 270.
Tour. 466.

HABITAT Monspelii *au bois de Gramont*; à Caunelles,
& dans toutes les Garrigues.

Obs. Synonymiam Bauhinianam, claris. Linnæus
scabiosæ columbariæ opposuerat quam ad hanc
potius pertinere credimus.

* * *Corollulis quinquefidis.*

8. SCAB. corollulis quinquefidis, foliis radicalibus *Columbaria.*
ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. Linn. sp.
pl. 99. Sauv. 242.

Scabiosa capitulo globoso major. Tour. 465.

Scabiosa minor vulgaris. Bot. Mons. 230.

HABITAT Monspelii; abundat versus castrum no-
vum.

9. SCAB. corollulis quinquefidis, foliis dissectis, re- *Atropurpu-*
ceptaculis florum subulatis. Linn. sp. pl. 190. *rea.*

Scabiosa peregrina rubra, capite oblongo. Tour.
464.

Le Regardez-moi des Jardiniers.

HABITAT Monspelii. Colitur in hortis. Annuæ.

10. SCAB. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis *Ochroleuca.*
bipinnatis linearibus. Linn. sp. pl. 101.

Scabiosa multifido folio flore flavescente. Tour. 464.

Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis fo-
liolis lanceolatis superne incisis. Sauv. 241.

Scabiosa sulphurea incisis foliis. Barr. Ic. 770.
n°. 2.

HABITAT Monspelii, *au Mont St. Loup, à St.*
George, à l'Esperou.

11. SCAB. corollulis quinquefidis, caule herbaceo, *Papposa.*
calycibus foliosis florem superantibus. Linn. sp.
pl. pag. 101.

Scabiosa cretica, capitulo pappos mentiente Tour. 34.

HABITAT... Annuæ apud nos.

12. SCAB. corollulis quinquefidis, radiantibus calyce *Maritima.*

brevioribus, foliis pinnatis, summis linearibus integerrimis. *Linn. sp. pl. pag. 889. cent. 2. pag. 8.*
Obs. Hujusce semina attulerat juvenis Chycoyneau, nullo nomine insignita. Corollulæ radii dilute cærulecentes.

HABITAT in maritimis, à *Cette*, au *Nazareth*, & à *la Plage vers Agde*.

KNAUTIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 91.*

Char. sec. *Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis simplex aggregata. Fulc. nulla.*

Orientalis.

KNAUT. Linn. Syst. nat.

Knautia orientalis. Linn. sp. pl. 101.

HABITAT... Annua. Folia lineari-lanceolata.

SPERMACOCE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 94.*

Char. sec. *Rad. simplex tenuis. Caul. herbacea ramosa tetragona articulata. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris sessilis verticillata. Fulc. nulla.*

Tenuior. 1. SPER. glabra, foliis lanceolatis, floribus verticillatis. *Linn. Syst. nat. pag. 890.*

Spermacoce glabra, staminibus inclusis. Linn. sp. pl. pag. 102.

HABITAT... Annua. Caulis acute tetragonus; fructus scaber, hispidus. Flores albi minimi.

SHERARDIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 92.*

Char. sec. *Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa tetragona articulata. Fol. sessilis simplex integerima verticillata, vel inferior verticillata, superior opposita. Flor. pedunculata terminalis & axillaris aggregata. Fulc. bractea aculeata octofida, vel simplex & integerrima.*

Arvensis. 1. SHER. foliis omnibus verticillatis, floribus terminibus. *Linn. sp. pl. pag. 102.*

Rubia

Rubia parva flore cæruleo se spargens. *Bot. Mons.* 224.
 Aparine pumila supina flore cæruleo. *Tour.* 114.
 Asperula flore carneo, acuto folio. *Barr. Ic.* 541. n°. 1.
HABITAT Monspelii ubique. Caulis inferne aculeis
 minimis scaber. Folia inferiora quaterna sena, iti-
 dem ad margines scabra seu aculeis ciliata; pedun-
 culi axillares solitarii foliis duplo longiores, termi-
 nati bractea magna multiflora; rami etiam termi-
 nati floribus.

2. SHER. foliis floralibus binis oppositis, binis floribus. *Muralis.*
Linn. sp. pl. 103.
 Rubia quadrifolia verticillato semine. *Bot. Mons.* 226.
HABITAT in sterilibus à *Lavalette*, *la Colombiere*.
 Annua.

A S P E R U L A.

Char. prim. *Linn. gen. pl. 93.*

Char. sec. *Rad. ramosa. Caul. ramosa articulata*
tetragona herbacea. Fol. sessilis simplex inte-
gerrima verticillata. Flor. terminalis fasciculata,
sessilis vel pedunculata. Fulc. nulla.

1. ASPER. foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis *Odorata.*
 pedunculatis. *Linn. sp. pl. 103.*
 Aparine latifolia humilior montana. *Tour. 114. Seg.*
Ver. T. 1. pag. 187.
HABITAT... Folia glaberrima.
HOSPITATUR sub dio.
2. ASPER. foliis senis, floribus sessilibus aggregatis ter- *Arvensis.*
 minalibus. *Linn. sp. pl. 103.*
 Rubia cærulea elatior vel erectior. *Bot. Mons.* 224.
 Gallium arvense flore cæruleo. *Tour. 115.*
HABITAT Monspelii ubique. Folia floralia sæpius ad
 basim ciliata; omnibus glabris.
3. ASPER. foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus fas- *Taurina.*
 ciculatis terminalibus. *Linn. sp. pl. p. 103. Syst. nat.*
pag. 891.
 Cruciatæ alpina latifolia lœvis. *Tour. 115.*
 Asperula foliis quaternis ovato-lanceolatis, ramis al-
 ternis. *Sauv. 164.*
 Rubia minor quadrifolia atrovirens. *Barr. Ic.* 547.
HABITAT Monspelii à *la Verune* & vers *Pignan*. Cor-
 rollæ multo longiores quam in priori; foliaque
 latiora.

- Tinctoria.* 4. ASPER. foliis linearibus; inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis. *Linn. sp. pl. p. 104.*
Asperula foliis quaternis linearibus, floribus saepe trifidis. *Sauv. 163.*
 HABITAT Monspelii cum priori.
- Cynanchica.* 5. ASPER. foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris floribus quadrifidis. *Linn. sp. p. 104.*
Asperula foliis linearibus quaternis, summis oppositis. *Sauv. 163.*
Rubia cynanchica. Bot. Mons. 225.
Rubeola vulgaris quadrifolia laevis floribus purpurascens. *Tour. 130.*
 HABITAT Monspelii. Frequens à *Boutounet*. Folia summa saepe bina linearia, saepius etiam quaterna, alternis minoribus brevioribus.

G A L L I U M.

Char. prim. *Linn. gen. pl. 97.*
 Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa articulata tetragona, erecta vel procumbens.
Fol. sessilis verticillata simplex integerrima.
Flor. axillaris & terminalis ramosa subpaniculata. *Fulc.* saepius nulla; in paucissimis aculei ad margines foliorum.

* *Fructu glabro.*

- Palustre.* 1. GAL. foliis quaternis ovatis inæqualibus, caulis diffusis. *Linn. sp. pl. pag. 105.*
Cruciata palustris alba. Tour. 115.
Gallium palustre album. Bot. Mons. 105.
Gallium aquaticum flore albo. Barr. Icon. 82.
Le Caillelait blanc.
 HABITAT Monspelii in rivulis, à *Castelnau*, *Selle-neuve*, &c.
- Verum.* 2. GAL. foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevioribus. *Linn. sp. pl. p. 107.*
Gallium luteum. Bot. Mons. 105. Tour. 115.
Le Caillelait jaune.
 HABITAT cum priori. Caulis obtuse quadrangulus, rami floriferi foliosi.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 67

3. GAL. foliis octonis ovatis linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. sp. pl. p. 107.* Mollugo.
- Gallium montanum latifolium ramosum. *Tour. 115.*
 Rubia sylvestris lævis. *Bot. Mons. 224.*
 HABITAT Monspelii in umbrosis, à gauche le long du Lés, à Castelnau.
4. GAL. foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, summo caule floriferis. *Linn. sp. pl. p. 107.*
Sauv. 161.
 Rubia montana angustifolia. *Bot. Mons. 225.*
 Gallium saxatile glauco folio. *B. Tour. 115.*
 HABITAT Monspelii, à la Colombiere, Lavalette, Gramont.
- * * * *Fructu hispido.*
5. GAL. foliis quaternis ovatis lævibus obtusis, panicula dichotoma, seminibus hispidis. *Linn. sp. pl. 108.* Rotundifolium.
- Cruciata lusitanica latifolia glabra flore albo. *Tour. 115.*
 Cruciata minor glabra, flore molluginis albo. *Barr. Icon. 323.*
 Gallium foliis quaternis ex ovato-lanceolatis, seminibus longe pedunculatis. *H. Sauv. 161.*
 HABITAT Monspelii vers Saint George & au-delà de la Verune.
6. GAL. foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido. Aparine.
Linn. sp. pl. p. 108.
 Aparine foliis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. *R. Sauv. 163.*
 Aparine vulgaris. *Bot. Mons. 25. Tour. 114.*
Le Grateron.
 HABITAT Monspelii ubique. Aculei ad margines foliorum & in dorso.

C R U C I A N E L L A.

- Char. prim. *Linn. gen. pl. 95.*
 Char. secund. *Rad. Ramosa. Caul. herbacea ramosa articulata tetragona. Fol. sessilis simplex integerrima verticillata. Flôr. terminalis spicata.*

Fulg. bracteæ simplices integerrimæ solitariæ
sub quolibet calyce.

- Angustifolia.* 1. CRUC. erecta foliis senis linearibus. *Linn. sp. pl.* 108.
Rubia angustifolia spicata. *Bot. Mons.* 225.
Rubeola angustiore folio. *Tour.* 130.
Rubia spicata angustifolia. *Barr. Icon.* 550.
HABITAT Monspelii, à la Colombiere, Gramont. Spicæ
bracteis lanceolatis.
- Latifolia* 2. CRUC. procumbens foliis quaternis lanceolatis, flo-
ribus spicatis. *Linn. sp. plant.* 109.
Rubeola latiore folio. *Tour.* 130.
Rubia latifolia spicata. *Barr. Icon.* 520.
Rubia spicata latifolia Imperati. *Barr. Icon.* 549.
HABITAT Monspelii, proche Merviel.
- Maritima.* 3. CRUC. procumbens foliis quaternis, spicis interruptis.
Crucianella procumbens foliis quaternis, floribus sub-
verticillatis. *Linn. sp. pl.* 109.
Rubia maritima. *Bot. Mons.* 226. *Barr. Icon.* 315.
Rubeola maritima. *Tour.* 130.
Rubia marina, strigosior, flore rubello. *Barr. Icon.*
355.
HABITAT in maritimis circa Perauls, Villeneuve, &c.
Bracteæ ovatæ ad margines ciliatæ membranaceæ.
Flores longitudine foliorum axillares solitarii.
- Monspelinica.* 4. CRUC. repens, foliis senis, spicis longis. *Linn. sp.*
pl. 109.
Rubia spicata repens. *Bot. Mons.* 225.
Rubeola supina spica longissima. *Tour.* 130.
HABITAT Monspelii ultra pontem Castrinovi, à La-
valette & à la Colombiere.

R U B I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 99.
Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea
ramosa tetragona articulata. Fol. sessilis, sim-
plex integerrima verticillata. Flor. paniculata
axillaris & terminalis. Fulc. aculei ad margi-
nes & nervos foliorum.

- Tinctorum.* 1. RUB. foliis senis. *Linn. sp. pl.* 109. & quinis. *Sauv.*
161.
Rubia sylvestris monspessulana major. *Bot. Mons.*
224.

- Rubia sylvestris monspessulana major. *Tour.* 114.
 2. Rubia tinctorum sativa. *Bot. Mons.* 224. *Tour.* 114.
La Garence.
 HABITAT Monspelii passim.

PLANTAGO.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 106.

Char. secund. *Rad.* fibrosa vel ramosa. *Caul.* scaposa vel foliosa, herbacea vel fruticosa. *Fol.* in scaposis radicalis simplex integra vel incisa, in foliosis caulina opposita integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Fult.* bracteæ monophyllæ solitariæ ad basim singuli calycis.

* *Scapo nudo.*

1. PLANT. foliis ovatis glabris, scapo nudo tereti, spica *Major.* flosculis imbricatis. *Linn. sp. pl.* 112.

Plantago latifolia sinuata. *Bot. Mons.* 205. *Tour.* 126.

2. *Plantago latifolia rosea* floribus quasi in spicam dis- *Rosea.* positis. *Tour.* 126.

Le plantain à bouquet.

HABITAT Monspelii ubique *B.* non occurrit in agro monspessulano. Scapus vix semipedalis; spica conica; bracteis ovatis petiolatis. Folia ad basim duobus, tribusve denticulis remotis; ad hanc referatur *plantago maxima tota glabra.* *Bot. Mons.* 205.

2. PLANT. foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica *Media.* cylindrica, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 113. Spicis teretibus. *Sauv.* 38.

Plantago latifolia incana. *Bot. Mons.* 303. *Tour.* 126.

HABITAT Monspelii, à *Saint Guillen le désert* & à *la Serane.*

3. PLANT. foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo *Lanceolata.* angulato. *Linn. sp. pl.* 113.

Plantago angustifolia major. *Bot. Mons.* 206. *Tour.* 127.

Le plantain; vernaculè, plântage ou herbe de cinq côtes.

HABITAT ubique Monspelii.

70 TETRANDRIA MONOGYNIA.

- Lagopus.* 4. PLANT. foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta, scapo angulato. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago angustifolia paniculis lagopi. *Bot. Mons.* 206. *Tour.* 127.
Plantago foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spicas globosis. *Sauv.* 16.
HABITAT Monspelii in maritimis.
- Albicans.* 5. PLANT. foliis linear-lanceolatis hirsutis, spica cylindrica erecta, scapo tereti, foliis longiore. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago angustifolia albida Monspeliensis. *Tour.* 127.
β. Holosteum hirsutum albicans minus. *Bot. Mons.* 132.
Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo foliis duplo longiore. *Sauv.* 26.
HABITAT Monspelii, vers Castelnau.
- Alpina.* 6. PLANT. foliis linearibus planis hirsutis, spica oblonga erecta. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago alpina folio angusto longo & nigricante. *Tour.* 127.
Plantago foliis linearibus, spica oblonga. H. *Sauv.* 26.
HABITAT Monspelii à la Serane, au mont St. Loup, à Saint Guillen le désert.
- Maritima.* 7. PLANT. foliis semi-cylindraceis integerrimis basi lantatis, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago maritima major tenuifolia. *Tour.* 127.
Coronopus maritima major. *Bot. Mons.* 76.
Plantago foliis semi-cylindraceis integerrimis. L. *Sauv.* 26.
HABITAT Monspelii ad mare. Folia carnosa.
- Subulata.* 8. PLANT. foliis subulatis triquetris rigidis, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 115.
Plantago gramineo folio minor. *Tour.* 127.
β. Coronopus serpentina. *Bot. Mons.* 79.
Plantago gramineo folio major. *Tour.* 127.
HABITAT Monspelii, au mont Saint Loup, à Valene.
β. Luxuriat à Sumene.
- Coronopus.* 9. PLANT. foliis linearibus pinnato-dentatis. L. *Sauv.* 275.
Plantago foliis linearibus dentatis scapo teteti. *Linn. sp. pl.* 115.
Coronopus hortensis. *Bot. Mons.* 79. *Tour.* 128.
La corne de cerf.
HABITAT Monspelii passim in arvis.

* * *Caule ramoso.*

10. PLANT. caule ramoso subfruticoso, foliis integermis, spicis aphyllis. *Linn. Syst. nat. p. 896.* *Psyllium majus supinum. Bot. Mons. 214. Tour. 128. Sauv. 126.* *Psyllium. Psyllium.*
11. Plantago caule ramoso, foliis integerrimis, spicis foliosis. *Linn. sp. plant. pag. 115. Sauv. 126.*
L'herbe aux puces.
HABITAT Monspelii in sterilibus, à Selleneuve, Lamalon, Castelnau, Gramont.
11. PLANT. caule ramoso herbaceo, foliis dentatis re-curvatis, spicis aphyllis. *Linn. Syst. nat. pag. 896.* *Cynops. Psyllium majus erectum. Bot. Mons. 214. Tour. 128.*
Plantago foliis dentatis, caule ramoso, spicis aphyllis. *Linn. sp. pl. pag. 116.*
HABITAT cum priori.

SANGUISORBA.

Char. prim. vid. Lin. gen. pl. 107.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres ramosa foliosa. Fol. alterna petiolata amplexicaulis pinnata, foliolis petiolatis, simplicibus integris. Flor. terminalis, spicata. Fulcr. stipulae petiolares, integræ binæ oppositæ reniformes.

Obs. Petioli foliorum sæpius etiam stipulis ovatis instruuntur.

1. SANG. spicis ovatis. *Linn. sp. pl. 116. Sauv. 220.* *Officinalis.*
Pimpinella sanguisorba major. *Bot. Mons. 204. Tour. 156.*

La Pimprenelle; vernaculè, la Pimpanela.

HABITAT Monspelii; à Lattes, la Verune. Caulis & folia glaberrima. Folia pinnata, ex foliolis quindecim vel 17. cordato-ovatis, serratis petiolatis sæpius oppositis. Stipulae duæ reniformes serratæ, supra basim petioli enascuntur. Stipulae verò foliolorum ad basim petiolorum.

CORNUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 110.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. arbo-E. iiiij.

rea. *Fol.* opposita petiolata simplex integrifolia. *Flor.* ramea terminalis cymosa. *Fulc.* nulla.

- Mas.* 1. CORN. arborea, umbellis involucrum æquantibus. *Linn. sp. pl.* 117.

Cornus hortensis mas. Bot. Mons. 79.

Cornus hortensis mas. Tour. 641. Et *sylvestris. Ibid.*

Cornus drupis ovalibus. Sauv. 151.

Le Cormier, ou Cornouiller; vernaculè, lou Cournier, las Cornies.

HABITAT Monspelii; à *Valene*, & au-delà du Pont de *Selleneuve*, à gauche dans le petit bois qui est vers la *Verune*, & à *Castelnau*.

- Sanguinem.* 2. CORN. arborea cymis nudis. *Linn. sp. pl.* 117.

Cornus drupis globosis. Sauv. 151.

Cornus femina. Bot. Mons. 79. *Tour.* 641.

Sanguine; vernaculè, lou Sangui.

HABITAT ubique; à *Castelnau*; & cum priori.

P T E L E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 112.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* petiolata alterna integrifolia ternata. *Flor.* ... *Fulc.* . . .

- Trifoliata.* 1. PTEL. foliis ternatis. *Linn. sp. pl. pag.* 118.

R I V I N A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 121.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea perennis. *Fol.* alterna petiolata simplex integrifolia. *Flor.* axillaris pedunculata racemosa solitaria. *Fulcr.* nulla.

- Humilis.* 1. RIV. humilis. *Linn. sp. pl.* 121.

HABITAT. . . . Caulis pedalis; folia ovata acuminata; petioli foliis breviores; racemi inferne nudi, longitudine foliorum. Floret æstate; semina maturans.

C A M P H O R O S M A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1042.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* subfruti-

cosa. *Fol.* alterna subulata sessilis, simplex integerrima. *Flor.* axillaris glomerata. *Fulcr.* nulla.

1. CAMP. foliis hirsutis linearibus. *Linn. sp. pl.* 123.
Sauv. 45.

Camphorata hirsuta. *Bot. Mons.* 47. *Tour. act.* 1705.
pag. 313.

Camphorata Monspeliensium. *Lob. Icon.* 403.
La Camphorata.

HABITAT Monspelii ubique in sterilibus.

ALCHEMILLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 122.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea teres foliosa ramosa. *Fol.* alterna petiolata, simplex lobata integra, vel quinto-digitata. *Flor.* axillaris & terminalis, pedunculata paniculata, vel sessilis glomerata. *Fulcr.* stipulæ geminæ, petiolares, adnatæ, vaginantes foliacæ integræ, nunc membranaceæ integerrimæ.

1. ALCH. foliis lobatis, stipulis foliaceis, serratis. *Vulgaris.*

Alchemilla foliis lobatis. *Linn. sp. pl.* 123.

Alchemilla vulgaris. *Tour.*

Le Pied de lion.

HABITAT Monspelii; *au Mont de St. Loup, à la Serane,* à l'Esperou. Folia glaberrima 7-globata ferrata, inferiora longe petiolata, superiora subreniformia, petiolis brevioribus.

2. ALCH. foliis digitatis, stipulis membranaceis integerrimis. *Alpina.*

Alchemilla (alpina,) foliis digitatis serratis. *Linn. sp. pl.* 123.

Alchemilla alpina quinquefolii folio subtus argenteo. *Tour.* 508.

Alchemilla argentea montana pentaphyllos. *Barr. Icon.* 756.

Le Pied de lion à feuilles argentées.

HABITAT cum priori. Foliola ovata ad apicem ferrata, subtus villis argenteis.

DIGYNIA.

APHANES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 123.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres.
Fol. alterna petiolata simplex incisa. *Flor.* axillaris sessilis glomerata. *Fulc.* stipulæ geminæ petiolares adnatæ, vaginantes incisæ.

Arvensis.

i. APH. arvensis. *Linn. sp. pl.* 123.

Alchemilla minima montana. *Bot.* 7.

HABITAT Monspelii in Sylvâ Gramuntiana. Folia sæpius trifida, laciniæque iterum trifidæ, stipulæ serratae magnitudine ferè foliorum.

CUSCUTA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 124.

Char. secund. *Rad.* conspicua nulla. *Caul.* filiformis volubilis parasitica florifera. *Fol.* nulla. *Flor.* glomerata sessilis sparsa. *Fulc.* nulla.

i. CUS. floribus sessilibus. *Linn. sp. pl.* 124.

Cuscuta nuda repens funiformis. *Sauv.* 11. & filiformis. *Ibid.*

Cuscuta major. *Bot. Mons.* 81. *Tour.* 653.

Cuscuta minor sive epithymum. *Bot. Mons.* 82. *Tour.* 653.

La Cuscute; vernaculè, *la Rasque.*

HABITAT ubique Monspelii.

HYPECOLUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 126.

Char. secund. *Rad.* fusiformis tenuis. *Caul.* scapoza teres simplicissima. *Fol.* radicalis pinnata foliolis incisis. *Flor.* terminalis subsolitaria. *Fulc.* bracteæ foliaceæ incisæ, solitariæ vel binæ infra flores.

Procumbens. i. HYP. siliquis arcuatis compressis. *Linn. sp. pl.* 125.

Hypocoum latiore folio. *Tour.* 230.

Hypocoum siliquosum. *Bot. Mons.* 134.

HABITAT Monspelii propè Sacellum ad aquas bellulu-

canas, frequentius *au Pont de la Peyrade*, à *Cette* ;
luxuriat circa urbem & in Horto regio.

2. HYP. siliquis cernuis teretibus cylindricis. *Linn. sp. pl. Pendulum.*
124. *Sauv. 263.*

Hypcoum tenuiori folio. Tour. 230.

Hypcoi altera species. Baub. Pin. 172.

Hypcoum tenuifolium Hispanicum flore pallido.
Barr. Icon. 352.

HABITAT Monspelii cum priori, sed rarius.

TETRAGYNIA.

I L E X.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 127.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea.*

Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor.
axillaris glomerata. Fulcr. aculei ad margines
foliorum.

1. ILEX foliis ovatis, acutis, spinosis. *Linn. sp. p. 125. Aquifolium.*

Agrifolium vulgò. Bot. Mons. 6.

Aquifolium vulgò, sive Agrifolium. Tour. 600.

Le Houx.

HABITAT Monspelii; *au Capouladou & à Valene.*

Arbor sempervirens.

POTAMOGETON.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 128.*

Char. secund. *Rad. articulata horizontalis, radiculis perpendicularibus fibrosis, ad articulos. Caul.*
herbacea teres ramosa articulata. Fol. alterna
vel opposita, sessilis vel petiolata, integerima
vel incisa. Flor. axillaris solitaria spicata. Fulc.
stipulæ. . . .

1. POT. foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Linn. Natans.*
sp. pl. 126. Sauv. 14. & 73.

Potamogeton rotundifolium. Tour. 233.

HABITAT Monspelli in Ledo amne ad dextram Castrinovi. Floret septembri. Folia longe petiolata integerima opposita.

- Densum.** 2. POT. foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulis dichotomis. *Linn. sp. pl. 126.*
Potamogeton minus, foliis densis, mucronatis, non serratis. *Bot. app. pag. 304.* *Tour. 233.* *Sauv. 124.*
HABITAT Monspelii in rivulis laterensibus
- Crispum.** 3. POT. foliis lanceolatis, alternis, undulatis, serratis. *Linn. sp. pl. 126.*
Potamogeton foliis crispis, sive lactuca ranarum. *Bot. Mons. 213.* *Tour. 233.*
HABITAT ubique Monspelii in aquis; à Castelnau, Lamoson.
- Setaceum.** 4. POT. foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *Linn. sp. pl. 127.*
Potamogeton angustifolium racemosum. *Bot. Mons. 213.*
Potamogeton ramosum angustifolium. *Bauh. prod. pag. 100.* *Tour. 233.*
HABITAT Monspelii in Ledo amne propè Molendinas.
- Pusillum.** 5. POT. foliis linearibus oppositis alternisque distinctis, basi patentibus, caule tereti. *Linn. sp. pl. 127.*
Potamogeton minimum capillaceum. *Bauh. prod. Bot. Mons. 213.*
Potamogeton pusillum gramineo folio, caule rotundo. *Raj. Synon.*
HABITAT Monspelii secus fluvium; au-delà de Caunelles, & à la source du Lés.

R U P P I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 842.*

Char. secund. Rad. fibrosa. Cau. herbacea articulata teres ramosa. Fol. alterna sessilis linearis simplex integerrima. Flor. axillaris pedunculata solitaria ramosa. Fulc. stipulæ geminæ membranaceæ vaginantes adnatæ integrimæ.

- Maritima.** 1. RUP. *Linn. sp. pl. pag. 127.*
Gramen maritimum fluitans cornutum. *B. Bot. Mons. 119.*
Fucus Folliculaceus fœniculi folio longiore. *B. pin. 365.*
Gramen aquæ innatans, cum utriculis, sive fœniculaea marina. *J. Bauh. Tom. III. pag. 784.*
Fucus ferulaceus. *Lob. Icon. 275.*
HABITAT Monspelii in stagnis.

S A G I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 129.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* teres articulata, simplex vel ramosa. *Fol.* opposita sessilis, simplex integerrima. *Flor.* pedunculata solitaria axillaris & terminalis. *Fulc.* nulla.

1. SAG. ramis procumbentibus. *Linn. sp. pl.* 128. *Sauv.* *Procumbens.*

^{142.}

Alfine pusilla graminea flore tetrapetalo. *Tour.* 243. & *Seguier*, *Tom. I.* pag. 421. tab. 5. f. 3.

Alfine littoralis graminea. *Bot. Mons.* 290.

HABITAT Monspelii in luco Gramuntio.

Pedunculi 1flori axillares solitarii foliis triplo longiores, erecti. Corolla magnitudine calycis vel paulo major. Folia linear-lanceolata; pedunculi fructiferi recurvi.

2. SAG. caule erecto unifloro. *Linn. sp. pl.* 128.

Erecta.

Alfine verna glabra. *Bot. Mons.* 14. *Tour.* 242.

HABITAT Monspelii cum priori in locis Mnio & Bryo obsitis, & frequentior à Caunelles.

Planta vix sesquipollucaris raro bipollucaris, foliorumque oppositionibus 4-7; terminata pedunculo longo, nudo, sub-unifloro.

T I L L Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 83.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea subramosa. *Fol.* spar a sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris sessilis solitaria. *Fulc.* nulla.

1. TIL. erecta, floribus lateralibus, foliis obtusis. *Sauv.*

^{129.} *Linn. sp. pl.* 129.

Rubra.

Sedum annum stellatum rubrum. *Bot. Mons.* 238.

tab. 237.

HABITAT Monspelii in colle Ferran, & ad laevam Castri novi, ut & etiam in olivetis circà Caunelles; & etiam in ingressu luci Gramuntii, ubi pulchrè mixta cum saxifraga tridactyl.

2. TIL. procumbens. *Sauv.* 129. *Linn. sp. pl.* 129.

Muscosa.

Polygonum muscosum minimum. *Bot. Mons.* 211.

Bocc. mus. 2. p. 36. t. 22.

HABITAT cum priori; utraque sèpiùs uncialis.

Classis V.

PENTANDRIA
MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 130.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. teres ramosa foliosa herbacea glabra. Fol. alterna simplex integrifolia, sessilis vel petiolata. Flor. terminalis conjugata, spicis cum florent recurvis & convolutis, dum fructum ferunt erectis strictis. Fulc. nulla.

- Europeum.* 1. HEL. foliis ovatis petiolatis, caule erecto.
Heliotropium foliis ovatis integrifolis tomentosis rugosis, spicis conjugatis. *Linn. sp. pl.* 130. *Sauv. & Bot. Mons.* 305.
Heliotropium majus Dioscoridis. *Bot. Mons.* 125.
Tour. 139.
Heliotropium majus & herba Cancri. *Lob. Icon.* 260.
L'Héliotrope, l'herbe aux verrues; vernaculè, herbe de la Verrugue.
HABITAT Monspelii ubique. Annum. Altitudo cubitalis.
- Curassavicum.* 2. HEL. foliis spatulatis sessilibus.
Heliotropium foliis lanceolato-linearibus glabris avenerii, spicis conjugatis. *Linn. sp. pl.* 130.
Heliotropium curassavicum foliis lini umbilicati. *M. Tour.* 139.
HOSPITATUR in hybernaculo. Planta terræ incumbens, glauca glaberrima, annua. Flores albi, calycibus vix longiores.
Obs. Singulare in hocce genere quod pars spicularum fructificans strictissima, pars verò florida recurva & convoluta evadat. Idem evenit in sequenti.

MYOSOTIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 131.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. herba teres.

Fol. sessilis alterna hirsuta simplex integerrima.

Flor. terminalis racemosa, racemis solitariis dum florent recurvis & convolutis, dum fructum ferunt erectis strictis. Fulc. nulla. Aculei supra capsulas in primâ specie.

1. MYOS. seminibus nudis : foliorum apicibus callosis. *Scorpioides.*

Linn. sp. pl. 131. Sauv. 63.

2. Myosotis foliis hirsutis. Linn. hort. Cliff. 46.

Echium scorpioides arvense. Bot. Mons. 87.

Arvensis.

Lithospermum arvense minus. Tour. 137.

3. Myosotis foliis glabris. Linn. hort. Cliff. 46.

Echium scorpioides palustre. Bot. Mons. 88.

Palustris.

Lithospermum palustre minus flore cœruleo. Tour. 137.

Lycopsis montana cœrulea, seu buglossum minimum montanum. Barr. Icon. 404.

Myosotis foliis glabris mollibus lanceolatis. Sauv. 63.

L'Oreille de Souris.

HABITAT ubique in umbrosis circa *Lavalette*, *Castelnau*. Annua. Pedalis vel sesquipedalis.

2. MYOS. seminum aculeis triglochidibus, foliis lanceolatis pilosis. Linn. sp. pl. 131. Sauv. 63. *Lappula.*

Cynoglossum medium & minus. Bauh. Pin. 257. Bot. Mons. 83.

Buglossum angustifolium semine echinato. Tour. 134.

Echioides minus globoso echinato & singulari capite.

Barr. Icon. 1246.

HABITAT Monspelii, à *St. Martin de Londres* auprès du Château, & à *Vials*. Annua.

3. MYOS. seminibus nudis, foliis hispidis, racemis foliosis. Linn. sp. pl. 131. *Apula.*

Anchusa lutea minima. Bot. Mons. 19.

Buglossum angustifolium luteum annum minimum. Tour. 134.

Lithospermum seminibus lœvibus, corollis vix caly-
cem superantibus, foliis lanceolatis. Sauv. 62.

HABITAT Monspelii circa *Selleneuve*, *Castelnau*. Annua.

LITHOSPERMUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 132.

Char. sec. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* herbacea teres ramosa vel fruticosa. *Fol.* alterna hirsuta, sessilis simplex integerrima. *Flor.* solitaria sub-sessilis laterifolia. *Fulg.* nulla.

Officinale.

1. LITH. seminibus lœvibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 133.

Lithospermum sive *milium* solis. *Bot. Mons.* 163.

Lithospermum majus erectum. *Tour.* 137.

Le Gremil.

HABITAT Monspelii passim circa *Castelnau*. Annum. Calyces pedunculo brevi donantur.

Arvense.

2. LITH. seminibus rugosis, corollis vix calicem superantibus. *Linn. sp. pl.* 132.

Lithospermum nigrum quibusdam flore albo semine echii. *Bot. Mons.* 164.

Buglossum arvense annum lithospermi folio. *Tour.* 134.

HABITAT Monspelii; abundat circa *Castelnau & Selle-neuve*. Annum; calyces pedunculati.

Purpuro-caeruleum.

3. LITH. seminibus lœvibus, corollis calycem multoties superantibus. *Linn. sp. pl.* 133.

Lithospermum repens majus. *Bot. Mons.* 163.

Lithospermum minus repens latifolium. *Tour.* 137.

L'Herbe aux Perles.

HABITAT Monspelii in pratis humidis ultra *Ledum* circa Molendinas; folia lanceolata uninervia. Floret Aprili.

Tinctorum.

4. LITH. villosum, caulis procumbentibus simpliciflavis. *Linn. sp. pl.* 133.

Anchusa Monspeliaca. *Bot. Mons.* 18.

Buglossum radice rubra, sive *anchusa vulgatior* floribus cœruleis. *Tour.* 134.

L'Orcanette.

HABITAT Monspelii ultra *Castrum novum* ad dexteram.

Fruticosum.

5. LITH. fruticosum, staminibus corollam æquantibus. *Linn. sp. pag.* 133.

Buglossum fruticosum rorismarini folio. *Tour.* 134.

Anchusa lignosior angustifolia. *Bot. Mons.* 18.

Anchusa minor & lignosior. *Bauh. Pin.* 255.

Anchusa

Anchusa lignosior Monspeliensium flore violaceo.

Barr. Icon. 1168.

HABITAT Monspelii circa Montferrier, Lavalette.

Calyces sessiles; caulis perennis hispidus.

A N C H U S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 133. Adde foliolum calycis unicum cæteris sublongius.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres ramosa hispida. Fol. alterna hispida sessilis. simplex integerrima. Flor. terminalis capitata vel subspicata. Fulc. nulla.

1. ANC. foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Officinalis.*
Linn. sp. pl. p. 133.

Buglossum angustifolium majus. *Bot. Mons.* 40.

Buglossum angustifolium majus flore albo. *Tour.* 134.
& cæruleo *ibid.*

La buglosse.

HABITAT Monspelii ubique, frequens circâ la Verune.

Rami alii ex axillis foliorum; alii ex ipso caule oriuntur.

2. ANC. pedunculis diphyllis capitatis. *Linn. sp. pl. 134. Sempervirens.*
Buglossum latifolium semper virens. *Tour.* 134.
Buglossum semper virens. *Lobel. Icon.* 575.

HOSPITATUR sub dio. Priori multo minus hirsuta.

Pedunculi axillares foliis breviores: folia duo ad basim capitulorum; corollæ azureæ, extus rubentes præsertim ante expansionem.

C Y N O G L O S S U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 134.

Char. secund. Rad. ramosa napiformis. Caul. herbacea ramosa villosa. Fol. alterna villosa mollis sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis ramosa. Fulcr. nulla.

1. CYN. staminibus corolla brevioribus foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Linn. sp. pl. 134.* *Officinale.*
Cynoglossum majus vulgare. *Bot. Mons.* 83. *Tour.* 139.

La langue de chien; vernaculè, lengue cane, ou herbe d'autal.

HABITAT ubique Monspelii, annum; occurrit versus *Prades & Montferrier* copiosum. F

Cheirifolium. 2. CYN. foliis spathulatis incanis tomentosis semi-amplexicaulibus.

Cynoglossum corollis calyce duplo longioribus, foliis lanceolatis. *Sauv.* 64. *Linn. sp.* 134.

Cynoglossum creticum angusto argenteo folio. *Bot. Mons.* 83. *Tour.* 140.

HABITAT Monspelii frequens versus *Sellenuve*, *Castelnau*, &c. Annum. Calyces duplo longiores quam in omnibus speciebus.

Apenninum. 3. CYN. staminibus corollam æquantibus. *Sauv.* 64. *Linn. sp. pl.* 134.

Cynoglossum montanum maximum. *Tour.* 139.

HABITAT Monspelii à la Source du Lés & au Puy de Saint Loup. Folia digito indice longiora. Annum & bienne.

Linifolium. 4. CYN. foliis linear - lanceolatis ciliatis, pedunculis axillaribus multifloris subnudis.

Cynoglossum foliis linear - lanceolatis glabris. *Linn. sp. pl.* 134. *Sauv.* 54. & 64.

Omphalodes lusitanica folio lini. *Tour.* 140.

Linum album blattariæ folio semine discofo. *Barr. Icon.* 1234.

β. Omphalodes lusitanica elatior cynoglossi folio. *Tour.* 140.

HOSPITATUR sub dio. Annum.

P U L M O N A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 136.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea villosa simplex. *Fol.* alterna hirsuta simplex integriflora, radicalis basi attenuato-petiolata, caulina sessilis amplexicaulis. *Flor.* terminalis congesta. *Fulcr.* nulla.

Officinalis. 1. PUL. foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Linn. sp. pl.* 135. *Sauv.* 101.

Pulmonaria Italorum ad buglossum accedens. *Tour.* 136.

La pulmonaire.

HOSPITATUR in frigidario. Perennis; folia radicalia palmata, basi veluti in petiolum attenuata. Floret primo vere, imò & autumno.

SYMPHYTUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 135.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel tuberosa, horizontalis vel perpendicularis. *Caul.* herbacea pilosa. *Fol.* sessilis hirsuta simplex integerrima decurrens alterna (in una specie inferior alterna superior, opposita) *Flor.* subaxillaris pedunculata, pedunculis multifloris. *Fulc.* nulla.

1. SYM. foliis omnibus alternis.

Officinale.

Symphytum foliis ovato-lanceolatis decurrentibus.

Linn. sp. pl. pag. 137.

Symphytum consolida major. Bot. Mons. 247. Tour. 138.

La grande consoude, ou l'oreille d'âne.

HABITAT Monspelii circà Castrum novum, le long du Lés & à Lattes.

2. SYM. foliis inferioribus alternis, floralibus oppositis. *Tuberosum.*

Symphytum foliis summis oppositis. Linn. sp. pl. pag.

136.

Symphytum majus, radice tuberosa. Bot. Mons. 248.

Tour. 138. majus & minus.

HABITAT Monspelii in pratis laterensibus.

HOSPITATUR in frigidario.

Obs. in utraque specie (apud nos) folia decurrunt in caulem & in pedunculos.

CERINTHE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 141. Adde foliolum unum calycis cæteris brevius angustius, alterum longius, latiusque.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa glabra vel hispida. *Fol.* simplex integerrima hispida alterna, sessilis vel amplexicaulis. *Flor.* solitaria pedunculata laterifolia. *Fulcr.* nulla.

1. CER. foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtusiusculis patulis. Linn. sp. pl. 136. Major.

Cerinthe foliis amplexicaulibus florum dentibus revolutis. Sauv. 63.

Cerinthe quorumdam major flore ex rubro purpureo
rascente. *Tour.* 80.

3. Cerinthe quorumdam spinoso folio flore flavo. *Tour.*
80.

Le melinet.

HOSPITATUR sub dio; radix perennis. Ludit foliis
emarginatis, glabris; antheræ sagittatæ; primo vere
imò & hyeme florens.

- Echioides.* 2. CER. foliis lanceolato-linearibus hispidis, seminibus
quaternis distinctis. *Linn. sp. pl.* 137.

Anchusa lutea minor & major. *Bauh. pin.* 255.

Symphytum echii folio angustiore, radice rubra, flore
luteo. *Tour.* 138. & folio latiore *Ibid.*

Symphytum foliis ligulatis hispidis, floribus, &c.
Sauv. 62.

Anchusa lutea & parva. *Lob. Icon.* 578.

4. Buglossum annum luteum minimum. *Tour.* 136.
Echium luteum minimum hispanicum. *Barr. Icon.*
1254.

HABITAT Monspelii circà la Colombiere & Selleneuve
au-delà de Caunelles, sed rarior; vulgatior ad Mont-
lupi lèvam & à l'Esperou; annua.

B O R R A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 137.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres
hispida ramosa. Fol. hirsuta simplex integer-
rima alterna (in una specie caulina alterna
ramea opposita) inferior petiolata, superior
fessilis. Flor. pedunculata, pedunculis solitariis,
nunc simplicibus laterifoliis, nunc ramosis axil-
laribus vel terminalibus. Fulcr. nulla.

- Officinalis.* 1. BOR. foliis omnibus alternis, calycibus patentibus.
Linn. sp. pl. pag. 137.

Borago floribus cæruleis. *Tour.* 133.

La Bourrache, vernaculè *bourracha*.

HABITAT Monspelii in oleribus, perennis, florens fere
toto anno. Pedunculi terminales multiflori.

- Indica.* 2. BOR. foliis ramificationum oppositis, calycinis folio-
lis sagittatis. *Linn. sp. pl.* 137.

HOSPITATUR in hyberniculo. Annua. Folia oblonga.

amplexicaulia, minus hirsuta quam in priori; ramī axillares solitarii, foliis oppositis. Pedunculi alii ē caule, alii axillares, alii oppositifolii, solitarii, uniflori, foliis duplo breviores.

3. BOR. calycibus tubo corollæ brevioribus. *Linn. sp. Orientalis.* *pl. 138.*

Borago Constantinopolitana, flore reflexo cæruleo, calyce vesicario. *Tour. cor. 6.*

HOSPITATUR sub dio & in frigidario; perennis. Folia radicalia cordata bipalmaria petiolata; petiolo foliis longiore pedali, canaliculato, inferne dilatato amplexicauli; caulis rubens hispidus sesquipedalis, erectus. Folia caulina ovata subsessilia. Pedunculi axillares solitarii, multiflori, longitudine foliorum. Corollæ calycibus duplo majores, tubo albicante longitudine calycis. Laciniæ quinque revolutæ cærulecentes hispidæ. Pili calycis & corollæ, albi. Longiores quam in caule & foliis; semina maturans.

A S P E R U G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 140.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa,* hispida fruticosa subangulata. *Fol. sessilis alterna simplex integerrima hispida. Flor. axillaris subsolitaria subsessilis. Fulcr. nulla.*

4. ASP. calycibus fructiferis reflexis cauli adpressis. *Procumbens.*

Asperugo. *Linn. sp. pl. 138. Sauv. 64. & 101.*

Buglossum sylvestre caulis procumbentibus. *Bot. Mons. 41.*

Asperugo vulgaris. *Tour. 134.*

Alyssum germanicum echoïdes. *Lab. Icon. 803.*

HABITAT Monspelii; luxuriat in horto regio. Annua; varians foliis oppositis, ternis vel quaternis, serratis, vel crenatis.

L Y C O P S I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 138.* Adde folia calycis inæqualia.

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea teres hispida ramosa. Fol. alterna sessilis simplex in-*

tegerrima hispida. *Flor.* solitaria caulina pedunculata. *Fulcr.* nulla.

Vesicaria. 1. LYC. foliis integerrimis, calycibus fructiferis inflatis pendulis. *Linn. sp. pl.* 138.

Pulmonaria orientalis foliis echii, calyce vesicario. *Tour. cor.* 6.

HOSPITATUR sub dio; annua.

HABITAT à la Taillade de Gignac, à Salaison à droite.

Arvensis. 2. LYC. foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. *Linn. sp. pl.* 139.

Lycopsis foliis lingulatis sinuatis cæruleo flore. *Sauv.* 62.

Buglossum sylvestre minus. *Bot. Mons.* 40. *Tour.* 134.

HABITAT Monspelii ultrà pontem Castrinovi ad lævam & in colle Ferran. Annua. Corollæ tubus albicans squamulis salbidis, limbo cærulescente, calyces suprà axillares solitarii; folia quandoque decurrent in caulem sinuato-dentata vel integerrima.

E C H I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 139. adde foliola calycis inæqualia.

Char secund. Rad. ramosa. Caul. teres herbacea hirsuta, simplex vel ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima hirsuta. Flor. spicata subaxillaris. Fulcr. nulla.

Italicum. 1. ECH. corollis vix calycem excedentibus margine villosis. *Linn. sp. pl.* 139.

Echium majus & asperius, flore albo. *Bot. Mons.* 88. *Tour.* 135.

Echium majus & asperius flore dilute purpureo. *Bot. Mons.* 88. *Tour.* 135.

Echium caule erecto asperimum, flore minore. *Sauv.* 61.

HABITAT Monspelii circa Molendinas; annum, diffusum; ramis saepius in conum digestis.

Vulgare. 2. ECH. caule simplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Linn. sp. pl.* 139.

Echium foliis lingulatis hispidis, ex singulis alis spicatum. *Sauv.* 61.

Echium vulgare. *Bot. Mons.* 88. *Tour.* 135.

2. *Echium sylvestre hirsutum maculatum.* *Bot. Mons.*

88. *Sauv.* 61.

La Viperine.

HABITAT Monspelii in satorum marginibus.

3. *ECH. calycibus fructiferis distantibus, caule pro-* *Creticum.*
cumbente. *Linn. sp. pl. 139.*

Echium creticum angustifolium rubrum. *Sauv.* 62.

Tour. 136. & *latifolium.* 135.

HABITAT ubique Monspelii. Annum.

A N D R O S A C E.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 143.*

Char. sec. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* scaposa.

Fol. radicalis sessilis simplex integra vel in-
tegerrima. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.*
bracteæ lineares involucriformes plurimæ.

1. *AND. perianthiis maximis.* *Linn. sp. pl. 141.* *Maxima.*

Androsace calycibus fructuum maximis. *Sauv.* 16.

Androsace vulgaris latifolia annua. *Tour.* 123.

HABITAT Monspelii in maritimis circa *Miraval*,
Frontignan. Palmarem non attingens altitudinem;
folia ovalia vel lanceolata denticulata, glabra. In-
volucrum foliis quinque vel sex ovalibus integris.
Flores minimi albi intra calicem maximum; pedun-
culi involucro subæquales; laciniæ calycis, sæpe
ferrulatæ. Annua.

2. *AND. foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis* *Septentriona-*
angulatis corolla brevioribus. *Linn. sp. pl. 142.* *lis.*

Alsine minor & verna. *Bauh. prodr.* pag. 118. n°.

V. & VI.

HABITAT in monte *l'Esperou*. Annua. Folia glaber-
rima lanceolata apice denticulata. Scapi plures pal-
mares teretes; foliola involuci brevissima; corol-
læ calycibus majores; florens Martio, Aprili & Maio;
Abundat entre *Lamalou* & la Montagne de *l'Esf-*
pinouse.

3. *AND. foliis linearibus glabris; umbella involucris* *Ladeo-*
multoties longiore. *Linn. sp. pl. 142.*

Androsace alpina perennis angustifolia, flore singu-
lari. *Tour.* 123, *Seg. ver. Tom.* 3. *pag. 110.*

HABITAT frequens à *Lamalou* & in umbrosis circa

Villemagne. Scapus 1florus vel ad summum triflorus; pedunculi sesquiunciales.

- Carnea.** 4. AND. foliis subulatis glabris, umbella involucris breviore. *Linn. sp. pl.* 132.
Androsace alpina angustifolia pereennis glabra & multiflora. *Tour.* 123.
HABITAT cum priori. Scapus vix biuncialis; folia lineas 6longa; pedunculi lineam unam duasve longi; corollæ calycibus paulo majores.
Obs. Per stolones fit propagatio.

P R I M U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 144.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex vel fibrosa.

Caul. scaposa. *Fol.* radicalis sessilis simplex integra vel integerima. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* bracteæ involucriformes plurimæ.

Officinalis. 1. PRIM. foliis dentatis, rugosis. *Linn. sp. pl.* 149. *Sauv.* 13.
Primula veris odorata, flore luteo simplici. *Tour.* 124.

Elatior. 2. *Primula veris caulinera pallido flore inodoro aut vix odoro*. *Bot. Mons.* 213.

Acaulis. 3. *Primula veris floribus ex singularibus pediculis pallidis majoribus simplicibus*. *Tour.* 125.

La Primevere.

Auricula. 2. PRIM. foliis serratis glabris. *Linn. sp. pl.* 143. *Sauv.* 13.
Auricula ursi. *Tour.* 143. 1-16.

L'Oreille d'ours; vernaculè, *l'Aureilla d'ours*.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Foliorum basis dilatata; foliola involuci ovata; unicum sæpiùs longius spathulatum umbellam superans; pedunculi omnes incani & veluti farinosi.

Hujus varietates innumeræ vide in *Tournefortio*. Culturæ effectus. In hortis luxurians, plena, multipli- cata, frondosa.

Farinosa. 3. PRIM. foliis crenatis glabris. *Sauv.* 143. *Florum limbo* plano. *Linn. sp. pl.* 143.

Primula veris rubro flore. *Tour.* 124.

Sanicula alpina minor, sive *media*. *Lob. Icon.* 571.

HABITAT in umbrosis; à *Lamalou*, au *Pouget*; ubi floret etiam autumno.

HOSPITATUR in frigidario. Priore multò minor.

4. PRIM. foliis linearibus integerrimis, floribus sessilibus. *Vitaliana.*
Linn. sp. pl. 143.
 Aretia foliis linearibus glabris, caule paucifloro. *Hall. bel. 486.*
 HABITAT cum priori in locis musco obsitis. Folia vix lineas duas longa. Radiculæ lignosæ plurimæ horizontales squamosæ; umbella biflora triflorave in medio foliorum subfessilis.
5. PRIM. foliis integerrimis, glabris oblongis, calycibus *Integrifolia.*
 tubulosis obtusis. *Linn. sp. pl. 144.*
 Auricula ursi carni coloris, foliis minimè serratis.
J. B. Tour. 120.
 HABITAT cum priore. Scapus sesquiuncialis, sub-triflorus. Flores maximi; foliola involucri terna vel quaterna linearia inæqualia.
 Obs. Stolonibus multiplicantur. Variat numerus statim vel laciniarum corollæ, in toto genere.

CYCLAMEN.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 193.

Char. secund. *Rad. tuberosa. Caul. scaposa, scapo unifloro spirali, dum floret, erecto stricto, dum fructificat, procumbente. Fol. radicalis petiolata simplex integra. Flor. terminalis cernua solitaria. Fulc. nulla.*

1. CYC. corolla retroflexa. *Linn. sp. pl. 145. Tour. 154. Europeum.*
Seg. Flor. ver. Tom. I. pag. 274. Sauv. 28.

Cyclamen. *Lob. Icon. 604. & 605.*

Cyclamen Byzantium. *Bot. Mons. 82.*

Le Pain de pourceau.

HABITAT Monspelii; au Château Bon, dans les murailles; à St. Guillin le désert, & aux Capouladoux, &c.

Variat foliis cordatis, orbiculatis, reniformibus, maculatis, floribusque purpureis, carneis, albis vel variegatis.

HOSPITATUR sub dio in umbrosis & humidis. Florens februario & martio, semina non maturans.

MENIANTHES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 147.

Char. secund. *Rad. horizontalis articulata sarmen-*

tosa. *Caul.* scaposa axillaris teres. *Fol.* radicalis petiolata vaginans ternato - dignitata, foliolis integerrimis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bracteæ monophyllæ integerrimæ amplexicaules.

Trifoliata. 1. MEN. foliis ternatis. Linn. sp. pl. 145.

Trifolium balustre. Dod. pempt. 570.

Menianthes 1. & 2. Tour. 154.

Le Trefle d'eau.

HABITAT in aquis; à l'Esperou. Foliola ovata æqualia.

Flores solitarii ex axillis bractearum. Corollæ intus.

barbatæ, calycibus triplo majores. Florens aprilii.

Semina non maturat.

HOSPITATUR sub dio, in aquario lacustri. Perennis.

LYSIMACHIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 149.

Char. secund. Rad. horizontalis, radiculis perpendicularibus. *Caul.* herbacea ramosa teres vel tetragona, repens vel erecta. *Fol.* simplex integerrima subsessilis, opposita vel verticillata. *Flor.* pedunculata terminalis, paniculata vel spicata, nunc axillaris simplicissima & solitaria. *Fulc.* nulla.

* *Floribus terminalibus.*

Vulgaris. 1. LYS. paniculata racemis terminalibus. Linn. sp. pl. 147.

Lysimachia lutea major. Bot. Mons. 172. Tour. 141.

Lysimachia (verticillata) foliis ovato-lanceolatis, floribus ad summos ramos spicatis. H. Sauv. 165. & 130. (oppositis.)

Lysimachia lutea sive salicaria. Lob. Icon. 142.

La Corneille.

HABITAT Monspelii ubique ad aquas. Tripedalis. Folia terna vel quaterna acuminata. Ramis axillaribus. Flores lutei; folia ramorum saepius opposita; folii cujusque nervi omnes propè ipsius margines anastomosim ineunt.

Ephemeron. 2. LYS. racemis simplicibus terminalibus, petalis obtusis,

- staminibus corolla brevioribus. *Linn. sp. pl.* 146.
 Ephemerum Mathioli. *Dod.* 203.
 HOSPITATUR sub dio. Annua.
3. LYS. spicis terminalibus patulis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. pl.* 147. *Atropurpurea.*
Lysimachia orientalis angustifolia, flore pùrpureo.
Tour. cor. 7.
 HOSPITATUR sub dio. Radix perennis (apud nos.)
- * *Floribus axillaribus.*
4. LYS. foliis subulatis, pedunculis folio brevioribus, caule erecto ramosissimo. *Linum stellatum.*
Lysimachia calycibus corollam superantibus, caule, &c.
Sauv. 130. *Linn. sp. pl.* 148.
Linum minimum stellatum. Bot. Mons. pag. 163. *Icon.* 162.
Lysimachia annua minima polygonifolio. Tour. 142.
 HABITAT Monspelii; à Castelnau, Gramont, à Cau-
 nelles. Annua; vix sesquiuncialis.
5. LYS. foliis orbiculatis, acuminatis, sessilibus; pedun- *Nemorum.*
 culis folio duplo longioribus, caule procumbente.
Lysimachia foliis ovatis acutis, floribus solitariis,
 caule procumbente. *Linn. sp. pl.* 148.
Anagallis lutea. Lob. Icon. 466.
Lysimachia humifusa, folio rotundiore acuminato,
 flore luteo. *Tour.* 142.
 HABITAT Monspelii, au-delà des Mateles & de Rou-
 quet ad lævam juxta rivulos; radix perennis. Cau-
 lis sæpè radices agit fibrosas.
6. LYS. foliis orbiculatis obtusis subpetiolatis, pedun- *Nummularia*
 culis longitudine foliorum, caule repente...
Lysimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule
 repente. *Linn. sp. pl.* 148. *Sauv.* 134.
Nummularia major lutea. Bot. Mons. 187.
Lysimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo.
Tour. 141.
L'herbe aux écus ou la nummulaire.
 HABITAT Monspelii, à Castelnau, le long du Lés, à
 Luttes. Radix perennis.
7. LYS. foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio lon- *Tenella.*
 gioribus, caule repente. *Linn. sp. pl.* 148.
Lysimachia foliis orbiculatis planis, floribus solitariis
 rubellis. *Sauv.* 135.

Nummularia minor purpurascente flore. *Bot. Mons.*
187.

Lysimachia humifusa rotundiore folio, flore purpu-
rascente. *Tour.* 141.

HABITAT Monspelii cum priori; folia vix pisi latitu-
dinem adæquant. Radix perennis.

A N A G A L L I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 150.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa
tetragona. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima.
Flor. axillaris solitaria pedunculata.
Fulcr. nulla.

Arvensis. 1. ANAG. foliis indivisis, caule procumbente. *Linn. sp.*
pl. 148. *Sauv.* 135.

Anagallis phænicio flore. *Bot. Mons.* 17. *Tour.* 142.

2. Anagallis cæruleo flore. *Bot. Mons.* 17. *Tour.* 142.
Le Mouron; vernaculè *Mourillous*.

HABITAT Monspelii ubique, præsertim in agris circa
lucum Gramuntium. Annua. Pedunculi foliis sub-
æquales. Petala crenulata. Filamenta villosa; foliola
calycis carinata.

P L U M B A G O.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 176.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres
striata ramosa. *Fol.* alterna simplex integerrima
amplexicaulis. *Flor.* terminalis spicata vel
congesta. *Fulcr.* glandulæ pedicellatæ suprà
calyces.

Europæa. 1. PLUM. foliis ovatis ciliatis, floribus congestis, stami-
nibus exclusis.

Plumbago foliis amplexicaulibus. *Linn. sp. pl.* 151.
Sauv. 63.

Lepidium dentillaria dictum. *Bot. Mons.* 153.
Plumbago. *Tour.* 140.

La dentelaire ou malherbe.

HABITAT Monspelii ubique; altitudo bicubitalis; fo-
lia quandoque obverse-ovata; stamina extrà tubum;
radix perennis.

2. PLUM. foliis ovato-lanceolatis glabris basi attenuata tis, floribus spicatis, staminibus inclusis. *Zeylanica.*
Plumbago foliis lanceolatis. *Linn. sp. pl. 151.*
HOSPITATUR sub dio; semper virens & semper florens; & etiam hyeme in hybernaculo & caldario; semina maturans; pedalis diffusa, folia subtus pulverulenta.

CONVOLVULUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. plant. 157.*

Char. secund. *Rad.* tenuis fibrosa vel ramosa.

Caul. teres herbacea stricta. *Fol.* simplex integra vel pinnata. *Flor.* axillaris, pedunculata, pedunculis uni vel multifloris. *Fulcr.* saepius nulla; in quibusdam bracteæ binæ infrà calyces.

* *Caule volubili.*

1. CONV. foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis *Arvensis.* unifloris. *Linn. sp. pl. 153. Sauv. 100.*

Convolvulus minor arvensis. Bot. Mons. 74. Tour. 83.

Le petit liséron; vernaculè de Campanetes.

HABITAT Monspelii ubique; foliorum petioli breves; pedunculi foliis subæquales.

2. CONV. foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis *Sepium.* unifloris. *Linn. sp. pl. 153.*

Convolvulus major albus. Bot. Mons. 73. Tour. 82.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, Lattes, aux prés d'Arene; scandens, & late se extendens suprà arbores; pedunculi longitudine petiolorum; bracteæ geminæ cordatæ calycibus majores.

3. CONV. calycibus tuberculatis pilosis. *Linn. sp. pl. 154. Hederaceus.*

4. Convolvulus cæruleus hederaceo, angusto folio. *Tour. 84.*

HOSPITATUR sub dio; folia saepius 3loba, lobo intermedio majore acuminato; pedunculi petiolis duplo ferè breviores; bracteæ subulatæ.

4. CONV. foliis palmatis cordatis sericeis: lobis repandis, pedunculis bifloris. *Linn. sp. pl. 156. Althæoides.*

Convolvulus foliis cordato-digitatis sericeis, foliolis linearibus, intermediis. Sauv. 202.

Convolvulus peregrinus pulcher folio betonicæ. Bot. Mons. 74. Tour. 85.

Convolvulus betonicae folio argenteus, &c. Barr.
Icon. 312.

HABITAT ultrà montem Cetium in loco dicto *le Nazareth*; ibi florentem Aprili & Maio vidimus & versùs *Meze*.

* *Caule prostrato nec volubili.*

Gneorum. 5. CONV. foliis lanceolatis obtusis sericeis. Linn. sp.
pl. 157. Sauv. 56.

Convolvulus argenteus umbellatus erectus. Tour. 84.

β. CONVOLVULUS SPICÆFOLIUS ARGENTEUS REPENS. Tour. 84.

Convolvulus minor argenteus repens acaulis ferme.
Tour. 84.

Convolvulus minor spicæfolius hispanicus. Barr. Icon.
311.

HABITAT Monspelii ubique in sterilibus, à *Selleneuve*,
Montferrier, *Castelnau*. Flores subcapitati.

Cantabrica. 6. CONV. foliis linearis lanceolatis acutis, caule ramoso
recto, pedunculis bifloris. Sauv. 156. Linn. sp. pl.
158.

Convolvulus linariæ folio. Tour. 84.

Convolvulus minimus spicæfolius, vel stæchadi ci-
trinæ aut linariæ folio. Bot. Mons. 741.

HABITAT Monspelii, passim-priori vulgatior; pedun-
culi foliis quadruplo longiores; altitudinem sesqui-
pedalem attingit.

Tricolor. 7. CONV. foliis lanceolato-ovatis glabris, caule decli-
nato, floribus solitariis. Linn. sp. pl. 158.

Convolvulus lusitanicus flore cyaneo. Tour. 83. Sauv.
65.

Convolvulus azureus longifolius, niveo umbilico.
Bocc. mus. 76. Barr. Icon. 321. & 322.

HOSPITATUR sub dio; annuus; caulis interdum ru-
bens uti & nervi foliorum subtus; pedunculi foliis
longiores.

8. CONV. foliis reniformibus, pedunculis unifloris.
Linn. sp. pl. 159.

Convolvulus maritimus nostras rotundi-folius. Tour.
83.

Soldanella sive brassica marina. Lob. Icon. 602.

HABITAT Monspelii in maritimis; bractææ calycibus
majores cordataæ binæ.

I P O M E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 158.

Char. secund. *Rad.* ramosa teres. *Caul.* herbacea volubilis striata angulata. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima integra, vel incisa. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis uni vel multifloris. *Fulcr.* nulla.

1. IPOM. foliis pinnatifidis linearibus, floribus solitariis. *Quamoclit.*
Linn. sp. pl. 159.

Convolvulus pennatus exoticus rarer. *Bauh. Pin.* 398.

Convolvulus pennato folio gelsemini flore quamoclit foliis tenuiter incisis & pennatis. *Tour.* 116.

HOSPITATUR in caldario; annua; variat pedunculis multifloris.

2. IPOM. foliis cordatis acuminatis basi angulatis, pedunculis multifloris. *Linn. sp. pl. 160.* *Coccinea.*

Ipomea foliis cordatis integerrimis, limbo floris quinquefido. *Sauv.* 114.

Quamoclit americana foliis amplissimis angulatis. *Tour.* 116.

HOSPITATUR sub dio; pedunculi foliis multo longiores.

3. IPOM. foliis cordatis integerrimis, floribus confertis, corollis indivisis. *Sauv.* 114. *Linn. sp. pl. 161.*

Quamoclit foliis amplissimis cordiformibus. *Tour.* 116.

HOSPITATUR sub dio; in hortis apud nos colitur; facta indigena.

4. IPOM. foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. *Triloba.*
Linn. sp. pl. 161.

HOSPITATUR sub dio; annua.

P O L E M O N I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 159. Adde filamenta duo longiora, tria breviora.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea striata erecta simplex. *Fol.* alterna sessilis imparipinnata, foliolis integerrimis. *Flor.* terminalis ramosa racemosa. *Fulcr.* nulla.

1. POL. calycibus corollæ tubo longioribus. *Linn. sp. Caruleum.*
pl. 162.

Polemonium vulgare cæruleum. Tour. 146. & al-
bum polemonium foliis ensiformibus. Sauv. 220.
La Valeriane grecque.

HOSPITATUR sub dio. & in caldariæ. Perenne. Cau-
 lis sesqui-pedalis. Pedunculi plurimi terminales,
 multiflori, alterni; pistillum staminibus longius;
 stamina longitudine corollæ; florens Maïo &
 Junio.

C A M P A N U L A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 161.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea, teres
 vel angulata, nunc simplex aut ramosa aut
 dichotoma. *Fol.* simplex integerrima, alterna
 vel opposita, petiolata aut sessilis; vel etiam
 inferior petiolata; superior sessilis. *Flor.* termi-
 nalis spicata racemosa paniculata vel axil-
 laris conglomerata. *Fulcr.* glandulæ ad mar-
 gines foliorum; bracteæ ad basim peduncu-
 lorum solitariæ.

* *Foliis lævioribus angustioribus.*

Rotundifolia. 1. CAMP. foliis radicalibus reniformibus, caulinis linea-
 ribus. *Linn. sp. pl. 163.*

Campanula foliis linearibus integerrimis, floribus
 terminalibus, caule erecto simplici. *Sauv. 65.*

Campanula alpina linifolia cærulea. *Bot. Mons. 47.*
Icon. 46. Tom. III.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Tour. 111.*
 & alpina. 112.

HABITAT Monspelii, au Mont St. Loup, à l'Es-
 perou. Folia omnia alterna.

Rapunculus. 2. CAMP. foliis undulatis radicalibus lanceolato-ovali-
 bus panicula coarctata. *Linn. sp. pl. 164.*

Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus,
 caulis reflexis. *Sauv. 65.*

Rapunculus esculentus. *Bot. Mons. 220.*

Campanula radice esculenta, flore cæruleo. *Tour. 111.*
 vernaculè, de Repooinchous.

HABITAT Monspelii ubique circa Boutonnet, Castelnau.

Persicifolia. 3. CAMP. foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceo-
 lato-

lato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Linn.*
sp. pl. p. 164.

Campanula foliis linearibus serratis, floribus diffitis
 longe petiolatis. *Sauv. 56.*

Rapunculus persicifolius magno flore. *Bot. Mons. 220.*

Campanula persicifolia. *Tour. 111.*

HOSPITATUR sub dio; perennis; in hortis colitur.
 Floret æstate. Folia omnia alterna.

4. CAMP. foliis ovatis glabris subserratis, caule erecto *Pyramidalis*.
 paniculato, ramulis brevibus. *Linn. sp. pl. p. 164.*
Sauv. 106. n°. 156.

Campanula pyramidalis altissima. *Tour. 109.*

Campanula lactescens fœtidior. *Clus. Hist. CLXXII.*

La Pyramide, vernaculè *la Pyramidale*.

HOSPITATUR in hybernaculo; altitudo humana, &
 altior. Folia radicalia ovata vel cordata petiolata,
 inferiora ovata vel ovato-lanceolata subsessilia. Flo-
 rens autumno & hyeme,

** *Foliis scabris latioribus.*

5. CAMP. caule angulato foliis petiolatis, calycibus *Trachelium*.
 ciliatis, pedunculis trifidis. *Linn. sp. pl. 166.*

Cervicaria major. *Dod. Pempt. 164.*

Campanula vulgatior foliis urticæ, vel major & af-
 perior. *Bot. Mons. 45. Tour. 109.*

HABITAT Monspelii à l'Esperou, à St. Guillin le
 Desert, au Capouladou. Folia alterna petiolata.

HOSPITATUR in frigidario.

6. CAMP. caule angulato simplici, floribus sessilibus
 capitulo terminali. *Linn. sp. pl. p. 166.* *Glomerata*.

Campanula pratensis flore conglomerato. *Bot. Mons.*
45. Tour. 110.

Rapunculus calyculatus. *Barr. Icon. 523. n°. 3.*

HABITAT Monspelii, au Bois de Valene & à Prades.

Ipsam vidi à Lamalou variantem caule tereti, foliis
 omnibus cordatis obtusis; floribusque solitariis axil-
 laribus sessilibus, capitulo terminali. In horto culta,
 folia caulina, inferiora petiolata, summa sessilia,
 acuminata vel obtusa.

HOSPITATUR in frigidario.

7. CAMP. capitulis quinque locularibus tectis, calycis si-
 nubus reflexis. *Linn. sp. pl. 167.* *Medium*.

Campanula calycibus à tergo lamellis quinque notatis. Sauv. 65.

Campanula foliis obtusis serratis hispidis, floribus in fauce lanuginosis. Sauv. 64.

Campanula floribus echii, floribus villosis. Bot. Mons. 45. Tour. 110.

HABITAT cum priori.

HOSPITATUR in frigidario.

* *Caule sub-diviso.*

Canariensis. 8. CAMP. foliis hastatis dentatis oppositis petiolatis, capsulis quinquelocularibus. Linn. sp. pl. 168.

Campanula Canariensis atriplicis folio, tuberosa radice. Tour. 109.

HOSPITATUR in caldario; *caulis* fistulosus glaucus teres brachiatus; *folia* denticulis alternis minoribus. *Petoli* foliis dimidio breviores. *Rami* axillares patentibus. *Flores* ex dichotomia, solitarii pedunculo brevi. *Corollarum* laciniæ denticulatae; *stamina* pistillis breviora. *Pistillum* longitudine corollæ; autumno germinat plantis vicinis intricata; *florens* hyeme. *Folia* omnia primo vere decidunt. *Radix* perennis. Variat staminibus sex, corollis calycibusque sexfidis.

Speculum. 9. CAMP. caule diffuso ramosissimo, foliis oblongis subcrenatis; calycibus solitariis, corolla longioribus. Linn. sp. pl. 168. Capsulis prismaticis.

Campanula arvensis erecta. Tour. 112.

Onobrychis arvensis, seu Campanula arvensis erecta. Bot. Mons. 45.

HABITAT ubique Monspelii. *Radix* teres; *caulis* semipedalis; *flores* saepius terni, ramei terminales; *folia* omnia alterna sessilia.

Erinus. 10. CAMP. caule dichotomo, foliis sessilibus utrinque dentatis Linn. sp. pl. p. 169.

Campanula minor foliis incisis, annua. Tour. 112.

Rapunculus minor foliis incisis. Bot. Mons. 220.

HABITAT Monspelii ubique in satis.

Perfoliata. 11. CAMP. caule simplici, foliis cordatis amplexi-caulibus dentatis, floribus aggregatis sessilibus. Linn. sp. pl. p. 169.

Campanula pentagonia perfoliata. Tour. 112.

Rapunculum minimum rotundifolium verticillatum
flore purpuro-violaceo. Barr. icon. 1133.
HOSPITATUR in caldario. Annua.
Obs. Species nullæ apud nos semina maturant, ex-
ceptis 9^a. & 10^a.

PHYTEUMA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 162.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea sim-
plex teres. Fol. alterna sessilis simplex integer-
rima vel integra, vel inferior petiolata, su-
perior sessilis. Flor. terminalis, capitata vel
spicata. Fulc. glandulæ ad margines foliorum.
Nota. Facie propriâ solo tubo corollæ longissimo
à campanulis dignoscitur.

1. PHYT. capitulo sub-rotundo, foliis linearibus inte- *Hemisphaerica*
gerrimis. Linn. sp. pl. p. 170.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. Sauv. 50.

Rapunculus montanus gramineus corniculatus. Barr.
Icon. 523. n°. 3.

Rapuntium folio gramineo. Tour. 113.

HABITAT à l'Esperou.

HOSPITATUR in frigidario.

2. PHYT. capitulo sub-rotundo, foliis serratis, radica- *Orbiculares*
libus cordatis. Linn. sp. pl. 170.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. Tour. 113.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. Sauv. 51.

Rapunculus corniculatus cæruleus minor. Barr. Icon.
524. & 525.

HABITAT cum priori. Vidi prope Villemagne & Val-
magne variantem foliis caulinis inferioribus, cor-
datis, petiolatis, profunde incisis, superioribus
sessilibus ovatis sessilibus.

3. PHYT. spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis *spicata*
radicalibus cordatis. Linn. sp. pl. 171.

Rapunculus spicatus sive comosus cæruleus. Bot. Mons.
220. Tour. 113. & albus.

Rapunculum alopecurum flore albo Italicum. Barr.
Icon. 892.

La Raiponce.

HABITAT Monspelii cum prioribus, & à St. Guillin
le Desert.

- Comosa.* 4. PHYT. fasciculo terminali sessili, foliis dentatis; radicalibus cordatis. *Linn. sp. pl. p. 171.*
Rapunculus alpinus corniculatus. Tour. 113.
Trachelium minus petræum ponæ. Barr. Icon. 889.
HABITAT copiosè in declivibus, circa Villemagne & Fougere.

T R A C H E L I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 163.*

Char. sec. *Rad. ramosa. Caul. herbacea teres sub-simplex. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. paniculato-corymbosa terminalis. Fulc. nulla.*

- Azureum.* 1. TRA. foliis ovatis serratis, corymbis compositis. *Linn. virid. Cliff. 17.*

Trachelium azureum. Linn. sp. pl. p. 171. Tour. 130. Sauv. 173.

Valeriana cærulea urticæfolia. Barr. Icon. 683.

HOSPITATUR sub diò. Perennis; semina maturans.

S A M O L U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 172.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. herbacea teres simplex. Fol. alterna sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.*

- Valerande.* 1. SAM. *Linn. sp. pl. pag. 171. Sauv. 65. Tour. 143.*
Anagallis aquatica folio rotundo non crenato. Bot. Mons. 18.

Anagallis aquatica tertia. Lob. Icon. 466.

Le Mouron d'eau; vernaculè, lou Panfourmen.

HABITAT Monspelii, à Lattes, à Castelnau, à Selle-neuve ad aquas. Pedunculi laterales folium unicum gerunt ovatum; terminalis nudus; variat radice simplici tenuiori.

C O F F E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 169.*

Char. sec. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. . . . Fulcr. . . .*

- Arabica.* 1. COF. *Linn. sp. pl. pag. 172.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 101

Le Caffé; vernaculè *lou Caffé*.

HOSPITATUR in caldario; semper virens. Nondum floruit.

LONICERA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 174.

Char. sec. Rad. lignosa. Caul. fruticosa volubilis vel erecta. Fol. opposita, sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris vel terminalis, capitata vel verticillata, pedunculata vel sessilis. Fulc. nulla.

* *Periclymena caule volubili.*

1. LON. floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. Linn. sp. pl. pag. 173. Sauv. 139.

Periclymenum perfoliatum. Bot. Mons. 201.

Caprifolium italicum. Tour. 608.

Chevre-feuille.

HABITAT Monspelii ubique, à Castelnau, Gramont, &c.

2. LON. capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. Linn. pag. 173. Sauv. 139. *Periclymenum*.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. Bot. Mons. 200.

Caprifolium germanicum. Tour. 608.

Vernaculè utraque, *Herbe de Pantacouste*.

HABITAT cum priori.

* *Chamæcerasà pedunculis bifloris.*

3. LON. pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. Linn. sp. pl. pag. 174. *Xylosteum*.
Sauv. 140.

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro.
Tour. 609.

Caprifolium erectum minus xylostei Dodonæi species.
Barr. Icon. 511.

HOSPITATUR sub dio.

HABITAT à l'Esperou, à Villemagne, à Fougeres, à Meyrueis. Folia ferrulata. Variat foliis ramorum alternis.

4. LON. pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis. Linn. sp. pl. p. 174. *Alpigena*.

Chamæcerasus alpigena. Lob. Icon. 173.

Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis acutis integris. Sauv. 140.

Chamæcerasus alpina, fructu rubro gemino punctis duobus notato. Tour. 609.

HABITAT cum priori.

MIRABILIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 175.

Char. sec. *Rad. carnosa rapacea. Caul. herbacea dichotoma teres. Fol. opposita simplex integerima, inferior petiolata, floralis sessilis. Flor. axillaris aggregata. Fulc. nulla.*

Jalappa. 1. MIRAB. corollarum laciniis obtusis emarginatis tubis brevibus.

Mirabilis. Linn. sp. pl. p. 177.

Jalappa. Tour. 130.

La Belle de nuit; vernaculè Belle de nuit.

2. Mirabilis corollarum laciniis acuminatis bifidis tubis longissimis.

Jalappa fructu rugoso. Tour. 178.

Le vrai Jalap.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis.

CORIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 183.

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. subfruticosa. Fol. sparsa sessilis simplex integerima.*

Flor. terminalis spicata. Fulcr. acu ei suprà calyces; 2^o. glandulæ infrà denticulos calycis.

Monspeliensis. 1. CORIS.

Coris. Linn. sp. pl. 177. Sauv. 46.

Coris cærulea maritima. Bot. Mons. 78. Tour. 652.

HABITAT Monspelii ad mare à Selleneuve & auprès de Monferrier, à droite, au Martinet de Mr. Boulet, ibi in pinetis.

HOSPITATUR sub dio. Plantula palmaris fruticosa perennis; folia linearia ciliata. Vidi annuam circa la Verune à droite.

V E R B A S C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 182.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres vel angulata, simplex vel ramosa. *Fol.* sparsa simplex integra sessilis, nunc inferior petiolata, superior sessilis, nunc decurrentis aut amplexicaulis. *Flor.* terminalis spicata vel axillaris sessilis. *Fulcr.* bracteæ in spicis foliaceæ.

1. VERB. foliis decurrentibus utrinque tomentosis. *Linn.* *Thapsus.*

sp. pl. 177. Spica indivisa. *Sauv.* 65.

Verbasum flore luteo magno; folio maximo. *Bot.*
Mons. 274.

Verbasum mas latifolium luteum. *Tour.* 146.

Le Bouillon blanc, vernaculè.

HABITAT Monspelii, à *Lattes*, *Castelnau*.

2. VERB. foliis cuneiformibus oblongis. *Linn.* *sp. pl.* *Lychnitis.*
177.

Verbasum pulverulentum flore luteo parvo. *Bot.*
Mons. 274. *Tour.* 147.

Verbasum foliis lanceolatis crispis crenatis incanis racemo terminali. *Sauv.* 66 & 105.

HABITAT Monspelii, au-delà de *Selleneuve* & à *Lattes*.

3. VERB. foliis cordato-oblongis petiolatis. *Linn.* *sp. Nigrum.*
pl. 178.

Verbasum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis caule angulato. *L. Sauv.* 65. & 104.

Verbasum nigrum flore ex luteo purpurascente. *Bot.*
Mons. 178. *Tour.* 147.

HABITAT Monspelii circà *Rouquet*, *Valene*. Caulis rubens.

4. VERB. foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis axillaribus solitariis. *Linn.* *sp. pl.* 178. *Blattaria.*

Blattaria lutea folio longo laciniato. *Bot.* *Mons.* 38.
Tour. 147.

Verbasum foliis glabris serrato-dentatis radicalibus sinuatis. *Sauv.* 105.

HABITAT Monspelii circà *la Peissine*; ad basim foliorum lineæ duæ elevatæ decurrent in caulem.

5. VERB. foliis radicalibus oblongis sinuatis undulatis. *Sinuatus.*

tomentosis, caulinis cordatis amplexicaulibus nudiusculis. *Linn. sp. pl.* 178.

Verbascum foliis pinnato-sinuatis hirsutis subtus tomentosis. *Sauv.* 276.

Verbascum nigrum folio papaveris corniculati. *Bot. Mons.* 274. *Tour.* 147.

Verbascum foliis radicalibus pinnatifido-repandis tomentosis; caulinis rameis primis oppositis amplexicaulibus. *Linn. Syst. nat.* pag. 931.

HABITAT Monspelii ubique.

D A T U R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 177.

C. ar. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea angulata. *Fol.* geminata petiolata simplex integra.

Flor. solitaria pedunculata interfoliacea. *Fulcr.* spinæ supra capsulas.

Stramonium. 1. DAT. pericarpiis spinosis erectis ovatis. *Linn. sp. pl.* 179. *Sauv.* 100. & 274.

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Bot. Mons.* 243.

Stramonium sativum pomo spinoso oblongo & violaceo. *Tour.* 118.

L'endormie; vernaculē l'herbe de las taoipas.

HABITAT Monspelii versus *Viols*, *Grabels*, *Vic*, *Bouzignes*, corollæ longiores quam in omnibus.

Ferox. 2. DAT. pericarpiis spinosis erectis: spinis summis marginibus conniventibus. *Linn. Syst. nat.* 932. *A. Anenit. acad. tom. III.* pag. 403.

Stramonium longioribus aculeis. *Barr. Icon.* 1112.

Stramonium ferox. *Bjcc. Sicil.* 50. *Tour.* 119.

La pomme épineuse.

HOSPITATUR sub dio; pedunculus calyx & corolla vix biunciale obtinent longitudinem.

Mel. 3. DAT. pericarpiis spinosis nutantibus globosis. *Linn. sp.* 179. *Sauv.* 100. & 275.

Stramonium pomo spinoso rotundo, longo flore albo simplici. *Tour.* 118.

Stramonium peregrinum. *Lob. Icon.* 264.

HOSPITATUR sub dio.

HABITAT cum priori.

Obs. in singulis speciebus prodeunt pedunculi pluri-
mi è divisione caulis & ramorum.

H Y O S C Y A M U S.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 178.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea
teres simplex. *Fol.* alterna patens simplex in-
tegerrima, sessilis aut petiolata. *Flor.* axillaris
solitaria secunda, sessilis vel petiolata. *Fulc.* . . .

1. HYOS. foliis amplexicaulibus. *Linn. sp. pl.* 179. *Niger.*
Hyoscyamus vulgaris & niger. Bot. Mons. 134. *Tour.*
118.

La jusquiamo, vernaculè *la careillade*, sed imprèpriè.

HABITAT Monspelii à *Lattes*, à *Castelnau*.

2. HYOS. foliis petiolatis floribus sessilibus. *Linn.* 180. *Albus.*
Sauv. 275.

Hyoscyamus albus major. Bot. Mons. 134. *Tour.* 118.

Vernaculè *la careillade*.

HABITAT ubique; priori frequentior; folia attenuata
ad basim in petiolum. Calyces striis elevatis.

3. HYOS. foliis petiolatis, floribus pedunculatis. *Linn. Aureus.*
sp. pl. 180.

Hyoscyamus creticus luteus major. Bot. Mons. 134.
Tour. 118.

HABITAT Monspelii, au-delà de *Boutounet* & de
Castelnau, rara hodie apud nos.

N I C O T I A N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 179. Adde lacinia
una calycis sæpius longior.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres.
Fol. alterna simplex integerrima decurrens vel
petiolata. *Flor.* terminalis simplex, racemosa vel
paniculata. *Fulc.* nulla.

1. NIC. foliis decurrentibus, lanceolatis. . . *Tabacum.*

Sana sancta Indorum. *Lob. Icon.* 584.

Nicotiana major latifolia. Tour. 117.

Nicotiana foliis lanceolatis. Linn. sp. pl. 180. *Sauv.*
104.

Le tabac; vernaculè *lou tabac*.

HOSPITATUR sub dio; annua. Folia ferè omnia am-

plexicaulia; altitudo humana. Corollæ roseæ.

Rustica. 2. NIC. foliis ovatis petiolatis floribus sub-capitatis.

Nicotiana foliis ovatis. *Linn. sp. 180. Sauv. 100.*

Sana sancta minima. *Lob. Icon. 584.*

Nicotiana minor. *Tour. 117.*

La priapée.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Vix pedalis. Corolla viridis vel flavescens; tubo calycibus duplo longiore.

Paniculata. 3. NIC. foliis cordatis floribus paniculatis, tubis clavatis.

Linn. sp. pl. 180.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Bipedalis. Folia petiolata. Corollæ virides; tubo longissimo.

Glutinosa. 4. NIC. foliis cordatis petiolatis, floribus racemosis secundis.

Nicotiana foliis cordatis, corollis racemosis subrungentibus; calycibus inæqualibus. *Linn. sp. pl. 181.*

Tabacum sive herba sancta minor. *Lob. Icon. 584.*

HOSPITATUR sub dio. Annua, altitudo nicotianæ primæ. Corollæ roseæ.

A T R O P A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 180. & 181.

Char. secund. Rad. fibrosa vel napiformis, simplex aut geminata. Caul. herbacea foliosa aut scaposa, teres aut angulata. Fol. petiolata sim-

plex integra vel integerrima; nunc radicalis, nunc caulina alterna solitaria, vel geminata inæqualis. Flor. solitaria pedunculata, nunc radicalis, nunc caulina interfoliacea aut laterifolia.

Fulcr. nulla.


Humifusa. 1. ATROPA foliis geminatis, calycibus policarpis caule humifuso.

HOSPITATUR sub dio; semper virens & florens toto anno; hyeme in caldario apricatur.

Humifusa valde ramosa; folia geminata (altero breviore) per petiolum decurrentia ciliata carnosa. integerrima; pedunculi uniflori interfoliacei. Calix quinquangularis, quinquefidus, laciniis duabus tribusve saepius coalitis. Corolla campanulata nec lobata cinerea venis cærulecentibus picta. Stamina cærulecentia villosissima. Baccæ tres quatuor vel



ATROPA humifusa pag. 106.
A - calyx et Semina 5
B - corolla



quinque monospermæ, in quolibet calice. *Pedunculi* fructiferi folio majore longiores, floriferi ipso met folio breviores... Cuinam ipsa debeatur nescimus. Missa fuerat pro atropa physalode.

2. ATR. foliis ovatis radicalibus, scapis unifloris. *Mandragora.*
Mandragora. *Linn. sp. pl. p. 181. Sauv. 14.*

Atropa acaulis. Linn. Syst. nat. pag. 933.
Mandragora fructu rotundo. Tour. 76.

La Mandragore.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Folia semi-pedalia in petiolum decurrentia.

3. ATR. foliis geminatis, calycibus monocarpis, caule *Belladonna.* erecto.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris. Linn.
sp. p. 181. Sauv. 104.

Solanum lethale. Bot. Mons. 243.

Belladonna majoribus foliis & floribus. Tour. 77.

La Belladone.

HABITAT Monspelii. *Au Puy de St. Loup, au Capou-ladou.* Corollæ ferrugineæ. Folia integerrima ovata. Caulis & rami teretes.

4. ATR. foliis solitariis.

Physalodes.

Atropa foliis sinuato-angulatis, calycibus clausis acutangulis. Linn. sp. pl. p. 181.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Vide egregiam Linnæi descriptionem sub suo nomine *sp. pl. 181.* Apud nos ad altitudinem humanam excrescit.

P H Y S A L I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 197.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres vel angulata. *Fol.* geminata inæqualis petiolata, simplex integra vel integerrima. *Flor.* interfoliacea solitaria vel aggregata, sessilis vel pendunculata. *Fulc.* nulla.

* Perennies.

1. PHYS. caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis. *Linn. pag. 182.* *Somnifera.*

Phy whole fruticoso tereti, foliis ovatis integerimis, floribus confertis. Sauv. 104.

Alkekengi fructu parvo verticillato. Tour. 151.

Solanum majus vesicarium coralloides. Barr. Icon. 149.
HOSPITATUR sub dio. Corollæ viridescentes vix calice
majores. Caulis tomento cinereo tectus. Folia apud nos geminata; flores subsessiles.

- Alkekengi.* 2. **PHYS.** floribus solitariis pedunculatis.
Physalis foliis geminis. Linn. sp. pl. p. 180. Sauv. 104.
Solanum vesicarium. Bot. Mons. 243.
Alkekengi officinarum. Tour. 131.
L'Alkekengi ou Coqueret.
HABITAT Monspelii, à Frontignan, Miraval. Vidi ipsam inter aquas Bellilucanas & Bouziques secus stagnum. Calix quinquedentatus.

* *Annuæ.*

- Pubescens.* 3. **PHYS.** ramosissima, foliis villosö-viscosis, pedunculis nutantibus. *Linn. sp. pl. p. 183.*
Alkekengi virginianum fructu luteo. Tour. 131.
Solanum annuum vesicarium procumbens. Barr. Icon. 152.
HOSPITATUR sub dio.

SOLANUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 196.

Char. secund. Rad. simplex tenuis, ramosa, tuberosa vel fibrosa. Caul. herbacea, flexuosa, vel fruticosa. Fol. alterna petiolata solitaria aut geminata, nunc simplex integra, nunc impari-pinnata, foliolis æqualibus & integerimis, vel inæqualibus & incisis. Flor. oppositifolia pedunculata, cymosa, racemosa, aut solitaria. Fulc. aculei in plurimis supra caulem folia & calyces.

* *Inermia.*

- Pseudo-cap.* 1. **SOL.** caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis, umbellis sessilibus. *Linn. 184. Sauv. 58.* Floribus solitariis. *Solanum fruticosum bacciferum. Tour. 149.*
HOSPITATUR sub dio. Caulis perennis glaber; folia (quandoque geminata) integerima; flores albi; bacca ovo passerino major rubra.
- Dultamora.* 2. **SOL.** caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Linn. sp. pl. 185.*

Solanum caule inermi, &c. *Sauv.* 103. 274.

Solanum scandens seu dulcamara. *Bot. Mons.* 243.

Tour. 149.

La Douce amere, ou Vigne de Judée; vernaculè, *la Loque*.

HABITAT Monspelii passim. Radix perennis.

3. SOL. caule inermi frutescente flexuoso, foliis oblongis lateribus sinuatis; racemis cymosis. *Linn. sp. pl.* 185. *Quercifolium.*

HOSPITATUR in hybernaculo.

4. SOL. caule frutescente subinermi, foliis cuneiformibus sinuato-repandis. *Linn. sp. pl.* 185. *Bonariense.*

Solanum Americanum arborescens amygdalifolio undulato, magno flore albo, fructu rubro. *Tour.* 150.

HOSPITATUR in hybernaculo; nunquam semina matutans.

5. SOL. foliis pinnatis, foliolis integerrimis: impari maximo. *Tuberosum.*

Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integrerrimis. *Linn. sp. pl.* 185. *Sauv.* 220.

Solanum tuberosum esculentum. *Tour.* 149.

Les Taupinambours; vernaculè, *Taupinambour*.

HABITAT Monspelii in hortis. Sponte provenit à l'*Espérone*, à *Villefranche*, &c. Altitudo pedalis vel sesquipedalis. Folia pinnata, foliolis 5. vel septem; petioli decurrent in caulem. Annum.

6. SOL. foliis interrupte-pinnatis, foliolis subæqualibus *Lycopersicon* incisis.

Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integris, racemis simplicibus. *Linn. sp. pl.* 185.

Lycopersicon Galeni. *Tour.* 150.

Solanum caule inermi, &c. *Sauv.* 246.

Les Pommes d'amour.

HOSPITATUR sub dio. Annum.

7. SOL. caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. *Linn. sp. pl.* 186. *Nigrum.*
Sauv. 103.

Solanum officinarum baccis rubris, *Bot. Mons.* 243. & nigris. *Ibid.* 148.

La Morelle; vernaculè, *la Mourela*.

HABITAT Monspelii ubique. Folia geminata; variat foliis solitariis, pedunculisque unifloris.

** *Spinosa.*

- Melongena.* 8. SOL. caule inermi herbaceo, foliis ovatis, tomentosis, nigris; calycibus spinosis. *Linn. sp. pl.* 186. *Sauv.* 103. Et fructu pendulo. *Linn. Syst. nat.* 934.
Melongena. *Tour.* 151.
Melanazana seu *Melongena.* *Barr. Icon.* n°. 9.
 8. Malum Æthiopicum fructu luteo. *Barr. Icon.* 30.
La Mayenne, ou *Aubergine*; vernaculè, *Aoubergina*, ou *Vienuse*.
 HABITAT in hortis. Apricatur.
- Mammosum.* 9. SOL. caule aculeato herbaceo, foliis cordatis quinquelobis utrinque villosis aculeatis. *Linn. sp. pl.* 187. Foliis angulato-lobatis utrinque villosis, sparse aculeatis. *Linn. Syst. nat.* 934.
Solanum Americanum molle, foliorum margine & aculeis flavescentibus, fructu mammoso. *Tour.* 149.
 HOSPITATUR sub dio.
- Indicum.* 10. SOL. caule aculeato fruticoso, foliis angulatis tomentosis integerrimis, aculeis utrinque rectis, calycibus inermibus. *Linn. sp. pl.* 187.
Solanum Indicum spinosum, flore borraginis. *Tour.* 148.
Solanum caule & foliis cuneiformibus, angulatis, subvillosis, integerrimis, aculeis, &c. *Linn. Syst. nat.* 935.
 HOSPITATUR in caldario, sempervirens.
- Sodomeum.* 11. SOL. caule aculeis recurvis, foliis sinuatis, subtus tomentosis, utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Linn. sp. pl.* 188.
Solanum pomiferum frutescens, Africænum, spinosum, nigricans; borraginis flore, foliis profundè laciniatis. *Tour. inst.* 149.
Solanum caule aculeato fruticoso, foliis obovatis, pinnatifido-sinuatis, obtusis, &c. *Linn. Syst. nat.* 935.
 HOSPITATUR in caldario. Frutex sempervirens.
- Tomentosum.* 12. SOL. caule aculeato fruticoso, foliis villosis cordatis, margine crenatis, calycibus inermibus. *Linn. sp. pl.* 188.
Solanum (pulverulentum) caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis, foliis cordatis, inermibus, subrepandis; tenellis purpureo-pulverulentis. *Linn. Syst. nat.* 935.

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens, frutex.

13. SOL. caule aculeato fruticoso, foliis lanceolatis angulato-dentatis. *Linn. sp. pl. 188.* Bahamense.

Solanum spiniferum frutescens, spinis igneis Americanum. *P. Tour. 149.*

Solanum, &c. foliis lanceolatis subangulatis, costa spinosis. *Linn. Syst. nat. 935.*

HOSPITATUR in caldario. Frutex.

C A P S I C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 195.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea. vel fruticosa angulata. Fol. alterna, .geminata, petiolata, simplex, integerrima. Flor. oppositifolia, pedunculata, solitaria. Fulc. nulla.

1. CAPS. caule herbaceo. *Linn. sp. pl. 188.* Pedunculis solitariis. *Linn. Syst. nat. 935.* Annuum.

Capsicum siliquis recurvis propendentibus. *Tour. 152.*

Capsicum caule herbaceo. *Sauv. 103.*

Le Corail des jardins, ou Poivre de Guinée; vernaculè de Courals.

HABITAT Monspelii ubique in hortis. Pedunculi sæpius bini.

2. CAPS. caule fruticoso. *Linn. sp. pl. 189.* *Sauv. 104.* Frutescens.

Pedunculis geminis. *Linn. Syst. nat. 935.*

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens. Folia duplo minora quam in priori; folia quandoque solitaria; pedunculi solitarii vel bini.

Obs. Genera solanorum, atropæ, physalidum & capsici multum affinia & à facie propria difficile distinguenda tum ob obliquam foliorum circumscriptiōnem, vel etiam situm pedunculorum ad latus foliorum, vel ipsis oppositionem.

L Y C I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 187.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa, Fol. sessilis alterna simplex integerrima. Flor. axillaris, solitaria. Fulc. aculei axillares.

1. LYC. foliis cuneiformibus. *Linn. sp. pl. 192.* *Sauv. 56.* Europæum.

Rhamnus cortice albo Monspeliensis. *Bot. Mons. 221.*

Vernaculè, lous Arnives; la Granete d'Avignon.
HABITAT Monspelii ad margines fatorum & vinearum,
Floret etiam autumno.

R H A M N U S.

Char. prim. Vid Linn. gen. pl. 184.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.*
alterna petiolata simplex integra vel integer-
rima. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata; pe-
dunculis uni vel multifloris. *Fulc.* nulla; vel acu-
lei, vel spinæ laterifoliæ simplices vel termi-
nales.

* *Inermes.*

Frangula. 1. RHAM. floribus monogynis hermaphroditis, foliis
integerimis. *Linn. sp. pl. 193.*

Alnus nigra baccifera. *Bot. Mons. 290.*

Frangula. *Tour. 612.*

HABITAT Monspelii in sylvâ *Valene*, ubi variat foliis
minutissimè serratis.

** *Spinosi.*

Alaternus. 2. RHAM. spinis geminis deciduis, foliis lanceolatis ser-
rato-spinosis.

Rhamnus inermis, floribus dioicis, stigmate triplici.
Linn. sp. pl. 193. Sauv. 95.

Phylica elatior. *Bot. Mons. 203.*

Alaternus. *Tour. 595.*

L'Alaterne, Bourgespine; vernaculè, *l'Alader.*

HABITAT Monspelii ad mare, in luco Gramuntio, &
à *Valene*. Spinæ duæ æquales minimæ nigræ utrin-
que ad latus foliorum erectæ, autumno deciduæ.

Catharticus. 3. RHAM. spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioi-
cis. *Linn. sp. pl. 193.*

Rhamnus catharticus. *Bot. Mons. 222. Tour. 593.*

Le N'rprun.

HABITAT Monspelii ad dextram & ad lævam secus
amnem, à *Salazon*, & ultra lucum Gramuntium.

*** *Aculeati.*

Paliurus. 4. RHAM. aculeis geminis inæqualibus, foliis trinerviis
subserratis, pedunculis solitariis, fructibus margine
membranaceo, clypeiformibus.

Rhamnus

Rhamnus aculeis geminatis, inferiore reflexo, floribus trigynis. *Linn. sp. pl.* 194. *Sauv.* 306.

Rhamnus sive paliurus folio jujubino. *Bot. Mons.* 221. Paliurus. *Tour.* 616.

Le Paliure; vernacule fructus dicuntur *lous Capelets*.

HABITAT Monspelii, à la Mouson, Selleneuve, Gramont, &c.

1. RHAM, aculeis geminis subæqualibus, foliis oblique ovatis trinerviis serratis, pedunculis confertis, fructibus ovatis. *Zizyphus.*

Rhamnus aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Linn. sp. pl.* 194. *Sauv.* 59.

Zizypha sylvestris & sativa. *Bot. Mons.* 283.

Zizyphus. *Tour.* 627.

Le Jujubier; vernaculè, *lou Guindoulier*.

HABITAT Monspelii ubique in hortis & agris.

EVONYMUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. axillaris multiplex pedunculata sub-dichotoma. Ful. nulla.

1. EVON. foliis obtuse serratis, capsularum angulis *Europaeus*. obtusis.

Evonymus floribus plerisque quadrifidis. *Linn. sp.* 197.

Evonymus vulgaris, granis rubentibus. *Bot. Mons.* 93. Tenuifolius. *Tour.* 617.

2. Evonymus foliis acute & argute serratis, capsularum angulis acutis membranaceis. *Latifolius*.

Evonymus latifolius. *Tour.* 617.

Le Fusain, ou Bonnet de Prêtre.

HABITAT Monspelii, frequens juxta Ledum amnem.

Obs. *Tenuifolii* pedunculi multiflori virides; folia sèpè integriforma; *latifolii* pedunculi biflori triflorive, rubentes longissimi; capsulæ duplo majores quàm in priori.

DIOSMA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 206.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. 17

Flor.... Fulc....

Rubra. 1. DIOS. foliis linearibus acutis glabris, subtus bifariam punctatis. *Linn. sp. pl.* 198.

Diosma foliis linearibus mucronatis glabris carinatis, &c. *Linn. Syst. nat.* 930.

HOSPITATUR in caldario. Fruticosa sempervirens. Hanc elegantissimam plantulam ex horro Parisino attulerat Franciscus Imbert, Universitatis Cancellarius. Periit primo anno.

R I B E S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 202.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex lobata. *Flor.* racemosa axillaris, vel solitaria. *Fulg.* aculei in caule, bracteæ infra flores.

* *Ribesia inermia.*

Rubrum. 1. RIB. inerme racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Linn. sp. pl.* p. 200.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *L. Sauv.* 210.

Grossularia multiplici acino, seu non spinosa hortensis, sive Ribes Officinarum. *Tour.* 639.

Le Groselier; vernaculè *lou Grouselier.*

HOSPITATUR sub dio. In hortis colitur.

Alpinum. 2. RIB. inerme racemis erectis, bracteis flore longioribus. *Linn. sp. pl.* p. 200.

Ribes inerme floribus planiusculis racemis erectis. *Sauv.* 210.

Grossularia non spinosa. *Bot. Mons.* 123.

Grossularia vulgaris fructu dulci. *Tour.* 640.

HABITAT Monspelii, *au nord du mont St. Loup.*

Nigrum. 3. RIB. inerme racemis pilosis, floribus oblongis. *Linn. sp. pl.* p. 201. *Sauv.* 210.

Ribes inerme floribus oblongis monogynis. *Sauv.* 210.

Glossularia non spinosa fructu nigro. *Tour.* 640.

Le Cassier ou Cassis; vernaculè *lou Cassi.*

HABITAT Monspelii, à Prades ad dexteram, & à Meyrueis.

* * *Grossulariæ aculeatæ.*

Uva crispa. 4. RIB. racemis aculeatis, baccis glabris, petioli bractea monophylla. *Linn. sp. pl.* p. 201.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 115

Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Sauv.* 210.
Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris. Bot.
Mons. 123. *Tour.* 639.

Le Bluët.

HABITAT Monspelii ubique. Aculei tres longi ad basim petiolorum; bractea infra calycem simplex; caulis undique aculeatus; folia triloba vel quinqueloba; flores saepe bini.

H E D E R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 200.

Char. sec. Rad. lignosa horizontalis. Caul. volubilis fruticosa. Fol. alterna petiolata, nunc simplex integerrima, nunc digitato-quinata. Flor. terminalis glomerato-racemosa. Fuci. cirrus oppositifolius ramosus.

1. HED. foliis ovatis lobatisque. *Linn. sp. pl. p. 202.*

Helix.

Hedera arborea. Tour. 613.

Hedera corymbosa communis. Bot. Mons. 124.

Le Lierre ordinaire; vernaculè, l'Eure.

HABITAT ubique; arboribus & parietibus adhærens, semper-virens.

2. HED. foliis quinatis ovatis serratis. *Linn. sp. pl. p. 202. Quinquefolia*

Vitis quinquefolia Canadensis scandens. Tour. 613.

Hedera quinquefolia virginiana. Barr. Icon. 227.

La Vigne vierge, ou Vigne de Canada.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme cooperta plantis demortuis; foliola inæqualia, inferiora minora.

V I T I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 201.

Char. sec. Rad. lignosa. Caul. fruticosa flexuosa. Fol. alterna petiolata simplex lobata digitato-quinata. Flor. oppositifolia racemosa. Fuci. cirrus peduncularis.

1. VIT. foliis lobatis sinuatis nudis. *Linn. sp. pl. p. 202. Vinifera*
Vitis vinifera. Bot. Mons. 279. Tour. 613.

2. Vitis Corinthiaca alba. *Barr. Icon. 720.*

3. Vitis Labrusca. *Bot. Mons. 281.*

La Vigne ordinaire.

4. Le Raisin de Corinthe.

HABITAT ubique Monspelii; cuius innumeræ varietates.

Laciniosa. 2. VIT. foliis quinatis, foliolis multifidis. *Linn. sp. pl.* p. 203. *Sauv.* 180.

Vitis laciniatis foliis. *Tour.* 612.

Vitis Cretica alba laciniatis foliis. *Barr. Icon.* 701.
HOSPITATUR sub dio.

L A G O E C I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 207.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres herbacea:

Fol. alterna basi dilatata vaginans impari-pinnata. *Flor.* axillaris pedunculata umbellato-capitata. *Fulc.* spinæ supra denticulos foliorum & involucrorum.

Cuminoides. 1. LAG. *Linn. sp. pl.* p. 203. *Sauv.* 227.

Cuminum sylvestre. *Lob. Icon.* 743.

Cuminoides vulgare. *Tour.* 301.

Le Nid de Lievre.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Foliola quandoque omnia tridentata vel in summo caule tantum, denticuli omnes foliorum & radiorum involucri terminantur seta rigidula; folia ad basim latiora denticuloque longiori stipulæformi instructa.

A C H Y R A N T H E S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 214.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa tetragona articulata. *Fol.* oppofita petiolata simplex integriflora. *Flor.* terminalis spicata. *Fulcr.* bracteæ herbaceæ subulatæ tres circa quemlibet calycem, instar calycis.

Aspera. 1. ACHYR. calycibus floriferis erectis, fructiferis reflexis spicæ adpressis.

Achyranthes catile erecto, calycibus spicæ adpressis. *Linn. sp. pl.* 205.

Amaranthus Siculus spicatus. *Tour.* 235.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario; semper florens; altitudinem humanam superans. Ramis patentibus, spicis pedalibus.

Obs. Sequenti multum affinis ita ut solo charactere capsularum seu numero seminum differant.

C E L O S I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. *Addē calix coloratus sphyllus*, corolla nulla.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata.

Fol. alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* spicata, spicis terminalibus axillaribusque. *Fulc.* bracteæ coloratæ tres circa quemlibet calycem, instar calycis.

1. CEL. foliis lanceolatis, pedunculis angulatis, spica ovato-oblonga. *Linn. sp. pl. p. 205.* *Argentea.*
Amaranthus spicis carneis interfusa flavedine micantibus. *Tour. 235.*
HOSPITATUR sub dio. Sesquipedalis; folia glabra, basi attenuato-petiolata. Spicæ pars florifera carnea, fructifera pallescens. Annua.
2. CEL. foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spica oblonga. *Linn. sp. pl. p. 205.* *Cristata.*
Amaranthus panicula incurva. *Tour. 235.*
HOSPITATUR sub dio. Priori minor, minus striata.
Annua.

I L L E C E B R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 229.

Char. sec. *Rad.* teres. *Caul.* herbacea teres ramosissima articulata. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* verticillata, vel terminalis cymosa, vel capitata. *Fulc.* nulla, vel stipula gemina subulata membranacea, pellucida. 2º. bractea ovata membranacea, pellicula; vel nulla.

1. ILLEC. floribus verticillatis nudis, caulis procumbentibus. *Linn. sp. pl. p. 206.* *Verticillatum*
Polygala repens nivea. *Lob. Icon. 416.*
Paronychia palustris humifusa orientalis. *Tour. Cor. 38.*
Illecebrum caulis procumbentibus. *Sauv. 126.*
HABITAT Monspelii, au-delà de St. George ad dexteram. Facies herniariæ.

- Cymosum.* 2. ILLEC. spicis cymosis secundis, caule diffuso. *Linn.*
sp. pl. p. 206.
 HABITAT cùm priori, & à la source du Lés derrière
 la montagne; articuli triplo remotiores quam in
 præcedenti.
- Paronichia.* 3. ILLEC. floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus
 procumbentibus. *Linn. sp. pl. p. 206.*
Herniaria squamis nitidis flores superantibus. *Sauv.*
 129.
Paronychia hispanica. *Tour.* 607.
Polygonum minus candicans supinum. *Bot. Mons.*
 209.
Polygonum montanum niveum minus. *Barr. Ikon.*
 726.
 HABITAT Monspelii ad mare ultrà montem Cetium,
 & à l'Esperou.
4. ILLEC. floribus bracteis nitidis occultatis, capitulis
 terminalibus, caule erecto. *Linn. sp. pl. 207.*
Herniaria erecta, squamis nitidis flores occultantibus.
Sauv. 129.
Polygonum minus candicans, capitulis surrectis. *Bot.*
Mons. 209.
Paronychia Narbonensis erecta. *Tour.* 508.
 HABITAT Monspelii, au-delà de Selleneuve, & au-
 delà de Caunelles.

T H E S I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 212.*

Char. secund. *Rad. simplex tenuis* *Caul.* teres sim-
 plex *Fo.* alterna sessilis simplex integerrima.
Flor. terminalis paniculato-racemosa. *Fult.* brac-
 teæ tres, patentes, foliaceæ, ad basim floris
 singuli, persistentes, involucriformes.

- Linophyllum.* 1. THES. calyce bracteis longiore, foliorum nervis de-
 currentibus.
Thesium panicula foliata, foliis linearibus. *Linn. sp.*
 207.
Thesium floribus sparsis. *Sauv.* 48.
Linaria montana flosculis albicantibus. *Bot. Mons.*
 159.
Alchimilla linariæ folio, florum calyce albo. *Tour.*
 509.

HABITAT Monspelii; à la Colombiere, la Valette & in sterilibus circà Prades & Montferrier.

Altitudo sesquipedalis. Calix extus viridis, intus albicans; bractea una, cæteris paulò major, calyci subæqualis, raro longior.

N E R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 218.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. simplex integerrima petiolata terna, vel inferior terna, superior opposita. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

1. NER. foliis linear-lanceolatis ternis. *Linn. sp. 209.* Oleander-Nerium foliis linear-lanceolatis. *Sauv. 169.*
Nerion floribus rubescentibus. *Tour. 605.*
Oleander. *Lob. Icon. 364.*
Le laurier-rose, vernaculè, *la laurier-rose*.
HOSPITATUR in hybernaculo; & sub dio apricatur. Sempervirens. Semina (apud nos) nunquam maturans; variat foliis omnibus oppositis vel ternis, vel etiam inferioribus ternis, superioribus oppositis. Ramis in terram delapsis multiplicatur proles.

V I N C A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 217.

Char. sec. Rad. fibrosa vel lignosa. Caul. ramosa fruticosa, repens vel erecta. Fol. opposita petiolata simplex integerrima. Flor. axillaris, solitaria: pedunculata, vel aggregata sessilis. Ful. nulla.

1. VINCA floribus pedunculatis solitariis, nectariis globosis. *Major.*

Vinca caule erecto, foliis ovatis. *Linn. sp. pag. 209.*

Pervinca vulgaris latifolia flore cæruleo. *Tour. 120.*

Clematis daphnoides major. *Bot. Mons. 70.*

La pervanche; vernaculè, *dé pervinque ou prouvinque*.

HABITAT Monspelii ubique. Pedunculi longitudine internodiorum. Ad basim germinis nectaria duo globosa.

2. VINCA floribus sessilibus, inferioribus solitariis, cæteris Roseæ aggregatis, nectariis subulatis.

Vinca (rosea) caule frutescente erecto rigido, foliis ovatis. Linn. Syst. nat. p. 944. Mill. fig. 186.
La prévanche de Madagascar.

HOSPITATUR sub dio, in hybernaculo & caldario. Fruticulosa, rubens. Folia saepe emarginata. Flores rosei coloris. Corollarum tubi longissimi, apice parum ampliati. Flores inferiores solitarii; cæteri bini, quaterni, octoni & sic deinceps, ita ut in summo caule innumeri.

DIGYNIA.

C Y N A N C H U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 226.

Char. sec. Rad. fusiformis vel ramosa. Caul. herbacea teres ramosa, volubilis vel erecta. Fol. opposita petiolata simplex integerrima. Flor. laterifolia alterna cymosa. Fulc. nulla.

Monspelia- 1. CYN. caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. Linn. sp. pag. 212. Sauv. pag. 133.

Scammonea Monspeliaca foliis rotundioribus. Bot. Mons. 232.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus. Tour. 93.

La scammonée de Montpellier.

HABITAT Monspelii ad mare.

Erectum. 2. CYN. caule erecto divaricato, foliis cordatis glabris.

Linn. sp. pag. 213. Sauv. 135.

Apocynum folio subrotundo. Tour. 92.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Folia summa in utrâque specie saepe alterna.

A P O C Y N U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 227.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea erecta ramosa. Fol. opposita simplex integerrima. Flor. cymosa axillaris alterna (terminalis in unâ specie) Fulc. nulla.

Androsami- 1. APOC. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus. Linn. sp. pl. pag.

213.

Apocynum caule erecto annuo foliis ovatis. *Sauv.* 133.
Apocynum Canadense, foliis androsæmi majoris, flore
 lilii convallii suave-rubentis. *Tour. inst. pag.* 91.

L'Oüette; vernaculè *l'Oiate*.

HOSPITATUR in hybernaculo.

2. APOC. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato-lan-
- ceolatis. *Linn. sp. pag.* 213.
- Apocynum caule erecto annuo, foliis ovato-lanceo-
- latis. *Sauv.* 133.
- Apocynum maritimum venetum salicis folio, flore
- purpureo. *Tour.* 92.
- HOSPITATUR sub dio.

ASCLEPIAS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 224.

Char. sec. Rad. ramosa sæpiùs horizontalis. Caul.
 ramosa, herbacea vel fruticosa. Fol. simplex
 opposita integerrima, petiolata vel sessilis,
 nunc plana, nunc revoluta. Flor. umbellata
 laterifolia pedunculata in unâ specie sessilis, in
 altera terminalis. Ful. nulla.

* *Foliis planis.*

1. ASCL. foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simpli- *Syriaca*.
 cissimo, umbellis nutantibus. *Linn. sp.* 214.
Apocynum erectum, latifolium, incanum syriacum,
 flore parvo obsolete purpurascente. *Tour.* 91.
 HOSPITATUR in hybernaculo. Apud nos bicubitalis.
2. ASCL. foliis lanceolatis, glabris, caule simplici, um- *Nivea*.
 bellis erectis lateralibus solitariis. *Linn. sp. pag.*
 215.
Apocynum Americanum foliis amygdali longioribus.
Tour. 92.
 HOSPITATUR in hybernaculo.
3. ASCL. foliis lanceolatis, caule supernè diviso, umbellis *Incarnata*.
 terminalibus congestis. *Linn. sp. pag.* 215.
Apocynum minus, rectum canadense angustifolium.
Tour. 91.
Apocynum minus erectum canadense. *Barr. Icon.* 72.
 HOSPITATUR in hybernacelo; umbellæ sæpiùs quaternæ.
4. ASCL. foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule sim- *Curassavica*.

plici, umbellis erectis solitariis. *Linn. sp. pag. 215.*
Apocynum curassavicum fibrosâ radice, floribus au-
 rantiis, chamænerii foliis latioribus & angustioribus.
Tour. 92.

HOSPITATUR in hybernaculo.

Vincetoxi- 5. ASCL. foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis
 proliferis *Linn. sp. pag. 216.*

Asclepias albo flore. Bot. Mons. 29. Tour. 94.

Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis,
 floribus confertis. *Sauv. 133.*

Le dompte-vénin.

HABITAT Monspelii, à Gramont, Castelnau, Mont-
 ferrier, &c. Radix perennis.

Nigra. 6. ASCL. foliis ovatis, basi barbatis, caule superne sub-
 volubili. *Linn. sp. pag. 216.*

Asclepias nigro flore. Bot. Mons. 30. Tour. 34.

*Asclepias caule subvolubili herbaceo, floribus paten-
 tissimis. Sauv. 133.*

HABITAT cum priori. Radix perennis.

* *Foliis latere revolutis.*

Fruticosa. 7. ASCL. foliis revolutis lanceolatis, caule fruticoso.
Linn. sp. pag. 216.

*Apocynum erectum, africanum, villoso fructu, sali-
 cis folio. Tour. 92.*

HOSPITATUR in caldario. Altitudinem humanam
 excedit. Folia sœpè terna.

Pedunculus umbellæ foliis duplo brevior. Corollæ
 albæ.

S T A P E L I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 223.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. angulata articulata*
 ramosa succulenta denticulata; denticulis oppo-
 sitis. *Fol. nulla Flor. in axillis denticulorum,*
 pedunculata solitaria. *Ful. nulla.*

Variegata. 1. STAP. denticulis ramorum patentibus. *Linn. sp. pag.*
217.

Asclepias Africana aizooïdes. Tour. 94.

La Crapaudine.

HOSPITATUR sub dio & in caldario. Flores grisei,

rugosi, punctis purpureis picti.
Floret autumno. Varians corollis calycibus, nectariis-
que 6fidis, staminibusque sex. Rami abscissi in ter-
ram delapsi novam matrem præbent.

HERNIARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 228.

Char. sec. Rad. tenuis vix ramosa. Caul. articu-
lata herbacea ramosissima procumbens. Fol.
opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axil-
laris glomerata sessilis. Fulc. stipulæ minimæ
membranaceæ, oppositæ interfoliaceæ.

1. HERN. glabra. *Linn. sp. pag. 218. Tour. 507.* *Glabra.*
Polygonum minus sive millegrana major. *Bot. Mons.*
210.
2. HERN. hirsuta. *Linn. sp. pag. 218. Tour. 507.* *Hirsuta.*
Hernaria hirsuta. *Baub. Pin. 282.*
Anthyllis valentina Clusii. *Lob. Ikon. 421.*
Huic similis aut eadem est Anthyllis valentina Clusii.
Baub. Pin. 282.
La Turquette ou herniaire; vernaculè la turquete.
HABITAT Monspelii cum priori & vulgatior.

C H E N O P O D I U M

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 230.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa
striata, teres vel angulata. Fol. alterna simplex
incisa integra, vel integerrima, sessilis vel
petiolata. Flor. glomerato-racemosa axillaris &
terminalis, nuda vel foliosa. Fulc. nulla.

* *Foliis angulosis.*

1. CHEN. foliis triangulari-sagittatis integerrimis. *Linn. sp. pag. 218. Sauv. 100.* *Bonus Henri-*
cus.
Chenopodium folio triangulo. *Tour. 506.*
Le bon Henri.
HABITAT Monspelii, à l'Esperou, au mont Saint Loup
ad levam & au Vigan. Folia palmaria longe petio-
lata, petiolo basi dilatato amplexicauli.
2. CHEN. foliis cordato-triangularibus obtusiusculis *Rubrum.*

dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule brevioribus. *Linn. sp. pag. 218. Sauv. 273.*
Chenopodium pesanserinus primus. Tour. 506.
Atriplex sylvestris latifolia. Bot. Mons. 34.
Chenopodium foliis subtus farinosis rhomboïdeis multis & minoribus dentibus ferratis. Sauv. 99.
HABITAT Monspelii ad lœvam ultrâ Salazon juxtâ fluvium.

Album. 3. CHEN. foliis rhomboïdeo-triangularibus erosis postice-integris, summis oblongis, racemis erectis. *Linn. sp. pag. 219. Sauv. 273.*

Atriplex sylvestris. Bot. Mons. 34.

Chenopodium folio sinuato canticante. Tour. 506. Bauh. Pin. 119.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis, summis linear-lanceolatis. Sauv. 99.

HABITAT Monspelii, à Lattes & circâ hortos.

Viride. 4. CHEN. foliis rhomboïdeis dentato-sinuatis, racemis ramosis subnudis. *Linn. sp. pag. 219.*

HABITAT ubique Monspelii.

Hybridum. 5. CHEN. foliis subcordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Linn. sp. pag. 219.*

Atriplex daturæ folio Mag. hort. Mons. 29. anguloso folio. Barr. Icon. 540.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. Bot. Mons. 35.

Chenopodium pesanserinus secundus. Tour. 506.

Chenopodium folio lœvi paucis & amplissimis dentibus inciso, racemis florigeris laxis & ramosis. Sauv. 273.

HABITAT Monspelii ubique in oleribus.

Botrys. 6. CHEN. foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Linn. sp. pag. 219. Sauv. 273.*

Chenopodium ambrosioïdes folio sinuato. Tour. 504.

Botrys ambrosioïdes vulgaris. Bot. Mons. 34.

Le Piment.

HABITAT Monspelii, à Lattes, à Salazon.

Ambrosioïdes 7. CHEN. foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Linn. sp. pag. 219.*

Chenopodium ambrosioïdes maximum. Tour. 506.

Botrys bætica atriplicis sylvestris facie, vulgò botrys maxima. Barr. Icon. 1185.

L'Ambroisie ou thé du Mexique.

HOSPITATUR sub dio. Annum. Luxuriat in horto regio.

* *Foliis integris.*

8. CHEN. foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus *Vulvaria*.
conglomeratis. *Linn. sp. p. 220.*
Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Sauv. 102.
Chenopodium fætidum. Tour. 506.
Atriplex fætida. Bot. Mons. 35.
HABITAT Monspelii in agris & hortis. Annum.
9. CHEN. foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, *Polyspernum*.
cymis dichotomis. *Linn. sp. pag. 220.*
Chenopodium betæ folio. Tour. 506.
Blittum erectius sive tertium Tragi. Bot. Mons. 38.
HABITAT Monspelii in oleribus. Annum.
10. CHEN. foliis linear-lanceolatis planis integerrimis. *Scoparium*.
Linn. sp. pag. 221. Sauv. 53.
Chenopodium lini folio villoso. Tour. 506.
Le Belveder.
HOSPITATUR sub dio. Humanam superans altitudinem. Caulis glaberrimus, albicans.
11. CHEN. foliis subulatis semi-cylindricis. *Linn. sp. pag. Maritimum.*
^{221.}
Chenopodium herbaceum, foliis semi-cylindricis acutis alternis. Sauv. 7.
Kali minus album, semine splendente. Bot. Mons.
^{141.}
La Blanchete. Vernaculè Blanquete.
HABITAT Monspelii ad mare.
12. CHEN. foliis linearibus teretibus carnosis, caule *Fruticosum*.
fruticoso. *Sauv. 7. Linn. sp. pag. 221.*
Vernaculè l'Engane.
HABITAT ad mare secus cetium.
13. CHEN. foliis obtusis teretibus tomentosis alternis, *Hirsutum*.
caule herbaceo. *Sauv. 7. Linn. 221.*
Kali minus villosum. Bot. Mons. 146.
HABITAT Monspelii ad mare.

B E T A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea angulata sulcata. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. glomerato-ramosa axillaris & terminalis. Fulc. nulla.

Vulgaris.

1. BETA Linn. sp. pag. 222.

Beta rubra vulgaris. Tour.

La Bette-rave. Vernaculè *Bletta rava.*

2. Beta pallide virens major. Tour.

Beta communis viridis. Bot. Mons. 37.

La Poirée blanche. Vernaculè *l'Orte la Bléde.*

HABITAT Monspelii in hortis. Folia subcordata in petiolum decurrentia.

S A L S O L A.

Char. prim. Vid. Linn. gén. pl. 232.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa.

Fol. sessilis simplex integerrima succulenta, alterna vel opposita. Flor. axillaris solitaria. Fulc. nulla (aculei ad apicem foliorum in una specie.)

Kali.

1. SAL. herbacea, foliis subulatis mucronatis, calycibus ovatis axillaribus. Linn. sp. pag. 222. Sauv. 7. & 147.

Kali spinosum cochleatum. Bot. Mons. 146.

Kali spinosum foliis longioribus & angustioribus. Tour. 247.

HABITAT Monspelii ultra Castrum novum ad lævam in agris, & ad mare.

2. SAL. herbacea, foliis inermibus. Linn. sp. pag. 223. Sauv. 7. & 147.

Kali majus cochleato semine. Bot. Mons. 146. Tour. 247.

La Soude.

HABITAT Monspelii ad mare.

C R E S S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1046.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea humifusa

ramosissima. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* glomerato-racemosa terminalis. *Fulc.* nulla.

I. CRESSA: *Linn. sp. pag. 223. Sauv. 92.*

Quamoclit minima humifusa palustris herniariæ folio.

Tour. Cor. 4.

Anthyllis. Bot. Mons. app. 290.

HABITAT Monspelii ad lœvam, à Perols in fossis: folia ovata minima.

Cretica.

G O M P H R E N A.

Char. prim. Vid. *Lin. gen. pl. 233.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea erecta teres ramosa *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* pedunculata terminalis capitata. *Fulcr.* bracteæ binæ oppositæ foliaceæ ovatæ integerrimæ, infra capitulum.

I. GOMPH. foliis ovatis, pedunculis pubescentibus...

Globosa.

Gomphrena caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis. Linn. sp. pag. 224. Sauv.

Amaranthoides lychnidis folio, capitulis argenteis purpureis, &c. Tour. 654.

L'Immortelle rouge des Jardiniers.

HOSPITATUR sub dio. Annua.

U L M U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 239.*

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis subquaternis. *Fulc.* stipulæ deciduæ.

I. ULM. foliis duplicato-serratis, basi inæqualibus. *Campestris.*

Linn. sp. pag. 225. Sauv. 98.

Ulmus campestris & Theophrasti. Bot. Mons. 281. Tour. 601.

L'Orneau ou Orme; vernaculè l'Ourme.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, Lattes, Caunelles, &c.

HEUCHERA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 235.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis petiolata simplex lobata. *Flor.* racemosa terminalis. *Fulg.* bractea solitaria tridentata, denticulo intermedio longiore, ad basim peduncularum partialium racemi.

Americana. 1. HEUCH. *Linn. sp. pag. 226. Sauv.*

Mitella Americana florum petalis integris. *Tour. 242.*

HOSPITATUR sub dio. Perennis; scapus sesquipedalis; racemus ramosus; rami dichotomi alterni; bractea ad basim suffulti; interdum folium unicum parvum lobatum scapo adnectitur. Semina abortiunt.

GENTIANA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 236.

Char. secund. *Rad.* subhorizontalis teres simplex.

Caul. herbacea articulata, simplex vel ramosa, teres vel tetragona. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima, perfoliata vel connato-vaginans. *Flor.* axillaris sessilis conferta vel terminalis dichotoma aut verticillata. *Fulg.* nulla.

* *Corollulis quinquefidis sub-campaniformibus.*

Lutea.

1. GENT. corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. *Linn. sp. pag. 227.*

Gentiana major lutea. *Tour. 80. Seg. Ver. tom. I. p. 144.*

2. Gentiana major vulgaris, pallido & parvo flore. *Barr. Icon. 63.*

La grande Gentiane.

HABITAT à l'Esperou. Flores pedunculati.

Asclepiadea. 2. GENT. corollulis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus. *Linn. sp. p. 227.*

Gentiana asclepiadis folio. *Tour. 80. Seg. Ver. tom. I. pag. 145.*

Gentiana asclepiadis folio. *Barr. Icon. 70.*

HABITAT in humidis, à Villemagne, Lamalou, l'Esperou.

* *Corollis*

* *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

5. GENT. corollis quinquefidis infundibuliformibus, *Centaureum*.
caule dichotomo. *Linn. sp. pag. 229.*

Gentiana foliis trinerviis ovatis, floribus umbellatis,
tubo strictissimo. Sauv. 132.

Centaureum minus. Bot. Mons. 57. Tour. 122. Seg.
Ver. tom. I. p. 200.

6. *Centaureum minus. Barr. Icon. 424. & 1242.*

La petite Centaurée; vernaculé lou Trescalau.

HABITAT Monspelii, aux prés d'Arene.

* *Corollis quadrifidis.*

4. GENT. corollis quadrifidis fauce barbatis. *Linn. sp. Campestris.*
pag. 231.

Gentiana purpurea minima. Barr. Icon. 97. fig. 2.

Gentiana alpina pumila verna minor. Tour. 81.

HABITAT à l'Esperou. Tubi ampliati. Folia floralia
ovata lata.

5. GENT. corollis quadrifidis imberbibus verticillatis
sessilibus. *Linn. sp. pag. 231.* *Cruciata.*

Gentiana cruciata. Barr. Icon. 65. Tour. 81. Major.

Seguier Ver. tom. I. p. 146.

HABITAT à l'Esperou. Folia sèpius trinervia, basi
connata vaginantia; corollæ cæruleæ; calix tubu-
latus quadridentatus.

6. GENT. corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Linn. sp. Perfoliata.*
pag. 232. Sauv. 136.

Centaureum luteum perfoliatum. Bot. Mons. 57.
Tour. 123.

Centaureum minus perfoliatum luteum, &c. Barr.
Icon. 515. & 516.

HABITAT Monspelii circa Selleneuve, Castelnau. Fre-
quens aux prairies d'Arene.

Obs. In hoc genere variat numerus staminum cum
numero laciniarum corollæ; idem calyx eandem
servans cum corolla & staminibus proportionem,
seu denticulorum numerum.

P H Y L L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 242.*

Char. secund. *Rac. lignosa. Caul. fruticosa arti-*
culata. Fol. terna petiolata simplex integerrima.
Flor. paniculato-trichotoma. Fulc. stipulæ soli-

tariæ dentatæ, foliis interjectæ; bracteæ integrimæ ad quamlibet divisionem pedunculorum.

- Nobla.** 1. PHYL. stipulis dentatis. *Linn. sp. pag. 232.*
HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario. Semper virens, semina maturans. Pedunculi uniflori ex dichotomiâ.

ERYNGIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 241.*

Char. sec. *Rad.* ramosa subhorizontalis. *Caul.* herbacea striata subsimplex. *Fol.* alterna, radicalis petiolata simplex integra incisa vel pinnata, caulina, amplexicaulis, pinnato-pinnatifida. *Flor.* terminalis capitata pedunculata sub-dichotoma. *Fulc.* aculei ad margines foliorum & radiorum involucri.

- Maritimum.** 1. ERYNG. involucris foliaceis ovatis, longitudine capituli.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis. *Linn. sp. pl. pag. 233.*

Eryngium maritimum. Bot. Mons. 92. Tour. 327.

Le Panicaut de mer.

HABITAT Monspelii ad mare. Involucrum radiis tribus vel quinque.

- Campestre.** 2. ERYNG. involucris subulatis capitulo longioribus.

Eryngium foliis radicalibus pinnatis tripartitis. *Linn. sp. pag. 233.*

Eryngium vulgare. Bot. Mons. 93. Tour. 327.

Le Panicaut, ou Chardon roland.

HABITAT ubique Monspelii. Radii involucrum denticulo unico sæpiùs ad basim.

- Amethysti-** 3. ERYNG. involucris lanceolatis capitulo longioribus. *Eryngium* foliis radicalibus digitato-multifidis. *Linn. sp. pag. 233.*

Eryngium totum cœruleum. Tour. 327.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis.

HYDROCOTYLE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 243.*

Char. sec. *Rad.* horizontalis, nodosa stolonifera.

fera, radiculis perpendicularibus. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis solitaria alterna petiolata simplex peltata integra. *Flor.* pedunculata umbellata radicalis. *Fulc.* nulla.

1. HYDR. foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Linn.* *vulgaris.*
sp. pag. 234.

Ranunculus aquaticus cotyledonis folio. *Bot. Mons.*
218.

Hydrocotyle vulgaris. *Tour.* 382.

Hydrocotyle foliis peltatis undique emarginatis.
Sauv. 39.

L'Ecuelle d'eau.

HABITAT Monspelii ad dexteram Castrinovi in Ledo amne. Folia orbiculata. *A Castelnau près des moulins.*

S A N I C U L A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 244.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea subnuda, simplex. *Fol.* simplex incisa, lobata, radicalis petiolata, caulina subsessilis sæpius solitaria. *Flor.* terminalis umbellata, umbellula subcapitata. *Fulc.* nulla.

1. SAN. foliis palmato-digitatis, foliolis quinis incisis ovali-lanceolatis. *Sauv.* 209. *Officinalis.*

Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Linn. sp. pag. 235.*

Sanicula officinarum. *Bot. Mons.* 229. *Tour.* 326.

La Sanicle; vernaculè de Sanicle.

HABITAT Monspelii; à l'Esperou, au Capouladou, & au bois de Salvous.

HOSPITATUR in frigidario. Folium unicum (sæpius) in summo caule folium seminale subcuneiforme, vel ovatum.

A S T R A N T I A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 215.

Char. sec. *Rad.* fusiformis, radiculis fusiformibus parallelis. *Caul.* herbacea striata simplex. *Fol.* simplex incisa lobata, radicalis petiolata, caulina sessilis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Major. 1. ASTR. foliis quinquelobis; lobis trifidis. *Linn. sp.*
pag. 235.

Astrantia major, corona floris purpurascente & albida.
Tour. 314.

HOSPITATUR in frigidario. Vix semipedalis. Folia sæpius in caule bina, involucri radiis umbella longioribus, serraturæ foliorum setis rigidis terminatæ.

B U P L E U R U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 272.*

Char. sec. *Rad.* tenuis, simplex vel ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa, simplex vel ramosa. *Fol.* simplex integerrima amplexicaulis aut perfoliata, inferior attenuato-petiolata, superior sessilis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

* *Herbacea.*

Rotundifolium. 1. BUPL. involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Linn. sp. pag. 236.*

Perfoliata vulgaris arvensis. *Bot. Mons. 200.*

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annum. *Tour. 310.*

2. Perfoliata minor folio acuto. *Barr. Ikon. 1128.*

HABITAT Monspelii, circa Montferrier ad lævam.

Foliola involucrorum quinque-ovata, tria acuminate majora, duo obtusa minora.

Odontites. 2. BUPL. involucellis pentaphyllis acutis; universali triphylo, flosculo centrali altiore, ramis divaricatis. *Linn. sp. pag. 237.*

Perfoliata minor angustifolia bupleuri folio. *Bot. Mons. 200.*

Bupleurum annum minimum angustifolium. *Hort. Mons. Tour. 310.*

Bupleurum foliis gramineis, calyce peculiari, quinque-folio aristato rigido. *L. Sauv. 49.*

3. *Bupleurum foliis linearibus petiolatis, floralibus lanceolatis.* *Sauv. 50.*

Bupleurum annum angustifolium. *Bot. Mons. 42.*
Tour. 309.

HABITAT Monspelii in saxosis, circa la Valette, Montferrier, Castelnau. Plantula vix palmaris. Foliola involucri inæqualia lanceolata umbellis longiora.

3. BUPL. caule dichotomo subnudo, involucris minimis *Rigidum.*
acutis. *Linn. sp. pag. 238.*

Bupleurum foliis lanceolatis rigidis; radicalibus obtusis, caulinis acutis. *Sauv. 76.*

Bupleurum folio rigido. *Bot. Mons. 42. Tour. 309.*
L'Oreille de liévre.

HABITAT Monspelii in luco Gramuntio. Altitudo bipedalis.

4. BUPL. umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtri-floris. *Linn. sp. pag. 238.* *Tenuissimum.*

Bupleurum angustissimo folio. *Bot. Mons. 42. Tour. 310.*

Bupleurum tertium minimum Fabii Columnæ. *Barz. Icon. 1248.*

Bupleurum gramineo folio; umbellis & calycibus omnium minimis. *Sauv. 49.*

HABITAT cum prioribus. Altitudo sesquipedalis.

* *Frutescentia.*

5. BUPL. frutescens, foliis obovatis integerrimis. *Linn. Fruticosum.*
sp. pag. 238.

Seseli Æthiopicum salicis folio. *Bot. Mons. 240.*

Bupleurum arborescens salicis folio. *Tour. 310.*

Luxuriat in horto regio. Sempervirens. Folia glaberrima obverse ovata sessilia.

ECHINOPHORA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1017.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. striata ramosa herbacea. Fol. alterna pinnata, pinnulis sessilibus oppositis saepius 4dentatis. Flor. terminalis umbellata. Fulc. aculei ad apices foliolorum.

6. ECHIN. foliolis subulato-spinosis integerrimis. *Linn. Spinosa.*
sp. pag. 239.

Caucalis caule lignoso, foliolis subulato-spinosis integerrimis. *Sauv. 258.*

Chritmum maritimum spinosum. *Bot. Mons. 80.*

Echinophora maritima spinosa. *Tour. 656.*

HABITAT Monspelii ad mare.

TORDYLIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 247.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea striata.

subsimplex. *Fol.* alterna amplexicaulis, pinnata, pinnulis incisis. *Flor.* umbellata terminalis (lateralis sessilis in unâ specie.) *Fulcr.* nulla; aculei supra semina (in unâ specie.)

Syriacum. 1. TORD. foliolo terminali maximo; involucris umbella longioribus. *Linn. sp.* 239.

Tordylium limbo granulato Syriacum minus. *Tour.* 329.
Gingidium primum. *Dod.* 690.

HOSPITATUR sub dio. Foliola involucri lanceolata vel spathulata.

Officinale. 2. TORD. involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis, laciniatis. *Linn.* 239.

Tordylium Narbonense minus. *Tour.* 320.

Seseli creticum minus. *Bot. Mons.* 239.

Le Seseli de Crete.

HABITAT Monspelii versus *la Valette, la Colombière, Castelnau, &c.*

Maximum. 3. TORD. umbella conferta radiata, foliolis lanceolatis inciso-serratis. *Sauv.* 230. & 259.

Seseli Creticum majus. *Bot. Mons.* 240.

Tordylium maximum. *Tour.* 320.

Sphondylium minus Syriacum. *Barr. Icon.* 349.

HABITAT Monspelii cum priori.

Latifolium. 4. TORD. umbella conferta nudiuscula, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-serratis. *Linn. sp.* 240.

Caucalis umbella universali trifida, partialibus pentaspermis, foliis pinnatis serratis. *Sauv.* 236.

Caucalis arvensis echinata latifolia. *Bot. Mons.* 55. & *Tour.* 323.

Lappula Canaria latifolia. *Baup. hist.* 2. p. 80.

HABITAT Monspelii cum prioribus.

Auriculus. 5. TORD. umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Linn.* 240.

Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. *Bot. Mons.* 56.

Daucus annuus minor floribus rubentibus. *Tour.* 308.

HABITAT Monspelii in arvis.

Nodosum. 6. TORD. umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. *Linn. sp.* 240.

Daucus annuus ad nodos floridus. *Tour.* 308.

Caucalis nodosa echinata semine. *Bot. 56.*

HABITAT ubique.

CAUCALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 248.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. striata herbaea ramosa. Fol. alterna amplexicaulis, pinnata, pinnulis pinnato-multifidis. Flor. umbellata terminalis. Fulc. aculei supra semina.

1. CAUC. umbella bifida, umbellulis dispermis, involucris semine brevioribus linearibus. *Maritima.*

Caucalis pumila maritima. *Bauh. pin. 153. Tour.*

323.

Lappula Canaria sive caucalis maritima. *Bauh. hist. 3. part. 2. 87.*

Caucalis umbellis trifidis dispermis, caule prostrato. *Linn. Syft. nat. p. 955.*

HABITAT ad mare. Vix palmaris. Petioli valde hirsuti; pedunculus longitudine petiolorum. Rami axillares, unde pedunculi oppositifolii apparent. Umbella saepius bifida. Radii involucri diphylli, seminibus breviores. Accedit raro umbella trifida, & tunc umbellulæ duas dispermæ, altera monosperma.

2. CAUC. involucris singulis pentaphyllis, petalo unico *Grandiflora.* duplo majore. *Linn. sp. 240.*

Caucalis arvensis echinato magno fructu. *Tour. 323. Bot. Mons. 56.*

Caucalis *Dod. 700.*

HABITAT Monspelii ubique. Foliola involucri margine membranacea.

3. CAUC. involucro universali longitudine umbellæ lancolato. *Linn. sp. 241.* *Daucoides.*

Caucalis dauci sylvestris folio, echinato magno fructu, *Mag. Bot. app. 293. Tour. 323.*

HABITAT Monspelii; à Castelnau ad levam, à Gramont. Altitudo prioris. Radii involucrorum margine membranacei.

4. CAUC. umbella trifida, umbellulis trispermis, involucris triphyllis. *Linn. 241. Sauv. 258.* *Platycarpos.*

Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu. *Bot. Mons. 56. Tour. 323.*

HABITAT frequens, à la Garrigue du Terrail.

- Leptophylla.* 5. CAUC. seminum aculeis triglochidibus uncinatis: pilis verticillatis hispidis. *Linn. sp. pag. 242.*
Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu. *Bot. Mons. 56. Tour. 323.*
Caucalis involucro universalis sæpè nullo, laciniis foliorum perangustis. *Sauv. 258.*
HABITAT cum priori. Rarior.

D A U C U S.

- Char. prim.** Vid. *Linn. gen. pl. 250.*
Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis pinnato - multifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla, pili rigidi in caule (& seminibus in unâ specie.)

- Carota.* 1. DAUC. seminibus hispidis. *Linn. sp. pag. 242.*
Pastinaca tenuifolia sylvestris *Dioscoridis.* *Bot. Mons. 199.*
Daucus sativus. *Tour. 307.* Radice rubra & lutea.
La Carote.
HABITAT Monspelii in oleribus.
Ginsaga. 2. DAUC. seminibus nudis. *Linn. sp. 242.* *Sauv. 257.*
Gingidium umbella oblonga. *Bot. Mons. 109.*
Foeniculum annum umbella contracta oblonga. *Tour. 311.*
HABITAT Monspelii frequens in monte Cetio versus mare, in loco dicto *le Nazareth*, & alibi versus Villam novam.
Gingidium. 3. DAUC. involuci radiis planis; laciniis recurvis. *Linn. sp. 242.*
Daucus maritimus lucidus. *Tour. 307.*
Pastinaca tenuifolia marina foliis obscurè virentibus. *Bot. Mons. 199.*
HABITAT Monspelii cum priori, sed rarer. Bis vidi seclus stagnum, à Bouzigues.

A M M I.

- Char. prim.** Vid. *Linn. gen. pl. 251.*
Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex. *Fol.* alterna amplexicaulis, inferior bipinnata simplex integra, superior simplex li-

neari - multifida. *Flor.* terminalis umbellata.
Fulc. nulla.

- I. AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, *Majus.*
superioribus linearibus multifidis. *Linn. sp. pag. 243.*
Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Sauv. 232.*
Ammi majus. *Bot. Mons. 16. Tour. 104.*
L'Amme.

HABITAT Monspelii circà Gramuntium lucum ad dexteram. Rarum hodie apud nos ; nec unquam ubi notat Magnol ultra portam Laterensem reperire licuit.

BUNIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 252.

Char. sec. *Rad.* bulbosa solida. *Caul.* herbacea.
Fol. alterna amplexicaulis pinnata pinnulis linearis-multifidis. *Flor.* umbellata terminalis.
Fulc. nulla.

- I. BUN. *Linn. sp. pag. 243. Sauv. 256.*

Bulbocasta-

Bulbocastanum majus folio apii. Bot. Mons. 41. Tour. num.
307.

Bulbocastanum alterum, caule firmiore. Barr. Icon.
244.

Terrenoix.

HABITAT Monspelii ; au Capouladou, à la Serane, à l'Esperou.

CONIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 253.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, pinnata pinnulis folii cujuslibet inferioribus pinnatis, superioribus pinnatifidis ; foliolis omnibus pinnatifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

- I. CON. seminibus striatis. *Linn. sp. 243. Sauv. 259.*

Maculatum.

Cicuta major. Tour. 306.

La grande Ciguë ; vernaculé, Jauvertasse.

HABITAT Monspelii ; sous le Perou , in loco dicto Lasagarelles.

ATHAMANTA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 255.
 Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea,
 simplex vel ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis
 pinnata, pinnulis pinnatis vel pinnato-multifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Libanotis. 1. ATH. foliolis bipinnatis planis, umbella hemisphærica, seminibus hirsutis. *Linn. sp. pag. 244.*

Daucus montanus apii folio major. *Bauh. Pin. 150.*
Bot. Mons. 84.

Oreoselinum apii folio majus. *Tour. 318.*

Le Persil de montagne.

HOSPITATUR sub dio.

Oreoselinum. 2. ATH. foliolis divaricatis. *Linn. sp. pag. 244.*

Apium montanum nigrum. *Bauh. Pin. 153.*

Apium montanum folio ampliore. *Bauh. Pin. ibid.*

Oreoselinum apii folio minus. *Tour. 318.*

HOSPITATUR sub dio.

Cretenis. 3. ATH. foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hispidis. *Linn. sp. p. 245.*

Myrrhis annua semine striato incano. *Tour. 315.*

Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus, umbella candida. *Bauh. Pin. 150.*

HABITAT à l'Esperou. Plantula palmaris elegantissima simplex.

Meum. 4. ATH. foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis.

Linn. sp. pag. 245.

Meum foliis anethi. *Tour. 312.*

HABITAT cum priori.

PEUCE DANUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 256.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis pinnatis vel pinnatifidis. *Flor.* umbellata terminalis. *Fuler.* nulla.

Officinale. 1. PEUCED. foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus. *Linn. sp. p. 245.*

Peucedanum Germanicum. *Bot. Mons. 201.* *Tour. 318.*

β. *Peucedanum italicum* longioribus foliis. *Barr. Ikon. 78.*

Le Fenouil de porc.

HABITAT Monspelii. Frequens in luco & ultra lucum Gramuntium.

2. PEUCED. foliolis pinnatifidis, laciniis oppositis. *Linn. silaus.*
sp. pag. 246.

Seseli pratense Monspeliensium. Bot. Mons. 239.

Angelica pratensis apii folio. Tour. 313.

HABITAT Monspelii cum priori, & versus Castrum-novum, & à Salazon. Folia longe petiolata; foliola pinnularum saepius trifida vel quinquefida.

C R I T H M U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 257.*

Char. sec. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis, bipinnata succulenta. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.*

1. CRIT. foliolis lanceolatis carnosis. *Sauv. 258. Linn. Maritimum.*

sp. pag. 247.

Crithmum seu foeniculum maritimum minus. Bot. Mons. 80. Tour. 317.

Le Fenouil de mer, Perce-pierre ou Criste marine.

HABITAT ubique ad mare.

C A C H R Y S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 258.*

Char. sec. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis multifidis. Flor. terminalis umbellata. Fulc. nulla.*

1. CAC. foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis. *Linn. Libanotis.*

sp. p. 246.

Libanotis cachryophoros quibusdam flore luteo. Bot. Mons. 154.

Cachrys semine fungoso plano majori, foliis peucedani angustis. Tour. 325.

L'Armarinte.

HABITAT Monspelii, secus fluvium Lamouson versus villam novam, & prope pagum Fabregues in rupibus ad levam. *Les Rochers de Mijoulan.*

FERULA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 259.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis bipinnata. Flor. umbellata terminalis. Fulcr. nulla.

Communis. 1. FER. foliolis linearibus longissimis simplicibus. Linn. sp. pag. 246. Sauv. 257.

Ferula femina Plinii. Bot. Mons. 97. Tour. 321.
La Ferule.

HABITAT Monspelii ad mare & stagna. Altitudinem humanam excedit.

LASERPITIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 260.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea striata. Fol. alterna amplexicaulis, bipinnata vel tripinnata, foliolis integris. Flor. terminalis umbellata. Fulc. nulla.

Gallicum. 1. LASERP. foliolis cuneiformibus furcatis. Linn. sp. p. 248.

Laserpitium foliolis ramosis sessilibus. Sauv. 261.

Laserpitium gallicum. Bot. Mons. 300. Tour. 324.
Le Laser.

HOSPITATUR in frigidario.

HABITAT à St. Guillin le Désert, à la Serane. Copiosius à Lamalou.

Siler. 2. LASERP. foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis. Linn. sp. p. 249.

Siler montanum officinarum. Bot. Mons. 241.

Ligusticum quod seseli officinum. Tour. 323.

L'Iveche ou le Seseli de montagne.

HABITAT Monspelii cum priori, & au Capouladou.

HOSPITATUR in frigidario.

Chironium. 3. LASERP. foliolis oblique cordatis, petiolis hirsutis. Linn. sp. pag. 249.

Panax costinum. Bot. Mons. 197.

HABITAT Monspelii, aux rochers de Mijoulan, ubi Cachrys. Vide supra.

Obs. Hanc speciem pro panace costino Bauhini male habuerat Magnolius.

H E R A C L E U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 277.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis, simplex, integra vel pinnata pinnulis pinnatifidis. Flor. umbellata terminalis. Fulcr. nulla.

1. HERACL. foliolis pinnatifidis. Linn. sp. pag. 249. *Sphondylium*.

Sauv. 230.

Sphondylium vulgare hirsutum. Tour. 320.

2. *Sphondylium. Barr. Icon. 56. & 371.*

La Berce.

HABITAT Monspelii à l'Esperou, la Serane, au Capouladou, &c.

HOSPITATUR in frigidario. Frequens in horto regio.

2. HERACL. foliis simplicibus integris, floribus radia-

Alpinum.

tis. Linn. sp. 250.

Sphondylium alpinum glabrum. Tour. 320.

HOSPITATUR sub dio. Planta vix pedalis, perennis; folia radicalia cordata dentata sublobata glaberrima, petiolo caulem inferne amplectente ruberrimo sulcato; folia summa sub-cuneiformia, serrata, petiolo breviori.

L I G U S T I C U M.

Char prim. Vid. Linn. gen. pl. 261.

Char. sec. Rad. fusiformis ramosa. Caul. herbacea.

Fol. alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis oppositis, sessilibus simplicibus incisis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

1. LIGUST. foliis multiplicibus, foliolis superne incisis, *Levisticum.*

Linn. sp. 250. Sauv. 261.

Angelica montana perennis paludapii folio. Tour. 313.

L'Iveche ou ache de montagne.

HABITAT à l'Esperou la louzere.

HOSPITATUR in frigidario.

A N G E L I C A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 262.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. fistulosa ramosa

herbacea. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis oppositis sessilibus simplicibus integris. *Flor.* umbellata terminalis. *Fulcr.* nulla.

Archangelica 1. ANGEL. foliorum impari lobato. *Linn. sp. pag. 250.*
Sauv. 261.

Imperatoria sativa. *Tour. 317.*

L'Angélique, vernaculè *l'angélique*.

HOSPITATUR in frigidario. Radix perennis.

S I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 263.

Char. sec. *Rad.* tuberosa fibrosa fusiformis. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna, amplexicaulis pinnata, foliolis simplicibus integris. *Flor.* terminalis vel axillaris, nunc pedunculata nunc sessilis. *Fulcr.* nulla.

Latifolium. 1. SIUM foliis pinnatis, umbellâ terminali. *Linn. sp. 251.* *Sauv. 231.*

Sium latifolium. *Tour. 308.*

La Berle.

HABITAT Monspelii in aquis juxtâ *Castelnau & La-verune*, &c.

Nodiflorum. 2. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. *Linn. sp. 251.*

Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Tour. 308.*

HABITAT in aquis ubique, *au Verdanson*. Umbellæ aliæ oppositifoliæ.

Sifarum. 3. SIUM foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Linn. sp. 251.*

Sisarum Germanorum. *Tour. 308.*

Le Chervi.

HOSPITATUR sub dio. Foliolum terminale (sæpiùs) cordatum. Radix tuberosa.

S I S O N.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 265.

Char. sec. *Rad.* tenuis fusiformis. *Caul.* simplex herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis simplicibus integris aut incisis, oppositis vel verticillatis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. Linn. sp. *Amomum*.
pag. 252. Sauv. 232.

Sison amomum officinis nostris. Bot. Mons. 242.

Sison aromaticum sive sison officinarum. Tour. 308.

HABITAT Monspelii in ledo amne, à Grammont, à Salazon ad lèvam in rivulo.

2. SISON foliolis caulinis subcapillaribus. Linn. sp. pag. *Ammi*.
252.

Fœniculum annum odore origani. Tour. 312.

Ammi perpusillum. Lob. Icon. 725.

HOSPITATUR sub dio. Umbella universalis (apud nos an semper) umbilicata; umbellulæ omnes involucello quinquephyllo, foliolis duobus cæteris longioribus, apice dilatis, ovatis, acuminatis.

3. SISON foliolis verticillatis capillaribus. Linn. sp. pag. *verticillatum*
253.

Bunium bulbis oblongis. Sauv. 256.

Carum foliolis setaceis verticillatis, radice napiformi.
Sauv. 168.

Carvi foliis tenuissimis asphodeli radice. Tour. 306.

HABITAT à l'Esperou, Saint Guillen le Désert.

HOSPITATUR sub dio.

B U B O N.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 264.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis, inferior bipinnata, summa pinnata, foliolis inferioribus pinnularum petiolatis; omnibus simplicibus incisis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

1. BUB. foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. Linn. sp. 253. Sauv. 260. *Macedonicum*

Apium Macedonicum. Tour. 305.

Le persil de Macédoine.

HOSPITATUR sub dio. Folia tenera tomento incana, caulis summus itidem albicans.

O E N A N T H E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 267.

Char. sec. Rad. nunc perpendicularis bulbosa, nunc horizontalis fibrosa. Caul. herbacea striata,

nunc solida, nunc stipulosa. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus incisis; vel inferior bipinnata, superior pinnata. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Fistulosa. 1. OENANT. stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Linn. sp.* 254.

Oenanthe aquatica. *Tour.* 313. *Bot. Mons.* 189.

Oenanthe sive filipendula aquatica.

HABITAT Monspelii in aquis laterensibus. Altitudo pedalis & sesquipedalis. Foliola inferiora bipinnata, foliolis pinnularum ovatis profunde incisis. Umbellulæ convexæ. Radix quandoque bulbiformis globosa, radiculis fibrosis lateralibus.

Crocata. 2. OENANT. foliis omnibus multifidis obtusis subæqualibus. *Linn. sp.* 254.

Oenanthe chærophyllo foliis. *Tour.* 313.

Oenanthe cicutæ facie succo viroso croceo. *Lob. Icon.* 730.

HOSPITATUR in frigidario. Succus venenatus.

Pimpinelloï- des. 3. OENANT. foliolis radicalibus ovatis incisis, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus. *Linn. sp. pag.* 255.

Oenanthe pastinacæ sylvestris folio, semine attriplicis. *Bot. Mons.* 189.

Oenanthe apiifolio. *Tour.* 313.

HOSPITATUR sub dio. Rara in agro Monspeliensi. Bis tantum vidi ultrà *Prades*, ad lœvam versus Montem lupum.

Charophyllæa. 4. OENANT. foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis, feminibus muticis.

Oenanthe chærophyllo foliis. *Sauv.* 260. *Magn. hor.* 146. *Tour.* 313.

Ferula alpina humilis, foliorum pinnis angustissimis, trifariam, quinquefariamve divisis. *Seg. ver. tom. II. p.* 37.

Seseli Massiliense nuperorum, folio aliquatenus simili visnagæ. *J. B.* 3. p. 2. 33.

Seseli nuperorum. *Lob. Icon.* 785. Icon bona.

HOSPITATUR sub dio. An revera sui generis nondum examinare licuit. Semina hujuscce ex horto Parisino habuerat juvenis Chycoyneau sub nomine *Oenant.*

Charoph.

Chæroph. fol. hort. Mons. ipsa tamen involucra neque semen figuram sui generis præ se fert.

P H E L L A N D R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 268.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. ramosa striata herbacea. Fol. alterna amplexicaulis, inferior tripinnata, superior bipinnatafoliolis simplicibus pinnatifidis. Flor. umbellata terminalis. Fulcr. nulla.

i. PHELLAND. foliorum ramificationibus divaricatis. *Aquaticum.*
Linn. sp. 255.

Cicutaria palustris tenuifolia. Bot. Mons. 293.

Phellandrium. Tour. 306.

La Cigüe d'eau.

HABITAT propè Monspelium, à Nîmes dans le Vistre.
HOSPITATUR in aquario palustri.

Æ T H U S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 271.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis bipinnatafoliolis sessilibus simplicibus multifidis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

i. ÆTHUSA. Linn. sp. 256. *Cynapium.*

Cicuta minor petroselino similis. Tour. 306.

La petite Cigüe.

HOSPITATUR sub dio.

C O R I A N D R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 270.

Char. sec. Rad. tenuis fusiformis. Caul. herbacea striata. Fol. alterna amplexicaulis pinnatafoliolis simplicibus multifidis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

i. CORIAND. fructibus globosis. Linn. sp. pag. 256. *Majus.*
Sauv. 260. Tour. 316.

Le Coriandre.

HOSPITATUR sub dio. Annum.

S C A N D I X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 273.

Char. sec. *Rad.* fusiformis tenuis. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata vel bipinnata, foliolis incisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

Odorata. 1. SCAND. seminibus sulcatis angulatis. *Linn. sp.* 256.
Sauv. 260.

Myrrhis major seu *cicutaria odorata.* *Tour.* 315.
Le Cerfeuil musqué.

HOSPITATUR sub dio.

Pedunculata. 2. SCAND. seminibus lœvibus rostro longioribus. *Linn. sp.* 256.

Scandix semine rostrato, vulgaris. *Bot. Mons.* 232.
Tour. 326.

Le peigne de Venus. Vernaculè *las aguietas,* sed impropriè.

HABITAT ubique Monspelii.

Cerefolium. 3. SCAND. seminibus nitidis ovato-subulatis. *Linn. sp.*
pag. 257.

Chærophillum sativum. *Tour.* 314.

Le Cerfeuil; vernaculè de Cerfeul.

HABITAT Monspelii in oleribus.

Australis. 4. SCAND. seminibus rostratis patulis pedunculo longioribus. *Sauv.* 260.

Scandix seminibus rostratis subulatis hispidis, floribus radiatis, caulis lœvibus. *Linn. sp.* 257.

Scandix cretica minor. *Bot. Mons.* 232. *Tour.* 326.

HABITAT Monspelii ad lœvam circà *Boutonet;* vix semipedalis rigida nec striata, simplicissima vel quandoque ramo uno aut altero à basi caulis. Umbellæ sæpiùs terminales duæ; foliola capillaria.

C H Æ R O P H Y L L U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 274.

Char. sec. *Rad.* fusiformis (in unâ specie globosa.) *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus incisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

* *Floribus omnibus hermaphroditis.*

1. CHÆR. flosculis omnibus hermaphroditis, caule *sylvestre*: æquali. *Linn. sp. 258.*
Myrrhis sylvestris seminibus lœvibus. *Bot. Mons. 181.*
Chærophillum sylvestre perenne cicutæ folio. *Tour. 114.*
Chærophillum seminibus lœvibus nitidis, petiolis ramiferis simplicibus. *Sauv. 258.*
HABITAT *Monspelii*, à la Verune dans le Parc.
HOSPITATUR sub dio.
- * *Floribus disci masculis.*
2. CHÆR. caule scabro, geniculis tumidis. *Linn. sp. 253.* *Temulum.*
Chærophillum caule maculato, geniculis tumidis. *Sauv. 262.*
Myrrhis annua semine striato lœvi. *Tour. 315.*
HABITAT à l'Esperou.
HOSPITATUR in frigidario. Foliola extima in petiolum decurrentia seu basi coadunata, ut apex pinnularum videatur tantum pinnatifidus. Caulis fistulosus.
3. CHÆR. caule æquali, foliolis incisis acutis. *Linn. sp. 258.* *Hirsutum.*
Chærophillum foliolis dissectis, petiolis ramiferis universalibus, utrinque membrana auctis. *Sauv. 262.*
Myrrhis palustris latifolia alba. *Tour. 315.*
HABITAT cum priori.
HOSPITATUR sub dio. Puncta albida supra serraturas; an glandulæ? foliola omnia exteriora latiora & longiora.

S E S E L I.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 275.*

Char. sec. Rad. tenuis fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis, bipinnata vel tripinnata, foliolis simplicibus linearibus. Flor. umbellata terminalis. Fulc. nulla.

1. SES. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis. *Linn. sp. 260.* *Sauv. 256.* *Montanum.*
Fœniculum sylvestre perenne ferulæ folio breviori. *Tour. 311.*
Meum alterum *Italicum* quibusdam. *J. Bauh. 3. part. 2. 15.*
HOSPITATUR sub dio.
2. SES. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis singularibus binatisque. *Linn. sp. 260.* *Glaucum.*

Daucus glauco folio similis fœniculo tortuoso. Bot.
Mons. 85.

Fœniculum sylvestre glauco folio. Tour. 311.

Peucedanum minus. Bauh. pin. 149.

Le Sefeli.

HABITAT Monspelii circà la Valette, la Colombiere,
Montferrier.

Tortuosum. 3. SES. caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis.
Linn. sp. 260.

Oenanthe striata rigida. Sauv. 257.

Seseli Massiliense fœniculi folio crassiore. Bot. Mons.
239.

Fœniculum tortuosum. Tour. 311.

Le Sefeli de Marseille, ou Fenouil tortu.

HABITAT Monspelii, frequens circà Gramuntium.

Annum. 4. SES. petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. Sauv. 256. Linn. sp. pag. 260.

HABITAT Montpelii cum ses. glauco, sed rariùs.

THAPSIA.

Char. prim. Vid. Linn gen. pl. 278.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus pinnatifidis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

Villosa. 1. THAP. foliolis dentatis basi coadunatis. Linn. sp. 261.
Thapsia quorumdam hirsuta & aspera cicutæ folio, flore luteo, semine lato. Bot. Mons. 249.

Thapsia latifolia villosa. Tour. 322.

Malherbe.

HABITAT Monspelii ad mare.

Fætidæ. 2. THAP. foliolis multifidis basi angustatis. Linn. sp. 261.
Thapsia carottæ folio. Bauh. pin. 149.
HOSPITATUR sub dio.

Asclepium. 3. THAP. foliolis multifidis setaceis. Linn. sp. 261.
Thapsia foliolis pinnatifidis linearibus ad petiolum communem radiatis. Sauv. 258.

Thapsia tenuiore folio. Tour. 322.

Thapsia sive turbith garganicum. Tour. 322.

Thapsia thalictri folio. Bot. Mons. 287. Icon. 286.

La Thapsie, ou Turbith bâtarde.

HABITAT Monspelii; près de l'Esperou, dans le bois de Salvos.

PASTINACA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 279.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis, pinnata, bipinnata, foliolis simplicibus, latis incisis. Flor. terminalis umbellata. Fulc. nulla.

1. PAST. foliis pinnatis simpliciter. Linn. sp. 262.

Pastinaca sylvestris latifolia. Tour. 319. Bot. Mons. 199. & sativa. Tour. ibid.

Le Panais, ou Pastenade; vernaculè, Pastenague.

HABITAT Monspelii ubique. Pinnulæ obliquè ovatæ, incisæ oppositæ (pastinacæ sativæ,) subsessiles; in pastinaca sylvestri, pinnulæ petiolatæ, duplo majoræ, hirsutæ lobatæ.

2. PAST. foliis decompositis pinnatis. Linn. sp. 262.

Panax costinum. Bot. Mons. 197.

Pastinaca sylvestris altissima. Tour. 319.

HABITAT Monspelii versùs Villam novam secus fluvium.

SMYRNIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 280.

Char. sec. Rad. rapacea. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis biternata, foliolis simplicibus incisis latiusculis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

1. SMYR. foliis caulinis ternatis petiolatis ferratis. Sauv. 262. Linn. 262. Olfatrum.

Smyrnium Dioscoridis. Bot. Mons. 242.

Smyrnium Mathioli. Tour. 316.

Le Maceron.

HABITAT Monspelii versùs Villam novam; à St. Paul, à Monteil, ad dexteram.

ANETHUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 281.

Char. sec. Rad. tereti-fusiformis. Caul. herbacea striata. Fol. alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus pinnatifidis, filiformibus vel

linearibus, planiusculis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

Graveolens. 1. ANETH. fructibus compressis. *Linn.* sp. 263. *Sauv.* 255.

Anethum hortense. *Tour.* 318.

Anethum. *Lob. Icon.* 776.

L'Anet.

HOSPITATUR sub dio. Annum. Vix pedalem superans altitudinem. Foliola omnia linearia planiuscula.

Foeniculum. 2. ANETH. fructibus ovatis. *Linn.* sp. 263. *Sauv.* 255.

Foeniculum vulgare acriori & nigriori semine. *Bot. Mons.* 98.

Foeniculum dulce majore & albo semine. *Tour.* 311.

Le Fenouil; vernaculè, *lou Fenoul.*

HABITAT ubique Monspelii. Foliola linearia teretiuscula. Altitudo humana.

C A R U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 282.

Char sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea. *Fol.* alterna amplexicaulis, bipinnata, foliolis simplicibus incisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Carvi. 1. CAR. *Linn.* sp. 263. *Lob. Icon.* 724. *Tour.* 306. *Sauv.*

257.

Le Carvi.

HABITAT Monspelii; à l'Esperou.

HOSPITATUR sub dio.

PIMPINELLA.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 283.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, foliolis latiusculis simplicibus incisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Saxifraga. 1. PIMPIN. foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. *Linn.* sp. pag. 263.

Pimpinella saxifraga minor. *Bot. Mons.* 204. & major.

Ibid.

Tragofelinum umbella rubente. *Tour.* 309.

1. *Pimpinella foliolis trifidis lobo medio tripartito, lobulis quadrifidis.* *Sauv.* 231.
La Bouquetine.

2. *Pimpinella pinnis semi-lobatis circumferratis.* *Sauv.* 231.

Tragofelinum umbella candida. *Tour.* 309.

La Pimprenelle blanche.

3. *Pimpinella foliolis subrotundis.* *Sauv.* 231. & *pinnis laciniatis superioribus tenuissimis.* *Sauv.* 231.

Tragofelinum alterum majus. *Tour.* 309. & *minus.*
Ibid.

Le Boucage.

HABITAT Monspelii; *au Capouladou*, à l'Esperou. B. *au nord du mont St. Loup.*

4. *PIMPIN.* *foliis radicalibus trifidis incisis.* *Linn.* 264. *Anisum.*

Anisum foliis radicalibus simplicibus. *Sauv.* 231.

L'Anis, vernaculè *l'Anis.*

HOSPITATUR sub dio. Annum. Altitudo anethi.

A P I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 285.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata, sulcata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulg.* nulla.

1. *APIUM* foliolis caulinis linearibus. *Linn.* 264. *Petroselinum.*
Apium hortense. *Tour.* 305. vulgò petroselinum.
Le Persil, vernaculè *Jaoüibert.*
HABITAT Monspelii in hortis. Folia summa pinnata, foliolis tribus vel quinque integerrimis; foliolum unicum simplex (sæpiùs) involucriforme ad basim umbellæ universalis.

2. *APIUM* foliolis caulinis cuneiformibus. *Linn.* sp. 264. *Graveolens.*
subtrifidis.

Apium palustre seu officinarum. *Bot. Mons.* 24. *Tour.* 305.

Le Celeri, vernaculè *l'Api.*

HABITAT Monspelii cum priori. Caulis sulcatus. Foliola inferiora opposita petiolata trifida, superiora subsessilia. Puncta albida supra serraturas.

ÆGOPODIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 284.

Char. sec. *Rad.* horizontalis. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, inferior biternata, foliolis sessilibus, superior ternata foliolis petiolatis, omnibus simplicibus integris. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

Podagraria. 1. ÆGOP. foliis caulinis summis ternatis. *Linn.* 265.

Sauv. 182.

Angelica sylvestris minor seu erratica. *Tour.* 313.

Podagraria Germanica. *Lob. Icon.* 700.

L'Herbe à Gerard, ou Pied de chévre.

HABITAT Monspelii; à l'Esperou. Luxuriat in labyrintho horti regii.

Foliola obversè ovata acuta serrata.

TRIGYNIA.

RHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 287.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa arborea. *Fol.* simplex integerrima alterna petiolata, nunc ternata, aut impari-pinnata, foliolis simplicibus integris. *Flor.* axillaris terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Coriaria. 1. RHUS foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus, subtus villosis. *Linn. sp.* 265.

Rhus folio ulmi. *Bot. Mons.* 222. *Tour.* 611.

Rhus coriariorum. *Lob. Icon.* 98.

Rhus sive sumac. *J. Bauh.* 1. 555.

Le Sumac.

HABITAT Monspelii; à Castelnau, Lamousson, &c. Arbor. Folia pinnata, foliolis 13. vel 15. sessilibus oppositis ad apicem serratis, basi integerrimis. Florens julio.

Toxicoden- 2. RHUS foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pu-
dron. bescientibus. *Linn.* 266.

Toxicodendrum triphyllum, folio sinuato candicante. *Tour.* 611.

- Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis, &c. Sauv. 172.
 Hedera trifolia racemosa Canadensis. Barr. Icon. 288.
 HOSPITATUR in frigidario. Radix horizontalis. Frutex.
3. RHUS foliis simplicibus obovatis. Linn. sp. 267. *Cotinus.*
Cotinus coriaria. Tour. 611.
Coccygria Theophrasti. Lob. Icon. 99. Barr. Icon. 528.
Le Fustet.
 HOSPITATUR in frigidario. Frutex.

VIBURNUM.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 292.
 Char. sec. Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea.
Fol. opposita petiolata, simplex integra integrifolia. *Flor.* terminalis cymosa vel capitata.
Fulcr. nulla; glandulæ (in unâ specie) supra petiolum.
1. VIBUR. foliis integerrimis ovatis, ramificationibus subtus villoso-glandulosis. Linn. sp. pag. 267. *Tinus.*
 Viburnum foliis ovatis integerrimis. Sauv. 136.
Laurus sylvestris, corni feminæ folio hirsuto. Bot. Mons. 152.
Tinus prior. Tour. 607.
Le Laurier-tin, vernaculè *Laoürietin*.
 HABITAT Monspelii; à Valene. Arbor semperfurens.
2. VIBUR. foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosus. Linn. sp. 268. Sauv. 136. *Lantana.*
 Viburnum vulgò. Bot. Mons. 275. Tour. 607.
La Viorne.
 HABITAT Monspelii, à Valene & à St. Martin. Arbuscula.
3. VIBUR. foliis lobatis, petiolis glandulosis. Linn. 268. *Opulus.*
 Opulus. Tour. 607. Sauv. 202.
L'Obier.
 HOSPITATUR sub dio. Arbuscula. Corymbi globosi.

SAMBUCUS.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 294.
 Char. sec. Rad. lignosa ramosa. Caul. herbacea vel arborea. Fol. opposita impari-pinnata, foliolis simplicibus integris petiolatis. Flor. cymosa vel racemosa, terminalis pedunculata.
Fulcr. stipulæ.

- Ebulus.** 1. SAMB. cymis tripartitis, stipulis foliaceis. *Linn. sp.*
pag. 269.
Sambucus humilis sive ebulus. Bot. Mons. 229. Tour.
606.
L'Hyble; vernaculè, lous Ebous.
HABITAT Monspelii secus amnem.
- Nigra.** 2. SAMB. cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn.*
sp. pag. 269.
Sambucus fructu in umbella nigro. Bot. Mons. 229.
Tour. 606.
Sambucus caule arboreo floribus umbellatis. Sauv. 222.
Le Sureau; vernaculè, lou Sambuc.
HABITAT ubique ad margines agrorum.
- Racemosa.** 3. SAMB. racemis compositis ovatis, caule arboreo.
Linn. sp. p. 270.
Sambucus caule arboreo ramoso, floribus racemosis.
Sauv. 222.
Sambucus racemosa. Tour. 606.
HOSPITATUR sub dio.

S T A P H Y L E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 296.*
Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol.*
opposita, impari-pinnata, foliolis simplicibus.
integris sessilibus. Flor. laxe racemosa axillaris;
& terminalis. Fulcr. stipulæ binæ lanceolatæ
membranaceæ.

- Pinnata.** 1. STAPH. foliis pinnatis. *Linn. sp. pag. 270.*
Staphylocarpus. Tour. 616.
Le Nés coupé.
HOSPITATUR in frigidario. Arbor. Semina maturans.
 Folia pinnata foliolis quinque vel septem argutè serratis. Stipulæ flavescentes. Racemi longitudine foliorum.

T A M A R I X.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 295.*
Char. sec. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea.*
Fol. minima alterna imbricata simplicissima integerrima. Flor. racemosa terminalis. Fulcr.
stipula solitaria subulata minima, ad basim ramificationum.

- I. TAM. floribus pentandris. *Linn. sp. p. 270. Sauv. 45.* *Gallica.*
Tamariscus Narbonensis. Bot. Mons. 248. Tour. 661.
Le Tamarisc; vernaculè, de Tamaris.
HABITAT Monspelii ad mare, & à Montferrier.

T U R N E R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 297.*

Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol.*
alterna subpetiolata simplex integra. Flor. axil-
laris solitaria subsessilis petiolaris. Fulc. bracteæ
binæ ad latera calycis lanceolatæ; glandula
solitaria petiolaris.

- I. TURN. bracteis serratis calyci æqualibus.

Ulmifolia.

Turnera foliis serratis, petiolis floriferis. Linn. sp. p. 271.
HOSPITATUR sub dio. Folia ovato-lanceolata inæqua-
liter serrata, petiolo nullo vel brevissimo. Flores
lutei in medio petiolo. Calycis denticuli acuminati.
Difficile sæpius distinguitur utrum reverâ flos sit
petiolaris vel axillaris, idque petioli brevitatis causa.

T E L E P H I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 298.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea an-*
gulata procumbens. Fol. alterna sessilis simplex
integerrima. Flor. cymosa terminalis. Fulc.
nulla.

- I. TELEPH. foliis obverse ovatis.

Imperati.

Telephium. Linn. sp. p. 271. Tour. 249.

Telephium foliis orbicularis humifusis pinnatis. Sauv.
^{227.}

HOSPITATUR sub dio. Nervi foliorum decurrent in
caulem.

C O R R I G I O L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 299.*

Char. sec. *Rad. tenuissima. Caul. herbacea ramosa*
teres. Fol. alterna sessilis simplex integerrima.
Flor. fasciculata terminalis. Fulcr. nulla.

- I. CORRIG. foliis lanceolatis.

Littoralis.

Corrigiola. Linn. sp. p. 271. Sauv. 53.

156 PENTANDRIA TETRAGYNIA.

Polygonifolia per terram sparsa flore scorpioïdes.

Bot. Mons. 210.

HABITAT Monspelii, *au mont St. Loup*, & à la source du Lés ad lèvam pone montem; glomeruli quidam florum interdum axillares. Plantula vix palmaris.

ALSINE.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 342.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea teres articulata. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata, solitaria. *Fulc.* nulla.

Media. 1. ALS. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn.* sp. p. 272.

Alsine media. *Tour.* 243.

Alsine vulgaris sive morsus gallinæ. *Bot. Mons.* 12.

La Morgeline; vernaculè, *de Mourillous*.

HABITAT Monspelii passim.

BASSELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1047.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres volubilis. *Fol.* petiolata simplex integerrima succulenta. *Flor.* axillaris racemosa pedunculata. *Fulc.* nulla.

Rubra. 1. BAS. foliis planis. *Linn.* sp. p. 272.

HOSPITATUR sub dio. Annua (apud nos) Caulis dextrorum volubilis, ruber. Folia ovalia, petiolo ipsis multo breviore; corollæ albæ crassæ, apice purpureascentes.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 302.

Char. sec. *Rad.* subfusiformis radiculis fibrosis involuta. *Caul.* herbacea monophylla teres simplicissima. *Fol.* simplex integerrima, radicalis petiolata, caulina solitaria amplexicaulis sessilis. *Flor.* terminalis solitaria. *Fulc.* nulla.

1. PARN. foliis omnibus cordatis. *Palustris.*
 Parnassia. Linn. sp. p. 273. Sauv.
 Parnassia palustris & vulgaris. Tour. 246. Seg. ver.
 tom. I. pag. 441.
 HABITAT Monspelii, à l'Esperou, à Joyeuse.
 HOSPITATUR in frigidario; altitudo sesqui-palmaris
 vel minor.

PENTAGYNYIA.

STATICE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 305.

Char. sec. Rad. setacea tenuis. Caul. scaposa
 ramosissima. Fol. radicata sessilis simplex inte-
 gerrima. Flor. terminalis capitata vel laxè pa-
 niculata. Fulc. bractea (in paniculatis) subulata
 rigida ad basim cujuslibet calycis.

1. STAT. caule nudo simplici capitato. Linn. 274. *Armeria.*
Sauv. 27.

Statice Lugdunensium. Tour. 341.

Caryophyllum montanum major flore globofo. Bot.
Mons. 54. & minor. *Ibid.*

Le Gazon d'Espagne ou d'Olimpe.

HABITAT Monspelii, à l'Esperou.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Folia oblonga rigida.
 In horto culta foliis linearibus mollibus variat.

2. STAT. caule nudo paniculato tereti, foliis lœvibus. *Limonium.*
Linn. sp. p. 274.

Statice caule ramoso nudo, foliis lanceolato-ovali-
 bus glabris. *Sauv. 28.*

Limonium maritimum majus. Bot. *Mons. 155.* Tour.
 341.

3. Statice foliis obverse ovatis glabris, caule nudo.
Sauv. 15.

Limonium parvum, bellidis minoris folio. Bot. *Mons.*
 155. Tour. 341.

HABITAT Monspelii ad mare, ad stagna. Florens
 Augosto.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

3. STAT. caule nudo paniculato tereti, foliis tubercu- *Echioides.*
 latis. Linn. sp. p. 275.

Limonium minus annum, bullatis foliis. Bot. Mons.
157. Tab. 156. Tour. 342.

HABITAT Monspelii ultra pontem Sallenovæ ad dexteram in olivetis; vide superius ubi de avenâ bromoide & tillæâ rubrâ.

HOSPITATUR sub dio. Annua; palmaris.

L I N U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 306.

Char. sec. *Rad.* tenuis setacea. *Caul.* herbacea teres. *Fol.* simplex sessilis integerrima, alterna vel opposita, vel inferior opposita, superior alterna. *Flor.* terminalis laxe paniculata. *Fulc.* nulla.

* *Foliis alternis.*

Usitatissimum.

1. **LINUM** calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Linn. sp. p. 277.*

Linum ramis foliisque alternis, radice annua. *Sauv. 53.*

Linum angustifolium. Bot. Mons. 160.

Linum arvense. Tour. 339. & sativum. *Ibid.*

Le Lin d'usage; vernaculè lou lin.

HABITAT Monspelii in agris.

Perenne. 2. **LINUM** calycibus, capsulisque obtusis, foliis alternis lanceolatis integerrimis. *Linn. 277.*

Linum perenne ramis, foliisque alternis linearilanceolatis. *Sauv. 53.*

Linum perenne majus cæruleum, capitulo majore.
Tour. 339.

HOSPITATUR sub dio.

Narbonense. 3. **LINUM** calycibus acuminatis, foliis lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso. *Linn. sp. 278.*

Linum sylvestre cæruleum, folio acuto. Tour. 340.
& Barr. Icon. 100. Sauv. 92.

Linum sylvestre cæruleo ampio flore, angustifolium.
Sauv. 54. Bot. Mons. 161.

HABITAT Monspelii, circâ Caunelles, Castelnau.

Tenuifolium. 4. **LINUM** calycibus acuminatis; foliis sparsis linearibus setaceis retrorsum scabris. *Linn. 278.*

Linum perenne foliis angustioribus, calyce aristato.
Sauv. 49.

3. Linum sylvestre angustifolium floribus dilutè purpureis vel carneis. Bot. Mons. 160. Tour. 340.
 HABITAT cum priori mirè varians.
4. LINUM calycibus acutis, foliis linear-lanceolatis *Trigynum.*
 alternis, paniculæ ramis bifloris. Linn. sp. pag. 279.
 Linum sylvestre annum luteum, folio angustiore.
 Tour. 340.
 Linum sylvestre minus flore luteo. Bot. Mons. 160.
 Linum foliis linear-lanceolatis, pedunculis bifidis,
 flore luteo. Sauv. 53.
 HABITAT Monspelii, à la Valette, au Terrail. Variat
 quandoque floribus pentagynis.
6. LINUM calycibus subserrato-scabris lanceolatis sub- *Flavum.*
 sessilibus, panicula ramis dichotomis. Linn. sp. 279.
 Linum sylvestre latifolium luteum. Tour. 340.
 HABITAT Monspelii, au Mont Saint Loup.
7. LINUM calycibus, foliisque lanceolatis strictis mu- *strictum.*
 cronatis: margine scabris. Linn. 279.
 Linum foliis asperis umbellatum luteum. Bot. Mons.
 164. Tour. 340. Sauv. 53.
 Lithospermum linariæ folio Monspeliacum. Bot.
 Mons. 164.
 HABITAT Monspelii frequens. Copiosum circà La-
 vanet & Boutonet: vix semipedale. Folia cauli ad-
 pressa; nervo & margine scabris. Panicula con-
 glomerata.
8. LINUM foliorum basi utrinque puncto glandulosi. *Campanula-*
tum.
 Linn. sp. 280.
 Linum foliis imis spathulatis, floribus luteis. Sauv. 76.
 Campanula montis Lupi. Lob. Icon. 414. Barr.
 Icon. 820. insufficiens.
 Linum sylvestre luteum foliis subrotundis. Bot.
 Mons. 163. Tour. 340.
 HABITAT Monspelii, au mont Saint Loup.
9. LINUM calycibus ovatis acutis muticis, foliis lan- *Maritimum.*
 ceolatis: inferioribus oppositis. Linn. sp. pag. 280.
 Linum caule simplici, ramis, foliisque inferioribus
 oppositis. Sauv. 147.
 Linum maritimum luteum. Bot. Mons. 160. Tour.
 340.
 HABITAT Monspelii ad mare & stagna. Occurrit
 quandoque in pratis laterensibus. Florens Augusto.

* *Foliis oppositis.*

- Catharticum** 10. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Linn. sp.* 281.
 Linum maritimum vel alsine glabra flosculis albis.
Bot. Mons. 161.
 Linum pratense flosculis exiguis. *Tour.* 340. *Barr.*
Icon. 1165. n°. 1.
 Linum caule dichotomo, foliis, &c. *Sauv.* 147.
 HABITAT Monspelii propè Molendinas secùs ledum
Amnem. A *Sauret.*

D R O S E R A.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. plant.* 307.
 Char. sec. *Rad.* tenuissima filiformis. *Caul.* scapoza multiflora. *Fol.* radicalis simplex petiolata integerrima. *Flor.* terminalis racemosa simplex. *Fulcr.* grandulæ petiolatæ glutinosæ confertæ suprà folia.

- Rotundifolia.** 1. DROS. scapis radicantis, foliis orbiculatis. *Linn. sp.* 281. *Sauv.* 15.
 Rossolis folio rotundo. *Tour.* 245. *Barr.* *Icon.* 251.
Le Rossolis.
 HABITAT in humidis. à l'Esperou.
 HOSPITATUR sub dio. In frigidario & labyrintho horti regii; annum.

C R A S S U L A.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 308.
 Char. sec. *Rad.* fibrosa, funiformis. *Caul.* herbacea articulata succulenta. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima succulenta. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulcr.* nulla.

- Perfoliata.** 1. CRAS. foliis lanceolato-subulatis sessilibus connatis canaliculatis: subtus convexis. *Linn. sp.* 282.
 HOSPITATUR in Caldario.
Tetragona. 2. CRAS. foliis subulatis obsolete tetragonis. *Linn. sp.* 283. *Sauv.* 7.
 HOSPITATUR in Caldario.

POLYGYNIA.

MYOSURUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 311.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* teres
scaposa uniflora. *Fol.* radicalis linearis simplex
sessilis integerrima. *Flor.* terminalis solitaria.
Fulc. nulla.

Obs. Cave ne receptaculum elongatum pro spicula
sumas.

MYOS. Linn. sp. 284. Sauv. 26.

Ranunculus gramineo folio; flore caudato in capi-
tulum spicatum congestis. Tour. 293. *Minimus.*

Myosurus sive cauda muris. Lob. Icon. 440.

Holosteum affinis cauda muris. Bot. Mons. 132.

La queue de rat.

HABITAT Monspelii in humidis, à l'entrée du bois de
Gramont; scapus vix triuncialis. Folia plana;
variat floribus dodecandris.



Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

B R O M E L I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 312.

Char. secund. *Rad.* funiformis. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis sessilis simplex integra. *Flor.* radicalis sessilis spicata conica strobiliformis. *Fulcr.* bracteæ ad basim calycis, ovatæ, solitariæ. Bracteæ foliaceæ magnæ terminales steriles. Spinæ ad margines foliorum.

Ananas. 1. BROM. foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. Linn. sp. 285.

Ananas fructu pyramidato carne albida. Tour. 653.
& carne aurea. Ibid.

L'Ananas ou le pain de sucre.

HOSPITATUR in caldario. Semper virens.

T R A D E S C A N T I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 316.

Char. secund. *Rad.* carnofa. *Caul.* herbacea. *Fol.* alterna, subulata vaginans simplex integerrima, basi connata. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* bracteæ binæ involucri-formes ad basim umbellæ, foliaceæ subulatæ.

Virginiana. 1. TRAD. bracteis umbella longioribus, pedunculis apice incrassatis.

Tradescantia. Linn. sp. 288.

Ephemerum virginianum flore cæruleo minori. Tour. 368.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi inæquales. Calix villosus magnitudine ferè floris.

G A L A N T H U S.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 317.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa uniflora. *Fol.* radicalis sessilis linearis simplex integrerrima. *Flor.* terminalis solitaria. *Fulcr.* nulla.

I. GAL. *Linn. sp.* 288. *Sauv.*

Narcisso-leucojum trifolium minus. *Tour.* 387. *Seg. ver. T. II. p.* 72.

HOSPITATUR in frigidario. Spatha longitudine floris vel paulo brevior spathulata.

L E U C O J U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 318.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa multiflora. *Fol.* radicalis linearis sessilis simplex integrerrima. *Flor.* terminalis aggregata. *Fulcr.* nulla.

I. LEUC. spatha multiflora, stilo filiformi. *Linn. sp.* 289. *Autumnale.*

Leucojum bulbosum majus. *Bot. Mons.* 153.

Narcisso-leucojum pratense multiflorum. *Tour.* 383. *Le perce-neige.*

HABITAT Monspelii in pratis Laterensibus. Floret apud nos primo vere; scapus pedalis; pedunculi inæquales; spatha oblonga.

N A R C I S S U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 319. Adde stamina tria longiora, tria breviora intrà tubum.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis sessilis simplex integrerrima. *Flor.* terminalis. *Fulcr.* nulla.

Obs. Utrum revera tubus (intrà corollam) sit corollæ, vel nectarii pars, non adeo perspicuum; lineæ enim suprà petala excurrentes pari passu in tubum descendunt; undè ad corollam pertinere potius crederem.

I. NARC. spatha uniflora, nectarii limbo rotato brevissimo. *Linn. sp.* 289. *Poëticus.*

Narcissus foliis ensiformibus, floris nectario rotato brevissimo. *Sauv.* 17.

Narcissus albus circulo purpureo. *Bot. Mons.* 181. *Tour.* 353.

HABITAT Monspelii; prata laterensia una cum orchide militari pulchre ornat.

Pseudo Nar- 2. *NARC.* spatha uniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo æquale. *Linn. sp.* 289.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Sauv.* 17.

Narcissus sylvestris pallidus calycè luteo. *Tour.* 356.

HOSPITATUR sub dio. Scapus subanceps. Nectarium saepius crenatum.

Jonquilla. 3. *NARC.* spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Linn. sp.* 291.

Narcissus foliis subulatis florum nectariis brevissimis. *Sauv.* 19.

Narcissus juncifolius luteus minor. *Bot. Mons.* 182. *Tour.* 355.

La Jonquille; vernaculè *jonquille*.

HABITAT Monspelii, au Capouladou, à Saint Guillem le Désert.

Tazetta. 4. *NARC.* spatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Linn. sp.* 290.

Narcissus foliis ensiformibus, nectario campanulato, petalis longe breviore. *Sauv.* 18.

Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi. *Bot. Mons.* 181. *Tour.* 354. *Barr. Icon.* 925.

Le Narcisse; vernaculè *Pissauliech*.

HABITAT Monspelii, passim in pratis; folia plana disticha, pedunculi partiales subtriquetri. Tubus corollæ viridis.

PANCRA T I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 320.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa anceps multiflora. *Fol.* radicalis sessilis simplex integrifolia. *Flor.* terminalis. *Fulcr.* nulla.

Obs. Germina omnia sessilia in medio spathæ. Tubi florum longissimi, quibus notis ab omnibus distinguuntur.

1. PANCRAT. spatha multiflora, petalis planis, foliis *Maritimum*.
lingulatis. *Linn. sp. 291.*

Narcissus maritimus. Bot. Mons. 182. Tour. 357.
Le Narcisse de mer.

HABITAT Monspelii ad mare. Florens in fine Au-gusti. Nectarium bifidum, lacinulis emarginatis; stamina in ipsiusmet fissuris nectarii inserta.

A M A R Y L L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 321.*

Char. secund. *Rad. bulbosa. Caul. scaposa angu-lata sub-anceps. Fol. radicalis plana simplex. integerrima disticha. Flor. terminalis. Fulcr. nulla.*

1. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, geni-talibus strictis. *Lutea.*

Amaryllis spatha uniflora, corolla æquali, staminibus declinatis. *Linn. sp. 292.*

Lilio-narcissus luteus autumnalis major. *Tour. 386.*

L'Amaryllis jaune.

HOSPITATUR sub dio; luxuriat in horto regio; sta-mina alterna breviora.

2. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, ge-nitalibus declinatis. *Linn. 293.* *Formosissima.*

Lilio-narcissus jacobæus indicus latifolius, rubro flore.

Tour. 385. Barr. Icon. 1035.

La belle Amaryllis.

HOSPITATUR sub dio. Semper-virens.

3. AMARYLLIS spatha uniflora, corollis revolutis, ge-nitalibus strictis. *Linn. sp. 293.* *Sarniensis.*

Lilio-narcissus Japonicus rutilo flore. *Tour. 386.*

Lilio-narcissus Indicus polyanthos. *Barr. Icon. 126.*

La Guernesienne.

HOSPITATUR in hybernaculo.

A P H Y L L A N T H E S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 348.*

Char. secund. *Rad. fibrosa. Caul. teres scaposa. Fol. nulla. Flor. terminalis geminata sessilis. Fulcr. nulla.*

1. APHYLL. *Linn. sp. 294. Sauv. 8. Tour. 657.*

Monspeliensis

L. iij.

Caryophillus cæruleus Monspeliensium. *Bot. Mons.* 53.
Vernaculè Bragalou.
 HABITAT in sterilibus circà *Castelnau*, *Selleneuve*.

ALLIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 326.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* herbacea foliosa, nunc scaposa. *Fol.* sessilis simplex integrifolia, radicalis aut caulina vaginans solida, vel fistulosa. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

* *Foliis caulinis planis, umbellis capsuliferis, staminibus trifidis.*

Ampelopra- 1. ALLIUM caule planifolio, umbellifero, umbella, globosa, staminibus tricuspidatis, radice laterali. *Linn. sp. 294.*

Allium sphærico capite, folio latiore seu scorodoprasum alterum. *Tour. 383.*

HOSPITATUR sub dio.

Porrum. 2. ALLIUM planifolio caule umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Linn. sp. pag. 295.*

Porrum commune capitatum. *Tour. 382.* & *sativum latifolium.* *Ibid.*

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Sauv. 43.*

Le Porreau; vernaculè, des Porres.

HABITAT Monspelii in hortis & arvis.

Victorialis. 3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis, corolla longioribus. *Linn. sp. p. 295.*

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis.

Sauv. 42.

Allium montanum latifolium maculatum. *Tour. 383.*

HOSPITATUR sub dio.

Subhirsutum. 4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis. *Linn. sp. p. 295.*

Allium angustifolium umbellatum, flore albo. *Tour. 385.*

Allium sylvestre sive moly angustifolium umbellatum.

Bot. Mons. 9.

HABITAT Monspelii in maritimis.

Roseum. 5. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella fastigiata, staminibus corollam æquantibus, foliis laevibus. *Linn. sp. p. 296.*

Allium foliis ensiformibus, radice bulbillis stipata, floribus amplis umbellatis. *Sauv.* 42.

Allium sylvestre seu *moly* roseo ampio flore. *Bot.* *Mons.* II. tab. 10. *Tour.* 385.

HABITAT Monspelii. Copiosissimum à la Colombiere, Mommau, Lavalette. Altitudo pedalis. Flores 6-18.

* *Foliis caulinis planis, staminibus trifidis, umbellis bulbiferis.*

6. **ALLIUM** caule planifolio bulbifero, radice compo- *sativum.*
sita, staminibus tricuspidatis. *Linn.* sp. p. 296.

Allium sativum. *Tour.* 383.

L'Ail; vernaculè, *l'Al.*

HABITAT Monspelii in hortis.

7. **ALLIUM** caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis, *Scorodoprasum.*
vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis. *Linn.* sp. p. 297.

Porrum capitulo bulboso erecto, foliis planis subcre-
natis, vaginis ancipitibus. *Sauv.* 43.

Porrum radice laterali cordata solida, pedunculo re-
voluto, capitulo bulbifero. *Sauv.* 43.

Allium sativum alterum seu allioprasum caulis summo
circumvoluto. *Tour.* 383.

La Rocambole.

HABITAT Monspelii in oleribus.

* *Foliis caulinis teretibus, staminibus trifidis,*
umbellis capsuliferis.

8. **ALLIUM** caule teretifolio umbellifero, foliis semi- *Sphaerophyton.*
teretibus, staminibus tricuspidatis corolla longio-
ribus. *Linn.* sp. p. 297.

Allium montanum capite rotundo. *Tour.* 382.

Allium sive *moly* *montanum* *quintum.* *Bot.* *Mons.* 9.

Porrum capite sphærico absque bulbis, staminibus
alternatim trifidis. *Sauv.* II.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, Mommau, Mont-
ferrier.

9. **ALLIUM** caule teretifolio subnudo umbellifero, *Moschatum.*
umbella fastigiata, petalis truncatis, staminibus
tricuspidatis. *Linn.* sp. 298.

Allium moschatum capillaceo folio. *Bot.* *Mons.* II.

Sauv. 10.

Allium sylvestre perpusillum juncifolium moschatum. *Tour. 385.*

HABITAT Monspelii circà Montferrier, la Colombiere.

Flavum. 10. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus subulatis. *Linn. sp. p. 298.*

Allium sylvestre luteum juncifolium bicornis. *Bot. Mons. 9. Sauv. 10. Tour. 385.*

HABITAT Monspelii, à Boutonet.

* *Foliis caulinis teretibus, staminibus trifidis, umbellis bulbiferis.*

Vineale. 11. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Linn. sp. p. 299.*

Allium sylvestre vinearum. *Bot. Mons. 212. Tour. 382.*

Porrum radice conoidea, bulbillis innixa, foliis planis. *Sauv. 43.*

HABITAT Monspelii circà Castelnau & Gramont. Altitudo sesquipedalis.

Oleraceum. 12. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis. *Linn. pag. 299.*

Allium montanum bicornis flore obsoletiore. *Bot. Mons. 9. Tour. 382. Sauv. 10.*

HABITAT Monspelli ad lèvam à Selleneuve, & in sterilibus circà Montferrier ad dextram.

* *Foliis radicalibus scapo nudo.*

Angulosum. 13. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. *Linn. sp. p. 300.*

Allium petiænum umbelliferum. *Bot. Mons. 289. Tour. 384.*

Allium radice senescente lignosa transversa, umbella erecta. *Sauv. 42.*

HABITAT Monspelii in rupibus circà Rouquet, & pagum dictum les Matelles; ad lèvam circà sylvam Valene.

Ascalinum 14. ALLIUM scapo nudo tereti, foliis subulatis, umbella globosa, staminibus tricuspidatis. *Linn. Syst. nat. pag. 979.*

Cepa radice ovata tunicata fœta, bulbillis ovato-acuminatis hinc planis. *Sauv. 10.*

Cepa sterilis. *Bauh. pin. 72.*

Cepa ascalonica. *Tour.* 382.

Les Echalottes; vernaculè, *la Chalotte*.

HABITAT Monspelii cum oleribus.

15. ALLIUM scapo nudo semi-cylindrico, foliis lanceo-latis petiolatis, umbella fastigiata. *Linn. sp. p. 300.* *Ursinum.*

Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semi-cylindra-ceo, bulbo setis obvallato. *Sauv. 16.*

Allium sylvestre latifolium. *Tour. 383.*

HABITAT Monspelii, au Capouladou, à Lesperou. Folia palmaria.

16. ALLIUM scapo nudo infernè ventricoso longiore, foliis teretibus. *Linn. sp. p. 300.* *Cepa.*

Cepa vulgaris. *Tour. 382.*

Cepa scapo ventricoso foliis longiore, radice de-pressa. *Sauv. 10.*

L'Oignon; vernaculè, *la Sébe*.

17. ALLIUM scapo nudo folia adæquante, foliis tere-tibus ventricosis. *Linn. sp. p. 301.* *Fistulosum.*

Cepa oblonga. *Tour. 382.*

Cepa scapo nudo longitudine foliorum, foliis ven-tricosis. *Sauv. 10.*

La Ciboule; vernaculè, *la Ciboule*.

HABITAT in hortis oleraceis.

18. ALLIUM scapo nudo adæquante folia teretia su-bulato-filiformia. *Linn. sp. p. 301.* *Schanopra-sum.*

Cepa sterilis juncifolia perennis. *Tour. 382.*

Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis subulatis teretibus, &c. *Sauv. 10.*

Multis etiam *Ciboule*.

HABITAT in hortis; scapus vix palmaris. Folia fistulosa.

L I L I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 329.*

Char. sec. *Rad.* bulbosa squamosa. *Caul.* herbacea foliosa simplicissima. *Fol.* sessilis simplex integerrima, sparsa vel verticillata. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulg.* stipula unica, vel bina ad basim singuli pedicelli.

1. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis intus glabris. *Linn. sp. p. 302.* *Candidum.*

Lilium vulgare album. *Tour. 369.* flore erecto, & floribus dependentibus. *Ibid.*

Le Lys; vernaculè, *l'Ely*.

HOSPITATUR sub dio.

Chalcedoni. 2. LIL. foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. sp. p. 302.*

Lilium Byzantium miniatum. Tour. 371.

Lilium foliis verticillatis denis, corollis revolutis.

Sauv. 165.

Le Lys de St. Bruno, ou la Calcedoine.

HOSPITATUR sub dio.

Datur apud nos caule unifloro, foliis imbricatis, margine sub-cartilagineo albicante, petalorum unguibus valde pilosis, foliisque (summis) quinis, senis, octonis, denis & subverticillatis.

Martagon. 3. LIL. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. sp. p. 303.*

Lilium flore nutante ferrugineo. Bot. Mons. 155.

Lilium floribus reflexis, latifolium. Tour. 371.

Le Martagon; vernaculè, lou Martagoun.

HABITAT Monspelii, à *Lesperou*. Pulchrè varians; petala intus canaliculata; stamina longitudine pistilli, bracteæ geminæ ad basim cujuslibet pedunculi, altera minore; ita servato ordine, ut in inferioribus floribus bractea major ad sinistram, in superioribus verò ad dexteram pedicelli sita sit.

FRITILLARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 330.*

Char. sec. Rad. bulbosa duplicata. Caul. herbacea foliosa simplicissima. Fol. sessilis simplex integriformis subspiraliter digesta. Flor. terminalis racemosa. Fulc. bracteæ aliæ ad basim pedicelorum; aliæ ad apicem racemi steriles.

Imperialis. 1. FRITIL. racemo comoso infernè nudo, foliis integriformis. *Linn. sp. p. 303.*

Corona Imperialis. Tour. 373.

La Couronne Impériale.

HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis supernè coloratus, ad basim nudus, in medio foliosus. Folia decurrentia. Corollæ subcapitulatæ; petala basi nigricantia; cavitas nectarifera alba; stamina alterna longiora; radiculæ horizontales; florens Martio. Bracteæ terminales magnæ.

2. FRITIL. racemo mediisculo, foliis obliquis. *Linn.* *Perficea;*
pag. 304.

Fritillaria maxima flore obsoleto purpureo. *Tour.* 377.
Lilium Persicum. *Dodon.* 220.

La Fritillaire.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis; corollæ coloris violacei, vel purpurei obsoleti, vix avellanæ majores; stamina tria breviora; glandula nectarifera viridis; eodem tempore florens. Bracteæ terminales nullæ.

T U L I P A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 331.

Char. secund. *Rad.* bulbosa solida. *Caul.* scaposa uniflora. *Fol.* radicalis simplex integerrima. *Flor.* solitaria terminalis. *Fulc.* nulla.

1. TULIPA flore subnutante, foliis lanceolatis. *Linn.* sp. *Sylvestris.*
pag. 305.

Tulipa minor lutea Narbonensis. *Bot. Mons.* 272.
Tour. 372. *Sauv.* 306.

La Tulipe; vernaculè, la Tulipe.

HABITAT Monspelii, à Jouvignac, ad lœvam Sella-novæ, & à Caravettes.

2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. *Linn.* *Gesneriana.*
sp. p. 306.

Tulipa. *Tour.* 372. cuius varietates innumeræ.

La Tulipe des Jardiniers.

HABITAT in hortis.

O R N I T H O G A L U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 338.

Char. sec. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis simplex integerrima. *Flor.* terminalis racemosa corymbosa. *Fulc.* bracteæ ad basim pedicellorum.

* *Staminibus omnibus subulatis.*

1. ORNITH. scapo angulato, bracteis binis, umbella longioribus, pedunculis simplicissimis. *Luteum.*

Ornithogalum scapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Linn.* sp. p. 306. *Sauv.* 20.

Ornithogalum luteum. *Tour.* 379.

L'Ornithogale jaune.

HABITAT Monspelii circā pagum St. Jean de Vedas, la Garrigue du terrail.

- Minimum.* 2. ORNITH. scapo angulato, bracteis binis ternisve umbella longioribus, pedunculis ramosis.

Ornithogalum scapo angulato diphyllo, vel triphyllo, pedunculis ramosis. *Sauv.* 20. *Linn. sp. pag.* 306.

Ornithogalum luteum minus. *Tour.* 379.

HABITAT Monspelii; à la Croix du Capitaine ad lèvam, à Monteils in arvis. Palmare sæpius vidi, raro altius.

- Pyrenaicum.* 3. ORNITH. racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus, fructiferis scapo approximatis. *Linn. sp.* 306.

Ornithogalum spica longissima, filamentis triangulibus. *Sauv.* 19.

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albore virescentibus. *Tour.* 379.

HABITAT Monspelii; à la Garrigue du terrail, & à la Verune, in arvis; aux prés d'Arenes.

* *Staminibus alternis emarginatis.*

- Arabicum.* 4. ORNITH. floribus corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filamentis emarginatis. *Linn. sp. pag.* 307.

Ornithogalum umbellatum maximum. *Tour.* 378.

Lilium Alexandrinum Neotericorum, seu ornithogalum majus. *Lob. Icon.* 148.

HOSPITATUR sub dio. Scapus pedalis. Bracteæ magnæ cordatæ amplexicaules.

- Umbellatum.* 5. ORNITH. floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Linn. sp. pag.* 307.

Ornithogalum pedunculis imis summos superantibus. *Sauv.* 20.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. *Bot. Mons.* 194. *Tour.* 378.

L'Ornithogale ordinaire.

HABITAT Monspelii in arvis.

- Narbonense.* 6. ORNITH. racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis, floribusque patentibus. *Linn. Syst. 981. Cent. 2. pag.* 15.

Ornithogalum majus spicatum flore albo. *Tour.* 379.

Ornithogalum spicatum Monspeliense lacteo flore.

Bot. Mons. 194.

HABITAT cum priori.

S C I L L A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 337.

Char. secund. *Rad.* bulbosa solida, vel tunicata.

Caul. scaposa. *Fol.* radicalis sessilis simplex integrifolia. *Flor.* terminalis corymbosa, sub-racemosa. *Fulc.* bracteæ solitariæ vel binæ ad basim cujuslibet pedicelli, (in unâ specie nullæ.)

1. SCIL. radice tunicata. *Linn. sp.* 308. *Sauv.* 18.

Ornithogalum maritimum, sive *scilla* radice rubrâ.

Tour. 381.

La Squille, vernaculè *la Squille*.

HOSPITATUR sub dio. Florens extra terram.

2. SCIL. radice solidâ, corymbo conferto hemisphærico, bracteis geminis inæqualibus. *Linn. sp.* 308.

Scilla radice solidâ, floribus patentibus confertis corymbosis. *Sauv.* 18.

Ornithogalum spicatum cinereum, *Tour.* 380.

HOSPITATUR sub dio. Scapus pedalis. Folia latiora.

Filamenta lanceolata fistulosa. Bracteæ concolores duæ subulatæ; altera pedicello æqualis, altera longior.

3. SCIL. radice solidâ, corymbo conferto conico. *Linn.* *Peruviana*.
sp. 309.

Scilla latè umbellifera. *Sauv.* 18.

Ornithogalum cæruleum Lusitanicum latifolium. *Tour.* 381.

Ornithogalum eriophorum Peruvianum. *Tour. ibid.*

HOSPITATUR sub dio. Scapus vix semipedalis. Stamina fistulosa; corollæ minores quàm in priori.

4. SCILLA radice solidâ, floribus alternis lateralibus subnutantibus. *Linn. sp.* 309.

Hyacinthus serotinus elegantissimus. *J. Bauh. hist.* 2.
sp. 382.

Ornithogalum cæruleum Byzantium. *Tour.* 380.

Scilla radice solidâ, floribus nutantibus alternis. *Sauv.* 8.

HOSPITATUR in frigidario. Scapus palmaris vel semi-pedalis, angulatus sub-biflorus. Petala tria intus apice callosa; omnibus ad basim punctis albidis, notatis. Bracteæ minima membranacea. Folia lata scapo subæqualia.

Maritima.

Italica.

Peruviana.

Amœna.

- Autumnalis.* 5. SCILLA radice solida, foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis nudis adscendentibus longitudine floris. *Linn. sp. 309.*
Scilla radice solidâ, scapo multifloro, floribus capitatis. *Sauv. 19.*
Ornithogalum autumnale floribus dilutè purpureis. *Tour. 381.* & floribus cæruleis. *Ibid.*
Hyacinthus autumnalis minor. *Bot. Mons. 134.*
Hyacinthus stellaris autumnalis minor. *B. Pin. 47.* Flos cæruleus purpuræ dilutioris.
HABITAT in pratulis Gramuntianis, & ad lœvam in sterilibus, à Montferrier, vis-à-vis la Valette. Scapus palmaris teretiusculus; corollæ vix piso majores. Pedicelli longitudine florum. Bracteæ nullæ.
- Bifolia.* 6. SCILLA radice solidâ, floribus erectioribus paucioribus. *Linn. sp. 309.* *Sauv. 18.*
Ornithogalum Germanicum. *Tour. 380.* Species tres.
HABITAT à L'esperou.

A S P H O D E L U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 335.*

Char. secund. *Rad.* tuberosa fasciculata. *Caul.* nunc scaposa nunc foliosa. *Fol.* sessilis simplex integrerima, nunc radicalis subulata, nunc caulinæ triquetra; utraque fistulosa (in unâ specie) solida. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bractea ad basim pedicellorum.

- Luteus.* 1. ASPHOD. caule folioso, foliis triquetræ fistulosis. *Linn. sp. 309.* & foliis striatis. *Linn. Syst. 982.*
Asphodelus caule simplici folioso, foliis trigonis fistulosis. *Sauv. 43.*
Asphodelus luteus flore & radice. *Tour. 343.*
L'Asphodele jaune.
HOSPITATUR sub dio.

- Fistulosus.* 2. ASPHOD. scapo nudo, foliis strictis subulatis striatis subfistulosis. *Linn. sp. 309.* *Hort. Ups. 83.*
Asphodelus foliis fistulosis. *Tour. 344.*
Asphodelus caule nudo, foliis strictis. *Sauv. 20.*
HOSPITATUR sub dio & in frigidario. Folia sæpiùs semiteretia seu latere altero plano, altero lineis longitudinalibus scabro. Petala ovata albida; filamenta apice incrassata & dilatata.

3. ASPHOD. scapo nudo, foliis ensiformibus carinatis *Ramojus*:
lævibus. *Linn. sp.* 310.
Asphodelus caule nudo, foliis laxis. *Sauv.* 20.
Asphodelus albus ramosus mas. *Bot. Mons.* 31, *Tour.*
343. & non ramosus.
HABITAT ad mare, vers *Frontignan* & *Cette*.

ANTHERICUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 336.

Char. secund. *Rad.* funiculiformis. *Caul.* scaposa
simplex vel ramosa. *Fol.* radicalis graminea
canaliculata subulata vel succulenta. *Flor.* ter-
minalis racemosa, racemis simplicibus aut ra-
mosis. *Fulc.* bractea ad basim pedicellorum.

* *Phalangium foliis canaliculatis.*

1. ANOTHER. foliis planis, scapo ramoso, corollis pla- *Ramosum*.
nis. *Linn. sp.* 310. deciduis. *Sauv.* 19.

Phalangium parvo flore ramosum. *Tour.* 368. *Seg.*
ver. 2. p. 61.

HOSPITATUR sub dio.

2. ANOTHER. foliis planis, scapo simplicissimo. *Linn. Liliago.*
sp. 310.

Phalangium parvo flore non ramosum. *Tour.* 368.

Phalangium non ramosum. *Bot. Mons.* 201.

HABITAT à *Lesperou*, & au bois de *Valene*.

* *Bulbine foliis carnosis.*

3. ANOTHER. foliis carnosis teretibus, caule fruticoso. *Frutescens.*
Linn. sp. 310.

Bulbine caulescens. *Linn. hort. cliff.* 122.

HOSPITATUR in caldario. Bractæ ovatæ membrana-
ceæ magnæ.

* *Narthecium foliis ensiformibus.*

4. ANOTHER. foliis ensiformibus, perianthiis trilobis,
filamentis glabris. *Linn. sp. 311. Sauv.* 19. *Calycula-*
tum.

Phalangium alpinum palustre iridis folio. *Tour.* 368.

Seg. ver. Tom. II. p. 61. tab. XIV. Icon optima.

HABITAT à *Lesperou*. Folium quandoque unicum in
caule. Flores subspicati. Scapus simplicissimus.

ASPARAGUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 339.

Char. secund. Rad. uniformis Caul. ramosissima herbacea aut fruticulosa. Fol. sessilis linearis simplex integerrima, solitaria, terna aut fasciculata. Fulc. stipulae membranaceae minimae ad basim ramorum & foliorum.

Officinalis. 1. ASPAR. caule erecto herbaceo, foliis setaceis, stipulis paribus. *Linn. sp.* 313.

Asparagus. *Sauv.* 44. n^o. 150. & pag. 45. n^o. 151. & 152.

Maritimus. α . Asparagus maritimus crassiore folio. *Tour.* 300. *Bot. Mons.* 30.

Sativus. β . Asparagus sylvestris folio tenuissimo. *Tour.* 300. *Bot. Mons.* 30.

L'Asperge ordinaire, vernaculè *lous Espargous*.

HABITAT in hortis. α . ad mare.

Acutifolius. 2. ASPAR. caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis æqualibus. *Linn. sp.* 314.

Asparagus foliis aciformibus pungentibus, &c. *Sauv.* 45.

Asparagus foliis acutis. *Bot. Mons.* 31. *Tour.* 300.

L'Asperge sauvage, vernaculè *Espargou sauvage*, *roumecounil*.

HABITAT ad margines agrorum.

CONVALLARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 341.

Char. secund. Rad. horizontalis nodosa. Caul. scaposa vel foliosa. Fol. simplex integerrima, nunc sessilis radicalis basi angustata vaginans, nunc caulina semiamplexicaulis vel petiolata, alterna aut verticillata. Flor. nunc terminalis racemosa, nunc axillaris pedunculis uni vel multifloris. Ful. bracteæ (in racemosis) minimæ, (in axillaribus) nullæ.

* *Floribus racemosis.*

Majalis. 1. CONVALL. scapo nudo, corollis campanulatis. Convallaria scapo nudo. *Linn. sp.* 314. *Sauv.* 16.

Lilium

Lilium convallium. *Dod. pempt.* 205.

Lilium convallium album. *Tour.* 77. & *latifolium.* *Ibid.*

Le Lys des vallées.

HOSPITATUR sub dio. Folia sæpiùs bina lato-lanceo-lata vel ovata. Racemus secundus pauciflorus.

2. CONVALL. caule folioso, corollis rotatis, foliis *Bifolia*, cordatis alternis petiolatis.

Convallaria foliis cordatis. *Sauv.* 113. *Linn. sp.* 316.

Lilium convallium minus. *Barr. Icon.* 1212.

Smilax unifolia humillima. *Tour.* 654.

HABITAT à L'esperou. Corollæ sæpiùs quadrifidæ. Caulis palmaris.

HOSPITATUR in frigidario.

* *Floribus axillaribus.*

3. CONVALL. foliis verticillatis. *Linn. sp.* 315. *Sauv.* *verticillata.* 164.

Polygonatum angustifolium non ramosum. *Tour.* 78.
& ramosum.

HOSPITATUR in frigidario.

HABITAT à St. Guillin le Désert.

4. CONVALL. foliis alternis amplexicaulibus, caule *Polygonatum* ancipi, pedunculis axillaribus unifloris. *Linn. sp. tum.* 315. *Sauv.* 42. n°. 133.

Polygonatum vulgare latifolium. *Tour.* 78.

Polygonatum floribus ex singulis pedunculis. *Barr. Icon.* 711.

Le Sceau de Salomon.

HABITAT cum prioribus, & au bois de Salvous, près de L'esperou. Pedunculi quandoque biflori triflorive.

5. CONVALL. foliis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Linn. sp.* 315. *Multiflora.*

Polygonatum latifolium maximum. *Lob. Icon.* 637. *Tour.* 78.

Convallaria foliis alternis, pedunculis multifloris pendulis. *Sauv.* 42.

HABITAT cum prioribus.

Obs. Utraque datur apud nos, caule tereti vel ancipi, foliis latis aut angustis, pedunculis unifloris multiflorisve. An rite satis distinctæ? non patet.

POLIANTHES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 323.

Char. secund. *Rad.* tuberosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* sessilis simplex integerrima alterna subulata. *Flor.* terminalis alterna sessilis. *Fulc.* bractea ad basim floris singuli.

Tuberosa. 1. POLIANTH. *Linn.* sp. 316. *Sauv.* 41.

Hyacinthus Indicus tuberosus, flore Narcissi. *Bauh.* pin. 47. *Barr. Icon.* 1217.

Hyacinthus Indicus tuberosus, flore hyacinthi orientalis. *Tour.* 347.

La Tuberuse, vernaculè *la Tuberuse*.

HOSPITATUR sub dio.

HYACINTHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 342.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis simplex integerrima linearis hinc sufficiata vel utrinque plana. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Serotinus. 1. HYACINTH. corollarum exterioribus petalis distinctis, interioribus coadunatis. *Linn.* sp. 317.

Hyacinthus obsoleto flore. *Tour.* 345.

HOSPITATUR sub dio.

Orientalis. 2. HYACINTH. corollis infundibuliformibus semiflexidis basi ventricosis. *Linn.* sp. 317. *Sauv.* 17.

Hyacinthus orientalis. *Tour.* 345. Innumeræ varietates.

Hyacinthe ou Jacinthe, *Muguet*; vernaculè *lou Muguet*.

HOSPITATUR sub dio.

Muscari. 3. HYACINTH. corollis ovatis. *Linn.* sp. 317. *Sauv.* 17.

Hyacinthus racemosus moschatus. *Tour.* 348.

HABITAT ad lævam, *au-delà de la Peissine*; frequenter à *Nimes*.

Comosus. 4. HYACINTH. corollis angulato-cylindricis, summis sterilibus longius pedicellatis. *Linn.* sp. 318.

Hyacinthus corollis globosis, summis pedunculatis, foliis ensiformibus. *Sauv.* 17.

Muscari arvense latifolium purpurascens. *Tour.* 347.

Hyacinthus maximus botryoides. *Bat. Mons.* 133.

Vernaculè, *lou Couguoii*.

HABITAT in arvis circà urbem; & à Selleneuve, la Véruine, &c.

5. HYACINTH. corollis globosis uniformibus, foliis *Botryoides*.
canalicularo-cylindricis. *Linn. sp. 318.*

Hyacinthus coroialis globosis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. 19.*

Muscari arvense juncifolium cæruleum minus. *Tour. 348.*

Hyacinthus verus Botryoides cæruleus minor angustioribus foliis, odoratus. *Bot. Mons. 133.*

Vernaculè etiam, *lou Couguou.*

HABITAT ubique cum priori.

Y U C C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 344.*

Char. secund. *Rad. funiformis. Caul. scaposa. Fol. radicalis sessilis subulata succulenta simplex integerrima aut integra. Flor. racemosa axillaris. Fulc. aculei ad apicem foliorum solitarii. Bractea ad basim cujuslibet pedicelli.*

1. YUCCA foliis integerrimis. *Linn. sp. 319.*

Gloriosa.

Yucca Indica foliis aloës. *Barr. Icon. 1194.*

Cordyline foliis pungentibus integerrimis. *Sauv. 41.*

L'Yucca.

HOSPITATUR sub dio. Foliis abscissis, radix elevatur supra terram instar trunci.

2. YUCCA foliis crenatis nutantibus. *Linn. sp. 319.*

Draconis.

HOSPITATUR sub dio. Utraque species semina maturens.

A L O E.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 343.*

Char. secund. *Rad. funiformis. Caul. scaposa. Fol. succulenta radicalis simplex integerrima sessilis vel amplexicaulis. Flor. axillaris solitaria racemosa aut spicata. Fulc. aculei innumeri epiphylli (in plurimis) bractea solitaria ad basim floris cujuslibet.*

1. ALOE floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis. *Linn. sp. 319.*

Perfoliata.

Aloë foliis caulinis dentatis amplexicaulibus. *Sauv. 41.*

a. Aloë Africana caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Linn. sp. 320.*

g. Aloë Africana caulescens, foliis glaucis amplectentibus. *Linn. sp. 320.*

γ. Aloë Africana foliis glaucis; margine & dorsi superiore parte spinosis, flore rubro. *Linn. sp. 320.*

Humilis. δ. Aloë foliis erectis subulatis radicatis undique inerme spinosis. *Linn. sp. 320. Sauv. 6.*

Aloë Americana minor, foliis per margines frequen-
tissimis & mollibus spinis. *Tour. 366.*

L'Aloës à dent de Brochet.

Vera. ε. Aloë foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus pla-
nis maculatis. *Linn. sp. 320. Sauv. 41.*

Aloë vulgaris. *Tour. 366.*

L'Aloës succotrin.

HOSPITATUR in hybernaculo & sub dio.

Variegata. ζ. ALOE floribus pedunculatis cernuis racemosis prif-
maticis, ore patulo æquali. *Linn. sp. 321.*

Aloë Americana sobolifera foliis eleganter variegatis.
Tour. 367.

Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis. *Sauv. 40.*

L'Aloës Perroquet.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.

Disticha. η. ALOE floribus pedunculatis, pedunculis ovato-cylin-
dricis curvis. *Linn. sp. 321.*

Aloë foliis linguiformibus patulis distichis. *Sauv. 19.*

β. Aloë Africana flore rubro, folio triangulari & verru-
cis albicantibus ab utraque parte notato. *Linn. sp. 321.*

L'Aloës à bec de canne.

HOSPITATUR in hybernaculo. Folia (in β.) non exactè
triangularia, sed margo alter est bimarginatus.

Spiralis. θ. ALOE floribus sessilibus ovatis crenatis, segmentis
interioribus conniventibus. *Linn. sp. 322.*

L'Aloës en épi.

HOSPITATUR cum prioribus.

Retusa. ι. ALOE floribus sessilibus triquetris bilabiatis, labio
inferiore revoluto. *Linn. sp. 322.*

Aloë foliis rhomboidalibus ventricosis obliquè resectis
triquetris. *Sauv. 6.*

L'Aloës à pouce écrasé.

HOSPITATUR cum congeneribus.

Viscosa. Κ. ALOE floribus sessilibus infundibuliformibus bilabiatis,

laciniis quinque revolutis; summa erecta. *Linn. sp.*

322.

Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis, caulinis apice reflexo-patulis. *Sauv. 41.*

L'Aloës en échutiere.

HOSPITATUR cum antecedentibus.

7. ALOE floribus sessilibus bilabiatis: labio superiore *pumila.* erecto: inferiore patente. *Linn. sp. 322.*

Aloë foliis ovato-subulatis acuminatis tuberculis cartilagineis undique adspersis. *Linn. sp. hort. Cliff. 131. Sauv. 6.*

a. Aloë margaritifera major.

Margaritifera.

b. Aloë margaritifera minor.

c. Aloë margaritifera minima. *Dill. Elth. 19. & 20.*

d. Aloë foliis ovato lanceolatis carnosis apice triquetris: angulis inerme dentatis, *Linn. sp. 323. Sauv. dea.* Arachnoidea.

17.

L'Aloës perlé. d. l'Aloës à patte d'araignée.

HOSPITATUR in caldario. Folia interdum disticha,

A G A V E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1080.

Char. secund. Rad. funiformis. Caul. scaposa.

Fol. radicalis sessilis simplex integerrima. Flor. racemosa axillaris. Fulc. bractea ad basim penduncularum. Spinæ epiphyllæ marginales.

1. AGAVE foliis dentato-spinosis, scapo ramoso. *Linn. Americana- sp. 323.*

Aloë foliis lanceolatis dentatis spinâ terminatis. *Sauv.*

17.

Aloë folio in longum mucronem abeunte. *Tour. 366.*

L'Aloës en arbre.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.

H E M E R O C A L L I S.

Char. prim. Vid. Lin. gen. pl. 345.

Char. secund. Rad. tuberosa fasciculata. Caul. scaposa fistulosa. Fol. radicalis subulata sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis ramosa. Fulc. bractea solitaria ad basim floris singuli.

Lilio-asphodelus. 1. HEMEROCALLIS scapo ramoso, corollis monopetalis. *Linn. sp. 324.*

Lilio-asphodelus luteo flore. *Tour. 344.*

Le Lys asfodele, ou la belle de jour.

HOSPITATUR sub dio. Scapus subbipedalis subanceps
Bracteæ ovatæ.

A C O R U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 346.*

Char. secund. *Rad. horizontalis articulata teres.*

Caul. scaposa apice foliaceo. Fol. radicalis vaginans simplex integerrima. Flor. spicata lateralis clavata sessilis solitaria. Fulc. nulla.

Calamus. 1. ACORUS. *Linn. sp. 324.*

Acorus seu calamus officinalis aromaticus. *Bauh. pin. 34.*

Le Junc odorant.

HOSPITATUR in aquario lacustri. Scapus infrà apicem subtriqueter; suprà ipsum anceps foliaceus; hinc acutus, illinc canaliculatus. Spica à latere canaliculato biuncialis.

J U N C U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 349.*

Char. secund. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa teres solida nuda vel foliosa. Fol. (graminea) vaginans simplex integerrima, (in una specie) articulata; nunc radicalis aut caulina, nunc linearis aut subulata. Flor. terminalis vel lateralis; spicata paniculata vel glomerato-paniculata. Fulc bractea solitaria involucriformis, universalis & partialis; (in una specie) bractea duplex aculeata.*

* *Culmis nudis.*

Acutus. 1. JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, bractea dupli spinosa.

Juncus culmo.... involucro diphyllo. Linn. sp. 325.

Juncus culmo pungente, panicula ex folii solitarii axillâ. Sauv. 9.

Juncus acutus capitulis forghi. Bot. Mons. 143. Tour.

246. & Bauh. pin. II. prodr. 21.

Juncus maritimus forghi panicula. Barr. Icon. 203. n° 2.

Le Jonc ordinaire; vernaculè lous Jouns.

HABITAT in fossis humidis.

2. *JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo lateralii.* Linn. Conglomeratus. sp. 326.

Juncus laevis panicula non sparsa. Bot. Mons. 142.

Tour. 246.

HABITAT ubique, à Lattes, Castelnau.

3. *JUNCUS culmo nudo stricto, panicula lateralii.* Effusus. Linn. sp. 326.

a. *Juncus laevis panicula sparsa major.* Bot. Mons. 142.

Tour. 246.

HABITAT cum priori & à Montferrier.

4. *JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo incurvo, inflexus, panicula lateralii.* Linn. sp. 326.

Juncus culmo nudo paniculam arcuatim regente.

Sauv. 9.

Juncus acumine reflexo major. Bot. Mons. 142. Tour.

246.

HABITAT dans le Lés, à Castelnau & à Caunelles, Lattes.

5. *JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glo- meratis aphyllis.* Linn. sp. 327. squarrosum.

Juncus parvus pericarpiis rotundis. Bot. Mons. Bauh. hist. Tour. 247.

Gramen junceum foliis & spica junci. Bot. Mons. 119.

Juncus foliis duris carinatis, caule nudo, floribus cartilagineis nitentibus in raram paniculam congestis. Hall. Sauv. 22.

HABITAT dans le Lés, à Montferrier, Lavalette.

* Culmis foliosis.

6. *JUNCUS foliis nodoso-articulatis.* Linn. sp. 327. Articulatus.

Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis. Tour.

247.

Gramen junceum, folio articulato aquaticum. Bot. Mons. 119.

HABITAT in aquis, à Lattes, Caunelles. Articuli foliorum in exsiccatis tantum conspicui.

- Bufonius.* 7. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Linn. sp.* 328.
Juncus palustris humilior erectus. *Tour.* 246. *Barr. Icon.* 263. & 264.
Gramen nemorosum calyculis paleaceis. *Bot. Mons.* 118.
HABITAT in fossis humidis, à la Peissine, Caunelles, & circè Urbem.
- Competris.* 8. JUNCUS foliis planis subpilosis, spicis sessilibus, pedunculatisque. *Linn. sp.* 329. *Sauv.* 25.
Gramen exile hirsutum cyperoides. *Bot. Mons.* 118.
Juncus pilosus capitulis psyllii. *Tour.* 246.
9. Juncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. *Sauv.* 25.
HABITAT dans le Lés & à la Mer.
- Pilosus.* 9. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso. *Linn. sp.* 329. *Sauv.* 25.
Juncus nemorosus latifolius major. *Tour.* 247.
* Juncus. *Sauv.* 26. n°. 136-140.
Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. *Bot. Mons.* 118.
Juncus angustifolius villosus, floribus albis paniculatis. *Tour.* 247.
HABITAT à Lesperou, ubi mire variat. a. Ad mare & stagna.
- Spicatus.* 10. JUNCUS foliis planis, spica racemosa nutante. *Linn. sp.* 330.
Juncus alpinus panicula racemosa nigricante pendula. *Mich. Nov. gen.* 42.
HABITAT cum superiori. Vix sesquipalmaris.

BERBERIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 351.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris racemosa. *Fulc.* spina tricuspidis ad basim ramis cujusque. Spinulæ ad margines foliorum.

- Vulgaris.* 1. BERB. pedunculis racemosis. *Linn. sp.* 330.
Berberis dumetorum. *Tour.* 614.
L'Epine vinette.
HOSPITATUR sub dio.

HABITAT à Valene. Folia obversè ovata. Flores plurimi ad basim racemorum verticillati. Olent sperma virile.

F R A N K E N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 423.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* teres herbacea rigescens. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fulcr.* nulla.

1. FRANK. foliis linearibus basi ciliatis. *Linn. sp.* 331. *Lavis.*

Frankenia foliis aciformibus congestis. *Sauv.* 46.

Polygonum alterum pusillo vermiculato folio. *Bot. Mons.* 210.

Alpine maritima supina foliis quasi vermiculatis. *Tour.* 245.

HABITAT au-delà des prés de Lattes vers la mer, & au port de Cette.

2. FRANK. foliis obovatis retusis subtus pulverulentis. *Pulverulenta.* *Linn. 332.*

Frankenia foliis ovalibus. *Sauv.* 168.

Anthyllis marina Narbonensium altera. *Bot. Mons.* 22.

Alpine maritima supina foliis chamæsycées. *Tour.* 244.

HABITAT cum priori. Utraque procumbens.

D I G Y N I A.

V E L E Z I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. . .

Char. secund. *Rad.* lignosa simplex tenuis. *Caul.* herbacea rigida articulata subdichotoma. *Fol.* opposita connata subulata simplex integerrima. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fulcr.* nulla.

1. VELEZIA. *Linn. sp.* 332.

Silene foliis subulatis cauli appressis, calycibus rigidis internodio longioribus. *Sauv.* 145.

Lychnis minima rigida Cherler. *Bot. Mons.* 171. *Barr. Icon.* 1017.

HABITAT à Boutonet, Castelnau au-delà de la rivière vers Gramont; altitude sesquipalmaris. Caule, calycibusque striatis.

Rigida.

TRIGYNIA.

R U M E X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 357.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel tuberosa. *Caul.* striata herbacea vel fruticosa. *Fol.* alternata vaginans petiolata simplex integra aut integerim. *Flor.* racemosa axillaris vel terminalis, aut utraque simul. *Fulc.* nulla.

Obs. in quibusdam petioli ad basim aucti membranae vaginante tenuissima.

* *Hermaphroditum : valvulis granulo notatis.*

Patientia. 1. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integerimis : unica granifera, foliis cordatis. *Linn. sp. 333.* cordato-lanceolatis. *Syst. nat. 990.*

Lapathum hortense folio oblongo. *Tour. 504.*

La Patience.

HABITAT in hortis oleraceis.

Sanguineus. 2. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integerimis, unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Linn. sp. 334.*

Lapathum folio acuto rubente. *Tour. 504.*

Le Sang-dragon.

HOSPITATUR in frigidario. Altitudo bicubitalis. Folia inferiora maxima venis insignita sanguineis; superiora obliquè cordata.

Crispus. 3. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integerimis graniferis, foliis acutis lanceolatis undulatis. *Linn. sp. 335.*

B. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, foliis obtusis crispis. *Sauv. 70.*

Lapathum folio acuto criso. *Tour. 504.*

HABITAT in fossis uidis. *A Gramont, Caunelles, La-verune.*

Acutus. 4. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis. *Linn. Syst. 990.* acuminatis.

Lapathum folio acuto plano. *Tour. 504.*

Lapathum vulgare ramosum. *Bot. Mons. 299.*

Lapathum acutum sive oxylapathum. *Bot. Mons.* 149.

Vernaculè *lou Rénebre*.

HABITAT cum præsti, & à la riviere.

5. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis radicalibus lyratis. *Linn. Syst.* 990. *Pulcher.*

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis granulo destitutis, foliis lyratis. *Linn. sp.* 336.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum. *Bot. Mons.* 300.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, foliis supra petiolum emarginatis. *Sauv.* 69 & 272.

Le Violon.

HABITAT in humidis. *A Lattes* & à la mer.

* *Hermaphroditii: valvulis granulo destitutis.*

6. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis. *Linn. sp. p.* 336. *Bucephalophorus.*

Acetosa ocymi folio Neapolitana. *Tour.* 503. *Bot. Mons.* 311.

HABITAT ad lœvam; à la Verune. Vix palmaris, ramosus.

7. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integrimis nudis, foliis cordatis. *Linn. sp. p.* 336. *Aquaticus.*
Sauv. 69. n°. 386.

Lapathum aquaticum folio cubitali. *Bot. Mons.* 149.

Tour. 504.

Lapathum . . . foliis cordatis glabris acutis. *Linn. Syst.* 990.

HABITAT. *Au-delà de Mauguio*, & à Aiguemortes.

8. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis lœvibus, caule arboreo, foliis subcordatis. *Linn. sp. p.* 336. *Lunaria.*

Acetosa arborescens folio subrotundo. *Tour.* 503.

HOSPITATUR in hybernaculo. Semperfivens. Folia succulenta.

9. RUMEX floribus hermaphroditis geminatis, valvularum alis maximis membranaceis reflexis, foliis indivisis. *Linn. sp. p.* 337. *Sauv.* 101. *Vescarius.*

Oxis seu acetosa Americana. *Barr. Icon.* 1112.

Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis. *Tour.* 503.

HOSPITATUR sub dio.

10. RUMEX floribus hermaphroditis distinctis, valvu-

Roseus.

larum alis maximis membranaceis, foliis erosis.

Linn. sp. p. 337.

Rumex floribus ... geminatis, valvulae unius ala maxima membranacea denticulata, foliis erosis. *Linn. Syst. 990.*

HOSPITATUR sub dio. Annuus, uti prior.

Scutatus. 11. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis. *Linn. sp. p. 337.*

Acetosa rotundifolia hortensis. *Bot. Mons. 4. Tour. 503.*

L'Oseille; vernaculè l'Oseille ou Agrette.

HABITAT in hortis oleraceis.

* *Floribus diclinis.*

spinosus. 12. RUMEX floribus androgynis, calycibus femineis monophyllis, valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Linn. sp. p. 337.*

Rumex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis, foliis ovatis. *Sauv. 101.*

Spinacia Cretica, capsula seminis aculeata. *Tour. 533.*

L'Epinar de Crète.

HOSPITATUR sub dio. Procumbens.

Acetosa. 13. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Linn. sp. p. 337. Sauv. 70.*

Acetosa pratensis. *Tour. 502.*

L'Ozeille des prés.

HABITAT à Lattes, Selleneuve, Castelnau.

Acetosella. 14. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. sp. p. 338.*

Acetosa arvensis lanceolata. *Bot. Mons. 3. Tour. 503.*

β. Acetosa lanceolata angustifolia. *Bot. Mons. 3. Tour. 503.*

Rumex floribus dioicis, foliis linearibus hastatis. *Sauv. 70.* & foliis lanceolatis. *Sauv. ibid.*

Vernaculè *l'Agrette Saoïvage.*

HABITAT ad lœvam, à Castelnau, Montferrier, & à la Verune.

TRIGLOCHIN.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 359.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. scaposa. Fol.

(graminea) radicalis subulata vaginans simplex integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus. *Palustre.*
Linn. sp. p. 338.
 Gramen juncicum spicatum seu triglochin. *Bot. Mons.*
 119.
 Juncago palustris & vulgaris. *Tour. 266.*
 HABITAT in aquis, à *Lattes* vers les étangs. Scapus
 sesquipalmaris à latere radicis. Flores alterni sæ-
 pius scapo appressi.

MENISPERMUM.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 362.
 Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticulosa
 volubilis. *Fol.* alterna petiolata simplex integra
 peltata. *Flor.* *Fulcr.*
 1. MENISPERMUM foliis cordatis peltatis lobatis. *Linn. Virginicum.*
sp. p. 340.
 HOSRITATUR in caldario. Sempervirens.

COLCHICUM.


- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 360.
 Char. sec. *Rad.* tuberosa. *Caul.* nulla. *Fol.* radi-
 calis simplex integerrima. *Flor.* solitaria radi-
 calis ad latera tuberis. *Fulc.* nulla.
 1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. *Linn. Autumnale.*
sp. p. 341. Sauv. 18.
 Colchicum commune. *Bot. Mons.* 71. *Tour. 348.*
Le Tué-chien.
 HABITAT in pratis & arvis. A *Lattes*, *Sembrés*, *Cas-*
telnau; aux prairies d'Arene. Tubus corollæ longus
 immediate prodit à latère tuberis.

POLYGYNIA.

ALISMA.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 365.
 Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radi-
 calis petiolata vaginans simplex integerrima.
Flor. terminalis verticillato-paniculata. *Fulc.*
 bractea membranacea ad basim ramorum. Acu-
 lei (in una specie) supra capsulas.

- Plantago.* 1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtusè trigonis. *Linn. sp. p. 342.*
Alisma fructu obtuso trigono. Sauv. 14.
Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore. Tour. 292.
Plantago aquatica latifolia. Bot. Mons. 206.
Le Plaintain d'eau.
HABITAT in aquis circa Urbem. Au Verdanson. Rami verticillorum inferiorum umbelliferi.
- Damasonium* 2. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis.
Linn. sp. p. 342. Sauv. 14.
Plantago aquatica stellata. Bot. Mons. 206.
Damasonium stellatum. Tour. 257.
HABITAT in aquis versus stagna. Rarius hodiè dans le Verdanson sous la Citadelle.
- Ranuncu-
loides.* 3. ALISMA foliis linear-lanceolatis, fructibus globoso-squarrosis. *Linn. sp. pag. 342.*
Alisma fructu globo undique echinato. Sauv. 14.
Plantago aquatica angustifolia. Bot. Mons. 206. Bauh. pin. 190.
Ranunculus palustris plantaginis folio angustiore. Tour. 292.
*HABITAT in amne. Au-delà de Lavalette, & in riu-
vulo ad lèvam circà Nemausum, à Lunel & à
Nîmes.*



Classis VII.

HEPTANDRIA MONOGYNIA.

ÆSCULUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 367.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* opposita petiolata digitata, foliolis integris. *Flor.* ramea terminalis racemosa. *Fulc.* aculei supra capsulas.

1. *ÆSCULUS* floribus heptandris. *Linn. sp.* 344.

Hippocasta-
num.

Hippocastanum. Tour. 611.

Le Marronier d'Inde.

HOSPITATUR sub dio.



Classis VIII.

OCTANDRIA
MONOGYNIA.

TROPÆOLUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 369.

Char. secund. *Rad.* fibroſa. *Caul.* flexuosa herbaea. *Fol.* alterna petiolata peltata simplex subintegerrima. *Flor.* solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

Minus. 1. TROPÆOL. foliis quinquelobis petalis obtusis. *Linn.* *sp.* 345.

Cardamindum ampliorifolio & majori flore. *Tour.* 430.
La Capucine.

HOSPITATUR sub dio. Annum. In hortis colitur pro acetariis.

OENOTHERA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 376.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna simplex subintegerima sessilis vel petiolata, vel inferior petiolata, superior sessilis. *Flor.* axillaris solitaria sessilis, vel terminalis paniculata. *Fulc.* nulla.

Biennis. 1. OENOTH. foliis ovato-lanceolatis, floribus axillaris, caule fistuloſo.

Oenothera foliis ovato-lanceolatis planis. *Linn. sp.* 347. Caule scabro. *Linn. Syst.* 998.

Onagra latifolia. *Tour.* 302.

L'Herbe aux ânes.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia subdenticulata radicalia petiolata in petiolum decurrentia. Flores lutei. Nervi foliorum decurrent in caulem.

Mollissima. 2. OENOTH. foliis linear-lanceolatis, floribus axillaris.

Oenothera

Oenothera foliis lanceolatis undulatis. *Linn.* sp. 347.
Sauv. 74.

HOSPITATUR sub dio. Capsulæ longiores quam in priori tomento albido obtectæ. Folia denticulis raris remotis.

3. OENOTH. foliis lanceolatis, floribus terminalibus *Fruticosæ,* paniculatis.

Oenothera foliis lanceolatis subdentatis, capsulis pedicellatis acutangulis. *Syst. nat.* 998.

Oenothera foliis lanceolatis, capsulis acutangulis. *Linn.* sp. 346. & *Sauv.* 74.

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minore. *Tour.* 302.

HOSPITATUR sub dio. Flores albi parvi. Stamina petalis opposita.

EPILOBIUM.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 377.

Char. secund. Rad. simplex tenuis aut lignosa ramosa. Caul. herbacea teres aut tetragona repens vel erecta. Fol. simplex integra, nunc alterna vel opposita, nunc sessilis aut petiolata. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Ful. nulla.

* *Staminibus declinatis.*

1. EPILOB. foliis sparsis linear-lanceolatis. *Linn.* sp. 347. *Angustifolium.*
Lysimachia chamænerion dicta *angustifolia.* *Bauh. pin.* 245.

Chamænerion angustifolium alpinum flore purpureo. *Tour.* 303. & *Seg. ver. Tom. I. p.* 402.

Chamænerion vulgare latifolium. *Tour.* 303. & *alpinum. Ibid.*

Epilobium foliis difformibus, pistillo declinato. *Sauv.* 74.

HABITAT *au Vigan, Ganges.*

* *Staminibus erectis, petalis bifidis.*

2. EPILOB. foliis oppositis lanceolatis serratis. *Linn.* sp. *Hirsutum.* 347. *Sauv.* 74.

Chamænerion villosum magno flore violaceo. *Tour.* 303. *Seg. Tom. I.* 402.

Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore violaceo. *Bot. Mons.* 172.

HABITAT cum priori. Folia sessilia.

- Montanum.* 3. EPILOB. foliis oppositis ovatis dentatis. *Linn. sp. 348.*
Sauv. 106.

Chamænerion glabrum majus. *Tour. 303. Seg. Tom. I.*
402.

HABITAT frequens in umbrosis rupibus; à Montferrier, juxta amnem; à la source du Lés, au mont St. Loup. Vix sesquipalmare simplicissimum. Folia summa quandoque oblonga, omnibus petiolatis.

- Tetragonum.* 4. EPILOB. foliis lanceolato-linearibus denticulatis, imis oppositis, caule tetragono. *Linn. sp. 348. Sauv. 75.*
Lysimachia siliquosa glabra minor. *Bot. Mons. 172.*
Chamænerion glabrum minus. *Tour. 303.*
HABITAT à la Verune, Caunelles, Castelnau. Folia sessilia.

VACCINIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 384.*

Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. fruticosa angulata. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulcr. nulla.*

- Myrtillus.* 1. VACCIN. pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. *Linn. sp. 349. Sauv. 95.*
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante.
Tour. 608. & Seg. ver. 2. 228.
L'Airelle, ou Myrtle.
HABITAT à Lesperou, la Serane. Frutex.

ERIC A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 378.*

Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. fruticulosa aut arborea. Fol. sessilis simplex integerrima opposita terna vel quaterna. Flor. pedunculata, nunc solitaria axillaris, nunc racemosa terminalis. Fulc. nulla vel bracteæ duæ (in quibusdam) oppositæ minimæ in medio peduncularum.*

* *Antheris bicornibus.*

- Vulgaris.* 1. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Linn. sp. 352.*
Erica vulgaris glabra. *Bot. Mons. 90. Tour. 602. Seg. ver. 2. 279.*

*La Bruyere.**HABITAT à Valene.*

2. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis tomentosis. *Linn. sp. 353.* *Scoparia.*

Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas sessilibus verticillatis. *Sauv. 170.*

Erica scoparia foliis deciduis. *Tour. 602.*

Erica scoparia floribus herbaceis. *Sauv. 46. Bot. Mons. 90.*

Vernaculè, lou Bruc.

HABITAT au bois de Gramont.

3. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis viridi-purpureo-longioribus, racemis corymbosis secundis, foliis ternis. *Linn. sp. 353.* *viridi-purpurea.*

Erica foliis lanceolatis oppositis imbricatis, floribus uno versu racemosis. *Sauv. 170.*

Erica major, floribus ex herbaceo-purpureis. *Bot. Mons. 90. Tour. 602.*

HABITAT à Valene, Rouquet, Gramont.

4. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis cinereo-racemosis, foliis ternis glabris linearibus. *Linn. sp. 352.* *Cinerea.*

Erica ramulis foliisque ternis, ramis apice floriferis. *Sauv. 169.*

Erica cortice cinereo, arbuti flore. Tour. 602.

Erica ternis per intervalla ramulis. Bot. Mons. 91. Tour. 602.

Erica arborescens Monspeliensis flore purpurascente. *B. Hist. 1. 357.*

HABITAT cum priori.

5. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis quaternis patentissimis, caule subarboreo tomentoso. *Linn. sp. 353.* *Arborea.*

Erica foliis quaternis, floribus spicato-racemosis. *Sauv. 170. & 46.*

Erica alba maxima. Bot. Mons. 90. Tour. 602.

HABITAT cum prioribus.

* *Antheris simplicibus obtusis emarginatis.*

6. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis campanulatis longioribus, foliis quinis linearibus patentibus. *Linn. sp. 355.* *Multiflora.*

Erica foliis corios multiflora. *Tour.* 602.

Erica juniperifolia dense fruticans Narbonensis. *Bot. Mons.* 90. *Sauv.* 46.

HABITAT à Valene, Merviel, à Villemagne.

D A P H N E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 379.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* sparsa conferta sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris caulina, vel terminalis pedunculata, vel sessilis aggregata racemosa aut paniculata. *Fulcr.* nulla.

* *Floribus lateralibus.*

Mezereum. 1. DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn. sp.* 356.

Thymelæa folio deciduo. *Tour.* 595.

Le Bois gentil.

HABITAT à Lesperou.

Thymelæa. 2. DAPHNE floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulis simplicissimis. *Linn. sp.* 356.

Thymelæa foliis polygalæ glabris. *Bot. Mons.* 305.

HABITAT à la Taillade de Gignac.

, *Laureola.* 3. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris. *Linn. sp.* 357.

Daphne racemis lateralibus, foliis integris. *Sauv.* 57.

Thymelæa laurifolia sempervirens; seu laureola mas.

Tour. 595.

Laureola sempervirens, flore viridi, seu mas. *Bot. Mons.* 152.

La Laureole male.

HABITAT au Capouladou; à la Serane, St. Guillen le Désert.

* *Floribus terminalibus.*

Gnidium. 4. DAPHNE panicula terminali, foliis linear-lanceolatis acuminatis. *Linn. sp.* 357.

Daphne foliis lanceolatis basi angustioribus, racemo terminali nudo. *Sauv.* 56.

Thymelæa Monspeliaca. *Bot. Mons.* 252.

Thymelæa foliis lini. *Tour.* 594.

Vernaculè, la Trintanele, Cante-perdris, Garou.

HABITAT à Gramont, St. George.

STELLERA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1053.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex lignosa. *Caul.* herbacea simplex rigescens. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris sessilis subsolitaria. *Fulcr.* nulla.

I. STELL. foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Linn.* *Passerina.*
sp. 359. *Sauv.* 69.

Thymelæa linariæ folio, vulgaris. *Tour.* 594.

Sanamunda annua. *Magnol.* *Char.* 150. *Linariæ folio.*
Hort. 178.

HABITAT in sabulosis ultra amnem. *A Sauret, Salicate,*
& à Montferrier. Altitudo sesquipalmaris.

DIGYNIA.

MOEHRINGIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 386.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex. *Caul.* herbacea debilis. *Fol.* opposita subconnata sessilis subulata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla, vel quandoque bracteæ minimæ in medio pedunculi, oppositæ.

I. MOEHRINGIA. *Linn.* *sp.* 359.

Alsine tenuifolia muscosa. *Bot. Mons.* 13. *Seg. Ver.* 1.

Muscosa.

418. *tab. V. fig. 1.*

HABITAT *au bois de Gramont.* Inter Bryum & Maium.

TRIGYNIA.

POLYGONUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 391.

Char. secund. *Rad.* horizontalis nodosa. *Caul.* herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna simplex integerrima sessilis aut petiolata, vel inferior petiolata, superior sessilis. *Flor.* axillaris aggregata petiolata aut terminalis spicata. *Fulc.* stipulae

N. iij

solitaria vaginans adnata. Bracteæ membranaceæ infra flores.

* *Bistorta spica unica.*

- Bistorta.* 1. POLYG. caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. sp. 360.*
Bistorta major, radice magis intorta. *Tour. 511.*
La Bistorte.
HABITAT à Lesperou, Lamalou. Folia summa sessilia amplexicaulia.

* *Persicaria pistillo bifido.*

- Virginianum.* 2. POLYG. floribus pentandris digynis, corollis quadrididis, foliis ovatis. *Linn. sp. pag. 360.*

Persicaria frutescens virginiana maculosa, flore albo. *Tour. 510.*

HOSPITATUR sub dio.

- Amphibium.* 3. POLYG. floribus pentandris semi-digynis, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. pag. 361.*

Persicaria salicis folio, *potamogeton angustifolium dicta.* *Tour. 509.*

Potamogeton salicis folio. *Bot. Mons. 213.*

HABITAT in aquis, à Lattes, Castelnau.

- Maritimum.* 4. POLYG. floribus pentandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule stipulis obtecto fruticoso. *Linn. sp. pag. 361.*

Polygonum maritimum latifolium. *Bot. Mons. 209.*

Tour. 510. Sauv. 53. utrumque.

La Renouée de mer.

HABITAT ad mare & stagna. Flores terni quaterni axillares.

- Hydropiper.* 5. POLYG. floribus hexandris semi-digynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. sp. pag. 361.*

Persicaria urens seu hydropiper. *Bot. Mons. 201. Tour. 509.*

Le Poivre d'eau ou Curage.

HABITAT à Lattes, Caunelles.

- Persicaria.* 6. POLYG. floribus hexandris digynis, spicis ovatis oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. sp. pag. 361.*

Persicaria mitis maculosa & non. *Bot. Mons. 201.*

Tour. 509.

La Persicaire.

HABITAT in fossis udis, à la Verune, la Peissine,
& circà Urbem.

7. POLYG. floribus hexandris digynis, foliis ovatis, *Orientalis.*
caule erecto, stipulis hirtis. *Linn. sp. pag. 362.*
Persicaria orientalis nicotianæ folio, calyce florum
purpureo. *Tour. cor. 38.*

Le Monte-au-ciel.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana.

* *Polygonum foliis indivisis, floribus octandris.*

8. POLYG. floribus octandris trigynis axillaribus, fo- *Aviculare.*
liis lanceolatis, caule herbaceo procumbente. *Linn.*
sp. pag. 362.

Polygonum latifolium. Bot. Mons. 209. Tour. 510. &
angustifolium. Bot. Mons. 209.

La Renouée ou Trenasse.

HABITAT ad margines viarum & in ambulacris.

9. POLYG. foliis cordato-sagittatis, caule erecto sim- *Tataricum.*
plici, seminibus subdentatis. *Linn. sp. pag. 364.*

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Altitudo cubitalis.
Caulis à latere folii cujuslibet canaliculatus. Pe-
tioli sulcati.

10. POLYG. foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo *Fagopyrum.*
inermi, seminum angulis æqualibus. *Linn. sp. p. 364.*

Fagopyrum erectum. Tour. 511.

Helxine caule erecto inermi, foliis cordato-sagitta-
tis. Sauv. 114.

Le Bled noir ou Sarrasin.

HABITAT à Lesperou, Lamalou.

CARDIOSPERMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 394.*

Char. sec. Rad. tenuis subsimplex. Caul. herbacea.
striata angulata volubilis. Fol. alterna petio-
lata biternata, foliolis simplicibus incisis. Flor.
pedunculata laterifolia corymbosa. Fulc. cir-
rus geminus peduncularis infra corymbum.

1. CARDIOSPERMUM. *Linn. sp. pag. 367.*

Corindum ampliori folio, fructu maximo. Tour. 431. Halicacabum

Le pois de merveille.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Foliola incisa ovata. Pedunculi foliis longiores teretes. Calyx minimus viridis, foliolis 2 majoribus, & duobus minoribus, alternis.

TETRAGYNIA.

P A R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 396.

Char. sec. Rad. horizontalis articulata nodosa.

Caul. teres simplicissima tetraphylla herbacea.

Fol. sessilis simplex integerrima verticillata.

Flor. terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

Quadrifolia. 1. PARIS. Linn. sp. p. 367. Sauv. 167.

Herba Paris. Tour. 233.

Le Raisin de renard.

HABITAT à L'esperon.

HOSPITATUR in frigidario. Sesquipalmaris. Folia interdum quina.

A D O X A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 397.

Char. sec. Rad. horizontalis nodosa. *Caul.* simplicissima pauciflora diphylla herbacea teres.

Fol. opposita petiolata simplex digitato-pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata subcapitata.

Fulc. nulla.

Moschatel. 1. ADOXA. Linn. sp. 367. Sauv. 174.
lina.

Moschatellina foliis fumariæ bulbotæ. Tour. 156.

Ranunculus minimus septentrionalium. Lob. Icon. 674.

La Moscatelline.

HABITAT cum priori. Frequens à L'espouse près de Lamalou.

HOSPITATUR in frigidario, dans le Labyrinthe. Palmaris; florens Aprili.



Classis IX.

ENNEANDRIA
MONOGYNIA.

LAURUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 400.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea teres glabra. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis solitariis bifidis multifloris. *Fulcr.* nulla.

1. LAURUS foliis lanceolatis venosis perennantibus, *Nobilis.* floribus dioicis quadrifidis. *Linn. sp. p. 369.*

Laurus vulgaris. Bot. Mons. 152. Tour. 597.

Le Laurier; vernaculè lou Laourié.

HABITAT in hortis. Semper-virens. Florens martio, semina maturans autumno.

TRIGYNIA.

RHEUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 401.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea simplex. *Fol.* alterna vaginans, simplex integra sinuata crispa, inferior petiolata, floralis sessilis, petiolis basi vaginantibus. *Flor.* terminalis paniculato-racemosa. *Fulcr.* nulla.

1. RHEUM foliis glabris, petiolis subsulcatis. *Linn. sp. Rhabonticum pag. 371.*

Rhabarbarum Dioscoridis. Tour. 89.

Le Rapontic.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo cubitalis.

2. RHEUM foliis subvillosis, petiolis æqualibus. *Linn. Rhabarbarum. sp. p. 372.*

Rhabarbarum foliis subvillosis. Linn. amæn. acad. 3. p. 213. tab. IV.

La Rhubarbe.

HOSPITATUR sub dio. Folia duplo minora. Caulis
humilior.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 403.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* scaposa multiflora.

Fol. radicalis subulata simplex integerrima vagi-
nans. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.


Umbellatus. I. BUTOMUS. Linn. sp. p. 372.

Juncus cyperoides paludosus floridus. Bot. Mons. 145.

Butomus flore roseo. Tour. 271.

Le Jonc fleuri.

HABITAT in aquis. A Lattes.



Classis X.

DECANDRIA *MONOGYNIA.*

A N A G Y R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 700.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* suffruticosa.
Fol. alterna petiolata ternata foliolis integerimis sessilibus. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis multifloris. *Fulcr.* stipula oppositifolia bifida acuminata.

i. ANAGYRIS. *Linn. sp. pag. 374.*

fætidæ.

Anagyris fætida. *Tour. 647. Barr. Icon. 569.*

Le Bois puant.

HABITAT à Montbasin, St. Guillin le Desert.

C E R C I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 405.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integerima. *Flor.* axillaris racemosa. *Fulc.* stipulæ binæ deciduæ. Obs. Pedunculi plures in caule vagi uniflori biflorive. Mera luxuriatio.

i. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Linn. sp. Siliquastrum pag. 374.*

Siliquastrum. *Tour. 646.*

L'Arbre de Judas ou Guainier.

HABITAT à la Verune, Gramont, Chateaubon, Selle-neuve, Castelnau.

C A S S I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 408.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna abruptè-pinnata foliolis subsessilibus integerrimis. *Flor.* axillaris racemosa. *Fulcr.* stipulæ binæ parvæ.

Obs. In hoc genere, pinnulæ inferiores cujuslibet folii minores, superiores majores sunt. In quibusdam speciebus adest glandula supra petiolum.

* *Sennæ.*

Senna. 1. CASSIA foliolis trijugatis quadrijugatisque subovatis. *Linn. sp. pag. 377.*

Senna Alexandrina foliis acutis. *Tour. 619.*

2. *Senna Italica* foliis obtusis. *Tour. 619.*
Le Senné.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Annua. Pinnulæ subæquales.

Occidentalis. 2. CASSIA foliolis quinquejugatis ovato-lanceolatis margine scabris, exterioribus majoribus, glandula baseos petiolorum. *Linn. sp. pag. 377.*

Cassia Americana foetida, foliis oblongis glabris. *Tour. 619.*

HOSPITATUR in caldario. Pinnulæ inferiores superioribus triplo minores; omnes acuminatae.

Planifolia. 3. CASSIA foliolis quinquejugatis ovatis, vel ovato-lanceolatis glabris, glandula baseos petiolorum. *Linn. sp. pag. 377.*

Cassia siliquis planis. *Tour. 619.*

HOSPITATUR in caldario.

POINCIANA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 409.*

Char. sec. *Rad. lignosa. Caul. fruticulosa. Fol. alterna abruptè bipinnata foliolis petiolatis simplicibus integerrimis, superioribus majoribus, cæteris decrescentibus. Flor. . . . Fulc. aculei gemini ad basim petiolorum. Filum ad basim cujuslibet folioli.*

Pulcherrima. 1. POINCIANA aculeis geminis. *Linn. sp. p. 380.*

Poinciana flore pulcherrimo. *Tour. 619.*

La Poincillade ou Poinciane.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo. Foliola obversè-ovata.

GUILANDINA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 997.*

Char. sec. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna*

abruptè bipinnata, foliolis petiolatis integerimis alternis. *Flor.* . . . *Fulcr.* aculei in caule & supra capsulas.

- I. GUILANDINA aculeata, foliolis ovalibus acuminate. *Bondue.*
Linn. sp. p. 381.

Fructus peregrinus primus. *Clus. exot. lib. 2. 30.*

Le Bonduc, Oeil de chat, ou pois nud.

HOSPITATUR sub dio & in caldario.

DICTAMNUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 412.

Char. sec. Rad. horizontalis funiformis. *Caul.* teres herbacea simplex. *Fol.* alterna imparipinnata foliolis oppositis sessilibus integris. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* pili hispidi atri in caule & pedunculis glandulæ supra stamina confertæ. Filum in medio pedicellorum. Bractea ad basim singuli.

- I. DICTAMNUS. Linn. sp. p. 383. Sauv. 232.

Albus.

Fraxinella. Bot. Mons. 99. Tour. 430.

Dictamnus albus seu fraxinella. Barr. Icon. 1318.

Le Dictame blanc ou la Fraxinelle.

HABITAT au bois de Candiac vers Nîmes.

HOSPITATUR in frigidario. Altitudo pedalis. Foliola serrata; impari majori subcordato. Pedicelli inferiores bifidi biflorique.

RUTA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 374.

Char. secund. Rad. ramosa. *Caul.* fruticulosa glaberrima teres. *Fol.* alterna impari-subtripinnata foliolis integerrimis subcarnosis. *Flor.* terminalis cymosa. *Fulc.* nulla

- I. RUTA foliis decompositis. Linn. sp. 383.

Graveolens.

Ruta sylvestris major. Bot. Mons. 227. Tour. 257.

La Rue; vernaculè de Ruda.

HABITAT à Castelnau, la Colombiere, au Terrail.

MELIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 418.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata impari-bipinnata, foliolis petiolatis integris. *Flor.* axillaris pedunculata racemosa. *Fulc.* nulla.

Azedarach. I. MELIA foliis bipinnatis. *Linn. sp.* 384.

Azedarach. *Tour.* 616.

Le faux Sycomore; vernaculè *Lou pater noster*.

HABITAT in ambulacris, au plan de Loune, dans le jardin des Pénitens Blancs. Nectarium tubulatum erectum atro-purpureum, longitudine petalorum. Stamina limbo nectarii affixa.

ZYGOPHYLLUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 415.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa articulata diffusa. *Fol.* opposita petiolata carnosa binata, foliolis æqualibus integerimis. *Flor.* interfoliacea alterna geminata pedunculata, pedunculis unifloris. *Fulc.* stipula integerrima utrinque bina interfoliacea, singula ad basim singuli pedunculi.

Fabago. I. ZYGOPH. capsulis prismatico-pentaëdris. *Linn. sp.* 385.

Fabago Belgarum seu *peplus Parisiensium*. *Tour.* 259. HOSPITATUR sub dio. *Caulis* diffusus.

FAGONIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 421.

Char. secund. *Rad.* ramosa, radiculis fibrosis. *Caul.* herbacea ramosa articulata tetragona. *Fol.* opposita petiolata ternata, foliolis æqualibus sessilibus integerrimis. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata *Fulc.* stipulæ binæ setaceæ. Spinæ ad apicem foliorum & stipularum.

Cretica. I. FAGON. spinosa, foliolis lanceolatis planis lœvibus.

Linn. sp. 386.

Fagonia spinosa. *Tour.* 265. *Sauv.* 178.

La Fagon ou Trefle épineux.

HOSPITATUR sub dio. Capsulæ ciliatæ. Stamina quinque intra petala, quinque inter ipsa. Stylus longitudine staminum.

T R I B U L U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 419.

Char. secund. Rad. tenuis fibrofa. Caul. procumbens herbacea ramosa. Fol. opposita abrupte pinnata foliolis sessilibus integerrimis, alternatim trijugis & sexjugis. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. stipulæ binæ integerrimæ, aculei suprà capsulas.

i. TRIB. foliolis sexjugatis subæqualibus. Linn. sp. 387. *Terrestris.*

Sauv. 227.

Tribulus terrestris. Bot. Mons. 260. Tour. 266.

Le Tribule.

HABITAT sous le Perou, à l'Hôpital général, à Montferrier. Caulis procumbit, villosus, rubens. Foliola ciliata, subtus villosa, oblique lanceolata. Pedunculi foliis duplo longiores.

M O N O T R O P A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 414.

Char. secund. Rad. nulla. Caul. scaposa simplissima multiflora parasitica. Fol. nulla. Flor. spicata terminalis. Fulc. squamæ in scapo & ad basim floris cujuslibet, amplexicaules.

i. MONOT. floribus lateralibus octandris, terminali *Hypopithys.* decandro. Linn. sp. 387.

HABITAT à L'esperou. Palmaris vel humilior. Suprà radices & ad basim trunci pini.

A R B U T U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 427.

Char. secund. Rad. lignosa Caul. fruticosa. Fol. alterna petiolata simplex integra aut integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. bractea parva ad basim floris singuli.

i. ARBUT. caule erecto, foliis glabris ferratis, baccis *Unedo.*

- polyspermis.* Linn. sp. 395. Sauv. 59. & 96.
Arbutus folio serrato. Bot. Mons. 26. Tour. 598. Barr.
Icon. 69.
L'Arbousier; vernacule *Lous Arboussé.*
HABITAT à Valene, Rouquet, Lafiguaredé.
- Uva ursi.* 2. *ARBUT.* caulis procumbentibus, foliis integerimis. Linn. sp. 395.
Vitis idaea foliis carnosis & veluti punctatis. Bauh.
Pin. 470.
Uva ursi. Tour. 599.
La Boufferole ou Buxerole.
HABITAT à Lesperou. Folia obversè ovata, quandoque emarginata.

P Y R O L A.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 425.
 Char. secund. Rad. horizontalis funiformis. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis petiolata simplex integrifolia. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* squamæ vagæ in scapo. Bractea ad basim singuli pedicelli.

- Rotundifolia.* 1. *PYROLA* staminibus adscendentibus, pistillo declinato. Linn. sp. 396.
Pyrola foliis integerrimis. Sauv. app. 305.
Pyrola rotundifolia. Tour. 256.
La Pyrole.
HABITAT à Lesperou, à la Serane.

D I G Y N I A.

C H R Y S O S P L E N I U M.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 387.
 Char. secund. Rad. fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa.
Fol. opposita petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

- Oppositifolia.* 1. *CHRYSOSP.* foliis oppositis. Sauv. 128. Linn. sp. 398.
Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. Tour. 146. Seg. 1. 241.
La Saxifrage dorée.
HABITAT à Lesperou.

SAXIFRAGA.

SAXIFRAGA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 434.

Char. secund. *Rad.* tenuis incerta, simplex vel ramosa bulbosa aut granulata, aut fibrosa horizontalis. *Caul.* teres herbacea simplex vel ramosa, erecta vel humiliosa, subnuda aut foliosa. *Fol.* alterna simplex incisa integra aut integerrima, petiolata vel sessilis, vel inferior petiolata, superior sessilis. *Flor.* terminalis subpaniculata, aut axillaris, pedunculis solitariis multifloris. *Fulc.* nulla.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

1. SAXIF. foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-serratis, caule paniculato. *Linn. sp.* 398.

Saxifraga foliorum marginibus cartilagineo-serratis.

Sauv. 52. & 116.

Saxifraga sedi folio angustiore ferrato. *Tour. 252.*

Seg. ver. tom. I. 448. tab. 9. fig. 1.

2. SAXIF. *Saxifraga* sedi folio flore albo, multiflora. *Tour. ibid.*

Sedum montanum. Barr. Icon. 1309. 1310. 1311.

1312. 373. 392.

La Saxifrage.

HABITAT à *Lesperou*.

3. SAXIF. foliis cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Linn. sp.* 401.

Geum rotundifolium minus. Tour. 251.

HOSPITATUR in frigidario.

* *Foliis indivisis, caule nudo.*

3. SAXIF. foliis caulinis linearis-subulatis sparsis nudis *Aizoides.* inermibus, caulis decumbentibus. *Linn. sp.* 403.

Sedum alpinum flore pallido. *Bot. Mons. 235. Tour. 263.*

HABITAT à *Lesperou*, au *Capouladou*.

4. SAXIF. foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, *Rotundifolia.* *Linn. sp.* 403.

Geum rotundifolium majus. Tour. 251.

HABITAT cum priori.

* *Foliis lobatis, caule erecto.*

Granulata. 5. SAXIF. foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Linn. sp. 403.*

Saxifraga rotundifolia alba. Tour. 252.

HABITAT cum congeneribus. Caulis villosus pallide rubens. Petioli foliis paulò longiores, basi dilatati. Catyx profundè quinquefidus. Radix granulis imbricatis.

Tridactylites. 6. SAXIF. foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Linn. sp. 404.*

Saxifraga foliis trifidis basi angustatis, caule erecto. Sauv. 208.

Sedum tridactylites tectorum. Bot. Mons. 238.

Saxifraga verna annua humilior. Seg. ver. I. 448. Tour. 252.

HABITAT à Caunelles, Gramont, Castelnau cum globularia vulgari. Variat foliis caulinis integerrimis ovatis.

Cespitosa. 7. SAXIF. foliis radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto subnudo subbisfloro. *Linn. sp. 404.*

Saxifraga tridactylites alpina minor & villosa. Tour. 252.

Sedum tridactylites alpinum minus. Bot. Mons. 238.

Saxifraga foliis integris partim trifidis. Seg. ver. 451. Tab. 9. fig. 4.

HABITAT au Mont Saint Loup & à Lesperou.

* *Foliis lobatis, caulis procumbentibus.*

Hypnoïdes. 8. SAXIF. foliis caulinis linearibus integris trifidisque, stolonibus procumbentibus, caule erecto nudiusculo. *Linn. sp. 405.*

Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidisque. Sauv. 208. & quinquefidis. 208. n°. 90. 91. & 92.

Saxifraga muscosa trifido folio. Tour. 252.

HABITAT à Lesperou.

Adscendens. 9. SAXIF. foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule adscendente subvilloso. *Linn. sp. 405.*

Sedum tridactylites alpinum majus. Bauh. Pin. prod. 131. n°. 3.

HABITAT cum prioribus. Altitudo saxifragæ rotundi-foliae.

S C L E R A N T H U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 432.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex rigida. *Caul.* rigida articulata procumbens. *Fol.* opposita subconnata sessilis simplex integerrima subulata. *Flor.* terminalis fastigiata. *Fulc.* nulla.

1. SCLER. calycibus fructus patulis. *Linn. sp.* 406. *Annua.*

Sauv. 124.

Polygonum acuto angusto & gramineo folio minus repens. *Bot.* 211.

Alchimilla supina gramineo folio, flore minore. *Tour.* 508.

Knavel. *Seg. ver.* 1. *p.* 96.

HABITAT à Gramont, & à Montferrier.

G Y P S O P H I L A.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 498.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex vel ramosa. *Caul.* articulata herbacea teres ramosa rigida. *Fol.* opposita sessilis subconnata simplex integerrima. *Flor.* terminalis aggregata vel fastigiata. *Fulc.* nulla.

1. GYPSOPH. foliis mucronatis recurvatis, floribus *Aggregata.* aggregatis. *Linn. sp.* 406.

Caryophyllum saxatilis ericæ folio, umbellatis corymbis. *Bot. Mons.* 53. *Tab.* 5.

Rubiola montana. *Barr. Icon.* 595.

HABITAT au Vigan après avoir passé le Pont, sur la montagne qui est vis-à-vis, & au Capouladou. Palmeris.

2. GYPSOPH. foliis lanceolato-linearibus obsoletè triquetris lœvibus obtusis secundis. *Linn. sp.* 407. *Fastigiata.*

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis, foliis linearibus, caule adscidente. *Sauv.* 145.

HABITAT à Villemagne & Fougeres.

3. GYPSOPH. foliis linear-lanceolatis planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Linn. sp.* 408. *Rigida.*

Saponaria caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato, floribus sparsis. Sauv. 145.

HABITAT à la Salle.

Saxifraga. 4. GYPSOPH. foliis linearibus, calycibus angulatis, squamis (sæpiùs) duabus, corollis crenatis. Linn. Syst. 1028.

Dianthus calycibus quinquangularibus, squamis calycinis lanceolatis æqualibus, foliis subulatis. Linn. sp. 413.

Lychnis minor saxifraga. Tour. 338.

HOSPITATUR sub dio. Squamæ ad calyces interdum quatuor. Semper florens.

S A P O N A R I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 431.

Char. secund. Rad. simplex tenuis. Caul. herbaea articulata teres ramosa. Fol. opposita subconnata sessilis simplex integerrima. Flor. pendulata pedunculis axillaribus, terminalibusque multifloris (interdum pedunculi uniflori in divisione ramorum.) Fulc. nulla.

Officinalis. 1. SAPON. calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. Linn. sp. 408.

Saponaria major lœvis. Bot. Mons. 229. Barr. Icon. 92.

Lychnis quæ saponaria vulgo. Tour. 336.

La Savonaire.

HABITAT circà Molendinas & ad agrorum margines.

Vaccaria. 2. SAPON. calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. Linn. sp. 409. Sauv. 153.

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ. Bot. Mons. 169. Tour. 335.

HABITAT in arvis. Calyx angulis quinque viridibus, dentibus quinque rufescensibus.

Ocymoides. 3. SAPON. calycibus cylindricis villosis, caulis dichotomis procumbentibus. Linn. sp. 409.

Lychnis vel ocymoides repens montanum. Bot. Mons. 172. Tour. 337.

Saponaria humifusa hirsuta, calyce tubuloso. Sauv. 144.

HABITAT à Valene, Rouquet, Saint Gelly.

DIANTHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 430.

Char. secund. Rad. simplex tenuis vel ramosa.

Caul. herbacea simplex articulata. Fol. opposita sessilis subconnata simplex integerrima subulata. Flor. terminalis solitaria aut aggregata. Fulc. nulla.

* Flores aggregati.

1. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum æquantibus, foliis lanceolatis. Linn. sp. 409. Sauv. 144. *Barbatus;*
Caryophyllus hortensis barbatus latifolius. Tour. 332.
& angustifolius. Ibid.
HABITAT in sterilibus. A St. George. Folia trinervia villosa. Petala apice serrulata.
2. DIANTHUS floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus, foliis linearibus. Linn. sp. p. 409. *Carthusianorum.*
Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. Tour. 333.
Caryophyllus barbatus angustifolius. Seg. ver. I. p. 438.
Le Bouquet parfait.
HOSPITATUR subdio. Colitur in hortis.
3. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. Linn. sp. 410. & Sauv. 144. *Armeria.*
Caryophyllus sylvestris barbatus. Bot. Mons. 52. Tour. 335.
HABITAT à Montferrier, Castelnau.
4. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus. Linn. sp. p. 410. *Prolifer.*
Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, squamis calycinis obtusis magnis. Sauv. 144.
Caryophyllus sylvestris prolifer. Bot. Mons. 52. Tour. 332.
HABITAT à Lavalette, Caunelles ; circa urbem & cum priori.

* *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

Caryophyllus. 5. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Linn. sp. p. 410. Sauv. 143.*

*Caryophyllus hortensis. Tour. 332. & varietates.
L'Oeillet; vernaculè la Girouflade.*

HABITAT cum prioribus; mire varians in hortis floridum elegantia.

Deltoides. 6. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Linn. sp. p. 411.*
*Caryophyllus sylvestris vulgarissimus. Bot. Mons. 52.
Tour. 333.*

Vernaculè l'Oeuillet sauvage.

HABITAT cum prioribus. Caulis simplicissimus pauciflorus.

Chinensis. 7. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subulatis patulis tubum æquantibus, corollis crenatis. *Linn. sp. 411.*

Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis longitudine tubi. Sauv. 144.

La Mignonette.

HOSPITATUR sub dio. Folia ad margines aspera. Flores variegati.

Plumarius. 8. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. *Linn. sp. 411.*

Dianthus floribus solitariis, petalis multifidis basi canaliculatis. Sauv. 143.

Caryophyllus flore tenuissimè dissecto. Bot. Mons. 52.

Tour. 331. Seg. ver. 1. p. 437. flore odoratissimo.

L'Oillet à plume.

HABITAT à L'esperou, à la Salle, au Vigan.

Arenarius. 9. DIANTHUS caulibus unifloris, squamis calycinis ovatis, corollis multifidis, foliis linearibus. *Linn. sp. 412.*

Dianthus foliis brevibus, squamis muticis, caule unifloro. Sauv. 143.

Caryophyllus sylvestris humilis flore unico. Tour. 333.

HABITAT à L'esperou; frequentior à Lamalou, Fougere.

TRIGYNYIA.

CUCUBALUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 443.

Char. secund. *Rad.* simplex tenuis. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* opposita subconnata sessilis simplex integerrima. *Flor.* pedunculata axillaris aut terminalis, solitaria paniculata, spicata aut verticillata. *Fulcr.* nulla.

1. CUCUB. calycibus campanulatis, petalis distantibus, *Baccifera*
fructu colorato, ramis divaricatis. *Linn. sp.* 414.

Alsine scandens baccifera. *Bot. Mons.* 15.

Cucubalus Plinii. *Tour.* 339.

HABITAT à Lattes, la Veruné. Pedunculi uniflori
axillares.

2. CUCUB. calycibus subglobosis glabris reticulato-*Behen*.
venosus, capsulis trilocularibus, corollis subnudis.
Linn. sp. 414. *Sauv.* 151.

Lychnis sylvestris quæ behen album vulgo. *Bot. Mons.*
168. *Tour.* 335.

Le Behen blanc; vernaculè *lous Caoülichous*.

HABITAT in arvis. Pedunculi dichotomi terminales.

3. CUCUB. pedunculis axillaribus unifloris, floribus *Tataricus*.
secundis, foliis scabris. *Linn.*
Cucubalus petalis bipartitis, floribus secundis decum-
bentibus, pedunculis oppositis solitariis erectis,
caule simplicissimo. *Linn. sp.* 415.

HOSPITATUR sub dio. Folia oblonga retrorsum scabra.

4. CUCUB. petalis bipartitis, floribus paniculatis, sta- *Catholicus*.
minibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. sp.* 415.

HOSPITATUR sub dio.

5. CUCUB. floribus dioicis verticillatis, petalis setaceis *Otites*.
indivisis. *Linn. sp.* 415.

Lychnis viscosa flore muscofo. *Bot. Mons.* 168. *Tour.*
336.

Silene floribus dioicis, petalis simplicissimis setaceis.
Sauv. 145.

HABITAT à Castelnau, Lavalette.

6. CUCUB. floribus spicatis alternis secundis subsessi- *Reflexus*.
libus, corollis obtusis nudis. *Linn. sp.* 416.

O. iiiij.

Lychnis sylvestris alba, spica reflexa. *Bot. Mons.* 171.
Icon. 170. *Barr. Icon.* 1027. n^o. 1. & 2. *Tour.* 338.
 HABITAT à Boutonet & cum prioribus.

S I L E N E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 444.

Char. sec. *Rad.* simplex tenuis. *Caul.* herbacea
 vel fruticosa, simplex vel ramosa. *Fol.* oppo-
 sita subconnata simplex integerrima. *Flor.* pe-
 dunculata axillaris solitaria vel conferta, aut
 terminalis paniculato-dichotoma vel spicata.
Fulcr. nulla.

* *Floribus lateralibus solitariis.*

Quinque- 1. SILENE petalis integerrimis subrotundis; fructibus
vulnera. erectis alternis. *Linn. sp.* 416.
Silene spica incurva uno versu florida, foliis imis
 spathulatis. *Sauv.* 146.
 HABITAT à la Verne, Gramont.

* *Floribus lateralibus confertis.*

Nutans. 2. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secundis
 cernuis, caule recurvato. *Linn. sp.* 417.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Bot. Mons.*
 168. *Tour.* 335.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nu-
 tantibus, calyce striato, corolla involuta. *Sauv.* 145.

HABITAT à Castelnau.

Fruticosa. 3. SILENE petalis bifidis, caule fruticoso, foliis lato-
 lanceolatis, panicula trichotoma. *Linn. sp.* 417.

Lychnis sylvestris frutescens myrtifolia behen albo
 simili. *Tour.* 335.

HOSPITATUR sub dio.

* *Floribus ex dichotomia caulis.*

Coneidea. 4. SILENE calycibus fructus globosis acuminatis, striis
 triginta, foliis glabris. *Linn. sp.* 418. *Sauv.* 146.

Cucubalus calycibus globosis acuminatis. *Sauv.* 146.
Lychnis sylvestris latifolia, calycibus turgidis striatis.
Bot. Mons. 169. *Tour.* 337.

HABITAT à gauche du pont de Castelnau, cum globu-
 laria vulgari.

5. SILENE calycibus fructus conicis, striis triginta, *Conicas*:
foliis mollibus. *Linn. sp.* 418.
Lychnis sylvestris angustifolia, calycibus turgidis
striatis. *Tour. 337. Barr. Icon.* 1027.
Cucubalus calycibus fructus conicis. *Sauv.* 146.
HOSPITATUR sub dio.
6. SILENE calycibus ovatis glabris venoso-reticulatis, *Behen*.
capsulis trilocularibus. *Linn. sp.* 418.
Lychnis cretica vesicaria, parvo flore purpurascente.
Tour. cor. 24.
HABITAT à Gramont, & à St. George.
7. SILENE petalis bifidis, caule dichotomo, floribus *Muscipula*.
axillaribus sessilibus, foliis glabris. *Linn. sp.* 420.
Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *Bot. Mons.*
169. *Tour. 337.*
HABITAT à la Verune, Caunelles & Lamousson.
8. SILENE floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Linn. sp.* 420.
Lychnis viscosa purpurea latifolia laevis. *Bot. Mons.*
169. *Tour. 335.*
HABITAT cum prioribus.
9. SILENE floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Linn. sp.* 421. *Rupestris*.
Myosotis foliis perangustis flore calycem excedente.
Seg. ver. tom. 3. p. 184.
Caryophylli minima species flore albo. *Bot. Mons.* 54.
Lychnis saxatilis alpina glabra pumila. *Tour. 338.*
HABITAT cum gypsophila aggregata. Pedunculi internodiis æquales. Caulis palmaris. Folia sæpè ovata.
10. SILENE caulibus unifloris, pedunculis longitudine *Saxifraga*.
caulis. *Linn. sp.* 421.
Lychnis minor saxifraga. *Tour. 338. Seg. ver. pag.*
431. *tab. VI. fig. 1.*
HABITAT cum priori. Abundat à Fougeres. Vix biuncialis aut sesquiuncialis.

S T E L L A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. syst. pl.* 504.

Char. sec. *Rad.* tenuis. funiculiformis subhorizontalis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* opposita simplex integerrima sessilis aut petiolata. *Flor.* axillaris & terminalis, pedunculis ramosis vel simplicibus. *Fulcr.* nulla.

Nemorum. 1. STELL. foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis.
Linn. sp. 421.

Alsine altissima nemorum. Tour. 243.

Alsine foliis ovato-cordatis, floribus trigynis. Sauv. 152.
HABITAT à Lesperou. Petioli longissimi. Folia summa
sessilia.

Dichotoma. 2. STELL. foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, flo-
ribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis. Linn.
sp. 421.

HABITAT cum priori, & à Lamalou.

Graminea. 3. STELL. foliis linearibus integerrimis, floribus pani-
culatis. Linn. sp. 422.

Cerastium caule hirsuto, foliis linearibus glabris, co-
rolla calycem excedente. Sauv. 143.

Alsine pratensis gramineo folio angustiore. Tour. 243.

HABITAT in iisdem locis.

ARENARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 446.

Char. secund. Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea
ramosa. Fol. opposita sessilis simplex integer-
rima. Flor. axillaris & terminalis, pedunculis
uni vel multifloris. Fulc. (nulla in una specie)
stipulae foliis interjectæ oppositæ membranaceæ.

Trinervia. 1. AREN. foliis ovatis acutis nervosis petiolatis. Linn.
sp. 423. & Sauv. 153.

Alsine plantaginis folio. Tour. 242. Bot. Mons. 13.

HABITAT à la Verune, Villeneuve.

Serpullifolia. 2. AREN. foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce
brevioribus. Linn. sp. 423.

Alsine minor multicaulis. Bot. Mons. 13. Tour. 243.

Alsine foliis subovatis acutis sessilibus. Sauv. 153.

HABITAT juxta muros hortorum, & ad agrorum mar-
gines.

Rubra. 3. AREN. foliis filiformibus, stipulis membranaceis vagi-
nantibus. Linn. sp. 423.

Campestris. a. Alsine spargulæ facie, minor, seu spargula minor
flore subcæruleo. Bot. Mons. 13. Tour. 245.

Arenaria foliis linearibus vaginantibus, internodio
longioribus. Sauv. 153.

Marina. b. Alsine spargulæ facie mediâ. Bot. Mons. 14. Tour. 244.

Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum.

Sauv. 141.

HABITAT in ambulacris. **β.** Procumbens foliis carnosis; ad mare.

4. **AREN.** foliis subulatis, caulis paniculatis, calycum *saxatilis.* foliolis ovatis. *Linn. sp.* 424.

Spergula foliis aciformibus densis, ramis ramosis subnudis. *Sauv.* 45.

Alsine saxatilis laricis folio minor, & minori flore.

Hort. Mons. Ic. 11. *Tour.* 244.

HABITAT au delà du pont de Selleneuve, à Montferrier, à la source du Lés.

5. **AREN.** foliis subulatis, caule paniculato, pedunculis simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus. *Linn. sp.* 424. *Tenuifolia.*

Alsine tenuifolia. *Bot. Mons.* 13. *Tour.* 243.

HABITAT cum arenaria serpyllifolia.

6. **AREN.** foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. *Linn. sp.* 424. *Laricifolia.*

Alsine alpina junceo folio. *Tour.* 243.

HABITAT à la source du Lés, ponè móntem; & à Lesperou.

7. **AREN.** foliis ovatis ciliatis acutis. *Linn. sp.* 425. *Ciliata.*
Arenaria serpyllifolia multicaulis & multiflora. *Seg.*

Tom. I. p. 421. tab. V. fig. 2.

Alsine foliis lanceolatis, petalis integris, calyce majoribus. *Sauv.* 153.

HABITAT cum priori, & à Merviel; copiosior à Lamalou, Villemagne.

GARIDELLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 440.

Char. secund. *Rad.* tenuis fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex linearis-multiplex. *Flor.* pedunculata, pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris. *Fulc.* nulla.

1. **GARIDELLA.** *Linn. sp.* 425. *Sauv.* 252. *Nigellastrum.*

Nigellastrum rariss & fœniculaceis foliis. *Hort. Mons. Ic. trum.* 143. *Tour.* 655. *Barr. Icon.* 1240.

La Garidel.

HOSPITATUR sub dio. Annua.

PENTAGYNIA.

COTYLEDON.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 454.

Char. secund. *Rad.* bulbosa vel funiculiformis.

Caul. herbacea succulenta ramosa teres. *Fol.* succulenta sessilis vel petiolata, opposita vel alterna. *Flor.* terminalis cymosa vel racemosa.

Fulcr. nulla.

Orbiculata. 1. COTYL. foliis subrotundis planis integerrimis. *Linn.* sp. 429. *Sauv.* 134.

Cotyledon Africanum frutescens, orbiculatis foliis, limbo purpureo cinctis. *Tour.* 90.

HOSPITATUR in hybernaculo & caldario. Rami abscissi in terram delapsi radices agunt.

*Hemispha-
rica.* 2. COTYL. foliis semi-globosis. *Linn.* sp. 429.

HOSPITATUR cum priori. Rami novam prolem praebent, ut in priori.

Umbilicus. 3. COTYL. foliis cucullatis ferrato-dentatis alternis, caule ramoso, floribus erectis. *Linn.* sp. 429.

Cotyledon major. *Bot. Mons.* 80. *Tour.* 90.

Le Nombrit de Vénus; vernaculè, *de Coucoumèle.*

HABITAT in parietibus humidis.

Laciniata. 4. COTYL. foliis oppositis laciniatis, floribus calycibusque quadrifidis. *Linn.* sp. 430.

HOSPITATUR cum prioribus. Corollæ tubus tetragonus inferne amplior. Folia caulina inferiora cuneiformia trifida, summa integra oblonga.

S E D U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 455.

Char. secund. *Rad.* fibrosa vel tenuis simplex.

Caul. herbacea succulenta. *Fol.* succulenta sessilis simplex integra aut integerrima, opposita vel sparsa. *Flor.* terminalis cymosa vel corymbosa. *Fulcr.* nulla.

* Planifolia.

Telephium. 1. SEDUM foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. *Linn.* sp. 430.

Anacampseros prima. *Tour.* 264. *Barr. Icon.* 837.

2. Sedum foliis ovalibus ferratis, umbella ex alis foliorum. *Sauv.* 116. & 120.

L'Orpin, ou Reprise.

HABITAT à Lesperou.

HOSPITATUR sub dio. Florens absque fructu.

2. SEDUM foliis cuneiformibus integerrimis, caulis decumbentibus, floribus corymbosis. *Linn. sp.* 430. ros.

Sedum foliis spathulatis indivisis, umbella terminali.

Sauv. 77.

Anacampseros minor rotundiore folio, sempervirens.

Tour. 264.

HOSPITATUR sub dio.

3. SEDUM foliis planis, caule ramoso, floribus paniculatis. *Linn. sp.* 431. *Sauv.* 76. Cepaea.

Sedum cepaea dictum. *Tour.* 263.

HABITAT au Vigan, & à Lesperou.

* *Teretifolia.*

4. SEDUM foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule infirme, floribus sparsis. *Linn. sp.* 431. *Dasyphyl-*
lum.

Sedum minus folio circinnato. *Bot. Mons.* 236. *Tour.*
263.

Sedum foliis cordato-ovatis compressis, saepius oppositis, floribus sparsis. *Sauv.* 8.

HABITAT in Saxosis humidis; à Castelnau, Selleneuve.

5. SEDUM foliis subulatis confertis, basi membranacea solutis, floribus cymosis. *Linn. sp.* p. 431. *Sauv.* 7. *Rupestre.*

Sedum minus luteum folio acuto. *Bot. Mons.* 235.
Tour. 263.

6. Sedum minus luteum flore se circumflectente. *Bot.*
Mons. 235. *Tour.* 263.

Sedum foliis teretibus, umbella semi-circulari. *Sauv.* 7.

Le Triquemadame; vernaculè, lou Ris saouvage.

HABITAT à Boutonet, Lavanet, Selleneuve, Caunelles.

6. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Linn. sp.* 432. *Sauv.* 8. *Album.*

Sedum minus teretifolium album. *Bot. Mons.* 236.
Tour. 262.

HABITAT cum priori & circà urbem.

7. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Linn. sp.* 432. *Sauv.* 7. *Acre.*

7. Racemo trifido triplici.

Sedum parvum acre flore luteo. *Bot. Mons.* 236. *Tour.* 263.

HABITAT cum congeneribus.

- sexangulare.* 8. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. *Linn. sp.* 432.
Sedum luteum minimum non acre. *Bot. Mons.* 236.
Tour. 263.
HABITAT in iisdem locis.

O X A L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. plant.* 453.

Char. secund. *Rad.* fibrofa horizontalis stolonifera. *Caul.* herbacea ramosa repens. *Fol.* alterna petiolata ternata, foliolis integris cordatis sessilibus. *Flor.* pedunculata axillaris subumbellata. *Fulcr.* bracteæ lineares involucriformes.

- Corniculata.* 1. OXALIS caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis. *Linn. sp.* 435. *Sauv.* 173.
Oxys flore flavo. *Tour.* 88.
Trifolium acetosum corniculatum. *Bot. Mons.* 271.
L'Alleluia, ou Pain à coucou.
HABITAT circà St. George, Pignan. Luxuriat in horto regio.

A G R O S T E M M A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 449.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbacea articulata teres ramosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

- Githago.* 1. AGROST. hirsuta, calycibus corollam æquantibus, petalis nudis integris. *Linn. sp.* 435. *Sauv.* 146.

Lychnis segetum major. *Bot. Mons.* 169. *Tour.* 335.
La Nielle des bleus.

HABITAT in arvis. Apud nos datur calycibus corollas longè superantibus.

- Coronaria.* 2. AGROST. tomentosa, foliis ovato-lanceolatis, petalis integris coronatis. *Linn. sp.* 436. *Sauv.* 146. Coronaria.

Lychnis coronaria Dioscoridis. *Tour.* 334. *Barr. Icon.* 1006.

La Coquelourde.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi uniflori. Calyces angulis decem; alternis quinque minoribus.

L Y C H N I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 451.

Char. secund. Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea teres articulata. Fol. opposita sessilis subconnata simplex integerrima. Flor. terminalis fastigiata vel subdichotoma. Fulcr. nulla.

1. LYCHN. floribus fasciculatis fastigiatis. Linn. sp. 436. *Chalcedonica.*
Lychnis hirsuta flore coccineo. Tour. 334.
La Croix de Malthe.
HOSPITATUR sub dio. Caulis hirsutus bipedalis vel sesquipedalis. Folia ovato-lanceolata.
2. LYCHN. petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Linn. *Flos cuculi.*
sp. 436. Sauv. 146.
Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici. Bot. Mons. 53.
Lychnis pratensis flore laciniato simplici. Tour. 334.
HABITAT à Gramont, la Verune. Caulis pubescens.
Folia superiora linear-lanceolata glabra. Calyx striis decem viridibus, subcampanulatus. Petali cujuslibet laciniæ intermediæ latiores & longiores.
3. LYCHN. floribus dioicis. Linn. sp. 437. *Dioica.*
Lychnis sylvestris alba simplex. Bot. Mons. 168. Tour.
334.
HABITAT in arvis, cum agrostemmâ.

C E R A S T I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 448.

Char. secund. Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea teres articulata. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis pedunculata pendulinis unifloris, multiflorisve subdichotomis.
Fulcr. nulla.

* *Capulis oblongis.*

1. CERAST. erectum villoso-viscosum. Linn. sp. 437. *Viscosum.*
Sauv. 153.
Myosotis hirsuta altera viscosa. Tour. 245.
Alsine hirsuta altera viscosa. Bot. Mons. 15.

Cerastrum foliis ex ovato-acuminatis, flore calyci
æquale. Sauv. 152.

HABITAT ad agrorum margines.

Arvense. 2. CERAST. foliis linear-lanceolatis obtusis glabris,
corollis calyce majoribus. Linn. sp. 438.

Cerastrum foliis, calycibusque hirsutis. Sauv. 142.

Myosotis arvensis hirsuta flore majore. Tour. 245.

HABITAT cum priori.

* *Capulis subrotundis.*

Repens. 3. CERAST. foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, cap-
sulis subrotundis. Linn. sp. 439.

Cerastrum caule perenni procumbente, foliis lanceo-
latis. Sauv. 142.

Myosotis incana repens. Tour. 245.

L'Oreille de Souris.

HOSPITATUR sub dio.

Tomentosum. 4. CERAST. foliis oblongis tomentosis, pedunculis ra-
mosis, capsulis globosis. Linn. sp. 440.

Myosotis tomentosa latifolia. Tour. 245.

β. Myosotis tomentosa linariæ folio angustiore. Tour. ibid.

Caryophyllus holosteus tomentosus angustifolius. Bot.
Mons. 54.

HABITAT au Vigan, au Capouladou.

Latifolium. 5. CERAST. foliis ovatis subtomentosis, ramis unifloris,
capsulis globosis. Linn. sp. 439.

Cerastrum corolla calycem superante. Sauv. 152.

Myosotis alpina latifolia. Tour. 244.

HABITAT à Saint George, à la source du Lés.

S P E R G U L A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 447.

Char. secund. Rad. tenuis simplex. Caul. herba-
cea ramosa. Fol. sessilis simplex integerrima
opposita aut verticillata. Flor. terminalis sub-
dichotoma. Fulc. nulla.

Pentandra. 1. SPERG. foliis verticillatis; floribus pentandris. Linn.
sp. 440.

Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis.
Tour. 244.

Alsine spergulæ facie minima. Bot. Mons. 14.

HABITAT

HABITAT à Gramont, Selleneuve, Laverune, & in ambulacris.

2. SPERG. foliis oppositis subulatis lœvibus, caulis *Nodosa*. simplicibus. *Linn. sp. 440.*

Alsine nodosa Germanica. Bauh. prodr. 118.

HABITAT cum priori.

3. SPERG. foliis oppositis linearibus lœvibus, pedunculis *Saginoides*, solitariis longissimis, caule repente. *Linn. sp. 441.*

Alsine caryophylloides glabra, florum pediculis longissimis. Seg. tom. III. Tab. IV. fig. 2.

HABITAT au Mont Saint Loup, Rouquet, Valene, à la source du Lés.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 459.*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea teres. Fol. alterna petiolata simplex integerima. Flor. racemosa oppositifolia pedunculata solitaria. Fulc. nulla.*

1. PHYTOLACCA foliis integerrimis. *Linn. sp. 441. Americana.*

Phytolacca Americana majori fructu. Tour. 299.

Solanum Americanum. Barr. Icon. 150.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis : altitudinem humanam superat.



Classis XI.

DODECANDRIA
MONOGYNIA.

A S A R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 461.

Char. secund. *Rad.* horizontalis nodosa vel nulla.
Caul. herbacea simplicissima radicata vel parasitica.
Fol. simplex integerima, sessilis vel petiolata, opposita vel sparsa. *Flor.* pedunculata terminalis. *Fulc.* nulla.

Europaeum. 1. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis. *Linn. sp.*
442.

Asarum. *Tour.* 501.

L'Oreille d'homme ou Cabaret.

HOSPITATUR in frigidario. Primo vere è gemmis membranaceis atro-purpureis vel nigricantibus prodeunt folia duo sessilia. Pedunculus ex eorum medio, uniflorus, brevissimus. Absolutâ florescentiâ, petioli foliorum elongantur; pedunculi recurvantur, nec longiores evadunt.

Hypocistis. 2. ASARUM foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis. *Linn. sp.* 442.

Hypocistis. *Tour. Cor.* 46. *Bot. Mons.* 135.

Asarum aphyllum squamosum. *Sauv.* 4.

L'Hypociste.

HABITAT à Gramont, Montferrier, Lavalette; ad basim cisti Monspeliensis & ladaniferæ, vel etiam suprà illarum radices.

P E G A N U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 520. *Adde* folia calycis inæqualia.

Char. secund. *Rad.* subsimplex fusiformis. *Caul.* striata herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex lineari-multifida, succulenta. *Flor.* pedunculata solitaria oppositifolia. *Fulc.* nulla.

1. PEGÁN. foliis multifidis. *Linn.* sp. 444. *Sauv.* 208. *Harmala*.
Harmala. *Tour.* 235.
La Rue sauvage.
 HOSPITATUR sub dio. Corollæ calycibus minores.
 Pedunculi foliis subæquales. Foliola calycina linea-
 ria; tria longiora.

P O R T U L A C C A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 523.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herba-
 cea succulenta ramosa. *Fol.* alterna sessilis sim-
 plex integerrima succulenta. *Flor.* axillaris fo-
 litaria sessilis. *Fulc.* nulla.

1. PORT. foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Linn.* *Oleracea*.
 sp. 445. & *Sauv.* 168.

Portulacca angustifolia sylvestris. *Bot. Mons.* 212.
Tour. 236.

Le Pourpier; vernaculè *les Bourroutaigues*.

HABITAT in hortis & arvis.

2. PORT. foliis subulatis alternis, axillis pilosis, flo. *Pilosæ*.
 ribus sessilibus. *Linn.* sp. 445.

Portulacca curassavica angusto longo, lucidoque fo-
 lio, procumbens. *Tour.* 236.

Portulacca..... flore dilutius rubente, *Tour. ibid.*

Le Pourpier de Curaçao.

HOSPITATUR sub dio. Luxuriat in horto regio.

L Y T H R U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 463.

Char. secund. *Rad.* ramosa perpendicularis vel
 horizontalis fibrosa. *Caul.* herbacea tetragona
 ramosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima oppo-
 sita vel alterna. *Flor.* terminalis spicata aut
 axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla, (in spi-
 catis, bracteæ ovatæ sparsæ.)

1. LYTH. foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus *Salicaria*.
 spicatis dodecangris. *Linn.* sp. 446.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. *Tour.* 253.

Lysimachia purpurea vulgaris spicata. *Bot. Mons.* 172.
La Salicaire.

HABITAT circà Molendinas. Altitudo tripedalis. Bracteæ calycibus longiores. Calyx striatus cylindricus, denticulis alternis minimis introflexis. Stamina 6. vel septem petalis breviora; reliqua pistillo etiam breviora intrà tubum calycis recondita. Nervorum anastomoses ad foliorum margines ut in lysimachia vulgari.

Hyssopifolium 2. LYTH. foliis alternis linearibus, floribus hexandris.

Linn. sp. 447.

Salicaria hyssopifolio latiore. *Tour. 253.*

Grotiola minor sive hyssopifolia. *Bot. Mons. 123.*

Lythrum foliis alternis. *Sauv. 53.*

Polygonum aquaticum majus. *Barr. Icon. 773. n°. 1.*

HABITAT in fossis uidis à Selleneuve, la Peissine, Gramont. Caulis vix semipedalis. Folia obtusa; inferioribus sæpe oppositis.

Thymifolium 3. LYTH. foliis alternis linearibus, floribus tetrapetalis diandris. *Linn. sp. 447.*

Gratiola minima vel hyssopifolia minor. *Bot. Mons. 123.*

Salicaria minima tenuifolia. *Tour. 254.*

HABITAT in pratulo ad lævam, à Gramont. Priori humilius.

B O C C O N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 500. *Addit. corolla nulla.*

Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticulosa. Fol. alterna petiolata simplex incisa. Flor. paniculato - racemosa axillaris & terminalis. Fulc. nulla... lactescentia crocea.

Frutescens. 1. BOCCONIA. *Linn. sp. 505.* polyandria.

La Boccon.

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens. Folia ovato-sinuata subtus tomentosa.

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 464.

Char. secund. Rad. horizontalis ramosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna sessilis im-

pari & interrupte-pinnata foliolis sessilibus incisis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* stipulæ binæ foliaceæ incisæ amplexicaules semicordatæ. Hami rigidi suprà capsulas.

1. AGRIM. foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis. *Eupatoria.*
Linn. sp. 448.
Agrimonia officinalis. *Tour. 301.*
Eupatorium veterum seu agrimonia. *Bot. Mons. 93.*
2. Agrimonia foliolis basi integerrimis.
Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repente. *Tour. cor. 21.*
L'Aigremoine.
HABITAT in arvis & in fossis. β. Foliola duplo majora. Tota planta villoso. Racemus compactor.

TRIGYNIA.

R E S E D A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 534.

Char. secund. Rad. simplex tenuis. Caul. herba-cea ramosa teres. Fol. sessilis alterna simplex integerrima aut integra aut incisa, nunc impari-pinnata; vel utraque simul. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bractea solitaria linearis ad basim floris singuli.

1. RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus qua- *Luteola.*
drifidis. *Linn. sp. 448.*
Luteola herba salicis folio. *Bot. Mons. 168.* *Tour. 423.*
La Gaude ou herbe jaune.
HABITAT in arvis au-delà du Pont de Castelnau.
2. RESEDA foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis. *Sesamoides.*
Linn. sp. 449.
Reseda linariæ folio. *Bauh. prod. 42.* *Sauv. 48.*
Sesamoides fructu stellato. *Tour. 424.*
HABITAT à L'esperou; au Mont Saint Loup, in hu-midis rupium fissuris. Flores subsessiles. Cauliculi palmares.
3. RESEDA foliis pinnatis, floribus tetragynis. *Linn. Alba.*
sp. 449.
Reseda foliis calcitrapæ, flore albo. *Bot. Mons. 221.*
Tour. 423. P. iij.

230 DODECANDRIA TRIGYNIA.

HABITAT juxta amnem à Lamousson & à la Mer.

- Lutea.* 4. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *Linn. sp. 449.*

Reseda vulgaris. *Bot. Mons. 221. Tour. 423.*

Reseda foliis trifidis infimis laciniatis. *Sauv. 194.*

HABITAT in arvis, à Boutonet, Montferrier.

- Phyteuma.* 5. RESEDA foliis integris, trilobisque, calycibus maximis. *Linn. sp. 449.*

Reseda foliis integris trilobisve, calycibus maximis hexaphyllis. *Sauv. 194.*

Reseda minor vulgaris. *Tour. 423.*

Resedæ affinis phyteuma. *Bot. Mons. 221.*

HABITAT cum priori & in hortis. Laciniæ petalorum intermediæ breviores.

- Odorata.* 6. RESEDA foliis integris, trilobisque, calycibus floræ æquantibus. *Linn. Syst. nat. 2. p. 1046.*

Reseda foliis aliis integris, aliis trilobis, calycibus exiguis. *Sauv. 194.*

HOSPITATUR sub dio. Ägyptiaca. Semperfivens & semperflorens. Petalorum laciniæ laterales intermediiæ breviores.

EUPHORBIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 517.

Char. sec. Rad. fibrosa vel funiculiformis vel simplex tenuis. Caul. herbacea ramosa vel fruticosa articulata succulenta, nuda vel foliosa, teres vel angulata. Fol. vel nulla, vel simplex integra aut integerrima, sparsa vel opposita, sessilis aut petiolata. Flor. terminalis umbellata dichotoma, trichotoma, &c. vel axillaris solitaria pedunculata. Fulc. vel nulla, vel aculei suprà angulos caulis, geminati (in unâ specie) suprà capsulas. Lactescentia (in omnibus speciebus) alba.

* Fruticosæ aculeatæ.

- Canariensis.* 1. EUPH. aculeata nuda subquinquangularis, aculeis geminatis. *Linn. sp. 450.*

HOSPITATUR sub dio & in caldario.

- Officinarum.* 2. EUPH. aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Linn. sp. 451.*

L'Euphorbe.

HOSPITATUR in hybernaculo.

3. EUPH. aculeata semi-nuda, angulis oblique tuberculatis. *Linn. sp. 451.* *Neriifolia.*

Tithymaloides frutescens, foliis nerii. *Tour. 654.*

HOSPITATUR in caldario.

** Fruticosæ inermes.*

4. EUPH. inermis nuda fruticosa filiformis (funiformis) *Viminalis.*
volubilis, cicatricibus oppositis. *Linn. sp. 452.*
Sauv. 6.

HOSPITATUR in caldario.

5. EUPH. inermis semi-nuda fruticosa filiformis flaccida, foliis alternis. *Linn. sp. 452.* *Mauritanica.*
Sauv. 6.

HOSPITATUR in caldario.

6. EUPH. inermis subnuda fruticosa filiformis (funiformis) erecta, ramis patulis determinatè confertis. *Tirucallii.*
Linn. sp. 452. *Sauv. 6.*

La Discipline.

HOSPITATUR cum prioribus.

7. EUPH. inermis imbricata tuberculis foliolo linearis instructis. *Linn. sp. 452.* *Caput-Medusæ.*

La Tête de Meduse.

HOSPITATUR cum congeneribus.

** Dichoromæ, umbella bifida aut nulla.*

8. EUPH. dichotoma, foliis serratis oblongis pilosis, floribus axillaribus solitariis, ramis patulis. *Linn. Maculata.*
sp. 455.

HOSPITATUR sub dio.

9. EUPH. dichotoma, foliis crenulatis subrotundis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *Linn. sp. 455.* *Chamæsyce.*

Tithymalus exiguus glaber nummulariæ folio. *Tour. 87.*Chamæsyce. *Bot. Mons. 62.*

HABITAT in arvis & hortis.

10. EUPH. dichotoma, foliis integerrimis semi-cordatis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *Linn. sp. 455.* *Replis.*

Peplus minor. *Bot. Mons. 200.*Peplus maritima folio rubro & albo. *Bot. Mons. 200.*

Tithymalus maritimus folio obtuso aurito, rubro & viridi. *Tour.* 87.

HABITAT ad mare & stagna.

* *Umbella trifida.*

Peplus. 11. EUPH. umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Linn. sp.* 456.

Tithymalus foliis subrotundis non crenatis. *Tour.* 87.

Peplus sive *esula* rotunda. *Bot. Mons.* 200.

HABITAT in arvis.

Exigua. 12. EUPH. umbella trifida, dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Linn. sp.* 456.

Acuta. Tithymalus seu *esula* *exigua*. *Bot. Mons.* 306. *Tour.* 86.

Retusa. 13. Tithymalus exiguus saxatilis. *Bot. Mons.* 259. tab. 258. *Tour.* 86.

Tithymalus inermis foliis ad caulem linearibus, ad umbellas ternis, quinis, &c. *Sauv.* 47.

HABITAT in sterilibus; à *Boutonet*, *Montferrier*, *Caunelles*, *la Valette*.

* *Umbella quadrifida.*

Lathyrus. 13. EUPH. umbella quadrifida, dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Linn. sp.* 457.

Tithymalus cataputia dictus. *Tour.* 86.

L'Epurge; vernaculè, *la Catapuce*, ou *Lach de pute*.

HABITAT au *Vigan*. Humanam superat altitudinem.

Involucra omnia cordato-ovata. Variat foliis ramorum omnium, oblongis alternis; involucellis lanceolatis.

* *Umbella quinquefida.*

Spinoza. 14. EUPH. umbella subquinquefida simplici, involucellis ovatis; primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso. *Linn. sp.* 457.

Tithymalus maritimus spinosus. *Tour.* 87.

HOSPITATUR sub dio.

Dulcis. 15. EUPH. umbella quinquefida; bifida, involucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Linn. sp.* 457.

Tithymalus montanus non acris. *Bot. Mons.* 306. *Tour.* 86.

Tithymalus dulcis tuberosa radice. Barr. Icon. 909.

HABITAT au Capouladou ; à St. Guillin le Désert. Radix nodosa.

16. EUPH. umbella quinquefida ; bifida , involucellis ovatis mucronatis , foliis lanceolatis. Linn. sp. 458. *Pithysa.*

Tithymalus foliis brevibus aculeatis. Seg. Tom. I.

p. 154.

HOSPITATUR sub dio.

17. EUPH. umbella subquinquefida ; bifida , involucellis cordato-reniformibus, foliis sursum imbricatis. Linn. sp. 458. *Paralias.*

Tithymalus maritimus. Bot. Mons. 255. Tour. 87. Barr. Ic. 886.

HABITAT ad mare & stagna.

18. EUPH. umbella quinquefida ; dichotoma, involucellis cordatis acutis , foliis linear-lanceolatis , ramis floriferis. Linn. sp. 458. *Segetalis.*

Tithymalus amygdaloïdes angustifolius. Bot. Mons. 256. Tour. 86.

Tithymalus lini folio acuto. Bot. Mons. Tour. 86.

HABITAT in segetibus , ad mare.

19. EUPH. umbella quinquefida ; trifida ; dichotoma , involucellis obovatis , foliis cuneiformibus serratis. Linn. sp. 459. *Helioscopia.*

Tithymalus helioscopius. Bot. Mons. 256. Tour. 87. Barr. Ic. 212.

HABITAT à Castelnau , Laites , Selleneuve.

20. EUPH. umbella quinquefida ; trifida ; dichotoma , involucellis diphyllis reniformibus , foliis amplexicaulibus cordatis serratis. Linn. sp. 459. *Serrata.*

Tithymalus characias folio ferrato. Bot. Mons. 254. Tour. 87.

HABITAT cum priori.

21. EUPH. umbella quinquefida ; trifida ; dichotoma , involucellis subovatis , foliis lanceolatis serratis , capsulis verrucosis. Linn. 459. *Verrucosa.*

Tithymalus myrsinites , fructu verrucæ simili. Bot. Mons. 255. Tour. 86.

HABITAT à la Peissine , la Verune.

22. EUPH. umbella quinquefida ; subquadrifida ; dichotoma , involucellis primariis tetraphyllis , foliis lanceolatis ferratis sessilibus. Linn. sp. 460. *Platypbyllis.*

Tithymalus arvensis latifolius Germanicus. Bot. Mons.

256. *Tour. 86.*

HABITAT in maritimis.

- Pilosæ.* 23. EUPH. umbella quinquefida; trifida; bifida, involucris ovatis, petalis integris, foliis lanceolatis subpilosis apice ferrulatis. *Linn. sp. 460.*

Tithymalus incanus hirsutus. Tour. 86.

Tithymalus characias prætensis incanus. Bot. Mons.

255.

HABITAT à gauche du pont de Salaison, à Lattes, à la source du Lés.

* *Umbellâ multifidâ.*

- Efula.* 24. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. *Linn. sp. 461.*

Tithymalus foliis pini forte Dioscoridis. Bot. Mons.

256. *Tour. 86. B. Pin. 292.*

HABITAT à Montferrier.

- Cyparissias.* 25. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis. *Linn. sp. 461.*

Tithymalus cyparissias. Bot. Mons. 256. Tour. 86.

HABITAT cum prioribus.

- Myrsinites.* 26. EUPH. umbella suboctofida; bifida, involucellis subovatis, foliis spathulatis patentibus carnosis mucronatis margine scabris. *Linn. sp. 461.*

Tithymalus myrsinites latifolius. Tour. 86. Barr. Ic. 1200.

HABITAT à Mauguio, Lattes, Villeneuve.

- Amygdaloi-des.* 27. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis petiolatis orbiculatis, foliis obtusis. *Linn. sp. 463.*

Tithymalus characias amygdaloïdes. Bot. Mons. 254.

HABITAT cum priori, & à Selleneuve; ad lœvam secus amnem.

- Sylvatica.* 28. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis perfoliatis subcordatis, foliis lanceolatis integerimis. *Linn. sp. 463.*

Tithymalus sylvaticus lunato flore. Tour. 85.

HABITAT à St. George, Courpoiran, Caunelles, Villeneuve.

- Characias.* 29. EUPH. umbella multifida; bifida, involucellis per-

foliatis emarginatis, foliis integerrimis, caule frutescente. Linn. sp. 463.

Tithymalus characias rubens peregrinus. Bot. Mons. 254. Tour. 85.

HABITAT ad lœvam à Sembrés, Salason, & à la mer.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 465.

Char. secund. Rad. rapacea vel ramosa. Caul. herbacea vel fruticosa. Fol. sessilis simplex integerrima conferta (sæpius radicata) succulenta. Flor. terminalis subcorymbosa. Fulcr. nulla.

1. SEMPERV. caule arborescente lœvi ramoso. Linn. sp. Arboreum. 464.

Sedum majus arborescens, flosculis candidis. Tour. 262.

La Joubarbe en arbre.

HOSPITATUR in hybernaculo.

2. SEMPERV. foliis ciliatis, propaginibus patentibus. Tectorum. Linn. sp. 464.

Sedum majus vulgare. Tour. 262.

La Joubarbe ; vernaculè, las Carchofes, l'Herbe das agacisses.


HOSPITATUR sub dio. Folia lingulata acuminata.

3. SEMPERV. foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. Linn. sp. 465. Arachnoideum.

Sedum montanum tomentosum. Tour. 262. Barr. Ic.

391. n°. 1. 393.

HOSPITATUR sub dio. Folia oblonga, latere altero piano, altero convexo. Caulis vix biuncialis. Radix crassa napiformis.



Classis XII.

ICOSANDRIA
MONOGYNIA.

CACTUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 466.

Char. secund. *Rad.* funiculiformis. *Caul.* succulenta articulato - prolifer, nunc angulata vel compressa, nunc repens vel erecta, nunc radicans. *Fol.* nulla. *Flor.* solitaria sessilis supra angulos caulis vel ad margines articulorum. *Fulc.* tubercula ad margines & supra angulos articulorum. Spinæ supra tubercula & fructum. Lactescens in paucis.

* Echino-melocacti *subrotundi*.

Mammillaris. 1. CACTUS subrotundus rectus tuberculis ovatis barbatis. Linn. sp. pag. 466.

Melocactus Americanus, ex plurimis globulis opuntiae modo nescientibus, conflatus. Tour. 653.

Le Melon épineux.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario. Lactescens.

* Cerei erecti stantes per se.

Peruvianus. 2. CACTUS erectus longus suboctangularis; angulis obtusis. Linn. sp. pag. 467.

Cactus novemangularis longus erectus. Sauv. 5.

Le Cierge du Pérou.

HOSPITATUR sub dio. Florens quolibet anno absque fructu.

* Cerei repentes radiculis lateralibus.

Grandiflorus. 3. CACTUS repens subquinquangularis. Linn. sp. 467.

Cactus scandens angulis quinque vel pluribus obtusis.

Sauv. 5.

Le Cierge rampant.

- HOSPITATUR sub dio & in caldario.
4. CACTUS repens decemangularis. *Linn. sp. 467.* Decem-angu-
laris.
Autre Cierge rampant.
- HOSPITATUR cum priori.
5. CACTUS repens triangularis. *Linn. sp. 468.* Triangularis.
Cactus scandens triangularis articulatus. Sauv. 5.
Le Cierge grimpant.
- HOSPITATUR in caldario cujus parietes scandit.
- * *Opuntiae compressæ articulis proliferis.*
6. CACTUS articulato-prolifer laxus, articulis ovatis, *Opuntia.*
spinis setaceis. *Linn. sp. 468.*
Opuntia vulgo herbariorum. Tour. 239.
La Raquette.
- HOSPITATUR sub dio. Solus inter congeneres fructum maturans.
7. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis; spinis setaceis. *Linn. sp. 468. Sauv. 5.* *Ficus Indica.*
Opuntia maxima folio spinoso latissimo & longissimo. Tour. 240.
Le Figuier d'Inde, ou Cardasse.
- HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.
8. CACTUS articulato-prolifer; articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Linn. sp. 468.* *Tuna.*
HOSPITATUR cum congenib. *La Cochenille.*
9. CACTUS articulato-prolifer; articulis ovato-oblongis subinermibus. *Linn. sp. 468.* *Cochenillifer.*
HOSPITATUR in caldario. Rarò florens.
10. CACTUS articulato-prolifer, articulis cylindrico-ventricosis compressis. *Linn. sp. 469.* *Curassavicus.*
Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovatis, spinis solitariis. Sauv. 5.
Opuntia Americana minima spinis creberrimis tenuissimis. Tour. 240.
Le Figuier de Curaçao.
- HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo. Articuli vix unciales.

PHILADELPHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 479.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa, Caul. fruti-

cosa. *Fol.* opposita petiolata simplex subintegerrima. *Flor.* terminalis pedunculata subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

- Coronarius.* 1. PHILAD. foliis subdentatis. *Linn.* sp. 470.
Syringa alba sive philadelphus. *Tour.* 617.
Le Siringa; vernaculè *lou Siringua*.
HOSPITATUR sub dio.

M Y R T U S.

- Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 471.
Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* opposita subsessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria. *Fulcr.* bracteæ involucriformes binæ.

- Communis.* 1. MYRTUS floribus solitariis, involucro diphyllo. *Linn.* sp. 471.

- Myrtus communis Italica.* *Tour.* 640.
2. *Myrtus Romana latifolia.* *Tour.* 640.
Le Myrte; vernaculè, *de Murtra ou herba daouï lagui*.
HOSPITATUR sub dio. Variat foliis ternis. Folia (in communi) perforata seu punctis pertusa, ut in hyperico.

P U N I C A.

- Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 469.
Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* sessilis terminalis subsolitaria. *Fulc.* nulla.

- Granatum.* 1. PUNICA. *Linn.* sp. 472.

- Malus punica sylvestris.* *Bot. Mons.* 173. *Tour.* 636.
Le Grenadier; vernaculè *lou Miougranié*.
HABITAT ad margines agrorum. Sepes majores constitutens.

A M Y G D A L U S.

- Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 473.
Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna simplex integra, petiolata aut sessilis. *Flor.* axillaris pedunculata conferta. *Fulcr.* stipulæ binæ deciduæ. Glandulæ supra ferraturas foliorum (in unâ specie.)

1. AMYGD. foliorum serraturis omnibus acutis. *Linn.* *Persica.*
sp. 472.
Persica molli carne & vulgaris. *Tour.* 624.
Le Pécher ; vernaculè lou Peché, las Aouberges.
HOSPITATUR sub dio.
2. AMYGD. foliis petiolatis, serraturis infimis glandu- *Communis.*
 losis. *Linn.* *sp. 473.*
Amygdalus sativa. *Tour.* 627.
L'Amandier ; vernaculè l'Amellié.
HABITAT in arvis & vineis. *A Castelnau, la Verune.*
3. AMYGD. foliis petiolatis basi attenuatis. *Linn.* *sp. 473.* *Nana.*
Amygdalus indica nana. *Tour.* 627.
L'Amandier nain.
HOSPITATUR sub dio.

PRUNUS.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 474.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol.
 alterna petiolata simplex integra vel integer-
 rima. Flor. pedunculata, solitaria aut racemo-
 sa, axillaris aut ramea terminalis. Fulcr. nulla.
 (in una specie) aculei sparsi ; glandulæ (in
 paucis) supra petiolum, aut in paginâ folio-
 rum inferiori.

1. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi sub- *Padus.*
 tus biglandulosis. *Linn.* *sp. 473.*
Cerasus ramosa sylvestris, fructu non eduli. *Tour.* 626.
Le Bois de Ste. Lucie.
HOSPITATUR sub dio. Folia utrinque sæpius glan-
dulosa. Petioli glandulosi. Racemi ramei terminales.
Fructum maturans.
2. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus *Lusitanica.*
 è glandulosis. *Linn.* *sp. 473.*
Laurocerasus Lusitanica minor. *Tour.* 628.
HOSPITATUR sub dio. Racemi axillares foliis longiores.
3. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus *Laurocerasus*
 dorso biglandulosis. *Linn.* *sp. 474.*
Laurocerasus. *Tour.* 628. *Barr. Icon.* 873.
Le Laurier-cerise.
HOSPITATUR sub dio. Racemi axillares foliis breviores. *Mahaleb.*
4. PRUNUS floribus corymbosis, foliis ovatis. *Linn.*
 sp. 474.

Cerasus sylvestris amara. Bot. Mons. 58.

Cerasus mahaleb putata. Tour. 627.

Le Malague; vernaculè *l'Amarel*.

HABITAT au bois de Valene. Corymbi ramulos terminant.

Armeniaca. 5. PRUNUS floribus sessilibus, foliis subcordatis. Linn. sp. 474.

Armeniaca fructu majore. Tour. 623.

L'Abricotier; vernaculè *l'Aaoubriicotié*.

HABITAT in hortis sub dio. Apricatur.

Cerasus. 6. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis. Linn. sp. 474.

Cerasus sativa. Tour. 625. Bot. Mons. 58. acida.

Le Cerisier; vernaculè *las Cerieiras, las Agriotes*.

HABITAT ad lœvam juxta amnem. *A Castelnau, Montferrier*.

Domestica. 7. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis lanceolato-ovatis convolutis. Linn. sp. 475.

Prunus domestica. Tour. 622. innumeræ varietates.

Le Prunier; vernaculè *lou Prunié*.

HABITAT cum priori.

Spinosa. 8. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. Linn. sp. 475.

Prunus sylvestris. Bot. Mons. 213. Tour. 623.

Le Prunellier; vernaculè *las Agrunelas*.

HABITAT ad agrorum margines. Sepes mediocres constituit.

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 477.

Char. sec. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra aut incisa. Flor. corymbosa ramea axillaris & terminalis. Fulcr. stipulæ binæ deciduæ. Spinæ sparsæ.

Aria. 1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter serratis subtus tomentosis. Linn. sp. 475.

Cratægus folio subrotundo ferrato subtus incano. Tour. 633.

Le Drouillier, Drullier.

HABITAT

HABITAT à Alais, Fougeres.

2. CRATÆGUS foliis cordatis septangulis, lobis infra-terminalis.
mis divaricatis. Linn. sp. 476.

Cratægus folio laciniato. Tour. 633.

Mespilus apii folio sylvestris, non spinosa, sive sor-
bus terminalis. Bot. Mons. 176.

HABITAT à Valene, Viols.

3. CRATÆGUS foliis obtusis bitrifidis serratis. Linn. Oxyacantha.
sp. 477.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa seu oxyacantha.
Bot. Mons. 177. & Tour. 642.

L'Aubepin; vernaculè las Poumetas.

HABITAT ad margines agrorum. Sæpius datur flori-
bus monogynis.

4. CRATÆGUS foliis obtusis bitrifidis subdentatis. Azarolus.
Linn. sp. 477.

Mespilus apii folio laciniato. Bot. Mons. 176. Tour. 641.

L'Azerolier; vernaculè, las Poumetas de doux cloffés.

HABITAT in arvis & vineis. A Castelnau, Montferrier.

TRIGYNYA.

SORBUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 478.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol.
alterna impari-pinnata, foliolis oppositis sessi-
libus integris. Flor. ramea terminalis subcorym-
bosa. Fulc. nulla.

1. SORBUS foliis utrinque glabris. Linn. sp. 477. Aucuparia.

Sorbus aucuparia. Tour. 634.

Le Sorbier sauvage.

HABITAT à Valene, Lesperou.

2. SORBUS foliis subtus tomentosis. Linn. sp. 477. Domestica.

Sorbus sativa. Bot. Mons. 245. Tour. 633.

Le Cormier ou Sorbier; vernaculè lou Sourbié.

HABITAT cum prunis, amygdalis, punicâ. A Mont-
ferrier, Gramont, Selleneuve.

PENTAGYNIA.**M E S P I L U S.**

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 480.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra aut integerrima. *Flor.* axillaris vel ramea terminalis, solitaria vel corymbosa. *Fulcr.* nulla. Aculei in paucissimis.

Germanica. 1. MESPILUS inermis foliis lanceolatis integerimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis. *Linn. sp.* 478. *Mespilus Germanica* folio laurino non ferrato. *Tour.* 641. *Le Neflier*; vernaculè *las Mespoules*.
HABITAT à Valene, Lamalou.

Pyracantha. 2. MESPILUS spinosa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtusis. *Linn. sp.* 478. *Mespilus aculeata amygdali folio.* *Tour.* 642. *Pyracantha sempervirens.* *Barr. Icon.* 874. *Le Buisson ardent.*
HOSPITATUR sub dio.

Amelanchier. 3. MESPILUS inermis, foliis ovalibus serratis, caulinis hirsutis. *Linn. sp.* 478. *Mespilus folio rotundiori, fructu nigro subdulci.* *Tour.* 642. *Alni effigie lanato folio minor.* *Bot. Mons.* 12. *L'Amelanchier.*
HABITAT Monspelii, à Valene, St. Guillin le Désert.

Crataegus. 4. MESPILUS foliis ovatis integerimis. *Linn. sp.* 479. *Mespilus folio subrotundo, fructu rubro.* *Tour.* 633. HOSPITATUR sub dio.

P Y R U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 481.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis cymosa vel umbellata vel solitaria. *Fulcr.* nulla.

Communis. 1. PYRUS foliis serratis, pomis basi productis. *Linn. sp.* 479. *Pyrus foliis serratis, floribus corymbosis.* *Linn. Syst. nat. tom. II. p. 1058.*

Pyrus sylvestris. Bot. Mons. 215. Tour. 632. & varietates.

Le Poirier; vernaculè *lou Perié,* *las Perusses.*

HABITAT à *Caunelles,* *la Verune.*

2. PYRUS foliis serratis, pomis basi concavis. Linn. sp. Malus. 479.

Pyrus foliis serratis, umbellis sessilibus. Linn. Syst. pag. 1058.

Malus sylvestris. Tour. 634. & varietates.

Le Pommier; vernaculè *lou Poumié.*

HABITAT à *Fougeres,* *Lamalou,* *la Salle.*

3. PYRUS foliis integerrimis, floribus solitariis. Syst. Cydonia. nat. p. 1058.

Cydonia vulgaris. Tour. 632.

Malus cotonea sylvestris. Bot. Mons. 173.

Le Coignassier; vernaculè *lou Coudonné.*

HABITAT ad margines agrorum. Sepes majores constituentes.

M E S E M B R Y A N T H E M U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 540.

Char. secund. Rad. funiculiformis. Caul. herbacea succulenta, teres vel angulata. Fol. simplex sessilis subconnata succulenta, teres vel angulata, alterna vel opposita. Flor. solitaria pendulata terminalis. Fulcr. glandulæ epiphyllæ sparsæ (in plurimis.)

* *Albis corollis.*

1. MESEMBR. foliis alternis ovatis obtusis undulatis. *Crystallinum* Linn. sp. 480.

Mesembryanthemum foliis alternis papillosum undulatis. Linn. Syst. 1059.

La Glaciale.

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis oppositis. Annum.

* *Rubicundis corollis.*

2. MESEMBR. acaule, foliis triquetris linearibus apice *Bellidiflorum* trifariam dentatis. Linn. sp. pag. 482.

Mesembryanthemum acaule, foliis triquetris impunctatis, &c. Linn. Syst. 1059.

HOSPITATUR sub dio. Variat flore albo. Floret autumno. Pedunculi unciales.

Qij

- Deltoideum.* 3. MESEMBR. caulescens, foliis deltoidibus triquetris dentatis impunctatis distinctis. *Linn. Syst.* 1059.
Mesembryanthemum caulescens foliis deltoidibus triquetris dentatis. *Linn. sp.* 480.
 HOSPITATUR in caldario.
- [*Barbatum.* 4. MESEMBR. foliis triquetro-ovatis papulosis distinctis apice barbatis. *Linn. Syst.* 1059.
Mesembryanthemum foliis apice barbatis. *Linn. sp.* 480.
 HOSPITATUR in caldario.
- Acinaciforme* 5. MESEMBR. foliis acinaciformibus impunctatis connatis, angulo carinali crenulatis, petalis lanceolatis. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum foliis acinaciformibus connatis, angulo carinali scabris, ramis angulatis. *Linn. sp.* 485.
 HOSPITATUR in caldario.
- Crassifolium.* 6. MESEMBR. foliis semicylindraceis impunctatis connatis apice triquetris, caule repente semicylindrico. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum caule repente semicylindrico, foliis levibus semicylindraceis connatis apice triquetris. *Linn. sp.* 484.
 HOSPITATUR cum prioribus.
- Scabrum.* 7. MESEMBR. foliis subulatis distinctis, subtus undique punctato-muricatis. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum foliis subulatis, subtus undique scabris. *Linn. sp.* 481.
 HOSPITATUR in caldario.

* *Luteis corollis.*

- Glaucum.* 8. MESEMBR. foliis triquetris acutis punctatis distinctis, foliolis calycinis ovato-cordatis. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum foliis subulatis triquetris strictis acutis, punctis pellucidis obsoletis sparsis. *Linn. sp.* 486.
 HOSPITATUR in caldario.
- Dolabriforme* 9. MESEMBR. foliis dolabriformibus punctatis. *Linn. Syst.* 1061.
Mesembryanthemum foliis dolabriformibus. *Linn. sp.* 487.
 HOSPITATUR cum congeneribus.

S P I R Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 482.

Char. secund. Rad. fusiformis vel tuberosa fasciculata. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna interrupte & impari-pinnata foliolis sessilibus simplicibus integris. Flor. terminalis cymosa. Fulcr. stipulae adnatæ geminæ.

1. SPIRÆA foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, floribus cymosis, caule herbaceo. *Linn. sp. 490.* *Filipendula*.

Filipendula vulgaris. Tour. 293. Bot. Mons. 97.

La Filipendule.

HABITAT à Lesperou, au Capouladou.

2. SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Linn. sp. 490.* *Ulmaria*.

Ulmaria Clusii. Tour. 265.

La Reine des prés.

HABITAT à Lesperou.

POLYGYNIA.

R O S A.

Char. prim. Vid. Lin. gen. pl. 484.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticulosa. Fol. alterna impari-pinnata, foliolis simplicibus integris sessilibus. Flor. pedunculata axillaris & terminalis. Fulc. aculei suprà caulem petiolos pedunculosque stipulae binæ adnatæ.

* *Germinibus subglobosis.*

1. ROSA aculeata, foliis odoratis subtus rubiginosis. *Eglanteria*.
Linn. sp. 491.

Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis. Linn. Syst. 1062..

Rosa sylvestris foliis odoratis. Bot. Mons. 223. Tour. 638.

L'Eglantier.

HABITAT à Mauguiò, Villeneuve, Laverune.

2. ROSA germinibus globosis aculeatis, pedunculis *villoso-*
hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis,

foliis tomentosis. *Linn. Syst.* 1068.

Rosa foliis utrinque villosis, fructu spinoso. *Linn. sp.* 491.

Rosa pomo spinoso folio hirsuto. *Bot. Mons.* 223.

Rosa sylvestris pomifera major. *Tour.* 638.

HABITAT à *Selleneuve*, *Caunelles*.

* *Germinibus ovatis.*

Canina. 3. *ROSA* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *Linn. sp.* 491.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. *Bot. Mons.* 222. *Tour.* 638.

Le Chinorodon; vernaculè *lou Tapacuou*.

HABITAT ad margines sepium.

Spinofissima. 4. *ROSA* germinibus ovatis glabris; pedunculis caule petiolisque aculeatissimis. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis indivisis. *Linn. sp.* 491.

Rosa spinosissima pumila flore rubro. *Bot. Mons.* 223. *Tour.* 638.

HABITAT cum priori.

Centifolia. 5. *ROSA* caule aculeato, pedunculis hispidis, calycibus semipinnatis glabris. *Linn. sp.* 491.

Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa rubra milesia. *Bot. Mons.* 222.

Rosa rubra simplex & multiplex. *Tour.* 637.

HABITAT à *Villeneuve*, *Mauguio*.

R U B U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 485.

Char. secund. *Rad.* lignosa reptans. *Caul.* fruticulosa. *Fol.* alterna petiolata ternata aut quinata foliolis simplicibus integris. *Flor.* terminalis subracemosa. *Fulg.* aculei suprà caulem petiolos pedunculosque; stipulæ in paucis speciebus.

* *Frutescentes.*

Ideas. 1. RUBUS foliis quinato-pinnatis, ternatisque, caule

- aculeato, petiolis canaliculatis. *Linn. sp. 492.*
Rubus idæus spinosus. Tour. 614.
*Rubus foliis ternatis ac quinatis, costa plerumque
inermi, fructu rubro villoso. Sauv. 178.*
Le Framboisier; vernaculè lou Framboisé.
*HOSPITATUR sub dio. Aculei patentes folia subtus
tomentosa.*
2. RUBUS foliis ternatis nudis, caule aculeato tereti. *Cafius.*
Linn. sp. 493.
Rubus repens fructu cæsio. Bot. Mons. 226. Tour. 614.
Le Ronce rampant.
HABITAT à la Colombiere. Aculei recurvi.
3. RUBUS foliis quinato-digitatis, ternatisque, caule, *Fruticosus.*
petiolisque aculeatis. *Linn. sp. 493.*
Rubus vulgaris seu fructu nigro. Bot. Mons. 226.
Tour. 614.
*Le Ronce; vernaculè lou Roncè, ou las amoures de
Bartas.*
*HABITAT ad margines agrorum. Sepes majores con-
tituit.*
- * *Herbacei.*
4. RUBUS foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus *Saxatilis;*
herbaceis. *Linn. sp. 494.*
Rubus saxatilis alpinus. Bot. Mons. 304. Tour. 615.
Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. Sauv. 178.
*HABITAT à Valmagne, à Saint Guillin le Désert, au
Capouladou. Variat foliis simplicibus; inferioribus
trilobis.*
- F R A G A R I A.
- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 486.
Char. secund. *Rad. horizontalis stolonifera funi-
culiformis. Caul. scaposa multiflora. Fol. radi-
calis petiolata ternata: foliolis sessilibus integris.
Flor. radicalis pedunculata. Fulc. bractea ad
basim singuli pedicelli.*
1. FRAGARIA flagellis reptans. *Linn. sp. 494.* *Vesca.*
Fragaria vulgaris. Bot. Mons. 99. Tour. 695..
Le Fraisier; vernaculè lou Fréisé.
HABITAT ad agrorum margines; à la Colombière.
2. FRAG. caule decumbente repente. *Linn. sp. 495.* *Sterilis.*
Q iiii

Fragaria sterilis. *Tour* 296.

Fragaria sterilis. *Lob. Icon.* 698.

HABITAT cum priori. *A Montferrier, à la source du Lés.*

POTENTILLA

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 487.

Char. secund. *Rad.* ramosa subhorizontalis. *Caul.* herbacea teres repens vel erecta. *Fol.* alterna petiolata æqualiter vel interrupte-pinnata, vel digitata; foliolis simplicibus integris. *Flor.* pendunculata, pedunculis axillaribus, terminalibusque unifloris, multiflorisve. *Fulg.* stipulæ adnatæ integræ.

Anserina. 1. POTENT. foliis pinnatis ferratis, caule repente.
Linn. sp. 495.

Pentaphylloides argenteum alatum seu potentilla.
Tour. 298.

L'Argentine.

HABITAT à *Lesperou*, au pont du *Saint-Esprit*.

Multifida. 2. POTENT. foliis bipinnatis: segmentis integerrimis distantibus subtus tomentosis, caule decumbente.
Linn. sp. 496.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo pedalis. Cauliculi simplices.

Rupifris. 3. POTENT. foliis pinnatis alternis: foliolis quinque ovatis crenatis, caule erecto. *Linn. sp.* 496.

Pentaphylloides erectum. *Tour.* 298:

Potentilla foliis quinatis pinnatis, foliolis ovatis crenatis. *Sauv.* 224.

HABITAT à *Saint Guillin le Désert*, à *Lesperou*.

* *Foliis quinatis.*

Recta. 4. POTENT. foliis digitatis lanceolatis serratis utrinque subpilosis, caule erecto. *Linn. sp.* 497.

Quinquefolium rectum luteum. *Tour.* 297.

Potentilla foliis digitatis inciso-serratis, caule erecto.
Sauv. 179.

HABITAT à *Villemagne*.

Argentea. 5. POTENT. foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. *Linn. sp.* 497.

Quinquefolium rectum foliis profundè dissectis subtus argenteis. *Bot. Mons.* 216.

Quinquefolium folio argenteo. *Tour.* 297.

HABITAT à *Lesperou*, *Villemagne*, in humidis.

6. POTENT. foliis septenis, quinatisque cuneiformibus incisis pilosis, caule adscendente. *Linn. sp.* 497.
Quinquefolium rectum montanum luteum. *Bot. Mons.* 216. *Tour.* 297.

Potentilla foliis quinatis obtusè in apice serratis petalis cordatis. *Sauv.* 179.

HABITAT à *Caunelles*, *Lamousson*.

7. POTENT. foliis digitatis apice conniventi-serratis, *Alba*. caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Linn. sp.* 498.

Quinquefolium minus album alterum. *Tour.* 297.

HABITAT au *Mont Saint Loup*, à *Lesperou*.

8. POTENT. foliis digitatis, caule repente, pedunculis *Reptans*. unifloris. *Linn. sp.* 499.

Quinquefolium majus repens luteum. *Bot. Mons.* 215.

Tour. 297.

La Quintefeuille.

HABITAT in fossis udis. Aux prés d'*Arene*, *Gramont*, la *Peissine*.

T O R M E N T I L L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 488.

Char. secund. Rad. nodosa reptans. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna petiolata ternata: foliolis sessilibus simplicibus integris. Flor. solitaria oppositifolia pedunculata. Fulc. stipulæ liberæ foliola mentientes.

- i. TORMENTILLA caule erecto. *Linn. sp.* 500. *Erecta*.

Tomentilla sylvestris. *Tour.* 298.

La Tormentille.

HABITAT in humidis, à *Lesperou*.

G E U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 490.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. inferior lyrato-pinnata, superior digitato-pinnata; foliolis simplicibus. Flor. pendunculata axillaris & terminalis solitaria. Fulc. stipulæ liberæ integræ.

250 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

- Urbanum.* 1. GEUM floribus erectis, fructu globoso : aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Linn. sp. 501.*
Caryophyllata vulgaris. Bot. Mons. 52. Tour. 294.
La Benoite.
 HABITAT in umbrosis; à la Colombiere, Lavalette, Gramont.
- Rivole.* 2. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo : aristis plumosis. *Linn. sp. 501.*
Caryophyllata aquatica, nutante flore. Tour. 295.
La Benoite aquatique.
 HABITAT à Villemagne, Lamalou. Vix sesquipalmare.
- Montanum.* 3. GEUM flore erecto solitario, fructu oblongo : aristis plumosis. *Linn. sp. 501.*
Caryophyllata alpina lutea. Bot. Mons. 52. Tour. 295.
 HABITAT à Valmagne ad lævam, & à la Serane.



Classis XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

CAPPARIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 505.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* fruticulosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* pedunculata axillaris solitaria. *Fulc.* aculei ad latera petiolorum.

1. CAPPARIS aculeata. *Linn. sp.* 503. *Spinosa.*
Capparis spinosa folio acuto, fructu minore. *Bot.*
Mons. 48. *Tour.* 261. & folio obtuso. *ibid.*
Le Caprier; vernaculè *las Taperes*.
HABITAT in hortis.

ACTÆA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 499.

Char. secund. *Rad.* nodosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna bipinnata: foliolis integris quinis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulcr.* nulla.

1. ACTÆA racemo ovato, fructibus baccatis. *Linn. 504. Spicata.*
Christophoriana vulgaris. *Tour.* 299. & *Americana.*
Ibid.
L'Herbe de Saint Christophle.
HABITAT à *Lesperou*.

CHELIDONIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 496.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel pinnatifido-pinnata. *Flor.* pedunculata axillaris solitaria vel umbellata. *Fulcr.* nulla. In paucis bractea foliacea in medio pedunculorum, . . . lactescens crocea.

- Majus.* 1. **CHELIDON.** pedunculis umbellatis. *Linn. sp.* 505.
Chelidonium majus vulgare. Bot. Mons. 62. Tour. 231.
La Chéridoines, ou éclaire.
HABITAT in arvis & viis.
- Glancium.* 2. **CHELIDON.** pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. *Linn. sp.* 506.
Papaver corniculatum luteum. Bot. Mons. 198.
Glaucium flore luteo. Tour. 254.
Le Pavot cornu.
HABITAT au pont de la Peyrade à Cette.
- Cornicula-* 3. **CHELIDON.** pedunculis unifloris, foliis sessilibus pinnatifidis, caule hispido. *Linn. sp.* 506.
Papaver corniculatum phœnieceum hirsutum. Bot.
Mons. 198. B. Pin. 171.
Glaucium hirsutum flore phœniceo. Tour. 254.
Le Pavot cornu à fleur rouge.
HABITAT à Villeneuve & à la Mer.
- Hybridum.* 4. **CHELIDON.** pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule lœvi. *Linn. sp.* 506.
Papaver corniculatum violaceum. Bot. Mons. 199.
Glaucium flore violaceo. Tour. 254.
Le Pavot cornu à fleur violette.
HABITAT à Salaison vers Gramont, Mauguio, Castelnau.

P A P A V E R.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 495.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa teres, vel scaposa. *Fol.* radicalis bipinnata vel caulina alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* pedunculata solitaria radicalis vel caulina axillaris. *Fulc.* pili rigidi in tota planta.

* *Capsulis hispidis.*

- Hybridum.* 1. PAPAVER capsulis subglobosis torosis hispidis, caule multifloro folioso. *Linn. sp.* 506.
Papaver erraticum capite oblongo hispido. Tour. 238.
Argemone capitulo breviore. Bot. Mons. 26.
HABITAT à Prades & à la source du Lés.
- Argemone.* 2. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. *Linn. sp.* 506.
Argemone capitulo longiore. Bot. Mons. 26.

POLYANDRIA MONOGYNIA. 253

Papaver erraticum capitulo longiore hispido. Tour.

238.

HABITAT à Bouzigues, & cum priori.

3. PAPAVER capsula hispida, scapo unifloro nudo *Alpinum.*
hispido, foliis bipinnatis. Linn. sp. 507.

Papaver alpinum saxatile, coriandri folio. Seg. ver.

I. 416. T. IV. fig. 4. & Barr. Icon. 264.

HABITAT in declivibus circà Villemagne & Fougeres,
à Léspinouse. Vix biuncialis villosissimus.

* *Capsulis glabris.*

4. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso *Rheas.*
multifloro, foliis pinnatifidis incisis. Linn. sp. 507.

Papaver erraticum majus. Bot. Mons. 198. Tour. 238.
flore pleno. ibid.

Le Coquelicot; vernaculè la Graouïsele.

HABITAT in segetibus.

5. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis am- *Somniferum*
plexicaulibus incisis. Linn. sp. 508.

Papaver hortense semine nigro. Bot. Mons. 197.
Tour. 237. & albo. ibid.

Le Pavot des jardins.

HABITAT à Lattes, Mauguio, & locis vicinis.

ARGEMONE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 494.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea
teres ramosa. Fol. alterna simplex incisa am-
plexicaulis. Flor. axillaris pedunculata solitaria.
Fulc. spinulæ in tota planta.

1. ARGEM. capsulis quinquevalvibus, foliis spinosis. *Mexicana.*

Linn. sp. 508.

Argemone. Tour. 239.

Le Pavot épineux.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Flores albi.

NYMPHÆA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 493.

Char. secund. Rad. horizontalis funiformis stolo-
nifera. Caul. scaposa uniflora. Fol. petiolata
radicalis simplex integerrima peltata. Flor. ter-
minalis solitaria. Fulc. nulla.

- Lutea.* 1. NYMPHÆA calyce magno pentaphyllo. *Linn. sp. 510.*
Nymphæa lutea major. Bot. Mons. 188. Tour. 261.
Le Nenuphar jaune ; vernaculè lou Ninfea.
HABITAT in amne.
- Alba.* 2. NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Linn. sp. 510.*
Nymphæa alba minor. Bot. Mons. 188. Tour. 260.
Le Nenuphar blanc ; vernaculè lou Ninfea blan.
HABITAT cum priori.

T I L I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 508.*
 Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. pedunculata, pedunculis stipularibus subquadrifloris solitariis. Fulc. stipula lanceolata solitaria florifera.*

- Europæa.* 1. TILIA floribus nectario destitutis. *Linn. sp. 514.*
Tilia vulgaris platyphyllos. Bot. Mons. 254.
Tilia femina. Tour. 611.
Le Tilleul ou Tilieul.
HABITAT à la Peissine, Lamousson, Laverune. Folia oblique cordata vel cordato-ovata serrata; pedunculi è medio stipulæ, pedicellis divaricatis.

C I S T U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 519.*
 Char. secund. *Rad. lignosa vel fibrosa. Caul. herbacea vel fruticulosa. Fol. simplex integra vel integerrima, petiolata vel sessilis, opposita (in quibusdam connata) vel alterna. Flor. pedunculata nunc solitaria caulina vel axillaris, nunc terminalis racemosa vel subcorymbosa. Fulc. stipulæ in plurimis binæ solutæ. Bracteæ in medio peduncularum oppositæ vel in racemosis laterifloræ.*

* *Exstipulatæ fruticosæ.*

- Laurifolia.* 1. CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis trinerviis suprà glabris : petiolis basi connatis. *Linn. sp. 523.*
Cistus ledon foliis laurinis. Bot. Mons. 67. Tour. 260.
HABITAT à Saint George, Caunelles à droite. Folia subtus tomentosa.

2. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis suprà lèvibus, *Ladanifera.*
 petiolis basi coalitis vaginantibus. *Linn. sp. 523.*
Cistus ladanifera hispanica incana. Bot. Mons. 67.
Cistus salicis folio, flore candido. Tour. 260.
 HABITAT à *Gramont, Montferrier, Lavalette.*
3. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis sessilibus utrin- *Monspeliensis.*
 que villosis trinerviis, alis nudis. *Linn. sp. 524.*
Cistus ladanifera Monspeliensium. Bot. Mons. 67.
 Tour. 260.
Le Ciste, vernaculè tous Mougés.
 HABITAT cum priori.
4. CISTUS arborescens, foliis oblongis tomentosis in- *Albida.*
 canis sessilibus suprà aveniis, alis nudis. *Linn. sp.*
 524.
Cistus mas quartus Monspeliensis folio oblongo albido.
Bot. Mons. 66.
Cistus mas folio oblongo incano. Tour. 259.
 HABITAT ad mare, à *Cette vers le Nazareth.*
5. CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis utrinque *Salvifolia.*
 hirsutis, alis nudis. *Linn. sp. 524.*
Cistus femina Monspeliaca flore albo. Bot. Mons. 67.
Cistus femina salviæ folio elatior & rectis virgis.
 Tour. 259.
 HABITAT à *Gramont, Lavalette.*
6. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis hirsutis re- *Crispa.*
 pandis, alis nudis. *Linn. sp. 524.*
Cistus mas foliis undulatis & crisspis. Tour. 259.
Cistus mas supinus & fimbriatis foliis. Bot. Mons. 66.
 HABITAT à *Villemagne, Lamalou.*
- * *Exstipulatæ suffruticosæ.*
7. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus; foliis *Fumana.*
 alternis linearibus, pedunculis unifloris. *Linn. sp.*
 525.
Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, flore
luteo. Tour. 249.
Cistus humilis sive chamæcistus ericæ folio luteus
erectior. Bot. Mons. 69.
8. Helianthemum tenuifolium glabrum, flore luteo per
 humum sparsum. *Tour. 249.*
Chamæcistus ericæ folio luteus humilior. Bot. Mons. 69.
 HABITAT à *la Garigue du Terrail, Caunelles, Lavalette.*

Canus. 8. **CISTUS** suffruticosus exstipulatus procumbens, foliis oppositis villosis subtus tomentosis. *Linn. sp. 525.*

Chamæcistus foliis myrti minoris incanis. *Bot. Mons. 69.*

Helianthemum foliis myrti minoris, subtus incanis. *Tour. 249.*

HABITAT à St. Guillin le Désert, à la Serane.

* *Exstipulatæ herbaceæ.*

Tuberaria. 9. **CISTUS** exstipulatus perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentosis; caulinis glabris lanceolatis, summis alternis. *Linn. sp. 526.*

Helianthemum plantaginis folio perenne. *Tour. 250.*

Cistus plantaginis folio. *Bot. Mons. 69. & major. 293.*

HABITAT ad mare, & à Villemagne, Fougeres.

Guttatus. 10. **CISTUS** herbaceus exstipulatus, foliis oppositis trinerviis, racemis ebracteatis. *Linn. sp. 526.*

Helianthemum flore maculoso. *Tour. 250.*

HABITAT au bois de Gramont. Vix palmaris. Folia summa oblonga sæpiùs alterna stipulata. Flores albi; ad basim cujuslibet petali macula purpurea vel carnea.

Ledifolius. 11. **CISTUS** herbaceus erectus glaber stipulatus, floribus solitariis subsessilibus, folio ternato-oppositis. *Linn. sp. 527.*

Helianthemum ledi folio. *Tour. 249.*

Cistus annuus foliis ledi. *Bot. Mons. 70.*

HABITAT à la Verune, St. Jean de Vedas. Folia & stipulæ ejusdem ferè magnitudinis. Pedunculus brevissimus è caule ipso, folio oppositus, sed infra ejusdem regionem.

Nummularius. 12. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, follis inferioribus orbiculatis, superioribus ovatis. *Linn. sp. 527.*

Cistus humilis vel chamæcistus nummulariæ folio luteus. *Bot. Mons. 294.*

Helianthemum ad nummulariam accedens. *Tour. 249.*

HABITAT à St. Guillin le Désert, à la Serane.

Serpullifolius. 13. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis oblongis, calycibus lœvibus. *Linn. sp. 527.*

Cistus sive chamæcistus repens serpyllifolio luteus. *Bot. Mons. 293.*

Cistus humilis serpyllifolio, flore majore aureo odorato. *Tour. 249.*

HABITAT à Rouquet, Valene, aux rochers de Mijolan, près de St. Jean de Vedas.

14. **CIST.**

14. CISTUS suffruticosus stipulatus procumbens, foliis *Thymifolius*. ovali-linearibus oppositis congestis. *Linn. sp. 528.*
Cistus humilis sive chamæcistus folio thymi incano.
Bot. Mons. 68.
Helianthemum folio thymi incano. *Tour. 249.*
HABITAT cum priori; à la Colombiere, Castelnau; ad lævam.
15. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis linearibus *Pilosus*. subtus bisulcatis incanis, calycibus lævibus. *Linn. sp. 528.*
Cistus humilis sive helianthemum folio sampfuci, capitulis valdè hirsutis. *Bot. Mons. 68.*
Helianthemum folio sampfuci. *Tour. 249.*
16. Cistus humilis sive helianthemum flore albo, folio angusto hirsuto. *Bot. Mons. 68.*
Helianthemum. *Tour. 249.*
HABITAT à Montferrier, Castelnau. Bracteæ solitariæ ad latera pedicellorum.
16. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Linn. sp. 528. Helianthemum.*
Cistus humilis sive chamæcistus vulgaris flore luteo.
Bot. Mons. 67.
Helianthemum vulgare flore luteo. *Tour. 249.*
Vernaculè, l'Hyssope de Garrigue.
HABITAT au Terrail, la Verune, Prades.
17. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis ovatis, calycibus hispidis. *Linn. sp. 528. Hirtus.*
Helianthemum rorismarini folio subtus incano splendente. *Tour. 250.*
Cistus humilis foliis minoribus & incanis. *B. Pin. 465. Bot. Mons. 68.*
HABITAT cum priori; & à la Valette.

C O R C H O R U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 525.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna simplex integra petiolata. Flor. subsessilis solitaria vel aggregata, oppositifolia & axillaris. Fulcr. stipulæ filiformes ad basim petiolorum, solutæ geminæ.

1. CORCH. capsulis linearibus compressis bivalvibus. *Siliquosus.*
Linn. sp. 529. R

Corchorus Americana, foliis & fructu angustioribus.
Tour. 259.

- HOSPITATUR* sub dio. Apricatur. Flores terni vel quaterni, alii axillares, oppositifolii alteri. Siliquæ longissimæ biunciales. Folia linear-lanceolata serrata.
- Olitorius.* 2. *CORCH.* capsulis oblongis ventricosis, foliorum infimis ferraturis setaceis reflexis. *Linn. sp. 529.*
- Corchorus* sive *melochia*. *Tour. 259.*
- HOSPITATUR* sub dio. Folia ovata serrata. Capsulae solitariæ oppositifoliæ; rariùs axillares.

DIGYNIA.

PÆONIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 531.*

Char. secund. *Rad.* tuberosa fasciculata. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna duplicato-terminalia, foliolis obliquè lobatis. *Flor.* solitaria pedunculata terminalis. *Fulc.* nulla.

Officinalis. 1. *PÆON.* *Linn. sp. 530.*

Pæonia femina. *Tour. 274.* & mas. *Ibid.*

La Pivoine mâle & femelle; vernaculè, *lou Pavot double*.

HOSPITATUR sub dio.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 535.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna simplex palmata vel pinnatifida, petiolata aut sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bractea solitaria bina vel terna, integerrima vel incisa, ad basim singuli pedicelli.

* *Unicapsulares.*

Consolida. 1. *DELPH.* nectariis monophyllis, caule subdiviso. *Linn. sp. 530.*

Delphinium segetum. *Tour. 426.*

Consolida regalis arvensis. Bot. Mons. 73.

HABITAT in arvis; à Montferrier, la Valette.

2. DELPH. nectariis monophyllis, caule simplici. Linn. *Ajasis.*
sp. 531.

Delphinium hortense flore majore & simplici. Tour.

426.

Le Pied d'aloïette.

HOSPITATUR sub dio. Mirè varians culturâ.

* *Tricapsulares.*

3. DELPH. nectariis diphyllis, labellis bifidis apice bar- *Elatum.*
batis, foliis incisis, caule erecto. Linn. *sp. 531.*

Delphinium perenne montanum villosum aconitifolio.
Tour. 426.

HOSPITATUR sub dio.

4. DELPH. nectariis diphyllis, foliis palmatis. *Linn. sp. 531. Staphisagria.*

Delphinium platani folio. Tour. 428.

Staphisagria. Bot. Mons. 246.

La Staphisaigre, ou Herbe aux poux.

HABITAT au bois de Gramont; hodie rarius. Occurrit
à Prades.

A C O N I T U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 536.

Char. secund. Rad. tuberosa fasciculata, vel fusiformis. Caul. herbacea teres simplex. Fol. alterna petiolata simplex digitata multifida. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla. In quibusdam speciebus, bractea ad basim cujuslibet pedicelli.

1. ACON. foliis palmatis multifidis villosis. *Linn. sp. 532. Lycocionum.*

Aconitum lycocionum luteum. Tour. 424. Barr. Ic. 399.

Le Tuë-loup.

HABITAT à Lesperou. Petoli foliis breviores. Pedunculi inferiores ramosi, omnes bracteati.

2. ACON. laciniis foliorum linearibus supernè latioribus *Napellus.*
linea exaratis. *Linn. sp. 532.*

Aconitum cæruleum seu napellus. Tour. 425.

L'Aconit, ou Napes.

HABITAT cum priori. Pedunculi omnes simplicissimi
ebracteati.

3. ACON. floribus pentagynis. *Linn. sp. 532. Anthora.*

Rij

Aconitum salutiferum seu *anthora*. *Tour.* 425. *Barr.* Ic.

609.

L'Antithora.

HOSPITATUR in frigidario.

PENTAGYNIA.

A Q U I L E G I A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 541.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna triternata, foliolis integris latiusculis. *Flor.* terminalis subcorymbosa. *Fulc.* bracteæ subulatæ parvæ ad basim pedicelorum.

Vulgaris. 1. *AQUIL.* nectariis incurvis. *Linn.* sp. 533.

Aquilegia sylvestris. *Bot. Mons.* 25. *Tour.* 428. *Barr.* Ic. 628. 608. 613.

L'Ancolie, ou Ayglantine.

HABITAT à Valmagne, *Lespinouse*.

N I G E L L A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 542.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex linearis-multifida. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

* Pentagynæ.

Damascena. 1. *NIGEL.* floribus involucro folioso cinctis. *Linn.* sp. 534.

Nigella angustifolia flore majore. *Tour.* 258.

HABITAT in arvis.

Sativa. 2. *NIGEL.* petalis subtricuspidatis, foliis subpilosis. *Linn.* sp. 534.

Nigella flore minore simplici candido. *Tour.* 258.

La Nielle.

HOSPITATUR sub dio.

Arvensis. 3. *NIGEL.* pistillis quinque, petalis integris, capsulis turbinatis. *Linn.* sp. 534.

Nigella arvensis cornuta. *Bot. Mons.* 187. *Tour.* 258.

La toute épice.

HABITAT cum priori.

* Decagynæ.

4. NIGEL. pistillis denis corollam æquantibus. Linn. sp. Hispanica.

^{534.}
Nigella latifolia, flore majori simplici cæruleo. Tour. 258.

HOSPITATUR sub dio.

5. NIGEL. pistillis denis corolla longioribus. Linn. sp. 534. Orientalis.
Nigella orientalis flore flavo, semine alato plano.

Tour. Cor. 19.

HOSPITATUR sub dio.

POLYGYNIA.

ANEMONE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 450. 549. 548.

Char. secund. Rad. fibrosa vel tuberosa. Caul. scaposa vel foliosa. Fol. petiolata radicalis vel caulinæ, nunc simplex integra aut integerrima aut multifida, nunc pinnata. Flor. terminalis pedunculata solitaria, radicalis vel caulinæ. Fulc. nulla. In paucis bracteæ infra flores.

* Hepaticæ & pulsatillæ flore bracteato, caule scapo.

1. ANEM. bracteis ternis approximatis integerrimis, foliis Hepaticæ trilobis integerrimis.

Anemone foliis trilobis integerrimis. Linn. sp. 538.

Trifolium hepaticum, sive trinitatis herba, flore cæruleo.

Bot. 271.

Ranunculus tridentatus vernus flore. Tour. 286. & 287.

L'Hépatique.

HABITAT à L'esperou, à la Serane.

2. ANEM. bractea remota multifida, petalis rectis, foliis Pulsatillæ bipinnatis.

Anemone pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. Linn. sp. 539.

Pulsatilla folio crassiori, majori flore. Bot. Mons. 394.

Tour. 284.

La Pulsatille.

HABITAT cum priori.

* *Anemone caule folioso, seminibus caudatis.*

Coronaria. 3. ANEM. foliis radicalibus ternato-decompositis, involucro folioso. *Linn. sp. 539.*

Anemone tenuifolia, flore simplici. Tour. 277.
L'Anemone.

HABITAT in arvis; à la Verune, Château Bon.

Hortensis. 4. ANEM. foliis digitatis. *Linn. sp. 540.*

Anemone geranii folio rotundo. Tour. 276.

HOSPITATUR sub dio. In hortis coloribus & magnitudine varians.

* *Anemone flore nudo, seminibus ecaudatis.*

Virginiana. 5. ANEM. pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, seminibus hirsutis muticis. *Linn. sp. 540.*
HOSPITATUR sub dio.

Trifolia. 6. ANEM. foliis ternatis ovaris integris serratis, caule unifloro. *Linn. sp. 540.*

HABITAT à L'espouse; ad lèvam juxta rivulum.

Nemorosa. 7. ANEM. seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Linn. sp. 541.*

Ranunculus phragmites albus vernus. Tour. 285.

Ranunculus nemorosus, anemones flore minor. Bot. Mons. 219. 304. & Bauh. Prod. 95.

HABITAT à L'esperou, St. Guillen le Désert.

CLEMATIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 551.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea volubilis ramosa. Fol. opposita sessilis vel petiolata, simplex integerrima aut impari pinnata. Flor. terminalis, solitaria vel subumbellata. Fulcr. nulla.*

* *Scandentes.*

Vitalba. 1. CLEM. foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentibus.
Linn. sp. 544.

Clematis sylvestris latifolia. Bot. Mons. 70. Tour. 293.

*Clematis foliis cordatis, foliolis inæqualiter serratis.
Sauv. 249.*

HABITAT à Montferrier, Lattes.

Flammula. 2. CLEM. foliis inferioribus pinnatis laciniatis, summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Linn. sp. 544.*

Clematis sive flammula scandens alba tenuifolia. Bot.

Mons. 70.

Clematis sive flammula repens. Tour. 293.

HABITAT à Castelnau, la Verune, Selleneuve.

* *Erectæ.*

3. CLEM. foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis integrimis, caule erecto. Linn. sp. 544. Sauv. 249. *Recta.*

Clematis sive flammula surrecta alba. Tour. 294.

L'herbe aux gueux ; vernaculè, d'Entrevgies.

HABITAT au chemin de Castelnau, à droite avant le pont.

4. CLEM. foliis simplicibus ovato-lanceolatis. Linn. sp. *Integrifolia.* 544. Sauv. 149.

Clematitis cærulea erecta. Tour. 294. Barr. Ic. 397.

HOSPITATUR sub dio.

T H A L I C T R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 552.

Char. secund. Rad. horizontalis stolonifera. Caul. herbacea rigida striata subsimplex. Fol. alterna amplexicaulis tripinnata, foliolis integris. Flor. terminalis paniculata vel subcorymbosa. Fulc. nulla.

1. THALICT. caule paniculato ramosissimo folioso. Linn. *Fætidum.* sp. 545.

Thalictrum minimum fœtidissimum. Tour. 271.

Thalictrum caule filiformi ramosissimo, interpersis foliolis paniculato. Sauv. 251.

HABITAT ad lœvam ; à Castelnau, sous la montagne.

2. THALICT. foliis sexpartitis, floribus cernuis. Linn. *Minus.* sp. 546.

Thalictrum minus. Bot. Mons. 249. Tour. 271.

HABITAT à Lattes, la Verune, Mauguio.

3. THALICT. foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Angustifolium.* Linn. sp. 546.

Thalictrum pratense angustissimo folio. Tour. 271.

HABITAT ad mare & à Lattes.

4. THALICT. caule folioso sulcato, panicula multiplici *Flavum.* erecta. Linn. sp. 546.

Thalictrum majus siliqua angulosa seu striata. Tour. 270.

HABITAT cum priori, & à Lunel.

Aquilegifo- lium. 5. THALICT. fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti. *Linn. sp. 547.*
Thalictrum majus alpinum aquilegiæ folio. *Tour. 270.*
HOSPITATUR sub dio.

ADONIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 553.
Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. herbacea sub-
simplex. Fol. alterna sessilis simplex linearis mul-
tifida. Flor. solitaria pedunculata terminalis.
Fulc. nulla.

Annuæ. 1. ADON. floribus octopetalis, fructibus semi-cylindricis.
Linn. sp. 547.

Ranunculus arvensis foliis chamæmeli, flore minore
atrorubente. *Tour. 291.*

Adonis recentiorum anemone species. *Bot. Mons. 5.*

HABITAT in pascuis à Lavanet, Boutonet, Selleneuve;
foliorum apices inermes.

Vernalis. 2. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato. *Linn. sp. 547.*

Ranunculus fœniculaceis foliis, hellebori radice. *hort. Mons. 168. Tour. 291.*

Helleborus Hippocratis. *Tab. Icon. 721. Barr. Icon. 1178.*

L'Hellebore d'Hippocrate.

HABITAT à Lesperou. Foliorum laciniae subspinosaæ
pungentes.

RANUNCULUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 554.

Char. secund. Rad. fibrosa bulbosa vel tuberosa
fasciculata. Caul. teres herbacea simplex vel
ramosa. Fol. alterna petiolata vel inferior pe-
tiolata, superior sessilis, simplex integra vel
integerrima vel pinnatifida. *Fulc.* nulla.

* *Foliis simplicibus.*

Flammula. 1. RANUNC. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule
declinato. *Linn. sp. 548.*

Ranunculus longifolius palustris minor. *Bot. Mons. 218. Tour. 292.*

HABITAT à Sauret dans le pré à gauche, & à Caunelles.

2. RANUNC. foliis lanceolatis, caule erecto. *Linn. sp.* *Lingua.*
 §49.
 Ranunculus longifolius palustris major. *Tour. 292.*
 HABITAT à *Laverune*; *Lamousson*, *Lattes*.
 3. RANUNC. foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus, *Amplexicau-*
lis. caule subunifloro, radice fasciculata. *Linn. sp. 549.*
 Ranunculus montanus gramineo folio. *Bot. Mons. 218.*
 HABITAT à *Rouquet* ad lævam, & au *Mont St. Loup*.
 4. RANUNC. foliis cordatis angulatis petiolatis. *Linn. Ficaria.*
sp. 550.
 Ranunculus vernus rotundifolius major & minor.
Tour. 286.
 Chelidonia rotundifolia major & minor. *Bot. Mons.*
 62.
 HABITAT in fossis humidis. *A la Peissine*, *Selleneuve*, *Castelnau*.
 5. RANUNC. foliis reniformibus subtrilobis crenatis, *Thora.*
 caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbi-
 floro. *Linn. sp. 550.*
 Ranunculus foliis radicalibus cordato-subrotundis,
 caulinis tripartitis sessilibus lanceolatis integerrimis.
Sauv. 205.
 HOSPITATUR in frigidario.

* *Foliis dissectis & divisis.*

6. RANUNC. foliis radicalibus reniformibus crenatis *Auricomus.*
 incisis: caulinis digitatis linearibus, caule multi-
 floro. *Linn. sp. 551.*
 Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus. *B. Hist.*
 3. 841.
 Ranunculus nemorosus seu sylvaticus, folio subro-
 tundo. *Tour. 285.*
 HOSPITATUR in frigidario.
 7. RANUNC. foliis inferioribus palmatis, summis di- *Sceleratus.*
 gitatis, fructibus oblongis. *Linn. sp. 551.*
 Ranunculus palustris apii folio lævis. *Bot. Mons. 217.*
Tour. 291.
 Ranunculus rectus foliis pallidioribus. *Bot. Mons.*
 217. *Tour. 291.*
 HABITAT à *Caunelles*, *Lattes*, *Laverune*.
 8. RANUNC. foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *Allyricus.*
Linn. sp. 552.

Ranunculus lanuginosus angustifolius, grumosa
radice major. *Bot. Mons.* 218. *Tour.* 289.

HABITAT cum priori, & à Castelnau près des moulins.

- Monspeliacus* 9. RANUNC. foliis tripartitis crenatis, caule simplici
villoso subnudo unifloro. *Linn. sp.* 553.
Ranunculus saxatilis magno flore. *Bot. Mons.* 217.
Tour. 291.

HABITAT à Prades, à la source du Lés.

- Bulbosus.* 10. RANUNC. calycibus retroflexis, pedunculis sulca-
tis, caule erecto, foliis compositis. *Linn. sp.* 554.
Ranunculus bulbosus. *Bot. Mons.* 216.
Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotun-
da. *Tour.* 289.

HABITAT à Caunelles, Lamousson.

- Repens.* 11. RANUNC. calycibus patulis, pedunculis sulcatis,
stolonibus repentibus, foliis compositis. *Linn. sp.*
554.
Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Bot. Mons.* 216.
Tour. 289.

Le Bouton dor.

HABITAT cum priori in hortis; variat foliis plenis,
multiplicatis proliferis, & frondosis.

- Acris.* 12. RANUNC. calycibus patulis, pedunculis teretibus,
foliis tripartito-multifidis : summis linearibus. *Linn.*
sp. 554.
Ranunculus pratensis erectus acris. *Bot. Mons.* 216.
Tour. 289.

HABITAT in fossis udis; à la Peissine, Selleneuve,
Laverune, aux Prés d'Arene.

- Lanuginosus.* 13. RANUNC. foliis tripartitis acutè sinuatis tomentosis.
Linn. sp. 554.

Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi
pratensis repentis. *Tour.* 281.

Ranunculus magnus valdè hirsutus. *Bot. Mons.* 216.

HABITAT à Caunelles, Montferrier, le long du Lés.

- Chærophyllos.* 14. RANUNC. calycibus retroflexis, pedunculis sulca-
tis, caule erecto, foliis compositis. *Linn. sp.* 555.
radice granulosa. *Linn. Syst.* 1087.

Ranunculus chærophyllos asphodeli radice. *Bot.*
Mons. 218. *Tour.* 289.

HABITAT cum priori.

15. RANUNC. seminibus aculeatis, foliis superioribus *Arvensis*.
decompositis linearibus. *Linn. sp. 555.*
Ranunculus arvensis echinatus. Bot. Mons. 217.
Tour. 289.
HABITAT in segetibus.
16. RANUNC. seminibus aculeatis, foliis simplicibus *Muricatus*.
palmatis incisis. *Linn. sp. 555.*
Ranunculus palustris echinatus. Bot. Mons. 217.
Tour. 286.
HABITAT cum priori & in fossis inundatis, à la
Peissine, Montferrier.
17. RANUNC. foliis filiformi-ramosis, calycibus appen- *Falcatus*.
diculatis. *Linn. sp. 556.*
Ranunculus ceratocephalus, seminibus falcatis in
spicam adactis. Tour. 289.
Ranunculus coronopifolius capite alopecuri. Bot.
Mons. 218.
Crataegonium pumilum luteum. Barr. Icon. 376.
icon imperfecta.
HABITAT in arvis, circà urbem. Raro biuncialis.
18. RANUNC. foliis submersis capillaceis, emersis pel- *Aquatilis*.
tatis. *Linn. sp. 556.*
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo.
Bot. Mons. 219. Tour. 291. Barr. Icon. 565.
Millefolium aquaticum foliis abrotani. Bot. Mons.
177.
Millefolium maratriphyllum fluitans, ranunculo sive
polyanthemo affine. Bot. Mons. 178.
Millefolium aquaticum fluitans fæniculi foliis. B.
Pin. 141.
HABITAT in aquis, à *Lattes, Caunelles, Laverune*
& circà urbem.

I S O P Y R U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 533.*

Char. secund. *Rad. simplex filiformis. Caul. teres*
herbacea ramosa. Fol. alterna pinnato-pinna-
tifida : foliolis integerrimis, inferior petiolata;
superior sessilis amplexicaulis. Flor. peduncu-
lata solitaria oppositifolia. Fulc. stipulæ fili-
formes minimæ laterifoliæ.

Fumarioides. 1. ISOPYRUM stipulis subulatis, petalis acutis. *Linn.*
sp. 557.
 HOSPITATUR sub dio. Annuum.

H E L L E B O R U S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 556.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel fibrosa. *Caul.* scapo pauciflora vel foliosa. *Fol.* petiolata pedata simplex linearis-multifida, radicalis vel **caulina**. *Flor.* terminalis pedunculata radicalis vel caulina. *Fulc.* bractea solitaria foliacea ad basim singuli pedicelli, integerrima vel ad apicem incisa.

Niger. 1. HELLEB. scapo subunifloro subnudo, foliis pedatis. *Linn. sp. 558.*

Helleborus niger angustiori folio. *Tour.* 272.

Helleborus scapo florifero subnudo, pedunculo communis bipartito. *Sauv.* 180.

L'Herbe du feu.

HOSPITATUR in frigidario.

Fætidus. 2. HELLEB. caule-multifloro folioso, foliis pedatis. *Linn. sp. 558.*

Helleborus niger fætidus. *Bot. Mons.* 126. *Tour.* 272.

Veratrum nigrum tertium. *Dod. Pempt.* 382.

L'Hellebore ou pied de grifon.

HABITAT secus amnem. *A Castelnau, Lavalette;* semperflorens.

C A L T H A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 555.

Char. secund. *Rad.* subhorizontalis fibrosa. *Caul.* teres herbacea subsimplex. *Fol.* petiolata alterna simplex integra. *Flor.* pedunculata solitaria, axillaris & terminalis. *Fulcr.* nulla.

Populago. 1. CALTHA. *Linn. sp. 558. Sauv. 110.*

Populago. *Tour.* 273.

Le Souci d'eau.

HABITAT in aquis; *entre Lamalou & Villemagne,* & à la Louzere. Folia crenata; inferiora longe petiolata orbiculata; superiora petiolo donata brevissimo; subreniformia.

Classis XIV.

DIDYNAMIA GYMNO SPERMIA.

A J U G A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 557.

Char. secund. *Rad.* horizontalis fibrosa stolonifera. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* opposita simplex integerrima : radicalis petiolata : caulinis sessilis. *Flor.* verticillata. *Fulcr.* bracteæ oppositæ integerrimæ foliaceæ.

- i. AJUGA stolonibus repentibus. *Linn.* sp. 561. *Reptans.*
Consolida media pratensis cærulea. *Bot. Mons.* 73.
Bugula. *Tour.* 208.
Bugula media flore cæruleo. *Barr. Icon.* 338.
La Bugle.
 HABITAT circà molendinas ultrà amnem in pratis;
 à Sauret, Castelnau.

T E U C R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 558. *Adde* in quibusdam calyces bilabiati.

Char. secund. *Rad.* fibrosa vel lignosa ramosa vel simplex. *Caul.* herbacea vel fruticosa, teres vel obtuse tetragona. *Fol.* opposita simplex integerrima integra aut multifida, sessilis vel petiolata. *Flor.* nunc axillaris solitaria aut verticillata, sessilis vel pedunculata, nunc terminalis racemosa, capitata. *Fulc.* nulla. Bracteæ in paucis.

* *Calycibus bilabiatis, floribus racemosis.*

- i. TEUCRIUM calycibus bilabiatis inferne ventricosis, *virginicum.*
 racemis æqualibus, foliis cordatis duplicato-crenatis petiolatis.
 Teucrium foliis ovatis inæqualiter serratis, racemis terminalibus. *Linn.* sp. 564.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens. Caulis pubescens rubens tetragonus. Corollæ purpurascentes. Variat foliis ovatis obtusis. Florens vere, æstate & autumno.

- Scorodonia.* 2. TEUCRIUM calycibus bilabiatis infernè ventricosis, racemis secundis, foliis cordatis serratis petiolatis. Teucrium foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Linn. sp. 564.* Chamædrys fruticosa sylvestris melissæ folio. *Tour. 205.* Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis secundis. *Sauv. 145.*

La Sauge sauvage.

HABITAT à *Prades*, *Valene*, *Lattes*, *Lamalou*. In istâ & priori specie, bracteæ ad basim pedicellorum setaceæ.

* *Floribus subcapitatis.*

- Montanum.* 3. TEUCRIUM floribus subcapitatis, foliis integerrimis lanceolatis.

Teucrium corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. sp. 565.*

Polium lavandulæ folio. *Bot. Mons. 207. Tour. 206.*

Polium montanum album non serratum viride. *Barr. Icon. 1081.*

HABITAT à *Rouquet* & cum priori.

- Polium.* 4. TEUCRIUM floribus subcapitatis, foliis linearibus sessilibus tomentosis apice crenatis.

Teucrium spicis subrotundis, foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus. *Linn. sp. 566.*

Polium montanum luteum. *Bot. Mons. 207. Tour. 206.*

- β. Polium maritimum erectum Monspeliacum. *Bot. 207. Tour. 208.*

Polium montanum supinum capite oblongo. *Barr. Icon. 1082.*

Le Pouillot.

HABITAT à *Castelnau*, *Salason*, *Valene*, *Selleneuve*, *la Verune*, & à *la Garrigue du Terrail*. β. Ad mare, *Gignac*, *Salason*. Foliis integerrimis angustissimis.

* *Floribus axillaribus sessilibus.*

- Chamæpitys.* 5. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis sessilibus, foliis linearis-tripartitis integerrimis.

Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus. *Linn. sp.* 562.

Chamæpitys lutea vulgaris folio trifido. *Bot. Mons.* 61. *Tour.* 208.

HABITAT in arvis circa urbem.

6. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis sessilibus, *Iva.* foliis linearibus tridentatis sessilibus.

Teucrium foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus. *Linn. sp.* 563.

Chamæpitys moschata folio serrato. *Bot. Mons.* 61. *Tour.* 208.

L'Ivette.

HABITAT cum priori. *A Selleneuve, la Colombiere.*

* *Floribus axillaribus pedunculatis.*

7. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis pedunculatis secundis, calycibus infernè ventricosis, foliis ovatis acutis subintegerrimis petiolatis. *Marum.*

Teucrium foliis ovatis integerrimis utrinque acutis, racemis secundis villosis. *Linn. sp.* 564.

Chamædrys maritima incana frutescens, foliis lanceolatis. *Tour.* 205.

Le Marum ou l'herbe au chat.

HOSPITATUR sub dio. *Sempervirens.*

8. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis pedunculatis, calycibus aristatis, foliis linearibus trifidis *Pseudeo-chamæpitys.* integerrimis sessilibus.

Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis subracemosis, caule erecto. *Linn. sp.* 562.

Teucrium floribus solitariis pedunculatis.... *Linn.* *Syst.* 1094.

Teucrium supinum perenne foliis laciniatis. *Tour.* 208.

Chamæpitys adulterina. *Lob. Ic.* 385.

HABITAT Massiliæ. Filamenta longissima.

* * *Floribus verticillatis.*

9. TEUCRIUM floribus verticillatis pedunculatis senis, *Botrys.* calycibus infernè ventricosis, foliis pinnatifidis petiolatis.

Teucrium foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis. *Linn. sp.* 562.

Chamædrys folio laciniato. *Bot. Mons.* 59. *Tour.* 205.
HABITAT à *Lesperou*, *Valmagne*.

Creticum. 10. TEUCRIUM pedunculis axillaribus solitariis trifloris, calycibus tomentosis, foliis linearibus integerrimis subtus incanis.

Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis, racemo subspicato. *Linn. sp.* 563.

Teucrium pedunculis trifloris. *Linn. Syst.* 1094.
Teucrium frutescens foliis linearibus integerrimis. *Sauv.* 141.

Teucrium frutescens stæchadis Arabicæ folio & facie. *Tour. cor.* 14.

HOSPITATUR sub dio. Semperfirens. Variat (autumno) floribus solitariis subsessilibus. Calyces pungentes ut in specie 8⁴.

Multiflorum. 11. TEUCRIUM floribus verticillatis pedunculatis senis, calycibus infernè ventricosis, foliis ovatis petiolatis glabris apice serratis.

Teucrium foliis ovatis utrinque acutis, superne ferrato-dentatis, floribus racemosis. *Linn. sp.* 564. *Syst.* 1094.

Chamædrys multiflora tenuifolia Hispanica. *Tour.* 205.
HOSPITATUR sub dio.

Scordium. 12. TEUCRIUM floribus verticillatis quaternis pedunculatis, calycibus ventricosis, foliis ovatis sessilibus dentatis.

Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus, caule diffuso. *Linn. sp.* 565.

Scordium. *Bot. Mons.* 233.

Scordium sive trixago palustris. *Lob. Ic.* 497.

Chamædrys palustris canescens sive scordium Officinarum. *Tour.* 205.

La Germandrée aquatique.

HABITAT à *Lattes*, *Montferrier*, *Lamousson*.

Chamædrys. 13. TEUCRIUM floribus verticillatis quaternis pedunculatis, calycibus infernè ventricosis, foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis.

Teucrium floribus subverticillatis *Linn. sp.* 565.

Chamædrys vulgo vera existimata. *Bot. Mons.* 58.

Chamædrys major repens. *Tour.* 204.

Le petit Chêne ou la Germandrée.

HABITAT cum priori; à la Valette.

14. TEUCRIUM floribus verticillatis senis pedunculatis, calycibus infernè ventricosis, foliis subcordatis petiolatis crenatis, bracteis concavis integerimis. *Elavum.*

Teucrium foliis cordatis undulatis obtusè-serratis, floralibus concavis integerrimis, caule fruticoso. *Linn. sp. 565.*

Chamædrys frutescens teuctrium vulgo. *Tour. 205.*

Teucrium vulgare fruticans. *Bot. Mons. 249.*

HABITAT cum priori.

S A T U R E J A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 561.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. obtusè-quadrangula, fruticosa vel herbacea. Fol. opposita sessilis simplex integerima sèpius punctis callosis adspersa. Flor. axillaris subverticillata pedunculata. Fulc. nulla. (bracteæ in paucissimis setaceæ.)

1. SATUR. verticillis concatenatis fastigiatis, foliis linear-lanceolatis. *Linn. sp. 567. Julianæ.*

Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis. *Sauv.*

^{147.}

Thymbra sancti Juliani. *Tour. 198.*

HOSPITATUR sub dio.

2. SATUR. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis. *Thymbra. Linn. sp. 567.*

Thymbra legitima. *Tour. 197.*

HOSPITATUR sub dio.

3. SATUR. pedunculis bifloris. *Linn. sp. 568. Sauv. 142. Hortensis.*

Satureja hortensis. *Bot. Mons. 230. Sauv. 197.*

La Sariette; vernaculè de Sagriéche.

HABITAT à la Colombiere, la Valette, Lamousson.

4. SATUR. pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, *Montana. Linn. sp. 568.*

calycibus foliisque mucronatis. *Linn. sp. 568.*

Satureja pedunculis dichotomis. *Sauv. 142.*

Satureja montana flosculis candidis. *Bot. Mons. 230.*

Calamintha frutescens saturejæ folio & facie. *Tour.*

^{230.}

HABITAT cum priori.

T H Y M B R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 627.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* subangulata fruticulosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Fulc.* bracteæ foliaceæ floribus interjectæ.

Spicata. 1. THYMBRA. floribus spicatis, foliis bracteisque ciliatis. *Linn. sp.* 569.

Thymbra spicata verior Hispanica. *Barr. Icon.* 1230. HOSPITATUR sub dio. Perennis. Flores purpurei, ex axilla cujuslibet bracteæ, terni.

H Y S S O P U S.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 565.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona. *Fol.* opposita simplex integra vel integerrima, petiolata vel sessilis. *Flor.* spicato-verticillata pedunculata. *Fulcr.* bracteæ ad basim pedunculorum saepius binæ.

Officinalis. 1. HYSSOPUS foliis ovatis integerrimis sessilibus.

Hyssopus spicis secundis. *Linn. sp.* 569.

Hyssopus Officinarum cærulea. *Tour.* 201.

L'Hyssope.

HOSPITATUR sub dio. Corollæ calycibus longiores. Stamina & pistillum corollis longiora. Pedunculi multiflori.

Lophanthus. 2. HYSSOPUS foliis cordatis crenatis petiolatis.

Hyssopus corollis transversalibus, staminibus inferioribus corolla brevioribus. *Linn. sp.* 569.

Hyssopus corollis resupinatis. *Linn. Syst.* 1096.

HOSPITATUR sub dio. Petoli calycibus breviores. Pedunculi axillares solitarii, multiflori. Flores albi.

N E P E T A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 570.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* spicato - verticillata pedunculata. *Fulcr.* bracteæ subulatæ parvæ ad basim calyculum solitariæ vel binæ oppositæ.

1. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, *Cataria.*
foliis cordatis petiolatis dentato-serratis. *Linn. sp. 570.*
Cataria major & vulgaris. Tour. 202.
Mentha cataria major & vulgaris. Bot. Mons. 176.
L'Herbe au chat.
HABITAT à *Lattes*, *Selleneuve*, *Villeneuve*. Pedunculi
verticillorum bracteis obvallati viridibus margine
albidis linear-lanceolatis; calyces inæquales.

L A V A N D U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 564.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. tetragona her-*
bacea vel fruticosa. Fol. opposita sessilis sim-
plex pinnato-multifida integra aut integerrima.
Flor. terminalis spicata vel spicato-verticillata.
Fulc. bracteæ (in spicatis) solitariæ ad basim
cujuslibet calycis; bracteæ (in verticillatis)
binæ oppositæ.

* *Spicatæ.*

1. LAVAND. foliis lanceolato-linearibus, spica comosa. *Stachas.*
Linn. sp. 573.

Stæchas Arabica vulgò dicta. Bot. Mons. 246.

Stæchas Arabica cum ligulis albis. Bot. Mons. 246.

Stæchas caulinis foliatis. Tour. 201. & non foliatis.
Ibid.

Le Stécas.

HABITAT à *Gramont*, *au fond du bois.*

2. LAVAND. foliis duplicato-pinnatifidis. *Linn. sp. 572. Multifida.*
Lavandula folio dissesto. Tour. 198. Barr. Icon. 798.
La Lavande à feuilles découpées.

HOSPITATUR sub dio. Semper-virens.

** *Spicato-verticillatæ.*

3. LAVAND. bracteis calyce majoribus, spica comosa, *Dentata.*
foliis pinnato-dentatis.

Lavandula foliis pinnato-dentatis. Linn. sp. 572.

Stæchas folio serrato. Barr. Icon. 797.

Lavandula folio crenato. Tour. 198.

HOSPITATUR sub dio. Folia linearia. Bracteæ termi-
nales coloratæ maximæ steriles.

Spica. 4. LAVAND. bracteis calyce brevioribus; foliis integerimis.

Lavandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis. Linn.
sp. 572.

Lavandula latifolia. Bot. Mons. 151. Tour. 198. &
angustifolia. Ibid.

La Lavande; vernaculè, l'Aspic.

HABITAT au Terrail, Montferrier, Selleneuve, &c.
Calyces cærulescentes.

B E T O N I C A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 571.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea tetragona. Fol. opposita simplex integra sessilis, vel inferior petiolata, superior sessilis. Flor. verticillata vel spicata. Fulcr. bracteæ ad basim floris singuli (in spicatis,) vel binæ (in verticillatis) oppositæ.

Officinalis. 1. BETON. spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedii emarginata. Linn. sp. 573.

Betonica purpurea. Bot. Mons. 38. Tour. 203.
La Bétoine.

HABITAT à Gramont, la Verune. Folia radicalia petiolata.

Orientalis. 2. BETON. spica integra, corollarum lacinia labii intermedii integerrima. Linn. sp. 573.

Betonica orientalis angustissimo & longissimo folio, spica florum crassiori. Tour. cor. 13.

HOSPITATUR subdio. Altitudo bipedalis. Folia inferiore cordato-oblonga crenata villosa, superiora subsessilia.

Annuæ. 3. BETON. verticillata, calycibus spinosis. Linn. sp. 573.
Betonica glabriuscula calycibus spinosis. Linn. Syst. 1097.

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente.
Tour. 203.

Sideritis arvensis latifolia glabra. Bot. Mons. 305.

Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. Sauv.
142.

HABITAT à Salaison, Lattes, Sembres. Folia sessilia.

Hirta. 4. BETON. verticillata villosa, calycibus subspinosis.
Linn. Syst. 1097.

Betonica annua. $\beta.$ Linn. sp. 573.

Stachys foliis vix serratis scabris sessilibus. Sauv. 144.

Sideritis vulgaris hirsuta. Bot. Mons. 240. Tour. 191.

Betonica foliis inter verticillos dissitos longioribus. Sauv.

144. n°. 166. & 167. & foliis brevibus. Sauv. ibid.

Sideritis hirsuta procumbens. Bauh. Pin. 233. n°. 11.

& 111.

La Crapaudine.

HABITAT cum priori, & à la Valette, la Colombiere,

Boutonet, Castelnau. Folia sessilia ad basim integra,

superne serrata, vel etiam summa integerrima.

S I D E R I T I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 569.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona ramosa herbacea vel fruticosa. Fol. opposita sessilis simplex integra vel integerrima. Flor. verticillata. Fulc. bracteæ verticillis majores oppositæ, sæpius spinosæ.

1. SIDER. fruticosa tomentoso-lanata, foliis lineari-lan- *syriaca*,
ceolatis. Linn. sp. 574.
Sideritis cretica tomentosa candidissima. Tour. cor. 12.
Flore luteo.
2. Stachys lachnoides incana repens. Barr. Icon. 1187.
HOSPITATUR sub dio. Bracteæ cordatae maximæ integrimæ lanatae.
2. SIDER. herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus *Perfoliata*.
amplexicaulibus. Linn. sp. 575.
Sideritis orientalis phlomidis folio. Tour. cor. 12.
Sideritis salviæ folio nostras. Bot. Mons. 241. Sauv. 149.
HABITAT à Mouguio, Medason, & à la mer. Bracteæ maximæ amplexicaules.
3. Sideritis herbacea decumbens, calycibus spinosis, labio superiore trifido. Linn. sp. 575.
Marrubiastrum sideritidis folio, calyculis aculeatis,
flore albo, limbo atro-purpureo. Tour. 190.
HOSPITATUR sub dio. Folia ad basim verticillorum,
loco bractearum. Altitudo pedalis. Facies sideritidis Romanæ. Folia transversalia sub- ζ nervia.
4. SIDER. herbacea decumbens, calycibus spinosis; labio superiori indiviso. Linn. sp. 575.

Marrubiastrum sideritis folio, flore candicante, calyculis aculeatis. *Tour.* 190.

Sideritis verticillaris spinosis. *Bot. Mons.* 241.

Cunila calycum superiore latoe ovario-trinervi. *Sauv.*
^{145.}

HABITAT à *Castelnau*, *Gramont*, *la Valette*; & in vicinis. Folia sessilia ovata hirsuta ad apicem serrata spinosa; verticilli 6flori. Corollarum labio superiori minori. Calyx villosus; labio inferiore quadridentato. Folia ad basim verticillorum, loco bractearum.

Hyssopifolia. 5. **SIDER.** foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. *Linn.*
sp. 575.

Sideritis foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris.
Sauv. 142.

Sideritis alpina hyssopifolia. *Tour.* 191.

HABITAT à *Valene*, *Rouquet*, *Prades*.

Hirsuta. 6. **SIDER.** foliis lanceolatis subdentatis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. *Linn. sp. 575.*
Sideritis montana scordioides altera. *Bot. Mons.* 240.
Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis. *Tour.* 191.
Sideritis foliis dentatis recurvatis lanceolatis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus, caulis prostratis. *Linn. Syst.* 1098.

HABITAT à *Castelnau aux fourches*, à *Montferrier*, *la Valette*, *la source du Léz*. Caulis obtusè tetragonus. Folia sessilia, serraturis spinula terminatis. Bractæ floribus multo majores. Flores lutei vix calyce majores; calycis faux villosa.

Ocymastrum. 7. **SIDER.** herbacea pilosa, foliis ovatis obtusis, corollis labio superiore divaricatis. *Linn. Syst.* 1098.
Galeopsis caule piloso, calycibus labio superiore corollæ longioribus. *Linn. sp. 580.*

Marrubium Hispanicum odore stachados. *Lob. Ic.* 519.

Galeopsis annua Hispanica rotundiore folio. *Tour.* 186.

HABITAT à *la Verune*, *Caunes*. folia crenata, inferiora petiolata, summa subsessilia, omnibus apice aristatis. Calyces aristati. Variat foliis cordatis.

M E N T H A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 572.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea ra-

mosa tetragona. *Fol.* opposita simplex integra vel integerrima, sessilis vel petiolata. *Flor.* terminalis spicata vel spicato-capitata vel verticillata. *Fulcr.* nulla. In quibusdam bracteæ circa flores.

1. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis serratis. *Spicata.*
Linn. sp. 576. Sauv. 143.
Mentha sylvestris longioribus nigrioribus & minus incanis foliis. Tour. 189.
2. *a.* Mentha spicis confertis, foliis serratis tomentosis sessiliis. *Longifolia.*
Mentha sylvestris folio longiore. Bot. Mons. 176. Tour. 189.
b. Mentha foliis ovatis tomentosis, verticillis in spicam Rotundifolia. nudam continuatis. *Sauv. 148.*
Mentha sylvestris rotundiore folio. Bot. Mons. 175. Tour. 189.
Vernaculè, ou Mentastre.
HABITAT circa urbem. *a.* Foliis subtus incanis, bracteis subulatis longissimis. *b.* A Selleneuve, Castelnau, Lattes.
2. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis *Aquatica.* petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. 576.*
Mentha foliis ovato-lanceolatis, verticillis paucis, supremo maximo. Sauv. 146.
Mentha aquatica sive sisymbrium. Bot. Mons. 175.
Nepeta rotundifolia palustris, sive aquatica major. Tour. 189.
Le Baume, ou la Menthe aquatique ; vernaculè etiam, Mentastre.
HABITAT cum priori.
3. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis *Gentilis.* serratis, staminibus corolla brevioribus. *Linn. sp. 577.*
Mentha sylvestris verticillata ocymi odore. Tour. 189.
La Menthe, ou Baume des jardins ; vernaculè, de Mente.
HOSPITATUR sub dio.
4. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis *Pulegium.* subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus. *Linn. sp. 577.*

280 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Mentha foliis subrotundis, verticillis nudis. *Sauv.* 148.

Mentha aquatica sive *pulegium*. *Tour.* 190.

Pulegium latifolium. *Bot. Mons.* 214.

Le Pouliot.

HABITAT in fossis humidis; à *Lavanet*, *la Peissine*.

Folia ad basim verticillorum. Verticilli globosi. Caulis glaber. Folia petiolata.

Ceruma. 5. *MENTHA* floribus verticillatis, foliis linearibus. *Linn.* sp. 578. *Sauv.* 143.

Mentha aquatica saturejæ folio. *Tour.* 190.

Pulegium cervinum *Monspeliense* odoratus. *Bot. Mons.* 214.

HABITAT cum priori.

GLECHOMA.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 568.

Char. secund. *Rad.* horizontalis repens stolonifera. *Caul.* herbacea tetragona radicans. *Fol.* opposita petiolata simplex integral. *Flor.* verticillata pedunculata. *Fulcr.* nulla.

Hederaceæ. 1. *GLECH.* foliis reniformibus crenatis. *Linn.* sp. 578. *Sauv.* 149.

Chalaminta humilior folio rotundiore. *Tour.* 194.

Hedera terrestris vulgaris. *Bot. Mons.* 124.

La Rondote, ou *Lierre terrestre*.

HABITAT à *Lattes*. Cauliculi erecti palmates. Folia superiora sèpè cordata acuminata longè petiolata. Verticilli sexfiori; floribus sessilibus. Aprili & martio florens.

LAMIUM.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 577.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea simplex tetragona. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* verticillata subsessilis. *Fulcr.* bracteæ integræ vel integerrimæ oppositæ vel sparsæ.

Album. 1. *LAMIUM* foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis.

Linn. sp. 579.

Lamium foliis diffitis cordatis acutis. *Sauv.* 150.

Lamium album sive archangelica flore albo. *Tour.* 183.
L'Archangélique.

HABITAT à *Lesperou*. Frequentior à *Villemagne*, *La-malou*. Petioli calycibus vix longiores, subtus ad basim puncto concavo notati. Verticilli multiflori. Calyces ad basim subtus purpurascens, compressi. Corollæ calycibus triplo maiores; labio inferiori transversali; superiore villoso concavo. Variat floribus diandris. Bracteæ subulatae inter flores.

2. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Linn. sp. Purpureum.*

579. Sauv. 151.

Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo. *Bot.*
Mons. 148.

Lamium ... sive *Galeopsis* *Dioscoridis*. *Tour.* 183.

HABITAT à *Caunelles*, *la Verune*, *St. George*.

3. LAMIUM foliis cordatis crenatis, bracteis oppositis *Amplexi-caule*.
 cordatis incisis amplexicaulibus.

Lamium foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Linn. sp. 579.*

Lamium folio caulem ambiente minus. *Bot. Mons.* 149.

Tour. 184.

HABITAT in arvis. Folia longissimè petiolata.

G A L E O P S I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 578. Adde* calyces aristati.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea tetragona ramosa vel simplex. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. verticillata sessilis. Fulcr. bracteæ subulatae aristatae involucriformes, ad basim singuli calycis.

1. GALEOP. internodiis caulinis æqualibus; verticillis *Ladanum.* omnibus remotis. *Linn. sp. 579.*

Galeopsis patula segetum flore purpurascente. *Tour.* 185.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. *Bot. Mons.* 241.

Galeopsis ramis summis pubescentibus. *Sauv.* 143.

HABITAT in arvis; à *Grämont*, *la Verune*. Caulis bipedalis ramosissimus brachiatus. Folia linear-lanceolata dentata vel integriflora. Corollæ calycibus triplo longiores radiis involuci alternis longioribus spinosis.

- Tetrahit.* 2. **GALEOPSIS** internodiis superne incrassatis, verticillis subnudis subcontiguis. *Linn. sp. 579.*
Galeopsis procerior calyculis aculeatis, flore purpureo-rascente. *Tour. 185.*
Galeopsis ramis summis strigosis. *Sauv. 143.*
HABITAT ad lævam; à *Castelnau* vers *Salason*, *Gramont*. In arvis.
- Galeobdolon.* 3. **GALEOPSIS** verticillis sexfloris, involucro tetraphylo. *Linn. sp. 580.*
Galeopsis sive *urtica* iners flore luteo. *Tour. 185.*
Lamium folio oblongo luteum. *Bot. Mons. 149.*
Leonurus foliis ovatis serratis acutis. *Sauv. 147.*
HABITAT à *Valene*, la source du Lés, au mont St. Loup.
 Altitudo pedalis. Folia cordata; summa lanceolata subfessilia. Verticilli sub-12 flori.

S T A C H Y S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 579.* *Adde* calyces aristati.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea tetragona sulcata simplex. *Fol.* opposita simplex integra, petiolata vel sessilis. *Flor.* verticillata. *Fulcr.* bracteæ vel binæ oppositæ vel subulatæ involucriformes plurimæ.

Sylvatica. 1. **STACHYS** verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Linn. sp. 580.*

Galeopsis procerior fœtida spicata. *Tour. 185.*

Lamium maximum sylvaticum fœtidum. *Bot. Mons. 299.*

HABITAT au Capouladou, Lamalou. Luxuriat in labyrintho Horti Regii. Altitudo bipedalis. Caulis villosum. Folia palmaria hispida longè petiolata serrata. Bracteæ binæ lanceolatæ integerrimæ. Corollæ purpurascentes; labio inferiore maculato.

Palustris. 2. **STACHYS** verticillis sexfloris, foliis linear-lanceolatis semi-amplexicaulibus. *Linn. sp. 580.*

Galeopsis palustris Betonicæ folio, flore variegato. *Tour. 185.*

Stachys palustris fœtida. *Bot. Mons. 246.*

Stachys foliis linear-lanceolatis basi emarginatis sessilibus. *Sauv. 142.*

HABITAT à *Lattes*, *Caunelles*. Folia subcordata serrata subsessilia.

3. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis *Germanica*. imbricatis. *Linn. sp. 581.*

Stachys major Germanica. Bot. Mons. 245. Tour. 186.

Stachys verticillis quadraginta-floris, caule lanato. Sauv. 151.

HABITAT cum priori. Altitudo tripedalis. Verticilli lanati pedunculati. Folia summa brevissimè petiolata, petiolo dilatato subamplexicauli. Bracteæ subulatæ vel ovatæ ad basim singuli calycis. Denticuli calycum inæquales; superioribus longioribus.

4. STACHYS verticillis triginta-floris, calycibus punctatis. *Cretica. Linn. sp. 581.*

Stachys Cretica. Tour. 186.

Pseudo-stachys *Cretica. Bauh. prod. 113.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo prioris. Minus lanata.

Folia crenata. Bracteæ plurimæ subulatæ præter duas oppositas cordatas, magnitudine verticillorum.

Obs. In speciebus plurimis, radices tuberibus præditæ magnitudine pomi.

B A L L O T A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 580.*

Char. sec. *Rad. ramosa. Caul. herbacea tetragona ramosa. Fol. opposita simplex integra petiolata.*

Flor. verticillata pedunculata. Fulcr. bracteæ involucriformes ad basim floris singuli.

1. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis. *Linn. sp. Nigra. 582.*

Ballota. Tour. 185.

Marrubium nigrum foetidum. Bot. Mons. 174.

Le Marrube puant ou la Ballote.

HABITAT in arvis & ad eorum margines. Variat foliis obtusis crenatis ovatis. Involucrum dimidiatum.

M A R R U B I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 581.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. tetragona herbacea vel fruticulosa. Fol. opposita simplex in-*

*tegra petiolata. Flor. verticillata sessilis. Fulc.
bracteæ subulatæ involucriformes.*

* *Calycibus 5dentatis.*

- Peregrinum.* 1. MARRUB. foliis ovato-lanceolatis serratis, calycum denticulis setaceis. *Linn. sp. 582.*
Marrubium album latifolium peregrinum. Tour. 192.
Marrubium candidum. Dod. Pempt. 67.
HOSPITATUR sub dio. Bracteæ calycibus æquales.

* *Calycibus 10dentatis.*

- Hispanicum.* 2. MARRUB. calycum limbis patentibus, denticulis acutis *Linn. sp. 583.*
Pseudo-dictamnus Hispanicus amplissimo folio candente & villoso. Tour. 188.
Marrubium folio subrotundo. Barr. Icon. 767.
Marrubium frutescens, foliis cordatis crenatis, denticulis calycinis denis alternè minoribus. Sauv. 150.
HOSPITATUR sub dio.

- vulgare.* 3. MARRUB. dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Linn. sp. 583. Sauv. 150.*
Marrubium album vulgare. Bot. Mons. 174. Tour. 192.
Le Marrube blanc.

HABITAT ad agrorum margines.

- Pseudo-dic-* 4. MARRUB. calycum limbis planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso. *Linn. sp. 583. foliis concavis cordatis. Linn. Syst. 1101.*

- Pseudo-dictamnus verticillatus inodorus. Tour. 188.*
Marrubium frutescens foliis obtusis cordatis tomentosis non crenatis. Sauv. 151.
HOSPITATUR sub dio. Calyces pungentes. Folia crenata.

- Acetabulo-* 5. MARRUB. calycum limbis tubo longioribus membranaceis, angulis majoribus rotundatis. *Linn. sp. 584.*

- Pseudo-dictamnus acetabulalis Moluccæ. Tour. 188.*
HOSPITATUR sub dio. Folia obtusa.

LEONURUS.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 583. Adde calyces pungentes.*

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. tetragona herbacea ramosa. Fol. opposita petiolata simplex multifida. Flor. verticillata sessilis. Fulc. bracteæ subulatæ involucriformes.

1. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. Linn. *Cardiaca*.
sp. 584.

Cardiaca. Tour. 186.

L'Agripaume.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia summa lanceolata sæpius integerrima. Corollæ villosissimæ.

2. LEONURUS foliis tripartitis laciniatis, calycibus villosis. Linn. sp. 584. *Tataricus*.

Cardiaca orientalis canescens foliis ranunculi. Tour.
cor. 12.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo prioris. Corollæ minus villosæ.

PHLOMIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 585.

Char. secund. Rad. ramosa vel tuberosa. Caul. tetragona herbacea vel fruticosa. Fol. opposita simplex integra vel integerrima, petiolata vel inferior petiolata, summa sessilis. Fulc. bracteæ subulatæ involucriformes.

1. PHLOMIS foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucris lanceolatis. Linn. sp. 584. *Fruticosa*.

Phlomis fruticosa salviæ folio latiore & rotundiore.
Tour. 177.

Phlomis foliis cordatis villosis, caule fruticoso. Sauv.
152.

2. Stachys fruticans flore aureo. Barr. Ikon. 406.

HOSPITATUR sub dio. Perennis, sesquipedalis. Variat foliis cordatis vel lanceolatis; verticilli sæpius duo, raro terni.

2. PHLOMIS foliis radicalibus cordatis utrinque tomentosis villosis. Linn. sp. 585. *Nissolii*.

Phlomis orientalis angusto & longiore folio, flore luteo. Tour. cor. 10.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia tomento densissimo utrinque coperta; summa ovata

subsessilia longitudine florum. Verticilli sexflori.
Bracteæ sæpius quatuor vel sex.

Lychnitis. 3. PHLOMIS foliis lanceolatis tomentosis, floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis. *Linn. sp. 585.*
Phlomis lychnitis. *Tour. 178.*

Verbascum sylvestre Monspeliense flore luteo hiante.
Bot. Mons. 275.

Stæchas prælongo & angusto folio. *Barr. Icon. 1321.*
HABITAT à Castelnau, Lavalette, Caunelles, au Terrail. Altitudo cubitalis. Folia verticillis subjecta subcordata amplexicaulia acuminata bracteas æmulantia.

Herba venti. 4. PHLOMIS involucris setaceis hispidis, foliis ovato-oblongis scabris, caule herbaceo. *Linn. sp. 586.*
Sauv. 152.

Phlomis Narbonensis hormini folio, flore purpurascente. *Tour. 178.*

Marrubium nigrum latifolium. *Bot. Mons. 174.*

Herba venti. *Bot. Mons. 127.*

HABITAT à Caunelles, à la garrigue du Terrail, à Gramont, Castelnau & Lavanet vers la Gaillarde. Altitudo bipedalis. Folia rigida scabra dentata. Flores purpuro-violacei. Bracteæ hispidæ. Calyces quinqueidentati.

Tuberosa. 5. PHLOMIS involucris hispidis subulatis, foliis cordatis scabris, caule herbaceo. *Linn. sp. 586.*

Phlomis Orientalis hormini folio, flore minore, calyce glabro. *Tour. cor. 10.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia crenata; summa ovata. Tubera magnitudine pomorum.

Leonurus. 6. PHLOMIS foliis lanceolatis ferratis, involucris linearibus nudis, calycibus decagonis decemdentatis. *Linn. sp. 587.*

Leonurus perennis Africanus sideritidis folio, flore phœnicio majore. *Tour. 187.*

La Queue de lion.

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens; fruticosa. Bis florens in anno, vere & autumno. Folia ad basim integerrima, in petiolum attenuata. Denticuli calycis alternatim minores, bracteis longiores; rami abscissi in terram defossi radices agunt, novamque præbent sebolem.

MOLUCCELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 582.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea tetragona simplex. *Fol.* opposita petiolata simplex integra vel incisa. *Flor.* verticillata sessilis. *Fulcr.* bracteæ subulatæ involucriformes calycum basi adnatae.

1. MOLUC. foliis cuneiformibus dentatis, calycibus *Lævis.* campanulatis corollas superantibus.

Moluccella calycibus quinquedentatis, dentibus æquilibus. *Linn. sp.* 587.

Molucca *lævis.* *Tour.* 187.

Cardiaca melica sive molucca minus aspera. *Lob. Ic.* 516.

La Mélisse des Isles Moluques.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Altitudo bipedalis. Denticuli calycini minimi.

2. MOLUC. foliis subcordatis palmatis, calycibus bilabiatis spinosis, labio superiore longiore integro, inferiore 6dentato. *spinosæ.*

Molucca *spinosa.* *Tour.* 187.

Melica sive Molucca asperior. *Lob. Ic.* 517.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Calycis labium inferius denticulis 6. vel septem acuminatis. Corollæ calycibus duplo maiores. Folia lobis septem vel quinque.

CLINOPODIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 562.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis, capitato - verticillata. *Fulcr.* bracteæ setaceæ involucriformes.

1. CLINOPOD. capitulis subrotundis hispidis, bracteis *vulgare.* setaceis. *Linn. sp.* 587.

Clinopodium origano simile. *Bot. Mons.* 224.

Clinopodium origano simile elatius, majori flore. *Tour.* 195.

Le Basilic sauvage.

HABITAT à *Castelnau*, *Selleneuve*. Caulis pedalis villosus. Folia ovata denticulata, subitus pubescentia. Flores purpurei. Calycis faux villosa.

ORIGANUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 563.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. tetragona ramosa fruticulosa. Fol. opposita simplex subintegerrima petiolata vel sessilis. Flor. terminalis spicata. Fulc. bracteæ in strobilum tetragonum floriferum conniventes.

Dictamnus. 1. ORIGAN. foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. *Linn. sp. 589.*

Origanum Creticum latifolium tomentosum seu dictamnus Creticus. *Tour. 199.*

Dictamnum verum. *Dod. Pempt. 281.*

Le Dictame de Crète.

HOSPITATUR in hybernaculo. Semina raro maturans.

Folia sessilia integerrima ovato-orbiculata. Bracteæ maximæ pellucidæ laxæ.

Creticum. 2. ORIGAN. spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus. *Linn. sp. 589.*

Origanum folio subrotundo. *Tour. 199.*

Origanum Monspeliense pulchrum. *Bot. Mons. 194.*

HABITAT à *Salaison*, *Castelnau*, la source du Lés. Folia subsessilia integerrima.

Smyrnæum. 3. ORIGAN. foliis ovatis acutis serratis, spicis congestis umbellatim fastigiatis. *Linn. sp. 589.*

Majorana cretica, origani foliis, villosa, saturejæ odore, corymbis albis majoribus. *Tour. cor. 13.*

La Marjolaine du levant.

HOSPITATUR sub dio. Caulis obtusè tetragonus villosus. Folia sessilia serraturis utrinque duabus tribusve. Spiculæ globosæ. Corollæ bracteis majores.

vulgare. 4. ORIGAN. spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Linn. sp. 590.*

Origanum sylvestre. *Bot. Mons. 194.*

Origanum sylvestre sive cunila bubula Plinii. *Tour. 198.*

Origanum foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatim digestis. *Sauv. 147.*

L'Origan.

L'Origan.

HABITAT in arvis & viis ; altitudo bipedalis. Caulis subbrachiatus rubens. Folia denticulata brevi petiolo affixa. Stamina corollis duplo longiora.

5. ORIGAN. foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis *Majorana*. compactis pubescentibus. Linn. sp. 590.

Majorana vulgaris. Tour. 199.

La Marjolaine ; vernaculè la Majurene.

HOSPITATUR sub dio. Folia integerrima incana subsessilia.

T H Y M U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 560.

Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. tetragona rigida herbacea vel fruticulosa. Fol. opposita simplex integra vel integerrima, sessilis aut petiolata. Flor. verticillata vel capitata pedunculata. Fulc. nulla.

1. THYMUS floribus capitatis, caulis repentibus, *Serpyllum*. foliis planis obtusis basi ciliatis. Linn. sp. 590.

Serpyllum vulgare minus. Tour. 197.

Serpyllum vulgare repens. Bot. Mons. 238.

Thymus verticillaris in summis ramis congestis, foliis ovatis basi ciliatis, flore majore. Sauv. 148. & flore minore. ibid.

2. Serpyllum citri odore. Bot. Mons. 305. Tour. 197. Citratum. *Le Serpolet ; vernaculè lou serpoul.*

HABITAT à Prades, Rouquet, Valene. ß. à la Serane, au Capouladou.

2. THYMUS erectus, foliis ovatis revolutis, floribus *vulgaris*. verticillato-spicatis. Linn. sp. 591.

Thymus vulgare rigidius folio cinereo. Bot. Mons. 235.

Thymus vulgaris folio tenuiore. Tour. 196. & latiore. Ibid.

Le Thym ; vernaculè lou Tin, la pote, la frigoule.

HABITAT in toto agro Monspessulano.

3. THYMUS floribus verticillato-spicatis, caule suffructicoso, foliis linearibus basi ciliatis. Linn. sp. 591.

Serpyllum longifolium hispidum. Bot. Mons. 239.

Thymus angusto & longiori folio. Barr. Icon. 777.

Thymbra Hispanica coridis folio. Tour. 197.

290 DIDYNAMIA GYMNOispermia.

HABITAT au-delà de Caunelle, au Terrail. Folia verticillis æqualia.

Acinos. 4. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulis erectis subramosis, foliis acutis serratis.
Linn. sp. 591. calycibus basi ventricosis.

Clinopodium arvense, ocyti facie. Bot. Mons.. 71.
Tour. 195.

Thymus floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulis.... Sauv. 148.

HABITAT à Boutonet, Lavanet, Castelnau. Est plantula semipedalis obtusè tetragona. Folia in petiolum attenuata, serraturis utrinque tribus, duabus aut unica. Labium inferius corollæ maculatum. Labium calycis superius, denticulis tribus divaricatis; labium inferius denticulis duobus conniventibus.

Pulegioides. 5. THYMUS ramis verticillatis longis, foliis ovalibus striatis. Linn. sp. 592.

HABITAT à Prades, la source du Lés. Sesquipedalis. Verticilli numerosiores quam in cæteris speciebus.

M E L I S S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 566.

Char. secund. Rad. ramosa fibrosa. Caul. tetragona herbacea ramosa. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. axillaris verticillata pedunculata, pedunculis unifloris vel multifloris. Ful.. nulla.

Officinalis. 1. MELISSA racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. Linn. sp. 592.

Melissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. Sauv. 149.

Melissa hortensis. Bot. Mons. 175. Tour. 193.

La Melisse; vernaculè la Citrounele.

HABITAT à Coulondres, Valene.

Grandiflora. 2. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. Linn. sp. 592.

Calamintha magno flore. Tour. 194.

Calamintha montana præstantior. Lob. Icon. 512.
Barr. Icon. 398.

HABITAT à Lesperou. Folia ovata ferrata ut in priori.
Flores maximi purpurei.

Calamintha. 3. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. Linn. sp. 593.

Melissa floribus ex alis superioribus pedunculo communi confertis. *Sauv.* 149.

Calamintha vulgaris & officinarum Germaniae. Bot.
Mons. 44. *Tour.* 194.

Le Calament.

HABITAT à *Lesperou*, au *Capouladou*.

4. *MELISSA* pedunculis axillaribus dichotomis folio *Nepetae* longioribus, caule decumbente. *Linn.* sp. 593.

Melissa foliis ovato-triangularibus obtusis. *Sauv.* 149.

Calamintha pulegii odore, sive *nepeta*. *Bot.* *Mons.* 44. *Tour.* 194.

5. *Calamintha montana* præalta pulegii odore. *Tour.* 194.

HABITAT in toto agro *Monspessulano*. Altitudo bipedalis. Folia villosa dentata. Calycum denticulis inferioribus longioribus. Corollæ lauæ punctis adspersa purpureis.

DRACOCEPHALUM.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 574.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea vel fruticulosa. *Fol.* opposita petiolata nunc simplex integra vel incisa, nunc ternata foliolis sessilibus integris. *Flor.* terminalis spicata vel axillaris verticillata. *Fulg.* bracteæ (in spicatis) ad basim calycum solitariæ (in verticillatis) axillares geminatæ.

* *Spicata.*

1. *DRACOC.* floribus spicatis, foliis compositis. *Linn.* *Canariense*.
sp. 594.

Moldavica Americana trifolia odore gravi. *Tour.* 184.

HOSPITATUR in hybernaculo. Aestate sub dio. Caulis acutè tetragonus glaber. Folia ternata petiolata; foliolis lateralibus oblique lanceolatis, obtusè serratis; foliolis imparibus majoribus. Petioli longitudine folioli imparis. Odor camphoræ.

2. *DRACOC.* floribus spicatis, foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Linn.* sp. 595. *Ruyschiana.*

HOSPITATUR sub dio. Vix palmare. Folia utrinque denticulis duobus tribusvè. Calyces bilabiati, labio superiore majore tridentato; inferiore minore bidentato profundiusque diviso.

T ij

* *Verticillata.*

Moldavica. 3. DRACOC. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis; serraturis capillaceis. *Linn. sp.* 595. *Sauv.* 144.

Moldavica betonicæ folio flore cæruleo. *Tour.* 184.

Melissophyllum Turcicum. *Lob. Icon.* 515.

La Melisse des Moldaves.

HOSPITATUR sub dio. Serraturæ bractearum & foliorum filo terminatæ; folia petiolo brevi, ovata vel oblonga vel ovato-triangularia; calyces bilabiati. Bracteæ ovatae.

Canescens. 4. DRACOC. floribus verticillatis, bracteis oblongis; serraturis spinosis, foliis subtomentosis. *Linn. sp.* 595.

Moldavica orientalis betonicæ folio, flore magno violaceo. *Tour. Cor.* 11.

Autre Melisse des Moldaves.

HOSPITATUR cum prioribus. Altitudo pedalis. Folia ovato-lanceolata incana longè petiolata. Calix quinquefidus. Bractearum serraturæ filo terminatæ.

Thymiflora. 5. DRACOC. floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus. *Linn. sp.* 596.

HOSPITATUR sub dio. Folia cordata vel cordato-ovata dentata; petioli longi; calyces magnitudine calycum thymi vulgaris.

H O R M I N U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 567.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona ramosa herbacea. *Fol.* opposita simplex integra, inferior petiolata, summa sessilis. *Flor.* spicato-verticillata. *Fulc.* bracteæ oppositæ, ad basim verticillorum.

Virginicum. 1. HORM. foliis cuneiformibus oblongis, caule bifolio.

Linn. sp. 596.

L'Ormin de Virginie.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Caulis hirsutus pedalis, raro altior. Folia duo ad basim caulis, denticulata; duo ad apicem sessilia ovata, è quorum alis rami simplicissimi solitarii floriferi & nudi. Verticilli sex vel octo.

M E L I T T I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 575.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea simplex. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

1. MELITTIS. *Linn.* sp. 597.

Lamium montanum melissæ folio. *Bot. Mons.* 149. *Melissophyl-*
lum.

Melissa humilis latifolia, flore maximo purpurascente.

Tour. 193.

Melissa Fuchsii. *Lob. Icon.* 515.

La Melisse de montagne.

HABITAT à *Lesperou*, à *Lamalou*, *Fougeres*. Folia ovata crenata obtusa vel acuminata. Pedunculi calycibus breviores. Corollæ calycibus triplo majores.

O C Y M U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 573.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona, herbacea vel fruticulosa. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis recemosa vel axillaris verticillata. *Fulc.* bracteæ ad basim verticillorum, binæ.

1. OCYM. racemis secundis lateralibus, caule erecto. *Frutescens.*

Linn. sp. 597.

Le Basilic en arbre.

HOSPITATUR in hybernaculo. Altitudo bipedalis. Folia longè petiolata ovali-lanceolata dentata. Flores minimi. Perenne.

2. OCYM. foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Linn.* *Basilicum.*

sp. 597.

Ocymum caryophyllum majus. *Tour.* 204. & maximum. *Ibid.*

3. Ocymum latifolium maculatum. *Tour.* *ibid.* *Barr.* *Ic.*
1064. 1702. 1053.

γ. Ocymum viride bullatis foliis. *Tour.* *ibid.*

Le Basilic; vernaculè *lou Bafari*.

HOSPITATUR sub dio. Annum.

3. OCYM. foliis ovatis integerrimis. *Linn.* sp. 597. *Minimum.*
Ocymum minimum. *Tour.* 204.

Ocymum minimum vulgare folio acuto. Barr. Icon. 1077.

HOSPITATUR sub dio.

SCUTELLARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 587.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona herbacea ramosa. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. terminalis spicata, vel axillaris solitaria pedunculata. Fulc. vel nulla vel (in spicatis) bracteæ oppositæ ad basim florum.

Orientalis. 1. SCUTELL. foliis incisis subtus tomentosis. Linn. sp. 598.

Cassida orientalis folio chamædryos, flore luteo. Tour. Cor. II.

HOSPITATUR in hybernaculo. Bracteæ integerrimæ concavæ. Folia profundè incisa subovata. Caulis diffusus.

Cretica. 2. SCUTELL. foliis cordatis obtusis obtuseque ferratis, spicis foliosis. Linn. sp. 600.

Cassida cretica fruticosa, folio catariæ, flore albo. Tour. Cor. II.

HOSPITATUR in hybernaculo. Caulis & folia pubescentia. Bracteæ ovatæ foliaceæ nec concavæ ut in cæteris speciebus.

Galericalata 3. SCUTELL. foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. Linn. sp. 599.

Cassida palustris vulgator flore cæruleo. Tour. 182.

HABITAT à Lattes. Petioli breves. Caulis erectus glaber pedalis.

Peregrina. 4. SCUTELL. foliis subcordatis serratis, spicis interrumpitis. Linn. sp. 599.

Cassida Columnæ. Tour. 181.

Lamium astragaloides. Corn. Can. 129.

La Toque.

HOSPITATUR sub dio.

BRUNELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 586.

Char. secund. Rad. subhorizontalis ramosa. Caul. tétragona simplex herbacea. Fol. oppositæ sim-

plex incisa vel integra vel integerrima, petiolata vel sessilis, vel inferior petiolata, summa sessilis. *Flor.* terminalis verticillato-capitata. *Fulc.* bracteæ oppositæ binæ amplexicaules verticillos distinguentes.

1. BRUN. foliis ovato-oblongis petiolatis. *Linn. sp.* 600. *vulgaris.*
Brunella major folio non dissecto. *Bot. Mons.* 39.
Tour. 182.
Brunella foliis dentatis, spica foliis minori. *Sauv.*
142. & 279.
Brunella foliis integris vix dentatis, spica foliis majori. *Sauv.* 142. & Grandiflora.
Brunella flore cæruleo magno. *Tour.* 182.
2. Brunella foliis imis integris, summis laciniatis parvi-
flora. *Sauv.* 279. & grandiflora. *Sauv. ibid.*
Brunella folio laciniato. *Bot. Mons.* 40. *Tour.* 182.
Symphytum petræum. *Lob. Icon.* 475.
La Brunelle.
HABITAT juxta amnem. ♂. à *Lesserou.* ♀. à *Gramont.*
Vix semipedalis. Latera duo opposita alternatim
sulcata. ♀. Folia villosa linearis-pinnatifida; bracteæ
ad margines villosæ.
2. BRUN. foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsessili- *Hyssopifolia.*
bus. *Sauv.* 141. *Linn. sp.* 600.
Brunella hyssopifolia. *Bot. Mons.* 40. *Tour.* 183.
HABITAT à *Gramont*, *Caunelles.* Bracteæ acuminatæ.
Folia retrorsum scabra seu pilis rigidis ciliata univ-
nervia.

P R A S I U M.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 588.
Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* tetragona fruticosa. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria subsessilis. *Fulc.* nulla.
1. PRAS. foliis ovato-oblongis ferratis. *Linn. sp.* 601. *Majus.*
Galeopsis Hispanica frutescens teucrii folio. *Tour.* 186.
Teucrium fruticans amplio & albo flore, *Italicum.*
Barr. Icon. 895.
HOSPITATUR sub dio. Petioli foliis duplo breviores.
Stamina corollis æqualia; calyces ampliati.

ANGIOSPERMIA.

R H I N A N T H U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 593.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea simplicissima vel ramosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integra. *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* bractea ad basim singuli floris

Trixago. 1. RHIN. calycibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obtusè serratis. *Linn. Syst.* 1107.

Bartsia (trixago) foliis oppositis lanceolatis obtusè serratis. *Linn. sp.* 602.

Anthirrinum album serrato folio. *Bot. Mons.* 23.

Pedicularis maritima folio oblongo serrato. *Tour.* 172.

Trixago chamedryos foliis. *Barr. Icon.* 774. n°. 2.

HABITAT ad mare. *Au-delà du Nazareth, à Cette.*
Altitudo sesquipalmaris.

Crista-galli. 2. RHIN. corollarum labio superiore compresso breviore. *Linn. sp.* 603.

Pedicularis pratensis lutea, sive *crista galli*. *Bot. Mons.* 200. *Tour.* 172.

La Crête de coq.

HABITAT in pratis inundatis. *A Lattes, Mauguio.*

Altitudo sesquipedalis. Folia glaberrima ferrata.

Calyces compressi glaberrimi reticulati. Bracteæ ovatæ serratæ magnæ.

E U P H R A S I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 594.

Char. secund. *Rad.* ramosa rigida. *Caul.* herbacea tetragona vel teres, simplex vel ramosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Fulc.* bracteæ ad basim floris singuli.

Latifolia. 1. EUPHR. foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis. *Linn. sp.* 604.

Euphrasia foliis ovatis, floribus spicatis. *Sauv.* 139.

Pedicularis purpurea annua minima verna. *Tour.* 172.

Euphrasia purpurea minor. *Bot. Mons.* 95. *Icon.* 94.

Euphrasia. *Barr. Icon.* 276. n°. 1. & 3.

HABITAT à Caunelles & au-delà. Vix triuncialis, obscurè tetragona. Bracteæ palmatae hirsutæ.

2. EUPHR. foliis ovatis argutè dentatis. Linn. sp. 604. *Officinalis.*
Euphrasia officinarum. *Tour.* 174.
Euphrasia foliis ovatis acutè dentatis, floribus sparsis.

Sauv. 139.

L'Euphrase.

HABITAT à Lesperou, à Saint Guillin le Désert.

3. EUPHR. foliis linearibus : omnibus serratis. Linn. *Odontites.*
sp. 604.
Pedicularis serotina, purpurascente flore. *Tour.* 172.
Euphrasia pratensis rubra. *Bot. Mons.* 93.
Euphrasia foliis lanceolatis. *Sauv.* 139.
Euphrasia sylvestris major purpurea. *Barr. Icon.* 276.
n°. 2.

HABITAT à Lattes, Castelnau & in fossis humidis,
à la Peissine. Altitudinem pedalem excedit. Caulis
brachiatus ramosissimus. Variat foliis ovatis; flores
secundi purpurei.

4. EUPHR. foliis linearibus serratis: superioribus inte- *Lutea.*
gerrimis. Linn. sp. 604.
Euphrasia pratensis lutea. *Bot. Mons.* 95.
Pedicularis serotina lutea. *Tour.* 172.
Euphrasia foliis linearibus. *Sauv.* 138.
HABITAT à Castelnau le long du Lés à gauche, &
à Montferrier. Altitudo semi-pedalis. Caulis teres
rubens.

M E L A M P Y R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 595.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. ramosa suban-
gulata. Fol. opposita sessilis simplex integra vel
incisa. Flor. terminalis subspicata. Fulc. bracteæ
foliaceæ floribus interjectæ.

1. MELAMP. spicis conicis laxis laceris. Linn. sp. 605. *Arvensis.*
Melampyrum purpurascente coma. *Bot. Mons.* 174.
Tour. 173.
Le Blé de vache.
HABITAT à Rouquet, Prades, à Mauguio & Lattes;
sed rarius.
2. MELAMP. florum conjugationibus remotis, corollis *Pratense.*
clausis. Linn. sp. 605.

298 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Melampyrum luteum latifolium. Bot. Mons. 302.
Tour. 173.

*Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remo-
tis.* Sauv. 138. & 277.

HABITAT à Lesperou. Variat foliis integerimis vel
laciñiatis.

P E D I C U L A R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 592.

Char. secund. Rad. funiculiformis vel fusiformis.

Caul. herbacea simplex vel ramosa, teres vel
angulata. Fol. pinnata alterna vel opposita vel
verticillata. Flor. axillaris solitaria pedunculata
vel terminalis spicata. Fulc. nulla. Bracteæ
(in spicatis) ad basim calycum.

Sylvatica. 1. PEDICUL. caule ramoso, calycibus angulatis oblongis lœvibus. Linn. sp. 607.

Pedicularis..... calycis labio cordato. Linn. Syst. 1109.

Pedicularis pratensis purpurea. Tour. 173.

Pedicularis. Lob. Icon. 548.

La Péridulaire des prés.

HABITAT à Lesperou, Lamalou. Folia bipinnatifida.

Flores axillares solitarii; pedunculi brevissimi. Folia alterna.

Rostrata. 2. PEDICUL. caule subramoso, corollis galea rostrato-acuminatis, calycibus subhirsutis. Linn. sp. 607.

Pedicularis alpina filicis folio, minor. Tour. 173.

HABITAT à Léspinouse auprès de Lamalou.

Verticillata. 3. PEDICUL. caule simplici, foliis quaternis. Linn. sp. 608.

Pedicularis alpina altera asphodeli radice. Tour. 173.

HABITAT à Lesperou & cum priori. Flores spicati terminales. Bracteæ parvæ. Radix constat radiculis funiculiformibus aggregatis ut in sequenti.

Tuberosa. 4. PEDICUL. caule simplici, calycibus crenatis, corollis galea rostrato-aduncis. Linn. sp. 610.

Pedicularis alpina asphodeli radice, flore purpurascente. Tour. 173.

Alectorolophos montana flore luteo. Barr. Icon. 469.

HABITAT cum superiori & à Lesperou. Radiculæ tres, vel quaternæ fusiformes.

ANTHIRRINUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 589.

Char. sec. Rad. fusiformis vel ramosa. Caul. herbacea teres simplex aut ramosa. Fol. simplex petiolata vel sessilis; alterna vel opposita vel terna vel etiam sparsa; integra integerrima vel incisa; aut inferior incisa, superior integerrima. Flor. nunc axillaris solitaria pedunculata aut sessilis, nunc terminalis spicata vel racemosa. Fulc. nulla. (In paucis bracteæ foliaceæ ad basim florum.)

* *Foliis angulatis.*

1. ANTHRIR. foliis cordatis crenatis oppositis. Linn. sp. *Asarina*.
612.

Asarina seu *hederula saxatilis*. Lob. Ic. 601. Tour. 171.

Anthirrinum (asarina) foliis oppositis cordatis crenatis, corollis ecaudatis, caulis procumbentibus.

Linn. Syst. 1110.

HABITAT à *Lesperou*. Caulis humifusus hispidus teres. Folia longè petiolata. Flores solitarii axillares albi vel flavi, petiolo brevi & villoso. Faux corollæ punctis insignita purpureis. Stamina alba. Pistillum purpurascens.

2. ANTHRIR. foliis cordatis alternis quinquelobis. Linn. *Cymbalaria*.
sp. 612.

Anthirrinum (cymbalaria) caulis procumbentibus. Linn. Syst. 1111.

Linaria hederaceo folio glabro seu cymbalaria. Tour.
169.

HABITAT in muris humidis. Luxuriat in horto regio.
Petioli pedunculique longissimi.

3. ANTHRIR. foliis alternis hastatis, caule flaccido. *Elatine*.
Linn. sp. 612.

*Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villoso,
flore cæruleo*. Tour. 169.

Elatine folio acuminato, flore cæruleo. Bot. Mons. 89.

Anthirrinum (elatine) foliis . . . caulis procumbentibus, corollis calcaratis. Linn. Syst. 1111.

La Velvete.

HABITAT à la Verune dans le bosquet ; à Boutonet ,
Selleneuve. Pedunculi longitudine foliorum.

Spurium. 4. ANTHRIR. foliis ovatis alternis , caulis procumbentibus , corollis calcaratis. *Linn. Syst.* 1111.

Anthirrinum foliis ovatis alternis , caule flaccido.
Linn. sp. 613.

Elatine folio subrotundo. *Bot. Mons.* 88.

Linaria segetum nummulariæ folio villoso. *Tour.* 169.
La Velvete femelle.

HABITAT à Lattes & cum priori. Folia sèpè cordata.
Pedunculi foliis multo longiores. Corollæ labium superius atro-purpureum. Floret in fine septembbris.

* *Foliis oppositis.*

Triphyllum. 5. ANTHRIR. foliis ternis ovatis. *Linn. sp.* 613. *Sauv.* 165.

Linaria triphylla cærulea. *Tour.* 169.

Linaria Valentina. *Lob. Icon.* 408.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo semipedalis. Folia sessilia integerrima , quandoque opposita ; vel inferiora terna , superiora opposita vel alterna. Flores spicati.

Bipunctatum 6. ANTHRIR. foliis lanceolatis glabris , inferioribus quaternis , caule erecto paniculato , floribus spicato-capitatis. *Linn. sp.* 614.

Linaria pumila foliis carnosis , flosculis minimis flavis. *Bauh. Pin.* 213. & *Tour.* 170.

Linaria lutea annua parva. *Bot. Mons.* 159.

Anthirrinum erectum , foliis linearibus , imis verticillatis , pauciflorum. *Sauv.* 165.

HABITAT à Lamousson , Boutonet , St. George. Supra muros antiquos & inter saxa. Variat foliis alternis vel omnibus quaternis , floribusque duobus tribusve alternis sessilibus.

Arvense. 7. ANTHRIR. foliis sublinearibus , inferioribus verticillatis , calycibus pilosis viscidis , floribus spicatis , caule erecto. *Linn. sp.* 614.

Linaria arvensis cærulea erecta. *Bot. Mons.* 157. *Tour.* 170.

HABITAT ad mare , & à Cette vers le Nazareth.

Pelisserianum 8. ANTHRIR. foliis caulinis lanceolato - linearibus sparsis , radicalibus rotundis ternis. *Linn. sp.* 615.

Linaria annua purpuro-violacea , calcaribus longis ,

- foliis imis rotundioribus. *Bot. Mons.* 159. *Tour.* 170.
Anthirrinum foliis ad caulem linearibus, ad radicem
 ovatis saepius ternis. *Sauv.* 166.
Chamælinaria violacea *Italica*. *Barr. Icon.* 1162.
 HABITAT à *Gramont*. Variat caule ramosissimo, flo-
 ribus luteis calcari albido donatis sessilibus, foliis-
 que omnibus linearibus.
9. ANTHR. foliis oppositis lanceolatis, floribus laxè *Origani-*
racemosis. *Linn. sp.* 615. *folium.*
Linaria saxatilis serpylli folio. *Tour.* 169.
Anthirrinum saxatile serpylli folio. *Bot. Mons.* 25.
Icon. 24.
Orontium saxatile serpylli folio. *Barr. Icon.* 1100.
 HABITAT aux rochers de *Mijoulan*, & au-delà de la
Verune in loco dicto *la Peyrieire*. Variat foliis al-
 ternis. Flores axillares. Pedunculi longitudine fo-
 liorum.
- * *Foliis alternis.*
10. ANTHR. foliis linearibus acuminatis alternis, flo- *Supinum.*
 ribus racemosis, caule diffuso. *Linn. sp.* 615.
Sauv. 48.
Linaria pumila supina lutea. *Bot. Mons.* 159. *Tour.* 170.
Osyris flava. *Lob. Icon.* 410.
 HABITAT à *Lesperou*, à *St. Guillin le Désert*.
11. ANTHR. foliis lanceolato-linearibus confertis, *Linaria*
 caule erecto, spicis sessilibus terminalibus, flori-
 bus imbricatis. *Linn. sp.* 616.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Tour.* 170.
 Peloria. *Linn. amæn. acad. tom. I. pag. 55. tab. 3.*
 hybrida.
 HABITAT à *Gramont*, *Montferrier*, *Lavalette*, &
 à *Cette*.
12. ANTHR. foliis linearibus confertis, caule nitido *Monspessula-*
 paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Linn. sp. num.*
 616. *Sauv.* 47.
Linaria capillaceo folio, odora. *Tour.* 170.
Linaria odorata *Monspessulana*. *Bot. Mons.* 157.
 HABITAT cum priori; à *Caunelles*.
13. ANTHR. foliis lanceolatis obtusis alternis, caule *Minus*.
 ramosissimo diffuso. *Linn. sp.* 617. *Sauv.* 52.
Linaria pumila *vulgatior arvensis*. *Tour.* 169.

Anthirrinum arvense minus. Bot. Mons. 23.

HABITAT à Castelnau, Selleneuve. Flores axillares longè pedunculati.

* *Corollis ecaudatis hiantibus, foliis alternis integris.*

Majus. 14. ANTHR. *corollis ecaudatis, calycibus rotundatis.*

Linn. sp. 617.

Anthirrinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. Sauv. 52.

Anthirrinum majus flore roseo. Bot. Mons. 23.

Anthirrinum vulgare. Tour. 168.

β. *Anthirrinum latifolium.* Barr. Icon. 655.

Le Musle de veau.

HABITAT ubique supra muros. A Castelnau, & circa urbem.

Orontium. 15. ANTHR. *corollis ecaudatis, calycibus corolla longioribus.* Linn. sp. 617.

Anthirrinum arvense majus. Bot. Mons. 23. Tour. 168.

β. *Anthirrinum.* Barr. Icon. 652. & 651.

HABITAT in arvis. Variat foliolo calycinio superiore minimo vel majori. Flores axillares subsessiles dilutè rosei.

Bellidifolium 16. ANTHR. *foliis imis spathulatis, summis digitatis.*

Sauv. 67.

Anthirrinum foliis ovatis serratis, corollis patulis.

Linn. sp. 617.

Anthirrinum foliis . . . corollis ecaudatis hiantibus.

Linn. Syst. 1112.

Linaria bellidis folio. Tour. 169.

HABITAT à Lesperou, au Capouladou, à St. Guillin

le Désert. Caulis tripedalis, basi ramosus, teres.

Folia summa linearia integerrima. Radix fusiformis.

Folia radicalia semiamplexicaulia. Flores axillares solitarii minimi, violacei cæruleive, subsessiles.

M A R T Y N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 611. Syst. nat. 671.

Char. sec. Rad. articulata. Caul. herbacea teres ramosa fistulosa. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. terminalis laxè racemosa.

Fulc. bracteæ duæ ad basim singuli calycis (hæs
Linnæus calycis exterioris nomine donat.)

1. MART. caule petiolisque fistulosis, floribus bibrac- *Annua.*
teatis.

Martynia caule ramoso, foliis angulatis. *Linn.* sp. 618.

Martynia caule ramoso, foliis integerrimis, calyci-
bus cordato-lobatis, exterioribus diphyllis. *Linn.*
Syst. 1113.

HOSPITATUR sub dio. Facta indigena. Occurrit in
arvis circà hortum regium. Caulis diffusus hispi-
dus. Folia cordata longè petiolata. Flores albi. Co-
rollarum laciniæ inferiores tres punctatæ; inter-
media lineis 6. vel 7. croceis longitudinalibus no-
tata; superioribus punctis insignita purpureis. Filo-
menta punctis adspersa. Corollæ extus villosæ his-
pidæ; calyces trilobi; lobo intermedio majori. Brac-
teæ ovatæ aut subulatæ.

SCROPHULARIA.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 612.

Char. sec. *Rad.* ramosa vel nodosa. *Caul.* her-
bacea tetragona ramosa. *Fol.* opposita simplex
integra vel pinnato-multifida. *Flor.* axillaris pe-
dunculata, pedunculis ramosis, vel terminalis
racemosa. *Fulcr.* bracteæ vagæ solitariæ subu-
latæ parvæ.

1. SCROPH. foliis cordatis basi transversis, caule ob- *Nodosæ.*
tus-angulo. *Linn.* sp. 619.

Scrophularia nodosa fœtida. *Bot. Mons.* 234. *Tour.* 166.

Scrophularia. *Dod. Pempt.* 50.

Scrophularia foliis cordatis oppositis, racemis termi-
nalibus. *Sauv.* 138.

HABITAT à St. Guillen le Désert, Aniane, Villema-
gne. Variat foliis cordato-lanceolatis. Racemus ra-
mosissimus.

2. SCROPH. foliis cordatis petiolatis decurrentibus, *Aquatica.*
caule membranis angulato, racemis terminalibus.
Linn. sp. 620.

Scrophularia aquatica major. *Bot. Mons.* 234. *Tour.* 166.

Betonica aquatica. *Dod. Pempt.* 50.

Scrophularia foliis oppositis ex elliptico-decrescentibus, caule & ramo paniculatis nudisque spicis terminalibus. *Sauv.* 138.

La Scrophulaire aquatique; vernaculè, l'Herbe daou siége.

HABITAT in aquis; à Castelnau, Lattes, & dans le Verdanson.

Scorodonia. 3. SCROPH. foliis cordatis duplicato-serratis, racemo composito. *Linn.* sp. 620.

Scrophularia foliis oblongo-cordatis oppositis inæquilater ferratis, racemo composito. *Sauv.* 138.

Scrophularia melissæ folio. *Tour.* 166.

HOSPITATUR sub dio. Corollæ superius labium coloratum, inferius albicans.

Vernalis. 4. SCROPH. foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis. *Linn.* sp. 620.

Scrophularia flore luteo. *Tour.* 166.

Scrophularia foliis oppositis cordatis, pedunculis solitariis lateralibus multifloris. *Sauv.* 119. & 166.

Scrophularia montana maxima latifolia, flore luteo. *Barr. Ic.* 273.

HABITAT à Lessorou, St. Guillin le Désert. Caulis fistulosus cubitalis hispidus. Folia duplicato-serrata. Pedunculi longitudine foliorum compressi, triflori quadriflorive. Corollæ globosæ ferè clausæ. Odor fœtidus. Floret martio.

Canina. 5. SCROPH. foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis. *Linn.* sp. 621. *Sauv.* 247.

Scrophularia ruta canina dicta. *Bot. Mons.* 224. *Tour.* 167.

HABITAT à Castelnau, la Verune, la Peissine, Lamousson.

Peregrina. 6. SCROPH. foliis cordatis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus bifloris. *Linn.* sp. 621. *Sauv.* 116.

Scrophularia urticæ folio. *Bot. Mons.* 234. *Tour.* 166.

HABITAT in humidis & umbrosis. Glaberrima.

DIGITALIS.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 614.

Char. secund. Rad. napiformis, radiculis lateribus fibrosis. Caul. herbacea teres simplex. Fol. alterna sessilis simplex subintegerrima. Flor. terminalis

terminalis racemosa secunda. *Fulc.* bractea ad basim floris cujuslibet.

1. DIGIT. calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis, *Purpurea*.
labio superiore integro. *Linn.* sp. 621.
Digitalis purpurea, folio aspero. *Tour.* 165.
Digitalis foliolis calycinis acuminatis. *Sauv.* 66.
La Digitale, ou Gants de Notre-Dame.
HABITAT à *Lesperou*.
2. DIGIT. calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis, *Lutea*.
labio superiore bifido. *Linn.* sp. 622.
Digitalis foliolis calycinis lanceolatis. *Sauv.* 66.
Digitalis major lutea, sive *pallida*, parvo flore. *Bot.*
Mons. 86. *Tour.* 165.
HABITAT cum priori. Altitudo sesquipedalis. Caulis
striatus. Folia oblonga lanceolata semi-amplexicaulia
denticulata glabra. Bracteæ foliaceæ ovatæ acumi-
natæ.

BIGNONIA.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 615.

Char. secund. *Rad.* horizontalis funiformis stolo-
nifera. *Caul.* fruticosa flexuosa radicans. *Fol.*
opposita impari-pinnata, foliolis simplicibus
integris sessilibus oppositis. *Flor.* terminalis ag-
gregata. *Fulc.* nulla.

1. BIGN. foliis pinnatis, foliolis incisis, geniculis radica- *Radicans*.
tis. *Linn.* sp. 624.

Bignonia Americana *fraxini* folio, flore amplio phœ-
niceo. *Tour.* 164.

Gelsemium hederaceum *Indicum*. *Barr. Ic.* 59.

La Bignone.

HOSPITATUR sub dio. Horti regii parietes scandit.
Rami teretes glabri. Calyx coloratus rubens carno-
sus, facie *punicæ granati*. Corollæ calycibus triplo
majores. Semina nunquam maturans.

LANTANA.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 632.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* fruticulosa te-
tragona. *Fol.* simplex integra petiolata, oppo-
sita vel terna. *Flor.* axillaris pedunculata spi-

cata vel spicato-capitata. *Fulc.* bracteæ ad basim calycum solitariæ (aculei in una specie supra caulem.)

Trifolia. 1. LANT. foliis ternis, spicis oblongis imbricatis. *Linn.* sp. 626.

HOSPITATUR in hybernaculo. Folia rugosa dentata ovata. Petioli breves. Flores dilutè carnei. Variat foliis oppositis.

spinosa. 2. LANT. foliis oppositis, caule aculeato ramoso, floribus capitato-umbellatis. *Linn.* sp. 627.

Myrobatindum viburnifolium spinosum, floribus coccineis. *Vaill. act. 1722. p. 276.*

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens. Priori altior. Aculei nulli in tenella planta. Apparent tantum secundo anno (in adulta.) Pedunculi longitudine foliorum. Flores miniati. Utraque species semina maturans. Petioli multo longiores quām in priori.

C A P R A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 636.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. teres ramosa fruticulosa. Fol. alterna sessilis simplex integra. Flor. axillaris geminata pedunculata. Fulc. nulla.*

Biflora. 1. CAPR., foliis alternis, floribus geminis. *Linn. Syst. 1116.*

Ageratum Americanum folio & facie rapunculi. Tour. 652.

Le Thé de Curaçao.

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens, semperflorens. Folia ovali-lanceolata serrata. Pedunculi breves. Flores albi. Variat floribus pentandris.

E R I N U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 629.*

Char. secund. *Rad. ramosa rigida. Caul. herbacea ramosa procumbens. Fol. alterna sessilis simplex integra. Flor. terminalis racemosa. Fulcr. bractea foliacea ad basim floris cujuslibet.*

1. ERIN. floribus racemosis. *Linn.* sp. 630. *Sauv.* 116. *Alpinus.*
Ageratum alpinum glabrum flore purpureo. *Tour.*
 651.
 2. *Ageratum flore albo, minus saxatile.* *Barr. Icon.* 1192.
HABITAT à Lesperou. *Cauliculi triunciales glabri.* *Folia obversè ovata seu spathulata, apice ferrata.* *Bracteæ ovatæ longitudine florum.*

L I N N Æ A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 624.

Char. secund. *Rad.* horizontalis stolonifera. *Caul.* herbacea simplicissima teres. *Fol.* opposita subsessilis simplex integra. *Flor.* terminalis geminata. *Fulc.* bractea gemina ad basim florum, opposita minima.

1. LINN. floribus geminatis. *Linn.* sp. 631. *Sauv.* 137. *Borealis.*
Seg. ver. t. p. 183.

Campanula serpyllifolia. *Tour.* 112.

La Linnée.

HABITAT entre Lesperou & Meyrveis. *Cauliculi vix triunciales glaberrimi stricti, oppositionibus foliorum duabus tribusve; cæterum nudi, apice biflori.* *Folia inferioris oppositionis minora orbiculata; cætera majora ovata serrulata, foliis lysimachiae tennellæ simillima.*

Obs. In horto regio nondum fuit demonstrata; attamen utpotè in agro Monspessulano nuper detecta, ipsius locum natalem, characteresque proprios botanophilis assignare necessarium putavimus. Occurrit etiam in monte *Lespinouse près de Lamalou;* cum pendiculari rostrata.

R U E L L I A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 616.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticulosa sub-tetragona. *Fol.* opposita petiolata simplex integriforma. *Flor.* axillaris sessilis verticillata. *Fulc.* nulla.

1. RUELL. foliis petiolatis, floribus verticillatis subsessilibus. *Linn.* sp. 634. *Strepens.*

HOSPITATUR in caldario. Petioli brevissimi. Verticilli subquadriflori.

O R O B A N C H E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 596.

Char. secund. *Rad.* funiculiformis. *Caul.* scaposa. *Fol.* nulla. *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* bracteæ imbricatæ foliaceæ scapo adpressæ; aliæ ad basim florum, solitariæ.

Lævis. 1. OROB. scapo lævi simplicissimo, staminibus exsertis. *Linn. sp.* 632.

Orobanche caule simplici cœruleo, bracteis brevibus. *Sauv.* 4.

Orobanche magna purpurea Monspessulana. *Bot. Mons.* 195.

HABITAT à Gramont, Lavalette, Castelnau.

Obs. Utrum synonymia Magnolii ad hanc pertineat, dubitamus; nam *orchidem abortivam seu limodorum austriacum Clusii* designasse, nobis visus est.

Major. 2. OROB. scapo pubescente simplicissimo, staminibus inclusis. *Linn. sp.* 632.

Orobanche caule simplici, bracteis longioribus. *Sauv.* 5.

Orobanche 1^a. *Bot. Mons.* 195.

Orobanche major garyophyllum olens. *Tour.* 176.

HABITAT cum superiori.

Ramosa. 3. OROB. scapo ramoso, corollis quinquefidis. *Linn. sp.* 633. *Sauv.* 4.

Orobanche subcœruleo flore sive 2^a. *Bot. Mons.* 197. *Tour.* 176.

4. Orobanche minor purpureis floribus, sive ramosa. *Bot. Mons.* 197. *Tour.* 176.

HABITAT à Lattes, Laverune. Scapus flavescens. Bracteæ pauciores. Flores minores, obvallati bracteis purpurascientibus.

V I T E X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 634.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* opposita petiolata quinata, foliolis inæqualibus integerrimis. *Flor.* terminalis verticillato-spicata. *Fulc.* nulla.

1. VITEX foliis digitatis, spicis verticillatis. *Linn. sp.* *Agnus castus.*
638.

Vitex latiore folio. *Tour. 603.*

Elæagnus Theophrasti, sive vitex agnus castus. *Lob.*
Icon. 2. 138.

2. Vitex serrato folio. *Lob. Icon. 2. 139.*

Vernaculè, l'Aoübre de Pébre.

HOSPITATUR sub dio. Rami foliaque subtus incana
glaberrima lanceolata quina vel septena. Spicæ verti-
cillis octo vel novem subglobosis. Variat foliolis ad
apicem serratis.

A C A N T H U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 540.

Char. secund. Rad. fusiformis ramosa. Caul. sca-
posa teres multiflora. Fol. radicalis sinuato-
pinnatifida semi-amplexicaulis. Flor. termi-
nalis spicata. Fulc. bracteæ solitariæ ad quem-
libet florem. (Spinulæ supra serraturas folio-
rum & bractearum, in unâ specie.).

1. ACANTH. foliis sinuatis inermibus. *Linn. sp.* 639. *Mollis.*
Sauv. 278.

Acanthus sativus sive mollis. Virgilii. Bot. Mons. 2.
Tour. 176.

L'Acante, ou Branc-ursine.

HABITAT à Salaison à gauche, & à Nîmes. Foliola ca-
lycis 6inæqualia, superiore & inferiore latioribus,
lateralibus utrinque duobus minoribus angustiori-
busque.

2. ACANTH. foliis spinosis pinnatifidis. *Linn. sp.* 639. *Spinofusa.*
Sauv. 278.

Acanthus aculeatus. *Tour. 176.*

La Branc-ursine épineuse.

HABITAT circà urbem. In utraque specie, filamenta
lignosa.

M E L I A N T H U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 641.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol.
alterna semi-vaginans impari-pinnata, foliolis
sessilibus integris. Flor. axillaris subracemosæ.

pedunculata solitaria. *Fulg.* stipulæ binæ foliæ. Bracteæ ad florem quemlibet concavæ solitariæ.

Minor. i. MELIANTH. stipulis geminis distinctis. *Linn.* sp.
639.

Melianthus Africanus. *Tour.* 431.

Le Méliante.

HOSPITATUR sub dio. Foliola septem vel novem lan-

ceolata acutè dentata subæqualia, stipulæ setaceæ.



Classis XV.

TETRADYNAMIA. SILICULOSA.

MYAGRUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 642.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa vel simplex. *Fol.* alterna simplex integerrima integra vel incisa, sessilis vel radicalis petiolata, caulina sessilis. *Flor.* terminalis spicata vel paniculata. *Fulc.* nulla.

1. MYAGR. siliculis biarticulatis dispermis, foliis ex- *Perenne.*
trorsum sinuatis denticulatis. *Linn. sp.* 640. *Sauv.*
280.

Raphanistrum monospermum capsulis striatis tenuibus.
& longiusculis. *Moris. Hist.* 2. 267.

Rapistrum monospermum. *Bot. Mons.* 219. *Tour.* 211.
Seg. ver. 1. p. 368.

HABITAT in arvis. Variat foliis lanceolatis vel lyrato-
pinnatifidis. Siliculæ subsessiles.

2. MYAGR. siliculis cordatis subsessilibus, foliis ample- *Perfoliatum.*
xicaulibus. *Linn. sp.* 640. & *Sauv.* 77.
Myagrum monospermum latifolium. *Seg.* 1. p. 369.
Tour. 211.

Myagrum monospermum. *B. Hist.* 894. *Tom. II.*

HABITAT cum priori; à *Lattes.*, *Laverune.* Siliculæ
pedunculo brevissimo.

3. MYAGR. siliculis ovatis pedunculatis polyspermis. *Sativum.*
Linn. sp. 641.

Myagrum sylvestre seu camelina. *B. Hist.* 2. p. 892.

Alyssum segetum foliis auriculatis acutis. *Tour.* 217.

Myagrum sativum. *Bot. Mons.* 180.

Myagrum siliculis obversè ovatis pedunculatis. *Sauv.* 77.

La Cameline.

HABITAT in fabulosis ultra amnem. *A Castelnau, Sa-*
lason. Folia linear-lanceolata semi-amplexicaulia
denticulata.

- Panicula*. 4. MYAGR. siliculis globosis compressis punctato-rugosis. *Linn. sp.* 641.
Rapistrum arvense folio auriculato acuto. *Tour.* 211.
Myagro affinis herba capitulis rotundis. *Bot. Mons.* 180.
Myagro similis siliqua rotunda. *Seg. Tom. I.* p. 368.
HABITAT cum prioribus.
- Saxatile*. 5. MYAGR. siliculis lentiformibus obovatis glabris, foliis lanceolatis serratis. *Linn. Syst.* 1126.
Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis serratis, caulinis linearibus. *Linn. sp.* 648.
Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo. *Bot. Mons.* 251.
Cochlearia perennis saxatilis minima. *Hort. Mons.* 59.
Alyssum alpinum foliis circa radicem subovatis serratis in orbem circumactis. *Seg. ver. I.* p. 378.
HABITAT à *Gramont*, & cum prioribus. Altitudo semi-pedalis. Caulis subsimplicissimus. Variat foliis caulinis lineari-hastatis amplexicaulibus.

VELLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 654.
Char. secund. *Rad.* napiformis vel lignosa ramosa. *Caul.* ramosa herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima vel pinnatifida. *Flor.* racemosa oppositifolia vel terminalis. *Fulg.* nulla.

- Annua*. 1. VELLA racemis oppositifoliis, foliis bipinnatifidis. Vella foliis pinnatifidis, siliculis pendulis. *Linn. sp.* 641. Vella. *Sauv.* 280. 254.
HOSPITATUR sub dio. Tota pilis rigidis hispida. Laciniae foliorum lineares. Racemi foliis longiores. Floret februario & aprilii.

- Pseudo cytisus*. 2. VELLA racemis terminalibus, foliis carnosis obovatis ciliatis integerrimis. Vella foliis integris, siliculis erectis. *Linn. sp.* 641. Cytisi facie alysson fruticans. *Lob. Icon.* 2. 49.
HOSPITATUR in hybernaculo. Folia veluti spinulis ciliata. Variat floribus quibusdam (in tenella planta) axillaribus, vagis, solitariis.

ANASTATICA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 643.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. lignosa ramosa. Fol. alterna sessilis integerrima. Flor. axillaris solitaria sessilis. Fulcr. nulla.

1. ANAST. Linn. sp. 641.

Hierocuntica.

Thlaspi rosa de Hiericho dictum. Tour. 213.

La Rose de Jérico.

HOSPITATUR sub dio. Vix palmaris, ad basim ramosa, pubescens. Folia carnosa spathulata vel ovata, apice subcrenata. Flores albi. Semina saepius utrinque bina.

DRABA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 653.

Char. secund. Rad. napiformis tenuis. Caul. scapo vel foliosa simplex. Fol. alterna simplex integra, radicalis petiolata caulina sessilis. Flor. terminalis racemosa. Fulcr. nulla.

1. DRABA scapo ramoso, foliis linear-lanceolatis dentatis. *Verna.*

Draba caulis nudis, foliis incisis. Linn. sp. 642.

Draba scapis nudis, foliis subserratis. Linn. Syst. 1127.

Alysson vulgare polygoni folio, caule nudo. Tour. 217.

Seg. ver. 1. pag. 375. tab. IV. fig. 3.

Bursa pastoris minor loculo oblongo. Bot. Mons. 43.

HABITAT in arvis, à Boutonet, Castelnau. Triuncialis. Folia ad apicem denticulata.

2. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. *Muralis.* Linn. sp. 642.

Bursa pastoris major loculo oblongo. Bot. Mons. 43.

Myagroides subrotundis serratis foliis, flore albo. Barr.

Icon. 816. Optima.

Draba caule ramosissimo, foliis cordatis amplexicaulibus. Sauv. 118.

Alysson veronicæ folio. Tour. 217.

HABITAT in rupibus humidis & umbrosis. A Castelnau, Lavalette. Altitudo pedalis. Florum racemi laxi. Folia radicalia ovata, caulina inferiora oblonga, summa cordata. Variat floribus diandris & tetrandris.

[*Nemorosa*. 3. DRABA caule ramoso, foliis ovatis sessilibus dentatis. *Linn. sp. 643.*

Alyssum alpinum polygoni folio. Tour. 217.

HABITAT à *Prades* & à *Rouquet*, vers le bois de *Valene*.
Altitudo prioris.

[*Ineana*. 4. DRABA foliis caulinis numerosis incanis, siliculis obliquis. *Linn. sp. 643. Sauv. 93. Absque synonymia Tournefortii.*

HABITAT cum priori, & au *Capouladou*.

LEPIDIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 645.*

Char. secund. *Rad. napiformis. Caul. scaposa ramosa* vel foliosa. *Fol. radicalis* vel *caulina alterna* sessilis vel petiolata, vel inferior petiolata, superior sessilis, nunc simplex integer-rima integra vel incisa, nunc impari-pinnata, vel etiam inferior pinnata, superior simplex-multifida. *Flor. racemosa* radicalis aut *caulina*. *Fulc. nulla*.

[*Nudicaule*. 1. LEPID. scapo nudo subsimplicissimo, floribus tetrandris. *Linn. Syst. 1127.*

Nasturtium minimum vernum foliis tantum circa radicem. *Bot. Mons. 187. tab. 186. Tour. 214.*

Thlaspi minus Monspeliensium. Bauh. Pin. 108.

Lepidium foliis filiformibus, apice pinnatifidis, caule nudo. *Sauv. 228. & 281.*

HABITAT à *Castelnau*, *Gramont*, sous la *Citadelle*; in arenosis. Scapus vix triuncialis rigidus glaber. Variat scapo foliis duobus tribusve instructo.

[*Procumbens*. 2. LEVID. foliis pinnatifidis, extremo majore, scapo nudo, caulis prostratis racemiferis. *Linn. Syst. 1127.*

Lepidium foliis pinnatis, impari majore, caule procumbente. *Sauv. 228. Linn. sp. 643.*

Nasturtium pumilum supinum vernum. Bot. Mons. Icon. 184. p. 125. Tour. 214.

HABITAT cum priori. Variat caule folioso.

[*Cardamine*. 3. LEVID. foliis radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. *Linn. Syst. 1127.*

HOSPITATUR sub dio. Caulis sesquipedalis ramosus. Folia radicalia pinnata, foliolis septem vel novem

subcordatis integerrimis glaucis, impari majore. Folia caulina sessilia semi-amplexicaulia multo minora. Flores albi subpaniculati, sæpè tetrandri. Folia summa simplicia dentata.

4. LEPID. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus. *Linn. Syst. 1127. sp. pl. 644.* *Petraeum.*

Lepidium foliis pinnatis, pinnis lanceolatis. *Sauv. 228.*
Nasturtium pumilum vernum. *Bot. Mons. 183.* *Tour. 214. seg. 1. 371. n°. 1.*

HABITAT cum superioribus & secus amnem; à *Mont-ferrier, Lavalette.*

5. LEPID. floribus tetradynamis, foliis oblongis multi-*sativum.* fidis. *Linn. sp. 644.*

Nasturtium hortense. *Tour. 213.*

Lepidium foliis oblongis multifidis. *Sauv. 234.*

Le Cresson alenois, ou Nasitor; vernaculè, *lou Nasitor.* HOSPITATUR sub dio. Variat foliis lanceolatis vel obovatis dentatis simplicibus & summis apice tantum dentatis. Altitudo bipedalis.

6. *Lepidium* foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Latifolium.* *Linn. sp. 644.*

Lepidium latifolium. *Bot. Mons. 153.* *Tour. 216.*

HABITAT *au Verdanson, Lavanet, Selleneuve.* Caulis glaber ramosissimus priori altior. Folia sessilia glaberrima. Racemi plurimi ex alis superioribus.

7. LEPID. floribus diandris apetalis, foliis radicalibus *Ruderale.* dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Linn. sp. 645.*

Lepidium foliis imis pinnato-multifidis, summis integris perangustis. *Sauv. 254.*

Thlaspi minus hortense osyridis folio. *Lob. Icon. 214.* Pessima Icon insufficiens.

HABITAT in maritimis & in sabulosis, *vers la source du Lés, à Prades.*

8. LEPID. floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus ferratis lanceolatis, superioribus linearibus integerrimis. *Linn. sp. 645.* *Sauv. 72. & 93.* *Iberis.*

Lepidium gramineo folio seu iberis. *Tour. 216.*

Iberis latiore folio. *Bot. Mons. 139.*

La Passerage.

HABITAT supra muros & ad viarum, agrorum margines. Datur floribus tetrandris, tetradynamisque:

foliis radicalibus spathulatis apice ferratis, s^æpè etiam lyrato-pinnatifidis.

T H L A S P I.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 648.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* simplex integerrima integra vel incisa, radicalis petiolata, caulinis sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Peregrinum. 1. THLASPI siliculis suborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. sp.* 645.

Thlaspi capsula cordata peregrinum. *Tour.* 212.

HOSPITATUR sub dio.

Arvense. 2. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Linn. sp.* 646.

Thlaspi arvense siliquis latis. *Tour.* 212.

HOSPITATUR sub dio. Caulis glaber pedalis. Flores longè pedunculati. Folia caulinis semiamplexicaulia.

Saxatile. 3. THLASPI siliculis ellipticis, foliis lanceolato-linearis integerrimis. *Sauv.* 53. 71. *Linn. sp.* 646.

Thlaspi parvum saxatile flore rubente. *Bot. Mons.* 252. *Tour.* 212. *Seg.* 1. 370.

Thlaspi siliculis subrotundis, foliis lanceolato-obtusis integerrimis carnosis. *Linn. Syst.* 1128.

Thlaspi montanum pingui folio, carneo flore. *Barr.* *Icon.* 845.

HABITAT *au Capouladou, à St. Guillin le Désert.* Altitudinem sesquiuncialem attingit. Occurrit *à Grabels, Viols.*

Perfoliatum. 4. THLASPI siliculis subrotundis, foliis amplexicaulis cordatis subserratis. *Linn. sp.* 646.

Thlaspi foliis imis petiolatis; reliquis amplexicaulis cordatis. *Sauv.* 120.

Thlaspi arvense perfoliatum majus. *Bot. Mons.* 25. *Tour.* 212. *Seg.* 1. 370.

Thlaspi cordatum minus flore albo insipidum. *Barr.* *Icon.* 815.

HABITAT *à Selleneuve, Boutonet, Castelnau.* In umbrosis.

Hirtum. 5. THLASPI siliculis subrotundis pilosis, foliis caulinis sagittatis hirsutis. *Linn. sp.* 646. *Sauv.* 120.

Thlaspi villosum capsulis hirsutis. Bot. Mons. 250.

Tour. 212.

HABITAT à la Colombiere, Lavalette, Montferrier.

Palmarem raro attingit altitudinem.

6. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis den- Campestre.
tatis incanis. Linn. sp. 646. Sauv. 78.

Thlaspi vulgatius. Tour. 212. & alterum. Dod. pempt.
700.

7. Thlaspi arvense vaccariæ incano folio, minus. Bot.
Mons. 251. Tour. 212.

HABITAT à Prades, Rouquet, Viols.

7. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis radicalibus cu- Montanum.
neiformibus integerrimis. Linn. sp. 647.

Bursa pastoris montana globulariæ folio. Tour. 216.

Thlaspi Alpinum bellidis folio. Bot. Mons. 305.

Thlaspi montanum bellidis folio, flore albo. Barr.
Icon. 861.

Thlaspi subrotundo folio, utriculo gruinali. Barr.
Icon. 1305. n°. 2.

HABITAT cum priori; & à Cette derriere la montagne.

Raro palmarem superat altitudinem. Flores calyci-
bus triplo maiores. Occurrit à Valene, Rouquet.

8. THLASPI siliculis obcordatis, foliis radicalibus pin- Bursa pastoris
natifidis. Linn. sp. 647.

Bursa pastoris major folio sinuato. Bot. Mons. 43.
Tour. 216.

Thlaspi siliculis obcordatis. Sauv. 281.

Le Tabouret ou Bourse à Berger.

HABITAT in arvis. Mirè varians ex loco.

C O C H L E A R I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 646.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea
ramosa. Fol. simplex integerrima integra vel
incisa, radicalis petiolata, caulina sessilis. Flor.
racemosa axillaris & terminalis. Fulc. nulla.

1. COCHL. foliis radicalibus subrotundis, caulinis ob- Officinalis.
longis sinuatis. Linn. sp. 647.

Cochlearia folio subrotundo. Tour. 215.

L'herbe aux Cuilliers.

HOSPITATUR sub dio. Folia succulenta. Radicalia
sæpe cordata.

- Draba.* 2. COCHL. foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis.
Linn. Syst. 1129.
Lepidium (draba) foliis lanceolatis.... *Linn. sp.* 645.
Sauv. 78. & 120.
Lepidium humile incanum arvense. *Tour.* 216.
Draba umbellata vel *draba major* capitulis donata.
Bot. Mons. 86.
La Drave, espèce de passerage.
HABITAT in arvis. *A la Peissine, Gramont, aux prés d'Arene, Castelnau.* Folia caulina sæpius sagittato-lanceolata.
- Coronopus.* 3. COCHL. foliis pinnatifidis. *Linn. sp.* 648. *Sauv.* 254. 281.
Coronopus Ruellii sive *nasturtium verrucosum*. *Bot. Mons.* 80.
Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. *Tour.* 214.
La Corne de cerf.
HABITAT in fossis humidis, à *Gramont*, sous la *Citadelle*, secùs vias. Racemi pauciflori laterales brevissimi.
- Armoracia.* 4. COCHL. foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. *Linn. sp.* 648. *Sauv.* 72. & 78. & 280.
*Raphanus rusticana*ns. *Lob. Icon.* 380.
Cochlearia folio cubitali. *Tour.* 215. *Sauv.* 72.
Le grand Raifort sauvage.
HABITAT in aquis sous la *Citadelle*.
5. COCHL. foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus. *Linn. sp.* 648. *Sauv.* 78. & 120.
Cochlearia altissima glasti folio. *Tour.* 215.
Lepidium annuum. *Lob. Icon.* 321.
HOSPITATUR sub dio.

IBERIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 647.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea vel fruticulosa, scaposa vel foliosa. *Fol.* alterna simplex integerrima vel pinnato pinnatifida (in quibusdam speciebus succulenta.) *Flor.* terminalis racemoso-corymbosa. *Fulc.* nulla.

Semperflorens 1. IBERIS foliis cuneiformibus integrimis obtusis. *Linn. sp.* 648.

Thlaspidium frutescens folio leucoji, semperflorens.

Tour. 214.

Le Thlaspi ou Taraspi des Jardiniers.

HOSPITATUR sub dio. Folia carnosa. Rami abscissi novam præbent sobolem, & radices agunt.

2. IBERIS frutescens foliis linearibus acutis integerrimis. *Sempervirens*. Linn. sp. 648.

Thlaspi montanum sempervirens. Tour. 213.

Thlaspi Creticum perenne flore albo. Barr. Icon. 214.

Autre Taraspi.

HOSPITATUR sub dio.

3. IBERIS foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus *Umbellata*. serratis, superioribus integerrimis. Linn. sp. 649.

Thlaspi Creticum iberidis folio. Barr. Icon. 893. n°. 1.

Thlaspi Creticum quibusdam flore rubente & albo.

Tour. 213.

Le Taraspi ou Thlaspi de Candie.

4. Iberis foliis lanceolatis indivisis, corymbis hæmisphæ- Cretica. ricis. Sauv. 72. Linn. sp. 649.

Thlaspi Lusitanicum umbellatum gramineo folio, flore purpurascente. Tour. 21.

HABITAT in arvis. à Montferrier, la source du Lés, & au pont de la Lironde.

4. IBERIS foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus Amara. racemosis. Linn. sp. 649. Sauv. 72.

Thlaspi umbellatum arvense amarum. Tour. 213.

HABITAT in arvis; à Castelnau, Montferrier, & au-delà du Lés. Caulis semipedalis striatus ramosissimus. Florescentia corymbosa; fructificatio racemosa.

5. IBERIS foliis sinuatis, scapo nudo simplici. Linn. sp. 650. *Nudicaulis.* Bursa pastoris minor foliis incisis. Bot. Mons. 43.

Nasturtium petræum foliis bursæ pastoris. Bauh. Pin.

104. Tour. 214.

6. Pastoria bursa minima. Lob. Icon. 221.

HABITAT in umbrosis arenosis. A Valmagne, Ville-magne. Altitudo lepidii procumbentis.

6. IBERIS foliis linearibus pinnatifidis. Linn. Syst. 1129. *Pinnata.* cent. 49.

Iberis foliis linearibus apice pinnatifidis. Sauv. 228. & 281.

Thlaspi alterum umbellatum nasturtii folio Monspe- liacum. Bauh. Pin. 106.

Thlaspi alterum umbellatum minus folio nasturtii hortensis. Lob. Icon. 218.

HABITAT cum ib. amara, umbellata. Caulis corymbosus. Florescentia remanet corymbosa ut in specie tertia.

A L Y S S U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 651. Syst. nat. 722.

Char. sec. Rad. napiformis. Caul. herbacea rigida teres simplex vel ramosa vel suffruticulosa. Fol. alterna sessilis simplex integra vel integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

* *Suffruticosa.*

spinosum. 1. ALYSSUM ramis senilibus spiniformibus nudis. Linn. sp. 650. Sauv. 70.

Alyssum ramis floreis senilibus spiniformibus nudis. Linn. Syst. 1129.

Alyssum fruticosum aculeatum. Tour. 217.

Thlaspi fruticosum spinosum Narbonense. Bot. Mons. 251.

HABITAT à Valmagne, Le spinouse, Ganges. Folia cuneiformia incana glabra.

saxatile. 2. ALYSSUM caulis frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis undulatis integris. Linn. sp. 650. foliis mollissimis. Syst. nat. 1129.

Alyssum Creticum saxatile, foliis undulatis incanis. Tour. cor. 15.

Alyssum foliis lanceolatis integris, radicibus caulescentibus diffusis, caule paniculato. Sauv. 71.

Thlaspi luteo leucoji flore. Barr. Icon. 842.

HOSPITATUR sub dio.

* *Herbacea.*

Clypeatum. 3. ALYSSUM caule erecto herbaceo, siliculis sessilibus ovalibus, compresso - planis, petalis acuminatis. Linn. sp. 651.

Lunaria leucoji folio, siliqua oblonga majori. Tour. 218.

Thlaspi album leucoji flore & folio, Italicum. Barr. Icon. 911. n°. 2.

Alysson Dioscoridis. Lob. Icon. 323.

HABITAT ad mare. *A. Maguelone.* Sesquipedalis. Folia scabra lanceolata.

4. ALYSSUM caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis, siliculis inflatis. *Linn. sp. 651.* *Sinuatum.*

Alyssoides incanum foliis sinuatis. *Tour. 213.*

Alysson foliis lanceolatis repando-dentatis. *Sauv. 280.*

HOSPITATUR sub dio.

5. ALYSSUM caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis *Creticum.* incanis subintegerrimis, siliculis inflatis. *Linn. sp. 651.*

Alyssoides fruticosum Creticum, leucoji folio incanum. *Tour. cor. 15.*

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis denticulato-sinuatis.

6. ALYSSUM staminibus quatuor dentatis, duobus squama longitudinali, calycibus persistentibus. *Linn. Alyssoides. Syst. 1130.*

Clypeola (Alyssoides) siliculis bilocularibus tetraspermis. *Linn. sp. 652. Sauv. 71.*

Alyssum incanum serpylli folio majus. *Tour. 215.*

HABITAT in sterilibus saxosis. *Au mont Saint Loup, Viols, Valene.* Folia scabra punctis prominulis. Denticuli à latere interno staminum longiorum. Squama à latere filamenti brevioris.

7. ALYSSUM staminibus terminalibus setis interpositis. *Campestre.* *Linn. Syst. 1130.*

Clypeola (campestris) annua, siliculis bilocularibus dispermis, calycibus persistentibus. *Sauv. 71. Linn. sp. 652.*

Alyssum incanum serpylli folio minus. *Tour. 217.*

Thlaspi alysson dictum campestre minus. *Bot. Mons. 251.*

Thlaspi alysson incanum. *Barr. Icon. 908. n° 2.*

Thlaspi alysson incanum luteum, lunato utriculo. *Barr. Icon. 912. n° 2.*

8. Alysson incanum serpylli folio, fructu nudo. *Tour. 215.*

Thlaspi alysson dictum minus (capsulis non foliatis.) *Bot. Mons. 251.*

HABITAT ad agrorum margines. *A Boutonet, sous le Perou, à Lavanet.* Vix palmare, ad basim ramosum.

CLYPEOLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 650.

Char. secund. Rad. tenuis napiformis. Caul. teres debilis ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

Jonthlaspi. 1. CLYP. siliculis unilocularibus monospermis. Linn. Syft. 1130. sp. 652.

Jonthlaspi minimum spicatum lunatum. Tour. 210.

Thlaspi clypeatum serpylli folio. Bot. Mons. 252.

Thlaspi alterum minus clypeatum serpylli folio. Lob. Icon. 215.

HABITAT à Boutonet suprà muros. A Castelnau, Cau-
nelles, Montferrier.

Maritima. 2. CLYP. perennis, siliculis bilocularibus ovatis disper-
mis. Linn. sp. 652.

Alyssum maritimum. Tour. 216.

Thlaspi Narbonense centunculi angusto folio. Bot.
Mons. 251.

Thlaspi montanum perenne flore albo. Barr. Icon. 844.

HABITAT ad littora maris. Facies lepidii. Folia linea-
ria vel linear-lanceolata. Caulis diffusus valdè ra-
mosus. Petala extus rubent vel dilute rosea, intus
alba.

BISCUTELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 649.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. erecta sim-
plex teres herbacea. Fol. alterna simplex inte-
gra, radicalis subpetiolata, caulina sessili-am-
plexicaulis. Flor. racemosa terminalis. Fulc.
nulla.

Auriculata. 1. BISCUT. calycibus nectario utrinque gibbis, siliculis
in stylum coëuntibus. Linn. sp. 652.

Thlaspidium hirsutum flore calcari donato. Tour. 214.
Jondraba alyssoides lutea angustifolia. Barr. Icon. 230.
& 1219.

La Lunetiere.

HOSPITATUR sub dio... è pyrenæis.

Didyma. 2. BISCUT. siliculis orbiculato-didymis à stylo diver-
gentibus. Linn. sp. 653. Sauv. 72. 282.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 323

Thlaspidium Monspeliense hieracii folio hirsuto. *Tour.*

^{214.}

Thlaspi parvum hieraciifolium sive lunaria lutea Mons-
peliaca. *Bot. Mons.* 252.

Jondraba. *Barr. Icon.* 900. 253. n°. 1.

Autre Lunetiere.

HABITAT in arvis & sterilibus. *A Castelnau, Boute-*
net, Lavanet, Caunelles. Altitudo bipedalis. Caulis
pilis rigidis hispidus. Variat foliis lanceolatis vel
cuneiformibus, integerrimis vel serratis, pinnati-
fidisque. Corollæ duplo minores quam in priori.

LUNARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 652.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea
teres ramosa. Fol. alterna simplex integra, ra-
dicalis petiolata, superior sessilis. Flor. termi-
nalis racemosa. Fulc. nulla.

i. LUNARIA siliculis oblongis, foliis cordatis. *Linn. sp. Rediviva.*

^{653.}

Lunaria major siliqua oblonga. *Tour.* 220.

La Lunaire.

HOSPITATUR sub dio. Folia summa acuminata serrata.

Racemi ex alis superioribus, duobus tribusve foliis
instructi; radix interdum tuberosa vel fasciculata.

SILIQUOSA.

DENTARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 659.

Char. secund. Rad. nodosa squamis imbricatis
obtecta. Caul. teres herbacea simplex. Fol.
alterna petiolata digitata: foliolis simplicibus
integris. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

i. DENT. foliis summis digitatis. *Linn. sp. 654.* *Pentaphyllos.*

Dentaria foliolis septenis, superioribus quinatis. *Sauv.*
180. & 228.

Dentaria heptaphyllos. *Tour.* 225.

La Dentaire.

HABITAT à Lesperou. Altitudo pedalis. Foliola serrata
lanceolata acuminata.

X ij

C A R D A M I N E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 660.

Char. secund. *Rad.* tenuis napiformis. *Caul.* herbaea debilis ramosa vel simplex. *Fol.* alterna pinnata foliolis simplicibus subintegerrimis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Impatiens. 1. CARDAM. foliis pinnatis, floribus apetalis. *Linn.* sp. 655.

Cardamine annua exiguo flore. *Tour.* 224.

Cardamine foliis pinnatis, pinnis laciniatis. *Sauv.* 255.

HABITAT à *Lesperou* & au mont *Saint Loup* ad lèvam in humidis umbrofis. Luxuriat in labyrintho horti regii. Foliola acuminata incisa sub lanceolata. Petala capillaria cito decidua. Variat floribus tetrandris. Altitudinem pedalem sæpius attingit.

Hirsuta. 2. CARDAM. foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Linn.* sp. 655. *Sauv.* 229.

Cardamine sylvestris minor italica. *Barr. Icon.* 455.

Cardamine quarta Dalechampii. *Tour.* 224.

Nasturtium aquaticum minus. *Bot. Mons.* 183.

Vernaculè de *Creissous* sauvages.

HABITAT juxta hortorum muros humidos. Foliola sæpius ovata, subcordata integerrima. Petala calycibus majora. Flores albi.

Pratensis. 3. CARDAM. foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Linn.* sp. 656.

Cardamine foliis pinnatis, imorum pinnis subrotundis angulosis, superiorum oblongis. *Sauv.* 229.

Cardamine pratensis magno flore. *Tour.* 224.

4. Cardamine pratensis parvo flore. *Tour.* 224.

Nasturtium pratense parvo flore. *Bot. Mons.* 183.

Cardamine caule & foliis hirsutis. *Sauv.* 229.

HABITAT in pratulo à *Gramont* cum gratiola & scilla autumnali. Foliola summa sæpe linearia. Ad altitudinem semipedalem excrescit.

Amara. 4. CARDAM. foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Linn.* sp. 656.


Cardamine flore majore elatior. *Tour.* 224.

Cardamine foliis pinnatis, pinnis angulosis subrotundis. *Sauv.* 229.

HABITAT in aquis; à *Castelnau*, *Selleneuve*,



CARDAMINE *lunaria* . pag. 324 .



5. CARDAM. foliis inferioribus ovatis integris, inter- *Resedifolia.*
mediis ternatis, summis pinnatis.
Cardamine foliis pinnatis, foliolis decurrentibus
confluentibus. *Linn. sp. 656.*
Cardamine alpina minor resedæ foliis. *Tour. 225.*
Cardamine caule procumbente, pinnulis ovatis, cum
nervo confluentibus. *Sauv. 229.*
HABITAT in humidis *au mont Saint Loup, à Mont-*
ferrier. Vix palmaris; variat caule ad basim ramoso,
glabro vel hirsuto. Foliola integerrima.
6. CARDAM. siliculis ellypticis sinuatis pendulis unilo- *Lunaria.*
cularibus, foliis bipinnatifidis incisis.
Cardamine foliis supràdecompositis, siliquis unilo-
cularibus pendulis. *Linn. sp. 656.*
HOSPITATUR sub dio. Annua, glabra, debilis. Folia
summa sisymbrii sophiæ foliis satis similia; sileculæ
stylo terminatae. Corollæ violaceæ.

S I S Y M B R I U M.

Char. prim. Vid. Lin. gen. pl. 666.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea
teres simplex vel ramosa. Fol. alterna nunc
simplex integra vel pinnatifida, nunc impari-
pinnata; foliolis simplicibus aut incisis. Flor.
nunc terminalis racemosa, nunc axillaris sessilis.
solitaria vel aggregata. Fulc. nulla.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

1. SISYMB. siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis *Nasturtium.*
subcordatis. *Linn. sp. 657.*

Sisymbrium aquaticum. Tour. 226.

Nasturtium aquaticum supinum. Bot. Mons. 183.

Sisymbrium foliis pinnatis, foliolis subcordatis. Sauv.
228.

Le Cresson d'eau; vernaculè de Creissous.

HABITAT in aquis. *Dans le Verdanson, à Lattes, &c.*

2. SISYMB. siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis *Sylvestre.*
lanceolatis serratis. *Linn. sp. 657.*

Sisymbrium palustre repens nasturtii folio. Tour. 226.

HABITAT ubique in humidis.

3. SISYMB. siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis *Amphibium.*
pinnatifidis serratis. *Linn. sp. 657.*

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias divisis, siliqua breviori. *Tour.* 226.

Aquaticum. *Raphanus aquaticus* foliis in profundas lacinias divisis. *Bot. Mons.* 219.

Sisymbrium foliis pinnatis, pinnis ferratis, siliqua brevi. *Sauv.* 229.

Terrestre. *g.* *Sisymbrium* foliis imis integris ovatis ferratis, summis pinnatis. *Sauv.* 229.

HABITAT in aquis... *g.* Ad margines viarum.

* *Siliquis axillaribus sessilibus.*

Polyceratum 4. *SISYMB.* *siliquis axillaribus sessilibus* subulatis aggregatis, foliis repando dentatis. *Linn. sp.* 658. *Sauv.* 283.

Erysimum polyceratum five *corniculatum*. *Bot. Mons.* 92. *Tour.* 228.

Erysimum alterum. *Lob. Icon.* 206.

HABITAT à *Montferrier*, *Caunelles*. Folia sæpè lanceolata denticulata.

Murale. 5. *SISYMB.* *foliis lyratis denticulatis*, *siliquis sessilibus.* *Linn. sp.* 658.

Eruca sylvestris minor lutea bursæ pastoris folio. *Bot. Mons.* 91. *Tour.* 227.

Sisymbrium foliis lanceolatis integris ferratis. *Sauv.* 109.

HABITAT à *la Lironde*, *Montferrier*.

* *Foliis Bipinnatis.*

Asperum. 6. *SISYMB.* *siliquis scabris*, *foliis pinnatifidis*: *pinnis linearis-lanceolatis* subdentatis, *corollis calyce longioribus.* *Linn. sp.* 659. *Sauv.* 283.

Sisymbrium foliis pinnatifidis raro dentatis angustifimis. *Sauv.* 255.

Sisymbrium palustre minus siliqua *aspera.* *Tour.* 226.

Sisymbrium foliorum pinnis linearis-lanceolatis, raro dentatis, *corollis luteis calyce majoribus.* *Sauv.* 283.

Sisymbrium Monspessulanum siliqua hirsuta *aspera.* *Bot. Mons.* 242.

HABITAT à *Lattes*, *Perauls*. Vix palmare, sæpius simplicissimum.

Sophia. 7. *SISYMB.* *petalis calyce minoribus*, *foliis decomposito-pinnatis.* *Linn. sp.* 659. *Sauv.* 254.

Sisymbrium annuum absinthii minoris folio. *Tour.*

226.

Sophia Chirurgorum. *Lob. Icon.* 738.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis. Florum pedicelli longissimi.

8. *SISYMB.* foliis pinnato-hastatis flaccidis : foliolis *Altissimum*, sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Linn.*

sp. 659. *Sauv.* 229.

Erysimum angustifolium majus. *Bot. Mons.* 93.

Tour. 228.

HABITAT ad sepium & agrorum margines.

9. *SISYMB.* foliis pinnato-hastatis dentatis, siliquis *Irio* erectis. *Linn.* *sp.* 659.

Erysimum foliis lyrato-pinnatis : extimo hastato.

Sauv. 284.

Erysimum latifolium majus glabrum. *Bot. Mons.*

92. *Tour.* 228.

HABITAT in arvis & viis.

* *Foliis lanceolatis integris.*

10. *SISYMB.* foliis lanceolatis dentato-serratis caulinis. *Stridissimum*. *Linn.* *sp.* 660. *Sauv.* 109.

Hesperis lutea siliquis strictissimis. *Tour.* 222.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Folia laurina glaberrima. Altitudo sesquipedalis.

E R Y S I M U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 664.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna simplex integra vel pinnatifida petiolata vel sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

1. *ERYSIM.* siliquis spicæ adpressis. *Linn.* *sp.* 660. *Officinale*. *Sauv.* 283.

Erysimum vulgare. *Bot. Mons.* 92. *Tour.* 228.

Le Velar ou Tortelle.

HABITAT in arvis. Folia saepius lyrata, extima lacinia acuminata, siliqua obscure tetragonæ, brevissimæ, subsessiles.

2. *ERYSIM.* foliis lyratis, extimo subrotundo. *Linn.* *Barbarea*. *sp.* 660.

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. Tour. 226.
Eruca latifolia lutea sive barbarea. Bot. Mons. 98.
Barbarea latifolia. Dod. Pempt. 700.
L'Herbe de Sainte Barbe, ou l'Herbe au charpentier.
HABITAT in fossis inundatis. *A Lattes.* Folia inferiora in petiolum attenuata, summa semiamplexicaulia; variat foliorum laciniis lateralibus linearibus, extima laciniata lanceolata.

Alliaria. 3. *ERYSIM.* foliis cordatis. *Linn. sp. 660. Sauv. 113.*

Hesperis allium redolens. Tour. 222.

Alliaria. Bot. Mons. 8.

L'Alliaire.

HABITAT à *Lattes, Castelnau* secùs amnem. Altitudo pedalis. Folia petiolata dentata vel crenata. Variat foliis inferioribus reniformibus. Flores albi.

Cheiranthoë. 4. *ERYSIM.* foliis integris lanceolatis. *Linn. sp. 661.*
Turritis leucoji folio. Tour. 224.

Camelina sive myagrum thlaspi effigie. Lob. Ikon. 225.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem pedalem superat. Folia conferta repanda sessilia; nervo foliorum in caulem decurrente. Flores parvi lutei. Siliquæ longè pedunculatæ.

Repandum. 5. *ERYSIM.* foliis lanceolatis, radicalibus repando-dentatis, siliquis racemosis. *Linn. Syst. 1133. amœn. Acad. tom. III. pag. 415.*

HOSPITATUR sub dio. Vix palmare. Folia linearilanceolata. Radix tenuissima.

CHEIRANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 656.*

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres ramosa herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima vel integra. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Erysimoides. 1. *CHEIR.* foliis lanceolatis dentatis, caule erecto, siliquis tetragonis. *Linn. sp. 661.*

Hesperis leucoji folio non serrato, siliqua quadrangle. Tour. 223.

Leucojum. Allion. Ped. tab. VIII. fig. 2.

HOSPITATUR sub dio. Nervi foliorum decurrent in caulem. Flores coloris sulphurei, odoris suavissimi, floribus cheiranthe hortensis paulo maiores.

2. CHEIR. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angustatis. *Linn. Syst. 1133. sp. 661.*
Leucojum luteum vulgare. Bot. Mons. 154. Tour. 221.
Cheiranthus foliis lanceolatis acutis glabris. Sauv. 73.
3. Erysimum foliis serratis lanceolatis. *Sauv. 109.*
Le Violier jaune; vernaculé, lou Vioulié jaouine.
 HABITAT supra muros antiquos.
3. CHEIR. foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, *Incanus.*
 siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Linn. sp. 662.*
Leucojum incanum hortense. Tour. 220.
Le Violier ou Geroflée; vernaculé, lou Vioulié.
 HABITAT in maritimis.
4. CHEIR. foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, *Annuus.*
 siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo.
Linn. sp. 662.
Leucojum incanum minus. Tour. 221.
Cheiranthus foliis lanceolatis rarius denticulatis obtusis incanis. Sauv. 282.
 HABITAT ad mare.
5. CHEIR. foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus, petalis undatis, caule suffruticoso. *Linn. sp. 662.*
Leucojum maritimum angustifolium. Bot. Mons. 154.
Hesperis maritima angustifolia incana. Tour. 223.
Leucojum minus breviori folio, obsoleto flore. Barr.
Icon. 999. n°. 2.
Cheiranthus (tristis) Linn. Syst. 1134.
 HABITAT cum prioribus, à Perauls, Maguelone.
6. CHEIR. foliis conferto-capitatis, recurvatis undatis. *Fenestralis.*
Linn. Syst. 1134. sp. pl. app. 1198.
HOSPITATUR sub dio. Biennis. Siliquæ ad basim crassiores. Floret tantum secundo anno.

H E S P E R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 657.

Char. sec. Rad. napiformis. Caul. teres herbaea simplex vel ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima vel integra, radicalis attenuato-petiolata, superior sessilis. Flor. terminalis racemosa. Fult. nulla.

1. HESP. caule hispido ramoso patente. *Linn. sp. 663. Tristis.*

Hesperis caule procumbente. *Sauv.* 104.

HOSPITATUR sub dio.

Matronalis. 2. HESP. caule erecto simplici, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Linn. sp.* 663. *Sauv.* 74. & 104.

Hesperis hortensis. *Tour.* 222.

La Julienne ou Cassolette; vernaculè, *la Cassoulète*, *Juliene*.

HOSPITATUR sub dio.

Africana. 3. HESP. caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis serratis scabris, siliquis sessilibus. *Linn. sp.* 663.

Hesperis sylvestris parvo flore. *Bot. Mons.* 127. *Tour.* 223.

Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis, sæpius dentatis. *Sauv.* 74. & 104.

HABITAT à *Selleneuve*, & sous le *Perou*; sed rarior. Variat foliis cuneiformibus integerrimis. Flores remoti.

Provincialis. 4. HESP. caule ramoso diffuso, siliquis teretibus. *Linn. sp.* 664.

Leucojum minus lavandulæ folio, obsoleto flore. *Barr. Icon.* 803.

HOSPITATUR sub dio.

Verna. 5. HESP. caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis. *Linn. sp.* 664.

Turritis annua verna, flore purpurascente. *Tour.* 224.

Leucojum rotundifolium minus. *Barr. Icon.* 876.

HABITAT au mont *St. Loup*, & in loco dicto *Montferrand*, ultra pagum sic dictum. Facies drabæ muralis.

Sibirica. 6. HESP. caule simplici, foliis lanceolatis dentato-serratis, petalis obtusissimis integris. *Linn. sp.* 663.

HOSPITATUR sub dio. Folia acuminata glaberrima, denticulis alternis minoribus, ut in chenopodio hybrido. Racemi ex alis superioribus plures.

A R A B I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 663.

Char. sec. Rad. napiiformis. Caul. teres herbacea simplex vel ramosa. Fol. alterna simplex integriflora vel integra, radicalis attenuato-petiolata, summa sessilis. Flor. terminalis racemosa. Fulcr. nulla.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 331

1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *Linn. sp.* 664. *Alpina*
Sauv. 282.
Hesperis ramosa procumbens, foliis tomentosis cre-
natis amplexicaulibus. *Sauv.* 74. & pag. 282.
2. Leucojum vernum perenne album majus. *Tour.* 221.
Draba alba siliquosa. *Bot. Mons.* 87.
Hesperis Alpina sive muralis minor. *B. hist.* 2. p. 280.
HABITAT à *Lesperou*. Bipedalis, pubescens. Folia radi-
calia dentata scabra succulenta livida, sæpius pinna-
tifida. 3. Folia mollia lanceolato-oblonga tomentosa.
2. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis cilia- *Thaliana*.
tis. *Linn. sp.* 665.
Bursæ pastoris similis siliquosa major. *B. hist.* 2. 870.
Bot. Mons. 43.
Turritis vulgaris ramosa. *Tour.* 224.
Draba. *Barr. Ikon.* 869. & 870.
HABITAT à *Castelnau*, *Lavalette*; sponte in ambu-
lacris horti regii provenit. Altitudo sesquipedalis.
Folia radicalia ovata vel lanceolata, quandoque si-
nuato-dentata; caulina ovata sessilia vel lingulata.
3. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis pla- *Turritas*.
nis linearibus, calycibus subrugosis. *Linn. sp.* 665.
Turritis caule simplici, foliis lanceolatis subdentatis
glabris. *Sauv.* 73.
Glastifolia chicoroides. *B. hist.* 2. 836.
Brassica sylvestris hispida non ramosa. *B. Pin.* 112.
edit. 2. & foliis integris hispidis, edit. 1. p. 112.
Leucojum hesperidis folio. *Tour.* 221.
HABITAT cum specie primâ. Multo minor. Caulis sa-
pissimè simplex.

T U R R I T I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 665.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres herbacea
simplicissima. *Fol.* alterna simplex integra, ra-
dicalis attenuato-petiolata, caulina semiam-
plexicaulis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulcr.*
nulla.

1. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexi- *Hirsuta*.
caulibus. *Linn. sp.* 666.
Turritis minor. *Bot. Mons.* 272. *Tour.* 223.

Turritis foliis omnibus hispidis. *Sauv.* 72. & 121.
La Tourrette.

HABITAT à la Peissine, Selleneuve, Caunelles, Castelnau, Gramont. Variat foliis inferioribus ovatis vel lanceolatis, dentatis aut pinnatifidis. Altitudo pedalis. Siliquæ cauli adpressæ.

B R A S S I C A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 661.

Char. secund. Rad. napiformis vel orbiculata raphaea. Caul. herbacea simplex vel ramosa. Fol. alterna simplex integerrima vel integra, caulinæ sessili-amplexicaulis. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

* *Stylo obtusifuscule.*

Orientalis. 1. BRAS. foliis cordatis amplexicaulibus glabris, radicalibus integerrimis scabris, siliquis tetragonis. *Linn.* sp. 666.

Brassica campestris perfoliata flore albo. *B. Pin.* 112. luteo. *Sauv.* 117.

Brassica orientalis perfoliata, flore albo, siliqua quadrangula. *Tour. cor.* 16.

Perfoliata napifolia. *Lob. Icon.* 396.

HOSPITATUR sub dio. Ferè pedalis, glabra simplicissima. Folia glaberrima glauca. Variat foliis caulinis ovatis denticulatis.

Napus. 2. BRAS. radice caulescente fusiformi. *Linn.* sp. 666. *Sauv.* 284.

Napus sativa. *Bot. Mons.* 181.

Napus radice alba. *Tour.* 229.

Le Navet; vernaculè, *lou Nat.*

HABITAT in arvis. Folia radicalia lyrata; caulinæ cordato-amplexicaulia acuminata. Racemi plures axillares, folio unico vel gemino instructi. Flores lutei laxè racemosi. Filamenta subæqualia. Variat foliis omnibus serratis, radicalibus lanceolatis.

Rapa. 3. BRAS. radice caulescente orbiculari depressa carnosa. *Linn.* sp. 666. *Sauv.* 284.

Rapum sylvestre non bulbosum. *Bot. Mons.* 219.

Rapa sylvestris. *Tour.* 229.

La Rave; vernaculè, *la Rave.*

HABITAT cum priori. *Ala Verune*, Pignan.

4. BRAS. radice caulescente tereti carnosa. Linn. sp. 667. *Oleracea*.
Brassica radice alba. Tour. 219. & varietates.
Le Chou; vernaculè, *lou Caoület*.
HABITAT in hortis.

* *Erucæ siliquis stylo ensiformi*.

5. BRAS. foliis dentato-pinnatifidis, caule hispido, si- *Eructrum*.
liquis lœvibus. Linn. sp. 667.
Sisymbrium foliis imis pinnatifidis, aliis longis linearilanceolatis, caule glabro. Sauv. 283.
β. Eruca tenuifolia perennis luteo flore. Bot. Mons. 91.
Tour. 227.
La Roquette sauvage; vernaculè, *la Rouquéte sauvage*.
HABITAT in arvis & supra muros.
6. BRAS. foliis lyratis, caule hirsuto, foliis glabris. *Eructa*.
Linn. sp. 667. Sauv. 284.
Eruca latifolia alba. Tour. 227.
Sisymbrium foliis pinnatifidis, laciniis exterioribus
majoribus, caule hirsuto. Sauv. 283.
La Roquette; vernaculè, *la Rouquéte*.
HABITAT in arvis. Calyx coloratus rubens. Foliola
calycina ferè coalita; filamenta apice purpurascientia.

S I N A P I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 662.

Char. sec. Rad. napiformis. Caul. herbacea ra-
mosa teres. Fol. alterna sessilis simplex pinna-
tifida. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

1. SINAPIS siliquis multangulis toroso-turgidis rostro *Arvensis*.
longioribus. Linn. sp. 668. Sauv. 284.
Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido. Tour.
Rapistrum flore luteo. Bot. Mons. 219.
La Moutarde; vernaculè, *la Moustarde*.
HABITAT in arvis.
2. SINAPIS siliquis tetragonis glabris. Linn. sp. 668. *Nigra*.
Sauv. 284.
Sinapis siliqua latiuscula glabra, semine rufo, sive
vulgare. Bot. Mons. 241.
Sinapis rapi folio. Tour. 227.
Autre Moutarde.

HABITAT à Lattes, Mauguio.

Alba. 3. SINAPIS siliquis hispidis, rostro obliquo longissimo.
Linn. sp. 668. Sauv. 230. & 284.

Sinapis album siliqua hirsuta, semine albo & rufo.
Tour. 227.

HABITAT cum priori, & ad mare.

Levigata. 4. SINAPIS siliquis lèvibus patulis, foliis lyratis glabris,
summis lanceolatis, caule lèvi. Linn. Syst. 1136.
cent. 57.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis. Siliquæ
longissimæ. Variat foliis omnibus lyratis.

R A P H A N U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 658.

Char. sec. Rad. napiformis. Caul. herbacea teres
ramosa. Fol. alterna simplex pinnatifida, in-
ferior petiolata, summa sessilis. Flor. racemosa
terminalis. Fulc. nulla.

Sativus. 1. RAPH. siliquis teretibus torosis bilocularibus. Linn.
sp. 669. Sauv. 285.

Raphanus minor oblongus. Tour. 229.

2. Raphanus radice suborbiculata tuberiformi.
Le Raifort; vernaculè, *lou Rabé*. B. *Le Radi*.
HABITAT in hortis.

Raphanis- 2. RAPH. siliquis teretibus articulatis lèvibus unilocu-
trum. Linn. sp. 669.

Raphanistrum siliqua articulata glabra majore. Tour.
229.

Rapistrum flore albo, siliqua articulata. Bot. Mons. 219.
Le Raifort sauvage.

HABITAT in arvis. *A Boutonet*, *Selleneuve*.

B U N I A S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 655.

Char. sec. Rad. napiformis. Caul. herbacea teres
ramosa. Fol. alterna simplex pinnatifida sessilis,
radicalis attenuato-petiolata (in unâ specie suc-
culenta.) Flor. terminalis racemosa. Fulc. tu-
bercula supra capsulas & in totâ plantâ (in
quibusdam speciebus.)

1. BUNIAS siliquis tetragonis : angulis bicristatis. *Linn.* *Erucago.*
sp. 670.
 Bunias foliis antrorsum sinuatis. *Sauv.* 285.
 Erucago segetum. *Tour.* 232.
 Erucago Monspeliaca siliqua quadrangula echinata.
Bot. Mons. 91.
La Masse au bedeau.
 HABITAT in arvis & in sterilibus. *A Castelnau, Bou-*
tonet, Lavalette, & variat foliis pinnatifidis, lan-
 ceolatis vel lyratis.
2. BUNIAS siliquis ovatis gibbis verrucosis. *Linn.* *sp. Orientalis.*
 670.
 Crambe orientalis dentis leonis folio erucaginis facie.
Tour. Cor. 14.
 Crambe foliis pinnato-hastatis. *Sauv.* 281.
 HOSPITATUR sub dio. Variat foliis lanceolatis inte-
 gerrimis. Altitudo pedalis ; siliquæ patulæ subglobo-
 fæ, apice recurvo, latere altero ventricosiore.
3. BUNIAS siliquis ovatis lævibus ancipitibus. *Linn.* *sp. Cakile.*
 670.
 Crambe foliis succulentis linearibus pinnato-dentatis. *Sauv.* 280.
 Raphanus siliquis ovatis angulatis monospermis. *Sauv.*
 285.
 Cakile maritima folio ampliori & angustiori, fructu
 hastæformi. *Tour. Cor.* 49.
 Eruca maritima Italica, siliqua hastæ cuspidi simili.
Bot. Mons. 92. *Bauh. Prod. pag.* 40.
La Roquette de mer.
 HABITAT ad mare. Datur siliquis tetragonis bafi den-
 tatis. Folia carnosa.

I S A T I S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 668.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea
 teres ramosa. *Fol.* alterna simplex integra, ra-
 dicalis petiolata, caulina sessilis amplexicaulis.
Flor. terminalis racemoso-corymbosa. *Fulc.*
 nulla.

1. ISATIS foliis radicalibus crenatis : caulinis sagittatis, *Tinctoria.*
 siliquis oblongis. *Linn.* *sp.* 670.

Isatis syvestris. Tour. 211. Sauv. 78. & 120.

Le Pastel ou la Guéde.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis; caulis glaberrimus. Racemi alterni plures.

C R A M B E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 667.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna simplex pinnatifida sessilis vel petiolata. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

Maritima. 1. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Linn. sp. 671. Sauv. 119.*

Crambe maritima brassicæ folio. Tour. 211.

Le Chou marin.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo tripedalis. Folia magna sinuato-pinnatifida.

Orientalis. 2. CRAMBE foliis scabris, caule glabro. *Linn. sp. 671.*

Crambe foliis & foliolis alternatim pinnatifidis. Sauv. 254. & 280.

Rapistrum orientale acanthi folio. Tour. Cor. 14.

HOSPITATUR sub dio. Folia majora quam in priori, lanceolata pinnatifida. Altitudo prioris & major. Caulis & racemi, ramosi. Flores albi.

Hispanica. 3. CRAMBE foliis cauleque scabris. *Linn. sp. 671.*

Crambe foliis subcordatis crenatis scabris. Sauv. 119.

Rapistrum maximum rotundifolium monospermum. Tour. 211.

Rapistrum maximum monospermum flore luteo.

Barr. Icon. 387.

HOSPITATUR sub dio. Caulis vix pedalis. Variat foliis lyratis, extimo cordato majori. Petioli longitudo foliorum angulati. Folia omnia petiolata, summa brevissimo petiolo donata.


C L E O M E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 669.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea teres simplex vel ramosa. Fol. alterna digitata, foliolis integerrimis sessilibus, petiolata, summa sessilis. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. nulla.

i. CLEOME

1. CLEOME floribus gynandris, foliis digitatis. Linn. *Gynandra*.
sp. 671.
 Synapistrum *Ægyptiacum* heptaphyllum, flore carneo, majus. *Tour.* 231.
 HOSPITATUR sub dio. Folia longè petiolata. Foliola utrinque acuminata ovalia, inferiora minora. Folia ad basim cujuslibet pedunculi ternata subsessilia vel simplicia.
2. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis *Ornithopodoides*.
ovali-lanceolatis. Linn. *sp.* 672.
 Synapistrum *orientale* triphyllum, ornithopodii siliquis. *Tour.* 231.
 HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longitudine petiolorum. Folia floralia inferiora petiolata, summa sessilia.



Classis XVI.

MONADELPHIA
PENTANDRIA.

HERMANNIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 670.
 Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticosa
 teres ramosa. Fol. alterna petiolata simplex
 integra. Flor. axillaris pedunculata, pedunculis
 solitariis multifloris. Fult. stipulæ geminæ solu-
 tæ integrimæ. Bractea infrà florem quemlibet,
 foliacea integrimæ.

Hyssopifolia. i. HERM. foliis cuneiformibus apice ferratis, pedun-
 culis trifloris.

Hermannia (*hyssopifolia*) foliis lanceolatis obtusis
 serratis. Linn. sp. 674.

Hermannia folio oblongo serrato. Tour. 656.

L'Hermanne.

HOSPITATUR in caldario. Altitudo humana. Rami
 distichi patentes. Folia ferè ononidis; petioli stipulis
 multo breviores. Stipulæ ovatæ acuminatæ integr-
 rimæ. Pedunculis sæpius triflori. Bracteæ stipulis
 subæquales, similesque. Calyces inflati pubescentes
 globosi lutei. Corollæ flavæ. Faux corollæ angusti-
 ssima.

DECANDRIA.

GERANIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 675. *Addere*
 foliola calycis duo angustiora.

Char. secund. Rad. napiformis vel tuberosa ag-
 gregata vel ramosa. Caul. ramosa, herbacea
 vel fruticosa. Fol. alterna vel opposita, sim-
 plex integra nunc incisa vel pinnata, petiolata

summa subsessilis, (in quibusdam succulenta.) *Flor.* pedunculata, umbellata vel solitaria, axillaris vel oppositifolia. *Fulg.* stipulæ geminæ solutæ integerimæ. Bracteæ involucriformes ad basim pedunculorum partialium.

Obs. ut facilius eruerentur species, à situ pedunculorum & foliorum potiusquam à numero staminum fertilium steriliumve, divisionem sumsimus.

* *Pedunculis oppositifoliis, foliis alternis.*

1. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis, ca- *Triste.*
lycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus,
radice subrotunda. *Linn. sp. 676.*

Geranium pedunculis novemfloris, foliis tripinnatifidis ligulatis, petalis maculatis. *Sauv. 251.*

Geranium triste noctu olens. Tour. 270.

2. Geranium Africanum noctu olens. *Tour. ibid.* Foliis
pastinacæ latioribus & angustioribus. *Ibid.*

Geranium triste Africanum cornuti. Barr. Icon. 68.

HOSPITATUR in caldario. Folia hirsuta bipinnata, foliolis pinnatifidis. Variat radice globosa vel tuberosa aggregata. Bracteæ involuci ovatæ parvæ numerosæ.

2. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis orbiculato-reniformibus tomentosis crenatis integriusculis, calycibus monophyllis. *Linn. sp. 676.* Caule fruticoso. *Linn. Syst. 1141.* *Inquinans:*

HOSPITATUR cum priori. Fruticosum & succulentum. Folia longè petiolata succulenta. Stipulæ cordato-ovatæ latiusculæ. Bracteæ latiores. Flores maximi.

3. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis angustatis, calycibus monophyllis, corollis papilionaceis, vexillo dipetalo maximo. *Linn. sp. 677.* *Syst. 1141.* *Papilionaceum.*

HOSPITATUR cum prioribus. Folia lobato-cordata villosa verrucosa. Bracteæ sæpiùs quinæ. Calyces reflexi. Rami sæpiùs terminati umbellulâ. Petala tria linearia calycibus ferè minora, duo superiora maxima obversè ovata. Floret martio.

4. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis glabris subovatis carnosis crenatis, calycibus monophyllis. *Linn. sp. 678.* Caule fruticoso. *Syst. 1142.* *Acetosum.*

HOSPITATUR cum prioribus. Succulentum glaberri-

mum. Flores maximi sex vel septem. Variat foliis reniformibus. Bracteæ orbiculatae sæpius quinæ.

Zonale. 5. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis cordato-orbiculatis zona notatis, calycibus monophyllis. Linn. sp. 678. Sauv. 154. Caule fruticoso. Linn. Syst. 1142.

Geranium Africanum betonicæ folio laciniato & maculato, flore incarnato. Tour. 269.

HOSPITATUR cum congenéribus. Umbella vigintiflora. Succulentum & fruticosum. Bracteæ ovatae acuminatae. Stipulae subcordatae latiusculæ.

Vitifolium. 6. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis, lobatis adscendentibus pubescentibus, floribus capitatis, caule fruticoso. Linn. Syst. 1142.

Geranium (vitifolium) calycibus monophyllis, foliis adscendentibus lobatis pubescentibus. Linn. sp. 678.

HOSPITATUR cum prioribus. Facies geranii papilionacei. Corollæ maximæ. Flores in medio bractearum sessiles.

Obs. Species omnes supra memoratae (excepta prima) ramis abscissis & in terram defossis, sobolescentes. Prima autem à radicibus multiplicatur.

* *Pedunculis axillaribus, foliis sæpiissimè oppositis.*

Alchimilloides. 7. GERAN. pedunculis axillaribus, foliis oppositis orbiculatis palmatis incisis pilosis, calycibus monophyllis, caule herbaceo. Linn. sp. 678. Sauv. 154.

Geranium Africanum alchimillæ folio hirsuto, floribus albidis. Tour. 269.

HOSPITATUR sub dio. Maximè villosum. Pedunculi longissimi. Umbella subquinqueflora. Bracteæ subulatae. Stipulae utrinque solitariae oppositæ interfoliaceæ, nec duæ ad folium singulare ut in sequentibus, prioribusque.

Cicutarium. 8. GERAN. pedunculis axillaribus multifloris, foliis oppositis pinnatis incisis obtusis, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. Linn. sp. 680. & foliis duplicato-pinnatis. Sauv. 252.

Geranium cicutæ folio minus & supinum. Bot. Mons. 109. Tour. 269.

Moschatum. 9. Geranium floribus pentandris, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus impari trifido. Sauv. 227.

- Geranium moschatum. *Tour.* 268.
- ✓ 7. Geranium petræum cicutæ folio, radice crassa, foeti- Petræum.
dum. *Bot. Mons.* 109. *Icon.* 108. *Tour.* 269.
- HABITAT in arvis & pratis. *B.* *A Rouquet, Valene,*
Prades. Stipulæ membranaceæ. Foliola ovata in-
cisa duplo majora quam in *a.* *g. au mont St. Loup.*
Foliola linearis-multifida. Cauliculi vix palmates.
9. GERAN. pedunculis axillaribus multifloris, foliis *Malacoides*
oppositis cordatis sublobatis, calycibus pentaphyl-
lis, floribus pentandris. *Linn. sp.* 680. *Sauv.* 154.
& 286.
- Geranium folio althææ. *Bot. Mons.* 108. *Tour.* 268.
- Pes columbinus. *Dod. Pempt.* 61.
- HABITAT in arvis & herbidis circà urbem. *A la*
Peissine, Laverune, &c.
10. GERAN. pedunculis axillaribus multifloris, foliis *Gruinum.*
oppositis pinnatis acutis sinuatis, calycibus penta-
phyllis, floribus pentandris. *Linn. sp.* 680.
- Geranium cicutæ folio acu longissima. *Tour.* 268.
- Geranium maximum acu longissima. *Bot. Mons.* 108.
- Geranium pedunculis multifloris, pinnis foliorum
aliis laciniatis, aliis simplicibus minimis. *Sauv.* 251.
Le Bec de grue; vernaculè, las Agujetas.
- HABITAT cum prioribus, ad margines sepium.
11. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis op- *Tuberosum.*
positis multipartitis, laciniis linearibus subdivisis.
Linn. sp. 681.
- Geranium bulbosum. *Lob. Icon.* 661.
- Geranium pedunculis bifloris, foliis multipartitis,
laciniis linearibus ramosis patulis obtusis. *Sauv.*
208.
- Geranium tuberosum majus. *Tour.* 267.
- HOSPITATUR sub dio.
12. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis alter- *Phœum.*
nis, calycibus subaristatis, caule erecto. *Linn. sp.*
681. Petalis undatis. *Linn. Syst.* 1143.
- Geranium foliis semi-quinquelobis sericeis, floribus
spicatis ex atro-purpureis. *Sauv.* 207.
- Geranium phœum sive fuscum, petalis reflexis. *Tour.*
267.
- HOSPITATUR sub dio.
13. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis op- *Nodosum.*
Y iij

positis, caulinis trilobis integris ferratis, summis subseffilibus. *Linn. sp. 681. Sauv. 208.*

Geranium nodosum. Tour. 267.

HABITAT près de *Lesperou*. Variat foliis caulinis cordatis quinquelobis. Caulis & folia glabra.

- Sylvaticum.* 14. **GERAN.** pedunculis bifloris axillaribus, foliis oppositis peltatis inciso-ferratis, caule erecto. *Linn. sp. 681. petalis emarginatis. Syst. 1143. Sauv. 207.*
Geranium batrachoides folio aconiti. Tour. 266.
HOSPITATUR sub dio. Bracteæ quatuor vel tres, latiusculæ. Foliola acuminata. Variat pedunculis unifloris.

- Pratense.* 15. **GERAN.** pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Linn. sp. 681. Petalis integris. Syst. nat. 1143.*
Geranium batrachoides gratia Dei Germanorum. Tour. 266.

HABITAT à Lattes, Montferrier.

- Robertia.* 16. **GERAN.** pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis, calycibus pilosis decem-angulatis. *Linn. sp. 681.*
Geranium robertianum murale. Bot. Mons. 108.
Geranium robertianum primum. Tour. 268.
Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-partitis, lobis pinnatifidis. Sauv. 252.

L'Herbe à Robert.

HABITAT cum priori, & à *Lattes, Selleneuve, Castelnau.*

- Molle.* 17. **GERAN.** pedunculis axillaribus, superioribus oppositifoliis, foliis inferioribus oppositis, summis ramulis alternis, caule ramoso diffuso, calycibus multicis. *Linn. sp. 682.*

Geranium columbinum minus, majori flore, & foliis bifidis. Bot. Mons. 107. Tour. 268.

Geranium pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus mollibus semi-quinquefidis, latissimis. Sauv. 207.

HABITAT sous la *Citadelle, à Castelnau, sous le Pérou;* & ad agrorum margines.

- Lucidum.* 18. **GERAN.** pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis quinquelobis rotundatis, calycibus pyramidatis angulatis. *Linn. sp. 682. Sauv. 207.*
Geranium lucidum saxatile. Bot. Mons. 108. Tour. 267.

HABITAT au-delà de Caunelles le long de la riviere,
vers Grabels.

HOSPITATUR in frigidario. Caulis rubens glaberrimus.

19. GERAN. pedunculis bifloris, foliis oppositis quinquepartito-multifidis angulatis, laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. *Linn. sp. 682.* *Columbi-*
num.

Geranium columbinum majus foliis tenuiter dissectis,
foliis florum bifidis. *Bot. Mons. 107. Tour. 268.*

Geranium columbinum foliis dissectis, foliis florum
longissimis. *Sauv. 206.*

HABITAT à Montferrier, Selleneuve, Laverune. Pe-
dicelli partiales longiores quàm in reliquis spe-
ciebus.

20. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppo- *Rotundifo-*
sitis reniformibus, petalis integris, longitudine *lium.*
calycis, caule prostrato. *Linn. sp. 683. Incis. Linn.*
Syst. 1144.

Geranium folio malvae rotundo. *Bot. Mons. 106.*
Tour. 268.

Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis mul-
tifidis, caule procumbente. *Sauv. 206.*

HABITAT in herbidis & pratis.

21. GERAN. pedunculis axillaribus unifloris, foliis op- *Sanguineum.*
positis quinquepartitis trifidis orbiculatis. *Linn. sp.*
683.

Geranium pedunculis unifloris simplicibus. *Sauv. 206.*

Geranium sanguineum sive hæmatodes radice crassa.
Bot. Mons. 107. Tour. 267.

HABITAT à Mauglio, Valene, Aniane, Valmagne.

Caulis pilosus folia summa petiolis affixa brevissi-
mis. Bractæ duæ tantum in summo pedunculo.
Corollæ maximæ violaceæ.

Obs. petioli è quorum alis prodeunt pedunculi,
semper petiolo opposito breviores sunt.

22. GERAN. pedunculis bifloris, foliis quinquepartito- *Disséatum.*
multifidis angulatis, laciniis acutis, capsulis gla-
bris, calycibus aristatis. *Linn. syst. 1144. cent. 62.*

Geranium columbinum majus, foliis tenuiter dissec-
tis, foliis florum bifidis. *Bot. Mons. 107. Tour. 268.*

POLYANDRIA.

S I D A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 674.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* teres herbaea vel fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulcr.* stipulæ solutæ geminæ integerrimæ.

Spinosæ. 1. SIDA foliis cordato-ovatis serratis, stipulis setaceis, axillis subspinosis. *Linn. sp.* 683.

Malva Canadensis mori folio, semine cum gemino rostro. *Tour.* 96.

β. *Malva indica* foliis subrotundis. *Tour.* 96.

HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis. Corollæ luteæ calycibus paulo maiores. Pedunculi petiolis subæquales. Annua.

Cordifolia. 2. SIDA foliis cordatis subangulatis serratis villosis. *Linn. sp.* 684.

HOSPITATUR in caldario. Apud nos fruticosa. Altitudo humana. Rami subtrigoni. Pedunculi petiolis multo longiores; capsulæ calycibus maiores. Folia mollissima.

Abutilon. 3. SIDA foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis. *Linn. sp.* 685.

Sida foliis subrotundo-cordatis acuminatis, pedunculis folio brevioribus, capsularum corniculis bifidis. *Linn. Syst.* 1145.

Abutilon. *Tour.* 99.

La fausse Guimauve.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo prioris. Caulis teres nec angulatus; capsulæ quadruplo maiores. Pedunculi petiolis duplo breviores.

Cristata. 4. SIDA foliis angulatis: inferioribus cordatis, superioribus panduri-formibus. *Linn. sp.* 685.

β. Sida foliis inferioribus cordato-angulatis, superioribus hastatis, petalis integerrimis. *Linn. Hort. upf.* 199.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Folia sæpius palmato-quinquepartita vel quinquangularia glabra, ad margines integerrima & obscurè rubentia. Caulis & petioli hirsuti. Pedunculi foliis duplo longiores. Corollæ calycibus duplo maiores dilutè cœruleæ. Variat foliis summis lanceolatis aut hastatis.

N A P Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1083.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex palmata. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis ramosis. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ. (Bracteæ vagæ ad basim florum, in una specie.)

1. NAPÆA glabra, pedunculis subquadrifloris ebracteatis. *Hermaphro-*

Napæa pedunculis nudis lœvibus, foliis glabris, flo-
ribus hermaphroditis. *Linn. sp.* 686.

Sida foliis palmatis: laciniis lanceolato-acuminatis.

Sauv. 201.

Malva aceris folio virginiana. *Tour.* 95.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Petioli bre-
vissimi. Folia inferiora palmato-quinquepartita;
summa tripartita. Pedunculi foliis æquales.

2. NAPÆA hirsuta, pedunculis multifloris, floribus *Dioica*,
subcapitatis bracteatis.

Napæa pedunculis involucratis angulatis, foliis sca-
bris, floribus dioicis. *Linn. sp.* 686.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana seu prioris.

Caulis striatus. Folia profundius divisa; stipulæ la-
tiores. Flores multo minores.

A L T H Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 680.

Char. secund. *Rad.* fusiformis tereti-attenuata.

Caul. teres herbacea ramosa. *Fol.* alterna petio-
lata nunc simplex integra vel palmata, nunc
inferior simplex palmata, superior digitata,
foliolis simplicibus. *Flor.* axillaris pedunculata,
pedunculis unifloris multiflorisvè. *Fulc.* stipulæ
geminæ solutæ simplices integerrimæ.

1. ALTHÆA foliis cordato-ovatis angulatis crenatis, *Officinalis*,
pedunculis subtrifloris.

Althæa foliis simplicibus tomentosis. *Linn. sp.* 686.

Sauv. 99.

Althæa *Dioscoridis* & *Plinii. Bot. Mons.* 16. *Tour.* 97.

La Guimauve.

HABITAT copiosè à *Lattes*, *Lamousson*. Petioli foliis breviores. Pedunculi longitudine petiolorum vel breviores, uniflori biflori triflorivè. Flores in summo caule plures subsessiles. Altitudo tripedalis.

Cannabina. 2. ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, caule suffruticoso. *Linn. sp.* 686. *Sauv.* 200. *Alcea cannabina*. *Tour.* 98.

HABITAT à *Castelnau*, *Gramont*, *Selleneuve* & circà Urbem. Altitudinem humanam longè superat. Foliola lanceolata inciso - serrata. Caulis obscurè rubens vel viridis. Pedunculi uniflori foliis longiores.

Hirsuta. 3. ALTHÆA foliis inferioribus subcordatis inciso-crenatis, cæteris trifidis.

Althæa foliis trifidis piloso-hispidae. *Linn. sp.* 687. *Sauv.* 200.

Alcea hirsuta. *Bot. Mons.* 6. *Tour.* 98.

HABITAT in sterilibus & saxosis. *A la Colombiere*, *Lavalette*, *Caunelles*. Cauliculi vix palmares ramosi diffusi. Petioli foliis longiores. Pedunculi foliis duplo longiores. Calyces interiores maximi acuminati hispidae. Variat foliis inferioribus cordatis, ovatis vel reniformibus.

A L C E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 679.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra vel palmato-incisa. *Flor.* axillaris pedunculata subsolitaria. *Fulg.* stipulæ geminæ solutæ simplices.

Rosea. 1. ALCEA foliis cordatis sinuato-angulosis. *Linn. sp.* 687. *Malva rosea* folio subrotundo. *Tour.* 98.

La Mauve rose ou Passerose; vernaculè *la Passerose*. HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Stipulæ palmatae trifidae. Variat floribus senis, quinis.

Ficifolia. 2. ALCEA foliis palmatis. *Linn. sp.* 687. *Malva rosea* folio ficus. *Tour.* 98.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Utraque in hortis colitur; folia palmato-quinquepartita vel septempartita. Flores plurimi sparsi in summo caule subsessiles.

M A L V A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 676.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra vel incisa, aut inferior simplex, superior pinnato-multipartita. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria vel aggregata vel spicata. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ simplices.

* *Foliis indivisis.*

1. MALVA foliis ovato-oblongis acutè-serratis, capsulis tricuspidatis. *Linn. sp.* 687. *Coromandelliana.*

HOSPITATUR sub dio. Caulis pilosus sesquipedalis. Petioli foliis longiores. Pedunculi uniflori brevissimi. Folia summa lanceolata. Flores lutei parvi.

* *Foliis angulatis.*

2. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis *Peruviana*. secundis, seminibus lœvibus. *Linn. Syst.* 1146.

Malva caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis axillaribus secundis. *Linn. sp.* 688.

Malva lusitanica ribesii folio. *Tour.* 96.

HOSPITATUR in hybernaculo. Spicæ pedunculus longitudine foliorum.

3. MALVA foliis subcordatis laciniatis glabris, caule *Capensis*. arborescente. *Linn. sp.* 688.

Malva caule frutescente, pilis compositis, foliis cordatis quinquelobis, floribus cernuis: petalis distantibus. *Linn. Syst.* 1147.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia summa quinquelobata: lobo terminali majore. Petala cordata. Puncta rubra ad basim filamentorum. Flores rubri. Variat foliis ovatis, cordatis, vel summis lanceolatis.

4. Malva caule repente, foliis multifidis. *Linn. sp.* 688. *Caroliniana*. *Sauv.* 200. & 274.

HOSPITATUR sub dio. Petioli pedunculique subæquales. Folia inferiora orbiculata incisa; summa quinque vel septem partita, laciniis incisis acuminate.

5. MALVA caule repente, foliis cordato-orbiculatis *Rotundifolia*.

obsoletè quinquelobis. *Linn.* sp. 688. *Sauv.* 200.
Malva sylvestris folio rotundo. *Bot. Mons.* 173. &
 301.

Malva vulgaris flore minore, folio rotundo. *Tour.* 95.
 HABITAT ad margines sepium & in arvis.

Sylvestris. 6. **MALVA** caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis,
 pedunculis & petiolis pilosis. *Linn.* sp. 689.

Malva caule erecto, foliis fermè palmatis, obsoletè
 serratis. *Sauv.* 200.

Malva vulgaris folio sinuato. *Bot. Mons.* 173. & 301.

Malva vulgaris flore majore, folio sinuato. *Tour.* 95.

La Mauve; vernaculè *la Mauïbe*.

HABITAT cum priori. Pedunculi sæpius quinque vel
 septem.

Alcea. 7. **MALVA** caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis.

Linn. sp. 689. *Sauv.* 200.

Alcea vulgaris major. *Bot. Mons.* 6. *Tour.* 67.

L'Alcée ou Mauve sauvage.

HABITAT à *Castelnau*, *Gramont* & cum præcedenti.

Moschata. 8. **MALVA** foliis radicalibus reniformibus incisis, cau-
 linis quinquepartitis pinnato - multifidis. *Linn.* sp.
 690.

Malva foliis quinquepartitis, laciniis lateralibus bis
 tripartitis. *Sauv.* 200.

Alcea folio rotundo laciniato. *Tour.* 97.

HABITAT à *Lesperou* & au *Mont Saint Loup*. Stipulæ
 ovato-lanceolatæ.

L A V A T E R A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 677.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Cau.* herbacea vel
 arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex angulata
 integra. *Flor.* axillaris pedunculata pedunculis
 aggregatis. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ.

* *Caule fruticoso*.

Arborea. 1. **LAVAT.** caule arboreo, foliis septemangularibus
 tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris
 axillaribus. *Linn.* sp. 690.

Althæa arborea veneta maritima. *Tour.* 97.

Lavatera caule arboriformi, foliis . . . *Sauv.* 199.

La Mauve en arbre.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Variat pedunculis binis vel solitariis. Pedunculi brevissimi. Lobi calycis exterioris obtusi saepe emarginati.

2. LAVAT. caule fruticoso, foliis quinquelobo-hastatis. *Olbia.*
Linn. sp. 690. Sauv. 200.

Althaea frutescens folio acuto, parvo flore. Tour. 96.

HOSPITATUR sub dio. Folia summa saepè lanceolata.

Laciniæ calycis exterioris acuminatæ. Pedunculi foliis longiores bini, terni, altero longiore.

3. LAVAT. caule fruticoso, foliis subcordatis subtrilobis rotundatis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis unifloris. *Trileba.* Linn. sp. 691. aggregatis. Linn. Syst. 1147.

Althaea frutescens folio rotundiore incano. Tour. 97.

Barr. Icon. 428.

Althaea arborescens. Bot. Mons. 16.

HABITAT à Miraval, & à la plaine de Launac à gauche sur la montagne. Calyx exterior profundè trifidus. Pedunculi sex vel septem subæquales, petiolis breviores. Crenæ foliorum acuminatæ.

* *Caule herbaceo.*

4. LAVAT. caule herbaceo, fructibus denudatis, caly- *Thuringiaca.*
cibus incisis. Linn. sp. 691. Sauv. 200.

Althaea flore majore. Bot. Mons. 16. Tour. 97.

HOSPITATUR sub dio. Utrum in agro Monspeffulano occurrat, adhuc ignoramus.

5. LAVAT. foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. *Trimestris.* Linn. sp. 692.

Lavatera foliis ovato-lanceolatis, infernè angulatis, pedunculis unifloris, caule herbaceo. Sauv. 101.

Malva trimestris cum unguibus purpureis. Tour. 96.

HOSPITATUR sub dio.

M A L O P E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 683.

Char. sec. Rad. tenuis fusiformis. Caul. herbacea ramosa procumbens. Fol. alterna petiolata sim-

plex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* stipulæ solutæ geminæ integerrimæ.

Malacoides. 1. MALOPE foliis ovatis crenatis supra glabris. *Linn.* sp. 692.

Malacoides betonicæ folio. *Tour.* 98.

Alcea betonicæ folio, flore purpuro-violaceo. *Barr.* *Icon.* 1189.

HOSPITATUR sub dio. In caldario perennis. Petioli longissimi; pedunculi iis æquales. Folia summa lanceolata.

G O S S Y P I U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 678.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa herbacea vel arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex lobata, lobis integerrimis. *Flor.* pedunculata solitaria oppositifolia. *Fulcr.* stipulæ oppositæ, inter pedunculum petiolumque glandulæ (in unâ specie) hypophyllæ.

Herbaceum. 1. GOSSYP. foliis quinquelobis, caule herbaceo. *Linn.* sp. 693. *Sauv.* 199.

Xylon live gossypium herbaceum. *Tour.* 101.

Le Coton; vernaculè, *lou coutou*.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Apud nos biennie.

Barbadense. 2. GOSSYP. foliis trilobis integerrimis. *Linn.* sp. 693. *Sauv.* 199.

Gossypium foliis subtus triglandulosis. *Linn.* *Syst.* 1148.

Le Coton des Barbades.

HOSPITATUR hyeme in caldario.

Arboreum. 3. GOSSYP. foliis palmatis, lobis lanceolatis, caule fruticoso. *Linn.* sp. 693.

Xylon arboreum. *Tour.* 101.

Le Coton en arbre.

HOSPITATUR cum prioribus.

H I B I S C U S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 681.

Char. sec. *Rad.* subfusiformis, ramosa. *Caul.* herbacea vel arborea. *Fol.* alterna petiolata sim-

plex palmato-multifida. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata subpetiolaris. *Fult.* stipulæ geminæ solutæ integerrimæ. Aculei in caule, luxuriationis effectus (in unâ specie.)

1. HIBISC. foliis ovato-lanceolatis, supernè inciso-serra-*Syriacus.* tis, caule arboreo. *Linn.* sp. 695. *Sauv.* 60. foliis rhomboideis. *Sauv.* 99.
Ketmia Syrorum quibusdam. *Tour.* 99.
Althæa frutescens flore albo & rubro. *Barr. Icon.* 491.
La Rose de Cayenne.
HOSPITATUR sub dio. Petioli foliis triplo breviores. Pedunculique petiolis breviores & crassiores. Variat foliis trilobis; intermedio longiore. Stipulæ minimæ setaceæ. Calyces glaberrimi æquales.
2. HIBISC. foliis tripartitis incisis, calycibus inflatis cap-*Trionum.* sulam obtegentibus. *Sauv.* 201. *Linn. sp.* 697.
Ketmia vesicaria vulgaris. *Tour.* 100.
Alcea vesicaria. *Barr. Icon.* 472.
HOSPITATUR sub dio. Caulis fesquipedalis diffusus hirsutus. Petioli foliis æquales; pedunculi longitudine petiolorum. Capsulæ subglobosæ. Corollæ extus coloris violacei obsoleti.
3. HIBISC. foliis serratis, inferioribus ovatis indivisis, *Sabdariffa.* superioribus tripartitis, caule aculeato. *Linn. sp.* 695. inermi. *Syst.* 1149.
Ketmia indica gossypii folio, acetosæ sapore. *Tour.* 100.
β. Ketmia vitis folio ampliore. *Tour. ibid.*
Hibiscus inermis, foliis indivisis, mediis tripartitis, summis quinquepartitis. *Linn. sp.* 695.
HOSPITATUR sub dio. Altitudo fesquipedalis. Caulis scaber. Petioli longissimi. Flores subsessiles. Calyx interior quinquangularis tuberculatus persistens capsulam involvens. Filamenta purpurea. Capsula calycem excedens hirta.
4. HIBISC. foliis palmato-digitatis septempartitis. *Linn. Manihot.* sp. 696.
HOSPITATUR sub dio. Fruticosus. Altitudinem humanam superans. Calyx exterior pilis punctisque purpureis adspersus.
5. HIBISC. foliis subpetiato-cordatis septemangularibus. *Abelmoschus.* ferratis hispidis. *Linn. sp.* 696. *Sauv.* 201.


Ketmia *Ægyptiaca* semine moschato. *Tour.* 100.

HOSPITATUR sub dio. Vix pedalis. Petioli foliis multo longiores. Stipulæ deciduæ setaceæ.

Esculentus. 6. HIBISC. foliis quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. *Linn. sp.* 696.

Ketmia Brasiliensis folio ficus, fructu pyramidato sulcato. *Tour.* 100.

HOSPITATUR sub dio. Capsulæ sæpius decagonæ biunciales vel longiores glabriusculæ.



Classis XVII.

DIADELPHIA *HEXANDRIA.*

FUMARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 685.

Char. secund. *Rad.* fusiformis attenuata vel bulbosa. *Caul.* herbacea teres vel angulata, simplex vel ramosa, (in unâ specie flexuosa.) *Fol.* alterna petiolata impari-pinnata, foliolis pinnato-multifidis. *Flor.* racemosa terminalis vel oppositifolia. *Fulg.* nulla (in unâ specie cirrus folia terminans.)

* *Floribus unicalcaratis.*

1. FUM. caule simplici, bracteis longitudine florum. *Bulbosa.*
Linn. sp. 699.

Fumaria caule diphyllo simplici, floribus calyce defitutis. Sauv. 194.

Fumaria bulbosa radice cava major. Bot. Mons. 296.
Tour. 424.

HABITAT à Lesperou. Folia saepius ternata, foliolis ternato-pinnatifidis; laciniis lateralibus obtusis bifidis; intermedia triloba obtusa. Corollæ maximæ violaceæ. Calcar longissimum. Racemi quinqueflori vel 6flori laxi. Floret martio.

2. FUM. siliquis linearibus tetragonis, caulis diffusis *Capnoïdes.*
acutangulis. Linn. sp. 700.

HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis glaberrimus. Foliorum petioli canaliculati longissimi. Flores laxè racemosi pauci. Quidam axillares vagi. Siliquæ curvilinæ.

3. FUM. pericarpiis monospermis racemosis, caule difuso. *Officinalis.*
Linn. sp. 700.

Fumaria pericarpiis monospermis, foliis obtusis incisis. Sauv. 263.

Fumaria Officinarum. Bot. Mons. 100. Tour. 422.

La Fumeterre.

HABITAT in arvis & supra muros. Calyces ciliati.
Racemi oppositifolii.

spicata. 4. FUM. pericarpiis monospermis spicatis, caule erecto,
foliolis filiformibus. *Linn. sp. 700. Sauv. 263.*

Fumaria minor tenuifolia flore variegato. Tour. 422.

*Fumaria minor seu nobilis Monspeliaca. Bot. Mons.
101.*

5. *Fumaria foliis tenuissimis, flore albo. Bot. Mons. 101.
Tour. 422.*

HABITAT cum priori. Racemi oppositifolii densi.
Capsulæ corollis minores.

Caprealata. 5. FUM. pericarpiis monospermis racemosis, foliis scan-
dentibus subcirrhosis. *Linn. sp. 701.*

*Fumaria viticulis & caprealis plantis vicinis adhæ-
rens. Bot. Mons. 101. Tour. 422.*

HABITAT à la plaine de Launac, à Fabregues. Folia
volubilia terminata vel cirrho vel petiolo denu-
dato aphyllo.

Claviculata. 6. FUM. siliquis linearibus, foliis cirriferis. *Linn. sp. 701.*

Fumaria foliis cirriferis, floribus spicatis. Sauv. 194.

HABITAT cum priori, & aux rochers de Mijoulan. Ra-
cemi oppositifolii. Foliola remota. Cirrus folia
terminans.

O C T A N D R I A.

P O L Y G A L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 686.*

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea simplex
erecta. Fol. alterna sessilis simplex integerrima.
Flor. terminalis racemosa. Fulcr. bractea subu-
lata solitaria ad basim floris singuli.

Vulgaris. 1. POLYG. floribus cristatis racemosis, caulis herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearibus lanceolatis. *Linn. sp. 702.*

*Polygala major. Bot. Mons. 207. Tour. 174. vulgaris.
Bot. Mons. 208. Tour. 174.*

*Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulis diffusis
herbaceis. Sauv. 52.*

HABITAT à Lattes, Caunelles, Lamousson. Altitudo palmaris.

2. POLYG. floribus cristatis racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Linn. sp. 702.*
Sauv. 53.

Polygala annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti, carneis lineis virgatis. *Bot. Mons. 208. Tour. 175.*

3. Polygala acutioribus foliis Monspeliaca. *Bot. Mons. 207. Tour. 174.*

HABITAT au Terrail, Laverune, l'Engarran.

DECANDRIA.

SPARTIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 690.*

Char. sec. *Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticulosa teres vel angulata. Fol. alterna, sessilis vel petiolata, simplex integerrima vel ternata, foliolis simplicibus. Flôr. racemosa ramea, terminalis vel lateralis. Fulc. stipulæ adnatæ minimæ; (in quibusdam spinæ floriferæ ramosæ.)*

* *Foliis simplicibus.*

1. SPART. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Linn. sp. 708. Sauv. 60. & 93.*

Genista juncea. Bot. Mons. 105. Tour. 643.

Le Genêt d'Espagne.

HABITAT à Gramont. Flores maximi. Legumina villo-

sissima.

2. SPART. ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. *Linn. sp. 708. Sauv. 60. & 93.*

Spartium alterum monospermum semine reni simili.

Tour. 646.

HABITAT à Valene, Lesperou.

3. SPART. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis. *Linn. Scorpious, sp. 708.*

Genista-spartium majus spinosum, flore luteo. Bot. Mons. 106. Tour. 645.

Genista foliis lanceolatis, spinis nudis multifloris.

Sauv. 94.

Le Genêt épineux; vernaculè, lous Arjalas.

HABITAT à Gramont, Montferrier, Lavalette, La-

verune.

* *Foliis ternatis.*

Complicatum 4. SPART. foliis ternatis, foliolis involutis, caulis inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris.
Linn. sp. 709.

Cytisus ramis humifusis albidis, floribus capitatis terminalibus, foliolis ovalibus glabris agrestis. *Sauv. 190.*

Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis. *Bot. Mons. 84. Tour. 648.*

HABITAT *au Vigan, & à Gramont vers Mauguio.*

Scoparium. 5. SPART. foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn. sp. 709.*

Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo. *Tour. 649.*
Le Genêt à balais.

HABITAT *à Léspérone.*

spinosum. 6. SPART. foliis ternatis, ramis angulatis spinosis.
Linn. sp. 709. Sauv. 191.

Cytisus spinosus. *Tour. 648.*

Acacia trifolia. *Bot. Mons. 1.*

HABITAT *à Lamalou, Valmagne, Beziers, & au bois de Candiac avec la Fraxinelle.*

GENISTA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 691.*

Char. sec. *Rad. lignosa. Caul. teres vel angulata, simplex vel articulata, herbacea vel fruticulosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis spicata, vel axillaris subsolitaria. Fulc. nulla. Spinæ in quibusdam speciebus ramosæ axillares floriferæ; in aliis bracteæ ad basim pedicellorum; in paucis verò stipulæ setaceæ.*

* *Inermes.*

Sagittalis. 1. GEN. ramis ancipitibus articulatis, foliis ovatis lanceolatis. *Linn. sp. 710.*

Chamæspartium supinum caule folioso, *Hispanicum.*
Barr. Icon. 570.

Genista ramis trianguli-ancipitibus, petiolis decurrentibus, foliis ovato-lanceolatis. *Sauv. 92.*

Genistella herbacea. *Tour.* 646.

La Spargelle.

HABITAT à *Lesperou*, au mont *St. Loup*. Vix sesquipalmaris. Caulis alatus anceps. Flores spicati. Bracteæ subulatæ minimæ.

2. GEN. foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis. *Tinctoria.* *Linn.* sp. 710. *Sauv.* 60.

Genista tinctoria Germanica. *Bot. Mons.* 106. *Tour.* 643.

Le Genêt; vernaculè, de *Geniste ou Genet.*

HABITAT à *Gramont*, *Selleneuve*, *Laverune*, *Lavalette.*

Spicæ ramos terminant. Stipulæ vix conspicuæ. Bracteæ ovatae foliaceæ.

3. GEN. foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato *Pilosa.* decumbente. *Linn.* sp. 710.

Genistella pilosa. *Bot. Mons.* 106.

Genista ramosa foliis hyperici. *Tour.* 643.

Genista foliis ovatis confertis, infernè pilosis, floribus sessilibus sparsis. *Sauv.* 92.

HABITAT à *Gramont*, *Montferrier*, là source du Lés.

* *Spinæ laterales.*

4. GEN. spinis decompositis, ramis floriferis inermibus, *Hispanica.* foliis linearibus pilosis. *Linn.* sp. 711.

Genista-spartium montis ventosi. *Tour.* 645.

Genistella spinosa *Monspeliaca.* *Bot. Mons.* 106.

HABITAT au mont *St. Loup*, à *Lesperou*. Flores subcapitati. Spinæ crassæ remotæ; ramis etiam spinula acutiori & tenui terminatis.

5. GEN. spinis compositis, ramis floriferis inermibus, *Germanica.* foliis lanceolatis. *Linn.* sp. 710. *Sauv.* 61.

Genista-spartium minus *Germanicum.* *Tour.* 645.

HABITAT à *Lesperou*. Caulis striatus pilosus.

A M O R P H A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 689.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna impari-pinnata, foliolis integerimis petiolatis oppositis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulg.* stipulæ geminæ solutæ setaceæ. *Film.* ad basim singulæ pinnulæ.

1. AMORPHA. *Linn.* sp. 713.

Fruticosa.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Rami stricti rubent. Folia pinnata foliolis utrinque 13. vel 15. ovali-lanceolatis integerrimis. Corollæ atro-purpureæ. Filamenta corollis multo longiora. Antheræ luteæ. Floret vere & autumno. Racemi interdum quidam vagi axillares.

G A L E G A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 692.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticulosa striata. Fol. alterna impari-pinnata, foliolis integerrimis petiolatis suboppositis. Flor. racemosa axillaris, racemis solitariis. Fulc. stipulæ geminæ solutæ sagittatæ. Bractea gemina ad basim floris singuli. Filum terminans singulum foliolum.

Officinalis. 1. GALEGA. Linn. sp. 714. Sauv. 235.

Galega vulgaris. Four. 398. & floribus candidantibus.
Ibid.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia pinnata foliolis utrinque 7. vel 9. ovatis vel obovatis vel lanceolatis apice emarginatis. Petioli quandoque spinulam exserunt ad basim folioli imparis. Secunda species *Tournefortii* pauciflora, minor. Floret vere & æstate.

O N O N I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 696.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. herbacea ramosa vel fruticulosa. Fol. alterna petiolata, simplex integra vel ternata, vel utraque simul in eadem specie. Flor. axillaris solitaria pedunculata aut sessilis, vel spicata interjectis foliis. Fulcr. stipulæ adnatae geminæ vaginantes amplexicaules. Filum ad apicem pedunculi in plurimis speciebus.

* *Floribus sessilibus.*

Spinosa. 1. ONONIS floribus racemosis solitariis, foliis ternatis, ramis spiniformibus. Linn. Syst. 1159.

Ononis floribus racemosis geminatis, foliis ternatis,

ramis spinosis. *Linn. sp.* 716.

Ononis spinosa flore purpureo. *Bot. Mons.* 20. *Tour.* 408.

Ononis floribus sessilibus lateralibus, caule spinoso.

Sauv. 189.

HABITAT aux prés d'Arene, à Lattes, Selleneuve.

Variat floribus geminatis. Rami brevissimi uniflori, biflori, triflorive.

2. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, ramis inermibus. *Linn. Syst.* 1159. *Arvensis.*

Ononis spinosa. *B. Linn. sp.* 716.

Ononis floribus sessilibus solitariis, ramis junioribus inermibus, floribus albis. *Sauv.* 189.

Ononis spinis carens purpurea. *Tour.* 408.

HABITAT cum priori, & à Laverune.

3. ONONIS floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus minutissima: ternatis & petiolatis, stipulis setaceis. *Linn. sp.* 717. *Minutissima.*

Ononis stipulis calycibusque setaceis. *Linn. Syst.* 1159.

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis & stipulis longas setas exerentibus. *Sauv.* 190.

Ononis pusilla glabra angustifolia lutea. *Tour.* 409.

Ononis pusilla glabra fruticans trifoliis affinis. *Bot. Mons.* 22.

HABITAT inter saxa; à Montferrier, Lavalette, La-colombiere, Castelnau. Cauliculi & calyces rubent. Corollæ calycibus breviores. Folia sæpius obversè ovata emarginata, interdum lanceolata.

4. ONONIS spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis *Alopecuroides* suborbiculatis. *Linn. sp.* 717.

Ononis sicula alopecuroides. *Tour.* 408.

HOSPITATUR sub dio. Annua herbacea. Spica foliis lanceolatis apice serratis interrupta. Folia caulina omnia ad. margines denticulata. Stipulæ latissimæ.

* *Floribus pedunculatis.*

5. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis Natrice: ternatis. *Linn. sp.* 718. *Sauv.* 189. *Natrica.*

Anonis viscosa spinis carens lutea major. *Bot. Mons.* 20. *Tour.* 409.

Ononis pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ter- natis, stipulis integerrimis. *Linn. Syst.* 1160.

3. *Ononis pedunculis unifloris seta terminatis, foliis ternatis simplicibusque.* Sauv. 189.

Anonis viscosa spinis carens lutea minor. Bot. Mons. 21. Tour. 409.

L'Arrête-bœuf; vernaculè, tous Agalousses.

HABITAT in arvis; à Castelnau, Boutonet, Selleneuve.

viscosa. 6. *ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis simplicibus.* Linn. sp. 718. Ternatisque. Syst. 1160. *Ononis viscosa spinis carens lutea latifolia annua.* Bot. Mons. 21. Tour. 409. Sauv. 190.

HABITAT à Bouzigues, Frontignan, Balaruc.

Cherleri. 7. *ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis stipulis dentatis.* Linn. Syst. 1160.

Ononis trifolia viscosa hirsuta, pedunculis congestis, floribus pendulis. Sauv. 190.

Anonis pusilla villosa & viscosa purpurascente flore. Tour. 408.

Trifoliis affinis anonis minima hirsuta Cherleri. J. B. Hist. 2. 394.

Anonis minima hirsuta Cherleri. Bot. Mons. 20.

HABITAT cum priori; à la source du Lés, au-delà de Montferrier. Facies ononidis minutissimæ.

ANTHYLLIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 712.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. teres ramosa; herbacea vel fruticosa. Fol. alterna imparipinnata, foliolis integerrimis, ternis quaternis sessilibus, pluribusvè. Flor. nunc terminalis pedunculata capitata, nunc axillaris aggregata pedunculata aut sessilis. Fulc. bracteæ in plurimis spiciebus ad basim capitulorum, palmato-incisæ vel pedunculos terminantes & integerrimæ; in aliis nullæ.

* Herbaceæ.

Tetraphylla. 1. ANTH. herbacea, foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. Linn. sp. 719. Sauv. 237.

Vulneraria pentaphyllos. Tour. 291.

Lotus pentaphyllos vesicaria. Bot. Mons. 166.

Anthyllis leguminosa vesicaria lutea. Barr. Icon. 554.

HABITAT à Selleneuve à droite, & à Lamousson à gauche: caulinuli villosi subangulati. Petioli foliorum plani dilatati. Flores axillares sessiles quaterni vel quini multo maiores quam in cæteris speciebus. Vexillum album; alæ & carina flavæ. Foliolum impar maximum.

2. ANTH. herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn. sp. 719.* *Vulneraria.*

Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus (septenis) terminali majore. *Sauv. 237.*

Vulneraria rusticæ. *Tour. 391.*

Loto affinis vulneraria pratensis. *Bot. Mons. 166.*

Anthyllis leguminosa luteo flore. *Barr. Icon. 575.* & *cæruleo.* 553.

La Vulneraire.

HABITAT à Lesperou. Foliolum impar lanceolatum.

Folia saepius pinnata foliolis septem. Variat capitulis alternis, quod rectè exprimit icon Barrelieri 575. Bractæ palmatæ.

3. ANTH. herbacea, foliis pinnatis æqualibus, capitulo *Montana.* terminali. *Linn. sp. 719.*

Vulneraria. foliis sub umbella palmatis. *Sauv. 237.*

Astragalus villosus floribus globosis. *Bot. Mons. 34.*

Barba jovis pumila villoso flore globoſo & purpureo. *Tour. 651.*

Astragalus montanus tomentosus globoſo & pallido flore. *Barr. Icon. 722.*

HABITAT à Lesperou. Cauliculi vix palmares rigidi.

Folia pinnata foliolis utrinque 7. vel 9. Petioli amplexicaules. Bractæ palmatæ.

* *Fruticosæ.*

4. ANTH. fruticosa, foliis pinnatis æqualibus; florib[us] *Barba jovis.* capitatis. *Linn. sp. 720.* *Sauv. 237.*

Barba jovis pulchrè lucens. *Tour. 651.*

Barba jovis. *Bot. Mons. 36.*

Barba jovis lentifolia incana. *Barr. Icon. 378.*

HOSPITATUR in hybernaculo. Non occurrit in agro Monspessulano. Petioli amplexicaules. Folia pinnata foliolis utrinque 7. vel 9. coloris argentei; flores lutei. Bractæ digitatæ.

Cytisoides. 5. ANTH. fruticosa, foliis ternatis inæqualibus, caly-
cibus lanatis lateralibus. *Linn. sp.* 720.
Barba jovis incana Hispanica. *Tour.* 651.
Spartium latifolium parvo flore. *Barr. Icon.* 1182.
HOSPITATUR sub dio. Bipedalis, incana : rami tere-
tes. Folia inferiora ternata. Foliolis integerrimis ;
impari petiolato majori. Folia summa simplicia ses-
silia ovata, è quorum alis pedunculi solitarii triflori
quadriflorivè, bractea ovata foliacea integerrima
terminati. Flores lutei. Semina non maturans.

L U P I N U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 693.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea sim-
plex. *Fol.* alterna petiolata digitata foliolis in-
tegerrimis. *Flor.* sessilis terminalis subverticil-
lata. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ integerrimæ,
basi adnatæ.

Varius. 1. LUPINUS calicibus semiverticillatis appendiculatis :
labio superiore bifido, inferiore subtridentato.
Linn. sp. 721.

Lupinus calycibus alternis utrinque appendiculatis.
Sauv. 214.

Lupinus calycibus verticillatis trifoliis, foliis linearibus
septenis. *Sauv.* 215.

Lupinus sylvestris purpureo flore, semine rotundo
vario. *Bot. Mons.* 167.

Et semine majore. *Bot. app.* 301. & minor. *Ibid.* &
Tour. 392.

Le Lupin.

HABITAT à Gramont. Huc certè referendus lupinus.
Sauv. 215. n°. 138. & *Bot. Mons.* 167. n°. 2.

Hirsutus. 2. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis : labio
superiore & inferiore integris. *Linn. sp.* 721.

Lupinus Indicus. *Corn. can.* 207.

Lupinus calycibus verticillatis, labio inferiore inte-
gerrimo. *Sauv.* 215.

Lupinus peregrinus vel villosus cœruleus major. *Tour.*
392.

HOSPITATUR sub dio.

Luteus. 3. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis : labio

superiore bipartito, inferiore tridentato. *Linn. sp.*
722.

Lupinus calycibus verticillatis, labio inferiore trifido.
Sauv. 215.

Lupinus luteo flore, semine compresso vario. *Bot. Mons. 167.*

Lupinus sylvestris flore luteo. *Tour. 393. Barr. Icon.*
1032.

HABITAT à Rouquet, Valene.

R O B I N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 702.*

Char. secund. *Rad. ramosa lignosa. Caul. arborea*
vel fruticulosa. *Fol. alterna, abrupte vel impa-*
ri-pinnata, foliolis æqualibus integerrimis op-
positis, sessilibus vel petiolatis. *Flor. axillaris ra-*
cemosæ vel aggregata. *Fulc. aculei geminati loco*
stipularum. *Spinulæ (in una specie) petiolos*
& foliola terminantes.

1. ROBIN. pedunculis (racemosis, foliis impari - pin- *Pseu-*
natis. *Linn. sp. 722.* *acacia.*
- Robinia aculeis geminatis. *Sauv. 238.*
- Acacia Americana Robini. *Barr. Ic. 740. Corn. can. 172.*
- Le faux Acacia; vernaculè l'Acacia.*
- HOSPITATUR sub dio. Facta indigena.
2. ROBIN. pedunculis simplicissimis, foliis abruptè-pin- *Caragana*
natis. *Linn. sp. 722.*
- Robinia pedunculis simplicissimis, foliis pinnatis.
Hort. upf. 212.
- HOSPITATUR sub dio. Frutex humanæ altitudinis. E
geminis prodeunt primo vere folia sex vel quinque,
è quorum medio simul pedunculi totidem uniflori.
Rami angulati. Folia pinnata foliolis quinque vel
utrinque 7.
3. ROBIN. pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis *Pygmaea.*
sessilibus. *Linn. sp. 723.*
- HOSPITATUR sub dio. Petiolorum basis incrassata.
Foliola lanceolata apice pungentia. Petioli spinulâ
etiam terminati loco folioli imparis.

C O L U T E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 722.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna impari-pinnata, foliolis petiolatis æqualibus integerrimis. *Flor.* axillaris petiolata, laxè racemosa. *Fulc.* stipulæ minimæ solutæ geminæ. Bracteæ minimæ ad basim singuli pedicelli.

Arborescens. 1. COLUT. arborea, foliolis obcordatis. Linn. sp. 723.

Colutea vesicaria. Bot. Mons. 72. Tour. 649.
Le Baguenaudier.

HABITAT à Castelnau, Lavalette, le long de la riviere.
Rami glaberrimi. Foliola sæpius ovata, emarginata, stylo terminata. Flores lutei.

Frutescens. 2. COLUT. fruticosa, foliolis ovato-oblongis. Linn. sp. 723.

Colutea Æthiopica flore purpureo. Tour. 649.
Le Baguenaudier d'Ethiopie.

HOSPITATUR in hybernaculo. Rami striati pubescentes.
Foliola pubescentia. Flores coccinei. Frutex.

P H A S E O L U S,

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 703.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea volubilis ramosa. *Fol.* alterna petiolata ternata : foliolis integerrimis : lateralibus deorsum latioribus sessilibus : impari æquali petiolato. *Flor.* axillaris racemosa vel subcapitata. *Fulc.* stipulæ minimæ solutæ geminæ. Bracteæ binæ ad singulum florem singulumque foliolum.

* Scandentes.

Vulgaris. 1. PHAS. caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis.
Linn. sp. 723.

Phaseolus vulgaris. Tour. 412.

Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis torulosis compressis. Sauv. 191.

L'Haricot ; vernaculè *lou Fabarooii*, *las Moungetes*.

HABITAT in hortis oleraceis.

Coccineus. 2. PHAS. caule volubili, floribus racemosis geminis,

bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis.

Linn. sp. 724.

Phaseolus phænicoe flore. Tour. 414. Sauv. 192.

HABITAT in hortis pro ornamento.

3. PHAS. caule volubili, pedunculis subcapitatis, semi-nibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Linn. sp. 724. Sauv. 192.*

HOSPITATUR sub dio. Foliolum impar trilobum, intermedio productiore. Foliola lateralia subbiloba. Pedunculi foliis longiores.

4. PHAS. caule volubili, vexillis & carina spiraliter *Caracalla*. convolutis. *Linn. sp. 725.*

Phaseolus Indicus cochleato flore. Tour. 414.

Phaseolus radice perenni subrotunda, leguminibus folio longioribus teretiusculis glabris. Sauv. 192.

La Caracalle.

HOSPITATUR in hybernaculo.

D O L I C H O S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 704.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. volubilis herbacea ramosa. Fol. alterna petiolata ternata foliolis integerrimis; ut in priori. Flor. terminalis subverticillata. Fulc. ut in priori.

Obs. genus istud priori summoperè vicinum, & à sola fructificatione repetenda disparitas.

1. DOLIC. leguminibus ovato-acinaciformibus, semi-nibus ovatis hilo arcuato versus alteram extremitatem. *Linn. sp. 725. Sauv. 192.*

Phaseolus Ægyptiacus nigro semine. Tour. 414.

HOSPITATUR sub dio. Bracteæ setaceæ ad basim foliorum. Bracteæ ad basim calycum concavæ; ipso fere majores, ovatæ. Basis communis florum callosa. Caulis sæpius scaber. Flores semiverticillati, quatuor vel quinque simul.

2. DOLIC. leguminibus pendulis cylindricis torulosis, semi-nibus erectis multifloris. *Linn. Cent. 184. Syst. 1162.*

HOSPITATUR sub dio. Folia magna, Legumina longiora.

P I S U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 706.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea volubilis ramosa. *Fol.* alterna abruptè pinnata : foliolis integerrimis sessilibus. *Flor.* axillaris pendunculata, pedunculis unifloris multiflorisvè. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ. *Cirrhus* ramosus folia terminans. Pedunculi filo terminati.

Sativum. 1. PISUM stipulis infernè rotundatis crenatis, petiolis teretibus, pedunculis multifloris. *Linn. sp.* 727.
Pisum hortense majus. *Tour.* 394. & varietates.
Le Pois; vernaculè *lous pésés*.
HABITAT in hortis. Stipulæ foliolis multo maiores. Foliola ovata.

Ochrus. 2. PISUM petiolis decurrentibus membranaceis diphyllicis, pedunculis unifloris. *Linn. sp.* 727.
Ochrus folio integro capreolos emittente. *Bot. Mons.* 188. *Tour.* 396.
HABITAT à la *Colombiere*, *Montferrier*, *Laverune*. Occurrit sèpe petiolis tetraphyllis... Facies lathyri.

O R O B U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 709.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel tuberosa. *Caul.* herbacea rigida, simplex vel ramosa. *Fol.* alterna abruptè pinnata : foliolis subpetiolatis integerrimis. *Flor.* axillaris pedunculata subracemosæ. *Fulc.* stipulæ solutæ geminæ.

Vernus. 1. OROB. foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. sp.* 728.
Orobus sylvaticus purpureus vernus. *Tour.* 393.
Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis. *Sauv.* 236.
L'Orobe Sauvage.

HABITAT à *Lesperou*, *Lamalou*, *Villemagne*.

Tuberosus. 2. OROB. foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. sp.* 728.
Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis oblongis. *Sauv.* 235.
Orobus sylvestris angustifolius asphodeli radice. *Bot. Mons.* 303. *Tour.* 393.

HABITAT cum priori, & à Valene.

3. OROB. caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis. *Niger.*
Linn. sp. 729. stipulis subulatis.

Orobus caule ramoso glabro, foliis.... Linn. Syst.
1164.

Orobus sylvaticus foliis viciæ. Bot. Mons. 196. Tour.
393.

Orobus caule ramoso. Sauv. 236.
L'Orobe.

HABITAT cum prioribus.

4. OROB. caule ramoso, foliis bijugis lanceolatis nervosis, stipulis subspinosis. *Pyrenaicus.*
Linn. Syst. 1164.

Orobus caule ramoso, foliis trijugis.... sp. pl. 729.

Orobus pyrenaicus latifolius nervosus. Tour. 235.

HABITAT à Lespinouse près de Lamalou.

L A T H Y R U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 707.

Char. secund. Rad. fibrosa ramosa vel tuberosa.

Caul. herbacea volubilis angulata. Fol. alterna, nunc simplex integerrima sessilis, nunc abruptè pinnata, petiolata; petiolis sæpiùs diphyllis. Flor. axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve. Fulc. stipulæ sagittatæ vel semi-sagittatæ solutæ geminæ. Cirrhi ramosi ad apicem petiolorum.

Obs. Species una aphylla, & cirrhis destituta.

* *Pedunculis unifloris.*

1. LATH. pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. *Nissolia.*
Linn. sp. 729.

Lathyrus sylvestris minor. Bot. Mons. 150.

Nissolia vulgaris. Tour. 656.

Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari sine capillis Nissolii. Hort. Mons. Icon. 112.

HABITAT à Montferrier, Lavalette, Clapiers. Cirrhi nulli. Folia linearia. Variat pedunculis bifloris.

2. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagittato-cordatis. *Aphaca.*
Linn. sp. 729.

Vicia lutea foliis convolvuli minoris. Bot. Mons. 278.

Aphaca Lobelii. Tour. 399.

Vernaculè, *la Lisette*.

HABITAT in arvis. Caulis subtetragonus. Cirrhi è medio stipularum, pedunculus ex ala cirrhi.

Amphicarpos. 3. LATH. pedunculis unifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis. *Linn. sp. 729.*

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, radicibus etiam sub terram fructificantibus. *Sauv. 192.*

Vicia siliquas infra supraque terram edens. *Tour. 397.*

Viciæ similis supra & infra terram fructum gerens. *Bot. Mons. 276.*

HABITAT à *la Garrigue du Terrail*, & au-delà de *La-verune*.

Cicera. 4. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis, dorso canaliculatis. *Linn. sp. 730.*

Lathyrus pedunculis unifloris, foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv. 193.*

Lathyrus sativus flore purpureo. *Bot. Mons. 150. Tour. 395.*

Vernaculè, *las Gairouttes*.

HABITAT in arvis.

Sativus. 5. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis, dorso bimarginatis. *Linn. sp. 730. Sauv. 193.*

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque. *Linn. Syft. 1164.*

Lathyrus sylvestris flore fructuque albo. *Bot. Mons. 150. Tour. 395.*

La Geffe, vernaculè, *las Geisses*.

HABITAT cum prioribus. Caulis anceps. Corollæ vexillum coccineum vel violaceum. Alæ albæ, apice nigricantes. Calycis lacinia inferior longior.

Setifolius. 6. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis setaceo-linearibus. *Linn. sp. 731.*

Lathyrus foliis linearibus, stipulis subulatis, caulis nudi. *Sauv. 193.*

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Bot. Mons. 151. Tour. 396.*

HABITAT à *Caunelles*, *Montferrier*. Folia radicalia stylo terminata. Legumina subtetasperma glabra ventricosa; corollæ calycibus majores.

7. LATH. pedunculis unifloris cirrho terminatis, cirrhis *Angulatus*, diphyllis, foliolis linearibus. *Linn. sp.* 731.
 Lathyrus angustifolius humilior. *Bot. Mons.* 150.
 Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis capillaceis. *Sauv.* 193.
 Lathyrus angustissimo folio semine angulofo. *Tour.* 395.
 HABITAT cum superiori, à *Castelnau*, au *Terrail*.
 Filum pedunculos terminans calyce longius. Legmina lineari-lanceolata compressa subdecasperma.

* *Pedunculus bifloris.*

8. LATH. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis *Odoratus*, ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Linn. sp.* 732. *Le Pois d'odeur.*
 HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens.
 9. LATH. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis *Hirsutus*, lineari-lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *Linn. sp.* 732. *Sauv.* 113.
 Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta.
Tour. 396.
 HABITAT à *Prades*, *Laverune*.
 10. LATH. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis *Annuus*, ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis. *Linn. syst.* 1165.
 HABITAT aux prés d'*Arene* & à *Lattes*. Lobus inferior stipularum superiore sextuplo minor, capillaris.

* *Pedunculus multifloris.*

11. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis; foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Linn. sp.* 732. *Sauv.* 194.
 Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Bot. Mons.* 151.
Tour. 395.
Les Glands de terre, ou Vesse sauvage.
 HABITAT à *Lattes*. Rami humifusi. Foliola ovalia stylo terminata.
 12. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis; foliolis lanceolatis; cirrhis simplicissimis. *Linn. sp.* 733.
 Lathyrus sylvestris luteus foliis viciæ. *Tour.* 395.
 Lathyrus sylvestris luteus dumetorum. *Bot. Mons.* 151.

Lathyrus pedunculis multifloris.... internodiis nudis. *Sauv.* 193.

B. Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis.

Lathyrus foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv.* 193. n°. 152.

Lathyrus latifolius luteus. *Bot. Mons.* 150. *Tour.* 395.

HABITAT à Gramont, Lattes. Stipulæ maximæ. Foliola cirrho longiora.

Latifolius. 13. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis; foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Linn.* sp. 733. *Sauv.* 194.

Lathyrus latifolius. *Bot. Mons.* 151. *Tour.* 395.

HABITAT cum superioribus, & à Lavalette.

Heterophyl. 14. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque; foliolis lanceolatis. *Linn.* sp. 733.

Lathyrus foliolis gramineis trinerviis, internodiis membranaceis. *Sauv.* 193.

Lathyrus major Narbonensis angustifolius. *Bot. Mons.* 151. *Tour.* 395.

HABITAT au Terrail, Laverune; & cum congeneribus.

V I C I A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 708.

Char. secund. Rad. fibrosa ramosa. Caul. herbacea ramosa subtetragona. Fol. alterna abruptè pinnata, foliolis integerrimis subsessili- bus. Flor. axillaris, nunc subsessilis solitaria vel aggregata, nunc racemosa pedunculata. Fulc. stipulæ geminæ solutæ sæpiùs semi-sagit- tatæ integerrimæ vel integræ. Cirri petiolos terminantes, ramosi.

* *Floribus racemosis seu pedunculis multifloris.*

Dumetorum. 1. VICIA pedunculis multifloris, foliolis reflexis mucronatis ovatis, stipulis subdentatis. *Linn.* sp. 734.

Vicia ... petiolis polyphyllis cirrhosis, foliolis al- ternis ovatis, stipulis dentatis. *Sauv.* 234.

Vicia sepium perennis. *Bot. Mons.* 307.

Vicia maxima dumetorum. *Tour.* 307.

HABITAT inter Dumeta; à Prades, Rouquet, Valene.

2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Linn. sp. 734.*
Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis. Sauv. 234.
 HABITAT à Valene, au Mont St. Loup.
3. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Linn. Cracca sp. 735.*
Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. Sauv. 234.
Vicia perennis dumetorum multiflora. Bot. 277. & perennis incana multiflora. Ibid.
Vicia multiflora. Tour. 397.
 HABITAT in pratis; à Lattes. Racemi foliis multo longiores, infernè nudi.
4. VICIA pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis infernè denticulatis. *Linn. Onobrychion des. sp. 735.*
Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis, foliolis linearibus. Sauv. 235.
Vicia sive cracca foliis & siliquis longioribus. Bot. Mons. 277. Tour. 397.
 HABITAT à Lattes, Monteils.
5. VICIA pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subdecaphyllis; foliolis lanceolatis glabris. *Linn. Biennie. sp. 736.*
Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis.... Sauv. 234.
Vicia perennis multiflora majori flore cæruleo & albo. Bot. Mons. 307. Tour. 397.
- * *Floribus axillaribus sessilibus.*
6. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliolis retusis, stipulis macula notatis. *Linn. sp. 736.*
Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis dentatis. Sauv. 234.
Vicia sativa vulgaris. Bot. Mons. 276. Tour. 396.
La Vesse; vernaculè, de Besses.
 HABITAT in arvis. Foliola linear-lanceolata stylo terminata. Stipularum denticulus uncinatus. Flores foliolis æquales.
7. VICIA leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis, inferioribus obcordatis. *Linn. sp. 736.* *Lathyroides.*

Vicia minima cum siliquis glabris. *Tour.* 397.

Viciæ sive craccæ minimæ species cum siliquis glabris.
Bot. Mons. 277.

HABITAT copiosè *au bois de Gramont*. Cauliculi palmares tenuissimi humifusi. Petioli inferiores sæpius diphylli. Stipulæ integerrimæ. Legumina subdeca-sperma lanceolata. Foliola superiora lanceolata acuminata, leguminibus duplo minora. Flores cœrulae minimi. Floret ferè toto anno.

Lutea. 8. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris. *Linn. sp.* 736.
Vicia leguminibus solitariis deorsum flexis hirsutis.
Sauv. 235.

Vicia sylvestris lutea siliqua hirsuta. *Tour.* 398.

Vernaculæ, *Cornebioou*.

HABITAT in arvis, pratis & herbidis. Foliola obversè cordata vel ovata stylo terminata. Stipulæ integerrimæ vel denticulatæ, minimæ. Legumina sæpius pentasperma ovata ventricosa.

Hybrida. 9. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis pentaspermis, corollæ vexillis villosis. *Linn. sp.* 737.

HABITAT cum priori cui simillima.

Peregrina. 10. VICIA leguminibus sessilibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. *Linn. sp.* 737.
Vicia angustifolia purpuro-violacea, siliqua lata glabra. *Bot. Mons.* 276. *Tour.* 397.

Vicia pedunculis unifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis linearibus, stipulis crenatis. *Sauv.* 234.

HABITAT à *Castelnau*, *Montferrier*, *Lavalette*, *Lacolombiere*. Foliola angustissima linearia emarginata cum stylo. Petioli calycibus subæquales. Variat foliolis obcordatis.

Sepium. 11. VICIA leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decrescentibus. *Linn. sp.* 737.

Vicia leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Sauv.* 234.

Vicia sepium folio rotundiore acuto. *Tour.* 397.

HABITAT à *Valene*, vers la source du Lès, à *Lesperrou*, au mont St. Loup. Flores sæpius bini vel terni pedunculo brevissimo donati.

Narbonensis. 12. VICIA leguminibus subsessilibus solitariis erectis vil-

losis, foliolis senis subovatis, stipulis denticulatis.
Linn. sp. 737.

Vicia léguminibus subsessilibus erectis, foliolis subo-
vatis, stipulis dentatis. *Sauv. 234.*

Vicia sepium latissimo folio non serrato. *Tour. 397.*

Faba sylvestris fructu rotundo atro. *Bot. Mons. 96.*

HABITAT ad dexteram; à *Boutonet*, *Prades*, *Gra-
bels*, & à la mer. Datur foliolis omnibus quaternis
acuminatis integerrimis.

13. *VICIA* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Linn. Faba,
sp. 737.*

Faba rotunda oblonga. *Tour. 392.*

La Fève de Marais; vernaculè, *les Fabas.*

HABITAT in hortis.

C I C E R.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 715.

Char. secund. *Rad.* fibrosa ramosa. *Caul.* herba-
cea erecta ramosa angulata. *Fol.* alterna im-
pari-pinnata, foliolis simplicibus subsessilibus.
Flor. axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* sti-
pulæ geminæ solutæ. *Filum* pedunculos ter-
minans.

1. *CICER* foliolis serratis ovatis ad basim integerrimis, *Arietinum.*
stipulis dentatis.

Cicer foliolis serratis. *Linn. sp. 738. Sauv. 233.*

Cicer sativum. *Bot. Mons. 65. Tour. 389.*

Le Pois chiche; vernaculè, *louis Séses.*

HABITAT circa urbem, in fossis & arvis. *Caulis* vil-
losus. Pedunculi longitudine foliorum. *Folia* pin-
nata, foliolis 15. vel 17.

E R V U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 714.

Char. secund. *Rad.* fibrosa ramosa. *Caul.* her-
bacea ramosa angulata. *Fol.* alterna abruptè-
pinnata, foliolis sessilibus integerrimis. *Flor.*
axillaris pedunculata, pedunculis unifloris
multifloris ve. *Fulc.* stipulæ subsagittatæ ge-
minæ solutæ. *Cirrus* petiolos terminans
simplex.

Obs. Genera viciae & ervi summoperè affinia.

Lens. 1. ERVUM seminibus compressis convexis. *Linn. sp. 738.*
Cicer pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipulis indivisis. *Sauv. 233.*

Lens vulgaris. *Bot. Mons. 152. Tour. 390.*
La Lentille; vernaculè, las Lentilles.

HABITAT in arvis. Pedunculi longitudine foliorum subquadriflori. Foliola ovata.

Tetrasper- 2. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis
mum. quaternis. *Linn. sp. 738.*

Vicia segetum singularibus siliquis glabris. *Tour. 397.*
Vicia sive cracca foliis & siliquis longioribus. *Bot. Mons. 277. Tour. 397.*

HABITAT à la Valette, la Colombiere, Castelnau. Pedunculi interdum quadriflori longitudine foliorum. Foliola linearia utrinque acuminata. Variat pedunculis unifloris, leguminibus pentaspermis.

Obs. Utrum ad istam speciem vel viciam onobrychiodem pertineat synonymia Magnolii, decidunt ocultiores.

Hirsutum. 3. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Linn. sp. 738.*

Cicer pedunculis unifloris vel multifloris, seminibus globosis. *Sauv. 233.*

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bot. Mons. 277. Tour. 397.*

HABITAT cum priori. Pedunculi quadriflori. Foliola duplo breviora quàm in specie supra laudata, linearia integerima. Legumina etiam sàpè trisperma & tetrasperma.

Ervilia. 4. ERVUM germinibus undato-plicatis. *Linn. sp. 738.*
Sauv. 237.

Orobus receptus herbariorum. *Bot. Mons. 196.*

Ervum verum. *Tour. 398.*

Les Ers; vernaculè, lous Eſſes.

HABITAT in arvis. Folia utrinque 10-16. ovata, apice emarginata. Stipulae sagittatae minimæ. Pedunculi quadriflori. Flores distantes. Legumina majora quàm in præcedentibus, tetrasperma vel trisperma.

Soleniense. 5. ERVUM pedunculis subbifloris cirrhosis, petiolis acuminatis, foliolis obtusis. *Linn. syst. 1167.*

HABITAT à Montferrier, la Colombiere, au Terrail.

CYTISUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 699.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticulosa vel arborea. *Fol.* alterna petiolata vel sessilis, ternata; foliolis integerrimis æqualibus. *Flor.* nunc racemosa terminalis, nunc axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve, solitariis aut aggregatis. *Fult.* stipulæ geminæ solutæ simplices integerrimæ. (Bracteæ in quibusdam speciebus ad basim calycum.)

1. CYTIS. racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Linn. sp. 739. Sauv. 190.*

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo. *Tour. 648.*

Le Cytise des Alpes.

HOSPITATUR sub dio, in frigidario. Arbor humanam bis excedens altitudinem. Foliorum petioli longissimi.

2. CYTIS. racemis simplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis. *Linn. sp. 739. Sauv. 190.*

Cytisus glaber nigricans. *Tour. 649.*

HABITAT à *Lesperou*.

3. CYTIS. racemis erectis, calycibus bractea triplici auctis, foliis floralibus sessilibus. *Linn. sp. 739.*

Cytisus foliis sæpiùs sessilibus, calycibus squama triplici auctis. *Sauv. 191. n°. 128. & 131.*

Cytisus glaber foliis subrotundis, pediculis brevissimis. *Tour. 648.*

Cytisus glaber siliqua lata. *Bot. Mons. 34.*

Le Cytise.

HABITAT à *Viols*, *Grabels*, *Valene*.

4. CYTIS. floribus capitatis, ramis decumbentibus. *Linn. supinus.* *sp. 740. Sauv. 190.*

Cytisus hirsutus. *Tour. 648.*

HABITAT à *Lesperou*, *Lamalon*.

5. CYTIS. floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule erecto striato. *Sauv. 191. Linn. sp. 740.*

Cytisus Monspessulanus, medicæ folio, siliquis dense congestis & villosis. *Tour. 648.*

HABITAT à *Gramont*, *Montferrier*. Pedunculi sæpiùs quaterni, quini æquales, uniflori.

6. CYTIS. floribus pedunculatis subsessilibusque, foliis *Argenteus.*

tomentosis conduplicatis, caulis fruticosis. *Linn.*
Syst. 1167.

Cytisus floribus subsessilibus, foliis tomentosis, caulis herbaceis. *Linn. sp.* 740.

Cytisus acaulis, floribus solitariis, foliis sericeis lan-

ceolatis. *Sauv.* 191.

Trifolium argenteum floribus luteis. *Bot. Mons.* 267.

Cytisus humilis angustifolius argenteus. *Tour.* 648.

Le Cytise argenté de Montpellier.

HABITAT à la Colombiere, Lavalette, Montferrier,
Castelnau; & vicinis inter Saxa. Pétoli longissimi.
Stipulæ subulatæ integerrimæ. Bractea triplex ad
quemlibet calycem. Tota planta incana splendens.
Pedunculi sæpius quadriscoli quandoque oppositifolii.

A R A C H I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 723.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata.

Fol. alterna petiolata abruptè pinnata tetra-

phylla, foliolis integerrimis. *Flor.* axillaris so-

litaria pedunculata. *Fulc.* stipulæ adnatæ ge-

minæ amplexicaules integerrimæ subulatæ.

Hypogaea. i. ARACHIS. *Linn. sp.* 741.

Lupinus quadrifolius luteus. *Barr. Icon.* 1215.

Le Pistachier de terre.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Foliola subæqualia

ovalia nervosa. Pedunculi villosi. Stipulæ longissimæ.

Pétoli villosi canaliculati.

G L Y C Y R R H I Z A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 726.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata

ramosa. *Fol.* alterna impari-pinnata, foliolis

oppositis integerrimis. *Flor.* axillaris peduncu-

lata subcapitata. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ

integerrimæ. Bractea ad basim singuli floris,

integerrima.

Echinata. i. GLYCYRR, leguminibus echinatis, foliolis imparibus

fessilibus. *Linn. Syst.* 1168.

Glycyrrhiza leguminibus echinatis, *Linn. sp.* 741.

Sauv. 233.

Glycyrrhiza capite echinato. *Tour.* 389.

HOSPITATUR sub dio. Foliola subsessilia. Capitulis vix foliolo longioribus. Stipulæ & bracteæ subulatæ.

2. GLYCYRR. leguminibus glabris, foliolis imparibus *Glabra*. petiolatis. *Linn. Syst.* 1168.

Glycyrrhiza leguminibus glabris. *Linn. sp.* 742. *Sauv.*
232.

Glycyrrhiza glabra & Germanica, radice repente.
Bot. Mons. 110. *Tour.* 389.

La Reglisso; vernaculè, *la Regalussie*.

HABITAT à *Vic*, *Méze*. Foliola omnia ovalia acuminata, ut in priori.

CORONILLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 732.

Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticosa vel herbacea, teres vel angulata. Fol. impari-pinnata, foliolis integerrimis petiolatis oppositis. Flor. axillaris pedunculata dimidiato-capitata. Fulc. stipulæ nunc geminæ solutæ laterifoliæ, nunc solitariæ oppositifoliæ.

1. CORON. fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollæ *Emerus*. rum unguibus calyce duplo longioribus, caule angulato. *Linn. Syst.* 1168.

Coronilla fruticosa, corollarum unguibus calyce duplo longioribus. *Linn. sp.* 742.

Emerus. *Tour.* 650.

Colutea siliquosa vel scorpioides major. *Bot. Mons.* 76.

Le Colutea des Jardiniers Fleuristes.

HABITAT juxta amnem; à *Castelnau*, *Lavalette*. Variat pedunculis sexfloris. Stipulæ deciduæ. Foliola obversè ovata.

2. CORON. fruticosa, foliolis quinatis ternatisque linearilanceolatis subcarnosis obtusis. *Linn. Syst.* 1168. *Juncea*.

Coronilla fruticosa, foliolis quinis sublanceolatis, stipulis lanceolatis. *Linn. sp.* 742.

Colutea caule genistæ fungoso. *Bot. Mons.* 72.

Coronilla caule genistæ fungoso. *Tour.* 650.

HOSPITATUR sub dio. Nondum vidi in agro Mons-pessulano.

3. CORON. fruticosa, foliolis subnovenis, stipulis *Valentina*. suborbiculatis. *Linn. Syst.* 1168.

Coronilla fruticosa stipulis subrotundis. *Linn. sp. 742.*
Coronilla fruticosa, leguminibus teretibus, peduncu-
 culis multifloris. *Sauv. 233.*

Polygala Valentina. *Bot. Mons. 303.*

Coronilla sive colutea minima. *Tour. 650.*

HABITAT à Valene, au Capouladou.

Glaucia. 4. **CORON.** fruticosa, foliolis suborbiculatis, stipulis
 ovatis, pedunculis complanatis.

Coronilla foliolis septenis, stipulis lanceolatis. *Linn.
 Syst. 1168. Cent. 68.*

Colutea scorpioides coronata. *Bot. Mons. 72.*

Coronilla maritima glauco folio. *Tour. 650.*

Colutea scorpioides coronata glauco folio, maritima.
B. Pin. 397.

HOSPITATUR sub dio. *A Cette vers le Nazareth, à
 Valene.* Folia interdum quinque, septem vel novem
 obcordata.

Minima. 5. **CORON.** suffruticosa procumbens, foliolis lanceola-
 tis novenis, stipula oppositifolia emarginata. *Linn.
 Syst. 1168. Cent. 186.*

Ferrum equinum Gallicum. *Bot. Mons. 97.*

Coronilla minima. *Tour. 650.*

HABITAT à Montferrier; in pinetis, *au Martinet de
 Mr. Boulet, près Lavalette.* Foliola omnia interdum
 obverse ovata, inferioribus ad basim petioli juxta-
 caulem, in omnibus verò speciebus, petioli ad ba-
 sim denudati. Stipula minima.

Securidaca. 6. **CORON.** herbacea leguminibus falcato-gladiatis, fo-
 liolis plurimis. *Linn. Syst. 1168. Sp. pl. 743. Sauv. 235.*
Securidaca lutea major. *Tour. 399.*

HOSPITATUR sub dio. Folia pinnata, foliolis utrin-
 que 9 vel 11 obovatis. Caulis fistulosus. Pedunculi
 foliis duplo longiores.

Varia. 7. **CORON.** herbacea, leguminibus erectis teretibus
 torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *Linn.
 Syst. 1168. Sp. pl. 743.*

Coronilla flore vario. *Tour. 650.*

Securidaca dumetorum major, flore vario, siliquis
 articulatis. *Bot. Mons. 235.*

HABITAT *au Capouladou, à Valene, St. Guillen le
 Désert.* Rami striati humifusi. Foliola utrinque 9 vel
 11 stylo terminata. Pedunculi foliis æquales. Petioli
 ad basim foliosi ut in specie 5^a.

ORNITHOPUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 731.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex. *Caul.* herbaea teres ramosa. *Fol.* alterna ternata vel impari-pinnata, foliolis oppositis subsessilibus integrerrimis. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis solitariis multifloris nudis vel apice foliosis. *Fulc.* nulla, (in unâ specie stipula oppositifolia emarginata.)

1. ORNITH. foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *Perpusillus.*
Linn. sp. 743. Sauv. 236.

2. Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus articulatis, radice tuberosa. *Sauv.* 236.

2. Ornithopus ... articulis leguminum subrotundis lăvibus. *Sauv.* 236.

HABITAT aux Mateles, à Prades, Rouquet.

2. ORNITH. foliis pinnatis, leguminibus compressis rugosis, pedunculis folio terminatis. *Compressus.*

Ornithopus ... leguminibus compressis rugosis. Linn.
sp. 744.

Ornithopodium scorpioides siliqua compressa. Tour.
400.

Ornithopodio affinis hirsuta scorpioides. Bot. Mons.
194.

Le Pied d'oiseau.

HABITAT à Gramont, Montferrier. Procumbens. Pedunculi terminati, folio pinnato, foliolis quinque septenatis vel novenis.

3. ORNITH. foliis inferioribus simplicibus summis ternatis, impari maximo, stipula oppositifolia emarginata. *Scorpioides.*

Ornithopus foliis ternatis subsessilibus, impari maximo. Linn. sp. 744.

Ornithopus foliis ternatis appendiculatis. *Sauv.* 190.

Scorpioides an cratævæ telephium. Bot. Mons. 232.
Vernaculè, las Amaréles.

HABITAT in arvis copiose. Caulis erectus. Stipula semivaginans. Pedunculi subquadriflori nudi,

HIPPOCREPIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 729.

Char. secund. Rad. tenuis subsimplex lignosa.

Caul. herbacea angulata ramosa. Fol. alterna impari-pinnata: foliolis subsessilibus integerrimis. Flor. axillaris, nunc sessilis solitaria, nunc pedunculata dimidiato-capitata. Fulc. stipulae geminæ solutæ.

Uniflora. 1. HIPPOC. leguminibus solitariis subsessilibus. Linn. sp.

744. Sauv. 236.

Ferrum equinum siliqua singulari. Bot. Mons. 96.
Tour. 400.

Le Fer à cheval.

HABITAT à Lavalette, au Terrail, Castelnau, Bou-tonet. Humifusa. Folia pinnata foliolis 7-9emarginatis subovatis. Legumina foliis æqualia.

Multifilia. 2. HIPPOC. leguminibus pedunculatis confertis, mar-gine interiore sinuatis. Linn. Syst. 1169.

Hippocrepis leguminibus pedunculatis, margine al-tero lobatis. Linn. sp. 744. Sauv. 236.

Ferrum equinum siliqua multiplici. Bot. Mons. 96.
Tour. 400.

HABITAT cum priori. Pedunculi foliis triplo longio-res. Folia linear-lanceolata.

Comosa. 3. HIPPOC. leguminibus pedunculatis confertis, mar-gine exteriore repandis. Linn. sp. 744.

Hippocrepis siliquis umbellatis utrinque emarginatis.
Sauv. 236.

Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate.
Bot. Mons. 96. Tour. 400.

HABITAT cum præcedentibus, & à Lattes. Facies antecedentis.

SCORPIURUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 730.

Char. secund. Rad. lignosa subsimplex. Caul. her-bacea ramosa subangulata. Fol. alterna attenua-to-petiolata simplex integerrima. Flor. axilla-ris pedunculata, pedunculis subtriquetris soli-tariis apice multifloris. Fulc. stipulae geminæ adnatæ subulatæ.

1. SCORP. pedunculis unifloris, leguminibus tectis unde squamis obtusis. *Linn. sp.* 744. *Vermiculata.*
Scorpioides siliqua crassa Boëlii. *Tour.* 402.
La Chenille.
HABITAT à la Colombiere. Procumbens.
2. SCORP. pedunculis subquadrisporus, leguminibus ex-*subvillosa.* trorsum spinis confertis acutis. *Linn. sp.* 745.
Scorpioides repens bupleuri folio. *Bot. Mons.* 233.
Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis in se contortis & convolutis. *Tour.* 402.
Scorpiurus. *Sauv.* 61.
HABITAT à Castelnau, la Peissine, Lavanet, Lavlette. Pedunculi foliis triplo ferè longiores.
3. SCORP. pedunculis subtrifloris, leguminibus extror-*sulcata.* sum spinis distinctis acutis. *Linn. sp.* 745.
Scorpioides repens bupleuri folio. *Bot. Mons.* 233.
Tour. 402.
HABITAT au Terrail, Lavlette.

H E D Y S A R U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 727.

Char. secund. Rad. tenuis simplex aut ramosa.

Caul. herbacea striata ramosa, procumbens aut erecta. Fol. alterna, nunc ternata foliolis petiolatis integerrimis, nunc impari-pinnata foliolis sessilibus integerrimis. Flor. pedunculata, axillaris aut terminalis, racemosa vel subspicata. Fulc. stipulæ geminæ solutæ integerrimæ. Bracteæ ad basim florum. (Filum ad basim foliorum in trifoliatis; aculei in paucis supra legumina.)

* *Foliis ternatis.*

1. HEDYS. foliis simplicibus ternatisque, floribus race-*Canadense.* mosis *Linn. sp.* 748.
Hedysarum triphyllum Canadense. *Tour.* 401. *Barr.*
Icon. 1140.
Hedysarum foliis inferioribus simplicibus, caulis ternatis, floribus laxè spicatis, leguminibus undulatis. *Sauv.* 191.
Le Sainfoin de Canada.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Caulis tripedalis erectus. Foliola ovato-lanceolata. Stipulae setaceæ. Racemi axillares, ad basim bractea gemina setacea minima instructi inter stipulas. Bracteæ summae ad basim florum ovatae acuminatæ. Racemus terminalis longissimus. Legumina articulis quatuor vel quinque. Petiolorum basis incrassata.

- Canescens.* 2. HEDYS. foliis ternatis subtus scabris, caule hispido, floribus racemosis conjugatis. *Linn. sp. 748.*
Hedysarum fruticosum supinum triphyllum flore purpureo. *Tour. 401.*
HOSPITATUR sub dio. Racemi subpaniculati. Bracteæ stipulæque ut in priori.

* *Foliis pinnatis.*

- Coronarium.* 3. HEDYS. foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis erectis, caule diffuso. *Linn. sp. 750.*
Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente. *Tour. 401.*
Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis. *Sauv. 233.*

Le Sainfoin d'Espagne.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi foliis longiores. Foliola ovalia carnosa, impari majori.

- Onobrychis.* 4. HEDYS. foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus. *Linn. sp. 751.*

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis. *Sauv. 233.*

Onobrychis folio viciæ, fructu echinato major. *Bot. Mons. 191. Tour. 390.*

Le Sainfoin; vernaculè, l'Esparset.

HABITAT in arvis. Pedunculi longissimi. Bracteæ binæ ad florem singulum. Stipulae acuminatæ duplo maiores quam in priori. Foliola stylo terminata, ovali-lanceolata. Denticulus calycinus inferior minimus.

- Caput-galli.* 5. HEDYS. foliis pinnatis, pedunculis subtrifloris, floribus alternis sessilibus subspicatis.

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, petalis æqualibus. *Linn. sp. 751.*

Onobrychis fructu echinato minor. *Bot. Mons. 191. Tour. 390.*

HABITAT au-delà de Caunelles vers St. George, & à

St. Jean de Vedas. Cauliculi procumbentes striati angulati. Pedunculi floriferi foliis breviores; fructiferi longiores. Calycum denticuli inferiores longissimi. Foliola ovata vel obcordata. Petioli ad basim foliolosi, in prioribus autem nudi. Legumina disperma. Corollæ magnitudine calycum. Aculei plurimi supra legumen; crista composita denticulis foliaceis compressis latioribus, ternis vel quaternis incisis.

6. HEDYS. foliis pinnatis, leguminibus articulatis asperis, corollæ alis obsoletis, spicis hirsutis, caulis depresso. *Linn. Syst. 1171.* *Humile.*

Onobrychis clypeata aspera minor. *Bot. Mons. 191.*
Hedysarum clypeatum minus, flore purpureo. *Tour. 401.*

HABITAT in saxosis; à *Rouquet*, *Valene*, *les Mateles*. Pedunculi spicati multiflori. Illud nunquam vidimus ubi notat *Magnol*; à *Fontfrede*.

INDIGOFERA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 1065.*

Char. secund. *Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticulosa ramosa. Fol. alterna impari-pinnata: foliolis oppositis petiolatis integerrimis. Flor. racemosa axillaris solitaria subsessilis. Fulc. stipulae geminæ minimæ subadnatae. Bracteæ floribus interjectæ setaceaæ.*

1. INDIG. leguminibus arcuatis incanis, racemis folio *Tindoria*. brevioribus. *Linn. sp. 751.*

L'Indigo.

HOSPITATUR hyeme in caldario. Triennis. Altitudinem humanam excedens. Foliola stylo terminata ovata vel lanceolata. Flores minimi. Racemi densi. Legumina foliolis subæqualia.

ASTRAGALUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 717.*

Char. secund. *Rad. ramosa vel simplex tenuis. Caul. scaposa vel foliosa, erecta vel procumbens. Fol. impari-pinnata: foliolis subpetiolatis oppositis integerrimis, radicalis aut caulina alterna. Flor. racemosa vel spicata, radicalis*

vel caulina axillaris sessilis aut pedunculata.
Fulg. stipulæ geminæ, solutæ vel adnatæ. Bracteæ ad basim florum setaceæ.

* *Caulibus foliosis erectis nec prostratis.*

- Alopecuroi-des.* 1. ASTRAG. caulescens, spicis cylindricis subsellibus, calycibus leguminibusque lanatis. *Linn. sp. 755.*
Astragalus Alpinus alopecuroides. Tour. 416.
HOSPITATUR sub dio. Floret secundo anno. Perennis.
Folia cubitalia pinnata foliolis utrinque 21-23 ovatis maximis. Spicæ densæ.
- Galegiformis.* 2. ASTRAG. caulescens strictus glaber, floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. *Linn. sp. 756.*
Astragalus Orientalis altissimus galegæ foliis angustioribus, flore minimo. Tour. cor. 29.
HOSPITATUR sub dio. Altitudo & facies galegæ. Racemi axillares longitudine foliorum. Stipulæ solutæ. Foliola ovalia,

* *Caulibus foliosis diffusis.*

- Cicer.* 3. ASTRAG. caulescens prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis. *Linn. sp. 757.*
Astragalus luteus perennis siliqua gemella rotunda, vesicam referente. Tour. 416.
HOSPITATUR sub dio. Racemi pauciflori. Pedunculi longitudine foliorum. Stipulæ solutæ subulatæ. Bracteæ geminatæ inæquales. Capsulæ scrotum referentes. Flores lutei.

- Glycyphyllos.* 4. ASTRAG. caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculo longioribus. *Linn. sp. 758.*
Astragalus luteus perennis procumbens. Tour. 416.
HABITAT à Lesperon. Stipulæ magnæ solutæ ovato-acuminatæ. Bracteæ longiores quam in priori. Pedunculi foliis duplo breviores.

- Hamosus.* 5. ASTRAG. caulescens procumbens, leguminibus subulatis glabris recurvatis. *Linn. sp. 758. Sauv. 237.*
Astragalus annuus Monspessulanus procumbens. Tour. 416.

Securidaca lutea minor corniculis recurvis. Bot. Mons. 235.

Hedysarum

Hedysarum alterum. Dod. Pempt. 536.

HABITAT à Castelnau, Selleneuve, la Colombiere; à St. Martin de Prunet. Foliola subtus villosa ovalia emarginata vel obversè cordata. Legumina sursum arcuata. Pedunculi foliis æquales. Spicæ paucifloræ. Stipulæ solutæ.

6. ASTRAG. caulescens procumbens, spicis peduncu- *Bæticus.*
latis, leguminibus prismaticis rectis triquetris apice
uncinatis. Linn. sp. 758.

HOSPITATUR sub dio.

7. ASTRAG. caulescens diffusus, capitulis subsessilibus *Sesameus.*
lateralibus, leguminibus erectis subulatis acumine
reflexis. Linn. sp. 759.

Astragalus annuus angustifolius, flosculis subcæruleis
cauliculis adhærentibus. Tour. 416.

Ornithopodio affinis hirsuta stella leguminosa. Bot.
Mons. 184. Secunda species quæ designatur à Magnolio;
leguminibus cauliculis adhærentibus.

8. Astragalus capitulis pedunculatis, pedunculis longi-
tudine foliorum.

Astragalus annuus angustifolius, flosculis pediculis
insidentibus. Tour. 416.

Ornithopodio affinis hirsuta stella leguminosa. Bot.
Mons. 194. Prior species.

HABITAT au Terrail, à Monteils. Cum varietate β.
Cujus foliola sæpius linear-lanceolata.

* *Scapo nudo, absque caule folioso.*

9. ASTRAG. acaulis, scapis declinatis, longitudine fo- *Monspessulan-*
liorum, leguminibus subulatis teretibus subarcua- *nus.*
tis glabris. Linn. sp. 761. Sauv. 238.

Astragalus Monspessulanus. Bot. Mons. 33. Tour. 416.
L'Astragal de Montpellier.

HABITAT in saxosis & herbidis. A Lavalette & vi-
cinis. A Castelnau, Caunelles. Scapi sæpè foliis du-
plo longiores. Stipulæ adnatæ. Vexillum longissi-
mum. Petioli ad basim foliolis destituti. Bracteæ
sæpius solitariæ. Florum racemi laxi.

9. ASTRAG. acaulos, scapis declinatis longitudine fo- *Incanus.*
liorum, foliis tomentosis, leguminibus subulatis
subarcuatis incanis. Linn. Syst. 1175.

Astragalus incanus siliqua incurva. Bot. Mons. 33.
Icon. 32. Tour. 416.

B b

Onobrychis incana siliquis longioribus. *B. Pin.* 350.

Prod. 149.

HABITAT in locis à Magnolio designatis. *A Fontanès, Assas, à Coulondres à droite, au mont St. Loup vers Valene.*

Montanus. 10. ASTRAG. subacaulos, scapis folio longioribus, floribus laxè spicatis erectis. *Linn. sp.* 760.

Astragalus quidam montanus vel onobrychis aliis.
Tour. 416.

HABITAT à *Lesperou*, à *Viols*, au mont *St. Loup*, à *Lamalou*. *Stipulæ adnatæ. Petioli ad basim nudi. Bracteæ solitariæ. Pedunculi axillares longitudine foliorum.*

* *Caule lignoso.*

Tragacantha. 11. ASTRAG. caudice arborescente, petiolis spinescentibus. *Linn. sp.* 762.

Tragacantha Massiliensis. *Tour.* 417. *Sauv.* 237.
L'Adragant; Barbe-renard.

HOSPITATUR sub dio. *Frequens Massiliae. Stipulæ adnatæ. Foliola & tota planta tomentosa.*

B I S E R R U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 718.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex. *Caul.* herbacea teres striata ramosa. *Fol.* alterna impari-pinnata: foliolis oppositis subsessilibus integrerrimis. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata dimidiato-capitata. *Fulc.* stipulæ solutæ geminæ integrerrimæ. *Bracteæ* minimæ subsolitariæ ad basim floris singuli.

Pelecinus. 1. BISERRULA. *Linn. sp.* 762. *Sauv.* 237.

Pelecinus. *Tour.* 417.

La Scie.

HABITAT au-delà de la *Colombiere* in loco dicto *lomas de Garimond*. *Foliola obcordata. Pedunculi foliis æquales.*

P S O R A L E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 716.

Char. secund. *Rad.* simplex vel ramosa lignosa.
Caul. herbacea ramosa vel fruticosa. *Fol.* al-

terna petiolata, nunc simplex integerrima, nunc ternata aut impari-pinnata: foliolis integerrimis. *Flor.* axillaris, nunc sessilis solitaria, nunc capitata pedunculata. *Fulcr.* stipulæ geminæ solutæ integerrimæ. Bractea ad basim capitulorum.

1. PSOR. foliis pinnatis, floribus axillaribus. *Linn. sp. 762.* *Pinnata.*
HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario. Caulis villosus fruticosus. Folia conferta pinnata foliolis sæpius quinque linearibus acuminatis canaliculatis, inferioribus duobus longioribus. Flores sessiles solitarii. Vexillum cærulescens; alæ pallidæ; carina albicans. apice atro-purpurea.
2. PSOR. foliis omnibus ternatis, pedunculis spicatis *Bituminosa.*
folio longioribus. Linn. sp. 763.
Trifolium bitumen redolens. *Tour. 405.*
Trifolium asphaltes sive bituminosum odoratum. *Bot. Mons. 260.*
Psoralea foliis omnibus ternatis. *Sauv. 190.*
HABITAT à Castelnau, Gramont. Altitudo humana.
Foliola glaberrima lanceolata. Bractæ ovatæ. Legumina stylo ensiformi terminata.
3. PSOR. foliis ovatis simplicibus. *Linn. sp. 764.* *Corylifolia.*
HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis. Petioli foliis duplo breviores canaliculati. Pedunculi foliis æquales. Corollæ cærulecentes. Vexillum dilutè violaceum. Calyx pilis nigris adspersus. Folia sinuata. Legumina subrotunda. Floret augusto. Annua.

TRIFOLIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 713.*

Char. secund. *Rad. horizontalis repens vel perpendicularis. Caul. herbacea teres ramosa, repens vel erecta. Fol. alterna petiolata ternata: foliolis subæqualibus integris, sessilibus vel petiolatis, terminali sæpius petiolato. Flor. pedunculata (in una specie sessilis) axillaris vel terminalis, nunc racemosa aut spicata, nunc capitata. Fulc. stipulæ geminæ adnatæ vaginantes. Bractæ situ numero & figura variæ.*

* *Meliloti leguminibus nudis polyspermis, foliolo impari petiolato.*

Melilotus 1. TRIFOL. spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto. *Linn. sp. 764. Sauv. 185.*

Melilotus major odorata violacea. Tour. 407.

Le Melilot odorant.

HOSPITATUR sub dio. Stipulae minimae. Foliola ovalia denticulata. Bracteae nullae. Racemi longitudine foliorum, densi pauciflori.

Melilotus 2. TRIFOL. leguminibus racemosis nudis dispermis, caule erecto. *Linn. sp. 765. Sauv. 185.*

Melilotus Officinarum luteo flore. Bot. Mons. 175. Tour. 407.

β. *Melilotus major candida. Bot. Mons. 175.*

Melilotus Officinarum flore albo. Tour. 407. & altissima. Ibid.

Melilotus frutescens siliquis brevibus turgidis minus rugosis. Sauv. 185.

Le Melilot d'usage.

HABITAT aux prés d'Arene, Laverune, Castelnau.

β. Altitudo humana. Racemi laxi multiflori longiores. Flores penduli. Bracteae vix conspicuae. Foliola ovalia ferrata.

Melilotus 3. TRIFOL. leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis integris. *Linn. sp. 765.*

Trifolium erectum, foliolis obtuse quadrangulis, leguminibus sphæricis. Sauv. 186.

Melilotus Italica folliculis rotundis. Tour. 407.

HABITAT à Gramont, Montferrier. Racemi pauciflori. Folia subsessilia.

Melilotus 4. TRIFOL. leguminibus racemosis nudis dispermis membranaceis, caule erectiusculo. *Linn. sp. 765.*

Melilotus Cretica fructu maximo. Tour. 407.

HOSPITATUR sub dio. Foliola obcordata. Legumina ad siliquas lunariae accedunt. Pedunculi pauciflori, breves.

* *Lotoidea leguminibus tectis polyspermis, foliolis sessilibus.*

Repens. 5. TRIFOL. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Linn. sp. 767.*

- Trifolium pratense album. *Bot. Mons.* 261. *Tour.* 406.
 Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Sauv.*
 184. procumbente.
Le Trefle des prés.
 HABITAT in pratis & herbidis. Folia interdum maculata. Foliola ovali-orbiculata emarginata.
6. TRIFOL. scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis, foliolis linearis-lanceolatis. *Linn. sp.* 767. *Alpinum.*
 Trifolium caule nudo simplicissimo, foliis linearis-lanceolatis. *Sauv.* 185.
La Reglis de montagne.
 HABITAT à L'esperou, Villemagne. Foliola integerrima glaberrima.
 * *Lagopoda calycibus villosis, foliolis sessilibus.*
7. TRIFOL. capitulis villosis quinquefloris, involucro subterraneo centrali reflexo rigido, fructum involvente. *Linn. neum.* *sp.* 767.
 Trifolium subterraneum sive folliculos sub terram condens. *Bot. Mons.* 265.
 Trifolium semen sub terram condens. *Tour.* 406.
 HABITAT à l'entrée du bois de Gramont. in herbidis. Cauliculi repentes. Foliola obcordata. Corollæ ex flavo albidæ. Pedunculi longitudine foliorum.
8. TRIFOL. capitulis villosis hemisphæricis terminalibus solitariis, calycibus omnibus fertilibus. *Linn. Cherlerii.*
Syst. 1177.
 Trifolium capitulis villosis globosis terminalibus, bractea orbiculata vestitis. *Sauv.* 184.
 Trifolium glomerulis personatæ cherleri. *Bot. Mons.* 266.
 Trifolium globosum repens. *Tour.* 405.
La Houpe.
 HABITAT à Gramont, Rouquet, à la source du Lés, Valene. Cauliculi tomentosi. Bractea sæpius triplex, maxima cordata ad margines colorata. Stipulæ magnitudine foliorum, nervosæ.
9. TRIFOL. spicis villosis longis, corollis monopetalis, *Rubens.* caule erecto, foliis ferrulatis. *Linn. sp.* 768. *Sauv.*
 184.
 Trifolium montanum spica longissima rubente. *Bot. Mons.* 261. *Tour.* 405.

HABITAT à Valene, Grabels. Folii nervorum apices denudati; unde ferraturæ foliolorum. Foliola lanceolata glaberrima. Stipulæ longissimæ glaberrimæ. Spicæ densæ. Denticuli calycini longissimi.

- Pratense.* 10. TRIFOL. spicis subvillosois, cinctis stipulis (bracteis) oppositis membranaceis, corollis monopetalis. Linn. sp. 768.

Trifolium pratense purpureum. Bot. Mons. 261.

Trifolium pratense flore monopetalo. Tour. 404.

HABITAT in pratis. Stipulæ omnes membranaceæ nervosæ. Foliola ovalia integerrima vel subserrulata, stylo terminata, sèpè maculata.

- Glomeratum.* 11. TRIFOL. capitulis sessilibus globosis, calycibus striatis æqualibus patulis. Linn. sp. 770.

Trifolium capitulis sessilibus lateralibus subglobosis. Sauv. 183.

HABITAT à Grabels, Valene, Rouquet.

- Lappaceum.* 12. TRIFOL. spicis subglobosis, calycibus setis rigidis obvallatis, caule erecto. Linn. sp. 768.

Trifolium capitulo glomerato. Bot. Mons. 267.

Trifolium globosum seu capitulo lagopi rotundiore. Tour. 405.

Trifolium spicis globosis subsessilibus terminalibus, caule diffuso. Linn. Syst. 1177.

Trifolium nemorosum capite ovato rufescente. Barr. Icon. 871.

HABITAT juxta sepes, à la Peissine, au petit chemin de Selleneuve. Stipulæ subulatæ. Foliola ovalia vel obversè ovata integerrima. Caulis pedalis erectus vel procumbens villosus. Corollæ albæ vel roseæ. Absoluta florescentia calycum denticuli rigidi fiunt.

- Angustifolium.* 13. TRIFOL. spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subæqualibus, foliolis linearibus. Linn. sp. 769.

Trifolium montanum angustifolium spicatum. Bot. Mons. 261. Tour. 405.

HABITAT au chemin des près d'Arene, Lattes, Lamousson, Laverune. Denticuli calycini setis rigidis ciliati. Foliola longissima integerrima. Stipulæ basi dilatatae venosæ acuminatæ, petiolis longiores. Spicæ triunciales, terminales & axillares.

- Arvense.* 14. TRIFOL. spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis

setaceis æqualibus. *Linn.* sp. 769. *Sauv.* 184.

Trifolium arvense humile spicatum sive lagopus. *Bot.*

Mons. 262. *Tour.* 405.

Lagopus angustifolia minor erectior. *Barr. Icon.* 901.

β. *Lagopus altera.* *Barr. Icon.* 902.

La Patte de lièvre.

HABITAT à *Gramont*, *Castelnau*, *Selleneuve* & vici-
nis. Foliola obovata longa emarginata.

15. TRIFOL. spicis pilosis, calycibus patentibus, caule *stellatum*.
diffuso, foliolis cuneiformibus. *Linn. sp.* 769.

Trifolium spicis ovatis pilosis, denticulis calycinis
patentibus lanceolatis. *Sauv.* 184.

Trifolium stellatum purpureum *Monspeßulanum.*

Bot. Mons. 262. *Tour.* 405.

Le Trefle étoilé.

HABITAT à *Castelnau*, *Lavalette*, *Gramont*. Capitula
terminalia longè pedunculata. Bractæ ovatæ ob-
tusæ vaginantes connatæ.

16. TRIFOL. capitulis sessilibus ovatis, calycibus villo- *Scabrum.*
sis inæqualibus. *Linn. sp.* 770.

Trifolium spicis sessilibus lateralibus ovatis scabris.
Sauv. 183.

Trifolium minus villosum. *Barr. Icon.* 869. & 870.

Trifolium cujus caules ex geniculis glomerulos ob-
longos proferunt. *Bot. Mons.* 266.

Trifolium capitulo oblongo aspero. *Tour.* 406.

γ. *Trifolium capitulo spumoso aspero minus.* *Bot. Mons.*
267. *Tour.* 406.

HABITAT au chemin des prés d'Arene, à Laverune,
& cum priori. A Boutonet. Foliola obversè ovata
serrulata, glabra duriuscula, ut folia myrti.

17. TRIFOL. capitulis terminalibus, corollarum vexillis *Montanum.*
subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis ferratis.

Linn. sp. 770.

Trifolium montanum album. *Bot. Mons.* 261. *Tour.*

405.

HABITAT à *Grabels*, *Valene*, *Rouquet*, *Lamalou*. Tota
planta glaberrima. Foliola ad basim integerrima,
emarginata.

* *Vesicaria calycibus inflatis ventricosis, foliolis sessilibus.*

Spumosum. 18. TRIFOL. spicis ovatis, calycibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis. *Linn. sp. 771.*

Trifolium spicis densis quasi radicatis humi appressis. *Sauv. 183.*

Trifolium fragiferum majus & minus. *Barr. Icon. 851. & 852.*

HABITAT in ambulacris. *Sur le Perou, à l'Esplanade, à Caunelles, Castelnau.* Foliola glaberrima suborbiculata emarginata, serraturis vix conspicuis. Pedunculi foliis longiores sesquiunciales vel biunciales. Bracteæ ovatæ parvæ acuminatae.

Resupinatum 19. TRIFOL. spicis subovatis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulis prostratis. *Linn. sp. 771. Sauv. 183.* absque synonymia.

Trifolium pratense folliculatum. *Bot. Mons. 263.* *Tour. 404.*

HABITAT ad mare. *A Villeneuve, Perauls, Cette.* *Tomentosum.* 20. TRIFOL. capitulis sessilibus globosis hirsutis, calycibus inflatis reflexis. *Linn. sp. 771.*

Trifolium calycibus inflatis obtusis. *Sauv. 175.*

Trifolium fragiferum tomentosum. *Bot. Mons. 265.* *Icon. Tour. 406.*

Trifolium luteum capite rotundo. *Barr. Icon. 864.* Ad hanc speciem rectius pertinet quam ad trifolium *capite spumoso laevi.* *B. Pin.*

Fragiferum. 21. HABITAT à *Viols, Grabels & vicinis.*

TRIFOL. capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. *Linn. sp. 774.*

Trifolium capitulis subrotundis. 8. *Sauv. 175.*

Trifolium fragiferum frisicum. *Bot. Mons. 265.* *Tour. 406.*

HABITAT cum priori, & à *Gramont, Salaison,* ad dexteram.

* *Lupulina vexillis corollæ inflexis.*

Agrarium. 22. TRIFOL. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. sp. 772.* *Sauv. 183.*

Trifolium pratense luteum capitulo lupuli sive agrarium. *Bot. Mons.* 262. *Tour.* 404.

HABITAT in pratis. Foliola subcordata, vel orbiculata, ad basim integerrima, impari petiolato. Stipulae minimae.

23. TRIFOL. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Montanum.*
Linn. sp. 772.

Trifolium montanum lupulinum. *Tour.* 406.

Lotus montanus aureus amplio lupuli capitulo. *Barr.*
Icon. 1024.

HABITAT *au mont St. Loup, à Valene.* Foliola ovalia obtusa ad basim integerrima, glaberrima. Stipulae longae lanceolatae acutae.

L O T U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 710.

Char secund. Rad. tenuis simplex, debilis vel lignosa ramosa. Caul. teres ramosa, herbacea vel fruticosa. Fol. alterna petiolata ternata: foliolis æqualibus integerrimis sessilibus. Flor. axillaris pedunculata, nunc solitaria, nunc capitata vel capitato-dimidiata. Fulc. stipulae geminæ foliaceæ solutæ, foliolis subæquales. Bractea sæpius triplex foliacea in apice pedunculi, floribus subiecta (in unâ specie nulla.)

* *Leguminibus rarioribus nec capitulum constitutentibus.*

1. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadangulatis, bracteis lanceolatis. *Linn. sp. 775.* *Sauv.* 188. foliis floralibus lanceolatis. *Maritima.*

Lotus maritima lutea siliquosa, folio pingui glabro.
Bot. Mons. 165. Tour. 403.

2. Lotus siliquosa cytisi facie. *Barr. Icon. 1031.*

HABITAT ad mare, & à Castelnau le long de la riviere. Glabra aut hirsuta. Pedunculi foliis triplo longiores. Bracteæ longitudine calycum, intermedia longiore. Foliola obversè ovata. Stipulae ovatae adnatæ. Legumina foliolis duplo longiora.

- Conjugata.* 2. LOTUS leguminibus conjugatis membranaceo-quadrangulis, bracteis oblongo-ovatis. *Linn. sp. 774.*
HABITAT à Salaison, Montferrier, Prades.
- Siliquosa.* 3. LOTUS leguminibus solitariis quadrangulis, caulis procumbentibus, foliis hirsutis. *Linn. Syst. 1178.*
Lotus leguminibus solitariis rectis teretibus terminibus, caule erecto. Sauv. 189. Linn. sp. 774. erecta.
nº. 4.
Lotus pratensis siliquosus minor & mollior. Tour. 403.
Lotus pratensis siliquosa lutea. Bot. Mons. 165.
HABITAT in pratis.
- Peregrina.* 4. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus. *Linn. sp. 774. Sauv. 188.*
HOSPITATUR sub dio. Pedalis. Folia pinguia glabra.
Flores stipulis triplo minores. Pedunculi foliis longiores. Corollæ magnitudine ferè calycum, dilutè roseæ. Legumina immatura cylindrica, matura verò compressa. Bractea media longior.
- Angustifolia.* 5. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis. *Linn. sp. 774.*
Lotus leguminibus sèpius ternatis linearibus strictis erectis. Sauv. 188.
Trifolium corniculatum minus pilosum. B. Prod.
nº. 21.
Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliqua angustissima.
Bot. Mons. 164. Tour. 403.
HABITAT à Gramont, Mauguio, à la source du Lés.
Pedunculi foliis æquales sèpius uniflori. Bractæ quandoque solitariæ. Foliola & stipulæ ejusdem magnitudinis.
- Ornithopo-*
dioides. 6. LOTUS leguminibus subquinatis arcuatis compressis, caulis diffusis. *Linn. sp. 775.*
Lotus leguminibus arcuatis subquinatis. Sauv. 188.
Lotus siliquis ornithopodii. Tour. 403.
HOSPITATUR sub dio. Cauliculi debiles. Foliola subcuneiformia acuminata; stipulæ triplo minores. Pedunculi foliis longiores. Bractæ corollis majores. Legumina pedunculis longiora stylo terminata.
- Jacobaeus.* 7. LOTUS leguminibus subternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus. *Linn. sp. 775.*
Le Lotier de St. Jacques.
HOSPITATUR sub dio. Apud nos fruticulus semper-

virens. Stipulæ foliolaque lanceolato-linearia. Pedunculi foliis æquales. Vexillum corollæ atropurpureum uti & alæ; carina lutescens alis paulo longior. Legumina teretia.

* *Pedunculis multifloris in capitulum.*

8. LOTUS capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Linn. sp. 775. Sauv. 188.* *Hirsuta.*

Lotus pentaphyllos siliquosus villosus. *Bot. Mons. 165. Tour. 403.*

Lotus hemorrhoidalis. *Tour. 403.*

Le Lotier ou Trefle hémorroidal.

HABITAT juxta amnem. Folia sessilia stipulis æqualia. Flores 7. vel 9. Stipulæ floribus æquales lanceolatæ. Calyces superne rubri; lacinia inferiore longiore. Vexillum helvulum. Alæ albidæ; carina apice nigricans.

9. LOTUS capitulis subglobosis, caule erecto angustato, leguminibus rectis glabris. *Linn. sp. 775.* *Recta.*

Lotus caule fruticoso florùm capitulis globosis. *Sauv. 188.*

Lotus siliquosus glaber flore rotundo. *Bot. Mons. 166.*

Lotus altissimus flore glomerato. *Tour. 403.*

Lotus coronatus latifolius siliquis nigris. *Barr. Icon. 544.*

HABITAT cum priori. Altitudo humana. Foliola obversè ovata acuminata. Stipulæ subcordatae foliolis duplo minores. Pedunculi foliis longiores. Bractæ minimæ, à capitulo remotæ. Legumina longitudine stipularum.

10. LOTUS capitulis depresso, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis. *Linn. sp. 775.* *Corniculata.*

Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus teretibus. *Sauv. 188.*

Lotus corniculata & hirsuta minor. *Tour. 403.*

Lotus corniculata glabra & hirsuta minor. *Bot. Mons. 164.*

8. Lotus pentaphyllos tenuissimis glabris foliis. *Bot. Mons. 164. Sauv. 189.*

HABITAT à Castelnau, Lavalette, au Martinet de Mr. Alut.

11. LOTUS capitulis ebracteatis, foliolis stipulisque *Dorycnium.*

sessilibus æqualibus lanceolato-linearibus.
Lotus capitulis aphyllis, foliolis sessilibus quinatis.
Linn. sp. 776.
Dorycnium foliis sessilibus digitatis. *Sauv. 214.*
Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulo congestis. *Bot. Mons. 267.*
Dorycnium Monspeliensium. *Tour. 391.*
HABITAT à la Colombiere, Lavalette, Laverune, la Peissine. Pedunculi longissimi stricti rigidi. Bractæ sæpius nullæ vel unica minima in medio pedunculi. Flores albi minimi. Carina nigricans.

TRIGONELLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 724.*
Char. secund. *Rad. simplex* vel *ramosa*. *Caul. herbacea ramosa*, repens vel erecta. *Fol. alterna petiolata ternata*, foliolis integris, impari petiolato. *Flor. axillaris nunc solitaria vel aggregata sessilis nunc pedunculata subracemosa*. *Fulc. stipulæ geminæ adnatæ.*

Polyceratia. 1. TRIG. leguminibus pedunculatis sessilibusque congestis erectis rectis parallelis linearibus. *Linn. sp. 777.*

Trigonella leguminibus subsessilibus congestis erectis subrectis longis. *Linn. Syst. 1179.*

Medicago leguminibus sessilibus confertis. *Sauv. 187.*
Fœnum græcum sylvestre alterum polyceratum. *Bot. Mons. 99.* *Tour. 409.*

HABITAT à Rautonet, Caunelles.

Monspeliacæ. 2. TRIG. leguminibus congestis sessilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus. *Linn. Syst. 1180.*

Trigonella leguminibus congestis pedunculatis declinatis subfalcatis, pedunculo communi inermi foliis longiore. *Linn. sp. 777.*

Medicago leguminibus confertis sessilibus arcuatis inclinatis. *Sauv. 187.*

Fœnum græcum sylvestre siliquis pluribus. *Tour. 402.*
HABITAT circè Urbem, & cum priori. Foliola obcordata, aut cuneiformia.

Fœnum græcum. 3. TRIG. leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis & acuminatis. *Linn. sp. 777.*

Trigonella leguminibus sessilibus. *Sauv.* 187.

Fœnum græcum sylvestre. *Bot. Mons.* 98. *Tour.* 409.

Le Fenu Grec.

HABITAT in arvis, *au près Darenne, à Lamousson, Castelnau.* Foliola cuneiformia ad apicem ferrulata. Legumina foliolis longiora.

4. TRIG. leguminibus pedunculatis congestis declinatis *Corniculata.* falcatis compressis, pedunculo communi longo subspinoso, caule erecto. *Linn. Syst.* 1180.

Trifolium (corniculatum) floribus spicatis, leguminibus nudis mucronatis falcatis declinatis. *Linn. sp.* 766.

Fœnum græcum sylvestre meliloti facie. *Tour. cor.* 28.

HOSPITATUR sub dio. Foliola apice denticulata obcordata. Stipulæ minutissimæ. Pedunculi foliolis triplo longiores. Corollæ luteæ odoratissimæ incumbentes.

M E D I C A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 725.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex perpendicularis vel repens. *Caul.* herbacea teres ramosa, *Fol.* alterna petiolata ternata, foliolis integris, impari petiolato; (in unâ specie impari-pinnata: foliolis integris sessilibus.) *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisvè aut racemiferis. *Fulc.* stipulæ geminæ adnatæ integræ. Filum pedunculos terminans. (Spinulæ suprà fructum in quibusdam. Bractea in apice pedunculi in unâ specie.)

1. MEDIC. leguminibus reniformibus margine dentatis, *Radiata.* liis ternatis. *Linn. sp.* 778.

Medicago annua trifolii facie. *Tour.* 412.

Lunaria radiata Italorum. *Lob. Icon.* 38.

HOSPITATUR sub dio. Foliola obcordata apice denticulata.

2. MEDIC. leguminibus reniformibus margine dentatis, *Circinnata.* foliis pinnatis. *Linn. sp.* 778.

Medicago vulnerariæ facie Hispanica. *Tour.* 412.

Anthyllis lunaria flore luteo. *Barr. Icon.* 576.

HOSPITATUR sub dio. Caulis humifusus. Folia pin-

nata foliolis s^epiùs quinque integerrimis, impari maximo obovato. Pedunculi foliis longiores subquadriflori, bractea ovata floribus majore, terminati.

Sativa. 3. MEDIC. pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule glabro erecto. *Linn. sp.* 778.

Medicago major erectior floribus purpureis. *Tour.* 410.

Medicago sativa pedunculis laxè spicatis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Sauv.* 186.

La Luserne; vernaculè *la Luserna*.

HABITAT in arvis. Racemi foliis duplo longiores, foliola ovalia vel ovali-lanceolata ad apicem ferrulata.

Falcata. 4. MEDIC. pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Linn. sp.* 779.

Medica sylvestris flore croceo. *Tour.* 410.

Trifolium sylvestre luteum siliquâ cornutâ. *Bot.* *Mons.* 271.

Autre Luserne.

HABITAT cum priori.

Lupulina. 5. MEDIC. spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *Linn. sp.* 779. *Sauv.* 185.

Melilotus capsulis reni similibus in capitulum congestis.

Tour. 407.

Trifolium pratense luteum. *Bot. Mons.* 262.

HABITAT cum prioribus & aux prés d'Arene. Foliolis suborbiculatis; vel radicalibus obcordatis, summis subovalibus. Stipulæ subintegerrimæ acuminatæ ovatæ. Pedunculi subquadriflori.

Marina. 6. MEDIC. pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. *Linn. sp.* 779. *Sauv.* 186.

Trifolium cochléatum marinum tomentosum. *Bot.* *Mons.* 779.

Medica marina. *Tour.* 410.

La Luserne de mer.

HABITAT ad littora maris. Foliola obcordata vel cuneiformia integerrima. Stipulæ integerrimæ. Pedunculi foliis duplo longiores.

Pelymorpha. 7. MEDIC. leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Linn. sp.* 779.


- a. *Medicago leguminibus solitariis cochleatis inermibus Cribicularis.*
compressis planis, stipulis ciliatis, caule diffuso.
Linn. Syst. 1180. Sauv. 186.
- Trifolium cochleatum vel scutellatum, fructu latoire,*
folio minuto obtuso. Bot. Mons. 267.
- Medica orbiculata. Tour. 410.*
- b. *Medicago cochleata major dicarpos, capsula rotunda Scuteliata.*
globosa scutellata. Linn. sp. 779.
- Trifolium cochleatum fructu latoire. Bot. Mons. 267.*
- Medica scutellata. Tour. 410.*
- Medicago leguminibus cochleatis, stipulis dentatis,*
caule diffuso. Sauv. 186.
- c. *Medicago fructu turbinato. Sauv. 187.*
- Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu com-* Turbinata.
presso oblongo. Bot. Mons. 268.
- Medica magna turbinata. Tour. 410.*
- d. *Medica cochleata spinosa major dicarpos, capsula Intertexta.*
spinis longioribus sursum & deorsum tendentibus.
M. Linn. sp. 780.
- e. *Medica cochleata minor annua polycarpos, cap-* Arabica.
sula majore alba, folio cordato macula fusca. M.
Linn. sp. 780.
- Trifolium cochleatum folio cordato maculato. Bot.*
Mons. 268.
- Medica echinata glabra cum maculis fuscis. Tour. 410.*
& sine maculis Tour. ibid.
- ζ. *Medicago fructu minimo coronulam utrinque denta-* Coronata.
tam referente. Sauv. 187.
- Medicago folliculis coronæ similibus. Bot. Mons. 269.*
- Medica coronata Cherleri parva. Tour. 411.*
- η. *Medicago leguminibus congestis globosis hispidis, Ciliaris.*
stipulis ciliatis. Sauv. 187.
- Trifolium fructu cochleato ciliari. Bot. Mons. 269.*
- Medica annua fructu ciliari. Tour. 410.*
- θ. *Medicago leguminibus solitariis globosis brevissimè Hirsuta.*
echinatis, stipulis serratis. Sauv. 186.
- Medica echinata hirsuta. Tour. 410.*
- Trifolium arvense echinatum. Bot. Mons. 271.*
- ι. *Medicago triphylla, leguminibus cochleatis spinosis, Rigidula.*
foliolis inferioribus cuneiformibus retusis, superio-
ribus subrotundis. D. Linn. sp. 780.
- Medica hirsuta echinata, echinis rigidioribus. Tour.*
401.

Medicago fructu compresso spinis horrido. Bot. Mons. 268.

Laciniata. n. *Medicago fructu echinato, foliis linearibus dentato-pinnatifidis. Sauv. 187.*

Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissectis. Bot. Mons. 271. Icon. 270.

HABITAT in arvis & pratis.... ♂. à *Lavalette*, au *Terrail*.... ♀. à *la Peissine* & in Urbis fossis.... ♀. à *la Colombiere*, *Montferrier*. Folia emarginata denticulis utrinque duobus longioribus instructa. Pedunculi subbiflori foliis breviores. Stipulae profundè laciniatæ. Filum terminans pedunculos, longitudine calycum.



Classis XVIII.

POLYADELPHIA *ICOSANDRIA.*

C I T R U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 735.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea:

Fol. alterna pétiolata simplex subintegerrima.

Flor. pedunculata aggregata subterminalis. *Fu'c.*

nulla. (Aculei in caule, ubi species incultæ & neglectæ, depravatæ & quasi degeneres evaserunt.)

1. CITRUS petiolis linearibus. *Linn.* sp. 782. *Sauv.* 60. *Medicis*:
Citrum vulgare. *Tour.* 521.

B. Limon vulgaris. *Tour.* 521.

Le Citronier, le Limonier; vernaculè *lou Citroun, las Limounas.*

HOSPITATUR in hybernaculo:

2. CITRUS petiolis alatis. *Linn.* sp. 782. *Sauv.* 60.

Aurantium acri medulla. *Tour.* 620.

Les Orangers, les Chinois; vernaculè *l'Irangé, lou Chinois.*

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.

P O L Y A N D R I A.

H Y P E R I C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 636.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa, teres val angulata. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima *Fo'*. axillaris & terminalis pedunculata: pedunculis simplicibus vel ramosis, unifloris multiflorisvè. *Fulc.* glandulæ in quibusdam ad margines foliolorum calycis.

* *Trigyna.*

- Androfa.* 1. HYPER. floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti. *Linn. sp.* 784.
Androsænum maximum frutescens. Bot. Mons. 19.
Tour. 251.
Hypericum... foliis ovatis pedunculo longioribus. Sauv. 149.
La toute Saine.
HABITAT à la Serane, au Capouladou. Folia maxima. Flores terminales sæpius quinque vel 7. subumbellati.
- Hircinum.* 2. HYPER. floribus trigynis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso ancipiti. *Linn. sp.* 784.
Sauv. 150.
Hypericum fœtidum frutescens. Tour. 255.
HOSPITATUR sub dio. Variat caule ramisque teretibus. Pedunculi axillares, foliis breviores subquadriflori. Petala linear-lanceolata.
- Quadrangul.* 3. HYPER. floribus trigynis, caule quadrato herbaceo.
lum. *Linn. sp.* 785. *Sauv.* 149.
Afcyron. Bot. Mons. 30.
Hypericum afcyron dictum caule quadrangulo. Tour. 255.
HABITAT à Lamalou, Lamousson, Laverune. Folia ovata. Flores terminales subcorymbosi. Petala exigua. Altitudo tripedalis.
- Perforatum.* 4. HYPER. floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. *Linn. sp.* 785.
Hypericum vulgare. Bot. Mons. 135. *Tour.* 254.
Le Millepertuis.
HABITAT in arvis, fossis. A Selleneuve & circà Urbem.
- Hirsutum.* 5. HYPER. floribus trigynis: calycibus serrato glandulosis, caule erecto, foliis ovalibus. *Linn. sp.* 786.
Hypericum elegantissimum non ramosum foliolato. Tour. 255.
Androsænum glabrum non ramosum. Bot. Mons. 20.
HABITAT à Lesperou, au mont Saint Loup. Caulis teres hirsutus. Folia glaberrima. Pedunculi oppositi axillares, subquinqueflori foliis breviores. Flores terminantes conferti. Bracteæ duæ foliaceæ oppositæ, floribus æquales.
- Temnosom.* 6. HYPER. floribus trigynis: calycibus serrato-glandu-

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 403

losis, foliis subovatis hirsutis. *Linn. sp. 786.*

Hypericum supinum tomentosum minus & Mons-
peliacum. *Bot. Mons. 135. Tour. 255.*


Hypericum floribus trigynis, calycum ferraturis ca-
pitatis. *Sauv. 149.*

HABITAT à *Boutonet*, *Lattes*, *Selleneuve*. Caulis te-
res. Rami teretes subdichotomi. Bracteæ setaceæ.

7. HYPER. floribus trigynis : calycibus serrato-glandu- *pulchrum*,
losis, foliis cordatis glabris. *Linn. sp. 786.*

Hypericum minus erectum. *Tour. 255.*

HABITAT à *Lesperou*. Folia quandoque obtusa.



Classis XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 749.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessili-amplexicaulis, simplex integerrima vel integra vel incisa. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata.

Fulc. nulla. (Pili rigidi in paucis.)

Pratense. 1. TRAGOP. calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Linn. sp.* 789.

Tragopogon calycibus florem luteum superantibus, foliis gramineis. *Sauv.* 82.

Tragopogon pratense luteum majus. *Bot. Mons.* 259.
Tour. 477.

Barbe de bouc.

HABITAT in pratis. *A Gramont, Castelnau.* Folia glaberrima ovato-acuminata.

Porrifolium. 2. TRAGOP. calycibus corollæ radiis longioribus, foliis strictis integris, pedunculis superne incrassatis. *Linn. sp.* 789.

Tragopogon calycibus florem purpuro-cæruleum superantibus, foliis gramineis. *Sauv.* 82.

Tragopogon purpuro-cæruleum porri folio, quod Artifi vulgo. *Bot. Mons.* 259. *Tour.* 477.

Le Salsifis; vernaculè lou Sarsifi.

HABITAT cum priori.

Dalechampii. 3. TRAGOP. calycibus corolla brevioribus inermibus, foliis lyrato-sinuatis. *Linn. sp.* 790. *Sauv.* 295.

Hieracium magnum Dalechampii. *Tour.* 470.

Hieracium dentis leonis folio cichoraceo tomentoso.
Bot. Mons. 58.

HABITAT in arvis & pratis. Folia summa sæpius integerrima. Pedunculi superne incrassati. Variat foliis omnibus lanceolatis.

4. TRAGOP. calycibus corolla brevioribus aculeatis, *Picroides*,
foliis pinnato-hastatis. *Linn. sp.* 790.
Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis inermibus
hastato-sinuatis. *Sauv.* 295.
Sonchus asper laciniatus creticus. *Bot. Mons.* 244.
Tour. 474.
HABITAT à *Lavalette*, *Lacolombiere*. Altitudo semi-
pedalis. Tota planta pilis rigidis exasperata. Pedun-
culi supernè crassiores. Nervi foliorum quandoque
aculeati.
5. TRAGOP. calycibus corolla brevioribus hispidis, fo-
liis integris, caulinis oblongis. *Sauv.* 82. *Linn. sp.*
790.
Sonchus asper folio subrotundo. *Bot. Mons.* 244.
Sonchus asper non laciniatus dipsaci vel lactucæ folio.
Tour. 474.
HABITAT cum priori, & à *Prades*; au *Terrail*. Altitudo
sæpius biuncialis, raro major. Folia ovata,
lanceolata vel ovato-oblonga, quatuor vel quinque
in eodem caulinulo.
6. TRAGOP. calycibus corollæ radio longioribus, foliis *Crocifolium*,
integris : radicalibus pedunculisque basi villosis.
Linn. Syst. 1191.
Tragopogon purpuro-cæruleum *crocifolium*. *Bot.*
Mons. 307. *Tour.* 407.
HABITAT entre *Lamalou* & *Fougeres*; & à *la Louzere*.

SCORZONERA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 748. *Add*
squamæ calycinæ inferiores cordatæ.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* teres her-
bacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis,
simplex integra vel incisa. *Flor.* terminalis pe-
dunculata solitaria. *Fulc.* nulla (in quibusdam
squamæ vagæ cordatæ, suprà caulem & pedun-
culos.)

1. SCORZ. caule ramoso, foliis amplexicaulibus inte- *Hispanicæ*,
gris ferrulatis. *Linn. sp.* 791.
Scorzonera caule ramoso, foliis amplexicaulibus un-
dulatis. *Sauv.* 82.
Tragopogon Hispanicum sive *scorzonera*. *Bot. Mons.*
260.

Scorzonera latifolia sinuata. *Tour.* 476.

La Scorsonere.

HABITAT à *Viols*, *Grabels*. Folia radicalia sæpe lanceolata subintegerrima.

Angustifolia. 2. SCORZ. foliis subulatis integris, pedunculo incrassato, caule basi villoso. *Linn.* sp. 791.

Scorzonera angustifolia prima. *Tour.* 476.

HABITAT au bois de *Valene*, à *Valmagne* ubi variat caule toto lanato simplicissimo. Folia graminea angustissima longa, radicalia caulem adæquant. Squamæ calycinæ petalis æquales.

Laciniata. 3. SCORZ. foliis linearibus dentatis. *Linn.* sp. 791.

Scorzonera foliis laciniatis. *Sauv.* 692. *Tour.* 477.

Tragopogon tenuissimè laciniatum. *Bot. Mons.* 259.

Tragopogon resedæ minoribus foliis. *Barr. Icon.* 799.

HABITAT ad margines agrorum, circa Urbem.

Picroides. 4. SCORZ. foliis superioribus amplexicaulibus integerimis, inferioribus lyratis. *Linn.* sp. 792. pedunculis squamosis. *Syst.* 1192.

Chondryllis affinis quædam laciniata. *Bot. Mons.* 64.

Sonchus lœvis angustifolius. *Tour.* 475.

Sonchus lœvis Matthioli. *Lob. Icon.* 236.

Crepis folio lœviter dentato. *Sauv.* 81.

Vernaculè la Terra grépie.

HABITAT in arvis. Variat foliis radicalibus linearibus, caulinis subulatis denticulatis. Caulis sæpius simplex.

P I C R I S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 745.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis amplexicaulis simplex integra vel incisa. *Flor.* terminalis solitaria pendulata. *Fulg.* pili rigidi in tota planta. (Bracteæ in una specie calycem singulum cingentes, subquaternæ, magnitudine calycis, foliaceæ ovatæ.)

Echinoïdes. 1. PICRIS perianthiis involucro maximo cinctis. *Linn.* sp. 792. *Sauv.* 82.

Hieracium echinoïdes capitulis cardui benedicti. *Bot. Mons.* 131. *Tour.* 470.

HABITAT à *Selleneuve*, *Gramont*. Altitudo bipedalis. Folia inferiora longa sinuato-dentata.

2. PICRIS perianthiis imbricatis ebracteatis. *Linn.* sp. *Hieracioides*,
792. *Sauv.* 82.

Hieracium asperum majori flore è limitibus agrorum.
Bot. Mons. 131. *Tour.* 469.

HABITAT in arvis & sterilibus circà *Castelnau*, *Salasson*, *Caunelles*. Folia summa nunc ovata integerima, nunc sinuata vel pinnato-pinnatifida.

S O N C H U S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 751.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea fistulosa ramosa. *Fol.* alterna sessili-amplexicaulis simplex integra vel inciso - pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata, pedunculis uni vel multifloris. *Fulg.* nulla. (In paucis pili rigidi suprà caulem & folia. In aliis squamæ suprà caulem pedunculosque) . . . lactescens alba.

1. SONC. pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis basi cordatis. *Linn.* sp. 793. *Arvensis.*

Sonchus calycibus pedunculisque hispidis, floribus congestis. *Sauv.* 300.

Sonchus repens, multis hieracium minus & majus. *Tour.* 474.

Hieracium minus folio sonchi vel hieracium sonchites. *Bot. Mons.* 127.

HABITAT à *Caunelles*, *Laverune*, *Selleneuve*, *Boutonet*, in arvis.

2. SONC. pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Oleraceus.* *Linn.* sp. 794.

Sonchus foliis lœvibus & teneris, calycibus glabris. *Sauv.* 300.

Sonchus lœvis laciniatus latifolius. *Bot. Mons.* 244. *Tour.* 474.

β. *Sonchus* foliis rigidiusculis ferratis, calycibus lœvibus. *Asper.* *Sauv.* 300.

Sonchus asper laciniatus & non laciniatus. *Bot. Mons.* 244. *Sonchus asper* foliis dentis leonis. *Tour.* 474. *Le Laitron*; vernaculè *la Lacheta*.

HABITAT cum oleribus.

3. SONC. pedunculis tomentosis, calycibus pilosis. *Linn.* *Tenerimus.* *sp.* 724. *Cc* iiiij

Sonchus lœvis in plurimas & tenuissimas laciniis divisus. *Bot. Mons.* 245. *Tour.* 475.

HABITAT circâ Urbem.

Alpinus. 4. SONC. pedunculis squamosis, floribus racemosis. *Linn.* sp. 794.

Sonchus floribus spicatis cœruleis, *Sauv.* 300.

Lactuca montana latifolia laciniata flore cœruleo. *Tour.* 474.

HABITAT à *Lespinouse* près de *Saint Pons*.

L A C T U C A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 739.

Char. secund. *Rœd.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessili-amplexicaulis simplex integra vel inciso pinnatifida. *Fior.* terminalis subpaniculata. *Fulc.* aculei in plurimis ad margines nervosque foliorum. *Squamæ* suprà pedunculos... lactescentia alba.

Sativa. 1. LACT. foliis rotundatis, caule corymboso. *Linn.* sp. 795.

Lactuca romana longa dulcis. *Sauv.* 83.

La Laitue; vernaculè *la Lachuga*.

HABITAT in hortis oleraceis.

Viresa. 2. LACT. foliis carina aculeatis dentatis. *Linn.* sp. 795.

Lactuca caule foliisque aculeatis. *Sauv.* 295.

Lactuca sylvestris odore viroso. *Bot. Mons.* 148. *Tour.* 473.

Lactuca foliis verticalibus carina aculeatis. *Linn.* Syft. 1193.

Laciniata. 3. *Lactuca* foliis costa aculeatis pinnatifidis. *Sauv.* 295.

Lactuca sylvestris folio laciniato dorso spinoso. *Bot. Mons.* 148. *Tour.* 473.

HABITAT à *Castelnau* juxtâ amnem. Altitudo humana. *Caulis* albicans glaberrimus. *Folia* ciliato-spicosa.

Saligna. 3. LACT. foliis hastato - linearibus sessilibus carina aculeatis. *Linn.* sp. 796.

Lactuca foliis imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus basi hastatis dorso ferratis. *Sauv.* 642.

Lactuca sylvestris angusto & laciniato. folio. *Bot. Mons.* 298. *Tour.* 474.

HABITAT in maritimis.

4. LACT. foliis linearibus dentato-pinnatis, laciinis sursum dentatis. *Linn. sp. 796. Sauv. 296.* *Perennis.*
Lactuca perennis humilior flore cæruleo. Tour. 473.
Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. Bot. Mons. 63.
HABITAT à *Lavalette*, *la Colombiere*, & vicinis saxosis. Altitudo sesquipalmaris, raro major. Folia summa quandoque subulata integerrima.

CHONDRILLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 740.*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea rigida*, basi ramosa. *o'. alterna sessilis, simplex, radicalis inciso-pinnatifida*, caulinis integerrima linearis graminea. *Flor. axillaris sessilis aggregata. Fulc. nulla. Laetescens alba.*

1. CHOND. *Linn. sp. 796. Sauv. 300.* *Juncea.*
Chondrilla juncea. Bot. Mons. 62.
Chondrilla juncea viscosa arvensis. Tour. 475.
La Condrie.
HABITAT ad agrorum margines. Altitudo sesquipedalis. Flores in alis foliorum tres quatuorve si. nul.

PRENANTHES.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 738.*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis amplexicaulis simplex integra vel incisa aut pinnatifida. For. axillaris pedunculata subpaniculata. Fulc. nulla, (quandoque squamæ supra pedunculos.)*

1. PREN. foliorum ramentis cauli adnatis. *Linn. sp. 797. viminea.*
Prenanthes foliorum laciinis extrorsum dentatis, ramentis foliaceis cauli & ramis adnatis. Sauv. 692.
Chondrilla viscosa caule foliis obducto. Bot. Mons. 63.
Lactuca viscosa, caule foliis obducto. Tour. 473.
HABITAT à *la Peissine*, *Selleneuve.*
2. PREN. flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. *Linn. sp. 797. Sauv. 109.* *Purpurea.*
Chondrilla sonchi folio, flore purpurascente major. Tour. 475.

HABITAT à *Lesperou*. Folia glaberrima sagittato - lanceolata.

Muralis. 3. PREN. flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis. *Linn. sp.* 797. *Sauv. 696.*

Chondrilla sonchi folio flore luteo pallecente. *Tour. 475.*

Sonchus alter folio profundè laciniato sinuato. *Bot. Mons. 244.*

HABITAT à *Valene*, à la Source du Lés; & quandoque circà urbem.

LEONTODON.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 747.*

Char. secund. *Rad. fusiformis vel bulbosa vel tuberosa fasciculata. Caul. scaposa uniflora fistulosa. Fol. radicalis attenuato-petiolata simplex pinnatifida. Flor. radicalis solitaria. Fulc. nulla, (in paucis squamæ supra pedunculos; in aliis pili rigidi etiam supra folia.)*

Taraxacum. 1. LEONT. calyce infernè reflexo. *Linn. sp. 798.*

Dens leonis vulgi sive urinaria. *Bot. Mons. 85.*

Dens leonis latiore folio. *Tour. 468.*

Taraxacum pinnis foliorum triangularibus. *Sauv. 297.*

2. Dens leonis latiore & rotundiore folio. *Bot. Mons. 85.* *Tour. 468.*

Dent de lion.

HABITAT in herbidis, pratis & arvis. Folia pinnatifida. & Folia ovalia latissima denticulata. Flores duplo maiores. Frequens in horti regii ambulacris.

Bulbosum. 2. LEONT. foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris, calycibus lœvibus, pedunculis hirtis. *Linn. sp. 798.*

Taraxacum calyce toto erecto subhirsuto, radice bulbosa. *Sauv. 297.*

Dens leonis tuberosa radice. *Tour. 468.*

Chondrilla pusilla maritima bulbosa. *Bot. Mons. 64.*

HABITAT ad mare, & à *Laverune*, *Selleneuve*, *Salanson*, & à *Montferrier*, secùs amnem. Folia attenuato-petiolata subspathulata.

Autumnale. 3. LEONT. calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis. *Linn. sp. 798.*

Hieracium chondrillæ folio, radice succisa majus, folio glabro. *Bot. Mons. 127.* *Tour. 470.*

Crepis foliis longis, dentibus linearibus, caule declinato. *Sauv.* 298.

Scorzonera foliis semi-pinnatis, caule penè nudo, pappo sessili. *Sauv.* 296.

Taraxacum calycibus erectis, foliis glabris dentatis integrerrimis. *Sauv.* 297.

HABITAT à *Lattes*, *Selleneuve*, *Salaison*, ad dextram in pratis.

4. LEONT. foliis dentatis hirsutis, calyce erecto acuto. *Tuberosum.*
Linn. sp. 799.

Dens leonis *Monspeliensium* asphodeli bulbulis. *Bot.*
Mons. 86.

Dens leonis asphodeli bulbulis. *Tour.* 468.

HABITAT cum prioribus. Frequens à *Salaison*, & à *Sembrés*, in pratis domini Romieu regiæ Societatis Scientiarum Socii, ubi variat foliis subtomentosis, scapo sesquipedali hirsutissimo, vel etiam foliis linearibus integrerrimis aut hastato-pinnatifidis.

5. LEONT. calyce toto erecto hispido, foliis dentatis integrerrimis hispidis, setis furcatis. *Linn. Syst.* 1194.

Dens leonis minor folio aspero. *Bot. Mons.* 86. *Tour.* 468.

Hieracium caule aphyllum, hirsutum. *Bot. Mons.* 130.

Dens leonis foliis hirsutis & asperis. *Tour.* 468.

6. *Crepis (nudicaulis)* foliis lanceolatis dentato-sinuatis hispidis, setis subulatis, scapo unifloro. *Linn. sp.* 805.

Hieracium dentis leonis folio, hirsutie asperum, minus laciniatum. *Bot. Mons.* 130.

Dens leonis foliis hirsutis & asperis saxatile. *Tour.* 468.

HABITAT cum priori & à *la Colombiere*. Altitudo palmaris.

6. LEONT. calyce toto erecto lœviusculo, foliis dentatis *Hirtum.* hirtis, setis simplicissimis. *Linn. Syst.* 1194.

Hieracium foliis triangulariter dentatis pilosis, calyce subhirsuto penè nudo. *Sauv.* 298.

Leontodon calyce erecto, foliis hispidis dentatis, dentibus integrerrimis. *Sauv.* 388.

Hieracium hirsutum parvum, caule aphyllum. *Bot.*
Mons. 131.

Dens leonis foliis minimis hirsutis & asperis. *Tour.* 469.

Dens leonis minimus asper. *Tour.* 469.

HABITAT cum priori, à *Lavalette*. Variat foliis ova-

tis integerrimis vel linearibus, scapo vix triunciali, raro palmari.

HIERACIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 741.

Char. secund. Rad. fusiformis vel ramosa, integerrima vel præmorsa, perpendicularis vel horizontalis stolonifera. Caul. nunc scaposa uniflora vel multiflora, nunc foliosa herbacea ramosa. Fol. simplex integerrima vel integra vel incisa, petiolata vel sessilis, radicalis vel caulina. Flor. pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve, radicalis aut caulina. Fulc. nulla.

* Scapo unifloro.

Hedypnoides. 1. HIERAC. foliis dentatis viscidis hirsutis subasperis, scapo unifloro, calyce hirto. Linn. sp. 800. Sauv. 298. Dens leonis foliis canescensibus villosis. Tour. 468. Hieracium montanum laciniatum lanuginoso folio. Bot. Mons. 298.

HABITAT à la Serane, Lamalou.

Alpinum. 2. HIERAC. foliis oblongis integris dentatis, scapo unifloro, calyce piloso. Linn. sp. 800.

HABITAT à Lespinouse, auprès de Lamalou. Scapus vix sesquiuncialis, ad apicem foliolo quandoque unico vago instructus. Variat foliis glabris vel pilosis ovatis. Radices funiculiformes fibrosæ.

Pilosella. 3. HIERAC. foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. Linn. sp. 800.

Hieracium ... foliis subtus tomentosis. Linn. syst. 1194.
Sauv. 14.

Pilosella major repens hirsuta. Bot. Mons. 204.

Dens leonis qui pilosella officinarum. Tour. 469.

La Piloselle, ou Greille de souris.

HABITAT juxta amnem, à Castelnau, à Gramont; & in herbidis juxta urbem. Folia incana subtus villosissima, calyces lanati.

* Scapo multifloro.

Dubium. 4. HIERAC. foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo multifloro. Linn. sp. 800. Sauv. 14.

Dens leonis qui pilosella folio minus villoso. *Tour.* 469.
 HABITAT in herbidis juxta *Caunelles*, *Gramont*, le
Terrail. Scapus ramosus. Rami tres quatuorve diva-
 ricati uniflori.

5. HIERAC. foliis ovatis subdentatis, scapo racemoso *Premorsum*.
 floribus superioribus primoribus. *Linn. sp.* 801.
Hieracium pilosellæ folio erectum majus. *Tour.* 471.
Pilosella major erecta. *Bot. Mons.* 204.
Hieracium foliis integerrimis, caule repente, scapo
multifloro. *Sauv.* 14.
 HABITAT *au bois de Gramont*, & *au Martinet près de*
Montferrier.
- * *Caule folioso.*

6. HIERAC. caule ramoso folioso, foliis radicalibus *Murorum*.
 ovatis dentatis, caulino minori. *Linn. sp.* 802. *Sauv.*
 100.
Hieracium murorum folio pilosissimo. *Bot. Mons.* 131.
Tour. 471.
8. Pulmonaria Gallorum rotundifolia lævior. *Barr. Ic.* 342.
La Pulmonaire.
 HABITAT à *Gramont*, *Castelnau*, *Lavalette*, *Selle-*
neuve. Folia subtus villosa atro-virentia.
7. HIERAC. caule erecto multifloro, foliis ovato-lan-
 ceolatis dentatis semi-amplexicaulibus. *Linn. sp.* 804. *sabaudum.*
Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. *Tour.* 472.
 HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis & major.
 Folia caulina conferta. Caulis subrubens.
8. HIERAC. foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus *Umbellatum*.
 subumbellatis. *Linn. sp.* 804.
Hieracium fruticosum angustifolium majus. *Bot. Mons.*
 131. *Tour.* 472.
Hieracium foliis lanceolato-linearibus obsoletè denti-
culatis sparsis. *Sauv.* 83.
Hieracium fruticosum latifolium dentatum glabrum.
Bot. Mons. 298.
 HABITAT à *Gramont*, *Salason*. Altitudo prioris. Folia
 caulina sæpiùs ovata, uno aut altero instructo den-
 ticulo.

C R E P I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 742.

Char. secund. *Rad. fusiformis vel ramosa. Caul.*

herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna sessilis simplex multifida. *Flor.* terminalis pedunculata ramosa. *Fult.* nulla, (in quibusdam bracteæ involucriformes, ad singulum calycem.)

Barbata. 1. CREPIS bracteis calyce longioribus, squamis setaceis sparsis. *Linn. sp.* 805.

Hieracium calycibus setis longissimis distantibus patentibus obvallatis. *Sauv.* 83.

Hieracium proliferum falcatum. *Bot. Mons.* 129.

HABITAT à Gramont, vers Mauguio. Folia glabra lanceolata dentata vel laciniata.

Rubra. 2. CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis, radicalibus sinuatis. *Linn. sp.* 806. *Sauv.* 299.

Hieracium dentis leonis folio, flore suavè rubente.

Tour. 469.

HABITAT au mont St. Loup, Prades, St. George.

Pulchra. 3. CREPIS foliis sagittatis dentatis, pedunculis superne turbinato-inflatis, calycibus pyramidatis. *Linn. Syst.* 1196. *sp.* 806.

Chondrilla hieracii folio annua. *Tour.* 238.

Hieracium pulchrum. *Bot. Mons.* 127.

4. Lapsana (*chondrilloides*) calycibus pyramidatis, seminis papposis, foliis oblongis subdentatis scabris. *Linn. sp.* 812. *Sauv.* 83.

HABITAT in arvis, à Gramont, Laverune; & circà urbem.

Biennis. 4. CREPIS foliis pinnato-hastatis scabris, basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Linn. sp.* 807.

Hirta. 5. Crepis (*hieracioides*) foliis variis subasperis, caule altissimo folioso & unifloro. *Sauv.* 299.

Crepis foliis hastato-lyratis, caule piloso. *Linn. sp.* 807.

Hieracium chondrillæ folio hirsutum. *Bot. Mons.* 127.

Tour. 470.

Glabra. 7. Crepis (*chondrilloides*) foliis variis glabris, caule ramosissimo. *Sauv.* 299.

Hieracium chondrillæ folio glabrum. *Tour.* 470.

HABITAT ad agrorum margines & in arvis, cum priori.

Fœtida. 5. CREPIS foliis pinnatis angulatis, petiolis dentatis. *Linn. sp.* 807. *Sauv.* 298.

Hieracium foliis cichorii sylvestris villosis, odore castorei. *Bot. Mons.* 129. *Icon.* 128.

Hieracium amygdalas amaras olens. *Tour.* 469.
HABITAT in limitibus agrorum. Folia profundè pinnatifida.

ANDRYALA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 743.

Char. secund. *Rad.* subsimplex. *Caul.* herbacea ramosa teres. *Fol.* alterna simplex integerrima, sessili-amplexicaulis. *Flor.* terminalis pedunculata fastigiata. *Fulc.* nulla.

1. ANDR. foliis integerrimis. *Linn. sp.* 808. *Sauv.* 83. *Integifolia.*
Tomentosis. *Syst.* 1196.

Sonchus villosus luteus major. *Bot. Mons.* 245.

Hieracium villosum sonchus lanatus Dalechampii.
Tour. 470.

HABITAT ad mare. Folia lanceolato-linearia.

2. ANDR. foliis dentato-hastatis. *Linn. sp.* 808. *Sinuata.*
Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integris.
Sauv. 696.

Andryala foliis lato-lanceolatis dentatis. *Linn. syst.*
1196.

HABITAT à Valene, & vicinis; à la source du Lés.

HYOSERIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 796.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* scaposa subsimplex vel foliosa herbacea ramosa. *Fol.* sessilis simplex integra vel pinnatifida, radicalis aut caulinis alterna. *Flor.* pedunculata terminalis solitaria. *Fulc.* nulla.

* *Scapo unifloro, simplici, vel ramoso.*

1. HYOS. scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Linn. sp.* 808. *Fœtidæ.*

Dens leonis tenuissimo folio. *Bot. Mons.* 86. *Tour.* 468.
HABITAT à Montferrier, Lavalette, Castelnau.

2. HYOS. scapis unifloris, foliis glabris lyrato-hastatis *Radiata,* angulatis. *Linn. sp.* 808.

Hyoseris foliis glabris hastato-pinnatis. *Sauv.* 300.

Dens leonis minor foliis radiatis. *Bot. Mons.* 295. *Tour.*
468.

HABITAT in pratis, à Villeneuve, & à la mer; à La-
verne. Facies erysimi. Radix præmorsa.

Minima. 3. HYOS. scapo diviso nudo. Linn. sp. 809. Sauv. 14.
Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro:
Tour. 470.

HABITAT in herbidis, à Caunelles, St. George. Cau-
liculi vix sesquiunciales. Folia oblonga sinuata:

* *Caule folioso.*

Hedypnois. 4. HYOS. fructibus subglobosis glabris, caule ramoso.
Linn. sp. 809.

Lapsana fructibus globosis glabris, seminibus disci ca-
lyculato-papposis. Sauv. 83.

Hieracium capitulum inclinans femine aduncum. B. Pin.
128. Bot. Mons. 129.

Hedypnois annua. *Tour.* 478.

HABITAT in sterilibus, au chemin de Lavalette, à
Castelnau; & cum priori: Pedunculi supernè incrassati-
tato-turbinati. Variat caule simplicissimo nudo, fo-
liisque lanceolatis integris aut pinnatifidis:

H Y P O C H Æ R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 744.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. scaposa vel
foliosa herbacea ramosa. Fol. simplex sessilis in-
tegra vel incisa, radicalis aut caulina. Flor. pe-
dunculata subsolitaria, radicalis vel caulina.
Fulc. nulla, (in unâ specie spinulæ supra ca-
lyces foliaque.)

Achyrophorus. 1. HYPOCH. calycibus æqualibus hispidis. Linn. sp. 810.
Sauv. 83.

Hypochæris foliolis calycinis æqualibus hispidis. Linn.
syst. 1196.

HOSPITATUR sub dio. Folia caulina sæpius ovata den-
tata. Pedunculi longi uniflori hispidae.

Maculata. 2. HYPOCH. caule subnudo, ramo solitario, foliis
ovato-oblongis integris dentatis. Linn. sp. 810.

Hieracium primum latifolium. Bot. Mons. 131.

Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore
magno. *Tour.* 472.

HABITAT à Lespinouse, Villemagne. Variat foliis pin-
natifidis.

3. HYPOCH.

3. HYPOCH. glabra, calycibus oblongis imbricatis, *Glabra*,
caule nudo, foliis dentato-sinuatis. *Linn. sp.* 811.
Sauv. 300.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro.
Tour. 471.

HABITAT in pratis, à *Lattes*, *Mauguio*.

4. HYPOCH. foliis dentato-sinuatis scabris, caule ra- *Radicata*,
moso nudo, pedunculis squamosis. *Linn. sp.* 811.
Sauv. 299.

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus. *Bot. Mons.*
130. *Tour.* 470.

Hypochæris caulibus ramosis nudis, foliis lyrato-
oblongis, radice granulosa. *Sauv.* 300.

HABITAT à *Castelnau*, *Lavalette*, secùs amnem.

L A P S A N A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 752.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea
ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel
pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata, pe-
dunculis unifloris aut multifloris. *Fulcr.* nulla.

1. LAPS. calycibus fructus angulatis, pedunculis tenui- *Communis*.
bus ramosissimis. *Linn. sp.* 811.

Lampsana. *Tour.* 479.

Soncho affinis lapsana domestica. *Bot. Mons.* 245.

HABITAT in humidis fossis. Altitudo tripedalis. Folia
lyrata, extimo subcordato sinuato. Florescentia pa-
niculato-subcorymbosa.

2. LAPS. calycibus fructus torulosis depresso-obtusis ses- *Zacintha*.
silibus. *Linn. sp.* 811.

Lapsana calycibus fructus subrotundis angulatis, pe-
dunculis incrassatis, floribus erectis. *Sauv.* 301.

Cichorium verrucatum, zacintha. *Tour.* 476.

HABITAT à *Lattes*, *Salaison*. Priori duplo minor.

3. LAPS. calycibus fructus undique patentibus, radiis *Stellata*.
subulatis, foliis lanceolatis indivisis. *Linn. sp.* 811.
Sauv. 82.

Hieracium siliqua falcata. *Bot. Mons.* 129.

Rhagadiolus alter Cæsalpini. *Tour.* 480.

HABITAT ad agrorum margines, circà urbem. Folia
sinuata, caulina subovata denticulata. Rami divari-

cati. Variat foliis inferioribus pinnatifidis. Pedunculi uniflori simplices etiam divaricati.

Capillaris. 4. LAPS. seminibus papposis, foliis radicalibus lanceolatis obtusis subdentatis, caulinis hastatis, caule filiformi. *Linn. sp.* 812.

Hieracium minus glabrum foliis eleganter virentibus.
Sauv. 298.

HABITAT *au bois de Gramont, vers Mauguio.*

Rhagadiolus. 5. LAPS. calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis, foliis lyratis. *Linn. sp.* 812.

Rhagadiolus lapsanæ folio. *Tour. cor. 36.*
HOSPITATUR sub dio.

CATANANCHE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 754.*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea teres subsimplex. Fol. alterna sessilis simplex integrifolia. Flor. pedunculata terminalis solitaria. Fulc. nulla.*

Cerulea. 1. CATAN. squamis calycinis inferioribus ovatis. *Linn. sp. 812.*

Chondrilla cærulea cyani capitulo. *Bot. Mons. 64.*

Catananche quorundam. *Tour. 478.*

β. Chondrilla cærulea sesamoides flore completo. *Bot. Mons. 64.*

Chondrilla cyanoides cærulea coronopi folio. *Barr. Icon. 1134.*

La Cupidone.

HABITAT in saxosis, à Montferrier, Lavalette, Gramont. Folia linear-lanceolata denticulo utrinque unico vel bino instructa.

Lutea. 2. CATAN. squamis calycinis inferioribus lanceolatis. *Linn. sp. 812. Sauv. 308.*

Chondrilla cyanoides lutea, folio non diviso. *Barr. Icon. 1135.*

Catananche flore luteo, latiore folio. *Tour. 478.*

HOSPITATUR sub dio. Folia lanceolata subtrinervia. Petala extus villosa, ut in priori.

CICHORIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 753.*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea ra-*

mosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra. *Flor.* pedunculata terminalis subramosa. *Fult.* nulla. (In unâ specie spinulæ in caule ad basim ramorum.)

1. CICHOR. caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *Linn.* *Intybus.*
sp. 813. *Sauv.* 301.
Cichorium caule simplici ramoso, floribus confertis, omnibus sessilibus. *Linn.* *Syst.* 1197.
Cichorium sylvestre seu Officinarum. *Bot. Mons.* 65.
Tour. 479.
La Chicorée; vernaculè, *la Chicouréa*.
HABITAT in hortis.
2. CICHOR. caule spinoso dichotomo. *Linn.* *sp.* 813. *Spinosum*:
Cichorium spinosum. *Tour.* 479.
Cichorium spinosum Imperati. *Barr. Icon.* 1159.
HOSPITATUR sub dio.

S C O L Y M U S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 750.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna decurrentis simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fult.* spinulæ ad margines foliorum.

1. SCOLYM. foliis margine attenuatis. *Linn.* *sp.* 813. *Maculatus*:
Scolymus chrysanthemos annuus. *Bot. Mons.* 233.
Tour. 480.
HABITAT à *Lamalou*, *Villemagne*, *Fougeres*.
2. SCOLYM. foliis margine incrassatis. *Linn.* *sp.* 813. *Hispanicus*.
Scolymus Theophrasti. *Bot. Mons.* 233. *Tour.* 480.
Sauv. 294.
L'Epine jaune; vernaculè, *lous Cardouffés*.
HABITAT ad margines viarum & agrorum. *Caulis* sesquipedalis ramosus villosus. *Folia* subtus villosa.

E C H I N O P S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 759.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis peduncu-

lata capitata. *Fulc.* spinulæ supra serraturas foliorum.

- Spherocephala*. 1. ECHIN. calycibus unifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis. *Linn. Syst.* 814.
bus. Echinops floribus capitatis, calyculis unifloris. *Sauv.* 293.
Echinops major. *Tour.* 463.
Carduus spherocephalus latifolius albus. *Barr. Ic.* 143.
HABITAT copiosè circa Moletrinas. Folia subtus tomentosa.
- Ritro. 2. ECHIN. calyculis unifloris, caule unicapitato. *Linn.*
sp. 815.
Echinops caule subunifloro. *Sauv.* 293.
Echinopus minor. *Tour.* 463.
Carduus spherocephalus cæruleus minor. *Bot. Mons.*
50. Barr. Icon. 411. 412.
HABITAT ad lævam à *Salaison.* Vix palmaris.

A R C T I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 760.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* ramea axillaris solitaria. *Fulcr.* nulla.

- Lappa.* 1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. *Linn.*
sp. 816.
Arctium capitulis majoribus. *Sauv.* 118.
Lappa major seu arctium Dioscoridis. *Bot. Mons.*
150. Tour. 450.
La Bardane ; vernaculè , de Lappetas.
HABITAT à *Castelnau, Gramont, Perauls & circa urbem.*

S E R R A T U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 761.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata, solitaria vel thyrsoideo - spicata. *Fulc.* spinulæ in plurimis ad margines foliorum.

- Babilonica.* 1. SERRAT. foliis tomentosis subintegerrimis, radica-

libus subcuneiformibus planis, caulinis decurrentibus concavis, floribus thyrsideo-spicatis.

- β. Serratula foliis tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis decurrentibus, floribus thyrsodeis. *Linn. Syst.* 1199.

Jacea Babilonica. Bauh. Prod. 129.

Jacea latissimo folio laciniato. Bauh. Pin. 272. *Tour.* 441.

HOSPITATUR sub dio. Caulis tomentosus humanam superans altitudinem, saepius simplicissimus. Folia in petiolum attenuata saepius integerrima. Florum thyrsus longissimus subspicatus. Pedicelli brevissimi sub4flori.

2. SERRAT. foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima. *Linn sp.* 816. *Tinctoria.*

Jacea quæ serratula vulgo. Tour. 444.

Serratula. Bot. Mons. 239. foliis pinnatifidis. *Sauv.* 239.

HABITAT ad mare, & à Perauls, Medasen, Manguio. Laciniæ foliorum dentato-spinosæ.

3. SERRAT. foliis dentatis spinosis. *Linn. sp.* 820. *Sauv. Arvensis.* 292.

Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis margine aculeatis. Sauv. 79.

Carduus vinearum repens sonchi folio. Bot. Mons. 49.

Cirsium arvense sonchi folio, radice repente, flore purpurascente. Tour. 448.

Vernaculè las Caoussides.

HABITAT in toto agro Monspessulano. Vitium in vineis & arvis.

C A R D U U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen pl.* 763.

Char. secund. Rad. ramosa vel tuberosa. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis decurrens vel amplexicaulis, simplex integra vel pinnatifida. For. terminalis pedunculata : pedunculis unifloris vel multifloris. Falc. spinulæ ad margines foliorum.

* *Foliis decurrentibus.*

1. CARD. foliis decurrentibus hastato-pinnatis spinosis, lanceolatis, laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Linn. sp.* 821. *Lanceolatus.*

Carduus foliis sinuatis decurrentibus, denticulis superficieque spinosis, capitulis turbinatis. *Sauv.* 291.

Carduus lanceolatus latifolius. *Tour.* 440.

Carduus lanceolatus sive sylvestris. *Bot. Mons.* 49.

HABITAT in arvis & viis.

Nutans. 2. CARD. foliis spinosis semidecurrentibus, floribus cernuis, squamis calycinis superne patentibus. *Linn.* sp. 821. *Sauv.* 290.

Carduus nutans. *Bot. Mons.* 49. *Tour.* 440.

Onopyxus amplio capite. *Barr. Icon.* 1116.

HABITAT ad fatorum margines.

Acanthoides. 3. CARD. foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Linn.* sp. 821.

Carduus acanthoides. *Bot. Mons.* 49. *Tour.* 440.

Carduus foliis laciniatis subtus tomentosis margine spinosis, capitulis sessilibus congestis aculeatis. *Sauv.* 292.

HABITAT à la Colombiere, Montferrier.

Crispus. 4. CARD. foliis sinuatis decurrentibus, margine spinosis, flosculis aggregatis terminalibus nudis. *Linn.* sp. 821. muticis. *Syst.* 1199.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. *Bot. Mons.* 49.

Carduus caule crispo. *Tour.* 440.

Carduus cirsum dictus folio laciniato nigrius. *B. Hist.* 3. 44.

Le Chardon ; vernaculè, las Carchofas d'Asé.

HABITAT in viis & arvis.

Monspeliacula. 5. CARD. foliis lanceolatis subrepandis glabris decurrentibus inæqualiter ciliatis, pedunculis alternis, calycibus inermibus. *Linn.* sp. 822.

Carduus foliis lanceolatis glabris integris ciliatis decurrentibus, calycibus inermibus. *Sauv.* 79.

Cirsium Monspeliacum, folio longo glabro. *Bot. Mons.* 66.

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis. *Tour.* 447.

HABITAT juxta amnem.

* *Foliis amplexicaulibus.*

Marianus. 6. CARD. foliis amplexicaulibus hastato - pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis, spinis canaliculatis du-

- plicato-spinosis. *Linn.* sp. 823.
Carduus squamis calycinis apice margineque spinosis.
Sauv. 291.
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Bot. Mons.*
 49. *Tour.* 440.
Le Chardon-Marie.
 HABITAT circa hortos. *A Selleneuve, Lavanet.*
 7. CARD. foliis sessilibus bifariam pinnatifidis, laciniis *Eriophorus*,
 alternis erectis, calycibus globosis villosis. *Linn.*
 sp. 823. *Sauv.* 290.
Carduus capite rotundo tomentoso. *Bot. Mons.* 50.
Tour. 441.
 HABITAT à *Rouquet, Valene, & vicinis.*
 8. CARD. foliis pinnatifidis spinosis sessilibus, caule *Tuberosus*,
 inermi, capitulis solitariis. *Linn.* sp. 824.
Cirsium pratense asphodeli radice latifolium. *Tour.* 448.
Carduus pratensis asphodeli radice latifolius. *Bot.*
Mons. 48.
Carduus foliis semipinnatis, pinnis semibilobis, ca-
pitulis inermibus singularibus. *Sauv.* 292.
 Occurrit in pratis & circa Moletrinas.

C N I C U S.

- Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 806.
 Char. secund. Rad. fusiformis subramosa. Caul.
 herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis vel de-
 currans, simplex integra vel pinnatifida. Flor.
 terminalis pedunculata, pedunculis multifloris.
 Fulc. aculei ad margines foliorum.
- i. CNICUS foliis lanceolatis decurrentibus indivisis, *Acarna*,
 calycibus pinnato - spinosis. *Linn.* Syst. 1201.
Carduus (acarna) foliis lanceolatis dentatis ciliatis de-
 currentibus : spinis marginalibus duplicitibus. *Linn.*
 sp. 820.
Carduus caule alato spinoso, foliis spinosis, spinis
duplicibus. *Sauv.* 291.
Cnicus polycephalus canescens, aculeis flavescentibus
munitus. *Tour.* 451.
Carduus lanceolatus ferocior. *Bot. Mons.* 50.
Chamæleon niger Salmanticensis. *Bot. Mons.* 60.
Acarna Theophrasti. *Barr. Icon.* 1211.

HABITAT à Prades, à la source du Lés. Altitudinem humanam superans.

Benedictus. 2. **CNICUS** caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Linn.* sp. 826.

Carduus Benedictus. *Tour.* 450.

Le Chardon bénit.

HOSPITATUR sub dio. Rarò semina maturans.

O N O P O R D U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 762.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna decurrentis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis & axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* aculei ad margines foliorum.

Acanthium. 1. **ONOP.** calycibus squarrosois, foliis ovato - oblongis sinuatis. *Linn.* sp. 827.

Onopordum calycibus squarrosois squamis subulatis. *Linn. Syst.* 1201.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris. *Tour.* 441.

Acanthium. *Bot. Mons.* 2. *Barr. Icon.* 502.

Onopordum foliis tomentosis obiter laciniatis, caule alato brachiato. *Sauv.* 80. 290.

Le Pet d'Asne, ou l'Epine blanche.

HABITAT à Castelnau, Montferrier.

Illyricum. 2. **ONOP.** calycibus squarrosois, squamis lanceolatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Linn. Syst.* 1201.

Onopordum calycibus squarrosois, foliis linearibus pinnatifidis. *Linn. sp.* 827.

Onopordum foliis decurrentibus ligulatis pinnatifidis. *Sauv.* 290.

Acanthium Illyricum. *Bot. Mons.* 2.

Carduus tomentosus acanthi folio angustiori. *Tour.* 441.

Acanthium virens majoribus capitulis. *Barr. Icon.* 501.

HABITAT ad mare.

Arabicum. 3. **ONOP.** spinis divaricatis, calycibus imbricatis. *Linn.* sp. 827.

Carduus tomentosus acanthi folio altissimus Lusitanicus. *Barr. Icon.* 501.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Altitudinem humanam superat.

C I N A R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 764.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna semidecurrens simplex pinnato-pinnatifida, vel impari-pinnata. *Flor.* terminalis subsolitaria pedunculata. *Fulcr.* aculei in plurimis supra serraturas foliorum.

1. CINARA foliis subspinosis pinnatis indivisisque, ca- *Scolymus*.
lycinis squamis ovatis. *Linn. sp.* 827.

Cinara foliis pinnatis, foliolis ferratis. *Sauv.* 239.

Cinara sylvestris latifolia. *Bot. Mons.* 65. *Tour.* 442.

- β. Cinara foliis bipinnatis angustis, caule spinoso. *Sauv.*
^{263.}

L'Artichaud; vernaculè, *l'Artichaou*; *β. la Cardounetæ.*

HABITAT in hortis. *β.* Ad mare. *A Perauls, Ville-neuve, au Terrail.*

2. CINARA foliis spinosis, omnibus pinnatifidis, ca- *Cardunculus*
lycinis squamis ovatis. *Linn. sp.* 827.

Cinara foliis pinnatis, foliolis oblongis indivisis, caule spinoso. *Sauv.* 239.

Cinara spinosa, cuius pediculi esitantur. *Tour.* 442.

HOSPITATUR sub dio.

3. CINARA foliis spinosis bipinnatifidis subtus tomen- *Humilis*.
tosis, calycibus squamis subulatis. *Linn. sp.* 828.

Cinara sylvestris Bætica. *Tour.* 442.

HOSPITATUR sub dio. *Sempervirens.* Folia palmaria,
vel sesquipalmaria bipinnatifida, foliorum laciniis
acutis.

C A R L I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 766.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis vel lateralis, sessilis aut pedunculata: pedunculis unifloris multiflorifve. *Fulc.* spinæ ad margines foliorum.

1. CARL. caule unifloro flore breviore. *Linn. sp.* 828. *Acaulis.*

Carlina caulifera & acaulis. *Bot. Mons.* app. 292.

Carlina caule unifloro. *Sauv.* 293.

Carlina acaulos magno flore albo. *Tour.* 500.

Vernaculè *Cardouilla*.

HABITAT à *Lesperou*, à *Lespinouse*.

Lanata. 2. CARL. caule subunifloro longiore lanato, radio calycis purpureo. *Linn. Syst.* 1201.

Carlina caule trifloro subdichotomo : intermedio sessili. *Sauv.* 293. *Linn. sp.* 828.

Carlina annua purpurea *Monspeliensium*. *Bot. Mons.* 51. *sive Carlina Richeri de Belleval.*

Carlina annua flore purpuro-rubente patulo. *Tour.* 500.

Acarna atractylidis folio, amplio flore. *Barr. Icon.* 483.

HABITAT à *la Peissiné*, *Selleneuve*, *Laverune* & circà Urbem ; folia caulina lanceolata.

Corymbosa. 3. CARL. caule multifloro subdiviso, floribus sessilibus, radio calycis sulphureo. *Linn. Syst.* 1202.

Carlina caule multifloro corymboso, floribus terminalibus. *Linn. sp.* 828.

Carlina caule ramoso, floribus umbellatis. *Sauv.* 293.

Carlina sylvestris vulgaris. *Bot. Mons.* 51. *Tour.* 501.

4. *Carlina* patula atractylidis folio & facie. *Tour.* 500.
La Carline.

HABITAT cum priori.

Racemosa. 4. CARL. floribus sessilibus lateralibus paucissimis. *Sauv.* 293. *Linn. sp.* 829.

Carlina sylvestris minor Hispanica. *Bot. Mons.* 51. *Tour.* 500.

HABITAT à *Villemagne* & *Fougeres*, à *Rouquet* & *Valene* ubi palmarem vidimus, caule simplicissimo, foliisque ovatis sinuatis subinermibus.

A T R A C T Y L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 756.

Char. secund. Rad. fusiformis subramosa. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis pedunculata solitaria. Fulc. spinulæ ad margines foliorum. Bracteæ involucriformes plurimæ ad basim calycum, spinosæ, laciniatæ.

Cancellata. 1. ATRACT. bracteis cancellatis ventricosis linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus flosculosis. *Linn. sp.* 830.

Atractylis foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. *Sauv.* 293.

Cnicus exiguus capite cancellato, semine tomentoso.

Tour. 451.

La Fuselée.

HOSPITATUR sub dio. Apud nos facta indigena.

Occurrit à *Castelnau le long de la riviere*. Caulis teres ramosus tomentosus. Rami erecti. Folia linearilanceolata spinulis ciliata, obtusa, semiamplexicaulia. Bracteæ calycibus longiores, apice latiores spinosæ pinnatifido-dentatae.

C A R T H A M U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 765.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra aut pinnatifida. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulc.* aculei ad margines foliorum.

1. CART. foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Linn. Tinctorius.*
sp. 830. Sauv. 80.

Cnicus sativus seu carthamus officinarum. Tour. 457.

Le Cartame ou Safran bâtarde.

HOSPITATUR sub dio. Caulis tripedalis albicans. Folia trinervia glabra. Tubi flosculorum longissimi rubri vel crocei.

2. CART. caule piloso supernè lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis. *Linn. sp. 830. Sauv. 292.*

Cnicus atrœctylis lutea dictus. Tour. 451.

Atractylis lutea. Bot. Mons. 34.

HABITAT in arvis. Altitudo pedalis. Folia caulina dentato-pinnatifida.

3. CART. foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantæ. *Linn. sp. 831.*

Carthamus foliis caule longioribus ligulatis pinnatifidis. Sauv. 292.

Carduncellus montis Lupi. Bot. Mons. 51.

Cnicus cœruleus humilior montis Lupi. Tour. 451.

Carduncellus purpureus singulari flore tenuifolius. Barr. Icon. 345.

HABITAT au mont *Saint Loup*. Interdum acaulis vel semipalmaris. Variat foliis caulinis lanceolatis integris vel pinnatifidis, calycibusque spinosis vel inermibus.

B I D E N S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 776.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea
striata, teres vel angulata. *Fol.* opposita
petiolata vel sessilis, simplex integra vel im-
pari pinnata: foliolis integris aut incisis. *Flor.*
terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.
(in una specie bracteæ foliaceæ involucrifor-
mes ad basim calycis singuli.)

Tripartita. 1. BIDENS corollis flosculosis, calycibus subfoliosis,
seminibus erectis, foliis trifidis. *Linn. sp.* 831.

Bidens coronis seminum retrorsum aculeatis serratis,
seminibus erectis. *Sauv.* 195. 240.

Bidens foliis tripartito-divisis. *Tour.* 462.

Eupatorium dictum cannabina aquatica folio tripar-
tito. *Bot. Mons.* 296.

HABITAT in fossis inundatis, à la Roubine, à Lattes.
Floret autumno.

Cernua. 2. BIDENS seminibus erectis: foliis lanceolatis ample-
xicaulibus, floribus cernuis. *Linn. sp.* 832.

Eupatorium dictum cannabina aquatica folio non
diviso. *Bot. Mons.* 295.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Barr. Icon.*
1209.

Bidens folio dissecto. *Tour.* 462.

HABITAT cum priori.

Frondosa. 3. BIDENS foliis pinnatis ternatisque serratis glabris,
seminibus erectis, calycibus frondosis, caule lævi.
Linn. Syst. 1203.

Bidens foliis pinnatis serratis, seminibus erecto-dis-
tantibus, calycibus frondosis, corollis radiatis.
Linn. sp. 832.

Bidens Canadensis latifolia flore luteo. *Tour.* 462.

HOSPITATUR sub dio. Frequens in horto regio. Se-
mina obversè ovata compressa aristis quatuor ter-
minata, alternis duabus brevissimis. Bracteæ plu-
rimæ inæquales ad basim ciliatæ. Variat foliis sum-
mis simplicissimis integerrimisque.

Bipinnata. 4. BIDENS foliis bipinnatifidis incisis, calycibus in-
volucratis, corollis semiradiatis, seminibus divergen-
tibus. *Linn. Syst.* 1203.

Bidens Americana apii folio. *Tour.* 462.

HOSPITATUR sub dio. Semina linearia obsoletè tetragona, quadriaristata alternis aristis minimis.

C A C A L I A.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. nat. 841.

Char. secund. Rad. funiculiformis vel fusiformis.

Caul. herbacea subsimplex vel fruticosa succulenta. *Fol.* alterna succulenta, sessilis aut petiolata, simplex integerrima aut integra. *Flor.* terminalis pedunculata corymbosa. *Fulc.* nulla.

* Frutescentes.

1. CACAL. caule fruticoso, foliis ovato-oblongis, petiolis basi linea triplici deductis. *Linn. sp.* 834. *Antieuphorbiaum.*

Kleinia foliis carnosis planis ovato-oblongis. *Sauv.*

6. & 81.

L'Antieuphorbe.

HOSPITATUR in caldario. Succulenta glauca, florens autumno absque fructu.

2. CACAL. caule fruticoso composito, foliis lanceolatis planis sessilibus, petiolorum cicatricibus obsoletis. *Linn. sp.* 834. *Kleinia.*

Cacalia foliis lanceolatis planis, caule lævi ventricoso.

Sauv. 52.

HOSPITATUR cum priori. Florens eodem tempore absque fructu. Altitudo humana. Folia in petiolum attenuata.

* Herbacea.

3. CACAL. foliis reniformibus petiolatis acutis denticulatis *Linn. sp.* 836. *Alpina.*

Tussilago caule ramoso. *Sauv.* 113.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris. *Tour.*

452.

Cacalia foliis crassis hirsutis. *Tour.* 452.

HABITAT à *Lesperou*. Folia subtus tomentosa, denticulis inæqualibus.

E U P A T O R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 772.

Char. secund. Rad. fusiformis vel Ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna petiolata

simplex integra vel opposita subsessilis ternata, foliolis integerrimis. *Flor.* terminalis pedunculata paniculato-corymbosa conferta vel rara. *Fulc.* nulla.

* *Calycibus quinquefloris.*

Cannabinum I. EUPAT. foliis oppositis ternatis sessilibus integerrimis. *Eupatorium* foliis digitatis. *Linn.* sp. 838. *Sauv.* 195. *Eupatorium cannabinum*. *Bot. Mons.* 93. *Tour.* 456. *L'Eupatoire.*

HABITAT à *Laverune*, *Lattes*, *Selleneuve*; variat à *Lesperou* foliolis omnibus acutè serratis.

* *Calycibus multifloris.*

Cœlestinum 2. EUPAT. foliis cordato-ovatis obtusè serratis petiolatis, calycibus multifloris. *Linn.* sp. 838.

HOSPITATUR sub dio. Caulis debilis pubescens. Pedunculi pauciflori.

STÆHELINA.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 767.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. suffruticosa ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integra. *Flor.* pedunculata terminalis subsolitaria. *Fulc.* nulla.

Dubia. I. STÆH. foliis linearibus denticulatis, squamis calycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo longiore. *Linn. Syst. nat.* 1205.

Stæhelina foliis linearibus denticulatis, squamis calycinis lanceolatis. *Linn. sp.* 840.

Stæchas citrina altera inodora. *Lob. Icon.* 486.

Jacea capitata rorismarini folio. *Tour.* 444.

Helichrysum sylvestre flore oblongo. *Bot. Mons.* 125. & 297.

Chamæchrysocome prælongis purpureisque jaceæ capitulis. *Barr. Icon.* * 406.

HABITAT à *Lacolombiere*. Frequentior à *Sembrés*. Caulis & folia subtus tomentosa. Calycum squamæ purpurascentes. Foliorum nervi in caulem decurrent. Floret mense Septembri.

C H R Y S O C O M A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 770.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres
ramosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima sparsa.
Flor. ramea terminalis solitaria. *Fulc.* nulla.

1. CHRYS. herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus *Linosyris.*
laxis. *Linn. sp.* 841.

Conyza linariæ folio. *Tour.* 455.

Linosyris nuperorum. *Lob. Icon.* 409.

Conyza calycibus laxis. *Sauv.* 48.

Linaria folioso capitulo. *Bot. Mons.* 159.

HABITAT à *Fontfrede*, *Lavalette*, *Mommaou*. Floret
autumno.

S A N T O L I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 769.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa
fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex inte-
gerrima vel integra. *Flor.* terminalis pedun-
culata solitaria. *Fulc.* nulla (in una specie glan-
dulæ epiphyllæ innumeræ.)

1. SANT. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam den-
tatis. *Linn. sp.* 842. *Chamacypa-
ryssus.*

Santolina foliis teretibus. *Tour.* 460.

Abrotanum fœmina incanum Hispánicum. *Barr. It.*
463.

La Garderobe.

HOSPITATUR sub dio. Huc referatur *santolina* flore
minore, foliis villosis incanis. *Tour.* 460.

2. SANT. pedunculis unifloris, foliis linearibus margine
tuberculatis glandulosis. *Linn. Syst.* 1206. *Rorismarini-
folia.*

Santolina pedunculis unifloris, foliis linearibus. *Linn.*
sp. 842.

Santolina rorismarini folio major. *Tour.* 461.

Abrotanum fœmina virens vermiculato folio. *Barr.*
Icon. 464.

HOSPITATUR sub dio.



TANACETUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 773.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres fruticulosa.

Fol. alterna, nunc sessilis pinnata, nunc petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis corymbosa.

Fulc. nulla.

* *Fruticulosa.*

vulgare. 1. TANAC. foliis bipinnatis incisis serratis. *Linn. sp.* 844.

Tanacetum foliis pinnatis pinnis pinnatifidis incisis serratis. *Sauv.* 240. & 265.

Tanacetum vulgare luteum. *Tour.* 461.

La Tanaise.

HOSPITATUR sub dio.

Balsamita. 2. TANAC. foliis ovatis integris serratis petiolatis. *Linn.*

sp. 845. *Sauv.* 81.

Tanacetum hortense foliis & odore menthae. *Tour.* 461.

La Menthe-coq, le coq, ou l'herbe coq des jardins.

HOSPITATUR sub dio. Folia summa sessilia.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

ARTEMISIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 779.

Char. secund. *Rad.* lignosa vel fibrosa. *Caul.* teres striata, herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna, petiolata vel sessilis, nunc simplex integerrima aut pinnatifida, nunc subbipinnata. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis racemosis foliosis: floribus solitariis pedicellatis vel sessilibus aggestis. *Fulc.* nulla.

* *Fruticosæ erectæ.*

Abrotanum. 1. ARTEM. foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso. *Linn. sp.* 845.

Abrotanum mas angustifolium. *Tour.* 459.

Artemisia foliis multifidis setaceis, caule erecto. *Sauv.* 264.

L'Aurone mâle.

HABITAT ad margines agrorum & sepium. *A Castelnau, Boutonet, &c.*

* *Procumbentes*

* *Procumbentes ante florescentiam.*

2. ARTEM. foliis multifidis linearibus, caulis pro- *Campestris,*
cumbentibus virgatis. *Linn. sp.* 846. *Sauv.* 264.
Abrotanum campestre caulinis rubentibus. *Tour.*
459. & albicantibus. *Ibid.*
Artemisia tenuifolia. *Bot. Mons.* 29.
HABITAT cum priori.
3. ARTEM. foliis multipartitis tomentosis, racemis cer- *Maritima,*
nuis, flosculis femineis ternis. *Linn. sp.* 846.
Artemisia foliis multifidis compositis, racemis sim-
plicibus alternis, floribus erectis sessilibus. *Sauv.* 264.
Absinthium seriphium gallicum. *Bot. Mons.* 1.
HABITAT ad mare vers *Aiguemorte* & *Agde.*

* *Erectæ herbaceæ, foliis compositis.*

4. ARTEM. foliis multipartitis subtus tomentosis, flo- *Ponticas;*
ribus subrotundis nutantibus : receptaculo nudo.
Linn. sp. 847. *Sauv.* 264.
Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Tour.* 457.
HOSPITATUR sub dio.
5. ARTEM. foliis compositis multifidis, floribus sub- *Absinthium,*
globosis pendulis : receptaculo villoso. *Linn. sp.* 848.
Sauv. 264.
Absinthium Ponticum seu *Romanum.* *Tour.* 457.
L'Absinthe ; vernaculè *l'Absinta*, *l'Absin menut.*
HABITAT à *la Louzere*, à *Saint Guillin.* Caulis &
folia incana. Laciniae foliotum lineares. Racemi
axillares secundi foliosi.
6. ARTEM. foliis pinnatifidis planis incisis : subius to- *Vulgaris.*
mentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis : ra-
dio quinquefloro. *Linn. sp.* 848.
Artemisia vulgaris major. *Bot. Mons.* 28. *Tour.* 460.
Artemisia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus
erectis. *Sauv.* 294.
L'Armoise ; vernaculè *l'Artemisa*, *l'Arcemisa.*
HABITAT à *Selleneuve* & *Lamousson*, au *Terrail*, à
Villeneuve.

* *Foliis simplicibus.*

7. ARTEM. foliis lineari-lanceolatis sessilibus glabris in- *Dracunculus,*
tegerrimis. *Linn. sp.* 849.
Abrotanum lini folio acriori & odorato. *Tour.* 459.

Artemisia foliis lanceolato-linearibus alternis integerimis. *Sauv.* 54.

L'Estragon.

HOSPITATUR sub dio.

G N A P H A L I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 778.

Char. secund. *Rad.* repens farmentosa vel ramosa vel simplex tereti-attenuata. *Caul.* herbacea ramosa vel fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* nunc terminalis capitata vel capitato-corymbosa vel solitaria, nunc lateralis sessilis; vel utraque simul. *Fulc.* nulla.

* *Argyrocomæ Calycibus albis.*

Dioicum. 1. GNAPH. caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, farmentis procumbentibus. *Linn. sp.* 850. *Gnaphalium montanum* flore rotundiore. *Tour.* 453. & folio & flore longiore. *Ibid.*

Gnaphalium sexubus tota planta distinctis. *Sauv.* 80. & 116.

Le pied de chat; vernaculè lou pé de cat.

HABITAT à *Lesperou*, à *Lamalou*. Variat foliis radi-calibus spathulatis vel linearibus.

Fœtidum. 2. GNAPH. foliis amplexicaulibus integerrimis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. *Linn. sp.* 851. *Elichrysum Africanum lanuginosum latifolium*, ca-

lyce floris argenteo & amplissimo. *Tour.* 453.

HOSPITATUR sub dio. Caulis bipedalis hispidus. Folia ovalia oblonga. *Squamæ calycinæ acuminatæ.*

Luteo-album 3. GNAPH. foliis semi-amplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, floribus conglobatis. *Linn. sp.* 851.

Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis conglobatis. *Tour.* 452.

Gnaphalium ad stæchadæm accedens. *Bot. Mons.* 111.

HABITAT à *Lamousson* juxtâ aquas, à *Castelnau*, vers *Lavalette*; facies sequentis; altitudo major.

* Chrysocomæ *Calycibus luteis.*

4. GNAPH. foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, *stæchas.*
corymbo composito. *Linn. sp.* 853.
Gnaphalium foliis perangustis congestis, umbella exi-
guia lutea caulem terminante. *Sauv.* 49.
Elichrysum seu stæchas citrina angustifolia. *Bot.*
Mons. 124. *Tour.* 452.
L'Immortelle jaune des jardinier's; vernaculè *l'Immour-*
tela jaoune.
HABITAT à *Castelnau vers le moulin des Guilhens*, à
Lacolombiere, à *Caunelles*, *Selleneuve*.
5. GNAPH. foliis linearibus alternis, caule frutescente, *sordidum.*
floribus paniculatis subternis terminalibus sessilibus,
Linn. sp. 853. *Sauv.* 49.
Elichrysum sylvestre angustifolium capitulis conglo-
batis. *Bot. Mons.* 125. *Tour.* 453.
HABITAT suprà muros. Circà *Urbem*, à *Lavanet*,
sous le Perou. Folia semiamplexicaulia.
- * Filagines *Calycibus cinereis.*
6. GNAPH. caule ramoso diffuso, floribus confertis *Uliginosum.*
terminalibus. *Linn. sp.* 856.
Gnaphalio vulgari similis. *Bot. Mons.* 110.
Elichrysum aquaticum ramosum minus capitulis fo-
liatis. *Tour.* 452.
Gnaphalium caule ramoso. *Sauv.* 48.
HABITAT à *Gramont*, *Castelnau*, *Lavalette*. Squamæ
calycinæ nigrescentes.
7. GNAPH. foliis alternis linearibus acutis planis, pe- *saxatile.*
dunculis unifloris longissimis. *Linn. sp.* 857.
Elichrysum sylvestre latifolium flore magno. *Tour.*
452. & parvo. *Ibid.*
Chrysocoma latifolia minima singulari flore. *Barr.*
Icon. 425.
HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis teres tomento-
sus. Folia denticulata semiamplexicaulia. Calycis
squamæ apice membranaceæ nigrescentes.

X E R A N T H E M U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 777.Char. secund. Rad. tenuis subsimplex. *Caul. her-*
Ee ij

bacea subramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulg.* nulla.

Annuum. 1. XERANTH. foliis lanceolatis patentibus. *Linn. sp.* 857.

Xeranthemum foliis lanceolatis, caule herbaceo. *Linn. Syst. 1211.*

Xeranthemum receptaculis paleaceis, seminum pappo quinqueseto. *Sauv. 54. & 88.*

Jacea oleæ folio, capitulis simplicibus. *Bot. Mons. 298.*

Jacea pumila oleæ folio purpureis & congestis floribus. *Barr. Icon. 1126.*

Xeranthemum flore simplici purpureo majori. *Tour. 499.*

HABITAT au mont Saint Loup, à L'esperou, Lavalette & vicinis. Rami paucissimi divaricati simplicissimi tomentosi. Squamæ calycinæ pellucidæ, linea purpurea notatae.

CONYZA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 780.*

Char. secund. *Rad.* ramosa, *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* terminalis fastigiato - corymbosa. *Fulg.* nulla.

Squarrofa. 1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. *Linn. sp.* 861.

Conyza major vulgaris. *Bot. Mons. 78. Tour. 454.*

Conyza foliis ovato-lanceolatis floribus laxè umbellatis. *Sauv. 80.*

L'Herbe aux puces, ou la Conise.

HABITAT à Castelnau, Montferrier, la Peissine. Altitudo humana; folia integerrima.

Bifrons. 2. CONYZA foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Linn. sp.* 861. *Sauv. 80.*

Conyza latifolia viscosa suavè olens flore aureo, è Gallo-Provincia. *Tour. 455.*

HOSPITATUR sub dio. In ista calyces quandoque squarrofi, foliaque decurrentia.

Chinensis. 3. CONYZA foliis lanceolato-ovatis serratis subtus to-

mentosis, floribus terminalibus congestis. *Linn. sp.*
862.

HOSPITATUR sub dio. Folia inferiora in petiolum
attenuata.

E R I G E R O N.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 782.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel simplex, vel
tuberosa. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa.
Fol. alterna sessilis simplex integra vel inte-
gerrima. *Flor.* pedunculata axillaris & termi-
nalis solitaria vel aggesta vel paniculata. *Fulc.*
nulla.

1. ERIG. pedunculis unifloris lateralibus, calycibus *Viscosum*
squarrosum. *Linn. sp.* 863. *Sauv.* 55.
Erigeron pedunculis unifloris, foliis lanceolatis. *Linn.*
Syst. 1213.
Conyza mas Monspeliensium odorata. Bot. Mons. 75.
Virga aurea major foliis glutinosis & graveolentibus.
Tour. 484.
HABITAT ad margines sepium, à *Laverune*, *Selle-*
neuve, &c. Folia ferrata. Altitudo bipedalis.
2. ERIG. ramis lateralibus multifloris, calycibus squar- *Graveolens*.
rosis. *Linn. Syst.* 1213.
Erigeron foliis lanceolato-linearibus, ramis lateralibus
multifloris foliosis. *Sauv.* 55.
Virga aurea minor foliis glutinosis & graveolentibus.
Tour. 484.
Conyza minor vera. Bot. Mons. 75.
HABITAT ad mare & stagna. Folia integerrima. Al-
titudo sesquipedalis.
3. ERIG. caule floribusque paniculatis, foliis lanceola- *Canadense*.
to-linearibus ciliatis confertis.
Erigeron floribus paniculatis. *Linn. sp.* 863. *Sauv.* 55.
Virga aurea annua Zanoni. *Tour.* 484.
8. Conyza minor unicaulis pallido flore. *Barr. Icon.* 1164.
HABITAT à *Salason*, *Selleneuve*, & circa urbem. Al-
titudinem bipedalem superat. Pedunculi multiflori
ramificationibus divaricatis. Folia integerrima, vel
una aut altera serratura.
4. ERIG. caule multifloro, foliis lanceolatis subserratis, *Phila delphi-*
cum.

caulinis semiamplexicaulibus. *Linn. sp.* 863.
HOSPITATUR sub dio. Folia radicalia subspathulata
vel ovata.

Acre. 5. ERIG. pedunculis alternis unifloris. *Linn. sp.* 863.
Sauv. 55.

Aster arvensis cæruleus acris. *Tour.* 481.

Conyza cærulea acris. *Bot. Mons.* 78.

HABITAT ultra pontem, à Castelnau, Salason, Font-
froide.

Siculum. 6. ERIG. squamis calycinis inferioribus laxis florem su-
perantibus. *Linn. sp.* 864.

Conyza foliis linear-lanceolatis, ramiferis majoribus.
Sauv. 54.

Conyza caulis rubentibus tenuioribus, flore luteo
nudo. *Bot. Mons.* 77. *Icon.* 76.

HABITAT in maritimis, ad stagna. Floret autumno.
Altitudo bipedalis vel major.

Tuberofum. 7. ERIG. foliis lanceolatis, ramis unifloris, caule suf-
fruticoso. *Linn. sp.* 864.

Erigeron caule subunifloro, foliis lancelato-lineari-
bus rigidis, radice tuberosa. *Sauv.* 55.

Aster maritimus tuberosus luteus. *Tour.* 483.

Conyza tuberosa lutea, foliis angustis & rigidis.
Bot. Mons. 77.

Conyza maxima. *Barr. Icon.* 157.

HABITAT cum priori, & à Cette; au mont St. Loup
vers Valene. Folia radicalia sæpius ovata obtusa.
Radix præmorsa. Cauliculi vix palmares.

T U S S I L A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 783.

Char. secund. Rad. fibrosa repens stolonifera.

Caul. scaposa uniflora vel foliosa simplex.

Fol. petiolata vaginans simplex integra vel in-
tegerrima, radicalis, aut caulina. Flor. termi-
nalis, nunc solitaria radicalis, nunc caulina
thyrsoides. Fulc. bracteæ foliaceæ, aliæ am-
plexicaules sparsæ, aliæ ad basim florum soli-
tariæ.

Alpina. 1. TUSSIL. scapo subnudo unifloro, foliis cordato-or-
biculatis crenatis. *Linn. sp.* 865.

Tussilago montana minima. *Lob. Icon.* 590.

HABITAT à *Lespinouse* près de *Lamalou*. Scapus palmaris una aut gemina bractea munitus.

2. TUSSIL. scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis *Farfara*, angulatis denticulatis. *Linn. sp.* 865. *Sauv.* 30.

Tussilago vulgaris. *Bot. Mons.* 272. *Tour.* 487.

Le Tussilage; vernaculè, *lou Tussilage*.

HABITAT à *Lesperou*, le long de l'*Herau*. Scapus bracteis numerosis.

S E N E C I O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 786.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* herbacea angulata vel teres, simplex vel ramosa (in quibusdam fistulosa.) *Fol.* alterna sessilis (in nonnullis decurrentes) simplex integra vel pinnatifida vel linearis-multifida. *Flor.* terminalis pedunculata, subsolitaria, aggregata, subcorymbosa vel paniculata. *Fulg.* nulla.

* *Floribus flosculosis.*

1. SENECAE. corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis ample- *vulgaris.* xicaulibus, floribus sparsis. *Linn. sp.* 867. *Sauv.* 294.

Senecio minor vulgaris. *Bot. Mons.* 238. *Tour.* 456.

Le Seneçon.

HABITAT in arvis & pratis. *Caulis* fistulosus.

* *Floribus radiatis : radio revoluta.*

2. SENECAE. corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, *viscosus.* squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Linn. sp.* 868.

Jacobaea prima pannonica. *Bot. Mons.* 139. *Tour.* 486.

Senecio foliis pinguibus pinnatis, pinnis alternis brevissimis, radiis exiguis. *Sauv.* 241.

HABITAT in paludibus. Ad mare & stagna, & au mont *St. Loup*.

3. SENECAE. corollis revolutis, foliis pinnatifidis denti- *Sylvaticus.* culatis, caule erecto corymboso. *Linn. sp.* 868.

Senecio foliis.... florum radiis revolutis linearibus.

Sauv. 301.

Jacobaea senencionis folio. *Bot. Mons.* 139. *Tour.* 486.

E e iiii.

HABITAT à Manguio & au mont St. Loup.

* *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

Elegans. 4. SENECAE. corollis radiantibus, foliis pinnatifidis æquilibus patentissimis; rachi infernè angustata. Linn. sp. 869.

Senecio Americanus purpureo cæruleo flore. Tour. 456.
HOSPITATUR sub dio & in caldario. Caulis glaucus semperfurens. Pedunculi subuniflori. Corollæ radius purpureus.

Incanus. 5. SENECAE. corollis radiantibus, foliis utrinque tomentosis semipinnatis, laciniis subdentatis, corymbo subrotundo. Linn. sp. 869.

Senecio tomentosus foliis spathulatis pinnatifidis, pinis subrotundis. Sauv. 302.

Jacobaea Alpina absinthii folio humilior. Tour. 486.

HABITAT à Lespinouse & à Puycerda; Facies Othonna maritima. Laciniæ foliorum obtusæ integerrimæ. Pedunculi axillares plures corymbiferi, foliis longiores.

Abronianifolia. 6. SENECAE. corollis radiantibus, foliis pinnato-multifidis linearibus, Linn. sp. 869.

Senecio foliis ramosis, nervo & pinnulis planis & angustissimis, floribus umbellatis. Sauv. 265.

Jacobaea foliis ferulaceis flore minore. Tour. 486.

HABITAT à Lesperou, au mont St. Loup, & cum priori.

Jacobea. 7. SENECAE. corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto, Linn. sp. 870. Sauv. 240. 301.

Jacobaea vulgaris laciniata. Bot. Mons. 138. Tour. 485.

Jacobaea major artemisiæ folio non repens. Barr. Icon. 267.

Senecio foliis lyratis, pinnulis dentatis, floribus umbellatis. Sauv. 302.

La Jacobée. L'Armoise des Herboristes.

HABITAT in fossis udis, à Lavanet, & circa urbem.

* *Floribus radiatis: radio patente, foliis indivisis.*

Doria. 8. SENECAE. corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis, superioribus sensim minoribus. Linn. Syst. 1215.

Senecio foliis lanceolatis serratis, floralibus ad pedunculum minimis. Sauv. 85. Linn. Gmel. sib. 2, p. 165.

Virga aurea major vel doria. B. Pin. 268. Bot. Mons. 279.

Jacobaea pratensis altissima limonii folio. Tour. 485.
HABITAT juxta amnem, & à Caunelles. Altitudinem humanam superat. Folia glaberrima sæpius decurrentia.

9. SENECAE. corollis radiantibus octonis, foliis lanceolatis biserratis, subtus villosis, caule ramoso. *Linn. sp. 870.* *Nemorensis.*

Senecio foliis ovato-lanceolatis subtus hirsutis, floribus umbellatis. Sauv. 85.

HABITAT à Valene, au Puy de St. Loup, à Lesperou.

10. SENECAE. corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis. *Linn. sp. 871.* *Sarracenicus.*

Senecio foliis longè ellipticis acutè serratis, floribus umbellatis. Sauv. 85.

Jacobaea Alpina foliis longioribus serratis. Tour. 485.

HABITAT à Lesperou, & cum priori. Pedunculi plures axillares corymbiferi longitudine foliorum. Seraturæ foliorum minimæ.

11. SENECAE. corollis radiantibus, caule indiviso unifloro, foliis integris, radicalibus ovatis subtus villosis. *Linn. Syst. 1215.* *Doronicum.*

12. Solidago foliis lanceolatis subdentatis, caulinis amplexicaulibus, caule subunifloro. *Linn. sp. 880.* *Doronicum.*
Sauv. 84.

13. Doronicum foliis lanceolatis subtus tomentosis, caule Incanum. unifloro. *Linn. sp. 886. Sauv. 184.*

Doronicum integro & crasso hieracii folio. Bot. Mons. 295.

Jacobaea integro & crasso hieracii folio. Tour. 486.
HABITAT à Lesperou, à Lespinouse. Palmaris vel sesquipalmaris.

A S T E R.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 787.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea simplex vel ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima, integra aut incisa. Flor. terminalis pedunculata: pedunculis unifloris, multifloris, corymbiferis, vel paniculatis. Fulc. nulla.

* *Integrifolii, pedunculis nudis.*

Alpinus. 1. ASTER foliis lanceolatis hirtis, radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro. *Linn. sp. 872.*

Aster montanus cæruleus magno flore foliis oblongis. *Tour. 481.*

β. Aster Atticus Alpinus. *Ibid.*

γ. Aster hirsutus Austriacus cæruleus. *Ibid.*

HABITAT à *Lesperou*, à *Valene*, *Villemagne*. Vix palmaris. Folia radicalia sæpius spathulata. Caulina bina raro tria. Occurrit etiam à *Fougeres* ubi biuncialem vidimus.

Tripolium. 2. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. *Linn. sp. 872. Sauv. 54.*

Aster maritimus palustris cæruleus salicis folio. *Tour. 481. & minor. Ibid.*

Tripolium majus & minus. Bot. Mons. 271.

HABITAT ad mare & stagna. Floret augusto. Pedunculi uniflori nudi.

Amellus. 3. ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *Linn. sp. 873.*

Aster foliis lanceolatis scabris semiamplexicaulibus parum ferratis, calycibus laxis, squamis lanceolatis. *Sauv. 108.*

Aster atticus cæruleus vulgaris. *Tour. 481.*

HABITAT au *Capouladou*, à *St. Guillin le Désert*.

* *Integrifolii, pedunculis squamosis.*

Sedifolius. 4. ASTER foliis lanceolato-linearibus subcarnosis integerrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliolosis. *Linn. sp. 874.*

Aster tripolii flore. *Tour. 481.*

Aster Atticus Monspeliensis pурpureus, angustioribus foliis. *Bot. Mons. 32.*

Aster caule erecto umbellifero, ramis simplicibus, foliis ligulatis. *Sauv. 54.*

HABITAT à *Mauguio*, *Gramont*, à la mer. Folia rigida.

Nova Anglia. 5. ASTER foliis lanceolatis alternis integerrimis semiamplexicaulibus, floribus terminalibus. *Linn. sp. 875.*

Aster novæ Angliæ altissimus hirsutus, floribus om-

nium maximis purpuro-violaceis. *Tour.* 482.

L'Astre de la nouvelle Angleterre.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Caulis hirsutus rubens. Folia undulata uninervia. Squamæ calycinæ laxæ patentes.

* *Serratifolii, pedunculis squamosis.*

6. ASTER foliis lanceolatis sessilibus lœvibus subferratis, *Lævis.*
pedunculis foliolosis subdivisis. *Linn. sp.* 876.

HOSPITATUR sub dio. Florens autumno. Pedunculi uniflori longissimi. Folia conferta; summa semi-amplexicaulia integerrima, retrorsum scabra.

7. ASTER foliis lanceolato-linearibus medio ferratis, *Tradescantii.*
pedunculis foliosis, caule ramoso, calycibus erectis.
Linn. sp. 876.

Aster serotinus procerior ramosus bellidis sylvestris
flore. *Tour.* 482.

HOSPITATUR sub dio. Humanam excedit altitudinem;
ramosissimus. Folia summa integerrima semiamplexicaulia. Pedunculi divaricati.

8. ASTER foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, caly- *Chinenſis.*
cibus terminalibus patentibus foliosis. *Linn. sp.* 877.
Sauv. 302.

La Reine Marguerite.

HOSPITATUR sub dio. Caulis sesquipedalis ramosus
villosum. Folia in petiolum decurrent. Squamæ calycinæ ciliatæ oblongæ. Folia summa ciliata integræ lanceolata.

S O L I D A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 785.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa
herbacea vel suffruticosa. *Fol.* alterna sessilis
simplex integerrima aut integra. *Flor.* terminalis racemosa vel fastigiato-corymbosa. *Fulc.*
nulla.

1. SOLID. paniculato-corymbosa, racemis recurvatis, *Canadensis.*
floribus adscendentibus, foliis trinerviis subferratis
scabris. *Linn. sp.* 878. *Sauv.* 84.

Virga aurea angustifolia cespitosa exotica. *Barr. Icon.*
784.

La Verge d'or de Canada.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Folia lanceolata semi-amplexicaulia supernè ferrata, ferraturis utrinque 3. vel quatuor. Flores parvi.

Virga aurea. 2. SOLID. caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Linn. sp.* 880.

Virga aurea latifolia vulgaris. *Bot. Mons.* 279. *Tour.* 484.

Solidago caule erecto, racemis alternis erectis. *Sauv.* 84.
La Verge d'or.

HABITAT à *Lesperou*. Folia summa integerrima.

Rigida. 3. SOLID. foliis caulinis ovatis scabris, ramis alternis fastigiatis, corymbis terminalibus. *Linn. sp.* 880.

HOSPITATUR sub dio. Folia integerrima. Altitudo prioris.

Montana. 4. SOLID. foliis lanceolatis ferratis decurrentibus, caule angulato. *Linn. sp.* 881. *Sauv.* 84.

HABITAT à *Lesperou* & à *Lamalou*. Folia ad basim sæpè integerrima.

Alpina. 5. SOLID. foliis cordatis petiolatis dentatis. *Linn. sp.* 880.

Jacobæa alpina foliis subrotundis ferratis. *Tour.* 485.

Jacobæa tertia, latifolia prima *Clusii*. *Bot. Mons.* 139.

HABITAT cum priori. Nondum vidimus ubi notat *Magnolius*.

INULA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1066.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea, teres vel angulata, ramosa vel simplex. Fol. alterna sessilis sæpè amplexicaulis simplex integra vel integerrima (in una specie succulenta.) Flor. terminalis & axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multisflorisve. Fulc. nulla.

Helenium. 1. INULA foliis ovatis rugosis, subtùs tomentosis, calyx cum squamis ovatis. *Linn. sp.* 881. *Sauv.* 85.

Aster omnium maximus. *Tour.* 483.

L'Enule campane.

HOSPITATUR sub dio. Folia radicalia lanceolata pedalia denticulata, caulina semi-amplexicaulia. Pedunculi axillares uniflori.

Oculus 2. INULA foliis oblongis integris hirsutis, caule piloso Christi. corymboso, floribus confertis. *Linn. sp.* 881.

- Aster caule supernè ramoso ampliato ; foliis lanceolatis integris amplexicaulibus , calycibus laxis terminibus. *Sauv.* 87.
- Aster Pannonicus lanuginosus luteus. *Tour.* 482.
HOSPITATUR sub dio.
2. INULA foliis oblongis , caule hirsuto paniculato , *Dysenterica*. squamis calycinis setaceis. *Linn. sp.* 882. *Sauv.* 85.
- Conyza media asteris flore luteo. *Bot. Mons.* 77.
- Aster pratensis autumnalis conyzæ folio. *Tour.* 483.
- HABITAT secùs rivulos & in fossis uidis circà urbem.
Folia integerrima amplexicaulia. Pedunculi uniflori.
4. INULA foliis undulatis amplexicaulibus , caule prof-
trato. *Linn. sp.* 882. *Pulicaria*.
- Aster foliis lanceolatis , calycibus tomentosis , flori-
bus luteis vix radiatis focaneis. *Sauv.* 168.
- Aster palustris parvo flore globoso. *Tour.* 483.
- Conyza minima. *Bot. Mons.* 77.
- Vernaculè , l'Erba de St. Roch.
- HABITAT in fossis inundatis , à Lattes , Caunelles , Sa-
lagon , Montferrier.
5. INULA foliis lanceolatis recurvis serrato-ciliatis, flori-
bus solitariis, ramis angulatis. *Linn. sp.* 882. *Sauv.* 86.
- Aster montanus luteus salicis glabro folio. *Bot. Mons.*
32. *Tour.* 483.
- HABITAT in saxosis à Montferrier , Caunelles , Cas-
telnau. Caulis pedalis rigidus. Folia conferta. Squa-
mæ calycinæ laxæ.
6. INULA foliis linearibus carnosis tricuspidatis. *Linn. Chritmoides.*
sp. 883.
- Aster flore terminatrice , foliis tricuspidatis. *Sauv.* 8.
- Aster maritimus folio tereti crasso tridentato. *Tour.* 483.
- Chritmum maritimum flore asteris attici. *Bot. Mons.* 80.
- Vernaculè , las Limbardas.
- HABITAT ad mare & stagna , & à Laverune. Altí-
tudo humana.
7. INULA foliis lanceolatis pubescentibus integerrimis , *Montana*.
caule unifloro. *Linn. sp.* 884.
- Aster montanus luteo magno flore. *Tour.* 482.
- Aster atticus luteus montanus villosus , magno flore.
Bot. Mons. 32. *Tour.* 482.
- Aster foliis lanceolatis sessilibus villosis , caule sæpiùs
unifloro. *Sauv.* 86.

HABITAT *au mont St. Loup*, à *Valene*, à *Lesperou*.
Altitudo ferè pedalis. *Squamæ calycinæ ovatæ*. *Folia caulina tria vel quatuor*, raro quinque.

ARNICA.

Char. prim. Vid. Linn. syst. pl. 861.

Char. secund. *Rad.* subtuberous stolonifera. *Caul.* teres herbacea subsimplex. *Fol.* sessilis simplex *integra*, opposita vel alterna. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

Montana. 1. ARNICA foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Linn. sp.* 884.

Doronicum plantaginis folio alterum. *Tour.* 487.

Doronicum foliis caulinis oppositis. *Sauv.* 157.

HABITAT à *Lesperou*. Altitudo pedalis. Foliorum oppositiones sæpius binæ. . . . in frigidario.

Scorpioides. 2. ARNICA foliis alternis serratis. *Linn. sp.* 884.

Doronicum radice scorpis brachiata. *Tour.* 487.

HABITAT cum priori. Variat foliis subcordatis subintegerrimis.

DORONICUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 784.

Char. secund. *Rad.* subtuberous stolonifera. *Caul.* scaposa vel herbacea subsimplex. *Fol.* alterna simplex *integra*, radicalis petiolata; caulina sessili-amplexicaulis. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

Pardalian- 1. DORON. foliis cordatis obtusis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Linn. sp.* 885. *Sauv.* 119. n°. 270.

Doronicum foliis cordatis denticulatis, caule ramoso. *Sauv.* 119. n°. 271.

Doronicum maximum folio caulem amplexante. *Tour.* 488.

Le Doronic.

HABITAT à *Lesperou*. Rami subbiflori. . . . in frigidario.

Plantagi- 2. DORON. foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis. *Linn. sp.* 885.

Doronicum plantaginis folio. *Tour.* 487.

Doronicum foliis ovatis acutis obsoletè dentatis. *Sauv.* 107.

HABITAT cum priori. Folia glaberrima amplexicaulia.

3. DORON. scapo simplicissimo unifloro. *Bellidias-*
Doronicum caule nudo simplicissimo unifloro. *Linn. trum.*
sp. 886. Sauv. 13..

Bellis sylvestris media caule carens. *Bot. Mons. 37.*

Tour. 490.

HABITAT à Valene, au mont St. Loup, à Montferrier.

B E L L I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 795.

Char. secund. *Rad. fibrosa. Caul. scaposa vel foliosa subsimplex. Fol. simplex integra vel integriflora, nunc radicalis sessilis, nunc caulina sub-amplexicaulis. Flor. terminalis subsolitaria, nunc radicalis nunc caulina. Fulcr. nulla.*

1. BELLIS scapo nudo simplicissimo unifloro, foliis spathulatis. *Perennis.*

Bellis scapo nudo unifloro. *Linn. sp. 886. Sauv. 15.*

Bellis sylvestris minor. *Bot. Mons. 37. Tour. 491.*

La Paquerette, ou la Marguerite; vernaculé, la Margarideta.

HABITAT in herbidis.

2. BELLIS caule subsimplici subquadrifloro, foliis obovatis denticulatis. *Annua.*

Bellis caule subfolioso. *Linn. sp. 887.*

HABITAT ad mare. *En Avril au-delà de Perauls, & à Villeneuve.* Folia parva serraturis utrinque duabus tribusve.

T A G E T E S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 801.

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea teres, ramosa vel simplex. Fol. alterna sessilis imparipinnata. Flor. terminalis pedunculata solitaria. Fulcr. nulla.*

1. TAGET. caule subdiviso diffuso. *Linn. sp. 887. Patula.*

Tagetes Indicus minor multiplicato flore. *Tour. 488.*

L'Œillet d'Inde.

HOSPITATUR sub dio. Foliola filo terminata, ferrata linear-lanceolata. Pedunculi apice incrassati fistulosi. Calyces turbinati.

Erepta. 2. TAGET. caule erecto simplici, pedunculis nudis unifloris. *Linn. sp.* 887.

Tagetes maximus rectus flore maximo multiplicatae. *Tour.* 488.

Autre œillet d'Inde.

HOSPITATUR cum priori. Folia filo etiam terminata.

CHRYSANTHEMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 788.

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea striata ramosa*, vel suffruticosa. *Fol.* alterna sessilis, nunc simplex integra aut incisa, nunc pinnata. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria vel corymbosa. *Fulg.* nulla.

* *Leucanthema, radio florum albo.*

Leucanthe- 1. CHRYS. foliis amplexicaulibus oblongis, superne serratis, inferne dentatis. *Linn. sp.* 888. *Sauv.* 87.

Leucanthemum vulgare. Tour. 492.

Bellis sylvestris caule folioso major. Bot. Mons. 36.

2. Bellis montana folio obtuso crenato. *Bot. Mons. ibid.* HABITAT à *Lattes, Castelnau, Selleneuve.* Folia radicaria saepius spathulata, apice serrata, caulina verò utrinque ferrato-dentata.

Montanum. 2. CHRYS. foliis imis spathulato-lanceolatis serratis, summis linearibus ligulatis. *Sauv.* 87. *Linn. sp.* 888.

Leucanthemum montanum minus. Tour. 492.

Bellis montana minor. Bot. Mons. 36.

HABITAT à *Lesperou, au mont St. Loup.* Pedunculi longi uniflori nudi.

Graminifo- 3. CHRYS. foliis linearibus subintegerrimis. *Linn. sp.* 888. *Chrysanthemum foliis ligulatis saepius integerrimis. Sauv.* 87.

Bellis montana gramineo folio. Bot. Mons. 291. *Hort.* 31. *tab.* 31.

Leucanthemum folio gramineo. Tour. 493.

HABITAT à *Prades, à la source du Lés.* Caulis subsimplicissimus.

Monspeliense. 4. CHRYS. foliis imis palmatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *Sauv.* 304. *Linn. sp.* 889.

Bellis montana major, foliis chrysanthemi cretici angustioribus. Bot. Mons. 306.

Leucanthemum

Leucanthemum montanum foliis chrysanthemi. *Tour.*

492.

HABITAT à *Lesperou*, à *Valene*, du côté de *Viols*.

5. CHRYS. foliis pinnatis inciso-serratis, caule multi- *Corymbosum*:
floro. *Linn. sp. 890. Sauv. 267.*

Matricaria tanaceti folio, flore minore, semine um-
bilicato. *Tour. 494.*

Tanacetum montanum inodorum, minori flore. *Bor.*
Mons. 248. Barr. Icon. 781. & 786.

HABITAT à *Lesperou*, à *St. George* & à *Corpouiran*.
Foliola profundè dentata.

* *Chrysanthema, radio florum aureo.*

6. CHRYS. foliis amplexicaulibus, supernè laciniatis, *Segetum*:
infernè dentato-serratis. *Linn. sp. 889.*

Chrysanthemum segetum folio minus secto glauco.
Tour. 493.

Chrysanthemum, foliis amplexicaulibus oblongis
dentatis, pedunculis subnudis. *Sauv. 88.*

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis apice trifidis.

7. CHRYS. foliis pinnatifidis incisis, extrorsum latiori- *Coronarium*:
bus. *Linn. sp. 890.*

Chrysanthemum foliis matricariæ. *Tour. 491.*

HOSPITATUR sub dio. Folia interdum obversè ovata
serrato-dentata.

8. CHRYS. flosculis omnibus uniformibus hermaphro- *Flosculosum*,
ditis. *Linn. sp. 890.*

Bellis spinosa foliis agerati. *B. pin. 262.*

HOSPITATUR sub dio. Suffruticosum procumbens
semperfurens. Folia obovata in petiolum attenuata
sinuato-dentata rigidula. Flores parvi terminales fo-
litarii.

MATRICARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 789.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea teres*
ramosa. Fol. alterna, sessilis vel petiolata, sim-
plex multifida vel impari-pinnata. Flor. termi-
nalis pedunculata, solitaria vel corymbosa.
Fulc. nulla.

9. MATRIC. foliis compositis planis, foliolis ovatis in- *Parthenium*,
cisus, pedunculis ramosis. *Linn. sp. 890. Sauv. 266.*

Matricaria vulgaris seu sativa. *Tour.* 493.

La Matricaire.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi corymbosi. Folia subbipinnata petiolata. Squamæ calycinæ carinatæ.

Chamomilla. 2. MATRIC. receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis marginæ æqualibus. *Linn. syst.* 1222.

Chamæmelum vulgare seu leucanthemum *Dioscoridis.*

Bot. Mons. 60. *Tour.* 494.

La Camomille.

HABITAT ad mare.

Argentea. 3. MATRIC. foliis bipinnatis, pedunculis solitariis. *Linn.* sp. 891.

Chamæmelum orientale incanum, millefolii folio.

Tour. cor. 37.

Matricaria foliis duplicato-pinnatis. *Sauv.* 267.

La Camomille Orientale.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis. Pedunculi longi terminales, foliola linearia serrata vel dentata.

Inodora. 4. MATRIC. receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis marginæ obsoletis. *Linn. Syst.* 1222. *Sauv.* 266.

Chamæmelum inodorum. *Bot. Mons.* 60. *Tour.* 494.

HABITAT ad fatorum margines.

A N T H E M I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 793.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis simplex multifida vel pinnata. Flor. terminalis pedunculata solitaria. Fulc. nulla.

* Radio dicolore seu albo.

Altissima. 1. ANTH. erecta foliorum apicibus subspinosis. *Linn.* sp. 893.

Anthemis foliorum serraturis setaceis, radiis florum albis. *Sauv.* 255.

Chamæmelo affine buphtalmum *Italicum* segetum altissimum. *Bot. Mons.* 60.

β. Chamæmelum leucanthemum *Hispanicum* minus. *Tour.* 494.

HABITAT in arvis.

2. ANTH. foliis pinnatifidis denticulatis carnosis, caule *Maritima*. ramoso. *Linn. sp.* 893.
 Chamæmelum maritimum cotula quibusdam. *Bot. Mons.* 61. *Tour.* 494.
Anthemis foliis pinnatis denticulatis carnosis punctatis, caule ramoso prostrato, calycibus tomentosis. *Linn. Syst.* 1223.
Anthemis foliis pinnatifidis planis succulentis, pin-nulis ovalibus, pedunculo nudo. *Sauv.* 303.
 HABITAT ad mare. Floret Augusto.
3. ANTH. foliis pinnato-compositis linearibus acutis *Nobilis*. subvillosis. *Linn. sp.* 894.
Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, semi-nibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Sauv.* 266.
 Chamæmelum nobile seu leucanthemum odoratius. *Tour.* 494.
La Camomille de boutique.
 HOSPITATUR sub dio.
4. ANTH. receptaculis conicis : paleis setaceis, semini-bus nudis. *Linn. sp.* 894.
Anthemis foliis pinnato-decompositis : laciniis linea-ribus, caulibus diffusis, radice annua. *Sauv.* 266.
 Chamæmelum fœtidum. *Bot. Mons.* 61. *Tour.* 494.
 HABITAT in maritimis. *Vers Frontignan, Balaruc, Cette, Agde.*
5. ANTH. receptaculis paleaceis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Linn. sp.* 894. *Sauv.* 266.
 Chamæmelum inodorum. *Bot. Mons.* 60. *Tour.* 494.
 HABITAT in arvis. Utrum ad hanc vel ad matricariam inodoram pertineant synonymiæ Magnolii & Tour-nefortii, decidunt oculatores.
6. ANTH. caulibus simplicibus unifloris decumbenti-*Pyrethrum*. bus, foliis pinnato-multifidis. *Linn. sp.* 895.
 Buphthalmum caulibus simplicibus, &c. *Sauv.* 265.
 HABITAT à Lesperou.
- * *Radio concolore seu luteo.*
7. ANTH. caule ramoso, foliis pubescentibus pinnato-*Valentina*. multifidis setaceis, calycibus villosis pedunculatis. *Linn. sp.* 895. Ff ij

Buphthalmum, &c. Sauv. 265.

Cotula flore luteo radiato. Tour. 495.

Buphthalmum cotulæ folio. Bot. Mons. 41.

HABITAT ad mare vers Aiguemorte.

- Tinctoria.* 8. ANTH. foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso. Linn. sp. 896.
- Buphthalmum Dioscoridis. Bot. Mons. 40.
- Buphthalmum tanaceti minoris folio. Tour. 495.
- Buphthalmum floribus nudis, foliis subtus incanis pinnatis, pennis argutè serratis. Sauv. 265.
- Chrysanthemum tanaceti folio. Barr. Icon. 465. & 466.
L'œil de bœuf.
- HABITAT cum priori & au-delà de Cette vers Meze.

A C H I L L E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 794.

Char. secund. Rad. fusiformis vel ramosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna sessilis nunc simplex integra aut incisa, nunc multifido-pinnata. Flor. terminalis pedunculata arctè corymbosa. Fulc. nulla.

* *Corollis flavis.*

- Santolina.* 1. ACHILL. foliis setaceis dentatis: denticulis subintegris subulatis reflexis. Linn. sp. 896.
- Ptarmica orientalis santolinæ folio, flore majore. Tour. Cor. 37.
- HOSPITATUR sub dio. Cauliculi semipedales.
- Ageratum.* 2. ACHILL. foliis lanceolatis obtusis, acutè serratis. Linn. sp. 897. Sauv. 88.
- Ageratum foliis serratis. Bot. Mons. 5.
- Ptarmica lutea suavè olens. Tour. 497.
- HABITAT ad mare, à Lamousson.
- Pubescens.* 3. ACHILL. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis incisis serratis subtus lanigeris. Linn. sp. 897. Sauv. 268.
- Ptarmica orientalis, foliis tanaceti incanis, semiflosculis florum pallidè luteis. Tour. Cor. 37.
- HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis. Cauliculi simplicissimi.

* *Corollis radio albis.*

- Clivenna.* 4. ACHILL. foliis pinnatifidis planis obtusis tomentosis. Linn. sp. 898.

Ptarmica incana humilis foliis laciniatis, absinthii æmulis. *Tour.* 496. *Seg. ver. tom. II.* p. 230.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi vix triunciales. Calycinæ squamæ longæ ad margines nigræ veluti sphacelatae.

5. ACHILL. foliis lanceolatis acuminatis argutè serratis. *Ptarmica,* Linn. sp. 898.

Ptarmica vulgaris folio longo ferrato, flore albo. *Tour.* 496.

Achillea foliis integris minutissimè serratis. *Sauv.* 54. *L'Herbe à éternuer.*

HABITAT à *Lesperou.*

6. ACHILL. foliis bipinnatis nudis : laciniis linearibus *Millefolium* dentatis. Linn. sp. 899.

Millefolium vulgare album. Bot. *Monf.* 177. *Tour.* 496. *Album.*

Achillea foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus laciniatis acutis. *Sauv.* 267. & 268.

7. Achillea pinnis foliorum semipinnatis & variè incisis. *Purpureum,* *Sauv.* 267.

Millefolium purpureum majus. *Tour.* 496.

Le Millefeuille ou l'herbe au charpentier.

HABITAT au *Pont Juvenal*, *Lattes*, *Laverune*. In β. pinnulæ hinc tantum denticulatae.

7. ACHILL. foliis bipinnatis, pinnis distantibus utrinque subseptenis obtusiusculis. Linn. sp. 899. foliolis ovatis confertis. *Syst.* 1225.

Achillea pinnis confertis æqualibus tomentosis: pinnulis capillariter divisis. *Sauv.* 267.

Millefolium odoratum minus Monspeliensium. Bot. *Monf.* 177. *Tour.* 496.

HABITAT à *Caunelles*, *Selleneuve*, *Lamousson*, *Ville-neuve*. Cauliculi vix semipedales vel breviores. Pinnulæ foliorum septem vel duodecim.

S I G E S B E C K I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 798.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa teres. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. terminalis pedunculata subdichotoma. Fulc. bractææ involucriformes plurimæ ad basim floris singuli. Glandulæ pedicellatae supra calyces & bracteas.

Orientalis. 1. SIGESB. petiolis sessilibus, calycibus bracteatis. *Linn.* sp. 900.

La Sigesbeck.

HOSPITATUR sub dio. Bipedalis ramosissima, folia in petiolum decurrent subcordata, inæqualiter dentata. Bracteæ spathulatae glandulis hispidæ. Flosculi lutei quinquefidi. Semiflosculi vero longiores trifidi.

V E R B E S I N A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 799.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea ramosa teres. *Fol.* simplex integra vel integerima, sessilis vel decurrentis, opposita vel alterna. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria, vel axillaris aggregata. *Fulc.* nulla.

Alata. 1. VERBES. foliis alternis decurrentibus undulatis obtusis, floribus terminalibus. *Linn.* sp. 901.

Bidens indica hieracii folio alato caule. *Tour.* 462.

Cannabina indica foliis integris, alato caule. *Mag. hort.* 40. *tab.* 40.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens. Caulis pedalisi obscurè rubens: folia ovata. Pedunculi longissimi pubescentes. Calycinæ squamæ æquales lineares. Corollæ croceæ. Semina denticulis duobus armata, altero longiore hamato.

Alba 2. VERBES. foliis oppositis lanceolatis sessilibus serratis; floribus axillaribus subquaternis.

Verbesina foliis oppositis lanceolatis serratis. *Linn.* sp. 902. floribus sessilibus & pedunculatis. *Linn. Syst.* 1226.

HOSPITATUR sub dio. Calycinæ squamæ ovatæ. Pedunculi lanati.

B U P H T H A L M U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 790.

Char. secund. *Rad.* simplex vel ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna simplex integerrima sessilis. *Flor.* terminalis solitaria, pedunculata vel sessilis. *Fulc.* nulla. (In una specie spinulæ ad apicem foliorum calycis.)

* Asterici. *Tour.*

1. BUPHTH. calycibus acutè foliosis spinosis, ramis *spinosum*. alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerimis. *Linn. sp. 903. Sauv. 87.*
Aster luteus foliis ad florem rigidis. *Bot. Mons. 31.*
Asteriscus foliis ad florem rigidis. *Tour. 497.*
HABITAT in arvis à *Gramont*, *Lavanet*, *Castelnau*.
 Caulis rigidus lanatus subpedalis. Folia villosa. Foliola calycina inferiora latiora, radium superantia, trinervia, rigida.
2. BUPHTH. calycibus obtusè foliosis sessilibus axillaribus, foliis oblongis obtusis. *Linn. sp. 903. Sauv. 87.* *Aquaticum.*
Aster annuus aquaticus patulus. *Tour. 498.*
Aster annuus attico. luteo similis, foliis ad florem mollibus. *Bot. Mons. 32.*
HABITAT ad aquas. *A Lamousson, Cauelles, Montferrier, Villeneuve.*

* Asteroidea. *Tour.*

3. BUPHTH. foliis lanceolatis subserratis villosis, calycibus nudis. *Linn. sp. 904. Sauv. 87.* *Salicifolium.*
HABITAT à *Lattes*, & à la mer.
4. BUPHTH. foliis lanceolatis subdenticulatis glabris, *Grandiflorum.* calycibus nudis. *Linn. sp. 904. Sauv. 87.*
Asteroides alpina salicis folio. *Tour. Cor. 4.*
HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longi uniflori terminales. Caulis diffusus. Folia semiamplexicaulia.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

HELIANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 802. Soleil.*

Char. secund. *Rad.* ramosa vel tuberosa. *Caul.* teres herbacea ramosa. *Fol.* simplex integra, sessilis aut petiolata, caulina inferior opposita; summa alterna. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

1. HELIANT. foliis omnibus cordatis: nervis pone *Annuus*. basim unitis: extrorsum denudatis. *Linn. sp. 904.*
Corona solis maxima. *Tour. 488.*

Vernaculè *lou Biz asoureil.*

HOSPITATUR sub dio. Semina usta odorem coffeeæ spirant : potus gratissimus.

Multiflorus. 2. HELIANT. foliis inferioribus cordatis, nervis ponè basim unitis denudatis : superioribus ovatis. *Linn.* sp. 905.

Corona solis ramosa. *Tour.* 488.

Tuberosus. 3. HELIANT. foliis ovato-cordatis, nervis intra folium unitis. *Linn. sp.* 905.

Corona solis parvo flore, tuberosa radice. *Tour.* 489.

Le Topinambour; vernaculè *lou toupinambour.*

HOSPITATUR sub dio.

Atro-rubens. 4. HELIANT. foliis ovatis crenatis tinerviis scabris, squamis calycinis erectis longitudine disci. *Linn. sp.* 906.

HOSPITATUR sub dio. Squama calycina una aut altera, cæteris longior.

R U D B E C K I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 803.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea sub-simplex. *Fol.* alterna sessilis simplex integra. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulc.* pili rigidi in tota planta.

Hirta. 1. RUDB. foliis indivisis spathulato-ovatis : radii petalis emarginatis. *Linn. sp.* 907.

La Rudbeck.

HOSPITATUR sub dio. Biennis, sempervirens. Cauliculi ferè pedales rigidi. Variat foliis decurrentibus.

C O R E O P S I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 804.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea sub-simplex, terè vel tetragona, plena vel fistulosa. *Fol.* petiolata, opposita vel alterna, simplex integra vel ternata aut quinata foliolis simplicissimis. *Flor.* terminalis pedunculata sub-racemosa vel subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

Leucanthe- ma. 1. COREOPSIS foliis pinnatis ferratis, radio florum diversicolore. *Linn. Syst.* 1128.

Bidens Americana trifolia leucanthemi flore. *Tour.* 462.

HOSPITATUR sub dio. Folia ternata vel quinata : foliolis ovatis.

2. COREOPSIS foliis subternatis quinatis yè, foliolis *Tripteris*. linear-i-lanceolatis integerrimis, caule fistuloso.

Coreopsis foliis subternatis integerrimis. *Linn. sp.* 908.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Pedunculi superne incrassati. Folia summa opposita simpliciflora.

3. COREOPSIS foliis lanceolatis serratis alternis petiolatis decurrentibus. *Linn. sp.* 909. *Alternifolia*.

Corona solis altissima alato caule. *Tour.* 462.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Flores subracemosi.

CENTAUREA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 805.

Char. secund. Rad. simplex vel ramosa. Caul. simplex vel ramosa, herbacea vel suffruticosa. Fol. alterna sessilis vel decurrens, nunc simplex integerrima, integra aut inciso-pinnatifida, nunc impari-pinnata; vel etiam radicalis integerrima, caulina multifida. Flor. terminalis solitaria pedunculata. Fulc. spinulæ in plurimis supra calyces & margines foliorum.

* *Jaceæ calycibus lœvibus inermibus.*

1. CENT. calycibus inermibus, squamis linearis-subulatis, foliis pinnatis serratis. *Linn. sp.* 909. *Sauv.* 264. *Crupina*.

Cyanus pulchro semine centaurii majoris. Bot. Mons. 82. *Jacea annua* foliis laciniatis serratis purpurascente flore.

Tour. 444.

Chondrilla purpurascens tenuifolia, capite jaceæ, semine cardui. Barr. Icon. 1136.

HABITAT in sterilibus, à *Boutonet*, *Castelnau*, *Gramont*. Caulis striatus tripedalis subsimplicissimus. Foliola linearia scabra integerrima. Calyces ovati acuti, squamis apice purpurascens glaberrimis. Pappus seminum niger rigidus.

2. CENT. calycibus inermibus subrotundis glabris, squamis ovatis, foliis sinuatis. *Linn. sp.* 909. *Sauv.* 287. *Moschata*.

Cyanus floridus odoratus turcicus. *Tour.* 441.

Jacea odora. *B. pin.* 272. n°. VI.

L'Ambrette.

HOSPITATUR sub dio. Flores albi odoratissimi. Folia s̄epiūs pinnatifida.

* *Cyani calycinis squamis serrato-ciliatis.*

Phrygia. 3. CENT. calycibus recurvato-plumosis, foliis indivisis. *Linn. sp.* 910.

Jacea cum squamis pennatis sive capite villoso. *Bot. Mons.* 136. *Tour.* 443.

HABITAT à Valene, Rouquet. Folia ovata dentata amplexicaulia.

Nigra. 4. CENT. calycibus ciliatis, squamula ovata, ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus flosculosis. *Linn. syst.* 1229. *sp. pl.* 911.

Jacea nigra laciniata. *Tour.* 443.

Jacea cum squamis cilii instar pilosif. *Bot. Mons.* 136. *Tour.* 443.

HABITAT à Lesperou, au mont St. Loup. Folia summa lanceolata integerrima.

Pullata. 5. CENT. calycibus ciliatis verticillato-foliosis, foliis lyrato-dentatis, caule foliis breviore. *Linn. sp.* 911. Foliis lyratis obtusis. *Syst. nat.* 1229.

Cyanus humilis albus hieracii folio. *Tour.* 446.

Jacea humilis alba hieracii folio. *Bot. Mons.* 136.

Centaurea inermis, calycum ciliis pinnatis, foliis oblongis villosis & humifusis, floralibus verticillatis ligulatis. *Sauv.* 288.

HABITAT à Castelnau, au chemin des près d'Arene, à Selleneuve. Interdum acaulis. Folia floralia lanceolata. Floret martio. Variat foliis omnibus integerimis.

Montana. 6. CENT. calycibus serratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo. *Linn. sp.* 911. *Sauv.* 78.

Cyanus montanus latifolius. *Bot. Mons.* 294.

Cyanus montanus latifolius seu verbasculum cyanooides. *Tour.* 445.

HABITAT à Lesperou & à la Serane. Caulis lanatus. Folia integerrima. Variat foliis decurrentibus vel sessilibus.

Cyanus. 7. CENT. calycibus serratis, foliis linearibus integerimis, infimis dentatis. *Linn. sp.* 911. *Sauv.* 288.

- Cyanus segetum. Bot. Mons. 82. Tour. 446.
Le Bluet, ou Casselunette; vernaculè, las Blavétas.
 HABITAT in arvis.
8. CENT. calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Paniculata.* Linn. sp. 912.
Jacea vel Stœbe Gallica & Austriaca elatior. Bot. Mons. 146.
Jacea foliis candicantibus laciniatis, calyculis non splendentibus. Tour. 444.
 HABITAT ad margines sepium & agrorum. *A Castelnau, Selleneuve.*
9. CENT. calycibus ciliatis, foliis lanceolatis serratis, *Sempervirens.* inferioribus hastatis. *Linn. syst. 1230.*
Centaurea calycibus ciliatis, foliis lanceolatis, superne serratis. Linn. sp. 913.
Jacea Lusitanica sempervirens. Tour. 444.
 HOSPITATUR sub dio. Floret augusto.
10. CENT. calycibus margine ciliatis, foliis pinnatifidis, *Scabiosa.* pennis lanceolatis. *Linn. sp. 913.*
Jacea vulgaris laciniata flore purpureo. Tour. 443.
Scabiosa major squamatis capitulis. Bot. Mons. 304.
 HABITAT à *Lesperou, à St. Guillin le Désert.*
11. CENT. calycibus squamosis, foliis lanceolatis, radi- *Jacea.* calibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn. sp. 914. Sauv. 79.*
Jacea vulgaris nigra capitata squamosa. Bot. Mons. 139.
Jacea pratensis nigra latifolia. Tour. 443.
La Jacée.
 HABITAT à *Montferrier, Lavalette; ubi variat foliis linearibus integerrimis.*
12. CENT. calycibus squamosis, foliis tomentosis, radicibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, caule simplici. *Conifera. Linn. sp. 915. Sauv. 289.*
Jacea montana incana capite pini. Bot. Mons. 136.
Centaurium majus humile capite pini. Tour. 449.
Stœbe pinea amplio capite. Barr. Icon. 138.
 HABITAT cum priori. Vix palmaris, tomentosa. Folia radicalia integerrima, summa pinnatifida, lacinia terminali majore. Squamæ calycinæ splendentes pellucidæ, superiores purpurascentes. Radix fusiformis.

* *Stoebæ calycinis spinis palmatis.**Seridis.*

13. CENT. calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus tomentosis oblongis, infimis sinuato-dentatis.
Linn. sp. 915. Sauv. 228.

Carduus Hispánicus purpureus foliis cichorei. Tour. 442.

Jacea latifolia spinosis capitulis pulchris, flore purpureo. Bot. Mons. 137.

HABITAT à St. Jean de Védas, Monteils, Villeneuve. Pedunculi quidam axillares solitarii uniflori, breves, diphylli.

- Aspera.* 14. CENT. calycibus squamis palmato-quinquespinosis, foliis lanceolatis dentatis. *Sauv. 289. Linn. sp. 916.*

Carduus jaceæ folio capitulo minori cum squamis tricuspidatis. Tour. 442.

Jacea cum spinosis capitulis, purpurea tenuifolia. Bot. Mons. 138.

HABITAT ubique in satis. Ramosissima. Sepes mediocres constituit.

* *Calcitrapæ calycinis spinis compositis.*

- Calcitrapa.* 15. CENT. calycibus subduplicato-spinosis, foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis, caule spinoso. *Linn. syst. 1231. sp. pl. 917.*

Centaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. Sauv. 288.

Carduus stellatus seu calcitrapa. Tour. 440.

Carduus stellatus foliis papaveris erratici. Bot. Mons. 50.

La Chaussetrap, ou Chardon étoilé; vernaculè, l'Agriola masclaoii.

HABITAT ad viarum & agrorum margines.

- Solstitialis.* 16. CENT. calycibus duplicato-spinosis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, caulinis lyrate-pinnatifidis. *Linn. sp. 917. Sauv. 288.*

Carduus stellatus luteus foliis oyani. Bot. Mons. 50. Tour. 440.

HABITAT in arvis, à Lavanet, Boutonet, Selleneuve.

- Melitensis.* 17. CENT. calycibus duplicato-spinosis subrotundis lateralibus, foliis decurrentibus lanceolatis sinuosis inermibus. *Linn. sp. 917. Sauv. 288.*

Carduus Melitensis capitulis conglobatis. Tour. 443.

Jacea Melitensis capitulis conglobatis. Bot. Mons. 298.

HABITAT à Caunelles, à St. George, à Restinclières.

18. CENT. calycibus ciliato-spinosis, foliis lyratis inermibus incanis, capitulis terminalibus. Sauv. 290.
Linn. sp. 918.

Carduus Melitensis erucæ folio, luteo flore. Tour. 442.

Jacea sicula cichorii folio, flore luteo, capite spinoso. Bot. Mons. 138.

HABITAT ad mare & stagna. A Frontignan, Balaruc,
au mont St. Loup.

19. CENT. calycibus subduplicato-spinosis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indivisis serratis. Linn. des. Calcitrapo-
syst. 1231.

Carduus stellatus foliis integris serratis. Bot. Mons.
293. Tour. 440.

HABITAT à Nîmes, juxta rivulum dictum le Vistre.

20. CENT. calycibus ciliatis spinosis, foliis pinnatifidis, Centauroi-
laciniis superioribus majoribus. Linn. sp. 918. Sauv. des.
289. Foliis omnibus margine integris.

HABITAT juxta amnem, à Castelnau, Salaison,
Clapiers.

21. CENT. calycibus ciliatis spinosis, foliis bipinnatifidi- Collina;
dis. Linn. sp. 918.

Jacea lutea capite spinoso. Bot. Mons. 138.

Carduus luteus centauroides segetum. Tour. 443.

HABITAT à Lavanet, Castelnau, la Peissine. Folia ra-
dicalia tantum bipinnatifida. Squamæ supremæ ob-
tusæ ciliatæ.

* *Crocodiloidea spinis simplicibus.*

22. CENT. calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis Salmantica.
dentato-pinnatifidis serratis. Linn. sp. 918. Sauv. 287.

Jacea foliis cichoraceis villosis altissima, flore pur-
pureo. Tour. 444.

Jacea intybacea sive stœbe Salmanticensis prior. Bot.
Mons. 137.

HABITAT cum priori. Folia caulina ovato-lanceolata
serrata sessilia. Calyces ovati, squamis apice atro-
purpureis, spinula setacea minima terminatis. Folia
summa lanceolata dentato-spinosa.

23. CENT. calycibus setaceo-spinosis, foliis decurrenti- Galactites.
bus sinuatis spinosis. Linn. sp. 919. Sauv. 289.

Carduus galactites. Bot. Mons. 49. Tour. 441.

*HABITAT au chemin de Selleneuve, à Lacolombiere.
Folia subtus tomentosa, pinnatifida.*

POLYGAMIA NECESSARIA.

SILPHIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 812.

*Char. secund. Rad. carnosa subtuberosa. Caul.
herbacea simplex tetragona. Fol. simplex inte-
gra, radicalis petiolata, caulina opposita con-
nata. Flor. terminalis subdichotoma. Fulc. nulla.*

Perfoliatum. 1. SILPH. foliis radicalibus cordato-ovatis inæqualiter
dentatis, caulinis subintegerrimis.

*Silphium foliis cordatis oppositis connato-perfoliatis.
Linn. syst. 1232.*

*HOSPITATUR sub dio & in caldario. Caulis humanæ
altitudinis, rubens. Folia radicalia longè petiolata.
Petiolis hinc canaliculati alati. Corollarum radii pe-
dunculis longiores.*

CALENDULA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 807.

*Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea
teres ramosa. Fol. alterna sessilis simplex subin-
tegerrima vel integra. Flor. terminalis solitaria
pedunculata. Fulc. nulla, (in unâ specie aculei
rigidiusculi supra capsulas.)*

Officinalis. 1. CALEND. seminibus radii cymbiformibus echinatis,
disci bicornibus. *Linn. sp. 921.*

*Caltha arvensis. Bot. Mons. 44. Tour. 498.
Le Souci.*

*HABITAT in arvis, à Monteils, Laverune, Lavanet,
& circâ urbem. Folia subintegerrima linearia, vel
obversè-ovata, semi-amplexicaulia. Semperflorens
& semperflorens.*

Pluvialis. 2. CALEND. foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis
filiformibus. *Linn. sp. 921. Sauv. 88. & 304.*

*Caltha Africana flore intùs albo, foris violaceo. Tour.
498.*

HOSPITATUR sub dio. Squamæ calycinæ maximæ acuminatæ.

3. CALEND. foliis lanceolatis dentatis, pedunculis superiore incrassatis. *Linn. sp. 921. Sauv. 304.* *Hybrida.*

HOSPITATUR sub dio. Folia sæpius ovata subcarnosa, apice denticulis duobus tribusve. Caulis pubescens. Pedunculi longè nudiusculi. Floret augusto.

ARCTOTIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 808.

Char. secund. Rad. subfusiformis. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna petiolata simplex pinnatifida. Flor. terminalis solitaria pedunculata. Fulc. nulla.

1. ARCT. flosculis radiantibus vicenis tripartitis. *Linn. sp. Triflisis.*

922.

Arctotis foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis radii profundè trifidis. *Sauv. 304.*

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Folia lyrato-pinnatifida crenata tomentosa. Variat scapo subunifloro, vel caule folioso ramoso.

OSTEOSPERMUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 809.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. fruticosa. Fol. alterna subsessilis simplex integra subcarnosa. Flor. terminalis pedunculata, pedunculis subquaternis. Fulc. nulla.

1. OSTEOSP. foliis ovalibus serratis subpetiolatis. *Linn. Moniliferum.*

sp. 923.

Le Porte-collier.

HOSPITATUR hyeme in caldario. Sempervirens, bis florens in anno. Altitudo humana. Folia tenella incana. Nervi foliorum in caulem decurrentes. Petiolorum basis tumida. Semina maturans.

OTHONNA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 813.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea vel fruticosa repens vel erecta (in unâ specie radicans.) Fol. alterna sessilis vel petiolata, nunc

simplex integerrima aut integra (in unâ specie succulenta,) nunc pinnata, foliolis multifidis. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria vel subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

* *Herbaceæ.*

Helenitis. 1. OTHON. foliis lanceolatis integris villosis, floribus umbellatis. *Linn.* sp. 925.

Aster incanus verbasci folio villosus. *Tour.* 482. *Sauv.* 108. & 87.

Conyza helenitis incana mellita. *Bot. Mons.* 78.

HABITAT à St. George, à Selleneuve, au-delà du pont vers Caunelles, & à gauche dans un petit bois.

* *Fruticosæ.*

Maritima. 2. OTHON. foliis pinnatifidis tomentosis, laciniis sinuatis, caule fruticoso. *Linn.* sp. 925. *Sauv.* 303.

Jacobea maritima. *Tour.* 486.

HABITAT ad mare; à la Plage, vers Agde & Aiguesmorte. Tota planta tomentosa. Flores corymbosi lutei.

Pedunculata. 3. OTHON. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus parallelis. *Linn.* sp. 926.

Cotula Africana calyce eleganti cæsio. *Tour.* 495.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi supernè incrassati fistulosi.

Cheirifolia. 4. OTHON. foliis carnosis lanceolatis integerrimis. *Linn.* sp. 926. *Sauv.* 88.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi humifusi radicantes glauci subsimplicissimi. Folia trinervia glabra glauca succulenta, ad margines cartilaginea semi-amplexicaulia; flores lutei. Pedunculi solitarii terminales uniflori longi supernè incrassati fistulosi. Calyces saepius quinque vel sexfidi. Pappus albus longus. Tota hyeme & æstate florens. Semina non maturans.

F I L A G O.

Char. prim. Vid. *Linn.* Syst. pl. 891.

Char. secund. *Rad.* subsimplex rigidiuscula. *Caul.* teres herbacea vel suffruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima conferta. *Flor.* nunc terminalis subcorymbosa vel glomerata, nunc axillaris aut lateralis subsessilis, vel utraque simul. *Fulc.* nulla.

i. FILAGO

1. FILAGO floribus sessilibus terminalibus, foliis flora- *Pygmaea.*
libus majoribus. *Linn. sp.* 927.
Filago marina capite folioso. *Tour.* 455.
Gnaphalium umbellatum minimum. *Bot. Mons.* 111.
HABITAT ad mare, à *Cette*, au *Nazareth*, & derrière
le fort Richelieu, & derrière la montagne vers *Meze*.
Vix uncialis. Folia circa flores conferta, capitulo
longiora, radium mentientia, tomento cinereo ob-
sita. Occurrit in monte Lupo.
2. FILAGO tomentosa corymbo subramoso, foliis ob- *Maritima.*
longis obtusis subcrenatis. *Linn. sp.* 927.
Gnaphalium corymbo terminali subdiviso, foliis ob-
longis integerrimis obtusis. *Sauv.* 80.
Gnaphalium maritimum. *Bot. Mons.* 110. *Tour.* 461.
Le Coton de mer.
HABITAT in totò tractu ad mare. Floret augusto. Fo-
lia semiamplexicaulia. Tota planta tomentosa.
3. FILAGO calycibus pyramidatis pentagonis axillaribus, *Germanica.*
caule dichotomo erectiusculo. *Linn. Syst.* 1235.
Gnaphalium caule erecto dichotomo, capitulis glo-
bosis axillaribus terminalibusque. *Linn. sp.* 857.
Filago floribus pyramidatis pentagonis flosculis femi-
neis serratis. *Linn. sp.* 1199.
Gnaphalium vulgare majus. *Bot. Mons.* 110.
Filago impia Dodonæi. *Tour.* 454.
HABITAT in arvis, aux prés d' *Arene*, à *Castelnau*. Fo-
lia ferè decurrentia incana. Caulis quandoque tri-
chotomus.
4. FILAGO floribus conicis terminalibus axillaribusque, *Montana.*
caule erecto subdichotomo. *Linn. Syst.* 1235.
Gnaphalium caule erecto diviso, floribus pyramidati-
tis axillaribus lateralibusque. *Linn. sp.* 857.
Gnaphalium minus repens. *Bot. Mons.* 111.
Filago minor. *Tour.* 455.
HABITAT à *Caunelles*, à la *Garrigue du Terrail*, à
Montferrier.
5. FILAGO floribus conicis lateralibus, caule panicu- *Arvensis:*
lato. *Linn. Syst.* 1235.
Gnaphalium paniculatum hirsutum. *Linn. sp.* 856.
Gnaphalium caule erecto ramosissimo, glomerulis
florum ad alas sessilibus. *Sauv.* 48.

Filago incana floribus per caulem sparsis. *Tour.* 455.
HABITAT cum prioribus.

MONOGAMIA.

JASIONE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 819.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa erecta. *Fol.* alterna sessilis simplex subintegerrima. *Flor.* terminalis pedunculata capitata. *Fulc.* nulla.

Montana. 1. JASIONE. *Linn.* sp. 928.

Jasione foliis linear-lanceolatis obsoletè-serratis. *Sauv.* 64.

Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *Bot. Mons.* 220. *Tour.* 113.

HABITAT à Gramont, Castelnau, montferrier. Caulis pedalis villosus. Folia sæpius ciliata. Pedunculi nudi longissimi.

LOBELIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 820.

Char. secund. *Rad.* fibrosa subrepens. *Caul.* herbacea ramosa procumbens. *Fol.* alterna sessilis simplex subintegerrima. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulcr.* nulla.

Laurentia. 1. LOBELIA caule prostrato, foliis lanceolatis ovalibus crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis unifloris longissimis. *Linn.* sp. 931.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longissimi. Variat foliis spathulatis.

VIOLE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 821.

Char. secund. *Rad.* fibrosa farmentosa stolonifera. *Caul.* nunc scaposa, nunc foliosa ramosa teres vel angulata. *Fol.* simplex integra, nunc radicalis petiolata, nunc caulina petiolata vel sessilis. *Flor.* solitaria pedunculata, radicalis aut caulina axillaris. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ.

* *Acaules.*

1. VIOLA acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptanti- *Odorata*
bus. Linn. sp. 934.

Viola acaulis, stolonibus teretibus reptantibus, pe-
dunculis radicalibus. Sauv. 29.

Viola martia purpurea, flore simplici odoro. Bot.
Mons. 278. Tour. 419.

La Violette; vernaculè, *la Vioüeta*.

HABITAT in herbidis, à Castelnau, Lavalette, la
Peissine, Lattes.

* *Caulescentes.*

2. VIOLA caule demum adscendente, foliis oblongo- *Canina*
cordatis. Linn. sp. 935.

Viola caulibus adscendentibus floriferis, foliis corda-
tis. Sauv. 111.

Viola martia inodora sylvestris. Bot. Mons. 278.

Viola martia foliis majoribus & rotundioribus. Tour.
419.

Viola martia minor flore violaceo. Barr. Icon. 695.

HABITAT à Lavalette, Montferrier. Luxuriat in la-
byrintho horti regii. Stipulae setaceæ. Folia crenata.
Pedunculi longitudine petiolorum.

3. VIOLA caule triquetro diffuso, foliis oblongis in- *Tricolor*,
cisis, stipulis dentatis. Linn. sp. 935.

Viola arvensis bicolor. Bot. Mons. 278. Tour. 421.

La Pensée; vernaculè, *la Panséa*.

HABITAT cum prioribus. Pedunculi foliis multo lon-
giores: fructiferi recurvi.

I M P A T I E N S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 822.

Char. secund. Rad. subfusiformis. Caul. herbacea
ramosa. Fol. alterna simplex integra subsessilis.
Flor. axillaris pedunculata: pedunculis uniflo-
ris aggregatis vel solitariis multifloris. Fulc.
glandulæ plurimæ ad basim foliorum.

1. IMPAT. pedunculis aggregatis unifloris, foliis lan- *Balsamina*
ceolatis, nectariis flore brevioribus. Linn. sp. 938.

Impatiens pedunculis confertis unifloris. *Sauv.* 77.
Balsamina fœmina. *Tour.* 418.

Le Balsamine; vernaculè, *la Balsamina.*

HOSPITATUR sub dio. Folia serrata. Variat pedunculis solitariis, foliis multo brevioribus.

* *Pedunculis multifloris.*

Noli me tan- 2. IMPAT. pedunculis multifloris solitariis, foliis ovagere. tis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn.* sp. 938.
Sauv. 77.

Balsamina lutea. *Barr. Icon.* 1197.

La Balsamine jaune.

HOSPITATUR cum priori. Pedunculi foliis longiores.



Classis XX.

GYNANDRIA
DIANDRIA.

ORCHIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 823.

Char. secund. Rad. bulbosa solida geminata palmata vel fasciculato-aggregata. Caul. herbacea simplicissima. Fol. alterna vaginans integerrima. Flor. terminalis spicata. Fulc. bractea ad basim floris singuli.

* *Bulbis indivisis.*

1. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii cornu longo: labio trifido æquali integerrimo, petalis lanceolatis. *Pyramidalis.*
Linn. Syst. 1242.
Orchis purpurea, spica congesta pyramidali. *Seg. tom. II. p. 129. tab. XV. fig. 11.*
Orchis cynosorchis & testiculus canis major, flore dilutè purpurascente sive incarnato. *Bot. Mons. 192.*
Orchis latifolia spica compacta. *Tour. 433.*
HABITAT in pratis. *A Prades, Viols, Grabels.*
2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. *Coriophora.*
Linn. sp. 940.
Orchis bulbis indivisis, labello trifido punctato: lacinula media longiore, cornu germinibus breviore. *Sauv. 23.*
Orchis odore hirci minor. *Bot. Mons. 192. Tour. 433.*
Seg. 2. p. 128.
HABITAT à Gramont, Castelnau ultra amnem.
3. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido *Moria.* crenulato, cornu obtuso, petalis omnibus conniventibus. *Linn. Syst. 1242. sp. 940. Sauv. 23. n°. 113.*
Orchis morio femina. *Bot. Mons. 192. Tour. 433. Seg. 2. tab. XV. fig. 7.*
4. Orchis morio femina, calcari extuberante bifariamque diviso. *Seg. ibid. fig. 8.* *G. g. iij*

HABITAT à Lattes, Caunelles. fl. Spica longa. Bracteæ latiusculæ longitudine germinis. Variat floribus unicoloribus vel variegatis.

Mascula. 4. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.

Linn. Syst. 1242. Sauv. 23. n°. 110.

Orchis morio mas, floribus roseis, folio non maculato. Seg. tom. II. p. 125. tab. XV. fig. VI.

Orchis morio. Tour. 432. mas, foliis maculatis, vel non. Ibid.

Ostulata. 5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctulis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis.

Linn. sp. 941.

Orchis pannonica quarta Clusii. Bot. Mons. 192.

Orchis radicibus subrotundis, spica densa, crusculis labelli ampliter divergentibus. Sauv. 23.

Orchis militaris pratensis humilior. Tour. 432. Seg. 2. p. 123. tab. XV. fig. 4.

HABITAT in herbidis, à Lavanet, la Peissine, Montferrier.

Militaris. 6. ORCHIS bulbis indiyisis, nectarii labio quinquefido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. Linn. sp. 941.

Orchis latifolia hiante cucullo major. Tour. 432. Seg. 2. tab. XV. fig. 2. & 4.

Orchis parvis floribus multis punctis notatis. Bot. Mons. 303.

Orchis radicibus subrotundis ovoidæis, brachiolis labelli brevioribus, spinula ex divisione trunculi eminenti. Sauv. 22.

HABITAT à Lattes, à St. George.

* *Bulbis palmatis.*

Palmata. 7. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. Linn. sp. 941.

Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus breviore. Sauv. 23. n°. 116-117. & 24. n°. 118.

Orchis palmata pratensis longis calcaribus. Bot. Mons. 193. Seg. 132. tom. II.

HABITAT cum priori.

8. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo, *Odoratissima*,
labello ovato trilobo acuto, foliis linearibus. *Linn.*
Syst. 1243.

Orchis palmata angustifolia minor odoratissima.
Bot. Mons. 193 & 303. *Tour.* 435. *Seg. tom. III.*
tab. VIII. fig. 6.

Orchis palmata minor calcaribus oblongis. *Tour.*
435. *Seg. tom. III. tab. VIII. fig. 7.*

Orchis bulbis palmatis, angustissimo folio, calcare
gracili, ovario brevissimo. *Sauv.* 24.

HABITAT ad lævam ultra pontem, à *Selleneuve*, &
à *Rouquet près la source du Lé*s.

9. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu *Maculata*,
germinibus breviore: labio plano, petalis dorsa-
libus erectis. *Linn. sp.* 942. *Sauv.* 23. n°. 117.

Orchis montana palmata maculata. *Seg. tom. II. p.*
132. *tab. XV. fig. XVI. Tour.* 436.

HABITAT au mont *St. Loup*, & cum priori.

* *Bulbis fasciculatis.*

10. ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii *Abortiva*,
labio ovato integerrimo. *Linn. sp.* 943.

Orchis radibus cylindricis, bracteis flore brevio-
ribus, labello trifido obtuso, sera germinibus bre-
viore. *Sauv.* 23.

Lymodorum Austriacum. *Tour.* 437. *Seg. tom. II.*
pag. 137.

HABITAT copiosè à *la Peissine* & in pinetis à *Lava-*
lette cum *coronilla minima*, *astragalo Monspessu-*
lano & *globularia*.

S A T Y R I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 824.

Char. secund. *Riz.* bulbosa, geminata vel fas-
ciculata. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* al-
terna vaginans integerrima. *Flor.* terminalis
spicata. *Fulc.* bractea ad basim floris cuius-
libet.

1. SATYR. bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii *Hircinum*,
labio trifido, intermedia linearis obliqua præmorsa.
Linn. sp. 944.

Orchis barbata fœtida. *Bot. Mons.* 192.

Orchis barbata odore hirci, breviore & latiore folio.
Tour. 433. *Seg. tab. XV.* fig. 1.

Satyrium radicibus subrotundis, labello longissimo
gracili, calcare brevissimo. *Sauv.* 24.

HABITAT à *Lavalette* juxta amnem. Caulis sæpè fistulosus, pedalis. Lacinia nectarii intermedia contorta longissima. Bracteæ subulatæ germinibus multo longiores.

O P H R Y S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 828.

Char. secund. *Rad.* bulbosa solida, simplex vel ramosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* alterna simplex integerrima vaginans (in una specie opposita.) *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* bracteæ ut in prioribus.

* *Bulbis ramosis.*

Nidus avis. 1. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido. *Linn. sp.* 945.

Neottia bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido.
Sauv. 25.

Nidus avis. *Tour.* 437.

Le Nid d'oiseau.

HABITAT in umbrosis, à *Villemagne*, *Fougeres*, *La-malou*.

Spiralis. 2. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule subflio, floribus secundis, nectarii labio indiviso.
Linn. sp. 945.

Orchiastrum autumnale pratense spirale album odoratum. *Seg. tom. III. tab. VIII.* fig. 9.

Orchis spiralis odorata alba. *Bot. Mons.* 193. *Tour.* 433.

Neottia bulbis fasciculatis, nectarii labio indiviso.
Linn. sp. 945. *Sauv.* 25.

HABITAT à *Laverune*, à *Montferrier* & *Lavalette* ultra amnem. Floret autumno. Odor suavissimus.

Folia radicalia ovata latiuscula. Caulis à latere bulbi.

Ovata. 3. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. sp.* 946. *Sauv.* 128.

Ophrys bifolia. *Bot. Mons.* 191. *Tour.* 437. *Seg. tom. II.* p. 138.

Double-Feuille.

HABITAT au-delà du pont Juvenal à droite vers Souliers, & à la Font Pompiniane. Bracteæ minimæ.

* *Bulbis rotundis.*

4. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nectarii *Antropophora* labio linearis tripartito, medio elongato bifido. Linn.
sp. 948.
Ophrys bulbis subrotundis, scapo folioso, &c. Linn.
Syst. 1245.
Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans. Bot.
Mons. 192. Tour. 433. Seg. tom. II. p. 126. Sauv. 23.
Neottia bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido.
Sauv. 25.
HABITAT in pratis ad dexteram à Sembres, Selleneuve.
5. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nectaria-*Insectifera*.
rii labio subquinquelobo. Linn. sp. 948.
Cypripedium bulbis subrotundis, foliis oblongis cau-
linis. *Sauv.* 24.
- a. Orchis muscam referens minor. Bot. Mons. 193. galea Myodes.
& alis herbidis. Tour. 434.
Cypripedium radicibus subrotundis, calcare nullo, la-
bello latiusculo bisulco, brachiolis brevibus. *Sauv.* 25.
- b. Orchis muscam referens major. Bot. Mons. 193. Tour.
434.
c. Orchis muscam referens lutea. Bot. Mons. 193. Tour.
434.
d. Orchis radicibus subrotundis, calcari nullo, labello
latissimo holosericeo unicolore integro obtuso. *Sauv.*
25. 26. n°. 127. Seg. 2. Tab. XV. f. 2. p. 131.
Orchis muscam referens, colore rubiginoso. Bot.
Mons. 192. Tour. 434. Seg. 2. p. 131.
- e. Orchis araneam referens. Tour. 434. Tab. 247. fig. C. Adrachnites
Seg. tom. III. Tab. 8. fig. 1.
Orchis araneam referens, rostro recurvo. Seg. tom.
III. Tab. 8. fig. 2.
HABITAT in pratis : a. à la Peissine, Caunelles. b. in
iisdem locis & à Castelnau. c. tantum ipsam vidi-
mus à la Peissine dans le parc & à Laverune. d. cum
prioribus & à Lavanet. e. A Caunelles, Gramont,
au Terrail. Occurrit ultrà amnem à Castelnau.

S E R A P I A S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 825.

Char. secund. *Rad.* bulbosa carnosa solida vel fibrosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* alterna vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis laxè spicata. *Fulc.* ut in prioribus generibus.

Helleborine. 1. SERAP. bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis breviore. *Linn. sp.* 1245.

Latifolia. a. Serapias caule multifolio multifloro. *Sauv.* 107.
Helleborine latifolia montana. *Bot. Mons.* 126. *Tour.* 437. *Seg. 2. p.* 134.

Purpurea. b. *Helleborine montana angustifolia purpurascens.* *Bot. Mons.* 126. *Tour.* 437. *Seg. 136.*

Longifolia. y. *Helleborine floribus albis.* *Bot. Mons.* 126.
Serapias radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso petalis breviore, foliis ensiformibus. *Linn. sp.* 950.

Helleborine flore albo vel damasonium montanum latifolium. *Tour.* 437. *Seg. 2. p.* 136.

Palustris. d. Serapias angustifolia tomentosa, floribus herbaceis intus albis. *Sauv.* 42.
Helleborine angustifolia pratensis. *Bot. Mons.* 126. *Tour.* 436.

HABITAT in umbrosis humidis. *Le long du Lés,* & à *Lattes.* a. Bractæ germinibus longiores atque latiores lanceolatæ.

Lingua. 2. SERAP. bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato petalis longiore. *Linn. sp.* 950.

Satyrium radicibus subrotundis, cucullo clauso monopetalo : labello ovato-lanceolato. *Sauv.* 24.

Orchis montana Italica flore ferrugineo, lingua oblonga. *Bot. Mons.* 303. *Tour.* 434. *Seg. tom. III. p. 248. tab. 8. f. 4.*

HABITAT cum priori, à Gramont; bractæ longissimæ & latissimæ.

C Y P R I P E D I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 830.

Char. secund. *Rad.* bulboso-fibrosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* alterna subvaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis subsolitaria. *Fulc.* ut in præcedentibus.

- i. CYPRIP. radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis *Calceolus*
caulinis. Linn. sp. 951.
Calceolus. Tour. tab. 249.
Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. Sauv. 24.
Le Sabot de notre Dame.
HABITAT in herbidis humidis, à la Peissine.
Obs. anno 1760. studiosus Medicinæ, nomine Sa-
lanson, plantas quæsiturus hanc primus in agro
Monspessulano detexerat. Anno sequenti ipsam in
eodem loco vidimus, caule unifloro bifloroque.
Bractæ magnæ.

TRIANDRIA.

SISYRINCHIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 832.

Char. secund. *Rad.* bulbo-fibrosa carnosa. *Caul.*
herbacea anceps articulata ramosa. *Fol.* alterna
vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis
& lateralis, pedunculata aggregata. *Fulc.* brac-
teæ floribus interjectæ spathæformes.

- i. SISYR. caule foliisque ancipitibus. Linn. sp. 954. *Bermudiana*.
Bermudiana iridis folio, radice fibrosa. Tour. 489.
HOSPITATUR sub dio. Spatha subseptemflora, di-
phylla; foliolo inferiore minori: superiore flores
superante. Corollæ violâ martiali paulo majores,
ad basim petalorum intus luteæ.

PENTANDRIA.

PASSIFLORA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 834.

Char. secund. *Rad.* repens sarmentosa stolonifera:
Caul. fruticosa flexuosa angulata scandens. *Fol.*
alterna petiolata simplex palmata. *Flor.* axillaris
solitaria pedunculata. *Fulc.* stipulæ solutæ ge-
minæ. *Cirrus* axillaris, ad latera pedunculi.
Bractea triplex ad quemlibet calycem, involu-
criformis. *Glandula* ad basim cujuslibet laciniæ
foliorum.

Cærulea. 1. PASSIF. foliis palmatis integerrimis. *Linn. sp. 959.*
La Grenadille ou Fleur de la Passion.
 HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Folia sæpius palmata quinque vel septempartita, laciniis lanceolato-ovatis integerrimis. Petoli foliis breviores. Pedunculi petiolis longiores. Bracteæ cordatæ magnæ foliaceæ. Stipulæ reniformes dentatæ. Calix corollam mentiens foliolis infrà apicem denticulo instructis, quâ notâ à corolla distinguitur; nectarium fibris in orbem positis constat, apice violaceis aut cæruleis in medio albis, ad basim atro-purpureis. Puncta glandulosa ad basim filamentorum in medio nectarii.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 835.*

Char. secund. *Rad.* tuberosa : radiculis fibrosis lateralibus reptantibus stoloniferis. *Caul.* herbacea articulata angulata flexuosa striata simplex vel ramosa, repens vel erecta. *Fol.* alterna simplex integerrima vel integrâ, sessilis vel petiolata. *Flor.* axillaris solitaria vel aggregata, sessilis vel pedunculata. *Fulc.* nulla.

Pistolochia. 1. ARIST. foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis. *Linn. sp. 962.* Foliis subtus reticulatis. *Syst. 1249.*

Aristolochia caule infimo ramoso, foliis cordatis obsoletè serratis, floribus solitariis erectis. *Sauv. III.*

Aristolochia pistolochia dicta. *Bot. Mons. 28. Tour. 162.*

HABITAT in vineis. *A Lacolombiere, Selleneuve, Lattes,* flores pedunculati.

Rotunda. 2. ARIST. foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infimo, floribus solitariis. *Linn. sp. 962.*

Aristolochia caule infimo ramoso, foliis cordatis integerrimis, floribus solitariis erectis. *Sauv. III.*

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bot. Mons. 27. Tour. 162.*

2. Aristolochia rotunda flore ex albo purpurascente. *Bot.*
27. Tour. 162.
L'Aristolochie ronde.
 HABITAT cum priori. Folia sæpius emarginata. Caulis subtetragonous.
3. ARIST. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Linn. sp. 962.* *Longa.*
 Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis longè petiolatis, floribus solitariis. *Sauv. 111.*
 Aristolochia longa vera. *Bot. Mons. 27. Tour. 162.*
L'Aristolochie longue.
 HABITAT ad mare, à *Cette*, *Bouzigues*. Caulis quadrangulus.
4. ARIST. foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Linn. sp. 962.* *Clematitis.*
 Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis *Sauv. 111.*
 Aristolochia clematitis erecta. *Bot. Mons. 28. Tour. 162.*
Autre Aristolochie. Omnes suprà memoratæ vocantur vernaculè *Faoüterna*.
 HABITAT cum prioribus. Caulis striatus. Folia petiolata: flores longitudine ferè internodiorum.

POLYANDRIA.

ARUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 840.

Char. secund. *Rad.* tuberosa. *Caul.* scaposa simplicissima. *Fol.* radicalis petiolata vaginans simplex integerrima vel pedata. *Flor.* terminalis clavato-spicata. *Fulc.* nulla.

* *Acaulia, foliis compositis.*

1. ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis *Dracunculus* æquantibus spatham spadice longiorem. *Linn. sp. 964. Sauv. 196.*
- Dracunculus polyphyllus. Bot. Mons. 87. Tour. 160.*
La Serpentaire.
- HOSPITATUR sub dio. Non occurrit hodie in agro Monspessulano.

* *Acaulia foliis simplicibus.*

Colocasia. 2. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis repandis : basi semibifidis. Linn. sp. 965. Margine integerrimis. Sauv. 121.

Arum maximum Ægyptiacum quod vulgo colocasia. Tour. 759.

Arum Ægyptiacum. Barr. Icon. 668. & varietates. *Le pied de veau d'Egypte.*

HOSPITATUR sub dio. Folia cubitalia reticulata.

Maculatum. 3. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. Linn. sp. 966.

ARUM vulgare non maculatum. Bot. Mons. 29. Tour. 158.

¶. Arum maculatum maculis candidis & nigris. Bot. Mons. 29. Tour. 158.

Le pied de veau.

HABITAT ad rivulorum margines circà Urbem. Et in umbrosis. *A la Peissine, Laverune, Lattes.*

Arisarum. 4. ARUM acaule, foliis cordato-oblongis, spatha bifida, spadice incurvo. Linn. sp. 966.

Arisarum latifolium alterum. Bot. Mons. 27. Tour. 161.

HABITAT à Valmagne ; à Bouzigues au bord des étangs, & à Frontignan.

Z O S T E R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1068.

Char. secund. Rad. articulata nodosa subhorizontalis. Caul. nulla. Fol. fasciculata sessilis radicalis simplex integerrima florifera. Flor. pendunculata clavato-spicata epiphylla. Fulc. nulla.

Marina. 1. ZOSTERA. Linn. sp. 968.

Alga angustifolia vitriariorum. Bot. Mons. 7. Tour. 569.

L'Algue marine, ou Foin de mer, vernaculè la Moussa.
HABITAT in stagnis ubi floret Aprili ; folia basi spadicem vaginantia.



Classis XXI.

MONOECIA MONANDRIA.

ZANICHELLIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 844.

Char. secund. *Rad.* fibrosa articulata horizontalis.

Caul. herbacea ramosa articulata. *Fol.* sessilis simplex integerrima; inferior alterna; summa opposita. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla.

1. ZANICHELLIA. Linn. sp. 969. Sauv. 124. & 50. *Palustris.*
Potamogeton capillaceum capitulis ad alas trifidis.
Bot. Mons. 213.
HABITAT in amne. *A Salicate & aux Guilheins au-delà de la riviere.* Folia inferiora ad basim sæpe dilatata, vaginantia.

DIANDRIA.

LEMNA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 960.

Char. secund. *Rad.* fibrosa perpendicularis filiformis simplicissima. *Caul.* nulla, vel herbacea radicans ramosa teres. *Fol.* alterna simplex integerrima (in unâ specie radicans) sessilis vel petiolata. *Flor.* axillaris pedunculata. *Fulc.* tubi vaginantes radicularum apicem.

1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. Linn. sp. 970. *Trisulca:*
Lemna foliis lanceolatis: extremis decussatis. Sauv. 91.
Lenticula aquatica trisulca. Bot. Mons. 301.
HABITAT à Lattes, & à où mis de Fangouse.
2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radi- *Minor,*
cibus solitariis. Linn. sp. 970. Sauv. 31.
Lenticula palustris minor vulgaris. Bot. Mons. 152.

La Lentille d'eau.

HABITAT cum priori. Folia minima suborbiculata.

TRIANDRIA.

T Y P H A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 850.

Char. secund. *Rad.* carnosa horizontalis nodosa stolonifera. *Caul.* culmosa plena simplicissima teres. *Fol.* alterna simplex vaginans integerrima. *Flor.* terminalis clavato-spicata, spicis geminis alternis. *Fulc.* nulla.

Latifolia. 1. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Linn. sp.* 971.

Typha palustris major. *Bot. Mons.* 272. *Tour.* 530.

La Masse d'eau ou le Roseau.

HABITAT in arvis. *A Castelnau.*

Angustifolia. 2. TYPHA foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. *Linn. sp.* 971.

Typha palustris media. *Bot. Mons.* 273.

Typha palustris clava gracili. *Tour.* 530.

HABITAT cum priori. *A Lattes.*

S P A R G A N I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 849.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* culmosa teres ramosa. *Fol.* alterna (graminea) simplex integerima amplexicaulis. *Flor.* axillaris & terminalis pedunculata : pedunculis compresso planiusculis ; amentis globosis alternis sessilibus lateribus secundum longitudinem pedunculorum. *Fulc.* nulla.

Erectum. 1. SPARG. foliis erectis triquetris. *Linn. sp.* 971.

Sparganium ramosum. *Bot. Mons.* 245. *Tour.* 531.

Sparganium foliis assurgentibus triangulis. *Sauv.* 40.

Le Ruban d'eau.

HABITAT in amne, à *Castelnau*, *Lamousson*.

Z E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 846.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* culmosa plena articulata. *Fol.* alterna (graminea) viginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis paniculata. *Fulc.* nulla.

i. ZEA. Linn. sp. 971. Sauv. 40. Linn. Syst. 1260. Mays.

Mays granis aureis. Tour. 531.

Le Blé de Turquie; vernaculè *lou Blat d'Espagna*.

HOSPITATUR sub dio. Facta indigena, ubique occurrat in hortis.

C O I X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 847.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* culmosa plena articulata. *Fol.* alterna (graminea) viginans simplex integerrima. *Flor.* axillaris spicata spiculis solitariis. *Fulc.* nulla.

i. COIX seminibus ovatis. Linn. sp. 972.

Lachryma Jobi. Tour. 532.

Lachryma
Jobi.

La Larme de Job.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis.

C A R E X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 848.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa plena simplex teres vel triquetra. *Fol.* alternâ viginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata, spiculis solitariis pluribusvè alternis sessiliibus aut pedunculatis. *Fulc.* nulla.

* *Spica unica simplici.*

i. CAREX spica dioica simplici. Linn. sp. 972.

Dioica.

Cyperoides paryum, caulis & foliis tenuissimis triangularibus, spicâ longiore. Seg. tom. II. p. 118.

Gramen cyperoides minimum spicâ simplici. Scheuc. 497. Tab. II.

HABITAT in humidis à Prades, Montferrier. Culmi vix semipalmates simplicissimi nec articulati subnudi.

* *Spicis androgynis.*

Leporina. 2. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Linn. sp. 973.*
Gramen cyperoides parvum aquaticum. *Bot. Mons. 118.*
HABITAT à Lattes, Selleneuve.

Vulpina. 3. CAREX spica supra décomposita infernè laxiore, spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis, supernè masculis. *Linn. sp. 973. Sauv. 21.*
Gramen palustre cyperoides. *Lob. Icon. 19.*
Juncus repens grumosa & echinata spica. *Barr. Icon. 114. n°. 2.*
HABITAT cum priori. Culmi vix sesquipalmates foliis longiores.

Muricata. 4. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Linn. sp. 974.*
Gramen spicis brevibus echinatis (androgynis) sessilibus distinctis. *Sauv. 21.*
HABITAT à Lattes & à la mer. Spiculæ subquinquefloræ.

* *Spicis sexu distinctis, femineis sessilibus.*

Flava. 5. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis, mascula linearis, capsulis acutis recurvis. *Linn. sp. 975.*
Carex spicis ad apicem tribus sessilibus, fœmininis subrotundis. *Sauv. 22.*
Cyperoides palustre aculeatum capitulo breviore. *Tour. 529.*
HABITAT juxta rivulos. A Montferrier, Laverune, & à la mer.

Digitata. 6. CAREX foliis linearibus erectis, mascula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Linn. sp. 975.*

Gramen nemorosum caryophyllum spica multiplici. *Scheuchz. pag. 450.*

HABITAT à Lesperou.

* *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

Pseudo-cype- 7. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis. *Linn. sp. 978.*
Carex spicis pendulis, omnibus femineis, unica androgyna infernè mascula. *Sauv. 22.*

Cyperoides spica pendula breviore. *Tour.* 529.

HABITAT in aquis, à Lavalette, Castelnau.

* *Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.*

3. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subsessili- *Acuta.*
bus, capsulis obtusiusculis. *Linn. sp.* 978.

a. Carex spicis erectis oblongis sessilibus alternis folio flo- *Nigra.*
rali brevioribus, superioribus masculis. *Sauv.* 21.

Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Tour.* 529.

b. Carex spicis masculis superioribus numerosis, femineis *Ruffa.*
inferioribus, intermedia unica androgyna. *Linn. sp.*
979. *Sauv.* 22.

Cyperoides latifolium spicæ ruffa sive caule triangulo.
Bot. Mons. 117. *Tour.* 529.

HABITAT à Castelnau, Gramont. Altitudo prioris ses-
quipedalis.

9. CAREX spicis masculis pluribus, femineis peduncu- *Vescaria.*
latis, capsulis inflatis acuminatis. *Linn. sp.* 979.

Cyperoides polystachion spicis teretibus erectis. *Tour.*
529.

HABITAT à Lesperou & au mont St. Loup.

TETRANDRIA.

B E T U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 855.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arbo-
rea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra;
Flor. axillaris pedunculata pedunculis solitariis
ramosis. *Fulcr.* stipulæ geminæ solutæ deciduæ:

i. BETULA pedunculis ramosis. *Linn. sp.* 983. *Alnus.*

Alnus. *Sauv.* 306. *Linn. Fl. Suec.* 775. *Fl. Lapp.* 340.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Bot. Mons.* 11.
Tour. 587.

L'Aulne, ou Aune.

HABITAT à Lavanet, à Lesperou. Folia obversè ovata
duplicato-serrata.

B U X U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 854.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticu-

losa, ramis subtetragonis. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* sessilis opposita axillaris & terminalis. *Fulc.* nulla.

- Sempervirens.* 1. BUXUS. Linn. sp. 983. Bot. Mons. 44. Tour. 578.
Le Buis; vernaculè, *lou Boui*.
 HABITAT à Lavalette, Valene.

URTICA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 853.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* petiolata simplex integra aut integerrima, opposita vel alterna. *Flor.* pedunculata axillaris, opposita vel alterna, pedunculis simplicibus confertis, vel ramosis solitariis. *Fulc.* pili pungentes in tota planta in plurimis speciebus.

* *Oppositifoliæ.*

- Pilulifera.* 1. URTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis. Linn. sp. 983. Sauv. 307.

Urtica urens pilulas ferens. Bot. Mons. 281.

Urtica prima Dioscoridis, semine lini. Tour. 535.
L'Ortie Romaine.

HABITAT in arvis. Folia profundè dentata. Pedunculi amentorum petiolis longiores.

- Urens.* 2. URTICA foliis oppositis ovalibus. Linn. sp. 984. Sauv. 307.

Urtica urens minor. Bot. Mons. 282. Tour. 535.

L'Ortie grecque; vernaculè, *l'Ourtica*.

HABITAT cum priori.

- Dioica.* 3. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis. Linn. sp. 984.

Urtica foliis oblongo-cordatis. Sauv. 307.

Urtica urens maxima. Bot. Mons. 281. Tour. 534.
L'Ortie ordinaire.

HABITAT in hortis & ad agrorum margines.

- Parietaria.* 4. URTICA foliis oppositis lanceolatis integerrimis, hinc angustioribus. Linn. sp. 985.

Urtica altera pilulifera parietariæ folio. Tour. 535.

HOSPITATUR sub dio. Caulis vix semi-pedalis. Racemi axillares gemini petiolis longiores. Folia obliquè lanceolata glabra.

* *Alternifoliae.*

5. URTICA foliis alternis cordato-ovatis, amentis ramosis distichis erectis. *Linn. sp. 985.* *Canadensis.*

Urtica maxima racemosa Canadensis. Tour. 536.

HOSPITATUR sub dio. Caulis glaber bipedalis ramosissimus. Folia serrata acuminata petiolo brevissimo. Amenta foliis breviora axillaria solitaria paniculata ramosa.

M O R U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 857.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. axillaris pedunculata subsolitaria. Fulc. nulla.*

1. MORUS foliis obliquè cordatis lèvibus. *Linn. sp. 986. Alba.*
Sauv. 117.

Morus fructu albo. Bot. Mons. 178. Tour. 589.

Le Murier blanc; vernaculè, l'Amourie.

HABITAT in arvis. Folia bombycum pabula.

2. MORUS foliis cordatis scabris. *Linn. sp. 986. Nigra.*
Morus fructu nigro. Bot. Mons. 178. Tour. 589.
Le Murier noir; vernaculè, las Amouras de Dama.
HABITAT cum priori. Variat foliis quinquelobis.

P E N T A N D R I A.

XANTHIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 858.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna petiolata simplex integerrima vel integra. Flor. axillaris sessilis solitaria vel conferta. Fulc. aculei supra capsulas (spinæ geminæ loco stipularum in unâ specie.)*

1. XANTH. caule inermi, foliis cordato-lobatis, floribus aggregatis. *Strumaria.*

Xanthium caule inermi. Linn. sp. 987.

Xanthium. Tour. 439.

Lappa minor sive Xanthium Dioscoridis. Bot. Mons. 150.

Le petit Glouteron; vernaculè, lous Tira peouisés.

HABITAT in arvis. Folia longè petiolata duplicato-serata. Flores tres quatuorve simul.

Spinosum. 2. XANTH. spinis tridentatis, foliis subsessilibus hastato-trilobis integerrimis, floribus solitariis.

Xanthium spinis ternatis. *Linn. sp.* 987.

Xanthium laciniatum validissimis aculeis munitum. *Tour.* 439.

HABITAT ubique in arvis, & ad margines sepium. Folia subtus incana. Facta indigena.

A M B R O S I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 859.

Char. secund. Rad. subfusiformis. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna petiolata simplex multifida. Flor. feminea axillaris conferta sessilis, mascula terminalis spicata. Fulc. denticuli supra capsulas.

Asperifolia. 1. AMBR. foliis bipinnatifidis, racemis solitariis pilosis. *Linn. sp.* 988.

Ambrosia maritima. *Tour.* 439.

Ambrosia foliis tripartitis multifidis. *Sauv.* 294.

Ambrosia vulgaris. *Barr. Icon.* 1144.

L' Ambrosie.

HOSPITATUR sub dio. Caulis racemi, foliaque pubescentia. Folia sæpè opposita. Racemi subsessiles.

P A R T H E N I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 860.

Char. secund. Rad. subfusiformis tenuis. Caul. herbacea teres subsimplex. Fol. alterna petiolata simplex multifida. Flor. terminalis paniculato corymbosa. Fulc. nulla.

Hysterophorus. 1. PARTH. foliis composito-multifidis. *Linn. sp.* 988.

HOSPITATUR sub dio. Facies & altitudo ambrosiae. Caulis striatus. Laciæ foliorum inferiores minores, superiores lanceolatæ incisæ acuminatæ.

A M A R A N T H U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 861. *L'Amarante.*

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea striata ramosa. Fol. alterna petiolata simplex

integerrima, *Flor.* terminalis vel axillaris, glomerata vel racemosa, sessilis aut petiolata. *Fulg.* nulla, (in unâ specie spinæ geminæ axillares.)

* *Triandri.*

1. AMAR. capitellis seu glomerulis triandris subrotundis *Tricolora*, amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn.*
sp. 989. Lanceolato-ovatis. *Syst. 1268.*

Amaranthus folio variegato femina. *Tour. 236.*

Amaranthus tricolore folio. *Barr. Icon. 647.*

L' Amarante.

HOSPITATUR sub dio.

2. AMAR. glomerulis triandris axillaribus sessilibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn. Syst. 1268.* *Melancholia-*
cus.

Amaranthus capitellis triandris subrotundis sessilibus, foliis lanceolatis sparsis. *Linn. sp. 989.*

Amaranthus folio obscuriore variegato seu mas. *Tour. 236.*

HOSPITATUR sub dio.

3. AMAR. glomerulis triandris axillaribus, foliis lanceolatis repandis obtusis. *Linn. Syst. 1268.* *Gracizans*

Amaranthus floribus triandris conglomeratis axillaribus, foliis lanceolatis obtusis. *Linn. sp. 990.*

HOSPITATUR sub dio.

4. AMAR. floribus triandris erectiusculis, foliis ovatis *Blitum*, retusis. *Linn. Syst. 1268.*

Amaranthus floribus glomeratis lateralibus, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Linn. sp. 990.*

Blitum sylvestre spicatum. *Tour. 507.*

Blitum album minus. *Bot. Mons. 38.*

HABITAT in cultis & hortis.

* *Pentandri.*

5. AMAR. racemis pentandris simplicibus pendulis longissimis. *Linn. Syst. 1269.* *Caudatus.*

Amaranthus maximus. *Tour. 254.*

L' Amarante; vernaculè, *la Cresta de Gal.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana.

6. AMAR. racemis pentandris compositis congestis nudis, spiculis conjugatis. *Linn. Syst. 1268.* *Hybridus.*

Amaranthus racemis pentandris cylindricis horizonta-
libus, caule inermi. *Linn. sp.* 990.

Amaranthus inermis, floribus lateralibus sessilibus
confertis, foliis ovatis. *Sauv.* 103.

HOSPITATUR sub dio.

Hypocondria. 7. AMAR. racemis pentandris compositis erectis, foliis
eus. oblongo-ovatis. *Linn. Syt.* 1269.

Amaranthus racemis pentandris cylindricis erectis,
caule inermi. *Linn. sp.* 991.

Amaranthus sylvestris maximus novæ Angliæ, spicis
pùrpureis. *Tour.* 1235.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo priorum.

Spinosus. 8. AMAR. racemis pentandris, axillis spinosis. *Linn.*
Syt. 1269.

Amaranthus racemis cylindricis erectis, axillis spino-
sis. *Linn. sp.* 991.

Amaranthus Indicus spinosus, spica herbacea. *Tour.*
236.

HOSPITATUR sub dio. Spinæ longiusculæ erectæ.

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 871.

Char. secund. *Rad.* articulata horizontalis stolo-
nifera. *Caul.* herbacea articulata ramosa. *Fol.*
verticillata sessilis simplex dichotoma. *Flor.*
axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla.

Demersum. 1. CERATOPH. *Linn. sp.* 992.

Ceratophyllum folijs asperis bis bifurcatis. *Sauv.* 160.
L'Hydre cornu.

HABITAT in aquis. *A Castelnau, Caunelles.* Folia sa-
pius sena.

MYRIOPHYLLUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 870.

Char. secund. *Rad.* articulata horizontalis stolo-
nifera. *Caul.* herbacea articulata ramosa. *Fol.*
verticillata sessilis linearis-pinnata. *Flor.* verti-
cillata axillaris sessilis aut verticillato - spicata
terminalis pedunculata. *Fulc.* nulla.

1. MYRIOPH. floribus masculis interruptè - spicatis. *spicatum.*
Linn. sp. 992.
 Potamogeton foliis pennatis. *Tour. 233.*
 Millefolium aquaticum pennatum *spicatum.* *Bot. Mons. 138.*
Le Volant d'eau.
 HABITAT in amne. Folia quina vel sena.
 2. MYRIOPH. floribus omnibus verticillatis. *Linn. sp. verticillatum*
992. Sauv. 160.
 Potamogeton flosculis ad foliorum nodos. *Tour. 233.*
 Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos.
Bot. Mons. 178.
 HABITAT cum priori.

SAGITTARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 869.

Char. secund. *Rad.* horizontalis fibrosa stolonifera. *Caul.* scaposa ramosa. *Fol.* radicalis petiolata simplex integerrima, basi vaginans. *Flor.* terminalis verticillato-subracemosa. *Fulc.* nulla.

1. SAGIT. foliis sagittatis acutis. *Linn. sp. 993.* *Sagittifolia.*
 Ranunculus aquaticus folio sagittato minor. *Tour. 292.*
 Sagitta aquatica minor latifolia. *Bot. Mons. 228.*
 Sagittaria foliis sagittatis ligulatis. *Sauv. 27. & 77.* *Angustifolia.*
 2. Sagittaria foliis sagittatis ligulatis. *Sauv. 29.* *Latifolia.*
La Flèche d'eau.
 HABITAT à la Roubine, à Lattes. β. A Nîmes dans le Vistre.

THELIGONUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 864.

Char. secund. *Rad.* horizontalis stolonifera. *Caul.* teres herbacea articulata subsimplex. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima succulenta. *Flor.* sessilis, feminea axillaris solitaria, mascula folio & flore femineo opposita subsolitaria. *Fulc.* nulla.

1. THELIG. *Sauv. 129. Linn. sp. 993.* *Cynocrambe.*
 Alsine parietariæ foliis. *Bot. Mons. 15.*
 Cynocrambe Dioscoridis. *Mag. ch. pl. 150.*

HABITAT in rupium fissuris. *A Bousigues*, *Frontignan*.
Petioli ad basim dilatati semiamplexicaules auriculati. Folia in petiolum decurrentia ovata. Geniculi tumidi. Cauliculi procumbentes. Flores masculi non flores femineos oppositos sed inferiores verosimiliter fecundant. Folia interdum opposita.

P O T E R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 868.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna impari-pinnata: foliolis simplicibus integris. *Flor.* capitata solitaria terminalis & axillaris. *Fulcr.* stipulæ geminæ solutæ foliaceæ. Bractea ad basim floris singuli.

Sanguisorba. 1. POTER. inerme, caulis subangulosus. *Linn. sp.* 994.
Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *Bot. Mons.* 204. *Tour.* 157.

Poterium inerme filamentis longissimis. *Sauv.* 220.
La petite Pimprenelle; vernaculè, *de Pimpanela*.

HABITAT in arvis & incultis. Foliola petiolata incisa.

Hybridum. 2. POTER. caulis teretibus strictis. *Linn. sp.* 994.
Poterium agrimonoides. *Sauv.* 220.

Pimpinella agrimonoides odorata. *Tour.* 157.
La Pimprenelle odorante ou musquée.

HOSPITATUR sub dio. Foliola ovalia dentata villosa, superiora majora.

spinosum. 3. POTER. spinis ramosis. *Linn. sp.* 994.

Pimpinella spinosa seu sempervirens. *Tour.* 157.

Pimpinella spinosa. *Barr. Icon.* 631.

La Pimprenelle épineuse.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo. Foliola superiora obversè-ovata, cuneiformia majora. Petioli dilatati amplexicaules seu vaginantes.

Q U E R C U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 872.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna simplex integerrima, integra vel incisa, sessilis aut petiolata. *Flor.* axillaris con-

ferta sessilis. *Fulc.* spinulæ inermes retroflexæ supra calyces femineos.

1. QUERCUS foliis ovato-oblongis indivisis serratisque *Ilex*. subtus tomentosis, cortice integro. *Linn. Syst.* 1271.
Sauv. 96.
Ilex folio oblongo serrato. *Tour.* 583.
Ilex arbor. *Bot. Mons.* 141.
2. Quercus (*smilax*) foliis oblongo-ovatis subtus tomentosis integerrimis. *Linn. sp.* 994. *Sauv.* 96.
Ilex folio angustò non serrato. *Tour.* 583.
L'Yeuse ou Chêne vert; vernaculè, *l'Eoïsé*.
HABITAT à *Valene*.
3. QUERCUS foliis oblongo-ovatis sinuato-spinosis *Gramuntia*. sessilibus subtus tomentosis, glandibus pedunculatis. *Sauv.* 96. *Linn. sp.* 995.
Ilex arbor foliis rotundioribus & spinosis. *Bot. Mons.* 141.
HABITAT à *Gramont*, *Lavalette*. Hanc superioris varietatem habuerat *Gerard*. Vid. *Linn. Syst.* 1273. quod falsum. In superiore folia petiolata.
4. QUERCUS foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis *Coccifera*. utrinque glabris. *Linn. sp.* 995.
Quercus foliis ovatis dentato-spinosis, glandibus sessilibus. *Sauv.* 96.
Ilex aculeata cocciglandifera. *Bot. Mons.* 140. *Tour.* 583.
Vernaculè, *lous Avavusés*.
HABITAT cum priori.
5. QUERCUS foliis deciduis oblongis supernè latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis. *Linn. sp.* 996. *Sauv.* 272.
Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo. *Bot. Mons.* 215. *Tour.* 582.
Quercus foliis subtus tomentosis pinnato-sinuatis supernè latioribus. *Sauv.* 271.
Le Chêne; vernaculè, *lou Chaïne*, *lou Rouvé*.
HABITAT juxta amnem, & à *Gramont*.
6. QUERCUS foliis oblongo-ovatis indivisis ferratis subtus tomentosis, cortice rimoso fungoso. *Linn. sp.* 995. *Sauv.* 96.
Suber latifolium perpetuovirens. *Tour.* 584.
Le Liège; vernaculè, *lou Ciauré*.

HOSPITATUR sub dio. Nuper periit arbor quam propè Gramuntium plantaverat Dominus Nissole.

J U G L A N S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 872.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.
Fol. alterna impari - pinnata : foliolis sessilibus
 integerrimis. *Flor.* axillaris subsessilis conferta.
Fulc. stipulæ deciduæ geminæ solutæ.

Regia. 1. JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis subæqualibus. *Linn. sp.* 997.
 Nux juglans regia vulgaris. *Bot. Mons.* 187. *Tour.* 58.
Le Noyer; vernaculè, *lou Nouguie*.
 HABITAT in vineis & in ambulacris. Flores sæpè tres
 vel quatuor simul.

F A G U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 874.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.
Fol. alterna petiolata simplex integerrima vel
 integra. *Flor.* axillaris sessilis conferta spicata
 vel capitata. *Fulc.* stipulæ geminæ deciduæ.
 Spinulæ supra capsulas.

Castanea. 1. FAGUS foliis lanceolatis acuminato - ferratis subtus nudis. *Linn. sp.* 997.
 Castanea sativa. *Bot. Mons.* 55. *Tour.* 584.
Le Chataignier; vernaculè, *lou Castanié*.
 HABITAT à *Lesperou*, dans les Cévennes. Flores masculi spicati.

sylvatica. 2. FAGUS foliis ovatis obsoletè-serratis. *Linn. sp.* 998.
 Fagus foliis ovatis undulatis serratis. *Sauv.* 98.
Fagus. *Tour.* 584.
Le Hêtre ou Fau; vernaculè, *lou Faoii*.
 HABITAT cum priori. Foliorum margines villoſi. Flores masculi glomerati.

C A R P I N U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 876.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra.

Flor. ramea terminalis, amentis racemosis.

Fulc. stipulæ geminæ deciduæ solutæ.

1. CARP. squamis strobilorum planis. *Linn. sp. 998.* *Betulus.*

Carpinus. *Bot. Mons. 50. Tour. 582.*

Le Charme; vernaculè, *la Charmia*

HABITAT ubique. Folia duplicato-serrata ovato-lanceolata. Squamæ strobilorum trilobæ : intermedio longiori oblongo apice serrato.

C O R Y L U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 875.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna petiolata simplex integra. *Flor.* ramea terminalis glomerata. *Fulc.* stipulæ geminæ deciduæ solutæ.

1. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Linn. sp. 998.* *Avellana.*

Corylus sylvestris. *Tour. 582.*

Avellana sylvestris seu corylus sylvestris. *Bot. Mons. 35.*

Le Noisetier; vernaculè, *l'Abelanie*.

HABITAT à *Laverune*. Copiosissima à *Lamalou*. Folia duplicato-serrata, petiolo brevissimo, ovata acuminate. Rami recti.

P L A T A N U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 877.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna petiolata simplex integra. *Flor.* feminea pedunculata capitata; mascula. . . .

Fulc. stipula vaginans solitaria decidua.

1. PLATANUS foliis palmatis. *Linn. sp. 999.* *Orientalis.*

Platanus Orientalis verus. *Tour. 590.*

Le Platane d'Orient.

HOSPITATUR sub dio. Truncus incanus. Folia tenella subtus tomentosa.

2. PLATANUS foliis lobatis. *Linn. sp. 999.* *Occidentalis.*

Platanus Occidentalis. *Tour. 590.*

Le Platane d'Occident.

HOSPITATUR cum priori. Frequens in hortis.

MONADELPHIA.

PINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 879.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.
Fol. conferta sessilis simplex integerrima solitaria vel geminata. *Flor.* axillaris subsolitaria pedunculata. *Fulc.* stipula tubulosa solitaria vaginalis foliorum basim, vel nulla.

* *Foliis pluribus ex eadem basi vaginali.*

Sylvestris. 1. PINUS foliis geminis, primordialibus solitariis glabris. Linn. sp. 1000. Sauv. 44.

Pinus vulgaris Genevensis. Tour. 586.

2. *Pinus maritima altera.* Bot. Mons. 205.
Le Pin sauvage.

HABITAT ad mare. *A Valene, au mont St. Loup,*
Lavalette, & vicinis.

Pinea. 2. PINUS foliis geminis, primordialibus solitariis ciliatis. Linn. sp. 1000. Sauv. 44.

Pinus sativa. Bot. Mons. 205. Tour. 585.

Le Pin; vernaculè, lou Pin, las Pincas.

HABITAT à la Peissine, à Aiguemortes.

* *Foliis solitariis & basi distinctis.*

Picea. 3. PINUS foliis solitariis emarginatis. Linn. sp. 1001.
Abies taxi folio, fructu sursum spectante. Tour. 585.
 Seg. 2. pag. 254.

Le Sapin; vernaculè, lou Sapin.

HOSPITATUR sub dio.

Abies. 4. PINUS foliis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. Linn. sp. 1001.

Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo. Tour. 585. Seg. 2. p. 254.

Le faux Sapin.

HOSPITATUR sub dio.

THUJA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 882.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruti-

cosa. *Fol.* imbricata conferta integerrima. *Flor.*
... *Fulc.* ...

1. THUJA strobilis squarrofis, squamis acuminatis re- *Orientalis.*
flexis. *Linn.* sp. 1002.

L'Arbre de vie Oriental.

HOSPITATUR in caldario. Folia seminalia bina lan-
ceolata. Folia radicalia quaterna verticillata subu-
lata decidua; deinde bina opposita etiam decidua.
Caulina verò persistentia ovata imbricata.

C U P R E S S U S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 881.

Char. secund. *Rad* ramosa lignosa. *Caul.* arborea:

Fol. imbricata opposita conferta integerrima.

Flor. sparsa sessilis subsolitaria. *Fulc.* nulla.

1. CUPRESSUS foliis imbricatis, frondibus quadran- *Sempervirens*
gulis. *Linn.* sp. 1002.

Cupressus. *Bot. Mons.* 81.

Cupressus meta in fastigium convoluta (*femina*) *Tour.* *Femina*:
587.

2. *Cupressus* ramos extra se expargens (*mas*) *Tour.* 587. *Mas*:

Le Cyprès; vernaculè, lou Cipré.

HABITAT à *Lavalette, Castelnau, la Peissine, &c.*

C R O T O N.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 866.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea
ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra.

Fol. axillaris pedunculata conferta. *Fulc.* nulla.

1. CROTON foliis rhombeis repandis, capsulis pen- *Tindorium.*
dulis, caule herbaceo. *Linn.* sp. 1004.

Heliotropium tricoccum. *Bot. Mons.* 126.

Croton foliis ovatis plicatis scabris, capsulis pendu-
lis, pedunculis ramosis. *Sauv.* 305.

Ricinoides ex quo paratur tournesol Gallorum. *Tour.*
655.

Le Tournesol; vernaculè, lou Tournesol.

HABITAT in arvis & incultis circà urbem. Folia lon-
gè petiolata sinuata. Rami & folia tenella pulve-
rulenta.

RICINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 883.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.* herbacea ramosa teres fistulosa. *Fol.* alterna peltata simplex palmata petiolata : petiolis fistulosis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fult.* glandulæ petiolares. Spinulæ flexiles supra capsulas.

vulgaris. 1. RICINUS foliis peltatis subpalmatis serratis. *Linn.* Syft. 1276.

Ricinus. *Linn.* sp. 1007. *Tour.* 532.

Le Ricin.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Caulis rubens glaber. Foliorum laciniæ acuminatæ ferratæ. Petioles longissimi. Glandulæ sæpius tres supra petiolum quemlibet, quarum duæ ad basim, altera verò ad apicem petioles. Calyx masculus femineo multo major. Tota planta (exceptis radicibus fructibusque) fistulosa.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 885.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.* herbacea procumbens aut volubilis. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima aut inciso-pinnatifida. *Flor.* axillaris petiolata : petiolis uni vel multifloris. *Fult.* Bractea ad basim floris singuli. (In quibusdam cirrhi axillares ad latera peduncolorum : in aliis spinulæ inermes supra capsulas.)

Balsamina. 1. MOMORD. pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. *Linn.* sp. 1009.

Momordica vulgaris. *Tour.* 103.

La Pomme de Merveille.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi uniflori. Bractea in medio peduncolorum cordata sessilis amplexans pedunculum. Cirrhi simplices.

Luffa. 2. MOMORD. pomis oblongis, sulcis catenulatis, foliis incisis. *Linn.* sp. 1009.

Luffa

Luffa Arabum. Prof. Alp. de plantis Aegypti.

HOSPITATUR sub dio. Cirrhi ad apicem ramosi.

3. *MOMORD. pomis hispidis, cirrhis nullis. Linn. sp. Elaterium.*
1010.

Cucumis sylvestris asininus dictus. Bot. Mons. 81.

Tour. 104.

Le Concombre d'âne; vernaculè lou Coucombré d'asé.

HABITAT ad margines fatorum. Circà Urbem: folia cordato-angulata subtus villosa. Petiolis hispidis. Bracteæ subulatæ.

C U C U R B I T A,

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 887.

Char. secund. *Rad. fusiformis subsimplex. Caül.*

herbacea volubilis ramosa. *Fol. alterna pétio-*
lata simplex integra vel incisa. Flor. axillaris
pedunculata solitaria. Fulc. cirrus laterifolius.
(*Glandulæ in quibusdam epiphyllæ.*)

1. *CUCURB. foliis subangulatis cordatis tomentosis Lagenaria.*
basi subtus biglandulosis. *Linn. sp. 1010. Pomis*
lignosis.

Cucurbita seminibus obsoletè bicornibus. Sauv. 112.

Cucurbita lagenaria. Tour. 107.

La Calebasse ou Courge de Pelerin; vernaculè la Gourda.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longissimi stricti.

2. *CUCURB. foliis lobatis, pomis lœvibus. Linn. sp. Pepo.*
1010.

Cucurbita seminum margine integro tumido. Sauv.

112.

Pepo oblongus. Tour. 105.

La Courge de Saint Jean.

HABITAT in hortis.

3. *CUCURB. foliis lobatis, caule erecto, pomis depres- Melopepo.*
so-nodosis. *Linn. sp. 1010.*

Melopepo clipeiformis. Lob. 642. Tour. 106.

Le Bonnet d'Electeur; vernaculè lou Pastisson.

HABITAT cum oleribus. Folia ad margines denticulata,
cordato-angulata.

4. *CUCURB. foliis lobato-pinnatifidis; lobis obtusis. Citrullus.*
Cucurbita foliis multipartitis. Linn. sp. 1010. Sauv.

198.

Anguria citrullus dicta. *Tour.* 106.

La Citrouille; vernaculè *la Citrouia ou pastequa.*
HABITAT cum prioribus.

C U C U M I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 886.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.* herbacea ramosa flexuosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra vel incisa. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* cirrus laterifolius.

Colocynthis. 1. CUCUMIS foliis multifidis, pomis globosis glabris.

Linn. sp. 1011.

Colocynthis fructu rotundo major. *Tour.* 107.

La Coloquinte ordinaire.

HOSPITATUR sub dio.

Anguria. 2. CUCUMIS foliis palmato-sinuatis, pomis subovatis echinatis. *Linn. sp.* 1011.

Anguria Americana fructu echinato eduli. *Tour.* 107.

HOSPITATUR sub dio.

Melo. 3. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Linn. sp.* 1011.

Melo vulgaris. *Tour.* 104.

Le Melon; vernaculè *lou Meloun.*

HOSPITATUR sub dio.

Sativus. 4. CUCUMIS foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Linn. sp.* 1011.

Cucumis sativus vulgaris. *Tour.* 104.

Le Concombre; vernaculè *lous coucoumbrés.*

HOSPITATUR cum prioribus.

B R Y O N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 889.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea volubilis *Fol.* alterna petiolata simplex multifida. *Flor.* axillaris pedunculata : pedunculis multifloris. *Fulc.* cirrus subaxillaris nisi laterifolium mavis.

Alba. 1. BRYON. foliis palmatis utrinque calloso - scabris.

Linn. sp. 1012.

Bryonia alba baccis nigris. *Tour.* 103. *Bot. Mons.* 39.
La Bryoyne, Bryone ou Couleuvrée.

HABITAT à Castelnau; Lamousson. Folia cordato-palmata.

2. BRYON. foliis palmatis scabris : laciniis lanceolatis *Laciniosa*, serratis, lateralibus minimis. Linn. sp. 1013.
Bryonia zeylanica foliis in profundas lacinias divisis.
Tour. 103.
 HOSPITATUR sub dio. Folia subsessilia, laciniæ sæpius pinnatifidæ.


GYNANDRIA.

ANDRACHNE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 862.

Char. secund. Rad. tenuis, simplex. Caul. herbaea procumbens teres ramosa. Fol. alterna secunda petiolata simplex integrerrima. Flor. axillaris pedunculata solitaria. Fulc. stipulæ minimæ solutæ geminæ.

1. ANDRAC. procumbens herbacea. Linn. sp. 1014. *Telephioides*.
 Telephioides græcum humifusum, flore albo. *Tour.*
Cer. 50.
Andrachne pinnata. Sauv. 227.
 HOSPITATUR sub dio. Folia ovata. Pedunculi superne incrassati petiolis longiores. Calyces capsulis subæquales persistentes.



Classis XXII.

DIOECIA MONANDRIA.

NAJAS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 843.

Char. secund. *Rad.* horizontalis articulata. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* opposita sessilis subconnata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* aculei in caule sparsi.

Marina. 1. NAJAS. Linn. sp. 1015. Sauv. 159. & 124.

La Nayade.

HABITAT in stagnis & in amne. Folia linearia sinuato-dentata, terna vel quaterna, s̄epissimè bina. Pedunculi brevissimi. *A Semalen, & à Salicate.*

DIANDRIA.

SALIX.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 892.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa arborea. *Fol.* alterna petiolata. sim plex integerrima vel integra. *Flor.* ramea terminalis pedunculata : amentis subsolitariis cylindricis. *Fulc.* in quibusdam stipulæ solutæ geminæ, in aliis glandulæ suprà petiolos vel ad margines foliorum.

* *Foliis glabris ferratis.*

Vitellina. 1. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris : serraturis cartilagineis, petiolis calloso - punctatis. Linn. sp. 1016.

Salix lento vimine & squama florali flavis, foliis elliptico-lanceolatis. Sauv. 58.

Salix sativa lutea, folio crenato. Tour. 590.

L'Ozier; vernaculè *l'Amarinié*, *las Amarinas*.

HABITAT à *Saint Guillen le Désert*, à *Lesperon*.

2. SALIX foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, *Amygdalina*.
stipulis trapæzi-formibus. Linn. sp. 1016.

Salix foliis glabris acutè serratis, &c. Sauv. 172.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. Tour.

591.

HABITAT à *Valmagne* & vicinis.

3. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibus sessili- *Rorismarinis*.
libus strictis subtus tomentosis. Linn. sp. 1020. *folia*.

Salix humilis angustifolia. Tour. 590.

HABITAT à *Lesp rou*. Folia biuncialia.

4. SALIX foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis *Fragilis*.
dentato-glandulosis. Linn. sp. 1017.

Salix foliis serratis glabris lanceolatis acuminatis
appendiculatis. Sauv. 172.

HABITAT à *Lespinouse* près de *Saint Pons*.

* *Foliis subserratis villosis*.

5. SALIX foliis ovatis rugosis : subtus tomentosis unda- *Caprea*.
tis supernè denticulatis. Linn. sp. 1020.

Salix latifolia infernè hirsuta. Bot. Mons. 228.

Salix latifolia rotunda. Tour. 591.

Salix foliis ovatis rugosis, subtus tomentosi, supernè
dentatis. Sauv. 98.

Salix foliis obscurè crenatis utrinque villosis ovato-
oblongis. Sauv. 98.

Le Saule marceau.

HABITAT à *Castelnau*, *Salason*, *Selleneuve*.

6. SALIX foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus *Viminalis*.
longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis.
Linn. sp. 1021.

Salix oblongo incano acuto folio. Bauh. Pin. 474.

Salix angustis & longissimis foliis crispis subtus albi-
cantibus. Bot. Mons. 228.

Salix foliis lanceolato linearibus subtus incanis seri-
ceis supernè glbris. Sauv. 58.

HABITAT à *Selleneuve*, *Caunelles*, *Villeneuve*.

7. SALIX foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque *Alba*.
pubescentibus : serraturis infimis glandulosis. Linn.
sp. 1021.

Salix vulgaris alba arborescens. Tour. 591.

Salix alba perticalis vulgaris. Bot. Mons. 228.
Le Saule; vernaculè lou Saoüé.
HABITAT juxtà rivulos circà Urbem.

TRIANDRIA.

O S Y R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 893.
Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. fruticosa teres striata. Fol. sessilis alterna simplex integerrima. Flor. ramea terminalis conferta pedunculata subracemosa. Fulc. nulla.

- Alba.* 1. OSYRIS. *Linn. sp. 1022. Sauv. 56.*
Casia poëtica Monspeliensem. Bot. Mons. 54. Tour. 664.
Vernaculè lou rouné.
HABITAT à Castelnau, Lavalette. Foliorum nervi decurrent in caulem.

TETRANDRIA.

V I S C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 895.
Char. secund. Rad. nulla. Caul. dichotoma parasitica articulata teres suffruticosa. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris spicata solitaria sessilis. Fulc. nulla.

- Album.* 1. VISCUM foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. sp. 1023. Sauv. 125.*
Viscum Baccis albis. Tour. 609.
La Guy de chêne.
HABITAT à Lamalou. Folia crassa.

P I S T A C I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 898.
Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata impari vel abruptè-pinnata; foliolis simplicibus petiolatis. Flor. axillaris sessilis vel petiolata, amentis cylindricis simplicibus vel ramosis. Fulc. nulla.

1. PIST. foliis subternatis. *Linn. sp. 1025. Sauv. 219. Trifolia.*
Terebinthus seu pistacia trifolia. Tour. 580.
HOSPITATUR sub. dio.
2. PIST. foliis ternatis pinnatisque suborbiculatis. *Linn. Narbonensis.*
sp. 1025.
Pistacia foliis sæpius quinatis orbiculatis. Sauv. 219.
Terebinthus peregrina fructu majore pistaciis similis
eduli. Tour. 579.
Terebinthus major pistaciæ folio. Bot. Mons. 249.
HABITAT au bois de Valene.
3. PIST. foliis impari-pinnatis : foliolis subovatis recur- *Vera.*
vis. Linn. sp. 1025.
Terebinthus indica Theophrasti seu pistacia Dioscori-
dis. Tour. 380.
Le Pistachier ou Pistacier ; vernaculè lou Pistachié.
HOSPITATUR sub. dio. Pedunculi ramosi. Fructus.
maturat.
4. PIST. foliis impari-pinnatis : foliolis ovato-lanceola- *Terebinthus.*
tis. Linn. sp. 1025. Sauv. 219.
Terebinthus vulgaris. Bot. Mons. 248. Tour. 579.
Le Terebinthe ou Terebinte ; vernaculè lou Pudis , lou
Terebinta.
HABITAT à Gramont , Castelnau , Lavalette , &c. Pe-
dunculi ramosi. Foliola vel integerrima vel ferrata.
5. PIST. foliis abruptè-pinnatis. *Linn. sp. 1026. Sauv. Lentiscus.*
219. Foliis lanceolatis.
Lentiscus vulgaris. Bot. Mons. 153. Tour. 580.
Le Lentisque ; vernaculè lou restencle.
HABITAT circà Urbem & cum priori. Amenta ge-
minata, sessilia brevia divergentia compacta. Foliola
sæpius utrinque 6. vel 5. integerrima. Petioli mar-
ginati.

C E R A T O N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 899.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. fruti-*
cosa. Fol. alterna abruptè pinnata : foliolis
integerrimis subsessilibus. Flor. axillaris race-
mosa. solitaria sessilis. Fulc. nulla.

1. CERATONIA. *Linn. sp. 1026. Sauv. 219.*
Siliqua edulis. Tour. 578.

Siliqua

Ei. iiiij

Le Couroubier ou Caroubier; vernaculè las Couroubias.
HOSPITATUR in hybernaculo. Foliola suborbiculata
vel obcordata integerrima sinuata quinquejuga,
superiora majora; cæteris decrescentibus. Calyces
masculi pedunculati, feminei sessiles.

S P I N A C I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 900.
Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea
 ramosa. Fol. alterna petiolata simplex integra.
Flor. subspicata terminalis & axillaris. Fulc.
nulla.

Oleracea. 1. SPINACIA. Linn. sp. 1027. Sauv. 273.
 Spinacia mas. Tour. 533. & femina. Ibid.
Les Epinards; vernaculè lous Espinars.
 HABITAT in cultis.

C A N N A B I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 901.
Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea
 striata ramosa. Fol. Alterna petiolata digitata:
 foliolis quinque integris. Flor. axillaris & termi-
 nalis; feminea glomerata; mascula subracemosa.
Fulcr. nulla.

Sativa. 1. CANNABIS. Linn. sp. 1027. Sauv. 172.
 Cannabis mas. Bot. Mons. 47. Tour. 535.
 Cannabis femina. Bot. Mons. 48. Tour. 535.
Le Chanvre; vernaculè lou Canbé.
 HOSPITATUR sub dio. Occurrit sœpè à la Font Pu-
 tanella, au Verdanson. In mare, foliola lanceolata
 dentata, inferioribus duobus integerrimis minimis.
 In femina foliola omnia angustiora dentata.

H U M U L U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 902.
Char. secund. Rad. horizontalis ramosa stoloni-
 fera. Caul. angulata herbacea volubilis. Fol.
 opposita petiolata simplex integra. Flor. oppo-
 sita pedunculata axillaris glomerata substrobili-
 fera. Fulc. stipulæ oppositæ interfoliaceæ. Spi-
 nulæ in caule & petiolis.

1. HUMULUS. *Linn. sp. 1028. Sauv. 196.* *Lupulus*
Lupulus mas & femina. Bot. Mons. 167. Tour. 535.
Le Houblon, vernaculè, l'Oubloun.
HABITAT juxta amnem. Folia cordata vel triloba ser-
rata. Stipulæ emarginatæ. Pedunculi petiolis æqua-
les. Squamæ seu strobilorum foliola ovata.

HEXANDRIA.

T A M U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 905.

Char. secund. *Rad. fusiformis subsimplex. Caul.*
herbacea teres ramosa volubilis. Fol. alterna
petiolata simplex integerrima. Flor. racemosa
terminalis & axillaris. Fulc. nulla.

1. TAMUS. *Linn. sp. 1028. Sauv. 113.*

Communis.

Bryonica lœvis sive nigra racemosa. Bot. Mons. 39.
Tamus racemosa flore minore luteo pallecente. Tour.

103.

Le Sceau de la Vierge.

HABITAT à Rouquet, les Mateles, & vicinis. Folia
longè petiolata cordata, interdum acuminata vel
emarginata. Flores etiam axillares solitarii.

S M I L A X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 904.

Char. secund. *Rad. ramosa stolonifera. Caul.* her-
bacea rigida striata volubilis infracto-flexuosa.
Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor.
axillaris glomerato-spicata, glomerulis juxta
pedunculum sessilibus. Fulcr. cirrhi gemini pe-
tiolares divergentes. Aculei in caule sparsi & ad
margines nervosque foliorum.

1. SMILAX caule aculeato angulato, foliis dentato-acu- *Aspera.*
leatis cordatis. Linn. sp. 1028. Novemnerviis.

Smilax aspera rutilo fructu. Bot. Mons. 242.

Smilax aspera fructu rubente. Tour. 654.

HABITAT ad margines sepium. Petioli breves. Cirrhi
ad basim petiolorum.

OCTANDRIA.

POPULUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 909.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* ramea pedunculata, pedunculis ramosif. *Fulc.* nulla, (glandulæ quandoque ad basim foliorum.).

Alba. 1. POPUL. foliis subrotundis dentato-angulatis, subtus tomentosis. *Linn.* sp. 1034. *Sauv.* 198.

Populus alba. *Bot. Mons.* 212. *Tour.* 598.

Le Peuplier blanc; vernaculè, *l'Aoüba.*

HABITAT juxta amnem. Folia interdum lobata.

Nigra. 2. POPUL. foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Linn.* sp. 1034. *Sauv.* 99.

Populus nigra. *Bot. Mons.* 212. *Tour.* 592.

Le Peuplier noir; vernaculè, *lou Pibou.*

HABITAT cum priori.

RHODIOLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 934.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea simplex succulenta. *Fol.* sparsa sessilis simplex integra succulenta. *Flor.* terminalis fastigiata. *Fulc.* nulla.

Rosea. 1. RHODIOLA. *Linn.* sp. 1035. *Sauv.* 77. & 116.

Anacampseros radice rosam spirante major. *Tour.* 264.

Seg. Tom. II. p. 356.

Radix rhodia. *Lob. Icon.* 391.

HOSPITATUR sub dio. Folia ad apicem ferrata ovato-lanceolata.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 910.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* articulata herbacea vel fruticulosa, simplex vel ramosa. *Fol.* opposita simplex integerrima vel

integra, sessilis aut petiolata. *Flor.* opposita axillaris, mascula pedunculata glomerato-spicata, feminea subsessilis subgeminata. *Fulg.* stipulæ geminæ solutæ.

1. MERCUR. caule simplicissimo, foliis scabris. *Linn.* *Perennis.*
sp. 1035.
Mercurialis montana spicata. *Bot. Mons.* 176. *Tour.*
534.
Mercurialis montana testiculata. *Tour.* 534.
La Mercuriale de montagne.
HABITAT *au Capouladou, Villemagne.* Luxuriat in labyrintho horti regii. Folia lanceolata ferrata. Stipulæ minimæ. Spicæ masculæ longitudine foliorum.
2. MERCUR. caule brachiato, foliis glabris. *Linn.* *sp. Annua.*
1035.
Mercurialis testiculata seu mas. *Bot. Mons.* 176. *Tour.*
534.
Mercurialis spicata seu femina. *Bot. Mons.* 176. *Tour.*
534.
La Mercuriale mâle & femelle, ou la Foirole; vernalè, Cagaréla.
HABITAT in arvis. Folia ovata ferrata. Flores feminei sessiles.
3. MERCUR. caule suffruticoso, foliis tomentosis sessilibus integerrimis. *Linn.* *sp. 1035.*
Mercurialis fruticosa incana spicata. *Tour.* 534.
Phyllum testiculatum. *Bot. Mons.* 203.
Mercurialis fruticosa incana testiculata. *Tour.* 534.
Phyllum spicatum. *Bot. Mons.* 203.
HABITAT à *Gramont, Castelnau.* Folia ovata. Flores glomerati, masculi in apice pedunculorum. Pedunculi foliis longiores, flores feminei subternati, altero pedunculato.

H Y D R O C H A R I S.

Char. prim. vid. *Linn.* gen. pl. 911.

Char. secund. *Rad.* funiculiformis repens stolonifera. *Caul.* scaposa triflora. *Fol.* radicalis petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris solitaria. *Fulg.* stipulæ geminæ adnatæ scapum vaginantes.

Morsus ranae. I. HYDROCHARIS. *Linn. sp. 1036. Sauv. 29.*

Nymphaea alba minor. Bot. Mons. 188. & minima.
Ibid.

HABITAT in aquis, à *Lattes*, à *la Roubine*. Folia suborbiculata. Scapi plures, singuli ex alâ cujuslibet folii.

DECANDRIA.

SCHINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 991. (Classe tantum mutandum genus proposita specie tenuis.)

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea,*
Fol. alterna impari-pinnata. Flor. terminalis pa-
niculato racemosa. Fulc. nulla.

Molle. I. SCHINUS foliis pinnatis, foliolis serratis, impari longissimo, petiolo æquali. *Linn sp. 388. Decandria Monogynia.*

Molle Clusii. Tour. 661.

Le Poivrier du Pérou.

HOSPITATUR sub dio. Florens. Marem tantum in horto regio vidimus. Flores sæpè polyandri. Corollæ minimæ albæ. Rudimentum pistilli in quolibet flore.

CORIARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 458.

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. fruti-*
cosa. Fol. opposita sessilis simplex integerrima.
Flor. ramea terminalis racemosa. Fulc. bractea
ad basim floris singuli.

Myrtifolia. I. CORIARIA foliis ovato-oblongis trinerviis. *Linn. sp.*
1037. *Sauv. 151.*

Rhus myrtifolia Monspeliensium. Bot. Mons. 222.

Vernaculè, lou Rédon.

HABITAT ad margines sepium, à *Castelnau*, *Boutonet*,
Lattes, &c. Bracteæ ovatæ. Racemi laxi.

DATISCA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1072.

Char. secund. *Rad. ramosa, Caul. herbacea ra-*

mosa. *Fol.* alterna petiolata impari-pinnata.
Flor. axillaris & terminalis, racemosa. *Fulc.*
 bracteæ floribus interjectæ.

1. DATISCA caule lævi. *Linn. sp.* 1037. *Cannabina.*
 Cannabina cretica florifera. *Tour. cor.* 52.
La Cannabine, ou faux Chanvre.
 HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Foliola lan-
 ceolata ad basim ferrata, acuminata. Floret absque
 fructu.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 917.
 Char secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruti-
 cosa. *Fol.* simplex sessilis integerrima, nunc
 opposita patens vel imbricata, nunc terna. *Flor.*
 axillaris sessilis glomerata. *Fulcr.* nulla.
1. JUNIP. foliis ternis patentibus mucronatis, bacca *Oxycedrus.*
 brevioribus. *Linn. syst.* 1297.
Juniperus foliis quaternis patentibus subulatis mucro-
 natis. *Linn. sp.* 1038.
Juniperus major bacca rufescente. *Bot. Mons.* 228.
Tour. 589.
Juniperus foliis ternis patentibus pungentibus. *Sauv.*
 169.
Le Cade; vernaculè, *lou Cadé*.
 HABITAT à Valene, Caravattes, Viols.
2. JUNIP. foliis termis oblitteratis imbricatis obtusis. *Linn. Phenicea.*
sp. 1040. *Syst.* 1297. *Sauv.* 169.
Sabina major Monspeliensium. *Bot. Mons.* 228.
Cedrus folio cupressi major fructu flavescente. *Bot.*
Mons. 56. *Tour.* 538.
L'Oxycédre.
 HABITAT à Cette, vers Meze; & cum priori.
3. JUNIP. foliis ternis undique imbricatis obtusis ovatis. *Lycia.*
Linn. sp. 1039.
Cedrus folio cupressi media majoribus baccis. *Tour.*
 588.
 HABITAT à Lamalou, Villemagne.

Sabina. 4. JUNIP. foliis oppositis erectis decurrentibus oppositionibus pyxidatis. *Linn. sp.* 1039.

Juniperus foliis infernè adnatis, oppositionibus concatenatis. *Sauv.* 169.

Le Savinier, la Sabine; vernaculè, *la Sabina*.

HABITAT à *Alais*, & vicinis.

Communis. 5. JUNIP. foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Linn. sp.* 1040.

Juniperus vulgaris fruticosa. *Bot. Mons.* 145. *Tour.* 588.

β. Juniperus vulgaris arbor. *Tour.* 588.

γ. Juniperus montana folio latiore, fructu longiore. *Tour.* 588.

Le Genievre; vernaculè, *lou Géniébré*.

HABITAT à *Montferrier, Laverune*, & cum priori.

T A X U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 918.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna conferta subsessilis simplex integerima. *Flor.* axillaris secunda solitaria sessilis.

Fulc. nulla.

Baccata. 1. TAXUS foliis approximatis. *Linn. sp.* 1040.

Taxus foliis pinnatis. *Sauv.* 220. *Tour.* 589.

L'If; vernaculè, *l'If*.

HOSPITATUR sub dio. Semperirens, fructus maturans. Folia linearia.

E P H E D R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1040.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa teres articulata. *Fol.* nulla. *Flor.* pedunculata solitaria opposita axillaris. *Fulc.* stipulæ connatæ vaginantes, ad quemlibet articulum è quarum alis prodeunt pedunculi.

Distchia. 1. EPHEDRA pedunculis oppositis, amentis geminis.

Linn. sp. 1040..

Ephedra marina minor. *Tour.* 663.

Polygonum bacciferum maritimum minus. *Bot. Mons.* 208.

Polygonum fruticans. *Barr. Icon.* 731.

Le Raisin de mer.

HABITAT ad mare. Ramis, pedunculis, stipulisque oppositis.

SYNGENESIA.

R U S C U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 920.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruticulosa vel fruticosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* nunc solitaria sessilis epiphylla vel hypophylla, nunc ramea terminalis racemosa. *Fulg.* stipula solitaria ad basim folii cuiuslibet, (in una specie spinula ad apicem foliorum, in altera bractea ad quemlibet florem.)

1. RUSCUS foliis supra floriferis nudis. Linn. sp. 1041. *Aculeatus.*
Ruscus. Bot. Mons. 226. Barr. Icon. 517.
Ruscus myrtifolius aculeatus. Tour. 79.
Ruscus foliis nudis supinè floriferis. Sauv. 94.
Le Houx frélon; vernaculè, *lou Bérbouisset*.
HABITAT à Castelnau, la Peissine, &c. Sepes horridas constituens. Rami sæpiùs terni, quaterni verticillati. Folia spinula terminantur.
2. RUSCUS foliis subtùs floriferis nudis. Linn. sp. 1041. *Hypophyllum.*
Ruscus latifolius fructu folio innascente. Tour. 79.
Ruscus latifolius foliis nudis pronè floriferis. Sauv. 94.
Ruscus Alexandrina vera. Barr. Icon. 250.
Le Laurier Alexandrin.
HOSPITATUR sub dio.
3. RUSCUS foliis subtùs floriferis sub foliolo. Linn. sp. *Hypoglossum.*
1041. Sauv. 94.
Ruscus angustifolius fructu folio innascente. Tour. 79.
Hypoglossum seu bislingua. Barr. Icon. 249.
HOSPITATUR sub dio. Folia ovata. Bractea lanceolata flores sæpiùs quinque foveis. Variat foliis oppositis.
4. RUSCUS racemo terminali hermaphrodito. Linn. sp. *Racemosus.*
1041.
Ruscus angustifolius fructu summis ramulis innascente.
Tour. 79.
Le Houx en grappe.
HOSPITATUR sub dio. Folia ovato-lanceolata. Racemi subseptemflori.

Classis XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

CELTIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 924.
 Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arbo-
 rea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.*
 axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

- Australis.* 1. CELTIS foliis obliquè ovatis serratis acuminatis.
 Celtis foliis ovato - lanceolatis. *Sauv.* 60. *Linn.*
sp. 1043.
 Celtis fructu nigricante. *Tour.* 612.
 Lotus arbor. *Bot. Mons.* 167.
Le Micocoulier; vernaculè, *lou Micacoulié*.
 HABITAT à Gramont, Lavanet, Castelnau. Foliorum
 lobus superior latior.

VERATRUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 923.
 Char. secund. *Rad.* subtuberosa. *Caul.* herbacea
 simplex. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima
 subvaginans. *Flor.* terminalis ramoso-racemosa.
Fulc. bractea ad basim floris singuli.

- Album.* 1. VERAT. racemo supra decomposito, corollis erectis.
Linn. sp. 1044.
 Veratrum flore subviridi. *Tour.* 273.
 Veratrum. *Sauv.* 107.
L'Hellebore blanc; vernaculè, *lou Varaire*.
 HABITAT à Lesperou, la Louzere. Folia ovata.

ANDROPOGON.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 1014.
 Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articu-
 lata. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex
 integerrima,

integerrima. *Flor.* terminalis paniculata vel spicato-digitata. *Fulcr.* nulla.

1. ANDROP. paniculæ pedunculis simplicissimis trifloris, flosculo hermaphrodito aristato ciliato basi barbato. *Linn. Syst.* 1304. *Gryllus*. Gramen sparteum festuceum seu ægylops spartea villosa. *Barr. Icon.* 18. fig. 2. *Ægylops bromoides* juba purpurascente. *Scheuc.* 267. tab. VI. fig. 1. A. B. Gramen avenaceum locustis purpurascensibus longissimis pediculis donatis. *Seg. tom. I.* p. 355. HABITAT à Gramont, Montferrier.
 2. ANDROP. spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis. *Linn. sp.* 1047. Gramen dactylon spicis villosis. *Bot. Mons.* 114. *Tour.* 520. *Ischænum spicis villosis.* *Sauv.* 34. *Le Pied de poule.* HABITAT in saxosis circà Gramont, Lacolombiere, Lavalette, Castelnau, Salaison. Altitudo sesquipedalis. Spiculæ purpurascentes. Aristæ glumis triplo longiores. Spiculæ ternæ, quaternæ.
- H O L C U S.
- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1047.
- Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata plena. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis paniculata. *Fulc.* nulla.
1. HOLCUS glumis villosis, seminibus aristatis. *Linn. sorghum.* sp. 1047. *Milium arundinaceum* subrotundo semine, sorgho nominatum. *Tour.* 514. *Milium.... albo & plano* semine. *Tour.* 514. *Le Millet d'Inde.* HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Aristæ longæ. Panicula ramosissima pedalis.
 2. HOLCUS glumis glabris, floribus hermaphroditis *Halepensis.* muticis, femineo aristato. *Linn. sp.* 1047. Gramen arundinaceum paniculatum, locustis partim

muticis, partim aristatis. *Scheuc.* 509. *tab. XI. fig.*
12. 13. 14. ♂ 15.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo tripedalis. Panicula
patens palmaris purpurascens.

Lanatus. 3. HOLCUS glumis villosis bifloris : hermaphrodito mu-
tico : masculo arista recurva. *Linn. sp.* 1048.

Aira flosculo masculo aristato, femineo mutico,
Sauv. 309.

Gramen pratense paniculatum molle. *Bot. Mons.*
112. *Tour.* 522.

HABITAT juxta amnem & agrorum margines. Pani-
cula triuncialis viridis.

Odoratus. 4. HOLCUS glumis trifloris muticis glabris : herma-
phrodito diandro. *Linn. sp.* 1048.

Aira foliis planis, floribus trifloris aristatis, flosculo
intermedio mutico diandro. *Sauv.* 36.

Gramen paniculatum odoratum. *Scheuc.* 236. *tab. IV.*
fig. 26.

HABITAT *au mont St. Loup, Valene.* Panicula nu-
tans atro - purpurea simplex sesquiuncialis. Facies
melicæ.

Mollis. 5. HOLCUS glumis bifloris nudiusculis : hermaphro-
dito mutico : masculo arista geniculata. *Linn. Syst.*
1305.

Gramen caninum longius radicatum majus. *Baeh. Pin.* 1.

HABITAT cum priori, &c in pascuis à Montferrier,
Laverune. Panicula biuncialis subspicata. Calyces
magis acuminati quam in prioribus.

C E N C H R U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 927.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa erecta
teres enodis vel repens articulata ramosa ra-
dicans. *Fol.* alterna (graminea) vaginans sim-
plex integerrima. *Flor.* terminalis spicata vel
capitata. *Fulc.* nulla. (Spinulæ supra glumas
in una specie.)

Racemosus. 1. CENCHRUS panicula spicata, glumis muricatis,
setis ciliaribus, foliis ciliatis. *Linn. sp.* 1049. *Sauv.* 40.
Gramen spicatum, locustis echinatis. *Tour.* 519.
Gramen spicatum maritimum spica echinata. *Bot.*
Mons. 114.

HABITAT ad margines sepium, viarum & agrorum.

In sabulosis & ruderatis, sous le Perou, à Salason, au-delà du Lés vers Gramont. Culmus teres radicans rufescens. Spica erecta simplicissima. Glumæ absoluta florescentia rubent.

2. CENCHRUS spica ovata simplici. *Linn. sp.* 1049. *Capitatus.*
Gramen spica subrotunda echinata. *Bot. Mons.* 116.
Tour. 519.

HABITAT à Montferrier, Caunelles, à Boutonet. Culmi vix biunciales simplicissimi enodes, vel ad basim semel tantum articulati.

ÆGILOPS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 926.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* nulla.

1. ÆGIL. spica ovata, aristis calycum ternis. *Linn. Syst. Ovata.*
1307.

Ægilops spica ovata aristis breviore. *Linn. sp.* 1050.
Sauv. 40.

Gramen spicatum crassioribus & durioribus loculis, spica brevi. *Tour.* 519.

Gramen sive festuca altera capitulis duris. *Bot. Mons.*
122.

HABITAT in arvis & incultis.

2. ÆGIL. spica oblonga, aristis calycum inferiorum binis. *Linn. Syst.* 1307. *Triuncialis.*

Gramen spicatum crassioribus & durioribus loculis, spica longissima. *Tour.* 519.

Ægilops spica subulata scabra, aristis longitudine spicæ. *Linn. sp.* 1051.

HABITAT cum priori. Variat calycum inferiorum aristis ternis quaternis longitudine spicæ.

V A L A N T I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 928.

Char. secund. *Rad.* fibrosa simplex vel ramosa.
Caul. herbacea articulata tetragona ramosa.
Fol. sessilis simplex integerrima verticillata.

Flor. axillaris conferta pedunculata. *Fulc.* nulla.

Muralis. 1. VALANT. floribus masculis trifidis, hermaphroditici germini glabro insidentibus. *Linn. sp.* 1051. *Sauv.* 162.

Rubia quadrifolia verticillato semine. *Bot. Mons.* 226.

Valantia quadrifolia verticillata. *Tour. act.* 1706. p. 86.

Asperula obtuso folio. *Barr. Icon.* 541. n°. 2.

HABITAT à *Boutonet*, *Caunelles*. Inter rupium fissuras.

Obs. Huc pertinet synonymia Magnolii non verò ad Sherardiam. *Vid. sup. Tetrant.*

Aparine. 2. VALANT. floribus masculis trifidis hermaphroditici pedunculo insidentibus. *Linn. sp.* 1051. *Sauv.* 162.

Aparine fructu coriandri saccharati. *Bot. Mons.* 25.

Tour. 114.

Aparine semine lævi. *Tour.* 114.

HABITAT à *Lavalette*, *Mommau*. Folia ciliata linearia. Pedunculi foliis subæquales.

Articulata. 3. VALANT. floribus masculis quadrifidis, pedunculis nudis. *Linn. sp.* 1052.

Cruciata orientalis latifolia erecta glabra. *Tour. cor.* 4.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi pedales. Flores sæpius hermaphroditi.

Cruciata. 4. VALANT. floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Linn. sp.* 1052.

Cruciata hirsuta. *Tour.* 115.

La Croisette.

HABITAT in arvis. A *Castelnau*, *la Peissine*. Folia ovata hirsuta sæpius quaterna vel quina (sed raro.) Flores pedunculo brevissimo donati.

P A R I E T A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 929.

Char. secund. Rad. subfusiformis. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. axillaris subsessilis conferta. Fulc. nulla.

Officinalis. 1. PARIET. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Linn. Syst.* 1308.

Parietaria foliis lanceolato - ovatis alternis. *Linn. sp.* 1052.

Parietaria Officinarum & *Dioscoridis*. *Bot. Mons.* 199.

Tour. 509.

La Parietaire; vernaculè, *l'Erba de nostra Dama*.
HABITAT in muris. Folia longè petiolata ovata.

A T R I P L E X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 930.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa vel simplex fusiformis. *Caul.* ramosa herbacea vel fruticosa. *Fol.* simplex subintegerrima (in una specie fuculenta) alterna vel opposita, petiolata vel sessilis. *Flor.* glomerato-spicata terminalis & axillaris. *Fulc.* nulla.

1. ATRIP. caule fruticoso, foliis obovatis. *Linn. sp. Portulacoides.*
1053. oppositis.

Atriplex maritima angustissimo folio. *Tour. 505.*

Halimus seu portulaca marina. *Bot. Mons. 124.*

Le Pourpier de mer; vernaculè, *las Bourtoulaiguas de mar.*

HABITAT ad ripas maris & stagnorum. Rami teretes.

Folia carnosa in petiolum attenuata integerrima.

2. ATRIP. caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hortensis.*
Linn. sp. 1053.

Atriplex hortensis alba seu pallidè virens. *Tour. 505.*

Atriplex caule erecto annuo foliis triangularibus.
Sauv. 100. 128.

L'Arroche ou Bonne-Dame.

HABITAT in hortis. Folia alterna sīnuata aut crenata.

3. ATRIP. caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis *Laciniata.*
obtusè dentatis subtus farinaceis. *Linn. sp. 1053.*
Sauv. 128. 272.

Atriplex maritima laciniata. *Bot. Mons. 35. Tour. 505.*

Atriplex foliis deltoideis dentatis subtus argenteis.
Linn. Syst. 1308.

HABITAT ad mare. Caulis procumbens striatus. Folia petiolo brevi, subtus argentea alterna succulenta.

4. ATRIP. caule herbaceo, valvulis femineis magnis *Hastata.*
deltoidibus sinuatis. *Linn. sp. 1053.*

Atriplex sylvestris folio hastato seu deltoideo. *Bot. Mons. 34. Tour. 505.*

Atriplex caule erecto annuo, foliis in medio hastatis.
Sauv. 273.

HABITAT in arvis circa urbem. Altitudo sesquipedalis.

- Patula.* 5. ATRIP. caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Linn.* sp. 1053. *Sauv.* 125.
Atriplex angusto oblongo folio. *Bot. Mons.* 35. *Tour.* 505.
Atriplex erecta annua involucris seminum hastatis, foliis lanceolato-linearibus. *Sauv.* 126.
Atriplex Monspessulana cum pulchris involucris. *Bot. Mons.* 35.
HABITAT juxta hortos, & in cultis.

A C E R.

- Char. prim.* Vid. *Linn. Syst. pl.* 1023.
Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* opposita petiolata simplex integra.
Flor. ramea pedunculata terminalis racemosa vel subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

- Pseuso-pla-* 1. ACER foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis. *Linn. sp.* 1054.
Acer montanum candidum. *Tour.* 615.
Acer majus. *Bot. Mons.* 3.
Acer foliis quinquelobis acutis obtusè serratis, petiolis canaliculatis. *Sauv.* 212.
Le grand Erable ou faux Platane.
HABITAT au Capouladou, à Léspinouse. Frequens à la Peissine, Laverune.
Platanoïdes. 2. ACER foliis quinquelobis acuminatis acutè dentatis glabris, floribus corymbosis. *Linn. sp.* 1055. *Sauv.* 212.
Acer platanoides. *Tour.* 615.
Le faux Sycomore.
HOSPITATUR sub dio. Occurrit à la Peissine, Lamousson.
Campestro. 3. ACER foliis lobatis obtusis emarginatis. *Linn. sp.* 1055.
Acer campestre & minus. *Bot. Mons.* 3. *Tour.* 615.
Acer foliis semitrilobis, lobis obtusè incisis. *Sauv.* 212.
Le petit Erable.
HABITAT à Valene & vicinis. A St. Jean de Vedas, Montbasin.
Monspessula- 4. ACER foliis trilobis integerrimis. *Linn. sp.* 1056.
num. *Sauv.* 212.

Acer trifolium. *Tour.* 615.

Acer Monspessulanum. *Bot. Mons.* 3.

L'Erable de Montpellier.

HABITAT à Gramont, Castelnau. Flores corymbosi.

Foliorum lobi acuminati.

M I M O S A.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 1310.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* ramosa ; herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna petiolata abruptè-pinnata vel bipinnata. *Flor.* axillaris pedunculata, capitata vel subspicata. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ vel earum loco spinæ. Glandulæ petiolares sessiles. (In una specie spinulæ supra capsulas.)

* *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

1. MIMOSA aculeata, foliis conjugatis pinnatis : par- *sensitiva*. tialibus bijugis, intimis minimis. *Linn. sp.* 518.

Mimosa altera spinis horridiuscula & sensitiva magis. *Tour.* 606.

La Sensitive épineuse.

HOSPITATUR in caldario. Caulis erectus biennis.

2. MIMOSA aculeata foliis conjugatis pinnatis, caule *pudica*. hispido. *Linn. sp.* 518.

Mimosa seu frutex sensibilis. *Tour.* 606.

La Sensitive.

HOSPITATUR in caldario. Sub dio æstate florens, valde hirsuta, procumbens. Aculei suprà capsulas.

* *Foliis duplicato-pinnatis.*

3. MIMOSA inermis decumbens, foliis bipinnatis, *Pernambucana*. spicis cernuis, floribus pentandris : inferioribus na. castratis. *Linn. sp.* 519.

Mimosa pernambucana. *Tour.* 606.

La Sensitive de Pernambouc.

HOSPITATUR sub dio. Sponte in horto regio crescit.

Cauliculi recti simplices subquinquangulares. Glandula ad basim petiolorum concava rubra. Stipula filiformis ad apicem petioli. Stipulæ duæ laterifoliæ rigidæ. Legumina linearia plana sæpius quina in apice peduncularum.

Farnesiana. 4. MIMOSA spinis stipularibus distinctis, foliis bipinnatis partialibus octo-jugis, spicis globosis. *Linn.* sp. 561.

Acacia Indica *Farnesiana*. *Tour.* 605.

Acacia Ægyptia. *Barr. Icon.* 1138.

L'Acacia à bouton d'or. Sensitive du jardin de Farnèse.
HOSPITATUR sub dio. Florens autumno & hyeme. Pedunculi foliis æquales. Flores crocei odori cappati. Legumina cylindrica succulenta.

D I O E C I A.

G L E D I T S I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 908.

Char. secund. *Rad.* horizontalis stolonifera & perpendicularis. *Caul.* arborea. *Fol.* primordialis conferta fasciculata abruptè-pinnata decidua; ramea abruptè - bipinnata persistens: *Flor.* racemosa pedunculata solitaria è medio foliorum primordialium. *Fulc.* spina ramosa caulina sparsa, suprà regionem foliorum.

Tricanthos. 1. GLEDITSIA. *Linn. sp.* 1056.

La Gledits.

HOSPITATUR sub dio. E gemmis primo vere prodeunt folia sex vel septem pinnata foliolis ovatis integerrimis. Racemi foliis æquales. Absoluta florcentia racemi & folia illa decidunt; tunc rami enascuntur, elongantur foliis bipinnatis, foliolis serratis, & spinis ramolis triuncialibus onerandi. Semina non maturat.

F R A X I N U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 933.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.

Fol. opposita impari-pinnata. *Flor.* terminalis ramea paniculato-racemosa. *Fulc.* nulla.

Excelsior. 1. FRAXINUS foliolis serratis, floribus apetalis. *Linn.*

sp. 1057.

Fraxinus excelsior. *Tour.* 577.

Fraxinus. *Bot. Mons.* 99.

Le Fresne; vernaculè *lou Fraissé*.

HABITAT juxtà amnem. Petioli marginati. Foliola ovata : impari majori cuneiformi.

2. FRAXINUS foliolis ferratis, floribus corollatis. *Linn. Ornus.*
sp. 1057.

Fraxinus florida botryoides. Tour. 577.

Le Fresne à fleur.

HOSPITATUR sub dio. Petioli æquales. Foliola æqualia lanceolata.

DIOSPYROS.

Char. prim. Vid. *Linn. Syst. pl. 1027.*

Char. secund. *Rad. ramosa lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. axillaris conferta sessilis. Fulc. nulla.*

1. DIOSPYROS foliorum paginis discoloribus. *Linn. Lotus.*

sp. 1057. Sauv. 59. & 132.

Guajacana. Tour. 600.

HOSPITATUR sub dio, in frigidario. *Au Labyrinthe du Jardin Royal.* Folia ovalia. Petioli brevissimi. Flores sæpiùs quaterni. Semina non maturat.

POLYOECKIA.

FICUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 936.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. aggregata in calyce communi turbinato fructiformi clauso sparso subsolitario sessili. Fulc. nulla. Laetescientia alba.*

1. FICUS foliis palmatis. *Linn. sp. 1059. Sauv. 196. Carica.*

Ficus sativa. Tour. 663. & varietates. Sauv. 196.

Ficus communis. Bot. Mons. 97.

- β. Caprificus. *Bot. Mons. 97. Caprificus.*

*Le Figuier; vernaculè *lou Figuié*. β. la Figueira cabraou.*

HABITAT in vineis & arvis. β. in hortorum mutis, sterilis.



Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA FILICES.

Obs. In hoc ordine, Autores plurimi florum fructuumque figuram & anatomiam nescientes, eorum situm pro nota generica *primaria* habuerunt; sed æqua lege eandem notam pro *secundaria* assumimus.

EQUISETUM.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* horizontalis articulata stolonifera. *Caul.* articulata scaposa vel foliosa. *Fol.* frondosa articulata verticillata. *Flor.* spicata: spica *fructificationibus* peltatis, basi dehiscensibus, multivalvi: radicali vel terminali. *Linn.* *Syst. nat.* 1034. *Fulc.* nulla.

Obs. Caulis & frondium quilibet articulus apice ferratus, basim superioris articuli vaginat.

Arvense. 1. EQUIS. scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Linn. sp.* 1061.

Equisetum arvense longioribus setis. *Bot. Mons.* 89. *Tour.* 532.

Equisetum setis simplicibus internodio multoties longioribus. *Sauv.* 158.

La Queue de cheval.

HABITAT in humidis. *A Castelnau, aux prés d'Arene.*

Palustre. 2. EQUIS. caule angulato, frondibus simplicibus. *Linn. sp.* 1061.

Equisetum palustre. *Lob. Icon.* 795.

Equisetum setis simplicibus internodia vix superantibus. *Sauv.* 158.

Equisetum palustre brevioribus setis. *Tour.* 532.

Autre Queue de cheval.

HABITAT cum priori & à Caunelles.

3. EQUIS. caule striato, frondibus subsimplicibus. *Linn.* *Fluvatile.*
sp. 1062.
Equisetum majus aquaticum. *Bot. Mons.* 89.
Equisetum caule non sulcato latissimo, verticillis den-
sissimis. *Sauv.* 158.
Equisetum palustre longioribus setis. *Tour.* 533.
La préle; vernaculè las Cassooüdas.
HABITAT in aquis.
4. EQUIS. caule nudo scabro basi subramoso. *Linn.* *sp. Hyemale.*
1062.
Equisetum caule nudo simplicissimo. *Sauv.* 158.
Equisetum nudum minus variegatum. *Tour.* 533.
HABITAT à Castelnau. In aquis. A Salason, Mont-
ferrier.

OPHIOGLOSSUM.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* nulla. *Fol.* fron-
 dosa radicalis petiolata simplex integerrima.
Flor. spicata epiphylla : *spica* pedunculata artic-
 ulata disticha : articulis transversim dehiscenti-
 bus. *Linn.* *Syst.* 1035. *Fulc.* nulla.

1. OPHIOG. fronde ovata. *Linn.* *sp.* 1062. *Sauv.* 107. *Vulgatum.*
Ophioglossum vulgatum. *Bot. Mons.* 191. *Tour.* 548.
Barr. Icon. 252. n°. 1.
La Langue de serpent.
HABITAT in pratis inundatis, au-delà de la riviere
à Castelnau à droite. Frons integerrima. Scapus fron-
de longior, ad basim ipsius.

OSMUNDA.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* nulla. *Fol.* fron-
 dosa petiolata simplex bipinnatifida vel pinna-
 tifida. *Flor.* epiphylla, pedunculata spicata ra-
 moso, vel sessilis discum frondis tegens : fruc-
 tificationibus globofisis. *Linn.* *Syst.* 1036. *Fulc.*
 nulla.

* *Floribus spicatis pedunculatis.*

1. OSMUNDA spica caulinaria solitaria, fronde pinnatifida *Lunaria.*
 solitaria.

Osmunda scapo caulino solitario, fronde pinnatifida solitaria. Linn. sp. 1064.

Osmunda foliis lunatis. Tour. 547.

Lunaria botrytes. Barr. Ikon. 252. fig. 3.

Osmunda scapo caulino unico, fronde pinnata solitaria. Sauv. 218.

HABITAT à Lesperou. Laciniæ frondis reniformes, imæ subtrilobæ. Spica fronde longior pauciflora.

* *Frondibus aliis foliaceis, aliis fructiferis, floribus sessilibus.*

Spicant. 2. OSMUNDA frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integerrimis parallelis. Linn. sp. 1066.

Polypodium angustifolium folio variolo. Tour. 540.

Pteris fronde pinnata, foliolis linearibus parallelis. Sauv. 270.

HABITAT à Lesperou, à la Serane.

HOSPITATUR cum priori in frigidario. Frondes foliaceæ fructiferis breviores: fructiferæ ad basim rubent, foliolis strictioribus angustioribusque.

A C R O S T I C H U M.

Char. prim. . . .

Char. secund. Rad. carnosa nodosa horizontalis stolonifera. Caul. nulla. Fol. frondosa radicalis petiolata simplex integra vel bipinnata. Flor. epiphylla sessilis fructificationibus discum totum frondis tegentibus. Linn. Syst. 1036. Fulc. nulla.

* *Fronde simplici divisa.*

Septentrionali. 1. ACROST. fronde nuda lineari-laciniata. Linn. sp. 1068.

Filicula saxatilis corniculata. Tour. 542.

Acrostichum fronde lineari-laciniata. Sauv. 270.

HABITAT à Lesperou, Saint Guillin le Désert. Frondes vix biunciales filiformes.

* *Fronde subbipinnata.*

Tkelypteris. 2. ACROST. fronde pinnata, pinnis pinnatifidis integerrimis. Linn. sp. 1071.

HABITAT à *Lesperou*, *Lamalou*.

* *Fronde bipinnata.*

3. ACROST. *bipinnatum*, *pinnulis indivisis*. *Sauv.* 246. *Pulchrum*.
Linn. *sp.* 1072.

Filicula quæ adiantum nigrum officinarum, *pinnulis obtusioribus*. *Tour.* 542.

HABITAT cum priori.

P T E R I S.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* *carnosa nodosa horizontalis stolonifera*. *Caul.* *nulla*. *Fol.* *radicalis petiolata frondosa subtripinnata*. *Flor.* *epiphylla sessilis : fructificationibus in lineis marginalibus*. *Linn.* *Syst. nat.* 1038. *Fulcr.* *nulla*.

1. PTERIS *fronde supradecomposita : foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis : superioribus minoribus*. *Linn.* *sp.* 1075. *Sauv.* 244. *Aquilina*.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. *Bot.* *Mons.* 98. *Tour.* 536.

La Fougere fémelle.

HABITAT circa amnem & in arvis subjacentibus.
Frondes maximæ. Variat foliolis inferioribus sinuatibus. Stipites rigidi glaberrimi.

A S P L E N I U M.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* *fibrosa vel nodosa carnosa horizontalis*. *Caul.* *nulla*. *Fol.* *radicalis petiolata frondosa nunc simplex incisa vel integerrima, nunc impari-pinnata, bipinnata aut tripinnata*. *Flor.* *epiphylla sessilis : fructificationibus in lineolis disci frondis sparsis*. *Linn.* *Syst. nat.* 1042. *Fulc.* *nulla*.

* *Fronde simplici.*

1. ASPLEN. *frondibus simplicibus cordato-lingulatis in-tegerrimis, stipitibus hirsutis*. *Linn.* *sp.* 1079. *Scolopendrium*.
Asplenium *frondibus ensiformibus integris : basi cor-*

datis inflexis, petiolis hirsutis. Sauv. 27.
Lingua cervina officinarum. Bot. Mons. 159. Tour.
544.

La Scolopendre.

HABITAT in rupium fissuris, &c puteis.

* *Fronde pinnatifida.*

Ceterach. 2. ASPLEN. frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus. Linn. sp. 1080.

Ceterach officinarum. Bot. Mons. 58.

Asplenium sive ceterach. Tour. 544. Barr. Icon. 1052.
L'Herbe dorée; vernaculè *l'Erba daourada*.

HABITAT in muris humidis. *A Boutonet*, *Lavanet* & cum priori. Frondes oblongæ: lobis obtusis.

* *Fronde pinnata.*

Trichomanes. 3. ASPLEN. frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. Linn. sp. 1080.

Trichomanes seu polytrichum officinarum. Bot. Mons. 212. Tour. 549.

B. Trichomanes foliis eleganter incisis. Tour. 539.
Le Politric; vernaculè *Capillaire*.

HABITAT in puteorum rimis. B. *A Lesperou*, au Mont *Saint Loup*. Foliolis acutis pinnatifidis ovatis. Frondes ovatæ.

* *Fronde decomposita.*

Adiantum nigrum. 4. ASPLEN. frondibus duplicato-pinnatis: pinnis obovatis superne crenatis: foliolis inferioribus majoribus. Linn. sp. 1081.

Adiantum nigrum. Bot. Mons. 5.

Filicula quæ adiantum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. Tour. 542.

Le Capillaire ordinaire.

HABITAT à Gramont, Castelnau, Lavalette.

Ruta muraria. 5. ASPLEN. frondibus alternatim decompositis; foliolis cuneiformibus crenulatis. Linn. sp. 1081.

Ruta muraria. Bot. Mons. 227. Tour. 541.

HABITAT in muris hortorum. *Au jardin de Mr. Baron*, à Lavanet; sous le Perou dans un puits. *A Selleneuve* à gauche au-delà du pont. Frondes vix biunciales.

6. ASPLEN. frondibus tripinnatis : foliolis alternis, *Onopteris*, pinnis lanceolatis inciso-serratis. *Linn. sp.* 1081.
Asplenium frondibus duplicato-pinnatis, foliis inferioribus majoribus : foliolis ovatis superne crenatis.
Sauv. 245.

HABITAT à Valene, au mont Saint Loup.

P O L Y P O D I U M.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* carnosa nodosa horizontalis stolonifera. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis petiolata frondosa, simplex pinnatifida vel impari-pinnata, bipinnata, aut tripinnata. *Flor.* epiphylla sessilis : *fructificationibus* in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis. *Linn. Syst. nat.* 1043. *Fulc.* nulla.

* *Fronde pinnatifida* : lobis coadunatis

1. POLYP. frondibus pinnatifidis, pinnis oblongis sub- *vulgare*. serratis obtusis, radice squamata. *Linn. sp.* 1085.
Polypodium vulgare. *Bot. Mons.* 211. *Tour.* 540.
Polypodium fronde pinnata : foliolis lanceolatis integris serratis alternis connato-sessilibus. *Sauv. 218.*
Le Polypode.
HABITAT à Castelnau, Montferrier. Frondes oblongæ : pinnulis alternis. Frondes interdum lineares, angustæ.
2. POLYP. frondibus pinnatifidis : pinnulis lanceolatis *Cambricum*, lacero-pinnatifidis serratis. *Linn. sp.* 1086.
Polypodium Cambro-Britannicum, pinnulis ad margines laciniatis. *Tour.* 540.
HABITAT à Lesperou, la Serane. Frondes subcordatæ. Pinnulæ oppositæ : summis linear-lanceolatis dentatis.
- * *Fronde pinnata simpliciter.*
3. POLYP. fronde pinnata, pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis, petiolis strigosis. *Linn. sp.* 1088.
Lonchitis mas seu *latifolia aspera*. *Barr. Ikon.* 1121.
Lonchitis aspera. *Tour.* 538.
Lonkite.
HABITAT cum priori. Frondes linear-lanceolatæ. Stipites squamulis obducti.

- Rhegopteris.* 4. POLYP. frondibus subbipinnatis, foliolis infimis reflexis, paribus pinnula quadrangulari coadunatis. *Linn. sp. 1089.*
 HABITAT à *Lamalou*, à *Lesperou*. Frondes subtriangularis. Pinnulæ ovato-lanceolatæ pinnatifidæ, foliolis integerrimis. Stipitibus glabris villosis.
- Felix mas.* 5. POLYP. fronde bipinnata, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Linn. sp. 1090. Sauv. 244.*
Felix mas non ramosa dentata. Tour. 536.
La Fougere mâle.
 HABITAT au mont *St. Loup*. Frondes lanceolatæ. Pinnæ subpinnatæ ovato-lanceolatæ.
- Felix femina.* 6. POLYP. fronde bipinnata, pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Linn. sp. 1090. Sauv. 244.*
 HABITAT cum priori, & à *Lesperou*.
- Cristatum.* 7. POLYP. frondibus subbipinnatis, foliolis ovato-oblongis, pinnis obtusiusculis apice acutè ferratis. *Linn. sp. 1090.*
 Polypodium fronde duplicato-pinnata, pinnulis obtusis coadunatis crenatis. *Sauv. 245.*
 HABITAT cum prioribus, & à *Lamalou*.
- Aculeatum.* 8. POLYP. fronde bipinnata, pinnis lunulatis dentatis, stipite strigoso. *Linn. sp. 1090.*
Lonchitis aculeata major. Tour. 538.
 HABITAT cum prioribus.
- Rhaeticum.* 9. POLYP. fronde bipinnata, foliolis pinnisque remotis lanceolatis, serraturis acuminatis. *Linn. sp. 1091.*
Felix tenuissimè denticulata rhætica. Tour. 537.
Adiantum filicinum aquaticum. Barr. Icon. 432. n° 2.
Pessima.
 HABITAT cum priori. Pinnæ lineares profundè dentatae. Stipites glaberrimi tenuissimi.
- Fragile.* 10. POLYP. fronde bipinnata, foliolis remotis, pinnis subrotundis incisis. *Linn. sp. 1091.*
 Polypodium fronde duplicato-pinnata, pinnis ramosis, foliolis incisis subrotundis. *Sauv. 244.*
Filicula marina minima segmentis rotundioribus. Tour. 542.
 HABITAT cum congeneribus, & à *Lespinouse*. Stipites glaberrimi.

* *Fronde supradecomposita.*

- i. POLYP. *fronde supradecomposita*, foliolis ternis *Dryopteris*,
bi pinnatis. *Linn. sp.* 1093.
Filix ramosa minor, pinnulis dentatis. *Tour.* 536.
HABITAT cum prioribus, & dans un puits sous le
Perou. *Frondes palmates triangulares*, stipitibus
glaberrimis.

ADIANTUM.

Char. prim.

Char. secund. *Rad. carnosa horizontalis stoloni-
fera. Caul. nulla. Fol. radicalis petiolata
frondosa bipinnata. Flor. epiphylla sessilis,
fructificationibus in maculis terminalibus sub
replicato margine frondis.* *Linn. syst. nat.*
1044. *Fulc. nulla.*

- i. ADIANT. *frondibus decompositis*, foliis alteritis, *Capillaris*
pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Linn. sp. Veneris.*
1096:

Adiantum ramis pinnatis, foliis circuli sectorem re-
ferentibus. *Sauv.* 245.

Adiantum foliis coriandri. *Bot. Mons.* 4. *Tour.* 543.
Capillaire de Montpellier.

HABITAT ad puteorum fissuras. *Frondes bipinnatae.*
Stipites glaberrimi atro-purpurascentes.

MARSILEA.

Char. prim.

Char. secund. *Rad. filamentosa perpendicularis.*
*Caul. horizontalis radicans. Fol. opposita fron-
dosa sessilis simplex integerrima. Flor. mascula
epiphylla sessilis conferta, feminea pedunculata
solitaria radicibus involuta. Fulc. nulla.*

- i. MARSILEA foliis oppositis simplicibus. *Linn. sp. Natans.*
1099.

Lenticula palustris latifolia punctata. *Bot. Mons.* 301.

Lenticula palustris latifolia. *Bauh. prod.* 153.

HABITAT in aquis, à Mauguio, & au fonds de Lattes,
à Maupas. *Folia ovato-orbiculata*, ad basim sèpius
emarginata subpetiolata.

M U S C I.

LYCOPODIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 953.

Char. secund. *Rad.* fibrofa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* sessilis conferta imbricata simplex integerrima. *Flor.* spicata sparsa pedunculata vel sessilis. *Fulc.* nulla.

Clavatum. 1. LYCOP. foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pendunculatis geminis. *Linn. sp.* 1101.

Muscus vulgaris squamosus repens clavatus. *Tour.* 553.
HABITAT à Valene, inter muscos; au Mont St. Loup.

Alpinum. 2. LYCOP. foliis quadrifariam imbricatis acutis, surculis erectis dichotomis, spicis sessilibus teretibus. *Linn. sp.* 1104.

Muscus squamosus cypressiformis. *Tour.* 555.

HABITAT in fagetis, à Lamalou, Léspinouse, vers St. Pons.

Denticula-
tum. 3. LYCOP. foliis bifariis, superficialibus imbricatis, surculis repentibus, floribus sparsis. *Linn. sp.* 1106.

Muscus denticulatus minor. *Bot. Mons.* 178. *Tour.* 556.
HABITAT in humidis, à Gramont, à droite vers Mau-

guio.

SPHAGNUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 951.

Char. secund. *Rad.* fibrofa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* conferta imbricata, sessilis simpliciflora. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

Palustre. 1. SPHAGNUM ramis deflexis. *Linn. sp.* 1106.

Sphagnum caulerum ramosum palustre candicans, ramulis reflexis, foliis angustioribus. *Sauv.* 23.

HABITAT à Léperou, ubi nihil vulgatus.

FONTINALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 952.

Char. secund. *Rad.* fibrofa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris solitaria subsessilis, mascula & feminea in eadem planta. *Fulc.* nullā.

1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. sp. 1107.* *Antipyretica.*
HABITAT in aquis, à la source du Lés, à Lesperou.

POLYTRICHUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 948.*

Char. secund. *Rad. fibrosa. Caul. simplicissima*
herbacea. Fol. sessilis simplex integerrima con-
ferta imbricata. Flor. solitaria terminalis pedun-
culata, mascula & feminea in distincta planta,
Fulc. nulla.

1. POLYT. caule simplici. *Linn. sp. 1109.* Anthera parallelipipedata. *Linn. syst. 133.* *Commune;*

Muscus capillaris. Bot. Mons. 179.

Muscus capillaris minor capitulo longiore falcato.
Tour. 551.

Polytrichum vulgare majus. Seg. Tom. I. p. 35. Barr.
Icon. 251. n°. 3.

Le Polytric.

HABITAT à Gramont, Valenç, la source du Lés. Caudiculi biunciales ad basim foliosi superne nudi.

MNIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 1030.*

Char. secund. *Rad. fibrosa capillaris. Caul. sca-*
posa vel foliosa. Fol. simplex integerrima sessi-
lis, radicalis vel caulina. Flor. feminea sessilis
terminalis, mascula pedunculata. Fulc. nulla.

1. MNIUM acaule, anthera nutante, calyptra reflexa *Hygrometri-*
tetragona. Linn. sp. 1110. cum.

Bryum capsula nutante turbinato-ovata, calyptra re-
flexa quadrangulari. Sauv. 33.

Muscus capillaceus minor folio breviori, capitulo
nutante. Tour. 550.

Muscus capillaris, altera species minor. Bot. Mons. 179.

HABITAT in umbrosis humidis. *A Laverune, Castelnau,*

2. MNIUM antheris pendulis, foliis ovatis fetiferis cari- *Capillare.*
natis, pedunculis longissimis. *Linn. syst. 1333.*

Bryum capillare. Linn. sp. 1121.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis vulgarissi-
mus. Mich. gen. 108. tab. 59. fig. 7.

HABITAT in muris humidis. Cauliculi ad basim foliis duobus tribusve instructi cæterum nudi. Calyptra longa acuminata.

- Fontanum.* 3. MNIUM caule simplici geniculis inflexo. *Linn. sp.* 1110. Muscus capillaris tenuissimus, pediculo longissimo purpurascente, capitulo rotundiore. *Tour.* 552.
HABITAT à Gramont, Castelnau. Pedunculi masculi femineos longè superant.

B R Y U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 949.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. scaposa vel foliosa. Fol. simplex integerrima sessilis, radicalis aut caulina. Flor. terminalis aut radicalis, solitaria; mascula pedunculata, feminea sessilis in eadem planta. Fulc. nulla.

* *Antheris pedunculatis erectis.*

Extincto. 1. BRYUM anthera erecta oblonga minori calypris rium. laxis æqualibus. *Linn. sp.* 1116.

Bryum calyptra extintorii forma minus. *Sauv.* 32.

Muscus capillaris minimus calyptra longa conoidea nitida. *Tour.* 552.

HABITAT à Gramont, supra muros circa urbem.

Murale. 2. BRYUM antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, surculis simplicibus cespitosis. *Linn. sp.* 1117.

Muscus capillaris minor capitulis erectis, vulgatissimus. *Mich. tab.* 59. fig. 7.

Vernaculè de Moussa.

HABITAT in rupibus & tectis humidis.

Pomiforme. 3. BRYUM antheris erectis sphæricis. *Linn. sp.* 1115.

Bryum caule erecto, foliis setaceis, capitulis globosis. *Sauv.* 32.

HABITAT in umbrosis cum prioribus. Frequens in labyrintho horti regii.

A L G Ā.

M A R C H A N T I A.

Char. prim. Vid. Lin. gen. pl. 954.

Char. secund. Rad. capillaris. Caul. nulla. Fol. frondosa lamellosa simplex radicans vegetabilis.

bus aut mineralibus adhærens subarticulata.
Flor. epiphylla solitaria, mascula pedunculata,
pedunculis tetragonis, feminea sessilis, in ea-
dem planta. *Fulc.* nulla.

Obs. Frondium pagina inferior è nervo longitu-
dinali radices agit.

1. MARCH. calyce communi decemfido. *Linn. sp. Polymorpha:*
1137.

Muscus saxatilis sive lichen petræus. *Bot. Mons.* 179.
L'Hépatique de fontaine.

HABITAT in puteis & fontibus; *sous le Perou, à la*
Peissine, Lavanet, &c. Pedunculus ad apicem fron-
dis cujuslibet.

2. MARCH. calyce communi quadripartito, laciniis *Cruciata.*
tubulosis. *Linn. sp. 1137.*

Marchantia floribus masculis cruciformibus, femineis
sessilibus lunulatis. *Sauv.* 270.

HABITAT supra muros. *Au pont Juvenal, & dans le*
labyrinthe du jardin du Roi.

3. MARCH. calyce communi quinquefido hemisphæ- *Hemisphæ-*
rico, perichætio nullo. *Linn. sp. 1138.* *rīca.*

HABITAT in puteis omnibus circa hortum regium.

4. MARCH. calyce communi quinqueloculari subovato. *Conica.*
Linn. sp. 1138.

Hepatica vulgaris major vel officinarum Italiae. *Seg.*
Tom. I. 47.

HABITAT cum prioribus, & à Castelnau.

Obs. Omnes supra memoratæ species florent februario,
aprili & maio.

L I C H E N.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 958.*

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* nulla vel rigida
ramosissima filamentosa parasitica. *Fol.* nulla vel
crustacea vegetabilibus aut mineralibus adhæ-
rens. *Flor.* sparsa sessilis caulina vel epiphylla.
Fulc. nulla.

* *Foliacei.*

1. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber, supra *Pulmona-*
lacunosus: subtus tomentosus. *Linn. sp. 1145.* *rius.*

L 1 iij

Muscus pulmonarius sive *pulmonaria arborea*. *Tour.*

§49.

Muscus pulmonarius. *Bot. Mons.* 179.

Lichen foliis oblongis divisus, superficie reticulato-punctata. *Sauv.* 31.

La Pulmonaire de chêne.

HABITAT supra arbores. A Montferrier, Castelnau.

Furfuraceus. 2. *LICHEN* foliaceus decumbens furfuraceus, laciniis acutis, subtus lacunosis atris. *Linn. sp.* 1146.

HABITAT cum priori. Ramosissimus, superne cinereus.

* *Scyphiferi.*

Pyxidatus. 3. *LICHEN* scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. sp.* 1151.

Lichen pyxidatus major. *Tour.* §49.

Fungus terrestris pyxidatus. *Magnol. Hort. Mons.* tab. 83.
HABITAT à Gramont, supra arbores, Boletum & Agaricum.

* *Fruticulosi.*

Rangiferi-nus. 4. *LICHEN* fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Linn. sp.* 1153.

Coralloides corniculis rufescens. *Tour.* 567.

Muscus terrestris coralloides erectus, corniculis rufescens. *Bot. Mons.* 179.

HABITAT à Gramont, Caunelles.

* *Filamentosii.*

Plicatus. 5. *LICHEN* filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *Linn. sp.* 1154.

Muscus arboreus usnea officinarum. *Bot. Mons.* 179.

Lichen cinereus vulgaris capillaceus folio minori. *Tour.* §50.

Lichen capillaceus minor ex abiete pendens. *Tour. cor.* 40.

Lichen capillaceus ex cinereo rutilans, receptaculis florrum subcinereis & barbatis. *Mich. gen.* 77. *tab.* 39. *fig.* 5.

L'Usnée commune.

HABITAT supra arbores, à Valene. Scutella ramulis strictis patentibus simplicibus radiata.

Barbatus. 6. *LICHEN* filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentibus. *Linn. sp.* 1155.

Lichen capillaceus ex fago & abiete pendens. *Tour. cor. 40.*

Muscus capillaceus longissimus. *Bot. Mons. 180.*

HABITAT cum priori, & à Gramont, St. George.

C H A R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 692.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. articulata ramosa herbacea. Fol. frondosa verticillata sessilis simplex. Flor. ad articulos solitaria sessilis.

1. CHARA caulis lœvibus, frondibus internè dentatis. *Vulgaris.*
Linn. sp. 1156.

Equisetum foetidum sub aqua repens. *Bot. Mons. 89.*
Le Lustre d'eau.

HABITAT in aquis, circa urbem, & à Castelnau,
Lattes, Selleneuve.

T R E M E L L A.

Char. prim.

Char. secund. Rad. nulla. Caul. gelatinosa figuræ incertæ, vegetabilibus & mineralibus adhærens.
Fol. nulla. Flor. inconspicua, frutificationibus in corpore gelatinoso vix manifestis. *Linn. syst. nat. 1067.* Fulc. nulla.

1. TREM. plicata undulata. *Linn. sp. 1157.* *Noftœ.*
Muscus fugax membranaceus pinguis. *Bot. Mons. 180.*
HABITAT in pratis post pluvias. *A la Peissine, Cau- nelles.* Magnitudo quoque indeterminata.
2. TREM. sessilis membranacea auriformis cinerea. *Linn. Auricula.*
sp. 1157.
Fungus membranaceus auriculam referens seu sambu- cinus. *Bauh. pin. 372.*
L'Oreille de Judas.
HABITAT supra arbores demortuas, salices præsertim.
A Lattes, Caunelles; frequens à Rouquet; juxta rivulum.
3. TREM. tuberculosa solida rugosa. *Linn. sp. 1158.* *Verrucosa.*
HABITAT in stagnis; à Bouzigues, Perauls; vel ra- dicibus zosteræ marinæ demortuæ adhærens.
4. TREM. hemisphærica sparsa. *Linn. sp. 1158.* *Hemisphæ- ricæ.*
Ll iiiij.

HABITAT in mari & stagnis subjacentibus. Quandoque petiolata.

FUCUS.

Char. prim. Vid. Linn. syst. pl. 1168.

Char. secund. Rad. nulla vel fibrosa. Caul. nulla vel herbacea dichotoma ramosa funiculiformis radicata vel vaga. Fol. nulla vel frondosa alterna sessilis simplex integra, vel etiam mineralibus vegetabilibus ye adhærens. Flor. nunc sparsa petiolata aut sessilis, caulinæ vel epiphylla, nunc terminalis. Fulc. nulla.

* *Dichotomi Frondescentes.*

Vesiculosus. 1. FUCUS fronde dichotoma integra, caule medium filum transcurrente, vesiculis verrucosis terminalibus. Linn. sp. 1158.

Fucus marinus seu quercus marina foliorum extremis tumidis. Tour. 566.

HABITAT in mare.

* *Ramosi foliis distinctis.*

Nudans. 2. FUCUS caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis serratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis. Linn. sp. 1160.

Lenticula marina serratis foliis. Lob. Ikon. 266.

Fucus folliculaceus ferrato folio. Bot. Mons. 296. Barr. Ikon. 1129.

HABITAT ad maris littora. In mari vagus ut species quarta.

* *Ramosi fronde unita.*

Siliquosus. 3. FUCUS caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis, vesiculis oblongis acuminatis. Linn. sp. 1160.

Fucus fruticosus caudice verrucoso. Bot. Mons. 100.

Fucus tenuissimo folio siliquatus. Ray. syn.

HABITAT circâ maris littora; au-delà du Nazareth, à Cette.

* *Fructificationibus non vesicariis.*

Cartilagineus. 4. FUCUS cartilagineus, caule teretiusculo compresso, frondibus supradecompositis pinnatis, laciniis linearibus coloratis. Linn. sp. 1161.

2. *Muscus marinus capillaceus multifido folio. Bot. Mons.*
180. *Albidus.*
Corallina capillaceo multifido folio, albida. Tour. 571.
HABITAT copiosè ad mare in toto tractu. Vagus, ver-
sicolor. Copiosè post tempestates occurrit à Perauls,
Maguelone.
3. **FUCUS** fronde sessili reniformi decussatim striata. *Pavoninus.*
Linn. sp. 1162.
Fucus maritimus gallo-pavonis pennas referens. Baub.
prod. 155.
Fucus maritimus gallo-pavonis plumas referens. Tour.
569.
La Plume de paon.
HABITAT supra lapides & testacea in fundo maris. *Au*
port de Cette. Frondes pollicem latæ orbiculato-reni-
formes versicolores compressæ.
4. **Fucus** frondibus planis palmatis. *Linn. sp. 1162.* *Palmatus.*
Fucus manum referens. Tour. 568.
La Main de mer.
HABITAT cum priori. Saxis, conchis arctè adhærens;
neritas turbines buccina elit. Rubens vel cinereus.
5. **FUCUS** dichotomus ramosissimus teres uniformis *Fastigiatus.*
fastigiatus. Linn. sp. 1162.
HABITAT cum prioribus. Rami sæpè complanati; ci-
nereus.
6. **FUCUS** filiformis simplex subfragilis opacus. *Linn. Filum.*
sp. 1162.
Fucus latus fœniculaceus, coralloides lenta fœnicu-
lacea. Bot. Mons. 100.
Corallina marina minima lenticigera. Tour. 571.
HABITAT cum congeneribus.

U L V A.

- Char. prim.
- Char. sec. *Rad.* nulla. *Caul.* nulla. *Fol.* frondosa
membranacea sessilis conchis scopulis & zoo-
phytis adhærens, tubulosa vel complanata.
Flor. inconspicua, fructificationibus in mem-
brana diaphana. *Linn. syst. nat. 1069.* *Fulc.*
nulla.
7. **ULVA** tubulosa simplex. *Linn. sp. 1163.* *Intestinalis.*
Tremella marina tubulosa. Sauv. 4.

Fucus tubulosus intestinorum forma. *Tour.* 568.
Le Boyau de chat.

HABITAT ad mare. *Cinerea & albida.*

- Lactuca.* 2. ULVA palmata prolifera membranacea, ramentis inferne angustatis. *Linn. sp.* 1163.
 Fucus lactucæ folio. *Tour.* 568.
 Muscus marinus lactucæ folio. *Bot. Mons.* 180.
La Laitue de mer.
 HABITAT ad mare & in stagnis subjacentibus inter fuços & zosteram ubicumque adhærens.

C O N F E R V A.

Char. prim.

Char. secund. Rad. nulla. Caul. filiformis ramo-
 fissima vaga libera. Flor. tuberculis inæquali-
 bus, in fibris capillaribus. *Linn. syst. nat.*
 1070. Frutificatio? Fol. nulla. Fulc. nulla.

* *Filamentis simplicibus æqualibus.*

- Rivularis.* 1. CONF. filamentis simplicissimis æqualibus. *Linn. sp.*
 1164.

HABITAT in aquis circà urbem.

* *Filamentis ramosis æqualibus.*

- Ballofa.* 2. CONF. filamentis ramosis æqualibus, bullas aëreas
 includens. *Linn. sp.* 1164.

Conferva filis ramosis æqualibus radicatis. *Sauv.* II.
La Queue de renard.

HABITAT in aquis stagnantibus; à Caunelles, *Lave-
 rune*, *Lattes*.

* *Filamentis geniculatis.*

- Egagropila.* 3. CONF. filamentis geniculatis ramosissimis è centro
 confertissimis globum constituentibus. *Linn. sp.* 1167.

Alcyonium decimum quartum. *Bot. Mons.* 7.

La Pomme de mer, ou Egagropile de mer.

HABITAT ad mare. Ovo gallinaceo major, fusca vel
 nigrescens, filis rigidis.

S P O N G I A.

Char. prim.

Char. secund. Rad. nulla. Caul. poris pertusa

ramosa : filis seu pilis intricatis intertextis.
Linn. Syst. nat. 1072. Fol. nulla. Flor... Fulc...

* *Tenaces.*

1. SPONGIA tenax subramosa , ramis difformibus per- *Officinalis.*
 tufis. *Linn. sp. 1169.*

Spongia ad usum præstantissima. *Tour. 575.*

L'Eponge ordinaire ; vernaculè, l'Espounga.

HABITAT in mare scopulis & conchis adhærens.

2. SPONGIA turbinata cava. *Linn. sp. 1170.* *Infundibuli-*
 Spongia infundibulum imitata. *Tour. 575.* *formis.*
L'Entonnoir de mer ; vernaculè, lou Bounet de Nep-
tuna.
 HABITAT inter saxa ostreis scatentia. *A Cette. Pileo*
quadrato major.

F U N G I.

A G A R I C U S.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad. subbulbosa. Caul. rarius nulla :*
 simplicissima nuda vel volvata : pileus termina-
 lis subitus lamellosus orbiculatus vel dimidiatus.

Linn. Syst. nat. 1074. Fol... Flor... Fulc...

Obs. Obscurus & ignotus volvæ usus. An ful-
 crum involucriforme ?

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

1. AGAR. stipitatus , lamellis ramosis decurrentibus. *Chantarellus.*
Linn. sp. 1171.

Agaricus caulescens , lamellis . . . Sauv. 2.

Fungus luteus seu pallidus se contorquens esculentus.
Bot. Mons. 103.

Vernaculè, *Gerille.*

HABITAT in herbidis juxta amnem.

2. AGAR. stipitatus , lamellis ramosis omnibus magnitu- *Integer.*
 dine æqualibus. *Linn. sp. 1171.*

Fungus supernè saturatè ruber esculentorum 13. ge-
 neris species. *Bot. Mons. 103.*

HABITAT à Laverune, Gramont, Manguio.

Campestris. 3. AGAR. stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis ruffis. *Linn.* sp. 1173. *Sauv.* 1.

Fungus campestris albus, infernè rubens. *Bot. Mons.* 102.

Fungus pileo lato & rotundo. *Bauh. Pin.* 373.

Le Champignon; vernaculè, de Boulets,

HABITAT copiosè à la Peissine, Laverune.

Georgii. 4. AGAR. stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn.* sp. 1173.

Fungus pileo lato orbiculari candicante. *Bot. Mons.* 103.

HABITAT cum priori, & à Gramont.

Extinctorius. 5. AGAR. stipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, stipite subbulbosu subulato nudo. *Linn.* sp. 1174.

HABITAT à Lattes, Gramont. Circa simeta, & à Boutonet.

Fimetarius. 6. AGAR. stipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistulosu. *Linn.* sp. 1174.

Fungus venenatus sine striis, supernè cinereus, infernè luteus. *Bot. Mons.* 105.

HABITAT circa hortos in simetis.

* *Parasitici acaules dimidiati.*

Quercinus. 7. AGAR. acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Linn.* sp. 1176.

Agaricus villosus lamellis sinuosis & invicem implexis. *Sauv.* 2.

L'Agaric de chêne.

HABITAT supra quercus. *A Rouquet, Valene, Cau-
nelles.*

BOLETUS.

Char. prim.....

Char. secund. *Rad.* nulla vel subbulbosa. *Caul.* nulla vel simplicissima nuda aut volvata: pileus terminalis subtus porosus. *Linn. Syst. nat.* 1075.

Fol. . . . *Flor.* . . . *Fulcr.* . . .

* *Acaules parasitici.*

Cristatus. 1. BOLETUS acaulis ramosissimus, lamellis reniformibus anostomosantibus, margine undulatis integerrimis.

Agaricus seu *fungus ramosus cristatus medius*. *Barr.*
Icon. 1271.

2. *Agaricus præcox albo-gilvus cristatus*. *Tour.* 562.
Fungus palmatus. *Barr. Icon.* 1267.
- γ. *Agaricus major dendroides cristatus*. *Tour.* 562.
Fungus foliaceus major carnosior dendroides. *Barr.*
Icon. 1268.
- δ. *Agaricus major dendroides multifidus*. *Tour.* 562.
Fungus ramosus cristatus lobis angustioribus crispis.
Barr. Icon. 1272.

HABITAT supra quercus demortuas, siliquastrum,
 abietes. Luxuriat in horto regio; à la Peissine.
 Magnitudo capitis humani. Albus. Lamellæ palma-
 res complanatæ. Odor teterrimus.

2. *BOLETUS acaulis pulvinatus lævis*, poris tenuissimis. *Igniarius*.
Linn. sp. 1176.

Boletus perennis supernè cinereus, infernè luteus.
Sauv. 2.

Agaricus pedis equini facie. *Tour.* 562.

HABITAT supra truncos antiquarum arborum. *A La-
 verune, Lattes*.

* *Stipitati.*

3. *BOLETUS stipitatus*, pileo pulvinato subviscido, *Luteus*.
 poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido.

Linn. sp. 1177.

HABITAT à la Peissine, Lavalette.

P H A L L U S.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* subbulbosa. *Caul.* simplicissima
 nuda vel volvata: pileus terminalis supra reti-
 culatus, subtus lævis. *Linn. Syst. nat.* 1077.
Fol. . . . *Flor.* . . . *Fulc.* . . .

1. *PHALLUS* pileo ovato, stipite nudo rugoso. *Linn. Esculentus*.
sp. 1178.

*Boletus esculentus rugosus albicans quasi fuligine in-
 festus*. *Tour.* 561. *tab.* 329. *fig. A.*

Fungus porosus. *Bot. Mons.* 101.

Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique anniexo.
Sauv. 3.

Vernaculè, la Mouria.

HABITAT à Laverune, Lamousson.

Impudicus. 2. PHALLUS volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Linn.*
sp. 1179.

Phallus volvatus pileo apice clauso. *Fl. Suec.* 1101.

Phallus volva exceptus pilei apice pervio. *Sauv.* 3.

Fungus fœtidus penis imaginem referens. *Bot. Mons.*
296.

Fungus phalloides Gallus. *Barr. Icon.* 1264.

Le Membre viril.

HABITAT à Lattes, & au bois près de Perauls; à
Monteils.

CLATHRUS.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* subbulbosa. *Caul.* ramosa :
ramis convergentibus anastomosantibus, can-
cellata volvata. *Fol.* . . . *Flor.* . . . *Fulc.* . . .

Cancellatus. 1. CLATHRUS acaulis subrotundus. *Linn.* *sp.* 1179.

Fungus coralloides cancellatus. *Bot. Mons.* 296.

Boletus cancellatus purpureus. *Tour. tab.* 329. fig. 6.

Fungus cancellatus purpureus. *Barr. Icon.* 1263. &
1265.

HABITAT à Montferrier, Prades, Mauguio. Ovatus
vel rotundus.

CLAVARIA.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* subbulbosa. *Caul.* ramosa :
ramis liberis : pileo nullo. *Fol.* . . . *Flor.* . . .
Fulc. . . .

Coralloides. 1. CLAV. ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Linn.*
sp. 1182.

Fungus ramosus albidus. *Bot. Mons.* 104.

Coralloides flava & albida. *Tour. 564. tab.* 332, fig. B.

HABITAT à Corpouiran, St. George.

LYCOPERDON.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* globosa intus
cava vel solida, terrestris vel subterranea,
nuda vel volvata. *Fol.* . . . *Flor.* . . . *Fulc.* . . .

* *Solida subterranea nuda.*

1. LYCOP. solidum muricatum radice destitutum. Linn. *Tuber.*
sp. 1183.

Lycoperdon solidum. Sauv. 1.

Tubera Matthioli. Bot. Mons. 272.

La Trufe.

HABITAT à *Laverune dans le Parc, à Pignan.*

* *Pulverulenta supra terram.*

2. LYCOP. subrotundum, lacerato dehiscens. Linn. sp. *Bovista.*
1183.

Lycoperdon vulgare. Tour. 563.

La Vesse de loup.

HABITAT in pratis. *À la Peissine, Laverune, Lattes,*
Gramont.

3. LYCOP. volva patente multifida, capitulo glabro, *stellatum.*
ore dentato acuminato. Linn. sp. 1184.

Geaster major umbilico fimbriato. Mich. gen. tab.
100. fig. 1. 2. 3.

La Vesse de loup étoilée.

HABITAT à *Gramont, Lattes, Caunelles; sed rarius.*

Ovo columbino simile. Volva dura,



P A L M Æ FLABELLIFOLIÆ.

C H A M Æ R O P S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 985.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* nulla. *Fol.* petiolata radicalis simplex palmata. *Flor.* radicalis sessilis axillaris. *Fulc.* spinæ ad margines petiolorum.

Humilis. I. CHAMÆROPS frondibus palmatis plicatis, stipibus spinosis. *Linn. sp.* 1187.

Le Palmier à balay; vernaculè, *las Escoubas.*

HOSPITATUR sub dio. Abscissis quolibet anno foliis, radix denudata elevatur supra terram instar trunci... *Aloë, Agave.*

C O R Y P H A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 987.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* sparsa petiolata simplex palmata. *Flor.* . . . *Fulc.* . . .

Umbraculi- I. CORYPHÀ frondibus plicatis pinnato-palmatis filo fera. interjectis. *Linn. sp.* 1187.

HOSPITATUR in hybernaculo.

P E N N A T I F O L I Æ.

P H Æ N I X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 986.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* sparsa petiolata pinnata: foliolis alternis sessili- bus complicatis integerrimis. *Flor.* . . . *Fulc.* spina ad apicem singuli folioli.

Dactylifera. I. PHÆNIX frondibus pinnatis, foliolis complicatis. *Linn. sp.* 1188.

Le Dattier; vernaculè, *lous Datus.*

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Petioli ad basim subtetragoni; ad apicem triquetri..

APPENDIX.

Triandria Monogynia post Gladiolum. pag. 25.

ANTHOLYZA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 48.

Char. secund. Rad. nodosa carnosa horizontalis.

Caul. herbacea articulata simplicissima. Fol. disticha alterna simplex integerrima vaginans ensiformis. Flor. terminalis spicata. Fulc. bractea duplex ad basim floris singuli; interiore minore bifida.

1. ANTHOL. staminibus omnibus ascendentibus. *Linn. Cunonia.*
sp. 37.

Antholyza corollarum alis reflexis: labio inferiore minuto. *Linn. Syst. 863.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo pedalis. Flores coccinei. Spica disticha. Floret autumno, absque fructu.

Triandria Digynia ad Phalarim. pag. 34.

4. PHALARIS panicula spicata, petalis arista articulata, *Utriculata.*
vagina folii supremi spathiformi. *Linn. Syst. 869.*

Gramen pratense spica purpurea ex utriculo prodeunte. *Bauh. Pin. 3. & Bot. Mons. 114.*

Gramen spicatum pratense, spica &c. *Tour. 519.*

Gramen spicam folio amplectens. *B. hist. 3. p. 469.*

HABITAT à Lattes, Caunelles, Gramont.

Ad Panica spicata. pag. 34.

* 1. PANICUM spica tereti, involucellis bifloris fasciculato - pilosis, seminibus undulato - rugosis. *Linn. Syst. 871.* *Glaucum.*

Panicum (*glaucum* v.) spica simplici, aristis aggregatis flosculo subjectis. *Linn. sp. 56.*

Gramen paniceum spica simplici. *Bot. Mons. 116.* & molliori. *Tour. 515.*

HABITAT in arvis & fossis.

Ad Agrostim. pag. 41.

- Alba.* 9. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis æqualibus. *Linn. sp. 63.*
HABITAT à Gramont, Montferrier. Altitudo sesquipedalis. Glumæ maturæ albæ vel citrinæ.
- Viridis.* 10. AGROSTIS panicula interrupta laxa, calycibus muticis æqualibus ovatis.
Gramen radice repente panicula spadiceo-viridi, loculis exiguis muticis. *Scheuc. Gram. 130.*
HABITAT au mont Saint Loup. cum agrost. ventricosa. Altitudo prioris.

Triandria Trigynia ante Polycarpon. pag. 58.

MONTIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 82.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa articulata radicans. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata aggregata. *Fulg.* nulla.

Fontana. 1. MONTIA. *Linn. sp. 87. Sauv. 127.*

HABITAT in aquis. *A Valmagne, Aniane & vicinis.* Folia ovata vel oblonga vel obversè-ovata. Pedunculi terni quaterni uniflori; vel quandoque solitarii multiflori.

Polyandria Monogynia ad Cistum. pag. 254.

Levipes. * 9. CISTUS suffruticosus ascendens exstipulatus, foliis alternis linearibus glabris, pedunculis ramosis. *Linn. Syst. 1077. Cent. 38.*

Cistus humilis sive chamæcistus ericæ folio luteus erectior. *Bot. Mons. 69.*

Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, flore luteo. *Tour. 249.*

HABITAT à Lacolombiere, Lavalette, Montferrier.

Polyandria Polygynia ad Helleborum. p. 268.

Hyemalis. 3. HELLEBORUS flore folio insidente. *Linn. sp. 557.* Helleborus niger tuberosus, ranunculi folio, flore luteo. *Tour. 272.*

HOSPITATUR in frigidario. Scapus uniflorus. Bractea florem superans involucriformis. Floret Januario & Februario.

4. HELLEBORUS caule folioso multifloro, foliis digitiatis. *Linn. sp. 558.* *viridis.*

Helleborus niger hortensis flore viridi. Tour. 272.

HOSPITATUR in frigidario. Eodem tempore florens. Altitudo prioris, seu palmaris. Flores cernui.

SYNONYMA ADDENDA.

Triandria Monogynia.

3. IRIS. pag. 26. *Pumila.*
Iris minor lutea. *Bot. Mons. 142.*
Iris humilis flore luteo. *Tour. 362.*

6. SCIRPUS. pag. 31. *Setaceus.*
HABITAT à Gramont, Salagon, Montferrier.

Triandria Digynia.

1. AGROSTIS, pag. 39. An potius ad milii genus *Ventricosa*. referenda? & dicenda

Milium panicula spicata, calycibus subulatis inferne ventricosis, floribus aristatis.

Gramen serotinum arvense paniculâ contractâ pyramidali. *Scheuc. Gram. 148. Tab. 3. fig. II. C. Icon imperfecta.*

Panicum serotinum arvense spica pyramidali. *Tour. 515.*

1. FESTUCA, pag. 48. Deleantur Synonyma; & sequentia substituantur. *Ciliata.*

Bromus spiculis duabus erectis alternis. *Linn. cent. 104. Syst. 877.*

Gramen spica bryzæ minus. *Bot. Mons. 121.*

Gramen loliaceum minus spica brizæ prælonga, aristis donata. *Tour. 517.*

Festuca gracilis paucis utriculis. *Barr. Icon. 83. n°. 2.*

5. TRITICUM. pag. 57.

Gramen caninum arvense. *Bot. Mons. 112. Repens.*
M m ij

*Tetrandria Monogynia.**Maritima.* 12. *SCABIOSA*, pag. 63.*Scabiosa maritima parva.* *Bot. Mons.* 231. *Tour.* 465.*Tetradynamia siliculosa.**Pinnata.* 6. *IBERIS*, pag. 319.*Thlaspi umbellatum nasturtii folio Monspeliacum.**Bot. Mons.* 250.*Nasturtium sylvestre Dalechampii.* *Tour.* 213.*Monadelphia Decandria.**Columbinum* 19. *GERANIUM*. pag. 343.*Geranium columbinum tenuius laciniatum.* *Bot.**Mons.* 107.*Diadelphia Decandria.**Hirsutus.* 2. *LUPINUS*, pag. 362.*Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus.* *Bot.**Mons.* 167.**F I N I S.**



INDEX GENERUM,

Cum subjectis eorum Speciebus.

A.

A CANTHUS,	<i>pag. 309.</i>	Moschatellina.	
Mollis.			
Spinosus.			
A CER,	<i>pag. 518.</i>	Æ GILOPS,	<i>pag. 515.</i>
Pseudoplatanus.		Ovata.	
Platanoides.		Triuncialis.	
Campestre.		Æ GOPODIUM,	<i>pag. 152.</i>
Monspessulanum.		Podagraria.	
A CHILLEA,	<i>pag. 452</i>	Æ SCULUS,	<i>pag. 191.</i>
Santolina.		Hippocastanum.	
Ageratum.		Æ THUSA,	<i>pag. 145.</i>
Pubescens.		Cynapium.	
Clavennæ.		AG ARICUS,	<i>pag. 539.</i>
Ptarmica.		Chantarellus.	
Millefolium.		Integer.	
Nobilis.		Campestris.	
A CHYRANTHES,	<i>pag. 116.</i>	Georgii.	
Aspera.		Extinctorius.	
A CONITUM,	<i>pag. 259.</i>	Fimetarius.	
Lycoctonum.		Quercinus.	
Napellus.		A GAVE,	<i>pag. 181.</i>
Anthora.		Americana.	
A CORUS,	<i>pag. 182.</i>	AGR IMONIA,	<i>pag. 228.</i>
Calamus.		Eupatoria.	
A CROSTICHUM,	<i>pag. 524.</i>	AG ROSTEMMA,	<i>pag. 222.</i>
Septentrionale.		Githago.	
Thelypteris.		Coronaria.	
Pulchrum.		AG ROSTIS,	<i>pag. 39. & 546.</i>
A CTÆA,	<i>pag. 251.</i>	Ventricosa.	
Spicata.		Calamagrostis.	
A DIANTUM,	<i>pag. 529.</i>	Spica Venti.	
Capillus Veneris.		Rubra.	
A DONIS,	<i>pag. 264.</i>	Canina.	
Annua.		Stolonifera.	
Vernalis.		Capillaris.	
A DOXA,	<i>pag. 200.</i>	Minima.	
		Alba.	
		Viridis.	
		M m iij	

INDEX GENERUM.

A I R A ,	<i>pag. 41.</i>	ALOPECURUS ,	<i>pag. 37</i>
Cespitosa.		Bulbosus.	
Montana.		Aristatus.	
Canescens.		Pratensis.	
Caryophyllæa.		Geniculatus.	
Flexuosa.		A L S I N E ,	<i>pag. 156.</i>
Cristata,		Media.	
Aquatica.		A L T H Æ A ,	<i>pag. 345.</i>
A J U G A ,	<i>pag. 269.</i>	Officinalis.	
Reptans.		Cannabina.	
A L C E A ,	<i>pag. 346.</i>	Hirsuta.	
Rosea.		A L Y S S U M ,	<i>pag. 320.</i>
Ficifolia.		Spinosum.	
A L C H E M I L L A ,	<i>pag. 73.</i>	Saxatile.	
Vulgaris.		Clypeatum.	
Alpina.		Sinuatum.	
A L I S M A ,	<i>pag. 189.</i>	Creticum.	
Plantago,		Alyssoides.	
Damasonium.		Campestre.	
Ranunculoides.		A M A R A N T H U S ,	<i>pag. 486.</i>
A L L I U M ,	<i>pag. 166.</i>	Tricolor.	
Ampeloprasum.		Melancholicus.	
Porrum.		Græcizans.	
Victorialis.		Blitum.	
Subhirsutum.		Caudatus.	
Roseum.		Hybridus.	
Sativum.		Hypochondriacus.	
Scorodoprasum.		Spinosus.	
Sphærocephalon.		A M A R Y L L I S ,	<i>pag. 165.</i>
Moschatum.		Lutea.	
Flavum.		Formosissima.	
Vineale.		Sarniensis.	
Oleraceum.		A M B R O S I A ,	<i>pag. 486.</i>
Angulosum.		Maritima.	
Aescalonicum.		A M M I ,	<i>pag. 136.</i>
Ursinum.		Majus.	
Cepa.		A M O R P H A ,	<i>pag. 357.</i>
Fistulosum.		Fruticosa.	
Schoenoprasum.		A M Y G D A L U S ,	<i>pag. 238.</i>
A L O E ,	<i>pag. 179.</i>	Persica.	
Perfoliata.		Communis.	
Variegata.		Nana.	
Disticha.		A N A G A L L I S ,	<i>pag. 92.</i>
Spiralis.		Arvensis.	
Retusa.		A N A G Y R I S ,	<i>pag. 203.</i>
Viscosa.		Fœtida.	
Pumila.			

INDEX GENERUM.

- A**NASTATICA, *pag. 313.* Asarina.
Hierocuntica. Cymbalaria.
ANCHUSA, *pag. 81.* Elatine.
Officinalis. Spurium.
Sempervirens. Triphyllum.
ANDRACHNE, *pag. 499.* Bipunctatum.
Telephioides. Arvense.
ANDROPOGON, *pag. 512.* Pelisserianum.
Gryllus. Origanifolium.
Ischænum. Supinum.
ANDROSACE, *pag. 87.* Linaria.
Maxima. Monspeßulanum.
Septentrionalis. Minus.
Laetea. Majus.
Carnea. Orontium.
ANDRYALA, *pag. 415.* Bellidifolium.
Integrifolia. **A**NTHOLYZA, *pag. 545.*
Sinuata. Cunonia.
ANEMONE, *pag. 261.* **A**NTHOXANTHUM, *p. 20.*
Hepatica. Odoratum.
Pulsatilla. **A**NTHYLLIS, *pag. 360.*
Coronaria. Tetraphylla.
Hortensis. Vulneraria.
Virginiana. Montana.
Trifolia. Barba Jovis.
Nemorosa. Cytoides.
ANETHUM, *pag. 149.* **A**PHANES, *pag. 74.*
Graveolens, Arvensis.
Fœniculum. **A**PHYLLANTHES, *pag. 165.*
ANGELICA, *pag. 141.* Monspeliensis.
Archangelica.
ANTHEMIS, *pag. 450.* **A**PIUM, *pag. 151.*
Altissima. Petroselinum.
Maritima. Graveolens.
Nobilis. **A**POCYNUM, *pag. 120.*
Cotula. Androsemifolium.
Arvensis. Venetum.
Pyrethrum. **A**QUILEGIA, *pag. 260.*
Valentina. Vulgaris.
Tinctoria. **A**RABIS, *pag. 330.*
ANTHERICUM, *pag. 175.* Alpina.
Ramosum. Thaliana.
Liliago. Turrita.
Frutescens. **A**RACHIS, *pag. 376.*
Calyculatum. Hypogæa.
ANTHIRRINUM, *pag. 299.* **A**RBUTUS, *pag. 207.*
Unedo.

INDEX GENERUM.

Uva ursi.	Nivea.
ARCTIUM, pag. 420.	Incarnata.
Lappa.	Curaassavica.
ARCTOTIS, pag. 463.	Vincetoxicum.
Triflisis.	Nigra.
ARENARIA, pag. 218.	Fruticosa.
Trinervia.	ASPARAGUS, pag. 176.
Serpyllifolia.	Officinalis.
Rubra.	Acutifolius.
Saxatilis.	ASPERUGO, pag. 85.
Tenuifolia.	Procumbens.
Laricifolia.	ASPERULA, pag. 65.
Ciliata.	Odorata.
ARGEMONE, pag. 253.	Arvensis.
Mexicana.	Taurina.
ARISTOLOCHIA, pag. 476.	Tinctoria.
Pistolochia.	Cynanchica.
Rotunda.	ASPHODELUS, pag. 174.
Longa.	Luteus.
Clematitis.	Fistulosus.
ARNICA, pag. 446.	Ramosus.
Montana.	ASPLENIUM, pag. 525.
Scorpioides.	Scolopendrium.
ARTEMISIA, pag. 432.	Ceterach.
Abrotanum.	Trichomanes.
Campestris.	Adiantum nigrum.
Maritima.	Ruta muraria.
Pontica.	Onopteris.
Absinthium.	ASTER, pag. 441.
Vulgaris.	Alpinus.
Dracunculus.	Tripolium.
ARUM, pag. 477.	Amellus.
Dracunculus.	Sedifolius.
Colocasia.	Novæ Angliæ.
Maculatum.	Lævis.
Arisarum.	Tradescanti.
ARUNDO, pag. 54.	Chinensis.
Donax.	ASTRAGALUS, pag. 383.
Phragmites.	Alopecuroides.
Calamagrostis.	Galegiformis.
Arenaria.	Cicer.
ASARUM, pag. 226.	Glycyphyllos.
Europæum.	Hamosus.
Hypocistis.	Bœticus.
ASCLEPIAS, pag. 121.	Sesameus.
Syriaca.	Monspessulanus.

INDEX GENERUM.

Incanus.	BETONICA,	<i>pag.</i> 276.
Montanus.	Officinalis.	
Tragacantha.	Orientalis.	
ASTRANTIA, <i>pag.</i> 131.	Annua.	
Major.	Hirta.	
ATHAMANTA, <i>pag.</i> 138.	BETULA,	<i>pag.</i> 483.
Libanotis.	Alnus.	
Oreoselinum.	BIDENS,	<i>pag.</i> 428.
Cretensis.	Tripartita.	
Meum.	Cernua.	
TRACTYLIS, <i>pag.</i> 426.	Frondosa.	
Cancellata.	Bipinnata.	
TRIPLEX, <i>pag.</i> 517.	BIGNONIA,	<i>pag.</i> 305.
Portulacoides.	Radicans.	
Hortensis.	BISCUTELLA, <i>pag.</i> 321.	
Laciñata.	Auriculata.	
Haftata.	Didyma.	
Patula.	BISERRULA, <i>pag.</i> 386.	
ATROPA, <i>pag.</i> 106.	Pelecinus.	
Humifusa.	BLITUM,	<i>pag.</i> 3.
Mandragora.	Virgatum.	
Belladonna.	BOCCONIA, <i>pag.</i> 228.	
Physalodes.	Frutescens.	
AVENA, <i>pag.</i> 52.	BOERHAVIA, <i>pag.</i> 1.	
Bromoides.	Scandens.	
Sativa.	Erecta.	
Elatior.	BOLETUS, <i>pag.</i> 540.	
Fatua.	Cristatus.	
Flavescens.	Igniarius.	
Fragilis.	Luteus.	
Pratensis.	BORRAGO, <i>pag.</i> 84.	
	Officinalis.	
	Indica.	
	Orientalis.	
BALLOTA, <i>pag.</i> 283.	BRASSICA, <i>pag.</i> 332.	
Nigra.	Orientalis.	
BASELLA, <i>pag.</i> 156.	Napus.	
Rubra.	Rapa.	
BELLIS, <i>pag.</i> 447.	Oleracea.	
Perennis.	Erucastrum.	
Annua.	Eruca.	
BERBERIS, <i>pag.</i> 184.	BRIZA, <i>pag.</i> 45.	
Vulgaris.	Monspeßulana.	
BETA, <i>pag.</i> 126.	Eragrostis.	
Vulgaris.	Minor.	

INDEX GENERUM.

- | | |
|--|--|
| <i>Media.</i>
<i>Maxima.</i>
BROMELIA , <i>pag. 162.</i>
<i>Ananas.</i>
BROMUS , <i>pag. 50.</i>
<i>Secalinus.</i>
<i>Squarrosum.</i>
<i>Sterilis.</i>
<i>Arvensis.</i>
<i>Tectorum.</i>
<i>Pinnatus.</i>
BRUNELLA , <i>pag. 294.</i>
<i>Vulgaris.</i>
<i>Hyslopifolia.</i>
BRYONIA , <i>pag. 498.</i>
<i>Alba.</i>
<i>Laciniosa.</i>
BRYUM , <i>pag. 532.</i>
<i>Extinctorium.</i>
<i>Murale.</i>
<i>Pomiforme.</i>
BUBON , <i>pag. 143.</i>
<i>Macedonicum.</i>
BUFONIA , <i>pag. 59.</i>
<i>Tenuifolia.</i>
BUNIAS , <i>pag. 334.</i>
<i>Erucago.</i>
<i>Orientalis.</i>
<i>Cakile.</i>
BUNIUM , <i>pag. 137.</i>
<i>Bulbocastanum.</i>
BUPHTHALMUM , <i>p. 454.</i>
<i>Spinosum.</i>
<i>Aquaticum.</i>
<i>Salicifolium.</i>
<i>Grandiflorum.</i>
Bupleurum , <i>p. 132.</i>
<i>Rotundifolium.</i>
<i>Odontites.</i>
<i>Rigidum.</i>
<i>Tenuissimum.</i>
<i>Fruticosum.</i>
BUTOMUS , <i>pag. 202.</i>
<i>Umbellatus.</i>
BUXUS , <i>pag. 483.</i>
<i>Sempervirens.</i> | C.
ACALIA , <i>pag. 429.</i>
<i>Antieuphorbium.</i>
<i>Kleinia.</i>
<i>Alpina.</i>
CACHRYS , <i>pag. 139.</i>
<i>Libanotis.</i>
CACTUS , <i>pag. 236.</i>
<i>Mammillaris.</i>
<i>Peruvianus.</i>
<i>Grandiflorus.</i>
<i>Decemangularis.</i>
<i>Triangularis.</i>
<i>Opuntia.</i>
<i>Ficus indica.</i>
<i>Tuna.</i>
<i>Cochenillifer.</i>
<i>Curassavicus.</i>
CALENDULA , <i>p. 462.</i>
<i>Officinalis.</i>
<i>Pluvialis.</i>
<i>Hybrida.</i>
CALLITRICHE , <i>p. 3.</i>
<i>Autumnalis.</i>
<i>Verna.</i>
CALTHA , <i>pag. 268.</i>
<i>Populago.</i>
CAMPANULA , <i>p. 96.</i>
<i>Rotundifolia.</i>
<i>Rapunculus.</i>
<i>Persicifolia.</i>
<i>Pyramidalis.</i>
<i>Trachelium.</i>
<i>Glomerata.</i>
<i>Medium.</i>
<i>Canariensis.</i>
<i>Speculum.</i>
<i>Erinus.</i>
<i>Perfoliata.</i>
CAMPHOROSMA , <i>p. 72.</i>
<i>Monspeliaca.</i>
CANNA , <i>pag. 1.</i>
<i>Indica.</i> |
|--|--|

INDEX GENERUM.

1

- C**ANNABIS, *pag. 504.* Lanatus.
Sativa. Carduncellus.
- C**APPARIS, *pag. 251.* C A R U M, *pag. 150.*
Spinosa. Carvi.
- C**APRARIA, *pag. 306.* C A S S I A, *pag. 203.*
Biflora. Senna.
Occidentalis.
- C**APSICUM, *pag. 111.* Planifiliqua.
- Annuum.
Frutescens.
- C**ARDAMINE, *p. 324.* C A T A N A N C H E, *p. 418.*
Impatiens. Cærulea.
Hirsuta. Lutea.
- Pratensis.
- Amara.
- Resedifolia.
- Lunaria.
- C**ARDIOSPERMUM, *p. 199.* C A U C A L I S, *pag. 135.*
Halicacabum. Maritima.
Lanceolatus.
- Nutans.
- Acanthoides.
- Crispus.
- Monspessulanus.
- Marianus.
- Eriophorus.
- Tuberofus.
- C**AREX, *pag. 481.* C E L O S I A, *pag. 117.*
Dioica. Argentea.
Leporina. Cristata.
- Vulpina.
- Muricata.
- Flava.
- Digitata.
- Pseudo-cyperus.
- Acuta.
- Vesicaria.
- C**ARLINE, *pag. 425.* C E L T I S, *pag. 512.*
Acaulis.
- Lanata.
- Corymbosa.
- Racemosa.
- C**ARPINUS, *pag. 492.* C E N C H R U S, *pag. 514.*
Betulus.
- C**ARTHAMUS, *p. 427.* C E N T A U R E A, *p. 457.*
Tinctorius.
- Scabiosa.
- Jacea.
- Conifera.
- Seridis.
- Aspera.
- Calcitrapa.
- Solstitialis.
- Melitensis.
- Sicula.
- Calcitrapoides.
- Centauroides.

INDEX GENERUM.

- C**ollina.
- Salmantica.
- Galactites.
- C**ERASTIUM, *p. 223.*
- Viscosum.
- Arvense.
- Repens.
- Tomentosum.
- Latifolium.
- C**ERATONIA, *p. 503.*
- Siliqua.
- C**ERATOPHYLLUM, *p. 488.*
- Demorsum.
- C**ERCIS, *pag. 203.*
- Siliquastrum.
- C**ERINTHE, *pag. 83.*
- Major.
- Echioides.
- C**HÆROPHYLLUM, *p. 146.*
- Sylvestre.
- Temulum.
- Hirsutum.
- C**HAMÆROPS, *p. 544.*
- Humilis.
- C**HARA, *pag. 535.*
- Vulgaris.
- C**HEIRANTHUS, *pag. 328.*
- Erysimoides.
- Cheiri.
- Incanus.
- Annuus.
- Fruticulosus.
- Fenestralis.
- C**HELIDONIUM, *pag. 251.*
- Majus.
- Glaucium.
- Corniculatum.
- Hybridum.
- C**HENOPODIUM, *pag. 123.*
- Bonus Henricus.
- Rubrum.
- Album.
- Viride.
- Hybridum.
- Botrys.
- Ambrosioides.
- Vulvaria.
- Polyspermum.
- Scoparium.
- Maritimum.
- Fruticosum.
- Hirsutum.
- C**HONDRILLA, *p. 409.*
- Juncea.
- C**HRYSANTHEMUM, *p. 448.*
- Leucanthemum.
- Montanum.
- Graminifolium.
- Montpeliense.
- Corymbosum.
- Segetum.
- Coronarium.
- Flosculosum.
- C**HRYSOCOMA, *pag. 431.*
- Linosyris.
- C**HRYSOSPLENIUM, *p. 208.*
- Oppositifolium.
- C**ICER, *pag. 373.*
- Arietinum.
- C**ICHORIUM, *p. 418.*
- Intybus.
- Spinosum.
- C**INARA, *pag. 425.*
- Scolymus.
- Cardunculus.
- Humilis.
- C**IRCAEA, *pag. 8.*
- Lutetiana.
- C**ISTUS, *pag. 254. 546.*
- Laurifolia.
- Ladanifera.
- Monspeliensis.
- Albida.
- Salvifolia.
- Crispa.
- Fumaria.
- Lævipes.
- Canus.
- Tuberaria.
- Guttatus.
- Ledifolius.
- Nummularius.

INDEX GENERUM.

- Serpullifolius.
- Thymifolius.
- Pilosus.
- Helianthemum.
- Hirtus.
- C I T R U S,** pag. 401.
Medica.
Aurantium.
- C L A T H R U S,** pag. 542.
Cancellatus.
- C L A V A R I A,** pag. 542.
Coralloides.
- C L E M A T I S,** pag. 262.
Vitalba.
Flammula.
Recta.
Integrifolia.
- C L E O M E,** pag. 336.
Gynandra.
Ornithopodioides.
- C L I N O P O D I U M,** pag. 287.
Vulgare.
- C L Y P E O L A,** pag. 322.
Jonthlaspi.
Maritima.
- C N E O R U M,** pag. 23.
Tricoccos.
- C N I C U S,** pag. 423.
Acarna
Benedictus.
- C O C H L E A R I A,** pag. 317.
Officinalis.
Draba.
Coronopus.
Armoracia.
- C O F F E A,** pag. 100.
Arabica.
- C O I X,** pag. 481.
Lachryma Jobi.
- C O L C H I C U M,** pag. 189.
Autumnale.
- C O L U T E A,** pag. 364.
Arborescens.
Frutescens.
- C O M M E L I N A,** pag. 27.
Communis.
- C O N F E R V A,** pag. 538.
Rivularis,
Bullosa.
Ægagropila.
- C O N I U M,** pag. 137.
Maculatum.
- C O N V A L L A R I A,** pag. 176.
Majalis.
Bifolia.
Verticillata.
Polygonatum.
Multiflora.
- C O N V O L V U L U S,** pag. 93.
Arvensis.
Sepium.
Hederaceus.
Althæoides.
Cneorum.
Cantabrica.
Tricolor.
Soldanella.
- C O N Y Z A,** pag. 436.
Squarrofa.
Bifrons.
Chinenis.
- C O R C H O R U S,** pag. 257.
Siliquosus.
Olitorius.
- C O R E O P S I S,** pag. 456.
Leucanthema.
Tripteris.
Alternifolia.
- C O R I A N D R U M,** pag. 145.
Majus.
- C O R I A R I A,** pag. 508.
Myrtifolia.
- C O R I S,** pag. 102.
Monspeliensis.
- C O R I S P E R M U M,** pag. 3.
Hyssopifolium.
- C O R N U S,** pag. 71.
Mas.
Sanguinea.
- C O R O N I L L A,** pag. 377.
Emerus.
Juncea.

INDEX GENERUM.

<i>Valentina.</i>		<i>Monspeliaca.</i>
<i>Glaucha.</i>		<i>CUCUBALUS,</i> pag. 215.
<i>Minima.</i>		<i>Baccifer,</i>
<i>Securidaca.</i>		<i>Behen.</i>
<i>Varia.</i>		<i>Tataricus.</i>
<i>CORRIGIOLA,</i>	<i>pag. 155.</i>	<i>Catholicus.</i>
<i>Littoralis.</i>		<i>Oties.</i>
<i>CORYLUS,</i>	<i>pag. 493.</i>	<i>Reflexus.</i>
<i>Avellana.</i>		<i>CUCUMIS,</i> pag. 498.
<i>CORYPHA,</i>	<i>pag. 544.</i>	<i>Colocynththis.</i>
<i>Umbraculifera.</i>		<i>Anguria.</i>
<i>COTYLEDON,</i>	<i>pag. 220.</i>	<i>Melo.</i>
<i>Orbiculata.</i>		<i>Sativus.</i>
<i>Hemisphærica.</i>		<i>CUCURBITA,</i> pag. 497.
<i>Umbilicus.</i>		<i>Lagenaria.</i>
<i>Laciniata.</i>		<i>Pepo.</i>
<i>CRAMBE,</i>	<i>pag. 336.</i>	<i>Melopepo.</i>
<i>Maritima.</i>		<i>Citrullus.</i>
<i>Orientalis.</i>		<i>CUPRESSUS,</i> pag. 495.
<i>Hispanica.</i>		<i>Sempervirens,</i>
<i>CRASSULA,</i>	<i>pag. 160.</i>	<i>CUSCUTA,</i> pag. 74.
<i>Perfoliata.</i>		<i>Europæa.</i>
<i>Tetragona.</i>		<i>CYCLAMEN,</i> pag. 89.
<i>CRATÆGUS,</i>	<i>pag. 240.</i>	<i>Europæum.</i>
<i>Aria.</i>		<i>CYNANCHUM,</i> pag. 120.
<i>Terminalis.</i>		<i>Monspeliacum.</i>
<i>Oxyacantha.</i>		<i>Erectum.</i>
<i>Azarolus.</i>		<i>CYNOGLOSSUM,</i> pag. 81.
<i>CREPIS,</i>	<i>pag. 413.</i>	<i>Officinale.</i>
<i>Barbata.</i>		<i>Cheirifolium.</i>
<i>Rubra.</i>		<i>Apenninum.</i>
<i>Pulchra.</i>		<i>Linifolium.</i>
<i>Biennis.</i>		<i>CYNOSURUS,</i> pag. 47.
<i>Fœtida.</i>		<i>Cristatus.</i>
<i>CRESSA,</i>	<i>pag. 126.</i>	<i>Echinatus.</i>
<i>Cretica.</i>		<i>Indicus.</i>
<i>CRITHMUM,</i>	<i>pag. 139.</i>	<i>Paniceus.</i>
<i>Maritimum.</i>		<i>CYPERUS,</i> pag. 28.
<i>CROCUS,</i>	<i>pag. 24.</i>	<i>Longus.</i>
<i>Sativus.</i>		<i>Flavescens.</i>
<i>CROTON,</i>	<i>pag. 495.</i>	<i>Fuscus.</i>
<i>Tinctorium.</i>		<i>CYPRIPEDIUM,</i> pag. 474.
<i>CRUCIANELLA,</i>	<i>pag. 67.</i>	<i>Calceolus.</i>
<i>Angustifolia.</i>		<i>CYTISUS,</i> pag. 375.
<i>Larifolia.</i>		<i>Laburnum.</i>
<i>Maritima.</i>		<i>Nigricans.</i>

INDEX GENERUM

Sessilifolius.

Supinus.

Monspessulanus.

Argenteus.

D

DACTYLIS, *pag. 47.*
Glomeratus.

DAPHNE, *pag. 196.*

Mezereum.

Thymelæa.

Laureola.

Gnidium.

DATISCA, *pag. 508.*
Cannabina.

Datura, *pag. 104.*

Stramonium.

Ferox.

Metel.

DAUCUS, *pag. 136.*

Carota.

Visnaga.

Gingidium.

DELPHINUM, *pag. 258.*
Consolida.

Ajacus.

Elatum.

Staphisagria.

DENTARIA, *pag. 323.*
Pentaphyllos.

DIANTHUS, *pag. 213.*

Barbatus.

Carthusianorum.

Armeria.

Prolifer.

Caryophyllus.

Deltoides.

Chinensis.

Plumarius.

Arenarius.

DICTAMNUS, *pag. 205.*
Albus.

DIGITALIS, *pag. 304.*

Purpurea.

Lutea.

DIOSMA, *pag. 113.*

Rubra.

DIOSPYROS, *pag. 521.*

Lotus.

DIPSACUS, *pag. 60.*

Fullonum.

Laciniatus.

DOLICHOS, *pag. 365.*

Lablab.

Sinensis.

DORONICUM, *pag. 446.*

Pardalianches.

Plantagineum.

Bellidiastrum.

DRABA, *pag. 313.*

Verna.

Muralis.

Nemorosa.

Incana.

DRACOCEPHALUM, *pag. 291.*

Canariense.

Ruyschiana.

Moldavica.

Canescens.

Thymiflora.

DROSERA, *pag. 160.*

Rotundifolia.

E

ECHINOPHORA, *p. 133.*

Spinosa.

ECHINOPS, *pag. 419.*

Sphærocephalus.

Ritro.

ECHIUM, *pag. 86.*

Italicum.

Vulgare.

Creticum.

ELYMUS, *pag. 56.*

Arenarius.

EPHE德拉, *pag. 510.*

Dystachia.

INDEX GENERUM.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| EPILOBIUM , <i>pag. 193.</i> | EVONYMUS , <i>pag. 113.</i> |
| Angustifolium. | Europæus. |
| Hirsutum, | EUPATORIUM , <i>pag. 429.</i> |
| Montanum. | Cannabinum. |
| Tetragonum. | Cælestinum. |
| EQUISETUM , <i>pag. 522.</i> | EUPHORBIA , <i>pag. 230.</i> |
| Arvense. | Canariensis. |
| Palustre. | Officinarum. |
| Fluviatile. | Neriifolia. |
| Hyemale. | Viminalis. |
| ERICA , <i>pag. 194.</i> | Mauritanica. |
| Vulgaris. | Tirucalli. |
| Scoparia. | Caput medusæ. |
| Viridi-purpurea. | Maculata. |
| Cinerea. | Chamæsyce. |
| Arborea. | Peplis. |
| Multiflora. | Peplus. |
| ERIGERON , <i>pag. 437.</i> | Exigua. |
| Viscosum. | Lathyrus. |
| Graveolens. | Spinosa. |
| Canadense. | Dulcis. |
| Philadelphicum. | Pithyusa. |
| Acre. | Paralias. |
| Siculum. | Segetalis. |
| Tuberofsum. | Helioscopia. |
| ERINUS , <i>pag. 306.</i> | Serrata. |
| Alpinus. | Verrucosa. |
| ERIOPHORUM , <i>p. 32.</i> | Platyphyllos. |
| Vaginatum. | Pilosa. |
| Polystachion. | Esula. |
| ERVUM , <i>pag. 373.</i> | Cyparissias. |
| Lens. | Myrsinites. |
| Tetraspermum. | Amygdaloides. |
| Hirsutum. | Sylvatica. |
| Erilia. | Characias. |
| Soloniente. | |
| ERYNGIUM , <i>pag. 130.</i> | EUPHRASIA , <i>pag. 296.</i> |
| Maritimum. | Latifolia. |
| Campestre. | Officinalis. |
| Amethystinum. | Odontites. |
| ERYSIMUM , <i>pag. 327.</i> | Lutea. |
| Officinale. | |
| Barbarea | F |
| Alliaria. | FACONIA , <i>pag. 206.</i> |
| Cheiranthoides. | Cretica. |
| Repandum. | |

FAGU

INDEX GENERUM.

FAGUS,	<i>pag. 492.</i>	Officinalis. Castanea. Sylvatica.
FERULA,	<i>pag. 140.</i>	Capreolata. Claviculata. Communis.
FESTUCA,	<i>pag. 48.</i>	
Ciliata.		G
Ovina.		GALANTHUS , <i>p. 163.</i>
Rubra.		Nivalis.
Myuros.		
Bromoïdes.		GALEGA , <i>pag. 358.</i>
Fluitans.		Officinalis.
FICUS,	<i>pag. 521.</i>	GALEOPSIS , <i>pag. 281.</i>
Carica.		Ladanum. Tetrahit.
FILAGO,	<i>pag. 464.</i>	Galeobdolon.
Pygmæa.		
Maritima.		GALLIUM , <i>pag. 66.</i>
Germanica.		Palustre.
Montana.		Verum.
Arvensis.		Mollugo.
FONTINALIS , <i>pag. 530.</i>		Glaucum.
Antipyretica.		Rotundifolium.
FRAGARIA , <i>pag. 247.</i>		Aparine.
Vesca.		
Sterilis.		GARIDELLA , <i>p. 219.</i>
FRANKENIA , <i>pag. 185.</i>		Nigellastrum.
Lævis.		
Pulverulenta.		GENISTA , <i>pag. 356.</i>
FRAXINUS , <i>pag. 520.</i>		Sagittalis. Tinctoria.
Excelsior.		Pilosa.
Ornus.		Hispanica. Germanica.
FRITILLARIA , <i>p. 170.</i>		
Imperialis.		GENTIANA , <i>pag. 123.</i>
Persica.		Lutea. Asclepiadea.
FUCUS , <i>pag. 536.</i>		Centaurium. Campestris.
Vesiculosus.		Cruciata. Perfoliata.
Natans.		
Siliquosus.		GERANIUM , <i>pag. 338.</i>
Cartilagineus.		Triste.
Pavoninus.		Inquinans.
Palmatus.		Papilionaceum.
Fastigiatus.		Acetosum.
Filum.		Zonale.
FUMARIA , <i>pag. 353.</i>		Vitifolium. Alchimilloides.
Bulbosæ.		Cicutarium.
Capnoides.		

Nn

INDEX GENERUM.

- Malacoides.
- Gruinum.
- Tuberofum.
- Phæum.
- Nodosum.
- Sylvaticum.
- Pratense.
- Robertianum.
- Molle.
- Lucidum.
- Columbinum.
- Rotundifolium.
- Sanguineum.
- Dissectum.
- G E U M ,** *pag. 249.*
- Urbanum.
- Rivale.
- Montanum.
- G L A D I O L U S ,** *pag. 25.*
- Communis.
- G L E C H O M A ,** *pag. 280.*
- Hederacea.
- G L E D I T S I A ,** *pag. 520.*
- Triacanthos.
- G L O B U L A R I A ,** *pag. 60.*
- Alypum.
- Vulgaris.
- G L Y C Y R R H I Z A ,** *pag. 376.*
- Echinata.
- Glabra.
- G N A P H A L I U M ,** *p. 434.*
- Dioicum.
- Fœtidum.
- Luteo-album.
- Stœchas.
- Sordidum.
- Uliginosum.
- Saxatile.
- G O M P H R E N A ,** *pag. 127.*
- Globosa.
- G O S S Y P I U M ,** *pag. 350.*
- Herbaceum.
- Barbadense.
- Arboreum.
- G R A T I O L A ,** *pag. 13.*
- Officinalis.
- G U I L A N D I N A ,** *p. 204.*
- Bonduc.
- G Y P S O P H I L A ,** *p. 211.*
- Aggregata.
- Fastigiata.
- Rigida.
- Saxifraga.
- H**
- H E D E R A ,** *pag. 115.*
- Helix.
- Quinquefolia.
- H E D I S A R U M ,** *p. 384.*
- Canadense.
- Canescens.
- Coronarium.
- Onobrychis.
- Caput galli.
- Humile.
- H E L I A N T H U S ,** *pag. 455.*
- Annuus.
- Multiflorus.
- Tuberofus.
- Atro-rubens.
- H E L Y O T R O P I U M ,** *pag. 78.*
- Europæum.
- Curassavicum.
- H E L L E B O R U S ,** *p. 268. & 546.*
- Niger.
- Fœtidus.
- Hyemalis.
- Viridis.
- H E M E R O C A L L I S ,** *pag. 181.*
- Lilio-Asphodelus.
- H E R A C L E U M ,** *p. 141.*
- Sphondylium.
- Alpinum.
- H E R M A N N I A ,** *p. 338.*
- Hyssopifolia.
- H E R N I A R I A ,** *pag. 123.*
- Glabra.
- Hirsuta.
- H E S P E R I S ,** *pag. 329.*
- Triflisis.

INDEX GENERUM.

- Matronalis.
- Africana.
- Provincialis.
- Verna.
- Sibirica.
- H E U C H E R A**, pag. 128.
 - Americana.
- H I B I S C U S**, pag. 350.
 - Syriacus.
 - Trionum.
 - Sabdariffa.
 - Manihot.
 - Abelmoschus.
 - Esculentus.
- H I E R A C I U M**, pag. 412.
 - Hedypnoides.
 - Alpinum.
 - Pilosella.
 - Dubium.
 - Præmersum.
 - Murorum.
 - Sabaudum.
 - Umbellatum.
- H I P P O C R E P I S**, p. 380.
 - Unisiliquosa.
 - Multisiliquosa.
 - Comosa.
- H I P P U R I S**, pag. 2.
 - Vulgaris.
- H O L C U S**, pag. 513.
 - Sorghum.
 - Halepensis.
 - Lanatus.
 - Odoratus.
 - Mollis.
- H O R D E U M**, pag. 58.
 - Vulgare.
 - Distichon.
 - Murinum.
- H O R M I N U M**, pag. 292.
 - Virginicum.
- H U M U L U S**, pag. 504.
 - Lupulus.
- H Y A C I N T H U S**, p. 178.
 - Serotinus.
 - Orientalis.
- Muscari.
- Comosus.
- Botryoides.
- H Y D R O C H A R I S**, pag. 507.
 - Morsus ranæ.
- H Y D R O C O T Y L E**, pag. 130.
 - Vulgaris.
- H Y O S C Y A M U S**, pag. 105.
 - Niger.
 - Albus.
 - Aureus.
- H Y O S E R I S**, pag. 415.
 - Fœtida.
 - Radiata.
 - Minima.
 - Hedypnois.
- H Y P E C O U M**, pag. 74.
 - Procumbens.
 - Pendulum.
- H Y P E R I C U M**, p. 401.
 - Androsænum.
 - Hircinum.
 - Quadrangulum.
 - Perforatum.
 - Hirsutum.
 - Tomentosum.
 - Pulchrum.
- H Y P O C H A E R I S**, p. 416.
 - Achyrophorus.
 - Maculata.
 - Glabra.
 - Radicata.
- H Y S S O P U S**, pag. 274.
 - Officinalis.
 - Lophantus.

J

- J A S I O N E**, pag. 466.
 - Montana.
- J A S M I N U M**, pag. 5.
 - Officinale.
 - Azoricum.
 - Fruticans.
 - Humile.

N n ij

INDEX GENERUM.

I BERIS,	<i>pag. 318.</i>	J UNCUS,	<i>pag. 182.</i>
Semperflorens.		Acutus.	
Sempervirens.		Conlogmeratus.	
Umbellata.		Effusus.	
Amara.		Inflexus.	
Nudicaulis.		Squarrosum.	
Pinnata.		Articulatus.	
I LEX,	<i>pag. 75.</i>	Bufonius.	
Aquifolium.		Campestris.	
I LLECEBRUM,	<i>p. 117.</i>	Pilosus.	
Verticillatum.		Spicatus.	
Cymosum.		J UNIPERUS,	<i>pag. 509.</i>
Paronichia.		Oxycedrus.	
Capitatum.		Phœnicea.	
I MPIATIENS,	<i>pag. 467.</i>	Lycia.	
Balsamina.		Sabina.	
Nolimetangere.		Communis.	
I NDIGOFERA,	<i>p. 383.</i>	J USTICIA,	<i>pag. 13.</i>
Tinctoria.		Adhatoda.	
I NULA,	<i>pag. 444.</i>	I XIA,	<i>pag. 25.</i>
Helenium.		Chinensis.	
Oculus Christi.			K
Dysenterica.		K NAUTIA,	<i>pag. 64.</i>
Punicaria.		Orientalis.	
Salicina.			L
Chritmoides.		L ACTUCA,	<i>pag. 408.</i>
Montana.		Sativa.	
I POMEA,	<i>pag. 95.</i>	Virosa.	
Quamoclit.		Saligna.	
Coccinea.		Perennis.	
Violacea.		L AGOECIA,	<i>pag. 116.</i>
Triloba.		Cuminoidea.	
I RIS,	<i>pag. 25.</i>	L AGURUS,	<i>pag. 54.</i>
Germânica.		Ovatus.	
Florentina.		L AMIMUM,	<i>pag. 280.</i>
Pumila.		Album.	
Pseude acorus.		Purpureum.	
Fœtidissima.		Amplexicaule.	
Tuberosa.		L ANTANA,	<i>pag. 305.</i>
Xiphium.		Trifolia.	
I SATIS,	<i>pag. 335.</i>	Spinosa.	
Tinctoria.		L APSA NA,	<i>pag. 417.</i>
I SOPYRUM,	<i>pag. 267.</i>		
Fumarioidea.			
J UGLANS,	<i>pag. 492.</i>		
Regia.			

INDEX GENERUM.

Communis.	LEONURUS, p. 284.
Zacintha.	Cardiaca.
Stellata.	Tataricus.
Capillaris.	LEPIDIUM, p. 314.
Rhagadiolus.	Nudicaule.
LASERPITIUM, pag. 140.	Procumbens.
Gallicum.	Cardamine.
Siler.	Petræum.
Chironium.	Sativum.
LATHYRUS, p. 367.	Latifolium.
Nissolia.	Ruderale.
Aphaca.	Iberis.
Amphicarpos.	LEUCOJUM, p. 163.
Cicera.	Autumnale.
Sativus.	LICHEN, p. 533.
Setifolius.	Pulmonarius.
Angulatus.	Furfuraceus.
Odoratus.	Pyxidatus.
Hirsutus.	Rangiferinus.
Annuus.	Plicatus.
Tuberofus.	Barbatus.
Pratensis.	LIGUSTICUM, p. 141.
Latifolius.	Levisticum.
Heterophyllus.	LIGSTRUM, p. 6.
LAVANDULA, p. 275.	Vulgare.
Stœchas.	LILLIUM, p. 169.
Multifida.	Candidum.
Dentata.	Chalcedonicum.
Spica.	Martagon.
LAVATERA, p. 348.	LINNÆA, p. 307.
Arborea.	Borcalis.
Olbia.	LINUM, p. 158.
Triloba.	Usitatissimum.
Thuringiaca.	Perenne.
Trimestris.	Narbonense.
LAURUS, p. 201.	Tenuifolium.
Nobilis.	Trigynum.
LEMNA, p. 479.	Flavum.
Trifolia.	Strictum.
Minor.	Campanulatum.
LEONTODON, p. 410.	Maritimum.
Taraxacum.	Catharticum.
Bulbosum.	LITHOSPERMUM, p. 80.
Autumnale.	Officinale.
Tuberosum.	Arvense.
Hispidum.	Purpuro-Cæruleum.
Hirtum.	N n iii

INDEX GENERUM.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tinctorum. | Arvensis. |
| Fructicosum. | L Y C O P U S , p. 15. |
| L O B E L I A , | Palustris. |
| Laurentia. | L Y S I M A C H I A , p. 90. |
| L O L I U M , | Vulgaris. |
| Perenne. | Ephemerum. |
| Temulentum. | Atro-purpurea. |
| L O N I C E R A , | Linum stellatum. |
| Caprifolium. | Nemorum. |
| Periclymenum. | Nummularia. |
| Xilosteum. | Tenella. |
| Alpigena. | L Y T H R U M , p. 227. |
| L O T U S , | Salicaria. |
| Maritima. | Hyssopifolium. |
| Conjugata. | Thymifolium. |
| Siliquosa. | |
| Peregrina. | M. |
| Angustifolia. | M A L O P E , pag. 349. |
| Ornithopodioides. | Malacoides. |
| Jacobæus. | M A L V A , pag. 347. |
| Hirsuta. | Coromandeliana. |
| Recta. | Peruviana. |
| Corniculata. | Capensis. |
| Dorycnium. | Caroliniana. |
| L U N A R I A , | Rotundifolia. |
| Rediviva. | Sylvestris. |
| L U P I N U S , | Alcea. |
| Varius. | Moschata. |
| Hirsutus. | M A R C H A N T I A , p. 532. |
| Luteus. | Polymorpha. |
| L Y C H N I S , | Cruciata. |
| Chalcedonica. | Hæmispherica. |
| Flos cuculi. | Conica. |
| Dioica. | M A R R U B I U M , p. 283. |
| L Y C I U M , | Peregrinum. |
| Europæum. | Hispanicum. |
| L Y C O P E R D O N , | Vulgare. |
| Tuber. | Pseudo-dictamnus. |
| Bovista. | Acetabulosum. |
| Stellatum. | M A R S I L E A , pag. 529. |
| L Y C O P O D I U M , | Natans. |
| Clavatum. | M A R T Y N I A , pag. 302. |
| Alpinum. | Annua. |
| Denticulatum. | M A T R I C A R I A , p. 449. |
| L Y C O P S I S , | Parthenium. |
| Vesicaria. | |

INDEX GENERUM.

- Chamomilla.* Crystallinum.
- Argentea.* Bellidiflorum.
- Inodora.* Deltoideum.
- MEDICAGO,** pag. 397. Barbatum.
- Radiata.* Acinaciforme.
- Circinnata.* Crassifolium.
- Sativa.* Scabrum.
- Falcata.* Glaucum.
- Lupulina.* Dolabriforme.
- Marina.* **MESPILUS,** pag. 242:
- Polymorpha.* Germanica.
- MELAMPYRUM,** pag. 297: Pyracantha;
- Arvense.* Amelanchier;
- Pratense.* Cotoneaster.
- MELIA,** pag. 206. **MILIUM,** pag. 38:
- Azedarach.* Paradoxum.
- MELIANTHUS,** p. 309. **MIMOSA,** pag. 519:
- Minor.* Sensitiva.
- MELICA,** pag. 42. Pudica.
- Nutans.* Pernambucana.
- Ciliata.* Farnesiana.
- MELISSA,** pag. 290. **MIRABILIS,** pag. 102:
- Officinalis.* Jalappa.
- Grandiflora.* **MNIUM,** pag. 531:
- Calamintha.* Hygrometricum.
- Nepeta.* Capillare.
- MELITTIS,** pag. 293. Fontanum.
- Melissophyllum.* **MOEHRINGIA,** p. 197:
- MELOTHRIA,** p. 24: Muscosa.
- Pendula.* **MOLUCCELLA,** p. 287:
- MENIANTHES,** p. 89. Lævis.
- Trifoliata.* Spinosa.
- MENISPERMUM,** pag. 189. **MOMORDICA,** p. 496:
- Virginicum.* Balsamina.
- MENTHA,** pag. 278. Luffa.
- Spicata.* Elaterium.
- Aquatica.* **MONARDA,** pag. 16:
- Gentilis.* Fistulosa.
- Pulegium.* **MONOTROPA,** p. 207:
- Cervina.* Hypopithys.
- MERCURIALIS,** pag. 506. **MONTIA,** pag. 546:
- Perennis.* Fontana.
- Annua.* **MORUS,** pag. 485:
- Tomentosa.* Alba.
- MESEMBRIANTHEMUM,** pag. 243. Nigra.
- MYAGRUM,** pag. 311:
Nn iiiij

INDEX GENERUM.

- Perenne.
- Perfoliatum.
- Sativum.
- Paniculatum.
- Saxatile.
- M Y O S O T I S,** pag. 79.
Scorpioides.
- Lappula,
- Apula.
- M Y O S U R U S,** pag. 161.
Minimus.
- M Y R I O P H Y L L U M,** p. 488.
Spicatum.
- Verticillatum.
- M Y R T U S,** pag. 238.
Communis.
- N.**
- N A J A S,** pag. 500.
Marina.
- N A P A E A,** pag. 345.
Hermaphrodita.
- Diolca.
- N A R C I S S U S,** pag. 163.
Poëticus.
- Pseudo-narcissus.
- Jonquilla.
- Tazetta.
- N A R D U S,** pag. 32.
Stricta.
- Incurva.
- N E P E T A,** pag. 274.
Cataria.
- N E R I U M,** pag. 119.
Oleander.
- N I C O T I A N A,** pag. 105.
Tabacum.
- Rustica.
- Paniculata.
- Glutinosa.
- N I G E L L A,** pag. 260.
Damascena.
- Sativa.
- Arvensis.
- Hispanica.
- Orientalis.
- N Y C T A N T H E S,** pag. 5.
Sambac.
- N Y M P H A E A,** pag. 253.
Lutea.
- Alba.
- O.**
- O C Y M U M,** pag. 293.
Frutescens.
- Basilicum.
- Minimum.
- O E N A N T H E,** pag. 143.
Fistulosa.
- Crocata.
- Pimpinelloides.
- Chærophyllæa.
- O E N O T H E R A,** p. 192.
Biennis.
- Mollissima.
- Fruticosa.
- O L E A,** pag. 7.
Europæa.
- O N O N I S,** pag. 358.
Spinosa.
- Arvensis.
- Minutissima.
- Alopecuroides.
- Natrix.
- Viscosa.
- Cherleri.
- O N O P O R D U M,** p. 424.
Acanthium.
- Illyricum.
- Arabicum.
- O P H I O G L O S S U M,** pag. 523.
Vulgatum.
- O P H R I S,** pag. 472.
Nidus avis.
- Spiralis.
- Ovata.
- Antropophora.
- Insectifera.
- O R C H I S,** pag. 469.

INDEX GENERUM.

Pyramidalis.	Cheirifolia.
Coriophora.	O X A L I S , pag. 222. Corniculata:
Morio.	
Mascula.	
Ustulata.	P.
Militaris.	P
Palmata.	A E O N I A , pag. 258.
Odoratissima.	Officinalis.
Maculata.	P A N C R A T I U M , p. 164. Maritimum.
Abortiva.	P A N I C U M , p. 34. & 545. Glaucum. Italicum. Crus galli. Sanguinale. Dactylon. Miliaceum. Ægyptiacum.
O R I G A N U M , pag. 288.	P A P A V E R , pag. 252. Hybridum. Argemone. Alpinum. Rhæas. Somniferum.
Dictamnus.	P A R I E T A R I A , p. 516. Officinalis.
Creticum.	P A R I S , pag. 200. Quadrifolia.
Smyrnæum.	P A R N A S S I A , p. 156. Palustris.
Vulgare.	P A R T H E N I U M , p. 486. Hysterochorus.
Majorana.	P A S S I F L O R A , p. 475. Cærulea.
O R N I T H O G A L U M , p. 171.	P A S T I N A C A , p. 149. Sativa. Opopanax.
Luteum.	P E D I C U L A R I S , p. 298. Sylvatica.
Minimum.	Rostrata.
Pyrenaicum.	Verticillata.
Arabicum.	Tuberosa.
Umbellatum.	P E G A N U M , pag. 226. Harmala.
Narbonense.	P E U C E D A N U M , pag. 138. Officinale.
O R N I T H O P U S , p. 379.	
Perpusillus.	
Compressus.	
Scorpioides.	
O R O B A N C H E , p. 308.	
Lævis.	
Major.	
Ramosa.	
O R O B U S , pag. 366.	
Vernus.	
Tuberous.	
Niger.	
Pyrenaicus.	
O S M U N D A , pag. 523.	
Lunaria.	
Spicant.	
O S T E O S P E R M U M , p. 463.	
Moniliferum.	
O S Y R I S , pag. 502.	
Alba.	
O T H O N N A , pag. 463.	
Helenitis.	
Maritima.	
Pectinata.	

INDEX GENERUM.

Silaus.		PICRIS,	p. 406.
PHALARIS,	p. 33. & 545.	Echioides.	
Canariensis.		Hieracioides.	
Phleoides.		PIMPINELLA,	p. 150.
Arundinacea.		Saxifraga.	
Utriculata.		Anisum.	
PHALLUS,	p. 541.	PINUS,	p. 494.
Esculentus.		Sylvestris.	
Impudicus.		Pinea.	
PHASEOLUS,	p. 364.	Picea.	
Vulgaris.		Abies.	
Coccineus.		PISTACIA,	p. 502.
Farinosus.		Trifolia.	
Caracalla.		Narbonensis.	
PHELLANDRIUM,	p. 145.	Vera.	
Aquaticum.		Terebinthus.	
PHILADELPHUS,	p. 237.	Lentiscus.	
Coronarius.		PISUM,	p. 366.
PHILLYREA,	p. 6.	Sativum.	
Angustifolia.		Ockrus.	
Latifolia.		PLANTAGO,	p. 69.
PHLEUM,	p. 36.	Major.	
Pratense.		Media.	
Schoenoides.		Lanceolata.	
Bulbosum.		Lagopus.	
PHLOMIS,	p. 285.	Albicans.	
Fruticosa.		Alpina.	
Nissolia.		Maritima.	
Lychnitis.		Subulata.	
Herba venti.		Coronopus.	
Tuberosa.		Psyllium.	
Leonurus.		Cynops.	
PHOENIX,	p. 544.	PLATANUS,	p. 493.
Dactylifera.		Orientalis.	
PHYLLIS,	p. 129.	Occidentalis.	
Nobla.		PLUMBAGO,	p. 92.
PHYSALIS,	p. 107.	Europaea.	
Somnifera.		Zeylanica.	
Alkekengi.		POA,	p. 43.
Pubescens.		Aquatica.	
PHYTEUMA,	p. 99.	Trivialis.	
Hemisphaerica.		Angustifolia.	
Orbicularis.		Pratensis.	
Spicata.		Annuá.	
Comosa.		Eragrostis.	
PHYTOLACCA,	p. 225.	Compressa.	
Americana.		Nemoralis.	

INDEX GENERUM.

Bulbosa.	POTAMOGETON, p. 75.
POINCIANA, p. 204.	Natans.
Pulcherrima.	Densum.
POLEMONIUM, p. 95.	Crispum.
Cæruleum.	Setaceum.
POLIANTHES, p. 178.	Pusillum.
Tuberosa.	POTERIUM, p. 490.
POLYCARPON, p. 58.	Sanguisorba.
Tetraphyllum.	Hybridum.
POLYCNEUM, p. 24.	Spinosum.
Arvense.	POTENTILLA, p. 248.
POLYGALA, p. 354.	Anserina.
Vulgaris.	Multifida.
Monspeliaca.	Rupestris.
POLYGONUM, p. 197.	Recta.
Bistorta.	Argentea.
Virginianum.	Hirta.
Amphibium.	Alba.
Maritimum.	Reptans.
Hydropiper.	PRASIUM, p. 295.
Persicaria.	Majus.
Orientale.	PRENANTHES, p. 409.
Aviculare.	Viminea.
Tataricum.	Purpurea.
Fagopyrum.	Muralis.
POLYPODIUM, p. 527.	PRIMULA, p. 38.
Vulgare.	Officinalis.
Cambricum.	Auricula.
Lonchitis.	Farinosa.
Phegopteris.	Vitaliana.
Filix mas.	Integritolia.
Filix fœmina.	PRUNUS, p. 239.
Cristatum.	Padus.
Aculeatum.	Lusitanica.
Rhæticum.	Lauro-cerasus.
Fragile.	Mahaleb.
Dryopteris.	Armeniaca.
POLYTRICHUM, p. 531.	Cerasus.
Commune.	Domestica.
POPULUS, p. 506.	Spinosa.
Alba.	PSORALEA, p. 386.
Nigra.	Pinnata.
PORTULACCA, p. 227.	Bituminosa.
Oleracea.	Corilifolia.
Piloſa.	PTELEA, p. 82.
	Trifoliata.

INDEX GENERUM.

P TERIS,	<i>p. 525.</i>	R ESEDA,	<i>p. 229.</i>
Aquilina.		Luteola.	
P ULMONARIA,	<i>p. 82.</i>	Sesamoides.	
Officinalis.		Alba.	
P UNICA,	<i>p. 238.</i>	Lutea.	
Granatum.		Phyteuma.	
P YROLA,	<i>p. 208.</i>	Odorata.	
Rotundifolia.		R HAMNUS,	<i>p. 112.</i>
P YRUS,	<i>p. 242.</i>	Frangula.	
Communis.		Alaternus.	
Malus.		Catharticus.	
Cydonia.		Paliurus.	
		Zizyphus.	

Q

Q UERCUS,	<i>p. 490.</i>
Ilex.	
Gramuntia.	
Coccifera.	
Robur.	
Suber.	

R

R ANUNCULUS,	<i>p. 264.</i>
Flammula.	
Lingua.	
Amplexicaulis.	
Ficaria.	
Thora.	
Auricomus.	
Sceleratus.	
Illyricus.	
Monspeliacus.	
Bulbosus.	
Repens.	
Acris.	
Lanuginosus.	
Chærophyllos.	
Arvensis.	
Muricatus.	
Falcatus.	
Aquatalis.	
R APHANUS,	<i>p. 334.</i>
Sativus.	
Raphanistrum.	

R ESEA,	<i>p. 229.</i>
Luteola.	
Sesamoides.	
Alba.	
Lutea.	
Phyteuma.	
Odorata.	
R HAMNUS,	<i>p. 112.</i>
Frangula.	
Alaternus.	
Catharticus.	
Paliurus.	
Zizyphus.	
R HEUM,	<i>p. 201.</i>
Rhaponticum.	
Rhabarbarum.	
R HODIOLA,	<i>p. 506.</i>
Rosea.	
R HUS,	<i>p. 152.</i>
Coriaria.	
Toxicodendra.	
Cotinus.	
R IBES,	<i>p. 114.</i>
Rubrum.	
Alpinum.	
Nigrum.	
Uva crispa.	
R ICINUS,	<i>p. 496.</i>
Vulgaris.	
R INANTHUS,	<i>p. 296.</i>
Trixago.	
Crista galli.	
R IVINA,	<i>p. 72.</i>
Humilis.	
R OBINIA,	<i>p. 363.</i>
Pseudo-Acacia.	
Caragana.	
Pygmæa.	
R OSA,	<i>p. 245.</i>
Eglanteria.	
Villosa.	
Canina.	
Spinofissima.	
Centifolia.	
R OSMARINUS,	<i>p. 17.</i>
Officinalis.	

INDEX GENERUM.

RUBIA,	<i>p. 68.</i>	Vitellina.	
Tinctorum.		Amygdalina.	
RUBUS,	<i>p. 246.</i>	Rorismarinifolia.	
Idæus.		Fragilis.	
Cæsius.		Caprea.	
Fruticosus.		Viminalis.	
Saxatilis.		Alba.	
RUDBECKIA,	<i>p. 456.</i>	SALSOLA,	<i>p. 126.</i>
Hirta.		Kali.	
RUELLIA,	<i>p. 307.</i>	SODA.	
Strepens.		SALVIA,	<i>p. 17.</i>
RUMEX,	<i>p. 186.</i>	Lyrata.	
Patientia.		Officinalis.	
Sanguineus.		Pomifera.	
Crispus.		Urticifolia.	
Acutus.		Viridis.	
Pulcher.		Horminum.	
Bucephalophorus.		Sylvestris.	
Aquaticus.		Pratenis.	
Lunaria.		Verbenaca.	
Vesicarius.		Hispanica.	
Roseus.		Verticillata.	
Scutatus.		Glutinosa.	
Spinosus.		Canariensis.	
Acetosa.		Sclarea.	
Acetosella.		Ceratophylla.	
RUPPIA,	<i>p. 76.</i>	SAMBUCUS,	<i>p. 153.</i>
Maritima.		Ebulus.	
RUSCUS,	<i>p. 511.</i>	Nigra.	
Aculeatus.		Racemosa.	
Hypophyllum.		SAMOLUS,	<i>p. 105.</i>
Hypoglossum.		Valerandi.	
Racemosus.		SANGUISORBA,	<i>p. 71.</i>
RUTA,	<i>p. 205.</i>	Officinalis.	
Graveolens.		SANICULA,	<i>p. 131.</i>
		Officinalis.	
S		SANTOLINA,	<i>p. 431.</i>
SAGINA,	<i>p. 77.</i>	Chamæcyparissus.	
Procumbens.		Rorismarinifolia.	
Erecta.		SAPONARIA,	<i>p. 212.</i>
SAGITTARIA,	<i>p. 489.</i>	Officinalis.	
Sagittifolia.		Vaccaria.	
SALICORNIA,	<i>p. 2.</i>	Ocymoides.	
Europæa.		SATUREJA,	<i>pag. 273.</i>
SALIX,	<i>p. 500.</i>	Juliana.	
		Thymbra.	

INDEX GENERUM.

Hortensis.		Fluitans.
Montana.		Lacustris.
SATYR I U M ,	<i>p. 471.</i>	Holocephenus.
Hircinum.		Romanus.
SAXI F R A G A ,	<i>p. 209.</i>	Setaceus.
Cotyledon.		Mucronatus.
Geum.		Maritimus.
Aizoides.		Sylvaticus.
Rotundifolia.		SCLERANTH U S , <i>p. 211.</i>
Granulata.		Annuus.
Tridactylites.		SCOLY M U S , <i>p. 419.</i>
Cespitosa.		Maculatus.
Hypnoides.		Hispanicus.
Adscendens.		SCORPIU R U S , <i>p. 380.</i>
SCABIOSA ,	<i>p. 61.</i>	Vermiculata.
Alpina.		Subvillofa.
Leucantha.		Sulcata.
Succisa.		SCORZONERA , <i>p. 405.</i>
Syriaca.		Hispanica.
Integrifolia.		Angustifolia.
Arvensis.		Laciñiata.
Gramuntiana.		Picroides.
Columbaria.		SCROPHULARIA , <i>p. 303.</i>
Atro-purpurea.		Nodosa.
Ochroleuca.		Aquatica.
Papposa.		Scorodonia.
Maritima.		Vernalis.
SCANDIX ,	<i>p. 146.</i>	Canina.
Odorata.		Peregrina.
Pecten Veneris.		SCUTELLARIA , <i>p. 294.</i>
Cerefolium.		Orientalis.
Australis.		Cretica.
SCHIN U S ,	<i>p. 508.</i>	Galericulata.
Molle.		Peregrina.
SCHOEN U S ,	<i>p. 27.</i>	SECALE , <i>p. 56.</i>
Mariscus.		Cereale.
Mucronatus.		Villosum.
Nigricans.		SEDUM , <i>p. 220.</i>
SCILLA ,	<i>p. 173.</i>	Telephium.
Maritima.		Anacampteros.
Italica.		Cepaea.
Peruviana.		Dasyphyllum.
Amœna.		Rupestre.
Autumnalis.		Album.
Bifolia.		Acre.
SCIRP U S ,	<i>p. 29.</i>	Sexangulare.
Palustris.		

INDEX GENERUM.

S E M P E R V I V U M .	<i>p. 235.</i>	S I L E N E ,	<i>p. 216.</i>
Arboreum.		Quinquevulnera.	
Tectorum.		Nutans.	
Arachnoideum.		Fruticosa.	
S E N E C I O ,	<i>p. 439.</i>	Conoidea.	
Vulgaris.		Conica.	
Viscosus.		Behen.	
Sylvaticus.		Muscipula.	
Elegans.		Armeria.	
Incanus.		Rupestris	
Abrotanifolius.		Saxifraga.	
Jacobæa.		S I L P H I U M ,	<i>p. 462.</i>
Doria.		Perfoliatum.	
Nemorensis.		S I N A P I S ,	<i>p. 333.</i>
Sarracenicus.		Arvensis.	
Doronicum.		Nigra.	
S E R A P I A S ,	<i>p. 474.</i>	Alba.	
Helleborine.		Lævigata.	
Lingua.		S I S O N ,	<i>p. 142.</i>
S E R R A T U L A ,	<i>p. 420.</i>	Amomum.	
Babilonica.		Ammi.	
Tinctoria.		Verticillatum.	
Arvensis.		S I S Y M B R I U M ,	<i>p. 325.</i>
S E S E L I ,	<i>p. 147.</i>	Nasturtium.	
Montanum.		Sylvestre.	
Glaucum.		Amphibium.	
Tortuosum.		Polyceratium.	
Annuum.		Murale.	
S H E R A R D I A ,	<i>p. 64.</i>	Asperum.	
Arvensis.		Sophia.	
Muralis.		Altissimum.	
S I D A ,	<i>p. 344.</i>	Irio.	
Spinosa.		Strictissimum.	
Cordifolia.		S I S Y R I N C H I U M ,	<i>p. 475.</i>
Abutilon.		Bermudiana.	
Cristata.		S I U M ,	<i>p. 142.</i>
S I D E R I T I S ,	<i>p. 277.</i>	Latifolium.	
Syriaca.		Nodiflorum.	
Perfoliata.		Sisarum.	
Montana.		S M I L A X ,	<i>p. 505.</i>
Romana.		Aspera.	
Hyssopifolia.		S M Y R N I U M ,	<i>p. 149.</i>
Hirsuta.		Olusatrum.	
Ocymastrum.		S O L A N U M ,	<i>p. 108.</i>
S I G E S B E C K I A ,	<i>p. 453.</i>	Pseudo-capsicum.	
Orientalis.		Dulcamara.	

INDEX GENERUM.

<i>Quercifolium.</i>	<i>Ulmaria.</i>
<i>Bonariense.</i>	<i>S P O N G I A,</i> p. 538.
<i>Tuberosum.</i>	<i>Officinalis.</i>
<i>Lycopersicon.</i>	<i>Infundibuliformis.</i>
<i>Nigrum.</i>	<i>S T A C H Y S,</i> p. 282.
<i>Melongena.</i>	<i>Sylvatica.</i>
<i>Mammosum.</i>	<i>Palustris.</i>
<i>Indicum.</i>	<i>Germanica.</i>
<i>Sodomeum.</i>	<i>Cretica.</i>
<i>Tomentosum.</i>	<i>S T A H E L I N A,</i> p. 430.
<i>Bahamense.</i>	<i>Dubia.</i>
S O L I D A G O, p. 443.	S T A P E L I A, p. 122.
<i>Canadenis.</i>	<i>Variegata.</i>
<i>Virga aurea.</i>	S T A P H Y L E A, p. 154.
<i>Rigida.</i>	<i>Pinnata.</i>
<i>Montana.</i>	S T A T I C E, p. 157.
<i>Alpina.</i>	<i>Armeria.</i>
S O N C H U S, p. 407.	<i>Limonium.</i>
<i>Arvensis.</i>	<i>Echioides.</i>
<i>Oleraceus.</i>	S T E L L A R I A, p. 217.
<i>Tenerimus.</i>	<i>Nemorum.</i>
<i>Alpinus.</i>	<i>Dichotoma.</i>
S O R B U S, p. 241.	<i>Graminea.</i>
<i>Aucuparia.</i>	S T E L L E R A, p. 197.
<i>Domestica.</i>	<i>Passerina.</i>
S P A R G A N I U M, p. 480.	S T I P A, p. 51.
<i>Erectum.</i>	<i>Pennata.</i>
S P A R T I U M, p. 355.	<i>Juncea.</i>
<i>Junceum.</i>	S Y M P H Y T U M, p. 83.
<i>Monospermum.</i>	<i>Officinale.</i>
<i>Scorpius.</i>	<i>Tuberosum.</i>
<i>Complicatum.</i>	S Y R I N G A, p. 8.
<i>Scoparium.</i>	<i>Vulgaris.</i>
<i>Spinosum.</i>	<i>Perfica.</i>
S P E R G U L A, p. 224.	T
<i>Pentandra.</i>	T A G E T E S, p. 447.
<i>Nodosa.</i>	<i>Patula.</i>
<i>Saginooides.</i>	<i>Erecta.</i>
S P E R M A C O C E, p. 64.	T A M A R I X, p. 154.
<i>Tenuior.</i>	<i>Gallica.</i>
S P H A G N U M, p. 530.	T A M U S, p. 505.
<i>Palustre.</i>	<i>Communis.</i>
S P I N A C I A, p. 504.	T A N A C E T U M, p. 432.
<i>Oleracea.</i>	<i>Vulgare.</i>
S P I R A E A, p. 245.	<i>Balsamita.</i>
<i>Filipendula.</i>	T A X U S,

INDEX GENERUM.

TAXUS,	p. 510.	THYMUS,	p. 289.
Baccata.		Serpillum.	
TELEPHIUM,	p. 155.	Vulgaris.	
Imperati.		Zygis.	
TEUCRIUM,	p. 269.	Acinos.	
Virginicum.		Pulegioides.	
Scorodonia.			
Montanum.			
Polium.		TILIA,	p. 254.
Chamæpitys.		Europæa.	
Iva.		TILLÆA,	p. 77.
Marum.		Rubra.	
Pseudo-chamæpitys.		Muscosa.	
Botrys.			
Creticum.		TORDYLIUM,	p. 133.
Multiflorum.		Syriacum.	
Scordium.		Officinale.	
Chamædrys.		Maximum.	
Flavum.		Latifolium.	
THALICTRUM,	p. 263.	Anthriscus.	
Fœtidum.		Nodosum.	
Minus.			
Angustifolium.		TORMENTILLA,	p. 249.
Flavum.		Erecta.	
Aquilegifolium.			
THAPSIA,	p. 148.	TRACHELIUM,	p. 100.
Villosa.		Azureum.	
Fœtida.		TRADESCANTIA,	p. 162.
Asclepium.		Virginiana.	
THELIGONUM,	p. 489.	TRAGOPOGON,	p. 404.
Cynocrambe.		Pratense.	
THESIUM,	p. 118.	Porrifolium.	
Linophyllum.		Dalechampii.	
THLASPI,	p. 316.	Picroides.	
Peregrinum.		Asperum.	
Arvense.		Crocifolium.	
Saxatile.		TREMELLA,	p. 535.
Perfoliatum.		Noftoc.	
Hirtum.		Auricula.	
Campestre.		Verrucosa.	
Montanum.		Hemisphærica.	
Bursa pastoris.			
THUJA,	p. 494.	TRIBULUS,	p. 207.
Orientalis.		Terrestris.	
THYMBRA,	p. 274.		
Spicata.		TRIFOLIUM,	p. 387.
		Melilotus cærulea.	
		Officinalis.	
		Italica.	
		Cretica.	
		Repens.	
		Alpinum.	
		Subterraneum.	

OO

INDEX GENERUM

- C**herleri.
Rubens.
Pratense.
Glomeratum.
Lappaceum.
Angustifolium.
Arvense.
Stellatum.
Scabrum.
Montanum.
Spumosum.
Resupinatum.
Tomentosum.
Fragiferum.
Agrarium.
Montanum.
TRIGLOCHIN, p. 188.
 Palustre.
TRIGONELLA, p. 396.
 Policeratia.
 Monspeliaca.
 Fœnum Græcum.
 Corniculata.
TRICICUM, p. 57.
 Æstivum.
 Hybernum.
 Spelta.
 Monococcum.
 Repens.
 Caninum.
TROPÆOLUM, p. 192.
 Minus.
TULIPA, p. 171.
 Sylvestris
 Gesneriana.
TURNERA, p. 155.
 Ulmifolia.
TURRITIS, p. 331.
 Hirnsuta.
TUSSILAGO, p. 438.
 Alpina.
 Farfara.
TYPHÀ, p. 480.
 Latifolia.
 Angustifolia.
V
VACCINIUM, p. 194.
 Myrtillus.
VALANTIA, p. 515.
 Muralis.
 Aparine.
 Articulata.
 Cruciatum.
VALERIANA, p. 21.
 Rubra.
 Calcitrapa.
 Officinalis.
 Phu.
 Tripteris.
 Locusta.
 Mixta.
VELEZIA, p. 185.
 Rigida.
VELLA, p. 312.
 Annua.
 Pseudo - Cytisus.
VERATRUM, p. 512.
 Album.
VERBASCUM, p. 103.
 Thapsus.
 Lychnitis.
 Nigrum.
 Blattaria.
 Sinuatum.
VERBENA, p. 14.
 Nodiflora.
 Bonariensis.
 Hastata.
 Urticæfolia.
 Officinalis.
VERBESINA, p. 454.
 Alata.
 Alba.
VERONICA, p. 9.
 Spuria.
 Spicata.
 Officinalis.
 Alpina.
 Serpyllifolia.
 Beccabunga.

INDEX GENERUM.

Anagallis.	U L V A ,	p. 387.
Chamædrys.	Intestinalis,	
Latifolia.	Lactuca,	
Agrestis.	U R T I C A ,	p. 484.
Arvensis.	Pilulifera.	
Hederæfolia.	Urens.	
Triphyllos.	Dioica.	
VIBURNUM,	Parietaria.	
	Canadensis.	
Tinus.	U T R I C U L A R I A ,	p. 14.
Lantana.	Vulgaris.	
Opulus.		
VICIA,		
		X
Dumetorum.	XANTHIUM,	p. 485.
Sylvatica.	Strumarium.	
Cracca.	Spinosum.	
Onobrychioides.	XERANTHEMUM,	p. 435.
Biennis.	Annuum.	
Sativa.		Y
Lathyroides;	YUCCA,	p. 179.
Lutea.	Gloriosa.	
Hybrida.	Draconis.	
Peregrina.		Z
Sepium.	ZANICHELLIA ,	p. 479.
Narbonensis.	Palustris.	
Faba.	ZEA ,	p. 481.
VINCA,	Mays	
	ZIZIPHORA ,	p. 16.
Major.	Tenuior.	
Rosea.	ZOSTERA ,	p. 478.
VIOLA,	Marina.	
Odorata.	ZYGOPHYLLUM ,	p. 206.
Canina.	Fabago.	
Tricolor.		
VISCU M ,		
Album.		
VITEX ,		
Agnus castus.		
VITIS ,		
Vinifera.		
Laciniosa.		
ULMUS ,		
Campestris.		

FINIS.

E R R A T A.

- P**Ag. 1. lin. 9. Florescentia. *lege* ubique, Inflorescentia.
 2. 31. sonfouire. *leg.* sounfouire.
 3. 26. Foliat. simplex sparsa. *leg.* Foliat. simplex sparsa
 petiolata integrerima.
 11. integerimis. *leg.* inæqualibus.
 22. 27. La Chuguette. *leg.* la chugueta:
 27. 8. nectariferos. *leg.* nectariferæ.
 46. 2. Briza. *leg.* Briza n. §.
 48. 16. Viret. *leg.* Vitium.
 53. 32. Bione-la-Mouson. *leg.* Bione, Lamouson.
 66. 8. triquetris floribus, *leg.* triquetris, floribus &c.
 69. penult. herbe de cinq côtes *leg.* herba de cinq costas.
 78. 22. sessilibus. *leg.* sessilibus, caule procumbente.
 79. 8. primâ. *leg.* secundâ.
 81. 38. d'autal. *leg.* dàou tal.
 89. 31. Guillin. *lege* ubique, Guilhen.
 95. 38. ramosa racemosa. *leg.* ramoso-racemosa.
 102. 28. 2^e. *leg.* 2^o.
 130. 13. caulina, amplexicaulis, pinnato-pinnatifida.
 leg. caulina amplexicaulis pinnato-pinnatifida.
 130. 30. involucrum. *leg.* involucrorum.
 136. 13. pili rigidi in caule (& seminibus in una specie.)
 leg. (pili rigidi in caule, & seminibus in
 una specie.
 142. 11. tuberosa fibrosa fusiformis. *leg.* tuberosa, fibro-
 fa, vel fusiformis.
 144. 1. stipulosa. *leg.* fistulosa.
 163. 31. intrà. *leg.* infrà.
 179. 35. (in plurimis) bractea. *leg.* (in plurimis;)
 Bractea, &c.
 205. 15. pedunculis glandulæ. *leg.* pedunculis; glandulæ.
 206. 10. Loun. *leg.* Loun.
 218. 22. (nulla in una specie) stipulæ. *leg.* nulla (in
 una specie stipulæ.)
 220. 5. herbacea succulenta ramosa teres. *leg.* succu-
 lenta ramosa teres, herbacea vel fruticosa.
 227. 35. dodecangris. *leg.* dodecandris.
 235. 11. radicata. *leg.* radicalis.
 236. 17. nescientibus. *leg.* naſcentibus.
 268. 6. ramosa vel fibrosa. *leg.* ramosa, tuberosa, vel
 fibrosa.
 399. 7. scuteliata. *leg.* scutellata.
 494. 20. las Pincas. *leg.* las Pinias.

