

Catálogo de los Tenebrionidae (Coleoptera) de Chile.

Luis E. Peña G.

Research Associate in Zoology
Peabody Museum of Natural History
at Yale University

En el «Catálogo de los Coleopteros de Chile» de don Federico Philippi, publicado en los Anales de la Universidad de Chile en el año 1887, aparecen como del país la cantidad de 168 especies de *Tenebrionidae*. Posteriormente, en la „Check List of Coleopterous Insects of Mexico, Central America, The West Indies and South America“, del Dr. Richard E. Blackwelder, publicado por el United States National Museum en el año 1945, el número aumenta a 241 especies y que más o menos corresponde al „Katalog der Tenebrioniden (Col. Heteromera)“ de Hans Gebien, publicado en el Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 1938/1944 y en Pubblicazione del Museo Entomologico »Pietro Rossi« Duino en 1937.

Durante los años que hemos estado dedicado a explorar el territorio de Chile con especial dedicación a la recolección de *Tenebrionidae*, se han logrado descubrir numerosas especies y se han compilado enorme cantidad de datos sobre la distribución de las especies y lugares que ellas frecuentan. Esto nos ha inducido a presentar un nuevo catálogo agregando en él las nuevas especies descritas por autores contemporáneos tales como Hans Gebien, Hans Kulzer, Z. Kaszab y Heinz Freude, el primero de ellos ya fallecido.

En estos momentos el número de especies que se ha encontrado en Chile llegan a 367 de las cuales la gran mayoría son especies que han debido ser descritas como nuevas y el resto se debe a descubrimiento de especies ya descritas de Argentina, Bolivia o del Perú que no se habían encontrado anteriormente en nuestro país. Este enorme aumento de la fauna de esta familia, se debe, como dijimos anteriormente, a las continuas expediciones y viajes efectuados y estamos ciertos que si nuestra actividad exploratoria continúa, es muy probable que este número sea muy aumentado, pues hay

muchas regiones de nuestro país completamente desconocidas por los entomólogos y muchas de ellas reúnen condiciones muy favorables para hacer interesantes descubrimientos no solo, naturalmente en especies de esta familia, sino que en el resto de los insectos e incluso en aves y mamíferos y otros animales.

La gran mayoría de los *Typus* de las especies recientemente descritas se hayan depositados en nuestra colección particular y en el Museum Frey.

Santiago, Abril 1966.

Abreviatura Empleada en la Literatura

| | |
|----------------------|--|
| Ann. Ag. Lyon | Annales de la Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts utiles de Lyon (Lyon, Paris) |
| Ann. Mag. | Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology (Londres) |
| Ann. Soc. Ent. Belg. | Annales de la Société Entomologique de Belgique |
| Ann. Soc. Ent. Fr. | Annales de la Société Entomologique de France (Paris) |
| Ann. Soc. Nat. | Annales de la Société Naturelle de Paris |
| An. Univ. Chile | Anales de la Universidad de Chile |
| Arch. Nat. | Archiv für Naturgeschichte (Berlin) |
| Berl. Zeit. | Berliner Entomologischen Verein in Berlin |
| Bull. Mosc. | Bulletin de la Société Impériale de Naturalistes de Moscou |
| Bull. Paris | Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris |
| Bull. Soc. Ent. Fr. | Bulletin de la Société Entomologique de France (Paris) |
| Col. Chilensia. | Coleoptera Chilensia (Paris) |
| Col. Hefte | Coleopterologische Hefte. Herausgegeben von E. v. Harold (München) |
| Col. Kat. | Katalog der Tenebrionide (Col. Het.) Teil 1, en Pubblicazioni del Museo Entomologico „Pietro Rossi“ Duino; Teil II y III en Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft |
| Com. Mus. Bs. As. | Comunicaciones del Museo Bernardino Rivadavia (Buenos Aires) |
| Deut. Ent. Zeit. | Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berlin) |
| Ent. Arb. Mus. Frey | Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey (München) |
| Ent. Mag. | The Entomologist's Monthly Magazine (London) |

| | |
|--------------------------|---|
| Ent. Syst. | Entomologia Systematica, Hafniae. |
| Gen. Col. | Histoire Naturelle des Insectes. Généra des Coleoptères, Band 5 (Heteromera), (Paris) |
| Gen. Col. Eur. | Manual Entomologique. Genera des Coléoptères de Europe, Paris 1854 (Tenebrionidae 1861) |
| Ham. Mag. Samm. | Ergebnisse der Hamburger Magalhaenischen Sammelreise, Lief. |
| Hist. Chile | Historia Física y Política de Chile, Claudio Gay (Zoologia), (Paris) |
| Hist. Nat. | Histoire Naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptères (Paris) |
| Ins. Perj. | Los Insectos Perjudiciales a los Productos Almacenados etc., Editorial Universitaria (Santiago) |
| Mag. Zool. Melas. | Magazin de Zoologie, par F. E. Guérin-Meneville (Paris) |
| Mem. Act. Torin | Memoire della Reale Accademie delle Science di Torino |
| Miss. Sc. Cap. Horn | Mission Scientifique du Cap Horn (Paris) |
| Mitt. Münch. Ent. Ges. | Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft e. V. |
| Nat. Hist. Juan Fdz. | Natural History of Juan Fernandez and Easter Island, Zoology |
| Nat. Syst. | Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten . . . Käfer |
| Nov. Act. Ac. Leop. Gar. | Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae-Leopoldino-Carolinae, Naturae Curiosorum, Bonn |
| Not. Mens. Stgo. | Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile (Santiago) |
| Opusc. Ent. | Opuscula Entomologica (Lund) |
| Pet. Nouv. | Petites Nouvelles Entomologiques (Paris) |
| Phys. | Physis Recueil d'Histoire Naturelles |
| Proc. Cal. Ac. Sc. | Proceedings of the California Academy of Sciences |
| Proc. Phil. | Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia |
| Proc. Zool. Soc. | Proceedings of the Scientific Meeting of the Zoological Society of London (London) |
| Regne Anim. | Inconographie du regne Animal de G. Cuvier, Insectes |
| Reise Novara | Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde, Coleoptera (Viena) |
| Resa Eugenia | Kongliga Svenska Fregatten Eugenia resa omkring Jorden . . . Zoologi, I, Insecta |

| | |
|-----------------------|---|
| Reise Wüste Atac. | Reise durch die Wüste Atacama auf Befehl der Chilenischen Regierung im Sommer 1853/1854 unternommen und beschrieben, Halle |
| Rev. Univ. Cat. Chile | Revista Universitaria. Anales de la Academia Chilena de Ciencias Naturales, Universidad Católica de Chile |
| Rev. Zool. | Revue Zoologique |
| Stett. Ent. Zeit. | Stettiner Entomologischen Zeitung, Stettin |
| Studi Ent. | Studi Entomologici Pubblicati per Cura di Flamini Baudi e di Eugenio Truqui, Torino |
| Suppl. Ent. Syst. | Supplementum Entomologiae Systematicae, Hafniae |
| Syst. Eleut. | Systema eletheratorum, Kiliae |
| Syst. Nat. | Systema Natura per Regna Naturae secundum classes, . . . Holmiae |
| Tr. Am. Phil. Soc. | Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia |
| Tr. Ent. Lond. | Transactions of the Entomological Society of London |
| Tr. Linn. Soc. | Transactions of the Linnean Society of London |
| Tr. Zool. Lond. | Transactions of the Society of London |
| Voy Coq. | Voyage autour du monde exécuté par ordre du Roy, sur la Corvette de sa Majesté „Coquille“ |
| Voy D'Orb. | Insectes de l'Amerique Méridionale recueillis par Alcides D'Orbigny, Paris |
| Voy. du S. Y. Belgia | Expedition antarctique belge, résultats du voyage du S. Y. Belgia . . . Zoologie, Paris |
| Voy. Pole Sud | Voyage du Pole Sud . . . Zoologie, Paris |
| Zool. Atl. | Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten während Kotzebue's ect 2. Reise um die Welt, 1823–1826 gesammelt. Berlin, Reimer, 1929–1833. |

Sinopsis de los generos chilenos de la familia Tenebrionidae

| | | |
|----------------------|------------------------|---|
| Subfam. Epitragini | Melaphorus | 1 |
| Geoborus | 2 Subfam. Eurymetopini | |
| Nyctopetus | 12 Arthroconus | 1 |
| Parepitragus | 1 Hylithus | 3 |
| Hypselops | 1 Subfam. Thinobatini | |
| Aspidolobus | 2 Thinobatis | 6 |
| Omopheres | 1 Pseudothinobatis | 2 |
| Subfam. Evaniosomini | Cordibates | 1 |
| Aryenis | 1 Subfam. Trimytini | |
| Achanius | 1 Salax | 1 |

| | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|----|
| Trilobocara | 2 | Phaleria | 1 |
| Eremoecus | 2 | Phalerisida | 1 |
| Peltolobus | 2 | Subfam. Crypticini | |
| Subfam. Stenosini | | Archeocrypticus | 2 |
| Discopleurus | 2 | Subfam. Bolitophagini | |
| Grammicus | 1 | Trachyderas | 1 |
| Hexagonochilus | 2 | Subfam. Dysantini | |
| Subfam. Nyctoporini | | Ploepsidius | 4 |
| Ammophorus | 3 | Subfam. Diaperini | |
| Subfam. Nycteliini | | Hoplocephala | 1 |
| Gyriosomus | 34 | Platydemia | 1 |
| Nyctelia | 15 | Enneboeus | 1 |
| Epipedonota | 18 | Subfam. Ulomini | |
| Psectrascelis | 25 | Gnathocerus | 1 |
| Auladera | 3 | Phanerops | 2 |
| Mitragenius | 2 | Tribolium | 2 |
| Pilobalia | 3 | Oligocara | 2 |
| Subfam. Scotobiini | | Alphitobius | 2 |
| Psammetichus | 7 | Doliema | 1 |
| Diastoleus | 2 | Subfam. Eutelini | |
| Scotobius | 20 | Pteroderes | 1 |
| Emmalodera | 4 | Subfam. Tenebrionini | |
| Subfam. Eleodini | | Tenebrio | 2 |
| Nycterinus | 10 | Toxicum | 1 |
| Subfam. Physogasterini | | Subfam. Cyphaleini | |
| Philorea | 5 | Cyphaleus | 1 |
| Physogaster | 6 | Subfam. Apocryphini | |
| Entomochilus | 10 | Apocrypha | 2 |
| Subfam. Praocini | | Subfam. Adeliini | |
| Asidelia | 1 | Adelium | 2 |
| Neopraocis | 1 | Subfam. Misolampini | |
| Platesthes | 4 | Heliofugus | 25 |
| Praocis | 60 | Myrmecodema | 3 |
| Falsopraocis | 3 | Subfam. Helopini | |
| Subfam. Pedinini | | Parahelops | 5 |
| Opatrinus | 1 | Hydromedion | 5 |
| Blapstinus | 2 | Chanopterus | 1 |
| Subfam. Opatrini | | Brachyhelops | 1 |
| Ectatocnemis | 1 | Dolphus | 1 |
| Lepidocnemeplatia | 1 | Subfam. Strongilini | |
| Gonocephalum | 1 | Homocyrtus | 3 |
| Subfam. Phaleriini | | Cuphotes | 1 |

Epitragini Lacordaire

Geoborus Blanchard

= *Deroplatus* Solier

costatus Blanchard 1843, Voy D'Orb., 194, lám. 13, f. 1. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, 133, lám. 18, f. 4 e/f. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 67/68.

Loc: Prov. Coquimbo, Valparaíso y Santiago (Zonas arboladas), sobre plantas.

rugipennis (Solier) 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 134/135. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 68/69.

= *pilosus* Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit., 25, p. 331/332.

Loc: Prov. Atacama y Coquimbo (zonas áridas), sobre plantas y flores.

Nyctopetus Guérin

niger Germain 1855, An. Univ. Chile, p. 397/398. – Philippi 1864, Stett. Ent. Ges. 49, p. 71/72.

= *laticollis* Philippi l. c. 327/328.

= *carbonarius* Philippi l. c. 329.

Loc: Prov. Santiago y Colchagua sobre los 3.000 mts. Bajo piedras o plantas.

ssp. **parvus** Philippi l. c. 328/329. – Freude l. c. 74.

Loc: Prov. Valdivia (Corral).

argentinus Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 74/76.

Loc: Prov. Malleco (Liucura, El Arco, etc.), Prov. Aysén (Chile-Chico).

neuquensis Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 76/77.

Loc: Prov. Coquimbo (Cordillera de Illapel).

nitidus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 331. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ges. 49, p. 78/79.

Loc: Prov. Curicó y Colchagua (zonas arboladas).

carinatus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 330/331. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 79/80.

Loc: Prov. Colchagua.

rengoensis Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 81/82.

Loc: Prov. Santiago y O'Higgins (Sobre arbustos en zona pre-andina).

ssp. **illapelensis** Freude 1959, l. c. 82/83.

Loc: Prov. Coquimbo (zona andina de Illapel, sobre arbustos).

kaszabi Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 83/84.

Loc: Prov. Santiago a Linares (Cordillera). Coquimbo (Elqui). Prov. Concepción (Contulmo). (Sobre arbustos).

manni Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 84/86.

Loc: Prov. Santiago (Renca, Alhué, Aculeo, etc.); Valparaíso (Limache, Quilpué). Zona andina desde Santiago a Linares. (Sobre plantas).

leechi Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 86/87.

Loc: Prov. Coquimbo (Huanta, Elqui, Paihuano, Zona andina de Illapel, Zona costera de Pullalli).

maculipennis (Laporte) 1840, Hist. Nat. 2, p. 215. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 132, lám. 18, f. 4 a/d. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 89/90.

= var. *lividipennis* (Blanchard) 1843, Voy. D'Orb., p. 194 lám. 13, f. 2. Loc: Prov. Coquimbo, Aconcagua y Santiago (Zona andina), sobre arbustos y árboles.

penai Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 87/89.

Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo); Coquimbo (Illapel, Ovalle, Vicuña, Combarbalá, Serena); Aconcagua.

tenebrioides Guérin 1830, Voy. Coq. 2, p. 98, lám. 4, f. 7. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 215. – Solier 1851, in Gay Hist. Chile 5, p. 131. – Freude 1959, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49, p. 91/92.

Loc: Prov. Maule (Curanipe); Ñuble (zona preandina). Sobre árboles y arbustos.

ssp. **rossi** Freude 1959, l. c. 92/93.

Loc: Prov. Bio-Bio (Laguna del Laja, Pemehue); Malleco (La Fusta, Lonquimay, etc.); Cautín; Arauco (Cordillera de Nahuelbuta). Sobre árboles y arbustos.

ssp. **rubripes** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 329/330. – Freude l. c. 93/94.

Loc: Prov. Santiago a Talca (Zona precordillera de los Andes y de la cordillera de la Costa), sobre árboles y arbustos.

ssp. **gaudichaudi** (Laporte) 1840 l. c. 215. – Solier l. c. 132. – Freude l. c. 95/96.

= *quadricollis* Laporte l. c. 215. – Solier l. c. 132.

Loc: Prov. Valparaíso y Santiago (zonas boscosas y arbustivas).

Parepitragus Casey

pulverulentus Erichson 1847, Arch. Nat. 13, p. 117. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo., V, p. 1.

Loc: Prov. Tarapacá (Valle de Azapa).

Hypselops Solier

oblonga Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 135, lám. 18, f. 5.

Loc: Prov. Atacama (Domeyko) en zonas áridas.

Aspidolobus Redtenbacher

piliger Redtenbacher 1868, Reise Novara 2, p. 119.

Loc: Prov. Santiago (Quilicura).

penai Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 48.

Loc: Coquimbo (Playa de Talinay), bajo piedras.

Omopheres Casey

porteri Brêthes 1922, Rev. Chile Hist. Nat., p. 170.

Loc: indeterminada.

E v a n i o s o m i n i Lacordaire**Aryenis** Bates

unicolor Blanchard 1843, Voy. D'Orb. p. 199, lám. 15. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo., V, p. 1.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama y Toconao), bajo piedras.

Achanius Erichson

piceus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 902/903.

Loc: Prov. Tarapacá (Camarones, Lluta), bajo piedras?

Melaphorus Guérin

= *Stenholma* Solier

elegans Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 895/896.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica Camarones, pajo piedras?).

E u r y m e t o p i n i Casey**Arthroconus** Solier

= *Gymnognathus* Solier

elongatus Solier 1851 en Gay, Hist. Chile 5, p. 240.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel), Talca (Rio Maule), precordillera, bajo piedras.

fuscus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 137, lám. 18, f. 6.

= *piceus* Solier l. c. 239, lám. 20, f. 8.

Loc: Prov. Antofagasta a Linares bajo piedras, troncos, pasto, plantas, etc. o vagando durante el día.

Hylithus Guérin

humilis Erichson 1847, Arch. Nat. 13, I, p. 113. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre) bajo piedras en zona andina sobre los 3.200 mts.

tentyrioides Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 287. – Guerin 1834, Mag. Zool. Cl. IX, 12, p. 108. – Solier 1835, Ann. Soc. Ent. Fr. 4, p. 410, lám. 9, f. 15/17.

= *brevicornis* (Solier) 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 136.

Loc: Prov. Antofagasta a Atacama bajo piedras y plantas en zona andina sobre los 3.200 mts.

ssp. **atacamensis** Kaszab 1964, Ann. Hist. Nat. Mus. Hung. 56, p. 380.

Loc: Prov. Atacama (Vallenar). Bajo piedras y plantas.

forsteri Kaszab 1964, l. c. p. 380.

Loc: Prov. Tarapaca (Arica), bajo piedras y plantas.

ssp. **penai** Kaszab 1964, l. c. p. 382.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre, W. volcán Láskar, 3.500 mts.) bajo piedras y plantas.

Thinobatinia Lacordaire

Thinobatis Eschscholtz

= *Trinobatis* Laporte

ferruginea Eschscholtz 1831, Zool. Atl. 4, 9, lám. 18, f. 3. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 196. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges. p. 25/26.

= *minuta* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 126/127, lám. 18, f. 1. – Freude l. c. p. 26.

Loc: Prov. Atacama a Valparaiso zona de la costa, en dunas.

intermedia Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 327. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 26/27.

Loc: Prov. Valdivia a Chiloé, zona costera, en dunas.

rufipes Solier 1835, Ann. Soc. Ent. Fr. IV, p. 407/408, lám. 9, f. 11. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 27/28.

Loc: Prov. Coquimbo a Maule, zona costera, en dunas.

ssp. **penai** Freude. l. c. p. 28.

Loc: Prov. Osorno a Chiloé, zona costera en dunas.

rotundicollis Waterhouse 1845, Ann. Mag. XVI, p. 320. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 29.

Loc: Prov. Coquimbo (Sur), a Colchagua, zona costera en dunas.

kuscheli Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, 3, p. 903/905. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 30.

Loc: Prov. Antofagasta (Rinconada).

melcheri Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 30.

Loc: Prov. Atacama, zona costera en dunas.

brevicollis Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 51.

Loc: Prov. Valparaiso (Vina del Mar; Sn. Jeronimo; Algarrobo).

Pseudothinobatis Freude

ohausi (Kulzer) 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 905. – Freude 1960, Mitt. Münch. Ent. Ges., p. 34.

Loc. Prov. Tarapacá (?).

calderana Kulzer, 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 49.

Loc: Prov. Atacama (Caldera).

Cordibates Kulzer

chilensis Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 910/911.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta. Zona costera, llega a la luz.

Trimytini Casey

Salax Guérin

lacordairei Guérin 1843, Mag. Zool. Cl. IX, II, lám. 107. – Lacordaire 1859, Gen. Col. lám. 48, f. 1. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

= *salax* Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 288.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama, etc.), Zona andina, bajo piedras en zonas húmedas salobres.

Trilobocara Solier

= *Tribolocara* Lacordaire

= *Edrotinus* Fairmaire

ciliata Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 129.

Loc: Prov. Aconcagua y Coquimbo.

erotyloides Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 288. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

Loc: Santiago, probablemente haya confusión con la especie anterior, Consideramos dudosa la presencia de esta especie en Chile.

Eremoeucus Lacordaire

= *Hyperops* Solier

cardicollis Kirsch 1873, Berl. Zeit. 17, p. 402.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre), sobre 3.200 mts. Bajo piedras.

eschscholtzi (Solier) 1951 in Gay, Hist. Chile 5, p. 128, lám. I, f. 2.

Loc: Coquimbo (?).

Peltolobus Lacordaire

= *Megalophrys* Waterhouse

= *Albuena* Kulzer

patagonica (Waterhouse) 1845, Ann. Mag. 16, p. 322. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 462. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 1.

Loc: Prov. Magallanes (Natales, Cerro Payne), bajo piedras.

waterhousei Bates 1873, Ent. Mag. 10, p. 47.

= *penai* Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 912; 1962, l. c. 13, p. 100.

Loc: Santiago Cordillera de la Costa (Alhué), en troncos en descomposición, en bosques.

Stenosini Lacordaire

Discopleurus Lacordaire

= *Pleurophorus* Solier

acuminatus Reitter 1886, Deut. Ent. Zeit. 30, p. 99.

Loc: indeterminada

quadricollis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 163, lám. 18, f. 1.

Loc: Prov. Coquimbo, zona costera (Longotoma).

Grammicus Waterhouse

chilensis Waterhouse 1845, Ann. Mag. 16, p. 324.

= *rouletti* Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 162, lám. 18, f. II.

Loc: Prov. Coquimbo a Santiago en regiones áridas desde la costa hasta los 2.200 mts. bajo piedras, por lo general en colonias.

Hexagonochilus Solier

dilaticollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 169, lám. 19, f. 3.

Loc: Prov. Coquimbo a Curicó, bajo piedras o maderas.

tuberculatus Germain 1855, Ann. Univ. Chile 12, p. 399.

Loc: indeterminada.

Nyctoporini Lacordaire**Ammophorus** Guérin

= *Selenoma* Solier

peruvianus Guérin 1830, Voy. Coq. 2, p. 94, lám. 4, f. 4; 1834, Mag. Zool.

Cl. 9, p. 26. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 41, lám. 2, f. 1/5. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 303. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 170, lám. 19, f. 4.

Loc: Prov. Coquimbo a Santiago.

rubripes Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 42.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta, zona costera, bajo piedras etc. en partes áridas.

costatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melas. 26. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent.

Fr. 7, p. 43. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 203. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica).

Nycteliini Solier**Gyriosomus** Guérin

elongatus Waterhouse 1843, Ann. Mag. 12, p. 259. – Fairmaire 1876, Ann.

Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 144. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 145/148, lám. VII, f. 3. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 531, lám. 11, f. 1.

Loc: Prov. Atacama (Chañaral de Aceituno). En dunas.

gebieni Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 531/533, lám. 11, f. 2.

Loc: Prov. Atacama (Quebrada de Chañaral), en planicies arenosas. Costa sur de la provincia, vagando.

luczoti Chevrolat in Guér. Régne Anim. lám. 28, f. 5. – Laporte 1840, Hist.

Nat. 2, p. 189. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 221. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 150. – Gebien 1944, Mitt. Münch.

Ent. Ges. 34, p. 141/145. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.

= *curvilineatus* Guérin 1834, Mag. Zool. Melas. lám. 103, f. 2.

= *crispaticollis* Fairmaire 1866, Bull. Soc. Ent. Fr. CLXX.

- Loc: Prov. Coquimbo, en muy diversos ambientes desérticos, vagando.
- bridgesi** Waterhouse 1843, Ann. Mag. 12, p. 258. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 222. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 151. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 148/150. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533, lám. 11, f. 3.
= *carinatus* Solier 1848, Studi Ent. p. 365 (219).
Loc: Prov. Coquimbo, zona de la costa, diversos ambientes, vagando.
- whitei** Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 50. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 150 (nec. *whitei* Solier, var *waterhousei* Fairmaire l. c. p. 151, IX.). – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 150/153. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
Loc: Provincia Atacama, zona costera del sur, vagando.
- kingi** Reed 1873, Ent. Mag. 9, p. 207. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 149. – Blair 1935, Ent. Mag. 71, p. 104. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 153/155, VII, f. 4. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
= *affinis* Reed l. c. 208. – Fairmaire l. c. 149.
Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo), laderas arbustivas.
- planatus** Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 219. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 145. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 155/158, lám. X. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
Loc: Prov. Atacama (Huasco, Freirina), en laderas de lomajes suaves, vagando.
- planicollis** Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 161/163, lám. XII. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo), en zonas planas y arbustivas, vagando.
- batesi** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 148. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 166/169, lám. XIII. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 533.
= *whitei* Solier 1851 in Gay. Hist. Chile 5, p. 224.
Loc: Prov. Atacama (Caldera, Norte de Vallenar), vagando.
- atacamensis** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 146. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 164/166. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 534.
Loc: Prov. Atacama (Freirina), vagando en zonas planas.
- peñai** Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 534, lám. 11, f. 4.
Loc: Prov. Atacama (S. Oeste), vagando en planicies.

- subrugatus** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 147. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 169/171, lám. VIII, f. 2, lám. X, f. 2. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535.
 Loc: Prov. Atacama (Zona sur: Huasco, Freirina, El Colorado), vagando en laderas.
- angustus** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. p. 347. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 148. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 171/173. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535.
 Loc: Esta especie ha sido dada como des Perú, lo que es muy dudoso. Solo se conoce 1 ejemplar en la colección Sommer (Museo de München).
- parvus** Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 222. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 145. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 158/161, lám. VIII, f. 1, lám. XI. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535.
 = *incertus* Solier l. c. 218. – Fairmaire l. c. 147.
 Loc: Prov. Atacama (Canto del Agua, Freirina, Huasco, Copiapó?), vagando en planicies desérticas.
- amabilis** Kulzer 1950, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 535/537, lám. 11, f. 5/6.
 Loc: Coquimbo (Llano de la Higuera), vagando en planicies.
- barriai** Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 537/538, lám. 11, f. 7/8.
 Loc: Prov. Coquimbo (Región norte) (Choros Bajos), vagando en planicies.
- hopei** Gray 1832 in Griff, Animal Kingdom Index, lám. 50, f. 6, lám. 69, f. 6. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 189. – Solier 1848, Studi Ent. p. 363 (Sep. pág. 217). – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 152. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 173/176. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 538.
 = *semipunctatus* Solier l. c. 364 (Sep. 218); in Gay Hist. Chile 5, p. 223.
 Loc: Prov. Coquimbo (Serena, Socos, Rio Limarí etc.), vagando en planicies en la zona costera.
- reedi** Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 150; 1959 l. c. 10, p. 538/539.
 Loc: Prov. Coquimbo (Quilitapia, Punitaqui, Socos, etc.), vagando en lomajes suaves, arbustivos.
- leechi** Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 148, lám. 9, f. 1; 1959 l. c. 10, p. 538.
 Loc: Prov. Coquimbo (Barraza, Socos, Cuesta Buenos Aires), vagando en lomajes suaves.
- marmoratus** Waterhouse 1843, Ann. Mag. 12, p. 250. – Fairmaire 1876,

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 154. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 179/181, lám. XV. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 539. Loc: Prov. Coquimbo (Vicuña, Guampulla, Condoriaco, Cuesta de Buenos Aires etc.), vagando en planicies.

laevigatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melas., p. 6, lám. 103, f. 3. – Solier 1848, Studi Ent. p. 361, lám. 15, f. 14/17; 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 218, lám. 20, f. 1. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 155. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 189/192, lám. XVII. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 539.

Loc: Prov. Aconcagua, Santiago, Atacama, vagando en lomajes suaves.

granocostatus Fairmaire 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. p. CLXX. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 187/189, lám. VIII, f. 5. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 539.

Loc: Prov. Coquimbo (Combarbalá, Illapel, Punitaqui), vagando en laderas arbustivas.

foveopunctatus Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 153. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 185/187. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 359.

Loc: Prov. Coquimbo (Ovalle, Illapel).

ssp. **laevis** Kulzer l. c. 539/541, lám. 12, f. 1.

Loc: Prov. Coquimbo (Guampulla, Illapel), vagando en laderas arbustivas.

freyi Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 181 y 184, lám. XVI. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 541, lám. XII, f. 2.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Vilos, Socos, Cuesta de Buenos Aires, Manquehua, Alcones), vagando en lomajes arbustivos.

peniciliger Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 181/183, lám. XVI. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 541.

Loc: Prov. Coquimbo (Tongoy, Talinay), vagando en laderas y planicies.

lucens Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 542/543.

Loc: Prov. Coquimbo (Hda. Illapel 1800 mts. El Calabazo), vagando en planicies arbustivas.

pumilus Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 543/544.

Loc: Prov. Coquimbo (Hda. Illapel, Cuesta Los Hornos, Sur de Punitaqui, Norte de Combarbalá), vagando en planicies muy poco vegetadas, o bajo piedras.

paulseni Fairmaire 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. p. CLXX. – Gebien 1944, Mitt.

Münch. Ent. Ges. 34, p. 192/194. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 544.

Loc: Prov. Coquimbo (Huilmo, Salamanca, Quilitapia, Puerto Oscuro), vagando en lomajes pastosos.

modestus Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 544/545.

Loc: Prov. Coquimbo (Huentelauquén), vagando en planicies muy poco vegetadas, o bajo piedras.

melcheri Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 545/546.

Loc: Prov. Coquimbo (Puerto Oscuro, Rio Choapa, al SW de Illapel), en laderas pastosas.

impressus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. p. 6. – Solier 1848, Studi Ent. p. 359 (Sep. p. 213); 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 220. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 155. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 176/179, lám. VIII, f. 3. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 547.

= *fossulatus* Solier l. c. 359 (Sep. 213).

Loc: Prov. Atacama (Huasco) y Coquimbo.

curtisi Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 153. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 547, lám. 12, f. 6.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo?), Atacama (Carrizalillo, Carrizal Bajo), Coquimbo (Choros Bajos, NE de El Tofo), en laderas arbustivas y pedregosas.

coriaceus Fairmaire 1886, Bull. Soc. Ent. Fr. CLXX. – Gebien 1944, Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, p. 194. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 547.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Vilos).

lineatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. t. – Fairmaire 1886, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 146.

Loc: Esta especie se ha dado del Perú, lo que consideramos muy dudoso, creemos que se trata de una especie chilena.

Nyctelia Latreille

= *Nyctelioma* Casey

fitzroyi Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 109. – Curtis 1845, Tr. Linn. Soc., p. 463, lám. 41, f. 11. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 140. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 156. – Burmeister 1877, Stett. Zeit. 38, p. 69. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 20, lám. I, f. 1.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), en zonas esteparias, vagando.

- darwini** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 108; 1842, Ann. Mag. 10, p. 135. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 472, 38; 1877, 69. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 157 (Mon.). – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 20, lám. 1, f. 2.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), vagando en zonas esteparias planas.
- laevis** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 105; 1842, Ann. Mag. 10, p. 132; 1844, 50. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 159. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 21.
Loc: Sur de Chile, probablemente cordillera de la Prov. de Llanquihue.
- stephensi** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 113; 1842, Ann. Mag. 10, p. 139. – Fairmaire 1879, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 158. – Peña 1861, Not. Mens. Stgo. V, p. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 24, lám. I, f. 7.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), Zona esteparia.
- crassecostata** Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 295. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 27, lám. II, f. 1.
Loc: Prov. Malleco (Cordillera de Las Raices, Lonquimay, El Arco, etc.), en regiones planas, pastosas y abiertas.
- vulcanica** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 170. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 38, lám. III, f. 4.
Loc: Prov. Santiago (Lo Valdés), Zona andina sobre los 2.400 mts. vagando o bajo piedras.
- solieri** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 108; 1842, Ann. Mag. 10, p. 134. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 163. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 44/45, lám. IV, f. 2.
= *rectestriata* Fairmaire l. c. p. 162. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), Magallanes (Cerro Guido).
- plicata** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 107; 1842, Ann. Mag. 10, p. 133. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 473. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 165. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 45/46, lám. IV, f. 3.
Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas).
- geometrica** Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 292. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 55, lám. V, f. 3.
Loc: Prov. Llanquihue (Río Huemules?), Prov. Aysén (Puerto Ibañez, Chile-Chico), vagando en regiones planas y esteparias.

- bremei** Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 48. – Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond. XIX, p. 464, lám. 41, f. 13. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 167; 1906, Voy. du S. Y. Belgia (Zool. Ins. p. 41, lám. 1, f. 11). – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 56, lám. V, f. 5.
Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas), vagando en zonas esteparias.
- multicristata** Blanchard 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 141; 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 143, lám. 10, f. 1. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 167. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 58/59.
Loc: Prov. Magallanes (Natales, Puerto Hambre).
- granulata** Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 109; 1842, Ann. Mag. 10, p. 136. – Curtis 1845, Trans. Linn. Soc. Lond. 19, p. 464, lám. 41, f. 12. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 167. – Berg 1899, Com. Mus. Bs. As. I, p. 59. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 59, lám. V, f. 8.
= *granulosa* Gemminger 1870, Col. Hefte 6, p. 122. – Fairmaire l. c., p. 168. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas, Norte Isla Grande de Tierra del Fuego), vagando en regiones pastosas planas y esteparias.
- varipes** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 169. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 62, lám. VI, f. 2.
Loc: Prov. Talca, Curicó, Malleco en zonas sobre los 800 mts. en el borde del bosque. Prov. Concepción (Arauco), zona costera.
- unicosta** Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 294. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 63/64, lám. VI, f. 4.
Loc: Prov. Aysén (Río Galera, Balmaceda), zona alta plana y de pastizales, vagando.
- corrugata** Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond. XIX, p. 465, lám. 41, f. 14. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 164. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 66/67, lám. VI, f. 7.
= *longeplicata* Fairmaire 1900, Ann. Soc. Ent. Belg. 44, p. 111; 1906, Voy. du S. Y. Belgia, p. 41, lám. 1, f. 12. – Blair 1935, Ent. Mag. 71, p. 104.
Loc: Prov. Magallanes (Natales).

Epipedonota Solier

= *Callyntra* Solier

- multicostata** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. 5. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 337, lám. 7, f. 10/13. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 189.

– Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 154, lám. 18, f. 10. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 341. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 152.

= *rufipes* Solier l. c. 340; l. c. 155. – Fairmaire l. c. 342.

= *vicina* Solier l. c. 339. – Fairmaire l. c. 342.

Loc: Prov. Valparaiso a Maule zona costera arenosa. Vagando en planicies.

servillei (Solier) 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 341. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 153.

Loc: desconocida.

laticollis Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 333. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 343. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 153.

= *expansicollis* Fairmaire l. c. 344.

Loc: Prov. O'Higgins (zona andina).

rugulosa Gemminger 1870, Col. Hefte Münch. 6, p. 122. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 345. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 153.

= *rugosa* (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 155.

Loc: Prov. Curicó y Talca (zona andina), vagando en partes abiertas y pastosas.

rugosa Waterhouse 1841, Proc. Zool. Soc., p. 117. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 158. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 345. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 154.

= *anthracina* Germain 1854, Ann. Univ. Chile, p. 331.

Loc: Prov. Santiago (Farellones); O'Higgins (Rengo), zona andina sobre los 2.000 m. vagando o bajo piedras o bajo guano de vacunos en planicies.

paulseni Fairmaire 1855, Bull. Soc. Ent. Fr. CLVI. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 154.

Loc: Prov. Valparaiso a Arauco, vagando o bajo piedras en zonas de coirones sobre los 1.500 m. en la cordillera de la costa.

penai Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 154/155, lám. 9, f. 2.

Loc: Santiago (Alhué) en alturas, en bosques de Nothofagus, siempre vagando en sus deslindes (Cordillera de la costa).

rossi Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 155/157, lám. 9, f. 3.

Loc: Prov. Arauco, en coironales sobre los 1.100 mts. en la cordillera de Nahuelbuta.

riverai Kulzer 1962, Ent. Arb. Mus. Frey 13, p. 83/84.

Loc: Prov. Linares (zona andina de Parral).

- carbonaria** Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 334. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 346. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
Loc: Prov. Ñuble y Bio-Bio (zona andina, vagando en coironales).
- macrocosta** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. 4. – Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 48. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
= *major* Germain 1851, Ann. Univ. Chile 5, p. 329.
Loc: Prov. Santiago a Talca (zona andina).
- andina** Germain 1854, Ann. Univ. Chile, p. 329. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 347. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
Loc: Prov. Santiago (Farellones, etc.), en planicies, vagando o bajo guano de vacuno o piedras.
- unicosta** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 156. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 347. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157.
Loc: Prov. Curicó (Zona andina), vagando o bajo plantas en zonas abiertas de montaña sobre los 1.100 mts.
- planiuscula** Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 348. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 157/158.
Loc: Prov. Linares (zona Andina).
- lata** Waterhouse 1841, Proc. Soc. Lond., p. 119; 1842, Ann. Mag. 10, p. 146. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 478. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 349. – Berg 1901, Com. Mus. Bs. As., p. 268. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 160/161. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico); Magallanes. Vagando en zonas esteparias.
- monilis** ssp. *angustata* Burmeister 1875, Stett. Zeit., p. 479. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 353. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 161. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Antofagasta (Mucar), altiplano a 4.000 mts. vagando en laderas arenosas.
- tricastata** Burmeister 1875, Stett. Zeit., p. 479. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 354. – Berg 1901, Com. Mus. Bs. As., p. 267. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 164/165. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.
Loc: Prov. Magallanes (Natales, Cerro León).
- subplana** Gebien 1910, Col. Kat. 15, p. 145. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 165.
= *planiuscula* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 297.
Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), vagando en zonas esteparias.

Psectrascelis SolierSubg. **Psectrascelis** s. str.

aequalis Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 363. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 171.

Loc: Prov. Coquimbo (Baños del Toro), zona andina.

carioscollis Fairmaire 1904, Bull. Fr., p. 64. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Antofagasta (Salar Punta Negra).

intraticollis Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 356. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc: Prov. Antofagasta (Tumbre, Talabre, etc.) zona andina sobre los 3.000 mts. bajo piedras o plantas.

subdepressa Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 318. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 357. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

Loc. Prov. Atacama (Quebrada de San Andrés), zona desértica, bajo arbustos.

penai Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 175/176, lám. 9, f. 9.

Loc: Prov. Coquimbo (Talinay, Socos), bajo piedras en zonas áridas.

elongata Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 144. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 358. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177.

Loc: Prov. Atacama (Copiapó); Coquimbo (Valle del Elqui), bajo piedras.

crassiventris Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 483/484.

Loc: Prov. Atacama (Desierto entre Copiapó y Vallenar), zonas arenosas, enterrados bajo arbustos, muy rara vez sobre ellos.

pilipes Guérin 1834, Mag. Zool. Melás, p. 4, lám. 102, f. 1. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, p. 314, lám. 6, f. 9/15; 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 143, lám. 18, f. 8. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 188. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 358. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177.

= *brevis* Solier l. c. 146. – Fairmaire l. c. 359.

= *guerini* Solier l. c. 317; l. c. 144. – Fairmaire l. c. 314.

= *sulcicollis* Solier l. c. 314.

Loc: Prov. Atacama a Coquimbo; Aconcagua (?) bajo piedras o plantas en zonas áridas.

davidsi Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 53.

Loc: Prov. Coquimbo (Manquehua, Majada Blanca, Canela Alta), bajo piedras en laderas de los cerros.

sublaevicollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 146. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 356. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177.

Loc: Prov. Atacama (Freirina); Coquimbo (Elqui).

pilosa Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 147. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 359. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 177/178.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Vallenar) en zonas desérticas bajo piedras y plantas.

kuscheli Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 178/179.

Loc: Prov. Coquimbo (Herradura, Fray Jorge, Tongoy etc.) en arenas, bajo plantas.

Subg. *Cerostena* Solier

confinis Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 484/485.

Loc: Prov. Antofagasta (Mucar, Quisquiro, Pujsa, etc.). Zona andina sobre 4.000 mts. en planicies, bajo piedras y plantas.

alutacea Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 182/183.

Loc: Antofagasta (Socaire).

strigosula Gebien 1910 (nom. nov.), Co. Kat. 15, p. 147. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 190. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 2.

= *semistrigosa* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 298.

Loc: Prov. Talca (Laguna del Maule), planicies andinas.

pilosipes Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 191/192, lám. 14, f. 8.

Loc: Punta Acol. (?)

arenaria Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 399. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 365. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 192.

Loc: Prov. Santiago (zona costera) bajo plantas en planicies arenosas.

subcostata Germain 1855, Ann. Univ. Chile 12, p. 398. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 367. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 192.

= *paralela* Germain l. c. 398.

Loc: Prov. Santiago a O'Higgins (zona Andina).

difficilis Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 54.

Loc: Coquimbo (Hda. Illapel).

impressicollis Germain 1855, Ann. Univ. Chile 12, p. 398. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 366. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 192/193.

Loc: Prov. Santiago (Farellones, Chicauma, Cerro Vizcachas), zona Andina abierta, sobre los 1.800 m., bajo plantas y piedras.

crassicosta Fairmaire 1878, Rev. Mag. Zool. 269. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 193.

Loc: Deconocida.

cinerea Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 147. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 367. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 194.

Loc: Prov. Aconcagua (Los Andes); Santiago (Alhué).

pudens Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 557/558.

Loc: Prov. Coquimbo (Talinay, Quebrada El Teniente), zona arenosa de la costa, bajo plantas.

similis Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 194/195.

Loc: Prov. Valparaíso (Horcones a Viña del Mar), región costera, bajo plantas en lugares arenosos.

plicicollis Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 145. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 357. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 195/196.

Loc: Prov. Coquimbo (zona andina).

Auladera Solier

= *Aulacodera* Gemminger & Harold

andicola (Lacordaire) 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 278. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 334, lám. 7, f. 9; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 152. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 375. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 208.

= *rugicollis* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 332. – Fairmaire l. c. p. 360.

Loc: Prov. Aconcagua y Santiago zona preandina, bajo piedras y plantas en laderas pedregosas.

crenicosta Guérin 1834, Mag. Zool. Melás, p. 5. – Solier 1836, Ann. Soc. Ent. Fr. 9, p. 333, lám. 7, f. 4/8; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 152, lám. 18, f. 9. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 375. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 208.

= *jugeleti* Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 43.

Loc: Prov. Coquimbo (Los Molles, Puerto Oscuro, Punitaqui, etc.) en zonas áridas bajo plantas o piedras, preferiblemente en planicies.

atronitens Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 208/209, lám. 10, f. 7.

Loc: desconocida.

Mitragenius Solier

tristis Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 558/559.

Loc: Prov. Malleco (Pino Hachado) en portezuelos a 1.300 mts. bajo piedras.

gibbosus Blanchard 1843, Voy. D'Orb., p. 195, lám. 13, f. 8. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 481. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 372 (scr. gibbus). – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 210. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

= *araneiformis* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond., p. 466, lám. 41, f. 15.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico) bajo piedras y plantas en zonas esteparias.

Pilobalia Burmeister

decorata ssp. **immaculata** Blanchard 1843, Voy. D'Orb. 6, p. 197, lám. 14, f. 2. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 220. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

= *opaca* Kirsch 1886, Berl. Zeit. 30, p. 333.

= *alticola* Kirsch l. c. 332.

Loc: Prov. Tarapacá (Región altiplánica del Depto. de Arica), bajo piedras y plantas.

oblonga Blanchard 1843, Voy. D'Orb. 6, p. 197, lám. 14, f. 3. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 226, lám. 11, f. 9.

Loc: Prov. Tarapacá (Región altiplánica del Depto. de Arica), bajo piedras y plantas.

elegans Blanchard 1843, Voy. D'Orb. 6, p. 197, lám. 14, f. 5. – Fairmaire 1876, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 6, p. 380. – Kulzer 1954, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 235, lám. 12, f. 8. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Tarapacá (Región altiplánica del Depto. de Arica), bajo piedras y arbustas.

Scotobini Lacordaire

Psammetchus Latreille

costatus Guérin 1830, Voy. Coq., p. 95, lám. 4, f. 8. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 37, lám. 1, f. 7/10. – Laporte 1840, Hist. Nat. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 165. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 385/386. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Tarapacá (Iquique), zona de la costa, bajo plantas secas y basuras; Valparaiso (?), muy dudoso.

carinatus Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 37. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 386/387.

Loc: Tarapacá (Dept. Arica).

crassicornis Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 54. – Solier 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 166, lám. 19, f. 2. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 387/388.

Loc: Prov. Atacama (Carrizal Bajo); Coquimbo (Elqui, Ovalle) bajo piedras y plantas en cordillera y costa.

gracilis Erichson 1834, Nov. Act. Leop. Gar. 16, p. 245, lám. 38, f. 4. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 388.

Loc: Desconocida (norte del país).

pilipes Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 19. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 167. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 388/389.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo); Atacama (Copiapó, Caldera, Carrizal Bajo etc.) bajo piedras, en especial grandes y planas, en zonas áridas.

gebieni Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 389/390, lám. XX, f. 1.

Loc: Prov. Atacama (Pintados, Mamiña) bajo piedras y plantas.

penai Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 390/391, lám. XX, f. 2.

Loc: Prov. Tarapacá (Iquique), bajo piedras y plantas.

Diastoleus Solier

bicarinatus Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 181. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 399/400.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposo); Atacama (Sur de Huasco); Coquimbo (Carrizalillo), bajo piedras, en especial grandes.

collaris Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 17, lám. 110, f. 4. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 69, lám. 3, f. 7/12; 1851 in Gay, Hist. Chile 5, p. 180. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 198. – Lacordaire 1859, Gen. Col. V, p. 129. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 400/401.

Loc: Coquimbo (Punitaqui, Talinay, Puerto Oscuro), bajo piedras y arbustos, en zonas áridas.

Scotobius Germar

akidiodes Waterhouse 1845, Ann. Mag. 16, p. 319. – Burmeister 1875, 36, p. 465. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 401/402, lám. XX, f. 2.

- Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.
 Loc: Prov. Aysén (Lago General Carrera), bajo arbustos y piedras, en zonas esteparias.
 ssp. **bicostatus** Kulzer 1955, l. c. 402/403, lám. XX, f. 6. – Peña l. c. 230.
 Loc: la misma de la especie típica.
- crassus** Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 406/407, lám. XX, p. 7.
 Loc: Desconocida (Probable zona costera del extremo norte).
- costatus** Guérin 1830, Voy. Coq.; 1834, Mag. Zool. Melás., p. 16, lám. 110, f. 2. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 64. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 408/409. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.
 Loc: Prov. Antofagasta y Tarapacá (Zona desértica) en oasis bajo piedras donde hay algo de humedad.
- obscurus** Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 428/429, lám. XXII, f. 4.
 Loc: Prov. Malleco (Liucura, Marimenuco etc.), zona esteparia, bajo plantas en especial *Mulinus* sp.
- punctatus** Eschscholtz 1831, Zool. Atl. 4, p. 11, lám. 18, f. 5. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 65. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 429/430.
 Loc: Prov. Aconcagua (Piscicultura); Santiago (Lo Valdés); Concepción, Malleco, Arauco.
- bullatus** Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. Lond. 19, p. 459. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 178. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 430.
 = *antarcticus* Guérin i. l.
 Loc: Prov. Coquimbo a Valdivia. Magallanes? (Puerto Hambre?).
- kirbyi** Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 61. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 431. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.
 Loc: Prov. Coquimbo y Santiago.
- asperatus** Erichson 1834, Nov. Act. Car. 16, p. 247. – Curtis 1845, Tr. Lin. Soc. Lond. 19, p. 459. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 176. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 431/432, lám. XXII, f. 5.
 Loc: Coquimbo a Santiago (zona andina y Preandina).
- rugosulus** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 17, lám. 110, f. 5. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 173, lám. 19, f. 6. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 432/433, lám. XII, f. 6.
 Loc: Prov. Coquimbo a Concepción.
- gayi** Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 62; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 177, lám. 3, f. 2. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 433/434, lám. XXII, f. 7.

- Loc: Prov. Coquimbo (Combarbalá, y zona costera).
- crenicollis** Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 337. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 434/435, lám. XXII, f. 8.
Loc: Prov. Coquimbo, Copiapó?.
- rugicollis** Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 178. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 435/436, lám. XXII, f. 9.
Loc: Prov. Coquimbo (Illapel).
- emarginicollis** Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 437/438, lám. XXIII, f. 2.
Loc: Prov. Valparaíso (Quillota).
- planatus** Erichson 1834, Nov. Act. Car. 16 (12 Marz.), lám. XXXVIII, f. 5. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 441/443.
= *substriatus* Guérin 1834, Mag. Zool. (Jun), p. 16. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr, 7, p. 66.
= *cribricollis* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 289.
= *punctatellus* Blanchard 1843, Voy. D'Orb., p. 195, lám. 13, f. 5. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 466.
Loc: Prov. Santiago. Es posible que se encuentre en región andina del extremo norte.
- atacamensis** Germain 1855, Ann. Univ. Chile, p. 399. – Philippi 1860, Reise Wüste Atac., p. 172. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 443/444.
Loc: Prov. Tarapacá (Camarones, Mamiña etc.), Antofagasta (Caracoles, Toconao etc.), bajo piedras, plantas etc. en lugares algo húmedos.
- planicosta** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 17. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 444/445. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.
Loc: Prov. Antofagasta (Paposo, Ciudad de Antofagasta etc.), bajo plantas, piedras etc.
- laeviuscula** Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 336. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 445/446.
Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta (zona costera), bajo piedras y plantas.
- vulgaris** Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 16. – Solier 1838, Ann. Soc. Ent. Fr. 7, p. 50, lám. 2, f. 12/16; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 172, lám. 19, f. 5.
Loc: Norte del país (?)
- brevipes** Waterhouse 1844, Ann. Mag. 13, p. 53. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 173. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 447/448.
Loc: Prov. Atacama y Antofagasta (zona de la costa).

- brevis* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 336. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 448/450.
 Loc: Prov. Tarapacá (Arica).

Emmallodera Solier

- obesa* Guérin 1841, Rev. Zool. p. 215. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 182, lám. 19, f. 7. – Blanchard 1858, Voy. Pol. Sud., p. 146, lám. 10, f. 9. – Berg 1899, Com. Mus. Bs. As. 1, p. 462/463, lám. XXIII, f. 7.
 Loc: Prov. Magallanes (Pto. Hambre, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego). En zona esteparia, bajo plantas.
- nitens* Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 465/466. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.
 Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico), zona esteparia, bajo plantas y piedras, en especial en zona arenosas.
- multipunctata* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 461, lám. 41, f. 8. – Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 468. – Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 467, lám. XXIV, f. 2.
 = *granocostata* Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr. 74, p. 290.
 Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico); Magallanes (Natales, Tierra del Fuego, Punta Arenas), en zonas esteparias.
 ssp. *curvidens* Kulzer l. c. 467/468.
 Loc: Prov. Magallanes (Laguna Amarga), bajo piedras y plantas.
- hirtipes* Kulzer 1955, Ent. Arb. Mus. Frey 6, p. 471/472, lám. XXIV, f. 6.
 Loc: dudosa.

Eleodini Eschscholtz

Nycterinus Eschscholtz

- abdominalis* Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 14. – Solier 1848, Studi Ent. 269 (123), 271 (125); 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 215. – Germain 1903, An. Univ. Chile, p. 12. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 550/551, f. 1a.
 = *abbreviatus* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 347.
 = *rufipes* Solier l. c. 272 (126).
 = *spinolai* Solier l. c. 272 (126).
 = *gracilipes* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 345. – Germain 1903, An. Univ. Chile, p. 12.
 Loc: Prov. Coquimbo a Chiloé (zona costera), bajo plantas en arenales.
- genei* Solier 1848, Studi Ent., p. 269 (123), 274 (128); 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 216. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 17. – Kulzer

1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 551, f. 16.

= *costulatus* Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 344.

Loc: Prov. Coquimbo (zona de la costa).

rugiceps Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 468. – Erichson 1847, Arch. Nat. 13, I, p. 116. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 22. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 551/552, f. 2 b.

= *elongatus* Solier 1848, Studi Ent. 269 (123).

Loc: Prov. Antofagasta (Toconao, San Pedro de Atacama); Coquimbo a Concepción.

angusticollis Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 346. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 15. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 552, f. 2 a.

= *quadricollis* Germain l. c. p. 14.

Loc: Prov. Coquimbo (Costa desértica).

penai Kulzer 1961, Ent. Arb. Mus. Frey 12, p. 210/211, f. 1.

Loc: Prov. Antofagasta (La Chimba, Taltal), bajo plantas.

mannerheimi Solier 1848, Studi Ent. 275 (129); 1851 in Gay Hist. Chile, p. 216. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 15. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 552.

thoracicus Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 13, lám. 14, f. 17. – Guérin 1830, Voy. Coq. II, 2, p. 93. – Solier 1848, Studi Ent. 270 (124); 1851 in Gay Hist. Chile, p. 19. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 553, f. 3 a.

Loc: Prov. Nuble a Malleco.

laevigatus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 345. – Germain 1903, An. Univ. Chile 112, p. 21. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 553, f. 3 b.

Loc: Prov. Santiago a Malleco.

substriatus Solier 1848, Studi Ent. 271 (125); 1851 in Gay Hist. Chile, p. 214. – Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 553/554, f. 4 a, 4 b.

Loc: Prov. Aconcagua, Valparaiso, Santiago y O'Higgins.

rossi Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 554, f. 4 c, 4 d.

Loc: Aconcagua, Valparaiso y Santiago.

Physoasterini Lacordaire

Philorea Erichson

= *Polpocara* Solier

pilosula Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 923/924.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica), bajo plantas o piedras.

setipennis Lesné 1911, Bull. Paris, p. 295; 1917, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 72. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 927. – Peña 1961, Not. Mens. Stgo. V, p. 6.

Loc: Prov. Tarapacá (Chapiquiña, Putre, Camarones); Antofagasta (Tumbre, Chinina), bajo piedras en zonas áridas de altura.

kuscheli Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 927.

Loc: Prov. Tarapacá (Alcérreca, Chapiquiña), bajo piedras en zonas altioplánicas.

brvicornis Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 928.

Loc: Prov. Tarapacá (Putre, Caritaya); Antofagasta (Pocos, Talabre), en zonas áridas de altura, bajo piedras.

brevipipes Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 928/929.

Loc: Prov. Tarapacá? (Pampa del Toco).

Physogaster Guérin

globulus Fairmaire & Germain 1861, Col. Chilensia 2, p. 4. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 936.

Loc: Prov. Atacama (Domeyko, Rio Copiapó), bajo piedras en planicies áridas.

penai Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 200/201.

Loc: Prov. Atacama (Caldera a Huasco), bajo plantas en arenales.

oblongulus Fairmaire & Germain 1861, Col. Chilensia 2, p. 4. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 937.

Loc: Desconocida..

nitidus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 937/938.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama, Pocos, Chinina, Tumbre etc.), bajo plantas pequeñas y rastreras o piedras en planicies desérticas.

haagi Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 938/939.

Loc: Prov. Atacama (Freirina, Carrizal Bajo), bajo piedras o plantas en zonas áridas planas.

setifer Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 939/940.

Loc: Prov. Tarapacá (Pisagua, Champaja); Antofagasta (Cerro del Quimal), bajo plantas o piedras en zonas áridas.

Entomochilus Solier

pilosus Solier 1844, Mem. Ac. Torin (2) 6, p. 261 (49), lám. 2, f. 20/23. – Lacordaire 1859, Gen. Col. Atl., lám. 53, f. 1. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 941/942.

Loc: Prov. Atacama (Copiapó); Coquimbo (zona costera), Ovalle, Monte Patria; Santiago (Lo Valdés), bajo piedras.

tomentosus (Guérin) 1834, Mag. Zool. Melás. 3, p. 3. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile, p. 206. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 184. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 942.

Loc: Prov. Coquimbo, Aconcagua y Santiago, bajo piedras en zonas áridas.

laevipennis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 207. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 942.

Loc: Zona norte del país (Lugar desconocido).

parvus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 207. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 942/943.

Loc: Norte del país (Lugar desconocido).

hirtipes Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 943/944.

Loc: Prov. Antofagasta (Paposos); Atacama (Caldera, Copiapó), bajo piedras en zonas áridas.

quadratus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 944/945.

Loc: Prov. Atacama (Huasco, Copiapó, El Colorado, etc.); Coquimbo (El Tofo, Cuesta de Buenos Aires, etc.), bajo piedras o ramas, en zonas desérticas.

minor Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 945/946.

Loc: Prov. Atacama (Bombas, El Colorado); Coquimbo (Norte de la Serena, Llano de La Higuera, Río Elqui), bajo piedras en zonas áridas.

nitens Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 946/947.

Loc: Prov. Antofagasta (Quepiaco); Tarapacá (Tacora, Alcerreca etc.), bajo piedras en zonas altiplánicas.

rugosus Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 947/948.

Loc: Prov. Antofagasta (Conchi, El Tatío, Ojos río San Pedro, Linzor), bajo piedras en zonas de altura.

varius Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 948/949.

Loc: Prov. Tarapacá (Socoroma, Caritaya, Zapahuira, Pisagua?); Antofagasta (Cerro Aguas Dulce); Atacama (Salar de Maricunga), bajo plantas y piedras en laderas andinas.

ssp. **collaris** Kulzer l. c. 949.

Loc: Prov. Antofagasta (Talabre); Tarapacá (Mamiña), bajo piedras en laderas andinas.

ssp. **laevis** Kulzer l. c. 949/950.

Loc: Prov. Antofagasta (San Pedro de Atacama, Pocos), bajo piedras y plantas en zonas áridas.

P r a o c i n i Solier

Asidelia Fairmaire

contracta Fairmaire 1905, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 296. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 5/6. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile, p. 230.

Loc: Prov. Aysén (Balmaceda), bajo piedras.

Neopraocis Kulzer

reflexicollis (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 203. – Blanchard 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 144, lám. 10, f. 2.

Loc: Prov. Magallanes (Natales, Punta Arenas, Tierra del Fuego), bajo plantas o troncos y piedras.

Platesthes Waterhouse

kuscheli Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 10/11.

Loc: Prov. Aysén (Balmaceda, Chile-Chico), bajo piedras, zona esteparia.

depressa (Guérin) 1841, Rev. Zool., p. 215. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 203. – Blanchard 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 145, lám. 10, f. 3. – Haag-Rutenberg 1877, Stett. Zeit. 38, p. 155. – Berg 1899, Com. Mus. Bs. As. 1, p. 60. – Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 953; 1958 l. c. 9, p. 11.

Loc: Prov. Magallanes (Bahía Inutil, Bahía Munciones, Punta Arenas), bajo plantas en zonas arenosas.

similis Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 953/954.

Loc: Prov. Magallanes (Punta Arenas, Natales), bajo piedras en laderas.

nigra Kulzer 1956, Ent. Arb. Mus. Frey 7, p. 956/957; 1958 l. c. 9, p. 11. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Magallanes (Salto del Payne), bajo piedras en laderas.

Praocis Eschscholtz

= *Coelus* Solier

Subg. **Praocis** s. str.

rufipes Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 6, lám. 14, f. 2. – Solier 1940, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 221; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 186. – Laporte

- 1840, Hist. Nat. 2, p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 14/15.
= *mannerheimi* Fischer 1844, Bull. Mosc. 18, 1, p. 63. – Motschulsky 1845, Bull. Mosc. 18, 1, p. 63.
= *interrupta* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 187.
Loc: Prov. Coquimbo a Maule (zona costera), bajo plantas o vagando en dunas.
- costata** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 222; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 188. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 15.
= *ciliata* Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 400.
Loc: Prov. Arauco a Llanquihue (zona costera), bajo plantas y vagando en dunas.
- audouini** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 222. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 15/16.
Loc: Prov. Coquimbo (Huentelauquen, Los Vilos), bajo piedras.
- sanguinolenta** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 223; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 192. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 16.
Loc: Prov. Coquimbo a Santiago (zona de la costa), bajo piedras y arbustos.
- quadrисulcata** Germain 1856, An. Univ. Chile (2), p. 399. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 16/17.
Loc: Prov. Coquimbo (Los Vilos); Valparaiso (Algarrobo), bajo piedras o arbustos.
- curta** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 226; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 191. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 17.
= *nigroaenea* Solier l. c. 226; l. c. 191.
= *rugipennis* Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 400.
Loc: Prov. Coquimbo (Barraza, Los Vilos, Puerto Oscuro); Valparaiso y Santiago (zona de la costa), refugiados bajo piedras y plantas, en planicies.
- hirtella** Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 18/19, f. 3.
Loc: Prov. Coquimbo (zona costera entre La Serena y el rio Choapa), refugiados bajo piedras y plantas.
- sulcata** Eschscholtz 1829, Zool. Atl. 3, p. 7. – Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 235. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 19/20.
= *rotundata* Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat. 20, p. 284.
Loc: Prov. Coquimbo (Desde Serena al sur); Aconcagua a Maule, bajo piedras y plantas en zonas planas y áridas.

- subsulcata** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 224, lám. 9, f. 5; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 189. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 20.
= var. *confusa* Solier l. c. 224.
Loc: Prov. Coquimbo (Llano de la Higuera, Quillaycillo, La Pampilla, Rio Elqui, etc.).
- spinolai** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 223, lám. 9, f. 6/8; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 188. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 20/21.
Loc: Prov. Coquimbo (Desde Serena al rio Limari), zona costera bajo piedras, y plantas.
- bicostata** Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 341. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 21/22.
Loc: Prov. Coquimbo (Illapel)
- rufitarsis** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 227; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 194.
Loc: Prov. Coquimbo (Puerto Oscuro), bajo piedras y plantas en lomajes suaves.
- aenea** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 227; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 193. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 22/23.
Loc: Prov. Coquimbo.
- parva** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 232; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 194. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 23/24.
Loc: Prov. Coquimbo (Illapel).
- tibialis** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 225; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 193. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 24.
= *aeneipennis* Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 400.
Loc: Prov. Coquimbo (Illapel, Talinay, Tongoy, Fray Jorge), bajo piedras y plantas.
- submetallica** Guérin 1834, Mag. Zool., p. 9, lám. 105, f. 3. – Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 224; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 190. – Laporte 1840, Hist. Nat., p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 24/25.
= *angusta* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 342.
= *elliptica* Philippi l. c. 342.
Loc: Prov. Coquimbo (Illapel, Ovalle, Los Molles, Puerto Oscuro), bajo piedras y plantas.
- subaenea** Erichson 1834, Nov. Act. Ac. Leop. Gar. 16, Suppl. p. 248. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 26.

= *laevicosta* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 457.

Loc: Prov. Coquimbo (Huentelauquen, Ovalle, Los Vilos, Socos, Guampulla, etc.), bajo piedras, ramas y plantas.

marginata Germain 1856, An. Univ. Chile 12, p. 401. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 26/27.

Loc: Desconocida.

Subg. *Mesopraocis* Kulzer

pilula Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 31/32.

= *hirticollis* Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 212, lám. 9, f. 1 bis 4; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 188, lám. 19, f. 18.

Loc: Prov. Atacama (Huasco, Copiapó, Caldera, Sur de Chañaral); Coquimbo (Serena, Totoralillo), en zonas arenosas, bajo plantitas bajo la arena.

flava Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 32.

Loc: Prov. Coquimbo (Serena); Valparaíso.

calderana Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 32/33.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Copiapó, Norte Caldera), bajo plantas y piedras en zonas arenosas.

nitens Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 561/562, lám. 12, f. 9.

Loc: Prov. Atacama (Huasco), en dunas, bajo la arena entre plantas.

Subg. *Postpraocis* Kulzer

curtisi Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 192. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 33.

Loc: Prov. Atacama (Extremo sur); Coquimbo (Cuesta Buenos Aires, Puerto Oscuro), bajo plantas y piedras.

costatula Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 228; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 191. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 33/34.

= *angulifera* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 344.

Loc: Prov. Santiago (El Canelo, Lo Valdes, Barrancas, Maipú), bajo piedras y arbustos.

pubescens Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 324. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 34/35.

Loc: Coquimbo (Ovalle, Socos, Cerrillos Pobres), bajo piedras en planicies áridas.

pentachorda ssp. **minor** Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 36.

Loc: Prov. Antofagasta (Lever y Mucar), zona altiplánica sobre los 4.200 mts.

aenescens Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 37.

Loc: Prov. Valparaíso (La Ligua).

Subg. *Anthrasomus* Guérin

chevrolati Guérin 1834, Mag. Zool., p. 32. – Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 229, lám. 9, f. 9. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 187 y 204. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 39.

= *gayi* Solier l. c. 231; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 195.

= *bispidula* Philippi 1864, Stett. Zeit., p. 343.

= *laticollis* Philippi l. c. 343.

Loc: Prov. Coquimbo (Socos, Elqui, Illapel, Tofo); Valparaíso (Quillota); Santiago (San Cristobal, etc.), bajo plantas y piedras.

ssp. *subcostata* Solier l. c. 231; 1851 l. c. 195. – Kulzer l. c. 40.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel, Cavilolén, Canela Alta); Aconcagua, bajo piedras y arbustos.

ssp. *nigra* Kulzer l. c. 41.

Loc: Prov. Coquimbo (Talinay, Fray Jorge, Huentelauquen, Quillaycillo); Aconcagua (Papudo), bajo piedras y plantas.

hirtuosa Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 232; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 197. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 41/42.

= *pubens* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 339.

Loc: Prov. Aconcagua (Los Andes); Santiago (El Canelo, La Obra, El Manzano); Colchagua (zona andina), bajo plantas y piedras en laderas preandinas.

nuda Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 92.

Loc: Prov. Aconcagua.

Subg. *Filotarsus* Solier

tenuicornis Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 339; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 197. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 43/44.

Loc: Prov. Coquimbo (Valle río Elqui), bajo piedras y plantas.

castanea Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 400. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 44.

Loc: Prov. Coquimbo (Rapelcillo); Aconcagua (Chincolco); Santiago (El Canelo, La Obra, El Peumo, San Cristobal), bajo piedras en zona precordillerana.

rufilabris Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 233; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 197. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 44/45.

Loc: Prov. Aconcagua; Santiago (Los Maitenes, Lo Valdes), bajo piedras y plantas en zona andina.

uretai Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 45/46, f. 4.

Loc: Prov. Santiago (zona andina).

reedi Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 46/47.

Loc: Prov. Santiago (zona andina).

oblonga Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 196. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 47.

Loc: Prov. Antofagasta (Talabre, Tumbre, Salar Punta Negra, Laguna de Lejía, etc.); Coquimbo (Elqui). Bajo piedras y plantas en zonas sobre los 2.500 mts.

forsteri Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 48/49, f. 5.

Loc: Prov. Tarapacá y Antofagasta (zona andina sobre los 3.500 mts.).

Subg. *Hemipraocis* Kulzer

striolicollis Fairmaire 1833, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), p. 494. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 62.

Prov. Magallanes (Punta Arenas); Aysén (Balmaceda, Rio Galera).

Subg. *Praonoda* Kulzer

bicarinata Burmeister 1875, Stett. Zeit. 36, p. 495. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 66. – Peña 1961. Not. Mens. Stgo. 5, p. 6.

= *silphomorpha* Fairmaire 1833, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 3, p. 495. – Berg 1884, Bull. Fr., p. XCVIII.

Loc: Prov. Aysén (Chile-Chico); Magallanes (Laguna Amarga, C° Guido etc.). Zona esteparia, bajo piedras.

Subg. *Orthogonoderus* Solier

cribrata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 233; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 202. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 68/69.

Loc: Prov. Santiago (Lo Valdes, El Canelo); O'Higgins (Las Nieves); Concepción?, en zona preandina y andina, bajo piedras y plantas.

adspersa Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 402. – Kulzer 1958, Ent.

Loc: Prov. Coquimbo (Illapel); Precordillera, bajo piedras y plantas
Arb. Mus. Frey 9, p. 69.

- depresicollis** Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 402. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 69.
Loc: Prov. Santiago. Lugar desconocido.
- ecostata** Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 69/71, f. 11.
Loc: Prov. Antofagasta (Mucar, Lever, Puripicar). Zona altiplánica sobre 4.000 mts. bajo plantas en planicies.
- subreticulata** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 234; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 198. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 71.
Loc: Prov. Atacama (Freirina); Coquimbo (Los Molles, Punta Teatinos, Quebrada Honda).
- dentipes** Germain 1855. An. Univ. Chile 12, p. 401. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 71/72.
= *convexa* Germain l. c. 402.
Loc: Prov. Santiago a Talca (zona andina); Maule (Nogueche). Zona preandina de la Cordillera de Los Andes y Cordillera de la Costa. Bajo troncos en bosques de Nothofagus de altura.
- pleuroptera** Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 234; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 200. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 72/73.
Loc: Prov. Aconcagua (Los Andes); Valparaiso; Santiago (Calera de Tango, Lo Valdés, Cocalán, El Canelo); Concepción (Contulmo), en zonas precordilleranas y andinas, abiertas y de coironales, bajo plantas y piedras.
- plicicollis** Germain 1855, An. Univ. Chile, p. 403. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 73.
Loc: Prov. Valparaiso (Quillota); Santiago (Chicauma, Leyda, Farellones). En zonas precordilleranas y andinas, bajo piedras y plantas.
- laevicollis** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 338. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 73/74.
= *nitidicollis* Philippi l. c. 337.
Loc: Prov. Santiago a Talca y Valparaiso; Arauco (Cordillera de Nahuelbuta). En zonas de altura, vagando o bajo piedras y plantas.
- ebenina** Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 401. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 74/75.
Loc: Desconocida.
- picipes** Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 403. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 75/76.
= *consobrina* Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 339.
= *rotundicollis* Philippi l. c. 340.

Loc: Prov. Santiago (Cerro Ramón, El Manzano). Sobre los 2.500 mts, bajo piedras y arbustos.

costipennis Solier 1951 in Gay Hist. Chile 5, p. 202. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 5, p. 76.

Loc: Provincias Centrales (?).

rugata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 243; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 200. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 76.

= *sublaevigata* Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 401. – Philippi 1860, Reise Wüste Atac., p. 172.

Loc: Prov. Antofagasta (Mucar); Aconcagua (Los Andes); Santiago (Cerro Ramón, El Manzano). Zonas altas, bajo plantas y piedras.

punctata Solier 1840, Ann. Soc. Ent. Fr. (9), p. 236; 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 201. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 76/77.

Loc: Prov. Coquimbo (Zona andina).

penai Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 79/80, f. 12.

Loc: Antofagasta (Pocos, Cerro Aguas Dulce, Catarape, Salar Punta Negra, Ojos San Pedro etc.). Vagando en zonas arenosas de altura y refugiados bajo plantas. Prov. Curicó (El Coigual) (error).

chilensis (Gray) 1832 in Griff. An. Kingdom 2, p. 783, lám. 124, f. 1. – Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 188. – Lacordaire 1859, Gen. Col. V, p. 217. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 80/82.

Loc: Prov. Atacama (Caldera, Huasco); Coquimbo?, Valparaiso?. Vagando en arenales.

insularis Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 82.

Loc: Prov. Atacama (Isla Guacolda). Vagando en arenales.

Incerta sedis

pentagona Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat., p. 285. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 93.

Loc: Desconocida (Chile?).

squalida Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat., p. 285. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 93.

Loc: Desconocida (Andes?).

silphoides Lacordaire 1830, Ann. Sc. Nat., p. 284. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 93.

Loc: Prov. Santiago (Desconocida).

spinipes Laporte 1840, Hist. Nat., p. 187. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 94.

Loc: Desconocida.

Falsopraocis Kulzer

richardae (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 203. – Lacordaire 1859, Gen. Col. V, p. 214. – Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 102/103.

Loc: Prov. Coquimbo (Manquehua, Illapel); Santiago y Aconcagua (zona andina). Bajo piedras.

weiseri Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey 9, p. 103. – Peña 1962, Rev. Univ. Cat. Chile XLVII, p. 230.

Loc: Prov. Antofagasta (Laguna Lejía). Bajo piedras en zonas altas sobre 4.000 mts.

subnudus Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 562/563.

Loc: Prov. Antofagasta (Laguna Verde, Alita). Bajo piedras y plantas en zonas de altura sobre los 4.200 mts.

P e d i n i n i Solier**Opatrinus** Latrielle

= *Zidalus* Mulsant & Rey

= *Zodinus* Mulsant & Rey

striatus Guérin 1830, Voy. Coq. 2, 99, f. 4, f. 12 a/e.

Loc: Desconocida.

Blapstinus Waterhouse

= *Aspidius* Mulsant & Rey

= *Lodinus* Mulsant & Rey

= *Heteropus* Laporte

punctulatus Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 233, lám. 20, f. 4.

= *nigroaenus* Mulsant & Rey 1859, Ann. Agr. Lyon, p. 195; 1859, Opusc. Ent. 9, p. 131.

= *punctatus* Curtis 1845, Tr. Linn. Soc. 19, p. 469.

Loc: Prov. Coquimbo a Osorno (en muy diversos ambientes, vagando o bajo piedras, palos, plantas etc.).

holosericeus Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 221.

Loc: Prov. Tarapacá (Arica, Camarones, etc.); Antofagasta (Calama, Maria Elena, etc.). Por lo general en zonas regadas, bajo piedras, palos etc.

O p a t r i n i Laporte**Ectatocnemis** Horn

multilineata Horn 1866, Proc. Phil., p. 400.

Loc: Prov. Coquimbo.

Lepidocnemeplatia Kaszab

1938, Ent. Tidskrift, p. 80.

1942, Mitt. Münch. Ent. Ges. 32, p. 41.

1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, 1966, p. 39.

Loc: indeterminada.

murina Kaszab, l. c., p. 42.

= *Cnemeplatia murina* Germain i. l.

Gonocephalum Chevrolat

brevicolle Philippi 1860, Reise Wüste Atacama, p. 172.

Loc: Antofagasta?

Phaleriini Mulsant & Rey**Phaleria** Latreille

gayi Laporte 1840, Hist. Nat. 2, p. 219. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 244, lám. 20, f. 10.

= *marginata* Solier l. c. 244.

Loc: Prov. Tarapacá (Iquique). Bajo algas marinas en el litoral.

Phalerisida Kulzer

maculata Kulzer 1959, Ent. Arb. Mus. Frey 10, p. 564/565.

Loc: Prov. Coquimbo a Aconcagua (bajo algas, etc. en arenales del litoral).

ssp. *flava* Kulzer l. c., p. 565/566, f. 6.

Loc: Prov. Atacama (Rio Copiapó), bajo algas marinas en el litoral.

Crypticini Mls. & Rey**Archeocrypticus** Kaszab

patagonicus Kaszab, Ann. Hist. Hung. 56, p. 364.

Loc: desconocida, probablemente zonas esteparias o andinas de las provincias de Llanquihue y de Aysén.

topali Kaszab l. c., p. 361.

Loc: Prov. Santiago; Concepción.

Bolitophagini Mulsant & Rey**Trachyderas** Philippi

costulata Fairmaire & Germain 1860, Col. Chiliensia 2.

= *cancellatum* Philippi 1864, Stett. Zeit., p. 350.

Loc: Prov. Cautín (Cherquenco), a Chiloé (Huillinco, Quellón). Bajo corteza de troncos secos.

Dysantini Gebien

Phloeopsidius Gebien

angustatus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 242. – Lacordaire 1834, Gen. Col. 2, p. 360, nota 3.

Loc: Prov. Valdivia.

flexuosus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 241, lám. 20, f. 9. – Lacordaire 1854, Gen. Col. 2, p. 360, nota 3.

Loc: Prov. Santiago (El Canelo, Peñalolén); Linares (Fundo Malcho); Arauco y Malleco (Cordillera de Nahuelbuta). Bajo corteza secas.

regularis Kulzer 1966, Ent. Arb. Mus. Frey 17, p. 61.

Loc: Prov. Chiloé (Huillinco).

collaris Kulzer 1966, l. c. p. 62.

Loc: Prov. Cautin (Cherquenco).

Diaperini Geoffroy

Hoplocephala Laporte & Brullé

= *Arrhenoplita* Kirby

= *Evoplus* Leconte

= *Neomida* Latreille

quadrituberculata Curtis 1845, Tr. Lin. Soc. 19, p. 468.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

Platydema Laporte & Brullé

= *Neomida* Motschulsky

= *Histeropsis* Chevrolat

= *Typhobia* Pascoe

rubida Chevrolat 1877, Pet. Nouv. 2, p. 178.

Loc: Desconocida.

Enneboeus Waterhouse

bäckströmi Pic 1924, Nat. Hist. Juan Fdz. 3, Zool. p. 380

Loc: Islas de Juan Fernandez.

U l o m i n i Mulsant**Gnathocerus** Thunberg= *Cerandria* Lucas= *Echocerus* Horn**cornutus** (Fabricius) 1798, Suppl. Ent. Syst. 51.

Loc: Todo el pais (Introducida).

Phanerops Solier**elongata** Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 234, lám. 20, f. 5.

Loc: Prov. Arauco a Chillán y Aysén. Bajo corteza en zonas boscosas.

unicolor Germain 1855, An. Univ. Chile 12, p. 405.

Loc: Desconocida.

Tribolium MacLeay**castaneum** (Herbst) 1797, Nat. Syst. 7. – Duran 1952, Ins. Perj. p. 34/37.

Loc: Todo el pais (Introducida).

confusum Duval 1868, Gen. Col. Eur. 181, nota 1. – Durán 1952, Ins. Perj., p. 34/37.

Loc: Todo el pais (Introducida).

Oligocara Solier**nitidum** Solier 1848, Studi Ent. 227 (81), lám. 10, f. 1/7; in Gay Hist. Chile 5, p. 226, lám. 20, f. 2. – Lacordaire 1859, Gen. Col. Atl. Lam. 54, f. 4.

Loc: Prov. Santiago a Chiloé (Zona de bosques de Nothofagus, bajo cortezas y troncos en lugares húmedos).

tibialis Kulzer 1958, Ent. Arb. Mus. Frey. 9, p. 201/202.

Loc: Desconocida.

Alphitobius Stephens= *Cryptops* Solier**ulomoides** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 236, lám. 20, f. 6 a/c.

Loc: Valparaiso (?), seg. Gay.

Doliema Pascal= *Adelina* LeConte**plana** (Fabricius) 1801, Syst. Eleut. 2, p. 94.= *depressa* Erichson 1847, Arch. Nat. 13, 1, p. 119.= *lecontei* Horn 1870, Tr. Am. Phil. Soc. 13, 1, p. 119.= *scidaria* Reitter 1876, Col. Heft 15, p. 44.

Loc: Todo el pais (Introducida).

Eutelini Lacordaire**Pteroderes** Germain

tuberosa Germain 1894, An. Univ. Chile 87, p. 446 (4).

Loc: Desconocida.

Tenebrionini Redtenbacher**Tenebrio** Linné

molitor Linné 1758, Syst. Nat., p. 417. – Durán 1952, Ins. Perj., p. 37/40.

Loc: Todo el País (Introducida).

obscurum Fabricius 1792, Ent. Syst. 111. – Durán 1952, Ins. Perj., p. 37/40.

Loc: Todo el país (Introducido).

Toxicum Latreille

cribrarium Blanchard 1851 (gen. dub.) in Gay Hist. Chile 5, p. 441, lám. 26, f. 10.

Loc: Desconocida.

Cyphaleini Lacordaire**Cyphaleus** Westwood

valdivianus Philippi 1864, Stett. Zeit. 25, p. 350.

Loc: Prov. Valdivia a Chiloé (en ramas secas dentro del bosque húmedo, entre hojas).

Apocryphini Lacordaire**Apocrypha** Eschscholtz

= *Compsomorphus* Solier

elegans (Solier) 1851 in Gay Hist, Chile 5, p. 210, lám. 19. f. 11 a/g.

Loc: Prov. Valparaíso (Algarrobo); Santiago (Lo Valdés, Leyda, Los Maitenes); Linares (Estero de Leiva), Bajo piedras y otros objetos, por lo general en pequeños grupos en zonas abiertas.

ovipennis Kulzer 1962, Ent. Arb. Mus. Frey 13, p. 98/100.

Loc: Prov. Linares (Las Cruces).

Adeliini Lacordaire**Adelium** Kirby

= *Tropidopterus* Blanchard

aeneum Fairmaire & Germain 1861, Col. Chilensia 2, p. 5,

Loc: Prov. Cautín (Cherquenco).

sulcatulum Fairmaire y Germain 1860, Col. Chilensia 2.

Loc: Desconocida.

Misolampini Lacordaire**Heliofugus** Guérin= *Euschatia* Solier= *Heliophygus* AgassisSubg. **Collariheliofugus** Freude

collaris (Germain) 1855, An. Univ. Chile 12, p. 404. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 191. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 126.

Loc: Prov. O'Higgins (Rancagua); Temuco?

cryptocephalus Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 248/349. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 192. – Freude 1960, Proc. Ac. Sc. Cal. XXXI, 6, p. 126/128.

Loc. Prov. Colchagua (zona andina).

ssp. **curicoensis** Freude l. c. 128.

Loc: Prov. Curicó (El Coigual). Bajo troncos caídos o cortezas en bosques de *Nothofagus*.

Subg. **Rugosiheliofugus** Freude

sulcatulus (Gemminger) 1870, Col. Heft. VI, p. 123. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 192. – Freude 1960, Proc. Ac. Sc. Cal. XXXI, 6, p. 128/129.

= *sulcatus* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 230.

Loc: Santiago (Quebrada de Macul, Río Molina, El Canelo, Cerro Ramón etc.). Zona preandina y andina bajo cortezas o en el cuello de plantas, o bajo troncos.

Subg. **Inscutoheliofugus** Freude

kuscheli Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 130/131.

Loc: Desconocida.

Subg. **Heliofugus** sensu stricto

sulcatus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás. 27, f. 113. – Brême 1842, Rev. Zool. 113 (23). – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 197. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 131/132.

Loc: Desconocida.

impressus Guérin 1834, Mag. Zool. Melás., p. 27. – Brême 1842, Rev. Zool., p. 113 (23). – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 194. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 132/135.

- Loc: Prov. Maule a Llanquihue (en bosques de *Nothofagus*, bajo corteza o troncos).
ssp. **punctatus** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 228/229, lám. 20, f. 3 a/e. – Freude l. c. 135.
- Loc: Prov. Santiago?; Linares; Nuble; Malleco (zona precordillerana, bajo cortezas, troncos etc., en bosques).
ssp. **cribricephalus** Freude 1960, l. c. 160.
- Loc: Desconocida.
- punctatostriatus** (Fairmaire & Germain) 1861, Col. Chilensia, p. 5. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 194. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 136.
- Loc: Desconocida.
- tenuipunctatus** Philippi 1864, Stett. Ent. Zeit. 25, p. 349. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 136/137.
- Loc: Prov. Colchagua (zona andina).
- laticollis** (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 230. – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 193. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, p. 137/139.
- Loc: Desconocida (Provincias centrales).
- cribriceps** Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 196. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 139/140.
- Loc: Valdivia.
- penai** Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 140/141.
- Loc: Prov. Santiago (Alhué), en bosques de *Nothofagus*, bajo cortezas y troncos en zonas altas.
- ssp. **ohigginsii** Freude l. c., p. 141.
- Loc: Prov. O'Higgins (Cerro Poqui). En bosques de *Nothofagus*, bajo palos y cortezas, en zonas altas.
- colasi** Freude 1960, Proc. Ac. Sc. Cal. XXXI, 6, p. 142.
- Loc: Desconocida.
- sulcipennis** (Germain) 1855, An. Univ. Chile 12, p. 404. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 142/143.
- Loc: Prov. Chillán; Santiago (Aculeo).
- ssp. **brevipennis** Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 197/198. – Freude l. c. 143.
- Loc: Prov. Santiago.
- barossi** Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 143.
- Loc: Prov. Santiago (Alhué); Valparaiso (Quillota).

ventriosus Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, p. 144/146.

Loc: Prov. O'Higgins (Cerro Poqui). Bajo cortezas y ramas en bosques de *Nothofagus*, en alturas.

proximoides Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 146/147.

Loc: Prov. Colchagua (Nancagua). En zonas de basques.

ssp. **rotundangulus** Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 147.

Loc: Prov. Coquimbo (Quebrada de Amolanas). En el cuello de plantas en zonas desérticas.

leechi Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 147/148.

Loc: Prov. Curicó (Buchén, El Coigual). Bajo corteza y troncos en bosques de *Nothofagus* en planicies sobre los 800 mts.

ssp. **maulensis** Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 148.

Loc: Prov. Maule (Tregualemu). En bosques de *Nothofagus* de la zona costera, bajo troncos o cortezas.

quillotaensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 148/150.

Loc: Prov. Valparaíso (Quillota, Los Perales). En zonas boscosas, bajo cortezas y troncos.

biobioensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 149.

Loc: Prov. Ñuble (Cordillera de Curico). Bio Bio.

fairmairei Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 150/151.

Loc: Prov. Santiago (El Canelo, El Manzano, Peñalolén, Guayacán); O'Higgins (Bosque de Los Conservadores). Bajo cortezas y troncos.

arenosus Guérin 1830, Voy. Coq. Zool. t. II, p. 96/97, lám. IV, f. 6. – Bréme 1842, Rev. Zool. 112 (22). – Fairmaire 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 199. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 151/152.

= *parvus* Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 229.

Loc: Prov. Maule (Constitución, Chovellén, Tregualemu); Ñuble (Cobquecura); Concepción (Dichato); zona costera, bajo palos y basuras a orilla del mar, en lugares arenosos.

coquimbensis Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 152/153.

Loc: Prov. Coquimbo (Bosque de Fray Jorge, Bosque de Talinay). Bajo palos o cortezas.

rossi Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 153/154.

Loc: Prov. Arauco y Malleco (Cordillera de Nahuelbuta); Malleco (Icalma); Cautín (Cherquenco). En zonas de *Araucaria araucana*, bajo corteza y troncos.

proximus (Solier) 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 229. – Fairmaire 1875, Ann.

Soc. Ent. Fr., p. 198 (nota). – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 154/155.

Loc: Prov. Santiago; Maule (Tregualemu); Linares (Estero de Leiva); Concepción.

ssp. **punctatosulcatus** Fairmaire l. c. 197. – Freude l. c. 155.

Loc: Prov. Nuble (San Carlos).

germaini Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 157/158.

Loc: Prov. Curicó a Nuble (Zona preandina). En bosques de Nothofagus, bajo palos o cortezas.

Myrmecodema Gebien

= *Myrmecosoma* Germain

nycterinoides (Germain) 1955, An. Univ. Chile 12, p. 404. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 161/162.

Loc: Santiago (El Canelo, Peñalolén, Quebrada de Macul); O'Higgins (Las Nieves); Curicó (Palos Negros). En zonas altas sobre el límite de bosques, bajo piedras y raíces de plantas.

kochi Kulzer 1950, Ent. Arb. Mus. Frey 1, p. 29/30. – Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 162.

Loc: Desconocida.

michelbacheri Freude 1960, Proc. Cal. Ac. Sc. XXXI, 6, p. 163/165.

Loc: Prov. Coquimbo (Bosques de Fray Jorge y de Talinay, Huaquén, Pichidangui). Bajo palos y cortezas en bosques húmedos.

Helopini LeConte

Parahelops Waterhouse

darwinii Waterhouse 1875, Tr. Lond., p. 334. – Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 48, lám. 2, f. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 605/606.

Loc: Prov. Aysén y Magallanes (zona insular y de bosques) (Isla Tierra del Fuego, Isla Wellington, Puerto Edén, Islas Hermites etc.), bajo palos.

angulicollis Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. 6 (5), p. 56; 1891, Miss. Sc. Cap. Horn. VI, 2, p. 51, lám. 2, f. 3. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 606/607.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego), bajo palos en bosques.

pubescens Waterhouse 1875, Tr. Lond., p. 334. – Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 49, lám. 2, f. 2. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 607/609, lám. 1.

= *seriatus* Kolbe 1907, Erg. Hamb. Mag. Samm. 8, 4, p. 114.

Loc: Prov. Magallanes (Isla de Navarino, Isla Hoste, Isla Picton, Tierra del Fuego). Bajo palos en bosques.

kuscheli Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 611/612.

Loc: Prov. Magallanes (Co. Guido, Cerro Cazador).

Hydromedion Waterhouse

= *Mylops* Fairmaire

variegatus Waterhouse 1875, Tr. Ent. Lond., p. 336. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 617/619.

Loc: Prov. Magallanes (Isla Wellington, Puerto Edén).

anomocerum Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, p. 54. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 619.

Loc: Prov. Magallanes (Canal Beagle: Isla Picton, Navarino y Cabo Snipe).

elongatum Waterhouse 1875, Tr. Ent. Lond., p. 333. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 619/621.

= *distinguendum* Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 53.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

magellanicum (Fairmaire) 1883, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 3, p. 500. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 621/622.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego, Puerto Williams, Sur de Cameron, Porvenir).

oblongiusculum (Blanchard) 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 171, lám. 11, f. 13. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 623.

Loc: Prov. Magallanes (Puerto Hambre).

Chanopterus Boheman

= *Chitoniscus* Waterhouse

paradoxus Boheman 1858, Resa Eugenia, p. 98. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 625/626.

= *brevipennis* Waterhouse 1875, Tr. Ent. Lond., p. 331.

= *brevissimus* Fairmaire 1891, Miss. Sc. Cap. Horn VI, 2, Col., p. 39.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

Brachyhelops Fairmaire

hahni Fairmaire 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 5, p. 57; 1891, Miss. Sc. Cap. Horn VI, p. 53, lám. 2, f. 5. – Kulzer 1963, Ent. Arb. Mus. Frey 14, p. 626/628, lám. 6.

Loc: Prov. Magallanes (Bahía Orange, Isla Bertrand).

Dolphus Blanchard

globipennis Blanchard 1853, Voy. Pole Sud 4, p. 171, lám. 11, f. 12.

Loc: Prov. Magallanes (Tierra del Fuego).

Strongyliini Lacordaire**Homocyrtus** Reitter

= *Cyphonotus* Guérin

= *Schlinkus* Lucas

bonni (Germain) 1897, An. Univ. Chile 97, p. 283 (11).

Loc: Desconocida.

dives (Germain) 1855, An. Univ. Chile, p. 405, op. cit. 97; 1897, p. 284 (12).

Loc: Prov. Curicó a Valdivia, Valparaiso? (en bosques, sobre ramas de arbustos y de árboles).

dromedarius (Guérin) 1830, Voy. Coq. 2, p. 103, lám. 5, f. 4. – Laporte 1840, Hist. Nat. – Solier 1851 in Gay Hist. Chile 5, p. 263, lám. 21, f. 6. – Lacordaire 1859, Gen. Col. Atl., lám. 58, f. 3. – Germain 1855, Ann. Univ. Chile 97, p. 281 (9).

Loc: Prov. Arauco a Aysén (en bosques sobre ramas).

Cuphotes Champion

= *Phygoscotus* Schulz

= *Spheniscus* Kirby

mercurius (Thomson) 1897, Phys. I. 2, p. 132.

Loc: Prov. Chillán (Atacalco); Linares (Malcho); Bio-Bio y Malleco (zona preandina). Sobre ramas de árboles y arbustos.

INDEX

Subfamilies, Generos, Subgeneros

- Achanius Er. 404
 Adeliini Lac. 440
 Adelina LeConte 439
 Adeliium Kirby 440
Albuena Klzr. 407
 Alplitobius Steph. 439
 Ammophorus Guér. 408
 Anthrasomus Guér. 432
 Apocrypha Esch. 440
 Apocryphini Lac. 440
 Ardseocrypticus Kasz. 437
Arrhenoplita Kirby 438
 Arthroconus Sol. 404
 Aryenis Bates 404
 Asidelia Fairm. 428
Aspidius Muls. & Rey 436
 Aspidolobus Redt. 404
Aulacodera Gemm. & Har. 419
 Auladera Sol. 419
- Blapstinus Wat. 436
 Bolitophagini Muls. & Rey 437
 Brachyhelops Fair. 445
- Callyntra* Sol. 414
Cerandria Luc. 439
 Cerostena Sol. 418
 Chanopteris Boh. 445
Chitoniscus Wat. 445
 Collariheliofugus Freude 441
Coelus Sol. 428
Compsomorphus Sol. 440
 Cordibates Klzr. 406
 Crypticini Muls. & Rey 437
Cryptops Sol. 439
Cuphotes Champ. 446
 Cyphaleini Lac. 440
 Cyphaleus West. 440
 Cyphonotus Guér. 446
- Deroplatus* Sol. 402
 Diaperini Geoff. 438
- Diastoleus Sol. 421
 Dysantini Geb. 438
 Discopleurus Lac. 407
 Doliema Pasc. 439
 Dolphus Bl. 446
- Echocerus Horn 436
 Ectatocnemis Horn 436
Edrotinus Fairm. 406
 Eleodini Esch. 424
 Emmalodera Sol. 424
 Enneboeus Wat. 438
 Entomochilus Sol. 426
 Epipedonota Sol. 414
 Epitragini Lac. 402
 Eremoeus Lac. 407
 Eurimetopini Cas. 404
Euschatia Sol. 441
 Eutelini Lac. 440
 Evaniosomini Lac. 404
Evoplus Lac. 438
- Falsopraocis Klzr. 436
 Pilotarsus Sol. 432
- Geoborus Bl. 402
 Gnathocerus Thunb. 439
 Gonocephalium Chevr. 437
 Grammicus Wat. 407
Gymnognathus Sol. 404
 Gyriosomus Guér. 408
- Heliofugus Guér. 441
Heliophygus Agassiz 441
 Helopini Lac. 444
 Hemipraocis Klzr. 433
Heteropus Lap. 436
 Hexagonochilus Sol. 408
Histeropsis Chevr. 438
 Homocyrthus Reitt. 446
 Hoplocephala Lap. & Brullé 438
 Hydromedion Wat. 445

- Hylithus* Guér. 405
Hyperops Sol. 407
Hypselops Sol. 404

 Inscutoheliofugus Freude 441

Lepidocuemeplatia Kasz. 437
Lodinus Muls. & Rey 436

Megalophrys Wat. 407
Melaphorus Guér. 404
Mesopraocis Klzr. 431
Misolampini Lac. 441
Mitragenius Sol. 420
Mylops Fairm. 445
Myrmecodema Geb. 444
Myrmecosoma Germ. 444

Neomida Mots. 438
Neomida Latr. 438
Neopraocis Klzr. 428
Nyctelia Latr. 412
Nycteliini Sol. 408
Nyctelioma Casey 412
Nycterinus Esch. 424
Nyctopetus Guér. 402
Nyctoporini Lac. 408

Oligocara Sol. 439
Omopheres Cas. 404
Opatrini Lap. 436
Opatrinus Latr. 436
Orthogonoderus Sol. 433

Parahelops Wat. 444
Parepitragus Cas. 404
Pedinini Sol. 436
Peltolobus Lac. 407
Phaleria Latr. 437
Phaleriini Muls. & Rey 437
Phalerisida Klzr. 437
Phanerops Sol. 439
Philorea Erich. 425
Ploepsidius Geb. 438
Phygoscotus Sch. 446

Physogaster Guér. 426
Physogasterini Lac. 425
Pilobalia Burm. 420
Platesthes Wat. 428
Platydema Lap. & Brullé 438
Pleurophorus Sol. 407
Polpocara Sol. 425
Postpraocis Klzr. 431
Praocini Sol. 428
Praocis Esch. 428
Praonoda Klzr. 433
Psammetichus Latr. 420
Psectrascelis Sol. 417
Pseudothinobatis Fr. 406
Pteroderes Germ. 440

Rugosiheliofugus Freude 441

Salax Guér. 406
Schlinkus Lucas 446
Scotobiini Lac. 420
Scotobius Germar 421
Selenoma Sol. 408
Spheniscus Kirby 446
Stenholma Sol. 404
Stenosini Lac. 407
Strongyliini Lac. 446

Tenebrio L. 440
Tenebrionini Redt. 440
Thinobatini Lac. 405
Thinobatis Esch. 405
Toxicum Latr. 440
Trachyeras Phil. 437
Tribolium McLeay 439
Tribolocara Lac. 406
Trilobocara Sol. 406
Trimytini Cas. 406
Trinobatis Lap. 405
Tropidopterus Bl. 440
Typhobia Pascoe 438

Ulomini Muls. 439

Zidalus Muls. & Rey 436
Zodinus Muls. & Rey 436

Especies, Subespecies

- abdominalis Esch. 424
abreviatus Phil. 424
 acuminatus Reitt. 407
 adpersa Germ. 433
 aenea Sol. 430
aeneipennis Germ. 430
 aenescens Klzr. 432
 aeneum Fairm. & Germ. 440
 aequalis Fairm. 417
affinis Reed. 409
 akidiodes Wat. 421
alticola Kirch. 420
 alutacea Klzr. 418
 amabilis Klzr. 410
 andicola (Lac.) 419
 andina Germ. 416
 angulicollis Fairm. 444
angulifera Phil. 431
angusta Phil. 430
 angustata Burm. 416
 angustatus (Sol.) 438
 angustus Phil. 410
 angusticollis Phil. 425
 anomocerum Fairm. 445
 antarcticum Fairm.
antarcticus Guér. 422
anthracina Germ. 415
araneiformis Curt. 420
 arenaria Germ. 418
 arenosus Guér. 443
 argentinus Freude 402
 asperatus Erich. 422
 atacamensis Fairm. 409
 atacamensis Germ. 423
 atacamensis Kasz. 405
 atronitens Klzr. 420
 aoudouini Sol. 429
- bäckströmi Pic 438
 barriai Klzr. 410
 barrosi Freude 442
 batesi Fairm. 409
 bicarinata Burm. 433
 bicarinatus Sol. 421
 bicostata Phil. 430
 bicostatus Klzr. 422
 biobioensis Freude 443
 bonni (Germ.) 446
 bremeri Wat. 414
 brevicollis Klzr. 406
 brevicolle Phil. 437
- brevicornis Klzr. 426
brevicornis (Sol.) 405
 brevipennis Fairm. 442
 brevipennis Waterh. 445
 brevipes Klzr. 426
 brevipes Waterh. 423
 brevis Phil. 424
brevis Sol. 417
 brevissimus Fairm. 445
 bridgesi Wat. 409
 bullatus Curt. 422
- calderana Klzr. 431
 calderana Klzr. 406
cancelatum Phil. 437
 carbonaria Phil. 416
carbonarius Phil. 402
 carinatus Phil. 402
 carinatus Sol. 409
 carinatus Sol. 421
 cariosicollis Fairm. 417
 castanea Germ. 432
 castaneum (Herb.) 439
 chevrolati Guér. 432
 chilensis (Gray) 435
 chilensis Klzr. 406
 chilensis Wat. 407
ciliata Germ. 429
 ciliata Sol. 406
 cinerea Sol. 419
 colasi Freude 442
 collaris Guér. 421
 collaris (Germ.) 441
 collaris Klzr. 427
 collaris Klzr. 438
 confinis Klzr. 418
confusa Sol. 430
 confusum Duval 439
consobrina Phil. 434
 contracta Fairm. 428
convexa Germ. 434
 coquimbensis Freude 443
 cordicollis Kirsch 407
 coriaceus Fairm. 412
 cornutus (Fabr.) 439
 corrugata Curt. 414
 costata Sol. 429
 costatula Sol. 431
 costatus Bl. 402
 costatus Guér. 408
 costatus Guér. 420

- costatus* Guér. 422
costipennis Sol. 435
costulata Fairm. & Germ. 437
costulatus Phil. 425
crassecostata Fairm. 413
crassicornis Wat. 421
crassicosta Fairm. 419
crassiventris Klzr. 417
crassus Klzr. 422
crenicollis Phil. 423
crenicosta Guér. 419
cribrarium Bl. 440
cribrata Sol. 433
cribriceps Fairm. 442
cribricephalus Freude 442
cribricollis Fairm. 423
crispaticollis Fairm. 408
cryptocephalus Phil. 441
curicoensis Freude 441
curta Sol. 429
curtisi Fairm. 412
curtisi Sol. 431
curvidens Klzr. 424
curvilineatus Guér. 408
- darwinii* Waterh. 413
darwinii Waterh. 444
davidsi Klzr. 418
decorata Erich. 420
dentipes Germ. 434
depressa (Guér.) 428
depressa Erich. 439
depressicollis Germ. 434
difficilis Klzr. 418
dilaticollis Sol. 408
distinguendum Fairm. 445
dives Germ. 446
dromedarius (Guér.) 446
- ebenina* Germ. 434
ecostata Klzr. 434
elegans Bl. 420
elegans Klzr. 404
elegans (Sol.) 440
elongata Sol. 417
elongata Sol. 439
elongatus Sol. 404
elongatus Sol. 425
elongatum Waterh. 445
elongatus Waterh. 408
elliptica Phil. 430
emarginicollis Klzr. 423
erotyloides Lac. 407
- eschscholtzi* (Sol.) 407
expansicollis Fairm. 415
- fairmairei* Fr. 443
ferruginea Esch. 405
fitzroyi Waterh. 412
flava Wat.
flava Klzr. 431
flava Klzr. 437
flexuosus (Sol.) 438
forsteri Klzr. 433
forsteri Kasz. 405
fossulatus Sol. 412
foveopunctatus Fairm. 411
freyi Geb. 411
fuscus (Sol.) 405
- gaudichaudi* (Lap.) 403
gayi Lap. 437
gayi Sol. 432
gayi Sol. 422
gebieni Klzr. 408
gebieni Klzr. 421
genei Sol. 424
geometrica Fairm. 413
germaini Freude 444
gibbosus Bl. 420
globulus Fairm. & Germ. 426
globipennis Bl. 446
gracilipes Phil. 424
gracilis Erich. 421
granocostata Fairm. 424
granocostatus Fairm. 411
granulata Waterh. 414
granulosa Gemm. 414
guerini Sol. 417
- haagi* Klzr. 426
hahni Fairm. 445
hirtella Klzr. 429
hirticollis Sol. 431
hirtipes Klzr. 427
hirtipes Klzr. 424
hirtuosa Sol. 432
hispidula Phil. 432
holosericeus Lap. 436
hopei Gray 410
humilis Erich. 405
- illapelensis* Freude 402
impressicollis Germ. 419
impressus Guér. 412
impressus Guér. 441

- incertus* Sol. 410
inmaculata Bl. 420
insularis Klzr. 435
intermedia Phil. 405
interrupta Sol. 429
intraticollis Fairm. 417
jugeleti Wat. 419
- kaszabi* Freude 402
kingi Reed 409
kirbyi Sol. 422
kochi Klzr. 444
kuscheli Freude 441
kuscheli Klzr. 406
kuscheli Klzr. 418
kuscheli Klzr. 426
kuscheli Klzr. 428
kuscheli Klzr. 445
- lacordairei* Guér. 406
laevicollis Phil. 434
laevicosta Curt. 431
laevigatus Guér. 411
laevigatus Phil. 425
laevipennis (Sol.) 427
laevis Klzr. 411
laevis Klzr. 427
laevis Waterh. 413
laeviuscula Phil. 423
lata Waterh. 416
laticollis Phil. 432
laticollis Phil. 402
laticollis Phil. 415
laticollis (Sol.) 442
lecontei Horn 439
leechi Freude 403
leechi Freude 443
leechi Klzr. 410
lineatus Guér. 412
lividipennis (Bl.) 403
longeplicata Fairm. 414
lucens Klzr. 411
luczoti Chevr. 408
- macrocosta* Guér. 416
maculata Klzr. 437
maculipennis (Lap.) 403
magellanicum (Fairm.) 445
major Germ. 416
mannerheimi Fischer 429
mannerheimi Sol. 425
manni Freude 403
marginata Germ. 431
- marginata* Sol. 437
marmoratus Waterh. 410
maulensis Freude 443
melcheri Freude 406
melcheri Klzr. 412
mercurius (Thom.) 446
micelbacheri Freude 444
minor Klzr. 427
minor Klzr. 431
minuta Sol. 405
modestus Klzr. 412
molitor L. 440
monilis Lac. 416
multicostata Guér. 414
multicristata Bl. 414
multilineata Horn 436
multipunctata Curt. 424
murina Kasz. 437
murina Germ. 437
- neuquensis* Freude 402
niger Germ. 402
nigra Klzr. 428
nigra Klzr. 432
nigroaenea Sol. 429
nigroaenus Muls. & Rey 436
nitens Klzr. 424
nitens Klzr. 427
nitens Klzr. 431
nitidicollis Phil. 434
nitidum Sol. 439
nitidus Klzr. 426
nitidus Phil. 402
nuda Klzr. 432
nycterinoides (Germ.) 444
- obesa* Guér. 424
oblonga Bl. 420
oblonga Sol. 404
oblonga Sol. 433
oblongiusculum (Bl.) 445
oblongulus Fairm. 426
obscurum Fabr. 440
obscurus Klzr. 422
ohausi (Klzr.) 406
o'higginsii Freude 442
opaca Kirsch 420
ovipennis Klzr. 440
- paradoxus* Boh. 445
paraella Germ. 418
parva Sol. 430
parvus Phil. 402

- parvus Sol. 410
 parvus (Sol.) 427
parvus Sol. 443
 patagonica (Wat.) 407
 patagonicus Kasz. 437
 paulseni Fairm. 411
 paulseni Fairm. 415
 penai Freude 403
 penai Freude 406
 penai Freude 442
 penai Kasz. 405
 penai Klzr. 404
 penai Klzr. 409
 penai Klzr. 415
 penai Klzr. 417
 penai Klzr. 421
 penai Klzr. 425
 penai Klzr. 426
 penai Klzr. 435
penai Klzr. 407
 peniciliger Geb. 411
 pentachorda Phil. 431
 pentagona Lac. 435
 peruvianus Guér. 408
 piceus Klzr. 404
piceus Sol. 405
 picipes Germ. 434
 piliger Redt. 404
 pilipes Guér. 417
 pilipes Guér. 421
 pilosa Sol. 418
 pilosipes Klzr. 418
 pilosula Klzr. 425
pilosus Phil. 402
 pilosus Sol. 426
 pilula Lap. 431
 plana (Fabr.) 439
 planatus Erich. 423
 planatus Sol. 409
 planicollis Geb. 409
 planicosta Guér. 423
 planiuscula Fairm. 416
planiuscula Fairm. 416
 pleuroptera Sol. 434
 plicata Waterh. 413
 plicicollis Germ. 434
 plicicollis Sol. 419
 porteri Brêthes 404
 proximoides Freude 443
 proximus (Sol.) 443
pubens Phil. 432
 pubescens Phil. 431
 pubescens Wat. 444
 pudens Klzr. 419
 pulverulentus Erich. 404
 pumilus Klzr. 411
 punctata Sol. 435
punctatellus Bl. 423
 punctatostriatus Fairm. & Germ. 442
 punctatosulcatus Fairm. 444
 punctatus Curt.
punctatus Curt. 436
 punctatus Esch. 422
 punctatus (Sol.) 442
 punctulatus Sol. 436
 quadratus Klzr. 427
quadricollis Germ. 425
quadricollis Lap. 403
 quadricollis (Sol.) 407
 quadrisulcata Germ. 429
 quadrituberculata Curt. 438
 quillotaensis Freude 443
rectestriata Fairm. 413
 reedi Klzr. 410
 reedi Klzr. 433
 reflexicollis (Sol.) 428
 regularis Klzr. 438
 rengoensis Freude 402
 richardae (Sol.) 436
 riverai Klzr. 415
 rossi Freude 403
 rossi Freude 443
 rossi Klzr. 415
 rossi Klzr. 425
 rotundangulus Freude 443
rotundata Lac. 429
 rotundicollis Phil. 434
 rotundicollis Waterh. 406
rouleti Sol. 407
 rubida Chevr. 438
 rubripes Phil. 403
 rubripes Sol. 408
 rufilabris Sol. 433
 rufipes Esch. 428
 rufipes Sol. 405
rufipes Sol. 415
rufipes (Sol.) 424
 rufitarsis Sol. 430
 rugata Sol. 435
 rugiceps Curt. 425
rugicollis Phil. 419
 rugicollis Sol. 423
 rugipennis (Sol.) 402
rugipennis Germ. 429

- rugosa* (Sol.) 415
rugosa Wat. 415
rugosulus Guér. 422
rugosus Klzr. 427
rugulosa Gemm. 415
- salax* Lac. 406
sanguinolenta Sol. 429
scidaria Reit. 439
semipunctatus Sol. 410
semistrigosa Fairm. 418
seriatus Kolbe 444
servillei (Sol.) 415
setifer Klzr. 426
setipennis Lesné 426
silphoides Lac. 435
silphomorpha Fairm. 433
similis Klzr. 428
similis Klzr. 419
solieri Waterh. 413
spinipes Lap. 435
spinolai Sol. 430
spinolai Sol. 424
squalida Lac. 435
stephensi Wat. 413
striatus Guér. 436
strigosula Geb. 418
striolicollis Fairm. 433
subaenea Erich. 430
subcostata Germ. 418
subcostata Sol. 432
subdepressa Sol. 417
sublaevicollis Sol. 418
sublaevigata Germ. 435
submetallica Guér. 430
subnudus Klzr. 436
subplana Geb. 416
subreticulata Sol. 434
subrugatus Fairm. 410
substriatus Guér. 423
substriatus Sol. 425
subsulcata Sol. 430
- sulcata* Esch. 429
sulcatulus (Gemm.) 441
sulcatulum Fairm. & Germ. 440
sulcatus Guér. 441
sulcatus Sol. 441
sulcicollis Sol. 417
sulcipennis (Germ.) 442
- tenebrioides* Guér. 403
tentyroides Lac. 405
tenuicornis Sol. 432
tenuipunctatus Phil. 442
thoracicus Esch. 425
tibialis Klzr. 439
tibialis Sol. 430
tomentosus (Guér.) 427
topali Kasz. 437
tricostata Burm. 416
tristis Klzr. 420
tuberculatus Germ. 408
tuberosa Germ. 440
- ulomoides* (Sol.) 439
unicolor Bl. 404
unicolor Germ. 439
unicosta Fairm. 414
unicosta (Sol.) 416
uretai Klzr. 433
- valdivianus* Phil. 440
varipes Fairm. 414
variegatus Waterh. 445
varius Klzr. 427
ventriosus Freude 443
vicina Sol. 415
vulcanica Fairm. 413
vulgaris Guér. 423
- waterhousei* Bates 407
weiseri Klzr. 436
witbei Sol. 409
withei Waterh. 409

Anschrift des Verfassers:

Luis e. Peñ a, Casilla 2974, Santiago de Chile