

Par suite de la présentation qui avait été faite la veille, M. le Président proclame membre de la Société :

M. MICHAUX (Albert), rue de Londres, 58, à Paris, et à Bonnières (Seine-et-Oise), présenté par MM. Roze et Cornu.

Les communications suivantes ont été ensuite rattachées à cette séance par décision spéciale de la Société :

LISTE DES ESPÈCES RECUEILLIES PAR LA SOCIÉTÉ, LE 26 OCTOBRE 1877, DANS LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU, par M. **Maxime CORNU**.

1<sup>o</sup> Excursion pendant la matinée, au Calvaire.

manita Mappa.	Mycena flavoalba.
— phalloides.	Galera hypnorum.
Armillaria mellea.	Hypholoma fasciculare.
Tricholoma rutilans.	Cortinarius flexipes.
Clitocybe odora.	— castaneus.
— fragrans.	Marasmius erythropus.
— nebularis.	— androsaceus.
Collybia maculata.	Calocera viscosa.
— dryophila.	Dacrymyces deliquescens.
— conigena.	Lycoperdon perlatum.
— stipitaria.	— piriforme.
— tuberosa.	Geaster fimbriatus.
Mycena rorida.	Stictis nivea.
— vulgaris.	Hysterium Pinastri.
— pura.	

2<sup>o</sup> Excursion dans l'après-midi, au Mail de Henri IV.

Amanita rubescens.	Pluteus umbrosus.
— phalloides.	Galera hypnorum.
Armillaria robusta.	Naucoria melinoides.
Lepiota granulosa.	Cortinarius flexipes.
Tricholoma equestre.	Marasmius prasyosmus.
— terreum.	Cantharellus aurantiacus.
Clitocybe clavipes.	Panus stipticus.
— dealbata.	Hydnum molle.
— fragrans.	— auriscalpium.
— laccata.	Chlorosplenium æruginosum.
Collybia conigena.	Helotium imberbe.
— tuberosa.	Peziza calycina.
Mycena parabolica.	Elaphomyces asperulus.

LISTE DE QUELQUES ESPÈCES A AJOUTER A CELLES DÉJÀ SIGNALÉES COMME AYANT ÉTÉ RÉCOLTÉES PENDANT LA SESSION MYCOLOGIQUE DE 1877, par M. **COOKE**.

Dans la forêt de Saint-Germain :

Zygodesmus fuscus.	Sphærella isariphora.
Helotium serotinum.	



## Dans la forêt de Villers-Cotterets :

Peziza umbrata.		Saccobolus neglectus Boud.
— trachycarpa.		Ryparobius Cookei Boud.
— maurilabræ.		Zygodesmus fuscus.
Ascobolus atrofuscus.		

## Dans la forêt de Montmorency :

Helotium pallescens.		Melogramma rubricosum.
— geogenum.		Sporormia minima.
— phascoides.		

## Dans la forêt de Fontainebleau :

Phacidium dentatum.		Helotium puberulum.
Peziza petiolorum.		

A la clôture de cette séance, divers toasts furent portés de part et d'autre entre les mycologues anglais et français présents à la réunion ; puis des remerciements furent votés à l'unanimité aux organisateurs et aux membres du bureau de la Session mycologique de 1877, et le retour général s'effectua sur Paris, non sans un échange réciproque de souhaits d'une future rencontre au Congrès international de botanique en 1878.

---