

ESSAI

D'UN CATALOGUE DES INSECTES DE L'ILE CEYLAN

PAR

Victor de Motschulsky.

(Suite. Voy. Bullet. 1861. part. I. p. 93.)

B. RHYPOPHAGES.

Crassicornes.

Batrisus spinicollis Motsch. $\frac{2}{3}$ l. +
Diroptus ceylonicus Motsch. $\frac{2}{3}$ l. +

Metaxis? pilicollis Motsch.

Alata, elongato-ovata, subconvexa, nitida, rufo-testacea, oculis nigris, abdomine subinfuscato, palpis, antennarum apice pedibusque testaceis, capite triangulare, fronte convexo, inter oculos impresso, bituberculato, antennis crassiusculis, clava triarticulata, articulis 3—8 subtransversis, 9 et 10 transverso-subconicis, disjunctis, 11 magno, ovata, apice attenuato; thorace capite sublatiore, convexo piloso, postice transversim biarcuato impresso, antice sub-

conico angustato, postice leviter attenuato, angulis posticis obtusis, lateribus medio angulatis; scutello indistincto; elytris thorace duplo latioribus et longioribus, fere glabris, utrinque profundo bistriatis, basi triplicatis, antice arcuato-angustatis, lateribus abdomineque pilosis, hoc segmento primo simplici non ampliato.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Colombo.

Bryaxis gigantea Motsch.

Elongato - ovata, convexa, crassa, subgibbosa, nitida, rufo - testacea, oculis nigris; capite subelongata, glabro, inter oculos profundo bifoveolato, inter antennis impresso, bituberculato; thorace subtransverso - ovato, glaberrimo, convexo, capite paulo latiore, postice biarcuato impresso, utrinque ad apicem impressionis profundo unifoveolato; scutello indistincto; elytris thorace paulo latioribus, subtilissime sparsim punctulatis et pilosis, ad suturam unistriatis, ad humeros prominulis, longitudinaliter subimpressis, postice dilatatis; abdomine elytrorum latitudine, gibboso, nitido, sparsim testaceo - piloso, segmento primo simplici, non ampliato; pedibus validiusculis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Du sommet du mont Patannas.

Pyxidicerus Motsch. n. g.

Pselaphide de la forme allongée des *Euplectus*, mais plus robuste, plus déprimé, un peu élargi en arrière. Antennes insérées sur le front, occiput étroit élevé, brusquement tronqué en avant, ce qui forme une large excavation avec cinq tubercules sur la partie

antérieure de la tête; elles sont épaisses, plus courtes que la tête et le corselet réunis, avec leur 1-er article grand, le 2-d aussi large que le 1-er, mais moitié plus court, transversal, 3 — 8 un peu plus étroits, très-transversaux, rapprochés les uns des autres, 9 et 10 plus larges que le 1-er, transversaux, un peu obconiques et formant avec le 11-ème qui est petit, court et implanté sur le 10-ème, une massue courtement ovulaire, qui a l'apparence d'être biarticulée. — Yeux petits, peu saillants. Corselet fortement ponctué, aussi large que la tête, aussi long que large, rétréci en arrière, avec une impression longitudinale au milieu et deux fovéoles en arrière audessus de l'écusson, qui est très petit. Elytres moitié plus larges et un peu plus longues que le corselet, transversales, ponctuées, avec deux pliures de chaque côté de la base et une strie subsuturale. Abdomen ponctué assez large, comme chez les *Euplectus*. Pattes robustes, cuisses claviformes, un peu renflées. Le reste, je n'ai pas pu l'examiner faute de doubles.

Pyxidicerus castaneus Motsch.

Elongatus, subdepressus, punctatus, nitidus, cinereo subpilosus, castaneus, antennarum apice, elytris pedibusque rufo-testaceis; capite antice valde excavato, fronte supra excavatione producto, clypeo utrinque ante oculo testaceo bituberculato; thorace subcordato, subconvexo, fortiter punctato; elytris thorace latioribus, punctatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l. Tab. IX, fig. 16. (1)

Des sommités du mont Patannas.

(1) Vide Bullet. 1861. part I, tab. IX.

Euplectomorphus Motsch. n. g.

Psélaphide d'une forme voisine des *Trimium*, mais aplatie comme chez les *Euplectus*. Antennes courtes, un peu plus robustes que chez les premiers, avec la massue formée seulement par le 11-ème article, qui est ovulaire et presque aussi grand que le reste de l'antenne, ceux assez grands et saillants; corselet de forme atténuée comme chez les *Trimium*, mais déprimé et bifovéolé au milieu de sa base; élytres avec leurs angles huméraux distincts et deux fortes impressions de chaque côté à la base, qui paraît transversalement carenée. Faute de doubles, on n'a pu encore examiner ni les pattes, ni les parties de la bouche, et il suffira des caractères indiqués pour reconnaître l'insecte.

Euplectomorphus pygmaeus Motsch.

Elongatus, subparallelus, depressus, vix nitidus, rufotestaceus, elytris, antennis pedibusque dilutioribus, oculis nigris, prominulis; capite triangulari, antice inter antennis longitudinaliter bicarinulata, antennis breviusculis, articulis mediis valde transversis, 11 majusculo, ovato clava formante; thorace capitis latitudine, depresso, nitido, postice subangustato, basi medio bifoveolato; elytris thorace sublatioribus et longioribus, subquadratis antice - attenuatis, basi utrinque bimpressis, stria suturali distincta, humeris subprominulis; abdomine apice arcuatim attenuato, segmentis ligatura profundo impresso.

Long. $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{9}$ — $\frac{1}{7}$ l. Tab. IX, fig. 17.

Colombo.

Pselophanax setosus Walker $1\frac{3}{4}$ l.

Paussus pacificus Westw.

Pleuropterus Westermanni Westw.

Cerapterus latipes Swed.

Syndicus megomelas Walker 1 l. (*Scydmaenus*).

Eumicrus crassicornis Motsch. $\frac{4}{5}$ l. +

Pseudomicrus Motsch. n. g.

De la forme allongée-ovalaire des *Eumicrus*, mais avec des ailes bien développées. Quatrième article des palpes maxillaires très-obtus, à peine visible. Tête distinctement séparée du corselet par un col, carrée; yeux petits, peu saillants; antennes allongées, robustes, avec leur article grand, le 2-d sensiblement plus petit, mais toujours encore allongé ainsi que les quatre suivants, qui sont un peu coniques, les 7 et 8-me transversaux, 9—11 brusquement plus grands et formant une massue-allongée, peu solide; mandibules assez courbées, aigues, armées d'une forte dent bifide. Corselet convexe, oblong. Ecusson très-petit. Elytres ovalaires, atténuées vers les deux extrémités, non soudées. Mesosternum cariné. Tarses des mâles dilatés à leur base; coxes intermédiaires grands, allongés, claviformes, les postérieurs transversaux, distants; les tronchantères postérieurs allongés, élargis vers leur extrémité. Les mâles d'une taille plus grande que les femelles.

Pseudomicrus pilipennis Motsch.

Elongatus, ovatus, subdepressus, sparsim punctulatus, longissime cinereo pubescens, rufo-brunneus, palpis pedibusque rufo-testaceis, oculis minutis nigris; antennis crassiusculis, articulo 5-o elongato, 2—4, subelongatis, 6-o subgloboso, 7—8 transversis medio extrorsum subangulato productis, 9-o subquadrato, 10-o quadrangulato-subtrans-

verso, 11-o majore, conico; thorace capite vix latiore, oblongo, subconvexo, postice paulo angustato, truncato, angulis posticis rectis, lateribus fere rectis, antice subarcuatis, basi leviter quadrifoveolato; elytris pubescentibus, ovatis, medio subdilatatis, humeris vix, sutura modice elevatis; vertice in ♂ impresso, in ♀ convexo, femoribus clavatis, in ♂ antice angulatim dilatatis, robustis; tardis in ♂ distincto-dilatatis.

Long. $\frac{3}{4}$ — $\frac{4}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ l. Tab. XI, fig. 18.

Montagnes de Nura-Ellia.

Pseudomicrus alatus Nietner $\frac{2}{3}$ l. * (*Scydmaenus*).

— *femorialis* Nietner $\frac{2}{3}$ l. * (*Scydmaenus*).

— *ceylanicus* Nietner $\frac{3}{4}$ l. * (*Scydmaenus*).

— *intermedius* Nietner $\frac{3}{4}$ l. * (*Scydmaenus*).

— *pselaphoides* Nietner $1\frac{1}{4}$ l. * (*Scydmaenus*).

Scydmaenus trinodis Motsch. $\frac{2}{3}$ l. +

— *cyrtocerus* Motsch. $\frac{2}{3}$ l. +

— *advolans* Nietner $\frac{3}{4}$ l. *

Scydmaenus transversicornis Motsch.

Elongatus, ovatus, nitidus, sparsim puberulus, rufobrunneus, palpis, antennis pedibusque rufo-testaceis, oculis nigris, mediocri prominulis; capite subrotundato, glabro, inter antennis impresso, fronte subbiloba, antennis paulo abbreviatis, apice incrassatis, articulo 1-o magno, 2-de paulo brevior, elongato, claviforme, 3—5 subelongatis secundo dimidio brevioribus, 6—7 subglobosis 8—10 valde transversis versus apicem incrassatis, 11-o magno, breviter ovato, apice arcuatim acuminato; thorace capite latiore, convexo, ovato, glabro, margine artica reflexa, angulis

posticis obtusis; elytris thorace sublterioribus, oblongo-ovatis, apice subacuminatis subtiliter sparsim punctulatis et pilosis, ad humeras utrinque plicatis; femoribus simpliciter clavatis.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Forme de notre Sc. *collaris* M. et K.

— *graminicola* Nietner $\frac{3}{4}$ l. *

— *pyriformis* Nietner $\frac{1}{2}$ l. *

Scydmaenus quinque foveolatus Motsch.

Elongato-ovatus, nitidus, sparsim erecto pilosus, rufotestaceus, palpis, antennis pedibusque dilutioribus, oculis nigris; capite subrotundato, minuto; thorace capite latiore, subconvexo, nitido, antice arcuatim attenuato, postice late truncato, paulo angustato, basi quinque foveolato, lateribus arcuatis, angulis posticis rectis, elytris thorace latioribus, nitidis, sparsim punctulatis et pilosis, ovatis, postice subattenuatis, apice arcuto-truncatis, ad humeros distincto uniplicatis; antennis capite thoraceque conjuncto longitudinis, articulis duobus primis validis, elongatis, fere aequalibus, 3—6 minutis, subglobosis, 7 paulo latiore, majore, transverso, 8—10 abrupte latioribus, valde transverso-conicis, aequalibus, 11-o majore, breviter ovato, apice acuminato, cum tribus vel quatuor precedentibus clavam solutem parallelam longitudine dimidio antennis formantibus.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Colombo.

Forme de notre Sc. *elongatulus* M. et K.

Forme de notre *advolans* Nietner $\frac{3}{4}$ l. *
 — — *angusticeps* Nietner 1 l. *

Scydmaenus brunnipennis Motsch.

Elongato - ovatus, antice posticeque attenuatus, nitidus, cinereo pilosus, nigro-piceus, elytris brunneis sutura nigra, antennarum palporumque basi pedibusque rufo - testaceis; capite rotundo, vix convexo, inter antennas impresso, oculis vix prominulis, antennis thoracis basi paulo superantibus, articulis 1 et 2 validis, 3—7 minutis, subcylindricis, 8 paulo latiore, transverso, 9—10 abrupto majoribus, dilatato-obconicis, 11-o breviter ovato, apice acuminato cum duobus precedentibus clavam formantibus; thorace capitis latitudine, convexo, conico, villosus, postice transversim impresso et bifoveolato, angulis posticis rectis; elytris thorace laticribus, ovatis, postice attenuatis, sparsim pilosis, nitidis, impunctatis, humeris distincto uniplicatis.

Long. $\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Cette espèce présente une forme semblable à celle de notre *Sc. minutus* (*hirticollis* Ill.) et un corselet conique comme toutes celles qui suivent.

Scydmaenus pygmaeus Nietner $\frac{1}{3}$ l. * +
 — *pilicollis* Motsch. Bull. $\frac{1}{2}$ l. +

Scydmaenus glandulicornis Motsch.

Elongato - ovatus, postice dilatatus, nitidus, longissime sparsim pilosus, rufo-castaneus, palpis, antennarum apice, tibus tarsisque dilutioribus, oculis subnigris, subprominu-

lis; capite oblongo, postice attenuato, convexo, lateraliter villosa, antennis thoracis basi non superantibus, dilatatis, compressis, clava soluta, quadriarticulata, articulis 1 et 2 validis, 3-o brevissimo transversa, 4—6 minutis, subconicis, 7-o paulo majore et latiore, conico 8—10 abrupte majoribus, transversis, apice incrassatis, 11-o ovato, glanduliforme; thorace capite non latiore, elongato-conico, convexo, sparsim piloso, postice truncato, transversa impresso; elytris thorace latioribus, ovatis, dilatatis, apice arcuatim attenuatis, sparsim subtilissime punctulatis et longissime pilosis; femoribus elavatis, pilosis, tibiis anticis dimidia antice dilatata, depressa, parallela.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

De la forme élargie de notre *Sc. major* Motsch., mais avec un corselet plus étroit et plus allongé, ce qui le rapproche beaucoup de mon *Sc. latipennis*, mais la taille est moitié plus petite.

Scydmaenus extensicornis Motsch.

Elongato-ovatus, postice dilatatus, nitidus, pallido pilosus, rufo - testaceus, palpis, antennis pedibusque pallidis, oculis prominulis, nigris; capite fere obconico, convexo, inter oculos impresso, binodulo, antennis dimidio corpore longioribus, gracilis, clava elongata, soluta; longitudine dimidio antennis, apice non incrassata, quadriarticulata, articulis 1 et 2 validis, 3-o minutissimo, 4—7 subaequalibus, elongato - subovatis, 8—10 abrupte majoribus, subglobosis, 11-o valido, ovato, apice subacuminato; thorace capitis latitudine, antice conico, postice subquadrato, basi transversim impresso, trifoveolato; elytris thorace duplo

laticribus, ovatis, medio dilatatis, postice attenuatis, distincto punctatis et sparsim pilosis; femoribus leviter elavatis, tibiis anticis simpliciter versus apicem paulo dilatatis.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des sommités du Mont Patannas.

Forme élargie très-voisine du *Sc. latipennis*, mais beaucoup plus petit et avec les antennes plus allongées.

Scydmaenus pubescens Nietner $\frac{2}{3}$ l. *

— *glanduliferus* Nietner $\frac{3}{4}$ l. *

— *latipennis* Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

— *Nietneri* Motsch. $\frac{4}{5}$ l. +

Erineus monstrosus Walker 3 l.

Cephennium brevisculum Motsch. $\frac{1}{3}$ l. +

— ? *ovatum* Nietner $\frac{1}{2}$ l. * (*Scydmaenus*).

Glisonotha Motsch. n. g.

Cryptophagide de forme allongée atténuée, constituant un passage aux *Erotylines*, rappelant en même temps une *Mycetea* très-allongée, mais dont le corselet n'a pas les lignes imprimées latérales. Tarses de cinq articles aux quatre pattes antérieures, de quatre seulement aux postérieures. Antennes allongées, dépassant un peu la base du corselet, composées d'articles un peu allongés vers la base, plus transversaux vers l'extrémité, leur 1-er article assez, pas plus long que large, le 2-d plus petit, un peu carré, 3—5 encore un peu plus étroits, obconiques, égaux entr' eux, 6—8 un peu raccourcis et s'élargissant vers la massue, qui est composée de trois articles transversaux, brusquement élargis, dont le

9-me est obconique, le 10-me cylindrique et le 11-me court, semiovalaire. Palpes maxillaires à dernier article allongé, ovalaire et fortement acuminé à l'extrémité. Labre transversal, un peu trapézoïdal. Tête transversale. Yeux arrondis, saillants. Corselet transversal, un peu renflé en avant, transversalement imprimé ou profondément bifovéolé en arrière, côtés latéraux presque droits et largement réfléchis, tous les quatre angles distincts. Ecusson assez grand, transversal. Elytres un peu plus larges et trois fois plus longues que le corselet, atténuées en arrière, marquées de stries ponctuées plus ou moins fines, qui vont jusqu'à l'extrémité, intervalles lisses ou garnis de long poils élevés. Dernier article des tarsi presque aussi long que les précédents réunis, 4-me bilobé, mais à peine plus large que les autres, qui sont transversaux.

Il paraît que ce genre remplace aux Indes nos *Cryptophages*.

Glysonotha setosa Motsch.

Elongato-ovata, subattenuata, subconvexa, nitida, setosa, rufo-testacea, oculis nigris; thorace capite latiore, transverso-quadrangulato, convexo, punctato, postice transversim impresso, impressione utrinque foveolato, lateribus vix arcuatis, reflexis, angulis posticis rectis, sub prominulis, anticis subobtusis; elytris thorace vix latioribus, elongatis, postice arcuatim-attenuatis, punctato-striatis, subseriatim setosis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{3}$ l. Tab. IX. fig. 19.

Colombo.

Glysonotha nigripennis Motsch.

Elongata, subattenuata, subconvexa, nitida, punctata, rufo-ferruginea, oculis, scutello elytrisque nigris, antennarum clava infuscata; capite thoraceque punctatis, hoc transverso, quadrangulato, convexo, postice transversum impresso, lateribus paulo arcuatis, reflexis postice modice angustatis, angulis anticis subprominulis, posticis rectis; elytris thorace vix latioribus, elongatis, postice attenuatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, impunctatis, sutura ad apicem inflexa, utrinque unisulcata.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Syncalypta pilosella Motsch. $\frac{3}{5}$ l. +
Inclica solida Walker $\frac{3}{4}$ l.

Nosodendron ceylanicum Motsch.

Ovatum, gibbosum, punctulatum, brevissime cinereo velutinum, nigrum, antennis tarsisque ferrugineis, his clava dilutiora; thorace valde transverso, punctato, antice angustato, angulis anticis obtusis, subropinulis, posticis subacutis; elytris thorace vix latioribus, ovatis, dorso subelevatis, disperse punctulatis; corpore subtus pedibusque fortiter punctatis, abdominis segmento ultimo fere glabro.

Long. $1\frac{2}{3}$ l. — lat. $1\frac{1}{6}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Un peu plus allongé que notre *N. fasciculare*, mais pas plus grand. Une autre espèce plus grande du continent indien est mon *N. nitidum* et une quatrième *N.*

atratum m. plus petite et proportionnellement plus large que le *N. unicolor* Say, vient de Texas.

Brevicornes.

Anthrenus fasciatus? Hrbst. †

Trinodes cinereohirtus Motsch.

Ovatus, subconvexus, nitidus, cinereo hirtus, niger, tibis tarsisque piceis; capite rotundato, nigro subpiloso, fronte rugosopunctata, cinereo hirta; thorace valde transverso, densissime cinereo villosa, angulis posticis acutiusculis; elytris thorace latioribus, ovatis, irregulariter punctulatis et cinereo pilosis, apice arcuatim subattenuatis.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Taille et forme de nôtre *Tr. hirtus*, mais différent par la villosité d'un test grisâtre qui le recouvre.

Trinodes hirtellus Walker $\frac{1}{2}$ l.

Une quatrième espèce est le *Tr. hispidus* Melsh. de l'Amérique septentrionale et une cinquième le *Tr. flavus* m. d'Égypte, qui n'a qu'une $\frac{1}{2}$ ligne de longueur et d'un test roussâtre unicolore.

Aethriostoma rufipes Walker $1\frac{1}{2}$ l. † (Attagenus).

Attagenus defectus Walker 1 l.

Dermestes vulpinus F.

Tenuicornes.

Ptenidium macrocephalum Nietner $\frac{1}{4}$ l.

Camptotrichis Motsch. n. g.

Trichoptilien intermédiaire entre *Ptinella* et *Acratrichis*, chez lequel le mésosternum est dépourvu de carénule et les coxes postérieures sont simples. Tête presque cachée dans le corselet. Antennes comme chez les Trichoptiliens, avec leur 1-er article grand et obconique le 2-d plus étroit et cylindrique, les autres allongés, le 11-me allongé-ovalaire. Corselet convexe, arrondi en avant, arqué et sinué à la base, avec les angles fortement prolongés sur les élytres. Ecusson petit. Elytres déprimées, carrées un peu plus courtes que l'abdomen. Ailes sans péduncule distinct et garnies de franges beaucoup plus courtes que chez les autres genres de la famille. Cuisse assez fortes, l'avant dernier article des tarsi aussi long que les précédents réunis, un peu bilobé, et garni de poils. Coxes postérieurs distants.

Camptotrichis subquadratus Nietner $\frac{1}{4}$ l. ☉ (Ptilium).

Micrus invisibilis Nietner $\frac{1}{5}$ l. ☉ (Trichopteryx).

Acratrichis immaturus Nietner $\frac{1}{3}$ l. ☉ (Trichopteryx).

— *cursitans* Nietner $\frac{2}{5}$ l. ☉ (Trichopteryx).

— *orientalis* Motsch. $\frac{1}{2}$ l. +

— *trapeziformis* Motsch. $\frac{1}{2}$ l. +

— *ceylonica* Motsch. $\frac{3}{5}$ l. +

Scaphidium saucineum Nietner Motsch.

Scaphisoma anale Motsch.

Ovale, convexum, nitidissimum, nigrum, capite, ore, antennis, thoracis lateribus vittaque media, elytrorum macula transversa sinuata basali cum altera apicali lateraliter conjuncta, corporis subtus margine et ano pedibusque rufotestaceis; thorace glabro, transverso, antice subarcuatim

angustato, angulis posticis fere rectis, scutello oblecto; elytris thoracis fere latitudine et dimidio longioribus, crebre punctatis, ad suturam unisulcatis, sulco utrinque punctato-striato.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Scaphisoma pictum Motsch.

Ovale, convexum, nitidissimum, testaceum, oculis, thoracis vittis duabus, elytrorum maculis suturali, elongata ad basin dilatata, ad apicem interrupta lateribusque medio quadratim dilatatis nigris, metothorace plus minusve nigropiceo; thorace ut in priori glabra; elytris punctatis, sutura unistriata, stria utrinque punctato-striato.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. vix $\frac{1}{2}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Scaphisoma obliquemaculatum Motsch.

Oblongo-subovatum, convexum, glaberrimum, nitidissimum, nigrum, ore, palpis antennis, fronte, pedibus, elytrorum macula obliquo-elliptica antice apiceque testaceis; thorace transverso, antice subangustato, angulis posticis subacutis; elytris thorace vix latioribus, parum attenuatis, utrinque ad suturam unistriatis; ano testaceo.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scaphicoma Motsch. n. g.

Scaphidien de forme allongée, qui rapelle un peu quelques *Anaspis*. Antennes capillaires, un peu plus lon-

gues que la tête et le corselet réunis, leur premier article long et gros, logé dans une rainure latérale audessous de l'oeil, le 2-d étroit et très petit, le 3-me cinq fois plus long que le 2-d, mais moitié plus court que le 1-er, le 4-me moitié plus long que le 3-me, le 5-me à peine plus court, le 6-me comme le 4-me, tous très grêles, 7 d'un quart plus court, plus gros, renflé au milieu et poilu comme les suivants, qui sont un peu plus allongés, mais pas renflés, le dernier ovalaire.

Palpes maxillaires allongés, avec leurs trois derniers articles très allongés, subégaux et dont le quatrième fortement subuliforme. Yeux allongés, étant antérieurement recouverts pas les antennes. Lobe médian du corselet, recouvrant l'écusson. Elytres plus du double plus longues que le corselet, faiblement atténuées en arrière et tronquées. Pattes longues et grêles, jambes lisses, sans poils et sans épines, les quatre tarsi postérieurs plus longs que les antérieurs, articles grêles très-allongés, le 1-er presque aussi long que les deux suivants réunis, le 4-me un peu plus court, le 5-me de la longueur du 3-me. Saillie mésosternale distincte. Abdomen composé de cinq segments.

Scaphicoma flavovittata Motsch.

Elongata, angustata, subattenuata, convexa, nitidissima, nigra, ore, palpis, antennarum basi, thoracis vittis duobus mediis pedibusque rufo-testaceis, thoracis lateribus elytris que medio longitudinaliter lato pallido-testaceis; capite oblongo-triangulari, convexo, oculis sublongis, vix prominulis, antice inflexis; thorace capite latiore, postice dilatato, trapeziforme, convexo, glabro, postice bisinuato, medio valde producto, scutello obducto, angulis posticis subacutis; elytris thoracis latitudine, punctatis, brevissime sub-

puberulis, ad suturam utrinque unistriatis, apice recto-truncatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l. Tab. IX, fig. 20.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Clavicornes.

Phaleria rufipes Walker $2\frac{1}{2}$ l.

Catopsimorphus ? flavicornis Motsch.

Elongato-ovatus, attenatus, subdepressus, subiliter crebre punctatissimus, subcinereo pubescens, infuscato - rufo - testaceus, antennis pallido-testaceis, his articulo ultimo breviter semiovato, apice acuminato; capite triangulari, subglabro, puberulo, oculis minutis; thorace capite latiore, trapezoidale, subtiliter scareficato - punctato, basi leviter bisinuato, angulis posticis subacutis, prominulis, anticis fere rectis; scutello transversim-triangulari; elytris thoracis latitudine, creberrime scarificato-punctatis, postice attenuatis, apice arcuato-subtruncatis, ad suturam utrinque stria profunda impressa; corpore subtus vix nitido, mesosterno valde carinato; in maris tarsis anticis articulis tribus primis dilatatis, mediis elongatis non dilatatis.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Globicornes,

Colastus plagiatipennis Motsch. 1 l. +

Carpophilus hemipterus L. $1\frac{1}{2}$ l. +

— ligatus Motsch. $1\frac{1}{6}$ l. +

— marginellus Motsch. $1\frac{1}{3}$ l. * +

Carpophilus strigipennis Motsch. 1 l. *

— *pilosellus* Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

— *castanopterus* ? Er. 1 l. *

Ecnomorphus fulvipes Motsch. $1\frac{1}{5}$ l. +

— *fuscus* Motsch.

Nitidulopsis aequalis Walker $1\frac{1}{4}$ l.

Epurea ? *parallelopipeda* Motsch.

Elongata, parallela, depressa, nitida, punctatissima, testaceo sparsim puberula, rufo-testacea, oculis nigris, mandibulis infuscatis, unidentatis; capite transverso, clypeo medio subelevato, inter antennas vix impresso, antennarum clava suboblonga, triarticulata, articulis transversis, ultimo apice acuminato; thorace capite latiore, transverso-quadrangulato, lateribus rectis, antice arcuatim subangustatis, angulis posticis fere rectis, prominulis; scutello triangulari, strigato-punctato; elytris thoracis latitudine et plus duplo longioribus, utrinque marginatis et reflectis, postice paulo attenuatis, apice arcuato-truncatis; corpore subtus punctato, abdominis segmentis tribus superantibus, punctatissimis, triangulariter acuminatis.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Forme du genre *Platychora*, mais avec les tarses antérieurs dilatés.

Epurea reflexicollis Motsch.

Elongata, antice subattenuata, depressa, punctatissima, nitida, tenuissime sparsim puberula rufo-testacea, oculis nigris, prominulis; capite triangulare, subtiliter punctulato, inter antennas transversim impresso, utrinque foveola magna; thorace transverso, crebre punctulato, antice arcuatim-

attenuato, angulis obtusis, lateribus arcuatis, marginatis, reflexis; scutello triangulare, subpunctulato; elytris thorace paulo latioribus et duplo longioribus, sparsim punctulatis, truncatis, lateribus marginatis, subreflexis, subarcuatis postice paulo attenuatis; corpore subtus nitido, fere glabro

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Colombo.

Voisine de notre *Ep. florea*, mais avec le corselet plus étroit, les élytres plus courtes et plus fortement tronquées.

Epurea angustula Motsch.

Angustata, elongata, parallela, subopaca, vix punctulata fere glabra, rufo-testacea, oculis nigris, modice prominulis; capite triangulari, inter antennis leviter impresso, fronte subtilissime punctulato; thorace quadrangulato, transverso, antice vix attenuato, angulis rectis, lateribus subparallelis, antice posticeque subarcuatis, marginatis, indistincto reflexis; elytris thoracis fere latitudine et plus duplo longioribus, parallelis, postice lato truncatis; corpore subtus subnitido, impunctato, fusco-testaceo.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

♀ *thoracis lateribus antice subattenuatis.*

Colombo.

Moitié plus petite, plus étroite et plus parallèle que notre *Ep. pygmaea*. Il y a dans les mêmes localités une autre espèce également allongée, très-voisine et à peine plus grande, mais chez laquelle le corselet et les

élytres sont assez distinctement ponctuées. Je l'ai nommée *Ep. opaca*.

Nitidula contegens Walker $1\frac{1}{2}$ l.

— *submaculata* Walker 1 l.

— *significans* Walker $\frac{3}{4}$ l.

— *intendens* Walker $\frac{2}{3}$ l.

Nitidula ? *tomentifera* Walker $1\frac{2}{3}$ l.

Prometopia quadrimaculata Motsch.

Ovata, depressa, punctata, puberula, nigro-picea, antennis, thoracis elytrorumque lateribus, his maculis quatuor in medio, corpore subtus pedibusque rufo-testaceis; capite triangulari, punctato, inter antennis transversim-impresso; thorace transverso, punctulato, linea media subimpressa, angulis anticis acutis, prominulis, posticis fere rectis; scutello subsemilunato, subtilissime punctulato; elytris thoracis latitudine, postice arcuatim-attenuatis, punctatis, cinereo sparsim puberulis; corpore subtus subtiliter punctulato.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. thor. $\frac{3}{4}$ l.

Colombo.

Pocadius subquadratus Motsch. $\frac{3}{4}$ l. *

Cametis Motsch. n. g.

Nitidulide pubescent, à forme un peu orbiculaire, médiocrement convexe, sans saillie prosternale en arrière des hanches antérieures. Sillons antennaires sous-ophthalmiques. Tête sans oreillettes. Menton simplement arqué et marginé en avant, couvert de poils épars. Langue cornée. Palpes labiaux terminées par un article un peu semiovalaire, largement tronqué en avant, aussi

grand que les précédents réunis. Palpes maxillaires assez courts et terminés par un article allongé-ovalaire étroit. Labre bilobé. Antennes plus longues que la tête, leur 1-er article grand, claviforme, le 2-d moitié plus étroit et le double plus court, assez gros et un peu allongé, le 3-ième très - allongé, moitié plus étroit que le 2-d mais pas plus court, 4—5, un peu allongés, surtout le 4-ième, 6—8 courts, transversaux, s'élargissant vers la massue, qui est grande, presque ronde et composée de trois articles très-transversaux, extrémité un peu échan-crée et tronquée obliquement. Corselet large, très trans-versal et trapézoïdal. Ecusson assez grand, triangulaire. Elytres un peu plus longues que larges, un peu atténuées en arc et arrondies en arrière, avec une frange de poils serrés sur les côtés latéraux et de longs poils épars, disposés en lignes, sur le dessus, indépendamment de la pubescence courte qui les recouvre en entier. Un segment de l'abdomen apparent par dessous les élytres. Pattes peu allongées, les quatre tarse antérieurs aux trois premiers articles fortement dilatés et spongieux en dessous; crochets simples, dilatés vers la base.

Cametis picea Motsch.

Ovata, subconvexa, creberrime punctatissima, puberula, nigro picea, palpis, antennarum basi, corpore subtus pedibusque rufo-testaceis; capite triangulâri, punctato, oculis prominulis, subconicis; thorace fere triplo latiore, valde transverso, punctato, antice angustato, postice utrinque subsinuato, lateribus vix arcuatis, marginatis, ciliatis, angulis anticis subrectis, apice obtusis, posticis suboblique truncatis, fere rotundatis; elytris thoracis basi latitudine, punctatis, rufo-testaceo puberulis, seriatim pilis longissime,

non erectis, vestitis; corpore subtus fortiter punctato, mesosterno dilatato, depresso, non producto.

Long. 2 l. — lat. $1\frac{1}{5}$ l. Tab. IX, fig. 21.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Pria pallida F. $\frac{1}{2}$ l. *

Aethina? longipennis Motsch. $1\frac{1}{4}$ l. * (Carpophilus).

Meligethes respondens Walker $1\frac{1}{2}$ l.

— *orientalis* Nietn. 1 l.

Meligethes? politus Motsch.

Elongato-quadrangulatus, convexus, punctatus, nitidissimus, fere politus, rufo-testaceus, elytris fusco-aeneis, ad marginis dilutioribus, oculis nigris, capite triangulari, subtiliter sparsim punctato; thorace capite latiore, transverso, sparsim punctulato, antice vix angustato, lateribus marginalis, fere rectis, antice subarcuatis, angulis anticis subobtusis, posticis rectis; scutello triangulari, apice infuscato; elytris thoracis fere latitudine et duplo longioribus, sparsim punctatis, postice paulo attenuatis; tibiis dilatatis, anticis non dentatis, mediis ongulatis, postice subcrenulatis.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Il ne faut pas confondre cet insecte avec le *Mel. ruficollis* m. aussi des Indes, qui est quatre fois plus grand, moins luisant et présente les élytres noires.

Camptodes ornatus Motsch.

Suborbicularis, convexus, nitidus, punctulatus, niger, ore, palpis, antennarum basi, corpore subtus pedibusque

rufo-testaceis, fronte, thoracis marginis lato, macula rotundata utrinque in medio excepta, scutello antice elytrorumque maculis duabus rubris; capite subtransverso, sparsim punctulato, medio leviter impresso, antice subproducto, antennarum clava elongata, nigra, articulo ultimo elongato-conico, apice testaceo; thorace capite triplo latiore, subtilissime punctulato, antice semilunato, medio profundo excisopostice sub scutello paulo lametliforme-producto, angulis posticis rectis; scutello magno, arcuatim triangulari, punctato; elytris thoracis latitudine sed duplo longioribus, subhemisphaericis, subtiliter punctato-substriatis, interstitiis punctulatis; corpore subtus sparsim punctulato.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cryptarcha Rajah Motsch.

Subelongato-ovata, subconvexa, punctulata, vix nitida, cinereo puberula, sordide rufo-testacea, mandibulis apice, fronte, oculis, thoracis maculis tribus elytrorumque fasciis duabus sinuatis lateraliter abbreviatis, nigris; capite transverso, antice arcuato, oculis minutis vix productis; thorace capite latiore, transverso, subconvexo, puncto, antice arcuatim attenuato, postice leviter bisinuato, angulis posticis fere rectis, prominulis; scutello vix distincto, triangulare; elytris thoracis latitudine, subrugoso-punctatis cinereo puberulis, pilis longioribus adspersis, fasciis nigris ad suturam interruptis, postica utrinque fere in macula oblitterata; corpore subtus punctato, tarsis omnis dilatatis; mandibula sinistra brevi.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l

Colombo.

Sphaeridium tricolor Walker $1\frac{3}{4}$ l.

Trichopoda lineolata Motsch. (Cercyon).

Elongato - ellyptica, subconvexa, subnitida, densissime punctulata, nigro fusca, palpis, antennarum basi, thoracis elytrorumque lateribus, his striolis anyustissimis longitudinaliter, abdominis segmentis medio pedibusque sordido-testaceis; capite subquadrato, subconvexo, dense punctulato, fronte medio leviter foveolato; thorace capite dimidio latiore, transverso, dense punctulato, paulo trapeziforme, lateribus vix arcuatis, fere rectis, angulis subrectis; elytris thorace latitudine, ovatis, subconvexis, densissime punctulatis, angustissime testaceo lineatis, interstitiis profundo punctato-striatis; corpore subtus lateraliter opaco, metathoracis medio hexacono subelevato, nitido, punctulato.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia

Par son limbe autour du corps testacé, voisin du *C. praelectatum* S.

Cercyon lunigerum Motsch.

Ovatum, postice subattenuatum, convexum, nitidum, punctatissimum, rufo-testaceum, ore, palpis, antennarum basi, elytrorum apice pedibusque dilutioribus, capite, elytrorum lunula transversa medio suturaque plus minusve nigris; capite subquadrato, punctulato; thorace capite latiore, punctato, transverso, antice arcuatim angustato, angulis posticis rectis; scutello minuto, oblongo; elytris thorace vix latioribus, ovatis, convexis, punctatis, profundo striato-punctatis; corpore subtus lateraliter opaco, metathoracis medio pentagono subelevato, nitido, sparsim punctulato.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cercyon nigriceps Motsch.

Oblongo-ovatum, postice vix attenuatum, convexum, nitidum, subtilissime punctatissimum, rufo-testaceum; capite nigro, subrotundato, punctulato; thorace capite latiore, transverso, convexo, subtiliter punctulato, lateribus arcuatis, angulis fere rectis, retractis; scutello minuto, triangularem; elytris thoracis latitudine, ovatis, punctulatis, tenue punctato-striatis; corporis medio subtus nigro-piceo.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Cercyon ? rufo-testaceum Motsch.

Ellypticum, subconvexum, nitidum, rufo-brunneum, oculis nigris, prominulis; capite subtriangulare, fere glabro; thorace capite latiore, transverso, trapezoidale, glabro, lateribus subarcuatis, angulis anticis obtusis, posticis subacutis; scutello triangularem; elytris thoracis latitudine, semiovatis, profundo fortiter punctato striatis; corpore subtus opaco, metathoracis medio punctato, subnitido, pentagono subelevato, mesosterno vix elevato.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Cercyon ? hydrophiloides Motsch.

Elongato-ovatum, convexum, nitidum, punctatum, pallidum, capite supra et subtus nigro, ore, palpis, antennarum basi pedibusque dilutioribus, oculis griseis, vix prominulis; capite subquadrato, punctulato, inter antennis subinaequale; thorace capite paulo latiore, transverso, puncta-

to, antice arcuatim angustato, angulis posticis rectis, lateribus vix arcuatis; scutello minuto, oblongo; elytris thorace leviter latioribus, ovatis, profundo striatis, striis punctatis, interstitiis sparsim punctatis; corpore subtus subopaco, metathoracis medio subconvexo, subrotundato, nitido, vix punctulato, mesosterno breve, subdepresso.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Forme, couleurs et sculpture rapellant un peu les *Berosus*.

Cercyon vicinale Walker $\frac{1}{2}$ l.

Pachysternum Motsch. n. g.

Sphaeridien à mésosternum très-large, triangulaire, avance en angle vers le prosternum, qui est applati, quadrangulaire avec une saillie bilobée pour recevoir la pointe du mésosternum. Forme ovalaire atténuée des *Cryptopleurum*, mais avec les jambes antérieures échanerées sur leur face extérieure et distinctement dentées antérieurement, spinulées postérieurement, épine apicale longue et forte. Menton transversal. sinué au milieu. Palpes maxillaires pas plus longs que la tête, 2-d article claviforme, élargi, 3 et 4-e moitié plus étroits, grêles, mais presque pas plus courts, surtout le dernier, qui est un peu claviforme. Antennes composées de dix articles, dont le 1-ier gros, claviforme et un peu arqué, le 2-d un peu plus étroit et trois fois plus court, presque carré et un peu atténué en avant, 3-ième de la longueur de second, mais moitié plus étroit, cylindrique, 4-ième moitié plus court que le 2-d, un peu plus lar-

ge que le 3-ième, obconique, 5-ième encore plus court, transversal, 6-ième très transversal. annexé à la massue, qui est compacte, ovalaire. de quatre articles, dont le dernier cupuliforme, arrondi, distinctement implanté sur l'avant dernier. Premier article des tarsez postérieurs peu allongé, à peine plus long et plus étroit que le 2-d, celui-ci un peu plus long et plus étroit que le 3-ième et ainsi de suite jusqu'au 5-ième, qui est le plus étroit et le plus long de tous et armé de deux long poils à l'extrémité, les articles précédents sont garnis sur leurs bords latéraux d'épines obliques très - serrées; crochets simples, peu courbés. Ecusson distinct, en triangle allongé. Le dessous du corps moins opaque que chez les *Cercyon* et la place lisse au milieu du métathorax peu déterminée. Bords latéraux du corselet distinctement marginés et tranchants comme chez les *Cercyon*.

Pachysternum nigrovittatum Motsch.

Breviter - ovatum, postice valde attenuatum, convexum, nitidum, rufo-testaceum, corpore subtus, antennarum clavo, oculis, capite antice et lateraliter, thoracis macula trifida media, elytrorum utrinque vittis tribus, postice obliterated suturaque nigris, ore palpisque pallidis; capite triangulari, glabro, oculis vix prominulis; thorace capite latiore, valde transverso, convexo, nitido sparsim subtiliter punctulato, antice arcuatim attenuato, lateribus subcurvatis, angulis posticis subrectis, vix prominulis; elytris thorace latioribus, convexis, postice subconico attenuatis, glabris, striatis, striis in fundo punctatis, 5-a ad basin divergentia, 6—9 antice et postice obliterated; corpore subtus punctulato.

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{5}$ l. — Tab. IX, fig. 22.

Montagne de Nura - Ellia et sur le continent indien, où il y en a encore une seconde espèce (*P. apicatum* m.) moitié plus grande, noire, avec l'extrémité des élytres d'un test blanchâtre, les tarses et les jambes d'un test roussâtre.

Cryptopleurum sulcatum Motsch.

Breviter - ovatum fere rotundatum, subconvexum, vix nitidum, subtiliter punctulatum, nigro-piceum, ore, palpis, antennis, ano pedibusque rufo-testaceis; capite subtriangulare, opaco inter oculos transversim impresso, fronte subdeplanato; thorace capite latiore, transverso, irregulariter sparsim punctulato, antice arcuatim angustato, basi ampliato, utrinque subsinuato, angulis posticis subrectis, prominulis; elytris thorace latioribus, breviter semi ovatis, profundo sulcatis, sulcis crenulato-punctatis, humeris distinctis, lateribus antice paulo parallelis; corpore subtus subopaco, punctato, abdomine nitidiore.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l. .

Montagnes de Nura-Ellia et sur le continent indien. Une seconde espèce de cette dernière contrée (*Cr. ferrugineum* m.) ressemble extrêmement à notre *atomarium*, mais étant un peu plus courte et plus large, elle présente une couleur ferrugineuse surtout sur les élytres. C'est ici que doit être placé un nouveau genre *Crypteuna* de l'Amérique, que j'ai formé du *Cryptopleurus aequinoxialis*, mentionné dans mes Etudes entomologiques 1855 sur p. 20. Il diffère des *Cryptopleurus* et des *Cercyon*, par son mésosternum ovalaire, aplatie et concave au milieu, et par ses élytres fortement sillonnées.

Abraeus granosus Motsch.

Orbicularis, subglobosus, subopacus, punctatissimus vel subtiliter crebre cicatricosus, pilis subalbis sparsim adspersus, niger, antennarum clava oblonga tarsis piceis, oculis cinereis, prominulis; capite suboblongo, utrinque versus antennarum insertione subinflexo, supra oculos paulo elevato; thorace capite duplo latiore, valde transverso, punctatissimo, basi linea punctorum transversa impresso, lateribus antice rotundato-attenuatis, angulis posticis acutis, spiniforme productis; elytris ad basin thorace angustioribus, medio subdilatis, postice rotundatis, pygidio subobtectis, granulato-vel rugoso-punctatissimis, striis basalibus vix distinctis, interruptis, stria suturali nulla; corpore subtus punctato; tibiis anticis subdilatis apice subsinuatis.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Dendrophilus finitimus Walker.

Saprinus semipunctatis F. $3\frac{1}{2}$ l.

Hister femoralis Motsch.

Ovalis, subconvexus, nitidus, niger, antennis, femoribus intus, tibiis infra tarsisque rufo-testaceis vel piceis; capite subtriangulari, fronte simplici, subconvexo, subtiliter sparsim punctulato, antice vix impresso, stria antica medio angulatim inflexo, clypeo triangulariter subprominulo, mandibulis validis, latis, labro transverso; thorace capite plus duplo latiore, dense subtiliter punctulato, nitido, antice exciso, linea transversa impresso, postice subarcuato, vix sinuato, margine grosso punctato, linea laterali in medio distincta, antice in foveola magna, grosso punctata termina-

ta, postice abbreviata, lateribus obliquis, antice arcuato-angustatis, postice subdilatis, angulis anticis prominulis, subrectis, posticis subobtusis; elytris ad basin thoracis latitudine, in medio paulo dilatatis, apice attenuatis, subtilissime punctulatis, striis profundo impressis, punctatis, 1—3 integris, haec apice arcuata, 4-o postice subobliterata, 5 et 6 abbreviatis, medio paulo superantibus, postice subobliteratis, fossa marginali unisulcata, sulco punctato; pygidio subtiliter punctulato, nitido, antice punctis majoribus adpersis; corpore subtus subtilissime punctulato; mesosterno obliquo marginato, tibiis anticis depressis, subdilatis, longitudinaliter unicarinatis, sexdenticulatis, mediis sexspinosus, posticis biseriatim spinulosus.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une des plus petits espèces du genre, qui doit être placée dans le voisinage du *H. bifrons* de Marseul № 116.

Hister encaustus de Marseul $2\frac{1}{2}$ l

— *mundissimus* Walker $3\frac{1}{2}$ l.

— *bengalensis* Wiedm. $6\frac{1}{2}$ l.

Pactolinus bipustulatus F. $2\frac{1}{3}$ l.

— *orientalis* Payk. $2\frac{2}{3}$ l.

Platysoma subquadratum Motsch.

Oblongo-subquadratum, postice paulo attenuatum, subdepressum, nitidum, nigrum, antennarum clava fusco-grisea, maxillis rufo-testaceis; fronte concava, subtiliter punctulata, linea transversa recta, clypeo antice arcuatim

exciso, marginato, labro transverso inflexo, punctato, fere subbilobo; thorace subtransverso, glabro, subconvexo, antice vix angustato, lateribus subarcuatis, angulis posticis subrectis, stria marginali antice in medio lato interrupto; elytris ad basin thoracis latitudine, postice arcuatim attenuatis, apice truncatis, striis dorsalibus 1—3 integris 4—6 rudimentis postice distinctis; pygidio grosso sparsim punctato, fere foveolato, margine valde reflexo; corpore subtilus medio fere glabro, lateribus profundo strigato-punctatis, mesosterno linea media integra; tibiis omnis quadri-dentatis.

Long. 3 l. — lat. $1\frac{3}{5}$ l.

Colombo.

Platysoma dissimile Motsch.

Oblongo - subquadratum, postice attenuatum, subconvexum, nitidissimum, nigrum, antennis pedibusque piceis, clava fusco-grisea; fronte excavato, vix punctulato, linea transversa recta, labro transverso, nitido, fere glabro; thorace convexo, subtransverso, glabro, antice utrinque subimpresso, linea marginale medio late interrupta, angulis anticis valde productis, subobtusis, posticis rectis, lateribus vix arcuatis, antice rotundatis; elytris thoracis latitudine et paulo longioribus, postice attenuatis, striis dorsalibus 1—3 integris, 4—6 antice dimidio abbreviatis, 5-a paulo breviora; pygidio grosso - punctato, margine valde reflexo; corpore subtilus in medio glabro, lateribus grosso-punctatis, mesosterno linea media integra; tibiis anticis quadri-, mediis et posticis tridentatis.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. thor. $1\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia. Très-facile à reconnai-

tre par sa forme atténuée et les trois stries subsuturales, raccourcies seulement à la moitié de leur longueur.

Platysoma ceylonicum Motsch.

Oblongo-subquadratum, postice vix attenuatum, subdepressum, nitidissimum, nigrum, antennis subrufo-testaceis, pedibus piceis; fronte subexcavata, impunctata, linea transversa utrinque sinuata, medio subangulata, labro valde transverso, distincte bilobo, thorace subconvexo, subtransverso, glabro, antice paulo angustato, linea marginali medio late interrupta, angulis anticis modice productis, apice subrectis, posticis rectis, lateribus subparallelis, antice rotundatis; elytris thoracis latitudine et dimidio longioribus, striis dorsalibus 1—3 integris, 4 et 5 rudimentis postice valde abbreviatis, 6-a nulla; pygidio grosso-punctato, nitido, margine reflexo; corpore subtus in medio glabro, lateribus grosso-punctatis, mesosterno linea medio interrupta; tibiis omnis acute quadridentatis, anticis longitudinaliter curvato-carinalis.

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{6}$ l.

Montagnes de Nura- Ellia.

C'est probablement à cette espèce qu'il faut rapporter la *Pl. atratum?* Er., que M. Walker a énuméré comme espèce ceylanaise et qui est plus grande.

Platysoma desinens Walker $1\frac{3}{4}$ l.

— *restoratum* Walker $1\frac{3}{4}$ l.

Platysoma semistriatum Motsch.

Oblongo-subquadratum, postice vix attenuatum, subconvexum, nitidissimum, nigrum, antennis, abdominis segmentis

pedibusque rufo - piceis, palpis maxillisque rufo - testaceis; fronte valde excavato, impunctata, stria transversa recta, labro transverso, concavo nitido, glabro; thorace subconvexo, glaberrimo, stria marginali antice integra, ambiente, utrinque subimpresso, angulis anticis, modice prominulis, arcuatis, apice rectis, posticis rectis, subproductis, lateribus parallelis postice paulo dilatatis; elytris thoracis latitudine et dimidio longioribus, postice arcuatim subattenuatis, subangulatim truncatis, striis dorsalibus 1—3, 4—6 antice dimidio abbreviatis, 5-a paulo breviora; pygidio segmentis duabus grosso-punctatis, tertio paulo superante; corpore subtus in medio glabro, lateraliter rugoso-punctato, opaco, mesosterno linea media integra; tibiis anticis et mediis distincto tri-, postici bidentatis.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. 1 l.

Colombo.

Structure très voisine de la *Pl. carolinum*, mais d'un tiers plus grand et de forme plus allongée et plus convexe.

Platysoma inapertum Motsch.

Oblongo-subquadratum, postice attenuatum, subdepressum nitidissimum, nigrum, antennis pedibusque nigro-piceis; fronte subexcavato, subtilissime punctulato, linea transversa profundo impressa, vix sinuata, utrinque angulatim inflexa; thorace subtransverso, subconvexo, glabro, antice paulo angustato, linea marginali medio interrupta, angulis anticis productis, posticis rectis, lateribus vix arcuatis; elytris thorace fere angustioribus et paulo longioribus, postice valde attenuatis, 1—3 integris, 4 et 5 rudimentis postice valde abbreviatis, 6-a nulla; pygidio grosso-, propy-

gidio sparsim punctatis; mesosterno linea fere oblitterata, vix distincta; tibiis anticis distincto 4, mediis 3 et posticis 2 dentatis.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. thor. $\frac{5}{6}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Par sa structure très-voisine de la *Pl. ceylanicum*, mais d'un tiers plus petite, plus atténuée en arrière et plus courte.

Platysma quinquestriatum Motsch.

Elongato subquadratum, subdepressum, nitidissimum, nigrum, antennis pedibusque rufo-piceis; fronte subexcavato, linea transversa recta, utrinque angulatim inflexa; thorace subtransverso, quadrangulato, glabro, linea marginali medio late interrupta, angulis anticis vix prominulis. posticis rectis, lateribus parallelis, antice rotundatis; elytris thorace fere angustioribus et $\frac{1}{3}$ longioribus, postice arcuatim attenuatis, apice truncatis, striis dorsalibus 1—3 integris, 4 et 5 antice dimidio abbreviatis, 6-0 nulla; pygidio et propygidio antice grosso punctatis, postice glaberrimis, hoc linea transversa sinuata impresso; corpore subtus in medio fere glabro, lateraliter profundo oblique-strigato; mesosterno antice sinuato, linea media nulla, prosterno antice subdilato; tibiis anticis et mediis distincto 4, posticis 2 dentatis, his dente apicali bifido.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. thor. $\frac{5}{6}$ l.

Colombo.

Platysma decemstriatum Motsch.

Elongatum, parallelum, subdepressum, nitidissimum, nigrum, antennis pedibusque rufo-piceis; fronte subexcavata,

impunctata, linea transversa, medio subprominula, sulcifforme valde impressa, lateraliter obliterata; thorace subtransverso, quadrangulato, glabro, linea marginali integra, angulis rectis, anticis intus prominulis, lateribus parallelis, antice rotundatis; elytris thoracis latitudine et dimidio longioribus, striis dorsalibus 1—3 integris, 2-do et 4-a antice paulo, 5 tertia parte abbreviatis, 6-a nulla; abdomine modice producto, pygidio verticali, glabro, antice utrinque fossula valida oblonga profundo impressa, propygidio antice inaequaliter punctato, postice glabro; corpore subtus medio glabro, lateraliter sparsim inaequale punctato, mesosterno antice valde sinuato, marginato, linea media distincta, antice obliterata, prosterno postice dilatato; tibiis anticis et mediis 5 posticis 3 dentatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Elle ressemble un peu à notre *Pl. oblongum*, mais elle est presque de moitié plus petite, moins convexe et une véritable *Platysoma*.

Platysoma minutum Motsch.

Elongatum, quadrangulatum, parallelum, depressum, nitidissimum, nigrum; fronte subexcavata, impunctata, linea transversa subarcuata, profunda, lateraliter obliterata; thorace transverso, glabro, antice leviter attenuato, linea marginali antice integra, angulis rectis, anticis vix prominulis, lateribus subobliquis, antice rotundatis; elytris thoracis latitudine et duplo fere longioribus, parallelis, striis dorsalibus 1—3 integris, 4 et 5 antice $\frac{2}{3}$ abbreviatis, 6 a nulla; pygidio glabro, antice profundo bifo-

veolato, propygidio inaequaliter punctato; corpore subtus glabro, lateraliter sparsim punctato, mesosterno antice sinuato, marginato, linea media distincta, subintegra; prosterno fere parallelo; tibiis anticis 4, mediis 3, posticis 1 dentatis, dente bifido.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Paromalus ceylanicus Motsch.

Planiusculus, ovatus, postice vix arcuatim-attenuatus, nitidissimus punctulatus, niger, antennis pedibusque nigropiceis; fronte convexa, undique marginata, clypeo medio subsinuato; thorace transverso, antice attenuato, linea marginali antice integra, angulis anticis subrectis, productis, posticis rectis, lateribus vix arcuatis; elytris thoracis latitudine et dimidio longioribus, apice paulo truncatis, sutura laevigata, striis dorsalibus interruptis, laterali 1 postice distincta, altera rudimentaria antice; propygidio subtilissime punctulato, pygidio glabro, antice suboblique bifosulato; corpore subtus medio punctulato, lateraliter glabro, prosterno linea elliptica antice posticeque interrupta; tibiis anticis dilatatis 4 dentatis, mediis 4, posticis 2 spinosis

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Voisin du *P. oceanitis* Marseul, mais plus grand avec une longue strie latérale postérieurement et un rudiment très-court, oblique vers l'angle huméral, un troisième rudiment antérieur, un peu plus près du milieu des élytres, n'est marqué que par une raie de points.

Lamellicornes.

Scarabaeus indicus Motsch. { *Ovatus, subconvexus,*
 Ateuchus sacer L. Walker? { *vix nitidus, niger, cor-*
pore fusco-piloso; clypeo sexdentato, rugoso-tuberculato,
fronte transversim subcarinata, medio carina interrupta,
plana, non bituberculata; thorace transverso, convexo, sub-
tiliter tuberculifero non punctato; elytris thorace paulo la-
tioribus, subdilatis, impunctatis, tenuissime striatis, strüs
saepe oblitteratis; corpore subtus sparsim punctato, latera-
liter sparsim tuberculato, pygidio fere glabro, subilissime
sparsim tuberculato; pedibus brunneo villosis, tibiis anticis
valido quadridentatis.

Long. $12\frac{1}{2}$ l. — lat. $7\frac{3}{4}$ l.

Colombo.

Cette espèce ressemble beaucoup au *Sc. sacer* L. de Barbarie, mais on le reconnaît tout de suite par les tubercules qui chez le premier remplacent la ponctuation sur le corselet, par l'absence des deux proéminences corniformes sur le milieu du front, les jambes postérieures plus allongées et plus arquées, etc. Le *Sc. braminus* Illiger est plus petit, avec une tuberculose plus serrée, un tubercule sur le milieu du front, les élytres distinctement striées, etc.

Gymnopleurus smaragdifer Walker 7 l.

— *Königii* F. 4 l.

Sisyphus prominens Walker $3\frac{1}{2}$ l.

— *setosulus* Walker 3 l.

— *subsicens* Walker 2 l.

Onthophagus bonasus Oliv. 6 l.

- Ontho- { centricornis F.
phagus { cervicornis Walker.
- gravis Walker $3\frac{1}{2}$ l.
 - moerens Walker 3 l.
 - turbatus Walker 3 l.
 - difficilis Walker 3 l.
 - prolixus Walker 3 l.
 - negligens Walker $2\frac{1}{2}$ l.
 - pusillus F. $1\frac{4}{5}$ l. *
 - lugens Walker $1\frac{1}{3}$ l.
 - fuscopunctatus F. $1\frac{1}{3}$ l. *

Onthophagus rugosiceps Motsch.

Minutus, ovatus, subdepressus, granulate-punctatissimus, sparsim setulosus, nigro-fuscus, ore, antennis pedibusque piceis, capite grosso granulato-punctato, fronte medio pentagono subelevato, plano, grosso punctato, clypeo arcuato, reflexo, antice triangulariter exciso, thorace transverso, arcuato, convexo, crebre tuberculato et setuloso, angulis anticis productis, posticis obtusis, lateribus arcuatis; elytris thorace paulo latioribus et vix longioribus, cancellato-striatis, striis biserialim setulosis; corpore subtus medio sparsim grosso punctato et setuloso, abdomine glabro, marginis setulosis, pygidio nitido sparsim grosso punctato fere foveolato.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Colombo.

Forme et taille de la ♀ du *Onth. minutus* m. Etud. ent. 1858. p. 52, mais différant par sa granulation et ponctuation très-forte sur le corselet et la tête, ainsi que par la structure du front, la couleur des elytres, etc.

Onthophagus setulosus Motsch.

Minutus, ovatus, subconvexus, nitidus, grosso-punctatus, sparsim seriato-testaceo-setulosus, nigro-piceus, antennis, palpis, tibiis tarsisque plus minusve rufo-testaceis; capite subtransverso, subaeneo, clypeo triangulari, reflexo, antice subrugoso, quadripunctato, fronte postice subexcavato, punctis magnis in lineis duabus longitudinali dispositis, antice carina transversa, arcuata subelevata; thorace transverso, arcuato, grosso punctato, valde sparsim setoso, angulis rectis, anticis prominulis, lateribus vix arcuatis; elytris thorace paulo latoribus, sed non longioribus, semi-lunatis, leviter striatis, interstitiis punctis setisque magnis, sparsis, seria una; corpore subtus medio pygidioque sparsim, mesosterno antice marginisque segmentorum dense grosso-punctatis.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Colombo.

Par son corps luisant, parsemé de gros points ou fovéoles imprimés et de gros cils épars, cette espèce se distingue facilement de toutes ses congénères.

Onthophagus rufipennis Motsch. 1 l. *

Onitis Philemon F.

Drepanocerus taprobanae Westw. Walker.

Ixodina setosa Motsch.

Elongato-ovata, supra valde depressa, opaca, punctata, setosa, nigro-fusca, pedibus rufo-piceis, antennis palpisque rufo-testaceis; capite hexagono, supra plano, marginato, reflexo, antice subexcavato, obtuso bidentato, postice cur-

vato-carinato, medio carinulis subdivaricatis duabus longitudinaliter subelevatis; thorace transverso, densissime scrobiculato-punctato, medio longitudinali excavato, utrinque lato impresso, setulis obtusis, sordido testaceis, erecto adperso; elytris thoracis latitudine et vix longioribus, impunctatis, opacis, 5 striatis, interstitiis alternis suturaque elevatis, lateribus apiceque fasciculato-setosis; scutello minuto sed distincto, oblongo, apice acuminato; corpore subtus medio femoribusque densissime scrobiculatis, segmentis subtilissime granuloso-rugosis, pygidio triangulari, inaequali, medio longitudinali subcarinato, apice marginato, ante marginem bifasciculato-setoso; tibiis anticis subdilatatis, tridentatis, mediis et posticis simplicibus, subsetosis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat $\frac{4}{5}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Trox inclusus Walk. 5 l.

— *cornutus* F. Walk.

Copris ? *sagax* Quens. Walk.

— ? *capucinus* F. Walk.

— ? *pirmal* ? F. Walk.

— ? *repertus* Walk. 8 l.

— ? *cribricollis* Walk. 7 l.

— ? *sodalis* Walk. $5\frac{1}{2}$ l.

— ? *signatus* Walk. $4\frac{1}{2}$ l.

— ? *diminutivus* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

Aphodius robustus Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

— *mutans* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

— *dynastoides* Walk. $2\frac{1}{4}$ l.

— *pallidicornis* Walk. 2 l.

— *sequens* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

Liothorax piceoniger Motsch.

Elongato-ovatus, fere parallelus, subconvexus, nigro-subpiceus, capitis, thoracis segmentorumque abdominis marginis, palpis, antennis tarsisque rufo-testaceis, pedibus piceis, capite fere semilunato, subtiliter punctato, postice glabro, fronte inter oculos transversim sinuato-impreso, clypeo subconvexo, antice marginato, reflexo, tuberculis nullis; thorace capite paulo latiore, transverso, sparsim punctato, antice vix angustato, angulis subrectis; collo crebre scrobiculato-punctato; scutello triangulari; elytris thoracis latitudine, plus duplo longioribus, striato-punctatis, postice arcuato-subattenuatis; corpore subtus medio fere glabro, nitido, marginaliter coriaceo, opaco, mesosterno tenuissime granulato, lateraliter punctato, medio linea impressa, metathorace medio deplanato, linea longitudinali impressa, abdominis segmentis antice punctatis, ano subtestaceo.

Long. 2 l. — lat. $\frac{5}{6}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Un peu plus court et plus ovalaire que notre *Lioth. niger* Ill.

Phalacronothus carinulatus Motsch.

Elongato-ovatus, subconvexus, vix nitidus, subtilissime punctatus, brunneus, ore, palpis, antennis, capitis thoracisque marginis, elytrorum humeris, pectore pedibusque rufo-testaceis, oculis magnis, planiusculis, nigris; capite transverso, punctulato, clypeo marginato, reflexo, antice subsinuato; thorace transverso, sparsim inaequaliter punctulato, angulis obtusis, vix prominulis, lateribus subarcuatis; scutello elongato-triangulari, plano; elytris subova-

tis, postice arcuatim attenuatis, subcrenato-striatis, interstitiis convexis, subelevatis; corpore subtus medio nidido, metasterno inflexo, longitudinaliter unilineato, sparsim punctulato, mesosterno, opaco, coriaceo-punctato, postice carinulato; tarsorum articulo 1-o cylindrico, longitudine tribus sequentibus conjunctis fere aequale.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Colombo.

Mesontoplatys Motsch. n. g.

Aphodiide à écusson petit, allongé, triangulaire et un peu convexe. Épines ou cils à l'extrémité des jambes postérieures inégales. Front sans tubercules Chaperon fortement échancré en avant, comme bilobé. Corps lisse, luisant, sans pubescence. Corselet très-étroitement marginé en arrière, angles obtus mais distincts. Méso-sternum simple, sans carène longitudinale. Stries sur les élytres fines, ponctuées, intervalles très-planes. Premier article des tarsi postérieurs pas plus long que les deux suivants réunis.

Mesontoplatys rufolaterus Motsch.

Elongato-ellipticus, subparallelus, subconvexus, nitidissimus, rufo-testaceus, capitis thoracisque medio maculaque magna triangulari elytrorum ad scutellum et suturam nigropiceis, palpis antennisque subpallidis; capite transverso, sparsim subtilissime punctulato, fronte linea subsinuata transverso impressa, clypeo marginato, reflexo, antice subbilobo; thorace subtransverso, subtiliter sparsim punctulato, antice paulo angustato, angulis obtusis, lateribus fere rectis; scutello triangulari, subconvexo, nitido; elytris thora-

cis latitudine et dimidio longioribus, postice paulo arcuatim attenuatis, tenue punctato-striatis, interstitiis planiusculis, subtilissime sparsim punctulatis; corpore subtus nitido, medio sparsim subtiliter, ad lateribus grosso-punctato; metasterno subdepresso, linea media vix distincta, mesosterno subopaco, medio nitido, linea impressa.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l. Tab. IX, fig. 23.

Colombo.

Acrossus priscus Motsch. 2 l. ?

— *moestus* F. $2\frac{1}{3}$ l. *

Cylindropterus Motsch. n. g.

Psammodiide à jambes intermédiaires tridentées et avec cinq segments abdominaux, dont le premier est en partie caché sous les hanches et le métathorax. Parties de la bouche, autant que je les ai pu examiner, comme ceux des *Pleurophorus*; chaperon de la tête plus large et plus incliné en avant, (fig. 24) étant simplement sinué au milieu. Yeux pas visibles en dessus. Tête dilatée en angle postérieurement. Corselet et élytres comme parallèles, comme chez les *Pleurophorus*. Prosternum avancé un peu en corne au devant des hanches antérieurs, qui sont contiguës, aplani et arrondi en arrière où le mésosternum occupe un large espace et s'aminuit en saillie cariniforme entre les hanches intermédiaires, touchant le métasternum, qui se dilate triangulairement en arrière, étant luisant et marqué, au milieu, d'une ligne longitudinale fortement imprimée. Segments abdominaux cornés, un peu convexes, arqués concavement et marqués chacun d'une série de points serrés à sa

partie antérieure. Pygidium tout-à-fait caché dans les élytres. Cuisses ovalaires, jambes antérieures un peu dilatées et tridentées, les intermédiaires en triangle allongé, avec trois dents aiguës, qui paraissent indiquer le commencement de carénules transversales, comme chez les Géotrupides, les postérieurs avec des dents semblables; premier article des tarse pas plus court que les deux suivants réunis et que les éperons.

Cylindropterus pleurophoroides Motsch.

Elongatus, subcylindricus, nitidus, punctatus, niger, capitis margine pedibusque rufo-piceis, antennis rufo-testaceis; capite transverso, convexo, sparsim grosso punctato, leviter marginato, antice inflexo, subsinuato; thorace transverso, capite vix latiore, sparsim grosso-punctato, postice fere angustato, angulis rectis, apice obtusis, posticis subproductis, lateribus antice subarcuatis, postice ad angulos subsinuatis; scutello minuto elongato-triangulari, subconvexo, glabro; elytris thoracis latitudine et fere triplo longioribus, parallelis, profundo striatis, striis grosso punctatis, interstitiis planiusculis, glabris; corpore subtus medio glabro, nitido, lateraliter punctato.

Long. 2 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l. Tab. IX, fig. 24.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Pleurophorus cracens Motsch.

Elongatus, subcylindricus, punctatus, subnitidus, nigropiceus, palpis, antennis capitis elytrorumque marginis subtus, pedibusque rufo-testaceis; capite transverso, convexo, lateraliter rugoso-punctata, postice linea transversa impressa, medio in ♂ subelevato, clypeo late marginato, rufes-

cente, antice subbilobo exciso, reflexo; thorace transverso, sparsim grosso-punctato, subinaequale, transversim impresso, postice sulco medio longitudinali impresso, angulis obtusis, anticis, prominulis, posticis subrectis, lateribus vix arcuatis, antice leviter dilatatis; scutello triangulari, impunctato; elytris thorace fere angustioribus, sed plus duplo longioribus, profundo crenato-striatis, interstitiis angustioribus, subelevatis; corpore subtus fere glabro, metathoracis medio nitido, marginato, linea longitudinali valde impressa.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Colombo.

Voisin de notre *Pl. caesus*, mais presque du double plus petit, de couleur plus brunâtre et avec les intervalles des stries sur les élytres plus étroits et plus convexes.

Psammodyus inscitus Walk. $1\frac{1}{4}$ l.

Rhyssemus granosus Motsch

Elongatus, subcylindricus, vix nitidus, punctatus, niger, palpis, antennis pedibusque rufescentibus; capite transverso, rugoso, fronte tuberculo medio ocellisque quatuor postice nitidis, clypeo marginato, antice triangulariter sinuato; thorace transverso, sex-carinato, carinis nitidis, 4-a postice medio hamata, interstitiis rugoso-punctatis, apicis, angulis posticis rotundatis, anticis subrectis, prominulis, rufescentibus, lateribus arcuatis, subcrenulatis, marginis sub-albo-ciliatis, antice ligatura membranacea distincta; scutello triangulari, opaco; elytris thoracis latitudine, parallelis, densissime granuloso-striatis, alternis paulo elevatis; corpore subtus medio glabro, lateraliter ruguloso, metasterno

ongitudinaliter profundo-impresso, inter coxis mediis acutissime producto.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Très voisin de notre *Rh. germanus* L., mais un peu plus étroit, plus parallèle, avec les granulations sur les élytres plus développées et six carènes transversales sur le corselet, dont celle au dessus de l'écusson raccourcie des deux côtés.

Phlaeochrous indicus Westw. (Silphodes).

Orphnus detegens Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

— *scitissimus* Walk. 4 l.

Phileurus detractus Walk. $4\frac{1}{2}$ l.

Xylotrupes solidipes Walk. $7\frac{1}{2}$ l.

— *reductus* Walk. $7\frac{1}{2}$ l.

— *gideon* L. 17 l.

Oryctes rhinoceros L. 15 l.

Bolbocerus lineatus Westw.

C. PSEUDORHYPOPHAGES.

Phyllophages.

Adoretus assimilis Dej. Walk. (Trigonostoma).

— *umbrosus* F.? —

— *compressus* Wiedm. —

— *nanus* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Omaloplia fracta Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

— *interrupta* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Omaloplia semicineta Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

— hamifera Walk. 2 l.

Serica pruinosa Hope.

Serica variolosa Motsch.

*Elongato-ovata subparallela, convexa, sparsim punctata, velutino-opaca, setis testaceis brevissimis adspersa, rufo-testacea, capite antice, thoracis maculis magnis quadratis duabus, antice conjunctis elytrisque irrorato viridi-nigris; capite punctato, clypeo valde reflexo, antennis 10 articu-
latis, clava in ♂ longiora; thorace transverso, antice paulo angustato, angulis rectis, anticis prominulis, lateribus arcuatis, marginis, macula elongata medio punctoque minuto utrinque rufo-testaceis; elytris ad basin thoracis latitudine, medio paulo latioribus et fere triplo longioribus, leviter sulcato-striatis; corpore subtus nitido, medio sparsim lateraliter densiore punctato; mesosterno linea longitudinali distincta, antice in processu verticali subacuminato producto; tibiis antice apice excisis, unidentatis, mediis leviter sinuatis, posticis subdilatis, intus subserratis, extus obtuso-unidentatis.*

Long. 2 l. — lat. elytr. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sericesthis rotundata Walk. 4 l.

— subsignata Walk. $3\frac{3}{4}$ l.

— confirmata Walk. $2\frac{3}{4}$ l.

— mollis Walk.

Isonychus ventralis Walk. $3\frac{1}{4}$ l.

— pectoralis Walk. $3\frac{1}{4}$ l.

Plectris glabrilinea Walk. $4\frac{1}{4}$ l.

Plectris punctuligera Walk. 4 l.

— *solida* Walk. 3¹/₄ l.

Apogonia nigricans Hope.

Rhizotrogus exactus Walk. 5 l.

— *inductus* Walk. 5 l.

— *costatus* Walk. 5 l.

— *aequalis* Walk. 5¹/₂ l.

— *sulcifer* Walk. 6 l.

— *hirtipectus* Walk. 7 l.

Ancylonycha Reynandii Blanch.

Phytalus eurytomus Burm.

Melolontha pinguis Walk. 9 l. (*Hoplosternus*?)

— *setosa* Walk. 10 l. ———

— *seriata* Hope. ———

— *ferruginosa* Walk. 13 l. ———

— *rubiginosa* Walk. 15 l. ———

— *nummecdens* Newm. ———

Leucopholis Mellei Guérin.

— *piguus* Burm.

Phyllopertha transversa Burm.

Phylloperthina Motsch. n. g.

Anomalide à épimères mésothoraciques recouvertes, élytres non échancrées à leur base, chaperon tronqué en arc en avant et simplement marginé non rétroussé chez les ♀, mais recouvrant le labre, qui n'est visible que quand on regarde l'insecte en face. Lobe externe des mâchoires muni de trois grandes dents sur le bord supérieur et de trois autres sur le bord inférieur, ce qui, vu de côté, présente chaque dent comme double. Dernier article des palpes ovalaire. Antennes de 9 articles, dont trois pour la massue, qui est de la même longueur dans les deux sexes. Prosternum sans saillie

post-coxale. Les deux cuisses et jambes postérieures presque du double plus larges que celles des quatre pattes antérieures; jambes antérieures munies de deux fortes dents chacune; crochets égaux, le crochet supérieur des quatre pattes antérieures très-distinctement fendu.

Ce nouveau genre très-voisin, par sa forme, des *Phyllopertha*, s'en distingue tout de suite par ses pattes postérieures, beaucoup plus fortes que les antérieures, ses palpes à dernier article régulièrement ovalaire, son labre faiblement échancré en avant, mésosternum sans tubercule et les crochets fendus des quatre pattes antérieures.

Phylloperthina scutellata Motsch.

Ovata, subdepressa, nitida, punctata, testacea, oculis, antennarum clava corporeque subtus (abdomine excepto) plus minusve nigris, subviridis; capite postice, thorace (marginis excepto) elytrisque ad scutello et sutura viridinigris, metallicis; abdomine, pygidio tarsisque rufo-testaceis; capite subtriangulare, crebre punctato, clypeo in ♂ truncato medio subsinuato, reflexo, in ♀ subarcuato; thorace transverso, convexo, dense punctato, antice arcuatimangustato, angulis anticis subacutis, prominulis, posticis obtusis, elytris thorace latioribus et $\frac{1}{5}$ longioribus, postice attenuatis, subtiliter punctato-striatis, stris postice oblitteratis pygidio dense rugoso-punctato.

Long 2 l. — lat. 1 l. Tab. IX, fig. 25.

Var. *scutello, elytrorum lateribus abdominisque basi nigro-viridis vel nigro cupreis.*

Commun sur les plantes dans les Montagnes de Nura-Ellia.

Rhinoplia elata F. Walk.

Anomala humeralis Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

— discalis Walk. $5\frac{1}{2}$ l.

— infixa Walk. 5 l.

— varicolor Sch.

— conformis Walk. 4 l.

— similis Hope.

— punctatissima Walk. 4 l.

Euchlora viridis F. $9\frac{1}{2}$ l.

— perplexa Hope.

Mimela mundissima Walk. 7 l.

— variegata Walk. 6 l.

• Popilia marginicollis Newm.

— cyanella Hope.

— discalis Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Popilia albilatera Motsch.

Ovata, subdepressa, nitida, subtus longe pilosa, nigro-aenea vel viridis, clypeis margine, antennarum articulo primo, elytris, femoribus tibisque rufotestaceis, thoracis abdominisque lateribus pygidioque maculis duabus in medio albo villosis; capite punctato, ante oculos transversim subcarinato; thorace fere glabro, subtransverso, antice obliqueangustato, postice subdilatato, basi producto, aequaliter tritruncato, angulis acutis, productis; scutello magno, triangulare, medio modice punctato, elytris thorace latioribus, postice attenuatis, punctato-striatis, interstitiis subconvexis, impunctatis; corpore subtus pygidioque sparsim punctatis et pilosis; unguiculis valde inaequalibus, in ♂ duabus anticis solum fissis, in ♀ simplicibus.

Long. $3\frac{1}{2}$ l. — lat. 2 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Parastasia rufopicta Westw.

Mélitophiles.

Valgus addendus Walk. 1³/₄ l.

Protaetia maculata F.

— *Whitehousii* Parry.

Glyciphana versicolor F.

— *luctuosa* Gory.

— *variegata* F.

— *marginicollis* Gory.

Taeniodera malabariensis Gory.

— *quadrivittata* White.

— *alboguttata* Vigors.

Macronota quadrivittata Sch.

Clinteria imperialis Sch.

— *incerta* Parry.

— *chloronota* Blanch.

Agestrata orichalcea L.

— *nigrita* F.

Coryphocera elegans F.

Opontolabis bengalensis Parry.

— *emarginatus* Dej.

Aegus acuminatus F.

— *lunatus* F.

Singhala tenella Blanch.

Tenebrionites.

Passalus interstitialis Perch.

— *punctiger* ? Lef.

— *bicolor* F.

Zophobas errans ? Dej. Walk.

— *clavipes* Walk. 8 l.

? *Zophobas solidus* Walk. 3 l

Pseudoblaps nigrita F.

Tenebrio rubripes Hope.

— *retenta* Walk. 5 l.

Toxicum oppugnans Walk. 3 $\frac{1}{2}$ l.

— *biluna* Walk. 3 l.

Uloma scita Walk 3 $\frac{1}{2}$ l.

Heterophaga punctulata Motsch. 2 $\frac{1}{2}$ l.

— *nitidula* Motsch. 2 l.

Hypophloeus flavipennis Motsch. 1 $\frac{1}{2}$ l.

Stenochinus reticulatus Motsch. 2 $\frac{1}{6}$ l.

Stenochia geniculata Motsch.

Elongata, subparallela, crebre punctata, nitida, nigro-subaenea, ore, palporum basi, antennarum annulis, elytris pedibusque (geniculis excepto) rufo-testaceis; capite subelongato, creberrime punctulato, inter antennis transversim impresso, palporum articulo ultimo ovato-securiformi, antennis elongatis, dimidio corporis longioribus, articulo 1-o robusto, vix elongato, 2-do brevissimo, sequentibus primo fere duplo longioribus, subaequalibus, oculis prominulis, oblongiusculis, medio subcoarctatis, antice valde sinuatis, thorace capite paulo latiore, transverso, subconvexo, rugoso-punctato, antice posticeque marginato, latioribus convexis, arcuatis, angulis anticis rotundatis, posticis rectis, paulo prominulis, scutello triangulari, elytris thorace latioribus et quinduplo longioribus, parallelis, postice subsinuatis, grosso punctato-striatis, interstitiis angustatis, paulo elevatis; corpore subtus lateraliter rugoso-punctato, sparsim brevissimo pilosello.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ l — lat. 3 $\frac{1}{4}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Helops ebeninus Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Camaria amethystina Lep. et Serv.

Amarygmus chrysomeloides Walk. $4\frac{1}{2}$ l.

Amarygmus tenuicornis Motsch.

Ovatus, subgibbosus, postice attenuatus, subtilissime sparsim punctatus, fere glaber, nitidus, nigro subaeneus, pedibus nigropiceis, antennarum basi et apice tarsisque rufescentibus; capite minuto, triangulari, inclinato, fronte subpunctato, oculis vix prominulis, grosso-granulatis; antennis dimidio corporis paulo brevioribus, tenues, articulis 1, 3, 4 et 5 elongatis, subobconicis, 2-d brevissimo, 6—11 ovatis; thorace capite duplo latiore, valde transverso, antice angustato, lateribus vix arcuatis, angulis subrectis; scutello triangulari; elytris ovatis, antice paulo dilatatis, postice attenuatis, subcaudatis, subtiliter punctato-striatis; tibiis posticis subarcuatis, tarsorum articulo 1-0 valde elongato.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cholipus brevicornis Dej. 9 l.

Strongylium variabile Walk. 9 l.

— *parabolicus* Walk. 6 l.

— *laeviusculus* Walk. 6 l.

Camarimena Motsch. n. g.

Hétéromère de la forme des *Helops* allongés, mais très-remarquable par ses crochets aux tarse munis intérieurement de trois forts cils divergents, à peu près comme cela a lieu chez les *Sitaris* et les *Lucanides*, mais chez aucun autre Hélopide ou Erotyline, avec lequel il pre-

sente des antennes en massue un peu comprimée, analogues. Corps un peu plus arqué et plus dilaté sur les côtés latéraux des élytres que chez les *Stenochia* et plus atténué vers l'extrémité. Corselet plus allongé et presque coniquement rétréci vers la tête, qui est assez petite, un peu cylindrique, avec les yeux peu saillants, allongés, et assez fortement sinués au milieu, antérieurement; antennes un peu plus longues que la tête, assez robustes, deux premiers articles courts, 3-me plus long que le 1-er, 4—6 un peu plus courts que le 3-me, 7—11 élargies vers l'extrémité, formant la massue, dont 7 et 8 triangulaires, 9 et 10 transversaux, et le 11-me aussi long que le 3-me, ovalairement arrondi. Palpes maxillaires assez forts, avec le dernier article élargi, un peu sécuriforme et plus long que l'avant-dernier, celui-ci assez court, triangulaire, le 2-d de la longueur du 4-me, claviforme; les labiaux courts à dernier article ovalaire, un peu tronqué à l'extrémité. Menton avancé au milieu en angle arqué. Labre très-transversal, ponctué. Pattes médiocres, cuisses antérieures un peu renflées; jambes arrondies sur leur face extérieure, sans épines à l'extrémité, mais simplement prolongées en angle courbé intérieurement; tarsi pas plus longs que les jambes, épineux dessous, avec leur dernier article plus long que les quatre ou trois précédents réunis.

Camarimena ovicauda Motsch.

Elongato-subovata, postice paulo dilatata, apice arcuatim attenuata, convexa, punctata, nitida, nigro-subaenea, capite antice, femoribus tibisque cupreis; capite fere quadrato, punctato, ante oculos arcuatim impresso, clypeo late truncato, antice appendiculato, appendiculo valde transverso, nigro, medio transverso-impresso, labro subconvexo,

nigro-subviridi; thorace capite paulo latiore, latitudine fere non longiore, conico, sparsim punctato, postice solum marginato, angulis anticis subacutis, prominulis, posticis rectis; scutello triangulari, glabro; elytris thorace paulo latioribus et quadruplo longioribus, foveolato-striatis, foveolis postice obliteratis; corpore subtus sparsim, abdomine crebre punctulato.

Long. $5\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr. post. $1\frac{3}{4}$ l. Tab. IX, fig. 26.

Colombo.

Laena ceylonica Motsch. $1\frac{1}{2}$ l. +
Osdara picipes Walk. 4 l.

Conéphiles.

Opatrum contragens Walk. 4 l.

— bilineatum Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

— planatum Walk. 3 l.

— serricolle Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Leichenum argillaceum Motsch.

Elongato-subovatum, subconvexum, punctatum, setosum, nigrum undique unicolore argilloso squamosum; capite transverso, punctato, sparsim erecto-setoso, oculis subprominulis, grosso-granulosis; thorace capite duplo latiore, transverso, densissime granuloso, sparsim testaceo setoso, basi utrinque sinuato, lateribus leviter crenulatis, ciliatis, subarcuatis, antice rotundatis, postice sinuato-subangustatis, angulis anticis subrectis, vix prominulis, posticis acutis, productis; scutello transverso, ovato, punctato; elytris thoracis basi paulo latioribus, subparallelis, postice attenuatis,

profundo punctato-striatis, interstitiis carinato-elevatis, ciliatis; setis undique crassiusculis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{4}{5}$ l.

Colombo.

Asida horrida Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Crypticus detersus Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

— *longipennis* Walk. 3 l.

Mycophiles.

Boletoxenus tuberculifer Motsch

Subellipticus, convexus, opacus, argillaceo-sordidus, tuberculis subacutis adpersus, fuscus, antennis tarsisque rufo-testaceis; capite triangulari, rugoso-punctato, oculis vix prominulis, nigricantibus; thorace capite plus duplo latiore, valde transverso, dorso gibboso, utrinque series tribus tuberculorum, postice approximatis, medio longitudinaliter canaliculato, lateribus ad marginem valde dentatis vel digitatis, medio dilatatis, antice posticeque valde angustatis; elytris thorace vix latioribus, subseriatim sparso tuberculatis, tuberculis anticis elongatis, trifidis, margine obtuse crenato-dentato.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr. $1\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellià.

Une espèce extrêmement remarquable par sa forme ronde et convexe comme chez les Cassidaires, habite les îles de la Sonde. Elle est un peu plus grande que le *tuberculifer*, mais deux fois plus large, très-convexe, inégale et parsemée de petits tubercules épars et quatre

grandes bosses sur le dos, tous les côtés latéraux aplanis et marginés courtement en scie, ceux des elytres en outre transversalement ridés; front armé de deux longues cornes, un peu courbées en dedans et dilatées à l'extrémité. Je l'ai nommée *Boletax testudinarius*. Tab. IX, fig. 30. grandeur naturelle.

Boletophagus vacca Motsch. $1\frac{2}{3}$ l. *

Cis contendens Walk. 1 l.

Cis coriarius Motsch.

Angustatus, elongato-subovatus, punctatissimus, coriario-rugulosus, brevissime sparsim puberulus, niger, capite, thoracis margine antice pedibusque plus minusve rufo-testaceis; capite transverso, punctato, clypeo valde reflexo, medio late-arcuato exciso; thorace convexo, subquadrato, antice arcuatim angustato, creberrime ruguloso-punctato, basi bisinuato, lateribus arcuatis, angulis anticis obtusis, vix distinctis, posticis rectis, subinflexis; elytris thoracis latitudine, antice subparallelis, postice rotundatis, coriario-rugulosis; corpore subtus sparsim punctato; antennarum basi labroque lucido-testaceis.

Long $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cette espèce doit prendre place parmi les *Cis* à corselet non rébordé postérieurement, après le *C. rugulosus*, duquel elle se distingue aisément par sa taille quatre fois plus petite.

Diaperis velutina Walk. 3 l.

Cybocephalus major Motsch.

Gibbosus, nitidissimus, fere glaber, niger, antennarum basi, tibiis tarsisque, rufo - testaceis, in ♂ thorace capiteque, in ♀ thoracis margine antica solum plus minusve viridi-cyaneo metallicis; capite sub thorace occulto, glaberrimo, oculis prominulis; thorace lato, transverso, convexo, glabro, antice valde arcuato, producto, lateribus arcuatis, angulis anticis rectis, subprominulis, posticis rotundatis, scutello magno, triangulare, glabro; elytris thorace fere angustioribus et duplo longioribus, subattenuatis, subtilissime sparsim punctulatis; corpore subtus sparsim fusco puberulo, metathoracis margina postico, subviridi resplendens.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia, ainsi que sur le continent indien aux environs de Bombay.

Cybocephalus flavipes Motsch.

Gibbosus, nitidissimus, fere glaber, niger, antennarum basi, thoracis margine antice pedibusque testaceis, femoribus posticis ad basin infuscatas, in ♂ thorace antice capiteque laete chlorido-metallicis, in ♀ margine antica angustissime cyaneo - viridi resplendens; thoracis angulis rotundatis; elytris thorace dimidio longioribus, postice ovoides, subtilissime sparsim punctulatis; corpore subtus fusco puberulo.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia et le continent indien.

Une espèce presque de la taille du *major* et sensiblement plus grande que le *festivus*; je l'ai prise aux environs

de Genève sur les troncs mousseux du frêne et je l'ai nommée en conséquence *Cyb. fraxini*.

Cybocephalus chlorocephalus? Er. +

Une espèce très-voisine de nôtre *pulchellus* et de la même taille habite aussi le continent indien et paraît seulement un peu plus atténuée en arrière, pattes testacées, tête d'un vert métallique très-vif chez le mâle. Elle porte le nom de *Cyb. subrotundatus*

Cybocephalus nigripennis Motsch.

Gibbosus, nitidissimus, glaber, dilute testaceus, oculis, scutello elytris corporeque subtus dimidio postice nigris; thoracis angulis rotundatis; elytris thoracis latitudine et dimidio longioribus, postice ovato subattenuatis, apice testaceo transparentibus.

Long. $\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des hautes Montagnes de Patannas à Ceylan.

Cybocephalus subquadratus Motsch.

Gibbosus, subquadratus, nitidissimus, glaber, niger, pedibus rufo-piceis, in ♂ capite thoraceque leviter subcupreis; thoracis angulis rotundatis; elytris thoracis latitudine, et paulo longioribus, postice rotundatis.

Long. $\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{5}$ l. Tab. IX, fig. 27.

Des Montagnes de Nura-Ellia et du continent indien.

Outre les espèces citées et celles qui ont été décrites par Erichson et Boheman, il en existe encore dans les

collections quatre autres. toutes plus petites que le *Cyb. exiguus* Sahlb., notamment: 1) *Cyb. oblongulus* Motsch. des Indes orientales. de la taille du *subquadratus*, mais plus étroit et plus atténué en arrière, 2) *Cyb. latus* Motsch. d'Egypte, un peu plus grand et surtout plus large que le *subquadratus*, 3) *Cyb. aegyptiacus* Motsch. du double plus petit que *l'exiguus*, presque sphérique et 4) *Cyb. pusillus* Motsch. des Indes orientales, un peu plus long que $\frac{1}{4}$ de ligne.

Clambus pumilus Motsch.

Oblongo - ovatus, convexus, postice attenuatus, nitidus, glaber, niger, elytris nigro-piceis, ore subtestaceis; thorace valde transverso, antice fere lunato; elytris ad basin thoracis fere latitudine et triplo fere longioribus, vesus medio subdilatis, postice attenuatis, apice arcuatis; corpore subtus subopaco, impunctato.

Long. $\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{7}$ l.

Sur les sommités du Mont Patannas à Ceylan. Plus allongé que notre *Cl. armadillo* et quatre fois plus petit, rappelant un peu les *Ptenidium*. L'Europe possède une douzaine d'espèces de ce petit genre; pour les exotiques, il y en a encore trois, dont un de l'Amérique septentrionale, l'autre du détroit de Panama et un troisième, encore plus petit ($\frac{1}{4}$ l.) que le *pumilus*, est tout-à-fait d'un test roussâtre et vient du continent indien (*Cl. testaceus* Motsch.).

Alphitophagus subfascia Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

Litargosomus maculatus Motsch. $1\frac{1}{3}$ l. †

Fatua nepalensis Hope.

Triplax decorus Walk.

— *lugubris* Motsch. $1\frac{1}{3}$ l. *

— *melanocephalus* Motsch. $1\frac{3}{4}$ l. +

Tritomidea translucida Motsch. 1 l. +

Tritoma bifacies Walk. 2 l

— *preposita* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Ischyryus grandis F.

Eugonius annularis Gerst.

— *lunulatus* Gerst

Eumorphus pulchripes Gerst.

Stenotarsus Nietneri Gerst.

— *castaneus* Gerst.

— *tomentosus* Gerst.

— *vallatus* Gerst.

Lycoperdina glabrata Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

Ancylopus melanocephalus Oliv.

Saule nigripes Gerst. $1\frac{1}{2}$ l. +

— *ferruginea* Gerst.

Mycetina castanea Gerst.

Typhaea attenuata Motsch.

Elongato-ovata, postice arcuatim attenuata, subconvexa, nitida, pilifera, rufo-testacea, oculis nigris; capite triangulari, cum thorace sparsim punctulato et piloso; hoc capite paulo latiore, transverso, trapezoidale, subconvexo, basi subbisinuato, lateribus vix arcuatis, marginatis, angulis anticis fere rectis, posticis acutis, productis; scutello valde transverso, quadrangulato, elytris basi thorace vix latioribus sed fere quadruplo longioribus, aequaliter arcuatim-attenuatis, punctato-striatis et seriatim longe pilosis; corpore subtus paulo opaco, sparsim piloso.

Long. $\frac{3}{4}$ — $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia, ainsi que du continent indien.

Une espèce plus petite et de couleur plus claire, ne se distingue que par les angles postérieurs du corselet, qui sont moins saillants. Elle porte le nom de *Typh. pallens* m. et se rencontre dans les mêmes localités que la précédente.

Scraptia indica Motsch.

Elongata, subconvexa, dorso paulo deplanata, punctatissima, cinereo pubescens, fusca, ore, antennarum basi pedibusque testaceis; capite triangulari; thorace capite vix latiore, transverso, antice attenuato, elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice arcuatim subattenuatis; corpore subtus nitido, punctulato.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Très-voisine de notre *Scr. fascula*, mais avec la tête et le corselet plus étroits.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scraptia flavidula Motsch.

Elongata, dorso paulo deplanata, punctatissima, puberula, testacea, capite elytrorumque lateribus subinfuscatis, oculis nigris; thorace brevissimo, transverso, lateraliter subarcuato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice subarcuato attenuatis; corpore subtus nitido, sparsim punctulato.

Long. $\frac{1}{6}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

D. ANTHOPHILES.

*Egrostines.**Scirtes grandis* Motsch.

Ovatus, subdilatatus, subdepressus, cano pubescens, fusco-castaneus, oculis nigris, palpis, corpore subtus pedicibusque rufo-testaceis, antennis fusco-annulatis, femoribus apice infuscatis, fronte subrugoso-punctulato, thorace valde transverso, subtilissime punctulato, puberulo, angulis rectis, posticis subprominulis; elytris thorace paulo latioribus, elongato-ovatis, striguloso-punctulatis, cano puberulis.

Long. 2 l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scirtes canescens Motsch.

Ovatus, subconvexus, nitidus, cano pubescens, fusco-testaceus, oculis griseis, palpis, antennis, corpore subtus pedibusque rufo-testaceis, femoribus apice infuscatis; fronte subrugoso-punctato; thorace valde transverso, fere glabro, puberulo, angulis posticis rectis, anticis subprominulis; elytris thorace paulo latioribus, marginatis, striguloso-punctatis, pubescentibus, medio subdilatatis, postice arcuatim-atenuatis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. 1 l.

Des environs de Colombo.

Scirtes? convexiusculus Motsch.

Ovatus, convexus, nitidus, punctatus, testaceo pubescens, nigro-castaneus, oculis nigris, capite, palpis, antennis, tho-

race pedibusque plus minusve rufo-testaceis; capite dense punctulato, fronte plano; thorace transverso, punctulato, lateribus vix arcuatis, marginatis, angulis rectis, apice subrotundatis; elytris thorace latioribus, convexis, fortiter punctatis, pubescentibus, antice subparallelis, postice arcuatim attenuatis.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scirtes? nigropunctatus Motsch.

Suborbiculatus, postice arcuato-attenuatus, subdepressus, nitidus, inaequalis, lateraliter explanatus, pallido-testaceus, oculis punctisque numerosis minutis elytrorum nigris; capite postice subinfuscato, fronte nigro-bipunctato; thorace valde transverso, trapezoidale, angulis anticis subrotundatis, posticis subrectis; scutello triangulari; elytris thorace latioribus, medio dilatatis, inaequali-subrugatis, utrinque nervis vix elevatis et interruptis tribus.

Long. $1\frac{1}{4}$ — lat. 1 l.

Colombo.

Scirtes axillaris Motsch.

Ovatus, subconvexus, subtilissime punctulatus et cano puberulus, niger, antennarum basi, thorace, macula oblonga axillari pedibusque rufo-testaceis, femoribus basi infuscatis; elytris medio subdilatatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du Mt. Patannas.

Au premier abord très - ressemblant au *Hydrocyphon ruficollis* m. mais proportionnellement plus arqué sur les côtés, avec les cuisses postérieures renflées.

Mescirtes Motsch. n. g.

Forme arrondie, peu convexe des *Scirtes*, mais sans pubescence et avec les cuisses postérieures simples, non propres pour sauter. Hanches postérieures petites, ovales. Antennes aplaties, depuis le 3-me article fortement dilatées en articles trapézoïdals, le 1-er renflé, claviforme, le 2-d très-petit, le 3-me triangulaire et aussi grand que le 1-er, mais déprimé. Mésothorax transversal, métathorax triangulairement coupé vers l'insertion des pattes postérieures. Labre et épistome distincts, celui-ci un peu transversal. Tête distincte, verticale mais pas inclinée sous le corselet, qui est très-transversal, comme chez les *Scirtes*, mais entièrement appliqué à la base des élytres. Les parties du corps plus petites n'ont pas pu être examinées faute de doubles; il se pourrait donc que ce nouveau genre appartînt plus naturellement aux *Eubriades*, rappelant un peu par ses antennes quelques *Xyletinus* et *Dorcatoma*.

Mescirtes gagatinus Motsch.

Suborbicularis; vix convexus, subtiliter punctatus, nitidus, niger, ore, antennis, ano pedibusque rufo-testaceis; capite subtriangulâri, fronte punctulato, vertice glabro, ore subexsertis; thorace valde transverso, punctulato, antice angustato, lateraliter tenuissime marginato, marginis subtestaceis, angulis posticis subacutis, prominulis, anticis rectis; scutello triangulâri, fere glabro; elytris thorace vix latioribus, punctulatis, antice fere parallelis, postice rotun-

datis, humeris subprominulis; corpore subtus fere impunctato, subpuberulo.

Long. 1 l. — lat. $\frac{2}{3}$ l. Tab. IX, fig. 28.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Hydrocyphon atratus Motsch.

Ovalis, vix convexus, fere glaber, cinereo puberulus, ater, thoracis lateribus infuscatis, ore antennarumque basi rufotestaceis, tibiis tarsisque sordido testaceis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Peut être variété à corselet obscur de mon *Hydr. ruficollis*, dont il a la taille et la forme, ou bien l'autre sexe de cette espèce.

Hydrocyphon ? ruficollis Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

— ovalis Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

Cyphon flavescens Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

— pictus Motsch. 1 l. +

— infuscatus Motsch. 1 l. +

— affinis Motsch. $1\frac{1}{4}$ +

Ptilodactyla humeralis Motsch.

Elongato-ovata, dorso subdepressa, nitida, punctata, cano subpuberula, nigra, palpis antennarum basi, elytrorum humeris pedibusque rufotestaceis; fronte triangulariter impresso, punctato, oculis prominulis, antennis corpore paulo brevioribus in ♂ pectinato-appendiculatis; tho-

race triangulari, antice angustato, convexo, postice deplano, crebre punctato, angulis posticis acutis, productis; scutello triangulari, punctato; elytris thorace vix latioribus, punctato-striatis, antice paulo parallelis, postice arcuatim-attenuatis; corpore subtus subtiliter sparsim punctulato et piloso, nitido, ano subtestaceo, in mucrone, acuto producto.

Long. $1\frac{1}{5}$ (♂)— $1\frac{3}{4}$ (♀) l. — lat. $\frac{2}{5}$ — $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Il s'en trouve dans les mêmes localités une forme extrêmement voisine, mais qui est plus noirâtre, plus luisante et sans taches aux angles huméraux. Peut-être une variété seulement. Je l'ai nommée *Ptil. picea*. Une troisième espèce indienne est ma *Ptil. subcastanea*, qui a la taille et la forme des précédentes, mais d'un test brunâtre uniforme sur tout le corps, à l'exception de la tête, qui est brunâtre. Elle vient de Java.

Cistela falsifica Walk. 2 l.

— *congrua* Walk. $4\frac{1}{2}$ l.

Allecula flavifemur Walk. 6 l.

— *fusiformis* Walk. 5 l.

— *elegans* Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Acuminées.

Myrmecolax Nietneri Westw.

Mordellistena flaviceps Motsch.

Elongato-subovata, subconvexa, arcuatim attenuata, subtilissime punctulata, fusco pubescens, nigra; capite, anten-

nis pedibusque diluto rufo-testaceis, femoribus posticis infuscatis, oculis nigris; fronte subconvexo; thorace subtransverso, subtilissime punctulato, fusco puberulo, postice subdilatato, basi profundo bisinuato, lateribus arcuatis, angulis anticis obtusis, posticis rectis, apice subinflexis; elytris thorace paulo angustioribus, leviter attenuatis, subtiliter punctulatis, fusco puberulis apice utrinque subrotundatis, testaceo transparentibus; mucrone brevi, subobtusio.

Long. 1 l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Mordellistena trimaculata Motsch.

Elongato-attenuata, subconvexa, arcuata subtiliter punctulata, substestaceo puberula, nigro-picea, ore, palpis, antennis, humeris, elytrorum macula vel fascia postica pedibusque plus minusve rufo-testaceis; fronte glabro, subconvexo, oculis magnis, subapplanatis, fortiter granulatis; thorace trapezoidali, conico, subtilissime punctulato et puberulo, basi bisinuato, lateribus angulisque rectis, elytris thorace vix latioribus, punctulatis, puberulis postice attenuatis, apice utrinque rotundatis; mucrone elongato, substestaceo apice truncato subbispinoso.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Mordellistena rufotestacea Motsch.

Elongato-attenuata, subconvexa, arcuata, subtiliter punctulata, testaceo-sericeo puberula, rufo-testacea, oculis nigris, subapplanatis, distincto granulatis; capite puberulo, fronte

subconvexo; thorace fere quadrato, puberulo, antice subrotundato, basi bisinuato, lateribus fere rectis, subexplanatis, angulis rectis, apice rotundatis; elytris thorace paulo angustioribus, attenuatis, sericeo puberulis, apice subacuminatis; mucrone elongato, conico.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et du Patannas.

Très-voisine de notre *Mordel. lateralis*, mais un peu plus grande.

Mordella defectiva Walk. 2 l.

— *composita* Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Rhipiphorus tropicus Nietner.

Acosmus languidus Walk. 5 l.

Obtusipennes.

Macrarthrius robustus Motsch. $2\frac{1}{2}$ l. *

Macrarthrius pallipes Motsch.

Elongatus, subparallelus, convexus, punctatus, puberulus, nigro-fuscus, ore, antennis pedibusque testaceis, femoribus posticis apice oculisque nigris; capite rotundato, nitido, sparsim punctato; thorace capite fere angustiore, punctato, elongato, antice conico attenuato, postice truncato; elytris thorace latioribus, punctato-striatis, postice vix attenuatis, apice rotundatis; corpore subtus nitido, subtiliter punctulato, segmentis abdominis angustissime testaceo-marginatis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Corselet plus étroit, plus atténué vers la tête que chez le *M. robustus*.

Mecynotarsus fasciatus Motsch.

Subovatus, subconvexus, vix nitidus, holosericeo pubescens, pallide testaceus, macula scutellari, fascia lata pone medio elytrorum oculisque nigris; thorace subtransverso, cinereo pubescens, antice in cornu elongato-triangulari, lateraliter crenulato, producto; elytris thorace paulo latioribus, puberulis, postice arcuatim attenuatis; capite subinfuscato.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Cette jolie espèce se rencontre aux environs de Colombo.

Une autre espèce nouvelle, *Mec. piger* m., de la taille et de la forme du *M. fasciatus*, se distingue par son corps d'un noir unicolore et habite l'île de Sumatra.

Amblyderus spiniger Motsch.

Elongato-ovatus, convexus, nitidus, punctatus, subalbo pilosus, testaceus, fascia elytrorum ad suturam interrupta oculisque nigris; capite subtriangulari, postice subangulatim dilatato, nitido, piloso; thorace capituli latitudine, rufotestaceo, convexo, grosso punctato, postice coarctato, antice valido sexspinoso, lateribus subcrenulatis; elytris thorace latioribus, ovatis, punctatis, postice arcuatim-attenuatis.

Long. 1 l. — lat. élytr. $\frac{2}{5}$ l. Tab. IX, fig. 29.

Colombo.

Formicomus flavicornis Motsch.

Elongatus, subdilatatus, convexus, nitidissimus, glaber, castaneus, antennis pedibusque rufotestaceis, apice dilutioribus; capite subelongato, postice conico, oculis minutis, subprominulis, nigris, antennis capite duplo longioribus, apice incrassatis, articulis duabus penultimis fere quadratis, ultimo ovato; thorace capitis longitudine sed paulo angustiore, elongato, postice subcylindrico, angulis anticis paulo dilatatis; elytris thorace duplo latioribus, ovatis, medio dilatatis, glabris.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Il paraît qu'il existe à Ceylan une autre espèce de *Formicomus* plus grande et de couleur plus noirâtre, chez laquelle la partie antérieure des élytres est sensiblement imprimée et recouverte d'un duvet cendré. Je crois qu'elle est la même que mon *F. gagatinus* du continent indien; elle présente une couleur noire luisante sur les élytres, plus brunâtre et plus terne sur le corselet et la tête, pattes d'un brun roussâtre, base des antennes d'un roux testacé; longueur $1\frac{2}{3}$ l.

Formicomus quisquiliarius Nietner (*Anthicus*) $1\frac{2}{3}$ l. *

Leptaleus retrofasciatus Motsch.

Elongatus, angustatus, subarcuatus, convexiusculus, nitidus longe sparsim subalbo pilosus, rufo-testaceus, elytris basi grosso punctatis, medio fascia lata apiceque nigris, fascia postica pedibusque dilute testaceis; capite subrotundato, subinfuscato, fere glabro, oculis nigris, subprominu-

lis; thorace capitis longitudine, sed brevior, convexo, glabro, nitido, postice valde cordiformi constricto: elytris thorace latioribus, subovato-attenuatis, antice transversim subimpressis, grosso punctatis, punctis postice oblitteratis; corpore subtilis subglabro, nitido, femoribus subclavatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Il existe sur le continent indien encore une très-jolie espèce de *Leptaleus*, le *L. coloratus* m., qui a la taille du *retrofasciatus*, avec une forme plus ovale et plus atténuée en arrière et les couleurs de *l'Anth. cruciger* Laferte, mais plus vives et plus luisantes.

Anthicus patruelis? Laferté var.

Chez cette variété les taches postérieures sur les élytres manquent complètement.

Sur les sommités du Mont. Patannas dans l'île Ceylan.

Anthicus hirsutus Laferté var?; mais les exemplaires de Ceylan paraissent généralement plus étroits et plus parallèles, avec la bande testacée postérieure plus mince et prolongée jusqu'aux bords latéraux, ce qui me le fit séparer sous le nom d'*An. hirsutulus*.

Anthicus stricticollis Walk. 1 l.

Anthicus transversofasciatus Motsch.

Elongatus, parallelus, deplanatus, nitidus, punctulatus, sparsim brevissime pilosus, rufo-testaceus, oculis, elytrorum

fascia media apiceque lato nigris, capite subquadrato abdomineque infuscatis; thorace postice valde constricto cordiformi, transversim impresso, lateraliter utrinque foveolato, vix convexo, capite fere angustiore; elytris capite paulo latioribus, parallelis, subtilissime punctulatis, nitidissimis, sparsim puberulis.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ l.

Sur les Montagnes de Nura-Ellia et Patannas de l'île Ceylan.

Il appartient à la 4-me division des Anthicus de Laferté, et pourrait être placé avant *l'A. mylabrinus*.

Anthicus insulanus Nietner $1\frac{1}{2}$ l. ☺

Anthicus foveicollis Motsch.

Elongatus, subovatus, subconvexus, dorso transversim impressus, punctulatus, nitidus, brevissime cinereo puberulus, pilis longissimis erectis sparsim adpersus, niger, ore testaceis, femoribus basi subalbo; capite subrotundato, crebre punctato, testaceo puberulo, postice subattenuato, oculis magnis, paulo prominulis, valde granulatis; thorace capite angustiore, subelongato, punctulato, testaceo puberulo, antice subgloboso, postice subdilatato, medio constricto, utrinque profundo unifoveolato, angulis posticis subacutis; elytris thorace duplo latioribus, elongato-ellipticis, subtilissime punctulatis, nitidis, brevissime sparsim puberulis, basi utrinque longitudinaliter impressis, humeris subprominulis, sutura antice inflexa, medio subelevata.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ochthenomus ceylonicus Motsch.

Elongatus, angustatus, vix convexus, punctatissimus, subopacus, subalbo-squammosus, rufo testaceus, oculis nigris; capite quadrato, clypeo truncato, antice inter antenas concavo, antennarum articulis subelongatis, tribus penultimis crassioribus, triangularibus, ultimo ovato, acuminato; thorace capite valde angustiore et paulo brevior, subconvexo, postice vix angustato, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; elytris thorace duplo latioribus et longioribus, elongato-ovatis, humeris paulo prominulis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo

Très-voisin de notre *Och. angustatus*, mais le double plus petit, plus testacé, recouvert d'écaillés plus blanchâtres.

Psammoecus trimaculatus Motsch. $1\frac{1}{3}$ l. +

Obesicornes.

Mylabris humeralis Walk. 9—11 l.

— *alterna* Walk. $3\frac{1}{2}$ —5 l.

— *recognita* Walk. 4 l.

Gracilicornes.

Epicauta nigrifinis Walk. $5\frac{1}{2}$ l.

Cissites testaceus F.

Atracocerus debilis Walk. 10—14 l.

— *reversus* Walk. 11 l.

Sténélytres.

Sora marginata Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

Thacona dimelaena Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

E. XYLOPHAGES.

Longicornes.

Molorchus filiformis Motsch.

Phyton Ypallidum Motsch.

Elongatum, angustatum, parallelum, deplanatum, sparsim punctatum, vix nitidum, fusco-piceum, elytris fasciis subalbidis, obliquis, ad suturam angulatim conjunctis quatuor, fascia tertia valde dilatato, quarta apicali, ad suturam interrupta; oculis magnis, prominulis, granosis, valde approximatis, profundo sinuatis, nigris, antennis pedibusque subalbo annulatis; thorace capite angustiore, subcylindrico, inaequale, sericeo pubescens, lateribus subnodosis; elytris capite vix latioribus, parallelis, apice rotundatis, sparsim pilosis.

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. élyt. $\frac{1}{2}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Très-voisin du *Phyt. pallidum* Say de l'Amérique du Nord, mais à corselet plus étroit, soyeux, les bandes blanchâtres sur les élytres plus distinctes, dont la 2-de en forme de V.

Obrium laterale Pasc. $2\frac{1}{2}$ l. *

— *moestum* Pasc.

Psilomerus macilentus Pasc.

Clytus vicinus Hope.

- *ascendens* Pasc.
- *Walkeri* Pasc.
- *annularis* F.
- *glaucus* ? F.

Tout à fait comme notre *Cl. plebejus*, mais avec deux grandes taches noirâtres sur le corselet et sans point cendré près des angles huméraux.

Centrotoclytus Motsch. n. g.

Tête et corselet comme chez les *Clytus*; élytres presque aussi élargies que chez les *Callidium* à angles huméraux saillants, les côtés latéraux carénés et avec l'extrémité armée de quatre fortes épines. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps, grêles, avec les six premiers articles allongés et les cinq derniers courts, transversaux, un peu plus larges que les premiers et formant ainsi une espèce de massue dentelée. Pattes assez grêles, mais courtes avec les cuisses claviformes.

Centrotoclytus quadridens Nietner.

Elongatus, subdeplanatus, punctatus, antice opacus, postice nitidus, squamulis subalbidis adpersus, nigro-piceus, thoracis margine antice, elytrorum basi, palpis, antennis pedibusque rufo-piceis, thoracis angulis posticis, elytrorum humeris, fascia media elevata nitida spinisque apicalis albis; capite triangulari, cinereo puberulo, oculis nigris, antice rufescentibus; thorace elongato, antice subcylindrico, postice rotundato, angustato; scutello triangulare, cinereo puberulo; elytris thorace latioribus et triplo longio-

ribus, antice subdilatatis, postice arcuatim attenuatis, apice bispinosis, spina laterali longiore, humeris prominulis.

Long. 2—2¹/₄ l. — lat. hum. ¹/₂—³/₅ l. Tab. IX, fig. 31.

Montagnes de Nura-Ellia.

Rhaphuma leucostellata Hope.

Ceresium cretatum White.

— Zeylanicum White.

Stromatium barbatum F.

— maculatum White.

Hesperophanes simplex Gyll.

Deuteromma mutica Pasc.

Thranium gibbosus Pasc.

Colobus cingalensis White.

Homalomelas gracilipes Parry.

— zonatus Pasc.

Callichroma trogoninum Pasc.

— telephoroides Westw.

Sebasmia Templetoni Pasc.

Cerambyx indutus Newn.

— vernicosus Pasc.

— corsocius Pasc.

— versutus Pasc.

— nitidus Pasc.

— macilentus Pasc.

— venustus Pasc.

Stibara nigricornis F.

Glenea sulphurella White.

— commissa Pasc.

— scopifera Pasc.

— vexator Pasc.

Jolea proxima Pasc.

- Jolea histrio* Pasc.
Hathlia procera Pasc.
Ropica praeusta Pasc.
Apomecyna histrio F.?
Praonetha annulata Chevr.
 — *posticalis* Pasc.
Olenocamptus bilobus F.
Pelargoderus tigrinus Chevr.
Cereopsius patronus Pasc.
Monohammus fistulator Germ.
 — *crucifer* F.
 — *nivosus* White.
 — *commixtus* Pasc.
Batocera rubus F.
 — *ferruginea* Blanch.
Cacia triloba Pasc.
Xylorhiza adusta Wied.
Coptops bidens F.
Mesosa columba Pasc.
Nyphona cylindracea White.
Aegosoma cingalense White.
Acanthophorus serraticornis Ol.
Prionomma orientalis Ol.
Trictenotoma Templetoni Westw.
Xenocerus anguliferus Walk. 6 l.
 — *revocans* Walk. 5 l.
Dendrotrogus Dohrnii Jek.
Eucorynus colligendus Walk. 3—4 l.
 — *colligens* Walk. $3\frac{3}{4}$ —5 l.
Basitropis disconotatus Jek.
Anthribus longicornis F.
 — *apicalis* Walk. 6 l.
Tropideres fragilis Walk. 2 l.

Tropideres cinereo - maculatus Motsch.

Elongato - subovatus, medio subcylindricus, punctatus, pubescens, opacus, niger, capite, thoracis lincis tribus sinuatis, antice recurvatis elytrisque maculis numerosus, plus minusve confluentibus cinereis, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, geniculis tarsisque infuscatis, oculis nigris; antennis corporis fere longitudine, articulis elongatis, versus apicem sensim incrassatis; thorace capite paulo latiore, crebre punctulato, antice arcuatim angustato, basi transversim carinato, angulis posticis subrectis, oblique truncatis; scutello subtransverso; elytris thoracis latitudine, parallelis, punctato-striatis, interstitiis subconvexis, densissime ruguloso-punctulatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cratoparis? brunnipennis Motsch.

Elongatus, subcylindricus, opacus, punctatissimus, puberulus, niger, elytris rufo-brunneis, cinereo nebulosis, ore antennarum basi, thoracis margine antice pedibusque rufo-testaceis; capite subtriangulare, cinereo puberulo, rostro brevissimo, oculis oblongiusculis, convexis, prominulis, antennis gracilis, capite fere duplo longioribus, apice abrupte clavatis, clava triarticulata; thorace antice capitis latitudine, postice fere triangulato dilatato, crebre punctato, postice transversim carinato, angulis posticis subacutis, prominulis, lateribus vix arcuatis; elytris thorace vix latioribus, grosso punctato-striatis, interstitiis vix punctatis, ntidis, cinereo puberulis, sutura scutelloque infuscatis.

Long. 1 l. — lat. elytr. $\frac{4}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Araecerus coffeae F.

— *insidiosus* F.

— *intangens* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

— *bifoveolatus* Walk. 1 l.

Xylinades indignus Walk. 7 l.

Variicornes.

Brontes? ceylonicus Motsch.

Elongatus, parallelus, valde depressus, nitidus, punctatus, fusco-testaceus, elytris, palpis pedibusque rufo-testaceis; capite triangularis, punctato, antice transversim impresso, lateribus elevatis, postice angulatim productis, oculis prominulis, nigris; thorace capitis latitudine, quadrato, postice leviter angustato, dorso deplanato, basi unifoveolato, lateribus subtiliter crenulatis, angulis anticis brevissime bidentatis, posticis rectis; elytris thorace paulo latioribus, punctato-striatis, striis alternis profundioribus, interstitiis subseriatim punctulatis; femoribus claviformi dilatatis; antennis corporis longitudine, pilosis.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura Ellia.

Laemophloeus minutus F. $\frac{5}{6}$ l. +

— *ferrugineus* Creutzer. $\frac{4}{5}$ l. +

Euryplatus lateralis Motsch. $1\frac{2}{3}$ l. +

Cucujus? incommodus Walk. $1\frac{1}{4}$ l.

Silvanus bidentatus Pz. $1\frac{2}{5}$ l. +

— *retrahens* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

— *scuticollis* Walk. $1\frac{1}{4}$ l. +

— *porrectus* Walk. $1\frac{1}{4}$ l. +

Silvanus graciosus Motsch.

Elongatus, deplanatus, reflexus, opacus, punctatissimus, rufo-testaceus, oculis prominulis; capite antice triangulari, postice parallelo, punctato, inter antennas biimpresso; thorace capite latiore, punctato, subquadrato, postice leviter bifoveolato, angulis anticis productis, subacutis, posticis rectis, lateribus paulo explanatis, vix arcuatis; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, densissime punctato-striatis, interstitiis alternis subelevatis. S. unidentato valde affinis sed dimidio minor.

Long. $\frac{1}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Silvanus bicornis Rosenh. $1\frac{1}{4}$ l. + *

Monotoma concinnula Walk. 1 l.

Ditoma angustula Motsch.

Linearis, subcylindrica, opaca, punctatissima, rufo-brunnea, oculis subprominulis, nigris; capite marginato, antice attenuato, arcuatim exciso, labro transverso; thorace capite paulo latiore, subelongato, granuloso-punctato, marginato, utrinque unicarinato et profundo unisulcato, dorso antice tri postice bifoveolato, angulis rectis, lateribus postice paulo attenuatis; elytris thorace vix latioribus et plus duplo longioribus, dense crenato-striatis, interstitiis alternis suturaque in carinis crenulatis, elevatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

N^o 2. 1863.

Une espèce extrêmement voisine se rencontre en Egypte, (*D. rufula* m.); mais elle est proportionnellement plus large, à corselet plus plane, à quatre côtés élevés, sans sillon latéral.

Ditoma rugicollis Walk. 1 l.

Cicones coloratus Motsch.

Elongato-ovatus, deplanatus, subopacus, punctatus, sparsim pilosis, squamulis albidis erectis adspersus, nigro-piceus, elytris dilute testaceo-roseo picturatis: fascia obliqua humerali, altera M formi in medio, macula rotundata versus apicem, antennis pedibusque rufo testaceis, femoribus paulo infuscatis, oculis subpromnulis, nigris; thorace capite paulo latiore, quadrangulato, subtransverso, inaequale 5 impresso, cinereo puberulo, angulis anticis subobtusis, posticis rectis, lateribus vix arcuatis, crenulatis; elytris thorace paulo latioribus et plus duplo longioribus, subovatis, crenato-striatis, interstitiis sparsim erecto pilosis et squamulatis.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. elytr. $\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce extrêmement voisine se rencontre dans l'Amérique du nord aux environs de la Nouvelle-Orléans et se distingue par une taille un peu plus grande et surtout plus large, par des dessins sur les élytres moins clairs et plus dilatés transversalement, présentant une bande postérieure de plus et sans trace de squamules blanches. Je l'ai nommée *C. tessellatus*.

Coxelus? unicolor Motsch.

Elongatus, subconvexus, opacus, breviter-setiferus, nigro-piceus, oculis nigris, prominulis; capite subquadrato, postice collo subglabro, opaco; thorace transverso, convexo, punctato, setifero, dorso leviter trifoveolato, postice cordatim angustato, lateribus subexplanatis, marginis setosis, angulis rectis; elytris thorace paulo latioribus striato-punctatis, interstitiis seriatim erecto-setosis, squamulis rufescentibus praesertim postice adpersis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Colobicus indicus Motsch.

Elongato-subovatus, vix convexus, marginatus, punctatus, squamuloso-setosus, nigro-piceus, marginis, ore, antennis pedibusque rufescentibus; capite triangulari, antice truncato, oculis magnis, subprominulis; thorace capite fere duplo latiore, valde transverso, grosso punctato, breviter setoso, antice attenuato, angulis anticis acutis, valde productis, posticis rotundatis, lateribus explanatis, vix arcuatis, elytris thoracis latitudine, crenato-striatis, striis seriatim setosis, interstitiis transversim subrugatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et du continent indien.

Très-voisin de notre espèce d'Europe, mais un peu plus allongé, corselet plus fortement ponctué et plus sensiblement atténué vers la tête, avec les angles antérieurs plus saillants, stries des élytres plus fines, leurs

points plus petits etc. A Madagascar il existe un *Colobiscus*, extrêmement ressemblant, mais d'un quart plus court, ce qui le fait paraître plus large, tête et corselet fortement ponctués, angles antérieurs du dernier moins saillants; stries des élytres plus distinctement crénelées; je l'ai nommé *Col. latiusculus*. Enfin l'Amérique septentrionale a aussi son représentant pour ce genre, dans le *Col. variegatus* m., qui est moitié plus petit et marqué sur les élytres de taches et d'une bande sinuée transversale d'un test roussâtre.

Tarphisoma Motsch. n. g.

Synchitède voisin des *Tarphius*, mais de la forme ovulaire de nos *Soronia*, d'un mat velouté et frangé autour du corps, et sur la face extérieure des jambes de petits cils obtus. Cuisses étroites, aplaties. Jambes sans épines apicales. Tarses de quatre articles à toutes les pattes, les trois premiers égaux, très-courts, le dernier plus long que les trois précédents réunis. Tête petite, avec des rainures faibles pour la réception des antennes, mais qui ne se prolongent pas sur le corselet. Prosternum avançant un peu les hanches antérieures, largement tronqué. Mandibules courtes, larges, courbées, simples sans denticulation apicale. Lèvre inférieure cornée transversale arrondie. Palpes labiaux terminés par un article allongé, acuminé, presque plus long que les précédents réunis. Palpes maxillaires terminés par un article allongé, ovulaire, tronqué à l'extrémité. Menton avancé, trapézoïdal, arrondi à l'extrémité. Labre transversal, angles un peu coupés obliquement. Antennes grêles, pas plus longues que la tête et le corselet réunis, avec leur deux premiers articles petits, le 2-d un peu plus large que le 1-er, le troisième le plus long de tous, pas plus court

que les deux précédents réunis, le 4-me un peu plus long que le 2-d, 5—8 courts, triangulaires, 9—11 élargis, transversaux formant une massue oblongue. Corselet trois fois plus large que la tête, très-transversal, à côtés arqués rebordés, angles antérieurs aigus, très-saillants, les postérieurs plus ou moins droits. Ecusson presque carré. Elytres à peine plus larges que le corselet, assez convexes, à angles huméraux droits, côtés latéraux parallèles antérieurement, régulièrement arrondis postérieurement. Mésosternum non avancé, aplani obliquement et bordé d'un bourrelet en forme de flèche en avant. Insertion de toutes les pattes égale, assez rapprochée. Premier segment de l'abdomen pas plus long que les autres. Yeux peu saillants, transversalement comprimés et un peu sinués en arrière.

Tarphisoma fasciata Motsch.

Oblongo-ovata, dilatata, subconvexa, opaca, velutino-nigra, palpis, antennarum apice tarsisque plus minusve rufo-testaceis, elytris maculis basalis fasciaque dentata postice cinereis; capite subelongato, granuloso punctato, oculis minutis, nigris; thorace granuloso-punctato, erecto setoso, valde transverso, cordato, postice lato truncato, lateribus explanatis, margine crenulato-setoso; scutello subquadrato, nitido; elytris thorace vix latioribus et fere triplo longioribus, velutino-squammosis, striis vix distinctis, margine crenulato-setoso; corpore subtus subnitido, punctato.

Long. $1\frac{2}{3}$ —2 l. — lat. $1-1\frac{1}{6}$ l. Tab. IX, fig. 32.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une seconde espèce très-voisine, de la même taille.

mais un peu plus large, se trouve sur l'île Timor et se distingue principalement en ce que tout le dessus, qui est d'un noir brunâtre unicolore, est parsemé de petites écailles et touffes blanchâtres et de gros cils obtus élevés. Je l'ai nommée *Tarphis. maculosa*.

Tarphius? pilosus Motsch.

Ovatus, gibbosus, opacus, punctatus, argillaceo-sordidus, sparsim longissime erecto-pilosus, nigro-piceus, palpis, antennarum apice pedibusque rufescentibus; capite subabbreviato, antice arcuatim attenuato, apice truncato, oculis rotundatis, subprominulis, nigris; thorace valde transverso, punctato, sparsim erecto nigro-piloso, lateribus dilatatis, valde arcuatis, margine crenulatis, angulis anticis acutis, productis, posticis subrectis; elytris thorace paulo latioribus, ovatis subgibbosis, sparsim erecto nigro-pilosis et setosis, setis brevioribus approximatis dorso fasciculis nonnullis formantibus, marginis subcrenulatis, setulosis; corpore subtus vix nitido, subglabro, abdominis segmento 4-o et 5-o mediis paulo longioribus.

Long. $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ostoma lanuginosa Motsch.

Lata, oblongo-ovata, deplanata, punctata, nitida, longe lanuginosa, ferruginea, marginis, antennarum basi, corpore subtus pedibusque rufescentibus; capite transverso, rugoso-punctato, antennarum articulo primo incrassato, acute angulatim producto; thorace trapezoidale, valde transverso, grosso punctato, angulis subobtusis rectis, anticis productis, lateribus vix arcuatis, antice valde oblique attenuatis, re-

flexis, longe lanuginoso-ciliatis; elytris thoracis basi latitudine, sed triplo longioribus, per pariam grosso punctato-striatis, interstitiis alternis subcarinato elevatis, margine longe lanuginoso-ciliato; corpore subtilis fere glabro, lateraliter paulo punctato.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ostoma subrotundata Motsch.

Breviter - ovata, deplanata, subopaca, punctata, squamulis nitidis albis adpersa, nigro - picea, thoracis elytrorumque marginis lato suturaque minus distincto testaceis, oculis antennarumque clava nigris, mandibulis, palpis antennarum basi pedibusque rufo-testaceis; capite triangulari, antice subtruncato, squamulis albidis adperso, mandibulis paulo exsertis; thorace valde transverso, trapezoidali, sparsim albo squamuloso - setosus, angulis productis, acutis, apice subrotundatis, lateribus fere rectis, valde obliquis, reflexis; elytris thorace paulo latioribus et plus duplo longioribus, reflexis, subtessellatis, punctato - striatis, interstitiis per pariam interrupto-albo-squamuloso picturatis et fasciis arcuatis sinuatis formantibus.

Long. $1\frac{2}{3}$ l. — lat. elytr. $\frac{5}{6}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Les Peltides paraissent être plus représentées sur notre globe qu'on ne le pense, car j'en possède une très-remarquable d'Algérie, qui est allongée, aussi déprimée que les *Brontes*, luisante, ponctuée, sans pubescence et

d'un roux un peu chatain. Elle surpasse à peine une ligne en longueur, les intervalles des stries sur les élytres sont un peu élevés en carène et crénelés. Elle porte le nom de *Peltis africana* m. Une Peltide, de forme entièrement semblable et de la même couleur, mais moitié plus petite et ciliée autour du corps de poils assez longs, a été trouvée par moi en Géorgie dans l'Amérique du Nord, et en conséquence nommée *Peltis americana*. La Californie offre une autre espèce, *Pelt. pallida* m., qui est voisine de la *Pelt. pubescens* Er., mais d'un quart plus petite, le test pâle. et recouvert d'une pubescence grisâtre comme les *Byturus*, élytres irrégulièrement ponctuées. Au Caucase enfin, on rencontre la *Peltis caucasica* m., très-voisine de celle d'Erichson, mais quatre fois plus petite, d'un roux brunâtre, et chez laquelle les élytres sont striées par de gros points épars, formant presque des chainons allongés et dont les intervalles alternes s'élèvent un peu en côtés, garnis de quelques cils blanchâtres.

Trogosita insinuans Walk. 3 l.

— rhyzophagoides Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

Aulosoma tenebrioides Motsch. $1\frac{1}{2}$ l. +

Teredus? biplagiatus Motsch.

Elongatus, subcylindricus, politus, subtilissime punctatus, niger, elytrorum utrinque macula elongata postice, ore, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite triangulare, subconvexo, sparsim punctulato, inter antennis linea arcuata transversa impressa; thorace capite paulo latiore, fere quadrato, subcylindrico, sparsim punctulato, antice paulo arcuatim attenuato, angulis posticis rectis; elytris

thoracis latitudine et duplo longioribus, cylindricis, apice attenuato-rotundatis, subtiliter punctato-striatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Rhyzophagus parallelus Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Cerylon orientale Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

Platypus caudatus Motsch.

Elongatus, postice in caudam attenuatus, punctulatus, nitidus, brunneus, oculis nigris; capite transverso, antice abrupte truncato, fronte leviter concavo, rugoso-punctato, antice paulo testaceo-piloso; thorace capitis latitudine, elongato, cylindrico, subtilissime punctulato, nitido, medio coarctato, postice subangulatim dilatato, angulis rectis; elytris thorace vix latioribus et dimidio longioribus, antice cylindricis, postice attenuatis in caudam, subbidentatum, productis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis alternis antice subelevatis, versus apicem pilis testaceis sparsim adpersis; corpore subtus sparsim punctulato et piloso.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platypus rotundicauda Motsch.

Elongatus, cylindricus, punctulatus, nitidus, fusco-castaneus, antennis pedibusque rufo-testaceis, oculis nigris; fronte leviter concavo; thorace subelongato, cylindrico, postice in medio confertim punctulato, angulis anticis rectis, postice subrotundatis; elytris thoracis fere latitudine et plus duplo longioribus, profundo punctato-striatis, striis ad su-

turam approximatis, subexcavatis, interstitiis alternis paulo concavis, apice rotundatis, testaceo pilosis; tibiis anticis in maris (?) subelongatis, antice denticulatis.

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platypus minax Walk. 3 l.

Platypus luniger Motsch.

Elongatus, cylindricus, vix punctulatus, fere glaber, nitidus, rufo-testaceus, elytris postice subinfuscatis, oculis nigris; capite transverso, sparim piloso. fronte in ♂ plano, in ♀ subconcavo, mandibulis subexsertis; thorace capitae latitudine, cylindrico, elongato, fere glabro, medio subcoarctato, postice paulo dilatato, angulis anticis rectis, posticis rotundatis; elytris fere thoracis latitudine, postice truncatis, margine subincrassatis, apice in ♂ sinuato — in ♀ sublunato excisis, subtiliter striatis, strüs in ♂ vix distincto punctatis, in ♀ obliteratedis, interstitiis ad basin paulo elevatis; corpore subtus glabro, opaco; tibiis anticis subcurvatis, in ♂ apice unidentatis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platypus latifinis Walk. 2 l.

Platypus cordatus Motsch.

Elongatus, cylindricus, nitidus, pallido-testaceus, capite, elytrorum sutura apiceque infuscatis, oculis nigris; capite

opaco, vertice linea nitida fusca, fronte deplanato, testaceo puberula; thorace capitis latitudine, subelongato, fere glabro, dorso postice subcordato impresso, impressione antice confertim punctulato, medio coarctato, postice subdilatato, angulis obtusis; elytris thoracis latitudine, cylindricis, subtilissime punctato-striatis, basi subrugulosis, postice sparsim testaceo pilosis, apice rotundatis; corpore subtus pallido, nitido, abdomine subinfuscato, subpiloso; tibiis anticis subovatis, oblique striatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platypus solidus Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

Anodius? exiguus Walk. $\frac{2}{3}$ l. (*Bostrichus*).

— *testaceus* Walk. $\frac{3}{4}$ l. (*Bostrichus*).

Anodius tuberculatus Motsch.

Elongatus, cylindricus, nitidus, punctulatus, rufo-testaceus, oculis mandibularumque apice nigris; capite transverso, subopaco, sparsim punctato et piloso, antice truncato, subreflexo, margine infuscato; thorace subelongato, dorso subelevato, antice rotundato, scarificato - rugoso, postice parallelo, glabro, marginis longe sparsim ciliatis, angulis posticis subrotundatis; elytris striatis, striis alternis distinctiore punctatis, interstitiis seriatim pilosis, postice oblique subtruncatis, sparsim tuberculatis

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Il paraît habiter toutes les parties de l'île Ceylan, même les plus hautes sommités et le continent indien.

Une espèce extrêmement voisine du continent indien est mon *Anod. denticulus*, qui est un peu plus grand, surtout plus large et plus cylindrique, avec toutes les stries fortement ponctuées sur les élytres, et dont le mâle présente sur le milieu de la troncature de l'abdomen deux tubercules évidemment dentiformes, parmi les autres plus petits, qui s'y trouvent.

Anodius piceus Motsch.

Elongatus, cylindricus, nitidus, punctulatus, rufo-piceus, oculis minutis, nigris; capite subtransverso, antice attenuato, marginato, lato bifoveolato, fronte impresso et trifoveolato, mandibulis infuscatis; thorace capite paulo latiore, elongato, subovato, medio subelevato, antice rugoso-punctato vel tuberculato, postice subglabro, angulis rotundatis, lateribus testaceo subciliatis, medio parallelis; elytris thoracis latitudine, subtiliter punctato-striatis, postice sparsim et seriatim cinereo piloso, apice oblique-subtruncato, sutura subelevata.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Anodius? vertens Walk. $1\frac{1}{2}$ l. (*Bostrichus*).

— *moderatus* Walk. 1 l. (*Bostrichus*).

Phloeotrogus Motsch. n. g.

Tête avancée, épaisse, atténuée en avant. Corselet presque plus large que les élytres, prismatiquement convexe dessus, sans impression marginale dessous. Antennes insérées latéralement entre la base des mandibules et les yeux; massue ronde, aplatie, solide, composée

de quatre articles; funicule de 6 articles, dont le 1-er grand et assez courtement conique, le 2-d le double plus étroit, allongé, les 3—6 très-transversaux, s'élargissant brusquement vers la massue, de sorte que vus avec une faible loupe ils paraissent former un seul article, l'article basilaire ou premier de l'antenne plus long que les 6 suivants réunis. Languette triangulaire, concave. Elytres cylindriques, leur moitié postérieure aplaniée obliquement vers l'extrémité, sans excavation et garnie de petits dents ou tubercules épars. Coxes antérieures très-rapprochés; 3-me article de tous les tarse simple; cuisses aplatiées; jambes dilatées en arc, les antérieures denticulées en avant, les médianes et les postérieures sur toute leur face extérieure, comme chez les *Histères*.

Phloeotrogus obliquecauda Motsch.

*Incrassatus, elongatus, cylindricus, nitidus, rufo-piceus, elytris postice infuscatis, antennis, pectore pedibusque testaceis; capite convexo, subelongato, antice attenuato, sparsim punctato et piloso, fronte medio longitudinaliter subelevato, mandibulis subexsertis; thorace capite latiore, subrotundato, convexo, medio subelevato, antice crebre tuberculato, postice glabro, angulis rotundatis; elytris fere thoracis latitudine, punctato-striatis, lateraliter subrugoso-punctatis, postice arcuatim-applanatis, apice medio utrinque seriatim tridenticulato et subtiliter tuberculato; corpore subtus nitido, sparsim piloso; femoribus anticis paulo dilatatis, tibiis depressis extus arcuatis, anticis apice versus 5 dentatis, mediis, ut in *Histeri*, multodenticulatis (8), posticis denticulatis et ciliatis.*

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l. Tab. IX, fig. 33.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une autre espèce du continent indien, le *Phleo. bidentatus*, est un peu plus petite, plus fortement ponctuée et présente les élytres profondément striées, avec deux dents aiguës postérieurement au milieu de la partie applanie. Une troisième espèce, également du continent indien, le *Phleo. sordicauda* m., est de la taille et des couleurs du *Phleo. obliquecauda*, mais plus courte et un peu plus large, ayant aussi les élytres finement striées, mais leur applanissement postérieur commence beaucoup plus près de la base et est recouverte de poils veloutés plus ou moins sordides. Une quatrième espèce des mêmes localités, le *Phleo. attenuatus* m., est encore un peu plus court, surtout aux élytres, qui sont distinctement atténuées et aussi sordides sur leur applanissement postérieur; corselet plus large que les élytres.

Phloeotrogus? mutilatus Walk. 3 l. (Bostrichus).

Tomicus adusticollis Motsch.

Elongatus, cylindricus, nitidus, punctulatus, nigro-piceus, antennis, thoracis basi, pectore pedibusque rufo-testaceis, oculis nigris; capite transverso, lateraliter sparsim punctato; thorace elongato, antice rotundato, transversim rugoso, sparsim ciliato, postice glabro, parallelo, angulis posticis subrectis; elytris thorace vix latioribus, parallelis, nitidis, punctato-striatis, postice truncatis, quadrispinosis, apice reflexo-marginatis.

Long. 1 l. — lat. elytr. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une autre espèce, le *T. quadrispinus* m. du Birma, se distingue de la précédente par une forme un peu plus

large, surtout au corselet, une couleur plus testacée sur tout le corps et les quatre épines plus prononcées sur la partie tronquée des élytres.

Eccoptyterus Motsch. n. g.

Hylésinide à tête avancée, épaisse, mais assez petite. Corselet très grand, embrassant presque la moitié du corps, convexe. Antennes insérées latéralement tout près des yeux, qui sont oblongs, massue ronde, aplatie, solide, un peu concave et opaque dessous, sans articulation distincte, funicule biarticulé, articles triangulaires, 1-er article presque aussi long que le funicule et la massue réunies. Languette triangulaire? Elytres courtes, atténuées et arrondies en arrière, largement excavées vers la suture et garnies de grandes dents sur les bords de cette excavation. Coxes antérieurs très-rapprochés. Cuisse assez aplaties. Jambes un peu arquées, dilatées vers l'extrémité, velues et ciliées extérieurement, les postérieures plus allongées que les antérieures. Tarses grêles, allongés à articles allongés, surtout aux postérieurs, où chacun des trois premiers est plus long que le dernier; 3-me article étroit et simple à tous les tarses. Abdomen convexe aussi long que les élytres. Ce nouveau doit prendre place à côté de nos *Eccoptogaster*.

Eccoptyterus sexspinosus Motsch.

Brevis, subovatus, punctatus, sparsim pilosus, nitidus, nigro-subpiceus, palpis, antennis tarsorumque articulo ultimo rufo-testaceis, coxis femoribusque albis; capite transverso, convexo, antice subtilissime crebre punctulato, postice glabro, nitido; thorace capite latiore, crasso, fere rotundato, transversim rugoso et tuberculato, sparsim erecto-

piloso, postice subglabro, vix nitido; elytris thoracis longitudine sed paulo angustioribus, postice arcuatim attenuatis, ruguloso-tuberculatis, sparsim breviter cinereo-pilosis, postice versus suturam longitudinaliter lato excavatis, excavationis margine utrinque acute tridentato; corpore subtus cinereo subvillosa.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. thor. $\frac{1}{2}$ l. Tab. IX, fig. 34. 18

Des Montagnes de Nura-Ellia et du Birma.

Hylurgus determinans Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

— *concinnulus* Walk. $\frac{3}{4}$ l.

Hylesinus curvifer Walk. $1\frac{2}{5}$ — $1\frac{3}{4}$ l. +

Hylesinus granulifer Motsch.

Subovatus, convexus, subopacus, granuloso-rugosus, brevissime setosus, fusco-ferrugineus, capite nigro, subtilissime punctulato; thorace subtransverso, profundo granuloso-rugoso, antice attenuato, postice bisinuato, medio subcarinato; elytris thoracis fere latitudine, profundo crenato-striatis, interstitiis elevatis, transversim rugosis, seriatim subalbo setulosis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Très - voisin de notre *Hyl. crenatus*; mais moitié plus petit.

Une espèce intermédiaire, un peu plus cylindrique, habite l'île de Candie. Elle est noire, avec les élytres d'un roux brunâtre et les tarse encore plus roussâtres;

la ponctuation sur la tête et le corselet est peu prononcée et peu profonde. Elle porte le nom de *Hyl. rufitarsis* m.

- Hylesinus despectus* Walk. 1 l.
 — ? *irresolutus* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.
Apate submedia Walk. 8 l.
Rhizopertha pusilla F. $1\frac{1}{6}$ l. *
Lyctus disputans Walk. $2\frac{1}{2}$ l.
 — *retractus* Walk. 2 l.
 — *brunneus* Steph. $1\frac{1}{2}$ —2 l.
Ptilinus binodulus Motsch. $1\frac{1}{2}$ l. *

Une forme voisine, mais plus courte, habite la Californie. Elle est noire, un peu pubescente, antennes et pattes plus roussâtres. Les premières sont formées comme chez les *Anobium* avec les trois derniers articles très allongés, les cinq précédents très-courts, presque transversaux. Sur le front du mâle s'élevaient deux longues cornes roussâtres droites, un peu courbées en dedans au bout. Je l'ai nommée *Anobides taurus*.

Serricorhynchus chinensis F. } (Dermestes) * +
Xyletinus serricornis Sch. }

Une espèce tout à fait pareille et de la même couleur, la *Serr. aegyptiacus* est moitié plus petite et habite l'Égypte, une troisième un peu plus foncée et plus luisante se trouve au Mexique; je l'ai nommée *Serr. micans*.

Ptinus nigerrimus Boield. } $1\frac{1}{2}$ l.
 — *lemoides* Walk. }

Myrmecospectra Nietneri Motsch. $1\frac{1}{4}$ l. +

Euglenus planipennis Motsch.

Elongatus, medio subparallelus, punctatissimus, brevissime puberulus, opacus, nigro-fuscus, humeris, plus minusve, tarsisque rufo-testaceis; capite subrotundato; thorace inaequale, postice lateralique impresso, fere capitis latitudine, quadrato, angulis anticis oblique truncatis; elytris thorace latioribus, dorso utrinque deplanatis, subconcavis, postice arcuatim-attenuatis, humeris subrectis, prominulis; femoribus posticis, subincrassatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Euglenus testaceipennis Motsch.

Elongato-subovatus, postice attenuatus, punctatus puberulus, nitidus, niger, elytris stramineo-testaceis, ore, palpis, antennis, pedibus anticis, geniculis, tarsisque mediis et posticis rufo-testaceis; capite nitido, punctato; thorace subaeneo, capite vix angustiore, subquadrato, inaequale, fortiter punctato, sparsim puberulo, angulis oblique truncatis, lateribus paulo dilatatis; elytris capite vix latioribus, punctatis, sparsim puberulis, sutura lateribusque angustissime nigro marginatis, postice arcuatim-attenuatis; ano testaceo; femoribus posticis subincrassatis.

Long $\frac{3}{4}$ l. — lat. elytr. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Xylophilus rufipes Motsch.

Subabbreviatus, subdeplanatus, punctatus, vix nitidus, nigro-fuscus, elytris fusco-testaceis, oculis prominulis, nig-

ris, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite transverso, rugoso-punctato; thorace capite angustiore, punctato, inaequale, antice oblique-attenuato, postice subquadrato, basi arcuato, profundo impresso, angulis posticis rectis, lateribus antice subangulatis, marginis dilutionibus; elytris basi capitis latitudine, postice subdilatis, crebre punctatis, antice pone scutellum utrinque paulo elevatis, humeris subprominulis.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. elytr. $\frac{2}{5}$ l.

Montagnes de Nura-Ellia.

Bruchus scutellaris F.

Spermophagus convolvuli Thunb.

- *figuratus* Walk. 1 l.
- *cisti* F.
- *incertus* Walk. 1 l.
- *decretus* Walk. $\frac{1}{2}$ l.

F. ERNOPHAGES.

Brachycéphales.

Sagra nigrita Oliv.

Donacia Delesserti Guer.

Coptocephala Templetoni Baly.

Corynodes cyaneus Hope.

- *aeneus* Baly.

Glyposcelis Templetoni Baly.

- *pyrospilotus* Baly.
- *micans* Baly.
- *cupreus* Baly.

Eumolpus lemoides Walk.

Cryptocephalus sexpunctatus F.

— *Walkerii* Baly.

Diapromorpha turcica F.

Nodostoma signata Motsch. Et. (*Metachroma*) 1 l. +

Nodina pusilla Motsch. $\frac{2}{3}$ l. *

Colaspis aureofasciata Nietner.

Oblonga, convexa, cribroso-punctatissima, nigro-violacea, thoracis marginis, elytrorum humeris, fasciis duabus mediis apiceque purpureo-aureis, nitidis, fronte, corpore subtus pedibusque cupreo-aureis, ore, palpis antennis (basi excepto), oculis tarsisque nigris, antennarum articulo 2-do rufo-testaceo; fronte depresso, punctato-rugoso, medio linea longitudinali vix distincta, antice bümpresso, antennis dimidio corporis longioribus, tenuis, apice vix incrassatis, articulis elongatis, 2-do brevissimo, 1-o paulo longiore; thorace transverso-quadrangulato, crebre scrobiculato; elytris thorace latioribus, creberrime scrobiculato-punctatis, versus suturam punctis fere in striis dispositis, postice aequaliter attenuatis, humeris prominulis; tarsis dilatatis, articulo 2-do brevi, transverso.

Long. $3\frac{1}{5}$ l. — lat. hum. $1\frac{4}{5}$ l.

M. Nietner l'a découverte sur les feuilles de la *Wrudlandia bicuspidata* à Nura-Ellia.

Chalcolampa Templetoni Baly.

Lina? *convexa* Baly.

Chrysomela? *Templetoni* Baly.

Luperodes alboplagiatus Motsch. $1\frac{1}{2}$ l. +

Graptodera cyanea F.

Monolepta pulchella Baly.

Aphthona latissima Motsch.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. 1 l. + *

— dimidiata Motsch.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l. +

— viridifusca Motsch.

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{5}$ l. +

Thyamis ceylonicus Baly.

Psylliodes viridana Motsch. $1\frac{1}{5}$ l. +

Leptispa pygmaea Baly.

Amplispa Dohrnii Baly.

Estigmaena chinensis Hope.

Hispa ceylonica Motsch. Schrenck Reise $1\frac{1}{2}$ l. +

— fulvipes Motsch. Schrenck Reise $1\frac{1}{2}$ l. +

— Perotetii Guer. Motsch. $1\frac{2}{5}$ l. +

— Walkeri Baly.

— erinacea F.

— histrix F.

Platypria echidna Guer.

Anisodera zinzibaris Nietn. Motsch.

Elongata, postice aequaliter subdilatata, supra opaca, subtus nitida, nigra, thorace elytrisque rubris, pectoris medio subtestaceo; capite minuto, subquadrato, fronte antice rubro, antennis subfiliformibus, dimidio corporis fere longitudine; thorace capite paulo longiore, quadrato, marginato, marginis subcrenulatis, medio antice bifoveolato po-

stice transversim impresso, sparsim punctato, angulis anticis excisis, posticis acutis, prominulis; elytris thorace latioribus, grosso per pariam punctato-striatis, utrinque carinis duabus ad basin conjunctis, fortiter elevatis, carina 3-ia laterali minus distincta; tarsis dilatatis, articulis valde transversis, 3-o longissimo bilobo, lobis longitudine 4-0 superantibus.

Long. $1\frac{2}{3}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{3}{4}$ l.

Trouvé par M. Nietner sur le gingembre à Nura-Ellia.

Epistictia matronula Boh.

Hoplionota tetraspilota Baly.

— *rubromarginata* Boh.

— *horrifera* Boh.

Aspidomorpha St. crucis F.

— *miliaris* F.

— *pallidimarginata* Baly.

— *dorsata* F.

— *calligera* Boh.

— *micans* F.

Cassida clathrata F.

— *timefacta* Boh.

— *farinosa* Boh.

Lacoptera 14 notata Boh.

Coptocycla 6 notata F.

— 13 *signata* Boh.

— 13 *notata* Boh.

— *ornata* F.

— *ceylonica* Boh.

— *Balyi* Boh.

— *trivittata* F.

Coptocycla 15 punctata Boh.

— *catenata* Dej.

Platycéphales.

Coccinella tricincta F.

— *repanda* Muls.

— *tenuelinea* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

— *rejiciens* Walk. 2 l.

— *interrumpens* Walk. $1\frac{1}{2}$ l.

— *quinqueplaga* Walk. $\frac{3}{4}$ l.

— *simplex* Walk. $\frac{1}{2}$ l.

— *antica* Walk. $\frac{2}{3}$ l.

— *flaviceps* Walk. $\frac{2}{3}$ l.

Neda tricolor F.

Coelophora 9 maculata ? F.

Chilocorus nigromarginatus Nietn.-Motsch. $1\frac{3}{4}$ l. †

— *opponens* Walk. 2 l.

Jauravia pallidula Motsch. 1 l. *

Epilachna 28 punctata F.

— *Delessertii* Guér.

— *pubescens* Hope.

— *innuba* Ol.

Aspidimerus circumflexus Motsch. (*Platynaspis*) 1 l. †

— *limbatus* Motsch. (*Scymnus*) $\frac{5}{6}$ l. *

— *suturalis* Motsch. (*Scymnus*).

Scymnus transversoplagiatus Motsch.

— *quadrillum* Motsch.

— *latemaculatus* Motsch.

— *variabilis* Walk. $\frac{1}{2}$ l.

— *saciformis* Motsch.

— *ceylonicus* Motsch.

Sacium unifasciatum Motsch. $\frac{1}{2}$ l. †

- Phalaerus rufitarsis Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +
 — rubidus Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +
 — ? conjiciens Walk. $\frac{4}{5}$ l.
 — ? contractus Walk. $\frac{1}{2}$ l.
 Augasmus mandibularis Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +
 Olibrus rufescens Motsch. $\frac{2}{3}$ l. +
 — brunnescens Motsch. $\frac{3}{5}$ l. +
 — pallidulus Motsch. $\frac{1}{2}$ l. +
 Languria minima Motsch. Schrenck. R. 2 l. +
 — nigriventris Motsch. Schr. R.
 — coeruleipennis Motsch. Schr. R.

Rhynchocéphales.

- Cerobates 6 sulcatus Motsch. 2 l. +
 — aciculatus Walk. 3 l.
 Arrhenodes miles Sch.
 — pilicornis Sch.
 — dentirostris Jek.
 — approximans Walk. $8\frac{1}{2}$ l.
 Geocephalus cavus Walk. 11 l.
 — reticulatus F.
 Nemocephalus sulcirostris De Haan.
 — planicollis Walk. 10 l.
 — spinirostris Walk. 13 l.
 Apoderus longicollis? F.
 — tranquebaricus F.
 — cygneus? F.
 — scitulus Walk. $2\frac{1}{4}$ l.
 — triangularis F.
 — echinatus Sch.
 Rhynchites suffundens Walk. $1\frac{1}{2}$ l.
 — restituens Walk. 2 l.

- Apion gracile* Gerst. 1 l. †
 — *nitidulum* Gerst. $1\frac{1}{6}$ l. †
 — *ceyonicum* Gerst. $1\frac{1}{6}$ l. †
 — *cingalense* Walk. $1\frac{1}{4}$ l.
Strophosomus suturalis Walk. $2\frac{3}{4}$ l.
Piazomias aequalis Walk. $3\frac{1}{2}$ l.
Astycus lateralis F.
 — *ebenus* Walk. $3\frac{1}{2}$ l.
 — *immunis* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.
Cleonus inducens Walk. 6.
Myllocerus transmarinus? Hrbst.
 — *spurcatus* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.
 — *retrahens* Walk. $1\frac{3}{4}$ l.
 — *posticus* Walk. $2\frac{1}{4}$ l.
Phyllobius mimicus Walk. $1\frac{2}{3}$ l.
Episomus pauperatus F.
Lixus nubulifascia Walk. $5\frac{1}{2}$ l.
Aclees cribratus Dej.

Orthosinus Motsch. n. g.

Erirhinide à élytres terminées par une petite queue bifide en arrière. Forme voisine de nos *Orthochaetes*, mais plus grande. Rostre cylindrique, assez grêle, aussi long que le corselet, vertical et un peu courbé. Antennes insérées presque au milieu du rostre, de huit articles dont six forment le funicule, le 1-er est triangulairement conique et très-distinctement séparé des autres, les 2—6 grossissant peu à peu vers la massue avec laquelle ils paraissent former un seul article obliquement tronqué au bout, mais avec la loupe on distingue le 2-d article en cône allongé plus long que le 1-er, puis les 3—6 très-transversaux et le 7-me ou la massue, ova-

laire, solide, sans articulation visible et largement tronqué à l'extrémité. Corselet presque carré un peu cylindrique, sans canaliculation pour la réception du bec. Elytres scrobiculées, un peu plus larges que le corselet, ovalaires, atténuées en arrière et terminées par une queue, armée de chaque côté d'un tubercule saillant. Hanches antérieures rapprochées; jambes terminées par un crochet aigu un peu courbé; troisième article des tarsi un peu bilobé en dessus.

Ortho. sculpticollis Motsch.

Elongato-subovatus, serobiculatus, opacus, nigro-piceus, tuberculis et lineis spongiosis rufo-testaceis variegatus, antennis tarsisque rufo-piceis; capite sparsim scrobiculato, rostro antice tricarinato, carina media lata, oculis paulo prominulis; thorace quadrato-cylindrico, profundo scrobiculato cribroso, interstitiis in lineis lateraliter sinuatis elevatis, margine antice medio spongioso-bituberculata; elytris scrobiculato-striatis, interstitiis in carinis, plus minusve interruptis elevatis et spongioso lineatis et tuberculatis, 3-0 utrinque versus apicem in nodo divaricato producto; corpore subtus sparsim grosso punctato.

Long. 2—2 $\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ — $\frac{5}{6}$ l.

Ortho. velatus Motsch.

Elongato-ovatus, medio subcylindricus, scrobiculatus, opacus, nigro-piceus, argillaceo spongiosus, antennis pedibusque rufo-piceis; capite rostroque sparsim grosso-punctatis, hoc antice sagittiforme carinato; thorace subconico, scrobiculato argillaceo-subspungioso; elytris thorace latioribus, profundo cancellato-striatis, interstitiis angustatis, in

carinulis supra argillaceo - spongiosis, elevatis, 3-0 postice nodo subproducto; corpore subtus scrobiculato-punctato.

Long. $2-2\frac{1}{6}$ l. — lat. $\frac{3}{4}-\frac{4}{5}$ l.

Toutes les deux espèces des Montagnes de Nura-Ellia.

Alcides signatus Boh.

- *obliquus* Walk. 5 l.
- *transversus* Wrlk 4. l.
- *clausus* Walk. $3\frac{3}{4}$ l.

Acienemis ceylonicus Jek.

Apotomorhinus signatus Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

- *alboater* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Barisoma pandanicola Nietn. Motsch. (*Centrinus*?)

Oblongo - ovata, dorso depressa, punctulata, nitida, nigerrima, antennis pedibusque subpiceis; capite minuto, rostro horizontale, angustato, cylindrico, subcurvato, in ♂ thoracis longitudine in ♀ dimidio brevior; thorace subquadrato, antice arcuatim attenuato, subconvexo, sparsim punctulato, lateribus leviter arcuatis, angulis posticis subinflexis, fere rectis; elytris thorace paulo latioribus, profunde crenato-striatis, interstitiis convexis, humeris rectis, prominulis, apice arcuato-attenuatis; femoribus subdilatatis, unidentatis. ♂

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{6}{7}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia, M. Nietner l'a trouvé sur les feuilles des *Pandanus*.

Apotomorhinus signatus Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

- *alboater* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

Cryptorhynchus ineffectus Walk. $3\frac{1}{2}$ l.

— *notabilis* Walk. 4 l.

— *declaratus* Walk. 5 l.

— *vexatus* Walk. 5 l.

— ? *assimilans* Walk. 5 l.

Camptorhinus reversus Walk. 4 l.

— *indiscretus* Walk. $3\frac{3}{4}$ l.

Coelosternus angulatus Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

— *albotessellatus* Motsch. $\frac{4}{2}$ l. +

Coeliösomus undulatus Motsch. $\frac{4}{5}$ l. +

— *pictus* Motsch. $\frac{4}{5}$ l. +

Desmidophorus hebes F.

— *communicans* Walk. $\frac{3}{4}$ l.

— *sternuus* Walk. 5 l.

— *inexpertus* Walk. $2\frac{3}{4}$ l.

— *discriminans* Walk. 5 l.

— *fasciculicollis* Walk. 3 l.

Zygops ? *balsaminae* Nietn.-Motsch.

Depressus, ovatus, antice posticeque attenuatus, opacus, albo pubescens, thorace elytrisque fusco-nigroque irroratis pedibus fusco-annulatis, macula scutellari altera suturale ante apicem albis, antennarum basi, rostris apice tarsisque rufescentibus; capite minuto, oculis valde approximatis, vix prominulis, nigris, rostro thorace longiore, subcylindrico, arcuato, postice tricarinulato; thorace transverso, conico, punctato, pubescens, lateribus vix arcuatis, angulis posticis subacutis; elytris thorace longioribus, punctatissimis, striatis, pubescentibus, aequaliter triangulare attenuatis, postice arcuatim truncatis, humeris rotundato-productis; abdomine elytrorum apice superante, segmento

ultimo lateraliter albo-fasciculoso; femoribus clavatis, lato unidentatis.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. hum. 1 l.

Découvert par M. Nietner sur des Balsamines à Nura-Ellia.

Mecinus? relictus Walk. $2\frac{1}{4}$ l.

Sipalus granulatus F.

— porosus Walk. 3 l.

— tinctus Walk. 9 l.

Rhynchophorus ferrugineus F.

— introductus Walk. 18 l.

Protocerus molossus? Ol.

Sphaenophorus glabridiscus Walk. 7 l.

— exquisitus Walk.

— Dehaani? Jek.

— cribricollis Walk 5 l.

— ? panops Walk. $2\frac{1}{2}$ l

Sitophilus oryzae L.

— disciferus Walk. $1\frac{3}{4}$ l.

Podalgomerus Motsch. n. g.

Cossonide avec le corps opaque, plus ou moins pubescent et les cuisses claviformes très-longues et fortement unidentées au milieu. Antennes de 11 articles, coudees, insérées un peu en avant du milieu et terminées par une massue oblongue de deux articles, occupant presque la moitié de l'antenne; funicule composé de 7 articles, dont le 1-er grand triangulaire, les suivants très-petits, transversaux et s'élargissant vers la massue. Trompe cylindrique, courbée, saillante, plus courte

que le corselet. Tête petite, yeux très-rapprochés, aplatis, embrassant presque toute la tête. Corselet allongé, parallèle en arrière, atténué vers la tête. Ecusson indistinct ou nul. Elytres de la largeur du corselet et moitié plus longues, un peu atténuées en arrière, ne laissant libre que le dernier segment de l'abdomen, mais qui est verticalement incliné, de sorte qu'il ne surpasse guère l'extrémité des élytres; elles sont largement striées, les intervalles étroitement élevés en carène. Cuisses postérieures plus longues et plus grandes que les autres; jambes arquées, surtout les postérieures, les intermédiaires avec un forte dent sur la face extérieure un peu en avant de leur extrémité; tarsi de quatre articles, dont le 3-me assez étroit et distinctement bilobé.

Podalgomerus nebulosus Motsch.

Angustatus, subcylindricus, postice leviter attenuatus, punctatissimus, opacus, niger, thoracis lateribus elytrorum fasciis interruptis tribus femoribusque annulis cinereo-puberulis, antennis femoribus basi, tibiis tarsisque plus minusve rufo-testaceis; rostro tenue, arcuato, basi paulo dilatato tricarinulato; apice subincrassato, rufescente; thorace capite latiore, elongato, subcylindrico, creberrime punctato, medio linea subelevata, nitida, lateribus antice attenuatis, postice parallelis, angulis posticis rectis; elytris thorace vix latioribus, parallelis, apice arcuatim attenuatis, lato crenulato-striatis, interstitiis angustissimis, elevatis; femoribus clavatis, lato unidentatis, posticis dimidio corpore longioribus, tibiis posticis valde curvatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ l — lat. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ l. Tab. IX. fig. 35.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cossonus quarimacula Walk. $1\frac{1}{4}$ l.

— ? *hebes* Walk. $2\frac{1}{2}$ l.

— *ambiguus* Sch.

Phloeophagus linearis Motsch.

Angustatus, cylindricus, punctatissimus, subnitidus, rufobrunneus; rostro longitudine thoracis paulo brevior, fere recto, postice transversim impresso, fortiter rugoso-punctato, antice glabro, medio bituberculato; thorace elongato, subconico, crebre punctato, postice paulo arcuatim angustato; elytris thoracis latitudine et plus duplo longioribus, profundo crenato-striatis, interstitiis paulo convexis.

Long. $1\frac{1}{3}$ —2 l. — lat. $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ l.

Encore plus étroit que notre *Cossonus linearis* et de couleur moins luisante.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phloeophagus? cossonoides Motsch.

Elongatus, antice posticeque attenuatus, subconvexus, punctatus, nitidus, niger, antennis tarsisque rufo-piceis; rostro horizontali, vix arcuato, cylindrico, punctato, antennarum clava ovata, solida, vix distincto biarticulata, rufa; thorace conice attenuato, crebre punctato, lateribus arcuatis, postice incurvis; elytris thoracis latitudine et plus duplo longioribus, postice attenuatis, lato punctato-striatis, stria suturali profundiora, interstitiis angustis, subconvexis;

corpore subtus punctulato; antennis versus basin thoracis insertae, 10 articulatis, funiculo septem articulato, articulis valde transversis, 1-o solum conico, subelongato.

Long. $1\frac{2}{5}$ — $2\frac{1}{3}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ — $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia..

(▲ continuer.)