

Dott. Edgardo Moltoni

Vice Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

---

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEGLI UCCELLI  
DELLA SOMALIA ITALIANA

---

In aggiunta al mio lavoro già stampato su questi Atti, 1933, dal titolo « *Elenco degli uccelli raccolti dal Prof. G. Scortecci nella Somalia Centrale e Settentrionale* » riporto ora notizie di oltre *trecentotrenta* esemplari appartenenti a *centocinquantaquattro* forme diverse ed a *quarantanove* famiglie, catturati in massima parte nella Somalia meridionale, Oltre Giuba compreso.

Con questo studio, che è il settimo lavoro sugli uccelli della Somalia eseguito da ornitologi italiani, si è ancora lontani dal conoscere bene l'avifauna della più orientale delle nostre colonie africane, ad ogni modo per la conoscenza di essa si porta un notevole contributo, dovuto di massima alla solerzia dei raccoglitori che non si limitarono alla preparazione ed all'invio degli uccelli più vistosi.

Tra questi, primo fra tutti, si deve annoverare il sig. Luppi appartenente all'Amministrazione della Somalia il quale raccolse nel Benadir e nell'Oltre Giuba ed inviò al nostro Museo due lotti di uccelli di circa 120 esemplari ciascuno. Secondo, come quantità di esemplari inviati, è S. E. il Dott. G. Corni, già Governatore della Somalia, indi il Tenente L. Boschis, il Colonnello I. Carnovali, ed altri cacciatori che desiderosi di far conoscere la fauna della colonia inviarono al Museo quella parte dei frutti delle loro caccie che poterono conservare.

Questa massa di uccelli, pochi esclusi, raccolta nella Somalia meridionale appartiene di massima alla formazione di foresta equatoriale per cui si verrebbe a confermare ciò che è già noto per lo studio di altri gruppi di animali e cioè che la Somalia meridionale ha molto più affinità colle regioni limitrofe del Chenia e dell'Abissinia che non con la restante Somalia posta al Nord dell'Uebi Scebeli.

In questo contributo viene descritta una nuova forma di otarda, *Eupodotis canicollis parva*, e sono elencate forme non ancora citate per la nostra Somalia.

Per ragioni ovvie ho creduto opportuno comprendere in questo studio anche un esiguo lotto di uccelli somali, circa cinquanta, inviati per la determinazione dal Prof. Daniele Rosa già Direttore dell'Istituto di Zoologia e di Anatomia Comparata della R. Università di Modena; tra essi quelli che non portano la data precisa di cattura, furono presi a Mogadiscio o negli immediati dintorni nel primo semestre del 1929 e furono donati da S. E. il Dott. G. Corni allora Governatore della Somalia.

La zona ove essi furono catturati e la data approssimativa degli esemplari che non portano indicazioni precise mi furono comunicate dietro richiesta dal Prof. I. Sciacchitano di quell'Istituto che le ebbe dal Luppi il quale preparò gli uccelli per il Dott. Corni.

Nell'elenco che segue, di fianco a ciascun esemplare che non sia stato procurato direttamente dal Luppi è posto il nome del raccoglitore; quelli non conservati in Museo, che sono poi gli esemplari di proprietà dell'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Modena porteranno oltre la data di cattura, spesso approssimativa, la dicitura R. Università di Modena.

Per ogni forma ho fatto precedere al nome scientifico il nome italiano che purtroppo spesso è risultato composto di parecchie voci qualificative; ciò è dovuto, data la attuale sottodivisione delle specie in forme geografiche, al bisogno di poter distinguere le diverse forme.

Molti nomi torneranno nuovi perchè ho dovuto coniarli traducendo il nome latino o quello inglese corrispondente, fatica non lieve che spero sarà apprezzata specialmente dalle persone non ornitologiche di professione.

## Ordine *Ratitae*

### Famiglia *Struthionidae*

1. Struzzo della Somalia - *Struthio camelus molybdophanes*, Reichw..

a) ♀ N. 24706, Bidi-Scionde, Basso Giuba, V-VI 1922 (T. Zammarano).

b) ♂ — El Bur, 12-VII-1930 (G. Corni).

c) zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare nella R. Università di Modena.

## Ordine *Ciconiiformes*

### Famiglia *Pelecanidae*

#### 2. Pellicano rossiccio - *Pelecanus rufescens*, Gmel..

a) zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.



Fig. 1. — Gruppo di Pellicani rossicci lungo la costa di Bender Cassim.

Questo pellicano non risulta ancora citato per la Somalia italiana. Il Prof. Scortecci mi procurò la fotografia riprodotta che dimostra l'abbondanza della specie sulle coste più settentrionali della colonia (Bender Cassim).

### Famiglia *Ardeidae*

#### 3. Airone testanera - *Ardea melanocephala*, Vig. et Childr..

a) ♂ N. 24707, Golgia, Oltre Giuba, III-1926, « occhi gialli ».

b) — Golgia, 1926.



Famiglia **Scopidae**

10. Umbretta di Bannerman - **Scopus umbretta bannermani**, C. Grant.

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Famiglia **Ciconiidae**

11. Cicogna - **Ciconia ciconia ciconia** (Linn.).

- a) Esemplare senza data della Somalia meridionale.

Questa specie non risulta ancora espressamente citata per la Somalia italiana.

12. Cicogna collolano africana - **Dissoura episcopus microscelis** (Gray).

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

13. Sfenorinco - **Sphenorynchus abdimii** (Licht.).

- a) ♂ N. 24710, Afgoi, -IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).

Anche questa specie non risulta citata per la Somalia italiana.

14. Anastomo d'Africa - **Anastomus lamelligerus lamelligerus**, Temm..

- a) ♀, Mogadiscio, V-1929 « occhi marrone », nella R. Università di Modena.

15. Mitteria del Senegal - **Ephippiorhynchus senegalensis** (Shaw.).

- a) ♂ N. 24711, Audegle (Uebi Scebeli), 1926 « occhi neri ».

Questa Mitteria non risulta citata per la nostra Somalia.

16. Tantalo - **Ibis ibis** (Linn.).

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Famiglia **Plegadidae**

17. Ibis sacro - **Threskiornis aethiopicus aethiopicus** (Lath.).

a) Esemplare della Somalia meridionale, 1929.

18. Tantalò hagedash dell' Africa orientale - **Hagedashia hagedash erlangeri**, Neum..

a) ♂ ? N. 24774, Mogadiscio, VI-1929 « occhio con pupilla nera e piccolo cerchio bianco ».

Ordine **Anseriformes**Famiglia **Anatidae**

19. Anatra arborea facciabianca - **Dendrocygna viduata** (Linn.).

a) ♂ N. 24712<sup>A</sup>, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926.

b) ♀ N. 24712<sup>B</sup>, Afmadù, VI-1926.

20. Oca egiziana - **Alopochen aegyptiacus** (Linn.).

a) ♀ N. 24713, Golgia, Oltre Giuba, III-1926, « occhi aranciati ».

Ordine **Falconiformes**Famiglia **Aegyptiidae**

21. Falsogrifone africano - **Pseudogyps africanus** (Salvadori).

a) ♀ N. 24714, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926, « occhi marrone ».

Questa specie non risulta ancora citata per la Somalia italiana. Attribuisco anche a questa forma gli avvoltoi fotografati dallo Scortecci nella Piana di Mansur, Oltre Giuba, il 26 giugno 1931 mentre sono riuniti attorno ad una carogna e riprodotti nella Tav. IX. Anche quello in volo credo debba appartenere a questa specie.

22. Capovaccaio pileato - *Necrosyrtes monachus pileatus*  
(Burch.).

- a) ♂ N. 24715<sup>A</sup>, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926,  
b) ♀? N. 24715<sup>B</sup>, Afmadù, V-1926.

Occhi neri, parti nude della testa rosso-viola, chiazze sotto la gola biancastre.

L'individuo femmina?, è un poco più chiaro superiormente del maschio.

Famiglia **Falconidae**

23. Falco cuculo orientale - *Falco amurensis*, Radde.

- a) ♂ N. 24797, Obbia, I-1931 (Ten. L. Boschis).  
b) *juv.* N. 24796, Obbia, I-1931 (Ten. L. Boschis).

Questa specie non risulta ancora espressamente citata per la Somalia italiana.

24. Falco semitorquato abissino - *Polihierax semitorquatus castanotus* (Heuglin).

- a) ♂ N. 24727, Villaggio Duca degli Abruzzi, IV-1929, « occhi marrone ».  
b) mummia in abito di maschio da Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

25. Nibbio egiziano - *Milvus migrans aegyptius* (Gmel.).

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

26. Aquila dal ciuffo - *Lophaëtus occipitalis* (Daud.).

- a) ♀, Caitoi (Merca), III-1929, « occhi gialli », esemplare della R. Università di Modena.

Quest' aquila non risulta ancora citata per la Somalia italiana.

27. Falco giocoliere - *Terathopius ecaudatus* (Daud.).

- a) Afgoi, IV-1933 (Col. I. Carnevali).  
b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

28. Aquila gridatrice - *Cuncuma vocifer* (Daud.).

- a) ♂ N. 24717, Curcumessa, Oltre Giuba, I-1926, « occhi marroni, cera gialla, gambe biancastre ».  
 b) *ad.*, zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.  
 c) *juv.*, id. id.

29. Astore cantante dell' Africa orientale - *Melierax poliopterus*, Cab..

- a) N. 24716<sup>A</sup>, Chisimaio, Oltre Giuba, 1925.  
 b) N. 24716<sup>B</sup>, Chisimaio, 1925.

Questa specie fu da me citata per la Migiurtinia in base ad un individuo giovane catturato dal Prof. Scortecci a Gardo nell'agosto 1931, ove appariva relativamente comune, era però già nota per la nostra colonia.

Ordine *Galliformes*Famiglia *Phasianidae*30. Francolino crestato del Giuba - *Francolinus sephaena jubaensis*, Zedl..

- a) ♂ N. 24718, Mogadiscio, V-1925, « occhi castani ».  
 b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare dubbio della R. Università di Modena.

Nome somalo: *Dor-Dur*.

31. Pterniste somalo - *Pternistis leucoscepus muhamedben-abdullah*, Erl..

- a) ♀ N. 24719, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926, « occhi quasi neri ».  
 b) ♀ N. 24720, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926, « occhi marrone scuro ».  
 c, d) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplari maschi della R. Università di Modena.

L'esemplare N. 24719 ed uno di quelli dell'Università di Modena presentano le macchie chiare delle parti superiori molto più ampie di quelle corrispondenti degli altri individui.

Pternisti che io attribuisco a questa forma furono già da me citati per la Migiurtinia (zona Kubo-Gardo) su un esemplare riportato dallo Scortecci, che riscontrò detto pterniste relativamente comune nella zona.

32. Pterniste infuscato - *Pternistis leucoscepus infuscatus*, Cab..

a) ♂ N. 24728, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926, « occhi quasi neri ».

Considero detto individuo come appartenente alla forma *infuscatus* essendo esso di un tono di colore molto più scuro di quello degli altri individui che ho presenti; compresa la femmina della forma *muhamed-ben-abdhullah* presa nella stessa località e nel medesimo periodo. Con tutta probabilità nella zona di Golgia, al confine col Chenia, si trovano individui intermedi tra le due forme ed individui che tendono piuttosto verso una o l'altra delle due forme a contatto.

Questo Pterniste è del resto già citato per la nostra Somalia dall'Erlanger e dallo Zedlitz.

33. Numida crestata del Chenia - *Guttera pucherani*, Hartl..

a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

È specie già citata dall'Erlanger (Mfùdu) e da van Someren per il Giuba (Jebeir = Giabbi?).

34. Numida vulturina - *Acryllium vulturinum* (Hardw.).

a) Esemplare della Somalia meridionale.

b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Questa specie fu rinvenuta dallo Scortecci anche in una boscaglia foltissima a 100 Km. da Gallacchio (reg. di Obbia <sup>(1)</sup>); per Gallacchio è pure citata dallo Witherby in *Ibis*, 1905, p. 523 in base ad un individuo catturato il 3 aprile 1903 dal Capitano Hamerton.

---

(1) *Natura*, Rivista di Scienze Naturali, vol. XXIII, 1932, p. 11.

Ordine **Gruiformes**Famiglia **Jacamidae**

35. Parra africana - **Actophilornis africana** (Gmel.).

a) ♀, Somalia meridionale, 1925-1926.

Famiglia **Otididae**

36. Otarda struzziuncola - **Choriotis struthiunculus** (Neum.).

a) N. 24721, Oltre Giuba, 1925 (Ten. B. Valentino Vecchi).

b) N. 24722, Piana di Chisimaio, 1928 (G. Corni).

Questa otarda non risulta citata per la Somalia italiana.

37. Otarda canicollo minore - **Eupodotis canicollis parva**,  
subsp. nova.

a) ♀ N. 24725, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926, « occhi biancastri » *Typus*.

b) in abito di ♀ molto probabilmente della medesima località e preso insieme all'altro individuo.

Istituisco una nuova sottospecie di *Eupodotis canicollis* basandomi sopra i succitati esemplari che si distinguono facilmente da quelli delle forme affini per la loro mole assai minore.

Li ho confrontati oltre che colle tavole che raffigurano la specie, coi due tipi ♂ e ♀ dell'*Eupodotis (Otis) canicollis*, Reichenow esistenti nella Collezione ornitologica Turati e che furono ceduti dal Reichenow stesso <sup>(1)</sup>.

Riunisco in una tabella le misure dei due tipi di *Eup. can. canicollis* e dei due esemplari attribuiti alla nuova sottospecie per far risaltare le diverse dimensioni.

---

(1) Molto probabilmente questi esemplari furono inviati al Prof. Reichenow nel 1880 dal mercante Abdu Gindi, che si trovava nella zona di Bardera (Giuba), e che si può considerare la prima persona che raccolse e inviò agli studiosi uccelli della Somalia.

|       | <i>Eupodotis can. canicollis</i> |         | <i>Eupodotis can. parva</i> |     |
|-------|----------------------------------|---------|-----------------------------|-----|
|       | ♂ typus                          | ♀ typus | ♀ typus                     | ♀ ? |
| Ala   | mm. 305                          | 284     | 290                         | 287 |
| Becco | » 40                             | 35      | 31? <sup>(1)</sup>          | 31  |
| Tarso | » 105                            | 102     | 95                          | 91  |




Fig. 2. — A sinistra *Eupodotis canicollis parva*, Moltoni; a destra *Eupodotis canicollis canicollis* (Reichw.).

Non si tratta di individui giovani in quanto che hanno il colore del piumaggio simile alla femmina adulta di *Eup. can. canicollis* inviata dal Reichenow ed anzi dirò che la nuova forma

(<sup>1</sup>) Il punto interrogativo è messo perchè il becco è un poco sciupato dalla preparazione.

è molto più simile, benchè superiormente sia più scura (si veggia Fig. 2), alla forma tipica che all' *Eupodotis somaliensis* (Erlanger). Le misure somatiche poi sono ancora inferiori a quelle date dal Reichenow per i giovani in *Die Vögel Afrikas* a p. 249 del primo volume. Come tono di colore delle parti superiori gli esemplari in questione sono poi più scuri di quello rappresentato nella tavola a colori annessa al lavoro dell' Erlanger in *Journ. f. Ornith.*, 1905, Tav. II, fig. 1, sul quale esemplare si è basato il Reichenow per istituire la forma *Otis canicollis erlangeri* (*Vögel Afrikas*, p. 802, volume III, specie 214 bis), ritenuta ora sinonimo della forma tipica.

Le macchie apicali bianche delle piume sottoascellari negli esemplari della nuova forma mancano tranne in alcune ove però sono ridotte ad una minima orlatura.

38. Otarda gindiana - *Lophotis gindiana gindiana* (Oust.).

- a) ♂ N. 24723, Mogadiscio, V-1925 « occhi gialli, zampe biancastre-gialle ».  
 b) ♀ N. 24724, Chisimaio, VIII-1925 « occhi giallo-chiaro ».

39. Otarda di Hartlaub - *Lissotis hartlaubii* (Heugl.).

- a) Esemplare maschio della Somalia meridionale, 1929.  
 b) ♂ N. 24237, dintorni di Mahaddei Uen, 22-II-1924 « iride gialla » (Magg. A. Dall' Era).

Questa otarda non risulta citata, fino ad oggi, per la Somalia italiana.

Ordine **Charadriiformes**

Famiglia **Charadriidae**

40. Piviere di Leschenault - *Charadrius leschenaulti*, Lesson.

- a) ♂ juv. N. 24729, Chisimaio, VIII-1925 « occhi neri ».

Questo piviere è già citato per Chisimaio dall' Erlanger col nome di *Charadrius geoffroyi*.

41. Pavoncella coronata somala - **Stephanibyx coronatus demissus**, Friedmann.

- a) ♀ N. 24732, Mogadiscio, V-1925.  
 b) ♀ N. 24733, Mogadiscio, VI-1929.

Per questa nuova forma si vegga H. Friedmann in *Proc. N. Engl. Zool. Cl.*, X, p. 97, 1928.

Questa pavoncella fu da me già citata per individui catturati dallo Scortecci nella Somalia centrale e settentrionale (Gal-lacchio e Gardo), ma era già stata riscontrata nella nostra colonia (Dolo, Barri, Brava, Afgoi).

42. Piviere lugubre - **Stephanibyx lugubris**, Lesson.

- a) ♂ N. 24730, Afgoi, V-1925 « iride gialla ».  
 b) ♀ N. 24731, Afgoi, V-1925 « iride gialla ».

Il piviere lugubre non mi risulta ancora citato per la Somalia italiana.

43. Piviere testanera minore - **Sarciophorus tectus latifrons**, Reichw..

- a) ♀ N. 24734, Mogadiscio, IV-1925 « occhi gialli ».  
 b) ♀ — Mogadiscio, V-1925, id. id.  
 c) ♂ N. 24735, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926, id. id..  
 d) ♂ N. 24736, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

Famiglia **Scolopacidae**44. Piovanello - **Erolia testacea** (Pallas).

- a) ♂ N. 24737, Chisimaio, VIII-1925 « iride nera e gambe nere ».

Questa specie era già stata riscontrata nel luglio 1901 a Chisimaio dall' Erlanger.

Famiglia **Glareolidae**45. Corriente del Giuba - **Cursorius cursor littoralis**, Erl.

- a) ♀ N. 24738, Chisimaio, VIII-1925 « occhi neri, gambe bianche ».

46. Pernice di mare del Madagascar - **Glareola ocularis**,  
Verreaux.

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre del 1929, esemplare in  
cattive condizioni della R. Università di Modena.  
Ala mm. 190, coda 75, tarso 26.

Quantunque l'esemplare sia in cattive condizioni ho potuto  
determinarlo con precisione per le caratteristiche della specie:  
coda, tarso, rosso sul ventre ecc..

Da quanto mi consta sarebbe la prima volta che questa specie  
viene riscontrata nella nostra Somalia. Per l'Africa orientale  
(coste) è citata per Lamu (Chenia).

#### Famiglia **Laridae**

47. Gabbiano di Hemprich - **Larus hemprichii** (Bruch).

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della  
R. Università di Modena.

Questo gabbiano è già noto per la costa della Somalia me-  
ridionale per individui presi a Brava ed a Chisimaio.

#### Famiglia **Pteroclididae**

48. Pterocle decorato di Ellenbeck - **Pterocles decoratus**  
**ellenbecki** (Erl.).

- a) ♂ N. 24739, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

Questo esemplare è in realtà rispetto al colore del piumaggio  
intermedio tra questa forma e la forma tipica, però io lo attri-  
buisco alla sottospecie *ellenbecki* giacchè ad essa si avvicina un  
poco di più.

#### Famiglia **Columbidae**

49. Tortora dal collare del Giuba - **Streptopelia decipiens**  
**elegans** (Zedlitz).

- a) ♀ N. 24743, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi bianco  
sporco ».

Questa tortora è citata per la nostra colonia (Afgoi) solo dallo Zedlitz.

50. Tortora senegalense equatoriale - *Stigmatopelia senegalensis aequatorialis* (Erl.).

a) ♀ N. 24740, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926 « occhi neri ».

51. Tortora del capo - *Oena capensis capensis* (Linn.).

a) ♀ Villaggio Duca degli Abruzzi, IV-1929 « occhi neri ».

Questa specie che è comune in tutta la Somalia fu già da me citata per la Somalia in base ad un esemplare di Carim (Migiurtinia) preso dallo Scortecci il 3-IX-1931.

52. Tortora minore - *Turtur afer kilimensis* (Mearns).

a) ♀, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926 « occhi neri ».

b) ♂, Villaggio Duca degli Abruzzi, IV-1929.

Questa tortora non era ancora nota per la Somalia italiana.

## Ordine *Cuculiformes*

### Famiglia *Cuculidae*

53. Cuculo canoro africano - *Cuculus canorus gularis*, Stephens?

a) Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

Il punto dubitativo è dovuto al fatto che essendo l'esemplare avuto una mummia di un individuo giovane non si può con precisione stabilire la sottospecie. Nessuna forma di cuculo canoro risulta fino ad oggi citata per la Somalia italiana.

54. Cuculo giacobino - *Clamator jacobinus* (Bodd.).

a) ♂ N. 24744, Afgoi, V-1925 « occhi neri ».

b) ♀ N. 24745, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926, id. id..

c) ♂ *juv.* N. 24746, Golgia, IV-1926, id. id..

- d) ♀ — Mogadiscio, VII-1926, id. id.  
 e) — Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

L'individuo maschio adulto ha il becco molto più massiccio degli altri. Nel maschio giovane tutto quanto il becco è color corno-chiaro e le parti inferiori sono isabelline; le cuopratrici alari hanno apici bianchi.

55. Cuculo dorato - *Lampromorpha caprius* (Bodd.).  
 (*Chrysococcyx cupreus* auct.).

- a) ♂ N. 24747, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».  
 b) ♂ — Somalia meridionale, 1929.  
 c) ♂ — Somalia meridionale, 1929.

Il cuculo dorato non risulta ancora espressamente citato per la Somalia italiana.

56. Cuculo speronato supercilioso - *Centropus superciliosus superciliosus*, Hempr. et Ehr..

- a) ♀ N. 24748, Afgoi, V-1925 « occhi rossi ».

Famiglia **Musophagidae**

57. Turaco dal ventre bianco - *Corythaixoides leucogaster* (Rüpp.).

- a) ♂ N. 24749, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂? N. 24750, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926, id. id..  
 c, d, e) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplari della R. Università di Modena.

Gli esemplari *a* e *b* hanno il becco nero, degli altri tre non ho preso nota della colorazione del becco.

Questa specie è notificata sia per la Somalia meridionale (Dolo, Serenli, Afgoi), sia per la centrale (Gallacaio, Beira).

Famiglia **Psittacidae**

58. Pappagallo rufiventre della Somalia - *Poicephalus rufiventris pallidus*, van Someren.

- a) ♂ N. 24751, Chisimaio, VIII-1925 « occhi color arancio ».

Questo individuo dell'Oltre Giuba è di una tinta leggermente diversa di quelli che ho presenti della Somalia settentrionale (Migiurtinia) presi nell'agosto del 1931.

Parrebbe tendere verso la tinta della sottospecie del Reichenow *Poicephalus rufiventris simplex* che è citata per Serenli (Giuba) da v. Someren (*Journ. E. Afr. Uganda N. H. Soc.*, N. 35, p. 38, 1929).

## Ordine **Coraciiformes**

### Famiglia **Coraciidae**

59. Ghiandaia marina pettogarofano - **Coracias caudatus** Iorti, Shelley.

a) N. 25028, Afmadù, Oltre Giuba, 1928 (G. Corni).

b, c, d) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplari della R. Università di Modena.

Questa ghiandaia marina è citata anche per la Somalia centrale (Belindula presso Gallacaio).

60. Euristomo dell'Africa orientale - **Eurystomus afer suahelicus**, Neum..

a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

### Famiglia **Alcedinidae**

61. Coritorne crestato - **Corythornis cristata cristata** (Pall.).

a) Individuo mummificato preso nel 1929 nella Somalia meridionale.

Questo coritorne è citato fino ad oggi solo dall'Erlanger per Hanole (Giuba).

62. Martin pescatore nano del Giuba - **Ispidina picta jubaensis**, v. Someren.

a) ♂ N. 24752, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi neri ».

b) ♀ N. 25030, Afgoi, IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).

c) ♀ *juv.*, N. 24753, Afgoi, VI-1929 « occhi neri ».

Attribuisco questi esemplari alla nuova forma istituita da van Someren per le dimensioni delle ali che non raggiungono i 52 mm..

63. Alcione arboreo di Zanzibar - *Halcyon leucocephala hyacinthina*, Reichw..

- a) ♂ N. 24754, Afgoi, V-1925 « occhi neri ».
- b) N. 24755, Afgoi, V-1925.
- c) ♂ N. 25031, Afgoi, IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).
- d) esemplare mummificato della Somalia meridionale, 1929.

Dei esemplari sono considerati come appartenenti alla forma *hyacinthina* per il colore delle piume delle ali e della coda che è blu-giacinto e ben diverso da quello degli altri esemplari di questa specie che ho presenti.

Questa forma di alcione arboreo non era stata ancora riscontrata nella nostra Somalia.

64. Martin pescatore striato - *Halcyon chelicuti chelicuti* (Stanley).

- a) ♀ N. 24756, Villaggio Duca degli Abruzzi, IV-1929.
- b) ♀ — Villaggio Duca degli Abruzzi, III-1929, esemplare della R. Università di Modena.

Famiglia **Meropidae**

65. Gruccione egiziano - *Merops persicus persicus*, Pall..

- a) N. 24757, esemplare senza data e località di cattura della Somalia meridionale, probabilmente 1929.

Questa specie non risulta ancora citata per la nostra Somalia.

66. Gruccione severo - *Merops superciliosus*, Linn..

- a) ♂ N. 24758, Mogadiscio, III-1929 « occhi rossi ».
- b) ♀ N. 24759, Mogadiscio, VI-1929, id. id..
- c) ♀ — Mogadiscio, III-1929, id. id..

67. Gruccione scarlatto - *Merops nubicus nubicus*, Gmel..

- a) ♂ N. 24760, Chisimaio, VIII-1925 « occhi rossi ».

68. Gruccione minore orientale - *Melittophagus pusillus cyanostictus* (Cab.).

- a) ♂ N. 24761, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi rossi ».
- b) ♀ N. 24762, Golgia, III-1926, id. id..
- c) ♂ N. 25032, Afgoi, IX-1928, id. id..
- d) ♂ *juv.*, N. 24763, Mogadiscio, VI-1929 id. id..
- e, f) due esemplari della Somalia meridionale senza data e località precisa, ma probabilmente della zona di Mogadiscio, 1929.

L'individuo maschio giovane manca della macchia scura sulla gola, la quale è invece colorata in verde come il dorso.

69. Gruccione somalo - *Melittophagus revoili* (Oust.).

- a) ♂ N. 24764, Mogadiscio, Pozzi di El, VI-1929 « occhi rossi ».
- b) ♂ — Mogadiscio, Pozzi di El, VI-1929, id. id..
- c) ♀ N. 24765, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

Gli individui di Mogadiscio sono superiormente un poco più scuri di quelli che ho presenti della Somalia settentrionale (Galla-cchio, Garoe, Gardo, Bur Dagner) presi dalla fine di luglio ad agosto od ai primi di settembre; due mancano quasi totalmente di quel color fulviccio sulla parte basale delle penne dell'alto dorso, che tanto caratterizza questa specie. Si tratta di individui giovani?

Famiglia **Bucerotidae**70. Lofocero nasuto - *Lophoceros nasutus nasutus* (Linn.).

- a) ♂, zona di Mogadiscio, marzo 1929, esemplare della R. Università di Modena.
- b) ♀, zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, id. id..

Per la nostra Somalia questo lofocero era citato fino ad oggi solo per la zona del Giuba.

71. Lofocero beccorosso - *Lophoceros erythrorhynchus erythrorhynchus* (Temm.).

- a) ♂ N. 24766, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».
- b) ♂ N. 24767, Afmadù, VI-1926, id. id..
- c) ♀ N. 24768, Afmadù, V-1926, id. id..

Questa specie venne da me già citata per la Somalia centrale in base ad un individuo riportato dallo Scortecci da Gal-lacaio.

72. Lofocero beccogiallo - **Lophoceros flavirostris flavirostris** (Rüpp.).

a) Somalia italiana 1931 (Prof. Tedeschi).

Questa specie fu già da me citata per un individuo preso nell'agosto del 1931 dallo Scortecci nella zona di Orgoble-Gardo (Migiurtinia), ma era già nota per la nostra Somalia (Damaso, Abrona, Sidimum, Bardera e Woreda).

73. Lofocero di von Decken - **Lophoceros deckeni** (Cab.).

a) ♂ N. 24769, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi neri ».

b) ♀ N. 24770, Golgia, III-1926, id. id..

Il lofocero di von Decken era già noto per la nostra Somalia in base ad individui catturati a Brava ed a Dolo.

Famiglia **Strigidae**

74. Civetta perlata - **Glaucidium perlatum** (Vieill.).

a) ♂ N. 24771, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi gialli ».

75. Gufo maculoso cinerescente - **Bubo africanus cinerascens**, Guérin.

a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

76. Gufo latteo - **Bubo lacteus** (Temm.).

a) ♂ N. 24772, Golgia, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».

b, c) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplari della R. Università di Modena.

Questo gufo è già citato per Dolo dal Salvadori e per la Somalia centrale (Galladi) dal Peel.

Famiglia **Caprimulgidae**

77. Succiacapre di Donaldson - **Caprimulgus donaldsoni**, Sharpe.

a) ♀ N. 24773, Chisimaio, VIII-1925 « occhi neri ».

Questo succiacapre è già noto per la zona del Giuba.

Famiglia **Micropodidae**

78. Rondone abissino - **Micropus affinis abessynicus** (Streubel).

a) Mogadiscio, X-1931 (G. Scortecci).

Questa specie non risulta ancora citata per la Somalia italiana. Lo Scortecci mi assicura che era specie molto abbondante a Mogadiscio città.

Famiglia **Coliidae**

79. Uccello topo striato orientale - **Colius striatus affinis**, Shelley.

a) ♂ N. 25033, Afgoi, IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).

b) ♀ — Afgoi, IX-1928, id. id..

c) — Somalia meridionale 1929, individuo mummificato.

80. Uccello topo capogrigio - **Colius leucocephalus turneri**, van Someren.

a) ♀ N. 24775, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi neri ».

b) — Golgia, III-1926, id. id..

c) ♀ N. 24776, Mogadiscio, V-1929, id. id..

d, e) due mummie di Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

81. Uccello topo nucablu - **Colius macrourus macrourus** (Linn.).

a) Una mummia di Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

Questa specie fu già da me citata per la regione di Obbia in base ad un esemplare riportato da Gallacchio nell'agosto 1931

dallo Scortecci, ove però era già stata raccolta dal Capitano Hamerton nel 1903. Nella Somalia meridionale venne raccolta invece la forma affine *Colius macrourus pulcher*, Neum..

### Famiglia **Capitonidae**

82. Capitone alinere didimo - **Lybius melanopterus didymus**, Grote.

a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Questo esemplare presenta le caratteristiche di questa sottospecie che fu descritta or non è molto dal Grote (*Ornith. Monatsber.* 1929, p. 75).

83. Tricolema stigmatotorace - **Tricholaema melanocephalum stigmatothorax**, Cab..

a) ♂ N. 24778, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926 « occhi neri ».

Questo maschio ha alcune piume con apice giallastro non solo sulla fronte, ma anche sulle rimanenti parti del capo. Sulla gola gli apici chiari delle penne sono ben visibili, com'è pure accentuata la macchia rossa e gialla pettorale.

84. Capitone testanera di Darnaud - **Trachyphonus darnaudi boehmi**, Fisch. et Reichw..

a) ♂ N. 24777, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».

b) ♀ N. 24779, Afmadù, V-1926 « occhi rosso-viola ».

c) ♂ — Afmadù, V-1926, id. id..

d) ♂ N. 24780, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

e) ♀ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..

f) ♂ N. 24781, Dafèt (regione del), VI-1929, id. id..

g) Esemplare mummificato della Somalia meridionale, 1929.

Questo capitone era già stato citato per Afgoi, Brava e zona Bardera-Mfùdu.

Famiglia **Picidae**85. Picchio nubico pallido - **Campethera nubica pallida**  
(Sharpe).

- a) ♂ N. 24782, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi rosso-viola ».  
 b) ♂ — Afmadù, V-1926, id. id..  
 c) ♀ N. 24783, Afmadù, V-1926, id. id..  
 d) ♀ — Afmadù, V-1926, id. id..  
 e) ♀ N. 24784, Golgia, Oltre Giuba, IV-1926 « occhi rosso-vino ».  
 f) ♀ N. 24785, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

Questa specie fu già da me citata per un esemplare preso a Gardo nella Migiurtinia il 16-VIII-1931 il quale si presenta con tinta un poco più scura superiormente e con un maggior numero di macchie nelle parti inferiori in confronto a questi esemplari della Somalia meridionale.

86. Picchio cardinale massaico - **Dendropicos fuscescens massaicus**, Neumann.

- a) ♂ N. 24786, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi rosso-scuro ».  
 b) ♂ N. 24787, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

Per il tono di colore delle piume e per le dimensioni considero questi due esemplari appartenenti alla forma *massaicus* anzichè alla forma *hemprichii* di Ehrenberg che è poi quella della quale il Prof. Scortecci riportò in Museo individui della zona di Gardo (Migiurtinia) e che era già nota per le terre bagnate dal Giuba e per Brava.

Non erano citate, fino ad oggi, catture di questa forma per la nostra Somalia.

Ordine **Passeriformes**Famiglia **Alaudidae**87. Mirafra pecilosterna - **Mirafra poecilosterna poecilosterna** (Reichw.).

- a) ♂ N. 24979, regione del Dafèt, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) ♂ — Mogadiscio, VI-1929 « occhi marroni ».  
 c) ♀ N. 24980, Mogadiscio, V-1929 « occhi neri ».  
 d) — Mogadiscio, 1929.

Questa specie è già citata per la Somalia meridionale.

88. Cappellaccia thekla somala - **Galerida theklae ellioti**,  
Hartert.

a) ♂ N. 24788, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

Questa cappellaccia fu da me già citata per la prima volta come presente nella Somalia italiana in base ad un individuo preso a Gallacchio (Rocca Littorio) nel luglio 1931 dallo Scortecci.

89. Lodola codacorta del Chenia - **Pseudalaemon fremantlii delamerei**, Sharpe.

a) ♂ N. 24789, Pozzi di El, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

Questa forma di lodola codacorta non era ancora nota per la Somalia italiana, per la quale si conosceva la presenza della forma tipica (*P. fremantlii fremantlii*, che abita la Somalia centrale e settentrionale) in base ad individui presi a Beira nel 1903 ed a Gardo nel 1931.

90. Allodola passerina testacastana - **Eremopteryx signata**  
(Oust.).

a) ♂ N. 24981, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

b, c) ♂♂, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

d) ♂ N. 24790, Somalia meridionale, III-1929.

e) ♀ N. 24982, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

f) ♀ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..

g) ♀ — zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

#### Famiglia **Motacillidae**

91. Ballerina gialla - **Motacilla cinerea cinerea**, Tunst..

a) Afgoi, IX-1928, esemplare della R. Università di Modena.

Questa ballerina non era ancora citata per la Somalia italiana.

92. Macronice tenerello - **Tmetothylacus tenellus** (Cab.).

a) ♂ N. 24792, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

b) ♂ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..

c) ♂ N. 24794, Mogadiscio, 1928 (G. Corni).

- d) ? N. 24795, Mogadiscio, 1928 (G. Corni).  
 e) ♂ — Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926.  
 f) ♂ — Afmadù, VI-1926.

93. Macronice golaranciata - **Macronyx aurantiigula**, Reichw..

- a) ♂ N. 24791, regione del Dafèt, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Famiglia **Timaliidae**

94. Crateropodo somalo - **Argya aylmeri aylmeri**, Shelley.

- a) ♂ N. 24793, Mogadiscio, VI-1929 « occhi bianchi ».  
 b) ♂ N. 24774, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 c, d) Mogadiscio, VI-1929.  
 e) ♂ N. 24975, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi bianchi ».

Questo crateropodo è già noto sia per la Somalia meridionale (zona tra Eil Wak e Bardera, Afgoi) che per la centrale (Beira).

Famiglia **Pycnonotidae**

95. Bulbul orecchiebianche - **Pycnonotus dodsoni**, Sharpe.

- a) ♂ N. 24976, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂ *juv.* N. 24977, Afmadù, V-1926, id. id..  
 c) ♀ N. 24978, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 d) Esemplare della Somalia meridionale, 1929.

Questa specie fu già citata da me per individui presi in Migurtinia nel luglio, nell'agosto e nel settembre 1931: Gallacchio, Garoe sul Nogal, Gardo, Kubo, Carim, ed era già nota la sua presenza lungo il Giuba.

Famiglia **Muscicapidae**

96. Pigliamosche grigio - **Bradornis griseus griseus?**

- a) Obbia 1930, esemplare mummificato (Ten. L. Boschis).

La sottospecie è classificata con dubbio perchè l'esemplare in questione in confronto agli esemplari di Beira (Km. 25 da

Gallacchio) e di Gardo (Migiurtinia) che ho presenti appare più chiaro inferiormente; il bianco delle redini ed il circolo perioculare è poi bianco quasi puro e non isabellino come è in questi ultimi.

97. Pigliamosche testanera - **Batis minor minor**, Erlanger.

a) ♂ N. 25035, Afgoi, VIII-1929 « occhi arancio ».

Specie già nota per le terre bagnate dal Giuba.

98. Pigliamosche bruno del paradiso - **Tchitrea viridis sua-helica** (Reichw.).

a) ♂ N. 25036, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926 « occhi neri ».

b) ♂ N. 25037, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi neri, palpebre e zampe azzurre ».

c) ♂ — Golgia, III-1926 « occhi neri, palpebre azzurre ».

d) ♂ — Afmadù, III-1926 « occhi neri ».

La sua presenza lungo il Giuba era già nota.

#### Famiglia **Turdidae**

99. Monachella dorsonero - **Oenanthe leucomela leucomela** (Pallas).

a) Somalia meridionale, 1929.

Si tratta di un individuo in abito di maschio.

Questa monachella era già stata rinvenuta sia lungo il Giuba sia a Brava ed a Afgoi.

100. Cicladusa guttata rufipenne - **Cicladusa guttata rufipennis**, Sharpe.

a) ♂ N. 25038, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

b) ♂ N. 25039, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

101. Eritropigia alibianche - **Erythropygia leucoptera leucoptera** (Rüpp.).

a) ♂ N. 25040, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».

b) ♂ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..

c) ♀ N. 25041, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

Questi individui mi paiono appartenere piuttosto alla forma tipica che alla *E. l. vulpina* citata dallo Zedlitz per Afgoi (*Journ. Ornith.*, 1916, p. 109).

### Famiglia **Sylviidae**

102. Calamonaste semplice - **Calamonastes simplex simplex** (Cab.).

a) ♂ N. 25042, Mogadiscio, VI-1929 « occhi marrone ».

Questo esemplare, forse giovane, è un poco più chiaro inferiormente e più bruno superiormente di altri due esemplari che ho presenti, presi in luglio a Gallacchio ed in agosto a Kubo, Gardo (Migiurtinia). È però specie già nota per Afgoi e per le terre bagnate dal Giuba.

103. Apale rufifronte - **Apalis rufifrons rufidorsalis?**

a) ♂ Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

Considero questo individuo dubitativamente come appartenente a questa forma perchè assai guasto, ha però tutto il pileo, parte del collo e parte delle piume del dorso rosso-castano più o meno evidente.

Potrebbe essere anche un giovane delle forme affini, ad esempio della *smithii* che fu già citata per Mogadiscio dallo Zedlitz, od un individuo con caratteri intermedi.

104. Silvietta isabellina - **Sylvietta isabellina**, Elliot.

a) ♀ N. 25043, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

105. Prinia somala di Erlanger - **Prinia somalica erlangeri**, Reichw..

a) ♂? N. 25044, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

### Famiglia **Hirundinidae**

106. Rondine etiopica - **Hirundo aethiopica**, Blanford.

a) ♂ N. 25045, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».

b) ♀ N. 25046, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

Questa specie è già citata per Brava e Serenli.

107. Rondine abissina - **Hirundo abyssinica abyssinica**, Guér..

- a) ♂ N. 25047, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».  
 b) ♀ N. 25048, Afmadù, V-1926, id. id..

Considero questi individui appartenenti alla forma tipica anzichè alla forma *unitutis* di Sclater e Praed perchè non sono sensibilmente diversi dagli esemplari di questa specie dell'Abissinia che ho presenti.

È specie citata per la nostra Somalia solo per Brava dal Fischer nel 1885 (*Hirundo puella*).

#### Famiglia **Dicruridae**

108. Dicruo divaricato - **Dicrurus adsimilis divaricatus** (Licht.)?

- a) ♂ N. 25049, Golgia, Oltre Giuba, III-1926, « occhi rossi ».  
 b) ♂ — Golgia, III-1926, id. id..

Questi due esemplari appaiono un poco più piccoli di quello già da me citato per la Somalia settentrionale preso nella zona di Gardo nell'agosto 1931. Van Someren nel 1931 ha considerati gli esemplari presi nella zona del Giuba come distinti dalla forma *divaricatus* (*D. a. jubaensis*). L'esemplare *a* ha la coda divaricata come i tipici *divaricatus* mentre *b* si presenta come gli *jubaensis* figurati in Nov. Zoologicae XXXVII, tav. III. Gli esemplari di Golgia hanno inoltre la coda più corta del *D. adsimilis divaricatus* di Gardo (Migiurtinia). In attesa di ulteriori studi e non avendo serie sufficienti per confronto li ascrivo con riserva alla forma *divaricatus*.

#### Famiglia **Prionopidae**

109. Prionopide crestato alinere - **Prionops cristata melanoptera**, Sharpe.

- a) ♀ N. 25050, Golgia, Oltre Giuba IV-1926 « occhi gialli ».  
 b) ♂ (*juv.*?) N. 25051, Golgia, III-1926, id. id..

L'esemplare maschio deve essere un giovane poichè ha le piume della nuca quasi tutte bianche e manca della macchia grigia sottogolare.

110. Eurocefalo di Decken - *Eurocephalus rueppelli deckeni*, Zedl..

- a) ♂ N. 25053, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂? N. 25054, regione del Dafèt, VI-1929, id. id..  
 c) — Obbia, 1930, esemplare mummificato (Ten. L. Boschis).

L'individuo di Obbia è per dimensioni intermedio tra gli altri due.

Famiglia **Laniidae**111. Averla dorsale - *Lanius dorsalis*, Cab..

- a) ♂? N. 25052, regione del Dafèt, VI-1929 « occhi neri ».

È specie ripetutamente citata per la nostra Somalia.

112. Averla isabellina - *Lanius cristatus isabellinus*, Hempr. et Ehr..

- a) Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).  
 b) Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

Si tratta di due mummie di individui più o meno giovani.

L'Averla isabellina per la nostra Somalia è citata solo dallo Zedlitz (Afgoi).

113. Averla funebre della Somalia meridionale - *Laniarius funebris degener*, Hilgert.

- a) ♂ N. 25055, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) ♀, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926, id. id..  
 c) ♀?, Afmadù, V-1926, id. id..

Questa averla è già citata sia per la zona del Giuba che per quella di Mogadiscio (Afgoi).

114. Averla chisimaiense - *Laniarius ruficeps kismayensis* (Erl.).

- a) ♂ N. 25057, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) ♂ N. 25058, Mogadiscio, V-1929, id. id..

- c) ♀ N. 25059, Mogadiscio, V-1929, id. id..  
 d) ♂ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 e) ♀ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..

L'esemplare N. 25059 presenta il rosso scuro del capo molto più esteso verso la fronte degli altri.

È specie già citata per il basso Giuba e per Afgoi.

115. Tsciagra testanera somala - **Tchagra senegala catho-  
leuca** (Neum.).

- a) ♂ N. 25060, Villaggio Duca degli Abruzzi, IV-1929 « occhi neri ».

Questa tsciagra fino ad oggi era citata per la nostra Somalia solo per la regione del Giuba.

116. Tsciagra capostrisciato - **Tchagra jamesi jamesi** (Shel-  
ley)?

- a) ♂ N. 25061, Mogadiscio, V-1929 « occhi neri ».

Questo individuo lo attribuisco alla forma tipica dubitativamente perchè pur essendo quasi simile ad un altro che ho presente della Somalia settentrionale preso ad Heibogan, Gardo, nell'agosto 1931, è leggermente più chiaro sul capo e perciò potrebbe anche avvicinarsi alla forma affine del Basso Giuba descritta dal Neumann in *Journ. Orn.*, 1902 a p. 369 col nome di *Telephonus jamesi kismayensis* e della quale non ho esemplari per confronto tanto più che lo Zedlitz cita esemplari di quest'ultima forma presi ad Afgoi.

117. Averla pettosolfureo del Sud - **Chlorophoneus sul-  
fureopectus similis** (Smith).

- a) ♂ N. 25062, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».  
 b) ♀ N. 25003, Afmadù, V-1926, id. id..

Specie già nota per la regione del Giuba.

118. Averla capogrigio ipopirra - **Malaconotus polioce-  
phalus hypopyrrhus**, Hartl..

- a) ♀, Mogadiscio, VI-1929 « occhi gialli ».

Considero questo individuo come appartenente a questa forma perchè è diverso da un esemplare di *Malaconotus p. approximans* di Belet-Amin, Basso Giuba, che ho presente, ed il color castagno si estende dal petto anche sulle altre parti inferiori del corpo in maniera più o meno visibile, gola esclusa.

Questa forma di averla capogrigio è già citata per la nostra Somalia da Erlanger (Chisimaio).

119. Averla golarossa di Hilgert - **Rhodophoneus cruentus hilgerti** (Neum.).

- a) N. 25004, Bur Àcaba, reg. del centro, 1928 (G. Corni).  
 b) — Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Specie già rinvenuta sia nella Somalia sett. (Gardo) e centrale (Beira), sia nella meridionale (Giuba).

Famiglia **Oriolidae**

120. Rigogolo testanera somalo - **Oriolus monacha reichenowi**, Zedl..

- a) ♂? N. 25005, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi rossi ».  
 b) ♀ Afmadù, Oltre Giuba, V-1926, id. id..

Specie già citata sia per la regione del Giuba che per Afgoi.

Famiglia **Corvidae**

121. Corvo somalo - **Corvus corax edithae**, Phillips.

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Questa specie non risultava espressamente citata per la nostra Somalia, ma con tutta probabilità il *Corvus umbrinus* notificato per Brava dal Fischer (1885) non è altro che questo corvo.

Famiglia **Sturnidae**

122. Storno bicolore - **Speculipastor bicolor**, Reichw..

- a) Obbia, 1930, esemplare mummificato in abito di maschio (Ten. L. Boschis).

Questo storno bicolore è citato per la Somalia italiana sia centrale (Beira) che meridionale (Chisimaio).

123. Storno splendente alipurpuree - **Lamprotornis purpuropterus purpuropterus**, Rüpp..

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.  
 b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Noto in Somalia italiana per la regione del Giuba e per quella dell'Uebi Scebeli (Avai).

124. Storno splendente pettoaurato - **Cosmopsarus regius regius**, Reichw..

- a) ♂ N. 25007, Baidoa, VIII-1928 (G. Corni).  
 b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Questa specie fu già da me citata per un esemplare preso a Gallacchio nel luglio 1931 dallo Scortecci. Era nota già per Gallacchio (Witherby) e per la regione del Giuba (Salvadori, Zedlitz e Someren).

125. Storno magnifico di Fischer - **Spreo fischeri** (Reichw.).

- a) ♀, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi bianchi ».

Specie già nota per le regioni del Giuba e per Afgoi.

126. Storno magnifico - **Spreo superbus** (Rüpp.).

- a) ♀ N. 25009, Somalia meridionale, III-1929 « occhi bianchi ».  
 b) — Somalia meridionale, III-1929, id. id..  
 c) Zona di Mogadiscio, III-1929, esemplare della R. Università di Modena.

Questo storno magnifico fu già citato da me per individui presi nella zona di Gardo, Migiurtinia, ove secondo lo Scortecci è l'uccello più comune.

La sua presenza è stata notificata per Gallacchio, Afgoi, Brava, Avai (Uebi Scebeli) e regione del Giuba.

127. Bufaga beccorosso - **Buphagus erythrorynchus erythrorynchus** (Stanley).

- a) ♂ N. 25010, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi arancio ».  
 b) ♂ N. 25011, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi giallo arancio ».  
 c) ♂ N. 25012, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».  
 d) — Mogadiscio, VI-1929.

Questa bufaga per la nostra Somalia mi risulta citata solo dal Salvadori per Dolo. Nella Tavola IX sono riprodotti alcuni individui mentre mangiano sul dorso di dromedari nella zona del Villaggio Duca degli Abruzzi.

Famiglia **Nectariniidae**128. Nettarinia pettorosso del Giuba - **Nectarinia erythroceria erlangeri?**

- a) Cito con dubbio questa specie per un individuo in abito di femmina senza data e località precisa catturato dal Luppi nella Somalia Meridionale, probabilmente nel 1929.

È specie nota per la Somalia italiana per Dolo, Goriale e Serenli.

129. Nettarinia pettoporpora del Giuba - **Cinnyris bifasciatus chalcomelas**, Reichw..

- a) ♂ N. 25013, Afgoi, IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).

- b) ♂ N. 25014, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 c) ♂ N. 25015, Mogadiscio, VI-1929.  
 d, e, f) — Mogadiscio, VI-1929.

È già nota oltre che per la regione del Giuba anche per Afgoi.

130. *Nettarinia ventrebianco* - ***Cinnyris albiventris*** (Strickl.).

- a) ♂ N. 25016, Mogadiscio, VII-1928 (G. Corni).  
 b) ♂ N. 25017, Pozzi di El, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 c, d) — Pozzi di El, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

Questa specie fu da me già citata per la Somalia in base ad un individuo preso a Beira (Gallacchio) il 23 luglio 1931.

Il tipo della specie fu preso a Ras Hafun (Dante).

131. *Nettarinia somala pettoscarlato* - ***Chalcomitra hunteri*** (Shelley).

- a) ♂ N. 25018, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 b, c) ♂♂, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 d) ♀ N. 25019, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 e) ♂, Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

È specie già citata sia per la Somalia italiana meridionale che per la centrale.

132. *Nettarinia orientale dorsoviola* - ***Anthreptes longuemarei orientalis***, Hartl..

- a) ♂ N. 25020, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) ♂ — Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 c) ♂ — Obbia, 1930 (Ten. L. Boschis).

Specie già nota sia per la Somalia italiana centrale che per la meridionale.

Famiglia **Ploceidae**

133. *Tessitore beccobianco intermedio* - ***Bubalornis albirostris intermedius*** (Cab.).

- a) ♂ N. 25021, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».

- b) ♂ — Afmadù, V-1926, id. id..  
 c) ♂ N. 25022, Afmadù, V-1926, id. id..

Gli individui presi in maggio sono evidentemente maschi poichè è visibilissimo il pene, in quello preso in giugno manca la caratteristica appendice.

134. Tessitore di Dinemell - **Dinemellia dinemelli dinemelli** (Rüpp.).

- a) ♀ ?, N. 24994, Golgia, Oltre Giuba, III-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂ — Afmadù, VI-1926, id. id..  
 c) ♂ N. 24995, Uarmahan, Mogadiscio, VI-1929.  
 d) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Non appartengono alla forma *Dinemellia dinemelli ruspoli* del Salvadori avendo essi le dimensioni della forma tipica. Anche gli esemplari di Gardo e Gallacchio già da me citati per la Somalia appartengono a questa forma tipica.

135. Ploceopassero propinquato - **Plocepasser mahali propinquatus**, Shelley.

- a) ♂ N. 24996, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rosso-pallido ».  
 b) ♀ N. 24997, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

L' esemplare maschio ha il becco più scuro di quello della femmina.

136. Passero castano - **Sorella eminibey eminibey**, Hartl..

- a) Somalia meridionale, 1929.

Si tratta di un individuo in abito di maschio.

Questa specie non mi risulta ancora citata per la nostra Somalia.

La sottospecie *S. e. guasso* di van Someren non credo debba essere distinta dalla forma tipica.

137. Tessitore vitellino del Chenia - **Ploceus vitellinus uluensis** (Neum.).

- a) ♂ N. 24998, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».

Questo tessitore senza distinzione di sottospecie è citato solo da v. Someren per Dolo e Serenli (*Hyphantornis vitellinus*).

138. Tessitore testanera - *Ploceus nigriceps nigriceps* (Layard).

- a) ♂ N. 24999, Afgoi, IX-1928 « occhi rossi » (G. Corni).
- b) — Somalia meridionale, 1926?
- c) N. 25000, Afgoi, VI-1929.
- d) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

L'esemplare preso nel giugno 1929 sembra essere un giovane maschio.

139. Tessitore nigricollo nero e giallo - *Ploceus nigricollis melanoxanthus* (Cab.).

- a) ♂ N. 25001, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».
- b) ♀ N. 25002, Mogadiscio, VI-1929, id. id..

140. Tessitore dorato di Bojer - *Ploceus aureoflavus bojeri* (Cab.).

- a) ♂ N. 25394, Afgoi, IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).
- b) — Mogadiscio, 1929, molto probabilmente in giugno.

141. Quelea etiopica - *Quelea quelea aethiopica* (Sund.).

- a) ♂ N. 25395, Afgoi, IX-1928 « occhi neri » (G. Corni).

142. Vedova zanzibarica - *Urobrachya axillaris zanzibarica*, Shelley.

- a) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.
- b) Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, id. id..

Questa specie non risulta ancora citata per la Somalia italiana.

143. Becco d'argento capogrigio - *Odontospiza caniceps* (Reichw.).

- a) Somalia meridionale, 1929.
- b) Somalia meridionale, 1929.

È specie non ancora citata per la Somalia italiana.

144. *Amadina fasciata abissina* - *Amadina fasciata alexanderi*, Neum..

- a) ♂ N. 25396, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂ — Somalia meridionale, 1929.

145. *Pitelia melba del Giuba* - *Pytilia melba jubaensis*, Van Someren.

- a) ♂ N. 25397, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi rosso-scuro ».  
 b) ♀ N. 25398, Afmadù, V-1926, id. id..  
 c) ♂ N. 25399, Mogadiscio, VI-1929 « occhi rossi ».  
 d) ♀ N. 25400, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 e) ♂ — Somalia meridionale, 1929.

Considero questi esemplari come appartenenti a questa forma basandomi su quanto scrive v. Someren in *Novitates Zoologicae* 1932, Vol. XXXVII, pp. 325-326.

146. Fringuello sanguigno somalo - *Lagonosticta senegala somaliensis*, Salvadori.

- a) ♂ N. 25401, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926.  
 b) ♀ N. 25402, Afmadù, V-1926.  
 c) ♀ N. 25403, Villaggio Duca degli Abruzzi, IV-1929.  
 d) ♂ — Somalia meridionale, 1926.

147. *Astrilda carmosina* - *Estrilda charmosyna charmosyna* (Reichw.).

- a) ♂ N. 25404, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926.  
 b) ♂ — Somalia meridionale, 1929.

148. *Granatina porpora somala* - *Granatina ianthinogaster hawkeri*, Phillips.

- a) ♂ N. 25405, Mogadiscio, VI-1929, « occhi rossi ».  
 b) ♂ N. 25406, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 c) ♀ N. 25407, Mogadiscio, VI-1929, id. id..  
 d, e) ♂ e ♀ Somalia meridionale, 1929.

149. Vedova del paradiso ipocherina - *Vidua hypocherina*, Verr..

- a) ♂ N. 25408, Afmadù, Oltre Giuba, VI-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂ N. 25409, Afmadù, VI-1926.

È specie citata per la Somalia italiana solo per Serenli (Giuba).

150. Vedova del paradiso di Fischer - *Vidua fischeri* (Reichw.).

- a) ♂ N. 25410, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) ♂ N. 25411, Afgoi, VIII-1929, id. id..  
 c) ♂ in muta, Somalia meridionale, III-1929, esemplare della R. Università di Modena.

Il maschio in muta molto probabilmente è un giovane.

Per la nostra Somalia la trovo citata solo per Gobuen presso Chisimaio.

151. Vedova del paradiso - *Steganura paradisea paradisea* (Linn.).

- a) ♂ N. 25412, Afmadù, Oltre Giuba, V-1926 « occhi neri ».  
 b) ♂ N. 25413, Bulo Mererta (Anole), 1928 (G. Corni).  
 c) ♂ N. 25414, Afgoi, IX-1929 « occhi neri ».  
 d) — Somalia meridionale, 1929.  
 e) — Zona di Mogadiscio, primo semestre 1929, esemplare della R. Università di Modena.

Anche gli esemplari *d* ed *e* sono in abito di maschio.

### Famiglia **Fringillidae**

152. Canarino dorsostriato della Somalia meridionale - *Serinus dorsostriatus harterti*, Zedl..

- a) ♂ N. 25415, Mogadiscio, VI-1929 « occhi neri ».  
 b) — Somalia meridionale, 1929.



*In alto a sinistra*: Falsigrifoni adunati presso una carogna; *a destra*: un individuo della medesima specie in volo; *in basso*: Bufaghe beccorosso su dromedari.

(Fot. concesse dal Prof. Scortecci)