

Van de 61 slangen behooren 31 tot de soorten zonder giftanden, de overige tot de giftige en daarvan tot de onechte giftslangen of die soorten welke slechts gesleufde gifthaken achter in de bovenkaak hebben 13, terwijl onder de overige echte giftslangen 5 soorten behooren tot de zeeslangen, zoodat de bekende echte giftslangen, welke het eiland zelf bewonen, slechts 12 in getal zijn, waaronder 4 adders of driehoekkopsslangen.

Behalve genoemde reptiliën en vischsoorten bestaat de bezending uit eenige stukken ijzerpyriet, eenige stukken tertiaire klei en een monster kapok mejrah. Deze stof komt in uiterlijk aanzien geheel overeen met de penghawar djambi (het harig bekleedsel van den wortel van *Cibotium glaucescens* Kaulf).

Wordt goedgevonden den heer Ludeking voor het gezondene dank te zeggen met verzoek eenige nadere inlichting te willen geven omtrent den zoogenoemde *rooden kapok*, zijne afkomst, mate van voorkomen, enz.

10. De heer Bleeker doet verslag van de verzameling visschen van Amboina, der Vereeniging aangeboden door het lid den heer Schröder.

Hij bevond die kollektie te bestaan uit de volgende soorten.

- 1 *Holocentrum argenteum* CV.
- 2 " *diadema* Lac.
- 3 " *leonoides* Blkr.
- 4 " *sammara* CV.
- 5 *Myripristis parvidens* CV.
- 6 *Serranus amboinensis* Blkr.
- 7 " *guttatus* CV.
- 8 *Mesoprion amboinensis* Blkr.
- 9 " *bottonensis* Blkr.

- 10 *Mesoprion macolor* Blkr.
- 11 " *octolineatus* Blkr.
- 12 " *dodecacanthoides* Blkr.
- 13 *Grammistes orientalis* Bl. Schn.
- 14 *Apogon roseipinnis* CV.
- 15 *Diagramma lineatum* CV.
- 16 " *punctatum* Ehr.
- 17 *Scolopsides bilineatus* CV.
- 18 *Uranoscopus bicinctus* TSchl.
- 19 *Upeneus barberinus* CV.
- 20 " *Brandesii* Blkr.
- 21 " *pleurospilos* Blkr.
- 22 " *trifasciatus* CV.
- 23 *Pterois antennata* CV.
- 24 " *brachypterus* CV.
- 25 " *volitans* CV.
- 26 " *zebra* CV.
- 27 *Scorpaenodes gibbosus* Blkr.
- 28 *Synanceia horrida* Bl. Schn.
- 29 *Platycephalus Quoyi* Blkr.
- 30 *Caesio coerulaureus* Lac.
- 31 " *erythrogaster* K. v. II.
- 32 *Chaetodon auriga* Forsk.
- 33 " *baronessa* CV.
- 34 " *strigangulus* Sol.
- 35 " *vagabundus* Bl.
- 36 " *virescens* CV.
- 37 " *vittatus* CV.
- 38 " *xanthurus* Blkr.
- 39 *Heniochus macrolepidotus* CV.
- 40 *Zanclus cornutus* CV.
- 41 *Holacanthus bicolor* Lac.
- 42 " *dux* Lac.
- 43 " *leucopleura* Blkr.
- 44 *Platax vespertilio* Cuv.
- 45 *Caranx Forsteri* CV.
- 46 *Amphacanthus vulpinus* Schl.
- 47 *Gobius criniger* CV.

- 48 *Antennarius pinniceps* Comm.
 49 *Amphisile scutata* Cuv.
 50 *Amphiprion chrysargurus* Richds.
 51 *Dascyllus aruanus* CV.
 52 *Heliases macrochir* Blkr.
 53 *Glyphisodon bengalensis* CV.
 54 " *coelestinus* CV.
 55 " *rahti* CV.
 56 " *trifasciatus* Blkr.
 57 *Cossyphus mesothorax* CV.
 58 *Julis (Halichoeres) elegans* K. v H.
 59 " (") *Schröderii* Blkr.
 60 *Cheilinus ceramensis* Blkr.
 61 *Saurida nebulosa* CV.
 62 *Diodon novemmaculatus* Cuv.
 63 *Arothron lineatus* Blkr.
 64 *Balistes lineatus* Bl.
 65 " *praslinus* Lac.
 66 *Alutarius nasicornis* T. Schl.
 67 *Ostracion cornutus* L.
 68 *Hippocampus kuda* Blkr.

Deze soorten waren alle reeds van Amboina bekend, met uitzondering slechts van *Holocentrum argenteum* CV. en *Julis (Halichoeres) Schröderii* Blkr, welke laatste soort de heer Bleeker als nieuw beschouwt voor de wetenschap en naar den toezender heeft genoemd. De beschrijvingen van beide genoemde soorten zullen nog bij wijze van aanhangsel gevoegd worden achter de reeds voor het 3^e deel der Acta van de Vereeniging afgedrukte Negende Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina.

De heer Bleeker deelt voorts nog mede, dat zich tusschen de genoemde visschen ook twee soorten van *Hemidactylus* bevonden, t. w. *Hemidactylus variegatus* Cuv. en *Hemidactylus platurus* Blkr. Indien deze

soorten, wat vermoedelijk is, insgelijks van Amboina afkomstig zijn zou de laatstgenoemde nieuw zijn voor de herpetologische kennis van dat eiland, van hetwelk volgens den heer Bleeker thans in het geheel 47 soorten van reptiliën zijn bekend geworden.

Hemidactylus platurus leeft volgens den heer Bleeker ook op Java, Sumatra, Nias en Banka, en is verwant aan *Hemidactylus mutilatus* Wieg. doch gemakkelijker herkenbaar aan de afwezigheid van het schildje achter de middelste kinschilden, welke zich tot aan de kleine halsschubben uitstrekken en door eene halvemaanvormige lijn van de kinschubjes zijn afgescheiden. Voorts heeft de staart er wel dezelfde gedaante als bij *Hemidactylus mutilatus* doch is ongetand. Te Batavia is *Hemidactylus platurus* in de huizen vrij algemeen, even als *Hemidactylus marginatus* Cuv. en *Hemidactylus frenatus* Schl. De kleur van de bovenhelft van ligchaam en staart is grijsachtig-oranje met kleine ronde verspreide geelachtige vlekjes en bruine spikkels. De pupil is vertikaal, de iris goudkleurig zwart geaderd. De soort is even als de aan haar verwante zeer levendig in hare bewegingen en geeft een zacht tjilpend geluid van zich.

11. Brief van den chef der geneeskundige dienst, gedagteekend Batavia 1 Oktober 1857 n^o 1997, aanbiedende een exemplaar der 4^e aflevering van het werk, getiteld: *Plantae Junghuhnianae*.

Wordt besloten op de gewone wijze dank te zeggen.

12. Brief van den resident van Manado, gedagteekend 24 July 1857 met toezending van een stortingsbewijs op 's lands kas, groot *f* 11 rec. wegens intekeningsgelden op de Akten der Vereeniging.

Gesteld in handen van den thesaurier.

13. Brief van den gouverneur der Moluksche eilanden,