

LXXIV. Decades plantarum novarum. XXXIV—XXXVII.

Auctore H. Léveillé.

(Originaldiagnosen¹⁾.)331. *Onothera (Onagra) Heribaudi* Lévl., nov. spec.

Planta habitu *O. communem biennem* referens sed foliorum forma et dentibus *O. sinuatam* aemulans.

Planta foliosa tota molliter pubescens; folia lanceolata, sinuato-dentata, dentibus conspicuis, repandis, remotis; inflorescentia racemosa ad apicem subcorymbosa; flores magnitudine florum *O. parviflorae* lutei, calice rubello, tubo calycino quam corolla longiore et hispido; petala lanceolata; stamina flava, corollam subaequantia; stylo flavido longe exerto; stigmate quadrifido.

Mexique: Rancho Pasadas, près Puebla, 2194 m, 17 juill. 1909; leg. Frère Nicolas. Commun. Fr. Héribaud.

332. *Erythraea Chaneti* Lévl., nov. spec.

Peraffinis *E. pulchellae* Horn., a quo differt: 1^o corollae lobis tubo longioribus; 2^o calice quam capsula dimidio circiter breviore; 3^o flores solitarii in dichotomiis plerumque desunt.

Pé-Tchi-Ly: Ling-Tchéou, fossés humides, juin 1908 (Chanet, 1320).

333. *Lithospermum Komarovianum* Lévl., nov. spec.

Planta gracilis 15—20 cm alta, longe hirta, foliis linearibus integerimis; flores albi mediocres; lobis calycinis anguste lanceolatis obtusis; antherae nigrae in fauce corollae infundibuliformis inclusae; corollae lobi obtusi rotundato-dilatati. Radice gracili et elongata.

Sagalien: In pago Mitsuriyoka, juill. 1908 (Faurie, 687).

334. *Scutellaria scordifolia* Fisch. var. *obtusifolia* Lévl., nov. var.

Planta ascendens 15—20 cm alta, foliis obtusissimis 15—20 mm longis, 10—15 mm latis conspicua.

Sagalien: In littore Korsakof, août 1908 (Faurie, 705).

335. *Chionanthus coreanus* Lévl., nov. spec.

Pulcherrima planta, ramis sulcatis, foliis 4—10 cm longis, 2—4 cm latis, reticulatis, subtus pallidioribus, villosis integerrimis, ovatis, obtusiusculis, longe petiolatis; flores in paniculos terminales ramorum et ramulorum dispositi; sepala lanceolata acuminata petalis 4-plo breviora; petala linearia, 5-nervata obtusiuscula; ovarium calycem circiter aequans.

Corea: Quelpaert secus torrentes Htepyeng, rara, 5 mai 1908 (Taquet, 1515).

336. *Hippuris Fauriei* Lévl., nov. spec.

Planta 20—40 cm alta, foliis 3—4 verticillatis oblongis 5—8 mm longis, 3—5 mm latis, obtusis distinctissima.

Sagalien: In paludosis littoris Sorioska, août 1908 (Faurie, 776).

¹⁾ Deinceps diagnoses erunt figurative, id est: plantas de pingemus aspectu et habitu et tantum modo notas praecipuas quae illas ab aliis immediate secernunt describemus; ceterae notae superfluae videntur.

337. ***Cornus Fauriei*** Lévl., nov. spec.

A *C. canadensi* et *C. suecica* caulibus longissime et ramosissime rep-
tantibus et radicantibus statim dignoscenda. A primo caule non simplici
differt; a secundo foliis supremis verticillatis, ceteris subnullis, caulis-
nudatis facile secernitur. Folia sub lente hispida; styli persistentes; flores
involucro paulo tantum breviores.

Sagalien: In silvis Soriofska, 2 sept. 1908 (Faurie, 762).

338. ***Geum Fauriei*** Lévl., nov. spec.

Planta hirta; folia omnia orbicularia, inciso-crenata, cordata, petiolo-
radicalium lobulis paucis et minutis munita; stipulae ovato-lanceolatae
acuminatae; aristae carpellorum glaberrimae ad apicem circinatae et deinde
angulo recto horizontaliter elongatae.

Sagalien: In silvis Kimonai, 20 sept. 1908 (Faurie, 586).

339. ***Geum sachalinense*** Lévl., nov. spec.

A *G. Fauriei* foliis cuneatim in petiolum decurrentibus et aristis car-
pellorum distinctum; a *G. stricto* cui affinis et cujus forsitan varietas
foliis omnibus simplicibus, trilobis vel trifidis secernitur.

Sagalien: In herbidis Vladimirof, juin 1908 (Faurie, 583).

340. ***Spiraea Fauriei*** Lévl., nov. spec.

A *S. prunifolia* cui proxima inflorescentia ad apicem ramorum corym-
bosa nec elongata et foliis ad apicem parce dentatis dignoscitur. Pedi-
celli floribus 2 - 3-plo longiores; stamina exserta. Rami nudi, rubescentes,
exfoliati, folia longe ciliata; stamina exserta.

Sagalien: In rupibus littoris Korsakoff, juill. 1908 (Faurie, 575).

341. ***Rosa Marretii*** Lévl., nov. spec.

Rami brunnei, aculeis et aciculis paucis muniti; folia 3-4 juga, rachi
tomentosa; foliola anguste lanceolata petiolulata, elongata, 1 cm vix lata
3 cm longa, subitus inconspicue hirtella, ciliolata; fructu globuloso, grosso,
sepalis erectis, fructu longioribus, ad basin tomentosis, abrupte strangu-
latis, dein glabris, 3-nervatis, integerrimis, linearis-dilatatis coronato.

Sagalien: Circa Korsakof, 10 sept. 1908 (Faurie, 571).

342. ***Arabis Fauriei*** Lévl. nov. spec.

Ab *A. sagittata* floribus flores *A. alpinae* cultae aequantibus, statim
diversa. Antherae conspicue sagittatae. Folia longe ciliata. Tota planta
(floribus exceptis) villosa; siliquae glabrescentes pedicellis 4-plo longiores.
strictae et appressae.

Sagalien: In littore Korsakof, 8 juill. 1908 (Faurie, 527).

343. ***Aster lofoensis*** Lévl. et Vant., nov. spec.

Planta elatissima lignosa, purpurea; folia *Rosmarini*, linearia, mar-
gine revoluta, sed supra alte impresso-nervata, inde alte rugosa, pilis
setosis distantibus et brevissimis munita; capitula aurea, corymbosa vel
interdum paniculata, in quovis ramo 3-15 disposita; flosculi ad apicem
brevissime lobati et brunnei; stylo parum exerto; akoenia grisea, longe
hirta; pappus elongatus, depauperatus, 8-10 setis remotis compositus,
akoeno longior.

Caulis striatus, puberulus; bracteae involucrales confertae imbricatae lineares, puberulae.

Kouy-Tchéou: Lo-Fou, mars 1907 (Jul. Cavalerie).

344. *Aster papposissimus* Lévl., nov. spec.

Planta 40—50 cm alta ramosissima; caulis angulatus, striatus, glaber, robustus; rami striati, angulati, glabri; folia integra, elongata, angustissime lanceolata, nervo medio proeminente; flosculi tubo ad basim angustissime et longius contracta dein dilatato, lobis sat alte fissis; bracteae involucrales, externae carinatae angustiores, internae obtusae 5-nerviae; akoenia olivacea, villosa; pappus albus, elongatus akoenio longior.

Capitula matura valde papposa, unde aspectus plantae plumosus.

Corea: Quelpaert, in sepibus Hongno, cascade, oct. 1909 (Taquet, 2988).

345. *Hydrangea sachalinensis* Lévl., nov. spec.

Planta caule rubescente, sulcato, muricato, glabro; foliis coriaceis, rubris, integris vel parce et partim calloso-dentatis, pedunculis et pedicellis inflorescentiae setosis, floribus autem glabris dignoscenda. Bracteae integrae; folia perfecte ovata in nervis et passim setosa.

Sagalien: In silvis Korsakof, oct. 1908 (Faurie, 439).

346. *Hydrangea tiliaefolia* Lévl., nov. spec.

Planta foliis *Tiliae parvifoliae* etsi parum cordatis conspicua; nunc viridis, nunc rubescens; folia in angulis nervorum fasciculis pilorum subtus munita; pedunculi et pedicelli hirto-setosa; stamina inaequalia, antherae purpureae; bracteae florales nervatae sed inconspicue reticulatae parvae, integrae.

Corea: Quelpaert, in silvis, dumosis et in rupibus Yang-Keni, 14 mai — octobre 1906, 1907 (Faurie, 358, 1654; Taquet, 809).

347. *Hydrangea Taquetii* Lévl., nov. spec.

Affinis praecedenti sed ab ea et ab *H. hortensi* diversa: 1^o foliis conspicue cordatis, grosse serratis, a basi ad apicem crescentibus, aequo longis ac latis; 2^o bracteis longe petiolatis; petiolo limbum subaequante.

Folia ciliata, praesertim secus nervos pilosa; bracteae triangulares, integrae ad petiolum recte truncatae; pedunculi et pedicelli dense pilosi.

Corea: Quelpaert, in muris agrorum Hongno et in silvis Yang-Keni, 10—12 mai 1908 (Taquet, 807, 808).

348. *Chrysosplenium pseudo-Fauriei* Lévl., nov. spec.

Affinis *C. Fauriei* a quo differt: foliis flaccidis, dentibus duplo numerosis. Lobi terminales foliorum in ramis sterilibus metiuntur 7 × 4 cm. Planta glaberrima foliis spatulato-orbiculatis.

Corea: In lacunis montium Ouen-San, 4 juill. 1906 (Faurie, 379).

349. *Astilbe Thunbergii* Miq. var. *Taquetii* Lévl., nov. var.

Folia ad basim conspicue cuneata et integra; caules folia vix vel non superantes. Planta 25—30 cm alta.

Corea: Quelpaert, in rupibus torrentium Hallaisan, 900 m, 3 sept. 1908 (Taquet, 800).

350. *Astilbe Thunbergii* Miq. var. *aethusifolia* Lévl., nov. var. an sp. propria?

Planta 25 cm circiter alta; caulis folia superans. Folia illa *Aethusae Cynapii* referentia. Folliculi glabri, terni, stylosi.

Corea: Quelpaert, in petrosis, secus torrentes, oct. 1906, 1907 (Taquet, 148; Faurie, 368); in silvis Hallaisan, juill. 1908 (Taquet, 797).

351. *Deutzia Fauriei* Lévl., nov. spec.

Rami exfoliati, puberuli; folia ovato-oblonga, argute serrulata acuminate breviter petiolata rubro-punctata; inflorescentiae umbellatae terminales; lobi calycinii hyalini, obtusissimi; styli 3 ad apicem glandulis stipitatis muniti.

Corea: In rupibus montis „des Diamants“, 24 juin 1906 (Faurie, 360).

352. *Deutzia coreana* Lévl., nov. spec.

Rami grisei, glabri; folia utrinque inconspicue pilosa, argutissime serrata, ovato-lanceolata, acuminata; flores axillares, glomerulati, infra folia in ramis oriundi; ovarium leviter araneosum, styli 3 longissimi contorti.

Corea: In monte des Diamants, juin 1906 (Faurie, 364).

353. *Adina Fauriei* Lévl., nov. spec.

Frutex 1—2 m alta; cortice rugoso, verrucoso; folia elliptica sessilia discoloria integrerrima supra hirtella subtus in nervis praesertim villosa; rami novelli et pedunculi dense hirto-tomentosi; inflorescentiae globoso-capitatae; perianthum pilosum; styli elongati, stigmate atrato brevissime clavato. Folia subcoriacea conspicue nervata, densa.

Corea: In ripis et petrosis torrentium Hongno et Hioton, 22 août—oct. 1906 (Faurie, 701; Taquet 1366).

354. *Dendropanax morbiferum* Lévl., nov. spec.

Planta glaberrima; arbor cortice rugoso, griseo; folia ovata coriacea, integra vel undulata, 7—10 × 4—7 cm, longe petiolata, petiolo 25—50 mm longo, glaberrima, nervis reticulatis; inflorescentia perfecte umbellata, pedunculo 3—5 cm longo ad basim conspicue articulato; pedicelli 1 cm circiter longi; calyx globosus, integer vel erosus; petala crassa, obtusa nervo eminente intus munita; antherae dorsifixae, subquadratae, loculis approximati, convexis; fructus pedicello brevior, 5—6 mm longus, 4—5 mm latus, pentagonus, valide costatus, stylis 5 persistentibus et pyramidato-coalitis coronatus.

Plante qui par son contact produit des éruptions sur la peau et dont la sève donne un excellent vernis.

Corea: Quelpaert, in silvis vel secus torrentes Hongno (Faurie, 547, 1663; Taquet, 183, 895, 896).

355. *Plantago Taquetii* Lévl., nov. spec.

Planta humilis; folia radicalia ovata integra 3-nervia longe petiolata, petiolo limbum aequante vel superante; limbus 2 cm × 12—16 mm, brevissime setulosus, obtusatus, ovatus; petiolus canaliculatus; scapi 1—2 graciles, erecti, angulati, puberuli, 5—9 cm alti; spica linearis, 5—15 mm laxa vel interrupta; bracteae ovatae acutae; sepala obtusissima, brunnea

margine fulva; capsula conica fulva granulata; lobis corollae persistentibus demum reflexis.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan, Yengsil, 1000 m, 17 août 1908 (Taquet, 1257).

356. **Plantago coreana** Lévl., nov. spec.

Affinis praecedenti et paulo robustior sed sequentibus notis distincta: folia oblonga, 5-nervia, utrinque inaequaliter 5—6 dentata, petiolo dilatato; glabrata; stylus elongatus; capsulae oblongae; scapi ascendententes.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan, 1000 m, 17 août 1908 (Taquet, 1262).

357. **Aneilema Taquetii** Lévl., nov. spec.

Planta debilis et procumbens, ramosa glabra; folia linearia, acuminata 7-nervia; flores axillares et terminales, solitarii, pedunculati, terminalis sat longe pedunculatus, reflexus; capsulae glabrae; styli conici.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan, 800 m, 18 sept. 1908 (Taquet, 1547).

358. **Commelina coreana** Lévl., nov. spec.

Planta humillima 4—7 cm alta, ramosa, puberula pustulata; folia con-duplicata, vaginis longe barbatis; spathae vix et parce nervatae; flores intense caerulei; stamna caerulea exserta.

Corea: Quelpaert, in littore Syekeni, juill. 1908 (Taquet, 1550).

359. **Oxalis corniculata** L. var. **trichocaulon** Lévl., nov. var.

Insignis caulis longissimis rubescensibus, basi lignosis comam intricatam efformantibus. Foliola ciliata.

Corea: Quelpaert, scandens in muris oryzetorum Syeteni, avr. 1908 (Taquet 612).

360. **Microrhamnus Taquetii** Lévl., nov. spec.

Rami angulo recto divaricati; folia obovata glabra, sub lente denticulata, brevissime petiolata, subacuminata; fructu oblongo, obtuso.

Corea: Quelpaert, secus torrentes, sept. 1907 (Taquet, 153).

361. **Euonymus coreanus** Lévl., nov. spec.

Affinis *E. europaea* a quo differt pedunculo florifero nullo, pedicellis e ramis oriundis bis articulatis, refractis; fructus lobis acute carinatis.

Corea: In dumosis Chinnampo, août 1906 (Faurie, 520).

362. **Celastrus clemacanthus** Lévl., nov. spec.

Frutex spinosus, sarmentosus, scandens; folia subovata, flaccida, laete viridia, petiolata, setaceo-denticulata, glabra; flores in fasciculos e caule vel ramis enascentes dispositi; flavidii; pedicelli flores aequantes vel superantes; stipulae setaceae; petala obtusa ad apicem erosa; stamna petalis paulo breviora; antherae glabrae.

Corea: Quelpaert, scandens in muris agrorum Haouen, 8 mai 1908 (Taquet, 632).

363. **Limnanthemum coreanum** Lévl., nov. spec.

Planta radicans vel stolonifera; folia radicalia ex aquae altitudine petiolata, numerosa orbicularia profunde et anguste cordata integra glabra, 3—4 × 3—4 cm; flores in umbellas densas et sessiles secus

caulem et stolones distributi; pedicelli floribus longiores; sepala lanceolata obtusa quam capsula matura dimidio breviora; petala flava? sepalis longiora; semina globosa levia flava nitida.

Corea: Quelpaert in oryzetis vel aquis Hannon, 27 août—30 oct. 1908 (Taquet 1516, 1518).

364. **Limnanthemum Taquetii** Lévl., nov. spec.

Forma lacuum et stagnorum radice robustissima, petiolis multo magis elongatis, limbo 7—8 cm tam longo quam lato; petiolis planis 4—6 mm latis; sepala acuta capsulam maturam aequantia; semina ut in praecedenti.

Corea: Quelpaert, in stagno Lineum, 14 sept. 1908 (Taquet, 1519).

365. **Syringa Fauriei** Lévl., nov. spec.

Affinis *S. amurensi* inflorescentia; differt autem forma foliorum lanceolatorum acuminatorum; proxima *S. villosae*, sed differt floribus minutis, antheris exsertis et glabrescentia omnium plantae partium. Fructus oblongi, obtusi, glaberrimi, striati, 1 cm longi.

Corea: In monte „des Diamants“ 22 mai, 21 juin 1906 (Faurie, 714, 722).

366. **Fraxinus Fauriei** Lévl., nov. spec.

Foliis discoloribus, supra atroviridis, subtus pallide griseis, utrinque villosis; foliolis late lanceolatis margine dentibus valde remotis, rariss. linearibus et productis facile dignoscitur.

Corea: Quelpaert, circa pagos, août 1907 (Faurie, 1867).

367. **Potamogeton perfoliatus** L. var. **sachalinensis** Lévl., nov. var.

Folia acuta et carpelli margine 1—2 carinati illum a typo secernunt. Sagalien: In lacubus Tonaichen, 18 sept. 1908 (Faurie, 372).

368. **Parnassia (saxifragastrum) Petitmengini** Lévl., nov. spec.

Folia radicalia numerosa (10—20), spatulata, glabrata 5—10 mm longa, petiolo alato limbum orbiculatum aequante; scapi 1—3, gracillimi 4—7 cm longi, folio minutissimo amplexicauli muniti; flores albi, dimetro 5—8 mm, sepala lanceolata obtusa, petalis dimidio breviora; petala obtusa, integrerrima nervata; staminodia brunnea integra; stamina staminodiis duplo longiora; antherae cum filamentis albae, subglobosae; ovarium conicum.

A *P. tenella* Hook. et Thomps. differt foliis spatulatis minoribus nec reniformibus et absentia stipularum fimbriatarum.

Kouy-Tchéou: Environs de Kouy-Yang, mont du Collège, gorges de Yang-Pa, sur les rochers, sept. 1898 (J. Chaffanjon in herb. Bonnier, 2497).

369. **Pollia Dielsii** Lévl., nov. spec.

A *Pollia sorzogonense* Endl. differt primo aspectu foliis polymorphis in eadem planta vere heterophylla. Folia alia longissime lanceolata; alia ovato-lanceolata, supremum ovatum imo suborbiculatum cordato-amplexicaule. Flores generis, racemosi, rhachide villosa; racemo nunc duplici, alio in axillo folii supremi latissimi, breviter pedunculato, alio longe pedunculato. Flores pallide caerulei.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, août 1904 (Jul. Cavalerie, 2053); Yun-Nan: Forêts des montagnes, juill. 1906 (Maire, 459).

370. *Alisma coreana* Lévl., nov. spec.

Folia graminiformia, striata, nervis transversis conspicuis; scapus gracilis; inflorescentia depauperata *Alismae ranunculoides*, id est flores 1—2 verticillati, verticilli 2—3 flori; non raro flos sessilis ad verticillum inferiorem adjunctus vel illum supplens; sepala mox reflexa.

Planta foliis gramineis nec petiolatis, 7—8 mm latis, obtusiusculis, reticulato-pellucidis insignis.

Corea: Quelpaert, in oryzetis Hannon, 28 sept. 1908 (Taquet, 1520).

LXXV. **Species novae ex: R. P. Merino, Flora descriptiva
é illustrada de Galicia. II. 1906.**

(Schluss.)

55. *Galactites tomentosa* Moench. var. 2 **microcephala** Merino, l. c., p. 437.

Caule simplice mono- et microcephalo; foliis pinnatifidis.

Galicia: En los contornos de Camposancos cerca de la costa, Pontevedra. Fl. desde fines de primavera.

56. *Thrincia hirta* Roth. var. 4 **autumnalis** Merino, l. c., p. 447.

Radice brevi praemorsa 1 cm longa radiculis paulo longioribus sti-
pata; foliis rosulatis, terrae adpressis linear-lanceolatis, sinuato-dentatis,
subglabris; scapis 4—6 raro pluribus erectis basi arcuatis, sub capitulo
incerassatis, fistulosis 4—8 cm long.; capitulis perparvis; achaeniis omnibus
apice attenuatis, erostratis; fl. autumno.

Galicia: La var. 4a en los prados vecinos al Miño, en los de la
costa de Camposancos, como también en los muy húmedos de la isla
de La Toja, Pontevedra. Fl. en todo el verano y parte del otoño.

57. *Leontodon autumnalis* L. var. **Merinoi** Pau apud Merino, l. c., p. 450.

Pappi radiis crebrioribus, aliis filiformibus denticulatis, aliis plumosis;
caule saepius simplici.

Galicia: La variedad viven en las resquebrajaduras de las rocas del
Brego, Peñarrubia y Pena Bolosa, Ancares, Lugo. Fl. en verano.

58. *Leontodon Taraxaci* Lois. var. **minor** Merino, l. c., p. 451.

Caule simplici, glabro, 1—2 dm alto, superne fistuloso densius squa-
moso caeterum unam alteramve squamam ferente; foliis glabris linear-
oblongis 2—8 cm long., aliis integris dentatis, aliis sinuato-dentatis vel
runcinatis; anthodii oblongi phyllis linear-lanceolatis nigricantibus tomen-
tellis pappo brevioribus; pappi nivei pilis biserialibus, omnibus plumosis
haud basi dilatatis. Quasi medium locum inter *L. Taraxaci* Lois. et *L. pyrenaeicum* Gouan tenet, ad primum pappo niveo undique plumoso accedit;
anthodii forma et colore squamisque sub anthodio aggregatis *L. pyrenaeicum* Gou. refert.