

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis

auctore

F. Fedde

No. 257/259

X. Band

15. März 1912

LXIII. Decades plantarum novarum. LXXV—LXXIX.

Auctore H. Léveillé.

(Originaldiagnosen.)

741. *Stellera Bodinieri* Lévl., nov. spec.

Stipite lignoso, crasso, pluricauli; caules recti, angulati, striati 15—30 cm alti; folia nunc linearia nunc ovata; pluri et penninervia, glabra hypericiformia sessilia vel subsessilia; flores pulchre lutei ad apicem caulium dense umbellati; perianthium valide nervatum; nervis intense flavis; lobi 5, magis etiam lutei, obtusi, ovati; stamina faucem non excedentia; antherae lineares.

Yun-Nan: Environs de Yun-Nan-Sen, haut des montagnes; montagnes entre Ma-Kay et Se-Hong, 9 mars; 9 avril 1897 (Fr. Ducloux); Kouy-Tchéou: montagnes entre Hin-Y-Hien et Hin-Y-Fou, 12 avril 1897 (Em. Bodinier).

742. *Daphne Martini* Lévl., nov. spec.

Caulis nunc atrobrunneus, nunc rubescens angulatus, glaber; folia glabra nunc glauco-viridia nunc ferrugineo-viridia nunc obovata obtusissima nunc lanceolata acuminata nervis nunc conspicuis nunc evanidis; flores albi, vel flavo-viridia nunc omnes terminales, nunc partim axillares; perianthium elongatum sericeo-villosum raro superne glabratum; pedunculo communi brevissimo, vel nullo; lobi perianthii patentes, nunc obtusati nunc acuti; staminum antherae ad faucem subexsertae luteae.

Kouy-Tchéou: Environs de Kouy-Yang, mont du Collège, février 1898 (J. Chaffanjon et Emile Bodinier, 2076); environs de Gan-Pin, grandes Rocailles, 12 février 1898 (L. Martin, 2076); Yeou-Lang (Jos. Esquirol, 775).

Forsan sub uno nomine diversae species nam flores nunc albi in planta Esquiroliana et folia acuminata; flavo-virides in planta a Bodinier, Chaffanjon et Martin collecta quae variat ipsa forma et colore foliorum.

743. *Cinnamomum Bodinieri* Lévl., nov. spec.

Arbor altissima et perlatissima, ramulis nodosis; folia ampla 3-trinervia nervis alternis, late ovata abrupte acuminata, supra atro- et oli-

vaceo-viridia subtus livido sed albido-tomentosa sat longe petiolata; inflorescentia amplissima decomposito-paniculata, puberulo-villosa; lobi perianthii breves, ovati, obtusi, caduci ideoque calyx fructifer cupuliformis; fructus nigrescens, parvus, globosus, apiculatus, rugosulus.

Kouy-Tchéou: Environs de Kouy-Yang, bois de la pagode de Lan-Yo-Chan, 15 juin 1899 (Em. Bodinier, 2622).

744. **Cinnamomum Cavaleriesi** Lévl., nov. spec.

Ramuli, folia arboris magni rubra; planta camphorata glaberrima; folia ovata asymetrica, rubro-petiolata, utrinque foveolato-reticulata penninervia, nervis suboppositis, dejecto-acuminata; inflorescentiae axillares, gracillimae, peraxilliflorae, pauciflorae (8—10); fructus parvus rubescens, globosus, nitidus.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 23 juin 1903 (Jul. Cavalerie, 1084).

745. **Cinnamomum Taquetii** Lévl., nov. spec.

Rami nigri vel atropurpurei glabri; folia membranaceo-coriacea, late ovata, acuminata; petiolo purpureo; limbo triplinervi, nervis luteis, utrinque foveolato-reticulato, pallide viridi, nitidulo; fructu globoso, opaco vel nitido, levi, magnitudine magni pisi; perianthio cupuliformi integerrimo; gemmae villosae.

A *C. Camphora* distinctum foliis late ovatis nec tamen rotundatis, potius membranaceis.

Quelpaert: In silvis Tolsouni et Taitpjeng, rara, jul. 1909, oct. 1908 (Taquet, 1344, 3159).

746. **Litsea coreana** Lévl., nov. spec.

Rami grisei; folia ovata vel lanceolata, glabra, coriacea, nitida, penninervia, rubro-viridia, subtus ferruginea, pulchre reticulata, obtuse acuminata; petiolis nigrescentibus, suberosis; gemmae foliiferae villosae; flores axillares, anthe anthesin globulosi; bracteis villosis inclusi, subsessiles, quasi glomerulati, magnitudine grani piperis; fructus, pedunculo communi elongato, pedicellati, globosi, magnitudine parvi cerasi, calice persistente lobato et striato suffulti.

A *L. aciculata* foliis penninerviis, subtus ferrugineis et supra non pustulatis distincta.

Corea: In silvis Taitpjeng, Yangkeuni, Sanpangsan et in pago Syekeni prope mare, jul.-oct. 1908—1910 (Taquet, 1355, 1356, 3171, 4401).

747. **Lindera Dielsii** Lévl., nov. spec.

Flores praecocissimi; frutex mascula, foliis nullis; ramis lutescentibus gracilibus; inflorescentiis brevissime stipitatis, globosis, cucullato-bracteatis; flores in folium capitulum aggregati, brevissime pedicellati, atro-utei; feminea frutex (an eadem sp.?) ramis purpureis; inflorescentiae breviter stipitatae; flores breviter pedicellati albo-lutei, odori; folia vix enascentia; pedicellis villosis; stylus exsertus, stigmatibus capitato, dilatato.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, montagnes, 27 fév. 1902, 22 mars 1903 (Jul. Cavalerie, 932, 1299).

748. *Litsea Cavalieriei* Lévl., nov. spec.

Frutex 1—2 m alta; rami grisei; folia lanceolata, supra glabra, nitidula nervis impressis; subtus ferrugineo-tomentosa, nervis conspicue elevatis, reticulata margine revoluto, acuminata, breviter petiolata petiolo nigro; flores albi, capitulose aggregati, pedunculi sicut ramuli novelli et petioli juniores hirsuti; bracteae sericeo-villosae; perianthio extus albide hirsutissimo, staminum filamenta hirta; antherae glabrae subflabellatae.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 15 juill. 1902 (Jul. Cavalerie, 65).

749. *Lindera Bodinieri* Lévl., nov. spec.

Rami brunnei, molliter pubescentes; folia *Litsea Cavalieriei* sed paulo majora; flores lutei umbellati, axillares, pedunculo communi brevissimo et pedicellis fulvo hirsutis; perianthio mox deciduo praecipue ad medium dorsum piloso; filamenta glabra, brunnea; antherae luteae; fructus nigri, rugosi, globosi vel oblongi magnitudine grani piperis.

Kouy-Tchéou: Environs de Kouy-Yang, grand arbuste; mont du Collège, bois de Kien-Lin-Chan, 12—14 avr. 1898 (Em. Bodinier, 2179); Pin-Fa, 25 juin 1902 (Jul. Cavalerie, 798).

750. *Lindera Yunnanensis* Lévl., nov. spec.

Affinis praecedenti sed foliis ovatis, multo minus nervatis, subtus reticulato-tomentellis; flores brevissime pedicellati, inflorescentias globosas et densas in axillis efformantes; antherae vexillares, complanatae. Inflorescentiae femineae globoso-subsessiles; pediculi et perianthium hirtella; ramuli rubelli glabrati vel parcissime pilosi.

A *L. Bodinieri* differt pedunculo communi nullo.

Yun-Nan: Environs de Yun-Nan-Sen, dans les bois de la montagne, grande ravine, 6 mars 1897 (Fr. Ducloux); 21 mars 1897 (Em. Bodinier).

751. *Lindera Cavalieriei* Lévl., nov. spec.

Parva arbor, ramulis gracilibus glabris; folia longe lanceolata, 10—20 × 2—4 cm, glabra, nervis subtus conspicuis, primario elevato, acuminata ad basin longe attenuata, petiolata, conferta; inflorescentia cymosa, longe pedunculata, laxiflora et pauciflora; perianthii alte fissi lobis ovatis, obtusis, costatis; fructus ovati, nigrobrunnei, granulati, magnitudine pisi.

Foliis *L. umbellatam* referens sed inflorescentia valde differt.

Kouy-Tchéou: Tsin-Gai, Kao-Po, bords des ruisseaux, 5 août 1903 (Jul. Cavalerie, 1222).

752. *Urtica pinfaensis* Lévl. et Blin, nov. spec.

Caulis gracillimus; folia profunde incisa, dentata ambitu triangularia, ad basim truncata vel obcordata, glabra longissime petiolata petiolo 6—8 cm, limbum subaequante et in foliis inferioribus superante; limbo 14—18 inciso-lobato; flores monoici, spicati; spicae laxiflorae, remotiflorae, 4—5 verticillatae; inferiores femineae petiolo breviores; superiores masculae petiolo longiores; semina rotundata flavida.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 9 oct. 1902 (Jul. Cavalerie, 771).

753. Boehmeria Esquirolii Lév. et Blin, nov. spec.

Affinis *B. niveae* a quo distat sequentibus notis. Planta dioica, lignosa, caules hirsuti; folia nunc opposita, nunc alterna, ovato-lanceolata, nunquam orbicularia, petiolo brevissimo, nervis primariis parallelis, confluentibus hirsutis; inflorescentiae masculae anthelatae ut in *Juncis*, ramis anthelae hirsutis: perianthio brunnescente, villosa; stamina glabra; antherae brunneae filamentis breviores.

Folia supra atroviridia alte rugosa, stellatim pilosa; subtus incanotomentosa.

Kouy-Tchéou: Ouang-Mou, juin 1904 (Jos. Esquirol).

754. Smilax Taquetii Lév.

A *S. herbacea* distincta: caule flexuosissimo, ramulis novellis luteis; bracteis perulae elongatis castaneis striato-carinatis, nec dilatatis; foliis perfecte orbiculatis; interdum apiculatis, saepius retusis; fructu ad maturitatem luteo, nitido et cerasi magnitudine.

Flores longe umbellati; stigmatate alte trilobo, lobis crassis.

Corea: In silvis Hongno et Hallaisan, maio-aug. 1909 (Taquet, 3306, 3307, 3308).

755. Tupistra Cavalieriei Lév., nov. spec.

Planta robusta; caulis crassus, diametro 2 cm nodosus, striatus vel costatus glaber, radicans; folia radicalia conferta, 40 cm longa, 5 cm lata; caulinarum 20 × 4 cm, striata, glabra in petiolum alatum longissime attenuata; flores in inflorescentias capitatas axillares multifloras, plures, alternas, densissimas sessiles vel subsessiles dispositi et congesti; capsula trivalvata, apice barbata; quavis valva extus ad apicem longe barbata, pilis fulvis, stigmatate persistente coronata.

Kouy-Tchéou: Lo-Fou, ouest, bois humides et ombreux; plante médicinale, nov. 1905; août 1909 (Jul. Cavalerie, 2565, 3517).

756. Disporum Taquetii Lév., nov. combin.

(*Tovaria Hallaisanensis* Lév. in Fedde, Repert., 1909, p. 264.)

Corea: In silvis Hallaisan, maio 1907 (U. Faurie, 2119); Quelpaert, in silvis Hallaisan, 800 m, in sepibus Hongno, 1 apr., 5 mai 1908—1910 (Taquet, 4052, 4737, 4738).

757. Hiptage Esquirolii Lév., nov. spec.

Pulchra arbor floribus albis; foliis subcoriaceis, ovatis vel obovatis abrupte in acumen dejectum contractis; inflorescentia vix pilosa, pilis albidis consita; flores parvi; calyx vix albide pilosus; antherae rotundatae; styli non raro tres.

Kouy-Tchéou: Choui-Teou, route de Tin-Fan-Lo-Fou, 4 mai 1900, alt. 900 m (Jos. Esquirol, 2097).

758. Hiptage Cavalieriei Lév., nov. spec.

Arbor magna 9 m alta; ramuli rugoso-suberosi; folia coriacea lanceolata, argute sed remote dentata, subtus ferruginea; inflorescentia pyramidalis, floribunda sed condensata, rufo-villosa; calyx rufo-tomentosus; sepala parva intus glabrata, ovata obtusa; petala alba, odora, emar-

ginata vel biloba; antherae rotundatae supra complanatae, marginatae, styli 3—4.

Styli in genere *Hiptage* variant numero 1—4 ut fit in genere *Crataegus*.

759. **Suttonia molokaiensis** Lévl., nov. nom.

(*Myrsine molokaiensis* Lévl. in Fedde, Repert., X [1911], p. 154.)

Sandwich: Molokai: Kamolo, 1000 m, jun. 1910 (Faurie, 435).

760. **Suttonia Fauriei** Lévl., nov. nom.

(*Myrsine Fauriei* Lévl. in Fedde, Repert., X [1911], p. 154.)

Sandwich: Oahu: Waiānai, maio 1910, Muranu, nov. 1909; Kona-huanui, oct. 1909 (Faurie, 422, 423, 427).

761. **Ardisia elegantissima** Lévl., nov. spec.

Frutex 1—2 m alta, apice tantum ramosa; ramuli alterni, angulo recto divaricati unde apex fruticis elegantissimus; folia maxima oblonga 10—13 × 3—4 cm viridi-brunnea acuminata petiolata glaberrima undulato-crenata, intra crenulas glandulosa, insuper punctulis parvis subtus conspersa; flores rosei, pulcherrimi, sat magni 1 cm, penduli, corymbosi, terminales; sepala obtusa ovata; petala triplo longiora acuminata; antherae magnae acuminatae; stylus exsertissimus.

Ab *A. virente* inflorescentiis paucifloris, petalis et antheris non punctatis, habituque diversa.

Hong-Kong: Bois de Happy Valley, 20 juin 1894 (Em. Boudinier, 665).

762. **Ardisia Labordei** Lévl., nov. spec.

Suffrutex 35 cm alta, cortice subereo; folia elliptica glaberrima calloso et glanduloso undulata margine revoluta, acuminata, subtus flavida supra laete viridia ad summos ramulos conferta et erecta; ramulis sulcatis; nervo primario uno conspicuo et intensius colorato; fructus pulchre rubri, globosi, perfecte umbellati, magnitudine pisi, nigro parce punctati pedicellis et pedunculis rubellis; inflorescentiae refractae.

Fructibus pulchre rubris, nervo foliorum rubro-flavido et valde conspicuo haec species insignitur.

Kouy-Tchéou: District de Tsin-Gay, dans les bois à Kao-Tchay, 8 mars 1898 (J. Laborde, 2512).

763. **Ardisia discolor** Lévl., nov. spec.

Species fruticosa his dignoscenda notis: Folia lanceolata coriacea, integerrima undulata, supra nitida levia, etsi grosse granulata, subtus livido-alba, brevissime pilosa, quasi tomentosa sub lente puncticulata, acuminata nervis supra impressis, subtus elevatis brunneis, dense villosis; ramuli dense pilosi, brunnei; inflorescentiae brunneo-pilosae paniculatae, corymbis densis efformatae; calyces hirti, sepala brevissima; petala villosula; antherae lanceolatae; filamenta ad apicem filiformi-attenuata.

Kouy-Tchéou: Ma-Jo (Jul. Cavalerie, 3610).

764. *Ardisia Meziana* Lévl., nov. spec.

Peraffinis *A. corymbiferae* a quo differt: punctulis foliorum multo numerosioribus, nec nigris; venis frequentissimis, angulo recto divaricatis, nervo marginali conspicuo; insuper fructibus duplo minoribus.

Kouy-Tchéou: Lo-Fou, mars 1909 (Jul. Cavalerie, 3530).

765. *Ardisia Cavaleriei* Lévl., nov. nom. (*A. castaneifolia* Lévl., in Fedde, Repertorium, IX, 1911, p. 461 non Mez).

Kouy-Tchéou: Environs de Tou-Chan; juin 1899; Pin-Fa, chutes d'eau, 9 déc. 1910 (Jul. Cavalerie, 751); Pin-Fa, fleurs roses, fruits d'un rouge clair, 15 juin 1905 (Jos. Esquirol).

766. *Ardisia crispa* Thunb. var. *Taquetii* Lévl., nov. var.

Differt a specie: caule altiore 1—2 m; ramis longioribus et minus ad apicem caulis confertis; foliis laete viridibus et longioribus.

Corée: Quelpaert, forêts le long des torrents, Hongno, oct. 1909 (Taquet, 2975).

767. *Embelia Esquirolii* Lévl., nov. spec.

Arbor ramis atro-purpureis; folia ovata 7—10 × 3—5 cm, membranacea dentata acuminata acumine dejecto, glabra, non punctata, petiolata; inflorescentiae cymosae pauciflorae, petiolis breviores; flores albo-virides; sepala lanceolata obtusa; petala duplo longiora, lamina ovato-dilatata; stamina brevissima, antherae crassae; stylus crassus; stigmatibus peltato, lobato.

Kouy-Tchéou: Collège, 10 mai 1906 (Jos. Esquirol).

768. *Embelia rubrinervis* Lévl., nov. spec.

Rami grisei striati; folia lanceolata glaberrima, crenata nitida lepidota conspicue rubrinervia petiolata; petiolis sub lente puberulis simul ac pedicellis; flores umbellati; sepala et petala aequilonga, inconspicue puberula; antherae inclusae acuminatae.

Species foliis rubrinerviis et sepalis petalis aequilongis praeclara.

Kouy-Tchéou (Jos. Esquirol, 729).

769. *Embelia Schlechteri* Lévl., nov. spec.

Ramuli graciles, tomentelli; folia ovata glabra, ad basin rotundata, sensim dejecto acuminata crenata, lineatim nec rotunde punctata, nervo primario uno subtus elevato, brevissime 1—2 mm petiolata; flores umbellati, axillares, pauci; pedunculi brevissimi 1—2 mm et pedicelli 3—4 mm brunneo-puberuli; sepala ovato-triangularia, margine pallidiora, punctata; petala 3-plo longiora subcucullata lanceolata margine etiam ad apicem pallidiora, obscure punctata, punctis haud rotundis; stamina inclusa; stylo flexuoso ideoque incluso etsi longiore.

Kouy-Tchéou: Environs de Kouy-Yang, mont du Collège petit arbuste, rocailles à l'entrée d'une grotte, février 1898 (Emile Bodinier, 2049).

770. *Embelia Dielsii* Lévl., nov. spec.

Frutex, ramis lenticellatis, purpureis; folia sublinearia, falcata glaberrima longe acuminata, 5—7 cm × 4—8 mm, margine remote et spinulose dentata; nervo primario supra impresso et uno subtus elevato;

subtus lineatim punctata si ita dicere liceat; breviter 2—3 mm petiolata; ramuli, pedunculus subnullus et pedicelli brunneo-puberuli; flores albo-lutei, parvi; sepala lanceolata, obtusa, puberula; petala lanceolata 2—3 plo longiora, lineatim punctata; antherae paulo exsertae, apiculatae.

Espèce remarquable par ses feuilles falquées et ses punctuations linéaires.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, bois, 17 février 1903 (Jul. Cavalerie, 1327).

771. **Embelia Blinii** Lévl., nov. spec.

Per affinis praecedenti sed bene distincta; foliis rectis nec falcatis, magis elongatis, pulchre crenatis, subtus lepidotis, dense et subrotunde punctatis; insuper flores sunt longiores et caulis scandens 2—3 m; pedunculi floriferi sunt brevissimi sed conspicui.

Kouy-Tchéou: Environs de Kouy-Yang, mont du Collège: Ké-Ma-Tong, février 1898 (J. Chaffanjon et Emile Bodinier, 2081).

772. **Embelia rubro-violacea** Lévl., nov. spec.

Arbor, ramis griseis; ramuli novelli tetrapteri glabri; folia supra intense brunneo-viridia, subtus brunnea perquam repandissime denticulata ovata ad basin subrotundata acuminata, glabra etsi subtus mollia, supra nitida petiolata; inflorescentiae axillares, corymbosae permultae; pedunculi fere 1 cm longi glabri simul ac pedicelli 2—4 mm longi; flores atro rubro-violacei; sepala breviter ovata obtusa; petala obtusa, 2-plo longiora, margine pallidiora; stamina post anthesin exserta; antherae acuminatae. Planta glaberrima.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, 23 juin 1902 (Jul. Cavalerie, 1334); forêts, juin 1905 (Jos. Esquirol, 429).

773. **Maesa aurea** Lévl., nov. spec.

Ramuli flavidi, punctati; folia utrinque aurea sed supra atro flava, lanceolata 10—16 × 3 cm glaberrima, parum conspicue denticulata, subtus praesertim nervosa, petiolo brunneo, canaliculato; flores racemosi, albi, racemis axillaribus petiolos non superantibus; pedunculi pedicelli hirti; bractae pilosae barbatae; sepala et petala glabra obtusa. Colore aureo foliorum statim dignoscenda.

Kouy-Tchéou: Environs de Tou-Chan, arbuste, 1^{es} oct. 1899 (Jul. Cavalerie, 2719).

774. **Maesa scandens** Lévl., nov. spec.

Frutex scandens, glaber; caulis densissime punctatus; ramuli striati, suberosi; folia petiolata, ovata viridi-brunnea ad basin attenuata ad apicem in acumen sat longum abrupte contracta, 4—8 × 1—3 cm, flores brevissime racemosi, rosei vel purpurei, inodori; calyx brevissimus, lobis ciliatis; corolla lageniformis; petala ad faucem pilosa, lanceolata; genitalia inclusa.

Kouy-Tchéou: Juin 1905 (Jos. Esquirol, 396, 399).

775. **Maesa myrsinoides** Lévl., nov. spec.

Caulis et rami albidi; folia lineari-lanceolata supra atroviridia subtus flavido-iridia brevissime petiolata ad basin cuneata ad apicem tantum

denticulata, denticulis remotis, acuminata, coriacea; nervo primario uno subtus elevato; nervis secundariis supra inconspicuis; fructus axillares et umbellatim dispositi, magnitudine grani piperis.

Habitu et foliis *Myrsinem africanam* refert sed fructu pluriloculari statim differt.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, ruisseau de La-Tong, 1^{es} oct. 1902 (Jul. Cavalerie, 579).

776. *Maesa Blinii* Lévl., nov. spec.

Frutex ramis brunneis; folia ampla, majora usque ad 15 × 4 cm; eleganter crenata pulchre et frequenter subtus reticulata et purpureo nervata, rubro-petiolata, ad basin rotunda ad apicem acuminata, late lanceolata nervis supra impressis; fructus circa 1 cm pedicellati, umbellatim dispositi, magnitudine grani piperis, purpurei.

Kouy-Tchéou: Ma-Jo, 24 juill. 1907 (Jul. Cavalerie, 3103).

777. *Myrsine Cavaleriesi* Lévl., nov. spec.

Frutex 1—2 m alta; folia disticha filicina angustissime lanceolata, acuminata ad basim subrotunda conferta brevissime petiolata, pulchre crenata profuse punctata; nervo uno supra impresso, subtus elevato, ceteris immersis et inconspicuis; flores axillares brevissime pedicellati, 2—3 gemini e pedunculo subnullo squamoso oriundi; rami hirtosetosi; sepala et petala obtusissima rotunda glaberrima, margine pallidiora; petala sepalis 4-plo longiora.

Species ramis frondes filicum fingentibus valde insignis.

Kouy-Tchéou: Montagnes, bois près ruisseaux, 11 oct. 1905 (Jul. Cavalerie, 2345).

778. *Myrsine Feddei* Lévl., nov. spec.

Rami grisei; folia saliciformia lanceolato-linearia parva, 2—3 cm × 4—8 mm, integerrima subtus squamosula ceterum glaberrima nervo uno supra impresso, subtus elevato conspicuo; ad basin attenuata; apice acuminata; flores albi, axillares, frequenter umbellati; sepala et petala obtusa, glabra; petala sepalis aequilongiora; genitalia inclusa; filamenta brevia sed conspicua; stylo subnullo, stigmatate crasso, capitato costato.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, ruisseaux, 23 mai 1902 (Jul. Cavalerie. 842).

779. *Rapanea aurea* Lévl., nov. spec.

Rami grisei, setosa; folia lanceolato-ovata, flavida vel aurea ad basin attenuata ad apicem obtuse acuminata vel obtusata, conferte dentata nervo uno supra impresso, subtus elevato, conspicuo, brevissime petiolata, brevia 2—5 cm × 10—15 mm; flores 2—3 gemini albi vel atrolactei; sepala et petala glabra obtusa, petala sepalis paulo longiora; genitalia inclusa; stylo nullo; antherae sessiles.

Colore flavo vel flavido foliorum facile dignoscenda.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, montagnes, 27 février, 10 mars 1902 (Jul. Cavalerie, 839, 841).

780. *Thalioctrum punctatum* Lévl., nov. spec.

Caulis 40—60 cm altus glaber; folia 2—3 ternata, glabra; foliolis ambitu ovatis, grosse crenatis vel dentatis, subtus pallidis vel albidis; in-

florescentia densa; staminum filamenta dilatata, conspicue punctata; sepala lanceolata striata; akenia breviter sed conspicue stipitata, trigona, faciebus levibus nec striatis; stigmatibus sessilibus.

Haec species filamentis punctatis et akeniis non striatis nec costatis facile dignoscitur.

Corea: Quelpaert, secus torrentes et in sepibus crateris Hallaisan, 1500—2000 m, 13 août 1908; juill. 1909 (Taquet, 513, 2565).

781. *Prunus Dunniana* Lévl., nov. spec.

Arbor magna, cortice nigrescente; folia ampla 10—15 × 3—6 cm, ovata, crenata, acuminata supra atroviridia subtus ferruginea reticulata pilosula, parallela et parum curvato-nervata; flores racemosi; fructus atropurpurei, ovati, apice attenuati stipitati, magnitudine pisi.

Kouy-Tchéou: Kai-Tchéou, juin 1908 (Jul. Cavalerie, 2985).

782. *Crataegus Chantcha* Lévl., nov. spec.

Rami puberuli; folia ambitu spatulata vel triangularia, ad basin cuneata et integra, ad dimidiam partem superiorem lobato incisa et dentata, utrinque, subtus praesertim et ad nervos praecipue villosa; flores ad apicem ramulorum brevissimorum et longe hirtorum solitarii vel 2—3 gemini, calice hirta, sepalis acuminatis; petala alba erosa; genitalia brevissima.

Kouy-Tchéou: Environs de Gan-Pin, 29 avril 1897 (Émile Bodinier).

783. *Crataegus Taquetii* Lévl., nov. spec. (*Pirus subcrataegifolius* Lévl. in Fedde, Repert., VII [1909], p. 197.)

Rami brunnei; folia confertissima laete viridia subtus parum flavida utrinque pilosula crenata acuminata, longe et pilose petiolata raro parce et remotissime incisa; inflorescentia umbellata; fructus purpurati, globosi, late et eleganter umbonati, pedicellis elongatis, glabris et flavidis.

Corea: Quelpaert, in silvis Yongsil, Hallaisan, 900—1000 m, oct. 1909, 12 aug. 1910 (Taquet, 2828, 4220); Hallaisan, jun. 1909 (Faurie, 1558).

784. *Pirus brunnea* Lévl., nov. spec.

Arbor ramis validis; ramuli, folia utraque pagina, petioli, pedicelli, fructus intense brunnea saltem in sicco; folia utrinque nitida; ovata, acuminata tenuissime serrata subtus eleganter sub lente reticulata et araneo-pilosa; petiolo araneo-villoso; fructus nitidi, glabri, magnitudine pisi.

A *P. sinensi* cui proxima colore brunneo et aspectu nitido diversa.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan, 800 m, oct. 1909 (Taquet, 2819).

785. *Pirus sinensis* Lindl. var. *Maximowicziana* Lévl., nov. var.

A typo diversa foliis rugosis subtus copiose villosis obtusatis.

Corea: Quelpaert, in silvis Haichenam, aug. 1909 (Taquet, 2821).

786. *Pirus spectabilis* Ait var. *albescens* Lévl., nov. var.

A specie diversa villositate omnium partium et praecipue foliis subtus albescentibus.

Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan, jun. 1909 (Taquet, 2815).

787. *Pirus Koehnei* Lév., nov. spec.

Frutex tota (pagina inferiore foliorum excepta) brunnea; folia sat longe petiolata, magna, acuminatissima, dentata simulac crenata subtus albido-tomentoso eleganter brunneo-nervata nervis confertis et ad apicem non raro dichotomis; inflorescentiae fulvo-pulverulentae, laxae, paniculatae, ramulos breves axillares terminantes, divaricatae, foliis tamen breviores; sepala caduca, acuta, albo-marginata; genitalia sepalis longiora; fructus alte foveolato-rugosi, floccosi, vix magnitudine grani piperis.

Affinis *P. Folgeri* Schneider, a qua differt foliis duplo majoribus, nervis paginae inferioris foliorum rubris et fructibus dimidio minoribus.

Kouy-Tchéou: Pin-Fa, montagnes, 15 juin 1905 (Jul. Cavalerie, 2376; Jos. Esquirol, 385).

788. *Rosa Korsakoviensis* Lév., nov. spec.

Caulis densissime aciculatus aculeis immixtis, ceterum glaber; aciculis erectis, aculeis parum recurvis; folia pinnata 2-juga, stipulae elongatae, dilatatae, fulvae acuminatae, longe connatae; foliola lanceolata, opaca villosa impari excepto sessilia; ad superiorem partem vel ad apicem tantum dentata; illa foliorum inferiorum minora; flores maximi; sepala longissime (apice dilatato) acuminata utrinque intus praesertim villosa, margine albido-tomentosa; stamina brevissima; styli crassi etiam brevissimi, ad basin dense barbati; ovarium glabrum.

Caule *R. pimpinellifoliam* refert; floribus *R. davuricam* a quibus dictis discrepat.

Sagalien: Circa Korsakof, aug. 1908 (Faurie, 570).

789. *Rosa quelpaertensis* Lév., nov. spec.

Scandens; ramuli flavidi, flexuosi, tenuissime striatuli; folia pinnata 3-juga; foliola minima 7×5 mm laete viridia obovata obtusissima, basi cuneata argute et alte dentata, rachide villosula, impari excepto subsessilia; stipulae alte pinnatifidae; flores parvi; calyx hispidulus; sepala mox refracta intus tomentella albomarginata; petala late et flabellato-dilatata apice obcordata; styli in columnam gracilem elongatam coadunati; stigmatibus distinctis.

A *R. multiflora* foliolis minimis distat et a *R. Beggeriana* stylis in columnam connatis discernitur.

Corea: In sepibus Hongno, maio 1909 (Taquet, 2870).

790. *Ligustrum Taquetii* Lév., nov. spec.

His statim distincta notis: folia ovato-lanceolata, margine undulata, opaca nec nitida, supra atro-viridia glaberrima; subtus tomento quam brevissimo sed densissimo vestita et punctata; inflorescentia amplissima gracillima, elegantissima sub lente puberula; flores conspicue pedicellati, pedicellis calices superantibus; corolla villosula calice eupuliformi vix 4-dentato 2—3 plo longior.

Arbor 7—8 m alta.

Corée: Quelpaert, forêts d'Hallaisan, juin 1909 (Taquet, 3051).