









DUPPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

FLORA
WIRCEBURGENSIS
SIVE
PLANTARUM IN MAGNO - DUCATU
WIRCEBURGENSI INDIGENARUM
ENUMERATIO SYSTEMATICA

CUM

CHARACTERIBUS GENERUM, SPECIERUM DIFFE-
RENTIIS, LOCIS NATALIBUS ET VITAE DURATIONE,
BREVIBUSQUE DESCRIPTIONIBUS

IN USUM TIRONUM DILUCIDATA

AUTHORE

FRANC. XAV. HELLER

MED. ET CHIR. DOCT. BOTAN. IN UNIVERS. MAGNO - DUCAL.
WIRCEBURGENSI PROF. PUBL. ET ORD. SOCIET. POLYTECHN.

WIRCEB. SODAL.

Pars I.

Gregor Kra
prof. bot.
erlang. hal. wir

WIRCEBURGI
apud Josephum Etahel

1810.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GEN
VENDU EN 1922

-XK314

H 41

1

Haec studia adolescentiam alent, senectatem oblectant.

Cicero pro A. P.

EDWARD
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

L. b. S.

Quod benevolo ac indulgenti tuo judicio tradere audeo, opusculum equidem praeter ea, quae a quavis uniuscujusque provinciae Flora jure tuo optimo maximoque exposcas, novi continet nihil. Hoc tamen non obstante non spero tantum, sed etiam plane confido, hoc quidquid est opusculi, haud omnino tibi ingratum, neque nullius, commodi tui rationibus inspectis, pretii futurum esse. Quotus enim quisque ibit insitias, regionem praecipue eam, quae vegetabilium suorum divitiis haud facile cuiquam alteri, paucis forte exceptis, palmam concedit, nonnisi difficulter sua speciali Flora carere posse, ejusque inopiam his praesertim temporibus, quibus amor et studium Botanices mirum in modum adcrevit lateque dominatur, eo vehementius sentiri?

Sedecim sunt, et quod excurrit, anni, quum *Patris* mei, mihi meisque praemature erepti, qui Floram patriam speciali prosecutus est cultu, miraque solertia ipse excolluit, ductu, plantarum indigenarum studio, procul habito omni earum discriminine, operam meam consecrare inciperem. Montes visitabam et valles, sylvas aequae ac locos palustres, et, ut breviter dicam, omnes eas

patriae meae plagas, quas penitus nosse a-
que perspicere plantarum amatoris quovis
modo interesse potest; colligebam, examina-
bam serius, colloquebar cum viris, quorum
in scientiam Botanices studium et amor non
vulgaris mihi innouerat, et quorum adeun-
dorum copiam ampla venerandi *Patris* mei
cum illis familiaritas mihi fecerat; colebam
ipsemet, quatenus id fieri poterat, et qua in
re *Patris*, cuius nulla unquam apud me erit
oblivio, indulgentia ac veluti manuductio
maximum mihi ante omnes alios subsidium
praebuit, patrias, et inter has praecipuo fer-
vore dubias, quos uspiam deprehendi, plan-
tas; quae ipsa proprio a me Marte suscep-
ta cultura facilem praebuit, et exoptatam
mihi occasionem, non teneram tantum ea-
rum adolescentiam, sed luxuriosum etiam
pleni, quam attigerant, vigoris florem quam
curatissime observandi.

Hic porro meus patriae Florae amor no-
vum ex praelectionibus et privatis etiam at-
que amicissimis instructionibus mei, quem
diutius superesse scientiae Botanices multum
intererat, Magistri, et in munere professora-
li Antecessoris celeberrimi *Heilmann*, cepit
incrementum, qui suas multo partas labore
notiones atque observationes benevolentissi-
me mihi communicabat, meamque qualem-
cunque patriarcharum plantarum culturam omni,
qua poterat, opera adjuvare adlaborabat.

Quos itaque pluribus annis continuavi la-
bores, eorum summam et fructum rei Bota-
nices peritis et amatoribus subtimidus expo-
no, benignam eorum indulgentiam eo majori
spe-

speluncans fiducia, quod tironum magis, quam eorum, qui sumnum in omni re botanica scientiae apicem attigerunt, commoda respiciam; proculque absim ab eo adrogantiae genere, quod novis, si Diis placet, in hac scientia factis, vel imaginariis inventionibus, variationibus, atque innovationibus, queis Summae rerum plus saepe detrimenti quam commodi adfertur, gaudere solet.

Accedit et illud, quod, qui mihi in hoc curriculo praeierit, et cujus veluti humeris insistere potuissem, vel qui viae, quam emetiri volebam, aditum aperuisset, fuerit nemo. *)

*) Edidit quidem *clariss.* Dr *Lehmann* plantarum circa Wirceburgum et in ejus vicinia (paucis exceptis) sponte crescentium enumerationem, cui ille *primarum Florae herbipolensis linearum* nomen tribuere non dubitavit, sed an omni etiam jure potuerit, magnopere dubium reliquit. Eam enim nec sufficere, nec vel posse etiam omnia complecti, quae *Flora particularis* totius ejusdam Provinciae requirit, cum insipienti patebit, tum vel leviter cogitanti facile erit ad adsequendum. Nam vir ille *doctissimus* brevi nimis tempore in nostra moratus provincia plurimarum Botanico maxime notatu dignarum regionum vix ullam sibi notitiam conciliavit. Quo posito in propatulo est, eum omni etiam sagacitate, non dicam *Floram patriam* perfectam, sed ne *primas* quidem ejus *lineas* elaborare potuisse. Hinc est, quod in illa enumeratione perplures plantas indigenas observatu dignissimas desideremus; hinc omissiones plantarum in illis etiam regionibus, quas *cl. Author* (uti ex locis ab eo citatis adparet) certissime invisit, nimis frequentium; hinc quod frequentes subin tanquam raras, et raras tanquam fre-

Extraneos plantarum scrutatores quod attinet, vel hos etiam omne huic nostrae Florae ditissimae pretium haud facile abjudicatueros esse, confido, *) quum haecce nostra opella ad construendam totius *Germaniae* Floram aliquod, quam leve illud etiam sit, haud tamen omnino contemnendum munusculum conferat. Itaque judices aequi boni-
que

frequentes adleget, et quae sunt hujus generis sphalmata plura.

*) *Celebris* omnique jure passim aestumatissimi Botanici *D. Doctoris Rohde* dicto, (vid. *Schraders neues Journal für die Botanik*, B. II. st. 2. p. 2 et seq.) magnum Ducatum wirzburgensem, si cum Comitatu werthemensi atque agro suevofurtano eum conferas, plantarum paupertate premi, unusquisque, qui anni tempestate plantis favorabili, nec hieme intempesta, qua nonnisi jam siccus *Carduus acanthoides* tibi comes sit, hujus, quae de suo flore jure potest meritoque sibi gratulari, provinciae plagas vel obiter peragraverit, id, quod ipse debetur, pretium suopte statuet. Evidem ego me, quum eas ipsas, quae loco citato exhibentur, litteras inspicerem, a risu mihi temperare non potuisse, haud diffiteor. Sane *celeberrimus* earum *Author* haud cogitaverit, Werthemii et Suevofurti regiones sine medio Magno ducatui wirzburgensi finitimas esse, quin etiam ex parte eodem cingi, cui consecaneum esse facile quisque largietur, omnia ea plantarum genera, quarum vegetatio in illis regionibus observatur in nostra quoque, quam suae apprime uberis terrae fertilitas commendat, nutriti, et quam laetissime efflorescere posse; praecipue quum provincia wirzburgensis montium, sylvarum atque omnis generis Florae botanicae nutrimento-
rum

que de meo, quem in hac Flora elaboranda mihi praefixi, fine merito haud aliter, quam ex animi mei sententia, statuent, et cuivis vel putatitio vel vero errori eo lubentius indulgebunt, quo certius est, nullas Florae cujuscunque primitias ad eum perfectionis gradum adductas esse, quem Botanici omnibus numeris absoluti exoptare merito possunt. Ut taceam, in mea, quum auditoribus meis praelectionibus praereo, potestate esse; quae desunt, supplendi, et corrigendi errata.

In elaboranda porro hac Flora eam mihi praecipue legem tuli, illas duntaxat plantas a me enumerari debere, quas ipsemet suis locis detexi et observavi, paucis exceptis, quae virorum fide dignissimorum benevolentia mihi innotuerunt. Sed et earum merito men-

tio-

rum frequentia praedictis regionibus multum praestet. Idque ipsum profecto *D. Doctori Lehmann*, quem antea excitavimus, laudi est, quod celeberrimi *Rohdii* judicium hiemale, si hoc verbo propterea uti liceat, quod intempestivum hocce judicium in medio hiemis rigore ferre haud dubitaverit, in suis primis lineis *Florae herbipolensis* maximam partem jam refutatum eat, ejusque causam in ignorantia vel certe mediocri notitia hujus nostrae provinciae ponat. Et profecto neque de singulis hominibus neque de totius cujusdam provinciae indole judicium aliter ferre oportaret, quam re penitus inspecta, omnibusque quae influunt, circumstantiis rite matureque ponderatis. Quarum rerum notitiam curatiorem sibi comparare *D. Doctori* eo fuisset facilius, quo magis de suis, quos Wirsburgi habuit vel nactus est, fautoribus et amicis gloriatur.

tionem faciendam esse existimavi, quae, etsi aliud habeant natale solum, penes nos tamen passim et communiter coluntur. Nam semper illud paradoxum mihi visum est, quoties observavi, tironem libro suo armatum, quum plantas quaesituras huc illucque circumvagatur, plenos circumdeintem agros, extra statum esse positum, quo plantas hanc in provinciam translatas et vulgariter cultas ad ejusdem libri ductum quaerere, inquirere, et determinare possit.

De characterum generum, et differentiarum specierum adcurata cognitione dum agebatur, uti et de ipsis, quas adjiciendas putavi, plantarum expositionibus, quae omnia tironibus quam utilissima sunt, eosque in illis detegentis mirum in modum adjuvant, consultis desuper probatissimis authoribus, vel vivum exemplar, quo adusque fieri poterat, vel plantas exsiccatas fideliter secutus sum. Vitae earum curriculum id semper annotavi, quod in hacce provincia continuo observaveram. Plantarum rariorum earumque, quae non passim et ubivis obveniunt, habitationes adcurate notandas putavi; ut plurimum vero eas praecipue, in quibus haec vagetabilia majori, quam in aliis locis, numero deprehenduntur. Qua in re id saepe anceps est, et propterea haud praetermittendum, quod plantae, quae paucos ante annos quodam in loco copiosius effloruere, jam vix ac ne vix quidem ibidem reperiantur; quod iis praecipue regionibus familiare est, in quibus cultura terrarum in dies sere singulos augetur, et propemodum quilibet loculus ad id ido-

idoneus in eam redigitur; *) id, quod meam experientia me edocuit, quam faciendi mihi saepissime fuit occasio. Inter complures alios unicum tantum eumque cuivis huijati incolae notissimum locum adducam. Est is fossa partim paludosa, partim vivis aquarum fontibus hinc inde persecata et inundationibus crebrioribus exposita, quae novam inter et ab eo urbis districtu; quem Pleichacher Viertheil nominant, sic dictam urbis wirceburgensis portam prope cataractam interjacet. Longiori enim abhinc tempore ibi *Leersia oryzoides*, *Caltha palustris*, *Hottonia palustris*, *Scirpus maritimus*, *Hydrochaeris morsus ranae*, aliaeque hujusmodi plantae comphures habitaverunt. Jam vero partim caespitis excisio, partim limi tellurisque amotio eas propemodum omnes exterminavit.

Authorum optimae eorumve, qui unum alterumve plantarum genus speciali sollicitudine elaborandum sibi sumsere, adlegationem necessariam esse existimavi. Hisce enim citatis partim luculentius, praecipue in casu plantarum dubiarum, ostenditur, quae nam earum animo obversata sit, partim tironi occasio offertur, hujuscemodi plantas in aliis etiam authoribus perquirendi, siveque se magis in vegetabilium diagnosi et adcurata determinatione exercitandi. Et certe ex citatis authoribus unus alterve in omnium tironum erit manibus. Nec vel illud omittendum esse

pu-

*) Latius atque eleganter hac de re Botanicis saepissime maxime infensa tractat: cl. Hoppe im neuen botan. Taschenbuch 1809. p. 214.

putavi, ut ad opera adeuratis plantarum iconibus instructa provocarem, quae cum in publicis tum in privatis etiam librorum Scriniis reperire est; neque ei, cuius interest, difficile erit, plantae cujusdam dubiae intuitum sibi comparare.

Qua porro unaquaelibet Flora magnopere indiget, topographiam brevem adjeci curavi; chartam vero specialem Magni ducatus Wirceburgensis alia vice, quam primum et rite fieri potuerit, lectoribus tradam.

Reliquum jam est, ut viris illis omnibus, qui in colligenda hac mea Flora manus adiutrices mihi praebuerunt, publicas et devotissimas grates rependam. Praeter Patrem meum et D. Professorem Heilmann piissime defunctos, multum sane debeo benevolentiae amici mei omni venerationis meae cultu dignissimi Domini consiliarii aulici Wibel Werthemiensis, rerum botanicarum cum scientia, tum hujus scientiae amore et studio ubique celeberrimi. Is enim favore plane exquisito ea omnia, quae ad nostrae provinciae limites ab eo detecta erant, mihi communicavit, et quidquid memoratu dignum in hacce ipsa provincia repererat atque observaverat, quam lubentissime mecum contulit.

Neque summam illam omniaque vota mea antevertentem D. Baronis de Bodeck ejusque perillustris uxoris benignitatem sine animi ingrati nota silentio premere possum, qui in suis, quae vario plantarum genere turgent, latifundiis omnem illos e vegetabilium progenie incolas perquirendi atque observandi occasionem mihi suppeditarunt; comites

mites ferme perpetui in excursionibus meis ejus rei gratia frequenter institutis, quin et mei manuductores; quid; quod plantas memoratu digniores ipsi pro me colligerent mihique submitterent.

Sed et a grati animi mei significacione publica *D. Doctorem Geist* medicum carolopolitanum excludi haud sinam nec patiar. Non tantum enim in ditissimo agro carolopolitanico plantarum caussa excurrenti mihi comitem se praebuit amicissimum; sed et ipse regiones plantis haud egenas cum proprius sitas, tum magis remotas sedulo peragravit, magna cura et industria colligens, collecta mecum communicans.

Quidquid denique, ne longior sim et fastidium pariam, *D. consiliarius medicinalis* et *Professor Horsch*, *D. Pharmacopaeus Kopp*, amicus meus, quem solers sua plantarum cura non parum commendat, *Hospitalis Juliani topiarius D. Wolff*, *D studiosus Neuwirth*, dilectissimus meus rei herbariae summo studio ac fervore deditus frater *Antonius Heller*, aliquique plures mihi praestitere, grato animo recolere nunquam intermittam. Horum omnium patriae aequae suae ac scientiae amatorum memoriam nulla unquam dies, nullum apud me delebit fatum. Ego quidem hoc mihi cum illis officium semper commune esse existimabo, ampliare, quantum in me est, atque augere viduatum plantarum patiarum regnum, quo magis apud nos extra morem venisse videtur, illos mundi vegetabilis incolas, qui nostras planities, montes, prata, pascua, sylvas, lacus ac fontes, occu-

cupant ornantque, quorumque usus oeconomicus vel technicus vel medicinalis jam satis demonstratus est, vel adhuc sufficiente modo cognoscetur et in oculos incurret, debita aestumatione prosequi.

Ainant enim plerique hodie, vulgoque praefuerunt curiosius inspicere et demirari vel *Ericam* ex promontorio, vel hianti ore intueri plantas, quae sub remotissimo totoque coelo a nostre diverso climate crescunt, *) quaeque in nostris plerumque tepidariis pumilionum formam prae se ferunt, vel nonnisi fractae aut mutilae originalium copiae sunt; nec vero, quae sub eorum pedibus versantur, gramina intelligunt, atque arva et sylvas peragrant, quasi stupefacti, nihilque eorum, quae ibi continentur, cogitantes.

Tandem si vel minimum quidpiam Florae hujus editione ad amplificandum patriarum plantarum studium contulero, erit sane, ut mihi gratuler, me eum, quem mihi proposui finem, feliciter adsecutum esse, eritque haec, quam unice exopto, laborum memoria gratissima merces, dum summi momenti plenum *praestantissimi Ehrharti* dictum in mentem revoco: *Turpe est in Patria habitare, et patriam ignorare.* **)

*) Vid. *Ehrharti* Beiträge zur Naturkunde etc.
B. II. p. 65.

**) Ejusd. Beiträge B. III. p. 57.

Magni Ducatus Wirceburgensis brevis Topographia botanica. *)

Situm *Magni Ducatus Wirceburgensis* geographicum, de quo ante omnia uno saltim verbo mentionem facere oportet, ad grad. 270 min. 15 longitudinis Ferron. latitudinis vero boreal. 28 min. 35 determinandum esse, novissimis edocemur observationibus.

Is ad orientem principatibus *Bamberensi* et *Coburgico*; ad septentrionem Comitatu *Hennebergico*, qui secundum pristinam Imperii Germanici formulam principali dignitate ornatus erat, et
prin-

*) Ne quis Lectorum integrum et adcuratim exasciatam *Magni*, de quo loquimur, *Ducatus* topographiam exspectet, moneo precorque; quam potius reliquendam aliis existime. Etenim, quoad hujus scripturae limites id permittunt, singula tantum ejusdem fragmenta brevesque earum regionum, quae *Botanicis* majoris esse debent momenti, descriptiones praebeo, sicque ipsos illos fontes quasi digno monstr, e quibus *Florae nostrae* divitiae maximam partem a me haustae sunt. Quod porro cooperam adjicienda *Magni Ducatus* chartae geographicae consilium, id pluribus ex causis me necdum exequi posse non absque omni doloris sensu profiteor. Quo praemisso nil supetest, quam uis, qui hujuscemodi perlustratione interea temporis indigent, Hammerianam *Magni Ducatus* chartam seu hactenus exactissimam commendem.

principatu *Fuldensi*; ad occidentem principatibus *Aschaffenburgico* et *Leiningensi*, atque Comitatu *Rienecciano*; denique ad meridiem circulo *Neostadtiano* principatus *Baruthini*, *Schwarzenburgensi* atque *Hohenloico* principatu et adjacentibus ordinis olim *Teutonici* possessionibus ac districtu *Salm - Krautheimensi* terminatur.

De cetero integér territorii *Würzburgensis* ambitus ut certitudine mathematica jam determinari possit, abest quam plurimum, partim quod dimensiones ad eum certitudinis gradum necessariae necdum ubique sint factae, partim quod territorii ejusdem fines non omni ex parte ita sint clausi, nec ea praediti vi repellente, ut nihil omnino regionis alienae hinc inter se ingerat. Id vero pro certo jam nunc habueri potest, praesentem *Magni - Ducatus* ambitum numerum octoginta et sex milliarum quadratorum excedere, et incolarum circiter bis centum et sexaginta duo millia continere. *)

Judicia porró provincialia triginta et unum, totidemque praefecturae administrandis bonis domaniaibus et colligendis Principis supremi redditibus destinatae, in quae *Magnus Ducatus* integer dispescitur, ordine alphabetico sunt sequentia: *Arnsdorf*,

*) Vid. *Adresskalender des kurpfälzischerischen Fürstenthums Würzburg* auf das Jahr 1806. p. 15, et compar. c. p. 22. — *Bundschuh's Franken vor dem lünneviller Frieden.* — *Ejusdem Grundriss zum Vortrag der vaterländischen Erdbeschreibung und Geschichte in Franken* p. 57. — *Hassels statistischer Umriss der sämtlichen europäischen Staaten Heft II.* p. 18. — *Hoecks statistische Darstellung der europäischen Staaten.* — *Schöpfs statistische Beschreibung des Fürstenthums Würzburg.*

stein, Bischofsheim vor der Rhön, Dettelbach, Ebern, Eltmann, Euerdorf, Fladungen, Gemünden, Gerols-
hofen, Gunzendorf, Haßfurth, Hilters, Hosheim, Homburg, Karlstadt, Kissingen, Kitzingen, Königs-
hofen, Mainberg, Mellerichstadt, Münnsterstadt, Neu-
stadt, Ochsenfurth, Prölsdorf, Röttingen, Schlüssel-
feld, Thundorf, Volkach, Werneck, Würzburg, quo-
rum ultimum in regionem cis et trans Moenum di-
visum est.

Clima *Magni Ducatus* quod attinet, id mite
et temperatum esse, situ ejusdem geographicō jam
praemissō, facile convincimur. Montes *Rhoenani*
ut et *Hassiacae*, *Thuringicæ* et *Baruthinæ*
montium catenæ contra vim intempestam ventorum
borealium et Euronoti satis eum amicē tuentur. Ad
meridiem vero venti australis et Africi clementiae
adeo longe lateque patescit, ut eorum jucunditate
et commodis satis superque gaudere possit. Varia et
amoenissima collum frugiferorum locorumque plano-
rum, pratorum succo et pinquedine exuberantium
agrorumque frumentariorum, et vinearum, horto-
rumque obsonia proferentium et pometorum vicissi-
tudo oculos mentemque mirifice delectat. Tellure
aeque ac aëre vegetatio magnum in modum promove-
tur; hinc et aroma et ignis vinorum *Wirceburgens-*
ium ac ejus praecipue, qui nomine des *Leisten* - et
Stein - *Weines* celebratur, cui vina *Sommeracensia*,
Volcacensia, *Escherndorfensia*, *Nordheimensia*, *Roe-*
delseensia, *Randersackerana*, *Eivelstadtiana*, *Thünn-*
gersheimensia et *Homburgensia* amico quodam foedere
se jungunt, suaque et generositate et amoenitate se
commendant. Praeter vini multitudinem quaecun-
que frumentorum genera terra haec, et ea quidem
tropia, profert, ut, quae annuatim exteris vendui-

tur,

tur, dimidiam annui eorum adquaestus partem exsuffarent. Cannabim et Linum regiones *Rhoenanae* praecipua ubertate, quae tamen in inferioribus etiam ad Moenum partibus non omnino desideratur e. gr. *Wiesenseldii* aliisque in locis progignunt. Trifolii aliarumque herbarum pabularium solers et copiosa cultura armentorum greges tam numero quam pulchritudine excellentes fovet nutritque. Obsoniorum genera pleraqua omnia, et arborum, quae arte etiam et industria passim generosiores sunt redditae, fructus, sapore se commendantes interque eos Cerasum idque etiam apronianum, prunum Damascenum, pomum, pyrum, nux et reliq. quorum non minima est in exteras regiones commercii causa exportatio, ubertim feliciterque coluntur. Nec solertis rei Botanicae Scrutatoris fallitur diligentia; passimque in *Magno Ducatu* plantae hujuscemodi deprehenduntur, quas Floristae, ut hoc verbo bona cum gratia lectoris utar, hinc inde inter rarissimas numerant.

In ista, quam naturae benignitas tam eximio suo favore prosequitur, *Wirceburgensi* provincia majoris altitudinis montes, nisi vini vel frumentorum cultuae inserviant, pulcherrimis sylvis nemoribusque superbiunt, non minimo, ut facile est conjecturare, incolarum ejus emolumento.

Sylvas inter momento suo, quod rei botanicae amatores et studiosi merito iis statuere debent, eminent sequentes.

Guttenbergica scilicet infra *Wirceburgum* et unius inde horae spatio distans, ad meridiem occidentem versus sita, quae plurium milliarium ambitum quasi coronat. In ea magnas hinc inde arboribus virgultisque vacuas planities deprehenderis, sicca et arenosa

tellure alias, alias lutosa; et has quidem limpidissimi passim fontes intercidunt quam amoenissime. Altiores porro montiumque aemulos, eosque partim arboribus frutetisque consitos, partim nudos et lapidosos, magis minusve arduos colles suo haec sylva sinu complectitur, quibus umbrosae vel siccae, vel paludosae respondent profunditates. Neque paludes ibidem desiderantur, neque vicissim plagae admodum siccae et lapidosae, ejus telluris, in qua calx praedominatur, dum contra aliae levi solo turfoso gaudeant. Et quidquid horum est tractuum, prounius cuiusque telluris propria conditione multas alit, easque bona ex parte perraras *Florae Wirceburgensis* plantas, quibus tanto major constat propagationis suae securitas, quanto minus forestum istud, quod sepe omni ex parte cingente munitur, frequentatur, neque tanto, ac aliae sylvae undique patescentes, expositum est periculo, ne incolis suis quantivis pretii spolietur, quod harum saepe numero fatum est, neve a pecude ibi pascente devastetur.

Aemula hujus est sylva *Irtenbergensis* duarum horarum spatio *Heripoli* dissita ad eam, quae *Episcopium ad Tuberam* dicit, viam publicam conspicua; sylvae porro circa vicos *Zellensem*, *Hoechbergensem*, *Küstianum* et *Waldbüttelbronensem* simili unius horae a *Wirceburgo* distan-
tia, cuivis rei botanicae studioso apprime commen-
dandae, quasque vix ullus hujus studii et ordinis nisi
levi duntaxat pede et errante oculo hunc cursum con-
ficerit, unquam inviset relinquetque, quin eruditae
sjuis curiositati satisfactum fuerit.

Non minore etiam, quam praemissae, attentione digna est ea, quam unius horulae intervallum *Wir-
Heller Flora. I.*

ceburgo separat, spectabilis sylva, cui nomen *Waldskugel* inditum est, non una ex parte admodum montosa, oppositis non paucis vallisibus partim perquam umbrosis et paludosis. Complures etiam ibidem plagas deprehendes insigni scaturiginum numero persecatas, passimque tanta frutetorum copia consitas, ut penetrare conanti non minima se difficultas opponat; quam vero si quis masculo animo semel devicerit, condigno hujus sui laboris praemio haud quaquam multabitur, quum plurimae majoris pulchritudinis plantae et herbae ibidem florere soleant, quibus sylva hactenus dicta potissimum ditescit.

Neque silentio praetereundum Forestum *Waldbrunnense* ad vicum scilicet *Waldbrunn* sesqui milliari ab urbe *Wirceburgensi* remotum, et ad quod in via publica *Hoechbergam* versus, curias *Erbacenses* a dextra parte praetereundo, commodissime pertinges. Hac in sylva scrutator rei herbariae in ea, quam speciatim *Hühnerberg* appellant, plaga maxima ex parte montosa, porro in *Neusee*, *Millert* et *Rosßrunner Leiden*, partibus tum montosis tum paludosis, justo anni tempore praedam locupletem faciet.

Praecipua etiam mentione digna est sylva *Vitihoechheimensis* cum adjacentibus regionibus, partim arvis frugiferis vel vineis, partim montibus siccis, lapidosis multamque calcem continentibus, campisque incultis, perquam aridis, vel simili modo lapidosis vel arenosis, de rudiori arenae genere, admodum sterilibus. Sesqui horae intervallo *Wirceburo* distans infra vicum *Vitihoechheimensem* sita est. Majusculis hinc inde montibus distinguitur,

mul-

multisque in locis nemoribus virgultisque obducta est, atque humida. Paucos adhuc ante annos Dictamnus albus et Lilium Martagon, et majori quidem copia, ibidem nutriebantur, quorum inde ab eo tempore, quibus nescio ex causis, multo major raritas hic dominatur. Et generatim in hac sylva plagae sunt nonnullae, quae plantas nutriunt ejus generis, quas in aliis forestis insignioris etiam magnitudinis incassum investigabis.

Non minus nota est, nec jure minori commemo rationem nostram sibi deposita sylva *Gramschatzensis*, cuius ab urbe distantia sesqui milliaris spatio, ad latus ejus septentrionale versus *Arnstein* definita est, ambitum plurium milliarium occupans. Plana est plerumque, umbra locuplete obducta et locis humidis, quo vix penetrari potest, dives. Plantas sylvestres, et, quae umbram amant, communes, quas scilicet foresta pleraque omnia pregenerant, non dispersas, sed magnis, ut ita dicam, gregibus coadunatas hic inveneris; ita, ut catervatim ibi colle gendi commoditas praesto sit, quidquid alias disjunctim et singulis duntaxat exemplaribus hic illave in sylva non exigua opera conquirere deberes. Mulieres, quae colligendis vendendisque herbis quaestum faciunt, indeque suam sortiuntur denominationem, dum plantas et herbas recentes floresque in foro *Wircburgensi* ad usum eorum, qui vere novo annuatim suam conantur restaurare sanitatem, venum exponunt, vel pharmacopolis plantas medicinales adferunt, quidquid est earum mercium, e sylva petunt comportantque, quam nominavimus; et sane nec blandis verbis nec pecuniae egomet saepiuscule par cere potui, eas ut adducerem, ut in illa Sanctuaria absconditasque et procul dissitas sylvae plagas adi-

tum mihi propalando patefacerent, quibus istos plantarum thesauros reconditos esse adseverabant. Quidquid sit, nec laboris mei nec aeris eam in rem expensi nunquam me poenituit, quum utriusque praeium nunquam non exspectatione mea majus reportarem, quumque, quod majus est, praeter plantas illas principes, earum quidem mulierum aestimatione tales, aliarum etiam, quas illae levioris esse momenti autumabant, quarumque raritas mihi nota fuit, copia mihi sit facta, eo majore meo compendio gaudioque, quo certius plantas hujusmodi rariores ibi haud quaesiturns, et fortassis alias nunquam inventurus fuisse. Generatio plantae perrarae, quas hoc forestum sinu suo nutrit, rei herbariae peritis magnum in modum se commendant, optaverimque, ut earum nutrix haec *Sylva a viris hujus ordinis creberime frequentetur.*

Sylvis porro ratione rei herbariae notatu dignissimis adnumerandae sunt duae, quarum una der *Tangen*, altera das *große Holz* compellatur, utraque prope pagum *Mühlhausenum*, quo duarum horarum via ab urbe principe pertingimus. In illis (etenim regni herbarii divitiis abundant) insignis plantarum phaenogamicarum et cryptogamicarum copia, alias haud ita frequentium deprehenditur. Quod vero attentionem nostram provocat praecipue sibique vindicat, *Cypripedium Calceolus* est, cuius tam laeti et frequentis in aliis regionibus floris vestigia haud facile inveniemus. Universa enim, de qua loquimur, sylvestris regio hocce ornamento tractu continuo et vix uspiam interrupto superbiret, ni rusticorum liberi e vicinia plenos florum istorum nitore et elegancia se commendantium corbes inde asportarent, quos-

sin-

singulis ferme diebus larga manu decerpere solent,
quin et cum ipsa radice non raro evellunt. *)

Larga, quae vix deesse poterit, hic loci facta adquisitione herbaria, collegis meis rei botanicae amatoribus amice, venia ad hoc ab ipsis data, suadeo, ut excusum suum, quo ipsis fiat utilior, versus pagum *Versbach* dirigant, non equidem linea recta, sed hinc inde deflectentes in prata ridentia, et intensa sollicitudine perquirant margines rivorum et fertilia vegetabilibus nemuscula. Inde per arva frugifera ad forestum, quod ajunt, latum (*das breite Holz*) a tergo pagi *Versbacensis* penetrabunt; post vero ad sylvam, quae *Taenn* audit, inde a pago *Dürrbacensi* via recta versus *Rimpar* decurrentem, montibus vallibusque, adjacentis foresti *Versbacensis* instar, alternantibus plenam; quibus omnibus in locis plantarum pulchritudo peritos earum allicit et delectat.

Iisdem herbariis divitiis abundantem videmus regionem a dextris proxime ad viam *Randersackerranam* versus *Theilhemium*: nec minus in sylvis ac nemusculis ad utrumque latus viae publicae a vicino *Klein ochsenfurthensi Erlacum* ducentis, quibus in partibus et lacus prataque uliginosa vegetabilibus haud contemmendis nequaquam destituuntur.

In-

*) Hujus rei egomet testis sum, ut et amicus meus aestumatisimus *D. Prof Gejer*, quam uterque oculis perceperimus. Excursione quadam in eam regionem suscepta occasionem praebente videbamus, vix ullum hortulum rusticum areamve hac planta eleganti carere, vel cum vel sine radice humo defixa.

Invisi etiam a Botanicis merentur das *obere* und *untere Gesprait* ad pagos *Prosselsheim* et *Büssensheim*, die *Breit*, der *Steinbusch* und *Eitel* prope *Wülfershausen*, quae omnia in sylvain majorem et densam coaluerunt, planiorem aliis et aridam, in qua praecipue gramina notatu et collectione digna procreantur et efflorescunt.

Quas hactenus extulimus praerogativas, easdem merito etiam sibi vindicant confinia pagorum *Mainsondheim*, *Klein*- et *Großenlangheim*, et quae his proprius adjacent, plagae turfosae et inter omnes alias forestum *Kitzingense*, quod horae dimidia intervallum ab urbe ejusdem nominis separat, in plures partes, quarum cuique sua est propria denominatio, distinctum et non uno in loco paludibus repletum. Atque ita omnis haec regio plantis aestuabilibus abundat, ut nonnisi expleto suo desiderio rei herbariae Scrutatores eam sint relicturi.

Huc quoque pertinet sylva sic dicta *Huck* in vicinia *Wipfeldensi*, ubi castrum *Klingensteine* visitur. Est ea non mediocris magnitudinis sylva, maxima ex parte montosa, neque tamem omnino strictibus planis et paludibus vacua, et umbra refrigerante destituta, ceterum vero plantis apprime dives Ad me quidem quod attinet, ne una quidem vice hanc sylvam invisum ivi, quin, diligentiori facta perquisitione, ditior, quam veneram, redirem.

Summae etiam considerationis et compendii proxiris, quorum causa haec scribimus, est omnis circa pristinam Abbatiam *Heidenfeldensem* regio, *Wipfeldiam* inter et *Suevofurthum* sita. In lacubus et fossis aqua repletis ibi admodum frequentibus,

tibus, ad rivos et in paludibus, ad ripas veteris alvei (*des Altwassers*) in sylvis earumque extremitatibus, et generatim in omnibus, qui eo pertinent, distric- tibus, alternis plagis pulcherrimae plantae deprehen- duntur; et praeprimis ferme omnia plantarum aqua- ticarum et paludosarum genera, multaeque aliae pas- sim etiam perrarae, ita, ut parvam sed peramoenam eodemque gradu instruentem plantarum rempubli- cam prae oculis habeas. Quoties etiam dictas regio- nes fueris perscrutatus, vix deerit, quod proximo aditu deteges novum aliquid et raritate se commen- dans, prout excursus quorundam annorum spatio sae- pius eo instituti et repetiti luculenter satis me ipsum docuerunt.

Eodem crebrioris aditus et perquisitionis honore terrae tractus inde ab urbe principe versus *Veits- höchheim*, *Margetshöchheim*, *Ober* - et *Unter* - *Leinach*, *Zellingen* et *Retzbach*, nec non versus *Carolopolim* et *Caroli arcem* (*Carls- stadt* et *Carlenburg*) dignissimi sunt. Alternant ibi vineae fertiles, et pinquia arva, uti campi aridi, ar- dori solis pervii, lapidosi et steriles, nec non ripae, prata, lacus, stagna, paludes montesque, quos inter der *Carlsberg* et vetus *arx Caroli* cum suis rui- nis dignitate quadam plantarumque thesauro eminent. Qua propter sane dolendum est, quod recentior ter- tiae illius, quae dictis ruinis interjacet, cultura plu- res tam pulchras quam raras plantas destruxerit. Ni- hilo tamen minus non exiguus ille inter easdem rui- nas et in propinquis collibus et scopulis manibus etiam pedibusque circumreptandi labor sua refert condigna praemia, largam scilicet plantarum messem dictum- que laborem suo pretio millies excedentem. Proxime ad

adjacet *Sylva*, quae frutetorum multitudine se distinguit, et *Haag* compellatur, non multa quidem, sed tamen nonnullis in locis attentione nostra digna vegetabilia in se continens. Ejusdem generis comprehendes ad viam publicam, in campis terrisque incolitis inde ab urbe *Corolopolitana* versus die *Schönhartshöfe* et *Stetten ad Werram*, eoque dulciore in perquirenda, pulchritudine plantarum, quas nutrit, celebri sylva *Stettensi* animus demulcetur delectatione, quod eidem sylvae id proprium sit, quod plantae rariores, quarum aliis in forestis vestigia incassum quaereres vel parvo tantum numero reperires, majore copia hic spectandas se praebant et colligendas. Liceat porro mihi esse auctorem, ut in istis confiniis paulo superius montes *Ober* et *Unterleinacenses*, tractum etiam inter *Retzbacum*, *Thüngen* et *Arnstein* non negligas. Quod idem de monte supra *Carolopolim*, Steinberg illum dominant, et de ripis *Werrae*, inde a pago *Stetten* versus *Thüngen* et ultra, dicendum est. Ante omnes vero alias eminet sua, in ratione botanica, praerogativa mons *Kalbensteinensis* ad vicum *Carlenburg*, quo in monte praeter vinum praestantissimum etiam plantae egregiae progenerantur.

Quid dicam de sylva majore et maxima ex parte densa, nomine *Oelgrund*, ubi planities, quarum spatium vix oculus emetiri potest, montes, paludes et fontes alternant: quid nimirum aliud, quam eam quoque, qua versus *Carsbach* et *Sachsenheim* sita est, vegetabilibus esse perquam divitem?

Merito etiam hic commemooro a pago *Carsbach* sesqui hora dissitum montem *Sodenberg* vel *Schottenberg*, qui et alias der *Kilianstein* audit, et non

non procul abhinc den *Reissenberg*, montes altos et nemoribus consitos, plantarum, quibus quilibet prudens arbiter pretium suum statuet, nutritores.

Omnis etiam circa *Gemünden*, *Zwing*, *Gräfendorf*, *Wolfsmünster* etc. regio eodem jure huc pertinet. Utroque ad alveum, quo flumen decurrit, latere sylvae densiores se praesentant. Magna certe est eorum remuneratio, qui labore in ripis hinc inde praecipiibus reptandi, vadando alibi peragrandi litora paludosa, alibique fruteta densiora vi quadam perrumpendi se deterreri quam minime patientur. Nil tale cogitantes subita rapimur admiratione *Nymphaearum* elegantium, magnaenque earum copiae conspectu, quae totam aquae superficiem hinc inde tegentes, oculis eam ferme subtrahunt, atque ita quasi hortum floriferum peramabilem, et in hoc elemento exoticum formant; nec minus per pulchri *Butomi* et *Hottoniae palustris* visu, quarum plantarum hi loci sunt fertilissimi, nec non rariorū quarrundam, veluti *Scirpi*, *Junci* etc. aliarumque tanta copia, quanta haud facile ullibi. Eruditam peregrinationem, me quidem judice, continuare in partes inferiores jam oportet, et *Lohram* usque excurrere, evagari subinde in nemora vegetabilium frugacia, perscrutari etiam nemuscula et paludes, perambulare prata floribus superbientia, arvaque culta; et vadem me interpono, uniuscujusque huic consilio obsequentis exspectationi, quantumvis non exigua ea fuerit, satifactum iri. Meorum quidem excursuum non sine difficultatibus, quae subin ejus etiam sunt generis, ut incautis periculum, ne aquis submergantur vel sanitatis patiantur jacturam, eo institutorum nunquam obliviscar; et non sine intima animi delectatio-

ne adhuc pervolvo illas herbarii mei chartas, quae sic-
cata continent vegetabilia ibideū collecta. Quibus
superest, ut praetereundo moneām, etiam sylvas non
procul a dictis regionibus dissitas aliaque loca plantis
referta apud *Wüstenzell*, *Holzkirchen*, *Holz-
kirchenhausen*, *Neubrunn*, *Homburg* etc.
negligi haud debere.

Inter *Magni Ducatus Virceburgensis*
saltus ille, quem *Steigerwald* vocamus, partim
magnitudine sua seu extensione physica, partim mo-
mento excellit, quod naturae scrutatores in genere,
et speciatim rei herbariae studiosi eidem statuere de-
bent. Limitem constituit *Magni Ducatus* ad me-
ridiem, partimque ad solem orientem percurrentes co-
mitatum *Castellanum*, seque extendens ultra *Ebr-
racum*, *Gerlocuriam* et *Haßfurthum*, deni-
que in principatu *Bambergensi* ad laevam fluminis
Regnitz terminatur. Sunt ibi alti et praerupti
denseque consiti montes, colles et loci altiores, sco-
puli nudi, barathra et plagae humiliores arboribus
virgultisque ita obductae, ut vix unquam solis radii
eo penetrare possint, solumque diversissimi est ge-
neris, partim paludosum, partim turfosum, hinc in-
de arenosum vel argillaceum. Quaecunque in una
alterave soli mox dicti specie efflorescere possunt,
plantae omnes in hoc salu tam spatiose non exigua
copia prognascuntur; et quo diligentiorem in eo per-
scrutationem feceris, eo certior esse potes, plantas
etiam rariores - imo rarissimas a te dedectum iri. Id
vero tibi cavendum praecipue, nec hanc tuam curio-
sitatem ad regiones tantum habitatas vel pagis vici-
nas vel vias tritas et hujusmodi partes limitatum eas;
potius solitudines locaque densissima et asperrima ti-
bi

bi pervadenda sunt, siquidem thesauros ibi absconditos in lucem protrahere tibique adpropriare velis. Magni quidem id operis est, et si duce viarum et locorum perito destituamur, facile exoritur periculum in avia et devia aberrandi: eo lorgior vero instat laborum omnium remuneratio victori, quum singulis ferme passibus novi quidpiam detegatur, unaque hora, quae in hac regione plantifera recte impenditur, plures et notatu digniores magisque diversimodae inveniantur plantae, quam alias vel decem horarum spatio, etiam solertissimo earundem venatu exactarum. Praeterea saltum istum ornat commendatque praestantissimum hyalurgium *Schleischacense* cum regione circumjacente. Neque minus mons *Michelauensis*, tractusque versus *Handthal*, curiam *Waldschwinnensem* et sacellum d. *Magdalena*e sacrum, quod medio eminet foresto, per pulchris vegetabilibus abundat, quod etiam de illa ejusdem saltus parte dicendum est, quae urbi *Gerlocuriensi* proxime adjacet, versusque *Zabelstein* se protendit.

Non procul ab oppido *Zeilensi* in districtu iudicii provincialis *Haßfurthensis* sito spectabile montis dorsum sub nomine *Haßberg* notum arboribus fruticibusque dense consitum variisque hinc inde locis cultum se extulit. Mons hicce sylvosus altitudine ferme aequali ad *Oberlauringen* usqne excurrit, ubi prosilit in arva, quae *Gräfeld* vocantur, hicque loci nomine des *kleinen Haßberges* insignitur. Quantumvis omne hujus dorsi montani spatium a medio ejusdem ad summitatem usque arboribus frutetisque omnino contingatur, aliisque locis e. gr. prope *Näßach* et alibi in infima sua parte,

te, collibusque illis, quibus ceu munitentis quibus-dam cingitur, vario frumenti trifoliique genere, variisque arboribus frugiferis et vineis sit locuples: hinc inde tamen, uti circa arcem *Bettenburg*, etiam magna inculta ac veluti nuda spatia in se con-tinet. Pene ubique, praesertim vero in regione *Unfindensi* et dictae arcis, porro ad *Kleinmünster*, *Oberlauringen*, *Grumm*, *Altershausen*, *Gosmannsdorf*, ubi lapides excellentes caedun-tur, porro *Haßfurthum* inter et *Ebertshausen*, ubi similiter lapidiniae melioris notae ac praecipue lapidum calcariorum inveniuntur, vegetabilia nas-cuntur laeteque florent attentione nostra sane haud indigna. Cuicunque rei herbariae amatori satis et temporis est et desiderii ad divincendas omnes, quae cum adcurata perscrutatione montis istius sylvosi junctae sunt, difficultates, ei sane omnibus modis persuadendum est, ut in eam regionem omnem ex-currat, spe largae messis fretus et accensus, quae falli, quave is decidere nullatenus possit.

Nec spatio, quod occupat, nec vegetabilium ra-tione habita contemnenda est etiam sylva *Bromber-gensis* in judicio provinciali *Hosheimensi* sita, atque ipsa circa *Hosheimum*, *Eicheldorf*, *Dit-terwind*, *Gemeinsfeld*, *Friesenhaußen*, *Rüg-heim* et *Humbrechtshaußen* circumiacens regio in eodem judicio provinciali, ubi quondam publicis ex causis diutius commoratus plantas per pulchras in-veni, Floramque patriam hoc etiam ex fonte locu-pletavi.

Omnes vero, quos hactenus attigimus, móntes momento suo omni procul dubio exsuperat non ra-tione,

tione rei herbariae tantum, verum etiam universim ad naturae cognitionem tota regio *Rhoenana*, limes *Magni Ducatus* ad septenurionem. Regioni huic *) montanae longitudo est octo ferme milliarium, latitudo vero pleraque ex parte pene unius milliaris; brachia ei, ut hoc utar, sunt duo, alterum prope *Gersfeld* in territorium *Fuldense*, alterum in vicinia *Zellensi* in *Isenacense* extenditur; summa vero *Rhoenarum* in ambitu *Magni Ducatus* altitudo est eo in monte, cui a Cruce nomen inditur, quae ibi devote colitur (*der Kreutzberg*) cujusque montis humeri monasterium ferunt d. Francisco sacrum et adhuc hodie a monachis ejus sancti discipulis habitatum. Addere liceat, quod elevatio montis mox nominati supra maris superficiem a D. Professore Fuldensi *Hellero* ope observationum barometricarum determinata sit ad 4227 mensuras gallicas, quas toises vocant (i. e. *Klafter.*) **) Universam hanc regionem climati rigidiori subesse, facile est ad intelligendum. Itaque *Rhoenae* superficies vix nive obtegitur, quin insignis frigoris rigor sentiatur; et ferme dimidia anni pars nives iis in locis, sive etiam frigus parit. Accedit, quod, quam

sem-

*) Ne omnibus numeris absoluta montium *Rhoenae* topographia a me describatur, prohibent justi hujus operis limites. Quapropter selectissimas tantum, respectu semper ad commoda rei herbariae amatorum Scrutatorumque habito, ex observationibus diarii mei exhibeo. Adenatiorem vero et quae lectorum votis satisfacere possit, descriptionem exhibet F. A. Jägeri opus, *Briefe über die hohe Rhoene Frankens etc.*

**) Fränkischer Merkur herausgegeben von *Bundschuh* 1796. St. 12.

summi horum montium apices fontibus abundant et paludibus, temporis etiam annorumve majore siccitate haud unquam arescentibus, ob ipsam soli aquosam et muscosi continuam exhalationem coelum singulis ferme diebus nebulis nubibusque involutum sit, quae deinde in pluvias nivesque solvuntur. Cave vero, ne, quod saepius contingere solet, *Rhoenias* sub imagine Sibiriae, earumque incolas ut semiesferos tibi cogites. Quin potius compluribus in partibus fertilitas regnat, variaque frumenti genera aliaque vegetabilia successu optimo coluntur, Rhoenianique industriae, ingenuitatis, candoris comitatisque, quae aliorum etiam vota anteveriat, laudem sibi merito propriam fecere.

Quo vero ea, quae rei herbariae causa suscipitur, peregrinatio cum majore emolumento conjuncta sit, suadendum, ut regionibus circa *Arnshausen*, *Kissingen*, praesertim monte *Bodenlauben* cum suis ruinis, *Salinarum Kissingensium* ambitu, ripisque *Saalas* et cataractae arte productae, cujus hodieum exstant vestigia, confiniis, quibus omnibus in locis nonnulla pulchrarum plantarum messis se praebet, peragratis, nec minus regionibus circum *Klosterhausen*, *Waldaschach*, *Bocklet* *) arvis, pratis, sylvis ibi circumiacentibus, ac praecipue monte *Männerstadtiano* perquisito, inde a pago *Bocklet* jam nominato, viam versus pagum *Huhn* ingrediare, hancque persequare per fauces, quae prata per pulchra includunt, ab utroque latere den-

*) De fontibus mineralibus ejus loci notitiam adcuratiorem exhibet das *Journal von und für Franken*. B. IV. p. 472.

densis plantarumque divitibus sylvis formatas, versus *Schmalwasser*; quo facto ad montem jam supra *a Cruce* nominatum, pervenisti. Superatis hic regionibus circum pagos sic dictos novos (*Walaberg, Saulberg, Kilianshof*) campisque, pratis et fontibus in omni hoc tractu curatius perquisitis, densam attinges sylvam, in quam ascendendo non sine difficultate penetrare debes, quae vero etiam ad finem exoptatissimum nos perducit. Has enim difficultates cum molesto in eum montem ascensu junctas masculo animo deverantem duplex excipit praemium, quorum alterum in pulcherrimo longissimoque in *Franconiae inferiore* prospectu consistit, alterum in plantarum, quarum in his locis habitationem vix ac ne vix quidem conjecturares, divite quaestu. Praeprimis invisendum montis hujus latus orientale (*um den Kissat.*) uti et occidentale latus versus den *Arnsberg*. Nec incurie omittant nostrae professionis homines ruinas arcis veteris nomine *Osterburg*, montesque, quos *Holzberg* et *Bauersberg* compellant, prope urbeculam *Episcopium*, ceterosque montes cum regione versus *Unterweissenbronn*, *Weisbach* ripasque praeterlabentis fluvii *Brent*. His vero praeferimus montem *Arnsberg*, aliumque densis nemoribus obductum, nomine *Honigschlag*, vegetabilibus notatu dignissimis consitum. Nec possum, quin sollicite commendem montes sic dictos *nigros*, partim cultos, partim densas sylvas dorsis suis impositas ferentes, non unius plantae exquisitoris domicilium.

Similis momenti est regio circa *Hilders*, *Reulbach* et *Simmershausen*. Nec sterilis est, quae in monte *Auersberg* majore et minore, in pratis et

et sylvis prope adjacentibus, v. gr. im *Bildsteiner Gehege*, im *Simmerhäuser Gehege* et reliq. nos suaviter allicere potest, rei herbariae messis. In montibus, quorum alterum *Dammersfeld*, unum montium *Rhoenanorum* praeter a sancta cruce dictum facile altissimum et latissimum, reliquos huic vicinos *Riedberg* et *Bildstein*, cuius supremus apex der *Eiershack* est, porro *Semmelberg* et *Ressberg* vocant, ferme ubivis cum in partibus sylvosis tum in lapidosis nonnulla se offerunt, quae scrutatorum rei herbariae desideriis facere satis possint. Prae istis vero eminet adhuc mons altus ac ferme omni modo e lapidibus compositus supra pagum *Reulbach* nomine *Schaafstein* insignis, omnique respectu naturae amatori et studioso aestu- mabilis. Ad ejus pedem sunt arva culta, prata palu- dosa, paulo superius vero nemus densum, in ejusque dorso singulae arbores et virgulta e lapidum acervis in altum excrescentia. Abundat ille melioris notae plantis cryptogamicis, a praecipuae *Levcoji verni* copia insigni. Pago *Wüstensachsen* imminet ad ejus pedem aedificato. Similis propemodum condi- tionis est mons insignis cognomento *Teufelsstein*, patria plantarum cryptogamicarum pulchritudine sua allicantium tellus et altor, quas etiam non parvo numero praeter alia bonae notae vegetabilia in im- menso illo pariete scopuloso, nomine vulgari die *Teufelwand*, ipsemet collegi et tanquam opima retuli spolia. Inde versus montem valde saxosum, qui *Buchenpat* dicitur, excursus nostros conti- nuantes in locis arenosis rara inveniemus vegetabilia, ea tamen lege, ne strictim ad ipsas vias nos restrin- gamus, sed ipsos petamus transversum campos. Ad similia dona sylva proxima nos invitat. Mons ipse

Bu-

Buchenpat sat largum continet thesaurum cryptogamicum, ad quem tamen colligendum ne omni ex parte pertingamus, prohibet cum enitendi summa difficultas propter loci arduitatem, tum vitae periculum non uno in loco ad oculum imminens. *)

Mons quoque peraltus nomine *Milzburg* sive *Milseburg* dignus est, ut naturae scrutatores in his locis temporis quodam spatio degentes oculos suos animosque in eum intendant. Non is altitudine tantum sua, quum juxta *D. Professoris Fuldensis Helleri* dimensiones barometricas trecentis et octoginta tribus, et quod excurrit, mensuris gallicis (*Toises*) supra maris superficiem elevetur, verum etiam figurae suae raritate variisque partium suarum inter se cohaerentium vicissitudinibus distinguitur. Omni ferme ex parte omnis ad eum montem aditus praecclusus est, ut quum vix semitam tutam detexisse te existimes, eandem ulterius progrediendo massis petroris praegrandibus immo immensis oppilatam cernes, vel paries scopulosus, qui nullo modo superari potest, prodigiis adinstar se tibi objicit viamque eccludit. Mox longioris intervalli abyssus longius

pro-

*) Lapidum massas hocce in monte adparentes perquisituris cautio adcuratissima haud satis commendari potest. Saepe numero viam planam recta procurrentem conjecturanti tibi abyssus, e cuius faucibus lapides acuti eminent, se aperit; non raro etiam lapis, cui securum insistere te posse autumas, in abyssum digreditur vel vi quadam majore praecipitatur. Iterata mihi vice mea qualemque rei herbariae scientiam meam ampliandi cupiditas vitae filum praescissura fuisse, nisi justo adhuc tempore animum recollegisset.

progrediendi facultatem imperiose prohibent, mox lapides soluti se offerunt, veluti minitantes, se momento eodem, quo eorum ope prorepere volueris, sub pedibus tuis recessuros. Quo tamen non obstante in istum montem ascensio haud plane inter *adversari* referenda est; et qui difficultates et pericula cum ea juncta superavit, eum non tantum dulcissima requies, quae in *d. Gangolfi Sacello* eum exspectat, sed etiam aqua pretiosissima, quam fons notissimus ab eodem Sancto cognominatus praebet, remunerabitur. Et quamvis *Milzburgi* potissima pars nuda sit et sterilis, arborumque et virgultorum solummodo pigmaei per massarum petrosarum et adcumulatarum hiatus parce et laboriose penetrare soleant, attamen non tantum plantae cryptogamicae melioris notae ibi reperiuntur, sed et hinc inde ejusdem conditionis plantae sexuales, quasi in hortulis sub arborum umbrarum tutela, collectae. *)

Nec oblivisci nos oportet montis *Hildburghensis* cum ruinis arcis veteris *Hildburg*, nec montis a *S. Gangolfo* dicti cum ruinis claustrum pristini, quod eidem Sancto quondam sacrum erat, denique montis, quem *Himmedankberg* vocant, quiique inter altissimos *Rhoenae* montes numeratur; nec enim vel nullum vel minimum est eorundem quoad rem herbariam momentum.

Quum

*) Juxta aliquos (vid. *Bundschaufs* geograph. Lexicon von Franken B. III. p. 615.) *Digitalis ferruginea* hoc in monte crescit. Ego quidem una alteraque vice cum summa animi intentione eum perquisivi, et fateor, eam mihi fortunam haud obtigisse, ut illam *ferrugineam* invenirem, potius *ambigua* tantum *Digitalis* mihi se obtulit.

Quum omnis regio *Rhoenana* humidos, paludosos vel inundationibus expositos districtus, eosque haud paucos, sinu suo complectatur, facile est ad intelligendum, numerum plantarum aquaticarum et paludosarum, quae ibi degunt, haud esse exiguum. Excellunt prae reliquis duae paludes magnae, notae sub nomine *des rothen und schwarzen Moors*. Illa versus pagum *Gersfeld* ambitum mille juggerum non explet tantum, sed etiam exsuperat. Haec vulgariter *Feldmoor* appellata, versus *Fladungen* et *Hausen* sexcentis circiter juggeribus coeretur. In utraque stagna minora cum humo paludosa et infirma, nec non cum plagis musco dense obiectis diversimode alternant. Profunditas harum paludum nulla hinc inde mensura determinanda, et levitas atque uligo soli, in quo minoris etiam ponderis corpora facile et confessim subsident, in causa est, cur illas justo scrutari modo necdum licuerit; et cur tempestate tantum calidissima sciendi cupidis liceat, penetrare in eas profundius, atque idoneas tentare disquisitiones, quod tamen ipsum haud aliter, quam cum cautione fieri debet. Praeterea in regionibus *Rhoenanis* complures adhuc numerantur partim majores partim minores paludes, stagna, fontes, rivi et fluvii, in quibus et ad quos varia notatique digniora vegetabilia habitant.

Praeter hactenus enumeratas non exigua in *Magni Ducatu Wirceburgensi* sylvarum majorum minorumque comprehenditur copia, quae pro varia sua conditione plantas illas omnes, arbores et fructices abunde satis proférunt, quae talibus in locis ex-

stare et reperiri solent, quaeque recensere ad unum omnia operis hujus limites omnino prohibent. *)

Simili modo praeter montes, quorum jam facta est mentio, in eodem *Ducatu* complures alii capita extollunt, minoris illi vel majoris altitudinis, neque Botanices amatorum attentione indigni. Considerentur solummodo vineae frugum feraces circa urbem principem, illae versus *Randersacker*, *Eibelstadt*, *Ochsenfurth* etc. nec illae minus prope *Dettelbach*, *Kitzingen*, *Volkach*, *Sommerrach*, *Escherndorf*, *Rödelsee* pluresque aliae, ad quarum pedes quarumve in dorsis inclinatis plantae deteguntur variae, non minimae pulchritudinis et hisce in locis vix exspectatae. Referendi hue etiam propius et proxime ad urbem *Wirceburgensem* conspicui montes *a. b. V. Maria* et *a. S. Nicolao* dicti, item mons *Zellensis* et *Dürrbaccensis*, in quorum posteriore ruinae arcis *Schenkianae* visuntur. Nec minus der *Ravensberg* infra pagum *Veitshoechheim*, die *Hallburg* et *Vogelsburg* prope urbeculam *Volcacensem*, cum quadam montis posterioris praerogativa, qui scilicet partim vitibus superbit, partim arvis cultis et frugiferis gaudet, hinc vero etiam et inde locis infoecundis amplioribus et vel lapidibus vel arena obductis horret, aut contra *Sylvulis*, quas continet, oculos animumque recreat. Mihi quidem feliciter evenit, ut nūmerum vegetabilium, quae detegere et colligere operaे pretium est, haud minimum ibi in-

*) Sylvarum, quas *Magnus Ducatus* continet, summa, non computatis *Rhoenaniis*, centum et quinquaginta jugerum millia exceedere dicitur.

invenirem. Eundem in censem venit der *Schwamberg* sive *Schwabenberg* prope *Rödelsee* et is quidem perquam insignis prospectus longioris delicias offerens et solerti Botanicorum disquisitioni certo certius respondens. Nefas etiam foret silentio premere montem *Kalbensteinensem* in vicinia pagi *Karlenburg* jam memoratum, porro montem notabilem *Kalmut* apud pristinam praeposituram *Triefenstein*, nec minus montem a *Carolo* dictum prope *Carolopolim*, illum etiam, cui nomen *Zabelstein* supra urbem *Gerlocuriam*, arcem *Trimberg* prope *Auram* et montem *Bodenlauen* partim sterilem partim cultum ad urbem *Kissingensem*, aliosque plures. Catenam quoque montium in confiniis urbis *Haßfurthensis* hoc loco adferre oportet, quae prope oppidum *Zeil* orta et pro partium suarum varietate variis etiam nominibus insignita, diversis in locis vitibus consita, maximam vero partem inculta est vel arbores profert et frutices. Hos inter montes altissimus eminet, qui *Hohwann* sive *Hauwann* cognominatur. Distat unus circiter horae spatio ab urbecula *Haßfurth*, campique illum inter et hanc siti omnes nonnisi arenosae terrae particulis constant. Ascensus in eum perquam difficilis, solumque inde ab oriente via paulo tolerabilius ad ejus apicem, ubi *Crux* lapidea et lignea quaedam Scamna ad quietem capessendam apta se praesentant, perducit. Propter ejus altitudinem amoenissimus inde patet in regiones remotas prospectus, dum modo tempestatis serenitas faveat. Ad haec omnis culturae defectus, quo maxima pars hujus montis premitur, et humi conditio sicca et ex calce consistens nullatenus impedit, quominus fructus proferat, si ita loqui liceat, botanicos, quos aliis

in locis similibus irrito saepe labore investigaremus. Heic etiam loci quasi per transennam lectoris, quum oculos non possim, mentem animumque in alium montem, quem *aureum* dicunt (*Goldberg*) directum velim, qui non habita etiam per pulchri in longinquum prospectus ratione, plantarum ibi crescentium selectu Botanicorum diligentiam et sciendi cupidinem magnopere incitat. Cuncti jam adducti montes, quamvis non omni ex parte culturae subacti sint, non tamen omnimodo steriles sunt prospectumque, qualem jam descripsimus, hinc atque illinc praebent. Eorum apices vel arcibus ornantur adhucdum habitatis, vel rudera ferunt arcium hujus modi, quae tempore vel belli manuarii, quod jus etiam, inepte satis, manuarium vocare quondam solebant, vel gentis rusticae devastationi succubuere. Quo rarius alibi est certum plantarum genus, eo major animi recreatio, dum saepenumero lapidum in hoc monte hiatus varias hujus generis species praesentant.

Maxima vero est iis in vallibus et planitiebus naturae liberalitas, quae montibus sylvisque occluduntur, vel omni ex parte liberis apertisque, longis et latis regionibus consistunt. Varia est, uti facile augurari licet, pro vario situ earum conditio. Vel enim arenosae, vel lapidosae, steriles solisque ardori undequaque expositae sunt plagae, vel terrae insistunt frugiferae, magis minusve pingui, ubi varia obsoniorum frumentique genera intermixtis quandoque arboribus frugiferis et industriae adjumento generosioribus, et subin etiam vitibus conspicuntur; vel planities formant minoribus frutetis dense obductas, vel pingua prata florum multitudine excel-

cellentia, vel contigua fluminibus vel fontibus rivisque persecata. Dum major eorum numerus crebrioribus inundationibus expositus est, aliae perpetuo humidae sunt et paludosae. Ubique vero praeter plantas naturae hujusmodi locorum adcommendas, eoque sensu vulgares, aliae etiam minus frequentes deprehenduntur.

Frumenti copia eminet *Regiscuriana* in arvis, *Swinfurtensis* et *Ochsenfurtensis* regio (der Königshöfer, Schweinsfurter und Ochsenfurter Gau); pabuli vero seu pastus divitiis valles pleraque ad flumina minora *Saale*, *Streu*, *Sinn* nec non vallis *Schlüsselheldensis* etc.

Flumina fluviosque Magni Ducatus quod attinet, princeps eorum est *Moenus*, a limite ejus orientali ad occidentalem usque variis flexibus sive, ut ajunt, cornubus eum *Ducatum* perfluens, nec ullibi ferendis navibus impar. Ripae hujus fluminis non infrequeiter planae, aequabiles et arenosae vel paludosae sunt, jam altiores, praeruptae et lapidibus consitae, jam densis teguntur nemoribus, jam pinguis pratis campisque cultis et frugacibus vel hortis pomariis finitimae sunt. Quousque hic *Moenus* territorii nostri limitibus arctatur, flumina plura multosque et majores et minores rivos alveo suo excipit. Haec ipsa, de quibus sermo fuit, litora scrutanti Botanices cultori non unam offerunt plantam pulchritudine eximiam. Tentandi causa perquirere dūntaxat placeat haec ipsa *Heripoli* inde ad *Retzbacum*, nec minus ab hocce pago *Corolopolum* et *Gemünden* usque etc. Porro versus *Heidingsfeld*, *Ochsenfurth*, prope *Kitzingen*,

Det-

Dettelbach, Volkach, Wipfeld reliq. Adhibita congrua diligentia haud abesse potest, quin non nullae attentione digna se exhibeant.

Tubera e districtu Rothenburgico decurrens, *Moenumque* penes civitatem *Wertheimensem* influens, etiam *Magni Ducatus* partem lambit. Ad ejus ripas in confiniis urbecularum *Lauda* et *Röttingen*, et in his praecipue posterioribus vegetabilia non pauca attentione et favore meo haud indigna ego met inveni.

Saalae etiam, cujus scaturigo pago *Alsleben* supra urbem *Regisurianam* in arvis confinis est, silentio haud quaquam praetereunda. Remotissimum ejus fontem den *Saalbrunnen* vocant, et infra *Unteresfeld*, facta ejus cum rivo *Salzbach* conjunctione, *Saalae* nomine primitus insignitur, multorum minorum fluminum multorumque rivorum in suum sinum benevola receptatrix. Permanata variis flexibus magna *Magni Ducatus* parte, qua ille septemtrionem versus occidentem respicit, penes urbeculam *Gemünden* in *Moenum* profunditur. Ripae ejus variis in regionibus e. gr. ad pagum *Saal* proqe *Neustadt*, *Gemünden* et reliq. ipsas adhuc *Moeni* *Tuberaeque* ripas vegetabilium divitiis, rite facta comparatione, justoque computu instituto exsuperant.

Minoris momenti fluvius die *Werrn* compellatur; oritur in praefectura *Ebenhausen* supra pagum *Poppenhausen*, variisque modis hue illucque deflectens versus *Geldersheim*, *Werneck*, *Arnstein*, *Thüngen*, *Stetten* etc. dirigitur,

tandemque prope pagum *Großwerrnfeld* in iudicio provinciali *Gemündano* in *Moenum* effluit. Decurrit ille plerumque per prata frugifera, minus vero frequenter altiores et monticulosae ei sunt ripae, vel vitibus, vel virguliis obductae; illae praecipue prope *Thüngen*, *Stetten* etc. nonnullis plantis elegantioribus loculos meos locupletarunt.

Exiguus quidam, qui *Milz* dicitur, fluvius e territorio *Hildburghusiano* supra pagum *Waltershäusen* in *Magnum Ducatum nostrum* ingreditur, et prope oppidum *Saal* cum flumine hujus nominis miscetur. Maxima ex parte fertilia alluit prata, et, quanquam nec in sinu nec in ripis ejusdem eximiae raritatis vegetabilia extent, tamen propter varietatem eorundem et vicissitudinem quasi arte et studio quodam productam non omni Botanicorum, casu quodam istam regionem invisen- tium, attentione est indignus.

Similis ferme cum quoad exiguitatem, tum in ratione ad rem herbarium conditionis est, qui *Sinn* audit, fluvius, ortum trahens e *Rhoenis* ad pedem montis a *Sancta Cruce* cognominati, alium montem *Arnsberg* dictum, inter et montes nigros; ad pagos *Wildfleck*, *Oberbach* etc. cursum super continuans, varie deflectens, denique in confrijs *Wolfsmünsterianis* facta sua cum *Saal* a fumine junctione proprium amittens nomen.

De alio consimili, qui *Brenta* vocatur, nil aliud notare opus, quam ejusdem ortum in montibus *Rhoenani*s ad eum, quem paulo ante nominavimus, montem *Arnsberg* scilicet, in vicinia pagi *Oberweissenbrunn*; decursum ad pagos *Fran-*
hen-

kenheim, Unterweissenbrunn, Wegfurth, Schönau et urbem Episcopium; et prope Neostadtium ad Saalam in fluvium hujus nominis influxum,

Eadem haec *Saala* sinu suo excipit non diversæ quidem magnitudinis, sed majoris tamen alia ratione momenti fluvium *Streu*, ad septentrionalem montium *Rhoenaeorum* terminum e sylva eodem nomine *Streu* insignita (*dem Streuwa/de*) scaturientem, cursumque suum ad *Fladungen*, ac postquam ejusdem iterum nominis regiunculam (*den Streugrund*) permeavit, *Neostadtium ad Saalam* prosequentem. Omnis ille, quem pervagatur, distinctus vegetabilibus abundat, eique complura atque etiam exquisitoria, quae *Floram Wirceburgensem* ornant, refero in acceptis, in confiniis *Mellerichstadtianis* pagorumque *Mittelstreu*, *Heustreu* et *Hirschfeld* a me reperta.

Ulstera, etiam minorum gentium flumen, ad pedem *Rhoenae* montium catenae *Ursprüngen* inter et *Wüstensachsen* prosiliens, *Hildersium* et *Episcopium Rhoenanum* praeterlabitur, et penes *Facha* se momenque suum *Werrae* fluvio haud repugnans immolat.

His paulo superior alveo et aqua decurrente est die *Lauer*, cuius scaturigo pago *Oberlauringen* confinis est, et cuius, péracto ad limina urbculæ *Lauringen* decursu, cum semet conjunctionem ad paum *Niederlauer* Saala lubenter patitur. In ejus confiniis praesertim apud *Bremich*, *Münnerstadt* et *Burklauer* praedam herbariam agenti mihi satis fuisse factum profiteor.

Ad ripas *Schundrae* sive *Schondrae* fluvii minoris, qui e provincia *Fuldensi*, natali suo solo; progressus apud *Gräsendorf Saalae*, tot aliorum instar, jungitur, non parva vegetabilium praestantiorum copia, praecipue penes *Wolfsmünster*, *Sohonderfeld* etc. reperitur; qua ex causa etiam *Schondrae* hic obliisci haud oportuit.

Atque hactenus de fluviis per *Magni Ducatus* ambitum majoribus minoribusque. Exstant vero in eodem, magno numero, rivi magis minusve ampli et effusi, tum ipsi, tum eorum ripae vegetabilium variorum et observatu digniorum habitacula. Ad priores referendi die *Nassach*, alios duos, nimirum *Auraißbach* et *Rietbach* in suum recipiens alveum, haud procul ab urbe *Haßfurthensi* undas fluminis *Moeni* unionem sua ampliaturus; porro *Thulba* sive der *Thulbabach*, qui rivus regioni judicij provincialis *Episcopiensis* ad *Rhoenam* ortum suum debet, et prope *Hammelburgum* *Saalae* jungitur; nec minus rivus *Unke* sive *Onke*, qui inde a fonte suo in terra *Traustadtensi*, non procul a sylva *Steigerwald*, continuo cursu *Moeno* adproperat, in quem infra pagum *Gräfenrheinfeld* ruit; deinde mediocris generis rivus die *Schwarzach* ex eadem, quam vix nominavimus, sylva prolabens, quem in confiniis extinctae nunc *Abbatiae Münster - Schwarzacensis* Moenus pater amplexu intimo ita secum conjungit, ut inde uno sub hujus nomine alveo decurrant. Rivulos complures silentio praetereamus.

Simili modo magnus est in *Magno Ducatu* lacuum stagnorumque numerus, peramoenae occupacionis non unam horam rei herbariae amatoribus felicitate

ter expleturae foecunda scaturigo. Memoratu ex his dignissimum est stagnum *Frickenhusanum*, quadrante horae a pago *Frickenhusano* et duobus quadrantibus a *Mellerichstadtio* remotum. Rotundum illud est, basisque, cui innititur, latiuscule inter duos montes quasi incidendo descendit. Ambitum ejus, quum ob praeruptam montis, praecipue septentrionem versus, conditionem nec facile nec sine periculo circumiri possit, haud praecisim determinabimus, dimidiae tamen horae ei fertur esse peripheria. Ad latus duntaxat occidentale aditus eo patet. Sat magna ei est introrsum regio nitens humo solida, et aquis impenetrabili, sive vi aquae emollienti resistente; haec vero circa ejus medietatem disparet subito, ejusque loco vorago immensa sese aperit, cujus profunditas necdum bolidis ope potuit explorari. Quanquam nullibi aquae ad eum accessus vel ab eo recessus observetur, ejus tamen undae foetorem nunquam induunt, earumque sapor aquae fluviali vividae adsimilatur. Singularius illud est, quod saepiuscule aqua ejus turbetur *) etsi omnis circum circa regio pluviam neque viderit neque persenserit. — Mentionem porro jure quodam suo sibi depositum der *große* und *kleine Sennfelder See*, der *Riedenheimer* bei dem Städtchen *Röttingen*, der *Heubacher* bei *Königshofen* im Grabfelde, der *Herlheimer See*, der *Strecksee* und der *neue See* bei *Gerolshofen*, der *Reichmannshäuser*, die Seen bei *Werneck*, bei *Heidenfeld* und *Schwarzach* (duae abbatiae, quae secularisationis, ut ajunt, fatum subiierunt) bei *Großenlangheim* und *Schlüsselheld*.

Ut

*) Vid. *Jägers* Briefe über die hohe Rhöne Frankens etc.
B. II p. 79.

Ut de aliis praesindamus, quum nonobis jam non liceat, esse longioribus. Non possum tamen, quin lacus commemorem *Kleinochsenfurth* inter et *Erlach* propterea, quod et ibimet et in eorum vicinia vegetabilium, quae suam ob qualitatem aestimantur, alibi que rariora sunt, copia hic deprehendatur. Idem ferme dicendum de lacubus in fossa oppidana *Herbolensi* portas inter, quas, alteram Pleichacensem alteram novam vocant. Mihi quidem fossas oppidanas pluribus annis continuis earumque lacus, fontes et rivos diligentius perquirenti larga nunquam non messis obtigit, ita, ut mea scrutandi cupiditas et labor impensus gaudii, quod rediens persensi, magnitudine compensaretur. Cultura tamen earum fossarum copiam plantarum praestantium minui easve plane extirpari non est eundum inficias, et hoc saltim respectu dolenter referendum.

Provinciae ejusmodi, qualis est, ut hactenus descripsimus, *Magnus* noster *Ducatus*, partim sylvis obductae, partim montibus majoris minorisque generis tumenti, totque fluviis, rivis et fontibus persecatae, nec non lacus et stagna varii generis et magnitudinis in se continent, loca quoque paludosa Botanicorum scopo haud inidonea facile deesse non posse, mirum sane non debet videri. Maxima eorum pars, et quae attentionem nostram majore jure sibi deposita, in confiniis *Rhoenae* atque in ipsa regione *Rhoenan*a extant, prout jam duo majora stagna sub nomine des *rothen* und *schwarzen* *Moores* commemoravimus. His etiam remotis alii complures *Magni* *Ducatus* districtus et paludes exhibent et prata paludosa. Id, quod praecipue locum habet in sylvis *Gramschatziana*, *Guttenbergensi*, *Ki-*

sten-

stensi, Zellensi, Irtenbergensi, Kitzingensi, im *Steigerwald*, porro in sylvis Abbatiam quondam *Heidensfeldensem*, nunc extinctam, cingentibus, porro in confiniis pristinae Abbatiae *Schwarzach*, penes *Dettelbach*, *Schwarzenau*, *Erlach*, *Ochsenfurth*, *Ebern*, *Schlüsselsfeld*; deinde ad litora Moeni versus *Corolopolim*, *Gemündam*, prope *Gräfendorf*, *Wolfsminster*, *Großen - et Kleinlangheim*, *Hassfurth* multisque aliis locis vel propioribus vel remotioribus. Ad urbeculam ultimo loco nominatam duae sunt paludes, quarum nobis potissimum facienda est mentio. Altera circiter horae quadrante ab illa distans et ad dextram in directione viae *Zeilensis* sita viginti quatuor juggerum ambitum emetiri videtur. Media nullum sustentat corpus, sed homines potius et animalia desident et merguntur. Sub nomine des *größen Moos* nota est. Altera minus lata, arctior et oblonga, sed priore minor, quam ejus magnitudo vix duodecim juggera attingere videatur, quingentis circiter passibus ab illa, obliqua directione versus patibulum, remota est. Ceterum hujus eadem ferme est, ac prioris, conditio, uti et in eo conveniunt, quod varia et notata digna nutriant vegetabilia.

Posteaquam nunc Lectores benevolos in potissimas, habita praeprimis rei herbariae ratione, *Magni Ducatus Virceburgensis* regiones manu veluti deduximus, temporare nobis, scriptiuncta hac ad finem properante, haud possumus, quin districtus illos, e quibus ad augendas explendasque *Florae domesticae* divitias maximus faciendus, et quoadusque sic loqui fas est, jam factus set quaestus, adhucdum enumeremus. Praeter sylvas, montes, colles, flumina . . . flu-

fluviosve jam nominatos hoc spectant judicia provincialia *Carlstadt*, *Gemünden*. *Ochsenfurth*, *Dettelbach*, *Volkach*, *Kitzingen*, *Gerolshofen*, *Röttingen*, *Königshofen*, *Schlüsselfeld*, *Hofheim*, *Haßfurth*, *Kissingen*, *Neustadt*, *Fladungen*, *Arnstein*, et quod ad postremo loco nominatum attinet, proxime adjacens regio, praecipue pagum *Büchold* versus. Inter virgultā, in sylvis, montibus, pratis, campis, agaris et ad fluvios, rivos et paludes eorum, quae enumeravimus, judiciorum provincialium curiosi vegetabilium scrutatoris, quantumvis ille et magna et complura exspectaverit, desideria omnino expletum iri certo est certius, uti et illud, quemlibet, qui non festinanter, sed cum sufficiente otio debitaque oculorum et animi intentione regiones *Magni Ducatus* potissimas et exquisitas perambulat visitatque, non tantum omnes vicinarum, quae aliis Imperantibus parent, provinciarum plantas, sed quasdam adhuc alias majoreque numero facile detecturum esse. Ego quidem nec tempori nec impensis parcendum, nec fugiendas cuiusvis generis difficultates esse existimavi, quo omnia cum summa sollicitudine perquirerem mihi facerem propria, eaque etiam ex causa partes *Magni Ducatus* omnes, quas perscrutari meae professionis hominum pree aliis quam maxime interest, non una tantum vice, sed pluries peragradi. Et siquidem patriae meae dulcissimae — in qua, si dicendum quod res est, rei herbariae cognitio plenior adhuc in cunis delitescit, paucos duntaxat numerans amatores, in qua porro proh dolor! *exoticae* quaedam *plantae* misera diligentia in tepidariis seu aedificiis calefactoriis educatae et dilitescentes, tanquam totius Botanices

Sum-

Summa et complexus multorum adhuc oculos mentesque in sese defigunt, et in tacitam rapiunt admirationem, quum contra *Deae* nostrae *domesticæ*, Florae scilicet nostri *Magni Ducatus* amabiles liberi non sine despectu negligantur, sicque pro Junone nubem amplecti, ornatumque pretio carentem et genus pygmaeum illi, quod in se et verissime pulchrum, magnum et utile est, praeferre haud est infrequens — commoda hisce meis conatibus vel mediocriter tantum promovero, hoc sane ipsum pro dulcissimo maximoque eorum prae-
mio reputabo.

C L A S S I S I.

M O N A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

1. H I P P U R I S.

Linn. Gen. plant. edit. Schreber. n. 15. *De Neck.*
cker. element. botan. n. 1817. Borkhausen. tentam.
disp. plant. n. 32.

Calyx margo bilobus german coronans. Corolla o.
Stamen ex anteriori marginis lobo. Stylus e poste-
riori lobo. Stigma simplex acutum. Nux 1-sperma
infera.

D I G Y N I A.

2. C A L L I T R I C H E.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 17. *De Neck.*
element. bot. n. 1674. Borkh. tent. n. 98.

MONANDRIA.

Calyx o. *Petala* 2 incurva canaliculata. *Capsula* compressa membranacea 4-sperma.

3. BLITUM.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 18. De Neck.
elem. bot. n. 917. Borkh. tentam. n. 142.*

Cal. 3-fidus patens. *Cor.* o. *Semen* 1 calyci bac-
cato carnosò immersum.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

I. HIPPURIS, *Tannenwedel.*

I) *H. vulgaris* foliis linearis-subulatis verticillatis. *Gemeiner Tannenwedel, Pferdeschwanz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 26. *Ejusd.* Enum. p. 7. Pers. synops. pl. I p. 5. Schrad. Germ. I. p. 2. Hoffm. Germ. I. p. 1. Schkuhr. bot. Handb. t. I. *De Vest* Man. bot. p. 229).

Perenn. Flor. Mayo - Junio.

Hab. in fossis, aquis stagnantibus et lente fluentibus. (In lacubus fossae oppidanae versns dem pleichacher Thore copiosissime, ad ripas Moeni hinc inde, in lacubus et piscinis apud Gero'shofen, Hassfurth, Karlstadt, in vicinia Abbatiarum Schwarzach, Heidenfeld, ibidem im Altwasser, alibique abunde).

Radix articulata, repens. Scapus 1-2-pedalis, erectus, teres, simplicissimus, immersus. Folia octona, integerrima, glaberrima, saturate viridia, nitida. Flores rubicundi, axillares, sessiles, hermaproditici, foemineis saepe immixti.

Varietatem scapo ramoso semel inveni.

D I G Y N I A.

2. CALLITRICE, Wasserstern.

1) *C. verna* foliis integerrimis linearibus: superioribus subrotundis. Frühlings-Wasserst.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 28. Pers. syn. pl. I. p. 5. Hoffm. Germ. I. p. 2. Schkuhr bot. Handb. t. I. n. 3.).

C. aquatica Willd. Enum. 7 p. 18.

Ann. Flor. Aprili-Junio.

Hab. in fossis, aquis stagnantibus, et rivulis. (In fossis oppidanis satis frequens. Prope Catarrhactam vor dem pleichacher Thore. Ad ripas Moeni supra Heydingfeld, Frickenhausen et alibi. Ad rivulos, scaturigines et fossas apud Veitshöchheim, Zell, Retzbach, alibique).

Caulis filiformis, articulatus, ramosus, radicans, 4-6-ucialis. Folia subsessilia: inferiora alterna, superiora in rosulam congesta. Flores monoici, axillares, sessiles, albidi.

2) *C. autumnalis* foliis omnibus linearibus apiee bifidis. Herbst-Wasserst.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 29. Pers. syn. pl. I. p. 6. Hoffm. Germ. I. c. Schkuhr bot. Handb. t. I. e.)

C. aquatica Willd. Enum. I. c.

Perenn. Flor. August. Septembri.

Hab. in fossis, lacubus, ad fontes et ripas cum praecedente. (Ad fontes et rivulos circa Veitshöchheim, Thiüngersheim, et Retzbach. Ad ripas Moeni et in stagnis prope Karlstadt, am Kanal beim Burkardsthore, in rivo fossae oppidanæ prope dem neuen Thore, alibique).

A præcedente foliis omnibus linearibus apice bifidis, et floribus plerisque hermaphroditis præcipue diversa.

3) *C. intermedia* foliis inferioribus linearibus apice bifidis, superioribus subemarginatis. *Mittlerer Wassert.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *Sturm* D. Fl. l. 3.)

C. dubia *Roth* *Germ.* I. p. 389. II. p. 417.

C. aquatica ♂ *Willd.* *Enum.* l. c.

Ann. Flor. *Aprili-Junio.*

Hab. in aquis lente fluentibus et stagnantibus, ad rivulos et ripas. (Ubique fere cum *C. verna*. Copiosissime praeterea ad scaturiginem fossae oppidanae prope dem *Wasserthurm*, et ad rivum inter *Theres* et *Wülsingen*.)

Flores moncici: inferiores foeminei, superiores masculi, saepe etiam hermaphroditi.

4) *C. minima* foliis omnibus linearibus utrinque attenuatis apice obtusis integris. *Kleinster Wasserstern.*

(*Hoppe* bot. Taschenb. 1792. p. 157. *De Vest.* *Man.* bot. p. 230. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *Rebentisch.* prodr. *Flor.* *neomarch.* p. 5.

C. cespitosa *Schultz* prodr. Fl. Stargard. p. 2.

C. aquatica ♂ *Willd.* *Enum.* l. c.

Perenn.? *Flor.* *April.* *Majo.*

Hab. in inundatis. (Juxta rivum prope oppidulum *Aub* ad radicem arboris truncati, et ad lacum *frickenhusianum* aliquoties inveni.)

Radix brevissima, maxime fibrosa, albida. *Caules* 2-4-unciales, filiformes, subpellucidi, cespitosi, ramosi

mosi et simplices, prostrati, ad articulos radicantes. *Folia* opposita, sessilia, reflexa, linearia, obtusa, integerrima, nitida, subtus glaucescentia: *suprema* minora approximata, in rosulam non congesta. *Flores* monoici: *inferiores* foeminei, *superiores* masculi.

3. BLITUM. Schminckbeere,

1) *B. capitatum* glomerulis spicatis terminalibus aphyllis. Aehrenblüthige Schminckb. Erdbeerspinat.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 30. *Pers.* syn. pl. I. p. 6. *Schrad.* Germ. I. p. 4. *Hoffm.* Germ. I. p. 2. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 1. *Sturm D. Fl.* I. 2. *Knorr* thesaur. I. t. E. 3.)

Morocarpus capitatus Scopol. Carniol. I. p. 6. Moench. Method. p. 342.

Ann. Flor. Junio-Augusto.

Hab. inter hortos extra urbem et circa dem Glacis hinc inde quasi sponte.

Caulis pedalis, angulatus, suberectus, superne ramosus. *Folia* alterna, longe petiolata, triangularia, sinuato-dentata. *Flores* axillares, sessiles, conglomerati, viridescentes. *Glomeruli* maturi rubri, succulenti, dulcescentes, *Mori fructus* imitantes.

C L A S S I S II.

D I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

4. L I G U S T R U M.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb. n.* 23. *De Neck.*
elem. bot. n. 677. *Borkh. tent. n.* 415.

Cal. minimus 4-dentatus. *Cor.* infundibiformis
 4-fida. *Bacca* supera globosa 2-locularis: *loculis*
 sub-2-spermis.

5. S Y R I N G A.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb. n.* 28. *De Neck.*
elem. bot. n. 608. *Borkh. tent. n.* 387.

Cal. minimus 4-dentatus. *Cor.* infundibiformis
 4-fida. *Capsula* supera 2-locularis. *Margo* semi-
 num membranaceus.

6. F R A X I N U S.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb. n.* 1597. *De Neck.*
elem. bot. n. 1181. *Borkh. tent. n.* 47.

Cal. et *Cor.* o. *Samara* lanceolata nuda. *Stigma*
 2-fidum. *Flores* polygami.

7. C I R C A E A.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb. n.* 31. *De Neck.*
elem. bot. n. 810. *Borkh. tent. n.* 83.

Cal. 2-phyllo superus deciduus. *Cor.* 2-petala.
Nux 2-locularis: *loculis* 1-spermis.

DIANDRIA.

S. VERONICA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 32. De Neck. el. bot. n. 606. Borkh. tent. n. 397.

Cal. 4-rarius 5-partitus. Cor. rotata 4-fida: lacinia insima angustiori. Caps. supera 2-locularis.

9. GRATIOLA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 37. De Neck. elem. bor. n. 518. Borkh. tent. n. 490.

Cal. 5-phylloides: basi foliolis 2-accessoriis auctus. Cor. 1-petala 4-fida 2-labiata: labio superiori reflexo. Stamina 4: 2 sterilia. Capsula supera 2-locularis.

10. UTRICULARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 41. De Neck. el. bot. n. 510. Borkh. tent. n. 399.

Cal. 2-phylloides aequalis deciduus. Cor. ringens calcarata. Caps. globosa supera circumscissa 1-locularis.

11. LYCOPUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 44. De Neck. el. bot. n. 467. Borkh. tent. n. 349.

Cal. tubulosus 5-fidus inferus. Cor. tubulosa fere aequalis 4-fida: lacinia superiori latiori emarginata. Stamina distantia. Semina 4 nuda.

12. SALVIA,

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 50. De Neck. el. bot. n. 465. Borkh. tent. n. 376.

Cal. 5-dentatus 2-labiatus. *Cor.* ringens. *galea* compressa emarginata. *Filamenta* transverse pedicello affixa. *Sem.* 4 nuda.

13. SALICORNIA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* *n.* 14. *De Neck. el. bot.* *n.* 918. *Borkh. tent.* *n.* 33.

Cal. ventricosus integer. *Cor.* o. *Semen* 1 in fundo calycis.

14. LEMNA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* *n.* 1400. *De Neck. el. bot.* *n.* 1675. *Borkh. tent.* *n.* 98.

Cal. 1-phillus latere aut superiore parte dehiscens. *Cor.* o. *Antherae* didymae. *Stigma* capitatum. *Cap-sula* 1-vel 2-loocularis.

DIGYNIA.

15. ANTHOXANTHUM.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* *n.* 58. *De Neck. el. bot.* *n.* 1572. *Borkh. tent.* *n.* 209.

Cal. gluma 2-valvis 1-flora. *Cor.* gluma duplex, utraque 2-valvis: exteriori aristata, interiori minima mutica. *Sem.* 1 corollae interiori adnatum.

C L A S S I S II.

D I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

4. L I G U S T R U M. *Rheinweide.*

1) *L. vulgare* foliis elliptico-lanceolatis, thyrsis terminalibus: pedicellis oppositis. *Gemeine Rheinw. Liguster, Zaunriegel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 41. Fjusd. Enum. p. 9. Pers. syn. pl. I. p. 8. Schrad. Germ. I. p. 7. Hoffm. Germ. I. p. 3. Schkuhr bot. Handb. t. 2. De Vest Man. bot. p. 252. Sturm D. Fl. I. 14. Herb. Blackw. t. 140.*)

Frutex. Flor. Jun. Julio.

Hab. in dumctis, et ad sepes ubique.

Frutex 6-9-pedalis, ramosissimus: ramis oppositis. Lignum durum, albidum. Folia opposita, breviter petiolata, integerrima, glabra, nitida. Flores nivei, odorati. Baccæ maturae nigrae, splendentes, subglobosae pisi majoris magnitudine.

Occurrit foliis ternis et maculatis.

Variationem baccis maturis viridibus sponte crescentem observavit amicissim. Wolff.

5. S Y R I N G A, *Flieder.*

1) *S. vulgaris* foliis cordato-ovatis integerrimis, racemis terminalibus. *Gemeiner Flied. Lilac, Holler.*
(*L.*)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 48. *Ejusd.* Enum. p. 14.
Pers. syn. pl. I. p. 9. *Schrad.* Germ. I. p. 10. *Hoffm.*
Germ. I. p. 3. *De Vest* Man. bot. p. 252. *Sturm* D.
Fl. I. 2. *Knorr.* thesaur. II. t. S. 11. *Schmidt*, Baumz.
t. 77.)

Lilac vulgaris Moench Meth. p. 430.

Frutex Flor. April, Majo.

Hab. ad sepes et in hortis ubique.

Frutex altitudine 9-12 pedum, saepe arborescens.
Lignum luteo-album, vetustius rubro-variegatum
aut rubellum. *Folia* opposita, petiolata, glabra, cor-
dato-ovata, acuminata, integerrima. *Racemi* termi-
nales, laxi, multiflori, saepe gemini. *Flores* suaveo-
lentes, coerulei, violacei aut albi.

Var. corollis quinquefidis.

6. FRAXINUS, *Esche.*

I) *F. excelsior* foliis pinnatis: foliolis oblongo-
lanceolatis seratis, floribus apetalis. *Hohe, gemeine*
Esche, Wundholzbaum.

L. sp. pl. ed. *Willd.* IV. p. 1099. *Ejusd.* Enum.
p. 1059. *Pers.* syn. pl. II. p. 604. *Schrad.* Germ I.
p. 12. *Hoffm.* Germ. II. p. 279. *Schkuhr* bot. Handb.
t. 357. *Herb. Blacko.* t. 328.)

F. Ornus Scopol. Carn. II. p. 281.

Arbor. Flor. April, Majo.

Hab. in sylvis, ad pagos. (In sylvis *Waldskugel*, *Guttenberg*, *Zell*, *Gramschatz*, *Veitshöchheim*,
et *Irtenberg*. In sylvaticis prope *Wolfsmünster*, *Heydenfeld*, *Klosterhaussen*, *Kitzingen*, et alibi.)

Arbor formosa, altitudine nonnunquam 120 pe-
dum. *Truncus* rectus *cortice* cinereo-fusco laevi, ad-
ultio-

ultiori aetate magis rugoso. *Gemmae magnae*, nigrae. *Folia impari-pinnata*: *foliolis* 8-12-13 vel 15 oppositis, subsessilibus, oblongo-lanceolatis, acuminatis, argute serratis, utrinque nudis. *Flores* in paniculis laxis lateralibus. *Semina matura* cinerea, fructibus *Arenae sativae* similia.

Floret ante foliorum eruptionem.

7. CIRCAEA, Hexenkraut.

1) *C. lutetiana* caule erecto pubescente, foliis ovatis acutis denticulatis. *Gemeines, französisches Hexenkraut, Stephanskraut, Waldklette.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 53. *Ejusd.* Enum. p. 14. *Pers. syn. pl.* I. p. 10. *Schrad.* Germ. I. p. 13. *Hoffm.* Germ. I. p. 3. *Schkuhr* bot. Handb. t. 2. *De Vest Man.* bot. p. 256.)

C. vulgaris *Mönch.* Meth. p. 279.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in umbrosis humidis. (In sylva Huck prope Klingenstein raro. In nemorosis des Oelgründes, et hinc inde auf dem Sodenberg. In sylvis inter Waldaschach et Klosterhausen. In numerosis versus der Cascate prope Kissingen, et prope Bocklet versus dem münnnerstadter Berg. In sylva Anspach ad Heydensfeld copiosissime).

Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, teres, pubescens: *ramis* oppositis erectis. *Folia* opposita, longius petiolata, ovata, acuta s. acuminata, denticulata, villosiuscula vel magis glabra, obscure viridia. *Racemi* terminales et axillares, erecti, praelongi, laxi. *Calycos pilosi*, rubelli. *Petala* obcordata, albida, rubello mixta.

2) *C. alpina* caule prostrato glaberrimo, foliis cordatis acuminatis dentatis. *Alpen-Hexenkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* *Germ.* I. p. 14. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 4. *De Vest Man. bot.* l. c.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in sylvaticis montosis humidiusculis, ad arborum truncos putridos. (In variis *Rhoeni* montium regionibus e. gr. ad pedes des grossen *Auersberges*, in sylva vulgo der *Honigschlag*, in locis humidis arboribus fructicibusque dense consistis montium sic dictorum *nigrorum*. Etiam in nemorosis ad *Cascatam kissingensem* invenit ill. *Antecess. Heilmann.*)

Caulis prostratus, semipedalis et altior, ramosus, glaberrimus, teres, subpellucidus: geniculis tumidiussculis. Folia opposita, petiolata, laete viridia, tenerima, marginibus subundulatis. Racemus unicus, terminalis, brevis. Flores albi, parvi: pedicellis capillaribus. Superiores plerumque steriles.

Circaeæ intermedia caule plerumque ramissimo, foliisque cordato-ovatis acuminatis subrepandis dentatis, quam clariss. *Ehrhart in seinen Beiträgen zur Naturkunde etc. Band 4.* p. 42. et *Hoffmann in Flor. germ.* I. p. 4. meram habent speciem, alii vero variationem solumodo praecedentis judicant, in iisdem fere provenit locis. Eam insuper aliquando inveni in regione hillerana im sogenannten *bildsteiner Gehege*.

S. VERONICA, Ehrenpreis.

SPICATAE.

1) *V. spuria* foliis ternis quaternisve breviter petiolatis lanceolatis simpliciter subaequaliter servatis glabris. Unechter Ehrenpr.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 55. Ejusd. Enum. p. 19. Pers. syn. pl. I. p. 10. Hoffm. Germ. I. p. 4. De Vest Man. bot. p. 253. Spreng. Hal. p. 6. t. I. f. 1.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in umbrosis, ad ripas. (Ad ripam des Wildwassers prope Abb. Heienfeld inter saliceta plagulam planta hac dense consitam vidi.)

Caulis sesquipedalis, 2-pedalis, erectus, strictus, teres, glabriusculus. *Folia* opposita, plerumque terna, etiam quaterna, breviter petiolata, angusta, lanceolata, acuta, utrinque glabra, argute simpliciter et subaequaliter servata: *servaturis* remotis. *Spicae* 5-7 terminales, longae, graciles, laxae: *media* reliquis longiore. *Bracteae* breves, lanceolatae. *Pedunculi* tenues *calyce* tetrapartito triplo fere longiores. *Corollae* coeruleae.

2) *V. spicata* spica terminali, foliis oppositis oblongis crenatis basi angustatis cauleque simplicissimo pubescentibus: radicalibus in petiolum decurrentibus obovatis. Aehrenblüthiger Ehrenpr.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 56. Ejusd. Enum. p. 15. Pers. syn. pl. I. p. 10. Schrad. Germ. I. p. 15. Hoffm. Germ. I. p. 5. De Vest Man. bot. p. 254.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montesis, sylvaticis, in collibus nemerosis. (In locis editioribus circa der Waldskugel

kugel et prope *Giebelstadt* rarissime. In collibus sylvae inter *Gretstadt* et *Horhaussen* pluries invenit *Am. Wolff*. Crescit etiam ad montem *Hohwann* prope oppidulum *Hassfurth.*)

Caulis palmaris, pedalis et altior, adscendens, basi plerumque procumbens, teres, simplex, villosus aut pubescens. *Folia* pallide viridia, opposita, pubescens, inaequaliter crenata: *apicibus* integerrimis, *summa sessilia* alterna. *Spica* terminalis, solitaria, erecta. *Flores* brevissime pedicellati, *bracteis* lanceolatis angustis villosis interstincti. *Calyx* profunde 4-partitus, hirsutus. *Corollae* coeruleae. *Capsulae* calycem aequantes, subrotundae, subcompressae, emarginatae.

3) *V. officinalis* foliis obovato - subrotundis serratis cauleque adscendente radicante villosis, spicis lateralibus: floribus distantibus. *Wahrer Ehrenpr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 59. *Ejusd.* Enum. p. 21. *Pers.* syn. pl. I. p. 11. *Schrad.* Germ. I. p. 31. *Hoffm.* Germ. I. p. 5. *Schkuhr* bot. Handb. t. 3. *De West Man.* bot. l. c. *Herb. Blackw.* t. 143. *Knorr.* thesaur. II. t. V. 1.)

Perenn. Flor. Majo-Julio.

Hab. in sylvis, pascuis sterilibus montanis, et ad sepes ubique.

Caules semipedales, pedales, teretes, rigidi, basi procumbentes et radicantes, apicem versus adscendentes, villosi, pilosiusculi, scabri. *Folia* opposita, breviter petiolata, serrata, villosa, scabriuscula vel magis glabra, pallide viridia. *Spicae* oppositae, adscendentes. *Corollae* pallide coeruleae, venis saturatioribus pictae. *Capsulae* obcordatae, compressae.

CORYMBOSO — RACEMOSAE.

4) *V. serpyllifolia* foliis oppositis ovatis glabris: inferioribus crenatis, racemo terminali subspicato, bracteis pedicellos excedentibus. *Quendelblättriger Ehrenpr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 64. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. I. p. 13. *Schrad.* Germ. I. p. 21. *Hoffm.* Germ. I. p. 6. *De West Man. bot.* p. 260.)

Perenn. Flor. Aprili-Julio.

Hab. in nemorosis, in pratis, agris, ad vias.
(In fossa oppidana prope dem *Sanderthore* satis frequens. In pratis inter *Wirceburgum* et *Heydingfeld.* In via vom *Bleichwaasen* versus *Himmelsforten*, circa der Leimhütte ibidem. In pratis bei der *Au-Rosen-* et *Lindleins-Mühle.* Ad margines et in graminosis sylvarum *Gramschatz*, *Irtenberg*, *Guttenberg*, *Waldbüttelbronn*, et alibi saepe frequens.)

Caules digitales, sesquidigitales et ultra, teretes, filiformes, glabri vel leviter pubescentes, ramosi, procumbentes: apieibus adscendentibus. Folia breviter petiolata, ovato-subrotunda, glabra, laete viridia: inferiora crenata, superiora sensim minora ac integerrima. Pedicelli erecti bracteis breviores. Collae albidae vel coerulecentes: lacinia angustiori plerumque alba vel pallide coerulea. Capsulae obcordatae, compressae.

5) *V. Beccabunga* foliis ovatis obtusis planis serrulatis, racemis lateralibus, caule repente inferne radicante. *Quellen-Ehrenpr. Bachbungen.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. c. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. I. p. 12. *Schrad.* Germ. I. p. 30. *Hoffm.* Germ.

Germ. I. p. 7. *De Vest. Man. bot.* p. 256. *Herb. Blackw.* t. 48. *Sturm. D. Fl.* I. 12.)

Perenn. Flor. Majo. Julio.

Hab. in fossis aquaticis, aquis stagnantibus, rivulis et ad fontium scaturigines ubique frequens.

Caules semipedales, pedales et altiores, teretes, glaberrimi, simplices aut ramosi, geniculis radicantes, basi procumbentes, a medio apicem versus erecti. Folia opposita, breviter petiolata, ovata vel elliptica obtusa, plana, obsolete serrata, subcarnosa, laete viridia. Flores coerulei: pedicellis bractea longioribus. Racemi erecti. Capsulae subrotundae, emarginatae, apice compressae.

In locis siccioribus omnibus in partibus minor adparet.

6) *V. Anagallis* foliis lanceolatis serratis glabris semianplexicaulibus, racemis lateralibus, caule erecto. *Wasser-Ehrenpr. Wassergauchheil.*

(*L. sp. pl. ed. Will. I. p. 65. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. I. p. 12. Sehrad. Germ. I. p. 29. Hoffm. Gérn. I. p. 7. De Vest Man. bot. l. c.*)
Perenn. Flor. Majo-Julio.

Hab. in fossis, rivulis, locis inundatis. et ad ripas. (In fossa oppidana prope dem Wasserthurm, dem neuen et Burkardsthore. In fossis et rivulis extra urbem prope portam Pleichach. Ad ripas Moeni versus Heydingsseld, Eivelstadt, Ochsenfurth, porro versus Zell, Veitshöchheim, Himmelstadt, Karlsstadt, ad fossas ibidem, ad locus prope Abbat. Heidenfeld, alibique.)

Caulis pedalis et ultra, erectus, teretiusculus vel sub-tetragonus, simplex aut parum ramosus, glaberimus. *Folia* opposita, sessilia, lanceolata, acuta, serrata, subcarnosa, glaberrima. *Racemi* longi, oppositi, axillares, adscendentes. *Flores* dilute coerulei, quandoque albi. *Capsulae* praecedentis.

7) *V. Scutellata* foliis linear-lanceolatis sub-integerrimis, racemis lateralibus alternis; pedicellis, pendulis, caule erectiusculo. *Schildsaamiger Ehrenpr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enn. p. 22. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 28. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest* Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Majo - Julio.

Hab. in uliginosis, pratis humidis, locis inundatis. (Frequens in fossa oppidana prope dem neuen et Sanderthore. Hinc inde ad rivum Studentenbach. In fossis aquaticis versus Gerbrunn, et Veits-höchein. In pratis humidiusculis et paludosis prope Himmelstadt, Gosmannsdorf, Dettelbach, Hürblach, Abbat. Heidenfeld, Hassfurth et alibi.)

Caulis digitalis, semipedalis, erectiusculus, debilis, teres, glaber, inferne ramosus. *Folia* opposita, sessilia, linear-s. ovato-lanceolata, acuta, denticulata, raro integerrima, subcarnosa, glabra. *Racemi* alterni, axillares, laxi: *inferiores* folia superantes, *superiores* iis minores. *Pedicelli* filiformes, flexuosi, bractea duplo fere longiores. *Corollae* albidae venis rubellis pictae. *Capsulae* orbiculatae, compresseae, emarginatae, glaberrimae.

8) *V. latifolia* foliis sessilibus subcordato-ovatis obtusiusculis serratis rugosis cauleque adscendente villosis, racemis lateralibus longissimis, calycibus quinquepartitis. *Breitblättriger Ehrenpr. Gamander - Ehrenpr.*

(*L.*)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 71. *Ejusd.* Enum. p. 23.
Pers. syn. pl. I. p. 12.. *Schrad.* Germ. I. p. 35. *Weinmann Phytanthesa - Iconogr.* IV. t. 1005. *De Vest Man. bot.* l. c.)

V. Tecurium L. sp. pl. ed. *Wild.* I. p. 66. *Pers.* syn. pl. c. *Hoffm.* Germ. I. p. 7.

V. pseudochamaedrys Jacq. Austr t. 60.

Perenn. Flor. Majo - Julio.

Hab. in pratis sicciорibus, in collibus graminosis, ad sylvarum et vinearum margines. (Ad dumeta et saepes circa urbem passim. In pratis prope *Mühlhausen* hinc inde copiose. In collibus [apud *Dettelbach*, *Sommerhausen*, *Volkach*, et ad vias inter vineas prope *Randesacker*, *Eibelstadt*, *Frickenhäusen*, et *Ochsenfurth*. In pratis supra *Heydingsfeld*, prope *Thüingen*, *Wolfsmünster*, *Sachsenheim*, im *Oelgrund*, ad sylvas ibidem, et prope *Graefendorf*, *Abbat. Heidenfeld*, alibique.)

Caules palmates, pedales et altiores, adscendentes, teretes, pilis brevibus crispatis pubescentes aut hirsuti, interdum magis glabri. *Folia* opposita, sessilia s. brevissime petiolata, subcordato-ovata, quandoque ovata, obtusa, inaequaliter obtuse serrata, rugosa, utrinque subtus praecipue villosa s. pubescens, laete viridia. *Racemi* in alis superioribus oppositi, longi erecti, densi, multiflori. *Flores* speciosi, coerulei. *Bracteae* linearis-lanceolatae, pubescentes. *Calyx*, 5-partitus: *laciniis* angustis inaequalibus. *Capsulae* obcordatae, compressae.

9) *V. prostrata* foliis sessilibus oblongo-lanceolatis obtusis serratis, calycibus 5-partitis, caule prostrato: florifero adscendente, racemis lateralibus. *Gestreckter Ehrenpreis.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 67. *Ejusd.* Enum. p. 22.
Pers. syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. I. p. 38. *Hoffm.*
Germ. I. p. 7. *De Vest.* Man. bot. p. 257. *Moench.*
Hass. no. 11. t. 1.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

*Hab. in montibus, collibus, et locis apri-
cis arenosis.* (Prope arcem auf dem *Schlossberge*,
in monte *Nicolai*, in asperis siccis prope *Ober-* et
Unterdiirrbach, inque vicinia des rothen Kreuzes. In
collibus am *Hexenbruch*, in via versus *Rimpar*, *Mühl-*
haussen et *Prosselsheim*. Circa *Arnstein*, *Prebersdorf*,
Thüngen, *Abbat. Hiedensfeld*, inter *Homburg* et *Rem-*
lingen, alibique.)

Caules digitales palmates, ad terram decumbentes,
prostrati, debiles, teretes, villosa - incani, subfle-
xuosi, simpliciusculi. *Folia* opposita, plerumque
sessilia vel breviter petiolata, villosa - incana: *infe-*
riora obovato - lanceolata serrata, *superiora* linear-
lanceolata integriuscula angustiora et longiora. *Ra-*
Racemi multiflori, laterales, erecti, caulem superan-
tes: *pedicellis* sparsis capillaribus villosis. *Corollae*
coerulecentes vel ex roseo - pallide - violaceae, raro
albidae, calyce duplo longiores. *Calyces* 5-partiti:
laciniis inaequalibus linearis - subulatis. *Capsulae* cor-
datae, emarginatae.

10) *Chamaedrys* foliis sessilibus ovatis rugosis
inciso - seratis: summis cordato - ovatis, racemis late-
ralibus, calycibus 4-partitis, caule utrinque linea pi-
losa. *Wald - Ehrenpreis*, wilder *Gamander*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 69. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. I. p. 12. *Schrad.* Germ. I. p. 33. *Hoffm.*
Germ. I. p. 8. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in pratis, ad sepes, dumeta, ad vias et sylvarum margines, in vineis nemoribus que ubique.

Caulis digitales, palmares, nonnunquam pedales, ex procumbente erecti, simplices, utrinque linea longitudinali pilosa notati. Folia opposita, rugosa, inciso-serrata, subtus praecipue pilis albis mollibus villosa: inferiora subpetiolata ovata minora, superiora sessilia cordato-ovata. Racemi ex alis superioribus, oppositi, erecti, laxi, multiflori. Bracteae lanceolatae, pedicellos subaequantes. Flores speciosi, laete coerulei, rarissime carnei vel albi. Calyx 4-partitus: lacinias inaequalibus. Capsula parva, obcordata, compressa.

II) *F. montana* foliis petiolatis cordato-ovatis serratis rugosis, racemis lateralibus paucifloris, calycibus 4-partitis hirsutis. *Berg-Ehrenpr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 68. *Pers. syn. pl. I. p. 12.* *Schrad. Germ. I. p. 32.* *Hoffm. Germ. I. p. 8.* *Ejusd. Germ. ed. 1791. t. 1.* *De Vest Man. bot. I. c. Jacq. Austr. t. 109.*)

Perenn. Fior. Maj. Junio.

Hab. in montosis umbrosis. (In umbrosis der Waldskugel rarissime sec. cl. D. Lehmann. In monte Hohwann apud Hassfurth, prope dem Zabelstein prope Gerolshofen, et in monte münnertstadiano prope Bocklet parraro. In monte prope Cascatam apud Kissingen aliquoties legit cl. Antec. Heilmann.)

Caulis palmaris, pedalis, teres, debilis, simplex, villosus, procumbens, geniculis terrae vicinis radicans, apicem versus adscendens. Folia opposita, petiolata, cordato-ovata, rugosa, plus minusve villosa, o tuse et inaequaliter serrata, subtus cum petiolis et caulis parte infeine plerumque purpurascen-

centia. *Racemi* in alis supremis oppositi, longi, filiformes, laxi, pauciflori. *Bracteae* lanceolatae, pubescentes, pedicellis multo breviores. *Calyces* corolla duplo breviores, hirsuti, 4-partiti: *lacinias* subaequalibus ellipticis ciliatis. *Corollae* aquose coeruleae, quandoque albidae venis violaceis pictae. *Capsulae* magnae, orbiculatae, planae, subemarginatae, marginibus ciliatae.

PEDUNCULIS UNIFLORIS.

12) *V. agrestis* floribus solitariis, foliis cordato-ovatis serratis petiolatis pedunculo brevioribus. *Acker-Ehrenpr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 72. *Ejusd.* Enum. p. 23. *Pers.* syn. pl. I. p. 13. *Schrad.* Germ. I. p. 42. *Hoffm.* Germ. I. p. 9. *De Vest Man. bot.* p. 259.)
Ann. Flor. Aprili - Junio.

*Hab. in hortis, agris, ruderatis et ad se-
pes ubique.*

Caulis digitalis, sesquidigitalis, teres, pubescens, decumbens, supra basin ramosus: *ramulis* brevibus procumbentibus. *Folia* petiolata, cordato-ovata, rugosa, serrata, pubescentia: *inferiora* opposita, *superiora* alterna. *Pedunculi* alares, solitarii, uniflori, filiformes, foliis plerumque longiores: *floriferi* erecti, *fructiferi* recurvi. *Calyx* pubescens, 4-partitus: *laci-
nias* ovatis obtusis subaequalibus. *Corollae* pallide coeruleae venis saturationibus pictae, quandoque albidae. *Capsulae* turgidae, scabriusculae, apice emarginatae.

13) *V. arvensis* floribus solitariis, foliis cordato-ovatis serratis petiolatis: floralibus sessilibus pedunculo longioribus. *Feld - Ehrenpr.*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 73. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. I. p. 13. *Schrad.* Germ. I. p. 41. *Hoffm.*
Germ. I. p. 9. *De Vest* Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Aprili - Junio.

*Hab. in arvis, pascuis, in ruderatis et
hortis, ad muros et inter segetes frequens.*

A praecedente *caulibus* adscendentibus vel erectis,
pedunculis folio brevioribus, *laciniis calycinis* lanceo-
latis, *corollis* minoribus, *capsulis* magis compressis
glabriusculis satis distincta.

14) *V. praecox* floribus solitariis longius pedun-
culatis, foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis
serratis, summis oblongis sessilibus subintegerrimis
pedunculo brevioribus, caule erectiusculo. *Fruher Eh-
renpreis.*

(*Pers.* syn. pl. I. p. 13. *Schrad.* Germ. I. p. 40.
Hoffm. Germ. l. c.)

V. acinifolia *L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 75. *De
Vest* Man. bot. p. 261.

Ann. Flor. Martio - Majo.

*Hab. in agris et arvis siccis, inter sege-
tes.* (Ad muros inter hortos circa urbem raro, hinc
inde in muris oppidanis. Ad margines agrorum prope
Theilheim, Rimpar, Mühhausen, Dippach, Hirsch-
feld, auf dem Galgen- und Kreinberge. In agris sic-
cis elevatis apud Arnstein, ad sepes in monte Kam-
merberg ibidem, in arvis prope Trabelsdorf, alibique
rarius.)

Caulis 2 - 3 - 4 - *uncialis*, erectiusculus, teres,
hirsutus, a basi plus minusve *ramosus* aut *simplex*.
Folia *opposita*, *crassiuscula*, *parum rugosa*: *inferiora*
petiolata *cordato-ovata* *obtuse crenata* *subtus cum*

cau-

caulis inferiore parte purpurascentia, **superiora** sensim minora angustiora sessilia subintegerrima pedunculo breviora. **Pedunculi** alares, solitarii, erecti, uniflori. **Calyx** 4-partitus, **lacinis** 2 minoribus. **Corollae** parvae, dilute coeruleae. **Capsulae** obovatae, turgidae emarginatae, calycem adaequantes, maturitate ex viridi coeruleentes.

15) *V. hederaefolia* floribus solitariis, foliis petiolatis planis cordatis 5-lobis: lobo medio majori, summis 3-lobis pedunculo brevioribus. *Epheublättriger Ehrenpreis, kleiner Gundermann.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 73. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. I. p. 43. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest Man. bot.* p. 259.)

Ann. Flor. Martio-Majo.

Hab. in cultis, ad vias, et sepes, in pomariis ubique.

Caulis digitalis, sesquidigitalis, teres aut teretiusculus, pubescens: *ramis* pluribus procumbentibus. *Folia* petiolata, reniformi-cordata, plana, subcarnosa, utrinque pilis brevibus obsessa, opposita, 5-loba: lobo medio maximo; **superiora** subsessilia alterna pedunculo breviora. **Pedunculi** solitarii, alares, uniflori, longi, filiformes, erecti, demum recurvi. **Calyces** 4-partiti: **lacinis** subaequalibus cordatis acutis ciliatis. **Corolla** calyce brevior, dilute coerulea, venis saturioribus; saepe albida. **Capsula** subrotunda, turgida, glabra, apice emarginata.

16) *V. triphyllos* floribus solitariis, foliis infimis petiolatis ovatis indivisis, superioribus digitato-partitis, summis 3-partitis sessilibus, pedunculis calyce longioribus, caule patulo. *Dreiblättriger Ehrenpr.*

(L.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 74. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. I. p. 13. Schrad. Germ. I. p. 44. Hoffm. Germ. I. p. 10. Sturm. Deutshl. Flor. I. §. De Vest Man bot. p. 260.*)

Ann. Flor. April. Majo.

Hab. in agris, arvis arenosis, in ruderatis, in hortis et ad sepes ubique.

Caulis uti tota planta pubescens, viscidus, digitalis, sesquidigitalis, teres erectiusculus, simplex aut ramosus: *ramulis* patulis. *Folia* subcarnosa, supra nigrescenti-viridia, subtus plerumque purpurascencia: *radicalia* petiolata ovata integrerrima, *caulina inferiora* brevius petiolata incisa aut subintegra, *media* subsessilia 5-partita: *lacinia intermedia* latiori, *summa* sessilia, plerumque 3-partita, saepe simplicia. *Pedunculi* alares, solitarii, uniflori, erecti, longitudo foliorum, aut iis paulo longiores. *Calyx* 4-partitus: *laciniis* lanceolatis obtusis. *Corolla* coerulea, aut aquose coerulea. *Capsula* suborbiculata, compressa, emarginata.

17) *V. verna* floribus solitariis, foliis digitato-partitis; summis indivisis, pedunculis calyce brevioribus, caule stricto. *Frühlings-Ehrenpreis.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 75. Ejusd. Enum. p. 24. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. I. p. 45. Hoffm. Germ. l. c. Sturm. D. Fl. I. 13. De Vest Man. bot. l. c.*)

Ann. Flor. April. Majo.

Hab. in agris, arvis arenosis, locis apri- cis. (In agris hinc inde juxta dem *Glacis* inter dem *neuen* et *Rennwegerthore*, in agris versus *Gerbrunn*, *Rimpar*, *Gramschatz*, *Thüngen*. In arenosis prope *Ochsenfurth*, *Röttingen* et alibi.)

Caulis uncialis, digitalis, erectus, strictus, teres, plus minusve ramosus, quandoque simplicissimus, pubescens ut reliquae partes. *Folia* sessilia aut in petiolum brevem decurrentia: *inferiora* opposita ovata profunde digitato - incisa aut serrata, *caulinæ* digitato-partita: *laciniis* linearibus acutis, *intermedia* latiori et longiori, *superiora* alterna linearis-lanceolata 3-partita, *summa* indivisa. *Pedunculi* solitarii, alares, alterni, recti, brevissimi. *Calyx* 4-partitus: *laciniis* linearis-lanceolatis inaequalibus foliis aequantibus. *Corolla* parva venis violaceis picta: *sauce* pallide lutea. *Capsula* orbiculata, compressa, emarginata, margine hirta.

9. GRATIOLA, Gnadenkraut.

1) *G. officinalis* foliis lanceolatis serrulatis sessilibus, pedunculis axillaribus. *Officinelle* *Gnadenkr.* *Wahres Purgirkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 102. *Ejusd.* *Enum.* p. 29. *Pers.* syn. pl. I. p. 14. *Schrad.* *Germ.* I. p. 50. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 10. *Schkahr Handb.* p. 13. t. 2. a. *Herb.* *Blackw.* t. 411. *De Vest Man. bot.* p. 262.)

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pratis humidis, in undatis, ad ripas. (Plantam hanc apud nos rarissimam in *regione gemündana* ad ripam *salae*, non procul inde, ubi fluvius iste in *Moenum* transit, ante plures annos semel inveni. *Am.* *Wolff* eam in humidis apud *Grettstadt* detexit, et *def.* *M. D. Billing* mihi exemplare in *saltu Kitzingensi* repertum misit. Ibi autem, et in aliis a pluribus designatis locis incassum quaesivi.)

Planta inodora, amarissima, ingrata. *Radix* repens, articulata, alba. *Caulis* pedalis circiter, erectus simplex, articulatus, ex albido viridis, inferne teres, superne tetragonous. *Folia* opposita, sessilia, ovato-lanceolata, obtusa, glabra, a medio apicem versus serrata, 5-nervia: *superiora* angustiora breviora acutiora 3-nervia integriuscula. *Flores* longe pedunculati, axillares, oppositi, solitarii, rubicundo-flavidi. *Capsulae* ovatae, acuminatae, polyspermae.

10. UTRICULARIA, *Wasserschlauch*.

1) *U. vulgaris* nectario conico, foliis pinnato-multipartitis. *Gemeiner Wasserschlauch, Wasserhelm.*

(L. sp. pl. ed. *IV* Willd. I. p. 112. *Ejusd.* Enum. p. 29. Pers. syn. pl. I. p. 18. Schrad. Germ. I. p. 54. Hoffm. Germ. I. p. 11. Sturm. D. Flor. I. 13. Schkuhr bot. Handb. p. 14. t. 3. *De Vest* Man. bot. p. 264.)

Lentibularia vulgaris Moench. Meth. p. 521.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in paludibus, in fossis, et aquis stagnantibus. (In lacu fossae oppidanae prope Hydraulicam specimina aliquot speciosa plantae florentis anno praeterito legi. Ibi etiam pluries invenit pater meus defunct. Raro praeterea occurrit in paludosis prope *Hassfurt*, *Abbat. Heidensfeld*, ad ripas Moeni paludosas aut in viciniis fossis e. gr. prope *Karlstadt* et *Gemiinden*.)

Planta ramosissima tempore florescentiae aquae innatans utriculis aere inflatis sublata, deflorata submersa utriculis aere destitutis. *Scapus* erectus, digitalis, palmaris, teres, squamis aliquot ovatis membranaceis vestitus, superne 2-3-4-florus. *Folia* mul-

multifida, ramosissima, setacea, utriculis obsessa. Corolla personata, ad faucem gibba, vitellina: lineis rubris. Calcar conicum, incurvum, labio fere aequale.

2) *U. minor* nectario carinato, foliis 3-partito-dichotomis. Kleiner Wasserschl.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. c. Pers. syn. pl. I. c. Schrad. Germ. I. p. 56. Hoffm. Germ. I. c. Sturm D. Fl. I. 17. De Vest Man. bot. I. c.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in fossis, et in undatis. (Rarissime ad rivulum fossae oppidanae prope dem *Wasserthurm*, et in fossis circa *Abbat. Heidenfeld.*)

Praecedenti simillima, sed omnibus in partibus minor. Corolla pallidior, ringens: fauce aperta. Calcar breve, carinatum, deorsum spectans.

II. LYCOPUS, Wolfsfuß.

1) *L. europaeus* foliis laciniato-serratis. Gemeiner Wolfsfuß, Wasser-Andorn, Zigeunerkraut.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 120. Ejusd. Enum. p. 30. Pers. syn. pl. I. p. 24. Schrad. Germ I. p. 57. Hoffm. Germ. I p. 12. Schkuhr bot. Handb. p. 15. t. 4. De Vest Man. bot. p. 264.*)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in humidis, ad fossas, ad rivos. (In fossis oppidanis, hinc inde ad rivum Studentenbach, apud Catarrhactam vor dem pleichacher Thore, ad ripas Moeni prope Zell, Veitshöchheim, Erlabrunn, Karlstadt, Wipfeld, Heidenfeld, et alibi frequens.)

Radix nodosa, valde repens. *Caulis* erectus, pedalis, cubitalis, tetragonus, sulcatus, ramosus, foliisque hinc inde hirsutus. *Folia* subsessilia, opposita, ovata vel ovato-lanceolata, laete viridia, rugosa, profunde inaequaliter serrata: *inferiora* subpinnatifid-serrata. *Flores* sessiles, verticillati, dense conferti, bracteis linear-lanceolatis suffulti. *Corollae* parvae, albae: *sauce* pilosa, punctis rubellis intus notata.

2) *L. exaltatus* foliis omnibus pinnatifidis. *Hoger Wolffsuss.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 121. *Ejusd. Enum.* p. 31.
Pers. syn. pl. l. c. *Schrad. Germ.* I. p. 58.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in locis humidis, ad ripas. (Ad moeni ripas prope *Wipfeld* sponte crescentem vidit *Am. Wolff.*)

Caule multo altiori, *foliisque* petiolatis, omnibus pinnatifidis a praecedente satis distinctus.

12. SALVIA, *Salbei.*

1) *S. pratensis* foliis cordato-oblongis inciso-crenatis, corollae galea subviscosa. *Wiesen-Salbei.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 135. *Ejusd. Enum.* p. 36.
Pers. syn. pl. I. p. 26. *Schrad. Germ.* I. p. 63. *Hoffm.* Germ. I. p. 13. *Herb. Blackw.* t. 258. *De Vest Man.* bot. p. 266.)

Sclarea pratensis *Moench.* *Meth.* p. 375.

Perenn. Flor. Majo-Julio.

Hab. in pratis et ad colles ubique.

Caulis sesquipedalis et altior, erectus, tetragonus, subvillosus, parum ramosus. *Folia* opposita, rugosa,

cor-

cordato-oblonga, *inaequaliter crenata*, *supra glabra*, *subtus cum petiolis villosa*: *radicalia petiolata*, *superiora minora subsessilia*, *summa lanceolata amplexicaulia*. *Flores* breviter pedunculati, verticillati. *Bracteae* sub quovis verticillo 2 ovatae, acuminatae. *vilosae*. *Corollae speciosae*, *coeruleae*, *carneae*, aut *albidae*. *Calyses* cum corollae *galea*, et superiori *caulis* parte magis minusve viscosi.

13. SALICORNIA, Glasschmalz.

1) *S. herbacea* geniculis compressis emarginatis, internodiis obconicis, spicis apicem versus attenuatis. *Krautartiges Glasschmalz*.

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 23. *Pers. syn. pl. I. p. 5.* *Schrad. Germ. I. p. 69.* *Hoffm. Germ. I. p. 1.* *Herb. Blackw. t. 598.* *Schkuhr Handb. I. p. 5. t. 1.* *De Vest Man. bot. p. 229.*)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. *ad salinas.* (*Circa Cascatam* et *ad salinas prope Kissingen* rarissime.)

Caulis *erectus*, *succulentus*, *ramosissimus*, *articulatus*: *articulis* *superne crassioribus*, *apice emarginato-bifidis submembranaceis*. *Spicae* in *ramis* *ramulisque terminales*, *teretes*, *geniculatae*, *apicem versus sensim attenuatae*. *Flores* *terni* in *quovis articulo oppositi*. *Squamae calycinae* *ovales*, *obtusae*. *Stamina* *plerumque* 2. *Stigma* 2-raro 3-fidum.

14. LEMNA, Wasserlinse.

1) *L. trisulca* *foliis lanceolatis petiolatis proliferis.* *Dreisurchige Wasserl.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* IV. p. 193. *Ejusd.* Enum. p. 951. *Pers.* syn. pl. II. p. 532. *Schrad.* Germ. I. p. 71. *Hoffm.* Germ. II. p. 186. *Wolff* comment. d. Lemn. f. 1-2-3. *De Vest Man. bot.* p. 115.)

Lenticula trisulca Scop. Carn. II. p. 213.
Moench. Meth. p. 319.

Ann. Flor. Maj. Junio.

Plantula natans, ramosissima, glabra, subpellucida. *Radices* breves, filiformes, solitariae, simplices. *Folia* petiolata, elliptico-lanceolata, obtusa, apicem versus subtilissime denticulata, basi in petiolum decurrentia, pallide viridia, subtus prolifera. *Flores* e rimâ marginali foliorum solitarii, hermaphroditi cum masculis. *Calyx* integer. *Stamina* adscendentia, alba: antheris didymis flavis. *Stigma* bifidum.

2) *L. minor* foliis sessilibus obovatis utrinque planiusculis. *Kleine Wasserlinse, Meerlinse.*

Lenticula minor Scopol. et Moench. l. c.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* IV. p. 194. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. I. p. 72. *Hoffm.* Germ. II. p. 187. *Schkuhr Handb.* t. 281. *Wolff.* Comm. d. Lemn. f. 4-10. *De Vest Man. bot.* l. c.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in aquis stagnantibus, fossis et lacubus copiose.

Radiculae solitariae, simplices, praelongae. *Folia* natantia, parva, obovata, integerrima, superne plana, subtus convexiuscula, laete viridia, 2 vel 3-basi connexa. *Flores* e foliorum marginibus, constanter hermaphroditi. *Calyx* bilobus.

3) *L. gibba* foliis sessilibus obovatis convexiusculis hemisphaericis. *Höckerige Wasserl.*

(*L.*

(L. sp. pl. ed. Willd. c. l. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. I. p. 73. Hoffm. Germ. l. c. Schkuhr Handb. t. 281. Wolff. C. d. Lemn. f. II - 15. De Vest Man. bot. l. c.)

Lenticula gibba Moench. Meth. l. c.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in iisdem cum prioribus locis, sed multo rarius. (Frequentius provenit in aquis fossae oppidanae prope dem Wässerthurm et alibi.)

Similis praecedenti, sed paulo major. *Folia* subtus celluloso-gibba et spongiosa, aqua sorbillata plena. *Calyx* margo obsoletus ante anthesin jam evanescens.

4) *L. polyyrrhiza* foliis sessilibus subrotundis, radiculis confertis. *Vielwurzliche Wässerlinse.*

(L. sp. pl. ed. Willd. IV. p. 195. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Schkuhr Handb. t. 281. Wolff. l. c. f. 16 - 21. De Vest Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. cum prioribus passim.

A 2 praecedentibus, quibus simillima, radiculis imprimis plurimis confertis differt. Folia praeterea triplo fere majora, rotundiora, obtusiora, emarginata, supra leviter sulcata, subtus convexiuscula subrugosa.

DIGYNIA.

15. ANTHOXANTHUM, Ruchgras..

1) *A. odoratum* panicula spicata ovato-oblonga, flosculis pedunculatis arista longioribus. *Wohlriechendes, gelbes Ruchgr. Melilotengras, Lavendelgras.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 156. *Ejusd.* Enum. p. 45. *Pers.* syn. pl. I. p. 30. *Schrad.* Germ. I. p. 77. *Hoffm.* Germ. I. p. 14. *Schkahr* Handb. I. p. 18. t. 4. *Sturm.* D. Fl. I. 4. *Leers* Flor. Herborn. t. 2. f. 1. *Host.* Gram. austr. I. p. 5. t. 5. *Koeleri* Descript. Gram. p. 68. *Schreb.* Gram. I. p. 49. t. 5.)

Perenn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. *in pratis siccioribus, in montosis,*
et ad colles ubique.

Gramen odore suavissimo imprimis tempore desiccationis. *Radix* odorata, aromatica. *Culmi* pedales, sesquipedales et ultra, erecti, tenues, glabri. *Folia* plana, glabra, versus basin pilis brevibus mollibus obsessa. *Vaginae* profunde striatae: *inferiores* ut plurimum pubescentes. *Ligula* obtusa, demum lacinulata. *Panicula* spicata, saepe interrupta, basi attenuata, circiter pollicem longa, primo viridis, demum flavescentia. *Flores* lanceolati, acuminati, superne compressi, immixtis multis sterilibus, praecipue in paniculae inferiore parte, sub anthesi patentes, rachi appressi ante et post anthesin.

Variat panicula dupli.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

16. VALERIANA.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 60. De Neck. el. bot. n. 206. Borckh. tent. n. 348.

Cal. margo minimus involutus germen coronans in pappum plumosum sessilem demum resolubilis. Cor. 1-petala 5-fida basi hinc gibba supera. Sem. 1 pappo plumoso coronatum.

17. FEDIA.

Borck. tent. n. 269. Gärtn. Fruct. II. p. 36. t. 86.

Cal. 3-5-dentatus. Cor. 1-petala 5-fida basi hinc gibba supera. Nux calyce persistente coronata 2-3-loocularis: loculo unico fertili.

18. POLYCNEMUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 72. De Neck. elem. b. n. 922. Borckh. tent. n. 34.

Cal. 2-3-phyllus. Petala 5 calyci similia. Utriculus 1-spermus.

19. GLADIOLUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 77. De Neck. el. bot. n. 1526. Borckh. tent. n. 431.

Spa-

Spatha 2-valvis 1-flora. *Cor.* 6-partita subringens. *Stamina* sub labio superiori curvata. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* subtrigona trilocularis.

20. IRIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 79. De Neck. elem. bot. n. 1516. Borkh. tent. n. 433.

Spatha 2-valvis. *Cor.* supera 6-partita: *laciniis* alternis reflexis. *Stylus* superne 3-partitus: *laciniis* petaliformibus staminibus incumbentibus. *Caps.* trigona trilocularis.

21. SCHOEONUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 92. De Neck. elem. bot. n. 1631. Borkh. tent. n. 234. et 236.

Cal. glumae 1-valves paleaceae in spiculas undique imbricatae: *inferioribus* sterilibus minoribus. *Semen* nudum vel basi setis obvallatum.

22. CYPERUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 93. De Neck. el. b. n. 1630. Borkh. tent. n. 238.

Cal. glumae 1-valves paleaceae distiche imbricatae in spiculas compressas. *Cor.* o. *Sem.* 1 nudum.

23. SCIRPUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 94. De Neck. el. b. n. 1629. Borkh. tent. n. 237.

Cal. glumae paleaceae convexae 1-valves 1-florae undique in spicas ovatas congestae. *Cor.* o. *Nux* 1-loocularis nuda vel setis basi cincta.

24. ERIOPHORUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 95. De Neck. el. b. n. 1633. Borkh. tent. 239.

Cal. glumae paleaceae 1-valves 1-florae undique in spicam imbricatae. *Cor.* o. *Nux* 1-locularis lana densa longissima cincta.

25. NARDUS.

Linn. *Gen.* *pl. ed.* *Schreb.* n. 97. *De Neck.* *el.* b. n. 1575. *Borkh.* *tent.* n. 233.

Cal. o. *Cor.* 2-valvis: *valvula altera* longe mucronata.

DIGYNIA.

26. CHAMAGROSTIS.

Borkh. *tent.* n. 206. (*Rothia*.)

Cal. 1-florus 2-valvis: *valvulis* aequalibus truncatis. *Cor.* 1-valvis villosa. *Sem.* liberum.

27. SYNTHERISMA.

Walt. *Carol.* p. 76.

Cal. 1-florus 3-valvis: *valvulis* corollae appressis inaequalibus, *tertia* minima. *Cor.* valvula exteriori convexa interiori planiusculam amplectente. *Sem.* corolla corticatum.

28. DIGITARIA.

De Neck. *elem.* b. n. 1584.

Cal. 2-valvis 1-florus: *valvulis* inaequalibus patentibus. *Cor.* 2-valvis compressa calyce major: *valvulis* subaequalilongis, *interiori* angustissima ab *exteriori* inclusa. *Sem.* corolla corticatum.

29. ALOPECURUS.

Linn. *Gen.* *pl. ed.* *Schreb.* n. 102. *De Neck.* *el.* b. n. 1582. *Borkh.* *tent.* n. 200.

Cal.

Cal. 2-valvis 1-florus: *valvulis* subaequalibus basi connatis. *Cor.* 1-valvis versus basin aristata. *Sem.* liberum corolla tectum.

30. LEERSIA.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 105. (*Asprella.*)
Borkh. tent. n. 232. (*Homalocenchrus.*)

Cal. o. *Cor.* 2-valvis clausa. *Sem.* liberum corolla tectum.

31. PHALARIS.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 106. *De Neck. el.*
b. n. 1573. *Borkh. tent.* n. 202.

Cal. 2-valvis 1-florus: *valvulis* subaequalibus *corollam duplicem* includentibus, *Sem.* corolla interiori corticatum.

32. PHLEUM.

Linn. *Cen. pl. ed. Schreb.* n. 109. *De Neck. el.*
b. n. 1581. *Borkh. tent.* n. 201.

Cal. 2-valvis 1-florus: *valvulis* subaequalibus mucronato-subaristatis. *Cor.* 2-valvis mutica calyce inclusa. *Sem.* liberum corolla tectum.

33. MILIUM.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 110. *De Neck. el.*
b. n. 1594. *Borkh. tent.* n. 203.

Cal. 2-valvis 1-florus ventricosus. *Cor.* calyce inclusa 2-valvis persistens. *Stigmata* penicilliformia. *Sem.* corolla corticatum.

34. TRICHODIUM.

Michaux Flor. bor. amer. I. p. 41.

Cal. 2-valvis 1-florus. *Cor.* 1-valvis calyce minor aristata et basi uno alteroVE pilorum fasciculo stipata. *Sem.* liberum corolla tectum.

35. AGROSTIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 111. De Neck. el. b. n. 1529. Borkh. tent. n. 204.

Cal. 2-valvis 1-florus compressus. Cor. 2-valvis calyce minor basi uno altero pilorum fasciculo stipata: valvula majori aristata s. mutica. Sem. liberum.

36. ARUNDO.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 124. De Neck. el. b. n. 1577. Borkh. tent. n. 223.

Cal. 2-valvis aequalis. Cor. 2-valvis pilis persistentibus cincta. Sem. liberum corolla tectum.

37. STIPA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 121. De Neck. el. b. n. 1590. Borkh. tent. n. 207.

Cal. 2-valvis 1-florus. Cor. 2-valvis: valvula exteriori arista terminali longissima tortuosa basi articulata. Sem. liberum, demum corolla indurata tectum.

38. ANDROPOGON.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1566. De Neck. el. b. n. 1578. Borkh. tent. n. 208.

Flores polygami geminati: altero hermaphrodito sessili aristato, altero masculo pedicellato mutico. Hermaphrod. cal. 2-valvis 1-florus basi pilosus. Cor. 2-valvis: valvula altera basi aristata. Mascul. cal. et cor. ut in hermaphrodit. Sem. liberum corolla tectum.

39. PANICUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 108. De Neck. el. b. n. 1585. Borkh. tent. n. 228.

Flores polygami. Cal. 2-valvis 2-florus: flosculo altero hermaphrodito s. masculo. Cor. 2-valvis mutica s. apice aristata. Sem. corolla persistente cartilaginea corticatum.

40. HOLCUS.

Borkh. tent. n. 212.

Flores polygami. Cal. 2-valvis 2-3-florus flosculos aequans: flosculo altero submutico, altero aristato.

41. AIRA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 112. De Neck. el. b. c. n. 1595. Borkh. tent. n. 210.

Cal. 2-valvis 2-florus absque interjecto rudimento flosculi tertii. Cor. 2-valvis: valvula exteriori supra basin dorso aristata. Sem. liberum corolla tectum.

42. MELICA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 113. De Neck. el. b. n. 1596. Borkh. tent. n. 211.

Cal. 2-valvis sub-2-florus cum rudimento flosculi tertii. Cor. 2-valvis mutica. Sem. corolla cartilaginea tectum.

43. SESLERIA.

Borkh. tent. n. 226. Scopol. Flor. carniol. I. p. 63.

Cal. 2-valvis 2-3-florus breviter aristatus. Cor. 2-valvis obtusa apice aristata: aristis variis. Sem. liberum corolla tectum.

44. POA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 114. De Neck. el. b. n. 1597. Borkh. tent. n. 217.

Cal. 2-valvis multiflorus. Cor. 2-valvis: valvulis ovatis acutiusculis muticis margine scariosis. Sem. liberum corolla tectum.

45. BRIZA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 115. De Neck. el. b. n. 1598. Borkh. tent. n. 218.

Cal. 2-valvis multiflorus. Cor. 2-valvis ventricosa: valvulis cordatis obtusis muticis. Sem. corollae adnatum.

46. DACTYLIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 117. De Neck. el. b. n. 1601. Borkh. tent. n. 220.

Cal. 2-valvis 3-4-florus compressus: altera valvula majore carinata, altera depressa angustiori. Cor. 2-valvis: valvulis lanceolatis muticis, exteriore mucronata. Sem. corollae adnatum.

47. CYNOSURUS.

De Neck. el. bot. n. 1603. Gärtn. Fruct. I. p. 5. t. I.

Cal. 2-valvis 3-4-florus. Cor. 2-valvis: valvulis linear-lanceolatis mucronatis. Spiculae involucro disticho glumaceo stipatae. Sem. corollae adnatum.

48. FESTUCA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 119. De Neck. el. bot. n. 1599. Borkh. tent. 219.

Cal. 2-valvis multiflorus. Cor. 2-valvis: valvulis lanceolatis, exteriori acuminata mutica aut apice in aristam abeunte. Sem. corollae adnatum.

49. BROMUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 120. De Neck. el. bot. n. 1600. Borkh. tent. n. 221.

Cal. 2-valvis multiflorus. Cor. 2-valvis: valvulis lanceolatis, exteriori sub apice aristata. Sem. corollae adnatum.

50. AVENA.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 122. *De Neck. elem. bot.* n. 1591. *Borkh. tent.* n. 222.

Cal. 2-valvis multiflorus. *Cor.* 2-valvis: *valvulis lanceolatis*, *exteriori* dorso aristata. *Sem.* corolla ple-
rumque corticatum.

51. SECALE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 127. *De Neck. el. bot.* n. 1608. *Borkh. tent.* n. 213.

Cal. oppositus 2-valvis 2-florus solitarius. *Cor.* 2-valvis: *valvula exteriore* arista longissima. *Sem.* li-
berum corolla tectum.

52. TRITICUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 130. *De Neck. el. bot.* n. 1607. *Borkh. tent.* n. 224.

Cal. 2-valvis oppositus solitarius multiflorus: *val-
vulis* subaequalibus. *Cor.* 2-valvis: *valvulis lanceola-
tis* muticis vel apice aristatis. *Sem.* corollae adnatum.

53. LOLIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 126. *De Neck. el. bot.* n. 1605. *Borkh. tent.* n. 199.

Cal. lateralis 1-valvis fixus solitarius multiflorus. *Cor.* 2-valvis: *valvulis acuminatis*, *exteriori* sub apice aristata vel mutica. *Spiculae* compressae, dorso ra-
chidi adpressae. *Sem.* corolla corticatum.

54. ELYMUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 128. *De Neck. el. bot.* n. 1604. *Borkh. tent.* n. 231.

Cal.

Cal. lateralis 2-valvis geminus aut ternus: *singularis* 2-3-floris. *Cor.* 2-valvis: *valvulis* lanceolatis, *exteriori* acuminata mutica s. apice aristata. *Sem.* corolla corticatum.

55. HORDEUM.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 129. *De Neck. el. bot.* n. 1606. *Borkh. tent.* n. 231.

Cal. lateralis 2-valvis 1-florus ternus: *flosculo intermedio* hermaphrodito, *lateralibus* masculis s. neutrīs. *Cor.* 2-valvis: *valvula exteriori* apice aristata. *Sem.* corolla corticatum.

TRIGYNIA.

56. MONTIA.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 133. *De Neck. el. bot.* n. 610. *Borkh. tent.* n. 403.

Cal. 2-phyllo persistens. *Cor.* 1-petala irregularis 5-partita. *Caps.* 1-locularis 3-valvis 3-sperma.

57. HOLOSTEUM.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* 136. *De Neck. el. b.* n. 839. *Borkh. tent.* 71.

Cal. 5-phyllo persistens. Petala 5aequalia ovata. *Caps.* subcylindracea 1-locularis polysperma apice in lacinias 6 dehiscens.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

16. VALERIANA, *Baldrian.*

1) *V. officinalis* floribus hermaphroditis, foliis omnibus pinnatis: foliolis lanceolatis dentatis. *Officineller, gemeiner Baldr. Katzenwurzel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 177. Ejusd. Enum. p. 50. Pers. syn. pl. I. p. 37. Schrad. Germ. I. p. 85. Hoffm. Germ. I. p. 15. Herb. Blackw. t. 271. Schkuhr Handb. t. 5. Sturm D. Flor. I. 9. De Vest. Man. bot. p. 278.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in humidis umbrosis, in nemoribus, et ad rivos frequens.

Radix fibris numerosis, longis, teretibus, extus ex fusco flavicantibus, intus sordide albidis: *odoris* fragrantis, foetidi, *saporis* ingrati amaricantis. *Caulis* 2 - 3 - 4 - *pedalis*, erectus, sulcatus, glaber, simplex, superne divisus. *Folia* omnia pinnata, opposita, petiolata. *Flores* paniculato-corymbosi *caulis* divisuras terminantes, albidi vel ex albido purpurascentes, *odoris* grati.

Duae *Valerianae* hujus varietates apud nos saepe occurunt.

Prima *caule* multo humiliori tenuiori, atque *foliolis* angustioribus, fere laciniatis *odore* gaudet graviori

viori, et montosa saxosa incolit. Altera vero altitudine, omniumque partium magnitudine adacta excellit. *Caulis* undique glaber, 5-6-pedalis et altior. *Folia* multo ampliora: *soliolis* latioribus, longioribus in acumen praelongum terminatis inciso-dentatis. Odor vero radicis minus gravis. Eam ad ripas Moeni humidas umbrosas pluries inveni e. gr. prope *Unterzell*, *Erlabrunn*, *Karlstadt*, *Gemünden*, *Volkach*, *Hassfurth*, et alibi. In *sylva* etiam *gramschatzensi*, *kitzingersi*, et passim in der *Waldskugel*, in locis depresso-humentibus arboribus fructicibusque dense consitis crescit.

Per multos annos in horto nostro botanico culta nullam unquam perpessa est mutationem, et forsitan peculiarem constituit speciem.

2) *V. dioica* floribus dioicis, soliis pinnatifidis: radicalibus ovatis. *Kleiner Sumpf-Baldrian.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 176. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. I. p. 84. *Hoffm.* Germ. I. p. 14. *Sturm* D. Flor. l. c. *Herb.* *Blackw.* t. 484. *De Vest* Man. bot. p. 277.)

Perenn. Flor. Aprili-Junio.

Hab. in pratis humidis, palustribus, in nemoribus. (In humidis fossae oppidanae, et ad lacus ibidem. Hinc inde prope Catarrhactam vor dem pleichachcr Thore. In pratis humidis versus *Rottendorf*, *Ochsenfurth*, *Sulzdorf* ad moenum, *Kitzingen*, *Hassfurth*, *Volkach* etc. Ad moeni ripas prope *Zellingen*, *Miiblbach*, *Karlstadt*, *Gemünden*, etc. In humidis sylvarum *Guttenberg*, et *Gramschatz*. In paludosis prope *Abbat. Heidenfeld*, alibique.)

Radix repens, geniculata, alba, *fibris* multis filiformibus aucta, aromatico, odore vero debiliori, quam in

in praecedente. *Caulis* plerumque basi stoloniferus, pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, subtetragonus, sulcatus, glaber, simplex. *Folia radicalia* longius petiolata, ovata, integra, hinc inde obsolete dentata: *caulina* opposita, in petiolum latiusculum amplexicaulem decurrentia, pinnatifida: *pinnis integris, supra* sessilia, angustiora. *Flores masculi* carnei vel pallide rubelli in corymbum laxum terminalem dispositi: *foeminei* minores, pallidiores in corymbo terminali conglobato.

Variat foliis tenuissime serratis, et floribus hermaphroditis.

17. FEDIA, Fedie.

1) *F. olitoria* fructu obsolete 3 - dentato, caule dichotomo glabriuscule, foliis oblongis obtusis subintegerrimis. *Salat-Fedie, Schaafmaülche, Lämmersalat.*

(*Gärtner de fruct. et sem. plant. 2. p. 36. Schrad. Germ. I. p. 95. Willd. Enum. p. 52.*)

(*Valeriana locusta, Linn.*)

(*Valeriana olitoria L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 182. Pers. syn. pl. I. p. 38. Hoffm. Germ. I. p. 16. Sturm. D. Flor. I 2. De Vest. Man. bot. p. 280. Ann. Flor. Aprili-Julio.*)

Hab. in arvis et in cultis ubique.

Radix parva, subramosa, fibrosa, odore imprimis tempore desiccationis acri, ingrato *Valerianae* simili. *Caulis* palmaris, pedalis, decumbens s. magis erectus, striatus, glaber, subinde pubescens, ramosus: *ramis* attenuatis. *Folia* glabra: *inferiora* integerima, nonnunquam varie laciniata; *superiora* basi plerumque dentata, angustiora, et acutiora. *Flores* coerulescentes, fasciculati, terminales.

2) *F. dentata* fructu 3-6-dentato: denticulis binis brevissimis, caule dichotomo divaricato scabro, foliis oblongis: superioribus dentatis. *Gezähnte Fed.* später *Lämmerlattich*.

(*Gärtn. l. c.* *Schrad. Germ. I.* p. 96. *Willd. Enum. l. c.*

(*Valeriana locusta* ♂ *Linn.*)

Valeriana dentata *L.* sp. pl. ed. *Willd. I.* p. 183. *Pers. syn. pl. l. c.* *Hoffm. Germ. l. c.* *De Vest Man. bot. l. c.*

Ann. Flor. Mayo - Augusto.

Hab. in agris, in sylvis, inque cultis passim cum praecedente.

A priori differt: *caule* proceriori magis divaricato scabro, *foliis* plus minusve scabris: *superioribus* basi plerumque dentatis, *fructu* 3-4-6-dentato: *dentibus* insimis minimis. *Flores* carnei, aut dilute subrubelli.

18. POLYCNEMUM, Knorpelkraut.

1) *P. arvense* caule diffuso, foliis subulatis triquetris. *Acker - Knorpelkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd. I.* p. 192. *Pers. syn. pl. I.* p. 40. *Schrad. Germ. I.* p. 97. *Hoffm. Germ. I.* p. 16. *Schkuhr, Handb. 1. t. 5.* *De Vest Man. bot. p. 285.*)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in arvis arenosis, locis saxosis sterilibus. (Hinc inde in agris prope dem *Schenkenschloß*, *Oberdürrbach*, *Veitshöchheim*, *Giebelstadt*, *Bütthardt*, et *Eibelstadt*. Copiosius in arenosis juxta dem *Haag* prope *Karlstadt*, in agris apud *Remliugen*, inter *Kissingen* et *Bocklet*, prope *Huhn* alibique.

Caulis 2-3-6-uncialis, teretiusculus, undique foliosus, basi praecipue purpurascens, coeterum viridis,

dis, diffusus, ramosissimus: *ramulis* decumbentibus prostratis calloso-articulatis. *Folia* sparsa, sessilia, subulata, carinata, glabriuscula, in cuspidem album attenuata. *Flores* minuti, albidi, axillares, sessiles, solitarii, aut gemini.

Variat caule foliisque rigidioribus villosis aut sub-tomentosis, floribus subinde 2-andris et 5-andris. Pluries etiam flores 2-gynos observavi.

19. GLADIOLUS, Siegwurz.

I) *G. communis* foliis ensiformibus nervosis, floribus distantibus secundis, spatha tubo longiori. *Ge-meine Siegw.* *Allermanns-Harnisch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 233. *Ejusd.* Enum. p. 59. *Pers.* syn. pl. I. p. 43. *Schrad.* Germ. I. p. 101. *Hoffm.* Germ. I. p. 17. *Schkukr Handb.* t. 6. *Weinmann Phy-tanthoza-Icon.* t. 546. f. a. *De Vest Man. bot.* p. 284. *Knorr.* thesaur. I. t. A. 5.)

Penn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in pratis sylvaticis. (Rarissime in sylva Stettensi prope Stetten. Prope *Margetshöchheim* invenit *Ill. Prof. Doellinger* et in den *Lacken ad Abbat. Heidenfeld ill. Bar. de Bodeck.*)

Bulbus subrotundus, solidus, intus lutescens, extus membranis reticulatis vestitus. *Scapus* pedalis, sesquipedalis, erectus, teres, glaber, simplicissimus, superne arcuatus. *Folia* alterna, ensiformia, vaginantia, glabra, stricta, nervosa. *Spatha* persistens, diphylla: *foliolis* inaequalibus lanceolatis acutis. *Flores* speciosi, purpurei, sessiles, gemino ordine in *racemum terminalem* secundum dispositi.

20. IRIS, Schwertel.

Laciniis corollae reflexis superne barbatis.

1) *I. pumila* barbata, scapo 1-floro foliis ensiformibus breviori. *Zwerg-Schwert. kleine Schwertlilie.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 224. *Ejusd. Enum.* p. 62. *Pers. syn. pl.* I. p. 50. *Schrad. Germ.* I. p. 102. *Hoffm. Germ.* I. p. 17. *Jacq. Flor. Austr.* I. p. 5. t. 1. *De Vest. Man. bot.* p. 282. *Thunb. Diss. V. 2.* p. 108.)

Perenn. Flor. April. Majo.

Hab. in montibus, collibus herbidis, in muris. (In muris ad moenum juxta dem *Heroldshause*. In monte *Adelsberg* prope *Gemünden* teste *Am. Wolff*. Praeterea frequentissima est in hortis, et in muris hortorum hinc inde quasi sponte crescit.)

Radix nodosa. Scapus 1-2-3-uncialis, erectus, teres, glaberrimus, 1-florus. Folia scapo longiora, erecta, ensiformia, subsfalcata, nervosa, glaucescentia, glaberrima. Corolla coerulea aut violaceo-purpurascens: laciniis magine undulatis et obsolete emarginatis. Germen obtuse trigonum.

2) *I. germanica* barbata, scapo multifloro foliis ensiformibus falcatis longiori. *Deutscher Schwert. Deutsche Veilwurz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 229. *Ejusd. Enum.* p. 63. *Pers. syn. pl.* I. p. 51. *Schrad. Germ.* I. p. 104. *Hoffm. Germ.* I. p. 18. *Herb. Blackw.* t. 69. *De Vest Man. bot.* p. 283. *Thunb. Diss. V. 2.* p. 111.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in muris et ruderatis. (Intra et circa arcam Marienburg, praecipue in rupibus versus dem *Kinderhause* copiose. In monte apud *Homburg* passim.

In

In hortis insuper frequens est, et inde nonnunquam in muris et ruderatis viciniis.)

Radix magna nodosa: fibris longissimis. Scapus scsquipedalis, 2-pedalis, erectus, teres, glaberimus, 3-4-florus. Folia ensiformia, falcata, erecta, nervosa, vaginantia, scapo breviora. Corollae magnae, speciosae, saturate violaceae: laciniis integerrimis aut apice emarginatis, erectis subrotundo - ovatis. Germen obsolete trigonum sulcatum.

Iris squalens colore modo corollarum ab hac differt.

Laciniis corollae reflexis imberibus.

3) *J. Pseud-Acorus imberbis*, scapo multifloro foliis ensiformibus longiori, corollae laciniis interioribus stigmate minoribus. *Wasser-Schw.* Unechter Kalmus, gelbe Teichlilie.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 232. Ejusd. Enum. p. 64. Pers. syn. pl. I. p. 52.. Schrad. Germ. I. p. 206. Hoffm. Germ. l. c. Herb. Blackw. t. 261. De Vest Man bot. l. c. Knorr. thesaur. I. t. L, 8. Thunb. Diss. V. 2. p. 115.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in fossis, paludosis, ad ripas fluviorum ubique.

Radix crassa, subcylindrica, horizontalis, subcarnosa: fibris multis longis tenacibus. Scapus 2-3-pedalis, erectus, teres vel tereti-compressus, glaberimus, ramosus, foliis plerumque altior. Folia ensiformia, nervosa, glaberrima, vaginantia, laete viridia, subfalcata: juniora recta. Flores flavi, inodori. Laciniæ corollae reflexae imberbes macula fulva venis nigrescentibus reticulata notatae. Tubus germine trigono dublo brevior.

4) *J. graminea* imberbis, scapo ancipiti sub-~~2~~
floro foliis linearibus duplo breviori, germinibus he-
xagonis. *Grasblättriger Schwert.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 236. Ejusd. Enum. p. 66.
Pers. syn. pl. I. p. 53. Schrad. Germ. I. p. 109. Hoffm.
Germ. I. c. Jacquin Austr. I. p. 5. t. 2. De Vest Man.
bot. I. c. Thunb. Diss. V. 2. p. 119.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

*Hab. in pratis humidis, et collibus hera-
bidis.* (Prope Horhausen et Theres semel invenit
Am. Wolff.)

Scapus pedalis, erectus, simplex, anceps, gla-
berrimus, 1-aut 2-florus, foliorum vaginis inclusus,
in folia 2 terminatus. *Folia angustissima, linéaria,*
recta, sulcata, graminea, scapo duplo longiora. *Flo-
res violaceo-purpurascentes, odorati. Tubus corollae*
brevissimus. Germen hexagonum.

21. SCHOENUS, *Knopfgras, Strickgras.*

1) *S. albus* culmo subtriquetrio folioso, foliis li-
nearibus canaliculatis, fasciculis terminalibus subco-
rymbosis involucrum aequantibus. *Weisses Knopfgr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 267. Pers. syn. pl. I. p.
59. Schrad. Germ. I. p. 111. Hoffm. Germ. I. p. 20.
Schkuhr. Handb. t. 7. De Vest Man. bot. p. 287.)

Rhynchospora alba Willd. Enum. p. 71.

Perenn. Flor. Junio—Augusto.

Hab. in turfosis, palustribus. (In uligino-
sis prope Hassfurth versus Zeil, apud Grettstadt, Spies-
heim, prope Zwing, Gemünden, Wolfsmünter et alibi
raro.)

Radix fibrosa, subrepens. *Culmi* plures sesquidigitales, palmares, etiam pedales, erecti, striati, glabri, foliosi, superne triquetri. *Folia* angusta, fere setacea, nervo albicante notata, a basi ad apicem usque carinata, *siccata* convoluta. *Spiculae* pedunculatae, terminales, lanceolatae, corymboso-fasciculatae, pauciflorae, albidae, demum, praecipue tempore desiccationis flavescentes. *Semen* basi setis 8-13 obvallatum.

2) *S. nigricans* culmo tereti nudo, spiculis fasciculatis, involucri 2-phylli valvula exteriori spiculas superante, fasciculis ovatis. *Schwärzliches Knopfgras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 261. *Pers.* syn. pl. I. p. 58. *Schrad.* Germ. I. p. 113. *Hoffm.* Germ. I. p. 19. *De Vest* Man. bot. I. c.)

Hab. in locis uidis, pratis uliginosis, turfosis. (In pratis humidis et ad lacus non procul a *Werneck* aliquoties invenit *An. Wolff*. In uliginosis prope *Hassfurth* cum praecedente, im sogenannten *Schladig* ibidem. In humidis prope *Fahr* et *Volkach* perraro. In pratis uidis ad *Saalam* prope *Neustadt*, *Kissingen*, ad *lacum frickenhusianum*, nec non alibi raro.)

Radix valde fibrosa. *Culmi* plures, palmares, pedales et altiores, erecti, simplicissimi, rigidi, teretes, striati, glabri, enodes, nudi, basi vaginati. *Folia* numerosa erecta, rigida, triquetra, canaliculata, setacea, striata, glabra, marginibus scabra, culmis breviora. *Spiculae* lanceolatae, compressae, fusco-nigricantes, splendidae, 3-4-florae, in apice culmi in capitulum ovatum involucratum congestae. *Semen* basi nudum.

In hac etiam specie *flores semper diandri* occur-
runt.

22 CYPERUS, Zypergras.

1) *C. flavescentia* culmo trigono nudo, umbella subcomposita 3-phyllo, spiculis lanceolatis confertis, glumis obtusis. *Gelbliches Zypergr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 279. Ejusd. Enum. p. 73. Pers. syn. pl. I. p. 62. Schrad. Germ. I. p. 117. Hoffm. Germ. I. p. 21. Schkuhr Handb. t. 7. Host. Gram. III. t. 72. De Vest Man. bot. p. 293.)

Ann. Flor. Junio - Septembri.

Hab. in paludosis. (In fossa oppidana versus dem neuen et pleichacher Thore rarissime. Hinc inde in humidis im Oelgrund, et ad ripas Moeni inter Karlstadt et Gemünden. In palude apud Wolbach inter Frickenhausen et Wechterswinkel.)

Radix fibrosa. Culmi plures, semiunciales, unciales, digitales et altiores, erecti, tenues, triquetri, striati, glabri, basi vaginati. *Folia* angustissima, carinata, mucronata, glabra, culmum aequantia aut eo paulo breviora. *Involucra* foliola 3 inaequali-longa foliis similia. *Pedicelli* simplices, inaequales, subumbellati. *Spiculae* lanceolatae, obtusae, confertae, inaequales, ex viridi-flavescentes. *Semina* lenticularia, basi attenuata, brunnea.

2) *C. fuscus* culmo trigono basi folioso, umbella composita 3-phyllo, spiculis linear-lanceolatis confertis, glumis acutis. *Braunes Zypergras.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 280. Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. I. c. Schrad. Germ. I. p. 118 Hoffm. Germ. I. c. Host. Gram. III. t. 73. Schkuhr Handb. t. 7. Leers Herb. t. I. f. 2. De Vest Man. bot. I. c.)

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab.

Hab. in paludosis. (Hinc inde cum praecedente, praeterea ad ripam Moeni versus *Karlstadt* infra der *Karlsburg*. In loco paludoso ad *Moenum* prope *Ochsenfurth* raro. Etiam in paludosis campi *Marrbach* prope *Abbat. Heidenfeld* aliquoties legi.)

Praecedenti maxime affinis, a quo *culmis* plerumque altioribus basi foliosis, *foliis* scabriusculis, *spiculis* pluribus pedunculatis sessilibusque minoribus ac angustioribus nigrescentibus et *glumis* acutis differt. *Semina* triquetra albida.

23. SCIRPUS, Binse.

Spica unica.

1) *Sc. Baeothryon* culmo tereti nudo basi vaginato, spica nuda, glumis obtusis, stigmatibus tribus. *Torf-Binse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 293. *Pers.* syn. pl. I. p. 66. *Schrad.* Germ. I. p. 125. *Sturm.* D. Flor. 1 10. *Hoffm.* Germ I. p. 22.)

Sc. Halleri *Villars* Delphin. 2. p. 188. n. 5. *Gmelin* Flor. badens. I. p. 95.

Sc. pauciflorus *Smith.* Flor. britan. Vol. I. p. 50. *Sprengel* Flor. halens. p. 23.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in paludibus, locis inundatis, et arenosis humidis. (Rarissime in pratis udis im *Werrngrund*, inter *Lindach* et *Gernach*. Ad Moeni ripas prope *Volkach*, *Fahr* et *Wipfeld*. Ad rivum prope oppidum *Ebern*. Etiam in udis fossae oppidanae inter dem *pleichacher* et *neuen Thore* ante aliquot annos plura legi specimina, ubi nunc abesse videtur.)

Radix repens. Culmi 3-4 raro plures, 3-6-unciales, erecti, tenues, teretes, glabri, striati, saepe flexuosi, basi vaginis oblique truncatis aphyllis arcte inclusi. Folia culmis similia, sed breviora. Spica solitaria, terminalis, 3-4-flora, oblongo-ovata, maturitate magis ovata, et paulo angustior. Glumae oblongo-ovatae, obtusae, nitidae, fuscae, margine apicem versus albidae. Nux obtuse trigona, nitida, pallide flava, basi setulis quibusdam hispidis cincta.

2) *Sc. palustris* culmo subtereti nudo basi vaginato, spica subovata terminali, glumis acutiusculis. *Sumpf-Binse, Weihergras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 291. *Ejusd.* Enum. p. 75. *Pers.* syn. pl. I. p. 65. *Schrad.* Germ. I. p. 127. *Hoffm.* Germ. I. p. 21. *Sturm.* D. Fl. I. 9. *Host.* Gram. t. 55. *Leers* Herb. p. 10. t. I. f. 3.)

Perenn. Flor. Majo-Julio.

Hab. in fossis, pratis udis, et ad ripas ubique.

Radix repens. Culmi pedales et altiores, erecti, teretiusculi, striati, glabri, nudi, basi vaginis truncatis aphyllis vestiti. Folia culmis simillima, iis vero breviora. Spica solitaria, terminalis, subovata, multiflora. Glumae oblongo-ovatae, imbricatae, nitidae, fuscescentes. Nux suborbicularis, pallide flava, basi setulis 4 cincta.

3) *Sc. acicularis* culmo subquadrangulo nudo setiformi basi vaginato, spica ovata acuta terminali nuda, seminibus nudis. *Nadelförmige Binse, Moosbinse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 295. *Ejusd.* Enum. p. 77. *Pers.* syn. pl. I. p. 66. *Schrad.* Germ. I. p. 130. *Hoffm.* Germ. p. 23. *Sturm.* D. Fl. I. 10. *Host* Gram. III. t. 60.)

Annu. Flor. Junio-Augusto.

Hab.

Hab. in inundatis arenosis, ad ripas, ad fontes. (Ad ripas Moeni infra Himmelsporten, Unterzell, apud Zell et Margetshöchheim raro. In Insula prope dem Siechhaus, ad rivulum prope Catarrhactam ante portam Pleichach, in fossis oppidanis hinc inde haud frequens. In paludosis prope Abbat. Schwarzach et Timbach, alibique.

Radix caespitosa, fibrosa. *Culmi* plures 2-3-uniales, erecti, tenuissimi, setacei, glabri, subquadranguli, basi vaginulis membranaceis oblique truncatis aphyllis vestiti. *Folia* culmis conformia. *Spica* solitaria terminalis, exigua, ovata, acutiuscula. *Glumae* inaequales, ovatae, obtusae, nitidae, viridiferrugineae. *Nux* ovata, subcompressa, alba, nitida, setulis basi plerumque destituta.

4) *Sc. caespitosus* culmo tereti, vaginis rudimento folii terminatis, spica terminali involucro 2-phyllo inclusa, stigmatibus tribus. *Rasen-Binse, Kolben-Binse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 292. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. I. p. 123. *Hoffm.* Germ. I. p. 22. *Sturm.* D. Flor. I. 10. *Host.* Gram. III. 59.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in uliginosis, pratis humidis, turfosis. (In fossa oppidana prope dem Wasserturm, ad moeni ripas supra Ochsenfurth, Retzbach Kitzingen, et Hassfurth rarius. Ad rivulum am Fahrwege versus Dürrbach. In turfosis prope Kleinlangheim, et Hassfurth im Schladig. Ad ripas salae prope Schundersfeld perraro. In paludosis prope Wollbach. Hinc inde in humidiusculis prope Hofheim, Eichelsdorf, Friesenhausen, et alibi raro.)

Radix valde fibrosa, caespitosa. *Culmi* plurimi caespitosi unciales, digitales, erecti, rigidi, teretes, striati, basi vaginis quibusdam in rudimentum folii desinentibus et squamis multis imbricatis arcte cincti. *Folia* pauca culmis simillima. *Spica* exigua, ovata, rufa, involucro 2-phyllo inaequali glumaceo inclusa. *Glumae* omnes fertiles, involucri foliolis conformes. *Nux* obtuse triquetra, nigra, basi setulis curvato-flexuosis cincta.

Spicae saepius viviparae.

5) *Sc. Caricis* culmo teretiusculo nudo basi vaginato, vaginis foliiferis, spica disticha compressa involucro 1-phyllo breviori; spiculis multifloris. *Riet-grasartige Binse.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 292. *Ejusd.* Enum. I. c. Roth. Tent. Flor. Germ. T. II. P. I. p. 56. *Host.* Gram. III. t. 57.)

Sc. caricinus, Schrad. Germ. I. p. 132.

Sc. compressus, Pers. syn. pl. I. p. 66.

Schoenus compressus, Linn. sp. pl. ed. 2. p. 65. Smith. Britan. V. p. 44. Hoffm. Germ. I. p. 20. Leers Fl. herb. p. 9. t. 1. f. 1.

Carex uliginosa, Linn. sp. pl. ed. 2. p. 1381. Perenn. Flor. Majo - Julio.

Hab. in uliginosis, inundatis, turfosis, ad ripas. (In fossa oppidana non procul von dem neuen Thore raro. Ad rivulum, et ad lacum *sylvae guttenbergensis*. In palude prope *Hafsfurth* versus patibulum vulgo: das *Moos*. Ad ripas et rivos prope Neustadt ad S. et *Münnerstadt*. Ad moeni ripas paludosas prope *Volkach*, *Astheim*, *Heidensfeld*, am *Wildwasser* ibidem et alibi.)

Radix repens, articulata, fibrosa, squamis fuscis tecta. *Culni semipedales*, et altiores, erecti vel varie flexi, glabri, nudi, teretiusculi, superne subterragoni, basi vaginati. *Folia linearia*, acuminata, carinata, striata, culmis breviora. *Spiculae sessiles*, ovatae, nitidae, 5-8-florae, viridi-fuscae s. ferrugineae in spicam terminalem solitariam disticham compressam dispositae. *Bractea triquetra*, solitaria, spica major. *Glumae lanceolatae*, acuminatae, carinatae. *Nux subtrigona*, nitida, pallide fusca, basi setulis 6 duplo longioribus cincta.

Culmo polystachyo.

6) *Sc. lacustris* culmo tereti nudo, cyma decomposita terminali, involucro 2-phyllo, spiculis ovatis sessilibus pedunculatisque. *See-Binse, Pferde-Binse.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 296. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. I. p. 67. Schrad. Germ. p. 133. Hoffm. Germ. I. p. 23. Host. Gram. III. t. 61.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in stagnis, fossis aquaticis, et ad ripas fere ubique.

Radix repens, articulata, crassa, fusca. *Culni 3-4-6-pedales* et altiores, erecti, teretes, nitidi, glaberrimi, laete virides, medulla alba spongiosa farcti, nudi, basi vaginis quibusdam membranaceis fuscescentibus vestiti, quarum nonnullae in folium breve rigidum canaliculatum transeunt. *Involucrum 2-phyllo*: *soliolo altero longiore*. *Panicula cymose decomposita*: *pedunculis maxime inaequalibus*; *fasciculatis*, modo compressis glabris, modo teretiusculis pilis bre-

brevibus rigidulis obsessis: *spiculae* in pedunculis terminales, aut sessiles, congestae, teretes, oblongae, nitidae, ferrugineae, multiflorae. *Glumae* lato-ovatae, carinatae, mucronatae: *infimis* plerumque sterilibus. *Nux* subtrigona, coronata, pallide flava, basi setulis, vel villis circa 6 cincta.

Varietatem multo minorem *culmis* canescensibus, *involucris* rigidis subpungentibus, *pedunculis* diffusis longioribus, *spiculisque* brevioribus nitidissimis aliquoties observavi.

7) *Sc. setaceus* culmo tereti setaceo, vaginis foliiferis, spiculis terminalibus subgeminis sessilibus, fructu costato imberbi. *Borstenförmige Binse.*

(*L.* sp. *lpl. ed. Willd.*, p. 298. *Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. I.* p. 137. *Hoffm. Germ. I.* p. 24. *Host. Gram. III. t. 65. Sturm. D. Fl. I. 10. Leers Herb.* p. 10. *t. I. f. 6.*)

Perenn. Flor. Majo - Augusto.

Hab. in paludosis, in humidis, locis inundatis, ad ripas. (In fossa oppidana non procul vom sander- et pleichacher Thore. In humidis im breiten Holz inter Versbach et Mühlhausen. Ad ripas Moeni apud Ochsenfurth, Kitzingen, infra Weitshöchheim versus Thiüngersheim. Ad lacus et ad ripas prope Karlstadt, Karsbach, Sachsenheim, et Gemünden. In paleo im sogenannten grossen Moos prope Hafsfurth. Ad ripas Salae hinc inde non procul a salinis kissingersibus, alibique.)

Radix fibrosa. *Culmi* plurimi in cespitem densum congesti, unciales, 2-unciales, setacei, teretes, acuminati, plerumque simplices, erecti vel basi procumbentes, saepe varie flexi. *Vaginae* membranaceae, ex fusco-purpurascentes, in folia brevia canaliculata desi-

desinentes. *Involuci* foliola 2: *superius* in culmi apice majus concavum, *inferius* spiculis minor concavum glumaceum. *Spiculae* exiguae, ovatae, multiflorae, plerumque geminae, saepe solitariae, raro ternae, paulo infra apicem culmi sessiles aut breviter pedunculatae. *Glumae* ovatae, concavae, purpurascentes, nervo carinali viridi. *Nux* minutissima, subtrigona, longitudinaliter costata, nitida, setulis destituta.

Culmo triquetro.

8) *S. sylvaticus* culmo triquetro folioso, cyma terminali supradecomposita foliacea, spicis confertis, glumis mucronatis. *Wald-Binse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 307. *Ejusd.* Enum. p. 79. *Pers.* syn. pl. I. p. 69. *Schrad.* Germ. I. p. 145. *Hoffm.* Germ. I. p. 26. *Leers Herborn.* p. 11. t. 1. f. 4. *Host.* Gram. III. t. 68.)

Perenn. Flor. Mayo - Julio.

Hab. in pratis udis, locis inundatis, ad fossas, ad ripas, inque sylvaticis fere ubique.

Radix repens, sublignosa, crassa, fusca, fibris multis tenacibus, aucta. *Culmus* sesquipedalis et altior, erectus, triquierter, glaberrimus, supra medium, foliosus. *Folia* pedalia, lata, linearia, acuta, carinata, nitida, laete viridia, basi vaginis longis instructa. *Involucrum* 3-phyllum: foliolis inaequalibus foliis similibus. *Umbella* terminalis, ampla, supradecomposita. *Pedunculi* inaequales, subtrigoni, basi vaginati. *Spiculae* exiguae, congestae, ovatae, viridescentes, demum e fusco nigricantes. *Glumae* oblongo-ovatae, carinatae, mucronatae. *Nux* triquetra, glabra,

bra, pallide flava, basi villis 4-6 paulo longioribus cincta.

Varietatem culmo percrasso, umbellis binis apice conjunctis ad lacum apud Rimbach semel observavi.

?) *Sc. maritimus* culmo triquetro folioso, panicula foliacea terminali, spiculis conglobatis sessilibus pedunculatisque involucro polyphyllo cinctis, glumis mucronatis trifidis. *Meer-Binse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 306. *Ejusd.* Enum. p. 78. *Pers. syn. pl.* p. 68. *Schrad.* Germ. I. p. 143. *Hoffm.* Germ. I. p. 25. *Schkuhr Handb.* t. 8. *Host.* III. t. 67.)

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in graminosis paludosis, ad fossas, ad ripas. (In fossa oppidana hinc inde non infrequens. In udis prope Catarrhactam ertra portam *Pleichach*, inque fossis versus *Heidinsfeld*. Ad moeni ripas prope dem *Siechhausse*, *Thüngersheim*, *Erlabrunn*, *Ochsensurth*, *Kitzingen* alibique.)

Radix repens fibris dense obsessa, squamosa, non-nunquam bulbosa, intus albida, extus fusca culmos plures pedales, sesquipedales et altiores, erectos, glabros, striatos, ad medium usque foliatos profers. Folia plura, rigidiuscula, striata, carinata, linearia, acuminata: inferiora breviora, superiora longiora culmum plerumque superantia. Vaginae striae, glabrae. Involucrum 3-phyllum: foliolis prae-longis inaequalibus foliis similibus. Panicula terminalis: spiculis pedunculatis sessilibusque, ovato-oblongis, conglobatis, luscis aut ferrugineis composita. Glumae ovatae, concavae, rugosae, apice 3-4-dentatae: dente intermedio longiori. Nux triquetra, basi atte-

attenuata, glaberrima, pallide fusca, basi setis 4-6 longioribus obvallata.

Variat culmis multo humilioribus, *spiculisque* minoribus, paucioribus, *omnibus* sessilibus.

24. ERIOPHORUM, *Wollgras, Dungras.*

I) *E. vaginatum* culmis vaginatis superne trigonis, spica solitaria oblengo-ovata, glumis scariosis. *Scheidiges Wollgras, Sumpfwolle.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 312. *Ejusd.* Enum. p. 80. *Pers.* syn. pl. I. p. 70. *Hoffm.* Germ. I. p. 26. *Smith.* Britan. V. I. p. 58. *Roth.* Germ. I. p. 24. *Spreng.* Hal. p. 25. *Sturm.* D. Flor. I. 10.)

E. cespitosum *Host.* Gram. t. 39. *Schrad.* Germ. I. p. 150.

Linagrostis vaginata *Scop.* Carn. p. 47.

Perenn. *Flor.* Maj. Junio.

Hab. in turfosis, uliginosis. (Baro in udis graminosis prope *Büchold*, *Waldaschach* et *Bocklet*. Inter *Huhn* et *Schmalwasser*, in palude apud *Wollbach* versus *Neustadt ad Saalam*, prope *Wechterswinkel*, in palude prope *Hassfurth* versus *patibulum*.)

Radix crassa, fusca, fibris multis praelongis tenacibus aucta. *Culmi* erecti, glabri, 3-4-nodes, inferne teretes s. teretiusculi, superne trigoni, ante anthesin et sub anthesi semipedales aut pedales, ad apicem usque *vaginis* inclusi, quarum superiores praeципue aphylli in processus solumodo foliosos aut cuspides terminatae sunt. *Anthesi peracta* culmus elongatione supremi articuli duplo fit longior, et ad medium usque *vaginatus* adparet. *Folia* omnia radicalia, primo culmum superantia, subulata, triquetra, glabra,

bra, apicem versus compressa, erecta, dein varie flexa, basi membranacea, vaginantia. *Spica* terminalis, solitaria, oblongo-ovata, erecta. *Glumae* oblongae, acuminatae, scariosae, nitidae, coeruleo-griseae vel nigrescentes. *Nux* subtrigona lana sericea, spica tandem duplo longiore circumvallata.

2) *E. triquetrum* culmis trigonis, foliis triquetris, spiculis inferioribus reflexis, pedunculis scabris. *Dreisitziges IVollgr.*

(*Schrud. Germ. I.* p. 152. *Hoppe* bot. *Taschenb.* 1800. p. 106. et 1801. p. 133. *De West Man. bot.* p. 292. *Hoffm. Germ. I.* p. 26. *Sturm. D. Flor. I.* 10.)

E. gracile Roth. *Catal. append. 2. Pers. syn.* pl. l. c.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in uliginosis, poludosis, ad ripas. (Apud Neustadt ad Saalam prope dem Schießplatze raro. Prope Münnertstadt, Bischofsheim, et Hilders teste Heilm. Ad ripas Salae pone salinas kissingenses passim. Ad ripas ejusdem fluminis prope Westheim et Langendorf. In locis uidis graminosis in regione oppiduli Ebern versus Vierzehnheiligen. Aliquoties etiam non procul a Werneck invenit Am. Wolff.)

Radix tenuis, praelonga, repens, squamosa. *Culmi* graciles, erecti, trigoni, glabri, 2-3-nodes, ante anthesin palmares, et pedales, ad apicem fere vaginati, post id tempus supremo articulo elongato sesquipedales, 2-pedales, et ultra medium nudi. *Folia* triquetra, acuminata, marginibus scabra, saepe glabat: *radicilia* fasciculata varie flexa emarcida convoluta culmeis longiora. *Vaginae* foliorum radicalium membranaceae, glabrae, fuscescentes striis plerumque purpurecentibus, vaginis culmeis laete viridibus longiores.

æs. *Spicae* binae, ternae, aut quaternae terminales, breves, oblongae, inaequaliter pedunculatae, erectae, anthesi peracta cernuae. *Glumæ* oblongæ, obtusæ, carinatae, nervosæ, nitidae, nigrescenti-viridulae. *Nux* oblonga, subtrigona, fusca, lana sericea tempore maturationis spica ipsa duplo longiore cincta.

3) *E. latifolium* culmis teretiusculis, foliis planis apice triquetris, spicis pluribus pedunculatis, pedunculis scabris. *Breitblattriges Wollgr. Wiesenwolle, Flachsgras.*

(*Schrad.* Germ. I. p. 154. *Hoppe* bot. Taschenb. 1800. p. 108. *Sturm.* D. Flor. I. 10. *De Vest Man. bot.* p. 292.)

E. polystachion L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 312. *Ejusd.* Enum. I. c. *Hoffm.* Germ. I. p. 27. *Leers* Herb. p. II. t. I. f. 5.

E. vulgare Pers. syn. pl. p. 70.

Linagrostis polystachya Scop. Carn. I. p. 48.

Hab. in pratis humidis, in palustribus.
(In humidis fossæ oppidanae, in pratis humidois am *Wellriether Hof*, prope *Dittelbach*, *Schwarzach*, *Fahr*, *Werneck*, *Abbat. Heidenfeld*, *Waldaschah*, *Klosterhausen*. Ad ripas moeni infra *Karlstadt*. Im breiten Holz prope *Versbach*, alibique frequens)

Radix fusca, crassiuscula, truncata, fibris multis longis tenacibus obsessa. *Culni* cum foliorum fasciculis caepitosi, erecti, teretiusculi, subtrigoni, glabri, 3-4-nodes, toti vaginati, pedales, semipedales. *Post florescentiam*, uti praecedentium, altiores, et ad medium usque vaginati. *Folia* culmis breviora, plana, apice triquetra. *Panicula* terminalis, erecta, spicis 5-7 demum nutantibus composita. *Glumæ* nitidae,

tidae, fusco-vel nigrescenti-virides. *Nux* triquetra, lana sericea longa obvallata.

4) *E. angustifolium* culmis subtrigonis, foliis canaliculatis apice triquetris, spicis pedunculatis, pedunculis glabris. *Schmalblättriges Wollgras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 313. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. I. l. c. *Schrad.* Germ. I. p. 153. *Hoffm.* Germ. I. l. c. *Sturm.* D. Fl. I. 10.)

Perenn. *Flor. Maj. Junio.*

Hab. in pratis humidis, in palustribus.
(In iisdem fere cum praecedente provenit locis. Praeterea ad ripas *Werrae* pluries invenit *Am. Wolff.* Ad ripas *Tuberae* prope *Röttigen*. Hinc inde in udis circa *Aub*, et *Moos* versus *Messelhausen*. In palude vulgo *das Moos* prope *Hassfurt* et im *Schladig* ibidem. In graminosis udis prope *Hosheim* et *Eicheldorf*. In pratis humidis prope *Klosterhausen*, *Kleinprag*, *Brendlorenzen*. In palude apud *Wollbach* versus *Neustadt*, et alibi.)

Radix prioris. *Culmi* erecti, semipedales, pedales, et saepe altiores, supra medium teretes, superne trigoni. *Post florescentiam* elongatione articuli supremi uti in praecedentibus, altiores evadunt. *Folia radicalia* fasciculata, *culnea* solitaria: *omnia* carinata, acuminata, apice triqueta. *Spicae* parvae, oblongae, erectae, demum nutantes, in paniculam terminalem collectae. *Pedunculi* glabri. *Glumae* nitidae, fuscescentes. *Nux* oblonga, triqueta, lana longissima cincta.

25. NARDUS, Borstengras, Pfriemgras.

1) *N. stricta* spica setacea erecta secunda. *Steifes Borstengr.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 314. *Ejusd.* Enum. p. 80.
Pers. syn. pl. I. p. 72. *Koeler.* Gram, p. 312. *Schrad.*
Germ. I. p. 157. *Hoffm.* Germ. I. p. p. 27. *Schkuhr*
Handb. I. p. 29. t. II. *Leers* Herborn. p. II. t.
 I. f. 7. *Host.* Gram. 2. p. 4. t. 4. *Schreb.* Gram. I.
 p. 65. t. 7.)

Perenn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in asperis sterilibus, in montosis et
 sylvaticis. (In monte *Nicolai*, iu montibus prope
Zellam, *Durrbach*, *Veitshöchheim* et *Retzbach*. In col-
 libus saxosis circa der *Waldskugel*. In asperis prope
Thüngen, *Rimpar* et alibi.)

Culmi e radice densa fibrosa plures congesti, sub-
 nudi, tenuissimi, stricti, glaucescentes, scabriuscui,
 palmares: *fructiferi* duplo fere longiores. *Folia* radi-
 calia, vaginantia, rigida, canaliculato-setacea, glau-
 cescentia, scabriuscula; fasciculata, dense congesta,
 refracto-secunda. *Spica* terminalis, simplicissima,
 gracilis, stricta, secunda. *Flosculi* subsessiles, rachi
 appressi, post florescentiam discedentes, subviolacei
 vel purpurascentes.

D I G Y N I A.

26. CHAMAGROSTIS, Zwerggras.

I) *Ch. minima* floribus alternis sessilibus, spica
 filiformi. Kleinstes Zwerggras.

(*Schrad.* Germ. I. p. 158. *Wibel* Werth. p. 126.)

Agrostis minima L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 272.
Smith. Brit. I. p. 82. *Koel.* Gram. p. 94.

Knappia agrostidea *Smith.* Britan. V. 3. p. 1387.

Sturmia minima *Sturm.* D. Fl. I. 7.

St. verna *Pers.* syn. pl. I. p. 76.

Ann. *Flor.* *Martio-Majo.*

Hab. in arenosis siccis. (In agris infra *Himmlerhofen*, Zell et *Veitshochheim* passim. Ad margines agrorum et in arenosis prope *Erlach*, *Frickenhäusen*, versus den *erlacher Seen* prope *Kleinnochsenfurth*, auf dem *Galgen-* und *Krainberge*, versus *Kürnach* und *Prosselsheim*. In arenosis sterilibus circa der *Vogelsburg* prope oppid. *Volkach*, circa *Astheim*, *Eusenheim*, et *Gaibach*. In monte *dürrbäcensi*, in monte *Schlossberg*, in arenosis prope *Giebelstadt*, *Sonderhofen*, *Aub* et alibi.)

Culmi caespitosi, 1-2-unciales, erecti, capillares, glaberrimi, argenteo-nitidi, superne plerumque purpurascentes, basi tantum vaginati. Folia pauca, brevissima, canaliculata, setacea, glabra. *Flores* 8-12 sessiles, alterni, exigui, mutici. *Spica terminalis*, simplicissima, erecta, filiformis, secunda. *Glumae calycinae* e fusco et purpurascente variae, apicibus albidae.

27. SYNTHERISMA, *Bluthirse.*

I) *S. vulgare* foliis vaginisque pilosis, flosculis oblongis imbricatis margine pubescentibus. *Gemeine Bluthirse.*

(*Schrad.* Germ. p. 161.)

Panicum sanguinale L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 342. *Hoffm.* Germ. p. 31. *Roth* Germ. I. p. 28. II. p. 73. *Host.* Gram. 2. p. 14. t. 17. *Schreb.* Gram. t. 16. *Leers* Herb. p. 14. t. 2. f. 6.

Digitaria sanguinalis Scapol. Carn. I. p. 52. *Koel.* Gram. p. 23. *Pers.* syn. pl. I. p. 84. *Moench.* Method. p. 205. *Willd.* Enum. p. 92.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in hortis, agris, vineis et ad vias ubique.

Cul-

Culmi e radice fibrosa plures, glabri, simplices, saepe etiam ramosi, sanquinolenti aut maculis et striis purpureis notati, pro solo diverso variae altitudinis, digitales, semipedales, pedales et altiores, procumbentes, aut basi tantum procumbentes, obliqui, raro toti erecti. *Folia* brevia, sed lata, lanceolata, villosa, plana, et saepe, praesertim in locis humidis undulata. *Vaginae* subcompressae, plus minusve sanguineae, pilosae. *Ligula* obtusa. *Spicae* digitatae, filiformes, rectae, basi interiori nodosae. *Elosculi* gemini, saepe terni, sanquinolenti vel violacei. *Semen* oblongum, obtusum, compressum, luteolum.

28. DIGITARIA, Fingergras.

I) *D. stolonifera* stolonibus repentibus. *Wucherndes Fingergr.*

(Schrad. Germ. I. p. 165. t. 3. f. 9.)

Panicum Dactylon L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 342.
Hoffm. Germ. I. p. 31. *Roth* Germ. I. p. 28. II. p. 74.
Host Gram. 2. p. 15. t. 18.

Cynodon Dactylon Pers. syn. pl. I. p. 85.
Marsch. a Bieberst. Flor. taur. caucas. I. p. 52. *Willd.*
Enum. p. 90.

Fibichia umbellata Koeler. Gram. p. 308.

Perenn. Flor. Junio-Augsto.

Hab. in cultis siccis. (In vineis der oberen Leiste versus *Höchberg*, et in monte *Kalbenstein* versus *Karlenburg*. In vineis auf dem karlstadter Steinberge prepe *Karlstadt* et *Retzbach*. In agris hinc inde prope *Stalldorf*, *Bütthardt* et *Schlüsselfeld* sec. specim. & cariss. patre deff. ibi collecta.)

Radix repens, geniculata, longissima, teres, squamosa. *Culmi* semipedales, pedales, erectiusculi, aut

basi procumbentes et radicantes, teretiusculi, glabri, simplices aut ramosi, basi *stolonibus* longe *repentibus* ramosis strictis praediti. *Folia* carinata, demum plana, laete viridia aut ex glauco viridia, pilosa s. magis glabra: *vaginis* laxis compressis aut teretiusculis glabris. *Ligulae* loco series pilorum. *Spiculae* 4-7 umbellatae, secundae, ex viridi purpurascentes.

29. ALOPECURUS, *Fuchsschwanz.*

1) *A. pratensis* culmo erecto glabro, spica subpaniculata densa obtusa cylindracea, glumis calycinis infra medium connatis acutis villosis. *Wiesen-Fuchsschwanz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 357. *Ejusd.* Enum. p. 86. *Pers.* syn. pl. I. p. 80. *Schrad.* Germ. p. 170. *Hoffm.* Germ. I. p. 28. *Host.* Gram. I. p. 133. t. 31. *Schkuhr.* botan. Handb. I. p. 34. t. 11. *Schreb.* Gram. t. 19. *Leers* Herb. p. 15. t. 2. f. 4. *Sturm.* D. Fl. I. 8. *Koeler.* Gram. p. 31.)

Perenn. *Flor. Majo—Julio.*

Hab. in pratis et pomariis copiose.

Culmi pedales et 2-pedales, in humidis 3-4-pedales, erecti, foliati, teretes, laeves. *Folia* plana, patentia, acuta, laevia. *Vaginae* striatae, glabrae; *suprema* longior subinflata. *Ligula* brevis obtusa. *Spica* terminalis, subpaniculata, solitaria, ovato-cylindrica, crassa, villosa, mollis, 1-3-uncialis, ex viridi argentea. *Flosculi* imbricati, brevissime pedicellati: *pedicelis* congestis subramosis 3-4-floris.

2) *A. agrestis* culmo erecto superne scabriusculo, spica subpaniculata gracili acuta cylindracea, glumis calycinis ultra medium connatis acutis nudiusculis. *Acker-Fuchsschw.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 357. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 171. *Hoffm.* Germ.
 p. 28. *Koel.* Gram. p. 34. *Host* Gram. 3. t. 12. *Schreb.*
Gram. I. p. 140. t. 19. f. 2. *Leers* Herb. p. 15. t. II. f. 5.)
Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in agris et ad margines eorum. (In
agris versus *Himmelsporten*, *Zell*, *Gerbrunn*, auf dem
Galgenberge alibique saepe copiose.)

Culmi pedales, sesquipedales, erecti, tenues, te-
 xetes, glabri, prope spicam scabriuscui. *Folia sca-
 bra: vaginis laevibus, suprema multo longiore et sub-
 inflata.* *Ligula* brevis, denticulata. *Spica termina-
 lis, solitaria, gracilis, 3-uncialis, ex viridi alba, de-
 dum purpurascens.* *Flosculi* laxe imbricati: *pedicel-
 lis* plerumque simplicibus vel parum divisis. *Glumae*
calycinae nudae, carina tantum brevissime ciliata.

3) *A. geniculatus* culmo adscendente genicu-
 lato, spica subpaniculata cylindrica obtusa, glumis
calycinis basi connatis obtusis subvillosis corollaque
 apice crenulatis. *Gegliederter Fuchsschw., Wasser-
 Fuchs-Schwanz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 358. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 173. *Hoffm.* Germ.
 p. 28. *Koeler.* Gram. p. 37. *Host* Gram. II. p. 24.
 t. 32. *Leers* Herb. p. 16. t. II. f. 7.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

*Hab. in fossis, inundatis, palustribus et
 ad ripas.* (In fossis oppidanis passim frequens. In
 fossis et ad Moeni ripas versus *Himmelsporten*, *Zell*,
Veitshöchheim, *Thüngersheim*, prope *Heidenfeld*, et
 alibi frequens.)

Culmi plures, pedales circiter, saepe multo lon-
 giores, tenues, glaberrimi, ad apicem usque vagi-
 nati,

na i adscendentes vel procumbentes *apicibus erectis*; *geniculis* pluribus infractis intercæpti: *inferioribus* plerumque radicantibus. *Folia* plana, latiuscula, brevia, acuta, supra scabra. *Vaginae* striatae, glabrae, laxae, compressiusculæ: *suprema* ventricosa. *Ligula* oblonga, obtusiuscula. *Spica* terminalis, solitaria, brevis, cylindrica, ex alido flavicans vel ex virescenti purpurascens: *flosculis* arcte imbricatis et brevissime aristatis.

30. LEERSIA, Leersie, Reisgras.

1) *L. oryzoides* panicula diffusa, flosculis pâtu-
lis, glumis carinâ ciliatis. *Reisartige Leersie*, *gemei-
nes Reisgras*.

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 325. *Pers. syn pl. I. p. 73.*
Schrad. Germ. p. 176. *Hoffm. Germ.* p. 29. *Koël.*
Gram p. 4. *Host. Gram. I. p. 27. t. 35*)

Phalaris oryzoides *L. sp. pl. ed. 2. p. 81. Roth.*
Germ. I. p. 26. II. p. 68. Schreb. Gram. II. p. 6. t. 22.

Ehrhartia clandestina *Wiggers. primit. p. 64.*

Asprella oryzoides *Moench. Method. Suppl.*
p. 103.

Perenn. Flor. August. Septembri.

Hab. in humidis (In fossâ oppidana prope dem
neuen et pleichacher Thore passim. Ad rivulos prope
Catarrhactam ante portam Pleichach, ibidem ad du-
meta solo humidiori inter hortos non procûl a via
versus Weitshöchheim. Ad Moeni ripâs prope Hirsch-
feld et Hassfurth. Auf dem oberen Wehr fluvii Moeni
juxta pontem versus Heidingsfeld. In humidis im
Marrbachsfelde prope Abbat. Heidenfeld et alibi
raro.)

Radix valde repens. *Culmi* plures, interdum solitarii, altitudine varii, digitales, palmares, semipeiales et altiores, simplices, saepe etiam ramosi, teretes, striati, glabri, geniculis villosi, basi procumbentes et radicantes vel erecti, ad apicem usque vaginati. *Folia* patentia, linearia, in acumen rigidulum attenuata, glauca vel laetius viridia, plana, siccitate convoluta. *Vaginae* compressae, striatae, retrorsum scabrae: *superiores* & ventricosae. *Ligula* brevis, truncata, demum lacinulata. *Panicula* ramosa, diffusa, apice nutans, ante anthesin contracta et vagina suprema tota inclusa, sub anthesi e vagina prodiens. *Flosculi* oblongo-ovales, acutiusculi, mutici, virescentes, semper clausi. *Pedunculi* ramosi et simplices, valde flexuosi, pilis brevissimis scabri.

31. PHALARIS, *Glanzgras.*

1) *Ph. arundinacea* panicula oblonga coarctata, glumis acuminatis. *Rohrartiges Glanzgras*, *Bandgras*, *Schilfgras*.

(L. sp. pl. ed. 2 p. 80. *Pcrs.* syn. pl. I. p. 78. *Schrad.* Germ. I. p. 180. t. 6. f. 5. *Hoffm.* Germ. I. p. 29. *Koel.* Gram. p. 45. *Schkuhr.* bot. Handb. p. 30. t. 9. *Host.* Gram II. p. 25. t. 33. *Leers* Herb. p. 17. t. 7. f. 3. *Willd.* Enum. p. 84.

Arundo colorata L. sp. ed. *Willd.* I. p. 457.

Baldingera colorata G. M. Sch. *Flor. wetter.* I. p. 96.

Typhoides arundinacea Moench. *Method.* p. 202.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in subhumidis et ad ripas ubique.

Cul-

Culmi 2-3-4-pedales, erecti, firmi, stricti, teretes, glabri, ad medium foliati. *Folia* plana, lata, laevia, versus apicem scabra, glauco-viridia. *Vaginae* longae, teretes, culmum arcte amplectentes. *Ligula* obtusa, brevis. *Panicula* speciosa, erecta, florens ventricosa, ampla, versicolor, ante et post anthesin contracta.

Varietas foliis eleganter variegatis (*Bandgras*) in hortis ubique colitur.

32. PHLEUM, Lieschgras.

1) *Phl. pratense* spica cylindrica longissima, calycibus truncatis mucronato-aristatis carina ciliatis, aristis calyce duplo longioribus. *Wiesen-Lieschgras*, *Timotheusgras*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 354. *Ejusd.* Enum. p. 84. Pers. syn. pl. I. p. 79. Schrad. Germ. p. 182. Hoffm. Germ. I. p. 33. Koel. Gram. I. p. 48. Schkuhr Handb. p. 33. t. 10. Host. Gram. 3. p. 7. t. 9. Schreb. Gram. t. 14. Leers Herb. p. 16. t. 3. f. 1.)

Perenn. Flor. Majo—Septembri.

Hab. in pratis et pascuis, ad viarum margines ubique.

Culni plures, 2-3-pedales, teretes, striati, glabri, erecti vel basi modo procumbentes. *Folia* plana, latiuscula, acuminata, superne et marginibus magis minusve scabra. *Vaginae* teretes, striatae, glabrae. *Ligula* oblonga, obtusa, demum fissa. *Spica* terminalis, solitaria, cylindrica, 2-4-uncialis, apice obtusa, viridis, demum canescens. *Flosculi* numerosissimi, conferti, brevissime pedicellati.

2) *Phl. nodosum* spica subcylindrica brevi basi sterili, culmo adscendente, radice bulbosa. *Knotiges Lieschgr.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 355. *Pers.* syn. pl. I. p. 79. *Hoffm.* Germ. I. p. 33. *Roth.* Germ. I. p. 29. II. p. 76. *Koel.* Gram. p. 50. *Leers* Herb. p. 17. t. 3. f. 2.)

Phl. pratens. β *Schrad.* Germ. I. p. 183. *Willd.* Enum. l. c.

Perenn. Flor. Majo—Augusto.

Hab. in pratis aridis, in vineis, ad agro-rum versuras et colles ubique.

Radix bulbosa, fusca, basi fibrosa. *Culmi* palmares, pedales, adscendentes, rarius erecti. *Folia* linearia, plana, angusta, utrinque scabriuscula. *Vaginae* sub-compressae, scabriusculae: *suprema* subventricosa. *Ligula* truncata, exserta, fissa. *Spica* cylindrica, aspera, 1-2 uncialis. *Flosculi* brevissime pedicellati, dense conferti: *infimi* emarcidi steriles.

3) *Phl. asperum* panicula cylindracea spiciformi, glumis calycinis cuneiformibus mucronatis scabris. *Rauhes Lieschgr.*

(*Pers.* syn. pl. I. p. 79. *Schrad.* Germ. I. p. 185. *Hoffm.* Germ. I. p. 32. *Koel.* Gram. p. 54. *Willd.* Enum. l. c.)

Phl. paniculatum *Smith.* Britan. V. I. p. 70.

Phl. ventricosum *Moench.* Method. p. 177.

Phl. viride *Allion.* Pedem. n. 2133.

Phalaris aspera *L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 328. *Host.* Gram. II. p. 28. t. 37.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in agris et collibus siccis. (In agris hinc inde prope *Rimpar*, *Oberdürrbach*, *Arnstein*, *Hirschfeld*, *Wülfershausen* et *Biebergau*. Pluries etiam inveni in via inter agros a pago *Mühlhausen* versus *Versbach*. Occurrit quoque in agro carolopolitano securi-

cundum specimina a cl. d. Doct. Geist mihi communicata.)

Radix fibrosa: fibris capillaribus dense confertis. Culmi plurimi in caespitem congesti, digitales, rarius altiores, erecti, teretes, glaberrimi, simplices, inferne saepius ramosi, basi attenuati, ultra medium foliati, 3-4-nodes. Folia brevia, plana, acuta, erecta, subtus scabra. Vaginae teretes, striatae, scabriuscule: suprema laxa subinflata. Ligulae exsertae, obtusae. Panicula spicata, erecta, cylindracea, densa, subcompressa, rigida, scabra, superne attenuata, virescens. Ramuli cum rachi angulati, scabri. Glumae calycinae corolla duplo fere longiores, subaequales, cuneiformes, trinerves, scabriuscule, superne ventricosae, obtusae, bifidae, mucrone parvo albido terminatae.

4) *Phl. Boehmeri* panicula spiciformi cylindracea glabra, glumis calycinis lanceolatis obtusis submucronatis scabriusculis. *Boehmers Lieschgras.*

(*Schrad. Germ.* I. p. 186. *Wibel Werth.* p. 125. *Willd Enum.* p. 85.)

Phl. Phalaris Pers. syn. pl. I. p. 79.

Phl. phalaroides Koel. Gram. p. 52.

Phl. glabrum Bernhard. Erford. p. 38.

Phalaris phleoides. L. sp. pl. ed. *Willd. I. p. 328. Hoffm. Germ. I. p. 29. Sprengel Hal. p. 28. Host. Gram. II. p. 26. t. 34. Roth. Germ. I. p. 26. II. p. 67. Perenn. Flor. Maj. Junio.*

Hab. in locis siccis, in saxosis, ad muros, et ad vias. In sterilibus saxosis in monte Nicolai inque montibus prope Hochberg, Zell, Dürrbech et Veitshöchheim passim. In sicciissimis circa Mühlhäusern, Rimpach, Lengseld, Dippach, Wipseld et Hesslar. Ad mar-

margines agrorum prope *Theilheim*, *Westheim*, *Zeutzleben*, *Hassfurth* et *Frankenwinheim*. In collibus aridis prope pagos *Arnshaussen*, *Poppenhausen*, *Nüdingen* et alibi.)

E radice fibrosa *culni* plures, palmares, pedales et altiores, teretes, glaberrimi, basin versus saepe rubelli, erecti, ad radicem declinati. *Folia* linearia, plana, acuta, ad oras et apicem versus scabra, coeterum glabra. *Vaginae* teretes, striatae, scabriusculae: *superior* subventricosa. *Ligula* brevis, truncata. *Panicula* spiciformis, cylindracea, utrinque attenuata, gracilis, glabriuscula, ex albido viridis, vel ex purpurascente et viridi varia. *Pedunculi* subelongati, rachi appressi.

33. MILIUM, *Hirsegras*, *Fladergras*.

I) *M. effusum* floribus paniculatis diffusis multicis. *Ausgebreitetes Hirsegr.* *Waldhirse*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 360. *Ejusd.* Enum. p. 94. *Pers.* syn. pl. I. p. 74. *Schrad.* Germ. I. p. 197. *Hoffm.* Germ. I. p. 33. *Koel.* Gram. p. 66. *Schkuhr* bot. Handb. I. p. 34. t. II. *Host.* Gram. III. p. 16. t. 23. *Leers* Herb. p. 18. t. VIII. f. 7.)

Miliarium effusum *Moench* Meth. p. 204.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis umbrosis sere ubique.

Radix repens. *Culmi* plures, 2-3-pedales, erecti, graciles, striati, glaberrimi. *Folia* lanceolata, acutissima, plana, utrinque scabriuscula, obscure viridia, apicibus plerumque nutantia. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* exserta, obtusa, lacera. *Panicula* praelonga, laxa, ramosa, mutiflora, diffusa, primo erecta, dein apice nutans. *Pedunculi* capillares, flexuosi, subramosi, horizontales, demum reflexi, ad basin

basin nodosi et squamulis minutis bracteati. *Flosculi* ovati, ventricosi, acuminati, glabri toti, virides vel ex viridi et purpurascente varii.

Gramen siccatum odorem *Meliloti* mentiens.

34. TRICHODIUM, *Straußgras.*

I) *T. caninum* calycibus ovatis acutis coloratis, arista dorsali infra medium proveniente, culmo procumbente ramoso. *Gemeines Straußgr.*

(*Schrad.* Germ. I. p. 198. *Willd.* Enum. p. 97.)

Agrostis canina L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 367. *Pers.* syn. pl. I. p. 75. *Hoffm.* Germ. I. p. 34. *Leers.* Herb. p. 19. t. IV. f. 2.

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pratis, pascuis, pomariis, ad margines sylvarum, inque uliginosis. (In fossis oppidanis hinc inde non infrequens. In udis prope Catarrhactam extra urbem. Ad ripas Moeni prope Sulzfeld, Ochsenfurth, Eivelstadt, Retzbach, Karlstadt, Kitzingen et alibi. Ad rivum inter Versbach et Rimpar, in sylva gramshatzensi, ad margines nemorum Eitel et Steinbusch prope Wülfershausen. In uliginosis et pratis udis circa Abbat. Heidenfeld passim.)

Radix plus minusve repens, fibrosa, nonnunquam stolones reptantes proferens. *Culmi* plures, pedales, sesquipedales et altiores, striati, graciles, procumbentes, adscendentes, basi saepe ramosi. *Lolia* utrinque scabra, siccata convoluta: *radicalia* angustissima, setacea, *culmea* latiora. *Vaginae* glabrae. *Ligulae* oblongae, obtusae, laciniatae. *Panicula* erecta, primo contracta, florens patens, semiverticillata, violaceofusca

fusca aut magis purpurascens vel coerulescens, demum pallescens. *Aristae breves*, geniculatae.

35. AGROSTIS, Windhalm.

Corolla aristata.

1) *A. Spica venti* panicula diffusa, petalo exteriore infra apicem arista longissima subflexuosa instructo. *Wahrer Windh.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 361. *Ejusd.* *Enum.* p. 94. *Pers.* syn. pl. I. p. 74. *Schrad.* *Germ* I. p. 203. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 33. *Koel.* *Gram.* p. 80. *Host.* *Gram.* III. p. 32. t. 47. *Leers.* *Herb.* p. 18. t. IV. f. I.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes et ad vias ubique.

Culmi plures, 1 - 2 - 3 - pedales, erecti, *striati*, *glaberrimi*. *Folia* plana, linearia, acuminata, supra pubescentia, subtus scabriuscula. *Vaginae* *striatae*, *glabra*. *Ligulae* elongatae, obtusae, lacinulatae. *Panicula* amplissima, erecta, subsecunda, primo contracta, florens patens, demum leviter cernua, nitida, viridis vel ex viridi purpurascens. *Pedunculi* semiverticillati, inaequales, ramosissimi, angulati, scabri, multiflori. *Arista* flore duplo longior, subflexuosa. *Fasciculus pilorum* utrinque ad latus glumae corollinae majoris.

Corolla mutica.

2) *A. vulgaris* paniculae ramis laeviusculis: ramulis divergentibus, ligula brevissima truncata. *Gemeiner Windh.*

(*Pers.* syn. pl. I. p. 75. *Schrad.* *Germ.* I. p. 206. t. 2. f. 4. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 36. *Spreng.* *Hal.* p. 30. *Smith.* *Britan.* V. I. p. 79. *Willd.* *Enum.* p. 96.)

A. divaricata Koel. Gram. p. 97. Hoffm. Germ. I. p. 37.

A. tenella Hoffm. Germ. I. p. 36.

A. capillaris. Roth. Germ. I. p. 32. II. p. 85. Schkuhr. bot. Handb. p. 37. t. 12.

A. stolonifera Leers Herb. p. 20. t. IV. f. 6. Spreng. Hal. p. 30.

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in pratis et pascuis, in montosis et collibus ubique.

Culmi plures, pedales, sesquipedales, adscendenttes vel magis erecti, nonnunquam repentes, gracieles, striati, glabri. *Folia* linearia, angusta, plana, acuta, scabra. *Vaginae* glabrae. *Ligula* nunquam exserta, truncata. *Panicula* erecta, multiflora, purpurascens vel ex viridi et purpurascente varia, ante et post anthesin contracta, sub anthesi patens et divaricata. *Rami* dichotomi et trichotomi: *ramuli* divergentes flexuosi.

Gramen hoc pro diverso solo natali, humido vel sicciori et arido maxime variat. *Radix* saepe simplicissima fibrosa aut magis minusve repens, non raro etiam stolonifera. *Culmi* in siccis montosis multo humiliores: *panicula* graciliori, in depressis humidiusculis altiores, mox decumbentes, oblique adscendentes, mox toti erecti, aut basi tantum terrae adpressi e geniculis infimis *radices* et *ramos* agentes.

3) *A. alba* paniculae ramis hispidis, ramulis patentibus, ligula oblonga. *Weisser Windhalm*. *Sumpf-Windhalm*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 371. Ejusd. Enum. p. 96. Pers. syn. pl. p. 76. Schrad. Germ. p. 209. t. II. f. 1. Hoffm.

Hoffm. Germ. p. 36. *Leers* Herb. p. 21. t. IV. f. 5. *Koel.* Gram. p. 95.)

Perenn. *Flor.* Jun. *Julio.*

*Hab. in paludosis, in pratis succulentis,
in nemorosis, ad fossas et ripas.*

*Radix fibrosa, albicans. Culmi 1 - 2 - 3 - pedales,
teretes, striati, rigidi, erecti, inferne saepe repen-
tes aut procumbentes, non raro etiam ramosi. Fo-
lia quam in praecedente latiora, firmiora, utrinque
magis minusve scabra, pallide viridia. Vaginae glab-
rae. Ligula exserta, oblonga. Panicula palmaris,
ramosissima, sub anthesi patens, albida vel ex viri-
di - purpurascens, demum canescens. Pedunculi den-
se verticillati, numerosi, inaequales, capillares, di-
visi, setuloso - hispidae.*

Coeterum pro solo diverso variat culnis altiori-
bus, totis erectis, et nonnunquam etiam tota ex par-
te procumbentibus ac repentibus. Interdum etiam
gluma corollae exterior aristam infra apicem producit
brevissimam.

36. ARUNDO, *Rohr, Schilf.*

Calyces uniflori.

1) *A. epigejos* panicula stricta patente, arista
dorsali recta pilis breviore, pilis calycem subaequan-
tibus. *Land-Rohr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 456. *Ejusd.* Enum. p.
126. Pers. syn. pl. I. p. 102. *Schrad.* Germ. I. p.
211. t. 4. f. 1. *Hoffm.* Germ. I. p. 60. *Smith.* Brit.
V. I. p. 145. *Scopol.* Carniol. I. p. 87. *Spreng.* Hal.
p. 43.)

Ca-

Calamagrostis epigejos Roth. Germ. I. p. 34. II. p. 91. Moench. Meth. p. 179. Koel. Gram. p. 110. Wib. Werth. p. 122.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in locis aridis sterilibus, et humidis, in sylvaticis. (Hinc inde in sylvis Guttenberg et Kitzingen, in collibus aridis prop. der Waldskugel, et sylvam gramschatzensem. Ad sylvam Edelmannsholz prope Veitshoechheim, ad magines sylvae Huck prope Wipfeld, et in sylva prope Wülfershausen vulgo die Breit. In locis sterilibus prope Fahr, Wipfeld, Volkach, Karlstadt, Stetten et alibi.)

Radix repens, albida, fibris multis aucta. Culmi erecti, stricti, teretes, superne praecipue scabri, 2 - 3 - pedales, in humidis saepe 4 - 6 - pedales. Folia lata, plana, acuminata, rigidula, utrinque scabra, laete viridia, saepe pedalia. Vaginae striatae, scabriuscule. Ligula exserta, acuta, fissa. Panicula ramosissima, stricta, rigida, utrinque attenuata, medio ventricosa, obscure purpurascens vel ex viridi - fusco rubella. Spiculae imbricato - congestae, plerumque secundae, lineares, longius mucronatae.

2) *A. pseudophragmites* panicula diffusa laxa, calycibus acuminatis, arista dorsali recta pilisque corolla paulo longioribus. *Unaechtes Rohr.*

(Schrad. Germ. I. p. 213. t. 4. f. 3. Hoffm. Germ. I. p. 61.)

A. glauca Marsch. a Biberst. Fl. taur. caucas. I. p. 79.

Calamagrostis pseudophragmitis Koel. Gram. p. 106.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab.

Hab. in graminosis humidis, in nemorosis, ad ripas. (In fossa oppidana prope dem Kartheuserkloster et dem Wasserthurm. Ad rivulum versus Rimpf. Ad Moeni ripas prope Volkach, Ochsenfurth, Unterzell, Zellingen, Karlstadt, Gemünden et alibi. Auf dem Bandwoerth versus Erlenbrunn. Im oberen Gesprait prope Prosselsheim et Büsensheim. Am Wildwasser, et in den Lacken prope Abb. Heidensfeld. Am Wehr prope dem Bauernsee ibidem. In pratis uidis versus den erlacher Seen. In nemorosis der Waldskugel, sylvae gramschatzensis, vitihoechheimensis, guttenbergensis, alibique.)

Radix valde repens. Culmi 1 - 2 - pedales et altiores, erecti, glabri, sub panicula scabriusculi, simplices, in humidis quandoque subramosi. Folia linearia, acuminata, rigidiuscula, undique seabra, nunc una alterave pagina glabra. Vaginae striatae glabrae. Ligula exserta, obtusa, demum lacinulata. Panicula erectiuscula, ramosissima, multiflora, laxa, diffusa, 3 - 6 - uncialis. Spiculae oblongae, subulatae, 1 - florae, nitidae, e fuscescente et purpureo variae.

3) A. *Calamagrostis* panicula diffusa, calycibus acuminatis, arista terminali brevi, pilis corolla longioribus. *Wiesen-Rohr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 456. Pers. syn. pl. p. 102. Schrad. Germ. p. 214. t. 4. f. 4. Hoffm. Germ. p. 61. Smith. Britan. V. I. p. 146.)

Calamagrostis lanceolata Roth. Germ. I. p. 34. II. p. 90. Koel. Gram. p. 103.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis uliginosis, ad ripas. (In fossa oppidana prope dem pleichacher Thore versus Heller Flava. I. 6 Moe-

Moenum, ibidem prope dem *Wasserthurm*. Ad *Moeni* ripas prope *Wipfeld*, *Volkach*, *Fahr*, *Nordheim* et *Hassfurth*. Ad ripas des Wildwassers et ad *Moenum* prope *Abb. Heydenfeld*, ad fossas ibidem. In humidis *sylvae stettensis*, et ad fossas prope *Karlstadt* pluries invenit am. Dr. Geist.)

Radix repens. Culni sesqui - 2 - 3 - pedales, erecti, tenues, teretes, striati, glabri, plerumque ramosi. *Folia* angusta, linearia, acuminata, utrinque glabra, marginibus retrorsum scaberrima, pagina superiori nonnunquam pubescentia. *Vaginae* glabrae. *Ligula* exserta, obtusa. *Panicula* lanceolata, medio ventricosa, laxa, 4 - 6 - uncialis, nitida, e canescente *viridiuscula* vel e purpurascente fuscoque varia, primo erecta, demum apice cernua, contracta ante et post anthesin.

4) *A. varia* panicula patente, calycibus acutis, pilis corollam aequantibus, arista dorsali geniculata calycem vix excedente. Veränderliches Rohr.

(Schrad. Germ. I. p. 216. t. 4. f. 6.)

Calamagrostis arundinacea *Wib.* Werth. p. 122.

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in sylvaticis humidis. (In saltu kitzingensi, in sylva *Ansbach* inter campos marbaccenses prope *Abb. Heydenfeld*, et in sylva stettensi prope *Werram* raro. In sylvis prope *Uettingen* alibique rarius.)

Radix repens. Culni pedales, sesquipedales et altiores, erecti, simplices, teretes, laeves, rigiduli, glabri, superne scabriusculi. *Folia* lata, acuminata, supra pubescentia, subtus et marginibus scabra. *Vaginae*

ginae striatae, glabrae. Ligula exserta, obtusa, crenulata, demum fissa. Panicula erecta, patens, 2-3-uncialis, nitida, e fusco purpureoque varia.

5) *A. sylvatica* panicula patente, calycibus acutis, pilis brevissimis, arista dorsali geniculata calycem excedente. *Waldrohr.*

(*Schrad. Germ.* I. p. 218. t. 4. f. 7. *Willd. Enum.* p. 128.)

Agrostis arundinacea L. sp. pl. ed. *Willd. I.* p. 364. *Pers. syn. pl. I.* p. 74.

Calamagrostis arundinacea Koel. *Gram.* p. 108. *Roth. Germ.* I. p. 33. II. p. 89.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sylvaticis, nemorosis. (In sylvis Guttenberg et Gramschatz. Im Kaeferhoelzchen und auf der Rossteige prope Rottendorf. In sylvis prope Röttigen, Kitzingen, Uettingen et alibi.)

Radix repens. Culmi 2-3-4-pedales, erecti, simplicissimi, rigiduli, teretes, striati, laete virides, glabri, versus paniculam scabriusculi. Folia lanceolato-linearia, mucronata, marginibus scabra, ad vaginas pilosa, primo carinata, dein magis plana, dorso laete viridia nitida, facie glaucescentia. Vaginae scabriusculae, insimae non raro pubescentes. Ligula exserta, obtusa, demum laciniata. Panicula erecta, palmaris, ramosissima, patens, ex viridi flavescentia, contracta ante et post anthesin.

Calyces multiflori.

6) *A. Phragmites* calycibus sub-5-floris, flosculis calycem excedentibus, panicula laxa. *Gemeines Rohr, Rohrschilf.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 454. *Ejusd.* Enum. p. 126. *Pers.* syn. pl. I. p. 102. *Schrad.* Germ. I. p. 223. t. 5. f. 4. *Hoffm.* Germ. I. p. 60. *Koel.* Gram. p. 276. *Schkuhr* bot. Handb. p. 53. t. 18. *Leers* Herb. p. 44. t. 7. f. 1)

Perenn. *Flor.* *Julio - Septembri.*

Hab. *ad ripas, in fossis et lacubus ubique frequens.*

Radix longa, articulata, valde repens, fibris multis validis aucta. Culmi 4-15-pedales, erecti, simplicissimi, stricti, firmi, teretes, striati, glaberrimi. Folia lanceolata, in acumen longum terminata, patentia, rigida, plana, siccata involuta, marginibus scaberrima, glaucescentia. Vaginæ longae, cylindricæ, striatae, glabrae. Ligulae loco series pilorum brevium. Panicula pedalis et longior, laxa, diffusa, ramosissima, fusco-purpurea vel e fusco-purpureo et viridi varia, primo erecta, demum plerumque cernua.

37. STIPA, Pfriemengras, Federgras.

I) *St. capillata* aristis nudis. *Haarsoermiges Pfriemengras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 441. *Ejusd.* Enum. p. 98. *Pers.* syn. pl. I. p. 99. *Schrad.* Germ. I. p. 231. *Hoffm.* Germ. I. p. 57. *Koel.* Gram. p. 75. *Host.* Gram. 3. p. 4. t. 5.)

Perenn. *Flor.* *Junio - Augusto.*

Hab. *in montosis, collibus apricis, et arenosis siccis.* (In collibus apricis prope *Arnstein*, in arenosis siccis prope *Remlingen* et hinc inde pre-

prope *Himmelspfosten*. Ad muros vinearum des *Steinberges* et prope *Thiingen* versus dem blauen Thurm.)

Culmi 1 - 2 - 3 - pedales, erecti, duri, glabri. *Folia* angustissima, linearia, acuminata, convoluta, dura, glauco - viridia, superne intus pubescentia, deorsum scabra. *Vaginae* glabrae. *Ligula* lanceolata, obtusa, integra. *Panicula* speciosa, contracta. *Spiculae* linear - lanceolatae, subcompressae, nitidae. *Pendunculi* magis minusve ramosi vel simpliciusculi, quini aut seni. *Calycis valvulae* inaequales: *major* linearis acuta carinata *arista* terminata. *Corollae valvula exterior* basi villosa, apice *aristam* capillarem retrorsum scabriusculam praelongam spiraliter flexam et curvatam exserens.

2) *St. pennata* aristis plumosis. *Federiges Psriegengras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 440. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 229. *Hoffm.* Germ. l. c. *Koel.* Gram. p. 72. *Schkuhr*, bot. Handb. I. p. 49. t. 16.)

Perenn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in montosis, in collibus, in arenosis siccis, et ad muros. (Hinc inde in apricis, ad muros, ad vias der Steinberge prope *Wirzburg* et *Karlstadt*. Ad rupes circa arcem *Marienberg* passim. In vicinia des *Schenkenschlosses* raro. In montosis pone *Randesacker*. In monte *Schwamberg* prope *Kitzingen*. Inter ruinas arcium *Karlbburg* et *Reichelshheim* prope *Aub*. In collibus aridis procul a via versus *Arnshaussen*. Etiam circa *Werneck* pluries observavit am *Wolff*.)

Culmi pedales, sesquipedales et altiores, erecti, teretes, rigidi, striati, glabri. *Folia* glauca, rigida, fere

fere setacea, convoluta, mucronata, supra glabra; subtus et marginibus scabra. *Vaginae* praelongae striatae, glabrae vel parum scabrae. *Ligula brevissima*, truncata, fissa. *Panicula* pedalis et sesquipedalis, plus minusve contracta, superne patens, ante anthesin vagina suprema inclusa. *Spiculae* lanceolatae, acutae, glabrae, laeves, nitidae, 1-florae, ex viridi flavicantes. *Pedunculi* bini, raro solitarii, erecti, plerumque simplices. *Calycis valvulae* subaequales, carinatae, patentes, in aristam albam tenuissimam terminatae. *Corollae valvula* exterior inferne villosa, apice arista capillacea pedali et longiori plumulis sericeis albis elegantissime ornata, prima recta, demum arcuatim curvata,

38. ANDROPOGON, Bartgras.

I) *A. Ischaemum* spicis pluribus digitatis, Fingersförmiges Bartgras.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* IV. P. II. p. 921. *Eiusdem* Enum. p. 1028. *Pers. syn.* pl. I. p. 104. *Schrad.* Germ. I. p. 233. *Hoffm.* Germ. I. p. 32. *Koel.* Gram. p. 119. *Host.* Gram. II. p. 3. t. 3. *Schreb.* Gram. II. p. 66. t. 33. *Jacq.* Austr. t. 3d4.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in collibus et arenosis siccis. (In arenosis saxosis prope der *Vogelsburg* et circa *Capellam* in vicinia oppidi *Volkach*. Hinc inde in arenosis prope *Roedelsee*. Ad arcem *Reichelsberg* prope *Aub*, et ad ruinas arcis *Bodenlauben* prope *Kissingen*. In monte *St. Viti* prope *Neustadt* raro. In siccissimis saxosis des *kalbensteiner Berges* prope *Karlburg* inventa cl. *Dr. Geist.*)

Radix fibrosa, repens. Culmi p dales, erecti, glaberrimi, rigidi, basi incurvi atque saepe ramosi, inferne plerumque semiteretes, superne teretes, nodis 6 - 9 purpurascentibus donati. Folia linearia, acuminata, rigidula, erecta, apice reflexa, utrinque pubescentia, pallide viridia, striis aut maculis purpurascentibus passim notata. Vaginae compressae, glabrae. Ligula brevissima, villosa, alba. Spicae 4 - 6 aut plures, terminales, digitatae, plumosae, lineares, circiter 2 - unciales, purpurascentes vel ex viridi purpureae, sub anthesi patentes, rachi appressae ante et post anthesin.

39. PANICUM, Fench.

I) *P. verticillatum* panicula spiciformi cylindracea, involucellis deorsum hispidis, culmis diffusis. Quirlblüthiger Fench, Klebgras.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 334. Ejusdem. Enum. p. 1030. Pers. syn. pl. I. p. 80. Schrad. Germ. I. p. 239. Hoffm. Germ. I. p. 30. Koel. Gram. p. 8. Host. Gram. II. p. 11. t. 13.)

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in arvis, vineis, hortis, ad muros et vias ubique.

Culmus plerumque unicus, digitalis, pedalis et altior, erectiusculus, tenuis, subtrigonus, superne teretiusculus, glaber, apicem versus scaber, nodis 4-6 purpurascentibus, basi ramosus. *Folia* striata, supra pilis sparsis obsessa, utrinque scabra, laete viridia, plana aut basi transversaliter undulata. *Vaginae* striae, glabrae: superiores teretes, infimae compressae et saepe purpurascentes. *Ligulae* loco series pilorum.

Pa-

Panicula spiciformis, cylindracea, setosa, viridis, demum ex viridi purpurascens, matura vestibus tenacissime adhaerens.

2) *P. viride* panicula spiciformi cylindracea, involucellis multisetis sursum hispidis. *Grüner Fench.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 335. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 81. *Schrad.* Germ. p. 240. *Hoffm.* Germ. l. c. *Host.* Gram. p. 12. t. 14. *Koel.* Gram. p. 10. *Leers* Herb. p. 13. t. 2. f. 2.)

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in agris, oleretis, inter segetes et ad vias ubique.

Culmi palmares, sesquipedales, inferne plerumque decumbentes, tenues, debiles, teretiusculi, basi saepissime ramosi. *Folia* praecedentis, plerumque autem latiora et longiora. *Vaginae* compressae. *Ligulae pili* breviores et magis aggregati. *Panicula* spiciformis, densa, aequali crassitie, inferne saepe interrupta, laete viridis, setosa, crassior et apice obtusior, quam in praecedente.

3) *P. glaucum* panicula spiciformi cylindracea, involucellis sursum hispidis, seminibus dorso transverse undulato-rugosis. *Grauer Fench.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 241. *Hoffm.* Germ. l. c. *Host.* Gram. II. p. 13. t. 16. *Schreb.* Gram. II. p. 21. t. 25. *Leers* Herb. p. 12. t. 2. f. 2. *Koel.* Gram. p. 13.)

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in cultis et ad vias ubique.

Culmus semipedalis, pedalis aut sesquipedalis, erectus, teres, striatus, glaber, infra paniculam deorsum

orsum scaber et sulcatus, inferne saepe ramosus. *Folia* glaucescentia, plana, striata, versus vaginam pilis longis candidis barbata. *Vaginae* compressae, striatae. *Ligulae* loco series pilorum brevissimorum. *Panicula* spiciformis, densa, teres, contigua, crassitie aequali, apice obtusa, primo plerumque viridis, demum ex rutilo - lutescens. *Semen maturum* superne striis transversis undulatis rugosum.

4) *P. crus galli* panicula secunda erecta, spiculis approximatis aristatis, foliis linearis - lanceolatis nudis. *Hahnensporn - Fench, Hühnerfench.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 337. Ejusd. Enum. p. 1032. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 243. t. 3. f. 8. Hoffm. Germ. l. c. Host. Gram. II. p. 15. t. 19. Leers Herb. p. 13. t. 2. f. 3. Koel. Gram. p. 17.)

Milium crus galli Moench. Meth. p. 202.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in agris, in oleraceis, ad vias, etiam in uliginosis fere ubique.

Culmi pedales, sesquipedales, erectiusculi s. obliqui, plerumque ramosi, striati, glabri, inferne compressi, superne teretiusculi. *Folia* plana, lata, striata, laete viridia, basi saepe undulata. *Vaginae* glabrae, compressae, laxae. *Ligula* nulla. *Panicula* erecta, secunda, florens patens, ante et post anthesin contracta. *Spiculae* brevissime pedicellatae, unilateraliter affixae, solitariae aut geminae, 2 - flörae, acutae, submuticae, virides aut purpurascentes. *Pedunculi* et *pedicelli* basi pilis brevibus albis involucrati.

5) *P. miliaceum* panicula laxa flaccida, spiculis muticis, foliis lanceolatis pilosis. *Hirsen - Fench, Hirse.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 348. *Ejusd.* Enum. p. 1033.
Schrad. Germ. p. 245. *Host.* Gram. II. p. 16. 1. 20.
Koel. Gram. p. 21.)

P. milium Pers. syn. pl. I. p. 83.

Milium esculentum Moench. Meth. p. 203.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in India orientali. (Colitur in agris et seminibus dissipatis in cultis, inque marginibus agrorum hinc inde quasi sponte provenit.)

Culmi 1 - 2 - pedales, erecti, ad paniculam usque vaginis vestiti, simplices aut ramosi, nodis 4 - 6 pilosis instructi. Folia lata, lanceolata, nervosa, plana, basi carinata, glabra, aut pilis hinc inde inspersa. Vaginae striato - sulcatae, subcompressae, laxae, scabrae, pilosae: pilis sursum erectis. Ligulae loco series pilorum. Panicula maxima, ramosissima, laxa, flaccida, superne nutans.

Variat seminibus nigris, luteis et albis.

40. HOLCUS, *Rossgras, Honiggras.*

I) *H. avenaceus* panicula aequali patente, spiculis glabris, flosculo masculo infero aristato: arista geniculata longissima, supero hermaphrodito: arista recta brevi. *Haserartiges Rossgras, französisches Rajgras.*

(*Schrad.* Germ. I. p. 247. *Roth* Germ. I. p. 429. II. p. 544. *Scopol.* Carn. II. p. 276. *Smith.* Britan. Vol. I. p. 90. *Spreng.* Hal. p. 34. *Moench.* Method. p. 184. *Willd.* Enum. p. 1034.)

Avena elatior L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 443. *Pers.* syn. pl. I. p. 100. *Hoffm.* Germ. I. p. 57. *Host.* Gram.

Gram. II. p. 36. t. 49. Schreb. Gram. I. p. 25. t. 1.
Leers Herb. p. 40. t. 10. f. 4. Koel. Gram. p. 305.

Perenn. Flor. Majo. - Julio.

Hab. in pratis et pomariis ubique.

Culmi plures inaequalis longitudinis, 2 - 3 et 4 - pedales, erecti, teretes, striati, glabri, simplicissimi; *geniculis* infimis magis incrassatis. *Folia* latiuscula, linearia, acuminata, plana, scabra, laete viridia, *superiora* sensim breviora. *Vaginae* teretes, striatae, glabrae: *inferiores* saepe subvillosae. *Ligula* brevis, obtusa, ciliata. *Panicula* palmaris et pedalis, erecta, laxe coarctata, splendens, ex viridi flavescentia s. albicans, in spicam contracta ante et post anthesin.

2) *H. mollis* panicula aequali coarctata, spiculis glabris, flosculo infero hermaphrodito mutico, supero masculo aristato, arista geniculata calycem excidente. *Weiches Roßgras.*

(L. sp. pl. ed. Willd. IV. p. 933. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. I. p. 78. Schrad. Germ. I. p. 249. Host. Gram. I. p. 3. t. 3. Schreb. Gram. I. p. 149. t. 20. f. 2. Leers Herb. p. 220. t. 7. f. 7.)

Avena mollis Koel. Gram. p. 300. Hoffm. Germ. p. 57.

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in pratis siccis, ad vias, ad margines agrorum, inter segetes, inque sylvaticis. (In agris, et ad vias versus Veitshöchheim, Rimpar, Eivelstadt, et alibi non infrequens.)

Gramen totum ex viridi glaucum. *Culmi* 1 - 2 - pedales, erecti, glabri: *geniculis* 3 - 4 villosis. *Folia* subvillosa, plana. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevis, cilia-

ciliata. *Panicula erecta*, aequalis, florens patens, contracta ante et post anthesin. *Spiculae albido - virides*, demum rufescentes.

3) *H. lanatus* panicula aequali subdiffusa, spiculis villosis, flosculo infimo hermaphrodito mutico, supero masculo aristato, arista recurva calyce inclusa. *Wolliges Rosgras.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 251. Host. Gram. I. p. 2. t. 2. Schreb. Gram. p. 145. t. 20. f. 1. Leers Herb. p. 221. t. 7. f. 6.

Avena lanata Koel. Gram. p. 303. Hoffm. Germ. p. 58.

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in pratis, pascuis, pomariis et insylvaticis ubique.

Gramen totum mollissime villosum. Culni plures, pedales, sesquipedales, erecti, aggregati. Vaginae laxae, suprema ventricosa. *Panicula erecta*, subdiffusa, ex albido et pallide roseo variegata, demum canescens, contracta ante et post anthesin.

41. AIRA, Schmiele, Schmellenengras.

Corollis muticis.

I) *A. cristata* panicula spicaeformi, glumis acuminatis, flosculis calycem excedentibus, foliis ciliatis. *Kammsförmige Schm.*

(Schrad. Germ. I. p. 255. Smith. Britan. Vol. I. p. 83. Scopol. Carn. I. p. 65. Sprengel. Hal. p. 31. Willd. Enum. p. 100.)

Poa cristata L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 402. Hoffm. Germ. I. p. 46. Host. Gram. II. p. 54. t. 75. Koel.

Gram-

Gram. p. 199. *Moench.* Meth. p. 189. *Roth* Germ. I. p. 43, II. p. 119. *Leers.* Herb. p. 30. t. 5. f. 6.

Koeleria cristata Pers. syn. pl. I. p. 97.

Dactylis cristata Marsch. a Bieberst. Fl. taur. caucas. p. 67.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in pratis, ad colles et agrorum margines ubique.

Culmi digitales, palmates et pedales, erecti, laeves, infra paniculam pubescentes. *Folia* brevia, plana, pubescentia, rigidula: *marginibus* scabris et ciliatis. *Vaginae* teretes, subvillosae: *superiores* scabrae. *Ligula* brevissima, subciliata. *Panicula* erecta, angusta, teres, pyramidalis, in spicam contracta, florens patentior. *Spiculae* nitentes, ex viridi - albidae. *Glumae* scariosae.

2) *A. aquatica* panicula patente, glumis obtusis, flosculis calyce brevioribus. *Wasser - Schmiele.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 376. *Pers.* syn. pl. I. p. 77. *Schrad.* Germ. I. p. 256. *Hoffm.* Germ. I. p. 38. *Host.* Gram. II. p. 30. t. 41)

Poa airoides Koel. Gram. p. 194.

Molinia aquatica Wibel Werth. p. 116.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in pratis udis, in uliginosis, ad fossas, ad ripas et rivulos ubique sere.

Culmi palmates et sesquipedales, teretiusculi, glaberrimi, laeves, molles, basi repentes, radicantes, plerumque ramosi, oblique adscendententes. *Folia* brevia, plana, glabra. *Vaginae* subcompressae, laxae, striatae, glabrae. *Ligula* oblonga, acuta. *Panicula* erecta,

erecta, laxa, ramosa, patens, contracta ante et post anthesin. Spiculae ovatae, obtusae, pellucidae, ex viridi et albo spadiceae.

Corollis aristatis.

3) *A. caespitosa* panicula diffusa, calyce flosculos aequante, arista longitudine glumarum. *Rasen-Schmiele.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 378. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 257. Hoffm. Germ. l. c. Host. Gram. II. p. 31. t. 42. Leers Herb. p. 23. t. 4. f. 8. Koel. Gram. p. 125.*)

A. altissima Moench. Meth. p. 182.

Perenn Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis, in nemorosis humidiusculis, ad fossas, lacus et ripas ubique.

Culmi 2 - 3 - pedales, erecti, stricti, striati, glabri, teretes, nodis 2 - 3 purpureis notati, inferne semiteretes. Folia linearia, acuminata, plana, siccata convoluta, supra sulcato-striata et scabra, subtus laevia: radicalia culmeis longiora et angustiora. Vaginae teretes, glabrae laeves. Ligulae ovatae, acutiusculae, integrae. Panicula semipedalis, erecta vel apice tantum nutans, ramosissima, ampla, florens patens, contracta ante et post anthesin. Spiculae parvae, lanceolatae, compressae, obtusae, splendentes, ex viridi-purpureo et argenteo variae.

4) *A. flexuosa* panicula erecto-patente, flosculis calycem aequantibus, arista geniculata calyx longiore, foliis setaceis. *Gewundene Schmiele.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. l c. Ejusd. Enum. p. 101. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 259. Hoffm. Germ.*

p. 39. *Host* Gram. II. p. 32. t. 43. *Schreb.* Gram. II. p. 57. t. 30. *Leers* Herb. p. 24. t. 5. f. 1. *Koel.* Gram. p. 129.)

Perenn. *Flor.* *Majo — Julio.*

Hab. *in montosis, in sylvaticis, in sabulosis et ericetis ubique.*

Culmi semipedales, pedales, erecti, tenues, debiles, teretes, striati, inferne plerumque incurvi, nodis 2 - 3 donati. *Folia* setacea, rigidula, scabra. *Vaginae* teretes, scabriusculae. *Ligulae* oblongae, crenulatae. *Panicula* digitalis, erecta, pauciflora, divaricata, ante et post anthesin contracta. *Pedicelli* flexuosi. *Spiculae* splendentes, argenteae, ex parte purpurascentes.

Aira montana plurimorum autorum specie ab hac non differt, sed est planta junior *Roth.* Germ. I. p. 36. II. p. 98. *Koel.* Gram. p. 131. *Leers* Herb. p. 24. t. 5. f. 2.

5) *A. caryophyllea* panicula divaricato-patente, flosculis calyce minoribus, aristis calyce longioribus geniculatis, foliis setaceis. *Nelkenartige Schmiele.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 380. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 261. *Hoffm.* Germ. l. c. *Host* Gram. II. p. 33. t. 44. *Koel.* Gram. p. 127.) *Ann. Flor.* *Aprili — Junio.*

Hab. *in montosis, in collibus apricis, in agris sabulosis, inque vineis.* (In monte Nicolai, in montibus prope Zell et Dürrbach passim. In agris infra Himmelsporten, Zell, Thüngersheim, Erlenbrunn etc. In agris prope Kürnach, Estenfeld, Geldersheim, Rimpf, Mühlhausen, auf dem Galgen und

und Krainberge. In vineis auf dem Stein, in der Harfe, im mittleren Sand et auf dem Schalksberge. In collibus prope Thüngen, Stetten, Büchold, Arnstein, alibique.)

Culmi 2 - unciales, digitales, palmares, erecti, teretiusculi, filiformes, striati, scabriusculi, *nodis* 2 purpureis instructi. *Folia* complicato-setacea, glauco-viridia vel rubella, *inferiora* caespitosa et culmeis breviora. *Vaginae* teretes, sulcatae, scabriusculae: *summa* subventricosa longior paniculam ante anthesin basi vestiens. *Ligulae* lanceolatae, demum laciniatae. *Panicula* uncialis, erecta, ramosissima, multiflora, splendens, e purpureo et viridi argentea, primo contracta, sub anthesi et post anthesin longe e vagina emersa, maximeque divaricata.

6) *A. praecox* panicula subspicata, flosculis calycem subaequantibus, arista recta geniculata calyce longiore, foliis setaceis. *Friühe Schmiele.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 380. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 262. Hoffm. Germ. l. c. Koel. Gram. p. 132.)

Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in locis sterilibus, sabulosis, in ericetis. (In Insula versus dem Siechhaufe. In arenosis et agris circa Himmelsporten, Zell, Eibelstadt, Kleinochsenfurth, Theilheim, Kürnach, Estensfeld, Gerbrunn, Rottendorf etc. In viis arenosis prope Dettelbach et der Wallfahrtskirche. In sabulosis versus Timbach, Sommerach, Escherndorf et alibi.)

Gramen minimum *culmis* vix digitalibus erectis filiformis debilibus caespitosis glaberrimis, *inferne* teretibus laeviusculis, *superne* subteretibus striatis. *Folia* convoluta, setacea, emarcida, glabra, ex glauco

viri-

viridia saepe rubella. *Vaginae* glabrae, sulcato-angulatae, *superior* subventricosa. *Ligula* ovata, fissa. *Panicula* parvula, coarctata, spiciformis, ex viridi albida, demum canescens.

7) *A. canescens* panicula subspicata, flosculis calyce minoribus, arista clavata calyce minori, foliis setaceis, vagina suprema ampla paniculam inferius fovente. *Graue Schmiele.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 379. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 263. Hoffm. Gerin. l. c. Schkuhr. bot. Handb. I. p. 39. t. 12. Koel. Gram. p. 134.)

Weingäertneria canescens Bernh. Erf. p. 51.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in arvis arenosis, in ericetis, montosis et collibus apricis. (In arvis, ad margines agrorum et ad vias prope dem rothen Kreutz, Oberdürrbach, Rimpar, Mühlhausen, Oberpleichfeld, Volkach et Fahr. In monte Schwammburg, et auf dem Hohwann prope Haßfurth. In collibus prope Stadt-Lauringen, Friedenhäusen et alibi non infrequens.)

Culni caespitosi, palmares et altiores, erecti, siliiformes, rigidi, laeves, 3 - nodes, canescentes. *Folia* caespitosa, setacea, glabra, mucronata, firma, rigida, glauca, interdum rubella. *Vaginae* glaucae, teretes, glabrae: *suprema* inflato-ventricosa. *Ligula* ovata, acutiuscula, incisa. *Panicula* uncialis et major, subspicata, lanceolata, ex glauco et albido rubella, ante anthesin in *vagina* suprema occulta, sub anthesi paululum emersa.

42. MELICA, *Perlgras.*

1) *M. ciliata* panicula erecta spicata aequali, flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Gefranztes Perlgr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 381. *Ejusd. Enum.* p. 101. *Pers. syn. pl.* I. p. 77. *Schrad. Germ.* I. p. 266. *Hoffm. Germ.* I. p. 40. *Host. Gram.* II. p. 10. t. 12. *Koel. Gram.* p. 137.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in montosis, in saxosis, ad muros.
(Ad muros oppidanos ubique, ad muros beim *Krahnen* juxta *moenum*. Ad muros vinearum der *Steinberge*, et ad viam versus *Veitshoechheim* alibique copiose.)

Culmi caespitosi, erecti, stricti, teretes, striati, glabri, infra paniculam scabriusculi, 2 - 4 nodis purpureis instructi, palmares, pedales et altiores. Folia pallide viridia, striata, pubescentia, rigidula, plana, siccata involuta. Vaginae subteretes: inferiores subvillosae scabriusculae, superiores glabrae. Ligulae oblongae, obtusae s. acutiusculae, demum bifidae. Panicula 2 - 3 - uncialis, erecta, cylindracea, in spicam semper contracta, splendens, sericeo-albida.

2) *M. nutans* panicula erecta subsimplici secunda, spiculis nutantibus, petalis imberbibus. *Ueberhängendes Perlgr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 382. *Ejusd. Enum.* p. 102. *Pers. syn. pl.* l. c. *Schrad. Germ.* p. 267. *Hoffm. Germ.* l. c. *Host. Gram.* II. p. 9. t. 10. *Schreb. Gram.* II. p. 62. t. 6. f. 2. *Leers. Herb.* p. 25. t. 3. f. 4. *Koel. Gram.* p. 141.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in umbrosis, nemorosis et ad sylvatum margines. (In sylvis prope Kist, Hochberg, Zell, Veitshöchheim, Gramschatz et alibique frequens.)

Culmi pedales, sesquipedales, erecti, graciles, striati, ex compresso tetragonali, laete virides. Folia plana, glabra, margine et carina scabriuscula, laete viridia: superiora inferioribus longiora. Vaginae subtetragonae, profunde striatae, scabrae. Ligulae loco margo cartilagineus fuscus. Panicula 3-4-uncialis, racemiformis, pauciflora, laxa, secunda, primo erecta, demum cernua. Spiculae mutantes, ovatae, obtusae, ventricosae, glabrae, e fusco purpu-rascentes, margine et apice albidae.

3) *M. uniflora* panicula suberecta ramosa se-cunda, spiculis erectis ovatis 2-floris: flosculo altero hermaphrodito, altero neutro, petalis imberbi-bus. *Einblühiges Perlgr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 383. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 78. Schrad. Germ. p. 269. Hoffm. Germ. l. c. Host. Gram. II. p. 9. t. 11. Köl. Gram. p. 139.*)

M. nutans Pollich Palatin. nro. 84.

M. Lobelii Villars Delph. 2. p. 90. t. 3. f. 3.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in nemorosis, montosis. (In iisdem fere cum praecedente locis et alibi.)

A priori, cui simillima, habitu semper tenuiori, *panicula* ramosa racemosa et *spiculis* erectis minori-bus differt. *Ligula* praeterea in hac acuminata pur-purea ex anteriori parte oris *vaginae* prodiens, in illa margo cartilagineus fuscus.

4) *M. coerulea* panicula coarctata aequali, spiculis erectis oblongo-cylindraceis, petalis imberibus. *Blaues Perlgras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd* 1 c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Schrad.* Germ. p. 269. *Hoffm.* Germ. l. c. *Host.* Gram. II. p. 7. t. 8. *Schkuhr.* bot. Handb. I. p. 40. t. 13.)

Aira coerulea *Pers.* syn. pl. I. p. 77. *Leers.* Herb. p. 22. t. 4. f. 7.

Molinia coerulea *Koel.* Gram. p. 145. *Schrantz.* Bav. n. 201. *Moench.* Meth. p. 183.

M. variabilis *Wib.* Werth. p. 115.

Perenn. *Flor.* Jul. *Augusto.*

Hab. in montosis sylvaticis, in paludosis, in pratis humidis, ad ripas et aquas stagnantes. (In fossa oppidana prope dem *Wasserthurm*, der *Karthaus*, et dem *Sanderthore*. Ad scaturiginem prope dem *Wasserfall* et ad ripas des *Studentenbaches* raro. In pratis et ad ripas Moeni supra *Heidingsfeld*, versus *Eivelstadt* et *Frickenhaußen*. In umbrosis humidiusculis sylvarum *Waldskugel*, *Gramschatz*, *Veits-höchheim*, *Waldbrunn*, *Guttenberg*, praecipue in *sylva Stettensi* ad *Werram*. In nemorosis prope *Abbat.* *Heidensfeld*, prope dem *Wehr*, in *sylva Anspach* et in den *Lacken* ibidem. In pratis apud *Grettstadt*, *Spießheim*, *Ebern*, alibique rarius.)

Culmi plures, sesquipedales, erecti, striati, glabri, duri, plerumque uninodes, infra nodum angustati, supra eum incrassati. *Folia* longa, firma, plana, apicem versus involuta, *culmea* radicalibus latiora. *Vaginae* subteretes, striatae, glabrae. *Ligula* villosa. *Panicula* erecta, elongata, coarctata, e viridi coerulea aut e violaceo coerulea.

43. SESLERIA, Seslerie.

1) *S. coerulea* spica ovato - oblonga bracteata;
bracteis subintegris coloratis. *Bläue Seslerie.*

(Pers. syn. pl. I. p. 72. Schrad. Germ. I. p. 273.
Scopol. Carn. I. p. 63. Host. Gram. II. p. 69. t. 98.
Smith. Britan. I. p. 94. Sprengel. Hal. p. 38. Willd.
Enum. p. 112.)

Cynosurus coeruleus L. sp. pl. ed. Willd. I.
p. 414. Hoffm. Germ. I. p. 48. Roth. Germ. I. p. 53.
II. p. 156. Koel. Gram. p. 374. Wibel Werth. p. 110.
Sturm. D. Fl. I. 6.

Perenn. Flor. Aprili - Junio.

Hab. in montosis, in collibus apricis et in
uliginosis. (In monte praecipiti versus septentrio-
nem inter Erlenbach et Marktheidenfeld copiose teste
am. Wolff. In montibus Kalmut, Kalbenstein, et Hoh-
wann. In collibus hinter den Steinweinbergen versus
Veitshöchheim. In monte versus Retzbach prope der
neuen Anlage. In humidis prope Abb. Heidenfeld
versus Garsbach. Ad ripas prope Hassfurth et Fahr.
In humidiusculis im Oelgrund prope Karsbach, Sach-
senheim, auf dem Sodenberge, et alibi rarius.)

Culmi caespitosi, palmares, pedales, adscendentes
et erecti, subnudi, enodes, compressiusculi. Folia
radicalia, caespitosa, planiuscula, carinata, obtusa,
glabra, firma. Vaginae brevissimae, glabrae, e cul-
mi basi orientes. Ligulae breves, obtusae, ciliatae.
Spica terminalis, erecta, uncialis, compacta, oblon-
go - ovata, ex tereti compressa, obtusa, imbricata,
nitida, coerulescens aut violacea, *bracteis* 3 sessili-
bus membranaceis integris mucronatis eleganter coe-
ruleo - violaceis marginibus albidis involucrata.

44. POA, *Rispengras.*

1) *P. aquatica* panicula aequali diffusa ramosissima, spiculis oblongis subcompressis. *Wasser-Rispengras.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 385. Ejusd. Enum. p. 103. Pers. syn. pl. I. p. 88. Schrad. Germ. I. p. 278. Hoffm. Germ. I. p. 41. Host. Gram. II. p. 44. t. 60. Leers Herb. p. 26. t. 5. f. 5. Koel. Gram. p. 173.*)

P. altissima Moench. Meth. p. 185.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. ad ripas, in pratis humidis, et locis paludosis ubique frequens.

Culmi 3 - 4 - pedales, erecti, firmi, laeves, glaberrimi, maxima ex parte foliati. *Folia* latissima, plana, laevia, margine scabra, laete viridia. *Vaginae* longae, compressiusculae, laeves, glabrae. *Ligulae* breves, ovatae, obtusae. *Panicula* speciosissima, palmaris et pedalis, patens, diffusa, ex viridi purpurascens aut albicans.

2) *P. fluitans* panicula subsecunda erecta divaricata, pedunculis sub anthesi horizontalibus, spiculis cylindricis 7 - 11 - floris, flosculis obtusis liberis 7 - nerviis *Schwimmendes Rispengras, Mannagras, Schwaden, Himmelsthau.*

(*Schrad. Germ. I. p. 280. Smith. Brit. V. I. p. 95. Koel. Gram. p. 204. Scopol. Carn. I. p. 73. Spreng. Hal. p. 35. Wibel. Werth. p. 111. Willd. Enum 1. c.*)

Festuca fluitans L. sp. pl. ed. *Willd. I. p. 426. Pers. syn. pl. I. p. 94. Hoffm. Germ. I. p. 52. Roth. Germ. I. p. 47. II. p. 132. Moench. Meth. p. 190. Host.*

Host. Gram. II. p. 55. t. 77. *Schreb.* Gram. I. p. 37. t. 3. *Leers* Herb. p. 35. t. 8 f. 5.

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab. *ad rivulos, ad ripas, et in fossis ubique copiose.*

Culmi 2 - 4 pedales, ramosi, suberecti, obliqui, inferne curvati, radicantes, ad paniculam fere tecti, in aquis natantes, ex tereti compressiusculi, laeves. *Folia* pallide viridia, lata, plana, retrorsum scabra: *radicalia* culmeis longiora. *Vaginae* compressae, laeves, glabrae. *Ligulae* oblongae, subacutae, exsertae. *Panicula* pedalis, sesquipedalis, erectiuscula, subsecunda, ramosa, laxa. *Spiculae* lineares, teretes, obtusae, adpressae, pallide virides.

3) *P. distans* panicula erecta divaricata: ramulis semiverticillatis demum reflexis, spiculis linearibus 5 - floris, flosculis obtusis obsolete 5 - nerviis. Entferntblüthiges Rispengr.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 401. *Ejusd.* Enum. p. 108. *Pers.* syn. pl. I. p. 83. *Schrad.* Germ. I. p. 282. *Host.* Gram. II. p. 46. t. 63. *Smith.* Britan. V. I. p. 96. *Marsch.* a *Biberst.* taur. caucas. p. 63. *Koel.* Gram. p. 177. *Spreng.* Hal. p. 35.)

P. retroflexa *Curt.* Lond. n. 61.

P. Salina *Hoffm.* Germ. I. p. 44. *Roth.* Germ. E. p. 43. II. p. 119. *Pollich.* Palatin. n. 92. *Leysser.* Hal. ed. 2. n. 93. *Moench.* Meth. p. 185.

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio*.

Hab. *ad vias, lacus, ripas, in pratis humidis et locis salsis.* (In fossula aquatica ad ambulacrum vor dem neuen Thore nächst der *Weinstein-fabrik*. Ad ripas Moeni prope *Gosmannsdorf*, *Zellingen*,

gen, et *Margetshöchheim* passim. Ad ripas Salae prope *Schunderfeld*, *Gemünden*, *Kissingen*, *Klosterhassen*, *Bocklet* alibique. Auf dem Schießplatze apud *Neustadt ad Saalam*.

Culmus palmaris, *pedalis* et *altior*, *teres*, *striatus*, *glaber*, *glauco-viridis*, *nodis plerumque 4* *purpleis instructus*, *adscendens*, *inferne procumbens*, *plerumque radicans et ramosus*. *Folia erecto-patentia*, *linearia*, *acuminata*, *supra striata atque scabra*, *subtus glabra*. *Vaginae teretes*, *striatae*, *glabrae*. *Ligula brevis*, *obtusa*. *Panicula digitalis et ultra*, *erecta*, *aequalis*, *ramosa*, *primum contracta*, *florens divaricata*. *Spiculae subteretes*, *lineares*, *obtusiusculae*, *virides aut e viridi-albido et spadiceo variegatae*.

4) *P. dura* *panicula secunda coarctata rigida*, *spiculis alternis sessilibus obtusis 3-5* - *floris*, *flosculis liberis 7* - *nervibus*. *Hartes Rispengras*.

(*Schrad. Germ.* p. 284. *Koel. Gram.* p. 189. *Host. Gram.* II. p. 53. t. 73. *Marsch. a Bieberst. taur. caucas.* p. 64. *Scopol. Carn.* I. p. 70. *Spreng. Hal.* p. 38. *Roth. Germ.* I. p. 43. II. p. 121.)

Cynosurus durus L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 413. *Schrank. Bav.* n. 219. *Hoffm. Germ.* p. 48.

Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in arenosis, saxosis sterilibus, ad vias. (In vallis oppidanis passim. In via versus *Himmelspfosten* prope dem Soldatengalgen, et ad ripas Moeni non procul inde. In pascuis sterilibus et ad vias prope *Weitshöchheim*, *Zell* et *Leinach*. In graminosis siccis circa arcem *Marienburg*, et auf dem *Schloßberge* versus *Höchberg*. In montosis prope *Volkach*,

bach, Hallburg, et der Vogelsburg. In collibus prope dem Schönhartshofe apud Stetten, prope Thüingen, Heßlar et alibi.)

Culmi plures caespitosi, digitales, procumbentes aut suberecti, rigidiusculi, compressi, glabri, laete virides, toti foliorum vaginis tecti, basi nonnunquam ramosi. *Folia* brevia, obtusa, glabra, laete viridia. *Vaginae* laxae, compressae, striatae, glabrae. *Ligulae* brevissimae, obtusiusculae. *Panicula* densa, spiciformis, obtusa, unilateralis, valde rigida, ex viridi alba.

5) *P. megastachya* panicula aequali patente: ramis inferioribus ad basin et ramifications pilosis, spiculis lanceolatis compressis 16 - 20 - floris, flosculis obtusis. *Großähriges Rispengr., Amurettgras.*

(*Pers.* syn. *pl. I.* p. 90. *Schrad.* *Germ. I.* p. 288. *Koel.* *Gram* p. 181.)

Briza Eragrostis L. sp. *pl. ed. Willd. I.* p. 405. *Hoffm.* *Germ.* p. 47. *Roth.* *Germ. I.* p. 40. *II.* p. 110. *Scopol.* *Carn. I.* p. 75. *Sprengel.* *Hal.* p. 39. *Schreb.* *Gram. II.* p. 83. t. 39.

B. oblonga Moench. *Method.* p. 185.

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in agris arenosis, ad muros, ad vias.
(In agris prope *Arnstein* non procul a monte sic dicto *wirceburgensi*. In via versus *Thüingen* prope dem *blauen Thurm*, et ad muros vinearum der *Steinberge* prope *Karlstadt* rarissime. In agris prope *Schlüssel-feld* detexit cl. *antecess.* *Heilm.* Etiam in sterilibus arenosis prope *Heidingsfeld* vidi. am. *Wolff.*)

Culmi plurimi; caespitosi, prostrati, apicibus oblique erecti, teretes, glabri, 3 - 4 - nodes, basi inter-

terdum ramosi, inaequalis longitudinis, 4 - 5 pollices aut sesquipedem longi, *Folia* plana, striata, supra et marginibus scabra, subtus glabra. *Vaginae* striatae, glabrae, marginibus ciliatae. *Ligulae* loco margo fuscus ciliatus. *Panicula* magna, aequalis, patens, erecta, ovata, rigida. *Pedunculi* ad basin et ad ramifications pilis brevibus albidis instructi. *Spiculae* ex ovato lanceolatae, obtusae, compressae, glabrae, cinereo - vel glauco - virescentes, aetate fuscae aut nigricantes.

6) *P. bulbosa* panicula subsecunda patente, spiculis ovatis 4 - floris, flosculis basi villo connexis, culmis basi bulbosis. *Knolliges Rispengr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 399. *Ejusd.* Enum. p. 108. Pers. syn. pl. p. 89. Schrad. Germ. p. 294. Hoffm. Germ. p. 46. Host. Gram. II. p. 47. t. 65. Koel. Gram. p. 187.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sterilibus arenosis, saxosis, ad muros et vineas. (Ad semitam supra *Heidingsfeld* versus *Giebelstadt*. In sterilibus saxosis inter *Randersacker* et *Theilheim*. In asperis montis *Nicolai*, et in monte *dürrbaccensi*. Ad munimenta arcis *Marienburg* passim copiose. In apricis circa *Thüngen*, *Karlstadt*, *Stetten*, *Oberdürrbach*, dem *rothen Kreutze*, auf dem *Krain* - und *Galgenberge*, ad vineas der *Harfe*, des *Grombühls*, *Schalksberges*, prope *Gerbrunn*, *Rottendorf* et alibi.)

Culmi plurimi caespitosi, palmares, pedales, erecti aut geniculis infimis procumbentes, teretes, striati, glabri, basi incrassati bulbosi, nodis 2 - 3 purpureis notati. *Folia* brevia, angusta, bulbulis compactis insidentia, scabriuscula, laete viridia, saepe rubella,

pla-

plana, siccata convoluta. *Vaginae teretes*, striatae, glabrae, plerumque purpurascentes. *Ligulae breves* obtusiusculae. *Panicula erecta*, subsecunda, patens, aequalis, pauciflora, crispata aut undulata. *Spiculae* ovato - lanceolatae, compressae, virides aut rubellae.

Variat flosculis omnibus sterilibus bulbiferis foliacis. *P. b. vivipara.*

7) *P. sudetica* panicula aequali diffusa, spiculis ovato - lanceolatis sub - 3 - floris, flosculis liberis, ligula brevissima, vaginis ancipitibus. *Schlesisches Riesengras.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 389. Ejusd. Enum. p. 106. Pers. syn. pl. p. 90. Schrad. Germ. p. 295. Hoffm. Germ. p. 43. Host. Gram. III. p. 9. t. 13. Sprengel. Hal. p. 37.*)

P. rubens *L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Moench. Meth. p. 187. Koel. Gram. p. 160.*

Poa quadripedalis *Ehrh.*

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sylvaticis montosis, in umbrosis.
 (In pratis humidis sylvaticis versus *Gramschatz* et prope *Erbshaußen*. In locis subhumidis umbrosis *in der Waldkugel* simul cum *Eupatorio cannabino* et *Atropa Belladonna* passim frequens. In umbrosis sylvarum *Guttenberg* et *Veitshöchheim*. Im sogenannten *Huck* prope *Wipsfeld*. In sylva vulgo *die Breit* prope *Wülfershausen*. In nemorosis humidiusculis montis *Reißenberg* prope *Karsbach*. In umbrosis des *Dreistocks* prope *Kitzingen*. Im *unteren Gesprait* prope *Proselsheim*, inque *sylva mühlhäuserno* passim frequens. In *sylva Stettensi* prope *Karlstadt* quoque invenit. cf. *Dr. Geist.*)

Culmi 3 - 4 - 5 - *pedales*, erecti, firmi, subcompresso, striati, glabri, sub panicula scabri. *Folia lata*, lanceolata, mucronata, supra scabriusculta, subtus glabra: *inferiora* longiora et latiora. *Vaginae* compressae, ancipites, striatae, glabriuscultae. *Ligula* brevissima, truncata, crenulata. *Panicula* magna, ramosissima, divaricata, sub anthesi erecta, anthesi peracta contracta atque cernua. *Spiculae* ovato-lanceolatae, acutae, compressae, plerumque 3 - *florae* interdum 2 - 4 - *florae*, virides aut ex viridi purpurascentes.

8) *P. trivialis* panicula aequali diffusa, spiculis oblongo - ovatis 2 - 3 - *floris*, flosculis basi pubescentibus, culmo inferne subancipiti vaginisque scabriusculis, ligula longa. *Gemeines Rispengr. Knotengras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 387. *Ejusd.* Enum. p. 104. *Pers.* syn. pl. p. 89. *Schrad.* Germ. p. 296. *Host.* Gram. II. p. 45. t. 62. *Smith.* Britan. V. I. p. 103. *Scopol.* Carn. I. p. 69. *Spreng.* Hal. p. 36.)

P. pratensis *Roth.* Germ. I. p. 42. II. p. 113. *Pollich.* Palat. n. 90.

P. palustris *Moench.* Method. p. 188.

P. dubia *Leers* Herb. p. 28. t. 6. f. 5.

P. scabra *Hoffm.* Germ. p. 41. *Koel.* Gram. p. 161. *Ehrh.*

Perenn. *Flor. Majo.* - *Octobri.*

Hab. in pratis, pascuis, pomariis et ad vias ubique.

Culmi caespitosi, 1 - 2 - 3 - *pedales*, erecti, ad genicula inferiora terrae adpressi atque radicantes, striati, inferne subancipites, superne teretiusculi,

sca-

scabriusculi, pallide virides, in siccioribus purpurascens. *Folia latiuscula*, linearia, acuta, carinata aut magis plana, siccata torta, subtus laevia, superne et marginibus scabra: *radicalia* in caespitem densum disposita culmeisque longiora. *Vaginae striatae*, glabrae, subcompressae. *Ligulae praelongae*, obtusiusculae. *Panicula digitalis*, palmaris, ramosissima, aequalis, diffusa. *Spiculae parvae*, oblongo-ovatae, plerumque 2 - 3 - rarius 4 - florae, acutae, compressae, ex violaceo-viridi et albido variegatae, demum fuscescentes et albidae.

9) *P. pratensis* panicula aequali diffusa, spiculis ovatis compressis scabris 2 - 3 - 5 - floris, flosculis basi pubescentibus, culmo tereti vaginisque glabris, ligula brevi. *Wiesen-Rispengr. Viehgras.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 388. *Ejusd. Enum. 1 c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 298. Hoffm. Germ. p. 42. Host. Gram. II. p. 44. t. 61. Smith. Britan. V. I. p. 104. Spreng. Hal. p. 36.)*

Penn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in pratis praecipue succulentioribus frequens, in pomariis, collibus graminosis, ad ripas et fossas ubique.

Culmi caespitosi, 1 - 2 - 3 - pedales, erecti toti aut basi incurvi, stricti, teretes, laeves, glabri aut sub panicula scabri. *Folia laete viridia*, plana, retrorsum scabra: *culmea* erecta breviora, *fasciculorum* longiora angustiora saepe complicata. *Vaginae striatae*, scabriusculae. *Ligulae breves*, obtusae, saepe fissae. *Panicula digitalis*, palmaris, laxa, florens diffusa, contracta ante et post anthesin. *Spiculae ovatae*, acutae, compressae, ex pallide-viridi et albo variegatae.

Huc

Huc quoque tanquam *varietates* pertinent: *P. angustifolia* L. sp. pl. ed. Willd. p. 387. Roth. Germ. I. p. 41. II. p. 112. Pers. syn. pl. p. 89. Leers. Herb. p. 27. t. 6. f. 3. Hoffm. Germ. p. 43. *P. setacea* et *P. strigosa* Hoffm. Germ. p. 44.

10) *P. serotina* panicula aequali erecta diffusa, spiculis oblongis 3 - 7 - floris glabris, nosculis basi pubescentibus, valvulis corollinis acutissimis, culmo tereti vaginisque scabriusculis. Spätes Rispengr.

(Schrad. Germ. p. 299. Hoffm. Germ. p. 42. Koel. Gram. p. 173. Ehrh. Gram. Willd. Enum. p. 105.)
P. palustris Roth. Germ. I. p. 43. II. p. 117. Koel. Gram. p. 155.

P. pratensis Moench. Meth. p. 188. Leers Herb. p. 27. t. 6. f. 4.

P. polymorpha Wibel Werth. p. 113.

P. fertilis Host. Gram. III. p. 10. t. 14.

Perenn. Flor. Junio - Octobri.

Hab. in pratis et pascuis udis, ad rivulos, ad muros inque vineis fere ubique.

Culmi plures caespitosi, pedales et ultra, erecti, basi plerumque incurvi et radicantes, saepe etiam imprimis solo humido ramos floriferos emittentes, coeterum teretes, stricti, scabriusculi, nodis plerumque 4 purpureis notati. Folia stricta, plana, apicem versus carinata, supra marginibusque retrorsum scabra, subtus laevia: infima plerumque emarcida. Vaginae teretes aut subcompressae, scabriusculae: supremae plerumque glabrae. Ligula brevissima aut ejus loco margo elevatus scariosus. Panicula digitalis, aequalis, ramosissima, laxa, sub anthesi diffusa, post anthesin contracta atque cernua. Pedicelli stricti, angulati,

gulati, scabri: *inferiores* terni et quaterni subramosi, *superiores* plerumque geminati aut solitarii. *Spiculae* oblongae, compressae, glabrae, 3 - 8 - florae, primo laete virides marginibus flavescentes, dein ex viridi et lutescente variegatae, maturae fuscescentes.

11) *P. nemoralis* panicula attenuata diffusa subsecunda subnutante, spiculis lanceolatis 2 - 3 - floris, flosculis liberis, ligula brevissima truncata, culmo subpresso vaginisque glabris. *Hain - Rispengr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 399. *Ejusd. Enum.* p. 108. *Pers. syn. pl.* p. 89. *Schrad. Germ.* p. 301. *Hoffm. Germ.* p. 46. *Host. Gram. II.* p. 51. t. 71. *Leers Herb.* p. 29. t. 5. f. 3. *Koel. Gram.* p. 191. *Spreng. Hal.* p. 37.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in umbrosis sylvaticis, in muris, ad dumeta. (In fossis oppidanis, et ad muros eorum. Ad dumeta extra urbem, et in sylvis viciniis alibique non infrequens.)

Culni 1 - 2 - 3 - pedales, erectiusculi, inferne plerumque incurvi, graciles, laeves, subcompressi, sub panicula scabri. *Folia* angustissima, plana, versus apicem carinata, supra retrorsum scabra, subtus glabra: *inferiora* breviora emarcida. *Vaginae* subcompressae, striatae, glabrae. *Ligula* brevissima, truncata. *Panicula* subsecunda, laxa, pauciflora, apicem versus attenuata, ante et post anthesin valde contracta atque cernua, sub florescentia erectiuscula diffusa. *Spiculae* praecedentis, sed angustiores, 2 - 3 " florae: *flosculis* non pubescentibus, ex viridi alboque dilute fuscis aut purpurascentibus.

12) *P. compressa* panicula subsecunda coarcta-
ta, spiculis oblongo - ovatis 5 - 8 floris, flosculis basi
pube-

pubescentibus, culmo compresso. *Zusammengedrücktes Rispengras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 397. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. p. 90. *Schrad.* *Germ.* p. 303. *Hoffm.* *Germ.* p. 45. *Host.* *Gram.* II. p. 51. t. 70. *Sprengel.* *Hal.* p. 35. *Koel.* *Gram.* p. 185. *Leers* *Herb.* p. 29. t. 5. f. 4.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. *in pratis siccis, in agris, in vineis,* *muris et ad vias ubique.*

Culmi plures, digitales, palmares, pedales et al-
tiiores, adscendentes, basi procumbentes et saepe ra-
dicantes atque ramosi, striati, glabri, compresso-
plani, *nodis* pluribus purpureis notati. *Folia* brevia,
plana, plus minusve scabra, plerumque glauco - vi-
ridia. *Vaginae* compressae, striatae, glabrae, folio-
rum colore. *Ligulae* breves, obtusae. *Panicula*
I - 2 - uncialis, erecta, rigida, subsecunda: *pedicel-*
bis brevibus plerumque geminis interdum solitariis
aut ternis et quinis. *Spiculae* oblongo - ovatae, acu-
tae, ex albo - virides, et apicibus rubellae.

Notabilis hujus varietas est *Poa muralis Wibelii*
(*Vid. ejus Flor. werth.* p. 114.) quam et ego diu obser-
vatam constantissimam semper inveni atque speciem
peculiarem habui. (*Vid. Enum. gram. wirceb.* p. 29.)
Ex sententia vero *cl. Wib.* mera est prioris varietas,
quippe qui *Poam compressam* in *P. muralem* trans-
euntem nuperrime observavit. Haec *in muris oppi-*
danis juxta dem Mainviertel, *ad muros vinearum des*
Steinberges, der Leiste alibique copiose crescit.

13) *P. annua* panicula divaricata subsecunda stric-
ta, spiculis oblongis obtusis 5 - 6 - floris, flosculis li-
beris, culmo obliquo compresso. *Jähriges Rispengr.*
(*L.*,

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 390. *Ejusd.* Enum. p. 106.
Pers. syn. pl. p. 90. *Schrad.* Germ. p. 304. *Hoffm.*
Germ. p. 45. *Host.* Gram. II. p. 46. t. 64. *Leers*
Herb. p. 29. t. 6. f. 1. *Koel.* Gram. p. 169.)

Ann. Flor. a vere ad autumnum.

Hab. in pratis, in cultis, ad vias et plateas ubique copiose.

Culmi plures, digitales, palmares, raro altiores,
oblique adscendentes, laeves, glabri, compressi, ba-
si saepe ramosi. *Folia* latiuscula, brevia, plana, re-
trorsum scabriuscula: *radicalia* caespitosa. *Vaginae*
compressae, laeves, et ut culmi foliaque laete viri-
des *Ligulae* oblongae acutae. *Panicula* vix digitalis,
erecta, stricta, diffusa, subsecunda, triangularis: *pe-*
dunculis infimis geminis, superioribus solitariis. *Spic-*
ulae oblongo-ovatae, obtusae, compressae, e viridi
et albido variegatae, apice interdum purpurascentes.

14) *P. decumbens* panicula subsimplici pauci-
flora coarctata erecta, spiculis ovatis 3 - 4 - floris,
calyce flosculis paulo majore, vaginis foliisque pilosis.
Niederliegendes Rispengras.

(*Schrad.* Germ. p. 305. *Host.* Gram. II. p. 52.
t. 72. *Scopol.* Carn. I. p. 69. *Smith.* Britan. Vol. I.
p. 107. *Spreng.* Hal. p. 38.)

Festuca decumbens *L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 424.
Pers. syn. pl. p. 94. *Roth* *Germ.* I. p. 46. II. p. 131.
Hoffm. *Germ.* p. 53. *Leers* *Herb.* p. 34. t. 7. f. 5.

Bromus decumbens *Koel.* Gram. p. 242.

Melica decumbens *Web.* spicul. p. 3. *Moench.*
Meth. p. 173.

M. rigida *Wib.* *Werth.* p. 117.

Sieglingia decumbens Bernhard Erf. p. 44.

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in pratis siccis, in collibus sterilibus, ad margines sylvarum, ad muros et vias,

Culmi plures, palmates, pedales aut sesquipedales, erecti aut curvato - decumbentes, rigidi, subcompressi, glabri, supra medium foliati, 3 - 4 - nodes. *Folia* glauco - viridia, erecta, rigidiuscula, carinata, siccitate involuta, margine et superne pilis sparsis obsessa: *culma* breviora, *supernum* paniculam plerumque superans. *Vaginae* subcompressae, superne villosae. *Ligula* brevis, truncata, villosa. *Panicula* erecta, contracta, spiciformis, simplicissima, pauciflora, rigidiuscula. *Spiculae* ovatae, obtusae, ventricosae, glabrae, splendentes, e viridi violaceae aut e viridi flavescentes.

45. BRIZA, Flittergras, Zittergras.

I) *Br. media* panicula erecta, spiculis sub - 7 - floris demum cordatis. *Gemeines Flittergr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 404. Pers. syn. pl. I. p. 92. Schrad. Germ. I. p. 309. Hoffm. Germ. I. p. 47. Schkuhr bot. Handb. I. p. 43. t. 14. Host. Gram. II. p. 22. t. 29. Sturm. D. Flor. I. 2. Leers Herb. p. 26. t. 7. f. 2.)

Br. tremula Koel. Gram. p. 149.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad colles, in pratis et pascuis frequens.

Culmi palmates, pedales et altiores, erecti, teretes, striati, glaberrimi. *Folia* angusta, plana, sca-

- bus-

briuscula, laete viridia. *Vaginae* striatae, glabrae: *suprema* longissima subventricosa. *Ligula* brevis, obtusa. *Panicula* erecta, laxa, sub anthesi patentissima triangulari - subrotunda: *pecculis* binis capillaribus flexuosis coloratis. *Spiculae* splendentes, glabrae, ovato - cordatae, obiusissimae, compressae, nutantes, tremulæ, ex viridi - albido - violaceo aut purpureo variegatae.

46. DACTYLIS, *Knaulgras*, *Hundsgras*.

1) *D. glomerata* panicula supradecomposita secunda glomerata. *Gemeines Knaulgr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 408. Pers. syn. pl. I. p. 83. Schrad. Germ. I. p. 311. Hoffm. Germ. I. p. 48. Host. Gram. II. p. 67. t. 94. Schreb. Gram. I. p. 72. t. 8. f. 2. Schkuhr bot. Handb. I. p. 43. t. 14. Leers Herb. p. 22. t. 3. f. 3 Sturm. D. Flor. I. 6.)

Bromus glomeratus Scopol. Carn. I. p. 76. Koel. Gram. p. 244.

Hab. in pratis, pomariis et ad vias ubique copiose.

Culni 1 - 2 - 3 - pedales, erecti, teretes, scabri. *Folia* firma, plana, latiuscula, utrinque, scaberima. *Vaginae* compressae, striatae, scabrae. *Ligula* elongata, plus minusve obtusa, integra, demum lacinulata. *Panicula* erecta, lata, secunda, rigida, *florens* horizontaliter patens, ante et post anthesin contracta. *Spiculae* pedicellatae, scabrae, conglomeratae, virides aut e viridi et purpurascente variae.

47. CYNOSURUS, *Kammgras*.

1) *C. cristatus* racemo spicato secundo linearis, bracteis pinnatis. *Gemeines Kammgr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 411. Ejusd. Enum. p. 111. Pers. syn. pl. I. p. 86. Schrad. Germ. I. p. 314. Hoffm. Germ. I. p. 48. Host. Gram. II. p. 68. t. 96. Schreb. Gram. I. p. 69. t. 8. f. 1. Leers Herb. p. 47. t. 7. f. 4. Koel. Gram. p. 371.*)

Phleum cristatum Scopol. Carn. I. p. 57.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis, pomariis et collibus graminosis ubique.

Culmi 1 - 2 - 3 - pedales, erecti, teretes, tenues, laeves, glaberrimi, laete virides, 3 - 4 - nodes. Folia pauca, angusta, plana, laete viridia, supra scabriuscula, subtus laevia. Vaginae teretes, striatae, glaberrimae. Ligulae brevissimae, truncatae, crenulatae. Racemus spicatus, secundus, linearis, obtusus, 2 - 3 uncialis, compositus: pedicellis brevibus flexuosis. Bractea sub quavis spicula pinnata: pinnis lanceolatis. Spiculae distichae, oblongae, compressae, subaristatae 2 - rarius 3 - florae, bracteis minoreis.

48. FESTUCA, *Schwingel, Schwingelgras.*

1) *F. ovina* panicula patente secunda, spiculis oblongis compressis breviter aristatis 4 - 5 - floris, foliis setaceis. *Schaaf-Schwingel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 419. Ejusdem. Enum. p. 114. Pers. syn. pl. I. p. 93. Schrad. Germ. I. p. 319. Hoffm. Germ. p. 51. Host. Gram. II. p. 60. t. 84. Koel. Gram. p. 250. Spreng. Hal. p. 39. Leers Herb. p. 31. t. 8. f. 3.*)

Bromus ovinus Scopol. Carn. I. p. 77.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in collibus apricis et versuris sterilibus ubique.

Culmi plurimi in caespitem densum congesti, palmares et pedales, erecti, rigidi, glabri, tenues, fere filiformes, supra medium nudi, subtetragoni, 2 - 3-nodes. *Folia* brevia, laevia, rigidiuscula, setaceo-convoluta, viridia aut rubella. *Vaginae* striatae, villoso-scabriuscule. *Ligulae* brevissimae, truncatae. *Panicula* 1 - 2 - 3 - uncialis, erecta, pauciflora, lanceolata, secunda, sub anthesi patens, in spicam contracta ante et post anthesin. *Spiculae* oblongae, compressae, glabrae aut pubescentes, saepe aristatae, subviolaceae.

2) *F. tenuifolia* panicula subsecunda coarctata mutica, culmo tetragono nudiusculo, foliis capillaris, ligula biaurita. *Dünnblättriger Schwingel.*

(Pers. syn. pl. p. 93. Schrad. Germ. p. 318. Hoffm. Germ. p. 51. Koel. Gram. p. 272. Leers Herb. p. 32. t. 8. f. 4. Willd. Enum. p. 113.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in collibus et montosis sterilibus.
(In vallis oppidanis hinc inde copiose, et prope Dürrbach circa sylvam alibique.)

Folia, quam in praecedente, angustiora fere capillaria, *panicula* angustior magis coarctata, *valvulae* corollarum *extiores* mucronatae nunquam aristatae, *antherae* violaceae, in priori luteae.

3) *F. glauca* panicula patente, spiculis lanceolatis aristatis, culmo superne angulato foliisque rigidis glaucescente. *Graugrüner Schwingel.*

Pers. syn. pl. p. 93. Schrad. Germ. p. 322. Lamarck. illustr. n. 1034. t. 4⁶. f. 3. Willd. Enum. p. 114.)

F. pallens Host. Gram II. p. 63. t. 88.

Prenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in siccis sterilibus, in saxosis et collibus. (In vallis oppidanis hinc inde haud infrequens. Copiose in campo sterili saxoso versus *Veits-hochheim*. In siccis asperis prope *Thüingen*, *Arnstein*, inter *Karlstadt* et *Stetten*, in monte *Kalbenstein* prope *Karlenburg* alibique.)

Gramen totum ex glauco viride. *Culmi* cum foliorum fasciculis pluribus in caespitem densum conjuncti palmares, pedales et altiores, erecti, rigidi, setacei, glabri, inferne teretes, superne angulati. *Folia* reflexa, rigida, complicato-setacea, supra pubescens, subus glabra: *fascicularum culmeis* multo longiora. *Vaginae* teretiusculae, striatae glabraeque. *Ligula* brevissima, ciliata, antice utrinque in processum auriformem obtusum ciliatum producta. *Panicula* erecta, subsecunda, florens patens, contracta ante et post anthesin. *Spiculae* lanceolatae, compressae, aristatae, 3 - 4 - interdum 6 - florae, plerumque glaucescentes, saepe etiam ex viridi et purpurascente variae.

— 4) *F. bromoides* panicula racemosa secunda, flosculis arista brevioribus 1 - andris. *Trespenartiger Schwingel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 418. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 325. Smith. Britan. V. I. p. 117. Koel. Gram. p. 263. Roth. Germ. II. p. 124.)

F. sciurooides L. sp. pl. ed. Willd. p. 423. Koel. Gram. p. 262. Hoffm. Germ. p. 49. Roth. Germ. I. p. 46. II. p. 130. Vib. Werth. p. 104.

B r o-

Bromus dertonensis Allion. Flor. pedem. n. 2225.
Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad margines agrorum, pratorum et sylvarum. Ad vias, in arenosis sterilibus, inque collibus graminosis (In vallis urbicis passim. In collibus sterilibus et ad margines prope Wirceburgum, Rottendorf, Gerbrunn, Rimpar, Giebelstadt, Kirchheim, Röttingen et Aub. Ad montem Kalbenstein prope Karlenburg, circa Stetten ad Weram. In versuris, et sterilibus arenosis prope Thüngen, Büchold et Gräfendorf. In via versus Veitshöchheim, Retzbach alibique saepe copiose.)

Culmi digitales, palmares, erecti, teretes, laeves, glabri, graciles, supra medium nudi, basi saepe ramosi. Folia linearia, angustissima, siccitate convoluta, brevia, laevia, glabra, glauca. Vaginae teretes, laxae, glabrae, sulcatae. Ligula minima, crenulata. Panicula erecta, racemosa, subsecunda, pauciflora. Spiculae primo virides demum purpurascentes, erectae, linearis-lanceolatae, compressae, 5-7-florae: flosculis monandris et longe aristatis.

5) *F. Myurus* panicula elongata contracta secunda subnutante, flosculis 1-andris arista brevioribus, culmo vaginis obiecto. *Mäuseschwanzähnlicher Schwingel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 422. *Ejusd. Enum.* p. 115. *Pers. syn. pl. l. c.* *Schrad. Germ.* p. 327. *Hoffm. Germ.* p. 50. *Host. Gram.* II. p. 66. t. 93. *Leers. Herb.* p. 33. t. 3. f. 5. *Koel. Gram.* p. 248.)

Vulpia Myurus *Gmelin.* badens. I. p. 8.

Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in locis saxosis, in arenosis sterilibus, ad vias siccas et agrorum margines. (In vallo oppidano prope dem *Teufelsthor* et alibi. Ad margines agrorum et viarum circa dem *Glacis* et ad ambulacrum inter *Populos*, ad rudeta ibidein. In via ab *Heiæingsfeld* versus *Giebelstadt* et *Rottenbauer*. Ad agros et inter segetes prope *Bütthardt*, *Neunkirchen*, *Tiefenthal* et *Höttingen*. In sterilibus prope *Thüningen*, *Arnstein*, *Dettelbach*, *Oberschwarzach*, *Kitzingen* et alibi.)

A praecedente, cui simillima, culmis praecipue altioribus ad paniculam usque foliorum vaginis obtectis, panicula elongata contracta apice plerumque nutante constanter differt.

6) *F. durinsecula* panicula erecta subsecunda diffusa, flosculis arista longioribus, radice fibrosa. *Harter Schwingel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 421. Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 328. Host. Gram. II. p. 59. t. 83. Leers Herb. p. 32. t. 8. f. 2. Smith. Britan. V. I. p. 115. Spreng. Hal. p. 39.)

F. heterophylla L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Pers. syn. pl. p. 93. Koel. Gram. p. 257. Jacq, collect. II, p. 93. Spreng. Hal. p. 39.

F. nemorum Leysser in den Abhandl. d. hall. naturf. Gesellsch. p. 369. Roth. Germ. I. p. 46. II. p. 129. Hoffm. Germ. p. 51.

F. rubra Hoffm. Germ. p. 50.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in graminosis siccis, in arenosis, in collibus et nemorosis. (Copiose hinc inde in vallis oppidanis. In arenosis siccis circa *Wirzburgum*, pro-

prope *Rimpar*, *Wipfeld*, *Dippach*, *Geldersheim* etc.
In siccis lapidosis prope sylvam ad *Veitshöchheim* et
alibi frequens.)

Culmi plures, palmates et pedales, erecti, glaberrimi, teretes, superne plerumque teretiusculi et sulcati. *Folia* margine et carina scabra: *culmea* superiora plana brevissima, *inferiora* et *fasciculorum* longiora complicato-setacea filiformia. *Vaginae* longae, teretiusculae, striatae, glabrae. *Ligula* tenuissime ciliata. *Panicula* erecta, oblonga, subsecunda, multiflora: *florens* patens, in spicam contracta ante et post anthesin. *Spiculae* lanceolatae, compressae, glabrae, 5 - 6 - florae, plerumque virides, perraro purpurascentes.

Var. spiculis pubescentibus. *F. dumetorum* L. sp. pl. ed. Willd. p. 422. Koel. Gram. p. 256. Roth. Germ. I. p. 45. II. p. 127.

7) *F. rubra* panicula secunda patente scabra, flosculis teretiusculis arista longioribus, radice repente. Rother Schwingel.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 420. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 93. Schrad. Germ. p. 329. Host. Gram. II. p. 59. t. 82. Roth. Germ. I. p. 45. II. p. 125. Smith. Britan. V. I. p. 116. Koel. Gram. p. 252.)
Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in locis arenosis et saxosis, in montosis siccis, inque pascuis sterilibus fere ubique.

Culmi palmates, pedales, erecti aut oblique ascendentes, filiformes, rigidi, striati, glabri, teretes aut teretiusculi, plerumque 2 - nodes, superne saepissime cum panicula matura rubicundi aut evio-

laceo

Iaceo rubri. *Folia* dura, complicato-setacea, supra striata saepe pubescentia, subtus laevia glabra, marginibus scabra. *Vaginae* longae, sulcato-sriatae, glabrae. *Ligula* brevissima truncata. *Panicula* erecta, secunda, scabra, sub florescentia patens. *Spiculae* oblongae, compressae, scabrae, 6-7-florae, pubescentes: *flosculis* tetetiusculis subcompressis breviter aristatis, *extimo* mutico sterili.

Radice repente a praecedente imprimis constanter diversa, quae in ea fibrosa est.

Variat foliis latioribus. *F. multiflora* Koel. Gram. p. 271. Hoffm. Germ. p. 50.

8) *F. pratensis* panicula ramosa secunda patent, spiculis linearibus glabris multifloris muticis aut brevissime aristatis, radice fibrosa. *Wiesen-Schwingel.*

(Smith. Britan. V. I. p. 123. Schrad. Germ. p. 332. Willd. Enum. p. 116.)

F. elatior L. sp. pl. ed. Willd. p. 425. Pers. syn. pl. p. 94. Hoffm. Germ. p. 51. Host. Gram. II. p. 57. t. 79. Schreb. Gram. I. p. 34 t. 2. Leers Herb. p. 34. t. 8 f. 6. Roth. Germ. I. p. 46. II. p. 128. Wibel Werth. p. 16. G. M. Sch. Flor. d. Wetter. I. p. 120.

Bromus elatior Koel. Gram. p. 214.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis, pomariis inque locis graminosis ubique.

Culmi 2-3-4-pedales, erecti, teretes, sriati, glaberrimi, virides, *nodis* 3-4 purpureis instruci. *Folia* plana, patentia, striata, supra et marginibus scabra: *radicalia* culmeis longiora. *Vaginas* teretes, stria-

striatae, glabrae. *Ligula* vix ulla. *Panicula* ramosa, secunda, multiflora, sub anthesi patens et erecta, ante et post anthesin cernua atque contracta. *Spiculae* lineares, subcompressae, glabrae, 6 - 8 florae, virides aut e viridi et purpurascente variae.

In locis fertilioribus et magis succulentis gramen hocce *culmis* multo altioribus fortioribusque, *soliis* longioribus atque latioribus utrinque glabris, *panicula* majori patentissima, *spiculisque* minus coloratis plerumque laete viridibus 11 - 15 - floris adparet. In locis vero siccis sterilibus *culmis* minoribus vix pedalibus, *soliis* brevioribus angustioribus plus minusve scabris, *radicalibus* plerumque convolutis, *panicula* simpliciori subspicata, *spiculisque* paucioribus 4 - 6 - floris purpureis variat. *Gluma corollina* exterior mox apice aristata mox mutica est.

9) *F. elatior* panicula patente ramosissima, spiculis ovato - laceolatis subaristatis 4 - 6 - floris, radice repente. Erhabener Schwing.

(*L.* sp. pl. ed. 2. p. 111. *Schrad.* Germ. p. 333. *Smith.* Britan. V. I. p. 124. *Willd.* Enum. l. c.)

F. arundinacea Villars Delph. II. p. 106.

F. spadicea Moench. Meth. p. 190.

Bromus littoreus *L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 433. *Host.* Gram. I. p. 7. t. 8.

B. arundinaceus *Koel.* Gram. p. 217. *Roth.* Germ. II. p. 141.

Perenn. *Flor.* Jun. Julio.

Hab. ad ripas, in pratis humidis, et sylvaticis. (Ad ripas Salae prope Schundersfeld, Gmünden et Gräfendorf. In sylvaticis humidiusculis des Oetgrunds, prope Schönau et Wolfsmünster. Ad

ripos

ripas *Werra* prope *Stetten*. In humidis non procul a pago *Marienburghausen*. In sylvaticis im *Klaushügel* prope *Klosterhausen* alibique perraro.)

Praeter characteres allegatos *culmis* multo altioribus crassioribus et rigidioribus, *soliis* longioribus latioribusque rigidis duris sulcato-striatis, *panicula* ampliori et ramosiori, *spiculis* sub 5 - floris, *flosculisque* majoribus et magis scabris a praecedente differt.

10) *F. loliacea* spica elongata disticha subnubante, spiculis subsessilibus linearis-oblongis remotis muticis, radice fibrosa. *Lolchartiger Schwingel*.

(L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 426. *Pers.* syn. pl. p. 92. *Schrad.* Germ. p. 341. *Hoffm.* Germ. p. 52. *Smith.* Britan. V. I. p. 122.)

F. elongata *Ehrhart's Beitr.* B. 6. p. 133.

Poa loliacea *Koel.* Gram. p. 207.

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab. in pratis humidis, ad ripas. (In fossa oppidana prope der *Karthaus* et dem *Sanderthore*. Ad rivulum non procul von der *dürren Brücke* am Fahrweege versus *Dürrbach*. In humidiusculis *sylvae grunschatzensis*, inque *saltu kitzingensi* passim raro. In humidis juxta *syam Marrbach* prope *Abb. Heidenfeld*. In graminosis uidis prope *Wolfsmünster* et *Holzkirchen*. Ad ripas *Werra* non procul a *sylva stettensi*. Rarius ad ripas *Moeni* prope *Hassfurth*, *Kitzingen* et *Volkach* prope der *Hallburg*.)

Culmi pedales, sesquipedales, striati, glabri, teretes, nodis 2 - 3 atropurpureis donati, primo ad spicam usque vagina suprema tecti, erecti toti s. basi incurvati. *Folia* obscure viridia, linearia, acuminata, glabra, plana, siccata parum convoluta; fas-

fasciculorum angustiora. *Vaginae* longae, teretes, glabrae. *Ligula* brevissima. *Spica* elongata, 2 - 3 - uncialis, apice nutans. *Spiculae* sessiles aut brevissime pedunculatae, alternae, distichae, remotae, compressae, glabrae, muticae, multiflorae, rachi appresae, florentes oblique patentes. *Flosculi* cylindracei ex viridi et albido varii.

Gramen *Lolio perenni* simillimum, cum quo, uti pluries mihi accidit, primo intuitu facillime confunditur. *Calycibus* interea 2 - *valvibus* satis distinctum.

In solo humidiori *culmi* altiores gracilioresque evadunt, vi minima humi prosternuntur, et rarissime dein resurgunt. Inde *culmi* saepe omnino decumbentes reperiuntur.

ii) *F. pinnata* spica simplici erecta disticha, spiculis sessilibus remotis subteretibus: florentibus patentibus, aristis gluma brevioribus, redice repente.
Gefiederter Schwing.

(*Schrad.* Germ. p. 342. *Koel.* Gram. p. 264. *Willd.* Enum. p. 117. *Moench.* Meth. p. 191. *G. M. Sch.* Wetter. f. p. 124.)

Bromus pinnatus L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 438. *Pers.* syn. pl. p. 96. *Hoffm.* Germ. p. 56. *Roth.* Germ. I. p. 49. II. p. 144. *Scopol.* Carn. I. p. 82. *Host.* Gram. I. p. 18. t. 22. *Leers* Herb. p. 39. t. 10. f. 3. *Triticum pinnatum* *Moench.* *Enumer.* n. 102. *Spreng.* Hal. p. 45.

T. bromoides *Wibel.* Werth. p. 104.

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. ad sepes, in versuris, in collibus et pratis siccis, inque sylvarum marginibus ubique.

Culmi palmates, 1 - 2 - pedales, erecti, rigidi, stricti, teretes, glabri, seminudi, cum foliis vaginisque e flavo virides. *Folia* plana, scabra, subvillosa. *Vaginae* teretes, striatae, villosae. *Ligula* brevis ovata, obtusa, ciliata. *Spica* erecta, rigida, compressa, sesqui - 2 - uncialis. *Spiculae* lanceolato - subulatae, alternae, distichae, remotiusculae, subteretes, pubescentes, multiflorae, aristatae, pallide virides, *florentes* patentes, rachi appressae ante et post anthesin: *inferiores* brevissime pedunculatae, coeterae sessiles.

12) *F. gracilis* spica simplici subnutante, spiculis sessilibus teretiusculis remotis aristatis, aristis gluma longioribus, radice fibroea. *Dünner Schwingel.*

(*Schrad.* Germ. p. 343. *Moench.* Meth. p. 191. *G. M. Sch.* Wetter. I. p. 124. *Willd.* Enum. p. 118.)
Bromus gracilis L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 438.
Pers. syn. pl. p. 96. *Roth.* Germ. I. p. 49. II. p. 145.
Marsch. a *Biberst.* Taur. Caucas. p. 74. *Gmel.* Bad. I. p. 244.

B. sylvaticus Host. Gram. I. p. 17. t. 21. *Hoffm.* Germ. p. 56. *Smith.* Britan. V. I. p. 136.

Triticum sylvaticum *Moench.* Enum. n. 103. *Sprengel.* Hal. p. 44.

T. teretiflorum *Wibel Werth.* p. 104.

Perenn. *Flor. Jun. Julio.*

Hab. in dumetis, in nemorosis, ad sepes. (Ad sepes hinc inde hortorum juxta dem *Studentenbach* et prope dem *Glacis*. Ad margines et in sylvis *Waldskugel*, *Gramschatz*, *Teitshöchheim* et *Guttenberg*. In nemoribus *Breit*, *Steinbusch* et *Eitel* prope *Wülfershausen*. In der *Leimgrub* et in den *Lacken* prope *Abb.*

Abb. Heidensfeld. In *sylva stettensi*, in nemorosis prope *Bergtheim* et *Uettingen* alibique.)

Culmi pedales, 2 - pedales, erecti, teretes, gracieles, fere filiformes, obsolete striati, plus minusve hirsuti. *Folia* laete viridia, plana, latiuscula, scabra, pilis brevibus sparsis imprimis basin versus obsessa: *culmea* breviora et latiora. *Vaginae* striatae teretes, hirsutae. *Ligula* exserta, ovata, obtusa, ciliata. *Spica* sesquiuncialis et longior, debilis, apice plerumque nutans. *Spiculae* erectae, alternae, remotiusculae, sessiles, scabrae, virescentes, teretiusculae, demum magis compressae, 5 - 9 - florae. *Aristae* capillares.

49. BROMUS, *Trespe.*

I) *Br. secalinus* panicula patente erecta: fructifera apice nutante, spiculis ovatis compressis nudis, flosculis teretiusculis demum distinctis, aristis flexuosis gluma brevioribus. *Roggem - Trespe.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 428. Ejusd. Enum. p. 119. Pers. syn. pl. I. p. 95. Schrad. Germ. I. p. 347. Hoffm. Germ. I. p. 53. Koel. Gram. p. 223. Host. Gram. I. p. 10. t. 12. Leers Herb. p. 36. t. II. f. 2.)

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. in agris praecipue secalinis saepè copiose.

Culmus 1 - 2 - pedalis et altior, erectus, teres, strictus, striatus, glaber, laete viridis, *geniculis* 4 - 5 magis vel minus pubescentibus interceptus. *Folia* plana, striata, pilis raris conspersa. *Vaginae* teretes, striatae, glabrae. *Ligula* brevis, obtusa, den-

dentata. *Panicula secunda*, patens, primo tota erecta, apice demum nutans. *Spiculae ovatae*, primo teretiusculae, dein e tereti compressae, ex glauco pallide virides: *flosculis* 7 - 10 distinctis remotiusculis.

Variat Spiculis muticis aut brevissime aristatis.

2) *Br. mollis* panicula erecta subcoarctata, spiculis ovatis subcompressis pubescentibus, flosculis imbricatis, corollae valvula exteriore apice bifida, aristis rectis valvulas aequantibus, foliis et vaginis mollissime villosis. *Weiche Tresp.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 429. *Ejusd.* Enum. 1 c. *Pers.* syn. pl. p. 95. *Schrad.* Germ. p. 351. *Hoffm.* Germ. p. 54. *Host.* Gram. I. p. 16. t. 19. *Schkuhr.* botan. Handb. I. p. 47. t. 16. *Schreb.* Gram. I. p. 60. t. 6. f. 1. *Leers* Herb. p. 36. t. 11. f. 1. *Koel.* Gram. p. 233.)

Bienn. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad vias, ad agros et muros, inque ruderatis copiosissime.

Culmi palmates, pedales et altiores, erecti, teretes, striati, subvillosi, pallide virides: *nodis* 3 - 4 incrassatis purpureis et villosis instructi. *Folia* et *vaginae* teretes villis canescensibus mollissimis obducta. *Ligula* brevis, obtusa pubescens, lacera. *Panicula* densiuscula, villosa, mollissima, e canescente viridis, erecta: *fructifera* cernua.

Occurrit in locis apricis sabulosis sterilibus *culmis* 3 - 4 - uncialibus, *spiculis* subpedunculatis laeviusculis. (*Brom. nanus* *Weigel.* obs. p. 8.)

3) *Br. commutatus* panicula apice nutante, spiculis lanceolatis compressis nudis, flosculis imbricatis, aristis rectis glumis longioribus, foliis villosis. *Verwechselt* *Trespe.*

(*Schrad.*

(*Schrad. Germ.* p. 353. *Willd. Enum.* l. c.)

Br. multiflorus L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 428. *Pers.* syn. pl. l. c. *Roth. Germ.* I. p. 47. II. p. 134. *Host. Gram.* I. p. 10. t. II.

Bienn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in pratis, ad vias et sepes, inter segetes. (In agris in fossa oppidana et extra urbem. Ad vias et sepes inter hortos inter dem neuen et rennweeger Thore, et prope der ickelsheimer Chaussée. Inter segetes prope Rimpach, Gerbrunn, Himmelspfosten, Giebelstadt, Bütthard, Sulzdorf ad Moenum, Stalldorf, Kirchheim et Arnstein. Ad ripas Moeni graminosas versus Heidingsfeld, Randersacker, Eibelstadt, et Ochsenfurth. In pratis prope Goßmannsdorf, Ochsenfurth, Erlach et Winterhausen. Copiosius in graminosis inter Obervolkach et Rimpach. Etiam in vallis oppidanis et in pratis prope der Au - et Rosenmühle alibique passim occurrit.)

Culmi pedales, sesquipedales et ultra, erectiusculi, teretes, striati, glabri s. obsolete pubescentes. Folia plana, molliter villosa, marginibus scabra. Vaginae longae, teretes, striatae, pilis horizontaliter patentibus mollibus dense obsessae. Ligula brevis, lacinulata. Panicula 3 - 4 - uncialis, patens, florens cernua, postea apice nutans. Spiculae lanceolatae, acutae, compressae, scabriusculae, nitidae, virescentes: flosculis 8 - 11 imbricatis.

4) *Br. arvensis* panicula subnutante, spiculis evato - oblongis acutis compressis glabriusculis, flosculis imbricatis, aristis rectis glumam aequantibus, feliis villosis. *Acker - Trespe.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 434. *Ejusd. Enum.* p. 121. *Pers. syn. pl.* p. 96. *Schrad. Germ.* p. 356. *Hoffm. Heller Flora I.*

Germ. p. 55. *Koel.* Gram. p. 220. *Host.* Gram. I.
p. 12. t. 14. *Leers* Herb. p. 37. t. 11. f. 3.)

Br. versicolor Moench. Meth. p. 193. *Pollich.* Pa-
latin. n. 109. *Koel.* Gram. p. 238.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. ad vias, inter segetes, in agris ste-
rilibus et ad eorum margines ubique.

Culmus palmaris, 1 - 2 - 3 - *pedalis*, erectus,
teres, glaber: *nodis* 3 - 4 purpureis. *Folia* plana,
latiuscula, utrinque pilosa. *Vaginae* teretes, stria-
tae, pubescentes: *suprema* glabra. *Ligulae* breves,
obtusae, lacerae. *Panicula* palmaris, multiflora: *flor-*
rens erecta, apice nutans ante et post anthesin. *Spicu-*
lae ovato - oblongae, acutae, compressae, nudae
aut obsolete pubescentes, nitidae, virescentes aut
ex viridi albo purpureo que variae. *Arista* recta, glu-
mam aequans, ea saepius paulo longior, plerumque
purpurascens.

5) *Br. erectus* panicula erecta, spiculis linear-
lanceolatis compressis, flosculis teretiusculis imbrica-
tis, aristis rectis gluma brevioribus, foliis radicalibus
angustissimis ciliato - pilosis. *Aufrechte Trespe.*

(*Pers.* syn. pl. p. 95. *Schrad.* Germ. p. 357.
Hoffm. Germ. p. 55. *Köl.* Gram. p. 240. *Sprengel.*
Hal. p. 41. *Smith.* Britan. V. I. p. 131.)

Br. pseudarvensis Koel. Gram. p. 241.

Br. montanus G. M. Sch. Fl. d. Wetter. I. p. 134.

Br. angustifolius Marsch. a Bieberst. Taur. Cau-
cas. p. 73. *Schrink.* Bavar. n. 236.

Br. agrestis Host. Gram. I. p. 9. t. 10. *Allion.*
Pedem. n. 2224.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. in collibus graminosis, in pomariis et pratis humidiusculis. (In vallo oppidano prope dem *Wasserthurm* versus der *Ledersfabrik* copiose. Ad rivum pone *Geldersheim*, prope *Mühlhäusen* et *Kürnach*. In pratis ad sylvam im *Oelgrund*. In collibus graminosis et in pratis prope *Zellingen*, *Ebern*, *Schlüsseldorf*, alibique.)

Radix fusca, sublignosa, fibris pluribus tenacibus aucta. Culmi caespitosi, pedales, sesquipedales, erecti, stricti, teretes, striati: geniculis 3 - 4 glabris. Folia linearia, acuminata, plana, duriuscula, laete viridia, retrorsum scabra: radicalia et fasciculorum pilis longis albido ciliata. Vaginae teretes, striatae: inferiores pilis mollibus ob sessae et breviores, supremae glabrae et longiores. Ligula brevis, obtusa, integerrima, demum laciniata. Panicula 4 - 5 - uncifalis, erecta: ramis sub anthesi erecto-patentibus, rachi appressis ante et post anthesin. Spiculae linearis - lanceolatae, acutae, primo teretiusculae, dein compressae, ex viridi purpurascentes: flosculis 5 - 9 teretiusculis imbricatis.

6) *Br. inermis* panicula erecta, spiculis linearibus subteretibus nudis, flosculis imbricatis submuticis, foliis glabriusculis. *Grannenlose, unbewehrte Trespe, Queck-Trespe.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 431. *Ejusd.* Enum. p. 120. *Pers.* syn. pl. p. 96. *Schrad.* Germ. p. 359. *Hoffm.* Germ. p. 54. *Host.* Gram. I. p. 8. t. 9. *Schreb.* Gram. I. p. 97. t. 13. *Koel.* Gram. p. 236.)

Festuca Leysseri Moench. Hass. n. 82.

F. speciosa Schreb. spicil. p. 59. *Wibel.* Werth. p. 106.

Hab. in pratis, in pomariis et ad ripas ubique sere.

Culmi 2 - 3 - pedales, erecti, teretes, striati, glabri, nodis 4 - 5 purpurascentibus instructi. *Folia* plana, rigida, laete viridia, utrinque scabra, rarius glabra, marginibus, praesertim solo humidiori saepe undulata. *Vaginae* teretes, striatae, glabrae. *Ligula* brevissima, rotundata, primo integerrima, demum laciniata. *Panicula* 6 - 9 - uncialis, erecta, speciosa, sub anthesi patentissima, contracta ante et post anthesin. *Spiculae* lineares, ex tereti compressae, acutae, nudae, nitidae, ex viridi et purpurascente variae.

7) *Br. asper* panicula nutante, spiculis linearilanceolatis compressis pubescentibus, flosculis demum remotiusculis, aristis rectis gluma brevioribus, foliis villosis scabris. *Rauhe Trespe.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 432. *Pers. syn. pl.* p. 96. *Schrad. Germ.* p. 360. *Host. Gram.* I. p. 6. t. 7. *Koel. Gram.* p. 210. *Sprengel. Hal.* p. 41. *Smith. Britan.* V. I. p. 133. *Roth. Germ.* I. p. 48. II. p. 136. *Moench. Method.* p. 193.)

Br. montanus Roth. Germ. I. p. 49. II. p. 141. *Koel. Gram.* p. 210. *Scopol. Carn.* I. p. 82. *Moench. Hass.* n. 90. *Wib. Werth.* p. 108. *Pollich. Palat.* n. 116.

Br. ramosus Linn. syst. Veg. ed. 13. p. 102.

Br. hirsutus Curt. Lond. n. 18. *Hoffm. Germ.* p. 55.

Br. nemorosus Villars Delph. II. p. 117.

Br. altissimus Web. Holsat. n. 94.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis nemorosis, in sylvis, in dumetis, et in collibus siccis. (In vallis oppidanis passim. In monte zellensi, et in monte Nicolai hinc inde. In pratis prope Ochsenfurth, Dettelbach, Geldersheim, Schrautenbach et Sesslach. In sylvis Gramschatz, Waldskugel, Guttenberg et prope Uettingen. In nemore Neusee prope Waldbrunn, et in den roßbrunner Leiden ibidem. Hinc inde in den schwarzen Pfütschen inter Poppenhausen et Münnerstadt. In collibus et dumetis prope Ebern, Jessendorf, Psarrweisach alibique.)

Culmi caespitosi 1 - 2 - 3 - pedales, teretes, striati, pilis brevibus scabri, nodis 3 - 4 pubescentibus instructi. Folia plana, longa lataque, scabra, basin versus villosa. Vaginae teretes, insimae praecipue strigoso - hirsutae. Ligula plerumque fuscescens. Panicula palmaris, pedalis, sparsa, erecta, superne nutans. Spiculae linearis - lanceolatae, acutae, demum compressae, virides vel ex viridi et purpurascente variae. : flosculis imbricatis, dein remotiusculis.

8) *Br. giganteus* panicula apice nutante, spiculis ovato - lanceolatis compressis nudis, flosculis imbricatis, aristis flexuosis gluma longioribus, foliis nudis. *Große Tresp. Futter - Trespe.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 435. Ejusd. Enum. p. 121. Schrad. Germ. p. 362. Hoffm. Germ. p. 56. Host. Gram. I. p. 6. t. 6. Schreb. Gram. I. p. 88. t. II. Leers. Herb. p. 38. t. 10. f. 1. Koel. Gram. p. 212. Moench. Method. p. 193.*)

Festuca gigantea Pers. syn. pl. p. 94. *Villars.* Delphin. II. p. 110. *Smith. Britan. Vol. I. p. 120.* *Perenn. Flor. Junio - Augusto,*

Hab. in sylvis, nemoribus, pratis humidiusculis et ad sepes. (In pratis, ad rivum et ad sepes prope der *Aumühl*, *Versbach*, *Kürnach*, *Rimpar*, *Lengfeld* et *Mühlhausen*. In pratis hinc inde apud *Gößmannsdorf*, *Retzbach*, circa *Abb. Heidenfeld*, *Haßfurth* et *Kitzingen*. Ad ripas *Werrae* et ad sepes prope *Thüingen*, *Stetten*, et dem *Schönhartshof*. In graminosis ad salam versus *Schundersfeld* et *Gräfendorf*. In humidiusculis sylvarum *Waldskugel*, *Gramschatz*, *Guttenberg* alibique haud raro.)

Culmi erecti vel basi incurvi, laeves, glabri, 2 - 3 - 4 - pedales. *Folia* longa et lata, fere ensiformia, plana, firma, nervosa, scabra, nuda. *Vaginae* teretiusculae, laeves: *inferiores* scabriusculae plerumque purpurascentes. *Ligula* brevissima, subcartilaginea, fuscescens. *Panicula* pedalis, elongata, rara, secunda, laxa, patens, apice nutans. *Spiculae* ovato-lanceolatae, ex tereti compressiusculae, demum compressae, laete virides albido variegatae: *flosculis* 5 - 6 remotiusculis. *Aristae* tenuissimae, flexuosae, glumis triplo fere longiores.

9) *Br. tectorum* panicula nutante subsecunda, spiculis oblongo-lanceolatis compressis pubescentibus, flosculis imbricatis demum remotiusculis, aristis rectis glumam aequantibus. *Dach-Tresp. Mauer-Trespe.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 434. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 96. *Schrad.* Germ. p. 363. *Hoffm.* Germ. p. 56. *Host.* Gram. I. p. 13. t. 15. *Koel.* Gram. p. 226. *Leers.* Herb. p. 38. t. 10. f. 2.)

Hab. in collibus siccis, in ruderatis, in tectis et muris ubique copiose.

Culmi palmates, pedales, teretes, tenues, glabri, erecti, deflorati semper fere decumbentes et dein rufescentes. *Folia* angusta, plana, utrinque villosa, mollia. *Vaginae* teretes, striatae, inferiores praecipue villosae et plerumque rufescentes. *Ligula* brevis, obtusa, demum lacera. *Panicula* palmaris erectiuscula, contracta, postea apice nutans et secunda. *Spiculae* laeves, pubescentes aut magis villosae, quandoque hirsutae, sub - 5 - florae, nitidae, virides vel ex viridi et purpureo variae.

10) *Br. sterilis* panicula nutante, spiculis linearibus longissimis scabris compressis superne latioribus, aristis rectis gluma longioribus. *Unfruchtbare Trespe, taube Trespe,*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 433. *Ejusd. Enum.* p. 120. Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 364. Hoffm. Germ. p. 55. Host. Gram. I. p. 13. t. 16. Koel. Gram. p. 228. Leers Herb. p. 37. t. II. f. 4.)

Br. distichus Moench. Meth. p. 192.

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab. ad vias, ad sepes, muros, inque ruderatis ubique copiose.

Culmi 1 - 2 - pedales, erecti, teretes, graciles, glabri, ad apicem usque plerumque foliati et tecti. *Folia* plana, laete viridia, flaccida, pubescentia, mollia. *Vaginae* teretes, pubescentes: *superiores* saepe scabriuscule. *Ligula* brevis, oblique truncata, demum lacera. *Panicula* speciosa, semipedalis fere, laxa, patula, demum apice nutans, primo valde contracta. *Spiculae* praelongae, ex tereti compressiusculae, scabrae, virides, purpureo saepius variegatae, primo erectae, demum nutantes.

50. AVENA, Hafer.

1) *A. strigosa* panicula secunda subpatente, spiculis 2 - floris, flosculis nudis calycem aequantibus triaristatis: arista dorsali longissima, reliquis duabus terminalibus brevibus rectis. *Gestreiftur Hafer, Ruchhafer, Sandhafer.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 446. Ejusd. Enum. p. 122. Pers. syn. pl. I. p. 100. Schrad. Germ. I. p. 368. Host. Gram. II. p. 41. t. 56. Koel. Gram. p. 285. Hoffm. Germ. I. p. 59. Roth. Germ. I. p. 39. II. p. 107.*)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in collibus, et inter segetes, prae-
cipue inter Avenam. (Inter segetes prope Unter-
zell, Veitshöchheim, Leinach, Ober- et Unterpleich-
feld, Wipfeld, Stammheim, Gernach alibique.)

Culmi 1 - 2 - pedales, erecti, teretes, striati, gla-
bri. Folia plana, utrinque et marginibus retrorsum
scabra, glaucescentia: culmea radicalibus multo bre-
viora. Vaginae teretes, striatae, glabrae, ad exor-
tum villis longis raris sessae. Ligula brevis, fissa.
Panicula palmaris, subpatens, secunda, erecta aut
apice nutans, in spicam contracta ante et post anthe-
sin. Spiculae lanceolatae, angustae, pendulae, splen-
dentes, plerumque 2 - rarissime 3 - florae.

2) *A. orientalis* panicula coarctata secunda, spiculis 2 - floris calyce minoribus, flosculo altero inutico. *Türkischer Haf., ungarischer Hafer.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. 1 c. Ejusd. Enum. 1. c. Pers. syn. pl. 1. c. Schrad. Germ. p. 371. Host. Gram.*
 III.

III. p. 31. t. 44. *Koel. Gram.* p. 292. *G. M. Sch. Fl.*
d. Wetter. I. p. 140. *Moench. Meth.* p. 195.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Colitur hinc inde in agris. (Seminibus dissipatis ad margines agrorum, inter segetes et in fime-
tis nonnunquam quasi sponte provenit.)

Culmi 2 - 3 - 4 - *pedales*, erecti, teretes, glabri,
superne praecipue sulcato - striati. *Folia* longa la-
taque, plana, laxa, marginibus praecipue retrorsum
scabra. *Vaginae* longae, teretes, glabrae, sulcato-
striatae. *Ligula* brevis, obtusa, demum lacinulata. *Panicula* coarctata, secunda, densa, erecta tota vel
apice nutans. *Spiculae* lanceolatae, teretiusculae,
primo erectae, demum parallele et horizontaliter
patentes, compositae e *flosculis* 2 ex tereti compres-
sis calyce minoribus, maturescentibus remotiusculis.

3) *A. sativa* panicula erecta divaricata, spiculis
pendulis 2 - floris: flosculo altero mutico. *Gemeiner*
Haser, Saat - Haser.

(L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 446. *Ejusd. Enum.* p. 123.
Pers. syn. pl. p. 100. *Koel. Gram.* p. 288. *Gmelin.*
Bad. I. p. 253. *Herb. Blackw.* t. 422.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in Insula Juan - Fernandez. (*Colitur*
in agris ubique et seminibus dissipatis hinc inde, praecipue in cultis quasi sponte crescere videtur.)

A praecedente *panicula* magis divaricata, *spiculis*
pendulis, *culmisque* tenuioribus ac demissioribus praecipue differt.

Variat 1) *Seminibus* flavescentibus glabris (*Gemeiner H., Weißhafer.*) 2) *Sem.* nigrescentibus et *ari-*
stis quoque inferne nigrescentibus. (*Schwarzer Haf.,*
Au-

Augusthafer.) 3) *Sem. majoribus, culmis crassioribus et altioribus soliisque latioribus.* (*Englischer Hafer, Winterhafer.*)

4) *A. sativa* panicula aequali patente, spiculis sub - 3 - floris, flosculis calyce minoribus basi pilosis, omnibus dorso aristatis. *Wildhafer, Flughäfer, Taubhafer.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 447. Ejusd. Enum. l. c. Schrad. Germ. p. 373. Hoffm. Germ. p. 60. Host. Gram. II. p. 42. t. 58. Koel. Gram. p. 286. Schreb. Gram. I. p. 109. t. 15. Pers. syn. pl. l. c. Leers. Herb. p. 42. t. 11. f. 4.*)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in agris, inter segetes, in arvis, in ruderatis et ad vias.

Culmi 2 - 3 et 4 pedes alti, teretes, striati, glabri, firmi, crassi, inferne curvati, dein erecti. Folia lata, plana, nitida, viridia, scabra: culmea inferiora supremis et radicalibus longiora. Vaginae striae, glabrae, infimae quandoque pilis raris obsessae. Ligula brevis, obtusa, fissa. Panicula aequalis, palmaris et pedalis, florens patens et erecta, fructifera secunda et apice cernua. Spiculae ovato-lanceolatae, teretiusculae, nutantes, ex glauco virides et flavicantes, sub - 3 - florae: flosculis demum remotiusculis basi et dorso pilis lutescentibus obsessis. Semina utrinque villosa.

5) *A. tenuis* panicula aequali patente pauciflora, spiculis 3 - floris, flosculis calycem excedentibus: inferiori apice uniaristato, reliquis apice aristis 2 brevibus et unica dorsali geniculata instructis. *Zarter Hafer, Spinnenhafer.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 448. *Ejusd.* Enum. l. c. *Schrad.* Germ. p. 375. *Host.* Gram II. p. 40. t. 55. *Moench.* Meth. p. 195. *G. M. Sch.* Fl. d. Wetter. I. p. 146.)

A. dubia *Roth.* Germ. I. p. 39. II. p. 108. *Hoffm.* Germ. p. 59. *Leers* Herb. p. 41. t. 9. f. 3. *Wibel* Werth. p. 121.

Bromus triflorus *Pollich.* Palatin. n. 119.

Trisetum striatum. *Pers.* syn. pl. I. p. 97.

Ventenata avenacea *Koel.* Gram. p. 274.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in agris sterilibus, in collibus, ad vineas. (In agris et ad eorum margines prope Köhler et Nordheim. In sterilibus prope der Vogelsburg versus der Hallburg. In collibus et arvis prope Arnstein, Büchold, Rieden, Seßlach, Hattersdorf aliquique passim. Ad vineas prope montem Kalbenstein et Thüngen raro.)

Culmi palmares pedales et ultra, tenues, teretes, striati, superne praecipue scabri, nodis 3 - 4 purpurascensibus donati, geniculis inferioribus plerumque procumbentes, raro toti erecti. *Folia* utrinque scabra, angusta, plana, demum convoluta. *Vaginae* teretes, striatae, glabrae. *Ligula* elongata, lanceolata, integra, demum bifida aut lacinulata. *Panicula* aequalis, tenerrima, erecta aut apice nutans, ante anthesin contracta, sub anthesi et post anthesin patens. *Spiculae* lanceolatae, teretiusculae, subsessiles, erectae, plerumque 3 - rarius 2 - florae. *Aristae* primo rectae, dein divaricatae et crispatae.

6) *A. flavescens* panicula aequali patente multiflora, spiculis sub - 3 - floris, flosculis calycem exceeding-

cedentibus basi pilosis, omnibus dorso aristatis.
Gelblicher Hafer, Goldhafer.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 449. *Ejusd.* Enum. p. 124.
Schrad. Germ. p. 377. *Hoffm.* Germ. p. 58. *Host.*
Gram. III. p. 26. t. 38. *Schreb.* Gram. I. p. 76. t. 9.
Koel. Gram. p. 282. *Leers.* Herb. p. 43. t. 10. f. 5.
Moench. Meth. p. 196.)

Trisetum pratense Pers. syn. pl. I p. 97.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

*Hab. in pratis, in pomariis et ad sepes
 ubique.*

Culmi plures pro solo diverso variam altitudinem attingentes, plerumque pedales, sesquipedales, etiam 2 - pedales, basi incurviusculi, dein erecti, tenues, teretes, striati, glabri, virides, nodis 2 - 4 contractis purpurascenscentibus villosis instructi. *Folia* angusta, plana, striata, subvillosa, laete - aut ex flavescente viridia. *Vaginae* teretes, striatae, subvillosae. *Ligula* brevissima, truncata, suberenata. *Panicula* digitalis, palmaris, densiuscula, multiflora, aequalis, flavescens, erecta aut cernua, florens horizontaliter patens, in spicam contracta ante et post anthesin. *Spiculae* parvulae, ovato-lanceolatae, compressae, glabrae, dorso scabriusculae, splendentes, ex viridi flavae. *Flosculi* calycem excedentes, compressi, basi pilis brevibus stipati, demum remoti. *Semina* flavescens.

7) *A. pubescens* panicula erecta aequali subsimili, spiculis sub - 3 - floris, flosculis calycem excedentibus basi pubescentibus: omnibus dorso aristatis, foliis pubescentibus. *Feinhaariger Hafer.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 448. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 100. *Schrad.* Germ. p. 382. *Hoffm.* Germ. p. 59. *Host.* Gram. II. p. 37. t. 50. *Koel.* Gram. p. 277. *Wibel.* Werth. p. 121. *Leers* Herb. p. 42. t. 9 f. 2.)

Perenn. *Flor.* *Majo — Julio.*

Hab. *in pratis, in pomariis et ad colles fere ubique.*

*Radix fibrosa, densa, subrepens, stolonifera, den-*sum foliorum et culmorum caespitem proferens. *Culni* sesquipedales, 1 - 2 - pedales, erecti, basi subincurvati, laeves, teretes, nodis 3 - 4 purpureis praediti. *Folia brevia, plana, marginibus scabra,* utrinque molliter pubescentia: *radicalia angustiora.* *Vaginae teretiusculae, striatae: superiores glabrae,* inferiores villosae. *Ligula oblonga, obtusa, integra.* *Panicula 4 - 5 - 6 - uncialis, erecta, aequalis, mol-*liuscula, subpatens in spicam contracta ante et post anthesin atque subnutans. *Spiculae erectae, lanceo-*latae, glabrae, splendentes, ex viridi - argenteo purpurascentes: *flosculis* basi pubescentibus plerumque tribus, terminali sterili; *omnibus* dorso aristatis.

8) *A. pratensis* panicula spicata simplici, spiculis snb - 5 - floris: flosculis calycem excedentibus basi pilosis, omnibus dorso aristatis. *Wiesen - Haser.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 451. *Pers.* syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 385. *Hoffm.* Germ. p. 59. *Host.* Gram. II. p. 38. t. 51. *Koel.* Gram. p. 279. *Moench.* Meth. p. 196. *Leers* Herb. p. 43. t. 9. f. 1.)

Perenn. *Flor.* *Majo — Julio.*

Hab. *in pratis siccis, in arenosis, in collibus et inter fruticeta ubique.*

Radix fibrosa plures foliorum fasciculos et culmos in caespitem densum conjunctos proferens. *Culmi* altitudine varii, plerumque pedales, etiam 2 - 3 - pedales, erecti toti aut basi curvati, teretes, tenues, stricti, striati, glaberrimi, magna ex parte nudi, plerumque laete virides, nodis 2 - 3 purpureis donati. *Folia* angusta, mucronata, laete viridia: *radicula* angustiora longiora rigidula glabra marginibus scaberrima plana demum complicata et varie flexa. *Vaginae* subcompressae, striatae, retrorsum scabrae. *Ligula* elongata, acuta, subintegra. *Panicula* digitalis, semipedalis, erecta, lanceolata, contracta, spiciformis, pauciflora, rigidiuscula. *Spiculae* erectae, lanceolatae, tereti-compressiusculae, glabrae, splendentes, ex viridi-albo et purpureo variegatae. *Flosculi* 4 - 5 subcompressi: ultimo sterili.

51. SECALE, Roggen.

1) *S. cereale* glumarum ciliis scabris. *Gemeiner Roggen, Korn.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 471. *Pers.* syn. pl. p. 108. *Moench.* Meth. p. 174. *Schkuhr* bot. Handb. t. 19. *Herb. Blackw.* t. 424 *Koel.* Gram. p. 367. *G. M. Sch. Flor. d. Wetter.* I. p. 155.)

Ann. bienn. Flor. Mayo.

Hab. in Creta. (Colitur in agris ubique, et hinc inde, praecipue in cultis quasi sponte provenit.)

Gramen hocce inter cerealia nostratia culta maximam attingit altitudinem, et *culmos* 6 - 9 - pedales, saepe altiores procreat. *Culmi* spicam versus attenuati, villosi atque scabri. *Spica* compressiuscula, disticha, erecta, fructifera nutans.

Distinguntur: 1. *Secale hybernum* (*Winterroggen*, *Winterkorn*) culmis altioribus, seminibusque majoribus. 2. *S. aestivum* (*Sommerroggen*, *Sommerkorn*) culmis demissioribus et seminibus minoribus ac tenuioribus.

Variat non raro, imprimis annis bonis tempestate favente spicis magis minusve ramosis.

52. TRITICUM, Waizen.

1) *Tr. caninum* spica disticha arcta subnutante, glumis calycinis brevius aristatis 3 - nervibus sub - 5 - floris, flosculis aristatis, radice fibrosa. *Hunds-Waizen*.

(*Willd.* Enum. p. 134. *Pers.* syn. pl. I. p. 109. *Schrad.* Germ. I. p. 389. *Gmel.* Bad. I. p. 298. *Spreng.* Hal. p. 45. *Wibel.* Werth. p. 103. *Host.* Gram. II. p. 20. t. 25. *Smith.* Britan. V. I. p. 159. *G. M. Sch.* Flor. d. Wetter. I. p. 168.)

Elymus caninus L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 469. *Schkuhr.* bot. Handb. I. p. 56. t. 19. *Roth.* Germ. I. p. 51. II. p. 151. *Hoffm.* Germ. I. p. 64. *Koel.* Gram. p. 333. *Leers* Herb. p. 45. t. 12. f. 4.

Perenn. *Flor.* Junio - Augusto.

Hab. ad sepes, in sylvis et dumetis ubique.

Radix longa, fibrosa, caespitosa. *Culmi* 2 - 3 - 4 - pedales, erecti, teretes, laeves, glabri, nodis 4 - 6 purpureis leviter pubescentibus notati. *Folia* longa, latiuscula, plana, rigidula, utrinque scabra, nuda, glauco - aut laete viridia. *Vaginae* longae, teretes, striatae, glabrae. *Ligula* brevissima, truncata. *Spica* 2 - 3 - 4 - uncialis et longior, arcta, disticha,

pri-

primo erecta, dein apice magis minusve nutans, *Spiculae* solitariae, erectae, alternae, sessiles, lanceolatae, acutae, 3 - 5 - florae, adpressae, ex flavicante virides: "juniores teretes, adultiores ex tereti compressiusculae.

Sequenti simillimum. Differt vero: *radice* fibrosa et nunquam repente, *spicis* demum nutantibus, *valvulis calycinis* constanter aristatis, *valvulaque corollina* exteriore in aristam duplo longiorem terminata.

2) *Tr. repens* spica erecta arcta disticha, glumis calycinis sub - 5 - nervibus 4 - 8 floris flosculisque aristatis et muticis, *radice* repente. *Kriechender Waizen, Quecke.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 481. *Ejusd. Enum.* p. 134. *Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ.* p. 390. *Hoffm. Germ.* p. 65. *Host. Gram. II.* p. 17. t. 21. *Schreb. Gram. II.* p. 24. t. 26. *Koel. Gram.* p. 346. *Schkuhr. botan. Handb. I.* p. 63. t. 20. *Herb. Blackw.* t. 537. *Leers Herb.* p. 44. t. 12. f. 3.)

Perenn. Flor. Jul. Augosto.

Hab. ad sepes, ad muros, in hortis et vineis ubique abunde.

Radix maxime repens, teres, articulata, nodosa, nitida, alba. *Culmi* 2 - 3 - 4 - pedales, erecti, temnes, laeves, glabri, *nodis* 4 - 6 purpureis aut viridibus instructi: *Folia* linearia, plana, supra et marginibus scabra, subtus laevia, laete aut ex flavicante viridia. *Vaginae* teretes, laeves, glabrae, interdum villosiusculae. *Ligula* margo elevatus. *Spica* 2 - 4 uncias longa, erecta, tenuis, compressa, obtusa, disticha. *Spiculae* alternae, sessiles, ovatae, obtusae, glabrae, inferne quandoque binae aut ternae, laete aut ex fla-

vicante virides, raro purpureae: *juniore*s ex tereti compressiusculae, *adultiores* compressae.

Variat *culmis* et *foliis* glauco - viridibus, *foliis* interdum subvillosis, *spiculis* minoribus aut majoribus magis vel minus approximatis, *flosculis* acutioribus aut magis obtusis, *glumisque* totis pubescentibus.

3) *Tr. sativum* calyce 4 - floro ventricoso glabro imbricato aristato vel submutico. *Gemeiner W. Saa/waizen.*

(*Pers. syn. pl. p. 109. Koel. Gram. p. 336.*)

Tr. cereale Schrank. Bavar. I. p. 387. *G. M. Sch. Flor. d. Wetter.* I. p. 162.

Tr. vulgare. Willd. Enum. p. 133.

Tr. aestivum, *Tr. hybernum* L. sp. pl. ed. Willd. p. 476. et 477. Moench. Meth. p. 174. *Herb. Blackw.* t. 40.

Ann. bienn. Flor. Junio.

Hab. in campis apud Baschkiros, in re-gione inter Euphratim et Tigrim, in Tau-ria? (In agris colitur ubique, et ad vias inque ag-ris requietis copiose sponte crescit.)

Culmi 2 - 4 - pedales, erecti: *nodis* 5 - 6 contractis viridibus aut purpureis. *Spica* crassa, arcta, sub-quadrangularis, obtusa. *Spiculae* sessiles, imbricatae, ventricosae.

Distinguntur: *T. aestivum* (*Sommer - Waizen*) *culnis* et *foliis* minoribus, *valvulis* aristatis vel muticis, *T. hybernum* (*Winter - Waizen*) *culmis* ac *foliis* majoribus, *valvulis* muticis aut subaristatis, *semi-nibusque* majoribus et magis farinosis.

4) *Tr. Spelta* calycibus 4 - floris truncatis, *flos-culis* aristatis: intermedio neutro. *Dunkel - Waizen*, *Dunkel, Spelz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 478. Ejusd. Enum. p. 134.
Pers. syn. pl. p. 109. Koel. Gram. p. 338.*)

Ann. bienn. Flor. Junio.

Hab. in Persia. (Colitur hinc inde copiose.)

Praecedenti valde affine, differt vero: *culmis* *plerumque* *humilioribus*, *soliis* *brevioribus* et *pallidioribus* ex *viridi* *flavescens* *tibus*, *spica* *compressiuscula*, *rachi* *glabra*, quae in *praecedente* *pubescit*, *valvulis* *calycinis* *truncatis* aut *acuminatis*, *glumis* *corollaceis* *breviter* *aristatis* aut *muticis* *semen* *arcte* *includen-* *tibus* et non, uti in *T. sativo* *dimmittentibus*, *sterili-* *buis* *semper* *muticis*.

5) *Tr. monococcum* *calycibus* *sub - 3 - floris*, *flosculo* *altero* *aristato*, *intermedio* *sterili*, *spica* *di-* *sticha* *compressa*. *Einkörniger Waizen*, *Linkorn*, *St.* *Peterskorn*.

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 479. Ejusd. Enum. p. 134.
Pers. syn. pl. p. 109. Koel. Gram. p. 343. Moench.
Meth. p. 175.*)

Ann. Flor. Junio.

Hab. in Tauriae campis apricis et ad la-
tera collium Caucasi. (Colitur hinc inde, sed
raro.)

Culmi *1 - 2 - 3 - pedales*, *erecti*, *firmi*, *glabri*, *nodis* *4 - 6* *parvis* *pubescentibus* *donati*. *Folia* *mu-*
cronata, *plana*, *pubescentia*, *subscabra*, *ex viridi* *fla-*
vescentia. *Vaginae* *ciliatae*, *glabiae* aut *praecipue*
inferne *hirsutae*. *Ligulae* *loco* *utrinque* *pili longi al-*
bi. *Spica* *compressa*, *disticha*, *arcta*, *subanceps*, *ex*
viridi *flavescens* *vel* *brunea*, *aetate fusca*. *Spiculae*
imbricatae, *sessiles*, *arcte* *adpressae*, *pubescentes*.

Variat spiculis dispermis, valvulis calycinis acutis edentatis, flosculisque omnibus aristatis. (*Tr. dicoccon Schrank. Bav. I. p. 389. Koel. Gram. p. 346. vulgo Emmer, s. Emmerkorn*) et spicis cum seminibus nigrescentibus.

53. LOLIUM, *Lolch.*

1) *L. perenne* spiculis muticis calyce longioribus, radice perenni. *Ausdauernder Lolch, Winter-Lolch, englisches Rajgras.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 461. Ejusd. Enum. p. 128. Pers. syn. pl. I. p. 110. Schrad. Germ I. p. 397. Hoffm. Germ I. p. 62. Host. Gram. I. p. 20. t. 25. Schreb. Gram. II. p. 79. t. 37. Koel. Gram. p. 359. Leers Herb. p. 46. t. 12. f. 1. Moench. Meth. p. 53.*)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis, ad muros, ad vias et plateas ubique copiosissime.

Culmi palmates, pedales et altiores, caespitosi, oblique adscendentes, adultiori aetate erecti, glabri, subcompressi. *Flia linearia*, mucronata, plana, glabra, laete viridia: *radicalia culmeis angustiora*. *Vaginae* compressae, laeves, glabrae. *Ligula* brevisima, truncata, incisa. *Spica* erecta aut subnutans, disticha, compresso-plana, 4 - 8 - uncialis, viridis. *Spiculae* alternae, sessiles, ovatae vel lanceolatae, compressae, glabrae, muticae, 5 - 9 florae.

Variat imprimis solo fertiliori *culmis* altioribus basi ramosis, *spicis* multo latioribus et ramosis.

2) *L. arvense* spiculis submuticis calycem aequalibus, radice annua. *Acker-Lolch.*

(*Willd.* Enum. p. 128. *Schrad.* Germ. p. 399.
Host. Gram. III. p. 17. t. 25. *Smith.* Britan. Vol. I.
 p. 150. *Spreng.* Hal. p. 44.)

L. multiflorum β *Pers.* syn. pl. l. c. *Koel.* Gram.
 p. 366.

L. remotum *Hoffm.* Germ. p. 63.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes. (In agris prope *Himmels-*
pforten, *Mittelzell*, in monte *Krainberg*, circa *Burg-*
grumbach, *Maidbrunn*, *Mühlhausen*, *Abb. Heiden-*
feld alibique.)

A priori, cum quo ob maximam affinitatem sae-
 pissime confunditur, radice praecipue brevi fibrosa
 annua ac nunquam repente, culmis altioribus tenuio-
 ribus semper erectis nunquam procumbentibus aut
 adscendentibus, vaginis perfecte teretibus, spicis
 longioribus et tenuioribus, flosculis muticis aut bre-
 vissime aristatis et valvulis calycinis aut spiculas ae-
 quantibus aut iis perparum longioribus differt.

3) *L. temulentum* spiculis aristatis calyce mi-
 noribus, radice annua. *Betäubender L.*, *Sommer-*
Lolch, *Tollkorn*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 462. *Ejusd.* Enum. p. 129.
Pers. syn. pl. l. c. *Schrad.* Germ. p. 400. *Hoffm.*
 Germ. p. 63. *Host.* Gram. I. p. 20. t. 26. *Schreb.*
 Gram. II. p. 74. t. 36. *Koel.* Gram. p. 363. *Schkuhr.*
botan. Handb. I. p. 55. t. 18. *Leers* *Herb.* p. 47.
 t. 12. f. 2.)

Bromus temulentus *Bernhard Erf.* p. 49.

Craepalia temulenta *Schrink.* Bav. n. 255.

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab.

Hab. in argris et inter segetes passim copiose.

Radix annua, fibrosa, nunquam repens. Culmi 2 - 3 - pedales, erecti, firmi, teretes, scabriusculi, nodis 3 - 4 purpureis praediti. Folia linearia, plana, supra et marginibus scabriuscula, laete aut ex flavicante viridia. Vaginae teretes, striatae, glabrae aut scabriusculae. Ligula brevissima, obtusa, crenulata. Spica 5 - 11 - uncialis, erecta, firma, plana, compressa, disticha. Spiculae aristatae, alternae, sessiles, oblongo - ovatae, quam in praecedente minus compressae, glabrae, 5 - 9 flosculos continent, virides et albidae.

54. ELYMUS, Haargras.

1) *E. europaeus* spiculis scabris, flosculis aristatis, foliis planis flaccidis. *Europäisches Haagr. Wald - Haargras.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 470. *Ejusd. Enum.* p. 132. *Pers. syn. pl.* I. p. 107. *Schrad. Germ.* I. p. 402. *Hoffm. Germ.* I. p. 63. *Host. Gram.* I. p. 22. t. 28. *Smith. Britan.* V. I. p. 144.)

Hordeum cylindricum *Mur. prodr.* p. 43. *Moench. Meth.* p. 198.

Cypera europaea *Koel. Gram.* p. 328.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in sylvis, praecipue montosis. (*In sylvis Waldskugel, Veitshöchheim et Guttenberg raro. Hinc inde in monte Reissenberg prope Karsbach et in der Breit prope Wülfershausen.* *Ex sylva stettensi specimina a cl. Doct. Geist accepi.*)

Culmus sesquipedalis, 2 - pedalis, erectus, *teres*, striatus, rigidus, glabriusculus: *geniculis* 3 - 4 fuscis villosiusculis. *Folia* longa, striata, utrinque retrorsum scabra. *Vaginae* teretes, pilis rigidiusculis retrorsum versis hirsutae. *Ligula* brevissima. *Spica* 2 - 3 - uncialis, erecta, rigida, cylindrica, viridis. *Spiculae* rachi adpressae, lanceolatae, acutae, compressae, 1 - 2 - florae, pedicellatae, ternae: *terminales* solitariae. *Flosculi* omnes hermaphroditi.

55. HORDEUM, Gerste.

I) *H. murinum* glumis calycinis intermediis linearis - lanceolatis ciliatis: exterioribus setaceis scabris. *Mauer - Gerste, Mäusegerste.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 474. *Ejusd.* Enum. p. 1038. Pers. syn. pl. I. p. 108. Schrad. Germ. I. p. 404. Hoffm. Germ. I. p. 64. Host. Gram. I. p. 25. t. 32 Koel. Gram. p. 322. Schkuhr. bot. Handb. I. p. 59. t. 19.)

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab. ad vias, ad muros, in ruderatis et plateis ubique copiosissime.

Culmi plures, palmares, pedales, erecti, basi incurvi, teretes, glabri, *nodis* 3 - 5 purpureis donati, omnino fere vaginis tecti, inferne interdum ramosi. *Folia* patentia, plana, latiuscula, utrinque villosiuscula, retrorsum scabra, laete viridia. *Vaginae* striatae, glabriusculae: *suprema* subventricosa. *Ligula* brevissima, obtusa, crenulata. *Spica* 2 - 3 - uncialis, ex tereti compressiuscula, lanceolata vel magis ovata, subhexasticha, erecta, postea magis inclinata,

Flo-

Flores imbricati, terni: intermedio sessili hermaphroditio fertili, lateralibus minoribus pedicellatis masculis vel neutris sterilibus.

2) *H. pratense* glumis calycinis omnibus setaceis scabris. *Wiesen - Gerste.*

(*Pers. syn. pl. l. c. Schrad. Germ. p. 405. Smith. Britan, V. I. p. 156.*)

H. secalinum L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 475. *Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Host. Gram. I. p. 26. t. 33. Koel. Gram. p. 324. Spreng. Hal. p. 46. Gmel. Bad. I. p. 284.*

H. murin. β Linn. sp. pl. ed. 2. p. 126.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis siccis et humidis, in locis graminosis, ad vias.

Ob maximam cum praecedente affinitatem saepissime etiam cum eo confunditur. Differt interea: *radice* perenni, *cultmis* altioribus tenuioribus totis erectis supra medium nudis, *vaginis* exacte teretibus atque *suprema* nunquam subventricosa, *spicis* angustioribus brevioribus magis compressis plerunque purpurascentibus aut e fuscescente viridibus, *glumis calycinis* brevioribus aequalibus angustissimis setaceis scabris et non ciliatis, *aristisque* angustissimis brevioribus.

Variat *spicis* totis viridibus, *spiculis* nudis et pubescentibus, *foliis vaginisque* glaberrimis aut magis minusve pilosis, *radice* etiam, praecipue in terra humidiori fertili subbulbosa.

3) *H. vulgare* flosculis omnibus hermaphroditis aris atis. *Gemeine G., Saat - Gerste, Wintergerste.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 472. *Ejusd.* Enum. p. 1037.
Pers. syn. pl. l. c. *Koel.* Gram. p. 317. *Gmel.* Bad.
 p. 279. *Herb.* *Blackw.* t. 423. *Moench.* Method.
 p. 197.)

Ann. Flor. Junio.

Hab. in *Sicilia circa Marzameni*, et in
Russia circa Samaram. (Colitur in agris.)

Culmi 2 - 3 - pedales, erecti, teretes, glabri, to-
 ti fere vaginis vestiti. *Spica* primo erecta, dein nu-
 tans, ex tereti compressa, obscure hexasticha: *ordi-*
nibus 2 majoribus et magis erectis, *ordinibus* 4 mino-
 ribus. *Floscu*i** omnes hermaphroditi: *aristis* scaber-
 rimis longissimisque spicam ipsam superantibus.

Variat *glumis corollaceis* maturis semen demitten-
 tibus, vel *seminibus* sponte decorticatis, vulgo *Hord.*
eveleste (*Himmels-Gerste*, *nackte Gerste*) et *seminibus*
nigrescentibus (*H. nigrum*, *Willd.* Enum. l. c.)

4) *H. distichon* flosculis lateralibus masculis
 muticis, *seminibus angularibus imbricatis*. *Zweizei-*
lige G., *Sommergerste*, *Futtergerste*, *kleine G.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 473. *Ejusd.* Enum. p. 1038.
Pers. syn. pl. l. c. *Koel.* Gram. p. 320. *Gmel.* Bad.
 p. 281.)

Ann. Flor. Junio.

Hab. ad *Samaram Tatariae fluvium*.
 (Colitur in agris.)

Ab *Hordeo vulgari* differt: *spicis* magis compressis
 superne paululum latioribus perfecte hexastichis: *or-*
dinibus 4 *intermediis* flosculis masculis sterilibus mu-
 ticis, *ordinibus* 2 *oppositis* flosculis hermaphroditis
 fertilibus aristatis, et *seminibus* majoribus.

Variat praecipue solo fertiliori *culmis* multo altioribus et crassioribus basi ramosis, atque *seminibus* sponte decorticatis.

TRIGYNIA.

56. MONTIA, Montie.

1) *M. fontana* foliis subcarnosis oblongo - ovalis, pedunculis 1 - floris: fructiferis deflexis. Quell-Montie, Brunnenmeyer.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 487. Ejusd. Enum. p. 136. Schrad. Germ. I. p. 414. Hoffm. Germ. p. 66. De Vest Man. bot. p. 331. Schkuhr bot. Handb. I. p. 63. t. 20. Pers. syn. pl. I. p. III. Sturm. D. Flor. I. II.)

Cameraria fontana Moench. Meth. p. 520.

Bienn. Flor. Mayo - Augusto.

Hab. ad ripas, ad fontes et rivulos, inque graminosis humidis. (Ad scaturiginem in fossa oppidana prope dem *Wasserthurm*, et extra urbem prope dem *Wasserfall*. Ad rivulum am *Fahrweege* versus *Dürrbach*. Ad scaturigines prope *Zell*, *Veits-höchheim*, *Karlstadt*, *Abb. Heidenfeld* et alibi.)

Planta glabra succulenta *caulibus* pluribus dichotomis decumbentibus tenuibus teretibus 4 - 8 - uncialibus, in aquis profundioribus longioribus et magis erectis. *Folia* opposita, sessilia, spatulata, obtusa, integerrima. *Pedunculi* breves, 1 - flori, basi *bractea* aut *squamula* membranacea suffulti, ex aliis superioribus prodeuntes. *Flores* parvi, albi, raro et sole modo acriori apperti, sub anthesi erecti, post anthesin nutantes.

Variat *calycibus* 3 - phyllis, et *floribus* 5 - andris.

57. HOLOSTEUM, *Nelkengras, Spurre.*

I) *H. umbellatum* floribus umbellatis, petalis apice denticulatis. *Geschirmtes Nelkengras, Doldensparre.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 489. *Ejusd.* Enum. p. 136. Pers. syn. pl. I. p. III. Schrad. Germ. I. p. 415. Schkuhr. bot. Handb. I. p. 64. t. 20. *De Vest.* Man. bot. p. 332.)

Ann. Flor. Martio - Majo.

Hab. in collibus graminosis, in pomariis, vineis, in ruderatis et ad muros ubique.

Caules plures, digitales plerumque, et palmares, basi ramosi, apicem versus pubescenti - viscidii. *Folia* ovata, acuta, integerrima, crassiuscula, glabra, glaucescentia, in petiolum attenuata: *radicalia* in orbem disposita, *caulina* opposita sessilia connata. *Pedunculi* umbellati, inaequales, viscidii, bracteati: *floriferi* erecti, *fructiferi* elongati retrofracti. *Petala* aequalia, alba, quandoque rubicunda, apice varie incisa.

Variat *staminibus* 4 - 5 et totidem *pistillis.*

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

58. GLOBULARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 146. De Neck. el. bot. n. 182. Borkh. tent. n. 447.

Cal. communis polyphyllus imbricatus persistens: proprius inferus tubulatus 5 - fidus. Cor. labio superiori 2 - partito: inferiori 3 - partito. Receptaculum paleaceum. Sem. nuda.

59. DIPSACUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 148. De Neck. el. b. n. 199. Borkh. tent. n. 446.

Cal. communis polyphyllus persistens: proprius 1 - phyllus minimus superus integer. Corollulae 4 - fidae. Receptaculum paleaceum. Sem. solitaria margine calycino integro coronata.

60. SCABIOSA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 149. De Neck. el. b. n. 188. Borkh. tent. n. 445.

Cal. communis polyphyllus persistens: proprius duplex superus, exterior membranaceus, interior 5 - fidus. Receptaculum paleaceum.

61. SHERARDIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 156. De Neck. el. b. n. 329. Borkh. tent. n. 403.

Cal. 1 - phyllus 4 - 6 - dentatus superus persistens. Cor. infundibiformis 4 - fida. Sem. 2 tridentata.

62. ASPERULA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 157. De Neck. el. b. n. 331. Borkh. tent. n. 407.

Cal. minimus 4 - dentatus superus. Cor. infundibiformis. Sem. 2 coalita globosa.

63. GALLIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 162. De Neck. el. bot. n. 332. Borkh. tent. n. 404.

Cal. minimus 4 - dentatus superus. Cor. 1 - petala plana supera 4 - fida. Sem. 2 subrotunda edentula.

64. RUBIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 164. De Neck. el. b. n. 330. Borkh. tent. n. 406.

Cal. minimus 4 - 5 - dentatus superus. Cor. supera campanulata 4 - 5 - fida. Baccæ 2 siccae 1 - spermae.

65. PLANTAGO.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 186. De Neck. el. bot. n. 614. Borkh. tent. n. 388.

Cal.

Cal. 4 - fidus. *Cor.* rotata 4 - fida infera: *limbo* reflexo. *Stamina* longissima. *Caps.* 2 - locularis circumscissa polysperma.

66. CENTUNCULUS.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 189. *De Neck. el. b.* n. 611. *Borkh. tent.* n. 373.

Cal. 4 - fidus persistens. *Cor.* 4 - fida infera tubulosa: *limbo* patente. *Stamina* brevissima. *Caps.* 1 - locularis circumscissa polysperma.

67. SANQUISORBA.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 190. *De Neck. el. b.* n. 814. *Borkh. tent.* n. 370.

Cal. 2 - phyllus inferus. *Cor.* 4 - petala supera. *Germen* inter calycem et corollam.

68. CORNUS.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 194. *De Neck. el. bot.* n. 1173. *Borkh. tent.* n. 143.

Involucrum 4 - phylum aut o. *Cal.* minimus 4 - dentatus inferus. *Petala* 4 supera. *Drupa* infera 2 - locularis.

69. TRAPA.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 208. *De Neck. el. bot.* n. 812. *Borkh. tent.* n. 148.

Cal. 4 - fidus persistens. *Cor.* 4 - petala. *Nux* spinis 4 oppositis cincta, quae calycis folia fuere.

70. PARIETARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1576. De Neck. el. bot. n. 930. Borkh. tent. n. 36.

Cal. 4 - fidus inferus. Cor. o. Sem. calyce elongato tectum. Flores aliquot foeminei.

71. ALCHEMILLA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 222. De Neck. el. b. n. 935. Borkh. tent. n. 605.

Cal. 1 - phyllus 8 - fidus inferus : laciniis alternis minoribus. Cor. o. Sem. 1 nudum.

72. APHANES.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 223. De Neck. elem. bot. n. 936.

Cal. tubulatus 8 - fidus : laciniis alternis minimis. Cor. o. Sem. 2 calyce vestita : uno saepius abortivo.

73. SCIOPHILA.

Wibel. Flor. werth. p. 147. Roth. Fl. germ. I. p. 70. (Majanthem.) G. M. Sch. Flor. d. Wetter. n. Lxvijj (Bifolium.)

Cal. o. Cor. 4 - fida : laciniis reflexis. Bacca 2 - locularis.

DIGYNIA.

74. CUSCUTA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 227. De Neck. el. b. n. 647. Borkh. tent. n. 389.

Cal.

Cal. 4 - 5 - fidus. *Cor.* 1 - petala subglobosa 4 - 5 - fida. *Stamina* (4 - 5) brevissima. *Caps.* carnosa 2 - locularis basi circumscissa. *Sem.* bina.

T E T R A G Y N I A.

75. POTAMOGETON.

Linn. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 234. *De Neck. el. bot.* n. 1668. *Borkh. tent.* 42.

Cal. o. *Petala* 4 decidua. *Stylus* o. *Sem.* 4 coriata acuminata gibba.

76. SAGINA.

L. *Gen. pl. ed. Schreb.* n. 236. *De Neck. el. bot.* n. 843. *Borckh. tent.* n. 68. .

Cal. 4 - phyllus. *Cor.* 4 - petala. *Caps.* 4 - valvis 1 - locularis polysperma.

77. RADIODIA.

Smith. Flor. britan. V. I. p. 202. *Pers. Synops.* *pl. I.* p. 153.

Cal. multifidus. *Cor.* 4 - petala. *Caps.* globosa supera 8 - valvis 8 - locularis. *Sem.* solitaria.

CLAS SIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

58. GLOBULARIA, *Kugelblume*.

I) *G. vulgaris* caule simplicissimo, foliis radiis calibus 3 - dentatis: caulinis lanceolatis. *Gemeine Kugelblume, blaue Maßlieben.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 540. Ejusd. Enum. p. 142. Pers. syn. pl. I. p. 118. Hoffm. Germ. I. p. 67. Sehkuhr. bot. Handb. t. 21. De Vest Man. bot. p. 338.*)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in montosis, apricis. (In monte versus sylvam vitihoechheimensem non procul a ruinis arcis *Ravenspurg* ante tres annos specimina tria legi. In monte *Kalbenstein* prope *Karlenburg* secundum exemplaria a cl. *D. Geist* mihi missa. In monte *Zabelstein* prope *Gerolshofen* ex trad. cl. *Antecess. Heilm.*)

Caulis digitalis, herbaceus, erectus totus, aul basi curvus, glaber, angulatus. Folia firma, nervosa, glabra, laete viridia: radicalia in orbem disposita, petiolata, ovata, apice emarginata sub - 3 - dentata: caulina minora, alterna, sessilia, lanceolata, vel lanceolato - oblonga. Flores plerumque coerulei, raro albi,

albi, sessiles, capitulum terminale densem calyce communi polyphyllo dense imbricato suffultum formant.

59. DIPSACUS, Karte, Kartendistel.

1) *D. Fullonum* foliis sessilibus serratis, paleis uncinatis. *Weber - Karte, Walker - Karte, Weberdistel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 543. *Ejusd. Enum.* p. 143. Pers. syn. pl. I. p. 119. Hoffm. Germ. I. p. 8, Schkuhr. Handb. t. 21. *Herb. Blackw.* t. 50. *De Vest.* Man. bot. p. 341.)

Bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in arvis arenosis, ad vias hinc inde quasi sponte. (In agris et arvis prope Thüngen et Aschach raro. Copiosius prope Königshofen in arvis.)

Caulis 4 - 5 - pedalis, rectus, glaberrimus, angulosus, aculeatus. *Folia* oblonga, obtusa, glabra, inaequaliter serrata costis aculeatis: *radicalia* in petiolum attenuata, *caulina* connato - perfoliata. *Flores* albi aut dilute purpurei in capitulum oblongo - ova- tum obtusissimum densem foliolis pluribus inaequali- longis rigidis mucronatis recurvatis involucratum collecti. *Paleae* rigidae, acuminatae, aduncae.

2) *D. sylvestris* foliis sessilibus serratis, paleis rectis. *Wilde Karte, Wald - Kartendistel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 544. *Ejusd. Enum.* l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Jacq. Austr. t. 402. *De Vest.* Man. bot. p. 342.)

Bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in hortis, ad sepes. (In Insula versus dem Siechhausse raro. Ad sepes infra Veitshöchheim versus Thüngersheim et Retzbach. Ad ripas Tuberis prope Röttingen et alibi frequens.)

Caulis 4 - 6 - pedalis, rectus, glaber, sulcatus, rigidus, aculeatus. *Folia* opposita, connato-perfoliata, glabra, ovato-lanceolata, inaequaliter serrata costis aculeatis: *summa* angustiora, lanceolata, integrerrima, marginibus hinc inde aculeata. *Capitulum* magnum figura prioris: *floribus* dilute purpureis aut albis. *Involucri foliola* majora, inaequalia, inflexa, capitulo longiora. *Paleae* rectae, lineares, setaceae, acutae, flexiles, flores multum excedentes.

3) *D. pilosus* foliis petiolatis appendiculatis, involucri foliolis capitulo subrotundo aequalibus.
Behaarte Karte.

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Jacq. Austr. t. 248. *De Vest. Man bot.* l. c.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in locis subhumidis, ad fossas, ad sepes. (In fossa oppidana prope dem Sanderthore per aliquot annos sponte crescentem observavi. Ad sepes hinc inde hortorum circa urbem. In Insula prope Ochsenfurth raro. In fossa oppidana carolopolitanam cum cl. D. Geist semel legi.)

Caulis 3 - 5 pedalis, rectus, angulatus, inferne pilosus, superne aculeatus: *ramis* multis oppositis. *Folia* laete viridia, utrinque pilosa, costa media aculeata, opposita, ovata, acuminata, serrata. *Petioi* complanati, basi connati, et praecipue superiores utrinque *auricula* instructi. *Involucri foliola* foliacea, plau-

plana, deflexa, capitulum subrotundum aequantia.
Flores albi. Paleae rectae, pilosissimae, ciliatae.

60. SCABIOSA, Krätkraut.

Corollulis quadrifidis.

1) *Sc. arvensis* corollulis 4 - fidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido. *Acker-Krätkraut, Apostemkraut, Grindkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 550. *Ejusd.* Enum. p. 145. *Pers.* syn. pl. I. p. 120. *Hoffm.* Germ. I. p. 69. *Schkuhr Handb.* t. 22. *Herb. Blackw.* t. 105. *De Vest. Man. bot.* p. 340.)

Perenn. Flor. Majo - Septembri.

Hab. in pratis, arvis, et ad vias ubique.

Caulis 1 - 2 - 3 - pedalis erectus, ramosus, teres, punctis nigricantibus pilosis hispidus. *Folia* hirsuta: *radicalia* lanceolata serrata, *caulina* pinnatifida incisa: *lobis* distantibus, *summa* indivisa. *Capitula* terminalia, hemisphaerica, radiata *Calyx communis* foliolis ciliatis: *proprios* denticulis 8 - 9 brevissimis villosis. *Corollulae* purpureo - coeruleae, incarnatae, interdum albidae.

2) *Sc. sylvatica* corollulis 4 - fidis radiantibus, foliis omnibus indivisis ovato - oblongis serratis, caule hispido. *Wildes Krätkraut, breitblättriges Apostemkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 551. *Ejusd.* Enum. p. 146. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. t. 362. *De Vest. Man. bot. l. c.*)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis sylvaticis. (Rarissime ad margines sylvae vitihoechheimensis, in sylvaticis prope Unterleinach, et im Huck prope Klingenstein. Etiam in monte supra Randersacker versus Theilheim semel legi.)

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, teres, ramosus, punctis nigricantibus aut atro - purpureis pilosis undique hispidus. *Folia* opposita, ovato - oblonga, serrata, indivisa, utrinque hirsuta: *radicalia* in petiolum decurrentia, *caulina* sessilia amplexicaulia, *summa* integerrima. *Corollulae* radiantes, aut subaequales, e purpureo - violaceae. *Capitula* mediocria, subrotunda, laxa.

3) *Sc. succisa* corollulis 4 - fidis aequalibus, caule simplici: ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, capitulis subglobosis. *Abgebißenes Krätzkr.* *Teufels - Abbiß.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 548. *Ejusdem* Enum. p. 144. *Pers.* syn. pl. p. 119. *Hoffm.* Germ. p. 68. *Herb. Blackw.* t. 142. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Knorr.* thesaur. I. t. T. 7.)

Succisa pratensis *Moench.* Meth. p. 489.

Perenn. Flor. Augusto - Octobri.

Hab. in sylvaticis subhumidis, et umbrosis ubique.

Radix praemorsa. *Caulis* 1 - 2 - pedalis, erectus, teres, glaberrimus, inferne simplex, superne in ramos aliquot oppositos minime divaricatos divisus. *Folia radicalia* in orbem digesta petiolata ovata integerrima, *caulina* opposita subsessilia lanceolata integra, quandoque denticulata, *suprema* linearis - lanceo-

ceolata integerrima. *Capitulum* subrotundum, densum, antrorum nutans. *Corollulae* violaceo-coeruleae.

Corollulis quinquefidis.

4) *Sc. columbaria* corollulis 5-fidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis lyratisque crenatis, caulinis pinnatis linearibus. *Tauben-Krätskr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 552. *Ejusd.* Enum. p. 146. *Pers.* syn. pl. p. 120. *Hoffm.* Germ. p. 69. *De Vest.* Man. bot. p. 341.)

Succisa columbaria *Moench.* Meth. l. c.

Perenn. *Flor.* Julio - Septembri.

Hab. in montibus, et ad colles fere ubique.

Caulis 1-2-3-pedalis, erectus, ramosus, teres, glaber, inferne quandoque villosus. *Folia radicalia* in petiolum decurrentia ovata s. lyrata crenata utrinque pilosa, *caulina* sessilia pilosa pinnata: *foliolis* linearibus angustissimis, fere setaceis: *lacinias* distantibus, *suprema* linearia, integerrima. *Capitula* terminalia, hemisphaerica, densa, erecta: *floribus* violaceo-coeruleis aut pallide purpurascensibus, maxime radiantibus.

Varietas foliis omnibus pinnatifidis, *caulinis* bipinnatis: *pinnis* pinnatifidis, *summis* pinnatis linearibus in pratis siccis, inque collibus herbidis passim occurrit. *Scab. germanica* *Wolff.* *M. D.?*

5) *Sc. ochroleuca* corollulis 5-fidis radiantibus; foliis linearibus pinnatis: radicalibus bipinnatis. *Blaßgelbes Krätskraut.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 559. Ejusd. Enum. p. 148. Pers. syn. pl. p. 121. Hoffm. Germ. l. c. Jacq. Austr. t. 439.. De Vest. Man. bot. l. c.)

Per un. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in siccis montanis, in collibus herbidis. (In monte dürrbacensi prope dem Schenken-schloße et versus Veitshöchheim. In monte Nicolai prope Capellam, in collibus siccis juxta sylvam Waldskugel, et prope Giebelstadt. In montibus prope Randersacker, Eivelstadt, Karlstadt, et alibi non adeo infrequens.

A praecedente, cui maxime affinis, florum prae-cipue colore constantissime flavescente - albido dif-fert.

Per plurimos annos in horto nostro botanico culta eandem semper retulit faciem.

61. SHERARDIA, Sherardie.

I) *Sh. arvensis* foliis omnibus verticillatis, flo-ribus terminalibus. *Acker - Sherardie, Sternkraut.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 574. Ejusd. Enum. p. 150. Pers. syn. pl. I. p. 124. Hoffm. Germ. I. p. 70. Schkuhr. Handb. t. 22. De Vest. Man. bot. p. 351.)

Ann. Flor. Julio - Septembri.

Hab. in arvis requietis, inter segetes, in vineis. (In agris, in arvis et inter segetes auf dem Galgen - und Krainberge, apud Geldersheim, Bergt-heim, Dettelbach, Mühlhausen, Versbach, Remlingen, Homburg, Frickenhausen alibique passim.)

Caulis digitalis, palmaris, plerumque decumbens aut erectiusculus, tetragonus, scaber, ramosus, vel sim-

simplex. *Folia* sessilia, ovato-lanceolata, mucronata, aspera, laete viridia, verticillata: *inferiora* saepissime quaterna, *superiora* sena, quina, aut septena. *Flores* violaceo-coerulei, interdum carnei, sessiles, terminales, fasciculato-umbellati, supremo foliorum verticillo involucrati.

62. ASPERULA, *Waldmeister, Mejerich.*

1) *A. odorata* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, fructu hispido. *Wohlriechender Waldm., Sternleberkraut, Majenkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 575. *Ejusd.* Enum. p. 150. *Pers.* syn. pl. I p. 124. *Hoffm.* Germ. I. p. 70. *Schkuhr.* Handb. t. 23. *Herb. Blackw.* t. 60. *De Vest.* Man. bot. p. 350.)

Galium odoratum Scopol. Carn. I. p. 105.

Perenn. *Flor. Maj.* *Junio.*

Hab. in sylvis, et nemoribus humidis ubique.

Radix repens. *Caulis* digitalis, palmaris, pedalis, erectus, tetragonus, glaber, simplicissimus. *Folia* sessilia, lanceolata, integerrima, glabra, marginibus scabra, ad quodvis geniculum 8 aut 7 - 9 verticillata. *Flores* albi, odorati, pedunculati, in corymbo terminali ramoso 3 - fido fasciculato. *Fructus* pilis uncinatis hispidus.

2) *A. arvensis* foliis senis linear-lanceolatis, florum fasciculis sessilibus, bracteis ciliatis minutis, fructu glabro. *Acker-Waldm., blaues Ackersternkraut.*

- (L. sp. pl. ed. Willd. p. 576. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.)
Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in arvis, inter segetes. (Inter segetes et in agris requietis auf dem Galgen - und Krainberge, prope Mühhausen, Rimpar, Arnstein, Veitshöchheim, Reitzbach, Stetten ad Werram, Remlingen, Homburg et alibi.)

Radix fibrosa. Caulis palmaris, pedalis, erectus, tetragonus, dichotomus, plus minusve scaber. Folia ad caulis genicula 6 - 8 verticillata, sessilia, linearilanceolata, margine revoluta, supra glabra, subtus scabra. Flores violaceo - coerulei, parvi, sessiles, terminales, dense fasciculati: bracteis pluribus lanceolatis ciliatis cincti. Fructus glaber.

3) *A. tinctoria* foliis linearibus: inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, corollis plerisque 3 - fidis, fructu glabriusculo. *Färbenier Waldmeister.*

(Linn. sp. pl. ed. Willd. p. 578. Ejusd. Enum. p. 151. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 351.)

Galium tinctorium Scopol. Carn. p. 101.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sylvaticis montosis, in saxosis asperis, et apricis. (In monte versus dem Kloster Unterzell rariissime. In monte Kalbenstein prope Karlenburg, et in monte Fogelsburg non procul ab oppidulo Volkach aliquoties legi. Crescit etiam prope dem Zabelstein sec. cl. antecess. Heilm. et in asperis prope Schleichach.)

Radix sublignosa, ramosa, repens. Caulis palmaris, 1 - 2 - pedalis, debilis, erectiusculus vel decumbens,

bens, obsolete tetragonus, striatus, glaber, inferne scabriusculus, ad genicula tumidus, ramosus: *ramis* flaccidis. *Folia* sessilia, linearia, angusta, glabra, siccata convoluta: *inferiora* sena, *intermedia* quaterna, *suprema* et *ramea* bina opposita. *Bracteae* oppositae, lanceolatae pedunculis breviores. *Flores* in corymbis terminalibus, fasciculatis, multifloris. *Corollae* albidae, saepissime 3 - fidae, 3 - andrae. *Fructus* glabriusculus.

4) *A. cynanchica* foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis, floribus corymboso - paniculatis, corollis 4 - fidis, fructu scabriusculo. *Hügel-Walde-meister.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 579. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Galium cynanchicum Scopol. Carn. l. c.

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in montosis, ad colles, in saxosis, et arenosis ubique.

Radix repens. *Caules* plures digitales, palmares, ramosissimi, dichotomi, quadranguli, scabri, debiles, decumbentes: *apicibus* erectis. *Folia* opposita, linearia, apicem versus paulo latiora, inaequalia, glabra, marginibus scabra: *inferiora* recurva quaterna, *suprema* bina. *Bracteae* minimae, linear - setaceae. *Pedunculi* 3 - fidi, 3 - flori. *Corollae* 4 fidae, purpurascentes aut albidae, extus pubescentes. *Fructus* glabriusculus vel parum scaber.

63. GALIUM, Labkraut.

Fructu glabro.

1) *G. palustre* foliis quaternis inaequalibus obovatis planis scabris, caulis diffusis superne ramosissimis. *Sumpf - Labkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 585. Ejusd. Enum. p. 152.
Pers. syn. pl. I. p. 125. Hoffm. Germ. I. p. 71. *De Vest.* Man. bot. p. 346.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. ad ripas, in fossis, et paludibus passim.

Caules 1 - 4 pedales, ramosissimi, diffusi, procumbentes, demum erectiusculi, tetragoni, scabri. Folia quaterna, inaequalia, patentia, recurva, obovata, plana, scabra. Flores candidi in paniculis corymbosis 3 - fidis laxis: pedunculis 3 - fidis. Fructus laevis.

Var. foliis quinis et senis.

2) *G. uliginosum* foliis senis lanceolatis retrorsum serrato - aculeatis mucronatis canque rigidis, corollis fructu majoribus. *Morast - Labkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 595. Ejusd. Enum. p. 154.
Pers. syn. pl. p. 126. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 348.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis uliginosis, ad fossas, ad ripas.

Caules digitales, palmates, erecti vel declinati, tetragoni, retrorsum aculeati, ramosi, geniculati, basi saepe repentes, et radicantes. Folia sena, lanceo-

ceolata, mucronata, glauco - viridia, basi retrorsum, apicem versus antrorsum setulis minimis scabra. *Flores albidi, interdum rubicundi in corymbis terminalibus: pedunculis brevibus 3 - fidis. Fructus per lentem punctis elevatis scaber.*

3) *G. scabrum* foliis suboctonis linearibus scabris mucronatis, caule subtetragono adscendente basi ramoso. *Scharfes Labkr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 590. Ejusd. Enum. p. 152. Hoffm. Germ. I. p. 72. Jacq. austr. t. 422. De Vest. Man. bot. p. 346.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in nemorosis montosis. (Prope Versbach versus Rimpar, et im Taenn versus Dürrbach, Mühlhausen, Majnbrunn. In monte zellensi infra Unterzell, in montibus Soden - et Reissenberg. Auf dem Hohwann prope Haßfurth. In monte Adelsberg prope Gemiünden. In siccis sylvae Klaushügel versus Klosterhausen alibique haud frequens.)

Caulis palmaris, pedalis, adscendens, basi attenuatus, hispidus atque ramosus, superne scaber divaricato - ramosus: ramis rigidulis. Folia linearia, angusta, mucronata, 7 - 9, inferiora hispido - scabra, superiora scabriuscula. Pedunculi subtrichotomi. Flores albi, odorati. Corollae patentissimae: lacinias lanceolatis acuminatis. Fructus glaber.

4) *G. glaucum* caule tereti stricto, foliis octonis subtus canaliculatis, ramis pedunculisque trichotomis. *Graues Labkr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 593. Ejusd. Enum. p. 153. Pers. syn. pl. p. 127. Hoffm. Germ. p. 73. Jacquin Austr. t. 81. De Vest. Man. bot. p. 347.*)

G. campanulatum Villars Delph. 2. p. 326. t. 7.
Wibel. Werth. p. 131.

Perenn. *Flor.* *Mojo — Julio.*

Hab. in montosis, saxosis, ad muros.
 (Ad muros et ad vias versus *Veitshöchheim* satis frequens. In muris et in saxosis inter vineas des *Steinberges*. Ad muros et ad vias der *Stein- + Weinberge* prope *Karlstadt*, in monte arcis *Karlsburg* ibidem, et in monte *Kalbenstein* prope *Karlenburg*.)

Caulis sesqui - 2 - pedalis, erectus, strictus, teres, ramosus, laevis, geniculatus, rore glauco adspersus. *Folia* linearia, angusta, mucronata, rigida, scabriuscula, subtus canaliculata, glauco - viridia; *inferiora* octona, *summa* quaterna. *Panicula* corymbosa, diffusa: *pedunculis* trifidis erectis. *Corollae* majusculae, subcampanulatae, purpurascentes aut albae. *Fructus* bini, oblongi, glabri.

5) *G. austriacum* foliis suboctonis glabris mucronatis, caule diffuso, ramis floriferis subtrichotomis. *Oesterreichisches Labkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 587. *Pers.* syn. pl. p. 127. *Jacq.* austr. t. 80. *De Vest.* Man. bot. p. 346.)

G. glabrum Hoffm. Germ. I. p. 72.

Perenn. *Flor.* *Jun. Julio.*

Hab. in saxosis apricis, etiam in sylvaticis. (In monte juxta dem *Bürgerwald* prope *Röttingen* specimen unicum legi. In *sylva* *gramschatzensi* et auf dem *Hexenbruch* invenit cl. *D. Lehmann.*)

Caules palmates, filiformes, diffusi, tetragoni, erectiusculi, glaberrimi, ad nodos rotundati. *Folia* pa-

patentia, linearia, mucronata, 5 ad 10, integerima glaberrima que. *Flores* albidi, erectiusculi, in pedunculis trichotomis aphyllis. *Fructus* subincurvi, nigrificantes.

6) *G. erectum* foliis suboctonis glabris antrorsum aculeato - serrulatis mucronatis, paniculis trichotomis. *Aufrechtes Labkr.*

(*Pers.* syn. pl. l. c. *Smith.* Britan. V. I. p. 176. *Hoffm.* Germ. I. p. 72.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in pratis siccis, in pascuis. (In siccis prope sylvam stettensem sec. specimen a cl. M. D. Geist mihi communicatum. Raro in pascuis des Hexenbruchs, Lehm.)

Caulis palmaris et altior, ramosissimus, flacidus, erectiusculus, glabriusculus. *Folia* 6 - 7 - 8, elliptico - lanceolata, mucronata, glabra, margine antrorsum aculeato - serrulata. *Paniculae* multiflorae, terminales et laterales, trichotomae, foliosae. *Corollae* albae, acuminatae. *Fructus* parvus, laevis

7) *G. verum* foliis octonis linearibus sulcatis scabriusculis, floribus paniculatis congestis, ramis floriferis brevibus. *Wahres, gelbes Labkraut.* *Frauenstroh.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 590. *Ejusd.* Enüm. p. 152. *Pers.* syn. pl. p. 127. *Hoffm.* Germ. p. 73. *Schkuhr.* Handb. t. 23. *Herb.* *Blackw.* t. 435. *De Vest.* Man. bot. p. 347.)

Perenn. *Flor.* *Junio - Augusto.*

Hab. in pratis, versuris, et ad vias ubique.

Cau-

Caulis 1 - 2 - 3 - *pedalis*, erectus vel adscendens, *teretiusculus* s. obsolete quadrangulus, durus, *scabriuscus*, ramosus, geniculatus. *Folia* sessilia, integerrima, margine revoluta, linearia, acuta, rigida, scabriuscula: *caulina* octona, *ramea* sena verticillata. *Flores* saturate lutei, odorati, in panicula terminali speciosa subcontracta densa multiflora: *pedunculis* 3 fidis. *Fructus* subrotundi, laeves.

8) *G.* *Mollugo* foliis octonis linearis-lanceolatis mucronatis planis scabriusculis, panicula divaricata, caule flaccido. *Weiβes Labkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab. in pratis, in campis, et ad vias ubique.

Caules 2 - 3 - 4 - *pedales*, erectiusculi, debiles, tetragoni, glabri, ramosi, geniculati. *Folia* linearis-lanceolata, plana, marginibus scabriuscula et serrulata, mucronata, patentia, sessilia: *inferiora* octona, *ramea* sena, *suprema* bina opposita. *Flores* albi in paniculis fasciculatis, subdiffusis, 3 - 5 - fidis. *Fructus* rugosus, glaber.

Variat foliis angustioribus et latioribus.

9) *G. sylvaticum* foliis octonis lanceolatis planis utrinque laevibus: floralibus binis, pedunculis capillaris elongatis, caule laevi stricto. *Wald-Labkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 591. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab.

Hab. in sylvis et nemoribus frequens.

Caulis 2 - 4 - *pedalis*, *erectus*, *subtetragonous*, *laevis*, *glaber*, *ramosus*, *geniculatus*, *rore glauco obductus*. *Folia* *glauco-viridia*, *lato-lanceolata*, *plana*, *mucronata*, *utrinque laevia*, *margine scabriuscula*: *inferiora octona*, *sena*, *floralia bina opposita*. *Panicula* 3 - *fida*, *diffusa*: *pedunculis elongatis capillaribus* 3 - *fidis*. *Flores* *albi*, *ante anthesin nuntiantes*. *Fructus* *parvus*, *laeviusculus*.

10) *G. spurium* foliis senis lanceolatis *carinatis* *scabris retrorsum aculeatis*, *pedunculis axillariis* 3 - *floris*. *Unäctes Labkr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 594. *Ejusd. Enum.* p. 154. *Pers. syn. pl.* p. 126. *Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot.* p. 348.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes passim

Caulis *pedalis*, *sesquipedalis*, *erectus*, *saepe ascendens et prostratus*, *tetragonous*, *basi tantum ramosus*, *coeterum simplex*, *geniculatus*: *angulis setis recurvis scabris*. *Folia* *sena*, *octona*, *lanceolata*, *mucronata*, *margine et carina retrorsum setis scaberima*. *Pedunculi* *axillares*, *solitarii aut bini*, *tetragoni*, *apice 3 - fidi et 3 - flori*. *longitudine foliorum*. *Corollae* *albidae*. *Fructus* *globosus*, *primo rugosus*, *maturitate laevis*.

11) *G. cruciatum* foliis *quaternis ovatis hirsutis*, *caule simplici piloso*, *pedunculis lateralibus* 2 - *phyllis*. *Kreutzförmiges Labkraut.*

(*Scopol. Flor. carniol.* I. p. 100. *Smith. Britan.* V. I. p. 173.)

Valantia cruciata L. sp. pl. ed. Willd. IV. p. 951.
Ejusd. Enum. p. 1040. *Pers.* syn. pl. I. p. 129. *Hoffm.*
Germ. II. p. 274. *Sturm.* D. Flor. I. 7. *Herb. Blackw.*
 t. 76. *De Vest.* Man. bot. p. 349.

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Augusto.*

Hab. in dumetis, nemoribus et sylvis fere ubique.

Caules plures pedales sesquipedales, debiles, diffusi, erectiusculi s. procumbentes, tetragoni, scabriusculi, pubescentes, simplices et ut folia laete virides. Folia late ovata, acutiuscula, integra, quaterna, patentia, molliuscula, pilosa. Flores parvi, aurei, corymbosi, pedunculati, ad genicula caulis congesti, hermaphroditici masculis intermixti. Corollae plerumque 4 - rarius 3 - fidae aut 5 - fidae. Fructus reniformi - globosus, glaber, pedicello reflexo infidens.

12) *G. Bocconi* foliis senis - octonis planis scabris mucronatis, caulis tetragonis prostratis basi pubescentibus, pedunculis subtrichotomis. *Bocconisches Labr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 587. *Ejusd.* Enum. p. 152; *Sprengel* Flor. halens. p. 51. *De Vest.* Man. botan. p. 346.)

G. sylvestre Pollich. Fl. palat. n. 151. Roth. Germ. T. I. P. II. p. 180. Wib. Werth. p. 132.

G. scabrum Pers. syn. pl. I. p. 127.

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in montosis saxosis, in collibus asperis, in que nemorosis. (Im Taenn inter Versbach et Dürrbach. Im versbacher Forst. In nemorosis prope Mühlhausen, et Gramschatz. In asperis, et mon-

montosis versus *Waldbüttelbrunn*. In montibus *Soden*-
et *Reissenberg*. In monte *Schwammburg* prope *Kitzingen*, et in monte *Hohwann* apud *Hassfurth* alibique.)

Caulis palmares, pedales, debiles, adscendentes,
erectiusculi, plerumque prostrati, tetragonii, striati,
basi hirsuti vel pubescentes, superne glabri et ramosi.
Folia scabra, linearis-lanceolata, mucronata,
marginē hispidula, plana: *inferiora* hirsuta octona,
ramea nuda sena. *Rami* floriferi elongati: *pedunculis*
erectis angulatis glabris 2 - 3 - fidis. *Corollae* albae.
Fructus subrotundus, glaber.

Fructu hispido.

13) *G. boreale* foliis quaternis lanceolatis 3-nerviis scabriusculis, caule erecto. *Nordisches Labkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 595. *Ejusd.* Enum. p. 154.
Pers. syn. pl. p. 128. *Hoffm.* Germ. p. 74. *De Pest.*
Man. bot. p. 349.)

Perenn. *Flor.* *Junio - Augusto.*

Hab. in pratis, dumetis, inque sylvaticis. (Ad margines *syrae vitihoechheimensis* raro. In dumetis et pratis prope der *Waldskuge* hinc inde. In saltu *Guttenberg* prope der *Tenfelsgrube*. In dumetis prope *Irauenroth*, *Hassenbach*, *Riedenberg*, in graminosis udis des *Kreutzberges* et alibi.)

Caulis palmaris, pedalis, sesquipedalis, erectus,
strictus, tetragonus, geniculatus, scabriusculus:
superne ramosus. *Folia* patentia, subaequalia, lanceolata, obtusa, mutica, glabra, carina et margine
tantum scabriuscula, 3 - nervia, quaterna: *floralia*
bina. *Flores* albi in corymbis racemosis, densis, mul-

tifloris : *pedunculis* sub - 3 - *sidis*. *Fructus* *setis hispidus*.

Variat foliis angustissimis, fructuque minus hispido.

I4) *G. Aparine* foliis octonis lanoeolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis. *Anklebendes Labkraut, Klebkraut, Zaunreis.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 597. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *Herb.* *Blackw.* t. 39. *De Vest.* *Man. bot.* l. c.)

Ann. Flor. Majo — Septembri.

Hab. in dumetis, cultis, et ad sepes ubique.

Caulis 2 - 4 - *pedalis* et altior, tetragonus, ramosus, debilis, scandens, ramosissimus, scaberrimus: *geniculis* tumidis villosis. *Folia* laete viridia, lanceolata, mucronulata, marginibus et carina setis retrorsum scaberrima et adhaerentia, sena, octona. *Flores* parvi, albidi vel flavescentes, fasciculati, terminales et axillares: *pedunculis* divisus scabris. *Fructus* magnus globosus, setis uncinatis hispidus.

64. R U B I A, Roethe.

I) *R. Tinctorum* foliis subsenis, caule aculeato scandente. *Färber - Röthe, Krapp.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 603. *Ejusd.* *Enum.* p. 155. *Pers.* syn. pl. I. p. 129. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 75. *Schkuhr.* *Handb.* t. 23. *Herb.* *Blackw.* t. 326. *De Vest.* *Man. bot.* p. 345.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab.

Hab. ad sepes. (Raro in hortis extra urbem et ad eorum sepes quasi sponte, inque dumetis prope Kleinlangheim et Königshofen.)

Caulis 2 - 3 - 4 - *pedalis*, scandens, ramosissimus, diffusus, angulatus, geniculatus, spinulis recurvis ob sessus. *Folia* verticillata, plerumque sena aut quina vel quaterna, ovato-lanceolata, acuminata, rigida, supra glabra, subtus et margine aculeata. *Flores* parvi, flavi, apice unquiculati, 4 - 5 fidi. *Baccæ* geminae, glabrae, globosae, nigrae.

Stamina saepius 5.

65. PLANTAGO, Weegerich.

1) *Pl. major* foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica cylindrica: floculis imbricatis. *Großer, breiter Weeger.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 641. *Ejusd. Enum.* p. 159. *Pers. syn. pl. I.* p. 138. *Hoffm. Germ. I.* p. 75. *Schkuhr. bot. Handb. t. 23.* *Herb. Blackw.* t. 35. *De Vest. Man. bot.* p. 343.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis, pascuis, ad vias et plateas ubique.

Folia omnia radicalia, ovata, obtusa, integra vel remote denticulata, in petiolum decurrentia, subtus nervis 7 - 9 eminentibus in petiolum continuatis praedita. *Scapi* plures erecti, teretes, nudi, scabriusculi. *Spica* terminalis 3 - 5 - uncialis, cylindrica, densa. *Flores* sessiles, imbricati.

2) *Pl. media* foliis ovato-lanceolatis pube censibus, scapo tereti, spica cylindrica brevi. *Mittlerer Weeger.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 642. *Ejusd.* Enum. p. 160. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Knorr.* thesaur. II. t. P.)

Perenn. Flor. Majo — Augusto.

Hab. cum praecedente ubique.

A priori foliis minus obtusis minoribus plerumque 5 - nerviis utrinque pubescentibus, petiolis brevissimis dilatatis, spica densiore ac multo breviore, et staminibus dilute purpureis differt.

3) *Pl. lanceolata* foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Spitziger Weegerich, Ruppenkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 643. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 76. *Herb. Blackw.* t. 14. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Knorr* thesaur. II. t. P. 2.)

Perenn. Flor. Majo — Augusto.

Hab. in pratis, pascuis, in cultis, et ad vias ubique.

Folia lanceolata, elongata, in petiolum decurrentia, 3 - 5 - 7 - nervia, subhirsuta, integra aut denticulata. Scapi erecti, palmares, pedales, sulcato-angulosi. Spica brevis, densa, ovata, albo nigroque varia.

66. CENTUNCULUS, *Centunkel, Kleinling.*

I) *C. minimus* foliis alternis ovatis, floribus sessilibus. *Kleinster Centunk.* *Wiesen — Kleinling.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 653. *Pers.* syn. pl. I. p. 141. *Hoffm.* Germ. I. p. 77. *Schkuhr.* Handb. t. 24. *De Vest.* Man. bot. p. 342.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. in arenosis humidis, ad ripas. (In Insula versus dem Siechhaūſe rarissime. Ad ripas moeni versus Ochsenfurth, Frickenhauſen, Euelstadt, et infra Karlstadt hinc inde. In agris etiam proventur arenosis infra Waldberg et alibi.)

Caulis 1 - 2 - uncialis, adscendens, tenuis, teres, glaber, simplex aut basi tantum parum ramosus. Folia alterna, sessilia, ovata, integerrima, crassiuscula, patentia. Flores axillares, sessiles, solitarii. Corollae regulares, exiguae, albidae vel rubicundae, pellucidae, maximo solis aestu tantum expansae. Capsulae globosae, maturae rubellae.

67. SANQUISORBA, Wiesenknopf.

I) *S. officinalis* spicis ovatis. *Offizineller Wiesenkn. Blutkraut, Speierlinggras.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 633. Ejusd. Enum. p. 163. Pers. syn. pl. I. p. 141. Hoffm. Germ. I. p. 78. Schkuhr. bot. Handb. t. 24. De Vest. Man bot. p. 345.*)

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in pratis subhumidis, et montosis. (In monte circa arcem Marienburg rarius. In pratis et locis graminosis prope Zell, Theilheim, Westheim, Ochsenfurth, Goffmannsdorf, Zellingen, Retzbach, Karsbach, alibique passim. Copiose in pratis ad Abb. Heidenfeld.)

Caulis 2 - 3 pedalis et altior, erectus, subangulatus, ramosus, saepe e fusco rubellus. Folia alterna, impari - pinnata: foliolis oppositis, pedicellatis, cordato - ovatis, obtusis, acute et inaequaliter serratis, glabris, venosis, basi saepe foliolis minimis stipulaceis acutis. Spicae terminales, solitariae, erectae, bre-

breves, ovatae, obtusae: floribus sessilibus dense imbricatis atro - sanquineis, superioribus primum expansis.

68. CORNU S, Hartriegel.

1) *C. mascula* umbellis involucrum aequantibus,
Gelbblihender Hartr. Kornelkirsche.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 661. Ejusd. Enum. p. 165. Pers. syn. pl. I. p. 143. Hoffm. Germ. I. p. 78. Schkuhr bot. Handb. t. 24. Herb. Blackw. t. 121. De Vest Man. bot. p. 353. Schmidt Baumz. t. 63. Knorr, thes. I. t. Z.)

Frutex. Flor. Mart. Aprili ante foliorum eruptionem.

Hab. copiose in hortis, et ad eorum sepes quasi sponte.

Frutex aut arbor mediocris: ramis patentissimis. Folia opposita, breviter petiolata, ovata, acuminata, integerrima, scabra. Flores pedunculati, flavi, umbellati: involucro 4 - phyllo colorato suffulti. Drupe oblonga, utrinque obtusa, nitida, cinnabarina.

Variat fructibus majoribus et minoribus, albidis et flavescensibus, floribusque 5 - andris.

2) *C. sanguinea* cymis planis involucro destitutis. *Rother Hartr. Handbeerstrauch.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 662. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Schmidt Baumz. t. 66.)

Frutex Flor. Jun. Julio.

Hab. ad sepes, in dumetis, et sylvis ubique.

Frutex mediocris: *ramis* erectis *virgatis* per hys-
mem et primo vere sanquineis. *Folia* petiolata, op-
posita, ovata, *integra*, *venosa*, *glabra*, utrinque vi-
ridia, subtus pallidiora, sero autumno rubescens.
Cymae terminales, multiflorae, planiusculae absque
involutio. *Corollae* albae. *Drupa* globosa pisi mag-
nitudine, nitida, nigra.

Variat fructibus maturis nigrescenti - coeruleis.

69. T R A P A, *Wassernuss.*

I) *T. natans* foliorum natantium petiolis vén-
tricosis. *Schwimmende Wassernuß*, *Seenuß*, *Stachel-*
nuss.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 681. *Ejusd.* Enum:
p. 168. Pers. syn. pl. I. p. 147. Hoffm. Germ. I.
p. 79. Söhkuhr. bot. Handb. t. 25. *De Vest* Man.
bot. p. 352.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

*Hab. in aquis stagnantibus, et lente flu-
entibus,* (In lacu prope *Abbat.* *Heidensfeld* cum *Ill.*
B. d. *Bodeck* speciūmina 2 legi. Ad lacum versus *Karl-*
stadt, et ad ripas *Moeni* ibidem detexit cl. *Antec.*
Heilm. Ad ripas *Moeni* inter dem *Burkardsthore* et
Heidingsfeld, inque labu fossae oppidanae prope dem
Wasserthurm aliquoties invenit *Pater meus* defunct.
Raro etiam in *lacu erlaccensi* prope *Erlach* provenit.)

Radix praelonga, sub aqua *repens*, articulata,
fibras multis capillaceis verticillatis aucta. *Caules*
longi, teretes, glabri, sub aqua repentes. *Folia* im-
me:sa multifido - capillaria: *superiora* natantia, in
orlem congesta, rhomboidea, obtusa, profunde den-
tata, supra *glabra* et laete viridia, subus fusco-
temen-

tomentosa. *Petioli longi*, tomentosi, in medio ventricosi, vesicarii. *Flores brevius pedunculati*, albi. *Nux matura durissima*, cornubus s. spinis 4 cincta, viridis, aetate nigra.

70. PARIETARIA, *Glaskraut.*

1) *P. officinalis* foliis lanceolato - ovatis basi 1 - nervibus, caule erectiusculo. *Officinelle Glaskr.* *St. Peterskraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* IV. p. 953. *Ejusd.* *Enum.* p. 1040. *Præc.* syn. pl. II. p. 555. *Hoffm.* *Germ.* II. p. 275. *Schkuhr.* *Handb.* t. 344. *Sturm Deutschl.* *Flor.* I. 9. *Herb. Blackw.* t. 56. *De Vest.* *Man.* bot. p. 354.)

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in ruderatis, ad muros. (Hinc inde ad muros fossæ oppidanæ, et in ruderatis inter hortos et vineas inter dem neuen et pleichacher Thore non procul a via versus Rimpar raro. Passim ad muros munimentorum interiorum arcis Marienburg. Inter ruinas arcium Reichelsheim prope Aub, Karlsburg apud Karlstadt, et Bodenlauben prope Kissingen, alibique.)

Caulis palmaris, pedalis et altior, erectiusculus teres, fragilis, nitens, rubello - viridis. *Folia alterna*, petiolata, lanceolato - ovata, integerrima, scabriuscula, laete viridia, subtus pallidiora. *Flores conglomerati*, axillares, sessiles, parvi, albidi. *Involucrum* 7 - fidum, 3 - florum: *flosculo centrali* foemineo.

71. ALCHEMILLA, *Frauenmantel.*

1) *A. vulgaris* foliis plicatis lobatis. *Gemeiner Frauenm.* *Sinai, Löwensuß.*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 698. *Ejusd.* Enum. p. 170.
Pers. syn. pl. I. p. 149. *Hoffm.* Germ. I. p. 79.
Sturm D. Flor. I. 2. *Herb. Blackw.* t. 72. *De Vest.*
Man. bot. p. 354. *Knorr.* thesaur. II. t. A. 9.)

Perenn. *Flor.* *Majo - Augusto.*

Hab. in umbrosis ubique.

Caulis digitalis, palmaris et altior, erectus, teres, villosus, superne paniculatus. *Folia* reniformia, plicata, pubescentia, acute dentata, lobata: *lobis* rotundatis confluentibus, *radicalia* longe petiolata *caulinis* multo ampliora. *Stipulae* magnae, foliaceae, inciso-serratae, amplexicaules. *Flores* breviter pedicellati, viridi-flavescentes, corymbosi, terminales.

72. APHANES, Ohmkraut.

I) *A. arvensis* foliis 3 - lobis pubescentibus, floribus axillaribus glomeratis sub - 1 - andris. *Ge-meines Ohmkr.* *Acker - Steinbrech.*

(*L.* spec. pl. p. 179. *Pollich.* Fl. palat. nro. 169. *Gmel.* Flor. badens. I. p. 3. *Pers.* syn. pl. I. p. 150.)

Alchemilla Aphanes *L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 699. *Hoffm.* Germ. I. p. 79. *Schkuhr.* botan. Handb. t. 26. *De Vest.* *Man. bot.* p. 354.

Alchemilla arvensis *Scopol.* Fl. carn. I. p. 115.

Ann. *Flor.* *Majo - Septembri.*

Hab. in agris arenosis, inter segetes fere ubique.

Caulis 1 - 2 - 3 - uncialis, erectiusculus s. pro-
 cumbens, ramosissimus, diffusus, villoso-canescens.
Folia breviter petiolata, alterna, villosa, subrotun-
 da,

da, 3 - loba: lobis cuneiformibus inciso - partitis.
Stipulae amplexicaules, villosae, ciliatae, dentatae.
Flores exigui, virides, hirsuti, subsessiles, axillares,
fasciculati, saepissime etiam 1 - andri et 2 - gyni.

75. SCIOPHILA, Schattenblümchen.

I) *Sc. convallarioides* foliis petiolatis cordatis.
Zauckenähnliches Schattenbl. Zweiblatt.

(Wib. Werth. p. 147.)

Convallaria bifolia L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 164.
Ejusd. Enum. p. 377. Pers. syn. pl. I. p. 373. Hoffm.
Germ. I. p. 163. Sturm. D. Flor. I. 13. De Vest.
Man. bot. p. 553.

Majanthemum Convallaria Roth. Germ. I. p. 70.
T. II. p. I. p. 196. Bernh. Erf. p. 88.

M. cordifolium Moench. Method. p. 638.

Bifolium cordatum G. M. Sch. Flor. der Wetter.
I. p. 209.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis nemoribusque fere ubique
frequens.

Caulis digitalis, sesquidigitalis, erectus, simplicissimus, teretiusculus s. angulosus, glaber, inferne punctis purpureis adspersus, foliis tantum 2 petiolatis alternis cordato - ovatis glabris integerrimis laete viridibus: altero majori. *Flores* parvi albi, odorati, pedicellis brevibus tenuibus in racemo terminali ovato, obtuso, multifloro, circiter unciali. *Bacca* globosa, immatura pallide viridis punctis rubellis, maturitate purpurea immaculata.

Variat interdum foliis tribus.

D I G Y N I A.

74. CUSCUTA, *Flachs - Seide.*

1) *C. europaea* aphylla filiformis, floribus aggregatis sessilibus, staminibus nudis. *Europäische Flachs - Seide, Seidenkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 702. Pers. syn. pl. I. p. 289. Hoffm. Germ. I. p. 80. Schkuhr. bot. Handb. t. 27. Sturm D. Flor. I. 10. Herb. Blackw. t. 554. De Vest. Man. bot. p. 355.*)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. ad sepes, in Urtica dioica, Erica vulgari, Artemisia campestri et vulgari, in Carduis et aliis plantis parasitica.

Caules praelongi, filiformes, glaberrimi, aphylli, implexi, subdichotomi, flavescenti - virides, fuscum pururascentes, radiculas papillares ex interno diis emittentes. Flores in alis ramorum aggregati, subsessiles, albidi aut dilute rubri.

2) *C. Epithymum* aphylla filiformis, floribus sessilibus aggregatis, staminibus basi squama crenata mucitis. *Thymian - Flachsseide, kleines Seidenkraut.*

(*Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c.*)

C. europaea β *L. sp. pl. ed. Willd. l. c.*

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in plantis minoribus parasitica, praecipue in Thymo Serpyllo.

A priori *caule* breviori, tenuissimo, fere capillari, magisque colorato, *calycibus* atque *corollis* minoribus constanter 5 - fidis, et *staminibus* 5 squamis crenatis germini incumbentibus differt.

T E T R A G Y N I A.

75. POTAMOGETON, Saamkraut.

1) *P. natans* foliis superioribus oblongo - ovatis petiolatis natantibus. Schwimmendes Saamkr.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 712. *Ejusd.* Enum. p. 173. *Pers. syn. pl.* I. p. 152. *Hoffm. Germ.* I. p. 81. *Schkuhr Handb.* t. 28. *Sturm D. Flor.* I. 9. *De Vest. Man. bot.* p. 357.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in fossis, lacubus, piscinis et ad ripas sere ubique.

Radix repens: fibris praelongis simplicibus. Caulis longissimi, teretes, simplices, superne divisi. Folia inferiora submersa linearia alterna, superiora natantia opposita magna oblongo - ovata integra glabra subcoriacea: petiolis praelongis planis. Spica cylindrica, obtusa, densa, fere digitalis, florens ex aqua emersa. Pedunculi crassiusculi, longi, teretes. Flores sessiles rubelli aut fusco virides.

Variat caulis tenuioribus et brevioribus, foliis angustioribus, spicisque tenuioribus, minus densis.

2) *P. fluitans* foliis inferioribus, longissimis lanceolatis membranaceis, superioribus ovali - lanceolatis coriaceis: omnibus petiolatis. Fluß - Saamkr.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 713. *Pers. syn. pl.* I. c. *Hoffm. Germ.* I. c. *De Vest. Man. bot.* p. 358.)

Perenn. Flor. Julio.

Hab. in lacubus, aquis lente fluentibus, et ad ripas fluviorum. (In lacu fossae oppidanae pro-

prope dem *Wasserthurm*. Ad moeni ripas inter *Karlstadt* et *Gemünden*. Im *Altwasser* prope *Abb. Heidenfeld* raro. Ad *Werram* prope *Werneck* aliquoties inventus *Am. Wolff.*)

Radix maxime repens: *fibris* praelongis simplicibus. *Caules* 4 - 6 - pedales, teretes, ramosi, nataentes. *Folia* alterna: *petiolis* praelongis tenuibus erectis: *inferiora* fere pedalia, lanceolata, acuminata, membranacea, subpellucida, submersa, *superiora* ovali-lanceolata, utrinque attenuata, in petiolum decurrentia, coriacea, laete viridia, natantia, *inferioribus* quidem latiora, sed multo breviora. *Pedunculi* *petiolis* crassiores, sed breviores. *Spica* subrotunda, obtusa, aquae innatans: *floribus* parvis rubicundis.

An sit praecedentis sola *varietas*, observationibus hucusque exploratum satis nondum est.

3) *P. perfoliatum* foliis cordatis amplexicaulis omnibus immersis. *Durchwachsenes Saamkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *De Vest.* *Man bot.* l. c.)

Perenn. *Flor. Majo — Julio.*

Hab. in fossis, lacubus, in rivulis, et ad ripas. (Ad lacus fossae oppidanae, et in rivulo ibidem. Ad Moeni ripas prope *Marienburghausen* et *Kitzingen*. In rivulo prope *Arnstein*, *Büchold*, et *Gänheim*. Ad rivum prope *Waldaschach* juxta molam alibique saepe copiose.)

Planta tota, praeter spicas, plerumque immersa. *Radix* longa, articulata, repens. *Caules* praelongi, teretes, ramosi, tenues, maxime foliosi. *Folia* util-

formia, alterna, sessilia, amplexicaulia, cordato-ovata, undulata, glaberrima, nitida, viridia, reticulata, pellucida, 5-nervia. Pedunculi foliis longiores cauleque paulo crassiores, axillares. Spica brevis, densa, fusca.

4) *P. lucens* foliis ovato-lanceolatis in petiolos desinentibus: omnibus immersis. Glänzendes Saamkr.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 714. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in fossis, lacubus, ad ripas. (Ad scaturiginem juxta dem Wässerthurm fossae oppidanae inque lacu ibidem. In lacu prope Erlach. Ad ripas Moeni prope Zell et Weitshöchheim raro. Ad ripas Salae prope Schundersfeld. Ad rivum prope Lbern et alibi.)

Radix repens, ramosa. Caules toti immersi, teretes, ramosi, glabri. Folia ovato-lanceolata, obtusa, nervosa, plana, integerrima, laete viridia, splendentia, pellucida: *inferiora* alterna in petiolum desinentia; *suprema* opposita sessilia. *Spica cylindrica, laxa, multiflora, fusco-virens, ex aqua emersa.*

5) *P. crispum* foliis lanceolatis alternis oppositisve undulatis serratis: omnibus immersis. Kraus-blättriges Saamkr.

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 82. De Vest. Man. bot. p. 359.)

Perenn. Flor. Maj. Iunio.

Hab. in fossis, lacubus, rivulis et ad ripas ubique.

Radix repens, ramosa. *Caules longi*, toti immersi, compressiusculi, angulati, ramosi, rubelli. *Folia lanceolata*, serrata, crispato - undulata, 3 - nervia, semiamplexicaulia, pellucida, splendentia: *inferiora remotta alterna*, *superiora magis approximata opposita*. *Pedunculi axillares foliis breviores*, cauleque tenuiores. *Spica brevis*, pauciflora: *floribus 4 - 6 rubicundis*.

6) *P. compressum* foliis linearibus obtusis, caule compresso. *Flachstengliches Saamkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 715. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in stagnis, ad ripas, et scaturigines. (Ad lacum fossae oppidanae juxta dem *Wasserthurm*. Ad ripas Moeni prope *Insulam* apud *Ochsenfurth*. Ad lacus *erlaccenses* prope *Erlach*. Ad rivulum *sylvae guttenbergensis* alibique raro.)

Radix repens, valde fibrosa. *Caules longi*, compressi, glaberrimi, ramosi, toti sub aqua natantes. *Folia sessilia*, linearia, angustissima, obtusa, integriflora, glabra, laete viridia, pellucida: *inferiora alterna*, *suprema opposita*. *Pedunculi complanati*, axillares, caule tenuiores, et foliis breviores. *Spica emersa*, parva, 4 - 6 - flora.

7) *P. marinum* foliis alternis linearibus distinctis basi vaginantibus. *Meer - Saamkraut.*

(L)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 716. *Hoffm.* Germ. I. c. *De Vest.* Man. bot. p. 360.)

P. pectinatum *Pers.* syn. pl. I. p. 152. *Smith.* Fl. britan. Vol. I. p. 197. *Spreng.* Fl. hal. p. 58.

Perenni. Flor. Jun, Julio.

Hab. passim cum prioribus.

Radix repens, tuberculis non unquam obsessa. *Caulis* immersi, praelongi, teretes, filiformes, articulati, basin versus saepe dilute rubelli, ramosissimi, dichotomi: *ramis* approximatis. *Folia* laete viridia graminea, disticha, congesta, sessilia, angustissima, linearia, basi semper vaginantia. *Stipulae* perangustrae, breves, plerumque lacerae, foliorum vaginis adnatae. *Pedunculi* axillares, solitarii, exserti, erecti, foliis longiores, crassiusculi. *Spica* florens sub-interrupta, brevis: *deflorata* longior, et valde interrupta.

76. S A G I N A, *Mastkraut.*

1) *S. procumbens* caulis procumbentibus glabris, petalis brevissimiis. *Niederliegendes Mastkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 718. *Ejusd.* Enum. p. 173. *Pers.* syn. pl. I. p. 153. *Hoffm.* Germ. I. p. 83. *Schkuhr.* Handb. t. 27. *De Vest.* Man. bot. p. 356.)

Ann. Flor. Mayo - Augusto.

Hab. in pascuis humidi usculis, in arenosis inundatis, et juxta vias ubique.

Caulis plures, 2 - unciales, vel digitales, tenues, glabri, ramosi, flavesceni - virides, procumbentes.

Fo-

Folia opposita, sessilia, connata, linearia, mucronata, plana, glabra, laete viridia: radicalia caespitosæ, suprema subfasciculata. Pedunculi axillares, foliis longiores, solitarii, 1 - flori: floriferi erecti. fructifera apice nutantes. Flores maximo tantum solis aestu expansi. Petala alba, parva, calyce breviora.

Variat floribus apetalis, et staminibus 5.

2) *S. apetala* caulis erectiusculis pubescentibus, petalis obsoletis. *Kronenloses Mastkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 719. *Pers.* syn. pl. I. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 357. *Gmel.* Bad. I. t. 1.)

Ann. Flcr. Jun. Julio.

Hab. in agris, ad vias, ad muros. (Ad vias inter vineas circa urbem, prope Veitshöchheim, et alibi. In agris am Glacis. prope Gerbrunn, Biebergau, Rimpach, Versbach, Mühlhausen, Geldersheim, Poppenhausen, et alibi.)

Caules plures, digitales, erectiusculi, tenerrimi, capillares, pubescentes, atro - virides. Folia opposita, sessilia, pubescentia, linearia - subulata. Pedunculi elongati, alterni, capillares, pilosiusculi, primo nutantes, demum erecti. Calyx clausus, margine purpurascens. Petala alba, minutissimæ, vix conspicua.

3) *S. erecta* caule erecto sub - 1 - floro. *Aufrechtes Mastkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Hoffm.* Germ. p. 84. *De Vest.* Man. bot. p. 357. *Gmel.* Bad. I. p. 393.)

Alsinella erecta Moench. Meth. p. 222.

Moenchia quaternella Ehrh. Beitr. II. p. 178.

Ann. Flor. April. Majo.

Hab. ad margines agrorum et vinearum, in sterilibus sabulosis. (Hinc inde raro ad vineas der Harfe, et im oberen Krombühel. Ad margines agrorum prope Bütthardt, Schlüsselfeld, et Tiefenthal. In sterilibus inter Retzbach et Thüngen.)

Planta glauco - viridis. Caulis 1 - 2 - uncialis, erectus, simplicissimus, strictus, glaber. Folia opposita, connato - sessilia, lanceolata, acuta, erecta, rigida, plana, glabra. Pedunculus terminalis, solitarius, (rarius bini) elongatus, 1 - florus. Flores clausi aut apice tantum subaperti. Calycis foliola rigida, acuta, glauca, margine membranacea. Petala alba, minuta, calyce breviora.

Variat floribus 6 - 8 - andris, et 5 - gynis.

77. RADIOLA, Strahlkraut.

I) *R. Millegrana* caule ramosissimo dichotomo. *Vielsaamiges Strahlkraut.*

(*Smith Flor. brit. Vol. I. p. 202. Sprengel. Flor. halens. p. 57. Pers. syn. pl. I. p. 153.*)

R. Linoides Roth. Germ. I. p. 71. II. p. 199.
Wib. Werth. p. 147.

R. dichotoma Moench. Meth. p. 288.

Linum Radiola sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1542.
Hoffm. Germ. I. 152. *De Vest. Man. bot.* p. 535.

Ann. Flor. Junio - Augusto.

Hab.

Hab. in pratis et pascuis arenosis, in inundatis. (Ad ripas Moeni prope Himmelsporten, Veitshöchheim, Thüngersheim, Eitelstadt, Frickenhausen, Sulzdorf etc. In arenosis prope Sommerach, Nordheim, Escherndorf, Astheim, Volkach, et Waldberg. In Insula versus dem Siechhausse at alibi.)

Caulis 1 - 2 uncialis, erectus, filiformis, ramosissimus, glaber, e glauco rubellus. *Folia* parva, opposita, sessilia, glabra, ovata, acuta, integerrima. *Flores* pedunculati e dichotomia caulis solitarii, erecti, minimi. *Petala* subrotunda alba.

C L A S S I S V.

P E N T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

78. M Y O S O T I S.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 240. De Neck. el. bot. n. 450. Borkh. tent. n. 363.

Cal. 5 - partitus persistens. *Cor.* hypocrateriformis 5 - fida, *tubo* brevissimo recto, *sause* clausa fornibus. *Sem.* 4 glabra aut echinata.

79. LITHOSPERMUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 241. De Neck. el. bot. n. 452. Borkh. tent. n. 355.

Cal. 5 - partitus persistens. *Cor.* infundibiliformis: *sauce* perforata nuda. *Stam.* corolla breviora. *Sem.* 4 ossea nitida.

80. ANCHUSA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 242. De Neck. el. b. n. 449. Borkh. tent. n. 362.

Cal. 5 - partitus persistens. *Cor.* infundibiliformis, *tubo* basi prismatico, *sauce* clausa 5 fornicibus. *Sem.* 4 oblongiuscula gibba basi insculpta.

81. CYNOGLOSSUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 243. De Neck. el. b. n. 454. Borkh. tent. n. 361.

Cal. 5 - partitus: *fructiferus* planus. *Cor.* infundibiliformis: *sauce* clausa 5 fornicibus. *Sem.* arillata deppressa latere ulteriore stylo affixa.

82. PULMONARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 244. De Neck. el. bot. n. 455. Borkh. tent. n. 354.

Cal. prismatico - pentagonus 5 - dentatus. *Cor.* infundibiliformis: *sauce* pervia. *Sem.* 4 subrotunda.

83. SYMPHYTUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 245. De Neck. el. bot. n. 456. Borkh. tent. n. 357.

Cal.

Cal. 5 - partitus pentagonus persistens. *Corollae* *limbus* tubulato - ventricosus: *fauce clausa radiis* 5 *subulatis conniventibus.* *Sem.* 4 acuta conniventia.

84. B O R A G O.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 248. De Neck. el. b. n. 457. Borkh. tent. n. 359.

Cal. 5 - partitus, post anthesin clausus. *Cor.* rotata: *fauce radiis clausa.* *Sem.* 4 rugosa receptaculo excavato inserta.

85. A S P E R U G O.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 249. De Neck. el. b. n. 453. Borkh. tent. n. 360.

Cal. 5 - fidus post anthesin increscens compressus. *Cor.* infundibiformis: *tubo recto, fauce clausa squamulis* 5 *conniventibus.* *Sem.* 4 oblonga compressa.

86. L Y C O P S I S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 250. De Neck. el. bot. n. 451. Borkh. tent. n. 365.

Cal. 5 - partitus. *Cor.* tubo curvato, *fauce clausa squamis* 5 *convexis.* *Sem.* 4.

87. E C H I U M.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 251. De Neck. el. b. n. 458. Borkh. tent. n. 366.

Cal. 5 - partitus. *Cor.* irregularis subcampanulata: *fauce nuda ampla.* *Stam.* tubo corollae longiora. *Stigma* 2 - partitum, *Sem.* 4.

88. ANDROSACE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 257. De Neck. el. bot. n. 633. Borkh. n. tent. 376.

Involucrum umbellulae, Cal. campanulatus angulosus 5 - dentatus. Cor. hypocrateriformis: tubo ova-to, fauce coarctata glandulosa. Caps. 1 - locularis glo-bosa apice dehiscens.

89. PRIMULA.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 258. De Neck. el. bot. n. 632. Borkh. tent. n. 375.

Cal. ventricosus pentagonus 5 - dentatus. Cor. tubo cylindrico recto, fauce pervia. Caps. teres 1 - locularis apice decemdentato dehiscens.

90. MENYANTHES.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 263. De Neck. el. b. n. 652. Borkh. tent. n. 381.

Cal. 5 - fidus persistens. Cor. 5 - fida: laciniis re-flexis intus villosis. Stigma 2 - fidum. Nectaria 5 ad basin germinis. Caps. 1 - locularis 2 - valvis erecta.

91. HOTTONIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 265. De Neck. el. bot. n. 631. Borkh. tent. n. 379.

Cal. 5 - fidus persistens. Cor. hypocrateriformis; limbo 5 - fido plano. Stam. tubo corollae imposita. Stigma globosum. Caps. 1 - locularis.

92. LYSIMACHIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 269. De Neck. el. bot. n. 659. Borkh. tent. n. 499.

Cal. 5 - partitus persistens. Cor. rotata 5 - fida. Stigma obtusum. Caps. globosa mucronata 1 - locularis 10 - valvis apice dehiscens

93. ANAGALLIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 270. De Neck. el. bot. n. 658. Borkh. tent. n. 378.

Cal. 5 - partitus persistens: laciniis carinatis. Cor. rotata 5 - partita. Filamenta hirsuta. Stigma capitatum. Caps. circumscissa 1 - locularis.

94. CONVOLVULUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 287. De Neck. el. b. n. 641. Borkh. tent. n. 393.

Cor. campanulata 5 - plicata. Stigm. 2 simplicia. Nectar. germen basi ambiens. Caps. 2 - locularis: loculis 2 - spermis.

95. CAMPANULA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 290. De Neck. el. b. n. 378. Borkh. tent. n. 372.

Cor. campanulata: fundo clauso valvis 5 staminiferis. Stigma 3 - fidum. Caps. infera poris lateralibus dehiscens.

96. PHYTEUMA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 292. De Neck. el. b. n. 377. Borkh. tent. n. 371.

Cor.

Cor. primo corniculata, a basi dein dehiscens, 5-partita rotata: *lacinias* linearibus laxis. *Stigma* 2-fidum. *Caps.* subrotunda 2-3-locularis: *foraminibus* lateralibus dehiscens.

97. LONICERA.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 319. De Neck. elem. bot. n. 219. Borkh. tent. n. 412.

Cal. 5-fidus exiguus persistens. *Cor.* 1-petala tubulosa 2-labiata: *lacinias* revolutis. *Bacca* infera 2-locularis polysperma.

98. VERBASCUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 331. De Neck. pl. bot. n. 661. Borkh. tent. n. 400.

Cor. 5-partita rotata subaequalis. *Stam.* declinata barbata. *Stigma* obtusum simplex. *Caps.* supera subrotunda 2-valvis 2-locularis.

99. Datura.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 332. De Neck. el. bot. n. 674. Borkh. tent. n. 392.

Cal. tubulosus angulosus 5-dentatus deciduus: *basi* orbiculata persistente. *Cor.* infundibiformis plicata: *angulis* aristatis. *Stigma* lamellatum. *Caps.* 2-locularis 4-valvis basi calycis imposita.

100. HYOSCYAMUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 333. De Neck. el. bot. n. 672. Borkh. tent. n. 402.

Cal.

Cal. 5 - fidus persistens. *Cor.* infundibiliformis irregularis: *limbo* 5 - fido obtuso. *Stam.* inclinata. *Caps.* operculata 2 - locularis.

101. A T R O P A.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 335. De Neck. el. bot. n. 702. Borkh. tent. n. 419.

Cal. 5 - fidus persistens. *Cor.* regularis campanulata 5 - fida. *Stam.* extrorsum arcuata. *Stigma* capitatum. *Bacca* globosa 2 - locularis calyci insidens.

102. P H Y S A L I S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 336. De Neck. el. b. n. 705. Borkh. tent. 508.

Cor. campanulato - rotata 5 - fida. *Stam.* conniventia; *antheris* subcoalitis. *Bacca* intra calycem inflatum coloratum 2 - locularis.

103. S O L A N U M.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 337. De Neck. el. b. n. 706. Borkh. tent. n. 507.

Cal. 5 - fidus acutus persistens. *Cor.* rotata 5 - loba. *Antherae* subcoalitae apice poro gemino dehiscentes. *Bacca* 2 - locularis polysperma.

104. C H I R O N I A.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 349. De Neck. el. bot. n. 664. Moench. Method. p. 449.

Cal. 5 - dentatus persistens. *Cor.* infundibiliformis 5 - fida. *Stam.* tubo corollae inserta; *antheris* demum spiralibus. *Caps.* 2 - locularis.

105. RHAMNU S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 358. De Neck. el. bot. n. 801. Borkh. tent. n. 618.

Cal. campanulatus 4 - 5 fidus. Petala squamae 4 - 5 staminibus oppositae, calycis incisuris insertae. Drupa 2 - 5 sperma. (Flor. hermaphrod. et dioici.)

106. E V O N Y M U S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 373. De Neck. el. b. n. 779. Borkh. tent. n. 63.

Cal. planus. Petala 4 - 5. Caps. 4 - 5 - gona 4 - 5 - locularis 4 - 5 valvis colorata. Sem. calyprata.

107. R I B E S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 390. De Neck. el. b. n. 816. Borkh. tent. n. 608.

Cal. superus campanulatus - 5 - fidus deciduus. Petala 5 et Stamina calyci inserta. Stylus 2 - fidus. Baccæ infera succosa polysperma.

108. H E D E R A.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 395. De Neck. el. b. n. 266. Borkh. tent. n. 132.

Cal. 5 - dentatus. Petala 5 oblonga basi dilatata. Baccæ globosa 5 - locularis 5 - sperma calyce cincta.

109. V I T I S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 396. De Neck. el. b. n. 962. Borkh. tent. n. 131.

Cal.

Cal. 5 - dentatus minimus *Petala* 5 apice calyptratim cohaerentia emarcida. *Stigma* sessile. *Bacca* 5 - sperma supera.

110. THESIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 410. De Neck. el. bot. n. 937. Borkh. tent. n. 606.

Cal. 1 - phyllus persistens 5 - dentatus superus, cui *Stamina* inserta. *Cor.* 0. *Nux infera ovalis* 1 - sperma calyce tecta.

111. VINCA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 419. De Neck. el. bot. n. 416. Borkh. tent. n. 396.

Cal. 5 - fidus. *Cor.* contorta hypocrateriformis 5 - partita infera: *fauce* pentagona. *Antherae* sagittatae. *Foliculi* 2 erecti *semina* oblonga nuda includentes.

112. VIOLE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1364. De Neck. el. bot. n. 1385. Borkh. tent. n. 346.

Cal. 5 - phyllus basi productus. *Cor.* 5 - petala irregularis postice cornuta. *Antherae* apice membranula cohaerentes. *Caps.* supera 3 - valvis 1 - locularis.

113. JASIONE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1362. De Neck. el. bot. n. 376. Borkh. tent. n. 511.

Cal. communis polyphyllus: *proprius* 1 - phyllus 5 - partitus superus. *Cor.* profunde 5 - partita: *la-*
ciniis

einiis linearibus. Stigma clavatum 2 - fidum. Antherae basi cohaerentes. Caps. infera 2 - locularis polysperma apice dehiscens.

114. IMPATIENS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1365. De Neck. el. bot. n. 1387. Borkh. tent. n. 347.

Cal. 2 - phyllus deciduus. Cor. 5 - petala irregularis: petalo superiore calcarato. Antherae apice connatae. Caps. supera 5 - valvis: valvulis spiraliter desilientibus.

DIGYNIA.

115. ASCLEPIAS.

Linn. Gen. pl. ed Schreb. n. 429. De Neck. el. bot. n. 411. Borkh. tent. n. 650.

Contorta. Nectaria 5 ovata concava corniculum exserentia. Foliculi 2. Sem. papposa.

116. HERNIARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 434. De Neck. el. bot. n. 933. Borkh. tent. n. 92.

Cal. 5 - partitus inferus persistens. Cor. o. Filamenta 10: 5 sterilibus alternis. Caps. 1 - sperma calyce tecta.

117. ATRIPLEX.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1577. De Neck. el. bot. n. 926. Borkh. tent. n. 39.

Flores hermaphroditici et foeminei. Cal. 5 - phyllos. Cor. o. Stylus 2 - partitus. Sem. I compressum. In flor. foemineis cal. 2 - phyllis.

118. CHENOPODIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 435 De Neck. el. bot. n. 921. Borkh. tent. n. 38.

Cal. 5 - phyllus 5 - gonus inferus persistens. Cor. o. Sem. I lenticulare superum calyce clauso tectum.

119. BEATA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 436. De Neck. el. bot. n. 923. Borkh. tent. n. 37.

Cal. 5 - partitus basi carnosus. Cor. o. Sem. I reniforme intra substantiam baseos calycis.

120. ULMUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 443. De Neck. el. bot. n. 876. Borkh. tent. n. 45.

Cal. 5 - fidus inferus persistens interne coloratus. Cor. o. Samara compresso - membranacea.

121. GENTIANA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 450. De Neck. el. bot. n. 620. Borkh. tent. n. 383.

Cal. subcampanulatus 5 - dentatus persistens. Cor. I - petala basi tubulosa: limbo 4 - 5 - fido. Caps. supera 1 - locularis 2 - valvis polysperma: seminibus valvulis insertis.

UMBELLATAE.

122. ERYNGIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 456. De Neck. el. bot. n. 307. Borkh. tent. n. 153.

Flores capitati paleis distincti. Involucrum polyphyllum. Cal. proprius 5 - phyllus superus. Corollae 5 - petalae. Fructus ovatus calyce et squamulis muricatus.

125. HYDROCOTYLE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 457. De Neck. el. bot. n. 298. Borkh. tent. n. 154.

Umbella simplex: involucro 4 - phyllo. Petala integra. Fructus a latere compressus gibbus.

124. SANICULA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 458. De Neck. el. bot. n. 290. Borkh. tent. n. 156.

Umbellae confertae subcapitatae. Involucra persistentia. Petala inflexa. Flosculi disci abortientes. Fructus setis hamatis hispidus.

125. ASTRANTIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 459. De Neck. el. bot. n. 305. Borkh. tent. n. 155.

Involucra partialia latiuscula patentia aequalia colorata. Flosculi radii masculi, centrales hermaphrodi fertiles. Umbella simplex. Fructus denticulis coronatus.

126. Bupleurum.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 460. De Neck. el. bot. n. 283. Borkh. tent. n. 182.

Involucella 5 - phylla umbellulis majora. Petala involuta lutea. Cal. obsoletus. Fructus subrotundus striatus lateribus compressus.

127. TORDYLIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 463. De Neck. el. bot. n. 297. Borkh. tent. n. 157.

Cor. radiatae: omnes fertiles. Involucra longa indivisa. Fructus suborbiculatus margine crenatus.

128. CAUCALIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 464. De Neck. el. bot. n. 289. Borkh. tent. n. 195.

Cor. radiatae: disci masculae. Petala inflexo-emarginata. Fructus setis per series longitudinales positus hispidus. Involucra integra.

129. DAUCUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 466. De Neck. el. bot. n. 288. Borkh. tent. n. 194.

Corollae subradiatae. Flosculi disci abortivi Involucri foliola multifida. Umbella fructifera concavo-connivens. Fructus costatus: aculeis in cristas longitudinales confluentibus maricatus.

130. CONIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 469. De Neck. el. bot. n. 294. Borkh. tent. n. 171.

Involucella dimidiata sub - 3 - phylla. Fruetus ovatus gibbus utrinque 5 - costatus: costis ante maturitatem crispis. Petala aequalia.

131. SELINUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 470. De Neck. el. bot. n. 299. Borkh. tent. n. 164.

Involucra reflexa. *Fructus* ovali - oblongus compresso - planus in medio striatus. *Petala* aequalia infexo - cordata.

152. ATHAMANTÀ.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 471. De Neck. el. bot. n. 291. Borkh. tent. n. 161.

Involucrum polyphyllum. *Petala* emarginata inflexa. *Cal.* integer. *Fructus* ovato - oblongus convexus pilosus, margine subalatus, medio costatus.

153. PEUCEDANUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 472. De Neck. el. bot. n. 328. Borkh. tent. n. 160.

Cal. 5 - dentatus. *Flosculi* disci abortivi. *Petala* regularia integra (flava) *Involucra* brevissima. *Fructus* ovali - oblongus convexus, margine alatus, medio costatus.

154. LASERPITIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 476. De Neck. el. bot. n. 279. Borkh. tent. n. 166.

Fructus oblongus utrinque 4 - alatus: *alis* membranaceis crispis pellucidis. *Petala* inflexa emarginata patentia.

155. HERACLEUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 477. De Neck. el. bot. n. 302. Borkh. tent. n. 159.

Fructus ellipticus emarginatus compressus striatus: *ala* crassiuscula cinctus. *Flosculi* radiantes. *Involucrum* caducum. *Petala* infexo - emarginata.

136. LIGUSTICUM.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 478. *De Neck. el. bot.* n. 293. *Borkh. tent. n.* 168.

Fructus oblongus utrinque 5 - sulcatus. Cor. aequales: petalis involutis integris. Cal. 5 - dentatus. Involucra marginibus membranaceis.

137. ANGELICA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 479. De Neck. el. bot. n. 317.

Fructus ovato - subrotundus: ala membranacea subpellucida cinctus, dorso costis 3 compressis parallelis notatus. Cor. aequales: petalis incurvis.

138. SIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 480. De Neck. el. bot. n. 285. Borkh. tent. n. 187.

Fructus subovatus striatus compressus. Involucra polyphylla. Petala uniformia cordata.

139. OENANTHE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 484. De Neck. el. bot. n. 308. Borkh. tent. n. 181.

Flosculi difformes, in disco sessiles steriles. Fructus ovatus striatus calyce stylisque persistentibus coronatus: cortice suberoso.

140. PHELLANDRIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 485. De Neck. el. bot. n. 309. Borkh. tent. n. 174.

Flosculi omnes fertiles: discales minores. Fructus ovato - oblongus, obsolete striatus calyce 5 - dentato stylisque coronatus.

141. CICUTA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 486. Borkh. tent. n. 176.

Fructus subrotundus striato - sulcatus. Involucrum o. Involucellum 3 - 5 phyllum: foliolis exterioribus longioribus. Cor. regulares.

142. AETHUSA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 487. De Neck. el. bot. n. 311. Borkh. tent. n. 173.

Involucrum o. Involucella 3 - phylla unilateralia pendula. Fructus subglobosus costato - sulcatus. Petala subregularia.

143. CORIANDRUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 488. De Neck. el. bot. n. 318. Borkh. tent. n. 172.

Fructus globosus glaber: striis obsoleteis. Cor. radiatae: petalis inflexo - emarginatis. Involucrum 1 - phillum: involucella dimidiata 3 - phylla.

144. SCANDEX.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 489. De Neck. el. bot. n. 314. Borkh. tent. n. 193.

Umbella simplex. Flores radiati. Involucrum o. Involucella 5 - phylla. Fructus rostro longissimo antcipiti terminatus.

145. CHAEROPHYLLUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 490. De Neck. el. bot. n. 315. Borkh. tent. n. 198.

Involucrum reflexum concavum. Petala inflexo - cordata. Fructus oblongus laevis aut striatus, glaberrimus.

146. ANTHRISCUS.

Persoon. Synops. plant. I. p. 320.

Umbella composita. Involucella lanceolata erecta. Fructus ovatus pilis scaber: rostro glabro.

147. S E S E L I.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 492. De Neck. el. bot. n. 310. Borkh. tent. n. 180.

Umbellulae subglobosae. Fructus ovatus striatus. Petala inflexo - cordata.

148. PASTINACA.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 494. De Neck. el. bot. n. 301. Borkh. tent. n. 158.

Fructus ellipticus compresso - planus utrinque laeviter emarginatus dorso striatus. Cor. aequales: petalis involutis integris (luteis.)

149. ANETHUM.

De Neck. el. bot. n. 322. Borkh. tent. n. 163.

Fructus ovalis convexus dorso striatus margine alatus. Cor. aequales: petalis involutis integris (flavis) brevissimis.

150. CARUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 497. De Neck. el. b. n. 327. Borkh. tent. n. 185.

Fructus ovato - oblongus gibbus striatus. Corollae fere regulares: petalis inflexo - emarginatis carinatis. Involucrum sub - I - phyllum.

151. PIMPINELLA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 498. De Neck. el. bot. n. 324. Borkh. tent. n. 177.

Fructus ovato - oblongus exiguus glaber: striis elevatis. Petala inflexa. Stigmata subglobosa. Umbellulae subglobosae primo nutantes.

152. APIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 499. De Neck. el. bot. n. 326. Borkh. tent. n. 188.

Fructus subglobosus aut ovatus angulatus basi ventricosus. Petala parva inflexa aequalia. Involucrum I - phyllum.

153. AEGOPODIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 500. De Neck. el. bot. n. 323. Borkh. tent. n. 189.

Fructus ovato - oblongus costatus. Petala emarginata inflexa. Involucra o.

TRIGYNI A.

154. VIBURNUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 503. De Neck. el. b. n. 247. Borkh. tent. n. 410.

Cal.

Cal. minimus 5 - partitus superus. *Cor.* rotato - campanulata 5 - fida. *Bacca* 1 - sperma.

155. SAMBUCUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 505. De Neck. el. b. n. 248. Borkh. tent. n. 411.

Cal. minimus superus 5 - partitus. *Cor.* rotato - concava 5 - fida. *Bacca* subrotunda 1 - locularis 3 - sperma.

156. STAPHYLAEA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 507. De Neck. el. b. n. 1074. Borkh. tent. n. 114.

Cal. 5 - partitus coloratus inferus. *Petala* 5. *Nectar.* in fundo floris concavum urceolatum. *Capsulae* inflatae connatae. *Nuces* 2 globosae osseae cum cicatrice.

157. ALSINE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 518. De Neck. el. bot. n. 840. Borkh. tent. n. 72.

Cal. 5 - phyllus persistens. *Petala* 5 aequalia 2 - partita. *Caps.* supera 1 - locularis 3 - valvis polysperma. *Receptaculum* centrale, liberum.

TETRAGYNIA.

158. PARNASSIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 523. De Neck. el. bot. n. 1185. Borkh. tent. n. 50.

Cal. profunde 5 - fidus persistens. *Petala* 5. *Nectar.* 5 cordata germen cingentia: *apicibus* globosis. *Caps.* 4 - valvis: *receptaculis* parietalibus.

PENTAGYNTIA.

159. STATICE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 527. De Neck. el. bot. n. 200. Borkh. tent. n. 444. Willd. Enum. pl. hort. berol. I. p. 333. (Armeria.)

Cal. communis polyphyllus: proprius 1 - phyllus integer plicatus scariosus. Petala 5. Caps. evalvis 1 - sperma calyce tecta. Recept. paleaceum.

160. LINUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 528. De Neck. el. b. n. 1824. Borkh. tent. n. 300.

Cal. 5 - phyllus persistens. Petala 5 evanida. Caps. supera 5 - valvis 10 - locularis. Sem. solitaria.

161. DROSERA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 531. De Neck. el. bot. n. 858. Borkh. tent. n. 51.

Cal. profunde 5 - fidus. Petala 5. Caps. supera 1 - locularis 3 - 4 - valvis polysperma.

POLYGYNIA.

162. MYOSURUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 538. De Neck. el. b. n. 1094. Borkh. tent. n. 122.

Cal. 5 - phyllus deciduus basi porrectus. Petala 5: unque tubuloso nectarifero. Sem. numerosa nuda.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

78. *MYOSOTIS*, *Mausohr*, *Vergissmeinnicht*.

1) *M. arvensis* caule ramoso foliisque ovato-lanceolatis hirsutis, calycibus corollam - aequantibus: fructiferis clausis, seminibus glabris. *Acker-Mausohr*.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 747. *Ejusd. Enum.* p. 176.
Pers. syn. pl. I. p. 156. *Hoffm. Germ.* I. p. 85. *De Vest. Man. bot.* p. 430.)

M. annua Moench. *hass. n.* 153.

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. in arvis, agris, pratis siccis, in ruderatis.

Caulis palmaris, *pedalis*, *erectus*, *ramosissimus*, *subangulosus*, *pilis rigidis scabris* *obsessus*. *Folia* *ovato-lanceolata* *integra*, *utrinque hirsutissima*: *radicalia* *et caulina inferiora* *obtusiora*, *petiolata*, *in petiolum decurrentia*, *superiora* *sessilia*. *Flores* *coerulei* *aut albidi*, *pedunculati* *in racemo secundo* *dichotomo*. *Calyx* *ovatus*, *acuminatus*, *hirsutissimus*, *corollam adaequans*, *aut ea parum brevior*.

Varietas *caule* digitali minus ramoso, *foliisque* angustioribus in siccissimis, et alia *caule* multo altiore, ramosiore, magis diffuso, *foliis* linear - lanceolatis, *racemo* conjugato (*M. sylvatica*) in sylvaticis umbrosis passim occurunt.

Varietas *corollis luteis teste Ill. Willdenowio* (Sp. pl. I. p. 747. sub. var. 3) in Episcopatu herbipolitano indigena mihi quidem nondum obviam fuit, sed plura ejus specimina, ni fallor, im Sinngrund, nescio quo loco lecta in Herbario paterno vidi.

2) *M. palustris* caule ramoso *foliisque lanceolatis* subglabris, calycibus ovalibus obtusis glabris longitudine tubi corollae: fructiferis subclausis, seminibus glabris. *Sumpf - Mausohr, Wasservergissmeinnicht.*

(Roth. Germ. I. p. 87. II. p. 221. Gmel. Flor. bad. I. p. 409. Wib. Werth. p. 176. G. M. Sch. Flor. der Wetter. I. p. 257. Sturm. D. Flor. I. 5. Knorr. thes. t. H. 1.)

M. scorpioides L. sp. pl. ed. Willd p. 146. Eiusd. Enum. p. 175. Pers. syn. pl. p. 156. Smith. Brit. Vol. I. p. 212. Hoffm. Germ. p. 85. De Vest. Man. bot. p. 430.

M. perennis Moench. hass. n. 154.

Perenn. Flor. Aprili — Julio.

Hab. in palustribus, ad scaturigines, et ripas ubique frequens.

A praecedente: radice perenni, *caule foliisque* magis succulentis, laete viridibus fere glabris, *corollis* majoribus elegantissimis pallide coerulescentibus, (interdum rubellis) *fause* lutescente constanter differt.

Variet. *corollis* niveis prope dem Wasserfall legit *D. stud. Neuwirth.* Ibidem etiam et in variis regionibus ad Moeni ripas observavi.

3) *M. Lappula* caule subramoso foliisque lanceolatis hirsuto, calycibus corollam subaequantibus: fructiferis patentibus, seminibus echinatis. *Kletten-saamiges Mausohr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 749. *Ejusd. Enum.* p. 176. *Pers. syn. pl.* p. 157. *Hoffm. Germ. l. c.* *De Vest. Man. bot.* p. 431.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in ruderatis, agris, vineis, ad muros et vias.

Caulis pedalis et altior, erectus, teres, scaber, inferne simplex, superne ramosus. *Folia* alterna, sessilia, scabra, lanceolata, integerrima. *Flores* spicato-racemosi, coerulei. *Semina* pilosa aculeis glocchidibus.

Variat floribus albis.

79. L I T H O S P E R M U M, *Steinsaame,* *Steinhirse.*

I) *L. arvense* seminibus rugosis, corollis calycem vix superantibus. *Acker - Steinsaame, Schminkwurz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 751. *Ejusd. Enum.* p. 177. *Pers. syn. pl.* I. p. 158. *Hoffm. Germ. I.* p. 86. *De Vest. Man. bot.* p. 436.)

Ann. Flor. Aprili — Julio.

Hab. in ruderatis, arvis, agris, inter segetes, et ad vias ubique frequens.

Radix ramosa, intus albida, extus rubra, tinctoria. *Caulis palmaris*, pedalis, sesquipedalis, erectus, ramosus, scaber. *Folia alterna*, sessilia, scabra, lanceolata, acuta, integerrima. *Flores parvi subsessiles* in racemis terminalibus secundis foliosis. *Calyces* profunde partiti, punctis nigris obsessi, hirsuti, corollas subaequantes. *Corollae albidae*, versus tubi basin annulo violaceo notatae. *Semina rugosa*, nigra.

2) *L. officinale* seminibus laevibus, corollis calycem vix superantibus. *Offizineller Steinsaame*, *Perlhirse*, *Sonnenhirse*, *wilder Thee*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 157. *Hoffm.* Germ. l. c. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 29. *Herb. Blackw.* t. 436. *Sturm.* D. Flor. I. 5. *De Vest.* Man. bot. p. 435.)

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab. in locis lapidosis, et nemorosis montosis. (Hinc inde ad vias inter vineas prope *Veits-höchheim* pone *hortum aulicum*, ibidem ad margines *sylvæ Edelmannsholz* raro. Prope *Karlstadt* inter vias des *Steinberges*, et in *lapidosis* siccissimis inter *Mühlbach* et *Karlsburg*. Raro etiam inter hortos et in eorum ejectamentis circa *Wirzburgum*, et in agris prope *Lindflur*.)

Caulis 1 - 2 - pedalis et altior, erectus, rigidus, teretiusculus, deorsum scaber, superne praecipue valde ramosus, dichotomus. *Folia* sessilia, alterna, lanceolata, acuminate, integerrima, subrugosa, punctis hirtis scabra, viridia, siccitate nigricantia. *Flores* parvi, lutei s. albi, subsessiles in *racemum* secundum dispositi. *Corollae* calycem scaberrimum vix excedentes. *Semina* nitidissima, margaritacea, alba.

3) *L. purpureo - coeruleum* seminibus laevis, corollis calycem longe superantibus. *Blaurother Steinsaame.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 754. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 158. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Fl. austr. t. 14. *De Vest.* Man. bot. p. 436.)

Prrenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in montosis sterilibus, et nemorosis.
(Juxta dem grossen Holz prope Mühlhausen. In sylvaticis prope Wipsfeld versus Klingenstein, inque sylvis Millert et Neusee rarius. Passim in montibus Soden - et Reissenberg prope Sachsenheim, prope der Sejfriedsburg infra Gemiunden. In montosis sylvaticis infra Veitshöchheim, circa der Waldskugel, et in monte dürrbaccensi versus sylvam hinc inde.)

Caules plurimi, inaequali - longi, plerumque pedales et sesquipedales, subteretes, hirsuti, superne ramosi : *exteriores* decumbentes steriles, *interiores* sub florescentia erecti, deflorati iterum decumbentes. *Folia* alterna in petiolum brevissimum decurrentia, saepe perfecte sessilia, oblongo - lanceolata, integra, hirsuta. *Flores* subsessiles, spicato - racemosi. *Corollae* purpureo - coeruleae aut violaceae, calycem multoties superantes. *Semina* nitida, alba.

So. ANCHUSA, Ochsenzunge.

I) *A. officinalis* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Gemeine Ochsenz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 756. *Ejusd.* Enum. p. 177. *Pers.* syn. pl. I. p. 159. *Hoffm.* Germ. I. p. 86.

p. 86. *Herb. Blackw.* t. 500. *Sturm D. Flor.* I. 18.

De Vest Man. bot. p. 431. *Knorr. thes.* II. t. B. 2.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in pratis siccis, ruderatis, ad vias et ripas ubique.

Caulis sesqui - 2 - *pedalis*, erectus, subangulosus, hirsutus, superne ramosus. *Folia alterna*, linearia, lanceolata, *integra*, utrinque hirsuta: *inferiora* in petiolum brevem decurrentia, *superiora* sessilia. *Spicae terminales*, conjugatae, secundae, apice incurvae. *Flores* primo rubri, demum violacei.

Varietatem *caule* humiliori, *foliis* angustioribus hirsutioribus, et *laciniis calycinis* angustissimis atque magis hirsutis in *Insula* versus *dem Siechhaūſe*, ad ripas Moeni versus *Thüngersheim*, in sterilibus sabulosis prope *dem blauen Thurm* versus *Thüingen*, prope *Volkach*, *Dettelbach*, alibique pluries vidi. (*A. angustifolia*, *Lehm.*) In hcrto nostro botanico culta nullam amplius ab *A. officinali* differentiam ostendit.

81. CYNOGLOSSUM, Hundszunge.

I) *C. officinale* foliis lato - lanceolatis basi attenuatis tomentosis sessilibus, staminibus corolla brevioribus. *Gemeine Hundsz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 760. *Ejusd. Enum.* p. 180. *Pers. syn. pl.* I. p. 159. *Hoffm. Germ.* I. p. 87. *Herb. Blackw.* t. 249. *Sturm D. Flor.* I. 9. *De Vest. Man. bot.* p. 432.)

Bienn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in pratis, ad vias, muros, ripas et in ruderatis.

Her-

Herba odoris taediosi, canini aut murini, narco-tici, siccitate evanescens. *Caulis* sesquipedalis, 2-pedalis, erectus, teres, villosus, superne ramosus: *foliis* multis lato-lanceolatis basi attenuatis integer-rimis utrinque mollibus sparsis amplexicaulibus dense obsessus. *Racemi* densi, secundi, apice reflexi. *Corollae* sordide purpureae, calycibus villosis parum longiores.

Variat raro floribus albis.

S2. PULMONARIA, *Lungenkraut.*

1) *P. officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis. *Gemeines Lungenkr. Hirschkohl.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 768. *Ejusd.* Enum. p. 182. *Pers.* syn. pl. I. p. 161. *Hoffm.* Germ. I. p. 88. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 30. *Herb.* *Blackw.* t. 376. *De Vest Man.* bot. p. 436. *Knorr.* thes. II. t. P. 2.)

Perenn. *Flor.* *Martio - Majo.*

Hab. in *sylvis*, *praecipue* *montosis* *fere ubique.*

Caules plures palmares, pedales, erecti, angulati, hirti, simpliciusculi. *Folia* *integra*, scabriuscula, albo-maculata: *caulinæ* ovato-oblonga alterna sub-decurrentia, *radicalia* latiora atque longiora ovato-cordata, longe petiolata, magisque maculata. *Flores* breviter pedunculati, terminales, racemosi, primo purpurei, demum coerulei.

Variat *foliis* *immaculatis.*

2) *P. angustifolia* foliis radicalibus lanceolatis. *Schmalblättriges Lungenkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. c. *Ejusd.* Enum. I. c.
Pers. syn. pl. p. 160. *Hoffm.* Germ. I. c. *De Vest.*
Man. bot. I. c.)

Perenn. Flor. Martio — Majo.

*Hab. in sylvis et nemorosis apricis satis
frequens.*

Folia semper immaculata, magis acuminata: *radica'ia* ovato-lanceolata in petiolum decurrentia, *caulinis* subcordato-aut ovato-lanceolata, sessilia. Coeterum cum praecedente convenit.

Varietatem floribus sordide flavis in monte Sodenberg semel vidi.

83. SYMPHYTUM, *Wallwurz*, *Beinwell*.

I) *S. officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Gemeine Wallwurz*, *Schwarzwurz*, *Großer Beinwell*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 770. *Ejusd.* Enum. p. 183. *Pers.* syn. pl. I. p. 161. *Hoffm.* Germ. I. p. 89. *Herb. Blackw.* t. 252. *Schkuhr* botan. Handb. t. 30. *Sturm D. Flor.* I. 17. *De Vest.* Man. bot. p. 434.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in umbrosis humidis, in pratis, ad ripas et in sylvis ubique.

Caulis 2-pedalis, erectus, angulatus, subramosus, scaber, foliis decurrentibus undique alatus. *Folia* scabra, rugosa, integra, ovato-lanceolata: *radicalia* petiolata, in petiolum decurrentia, et *caulinis* latiora. *Flores* terminales in racemis conjugatis basi dichotomis, unilateralibus, antrorsum nutantibus.

Co-

Corollae purpureae, carneae, aut albae, rarius pallide luteae.

Variat *calycibus* patentibus. (*S. patens.*)

84. BORAGO, *Boretsch, Boragen.*

1) *B. officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Gemeiner Boretsch, Gartenboragen.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 776. *Ejusd. Enum.* p. 185. *Pers. syn. pl.* I. p. 162. *Hoffm. Germ.* I. p. 90. *Herb. Blackw.* t. 36. *Schkuhr bot. Handb.* t. 31. *Sturm D. Flor.* I. 8. *De Vest. Man. bot.* p. 431. *Knorr. thesaur.* I. t. B. I.)

Ann. Flor. Junio — Octobri.

Hab. in cultis, inter hortos et in eorum ejectamentis quasi sponte.

Caulis pedalis et altior, erectus, dichotomus, hispidus. *Folia* alterna, sessilia, in caulem subdecurrentia, ovato - oblonga, obtusa, rugosa, hispida, scabra, laete viridia. *Racemi* terminales, bifidi, secundi, nutantes. *Corollae* formosae, cyaneae, quandoque albidae aut carneae; *staminibus* *radiisque* nigris.

85. ASPERUGO, *Scharfkraut.*

1) *A. procumbens* calycibus fructus complanatis, caule procumbente. *Liegendes Scharfskr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 778. *Ejusd. Enum.* p. 185. *Pers. syn. pl.* I. p. 162. *Hoffm. Germ.* I. p. 91.)

Ann. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in cultis, ruderatis solo pinguiori, et ad hortorum ejectamenta hinc inde.

Caules sesquipedales, 2 - pedales, procumbentes, quandoque scandentes, debiles, diffusi, angulosi, dichotomi, scabri. *Folia* alterna, in petiolum decurrentia, oblonga, acuta, integra, scaberima. *Flores* parvi, cyanei, solitarii aut gemini, axillares: *pedunculis* brevibus erectis post florescentiam recurvis. *Calyx fructus* maximus compresso - planus, scaber, nitidus, profunde lobatus.

86. LYCOPSIS, Krummhals, Wolfsgesicht.

1) *L. arvensis* foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. Acker - Krummh.

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 780. *Ejusd. Enum.* p. 186. *Pers. syn. pl. I.* p. 163. *Hoffm. Germ. I.* p. 91. *Schkuhr. bot. Handb. t. 31.* *De Vest. Man bot.* p. 434.)

Ann. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in agris, praecipue arenosis passim frequens.

Caulis palmaris, pedalis et altior, erectus, sulcatus, ramosus, undique setuloso - hispidus. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, angusto - lanceolata, margine subsinuato - dentata, saepe undulata, utrinque asperrima. *Racemi* terminales, gemini, secundi, apice incurvi, inferne laxiores. *Corollae cyaneae tubo* incurvato - flexo albo.

2) *L. pulla* foliis lanceolatis hirsutis integerrimis, calycibus fructescensibus inflatis pendulis. Schwarzbrauner Krummhals.

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 779. *Pers. syn. pl. p. 162.* *Hoffm. Germ. l. c. Jacquin Flor. austr. t. 188.* *De Vest. Man. bot.* p. 433.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. inter segetes, in agris arenosis. (Inter segetes prope *Gressthal* specimina aliquot legit *Pater meus def.* In agris ad *Lengfurth* quoque detexit *cl. D. Lehmann,*)

Radix repens. Caulis digitalis, palmaris, erectus, simplex, hirsutus. Folia lanceolata, acuminata, hirsuta, alterna, sessilia, semiamplexicaulia: radicalia in caespitem congesta obtusa. Racemi terminales, breves, incurvati, densi, multiflori; pedunculis brevissimis tomentosis. Calyx pilis rigidis obsessus, oblongus, inferne ventricosus: fructescens inflatus, pendulus. Corollae calyce duplo maiores, obsolete 5-fidae, purpureo - fuscae: extus sub limbo foveis 5 et squamis faucis setosis.

87. ECHIUM, *Natterkopf.*

I) *E. vulgare* caule tuberculato - hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, spicis lateralibus pilosis deflexis. *Gemeiner Natterkopf, Frauenkrieg.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 787. *Ejusd. Enum.* p. 187. *Pers. syn. pl.* I. p. 164. *Hoffm. Germ.* I. p. 91. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 32. *Sturm D. Flor.* I. 18. *Herb. Blackw.* t. 299. *De Vest. Man. bot.* p. 437. *Knorr. thes. II. t. E.*)

Bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in ruderatis, muris, saxosis, in collibus graminosis siccis ubique copiose.

Caulis 2 - 3 - 4 - pedalis, erectus, firmus, teres, ramosus, scaberrimus, tuberculis callosis setiferis nigris adspersus. Folia tuberculata, hispida, lanceolata, alterna, sessilia: radicalia petiolata, in petiolum decurrentia. Spicae longae, densae, pyramidatae,

tae, rigidae, apice incurvae. *Corollae* ante explicationem amoene purpureae, demum coeruleae, rarissime albae.

2) *L. violaceum* corollis stamina aequantibus, tubo calyce breviore, caule ramosissimo. *Violetter Natterkopf.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 788. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Roth.* Germ. I. p. 82. II. p. 211. *De Vest.* Man. bot. p. 438. *Moench.* Meth. p. 422.)
Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in *versuris*. (In via ab oppidulo *Ebern* versus *Gereuth* specimen unicum legi.)

Caule ramosissimo, magis diffuso, *staminibus* corollam aequantibus purpureis, *stylo* albo piloso, atque *calycibus* tubum *corollae* constanter *violaceae* aequantibus a praecedente distinctum.

88. ANDROSACE, *Mannsschild*, *Mannsharniseh.*

1) *A. septentrionalis* foliis lanceolatis dentatis glabris lucidis, perianthiis angulatis corolla brevioribus. *Nördliches Mannsch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 798. *Ejusd.* Enum. p. 190. *Pers.* syn. pl. I p. 169. *Hoffm.* Germ. ed. 1791. p. 67. *De Vest.* Man. bot. p. 451. *Moench.* Method. p. 426. *Wib.* Werth. p. 180.)

Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in *montosis*, in *agris arenosis*. (In monte *Nicolai* pluries invenit cl. *Antec.* *Heilm.* Ad margines agrorum prope *Gerbrunn* legit *Amiciss.* *Kopp.* Inter segetes prope *Himmelsporten*, *Lütthardt*,

hardi, et den *Erlacher Hösen* plagulas nonnunquam planta hac dense obsitas vidi.)

Scapi plures, 3 - 4 - unciales, palmares, stricti, teretes, nudi, glabri, simplicissimi. *Folia* omnia radicalia in orbem congesta, ad terram procumbentia, lanceolata, glabra, dentata, lucida, petiolata, in petiolum decurrentia. *Flores* albi: *pedunculis* brevibus tenuibus filiformibus simplicibus 1 - floris in apice scapi umbellatis. *Involucrum* 1 - phyllum, 8 - 10 - fidum: *laciniis* angustis lanceolatis glabris pedunculis brevioribus. *Calyx* sub 5 - gonus longitudine tubi corollae.

2) *A. elongata* foliis lanceolatis dentatis, umbella fructifera elongata, corollis calyce angulato brevioribus. *Verlängertes Mannsschild.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 797. Ejusd. Enum. p. 189. Pers. syn. pl l. c. Hoffm. Germ. I. p. 92. De Vest. Man. bot. l. c. Jacq. austr. t. 330.)

Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab inter segetes, in arenosis. (Perraro inter segetes et ad margines agrorum prope Schnackenwerth, Vassbühl, Untereussenheim et Neu - Bessingen. Copiosius in arenosis ad Tauberrettersheim, Kirchschembach, et Gerbrunn.)

Scapi plurimi, simplicissimi, filiformes, nudi, 2 - 4 - unciales. *Folia* cinerea, lanceolata, inaequilater et acute dentata, glabra, in petiolum decurrentia: *omnia* radicalia. *Involucra* inaequali - longa, integra, pedunculis breviora, acuminata. *Pedunculi* plures, umbellati, post florescentiam elongati, scapus aequantes, divaricati. *Corollae* calyce angulato breviores, albae: *laciniis* plerumque emarginatis.

89. PRIMULA, Schlüsselblume.

1) *P. officinalis* scapo multifloro, floribus omnibus nutantibus, corollarum limbo concavo. *Ge-meine Schlüsselbl.*

(*Hoffm. Germ.* I. p. 93. *Roth. Germ.* I. p. 89. II. p. 229. *Wibel. Werth.* p. 180. *Gmel. Bad.* I. p. 439. *Schlikuhr. Handb.* t. 33. *Sturm D. Flor.* I. 14.)

P. veris sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 300. *Ejusd. Enum.* p. 190. *Pers. syn. pl.* I. p. 169. *De Vest. Man. bot.* p. 448.

P. veris officinalis, *Linn.*

Perenn. Flor. April. Majo.

Hab. in pratis, pomariis et ad sepes ubique.

Folia omnia radicalia, in orbem congesta, ovata, obtusa, in petiolum decurrentia, subcrenulata, rugosa, subtus pubescentia. Scapi plerumque plures, digitales, sesquidigitales et altiores, erecti, teretes, pubescentes, simplicissimi. Flores odorati, terminales, nutantes, umbellati: pedunculis 1 - floris. Corollae luteae: limbo brevi suberecito concavo, tubo oblongo superne obsolete 5 - gono longitudine calycis. Calyx pubescens, parum inflatus. Involucrum parvum, polyphyllum.

2) *P. elatior* scapo multifloro, floribus exterioribus nutantibus, corollarum limbo plano. *Hohe Schlüsselbl. Wald-Schlüsselbl.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 801. *Ejusd. Enum.* l. c. *Pers. syn. pl.* I. p. 169. *Hoffm. Germ.* l. c. *Sturm D. Flor.* l. c. *Knorr. thes.* I. t. S. 9.)

P. inodora Hoffm. Germ. ed. 1791. p. 67. G. M. Sch. Fl. d. Wetter. I. p. 270. Walther. Flor. v. Gießen. p. 221.

P. sylvestris Scopol. Carn. I. p. 132.

P. veris elatior Linn.

Perenn. Flor. Martio — Majo.

Hab. in sylvis ubique, etiam in pratis.

A praecedente praeter magnitudinem omnium partium adiectam differt: *foliis* minus rugosis, *floribus* inodoris, *exterioribus* umbellae nutantibus, *intermediis* erectis, *corollarum limbo* majori plano, et *tubo calyce* longiore.

3) *P. farinosa* scapo multifloro, floribus omnibus erectis, corollarum limbo plano, foliis crenatis subtus pulverulentis. Bestäubte Schlüsselbl. Lerchenblümlein.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 802. Ejusd. Enum. p. 191. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 94. Sturm D. Flor. I. 14. De Vest. Man. bot. p. 449.)

Perenn. Flor. April. Majo.

Hab. in humidis. (Prope Horhausen, Grettstadt et Theres legit Am. Wolff, et in sylvaticis prope Gerolshofen cl. Dr. Loesch. copiose.)

Folia omnia radicalia in orbem digesta, oblonga, obtusa, crenata, in petiolum decurrentia, supra laete viridia, subtus farina alba obsessa. *Scapus* digitatus, erectus, glaber, superne farinosus. *Flores* terminales, erecti, umbellati, amoene purpurei. *Calyces* farinosi. *Corollarum limbus* planus, emarginatus.

90. MENYANTHES, Zottenblume.

I) *M. trifoliata* foliis ternatis. *Dreiblättrige Zottenbl. Fieberklee, Bitterklee, Wasserklee.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 811. Ejusd. Enum. p. 193. Pers. syn. pl. I. p. 171. Hoffm. Germ. I. p. 96. Sturm D. Flor. I. 8. Schkuhr. Handb. t. 35. Herb. Blackw. t. 474. De Vest. Man. bot. p. 454.*)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in paludosis, in pratis humidis, ad fossas, ad lacus. (Ad lacus et in graminosis uidis fossae oppidanae, in paludosis sylvae zellensis, in palustribus prope Dettelbach, Schwarzenau, Heidenfeld, Karlstadt, Gemünden, et ad rippas Moeni paludosas hinc inde copiosissime.)

Radix cylindrica, articulata, longe lateque repens. Folia longe petiolata, ternata: foliolis an aquis nantibus, ovato-lanceolatis s. ovatis, glabris, crassiusculis, obsolete repandis, supra laete viridibus, subtus pallidioribus punctatis. Scapus palmaris, pedalis, erectus, solidus, teres, articulatus, glaber. Flores pedicellati, racemosi. Corollae formosae ex incarnato-albidae, supra fibris densissimis obsessae.

91. HOTTONIA, Wasserfeder.

I) *H. palustris* caule multifloro, pedunculis verticillatis. *Gemeine Wass erf.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 812. Ejusd. Enum. p. 194. Pers. syn. pl. I. p. 171. Hoffm. Germ. I. p. 96. Schkuhr. bot. Handb. t. 35. De Vest. Man. bot. p. 453.*)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in aquis stagnantibus et lente fluentibus. (In fossae oppidanae lacubus prope dem *Wasserthurm*. Ad ripas Moeni supra *Ochsenfurth*, ad lacum *erlaccensem*, in aquis stagnantibus et ad lacus prope *Dettelbach*, *Schwarzach*, *Schwarzenau*, *Heidenseld*, *Karlstadt* et alibi. Ante plures annos etiam prope dem *Wasserfall* vor dem *pleichacher Thore* plures legi.)

Radix articulata, valde fibrosa, maxime repens. *Scapus palmaris*, *pedalis*, *erectus*, *teres*, *glaber*, *nudus*, *aqua emersus*. *Folia radicalia*, pectinato-pinnatifida, *glaberrima*, *laete viridia*, *submersa*, aut supra aquam expansa. *Flores pedunculati*, *verticillati* in *racemo terminali* *erecto conico* supra aquam elato. *Corollae formosae*, *albae* aut *subrubicundae*: *fauce tuboque flavescente*.

92. LYSIMACHIA, *Lysimache*, Zahlkraut.

1) *N. Nummularia* pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus, staminibus glandulosis, caule repente. *Sumpf-Lysimache*, *Pfennigkraut*, *Nagelkraut*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 821. *Ejusd.* Enum. p. 196. *Pers.* syn. pl. I. p. 172. *Hoffm.* Germ. I. p. 97. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 36. *Herb.* *Blackw.* t. 542. *De Vest.* Man. bot p. 446.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. ad fossas, ad rivulos, scaturigines, et in pratis humidis ubique.

Caulis pedalis, 2 - *pedalis*, *prostratus*, *repens*, *quadrangulus*, *compressus*, *glabriusculus*, *simplicissimus*, *saepe etiam ramosus*. *Folia breviter petiolata*,

ta, opposita, ovato - s. cordato - subrotunda, integerrima, laete viridia, glabra. *Pedunculi* axillares, solitarii, tetragoni, 1 flori, foliis plerumque breviores. *Corollae* magnae, luteae. *Stamina* glandulosa.

2) *L. nemorum* pedunculis axillaribus solitariis folio longioribus, staminibus eglandulosis, caule procumbente. *Wald-Lysimache*, *Waldweiderich*, *gelber Gauchheil*.

(*L.* sp. pl. ed *Willd.* p. 820. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Sturm* D. *Flor.* I. I. *De Vest.* *Man. bot.* p. 445.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in nemorosis umbrosis humidis. (In *sylvae Waldskugel* locis depresso humidis s. glareosis roridis passim. In humentibus sylvarum *Veitshöchheim*, *Gramsschatz*, *Kitzingen* et *Guttenberg*. Im Forst prope *Versbach*. In nemore *Huck* prope *Wipfeld*, in *sylva stettensi*, et alibi raro.)

Caulis palmaris, pedalis, procumbens, radicans, tevetiusculus, lateribus sulcatus, glaber, simpliciusculus, saepe rubicundus. *Folia* opposita, brevissime petiolata, ovata, acuta, integra, tenera, glaberrima, laete viridia, subtus punctata. *Pedunculi* solitarii, axillares, uniflori, graciles, foliis paulo longiores: *floriferi* erecti, *fructiferi* penduli. *Corollae* mediocres, luteae. *Stamina* glaberrima absque glandulis.

3) *L. vulgaris* paniculata, racemis terminalibus. *Gemeine Lysim.* *Gelbes Zahlkraut*, *gelber Weiderich*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 816. *Ejusd.* *Enum.* p. 194. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *Herb.* *Blackw.* t. 278. *De Vest.* *Man. bot.* l. c.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hal.

Hab. in umbrosis humidis, et ad ripas frequens.

Caulis 2 - 3 - 4 - *pedalis, erectus, durus, sublignosus, villosiusculus, sulcato - angulatus, ramosus. Folia opposita, brevissime petiolata s. subsessilia, saepe terna vel quaterna, ovato - lanceolata, integra, glabra, aut villosiuscula. Racemi terminales, multiflori, oppositi, paniculati. Corollae saturate luteae. Stamina glabra, basi coalita.*

4) *L. thyrsiflora* racemis lateralibus pedunculatis brevibus. *Stranßblüthige Lysimachie.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 818. Ejusd. Enum. p. 195. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in paludosis umbrosis. (Vidi specimen in Herbario cl. Antec. Heilmann in saltu kitzingensi ab eo repertum. Ipse nondum legi.)

Caulis *pedalis, sesquipedalis, erectus, simplicissimus, teres, glaber, articulatus, superne obsolete tetragonus. Folia opposita, sessilia, angusta, linearilanceolata, integerrima, supra glabra punctata, subtus villosiuscula. Racemi axillares, oppositi, erecti, breves, densi, ovati. Corollae parvae, luteae, interdum 6 - 7 - 10 - partitae. Stamina glabra, basi libera.*

93. ANAGALLIS, Gauchheil.

1) *A. phoenicea* laciniis calycinis lanceolatis corolla brevioribus. *Rother Gauchh. rother Hühnerdarm, rothe Miere.*

(*Hoffm.*)

(*Hoffm.* Germ. I. p. 98. *Gmel.* Bad. I. p. 456. *Moench.* Method. p. 512. *G. M. Sch.* Flor der Wetter. I. p. 277. *Herb. Blackw.* t. 43. *Schkuhr.* Handb. t. 63. *Sturm* D. Fl. I. I. *Wibel.* Werth. p. 181.)

A. arvensis L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 821. *Ejusd.* Enum. p. 197. *Pers.* syn. pl. I. p. 173. *Smith.* Brit. V. I. p. 230. *De Vest.* Man. bot. p. 446.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in agris, in hortis, et vineis ubique.

Caules digitales, palmares, quadranguli, glabri, basi praecipue ramosi, apicibus erectis. Folia opposita, sessilia, ovato-lanceolata, integerrima, glabra, subtus punctata. Pedunculi axillares, oppositi, simplicissimi, filiformes, uniflori: sub florescentia erecti, deflorati inflexi. Corollae constanter phoeniceae: laciniis marginibus subtilissime serrulatis, atque glandulis minutissimis obsessis. Stamina basi primo coalita, atque pilis brevibus articulatis instructa.

2) *A. coerulea* laciniis calycinis linearibus corollam aequantibus. *Blauer Gauchheil.*

(*Pers.* syn. pl. I. p. 173. *Hoffm.* Germ. l. c. *Gmel.* Bad. I. p. 458. *Moench.* Meth. p. 513. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. I. p. 278. *Herb. Blackw.* t. 274. *Wibel.* Werth. p. 182.)

A. arvensis β. L. sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Smith.* Britan. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in iisdem cum priori locis, sed frequentius.

A praecedente praeterea *caulibus* plerumque longioribus et magis ramosis, *foliis* minoribus, *corollis* paulo majoribus et constanter coeruleis differt.

94. CONVOLVULUS, *Winde.*

1) *C. arvensis* foliis sagittatis utrinque acutis, bracteis a flore remotis. *Acker-Winde. Kornwinde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 844. *Ejusdem* Enum. p. 202. *Pers. syn. pl.* I. p. 177. *Hoffm.* Germ. I. p. 99. *De Vest.* Man. bot. p. 456. *Knorr.* thesaur. I. t. W. 6.)

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in agris, arvis, collibus graminosis, inque vineis ubique.

Caules sesquipedales, et longiores, tenues, glabri, angulati, procumbentes, repentes, volubiles. *Folia* alterna, petiolata, cordato-sagittata, integra, glabra. *Pedunculi* axillares, solitarii, teretiusculi vel tetragoni, uniflori, superne incrassati, versus medium *bracteis* 2 oppositis angustissimis, fere setaceis notati. *Corollae* formosae, suaveolentes, albae: extus *radiis* purpurascensibus vel roseis: aut roseae: *radiis* albis. *Stamina* glandulosa.

Variat in aridis sterilibus *caulibus*, *foliis*, et *floribus* multo minoribus. *Pedunculos* etiam 2 - et 3 - *flores* observavi.

2) *C. Sepium* foliis sagittatis postice truncatis, bracteis floribus approximatis. *Hecken-Winde, Zaunglocke.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers. syn. pl.* l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Schkuhr.* bot. Handb.

Handb. t. 38. *Sturm* D. Flor. I. 1. *Herb. Blackw.* t. 38. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Knorr.* thesaur. I. t. W. 1.)

Perenn. Flor. Junio — Octobri.

Hab. in dumetis, et ad sepes praecipue riparum ubique.

Caulis praelongus, angulatus, glaber, volubilis, adscendens. *Folia* alterna, petiolata, glabra, cordato-sagittata, sinuata, dependentia. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, tetragoni, petiolis breviores apice *bracteis* 2 oppositis cordato-lanceolatis, magnis calycem superantibus instructi. *Corollae* magnae, speciosae, niveae. *Glandula* crocea, interdum albida, nitida ad basin germinis.

95. CAMPANULA, *Glockenblume.*

Foliis laevioribus, angustioribus.

I) *C. rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Rundblättrige Glockenblume, Buschglocke.*

(L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 892. *Ejusd.* Enum. p. 209. *Pers.* syn. pl. I. p. 188. *Hoffm.* Germ. I. p. 100. *De Vest.* Man. bot. p. 461.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pascuis, nemoribus et ad muros ubique frequens.

Caulis pedalis, erectus, subangulatus, glaber, ramosus, multiflorus. *Folia radicalia* longe petiolata, reniformi-cordata, obtusa, crenulata, sub florescentia plerumque jam emortua: *caulina infima* breviter petiolata alterna ovato-lanceolata, *reliqua* angusta linea-

linearia acuminata sessilia. *Flores coerulei*, raro albidii, terminales, subpaniculati subnutantes: *pedunculis* capillaribus inaequalibus unifloris. *Calycis segmenta* subulata, triquetra, laevia, corolla duplo breviora.

Varietatem *caule* humiliori unifloro in monte juxta Retzbach prope der englischen Anlage observavi.

Variat quoque *caule* elongato gracili, *foliis radicalibus* oblongis, *caulinis* angustioribus linearibus. (*C. tenuisolia Hoffm. Pers.*)

2) *C. patula* foliis strictis subvillosis: radicalibus lanceolato - ovalibus, panicula patula, calyce basi denticulato. *Ausgebreitete Glockenbl.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 896. *Ejusd. Enum.* p. 210. *Pers. syn. pl. p. 189. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 462.*

Bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis, collibus graminosis, ad margines sylvarum, et agrorum fere ubique.

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, angulatus, inferne simplex atque scaber, superne ramosus glabriusculus. *Folia radicalia* oblonga, obtusa, s. lanceolato - ovalia, in petiolum decurrentia: *caulina* alterna, sessilia, angustiora, lineari - lanceolata, amplexicaulia, obsolete crenata: *omnia* pallide viridia, utrinque villosiuscula. *Flores* coerulei aut pallide e purpureo coerulei, pedunculati, paniculati. *Panicula* terminalis, patentissima. *Calycis segmenta* angustissima, fere setacea, corolla multo breviora, basi utrinque denticulo praedita. *Corollae* ad medium 5-fidae, patentes: *laciniis* acutis.

Variat segmentis calycinis edentatis.

3) *C. Rapunculus* foliis undulatis: radicalibus lanceolato - ovalibus, panicula coarctata. *Rapunzel - Glockenblume, Acker - Rapunzel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 101. Schkuhr. botan. Handb. t. 39. De Vest. Man. bot. p. 463.)

Bienn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in pratis siccioribus, ad colles et sepes ubique.

Radix fusiformis, alba, esculenta. Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, angulatus, inferne hirsutus, superne glabriusculus: ramis brevibus erectis. Folia scabra, denticulata, undulata: radicalia ovato - lanceolata, obtusa, caulinis alterna sessilia linearis - lanceolata acuta. Panicula terminalis, erecta, longa, compacta, multiflora. Pedunculi longitudine varii, terni aut bini, uniflori. Corollae ventricosae, coeruleae aut e purpureo - coeruleae, in cultis saepe magis violaceae aut albidae. Calycis segmenta angustissima, setacea, acutissima, basi interdum denticulata.

4) *C. persicifolia* foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato - linearibus sessilibus subserratis remotis. *Pfirsichblättrige Glockenbl. Waldglocke.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 897. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Knorr. thesaur. I. t. G. I.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in pratis, ad dumeta, et in montosis sylvaticis passim frequens.

Caulis sesquipedalis, 2 - 3 - pedalis, erectus, angulatus, glaber, simplex. Folia glabra: radicalia et

cau-

caulina inferiora petiolata, in petiolum decurrentia, obovata, subserrata aut obsolete crenulata: *reliqua alterna*, sessilia, lanceolata, angustiora, remota, integrifolia. *Pedunculi* ex axillis superioribus solitarii, uniflori, breves, angulati. *Corollae magnae, speciosae, patentibus, coeruleae aut violaceo-coeruleae, quandoque, praesertim in cultis albae.* *Calycis segmenta* subulata, patentia, corolla multo breviora.

Foliis scabris, latioribus.

5) *C. rapunculoides* caule ramoso, foliis cordato-lanceolatis serratis, floribus secundis nutantibus sparsis. *Rapunzelartige Glockenbl.* Zaun-Rapunzel.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 901. *Ejusd. Enum.* p. 211. Pers. syn. pl. p. 190. Hoffm. Germ. p. 102. *De Vest. Man. bot.* p. 464.)

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in arvis, nemoribus, in cultis et ad sepes frequens.

Radix valde repens, dulcis, esculenta. *Caulis* pedalis, sesquipedalis, erectus, teretiusculus, hispidulus, superne ramosus. *Folia* cordato-lanceolata, inaequaliter serrata, supra glabriuscula, subtus magis scabra: *infima* longius petiolata, *superiora* sessilia alterna ovato-lanceolata. *Flores* terminales, spicati, longe pedunculati, sparsi, secundi, nutantes, coerulei. *Calycis segmenta* lanceolata, integerrima, scabra, reflexa, hirsuta.

6) *C. Trachelium* caule angulato, foliis cordato-lanceolatis acute serratis calycibusque hispidis,

pe-

pedunculis axillaribus trifidis. *Nesselblättrige Glockenblume, Halskraut, Zöpfeinkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 903. *Ejusd.* Enum. p. 212. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 101. *De Vest.* Man. bot. p. 465.)

Perenn. *Flor.* Jul. — Augusto.

Hab. in dumetis, ad sepes, in pomariis et nemoribus ubique.

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, angulatus, hispidus, strictus, simplex, ut plurimum cortice rubello s. sordide viridi vestitus. *Folia* hirsuta, scabra, *Urticae dioicae* foliis similia: *inferiora* longius petiolata, ovato - cordata, profunde et inaequaliter serrata, *media* brevius petiolata ovato - lanceolata, inaequaliter serrata, in petiolum decurrentia, *suprema* subsessilia lanceolata obsolete serrata. *Pedunculi* ex axillis superioribus, ramosi, plerumque 2 - 3 - fidi, rarius solitarii uniflori. *Corollae* nutantes, magnae, coeruleae, raro albidae, intus villosae. *Calycis segmenta* lanceolata, hispida, ciliata.

7) *C. glomerata* a caule angulato simplici, foliis ovatis crenatis scabris, floribus sessilibus, capitulo terminali glomerato. *Geknaulte Glockenbl.* *Buschelglockenbl.* *kleines Halskraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 102. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. *Flor.* Junio — Septembri.

Hab. in collibus herbidis, in montibus sylvaticis, nemoribus, pratis et ad sepes ubique fere.

Caulis semipedalis, pedalis, erectus, angulatus, scaber, simplex. *Folia* firma, scabra, minutim serrata,

lata, quandoque integerrima, subtus pallida: *radicalia* longe petiolata, cordato-lanceolata, *caulina* breviter petiolata, alterna, ovato-lanceolata, *suprema* sessilia, amplexicaulia. *Flores* violaceo-coerulei, sessiles, subterni, in capitulum terminale densum subglobosum congesti.

8) *Cervicaria* foliis lanceolato-linearibus undulatis hispidis, floribus aggregatis axillaribus terminalibusque. *Hirsch-Glockenbl.* *Mittleres Halskraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 904. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest. Man. bot.* p. 466.)
Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis dumetosis. (Raro in ruinis arcis *Karlsburg* inter fruticeta. In monte *Sodenburg*, et hinc inde circa arcem *Homburg* inter *Karsbach* et *Sachsenheim*. Prope *Traustadt* auf dem *Zabelstein*, in monte *Salzburg* versus *Neustadt* etiam invenit *cl. Antec. Heilm.*)

Caulis 1 - 2 - 3 - pedalis, erectus, simplex, angulatus, subtomentosus, hirsutus. *Folia* lanceolata, acuta, obtuse et inaequaliter serrata, undulata, hirsuta, scaberrima, subtus pilis albidis hispida: *radicalia* petiolata et latiora, *caulina* alterna, sessilia, semiamplexicaulia, angustiora atque acutiora. *Flores* parvi, sessiles, violaceo-s. atro-coerulei, extus hirti in axillis superioribus glomerati. *Calyces* hirsutissimi.

Capsulis obtectis, calycis sinubus reflexis.

9) *C. Speculum* caule ramosissimo diffuso, floribus solitariis, capsulis prismaticis. *Spiegel-Glockenbl.* *Frauenspiegel*, *Venusspiegel*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 912. *Ejusd. Enum.* p. 214.
Pers. syn. pl. p. 193. *Hoffm. Germ.* p. 103.)

Prismatocarpus speculum *Wib.* *Werth.* p. 184.
Moench. Method. p. 496.

Pentagonia speculum *De Vest.* *Man. bot.* p. 468.
Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. inter segetes. (Prope *Himmelsforten*,
Zell, *Weitshöchheim* etc. in monte *Galgenberg*, prope
Gerbrunn, *Bergtheim*, *Geldersheim* alibique frequens.)

Caulis digitalis, palmaris et altior, erectus, debilis, sulcatus, glaber, a basi jam ramosissimus, diffusus. *Folia* alterna, oblonga, obtusa, obsolete rariter crenulata, saturate viridia: *infima* petiolata, in petiolum decurrentia, scabriuscula: *reliqua* sessilia, semiamplexicaulia, subundulata, glabra. *Flores* copiosi in apicibus caulis et ramorum, solitarii, subsessiles, parvi, formosi, coeruleo - violacei, rarius albidii. *Corollae* subrotatae calycis segmentis breviores. *Capsulae* prismaticae.

Not. Corollis rotatis, atque valvularum staminiferarum defectu haec species a *Campanulis* quodammodo recedit.

96. PHYTUMA, *Rapunzel.*

1) *Ph. Spicatum* spica oblonga elongata, bracteis linearibus longissimis, foliis radicalibus cordatis.
Geährte Rapunz *Waldrapunzel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 923. *Ejusd. Enum.* p. 214.
Pers. syn. pl. I. p. 194. *Hoffm. Germ.* I. p. 105.
Schkuhr. bot. Handb. t. 39. *De Vest.* *Man. bot.*
 p. 460.)

Rapunculus spicatus Scopol. Carn. I. p. 150.
Moench. Meth. p. 494.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in sylvaticis umbrosis humidiusculis ubicunque frequens

Radix napiformis, esculenta. *Caulis* pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, simplicissimus, sulcatus, glaber. *Folia radicalia* longe petiolata, cordata, acuminata, obtusa, glabriuscula, duplicato - serrata, basi plerumque maculis fusco - s. atro - rubentibus notata: *caulina inferiora* in petiolum brevem decurrentia, cordato - lanceolata, serrulata, *superiora* sessilia, lanceolata, subintegerrima. *Spica* terminalis, 2 - 3 - uncialis, cylindrica, erecta, densa: *floribus* simul clausis, semiappertis, et perfecte appertis. *Corollae* coerulescentes, violaceae, ochroleucae, aut albidae, clausae in cornu longum attenuatae, primoque basi se expandentes. *Bracteae* longae, lineares, subciliatae.

Variat spica subovata.

2) *Ph. orbiculare* capitulo subrotundo, foliis crenatis ciliatis: radicalibus cordato - ovatis. *Kugelförmige Rapunzel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 921. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 459.)

Rapunculus orbicularis Scopol. Carniol. l. c., Moench. Meth. l. c.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis nemorosis, herbidis.
(Circa der Vogelsburg et Hallburg prope oppidum

Volkach rarissime. Non procul ab arce devastato *Bodenlauben*, et intra munita interiora *arcis Marienburg* ante aliquot annos specimina pauca inveni.)

A praecedente *caule* humiliori, *foliis* radicalibus cordato - ovatis, omnibusque crenatis ciliatis, *capitulo* florum subrotundo s. ovato, *bracteis* brevioribus, sed latioribus, et *corollis* purpureo - violaceis vel saturate cyaneis diversum.

97. LONICERA, *Lonizere.*

1) *L. Caprifolium* caule volubili, floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato - perfoliatis. *Durchwachsene Loniz. Jerichorose, Geisblatt.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 982. Ejusd. Enum. p. 220. Pers. syn. pl. I. p. 213. Hoffm. Germ. I. p. 106. Jacq. Fl. austr. t. 357. De Vest. Man. bot. p. 469.*)

Frutex. Flor. Majo — Julio.

*Hab. in hortis frequens, et ad eorum se-
pes hinc inde quasi sponte.*

Caulis lignosus, volubilis, teres, glaber, ramosus. *Folia* sessilia, connata, ovata, obtusa, glabra, integerrima, subtus glaucescentia: *summa* connato - perfoliata orbiculata. *Flores* vespere praesertim odorem aromaticum suavissimum exhalantes, terminales, verticillati, sessiles. *Corollae* flavescentes basi rubicundi aut ex niveo rubellae, interdum niveae. *Baccae* subrotundae, succulentae, fulvae.

2) *L. Periclymenum* caule volubili, capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Deutsche Lonizere, Specklilie, Deutsches Geisblatt.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 984. *Ejusd.* Enum. p. 221.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Schkuhr.* bot.
Handb. t. 40. *Herb. Blackw.* t. 25. *Schmidt* *Baumz.*
 t. 107. *De Vest.* *Man. bot.* l. c.)

Frutex Flor. Junio — Augusto.

Hab. cum priori, sed rarius.

Caulis lignosus, volubilis. *Folia* opposita, ovata, integerrima, subpubescentia, omnia perfecte distincta: *inferiora* breviter petiolata, *superiora* sessilia. *Flores* albi aut ochroleuci, extus plerumque rubicundi atque pubescentes, vespere imprimis suaveolentes, sessiles, in *capitulum terminale* ovato - subrotundum congesti. *Baccae* ovatae, succulentae, rubrae.

3) *L. Xylosteum* *trunko erecto, pedunculis 2-floris, foliis ovatis pubescentibus.* *Gemeine Loniz.* *Heckenkirsche, Beinholz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 986. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 107. *Schmidt.* *Baumz.* t. 113. *De Vest.* *Man. bot.* p. 470.)

Frutex Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis, nemoribus et ad sepes ubique.

Frutex 3 - 6 - *pedalis, erectus, ramosissimus.* *Lignum* durum, albidum. *Folia* opposita, petiolata, ovata, obtusa, integerrima, pubescentia, glauco-viridia. *Pedunculi* axillares, 2 - flori, petiolo longiores. *Corollae* albido - flavicantes, extus pubescentes, oppositi, inodori. *Baccae* globosae, rubrae, distinctae, basi connatae.

98. VERBASCUM, Wollkraut.

1) *V. Thapsus* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Gemeines Wollkr. Himmelsbrand, Königskerze.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1001. Ejusd. Enum. p. 223. Pers. syn. pl. I. p. 214. Hoffm. Germ. I. p. 107. Schkuhr. bot. Handb. t. 42. Herb. Blackw. t. 3. et t. 502. De Vest Man. bot. p. 443. Knorr. thes. II. t. V.*)

Bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in locis siccis arenosis, et in ruderatis frequens. (*In siccis prope dem blauen Thurm versus Thüngen copiosissime et alibi.*)

Caulis 2 - 3 - 4 - *pedalis*, erectus, strictus, simplex, tomentosus, foliis decurrentibus alatus. *Folia alterna*, oblonga, integra s. obtuse crenata, longe decurrentia, utrinque maxime tomentosa: *infima* petiolata, majora. *Spica terminalis*, longa, obtusa. *Pedunculi* breves, fasciculati, tomentosi. *Corollae magnae*, pallide luteae, extus pubescentes, intus splendidae. *Filamenta* 3 superiora lanata, 2 inferiora longiora, glabra.

2) *V. Lychnitidis* foliis cuneiformi - oblongis subtus tomentosis, caule angulato paniculato. *Lichtnelkenartiges Wollkr. Heidekerze.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1003. Ejusd. Enum. p. 224. Pers. syn. pl. p. 215. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.*)

Bienn. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in siccis, ruderatis, ad vias et sylvarum margines ubique.

Cau-

Caulis 2 - 3 - *pedalis*, *erectus*, *angulatus*, *incanus*, *ramosus*. *Folia* *cuneiformi* - *oblonga* s. *ovato-lanceolata*, *obtuse crenulata*, *supra subrugosa denu-data laete viridia*, *subtus tomentosa canescentia*: *radicalia* *petiolata*, *caulina alterna sessilia*. *Flores* *albi* s. *flavicanes*, *breviter pedunculati*, *fasciculati*, in *spicas terminales paniculatas laxas dispositi*. *Filamenta* *plumosa*.

3) *V. album* *foliis cordato - oblongis subtus farinosis canescentibus*, *caule angulato ramoso*. *Weißes Wollkraut*.

(*Mill. Dict.* n. 3. *Moench. Method.* p. 447. *G. M. Sch. Flor. der Wetter.* I. p. 296. *Walth. Flor. v. Gießs.* p. 226.)

V. Lychnitis β. *L.* sp. pl. ed. *Willd.*

Bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in ruderatis, saxosis, ad muras et vias passim cum priori.

Praecedenti maxime affine, a quo tamen differt: *foliis cordato - oblongis*, *subtus farinosis*, *spica ramosiore*, *floribusque minoribus constanter albis*.

In horto nostro botanico per multos annos cultum nulli succubuit mutationi.

4) *V. pulverulentum* *foliis ovato - oblongis subseratis utrinque pulverulentis*, *caule subtereti paniculato*. *Bestäubtes Wollkr. Staukerze*.

(*Pers. syn. pl. l. c. Smith Britan. Vol. I.* p. 251. *Gmel. Bad. I.* p. 498. *Spreng. Hal.* p. 74.)

V. Lychn. α. sp. pl. ed. *Willd. l. c.*

Bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. in locis sterilibus, ruderatis, ad vias et vinearum muros hinc inde cum prioribus.

Caulis 2 - 3 - *pedalis*, erectus, teres s. obsolete angulatus, ramosissimus, et ut folia pulverulento-tomentosus. *Folia* sessilia, ovato-oblonga, subserata: *caulina* subamplexicaulia. *Panicula* erecta, valde ramosa. *Calyx* farina alba obsoessi. *Corollae* majores, ut in praecedentibus, constanter luteae. *Stamina* villo albo obducta.

5) *V. nigrum* foliis cordato-oblongis undulato-crenatis utrinque villosis, caule subramoso. *Schwarzes Wollkr. Schwarze Kerze.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1204. *Ejusd.* Enum. p. 225. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 108. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in nemorosis montanis, ad sepes ad vias, inque ruderatis.

Caulis 2 - 3 - *pedalis*, erectus, striatus, angulosus, villosus, simpliciusculus, plerumque e viridi ruber. *Folia* utrinque villosa, scabriuscula, rugosa, undulata, obtuse crenata: *radicalia* et *caulina infima* petiolata, cordato-oblonga, acuta, magna lataque, *media* brevissime petiolata, ovata, acuminata, *suprema* sessilia. *Flores* mediocres, aurei, ad faucem maculis purpureis picti, pedunculati, fasciculati in spicis terminalibus densis simplicibus. *Stamina* purpurascens, medio villosa: *antheris* croceis.

99. D A T U R A, Stechapfel.

1) *D. stramonium* capsulis ovatis spinosis. *Gemeiner Stechapfel, Dornapfel, Igelkolben.*

(*L.*)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1008. *Ejusd.* Enum. p. 220. *Pers.* syn. pl. I. p. 216. *Hoffm.* Germ. I. p. 109. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 43. *Herb. Blackw.* t. 313. *De Vest.* Man. bot. p. 455. *Knorr.* thesaur. I. t. S. 13.)

Ann. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in cultis, ruderatis et ejectamentis ubique.

Caulis 1 - 2 - 3 - *pedalis* et *altior*, *erectus*, *teres*, *glaber*, *nitidus*, *ramosus*: *ramis* *patulis* *dichotomis*. *Folia* *alterna*, *petiolata*, *magna*, *ovata*, *acuta*, *sinuato-dentata*, *saturate viridia*, *utrinque glabra*. *Flores* *speciosi*, *magni*, *albi*, *breviter pedunculati*, *pli-cati*, *in dichotomiis et apicibus solitarii*. *Capsulae* *magnae*, *erectae*, *ovatae*, 4 - *sulcatae*: *spinis rigidis* *obsessae*.

Planta narcotica, *venenata*.

100. HYOSCYAMUS, *Bilsenkraut.*

I) *H. niger* *foliis amplexicaulibus sinuatis*, *floribus sessilibus venosis*. *Schwarzes Bilsenkr.* *Schlafkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1010. *Ejusd.* Enum. p. 227. *Pers.* syn. pl. I. p. 217. *Hoffm.* Germ. I. p. 109. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 44. *Sturm.* D. Flor. I. 3. *Herb. Blackw.* t. 550. *De Vest.* Man. bot. p. 455. *Knorr.* thes. I. t. B. 3.)

Ann. bienn. Flor. Mayo — Augusto.

Hab. in ruderatis, ad muros et ad vias frequens.

Radix *fusiformis*, *carnosa*. *Caulis* *palmaris*, *pe-dalis*, *sesquipedalis*, *solo pinquieri* 3 - 4 - *pedalis*, *erec-*

erectus s. oblique adscendens, plerumque simplex, saepius magis minusve ramosus, teres, crassiusculus, villosus, subviscosus. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, ovato - oblonga, sinuato - dentata, villosa, viscosa. *Flores* sessiles, erecti, in *spicam* terminalem secundam foliatam congesti. *Calyx* urceolatus, villosus, viscidus. *Corollae* sordide flavescentes, venis purpureis reticulatae, extus pubescentes, intus glabrae.

Planta exceptis seminibus tota venenata, narcotica.

101. ATROPA, *Wolfskirsche.*

I) *A. Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Tödtende Wolfsk.* *Tollkraut*, *Tollkirsche*, *Wolfsbeeren*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1017. *Ejusd.* Enum. p. 231. *Pers.* syn. pl. I. p. 218. *Hoffm.* Germ. I. p. 109. *Jacq.* Fl. austr. t. 309. *Schkuhr* bot. Handb. t. 45. *Herb. Blackw.* t. 564. *De Vest.* Man. bot. p. 458.)

Perenn. Flor. Junio - Augusto.

Hab. in sylvis, praesertim montosis frequens. (In sylvis *Waldskugel*, *Guttenberg*, *Irtenberg*, *Veitshöchheim*, *Gramschatz* alibique copiose.)

Caulis 3 - 5 - pedalis, erectus, teres, minute pubescens, trichotomus: *ramis* dichotomis. *Folia* petiolata, ovata s. ovato - lanceolata, integerrima, nervosa, molliuscula, sordide viridia: *radicalia* maxima, *caulinæ* minora ad ramos geminata: *altero* majore. *Flores* purpureo - sordide violacei, extus pubescentes: *pedunculis* axillaribus et lateralibus, solitariis, teretibus,

bus, unifloris, nutantibus. *Baccae nigrae*, nitidae, cerasa aemulantes, succo violaceo repletae.

Omnis plantae partes maxime venenatae, narcoticæ, lethales.

102. PHYSALIS, *Schlutte.*

1) *Ph. Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule inferne ramoso. *Gemeine Schl.* *Judenkirsche*, *Judendocke*, *Blasenkirsche*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1022. *Ejusd.* *Enum.* p. 232. *Pers.* syn. pl. I. p. 220. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 110. *Schkuhr.* *Handb.* t. 45. *Herb.* *Blackw.* t. 161. *De Vest.* *Man.* *bot.* p. 448. *Knorr.* *thes.* I. t. J. 4.)

Perenn. *Flor.* *Junio - Augusto.*

Hab. ad vias, in vineis. (Ad viam versus *Veitshöchheim* non procul a porta oppidana, et alibi. In vineis melioris indolis ubique fere.)

Caulis pedalis, sesquipedalis, oblique adscendens vel magis erectus, teres, striatus, subvillosus, inferne subramosus atque nudus. *Folia* gemina, petiolata, ovata, acuminata, integra. *Flores* sordide albidi s. flavescentes, pedunculati, axillares, solitarii. *Calyx* fructifer maxime inflatus, rubro - croceus continens *baccam* subrotundam nitidam coccineam.

103. SOLANUM, *Nachtschatten.*

1) *S. Dulcamara* caule fructicoso scandente, foliis superioribus hastatis, racemis oppositifoliis cymosis. *Bittersüßer Nachtsch.* *Bittersüß*, Je länger Je lieber.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1028. *Ejusd.* Enum. p. 234. *Pers.* syn. pl. I. p. 224. *Hoffm.* Germ. I. p. 110. *Herb. Blackw.* t. 34. *Sturm.* I. 18. *De Vest.* Man. bot. p. 447. *Knorr.* thes. I. t. H. 3.)

Frutex. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in sylvis, nemoribus, et ad ripas dumosas ubique.

Caules plures, praelongi, suffruticosi, ramosi, tenues, angulosi, procumbentes aut scandentes. *Folia* petiolata, alterna, integra, glabra: *inferiora* plurumque cordata aut ovata acuminata in petiolum decurrentia, *superiora* hastata aut 3 - loba, saepe sinuata. *Cymae* axillares, nutantes, multiflorae, 2 - fidae. *Corollae* formosae, violaceae: *laciinis* primo patentibus, dein reflexis. *Antherae* subcoalitae, citrinae. *Baccae* ovatae, rubrae, succulentae, fatuae, nauseosae.

Planta suspecta, dosi majori vim narcoticam atque purgantem ostendit.

2) *S. nigrum* caule herbaceo, foliis ovatis dentato - angulatis, racemis distichis nutantibus. *Schwarzer Nachtsch.* *Sautodt.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1035. *Ejusd.* Enum. p. 236. *Pers.* syn. pl. p. 224. *Hoffm.* Germ. I. c. *Sturm.* D. *Flor.* I. I. *Herb. Blackw.* t. 107. *Knorr.* thes. II. t. S. 3. *De Vest.* Man. bot. I. c.)

Ann. Flor. Junio — Novembri.

Hab. in cultis, ruderatis, ad sepes et vias ubicunque.

Caulis herbaceus, pedalis, sesquipedalis, erectus, teres, nodosus, ramosus. *Folia* petiolata, alterna, ovata, acuta, angulata, glabra. *Racemi* laterales, nu-

nutantes, 2 - fidi. *Corollae albae. Baccæ globosæ,*
nigrae, nitidae, glabrae, subdulces, fatuae, nau-
seosæ.

Variat *caule foliisque* magis villosis, et *baccis lu-*
teis. (*s. luteum.*)

Planta narcotica, in dosi majori adhibita perniciosa.

3) *S. tuberosum* caule herbaceo, foliis pinnatis.
Knölliger Nachtsch. *Grundbirn,* *Erdäpfel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd* p. 1033. *Eiusd. Entom.* p. 235.
Pers. syn. pl. p. 226. *Herb. Blackw.* t. 587. 523. a. b.
De Vest. Man. bot. I. c. *Knorr. thesaur.* II. t. S. 9.
S. 10.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in Peru, unde 1585 in Europam
venit. (*Colitur cum plurimis varietatibus ubique.*)

Planta ob *tubera esculenta* ubicunque notissima.
Folia pinnata: foliolis rugosis integerrimis. Pedunculi
subdivisi. Corollæ satis magnæ, albae, albidae, ex
albido - violaceæ aut coeruleæ. Baccæ magnæ,
globosæ, nitidae, virides.

104. CHIRONIA, *Chironie.*

1) *Ch. Centaurium* foliis ellipticis 3 - nerviis,
caule dichotomo corymboso, calycis laciniis subulatis
subpatulis, corollæ limbo plano, floribus basi squa-
mis cinctis. Gemeine Chironie, Tausendguldenkraut,
Erdgalle, Fieberkraut, rother Aurin.

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 1068. *Hoffm.* Germ.
I. p. III. *De Vest. Man. bot.* p. 453. *Smith.* Britan.
Vol. I. p. 257. *Sturm D. Flor.* I. 12. *Herb. Blackw.*
t. 452. *Knorr. thes.* I. t. T. 9.)

Erythraea Centaurium Pers. syn. pl. I. p. 283.
Willd. Enum. p. 247.

Centaurium minus Moench. Meth. p. 449. *Tournes.* elem. de Botan. I. p. 102. II. t. 48.

Gentiana Centaurium Linn. sp. pl. I. p. 332.
Roth. Germ. I. p. 112. T. II. p. I. p. 287. *Scopol.*
Carn. I. p. 180.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pascuis, pratis, in sylvis et nemoribus copiose.

Caules plures, palmares, pedales, erecti, subquadriguli, glabri, superne plus minusve ramosi, dichotomi. *Folia* opposita, sessilia, elliptico - oblonga, integerrima, laevia, 3 - 5 - nervia: *radicalia* in orbem congesta. *Flores* terminales, sessiles, erecti, fasciculato - corymbosi, basi squamis (1 - 2) cincti. *Calyx* pentagonus. *Corollae* eleganter rubellae. *Antherae* defloratae spiraliter tortae.

2) *Ch. Gerardi* pumila ramosissima: ramulis patentissimis, foliis ovalibus, calycis laciniis corollaeque limbo erectis, floribus basi squamis destitutis. *Gerardische, kleine Chironie, kleines Tausendguldenkraut.*

(*Schmidt.* Fl. bohem I. n. 131. *Gmel.* Bad. I. p. 523.
G. M. Sch. Fl. d. Wetter. I. p. 313.)

Chir. ramosissima Hoffm. Germ. l. c. Erhart.

Ch. pulchella Spreng. Fl. hal. p. 74. *Smith.* Brit. Vol. I. p. 258.

Chir. Centaur. β. L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1068.

Erythraea ramosissima Pers. syn. pl. l. c.

Gentiana Centaur. γ. Linn.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab.

Hab. in pascuis, ad vias, inque sylvaticis rarius.

Plantula 1 - 2 uncialis, erecta, ramosissima: ramulis tenuissimis, patentissimis. *Folia* brevia, ovata, laevia. *Flores* e dichotomia caulis erecti, pedicellati, absque squamis. *Calyx* ad basin usque 5-fidus: *laci*n*is* subulatis erectis, longitudine tubi. *Corollae* amoene rubellae: *limbo* erecto. *Antherae* tortae.

3) *Ch. inaperta* pumila simplex ramosaque: ramulis patentibus, foliis ovatis, calycis laciniis subulatis subpatulis, corollae limbo acuto connivente. *Ungeöffnete Chironie, kleinstes Tausendguldenkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1069. *Hoffm.* Germ. l. c. *Spreng.* Fl. hal. p. 75.)

Chir. Vaillantii Schm. Fl. boh. I. n. 132.

Erythraea inaperta Pers. syn. pl. I. p. 283. a.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. passim cum prioribus, sed rarius.
(In pratis humidis, ad fossas et rivulos versus *Bischöfssheim* et *Messelhausen*, prope *Oberschwarzach*, *Handthal*, *Schönaich*, *Büchold* alibique cum praecedente pluries inveni.)

A priori, cui maxime affinis, *corollis* imprimis semper clausis, acutis constanter differt.

105. RHAMNUS, Weegdorn.

1) *Rh. catharticus* spinis terminalibus, floribus 4 - fidis dioicis, foliis serratis, baccis 5 - spermis. *Purgirender Weegd.* *Kreuzdorn*, *Kreuzbeerdorn*, *Hirschedorn*.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1092. Ejusd. Enum. p. 249.
Pers. syn. pl. I. p. 238. Hoffm. Germ. I. p. 112.
Herb. Blackw. t. 135. De Vest. Man. bot. p. 472.*)

Cervispiña cathartica Moench. Meth. p. 686.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in hortis, ad sepes, in nemorosis.
(Ad sepes hortorum circa urbem passim, ad sepes et
in nemorosis prope *Rimpar*, *Gramschatz*, *Lengfeld*,
Gerbrunn, *Kitzingen*, *Karlstadt*, *Stetten*, inter *Ran-*
dersacker et *Theilheim*, in *sylva gramschatzensi* versus
dem *Dürrhof*, prope *Abb. Heidensfeld* in den *Lacken*,
alibique.)

Frutex 5 - 8 - pedalis, erectus, (quandoque ar-
buscula) ramosissimus: ramis alternis rigidis, tereti-
bus, adultioribus spina valida terminatis. Folia fas-
ciculata, opposita, petiolata, ovata, serrata, nervosa,
juniora pubescentia, adultiora glabra, supra splen-
dentia. Flores in alis foliorum aggregati, parvi, pe-
dunculati, ex albo aut luteo - virides, 4 - fidi, ra-
rius 5 - fidi, dioici, 4 - andri, nonnunquam 5 - an-
dri. Baccæ pifformis, succosa, nigra, glaberrima,
dulcescens, nauseosa, purgans.

2) *Rh. Frangula inermis*, floribus 5 - fidis her-
maphroditis, foliis integerrimis, baccis 2 - spermis.
Glatte Weegd. Faulbaum, Pulverholz, Zapfenholz,
Schießbeere.

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1098. Ejusd. Enum. p. 250.
Pers. syn. pl. p. 239. Hoffm. Germ. p. 112. Schkuhr.
bot. Handb. t. 46. Herb. Blackw. t. 152. De Vest.
Man. bot. p. 473.*)

Frangula Alnus Moench. Meth. suppl. p. 271.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in hortis, sylvis et ad sepes fere ubique.

Frutex aut arbor mediocris erectus, ramosissimus: ramis alttrnis, inermibus, apicibus nutantibus. Folia petiolata, opposita, nervosa, integerrima glaberrima que, ovato - lanceolata, laete viridia, subtus pallidiora. Flores in alis foliorum aggregati, pedunculati, subnutantes, parvi, hermaphroditi, 5 - fidi, albidi vel ex albido viridescentes, saepius rubelli. Baccæ pisiformes, glaberrimæ, 2 - spermae, rubellæ, demum nigrae, nauseosæ, drasticae.

106. E V O N Y M U S, *Spindelbaum.*

1) *E. europæus* floribus plerisque 4 - fildis 4 - andris, petalis acutis, ramis laevibus. *Gemeiner Spindelb.* *Pfaffenbüthlein*, *Pfefferröschen*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1130. *Ejusd.* *Enum.* p. 255. *Pers.* syn. pl. I. p. 243. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 113. *Schmidt Baumz.* t. 71. *Schkahr.* *bot. Handb.* t. 48. *De Vest. Man. bot.* p. 474.)

E. vulgaris *Roth.* *Germ.* T. I. p. 104. T. II. P. I. p. 266. *Scopol.* *Carn.* I. p. 166. *Moench.* *Method.* p. 71.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab ad sepes, in sylvis nemoribusque fere ubique.

Frutex 4 - 9 - pedalis, erectus, ramosissimus: ramis oppositis glabris viridibus teretibus, junioribus tetragonis. Folia opposita, petiolata, ovato - lanceolata, serrata, glabra. Pedunculi axillares, compressi, dichotomi, divaricati. Flores omnes, excepto primario, 4 - fidi, 4 - andri, ex viridi - flavescentes.

Capsulae nauseosae, valde purgantes, quadrangulæ: *angulis* obtusis, maturitate amoene rubrae. *Semina* ovata, alba, arillo croceo.

107. RIBES, *Krausbeere.**Inermia.*

1) *R. rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Rothe Krausb.* *Johannisbeere,* *Johannistrauben.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1153. *Ejusd.* *Enum.* p. 262. *Pers.* syn. pl. I. p. 251. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 113. *Schkuhr.* bot. *Handb.* t. 48. *Sturm D. Flor.* I. 4. *De Vest.* *Man.* bot. p. 475. *Herb. Blackw.* t. 285. *Schmidt.* *Baumz.* t. 93. *Knorr.* *thes.* I. t. J. 5.)

Grossularia rubra *Scopol.* *Carn.* I. p. 167.

Frutex. *Flor.* *April.* *Majo.*

Hab. *in hortis et ad eorum sepes ubique.*

Frutex 3 - 5 pedalis, erectus: *ramis* glabris inermibus. *Folia* petiolata, alterna, 5 - loba, serrata. *Racemi* simplices, multiflori, nutantes: *fructiferi* penduli. *Flores* luteo - virides. *Baccae* globosae, acidae, dulcescentes, rubrae, saepe etiam incarnatae, vel albae.

2) *R. nigrum* inerme, racemis laxis pilosis, floribus campanulatis. *Schwarze Krausb.* *Schwarze Johannisbeere,* *Wanzenstrauch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1156. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* p. 114. *De Vest.* *Man* *bot.* l. c. *Herb. Blackw.* t. 285. *Knorr.* *thesaur.* I. t. J. 6. *Schmidt.* *Baumz.* t. 91.)

Frutex. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab.

Hab. in hortis et ad sepes rarius.

Praeter magnitudinem partium omnium adiectam ab antecedente differt: *foliis* ex subrotundo triangularibus 3 - 5 - lobis acutiusculis rugosis subtus glandulosis villoso - pubescentibus cum tota planta oolidis, *petiolis* basi ciliatis, *racemis* pilosis, *floribus* oblongis campanulatis, *buccis* majoribus nigris.

Aculeata.

3) *R. Grossularia* ramis aculeatis, pedunculis unifloris, bracteis binis, baccis hirsutis. *Stachlige Krausb. Stachelbeere.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1158. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn pl. p. 252. Hoffm. Germ. l. c. Sturm D. Flor. I. 4. Schmidt. Baumz. t. 99. Knorr. thes. II. t. G. De Vest. Man. bot. p. 476.*)

Frutex. Flor. April. Majo

Hab. in hortis, sepibus et ad muros ubique.

Fruticulus 2 - 3 - 4 - pedalis, ramosissimus: *ramis* erectis aculeatis. *Aculei* sub gemmis solitarii, bini aut terni decidui. *Folia* petiolata, 3 - loba, incisa, subpubescentia. *Ciliae* petiolorum pilosae, quasi pennatae. *Flores* breviter pedunculati, penduli, solitarii, saepe etiam gemini, rubicundi, extus hirsuti. *Baccae* pendulae, hispidae.

4) *R. reclinatum* ramis subaculeatis reclinatis, pedunculi bractea triphylla. *Bogige & niederliegende Krausb. Rothe Stachelbeere.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Pers. syn. pl. l. c. De Vest. Man. bot. p. 476. Gmel. Bad. I. p. 538.*)

Frutex. Flor. April. Majo.

Hab. in hortis et ad sepes passim cum antecedente.

A priori *ramis* imprimis reclinatis, minus aculeatis, *baccisque* majoribus rubris discrepat.

5) *R. Uva crispa* ramis aculeatis, pedunculis 1-floris, bracteis connato-tubulosis, baccis glabris. *Glatte Krausb.* *Glatte Stachelbeere,* *Klosterbeere.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *Herb. Blackw.* t. 277. *Schmidt.* *Baumz.* t. 100 *De Vest.* *Man. bot.* l. c.)

Grossularia Uva Scopol. *Carn.* I. p. 168.

Frutex. Flor. April. Majo.

Hab. cum prioribus.

Maxime affine praecedentibus, a quibus differt: *bracteis* monophyllis in tubum quasi connatis, *pilis* petiolorum glandulosis, *baccisque* glabris. *Flores* albidi.

108. HEDERA, *Epheu, Wintergrün.*

1) *H. Helix* foliis ovatis lobatisque, umbellis erectis. *Wald-Epheu,* *Mauerlorbeer.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1179. *Ejusd.* *Enum.* p. 266. *Pers.* syn. pl. I. p. 252. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 114. *Schkahr.* *bot Handb.* t. 49. *Herb. Blackw.* t. 188. *De Vest.* *Man. bot.* p. 476.)

Frutex. Flor. Septembr. Octobri.

Hab. in nemorosis montosis umbrosis, in muris vetustis et hortis ubique.

Frutex truncis ramisque praelongis, scandentibus, arboribus murisque radiculis aut fulcris arcte adhaerentibus, longe lateque se spargentibus, aut ad terram

ram procumbentibus repentinibus. *Folia* petiolata, sparsa, semperfurentia, coriacea, obscure viridia, lucida: *inferiora* 3 - 5 - loba, *summa* et *floralia* cordata vel ovata, indivisa, *Umbellae* terminales, dense, multiflorae, globosae: *floribus* viridibus. *Baccae* globosae, laeves, succulentae, nigrae.

109. VITIS, *Weinstock*.

1) *V. vinifera* foliis lobatis sinuatis nudis. *Gewöhnlicher Weinstock, Weinrebe, Weintraube,*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1180. *Ejusd.* Enum. p. 267. *Pers. syn.* pl. I. p. 252. *Hoffm.* Germ. I. p. 115. *Herb. Blackw.* t 153. *Knorr, thes.* I. t. W. 10. *De Vest. Man. bot.* p. 475.)

Frutex. Flor. Majo — Julio.

Hab. in orbis 4 partibus temperatis. (In hortis et vineis cum innumeris variationibus ubique abundissime colitur.)

Folia petiolata, lobata, dentata, supra glabra, subtus pubescentia aut tomentosa, mox utrinque nuda. *Flores* parvi, virides, suaveolentes. *Baccae* ratione magnitudinis, figurae et coloris maxime variant.

2) *V. laciniosa* foliis quinatis: foliolis multifidis. *Schlitzblättriger Weinstock, Petersilientraube,*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1181. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers. syn.* pl. p. 253. *Moench. Method.* p. 75.)

Frutex. Flor. Júnio,

Hab. cum praecedente, sed rarius.

Foliola multifida: *laciiniis* dentatis incisis acuminate supra nudis obscure viridibus subius pallidioribus laeviter pubescentibus.

110. THESIUM, *Leinblatt.*

1) *Th. Linophyllum* panicula foliacea, foliis linearri - lanceolatis nervosis. *Wahres Leinbl.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 1211. *Ejusd. Enum.* p. 273. *Pers. syn. pl. I.* p. 211. *Hoffm. Germ. I.* p. 116. *Schkuhr. bot. Handb. t. 51.* *De Vest. Man. bot. p. 476.)*

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis sterilibus, lapidosis et in nemorosis. (Hinc inde in dorsis der Steinberge et montis dürrbaccensis. In monte zellensi passim, versus pagum Zell et infra Unterzell. In monte Nicolai prope Capellam et versus der Waldskugel. In montosis prope Randersacker, Theilheim et Gerbrunn. Ad margines sylvarum Irtenberg, Waldskugel, Gramsschatz, Kitzingen et alibi.)

Caulis palmaris, pedalis, primo decumbens, dein erectus, plerumque simplicissimus, glaber, teres, superne angulatus. *Folia* sessilia, sparsa, trinervia, linearri - lanceolata, integerrima, glabra, rigidula. *Panicula* racemosa, terminalis, laxa, composita. *Flores* intus albi, extus viridiusculi: *pedunculis* alaribus alternis erectis plerumque unifloris, mox 2 - 3 - floris, basi bracteatis.

Variationem *calycibus* 4 - fidis, et *staminibus* 4 prope dem Schwammburg apud Kitzingen et in dumetosis prope Nüdlingen, Arnshaußen et Knetzgau plures inveni.

Variat *caule* stricto (*Th. intermedium Schrad.* spicil. Fl. germ. I. p. 27.) et flaccido (*Th. montanum Schrad. l. c. Hoffm. Germ. I.* p. 116.)

III. VINCA, *Sinngrün*, *Immergrün*.

I) *V. minor* caulis procumbentibus, foliis elliptico-lanceolatis, floribus pedunculatis. *Kleines Sinngrün*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1232. *Ejusd.* Enum. p. 274. *Pers.* syn. pl. I. p. 267. *Hoffm.* Germ. I. p. 116. *Schkuhr.* bot. Handb. 1. 51. *Herb. Blackw.* t. 59. *De Vest. Man.* bot. p. 454.)

Pervinca minor *Scop.* Carn. I. p. 170.

Perenn. *Flor.* *Aprili* — *Junio*.

Hab. in dumetosis umbrosis, in sylvaticis et ad sepes. (In sylvis *Waldskugel*, *Guttenberg* et *Kitzingen*. Ad sepes prope der *Aumühle* alibique non infrequens.)

Caulis procumbens, radicans, teres, tenuis, glaber, ramosus: *ramis* et apicibus floriferis erectis. *Folia* opposita, petiolata, elliptico-lanceolata, integriflora, firma, nitida, glaberrima, semperfiventia. *Flores* speciosi, coerulei aut violacei, inodori, axillares: *pedunculis* solitariis erectis unifloris. *Corollae tubus* intus villosus.

Variationem *foliis* ex albo-variegatis etiam sponte crescentem vidi.

112. VIOLA, *Veilchen*.

Acaules.

I) *V. hirta* acaulis, foliis cordatis serratis petiolisque piloso-hispidis, bracteis infra medium pedunculi, calycibus obtusis. *Rauhhaariges Veilchen*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1162. *Ejusd.* Enum. p. 263. *Pers.* syn. pl. I. p. 254. *Hoffm.* Germ. II. p. 168. *De Vest.* Man. bot. p. 439. *Sturm* D. Flor. I. II.)

Perenn. Flor. Mart. Aprili.

Hab. in pascuis, nemoribus, dumetis et ad colles ubique.

Folia cordato - oblonga, serrata, venosa, utrinque piloso - hispida. Petioli radicales, erectiusculi, hispidi. Pedunculi radicales, erecti, uniflori, glabri, infra medium bracteis 2 subulatis praediti, inferne teretes, superne tetragoni. Flores nutantes, coerulei, inodori.

2) *V. odorata* acaulis, stolonibus reptantibus, foliis cordatis petiolisque glabris, bracteis supra medium pedunculi, calycibus obtusis. *Wohlriechendes Veilch. Märzveilchen.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1163. *Ejusd.* Enum. p. 264. *Pers.* syn. pl. I. c. *Hoffm.* Germ. I. c. *Sturm* D. Fl. I. II. *Herb. Blackw.* t. 55. *De Vest.* Man. bot. I. c. *Kuorr. thes.* I. t. V.)

Perenn. Flor. Martio — Majo.

Hab. ad sepes, in pascuis, pomariis, dumetis et in nemorosis abunde.

Stolones repentes, radicantes, foliosi. Folia cordata, crenata, glabra, subtus levissime pubescentia: petiolis glabris. Pedunculi radicales, glabri, supra medium bracteati, uniflori, apice incurvi. Flores purpureo - violacei, fragrantes, odore gratissimo.

Variat floribus albis, carneis et plenis.

3) *V. palustris* acaulis, foliis reniformibus petiolisque glabris, bracteis supra medium pedunculi, radice repente. *Sumpf - Veilch.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. p. 263.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c. *Sturm D.* *Flor.* l. c.)

Perenn. *Flor.* *Aprili* — *Junio.*

Hab. in paludosis, pratis uliginosis, ad fossas, ad ripas. (Ad ripas Moeni infra *Heidingsfeld*, prope *Ochsenfurth*, *Zell*, *Karlstadt*, *Gemiinden* etc. In graminosis udis sylvae *Guttenberg*, in *sylva homburgensi* versus *Böttingen*, prope *Gräfendorf*, in *nemore waldbronnensi* alibique.)

Radix repens absque stolonibus. *Folia* in cespitem densum congesti, reniformi - cordata, crenata petiolisque glabra. *Pedunculi* radicales, teretes, glabri, tetragoni, foliis longiores, supra medium bracteati, uniflori, apice incurvi. *Flores* dilute coerulei vel violacei, venis plerumque purpureis picti, inodori.

Caulescentes.

4) *V. canina* caule adultiore adscendente canaliculato, foliis oblongo - cordatis acutis, stipulis ciliato - dentatis, calycibus acutis. *Hunds - Veilch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1164. *Ejusd.* Enum. p. 264.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. p. 440. *Sturm D.* *Flor.* l. c.)

Perenn. *Flor.* *April.* *Majo.*

Hab. in pratis siccis, in montosis nemorosis, ad vias atque sylvarum margines ubiunque.

Caulis primo declinatus, adultior adscendens, glabriusculus, simplex aut parum ramosus, angulatus, hinc canaliculatus. *Folia* oblonga, cordata, acuta, glabra, crenata: *radicalia* longe petiolata in cespitem

con-

congesta, *caulina* brevius petiolata alterna. *Stipulae* lanceolatae, serratae, ciliatae, ad petiolorum basin. *Pedunculi* erecti, tetragoni, glabri, partim radicales, partim caulinis axillares, apicem versus *bracteis* 2 subulatis ciliatis praediti. *Flores* speciosi, dilute coerulei, inodori: *caulini* superiores plerumque apetali.

5) *V. persicifolia* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis serratis, stipulis dentatis. *Pfirsblättriges Veilchen.*

(Roth, Germ. T. II. p. 271. Hoffm, Germ. ed. 1791. p. 311. G. M. Sch. Flor der Wetter. Anh. p. 8. Röhling Deutschl. Flor. p. 140. Schweigg. spec. Flor. erl. p. 59. Schkuhr, bot. Handb. t. 269.)

V. montana β. L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1165. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. ed. 1804. II. p. 169. Spreng. Hal. p. 80. De Vest. Man. bot. p. 440. Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in umbrosis nemorosis, montanis, in pratis humidis. (In locis editioribus sylvarum Guttenberg, Stetten inque graminosis humidiusculis prope Haßfurth et Marienburghausen raro. In pratis humidis prope Werneck pluries invenit Am, Wolff.)

Radix repens. *Caulis* palmaris et altior, erectus, simplex, teres, glaber. *Folia* alterna, petiolata, in petiolum decurrentia, ovato-lanceolata, glaberrima, serrata, *superiora* angustiora, brevius petiolata, integrerrima. *Stipulae* oppositae, profunde inciso-serratae. *Pedunculi* terminales et axillares, praelongi, tenues, glabri, erecti, uniflori, apicem versus *bracteis* 2 lanceolatis notati. *Flores* inodori, dilute coerulei aut coeruleo-albidi.

A *Viola montana*, quae in hisce regionibus peregrina est, foliis praecipue ovato - lanceolatis, quae nunquam, ut in illa, cordato - oblonga evadunt, constanter differt.

Per plurimos jam annos ambo hae plantae in horto botanico absque ulla mutatione crescunt.

6) *V. mirabilis* caule triquetro adscendente, foliis reniformi - cordatis, floribus caulinis apetalis, radicalibus corollatis. *Wunderbares, verschiedenblühiges Veilchen.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1167. Ejusd. Enum. p. 265. Pers. syn. pl. p. 255. Hoffm. Germ. p. 169. De Vest. Man. bot. p. 440. Jacq. Austr. t. 19.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in umbrosis, nemorosis humidiussculis. (In sylvis Guttenberg et Waldskugel, in sylva stettensi, in nemorosis sic dicti Neusee et Millert prope Waldbronn, in sylvaticis prope Wiustenzell, Neubrunn, Wolfsmünster et alibi raro. Etiam in sylva prope Versbach invenit cl. D. Lehmann.)

Caulis sesquidigitalis et altior, triquierter, adscendens, glaberrimus. *Folia* reniformi - cordata, acuta, subcucullata: *petiolis* triquetris. *Stipulae* lanceolatae, integrae. *Flores* pedunculati, albidi: *caulini* apetali fertiles, *radicales* corollati abortientes.

7) *V. tricolor* caule angulato diffuso, foliis oblongis dentato - crenatis, stipulis lyrato - pinnatifidis, corollis calyce glabro duplo majoribus. *Drei-färbiges Veilch. Tag - und Nacht - Veilch. Dreifaltigkeitskraut, Freisamkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1168. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. p. 441. *Sturm* D. *Flor.* I. II. *Knorr.*
thes. I. t. D.)

Ann. Flor. Majo — Octobri.

Hab. in cultis et ad hortos quasi sponte.

Caulis ramosissimus, diffusus, angulatus, glaber.
Folia alterna, petiolata, oblonga, glabra, serrata vel
 crenata. *Stipulae* magnae, pinnatifidae: *lacinia terminali* maxima. *Pedunculi* longi, solitarii, uniflori,
 axillares, striati, nudi. *Bracteae* minimae. *Corollae*
 mox unicolores, mox bi- aut tricolores, speciosae,
 calyce glabro duplo aut ultra longiores,

8) *V. arvensis* caule angulato sulcato diffuso,
 foliis ovato - oblongis serratis, stipulis basi incisis,
 calyce pubescente corolla sublongiore. *Acker - Veilchen.*

(*Pers.* syn. pl. p. 255. *Hoffm.* Germ. p. 170. *Röhl.*
Deutschl. Fl. l. c. *Moench.* Method. p. 230. *Roth.*
Germ. T. I. p. 106. II. p. 273. *G. M Sch.* *Flor. der*
Wetter. I. p. 343. *Wibel.* Werth, p. 186. *Rebentisch*
Prodr. *Flor neomarch.* p. 122.)

Ann. Flor. Aprili — Augusto.

Hab. in agris ubique.

Caulis digitales, palmares, diffusi, ramosi, glabri
 aut parum pubescentes, inferne praecipue angulati
 et sulcati. *Folia* petiolata, ovato - oblonga, acuminata,
 saepe magis cordata, serrata. *Pedunculi* triangulares,
 hirsuti. *Corollae* luteo - albae calyces pubescentes
 aut hirsutos vix superantes.

Plantula in horto botanico per multos annos culta
 nulli unquam succubuit mutationi.

113. JASIONE, *Jasione*, Hügelblume.

1) *J. montana* foliis linear - oblongis undulatis.
Berg - Jasione, *gemeine Hügelbl. Schaafrapunzel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 888. Ejusd. Enum. p. 209. Pers. syn. pl. II. p. 215. Hoffm. Germ. II. p. 167. Schkuhr. bot. Handb. t. 266. Sturm D. Flor. I. 9. De Vest. Man. bot. p. 438.*)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in ericetis, et ad colles fere ubique.
(Ad margines sylvae stettensis copiosissime alibique.)

Caulis palmaris, pedalis, erectus, angulosus, scaber, ad medium fere foliosus, simplex aut apice parum divisus. Folia linear - oblonga, undulata, utrinque villosa: radicalia maxima in cespitem congesta, caulinaria alterna sessilia angustiora. Capitulum terminale, solitarium, erectum, subrotundum, multiflorum: involucro polyphyllo persistente suffultum. Flores numerosi, aggregati, pedicellati, amoene coerulei.

Variat foliis glabris et floribus albis.

114. IMPATIENS, *Springkraut.*

1) *I. noli tangere* pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus.
Gemeines Springkr. wilde Balsamine.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1176. Ejusd. Enum. p. 266. Pers. syn. pl. I. p. 157. Hoffm. Germ. II. p. 170. Schkuhr. bot. Handb. t. 270. Sturm D. Flor. I. 5. De Vest. Man. bot. p. 441.*)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab.

Hab. in nemorosis, umbrosis humentibus.
 (Hinc inde in locis demissioribus irriguis sylvarum
Waldskugel et *Guttenberg*. In sylvaticis humidis pro-
 pe *Mühlhausen* et im *Oelgrund* passim. In umbrosis
 ad catarrhactam prope *Triesenstein* raro sec. cl. D.
Lehm. Copiose in nemoribus ad *Abb. Heidenfeld*,
 et in *sylvis plurimis rhoenianis*)

Caulis 2 - 4 - *pedalis*, *erectus*, *teres*, *glaberri-*
mus, *succulentus*, *subpellucidus*, *ex viridi rubellus*:
ramis *multis alternis geniculisque tumidis*. *Folia* *al-*
terna, *petiolata*, *ovata*, *acuminata*, *serrata*, *laete*
viridia, *tenerrima*. *Pedunculi* *axillares*, 2 - 3 - 4 -
flori, *solitarii*, *basi incrassati*, *nutantes*. *Calycis fo-*
liola 2 *colorata*, *aequalia*, *decidua*. *Petala* *lutea*,
maxime inaequalia. *Nectarium* *cuculliforme* *apice re-*
curvo. *Antherae* *leviter cohaerentes*.

D I G Y N I A.

115. ASCLEPIAS, Schwalbenwurz.

I) *A. Vincetoxicum* *foliis ovatis acuminatis te-*
nuissime ciliatis. *Gemeine Schwalbenw.* *Giftwurz*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1208. *Ejusd.* *Enum.*
 p. 278. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 117. *De Vest.* *Man.*
bot. p. 478. *Schkuhr bot. Handb.* t. 55. *Sturm D.*
Flor. I. 9. *Herb. Blackw.* t. 96.)

Cynanchum Vincetoxicum, *Pers.* *syn. pl.* I.
 p. 274.

Vincetoxicum officinale *Mönch.* *Meth.* p. 717.
Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab. in montosis nemorosis ubique.

Cau-

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, simplex, teres, utrinque *linea* pubescente, glaber, viridis, basi purpurascens. *Folia* opposita, petiolata, cordato - ovata, acuminata, integerrima, glabra, basi et margine ciliata. *Umbellae* axillares, longe pedunculatae, subnutantes, proliferae. *Flores* albi. *Semina* lana sericea nivea aucta.

Variat *foliis* ternis et quaternis.

116. HERNIARIA, Bruchkraut.

1) *H. glabra* glabra, floribus sessilibus glomeratis *Glattes Bruchkr. Harnkraut, Jungferngras.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1296. *Ejusd.* Enum. p. 287. *Pers.* syn. pl. I. p. 292. *Hoffm.* Germ. I. p. 117. *Sohkuhr.* bot. Handb. t. 56. *Herb.* *Blackw.* t. 320. *De Vest.* Man. bot. p. 525.)

Ann. bienn. *Flor.* Junio — Septembri.

Hab. in arenosis, arvis et pascuis sterilitus ubique.

Caules plures, digitales, palmares, prostrati, terraè adpressi, filiformes, ramosissimi, dichotomi. *Folia* parva, opposita, subsessilia, ovata, acuta, integerrima, glabra: altero paulo minore, *suprema* alterna. *Stipulae* membranaceæ, albae. *Flores* minuti, sessiles, glabri, virides, in axillis glomerati.

2) *H. hirsuta* hirsuta, glomerulis paucifloris. *Behaartes Bruchkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1297. *Ejusd.* Enum. p. 288. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Smith.* Brit. V. I. p. 272. *De Vest.* Man. bot. p. 525.)

Ann. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. cum priori, sed multo rarius.

A praecedente *caulibus foliis* et *calycibus* pilis patentibus hirsutis *glomerulisque* paucifloris constantem differit.

117. ATRIPLEX, Melde.

1) *A. hortensis* foliis triangularibus. *Garten-Melde*, wilder Spinat.

(L. sp. pl. ed. Willd. IV. p. 961. *Ejusd. Enum.* p. 1041 *Pers. syn. pl. I.* p. 293. *Hoffm. Germ. II.* p. 277. *Schkuhr. bot. Handb. t. 349.* *Herb. Blackw.* t. 99. et t. 552. *De Vest. Man. bot.* p. 522.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in hortis, in ejjectamentis inque ruderatis. (Ad hortos circa urbem passim. Copiose intra ruinas arcis Karlsburg.)

Caulis 4 - 6 - pedalis et altior, erectus, angulosus, glaber, ramosus: *ramis* alternis erectis. *Folia* alterna, petiolata, triangularia, oblonga, plerumque integerrima, pallide viridia. *Racemi* terminales, multiflori, erecti. *Flores* parvi ex albido lutei. *Fructus* ex subrotundo ovati, glabri, valvulis membranaceis subrotundis integerrimis cincti.

Variat *caule*, foliis et *racemis* purpurascentibus.

2. *A. rosea* foliis incanis serratis, fructibus quadrangularibus dentatis. *Rosen-Melde.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 960. *Ejusd. Enum. l. c.* *Pers. syn. pl. l. c.* *Hoffm. Germ. p. 276.* *Schkuhr. bot. Handb. t. 350.* *De Vest. Man. bot. l. c.*)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. cum antecedente ad hortos, sed rarius.

Cau-

Caulis sesquipedalis et altior, erectus, subangulosus, albidus, glaber, ramosus: *ramis* alternis, diffusis. *Folia* alterna, subsessilia, ovata, basi cuneato-truncata, sinuato-dentata, incana, glabra, farina albida tenuissima adspersa. *Flores* glomerati, axillares, sessiles. *Fructus* compressi, nervoso-reticulati, incani, subquadranguli, dentati, crenati.

3) *A. hastata* foliis cordato-triangulis sinuato-dentatis. *Spießförmige Melde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 963. *Ejusd.* Enum. p. 1042. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. ed. 1791 p. 352. *De Vest.* Man. bot. p. 523.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in ruderatis et cultis.

Caulis sesquipedalis, 2-pedalis, erectus, glaber, ramosissimus, angulosus: *angulis* albis. *Rami* alterni et oppositi, sulcati, divaricati: *in simi* semper fere procumbentes. *Folia* opposita et alterna, petiolata, cordato-triangula, subhastata, sinuato-denticulata, glabra, glauco-viridia, subitus plerumque albida, farinosa: *suprema* lanceolata integerrima. *Spicae* terminales, multiflorae. *Flores* parvi, viridescentes, farinosi, glomerati. *Fructus* deltoideus, sinuato-denticulatus.

4) *A. patula* foliis ovato-lanceolatis subintegris. *Weitschweifige Melde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 964. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 277. *Schkahr.* bot. Handb. t. 347. *De Vest.* Man. bot. p. 523.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in cultis, ruderatis ad vias et pagos frequens.

Caulis palmaris, pedalis, sesquipedalis et altior, ramosissimus, diffusus, obsolete tetragonus, striatus, glaber, cum *ramis* procumbens. *Folia* opposita alternave, petiolata, glabra, glauco - viridia: *inferiora* hastata, oblonga, obtusa, *superiora* deltoidea, obsolete dentata, *suprema* lanceolata, integerrima. *Spicae* terminales et axillares. *Flores* exigui ex albo viridescentes. *Fructus* triangulus, disco denticulatus.

Variat caule ramisque erectis.

118. CHENOPODIUM, Gänsefuß.

Foliis angulosis.

I) *Ch. bonus Henricus* foliis triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis. *Dorf-Gänsef.* *Guter Heinrich*, *Feldspinat*, *Schmergelkraut*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1299. *Ejusd.* F. num. p. 288. *Pers.* syn. pl. I. p. 294. *Hoffm.* Germ. I. p. 117. *De Vest.* Man. bot. p. 519. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 56. *Herb. Blackw.* t. 311.)

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Augusto*.

Hab. in ruderatis, ad vias, ad muros et infimetiis frequens.

Caulis pedalis, sesquipedalis, sulcatus, inferne parum ramosus, superne simplex, uti foliorum dorsa, petioli, atque spicae farina unctuosa undique adspersus. *Folia* alterna, longe petiolata, integerrima, saturate viridia, supra glabra. *Spicae* racemosae compositae: *inferiores* axillares, *superiores* in racemū longum aphyllum congestae. *Flores* ex viridi flavescentes, glomerati, foemineis plurimis immixti.

2) *Ch. urbicium* foliis triangularibus subhastatis denticulatis, racemis confertis strictissimis longissimis subaphyllis cauli approximatis. *Stadt - Gänsef.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. I. p. 118. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in ruderatis, in cultis praesertim solo pinquiori, ad fimeta, ad agrorum margines inque plateis passim.

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, sulcatus, glaber, ramosus, interdum simplex, lineis saepe rubellis notatus. *Folia* alterna, petiolata, triangularia, in acumen longum terminata, medio praecipue denticulata, versus apicem integerrima, glabra, non pulvulenta, tenuia, ex flavicanti - s. albido viridia. *Racemi* longi, strictissimi, tenues, cauli fere adpresi. *Flores* parvi, virides.

3) *Ch. rubrum* foliis cordato - triangularibus obtusiusculis sinuato - dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Rother Gänsef.* *Mistmelde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1300. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 520.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in ruderatis, simetis, in cultis et ad sepes rarior.

Caulis 1 - 2 pedalis, erectus, plus minusve ramosus, diffusus, angulosus, striis lineisque rubris notatus. *Folia* alterna, petiolata, rhomboideo - triangularia, sinuato - dentata, basi producta, laete viridia.

dia subfarinosa. *Racemi* erecti, alares et terminales, longi, compositi, stricti. *Calyces* semper fere rubelli.

Planta tota fere in ultimo vegetationis stadio aut gelu tacta *rubra* evadit. *Racemi* dum viridi - purpurei.

4) *Ch. murale* foliis ovatis acutis nitidis dentatis, racemis erectis ramosis nudis terminalibus et axillaribus. *Mauer - Gänsef. Mauermelde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1301. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in ruderatis, in cultis, hortorum ejjectamentis et ad muros ubique fere.

Caulis semipedalis, pedalis, erectus, ramosissimus, divaricatus, angulatus, glaber, hinc inde farina adspersus. *Folia* alterna, petiolata, crassiuscula, triangulari - ovata, basi producta, inaequaliter sinuato-dentata, glabra, splendentia: *denticulis* ovatis acutis plerumque rubellis. *Racemi* axillares et terminales, erecti, ramosissimi, cymosi, aphylli. *Flores* fasciculati, virides. *Calyces* subpentagoni.

5) *Ch. album* foliis rhomboideo - ovatis erosis postice integris: superioribus oblongis integerrimis, racemis erectis ramosis subaphyllis. *Weißer Gänsefuß.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1302. *Ejusd.* Enum. p. 289. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Herb. Blackw.* t. 553.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in ruderatis, cultis et ad vias ubique.

Cau-

Caulis pedalis, sesquipedalis, in cultis saepe 2-pedalis et altior, erectus, ramosus, sulcatus, farina alba adspersus, saepe etiam in siccoribus proveniens inferne rubellus. *Folia* alterna, petiolata, rhomboideo-ovata s. triangularia, sinuato-dentata, quasi erosa, basi integerrima: *superiora* er *ramea* oblongo-lanceolata integra; *omnia* farina alba unctuosa subtus praedita. *Racemi* terminales, erecti, composti, candicantes, subaphylli. *Flores* conglomerati. *Calyces* pentagoni, albide farinosi.

Variat foliis integris angustioribus atque colore magis viridi. (*Chenop. viride* L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1303. Pers. syn. pl. Hoffm. Germ. et aliorum.)

6) *Ch. hybridum* foliis cordatis acuminatis angulato-dentatis, paniculis ramosissimis divaricatis nudis. *Unächter Gänsef.* *Schweinsmelde,* *stechapfelblättriger Gänsef.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1303. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 119. *De Vest.* Man bot. l. c.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in cultis inque ruderatis frequens.

Caulis 2-3-pedalis, erectus, ramosus, angulatus, glaber, viridis. *Folia* alterna, petiolata, magna, cordata, sinuato-dentata, longe acuminata, glabra, splendentia, laete viridia, iisque *Daturae stramonii* valde similia. *Panicula* terminalis, aphylla, ramosissima: *fructifera* patentissima. *Flores* parvi, viridiusculi, extus subfarinosi. *Calyces* obtuse pentagoni.

Planta suspecta, odore peculiari.

7) *Ch. glaucum* foliis oblongis sinuato - repandis subtus glaucis, racemis simplicibus glomeratis aphyllis. *Grauer Gänsef. Eisengraue Melde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1305. *Eiusd. Enum.* p. 290. *Pers. syn. pl.* l. c. *Hoffm.* *Germ. l. c.* *De Vest. Man. bot.* p. 521.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in hortis inque eorum ejectamentis, in oleraceis, ruderatis, ad ripas.

Caulis palmaris, pedalis et altior, angulatus, glaber, diffusus, erectus, vel prostratus. Folia petiolata, alterna, ovato - s. cordato - oblonga, obtusiuscula, sinuato - repanda, glabra, supra viridia nitida, subtus albido - glauca: summa cuneiformi - lanceolata. Racemi breves, glomerati, nudi. Flores viridescentes vel magis glauci. Calyces rotundati.

Foliis integris.

8) *Ch. olidum* foliis rhomboe - ovatis integerimis, floribus axillaribus conglomeratis, caule diffuso. *Stinkender Gänsefuß, Hundsmelde, Buhlkraut.*

(*Smith. Britan. Vol. I.* p. 277. *Hoffm. Germ. l. c. Spreng. halens. p. 87.)*

Chenopod. Vulvaria L. sp. pl. ed. *Willd. I.* p. 1305. *Eiusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. I.* p. 294. *De Vest. Man. bot.* p. 521.

Atriplex olida Herb. Blackw. t. 100.

Ann. Flor. Julio — Septembri.

Hab. ad vias, plateas et ad muros frequens.

Planta tota pulverulento - canescens et odorem peculiarem piscium salsorum subpuditorum spirans.

Cau-

Caules palmates, ramosi, divaricati, decumbentes. *Folia* alterna, petiolata, integerrima, obtusa, crassiuscula, glabra, *Flores* conglomerati, axillares, viridi - albi.

9) *Ch. polyspermum* foliis oblongo - ovatis integerrimis, cymis dichotomis aphyllis axillaribus, caule infra decumbente. *Vielsaamiger Gänsefuß, Fischmelde.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1305. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 295. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 521.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in cultis et ruderatis ubique.

Caulis pedalis, decumbens s. erectiusculus, debilis, ramosus, diffusus, angulosus, glaber, albido - viridis, saepe rubellus. *Folia* alterna, petiolata, oblongo - ovata, integerrima, glabra, laete viridia. *Racemi* cymosi, terminales et axillares, dichotomi, aphylli. *Flores* virides, conglomerati, sessiles.

119. B E T A, *Mangold.*

1) *B. vulgaris* floribus congestis, foliis inferioribus ovatis. *Gemeiner Mang. rothe Rübe.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1308. *Ejusd.* Enum. p. 291. *Pers.* syn. pl. I. p. 295. *De Vest.* Man. bot. p. 525. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. I. p. 359. *Herb. Blackw.* t. 235.)

Bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in Europae australioris maritimis.
(Colitur cum pluribus variationibus in agris et hortis ubique.)

Ras-

Radix rapiformis, magnitudine varia, intus plerumque sanquinea aut flavicans. Folia magna, plana, viridia aut fusco - rubra, glabra, splendentia. Flores viridescentes, congesti. Calycis foliola basi dentata.

2) *B. Cicla* floribus ternis, spicis lateralibus longissimis. *Weißer Mangold, Dickrübe, Runkelrübe.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1309. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. G. M. Sch. Flor. der Wetter. I. p. 360.*)

Bienn. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in Lusitania ad Tagum. (Colitur ubique cum priori.)

Radix subcylindrica, saepe praemagna, intus ex viridi - alba, annulis rubris. Caulis altus, 5 - 8 - pedalis, crassus: ramis virgatis. Folia ampla, undulata: petiolis nervisque albidis. Flores terni. Calycis foliola absque dentibus,

120. ULMUS, *Ulmbaum, Ulme.*

1) *U. campestris* foliis duplicato serratis basi inaequalibus, floribus subsessilibus congestis 5 - andris 4 - andrisque, samaris glabris. *Gemeiner Ulmbaum, Feld - Ulme, Rüster.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1324. Ejusd. Enum. p. 294. Pers. syn. pl. I. p. 291. Hoffm. Germ. I. p. 121. Schkuhr. bot. Handb. t. 57. De Vest. Man. bot. p. 525.*)

U. nuda Ehrh. Beitr. 6. p. 86.

Arbor. Flor. Martio — Majo,

Hab.

Hab. in sylvis hinc inde, ad pagos et ambulacra frequens.

Arbor procula, longaeva, *cortice* fusco - cinereo rimoso. *Lignum* durum, tenax. *Folia* alterna, breviter petiolata, ovata, acuminata, scabra, supra laete viridia nitida, subtus pallidiora, pubescentia, duplicito - serrata, basi uno latere in petiolum longius decurrentia. *Flores* fusco - rubri longe ante foliorum eruptionem ad latera *ramorum* in *umbellulas* densas congesti, sessiles. *Samarae* glabrae, monospermae.

Variat *cortice* ramulorum suberoso alato. (*U. suberosa* Ehrh. Beitr. 6. p. 87. *L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 1324. *Ejusd. Enum.* l. c. *Pers. syn. pl. I.* p. 291. et alior.)

2) *U. effusa* foliis duplicito serratis basi inaequalibus, floribus pedunculatis effusis 8 - andris, samaris ciliatis. *Langstieler Ulmb.* *Schwarzer Rüster,* *Rauhlinde.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1325. *Ejusd. Enum.* p. 295. *Pers. syn. pl. p. 291.* *Hoffm. Germ.* p. 121. *De Vest. Man. bot.* p. 526.)

U. octandra Schkuhr bot. Handb. t. 57. b.

U. ciliata Ehrh. Beitr. 6. p. 88.

U. montana Smith. Britan. Vol. I. p. 282.

Arbor. Flor. Aprili.

Hab. in sylvis, in hortis, ad pagos et ambulacra.

Arbor praecedente procerior, in sylvis vero densis et ad sepes saepe frutex. *Lignum* minus solidum. *Folia* latiora, atque minus aspera. *Flores* flavescentes rubello mixti, semper fere 8 - fidi, 8 - andri, rarius

rius 7 - 9 - andri, ad ramorum latera in racemos breves effusi: *pedunculis capillaribus, fructiferis longioribus. Samarae* margine pulchre ciliatae.

121. GENTIANA, Enzian.

1) *G. Pneumonanthe* corollis 5 - fidis campanulatis acuminatis, floribus pedunculatis, foliis linearibus obtusis. *Lungen - Enzian, Lungeublume.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 1336. *Ejusd. Enum.* p. 296. *Pers. syn. pl. I.* p. 284. *Hoffm. Germ. I.* p. 123. *Frölich. de Gentian. Disser.* p. 44. *Desv. Man. bot.* p. 482.)

Perenn. Flor. August. Septembri.

Hab. in pratis humidis, ad ripas. (In graminosis udis sylvarum Guttenberg, Kitzingen, et ad ripas Moeni udas supra Ochsenfurth rarissime. Im Oelgrund prope Sachsenheim, ad ripas Moeni et ad paludem vulgo Moos prope Haßfurth raro. In pratis humidiusculis satrapiae Ebern, et in der Anspach prope Abb. Heidenfeld.)

Caulis palmaris et pedalis, erectus simplex, obsolete quadrangulus, glaber. *Folia* opposita, sessilia, linearia, obtusa, integerrima, striata, subtus pallidiora: *inferiora* minima lanceolato - ovata. *Flores* pauci terminales et axillares, oppositi, pedunculati, 5 - fidi, campanulati, formosi, plicati, coerulei, punctati: *plicis* virescentibus.

2) *G. germanica* corollis 5 - fidis hypocrateriformibus acutis fauce barbatis, foliis ovato - lanceolatis. *Deutscher Enz.*

(*L.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1346. *De Vest. Man. bot.* p. 486. G. M. Sch. *Flor. der Weit. I.* p. 365. Spreng. *Hal.* p. 83.)

G. Amarella Pers. syn. pl. I. p. 286. *Smith. Brit.* Vol. I. p. 287. *Hoffm. Germ.* I. p. 124. *Fröl. de Gent. Diss.* p. 86.

Ann. Flor. Augusto — Octobri.

Hab. in pratis et pascuis montosis. (In monte Nicolai, in montosis graminosis circa den Waldskugel, in monte zellensi, in saxosis inter vineas prope Zell, Randersacker, Retzbach, Thüngersheim etc. In collibus siccis prope Bütthardt, Büchold, Sachsenheim, Stetten, Heidensfeld, Ochsenfurth alibi-que non raro.)

Caulis digitalis, palmaris, erectus, angulosus, glaber, ramosus: *ramis* oppositis brachiatis plerumque 1 - saepe multifloris internodiis longioribus. *Folia radicalia* in petiolum decurrentia, obovata, obtusa, terrae incumbentia, emarcida: *caulina* opposita, sessilia, ovato - lanceolata, *suprema* subcordata acuta. *Flores* terminales et axillares erecti: *pedunculis* brevibus angulatis. *Corollae* purpureo - coeruleae, in fauce *squamis* 5 membranaceis albidis apice multi-fido - capillaribus auctae.

3) *G. ciliata* corollis 4 - fidis: laciniis serratis medio inciso - ciliatis, foliis lanceolatis linearibusque. *Gefranzter Enz. Himmelsstengel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1351. *Pers. syn. pl.* p. 287. *Hoffm. Germ.* p. 125. *Jacq. Austr.* t. 113. *Fröl. d. Gent. Diss.* p. 109. *De Vest. Man. bot.* p. 485.)

Perenn. Flor. August, Septembri.

Hab.

Hab. in montosis siccis. (In monte circa arcem Marienburg, in monte Nicolai prope der Capelle, in montosis prope Zell, Dürrbach et alibi frequens.)

Caulis digitalis, flexuosus, adscendens s. suberectus, tetragonus, glaber, saepe purpurascens, uniflorus, simplex, perraro ramosus. *Folia* opposita, integrerrima, glabra: *radicalia* ovata obtusa minima, *caulinis* basi connata lanceolata obtusiuscula, *suprema* linearia acuta. *Flos* terminalis solitarius: *pedunculo* subtetragono, superne incrassato. *Corolla* hypocrateriformis, saturate coerulea, immaculata, 4 - fida: *laciniis* medio inciso - ciliatis.

4) *G. campestris* corollis 4 - fidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis, calycis laciniis 2 maximis. *Feld - Enziam.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1348. *Pers. syn. pl. p. 286.* *Hoffm. Germ. l. c. Fröl. d. Gent. Diss p. 91.* *De Vest. Man. bot. p. 487.*)

Ann. Flor. Augusto — Octobri.

Hab. in montosis graminosis, in pratis elatis siccis. (In montosis prope dem Hexenbruch versus Waldbüttelbronn. In monte zellensi infra pagum Zell. In monte Stein et prope Dürrbach prope dem Schenkenschloß. In collibus prope der Waldskugel. In monte Adelsberg prope Zwing alibique haud frequens.)

Caulis 2 - 3 - uncialis, palmaris, erectus, acute tetragonus, basi plerumque purpurascens, simplex, uniflorus aut inferne ramosus: *ramis* oppositis unifloris. *Folia* *radicalia* conferta, terrae incumbentia, cuneiformia, *caulinis* multo minora, emarcida: *caulinis*

lina oblonga sessilia. Pedunculi terminales, erecti, acute tetragoni, internodiis caulinis breviores. Corollae hypocrateri - s. infundibiliformes, quadri - et quinquesidae, coeruleo - violaceae: squamis 4 - 5 multipartito - capillaribus albidis in sauce. Calyx campanulatus, ventricosus, 4 - fidus: lacinias 2 oppositis reliquis 2 multo majoribus.

5) *G. cruciata* corollis hypocrateriformibus 4 - fidis imberibus, floribus verticillatis sessilibus, caulis ancipitibus basi attenuatis. *Kreutz - Enzian, Sybillenwurz.*

(L. sp. pl. ed Willd. p. 1334. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 284. Hoffm. Germ. p. 122. Jacq. Fl. austr. t. 372. Fröl. d. Gent. Diss. p. 28. De Vest. Man. bot. p. 486.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis apricis, sylvaticis. (Per raro in monte Nicolai versus der Waldskugel, inque collibus graminosis ibidem Ad viam inter Kleinoch-sensurth et den erlacher Seen. In sylvaticis montosis prope Ober - et Unterleinach, ad margines sylvae mühlkußanae, et im Gesprait prope Prosselsheim. Etiam in monte Reiffenberg hinc inde provenit.)

Caules plures spithamei, adscendentes, simplices, teretes, basin versus ancipites. Folia opposita, decussata, connato - vaginantia, lato - lanceolata, obtusa, 5 - nervia. Flores sessiles, s. brevissime pedunculati, verticillati. Corollae tubus longus superne ampliatus albidus, limbus brevis 4 - fidus amoene coeruleus, faux punctis viridi - coeruleis sparsus. Laciniae ovatae, acutiusculae: dentibus interjectis parvis triangulis acute 2 - fidis, lacinulatis.

UMBELLACEAE.

122. ERYNGIUM, *Mannstreu.*

1) *E. campestre* foliis amplexicaulibus pinnato-laciiniatis, caule superne ramosissimo. *Feld-Mannstreu, Brackenästel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 2358. *Ejusd.* Enum. p. 298. Pers. syn. pl. I. p. 299. Hoffm. Germ. I. p. 126. Jacq. Flor. austr. t. 155. Schkuhr. Handb. t. 59. Herb. Blackw. t. 297. *De Vest.* Man. bot. p. 489.)

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in pascuis siccis, locis sterilibus, in versuris et ad vias frequens.

Planta tota rigida atque pungens. *Caulis* pedalis, sesquipedalis, erectus, teres, glaber, striatus, superne ramosissimus. *Folia* glabra, nitida, radicalia bipinnata: *foliolis* pinnatifidis dentato-spinozis, *caulinæ inferiora* breviter petiolata pinnato-vaginantia, *suprema* amplexicaulia, pinnata: *foliolis* spinosis. *Flores* parvi, albi, sessiles, paleis setaceis rigidis longioribus interstincti in *umbellas terminales* capitatas multifloras congesti. *Involucrum* 5 - phyllum: *foliolis* inaequalibus lanceolatis spinosis umbella ipsa duplo vel triplo longioribus.

123. HYDROCOTYLE, *Wassernabel.*

1) *H. vulgaris* foliis peltatis orbiculatis, umbellis 5 - floris. *Gemeiner Wassern. Sumpfnabelkraut.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1360. *Ejusd.* Enum. p. 299. Pers. syn. pl. I. p. 301. Hoffm. Germ. I.

p. 126. Schkuhr. bot. Handb. t. 59. *De Vest. Man.*
bot. p. 488.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in paludosis, ad fossas, ripas et lacus. (Ad moeni ripas versus Heidingsfeld, prope Ochsenfurth, Kitzingen, Haßfurth, Hürblach, Wipfeld alibique rarissime. Ad lacum erlaccensem apud Erlach, et ad lacus fossae oppidanae prope dem Wasserthurm raro.)

Caules tenues, filiformes, teretes, articulati, glabri, repentes, radicantes. *Folia* alterna, longe petiolata, peltata, orbiculata, glabra, emarginata, crenata, laete viridia, subtus venoso - reticulata. *Pedunculi* axillares, teretes, glaberrimi, nudi. *Umbellae* exiguae, simplices, sub - 5 - florae, saepe proliiferae: *floribus* albidis vel rubicundis. *Involucrum* 2 - 4 - 5 - phyllum: *foliolis* subulatis.

124. SANICULA, Sanikel.

1) *S. europaea* foliis radicalibus simplicibus, involucris pinnatifidis, floribus omnibus sessilibus. *Gemeiner Sanik.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1356. *Ejusd. Enum.* p. 299. Pers. syn. pl. I. p. 303. Hoffm. Germ. I. p. 126. Schkuhr. bot. Handb. t. 60. *Herb. Blackw.* t. 63.)

Caucalis Sanicula Roth. Germ. I. p. 121. II. p. 310. *De Vest. Man.* bot. p. 492.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in nemoribus et sylvis umbrosis ubique frequens.

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, teres, sulcatus, subnudus, simplex, nitidus, glaber. *Folia radicalia* longius petiolata, orbicularia, nitida, glabra, 5 - loba: *lobis* cuneiformibus 2 - 3 - fidis inciso-serratis, *caulinum* solitarium plerumque, minus, conforme. *Umbella terminalis* 4 - 5 - fida: *umbellulis* inaequalibus 3 - fidis multifloris capitatis. *Flores* ex albido rubelli, hermaphroditici, masculi et foeminei, sessiles, conglomerati. *Involucrum universale* 3 - 5 - phyllum: *foliolis* inaequalibus trifidis dentatis: *partiale* consimile, brevius.

125. ASTRANTIA, Sterndolle, Astrenz.

i) *A. major* foliis quinquelobis: lobis trifidis.
Große Sterndold. Schwarze Meisterwurz.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1368. Ejusd: Ennum. p. 300. Pers. syn. pl. I. p. 34. Hoffm. Germ. I. p. 127. De Vest. Man. bot. p. 490. Schkuhr: bot. Handb. t. 60. Herb. Blackw. t. 470.)

A. nigra Scopol. Carniol. I. p. 188.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in sylvaticis umbrosis. (In sylva grammatischen invenit cl. Dr. Kuster et ego im Steigerwald versus Michelau.)

Radix ramosa, extus nigra. *Caulis* sesquipedalis et 2 - pedalis, erectus, striatus, glaber, parum ramosus. *Folia* longe petiolata, subrotunda, glabra, *inferiora* palmato - quinqueloba: *lobis* incisis argute serratis, *intermedio* trifido, *superiora* subtrifida. *Umbellae* terminales, parvae. *Involucrum* *partiale* speciosum, polyphyllum: *foliolis* albidis s. ex albo purpureo-venosis in stellam quasi positis pedunculis

lis longioribus. *Flosculi* radii plerumque masculi, disci hermaphroditi. *Stamina* corollulas longe superantia.

126. BUPLEURUM, Haasenohr.

1) *B. rotundifolium* involucro nullo, foliis perfoliatis ovatis acutis. *Rundblättriges Haasenohr, Durchwachs, Durchirech.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1369. *Ejusd. Enum.* p. 300. Pers. syn. pl. I. p. 304. Hoffm. Germ. I. p. 127. Herb. Blackw. t. 95. Sturm D. Flor. I. 5. *De West. Man. bot.* p. 509.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes, in vineis, ruderatis et ad vias.

Planta tota nitida, glabra. *Caulis* pedalis, sesquipedalis, ramosissimus, teres, pallide viridis aut rubellius. *Folia* alterna, perfoliata, integerrima, laete viridia, rore glauco quasi obducta, nervosa. *Umbellae* terminales, longe pedunculatae, 6 - 7 - radiatae. *Umbellulae* 6 - 8 9 - florae: *floribus* exiguis luteis subsessilibus. *Involucella* 3 - 4 - 5 - phylla: *foliolis* ellipticis integerrimis acutis.

2) *B. falcatum* involucro sub - 5 - phyllo, involucellis 5 - phyllis acutis, foliis lanceolatis falcatis. *Sichelblättriges Haasenohr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1372. *Ejusd. Enum.* p. 301. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Jacq. Austr. t. 158. *De West. Man. bot.* l. c.)

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab. ad vias, ad sepes, in montosis saxosis et nemorosis frequens.

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, subflexuosus, ramosus, rigidiusculus, teres, substriatus, glaber. *Folia* alterna, sessilia, linearia, acuta, subfalcata, rigidula, integerrima, glabra, nervosa: *radicalia* latiora, obovata, in petiolum decurrentia. *Umbellae terminales*, multifidae: *floribus* exiguis, flavis. *Involucrum* nullum aut 2 - 5 - phyllum: *foliolis* brevibus inaequalibus linearis - lanceolatis. *Involucellum* 5 - phyllum: *foliolis* aequalibus lanceolatis concavis.

3) *B. longifolium* involucro sub - 5 phyllo, involucellis 5 - phyllis ovatis, foliis ovatis amplexicaulibus. *Langblättriges Haasenohr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. p. 300.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis, siccis. (Ad vineas im Teufelskeller, ad montem Kallenstein prope Karlenburg, in monte Hohwann prope Haßfurth et in monte Reissenberg prope Sachsenheim perraro.)

Caulis sesqui - 2 - pedalis, erectus, teres, obsolete striatus, parum ramosus, glaberrimus. *Folia* integerrima, glabra, venosa: *radicalia* et *caulina* inferiora ovato - lanceolata in petiolum decurrentia, *superiora* breviora angustiora cordato - lanceolata sessilia, amplexicaulia. *Umbellae terminales*, multiflorae. *Flores* pedicellati lutei. *Involucrum* foliolis 3 - 5 obovatis obtusis, *involucellum* foliolis 5 ovatis, acuminate, flosculis aequalibus.

127. TORDYLIUM, *Zirmet*, *Drehkraut.*

1) *T. maximum* umbellis confertis, foliolis lanceolatis inciso - serratis. *Großer Zirm.*

(*L.*)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1382. *Pers.* syn. pl. I. p. 314. *Hoffm.* Germ. I. p. 128. *Jacquin.* Austr. t. 142.)

Caucalis maxima *De Vest.* Man. bot. p. 492.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in ruderatis. (Inter rudera arcis Karlsburg et prope eam passim.)

Caulis 3 - *pedalis* et *altior*, *erectus*, *sulcatus*, *dichotomus*, *hispidus*. *Folia* *scabra* *pinnata*: *radicalia* *foliolis* *ovato* - *oblongis* *lobatis* *crenatis*, *caulinæ* *foliolis* *elongatis*, *omnibus* *fere* *lanceolatis* *serrato* - *incisis*. *Umbellæ* *terminales* et *laterales*, *oppositifoliae*: *pedunculis* *longis* *asperis*. *Involucra* et *involucella* *foliolis* *linearibus* *subulatis*. *Flores* *radiati*, *albi*.

Plantam hanc *præter locum natalem* indicatum, ubi cum *cl. D. Geist* saepissime eam legi, ante plures annos etiam ad sepes vinearum *im Pfaffenberg* sponte crescentem per longum tempus observavi. Anno praeterito autem frustra eam ibi quaesivi.

128. CAUCALIS, *Haftdolde.*

I) *C. grandiflora* *involucris singulis 5 - phyllis*: *foliolo unico duplo majore*, *petalis exterioribus maximis*. *Großblüthige Haftd.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1383. *Ejusd.* Enum. p. 302. *Pers.* syn. pl. I. p. 306. *Hoffm.* Germ. I. p. 129. *Jacq.* Austr. t. 54. *De Vest.* Man. bot. p. 493.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes et ad vias siccissimas. (Inter segetes prope *Estenfeld*, *Muhlhausen*, *Poppenhausen*, *Thüngersheim* et *Retzbach*. In via inter

Randersacker et Theilheim, in agris requietis prope *Oberpleichfeld* copiose, alibique.)

Caulis palmaris, erectus, teres, sulcatus, glaber, ramosus: *ramis* diffusis. *Folia* tripinnata, basi vaginata, glabra, subtus subhirsuta. *Umbellae* magnae, planae, 2 - 3 - 6 - radiatae: *pedunculis* glabris striatis. *Involucra* et *involucella* plerumque 5 - phylla dimidiata: *foliolis* lanceolatis mucronatis inaequalibus margine albis. *Involucrum* saepe nullum. *Petalum exterius* corollarum radii maximum, profunde bipartitum, niveum. *Flores* disci exigni, aequales, saepissime steriles. *Semina* magna, ovata, sulcato-striata, aculeis rigidis confertis praedita.

2) *C. latifolia* umbellis 3 - fidis, umbellulis 5 - spermis, foliis pinnatis serratis. *Breitblättrige Haftdolde*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1384. *Ejusd. Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* hort. t. 128. *De Vest. Man. bot.* p. 494.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes, in cultis. (Ad hortos extra urbem, in vineis versus dem *Galgenberg*, in monte *Kreinberg* ad vias, inter segetes versus *Evelstadt*, *Veitshöchheim*, *Rimpar*, *Oberdürrbach* et alibi.)

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, ramis pedunculisque angulatus striatus setulosus scaber. *Folia* impari-pinnata: *petiolis* membranaceis striatis scabris amplexicaulibus. *Foliola* lanceolata, inciso-serrata, hirta. *Umbellae* 2 - 5 - radiatae, terminales et axillares oppositifoliae. *Involucrum* 2 - 3 - 4 phyllosum: *foliolis* ovatis acuminatis margine membranaceis. *Involucellum* sub - 5 - phyllum: *foliolis* angustis

stis obtusis albidis longitudine fere flosculorum. *Flores* radii fertiles, disci minores masculi steriles. *Corollae* rubellae aut albidae. *Semina* ovata setis purpureis retrorsum scabris obsessa.

3) *C. dancooides* umbellis 3 - fida, umbellulis 3 - spermis, involucro subnullo, involucello 3 - phyllo, foliis tripinnatis. *Mohrenartige Hafld.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Jacq. Austr.* t. 157.)

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. in agris, in vineis, ad vias. (In hortis et vineis prope urbem hinc inde frequens. In monte zellensi. In agris prope *Estensfeld*, *Bergtheim*, *Geldersheim*, *Rimpar* alibique.)

Caulis palmaris, erectus, flexuosus, angulatus ramisque divaricatis patentibus setuloso - hirsutus. *Folia* tripinnata, glabra, basi costisque pilis rigidis sparsis pellucidis obsessis. *Foliola* linearia, acutiuscula, profunde et tenuissime incisa. *Umbellae* longius pedunculatae, terminales, 3 - 5 - radiatae. *Umbellulae* floribus plerumque 5 sessilibus parvis rubicundis aut albidis, tribus modo fertilibus. *Involucrum* caducum, in planta juniore monophyllum, in adulta ejus loco congeries pilorum. *Involucella* dimidiata, lanceolato - linearia, ciliata, persistentia. *Semina* ovato - oblonga, dorso gibba, setis reduncis rigidis nitidis muricata.

4) *C. leptophylla* umbella 2 - fida, involucro subnullo, involucellis 5 - phyllis. *Kleinblättrige Hafldolle.*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1386. *Ejusd.* Enum. p. 303.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 61.)

Ann. bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in hortis, inter segetes. (Inter sege-
 tes, ad hortos extra urbem passim, in agris prope
Arnstein, Karlstadt, Bätthardt et alibi.)

A praecedente, cui simillima, differt: *caule* de-
 missiore, *soliis*, *petiolis*, *pedunculisque* undique pilis
 rigidis obsessis, *umbellis* ut plurimum 2 - fidis, *invo-*
lucellis 5 - phyllis, *corollis* minoribus, *fructibus* duplo
 minoribus hispidis *setis* confertioribus subuncinatis
 praeditis.

5) *C. stricta* umbellis confertis multifidis, invo-
 lucris polyphyllis, foliis bipinnatis, ramis erectiuscu-
 lis. *Steife Hastd.*

C. Anthriscus L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1388.
Ejusd. Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ.
 I. p. 130. *De Vest.* *Man. bot.* p. 493. *Roth.* Germ.
 I. p. 120. II. p. 309.

Tordylium Anthriscus Linn. *Jacq.* Austr. t. 261.
Torilis Gärtn.

Bienn. Flor. Junio — Augusto.

*Hab. in ruderatis, ad sepes, ad vias ubi-
 que.*

Caulis 2 - 3 - *pedalis*, *erectus*, *teres*, *rubelle striatus*, pilis retroflexis scaber: *ramis* alternis *erectis*. *Folia magna*, *pilosa*, *scabra*, *maculis purpureis saepe adspersa*, *bipinnata*: *foliolis* *pinnatifidis inciso-serratis lanceolato-ovatis*. *Umbellae confertae*, *lon-ge pedunculatae*, *planae*, *plerumque 6 - radiatae*, ter-

terminales: *floribus ex albido rubellis, intermediis plerumque sterilibus. Involucrum polyphyllum: foliolis subulatis umbellae adpressis. Involucella dimidiata polyphylla subulata inaequalia. Semina setis rigidis rubellis uncinatis hispida.*

6) *C. divaricata* caule ramosissimo, involucro subnullo, seminibus ovatis, stylis reflexis, foliis decompositis: foliolo extimo linearis - lanceolato. Sparrage Hafsdolde.

C. arvensis L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1387. Pers. syn. pl. I. p. 306. De Vest. Man. bot. p. 494.

C. helvetica Murr. system. veget. p. 276. Jaeg. hort. vind. 3. p. 12. t. 16.

Torilis divaricata Moench. Meth. suppl. p. 34. Wib. Werth. p. 193.

T. helvetica Gmel. Flor. bad. I. p. 617.

Ann. bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes. (Inter segetes et stipulas circa urbem hinc inde, prope Rimpar, Lengfeld, Detzelbach, Homburg, Neubrunn et alibi.)

Caulis palmaris, pedalis, subdecumbens, striatus, aculeolis scaber, ramosissimus: *ramis* rigidis divaricatis. *Folia* tripinnata, scabra, tenuissime divisa: *lacinias* foliorum superiorum extimis maxime elongatis. *Umbellae* parvae, longe pedunculatae, 8 - 10 - radiatae: *floribus* albidis, *intermediis* plerumque masculis sterilibus. *Fructus* oblongi, exsulci, setulis nigris hamosis asperis undique obsessi.

129. DAUCUS, Möhre, Mohrrübe.

1) *D. Carota* involucro pinnatifido. *Gelbe Möhre, gelbe Rübe, Vogelnest.*

(L.)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1389. *Ejusd.* Enum. p. 304. *Pers.* syn. pl. I. p. 306. *Hoffm.* Germ. I. p. 130. *Herb. Blackw.* t 546.)

Caucalis Carota *Roth.* Germ. I. p. 119. II. p. 304.

De Vest. Man. bot. p. 493.

Bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis, in collibus et ad vias ubique frequens. (Colitur praeterea cum pluribus variationibus in hortis et agris.)

Radix fusiformis, lutescens s. albida, aromaticā, dulcis, in cultis major ac magis succulenta. *Caulis* erectus, striatus, hispidus, dichotomus. *Folia* tri-pinnata, villosa, laciniata: *pinnis* supremis linearilanceolatis. *Petioli* subtus nervosi. *Umbellae* terminales, densissimae, multiradiatae, planae aut convexae, post anthesin nidi avis adinstar contractae. *Flores* albi: *petalis* bifidis. *Flosculus* centralis saepe sterilis carnosus purpureus. *Involucra* et *involucella* polyphylla, plerumque pinnatifida.

150. CONIUM, Schierling.

1) *C. maculatum* caule ramosissimo nitido maculato, foliis supradecompositis. *Gefleckter Schierling*, *Blutschierling*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1395. *Ejusd.* Enum. p. 305. *Pers.* syn. pl. I. p. 308. *Hoffm.* Germ. I. p. 131. *Jacq.* Austr. t. 156. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 62. *Herb. Blackw.* t. 451 et 573.)

Coriandrum maculatum *Roth.* Germ. I. p. 130. II. p. 343.

Sium Conium *De Vest.* Man. bot. p. 513.

Bienn. Flor. Jul. Augosto.

Ha b.

Hab. in hortis, ad sepes, pagos et in ruderatis passim frequens.

Planta venenata narcotica odore foetido murino, et sapore nauseoso. *Radix* fusiformis, simplex aut divisa, alba, rugosa. *Caulis* 2 - 5 - pedalis, solo pinguori ad humanam altitudinem accedens, erectus, strictus, fistulosus, teres, sulcatus, glaber, nitidus, purpureo - maculitus, ramosissimus. *Folia*, radicalia praecipue, praemana, patentia, glabra, nitida, saturate viridia, subtus pallidiora, supradecomposita: *caulinæ* alterna minora tripinnata: *pinnis* oppositis, *foliolis* subpinnatisidis lanceolatis inciso - serratis, *extremis* confluentibus. *Petioles* subteretes, fistulosi, glabri, striati, plerumque maculati, basi vaginati. *Umbellæ* terminales, planiusculæ, multifloræ, multiradiatae. *Umbellulae* consimiles: *floribus* albis, omnibus fertilibus. *Involucrum* 3 - 4 - 7 - phillum: *foliolis* latioribus ovato - lanceolatis acuminatis inaequibus reflexis basi coalitis. *Involucella* dimidiata, 3 - 4 - phylla, basi coalita. *Petala* cordata inflexa subæqualia. *Semina* matura fuscescens, striato - crenulata.

131. SELINUM, *Silge.*

I) *S. palustre* sublactescens, caule sulcato solitario, foliis quadruplicato - pinnatis: pinnulis pinnatisidis, involucro polyphyllo: foliolis margine membranaceis, stylis post anthesin divaricatis. *Sumpf-Silge*, wilder Bertram.

(*L.* sp. *pl. ed. Willd.* I. p. 1397. *Ejusd. Enum.* p. 305. *Pers. syn. pl.* I. p. 309. *Hoffm. Germ.* I. p. 132. *Jacq. Austr. t.* 152. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 63.)

Perenn. bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab.

Hab. in paludosis, ad ripas, ad lacus,
 (In fossa oppidana hinc inde, ad ripas Moeni prope
Karlstadt, Gemünden, Hassfurth. Ad lacum versus
Karlstadt, in uliginosis prope Heidensfeld, Ochsenfurth,
 alibique rarius.)

Radix subfusiformis, simplex aut parum ramosa,
valida, longa, extus fusco - flavicans, intus albida,
vere praecipue, uti caulis et folia, succo lacteo tena-
ci amarissimo repleta. Caulis 2 - 3 - 4 - pedalis, erec-
tus, superne ramosus, teres, sulcatus, fistulosus,
glaber, inferne plerumque rubicundus. Folia magna,
glabra, quadruplicato - pinnata: foliolis oppositis se-
mipinnatis linearibus apicibus plerumque purpura-
scentibus: summa minora sessilia. Petioli lati, stria-
ti, vaginati, marginibus apicibusque rubelli. Umbel-
lae terminales, magnae, planae, multiradiatae: flos-
culis albis aut subrubellis, omnibus fertilibus. Involu-
crum 8 - 10 - phyllum: foliolis lanceolatis reflexis
margine membranaceis. Involucella consimilia: folio-
lis exterioribus coeteris plerumque paulo longioribus.

2) *S. carvifolium* caule sulcato acutangulo,
 foliis tripinnatis: foliolis lanceolatis trifidis simplici-
 busque apice calloso - mucronulatis, involucro cadu-
 co, pistilis fructus reflexis. *Kümmelblättrige Silge,*
Pserdkümmel.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1398. *Ejusd.* Enn. p. 306. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. t. 16. *Hoffm.* Germ. ed. 1791. t. 3. *De Vest.* Man. bot. p. 499.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in pratis et nemorosis humidis, ad
fossas, lacus et ripas fere ubique.

Radix subfusiformis, magis minusve crassa, fusca, superne ramosa. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, parum ramosus, glaber, sulcatus, angulis acutis alatus. *Folia* alterna, glabra, laete viridia, tripinnata: *pinnis* ovato-lanceolatis simplicibus marginibus albidis subciliatis apice mucronatis, *impari* 2 - 3 - fido. *Petiolii* sulcati, basi membranacei, e *vagina* brevi orientes. *Umbellae* terminales, planae, multiradiatae, conformes, versus maturationem seminum plerumque convexae. *Involucrum* polyphyllum maxime deciduum. *Involucella* foliolis 9 - 12 brevibus, gracilibus, subulatis, persistentibus. *Flores* omnes fertiles, albi, ante explicationem dilute rubelli.

3) *S. Cervaria* caule striato ramoso, foliis duplicito-pinnatis: foliolis cordato-ovatis subtrilobis inciso-serratis: serraturis mucronatis, seminibus oblongis. *Hirsch-Silge*, *Hirschwurz*, *große Berg-petersilie*.

(*Pers. syn. pl.* p. 309. *De Vest. Man. bot.* p. 499. *Scopol. Carniol.* I, p. 201. *Roth. Germ.* I. p. 132. II. p. 354.)

Athamanta Cervaria L. sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1401. *Hoffm. Germ.* I. p. 133. *Jacq. Austr.* t. 69.

Cervaria nigra Borck. *G. M. Sch.* *Fl der Wetter.* I. p. 388.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hub. in montosis sylvaticis, et collibus apricis sere ubique.

Radix aromatic, acris, longa, teretiuscula, crassa, extus nigra, intus alba, superne setis nigris praedita. *Caulis* 2 - 3 - 4 - pedalis, erectus, firmus, sulcato-striatus, glaber, ramosus. *Folia radicalia* numero-

merosa, *caulina* alterna, magna, rigidiuscula, glabra, subtus reticulato - venosa, bipinnata: foliolis oppositis ovatis 2 - 3 - lobatis simplicibusque argute serratis mucronatis. *Petioli* foliorum radicalium praelongi, caulinorum breves vaginati. *Umbellae* terminales, magnae, planiusculae, multiradiatae. *Umbellulae* distinctae, multiflorae. *Petala* alba, subaequalia, ante explicationem rubella. *Involucra* involucellaque polyphylla: foliolis lanceolatis deflexis.

4) *S. Oreoselinum* caule striato dichotomo, foliis tripinnatis: foliolis ovato - acutis inciso - serratis divaricatis Petersilienartige Silge, kleine Bergpetersilie, Berghirschwurz, Grundheil, Augenwurz.

(Pers. syn. pl. l. c. De Vest. Man. bot. p. 500. Scopol. Carn. I. p. 201. Roth. Germ. I. p. 133. II. p. 355. Schkuhr. bot. Handb. t. 64.)

Athamanta Oreoselinum L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1403. Ejusd. Enum. p. 307. Hoffm. Germ. I. p. 133. Jacq. Austr. G. M. Sch. Flor. der Wetter, I. p. 376.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in nemorosis montosis, in collibus arenosis apricis sere ubique.

Radix subfusiformis, prima aetate magis simplex, dein ramosa, teretiuscula, extus luteo - fusca, intus alba, superne setis fuscis coronata, vere imprimis succum lacteum tenacem amarum siccitate in massam resinosam fuscam pellucidam transeuntem continens. Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, teres, striatus, glaber, viridis aut ex rubello viridis, superne dichotomus. Folia alterna, vaginantia, rigidiuscula, glabra, divaricata, sursum et retrorsum flexa, quasi refracta,

fracta, tripinnata: *foliolis* lanceolatis subtrifidis incisis mucronibus cartagineis albidis. *Umbellae* terminales, amplae, planiusculae, multiradiatae. *Umbellulae* convexae, multiflorae. *Involucra* et *involucella* polyphylla: *foliolis* reflexis lanceolatis plerumque integris, raro apicem versus incisis. *Petala* subaequalia, alba.

132. ATHAMANTA, Hirschwurz.

1) *A. Libanotis* foliis bipinnatis planis: foliis ovatis incisis, imis decussatis. *Weisse Hirschwurz, Weihrauchwurz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1400. *Ejusd.* *Enum.* p. 307. *Pers.* *syn. pl.* I. p. 316. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 132. *Jacq.* *Austr.* t. 392. *De Vest.* *Man. bot.* p. 491.)

Libanotis Riviniana Scopol. *Carn.* I. p. 193.

L. Athamantina Bork. *G. M. Sch.* *Flor. der Wetter.* I. p. 427.

Perenn. *Flor.* *Jul.* *Augusto.*

Hab., in montosis siccis. (Copiose in monte *Kalbenstein* prope *Karlenburg*. In montibus *Kalmat* et *Hohwann* prope *Haßfurth* rarius. In saxosis prope *Sulzthal* hinc inde.)

Radix subfusiformis, longa, lignosa, aromatica, acris, amara, superne setis longis nigricantibus persistentibus praedita. *Caulis* pedalis, 2 - pedalis, erectus, glabriusculus, angulatus, sulcato - striatus, simpliciusculus aut ramosus. *Folia* supra glabra, subtus pallida, villosiuscula, bipinnata: *pinnis* cuneiformibus pinnatifidis subconfluentibus, *pinnulis* in formam crucis quasi decussatis: *posterioribus* longioribus.

Pe-

Petioli subcompressi, sulcato - striati, basi membranacei vaginati. *Umbellae terminales*, densae, multiflorae, hemisphaericae. *Involuera* polyphylla: *foliolis* subulatis albide canescensibus. *Involucella* consimilia. *Petala* subaequalia, sordide alba. *Fructus* villosus.

133. PEUCEDANUM, Haarstrang.

1) *P. officinale* foliis quinques tripartitis: *foliolis* linearibus longissimis indivisis. *Gemeiner Haarstrang, Sausenkel, Schweißwurz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1405. *Ejusd.* Enum. p. 308. *Pers.* syn. pl. I. p. 310. *Hoffm.* Germ. I. p. 133. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 63.)

Selinum officinale *De Vest.* Man. bot. p. 498.

S. Peucedanum *Roth.* Germ. I. p. 133. II. p. 356.

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in montosis, nemorosis. (Ad margines ejus *sylvae vitihoechheimensis* partis, quam *Edelmannsholz* vocant, raro. Frequentius ad margines nemoris supra vineas prope *Gerbrunn*. Hinc inde im *Haag* prope *Karlstadt* et ad *sylvam stettensem*. In monte *Hohwann* prope *Häffurth*, im *Huck* prope *Klingenstein*, et in nemorosis montosis prope *Röttingen* aliquique rarius.)

Radix longa crassaque, cylindrica, extus nigricans, intus lutescens succo lacteo resinoso repleta. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, teres, glaber, striatus, geniculatus, ramosus, et, uti tota planta, laete viridis. *Folia* ampla, rigidiuscula, glaberrima, quinques tripartita: *foliolis* angustis linearibus planis integrerrimis mucronulatis; *radicalia* copiosa, *caulina* alterna. *Umbellae terminales*, magnae, multiradiatae:

pri-

primaria praecipue caulem terminans speciosa ac brevius pedunculata. *Radii exteriores* interioribus multo longiores. *Involucrum* foliolis 3 - 4 brevibus angustissimis setaceis maxime caducis. *Involucella* breviora, polyphylla, persistentia. *Petala* parva, flava, inflexa, apicibus denticulis 2 - 3 instructa.

2) *P. Silaus* foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis decurrentibus, involucro sub - 2 - phyllo. *Wiesen - Haarstr.* *Silau.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1406. *Ejusd.* Enum. p. 309. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. tab. 15.)

Sium Silaus *Roth.* Germ. I. p. 129. II. p. 340. *G. M. Sch.* Flor der Wetter. I. p. 411. *Moench* Meth. p. 89.

Crithmum Silaus *Wibel.* Werth. p. 197.

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pratis humidiisculis, in pomariis, et ad ripas sere ubique.

Radix longa, fusiformis, crassiuscula, fibrosa, extus fusco - lutea, intus albida. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, ramosus, striatus, glaber, superne sulcatus. *Folia* nitida, glabra, atro - viridia, tripinnata: foliolis pinnatifidis lanceolatis incisis acutis mucronatis decurrentibus. *Petioli* vaginantes, membranacei, striati, glabri. *Umbellae* terminales, multiradiatae, inaequales: *umbellulis* exterioribus elongatis. *Involucrum* 2 - 3 - phyllum, plerumque nullum. *Involucella* polyphylla: foliolis angustis, subulatis, apice plerumque rubellis, *umbellulis* brevioribus. *Corollae* exiguae, aequales, pallide flavae.

134. LASERPITIUM, *Laserkraut.*

1) *L. latifolium* foliolis oblique cordatis dentatis, dentibus mucronatis. *Breitblättriges Laserkraut, weißer Enzian.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1414. *Ejusd.* Enum. p. 310. *Pers.* syn. pl. I. p. 312. *Hoffm.* Germ. I. p. 134. *De Vest.* Man. bot. p. 502. *Jacq.* Austr. t. 146. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 67. *Roth.* Germ. I. p. 134. II. p. 361.)

Perenn. *Flor.* Jul. *Augusto.*

Hab. in montosis nemorosis. (In monte *Hohwann* prope *Hassfurt*, *Wolff.* In nemorosis hinc inde prope der *Hallburg* apud *Volkach* et in monte *Schwammburg*, *Heilm.* Juxta sylvam *Burgerwald* prope *Röttingen* et ad sylvam inter *Rimbach* et *Gerols-hofen* rarissime. Passim etiam in nemorosis ad *Gerbrunn* et in *sylva vitihochheimensi.*)

Radix praelonga, crassa, cylindrica, divisa in plura crura, fragrans, aromaticæ, amara, extus fusca, intus alba, vere lactescens, superne setis brevibus obsessa. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, crassiusculus, firmus, teres, sulcatus, glaber. *Folia* ampla, laete viridia, utrinque glabra: *radicalia* duplicato pinnata, *caulinæ* pinnata. *Foliola* basi oblique cordata, ovata, apicem versus duplicato - crenata: *dentibus* remotiusculis mucronatis. *Umbellæ* terminales, magnæ, multiradiatae, convexiusculæ: *radiis* inaequalibus. *Umbellulae* multifloræ: *floribus* albis aut dilute carneis. *Involucrum* polyphyllum: *soliolis* lanceolatis reflexis. *Involucella* polyphylla: *soliolis* brevibus et angustioribus.

135. HERACLEUM, Bärenkla.

1) *H. Sphondylium* foliolis quinis oblongis pinnatifidis dentatis. *Gemeiner Bärenkla*, *Bärwurz*, *Bartsch*, *Heilkraut*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1421. *Ejusd.* Enum. p. 311. *Pers.* syn. pl. I. p. 314. *Hoffm.* Germ. I. p. 135. *De Vest.* Man. bot. p. 497. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 67. *Jacq.* Austr. t. 173. *Herb.* *Blackw.* t. 540.)

Sphondylium Branca Scopol. Carniol. I. p. 204. *Moench.* Method. p. 83.

Bienn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pratis, nemoribus et ad sepes ubique frequens.

Radix cylindrica, ramosa, extus fusco - flavicans, intus albida. *Caulis* pro solo diverso natali montoso sicco aut humido vel riguo pedalis, 2 - pedalis aut 4 - 5 - pedalis, magis minusve ramosus, erectus, crassus, sulcatus, articulatus, scaber, hirtus, fistulosus. *Folia ampla*, hirsuta, scabra, pinnata: *foliolis* plerumque quinis oblongis obtusis serratis pinnatifidis lobatis: *impari* majore 3 - partito: *lobo intermedio* 3 - fido. *Vaginae* foliorum praemagnae, ventricosae, striato - sulcatae, hirsutae. *Umbellae* magna, planae, multiradiatae, terminales, plerumque tres: *duabus* oppositis, *intermedia* longius pedunculata. *Umbellulae* multiflorae: *floribus* albis, rarius rubellis, in radio irregularibus majoribus. *Involucra* et *involucella* polyphylla: *foliolis* lanceolatis caducis.

136. LIGUSTICUM, Liebstöckel.

1) *L. Levisticum* foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. *Gemeiner Liebst. Labestock.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1424. Ejusd. Enum. p. 312. Pers. syn. pl. I. p. 314. Hoffm. Germ. I. p. 136. De Vest. Man. bot. p. 508. Schkuhr. bot. Handb. t. 68. Herb. Blackw. t. 275.*)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis Europae australioris.
(In hortis, ad sepes et in vineis hinc inde quasi sponte. Ad sepes vinearum des oberen *Grombühls* per plures annos observavi.)

Planta tota maxime aromatica, fragrans. *Radix* crassa, fusiformis, subramosa, extus ferruginea, intus albida. *Caulis* 4 - 6 - pedalis, erectus, crassus, teres, striatus, superne ramosus, et, ut omnes partes, glaberrimus. *Folia* alterna, magna, duplicato-ternata: *foliolis* cuneiformibus, lucidis, 3 - lobis, superne incisis. *Folia suprema* pinnata: *foliolis* simplicibus aut plus minusve incisis. *Vaginae* petiolorum concavae, striatae, glabrae, amplexicaules. *Umbellae* terminales, mediocres, convexae, densae, multi-radiatae: *flosculis* pallide luteis. *Involucra* et *involucella* polyphylla: *foliolis* latis, lanceolatis, membranaceis, reflexis.

137. ANGELICA, Engelwurz.

1) *A. sylvestris* foliolis aequalibus ovato - lanceolatis serratis. *Wilde Engelw. Gemeine Angelik.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1429. Ejusd. Enum. p. 313. Pers. syn. pl. I. p. 315. Hoffm. Germ. I. p. 137. Schkuhr. bot. Handb. t. 68.*)

Selinum Angelica Roth. Germ. I. p. 133. II. p. 358. *De Vest. Man. bot.* p. 501.

S. pubescens Moench. *Method.* p. 80.)

Imperatoria Angelica Borck. G. M. Sch. *Flor. der Wetter.* I. p. 378.

Perenn. bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in sylvis, pratis sylvaticis, et ad ripas. (In locis demissioribus sylvae *Waldskugel*, in pratis ad sylvam *gramschatzensem*. In udis circa *Abb. Heidenfeld* alibique abunde.)

Radix magna, crassa, ramosa, cylindrica, fragrans, aromatica, extus albido - fusca intus albida. Caulis 3 - 4 - pedalis, erectus, teres, crassus, fistulosus, laevicer striatus, glaber, ramosus, rore glauco obductus. Folia ampla, glabra, subglaucia, triplinata: foliolis ovato - lanceolatis aequalibus distinctis acute serratis, serraturis mucronatis; summa plerumque opposita, trifoliata. Vaginae amplae, ventricosae, membranaceae: supremae saepe pendulae. Umbellae terminales, inaequales, hemisphaericae, magnae, multiradiatae. Umbellulae densae, multiflorae: floribus subaequalibus, ex albido - s. ex viridi - rubellis, intermediis plerumque sterilibus. Involucrum sub - 2 - phyllum, saepe nullum. Involucella polyphylla: foliolis inaequalibus linearibus acutis parvis demum reflexis.

138. SIUM, Merk.

1) *S. latifolium* foliolis oblongo - lanceolatis aequaliter serratis, caule elongato sulcato angulato. *Breitblättriger Merk, Wassermerk.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1431. *Ejusd.* Enum. p. 313. *Pers.* syn. pl. I. p. 316. *Hoffm.* Germ. I. p. 137. *De Vest.* Man. bot. p. 513. *Jacq.* Austr. t. 66.)

Coriandrum latifolium *Roth.* Germ. I. p. 131. II. p. 349.

Cicuta latifolia *Borck.*, *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. I. p. 391.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in fossis, aquis stagnantibus, ad rivulos. (In fossa oppidana prope dem neuen et pleichacher Thore. Ad moeni ripas supra Ochsenfurth, prope Kitzingen, Haßfurth et Wipfeld raro. Ad lacus versus Karlstadt, circa Abb. Heidenfeld et alibi.)

Caulis 2 - 4 - pedalis, erectus, profunde sulcatus, acutangulus, fistulosus, nodoso - articulatus, glaber, inferne praecipue crassus, parum ramosus: *ramis* erectis. *Folia* alterna, vaginantia, glabra, impari-pinnata: *foliolis* oblongo - lanceolatis vel ovato - oblongis sessilibus aequaliter et argute serratis, *immersis* saepe laciniatis. *Umbellae* terminales et axillares, solitariae, erectae, magnae, planiusculae, multiradiatae. *Umbellulae* convexae, multiflorae: *floribus* omnibus fertilibus. *Involucrum* polyphyllum: *foliolis* lanceolatis inaequalibus reflexis. *Involucella* consimilia, sed breviora. *Petala* subaequalia, alba.

Planta non quidem venenata, sed tamen suspecta, vaccis imprimis et vitulis noxia.

2) *S. angustifolium* foliolis inciso - lobatis serratis, umbellis pedunculatis oppositifoliis, involucris pinnatifidis, caule erecto. *Schmalblättriger Merk.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Jacq. Austr.
 t. 67. *De Vest.* Man. bot. p. 514. Roth. Germ. II.
 p. 333. I. p. 127.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in fossis, ad rivulos et ripas ubique.

Caulis basi plerumque repens et radicans, tunc erectus, 1 - 2 - 3 - pedalis, teres, glaber, substriatus, ramosus. *Folia* glabra, impari - pinnata: *radicalia* praemagna, saepe pedalia, caulina alterna, *suprema* et *ramea* parva. *Foliola* opposita, sessilia, cordato - aut ovato - lanceolata, argute et profunde inaequaliter serrata aut lobata, basi obliqua atque auriculata: *impari* plerumque trilobo. *Vaginae* breves, striatae, margine membranaceae. *Umbellae* solitariae, terminales et laterales, oppositifoliae, breviter pedunculatae, erectae, convexiusculae, multiradiatae. *Umbellulae* multiflorae: *floribus* aequalibus albis. *Involucrum* e foliolis 5 - 9 inaequalibus, partim simplicibus, partim pinnatifidis, reflexis. *Involucella* e foliolis plerumque 5 inaequalibus, integris aut dentatis.

3) *S. Falcaria* foliolis rigidis linearibus decurrentibus connatis argute serratis, caule ramosissimo. *Sichelblättriger Merk*, *Sichelkraut*, *Sichelmöhre*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1434. *Ejusd.* Enum. p. 314.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 138. *De Vest.*
 Man. bot. p. 514. Jacq. Austr. t. 257.)

Seseli Falcaria Scopol. Carniol. I. p. 213.

Drepanophyllum sioides Wib. Werth. p. 196.

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab.

*Hab. in agris, arvis, campis et ad vias
ubicunque.*

Radix praelonga, sublignosa. Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus firmus, teres, laevissime striatus, glaber, valde ramosus. Folia duriuscula, glabra, glauco-viridia, pinnata: foliolis longis linearibus subfalcatis acutis argute serratis profunde 2-3-fidis in petiolum decurrentibus. Petioli alati, inferne vaginati. Umbelae mediocres, terminales, planae, multiradiatae. Umbellulae densae multiflorae: flosculis parvis aequalibus albis, omnibus fertilibus. Involucra et involucella e foliolis 6-8 angustis linearibus acuminatis inaequalibus.

159. OENANTHE, Rebendolde.

I) *O. fistulosa* stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis, invelucro subnullo. *Röhrlige Rebendolde, Wasser-Raute, Wassersteinbrech, Tropfwurz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1440. Ejusd. Enum. p. 316. Pers. syn. pl. I. p. 318. Hoffm. Germ. I. p. 139. De Vest. Man. bot. p. 511. Schkuhr. bot. Handb. t. 70.*)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in fossis, in inundatis, ad ripas. (In fossis prope Himmelsforten, Zell et Thüngersheim. In paludosis prope Dettelbach, Timmbach, Heidensfeld et Haßfurth. Ad ripas moeni et ad lacus prope Karlstadt, Gemünden, Kitzingen, Ochsenfurth et alibi non infrequens.)

Radix stolonibus longis geniculatis repentibus. Caulis sesqui-2-pedalis, erectus, infirmus, hinc saepis-

pissime procumbens, teres, glaberrimus, striatus, ramosus, fistulosus, subinflatus. *Folia radicalia bipinnata*: *foliolis* planis cuneatis lobatis, *caulina pinnata*: *foliolis* angustis linearibus simplicibus 2 - 3 - lobisve fistulosis. *Petioli* inflati, fistulosi, inferne vaginati. *Umbellae terminales*, longe pedunculatae, mediocres, multiradiatae: *primariae* plerumque 2 - 3 - radiatae. *Umbellulae* subrotundae, densae, multiflorae: *floribus* albis, saepe etiam rubellis, *disci* regularibus fertilibus, *ra. ii* inaequalibus sterilibus. *Involutum* 1 - phylum, plerumque nullum. *Involucella* polyphylla: *foliolis* lanceolatis membranaceis albidis.

Planta venenata, pecoribus valde nociva.

140. PHELLANDRIUM, Wasserfenchel.

I) *Ph. aquaticum* caulis foliorumque ramificationibus divaricatis. *Gewöhnlicher Wasserf.* *Rossfenchel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1444. *Ejusd.* *Enum.* p. 316. *Pers.* syn. pl. I. p. 318. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 139. *Schkuhr.* bot. *Handb.* t. 71. *Herb.* *Blackw.* t. 570.)

Ligusticum Phellandrium *Roth.* *Germ.* I. p. 123. II. p. 321. *De Vest.* *Man.* bot. p. 507.

Bienn. *Flor.* *Junio — Augusto.*

Hab. ad fossas, lacus et ripas. (Ad fossas vor dem Burkardsthore, ad rivum Studentenbach ante urbem, ad rivum prope der versbacher Mühle, ad ripas Moeni et in stagnis prope Ochsenfurth, Kitzingen, Haßfurth, Heidenfeld, Karlstadt et alibi non infrequens.)

Cau-

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, inferne praecipue crassus, fistulosus, glaber, sulcatus, geniculatus: *geniculis* insimis radicantibus, *ramisque* divaricatis valde divisis. *Folia* glabra, patentissima, ampla, laete viridia, tripinnata: *ramificationibus* maxime divaricatis, *pinnulisque* semipinnatis obtusis incisis. *Vaginae* striatae, margine membranaceae, caulem arcte amplectentes. *Umbellae* oppositifoliae, breviter pedunculatae, patentes, inaequales, multiradiatae. *Umbellulae* confertae, densissimae, multiflorae: *floribus* omnibus fertilibus albis subaequalibus. *Involucrum* nullum. *Involucella* foliolis 8 - 10 angustissimis fere setaceis longitudine *umbellulae*. *Semina* acria, aromatica.

Planta suspecta, pecoribus nociva.

141. C I C U T A, Wütherich.

1) *C. virosa* umbellis oppositifoliis, stipulis obtusis petiolo adnatis. *Gifiger Wüther.* *Wasserschierling,* *Parzenkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1445. *Ejusd.* Enum. p. 316. *Pers.* syn. pl. I. p. 318. *Hoffm.* Germ. I. p. 140. *Schkuhr* bot. Handb. t. 71. *Herb. Blackw.* t. 574. a. b. c.)

Coriandrum Cicuta Roth. Germ. I. p. 130. II. p. 347.

Sium Cicuta De Vest. Man. bot. p. 512.

Hab. in paludibus, ad fossas, lacus et ripples. (*In fossa oppidana* prope dem *neuen Thore*, et juxta dem *Wasserthurm* cum *patre defuncto* olim copiose legi. Ad rivum *Studentenbach* prope dem *Schächersgarten* cum *D. Med. Cand. Drescher* semel

me observavi. Ad lacum trans Moenum versus *Karlstadt* legit *cl. M. D. Geist*, mihique inde plura misit exemplaria. Ad ripas Moeni versus *Heidingsfeld* invenit *pater meus defunctus*, et *cl. Prof. Heilmann* prope *Ochsenfurth* et *Kitzingen*. Aliquoties etiam inveni ad *lacum erlaccensem* prope *Ochsenfurth*, ad lacus prope *Heidenfeld*, et in palude *Moos* versus *Hassfurth*. In aliis a pluribus indicatis locis e. gr. ad ripas *Moeni* prope *Unterzell*, *Retzbach* et *Gemünden*, ad *lacum frickenhusianum* prope *Wechterswinkel*, in palude prope *Wolbach* versus *Neustadt*, ad lacus prope *Gerolshofen* alibique frustra eam quaesivi.)

Planta inter *umbelliferas* venenatissima. *Radix* magna, crassa, ramosa, annulata, *fibris* multis longis albido subverticillatis praedita, *loculamentis* pluribus succum croceo - lutescentem venenatissimum, vere praecipue, continentibus. *Caulis* 2 - 4 - pedalis, erectus, crassus, teres, fistulosus, leviter striatus, geniculatus, ex glauco viridis, saepius purpurascens, ramosus: *ramis* erectis firmis divaricatis dichotomis, inferne alternis, superne oppositis. *Folia* maxima, profunde viridia, glaberrima, tripinnata: *foliolis* subsimplicibus lanceolatis planis argute serratis decurrentibus, *terminalibus* profunde trilobis. *Petio- li* basi vaginati, striati: *stipulis* linearibus obtusis. *Umbellae* magnae, plano - concavae, multiradiatae, densae, laterales, oppositifoliae. *Umbellulae* hemisphaericæ, multifloræ: *floribus* albis regularibus. *Involucrum* foliolo uno alterove, plerumque nullum. *Involucella* polyphylla: *foliolis* linearibus acutis brevibus inaequalibus patentibus. *Semina* viridia, subglobosa, compressiuscula, sulcato - striata, *stylis* divaricatis coronata.

142. AETHUSA, *Gleise.*

1) *Ae. Cynapium* foliolis pinnatifidis nitidis decurrentibus. *Hunds - Gleise*, *Hundspetersilie*, *Tollpetersilie*.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1446. Ejusd. Enum. p. 317. Pers. syn. pl. I. p. 319. Hoffm. Germ. I. p. 140. Schkuhr. bot. Handb. t. 72. Herb. Blackw. t. 517.*)

Coriandrum Cynapium *Roth. Germ. I. p. 130. II. p. 346.*

Sium Cynapium *De Vest. Man. bot. p. 512.*

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in cultis, ruderatis et ad sepes ubique.

Radix fusiformis, alba. *Caulis* 2 - 4 - pedalis, erectus, ramosus, teres, striatus, nebula violacea quasi obductus, inferne saepe rubellus. *Vaginae* striatae, margine membranaceae, apice bidentatae. *Folia* alterna, triplicato - pinnata, atrovirentia, subtus nitentia, petiolata, *suprema* sessilia. *Pinnae* lineares, pinnatifidae. *Umbellae* longius pedunculatae, mediores, planiusculae, multiradiatae, terminales aut laterales oppositifoliae. *Umbellulae* radiatae, multiflorae. *Petala* alba, bifida. *Involucrum* nullum. *Involucella* dimidiata: *foliolis* 3 - 5 linearibus angustis pendulis umbellula longioribus.

Planta venenata, ab ignaris facile cum *Apio Petroselino* commutanda.

143. CORIANDRUM, *Koriander.*

1) *C. sativum* fructibus globosis. *Garten - Körwahrer Koriander.*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1448. *Ejusd.* Enum. p. 317. *Pers.* syn. pl. I. p. 319. *Hoffm.* Germ. I. p. 141. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 72. *Roth.* Germ. I. p. 130. II. p. 346. *Herb. Blackw.* t. 176.)

Sium Coriandrum De Vest. Man. bot. p. 513.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in hortis passim, et in ejjectamentis hinc inde quasi sponte.

Planta tota odore nauseoso, cymices redolens. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, teres, glaber, ramosissimus. *Folia* glabra laete viridia: *radicalia* pinata: *foliolis* ovatis inciso-dentatis, *caulinæ* bipinnata: *foliolis* linearibus angustis obtusis. *Umbellæ* terminales, planae, radiatae: *floribus* albis, interdum rubicundis. *Involucrum* monophyllum, lineare, plerumque nullum. *Involucella* minima, triphylla, dimidiata. *Fructus* laevissime striatus, flavo-griseus.

144. SCANDIX, Körbel.

I) *Sc. pecten* foliis tripinnatis: foliolis multipartitis linearibus. *Nadelkörbel*, *Kammkörb.* *Venuskamm*, *Hechelkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1449. *Ejusd.* Enum. p. 317. *Pers.* syn. pl. I. p. 319. *Hoffm.* Germ. I. p. 141. *Jacq Austr.* t. 263. *Wibel.* Werth. p. 199. *Roth.* Germ. I. p. 122. II. p. 315. *De Vest.* Man. bot. p. 505.)

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. in hortis, ad sepes et inter segetes passim.

Caulis palmaris, erectus, teres, striatus, pilosus, ramosus, divaricatus. *Folia* alterna, laete viridia, pilo-

pilosiuscula, supradecomposita, tenuissime divisa.
Vaginae tumidae, margine membranaceae, ciliatae.
Umbellae terminales, 2 - 3 - radiatae. *Umbellulae pauciflorae*: *flosculis albis*, *exterioribus petalis majoribus*, *interioribus abortivis*. *Involucrum nullum*. *Involucella foliolis 5 - 7 lanceolatis integris aut apice 2 - 3 - fidis*. *Fructus striatus*, basi incrassatus, in *rostrum unciale* aut *sesquiunciale retrorsum setulis scabrum terminatus*.

145. CHAEROPHYLLUM, Kälberkropf.

I) *Ch. sylvestre* caule striato: geniculis tumidiusculis, seminibus laevibus. *Wilder Kälberkropf, Eselskörbel*.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1452. Ejusd. Enum. p. 318. Pers. syn. pl. I. p. 320. Hoffm. Germ. I. p. 142. Jacq. Austr. t. 149. Schkuhr. bot. Handb. t. 73. Roth. Germ. I. p. 123. II. p. 319.*)

Scandix sylvestris *De Vest. Man. bot. p. 505.*

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in pratis, in pomariis, et ad sepes ubique frequens.

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, fistulosus, teres, striatus, ramosus, superne glaber, inferne scabriusculus: geniculis subincrassatis subpubescentibus. Folia tripinnata: pinnis lanceolatis pinnatifidis acutis margine et nervo subtus hirsutis. Vaginae striatae, glabrae, ciliatae. Umbellae terminales, majusculae, planiusculae, multiradiatae, ante anthesin nutantes. Umbellulae multiflorae: flosculis albis parum radiatis. Involucrum 2 - 4 - phyllum, valde caducum. Involucella foliolis 5 - 6 - 7 - inaequalibus lanceolatis ciliatis,

ris, primo erectis, demum deflexis. *Semina* oblonga, acuminata, non striata, glabra, nitida, nigra.

2) *Ch. temulum* caule maculato scabro: geniculis tumidis, seminibus striatis. *Giftiger Kälberkropf, Taumelkörbel, Gefleckter Körbel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1454. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 320. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacquin.* *Austr.* t. 65.)

Scandix temula *Roth.* Germ. I. p. 122. II. p. 317. *De Vest.* Man bot. p. 506. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. I. p. 415.

Scandix nutans *Moench.* Method. p. 101.

Myrrhis temula *Gärtn.* I. p. 109. t. 23. *Wibel.* Werth. p. 199.

Bienn. *Flor.* Junio — Augosto.

Hab. in ruderatis, dumetis, pratis et ad sepes ubique.

Caulis 2 - 3 - *pedalis*, *erectus*, *solidus*, *ramosus*, *teres*, *substriatus*, *pilosus*, *purpureo - maculatus*: *geniculis* *tumidis*. *Folia* *hirsuta* *costis* *purpurascen-*
tibus; *inferiora* *petiolata*, *superiora* *sessilia* 2 - 3 - *pinnata*: *pinnis* *ovatis* *obtusis* *pinnatifidis*. *Vaginae* *ge-*
nicula *arcte* *amplectentes*, *striatae*, *scabrae*, *plerum-*
que *fuscae*. *Umbellae* *terminales*, *convexo - planius-*
culae, *mediocres*, *multiradiatae*, *ante* *anthesin* *nu-*
tantes, *dein* *erectae*. *Flosculi* *irregularis*, *albi*, *disci*
abortientes. *Involucrum* *foliolis* 2 - 3 *caducis*. *Invo-*
lucella *foliolis* 5 - 6 - 8 *lanceolatis* *hirsutis* *ciliatis*. *Semina* *ovato - oblonga*, *immatura laevia*, *matura*
striata, *nigricantia*, *nitida*.

Planta valde suspecta, venenata.

3) *Ch. bulbosum* caule laevi geniculis tumido basi hirto. *Knölliger Kälberkr. Rübenkörbel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1453. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. tab. 63.)

Scandix bulbosa *Roth*, Germ. I. p. 123. II. p. 318. *De Vest.* Man. bot. p. 505. *Moench Method.* p. 101. *G. M. Sch.* Flor der Wetter. I. p. 417.

Myrrhis bulbosa *Wibel*. Werth. p. 199.
Bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis, pomariis, ad sepes, ad riperes, et in dumetosis passim.

Caulis 3 - 4 - 5 - pedalis, erectus, fistulosus, teres, substriatus, articulatus, ramosus, laete viridis, maculis plerumque ferrugineis purpureisque adspersus: *articulis* 3 infimis piloso - scabris, reliquis tumidis incrassatis lineatis glabris. *Folia* glabra, petiolis nervisque subtus pilosa, tripinnata: *pinnulis* tenuissime divisis acutis. *Vaginae* praelongae, striatae, margine membranaceae. *Umbellae* terminales, planiusculae, mediocres, multiradiatae: *floribus* albis. *Involucrum* nullum aut foliolo uno alterove. *Involucella* foliolis 5 - 6 inaequalibus lanceolatis reflexis. *Semina* oblonga, profunde striata, stylis distantibus coronata.

4) *Ch. hirsutum* caule striato hirto, foliolis incisis hirsutis, fructu stylis elongatis divaricatis coronato. *Rauhaariger Kälberkropf, Sumpfkälberkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1455. *Ejusd.* Enum. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. t. 148.)

Ch. palustre *Pers.* syn. pl. I. p. 320.

Scandix hirsuta Roth. Germ. I. p. 122. II. p. 315.

De Vest. Man. bot. p. 506.

Myrrhis hirsuta Vib. Werth. p. 200.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in humidiusculis, ad ripas. (In fossa oppidana prope dem burkarder Thore am Kanal, ad moeni ripas infra Himmelstadt et Gemiinden. Ad Werram versus Stetten, et ad ripas Salae prope Schunderfeld raro. In fossa oppidana oppiduli Karlstadt cum cl. D. Geist etiam legi.)

Caules plerumque plures, 1 - 2 - 3 - pedales, erecti, teretes, aequales, fistulosi, succulenti, fere dia phani, pilis albidis hirti, superne ramosi. *Folia* 3 - 2 - pinnata, hirsuta: pinnis incisis acutis. *Vaginae* latae, subcarnosae, pilosae, margine membranaceae. *Umbellae* terminales, convexae, densae, majusculae, multiradiatae, ante anthesin nutantes. *Umbellulae* multiflorae: floribus albidis s. ex albido rubellis irregularibus hirsutis, pluribus sterilibus. *Involucrum* monophyllum, plerumque nullum. *Involucella* foliolis 5 - 6 late - lanceolatis margine membranaceis albidis ciliatis. *Semina* sulcata stylis elongatis divaricatis coronata.

5) *Ch. aureum* caule aequali, foliolis incisis, seminibus coloratis sulcatis muticis. *Goldfärbiger Kälberkr.* gelber Kälbersaamen.

(*L.* sp. pl. ed. Willd. p. 1457. *Ejusd.* Enum. p. 319. *Pers.* syn. pl. p. 321. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacquin.* Austr. t. 64.)

Scandix aurea Roth. Germ. I. p. 123. II. p. 319.

De Vest. Man. bot. p. 506. *Mönch.* Meth. p. 101.

Myrr-

Myrrhis aurea Gärtn. I. p. 109. t. 23. *Wibel.*
Werth. p. 200.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in pratis humidiusculis, in nemorosis, ad sepes. (Im Oelgrund versus Sachsenheim, in monte Sodenberg, ad Werram prope den Schönhartshof, et ad Moenum prope Marienburghausen hinc inde. In pratis prope Hosheim, Eichelsdorf et Friesenhäusen rarius. Ad ripas Tuberis prope Tauberrettersheim, et in humidis ad Abb. Heidenfeld.)

Caulis sesquipedalis, 2 - pedalis, erectus, angulatus, striatus, ramosus, maculis hinc inde purpureis notatus, inferne hirsutus, superne glaber: *articulis* tumidis. *Folia* ampla, pallide viridia, villosiuscula, tripinnata: *pinnis* lanceolatis acutis profunde pinnato - incisis, *incisuris* dentatis. *Vaginae* membranaceae, villoso - albidae. *Umbellae* terminales, mediores, planae, 6 - 8 radiatae. *Umbellulae* 5 - 8 - florae: *flosculis* albis inaequalibus radiantibus, pluribus sterilibus. *Involucrum* foliolo uno alterove, plerumque nullum. *Involucella* foliolis 5 - 7 lanceolatis ciliatis demum reflexis longitudine umbellulae. *Semina* oblonga, glabra, lutescentia.

6) *Ch. sativum* caule laevi, umbellis lateribus oppositifolis. Zahmer Kälberkropf, Gartenkörbel, Körbelkraut.

(Pers. syn. pl. I. p. 320. *C. Bauhin.* Pin. theatr. bot. p. 152.)

Scandix Cerefolium L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1450. *Ejusd.* Enum. p. 318. *Hoffm.* Germ. I. p. 141. *Jacq.* Austr. t. 309. *Herb. Blackw.* t. 236. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 73. *Roth.* Germ. I. p. 122. *De Vest.* Man. bot. p. 505.

Chae-

Chaerophyllum Cerefolium Roth. Germ. II. p. 320.
Moench. Meth. p. 102.

Ann. bienn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in cultis quasi sponte, et ad sepes hortorum passim.

Caulis 1 - 2 - pedalis, erectus, striatus, glaber, aequalis, ramosus. *Folia* laete viridia, odorata, glabra, tenera, 2 - 3 - pinnata: *pinnis* ovatis remotis inciso - pinnatifidis. *Umbellae* 4 - 5 - radiatae, terminales longius pedunculatae, laterales subsessiles. *Umbellulae* sub - 5 - florae: *florculis* albis subaequalibus omnibus fertilibus. *Involutum* plerumque nullum. *Involutum* foliolis 2 - 3 parvis linearis - lanceolatis ciliatis reflexis. *Semina* subulata, tenuia, laevia, nitida, nigra.

146. ANTHRISCUS, Klettenkörbel.

I) *A. vulgaris* foliolis tripinnatis pilosis, corollis uniformibus, caule laevi. *Gemeiner Klettenkörbel.*

(Pers. syn. pl. I. p. 320.)

Scandix Anthriscus L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1450. *Ejusd.* Enum. p. 318. *Jacq. Austr.* t. 154.

Caucalis Scandicina Roth. Germ. I. p. 121. II. p. 312. *Hoffm.* Germ. I. p. 130.

C. Scandix Scopol. Carniol. I. p. 191.

C. Anthriscus De Vest. Man. bot. p. 493.

Torilis Anthriscus Moench. Meth. p. 103. *Wib.* Werth. p. 192. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. I. p. 428.

T. Scandicina Gmel. Flor. bad. I. p. 618.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in cultis, in ruderatis, ad muros et sepes passim.

Caulis palmaris, pedalis, erectus, debilis, teres, nodosus, substriatus, nitidus, glaber, ramosus, diffusus. *Folia* pilosa, tripinnata: *pinnulis* pinnatis. *Vaginae* ciliatae, margine albidae. *Umbellae* numerosae 4 - 5 - radiatae, *terminales* longius pedunculatae, *laterales* brevissime pedunculatae aut sessiles. *Umbellulae* parvae, pauciflorae: *flosculis* subinaequalibus albidis, omnibus fertilibus. *Involucrum* sub - 1 - phylum, plerumque nullum. *Involucella* 4 - 5 - phylla: *foliolis* lanceolatis ciliatis adpressis. *Semina* ova- ta, oblonga, aculeolis incurvis hirta, nigra.

147. S E S E L I , *Sesel*.

I) *S. annuum* caule subsimplici striato vaginato: vaginis ventricosis. *Einjähriger Sesel, Bocks-fenchel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1460. *Pers.* syn. pl. I. p. 321. *Hoffm.* Germ. I. p. 143. *Jacquin.* Austr. t. 55.)

Sium annuum *Roth.* Germ. I. p. 128. II. p. 337. *De Vest.* Man. bot. p. 515.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis nemorosis, pascuis sa- bulosis, in collibus asperis siccis. (In monte Nicolai versus der Waldskugel, et in asperis prope Ravenspurg versus sylvam vitihoechheimensem rarissime. In arenosis siccis prope Stalldorf, Bütthardt et Giebelstadt. In collibus siccis lapidosis in via a Thünn- gen versus Arnstein perraro.)

Caulis palmaris, pedalis, erectus, durus, striatus parum ramosus, glaber, glaucus, inferne rubellus. *Folia* rigidiuscula, glabra, e glauco viridia, *inferiora* triplicato - *superiora* bipinnata: *foliolis* linearibus acutis pinnatifidis. *Petioli* plerumque e viridi purpurei, *inferiores* longi teretes basi vaginati amplexicaules, *superiores* breves membranacei vaginantes striati glabri subventricosi. *Umbellae* terminales, parvae, densae, multiradiatae, convexae. *Umbellulae* planae, multiflorae: *flosculis* aequalibus albis aut ex albido rubentibus, omnibus fertilibus. *Involucrum* nullum aut monophyllum breve. *Involucella* polyphylla: *foliolis* lanceolatis margine membranaceis albidis inaequalibus, *exterioribus* umbellula plerumque longioribus.

148. PASTINACA, *Pastinak*.

1) *P. sativa* foliolis simpliciter pinnatis subtus pubescentibus. *Gemeiner*, *wilder Pastinak*.

(L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1466. *Ejusd.* Enum. p. 320. *Pers.* syn. pl. I. p. 322. *Hoffm.* Germ. I. p. 144. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 76. *Herb.* Blackw. t. 379.)

Selinum Pastinaca Roth. Germ. I. p. 133. II. p. 359. *De Vest.* Man. bot. p. 500.)

Anethum Pastinaca Wib. Werth. p. 195.

Bienn. *Flor.* Jul. *Augusto*.

Hab. in pratis, pascuis et ruderatis ubiunque frequens.

Radix fusiformis, albida s. lutescens, aromatica, dulcis, acris, edula. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, grassus, fistulosus, sulcato - angulosus, scabriusculus,

superne valde ramosus. *Folia alterna*, vaginantia, pinnata: *foliolis* ovatis inciso - lobatis laete viridibus supra glabris subtus scabriusculis pubescentibus, *impari* 3 - lobo. *Umbellae* terminales, magnae, planae, multiradiatae. *Involucra* et *involucella* nulla. *Petala* involuta, integra, lutea. *Fructus* magnus, odoratus, aromaticus.

149. ANETHUM, Dill.

1) *A. graveolens* foliis bipinnatis: foliolis setaceis, fructibus compressis. *Gemeiner Dill*, *Cucumerkraut*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1469. *Ejusd.* Enum. p. 321. *Pers.* syn. pl. I. p. 323. *Hoffm.* Germ. I. p. 144. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 77. *Herb.* *Blackw.* t. 545.)

Selinum Anethum *Roth.* Germ. I. p. 134. II. p. 359.
De Vest. Man. bot. p. 501.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in hortis et eorum ejjectamentis passim frequens.

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, teres, glaber, laeviter striatus, saturate viridis, dichotomus. *Folia* glabra, laevia, bipinnata: *foliolis* pinnatisidis setaceis. *Vaginae* membranaceae, amplexicaules, intus albicans. *Umbellae* terminales, magnae, planae, multiradiatae, inaequales. *Umbellulae* multiflorae, inaequales: *floribus* regularibus. *Petala* involuta, integra, flava. *Involucrum* et *involucella* nulla.

2) *A. Foeniculum* foliis multipartito - capillari - bus deflexis, fructibus ovatis. *Fenchel - Dill*, *Fenchel*.

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. c. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. I. c. *Hoffm.* Germ. p. 145. *Herb. Blackw.* t. 288.)

Ligusticum Foeniculum *Roth.* Germ. I. p. 124. II. p. 323. *De Vest.* Man. bot. p. 508.

Foeniculum vulgare *Gärtn.* t. 23. *Moench.* Method. p. 87. *G. M. Sch.* Fl. d. Wetter. I. p. 423.

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in cultis, in vineis, et juxta hortos rarius.

Planta praecedenti primo intuitu simillima, *caulibus* vero e radice pluribus et altioribus, *umbellis* copiosioribus minoribusque, atque *odore* peculiariter diversa. *Radix* fusiformis, ramosa, alba, aromaticā, dulcescens. *Caules* erecti, teretes, striati, glabri, rōre glauco obducti, ramosissimj. *Folia* alterna, diffusa, ampla, atro-viridia, tripinnata: *foliolis* longissimis setaceis acutis glabris dependentibus supra sulcatis subtus striatis. *Vaginae* longae, sulcatae, basi amplexicaules. *Umbellae* terminales, multiradiatae, planiusculae absque involucris et involucellis. *Petala* minuta, lutea, apice involuta,

150. CARUM, Kümmel.

I) *C. Carvi* caule ramoso, vaginis foliorum ventricosis, involucro partiali nullo. *Gemeiner Kümmel*, *Wiesenkümmel*, *Feldkümmel*, *Brodkümmel*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1470. *Ejusd.* Enum. p. 321. *Pers.* syn. pl. I. p. 323. *Hoffm.* Germ. I. p. 145. *Jacq.* Austr. t. 393. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 77. *Herb. Blackw.* t. 529.)

Ligusticum Carvi Roth. Germ. I. p. 124. II.
p. 324. *De Vest.* Man. bot. p. 508.

Seseli Carum Scopol. Carn. I. p. 215.

Aegopodium Carum Vib. Werth. p. 199.

Bi nn. Flor. Majo — Ju/lo.

Hab. in pratis ubique abunde.

Radix fusiformis, fibrosa, extus pallide flavescens,
intus albida, odorata, aromatica, *Caulis* pedalis et
altior, erectus, teres, striatus, glaber, ramosus.
Folia longa, glabra, bipinnata: *inferiora* petiolata al-
terna, *summa* sessilia opposita ad basin vaginae sub-
ventricosae *stipulis* multifidis praedita. *Foliola* linea-
ria, multifida, infirma, decussantia. *Umbellæ* ter-
minales, numerosæ, mediocres, planiusculæ, mul-
tiradiatae. *Involucrum* e foliolo uno altero ve setaceo,
saepe nullum. *Involucella* plerumque nulla. *Petala*
inflexo - cordata, subaequalia, albida, rarius dilute
carnea.

151. PIMPINELLA, Bibernell.

I) *P. Saxifraga* foliis pinnatis glabris, foliolis
radicalibus subrotundis argute dentatis: summis li-
nearibus. *Stein - Bibernell*, *Steinpetersilie*, *Pfeffer-
wurz*, *Theriakwurz*.

(*L.* sp. *pl.* ed. *Willd.* I. p. 1471. *Ejusd.* *Enum.* p. 321.
Pers. *syn.* *pl.* I. p. 323. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 145.
Jacq. *Austr.* t. 395. *Schkuhr.* *bot.* *Handb.* t. 78. *Roth.*
Germ. I. p. 129. II. p. 341. *Herb.* *Blackw.* t. 472.
De Vest. *Man. bot.* p. 518.)

Tragoselinum saxifragum Moench. *Meth.* p. 99.

Perenn. *Flor.* Junio — Septembri.

Hab.

Hab. in pratis siccis, in nemorosis et in collibus ubique.

Radix aromaticā, acris, longa, lignosa, subramosa, extus fusco - nigra, intus albida aut coerulea, dīgiti minimi crassitie. Caulis pedalīs, sesquipedalīs, erectus, rigidus, teres, striatus, glaber aut villosiusculus, superne dichotomus: ramis divaricatis. Folia venosa, glabra, interdum magis minusve villosa, radicalia plerumque simpliciter pinnata: foliolis sessilibus ovato - subrotundis argute serratis lobatis - ve, caulinā duplicato - pinnata: foliolis angustis lanceolatis mucronatis 2 - 3 - fidis. Umbellae terminales, mediocres, planiusculae, multiradiatae: floribus exiguis regularibus albīs raro rubicundis. Involucra et involucella nulla.

z) *P. nigra* foliis pinnatis pubescentibus, foliolis radicalibus subcordatis incisis obtusis dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. *Schwarzer Bibernell.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. c. Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. I. c. Hoffm. Germ. I. c. Roth. Germ. I. l. c. II. p. 342. De Vest. Man. bot. I. c.*)

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in montosis, collibus et in sylvaticis.
(In monte Nicolai, et in monte zellensi rarius. Auf den Schloßberge, et in collibus siccis circa der Waldskugel, prope Giebelstadt, Rimpf, Escherndorf aliquique. In siccissimis des Gramschatzer und guttenberger Waldes.)

Radix ramosa, extus atro - fusca s. nigra, intus albida, vere praecipue lacte coeruleo repleta. Caulis sesquipedalus, 2 - pedalīs, erectus, striatus, pilosus, superne dichotomus: ramis parum divaricatis. Folia hirsuta, atro - viridia, radicalia pinnata: foliolis ob-

cor-

cordatis obtusis incisis obtuse dentatis, terminali 3 - lobo, caulina bipinnata: foliolis angustis linearibus dentatis. Vaginae membranaceae, ventricosae, striae, hirsutae, fuscescentes: supremae plerumque folio uno altero terminatae. Umbellae terminales, mediocres, multiradiatae, planiusculae: flosculis albis, rarius rubicundis. Involucrum et involucella nulla.

3) *P magna* foliis uniformibus pinnatis, foliis omnibus lobatis: impari trilobo. *Großer Bibernell.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. t. 396. *Roth.* Germ. l. p. 129. Il. p. 343. *De Vest.* Man. bot. p. 518.)
Tragoselinum magnum *Monch.* Meth. p. 99.
Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in umbrosis, in nemorosis, ad sepes et pratorum margines. (In sylvis *Veitshöchheim*, *Waldskugel*, *Guttenberg*, *Gramschatz*, im *Huck* prope *Wipfeld* alibique. In nemorosis prope *Gerbrunn*, *Rottendorf*, *Versbach* et *Mühlhausen*. Ad margines pratorum prope *Mühlhausen*, *Sesslach*, *Büchold* et *Ebern* rarius.)

Radix teretiuscula, ramosa, ex flavicante albida. *Caulis* sesquipedalis, 2 pedalis, nonnunquam 3 - 4 - pedalis, erectus, sulcatus, glaber, ramosus. *Folia* uniformia, glabra, laete viridia, nitida, pinnata: *foliolis* latis ovatis acutis lobatisque, *impari* trilobo: *summa* angustiora caduca. *Petioli* compressi, striati, glabri. *Umbellae* terminales, majusculae, planae, multiradiatae: *flosculis* exiguis albis. *Involucra* et *involucella* nulla.

Datur Varietas: *foliis radicalibus pinnatis, foliolo intermedio basi auriculato, foliolis caulinis palmato-pinnatisidis*, quam *cl. D. Lehmann* in *prim. Lin. Flor. herb.* p. 24 tanquam peculiarem speciem sub *Pimp. intermed.* in insulae inferioris salicetis crescentem, ubi quoque inveni, comprehendit. Ab aliis auctoribus variis nominibus allegatur e. gr. *Pimp. media Hoffm. Germ. Jacq. Austr. t. 397. P. orientalis Gouan.* Est mera varietas secundum observationes per plures annos in horto nostro botanico institutas. Prope *Aub, Rottingen, Mühlhausen et Kleinrindersfeld* eam pluries observavi.

4) *P. dissecta* foliis omnibus pinnatis: pinnis multipartitis, segmentis subfalcatis acutis. *Schlitzblättriger Bibern.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1472. *Pers. syn. pl. p. 323. Hoffm. Germ. p. 146. Roth. Germ. II. p. 344. De Pest. Man. bot. p. 518.)*

Tragoselinum dissectum Moench. Method. p. 99. Peregrin. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis sylvaticis, ad muros antiquos. (*Ad margines sylvae vitihochheimensis et in asperis circa der Waldskugel raro.* Ad muros hinc inde arcis *Reichelsberg* prope *Aub.* In siccis des *Kreuzberges* et alibi.)

Affinis *Pimp. saxifragae*, a qua *caulibus* plerumque demissioribus e radice pluribus, *foliis* majoribus, *foliolis* dissectis multipartitis, *segmentis* subfalcatis acutis constanter differt.

Foliola plantae junioris rotundiora ac minus profunde incisa sunt, sicuti planta adultior magis dissecata adparet.

5) *P. dioica* pumila, foliolis multisidis linearibus, umbellis numerosissimis paniculatis, floribus dioicis. *Niedriger Bibernell.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1474. *Ejusd.* Enum. p. 322. *Pers.* syn. pl. p. 323. *Hoffm.* Germ. p. 146. *De Vest.* Man. bot. p. 518. *Jacq.* Austr. t. 28. *Roth.* Germ. II. p. 345.)

Cnidium tenuifolium Moench Method. p. 98.

Perenn. bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sicciissimis lapidosis. (In campo sterili lapidoso juxta viam versus *Veitshöchheim*, in monte *Schloßberg*, in montibus *Nicolai* et *Dürrbach*. In asperis lapidosis prope *Gerbrunn*, *Rimpar* alibique non infrequens.)

Radix subramosa, fibris longis praedita, extus luteo-fusca, intus albida, siccata nigra, supra terram villosa. *Caulis* digitalis, palmaris, erectus, sulcatus, angulatus, pallide virescens, saepissime, praecipue versus autumnum, rubellus, a basi ramosissimus; *ramis* sparsis divergentibus. *Folia* pauca, *radicalia* duplicito-pinnata: *foliolis* brevibus linearibus angustis simplicibus 2-3-fidisque subcanaliculatis ex lutescente viridibus s. glaucis, glabris. *Petioli* longi, sulcati, inferne vaginantes. *Folia* caulina et ramea sensim minora, pinnata: *folio/is* simplicibus 2-fidisque. *Petioli* brevissimi, toti vaginati, albido-membranacei, acumine brevi utrinque donati. *Umbellae* copiosae, terminales et laterales, paniculatae, parvae, multiradiatae, longe pedunculatae. *Flosculi* albidi, masculi et foeminei, rarissime hermaphroditi. *Involucra* et *involucella* nulla, aut *foliolum* unum alterumve breve maxime caducum.

152. APIUM, *Eppich.*

I) *A. graveolens* foliolis caulinis cuneiformibus incisis, umbellis subsessilibus. Starkriechender Eppich, Wassereppich, Zellerie.

(L. sp. pl. ed. Willd. I p. 1475. Ejusd. Enum. p. 322. Pers. syn. pl. I. p. 324. Hoffm. Germ. I. p. 146. Schkuhr bot. Handb. t. 78. Herb. Blackw. t. 443.)

Sium Apium Roth. Germ. I. p. 128. II. p. 339.

S. graveolens De Vest. Man. bot. p. 517.

Seseli graveolens Scopol. Carn. I. p. 215.

Bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in humidis umbrosis. (Ad ripas rivi Studentenbach juxta dem Schächersgarten ante aliquot annos vidi. Colitur praeterea in hortis culinis ubiquique.)

Radix tuberosa carnosa, aut e fibris pluribus crassis carnosis composita. *Caulis* pedalis, sesquipedalis aut 2 - pedalis, erectus, glaber, ramosissimus, angulatus, sulcatus, geniculatus. *Folia* glaberrima, lucida, *radicalia* praelonga pinnata: *foliolis* ovatis s. subrotundis trifidis inciso - serratis, *petiolisque* crassis sulcato - angulatis, *caulina* alterna, breviter petiolata, ternata: *foliolis* cuneiformibus trifidis incisis. *Umbellae* mediocres, terminales et axillares, sessiles atque breviter pedunculatae, multiradiatae. *Flores* exigui: *petalis* subaequalibus albis. *Involucrum* et *involucella* nulla.

Planta spontanea suspecta, *culta* subdulcis esculentia.

2) *A. Petroselinum* foliolis caulinis linearibus, umbellis pedunculatis, involucellis minutis. *Petersilien - Eppich, Petersilie, Gartenpetersilie.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* 1. c. *Ejusd.* Enum. 1. c. *Pers.* syn. pl 1. c. *Herb. Blackw.* t. 172.)

Sium Petroselinum De Vest. Man. bot. p. 517.

Bienn. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in Sardinia. (In hortis culinariis colitur ubique.)

Radix longa, fusiformis, carnosa, alba, magis minusve crassa. Caulis 2 - 3 pedalis, erectus, teres, striatus, glaberrimus, ramosus. Folia glaberrima, lucida, radicalia petiolata duplicato - pinnata: foliolis cuneiformibus s. ovatis trifidis incisis; caulina alterna vaginis petiolata biternata: foliolis angustis linearibus plerumque ternatis. Umbellae terminales, magnae, planae, multiradiatae, longe pedunculatae. Involucrum nullum. Involucella foliolis 6 - 8 brevibus, inaequalibus, setaceis. Flosculi omnes fertiles: petalis subaequalibus ex viridi - albis.

In hortis distinguntur: *Petroselinum crispum* (*Kräuterpetersilie*) foliis radicalibus amplioribus crispis, caulinis ovato - multifidis, radicibusque exiguis. *P. latifolium* (*Breitblättrige Petersilie, Wurzelperersilie.*) foliis radicalibus latioribus planis, radicibus majoribus et magis carnosis.

153. AEGOPODIUM, *Giersch, Geißfuß.*

1) *Ae. Podagraria* foliis summis ternatis, inferioribus triternatis, foliolis cordatis. *Gemeiner Giersch, Gerhardskraut, Zipperleinkraut,*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1476. *Ejusd.* Enum. p. 322. *Pers.* syn. pl. I. p. 324. *Hoffm.* Germ. I. p. 146. *Sohkuhr.* bot. Handb. t. 79.)

Ligusticum Podagraria *Roth.* Germ. I. p. 124. II. p. 322. *De Vest.* Man. bot. p. 508.

Seseli Aegopodium *Scopol.* Carniol. I. p. 215.

Podagraria Aegopodium *Moench.* Method. p. 90.

Perenn. *Flor.* *Majo - Augusto.*

Hab. in umbrosis humidiusculis, in nemoribus, sylvis, pomariis, et ad rivorum ripas ubique frequens.

Radix albida, stolonifera, valde repens, difficilime extirpanda. *Caulis* 2-3-pedalis, erectus, striatus, angulosus, fistulosus, glaber, ramosus. *Folia* alterna, glabra, radicalia triternata et quinata: *foliolis* cordatis s. obovalibus inciso-dentatis *petiolisque* longis triangularibus canaliculatis, caulina ternata: *foliolis* ovato-lanceolatis inaequaliter serratis. *Vaginae* magnae, ventricosae, striatae, glabrae, margine membranaceae. *Umbellae* terminales, longe pendunculatae, magnae, multiradiatae. *Petala* albida, subaequalia. *Involucrum* et *involucella* nulla.

TRIGYNIA.

154. VIBURNUM, *Schlingbaum.*

I) *V. Lantana* foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosis. *Wolliger Schlingb.* *Schwindelbeerbaum,* *Mehlbaum.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1489. *Ejusd.* Enum. p. 326. *Pers.* syn. pl. I. p. 327. *Hoffm.* Germ. I.

p. 147. *Jacq. Austr.* t. 341. *De Vest. Man. bot.*
p. 526.)

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis, ad sepes, et in hortis ubique.

Frutex 4 - 6 - pedalis, erectus: ramis oppositis divergentibus teretibus vimineis. Cortex trunci et ramosum annosiorum cinereus, molliusculus, glaber, in ramis junioribus tomentosus. Lignum albidum, tenax, subolidum. Folia opposita, petiolata, ovata, obtusa, basi cordata, rugosa, argute denticulata, venosa, utrinque pubescentia, subtus pallidiora tomentosa. Petioli tomentosi, superne compressi. Cymae terminales, planae, multiflorae, densae, ramosissimae. Corollae regulares, albae. Baccæ compressæ monospermae, primo viridescentes, demum rubentes, maturæ nigrae nitidae succulentæ. Semen compressum, cordatum, sulcatum.

2) *V. Opulus* foliis trilobis acuminato-dentatis utrinque glabris, petiolis glandulosis. *Gemeiner Schlingb. Schwelkenbaum, Wasserhollunder.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1490. *Ejusd. Enum.* l. c. *Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot.* p. 527. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 81. *Knorr. thes. II. t. S. 6.*)

Opulus glandulosa Moench. Method. p. 505. *G. M. Sch. Flor. der Wetter.* I. p. 431.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in humidiusculis nemorosis, in sylvis et ad sepes ubique.

Frutex 5 - 10 - pedalis, erectus, ramosissimus: ramis oppositis teretibus. Cortex glaber, pallide ci-
ne-

nereus, in ramis junioribus fuscescens nitidus. *Lignum* flavescentia, intus rubens, perdurum, tenax, odore nauseoso. *Folia* opposita, petiolata, subcordata, triloba, acuminata, serrata, venosa, glabra, subtus pallidiora. *Petioles* glabri, supra sulcati, superne *glandulis* 4 - 6 sessilibus, reniformibus, fuscescentibus aut rubicundis donati. *Cymae* terminales, pedunculatae, planae, radiantes. *Corollae* *exterior*es magnae, rotatae, planae, abortivae, niveae, *interior*es multo minores, campanulatae, flavicantes, fertiles. *Baccæ* orbiculatae, succosae, rubrae. *Semen* unicum, compressum, subcordatum.

Varietas *cymis* perfecte globosis densis, et *floribus* omnibus rotatis planis sterilibus niveis in hortis nostris satis nota. (*Viburn. roseum hortulan.* Schneeballstrauch.)

155. SAMBUCUS, Hollunder.

1) *S. Ebulus* *cymis tripartitis*, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Zwerg - Hollunder*, *Krautholl*. Attich.

(*L. sp. pl. ed. Willd.* I. p. 1494. *Ejusd. Enum.* p. 328. *Pers. syn. pl. I.* p. 328. *Hoffm. Germ. I.* p. 147. *De Vest. Man. bot.* p. 527. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 83. *Herb. Blackw.* t. 488.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in sylvaticis, ad margines agrorum, *ad ripas et sepes ubique.*

Radix longa, teres, subcarnosa, alba, valde repens. *Caulis* 2 - 3 - *pedalis*, *erectus*, *herbaceus*, *mollis*, *fragilis*, *teres*, *striato - sulcatus*, *crassus*, *glabriuscus*, *inferne simplex*, *superne ramosus*: *ramis* *oppositis*

sitis erectis. *Folia* opposita, impari - pinnata, petiolata, *suprema* sessilia. *Foliola* ovato - lanceolata, serrata, basi saepe glandulosa, superne glabra atro - viridia, inferne pubescentia pallidiora. *Stipulae* ad foliorum basin magnae, foliaceae, cordato - ovatae, acutae. *Cymae* terminales, majusculae, planae, tri - partitae: *pedunculis* ramosissimis. *Corollae* primo in - carnatae, apertae albae: *antheris* rubris, demum nig - ris. *Baccæ* globosae, glabrae, nigrae, acidulo - amaricantes, ingratae.

2) *S. nigra* cymis quinquepartitis, foliis pinna - tis: foliolis ovatis serratis, caule arboreo. *Schwarzer Hollunder.*

(*L.* sp. pl. ed *Willd* p. 1495. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest* Man. bot. l. c. *Herb. Blackw.* t. 151. *Knorr.* thes. I. t. H.)

Arbor et frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in dumetis, sepibus, ad pagos et in hortis ubique.

Frutex ad arboris magnitudinem saepe accedens, ramosissimus: *ramis* oppositis medulla levi farctis ci - nereis punctis elevatis ob sessis, junioribus viridibus. *Lignum* valde durum, flavum s. albidum. *Folia* op - posita, petiolata, impari - pinnata: *foliolis* 5 - 7 ova - tis acuminatis serratis glabris. *Stipulae* ad basin pe - tiolorum exiguae, subulatae, caducae. *Cymae* termi - nales, pedunculatae, planiusculae, magnae, plerum - que 5 - fidae, ramosissimae. *Flores* suaveolentes, albi. *Baccæ* globosae, nigrae, sub dulces.

In hortis varietates *foliis* eleganter albo - variega - tis cymisque minoribus, et aliae *baccis* maturis viri - dibus et albidis existunt.

3) *S. laciniata* cymis quinquepartitis, foliis pinnatis: foliolis laciniatis, caule arboreo. *Schlitzblättriger Hollunder.*

(Miller. dict. n. 2. *Rhez.* Obs. 3. p. 30. obs. 6. p. 27.)

S. nigra β. Linn. et omnium fere authorum.

Hab. in hortis et ad sepes raro.

Foliis bipinnatis, pinnis ternatis, foliolis lanceolatis incisis, quibus facilime dignoscitur, a praecedente diversissima.

Plantam cultam constantissimam semper observavi.

4) *S. racemosa* racemis compositis ovatis, caule arboreo. *Rother Hollunder, Trauben - Hollunder.*

(L. sp. pl. ed. *Wilh.* p. 1496. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Jacq.* icon. rar. t. 59.)

Frutex. Flor. Majo.

Hab. in nemorosis montosis. (Im *Käferhölzchen* prope *Rottendorf*, im *versbacher Forst* versus *Rimpar*, in nemore sic dicto *Ranger* prope *Mühlhäusern*, im *kitzinger Forst* versus *Schwarzach*, im *Krimmert* prope *Waldbrunn*, in monte *Reissenberg* prope *Sachsenheim* alibique rarius. Copiose in omnibus fere *sylvis rhoenanis.*)

Frutex altus, ad arboris magnitudinem saepe accedens, parum ramosus. *Lignum* perdurum, albidum. *Folia* opposita, petiolata, glauco - viridia, glabra, pinnata: *foliolis* ovato - lanceolatis acuminatis argute serratis venis plerumque rubellis percussis. *Stipulae* obtusae, crassae. *Racemi* terminales, pendunculati, compositi, densi, ovati s. subrotundi. *Ce-*

rollae virentes, ad basin 5 - fidae: *lacinis* reflexis.
Baccae subrotundae, splendentes, maturae elegantissime coccineae.

156. STAPHYLAEA, *Blasennußstrauch.*

I) *St. pinnata* foliis pinnatis, stylis binis. *Fiederblättriger Blasennußstr.* *Pimpernuss*, *Paternosterbaum*, *wilde Pistazie*.

(*L.* sp. pl. ed *Willd.* I. p. 1497. *Ejusd.* Enum. p. 329. *Pers.* syn. pl. I. p. 338. *Hoffm.* Germ. I. p. 148. *De Vest.* Man. bot. p. 528. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 84. *Schmidt.* Baumz. t. 80. *Knorr.* thes. II. t. S. I.)

Staphyllum dendron pinnatum *Scopol.* Carniol. I. p. 223. *Mönch.* Method. p. 64.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvaticis, ad sepes. (Ad sepes hinc inde rarissime. In sylvaticis prope *Theres* sponte crescentem aliquoties observavit *Am Wolff.*)

Frutex 4 - 10 - *pedalis*, *ramosus*: *ramis* *erectis*. *Folia* longe petiolata, opposita, impari - pinnata: *foliolis* 5 - 7 ovato - lanceolatis acutis tenuissime serratis glabris laete viridibus pedicellatis: *impari* majori latiorique. *Stipulae* ad basin petiolorum membranaceae, obtusae, deciduae. *Racemi* longe pedunculati, terminales, penduli, laxi. *Bracteae* setaceae, membranaceae. *Corollae* albae, apicibus rubellae, subrotundae, floribus *Convallariae majalis* similes, sed inodoreae. *Styli* plerumque 2, raro 3. *Capsulae* inflatae, membranaceae. *Semina* ossea, nitida, fusca, globosa.

157. ALSINE, *Vogelkraut*, *Miere*.

1) *A. media* caule unifariam piloso, petalis bipartitis, foliis ovato - cordatis. *Gemeines Vogelkraut*, *Vogelmiere*, *Hühnerdarm*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1511. *Ejusd.* Enum. p. 331. *Pers.* syn. pl. I. p. 330. *Hoffm.* Germ. I. p. 149. *De Vest.* Man. bot. p. 529. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 85. *Sturm.* Deutschl. Flor. I. 1. *Herb.* *Blackw.* t. 164.)

Stellaria media *Smith.* Britan. Vol. II. p. 473. *Spreng.* Flor. hal. p. 132.)

Ann. Flor. *toto sere anno*.

Hab. ad muros, ad vias, ad sepes et in cultis ubique frequens.

Caules plures, digitales, palmares, procumbentes, unifariam pilosi, succulenti, ramosi, dichotomi. *Folia* opposita, cordato - ovata, integerrima, villosiuscula: *petiolis* brevibus ciliatis basin versus latioribus. *Pedunculi* terminales et axillares, filiformes, solitarii, uniflori, erecti, deflorati penduli. *Flores* parvi: *petalis* albis bifidis calyci aequalibus. *Stamina* 5, saepe etiam 4 - 6 aut plura. *Capsulae* 5 - plerumque 6 - valves.

TETRAGYNIA.

158. PARNASSIA. *Parnassie*.

1) *P. palustris* caule simplici unifloro unifolio. *Sumpf - Parn.* *Weisse Leberblume*, *Einblatt*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1516. *Ejusd.* Enum. p. 332. *Pers.* syn. pl. I. p. 331. *Hoffm.* Germ. I.

p. 149. *De Vest. Man. bot.* p. 530. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 86.)

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in pratis uidis, paludosis, ad ripas et fossas. (In humidis graminosis sylvaticis im *Oelgrund* et prope *Wolfsmünster* raro. Ad margines *sylvae Anspach* poludosos prope *Abb. Heidenfeld* et in den *Lacken* ibidem passim. In *turfosis* prope *Kleinalangheim*, *Waldberg* alibique.)

Caulis digitalis, palmaris et altior, erectus, simplicissimus, sulcatus, angulosus, glaber, uniflorus, infra medium *folio solitario* sessili amplexicauli praeditus. *Folia radicalia* plura in orbem digesta, longius petiolata, cordato - subrotunda aut magis ovata, *integra*, glabra, nervosa, laete viridia. *Flos terminalis*, solitarius, formosus, albus: *petalis* cordatis concavis venosis. *Nectaria* petalis breviora, subcarnosa, setis apice glandulas globosas luteo - virides splendentes gerentibus pulcherrime ornata.

P E N T A G Y N I A.

159. STATICE, *Grasnelke*, *Sandnelke*.

I) *St. Armeria* scapo simplici capitato, foliis linearibus. *Gemeine Grasn.* *Nägeleinigras*:

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1522. *Pers.* syn. pl. I. p. 332. *Hoffm.* Germ. I. p. 150. *De Vest. Man. bot.* p. 530. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 87. *Sturm D. Flor.* I. 1.)

Armeria vulgaris *Willd.* *Enum.* p. 333.

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab.

Hab. in pratis, graminosis arenosis, et in collibus ubique.

Radix longa, sublignosa, fibrosa, repens. Scapi
plures, palmares, pedales, erecti, simplicissimi,
teretes, nudi, scabriuscui. Folia omnia radicalia,
angusta, linearia, carinata, integra, scabriuscula,
graminea, firma, glauco - viridia, in cespitem den-
sum congesta. Capitulum terminale, solitarium, den-
sum, multiflorum. Bractea tubulosa, membranacea,
maxime caduca, involucro adnata. Involucrum poly-
phyllum: foliolis scariosis imbricatis capitulo brevio-
ribus. Flores subcespitosi, rosei aut pallide rubelli.
Paleae albidae, splendentes inter flores.

160. LINUM, Lein.

I) *L. usitatissimum* calycibus capsulisque mu-
 cronatis, petalis crenatis, foliis alternis lanceolatis.
Gewöhnlichster Lein, Flachs.

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1533. Ejusd. Enum.*
p. 338. Pers. syn. pl. I. p. 334. Hoffm. Germ. I.
p. 150. De Vest. Man. bot. p. 532. Herb. Blackw.
t. 160. Knorr. thesaur. II. t. L. 9.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes passim. (Colitur in agris.)

Planta glaberrima, laete viridis. Caulis pedalis,
sesquipedalis et altior, erectus, teres, inferne sim-
plex, superne ramosus. Folia alterna, lanceolata,
acuminata, integerrima, trinervia. Flores termina-
les, pedunculati, speciosi: petalis obovatis crenatis
cyanis. Stamina basi connata.

Distinguntur: a) *L. humile* (*Niedriger Flachs,*
Springflachs, Klang - Lein) *caulibus demissioribus,*

foliis, floribus et capsulis majoribus perfecte maturis sponte desilientibus. b) *L. sylvestre* (*Wilder Flachs, Dreschflachs, Dorschlein*) *caulibus multo altioribus, capsulisque nunquam sponte desilientibus.*

2) *L. tenuifolium* calycibus acuminatis, foliis sparsis linearis - setaceis retrorsum scabris. *Dünnblättriger Lein.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1536. Pers. syn. pl. p. 335. Hoffm. Germ. p. 151. Jacq. Austr. t. 215. De Vest. Man. bot. p. 533.*)

Perenn. Flor. Jul. Augosto.

Hab. in montosis siccis. (Prope Rimpar, Mühlhausen, Arnstein, Karlstadt, Veitshöchheim et Kleinnochsenfurth. In siccis lapidosis prope Retzbach, Arnshausen et alibi raro.)

Caules plures palmatae, pedales, erecti, rigidiusculi, subpubescentes, a basi jam ramosi. *Folia* sparsa, angustissima, fere setacea, acuminata, glauco-viridia, margine spinulis tenuissimis retrorsum scabra. *Flores* satis magni in panicula terminali bifida. *Corollae* speciosae coeruleae aut ex violaceo - rubellae, nonnunquam albae. *Calycis foliola* acutissima, glandulosa, spinulosa - ciliata. *Stamina* basi dilatata.

3) *L. catharticum* foliis oppositis ovato - lanceolatis, petalis acutis, caule superne dichotomo. *Purgier - Lein, Wiesenflachs.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1541. Pers. syn. pl. p. 336. Hoffm. Germ. p. 152. De Vest. Man. bot. p. 534. Schkuhr. bot. Handb. t. 87. Herb. Blackw. t. 358.*)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab.

*Hab. in pratis et pascuis humidiusculis
inque sylvaticis ubique.*

Caulis digitalis, palmaris, erectus, basi quandoque procumbens, tenuis, filiformis, glaber, inferne simplex, superne dichotomus. Folia opposita, sessilia, ovato-lanceolata, integerrima glabra. Flores terminales, parvi, erecti, ante explicationem nutantes. Petala cuneiformia, calyce longiora, alba: unque flavo.

Herba amara cathartica.

Varietatem *floribus triandris trigynis, et capsulis quadrivalvibus* pluries observavi.

161. DROSERA, Sonnenthau.

I) *D. rotundifolia* foliis orbiculatis. *Rundblättriger Sonnenth.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. I. p. 1543. Ejusd. Enum. p. 340. Pers. syn. pl. I. p. 336. Hoffm. Germ. I. p. 152. De Vest. Man. bot. p. 531. Schkuhr. bot. Handb. t. 87. Herb. Blackw. t. 432.*)

Rossolis rotundifolia Moench. Meth. p. 57.

Rossolis septemtrionalis Scop. Carn. I. p. 232.

Ann. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in paludosis. (In paludosis prope Wolfs-münster, Gemiünden, Gräfendorf, Erlach, Dettelbach, Schwarzenau, Haßfurth alibique. Copiose praeterea in uliginosis turfosis Rhoenae.)

Scapus digitalis, erectus, simplex, teres, glaber, fusco-rubellus, nudus. Folia supra radicem in orbe congesta, longe petiolata, orbiculata, integerrima, rubella, supra concava et pilis rubris capitatis

suc-

succum glutinosum secernentibus obsessa, subtus glabra, ex viridi - albo rubicunda. Flores pedicellati, alterni in racemum terminalem secundum simplicem dispositi. Petala obovata, alba. Styli saepissime 6, interdum 7 - 8.

2) *D. longifolia* foliis obovatis oblongis. Langblättriger Sonnenth.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1544. *Pers. syn. pl.* p. 337. *Hoffm. Germ. l. c.* *De Vest. Man. bot. l. c.*)

Rossol. septentr. β. Scopol. Carn. l. c.

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. cum priori, sed multo rarius. (In paludosis prope *Hassfurth* et *Kleinlangheim* raro. Etiam in *sylva homburgensi* versus *Böttingen* specimina aliquot legi.)

Praecedenti nimis affinis. Sed differt praecipue scapis plerumque brevioribus, foliis obovatis oblongis, stigmatibus 2 - 3 - dentatis. Styli nunquam 6, saepissime 7 aut 8, rarius 9.

P O L Y G Y N I A.

162. M Y O S U R U S, Mäuseschwanz,

1) *M. minimus* foliis linearibus integerimis, Kleinster Mäuseschw. Mausgras,

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* I. p. 1568. *Ejusd. Enum.* p. 345. *Pers. syn. pl.* I. p. 341. *Hoffm. Germ. I.* p. 153. *De Vest. Man. bot.* p. 535. *Schkühr. bot. Handb. t. 83. Sturm. D. Flor. I. II.*)

Ann. Flor. Aprili — Junio.

Hab.

Hab. in agris et ad ripas arenosas. (In agris et ad ripas prope Himmelsgarten, Zell, Thüngersheim, Stetten, Eivelstadt, Frickenhausen et alibi saepe copiose.)

Scapi plures 1 - 2 - 3 - unciales, erecti, simplissimi, teretes, nudi, glabri, superne paulo inerasati. Folia supra radicem numerosa in orbem congesta, erectiuscula vel ad terram decumbentia, linearia, compressa, obtusiuscula, integerrima, subcarnosa, glabra, laete viridia. Flos terminalis, solitarius, erectus, parvus. Petala pallide flava, superne latiora, fugacia. Receptaculum post florescentiam elongatum, cylindricum, seminibus undique tectum, caudae murinae simile. Stamina saepe 6, rarius 8. §. 12,

C L A S S I S VI.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

163. G A L A N T H U S.

Linn, Gen, pl. ed. Schreb. n. 547. De Neck. et. bot. n. 1498. Borkh, tent, n. 100.

Cor,

Cor. supera 6 - petala: petalis 3 interioribus brevioribus emarginatis nectariferis, exterioribus oblongis concavis. Stigma simplex.

164. LEVCOJUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 548. De Neck. el. bot. n. 1497. Borkh. tent. n. 99.

Cor. supera 6 - petala: petalis apice incrassatis, Stigma simplex. Stam. aequalia: antheris obtusis.

165. ALLIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 557. De Neck. el. bot. n. 1513. Borkh. tent. n. 102.

Cor. infera 6 - petala patens. Spatha multiflora, Umbella congesta. Caps. supera,

166. LILIUM.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 558. De Neck. el. bot. n. 1531. Borkh. tent. n. 112.

Cor. 6 - petala subcampanulata: unquibus linea tubulosa nectarifera. Germen oblongum 3 - gonum, Caps. 3 - valvis: valvis pilo cancellato connexis.

167. TULIPA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 563. De Neck. el. bot. n. 1532. Borkh. tent. n. 113.

Cor. 6 - petala campanulata, Stylus o. Stigma 3 - lobum germini 3 - gono impositum. Semina plana.

168. ORNITHOGALUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 566. De Neck. el. bot. n. 1536. Borkh. tent. n. 105.

Cor.

Cor. 6 - petala erecta persistens supra medium patens. *Filamenta* basi dilatata. *Stylus* brevis: *stigmate* 3 - lobo. *Caps.* supera 3 - locularis 3 - gona. *Sem.* subrotunda nuda.

169. SCILLA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 567. De Neck. el. b. n. 1534. Borkh. tent. n. 107.

Cor. 6 - petala patens decidua. *Filamenta* subaequalia filiformia. *Stigma* simplex.

170. ANTHERICUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 570. De Neck. el. bot. n. 1537. Borkh. tent. n. 104. Persoon. Synopsis. plant. I. p. 367.

Cor. 6 - petala plana subpersistens. *Filamenta* filiformia nuda. *Caps.* supera ovata. *Sem.* angulata.

171. ASPARAGUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 573. De Neck. el. b. n. 1560. Borkh. tent. n. 442.

Cal. o. *Cor.* 6 - partita campanulata: *laciniis* 3 *inferioribus* apice reflexis. *Stylus* brevissimus. *Stigma* 3. *Bacca* supera globosa 3 - locularis.

172. CONVALLARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 575. De Neck. el. b. n. 1550. Borkh. tent. n. 441.

Cal. o. *Cor.* 1 - petala campanulata: *limbo* reflexo 6 - fido. *Stigma* 3 - gonum. *Bacca* supera 3 - locularis immatura maculata.

173. HYACINTHUS.

Tournef. *Elem. de Botaniq.* *Genr.* 4. *I. p.* 287.
t. 180. *Moench.* *Meth. p.* 633. (*Muscaria*) *Borkh.*
tent. *n.* 427.

Spatha o. *Cor.* cylindrica aut globosa: *limbo* coarc-
tato 6 - dentato. *Stigma* simplex. *Caps.* supera ova-
to - trigona.

174. ACORUS.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* *n.* 586. *De Neck. el.*
b. *n.* 1690. *Borkh. tent.* *n.* 264.

Spadix simplicissimus cylindricus *flosculis* undique
tectus. *Cal.* o. *Cor.* planiuscula: *petalis* 6 inflexis.
Stylus o. *Stigma* punctum prominens. *Caps.* brevis
trigona 3 - locularis.

175. JUNCUS.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* *n.* 590. *De Neck. el.*
bot. *n.* 1558. *Borkh. tent.* *n.* 96.

Cal. o. *Petala* 6 persistentia. *Stigmata* 3. *Caps.*
3 - locularis 3 - valvis 1 - sperma: *valvulis* medio
septiferis. *Sem.* dissepimento affixa.

176. BERBERIS.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* *n.* 595. *De Neck. el.*
bot. *n.* 1178. *Borkh. tent.* *n.* 136.

Cal. 6 - phyllus superus deciduus. *Petala* 6: ad
basin glandulis 2 nectariferis. *Stylus* o. *Bacca* ob-
longa supera 2 - sperma.

177. PEPLIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 605. De Neck. el. bot. n. 772. Borkh. tent. n. 632.

Cal. campanulatus: ore 12 - fido, denticulis alternis reflexis. Petala 6 minima fugacissima calyci inserta. Caps. supera 2 - locularis polysperma.

TRIGYNIA.

178. RUMEX.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 613. De Neck. el. bot. n. 947. Borkh. tent. n. 51.

*Cal. 3 - phyllus. Petala 3 conniventia persisten-
tia. Stigmata laciniata. Sem. 1 triquetrum nudum
superum.*

179. TRIGLOCHIN.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 616. De Neck. el. bot. n. 1557. Borkh. tent. n. 424.

*Cal. 3 - phyllus deciduus. Petala 3 calyci simi-
lia, erectiora. Styli o. Caps. supera basi dehiscens.
Sem. solitaria.*

180. COLCHICUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 621. De Neck. el. bot. n. 1542. Borkh. tent. n. 440.

*Cal. spatha. Cor. 6 - partita: tubo longissimo ra-
dicato. Stigmata canaliculata. Caps. 3 superae con-
nexae inflatae polyspermae.*

POLYGYNIA.

181. ALISMA.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 625. De Neck. el. bot. n. 1110. Borkh. tent. n. 121.

Cal. 3 - phyllus persistens. Cor. 3 - petala plana. Capsulae plures aggregatae 1 - spermae compresae receptaculo communi affixae.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

163. GALANTHUS, *Schneeglöckchen.*

1) *G. nivalis* foliis binis carinatis, scapo unifloro. *Gemeines Schneegl. Schneetropfen.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 29. Ejusd. Enum. p. 349. Pers. syn. pl. I. p. 349. Hoffm. Germ. I. p. 153. Jacq. Austr. t. 330. Schkuhr. bot. Handb. t. 89. Knorr. Thes. I. t. S. 15. De Vest. Man. bot. p. 546.*)

Perenn. Flor. Februar. Martio.

Hab.

Hab. in umbrosis. (Ad sepes hortorum extra urbem hinc inde. Inter *Aub* et *Gelchsheim* ad sepes aliquoties etiam legi.)

Bulbi ovati, parvi, extus nigricantes, intus albi, aggregati. *Folia* 2 aut 3 angusta, carinata, linearia, obtusa, apicibus callosa, glaberrima. *Scapus* digitalis, erectus, debilis, anceps, nudus, striatus, uniflorus, post florescentiam decumbens. *Flos* terminalis, pedunculatus, campanulatus, nutans, niveus, inodorus. *Petala* 3 *exteriora* oblonga concava patentia majora, 3 *interiora* (*Nectaria*) breviora erecta emarginata striata supra medium macula cordiformi viridi. *Spatha* linearis, compressa, apice saepe bifida.

164. LEVCOLUM, Knotenblume.

1) *L. vernum* spatha uniflora, stylo clavato.
Frühe Knotenbl. Märzglöckchen.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 30. *Ejusd.* Enum. p. 349. *Pers.* syn. pl. I. p. 349. *Hoffm.* Germ. I. p. 154. *Jacq.* Austr. t. 312. *Sohkuhr.* bot. Handb. t. 89. *De Vest.* Man. bot. p. 846. *Knorr.* Thesaur. I. t. S. 15.)

Nivaria verna *Moench.* Method. p. 279.

Perenn. *Flor.* Februario — Aprili.

Hab. in umbrosis, montosis sylvaticis. (In sylvaticis prope *Triesenstein* et in umbrosis sylvaticis prope dem *Zabelstein*. In nemorosis des münnnerstadter Berges prope *Bocklet*, et prope der Cascate apud *Kissingen*. In sylvaticis montosis prope *Bischofsheim* alibique.)

Bulbus subrotundus albus, extus fuscescens. *Scapus* digitalis, spithameus, erectus, simplicissimus, teretiusculus, nudus, glaber, uniflorus. *Folia* plura, plana, lanceolata, glabra, obtusa. *Flos* terminalis, pedunculatus, nutans. *Petala* subaequalia, nivea, apice obtusa incrassata viridescentia. *Spatha* carinata, 2 - valvis. *Antherae* filamentis longiores.

Variat rarissime scapo bifloro.

165. ALLIUM, Lauch.

Foliis caulinis planis. Umbella capsulifera.

I) *A. rotundum* caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, umbellis subglobosis, floribus lateralibus nutantibus. *Runder Lauch, kugelförmiger Lauch.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 65. Pers. syn. pl. I. p. 355. Hoffm. Germ. I. p. 155. De Vest. Man. bot. p. 548.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in arenosis, in vineis. (In vineis auf dem *Galgenberge*, des *Steins*, im *Fuchslein*, porro prope *Unterdürrbach*, *Zell*, *Hochberg* alibique. In arvis infra *Thüngersheim*. In arenosis raro prope der *Walfartskirche* apud *Dettelbach*, ad margines sylvae prope *Timbach* versus *Rimpach*.)

Radix bulbulis plurimis rotundis atropurpureis membrana alba invicem conjunctis. *Scapus* 1 - 2 - 3-pedalis, erectus, teres, glaber, inferne foliosus, superne nudus. *Folia* alterna, plana, acuminata, graminea, basi vaginantia. *Umbella* terminalis, densa, subsphaerica: floribus pedunculatis purpureis. *Pedun-*

dunculi inaequales, medii erecti, laterales nutantes.
Spatha brevissima. lacera.

2) *A. Porrum* caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Fleisch - Lauch, Porre.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 64. *Eiusd. Enum.* p. 357.
Pers. syn. pl. l. c. *Herb. Blackw.* t. 421.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in vineis Helvetiae. (Colitur in hortis culinariis ubique.)

Bulbus oblongus, simplex, tunicatus. *Scapus* erectus, teres, glaber, inferne foliosus. *Folia* alterna, longa lataque, carinata, basi vaginata. *Capitulum* terminale, densum: *floribus* albidis. *Petala* carina scabra.

Foliis caulinis planis. Umbella bulbifera.

3) *A. sativum* caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis. *Knoblauch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 68. *Eiusd. Enum.* p. 358.
Pers. syn. pl. p. 456.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in Sicilia. (Colitur cum praecedente.)

Bulbus subrotundus membrana albida sicca vestitus, compositus e *bulbulis* plurimis incurvis. *Scapus* altus, erectus, teres, inferne foliosus. *Folia* lata, plana, acuminata, basi vaginantia. *Umbella terminalis*, plana: *floribus* albidis s. purpurascenscentibus et *bulbulis* multis atro - rubentibus.

4) *A. scorodoprasum* caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis, vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis. *Schlangenlauch, Rockenbollen.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 69. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 456. *Hoffm.* Germ. I. p. 155. *De Vest.* Man. bot. p. 548.)

Perenn. *Flor.* Jun. Julio.

Hab. in pratis, in vineis. (Nullibi, nisi in vineis der Harfe specimina 2 legi. Colitur in fortis culinariis.)

Bulbus prioris, sed sapor et odor mitiores. *Scapus* erectus, teres, glaber, ante florescentiam sub umbella flexus contortus cernuus. *Folia* plana, lata, crenulata: *vaginis* compressis. *Umbella* terminalis, capitata: *floribus* rubris inaequaliter pedicellatis, et *bulbulis* multis atro - sanquineis.

5) *A. arenarium* caule planifolio bulbifero, *vaginis* teretibus, *spatha* mutica, staminibus tricuspidatis, petalis carina scabriusculis. *Sand - Lauch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 549.)

Perenn. *Flor.* Junio.

Hab. in montosis arenosis, in dumetis et vineis. (In monte dürrbaccensi, auf dem Schloßberg, ad sylvam kistensem et hoechbergensem passim. In vineis prope Randersacker, Eivelstadt alibique.)

Bulbus compositus, ovatus, fuscus, *bulbulis* pluribus parvis purpureis circumdatus. *Scapus* 2 - 3 - pedalis, erectus, teres, glaber, inferne foliatus. *Folia* linearia, plana, marginibus scabriuscula, ciliata. *Vaginae* longae, teretes. *Spatha* monophylla, brevis, decidua. *Capitulum* terminale, subrotundum, densum: *bulbulis* numerosis fuscis aut atro - purpureis.

reis. *Pedunculi* breves, incurvati. *Flores* pauci, purpureo - violacei: *petalis* lanceolatis acutis.

6) *A. carinatum* caule planifolio bulbifero, staminibus simplicibus, spatha longissima acuminato - setacea. *Berg - Lauch, Wald - Lauch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 70. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 156. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. *Flor.* Jul. *Augusto.*

Hab. in montosis dumetosis, in sylvis. (In monte zellensi, in dumetosis circa Dürrbach, Rimpar, Versbach et Mühlhausen rarius. Hinc inde in sylva vitihoechheimensi, et im oberen Gesprait versus Proselheim.)

Bulbus simplex, ovatus, carnosus, albidus, inodorus. *Scapus* sesquipedalis, 2 - 3 - nonnunquam solo pinquieri 4 - pedalis, erectus, teres, glaber, ad medium usque foliatus. *Folia* pauca, alterna, succulenta, linearia, inferne canaliculato - semiteretia, superne plana, angusta. *Vaginae* praelongae. *Spatha* longissima, biphylla: *foliolis* inaequalibus acuminato - setaceis sub florescentia pendulis. *Capitulum* terminale, subrotundum. *Flores* pauci, e viridi purpurascentes: *pedunculis* longis pendulis. *Bulbi* copiosi, acuminati, curvi, nitidi, fusci s. albidi, ante florescentiam jam generati. *Stamina* simplicia, subulata, basi subconnata.

Foliis caulinis teretibus. *Umbella* capsulifera.

7) *A. sphaerocephalon* caule teretifolio capsulifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. *Kugelförmiger Lauch.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 70. Pers. syn. pl. l. c.
Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis siccis, in agris inque vineis. (Ad muros et in vineis im Stein, prope Thüngersheim, Retzbach, Wipfeld, Frickenhausen et alibi. In agris prope Neunkirchen, Tiefenthal et Höttingen. In montosis versus der Hallburg et prope der Vogelsburg apud Volkach alibique.)

Bulbus simplex aut duplex. Scapus sesquipedalis, 2 - pedalis et altior, erectus, teres, glaber, foliosus. Folia pauca, alterna, semiteretia, acuminata, glabra, intus cava, mox marcescentia. Spatha brevis, 2 - valvis. Capitulum sphaericum: capsulis multis triquetris pyramidatis. Flores pauci, purpurei: exteriores longius pedunculati penduli, interiores brevius pedunculati erecti. Stamina tricuspidata, petalis longiora.

Foliis caulinis teretibus. Umbella bulbifera.

8) *A. vineale* caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Weinbergs - Lauch, Hundslauch.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 73. Ejusd. Enum. p. 359.
Pers. syn. pl. p. 456. Hoffm. Germ. p. 156. De Vest.
Man. bot. p. 550.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in vineis et agris arenosis. (In vineis des Steins, der Harse, im Sand et oberen Grombühl. In agris arenosis saxosis inter Retzbach et Thüngen, prope Versbach, Rimpf, Schlüsselsfeld, Seßlach aliisque rarius.)

Bul-

Bulbus ovatus, albidus e *bulbulis* numerosis variae magnitudinis compositus. *Scapus* pedalis, sesquipedalis, erectus, gracilis, teres, striatus, glaberrimus. *Folia* alterna, teretia, acuminata, fistulosa, glabra, vaginantia. *Spatha* longa, lacera, monophylla. *Capitulum* sphaericum, densum, parvum: *bulbulis* numerosis ovatis mucronatis. *Flores* pauci, parvi, violacei, albidi, s. carnei: *pedunculis* brevibus capillariibus. *Stamina* exserta, tricuspidato - biseta: *setis* antheram superantibus.

9) *A. oleraceum* caule teretifolio bulbifero, foliis semiteretibus scabris subtus sulcatis, staminibus simplicibus. *Grüner - Lauch, Gemüslauch.*

(*L.* sp. pl. ed *Willd.* p. 74. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 357. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in pratis, pomariis, dumetis, vineis et ad sepes. (In pratis, pomariis et ad sepes prope urbem hinc inde frequens. In vineis prope dem *Sanderthore*, ad viam versus *Eivelstadt* inque vineis ibidem. Ad margines sylvarum *Veitshöchheim*, *Waldbüttelbronn* et alibi.)

Bulbus simplex, ovatus, acuminatus, extus subfuscus, intus albidus. *Scapus* pedalis, sesquipedalis, erectus, gracilis, teres. *Folia* alterna, semiteretia, scabriuscula, fistulosa, subtus sulcata. *Spatha* longa, ventricosa, inaequalis: foliolo altero longissimo in apicem tenuissimam elongato. *Capitulum* terminale, subrotundum, bulbiferum, pauciflorum. *Flores* campanulati, ex albo et viridi purpurascentes, longe pendulati. *Stamina* simplicia, subulata, basi connata.

Fo-

Foliis radicalibus. Scapo nudo.

10) *A. angulosum* scapo nudo ancipi, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. *Eckiger Lauch, Wiesenlauch.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 76. Ejusd. Enum. p. 361. Pers. syn. pl. p. 357. Hoffm. Germ. p. 156. Jacq. Austr. Vol. 5. p. 11. t. 423. De Vest. Man. bot. p. 550.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab in montosis. (In monte prope *Retzbach* versus der neuen Anlage. In monte *Kalbenstein* prope *Karlenburg* et in montosis atque supra vineas inter *Veitshöchheim* et *Thüngersheim* alibique passim.)

Bulbus oblongus, valde fibrosus, aetate lignescens. Scapus palmaris et pedalis, erectus, nudus, glaber, striatus, anceps vel subtetragonus, laete viridis. Folia linearia, integra, glabra, triquetra, canaliculata, obtusa, scapo breviora, subtus subangulosa, interdum laevia. Spatha 1 - phylla, cinerea, brevis, obtusissima, plerumque 2 - fidia. Umbella terminalis; laxa, multiflora, fastigiata: pedunculis numerosis rectis strictis superne incrassatis. Petala dilute purpurea, lateribus conniventia: interiora apice patentia. Stamina simplicia corolla vix parum longiora.

11) *A. ascalonicum* scapo tereti nudo, foliis subulatis, umbella globosa, staminibus tricuspidatis. *Acolonischer Lauch, Scharlottenzwiebel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 75. Ejusd. Enum. p. 360. Pers. syn. pl. l. c.*)

Perenn. Flor. aestate.

Hab. in Palaestina. (Colitur in hortis.)

Bul-

Bulbus parvus, simplex, oblongus. Scapus spithameus et altior, erectus, teres, nudus. Folia subulata, fistulosa. Spatha membranacea. Capitulum terminale, globosum, densum. Petala ovato-lanceolata, erecta, coerulea, venis saturatioribus picta. Stamina alterna latissima.

Statura *Allii schoenoprasii*.

12) *A. ursinum* scapo nudo triquetro, foliis ovato-lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Bärenlauch, Walaknoblauch.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 79. Ejusd. Enum. p. 361. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 551.*)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in nemorosis umbrosis humidiusculis ubique frequens.

Bulbus simplex, oblongo-rotundus, albus. Scapus palmaris, pedalis, erectus, triangulus, glaber, nudus. Folia petiolata, subbina, lata, ovato-lanceolata, utrinque attenuata, integerrima glaberrimaque, laete viridia, laxa. Spatha brevis, ovata, 2-valvis. Umbella terminalis, planiuscula, multiflora: pedunculis erectis longitudine aequalibus. Petala lanceolata, plana, nivea: exteriora gibba. Stamina simplicia, corolla breviora.

13) *A. Cepa* scapo nudo inferne ventricoso foliis teretibus longiore. *Küchen-Lauch, gemeine Zwiebel, Sommerzwiebel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 80. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c.*)

Perenn. Flor. aestate.

Patria adhuc ignota. (Colitur in hortis culinariis abunde.)

Bulbus magnus, simplex, tunicatus, membrana flavescente s. alba obductus, oblongus s. magis rotundus, plus minusve compressus. *Scapus* altus, erectus, fistulosus, teres, glaber, inferne ventricosus, superne sensim attenuatus. *Folia* teretia, fistulosa, acuminata, scapo breviora. *Umbella* magna, globosa, densa, multiflora, ante florescentiam spatha albida, pellucida obducta.

In hortis nostris plures ejus Varietates exstant.

14) *A. fistulosum* scapo nudo adaequante folia teretia subulata ventricosa. *Rohriger Lauch*, *Winterzwiebel*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 81. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 358.)

Cepa ventricosa Moench. Method. p. 244.

Perenn. *Flor. Junio — Augusto.*

Hab. in Sibiria? (Colitur cum praecedente.)

Bulbus simplex, tunicatus. *Scapus* pedalis, sesquipedalis, erectus, fistulosus, ventricosus, inferne foliatus. *Folia* teretia, acuminata, fistulosa, scapo plerumque breviora. *Umbella* globosa, densa, multiflora, *spatha* albida, pellucida primo inclusa. *Petala* alba: *carina* viridi.

15) *A. Schoenoprasum* scapo nudo tereti adaequante folia teretia subulato-filiformia. *Suppen-Lauch*, *Schnittlauch*.

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. *Ejusd.* Enum. p. 162. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 157. *De Vest. Man. bot.* p. 551. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 91.)

Cepa schoenoprasa Moench. Method. p. 244.

Perenn. Flor. Mayo — Septembri.

Hab. in Sibiria, Oelandia, Helvetia, inque variis Germaniae regionibus. (In hortis nostris colitur abunde.)

Bulbi exigui, simplices, oblongi, dense conferti. Scapus palmaris, erectus, gracilis, fistulosus, nudus, folia adaequans. Folia erecto-patentia, basi vaginantia, teretia, subulata, tenuia, fistulosa. Spatha brevis, ovata, monophylla, lineis purpureis notata. Umbella terminalis, globosa, densa, multiflora. Petala violacea s. purpurea. Stamina simplicia, subulata.

166. LILIUM, *Lilie.*

I) *L. Martagon* foliis verticillatis, floribus reflexis: petalis revolutis. *Bundlilie*, *türkischer Bund*, *Goldwurz*.

(*L.* sp. pl. ed. Willd. II. p. 88. *Ejusd.* Enum. p. 363. *Pers.* syn. pl. I. p. 359. *Hoffm.* Germ. I. p. 157. *Jacq.* Austr. t. 351. *De Vest.* Man. bot. p. 556. *Knorr.* Thesaur. I. tab. T. 6.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis, nemorosis. (In *sylva viti-hoechheimensi*, im *Huck* prope *Wipsfeld*, in *sylva wald-bronnensi* alibique non adeo infrequens. Rarius in nemorosis inter *Randersacker* et *Theilheim*. In *monte crucis* passim frequens et alibi.)

Bulbus magnus, simplex, squamis multis luteis laxe imbricatis. Scapus sesquipedalis, 2 - pedalis et altior, erectus, teretiusculus, nonnunquam planiusculus,

culus, simplex, scabriusculus, punctatus, foliosus. *Folia* sessilia, patentia, late lanceolata, inaequali-longa, integra, glabra, laete viridia, quaterna aut sena verticillata: *suprema* alterna. *Racemus* terminalis, brevis, laxus. *Flores* longe pedunculati, antrorsum nutantes. *Petala* supra medium revoluta, ex fusco purpurascentia punctis asperis obscurioribus notata, raro alba. *Germen* acute hexagonum, clavatum.

167. T U L I P A, *Tulpe.*

1) *T. sylvestris* flore solitario subnutante, staminibus basi hirtutis, foliis lanceolatis. *Wilde Tulpe*, *Wiesentulipane*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 96. *Ejusd.* Enum. p. 365. *Pers.* syn. pl. I. p. 360. *Hoffm.* Germ. I. p. 158. *De Vest.* Man. bot. p. 561. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 93.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in nemorosis, ad sepes, in vineis, pratis et pomariis passim frequens.

Bulbus ovatus, solidus, albus, membrana libera fusca vestitus. *Scapus* palmaris, pedalis, erectus vel parum inclinatus, simplex, teres, glaber, uniflorus, supra medium nudus. *Folia* 2 - 3 sessilia, alterna, lato-lanceolata, erecta, integra, glabra, basi tubuloso-vaginantia. *Flos* terminalis, subnutans, odoratus, flavus, extus ex luteo-virens. *Petala* lanceolata, acuta, apice barbata: *exteriora* 3 angustiora, *interiora* latiora, basi et margine hirsuta. *Filamenta* basi attenuata atque villosa.

168. ORNITHOGALUM, Vogelmilch.

1) *O. luteum* scapo anguloso diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus glabris, petalis obtusis. *Gelbe Vogelm. Gelber Stern.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 113. Ejusd. Enum. p. 367. Pers. syn. pl. I. p. 363. Hoffm. Germ. I. p. 159. Sturm. D. Flor. I. 12. De Vest. Man. bot. p. 560.*)

Stellaris lutea Moench. Meth. p. 303.

Perenn. Fior. April. Majo.

Hab. in vineis, pratis, pomariis, collibus graminosis et ad sepes.

Radix parva, bulbosa, subrotunda, albida, carnosae, viscosa folium pleumque unicum, (rarius 2) lineare, canaliculatum, gramineum, glabrum, integrum proferens. Scapus 4 - 6 - 8 - uncialis, erectus, angulosus, nudus, simplex, apicem versus foliis 2 oppositis, inaequalibus, ciliatis, floribus brevioribus. Pedunculi terminales, graciles, simplices, uniflori, triquetri, umbellati. Petala lanceolata, obtusa, flavae, extus viridi lineata, margine albida. Pistillum et germen glabrum.

2) *O. minimum* scapo anguloso diphyllo, pedunculis umbellatis ramosis pubescentibus, petalis acutis. *Kleinste Vogelm. Kleiner Ackerstern.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 114. Pers. syn. pl. I. c. Hoffm. Germ. I. c. De Vest. Man. bot. I. c. Sturm. D. Flor. I. 12.*)

O. villosum Marsch. & Bieberst. Taur. caucas. p. 274. Willd. Enum. p. 368.

Stel.

Stellaris minima Moench. Method. l. c.

Perenn. Flor. April. Mayo.

Hab. in agris, pascuis, hortis inque vineis et ad sepes.

Simillimum praecedenti, a quo scapis, corollis et foliis minoribus, pedunculis ramosis teretiusculis pubescentibus s. magis villosis, pistillis germinibusque plus minusve hirsutis constanter differt. Petala praetera lanceolata acuta extus subhirsuta, scapus et pedunculi utplurimum rubelli sunt.

3) *O. umbellatum* pedunculis corymbosis scapotereti longioribus, filamentis subulato - dilatatis. *Geschirmte Vogelm. weißer Stern.*

(*L.* sp. pl. ed. Willd. p. 116. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 364. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man bot. l. c. *Jacq.* Austr. t. 343. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 94.)

Stellaris corymbosa Mönch. Meth. p. 304.

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in vineis, in hortis, ad sepes. (In vineis des Steins, der Harfe und des Schalksberges. In vineis im oberen Grombühl, im Sand, prope Randersacker, Gerbrunn, Karlstadt et Arnstein. Ad sepes infra Veitshöchheim versus Thiüngersheim, Retzbach alibique haud infrequens.)

Bulbus mediocris, subrotundus, albus, minoribus pluribus circumdatus. Scapus palmaris, erectus, teres, glaber, simplex, nudus. Folia in orbem digesta, linearia, obtusa, apice emarginata, canaliculata, integra, striata, glabra, crassiuscula, linea alba longitudinali notata. Pedunculi terminales, alterni, ter-

retes, glabri, uniflori, corymbosi: *interiores* breviores, *exteriorres* longiores, scapum adaequantes, aut eum superantes. *Bractea* ad quemvis pedunculum lanceolata, albida. *Petala* lanceolata, patentia, candida, nitida, subtus viridula. *Filamenta* basi dilata-ta, apice subulata, alterna breviora et angustiora.

Post florescentiam *pedunculi* maxime elongati, sae-pe pedales et longiores.

4) *O. nutans* floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi. *Ueberhängende Vogelmilch, wilde Hyazinthe.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 125. *Ejusd.* Enum. p. 369. *Pers.* syn. pl. p. 365. *Hoffm.* Germ. l. c. *Jacq.* Austr. t. 301. *De Vest.* Man. bot. p. 561.)

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in hortis, vineis, pratis et pomariis.
(In pratis vor dem *neuen Thore*, prope *Ochsenfurth* et *Theilheim*. In vineis der *Leiste*, et im unteren *Grombühl* copiose.)

Balbus magnus, subovatus, albus, membrana tenuima lutescente vestitus. *Scapus* pedalis et altior, erectus, terram profunde penetrans, crassus, teres, nudus, succulentus, laete viridis, inferne sensim attenuatus et albidus. *Folia* scapo breviora, linearia, obtusa, canaliculata, succulenta, laete viridia, striata, infirma, terrae plerumque incumbentia. *Racemus* terminalis, laxus, secundus. *Pedunculi* alterni, simplices, uniflori, basi bractea lanceolata membranacea fusca pedunculo longiore suffulti, primo erecti, dein penduli. *Flores* magni, patentissimi. *Petala* oblonga, alba, subtus viridescentia, margine albida. *Stamina* alterna breviora et angustiora, dilatata,

tata, apice 3 - dentata, in *campanam* quasi conniventia.

169. SCILLA, Meerzwiebel.

I) *Sc. bifolia* foliis lanceolatis binis, floribus racemosis erectiusculis ebracteatis. Zweiblättrige Meerzw. deuischer Hyazinth.

(*L.*, sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 128. *Ejusd.* Enum. p. 370. *Pers.* syn. pl. I. p. 366. *Hoffm.* Germ. I. p. 160. *De Vest.* Man. bot. p. 558. *Jacquin.* Austr. t. 117.)

Anthericum bifolium *Scopol.* Carniol. I. p. 247.
Stellaris bifolia *Moench.* Meth. p. 304.

Perenn. Flor. Martio — Majo.

Hab. in sylvis. (In sylvis prope Zell, Höchberg, Kist, Veitshöchheim, Fahr, in *sylva guttenbergensi* et alibi abunde.)

Bulbus subovatus, ex flavicante albido *folia* plerumque 2, nonnunquam 3 (rarius unicum) lanceolata, obtusa, canaliculata, saturate viridia, glabra, integra, succulenta, scapo breviora proferens. *Scapus* digitalis, erectus, teres, glaber, nudus, *foliis* inferne vaginatus. *Racemus* terminalis, simplex, laxus. *Pedunculi* pauci (2 - 6 - 7) erectiusculi, uniflori, bractea fugaci minima coerulescente suffulti. *Petala* patentissima, alterna angustiora, amoene coerulea, rarissime carnea aut alba. *Filamenta* aequalia, compressa, subulata, inferne albida, superne coerulea: *antheris* saturate coeruleis. *Stylus* trisulcatus cum germine coerulescens.

170. ANTHERICUM, Zaunblume, Graslilie.

1) *A. ramosum* scapo ramoso, pistillo recto.
Aestige Zaunbl. Erdspinnenkraut.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 158. *Ejusd.* Enum. p. 371. *Hoffm.* Germ. I. 160. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 95. *De Vest.* Man. bot. p. 558. *Jacquin.* Austr. t. 161.)

Phalangium ramosum Pers. syn. pl. I. p. 368. *Moench.* Meth. p. 302.

Perenn. Flor. Majo - Augusto.

Hab. in nemorosis, montosis, saxosis. (Circa dem *reitshöchheimer* et *gramschatzer* Wald hind inde. In collibus saxosis prope der *Waldskugel*. Ad montes *Kalmut*, *Schwammburg* et *Kalbenstein*. Prope *Aub* versus *Reichelssperg*. Prope *Kissingen* alibique frequens.)

Radix subrotunda, nodosa, fere bulbosa, parum divisa: *fibris* multis longis crassiusculis teretibus albidis. *Scapus* 2 - 3 - pedalis, erectus, nudus, teres, glaber, striatus, superne ramosus: *ramis* divaricatis. *Folia* radicalia in orbem congesta, linearia, acuminata, integerrima, glabra, inferne carinata, superne plana, scapo multo breviora. *Flores* pedunculati, copiosi, erecti, in racemos laxos dispositi. *Petala* patentissima, nivea, nitida, alterna angustiora.

2) *A. Liliago* scapo simplici, pistillo declinato. *Lilienartige Zaunbl.* einfaches Erdspinnenkraut.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 141. *Ejusd.* Enum. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 161. *De Vest.* Man. bot. p. 559. *Jacq.* hort. vindob. t. 83.)

*Phalang. Liliago Pers. syn. pl. I. p. 369. Moench.
Method. l. c.*

Perenn. Flor. cum priori.

Hab. in montosis, sterilibus, dumetosisis.
(Ad montem *Kalmut*, auf dem *Kalbenstein*, prope
der *Karlsburg*, in monte *Hohwann* apud *Haßfurth*,
et in pinetis lapidosis prope *Nüdlingen* et *Arnshau-*
ßen perraro.)

A praecedente differt: *scapo* demissiore plerum-
que simplici raro parum ramoso, *corollis* duplo fere
majoribus speciosioribus, et *pistillo* magis incurvato.

171. ASPARAGUS, Spargel.

I) *A. officinalis* foliis setaceis mollibus, pe-
dunculis in medio articulatis. *Gemeiner Sparg.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 150. *Ejusd.* Enum.
p. 373. *Pers.* syn. pl. I. p. 370. *Hoffm.* Germ. I.
p. 162. *De Vest.* Man. bot. p. 562. *Schkuhr.* bot.
Handb. t. 96. *Herb. Blackw.* t. 332. *Knorr.* thesaur.
tab. S. 22.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in arenosis, ad ripas Moeni inque-
vineis copiose. (Colitur praeterea in hortis ubi-
que.)

Planta tota glabra, ramosissima. *Radix* repens.
Caulis 2 - 3 pedalis, erectus, herbaceus, strictus,
superne angulosus, inferne magis teres. *Folia* filiformi-
setacea, mucronata, inaequalia, mollia, fasci-
culata. *Stipula* sub quovis fasciculo brevis, alba. *Pe-*
dunculi axillares, penduli, filiformes, in medio arti-
culati, uniflori, solitarii: *floribus* subcylindricis viri-
dan-

dantibus, saepe dioicis. *Baccæ globosæ*, rubrae: *seminibus nigris*.

172. CONVALLARIA, *Majblume*, *Thalblume*, *Zaucke*.

1) *C. majalis* scapo nudo subtriquetro inter folia 2 radicalia ovata, floribus spicatis pedicellatis secundis nutantibus. *Gemeine Majbl.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 160. *Ejusd.* Enum. p. 376. Pers. syn. pl. I. p. 372. Hoffm. Germ. I. p. 162. *De Vest.* Man. bot. p. 552. Sturm. D. Fl. I. 14. *Herb.* Blackw. t. 70. Knorr. thesaur. II. tab. C. 3.)

Lilium convallium majale Mönch. Method. p. 636.

Perenn. *Flor.* *Maj.* Junio.

Hab. in sylvis frondosis ubique copiose.

Radix repens, articulata, fibris multis longis tenacibus obsessa. *Folia* radicalia plerumque bina, saepe terna, petiolata, lata, ovato-lanceolata, integra, glaberrima, basi scapum amplectentia. *Scapus* palmaris, erectus, angulatus, nudus, simplex. *Racemus* terminalis, simplex, laxus, secundus, superne nutans. *Pedunculi* breves, nutantes, uniflori. *Corollæ* subglobosæ, albae, odoratissimæ: *laciniis* recurvis. *Baccæ* globosæ, glabrae, maturæ miniatæ.

Variationem *scapis* foliis brevioribus inferne stipulis membranaceis imbricatis fusco-rubellis vestitis, *pedunculis* multo longioribus arcuatibus et *bracteis* angustissimis prælongis inferne rubentibus (*Cony.*

Mappi Gmel. Flor. bad. II. p. 52.) in nemorosis prope Büchold, etiam in der Waldskugel et in *sylva grammatisensi* aliquoties inveni.

Variat floribus 8 - fidis 8 - andris, et plenis.

2) *C. verticillata* foliis verticillatis. Quirlförmige Majblume, schmalblättrige Weißwurz.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 161. Ejusd. Enum. p. 376. Pers. syn. pl. p. 373. Hoffm. Germ. p. 162. De Vest. Man. bot. p. 552.)

Polygonatum verticillatum Moench. Method. p. 637. Bernh. Erf. p. 199.

Perenn. Flor. Junio.

Hab. in sylvaticis montosis. (In praecipi-
tis nemorosis Rhoenae versus Hilters et in sylvaticis
saxosis montis Milzeburg hinc inde.)

Radix nodosa, carnosa, repens, albida. Scapus palmaris, pedalis et altior, erectus, glaber, simplex, inferne nudus. Folia sessilia, linearis-lanceolata, integerrima, glabra, patentia, supra laete - subitus glauco-viridia, verticillata terna aut quaterna. Pedunculi 2 - 3 - 4 - flori, axillares, verticillati, penduli. Corollae albae, apice viridescentes: laciniis intus sub apice barbatis patentissimis. Baccæ maturae violaceae.

3) *C. Polygonatum* caule ancipiti, foliis alter-
nis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus sub - I -
floris, corollis campanulato - infundibuliformibus.
Weißwurzliche Majbl. Weißwurz, Gelenkwurz, Salomonssiegel.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 161. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 373. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Knorr. thesaur. II. tab. P. 4.)

Polygonatum anceps Moench. Method. p. 637.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvaticis umbrosis ubique.

Radix longa crassaque, ramosa, articulata, fibrosa, solida, alba, horizontalis, impressionibus hinc inde sigilliformibus notata. Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, apice antrorsum nutans, firmus, simplex, glaberrimus, foliatus, inferne angulatus, superne anceps. Folia alterna, brevissime petiolata, perfecte sere sessilia, amplexicaulia, ovato-lanceolata, obtusa, integra, glabra, nervosa, firma, sursum directa, glauco-viridia. Pedunculi exillares, angulati, nutantes, secundi, uniflori, perraro biflori. Corollae cylindricae, tubulosae, pendulae, inodoreae, albae: limbo viridi. Baccæ globosae, glabrae, matrae nigrescenti-coeruleae.

4) *C. multiflora* caule tereti, foliis alternis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus multifloris. *Vielblühige Majbl. Majenschelle.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 162. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p 553. Schkuhr. bot. Handb. t. 97. Herb. Blackw. t. 251.)

Polygonatum multiflorum Mönch. Meth. p. 637.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis umbrosis ubique.

A praecedente *caulibus* teretibus plerumque altioribus, *pedunculis* ramosis 2 - 6 - floris, et *corollis* duplo minoribus distinctissima. *Filamenta* etiam primo florescentiae tempore basi pilosa, quae in priore glabra.

173. HYACINTHUS, *Hyazinthe.*

1) *H. comosus* corollis oblongis angulatis, floribus summis sterilibus erectis longius pedunculatis, foliis latis canaliculatis strictis. *Schopfblüthige Hyaz. Kornhyazinthe.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 169. Pers. syn. pl. I. p. 375. Hoffm. Germ. I. p. 163. De Vest. Man. bot. p. 554. Jacq. Austr. tab. 126.

Muscari comosum Mönch. Meth. p. 633. Willd. Enum. p. 378.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in agris, in dumetosis, ad sepes et in vineis. (In agris prope Hofstetten et Massenbuch passim. In sylvaticis, dumetosis inter Retzbach, Thüingen et prope Mühlhausen hinc inde. Ad sepes prope Thüngersheim et Aub, in vineis prope Rödelsee alibique perraro.)

Bulbus ovato - subrotundus, *albus* *folia* multa linearia obtusa canaliculata glabra scapum amplectentia eoque breviora proferens. *Scapus* palmaris, pedalis, erectus, teres, simplex, glaber, nudus, glauco - viridis. *Racemus* terminalis, praelongus, erectus, simplex, laxus, multiflorus. *Pedunculi* patentes, uniflori. *Corollae inferiores* oblongae, angulatae, fertiles, e bruneo et viridi flavicantes, *superiores* erectae, steriles, minores, longius pedunculatae, cum pedunculis violaceo - coeruleae, *comam* densam formantes.

2) *H. racemosus* corollis ovatis, floribus summis breviter pedunculatis sterilibus, foliis subulato - canaliculatis laxis dependentibus. *Traubenblüthige Hyaz.*

(L)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 170. *Pers.* syn. pl. l. c.
Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 555. *Jacq.*
Austr. t. 187. *Knorr.* thesaur. I. tab. T. 8.)

Muscari racemosum *Willd.* Enum. l. c.

Perenn. *Flor.* *April.* *Majo.*

Hab. *in agris, in vineis, ad sepes, in nemoribus.* (In agris et ad sepes infra *Weitshöchheim*, *Retzbach*, *Thüngersheim* et prope *Gemiinden*. In nemorosis prope *Gerbrunn*, *Lengfeld*, *Bergtheim* et *Rimpar*. In monte *Gejersberg* ad *Versbach*. In vineis *im Bogen*, prope *Escherndorf*, *Volkach*, *Nordheim* alibique non adeo raro.)

Bulbus ovatus, albus, minoribus pluribus circum-datus. *Folia* radicalia, numerosa, linearia, acuta, canaliculata, integra, laxa, decumbentia, scapum sub-adaequantia. *Scapus* digitalis, palmaris et altior, erectus, teres, glaber, simplex, nudus, laete viridis. *Racemus* terminalis, erectus, brevis, cylindricus, densus, multiflorus. *Flores* breviter pedunculati, ovati, subimbricati, atro-coerulei prunorum recentium odore: *pedunculis* brevissimis unifloris coeruleis, *summi* sessiles, steriles.

In hortis variat *corollis* incarnatis et albis.

3) *H. botryoides* corollis globosis, floribus omnibus fertilibus: summis sessilibus, foliis latis canaliculatis strictis. *Steifblättrige Hyaz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c.
Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 554.)

Muscari botryoides *Mönch.* *Meth.* l. c. *Willd.* *Enum.* l. c.

Perenn. *Flor.* *April* — *Majo.*

Hab.

Hab. in agris et vineis. (Ad margines agrorum et in vineis versus *Versbach*, *Rimpar*, *Wipfeld*, *Arnstein*, *Thüngen* et *Stetten*. In agris prope *Kitzingen*, *Repperndorf*, *Hohefeld*, *Neuses ad montem* alibi non infrequens.)

A praecedente, cui valde affinis, differt: *foliis firmioribus erectis, floribus globosis inodoris omnibus fertilibus.*

174. ACORUS, *Kalmus.*

I) *A. Calamus* scapi mucrone longissimo folia-
eo. *Gemeiner, wahrer Kalmus, Magenwurz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 199. *Ejusd.* Enum. p. 389. Pers. syn. pl. I. p. 382. Hoffm. Germ. I. p. 164. *De Vest.* Man. bot. p. 562. Schkuhr. bot. Handb. t. 97. *Herb. Blackw.* t. 466.)

Peregrin. Flor. Jun. Julio.

Hab. in paludibus, in fossis aquaticis et ad ripas. (In fossa oppidana passim, in fossis ad *Rothenbauer* copiose. Ad moeni ripas versus *Retzbach*, *Karlstadt*, *Gemünden* et alibi abunde.)

Radix longa, crassa, spongiosa, subcompressa, valde repens, fibris multis filiformibus tenacibus, fragrans, aromatica, acris, amara. Folia profert numerosa, 3 - 4 - pedalia, erecta, ensiformia, graminea, glabra, nitida, laete viridia, inferne vaginantia, superne latere uno transverse plicato - undulata. Scapus solitarius, erectus, planus, latus, foliaceus, supra spadicem inprocessum longum foliaceum terminatus. Spadix cylindricus, obtusus, lateralis, solitarius, sessilis, digit minimi crassitie, laete viridis,

flos-

flosculis exiguis ex viridescente luteis undique tectus.
Petala erecta, apice inflexa.

175. JUNCUS, *Simse.*

Culmis nudis.

1) *J. conglomeratus* culmo nudo stricto, panicula laterali coarctata conglobata, floribus triandris.
Knopf - Simse.

(L. sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 205. *Ejusd.* Enum. p. 390. *Pers.* syn. pl. I. p. 383. *Hoffm.* Germ. I. p. 164. *De Vest.* Man. bot. p. 563. *Leers.* Herborn. p. 87. t. 13. f. 1. *Host.* Gram. III. t. 82.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in humidis, paludosis, ad fossas, lacus et ripas ubique.

Radix horizontalis, fibris multis filiformibus vestita. *Culmi 1 - 2 - pedales, erecti, teretes, stricti, glabri, nudi, medulla alba farcti, basi *vaginis* obtusis aphyllis aristatis: *suprema* longiori. *Folia* e radice pauca, culmis similia. *Capitulum* subrotundum, glomeratum, multiflorum, laterale, infra apicem culmi. *Pedunculi* breves, conferti. *Flores* constanter triandri: *petalis* ovatis obtusis. *Capsula* trigona, stylo brevi terminata. *Semina* albida.*

Variat *capitulo* gemino.

2) *J. effusus* culmo nudo stricto, panicula laterali effusa supradecomposita, capsulis obovatis obtusis. *Flatter - Simse, Busch - Simse.*

(L. sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man.

Man. bot. l. c. *Leers. Herb.* p. 88. t. 13. f. 2. *Host.* III. t. 83.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in uliginosis, inundatis, et ad fossas et ripas frequens.

Affinis praecedenti, sed *statura* major. *Culmi* 3-pedales saepe, crassiores, medulla densiori farcti, facile rumpendi. *Folia culmis* similia. *Panicula lateralis*, effusa, divaricata, ramosissima, multiflora, infra apicem culmi. *Flores* subfuscus, 6-andri: *petalis* aequalibus. *Capsulae* obovatae, subtrigonae, obtusissimae. *Semina* fulva.

Variat quandoque *pedunculis* brevissimis, et *floribus* 3-andris.

3) *J. inflexus* culmo nudo apice infexo, panicula laterali effusa, capsulis oblongis acutis. *Gekriumne Simse.*

(*Hoffm. Germ.* I. p. 165. *Mönch. Meth.* p. 240. *Wibel. Werth.* p. 218. *Leers. Herb.* p. 88. t. 13. f. 3. *Host. III* t. 81)

J. glaucus L. sp. pl. ed. *Willd. II.* p. 206. *Ejusd. Enum.* l. c. *Pers. syn. pl. I.* p. 383. *De Vest. Man. bot.* p. 563.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. ad fossas, ad ripas, rivulos et in paludosis passim frequens cum praecedente.

A praecedente, cui affinis, facile distinqui potest: *culmis* tenuioribus filiformibus longioribus firmioribus tenacissimis glaucis minus rectis, basi *squamis* purpureis nitidis vestitis, supra paniculam in mucronem longum acutum incurvum et demum inflexum productis,

ties, panicula majori, pedunculis et pedicellis longioribus strictioribus, petalis longioribus subulatis: interioribus 3 reliquis paulo brevioribus, et capsulis acutioribus.

Flores cum bracteis spadiceo - purpurei nitidi, ante explicationem exacte subulati, constanter 6 - andri.

4) *J. filiformis* culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali bracteata subsimplici, capsulis subrotundis. *Fadenförmige Simse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 207. *Ejusd.* Enum. p. 391. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 564. *Leers.* Herb. p. 89. t. 13. f. 4. *Host.* HL. t. 84.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in paludosis et in turfosis. (In paludosis saltus kitzingensis, et in humidis musco obductis sylvae guttenbergensis. In uliginosis prope Dettelbach, Abb. Schwarzach, ad lacum prope Erlach, in uliginosis turfosis prope Spiesheim, Hassfurth et alibi.)

Radix teres, obliqua, articulata, albida, fibris multis capillaribus aucta, valde repens. *Culmi* plures palmares et pedales teretes s. subcompressi, nudi, infirmi, filiformes, striati, basi *squamis* fuscis obtusis aristatis vaginati, ad paniculam usque erecti, superne duplo longiores, incurvi. *Folia* culmis similia, sed multo breviora. *Panicula* simplicissima, pauciflora, albicans, infra culmi medium erumpens. *Pedunculi* 1 - 2 - flori, breves, inaequales, basi *bracteis* minimis lanceolatis aristatis suffulti. *Petala* alterna minora, subulata, flavo - vividia, 3 *interiora* paulo minora. *Capsula* obovata, triquetra.

5) *J. squarrosum* culmo nudo, foliis setaceis canaliculatis, panicula terminali composita. *Sparrage Simse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 209. *Pers.* syn. pl. p. 384. *Hoffm.* Germ. I. c. *De Vest.* Man. bot. I. c.)

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in graminosis humidis, ad ripas.
 (Ad moeni ripas inter *Eivelstadt* et *Ochsenfurth*, prope *Ketzbach*, *Kitzingen* et *Hürblach* passim. In graminosis udis *sylvae guttenbergensis*. Ad rivulos prope *Theres*, *Waldaschach* et *Lauringen*. Ad *salae* ripas prope *Schundersfeld* et alibi.)

Planta tota rigens: foliis patentibus. Radix repens, teres: fibris capillaribus numerosis aucta. Culmi palmares, pedales et sesquipedales, erecti, nudi, teretes, striati, scabri, basi incrassati. Folia radicalia numerosa, cespitosa, trigono-setacea, pungentia, dura, canaliculata, nitida, culmo multo breviora, eumque basi amplectentia. Panicula terminalis, rigida, ramosa, erecta, densa: pedunculis brevibus inaequalibus divisus et bracteis membranaceis albido splendentibus. Petala ovato-lanceolata, obtusa, rigida, nitida, flavicanti-albida. Capsula subtriquetra, ovata, obtusiuscula.

Culmis foliosis.

6) *J. aquaticus* culmo adscendente, foliis nodoso-articulatis compresso-teretiusculis, panicula composita, calycibus obtusis. *Wasser-Simse.*

(*Pers.* syn. pl. p. 384. *Roth.* Germ. I. p. 155. II. p. 403.)

J. ar-

J. articulatus L. sp. pl. ed. Willd. p. 211. *Ejusd.* Enum. p. 391. *Smith.* Britan. Vol. I. p. 279. *De Vest.* Man. bot. p. 565. *Leers.* Herb. p. 89. t. 13 f. 6.

J. obtusiflorus Hoffm. Germ. I. p. 166. *Wibel.* Werth. p. 218.

J. adscendens Spreng. Hal. p. 111. *Host.* III. t. 87. *Perenn.* *Flor.* Jun. Julio.

Hab. in paludosis et ad Moeni ripas sere ubique.

Radix fasciculata, fibrosa. *Culmi* palmares, pedales, basi praecipue, saepe toti decumbentes, aut parum erecti, glabri, foliosi, compressiusculi, basi vaginati. *Folia* alterna, erecta, linearia, acuminata, glabra, teretiuscula, fistulosa, striata, articulatnodosa, basi vaginantia. *Panicula* terminalis, ramosa, dichotoma. *Flores* sessiles, fasciculati, terminales et laterales. *Petala* subaequalia, obtusiuscula, spadiceo-purpurea. *Capsula* oblonga, triquetra, obtuse mucronata.

7) *J. sylvaticus* culmo erecto, foliis nodoso-articulatis teretibus, panicula supradecomposita, calycibus acutis. *Wald - Simse.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 211. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Roth.* Germ. I. p. 155. II. p. 405. *De Vest.* Man. bot. p. 565. *Spreng.* Hal. p. 111. *Host.* III. t. 86.)

J. acutiflorus Hoffm. Germ. l. c. *Wib.* Werth, p. 218.

J. articulat. γ. *Leers.* Herb. l. c.

Perenn. *Flor.* Jun. Julio.

Hab. cum priori iisdem in locis.

A praecedente, cui maxime affinis, differt: *radice* repente pennae anserinae crassitie, *culmis* altioribus erectis teretibus, *soliis* longioribus crassioribus tenuibus; *articulis* nodosis crassioribus, *panicula* majori ramosissima divaricata, *petalis* angustioribus mucronatis, et *capsulis* acutioribus.

Variat, uti et antecedens, *paniculis* viviparis.

8) *J. supinus* culmo subdichotomo, foliis filiformibus canaliculatis, capitulis florum triphyllis. *Niedrige Simse.*

(*Hoffm.* Germ. I. p. 166. *Moench.* Meth. p. 241. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. I. p. 500.)

J. subverticillatus L. sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 212. *Ejusd.* Enum. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 565. *Spreng.* Hal. p. 111. *Gmel.* Bad. II. p. 77.

J. verticillatus Pers. syn. pl. I. p. 384.

J. uliginosus Roth. Germ. II. p. 405. *Sturm.* D. Flor. f. 13.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis siccis et in inundatis.
(In arenosis siccis prope Köhler versus Moenum, circa Neusses am Berg, Bimbach, Burggrunbach et Oberschwarzach. In inundatis ad Moenum infra Karlstadt, ad Saalam prope Schundersfeld. Etiam prope Mellrichstadt et Mittelstreu plantas plures vidi.)

Radix bulbosa, fasciculis pluribus fibrarum aucta. *Culmi* 1 - 2 - 3 - unciales, erecti, demum decumbentes, teretes, glabri, foliosi, superne bisidi, rarius simplices, dense aggregati. *Folia* tenuia, filiformis-setacea, vix nodoso-articulata, teretuscula, supra obsolete carinata, inferne *vaginas* breves membranaceas

ceas margine albidas formantia. *Flores* laterales et terminales sessiles in *glomerulum* pauciflorum basi *bracteis* paleaceis pellucidis albidiis involucratum collecti. *Petala* ovata, acutiuscula, subaequalia dilute spadicea, aequantia *capsulam* ovatam obtusam.

9) *J. bulbosus* culmo subcompresso indiviso, foliis linearibus canaliculatis, corymbo terminali, petalis obtusis capsula subglobosa obtusa brevioribus, *Knollige Simse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 213. *Ejusd.* Enum. p. 392. *Hoffm.* Germ. p. 167. *Pers.* syn. pl. p. 385. *Leers.* Herb. p. 9. t. 13. f. 7. *De Vest.* Man bot. p. 565. *J. compressus* *Jacq.* hort vindobon. p. 235.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis, pascuis et in graminosis uidis, in sylvaticis humidis, et in inundatis arenosis passim frequens.

Radix repens, dense fibrosa, nusquam bulbosa. *Culni* inaequali - longi, palmares, pedales, erecti, teretiusculi, latere uno planiusculi, glabri, simplices, basi modo foliati. *Folia* culmo breviora, angustissima, acuminata, patentia, glabra, subtus striata, basi vaginantia. *Panicula* corymbosa, inaequalis, terminalis, erecta, multiflora: foliis floralibus 2 inaequalibus. *Pedunculi* subdivisi, *bracteis* setaceis suffulti. *Flores* exigui, purpurascentes. *Capsulae* subglobosae, fuscae, nitidae, patalis longiores. *Semina* pellucida, fulva.

10) *J. busonius* culmo dichotomo subcompresso, foliis linearibus canaliculato - carinatis, floribus solitariis sessilibus. *Kröten - Simse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 214. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *De Vest.* *Man. bot.* p. 566. *Leers.* *Herb.* p. 90. t. 13. f. 8.)

Ann. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in humidis arenosis, inundatis et ad ripas ubique.

Radix dense fibrosa. *Culmi* plures, 4 - 10 - unciales, erecti, dichotomi, teretiusculi, glabri, articulati. *Folia* linearia, mucronata, supra canaliculata, basi subvaginantia. *Flores* ante explicationem lanceolato - lineares, sessiles, solitarii, remoti, unilaterales: *unico* semper in culmi divisionibus axillari. *Petala* lanceolato - subulata: 3 *interiora* breviora. *Capsula* oblonga, subtrigona, obtusissima, nitida, fusca. *Semina* numerosa, fusca.

Variat pro solo diverso natali sicciori, arenoso, humido vel paludoso limoso *culmorum* et *foliorum* numero, eorumque altitudine. *Culmi* nonnunquam toti decumbentes.

II) *J. latifolius* foliis planis pilosis, panicula subradecomposita, pedunculis elongatis ramosis subtrifloris, petalis aristatis aequalibus. *Breitblättrige Simse.*

(*Wulfen.* in *Jacq. Collect.* 3. p. 59. *Gmel.* *Bad.* II. p. 83.)

J. maximus *L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 217. *Pers.* syn. pl. I. p. 385. *Hoffm.* *Germ.* ed. 1791. p. 126. *De Vest.* *Man. bot.* p. 567. *Roth.* *Germ.* II. p. 411.

J. sylvaticus *Hoffm.* *Germ.* ed. 1800. I. p. 168. *Smith.* *Britan.* Vol. I. p. 385.

Luzula maxima *Willd.* *Enum.* p. 393.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab.

Hab. in nemoribus et sylvis ubique.

Radix dense fibrosa. *Culmi* sesquipedales, 2 - pedales, erecti, teretes, simplices, *nodis* 3 - 4 instructi, foliorum vaginis toti fere tecti. *Folia* lata, plana, firma, vaginantia, lanceolata, marginibus et vaginis pilis longis rectis albidis praedita: *radicalia* in orbem densum digesta, latiora, longiora, semipedalia et pedalia, *caulinæ* angustiora, breviora, vix digitalia, apicem versus sensim minora. *Panicula* terminalis, magna, decomposita. *Pedunculi* elongati, divaricati, 2 - 3 - flori: *bracteis* lanceolatis paleaceis suffulti. *Petala* lanceolata, aristata, aequalia, spadiceo rubella. *Capsula* ovata, obtuse triquetra, nitida, fusco-castanea, trisperma.

12) *J. angustifolius* foliis planis pilosis, panicula supradecomposita, pedunculis ramosis subquadrisporis, foliolis calycinis subaequalibus mucronatis. *Schmalblättrige Simse.*

(*Wulf.* in *Jacq. Collect.* 3. p. 56. *Gmel. Bad.* II. p. 85.)

J. albidus L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 219. *Pers.* syn. pl. p. 386. *Hoffm. Germ.* p. 168. *De Vest. Man. bot.* p. 567. *Host.* III. t. 95. *Hoffm. Germ.* ed. 1791. t. 4.

J. niveus *Leers. Herb.* p. 91. t. 13. f. 9. *Roth. Germ.* I. p. 157. II. p. 413.

J. leucophobus *Ehrh. Beitr.* B. 6. p. 141.

Luzula albida *Willd.* l. c.

Perenn. *Flor. Jun. Julio.*

Hab. in sylvis praecipue montosis ubique.

A praecedente differt: *radice* tereti lignosa, *culmis* gracilioribus plerumque demissioribus: *soliis* raul.

multo angustioribus margine et apice praevertem pilosis in mucronem praelongum terminatis: culmeis longioribus, summis angustissimis arcuatis ante florescentiam praecipue paniculam superantibus, panicula minore diffusa trifida, pedunculis 4 - floris, nonnumquam 2 - floris, petalis ovato - acutis albidiis nitidis breviter mucronatis, 3 interioribus sublongioribus, capsulis ovato - globosis acutiusculis trispermis.

(3) *J. vernalis* foliis planis pilosis, panicula simpliciuscula, pedunculis simplicibus unifloris: inferioribus deflexis, foliolis calycinis acutis. Frühlings Simse.

(Reichard. Flor. moeno - francof. append. p. 182. n. 974. Ehrh. Beitr. 6. p. 137. Hoffm. Germ. p 168. Gmel. Bad. II. p. 82. Wib. Werth. p. 219.)

J. pilosus L. sp. pl. ed. Willd. p. 216. Pers. syn. pl. p. 385. De Vest. Man. bot. p. 566. Roth. Germ. I. p. 156. II. p. 410. Host. III. t. 100. Leers. Herb. p. 91. t. 13. f. 10.

Luzula pilosa Willd. Enum. 1. c.

Perenn. Flor. Mart. April.

Hab. in nemorosis ubique

Radix fibrosa, densa. *Culmi* plures, inaequali - longi, digitales, palmares et altiores, erecti, teretes, simplices. *Folia* linearis - lanceolata, acuminata, plana, graminea, vaginaria, marginibus et vaginis pilis longis tortilibus albis obsessa: *radicalia* in cespitem congesta, *caulina* 3 - 5 alterna, *summa* 2 inaequalia erecta panicula breviora. *Panicula* terminalis, corymbosa: *pedunculis* simplicibus, rarius bifidis, 1 - 2 - floris, basi bracteatis et vaginatis: *primariis* erectis, *secundariis* reflexis. *Flores* sessiles, ovato - acuminati,

minati, splendentes, spadiceo - purpurascentes. *Peta*'*a* ovato - acuminata, subaequalia, margine albida. *Capsula* subglobosa, stylo terminata, trisperma.

14) *J. campestris* foliis planis pilosis, spicis umbellatis sessilibus pedunculatisque, foliolis calycinis mucronatis capsula obtusa longioribus. *Feld-Simse, Hasenbrod.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 221. Pers. syn. pl. p. 386. Hoffm. Germ. p. 169. De Vest. Man. bot. p. 567. Leers. Herb. p. 92. t. 13. f. 5.)

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in montosis, collibus apricis, in sylvis, in pratis et arvis siccis ubique.

Radix sublignosa, fibrosa, nodosa, repens. *Culmi* 4 - 6 - unciales, nonnunquam pedales, erecti, teretes, simplices, striati, foliati, nodis 2 - 3 instructi. *Folia* graminea, plana, acuminata, apice callosa, undique, basin versus praecipue pilis albidis obsessa: *radicalia* in cespitem congesta latiora et longiora, *summa* 2 alterna angustiora inaequalia pedunculis breviora. *Vaginae* connatae, striatae, nuda. *Umbella* corymbosa, terminalis, simplex, composita e spicis 3 - 4 - 5 ovatis nitidis fusco - s. atro - spadiceis, paucioribus intermediis sessilibus, pluribus inaequali pedunculatis primo erectis, demum pendulis subsecundis. *Bractae* membranaceae, albidae, ovatae, acuminatae. *Petala* lanceolato - acuminata, subaequalia, fusco - spadicea, margine flavescente. *Capsula* petalis longior, ovata, obtusa, trisperma.

Variat: culmis altioribus, foliis angustioribus minus pilosis, Spiculis omnibus fere subsessilibus in ca-

pitulum densum compactis et *Spiculis* omnibus pedunculatis.

176. BERBERIS, Sauerdorn, Berberize.

I) *B. vulgaris* floribus racemosis, spinis triplicibus, foliorum serraturis aristatis. *Gemeiner Sauerd. Sauerach, Weinschädling.*

(*L.* sp. pl. ed *Willd.* II. p. 227. *Ejusd.* Enum. p. 395. *Pers.* syn. pl. I. p. 387. *Hoffm.* Germ. I. p. 169. *De Vest.* Man. bot. p. 544. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 99. *Herb. Blackw.* t. 165. *Knorr.* thesaur. II. tab. B.)

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in hortis et sepibus passim frequens.

Frutex densiusculus, 5 - 8 - pedalis: *ramis* alternis angulatis glabris. *Lignum* flavum. *Spinae* 3 rigidae, rectae, maxime pungentes sub quavis gemma et ramo, rarius solitariae. *Folia* petiolata, fasciculata, alterna, ovata, obtusa, glabra, laete viridia, serrata: *serraturis* in spinulas s. aristas coloratas terminatis. *Racemi* e gemmis foliorum solitarii, simplices, multiflori, penduli. *Pedunculi* basi articulati. *Flores* lutei, odorati: *glandulis* et *antheris* flavis. *Baccae* cylindricae, obtusae, glabrae, rubrae: *succo* acido repleteae.

Filamentis talis inest irritabilitas, ut stimulo minimo tacta impetu quodam in stigmata involent.

177. PEPLIS, Zipfelkraut.

I) *P. Portula* floribus axillaribus solitariis, foliis oppositis petiolatis obovatis. *Gemeines Zipfelkr. Zipfelblume.*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 243. *Pers.* syn. pl. I. p. 393. *Hoffm.* Germ. I. p. 170. *De Vest.* Man. bot. p. 562. *Sohkuhr.* bot. Handb. t. 99. *Sturm.* D. Flor. I. I..)

Portula diffusa *Moench.* Method. p. 661.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in palustribus, inundatis, ad fossas et ripas. (Ad lacus fossae oppidanae passim frequens. In Insula versus dem *Siechhauße* et ad Moe-ni ripas infra *Himmelsforten* raro. In uliginosis syl-varum *Kitzingen* et *Guttenberg* passim. Ad lacus pro-pe *Karlstadt*, *Gerolshofen* et *Ochsenfurth*. Im *Moos* et im *Schladig* prope *Haßfurth* alibique.)

Radix fibrosa, repens. Caulis digitalis, a basi ra-mosus, rarius simplex, obsolete tetragonus, articu-latus, viridis aut rubellus, prostratus, repens, saepe radicans, in aquis subnatans. Folia opposita, in pe-tiolum brevissimum decurrentia, ovata, obtusa, in-tegerrima, glabra, subcarnosa. Flores exigui in aliis solitarii, sessiles. Calyx angulatus, glaber, pallide viridis, striis rubellis notatus. Petala exigua, sub-rotunda, rubicunda, fugacissima.

TRIGYNIA.

178. RUMEX, *Ampfer*, *Grindwurz*.

Floribus hermaphroditis: valvulis granulo notatis.

I) *R. Patientia* floribus hermaphroditis, val-vulis integerrimis: unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Genus - Ampfer*, *englischer Spinat*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 249. *Ejusd.* Enum. p. 397. *Pers.* syn. pl. I. p. 394. *Hoffm.* Germ. I. p. 170. *De Vest.* Man. bot. p. 569. *Herb.* *Blackw.* t. 489.)

Lapathum hortense Mönch. Meth. p. 354.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in hortis et pomariis urbi viciniis raro.

Radix longa, fusiformis, ramosa, extus fusca, intus lutea. Caulis 3 - 6 - pedalis, erectus, teres, glaber, sulcatus, articulatus, viridis, saepe purpurascens, superne parum ramosus. Folia petiolata, alterna, lata, ovato-lanceolata, utrinque attenuata, integerrima, utrinque glabra. Vaginae membranaceae, striatae, nervosae, tubulosae, caulem arcte amplectentes. Flores viridescentes, breviter pedunculati, verticillati, in spicas terminales interruptas subnudas dispositi. Valvulae integerrimae: unica plerumque externe glandula globosa rubra notata. Folia seminalia sagittata.

2) *R. sanguineus* floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis oblongis: unica praecipue grani-fera, foliis cordato-lanceolatis. *Blutrother Ampfer,* rothblättrige *Drachenwurz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 250. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. I. c. *Hoffm.* Germ. p. 171. *De Vest.* Man. bot. I. c. *Herb.* *Blackw.* t. 492.)

Lapathum sanguineum Moench. Method. I. c.

Perenn. bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in hortis, et juxta eos quasi sponte.
(In pomario prope Veitshöchheim per multos annos sponte crescentem observavi.)

Radix fusiformis, ramosa, fusca, intus lutescens. Caulis 2 - 4 - pedalis, erectus, ramosus, sulcatus, glaber, purpurascens. Folia petiolata, cordato-lanceolata, lata, glabra, marginibus crenulata et subcrispa, costis et venis sanquineis succo rubro : radicalia maxima. Flores breviter pedicellati, rubicundi, verticillati, in spicas terminales interruptas subnudas dispositi. Valvulae integerrimae : unica plerumque glandula majuscula globosa rubra notata.

Saepe etiam valvula altera glandulam minorem profert.

3) *R. crispus* floribus hermaphroditis, valvulis ovatis integris: omnibus graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Krausblättriger Ampfer.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 251. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest. Man. bot.* p. 570.)

Lap. crispum *Moench.* *Method.* p. 1355. *Scopol.* *Carniol.* I. p. 261.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis, agris, ad vias, sepes, ripas et fossas ubique sere.

Radix fusiformis, ramosa, fusca, intus flava. Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, ramosus, glaber, striatus. Folia petiolata, alterna, lanceolata, obtusiuscula, margine undulata, crenulata, glabra, subtus ad costas scabriuscula. Petioli sulcati, plerumque punctis sanquineis adspersi. Flores viridescentes, pedicellati, verticillati, in spicas interruptas, dense glomeratas, basin versus subfoliosas dispositi. Valvulae integerrimae, ovatae, obtusae, omnes glandula rubra notatae.

Variat *caule* minori magis ramoso, *soliis* planiusculis minus undulatis, *florum* verticillis magis remotis numerosioribus, et *floribus* minoribus. *R. Nemolapathum* L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 252. Pers. syn. pl. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *R. conglomeratus* Hoffm. Germ. l. c. *Lapathum virginatum* Moench. Method. p. 355.

Not. *R. Nemolapathum* s. *conglomeratus* per plures annos in horto nostro botanico cultus a *R. crispo* non amplius discrepuit, ejusque mera varietas est, uti jam cl. Sprengel. in *Florae halens. tentam. nov.* p. 113 optime annotat.

4) *R. maritimus* floribus hermaphroditis, valvulis deltoideis dentatis graniferis, verticillis confertis, foliis linearibus. See - Ampfer, schmalblättrige Grindwurz.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 253. Ejusd. Enum. p. 398. Pers. syn. pl. p. 395. Hoffm. Germ. p. 172. *De Vest.* Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 100.)

Lap. maritimum Moench. Meth. p. 356.

Ann. bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in humidis, ad fossas, ad ripas. (In humidis fossae oppidanae et ante urbem prope dem Wasserfall raro. Ad ripas Moeni infra Karlstadt et prope Haßfurth alibique passim.)

Radix fusiformis, ramosa, fibrosa, intus rubra. *Caulis* 1 - 2 - pedalis, erectus, basi nonnunquam decumbens, teres, sulcatus, glaber, pallide viridis, saepe etiam rubicundus: *ramis* approximatis alternis brachiatis. *Folia inferiora* longius petiolata, ovato-lanceolata, *superiora* alterna, linearis-lanceolata, elongata, *ramea* perangusta, linearia: *omnia* iniegerima,

rima, glabra, pallide viridia. *Flores* pedunculati in foliorum alis conglomerati, verticillati, ex viridi rufescentes s. flavescentes: *glomerulis* approximatis densis multifloris, *superioribus* confluentibus. *Valvulae* triangulares, acutae, dentatae, ciliatae, omnes glandula oblonga instructae.

5) *R. acutus* floribus hermaphroditis, valvulis ovatis dentatis: omnibus graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Spitzblättriger Ampfer*, *Zitterwurz*, *gemeine Grindwurz*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 253. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 395. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Herb. Blackw.* t. 491.)

Lap. acutum *Moench.* Meth. p. 356. *Scopol.* Carn. I. p. 262.

Pereinn. *Flor.* Jun. *Julio.*

Hab. in pratis praesertim humidis, adfossas et ripas ubique.

Radix cylindrica, subramosa, extus fusca, intus flava. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, ramosus, angulatus, sulcatus, villosiusculus, rarius glaber. *Folia* alterna, petiolata, glabra, plana, integerrima, acutissima: *inferiora* longe petiolata cordato-oblonga, *superiora* brevissime petiolata, lanceolata. *Flores* parvi, viriduli, dense verticillati in racemis parum divaricatis foliosis. *Valvulae* cordatae, venulosae, profunde dentatae: *omnes* glandula gibbosa rubra notatae.

Saepissime valvula una glandula maxima instrucata, reliquae vero obsolete vel nusquam graniferae.

6) *R. obtusifolius* floribus hermaphroditis, valvulis ovatis dentatis: unica praecipue granifera, foliis

liis cordato - oblongis obtusis undulatis crenulatis.
Stumpfblättriger Ampfer.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 254. *Ejusd.* Enum. p. 399.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man.
 bot. p. 571.)

Lap. obtusifolium *Mönch.* Meth. p. 356.

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pratis et sylvaticis humidis, in
 palustribus, ad fossas, ad ripas inque cultis
 fere ubique.

Radix fusiformis, crassa, plus minusve ramosa,
 fusca, intus flavescens. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erec-
 tus, teres, ramosus, striatus, obsolete sulcatus, gla-
 ber, superne scabriuscus. *Folia* petiolata, glabra,
 obsolete crenulata, apice obtusa, margine magis mi-
 nusve undulata; *radicalia* longius petiolata, in orbem
 digesta, cordato - oblonga, *caulina* breviter petiolata,
 alterna, lanceolata, radicalibus angustiora et bre-
 viora. *Vaginae* magnae, membranaceae, fuscae, la-
 cerae. *Flores* viriduli, axillares, verticillato - race-
 mosi, subnutantes, nudiusculi: *pedicellis* capillaribus
 basi geniculatis. *Valvulae* magnae, cordato - trian-
 gulares, venosae, ante florescentiam integerrimae,
 demum basin versus inaequaliter acute dentatae.
Glandula oblonga, in valvula exteriore praecipue con-
 spicua, in coeteris obsolete.

Variat saepe floribus polygamis.

Flores hermaphroditici: valvulis granulo destitutis.

7) *R. aquaticus* floribus hermaphroditis, val-
 vulis integerrimis nudis, (s. obsolete graniferis) fo-
 liis

liis late cordatis glabris acutis. *Wasser - Ampfer, Rosampfer, wilde Rhabarber.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 255. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Herb. Blackw.* t. 490.)

R. Hydrolapathum Willd. Enum. p. 397.

Lap. aquaticum Moench. Method. p. 356. *Scopol.* Carniol. I. p. 263.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in humidis graminosis, ad fossas et ripas.

Radix crassa, ramosa, extus fusca, intus crocea.
Caulis 2 - 4 - pedalis, erectus, angulatus, sulcatus,
glaber, superne praecipue ramosus: ramis alternis
erectis. Folia insima magna, longe petiolata, corda-
ta, acuminata, plana, glabra, integerrima, reliqua
sensim minora et angustiora, ovato - lanceolata, ob-
solete crenata, plus minusve undulata. Flores viri-
duli, pedunculati, verticillato - racemosi: pedunculis
capillaribus nutantibus apice incrassatis. Racemi ter-
minales, compositi, erecti, subfoliati. Valvulae mag-
nae, ovatae, obtusae, integerrimae, eglandulosae.

8) *R. scutatus* floribus hermaphroditis, valvu-
lis nudis, foliis cordato - hastatis, caule tereti. *Schild-*
förmiger Ampfer, französischer Sauerampfer.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 257. *Ejusd.* Enum. p. 399.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 173. *De Vest.*
Man. bot. l. c. Herb. Blackw. t. 306.)

Lap. scutatum Mönch. Meth. p. 357.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in ruderatis, ad muros. (In muris
prope *Veitshöchheim, Retzbach, Gerbrunn, Zell et*
Gel-

Geldersheim. In fossa oppidana juxta dem *Wasserthurm* et ad muros hortorum passim frequens.)

Pianta tota glauca, pruinata, acida. *Radix* sublignosa, teretiuscula, rubicunda, valde repens. *Caulis* plures, pedales, 2 - pedales, decumbentes, apicibus erecti, teretes, striati, ramosi, glaberrimi: *geniculis* radicantibus. *Folia* alterna, longe petiolata, cordato - hastata, subrotunda, repanda, glaberrima, succulenta: *inferiora* reniformia, basi rotundata. *Flores* viriduli aut rubelli, pedunculati, verticillato - racemosi: *pedunculis* capillaribus nutantibus 3 e *vagina* membranacea brevi retusa. *Racemi* terminales, spicaeformes, laxae, nudae. *Valvulae* subrotundae, inaequales, glandulis destitutae.

Flores diclini.

9) *R. Acetosa* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis, caule elongato. *Sauerampfer.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 260. *Ejusd. Enum.* p. 400. Pers. syn. pl. p. 396. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man bot. p. 572. *Herb. Blackw.* t. 230. Knorr. thes. II. tab. A. 13.)

Lap. Acetosa Scop. Carn. I. p. 260.

Acetosa pratensis Moench. Method. p. 357.

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in pratis, pascuis et in hortis copiose.

Radix ramosa, fibrosa, lutescens. *Caulis* sesquipedalis, 2 - pedalis, erectus, teres, sulcato - striatus, simplex, superne parum ramosus. *Folia* oblonga, sagittata, obtusa, integerrima, glabra: *radicalia* longe petiolata, in orbem digesta, *caulina* alterna,

ses-

sessilia, amplexicaulia. *Vaginae* membranaceae, amplectentes, margine dentato-setaceae. *Flores* dioici, viridescentes, adultiores rubelli. *Racemi* plures, terminales: *pedunculis* articulatis. *Valvulae* ovatae, integrae: in *floribus* masculis patentibus, in foemineis conniventes. Stigma plumosum, albidum.

Variat foliis crispis.

10) *R. Acetosella* floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. Kleiner Sauerampfer, Schaafampfer.

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Herb. Blackw. t. 307.)

Lap. Acetosella Scopol. Carn. I. p. 261.

Acetosa hastata Monch. Meth. p. 357.

Perenn. Flor. Majo — Septembri.

Hab. in apricis, ad muros, ad vias et margines agrorum ubique.

Radix teretiuscula, fibrosa, repens, extus fusco-flavicans, intus albida. *Caulis* digitalis, palmaris, erectus, sulcato-angulatus, glaber, plerumque rubellus, ramosus. *Folia* lanceolata, acuminata, hastata, integra, glabra, saepissime ex viridi rubella: *radicalia* longe petiolata in orbem digesta, *caulina* alterna, multo minora. *Racemi* terminales, paniculati. *Flores* pedunculati, penduli, semiverticillati, dioici, ex viridi rubelli: *pedunculis* non articulatis. *Valvulae* ovatae, integrae, eglandulosaë, in floribus masculis et foemineis patentibus.

Pro solo diverso magnitudine partium omnium, et figura foliorum valde variat. In arvis arenosis saepissime tota rubella, vel magis purpurea.

179. TRIGLOCHIN, Dreizack, Salzgras.

1) *T. palustre* capsulis trilocularibus sublinearibus laevibus. *Sumpf - Dreiz.*, *Salzbinse*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II p. 264. *Ejusd.* *Enum.* p. 400. *Pers. syn. pl.* I. p. 396. *Hoffm. Germ.* I. p. 174. *De Vest. Man. bot.* p. 568. *Schkuhr bot. Handb.* t. 202. *Leers. Flor. herborn.* p. 93. t. 12. f. 5. *Sturm D. Flor.* I. 13.)

Juncago palustris. *Mönch. Method.* p. 644.

Pereenn. bienn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in graminosis udis, in uliginosis.
(In udis fossae oppidanae passim. Ad ripas Moeni prope Karlstadt et Haßfurth, ad lacus et in den Moosseen ibidem. In saltus kitzingensis humentibus, ad sylvam stettensem prope Werram, in humidis im Oelzgrund. In udis circa Abb. Heidenseid et alibi.)

Radix bulbosa, fibrosa. *Scapus* palmaris et altior, erectus, teretiusculus, obsolete striatus, strictus, simplex, nudus, glaber, folia superans. *Folia* radicalia, graminea, angusta, linearia, canaliculata, glabra, atro-viridia. *Flores* ex viridi rubelli, exigui, alterni, spicato-racemosi, inferne brevissime-superne longius pedunculati: *pedunculis* florentibus erectis, fructiferis scapo adpressis. *Racemus* praelongus, erectus. *Petala* 6 ovata, obtusa, dupli ordine alternatim disposita, unquibus inflexis staminifera. *Stigmata* 3 plumosa. *Capsula* linearis, obtusa, basi attenuata, laevis, 3-locularis, longitudine pedunculi. *Semina* linearia.

2) *T. maritimum* capsulis sexlocularibus ovatis sulcatis. *Seestrands - Dreiz.* *Meersalz - Binse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 265. *Pers.* syn. pl. I. c.
Hoffm. Germ. I. c. *De Vest.* Man. bot. I. c.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. *in humidis, inundatis, in salsis.* (In fossa oppidana versus dem Sanderthore raro. Ad ripas salae prope Schundersfeld, apud Gemünden, versus Wolffsmünster, Gräfendorf et Stetten. Ad salinas kisingenses hinc inde. In humidis prope Klosterhausen, Waldschach et Hohn. Prope Neustadt auf dem Schiefsplatze secundum specimina plura a cl. Prof. Pickel mihi communicata.)

A praecedente differt: *radice semper fibrosa, escapis* plerumque plurimis altioribus crassioribus superne attenuatis sulcatis, *soliis longioribus crassioribus* glauco - viridibus, *racemis longioribus densioribus* superne demum arcuatis, *stigmatibus 6, capsulis ova-*to - subrotundis 6 - locularibus sulcatis.

180. COLCHICUM, Zeitlose.

1) *C. autumnale* foliis erectis planis lanceolatis ebtusis. *Herbst-Zeitl.* nackte Jungfrau, Herbstblume, Lichtblume.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 272. *Ejusd.* Enum. p. 401. *Pers.* syn. pl. I. p. 398. *Hoffm.* Germ. I. p. 174. *De Vest.* Man. bot. p. 568. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 101. *Sturm.* D. Flor. I. 3. *Herb.* Blackw. t. 566. *Knorr.* thesaur. I. tab. Z. 1.)

Perenn. *Flor.* *Augusto — Novembri.*

Hab. *in pratis ubique copiose.*

Radix subrotunda, bulbosa, albida, hinc convexa, inde planiuscula canaliculata, membrana brunea extus

ve-

vestita, vere et ineunte aestate carnosa succulenta, autumno exsucca. *Folia* plerumque 3 radicalia, plana, lanceolata, obtusa, striata, glabra, dorso carinata, integra, laete viridia, aestate marcescentia. *Flos* elegans, nudus, rubens: *tubo* longissimo trigono radicato erecto albido ultra medium in terra latente, *fauce* pallide lutescente staminifera, *limbo* erectiusculo 6 - partito. *Capsula* elliptica, trisulca: *seminibus* globosis *mense Junio* plerumque anni sequentis maturantibus.

Planta tota, radix praecipue, nimia dosi venenata, et pecoribus praecipue valde noxia.

P O L Y G Y N I A.

181. ALISMA, *Froschlöffel.*

I) *A. Plantago* foliis ovatis acutis nervosis, panicula verticillato-decomposita, capsulis obtuse trigonis. *Gemeiner Fröschl. Wausser - Weegerich.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 276. *Ejusd.* Enum. p. 402. *Pers.* syn. pl. I. p. 400. *Hoffm.* Germ. I. p. 175. *De Vest.* Man. bot. p. 577. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 102.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in fossis, stagnis, et ad ripas ubique.

Radix crassa, carnosa, albida, fibrosa. *Caulis* sesqui-2-3-pedalis, erectus, obsolete trigonus, glaberrimus, nudus, superne ramosus: *ramis ramulisque* verticillatis. *Folia* radicalia, numerosa, in orbem digesta, longe petiolata, magna, ovata, acuta, variae latitudinis, nervosa, laete viridia, nonnunquam

quam purpureo maculata, integerrima glaberrima-que. *Stipulae* ad quemvis ramorum verticillum 3 breves, ovato - lanceolatae, sessiles, submembranaceae. *Pedunculi* breves, verticillati, uniflori. *Petala* 3 alba s. carnea, obovata, crenata. *Capsulae* numerosae, in *capitulum* obtuse trigonum aggregatae.

Planta acris valde suspecta.

2) *A. natans* foliis submersis linearibus, nantibus ovatis obtusis, pedunculis solitariis. *Schwimmender Froschl.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 278. *Ejusd.* Enum. p. 403. *Pers.* syn. pl. p. 401. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 578.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in aquis stagnantibus et fossis. (In lacu erlaccensi prope Ochsenfurth raro. In lacu apud Heidenfeld cum *illustr. lib. Bar. de Bodeck* specimina plura legi. In lacu frickenhusiano prope Wechterswinkel detexit *cl. antecessor Heilmann.*)

Radix fibris pluribus longis tenacibus. *Caulis* palmaris, pedalis et longior, articulatus, ramosus, teres, glaber, foliatus, inferne basin versus repens et radicans, superne natans et secundum aquae motum directus. *Folia* alterna: *inferiora* submersa linearilanceolata membranacea subsessilia graminea, *superiora* aquae innatantia ovata obtusa longe petiolata. *Pedunculi* pauci, axillares s. terminales, simplices, uniflori, basi *bractea* vaginati. *Flores* albi. *Capsulae* 6 - 9 compressae, striatae, in *capitulum* subrotundum congestae.

3) *A. ranunculoides* foliis linear - lanceolatis, caule verticillato paucifloro, capsulis pentagonis incurvis globoso - aggregatis. *Hahnenfußartiger Fröschl.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 279. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in paludosis. (In fossis et im Altwasser prope Abb. Heidenseld raro. In palude ad Dettelbach et Schwarzenau sec. cl. D. Lehmann. Ibidem et in aliis locis nondum observavi.)

Caules plerumque 2 aut 3 ex una radice, digitales, palmates, erecti s. depressi, teretes, nudi. *Folia radicalia*, in orbem digesta, linear - lanceolata, glabra, plana, integerrima, petiolata. *Pedunculi* pauci, uniflori, inaequales, subverticillati, *bracteis* parvis linearibus suffulti. *Petala* candida, crenata. *Capsulae* sulcatae, scabrae, numerosissimae in *capitulum* globosum conglomeratae.

Planta, uti 2 antecedentes, acris et suspecta.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

182. TRIENTALIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 626. De Neck. el. bot. n. 668. Borkh. tent. n. 386.

Cal. 7 - phyllus. Cor. 7 - partita aequalis rotata. Bacca exsucca globosa 1 - locularis: stylo persistente mucronata.

183. AESCULUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 628. De Neck. el. bot. n. 976. Borkh. tent. n. 87.

Cal. 1 - phyllus ventricosus 5 - dentatus. Cor. 5 - petala inaequalis pubescens calyci inserta. Caps. 3 - locularis 3 - valvis coriacea aculeata.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

182. TRIENTALIS, Schirmkraut.

I) *T. europaea* foliis ovato - lanceolatis integerrimis. Gemeines Schirmkr.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 282. Ejusd. Enum. p. 403. Pers. syn. pl. I. p. 402. Hoffm. Germ. I. p. 176. De Vest. Man. bot. p. 615. Schkuhr. bot. Handb. t. 103. Sturm. D. Flor. I. 17.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in nemorosis montosis. (In montibus prope Ober - et Unterleinach, prope Mühlbach, in monte Adelsberg apud Zwing, auf dem Hohwann prope Hassfurth et prope Cascatam apud Kissingen raro. In montosis prope Bischofsheim ad rhoen. In variis montibus rhoenanis Pater meus defunct. cum cl. D. Antecessore saepissime legit.)

Radix repens, subtuberosa. *Scapus* digitalis, palmaris, erectus, teres, simplex, inferne nudus, apicem versus foliis 6 - 7 sessilibus confertis patentibus ovato - lanceolatis integerrimis glaberrimisque praeditus. *Pedunculus* utplurimum solitarius (raro bini aut terni) terminalis, tenuis, patens, uniflorus. *Calyx*

lycis foliola subulata. *Corolla* elegantissima, nivea, ad basin fere divisa, patens. *Bacca* globosa, exsuc-
ca, suturis notata. *Semina* gibba, punctata.

Variat *calycibus* 5 - aut 6 - interdum 8 - phyllis, *corollis* 5 - 6 - et 8 - partitis, atque *staminibus* 5 - 6 et 8.

183. A E S C U L U S, *Roßkastanie.*

I) *Ae.* *Hippocastanum* foliis digitatis septen-
nis, corollis 5 - petalis patulis. *Gemeine Roßkastan.*
wilde Kastanie.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 285. *Ejusd.* Enum.
p. 404. *Pers.* syn. pl. I. p. 403. *Hoffm.* Germ. I.
p. 176. *De Vest.* Man bot. p. 615. *Schkuhr.* bot.
Handb. t. 104. *Weinmann.* Phytanthoza - Iconogr.
N. 342.)

Hippocastanum vulgare *Mönch.* Method. p. 65.

Arbor. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in Asia septentrionaliore, unde 1550
in Europam venit. (In hortis, ad pagos et am-
bulaera vulgaris.)

Arbor procera, speciosa, dense foliatus, longae-
vus, altitudinem 30 - 40 pedum saepe attingens:
truncо recto ramosissimo. *Folia* petiolata, opposita,
digitata: *petiolis* praelongis teretibus inferne incrassatis.
Foliola ex uno centro plerumque 7 obovata,
duplicato serrata, basin versus tomento ferrugineo
vesita. *Racemi* numerosissimi, terminales, magni,
erecti, pyramidati. *Flores* pedicellai, speciosissimi,
nivei, flavo rubelloque mixti, margine crassi:
inferiores hermaphroditici fertiles, *superiores* plerumque

masculi steriles. *Capsulae magnae, rotundae, echinatae, primo laete virides carnosae, deum fusco-virides coriaceae.* *Fructus magni, splendentes. Stamina saepe 8.*

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

184. ACER.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1590. De Neck. el. bot. n. 1107. Borkh. tent. n. 44.

Cal. 5 - fidus inferus. Cor. 5 - petala. Samarae 2 1 - spermae ala terminatae.

185. OENOTHERA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 637. De Neck. el. bot. n. 821. Borkh. tent. n. 616.

Cal. tubulosus 4 - fidus: laciniis deflexis deciduis. Petala 4 - calyci inserta. Stigma 4 - fidum. Caps. columnaris 4 - locularis 4 - valvis cylindrica. Sem. nuda receptaculo centrali tetragono affixa.

186.

186. EPILOBIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 639. De Neck. el. bot. n. 823. Borkh. tent. n. 617.

Cal. superus 1 - phyllus tubulosus 4 - fidus. Cor. 4 - petala. Caps. oblonga 4 - locularis infera. Sem. papposa.

187. VACCINIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 658. De Neck. el. bot. n. 358. Borkh. tent. n. 133 - 134.

Cal. 4 - dentatus brevissimus superus fructum coronans. Cor. 1 - petala campanulata 4 - 5 - fida decidua. Anthrae 2 - cornes dorso 2 - aristatae. Bacca globosa umbilicata 4 - 5 - locularis polysperma.

188. ERICA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 659. De Neck. el. bot. n. 355. Borkh. tent. n. 79.

Cal. 4 - phyllus persistens. Cor. 1 - petala 4 - fida persistens. Filam. receptaculo inserta: antheris 2 - fidis. Caps. supera 4 - locularis polysperma.

189. DAPHNE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 664. De Neck. el. bot. n. 887. Borkh. tent. n. 443.

Cal. o. Cor. infundibiformis marcescens 4 - fida stamina includens. Drupa 1 - sperma.

190. STELLERA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 667. De Neck. el. bot. n. 890. Borkh. tent. n. 352.

Cal.

Cal. o. *Cor.* infundibiformis 4 - fida inferne ventricosa. *Stam.* brevissima. *Nux* supera rostrata corolla persistente vestita.

DIGYNIA.

191. CHRYSOSPLENIUM.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 763. De Neck. el. bot. n. 1203. Borkh. tent. n. 91.

Cal. 4 - 5 - fidus planus coloratus. *Cor.* o. *Caps.* 2 - rostris 1 - locularis semi - infera polysperma.

TRIGYNIA.

192. POLYGONUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 677. De Neck. el. b. n. 943. Borkh. tent. n. 43.

Cal. 5 - partitus corollaceus persistens. *Cor.* o. *Sem.* 1 superum angulatum calyce tectum.

TETRAGYNIA.

193. PARIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 683. De Neck. el. bot. n. 1177 (*Alopicarpus.*) Borkh. tent. n. 137.

Cal. inferus 4 - phyllus. *Petala* 4 angustiora. *Antherae* filamentorum medio adnatae. *Bacca* supera globoso - tetragona 4 - locularis.

194. ADOXA.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 684. De Neck.
el. b. n. 1802. Borkh. tent. n. 414.*

*Cal. 2 - 3 - 4 - dentatus persistens. Cor. 4 - 5 -
fida plana decidua supera. Bucca 1 - locularis 4 -
sperma pulposa calyce semivestita. (Flores laterales
9 - 10 - andri.)*

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.

MONOGYNIA.

184. ACER, Ahorn, Maßholder.

1) *A. Pseudo - Platanus* foliis 5 - lobis inaequaliter serratis, racemis pendulis. *Weißer Ahorn, Waldesche, Weinblatt, Ehre, unechter Platanbaum.*

(L. sp. pl. ed. Willd. IV. p. 983. Ejusd. Enum. p. 1044. Pers. syn. pl. I. p. 417. Hoffm. Germ. II. p. 278. De Vest. Man. bot. p. 624. Schmidt. Baumz. t. I. Lauth. Diss. de Acere. p. 25.)

Arbor. Flor. Aprili Majo foliis jam eruptis.

Hab. in sylvis passim,

Ar-

Arbor formosa, saepe praealta: *trunko* tereti recto cortice laevi cinereo tecto, *ramulis* dependentibus. *Folia* longe petiolata, opposita, cordato - subrotunda, inaequaliter serrata, subtus pallidiora, quinqueloba: *lobis extimis* minimis, *intermedio* longiore. *Racemi* solitarii, axillares, multiflori, tomentosi, penduli. *Flores* e viridi flavescentes, pedicellati. *Germen* hirsutissimum.

Variat in hortis *foliis* eleganter variegatis.

2) *A. Platanooides* foliis 5 - lobis utrinque glabris, lobis dentibusque acuminatis, corymbis erectis. *Spitz-Ahorn*, *großer Milchahorn*, *Spitzfader*, *Breitlaub*, *Lenne*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 985. *Ejusd.* Enum. p. 1045. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 279. *De Vest.* Mon. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 351. Schmidt. Baumz. t. 3. Lauth. Diss. d. Acer. p. 19.)

Arbor. *Flor.* April. *Majo*. ante foliorum eruptionem.

Hab. in *sylvaticis humidiusculis*. (In *sylva guttenbergensi*, im *Oelgrund* et in *nemorosis humidis* juxta den *Marrbachsfeldern* prope *Abb. Heidenfeld*, alibique non infrequens.)

A priori differt: *altitudine minori*, *foliis* majoribus tenerrimis utrinque glaberrimis et viridibus, vere praecipue lactescensibus, profunde 5 - s. 6 - lobis: *lobis* magis acuminatis profundius et argutius dentatis, *floribus* majoribus dilute lutescentibus corymbosis, *corymbis* subrotundis erectis, demum nuantibus.

3) *A. campestre* foliis 5 - lobis subintegris, lobis obtusis majoribus obsolete subsinuatis, corymbis erec-

erectis. Feld - Ahorn, kleiner deutscher Maßholder, Elsdorn, Weißbaum.

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 939. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Schmidt. Baumz. t. 13. Lauth. Diss. p. 30.*)

Arbor et Frutex. Flor. April. Majo foliis jam eruptis.

Hab. in nemoribus et ad sepes ubique copiose.

Frutex, saepe arbor altus: ramis alternis oppositisque. Cortex trunci et ramorum suberosa, ramosa, in ramis junioribus laevis, Folia opposita, petiolata, mediocria, cordato - subrotunda, tenera, laete yiridia, laeviter pubescentia, profunde 5 - lobata: lobis obtusis, 3 mediis subtrifidis, extimis plerumque emarginatis. Petioli longi, teretes, pubescentes, plerumque rubelli. Racemi terminales, erecti, ramosi, pubescentes, bracteati. Flores virescentes: calycibus et petalis pubescentibus.

Variat foliis trilobis.

4) *A. monspessulanum* foliis trilobis integerim glabris. *Französischer - Ahorn, Berg - Ahorn.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 991. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Kerner. Darstellung I. t. 3. Schmidt. Baumz. t. 14. Lauth. Diss. de Acer. p. 37.*)

A. trilobum Mönch. Meth. p. 56.

Frutex. Flor. April. Majo.

Hab. in montosis dumetosis. (In dumetis et ad semitam, quae dicit a pago Mühlbach versus der Karlsburg et circa arcem Karlsburg copiose.)

Fru-

*Frutex mediocris, rectus, ramosissimus: ramis op-
positis. Folia opposita, petiolata, utrinque glaber-
rima, splendentia, subcoriacea, triloba: lobis obtu-
sis integerrimis aequalibus. Racemi parvi, termina-
les, penduli. Flores ex viridi flavescentes: pedunculis
longis inaequalibus simplicibus.*

185. OENOTHERA, Nachtkerze.

I) *Oe. biennis* foliis ovato - lanceolatis planis,
caule muricato subvilloso. Zweijährige Nachtk. gel-
ber Weiderich, Gartenrapunzel.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 306. Ejusd. Enum.
p. 408. Pers. syn. pl. I. p. 407. Hoffm. Germ. I.
p. 176. De Vest. Man. bot. p. 620. Sturm. D Flor.
f. 5.)

Onagra biennis Scopol. Carniol. I. p. 269. Mönch.
Meth. p. 675.

Bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in *Virginia*, unde 1614 in *Europam*
venit. (Ad ripas, ad vias, sepes et pagos ubique
fere)

*Radix fusiformis, fibrosa, extus lutescens, intus
albida, Caulis 3 - 4 - 5 - pedalis, erectus, ramosus,
sulcatus, scaber, pubescens, superne anulosus, in-
ferne teretiusculus, saepe rubellus. Folia alterna,
ovato - lanceolata, plana, glabra s. laeviter pubescen-
tia, integra s. obsolete denticulata: radicalia petio-
lata in petiolum desinentia, caulina sessilia. Flores
magni, speciosi, sulphurei, solitarii, axillares, ses-
siles in spicam terminalem raram dispositi. Petala
obovata unquibus calyci et staminibus adnata. Ger-
men*

men sessile pedunculum quasi mentiens. *Capsulae* obsolete tetragonae, axillares, secundae.

186. EPILOBIUM, Weiderich.

Staminibus declinatis.

I) *E. angustifolium* foliis sparsis linearis-lanceolatis integerrimis venosis, floribus inaequalibus. Schmalblättriger Weider.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 313. *Ejusd.* Enum. p. 410. *Hoffm.* Germ. I. p. 177. *De Vest.* Man. bot. p. 621. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 106.)

E. spicatum Pers. syn. pl. I. p. 409.

Chamaenerion angustifolium Scopol. Carniol. I. p. 271. Mönch. Meth. p. 677.

Perenn. *Flor.* Junia — Augusto.

Hab. in sylvaticis humidis. (In sylvis Waldskugel, Gramschatz, Veitshöchheim, Irtenberg, Guttenberg. In saltu kitzingensi, in sylva prope Großrinderfeld alibique satis frequens.)

Radix repens, albida. *Caulis* 3-4-pedalis et altior, erectus, teres, firmus, glaber, superne ramosus, dense foliatus, plerumque rubellus. *Folia* sparsa, sessilia, linearis-lanceolata, acuminata, glabra, transverse venosa, laevia, integerrima, subinde denticulata, subtus glaucescentia. *Flores* alterni, pedunculati, speciosi in *racemum* terminalem aphyllum multiflorum erectum pyramidalem dispositi. *Pedunculi* ante anthesin deflexi, floriferi erecti. *Calycos* pubescentes, purpurascentes. *Petala* purpurea, integra, inaequalia.

Planta imprimis florens formosissima, vix unquam extirpanda.

Staminibus erectis, petalis bifidis.

2) *E. grandiflorum* caule ramosissimo villoso, foliis oppositis alternisque semiamplexicaulibus ovato-lanceolatis hirsutis. *Großblüthiger Weider.*

(*Roth.* Germ. I. p. 167. II. p. 434. *Hoffm.* Germ. ed. 1791. p. 133. *Wib.* Werth. p. 225. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. II. p. 16. *Röhling* Deutschl. Flor. p. 190. *Walh.* Flor. v. Gießs. p. 308.)

E. hirsutum *Willd.* sp. pl. II. p. 315. *Ejusd.* Enum. 1 c. *Pers.* syn. pl. I. p. 410. *Hoffm.* Germ. ed. 1800. I. p. 177. *De Vest* Man. bot. p. 621.

Chamaen. grandiflorum *Moench.* Meth. p. 677.

Cham. hirsutum *Scopol.* Carn. I. p. 270.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in paludosis, ad fossas et ripas hinc inde frequens.

Radix repens, valde fibrosa. Caulis 2 - 3 - 4 - pedalis, erectus, teres, villosus, a basi ramosus: ramis oppositis adscendentibus. Folia opposita et alterna, sessilia, amplexicaulia, subdecurrentia, lato-lanceolata, acuminata, serrata, utrinque hirsuta, mollia. Flores speciosi, magni, solitarii, in alis superioribus sessiles: petalis aequalibus bifidis emarginatis purpureis, calyce duplo majoribus. Stigma crassum, villosum, quadrifidum, lobis revolutis.

3) *E. parviflorum* foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis pubescentibus subpetiolatis, caule simplici villoso. *Kleinblüthiger Weider.*

(*Hoffm.*

(*Hoffm.* Germ. I. p. 178. *Wib.* Werth. I. c. *G. M. Sch.* Flor. d. Wetter. II. p. 17. *Röhl.* D. Flor. I. c. *Smith.* Britan. Vol. I. p. 410. *Gmel.* Bad. II. p. 139. *Schreb.* spicileg. p. 146.)

E. pubescens L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 315. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. I. c. *Roth.* Germ. I. p. 167. II. p. 435. *De Vest.* Man. bot. p. 621. *Walth.* Flor. v. Giefs. p. 309.

Chamaen. pubescens Moench. Meth. p. 677.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in humidis umbrosis, in sylvaticis, ad fossas, ripas et sepes fere ubique.

Radix fibrosa. Caulis 1 - 2 - pedalis, erectus, teres, villosus, simplex s. superne parum ramosus. Folia ovato-lanceolata, serrulata, utrinque pubescens: inferiora opposita brevissime petiolata, superiora alterna sessilia, non amplexicaulia. Flores alterni, terminales, paniculati, triplo fere minores et pallidiores, quam in praecedente.

4) *E. montanum* caule subpubescente simplici, foliis oppositis alternisque ovatis dentatis glabris, stigmate quadrifido. *Berg - Weiderich.*

(L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 316. *Ejusd.* Enum. I. c. *Pers.* syn. pl. p. 410. *Hoffm.* Germ. p. 178. *De Vest.* Man. bot. p. 622.)

Chamaen. montanum Scopol. Carniol. I. p. 270. Moench. Meth. p. 677.

Perenn. bienn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in umbrosis subhumidis, in nemorosis et sylvis ubique.

Radix fibrosa, e lutescente albida, subrepens. *Caulis* pedalis, sesquipedalis, erectus, strictus, teres, plerumque glaber s. parum pubescens, saepe rubellus, simplex, apicem versus parum divisus. *Folia* serrulata, glabra s. subvillosa: *inferiora* breviter petiolata opposita ovata acuminata, *superiora* sessilia alterna lanceolata. *Flores* parvi, axillares, solitarii, alterni, in *paniculam* terminalem foliosam paucifloram laxam dispositi. *Calyx* 4-partitus basi 4-gonus. *Petala* dilute rubella, bifida, calyce longiora. *Stigma* pubescens, albidum, profunde quadrifidum.

5) *E. roseum* foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis glabris, stigmate indiviso. *Rosenfärbiger Weider.*

(*Pers.* syn. *pl. l. c.* *Hoffm.* *Germ. l. c.* *Smith.* *Britan.* Vol. I. p. 411. *Spreng.* *Hal.* p. 118. *Roth.* *Germ.* I. p. 168. II. p. 438. *Wibel.* *Werth.* p. 225. *Willd.* *Enum.* p. 411.)

E. montanum *v.* *L.* sp. *pl. ed.* *Willd.* II. p. 316. *De Vest. Man. bot.* p. 622.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pratis humidiusculis, in nemorosis, ad sepes, fossas et ripas.

Radix fibrosa, albida, subrepens. *Caulis* sesquipedalis, erectus, teres, apicem versus ramosus, glaber, superne candide villosus. *Folia* ovato-lanceolata, petiolata, serrata, glabra: *inferiora* opposita, *superiora* alterna angustiora. *Flores* parvi, carnei vel pallide rosei, racemosi. *Germen* villis albis dense obssessum. *Stigma* clavatum, indivisum.

6) *E. tetragonum* caule tetragono, foliis lanceolatis denticulatis: immis oppositis, stigmate indiviso.
Vierkantiger Weider.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 317. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c.)

Chamaener. tetragonum Scopol. Carn. I. p. 271.
Moench. Method. p. 678.

Perenn. *Flor.* Jul. Augosto.

Hab. in paludosis, humidis et in nemorosis. (In sylvis ad *Gramschatz*, *Veitshöchheim* et *Kitzingen* passim. In der *Waldskugel*, im breiten *Holz* prope *Versbach* et in *saltu mühlhusano*. Copiosus in pratis uidis des *Kreutzberges*.)

Radix fibrosa, fusco - albida. *Caulis* *pedalis*, *sesquipedalis*, *erectus*, *ramosus*, *glaber*, *vix pubescens*, *inferne praecipue obtuse tetragonus atque rubellus*, *superne teretiusculus*. *Folia* *subsessilia*, *glabra*, *in aequaliter denticulata*: *inferiora* *opposita* *ovato - lanceolata*, *superiora* *subalterna* *lineari - lanceolata*. *Flores* *parvi*, *axillares*, *pedunculati* *racemum terminalem* *foliosum pauciflorum* *formantes*. *Petala* *profunde emarginata*, *purpurea vel ex albido dilute rubella*. *Stigma* *crassum*, *clavatum*, *primo indivisum*, *demum subquadrifidum*.

7) *E. palustre* caule tereti *glabro*, foliis *oppositis* *sessilibus lanceolatis integris*, stigmate *indiviso*.
Sumpf - Weiderich.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 179. *De Vest.*
Man. bot. l. c.)

Chamaener. palustre Scopol. Carniol. I. p. 271.
Moench. Method. p. 678.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in humidis nemorosis, paludosis, ad ripas et fossas. (In humidis fossae oppidanae passim. In umbrosis humidis sylvae gramschatzensis, guttenbergensis et kitzingensis. Ad Moeni ripas prope der Hailburg, Fahr, Marienburghausen et Karlstadt. In paludosis inter Haßfurth et Zeil alibique.)

Radix e fibris plurimis albidis. Caulis palmaris, pedalis et altior, erectus, teres, glabriusculus, rarius parum pubescens, persaepe rubellus. Folia opposita, sessilia, subamplexicaulia, nonnunquam brevissime petiolata, linearis - lanceolata, obtusiuscula, glabra, integerrima s. obsolete denticulata: floralia alterna. Flores parvi, pedunculati, axillares, solitarii in racemum terminalem laxum foliosum dispositi. Petala emarginata, subbisida, dilute rubra, quandoque albida. Stigma clavatum, vix apice divisum. Pedunculi capsulis villosa - incanis plerumque longiores.

187. VACCINIUM, Heidelbeere.

I) *V. Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ovatis serratis deciduis, caule angulato. *Gemeine Heidelb. Schwarzbeere.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 348. *Ejusd.* Enum. p. 414. *Pers.* syn. pl. I. p. 478. *Hoffm.* Germ. I. p. 180. *De Vest.* Man. bot. p. 623. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 107. *Herb. Blackw.* t. 463. *Knorr.* thesaur. I. tab. S. 18. n. 1.)

Vitis idaea myrtillus Mönch. Meth. p. 47.

Fruticulus. Flor. Maj. Junio.

Hal.

Hab. in nemoribus, praecipue montosis fere ubique.

Fruticulus palmaris, pedalis et altior, ramosissimus, dichotomus: *trunko ramisque angulatis glabris laete viridibus*. *Folia alterna*, subsessilia, ovata, serrata, glabra, supra laete viridia, subtus pallida, venosa, saepe rubella, primo autumno decidentia. *Flores axillares*, pedunculati, solitarii, cernui. *Corolla basi gibboso - inflata*, ex albido - carnea, s. ex carneo - purpurea. *Bacca globosa*, succulenta, pisi majoris magnitudine, e coeruleo nigricans.

Variat saepe *corollis et calycibus* 5 - fidis staminibusque 10.

Varietas *baccis albis* apud nos rarissima. Semel modo mihi contigit, eam im oberen *Gesprait* prope *Büsensheim* invenire.

Baccae acidulae, dulcescentes, esculentae ab agricultoris nostris in urbe abundanter venaes exponuntur.

2) *V. Vitis idaea* racemis terminalibus nutantibus, foliis sempervirentibus obovatis revolutis integrerrimis subtus punctatis. *Rothe Heidelb.* *Preusselbeere*, *Kronsbeere*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 354. Ejusd. Enum. p. 414. Pers. syn. pl. p. 480. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man bot. l. c. Knorr. thes. I. tab. S. 18. n. 2.)

Vitis idaea punctata Moench. Method. l. c.

Fruticulus. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvaticis siccis sterilibus lapidis. (Im Steigerwald prope dem *michelauer Berg* et versus dem *waldschwiner Hof*. In sterilibus des *Holz* - et *Bauersberges* prope *Bischofsheim*. In ne-Heller Flora. I.

morosis versus der *Osterburg* et im *Himmeldung* ibi-
dem alibique.)

Fruticulus palmaris et *pedalis*, *semperfurens*, *trun-*
co ramisque alternis subcurvatis teretibus procumben-
tibus, apicibus erectis. *Folia alterna*, breviter pe-
tiolata, coriacea, *semperfurentia*, glaberrima, niti-
da, obovata, obtusa, margine parum revoluta, sub-
tus pallida, punctata, integerrima, juniora apicem
versus plerumque obsolete serrata. *Racemi termina-*
les, breves, simplices, densi, nutantas. *Corollae al-*
buae, *ventricosae*. *Stamina* 8, saepissime 10. *Baccae*
maturae coccineae, splendentes, succulentae, acidae,
amaricantes.

3) *V. Oxyccocus* foliis ovatis acutis integerri-
mis revolutis semperfurentibus, caulis repentibus
filiformibus nudis. *Moos-Heidelb.* *Moosbeere*, *Rausch-*
grün.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 354. *Ejusd.* *Enum.* I. c.
Hoffm. *Germ.* p. 180. *De Vest.* *Man. bot.* p. 623.
Schkuhr. *bot. Handb.* t. 107. *Herb. Blackw.* t. 593.)
Schollera Oxyccucus *Roth.* *Germ.* I. p. 170. II.
p. 442.

Oxyccucus palustris *Pers.* syn. pl. I. p. 419.

Fruticulus. Flor. Junio.

Hab. in paludosis turfosis, musco obduc-
tis. (Im Steigerwald versus dem *Zabelstein*, et pro-
pe *Handthal* in *monte Magdalene*. Im *bildsteiner Ge-*
hege prope *Hilters*, im *Honigschlag* versus *Sbhmal-*
wasser, in *montibus sic dictis nigris*, im *rothen Moor*,
inque aliis *montium rhoenanorum* *regionibus* saepe fre-
quens.)

Fru-

Fruticulus minimus, debilis: *caulibus* procumbentibus repentinibus radicantibus filiformibus dichotomis glabris rubicundis. *Folia alterna*, brevissime petiolata, parva, erecta, ovata, acuminata, coriacea, integriflora, glabra, parum revoluta, semperfiventia, supra viridia, subtus glauca. *Racemus terminalis*, brevissimus: *pedunculis* praelongis bracteolatis filiformibus unifloris glabris dilute purpureis apice incurvis. *Corollae speciosae*, ex albido rubellae, ad basin usque quadrifidae: *lacinias revolutis*. *Baccæ rubrae*, pendulae, succulentæ, acidæ.

188 ERICA, Heide.

I) *E. vulgaris* antheris inclusis, stylo exerto, corollis campanulatis subaequalibus, foliis sagittatis. *Gemeine Heide*, *Heidekraut*, *Waldheide*, *Rehkraut*.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 373. Pers. syn. pl. I. p. 422. Hoffm. Germ. I. p. 180. De Vest. Man. bot. p. 625. Schkuhr. bot. Handb. t. 107. Sturm. D. Flor. I. I. Thunberg. Dissert academ. Vol. II. p. 244.)

Calluna vulgaris Willd. Enum. p. 415.

Fruticulus. *Flor. Julio — Septembri.*

Hab. in pascuis sterilibus arenosis et juxta sylvas frequens.

Fruticulus flexuoso - erectus, palmaris, 1 - 2 - 3 - pedalis, ramosissimus *trunko* et *ramis* teretibus glaberrimis brunneis. *Rami* sparsi et verticillati, divaricato - patentes, virgati: *ramulis* oppositis brevissimis foliis tectis. *Folia* opposita, sessilia, sagittata, trigona, obtusa, tenuissime ciliata, glabra, subtus sulcata, laete viridia, quadrifariam imbricata. *Flores* terminales, spicato - racemosi, subsecundi, cernui:

pedunculis longitudine foliorum. *Calyx* *duplicatus*: *exterior* e foliolis 4 ovatis carinatis virentibus, *interior* multo major corollam arcte amplectens coloratus. *Corolla* campanulata, quadripartita, carneus, purpureus, albido violaceus, rarius tota nivea, calyce interiori duplo fere brevior.

189. DAPHNE, *Kellerhals*, *Seidelbast*.

I) *D. Mezereum* floribus sessilibus aggregatis caulinis, foliis deciduis lanceolatis. *Gemeiner Kellerh.* *Brennweurz*, *deutscher Pfeffer*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 415. *Ejusd.* *Enum.* p. 424. *Pers.* syn. pl. I. p. 434. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 181. *De Vest.* *Man. bot.* p. 628. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 107. *Herb. Blackw.* t. 582. *Knorr. thes.* I. tab. K. 6. *Schmidt. Baumz.* t. 16. *Sturm D. Flor.* I. 1.)

Thymelaea Mezereum Moench. *Method.* p. 636. *Scopol.* *Carniol.* I. p. 276.

Frutex. Flor. Martio Aprili.

Hab. in nemorosis praesertim montosis frequens.

Frutex 2 - 4 - *pedalis*, *erectus*, *ramosus*: *ramis* vimineis ante foliorum exortum medio floriferis, apice demum foliatis. *Folia* alterna, sessilia, lanceolata, integerrima, glabra, tenera, decidua: *terminalia* in comam congesta. *Flores* odorati, rubri, rarius albi, sessiles, basi bracteati, subterni e quavis gemma, in racemum speciosum dispositi. *Drupa* *bacata*, pisi majoris magnitudine, matura coccinea, rarius lutea.

Planta tota acerrima, venenata.

190. STELLERA, *Sperlingszunge*.

I) *St. passerina* foliis linearibus, floribus axillaribus sessilibus. *Gemeine Sperlingssz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II p. 429. Pers. syn. pl. I. p. 436. Hoffm. Germ. I. p. 182. De Vest. Man. bot. p. 629. Jacq. icon. rar. t. 68. Schkuhr. bot. Handb. t. 107.*)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in apricis, arenosis, in vineis, inter segetes. (*In agris et vineis prope Rimpar, Arnstein, Büthhardt et Schlüsseldorf rarius. In vicinia der Vögelsburg prope Volkach. Etiam prope Homburg et Remlingen pluries invenit amicissim. Wibel.*)

Radix e fibris pluribus lutescentibus. *Caulis* digitalis, palmaris et pedalis, erectus, strictus, virgatus, teres, inferne plerumque ramosus: *ramis* strictis simplicibus. *Folia* alterna, sessilia, angusta, linearilanceolata, acuminata, patentia, integerrima, glabra. *Flores* parvi, sessiles, in alis foliorum aggregati. *Corollae* plerumque clausae, extus virides villosae, intus flavescentes glabrae.

D I G Y N I A.

191. CHRYSOSPLENIUM, *Milzkraut*

I) *Ch. alternifolium* foliis alternis, caule triquetro. *Abwechselndblättriges Milzkr. Goldmilz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 637. Ejusd. Enum. p. 458. Pers. syn. pl. I. p. 487. Hoffm. Germ. I. p. 190. De Vest. Man. bot. p. 654. Schkuhr. bot. Handb. t. 108. Sturm D. Flor. I. 12.*)

Perenn. Flor. April. Mayo.

Hab.

Hab. in umbrosis humidis. (In depressis humidis der *Waldskugel* passim frequens. In humidis *sylvarum Guttenberg et Kitzingen*. In *saltu mihi hussano*, im *Huck* prope *Klingenstein*. In *paludosis sylvae* ad *Waldbrunn*, im *Millert* et *Neusee* ibidem. In *nemorosis humidis circa Abb. Heidenseld et alibi*.)

Plantula vix *digitalis*, *subcarnosa*, *succulenta*. *Radix* subrepens, fibrosa, albida. *Caulis* erectus, plerumque triquierter, nonnunquam teretiusculus, glaber, subpilosus, simplex, superne dichotomus, corymbosus. *Folia* petiolata, cordato-reniformia, obtuse crenata, supra nitida laete viridia pilis raris albidis obsessa, subtus pallidiora glabra: *radicalia* in rosulam congesta: *caulinia* alterna minora ac brevius petiolata, *floralia* subsessilia utrinque glabra. *Corymbus* terminalis, planus, foliis insidens. *Flores* parvi, sessiles, aggregati, aurei. *Semina* nitida, nigra.

Flos primordialis saepissime quinquefidus et decandrus, reliqui constanter quadrifidi octandri.

2) *Ch. oppositifolium* foliis oppositis, caule tetragono. Entgegenstehendblättriges Milzkr. kleines Milzkraut.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 638. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 655. *Sturm* D. Flor. I. 4.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. passim cum praecedente, sed rarius. (Im *Rangen* prope *Mühlhausen* cum *Cypripedio Calceol-*lo in locis humidis hinc inde frequens, im *großen Holz* et ad rivum ibidem. In *saltu kitzingensi*, in *sylva ansbaccensi* prope *Abbat. Heidenseld*. In *sylva hom-*

homburgensi versus *Böttingen*, im *Oelgrund* prope *Karsbach* et *Sachsenheim*. In *sylva guttenbergensi* aliquaque haud frequens.)

Priori valde affine, a quo differt: partibus omnibus minoribus et pallidioribus, *caulibus* tetragonis tenuioribus ut plurimum decumbentibus radicantibus, *foliis* brevius petiolatis oppositis, et *floribus* paucioribus multo minoribus.

Etiam in hoc, uti in praecedente flos primordialis quinquefidus et decandrus saepe occurrit.

TRIGYNIA.

192. POLYGONUM, Knöterich.

1) *P. Bistorta* caule simplicissimo monostachyo, spica cylindrica, foliis ovatis undulatis in petiolum decurrentibus, floribus 7 - 8 - andris trigynis. *Wiesen-Knöter. Natterwurz, Krebswurz, Schlangenkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 441. Ejusd. Enum. p. 427. Pers. syn. pl. I. p. 439. Hoffm. Germ. I. p. 183. De Vest. Man. bot. p. 630. Herb. Blackw. t. 254.*)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis humidis et montosis. (In pratis prope *Fahr*, *Volkach*, *Wolfsmünster*, *Waldaschach* et alibi. In *fossa oppidana carolopolitana* aliquaque frequens.)

Radix lignosa, crassa, intorta, extus fusca, interne rubicunda, carnea, recens praecipue valde adstringens. *Caulis* 2 - 3 - pedalis, erectus, simplicissimus,

simus, teres, glaber vaginatus, articulatus: *articulis* rubicundis superne tumidis. *Folia* glabra, integerima, supra saturate viridia, subtus glauca: *radicalia* copiosa in petiolum longum decurrentia ovata undulata in orbem congesta, *caulina* pauca alterna sessilia subundulata ovato - lanceolata *vaginis* amplexicaulia. *Spica* terminalis, solitaria, cylindrica, obtusa, erecta, densa, multiflora. *Flores* dilute carnei, gemini: *altero* pedunculato, *altero* sessili. *Bracteae* fuscae, aridae. *Semen* triquetrum, fuscum.

2) *P. amphibium* spica ovata, floribus pentandris semidigynis. *Wasserknöter. Amphibienknöterich.*

(L. sp. pl. ed. Willd p. 443. *Eiusd. Enum.* p. 428. Pers. syn. pl. p. 440. Hoffm. Germ. l. c. *De Fest. Man. bot. l. c.*)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in aquis stagnantibus, ad ripas et in paludosis.

Radix fibrosa, repens. *Caulis* erectus aut in aquis natans, radicans, teres, subsimplex, rubellus, geniculatus, *stipulis* membranaceis tubulosis arcte adpressis vestitus. *Folia* alterna, petiolata, supra aquam natantia, lato - s. angusto - lanceolata, glabra, laete viridia, integra aut serrulata. *Spicae* terminales, solitariae, pedunculatae, erectae, ovatae, densae, multiflorae, basi bracteatae. *Flores* pedicellati, rubri aut dilute rubelli. *Stamina* 5 calyce breviora. *Stylus* semibifidus. *Semina* plana, subrotundo - cordata.

Planta in aquis crescens *folia* habet longe petiolata lanceolata glabra, *spicas* subrotundas et *stamina* calyce breviora. (*P. aquaticum.*) Extra aquam vero proveniens *folia* subsessilia lanceolata hirsuta,

spi-

spicas oblongas, atque *stamina calyce longiora*. (*P. terrestre*.)

3) *P. lapathifolium* spicis brevibus obtusis demum nutantibus, stipulis muticis, pedunculis scabris, floribus 5 - andris 2 - gynis, seminibus utrinque concavis. *Ampferblättriger Knöter.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 442. Pers. syn. pl. p. 439. Hoffm. Germ. p. 183. De Vest. Man. bot. p. 631.*)

P. seabrum Mönch. Method. p. 629. *Walth. Flor. v. Gieß. p. 318.*

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in humidis, in cultis, ad ripas. (In fossa oppidana passim. Prope catarrhactam vor dem pleichacher Thore. In humidiusculis prope St. Veit, Erbshaußen, Schwemmelsbach et Mühlhausen. In cultis hinc inde prope Aub et ad rivum ibidem.)

Radix fibrosa, albida. Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, basi quandoque decumbens, fistulosus, teres, glaber, ramosus, pallide viridis, saepissime maculis rubris notatus: geniculis incrassatis. Folia alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima, supra glabra, subtus punctato-glandulosa, inimaculata aut maculis nigris sparsis obsessa: infima saepius obsolete dentata. Petioli breves, scabri. Stipulae arcte vaginantes muticae, non ciliatae. Spicae pedunculatae, oppositifoliae, breves, ovatae, obtusae, densae, erectae, demum subnutantes. Flores ex viridi albescentes aut dilute rubelli, 6 - andri. Stylus profunde bipartitus. Semina campressa, cordata, acuminata, nitida, medio utrinque depresso.

4) *P. Persicaria* spicis ovato-oblongis erectis, foliis lanceolatis submaculatis, stipulis ciliatis,

pe-

pedunculis laevibus, floribus 6 - andris 2 - gynis.
Pfirsichblättriger Knöter. gemeinses Flöhkraut.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 446. Ejusd. Enum. p. 429.
Pers. syn. pl. p. 440. Hoffm. Germ. p. 184. De
Vest. Man. bot. l. c. Herb. Blackw. t. 118.)

Ann. Flor. Julio — Septembri.

*Hab. in subhumidis, ad fossas, ad ripas,
ad margines agrorum et simeta ubique fre-
quens.*

*Radix fibrosa, albida. Caulis pedalis, sesqui - 2 -
pedalis, erectus, basi nonnunquam decumbens et ra-
dicans, teres, glaberrimus, viridis, saepe rubello-
maculatus: geniculis tumidis et ramis alternis paten-
tibus. Folia alterna, in petiolum brevem decurren-
tia, ovato - lanceolata, integra, glabra, margine
nervoque scabra, macula nigra retrorsum lunata ple-
rumque notata. Stipulae ciliatae. Spicae terminales
et axillares, oblongo - cylindricae, erectae, densae:
floribus imbricatis. Calyces dilute rubelli aut albi.
Stamina 6 longitudine calycis. Stylus ad medium
usque 2 - quandoque 3 - fidus. Semina ovata, sub-
triquetra, fusca,*

Variat foliis latioribus aut angustioribus et imma-
culatis.

5) *P. Hydropiper* spicis linearibus laxis nutan-
tibus, foliis lanceolatis undulatis immaculatis in pe-
tiolum decurrentibus, stipulis subciliatis, floribus 6 -
andris semi - 2 - gynis. *Scharfer Knöter, Wasser-
pfeffer, brennendes Flöhkraut.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 444. Ejusd. Enum. p. 428.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De
Vest. Man.

Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 108. Herb. Blackw. t. 119.)

Ann. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in humidis, inundatis, ad fossas et ripas.

Radix e fibris multis longis albidis. Caulis pedalis, sesquipedalis, interdum 2 - pedalis, erectus, dichotomus, teres, glaber, rubicundo aut fusco maculatus: geniculis tumidis. Folia alterna, in petiolum brevem decurrentia, lanceolata, acuta, utrinque glabra, subundulata, integra, pallide viridia, immaculata. Stipulae arcte vaginantes, cylindricae, truncatae, ciliatae. Spicae terminales tenues, filiformes, lineares, laxae, rarae, subnutantes. Flores parvi, e bractea bini s. terni, pallide rubri aut albidi, extus punctato - glandulosi. Stamina 6 calyce breviora. Stylus ad medium bifidus. Semina ovata, trigona, compressa, rufo - castanea.

Simillimum praecedenti, foliis vero, quae in eo saporem omnino mitem habent, masticatis acerrimis fere urentibus facile distinquitur.

6) *P. minus* spicis filiformibus erectiusculis, foliis linearis-lanceolatis, stipulis ciliatis, floribus 6-andris submonogynis, caule basi radicante. *Kleiner Knöter.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 445. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.)

P. angustifolium Roth. Germ. II. p. 453. Hoffm. Germ. ed. 1791. p. 138. Moench. Method. p. 630. Walh. Flor. v. Gieß. p. 320.

P. Persicaria β. Linn.

Ann. Flor. Jul. Augosto.

Hab.

Hab. in humidis, inundatis arenosis, ad fossas et ripas passim frequens.

Radix valde fibrosa, albida. *Caulis* digitalis, palmaris, interdum pedalis, teres, glaber, tenuis, filiformis, valde ramosus, rubellus aut magis purpureus, decumbens et radicans, superne erectus, supra genicula incrassatus. *Folia* alterna, subsessilia, linearilanceolata, utrinque attenuata, plana, glabra, integra, fere avenia. *Stipulae* arcte vaginantes, truncatae, ciliatae. *Spicae* terminales et axillares, tenues, filiformes, laxae, rarae, interruptae, erectiusculae. *Flores* parvi, rubelli, rarius albidi, 5-fidi. *Stamina* 6 interdum 5 brevissima. *Stylus* apice bifidus. *Semina* ovata, triquetra, fusca.

Pro loco natali diverso aquoso, uliginoso, vel sicciore *caulibus* spithameis, pedalibus et altioribus, totis viridibus, atque erectis, *spicisque* contiguis maxime variat.

Folia masticata non acria.

7) *P. incanum* floribus 6-andris 2-gynis, spicis ovato-oblongis, foliis oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus. *Grauer Knöter.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 446. *Ejusd. Enum.* p. 429. *Pers. syn. pl.* p. 440. *β. De Vest. Man. bot.* p. 631. *Rebent. prod. flor. neom.* p. 175.)

P. tomentosum *Schrank.* *Bavar. I.* p. 669.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. ad ripas, ad fossas, margines agrorum et ad sepes cum P. Pers. hinc inde.

A. *P. Persicaria*, cui simillimum, differt *caulibus* adscendentibus, *soliis* subtus albidis pubescentibus, et *spicis* interruptis erectiusculis.

8) *P. aviculare* caule procumbente, foliis elliptico-lanceolatis margine scabris, floribus axillaribus 3-andris 3-gynis. *Vogel-Knöter. Weegtritt, Weegras, Tausendknotenkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 449. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 439. Hoffm. Germ. p. 184. De Vest. Man. bot. p. 632. Sturm D. Flor. I. I. Herb. Blackw. t. 315.*)

Ann. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in incultis, ad vias et plateas ubique copiosissime.

Radix sublignosa, tenax, ramosa, fibrosa, albida. *Caules* plures digitales, palmares, pedales, procumbentes, teretes, filiformes, ramosi, divaricati, glabri, geniculati. *Folia* alterna, subsessilia, parva, elliptico-lanceolata, basi attenuata, interdum linearia, varie lata, integra, glabra. *Stipulae* obtusae, laceriae, scariosae, pellucidae, albidae. *Flores* parvi, axillares, subsessiles, solitarii, aut plerumque gemini et terni, quandoque conferti. *Calyces* quadripartiti, extus virides, intus albi aut rubelli. *Stamina* plerumque 8, interdum 5 et 7 calyce breviora. *Styli* 3 brevissimi. *Semen* trigonum, nitidum, fuscum.

Variat *soliis* latioribus longioribus albo-aut fuso maculatis, et *caule* erecto.

9) *P. Fagopyrum* foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, floribus 8-andris 3-gynis, seminum angulis aequalibus. *Heidekorn, Heidel, Buchweizen.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 455. Ejusd. Enum. p. 431. Pers. syn. pl. p. 441. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Knorr. thesaur. II. tab. F. Sturm D. Flor. I. 18.*)

Fagopyrum esculentum Mönch. Meth. p. 290.

Hab. in Asia boreali, unde initio saeculi decimi quinti in Europam venit. (Colitur in agris hinc inde. In arenosis prope der Karlsburg aliquique quasi sponte provenit.)

Radix fibrosa. Caulis pedalis et altior, erectus, interdum obliquus, carnosus, fistulosus, fragilis, glaber, ramosus, nitidus, rubello - purpurascens. *Folia* alterna, petiolata, subtriangularia, cordato - sagittata, integra, glabra, laete viridia: *suprema* minor, sessilia. *Stipulae* virides, breves, integerimae. *Racemi* terminales et axillares, pedunculati, fasciculati, densi, multiflori. *Flores* rosei aut albi, plerumque 8 - andri 3 - gyni. *Semina* calyce longiora, splendentia, fusca, triquetra: *angulis* aequalibus edentulis.

10) *P. Convolvulus* foliis cordatis, caule volubili angulato, laciniis calycinis obtuse carinatis. *Buchwinde, Heidelwinde, Schwarzwinde, Vogelzunge.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 185. *De Vest.* Man. bot. p. 633.)

Fagopyrum carinatum Mönch. Meth. p. 290.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in dumetosis, inter segetes et ad sepes.

Caulis 1 - 2 - 3 - pedalis, debilis, scandens, volubilis, subangulosus, superne ramosus. *Folia* alterna, petiolata, sagittato - cordata, acuminata, integerima, glabra. *Stipulae* fuscae, vaginatae, truncatae. *Racemi* terminales et axillares, breves, pauciflori.

Fla-

Flores ex albido virides, nutantes: phyllis 3 exteriores obtuse carinatis. Stamina 8: antheris violaceis. Styli 3 apice 3 - lobi. Semen triquetrum, obtusum, nigrum, calyce connivente inclusum.

II) *P. dumetorum* foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato - alatis, stylo brevissimo apice 3 - lobo. *Hecken - Buchwinde, Buschknöterich.*

(*L. sp. pl. ed Willd. I. c. Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. I. c. Hoffm. Germ. I. c. De Vest. Man. bot. I. c.*)

Fagopyrum membranaceum Mönch. *Meth. I. c. Ann. Flor. Jul. Augusto.*

Hab. in dumetis, ad sepes.

. A praecedente differt: caule multo longiore striato, floribus paniculatis, phyllis 3 exterioribus membrana pellucida dorso alatis, et antheris albis.

T E T R A G Y N I A.

193. P A R I S, *Einbeere.*

I) *P. quadrisolia* foliis quaternis, caule simplicissimo. *Vierblättrige Einb. Wolfsbeere, Pariskraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 471. Ejusd. Enum. p. 433. Pers. syn. pl. I. p. 446. Hoffm. Germ. I. p. 185. De Vest. Man. bot. p. 633. Schkuhr. bot. Handb. t. 109. Herb. Blackw. t. 286. Sturm. D. Flor. I. 12.*)

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in nemorosis umbrosis subhumidis ubique.

Radix repens, teres, geniculata, extus brunnea, intus albida. *Caulis* palmaris et pedalis, erectus, teres, glaber, striatus, simplicissimus. *Folia* ad apicem caulis 4 sessilia, verticillata, ovata, integerrima, glabra, patentia. *Flos* terminalis, solitarius, pedunculatus, e luteo virescens. *Bacca* nigra, globosa, obsolete quadrisulcata, carnosa.

Variat foliis tribus et quinque.

Planta narcotica, virescens.

194. ADOKA, Bisamkraut.

1) *A. moschatellina* foliis binis oppositis 3-lobis incisis. *Wahrs Bisamkr.* *Bisam - Erdrauch.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 472. *Ejusd.* Enum. p. 433. *Pers.* syn. pl. I. p. 446. *Hoffm.* Germ. I. p. 185. *De Vest.* Man. bot. p. 634. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 109.)

Moschatella Adoxa Scopol. Carn. I. p. 281.

Moschatellina tetragona Moench. Meth. p. 478.

Perenn. *Flor. Martio — Majo.*

Hab. in nemorosis, ad sepes. (In subhumidis umbrosis *sylvae guttenbergensis, stettensis* et im *Oelgrund* raro. Etiam ad sepes prope *Mürsbach* et *Gerolzwind* in satrapia *Ebern* specimina multa legi.)

Plantula tenerrima, mane praecipue moschum subredolens. *Radix* fasciculata, squamosa, carnosa, albida, stolonifera. *Caulis* spithameus, erectus, simplex, tetragonous, glaber, tenuis, inferne nudus, superne bifolius. *Folia* opposita, petiolata, triloba, incisa, glabra, laete viridia, subtus splendentia: *radicale* plerumque solitarium longius petiolatum. *Capitu-*

*pitulum terminale, solitarium, pedunculatum, cu-
boideum, subquinqueflorum. Flores sessiles, viridi-
lutescentes: terminali 4 - fido 8 - andro, lateralibus
5 - fidis 5 - andris. Bacc parva, ovato - globosa,
ex viridi lutescens Moschi odore.*

Duratio brevissima. Initio *Junii* nondum con-
spicua.

C L A S S I S IX.

E N N E A N D R I A.

H E X A G Y N I A.

195. BUTOMUS.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 693. De Neck. el.
bot. n. 1063. Borkh. tent. n. 127.*

*Involucrum breve 3 - phyllum. Cal. o. Petala 6,
alterna majora. Caps. 6 polyspermae introrsum de-
hiscentes.*

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

195. BUTOMUS, Wasserviole.

I) *B. umbellatus* floribus umbellatis, staminibus receptaculo insertis. *Geschirmte Wasserv.* *Wasserlisch,* *Blumenbinse.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 491. *Ejusd.* *Enum.* p. 436. *Pers. syn. pl.* I. p. 451. *Hoffm. Germ.* I. p. 186. *De Vest. Man. bot.* p. 636. *Schkuhr. bot. Handb.* t. III. *Sturm. D. Flor.* I. 18.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. ad moeni ripas et in fossa oppidanæ passim.

Radix tuberosa, fibrosa, albida. Scapus 2 - 3 - 4 - pedalis, erectus, firmus, teres, glaber, nudus, simplicissimus, foliis altior. Folia omnia radicalia, erecta, ensiformia, angusta, integerrima, glabra, spongiosa, inferne triquetra, superne plana, acuta. Umbella terminalis, formosa, simplex, multiflora. Pedunculi longi, erecti, uniflori, basi bracteati. Petala magna, concava, albido - purpurea, s. rosea, alterna minora.

C L A S S I S X.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

196. D I C T A M N U S.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 726. *De Neck. el. bot.* n. 1071. *Borkh. tent.* n. 120.

Cal. 5 - phyllus. *Petala* 5 inaequalia patula sub-unquiculata. *Filam.* punctis glandulosis adspersa declinata. *Caps.* 5 coalitae 2 - valves introrsum elastice dehiscentes.

197. M O N O T R O P A.

L. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 737. *De Neck. el. bot.* n. 1198. *Borkh. tent.* n. 81.

Cal. 4 - 5 - phyllus: *foliolis* erectis lanceolatis coloratis, basi excavatis melliferis. *Petala* 4 - 5 - erecta oblonga basi gibba. *Caps.* ovata 5 - valvis polysperma.

198. P Y R O L A.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 752. *De Neck. el. b.* n. 361. *Borkh. tent.* n. 61.

Cal. 5 - partitus. *Petala* 5 aequalia subrotunda.
Caps. supera 5 - locularis polysperma angulis dehis-
 cens.

D I G Y N I A.

199. SAXIFRAGA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 764. *De Neck. el. bot.* n. 1204. *Borkh. tent.* n. 52.

Cal. 5 - partitus carnosus persistens. *Petala* 5 pa-
 tentia. *Caps.* 2 - rostris 1 - locularis polysperma.

200. SCLERANTHUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 767. *De Neck. el. bot.* n. 938. *Borkh. tent.* n. 607.

Cal. 1 - phyllus campanulatus 5 - fidus superus
 persistens. *Cor.* o. *Stam.* calyci insidentia. *Sem.* 1
 calyce corticato tectum.

201. GYPSOPHILA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 768. *De Neck. el. bot.* n. 862. *Borkh. tent.* n. 57.

Cal. 1 - phyllus campanulatus angulatus 5 - parti-
 tus persistens. *Petala* 5 ovata sessilia. *Caps.* globo-
 sa 1 - locularis 5 - valvis polysperma.

202. SAPONARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 769. *De Neck. el. bot.* n. 864. *Borkh. tent.* n. 54.

Cal.

Cal. 1 - phyllus 5 - dentatus cylindricus aut ventricosus, basi nudus. *Petala* 5 unquiculata. *Caps.* oblonga 1 - locularis.

203. DIANTHUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 770. De Neck. el. b. n. 873. Borkh. tent. n. 53.

Cal. 1 - phyllus cylindricus 5 - dentatus, basi squamis auctus. *Petala* 5 unquiculata. *Caps.* cylindrica 1 - locularis apice dehiscens.

TRIGYNIA.

204. CUCUBALUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 771. De Neck. el. bot. n. 870. Borkh. tent. n. 59.

Cal. subinflatus 5 - dentatus. *Peta'ia* 5 unquiculata absque denticulis ad faucem. *Caps.* 3 - locularis polysperma.

205. SILENE.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 772. De Neck. el. bot. n. 869.

Cal. subventricosus 5 - dentatus. *Petala* 5 ad faucem denticulis coronata. *Caps.* subovata sub - 3 - locularis polysperma.

206. STELLARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 773. De Neck. el. bot. n. 853. Borkh. tent. n. 73.

Cal.

Cal. 5 - phyllus: *florens* patens. *Petala* 5 2 - partita. *Caps.* 1 - locularis polysperma ovata, ore 6 - dentato.

207. ARENARIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 774. De Neck. el. b. n. 850. Borkh. tent. n. 75.

Cal. 5 - phyllus patens. *Petala* 5 integerrima sub-persistentia. *Caps.* 1 - locularis apice dehiscens polysperma.

PENTAGYNTIA.

208. SEDUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 789. De Neck. el. b. n. 1098. Borkh. tent. n. 118.

Cal. 5 - fidus erectus persistens. *Petala* 5 lanceolata patentia. *Squamae nectariferae* 5 ad germinis basin. *Caps.* plures superae polyspermae introrsum dehiscentes.

209. OXALIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 794. De Neck. el. bot. n. 1270. Borkh. tent. n. 60.

Cal. 5 - phyllus persistens. *Petala* 5 unquibus connexa. *Stam.* sub - 1 - adelphia, alterna longiora. *Caps.* supera 5 - locularis 5 - gona angulis dehiscens. *Sem.* arillata.

210. AGROSTEMMA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 795. De Neck. el. bot. n. 868. Borkh. tent. n. 56.

Cal.

Cal. 1 - phyllus ventricosus angulosus coriaceus
 5 - dentatus. *Petala* 5 unquiculata: limbo obtuso in-
 divis. *Caps.* 1 - locularis ore 5 - dentato apice 5 -
 fariam dehiscens.

211. LYCHNIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 796. De Neck. el. bot. n. 866.

Cal. 1 - phyllus oblongus tubulosus 5 - dentatus.
Petala 5 sub - 2 - sida ad unques coronata. *Caps.* 1 -
 3 - 5 - locularis.

212. CERASTIUM.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 797. De Neck. el. bot. n. 852. Borkh. tent. n. 74.

Cal. 5 - phyllus erectus. *Petala* 2 - sida. *Caps.* oblonga aut subrotunda cartilaginea 1 - locularis ore 10 dentato apice dehiscens.

213. SPERGULA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 798. De Neck. el. bot. n. 851. Borkh. tent. n. 75.

Cal. 5 - phyllus persistens. *Petala* 5 integerrima fugacia. *Caps.* ovata 1 - locularis 5 - valvis.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

196. DICTAMNUS, *Diptam*.

1) *D. albus* caule simplici, foliis pinnatis. *Wei-*
ßer Diptam, Escherwurz.

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 541. Ejusd. Enum.*
p. 446. Hoffm. Germ. I. p. 187. De Vest. Man.
bot. p. 646. Schkuhr. bot. Handb. t. 114. Sturm D.
Flor. I. 6. Jaquin. Austr. t. 428. Herb. Blackw.
t. 75.)

D. Fraxinella Pers. syn. pl. I. p. 464.

Fraxinella dictamnus Mönch. Method. p. 68.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in asperis sylvaticis. (*In sylva viti-*
hoechheimensi et waldbüttelbronnensi. In nemorosis ad
Gerbrunn, Theilheim, Ochsenfurth, Stetten et Thünn-
gen. Ad montes Kalmut, Kalbenstein et alibi.)

Tota planta graveolens, viscida. *Radix* crassa,
lignosa, tortuosa, amara, aromatico, extus flavicans,
intus alba. *Caulis* pedalis, sesquipedalis et altior,
erectus, teres, striatus, simplex, superne praecipue
pilis resinosis glandulosis rubellis obsessus. *Folia* al-
terna, pinnata: *foliolis* oppositis sessilibus ovatis acu-
tis

tis serratis glabris. *Flores magni, speciosi, pedunculati in racemum terminalem erectum compositum dispositi.* *Petala albida s. dilute rubella, venis purpureis percussa, inaequalia: 2 sursum flexa, 2 oblique ad latera sita, unicum deflexum.* *Filamenta et germina glandulis punctiformibus fuscis viscidis adspersa.*

197. MONOTROPA, Ohnblatt.

1) *M. Hypopithys* flore terminali decandro, lateralibus octandris. *Fichten - Ohnbl.* *Fichtenspargel,* *Wurzelsauger,* *Waldwurz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 573. Pers. syn. pl. I. p. 469. Hoffm. Germ. I. p. 187. De Vest. Man. bot. p. 646. Schkuhr. bot. Handb. t. 116. Sturm. D Flor. I. 13.*)

Hypopithys multiflora Scopol. Carniol. I. p. 285.

H. monotropa Mönch. Meth. p. 306.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in umbrosis ad radices Pini, Fagi et Querci parasitica.

Planta succulenta, carnosa, nitida, ex luteo albida, demum nigricans. Scapus digitalis, palmaris, erectus, teres, simplex, crassiusculus, ophyllus, squamis ovatis obtusis fuscis tectus. Flores breviter pedunculati, cernui, in racemum terminalem dispositi: laterales 8 - petali 8 - andri, terminalis 10 - petalus 10 - andrus. Petala inaequalia, decidua, subcarnosa lignei coloris.

198. PYROLA, *Wintergrün*, *Birnkraut*.

1) *P. rotundifolia* foliis obovalibus, staminibus adscendentibus, pistillo declinato, racemo multifloro. *Rundblättriges Wintergr.* *gemeines Birnkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 621. *Ejusd. Enum.* p. 456. Pers. syn. pl. I. p. 483. Hoffm. Germ. I. p. 189. *De Vest.* Man. bot. p. 644. Sturm D. Flor. I. 13. *Herb. Blackw.* t. 594.)

P. declinata Mönch. Meth. p. 71.

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in umbrosis sylvaticis submontosis passim frequens.

Radix repens, fusco - albida. *Caulis palmaris et altior*, erectus, simplex, nudus, subangulatus. *Folia radicalia* in orbem digesta, petiolata, subrotunda, plana, firma, glaberrima, obsolete serrata. *Racemus terminalis*, simplex, erectusculus, laxus, multiflorus. *Pedunculi alterni*, subnutantes, uniflori, basi *bractea lanceolata* albida suffulti. *Corollae majuscule*, patentibus, albidae vel rubellae: *petalis* concavis. *Stamina deorsum curvata*. *Stylus* declinatus stamina superans.

2) *P. minor* floribus racemosis dispersis, staminibus pistilloque rectis. *Kleines Wintergr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. *Ejusd. Enum.* l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 190. *De Vest.* Man. bot. l. c. Sturm D. Flor. I. 13.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in nemorosis umbrosis. (Im Oelgrund prope Sachsenheim, in nemorosis des Reissenberges, pro-

prope *Wolfsmünster*, *Böttingen* et *Gemünden*. In nemore prope *Mühlhausen* alibique rarius.)

Similis praecedenti, sed omnibus in partibus minor. *Racemus* brevior, densior, erectus, e *floribus* multo pluribus, albidis vel rubellis, magis campanulato-globosis compositus. *Stamina* et *pistilla* recta. *Stigma* peltatum, convexum. *Folia* evidenter crenata.

3) *P. secunda* racemo unilaterali. *Einseitigblühendes Wintergr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *De Vest.* *Man. bot.* p. 645. *Sturm D. Flor.* I. 13.)

Perenn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in *sylvaticis umbrosis*. (In locis demissis umbrosissimis *sylvae* *Waldskugel* raro. In nemorosis prope *Leinach*, im großen *Holz* prope *Mühlhausen*, in *sylva stettensi* versus *Stetten ad Werram*, in *sylvis* prope *Uettingen* et alibi hinc inde.)

Caulis erectus, interdum procumbens, simplex aut rarius ramosus. *Folia* ovata, acuta, leviter crenata. *Racemus* longus, simplex, unilateralis, apice recurvus: *floribus* albis pendulis. *Stigma* verrucis 5 pertusis. Coeterum cum prioribus convenit.

4) *P. uniflora* caule unifloro. *Einblüthiges Wintergr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 622. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *De Vest.* *Man. bot.* l. c. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 119.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in *sylvaticis*. (Im *Oelgrund* et *in monte Sodenberg* rarissima.)

Folia in orbem congesta, rotunda, crenata, in petiolum decurrentia. *Caulis* digitalis, erectus, simplicissimus, teres, aphyllus. *Flos* pedunculatus, terminalis, solitarius, nutans, albus, odore fere *Convallariae majalis*.

D I G Y N I A.

199. SAXIFRAGA, Steinbrech.

1) *S. Tridactylites* foliis cuneiformibus trifidis, radice fibrosa. *Sand - Steinbr. dreitheiliger Steinbrech.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 654. Ejusd. Enum. p. 461. Pers. syn. pl. I. p. 490. Hoffm. Germ. I. p. 195. De Vest. Man. bot. p. 661.*)

Ann. Flor. April. Majo.

Hab. in arenosis humidiusculis, ad muros, rupes et sepes ubique.

Radix fibrosa. *Caulis* uncialis, digitalis, raro altior, erectus, teres, dichotomus, interdum simplex, pilosus, viscidus, inferne plerumque rubicundus. *Folia* crassiuscula, pubescentia, viscida, viridia, saepe fusco - rubella: *radicalia* petiolata, in orbem digesta, obovato - lanceolata, obtusa, integra aut trifida: *caulina* alterna, sessilia, cuneiformia, bi - aut trifida, *summa* lanceolata integra. *Pedunculi* laterales et terminales, longi, nudi, uniflori, villosi, ante anthesin nutantes. *Flores* parvi: *petalis* obovatis albis. *Calyx* rubellus, villoso - viscidus.

In locis magis humidis planta tota viridis et succulentior evadit.

2) *S. granulata* foliis reniformibus lobatis, radice granulata. Körniger Steinbr. weißer Steinbr.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 651. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 489. Hoffm. Germ. p. 194. De Vest. Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 119. Sturm D. Flor. l. 6. Hert. Blackw. t. 56.)

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in pratis siccis, ad margines viarum inque collibus passim copiose.

Radix granulata, carnosa, fibrosa, imbricata. *Caulis* palmaris et pedalis, erectus, teres, villosus, subviscosus, superne dichotomus, inferne rubicundus. *Folia* subhirsuta, villosa, laete viridia: *radicularia* in orbem congesta, in petiolum decurrentia, reniformia, lobata: *lobis* obtusis crenatis, *caulina* alterna, brevius petiolata, palmata, *summa* sessilia lanceolata integerrima. *Flores* pedunculati, terminales, fasciculati. *Calyx* piloso-glandulosus. *Petala* obovata, obtusa, alba. *Bracteae* lanceolatae.

200. SCLERANTHUS, Knauel.

1) *Sc. annuus* calycibus fructus patulis acutis, caulis patentibus. Jähriger Knauel.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 660. Ejusd. Enum. p. 463. Pers. syn. pl. I. p. 491. Hoffm. Germ. I. p. 196. De Vest. Man. bot. p. 654.)

Knauel annuum Scopol. Carniol. I. p. 298.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in agris arenosis inque collibus aridis fere ubique.

Radix parva, fibrosa, alba. Caules plures, digitales, sesquidigitales, teretes, debiles, subpubescentes, dichotomi, patentissimi. Folia opposita, con-nato - sessilia, linearis - subulata, glabra, basi subciliata. Flores parvi, viriduli, in caulis divisuris sessiles, ad apicem fasciculati. Calycis laciniae acutae, margine submembranaceae, semper patulae.

Variat staminibus 5 et 8. *Caules demum prostrati.*

2) *Sc. perennis* calycibus fructus clausis obtusis, caulis procumbentibus. *Ausdauernder Knauel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 661. *Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. I. c. Hoffm. Germ. I. c. De Vest. Man. bot. I. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 120.)*

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in campis arenosis, in collibus et montosis sterilibus fere ubique.

Habitus praecedentis, a quo differt: *colore* totius plantae cano, demum rubicundo, *radice* perenni, *caulis* prostratis, *soliis* crassioribus, brevioribus, *margine* albo - membranaceis, *laciinis calycinis* obtusis, manifeste albido - marginatis, *semimferis conniventibus.*

201. GYPSOPHILA, *Gypsbraut.*

1) *G. muralis* soliis linearibus planis, calycibus nudis, petalis inaequaliter crenatis, caule dichotomo. *Mauer - Gypskr. Mauernelke.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 666. *Ejusd. Enum. p. 464. Pers. syn. pl. I. p. 492. Hoffm. Germ. I. p. 196. De Vest. Man. bot. p. 664. Schkuhr. bot. Handb. t. 120. Sturm D. Flor. I. 1.)*

Ann. bienn. Flor. Julio — Septembri.

Hab.

*Hab. in campis arenosis, inter stipulas,
in vineis et ad muros hinc inde.*

Caulis uncialis, digitalis et major, erectus, filiformis, scabriusculus, dichotomus: *ramis* oppositis divergentibus. *Folia* opposita, sessilia, angustissima, graminea, linearia, obtusiuscula, glabra. *Pedunculi* terminales et axillares, solitarii, uniflori. *Calyx* campanulatus, basi squamis destitutus. *Petala* parva, carnea, venis saturationibus picta, apicem versus inaequaliter crenata.

202. SAPONARIA, Seifenkraut.

1) *S. officinalis* floribus fasciculatis, calycibus cylindricis, foliis elliptico - lanceolatis. *Gemines Seifenkr. Waschkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 667. *Ejusd.* Enum. p. 464. *Pers.* syn. pl. I. p. 492. *Hoffm.* Germ. I. p. 197. *De Vest.* Man. bot. p. 664. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 121. *Sturm D.* Flor. I. 6. *Herb. Blackw.* t. 113. *Knorr.* thesaur. I. tab. S. 17.)

Lychnis officinalis Scopol. Carn. I. p. 303.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in arenosis inundatis, ad vias, ad sepes et ripas copiose.

Radix praelonga, cylindrica, geniculata, externe rubicunda, interne albida. *Caulis* 2 - pedalis et altior, erectus s. obliquus, teres, geniculatus, glaber, superne ramosus, laete viridis, in siccissimis plerumque rubicundus. *Folia* opposita, connato - sessilia, elliptico - lanceolata, lata, trinervia, integerrima, glabra. *Flores* speciosi; magni, breviter pedunculati, suaveolentes, terminales, corymboso - fasciculati.

Pe-

Petala albida s. dilute carnea, integra, fauce coronata. *Germen* pedicellatum.

2) *S. Vaccaria* floribus solitariis, calycibus pyramidatis pentagonis, foliis ovatis acuminatis. *Acker. Seifenkr. Kuhkraut, Erdweich.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 668. *Ejusd.* Enum l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Lychnis Vaccaria Scopol. Carn. l. c.

Vaccaria pyramidata G. M. Sch. Flor. d. Wetter. II. p. 88.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes aestivas passim frequens.

Radix fibrosa, albida. *Caulis* pedalis et altior, erectus, teres, glaber, articulatus, pallide viridis, a basi statim ramosus. *Folia* opposita, connato - sessilia, amplexicaulia, ovata, acuminata, integerrima, glabra, glauco - viridia. *Pedunculi* terminales et axillares, erecti, longi, solitarii, uniflori. *Calyx* amplius, pyramidatus, exacte quinquangularis. *Flores* inodori. *Petala* calyce vix longiora, serrata, rosea. *Germen* sessile.

203. DIANTHUS, Nelke.

Floribus aggregatis.

1) *D. carthusianorum* floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucro oblongo aristato capitulo breviore, foliis linearibus trinerviis. *Karthäusernelke, Feldnelke, Donnernelke, Blutnägelein.*

(*L.*)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 671. *Ejusd.* Enum. p. 467. *Pers.* syn. pl. I. p. 493. *Hoffm.* Germ. I. p. 198. *De Vest.* Man. bot. p. 665.)

Tunica carthusianorum *Scopol.* Carn. I. p. 299.

Caryophyllus carthusianorum *Mönch.* Method. p. 59.

Perenn. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pratis et collibus graminosis ubique copiosissime.

Caulis palmaris et altior, erectus, teres, geniculatus, simplicissimus, scabriusculus. *Folia* opposita, basi connata, vaginantia, linearis-lanceolata, stricta, trinervia: *nervis* basi conniventibus. *Flores* terminales, aggregati, fasciculati, interdum solitarii, inodori, longe pedunculati et sessiles. *Squamæ* ad basin calycis 4 - 7 obovato-cuneiformes, aristatae, calyce breviores. *Calyx* e rubello purpurascens. *Petala* plana, truncata, crenata, supra pilosa, purpurea, rarius alba. *Stigmata* reflexa.

2) *D. Armeria* floribus aggregatis fasciculatis; squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus. *Wilde Nelke.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 673. *Pers.* syn. pl. I. c. *Hoffm.* Germ. I. c. *De Vest.* Man. bot. p. 666 *Schkuhr.* bot. Handb. t. 121.)

Caryophyllus armerius *Moench.* Meth. I. c.

Ann. *Flor.* Junio — Augusto.

Hab. in pascuis aridis, ad margines agrorum, in vineis inque sylvis caeduis. (In aridis prope Thüngen et ad margines agrorum prope Stetten raro. In vineis prope Retzbach, Karsbach et in

monte Kälbenstein. In sylvaticis siccis im Oelgrund, in sylva guttenbergensi, et im Haag juxta der Karlsburg. Ad muros arcis Reichelsberg prope Aub. In collibus aridis circa der Waldskugel et alibi.)

Caulis palmaris, pedalis, sesquipedalis, erectus, basi plerumque incurvus, teres, articulatus, scabriusculus, superne dichotomus: *ramis* strictis. *Folia* opposita, basi connata, lineari-lanceolata, pilosa, carinata, integra; enervia, erecta. *Flores* terminales, subsessiles, erecti, plerumque terni et quaterni, quandoque plures congesti, inodori. *Calyx* pubescens, *squamis* 2 - 4 longitudine tubi striatis villosis lanceolatis, apice patulis, basi connatis. *Petala* plana, superne latiora, glabra, serrata, rubra, versus basin punctis albidos notata. *Stigmata* erecta, divaricata.

3) *D. prolifer* floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis scariosis tubum superantibus. *Sprossende Nelke, Knopfnelke.*

(*L.* sp. pl. ed *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Tunica prolifera *Scopol.* Carniol. I. p. 299.

Caryophyllus aridus *Mönch.* Meth. p. 59.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in agris urenosis, inter segetes, in collibus apricis et ad muros frequens.

Caulis palmaris, pedalis et altior, erectus, strictus, geniculatus, glaber, simplex aut superne dichotomus: *ramis* alternis erectis. *Folia* opposita, basi connata, linearia, glabra, margine scabriuscula. *Flores* parvi, inodori, sessiles, aggregati, in *capitulum* ter-

terminale densum congesti. *Squamae calycinae* prae-magnae, ovatae, obtusae, muticae, apice crenulatae, scariosae: *interiores* calycis longitudine, *exteriores* breviores. *Petala* obovata, obtusa, avenia, integerima, apice emarginata, carnea.

Floribus solitariis.

4) *D. deltoides* floribus solitariis, squamis calycis ovato - lanceolatis acutis subbinis, foliis obtusiusculis subpubescentibus, petalis crenatis. *Wiesennelke, Heidenelke.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 676. *Ejusd. Enum.* p. 469. *Pers. syn. pl.* p. 494. *Hoffm. Germ.* p. 199. *De Vest. Man. bot. l. c.)*

Caryophyllus deltoides Mönch. *Meth. l. c.*

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in nemoribus ericetosis, in collibus apricis et pratis siccioribus passim.

Caulis digitalis, palmaris et altior, debilis, articulatus, teres, leviter pubescens, ramosus, ante fluorescentiam plerumque decumbens, sub anthesi erectus. *Folia* linearis - lanceolata, integra, glabriuscula, margine scabra: *radicalia* cespitosa, *caulina* opposita, connato - sessilia. *Pedunculi* terminales, longi, solitarii, uniflori. *Calyx* cylindricus, striatus, subpubescens, pallide purpurascens, 5 - dentatus: *dentibus* setaceis. *Squamae* ad calycis basin 2 oppositae, ovato - lanceolatae, mucronatae, calyce duplo breviores. *Petala* subdeltoidea, inaequaliter crenata, purpurea, superne punctis argenteis aut macula unica deltoi-dea notata.

Variat petalis albis.

5) *D. superbus* · floribus solitariis paniculatis, squamis calycinis ovatis acutis, petalis multifido - capillaribus. *Zottige Nelke, Prachtnelke.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 679. *Ejusd.* Enum. p. 470. *Pers.* syn. pl. p. 495. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 667.)

Caryophyllus superbus *Moench.* Method. l. c.

Bienn. *Flor.* - *Jul.* *Augusto.*

Hab. in nemorosis montosis. (In sylvis *Gramschatz*, *Waldskugel*, *Veitshöchheim*, *Guttenberg*, *Stetten* et alibi non adeo infrequens.)

Caulis sesquipedalis et altior, erectus, basi incurvus, teres, glaber, articulatus, superne ramosus. *Folia* opposita, basi connata, linearis - lanceolata, integerrima, glabra, laete viridia. *Pedunculi* terminales, subtrigoni, uniflori, solitarii aut bini. *Flores* vespere imprimis et mane fragrantissimi, paniculati. *Calyx* tubulosus, cylindricus, striatus, glaberrimus, 5 - dentatus: *squamis* ad basin ovatis, acuminatis, subviolaceis, tubo duplo brevioribus. *Petala* multifido - laciniata, ex albido violacea, versus faucem pilis flavis praedita: *unquibus* calyce longioribus.

TRIGYNIA.

204. CUCUBALUS, *Taubenkropf*, *Kukubal*.

1) *C. Behen* calycibus globosis reticulato - venosis, petalis semibifidis fauce subnudis. *Gemeiner Taubenkr.* *weißer Behen*, *Schaumrösllein*, *Kernkraut*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 684. *Ejusd.* Enum. p. 470. *Pers.* syn. pl. I. p. 495. *Hoffm.* Germ. I. p. 200,

p. 200. *De Vest.* Man. bot. p. 658. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 121. *Knorr.* thesaur. II. tab. L. 4. *Herb. Blackw.* t. 268.)

Lychnis Behen Scopol. Carniol. I. p. 305.

Silene inflata Smith. Britann. II. p. 467.

S. Cucubalus Wibel. Werth. p. 241.

Behen vulgaris Moench. Method. p. 709.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis siccioribus, in versuris et pomariis ubique.

Caulis sesquipedalis et altior, erectus, basi decumbens, teres, articulatus, glauco - viridis, inferne subpubescens, superne glaber, dichotomus. *Folia* opposita, connato - sessilia, ovato - lanceolata, acuminata, integerrima, subcarnosa, laevia aut subciliata, glauco - viridia. *Flores* pedunculati, terminales, nutantes, albi, in paniculam laxam dichotomam dispositi. *Pedunculi* uniflori. *Calyx* maxime inflatus, ova-tus, glaber, purpureo viridique reticulatus. *Petala* profunde bifida, margine crenulata.

Variationem *floribus tetragynis*, aliamque *floribus dioicis* aliquando observavi.

2) *C. Otites calycibus nervosis, petalis linearibus indivisis nudis.* *Acker - Taubenkr.* *Ohrlöffelkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 688. *Ejusd. Enum.* p. 471. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 669.)

Silene Otites Pers. syn. pl. I. p. 497. *Smith.* Brit. II. p. 469. *Wib.* Werth. l. c.

Lychnis Otites Scopol. Carniol. l. c.

Perenn. Flor. Maj. Junio,

Hab.

Hab. in arenosis siccis, lapidosis, in versuris, ad margines agrorum et vinearum passim frequens.

Caules plerumque plures, pedales et altiores, erecti, teretes, geniculati, subpubescentes, simpliciusculi, hinc inde, superne praecipue viscosi. Folia spathulata, hirta, firma, integra: radicalia in cespitem congesta, in petiolum decurrentia, caulinæ opposita, connato - sessilia, angustiora, minus hirta, saepe viscosa. Flores terminales, pedunculati, parvi, masculi et foeminei plerumque in diversa planta. Pedunculi subverticillati, dichotomi, glabri s. viscosi. Calyx tubulosus, nervosus, pubescens. Petala linearia, indivisa, nuda, apice incurva, ex viridi-albo flavicantia.

Flores masculi paulo maiores: calyce subrubro, foeminei minores: calyce viridi - striato.

Variat statura majori et floribus hermaphroditis.

205. S I L E N E, *Leimkraut.*

I) *S. baccifera* calycibus campanulatis, fructiferis cernuis inflatis, petalis distantibus, capsulis coloratis, ramis divaricatis. *Beerentragendes Leimkr., klimmender Meyer, Hühnerbiß.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 700. Ejusd Enum. p. 476. Hoffm. Geym. I. p. 202. Roth. Germ. I. p. 192. II. p. 493. Spreng. Hal. p. 131. Wib. Werth. p. 241.*)

Cucubalus bacciferus Linn. Pers. syn. pl. I. p. 496. Smith. Britann. II. p. 464.

C. horizontalis Mönch. Meth. p. 711.

Lychnis baccifera Scopol. Carn. I. p. 306.

Viscago baccifera De Vest. Man. bot. p. 668.

Scribaea divaricata G. M. Sch. Flor. der Wetter. II. p. 96.

Lychnanthus scandens Gmel. Bad. II. p. 250.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in nemorosis, ad sepes. (In sylva guttenbergensi, kitzingensi et stettensi passim. Im Taenn inter Dürrbach et Versbach raro. Im oberen Gesprait prope Büsensheim, in der Breit prope Wülfershausen et im Huck prope Wipfeld. Ad sepes prope Volkach, Haßfurth et alibi.)

Caulis praelongus, debilis, scandens, teres, geniculatus, piloso - scabriusculus, ramosissimus: *ramis* oppositis, divaricatis, subdichotomis. *Folia* opposita, in petiolum brevem decurrentia, ovata, acuminata, integra, scabriuscula, laete viridia. *Pedunculi* terminales et axillares, breves, solitarii, uniflori, ebracteati. *Flores* albido - virentes, nutantes. *Calyx* campanulatus, membranaceus, pubescens, ex viridi incanus: *fructiferus* amplissimus inflatus cernuuus. *Petala* distantia, bifida, crenata: *unquibus* praelongis et denticulis ad faucem. *Bacca* globosa, nigra, nitida, pulposa.

2) *S. nutans* floribus paniculatis secundis cernuis, petalis bifidis, foliis lanceolatis pubescentibus. Ueberhängendes Leimkr. weiße Silene.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 694. Ejusd. Enum. p. 474. Pers. syn. pl. p. 496. Hoffm. Germ. p. 201. De Vest. Man. bot. p. 670. Schkuhr. bot. Handb. t. 122.)

Lychnis nutans Scopol. Carn. I. p. 309.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in montosis nemorosis, ad muros et rupes ubique.

Caules plerumque plures, pedales et altiores, erecti vel basi modo ineurvi, teretes, articulati, villosi, superne subviscidi ramosi. Folia utrinque pubescens, scabra, integra, saepe undulata: radicalia in orbem congesta ovata acuminata, caulinæ opposita sessilia basi connata lanceolata. Flores terminales, breviter pedunculati, secundi, cernui, paniculati. Calyx cylindricus, villosus, striis 10 viridibus notatus. Petala bifida, apice crenulata, ad faucem denticulis coronata.

3) *S. noctiflora* calycibus 10 - angularibus: dentibus tubum subaequantibus, petalis bifidis obtuse coronatis, caule dichotomo. *Nachtblütiges Leimkr. Nacht - Silene.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 701. Ejusd. Enum. p. 477
Pers. syn. pl. p. 498. Hoffm. Germ. p. 202. De
Vest. Man. bot. p. 671. Sturm. D. Flor. I. 3.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in arvis arenosis, inter segetes. (Inter segetes juxta viam, quae dicit a pago Mühlhausen versus Versbach, circa Rimpach Proselsheim et Fahrarao. In arenosis prope Seßlach, Obervolkach, Nüdlingen et alibi infrequens.)

Caulis palmaris, pedalis, sesquipedalis, erectus, teres, articulatus, pubescens, subviscidus, superne dichotomus. Folia opposita, connato - sessilia, amplexicaulia, lanceolata, integrerrima, scabriuscula. Flores pedunculati, axillares et terminales, solitarii, magni, nocte et mane aperti. Calyx villosus, viscidus: costis 10 viridibus et dentibus linearibus tubum fere

fere aequantibus. *Petala* albida, semibifida, ad faucem coronata.

4) *S. Armeria* floribus fastigiatis fasciculatis, foliis superioribus cordatis glabris, petalis emarginatis. *Nelkenartige Silen*. *Garten - Silene*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 705. *Ejusd.* Enum. p. 478. *Pers.* syn. pl. p. 499. *Hoffm.* Germ. p. 202. *De Vest.* Man. bot. p. 672.)

Ann. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis. (In rupibus montis rhoenani *Milzeburg* passim, ubi etiam a cl. *D.* Custer lecta est.

Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, teres, ramosus, glaber, superne viscidus. *Folia* integrifolia, glabra: *radicalia* in petiolum decurrentia obverse lanceolata obtusiuscula, *caulina* opposita sessilia breviora cordato - ovata. *Panicula* terminalis, aphylla, dichotoma, fastigiata, multiflora: *floribus* erectis. *Calyx* glaber, decemstriatus: *striis* aequalibus. *Petala* obtusa, subemarginata, purpurea. *Cap-sulae* ellipticae, longe pedicellatae.

206. STELLARIA, Sternkraut, Sternmiere.

1) *St. nemorum* foliis petiolatis cordatis acutis: supremis lanceolatis sessilibus, panicula dichotoma. *Wald - Sternkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II p. 710. *Pers.* syn. pl. I. p. 500. *Hoffm.* Germ. I. p. 203. *De Vest.* Man. bot. p. 673.)

Perenn. *Flor. Jun. Julio.*

Hab.

Hab. in nemorosis humidiusculis. (In sylvis *Waldskugel*, *Guttenberg* et *Huck* prope *Wipfeld*. In umbrosis *sylvae stettensis* et alibi.)

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus aut decumbens, debilis, angulosus, subramosus, articulatus, villosus, basi stolonifer. *Folia* opposita, integerrima, pubescentia, laete viridia, subtus pallidiora: *inferiora* longius petiolata cordata, *superiora* subsessilia, *suprema* sessilia ovato-lanceolata. *Panicula* terminalis, dichotoma, laxa, divaricata, multiflora. *Pedunculi* floriferi erecti, fructiferi horizontales. *Flores* albi, campaniformes: *petalis* ad basin fere divisus, *lacinias* linearibus divaricatis. *Capsula* oblonga, cylindrica.

2) *St. Holosteum* foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis, calyce enervi. *Großblüthiges Sternkraut*, *Nelkenmiere*, *Augentrost*.

(*L. sp. pl. ed. Willd* p. 711. *Eiusd. Enum.* p. 479. *Pers. syn. pl.* p. 501. *Hoffm. Germ. l. c.* *De Vest.* *Man. bot. l. c.* *Schkahr. bot. Handb.* t. 122.)

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in nemorosis graminosis, ad sylvatum marginem ubique.

Caulis pedalis et sesquipedalis, basi repens, dein erectus, tenuis, articulatus, tetragonus, scabriuscusculus, superne dichotomo-paniculatus. *Folia* opposita, sessilia, basi connata, integra, lanceolata, graminea, integra, laete viridia, glabra, margine serrulata-scabra. *Pedunculi* terminales et axillares, praelongi, uniflori: *floriferi* erecti, *fructiferi* penduli. *Flores* formosi, magni, albi: *petalis* obcordatis semibifidis. *Capsula* globosa, calycem adaequans.

.. 3) *St. graminea* foliis linearī - lanceolatis integrimis, panicula terminali divaricata, calyce trinervi petalis aequali. *Grasartiges Sternkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* l. c. *De Vest.* *Man. bot.* l. c. *Smith.* *Britan.* Vol. II, p. 475.)

St. arvensis *Hoffm.* *Germ.* ed. 1791. p. 152. *Gmel.* *Bad.* II. p. 259. *Wib.* *Werth.* p. 244.

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in umbrosis, ad margines sylvarum et sepes.

Caulis palmaris, pedalis et altior, basi decumbens, dein erectus, tetragonus, glaber, geniculatus, debilis, fragilis, dichotomus. *Folia* opposita, connato-sessilia, linearī - lanceolata, acuminata, integerrima, glabra. *Panicula* terminalis, ramosissima, divaricata. *Pedunculi* terminales et axillares solitarii, longi, tenues, filiformes, laeves, 3 - 4 - 5 - flori, et 1 - flori. *Bracteae* ad peduncularum divisiones, membranaceae, albidae. *Phylla* striis 3 notata. *Petala* alba, ultra medium bipartita, calyce parum longiora. *Cap-sula* calyce minor, matura apice sexfariam dehiscens.

Variat *caulibus* altioribus ramosioribus et *panicula* pauciflora.

4) *St. Alsine* foliis oblongo - lanceolatis, pedunculis subgeminatis lateralibus uni - multiflorisve, petalis angustissimis calyce brevioribus, caule decumbente. *Vogel* - *Sternkr.* *Quellenmire.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 713. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* *Germ.* p. 204. ed. 1791. tab. 5. *De Vest.* *Man. bot.* l. c. *Sturm D. Flor.* I. 1.)

St. Dilleniana Leers. Herb. p. 108. Mönch. En. pl. Hass. t. 6.

St. uliginosa Roth. Germ. I. p. 191. II. p. 489. Gmel. Bad. II. p. 261. Spreng. Hal. p. 133. Smith. Britan. Vol. II. p. 476.

Ann. Flor. Maj. Junio.

Hab. in umbrosis humidis, in paludosis, ad fossas et ripas passim frequens.

Caules plures spithamei, digitales, basi decumbentes et radicantes, dein erectiusculi, debiles, articulati, tetragoni, glabri, nitidi, cum foliis teneri et subglauci. *Folia* opposita, sessilia, lanceolata, glabra, integra, bisi ciliata: *inferiora* reliquis latiora. *Pedunculi* capillares, *terminales* saepe 1 - 2 - flori, *axillares* terni: *intermedio* simplici unifloro prius florente, *lateralibus* 2 multifloris dichotomis divaricatis, *floriferi* erecti, *fructiferi* deflexi. *Flores* parvi, albi. *Petala* calyce breviora, ad basin bipartita: *lacinias* linearibus angustis distantibus. *Capsula* calyci subaequalis, ovali - oblonga, apice sexfariam dehiscens.

5) *St. palustris* foliis linearis lanceolatis acutis integerrimis, panicula dichotoma pauciflora, petalis bipartitis calyce multo majoribus. *Sumpf - Sternkraut, Wasser - Sternmiere.*

(*L.* sp. pl. ed. Willd. p. 712. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

St. glauca Smith. Britann. Vol. II. p. 475. Spreng. Hal. p. 133.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in humidis et paludosis. (In humidis sylvae guttenbergensis et kitzingensis. In paludosis pro-

prope *Spießheim*, *Wolfsmünster*, *Hassfurth* et alibi rarius.)

Caulis palmaris, pedalis et altior, erectus, tetragonius, articulatus, glaber, parum ramosus. *Folia* opposita, sessilia, angusta, linearis-lanceolata, acuta, integerrima, laevia, glauca. *Pedunculi* tenues, filiformes, axillares et terminales, pauci, paniculati: *floriferi* erecti, *fructiferi* nutantes. *Petala* obcordata, bipartita, alba, *calyce* duplo longiora. *Capsula* ovata, sexfariam apice dehiscens.

207. ARENARIA, *Sandkraut.*

1) *A. trinervia* foliis ovatis acutis petiolatis nervosis, calycibus obsolete trinervibus. *Dreinerviges Sandkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 718. *Ejusd.* Enum. p. 480. *Pers.* syn. pl. I. p. 502. *Hoffm.* Germ. I. p. 205. *De Vest.* Man. bot. p. 675. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 122.)

Ann. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in humidis nemorosis et ad arborum truncos putridos.

Caulis digitalis, spithameus, debilis, decumbens s. erectiusculus, teres, ramosus, articulatus, laeviter pubescens. *Folia* opposita, ovata, acuta, integerrima, subpubescentia, 3-5-nervia, plantaginea: *inferiora* in petiolum decurrentia, *superiora* sessilia. *Pedunculi* filiformes, uniflori, terminales et axillares solitarii, erecti: *fructiferi* declinati. *Petala* lanceolata, integerrima, alba, *calyce* breviora.

2) *A. serpyllifolia* foliis ovatis acutis enerviis subsessilibus, calycibus hirsutis subquinquenerviis corollas superantibus. *Quendelblättriges Sandkr.*

(*L.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 720. Ejusd. Enum. l. c.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest.
Man. bot. p. 676.)

Stellaria serpillifolia Scopol. Carn. I. p. 319.

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. in agris arenosis et ad muros ubique.

Caules 2 - 3 - pollicares, prostrati, s. adscendentes, tenues, teretes, rigiduli, laeviter pubescentes, ramosissimi, divaricati. *Folia* opposita, sessilia, parva, pubescentia, integerrima, dura, obsolete nervosa, ovata, acuminata: *inferiora* minora magisque conferta; *superiora* acutiora. *Pedunculi* tenues, uniflori terminales et axillares solitarii: *fructiferi* horizontales. *Petala* exigua, integra, alba, calyce multo breviora.

3) *A. rubra* foliis linearibus mucronulatis internodio brevioribus, stipulis scariosis vaginantibus, seminibus compresso - angulatis. *Rothblüthiges Sandkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 721. Ejusd. Enum. l. c.
Pers. syn. pl. p. 504. Hoffm. Germ. l. c. De Vest.
Man. bot. p. 677.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sabulosis, arenosis, ruderatis, inter segetes et ad ripas passim.

Caules plures digitales, sesquidigitales, prostrati, divaricati, ramosi, teretes, articulati, scabriuscui. *Folia* opposita, sessilia, angustissima, filiformia, crassiuscula, integra, subscabra, glauca, *internodiis caulinis* duplo fere breviora. *Stipulae* ad quodvis geniculum 2 oppositae, ovatae, amplexicaules, scariosae, albae. *Pedunculi* terminales et laterales solitarii, uniflori, pubescentes: *fructiferi* parum deflexi. *Petala*

rubra, integra, calyce paulo majora. *Capsula* ovata, longitudine calycis, apice trifariam dehiscens.

Variat floribus 6 - 8 - 9 - andris, et petalis albidis.

4) *A. tenuifolia* foliis subulatis oppositis, caule paniculato, petalis lanceolatis calyce brevioribus, capsulis erectis. *Dünnblättriges Sandkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 725. *Pers. syn. pl.* p. 504. *Hoffm. Germ.* p. 206. *De Vest. Man. bot.* p. 678.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in agris arenosis, ad eorum margines et ad muros passim.

Caulis digitalis et altior, erectus, teres, filiformis, articulatus, superne paniculatus. *Folia* opposita, basi connata, subulata, semiteretia, glabra, integra, trinervia, internodiis breviora. *Pedunculi* terminales et axillares, capillares, erecti, uniflori, glabri, foliis longiores. *Foliola calycina* lanceolata, mucronata, trinervia, margine membranacea, apice rubella. *Petala* ovalia, alba, calyce duplo fere breviora. *Capsula* erecta, ovata, calycem subaequans, apice trifariam dehiscens.

Variat saepè floribus pentandris.

P E N T A G Y N I A.

208. S E D U M, Steinwurz.

1) *S. Telephium* foliis planiusculis ovatis serratis sparsis, corymbo folioso, caule erecto. *Knollige Steinw. fette Henne, Schmeerwurz.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 760. *Ejusd. Enum.* p. 483. *Pers. syn. pl.* I. p. 511. *Hoffm. Germ.* I.

p. 207. *De Vest.* Man. bot. p. 685. *Sturm* D. Flor. I. 6. *Knorr.* thesaur. I. tab. F. 5. *Herb.* Blackw. t. 191.)

Perenn. *Flor.* Junio — Septembri.

Hab. ad margines agrorum, ad sepes et in collibus aridis frequens.

Radix tuberosa, carnosa, alba. *Caulis* palmaris, pedalis, 2 - pedalis, erectus, teres, simplex, glaberrimus, succulentus, plerumque purpurascens. *Folia* sparsa, sessilia, ovata, obtusa, plana, carnosa, dentato - serrata, laevia. *Corymbi* terminales, densi, multiflori, foliosi. *Flores* ex albido flavescentes, vel dilute purpurei.

2) *S. reflexum* foliis subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis, floribus subcymosis. *Zurückgebogene Steinw.* *Berg - Sedum.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 764. *Ejusd.* Enum. p. 486. *Pers.* syn. pl. p. 512. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 686.)

Perenn. *Flor.* Jun. Julio.

Hab. in arenosis lapidosis aridis et ad muros ubique.

Radix fibrosa. *Caules* plures digitales, sesquidigitales et altiores, teretes, glabri, e glauco virides, inferne plerumque rubelli: *steriles* decumbentes, *floriferi* adscendentibus laxius foliosi superne ramosi: *ramus* reflexis. *Folia* sessilia, multifariam disposita, basi soluta et producta, teretiuscula, subulata, mucronata, carnosa, glabra, glaucescentia vel laete viridia: *inferiora* decidua, hami adinstar recurvata. *Flores* aurei, subsessiles, in cymam terminalem dispositi.

3) *S. album* foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Weisse Steinw.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 766. Ejusd. Enum. p. 487. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 208. De Vest. Man. bot. p. 687. Herb. Blackw.t. 428.*)

Hab. in sicciissimis saxosis, in tectis, ad muros. (Prope dem Schenkenschloß, Dürrbach, Rimpar et Geldersheim. Ad muros vinearum des *Steines*, der *Harfe*, der *Leiste* alibique satis frequens.)

Radix fibrosa. Caules plures, digitales, palmates et altiores, basi decumbentes, dein erectiusculi, teretes, glabri, superne ramosi. *Folia* sparsa, sessilia, basi subsoluta, patentia, teretia, obtusa, carnosa, glabra, subglaucia. *Flores* pedunculati, erecti, cymosi. *Cyma* ramosa, trifida, conferta, multiflora. *Petala* acuta, alba, nonnunquam linea rubra notata.

4) *S. rupestre* foliis subulatis erectis quinfariam confertis basi solutis, floribus subcymosis. *Felsen - Steinw.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 764. Ejusd. Enum. p. 486. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 686. Sturm. D. Flor. I. 12.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in ruderatis, arenosis et ad muros. (In saxosis et arenosis versus Thüngen raro Inter ruderata arcis Karlsburg et in arenosis prope montem Kalbenstein hinc inde. In arenosis prope Pfarrweißbach et Gereuth prope Ebern alibique rarius.)

Caulis digitalis et palmaris, basi procumbens, radicans, dein adscendens, glaucus, inferne saepe rubellus, medio trifidus: *ramulis* erectiusculis. *Folia*

glauca, quinquefariam dense imbricata, subulata, linearia, obtusa, membranulam e basi demittentia: superiora paulo latiora. *Flores* alterni, sessiles, axillares, remote spicati, in cymam congesti: ramulis non reflexis. *Petala* aurea, lanceolata, calyce duplo longiora. *Calyx* glaucus, rubicundus, ad basin divisus.

5) *S. acre* foliis alternis subovatis carnosis gibbis adnato - sessilibus, cyma trifida foliosa. *Scharse Steinw. Mauerpfeffer, Katzenpfeffer.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 767. Ejusd. Enum. p. 487. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De West. Man. bot. p. 687. Schkuhr. bot. Handb. t. 123. Knorr. thesaur. II. tab. S. 12. 1. Herb. Blackw. t. 232.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in collibus siccis apricis, in tectis et muris copiosissime.

Caules e radice fibrosa plurimi, semidigitales, digitales, basi decumbentes, teretes, glabri, a basi ramosi, in cespitem densum congesti. *Folia* sparsa, brevissima, imbricata, carnosa, subrotundo - ovata, obtusa, adnato - sessilia, basi soluta, gibba, erecto - patentia. *Flores* alterni, erecti, sessiles, in cymam terminalem trifidam foliosam paucifloram dispositi. *Petala* flava, acuta, patentia, basi coalita. *Calyx* flavus: foliolis trigonis obtusis.

Herba recens acris, urens.

6) *S. sexangular e* foliis subternis teretiusculis adnato - sessilibus gibbis erectiusculis. sexfariam imbricatis, cyma trifida. *Sechseckige Steinwurz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 209. De West. Man. bot. p. 688.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. in apricis siccis, in rupibus et muris paesim.

Praecedenti simile, sed parum majus. *Caules* pauciores et minus ramosi. *Folia* longiora, subcylindrica, non gibbosa, basi soluta, ante florescentiam et in ramis sterilibus sexfariam imbricata, dein patentissima. *Flores* pauciores, alterni, axillares, sessiles, cymosi, flavi.

Herba non acris, insipida.

Variat staminibus 6 et 8.

7) *S. villosum* caule erecto, foliis linearibus planiusculis pedunculisque subpilosus. *Zottige Steinwurz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 768. *Ejusd. Enum.* l. c. Pers. syn. pl. p. 513. Hoffm. Germ. p. 209. *De Vest. Man. bot.* p. 688.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in uliginosis turfosis. (In palude rhoenano vulgo das Schwarze Moor satis frequens)

Radix e fibris multis capillaribus nigris composita. *Caulis* digitalis et palmaris, basi incurvus, dein erectus, teres, subvillosus, punctis purpurascens adspersus, simpliciusculus. *Folia* alterna, sessilia, linearia, obtusa, planiuscula, carnosa, villosa, subviscosa, punctis rubellis notata. *Pedunculi* erecti, uniflori, pubescentes, viscidii, in cymam terminalis dispositi. *Calyx* obtusus, piloso-viscidus, rubro punctatus. *Petala* ovato-lanceolata, dilute purpurascens: nervo longitudinali saturationi. *Capsulae* 5 purpureae.

Variat staminibus 5 et 8.

209. OXALIS, Sauerklee.

1) *O. Acetosella* scapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, stylis longitudine staminum interiorum. *Gemeiner Sauerklee, Buchampfer, Alleluja.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 780. Ejusd. Enum. p. 488. Pers. syn. pl. I. p. 515. Hoffm. Germ. I. p. 209. De Vest. Man. bot. p. 184. Schkuhr. bot. Handb. t. 123. Herb. Blackw. t. 308. Knorr. thesaur. II. tab. A. 14. Thunb. Diss. Vol. 2. p. 79.*)

Oxys Acetosella Scopol. Carn. I. p. 326. Mönch. Method. p. 48.

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in nemorosis umbrosis ubique.

Radix teres, repens: tuberculis carnosis imbricatis. Scapus unicus vel 2, digitalis et major, erectus, teres, debilis, simplex, uniflorus, pubescens, in medio articulatus. Petioli radicales, subieretes, striati, villosi, erecti, debiles. Folia acida, ternata: foliolis obcordatis subsessilibus reflexis tenuissime pilosis pilis adpressis, laete viridibus, subtus pallidioribus. Bracteae in medio scapi 2 oppositae, breves, subulatae. Flos terminalis, solitarius, campaniformis, nutans. Petala tenera, cuneiformia, retusa, calycem multoties superantia, alba: venis purpureis aut roseis et macula flava supra unques.

2) *O. stricta* caule erecto ramoso, foliis ternatis obcordatis, pedunculis umbelliferis. *Steifer Sauerklee.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 800. Ejusd. Enum. p. 490. Pers. syn. pl. p. 518. Hoffm. Germ. I. c. De Vest.*

Man

Man. bot. l. c. Sturm. D. Flor. I. 1. Thunb. Diss.
Vol. 2. p. 90.)

O. corniculata Roth. Germ. I. p. 200. II. p. 517.

Oxys lutea Mönch. Method. p. 48.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in cultis, dumetosis. (Ad hortos hinc
inde juxta dem Studentenbach et ad sepes juxta rivum
præpe Geldersheim raro. In dumetosis im Oelgrund
et ad montem Sodenberg passim.)

Radix fibrosa. *Caulis* palmaris, erectus, teres,
ramosus, glaber, inferne praecipue rubellus. *Folia*
alterna, longe petiolata, ternata: *foliolis* obcordatis
reflexis emarginatis utrinque glabris margine tenuis-
sime ciliatis. *Pedunculi* axillares, erecti, 3 - 4 - flo-
ri, umbelliferi, longitudine petiolorum aut iis parum
breviores. *Petala* ovata, integra, lutea, *striis* nigri-
cantibus, calyce vix majora.

Variat raro *caule* decumbente.

210. AGROSTEMMA, Raden.

1) *A. Githago* hirsuta, calyce corollam superan-
te, petalis integris nudis. *Korn - Raden*, *Kornrose*,
Kornnelke.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 805. *Ejusd.* Enum.
p. 490. Pers. syn. pl. I. p. 519. Hoffm. Germ. I.
p. 210. De Vest. Man. bot. p. 690. Schkuhr. bot.
Handb. t. 124. Sturm D. Flor. I. 5. Knorr. thesaur.
II. tab. L. 10.)

Lychnis Githago Scopol. Carniol. I. p. 310.

Ann. Flor. Jun. Julio,

Hab. frequens inter segetes.

Planta tota pilis erecto - adpressis canescentibus hirsuta. *Caulis* sesqui - 2 - 3 - *pedalis*, erectus, teres, articulatus, superne dichotomus. *Folia* opposita, sessilia, basi connata, linearis - lanceolata, integerrima. *Pedunculi* terminales, elongati, uniflori. *Calyx* durus, decemcostatus: *dentibus* linearis - lanceolatis foliaceis corollam excedentibus. *Petala* magna, obcordata, integra, purpurea, quandoque carnea: *sauce* nuda. *Semina* angulata, nigra.

Variat *dentibus calycinis* petala aequantibus.

211. LYCHNIS, *Lichtnelke*, *Wiederstoß*.

1) *L. flos cuculi* petalis laciniatis, fructu subrotundo uniloculari. *Wiesen - Lichtn.* *Gauchnelke*, *Guguksblume*, *Fleischblume*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 807. *Ejusd.* *Enum.* p. 491. *Pers.* *syn.* pl. I. p. 520. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 210. *De Vest.* *Man. bot.* p. 689.)

Perenn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in pratis uidis et juxta sylvas ubique.

Caules plures pedales et altiores, erecti, sulcati, articulati, hirti, viscosi, superne dichotomi: *geniculis* tumidis purpurascensibus. *Folia* opposita, sessilia, lanceolata, acuta, glabra, integerrima: *radicalia* in orbem congesta. *Flores* terminales et axillares, speciosi, rubri, paniculati. *Calyx* glaber, purpurascens, decemstriatus. *Petala* flaccida, *sauce* dentata, profunde bifida: *laciniis* iterum bifidis.

Variat interdum floribus albis et carneis.

2) *L. Viscaria* caule geniculis viscoso, petalis subintegris, fructu quinqueloculari. *Klebrige Lichtn.* *Pechnelke*, *Klebnelke*.

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 808. *Ejusd.* Enum l. c.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 211. *De Vest.*
Man. bot. l. c.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in pratis sylvaticis, ad margines sylvarum. (In locis graminosis siccis sylvae gramschätzensis versus Erbshaußen et St. Veit. In montosis sylvaticis prope Ober- et Unterleinach. Ad margines et in caeduis sylvae stettensis. In montibus sylvaticis prope Bischofsheim ad Rhoen. alibique raro.)

Caulis pedalis, erectus, teres, simplex, superne divisus, geniculatus, glaber, sub geniculis incrassatus, fusco - nigricans, viscidus. *Folia* opposita, connato - sessilia, lanceolata, acuta, integerrima, glabra, basi ciliata: *floralia* saepe rubra, *radicalia* in orbem congesta. *Racemus* terminalis, subspicatus: *pedunculis* oppositis bi - aut trifloris. *Calyx* decemstriatus, ruber. *Petala* obovata, subintegra, coronata, purpurea.

3) *L. arvensis* capsulae unilocularis apicibus erectis, petalis bisidis, foliis lanceolatis cauleque molliter pubescentibus. *Gemeine Lichtnelke, weiße Lichtn.*

(*Gmel.* Bad. II. p. 293. *G. M. Sch.* Flor. d. Wetter. II. p. 117.)

L. dioica (alba) *L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 810. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 520. *De Vest.* *Man. bot.* p. 689.

L. pratensis *Spreng.* Hal. p. 138. *Schkuhr.* *bot. Handb.* t. 124.

L. vespertina *Hoffm.* *Germ.* p. 211.

Saponaria dioica Moench. Meth. p. 76.

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in arvis, dumetis et in locis arenosis
siccis ubique.

Caulis sesquipedalis, 2 - pedalis, erectus, teres,
firmus, articulatus, dichotomus, paniculatus cum fo-
liis oppositis sessilibus lanceolatis integris molliter
incano - pubescens. *Flores* satis magni, circa vespe-
ram explicati, odorati, plerumque dioici, solitarii,
breviter pedunculati, terminales et alares. *Calyx* 10 -
angulus, coriaceus, villosus, in masculis oblongus,
in foemineis ovatus ventricosus. *Petala* alba, biñda.
Styli glabriuscui.

4) *L. sylvestris* capsulae unilocularis apicibus
recurvatis, petalis subbifidis, foliis ovato - lanceola-
tis cauleque hirsutis. *Wald - Lichtn.* rothe *Lichtn.*
reihe *Waldnelke.*

(Gmel. Bad. II. p. 291. G. M. Sch. Flor. d. Wet-
ter. II. p. 116. Spreng. Hal. p. 138. Schkuhr. I. c.
Willd. Enum. I. c.)

L. dioica (*rubra*) *L.* sp. pl. ed. Willd. I. c. Pers.
syn. pl. I. c. *De Vest.* Man. bot. I. c.)

L. diurna Hoffm. Germ. I. c.

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in sylvaticis et nemorosis humidis,
inque pratis virgultosis.

A praecedente differt: *caule* plerumque demissio-
re hirsuto magis succulento subfuscō - purpureo, fo-
liis latioribus villosō - hirsutis; *summis* coloratis, *ca-*
lycibus coloratis minus firmis pilis longis obsessis, *pe-*
talis minoribus roseis, *stylis* villosō - capitatis, et
capsularum dentibus recurvis.

Flores in priori vespere odorati, in hac inodori.

In horto botanico per plurimos annos cultae nullam unquam perpessae sunt mutationem.

212. CERASTIUM, Hornkraut.

Capsulis oblongis.

1) *C. vulgatum* foliis ellipticis obtusis, petalis calyci aequalibus, caulis diffusis. *Gemeines Hornkraut.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 811. *Ejusd.* Enum. p. 492. Pers. syn. pl. I. p. 520. Hoffm. Germ. I. p. 211. *De Vest.* Man. bot. p. 681.)

Myosotis vulgaris Moench. Meth. p. 224.

Ann. Flor. Mayo — Julio.

Hab. ad colles, muros, vias, inque sterilibus ubique.

Caules plures caespitosi, digitales, palmares, basi decumbentes, dein adscendentes, undique pilosi, teretes, articulati, superne ramosi. *Folia* utrinque hirsuta, integerrima: *radicalia* ovata in petiolum decurrentia, *caulina* opposita sessilia basi connata ovalia obtusa basi attenuata, *suprema* ligulata. *Flores* ex dichotomia, et terminales, solitarii: *pedunculis* brevibus 1 - floris, *floriferis* erectis, *fructiferis* deflexis. *Petala* alba, ad medium usque fere bifida, *calycem* hirsutum vix excedentia. *Capsula* calyce duplo longior, fere cylindrica, 10 - dentata.

2) *C. viscosum* foliis lanceolato - oblongis obtusis cauleque erecto viloso - viscosis, petalis apice bifidis calycem subæquantibus. *Klebrigtes Hornkr.*

(L.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 812. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 521. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Aprili — Augusto.

Hab. in pratis et pascuis macilentis, in vineis, ad viarum agrorum et sylvarum margines passim abunde.

Planta tota pilis glanduliferis viscidis obsessa. *Caules* inaequali - longi, digitales, palmares et altiores, erecti, teretes, articulati, simplices, superne dichotomi. *Folia* crassiuscula, integra, ovato - lanceolata, acutiuscula, e flavo virescentia: *infima* subpetiolata, *superiora* sessilia basi connata. *Flores* axillares et terminales, solitarii: *pedunculis* unifloris villosa - glandulosis, *floriferis* erectis, *fructiferis* declinatis. *Calycis foliola* pilosa, margine albida. *Petala* alba, apice bifida, calyce plerumque breviora. *Capsula* oblonga, calyce dimidio longior, apice io - fida.

3) *C. semidecandrum* foliis oblongis obtusis cauleque decumbente hirsutissimis, calycibus corollam superantibus, floribus pentandris. *Kleines Hornkr.* Schutt - *Hornkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 212. De Vest. Man. bot. l. c.)

Centunculus semidecander Scopol. Carniol. L. p. 321.

Myosotis semidecandra Moench. Meth. p. 225.

Ann. Flor. Majo — Augusto.

Hab. in pascuis apricis sabulosis, in locis lapidosis sterilibus, ad vias inque aggeribus. (In locis lapidosis sterilibus prope Randesacker,

Ei-

Eivelstadt, Ochsenfurth et Sulzdorf. Ad viarum margines prope *Gerbrunn, Rottendorf, Biebergau, Kitzingen et Dettelbach.* Ad vias inter vineas prope *Ober- et Unterdürrbach, juxta Veitshöchheim, Retzbach, Thüngen alibique.)*

Plantula tota cano - hirtusa. *Caules* unciales, sesquiunciales, basi decumbentes, teretes, simplices, superne subviscosi, demum altiores, toti fere erecti. *Folia* ovata, integerrima: *radicalia* in orbem digesta in petiolum decurrentia, *caulina* opposita latiora sessilia basi connata. *Flores* terminales et axillares, solitarii: *pedunculis* brevissimis unifloris, erectis, demum declinatis. *Foliola calycina* angusta, subulata, villoso - viscida, marginibus albida. *Petala* alba, linearis - lanceolata, emarginata, calyce plerumque breviora. *Stamina* plerumque 4 - 5 etiam 6 - 8, coetera sterilia. *Pistilla* 5, nonnunquam 3 - 4. *Capsulae* oblongae, incurvae, calyce duplo fere longiores.

Flores primo vere perfecte decandros et postea pentandros in eadem planta bis observavi.

4) *C. arvense* foliis linearis - lanceolatis obtusis cauleque primo decumbente pubescentibus, petalis calyce duplo longioribus. *Acker - Hornkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 813. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De West. Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 124. Sturm. D. Flor. I. 8.)

Centunculus arvensis Scopol. Carn. I. p. 321.

Myosotis linearis Mönch. Meth. p. 225.

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in arvis, vineis, ad muros et viarum agrorumque margines ubicunque.

Caules plures, digitales, palmares et altiores, teretes, villosa - pubescentes, basi plerumque rubelli, superne nudi, dichotomi, primo decumbentes, tempore inflorescentiae erecti. *Folia* opposita, sessilia, basi connata, linearis - lanceolata, obtusa, integerima, pubescentia, incano - viridia. *Flores* pauci, pendunculati, terminales, et in dichotomia caulis. *Petala* alba, bisida, obtusa, *phyllis* acutis margine membranaceis duplo longiora. *Capsula* oblonga, apice subincurva.

Capsulis subrotundis.

5) *C. aquaticum* foliis cordatis sessilibus, pendunculis lateralibus solitariis: fructiferis reflexis, petalis calyce duplo longioribus. *Wasser - Hornkr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 816. *Ejusd. Enum.* p. 493. *Hoffm. Germ.* p. 213. *De Vest. Man. bot.* p. 682.)

Stellaria aquatica Pers. syn. pl. p. 500. *Scopoli Carn.* I. p. 319.

Myosoton aquaticum Mönch. *Meth.* p. 225.

Perenn. *Flor. Junio — Augusto.*

Hab. in umbrosis humidis, ad sepes, rivos et ripas.

Caulis palmaris, pedalis, sesquipedalis et altior, basi decumbens, teres, debilis, articulatus, superne pubescens, ramosus. *Folia* laete viridia, opposita, sessilia, cordato - ovata, acuminata, integra, saepe undulata: *imma* in petiolum brevem decurrentia. *Pendunculi* terminales et axillares, solitarii, uniflori, pubescentes: *floriferi* erecti, *fructiferi* declinati. *Foliola calycina* pubescentia, viscidula. *Petala* alba, ad

ad basin usque bifida, calyce duplo longiora *Cap-*
sulae subrotundae, apice quinquefariam dehiscentes.

213. SPERGULA, Spark.

1) *Sp. arvensis* foliis verticillatis, floribus decandris, seminibus asperis. *Acker - Spark, Spergel, Futter-spergel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 818. Ejusd. Enum. p. 493. Pers. syn. pl. I. p. 522. Hoffm. Germ. I. p. 213. De Vest. Man. bot. p. 683. Schkuhr. bot. Handb. t. 125.*)

Stellaria arvensis Scopol. Carniol. I. p. 318.

Ann. Flor. Majo — Augusto.

Hab. in arenosis et inter segetes fere ubique.

Caulis palmaris, *pedalis*, erectus, e tereti compressiusculus, pubescens, nodosus, superne ramosus, nonnunquam simplex. *Folia* plurima verticillata, sessilia, crassiuscula, glabra aut subpubescentia, anguste-linearia, subulata, sulcata. *Stipulae* membranaceae, albidae, breves. *Panicula* terminalis, dichotoma, divaricata, multiflora. *Pedunculi* uniflori, pubescentes, visciduli, erecti: *fructiferae* declinati. *Petala* alba, calyce vix longiora. *Semina* reniformia, nigra, margine destituta.

Variat staminibus 5 - 6 et 7.

2) *Sp. pentandra* foliis verticillatis, floribus pentandris, seminibus margine alatis. *Fünfmännige Sp. Frühlings - Spark.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Sturm D. Flor. I. 12.*)

Stellaria pentandra Scopol. Carn. l. c.

Ann. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in arenosis, ad margines agrorum et vinearum muros passim.

Antecedenti simillima, sed differt partibus omnibus minoribus, *caule* teneriore minus ramoso inferne plerumque rubello, *soliis* verticillatis suboctonis setaceis glaucis, *staminibus* ut plurimum 5, et *seminibus* planis margine membranaceo albido cinctis.

Variat raro staminibus 10.

3) *Sp. nodosa* foliis oppositis subulatis laevibus: superioribus fasciculatis, floribus decandris. *Knotiger Spark.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 819. *Ejusd.* Enum. p. 494. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 214. *De Vest.* Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 125.)

Stellaria nodosa Scopol. Carn. I. p. 319.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis humidis, pomariis et ad ripas hinc inde.

Caules plures, 3 - 6 unciales, procumbentes s. erectilusculi, tenues, laeves, simplices, teretes, *geniculis* multis tumidis instructi. *Folia* subulata, laevia, crassiuscula, compressa: *radicalia* in cespitem congesta, *caulina* opposita connato - sessilia breviora, *suprema* in alis fasciculata. *Flores* terminales, pedunculati; constanter decandri, *Petala* alba, integra, calyce triplo fere majora.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

214. ASARUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 801. De Neck. el. bot. n. 1450. Borkh. tent. n. 97.

Cal. 1 - phyllus 3 - fidus coriaceus intus coloratus germini insidens. Cor. o. Antherae aristatae filamentorum medio adnatae. Stigma 5 - 6 - fidum. Caps. coriacea infera 6 - locularis coronata.

215. PORTULACA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 824. De Neck. el. bot. n. 1194. Borkh. tent. n. 48.

Cal. superus 2 - 3 - fidus persistens. Petala 5 integra. Caps. 1 - locularis circumscissa. Sem. pedicellata.

216. LYTHRUM.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 825. De Neck. el. bot. n. 773. Borkh. tent. n. 627.

Cal. cylindricus tubulatus striatus 10 - 12 - dentatus inferus subpersistens. Petala 5 - 6 calyci inserta.

Etiam.

Stam. alterna longiora. *Caps.* 2 - locularis polysperma sessilis.

DIGYNIA.

217. AGRIMONIA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 830. *De Neck. el. bot.* n. 767. *Borkh. tent.* n. 597.

Cal. setis hamatis aetate indurescentibus munitus. *Petala* 5 calyci inserta. *Sem.* 2 calyce vestita.

TRIGYNIA.

218. RESEDA.

L. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 831. *De Neck. el. bot.* n. 991. *Borkh. tent.* n. 86.

Cal. 1 - phyllus 4 - 6 - partitus. *Petala* 4 - 6 inaequalia multipartita. *Nectar.* rotundata petalis conexa. *Caps.* 1 - locularis: *apice* pervia. *Sem.* parietalia.

219. EUPHORBIA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 832. *De Neck. el. bot.* n. 1153. *Borkh. tent.* n. 85.

Cal. 1 - phyllus ventricosus inferus subpersistens. *Nectar* 4 - 8 crassiuscula calyci insidentia. *Caps.* 3 - cecca pedicellata.

DODECAGYNA.

220. SEMPERVIVUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 837. De Neck. el. b. n. 1067. Borkh. tent. n. 119.

Cal. 10 - 12 - partitus persistens. Cor. 10 - 12 - petala. Caps. 10 - 12 leguminosae polyspermae introrsum dehiscentes.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

214. ASARUM, Haselwurz.

1) *A. europaeum* foliis reniformibus obtusis binis. *Gemeine Haselw. wilder Nard.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 838. Ejusd. Enum. p. 495. Pers. syn. pl. II. p. 1. Hoffm. Germ. I. p. 214. De Vest. Man. bot. p. 758. Schkuhr. bot. Handb. t. 127. Sturm D. Flor. I. 2. Herb. Blackw. t. 383.*)

A. officinale Mönch. Method. p. 292.

Perenn. Flor. Martio — Mayo.

Hab. in nemorosis montosis ubique.

Radix repens, geniculata, filiformis, odore acri aromatico. *Caulis* brevissimus, simplex, uniflorus, bifolius, teres, villosus. *Folia* opposita, reniformia, orbicularia, coriacea, nitida, integerrima, glabra: *juniora* pubescentia. *Petioli* praelongi, teretes, villosi. *Flos* terminalis, breviter pedunculatus, trifidus, extus villosus e viridi ruber, intus atro - purpureus, germini insidens. *Stamina* conniventia, subulata. *Antherae* filamentorum medio adnatae. *Stylus* sexfidus.

215. PORTULACA, *Portulak.*

i) *P. oleracea* foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Gemeiner Port. Gartenportulak.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 859. *Ejusd.* Enum. p. 497. Pers. syn. pl. II. p. 6. Hoffm. Germ. I. p. 215. *De Vest. Man. bot.* p. 755. Schkuhr. bot. Handb. t. 130. *Herb. Blackw.* t. 287.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in hortis et agris arenosis. (In agris et oleraceis prope Abbat. Heidenfeld copiose et alibi.)

Caules plures digitales, palmares, procumbentes, ramosi, crassiusculi, teretes, succulentí, glaberrimi, plerumque rubelli. *Folia* opposita alternaque, sessilia, cuneiformia, obtusa, integerrima, glabra, nitida, succulenta, subcarniosa, laete viridia. *Flores* parvi, lutei, sessiles, solitarii et fasciculati, a hora decima ad duodecimam meridianam aperti.

Variat staminibus 6 - 8 et 15, stylisque 4 et 5.

216. LYTHRUM, Blutkraut.

1) *L. Salicaria* foliis oppositis cordato - lanceolatis, floribus verticillato - spicatis. *Gemeines Blutkr. Weidenkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 865. *Ejusd.* Enum. p. 498. *Pers.* syn. pl. II. p. 7. *Hoffm.* Germ. I. p. 215. *De Vest.* Man. bot. p. 751. *Herb.* *Blackw.* t. 520.)

Salicaria vulgaris *Moench.* Method. p. 665.

Perenn. *Flor.* Julio — Septembri.

Hab. in humidis umbrosis, ad ripas et lacus ubique.

Caulis 2 - 3 - pedalis et altior, erectus, angulosus, hirsutus, ramosus; *ramis* erectis tetragonis: *inferioribus* oppositis, *superioribus* sparsis. *Folia* opposita, sessilia, semiamplexicaulia, cordato - lanceolata, supra glabra nitida, subtus et marginibus pubescentia: *summa* alterna minora. *Flores* terminales, sessiles, verticillato - spicati, speciosi. *Calyx* truncatus: *denticulis* purpurascensibus alternis setaceis. *Petala* lanceolata, obtusa, undulata, purpurea. *Stamina* constanter 12 rubra, quorum 6 exserta.

Variat foliis ternis et quaternis.

2) *L. hyssopifolium* foliis alternis linearibus, floribus solitariis axillaribus. *Ysopblättriges Blutkr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 869. *Pers.* syn. pl. p. 8. *Hoffm.* Germ. I. c. *De Vest.* Man. bot. p. 752. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 128. *Jagc.* Austr. t. 133.)

Salicaria hyssopifolia *Mönch.* Meth. suppl. p. 281.

Ann. Flor. Jul. Augusto.

*Hab. in palustribus et inundatis arenosis
(Ad ripas Salae prope Neustadt, in palustribus ad Wolfsmünster et ad Moenum versus Karsbach perraro. Etiam juxta fossam aquaticam prope Himmels-pforten specimina aliquot legit cl. D. Braun.)*

Caulis digitalis, palmaris, basi ramosus et decumbens, teres, durus, glaber. *Folia* sessilia, linearilanceolata, obtusiuscula, glabra, integerrima, alterna: *infima* opposita. *Flores* axillares, sessiles, subsolitarii. *Calycis* denticuli alterne minores. *Petala* ovata, integra, fugacia, rubella, demum violacea. *Stamina* 6 calycem aequantia.

Variat staminibus 4 - 5.

D I G Y N I A.

217. AGRIMONIA, *Odermennig.*

I) *A. Eupatoria* foliis caulinis interrupte pinnatis: foliolis oblongo - ovatis grosse serratis, spicis elevatis. *Gemeiner Oderm. Leberklette.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 875. *Ejusd.* Enn. p. 519. Pers. syn. pl. II. p. 9. Hoffm. Germ. I. p. 216. *De Vest. Man. bot.* p. 759. Schkuhr. bot. Handb. t. 128. *Herb. Blackw.* t. 21.)

Perenn. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in pratis, ad colles, agros, ripas inque sylvaticis ubique.

Caulis 1 - 2 - pedalis et altior, erectus, simpli - ciusculus, teres, villosus. *Folia* alterna, petiolata, interrupte pinnata, sublyrata, pilosa: *foliolis* oblongo - ovatis acutis inciso - serratis, *lateralibus* minoribus

bus integris divisive, terminali majori petiolato. *Stipulae* binae, oppositae, subrotundae, amplexicaules, foliaceae, incisae. *Flores* alterni, breviter pedunculati in spicam terminalem elongatam erectam multisquam laxa.n dispositi. *Petala* lutea calyce duplo longiora. *Calyx* induratus sulcatus, setis uncinatis muricatus.

TRIGYNIA.

218. RESEDA, Harnkraut.

1) *R. Luteola* foliis lanceolatis integris planis basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Gelbliches Harnkr.* *Gelbkraut*, *Streichkraut*, *Wau*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 876. *Ejusd.* *Enum.* p. 499. *Pers.* syn. pl. II. p. 9. *Hoffm.* *Germ.* I. p. 216. *De Vest.* *Man. bot.* p. 760. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 129. *Herb. Blackw.* t. 283.)

Bienn. Flor. Majo — Julio.

Hab. ad muros, ad vias, et in ruderatis ubique.

Caulis 2 - 3 - pedalis, erectus, strictus, angulatus, glaber, ramosus: *ramis* alternis erectis virgatis. *Folia* linearis - lanceolata, obtusiuscula, sessilia, integra, saepe undulata, nitida, glabra: *radicalia* in orbem digesta basi utrinque denticulo calloso plerumque notata, *caulina* alterna et sparsa. *Spicae* terminales, erectae, multiflorae. *Pedunculi* solitarii, breves, uniflori, basi bracteolati. *Petala* pallide lutea: *supremum* tenuissime 4 - 5 - partitum, *lateralia* 2 trifida, *infima* & minima integra. *Calyces* quadrifidi.

2) *R. lutea* foliis inferioribus pinnatis, reliquis pinnatisidis trifidisque, calycibus sexfidiis. *Gelbes Harnkr. Gelber Wau.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 879. Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. p. 10. Hoffm. Germ. I. c. De Vest. Man. bot. I. c. Jacq. Austr. t. 352.*)

Bienn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in arenosis inundatis, ad margines viarum et agrorum fere ubique.

Caulis 1 - 2 - pedalis, erectus totus aut basi decumbens, diffusus, ramosus, angulatus, plus minusve hirsutus vel glaber. Folia alterna, in petiolum desinentia, glaberrima, nitida, inferiora pinnata: laciniis linearibus canaliculatis magis minusve undulatis, superiora pinnatifida, plerumque trifida. Spicae terminales, erectae, laxae, multiflorae, quam in antecedente breviores. Pedunculi longiores, solitarii, alterni. Petala 6 inaequalia, pallide sulphurea. Calyces sexfidi.

219. EUPHORBIA, *Wolfsmilch.*

Umbella trifida.

1) *E. Peplus umbella trifida dichotoma, involucellis ovatis, foliis obovatis petiolatis integerrimis. Rundblättrige Wolfsm. Garten - Wolfsm.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 903. Ejusd. Enum. p. 503. Pers. syn. pl. II. p. 14. Hoffm. Germ. I. p. 216. De Vest. Man. bot. p. 762. Schkuhr. bot. Handb. t. 129.*)

Tithymalus Peplus Mönch. Meth. p. 667.

Aun. Flor. Julio — Septembri.

-

Ha b.

Hab. in hortis, agris, vineis, oleraceis et ad sepes ubique.

Caulis palmaris, pedalis, erectus, teres, glaber, superne trifidus: *ramis* dichotomis. *Folia* laete viridia, alterna, in petiolum brevem decurrentia, obovata, obtusa, integra, glabra. *Involucra* atque *involucella* ovata, integerrima. *Flores* solitarii, sessiles, exigui. *Petala* viridiuscula, bicornia. *Capsulae* glabrae, tricarinatae. *Semina* ovata, nitida, reticulata.

2) *E. exigua* umbella trifida dichotoma, involucellis ovato - lanceolatis, foliis linearibus. *Kleine Wolfsm. Steinmilch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. p. 15. *Hoffm.* Germ. p. 217. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Tithymal. exiguus Moench. Method. l. c.

Ann. Flor. Julio — Septembri.

Hab. in vineis et inter segetes fere ubique.

Caulis 2 - 3 - uncialis, digitalis, erectus, teres, glaber, basi ramosus. *Folia* sessilia, alterna, sparsa, linearia, acuta, integerrima, adpressa. *Umbella* plurimque trifida, etiam 2 - 4 - 5 - fida: *ramis* dichotomis. *Involucra* et *involucella* ovato - lanceolata, basi inaequalia. *Flores* exigui, sessiles. *Petala* 4 lunata, bicornia, flava. *Capsulae* laeves. *Semina* quadrangula, corrugata.

Umbella quinquesfida.

3) *E. verrucosa* umbella quinquefida bifida, involucellis ovatis serrulatis, foliis lanceolatis obtusis villosis, capsulis verrucosis. *Warzige Wolfsm.*

(*L.*)

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 915. Pers. syn. pl. p. 17.
Hoffm. Germ. p. 218. De Vest. Man. bot. p. 764.*)
Bienn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in arenosis, aridis. (In aridis prope Zell, dem rothen Kreutze, Rimpar, Ochsensurth, in monte St. Viti prope Neuſtadt ad Saalam alibique rarissime.)

Caules plures, palmates, pedales, erectiusculi, simplices, teretes, glabriusculi, inferne plerumque fusco - rubelli. *Folia* alterna, sessilia, subovato-lanceolata, plana, subvillosa, serrulata, patentia, ex flavescente viridia: *inferiora* plerumque reflexa. *Umbella* 5 - fida: *ramis* sub - 3 - fidis bifidisque. *Involucrum* e foliolis 5 ellipticis obtusiusculis margine serrulatis. *Involucella* triphylla, diphylla: *foliolis* ovatis denticulatis ex viridi lutescentibus. *Petala* 4 rotunda, integra, lutca. *Capsulae* verrucosae, hispidae.

Variat *caulibus* totis decumbentibus *sclavisque* glabris.

4) *E. helioscopia* umbella quinquefida trifida dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis, capsulis glabris. *Sonnenwendige Wolfsm. Hundsmilch.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 914. Ejusd. Enum. p. 595.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 219. De Vest.
Man. bot. l. c.*)

Tithymalus helioscopius Scopol. Carn. I. p. 337. Monch. Method. p. 566.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in cultis ubiunque.

Cau-

Caules plures, palmares, pedales, raro altiores, erecti, teretes, glabri, subpubescentes, simplices, aut basi ramosi. *Folia* sparsa, breviter petiolata, obovata, obtusa, apicem versus serrulata, glabra, laete viridia. *Umbella* quinquefida: *ramulis* trifidis et dichotomis. *Involucrum* 5 - phyllum, *involucellum* 2 - 3 - phyllum: *foliolis* foliis similibus. *Petula* 4 subrotunda, integra, glabra, viridia. *Capsula* subrotunda, laevis, glabra,

5) *E. platyphyllos* umbella quinquefida trifida dichotoma, involucris carina pilosis, foliis lanceolatis serratis, capsulis verrucosis. *Breitblättrige Wolfsm.*

(L. sp. pl. ed *Willd* p. 918. *Ejusd. Enum.* l. c. *Pers.* syn. pl. p. 18. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 765. *Jacq.* Austr. t. 376.)

Tithym. platyphyllos *Scopol.* Carniol. I. p. 337. *Moench.* Method. l. c.

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. ad margines agrorum inque cultis fere ubique,

Caulis palmaris, pedalis et major, erectus, teres, glaber, superne valde ramosus, inferne plerumque purpurascens. *Folia* alterna, sessilia, lanceolata, acuta, supra glabra, subtus villosiuscula, glauca, e medio ad apicem serrulata, patentia: *infima* breviter petiolata obovata obtusa cauli appressa caduca. *Umbella* plerumque 5 - fida, interdum 4 - et 3 - fida: *radiis* 3 - fidis, *ramulis* dichotomis. *Rami* infra umbellam axillares saepe plures per caulem sparsi *umbella* 3 - fida terminati. *Involucrum* secundum radiorum numerum plerumque 5 - aut 4 - phyllum: *foliolis* lanceolatis deflexis carina pilosis tenuissime serrulatis.

ta. *Involucella* 3 - aut 2 - phylla: *soliolis* cordato - oblongis lutescentibus subserrulatis. *Stamina* plura sterilia. *Petala* suborbiculata, integra, lutea. *Capsula* subrotunda, tuberculato - scabra.

6) *E. sylvatica* umbella quinquefida dichotoma, involucellis reniformi - cordatis perfoliatis, foliis lanceolatis integerrimis subtus pubescentibus. *Wald-Wolffsm.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 924. Pers. syn. pl. p. 18. Hoffm. Germ. l. c. Jacq. Austr. t. 375.)

Tithym. sylvaticus Scopol. Carniol. I. p. 333. Perenn. *Flor. Junio*. — *Augusto*.

Hab. in sylvis ubique.

Caulis 1 - 2 - pedalis, erectus, teres, glaber, basi ramosus et rubellus. *Folia* alterna, in petiolum brevissimum decurrentia, lanceolata, integerrima, supra glabra, subtus pubescentia: *superiora* sensim minora. *Umbella* 5 - fida: *radiis* dichotomis. *Involucrum* 5 - phyllum: *soliolis* subrotundo - ovatis obtusis integerrimis. *Involucella* reniformi - cordata, connata, perfoliata. *Petala* semilunaria, cornubus conniventibus acuta, lutea, basin versus villosa. *Rami* floriferi infra umbellam alterni, axillares. *Capsula* laevis.

Umbella multifida.

7) *E. Esula* umbella multifida bifida, involucellis subcordatis, petalis bicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus linearibus, *Gemeine Wolffsm. Eselsmilch.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 919. *Ejusd. Enum* l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest. Man.*

Man. bot. p. 765. *Herb.* Blackw. t. 163. *Spreng.*
Hal. t. 3.)

Tithym. Esula Scopol. Carniol. I. p. 338. *Mönch.*
Method. p. 668.

Perenn. *Flor.* Jun. Julio.

*Hab. in versuris, ad ripas, vias et muros
 ubique.*

Caules plures, palmares, pedales et maiores, erecti toti, aut basi tantum incurvi, teretes, glabri, ramosi: *ramis* pluribus sterilibus. *Folia* sparsa, conferta, subsessilia, linearis - lanceolata, uninervia, glabra, integerrima, glauco - viridia, *omnia* uniformia, patentissima aut deflexa. *Umbella* multifida: *radiis* plerumque 6 - 8 - 12 dichotomis. *Involucra* foliis similia. *Involucella* cordato - subrotunda, acuminate, integerrima, glabra. *Petala* lunaña, bicornia, lutea. *Capsula* glabra, trigona.

8) *E. Gerardiana* umbella multifida dichotoma, involucellis subrotundis, petalis integerrimis, foliis linearis - lanceolatis mucronatis: superioribus latioribus. *Gerardische Wolfsm.*

(*L.* sp. pl. ed. Willd. p. 920. *Pers.* syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 220. *De Vest.* Man. bot. l. c. Jacq. Austr. t. 436. *Spreng.* Hal. t. III. f. 1.)

Tithym. cajogalus Moench. Meth. p. 667.

E. Cajogala Ehrh. Beitr. II. p. 102.

Perenn. *Flor.* Jun. Julio.

Hab. in versuris, ruderatis, ad vias, muros et ripas passim frequens.

Caules plures conferti, palmares, pedales et altiores, erecti, teretes, glabri, simplices. *Folia* alterna,

na, sessilia, fere imbricata, linearis - lanceolata, obtusiuscula, mucronata, integerrima, glabra, a basi usque ad medium trinervia, glauco - viridia: *inferiora* breviora ac angustiora. *Umbella* multiradiata: *radiis* erectis dichotomis. *Involucrum* polyphyllum: *foliolis* lato - lanceolatis integris glabris mucronulatis primo patentibus, demum reflexis. *Involucella* diphylla: *foliolis* ovato - cordatis mucronatis glabris integris supra ex viridi luteis. *Petala* 4 subrotunda, obtusa, integræ, fulva. *Capsula* subrotunda, obtuse trigona, glabra.

9) E. *Cyparissias* umbella multifida dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis; caulinis lanceolatis. *Zypressenartige Wolfsmilch, Teufelsmilch.*

(L. sp. pl. ed Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man bot. p. 766. Jacq. Austr. t. 435.)

Tithym. Cyparissias Scopol. Carniol. I. p. 339. Mönch. Method. p. 668.

Perenn. *Flor. Maj. Junio.*

Hab. in pascuis, in sylvaticis, ad colles et vias ubique.

Caulis palmaris, pedalis et major, erectus, teres, glaber: *ramis* sparsis foliosis sterilibus. *Folia* alterna, sessilia, linearis - lanceolata, obtusiuscula, integerrima, glabra, margine plerumque reflexa: *ramea* sparsa, conferta, breviora, angustissima, fere setacea. *Umbella* multiradiata: *radiis* dichotomis. *Rami* umbellae subjecti dichotomi. *Involucrum* polyphyllum: *foliolis* linearibus obtusiusculis subreflexis glabris inaequalibus. *Involucella* biphylla: *foliis* cordato -

to - reniformibus integerrimis glabris ex viridi flavi-cantibus, intus demum rubellis. *Petala* 4 *integra*, *lunata*, *bicornia*, *glabra*, *lutea*. *Capsula* subrotun-da punctis elevatis verruculosa.

Euphorbia degener umbella nulla, *soliis alter-nis obtusis punctis croceis*, *quae Aecidium Euphor-biae sunt*, est morbosa hujus varietas.

D O D E C A G Y N I A.

220. S E M P E R V I V U M, *Hauswurz*.

I) *S. tectorum* foliis ciliatis, propaginibus pa-tentibus. *Gemeine Hausw.* *Donnerkraut*.

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 932. Ejusd. Enum. p. 507. Pers. syn. pl. II. p. 20. Hoffm. Germ. I. p. 221. De Vest. Man. bot. p. 307. Herb. Blackw. t. 366. Knorr. thesaur. II. t. S. 4.*)

Sedum tectorum *Scopol.* *Carniol.* I. p. 325.

Perenn. *Flor.* *Jul.* *Augusto*.

Hab. in mūris et tectis ubique.

Caulis *pedalis et altior*, *erectus, teres, pube-scens, succulentus, squamis foliaceis imbricatis ve-stitus, superne ramosus: ramis patentibus squamosis plerumque rubellis.* *Folia* *radicalia, sessilia, obo-vata, acuta, carinata, glabra, valde carnosa, crassa, succulenta.* *Propagines* *funiculis cauli adhaerentes e foliis multis imbricatis in rosulari congestis: primo conniventibus, demum patentibus.* *Flores* *solitarii, subsessiles, secundi, purpurei, extus villosi in ran-cenos terminales patentes apice incurvos digesti.*

Numerus partium omnium admodum variabilis.

. 2) *S. globiferum* foliis ciliatis, propaginibus globosis. *Kugeltragende Hausw. kleine Hauswurz.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Vest. Man. bot. l. c. Jacq. Austr. app. t. 40.*)

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in tectis, in muris. (In muris circa Gellersheim, Haltenbergstetten alibique rarius.)

Differt a praecedente: *caulibus brevioribus, propaginibus copiosioribus minoribus globosis decidentibus: foliis* dense imbricatis. *Petala flava, subciliata 6 - 12 - 18, et tot pistilla.*

Propagines juniores adultioribus multo minores et perfectè globosae, *adultiores* patulae.

C L A S S I S XII.

I C O S A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

221. P H I L A D E L P H U S.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 840. De Neck. el. b. n. 732. Borkh. tent. n. 615.

Cal.

Cal. 4 - partitus superus persistens. *Petala* 4 subrotunda plana. *Stylus* 4 - fidus. *Caps.* ovatâ 4 - locularis polysperma.

222. AMYGDALUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 848. De Neck. el. bot. n. 717. (Amygdalophora) Borkh. tent. n. 623.

Cal. 5 - fidus inferus. *Cor.* 5 - petala. *Drupa* exsucca coriacea: *nuce* poris perforata.

223. PRUNUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 849. De Neck. el. bot. n. 719. (Prunophora) Borkh. tent. n. 622.

Cal. campanulatus 5 - fidus inferus deciduus. *Cor.* 5 - petala. *Drupa* nux suturis prominulis.

DIGYNIA.

224. CRATAEGUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 854. De Neck. el. bot. n. 725.

Cal. 5 - fidus persistens. *Cor.* 5 - petala. *Drupa* infera 2 - sperma farinosa calyce persistente corona-
ta: *nucleis* hinc convexis, inde planiusculis. (*Stylus* interdum 1.)

TRIGYNIA.

225. SORBUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 855. De Neck. el. bot. n. 726.

Cal.

Cal. 5 - fidus persistens fructum coronans. *Cor.* 5 - petala. *Pomum* 3 - loculare: loculis 1 - spermis.

PENTAGYNTA.

226. MESPILUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 857. De Neck. el. bot. n. 724. (Mespilophora.) Borkh. tent. n. 610.

Cal. 5 - fidus persistens. *Cor.* 5 - petala. *Drupa* infera 3 - 5 - sperma. *Sem.* ossea.

227. PYRUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 858. De Neck. el. bot. n. 721. (Pyrophorum) Borkh. tent. n. 613.

Cal. 5 - fidus superus persistens fructum coronans. *Cor.* 5 - petala. *Pomum* inferum carnosum magnum 5 - loculare polyspermum.

228. SPIRAEA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 862. De Neck. el. bot. n. 748. Borkh. tent. n. 628.

Cal. patens inferus 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Caps.* plures congestae 2 - valves polyspermae.

POLYGYNIA.

229. ROSA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 863. De Neck. el. bot. n. 754. (Rhodophora) Borkh. tent. n. 621.

Cal. 5 - fidus urceolatus, demum baccatus polyspermus. *Cor.* 5 - petala. *Sem.* plurima hispida interiori lateri calycis affixa.

230. RUBUS.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 864. *De Neck. el.*
bot. n. 751. *Borkh. tent. n.* 620.

Cal. 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Bacca* supera deci-
 dua composita acinis pluribus 1 - spermis.

231. FRAGARIA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 865. *De Neck.*
el. b. n. 755. *Borkh. tent. n.* 601.

Cal. 10 - fidus: *laciniis* alternis angustioribus.
Cor. 5 - petala. *Sem.* nuda receptaculo succulento
 pulposo deciduo immersa.

232. POTENTILLA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 866. *De Neck.*
el. bot. n. 756. *Borkh. tent. n.* 602.

Cal. 10 - fidus: *laciniis* alternis minoribus reflexis.
Cor. 5 - petala. *Sem.* plurima nuda mutica recepta-
 culo parvo exsucce sessili affixa.

233. TORMENTILLA.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 691. *De Neck. el.*
bot. n. 758. *Borkh. tent. n.* 599.

Cal. 8 - fidus: *laciniis* alternis minoribus. *Cor.* 4 -
 petala. *Sem.* plurima subrotunda nuda rugosa recep-
 taculo parvo exsucce affixa.

234. GEUM.

Linn. *Gen. pl. ed.* *Schreb.* n. 867. *De Neck. el.*
bot. n. 761. *Borkh. tent. n.* 604.

Cal. 10 - fidus: *lacinias* alternis minimis acutis.
Cor. 5 - petala. *Sem.* caudata receptaculo peduncula-
 to affixa.

235. COMARUM.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 869. De Neck. el.
 b. n. 759. Borkh. tent. n. 603.*

Cal. 10 - fidus coloratus: *lacinias* alternis minori-
 bus. *Petala* 5 calyce minora. *Sem.* nuda laevia re-
 ceptaculo ovato spongioso persistenti adfixa.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

221. PHILADELPHUS, *Pfeifenstrauch*.

1) *Ph. coronarius* foliis oppositis ovato - ob-
 longis subdentatis. *Wohlriechender Pfeifenstr.* *Flö-
 tenstrauch*, *wilder Jasmin*.

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 947. Ejusd. Enum.
 p. 511. Pers. syn. pl. II. p. 24. Hoffm. Germ. I.
 p. 222. De Vest. Man. bot. p. 748. Schkuhr. bot.
 Handb. t. 131. Sturm D. Flor. I. 3. Schmidt.
 Baumz. t. 59.*)

Sy-

Syringa suaveolens Moench. Method. p. 678.
Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in hortis et ad sepes passim quasi sponte.

Frutex 6 - 9 - pedalis, erectus, ramosissimus: ramis oppositis. Folia opposita, breviter petiolata, ovato - oblonga, acuminata, dentata, glabra. Flores racemosi, speciosi, albi: odore fragrantissimo gratisimoque. Racemi terminales, erecti, 4 - 6 - flori: Stylus sub florescentia quadrisidus, demum ad basin quadripartitus.

Flos primarius plerumque quinquefidus.

222. AMYGDALUS, Mandelbaum.

I) *A. communis* foliorum serraturis insimis glandulosis, floribus sessilibus geminis, patalis calyce majoribus. *Gemeiner Mandelb.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 982. *Ejusd.* Enum. p. 516. Pers. syn. pl. II. p. 34. *De Vest.* Man. bot. p. 749. *Herb.* Blackw. t. 105. Knorr. thesaur. t. M. 1. *Majer.* Pomon. francon. I. t. 3 - 4.)

Arbor. Flor. April. Mayo ante foliorum eruptionem.

Hab. in hortis et vineis.

Arbor mediocris: ramis multis patentibus. Folia sparsa, breviter petiolata, ovato - lanceolata, acuminata, utrinque glabra, serrata: *serraturis insimis et petiolis* glandulosis. *Flores* speciosi, carnei, sub-sessiles, plerumque gemini.

Var. nucleorum epidermide amara. (*Amygdalae amaras*).

2) *A. fragilis* petalis calycem subaequantibus.
Krachmandel.

(*G. M. Sch.* Flor. der Wetter. II. p. 161.)

Amygd. commun. β. *Linn.* *Majer.* *Pom.* *francon.*
I. t. V.

Arbor. Flor. Mayo ante foliorum exortum.

Hab. in iisdem locis.

A praecedente *petalis* calyce vix longioribus, *nucibusque* fragilibus constanter differt.

223. PRUNUS, *Pflaumenbaum.*

1) *P. Padus* florum racemis pendulis, *petalis* serrulatis, foliis deciduis duplicato - serratis: petiolis biglandulosis, fructibus globosis. *Vogelpflaume,* *Traubenkirsche,* *Ahlbeere.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II p. 984. *Ejusd.* Enum. p. 517. *Pers.* syn. pl. II. p. 34. *Hoffm.* Germ. I. p. 222. *Ds Vest.* Man. bot. p. 749. *Kerner* IV. t. 31.)

Padus avium *Moench.* Meth. p. 671. *G. M. Sch.* Flor. d. Wetter. II. p. 178.

Frutex s. Arbor. Flor. Mayo.

Hab. in sylvis et ad sepes passim.

Frutex 6 - 9 pedalis, erectus, ad arboris magnitudinem saepe accedens: *cortice* e bruno - cinereo tuberculis albidis obsesso. *Rami* alterni, erecti, terebrates, laeves. *Folia* alterna, petiolata, ovato - lanceolata, serrata, glabra, annua, laete viridia, inferne ad venas et costam barbata, basi glandulis 2 aut 3 - 4 instructa. *Stipulae* lanceolatae, parvae, deciduae. *Flores* parvi, odorati; *petalis* albis denticulatis ca-

calyci insertis, racemosi. Racemi terminales, laxi, multiflori, simplices nutantes: pedicellis numerosis unifloris. Drupae globosae, nigrae, succulentae, pauseosae, pisi magnitudine.

2) *P. Armeniaca* floribus sessilibus, foliis subcordatis. *Aprikosenpflaume, Aprikosenbaum.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 989. Ejusd. Enum p. 518
De Vest. Man. bot. p. 750. *Herb. Blackw.* t. 281
Majer Pom. franc. I. t. 1 - 8. *Kerner* t. 201.)

Armeniaca epirotica G. M. Sch. *Flor d. Wetter.* II p. 167.

A. vulgaris Pers. syn. pl. II. p. 36.

Arbor. Flor. Mart. *April ante foliorum eruptionem.*

Hab. in Asia. (*Colitur in hortis inque vineis cum pluribus variationibus.*)

Arbor mediocris, s. frutex ramis multis divaricatis, junioribus purpurascensibus. *Folia* longe petiolata, subcordata, acuminata, glabra, tenuiter serrato-dentata: vernantia convoluta. *Flores* speciosi, albi s. incarnati, sessiles, laterales, solitarii s. fasciculati.

3) *P. Cerasus* umbellis subsessilibus, foliis ova-to-lanceolatis glabris conduplicatis, fructibus globosis. *Saure Pflaume, Weichselbaum.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 991. Ejusd. Enum. l. c.
Pers. syn. pl. p. 34. *Hoffm. Germ.* p. 223. *De Vest.*
Man. bot. l. c. *Majer Pomon, franc.* T. II. *Herb.*
Blackw. t. 449)

Cerasus vulgaris Moench. *Meth.* p. 672.

C. acida G. M. Sch. *Fl. d. Wetter.* II. p. 185.

Arbor. Flor. April. Mayo.

Hab.

Hab. ad sepes, in vineis, in agris inque hortis cum pluribus variationibus

Arbor mediocris s. frutex: ramis nutantibus. Folia ovato - lanceolata, acuminata, serrato - dentata, glabra: juniora conduplicata. Petioli eglandulosi. Stipulae dentatae, glandulosae. Bracteae serratae, trifidae: intermedia foliacea. Petala alba. Fructus globosi, nigri s. rubri, acidi, aut subdulces.

4) *P. avium* umbellis sessilibus, foliis ovato - lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis: basi biglandulosis, fructibus globosis. *Süße Pflaume, Kirschbaum.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 35. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Majer Pom. franc. T. II. Kerner t. 30. Herb. Blackw. t. 425.*)

Cerasus avium Mönch. Method. p. 672.

C. dulcis G. M. Sch. Fl. d. Wetter. II. p. 181.

Arbor. Flor. April. Mayo.

Hab. in sylvaticis, ad pagos, ad sepes et colitur cum pluribus variationibus in agris, hortis et vineis.

Arbor saepe praealtus: ramis verticillatis strictis erectis. Folia ovata, acuminata, inaequaliter serrata, glabra, subtus laeviter pubescentia: primo conduplicata. Petioli apice biglandulosi. Umbellae perfecte sessiles, 3 - 4 - florae, saepius multiflorae. Petala alba. Fructus sanquineo - rubri, albido - rubelli vel nigricantes.

5) *P. domestica* pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato - ovatis crenatis, ramis muticis, fructibus ellipticis. *Gemeiner Pflaumenbaum, Zwetschge.*

(*L.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 995. *Ejusd.* Enum. p. 519.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c. *Herb. Blackw.* t. 281. *Knorr.* thes.
 I. t. P. 2. *Majer.* Pom. franc. T. I.)

Arbor. Flor. April. Majo.

*Hab. ad pagos, in vineis, agris et hortis
 ubique.*

Arbor mediocris: ramis multis divaricatis inermibus, aut passim spinosis. Folia breviter petiolata, lanceolato - ovata, serrata, glabra: juniora subtus pubescentia et convoluta. Pedunculi breves, uniflori, plerumque solitarii. Petala alba, obovata Calycis laciniae denticulatae, extus hirsutae. Fructus ellipticus, coeruleus rore glauco.

Innumerae hujus in hortis nostris existunt varietates fructuum magnitudine, figura, sapore, colore atque maturationis tempore invicem diversissimae.

6) *P. insititiu* pedunculis geminis, foliis lanceolato - ovatis subtus villosis, ramis spinescentibus, fructibus subrotundis. *Kriechenpflaume, Haaser-schleen.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 996. *Ejusd.* Enum l. c.
Pers. syn. pl. p. 35. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c. *Kern.* IV. t. 29. *Herb. Blackw.* t. 305.)

Frutex. Flor. Martio Aprili.

Hab. ad sepes, inter fruticeta, ad pagos inque nemorosis passim.

Frutex validus ad arboris magnitudinem saepe accedens; ramis alternis, spina simplici plerumque terminatis. Folia alterna, petiolata, ovata, basi attenuata-

nuata, subconvoluta, serrata, supra glabra, subtus villosa. Flores albi, terminales: *pedunculis* geminis et solitariis. *Fructus* subrotundus, magnitudine *Pruni avium*, ex nigro coeruleus rore glauco.

7) *P. spinosa* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis, fructibus subrotundis. *Schleenpflaume*, *Schleendorn*, *Schwarzdorn*.

(L. sp. pl. ed. *Wtld.* p. 997. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 751. *Schkahr.* bot. Handb. t. 132. Sturm D. Flor. I. 9. *Herb. Blackw.* t. 494.)

Frutex. Flor. April. Majo ante folia enata.

Hab. ad sepes ubique abunde.

Ab antecedente differt: *statura minori*, *ramis copiosioribus* magis *divaricatis* undique *spinis* validis *floriferis* obsessis, *foliis lanceolatis* s. *elliptico-lanceolatis* glabris, *pedunculis* terminalibus et lateralibus *soltariis* sparsis, *fructuque* duplo minore, maturo etiam maxime austero.

D I G Y N I A.

224. CRATAEGUS, *Weißdorn.*

1) *C. Oxyacantha* spinosa, foliis obtusis subtrifidis serratis glabris, floribus corymbosis digynis, pedunculis calycibusque glabriusculis, laciniis calycinis lanceolatis acutis. *Gemeiner Weißd.* *Hagedorn.*

(L. sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1005. Pers. syn. pl. II. p. 38. Hoffm. Germ. I. p. 224. *De Vest.* Man. bot. p. 758. *Schkahr.* bot. Handb. t. 132. Kerner VI. t. 43. *Jacq. Austr.* t. 292. f. 2. *Herb. Blackw.* t. 149. *Knorr. thesaur.* I. t. H. 4.)

Me-

Mespilus Oxyacantha Scopol. Carn. I. p. 344.
Mönch. Meth. p. 684. *Smith.* Britan. Vol. II. p. 529.
Ehrh. Beitr. B. 7. p. 134. *Willd.* Enum. p. 524.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad sepes et in dumetis ubique.

Frutex ad arboris altitudinem nonnunquam accedens: *ramis* alternis glabris rigidis aculeatis. *Lignum* albidum, durum. *Folia* alterna, petiolata, subrhomboidia, glabra, laete viridia, subtriloba: *lobis* obtusis incisis, *medio* trifido. *Flores* pedunculati, terminales, corymbosi odoris peculiari suburinosi. *Calyx* patentissimus. *Petala* 5 subrotunda, patentia, alba. *Stigmata* capitata. *Baccæ* elliptico - subrotundae, glabrae, rubrae, pulpa lutea farinosa.

Variat stylis 3 et 5, floribus plenis et roseis.

2) *C. monogyna* spinosa, foliis acutis subtrifidis serratis glabris, floribus corymbosis monogynis, pedunculis calycibusque pubescentibus, laciniis calycinis lanceolatis acuminatis. *Einweibiger Weißdorn,* *scharfblättriger Hagedorn.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1006. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Jacq.* Austr. t. 292. f. 1.)

Mespilus monogyna *Ehrh.* Beitr. B. 7. p. 133. *Spreng.* Hal. p. 143. *Willd.* Enum. l. c.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. cum priori.

Differt a praecedente: *ramis* procerioribus, *foliis* supra magis splendentibus in *lobos* 3 aut 5 profundiores acutiores et angustiores plerumque integerrimos aut superne dentato - serratos divisis: *pedunculis* ramo-

mosis *calycibusque plerumque pubescentibus, laciniis calycinis lanceolatis acuminatis et floribus monogynis.*

Var. *stylis 2 et foliis pinnatifidis.*

3) *C. torminalis* inermis, foliis simplicibus subcordatis inaequaliter septemlobis subtus pubescens: lobis infimis divaricatis. *Elzbeer - Weißdorn, Darmbeerbatum.*

(*De Vest.* Man. bot. p. 759. *Roth.* Germ. I. p. 213. II. p. 543. *Wibel.* Werth. p. 254. *Jacq.* Austr. t. 443.)

Pyrus torminalis L. sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1021. *Ejusd.* Enum. p. 527. *Hoffm.* Germ. I. p. 227. *Smith.* Britan. Vol II. p. 532. *Spreng.* Hal. p. 144. *Ehrh.* Beitr. B. 6. p. 92. *Mönch.* Meth. p. 681.

Sorbus torminalis Pers. syn. pl. II. p. 38.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis et nemoribus. (In sylvis *Gramschatz* et *Guttenberg*. In saltu *kitzingensi*. In nemorosis des *Steigerwaldes* versus *Falkenstein* et circa *Abbat. Heidenfeld*. Im *Huck* prope *Wipsfeld*. In sylvaticis prope *Uettingen*, *Wolfsmünster*, *Sachsenheim*, *Wülfershausen*, *Büchold*, *Prosselsheim*, *Mühlhausen*, *Stetten ad Werram*, am *Klaushügel* prope *Klosterhausen* alibique.)

Frutex aut *arbor mediocris*: *cortice laevi rubro albo maculato*. *Rami alterni*, *erectiusculi*, *glabri*, *inermes*. *Lignum perdurum*, *album*, *intus fuscescens*. *Folia alterna*, *longius petiolata*, *cordato - ovata*, *subrotunda*, *duriuscula*, *supra glabra*, *subtus pubescentia*, *septemlobata*: *lobis inaequalibus acutis serratis erectis*, *infimis 2 divergentibus*. *Petioli tomentosi*. *Corymbi terminales et axillares*, *ramosi*,

am-

ampli, multiflori: *pedunculis* tomentosis. *Calyces* patentes, acuti, lanati, albi. *Petala* subrotunda, calyce multo majora, alba. *Baccae* ellipticae, obtusae, maturitate fuscae, punctis albis notatae, pulposae, gratae acescentes.

Var. *stylis* 3 et 4.

TRIGYNIA.

225. SORBUS, Eberesche.

I) *S. Aucuparia* foliolis serratis utrinque glabris, floribus trigynis, fructibus magnitudine floris. *Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1008. Ejusd. Enum. p. 520. Pers. syn. pl. II. p. 38. Hoffm. Germ. I. p. 224. De Vest. Man. bot. p. 769. Schkuhr. bot. Handb. t. 133. Herb. Blackw. t. 173. Kern. 3. t. 21.*)

Pyrus aucuparia Smith. Britan. Vol. II. p. 533. Moench. Meth. p. 681. Ehrh. Beitr. B. 6. p. 94.

Mespilus aucuparia Scopol. Carniol. I. p. 346.

Arbor. Flor. Maj. Junio.

Hab. in sylvis, in dumetis, ad sepes et pagos ubique.

Arbor formosa variae altitudinis, *trunko recto cortice* cinereo obducto, *ramisque* multis longis alternis. *Lignum* perdurum, tenax, albidum. *Folia* alterna, petiolata, impari-pinnata: *foliolis* oppositis sessilibus lanceolatis acuminatis profunde et acute serratis, *junioribus* subtus pubescentibus, *impari* majore pedicellato. *Corymbi* terminales, pubescentes, ramosissimi, ampli, convexi, multiflori. *Flores* albi, odorati.

Bac-

Baccae globosae, nitidae, coccineae, succulentae, acidae, amaricantes.

Variat stylis 2 - 4 et 5.

2) *S. domestica* foliolis antice serratis subtus villosis, floribus pentagynis, fructibus flore multo majoribus. *Zahme Eberesche, Spierlingbaum, Speierling.*

(L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 1009. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 39. *Hoffm.* Germ. p. 225. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Jacq.* Austr. t. 447. *Herb.* *Blackw.* t. 174.)

Pyrus domestica *Smith.* Britan. Vol. II. p. 532. *Mönch.* Meth. l. c. *Ehrh.* Beitr. B. 6. p. 95.

Arbor. Flor. Majo.

Hab. ad vias, ad pagos inque hortis.

Arbor saepe procera *ramis* alternis, *cortice* rimoso e cinereo fusco. *Folia* alterna, impari - pinnata; *foliolis* oblongis acutis a medio ad apicem serratis subtus villosis, demum denudatis. *Flores* odori, albi, terminales, racemoso - paniculati: *pedunculis* tomentosis. *Fructus*, quam in praecedente multo major, pyriformis aut subrotundus, glaber, ex viridi - flavo - rubro varius, demum pulposus edulis.

Arbor tardissime crescens et post annum plerumque sexagesimum primum fructifera.

PENTAGYNIA.

226. MESPILOUS, *Mispel.*

1) *M. Cotoneaster* foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis. *Quitten - Mispel.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1012. *Ejusd.* Enum. p. 522. *Pers.* syn. pl. II. p. 39. *Hoffm.* Germ. I. p. 225. *De Vest.* Man. bot. p. 773. *Schmidt.* Baumz. t. 89.)

Pyrus cotoneaster *Mönch.* Meth. p. 681.

Frutex. Flor. April. Majo.

Hab. in montosis, ruderatis. (Copiose ad montem *Kalbenstein* prope *Karlstadt* et inter vineas ibidem. Inter ruinas arcis *Karlsburg* alibique rarius.)

Frutex 3 - 4 - 6 - *pedalis*, *erectus*, *ramosissimus*, *cortice cinereo glaberrimo*, *ramis alternis divergentibus*. *Folia alterna*, *breviter petiolata*, *ovata*, *acutiuscula*, *integerrima*, *supra glabra*, *laete viridia*; *subtus albo - tomentosa*. *Pedunculi laterales terminalesque*, *breves*, *pubescentes*, *subnutantes*, *ramosi*, 3 - 4 - *flori*, *rarius simplices uniflori*. *Flores parvi*: *petalis subrotundis albidis aut roseis*. *Baccae suborbiculatae*, *glaberrimae*, *rubrae*, *pulposae*, *subaustrae*, 3 - *rarius 5 - spermae*.

Variat saepissime *stylis* 3, etiam 4.

227. PYRUS, Birnbaum.

1) *P. communis* foliis ovatis serratis utrinque glabris, floribus corymbosis, fructibus basi productis. *Gemeiner Birnb.* *Holzbirne*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1016. *Ejusd.* Enum. p. 526. *Pers.* syn. pl. II. p. 40. *Hoffm.* Germ. I. p. 226. *De Vest.* Man. bot. p. 774. *Kern.* III. t. 31. *Herb. Blackw.* t. 453).

Arbor. Flor. April. Majo.

Hab. in sylvis, agris, ad vias et pagos nubicunque.

Arbor saepe excelsa, longaeva, *cortice* griseo demum rimoso, *ramis* erectis plerumque spinescentibus: *ramulis* dependentibus. *Lignum* compactum, durum, ex rubro luteum. *Folia* alterna, petiolata, elliptica, serrata, glabra, nitida, pendula: *juniora* villosiuscula. *Flores* speciosi, nivei, terminales, corymbosi: *pedunculis* villosis congestis elongatis. *Fructus* obverse conicus aut ovato - subrotundus, basi productus, durus, valde acerbus, maturitate emollitus flavescens.

Innumerae hujus in hortis nostris atque vineis colluntur variationes figura, magnitudine, colore, sapore et tempore maturationis fructuum distinctissimae. (Vid. Majer. Pomon. francon. Tom. III.)

2). *P. Malus* foliis ovatis serratis subtus subtomentosis, umbellis sessilibus, fructibus basi umbilicatis. *Apfelbirne*, *gemeiner Apfelbaum*, *Holzapfel*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1017. Ejusd. Enum l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vesi. Man. bot. l. c. Kern. III. t. 23. Schkuhr. bot. Handb. t. 134. Herb. Blackw. t. 141 et 178.)

Malus sylvestris Moench. Meth. p. 682.

Arbor. Flor. April. Majo.

Hab. cum priori.

Frutex plerumque *arbor*: *cortice* cinereo, in annosioribus e cinereo - nigricante, rimoso. *Rami* alterni *ramulique* tortuosi magis quam in praecedente horizontales. *Folia* petiolata, alterna aut fasciculata, ovata, acuminata, serrata, glabra: *juniora* præcipue subtus pubescentia. *Pedunculi* umbellato - congesti, brevissimi, uniflori, villosi. *Flores* odorati, speciosi. *Petala* alba, extus rubello mixta. *Fructus* sub-

subrotundus, basi excavatus, carnosus, succulentus, acidus.

Fructus ratione magnitudinis, figurae, coloris, saporis et maturationis temporis in hortis nostris admodum variant. (*Vid. Majer. Pomon. Tom III.*)

3) *P. Cydonia* foliis integerrimis, floribus solitariis. *Quittenbirne, Küttenbaum.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1020. Hoffm. Germ. p. 226. De Vest. Man. bot l. c. Jacq. Austr. t. 342. Herb. Blackw. t. 137. Knorr. thesaur. I. t. Q.*)

Cydonia cydonia Pers. syn. pl. II. p. 40.

C. vulgaris Willd. Enum. p. 528.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. prope urbem Cydon in Insula Creta et apud nos ad sepes hinc inde quasi sponte. (Ad sepes vinearum prope *Unterdürrbach*, dem rothen Kreutze, des *Steinberges* inter *Retzbach* et *Karlstadt* et in monte *Kalbenstein*. In vineis des *Grombühels*, im mittleren Sand, ad marginem *sylvae zellensis* versus dem *Gasthaus* alibique rarius.)

Frutex altus, ramosissimus: *ramis* alternis inermibus, *junioribus* tomento albo dense obsessis. *Lignum* perdurum, tenax, luteo - albidum. *Folia* alterna, ampla, ovalia, obtusiuscula, integerrima, supra glabra, nitida, subius albo - tomentosa: *petiolis* brevibus tomentosis. *Flores* magni, speciosi, albi, solitarii, *pedunculis* brevissimis insidentes. *Calyx* tomentosus, quinquesfidus: *laciinis* serratis. *Fructus* magnus, austerus, luteus, tomento albo obsessus, rotundus.

Var. *fructibus* basi productis pyriformibus. (*Birnquitte.*)

228. SPIRAEA, Spierstaude.

1) *Sp. Aruncus* foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus polygamis. *Geisbart* - *Spierst.* *wilder Bocksbart.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* II. p. 1060. *Ejusd. Enum.* p. 542. *Pers. syn. pl. II.* p. 46. *Hoffm. Germ. I.* p. 227. *De Vest. Man. bot.* p. 775.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in nemorosis montosis. (*In sylvis Waldskugel, Gramschatz et Guttenberg rarissime. In sylvaticis prope Haltenbergstetten, Röttingen, im Oelgrund, im Steigerwald versus Zabelstein, prope Kitzingen, ad montem Schwamberg alibique infrequens.*)

Caules e radice plures, erecti, 2 - 3 - 4 - pedales et altiores, sulcato - angulati, glabri, medulla alba farcti. *Folia amplissima*, alterna, petiolata, supra-decomposita: *foliolis* oppositis ovatis argute duplicito - serratis pedicellatis glabris mucrone praelongo terminatis: *impari* longius pedicellato 2 - 3 - lobo. *Pedunculi* longi, basi incrassati. *Panicula terminalis*, maxima, composita *spicis* erectis filiformibus ramosis nudis. *Flores* parvi, albi, conferti, polygami.

2) *Sp. Filipendula* foliis interrupte pinnatis: foliolis uniformibus interrupte serratis glabris, floribus cymosis polygynis. *Knollige Spierst.* *Filipendel,* *rother Steinbrech.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1061. *Ejusd. Enum. l. c.* *Pers. syn. pl. l. c.* *Hoffm. Germ. l. c.* *De Vest. Man. bot. l. c.* *Sturm. D. Flor. I.* 18. *Herb. Blackw.* t. 467.)

Filipendula vulgaris Moench. *Method.* p. 663.

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. in pratis, in nemorosis. (In pratis prope oppidulum *Aub* et *Ochsenfurth* raro. In graminosis juxta *Moenum* prope *Volkach* versus *der Hallburg*. In pratis *salae* prope *Kissingen* et in nemorosis versus *der Cascate* ibidem. Hinc inde juxta dem *Hoag* ad *Karlstadt*, in montibus *Soden* - et *Reißenberg* aliquique raro.)

Radix e tuberibus ellipticis, inaequalibus, extus fuscis, intus albis, carnosis, in fila attenuatis composita. *Caulis* pedalisch, sesquipedalis et altior, erectus, firmus, simplex, glaber, angulatus. *Folia* longa, impari pinnata: *pinnis* sessilibus glabris inciso-dentatis minoribus palmatis immixtis, *impari* 3-loba: *radicalia* in orbem digesta petiolata, *caulina* alterna erecta sessilia amplexicaulia. *Stipulae* adnatae, dentatae, rotundatae. *Panicula* terminalis, cymosa, erecta, multiflora, subdichotoma. *Flores* secundi, albi, extus rubelli.

3) *Sp. Ulmaria* foliis interrupte pinnatis subtus tomentosis, foliolis inaequalibus lobatis: impari tripartito, floribus polygynis. *Sumpfsperstaude*, *Johanniswadel*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. p. 47. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 776. *Sturm.* D. Flor. I. 18. *Herb. Blackw.* t. 465.)

Ulmaria palustris *Mönch.* Meth. p. 663.

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in pratis humidis umbrosis, et ad ripas ubique.

Caulis 3-4-pedalis, erectus, firmus, sulcatus, glaber, simplex. *Folia* alterna, petiolata, interrupta:

te pinnata: foliolis maxime inaequalibus lobatis serratis subtus tomentoso - albis, *impari* maximo trilobo. *Stipulae* amplexicaules, subrotundae, dentatae. *Flores* parvi, albi, terminales, cymosi: *cyma* intermedia sessili, *reliquis* longe pedunculatis.

P O L Y G Y N I A.

229. R O S A, Rose.

Germinibus globosis.

I) *R. lutea* fructibus globosis pedunculisque glabris, calycibus petiolisque spinulosis, aculeis ramorum sparsis rectis. *Gelbe Rose, Wanzenrose, türkische Sammtrose.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1064. Ejusd. Enum. p. 543. Hoffm. Germ. I. p. 228. De Vest. Man. bot. p. 788. Knorr. thesaur. I. t. R. II.*)

R. chlorophylla Ehrh. Beitr. B. 2. p. 69.

R. eglanteria Pers. syn. pl. II. p. 47. *Roth. Germ. I. p. 217. II. p. 553. Vib. Werth. p. 263.*

R. punicea Mill. Dict. no. 12.

Frutex. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sepibus (Ad sepes hortorum vor dem neuen et burkarder Thore inque vineis des Galgenberges passim raro. Ad sepes prope Kleinochsenfurth et alibi.)

Frutex orgyalis fere, ramosissimus: cortice rubescente. *Aculei* trunci et ramorum pauci, sparsi, recti. *Foliola* ovato - oblonga, utrinque glabra, odora-ta, duplicato et argute serrata. *Petioli* hispidi. *Pen-*
dun-

dunculi solitarii, glabri, uniflori. *Germen* subglobosum, glabrum. *Laciniae calycinae* pinnatae, glanduliferae. *Petala* speciosa, magna, subemarginata, flava.

Variat petalis extus flavis, intus puniceis. (*R. bicolor* Jacq. *hort. vind.* I. p. 1.)

Odor florum peculiaris, foetidus.

2) *R. cinnamomea* fructibus globosis pedunculisque glabris, aculeis stipularibus, petiolis subinermibus, foliolis oblongis obtusis basi attenuatis. *Zimmtrose*, *Mayrose*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1065. *Ejusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. II p. 47. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 786.)

R. collincola Ehrh. *Beitr.* B. 2. p. 70.

R. foecundissima Roth. Germ. I. p. 218. II. p. 557.

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in hortis, in eorum sepibus inque vineis passim.

Frutex 4 - 6 - *pedalis*, *erectus*, *ramosissimus*: *ramis* alternis *erectis* *purpurascensibus* *splendentibus*. *Aculei* *sparsi*, *plerumque* *axillares*, *apice recurvi*. *Foliola* 5 - 7 *oblonga*, *obtusa*, *simpliciter serrata*, *basin versus* *integra* et *angustiora*, *eglandulosa*, *subtus pubescentia*, *pallidiora*. *Petioli* *subtomentosi*, *incani*, *subtus plerumque aculeati*. *Stipulae* *fermembranaceae*, *reticulatae*, *superne serrulatae*, *glandulosae*. *Pedunculi* *terminales*, *solitarii*, *breves*, *uniflori*, *glabri*, *purpurei*. *Germen* *exiguum*, *globosum*, *glaberrimum*. *Laciniae calycinae* *subulatae*, *pubescentes*, *integrae*, *apice saepissime foliaceae*: *tribus*

plerumque corolla multo longioribus. *Flores* parvi, pallide rubri. *Fructus* maturus phoeniceus.

Extra hortos floribus semper plenis occurrit.

3) *R. arvensis* germinibus globosis pedunculisque elongatis glabris, caule repente petiolisque aculeatis, floribus subcymosis, stylis basi cohaerentibus elongatis. *Feld - Rose, Kriechrose.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1066. *Pers. syn. pl. l. c. Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest. Man. bot. l. c.*)

R. Herporhodon Ehrh. Beitr. B. 2. p. 71.

R. repens *Scopol.* Carniol. I. p. 355. *Gmel.* Bad. II. p. 418.

R. fusca Mönch. Method. p. 688.

Frutex. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sylvis et ad eorum margines. (In sylvis *Waldskugel, Guttenberg, Zell* alibique.)

Frutex 3 - 6 - pedalis *funiculis* foliosis longe supra terram serpentibus. *Aculei* validi, sparsi, recurvi, vel, in ramis floriferis praesertim, saepe tantum stipulares. *Foliola* 5 - 7 ovata, acuta, serrata, utrinque glabra, supra laete viridia, subtus pallidiora. *Petioles* aculeati. *Stipulae* breves, glanduloso - ciliatae. *Pedunculi* terminales, erecti, glanduloso - scabri, inermes, uniflori, 3 - 5 subcymosi, rarius solitarii. *Flores* speciosi, odorati. *Laciniae calycinae* villosiusculae, 3 pinnatifidae, reliquae integriusculae. *Petala* obcordata, alba. *Styli* praelongi, villosi, basi in columnam coaliti. *Fructus* globosi, glabri, atro-sanguinei.

4) *R. spinosissima* germinibus globosis pedunculisque glabris, aculeis caulinis numerosissimis in-

æqua-

aequalibus rectis setaceis, foliolis subrotundis glabris.
Vielstachlige Rose, weiße Sichelrose.

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1067. Pers. syn. pl. p. 48.*
Hoffm. Germ. p. 229. De Vest. Man. bot. l. c.)

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad margines agrorum, in ruderatis et dumetis. (Ad agros prope *Versbach, Rimpf, Arnstein, Schliesselfeld et Seßlach.* In lapidosis juxta *sylvam vitihoechheimensem* procul den Ruinen der *Ravensburg.* Ad montem *Kalmut,* am *Kalbenstein* prope *Karlstadt,* am *Schwamberg* versus *Kitzingen,* ad montem *Hohwann* prope *Haßfurth* et juxta der *Vogelsburg* versus *Volkach.* In dumetosis prope *Homburg, Aub* et alibi, sed raro.)

Frutex 1 - 2 - 3 - pedalis, interdum orgyalis, aculeatissimus, cortice rubello obductus. Aculei conser-
tissimi, recti, validi, minoribus et flexilioribus im-
mixtis. Foliola minima, subsessilia, 7 - 9, fere or-
biculata, glabra, aequaliter serrata. Petioli glabri,
aculeolati. Stipulae angustae, acutae, ciliatae. Pe-
dunculi terminales, solitarii, uniflori, erecti, glabri,
inermes, saepe aculeati. Laciniae calycinae integer-
yimae. Petala emarginata, alba: unque lutescente.
Fructus globosus, glaberrimus, splendens, purpureus,
demum niger exsuccus.

5) *R. villosa* germinibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis caulinis sparsis rectiusculis, foliolis ellipticis utrinque tomentosis. *Zottige Rose, Hahnen-*
buttenrose.

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1069. Ejusd. Enum. p. 544.*
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest.
Man. bot. p. 788. Knorr. thesaur. II. t. R. 2. a.)

R. po-

R. pomifera Borkh. Holz. p. 399.

Frutex. Flor. Majo — Julio.

Hab. in dumetis, ad sepes inque vineis passim.

Frutex fortis 4 - 6 - pedalis et altior, ramosissimus: ramis brevibus erectis, junioribus tomentosis. Truncus laevis, glaber: aculeis sparsis rarissimis, parvis validis, fere rectis. Foliola elliptica, serrato-dentata, utrinque subtus praecipue tomentosa. Petioli cum costa tomentosi, subtus aculeati. Stipulae linearres, acutae, margine subsericeae, glandulosae. Pedunculi terminales, uniflori, plerumque solitarii, rarius bini, setis rigidis apice glanduliferis muricatis. Laciniae calycinae elongatae, tomentosae, dorso muricatae: tribus plerumque semipinnatis. Petala obcordata, emarginata, pallide rubra. Fructus maximus, undique muricatus, splendens, maturus rubro-nigrescens, pulposus.

Variat germinibus inermibus. (*R. mollissima* Willd. prodr. Fl. berol. no. 1237.)

Germinibus ovatis.

6) *R. rubiginosa* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, aculeis caulinis aduncis, foliolis ellipticis subtus glanduloso-rubiginosis. Rostrose, Weinrose.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1073. Ejusd. Enum. p. 546. Pers. syn. pl. p. 49. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 787. Jacq. Austr. t. 50. Ehrh. Beitr. B. 4. p. 22. Schkuhr. bot. Handb. t. 134. Sturm. D. Flor. I. 18.)

Frutex. Flor. Majo — Julio.

Hab.

Hab. ad vias, ad sepes inque dumetis ubiqui-

Frutex 5 - 8 - pedalis, robustus, valde ramosus, cortice truncorum et ramorum vetustiorum rubello, juniorum viridi, splendente. Aculei validi, compresi, adunci, sparsi, flavescentes. Foliola 5 - 7 - 9 subsessilia, ovata, acuminata, duplicato - glandulososerrata, fragrantia, viscosa, supra saturate viridia, subtus pallidiora punctis resinosis rubiginosa. Petioli pilis glandulosis glutinosis adspersi, subtus aculeis parvis aduncis armati. Stipulae sagittatae, acutae, margine glanduloso - ciliatae. Pedunculi terminales, simplices uniflori, aut divisi bi - triflori, setis rigidis capitatis muricati. Laciniae calycinae lanceolatae, intus tomentosae, extus pilis capitatis glutinosis hispidae: tribus plerumque pinnatifidis, interdum omnibus integris. Petala obcordata, rubra: unque albidio aut flavescente. Fructus subrotundo - ovatus, basi hispidus, farinosus, phoeniceo - purpureus.

Variat saepissime floribus semiplenis.

7) *R. canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, aculeis caulinis aduncis, foliolis ovatis acuminatis glaberrimis. *Hundsrose, Heckenrose, Hagenbuttenrose,*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1077. Ejusd. Enum. p. 547. Pers. syn. pl. p. 50. Hoffm Germ. p. 230. De Vest. Man. bot. p. 788. Herb. Blackw. t. 8. Knorr. thes. I. t. R. 4. Sturm D. Flor. I. 18.*)

Frutex. Flor. Jun. Julio.

Hab. in dumetis, ad sepes ubique frequens.

Frutex fortis, 5 - 10 - pedalis et altior: ramis elongatis erecto - patentibus. Aculei sparsi, validi, com-

compressi, adunci, rubicundi. *Foliola* 5 - 7 subsesilia, ovata, acuminata, inaequaliter argute serrata, inodora, utrinque nuda et glaberrima. *Petioli* glabri, subtus aculeis curvatis praediti. *Stipulae* glabrae, margine tenuissime ciliatae. *Pedunculi* terminales, uniflori, glaberrimi, solitarii, interdum bini aut terni. *Laciniae calycinae* ciliatae, glandulosae, petala adaequantes: *tribus* plerumque pinnatifidis, reliquis integris. *Petala* obcordata, non raro biloba, odora-ta, pallide rubella, saepe albida. *Fructus* ovatus, glaber, coccineus, pulposus, gratae acescens.

8) *R. centifolia* germinibus ovatis pedunculis que hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. *Hundertblättrige Rose, gemeine Gartenrose.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1071. Ejusd. Enum. p. 545. Pers. syn. pl. p. 48. Knorr. thesaur. t. R.)

Fruticulus. Flor. Jun. Julio.

Hab. in vineis inque hortis cum pluribus variationibus.

Fruticulus notissimus: *ramis* paucis elongatis erecto - patentibus *truncoque* inferne praecipue hispido aculeatis. *Foliola* ovata, argute serrata, supra glabra saturate viridia, subtus pilosiuscula pallidiora. *Petio-li* glabri, inermes, glandulosi. *Pedunculi* terminales, elongati, hispidi, simplices uniflori, aut divisi bi-triflori. *Laciniae calycinae* semipinnatae, apicem versus glandulosae. *Flores rosei*, elegantissimi, odo-re pergrato, subnutantes, semper pleni. *Fructus* hispidus, interdum glaber, maturus ruber, pulposus.

9) *R. alba* germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, aculeis caulis et petiolorum sparsis aduncis. *Weisse Rose.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1080. *Ejusd.* Enum. p. 548.
Pers. syn. pl. p. 49. *De Vest.* Man. bot. p. 788.
Herb. Blackw. t. 73. *Knorr.* thesaur. I. t. R. 6.)

Frutex. Flor. Jun. Julio.

*Hab. in hortis, in vineis, ad eorum muros
 et sepes passim,*

*Frutex fortis, 4 - 9 - pedalis, ramosissimus, cor-
 tice viridi splendente obductus. Aculei validi, sparsi,
 recurvi: basi valde dilatati. Foliola ovata, supra
 glabra, subtus plus minusve villosa, aut scabra, ar-
 gute serrata: serraturis plerumque glandulosis. Pe-
 tioli villosi, subtus aculeolis sparsis viridibus, et ba-
 si glandulis pedicellatis praediti. Pedunculi termi-
 nales, pedicellato - glandulosi, hispidi, uniflori, so-
 litarii, aut bini et terni. Laciniae calycinae lanceo-
 latae, pleraequae basi pinnatifidae. Petala speciosa,
 nivea. Fructus matus fere glaber, fusco - pur-
 pureus.*

Flores plerumque semipleni.

230. RUBUS, *Himbeere.*

1) *R. idaeus* foliis quinato - pinnatis ternatis-
 que subtus tomentosis, petiolis canaliculatis, caule
 aculeato. *Gemeine Himb. Hohlbeere.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1081. *Ejusd.* Enum.
 p. 548. *Pers.* syn. pl. II. p. 51. *Hoffm.* Germ. I.
 p. 230. *De Vest.* Man. bot. p. 789. *Herb. Blackw.*
 t. 289. *Knorr.* thesaur. II. t. R. 1.)

Frutex. Flor. Maj. Junio.

*Hab. in sylvaticis et nemorosis montosis
 ubique.*

Frutex 3 - 4 - *pedalis et altior aculeis sparsis par-*
vis rectis armatus. Folia petiolata, alterna: inferio-
ra plerumque quinato - pinnata, superiora ternata:
foliolis oppositis sessilibus ovatis acuminatis argute
serratis supra laete viridibus glabris, subtus tomento-
so - albis. Petioli pubescentes, aculeati, supra cana-
liculati. Flores terminales et laterales, paniculati,
albi: pedunculis ramosis decurvis aculeolatis. Recep-
taculum conico - clavatum, villosum. Fructus matu-
rus ruber, succulentus, sapidus, acidulus, odoratus,
hemisphaericus, basi excavatus, deciduus.

Variat caule subinerme et fructibus albis.

2) *R. caesius* foliis ternatis subtus pilosis: late-
 ralibus bilobis, caule aculeato prostrato. *Ackerhim-*
beere, blaue Brombeere, Bocksbeere.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1084. *Ejusd. Enum.* p. 549.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 231. *De Vest.*
Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 135.)

Frutex. Flor. Jun. Julio.

Hab. in dumetis, fruticetis, ad margines
agrorum inque campis sterilibus ubique.

Trunci longi, diffusi, prostrati, radicantes, tere-
tes, strigoso - aculeati: cortice atro - sanquineo rore
caesio obducto Rami juniores striati, virides, iner-
mes. Folia alterna, omnia ternata: foliolis ovatis,
incisis, serratis, rugosis, supra laevibus, subtus hirs-
utis, utrinque viridibus, lateralibus 2 sessilibus ob-
liquis saepe bilobis, impari petiolato. Petioli cum
costis pubescentes aculeati, supra obsolete canalicu-
lati. Paniculae subcorymbosae terminales, multiflo-
vae: pedunculis alternis unifloris villosis aculeatissi-
mis. Petala ovata, speciosa, alba. Fructus niger
rōre

rōre caesio acido - dulcis, ex acinis paucioribus masculis compositus.

3) *R. fruticosus*, foliis - quinato - digitatis ternatisque subtus incano - tomentosis, caule angulato petiolisque aculeatis, calyce reflexo. *Strauchartige Himbeere, Brombeerstrauch, Schwarze Brombeere.*

(L. sp. pl. ed. *Willd* l. c. *Ejusd. Enum.* p. 550.
Pers. syn. pl. l. c. *Hoffm. Germ.* l. c. *De Vest.*
Man. bot. p. 790. *Herb. Blackw.* t. 45. *Knorr. thes.*
II. t. R.)

Frutex. Flor. Maj. Junio.

Hab. in saxosis, rupestribus, ad vias et vineas ubique.

Trunci longissimi, debiles, decumbentes, adscendentes, sulcati, tenaces, aculeis aduncis armati. Folia alterna, petiolata: inferiora quinata, superiora ternata: foliolis ovatis acuminatis serratis villosiusculis subtus plerumque incano - tomentosis. Petioli aculeati. Panicula terminalis, subracemosa, multiflora. Pedunculi villosi, uniflori, aculeolati. Petala ovata, obtusa, albida aut dilute purpurea. Fructus niger, nitidissimus, succulentus, acido - dulcis: ex acinis numerosis compositus.

Var. foliis utrinque viridibus.

4) *R. saxatilis* foliis ternatis glabriusculis, flagellis reptantibus herbaceis, panicula pauciflora. *Stein - Himb. Scharlachbocksbeere.*

(L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 1088. *Ejusd. Enum* p. 551.
Pers. syn. pl. p. 52. *Hoffm. Germ.* l. c. *De Vest.*
Man. bot. l. c. *Kern.* 6. t. 42.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in nemorosis, rupestribus. (In lapidosis profundioribus sylvae Waldskugel, in sylvis ad Veitshöchheim, Kist, Höchberg, Guttenberg et Versbach. Im Huck prope Wipfeld. In nemorosis ad Mühlhausen et in saltu kitzingensi. In sylvaticis prope Gerolshofen im Steigerwald, prope Wüstenzell, Holzkirchen, Gräfendorf, in sylva homburgensi alibi que.)

Caulis palmaris; sesquipedalis, erectus, simpliusculus, glaber, subangulatus, superne pilosus et aculeolis paucis obsitus, herbaceus, basi sublignosus. Flagella praelonga, prostrata, reptantia, sterilia, subaculeata. Folia alterna, longe petiolata, ternata: foliolis ovato - rhomboideis subsessilibus obliquis inciso - serratis glabriusculis utrinque laete viridibus, impari pedicellato. Petoli hispidi. Panicula terminalis, pauciflora: pedunculis erectis brevibus unifloris hispidis. Petala lanceolata, alba, longitudine calycis. Fructus ruber, succulentus, acidulus, ex acinis paucis separatis majusculis splendentibus compotitus.

231. FRAGARIA, Erdbeere.

1) *Fr. vesca* calyce fructus reflexo, pubescentia petiolorum patentissima, peduncularum adpressa. *Gemeine Erdb. Waldbeere.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1090. Ejusd. Enum. p. 551. Pers. syn. pl. II. p. 53. Hoffm. Germ. I. p. 232. De Vest. Man. bot. p. 738. Schkuhr. bot. Handb. t. 135. Herb. Blackw. t. 77. Knorr. thesaur. I. t. E. 1. Sturm D. Flor. I. 2.*)

F. vulgaris Ehrh. Beitr. B. 7. p. 21.

Potentilla Vesca Scopol. Carniol. I. p. 363.

Perenn. Flor. April. Majo.

Hab. in sylvaticis et nemorosis ubique abunde.

Caulis digitalis, palmaris, erectus, teres, villosus, superne divisus et foliosus. Flagella longissima, filiformia, pubescentia, reptantia, radicantia. Folia longe petiolata, ternata: foliolis ovalibus obtusis linearis utrinque pubescentibus serratis: serratura terminali proximis paulo longiore. Flores axillares, pendunculati. Calyx basi planus, pilosus. Petala subrotunda, alba, brevissime unquiculata, calyce breviora. Fructus nutans, ovatus, maturitate saturate ruber, carnosus, odoratus, gratissimus.

2) *Fr. collina* calyce fructus erecto, pubescens pedunculorum erecta, petiolorum patentissima.
Harte Erdbeere, Steinbeere, Steinknöpfse.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1093. *Eiusd.* Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. Ehrh. Beitr. 7. p. 27.)

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in sylvis sicciорibus et ad colles ubique.

A praecedente, cui maxime affinis: *serraturis ovato-lanceolatis, extima proximis breviore, pubescens petiolorum nusquam adpressa, sed erecta, calyce fructus semper erecto, et fructibus subrotundis constanter differt.*

3) *Fr. sterilis* caule decumbente, pubescentia petiolorum et pedunculorum patentissima, receptaculo sicco. *Falsche Erdbeere, trockene Erdbeere.*

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Hoffm. Germ. l. c. Smith. Brit. II. p. 546. Hoffm. Germ. ed. 1791. t. 6.) *Potentilla fragariastrum* Pers. syn. pl. II. p. 56.

P. fragariaefolia Gmel. Bad. II. p. 452.

P. prostrata Moench. Method. p. 659. G. M. Sch. Flor. der Wetter. II. p. 250.

Comarum fragarioides Roth. Germ. I. p. 224. II. p. 577. De Vest. Man. bot. p. 785. Spreng. Hal. p. 148.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in collibus sterilibus, ad ripas sabbulosas, inque sylvis depresso sere ubique.

Caules 2 - unciales, digitales, decumbentes, pilosi, folio uno altero instructi. Flagella nulla. Folia ternata: foliolis sessilibus obovatis obtusis, serrato-dentatis utrinque subtus praecipue sericeis, radicalia longe petiolata. Stipulae lanceolatae, sericeae. Pedunculi terminales, solitarii, filiformes, pilosi, uniflori. Calyx basi incrassatus, pilosissimus. Petala obcordata, nivea. Fructus parvus, exsuccus, vix deciduus.

Habitus *Fragariae vescae*.

232. POTENTILLA, Fingerkraut.

Foliis pinnatis.

I) *P. Anserina* foliis interrupte pinnatis serratis subtus sericeis, pedunculis unifloris, caule repente. Gänse - Fingerkr. Gänserich.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1095. Ejusd. Enum. p. 552. Pers. syn. pl. II. p. 53. Hoffm. Germ. I.

p. 233. *De Vest. Man. bot.* p. 778. *Herb. Blackw.*
t. 6. *Sturm D. Flor.* I. 4.)

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

*Hab. ad vias, plateas, in pratis et pas-
cuis frequens*

*Caules digitales, palmares, pedales, prostrati;
repentes, teretes, filiformes, pubescentes. Folia
interrupte pinnata: radicalia in orbem digesta, cau-
llina alterna. Foliola opposita sessilia, obtusa, inci-
so - serrata, supra viridia, subtus argentea nitidis-
sima: inferiora subrotunda, superiora ovato - lanceo-
lata, majora. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori,
erecti, villosi. Corolla speciosa, majuscula, aurea.
Petala ovata, patentissima, calyce duplo majora.*

2) *P. supina* foliis pinnatis: foliolis oblongis
serratis, caule dichotomo decumbente, pedunculis
solitariis axillaribus. *Niedriges Fingerkr.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1099. *Ejusd. Enum.* p. 553.
Pers. syn. pl. p. 54. *Hoffm. Germ. l. c. De Vest.*
Man. bot. p. 779. *Jacq. Austr.* t. 406.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

*Hab. in inundatis arenosis, ad ripas et in
agris. (Ad moeni ripas versus Erlabrunn, Mühl-
bach, Sulzfeld, Kitzingen, HaßfARTH alibique. Ad
scaturiginem extra portam Pleichach, in subhumidis
versus dem rothen Kreutze ibidem. Ad ripas rivi
Brent prope Unterweißenbronn et ad Saalam prope Ge-
münden et Schunderfeld. In agris circa dem Glacis
pässim. In agris prope Hürblach, Schwarzach et Som-
merach. In arenosis prope Dettelbach versus der
WallfARTHskirche et alibi.)*

Cau-

Caulis digitalis, palmaris, subhirsutus, teres, ramosus: *ramis* dichotomis erectiusculis. *Folia radicalia* et *caulina alterna*, pinnata, *rama* subsessilia, ternata, plerumque opposita. *Foliola* oblonga, profunde inciso - serrata, villosiuscula, utrinque laete viridia, nec sericea. *Pedunculi* axillares, solitarii, pubescentes, *floriferi* erecti, *fructiferi* penduli. *Corolla* lutea, parva, calycem vix excedens. *Petala* obovata, patentia, integra.

Foliis digitatis.

3) *P. recta* foliis septenatis quinatisque: foliolis lanceolatis grosse dentatis, petalis obcordatis calyce majoribus, caule erecto. *Aufrechtes Fingerkr.*

(*L.* sp. pl. ed *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Jacq.* Austr. t. 383.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in ruderatis, in sylvaticis asperis.
(In lapidosis montis *Nicolai* versus *Hochberg* et circa der *Waldskugel* raro. Inter ruinas arcis *Karlsburg*. In asperis montis *Adelsberg* prope *Zwing*. In monte *St. Viti* prope *Nenstadt* a. S. versus *Hoheneck*. In montosis prope *Neuses ad montem* alibique raro.)

Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, firmus, teres, villosus, superne corymboso - subdichotomus. *Folia radicalia* et *caulina insima* longe petiolata septenata, *superiora* brevius petiolata quinata, *summa* subsessilia, *rama* ternata. *Foliola* cuneiformi - lanceolata, aequaliter et profunde inciso - serrata, apice 3 - dentata, utrinque subhirsuta. *Pedunculi terminales*, uniflori, pilosi. *Calyx* planus, hirsutus.

sutissimus. *Petala* obcordata, emarginata, pallide lutea, calyce parum longiora.

Folia aetate villositatem fere omnem amittunt.

4) *P. argentea* foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. *Silbersärbiges Fingerkr. Silberkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1101. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Sturm D. Flor. I. 17.*)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad muros, ad vias, rupes inque collibus graminosis frequens.

Caules plerumque plures, palmates, pedales, erecti toti, aut basi tantum procumbentes, teretes, duri, tomentosi, inferne plerumque rubelli, suprane ramoso - dichotomi. *Folia* petiolata, digitata, quinata: *radicalia* in orbem digesta, *caulinia* alterna, *suprema* sessilia, ternata. *Foliola* coneiformi - lanceolata, firma, margine revoluta, profunde incisa, supra viridia, subtus niveo - tomentosa. *Flores* terminales et axillares, corymbosi: *pedunculis* erectis unifloris tomentosis. *Calycis* albo - tomentosi. *Petala* parva, obcordata, lutea, calyce majora.

5) *P. verna* foliis obovatis dentatis pubescensibus acute serratis: radicalibus quinatis, caulinis ternatis, petalis obcordatis calyce majoribus, caule declinato. *Frühlings - Fingerkr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1104. Ejusd. Enum. p. 554. Pers. syn. pl. p. 55. Hoffm. Germ. p. 234. De Vest. Man. bot. p. 780. Sturm D. Flor. I. 17.*)

Perenn. Flor. April. Mayo et vice altera autumno.

Hab. in pascuis siccioribus, locis editioribus apricis, in montosis et collibus graminosis siccis ubique frequens.

Caules plures 2 - unciales, digitales et longiores; tenues, teretes, villosi, superne ramosi, decumbentes: *apicibus* erectis: *Folia* digitata: *radicalia* longius petiolata quinata, *caulina* subsessilia ternata, *summa* simplicia. *Foliola* cuneiformia, retusa, inciso-dentata, lineata, utrinque villosula. *Pedunculi* terminales, erecti, uniflori, villosi. *Calyces* plani, villosi. *Flores* parvi: *petalis* obcordatis, luteis, basi quandoque macula fulva notatis, calyce longioribus.

6) *P. opaca* foliis septenatis quinatisque cuneiformibus inciso-serratis hirtis, *petalis* retusis longitudine calycis, *caulibus* decumbentibus filiformibus.
Schattenliebendes Fingerkr.

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1103. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 54. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Sturm. D. Flor. I. 17.*)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. ad muros, in campis apricis sterilibus. (Ad muros vinearum auf dem *Galgenberge*, in der *Harfe* und *Leiste*. In campo sterili prope *Thüngen* et *Weitshöchheim*, in collibus apricis ibidem et alibi passim frequens.)

Differt ab antecedente, cui simillima: *caulibus* longioribus pilis patentissimis hirtis fere rubellis, *soliolis* angustioribus apice rotundatis profundius dentatis non villosulis, sed hirtis, *petiolis* hirsutissimis, *pedunculis* longioribus tenerrimis pubescentibus, et *corollis* minoribus tantum versus meridiem apertis, alio tempore clausis.

7) *P. alba* foliis quinatis subtus sericeis apice conniventi - serratis, caulis filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Weißblüthiges Fingerkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1106. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. p. 55. Hoffm. Germ. p. 235. De Vest. Man. bet. p. 781. Jacq. Austr. t. 115. Sturm D. Flor. I. 4.*)

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in montosis, sylvaticis. (In montosis juxta sylvam vitihoechheimensem versus Thüngersheim raro. Ad montem Kalbenstein prope Karlstadt, in monte juxta der Karlsburg ibidem. In sylvaticis versus der Vogelsburg prope Volkach. Ad montem Hohwann prope Haßfurth et in monte St. Viti apud Neustadt a. S.)

Caules plures digitales, palmares, procumbentes, debiles, teretes, subtomentosi, superne divisi. Folia radicalia in orbem digesta, longius petiolata, caulinæ breviter petiolata, ternata et quaternata, summa sessilia simplicia. Foliola lanceolata, obtusiuscula, integra, apicem versus tantum serraturis conniventibus praedita, supra laete viridia pubescentia, subtus sericea. Pedunculi filiformes, albido - tomentosi, uniflori, erecti, fructiferi recurvi. Petala obcordata, candita, calyce paulo majora. Receptaculum pallide rubellum setis longis densis hirsutum.

8) *P. reptans* foliis quinatis obovatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris, *Kriechendes Fingerkraut. Fünffingerkraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1108. Ejusd. Enum. p. 555. Pers. syn. pl. p. 56. Hoffm. Germ. p. 236. De Vest.*

Man. bot. p. 782. Schkuhr. bot. Handb. t. 136. Herb. Blackw. t. 454.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. ad muros, vias et plateas ubi cunque-

Caules e radice nonnulli, pedales, 2 - pedales et longiores, flagelliformes, reptantes, pubescentes, superne subcompressi, geniculati: geniculis radicantibus. Folia alterna, erecta, longius petiolata, quinata: foliolis obovato - cuñeatis obtusis serratis rugosis pubescentibus utrinque laete viridibus. Flores axillares, majusculi: pedunculis solitariis erectis unifloris foliis longioribus. Calyx pilosus. Petala obcordata, aurea.

233. TORMENTILLA, Rührwurz.

I) *T. erecta* caule erectiusculo ramoso, foliis sessilibus. *Aufrechte Rührw. Blutwurz, Heilwurz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1112. Ejusd. Enum. p. 556. Pers. syn. pl. II. p. 50. Hoffm. Germ. I. p. 236. De Vest. Man. bot. p. 777. Schkuhr. bot. Handb. t. 136. Herb. Blackw. t. 445. Knorr. thesaur. II. t. T. i.)

T. officinalis Smith. Britan. II. p. 552.

Potentilla Tormentilla Scopol. Carn. I. p. 360.
Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in pascuis, pratis siccis; in umbrosis humidis et sylvaticis ubique.

Caules plures, palmares, pedales, decumbentes; s. adscendentes erectiusculi, teretes, debiles, filiformes, pubescentes, dichotomi, divaricati. Folia alterna, quinata et ternata: radicalia et caulina insi-

ma plerumque petiolata, *superiora sessilia*. *Foliola* cuneiformi - lanceolata, antice dentata vel profundus incisa, laete viridia, villosiuscula: *tribus intermediis* majoribus subpetiolatis, *lateralibus sessilibus* brevioribus et laticribus. *Pedunculi* terminales et laterales, longi, filiformes, villosiusculi, solitarii, uniflori. *Petala* 4 obcordata, plana, patentia, lutea, calycis longitudine.

2) *T. reptans* caule repente radicante, foliis petiolatis. *Kriechende Ruhrwurz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. I. c. Ejusd. Enum. I. c. Pers. syn. pl. I. c. Hoffm. Germ. p. 237. De Vest. Man. bot. p. 778.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in umbrosis nemorosis. (In locis editioribus der *Waldskugel*, in *sylva guttenbergensi*, in *sylva ad Stetten* alibique passim.)

Similis priori, cum qua facillime confunditur, *caule* vero longiore semper repente *geniculis* radicante pilosiusculo simplici, *foliis* longius petiolatis plerumque ternatis: *foliolis* obcordatis inciso - serratis pilosiusculis, *pedunculis* foliis longioribus, *corollisque* majoribus constanter differt.

254. GEUM, *Benedicktenwurz.*

1) *G. urbanum* foliis ternatis, stipulis rotundatis incisis, floribus erectis, aristis uncinatis nudis. *Gemeine Benedicktenwurz, Nelkenwurz.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1113. Ejusd. Enum. p. 557. Pers. syn. pl. II. p. 57. Hoffm. Germ. I. p. 237. De Vest. Man. bot. p. 783. Schkuhr. bot. Handb.

Handb. t. 137. *Sturm*. D. Flor. I. 5. *Herb. Blackw.*
t. 253.)

Caryophyllata urbana Scopol. Carniol. I. p. 364.

C. officinalis Moench. Method. p. 660.

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in umbrosis, ad sepes ubique.

Caulis 1 - 2 - pedalis et altior, erectus, teretiusculus, pilosus, superne ramosus. *Folia* petiolata, rugosa, hirsuta: *radicalia* in orbem digesta, lyrato-pinnata, quinata, *caulina* alterna, ternata: *lobo* medio maximo, *suprema* simplicia lanceolata. *Foliola* subcuneata, incisa et serrata. *Stipulae* maxima, amplexicaules, rotundatae, inciso - serratae. *Pedunculi* terminales, longi, solitarii, erecti, uniflori, pilosi. *Calyx* patens, villosus. *Petala* ovato - subrotunda, lutea, patentia, calyce subbreviora. *Semina* subpilosa: *aristis* purpureis nudis apice uncinatis.

Radix recens primo vere praecipue *Caryophyllos* redolet.

2) *G. rivale* foliis radicalibus lyratis, stipulis ovatis acutis incisis, floribus nutantibus, aristis plumosis tortis. *Sumpf - Benedicktenw.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1115. *Ejusd.* Enum 1. c. *Pers.* syn. pl. 1. c. *Hoffm.* Germ. p. 238. *De Vest.* Man. bot. 1. c. *Sturm* D. Flor. I. 8.)

Caryophyllata rivalis Scopol. Carniol. I. p. 365.

C. nutans Mönch. Meth. p. 661.

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in humidis, nemorosis. (In humidis sylvae *Waldskugel* et ad rivulum sylvae *guttenbergensis* raro. In humidis nemorosis ad *Veitshöchheim*, in syl-

sylva stettensi, in nemorosis ad Mühlhäusern, prope Wolfsmünster, Gemünden, Homburg, in saltu kitzingensi, ad fossam juxta den erlacher Seen satis frequens et alibi)

Diffr. ab antecedente: *radice* multo minus aromaticā, *caulibus* brevioribus teretibus simplicioribus plerumque rubellis: *foliolis* majoribus minoribus immixtis: *impari* trifido, *stipulis* minoribus ovato-lanceolatis dentatis, *floribus* majoribus speciosioribus nutantibus, *calycibus* inflatis hirsutis rubellis, *petalis* conniventibus rubicundis: *striis* purpurascens, *semīnum aristis* longioribus plumosis tortis, et *receptaculo* oblongo pedunculato.

235. COMARUM, Komarum.

I) *C. palustre* foliis pinnatis, petalis calyce minoribus. *Sumpf-Komarum*, rothes Siebensingerkraut, Blutauge.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1119. Ejusd. Enum. p. 558. Pers. syn. pl. II. p. 58. Hoffm. Germ. I. p. 239. De Vest. Man. bot. p. 785. Schkuhr. bot. Handb. t. 138. Hoffm. Germ. ed. 1791. t. 7)

Potentilla palustris Scopol. Carniol. I. p. 359. Mönch. Method. p. 557.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in paludosis. (In fossa oppidana versus dem Kartheuserkloster et dem pleichacher Thore. In paludosis sylvarum ad Höchberg, Zell, Kist et Güttenberg. In uliginosis saltus kitzingensis, prope Detzelbach, Schwarzenau alibique rarius.)

Caulis pedalis, sesquipedalis et major, teres, striatus, purpurascens, pilosus, superne ramosus, repens,

pens, demum erectus. *Folia* alterna: *inferiora* petiolata quinata aut septenata, *superiora* subsessilia ternata. *Foliola* subsessilia, approximata, elliptico-lanceolata, acute serrata, superne laete viridia glabra, subtus pallida villosa. *Petiolae* basi membranacei, vaginantes, amplexicaules. *Stipulae* ovatae, acutae. *Pedunculi* terminales et axillares, solitarii, erecti, uniflori, elongati, pubescentes, purpurascentes. *Calyx* patentissimus, atropurpureus: *laciinis* acutis, alternis inaequalibus. *Petala* lanceolata, acuta, atropurpurea, *laciinis calycinis* breviora et angustiora. *Receptaculum* seminum ovatum, villosum, calyce connivente tectum.

Variat *laciinis calycinis* 10 - 14, et *petalis* 6 - 8.

C L A S S I S XIII.

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

236. ACTAEA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 877. De Neck. el. bot. n. 1019. Borkh. tent. disp. pl. n. 26.

Cal. 4 - phyllus, deciduus. Cor. 4 - petala. Bacca 1 - locularis. Semina orbiculata.

237. C H E L I D O N I U M.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 880. De Neck. el. bot. n. 1013. Borkh. tent. n. 16.

Cal. 2 - phyllus. Petala 4. Stigma cordiforme. Siliqua linearis, cylindracea, 2 - valvis, 1 - locularis, supera. Semina valvis adpensa.

238. P A P A V E R.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 881. De Neck. el. b. n. 1014. Borkh. tent. n. 12.

Cal. 2 - phyllus deciduus. Petala 4. Stigma sessile, radiato - peltatum. Caps. 1 - locularis, semi-mutilocularis.

239. N Y M P H A E A.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 886. De Neck. el. bot. n. 1828. Borkh. tent. n. 28.

Cal. 4 - 5 - phyllus, inferus, persistens. Cor. polypetala. Stigma radiato - peltatum persistens. Bacca dura, pulposa, multilocularis, truncata.

240. T I L I A.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 894. De Neck. el. bot. n. 996. Borkh. tent. n. 14.

Cal. 5 - partitus, deciduus. Cor. 5 - petala, calyci aequalis. Caps. globosa, coriacea, 4 - 5 - locularis, sub - 4 - 5 - valvis, basi dehiscens. Sem. plurimumque unicum; reliquis abortivis.

241. HELIANTHEMUM.

*Tournef. elem. de Botan. p. 214. t. 128. Gärtn.
Sem. et Fr. I. p. 371. t. 76.*

Cal. 5 - phyllus: foliolis 2 minoribus. Cor. 5 - petala, aequalis, decidua. Caps. subtrigona, polysperma. Sem. valvis affixa.

242, DELPHINIUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 927. De Neck. el. bot. n. 1057. Borkh. tent. n. 25.

Cal. 0. Cor. 5 - petala: petalo quinto calcarato. Caps. leguminosa, altero latere dehiscens.

TRIGYNIA.

243. ACONITUM.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 928. De Neck. el. bot. n. 1058. Borkh. tent. n. 24.

Cal. 0. Cor. 5 - petala inaequalis: petalo supremo fornicate. Nectaria cuculli 2 pedicellati, recurvi, sub petalo supremo. Siliquae introrsum dehiscentes.

PENTAGYNIA.

244. AQUILEGIA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 934. De Neck. el. b. n. 1056. Borkh. tent. n. 23.

Cal. 0. Petala 5 aequalia. Nectaria 5 corniculata cum petalis alterna. Caps. 5 distinctae.

245. NIGELLA.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 935. De Neck. el. b. n. 1062. Borkh. tent. n. 18.

Cal. o. Petala 5 aequalia. Nectaria 8 bilabiata, radiato - patentia intra corollam. Caps. 5 connexae.

POLYGYNIA.

246. HEPATICA.

Borkh. tent. n. 5 Moench. Method. p. 216.

Cal. 3 - phyllus, postea a flore remotus. Petala 6. Sem. plura nuda,

247. PULSATILLA.

De Neck. el. bot. n. 1091. Tournef. elem. de Bot. p. 239. t. 148. Borkh. tent. n. 9.

Involucrum polyphyllum, foliaceum. Cal. o. Cor. 6 - petala. Sem. plura caudata.

248. ANEMONE.

De Neck. el. bot. n. 1090. Borkh. tent. n. 10.

Cal. o. Petala 5 - 6. Cingulum callosum sub corolla. Sem. plura ecaudata.

249. FICARIA.

Roth. tent. Flor. germ. I. p. 241. Borkh. tent. n. 3.

Cal. 3 - phyllus. Petala 8 - 9: foveola nectarifera unquium squama tecla. Sem. plura, nuda.

250. CLEMATIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 950. De Neck. el bot. n. 1092. Borkh. tent. n. 8.

Cal. o. Petala 4 - 6. Sem. plurima caudata: caudis pennaceis.

251. THALICTRUM.

L. Gen. pl. ed. Schreb. n. 951. De Neck. el. bot. n. 1095. Borkh. tent. n. 7.

Cal. o. Petala 4 caduca. Sem. plurima ecaudata.

252. ADONIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 952. De Neck. el. b. n. 1088. Borkh. tent. n. 4.

Cal. 5 - phyllus deciduus. Petala 5 - 8 absque nectario. Sem. plura, nuda, angulata, cordata.

253. RANUNCULUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 953. De Neck. el. bot. n. 1087. Borkh. tent. n. 2.

Cal. 5 - phyllus, deciduus. Cor. 5 - petala: petalis basi squamis nectariferis auctis. Sem. nuda.

254. TROLLIUS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 954. De Neck. el. bot. n. 1060. Borkh. tent. n. 21.

Cal. o. Cor. polypetala, decidua. Nectaria 9 linearia, plana, incurva, basi perforata. Caps. plurimae, ovatae.

255. HELLEBORUS.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 956. De Neck. et.
Bot. n. 1059. Borkh. tent. n. 19.*

*Cal. 5 - phyllus, aequalis, persistens. Cor. o.
Nectaria plurima, tubulosa, stamina cingentia.
Caps. plures, erectae, distinctae, polyspermae.*

256. CALTHA.

*Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 957. De Neck. et.
ib. n. 1054. Borkh. tent. n. 22.*

*Cal. o. Petala 5. Nectaria o. Caps. polysper-
mae, stellatim patentes.*

CLAS S I S XIII.

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

256. ACTAEA, Christophskraut.

1) *A. spicata* racemo ovato. Geährtes Christophskr. Schwarze Wolfswurz, gemeine Schwarzwurz.

(L.)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1139. *Ejusd.* Enum. p. 560. *Pers.* syn. pl. II. p. 61. *Hoffm.* Germ. I. p. 239. *De Vest.* Man. bot. p. 754. *Herb.* *Blackw.* t. 565.)

Christophoriana spicata *Mönch.* Meth. p. 276.

Actaea nigra *G. M. Sch.* Flor d. Wetter. II p. 265.

Perenn. *Flor.* *Maj.* *Junio.*

Hab. in sylvis umbrosis, praecipue montosis. (In sylvis *Waldskugel*, *Veitshöchheim*, *Guttenberg* et *Kitzingen* raro. In nemorosis prope *Waldbrunn*, *Majnbrunn*, *Sachsenheim* et im *Steigerwald* prope *Zabelstein*, *Schleichach* et *Michelau* alibique non adeo infrequens. In nemorosis montium *Soden* - et *Reißenberg*. In umbrosis circa *Cascatam kissingensem*, in monte *münnerstadtiano* prope *Bocklet*, in sylvis prope *Hilters*, *Fladungen Bischofsheim ad rhoen.* et alibi.)

Radix ramosa, carnosa, extus fusco - nigricans, intus luteo - albida, fibris plurimis filiformibus aucta. *Caulis* pedalis et altior, erectus, teres, glaber, geniculatus, simpliciusculus, basi squamatus. *Folia* ampla, alterna, pauca, petiolata, 2 - plicato - pinnata: *foliolis* ovato - cordatis inciso - serratis acuminatis glabris nitidis laete viridibus, *terminali* 3 - lobo. *Racemus* *terminalis*, simplex, ovatus, superne paulo inclinatus, multiflorus: *pedunculis* unifloris pubescens tibus basi bracteatis. *Petala* alba, patentia, rhombica, plana, caduca. *Baeca* pisi magnitudine, matura splendens, nigra, succulenta.

Planta tota venenata.

237. C H E L I D O N I U M, Schöllkraut.

I) *Ch. majus* pedunculis umbellatis, foliis pinnatis. *Großes Schöllkr.* *gemeine Schöllwurz.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1141. *Ejusd.* Enum. p. 561. *Pers. syn. pl.* II. p. 61. *Hoffm.* Germ. I. p. 239. *De Vest. Man. bot.* p. 753. *Herb. Blackw.* t. 91. *Knorr. thesaur.* I. tab. S. 23. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 140.)

Ch. haematodes *Mönch.* *Meth.* p. 249.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in muris, in ruderatis et ad sepes ubique abunde.

Planta tota succo croceo - luteo acri amaro nau-
seoso repleta, quem laesa imprimis largiter fundit.
Caules plerumque plures, 1 - 2 - pedales et altiores,
erecti, teretes, rariter pilosi, superne dichotomo-
ramosi, ad ramificationes incrassato - articulati. *Fo-*
lia pinnata: *foliolis* obtuse lobatis laevibus subglaucis
crenatis, *lobis* rotundatis. *Petioli* villosi. *Flores* ter-
minales, subumbellati: *pedunculis* pluribus erectis
villosis unifloris. *Petala* ovata, obtusa, integra, lu-
tea. *Siliquae* erectae, nodulosae, glabrae.

In hortis praecipue *soliis* laciniatis, *floribus* semi-
plenis, et *petalis* incisis variat. (*Ch. laciniatum*
Willd. *Enum. hort. berol. l. c.*)

238. P A P A V E R, *Mohn.*

1) *P. Argemone* capsulis clavatis hispidis, fo-
liis pinnatifidis. *Keulensförmiger Mohn,* *Sandmohn,*
Ackermohn.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II p. 1144. *Ejusd.* *Enum.*
p. 562. *Pers. syn. pl.* II. p. 62. *Hoffm.* *Germ.* I.
p. 240. *De Vest. Man. bot.* p. 752.)

Ann. Flor. Jun. Julio,

Hab.

Hab. in agris, in collibus, et in undatis arenosis. (Inter segetes circa Würzburgum; Gellersheim, Königshofen in arvis et Ochsenfurth passim. Ad moenii ripas et in insulis prope dem Siechhausse, Himmelsforten, Thiingersheim et alibi. Copiosius in vallo oppidano inter dem neuen et pleichacher Thore.)

Caulis palmaris et pedalis, erectus, tenuis, teres, ramosus, setis longis strictis erectis albidis dense obsessus. *Folia* alterna petiolata, tripartita, pinnatifida: *pinnis* dilatatis incisis hirsutis *Pedunculi* terminales, solitarii, setis patentibus scabri. *Petala* pallide coccinea, oblonga, apice tenuissime serrulata, fugacia. *Stamina* sub antheris dilatata. *Stigma* subacute, 4 - 5 - radiatum. *Capsula* oblonga, clavata, subpentagona, apice imprimis setis erectis albis hispida.

2) *P. Rhoeas* capsulis subglobosis glabris, foliis pinnatifidis. Wilder Mohn, rother Feldmohn, Klapperrose, Kornrose.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1146. Ejusd. Enum. p. 563. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 241. De Vest. Man. bot. p. 753. Sturm Deutschl. Flor. I. 17. Herb. Blackw. t. 2. Knorr. thes. I. t. R. 14.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes ubique copiose.

Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, teres, ramosus, setis horizontaliter patentibus albis undique obsessus. *Folia* alterna, pinnatifida, hispida, incisa. *Pedunculi* terminales, longissimi, setoso-pilosí. *Petala* speciosa, lata, subrotunda, integra, magis, quam in praecedente persistentia, eleganter cinnabarina, basi plerumque macula atra.

Stig-

Stigma multiradiatum. *Filamenta* numerosissima, ex nigro purpurecentia. *Capsula* ovato-globosa, truncata, glaberrima.

Perplures in hortis nostris variationes *floribus* plenis et semiplenis, rubris, albis et variegatis existunt. (Vid. Knorr. thes. I. t. R. 12 - 13.)

3) *P. dubium* capsulis oblongis glabris, foliis pinnatifidis. *Kleiner Mohn*, *Saatmohn*.

(L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Schkuhr. bot. Handb. t. 140.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes, ad vias, inque collibus graminosis ubique. (In iisdem cum *P. Argemon*. locis. Copiose in *vallis oppidanis*, alibique)

Caulis pedalis, sesquipedalis, erectus, teres, ramosus: *setis* patentibus. *Folia* pinnatifida, incisa. *Pendunculi* terminales, solitarii: *setis* arcte adpressis. *Petala* integræ, rubra, fugacia. *Filamenta* linearia. *Pollen* flavum. *Stigma* multiradiatum. *Capsula* clavato-oblonga, glaberrima.

4) *P. somniferum* capsulis glabris, foraminibus sub stigmate apertis, foliis amplexicaulibus incisis. *Schlafringender Mohn*, *schwarzer Mohnsaamen*.

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1147. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. De Vest. Man. bot. l. c. Knorr. thesaur. I. t. R. 16. *Herb. Blackw.* t. 482.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in Oriente, inque Asia calidiori. (In agris et hortis colitur passim abunde atque in rejec-

tamentis hinc inde e. gr. inter hortos circa *Wirzburgum* quasi sponte provenit.)

Caulis 2 - 3 - pedalis et altior, erectus, teres, strictus, inferne glaberrimus, superne setis raris horizontaliter patentibus hispidus. *Folia* sessilia, amplexicaulia, glaberrima, glauca, obtusa, lobata, crenata. *Petala* magna, albida aut dilute violacea, macula nigra splendente basi notata. *Calyx* glaber. *Stigma* multiradiatum. *Capsulae* magnae, subrotundae, glaberrimae, rore glauco obductae, semina foraminibus sub stigmate emittentes. *Semina* nigricantia.

Planta in hortis *floribus* plenis et semiplenis coloribus elegantissimis exornatis satis nota.

Variat *seminibus* coerulecentibus et albidis.

5) *P. album* capsulis glabris, foraminibus sub stigmate clausis, foliis amplexicaulibus incisis. *Weißer Mohn, großer Gartenmohn.*

(*C. Bauh.* Pin theatr. bot. p. 170. *Herb. Blackw.* t. 483.)

P. somnifer. var. *Linn.*

P. officinale *Gmel.* *Bad. II.* p. 479.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. cum priori.

Ab antecedente: *caulibus* altioribus, *foliis* amplioribus, *petalis* latioribus et longioribus, *capsulis* multo majoribus, sub stigmate poris non dehiscentibus, *seminibusque* albidis aut e canescente - albidis differt.

Plantam cultam constantissimam semper observavi.

239. NYMPHAEA, Seerose, Wasserrose.

1) *N. alba* foliis cordatis integerrimis: lobis imbricatis rotundis, calyce 4 - phyllo. *Weisse Seerose, große Seeblume, Wasser - Lilie.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1152. Eiusd. Enum. p. 546. Pers. syn. pl. II. p. 63. Hoffm. Germ. I. p. 242. De Vest. Man. bot. p. 757. Schkuhr. bot. Handb. t. 142. Knorr. thes. II. t. N. Herb. Blackw. t. 498, a. 498, b. et 499.*)

Perenn. Flor. Junio. — Augusto.

Hab. ad ripas, in stagnis et aquis lente fluentibus. (Ad moeni ripas prope Haßfurth et Kitzingen raro. Ad ripas Salae prope Gemünden, Schunderfeld et Gräfendorf. In lacubus et ad rivulos fossae oppidanae passim. Copiosissime in stagnis circa Abb. Heidenfeld et alibi.)

Radix praelonga, crassa, spongiosa: fibris plurimi tenacibus. Folia ampla, cordato - orbicularia, integerrima et glaberrima, subcoriacea, plana, ad petiolum usque incisa, lobis rotundis imbricatis, supra aquam natantia: petiolis longissimis radicalibus teretibus nudis intus spongiosis. Pedunculi radicales, nudi, extra aquam eminentes, glabri, 1 - flori. Corollae speciosissimae, magnae, polypetala: petalis niveis lanceolatis, interioribus sensim minoribus antheriferis. Calyx 4 - phyllus: foliolis oblongis extus viridibus intus albis petala aequantibus. Filamenta dilatata, flava. Germen margine processibus inflexis flavis cinctum. Fructus cicatricosus, globosus, obtusus.

2) *N. lutea* foliis cordatis integerrimis: lobis approximatis, calyce 5 - phyllo petalis longiore. *Gelbe Seerose, gelbe Wassernymphe, Saalkriuglein.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. p. 1151. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 241. De Vest. Man. bot. l. c. Knorr. thes. II. t. N. 1. Herb. Blackw. t. 497 a. et 497 b.*)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. ad ripas et in aquis stagnantibus.
(Ad ripas moeni et salae hinc inde frequens. Im *Altwasser* et in stagnis circa *Abb. Heidensfeld* abunde aliquique.)

Praecedente omnibus in partibus minor. *Foliorum lobi approximati. Petala 12 - 18 crassa cuneiformia phyllis extus viridibus intus luteis ultra dimidium breviora, Filamenta linearia, recurva, fere uniformia. Fructus laevis, conicus.*

240. T I L I A , Linde.

1) *T. grandifolia* foliis cordatis acuminatis serratis subhirsutis, fructu 4 - loculari, staminibus basi cohaerentibus, stigmate connivente. *Großblättrige Linde, Sommer - Linde, Wasser - Linde.*

(*Hoffm. Germ. I. p. 242. De Vest. Man. bot. p. 756. Mönch. Method. p. 67. Rebent. prodr. Flor. neomarch. p. 215. Wib. Werth. p. 261. G. M. Sch. Flor. der Wetter. II. p. 275. Mill. Dict. n. 2. Knorr. thesaur. I. t. L. 11. Herb. Blackw. t. 469. Schkuhr. t. 141.*)

T. europaea Willd. Enum. p. 565. Roth. Germ I. p. 229. II. p. 587. Smith. Britan. Vol. II. p. 571. Gmel. Bad. II. p. 483.

T. europ. β. L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1161. Pers.
syn. pl. II. p. 66.

T. platyphyllus Scopol. Carn. I. p. 373. Spreng.
Hal. p. 154. Borkh. Holzarten. p. 51.

Arbor. Flor. Jan. Julio,

Hab. in sylvis, in hortis, ad pagos et ambulaera frequens.

Arbor altitudinis variae, saepe praealtus, longaevus: ramis laevibus. *Lignum* leve, molle, albidum. *Folia* alterna, petiolata, cordato - subrotunda, acuminata, serrata, basi obliqua, venosa, subtus in venarum axillis brunneo - villosa. *Pedunculi* axillares, solitarii, corymbosi: *bractea* oblonga obtusa membranacea albida integerrima decurrente aucti. *Flores* albido - lutei, suaveolentes. *Germen* villosum. *Cap-sula* plerumque 4 - locularis, turbinato - globosa, coriacea, pilosiuscula: *loculamentis* pluribus abortientibus.

2) *T. parvifolia* foliis cordatis acuminatis inaequaliter serratis glaberrimis, fructu 5 - loculari, staminibus liberis, stigmate patente. *Kleinblättrige Linde, Winterlinde, Steinlinde.*

(Hoffm. Germ. l. c. *De Vest. Man. bot.* l. c. Mönch. Meth. l. c. Rebent pr. Fl. neom. l. c. Wib. Werth. l. c. G. M. Sch. Fl. der Wetter. II. p. 278. Gmel. Bad. II. p. 484. Schkuhr. l. c.)

T. europaea γ. L. sp. pl. ed. Willd. l. c.

T. europ. Pers. syn. pl. l. c.

T. microphylla Willd. Enum. l. c. Spreng. Hal. l. c.

T. ulmifolia Scopol. Carniol. I. p. 374. Borkh. Holzart. p. 53.

T. cor-

550 POLYANDRIA, MONOGYNIA.

T. cordata Mill. Dict. n. I. *Du Roi* Hærbk. [Baumz. ed. Pott. III. p. 114.

Arbor antecedente multo humilior. *Folia* dimidio fere minora, firmiora, inaequaliter serrata, utrinque glaberrima. *Flores* et *capsulas* tomentosae 5-loculares minores.

241. HELIANTHEMUM, Sonnenröschen.

I) *H. luteum* procumbens, fol. oblongis subpilosis, stipulis lanceolatis. *Gelbes Sonnenr. Goldrösllein, Sonnengürtel, Heidenysop, Heidenschmuck.*

H. vulgare Willd. Enum. p. 571. Pers. syn. pl. II. p. 79. Spreng. Hal. p. 154. Moench. Meth. p. 234.

Cistus Helianthemum L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1029. Hoffm. Germ. I. p. 243. De Vest. Man. bot. p. 756. Roth. Germ. I. p. 229. II. p. 586.

Fruticulus. Flor. Majo — Octobri.

Hab. in pascuis apricis, in ericetis et ad viarum margines ubique frequens.

Caulis lignosus, digitalis, palmaris et major, prostratus, teres, scabriusculus, debilis, parum ramosus. *Folia* opposita, breviter petiolata, oblongo-lanceolata, obtusiuscula, pilosula aut subhirsuta, ciliata, margine revoluta: *superiora* angustiora, elliptica. *Stipulae* oppositae, lanceolatae, pilosae. *Flores* terminales, pedunculati, laxe racemosi, ante anthesin nutantes: *pedunculis* pubescentibus. *Phylla* reflexa, hirsuta, membranacea, costata. *Petala* subrotunda, integririma, lutea, expansa, calycem multo superantia.

Varietas *corollis albis* ab Authoribus quibusdam alegata apud nos nunquam occurrit, et planta per plurimos etiam annos culta *petala semper lutea* retinuit.

Peculiaris ejus filamentorum irritabilitas notatu maxime digna. Stimulo enim minimo inferne tacta ad petala statim sese reclinunt, pistillo dein se inclinunt, tanta vi, ut antherae pistillo supersedeant.

2) *H. album* patulum, foliis lanceolatis hirtis in-canis, stipulis setaceis. *Weißes Sonnenröslein.*

H. apenninum Willd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. II. p. 80.

H. incanum Mönch. Meth. supplem. p. 76.

H. pulverulentum? Pers. syn. pl. 1 c.

Cistus apenninus L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1211. Houttuyn. Pilanzensyst. VII. p. 236.

Fruticulus. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sicciissimis lapidosis, in pascuis sterilibus et ad vias. (Copiose in campo sterili versus *Veitshöchheim* juxta der *Kastanien-Allee*. et in monte *Kalbenstein* prope *Karlstadt* inque ejus vicinia ad vineas et vias. Rarius in sterilibus siccis lapidosis prope *Gerbrunn*, in monte *Nicolai*, in campo sterili inter *Retzbach* et *Thüngen*, ad viam ab oppidulo *Karlstadt* versus *sylvam stettensem* alibique.)

Radix lignosa, longa, tortuosa, ramosa, digitii minimi crassitie, fibris copiosis tenacibus aucta, extus nigro-fusca, intus albida. *Caulis* lignosus, brevissimus, vix pollicaris, a basi ramosissimus: *ramis* patulis teretibus incano-pubescentibus basin versus saepe rubicundis, *interioribus* magis rectis. *Folia* op-

posita, breviter petiolata, lanceolata, margine revoluta ciliata, utrinque incana, supra magis minusve hirta, subtus tomentosa nervo intermedio valido dense villoso. *Stipulae* submembranaceae, setaceae, fuscae, caducae. *Flores* speciosi, terminales, racemosi, secundi, ante et post anthesin nutantes: *pedunculis* alternis pubescentibus superne paulo incrassatis. *Phylla* ovata, pubescentia, ciliata, albida: *costis* laete viridibus. *Petala* subrotunda, serrulata, alba, expansa, calyce duplo majora.

Pro solo diverso natali planta haec non parum variat. In siccissimis asperis, vel lapidosis sterilibus tota fere procumbit: *apicibus* modo erectis. *Folia* tunc habet angustissima, valde revoluta, fere teretiussula, utrinque, et *ramulos*, tomento albido dense vestita, supra nusquam hirta, et *flores* multo minores. In terra vero minus sterili major et magis erecta evadit, *soliaque* latiora, magis plana, minus revoluta supra hirta et *petala* majora ostendit.

In planta culta *caulis* et *rami* amoene rubelli et pilis incanis adpressis quasi pulverulentii adparent. *Folia* adhuc latiora et longiora, supra magis viridia pilis adpressis hirta, subtus tomento viridi - incano praedita.

In plantis multis per plurimos annos a patre meo cultis et in spontaneis petala semper constanter alba observavi.

242. DELPHINIUM, *Rittersporn.*

I) *D. Consolida* capsula solitaria, calcare calycem excedente, foliis multipartitis, caule ramoso.

Feld-

Feld - Rittersp. Spornblume, Lerchenklaue, St. Otilienkraut.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1226. *Ejusd.* Enum. p. 573. *Pers.* syn. pl. II. p. 82. *Hoffm.* Germ. I. p. 244. *De Vest.* Man. bot. p. 770. *Herb.* *Blackw.* t. 26. *Knorr.* thesaur. I. t. R. 17.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in agris, arvis et inter segetes frequens.

Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, teres, glaber s. villosiusculus, superne ramosus. *Folia* alterna, multifida: *lacinias* linearibus angustissimis subpubescentibus, *inferiora* petiolata, *superiora* sessilia. *Racemi* terminales, nudi, laxi, pauciflori. *Flores* coerulei postice calcare nectarifero unciali ascendente. *Capsula* oblonga, subulata, hinc ventricosa, inde apice dehiscens.

TRIGYNIA.

243. ACONITUM, Eisenhut, Sturmhut.

I) *A. Lycocotonum* foliis palmatis subvillosis: *lacinias* inciso - serratis subtrifidis, corollis flavis. *Gelber Eisenh.* *Wolfswurz*, *Wolfsgift*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1232. *Ejusd.* Enum. p. 575. *Pers.* syn. pl. II. p. 83. *Hoffm.* Germ. I. p. 245. *De Vest.* Man. bot. p. 770. *Jacq.* Austr. t. 380. *Herb.* *Blackw.* t. 563.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in montosis sylvaticis et ad ripas.
(In montosis des *Steigerwaldes* hinc inde frequens &

gr.

gr. versus dem *Zabelstein*, prope *Michelau* et der *Magdalenenkapelle*. In *sylva gramschatzeni* passim. Copiose in *monte crucis* inque aliis regionibus rhoenensis montosis. Ad ripas prope *Abb. Heidensfeld* e, gr. am *Wehr* versus dem *Bauernsee*, ubi cum *fratre dil.* specimina plurima legi. Ad moeni ripas prope *Kitzingen* versus *Gr. Benlangheim* legit am def. *Dr. Billing*, et in subhumidis umbrosis *sylvae Guttenberg* *D. Consil. cammer. Müller.*)

Caulis 2 - pedalis et altior, erectus, teres, dichotomus, superne praecipue pubescens. *Folia* alterna, longe petiolata, pubescentia, ciliata, atro - viridia, palmata, 5 - partita: *laciniis* cuneiformi - lanceolatis acutis plerumque trifidis laciniato - dentatis. *Racemi* terminales, simplices, longi. *Flores* alterni, pedunculati, villosi, flavi. *Galea* elongata, compressa, obtusa, rugosula, antice mucronata. *Cuculli* calcar spirale: *labio* truncato subemarginato.

2) *A. neomontanum* foliis digitato - quinque-partitis nitidis glabris: *laciniis* lato - lanceolatis dentatis, corollis coeruleis. *Neubergischer Eisenh.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1236. *Ejusd.* Enum l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 771. *Spreng.* Hal. p. 155. *Kölle* spicil. obs. de Aconit. 16.)

A. Napellus *Roth.* Germ. I. p. 231. II. p. 591. *Jacq.* Austr. t. 381.

Perenn. Flor. Jul. Augusto.

Hab. in montosis sylvaticis. (In montibus sylvaticis prope *Bischofsheim ad rhoen.* satis frequens, unde benignitate *cl. consil. medic. Horsch* specimenina plurima accepi.)

Cau-

Caulis 3 - 4 - pedalis, erectus, firmus, teres, simpliciusculus, glaber, superne parum pubescens. *Folia* alterna, petiolata, utrinque nuda laevia nitentia, supra obscure viridia, subtus pallidiora, ampla, subpalmato - quinquepartita: *segmentis* latis profunde inciso - laciniatis, *laciniis* lato - lanceolatis breviter et remote dentatis. *Racemus* terminalis, longus, laxus, inferne racemoso - ramosus. *Flores* speciosi, atro - cyanei vel saturate violacei, pedunculati: *pedunculis* pubescentibus unifloris. *Galea* brevis, fornicate, antrorsum breviter rostrata. *Cuculli* calcar aduncum, obtusum: *labio* lanceolato revoluto bifido.

P E N T A G Y N I A.

244. AQUILEGIA, Aglei.

1) *A. vulgaris* nectariis incurvis, foliolis 3 - lobis incisis cauleque multifloro glabris. *Gemeiner*, *Aglei*, *Ackelei*, *Adlersblume*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1245. *Ejusd.* Enum. p. 577. *Pers.* syn. pl. II. p. 85. *Hoffm.* Germ. I. p. 246. *De Vest.* Man. bot. p. 776. *Herb.* *Blackw.* t. 409. *Knorr.* thesaur. I. t. A.)

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Julio*.

Hab. in *sylvis*, *pratis* et *pomariis* fere ubique,

Caulis 1 - 2 - pedalis, erectus, teres, glaber, superne ramosus. *Folia* alterna, triangularia, tripli-cata: *foliolis* rotundatis trifidis obtuse dentatis glabris laevibus subtus glaucis, *radicalia* longe petiolata, *caulina* brevius petiolata, *suprema* sessilia. *Flores* ter-mi-

minales, subpaniculati, cernui, speciosi, coerulei.
Cornua nectarifera cum petalis alterna, sursum directa, incurva.

In spontanea planta *corollae* semper coeruleae. In hortis vero variationes elegantissimae *floribus* nectariis destitutis plenis et semiplenis variisque coloribus exornatis existunt.

245. NIGELLA, Schwarzkümmel.

1) *N. sativa* pilosa, capsulis muricatis, foliis decompositis: laciniis linearis - lanceolatis obtusiusculis. Zahmer Schwarzkümmel, Nardensaamen.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1248. *Ejusd.* Enum. p. 578. *Pers.* syn. pl. II. p. 85. *Hoffm.* Germ. I. p. 246. *De Vest.* Man. bot. p. 777. *Mill.* Dict. t. 187. f. 1.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in hortorum ejectamentis et inter segregates passim.

Caulis palmaris et pedalis, erectus, teres, striatus, pilosiusculus, simpliciusculus. *Folia* alterna, triplicato - pinnata: *foliolis* linearis - lanceolatis obtusiusculis pilosis ciliatis. *Flos* terminalis, longe pendunculatus absque involucro. *Petala* utrinque attenuata, plerumque albida, raro flava. *Capsulae* subrotundae, muricatae. *Semina* trigona, compressiuscula, rugoso - scabra, nigra, fragrantia, aromaticia.

In hortis variat floribus plenis.

2) *N. arvensis* glabra, capsulis turbinatis, foliis decompositis: laciniis linearis - setaceis. Wilder Schwarzk. Ackernigelle.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 146. *Herb. Blackw.* t. 559.)

Ann. Flor. Julio — Septembri.

Hab. inter segetes et ad vias sere ubique.

Similis antecedenti, a qua differt: *caulibus* demissioribus plerumque magis ramosis glabris, *foliolis* linearis - setaceis pilosiusculis, *floribus* minoribus, *petalis* longius unquiculatis ex albo viridescentibus s. coerulescentibus, et *capsulis* longe corniculatis.

3) *N. damascena* glabra, floribus involucro folioso cinctis. *Damaszenischer Schwarzk.* *Gretel unter dem Busch.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Ejusd.* Enum. p. 577. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Mill. Dict.* t. 187. f. 2. *Herb. Blackw.* t. 558.)

N. involucrata *Mönch.* Method. p. 314.

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in hortis et in eorum viciniis passim quasi sponte.

Caulis palmaris, *pedalis* et altior, *teres*, *striatus*, *subramosus*, *glaber*. *Folia* alterna, *sessilia*, *subradecomposita*: *foliolis* angustissimis linearis - setaceis glabris, *suprema* plerumque 5 florem involucri ad instar cingentia. *Petala* ovalia, *mucronata*, *pallide coerulea*. *Capsula* globosa *stylis* 5 *coronata*.

Variat in hortis floribus plenis.

POLYGYNIA.

246. HEPATICA, Leberkraut.

1) *H. nobilis* pedunculis foliisque trilobis integrerrimis radicalibus. *Edles Leberkr. Leberblümlein.*

(Moench. Method. p. 216. G. M. Sch. Flor. der Wetter. II. p. 300.

H. triloba Willd. Enum. p. 580.

H. anemonoides De Vest. Man. bot. p. 806.

Anemone Hepatica L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1272. Pers. syn. pl. II. p. 96. Hoffm. Germ. I. p. 247. Schkuhr. bot. Handb. t. 150. Sturm D. Flor. I. 7. Herb. Blackw. t. 207. Knorr. thesaur. t. L. 13.

Perenn. Flor. Mart. Aprilii.

Hab. in umbrosis montosis. (In monte prope Homburg, ad margines sylvae Anspach prope Abb. Heidenfeld raro et in hortis ubique.)

Folia e radice fibrosa plurima, in cespitem digesta, longe petiolata, coriacea, supra glabra nitida, subtus villosa, triangula, cordato - triloba: lobis integrerrimis. Petioli pedunculis crassiores, pilis longis pubescentes. Pedunculi radicales, digitales, erecti, teretes, uniflori, villosi, sursum attenuati, foliis paulo altiores, et ante ea progredientes. Calyx 3 - phyllus: foliolis ovatis acutiusculis villosis a petalis paululum remotis. Petala ovalia, obtusa, patentia, coerulea. Germina villosa.

In hortis floribus rubris, carneis, albidis et plenis variat.

247. PULSATILLA; Küchenschelle.

1) *P. vulgaris* petalis rectis. *Gemeine Küchensch.*
Osterblume, Schlottenkr.

(*Willd.* Enum. p. 581. *G. M. Sch.* Flor. d. Wetter. II. p. 294.)

Anemone Pulsatilla L. sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1274. *Pers.* syn. pl. II. p. 96. *Hoffm.* Germ. I. p. 247. *De Vest.* Man. bot. p. 792. *Sturm* D. Flor. I. 7. *Knorr.* thesaur. II. t. A. 7.

Perenn. Flor. *Martio* — *Majo.*

Hab. in asperis montosis et ad vias saxonias ubique.

Caulis digitalis, palmaris, post florescentiam duplo fere longior, erectus, teres, simplex, villosus, uniflorus. *Folia* radicalia, petiolata, in orbem digesta, bipinnatifida, incisa: *laciniis* linearibus acutis sulco exaratis villosis. *Involucrum* polyphyllum, foliaceum, villosum, primo florem amplectens, dein flori approximatum, et anthesi peracta pedunculi elongatione a fructu remotissimum. *Flos* speciosus, terminalis, solitarius, plerumque erectus, ante et post anthesin nutans. *Petala* elliptica, recta aut subrecurva, atro - purpurea, extus pilis albis hirsuta. *Semina* caudata plumosa.

Varietas *floribus* *albis* circa dem Hexenbruch non rara.

Planta acris, venenata.

2) *P. pratensis* petalis apice reflexis. *Wiesen-*
Küchensch. *Hackenkraut.*

(*Willd.* Enum. l. c. *G. M. Sch.* Flor. der Wetter. II. p. 295. *Moench.* Method. suppl. p. 205.)

Ane-

Anemone pratensis L. sp. pl. ed. Willd. I. c.
Pers. syn. pl. p. 97. Hoffm. Germ. I. c. De Vest.
Man. bot. I. c. Schkuhr bot. Handb. t. 150.)

Perenn. Flor. Martio — Majo.

Hab. in montosis saxosis. (In asperis hinc
inde ad montem Hohwann prope Haßfurth et circa
dem Zabelstein perraro. In saxosis pinetis versus
Arnshaußen specimina 3 legi.)

Antecedenti simillima, a qua differt: caule altiore,
foliis et involucris densius villosis, flore multo
minore angustiore semper pendulo, petalis breviori-
bus conniventibus apice semper reflexis magis nigri-
cantibus extus villosissimis.

Uti prior acris, venenata.

248. ANEMONE, *Windblume.*

1) *A. Sylvestris* seminibus lanatis, petalis 5 or-
biculato - ellipticis albis. Wald - Windbl.

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1278. Ejusd. Enum.
p. 581. Pers. syn. pl. II. p. 97. Hoffm. Germ. I.
p. 248. De Vest. Man. bot. p. 793.)

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in nemorosis, in saxosis et ad vias
fere ubique.

Caulis palmaris, pedalis et altior, erectus, teres,
villosus, simplex, ut plurimum 1 - florus, in medio
foliis ternis breviter petiolatis 3 - partitis laciniatis
praeditus. Folia radicalia longius petiolata, in orbem
disposita, 5 - partita: laciniis cuneiformibus trifidis
costato - venosis villosis. Flos terminalis, speciosus,
magnus, nutans. Petala plerumque 5, raro 6, orbi-
cula-

culato - elliptica, obtusissima, concava, integra, alba, extus villosa. *Semina* ovata, mucronulata, lanata.

Variat *caule* multo humiliori vix digitali et *floribus* triplo fere minoribus.

2) *A. nemorosa* seminibus nudis, petalis 6 ovatis albis. *Busch* - *Windbl.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1281. *Ejusd.* Enum l. c. *Pers.* syn. pl. p. 98. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 794. *Sturm D. Flor.* I. 14.)

Perenn. *Flor.* *Martio* — *Majo*.

Hab. in *sylvis*, in *nemoribus* et ad eorum *margines* ubique.

Caulis digitalis, palmaris et altior, erectus, teres, glabriusculus, simplex, semper uniflorus, in medio *foliis ternis* petiolatis ternatis: *foliolis* lanceolatis subtrifidis acute serratis glabris. *Folia radicalia* aut nulla aut unicum caulinis conforme. *Flos* terminalis, solitarius, nudus, subnutans. *Petala* saepissime 6, interdum 7, ovata, obtusa, integra, planiuscula, alba, glabra, extus plerumque rubicunda. *Semina* mucronata, nuda.

Varietas *corollis* dilute purpureis apud nos etiam occurrit.

3) *A. ranunculoides* seminibus nudis, petalis 5 ellipticis luteis. *Hahnenfußähnliche Windbl.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1282. *Ejusd.* Enum. p. 582. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 249. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Sturm D. Flor.* I. 7.)

Perenn. *Flor.* *April.* *Majo*.

Hab. in *sylvis* et *nemoribus* ubique, etiam ad *sepes* hinc inde.

Caulis digitalis, palmaris et altior, erectus, teres, simplex, glaber, 2 - aut 3 - florus, rarius 1 - florus, in medio *foliis ternis* fere sessilibus ternatis v. tri-partitis: *foliolis* lanceolatis incisis antice obtuse dentatis glabris. *Folium radicale* plerumque unicum, longe petiolatum, caulinis conforme, mox marcescens. *Pedunculi terminales*, erecti, 1 - flori, pilosi, foliis caulinis breviores. *Petala* 5 elliptica, obtusa, patentia, lutea. *Semina* mucronata, nuda.

Caulis primo intuitu uniflorus rudimento saltem floris alterius in axillis foliorum praeditus est.

249. FICARIA, *Fikarie*, *Feigwarzenkraut*.

I) *F. verna* foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Frühlings - Fikarie*, *kleines Schollkraut*.

(*Pers. syn. pl. II p. 102.*)

F. ranunculoides Roth. *Germ. I. p. 241. II. p. 622.* *Mönch. Method. p. 215.* *Rebent. Neomarch. p. 238.* *G. M. Sch. Flor d. Wetter. II p. 302.*

Ranunculus Ficaria L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1312. *Ejusd Enum. p. 587.* *Hoffm. Germ. I. p. 253.* *De Vest. Man. bot. p. 801.* *Herb. Blackw. t. 51.* *Sturm D. Flor. I. II.*

Perenn. Flor. Martio — Majo.

Hab. in umbrosis, ad ripas, in nemoribus et pratis uidis ubique.

Radix e tuberibus parvis pyriformibus carnosis composita. *Caulis* digitalis et palmaris, decumbens s. erectiusculus, debilis, compressiusculus, simplex s. parum ramosus, glaber. *Folia* longe petiolata,

cor-

cordata, angulata, glabra, nitida, in medio saepissime macula fusca notata: *radicalia* in orbem digesta, *caulina* alterna. *Flores* terminales: *pedunculis* solitariis unifloris erectis. *Phylla* 3 ovata, concava. *Petala* magna plerumque 8 aut 10, lanceolata, obtusa, integra, patentissima, splendentia, lutea, basi *squa-ma nectarifera* notata.

Variat *caulibus* minoribus et majoribus, interdum totis erectis.

Planta acris, suspecta.

250. CLEMATIS, *Waldrebe.*

I) *Cl. Vitalba* foliolis cordatis, petiolis cauleque scandentibus. *Wilde Waldr. kriechendes Brennkraut, Hexenstrang.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1292. *Ejusd.* Enum. p. 583. *Pers.* syn. pl. II. p. 100. *Hoffm.* Germ. I. p. 249. *De Vest.* Man. bot. p. 795. *Schkuhr.* bot. Handb. t. 151. *Jacq.* Austr. t. 308.)

Clematitis vitalba *Mönch.* Meth. p. 296.

Frutex. Flor. Junio — Septembri.

Hab. in sylvis, ad dumeta et sepes ubique copiose.

Caules plures, praelongi, flagelliformes, ramosi, angulati, sulcati, glabri, tenacissimi, super sepes et arbusta scandentes. *Petoli* flexuosi, volubiles. *Folia* opposita, pinnata: *foliolis* cordato - ovatis, acuminatis, integerrimis aut irregulariter incisis glabris, *floralia* plerumque simplicia. *Paniculae* terminales et axillares, infrafoliaceae, dichotomae, divaricatae: *ramis* et *pedunculis* tomentosis. *Petala* 4 subcoriacea,

lanceolata, *obtusa*, *reflexo-patentia*, *villosa*, *albida*. *Seminum caudae longae*, *plumosae*, *sericeae*, *albidae*, *splendentes*.

Planta acerrima, vesicans, venenata.

2) *Cl. erecta* foliolis ovato-lanceolatis integrerimis, caule erecto. *Aufrechte Waldr. aufrechtes Brennkraut.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1294. *Ejusd.* Enum l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 250. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Jacq.* Austr. t. 291.)

Clematitidis erecta Mönch. Meth. supplem. p. 104.

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in sylvaticis, ad ripas sabulosas et in pratis passim frequens.

Caulis 2 - 4 - *pedalis*, *erectus*, *firmus striatus*, *glaber*. *Folia* *opposita*, *petiolata*, *pinnata*: *foliolis* *pedicellatis* *ovato-lanceolatis* *integerrimis* *glabris*, *junioribus* *pubescentibus*, *summa* *minora ternata*. *Paniculae* *terminales*, *ramosae*, *erectae*, *multiflorae*: *pedunculis* *simplicibus* *unifloris* *longitudine* *fere* *aequalibus*. *Petala* 4 et 5 *obverse lanceolata*, *obtusissima*, *venosa*, *alba*, *extus laeviter pubescentia*. *Seminum caudae breves*, *reflexae*, *plumosae*.

Planta acris, rubefaciens, uti praecedens.

251. THALICTRUM, Wiesenraute.

1) *Th. minus* *follis tripinnatis*: *foliolis trifidis* *glaucis*, *floribus paniculatis cernuis*. *Kleine Wiesenraute.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1297. *Ejusd.* Enum. p. 584. *Pers.* syn. pl. II. p. 100. *Hoffm.* Germ. I. p. 250.

p. 250. *De Vest. Man. bot.* p. 796. *Jacq. Austr.*
t. 419. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 151.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in montosis herbidis. (Ad montem Schwammburg prope Kitzingen et circa dem Hohwann prope Haßfurth raro. Ad montem Kalmut et in summis des Kalbevsteiner Berges prope Karlenburg hinc inde.)

Caulis sesquipedalis et 2 - pedalis, erectus, teres, striatus, glaber, fistulosus, superne ramosus, nebula coerulescente obductus. *Folia* alterna, supradecomposita: *foliolis* utrinque glabris supra laete viridibus subtus pallidioribus venoso - reticulatis apice purpurascens: *inferioribus* subrotundis obtusis apice 4 - 5 - 6 - - ies incisis, *superioribus* subcuneiformi - rotundatis trifidis duplo fere majoribus. *Stipulae* ad basin petiolorum brevissimae, denticulatae, albidae. *Panicula* terminalis, ampla, divaricata, ramosa: *floribus* pedicellatis parvis cernuis. *Petala* elliptica, acutiuscula, purpureo - flavescentia, staminibus breviora. *Antherae* flavae. *Germinu* 4 - 5, rarius 6. *Semina* ovata, sulcata, acuta, fusca.

2) *Th. flavum* foliis bipinnatis: foliolis trifidis, caule sulcato, panicula ramosissima coarctata, floribus erectis. *Gelbe Wiesenr.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1300. *Eiusd. Enum.* p. 585
Pers. syn. pl. p. 101. *Hoffm. Germ.* p. 251. *De Vest. Man. bot.* l. c.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in pratis subhumidis, ad ripas inque nemorosis montosis. (In Insula versus dem Siechhaufse. Ad moeni ripas ante portam Pleichach versus Veits-

Veitshöchheim, prope *Thüngersheim*, *Zellingen*, *Retsbich*, *Gemünden*, *Ochsenfurth*, *Kitzingen* et alibi. In pratis prope *Randersacker*, *Goßmannsdorf*, *Himmelstadt*, *Wipfeld*, *Abb. Heidenfeld*, *Volkach*, *Gaibach* inque multis adhuc aliis regionibus.)

Caulis 2 - 4 - pedalis et altior, erectus, sulcato-striatus, fistulosus, glaber, parum ramosus. *Folia* alterna, subsessilia, bipinnata: *foliolis* sessilibus glabris supra saturate viridibus subtus pallidioribus lanceolatis integerrimis simplicibus 2 - 3 - fidisque cuneiformibus, *terminali* latiore et longiore. *Stipulae* breves, fuscae, lacerae. *Panicula* terminalis, densa erecta, speciosa, ramosissima, coarctata: *floribus* erectis. *Petala* ovata, concava, obtusa, lutea, staminibus breviora. *Antherae* pallide luteae. *Germina* 5 - 6 - 10. *Semina* subovata.

3) *Th. angustifolium* foliis sub - bipinnatis: *foliolis* linearibus integerrimis, caule sulcato, *panicula* ramosa, *floribus* subnutantibus. *Schmalblättrige Wiesenr.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1299. *Ejusd.* Enum. p. 584. *Pers.* syn. pl. l. c. *Roth.* Germ. I. p. 233. II. p. 597. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Spreng.* Hal. p. 156.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in graminosis siccis, ad sylvarum margines. (Ad margines sylvae *Burgerwald* prope *Röttingen* et in pratis siccis prope *Ebern* plantas paucas vidi.)

Caulis pedalis, sesquipedalis et altior, erectus, strictus, fistulosus, sulcato - angulatus, glaber, superne parum divisus. *Folia* alterna, bipinnata, cauli fere adpressa: *inferiora* pétiolis brevissimis membrana-

paceis vaginantibus fuscis superne sulcatis, *superiora* perfecte sessilia. *Foliola* angustissima, linearia, longa, integerrima, margine reflexa, obtusa, utrinque glabra, laete viridia, splendentia, rigidiuscula. *Stipulae* parvae, scariosae, lacerae, fuscae. *Panicula* terminalis, parva, stricta, nuda, ramosa: *floribus* subnutantibus. *Petala* lutescentia, staminibus multo minora. *Antherae* pallide luteae. *Germina* 4 - 8. *Semina* ovata, acuta, sulcata.

An sit praecedentis *varietas*, satis nondum exploratum est.

4) *Th. aquilegifolium* foliis bipinnatis: foliolis obtuse trilobis, caule tereti, panicula subcoarcta-
ta, floribus erectis. *Agleiblättrige Wiesenraute.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1301. Ejusd. Enum. p. 585.
Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest.
Man. bot. p. 797. Jacq. Austr. t. 318.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in montosis. (Ad montem *Kalmut* et inter ruinas arcis *Karlsburg*, ubi cum cl. D. Doct. Geist saepius legi. In monte *St. Viti* versus *Hoheneck* prope *Neustadt ad Saal*. Non procul a via praecipi*ti in monte crucis*, quam *Kniebrech* vocant, alibique raro.)

Caulis 1 - 2 - pedalis et altior, erectus, teres, glaber; fistulosus, laeviter striatus, superne divisus. *Folia* ampla, alterna, petiolata, bipinnata: *foliolis* ovato - subrotundis obtusis superne lobatis dentato - incisis glaberrimis supra viridibus subtus glaucis venoso - reticulatis, foliolis *Aquilegiae vulgaris* similibus. *Stipulae* parvae, amplexicaules. *Panicula* terminalis, corymbosa, densissima, maxime multi-flora: *floribus* pedunculatis odoratis erectis. *Petala* obo-

obovata, obtusa, concava, patentia, fugacia, albida, staminibus multo breviora. *Filamenta* ex lutescente albida, saepe purpurascentia: *antheris* pallide luteis. *Gernina* 6 - 8. *Semina* triangularia, obovata, glabra, pendula.

252. ADONIS, *Adonisröslein.*

1) *A. aestivalis* petalis sublanceolatis planiusculis, fructu cylindrico. *Sommer* - *Adonisr. Blutstropflein.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1303. *Pers.* syn. pl. II. p. 102. *De Vest.* Man. bot. p. 799. *Knorr.* thes. II. t. A. 12.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. in agris et inter segetes fere ubique.

Caulis palmaris, nonnunquam pedalis, erectus, teres, striatus, glaber, simplex, interdum ramosus. *Folia* alterna, bipinnato - multifida: *laciinis* linearibus teretiusculis laete viridibus glabriusculis, *inferiora* breviter petiolata, *superiora* sessilia amplexicaulia. *Flores* terminales, (interdum unicus) solitarii, erecti, pedunculati. *Calyx* 5 - phyllus. *Peta'a* 5 - 7 - 9 patentissima, sublanceolata, fere plana, elegantissime miniata: *unquibus* atro - purpureis. *Semina* ovato - subrotunda, acuta, scabriuscula, in capitulum elongatum cylindricum congesta.

Variat *petalis* citrinis macula ad basin atra vel violacea notatis.

2) *A. autumnalis* petalis obovatis emarginatis concavis, fructu ovato. *Herbst* - *Adonis, Teufelsauge, Blutauge.*

(*L.*)

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1304. *Pers. syn. pl. l. c.*
De Vest. Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Junio — Augusto.

Hab. inter segetes, in agris. (Inter segetes
 inter *Dippach* et *Wipsfeld* specimina plurima inveni
 et alibi.)

Praecedenti valde affinis, et ejus forsitan varietas.
 Spontanea autem planta interea differt: *caule* demissiore
 tenuiore *ramis* plerumque pluribus sterilibus
 praedito, *foliis* minoribus, *petalis* semper fere 8 aut
 9 minoribus obovatis concavis emarginatis raro inte-
 gerrimis saturate coccineis aut atropurpureis basi *ma-
 culæ* atra, et *capitulo* *seminum* magis ovato.

3) *A. flammea* petalis lanceolatis acutis, fructu
 cylindrico, caule hirto. *Brennendrothe Adon.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers. syn. pl. l. c.*
De Vest. Man. bot. l. c. *Hoffm. Germ. I.* p. 251.
Jacq. Austr. t. 355.)

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab. inter segetes. (Inter segetes prope *Burg-*
grumbach, *Oberschwarzach*, *Schönaich*, *Augsfeld*,
Schlüsselfeld et *Thüngbach* specimina plurima legi.
 Etiam in multis aliis adhuc regionibus indigena.)

A 2 praecedentibus *radicis* imprimis *sapore* miti
 fere dulcescenti, qui in illis amarus est, *caule* hirto,
calyce hirsuto, et *petalis* lanceolatis acutis inaequali-
 bus flammæo - miniatis antice subserratis discedit.

253. RANUNCULUS, *Hahnenfuß.*

Foliis simplicibus.

1) *R. Flammula* foliis ovato - lanceolatis petio-
 latis, caule declinato. *Beißender Hahnenf.* *Kleiner*
Sumpfhahnenfuß, *Brennkraut.*

(L.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II p. 1307. *Ejusd.* Enum. p. 586. *Pers.* syn. pl. II. p. 102. *Hoffm.* Germ. I. p. 252. *De Vest. Man. bot.* p. 800.)

Perenn. *Flor.* *Majo* — *Augusto.*

Hab. in lacustribus, in pratis uidis, ad fossas et ripas fere ubique.

Radix valde repens. *Caulis* palmaris et pedalis, procumbens, apice adscendens, teres, glaber, dichotomus. *Folia* alterna, ovato-lanceolata, obtusiuscula, glabra, nervosa, integra aut denticulata: *inferiora* petiolata in petiolum decurrentia, *superiora* subsessilia vaginantia. *Pedunculi* terminales et laterales, longi, erecti, solitarii, uniflori. *Flores* non magni: *petalis* ovatis obtusis integris luteis nitentibus. *Nectarium* fornice tectum.

Herba recens acerrima, vesicans, venenata.

2) *R. reptans* foliis linearibus, caule repente articulato radicante. *Wurzelnder Hahnenf.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest. Man. bot.* p. 801. *Roth.* Germ. I. p. 237. II. p. 610. *Lightfoot.* *Flor. Scot.* I. p. 289. t. I.)

Perenn. *Flor.* *Jun.* *Julio.*

Hab. in humidis et uliginosis. (In fossa oppidana et prope dem *Wassersfall* ante portam *Pleichach.* In uidis circa *Abb. Heidenseld* alibique saepe copiose.)

Differt ab antecedente: *caule* filiformi longiore reptante articulato ad *articulos* radicante *solio* uno alterove aut pluribus erectis obsesso, *foliis* linearibus angustioribus semper integerrimis in petiolum longiorrem

rem decurrentibus, *pedunculis* axillaribus brevioribus et *floribus* duplo minoribus.

Plantas spontaneas atque cultas tam constantes semper observavi, ut species potius peculiaris, quam praecedentis varietas esse videatur.

3) *R. Linqua* foliis lanceolatis acuminatis, caule erecto multifloro. *Großer Hahnens. großer Sumpf-hahnensuß.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1308. *Ejusd. Enum.* p. 587. *Pers. syn. pl. l. c.* *Hoffm. Germ.* l. c. *De Vest. Man. bot.* p. 801.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in stagnantibus, ad lacus et fossas.
(In fossa oppidana juxta dem *Wasserthurm* et ad lacus versus dem *pleichacher Thore* ibidem. Ad moeni ripas uliginosas prope *Hassfurth*, *Volkach* et versus *Hirschfeld*. In paludosis prope *Hassfurth* versus *Zeil*. Ad lacus prope *Gerolshofen* et circa *Abb. Heidenfeld*, in palustribus, ad lacus et am *Altwasser* ibidem. Ad salae ripas prope *Gemünden*, *Gräfendorf*, ad fossas versus *Wolfsmünster* alibique.)

Radix e fibris plurimis profunde terram penetrantibus. *Caulis* sesquipedalis, 2 - *pedalis* et *altior*, *erectus*, *teres*, *crassiusculus*, *articulatus*, *teres*, *stulosus*, *ramosus*, *superne praecipue pubescens*. *Folia* alterna, sessilia aut brevissime petiolata, *amplexicaulia*, *praelonga*, *lanceolata*, *acuminata*, *angusta*, *nervosa*, *integra*, *rarius denticulata*, *subtus praecipue pubescentia*, *costa intermedia canaliculata*. *Flores* speciosi, maximi: *pedunculis* solitariis *erectis pubescentibus longis unifloris*. *Phylla* colorata, sub-

hir-

hirsuta, fugacia. *Petala* obcordata, patentissima, lutea, splendentia.

Planta recens valde acris, caustica, venenata.

Foliis dissectis et divisis.

4) *R. auricomus* foliis radicalibus reniformibus tripartitis crenatis, caulinis sessilibus digitatis linearibus, caule multifloro. *Goldgelber Hahnenfuß.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1314. *Ejusd. Enum. l. c.* *Pers. syn. pl. p. 103. Hoffm. Germ. p. 153. De Vest.* *Man. bot. p. 802.)*

Pereann. Flor. April. Mayo.

Hab. in pratis et pomariis ubique.

Radix maxime fibrosa. *Caulis* palmaris, pedalis, erectus, debilis, teres, glaber, superne ramosus. *Folia* crassiuscula, splendentia, glabra: *radicalia* in orbem digesta longe petiolata reniformia aut subrotundo - cordata subtriloba crenulata, *caulina* alterna brevissime petiolata aut perfecte sessilia amplexicaulia digitata: *laciiniis* linearibus angustis obtusis divisis integerrimis aut dentatis. *Pedunculi* numerosi, terminales, solitarii, erecti, laeviter pubescentes, uniflori. *Phylla* pubescentia, margine luteola. *Petala* primo 2 - 3, dein 5, patentia, concava, lutea, splendentia.

Planta mitis, innocua.

5) *R. sceleratus* foliis inferioribus palmatis, summis digitatis: lobis obtusis, fructibus oblongis. *Gifthahnenfuß, Froschpfeffer.*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1315. *Ejusd. Enum. p. 588.* *Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. p. 254. De Vest.* *Man. bot. p. 803. Herb. Blackw. t. 259.)*

Ann. Flor. Jun. Julio.

Hab.

Hab. in paludosis et ad fossas fere ubique.

Planta tota glaberrima, pallide - viridis, splendens. *Radix* e fibris multis albidis. *Caulis* palmaris, pedalis, quandoque cubitalis, erectus, crassus, succulentus, angulato - sulcatus, ramosissimus: *ramis* erectis angulatis. *Folia radicula* in orbem digesta, longius petiolata, subrotunda, subcarnosa, triloba et 5 - loba: *lobis* cuneiformibus 3 - 5 - fidis integris vel denticulatis. *Folia caulinata* breviter petiolata, alterna, digitata, 3 - partita: *foliolis* linearis - lanceolatis obtusis inciso - dentatis. *Pedunculi* terminales et axillares copiosi, tenues, filiformes, erecti, uniflori. *Flores* parvi. *Phylla* concava, pallide flavescens, caduca. *Petala* obtusa, patentia, integerima, pallide flava, receptaculo oblongo multo breviora, decidua. *Fructus* oblongus, obtusus, viridis: *seminibus* numerosissimis vix maturis deciduis.

Folia recentia et germina acerrima, exulcerantia, maxime venenata.

6) *R. aconitifolius* foliis quinquelobis dentatis, lobis acuminatis, intermediis trifidis, floralibus summis digitatis sessilibus lanceolatis. *Sturmblättriger Hahnenf. Weißer Ranunkel.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. l. c. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 805.*)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in sylvis praecipue montosis. (In *sylva granschatensi*, in der *Waldskugel*, in nemorosis des guttenberger *Waldes* et in *saltu kitzingensi* aliquique saepe frequens.)

Radix e fibris plurimis longis albidis. *Caulis* 2-pedalis et altior, erectus, teres, glaber, fistulosus, superne dichotomus. *Folia* palmata, ad basin usque digitato-quinquepartita: *laciinis* oblongis acuminate dentatis, *intermediis* trifidis, *omnibus* margine inaequaliter inciso-serratis glabris subtus rugulosis venosis pallidioribus; *radicalia* et *caulina inferiora* longius petiolata, *suprema* sessilia ternata: *foliis* lanceolatis acutis serratis. *Pedunculi* terminales, erecti, uniflori. *Phylla* parva, maxime caduca, plerumque dilute purpurascens. *Petala* subrotunda, subserrulata, patentissima, nivea.

Variat interdum praesertim in nemorosis humidoribus foliis amplioribus et floribus majoribus.

Variationem hanc *cl. Dr. Lehmann* in suis sic dictis *primis lineis Florae herbipolensis* p. 39. pro *R. platanifolio*, qui in regionibus nostratibus omnino peregrinus est, summis. In locis enim ab eo allegatis, quae saepissime omni studio peragravi, haec quidem *R. aconitifolii* variatio, neutiquam vero *R. platanifolius* provenit.

Elegans variatio *floribus plenis* in hortis nostris existit.

Planta praecipue recens valde acris.

7) *R. bulbosus* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto multifloro, foliis ternatis trifidis. *Knolliger Hahnenf. Rübenranunkel, gemeine Schmelzblume,*

(*L. sp. pl. ed. Willd.* p. 1324. *Ejusd. Enum.* p. 590. *Pers. syn. pl.* p. 104. *Hoffm. Germ.* p. 255. *De Vest. Man. bot.* p. 804.)

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab.

Hab. in pratis, pascuis et pomariis ubique frequens.

Radix subrotunda, bulbosa, carnosa, albida, basi fibrosa. Caules plures, palmares, pedales et altiores, erecti, quandoque decumbentes, fistulosi, angulati, villosi, superne dichotomi multiflori. Folia ternata: foliolis trifidis inciso - dentatis laete viridibus utrinque villosis; radicalia longe petiolata in orbem digesta; caulina breviter petiolata alterna, summa sessilia digitata: foliolis 2 - et 3 - fidis subcuneiformibus, vel simplicibus linear - lanceolatis. Petioli amplexicaules, pilosi. Pedunculi terminales, erecti, longi, uniflori, sulcati, villosi. Phylla villosa, intus flava, semireflexa. Petala majuscula, subrotunda, obtusa, integra, patentia, lutea, splendentia. Fructus ovato - subrotundus. Semina minuta, inermia.

Variat *caule* digitali *foliisque* magis villosis et *radice* plane fibrosa.

Radix praecipue recens acerrima, vesicans.

In hortis variat floribus plenis.

8) *R. repens* calycibus hirsutis patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus. *Kriechender Hahnenfuß.*

(*L.* sp. *pl.* ed. *Willd.* p. 1325. *Ejusd.* *Enum.* l. c. *Pers. syn. pl.* p. 105. *Hoffm. Germ.* p. 256. *De Vest. Man. bot.* l. c. *Herb. Blackw.* t. 31.)

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in pratis, agris, in vineis et ad muros ubique.

E radice fibrosa *Sarmenta* plura *repentia* saepius etiam *radicantia*, *foliosa*. *Caulis* *pedalis* et *altior*,

gla-

glaber, ramosus, plerumque decumbens, saepius radicans, quandoque, praesertim in cultis, totus erectus. *Folia* petiolata, splendentia, ternata: foliolis tripartitis incisis acute dentatis, summa integerrima. *Pedunculi* terminales, sulcati, erecti. *Phylla* patentia, non retroflexa, extus hirsuta, viridula. *Petala* lutea, nitida, saepius emarginata, tempestate humida aut pluviosa conniventia.

Variationem *floribus plenis*, quae in hortis abundant, etiam spontaneam in pratis pinquieribus circa Abb. *Heidenfeld* cum ill. *Bar. de Bodeck* saepius legi.

Planta omnino mitis, submucilaginosa absque omni acrimonia et inde ab affinibus pluribus facile distinguenda.

9) *R. polyanthemos* calycibus patulis hirsutis, pedunculis sulcatis, foliis multipartitis, caule erecto multifloro, radice fibrosa. *Vielblumiger Hahnenfuß*, *Waldranunkel*.

(L. sp. pl. ed. *Willd.* l. c. *Pers.* syn. pl. l c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. p. 803.)
Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in collibus graminosis et in montosis sylvaticis.

Caulis pedalis et major, debilis, villosus, ramosus, sulcatus, erectus, basi plerumque incurvus. *Folia* villosa, maculata: *radicalia* et *caulina inferiora* subrotunda profunde 5-loba: *lobis* digitato-trifidis inciso-dentatis, *suprema* sessilia profunde triloba aut simplicia: *lobis* linearibus acuminatis. *Pedunculi* terminales, longi, sulcato-angulati, erecti. *Phylla* patentia, e viridi flavicantia, extus hirsuta. *Petala* subrotunda, obtusa, majuscula, lutea, splendentia.

Tem-

Tempestate humida pluviosa *flores* nutant, sed *petala* non connivent.

Acrimonia vix notabili, et pedunculis imprimis sulcatis planta haec a sequenti, cui valde affinis, satis distincta.

10) *R. acris* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito - multifidis, summis linearibus. *Scharfer Hahnenf. Blasenranunkel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1326. *Ejusd.* Enum l. c. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. l. c. *De Vest.* Man. bot. l. c. *Knorr.* thesaur. I. t. H. I.)

Perenn. Flor. Majo — Julio.

Hab. in pratis, pascuis, in pomariis et ad fontes ubique.

Radix subbulbosa: *fibris* longis simplicibus albidis. *Caulis* sesquipedalis, 2 - *pedalis* et *altior*, erectus, *teres*, parum foliosus, inferne pilis adpressis *hirsutus*, superne valde ramosus *multiflorus* minus *pilosus*, glabriusculus. *Folia* utrinque villosula, in medio macula nigricante plerumque notata; *radicalia* longius petiolata subrotunda tripartito - multifida, *suprema* sessilia linearis - lanceolata angusta. *Petioli* pilosi, basi membranacei, vaginantes. *Pedunculi* terminales, pubescentes, erecti, perfecte teretes et non sulcati. *Phylla* patentia, luteola, villosa. *Petala* obcordata, obtusa, lutea, splendentia.

Planta imprimis recens acerrima, vesicans.

Variatio *petalis* elegantissime niveo - variegatis in *sylva* *gramschatzensi* et in aridis prope *Veitshöchheim* haud infrequens.

Variat floribus plenis. Knorr. thes. I. t. H. 2.

11) *R. lanuginosus* calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis. *Rauher Hahnenfuß, wolliger Ranunkel.*

(L. sp. pl. ed. Willd. p. 1127. Ejusd. Enum. l. c. Pers. syn. pl. l. c. Hoffm. Germ. l. c. De Vest. Man. bot. p. 802.)

Perenn. Flor. Junio — Augusto.

Hab. in nemorosis praecipue montosis.
(In nemorosis circa Waldbronn, in sylva guttengenensi, in der Waldskugel inque omnibus fere sylvis montosis satis frequens)

Radix e fibris multis longis nigricantibus. Caulis sesquipedalis, 2 - pedalis, nonnunquam altior, erectus, teres, pilis longis albidis hirsutus, parum ramosus atque foliosus. Folia utrinque villosa holosericea, macula pallida saepius notata, subtus venosa, radicalia et inferiora caulinata longe petiolata ampla subrotunda grosse dentata triloba: lobis lateralibus bifidis medio trifido, intermedia sessilia, summa ternata vel simplicia lanceolata apicem versus serrulata. Pedunculi terminales et laterales, sparsi, erecti, fistulosi, villosi. Phylla patula, villoso - tomentosa. Petala majuscula, subrotunda, obtusa, patentia, integra, aurea, splendentia.

Herba mitis, non acris

12) *R. arvensis* foliis decompositis: laciinis linearibus, seminibus aculeatis. *Acker - Hahnenf. Stachelranunkel.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1329. *Ejusd.* Enum. l. c.
Pers. syn. pl. p. 106. *Hoffm.* Germ. p. 257. *De Vest.* Man. bot. l. c.)

Ann. Flor. Majo — Julio.

Hab. in agris et vineis ubique abunde.

Radix e fibris multis tenuibus albidis. *Caulis* pedalis et major, erectus, teres, dichotomus; glaber, superne pubescens. *Folia* petiolata, laete viridia, glabriuscula, decomposita: *laciniis* lanceolatis angustis obtusis; *radicalia* in orbem congesta, *caulina* alterna, *suprema* sessilia multifida: *laciniis* linearibus integerrimis. *Pedunculi* terminales et laterales, erecti, compressiusculi. *Calyx* villosus, patens, luteolus. *Petala* integra, citrina. *Semina* compressa, semilunaria, aculeata, mucrone recurvo terminata.

Planta tota valde acris.

13) *R. hederaceus* foliis reniformi - subrotundis trilobis quinquelobis integerimis, caule repente. *Epheublättriger Hahnenfuß*, *kleiner Wasserranunkel*.

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* p. 1331. *Pers.* syn. pl. l. c. *Hoffm.* Germ. p. 253. *De Vest.* Man. bot. p. 804. *Roth.* Germ. I. p. 240. II. p. 619.)

Perenn. Flor. Jun. Julio.

Hab. in aquis lente fluentibus, ad ripas vadosas. (Ad rivulos et scaturigines fossae oppidanae prope dem *Wasserthurm* et inter dem *neuen* und *rennweeger Thore*. Ad lacum *erlaccensem* prope *Kleinochsenfurth*. Ad lacum prope *Abb. Schwarzach*, prope *Gerolshofen*, circa *Abb. Heidenfeld* et im *Altwasser*

ibidem, ubi specimina pulcherrima legi. Ad moeni ripas vadas prope *Hirschfeld*, *Deichfeld* et alibi)

Radix repens e fibris plurimis tenuibus. *Caules* palmares, nonnunquam pedales et longiores, repentes, teretes, glabri, ramosi, striati, nitentes, in aquis cum foliis in earum superficie natantes. *Folia* longe petiolata, opposita et alterna, reniformi - subrotunda, crassiuscula, glabra, splendentia, macula plerumque fusco - nigricante in medio notata, lobata: *lobis* obtusis, integris, *inferiora* quinqueloba, *superiora* triloba. *Petioles* basi membranacei, subvaginantes, glaberrimi. *Pedunculi* axillares, oppositifolii, crassiusculi, solitarii, uniflori, erecti, *fructiferi* declinati. *Phylla* rotundata, concava, glaberrima, margine albida, demum reflexa. *Petala* ovato - oblonga, acutiuscula, integra, alba, calyce duplo longiora. *Nectaria* lutescentia. *Senuna* ovata, glabra.

Inter omnes *Ranunculi* species stamina paucissima habet, flores enim plerumque octandri, vix decandri evadunt.

Herba acris.

14) *R. heterophyllus* fluitans, foliis emersis peltatis, submersis capillaceis. *Verschiedenblättriger Hahnenfuß.*

(*Pers. syn. pl. l. c. Roth. Germ. I* p. 240. *II. p. 619. G M. Sch. Flor. der Wetter. II. p. 318. Wib. Werth. p. 274.*)

R. aquatilis L. sp. pl. ed. *Willd. p. 1332. Ejusd. Enum. p. 591. Hoffm. Germ. p. 257. De Vest. Man. bot. p. 805. Smith. Britan. Vol. II. p. 596. Spreng. Hal. p. 161.*

R. pel-

R. peltatus Moench. Meth. p. 214.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in aquis stagnantibus et lente fluentibus ubique.

Radix e fibris praelongis repentibus. *Caules* 1 - 2 - pedales et longiores, tenues, debiles, dichotomi, glaberrimi, natantes, submersi. *Folia* alterna, petiolata, glabra: *submersa* supradecomposita multifido - capillaria: *petiolis* brevioribus latis, *emersa* supra aquam natantia subcordacea reniformia longe petiolata, palmato - quinquelobata: *lobis* rotundatis emarginatis. *Pedunculi* praelongi erecti solitarii ex alis supremis. *Petala* speciosa subrotunda, alba, basi plerumque lutea, valde decidua.

Totus acris, uti praecedens.

Variat foliis et floribus majoribus.

15) *R. capillaceus* fluitans, foliis omnibus capillaceis: laciniis divergentibus flaccidis. *Dünnblättriger Hahnenfuß, haarförmiger weißer Wasserranunkel.*

(Pers. syn. pl. l. c. *Gmel. Fl. bad.* II. p. 556.)

R. aquatilis Roth. Germ. I. p. 241. II. p. 620.

R. aquatilis γ. L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 1332. *Hoffm.* Germ. l. c.

R. divaricatus Schrank. Bav. II. p. 104. *Moench.* Method. l. c. *G. M. Sch. Flor. der Wetter.* II. p. 319. *Wibel.* Werth. p. 274.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab.

Hab. in aquis stagnantibus, lente fluentibus et ad ripas ubique frequens.

Ab antecedente *foliis* omnibus capillaceis supradecompositis multifidis: *laciniis* divergentibus subcompressis circumscriptione rotundatis, et *floribus* minoribus perfecte distinctus.

An sit praecedentis *varietas*, valde dubito.

Herba recens insignem acrimoniam possidet.

16) *R. peucedanifolius* fluitans, foliis omnibus capillaceis: laciniis dichotomis parallelis longissimis. *Haarstrangblättriger Hahnenfuß.*

(*Moench. Method.* p. 214. *G. M. Sch. Flor. der Wetter.* II. p. 319. *Wib. Werth.* p. 274.)

R. fluvialis L. sp. pl. ed. *Willd.* p. 1333. *Pers.* syn. pl. p. 106. *Hoffm.* *Germ.* p. 257. *De Vest.* *Man. bot.* p. 806. *Roth.* *Germ.* I. p. 241. II. p. 621.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in lacubus, ad rivulos, ad scaturigines et moeni ripas vadas ubique vulgaris.

Canulea praelongi, 3-4-pedales et longiores, crassi, teretes, subramosi, glabri, cum foliis amoene virides, fluitantes. Folia longissima, alterna, basi lata *amplexicaulia*, *recta*, *circumscriptione oblonga*, *tripartito - multifida*: *laciniis* *capillaceis*, *teretibus*, *apice* *plerumque* *bifidis*, *undequaque dispersis*. *Pedunculi* *crassi*, *axillares*. *Petala* *subrotunda*, *alba*, *basi* *foveola* *annulo* *circumdata* *praedita*.

Planta recens acris.

254. TROLLIUS, *Trollblume, Engelblume.*

1) *T. europaeus* corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. *Europäische Trollbl.* *Kugelhahnenfuß, Kugelblume.*

(*L.* sp. pl. ed. *Willd.* II. p. 1333. *Ejusd.* *Enum.* p. 591. *Pers. syn. pl.* II. p. 106. *Hoffm. Germ.* I. p. 257. *De Vest. Man. bot.* p. 797. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 153. *Sturm D. Flor.* I. 5. *Knorr. thesaur.* II. t. T. 5.)

T. connivens *Mönch. Method.* p. 313.

Perenn. Flor. Mayo — Julio.

Hab. in pratis, in graminosis nemorosis et ad lacus. (In nemorosis des gramschatzer und guttenberger Waldes. In sylva stettensi prope Karlstadt et im Huck prope Wipfeld. In graminosis sylvae zellensis, waldbüttelbronnensis, kistensis et in pratis ad sylvam gramschatzensem e. gr. prope St. Veit copiosissime alibique.)

Radix fibrosa, nigricans. Caulis pedalis, erectus, teres, glaber, simplex, plerumque uniflorus. Folia radicalia in orbem digesta, longe petiolata, palmato-quinquepartita: lacinias incisis dentatis glaberrimis nitidis, caulina subsessilia alterna minora. Flos pulcherrimus, magnus, terminalis, solitarius, erectus, nudus. Petala 12 - 16 obovata, concava, lutea, splendentia, in globum quasi conniventia. Nectaria inter petala et stamina pedicellata, nitida, lutea, apice parum dilatata. Semina nitida, trigona.

Planta subacris.

255. HELLEBORUS, Nieswurz, Christwurz.

1) *H. foetidus* caule multifloro folioso, foliis pedatis, petalis conniventibus. *Stinkende Nieswurz, Läusekraut.*

(*L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1337. Ejusd. Enum. p. 592. Pers. syn. pl. II. p. 107. Hoffm. Germ. I. p. 259. De Vest. Man. bot. p. 798. Herb. Blackw. t. 57.*)

Helleboraster foetidus Mönch. Method. p. 236.

Perenn. Flor. Aprili — Junio.

Hab. in montosis nemorosis, ad sepes et in versuris. (*In sylva gramechatzensi, vitihoechheimensi, guttenbergensi, zellensi, in der Waldskugel et im Millert prope Waldbrunn. In montosis circa Veits-höchheim, Retzbach, Karlstadt et Thiingen. In montibus Kalmut, Kalbenstein, Schwamberg prope Kitzingen et Hohwann prope Haßfurth. Ad sepes et in versuris prope Remlingen, Seßlach, Ebern et versus Giesigheim alibique.*)

Radix carnosa, nigricans: fibris longis plurimis. Caulis 1 - 2 - pedalis et altior, erectus, crassus, firmus, teres, glaber, superne ramoso - dichotomus: ramis subangulatis villosiusculis. Folia alterna, petiolata, pedata: foliolis 9 - 10 subcoriaceis firmis glabris lanceolatis obscure viridibus a medio apicem versus argute et aequaliter serratis, superiora minora sessilia integra 2 - 3 - loba, interdum simplicia, summa ovato - lanceolata amplexicaulia integriruma colorata, radicalia nulla. Flores numerosi, peduncula-ti,

ti, terminales et axillares, cernui. *Phylla* persisten-
tia, erecto - conniventia, viridia, margine atro -
purpurea.

Planta foetida, acris, venenata, drasticas et eme-
ticas vires exercens.

256. CALTHA, *Dotterblume.*

I) *C. palustris* foliis longe petiolatis suborbicu-
latis glabris. *Sumpf-Dotterbl. Butterblume, Kuhblu-
me, Moosblume, deutsche Kaper.*

(L. sp. pl. ed. Willd. II. p. 1338. *Ejusd.* Enum.
p. 592. Pers. syn. pl. II. p. 107. Hoffm. Germ. I.
p. 259. *De Vest. Man. bot.* p. 797. Sturm. Deutschl.
Flor. I. 8. *Schkuhr. bot. Handb.* t. 154. Knorr.
thesaur. I. t. H. 2.)

Populago palustris Moench. Method. p. 300.

Perenn. Flor. Maj. Junio.

Hab. in pratis udis, in paludosis, ad ri-
culos et ripas passim copiose.

Radix fibrosa, albida. Caulis palmaris, pedalis,
interdum altior, erectus, basi plerumque incurvus,
quandoque decumbens, subangulatus, fistulosus, suc-
culentus, glaber, dichotomus. Folia crassiuscula,
glaberrima, lucida, subitus pallidiora, venosa: radica-
lia longe petiolata magna subreniformia vel cordato -
peltata crenata fissura unica, caulinia pauca minora
alterna subsessilia cordato - subtriangularia. Flores
speciosi, terminales, solitarii, magni: pedunculis
sul-

sulcatis unifloris. *Petala* 5 - 9 aurea, dorso subvividia.

Variat *floribus* minoribus, et in hortis *flore pleno*.
Knorr. thesaur. l. c.

Planta subacris, amariuscula.

I n d e x

Generum, Specierum et Synonymorum.

A.

| | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|-------|----------------------|-------------|
| Acer | 404 | Aegopodium | 212 |
| <i>campestre</i> | 408 | <i>Carum</i> | 326 |
| <i>monspessulanum</i> | 409 | <i>Podagraria</i> | 332 |
| <i>Platanoides</i> | 408 | Aesculus | 401 |
| <i>Pseudo - Platanus</i> | 407 | <i>Hippocastanum</i> | 403 |
| <i>trilobum</i> | 409 | <i>Aethusa</i> | 210 |
| <i>Acetosa hastata</i> | 395 | <i>Cynapium</i> | 314 |
| <i>pratensis</i> | 394 | Agrimonia | 480 |
| Aconitum | 538 | <i>Eupatoria</i> | 484 |
| <i>Lycocetonum</i> | 553 | Agrostemma | 438 |
| <i>Napellus</i> | 554 | <i>Githago</i> | 469 |
| <i>neomontanum</i> | ibid. | Agrostis | 38 |
| Acorus | 348 | <i>alba</i> | 78 |
| <i>Calamus</i> | 374 | <i>arundinacea</i> | 83 |
| Actaea | 536 | <i>canina</i> | 76 |
| <i>nigra</i> | 542 | <i>capillaris</i> | 78 |
| <i>spicata</i> | 541 | <i>divaricata</i> | ibid. |
| Adonis | 540 | <i>minima</i> | 65 |
| <i>aestivalis</i> | 568 | <i>Spica venti</i> | 77 |
| <i>autumnalis</i> | ibid. | <i>stolonifera</i> | 78 |
| <i>flammea</i> | 569 | <i>tenella</i> | ibid. |
| Adoxa | 407 | <i>vulgaris</i> | 77 |
| <i>moschatellina</i> | 432 | Aira | 39 |
| | | | Aira |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <i>Aira altissima</i> | 94 | <i>Alsinella erecta</i> | 194 |
| <i>aquatica</i> | 93 | <i>Amygdalus</i> | 495 |
| <i>caespitosa</i> | 94 | <i>communis</i> | 499 |
| <i>canescens</i> | 97 | <i>communis</i> | 500 |
| <i>caryophyllea</i> | 95 | <i>fragilis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>coerulea</i> | 100 | <i>Anagallis</i> | 199 |
| <i>cristata</i> | 92 | <i>arvensis</i> | 234 |
| <i>flexuosa</i> | 94 | <i>coerulea</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>montana</i> | 95 | <i>phoenicea</i> | 233 |
| <i>praecox</i> | 96 | | |
| <i>Alchemilla</i> | 158 | <i>Anchusa</i> | 196 |
| <i>Aphanes</i> | 185 | <i>angustifolia</i> | 220 |
| <i>arvensis</i> | <i>ibid.</i> | <i>officinalis</i> | 219 |
| <i>vulgaris</i> | 184 | <i>Andropogon</i> | 38 |
| <i>Alisma</i> | 350 | <i>Ischaemum</i> | 86 |
| <i>natans</i> | 399 | <i>Androsace</i> | 198 |
| <i>Plantago</i> | 398 | <i>elongata</i> | 227 |
| <i>ranunculoides</i> | 400 | <i>Septentrionalis</i> | 226 |
| <i>Allium</i> | 346 | <i>Anemone</i> | 539 |
| <i>angulosum</i> | 358 | <i>Hepatica</i> | 558 |
| <i>arenarium</i> | 354 | <i>nemorosa</i> | 561 |
| <i>ascalonicum</i> | 358 | <i>pratensis</i> | 559 |
| <i>carinatum</i> | 355 | <i>Pulsatilla</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Cepa</i> | 359 | <i>rannunculoides</i> | 561 |
| <i>fistulosum</i> | 360 | <i>sylvestris</i> | 560 |
| <i>oleraceum</i> | 357 | <i>Anethum</i> | 211 |
| <i>Porrum</i> | 353 | <i>Foeniculum</i> | 324 |
| <i>rotundum</i> | 352 | <i>graveolens</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>sativum</i> | 353 | <i>Pastinaca</i> | 323 |
| <i>Schoenoprasum</i> | 360 | <i>Angelica</i> | 209 |
| <i>Scorodoprasum</i> | 363 | <i>sylvestris</i> | 306 |
| <i>sphaerocephalon</i> | 355 | <i>Anthericum</i> | 347 |
| <i>ursinum</i> | 359 | <i>bifolium</i> | 366 |
| <i>vineale</i> | 356 | <i>Liliago</i> | 367 |
| <i>Alopecurus</i> | 36 | <i>ramosum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>agrestis</i> | 68 | <i>Anthoxanthum</i> | 9 |
| <i>geniculatus</i> | 69 | <i>odoratum</i> | 32 |
| <i>pratensis</i> | 68 | | |
| <i>Alsine</i> | 213 | <i>Anthriscus</i> | 211 |
| <i>media</i> | 339 | <i>vulgaris</i> | 321 |
| | | <i>Apha-</i> | |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| Aphanes | 158 | Asperula | 156 |
| arvensis | 185 | arvensis | 167 |
| Apium | 212 | cynanchica | 169 |
| graveolens | 331 | odorata | 167 |
| Petroselinum | 332 | tinctoria | 168 |
| Aquilegia | 558 | Asprella oryzoides | 70 |
| vulgaris | 555 | Astrantia | 206 |
| Arenaria | 438 | major | 288 |
| rubra | 462 | nigra | ibid. |
| Serpullifolia | 461 | Athamanta | 208 |
| tenuifolia | 463 | Cervaria | 299 |
| trinervia | 461 | Libanotis | 301 |
| Armeniaca epirotica | 501 | Oreoselinum | 300 |
| vulgaris | ibid. | Atriplex | 204 |
| Armeria vulgaris | 340 | hastata | 273 |
| Arundo | 38 | hortensis | 272 |
| Calamagrostis | 81 | olida | 278 |
| colorata | 71 | patula | 273 |
| epigejos | 79 | rosea | 272 |
| glauca | 80 | Atropa | 201 |
| Phragmites | 83 | Belladonna | 250 |
| pseudophragmites | 80 | Avena | 41 |
| sylvatica | 83 | dubia | 139 |
| varia | 82 | elatior | 90 |
| Asarum | 479 | sativa | 138 |
| europaeum | 481 | flavescens | 139 |
| officinale | ibid. | lanata | 92 |
| Asclepias | 204 | mollis | 91 |
| Vincetoxicum | 270 | orientalis | 136 |
| Asparagus | 347 | pratensis | 141 |
| officinalis | 368 | pubescens | 140 |
| Asperugo | 197 | sativa | 137 |
| procumbens | 223 | strigosa | 136 |
| | | tenuis | 138 |

B.

| | | | |
|---------------------|-----|----------|-----|
| Baldingera colorata | 71 | Berberis | 348 |
| Behen vulgaris | 453 | vulgaris | 386 |
| | | Be- | |

I n d e x.

| | P a g. | | P a g. |
|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Beta | 205 | Brom. <i>glomeratus</i> | 115 |
| Cicla | 280 | <i>gracilis</i> | 126 |
| vulgaris | 279 | <i>hirsutus</i> | 132 |
| <i>Bifolium cordatum</i> | 186 | <i>inermis</i> | 131 |
| Blitum | 2 | <i>littoreus</i> | 123 |
| capitalum | 6 | <i>mollis</i> | 128 |
| Borago | 197 | <i>montanus</i> | 130 - 132 |
| officinalis | 223 | <i>multiflorus</i> | 129 |
| Briza | 40 | <i>nanus</i> | 128 |
| <i>Eragrostis</i> | 105 | <i>nemorosus</i> | 132 |
| media | 114 | <i>ovinus</i> | 116 |
| <i>oblonga</i> | 105 | <i>pinnatus</i> | 125 |
| <i>tremula</i> | 114 | <i>pseudarvensis</i> | 130 |
| Bromus | 40 | <i>ramosus</i> | 132 |
| <i>agrestis</i> | 130 | <i>secalinus</i> | 127 |
| <i>altissimus</i> | 132 | <i>stevilis</i> | 135 |
| <i>angustifolius</i> | 130 | <i>sylvaticus</i> | 126 |
| <i>arundinaceus</i> | 123 | <i>teelorum</i> | 134 |
| <i>arvensis</i> | 129 | <i>temulentus</i> | 148 |
| <i>asper</i> | 132 | <i>triflorus</i> | 139 |
| <i>commutatus</i> | 128 | <i>versicolor</i> | 130 |
| <i>decumbens</i> | 113 | Bupleurum | 206 |
| <i>dertonensis</i> | 119 | <i>faleatum</i> | 289 |
| <i>distichus</i> | 135 | <i>longifolium</i> | 290 |
| <i>elatior</i> | 122 | <i>rotundifolium</i> | 289 |
| <i>erectus</i> | 130 | Butorius | 433 |
| <i>giganteus</i> | 133 | <i>umbellatus</i> | 434 |

C.

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| <i>Calamagrostis arundinacea</i> | 82 - 83 | Callitr. <i>intermedia</i> | 5 |
| <i>epigejos</i> | 80 | <i>minima</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>lanceolata</i> | 81 | <i>verna</i> | 4 |
| <i>pseudophragmites</i> | 80 | <i>Calluna vulgaris</i> | 419 |
| Callitrichie | 1 | Caltha | 541 |
| <i>aquatica</i> | 4 - 5 | <i>palustris</i> | 585 |
| <i>autumnalis</i> | 4 | <i>Cameraria fontana</i> | 153 |
| <i>cespitosa</i> | 5 | Campanula | 199 |
| <i>dubia</i> | <i>ibid.</i> | <i>Cervicaria</i> | 241 |
| | | | Cam- |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| <i>Campan. glomerata</i> | 240 | <i>Centunc. arvensis</i> | 475 |
| <i>patula</i> | 237 | <i>minimus</i> | 180 |
| <i>persicifolia</i> | 238 | <i>semidecander</i> | 474 |
| <i>rapunculoides</i> | 239 | <i>Cepa schoenoprasa</i> | 361 |
| <i>Rapunculus</i> | 238 | <i>ventricosa</i> | 360 |
| <i>rotundifolia</i> | 236 | <i>Cerastium</i> | 439 |
| <i>Speculum</i> | 241 | <i>aquaticum</i> | 476 |
| <i>tenuifolia</i> | 237 | <i>arvense</i> | 475 |
| <i>Trachelium</i> | 239 | <i>semidecandrum</i> | 474 |
| <i>Carex uliginosa</i> | 56 | <i>viscosum</i> | 473 |
| <i>Carum</i> | 212 | <i>vulgatum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Carvi</i> | 325 | <i>Cerasus acida</i> | 501 |
| <i>Caryophyllata nutans</i> | | <i>avium</i> | 502 |
| | 534 | <i>duelcis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>officinalis</i> | <i>ibid.</i> | <i>vulgaris</i> | 501 |
| <i>rivalis</i> | <i>ibid.</i> | <i>Cervaria nigra</i> | 299 |
| <i>urbana</i> | <i>ibid.</i> | <i>Ceryispina cathartica</i> | |
| <i>Caryophyllus aridus</i> | 450 | | 256 |
| <i>armerius</i> | 449 | <i>Chaerophyllum</i> | 211 |
| <i>carthusianorum</i> | <i>ibid.</i> | <i>aureum</i> | 319 |
| <i>deltoides</i> | 451 | <i>bulbosum</i> | 318 |
| <i>superbus</i> | 452 | <i>Ceresolium</i> | 321 |
| <i>Caucalis</i> | 207 | <i>hirsutum</i> | 318 |
| <i>Anthriscus</i> | 294 - 321 | <i>palustre</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>arvensis</i> | 255 | <i>sativum</i> | 320 |
| <i>Curta</i> | 296 | <i>sylvestre</i> | 316 |
| <i>daucoides</i> | 293 | <i>tenuum</i> | 317 |
| <i>divaricata</i> | 295 | <i>Chamaenerion angusti-</i> | |
| <i>grandiflora</i> | 291 | <i>folium</i> | 411 |
| <i>helvetica</i> | 295 | <i>grandiflorum</i> | 412 |
| <i>latifolia</i> | 292 | <i>hirsutum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>leptophylla</i> | 293 | <i>montanum</i> | 413 |
| <i>maxima</i> | 291 | <i>palustre</i> | 416 |
| <i>Sanicula</i> | 287 | <i>pubescens</i> | 413 |
| <i>Scandicina</i> | 321 | <i>tetragonum</i> | 415 |
| <i>Scandix</i> | <i>ibid.</i> | <i>Chamagrostis</i> | 36 |
| <i>stricta</i> | 294 | <i>minima</i> | 65 |
| <i>Centaurium minus</i> | 254 | <i>Chelidonium</i> | 537 |
| <i>Centunculus</i> | 157 | <i>haematoxides</i> | 543 |

Ch-

I n d e x.

| | Pág. | | Pág. |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Chelid. <i>laciniatum</i> | 543 | Clematis <i>Vitalba</i> | 563 |
| <i>majus</i> | 542 | <i>Clematitidis erecta</i> | 564 |
| Chenopodium | 205 | <i>vitalba</i> | 563 |
| <i>album</i> | 276 | <i>Cnidium tenuifolium</i> | 570 |
| <i>bonus Henricus</i> | 274 | Colchicum | 349 |
| <i>glaucum</i> | 278 | <i>autumnale</i> | 397 |
| <i>hybridum</i> | 277 | Comarum | 408 |
| <i>murale</i> | 276 | <i>fragarioides</i> | 526 |
| <i>olidum</i> | 278 | <i>palustre</i> | 535 |
| <i>polyspermum</i> | 279 | Conium | 207 |
| <i>rubrum</i> | 275 | <i>maculatum</i> | 296 |
| <i>urbicum</i> | <i>ibid.</i> | Convallaria | 347 |
| <i>viride</i> | 277 | <i>bifolia</i> | 185 |
| <i>Vivaria</i> | 278 | <i>majalis</i> | 369 |
| Chironia | 201 | <i>Mappi</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Centaurium</i> | 253 | <i>multiflora</i> | 371 |
| <i>Centaurium</i> | 254 | <i>Polygonatum</i> | 370 |
| <i>Gerardi</i> | <i>ibid.</i> | <i>verticillata</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>inaperta</i> | 255 | Convolvulus | 199 |
| <i>ramosissima</i> | 254 | <i>arvensis</i> | 235 |
| <i>pulchella</i> | <i>ibid.</i> | <i>sepium</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vaillantii</i> | 255 | Coriandrum | 210 |
| Christophoriana <i>spicata</i> | 542 | <i>Cicuta</i> | 312 |
| | | <i>Cynapium</i> | 314 |
| Chrysosplenium | 406 | <i>latifolium</i> | 308 |
| <i>alternifolium</i> | 421 | <i>maculatum</i> | 296 |
| <i>oppositifolium</i> | 422 | <i>sativum</i> | 314 |
| Cicuta | 210 | Cornus | 157 |
| <i>latifolia</i> | 308 | <i>mascula</i> | 182 |
| <i>virosa</i> | 312 | <i>sanquinea</i> | <i>ibid.</i> |
| Circaeа | 7 | Craepalia temulenta | 148 |
| <i>alpina</i> | 13 | | |
| <i>intermedia</i> | <i>ibid.</i> | Crataegus | 495 |
| <i>lutetiana</i> | 12 | <i>monogyna</i> | 505 |
| <i>vulgaris</i> | <i>ibid.</i> | <i>Oxyacantha</i> | 504 |
| Cistus apenninus | 551 | <i>torminalis</i> | 506 |
| <i>Helianthemum</i> | 550 | Crithmum Silaus | 303 |
| Clematis | 540 | Cucubalus | 437 |
| <i>erecta</i> | 564 | <i>bacciferus</i> | 454 |

Cucu-

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| <i>Cucubal.</i> Behen | 452 | <i>Cynodon dactylon</i> | 67 |
| <i>horizontalis</i> | 454 | <i>Cynoglossum</i> | 196 |
| <i>Otites</i> | 453 | <i>officinale</i> | 220 |
| <i>Cuscuta</i> | 158 | <i>Cynosurus</i> | 40 |
| <i>Epithymum</i> | 187 | <i>coeruleus</i> | 101 |
| <i>europaea</i> | ibid. | <i>cristatus</i> | 115 |
| <i>Cuviera europaea</i> | 149 | <i>durus</i> | 104 |
| <i>Cydonia Cydonia</i> | 511 | <i>Cyperus</i> | 35 |
| <i>vulgaris</i> | ibid. | <i>flavescens</i> | 52 |
| <i>Cynanchum Vincetoxi-</i> | | <i>fuscus</i> | ibid. |
| <i>cum</i> | 270 | | |

D.

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------------------|-------|
| <i>Dactylis</i> | 40 | <i>Dian.</i> <i>superbus</i> | 452 |
| <i>cristata</i> | 93 | <i>Dictamnus</i> | 455 |
| <i>glomerata</i> | 115 | <i>albus</i> | 440 |
| <i>Daphne</i> | 405 | <i>Fraxinella</i> | ibid. |
| <i>Mezereum</i> | 420 | <i>Digitaria</i> | 36 |
| <i>Datura</i> | 200 | <i>Sanquinalis</i> | 66 |
| <i>stramonium</i> | 248 | <i>stolonifera</i> | 67 |
| <i>Daucus</i> | 207 | <i>Dipsacus</i> | 155 |
| <i>Carota</i> | 295 | <i>Fullonum</i> | 161 |
| <i>Delphinium</i> | 538 | <i>pilosus</i> | 162 |
| <i>Consolida</i> | 552 | <i>sylvestris</i> | 161 |
| <i>Dianthus</i> | 437 | <i>Drepanophyllum sio-</i> | |
| <i>Armeria</i> | 449 | <i>des</i> | 309 |
| <i>carthusianorum</i> | 448 | <i>Drosera</i> | 214 |
| <i>deltoides</i> | 451 | <i>longifolia</i> | 344 |
| <i>prolifer</i> | 450 | <i>rotundifolia</i> | 343 |

E.

| | | | |
|------------------------------|-----|-----------------------|------|
| <i>Echium</i> | 197 | <i>Elymus caninus</i> | 143 |
| <i>violaceum</i> | 226 | <i>europaeus</i> | 149 |
| <i>vulgare</i> | 225 | <i>Epilobium</i> | 405 |
| <i>Ehrhartia clandestina</i> | 70 | <i>angustifolium</i> | 411 |
| <i>Elymus</i> | 41 | <i>grandiflorum</i> | 412 |
| | | | |
| Heller Flora. I. | 38 | | Epi- |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Epilob. hirsutum | 412 | Ering. campestre | 286 |
| <i>montanum</i> | 413 | Erithraea Centaurium | 254 |
| <i>montanum</i> | 414 | <i>inaperta</i> | 255 |
| <i>palustre</i> | 415 | <i>ramosissima</i> | 254 |
| <i>parviflorum</i> | 412 | Euphorbia | 480 |
| <i>pubescens</i> | 413 | <i>Cajogala</i> | 491 |
| <i>roseum</i> | 414 | <i>Cyparissias</i> | 492 |
| <i>Spicatum</i> | 411 | <i>degener</i> | 493 |
| <i>tetragonum</i> | 415 | <i>Esula</i> | 490 |
| Erica | 405 | <i>exigua</i> | 487 |
| <i>vulgaris</i> | 419 | <i>Gerardiana</i> | 491 |
| Eriophorum | 35 | <i>helioscopia</i> | 488 |
| <i>angustifolium</i> | 64 | <i>Peplus</i> | 486 |
| <i>cespitosum</i> | 61 | <i>platyphyllos</i> | 489 |
| <i>gracile</i> | 62 | <i>sylvatica</i> | 490 |
| <i>latifolium</i> | 63 | <i>verrucosa</i> | 487 |
| <i>polystachion</i> | ibid. | Evonymus | 202 |
| <i>triquestrum</i> | 62 | <i>europaeus</i> | 257 |
| <i>vaginatum</i> | 61 | <i>vulgaris</i> | ibid. |
| <i>vulgare</i> | 63 | | |
| Eryngium | 205 | | |

F.

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------|-----|
| <i>Fagopyrum carinatum</i> | 430 | <i>Festuca fluitans</i> | 102 |
| <i>esculentum</i> | ibid. | <i>gigantea</i> | 133 |
| <i>membranaceum</i> | 431 | <i>glauca</i> | 117 |
| Fedia | 34 | <i>gracilis</i> | 126 |
| <i>dentata</i> | 46 | <i>heterophylla</i> | 120 |
| <i>olitoria</i> | 45 | <i>Leysseri</i> | 131 |
| Festuca | 40 | <i>loliacea</i> | 124 |
| <i>arundinacea</i> | 123 | <i>multiflora</i> | 122 |
| <i>bromoides</i> | 118 | <i>Myurus</i> | 119 |
| <i>decumbens</i> | 113 | <i>nemorum</i> | 120 |
| <i>dumetorum</i> | 121 | <i>ovina</i> | 116 |
| <i>duriuscula</i> | 120 | <i>pallens</i> | 118 |
| <i>elatior</i> | 123 | <i>pinnata</i> | 125 |
| <i>elatior</i> | 122 | <i>pratensis</i> | 122 |
| <i>elongata</i> | 124 | <i>rubra</i> | 121 |
| | | <i>rubra</i> | 120 |

Fe-

I n d e x

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------------|
| <i>Fest. Sciurooides</i> | 118 | <i>Fragaria</i> | 497 |
| <i>spadicea</i> | 123 | <i>collina</i> | 525 |
| <i>Speciosa</i> | 131 | <i>sterilis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>tenuifolia</i> | 117 | <i>vesca</i> | 524 |
| <i>Fibichia umbellata</i> | 67 | <i>vulgaris</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Ficaria</i> | 539 | <i>Frangula Alnus</i> | 256 |
| <i>ranunculoides</i> | 562 | <i>Fraxinella dictamnus</i> | |
| <i>verna</i> | ibid. | | 440 |
| <i>Filipendula vulgaris</i> | 512 | <i>Fraxinus</i> | 7 |
| <i>Foeniculum vulgare</i> | 325 | <i>excelsior</i> | 11 |
| | | <i>Ornus</i> | <i>ibid.</i> |

G.

| | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|--------------|
| <i>Galanthus</i> | 345 | <i>Galium verum</i> | 173 |
| <i>nivalis</i> | 350 | <i>Gentiana</i> | 205 |
| <i>Galium</i> | 156 | <i>Amarella</i> | 283 |
| <i>Aparine</i> | 178 | <i>campestris</i> | 284 |
| <i>austriacum</i> | 172 | <i>Centaurium</i> | 254 |
| <i>Bocconi</i> | 176 | <i>ciliata</i> | 283 |
| <i>boreale</i> | 177 | <i>cruciata</i> | 285 |
| <i>campanulatum</i> | 172 | <i>germanica</i> | 282 |
| <i>cruciatum</i> | 175 | <i>Pneumonanthe</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>cynanchicum</i> | 169 | <i>Geum</i> | 497 |
| <i>erectum</i> | 173 | <i>rivale</i> | 534 |
| <i>glabrum</i> | 172 | <i>urbanum</i> | 533 |
| <i>glaucum</i> | 171 | <i>Gladiolus</i> | 34 |
| <i>Mollugo</i> | 174 | <i>communis</i> | 47 |
| <i>odoratum</i> | 167 | <i>Globularia</i> | 155 |
| <i>palustre</i> | 170 | <i>vulgaris</i> | 160 |
| <i>Scabrum</i> | 171 | <i>Gratiola</i> | 8 |
| <i>Scabrum</i> | 176 | <i>officinalis</i> | 26 |
| <i>Spurium</i> | 175 | <i>Grossularia rubra</i> | 258 |
| <i>Sylvaticum</i> | 174 | <i>Uva</i> | 260 |
| <i>Sylvestre</i> | 176 | <i>Gypsophila</i> | 436 |
| <i>tinctorium</i> | 168 | <i>muralis</i> | 446 |
| <i>uliginosum</i> | 170 | | |

H.

| | | | |
|---------------|-----|---------------------|-----|
| <i>Hedera</i> | 202 | <i>Helianthemum</i> | 538 |
| <i>Helix</i> | 260 | <i>album</i> | 551 |
| | | <i>38 *</i> | He- |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| <i>Helianth. apenninum</i> | 551 | <i>Holcus mollis</i> | 91 |
| <i>incanum</i> | ibid. | <i>Holosteum</i> | 42 |
| <i>luteum</i> | 550 | <i>nimbellatum</i> | 154 |
| <i>pulverulentum</i> | 551 | <i>Hordeum</i> | 42 |
| <i>vulgare</i> | 550 | <i>coeleste</i> | 152 |
| <i>Helleboraster foetidus</i> | | <i>cylindricum</i> | 149 |
| | 584 | <i>distichon</i> | 152 |
| <i>Helleborus</i> | 541 | <i>murinum</i> | 150 |
| <i>foetidus</i> | 584 | <i>murinum</i> | 151 |
| <i>Hepatica</i> | 539 | <i>nigrum</i> | 152 |
| <i>anemonoides</i> | 558 | <i>pratense</i> | 151 |
| <i>nobilis</i> | ibid. | <i>secalinum</i> | ibid. |
| <i>triloba</i> | ibid. | <i>vulgare</i> | ibid. |
| <i>Heracleum</i> | 208 | <i>Hottonia</i> | 198 |
| <i>Sphondylium</i> | 305 | <i>palustris</i> | 230 |
| <i>Herniaria</i> | 204 | <i>Hyacinthus</i> | 348 |
| <i>glabra</i> | 271 | <i>botryoides</i> | 373 |
| <i>hirsuta</i> | ibid. | <i>comosus</i> | 372 |
| <i>Hippocastanum vulgare</i> | | <i>racemosus</i> | ibid. |
| | 403 | <i>Hydrocotyle</i> | 206 |
| | | <i>vulgaris</i> | 286 |
| <i>Hippuris</i> | 1 | <i>Hyoscyamus</i> | 200 |
| <i>vulgaris</i> | 3 | <i>niger</i> | 249 |
| <i>Holcus</i> | 39 | <i>Hypopithys monotropa</i> | |
| <i>avenaceus</i> | 90 | | 441 |
| <i>lanatus</i> | 92 | <i>multiflora</i> | ibid. |
| I. | | | |
| <i>Jasione</i> | 203 | <i>Iris Squalens</i> | 49 |
| <i>montana</i> | 269 | <i>Juncago palustris</i> | 396 |
| <i>Impatiens</i> | 204 | <i>Juncus</i> | 348 |
| <i>noli tangere</i> | 269 | <i>acutiflorus</i> | 379 |
| <i>Imperatoria Angelica</i> | | <i>ascendens</i> | ibid. |
| | 307 | <i>albidus</i> | 383 |
| <i>Iris</i> | 35 | <i>angustifolius</i> | ibid. |
| <i>germanica</i> | 48 | <i>aquaticus</i> | 378 |
| <i>graminea</i> | 50 | <i>articulatus</i> | 379 |
| <i>Pseud - Acorus</i> | 49 | <i>bufonius</i> | 381 |
| <i>pumila</i> | 48 | <i>bulbosus</i> | ibid. |
| | | | Jun- |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <i>Juncus campestris</i> | 385 | <i>Juncus niveus</i> | 383 |
| <i>compressus</i> | 381 | <i>obtusiflorus</i> | 379 |
| <i>conglomeratus</i> | 375 | <i>pilosus</i> | 384 |
| <i>effusus</i> | <i>ibid.</i> | <i>squarrosum</i> | 378 |
| <i>filiformis</i> | 277 | <i>subverticillatus</i> | 380 |
| <i>glaucus</i> | 376 | <i>supinus</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>inflexus</i> | <i>ibid.</i> | <i>sylvaticus</i> | 379 |
| <i>latifolius</i> | 382 | <i>sylvaticus</i> | 382 |
| <i>leucophobus</i> | 383 | <i>wilginosus</i> | 380 |
| <i>maximus</i> | 382 | <i>vernalis</i> | 384 |
| | | <i>verticillatus</i> | 380 |

K.

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| <i>Knappia agrostidea</i> | 65 | <i>Koeleria cristata</i> | 93. |
| <i>Knauel annum</i> | 445 | | |

L.

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Lapathum Acetosa</i> | 394 | <i>Lentic. minor</i> | 31 |
| <i>Acetosella</i> | 395 | <i>trisulca</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>acutum</i> | 391 | <i>Levcojum</i> | 346 |
| <i>aquaticum</i> | 393 | <i>vernun</i> | 351 |
| <i>crispum</i> | 389 | <i>Libanotis Athamantina</i> | |
| <i>hortense</i> | 388 | | 301 |
| <i>maritimum</i> | 390 | <i>Riviniana</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>obtusifolium</i> | 392 | <i>Ligusticum</i> | 209 |
| <i>Sanquineum</i> | 388 | <i>Carvi</i> | 326 |
| <i>Scutatum</i> | 393 | <i>Foeniculum</i> | 325 |
| <i>virgatum</i> | 390 | <i>Levisticum</i> | 306 |
| <i>Laserpitium</i> | 208 | <i>Phellandrium</i> | 31 |
| <i>latifolium</i> | 304 | <i>Podagraria</i> | 333 |
| <i>Leersia</i> | 37 | <i>Ligustrum</i> | 7 |
| <i>oryzoides</i> | 70 | <i>vulgare</i> | 10 |
| <i>Lemna</i> | 9 | <i>Lilac vulgaris</i> | 11 |
| <i>gibba</i> | 31 | <i>Lilium</i> | 346 |
| <i>minor</i> | <i>ibid.</i> | <i>convallium majale</i> | 369 |
| <i>polyrrhiza</i> | 32 | <i>Martagon</i> | 361 |
| <i>trisulca</i> | 30 | | |
| <i>Lentibularia vulgaris</i> | 27 | <i>Linagrostis polystachya</i> | |
| <i>Lenticula gibba</i> | 32 | | 63 |
| | | | <i>Li-</i> |

I n d e x.

| | P a g. | | P a g. |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <i>Linagr. vaginata</i> | 61 | <i>Lychnis arvensis</i> | 471 |
| Linum | 214 | <i>baccifera</i> | 455 |
| <i>catharticum</i> | 342 | <i>Behen</i> | 453 |
| <i>humile</i> | 341 | <i>dioica</i> | 471 - 472 |
| <i>Radiola</i> | 194 | <i>diurna</i> | 472 |
| <i>sylvestre</i> | 342 | <i>Flos cenculi</i> | 470 |
| <i>tenuifolium</i> | <i>ibid.</i> | <i>Githago</i> | 469 |
| <i>usitatissimum</i> | 341 | <i>nutans</i> | 455 |
| Lithospermum | 196 | <i>officinalis</i> | 447 |
| <i>arvense</i> | 217 | <i>Otites</i> | 453 |
| <i>officinale</i> | 218 | <i>pratensis</i> | 471 |
| <i>purpureo - coeruleum</i> | 219 | <i>sylvestris</i> | 472 |
| | | <i>Vaccaria</i> | 448 |
| Lolium | 41 | <i>vespertina</i> | 471 |
| <i>arvense</i> | 147 | <i>Viscaria</i> | 470 |
| <i>multiflorum</i> | 148 | Lycopsis | 197 |
| <i>perenne</i> | 147 | <i>arvensis</i> | 224 |
| <i>remotum</i> | 148 | <i>pulla</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>temulentum</i> | <i>ibid.</i> | Lycopus | 8 |
| Lonicera | 200 | <i>europaeus</i> | 28 |
| <i>Caprifolium</i> | 244 | <i>exaltatus</i> | 29 |
| <i>Periclymenum</i> | <i>ibid.</i> | Lysimachia | 199 |
| <i>Xylosteum</i> | 245 | <i>nemorum</i> | 232 |
| <i>Luzula albida</i> | 383 | <i>Numimularia</i> | 231 |
| <i>maxima</i> | 382 | <i>thyrsiflora</i> | 233 |
| <i>pilosa</i> | 384 | <i>vulgaris</i> | 232 |
| <i>Lychnanthus scandens</i> | 455 | Lythrum | 479 |
| Lychnis | 439 | <i>hyssopifolium</i> | 483 |
| | | <i>Salicaria</i> | <i>ibid.</i> |
| M. | | | |
| <i>Malus sylvestris</i> | 510 | Melica Lobelii | 99 |
| <i>Majanthemum Convalla-</i> | | <i>nutans</i> | 98 |
| <i>ria</i> | 186 | <i>nutans</i> | 99 |
| <i>cordifolium</i> | <i>ibid.</i> | <i>rigida</i> | 113 |
| Melica | 59 | <i>uniflora</i> | 99 |
| <i>ciliata</i> | 98 | Menyanthes | 198 |
| <i>coerulea</i> | 100 | <i>trifoliata</i> | 230 |
| <i>decumbens</i> | 113 | Mespilus | 496 |
| | | Me- | |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <i>Mespilus aucuparia</i> | 507 | <i>Muscari botryoides</i> | 373 |
| <i>Cotoneaster</i> | 508 | <i>comosum</i> | 372 |
| <i>monogyna</i> | 505 | <i>racemosum</i> | 373 |
| <i>Oxyacantha</i> | <i>ibid.</i> | | |
| <i>Miliarium effusum</i> | 75 | <i>Myosotis</i> | 195 |
| <i>Milium</i> | 37 | <i>annua</i> | 215 |
| <i>crus galli</i> | 89 | <i>arvensis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>effusum</i> | 75 | <i>Lappula</i> | 217 |
| <i>esculentum</i> | 90 | <i>linearis</i> | 475 |
| <i>Moenchia quaternella</i> | 194 | <i>palustris</i> | 216 |
| | | <i>perennis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Molinia aquatica</i> | 93 | <i>Scorpioides</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>coerulea</i> | 100 | <i>semidecandra</i> | 474 |
| <i>variabilis</i> | <i>ibid.</i> | <i>sylvatica</i> | 216 |
| <i>Monotropa</i> | 435 | <i>vulgaris</i> | 473 |
| <i>Hypopithys</i> | 441 | | |
| <i>Montia</i> | 42 | <i>Myosoton aquaticum</i> | 476 |
| <i>fontana</i> | 153 | <i>Myosurus</i> | 214 |
| <i>Morocarpus capitatus</i> | 6 | <i>minimus</i> | 344 |
| <i>Moschatella Adoxa</i> | 432 | | |
| <i>Moschatellina tetragona</i> | | <i>Myrrhis aurea</i> | 320 |
| | | <i>bulbosa</i> | 318 |
| | | <i>hiruta</i> | 319 |
| | | <i>temula</i> | 317 |

N.

| | | | |
|------------------|-----|----------------------------|-----|
| <i>Nardus</i> | 36 | <i>Nigella involucrata</i> | 557 |
| <i>stricta</i> | 64 | <i>sativa</i> | 556 |
| | | <i>Nivaria verna</i> | 351 |
| <i>Nigella</i> | 539 | <i>Nymphaea</i> | 537 |
| <i>arvensis</i> | 556 | <i>alba</i> | 547 |
| <i>damascena</i> | 557 | <i>lutea</i> | 548 |

O.

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <i>Oenanthe</i> | 209 | <i>Ornithogalum</i> | 346 |
| <i>fistulosa</i> | 310 | <i>luteum</i> | 363 |
| <i>Oenothera</i> | 404 | <i>minimum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>biennis</i> | 410 | <i>nutans</i> | 365 |
| <i>Onagra biennis</i> | <i>ibid.</i> | <i>umbellatum</i> | 364 |
| <i>Opulus glandulosa</i> | 534 | <i>villosum</i> | 363 |

Oxa-

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Oxalis | 438 | <i>Oxycoccus palustris</i> | 418 |
| <i>Acetosella</i> | 463 | | |
| <i>corniculata</i> | 469 | <i>Oxys Acetosella</i> | 468 |
| <i>stricta</i> | 463 | <i>lutea</i> | 469 |
| | | | |
| | | P. | |
| <i>Padus avium</i> | 500 | <i>Peucedanum</i> | 208 |
| <i>Panicum</i> | 38 | <i>officinale</i> | 302 |
| <i>erns galli</i> | 89 | <i>silaus</i> | 303 |
| <i>Dactylon</i> | 67 | <i>Phalangium Liliago</i> | 568 |
| <i>glaucum</i> | 88 | <i>ramosum</i> | 367 |
| <i>miliaceum</i> | 89 | <i>Phalaris</i> | 37 |
| <i>milium</i> | 90 | <i>armudinacea</i> | 71 |
| <i>sanquinalis</i> | 66 | <i>aspera</i> | 73 |
| <i>{ verticillatum</i> | 87 | <i>oryzoides</i> | 70 |
| <i>viride</i> | 88 | <i>phleoides</i> | 74 |
| <i>Papaver</i> | 537 | <i>Phellandrium</i> | 209 |
| <i>album</i> | 546 | <i>aquaticum</i> | 311 |
| <i>Argemone</i> | 543 | <i>Philadelphus</i> | 494 |
| <i>dubium</i> | 545 | <i>coronarius</i> | 498 |
| <i>officinale</i> | 546 | <i>Phleum</i> | 37 |
| <i>Rhoeas</i> | 544 | <i>asperum</i> | 73 |
| <i>somniferum</i> | 545 | <i>Boehmeri</i> | 74 |
| <i>somniferum</i> | 546 | <i>cristatum</i> | 116 |
| <i>Parietaria</i> | 158 | <i>glabrum</i> | 74 |
| <i>officinalis</i> | 184 | <i>nodosum</i> | 72 |
| <i>Paris</i> | 406 | <i>paniculatum</i> | 73 |
| <i>quadrifolia</i> | 431 | <i>Phalaris</i> | 74 |
| <i>Parnassia</i> | 213 | <i>phalaroides</i> | ibid. |
| <i>palustris</i> | 339 | <i>pratense</i> | 72 |
| <i>Pastinaca</i> | 211 | <i>pratense</i> | 73 |
| <i>sativa</i> | 323 | <i>ventricosum</i> | ibid. |
| <i>Pentagonia speculum</i> | 242 | <i>viride</i> | ibid. |
| | | <i>Physalis</i> | 201 |
| <i>Peplis</i> | 349 | <i>Alkekengi</i> | 251 |
| <i>Portula</i> | 386 | <i>Phyteuma</i> | 199 |
| <i>Pervinca minor</i> | 263 | <i>orbiculare</i> | 243 |
| <i>Petroselinum crispum</i> | 332 | <i>spicatum</i> | 242 |
| <i>latifolium</i> | ibid. | <i>Pimpinella</i> | 212 |
| | | | Pim- |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Pimpin. dioica | 330 | Poa Serotina | 110 |
| <i>dissecta</i> | 329 | <i>Setacea</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>intermedia</i> | <i>ibid.</i> | <i>strigosa</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>magna</i> | 328 | <i>sudetica</i> | 107 |
| <i>media</i> | 329 | <i>trivialis</i> | 108 |
| <i>nigra</i> | 327 | Podagraria Aegopodium | |
| <i>orientalis</i> | 329 | | 333 |
| Saxifraga | 326 | Polycnemum | 34 |
| Plantago | 156 | <i>arvense</i> | 46 |
| <i>lanceolata</i> | 180 | Polygonatum anceps | 371 |
| <i>major</i> | 179 | <i>multiflorum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>media</i> | <i>ibid.</i> | <i>verticillatum</i> | 370 |
| Poa | 59 | Polygonum | 406 |
| <i>airoides</i> | 93 | <i>amphibium</i> | 424 |
| <i>altissima</i> | 102 | <i>angustifolium</i> | 427 |
| <i>angustifolia</i> | 110 | <i>aquaticum</i> | 424 |
| <i>annua</i> | 112 | <i>aviculare</i> | 429 |
| <i>aquatica</i> | 102 | <i>Bistorta</i> | 423 |
| <i>bulbosa</i> | 106 | <i>Convolvulus</i> | 430 |
| <i>vivipara</i> | 107 | <i>dumetorum</i> | 431 |
| <i>compressa</i> | 111 | <i>Fagopyrum</i> | 429 |
| <i>cristata</i> | 92 | <i>Hydropiper</i> | 426 |
| <i>decumbens</i> | 113 | <i>incanum</i> | 428 |
| <i>distans</i> | 103 | <i>lapathifolium</i> | 425 |
| <i>dubia</i> | 108 | <i>minus</i> | 427 |
| <i>dura</i> | 104 | <i>Persicaria</i> | 425 |
| <i>fertilis</i> | 110 | <i>Persicaria</i> | 427 |
| <i>fluitans</i> | 102 | <i>Scabrum</i> | 425 |
| <i>loliacea</i> | 124 | <i>terrestre</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>megastachya</i> | 105 | <i>tomentosum</i> | 428 |
| <i>muralis</i> | 112 | Populago palustris | 585 |
| <i>nemoralis</i> | 111 | Portula diffusa | 387 |
| <i>palustris</i> | 108 - 110 | Portulaca | 479 |
| <i>polymorpha</i> | 110 | <i>oleracea</i> | 482 |
| <i>pratensis</i> | 109 | Potamogeton | 159 |
| <i>pratensis</i> | 108 - 110 | <i>crispum</i> | 190 |
| <i>quadripedalis</i> | 107 | <i>compressum</i> | 191 |
| <i>retroflexa</i> | 103 | <i>fluitans</i> | 183 |
| <i>rubens</i> | 107 | <i>lucens</i> | 190 |
| <i>Salina</i> | 103 | <i>marinum</i> | 191 |
| <i>Scabra</i> | 108 | | |

Po-

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Potamog. <i>nutans</i> | 188 | Prunus | 495 |
| <i>pectinatum</i> | 192 | <i>Armeniaca</i> | 501 |
| <i>persoliatum</i> | 189 | <i>avium</i> | 502 |
| Potentilla | 497 | <i>Cerasus</i> | 501 |
| <i>alba</i> | 531 | <i>domestica</i> | 502 |
| <i>Anserina</i> | 526 | <i>insititia</i> | 503 |
| <i>argentea</i> | 529 | <i>Padus</i> | 500 |
| <i>fragariaefolia</i> | 526 | <i>Spinosa</i> | 504 |
| <i>fragariastrum</i> | <i>ibid.</i> | Pulmonaria | 196 |
| <i>opaca</i> | 530 | <i>angustifolia</i> | 221 |
| <i>palustris</i> | 535 | <i>officinalis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>prostrata</i> | 526 | Pulsatilla | 539 |
| <i>recta</i> | 528 | <i>pratensis</i> | 559 |
| <i>reptans</i> | 531 | <i>vulgaris</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>supina</i> | 527 | Pyrola | 435 |
| Tomentilla | 532 | <i>declinata</i> | 442 |
| <i>verna</i> | 529 | <i>minor</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Vesca</i> | 525 | <i>rotundifolia</i> | <i>ibid.</i> |
| Primula | 198 | <i>secunda</i> | 443 |
| <i>clatior</i> | 228 | <i>uniflora</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>farinosa</i> | 229 | Pyrus | 496 |
| <i>inedora</i> | <i>ibid.</i> | <i>aucuparia</i> | 507 |
| <i>officinalis</i> | 228 | <i>communis</i> | 509 |
| <i>sylvestris</i> | 229 | <i>cotoneaster</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>veris</i> | 228 | <i>Cydonia</i> | 511 |
| <i>elatior</i> | 229 | <i>domestica</i> | 518 |
| <i>officinalis</i> | 228 | <i>Malus</i> | 510 |
| Prismatocarpos | <i>Specu-</i> | <i>terminalis</i> | 506 |
| <i>lum</i> | 242 | | |

R.

| | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Radiola | 159 | Ranunc. <i>auricomus</i> | 572 |
| <i>dichotoma</i> | 194 | <i>bulbosus</i> | 574 |
| <i>linoides</i> | <i>ibid.</i> | <i>capillaceus</i> | 581 |
| <i>Millegrana</i> | <i>ibid.</i> | <i>divaricatus</i> | <i>ibid.</i> |
| Ranunculus | 540 | <i>Ficaria</i> | 562 |
| <i>aconitifolius</i> | 573 | <i>Flammula</i> | 569 |
| <i>acris</i> | 577 | <i>fluvialis</i> | 582 |
| <i>aquatalis</i> | 580 - 581 | <i>hederaceus</i> | 579 |
| <i>arvensis</i> | 578 | <i>heterophyllus</i> | 580 |

Ra-

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-------------------------------|-------|------------------------------|--------------|
| Ranunc. lanuginosus | 578 | Rosa foecundissima | 515 |
| <i>Linqua</i> | 571 | <i>fusca</i> | 516 |
| <i>peltatus</i> | 581 | <i>Herporhodon</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>peucedanifolius</i> | 582 | <i>lutea</i> | 514 |
| <i>platanifolius</i> | 574 | <i>mollissima</i> | 518 |
| <i>polyanthemos</i> | 576 | <i>pomifera</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>repens</i> | 575 | <i>punicea</i> | 514 |
| <i>reptans</i> | 570 | <i>repens</i> | 516 |
| <i>Sceleratus</i> | 572 | <i>rubiginosa</i> | 518 |
| Rapunculus orbicularis | 243 | <i>spinosissima</i> | 516 |
| <i>Spicatus</i> | ibid. | <i>villosa</i> | 517 |
| Reseda | 480 | Rassolis rotundifolia | 343 |
| <i>lutea</i> | 486 | <i>septemtrionalis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Luteola</i> | 485 | Rubia | 156 |
| Rhamnus | 202 | <i>Tinctorum</i> | 178 |
| <i>catharticus</i> | 255 | Rubus | 497 |
| <i>Frangula</i> | 256 | <i>caesius</i> | 522 |
| Rhinchospora alba | 50 | <i>fruticosus</i> | 523 |
| Ribes | 202 | <i>idaeus</i> | 521 |
| <i>Grossularia</i> | 259 | <i>saxatilis</i> | 523 |
| <i>nigrum</i> | 258 | Rumex | 349 |
| <i>reclinatum</i> | 259 | <i>acutus</i> | 391 |
| <i>rubrum</i> | 258 | <i>Acetosa</i> | 394 |
| <i>uva crispa</i> | 260 | <i>Acetosella</i> | 395 |
| Rosa | 496 | <i>aquaticus</i> | 392 |
| <i>alba</i> | 520 | <i>conglomeratus</i> | 390 |
| <i>arvensis</i> | 516 | <i>crispus</i> | 389 |
| <i>bicolor</i> | 515 | <i>Hydrolapathum</i> | 393 |
| <i>canina</i> | 519 | <i>maritimus</i> | 390 |
| <i>centifolia</i> | 520 | <i>Nemolapathum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>chlorophylla</i> | 514 | <i>obtusifolius</i> | 391 |
| <i>cinnamomea</i> | 515 | <i>Patientia</i> | 387 |
| <i>collincola</i> | ibid. | <i>sanquineus</i> | 388 |
| <i>eglantaria</i> | 514 | <i>scutatus</i> | 393 |

S,

| | | | |
|----------------|-----|----------------------|------------|
| Sagina | 159 | Sagina erecta | 195 |
| <i>apetala</i> | 193 | <i>procumbens</i> | 192 |
| | | | <i>Sa-</i> |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <i>Salicaria hyssopifolia</i> | 483 | <i>Scandix temula</i> | 517 |
| <i>vulgaris</i> | <i>ibid.</i> | <i>Schoenus</i> | 35 |
| <i>Salicornia</i> | 9 | <i>albus</i> | 50 |
| <i>herbaccea</i> | 30 | <i>compressus</i> | 56 |
| <i>Salvia</i> | 8 | <i>nigricans</i> | 51 |
| <i>pratensis</i> | 29 | <i>Schollera Oxyccoccus</i> | 418 |
| <i>Sambucus</i> | 213 | <i>Scilla</i> | 347 |
| <i>Ebulus</i> | 335 | <i>bifolia</i> | 366 |
| <i>laciniata</i> | 337 | <i>Sciophila</i> | 158 |
| <i>nigra</i> | 336 | <i>convallarioides</i> | 186 |
| <i>racemosa</i> | 337 | <i>Scirpus</i> | 35 |
| <i>Sanicula</i> | 206 | <i>acicularis</i> | 54 |
| <i>europaea</i> | 287 | <i>Baeothryon</i> | 53 |
| <i>Sanquisorba</i> | 157 | <i>caespitosus</i> | 55 |
| <i>officinalis</i> | 181 | <i>caricinus</i> | 56 |
| <i>Saponaria</i> | 436 | <i>compressus</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>dioica</i> | 472 | <i>Halleri</i> | 53 |
| <i>officinalis</i> | 447 | <i>lacustris</i> | 57 |
| <i>Vaccaria</i> | 448 | <i>maritimus</i> | 60 |
| <i>Saxifraga</i> | 436 | <i>palustris</i> | 54 |
| <i>granulata</i> | 445 | <i>pauciflorus</i> | 53 |
| <i>Tridactylites</i> | 444 | <i>setaceus</i> | 58 |
| <i>Scabiosa</i> | 155 | <i>sylvaticus</i> | 59 |
| <i>arvensis</i> | 163 | <i>Sclarea pratensis</i> | 29 |
| <i>columbaria</i> | 165 | <i>Scleranthus</i> | 436 |
| <i>germanica</i> | <i>ibid.</i> | <i>annuus</i> | 445 |
| <i>ochroleuca</i> | <i>ibid.</i> | <i>perennis</i> | 446 |
| <i>succisa</i> | 164 | <i>Scribaea divaricata</i> | 455 |
| <i>sylvatica</i> | 163 | <i>Secale</i> | 41 |
| <i>Scandix</i> | 210 | <i>aestivum</i> | 143 |
| <i>Anthriscus</i> | 321 | <i>cereale</i> | 142 |
| <i>aurea</i> | 319 | <i>hybernum</i> | 143 |
| <i>bulbosa</i> | 318 | <i>Sedum</i> | 438 |
| <i>Cerefolium</i> | 320 | <i>acre</i> | 466 |
| <i>hirsuta</i> | 319 | <i>album</i> | 465 |
| <i>nutans</i> | 317 | <i>reflexum</i> | 464 |
| <i>pecten</i> | 315 | <i>rupestre</i> | 465 |
| <i>sylvestris</i> | 316 | | |
| | | <i>Se-</i> | |

Index.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| <i>Sedum sexangulare</i> | 466 | <i>Sium annum</i> | 322 |
| <i>tectorum</i> | 493 | <i>Apium</i> | 331 |
| <i>Telephium</i> | 463 | <i>Cicuta</i> | 312 |
| <i>villosum</i> | 467 | <i>Conium</i> | 296 |
| <i>Selinum</i> | 207 | <i>Coriandrum</i> | 315 |
| <i>Anethum</i> | 324 | <i>Cynapium</i> | 314 |
| <i>Angelica</i> | 307 | <i>Falcaria</i> | 309 |
| <i>carvifolium</i> | 298 | <i>graveolens</i> | 351 |
| <i>Cervaria</i> | 299 | <i>latisolum</i> | 307 |
| <i>officina'e</i> | 302 | <i>Petroselinum</i> | 332 |
| <i>Oreoselinum</i> | 300 | <i>Silaus</i> | 503 |
| <i>palustre</i> | 297 | <i>Solanum</i> | 201 |
| <i>Pastinaca</i> | 323 | <i>Dulcamara</i> | 251 |
| <i>Peucedanum</i> | 302 | <i>luteum</i> | 253 |
| <i>pubescens</i> | 307 | <i>nigrum</i> | 252 |
| <i>Sempervivum</i> | 481 | <i>tuberosum</i> | 253 |
| <i>globiferum</i> | 494 | <i>Sorbus</i> | 495 |
| <i>tectorum</i> | 493 | <i>Aucuparia</i> | 507 |
| <i>Seseli</i> | 211 | <i>domestica</i> | 508 |
| <i>Aegopodium</i> | 333 | <i>torminalis</i> | 506 |
| <i>annuum</i> | 322 | <i>Spergula</i> | 439 |
| <i>Carum</i> | 326 | <i>arvensis</i> | 477 |
| <i>Falcaria</i> | 309 | <i>nodosa</i> | 478 |
| <i>graveolens</i> | 331 | <i>pentandra</i> | 477 |
| <i>Sesleria</i> | 39 | <i>Sphondylium Branca</i> | 305 |
| <i>coerulea</i> | 101 | <i>Spiraea</i> | 496 |
| <i>Sherardia</i> | 156 | <i>Aruncus</i> | 512 |
| <i>arvensis</i> | 166 | <i>Filipendula</i> | ibid. |
| <i>Sieblingia decumbens</i> | 114 | <i>Ulmaria</i> | 513 |
| <i>Silene</i> | 437 | <i>Staphylaea</i> | 213 |
| <i>Armeria</i> | 457 | <i>pinnata</i> | 338 |
| <i>baccifera</i> | 454 | <i>Staphyllodendron pinnatum</i> | ibid. |
| <i>Cucubalus</i> | 453 | <i>Statice</i> | 214 |
| <i>inflata</i> | ibid. | <i>Armeria</i> | 340 |
| <i>noctiflora</i> | 456 | <i>Stellaria</i> | 437 |
| <i>nutans</i> | 455 | <i>Alsine</i> | 459 |
| <i>Otites</i> | 453 | <i>aquatica</i> | 476 |
| <i>Sium</i> | 209 | <i>arvensis</i> | ibid. |
| <i>angustifolium</i> | 308 | <i>Stel-</i> | |

Index.

| | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <i>Stellar. arvensis</i> | 477 | <i>Stellera</i> | 405 |
| <i>Dilleniana</i> | 460 | <i>passerina</i> | 421 |
| <i>glauca</i> | <i>ibid.</i> | <i>Stipa</i> | 38 |
| <i>graminea</i> | 459 | <i>capillata</i> | 84 |
| <i>Holostea</i> | 458 | <i>pennata</i> | 85 |
| <i>media</i> | 339 | <i>Sturmia minima</i> | 65 |
| <i>nemorum</i> | 457 | <i>verna</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>nodosa</i> | 478 | <i>Succisa columbaria</i> | 165 |
| <i>palustris</i> | 460 | <i>pratensis</i> | 164 |
| <i>pentandra</i> | 478 | <i>Symphytum</i> | 196 |
| <i>serpillifolia</i> | 462 | <i>officinale</i> | 222 |
| <i>uliginosa</i> | 460 | <i>Syntherisma</i> | 36 |
| <i>Stellaris bifolia</i> | 366 | <i>vulgare</i> | 66 |
| <i>corymbosa</i> | 364 | <i>Syringa</i> | 7 |
| <i>lutea</i> | 363 | <i>suaveolens</i> | 499 |
| <i>minima</i> | 364 | <i>vulgaris</i> | 10 |

T.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Thalictrum | 540 | <i>Tithym. Cyparissias</i> | 492 |
| <i>angustifolium</i> | 566 | <i>Esu a</i> | 490 |
| <i>aquilegifolium</i> | 567 | <i>exiguus</i> | 487 |
| <i>flavum</i> | 565 | <i>helioscopius</i> | 488 |
| <i>minus</i> | 564 | <i>Peplos</i> | 486 |
| Thesium | 203 | <i>platyphyllos</i> | 489 |
| <i>intermedium</i> | 262 | <i>sylvaticus</i> | 490 |
| Linophyllum | <i>ibid.</i> | Tordylium | 207 |
| <i>montanum</i> | <i>ibid.</i> | <i>Anthriscus</i> | 294 |
| Thymelaea Mezereum | 420 | <i>maximum</i> | 290 |
| Tilia | 537 | Torilis Anthriscus | 321 |
| <i>cordata</i> | 550 | <i>divaricata</i> | 295 |
| <i>europaea</i> | 548 - 549 | <i>helvetica</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>grandifolia</i> | 548 | <i>scandicina</i> | 321 |
| <i>microphylla</i> | 549 | Tomentilla | 497 |
| <i>parvifolia</i> | <i>ibid.</i> | <i>erecta</i> | 532 |
| <i>platyphyllos</i> | <i>ibid.</i> | <i>officinalis</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>u. misfolia</i> | <i>ibid.</i> | <i>reptans</i> | 533 |
| Tithymalus cajogalus | 491 | Tragoselinum dissectum | 329 |
| | | | <i>Tra-</i> |

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| <i>Tragosel. magnum</i> | 328 | <i>Tritic. hybernuni</i> | 145 |
| <i>saxifragum</i> | 326 | <i>monococcum</i> | 146 |
| <i>Trapa</i> | 157 | <i>pinnatum</i> | 125 |
| <i>natans</i> | 183 | <i>repens</i> | 144 |
| <i>Trichodium</i> | 37 | <i>sativum</i> | 145 |
| <i>caninum</i> | 76 | <i>spelta</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Trientalis</i> | 401 | <i>syriaticum</i> | 126 |
| <i>europaea</i> | 402 | <i>teretiflorum</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Triglochin</i> | 349 | <i>vulgare</i> | 145 |
| <i>maritimum</i> | 396 | <i>Trechius</i> | 540 |
| <i>palustre</i> | <i>ibid.</i> | <i>connivens</i> | 583 |
| <i>Trisetum pratense</i> | 140 | <i>europaeus</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>striatum</i> | 139 | <i>Tulipa</i> | 346 |
| <i>Triticum</i> | 41 | <i>sylvestris</i> | 362 |
| <i>aestivum</i> | 145 | <i>Tunica carthusianorum</i> | 449 |
| <i>bromoides</i> | 125 | <i>prolifera</i> | 450 |
| <i>caninum</i> | 143 | <i>Typhoides arundinacea</i> | 71 |
| <i>cereale</i> | 145 | | |
| <i>dicoccum</i> | 147 | | |

U.

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| <i>Ulmaria palustris</i> | 513 | <i>Ulmus nuda</i> | 280 |
| <i>Ulmus</i> | 205 | <i>octandra</i> | 281 |
| <i>campestris</i> | 280 | <i>suberosa</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>ciliata</i> | 281 | <i>Utricularia</i> | 8 |
| <i>effusa</i> | <i>ibid.</i> | <i>minor</i> | 28 |
| <i>montana</i> | <i>ibid.</i> | <i>vulgaris</i> | 27 |

V.

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| <i>Vaccaria pyramidata</i> | 448 | <i>Valeriana dioica</i> | 44 |
| <i>Vaccinium</i> | 405 | <i>locusta</i> | 45 - 46 |
| <i>Myrtillus</i> | 416 | <i>officinalis</i> | 43 |
| <i>Oxycoleus</i> | 418 | <i>olitoria</i> | 45 |
| <i>Vitis idaea</i> | 417 | <i>Ventenata avenacea</i> | 139 |
| <i>Valantia cruciata</i> | 176 | <i>Verbascum</i> | 200 |
| <i>Valeriana</i> | 34 | <i>album</i> | 247 |
| <i>dentata</i> | 46 | <i>Lychnitis</i> | 246 |

Ver-

I n d e x.

| | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| <i>Verbasc. Lychnitis</i> | 247 | <i>Veronica verna</i> | 25 |
| nigrum | 248 | <i>Viburnum</i> | 212 |
| pulverulentum | 247 | Lantana | 333 |
| <i>Thapsus</i> | 246 | Opulus | 554 |
| <i>Veronica</i> | 8 | <i>Vinca</i> | 203 |
| <i>aciniſfolia</i> | 23 | minor | 263 |
| agrestis | 22 | <i>Vincetoxicum officinale</i> | 270 |
| <i>Anagallis</i> | 17 | <i>Viola</i> | 203 |
| arvensis | 22 | arvensis | 268 |
| <i>Beccabunga</i> | 16 | canina | 265 |
| <i>Chamaedrys</i> | 20 | hirta | 263 |
| <i>hederaeſolia</i> | 24 | mirabilis | 267 |
| latifolia | 18 | montana | 266 |
| montana | 21 | odorata | 264 |
| officinalis | 15 | palustris | <i>ibid.</i> |
| praecox | 23 | persicifolia | 266 |
| prostrata | 19 | tricolor | 267 |
| <i>pseudochamaedrys</i> | <i>ibid.</i> | <i>Viscago baccifera</i> | 455 |
| scutellata | 18 | <i>Vitis</i> | 202 |
| <i>serpyllifolia</i> | 16 | <i>idaea myrtillus</i> | 416 |
| spicata | 14 | <i>punctata</i> | 417 |
| spuria | <i>ibid.</i> | laciniosa | 261 |
| <i>Teucrium</i> | 19 | vinifera | <i>ibid.</i> |
| triphylos | 24 | <i>Vulpia Myurus</i> | 119 |

W.

| | |
|---------------------------------|----|
| <i>Weingaertneria canescens</i> | 97 |
|---------------------------------|----|

R e-

R e g i s t e r
der
deutschen Pflanzen - Benennungen.

A.

| | Pag. | | Pag. |
|----------------------|------|-----------------------|--------|
| Ackelei | 555 | Adonisrölein | 568 |
| Acker - Fuchsschwanz | 68 | Aglei | 555 |
| Acker - Hahnenfuß | 578 | Ahlbeere | 500 |
| Ackerhimbeere | 522 | Ahorn | 407 |
| Acker - Hörnkraut | 475 | Alleluja | 463 |
| Acker - Krummhals | 224 | Allermanns - Harnisch | 47 |
| Acker - Lolch | 147 | Ampfer | 387 |
| Acker - Mausohr | 215 | Amphibienknöterich | 424 |
| Ackermohn | 543 | Amurettgras | 105 |
| Ackernigelle | 556 | Angelik | 306 |
| Acker - Rapunzel | 258 | Apfelbirne | 510 |
| Acker - Seifenkraut | 448 | Apostemkraut | 163 |
| Acker - Spark | 477 | Aprikosenbaum | 501 |
| Acker - St inbrech | 185 | Aprikosenpflaume | ebend. |
| Acker - Steinsaame | 217 | Astrenz | 288 |
| Acker - Sternkraut | 167 | Attich | 335 |
| Acker - Taubenkopf | 453 | Augentrost | 458 |
| Acker - Trespe | 129 | Augenwurz | 300 |
| Ackerveilchen | 268 | Augusthafer | 138 |
| Acker - Waldmeister | 167 | Aurin, rother | 253 |
| <i>Adlersblume</i> | 555 | | |

B.

| | | | |
|-------------------|-----|------------|------|
| <i>Bachbungen</i> | 16 | Bärenlauch | 559 |
| <i>Bärenklau</i> | 305 | Bärwurz | 305 |
| Heller Flora I. | | 39 | Bal- |

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------|---------|-------------------|--------|
| Baldrian . | 43 | Blattkraut | 483 |
| Bausenme, wilde | 29 | Blutkraut | 181 |
| Bundgras | 71 | Blutnäglein | 448 |
| Barigras | 86 | Blutschierling | 296 |
| Bartsch | 305 | Blutstein | 508 |
| Buchen, weißer | 452 | Blutwurz | 532 |
| Beinholz | 245 | Bocksbart, wilder | 512 |
| Beinwell | 222 | Bockbeere | 522 |
| Benediktenwurz | 233 | Bocksfenchel | 322 |
| Berberize | 586 | Boragen | 223 |
| Berg - Ahorn | 409 | Boretsch | ebend. |
| Berghirschwurz | 500 | Borstengras | 64 |
| Berg - Lauch | 355 | Brackendistel | 286 |
| Bergpetersilie, große | 299 | Breitlaub | 468 |
| kleine | 500 | Brennkraut | 569 |
| Berg - Sedum | 464 | - aufrechtes | 564 |
| Berg - Weiderich | 413 | - kriechendes | 563 |
| Bibernell | 326 | Brennwurz | 426 |
| Bilsenkraut | 249 | Brodkümmel | 325 |
| Binse | 53 | Brombeere, blaue | 522 |
| Birnbaum | 509 | - schwarze | 523 |
| Birkkraut | 442 | Brombeerstrauch | ebend. |
| Birnquitte | 511 | Bruchkraut | 271 |
| Bisam - Erdrarch | 452 | Brunnenmejer | 153 |
| Bisamkraut | ebend. | Buchampfer | 468 |
| Biterklee | 230 | Buchweizen | 429 |
| Bittersüß | 251 | Buchwinde | 450 |
| Blasenkirsche | eben l. | Buhlkraut | 278 |
| Blasentuf. strauch | 338 | Bundlilie | 361 |
| Blasenranunkel | 577 | Büschenlilie | 240 |
| Blumenbinse | 454 | Buschiglocke | 236 |
| Blutauge | 355 | Buschknöterich | 451 |
| B'ntauge | 568 | Busch - Windblume | 561 |
| Bluthirse | 66 | Butterblume | 585 |

C.

| | | | |
|-----------------|-----|--------------|-----|
| Centunkel | 180 | Christwurz | 584 |
| Chironie | 253 | Cucumerkraut | 524 |
| Christophskraut | 541 | | |

D.

R e g i s t e r.

D.

| | Pag. | | Pag. |
|---------------|------|----------------------|--------|
| Dach - Trespe | 134 | Dotterblume | 585 |
| Darmbeerbaum | 506 | Drehkraut | 290 |
| Dickrube | 280 | Dreifaltigkeitskraut | 267 |
| Dill | 324 | Dreizack | 396 |
| Diptam | 440 | Dreschflachs | 342 |
| Doldensparre | 154 | Dungras | 61 |
| Donnerkraut | 493 | Dinkel | 145 |
| Donnernelke | 448 | Dunkelweizen | ebend. |
| Dorigänsefuss | 274 | Durchbrech | 289 |
| Dornapfel | 248 | Durchwachs | ebend. |
| Dorsch - Lein | 342 | | |

E.

| | | | |
|---------------------|--------|----------------|-----|
| Eberesche | 507 | Enzian | 282 |
| Lhre | 407 | Ephen | 260 |
| Elurenpreis | 14 | Eppich | 351 |
| Einbeere | 43 | Erdäpfel | 253 |
| Einblatt | 339 | Erdbeere | 524 |
| Einkorn | 146 | Erdbeerspinat | 6 |
| Eisenhut | 553 | Erdgalle | 255 |
| Elsbeer - Weissdorn | 506 | Erdpinnenkraut | 367 |
| Elsdorn | 409 | Erdweich | 448 |
| Emmer | 147 | Esche | 11 |
| Emmerkorn | ebend. | Escherwurz | 440 |
| Engelblume | 583 | Eselskörbel | 316 |
| Engelwurz | 306 | Eselsmilch | 490 |

F.

| | | | |
|-----------------|------|--------------------|-----|
| Färberröthe | 178 | Feld - Mannstreu | 286 |
| Faulbaum | 256 | Feldmohn, rother | 544 |
| Federgras | 84 | Feldnelke | 448 |
| Fedie | 45 | Feld - Rittersporn | 553 |
| Feigwarzenkraut | 562 | Feldrose | 516 |
| Feld - Ahorn | 409 | Feldsinuse | 385 |
| Feld - Enzian | 284 | Feldspinat | 274 |
| Feld - Kummel | 325 | Feld - Ulme | 280 |
| | 39 * | | |
| | | Fel- | |

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| Felsen - Steinwurz | 465 | Flöhkraut, brennendes | 426 |
| Fench | 87 | - gemeines | ebend. |
| Fette Henne | 463 | Föttenstrauch | 498 |
| Fichten - Ohnblatt | 441 | Flughäfer | 108 |
| Fichtenspargel | ebend, | Fluis - Saamkraut | 183 |
| Fieberklee | 230 | Frauenkrieg | 225 |
| Fieberkraut | 253 | Frauenmantel | 184 |
| Fikarie | 562 | Frauenspiegel | 241 |
| Filipendel | 512 | Frauenstroh | 173 |
| Fingergras | 67 | Freisamkraut | 267 |
| Fingerkraut | 526 | Froschloßel | 598 |
| Fischmelde | 279 | Frosch, jeffer | 572 |
| Flachs | 341 | Frühlings - Fikarie | 562 |
| Flachsgras | 63 | Frühlings - Fingerkraut | 529 |
| Flachs - Seide | 187 | Frühlings - Simse | 384 |
| Fladergras | 75 | Frühlings - Spark | 477 |
| Flattersimse | 375 | Fuchsschwanz | 68 |
| Fleischblume | 470 | Fünffingerkraut | 551 |
| Fleisch - Lauch | 353 | Futtergerste | 152 |
| Flieder | 10 | Futterspergel | 477 |
| Flittergras | 114 | Futter - Trespe | 153 |

G.

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------|-----|
| Gänse - Fingerkrant | 526 | Geisblatt | 244 |
| Gänsefuß | 274 | Geisfuß | 552 |
| Gänserich | 526 | Gelbkraut | 485 |
| Gamander - Ehrenpreis | 18 | Gelenkwurz | 570 |
| Gamanider, wilder | 20 | Gemüüs - Ampfer | 387 |
| Gartenvoragen | 223 | Gemüüs - Lauch | 557 |
| Gartenkörbel | 320 | Gerhardskraut | 532 |
| Garten - Koriander | 314 | Gerste | 150 |
| Garten - Melde | 272 | Giersch | 332 |
| Gartenmohn, großer | 546 | Gifthahnenfuß | 572 |
| Gartenpetersilie | 532 | Giftwurz | 270 |
| Gartenportulak | 482 | Glanzgras | 71 |
| Gartenrapunzel | 410 | Glaskraut | 184 |
| Garten - Silene | 457 | Glasschmalz | 30 |
| Garten - Wolffmilch | 486 | Gleifse | 314 |
| Gaukhfell | 253 | Glockenblume | 236 |
| Geishart - Spierstaude | 512 | Gnadenkraut | 26 |
| | | Gold- | |

R e g i s t e r .

| | P a g. | | P a g. |
|-------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| <i>Goldhafer</i> | 140 | <i>Grindkraut</i> | 163 |
| <i>Goldmilz</i> | 421 | <i>Grindwurz</i> | 387 |
| <i>Goldrölein</i> | 550 | <i>Grundbirn</i> | 253 |
| <i>Goldwurz</i> | 361 | <i>Grundheil</i> | 500 |
| <i>Graslilie</i> | 367 | <i>Gugucksblume</i> | 470 |
| <i>Grasnelke</i> | 340 | <i>Gundermann, kleiner</i> | 24 |
| <i>Gretel unter dem Busch</i> | | <i>Guier Heinrich</i> | 274 |
| | 557 | <i>Gypskraut</i> | 446 |

H.

| | | | |
|----------------------------|-----|------------------------------|--------|
| <i>Haaferschleen</i> | 503 | <i>Heidelwinde</i> | 450 |
| <i>Haargras</i> | 149 | <i>Heidenelke</i> | 451 |
| <i>Haarstrang</i> | 302 | <i>Heidenschmuck</i> | 550 |
| <i>Harkenkraut</i> | 559 | <i>Heidenysop</i> | ebend. |
| <i>Hafer</i> | 136 | <i>Heilkraut</i> | 305 |
| <i>Häldolle</i> | 291 | <i>Heilwurz</i> | 532 |
| <i>Hagedorn</i> | 504 | <i>Herbst - Adonis</i> | 568 |
| <i>Hagenbuttenrose</i> | 519 | <i>Herbstblume</i> | 397 |
| <i>Hahnenbuttenrose</i> | 517 | <i>Herbst - Zeitlose</i> | ebend. |
| <i>Hahnenfafs</i> | 569 | <i>Hexenkraut</i> | 12 |
| <i>Hahnensporn - Fench</i> | 89 | <i>Hexenstrang</i> | 563 |
| <i>Hainrisengras</i> | 111 | <i>Himbeere</i> | 521 |
| <i>Halskraut</i> | 240 | <i>Himmelsbrand</i> | 246 |
| <i>Harnkraut</i> | 485 | <i>Himmelsgerste</i> | 152 |
| <i>Hartriegel</i> | 182 | <i>Himmelsthau</i> | 302 |
| <i>Haselwurz</i> | 481 | <i>Himmelsstengel</i> | 283 |
| <i>Haenbrod</i> | 385 | <i>Hirsch - Glockenblume</i> | 241 |
| <i>Hasenohr</i> | 289 | <i>Hirschdorn</i> | 255 |
| <i>Hauswurz</i> | 493 | <i>Hirschkohl</i> | 221 |
| <i>Hechelkraut</i> | 345 | <i>Hirsch - Silge</i> | 299 |
| <i>Heckenbuchwinde</i> | 431 | <i>Hirschwurz</i> | 301 |
| <i>Heckenkirsche</i> | 245 | <i>Hirschwurz</i> | 299 |
| <i>Heckenrose</i> | 519 | <i>Hirse</i> | 89 |
| <i>Heckenwinde</i> | 235 | <i>Hirsegras</i> | 75 |
| <i>Heide</i> | 419 | <i>Hirszen - Fench</i> | 89 |
| <i>Heidekerze</i> | 246 | <i>Hohlbeere</i> | 521 |
| <i>Heidekorn</i> | 429 | <i>Holler</i> | 10 |
| <i>Heidekraut</i> | 419 | <i>Hollunder</i> | 355 |
| <i>Heidel</i> | 429 | <i>Holzapfel</i> | 510 |
| <i>Heidelbeere</i> | 416 | <i>Holzbirne</i> | 509 |
| | | <i>Ho-</i> | |

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|------------------------|------|---------------------------|------|
| Honiggras | 90 | <i>Hundslauch</i> | 356 |
| Hornkraut | 473 | <i>Hundsmelde</i> | 278 |
| Hägelblume | 269 | <i>Hundsmilch</i> | 488 |
| Higel - Waldmeister | 169 | <i>Hunds - Petersilie</i> | 314 |
| Hühnerbiss | 454 | <i>Hundsrose</i> | 519 |
| Hühnerdarm | 359 | <i>Hundsveilchen</i> | 265 |
| Hühnerfench | 89 | <i>Hundswaizen</i> | 143 |
| <i>Hundbeerstrauch</i> | 182 | <i>Hundszunge</i> | 220 |
| Hunds - Gleisse | 314 | <i>Hyazinthe</i> | 372 |
| Hundsgras | 149 | | |

I.

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|--------|
| Jasione | 269 | <i>Johannisbeere</i> | 258 |
| <i>Jasmin, wilder</i> | 498 | <i>Johannistauben</i> | ebend. |
| <i>Je länger je lieber</i> | 251 | <i>Johanniswedel</i> | 515 |
| <i>Jerichorose</i> | 244 | <i>Judendöcke</i> | 251 |
| <i>Igelkolben</i> | 248 | <i>Judenkirsche</i> | ebend. |
| <i>Immergrün</i> | 265 | <i>Jungferngras</i> | 271 |

K.

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----|
| Kälberkropf | 316 | <i>Klebkraut</i> | 178 |
| <i>Kälbersaumen, gelber</i> | 319 | <i>Klebnölke</i> | 470 |
| Kalmus | 374 | <i>Kleinling</i> | 180 |
| <i>Kalmus, unechter</i> | 49 | <i>Klang - Lein</i> | 341 |
| Kamigras | 115 | <i>Klettenkörbel</i> | 521 |
| Kammkörbel | 315 | <i>Klosterbeere</i> | 260 |
| <i>Kaper, deutsche</i> | 585 | <i>Knauel</i> | 445 |
| Karte | 161 | <i>Knaulgras</i> | 115 |
| Kartendistel | ebend. | <i>Knoblauch</i> | 353 |
| Karthäusernelke | 448 | <i>Knöterich</i> | 423 |
| Kastanie, wilde | 403 | <i>Knopfgras</i> | 50 |
| <i>Katzenpfeffer</i> | 466 | <i>Knopfnölke</i> | 450 |
| <i>Katzenwurzel</i> | 43 | <i>Knopfssimse</i> | 375 |
| Kellerhals | 420 | <i>Knorpelkrau</i> | 46 |
| <i>Kernkraut</i> | 452 | <i>Knotenblume</i> | 551 |
| Kirschbaum | 502 | <i>Knotengras</i> | 108 |
| <i>Klapperrose</i> | 544 | <i>Königskerze</i> | 246 |
| <i>Klebgras</i> | 87 | <i>Körbel</i> | 315 |

Kol-

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <i>Kolbenbinse</i> | 55 | <i>Kreutzdorn</i> | 255 |
| <i>Komarum</i> | 535 | <i>Kreutz - Enzian</i> | 285 |
| <i>Koriander</i> | 314 | <i>Kriechenpflaume</i> | 503 |
| <i>Korn</i> | 142 | <i>Kriechrose</i> | 516 |
| <i>Kornelkirsche</i> | 182 | <i>Krötensimse</i> | 381 |
| <i>Kornhyazinthe</i> | 572 | <i>Kronsbeere</i> | 417 |
| <i>Kornnelke</i> | 469 | <i>Krummhals</i> | 224 |
| <i>Korn - Raden</i> | <i>ebend.</i> | <i>Kugelblume</i> | 160 |
| <i>Kornrose</i> | 469 - 544 | <i>Küchenlauch</i> | 359 |
| <i>Kornwinde</i> | 235 | <i>Küchenschelle</i> | 559 |
| <i>Krachmandel</i> | 500 | <i>Kugeblume</i> | 583 |
| <i>Krätkraut</i> | 163 | <i>Kugelhahnenfuß</i> | <i>ebend.</i> |
| <i>Krapp</i> | 178 | <i>Kuhblume</i> | 585 |
| <i>Krausbeere</i> | 258 | <i>Kuhkraut</i> | 448 |
| <i>Krautkollunder</i> | 335 | <i>Kukabal</i> | 452 |
| <i>Krebswurz</i> | 423 | <i>Kümmel</i> | 325 |
| <i>Kreutzbeerdorn</i> | 255 | <i>Küttenbaum</i> | 511 |

L.

| | | | |
|--------------------------|-----|------------------------|---------------|
| <i>Labestock</i> | 306 | <i>Lerchenblume</i> | 553 |
| <i>Labkraut</i> | 170 | <i>Lerchentümlein</i> | 229 |
| <i>Lämmerlattich</i> | 46 | <i>Lichtblume</i> | 397 |
| <i>Lämmerosalat</i> | 45 | <i>Lichtnelke</i> | 470 |
| <i>Land - Rohr</i> | 79 | <i>Liebstöckel</i> | 306 |
| <i>Laserkraut</i> | 304 | <i>Lieschgras</i> | 72 |
| <i>Lauch</i> | 352 | <i>Liguster</i> | 10 |
| <i>Läusekraut</i> | 584 | <i>Lilac</i> | <i>ebend.</i> |
| <i>Lavende/gras</i> | 32 | <i>Lilie</i> | 561 |
| <i>Leberblume, weiße</i> | 539 | <i>Linde</i> | 548 |
| <i>Leberblümlein</i> | 558 | <i>Löwenfuß</i> | 184 |
| <i>Leberklette</i> | 484 | <i>Lolch</i> | 147 |
| <i>Leberkraut</i> | 558 | <i>Lonizere</i> | 244 |
| <i>Leersie</i> | 70 | <i>Lungenblume</i> | 282 |
| <i>Leimkraut</i> | 454 | <i>Lungen - Enzian</i> | <i>ebend.</i> |
| <i>Lein</i> | 341 | <i>Lungenkraut</i> | 221 |
| <i>Leinblatt</i> | 262 | <i>Lysimachie</i> | 251 |
| <i>Lenne</i> | 408 | | |

M.

| | | | |
|----------------------|-----|-------------------|-----|
| <i>Märzglöckchen</i> | 351 | <i>Magenwurz</i> | 374 |
| <i>Märzveilchen</i> | 264 | <i>Mandelbaum</i> | 499 |

Man-

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| Mangold | 279 | Meersaamkraut | 191 |
| Mannagras | 102 | Meersalz - Binse | 596 |
| Mannsharmishh | 226 | Meerzwiebel | 366 |
| Mannsschild | <i>ebend.</i> | Mehlbaum | 333 |
| Mannstreu | 286 | Mejerich | 167 |
| Mafholder | 407 | Melde | 272 |
| <i>M - blieben, blaue</i> | 160 | Melilotengras | 32 |
| Mastkraut | 192 | Merk | 307 |
| Mauer - Gänsefuß | 276 | Miere | 559 |
| Mauer - Gerste | 150 | <i>Mischahorn, großer</i> | 408 |
| Mauer - Gypsbraut | 446 | Milzkrant | 421 |
| Mauerlorber | 260 | Mispel | 508 |
| Mauermelde | 276 | Mistmelde | 275 |
| Mauernelke | 446 | Möhre | 295 |
| Mauerpfeffer | 466 | Mohn | 543 |
| Mauer - Trespe | 134 | Mohn, schlafbringender | 545 |
| Mäusegerste | 150 | Mohn, weißer | 546 |
| <i>Mausgras</i> | 344 | Mohnsaamen, schwarzer | |
| Mausohr | 215 | | 545 |
| Mäuseschwanz | 344 | Möhrübe | 295 |
| Mayblume | 369 | Montie | 153 |
| <i>Mayenkraut</i> | 167 | <i>Mosbeere</i> | 418 |
| <i>Mayenschelle</i> | 571 | Moosbinse | 54 |
| Mayrose | 515 | <i>Mosblume</i> | 585 |
| Meerbinse | 60 | Moos - Heidelbeere | 418 |
| Meerlinse | 31 | Morast - Labkraut | 170 |

N.

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|-----|
| Nachtkerze | 410 | <i>Nardensaamen</i> | 556 |
| Nachtschatten | 251 | Natterkopf | 225 |
| Nacht - Silene | 456 | <i>Natterwurz</i> | 423 |
| <i>Nackte - Jungfrau</i> | 397 | Nelke | 448 |
| Nadelkörbel | 315 | Nelkengras | 154 |
| <i>Nägeleingras</i> | 340 | <i>Netkenmiere</i> | 458 |
| <i>Nagetkraut</i> | 231 | Nelkenwurz | 535 |
| <i>Nard, wilder</i> | 481 | Nieswurz | 584 |

O.

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|-----|
| Ochsenzunge | 219 | Ohnblatt | 441 |
| Odermennig | 484 | <i>Ohröljekraut</i> | 455 |
| Ohnkraut | 185 | <i>Osterblume</i> | 559 |

P.

R e g i s t e r.

P.

| | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| <i>Pariskraut</i> | 431 | Pfeifenstrauch | 498 |
| Parnassie | 339 | Pfeuningkraut | 231 |
| <i>Parzenkraut</i> | 312 | <i>Pferde - Binse</i> | 57 |
| Pastinak | 323 | <i>Pferdeschwanz</i> | 3 |
| <i>Paternosterstrauch</i> | 338 | Pferdkümmel | 298 |
| Pechnelke | 470 | Pflaumenbaum | 500 |
| Perlgras | 98 | Pfriemengras | 84 |
| Perlhirse | 218 | <i>Pfriemgras</i> | 64 |
| Petersilie | 532 | <i>Pimpernuß</i> | 538 |
| Petersilien - Eppich | ebend. | <i>Pistazie, wilde</i> | ebend. |
| Petersilientraube | 261 | Porre | 553 |
| <i>Peterskorn</i> | 146 | Portulak | 482 |
| <i>Peterskraut</i> | 184 | Prachtnelke | 452 |
| <i>Pfaffenhuthlein</i> | 257 | <i>Preusselbeere</i> | 417 |
| <i>Pfeffer, deutscher</i> | 420 | <i>Pulverholzbaum</i> | 256 |
| <i>Pfefferroschen</i> | 257 | Purgir - Lein | 342 |
| <i>Pfefferwurz</i> | 326 | Purgirkraut, wahres | 26 |

Q.

| | | | |
|--------------|-----|------------------|-----|
| Quecke | 144 | Qnell - Montie | 153 |
| Quecktrespē | 131 | Quittenbirne | 511 |
| Quellenmiere | 459 | Quitten - Mispel | 508 |

R.

| | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|------|
| Raden | 469 | Rheinweide | 10 |
| <i>Rajgras, englisches</i> | 147 | <i>Rippenkraut</i> | 189 |
| - französisches | 90 | Rispengras | 192 |
| Rapunzel | 242 | Rittersporn | 552. |
| Rapunzel - Glockenbl. | 238 | Röthe | 178 |
| Rasen - Binse | 55 | Rockenbollen | 355 |
| Rasen - Schmiele | 94 | Roggen | 142 |
| <i>Rauhlinde</i> | 281 | Roggentrespē | 127 |
| <i>Rauschgrün</i> | 418 | Rohr | 79 |
| Rebendolde | 310 | Rohrschilf | 85 |
| <i>Rehkraut</i> | 419 | Rose | 514 |
| Reisgras | 70 | Rosenmelde | 272 |
| | | <i>Roß-</i> | |

R e g i s t e r.

| | P a g. | | P a g. |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| <i>Poßampfer</i> | 395 | <i>Ruchlafer</i> | 136 |
| <i>Poßfenchel</i> | 311 | <i>Rübenkorbel</i> | 318 |
| <i>Rosgras</i> | 90 | <i>Rubenranunkel</i> | 574 |
| <i>Roskastanie</i> | 403 | <i>Ruster</i> | 280 |
| <i>Rostrose</i> | 518 | <i>Ruhrwurz</i> | 512 |
| <i>Ruchgras</i> | 32 | <i>Runkelrübe</i> | 280 |

S.

| | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| <i>Saalkrüglein</i> | 548 | <i>Schaumrösllein</i> | 452 |
| <i>Saamkraut</i> | 188 | <i>Schierling</i> | 296 |
| <i>Saat - Gerste</i> | 151 | <i>Schießbeere</i> | 256 |
| <i>Saat - Haaser</i> | 131 | <i>Schilf</i> | 79 |
| <i>Saatmohn</i> | 545 | <i>Schilfgras</i> | 71 |
| <i>Saatwaizen</i> | 145 | <i>Schirunkraut</i> | 492 |
| <i>Salat - Fedia</i> | 45 | <i>Schlafkraut</i> | 249 |
| <i>Salbei</i> | 29 | <i>Schlängenkraut</i> | 423 |
| <i>Salomonssiegel</i> | 370 | <i>Schlangenlauch</i> | 313 |
| <i>Salzbinse</i> | 396 | <i>Schleendorn</i> | 504 |
| <i>Salzgras</i> | ebend. | <i>Schleenpflaume</i> | ebend. |
| <i>Sandhafer</i> | 136 | <i>Schlingbaum</i> | 333 |
| <i>Sandkrant</i> | 461 | <i>Schlottenkraut</i> | 559 |
| <i>Sandlauch</i> | 354 | <i>Schlüsselblume</i> | 228 |
| <i>Sandmohn</i> | 543 | <i>Schlutte</i> | 251 |
| <i>Sandnelke</i> | 340 | <i>Schmeerwurz</i> | 463 |
| <i>Sand - Steinbrech</i> | 444 | <i>Schmeilengras</i> | 92 |
| <i>Sanikel</i> | 287 | <i>Schmelzblume, gemeine</i> | 574 |
| <i>Sauerach</i> | 386 | <i>Schmergelkraut</i> | 274 |
| <i>Sauerampfer</i> | 394 | <i>Schmiele</i> | 92 |
| <i>Sauerdorn</i> | 386 | <i>Schminkebeere</i> | 6 |
| <i>Saufenchel</i> | 302 | <i>Schminkwurz</i> | 217 |
| <i>Sauerklee</i> | 468 | <i>Schneeballstrauch</i> | 335 |
| <i>Santodt</i> | 352 | <i>Schneeglöckchen</i> | 350 |
| <i>Schaafampfer</i> | 395 | <i>Schneetropfen</i> | ebend. |
| <i>Schaafmälche</i> | 45 | <i>Schnittlauch</i> | 360 |
| <i>Schaafrapunzel</i> | 269 | <i>Schöllkrant</i> | 542 |
| <i>Schaafschwingel</i> | 116 | <i>Schöllkraut, kleines</i> | 562 |
| <i>Scharfkraut</i> | 223 | <i>Schöllwurz</i> | ebend. |
| <i>Scharlach - Bocksbeere</i> | 523 | <i>Schutt - Hornkraut</i> | 474 |
| <i>Scharlottenzwiebel</i> | 358 | <i>Schwaden</i> | 102 |
| <i>Schattenblümchen</i> | 186 | <i>Schwalbenwurz</i> | 270 |

Schwarz-

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| Schwarzbeere | 416 | Sommer - Lolch | 148 |
| Schwarzdorn | 504 | Sommerroggen | 143 |
| Schwarzkimmel | 556 | Sommer - Waizer | 145 |
| Schwarzwinde | 430 | Sommerzwiebel | 359 |
| Schwarzwurz | 222 | Sonnengurtel | 550 |
| Schwarzwurz, gemeine | 541 | Sonnenhirse | 218 |
| Schwefelwurz | 301 | Sonnenröschen | 550 |
| Schweinsmelde | 277 | Sonnenthau | 343 |
| Schweikenbaum | 334 | Spargel | 368 |
| Schwertel | 48 | Spark | 477. |
| Schwindelbeerbaum | 353 | Specklilie | 244 |
| Schwingel | 116 | Speierling | 508 |
| Schwingelgras | ebend. | Speierlingsgras | 181 |
| See - Ampfer | 390 | Spelz | 145 |
| Seabinse | 57 | Spergel | 477 |
| Seeblume, große | 547 | Sperlingszunge | 421 |
| Seenuss | 183 | Spiegel - Glockenblume | 241 |
| Seerose | 547 | Spierlingsbann | 508 |
| Seerose, gelbe | 548 | Spierstaude | 512 |
| Seestands - Dreizack | 396 | Spinat, wilder | 272 |
| Seidelbast | 420 | Spindelbaum | 257 |
| Seidenkraut | 187 | Spinuenhafer | 158 |
| Seifenkraut | 447 | Spitz - Ahorn | 408 |
| Sesel | 522 | Spitzflader | ebend. |
| Seslerie | 101 | Spornglocke | 553 |
| Sherardie | 166 | Springfuchs | 341 |
| Sichelkraut | 309 | Springkraut | 269 |
| Sichelmöhre | ebend. | Spurre | 154 |
| Siebenfingerkraut, rothes | 535 | Stachelbeere | 259 |
| | | Stachelnuß | 185 |
| Siegwurz | 47 | Stachelranunkel | 578 |
| Sil u | 305 | Stachelrose | 517 |
| Silberkraut | 529 | Stadt - Gänselfuß | 275 |
| Silge | 297 | Staubkerze | 247 |
| Simse | 375 | Stechapfel | 248 |
| Sinaw | 184 | Steinbeere | 525 |
| Sinngrün | 263 | Stein - Bibernell | 326 |
| Sommer - Adonis | 568 | Steinbrech. | 441 |
| Sommergerste | 152 | - rother | 512 |
| Sommerkorn | 143 | Stein - Himbeere | 523 |
| Sommer - Linde | 548 | Steinhirse | 217 |

Stein-

R e g i s t e r.

| | P a g. | | P a g. |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| <i>Steinknöpfe</i> | 525 | <i>Sumpfbinse</i> | 54 |
| <i>Steinlinde</i> | 549 | <i>Sumpf - Dotterblume</i> | 585 |
| <i>Steinmilch</i> | 487 | <i>Sumpf - Dreizack</i> | 596 |
| <i>Stein - Petersilie</i> | 326 | <i>Sumpfhahnensuß, großer</i> | |
| <i>Steinsaame</i> | 217 | | 571 |
| <i>Steinwurz</i> | 463 | <i>- kleiner</i> | 569 |
| <i>Stephanskraut</i> | 12 | <i>Sumpf - Kälberkropf</i> | 318 |
| <i>Sterndolde</i> | 288 | <i>Sumpf - Komarum</i> | 535 |
| <i>Sternkraut</i> | 457 | <i>Sumpf - Labkraut</i> | 170 |
| <i>Sternkraut</i> | 166 | <i>Sumpf - Lysimachie</i> | 251 |
| <i>Sternleberkraut</i> | 167 | <i>Sumpf - Mausohr</i> | 216 |
| <i>Sternmiere</i> | 457 | <i>Sumpfnabelkraut</i> | 286 |
| <i>St. Otilienkraut</i> | 553 | <i>Sumpf - Parnassie</i> | 339 |
| <i>Strahlkraut</i> | 194 | <i>Sumpf - Spierstaude</i> | 513 |
| <i>Straußgras</i> | 76 | <i>Sumpf - Sternkraut</i> | 460 |
| <i>Streichkraut</i> | 485 | <i>Sumpfveilchen</i> | 264 |
| <i>Strickgras</i> | 50 | <i>Sumpf - Weiderich</i> | 415 |
| <i>Sturmhut</i> | 553 | <i>Sumpf - Windhalm</i> | 78 |
| <i>Sumpfkaldrian</i> | 44 | <i>Sumpfwolle</i> | 61 |
| <i>Sumpf - Benedicktenwurz</i> | 534 | <i>Suppenlauch</i> | 360 |
| | | <i>Sybillenwurz</i> | 285 |

T.

| | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| <i>Tag - und - Nacht - Veilchen</i> | 267 | <i>Thymian - Flachsseide</i> | 187 |
| | | <i>Timotheusgras</i> | 72 |
| <i>Tannenwedel</i> | 3 | <i>Tolkirsche</i> | 250 |
| <i>Tauben - Krätzkraut</i> | 165 | <i>Tollkorn</i> | 148 |
| <i>Taubenkropf</i> | 452 | <i>Tollkraut</i> | 250 |
| <i>Taubhafer</i> | 158 | <i>Tollpetersilie</i> | 314 |
| <i>Taumelkörbel</i> | 317 | <i>Torfsbinse</i> | 53 |
| <i>Tausendguldenkraut</i> | 253 | <i>Traubenhollunder</i> | 337 |
| <i>Tausendknotenkraut</i> | 429 | <i>Traubenkirsche</i> | 500 |
| <i>Teichlilie, gelbs</i> | 49 | <i>Trespe</i> | 127 |
| <i>Teufels - Abbiß</i> | 164 | <i>Trollblume</i> | 583 |
| <i>Teufelsauge</i> | 568 | <i>Tropfswurz</i> | 310 |
| <i>Teufelsmilch</i> | 492 | <i>Tulpe</i> | 562 |
| <i>Thalblume</i> | 369 | <i>Türkischer Bund</i> | 361 |
| <i>Theriakwurz</i> | 326 | | |

U.

R e g i s t e r.

U.

| | P a g. | | P a g. |
|---------|--------|------|--------|
| Ulmbaum | 280 | Ulme | 280 |

V.

| | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|---------------|
| Veilchen | 263 | Vogelkraut | 339 |
| <i>Veitwurz, deutsche</i> | 48 | <i>Vogelmiere</i> | <i>ebend.</i> |
| Venuskamm | 315 | Vogelmilch | 363 |
| <i>Venußspiegel</i> | 241 | <i>Vogelnest</i> | 295 |
| Vergißmeinnicht | 215 | Vogelpflaume | 500 |
| <i>Viehgras</i> | 109 | Vogelsternkraut | 459 |
| Vogelbeerbaum | 507 | <i>Vogelzunge</i> | 430 |
| Vogelknöterich | 429 | | |

W.

| | | | |
|----------------------------|-----|------------------------|-----|
| Waizen | 143 | Wald - Windblume | 560 |
| Waldbinse | 59 | Wald - Wolfsmilch | 490 |
| Waldephen | 260 | <i>Waldwurz</i> | 441 |
| <i>Walderdbeere</i> | 524 | <i>Walker - Karte</i> | 161 |
| <i>Waldesche</i> | 407 | Wallwurz | 222 |
| <i>Waldglocke</i> | 238 | Wanzenrose | 514 |
| <i>Wald - Haargras</i> | 149 | <i>Wanzenstrauch</i> | 258 |
| <i>Waldheide</i> | 419 | <i>Waschkraut</i> | 447 |
| <i>Waidhirse</i> | 75 | Wasser - Ampfer | 393 |
| <i>Wald - Kartendistel</i> | 161 | Wasser - Andorn | 28 |
| <i>Waldklette</i> | 12 | <i>Wasser - Eppich</i> | 531 |
| <i>Waldknoblauch</i> | 359 | Wasserseder | 230 |
| Wald - Labkraut | 174 | Wassersenfchel | 311 |
| <i>Wald - Lauch</i> | 355 | Wasser - Fuchsschwanz | 69 |
| Wald - Lichtnelke | 470 | <i>Wassergauchheil</i> | 17 |
| Wald - Lysimachie | 252 | <i>Wasserhelm</i> | 27 |
| Waldmeister | 167 | <i>Wasserhollunder</i> | 334 |
| <i>Waldrapunzel</i> | 242 | Wasser - Hornkraut | 476 |
| Waldrohr | 83 | <i>Wasserklee</i> | 230 |
| Waldschlüsselblume | 228 | Wasserknöterich | 424 |
| Waldsünse | 379 | <i>Wasser - Lilie</i> | 547 |
| Waldsternkraut | 457 | <i>Wasser - Linde</i> | 548 |
| <i>Waldweiderich</i> | 252 | Wasserlinse | 30 |

Was-

R e g i s t e r

| | Pag. | | Pag. |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------|
| <i>Wasserlisch</i> | 434 | <i>Weinstock</i> | 261 |
| <i>Wassermerk</i> | 307 | <i>Weißbaum</i> | 409 |
| <i>Wassernabel</i> | 286 | <i>Weißdorn</i> | 504 |
| <i>Wassernuß</i> | 183 | <i>Weißhafer</i> | 137 |
| <i>Wassernymphe, gelbe</i> | 548 | <i>Weißwurz</i> | 370 |
| <i>Wasserpfeffer</i> | 426 | <i>Wiederstoss</i> | 470 |
| <i>Wasserranunzel, kleiner</i> | 579 | <i>Wiesenflachs</i> | 342 |
| <i>- weißer</i> | 581 | <i>Wiesen - Fuchsschwanz</i> | 68 |
| <i>Wasser - Raute</i> | 310 | <i>Wiesen - Gerste</i> | 151 |
| <i>Wasser - Rispengras</i> | 102 | <i>Wiesenhafer</i> | 141 |
| <i>Wasserrose</i> | 547 | <i>Wiesen - Kleinling</i> | 180 |
| <i>Wasserschierling</i> | 312 | <i>Wiesenknopf</i> | 181 |
| <i>Wasserschlauch</i> | 27 | <i>Wiesenknöterich</i> | 423 |
| <i>Wasserschmiele</i> | 95 | <i>Wiesen - Küchenschelle</i> | 559 |
| <i>Wasser - Schwertel</i> | 49 | <i>Wiesenkummel</i> | 325 |
| <i>Wassersimse</i> | 3 8 | <i>Wiesen - Lichtenau</i> | 358 |
| <i>Wassersteinbrech</i> | 310 | <i>Wiesen - Lichtnelke</i> | 470 |
| <i>Wasserstern</i> | 4 | <i>Wiesen - Lieschgras</i> | 72 |
| <i>Wasser - Sternmiere</i> | 460 | <i>Wiesennelke</i> | 451 |
| <i>Wasser - Vergißmeinnicht</i> | 216 | <i>Wiesen - Rispengras</i> | 109 |
| <i>Wasserviole</i> | 434 | <i>Wiesenrohr</i> | 81 |
| <i>Wasser - Weegerich</i> | 398 | <i>Wiesen - Schwingel</i> | 122 |
| <i>Wau</i> | 485 - 486 | <i>Wiesentulipane</i> | 362 |
| <i>Weber - Distel</i> | 161 | <i>Wiesenwolle</i> | 63 |
| <i>Weber - Karte</i> | ebend. | <i>Wildhafer</i> | 138 |
| <i>Weedorn</i> | 255 | <i>Windblume</i> | 560 |
| <i>Weegerich</i> | 179 | <i>Winde</i> | 235 |
| <i>Weegras</i> | 429 | <i>Windhalm</i> | 77 |
| <i>Weegtritt</i> | ebend. | <i>Wintergerste</i> | 151 |
| <i>Weichselbaum</i> | 501 | <i>Wintergrün</i> | 260 |
| <i>Weidenkraut</i> | 483 | <i>Wintergrün</i> | 442 |
| <i>Weiderich</i> | 411 | <i>Winterkorn</i> | 143 |
| <i>Weihergras</i> | 54 | <i>Winter - Linde</i> | 549 |
| <i>Weihrauchwurz</i> | 301 | <i>Winter - Lolch</i> | 147 |
| <i>Weinbergs - Lauch</i> | 356 | <i>Winterroggen</i> | 143 |
| <i>Weinblatt</i> | 407 | <i>Winterriksen</i> | 145 |
| <i>Weinrebe</i> | 261 | <i>Winterzwiebel</i> | 360 |
| <i>Weinrose</i> | 518 | <i>Wolfsbeere</i> | 431 |
| <i>Weinschädling</i> | 386 | <i>Wolfsbeeren</i> | 250 |
| | | <i>Wolfsfuß</i> | 28 |
| | | <i>Wolfsgesicht</i> | 224 |

Wolfs-

R e g i s t e r.

| | Pag. | | Pag. |
|----------------------------|------|---------------------|------|
| <i>Wolfsgeist</i> | 553 | <i>Wollgras</i> | 61 |
| <i>Wollskirsche</i> | 260 | <i>Wollkraut</i> | 246 |
| <i>Wolfsmilch</i> | 486 | <i>Wundholzbaum</i> | 11 |
| <i>Wolfswurz</i> | 553 | <i>Wurzelauger</i> | 441 |
| <i>Wolfswurz, schwarze</i> | 541 | <i>Wütherich</i> | 312 |

Z.

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|--------|
| <i>Zah'kraut</i> | 231 | <i>Zipfelblume</i> | 586 |
| <i>Za'ecke</i> | 369 | <i>Zipfelkraut</i> | ebend. |
| <i>Zaunblume</i> | 367 | <i>Zipperlein-kraut</i> | 532 |
| <i>Zaunglocke</i> | 235 | <i>Zirmet</i> | 290 |
| <i>Zaun - Rapunzel</i> | 239 | <i>Zittergras</i> | 114 |
| <i>Zaunreis</i> | 178 | <i>Zitterwurz</i> | 391 |
| <i>Zaunriegel</i> | 10 | <i>Zottenblume</i> | 230 |
| <i>Zäpflein-kraut</i> | 240 | <i>Zweiblatt</i> | 186 |
| <i>Zapfenholz</i> | 256 | <i>Zwerggras</i> | 65 |
| <i>Zeitlose</i> | 397 | <i>Zwerghollunder</i> | 335 |
| <i>Zellerie</i> | 331 | <i>Zwerg - Schwertel</i> | 48 |
| <i>Ziegeuner-kraut</i> | 28 | <i>Zwetschge</i> | 502 |
| <i>Zimmtrose</i> | 515 | <i>Zypergras</i> | 52 |





New York Botanical Garden Library
QK314 .H41 v.1
Heller, Franz Xaver/Flora Wirceburgensis

gen



3 5185 00121 3923

