

*MASTIXIA TRICHOTOMA*, Bl.

*M*: foliis oppositis oblongis acuminatis subtus petiolis et corymbis trichotomis terminalibus puberulis, floribus tetrandris (Arbor 50-60 ped.).

*Crescit*: cum praecedenti.

*Floret*: fere toto anno.

*Nomen*: Palaglar burriet; Tenjoh.

*VIBURNUM*, Linn.

*Calix* superus, brevis, quinquedentatus. *Corolla* campanulata raro tubulosa, quinquefida. *Stamina* quinque; *filamenta* tubo corollae inserta. *Stigmata* tria, raro solitaria, sessilia. *Drupa* baccata, nucleo compresso monospermo. *Embryo* in albumine carnosus inversus.

*VIBURNUM MONOGYNUM*, Bl.

*V*: foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis supra basin glanduloso-denticulatis coriaceis glabris subtus pallidioribus, cymis divaricatis terminalibus puberis, floribus monogynis (aff. *V. eroso*, Thunb.).

*Crescit*: in sylvis montosis.

*Floret*: Novembri; Majo, etc.

*Nomen*: Kikukuran; Kiapo.

*VIBURNUM LUTESCENS*, Bl.

*V*: foliis oblongis obtuse acuminatis basi acutis grosse serratis coriaceis nitentibus subtus pallidioribus, cymis terminalibus divaricatis puberulis.

*Cres-*