



Inventaire Botanique du Massif du Panié et des Roches de la Ouaième, Nouvelle-Calédonie

Author: Munzinger, Jérôme

Source: Evaluation rapide de la biodiversité du massif du Panié et des Roches de la Ouaième, province Nord, Nouvelle-Calédonie: 45

Published By: Conservation International

URL: <https://doi.org/10.1896/054.065.0111>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

Chapter 1

Inventaire botanique du massif du Panié et des Roches de la Ouaième, Nouvelle-Calédonie

Botanical survey of the Mt. Panié and Roches de la Ouaième region, New Caledonia

Jérôme Munzinger

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Philippe Birnbaum (IAC-CIRAD-AMAP), Jean-Pierre Butin (SMRT-DDEE-Province nord), Martin Callmander (MO), Vanessa Hequet (IRD-AMAP), Pete Lowry (MO), Jérôme Munzinger (IRD-AMAP – Team Leader), Isaac Rounds (Conservation International Fiji) , Thomas Teimpouene, Mathias Teimpouene (Dayu Biik, Tribu de Haut-Coulna), Hervé Vandrot (IRD-AMAP).

RÉSUMÉ

La flore de trois sites du massif du Panié (Wewec, Dawenia et La Guen), ainsi que celle des Roches de la Ouaième, a été inventoriée et caractérisée en novembre 2010, notamment à travers la mise en place de 16 parcelles de 400 m², et la réalisation de 64 relevés de terrain. Cet inventaire a principalement visé les ligneux et les Orchidées. Un total de 4516 observations (herbiers, parcelles et relevés) a été réalisé, et identifiées à 92,4% à un niveau spécifique ou infra-spécifique. Un total de 617 taxons a été observé comprenant 490 espèces, 9 sous-espèces, et 14 variétés, validement publiées (Morat et al., 2012), et 10 taxons temporaires de travail (TTT) ; l'ensemble comprend 108 familles et 249 genres distincts. Les 523 espèces, TTT et rang infra-spécifiques correspondent à 404 taxons endémiques, 106 autochtones, 12 introduites (dont 5 considérées comme envahissantes) et 1 de statut non défini. 177 d'entre eux, soit 33,8% sont inscrits sur la liste des espèces protégées de la Province nord. 14 taxons (espèces ou rang-infra-spécifiques) suspectés d'être nouveaux pour la science ont été rencontrés, dont deux sont déjà publiés : *Meryta rivularis* Lowry et *Pandanus taluucensis* Callm. La végétation rencontrée correspond à ce qui est actuellement décrit comme de la forêt dense humide de basse et moyenne altitudes sur roches volcano-sédimentaires, dont des phases de reconstitution ont été observées localement, et de la forêt de montagne (ou oro-néphéophile).

SUMMARY

In November 2010, we surveyed the flora at three sites of the Mt. Panié massif, as well as at Roches de la Ouaième, through the establishment of sixteen (16) 400 m² plots and 64 field surveys. We focused the inventory on all trees species and orchids. A total of 4516 observations were made, with 92.4% individuals identified to the species or sub-species level. We recorded a total of 617 taxa, including 490 species, 9 subspecies and 14 varieties validly published (Morat et al., 2012), and 10 temporary taxa (TT) ; this represents 108 families and 249 genera. Among 523 species, TT and subspecies level taxa, 404 are endemic to New Caledonia, 106 are native (but not endemic) and 12 are introduced (including 5 considered invasive). 177 species (33.8%) are on the list of protected species for Province nord of New Caledonia. We found 14 taxa (species or sub-species) apparently new to science, two of which (*Meryta rivularis* Lowry and *Pandanus taluucensis* Callm.) have recently been described. The vegetation consisted of low and medium elevation rain forest on volcanic-sedimentary rocks, local patches of secondary vegetation, and montane cloud forest.

INTRODUCTION

La chaîne du Panié et les Roches de la Ouaième dans sa continuité sud, se trouvent dans l'extrême nord-est de la grande-terre. La végétation de ces sites comprend principalement de la forêt dense humide sur substrat métamorphique (Micascistes, gneiss siliceux ou gréso-conglomératiques) ou sur serpentinites (Roches de la Ouaième), mais également des savanes dans les parties basses et dégradées. Le massif du Panié a été de nombreuses fois prospecté, mais majoritairement dans son extrême nord (piste d'accès à l'antenne de Mandjélia) et pour le Mont Panié principalement à partir du chemin sur son flanc est. Ainsi de nombreuses récoltes avaient été faites le long celui-ci, lors de prospections aléatoires (au moins 1500 spécimens fertiles déposés à NOU) ou à travers deux transects altitudinaux (Conservation International et al 1998, Spir 2006). Ce n'est qu'en

Octobre-Novembre 1999 que Gordon McPherson et Henk van der Werff (MO) ont réalisé la première grande mission de récoltes sur le flanc ouest au dessus de Haut-Coulna, ce qui a permis la description d'une nouvelle espèce dans le genre *Zygogynum* (Vink, 2003). Le site de La Guen avait été rapidement prospecté par J. Munzinger en Mars 2005 et Avril 2007, révélant notamment *Pycnandra linearifolia* (Swenson and Munzinger 2009). En conséquence, les botanistes travaillant sur la flore de Nouvelle-Calédonie savaient que le massif n'est toujours pas bien connu, comme le confirme la description de nouveaux taxons endémiques du massif. Certains ont d'ailleurs été découverts récemment le long du chemin parcouru par tous les récolteurs contemporains comme *Paphia paniensis* (Venter and Munzinger 2007) ou *Symplocos paniensis* (Pillon et Nooteboom 2009). Un peu plus au sud, les Roches de la Ouaième ont également été prospectées par de nombreux botanistes (près de 500 récoltes fertiles à NOU), mais, malgré cela, des espèces nouvelles pour la science avaient été identifiées suite aux récoltes réalisées lors du RAP de 1996 (Dawson et al., 2000), et d'autres l'ont encore été très récemment, comme *Pycnandra ouaimeensis* récolté pour la première fois en 2005 (Swenson and Munzinger 2010), montrant le très grand nombre d'espèces végétales présentes sur le site, et le manque de connaissance de celui-ci, malgré les récoltes déjà réalisées. De plus, aucun inventaire standardisé n'avait été réalisé sur les Roches de la Ouaième préalablement à la mission RAP de novembre 2010. Les sites de Wewec et Dawenia n'avaient visiblement jamais été prospectés par le passé, ce RAP a donc produit les premières données botaniques en ces lieux.

L'intervention de l'équipe botanique a fait l'objet d'une convention avec la Province nord (PN/IRD 10C319) et les échantillons collectés l'ont été dans le cadre d'un permis officiel.

MÉTHODOLOGIE

Sites d'étude

Il avait été envisagé de travailler sur cinq sites : les Roches de la Ouaième, Wewec, Dawenia, La Guen et le sommet du Mont Panié. Finalement les conditions météorologiques n'ont pas permis de prospecter le sommet du Mont Panié et seul l'un d'entre nous (MC) a pu récolter un *Pandanus* lors d'un court passage sur ce dernier site. Les quatre autres sites ont été inventoriés, avec un travail plus approfondi à La Guen où l'équipe est restée plus longtemps que prévu initialement.

Le camp 1, à l'est des Roches de la Ouaième, se trouvait à 600 m, en lisière de forêt et de savane. A partir du camp il a été possible de monter jusqu'à la crête des roches vers 1000 m. Toute la zone prospectée est hors réserve.

Le camp 2, à Wewec se trouvait à 350 m, d'où il a été possible de monter jusque vers 700 m au nord, et vers 600 m à l'est, sur le flanc ouest du Panié, à l'intérieur de la réserve.

Le camp 3, à Dawenia était dans une cuvette, dans une petite forêt rivulaire vers 600 m, il a été possible de monter sur le flanc Ouest du Colnett jusqu'à 1000 m. Ce site était entièrement hors réserve.

Le camp 4 à La Guen utilisait le refuge Blaffart comme camp de base, à 600 m en bord de rivière, il était en savane à Niaouli, en limite de forêt. Des sentiers existants nous ont permis de monter jusqu'à 900 m. Toutes les récoltes de La Guen étaient à l'intérieur de la réserve.

Inventaire floristique

Des parcelles de 20×20 m ont été mises en place, choisies en privilégiant des sites forestiers homogènes (pas de gros châblis ou ruisseau, pente constante), si possible à 600 et 900 m, dans lesquelles tous les individus de diamètre supérieur ou égal à 5 cm à 1,30 mètre du sol (DBH) ont été numérotés à l'aide d'une étiquette forestière clouée, identifiés, et leur DBH mesuré. Chaque individu était positionné au sein de chacune des 16 sous-parcelles de 5×5 m. La hauteur de cinq individus, quatre représentatifs de la canopée et le plus grand arbre de la parcelle (émergent), a également été mesurée pour estimer la hauteur de la canopée.

Au total, 16 parcelles ont été mises en place :

- Roches de la Ouaième : 3 parcelles à 600m et 1 parcelle à 900m
- Wewec : 2 parcelles à 450m et 2 parcelles à 600m
- Dawenia : 3 parcelles à 600m,
- La Guen : 4 parcelles à 600m et 1 parcelle à 900m

Dans ces parcelles, 2951 arbres ont été numérotés. Cet inventaire est intégré à la base de données NC-PIPPN (New Caledonian Plant Inventory and Permanent Plot Network), notamment en lien avec l'étude en cours sur les faciès forestiers (convention PN/IRD 10C113 avec la Province nord).

Cette méthode à l'avantage d'identifier tous les individus, sans biais lié aux personnes mettant en place la parcelle, par contre elle ne permet de couvrir que de petites surfaces, et ne prend pas en compte toutes les herbacées, épiphytes, lianes de petit diamètre etc.

Des relevés ont été réalisés dans les parcelles (plantes de diamètre inférieur à 5 cm de DBH) et dans les différents milieux, en privilégiant les mieux conservés. Les espèces facilement identifiables sur le terrain sans prélèvement ont été notées, de façon opportuniste, par cheminement. Lorsqu'un changement de milieu était observé un nouveau relevé était réalisé. Cette méthode peut produire beaucoup d'observations en peu de temps, mais est fortement biaisée par la connaissance de l'observateur, un spécialiste des fougères produira un relevé très différent d'un spécialiste des Orchidées. Ainsi, 1094 taxons ont ainsi été annotés : 233 par J.-P. Butin en 16 relevés, 568 par J. Munzinger en 32 relevés, et 293 par les autres membres de l'équipe botanique dans 16 relevés complémentaires des parcelles.

Lorsqu'une identification certaine ne pouvait se faire sur le terrain ou qu'une plante pouvait présenter un intérêt pour la connaissance de la flore (fleurs, fruits, localité...), des plantes ont été récoltées et mises dans des feuilles de journal, puis

fixées à l'alcool à 70°C. Cela permet de fixer les plantes, et de les sécher ultérieurement, tout en les gardant en bon état pour leur étude à venir, voire leur intégration dans les herbiers de référence pour les spécimens intéressants. 390 spécimens en fleur ou en fruit ont ainsi numérotés, puis déposés à l'herbier du centre IRD de Nouméa (NOU), des doubles de chaque récolte sont envoyés dans d'autres herbiers de référence pour la flore de Nouvelle-Calédonie, notamment l'herbier du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (P), ou en fonction de la présence de spécialistes travaillant sur le groupe concerné, ainsi 280 doubles ont été envoyés aux herbiers suivants (acronymes officiels de l'Index herbariorum : <http://sweetgum.nybg.org/ih/>) : CANB (4), G (23), K (2), MO (81), NSW (3), OWU (1), P (158), S (5), SUVA (1), WAIK (1), WELTU (1). Les abréviations de récolteurs utilisées sont les suivantes : JM : Jérôme Munzinger ; PL : Pete Lowry ; MC : Martin Callmander.

Des petites plantes fugaces peuvent échapper à l'inventaire car elles ne sont visibles que quelques semaines par an, par exemple de petites Orchidées comme le genre *Acanthus* (16 espèces endémique en NC). Les petites fougères sont également souvent sous-récoltées (pas de spécialiste dans l'équipe botanique), même si un effort a été fait. Les épiphytes sont souvent sous-récoltées (difficultés d'accès), et l'ont probablement été lors de cette mission qui ne comportait pas de grimpeur. La présence de J.-P. Butin dans l'équipe fait que les Orchidées ont été particulièrement bien observées lors de ce RAP.

Les plantes ont été identifiées à l'herbier de Nouméa (NOU), principalement par J. Munzinger, H. Vandrot, C. Chambrey et V. Hequet (familles diverses), et par L. Barrabé

(Rubiaceae), P. Lowry (Araliaceae), M. Callmander (Pandanaceae), J.-P. Butin (Orchidaceae), à l'aide de la flore de Nouvelle-Calédonie et Dépendances (Aubréville et al. 1967-), et de divers travaux en taxonomie. Le référentiel de la Flore de la Nouvelle-Calédonie « FLORICAL » sert de base pour les taxons validement publiés (Morat et al. 2012 vers. 02.V.2011). Des taxons temporaires de travail « TTT » sont parfois utilisés. Il s'agit en général de taxons pour lesquels le statut est en cours d'étude, suspectés pour la plupart d'être nouveaux. Il peut également s'agir de complexes d'espèces ou « groupe » difficile à distinguer. C'est par exemple le cas du « *Plerandra* gpe *candelabra/pseudocandelabra* », les deux espèces *P. candelabra* et *P. pseudocandelabra* étant impossible à distinguer sans les fleurs ou fruits : nous utilisons en effet ce nom de groupe, plutôt que de laisser une identification au seul genre *Plerandra*, beaucoup plus vaste et moins informatif.

Noms vernaculaires en Némo

Quelques noms vernaculaires donnés principalement par Maurice Wangene, mais également par Gabriel Teimpouene, Thomas Teimpouene, Mathias Teimpouene, ont pu être relevés. La transcription a été possible grâce à l'aide de Jean-Jacques Folger ayant suivi une formation spécifique en linguistique. Cette liste est donnée en Annexe 4.

RÉSULTATS

Flore

Sur un total de 4516 observations, 4137, soit 92,4%, ont pu être identifiées au niveau spécifique ou infra-spécifique

Tableau 1 : caractéristiques des parcelles. Nombre d'individus, nombre de taxons, % ID : pourcentages d'identifications et indices de Shannon, Simpson et Hill.

	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	R. de Ouaième 1	R. de Ouaième 2	R. de Ouaième 3	R. de Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4
Nb d'individus/parcelle	186	147	199	269	222	158	182	322	176	195	229	235	87	100	111	133
Nb taxons/parcelle	64	52	57	52	64	34	42	85	60	60	75	53	41	27	24	39
% ID Sp. et infra-sp.	92,5	93,2	93,5	86,2	89,6	100	98,4	97,8	94,3	93,8	88,6	98,3	90,8	98	100	100
% ID genre	7,5	6,1	6	8,9	10,4	-	1,1	2,2	5,7	5,6	9,6	1,7	9,2	1	-	-
% ID famille	-	0,7	0,5	4,8	-	-	0,5	-	-	0,5	1,7	-	-	1	-	-
Indice de Shannon H'	5,38	5,16	5,36	5,02	5,45	4,32	4,57	5,63	5,25	4,96	5,66	5,04	4,81	3,94	3,64	4,23
H'max	6,00	5,70	5,83	5,70	6,00	5,09	5,39	6,41	5,91	5,91	6,23	5,73	5,36	4,75	4,58	5,29
H'/H'max	0,90	0,90	0,92	0,88	0,91	0,85	0,85	0,88	0,89	0,84	0,91	0,88	0,90	0,83	0,79	0,80
Indice de Simpson D	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,07	0,06	0,03	0,03	0,06	0,03	0,04	0,05	0,08	0,13	0,10
1-D	0,97	0,97	0,97	0,96	0,97	0,93	0,94	0,97	0,97	0,94	0,97	0,96	0,95	0,92	0,87	0,90
Indice de Hill	0,16	0,18	0,18	0,18	0,15	0,20	0,18	0,14	0,16	0,11	0,13	0,16	0,18	0,24	0,20	0,14
1-Indice de Hill	0,84	0,82	0,82	0,82	0,85	0,80	0,82	0,86	0,84	0,89	0,87	0,84	0,82	0,76	0,80	0,86

(sous-espèce, variété), 321 (7,1%) n'ont pu être identifiés qu'au genre, et 23 (0,5%) seulement à la famille.

Un total de 617 taxa a été observé lors de cette mission, présenté en Annexe 1, comprenant 490 espèces connues, 10 TTT, 9 sous-espèces, et 14 variétés.

Les 523 espèces, TTT et rang infra-spécifiques correspondent à 404 taxons endémiques, 106 autochtones, 12 introduites et 1 de statut non défini. 177 d'entre eux, soit 33,8% sont inscrits sur la liste des espèces protégées de la Province nord (Anonyme 2008) et 8 en VU sur la liste rouge de l'IUCN 2011 : *Agathis moorei* (Lindley) Masters, *Basselinia glabrata* Becc., *Dutaillyea amosensis* (Guillaumin) T.G.Hartley, *Ficus mutabilis* Bureau, *Montrouziera caulinflora* Planch. & Triana, *Neisosperma brevituba* (Boiteau) Boiteau, *Pittosporum paniense* Guillaumin, *Zygogynum tanyostigma* Vink (<http://www.iucnredlist.org/>), puis 2 NT et 3 LR/cd, mais il a déjà été mis en évidence que la liste rouge de l'IUCN nécessite d'être remise à jour pour la Nouvelle-Calédonie (Munzinger et al., 2008).

Les 510 espèces, TTT et rang infra-spécifiques endémiques et autochtones se répartissent en 26 fougères et alliées, 7 gymnospermes et 477 angiospermes, dont 111 monocotylédones et 366 dicotylédones.

De nombreuses données nouvelles ont été produites lors de cette mission, elles sont de plusieurs ordres.

Les premiers résultats (Munzinger et al. 2011) laissaient supposer qu'au moins deux taxons avaient été récoltés pour la première fois lors de cette mission : une Araliaceae, *Meryta* sp. nov. (PL7257) et une Sapotaceae, *Planchonella* sp. (JM6150). Ces deux taxons se révèlent effectivement être des nouveautés pour la science. L'Araliaceae a été décrite (Callmander and Lowry 2011) et s'appelle désormais *Meryta rivularis* Lowry, mais la plante avait finalement été déjà récoltée dans le passé puisque plusieurs parts ont été retrouvées à l'herbier du muséum à Paris (P), récoltées par Lécard (sans date [fin XIX^eme], Table Unio, [localité douteuse]), Hürli-mann (1951, Riv. Télème) et Mouly et al. (2003, Mont Colnett, pente est). Un échantillon stérile du *Planchonella* avait également été récolté par Munzinger en 2005 sur les Roches de la Ouaième, la description de cette nouvelle espèce est en cours.

Plusieurs espèces, déjà identifiées lors de précédents inventaires comme nouvelles pour la science ont été rencontrées et récoltées. Ces nouvelles récoltes vont permettre dans certains cas la description (en complétant le matériel déjà connu), ou de mieux cerner la morphologie et l'écologie de ces nouveautés. C'est ainsi que le *Pandanus taluucensis* Callm. (Pandanaceae) a été publié (Callmander and Lowry 2011).

Les espèces supposées nouvelles rencontrées lors de cette mission sont :

Balanops sp. nov. (JM4121) (Balanopaceae), les *Cryptocarya* (JM4792), (JM5874) et (JM5832) (Lauraceae), *Dendrobium letocartiorum* sp. nov. ined. (JM & al. 6290) (Orchidaceae) ; *Eugenia* « paniensis » J.W.Dawson ined. (JM & al. 6142) (Myrtaceae) ; *Elaphoglossum* sp. nov. (JM4301) (Lomariopsidaceae) ; *Goniothalamus* sp. nov. (JM6464)

(Annonaceae) ; *Podonephelium pachycaulum* Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki, ined. (MC895) (Sapindaceae).

Le *Tapeinosperma* sp. (JM3527) (Primulaceae) signalé (Munzinger et al. 2011) serait non pas une espèce inédite mais une variété nouvelle selon M. Schmid, travaillant actuellement sur la révision du genre pour la Nouvelle-Calédonie.

Des nouvelles localités ont ensuite été trouvées pour beaucoup de plantes. Certaines particulièrement intéressantes et/ou surprenantes :

- *Elaphoglossum huerlimannii* Guillaumin, Lomario-psidaceae. Cette petite fougère rencontrée sur des rochers en bord de rivière n'était connue que de trois récoltes, Mt Tsio, Ouégoa et Mandjélia, la dernière datant de 1984 (Brownlie 1969). La discréption de cette plante explique peut-être cette rareté de récoltes. Elle a été trouvée à Dawenia en altitude (1000 m).
- *Goniothalamus dumonetii* R.M.K.Saunders & Munzinger, Annonaceae. Cette espèce a été décrite en n'étant connue que de la réserve de la Nodéla, près de Bourail, sur terrain ultramafique. Elle avait été alors proposée avec un critère CR (Saunders and Munzinger 2007). Elle a ensuite été trouvée au Col d'Amieu et à La Guen en 2007, et très récemment sur le Tchingou (2011). Nous avons pu la retrouver à La Guen lors du RAP, où elle est abondante. Sa floraison à la base du tronc explique sans doute pourquoi elle est difficile à repérer.
- *Oncotheca humboldiana* (Guillaumin) Morat & Veillon, espèce de la famille endémique des Oncothecaceae, n'était connue que poussant sur terrain ultramafique (Morat and Veillon 1988). Elle a été rencontrée dans les forêts à côté du refuge Blaffart, à La Guen.
- *Planchonella mandjelianiana* Munzinger et Swenson, Sapotaceae. Cet arbuste décrit il y a peu n'était alors connu que de Mandjélia où il semble rare. Les auteurs l'avaient d'ailleurs proposé pour une inscription sur la liste rouge de l'IUCN avec un critère CR (Swenson et al. 2007). La plante a été trouvée la même année à La Guen, et restait depuis connue de ces deux seules localités. Nous l'avons trouvée à Dawenia et Wewec lors de cette mission, élargissant de façon importante sa distribution. Cette plante reste une endémique de la chaîne du Mont Panié, sans être aussi restreinte que décrite initialement.
- *Pycnandra bracteolata* Swenson & Munzinger, Sapotaceae. Cet arbuste récemment décrit n'est connu que des forêts allant des Roches de la Ouaième au Mont Colnett. Nous l'avons vu à La Guen alors qu'il n'y avait pas encore été signalé. Cette plante avait été proposée en VU (Swenson and Munzinger 2010).
- *Pycnandra ouaiemensis* Swenson et Munzinger, Sapotaceae. La description de cette plante a été publiée en 2010 (Swenson and Munzinger 2010). Elle n'était connue que des Roches de la Ouaième (d'où son nom) et proposée avec un critère CR. Elle a été observée également le long des berges de la rivière La Guen, c'est donc la deuxième localité connue pour cette plante rare.

Ce RAP a également permis de retrouver des plantes peu connues, comme :

- ***Bocquillonia phenacostigma*** Airy Shaw, Euphorbiaceae. Elle n'était connue que des forêts de l'Aoupinié (McPherson and Tirel 1987). La plante a été récoltée fertile (JM6361) et plusieurs individus ont été notés sur la parcelle La Guen 1 à 600 m.
- ***Bulbophyllum comptonii*** Rendle, Orchidaceae. Elle n'était connue que du type récolté par Compton, sans localité (Hallé 1977). Jean-Pierre Butin l'a retrouvée ; la localisation précise n'est pas divulguée pour éviter un pillage de la station.
- ***Dendrobium unicarinatum*** Kores, Orchidaceae, cette plante n'est pas officiellement signalée en Nouvelle-Calédonie (Pignal and Munzinger, in prep.), elle semble assez rare et a été vue aux Roches de la Ouaième et à La Guen.
- ***Sphenostemon thibaudii*** Jérémie, Paracryphiaceae (ex-Sphenostemonaceae). Ce petit arbre n'était connu que du type récolté en 1965 sur la face est du Mont Panié (Jérémie 1997). Deux individus stériles (mais d'identification certaine) ont été vus sur la parcelle La Guen 5 à 900 m.

Plantes introduites

14 taxons introduits ont été rencontrés lors de la mission, bien que l'équipe n'ait pas axé ses travaux sur la recherche d'espèces introduites. Toutes ces espèces ont été notées à Wewec. Il s'agit d'arbres plantés à proximité d'habitation comme le manguier *Mangifera indica*, le flamboyant *Delonix regia*, le jacquier *Artocarpus heterophyllus*, le badamier *Terminalia catappa*, d'espèces herbacées cultivées parfois échappées comme le tarot *Alocasia* sp. et le curcuma *Curcuma longa*, ou d'une ornementale échappée *Cuphea carthagenensis*.

Ensuite viennent des espèces considérées comme parmi les pires envahissantes en Nouvelle-Calédonie (Hequet et al. 2010), il s'agit du jambonier *Syzygium cumini*, la canne de Provence *Arundo donax*, le framboisier d'Asie *Rubus rosifolius*, le lantana *Lantana camara*, *Misanthus floridulus*, le tulipier du Gabon *Spathodea campanulata*, le goyavier *Psidium guajava*.

Cependant, les savanes environnantes des sites étudiés comporteraient très probablement des espèces introduites (au moins dans les Poaceae), mais n'ont pas été prospectées spécifiquement.

Noms vernaculaires en Némi

61 noms différents ont été relevés en Némi lors de la mission (Annexe 4). Ces noms couvrent une grande diversité de formes et groupes : arbres, arbustes, lianes, herbacées, fougères (arborescentes, terrestres, volubiles, épiphytes), de plantes poussant dans des milieux ouverts et perturbés ou au contraire dans les milieux forestiers les mieux conservés, en passant par les milieux rivulaires.

Il ressort qu'un même nom peut être donné pour des plantes botaniquement très différentes, comme « Thigic » donné pour *Alstonia costata* (Apocynaceae) et pour *Pisonia*

gigantocarpa (Nyctaginaceae), la forme du fruit en long haricot des deux espèces explique peut-être ce nom commun. Dans le cas de « Him », ce nom semble générique, mais les espèces sont ensuite distinguées par leur milieu « de savane » pour *Codia montana* et « de forêt » pour *C. incrassata* (Cunoniaceae). Alors que dans d'autres cas des espèces du même genre ont des noms différents, comme « Théûk » pour *Guioa ovalis* et « Yhaut » pour *G. crenulata* (Sapindaceae), ou « Hwén » pour *Garcinia densiflora* et « Who » pour *G. amplexicaulis* (Clusiaceae).

Le nom « Hawha » a été donné pour un *Cyathea*, mais sur le terrain il nous a semblé que ce nom s'applique aux fougères arborescentes en général (*Dicksonia*, *Alsophila*, *Cyathea*, *Sphaeropteris*). Un doute repose sur le nom « Djimwaake Phûlo » attribué à *Kermadecia rotundifolia* (Proteaceae) et à un *Agropogon* sp. (Malvaceae), mais le fait que « Djimwaake » soit *Kermadecia sinuata*, laisse penser que c'est bien aux *Kermadecia* que ce nom s'applique.

Végétation

La végétation a été étudiée à travers la mise en place de 16 parcelles, dont les caractéristiques floristiques sont données en Annexe 2 et Annexe 3. Le nombre de tiges par parcelle varie de 87 (Dawenia 3) à 322 (La Guen 5), avec en moyenne 185 tiges par parcelle, et le nombre de taxons de 39 (Wewec 3) à 123 (La Guen 5), avec une moyenne de 78. Au total, 2951 individus (2974 tiges) ont été numérotés et mesurés, et 94,3% d'entre-eux sont identifiés à l'espèce ou à un niveau infra-spécifique, 4,9% au genre et 0,7% à la famille. Le taux d'identification à l'espèce ou au niveau infra-spécifique le plus faible étant de 86,2% à La Guen 1, et le maximum de 100% à La Guen 3, Wewec 3 et 4. 272 taxons de plus de 5 cm de DBH ont été vus dans ces 16 parcelles. Les différents indices de diversité montrent qu'il n'y a pas de dominance d'un taxon par rapport à un autre (valeur de H'/H'_{\max} tendant vers 1), les abondances des différentes espèces sont donc assez proches. L'indice de Simpson (probabilité que deux individus sélectionnés au hasard appartiennent à la même espèce), ou plus intuitivement 1-D est proche de 1, ce qui indique une grande diversité dans les parcelles. L'indice de Hill (mesure de l'abondance proportionnelle, et donc prend mieux en compte les espèces rares), également plus intuitif soustrait de 1, garde une valeur forte et confirme cette grande diversité dans les parcelles.


Les hauteurs de canopée mesurées montrent des différences très importantes entre les parcelles (Tableau 2), les moyennes de quatre arbres représentatifs vont de 4,6 m (Wayem 4) à 25,7 m (Dawenia 2), la moyenne générale restant faible, avec 13,2 m. Les émergents dépassent parfois les 30 m, et par trois fois sont du « Tamanou » (*Calophyllum caledonicum*).

Les parcelles sont constituées majoritairement de tiges de petits diamètre (Graphique 1), ainsi les parcelles ont toutes plus de 50% de leurs tiges comprises dans la classe 5–10 cm, à l'exception de Wewec 1 (46% seulement). Sept parcelles sur les 16 n'ont aucun arbre dépassant 60 cm de diamètre.

Le rapport du nombre d'arbres de la classe 5–10 cm sur la classe 10–15 cm est en moyenne de 3,1. La valeur la plus forte étant observée à La Guen 5 (6,9), et les valeurs les plus petites à La Guen 3 (1,5) et Wewec 4 (1,8). Cette dernière parcelle montrait de nombreuses traces d'impacts de cerfs sur les troncs, et un sous-bois quasi-inexistant. Cette faible proportion de petites tiges est peut-être à mettre en relation avec

une surabondance locale de cerfs, sachant que c'est à Wewec que l'impact perçu est le plus fort (Theuerkauf et al. 2013).

L'étude des forêts denses humides de la Nouvelle-Calédonie étant en cours, seules les grandes unités actuellement reconnues seront détaillées ici.



Graphique 1 : Nombre d'individus par classe de diamètre dans les 16 parcelles. Note : Les classes de diamètre 15-20cm et 20-25cm DBH ont été regroupées en une classe unique et celles supérieures à 25cm DBH également.

Tableau 2 : hauteur de la canopée (*moyenne de quatre arbres représentatifs de la canopée également distribués dans la parcelle), taille et nom des émergents dans les parcelles (données manquantes pour Dawenia 1).

Parcelle	Canopée	Emergent	Taxon
	Hauteur*	Hauteur	
Dawenia 2	25,7	30,2	Indet.
Dawenia 3	14,8	25,3	<i>Calophyllum caledonicum</i> Vieill. ex Planch. & Triana (Calophyllaceae)
La Guen 1	8,9	12,6	<i>Storthocalyx</i> sp. A (JM6077) (Sapindaceae)
La Guen 2	8,3	18,2	<i>Piliocalyx laurifolius</i> Brongn. & Gris (Myrtaceae)
La Guen 3	15,1	18,4	<i>Plerandra gabriellae</i> (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin, ined. (Araliaceae)
La Guen 4	11,4	18,3	<i>Calophyllum caledonicum</i> Vieill. ex Planch. & Triana (Calophyllaceae)
La Guen 5	8,2	13,7	<i>Metrosideros oreomyrtus</i> Däniker (Myrtaceae)
Wayem 1	11,4	17,1	<i>Neuburgia neocaledonica</i> (Gigl & Benedict) J. Molina & Struwe (Loganiaceae)
Wayem 2	9,9	20,3	<i>Apodytes clusiifolia</i> (Baill.) Villiers (Icacinaceae)
Wayem 3	7,5	15,4	<i>Kermadecia sinuata</i> Brongn. & Gris (Proteaceae)
Wayem 4	4,6	8,7	<i>Kermadecia rotundifolia</i> Brongn. & Gris (Proteaceae)
Wewec 1	13,3	18,0	<i>Cryptocarya velutinosa</i> Kosterm. (Lauraceae)
Wewec 2	13,9	30,3	<i>Geissois racemosa</i> Labill. (Cunoniaceae)
Wewec 3	21,2	24,3	<i>Geissois racemosa</i> Labill. (Cunoniaceae)
Wewec 4	15,5	30,7	<i>Calophyllum caledonicum</i> Vieill. ex Planch. & Triana (Calophyllaceae)
Moyenne générale	13,2		

Forêt dense humide de basse et moyenne altitudes sur roches volcano-sédimentaires

Quatorze parcelles ont été installées entre 450 et 600 m d'altitude dans une végétation de type « forêts denses humides de basse et moyenne altitudes sur roches volcano-sédimentaires » sensu (Jaffré et al., à paraître), avec des abondances fortes dans les familles suivantes : Sapindaceae, Monimiaceae, Arecaceae, Lauraceae, Clusiaceae, Myrtaceae, fougères arborescentes (Dicksoniaceae et Cyatheaceae), Sapotaceae, Meliaceae, Calophyllaceae, Rubiaceae, Araliaceae, Primulaceae (voir Annexe 3), correspondant bien aux travaux déjà réalisés sur ce type de forêt (Jaffré and Veillon 1995). Les Sapindaceae sont ainsi généralement dominantes et présentes dans toutes les parcelles, avec un minimum de 6,2% des individus, et jusque 21,8%. Le plus fort pourcentage observé étant 45,9% pour les Monimiaceae dans la parcelle Wewec 3. Cinq familles ont été observées dans toutes les parcelles, les Sapindaceae, Monimiaceae, Arecaceae, Lauraceae, Myrtaceae et Meliaceae.

Les parcelles Wewec 2 et 3, correspondent à une ancienne implantation humaine, et donc à une ouverture par le passé, aujourd'hui complètement refermée. Des éléments floristiques témoignent cependant de cet historique, avec notamment la présence de très gros faux-tamanous (*Geissois racemosa*), émergents dans les parcelles (Tableau 1), c'est aussi uniquement dans ces parcelles que les lianes *Agatea pancheri* et *Piper austrocaledonicum* ont été rencontrées, ainsi que le palmier *Chambeyronia macrocarpa*. Ces deux parcelles montrent les plus faibles valeurs en nombre de taxons (24 et 27) de toutes les parcelles mises en place lors de cette mission, ainsi que les plus petits pourcentages de petits diamètres (<10 cm).

La présence au sein de la forêt à Dawenia 3 et La Guen 2 de gros individus de *Codia incrassata* (« Him »), témoigne également d'une ouverture dans le passé, au moins partielle et peut-être très localisée, possiblement en lien avec un passage cyclonique. La forte pente et l'absence de signe évident d'occupation humaine ancienne nous incitent à écarter l'hypothèse d'une perturbation anthropique récente de la forêt en ce lieu.

Forêt de montagne ou oro-néphéliche

Les deux parcelles d'altitude à 900 m, R. de la Ouaième 4 et La Guen 5, se distinguent par une forêt basse et la présence de taxons uniquement d'altitude. Certains taxons n'ont été rencontrés que dans ces deux parcelles : *Diospyros oubatchensis*, *Elaeocarpus bullatus*, *Eugenia paniensis* J.W.Dawson ined., *Pandanus altissimus*, *Austrobuxus ovalis*, *Polyscias lecardii*, ou certains taxons peu présents ailleurs y sont très abondants, notamment *Tapeinosperma nitidum*, *Gongrodiscus bilocularis* et *Pycnandra controversa*. Cette forêt peut être appelée forêt de montagne (Nasi et al. 2002) ou oro-néphéliche (Virot 1956). Le plus grand nombre de taxons a été rencontré dans la parcelle La Guen 5 (123), qui présente également le plus grand nombre d'individus (322), alors que la parcelle R. de la Ouaième 4 ce nombre de taxons (83) est proche de la moyenne (pour 235 individus).

DISCUSSION

Nous avons observé aux Roches de la Ouaième un grand ensemble forestier, mais qui est abîmé par les feux sur les bords ; certaines parties de la falaise ont également été touchées par des incendies partant de plus bas dans la vallée. Malgré des travaux antérieurs ciblant spécifiquement ce site, et mettant en avant le micro-endémisme qui y est observé (Bradford and Jaffré 2004), ce micro-endémisme des Roches de la Ouaième est plus important que celui qui avait été signalé par ces auteurs, comme en témoigne la découverte du *Planchonella* sp. (JM6150) en fleurs, confirmant qu'il s'agit d'une nouvelle espèce connue uniquement de ce lieu.

Le site de Wewec est remarquable par la présence de nombreuses traces d'occupations humaines ; ce qui permet d'observer une recolonisation forestière. Des impacts importants de cerfs ont été observés par endroits, où l'écorce de nombreux arbres était abîmée, la strate herbacée réduite voire inexisteante (Wewec 4 par exemple). C'est le site où nous avons observé le plus d'espèces introduites, dont certaines envahissantes, en raison des habitations humaines proches. Ces espèces traduisent surtout une dégradation du milieu naturel, nous n'en avons pas vu au sein du massif forestier bien conservé.

Une mosaïque de formations forestières a été observée à Dawenia, avec des crêtes qui présentent des niaoulis (*Melaleuca quinquenervia*), témoins de l'existence de savane sur celle-ci dans le passé, mais ces niaoulis commencent à être noyés dans de la forêt secondaire, ce qui témoigne d'une recolonisation de la forêt sur la savane (Ibanez et al., 2013). Le piémont ouest du Mont Colnett s'est révélé très dégradé, couvert d'une végétation basse dominée par des fougères pyrophiles, jusqu'à 1000 m d'altitude au moins. Cette végétation s'arrêtant sur les crêtes, il est très probable que des incendies anciens soient à l'origine de ces paysages ; des incendies contemporains pourraient maintenir ces milieux ouverts, expliquant l'absence d'une reforestation naturelle (Jaffré et Veillon, 1994). Des impacts importants de cerfs (écorçage, abrutissement) ont été observés par endroits.

Le grand ensemble forestier à La Guen est d'apparence relativement homogène mais nous y avons trouvé des signes d'ouvertures historiques (peut-être cyclone), comme le montre l'exemple de *Codia incrassata* (« Him ») en forêt ; plusieurs taxons rares ou nouveaux ont été observés le long de cours d'eau, ce qui indique peut-être un manque d'exploration de cet habitat.

L'observation d'anciens sites d'occupation humaine (villages ou lieux de campement), actuellement recouverts de forêt secondaire, indique que la recolonisation par la forêt est possible en l'absence de feux répétés.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Futurs inventaires

Malgré les nombreuses récoltes réalisées par le passé le long des principaux chemins des Roches de la Ouaième et du Mont Panié, ce nouvel inventaire montre que la flore de ces sites est loin d'être bien connue. De nombreuses espèces restent à découvrir, de même que leur distribution, caractéristiques morphologiques et écologiques. Ainsi de nombreuses parties de ces massifs restent non ou mal connues pour la botanique et mériteraient d'être explorées. Cette mission s'est surtout concentrée sur des zones relativement basses (autour de 600 m) pour un massif atteignant 1628 m, et des prospections plus en altitude seraient particulièrement intéressantes, côtés est et ouest de la chaîne du Panié, sachant que beaucoup de micro-endémiques du Mont Panié se trouvent plutôt dans la partie sommitale.

Plusieurs taxons restent indéterminés, faute de matériel correct en fleur ou en fruit, de nouvelles prospections ciblées pourraient aider à combler ce manque.

Recommandations pour la conservation

Les menaces principales observées lors de ce RAP par l'équipe botanique sont la destruction des habitats par le feu, puis les dégradations du sous-bois forestier par la surabondance de cerfs et de cochons. Il semble important de poursuivre la sensibilisation à la menace que représente le feu sur la biodiversité auprès des populations (comme le fait actuellement la Province nord). La régulation des populations de cerfs et de cochons semble également nécessaire vu les dégâts observés (alors que nous ne cherchions pas à les évaluer) en certains endroits, notamment à Wewec et Dawenia.

Les Roches de la Ouaième abritent un micro-endémisme remarquable. La création d'une aire protégée sur ce site, pourrait favoriser une prise de conscience collective et limiter les incendies.

L'agrandissement du périmètre de protection de la réserve de nature sauvage du Mont Panié aux sites de Wewec et Dawenia semble pertinent dans une politique de gestion de grand ensemble forestier.

RÉFÉRENCES

- Anonyme. 2008. Code de l'Environnement de la Province nord. Province nord.
- Aubréville, A., J.-F. Leroy, H. S. MacKee, and P. Morat, editors. 1967-. Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- Bradford, J., and T. Jaffré. 2004. Plant species microendemism and conservation of montane maquis in New Caledonia: two new species of *Panckeria* (Cunoniaceae) from Roche Ouaïème. Biodiversity and Conservation 13:2253–2273.
- Brownlie, G. 1969. Ptéridophytes. Pages 1–293 in A. Aubréville, editor. Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- Callmander, M. W., and P. P. Lowry II. 2011. Deux nouvelles espèces du Massif du Panié (Nouvelle-Calédonie): *Meryta rivularis* (Araliaceae) et *Pandanus taluucensis* (Pandanaceae). Candollea 66: 263–272.
- Conservation International, Maruia Society et Province nord. 1998. Conserving biodiversity in Province nord, New Caledonia. 2 volumes.
- Dawson, J. W., Whitaker, A. H., Whitaker, V. A., Gardner, R. C., and S. D. Wright. 2000. Two new species of *Metrosideros* (Myrtaceae) from New Caledonia: dual characterisation with morphology and nrDNA sequence variation. Blumea 45 : 433–441.
- Hallé, N. 1977. Orchidacées. Pages 1–565 in A. Aubréville and J.-F. Leroy, editors. Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- Hequet, V., M. L. Corre, F. Rigault, and V. Blanfort. 2010. Les Espèces Exotiques Envahissantes de Nouvelle-Calédonie. Nouméa.
- Ibanez, T., Munzinger, J., Gaucherel, C., Curt, T., & Hély, C. (2013). Mono-dominated and co-dominated early secondary succession patterns in New Caledonia.
- Jaffré, T., Rigault, F., & Munzinger, J. (2012). La végétation. In Atlas de la Nouvelle-Calédonie (eds J. Bonvallon, J.-C. Gay & É. Habert), pp. 77–80. IRD-Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Marseille-Nouméa.
- Jaffré, T., and J. M. Veillon. 1994. Les principales formations végétales autochtones en Nouvelle-Calédonie : caractéristiques, vulnérabilité, mesures de sauvegardes. Sciences de la vie, biodiversité. ORSTOM (IRD), Nouméa.
- Jaffré, T., and J. M. Veillon. 1995. Structural and floristic characteristics of a rain forest on schist in New Caledonia: a comparison with an ultramafic rain forest. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia, 4è sér. 17:201–226.
- Jérémie, J. 1997. Sphenostemonaceae. Pages 3–21 in P. Morat, editor. Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- McPherson, G., and C. Tirel. 1987. Euphorbiacées I. Page 226 in P. Morat and H. S. MacKee, editors. Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- Morat, P., T. Jaffré, F. Tronchet, J. Munzinger, Y. Pillon, J.-M. Veillon, and M. Chalopin. 2012. Le Référentiel taxonomique « FLORICAL » et caractéristiques de la flore indigène de la Nouvelle-Calédonie. Adansonia sér. 3 34:177–219 in press.
- Morat, P., and J. M. Veillon. 1988. Oncothecaceae. Pages 90–98 in P. Morat and H. S. McKee, editors. Flore de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances : volume 15. MNHN, Paris.
- Munzinger, J., G., McPherson and P. P. Lowry II. 2008. A second species in the endemic New Caledonian genus *Gastrolepis* (Stemonuraceae) and its implications for the

- conservation status of high-altitude maquis vegetation: coherent application of the IUCN Red List criteria is urgently needed in New Caledonia. *Botanical Journal of the Linnean Society* 157: 775–783.
- Munzinger, J., P. Birnbaum, J.-P. Butin, M. Callmander, V. Hequet, P. P. Lowry II, and H. Vandrot. 2011. Rapport préliminaire - RAP dans la massif du Mont Panié, Nouvelle-Calédonie. Institut de recherche pour le Développement, Nouméa.
- Munzinger, J., Lowry II, P.P., Callmander, M., & Buerki, S. (2013) A Taxonomic Revision of the Endemic New Caledonian Genus *Podonephelium* Baillon (*Sapindaceae*). *Systematic Botany*, in press.
- Nasi, R., T. Jaffré, and J. M. Sarailh. 2002. Les forêts de montagnes de Nouvelle-Calédonie. *Bois et Forêts des Tropiques* 274:5–17.
- Pignal, M., and J. Munzinger. in prep. Morphological and anatomical investigation on New Caledonian graminoid *Dendrobium* (Orchidaceae) with description of two new species, and a combination.
- Pillon, Y. and H. P. Nooteboom. 2009. A new species of *Symplocos* (Symplocaceae) from Mont Panié (New Caledonia). *Adansonia* sér. 3 31: 191–196.
- Saunders, R. M. K., and J. Munzinger. 2007. A new species of *Goniothalamus* (Annonaceae) from New Caledonia, representing a significant range extension for the genus. *Botanical Journal of the Linnean Society* 155:497–503.
- Spir, I. 2006. Végétation de la réserve spéciale botanique du Mont Panié : Valeur patrimoniale des formations rencontrées et identification des menaces. Institut de recherche pour le Développement, Nouméa.
- Swenson, U., and J. Munzinger. 2009. Revision of *Pycnandra* subgenus *Pycnandra* (Sapotaceae), a genus endemic to New Caledonia. *Australian Systematic Botany* 22: 437–465.
- Swenson, U., and J. Munzinger. 2010. Revision of *Pycnandra* subgenus *Achradiotypus* (Sapotaceae) with five new species from New Caledonia. *Australian Systematic Botany* 23:185–216.
- Swenson, U., J. Munzinger, and I. Bartish. 2007. Molecular phylogeny of *Planchonella* (Sapotaceae) and eight new species from New Caledonia. *Taxon* 56:329–354.
- Theuerkauf, J., Tron, F. M., & Franquet, R. (2013). Evaluation de la répartition des mammifères exotiques envahissants et leur impact potentiel dans le massif du Panié. In Evaluation rapide de la biodiversité du massif du Panié et des Roches de la Ouaième, province Nord, Nouvelle-Calédonie. RAP Bulletin of Biological Assessment (eds F. M. Tron, R. Franquet & J.-J. Cassan), Vol. 65, pp. 129–136. Conservation International, Arlington, VA, USA.
- Venter, S., and J. Munzinger. 2007. *Paphia paniensis* (Eriaceae), a new species from New Caledonia critically compared with *P. neocaldonica*. *New Zealand Journal of Botany* 45:503–508.
- Vink, W. 2003. A new species of *Zygogynum* (Winteraceae) from New Caledonia. *Blumea* 48: 183–186.
- Virot, R. 1956. La végétation canaque. Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, Sér. B, Botanique 7:1–400.

Annexe 1: Liste totale des plantes observées lors de l'inventaire sur le massif du Panué et sur les Roches de la Ouaième, en novembre 2010.

Abréviations : JM = Jérôme Munzinger ; PL = Pete Lowry ; MC = Martin Callmander ; VHB = Hervé Vandrot ; VH = Hervé Vandrot ; ACC = Martin Callmander ; Voucher = récolte fertile de référence, déposée à l'herbier NOU. Nb arbre = nombre d'individus identifiés dans les parcelles, et numérotés sur le terrain. Observation : individu observé et identifié sur le terrain sans récolte (relevé de terrain), ACC = plante notée lors de la mise en place des parcelles et identifiée par l'équipe. Statut PN = plante protégée en Province Nord (1) ou non (0), IUCN 2001 = statut IUCN d'après <http://www.iucnredlist.org/>.

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Acanthaceae	<i>Pseudanthemum</i>		JM	Genus	indigène	0		
Amaryllidaceae	<i>Crinum asiaticum</i> L.		JM, ACC	Species	indigène	0		
Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.		JM	Species	subspontanée	0		
Anacardiaceae	<i>Semecarpus atra</i> (G. Forst.) Viell.		JM	Species	endémique	0		
Annonaceae	<i>Goniothalamus</i> sp. nov. ("Hmoope")	JM 6192, 6464, 6475 ; JM & al. 6262, 6273	40	JM, ACC	TTT	endémique	0	
Annonaceae	<i>Meizyne tiebaghensis</i> (Däniker) Heusden	JM 6182 ; JM & al. 6264, 6289		ACC	Species	endémique	1	
Annonaceae	<i>Xylopia vnellardii</i> Baill.	JM & al. 6335	5	JM, ACC	Species	endémique	0	
Apocynaceae	<i>Alstonia costata</i> (G. Forst.) R. Br.		JM	Species	indigène	0		
Apocynaceae	<i>Alstonia quaternata</i> Van Heurck	JM & al. 6363	4	JM	Species	endémique	0	
Apocynaceae	<i>Alstonia R.Br.</i>		JM	Genus	indigène	0		
Apocynaceae	<i>Alpinia loeseneriana</i> Schltr.	JM 6094		Species	endémique	1		
Apocynaceae	<i>Alpinia margaretae</i> Boiteau	JM 6178		Species	endémique	1		
Apocynaceae	<i>Alpinia tisserantii</i> Montrouz.	JM 6169		Species	endémique	1		
Apocynaceae	<i>Melodinus aeneus</i> Baill.		ACC	Species	endémique	0		
Apocynaceae	<i>Nesosperma brevituba</i> (Boiteau) Boiteau	JM & al. 6349, 6354	3	Species	endémique	1	VU	
Apocynaceae	<i>Parsonia crebiflora</i> Baill.	JM (leg. HV et JPB) 6438		Species	endémique	0		
Apocynaceae	<i>Rauvolfia balansae</i> (Baill.) Boiteau	JM & al. 6279	3	JM	Species	endémique	0	
Aquifoliaceae	<i>Ilex sebertii</i> Pancher & Sebert	JM & al. 6342	2	JM	Species	endémique	0	
Araceae	<i>Alocasia</i>		JM	Genus	introduite	0		
Araceae	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.		JM	Species	indigène	0		
Araliaceae	<i>Meryta balansae</i> Baill.		9	JM, ACC	Species	endémique	0	
Araliaceae	<i>Meryta lecardii</i> (R. Vig.) Lowry & F. Tronchet, ined.		1	ACC	Species	endémique	0	
Araliaceae	<i>Meryta pedunculata</i> Lowry & F. Tronchet, ined.		2	ACC	Species	endémique	0	
Araliaceae	<i>Meryta rivularis</i> Lowry, ined.			Species	endémique	0		
Araliaceae	<i>Pleiantha</i> gpe candelabra/pseudocandela		7	JM	TTT	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Araliaceae	<i>Plerandra oyana</i> subsp. <i>toto</i> (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin	PL 7264			Subspecies	endémique	0	
Araliaceae	<i>Plerandra pancheri</i> (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin	MC 879	8		Species	endémique	0	
Araliaceae	<i>Plerandra veilloniorum</i> Lowry, G.M. Plunkett & Frodin	JM 6174, PL 7267, 7270	6		Species	endémique	1	
Araliaceae	<i>Polyosma bracteata</i> (R. Vig.) Lowry	PL 7266	1	ACC	Species	endémique	0	
Araliaceae	<i>Polyosma bracteata</i> ssp. <i>bracteata</i> (R. Vig.) Lowry	PL 7266	6	JM	Subspecies	endémique	0	
Araliaceae	<i>Polyosma lecardii</i> (R. Vig.) Lowry	PL 7268	7		Genus	indigène	0	
Araliaceae	<i>Polyosma vieillardii</i> (Baill.) Lowry & Plunkett	JM 6184	3		Species	endémique	0	
Araliaceae	<i>Polyosma vieillardii</i> subsp. <i>balansae</i> (Baill.) Lowry & G.M. Plunkett	PL 7259			Subspecies	endémique	0	
Araliaceae	<i>Schefflera J.R.Forst. & G.Forst.</i>	JM 6110, 6204, MC 881, 882	2	JM	Genus	indigène	0	
Araliaceae	<i>Schefflera vieillardii</i> Baill.	PL 7265			Species	endémique	1	
Araucariaceae	<i>Agathis montana</i> de Laub.			JM	Species	endémique	1	NT
Araucariaceae	<i>Agathis moorei</i> (Lindley) Masters			3	JM	Species	endémique	1
Araucariaceae	<i>Agathis Salish.</i>				JM	Genus	indigène	0
Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris</i> (Forster & Forster f.) J.D. Hook.				JM	Species	endémique	1
Araucariaceae	<i>Araucaria Juss.</i>				JM	Genus	indigène	1
Arecaceae	<i>Basellinia glabra</i> Becc.			69	JM	Species	endémique	1
Arecaceae	<i>Basellinia gracilis</i> (Brongn. & Gris) Vieill.			7	JM, ACC	Species	endémique	1
Arecaceae	<i>Basellinia Vieill.</i>	JM & al. 6346			Genus	endémique	0	
Arecaceae	<i>Burretokentia vieillardii</i> (Brongn. & Gris) Pic. Serm.		37	JM	Species	endémique	1	VU
Arecaceae	<i>Chambeyronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.		18	JM	Species	endémique	1	
Arecaceae	<i>Cyphobentzia</i>				Genus	endémique	0	
Arecaceae	<i>Cyphophoenix alba</i> (H.E. Moore) Pintaud & W.J. Baker		38	JM	Species	endémique	1	
Arecaceae	<i>Cyphosperma balansae</i> (Brongn.) H. Wendl. ex Salomon			JM	Species	endémique	1	
Argophyllaceae	<i>Argophyllum J.R.Forster & G.Forster</i>	JM & al. 6390			Genus	indigène	0	
Asparagaceae	<i>Condylina Comm. ex R.Br.</i>			JM, ACC	Genus	indigène	0	
Aspleniaceae	<i>Asplenium australasicum</i> (J. Smith) Hook. f.				Species	indigène	0	
Aspleniaceae	<i>Asplenium nidus</i> L.			JPB	Species	indigène	0	
Asteliaceae	<i>Astelia neocaldonica</i> Schltr.			JM, ACC	Species	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Num rang	Status biologique	Status PN	IUCN 2011
Atherospermataceae	<i>Nemmaron vieillardii</i> (Baill.) Baill.		24	JM, ACC	Species	endémique	0	
Balanopaceae	<i>Balanops balansae</i> Baill.			JM	Species	endémique	0	LR/cd
Balanopaceae	<i>Balanops oliviformis</i> Baill.		2	JM	Species	endémique	0	
Balanopaceae	<i>Balanops pachyphylla</i> Baill. ex Guillaumin	JM & al. 6154, 6396	1		Species	endémique	0	
Balanopaceae	<i>Balanops sp.</i> "Panlé"	JM & al. 6400	16	JM	TTT	endémique	0	
Balanopaceae	<i>Balanops sparsifolia</i> (Schltr.) Hjelmq.	JM & al. 6428		JM	Species	endémique	0	
Bignoniaceae	<i>Deplanchea speciosa</i> Vieill.			JM	Species	endémique	0	
Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> Pal			JM	Species	naturalisée	0	
Caesalpiniaceae	<i>Delanix regia</i> (Bojer) Raf.			JM	Species	cultivée	0	
Calophyllaceae	<i>Calophyllum caledonicum</i> Vieill. ex Planch. & Triana		100	JM, ACC	Species	endémique	0	
Cardiopteridaceae	<i>Citronella sarmenosa</i> (Baill.) Howard	JM & al. 61118	7	JM, ACC	Species	endémique	0	
Casuarinaceae	<i>Casuarina collina</i> J. Poiss.			JM	Species	endémique	0	
Casuarinaceae	<i>Gymnostoma nodiflorum</i> (Thunb.) L. A. S. Johnson			JM	Species	endémique	0	
Celastraceae	<i>Dicarrellum</i> (Loes.) A.C.Sm.			JM	Genus	endémique	0	
Celastraceae	<i>Dicarrellum baillonioides</i> (Loes.) A.C. Sm.	JM & al. 6344, 6416	2	JM	Species	endémique	0	
Celastraceae	<i>Dicarrellum pancheri</i> (Baill.) A.C. Sm.			ACC	Species	endémique	0	
Celastraceae	<i>Salaciopsis Baker</i> f.			JM	Genus	endémique	0	
Celastraceae	<i>Salaciopsis neoadedonica</i> Baker f.		5	ACC	Species	endémique	0	
Chloranthaceae	<i>Ascarina solmsiana</i> Schlr.		3	JM, ACC	Species	endémique	0	
Clusiaceae	<i>Garcinia amplexicantha</i> Vieill.		54	JM, ACC	Species	endémique	0	
Clusiaceae	<i>Garcinia densiflora</i> Pierre	JM 6446, 6448, 6466 ; JM & al. 6362	JM	Species	endémique	0		
Clusiaceae	<i>Garcinia</i> L.		1	JM	Genus	indigène	0	
Clusiaceae	<i>Garcinia neglecta</i> Vieill.		3	JM, ACC	Species	endémique	0	
Clusiaceae	<i>Garcinia puat</i> Guillaumin	JM 6093, 6113 ; JM & al. 6376	15	JM	Species	endémique	0	
Clusiaceae	<i>Garcinia vieillardii</i> Pierre	JM & al. 6260	51	JM, ACC	Species	endémique	0	
Clusiaceae	<i>Garcinia virgata</i> Vieill. ex Guillaumin	JM & al. 6125, 6146	29	JM, ACC	Species	endémique	0	
Clusiaceae	<i>Montrouziera caulinflora</i> Planch. & Triana		8	JM	Species	endémique	1	VU
Combretaceae	<i>Terminidia catappa</i> L.			JM	Species	introduite	0	
Connaraceae	<i>Rourea</i>			JM	Genus	indigène	0	
Connaceae	<i>Alangium busyanum</i> (Baill.) Harms		1	ACC	Species	endémique	0	
Connaceae	<i>Alangium</i> Lam.			JM	Genus	indigène	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Cunoniaceae	<i>Codia incrassata</i> Pamp.		6	JM	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Codia montana</i> J.R. Forst. & G. Forst.			JM	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Canonia austrocaledonica</i> Brongn. ex Guillaumin	JM & al. 6143	13	JM	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Canonia pulchellula</i> Brongn. & Gris	JM 6112, 6459 ; JM & al. 6320	5	JM	Genus	indigène	0	
Cunoniaceae	<i>Grissois racemosa</i> Labill.		6	JM	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Pancheria beauverdiana</i> Pamp.			JM	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Pancheria Brongn. & Gris</i>			JM	Genus	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Pancheria ternata</i> Brongn. & Gris			JM	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Spinacanthemum A. Gray</i>			JM	Genus	indigène	0	
Cunoniaceae	<i>Spinacanthemum densiflorum</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6156, 6420	9	JM, ACC	Species	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Weinmannia dichotoma</i> Brongn. & Gris var. <i>monticola</i> (Däniker) comb. ined.		3		Varietas	endémique	0	
Cunoniaceae	<i>Weinmannia L.</i>			JM	Genus	indigène	0	
Cyatheaceae	<i>Alsophila stelligera</i> (Holtum) R.M.Tryon			JM	Species	endémique	1	
Cyatheaceae	<i>Alsophila vieillardii</i> (Mett.) R.M.Tryon		77	JM, ACC	Species	indigène	1	
Cyatheaceae	<i>Cyathea Sm.</i>	JM 6453 ; JM & al. 6351 ; JM (leg. HV et JPB) 6429	JM	Genus	indigène	1		
Cyatheaceae	<i>Sphaeropteris intermedia</i> (Mett.) R.M.Tryon			JM	Species	endémique	1	
Cyatheaceae	<i>Sphaeropteris noua-caledoniae</i> (Mett.) R.M.Tryon		14	JM	Species	endémique	1	
Cyperaceae	<i>Carex neurochlamys</i> F. Muell.	JM & al. 6255, 6368	JM	Species	indigène	0		
Cyperaceae	<i>Scleria rheophila</i> J. Raynal, ined.	JM & al. 6241			Species	endémique	0	
Davalliacae	<i>Humata brackenridgei</i> Brownlie			JM	Species	indigène	0	
Denstaedtiaceae	<i>Orthopteris firma</i> (Kuhn) Brownlie			JPB	Species	indigène	0	
Dicksoniaceae	<i>Caloblaena straminea</i> (Labill.) R.White & M.Turner	JM 6106		ACC	Species	indigène	0	
Dicksoniaceae	<i>Dicksonia thrysperoides</i> Mett.		119	JM, ACC	Species	endémique	1	
Dilleniaceae	<i>Hibbertia Andrews</i>			JM	Genus	indigène	0	
Dilleniaceae	<i>Hibbertia comptonii</i> Baker f.		1	JM	Species	endémique	0	
Dilleniaceae	<i>Tetractera billardieri</i> Martelli		1	JM, ACC	Species	endémique	0	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i>			ACC	Genus	indigène	0	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.			JM	Species	indigène	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Dryopteridaceae	<i>Arachnioides aristata</i> (Forster & Forster f.) Tind.	JM & al. 6268	1	JM	Species	indigène	0	
Ebenaceae	<i>Diospyros brasica</i> F. White	JM 6165, 6477 ; JM (leg. HV et JPB) 6436	8		Species	endémique	0	
Ebenaceae	<i>Diospyros flavocarpa</i> Viell. ex P. Parm. F. White				Species	endémique	1	
Ebenaceae	<i>Diospyros macrocarpa</i> Hiern		13	JM, ACC	Species	endémique	1	LR/cd
Ebenaceae	<i>Diospyros olen</i> Hiern		36	JM, ACC	Species	indigène	0	
Ebenaceae	<i>Diospyros ombatchensis</i> Kosterm.	JM (leg. HV et JPB) 6431, 6433	21	JM	Species	endémique	1	
Ebenaceae	<i>Diospyros parviflora</i> (Schltr.) Bakh. f.	JM 6107	1		Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus angustifolius</i> Blume		1	JM, ACC	Species	indigène	0	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus bullatus</i> Tirel		13	JM	Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus dogyensis</i> Guillaumin	JM & al. 6159 ; JM (leg. HV et JPB) 6432			Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus geminiflorus</i> Brongn.		3	JM	Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus L.</i>			JM, ACC	Genus	indigène	0	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus ovigerus</i> Brongn.			JM	Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus weinmannioides</i> Tirel	JM & al. 6297, 6427	2		Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Shamea L.</i>			JM	Genus	indigène	0	
Elaeocarpaceae	<i>Shamea magnifolia</i> Tirel		2	JM	Species	endémique	1	
Elaeocarpaceae	<i>Shamea montana</i> (Labill.) A. C. Sm.	MC & al 906	1	JM	Species	endémique	1	
Ericaceae	<i>Dracophyllum Labill.</i>	JM & al. 6405			Genus	indigène	1	
Ericaceae	<i>Dracophyllum verticillatum</i> Labill.			JM	Species	endémique	1	
Ericaceae	<i>Styphelia Sm.</i>			JM	Genus	indigène	0	
Escalloniaceae	<i>Pohorma Blume</i>			JM	Genus	indigène	0	
Escalloniaceae	<i>Pohorma brachystachys</i> Schltr.	JM 6472			Species	endémique	0	
Escalloniaceae	<i>Pohorma spicata</i> Baill.	JM 6458			Species	endémique	0	
Euphorbiaceae	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.			JM	Species	indigène	0	
Euphorbiaceae	<i>Bulogilia inophylla</i> (G. Forst.) P.S. Green		1	JM, ACC	Species	indigène	0	
Euphorbiaceae	<i>Bucquillonia Baill.</i>			JM, ACC	Genus	endémique	1	
Euphorbiaceae	<i>Bucquillonia nervosa</i> Airy Shaw	JM 6101 ; JM & al. 6250	9		Species	endémique	1	
Euphorbiaceae	<i>Bucquillonia phenacostigma</i> Airy Shaw	JM & al. 6361	4	ACC	Species	endémique	1	
Euphorbiaceae	<i>Cleidion spathulatum</i> Baill.	JM & al. 6360	7		Species	endémique	0	
Fabaceae	<i>Caesalpinia schlechteri</i> Harms	JM 6109			Species	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Fabaceae	<i>Mezonuron devordiana</i> Guillaumin		ACC	Species	endémique	0		
Fabaceae	<i>Archidendropsis fuligens</i> (Labill.) I.C.Nielsen	JM & al. 6246	51	Species	endémique	0		
Fabaceae	<i>Mucuna</i> Adans.		JM	Genus	indigène	0		
Fabaceae	<i>Nephrodesmus</i> Schindl.	JM & al. 6243		Genus	endémique	0		
Flacourtiaceae	<i>Casuarina silvana</i> Schltr.	JM & al. 6331	1	Species	endémique	0		
Flacourtiaceae	<i>Lastochlamps reticulata</i> (Schltr.) Pax & K. Hoffm.	JM 6183, 6476 ; JM & al. 6153, 6333, 6352	5	ACC	Species	endémique	1	
Flacourtiaceae	<i>Xyloma</i> G.Forst.		ACC	Genus	indigène	0		
Genneriaceae	<i>Coronanthera barbata</i> C.B. Clarke		JM	Species	endémique	0		
Gesneriaceae	<i>Coronanthera clarkeana</i> Schltr.	JM & al. 6311	11	Species	endémique	0		
Gleicheniaceae	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underwood		JM	Species	indigène	0		
Gleicheniaceae	<i>Gleichenia dicarpa</i> R. Br.		JM	Species	indigène	0		
Gleicheniaceae	<i>Stromatopteris moniliformis</i> Mett.		JM	Species	endémique	0		
Goodeniaceae	<i>Scaevola cylindrica</i> Schltr.	JM & al. 6152		Species	indigène	0		
Grammitidaceae	<i>Radiogrammitis neocaledonica</i> (Copel.) Paris		JM	Species	endémique	0		
Hernandiaceae	<i>Hernandia cordigera</i> Vieill.		4	JM, ACC	Species	endémique	0	
Icacinaceae	<i>Apodites clusiifolia</i> (Baill.) Villiers		21	JM	Species	endémique	0	
Joinvilleaceae	<i>Joinvillea plicata</i> (Hook. f.) Newell & Stone		JPB	Species	indigène	0		
Lamiaceae	<i>Oxera coronata</i> de Kok	JM (leg. HV et JPB) 6440		Species	endémique	0		
Lamiaceae	<i>Oxera Labill.</i>	JM & al. 6345	2	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Lamiaceae	<i>Oxera morierei</i> Vieill.		ACC	Species	endémique	0		
Lauraceae	<i>Beilschmidia</i>		5	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya aristata</i> Kosterm.		JM	Species	endémique	0		
Lauraceae	<i>Cryptocarya elliptica</i> Schltr.	JM 6451, 6463	8	JM	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya gracilis</i> Schltr.	JM & al. 6397	2	JM	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya longifolia</i> Kosterm.	JM 6462	28	JM, ACC	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya macrodeme</i> Schltr.	JM 6111	6	JM, ACC	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya oubaicensis</i> Schltr.		62	JM, ACC	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya plurivastata</i> Kosterm.		JM, ACC	Species	endémique	0		
Lauraceae	<i>Cryptocarya sp. "aff. aristata"</i> (Munzinger 5874)	JM 6481 ; JM & al. 6263	4	JM, ACC	TTT	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya sp. "aff. plurivastata"</i> (Barrabé 280)		7	JM, ACC	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya sp. "urea"</i> ined (Munzinger 4792)	JM 6460 ; JM & al 6425	9	JM	TTT	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Lauraceae	<i>Cryptocarya</i> sp. "glaue" (Munzinger 5832)	JM & al. 6160, 6419	29	JM, ACC	TTR	endémique	0	
Lauraceae	<i>Cryptocarya velutinosa</i> Kosterm.		3	JM, ACC	Species	endémique	0	
Lauraceae	<i>Endandra baillonii</i> (Pancher & Sebert) Guillaumin		JM	Species	endémique	1		
Lauraceae	<i>Endandra</i> R.Br.	JM & al. 6149			Genus	indigène	0	
Lauraceae	<i>Litsea</i> Lam.	JM & al. 6130			Genus	indigène	0	
Lauraceae	<i>Litsea lecardii</i> Guillaumin	JM & al. 6317	JM	Species	endémique	1		
Lecythidaceae	<i>Barringtonia</i> J.R.Forst. & G.Forst.	JM & al. 6391	27	JM	Genus	indigène	0	
Linaceae	<i>Hugonia</i> sp. (NE Munzinger3338)		1	JM	TTR	endémique	0	
Linderniaceae	<i>Lindernia neocaledonica</i> S. Moore	JM & al. 6340			Species	endémique	0	
Loganiaceae	<i>Genistostoma vestitum</i> Baill.				JM, ACC	Species	endémique	0
Loganiaceae	<i>Neuburgia neocaledonica</i> (Gilg & Benedict) J. Molina & Struve		2	JM	Species	indigène	0	
Lomariopsidaceae	<i>Elaphoglossum huilimannii</i> Guillaumin	JM & al. 6309			Species	endémique	0	
Lomariopsidaceae	<i>Teratophyllum wilkesianum</i> (Brackenr.) Holttum				JM, ACC	Species	indigène	0
Loranthaceae	<i>Anjemia artensis</i> (Montrouz.) Danser	JM & al. 6389			Species	indigène	0	
Loranthaceae	<i>Anjemia scandens</i> (Tiegh.) Danser	JM & al. 6332			Species	indigène	0	
Lycopodiaceae	<i>Hyperzia</i> Bernh.	JM & al. 6330			Genus	indigène	0	
Lycopodiaceae	<i>Hyperzia serrata</i> (Thunb. Ex Murray) Rothm.		JM	Species	indigène	0		
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium deuterodensum</i> Herter				JM	Species	indigène	0
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium</i> L.	JM 6099 ; JM & al. 6256			Genus	indigène	0	
Lythraceae	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbr.		JM	Species	subspontanée	0		
Malvaceae	<i>Acropogon schistophylus</i> Morat & Chapolin		46	JM, ACC	Species	endémique	1	
Malvaceae	<i>Acropogon</i> Schltr.		JM	Genus	endémique	1		
Malvaceae	<i>Acropogon schumannianus</i> Schltr.	JM & al. 6301	1	JM, JPB	Species	endémique	1	
Marattiaceae	<i>Angiopteris evecta</i> (Forster & Forster f.) Hofm.		JM	Species	indigène	0		
Marattiaceae	<i>Prisana attenuata</i> (Labill.) Murdock		JM	Species	indigène	0		
Melastomataceae	<i>Melastoma malabathricum</i> ssp. <i>malabathricum</i> L.		JM	Subspecies	indigène	0		
Meliaceae	<i>Anthocarapa nitidula</i> (Benth.) T. D. Penn. ex Mabb.		21	JM, ACC	Species	indigène	0	
Meliaceae	<i>Dysosyphium</i> Blume		2	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Meliaceae	<i>Dysosyphium kourirense</i> Virot		10	JM	Species	endémique	0	
Meliaceae	<i>Dysosyphium roseum</i> C. DC.		31	ACC	Species	endémique	0	
Meliaceae	<i>Dysosyphium rufescens</i> ssp. <i>dumascense</i> (Guillaumin) Mabb.		11	JM	Species	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Monimiaceae	<i>Hedycarya chrysophylla</i> Perkins	JM (leg. HV et JPB) 6443	13	Species	endémique	0		
Monimiaceae	<i>Hedycarya cupulata</i> Baill.		138	JM, ACC	Species	endémique	0	
Monimiaceae	<i>Hedycarya engleri</i> S. Moore		74	JM	Species	endémique	0	
Monimiaceae	<i>Hedycarya</i> J.R.Forster & G.Forster		1	JM	Genus	indigène	0	
Monimiaceae	<i>Kibaropsis caledonica</i> (Guillaumin) Jérémie		53	JM, ACC	Species	endémique	0	
Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.		JM	Species	cultivée	0		
Moraceae	<i>Ficus cataractarum</i> Vieill. ex Bureau		JM	Species	endémique	1		
Moraceae	<i>Ficus habrophylla</i> Bennett ex Seemann		JM	Species	indigène	0		
Moraceae	<i>Ficus</i> L.	JM & al. 6314		Genus	indigène	0		
Moraceae	<i>Ficus mutabilis</i> Bureau	JM & al. 6341		Species	endémique	1	VU	
Moraceae	<i>Ficus otophora</i> Corner & Guillaumin	JM & al. 6378	2	JM	Species	endémique	0	
Moraceae	<i>Ficus pteroporum</i> Guillaumin	JM & al. 6253		Species	endémique	0		
Moraceae	<i>Ficus racemigera</i> Bureau		2	JM	Species	endémique	0	
Moraceae	<i>Ficus vieillardiana</i> Bureau	JM 6121 ; JM & al. 6338	4		Species	endémique	0	
Moraceae	<i>Ficus webbiana</i> (Miq.) Miq.	JM & al. 6134	1	JM	Species	endémique	0	
Myodocarpaceae	<i>Delanbreia harmsii</i> R. Vig.	JM & al. 6302 ; PL 7258, 7260, 7269	3		Species	endémique	0	
Myodocarpaceae	<i>Delanbreia montana</i> ssp. <i>arborea</i> (R. Vig.) Lowry		JM	Species	endémique	0		
Myodocarpaceae	<i>Delanbreia paradoxia</i> Vieill.		10	JM	Species	indigène	0	
Myodocarpaceae	<i>Myodocarpus</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6132		JM	Genus	endémique	0	
Myodocarpaceae	<i>Myodocarpus pinnatus</i> Brongn. & Gris		JM	Species	endémique	0		
Myodocarpaceae	<i>Myodocarpus simplicifolius</i> Brongn. & Gris		JM	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Carpolepis laurifolia</i> (Brongn. & Gris) J. W. Dawson	JM 6450 ; JM & al. 6386		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Eugenia brongniartiana</i> Guillaumin	JM 6447 ; JM & al. 6313, 6373		Genus	indigène	0		
Myrtaceae	<i>Eugenia mouensis</i> Baker f.	JM & al. 6364		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Eugenia paniensis</i> J.W.Dawson ined.	JM & al. 6142, 6370	26	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Kanakomyrtus</i> N. Snow		1	JM	Genus	endémique	0	
Myrtaceae	<i>Kanakomyrtus prominens</i> N. Snow	JM (leg. HV et JPB) 6442	2	ACC	Species	endémique	0	
Myrtaceae	<i>Medaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	JM		Species	indigène	0		
Myrtaceae	<i>Metrosideros brevistylis</i> J. W. Dawson	4	JM	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Metrosideros elegans</i> Schltr.	JM & al 6157		Species	endémique	1		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Myrtaceae	<i>Metrosideros nitida</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6294		Species	endémique	1		
Myrtaceae	<i>Metrosideros operculata</i> Labill.		JM	Species	endémique	1		
Myrtaceae	<i>Metrosideros operculata</i> var. <i>francii</i> J. W. Dawson	JM & al. 6270		Varietas	endémique	1		
Myrtaceae	<i>Metrosideros operculata</i> var. <i>operculata</i> Labill.		JM	Varietas	endémique	1		
Myrtaceae	<i>Piliocadyx</i>	JM & al. 6382		Genus	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Piliocadyx bullatus</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6384	6	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Piliocadyx ignambiensis</i> (Baker f.) Craven, comb. ined.	JM & al. 6359	1	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Piliocadyx laurifolius</i> Brongn. & Gris	JM 6172 ; JM & al. 6356	13	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Pistidium guajana</i> L.		JM	Species	naturalisée	0		
Myrtaceae	<i>Sannantha pinifolia</i> (Labill.) Peter G. Wilson		JM	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Sannantha virgata</i> (J. R. Forst. & G. Forst.) Peter G. Wilson		JM	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium amieuense</i> (Guillaumin) J. W. Dawson	JM & al. 6245	5	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium arboreum</i> (Baker f.) J. W. Dawson	JM & al. 6140	7	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium auriculatum</i> Brongn. & Gris	JM 6103, 6461 ; JM & al. 6281, 6310, 6366	4	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels		JM	Species	subspontanée	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium deplanchei</i> (Guillaumin) J. W. Dawson	JM & al. 6238, 6288		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium Gaertn.</i>		1	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Myrtaceae	<i>Syzygium Gaertn.</i>	JM 6129, 6197	1		Genus	indigène	0	
Myrtaceae	<i>Syzygium lateriflorum</i> Brongn. & Gris	JM 6186 ; JM & al. 6285		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium macranthum</i> Brongn. & Gris		JM	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium mouanum</i> Guillaumin	JM & al. 6158		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium neocalycinum</i> (Seem.) J. W. Dawson		5	JM, ACC	Species	endémique	0	
Myrtaceae	<i>Syzygium panicense</i> (Baker f.) J. W. Dawson	JM & al. 6283	22	JM	Species	endémique	0	
Myrtaceae	<i>Syzygium schlechterianum</i> Hochr.	JM 6164		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium tenuiflorum</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6305	5	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium toninense</i> (Baker f.) J. W. Dawson	JM		Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Syzygium tripetalum</i> Guillaumin		JM	Species	endémique	0		
Myrtaceae	<i>Xanthomyrtus kanalaensis</i> (Hochr.) N.Snow	JM 6457		Species	endémique	0		
Nytaginaceae	<i>Pisonia gigantocarpa</i> (Heimerl) Stemm.		8	JM, ACC	Species	endémique	0	
Oleaceae	<i>Chionanthus brachystachys</i> (Schltr.) P.S. Green		17	JM, ACC	Species	indigène	0	
Oleaceae	<i>Chionanthus peduncularis</i> P.S. Green		5	JM	Species	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Oncophoraceae	<i>Oncotheca humboldtiana</i> (Guillaumin) Morat & Veillon	JM & al. 6343	3	Species	endémique	0		
Orchidaceae	<i>Acanthephippium papuanum</i> Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Achydosa glandulosa</i> (Schltr.) M.A.Clem. & D.I.Jones		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Acianthus heptadactylus</i> Kraenzl.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Anoectochilus imitans</i> Schltr.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Appendicula reflexa</i> Blume		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum aphanopetalum</i> Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum arro rubens</i> Schltr.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum baladeanum</i> J.J. Sm.		JPB, ACC	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum betchei</i> F. Muell.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum hexarthropodus</i> Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum lingulatum</i> Rendle		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum longiflorum</i> Thouars		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum neocalycinum</i> Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Bulbophyllum pulchelliflorum</i> Schltr.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Calanthe balansae</i> Finet		JPB, ACC	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Calanthe langei</i> Muell.		JPB, ACC	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Calanthe R. Br.</i>		JPB	Genus	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Calanthe triplicata</i> (Willmet) Ames		JPB, ACC, JM	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Calanthe venulabrum</i> Rchb. f.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Clematepiphium smilacifolium</i> (Rchb. f.) N. Hallé		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Cryptostylis arachnites</i> (Blume) Hassk.	JM & al. 6278	JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium austrocadodicum</i> Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium camariariorum</i> Rchb.f.	JM & al. 6358	JPB, ACC	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium campylocentrum</i> Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium comptonii</i> Rendle		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium crassifolium</i> Schltr.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium finetianum</i> Schltr.		JPB, ACC	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium leucocartiorum</i> ined.	JM & al. 6290	JPB	Species	endémique	0		
Orchidaceae	<i>Dendrobium macrophyllum</i> A. Rich.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium morii</i> F.Muell		JPB	Species	indigène	1		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Orchidaceae	<i>Dendrobium munificum</i> (Finet) N. Hallé		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium muricatum</i> Finet		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium odontochilum</i> Rchb. f.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium oppositifolium</i> (Kraenzl.) N. Hallé	JM & al. 6319 ; JM (leg. JPB) 6468	JPB, ACC, JM	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium pectinatum</i> Finet		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium poisonianum</i> Schltr.		JPB, JM	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium polygalatum</i> Rchb. f.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium Suv.</i>	JM & al. 6322	JPB	Genus	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium sylvatum</i> Rchb. f.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dendrobium unicarinatum</i> Kores	JM & al. 6162 ; JM & al. 6401	JPB	Species	indigène	0		
Orchidaceae	<i>Dendrobium virginitum</i> Guillaumin		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Didymoplexis micradenia</i> (Rchb. f.) Hemsl.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Diplacalobium olibinnae</i> (Schltr.) Kraenzl.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Dipodium punctatum</i> (J.F.Sm.) R. Br.		JPB	Species	indigène	0		
Orchidaceae	<i>Earina valida</i> Rchb. f.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Epipogium roseum</i> (D. Don) Lindl.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Eria karrioyensis</i> Schltr.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Eria rostriflora</i> Rchb. f.		JPB, ACC, JM	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Eria rigidula</i> Rchb. f.		JPB, JM	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Glossyphryne macdonaldii</i> Schltr.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Gonatostylis villosa</i> (Rchb. f.) Schltr.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Goodenia scripta</i> (Rchb. f.) Schltr.		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Gunnarella aymardii</i> (N. Hallé) Senghas		JPB	Species	endémique	1		
Orchidaceae	<i>Heteraria oblongifolia</i> Blume		JPB, ACC	Species	indigène	0		
Orchidaceae	<i>Liparis condylobulbon</i> Rchb. f.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Liparis elliptica</i> Wight		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Liparis leylandii</i> F. Muell.		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Malaxis taurina</i> (Rchb. f.) Kunze		JPB, ACC	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Megastylis gigas</i> (Rchb. f.) Schltr.		JPB	Species	indigène	1		
Orchidaceae	<i>Megastylis montana</i> (Schltr.) Schltr.		JPB	Species	endémique	1		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Orchidaceae	<i>Microtiorchis schlechteri</i> Garay	JM & al. 6128		JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Microtiorchis</i> Schltr.				Genus	indigène	0	
Orchidaceae	<i>Nervilia aragoana</i> Gaudich.			JPB, ACC	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Oberonia ensiformis</i> (Sm.) Lindl.			JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Oberonia equitans</i> (G. Forst.) Mutel			JPB, ACC	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Oberonia neocaledonica</i> Schltr.			JPB	Species	endémique	1	
Orchidaceae	<i>Octanthera obertonoides</i> (Schltr.) Schltr.			JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Pachyplectron arifolium</i> Schltr.			JPB	Species	endémique	1	
Orchidaceae	<i>Peristylus novocaledonicum</i> F. Muell.			JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Phains daenikeri</i> Kraenzl.	JM & al. 6323		JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Pholidota imbricata</i> Hook.			JPB	Species	indigène	0	
Orchidaceae	<i>Phreatia hypsorhynchos</i> Schltr.			JPB, ACC	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Phreatia Lindl.</i>			JPB, ACC	Genus	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Phreatia pachyphylla</i> Schltr.			JPB, ACC	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Phreatia paleata</i> Rchb.f.			JPB	Species	endémique	1	
Orchidaceae	<i>Phreatia stenospathya</i> (Rchb. f.) Kraenzl.			JPB, ACC	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Phreatia sublata</i> N. Hallé			JPB	Species	endémique	1	
Orchidaceae	<i>Rhynchosphreatia micrantha</i> (A. Rich.) N.Hallé			ACC	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Spathoglottis pliata</i> Blume			JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Theymiria longifolia</i> J.R. Forst. & G. Forst.			JPB	Species	indigène	1	
Orchidaceae	<i>Tropidia viridiflava</i> Kraenzl.			JPB, ACC	Species	endémique	1	
Orchidaceae	<i>Zenixine vieillardii</i> (Rchb. f.) Schltr.			JPB	Species	indigène	1	
Osmundaceae	<i>Lepidopteris wilkesiana</i> (Brackent.) C. Chr.			JM	Species	indigène	0	
Pandanaceae	<i>Freyinetia arborea</i> Gaudich.	MC & al. 890		JM, ACC	Species	indigène	0	
Pandanaceae	<i>Freyinetia</i> Gaudich.	MC & al. 872, 878		JM	Genus	indigène	0	
Pandanaceae	<i>Freyinetia graminifolia</i> Solms	JM 6095		Species	endémique	0		
Pandanaceae	<i>Freyinetia aff. monticola</i> Rendle	MC & al. 883		Species	endémique	0		
Pandanaceae	<i>Freyinetia schlechteri</i> Warb.	MC 858, 884, 891		JM, ACC	Species	indigène	0	
Pandanaceae	<i>Freyinetia spectabilis</i> Solms	MC & al. 860		JM, ACC	Species	endémique	0	
Pandanaceae	<i>Freyinetia sulcata</i> Warb.	JM & al. 6259 ; MC 859		ACC	Species	indigène	0	
Pandanaceae	<i>Freyinetia verruculosa</i> Warb.	JM 6168 ; MC & al. 898		ACC	Species	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Pandanaceae	<i>Pandanus altissimus</i> (Brongn.) Solms	MC 876, 903		Species	endémique	1		
Pandanaceae	<i>Pandanus aragonensis</i> (Brongn.) Solms	MC 880, 888, 902		Species	endémique	1		
Pandanaceae	<i>Pandanus balansae</i> (Brongn.) Solms	MC 875, 889		Species	endémique	1		
Pandanaceae	<i>Pandanus clandestinus</i> Stone	MC 864, 865, 893 ; JM & al. 6127	50	Species	endémique	1	LR/cd	
Pandanaceae	<i>Pandanus reticulatus</i> Vieill.	MC 877		Species	endémique	1		
Pandanaceae	<i>Pandanus Rumph. ex L.f.</i>	MC 907		JM	Genus	indigène	0	
Paracryphiaceae	<i>Paracryphia alticola</i> (Schltr.) Steenis		3	JM	Species	endémique	0	
Paracryphiaceae	<i>Quintinia A.DC.</i>	JM 6180		ACC	Genus	indigène	0	
Paracryphiaceae	<i>Sphonestemon pachycladum</i> Baill.	JM 6478	1	Species	endémique	0		
Phellinaceae	<i>Phelline confertifolia</i> Baill.	JM 6474	1	Species	endémique	0		
Phellinaceae	<i>Phelline erubescens</i> Baill.	MC 900	2	Species	endémique	0		
Phellinaceae	<i>Phelline Labill.</i>			JM, ACC	Genus	endémique	0	
Phyllanthaceae	<i>Glochidion billardierei</i> Baill.		1	JM	Species	endémique	0	
Phyllanthaceae	<i>Glochidion J.R.Forst. & G.Forst.</i>	JM 6467 ; JM & al. 6242		JM	Genus	indigène	0	
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus bourgeisii</i> Baill.	JM & al. 6244, 6266, 6299		Species	indigène	0		
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus L.</i>	JM 6465	1	Genus	indigène	0		
Picrodendraceae	<i>Austrobuxus alticola</i> McPherson		1	JM, ACC	Species	endémique	0	
Picrodendraceae	<i>Austrobuxus Miq.</i>		1	Genus	non reconnue	0		
Picrodendraceae	<i>Austrobuxus ovalis</i> Airy Shaw		14	ACC	Species	endémique	0	
Picrodendraceae	<i>Austrobuxus villicundii</i> (Guillaumin) Airy Shaw	JM & al. 6383	7	JM, ACC	Species	endémique	0	
Piperaceae	<i>Peperomia Ruiz & Pav.</i>	JM 6452	2	JPB, JM, ACC	Genus	indigène	0	
Piperaceae	<i>Piper austrocoldominum</i> C. DC.				Species	indigène	0	
Piperaceae	<i>Piper L.</i>			JM, ACC	Genus	indigène	0	
Pittosporaceae	<i>Pittosporum dumeritiae</i> Guillaumin	JM & al. 6155		Species	endémique	0		
Pittosporaceae	<i>Pittosporum heckelii</i> Dubard	JM 6470 ; JM 6151		Species	endémique	0		
Pittosporaceae	<i>Pittosporum oreophilum</i> Guillaumin		2	JM	Species	endémique	0	
Pittosporaceae	<i>Pittosporum paniculatum</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6280, 6426		Species	endémique	0		
Pittosporaceae	<i>Pittosporum panicense</i> Guillaumin	JM & al. 6144		Species	endémique	1	VU	
Pittosporaceae	<i>Pittosporum pouehense</i> Guillaumin	JM & al. 6402, 6403		Species	endémique	0		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.		JM	Species	naturalisée	0		
Poaceae	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.		JM	Species	indigène	0		
Poaceae	<i>Poaceae</i> (R. Br.) Barnh.	JM 6176		Familia	non renseigné	0		
Podocarpaceae	<i>Fulatifolium taxoides</i> (Brongn. & Gris) de Laub.		JM	Species	endémique	1	LC	
Podocarpaceae	<i>Podocarpus Labill.</i>		JM, ACC	Genus	indigène	0		
Podocarpaceae	<i>Podocarpus sylvestris</i> J. Buchholz		JM	Species	endémique	1	LC	
Podocarpaceae	<i>Retrophyllum comptonii</i> (Buchh.) C. Page		3	JM	Species	endémique	1	LC
Polygonaceae	<i>Balgoya pacifica</i> Morat & Meijden		JM, ACC	Species	endémique	0		
Polyopodiaceae	<i>Drymaria rigidula</i> (Sw.) Beddome		JM, ACC	Species	indigène	0		
Primulaceae	<i>Maesa novocaledonica</i> Mez		JM	Species	endémique	0		
Primulaceae	<i>Rapanea arborea</i> M. Schmid	JM & al. 6119, 6136, 6377	11	Species	endémique	0		
Primulaceae	<i>Rapanea asymmetrica</i> Mez		4	JM, ACC	Species	endémique	0	
Primulaceae	<i>Rapanea Aubl.</i>		7	JM	Genus	indigène	0	
Primulaceae	<i>Rapanea citrifolia</i> Mez	JM 6175 ; JM & al. 6418 ; JM (leg. HV et JPB) 6430	4	Species	endémique	0		
Primulaceae	<i>Rapanea modesta</i> var. <i>modesta</i> Mez	JM 6455	1		Varietas	endémique	0	
Primulaceae	<i>Rapanea nigricans</i> var. <i>nigricans</i> M. Schmid	JM 6483		Varietas	endémique	0		
Primulaceae	<i>Rapanea novocaledonica</i> var. <i>novocaledonica</i> Mez	JM & al. 6404		Varietas	endémique	0		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma cohnitianum</i> Guillaumin	JM & al. 6375		Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma glandulosum</i> Guillaumin	JM & al. 6413		Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma gracile</i> Mez	JM 6102 ; JM & al. 6324, 6365		Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma grandiflora</i> Guillaumin	JM 6167		Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma Hook.f.</i>	JM & al. 6261	4	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Primulaceae	<i>Tapeinosperma minutum</i> Mez	JM 6479	1	Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma nitidum</i> Mez	JM & al. 6141, 6414	42	Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma pantheri</i> Mez	JM 6091 ; JM & al. 6274, 6388	11	Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma rubidum</i> Mez	JM & al. 6293		Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma scribuleata</i> (Seem.) Mez	JM & al. 6347, 6353		Species	non renseigné	1		
Primulaceae	<i>Tapeinosperma squarrosum</i> Mez	JM (leg. HV et JPB) 6444		Species	endémique	1		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Primulaceae	<i>Tapenosperma tchingouensis</i> var. <i>longipetiolatum</i> M. Schmid ined.	JM & al. 6392	JM, ACC	Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapenosperma vestitum</i> Mez		ACC	Species	endémique	1		
Primulaceae	<i>Tapenosperma villardii</i> Hook. f.	JM & al. 6265, 6395		Species	endémique	1		
Proteaceae	<i>Beaufrea Brongn. & Gris</i>		JM	Genus	endémique	1		
Proteaceae	<i>Beaufrea comptonii</i> S. Moore	JM & al. 6321, 6372		Species	endémique	1		
Proteaceae	<i>Beaufrea filipes</i> Schltr.	JM (leg. HV et JPB) 6434		Species	endémique	1		
Proteaceae	<i>Kermadecia rotundifolia</i> Brongn. & Gris	JM & al. 6138, 6385	7	JM, ACC	Species	endémique	0	
Proteaceae	<i>Kermadecia sinuata</i> Brongn. & Gris		8	JM	Species	endémique	0	
Proteaceae	<i>Sleurmerodendron austrocaledonicum</i> (Brongn. & Gris) Virot	JM & al. 6239		5	JM, ACC	Species	endémique	0
Proteaceae	<i>Stenocarpus R.Br.</i>		JM	Genus	indigène	0		
Proteaceae	<i>Virotia moussieri</i> (Vieill.) BH. Weston & A.R. Mast	JM & al. 6422		JM	Species	endémique	0	
Psilotaceae	<i>Tmesipteris</i>		23	JM	Species	indigène	0	
Rhizophoraceae	<i>Grasostylis multiflora</i> Brongn. & Gris		JM	Species	endémique	0		
Rosaceae	<i>Rubus moluccanus</i> L.		JM	Species	indigène	0		
Rosaceae	<i>Rubus rosifolius</i> Sm.		JM	Species	indigène	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus heterophyllum</i> (Montrouz.) Guillaumin & Beauvois		ACC	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus mollis</i> (Schltr.) comb. ined.	JM & al. 6374		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus nigrians</i> Mouly ined.	JM & al. 6308	1	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus pseudoterminalis</i> (Guillaumin) comb. ined.	JM & al. 6369		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus Schltr. & K.Krause</i>	JM & al. 6276, 6394		Genus	indigène	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus sessilifolius</i> Guillaumin	JM & al. 6249		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Atractocarpus sp. A</i> (MacKee 2534)	JM & al. 6371	2	TTT	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Coelospermum balansaeum</i> Baill.	JM & al. 6291	3	ACC	Species	endémique	0	
Rubiaceae	<i>Cyclophyllum Hook.f.</i>	JM 6115, 6171 ; JM & al. 6307		Genus	indigène	0		
Rubiaceae	<i>Gardenia odipe</i> Vieill.		20	JM, ACC	Species	endémique	0	
Rubiaceae	<i>Guettarda balansaeum</i>		7	JM, ACC	Species	endémique	0	
Rubiaceae	<i>Ixora comptonii</i> S. Moore	JM 6185 : JM & al. 6312, 6328, 6421		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Ixora L.</i>	JM & al. 6423	1	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Rubiaceae	<i>Morinda candollei</i> (Monttr.) Beauvis.	JM & al. 6282	3	Species	endémique	0		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Rubiaceae	<i>Morinda phyllireoides</i> Labill.	JM 6114	JM	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria baillonii</i> Schltr.	JM 6100	JM, ACC	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria baladenensis</i> (Baill.) Guillaumin	JM & al. 6275	JM, ACC	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria collina</i> Labill.		31	JM, ACC	Species	indigène	0	
Rubiaceae	<i>Psychotria fuguei</i> (Baill.) Schltr.	JM & al. 6267, 6357	ACC	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria frondosa</i> S. Moore	JM 6092 : JM & al. 6350	1	JPB, ACC	Species	endémique	0	
Rubiaceae	<i>Psychotria goniocarpa</i> (Baill.) Guillaumin		ACC	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria hoornemanniana</i> Barrabé & Florence, ined.							
Rubiaceae	<i>Psychotria L.</i>	JM & al. 6133	1	JM, ACC	Genus	indigène	0	
Rubiaceae	<i>Psychotria pancheri</i> (Baill.) Schltr.	JM 6090	4	JM, ACC	Species	endémique	0	
Rubiaceae	<i>Psychotria pubituba</i> S. Moore	JM & al. 6298		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria pulchrebracteata</i> Guillaumin	JM & al. 6398		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria roseo-tincta</i> S. Moore	JM 6166, 6482 ; JM & al. 6135, 6248, 6318		Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria schumanniana</i> Schltr.	JM & al. 6131, 6304, 6306	ACC	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria trisulata</i> (Baill.) Guillaumin	JM & al. 6287	JM & al. 6257	Species	endémique	0		
Rubiaceae	<i>Psychotria viellardi</i> (Baill.) Guillaumin							
Rubiaceae	<i>Psidax Gaertn.</i>	JM 6449	JM 6098	Genus	indigène	0		
Rubiaceae	<i>Tarenna ignambiensis</i> (Guillaumin) Jérémie		9	JM, ACC	Species	endémique	0	
Rutaceae	<i>Acronychia laevigata</i> J.R. Forst. & G. Forst.	JM		Species	indigène	0		
Rutaceae	<i>Comptonella drupacea</i> (Labill.) Guillaumin		2	JM, ACC	Species	endémique	0	
Rutaceae	<i>Comptonella oreophaila</i> var. <i>longipes</i> (Guillaumin) T.G. Hartley	JM 6456 ; JM & al. 6137, 6292, 6417	JM	Varietas	endémique	0		
Rutaceae	<i>Dutallayea amoserensis</i> (Guillaumin) T.G. Hartley	JM & al. 6417		Species	endémique	1	VU	
Rutaceae	<i>Melicope glaberrima</i> Guillaumin	JM & al. 6286	ACC	Species	endémique	0		
Rutaceae	<i>Melicope lasioneura</i> (Baill.) Baill. ex Guillaumin	JM (leg. HV et JPB) 6437		Species	endémique	0		
Rutaceae	<i>Melicope vieillardii</i> (Baill.) Baill. ex Guillaumin	JM & al. 6329	JM	Species	endémique	0		
Rutaceae	<i>Myrtopsis nonae-caledonicae</i> Vieill. ex Engl.	JM & al. 6407		Species	endémique	0		
Rutaceae	<i>Sarcomeleope follicularis</i> T.G. Hartley	5	JM, ACC	Species	endémique	0		
Rutaceae	<i>Sarcomeleope simplicifolia</i> (Endl.) T. Hartley	JM		Species	indigène	0		
Rutaceae	<i>Zanthoxylum L.</i>	JM 6104, 6454	2	Genus	indigène	0		

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Rutaceae	<i>Zanthoxylum schlechteri</i> Guillaumin	JM & al. 6126, 6303		Species	endémique	0		
Sapindaceae	<i>Arytera neobudensis</i> (Guillaumin) H. Turner	MC 869	2	JM	Species	indigène	0	
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis azanha</i> Radlk.	JM & al. 6120	1	Species	endémique	1		
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis macrocarpa</i> Radlk.	MC 873, 874, 894 ; JM 6177, 6179	34	JM, ACC	Species	endémique	1	
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis myrmecocyna</i> Radlk.	MC & al. 904		Species	endémique	1		
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis oedipoda</i> Radlk.	MC & al. 863, 870	1	JM, ACC	Species	endémique	1	
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis</i> aff. <i>petiolulata</i> Radlk.	MC & al. 867		Species	endémique	1		
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis petiolulata</i> Radlk.		52	JM	Species	endémique	1	
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis</i> Radlk.	MC 861, 885, 887, 892	1	JM	Genus	indigène	0	
Sapindaceae	<i>Cupaniopsis sylvatica</i> Guillaumin	MC 866	56	JM, ACC	Species	endémique	1	
Sapindaceae	<i>Gongrodiscus bilocularis</i> H. Turner		33	JM, ACC	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Gongrodiscus</i> Radlk.	MC 896		Genus	indigène	0		
Sapindaceae	<i>Guioa</i> Cav.	MC 905 ; JM & al. 6139		JM	Genus	indigène	0	
Sapindaceae	<i>Guioa crenulata</i> Radlk.	JM & al. 6258, 6339		JM	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Guioa glauca</i> (Labill.) Radlk.	JM & al. 6337 ; MC 862	6	JM	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Guioa glauca</i> var. <i>glauca</i> (Labill.) Radlk.	JM & al. 6316		Varietas	endémique	0		
Sapindaceae	<i>Guioa microsepala</i> Radlk.		17	JM	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Guioa ovalis</i> Radlk.		9	JM, ACC	Species	indigène	0	
Sapindaceae	<i>Guioa villosa</i> Radlk.	JM 6173		JM	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Harpulia austrocledonica</i> Baill.		13	JM	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Podonephelium concolor</i> Radlk.	MC 897		Species	endémique	0		
Sapindaceae	<i>Podonephelium pachycaula</i> Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki, ined.	MC 895	2	JM, ACC	Species	endémique	0	
Sapindaceae	<i>Storckia calyx</i> sp. A (Munzinger 6077)	MC 868, 871, 886, 901 ; JM 6108 ; JM 6193	85	ACC, JM	TTT	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Beccariella longipetiolata</i> Aubrév.		2	JPB, JM, ACC	Species	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Beccariella</i> Pierre	JM & al. 6336		Genus	indigène	0		
Sapotaceae	<i>Beccariella rubicunda</i> (Pierre ex Baill.) Pierre		22	JM, ACC	Species	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Planchonella amricana</i> (Guillaumin) Aubrév.		JM	Species	endémique	1		
Sapotaceae	<i>Planchonella glauca</i> Swenson & Munzinger	JM & al. 6326, 6326bis ; JM (leg. HV & IPB) 6441	2	JM	Species	endémique	1	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Sapotaceae	<i>Planchonella mandjeliaciana</i> Munzinger & Swenson	JM & al. 6271		JM, ACC	Species	endémique	1	
Sapotaceae	<i>Planchonella Pierre</i>	JM 6150 ; JM & al. 6247			Genus	indigène	1	
Sapotaceae	<i>Planchonella sphaerocarpa</i> (Baill.) Dubard		4	JM, ACC	Species	endémique	1	
Sapotaceae	<i>Pycnandra balansae</i> (Baill.) Swenson & Munzinger	JM 6473 ; JM & al. 6163	18	JM	Species	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Pycnandra comptonii</i> (S. Moore) Vink				Species	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Pycnandra contorta</i> (Guillaumin) Vink		28	JM, ACC	Species	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Pycnandra linearifolia</i> Swenson & Munzinger			JM	Species	endémique	0	
Sapotaceae	<i>Pycnandra ouatieriensis</i> Swenson & Munzinger	JM & al. 6406			Species	endémique	0	
Schizaceae	<i>Lygodium</i>	JM & al. 6399		JM	Genus	indigène	0	
Schizaceae	<i>Lygodium reticulatum</i> Schlk.			JPB, JM	Species	indigène	0	
Schizaceae	<i>Schizaea dichotoma</i> (L.) Smith			JPB	Species	indigène	0	
Schizaceae	<i>Schizaea melanosticta</i> Selling			JM	Species	indigène	0	
Selaginellaceae	<i>Selaginella</i>			JM, ACC	Genus	indigène	0	
Smilacaceae	<i>Smilax</i> L.	JM 6170		JM, ACC	Genus	indigène	0	
Smilacaceae	<i>Smilax ligustrifolia</i> A. DC.	JM & al. 6272			Species	endémique	0	
Smilacaceae	<i>Smilax neocaldonica</i> Schltr.			ACC	Species	endémique	0	
Symplocaceae	<i>Symplocos arborea</i> (Vieill.) Brongn. & Gris			JM, ACC	Species	endémique	0	
Symplocaceae	<i>Symplocos montana</i> (Vieill.) Brongn. & Gris		4	ACC	Species	endémique	0	
Symplocaceae	<i>Symplocos montana</i> var. <i>tortuosa</i> (Vieill. ex Guillaumin) Noot.		5	JM	Varietas	endémique	0	
Symplocaceae	<i>Symplocos neocaldonica</i> (Vieill.) Noot.	JM 6469 ; JM & al. 6269, 6412	28	JM	Species	endémique	0	
Taxaceae	<i>Austrotaxus spicata</i> Compton		1	JM	Species	endémique	1	NT
Thymelaeaceae	<i>Lethedon cernua</i> (Baill.) Kosterm.	JM & al. 6334			Species	endémique	1	
Thymelaeaceae	<i>Lethedon cordatotetra</i> Aymonin	JM & al. 6124, 6277	1		Species	endémique	0	
Thymelaeaceae	<i>Lethedon Spreng.</i>	JM & al. 6161, 6296, 6355, 6410	11		Genus	indigène	0	
Thymelaeaceae	<i>Wikstroemia indica</i> (L.) C.A. Mey.			JM	Species	indigène	0	
Trimeniaceae	<i>Trimenia neocaldonica</i> Baker f.	JM & al. 6117	3	JM, ACC	Species	endémique	0	
Urticaceae	<i>Nothocnide repanda</i> (Blume) Blume			JM, ACC	Species	indigène	0	
Urticaceae	<i>Procris pedunculata</i> (J.R. Forst. & G. Forst.) Wedd.			ACC	Species	indigène	0	
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.			JM	Species	naturalisée	0	
Violaceae	<i>Agata pancheri</i> Brongn.		4	JM, ACC	Species	endémique	0	

Famille	Taxon	Voucher	Nb arbres	Observation	Nom rang	Statut biologique	Statut PN	IUCN 2011
Violaceae	<i>Agatea rufofomentosa</i> Baker f.	JM & al. 6337bis	JM, ACC	Species	endémique	0		
Viscaceae	<i>Korthalsella disticha</i> (Endl.) Engl.	JM 6471 ; JM (leg. HV et JPB) 6435, 6439		Species	indigène	0		
Winteraceae	<i>Zygogynum amplexicaule</i> (Parmentier) Vink	JM & al. 6315		Species	endémique	1		
Winteraceae	<i>Zygogynum</i> Baill.		4	ACC	Genus	indigène	1	
Winteraceae	<i>Zygogynum comptonii</i> var. <i>comptonii</i> (Baker f.) Vink	JM 6480	4		Varietas	endémique	1	
Winteraceae	<i>Zygogynum comptonii</i> var. <i>taracticum</i> Vink	JM & al. 6148, 6411	1		Varietas	endémique	1	
Winteraceae	<i>Zygogynum pancheri</i> ssp. <i>deplanchei</i> (Tiegh.) Vink	JM 6105 ; JM & al. 6123		Subspecies	endémique	1		
Winteraceae	<i>Zygogynum pauciflorum</i> (Baker f.) Vink	JM 6181		Species	endémique	1		
Winteraceae	<i>Zygogynum pomiferum</i> ssp. <i>pomiferum</i> Baill.	JM & al. 6122, 6295, 6367		Subspecies	endémique	1		
Winteraceae	<i>Zygogynum tanyostigma</i> Vink	JM & al. 6415		Species	endémique	1	VU	
Xanthorrhoeaceae	<i>Rhus copallina javanica</i> Blume	JM		Species	indigène	0		
Zingiberaceae	<i>Curcuma longa</i> L.	JM		Species	subspontanée	0		

Annexe 2 : données des 16 parcelles mises en place en Novembre 2010 sur le massif du Panié et les Roches de la Ouaième. Total par famille et par taxon infra-familial.

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
Anacardiaceae R. Br.									1	1							2
<i>Euroschinus vieillardii</i> Engl.									1	1							2
Annonaceae Juss.	13	6	5	6	11							4					45
<i>Goniothalamus</i> sp. nov. ("Hmoope")	12	2	5	6	11							4					40
<i>Xylopia vieillardii</i> Baill.	1	4															5
Apocynaceae Juss.	1	1		4	4			1									11
<i>Alstonia quaternata</i> Van Heurck					4												4
<i>Alyxia</i> Banks ex R.Br.	1																1
<i>Neisosperma brevituba</i> (Boiteau) Boiteau				3													3
<i>Rauvolfia balansae</i> (Baill.) Boiteau		1		1			1										3
Aquifoliaceae DC. ex A. Rich.			2														2
<i>Ilex sebertii</i> Pancher & Sebert			2														2
Araliaceae Juss.	8	5	6	2	14	7	1	12	18	3	2	5	1	5	4		93
<i>Meryta balansae</i> Baill.									7		1				1		9
<i>Meryta lecardii</i> (R. Vig.) Lowry & F. Tronchet, ined.			1														1
<i>Meryta oxyalaena</i> Baill.					2			1		1					1		5
<i>Meryta pedunculata</i> Lowry & F. Tronchet, ined.		1										1					2
<i>Meryta schizolaena</i> Baill.									1								1
<i>Plerandra</i> A.Gray								1		1							2
<i>Plerandra gabriellae</i> (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin, ined.		2			1	2	1		3				5	1			15
<i>Plerandra</i> gpe candelabra/ pseudocandelabra	1								5			1					7
<i>Plerandra leptophylla</i> (Veitch ex T. Moore) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin, ined.					2			1									3
<i>Plerandra osyana</i> (Veitch ex Regel) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin, ined.				2													2
<i>Plerandra osyana</i> subsp. <i>toto</i> (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin, comb. ined.					4												4
<i>Plerandra pancheri</i> (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin	1	2	3					1		1							8
<i>Plerandra plerandrodes</i> (R. Viguier) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin, ined.	4											1		1			6
<i>Polyscias balansae</i> (Baill.) Harms			1		1												2
<i>Polyscias bracteata</i> (R.Vig.) Lowry			1														1
<i>Polyscias bracteata</i> ssp. <i>bracteata</i> (R. Vig.) Lowry				3	2			1									6
<i>Polyscias cissodendron</i> (C. Moore & F. Muell.) Harms						1											1
<i>Polyscias lecardii</i> (R. Vig.) Lowry							4				3						7
<i>Polyscias vieillardii</i> (Baill.) Lowry & Plunkett					3												3

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
<i>Schefflera</i> J.R.Forst. & G.Forst.	2																2
<i>Schefflera veillonorum</i> Lowry ined.									6								6
<i>Araucariaceae</i> Henkel & W. Hochst.	1								2								3
<i>Agathis moorei</i> (Lindley) Masters	1								2								3
<i>Areceae</i> Schultz	3	1	1	14	13	41	8	11	17	10	22	33	2	18	6	8	208
<i>Basselinia glabrata</i> Becc.				1	2	5	28	1	2	9	4	5		2	2	8	69
<i>Basselinia gracilis</i> (Brongn. & Gris) Vieill.									7								7
<i>Basselinia velutina</i> Becc.												21					21
<i>Burretokentia vieillardii</i> (Brongn. & Gris) Pic. Serm.	3	1				2	10		2	8	1	8		2			37
<i>Chambevronia macrocarpa</i> (Brongn.) Vieill. ex Becc.													15	3			18
<i>Clinosperma lanuginosa</i> (H.E. Moore) Pintaud & W.J. Baker												11					11
<i>Cyphokentia cerifera</i> (H.E. Moore) Pintaud & W.J. Baker										2	4			1			7
<i>Cyphophoenix alba</i> (H.E. Moore) Pintaud & W.J. Baker				12	6	3	7			3	5	1		1			38
<i>Atherospermataceae</i> R. Br.									16			8					24
<i>Nemuaron vieillardii</i> (Baill.) Baill.									16			8					24
<i>Balanopaceae</i> Benth. & Hook. f.	1	1	1	1	2			1		8	5						20
<i>Balanops oliviformis</i> Baill.				1						1							2
<i>Balanops pachyphylla</i> Baill. ex Guillaumin											1						1
<i>Balanops</i> sp. "Panié"	1	1		1	2			1		5	5						16
<i>Balanops vieillardii</i> Baill.										1							1
<i>Burseraceae</i> Kunth	1	2															3
<i>Canarium</i> aff. <i>oleiferum</i> (NE Munzinger 4002)	1	2															3
<i>Calophyllaceae</i> J. Agardh	1	12	9	2	2		20			45	4	3			3		101
<i>Calophyllum caledonicum</i> Vieill. ex Planch. & Triana	1	12	9	2	2		20			44	4	3			3		100
<i>Calophyllum inophyllum</i> L.										1							1
<i>Cardiopteridaceae</i> Blume	1		1					4				1					7
<i>Citronella sarmentosa</i> (Baill.) Howard	1		1					4				1					7
<i>Celastraceae</i> R. Br.					1		1		4	2	1		1				10
<i>Dicarpellum baillonianum</i> (Loes.) A.C. Sm.										1			1				2
<i>Maytenus fournieri</i> (Panchar & Sebert) Loesn.							1										1
<i>Salaciopsis neocaldonica</i> Baker f.									4	1							5
<i>Salaciopsis sparsiflora</i> Hürl.						1					1						2

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
Chloranthaceae R. Br. ex Sims	1			1					1								3
<i>Ascarina solmsiana</i> Schltr.	1			1						1							3
Clusiaceae Lindl.	15	4	28	26	13	1	9	23	6	6	18	5	4	3			161
<i>Garcinia amplexicaulis</i> Vieill.	12	1	6	8				9	4		10	2	2				54
<i>Garcinia</i> L.												1					1
<i>Garcinia neglecta</i> Vieill.			3														3
<i>Garcinia puat</i> Guillaumin					1	2		2	3	4		3					15
<i>Garcinia vieillardii</i> Pierre		2	16	17	11		2		1	1		1					51
<i>Garcinia virgata</i> Vieill. ex Guillaumin	3	1	3	1			5	10		2	1	3					29
<i>Montrouziera cauliflora</i> Planch. & Triana				2			4			2							8
Cornaceae Dumort.									1								1
<i>Alangium bussyianum</i> (Baill.) Harms									1								1
Cunoniaceae R. Br.	2		2	7	1	4	4	3		5	8	4	2	6	2		52
<i>Codia incrassata</i> Pamp.			2		4												6
<i>Cunonia aoupiniensis</i> Hoogland								2									2
<i>Cunonia pulchella</i> Brongn. & Gris							4	1			8						13
<i>Geissois montana</i> Vieill. ex. Brongn. & Gris									2	3							5
<i>Geissois polyphylla</i> Lécard ex Guillaumin	1										1						2
<i>Geissois racemosa</i> Labill.												2	4				6
<i>Spiraeaanthemum densiflorum</i> Brongn. & Gris			2	3				1		1		2					9
<i>Weinmannia dichotoma</i> Brongn. & Gris var. <i>monticola</i> (Däniker) comb. ined.	1							1		1							3
<i>Weinmannia serrata</i> Brongn. & Gris					1						1		2	2			6
Cyatheaceae Kaulf.	2			17	21	2	26	6		1	3	11	2				91
<i>Alsophila vieillardii</i> (Mett.) R.M.Tryon	2			17	16	1	26	1		1	2	9	2				77
<i>Sphaeropteris novae-caledoniae</i> (Mett.) R.M.Tryon					5	1		5			1	2					14
Dicksoniaceae M.R. Schomb.	10	2	1	13	4	5	11	2	17	11	25		14			4	119
<i>Dicksonia thyrsopterooides</i> Mett.	10	2	1	13	4	5	11	2	17	11	25		14			4	119
Dilleniaceae Salisb.				1								1		1			3
<i>Hibbertia comptonii</i> Baker f.												1					1
<i>Hibbertia pancheri</i> (Brongn. & Gris) Briq.				1													1
<i>Tetracera billardieri</i> Martelli													1				1
Ebenaceae Gürke	14	6	3	1	2	3		16	4	8	4	5		13		1	80
<i>Diospyros brassica</i> F. White							1										1
<i>Diospyros flavocarpa</i> (Viell. ex P. Parm.) F. White						2			3	1	2						8
<i>Diospyros macrocarpa</i> Hiern														13			13
<i>Diospyros olen</i> Hiern	14	6	3	1	2					7	2					1	36
<i>Diospyros oubatchensis</i> Kosterm.								16				5					21
<i>Diospyros parviflora</i> (Schltr.) Bakh. f.									1								1

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
Elaeocarpaceae Juss. ex DC.				1				9	2	3	6	7			1		29
<i>Elaeocarpus angustifolius</i> Blume														1			1
<i>Elaeocarpus bullatus</i> Tirel						9						4					13
<i>Elaeocarpus geminiflorus</i> Brongn.												3					3
<i>Elaeocarpus weibelianus</i> Tirel				1						1							2
<i>Sloanea magnifolia</i> Tirel							2										2
<i>Sloanea montana</i> (Labill.) A. C. Sm.										1							1
<i>Sloanea raynaliana</i> Tirel									2	5							7
Escalloniaceae R. Br. ex Dumort.															1		1
<i>Polyosma leratii</i> Guillaumin														1			1
Euphorbiaceae Juss.			4					13		4		1					22
<i>Baloghia inophylla</i> (G. Forst.) P.S. Green												1					1
<i>Bocquillonia lucidula</i> Airy Shaw									1								1
<i>Bocquillonia nervosa</i> Airy Shaw								9									9
<i>Bocquillonia phenacostigma</i> Airy Shaw			4														4
<i>Cleidion spathulatum</i> Baill.									3	4							7
Fabaceae Lindl. - Mimosoideae (R. Br.) DC.		9	18	19		5											51
<i>Archidendropsis fulgens</i> (Labill.) I.C.Nielsen		9	18	19		5											51
Flacourtiaceae	2		12	11			3	1						1			30
<i>Casearia silvana</i> Schltr.									1								1
<i>Homalium</i> Jacq.	2		11	11													24
<i>Lasiochlamys reticulata</i> (Schltr.) Pax & K. Hoffm.				1				3						1			5
Gentianaceae Juss.			1							1							2
<i>Fagraea berteroana</i> A. Gray ex Benth.		1							1								2
Gesneriaceae Rich. & Juss.ex DC.				1						3	6	1					11
<i>Coronanthera clarkeana</i> Schltr.					1					3	6	1					11
Hernandiaceae Bercht. & J. Presl	1	3															4
<i>Hernandia cordigera</i> Vieill.	1	3															4
Icacinaceae (Benth.) Miers									8		13						21
<i>Apodytes clusiifolia</i> (Baill.) Villiers								8		13							21
Lamiaceae Martynov			2					1	2	1	1	1	1	3			11
<i>Gmelina magnifica</i> Mabb.								1	2								3
<i>Oxera</i> Labill.			2														2
<i>Oxera robusta</i> Vieill.										1		1	3				5
<i>Oxera subverticillata</i> Vieill.											1						1
Lauraceae Juss.	3	7	10	19	5	13	31	6	15	16	13	6	5	1	1	12	163
<i>Beilschmiedia</i>					3			1					1				5
<i>Cryptocarya elliptica</i> Schltr.				1			6							1			8
<i>Cryptocarya gracilis</i> Schltr.								2									2
<i>Cryptocarya longifolia</i> Kosterm.			2	5		3	12		4			1			1		28
<i>Cryptocarya macrodesme</i> Schltr.							4							2		6	

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
<i>Cryptocarya oubatchensis</i> Schltr.	1	6		5	2	6	1	1	15	7	12	2	2				60
<i>Cryptocarya</i> R.Br.										2							2
<i>Cryptocarya</i> sp. "aff. <i>aristata</i> " (Munzinger 5874)	1							1		1						1	4
<i>Cryptocarya</i> sp. "aff. <i>pluricostata</i> " (Barrabé 280)		1	5													1	7
<i>Cryptocarya</i> sp. "aurea" ined. (Munzinger 4792)				1	1	4	1								2		9
<i>Cryptocarya</i> sp. "glauque" (Munzinger 5832)	1		3	4	2		6	2		2	1	4	1		3		29
<i>Cryptocarya velutinosa</i> Kosterm.												1			2		3
<i>Lecythidaceae</i> A. Rich.				3					6	8	12						29
<i>Barringtonia</i> J.R.Forst. & G.Forst.					3				5	8	11						27
<i>Barringtonia longifolia</i> Schltr.									1		1						2
<i>Linaceae</i> DC. ex Perleb								1									1
<i>Hugonia</i> sp. (NE Munzinger3338)								1									1
<i>Loganiaceae</i> R. Br.									1				1				2
<i>Neuburgia neocalledonica</i> (Gilg & Benedict) J. Molina & Struwe									1			1					2
<i>Malvaceae</i> Juss.	11	3	4	18	10						1						47
<i>Acropogon schistophilus</i> Morat & Chapolin	11	3	4	18	10												46
<i>Acropogon schumannianus</i> Schltr.										1							1
<i>Meliaceae</i> Juss.	5	3	5	3	7	4	6	12	3	6	5	2	10	15	12	5	103
<i>Anthocarapa nitidula</i> (Benth.) T. D. Penn. ex Mabb.	4	1	4	1	1	1	3	1		1	2		2				21
<i>Dysoxylum</i> Blume				2													2
<i>Dysoxylum kouiriense</i> Virot					3							2	1	2	2		10
<i>Dysoxylum macranthum</i> C. DC.										1		4	14	9			28
<i>Dysoxylum roseum</i> C. DC.	1	2	1		6		1	4	3	5	2	2	1		1	2	31
<i>Dysoxylum rufescens</i> ssp. <i>dzumacense</i> (Guillaumin) Mabb.							2	7				1			1		11
<i>Monimiaceae</i> Juss.	12	15	8	14	2	30	13	21	3	8	8	11	6	20	51	49	271
<i>Hedycarya chrysophylla</i> Perkins						1		2			3	6		1			13
<i>Hedycarya cupulata</i> Baill.	1	7	4	9	1	18	6	1	2	1	3		2	12	33	38	138
<i>Hedycarya engleriana</i> S. Moore	6	6		4	1	11	7			1		2	7	18	11		74
<i>Hedycarya</i> J.R.Forster & G.Forster									1								1
<i>Hedycarya parvifolia</i> Perkins & Schltr.	1						2										3
<i>Hedycarya symlocoides</i> S. Moore				1													1
<i>Kibaropsis caledonica</i> (Guillaumin) Jérémie	4	2	4					16		7	1	5	2				41
<i>Moraceae</i> Link	1	1				1		1	3		1		1				9
<i>Ficus otophora</i> Corner & Guillaumin	1								1								2
<i>Ficus racemigera</i> Bureau									1			1					2
<i>Ficus vieillardiana</i> Bureau		1				1		1			1						4
<i>Ficus webbiana</i> (Miq.) Miq.									1								1

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
<i>Myodocarpaceae</i> Doweld	1		1	1				8			1						12
<i>Delarbrea harmsii</i> R. Vig.											1						1
<i>Delarbrea montana</i> ssp. <i>arborea</i> (R. Vig.) Lowry				1													1
<i>Myodocarpus pinnatus</i> Brongn. & Gris	1		1					8									10
<i>Myrtaceae</i> Juss.	19	6	19	23	10	2	3	36	5	6	14	6	5	2	1	2	159
<i>Eugenia paniensis</i> J.W.Dawson ined.								22				4					26
<i>Gossia</i> N. Snow & Guymer												1					1
<i>Gossia nigripes</i> (Guillaumin) N.Snow								2									2
<i>Kanakomyrtus longipetiolata</i> N. Snow	1																1
<i>Kanakomyrtus</i> N. Snow									1								1
<i>Kanakomyrtus prominens</i> N. Snow									1				1				2
<i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn.									1								1
<i>Metrosideros brevistylis</i> J. W. Dawson								2			2						4
<i>Metrosideros oreomyrtus</i> Däniker								1									1
<i>Myrtaceae</i> Juss.	1	1	13					1		1	4		1				22
<i>Piliocalyx bullatus</i> Brongn. & Gris	1	5															6
<i>Piliocalyx ignambiensis</i> (Baker f.) Craven, comb. ined.					1												1
<i>Piliocalyx laurifolius</i> Brongn. & Gris				7	4		1						1				13
<i>Piliocalyx wagapensis</i> Brongn. & Gris	4	1	2	2	3		1				3		1	1		2	20
<i>Syzygium amieuense</i> (Guillaumin) J. W. Dawson	1				1	2			1								5
<i>Syzygium arboreum</i> (Baker f.) J. W. Dawson	1							3			1						5
<i>Syzygium auriculatum</i> Brongn. & Gris	1		1					1		1							4
<i>Syzygium brachycalyx</i> (Baker f.) J. W. Dawson	1		1							4							6
<i>Syzygium frutescens</i> Brongn. & Gris								1			1						2
<i>Syzygium</i> Gaertn.												1					1
<i>Syzygium neocaledonicum</i> (Seem.) J. W. Dawson	5																5
<i>Syzygium pancheri</i> Brongn. & Gris								1									1
<i>Syzygium paniense</i> (Baker f.) J. W. Dawson	5	3	9	1	1			2				1					22
<i>Syzygium tenuiflorum</i> Brongn. & Gris									2	3							5
<i>Syzygium wagapense</i> Brongn. & Gris											2						2
<i>Nyctaginaceae</i> Juss.	1				1							2			4		8
<i>Pisonia gigantocarpa</i> (Heimerl) Stemm.	1				1							2			4		8
<i>Oleaceae</i> Hoffmanns. & Link	4	4	3		1			1	2	1	6						22
<i>Chionanthus brachystachys</i> (Schltr.) P.S. Green	4	4	3		1			1			4						17
<i>Chionanthus pedunculatus</i> P.S.Green									2	1	2						5

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw				3													3
<i>Oncotheca humboldtiana</i> (Guillaumin) Morat & Veillon				3													3
Pandanaceae R. Br.	10	5	5		20		4	7	6	10	7		2				76
<i>Pandanus altissimus</i> (Brongn.) Solms					20				6								26
<i>Pandanus clandestinus</i> Stone	10	5	5				4	7		10	7		2				50
Paracryphiaceae Airy Shaw	2				6				1								9
<i>Paracryphia alticola</i> (Schltr.) Steenis					2				1								3
<i>Sphenostemon comptonii</i> Baker f.	2				1												3
<i>Sphenostemon pachycladum</i> Baill.					1												1
<i>Sphenostemon thibaudii</i> Jérémie					2												2
Phellinaceae (Loes.) Takht.	1				1				1								3
<i>Phelline confertifolia</i> Baill.					1				1								1
<i>Phelline erubescens</i> Baill.	1							1									2
Phyllanthaceae Martynov												1					1
<i>Glochidion billardierei</i> Baill.												1					1
Picrodendraceae Small		5	2		1	10					5						23
<i>Austrobuxus alticola</i> McPherson					1												1
<i>Austrobuxus Miq.</i>						1											1
<i>Austrobuxus ovalis</i> Airy Shaw					9				5								14
<i>Austrobuxus vieillardii</i> (Guillaumin) Airy Shaw		5	2														7
Piperaceae Bercht. & J. Presl												1	1				2
<i>Piper austrocaledonicum</i> C. DC.												1	1				2
Pittosporaceae R. Br.					1	1											2
<i>Pittosporum oreophilum</i> Guillaumin					1	1											2
Podocarpaceae Endl.					3												3
<i>Retrophyllum comptonii</i> (Buchh.) C. Page					3												3
Primulaceae Batsch ex Borkh.	5	2	3	2	2		1	16	5	6	4	37	2				85
<i>Rapanea arborea</i> M. Schmid									1	4	6						11
<i>Rapanea asymmetrica</i> Mez			2			1	1										4
<i>Rapanea Aubl.</i>	3	1	1									1	1				7
<i>Rapanea citrifolia</i> Mez						1		1		2							4
<i>Rapanea modesta</i> var. <i>modesta</i> Mez												1					1
<i>Tapeinosperma</i> Hook.f.	2			1	1												4
<i>Tapeinosperma minutum</i> Mez						1											1
<i>Tapeinosperma nitidum</i> Mez						13		1		28							42
<i>Tapeinosperma pancheri</i> Mez		1		1	1			5	3								11
Proteaceae Juss.	1	1	2			2		1	1	4	5		2		1		20
<i>Kermadecia rotundifolia</i> Brongn. & Gris	1	1	2			1			1	1							7
<i>Kermadecia sinuata</i> Brongn. & Gris							1	1	3		2		1				8
<i>Sleumerodendron austrocaledonicum</i> (Brongn. & Gris) Virot					1				4								5

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
Rhizophoraceae Pers.	2			4	9	2	3	2			3						25
<i>Crossostylis grandiflora</i> Pancher ex Brongn. & Gris						1					1						2
<i>Crossostylis multiflora</i> Brongn. & Gris	2			4	9	2	2	2			2						23
Rubiaceae Juss.	11	8	18	18	4	1	7	7	3	5	2	3	2		8	3	100
<i>Atractocarpus nigricans</i> Mouly ined.												1					1
<i>Atractocarpus</i> sp. A (MacKee 25341)										2							2
<i>Coelospermum balansaeicum</i> Baill.				2											1	3	
<i>Gardenia oudiepe</i> Vieill.	2	5	10	2											1	20	
<i>Guettarda baladensis</i> Guillaumin				1			5				1						7
<i>Guettarda</i> L.			1		2			1									4
<i>Guettarda wagapensis</i> Guillaumin									1	2							3
<i>Ixora</i> L.							1										1
<i>Morinda billardierei</i> Baill.								1	3					6			10
<i>Morinda candollei</i> (Montr.) Beauvis.			3														3
<i>Psychotria collina</i> Labill.	2	3	4	13	1		6					1			1		31
<i>Psychotria goniocarpa</i> (Baill.) Guillaumin											1						1
<i>Psychotria</i> L.											1						1
<i>Psychotria pancheri</i> (Baill.) Schltr.						1			1						2		4
<i>Tarenna ignambiensis</i> (Guillaumin) Jérémie	7				1		1										9
Rutaceae Juss.				2	4			8	2	1		3		2	1	1	24
<i>Comptonella drupacea</i> (Labill.) Guillaumin				1										1			2
<i>Comptonella</i> E.G.Baker									1								1
<i>Comptonella oreophila</i> var. <i>longipes</i> (Guillaumin) T.G. Hartley								8	1		2						11
<i>Picrella glandulosa</i> T.G.Hartley														2			2
<i>Picrella ignambiensis</i> (Guillaumin) T.G.Hartley & Mabb.															1		1
<i>Sarcomelicope follicularis</i> T.G. Hartley				4							1						5
<i>Zanthoxylum</i> L.				1					1								2
Sapindaceae Juss.	18	32	35	32	18	27	26	20	27	15	20	20	8	8	11	22	339
<i>Arytera neoebudensis</i> (Guillaumin) H.Turner			1						1								2
<i>Cupaniopsis azantha</i> Radlk.	1																1
<i>Cupaniopsis chytradenia</i> Radlk.								1	3		2						6
<i>Cupaniopsis mackeeana</i> Adema										1							1
<i>Cupaniopsis macrocarpa</i> Radlk.	1	1	6	1	2	10	2		1			1	1	6	2		34
<i>Cupaniopsis macrocarpa</i> var. <i>polyphylla</i> Adema										3							3
<i>Cupaniopsis myrmecotona</i> Radlk.	1				1				1		3	4					10
<i>Cupaniopsis oedipoda</i> Radlk.			1														1
<i>Cupaniopsis petiolulata</i> Radlk.	5	11			3	10			1				6	3	13		52

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
<i>Cupaniopsis phalacrocarpa</i> Adema						1			1	2							4
<i>Cupaniopsis</i> Radlk.									1								1
<i>Cupaniopsis sylvatica</i> Guillaumin	1	8	9	11	3	1	19					3	1				56
<i>Elattostachys apetala</i> (Labill.) Radlk.													2				2
<i>Gongrodiscus bilocularis</i> H.Turner		1	2					13	1	1	3	12					33
<i>Guioa glauca</i> (Labill.) Radlk.	6																6
<i>Guioa microsepala</i> Radlk.		1			1	4	3	3	1		3	1					17
<i>Guioa ovalis</i> Radlk.					2	2	1							4			9
<i>Guioa</i> sp. Panié (Munzinger4328)											1						1
<i>Harpullia austrocaledonica</i> Baill.		3							5	3	2						13
<i>Podonephelium pachycaule</i> Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki, ined.									2								2
<i>Storthocalyx</i> sp. A (Munzinger6077)		8	18	20	6		1	2	11	8	4	4				3	85
<i>Sapotaceae</i> Juss.	10	8	6	10	7	8		18	9	4	8	21	1			5	115
<i>Beccariella longipetiolata</i> Aubrév.	1									1							2
<i>Beccariella rubicunda</i> (Pierre ex Baill.) Pierre	1	1	2	10	3			1			1	3					22
<i>Planchonella glauca</i> Swenson & Munzinger								2									2
<i>Planchonella sphaerocarpa</i> (Baill.) Dubard		2	2														4
<i>Pycnandra balansae</i> (Baill.) Swenson & Munzinger	8		1						3	3	2	1					18
<i>Pycnandra benthamii</i> Baill.																1	1
<i>Pycnandra comptonii</i> (S. Moore) Vink	4	1		4	8			6		1					4		28
<i>Pycnandra controversa</i> (Guillaumin) Vink	1							13				15					28
<i>Pycnandra cylindricarpa</i> Swenson & Munzinger											3						3
<i>Pycnandra griseosepala</i> Vink								2			4						6
<i>Symplocaceae</i> Desf.	1	1	2	3	6	3	4	6	1	4		7				1	39
<i>Symplocos montana</i> (Vieill.) Brongn. & Gris	1		1			1	1										4
<i>Symplocos montana</i> var. <i>baptica</i> (Brongn. & Gris) Noot.				2				1									3
<i>Symplocos montana</i> var. <i>tortuosa</i> (Vieill. ex Guillaumin) Noot.			1							2					1		4
<i>Symplocos neocaldonica</i> (Vieill.) Noot.	1		1	6	2	3	5	1	2		7						28
<i>Taxaceae</i> Bercht. & J. Presl			1														1
<i>Austrotaxus spicata</i> Compton			1														1
<i>Thymelaeaceae</i> Juss.	4							2		1	3	2					12
<i>Lethedon cordatoretusa</i> Aymonin										1							1
<i>Lethedon</i> Spreng.	4							2		3	2						11
<i>Trimeniaceae</i> L.S. Gibbs										1							1
<i>Trimenia neocaldonica</i> Baker f.									1								1

Taxon	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Ouaième 1	Ouaième 2	Ouaième 3	Ouaième 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général
Violaceae Batsch																	4
<i>Agatea pancheri</i> Brongn.													1	3			4
Winteraceae R.Br. ex Lindl.	2	1				5	1		6						2	17	
<i>Zygogynum</i> Baill.						1		2									3
<i>Zygogynum comptonii</i> var. <i>comptonii</i> (Baker f.) Vink					3												3
<i>Zygogynum comptonii</i> var. <i>taracticum</i> Vink								1									1
<i>Zygogynum stipitatum</i> Baill.		1						3						2	6		
<i>Zygogynum tieghemii</i> ssp. <i>thulium</i> Vink					1												1
<i>Zygogynum vinkii</i> Sampson	2				1												3
Nombre d'individus/parcelle	186	147	199	269	222	158	182	322	176	195	229	235	87	100	111	133	2951
Nombre de taxons/parcelle	64	52	57	52	64	34	42	85	60	60	75	53	41	27	24	39	272
	Dawenia 1	Dawenia 2	Dawenia 3	La Guen 1	La Guen 2	La Guen 3	La Guen 4	La Guen 5	Wayem 1	Wayem 2	Wayem 3	Wayem 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4	Total général

Annexe 3 : Composition des parcelles en pourcentage par famille.

Parcelle Famille	Dawenia_1	Dawenia_2	Dawenia_3	La Guen_1	La Guen_2	La Guen_3	La Guen_4	La Guen_5	Wayem 1	Wayem 2	Wayem 3	Wayem 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4
Sapindaceae	9,7	21,8	17,6	11,9	8,1	17,1	14,3	6,2	15,3	7,7	8,7	8,5	9,2	8,0	9,9	16,5
Monimiaceae	6,5	10,2	4,0	5,2	0,9	19,0	7,1	6,5	1,7	4,1	3,5	4,7	6,9	20,0	45,9	36,8
Arecaceae	1,6	0,7	0,5	5,2	5,9	25,9	4,4	3,4	9,7	5,1	9,6	14,0	2,3	18,0	5,4	6,0
Lauraceae	1,6	4,8	5,0	7,1	2,3	8,2	17,0	1,9	8,5	8,2	5,7	2,6	5,7	1,0	0,9	9,0
Clusiaceae	8,1	2,7	14,1	9,7	5,9	0,6	4,9	7,1	3,4	3,1	7,9	2,1	4,6	3,0	-	-
Myrtaceae	10,2	4,1	9,5	8,6	4,5	1,3	1,6	11,2	2,8	3,1	6,1	2,6	5,7	2,0	0,9	1,5
Dicksoniaceae + Cyatheaceae	6,5	1,4	0,5	11,2	11,3	4,4	20,3	2,5	9,7	6,2	12,2	4,7	18,4	-	-	3,0
Sapotaceae	5,4	5,4	3,0	3,7	3,2	5,1	-	5,6	5,1	2,1	3,5	8,9	1,1	-	-	3,8
Meliaceae	2,7	2,0	2,5	1,1	3,2	2,5	3,3	3,7	1,7	3,1	2,2	0,9	11,5	15,0	10,8	3,8
Calophyllaceae	0,5	8,2	4,5	0,7	0,9	-	11,0	-	-	23,1	1,7	-	3,4	-	-	2,3
Rubiaceae	5,9	5,4	9,0	6,7	1,8	0,6	3,8	2,2	1,7	2,6	0,9	1,3	2,3	-	7,2	2,3
Araliaceae	4,3	3,4	3,0	0,7	6,3	4,4	0,5	3,7	10,2	1,5	0,9	2,1	-	1,0	4,5	3,0
Primulaceae	2,7	1,4	1,5	0,7	0,9	-	0,5	5,0	2,8	3,1	1,7	15,7	2,3	-	-	-
Ebenaceae	7,5	4,1	1,5	0,4	0,9	1,9	-	5,0	2,3	4,1	1,7	2,1	-	13,0	-	0,8
Pandanaceae	-	6,8	2,5	-	2,3	-	-	6,2	-	2,1	3,1	2,6	11,5	7,0	-	1,5
Cunoniaceae	1,1	-	1,0	0,7	3,2	0,6	2,2	1,2	1,7	-	2,2	3,4	4,6	2,0	5,4	1,5
Fabaceae	-	-	4,5	6,7	8,6	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvaceae	5,9	2,0	2,0	6,7	4,5	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Annonaceae	7,0	4,1	2,5	2,2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-
Symplocaceae	0,5	0,7	1,0	1,1	2,7	1,9	2,2	1,9	0,6	2,1	-	3,0	-	-	-	0,8
Flacourtiaceae	1,1	-	-	4,5	5,0	-	-	0,9	0,6	-	-	-	-	-	-	0,8
Elaeocarpaceae	-	-	-	-	0,5	-	-	2,8	1,1	1,5	2,6	3,0	-	-	0,9	-
Lecythidaceae	-	-	-	-	1,4	-	-	-	3,4	4,1	5,2	-	-	-	-	-
Rhizophoraceae	-	1,4	-	-	1,8	5,7	1,1	0,9	1,1	-	-	1,3	-	-	-	-
Atherospermataceae	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	3,5	-	-	-	-	-
Rutaceae	-	-	-	0,7	1,8	-	-	2,5	1,1	0,5	-	1,3	-	2,0	0,9	0,8
Picrodendraceae	-	-	2,5	-	0,9	-	0,5	3,1	-	-	-	2,1	-	-	-	-
Euphorbiaceae	-	-	-	1,5	-	-	-	-	7,4	-	1,7	-	-	1,0	-	-
Oleaceae	2,2	2,7	1,5	-	0,5	-	-	0,3	1,1	0,5	2,6	-	-	-	-	-
Icacinaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,5	-	-	-	-
Balanopaceae	0,5	0,7	0,5	0,4	0,9	-	-	0,3	-	4,1	2,2	-	-	-	-	-
Proteaceae	0,5	0,7	1,0	-	-	-	1,1	-	0,6	0,5	1,7	2,1	-	2,0	-	0,8
Winteraceae	1,1	0,7	-	-	-	-	-	1,6	0,6	-	2,6	-	-	-	-	1,5
Myodocarpaceae	0,5	-	0,5	-	0,5	-	-	2,5	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Thymelaeaceae	2,2	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,5	1,3	0,9	-	-	-	-
Apocynaceae	0,5	0,7	-	1,5	1,8	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesneriaceae	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,3	2,6	1,1	-	-	-
Lamiaceae	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,6	1,0	0,4	0,4	-	1,0	2,7	-
Celastraceae	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	2,3	1,0	0,4	-	1,1	-	-	-
Moraceae	0,5	0,7	-	-	-	0,6	-	0,3	1,7	-	0,4	-	1,1	-	-	-
Paracryphiaceae	-	1,4	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	0,4	-	-	-	-

Parcelle Famille	Dawenia_1	Dawenia_2	Dawenia_3	La Guen_1	La Guen_2	La Guen_3	La Guen_4	La Guen_5	Wayem 1	Wayem 2	Wayem 3	Wayem 4	Wewec 1	Wewec 2	Wewec 3	Wewec 4
Nyctaginaceae	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	3,0
Cardiopteridaceae	0,5	-	0,5	-	-	-	-	1,2	-	-	-	0,4	-	-	-	-
Hernandiaceae	-	0,7	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,7	-	-
Araucariaceae	0,5	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Burseraceae	0,5	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chloranthaceae	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Dilleniaceae	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,9	-
Oncothecaceae	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phellinaceae	0,5	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,4	-	-	-	-
Podocarpaceae	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Anacardiaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	-	-	-	-	-
Aquifoliaceae	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gentianaceae	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Loganiaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	1,0	-	-
Piperaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9	-
Pittosporaceae	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Cornaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
Escalloniaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Linaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Phyllanthaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Taxaceae	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trimeniaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-

Annexe 4 : Noms en Némi de quelques plantes rencontrées lors du RAP 2010 sur le Mont Panié et les Roches de la Ouaième.

Nom en Némi	Nom en latin
Bhooce	<i>Semecarpus atra</i> (G. Forst.) Vieill.
Ce Huc	<i>Cupaniopsis Radlk.</i>
Cé Khùra Lé Kùc	<i>Baloghia inophylla</i> (G. Forst.) P.S. Green
Ce Mala	<i>Glochidion billardierei</i> Baill.
Ce Vaac	<i>Carpolepis laurifolia</i> (Brongn. & Gris) J. W. Dawson
Ce Whague	<i>Deplanchea speciosa</i> Vieill.
Cero	<i>Cupaniopsis Radlk.</i>
Daac	<i>Smilax</i> L.
Dayu	<i>Agathis moorei</i> (Lindley) Masters
Dayu Biik	<i>Agathis montana</i> de Laub.
Dette	<i>Cryptocarya elliptica</i> Schltr.
Dhaagûnûk	<i>Polyscias</i> J.R.Forst. & G.Forst.
Dhova	<i>Ptisana attenuata</i> (Labill.) Murdock
Dhuun	<i>Piper</i> L.
Diadik	<i>Drymaria rigidula</i> (Sw.) Beddome
Diadiot	<i>Syzygium</i> Gaertn.
Djeme	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.
Djiimwaake	<i>Kermadecia sinuata</i> Brongn. & Gris
Djiimwaake Phûlo	<i>Acropogon</i> Schltr.
Djilhoowete	<i>Barringtonia</i> J.R.Forst. & G.Forst.
Djoogna	<i>Ficus racemigera</i> Bureau
Doolé	<i>Meryta balansae</i> Baill.
Famuulip	<i>Plectranthus</i> L'Hér.
Filayhac	<i>Metrosideros operculata</i> Labill.
Guece	<i>Fagraea berteroana</i> A. Gray ex Benth.
Hane	<i>Plerandra</i> A.Gray ou <i>Schefflera</i> J.R.Forst. & G.Forst.
Hawha	<i>Cyathea</i> Sm. (fougères arborescentes au sens large)
Him (de forêt)	<i>Codia incrassata</i> Pamp.
Him (de savane)	<i>Codia montana</i> J.R.Forst. & G.Forst.
Hmoope (sp nov)	<i>Goniothalamus</i> (Blume) Hook.f. & Thomson
Hoogne O Duet	<i>Sannantha virgata</i> (J.R.Forst. & G.Forst.) P.G.Wilson
Houpe	<i>Montrouziera caulinflora</i> Planch. & Triana
Hwamwe	<i>Araucaria</i> Juss.
Hwêñ	<i>Garcinia densiflora</i> Pierre
Hwêñ Hûne	<i>Diospyros olen</i> Hiern
Ka	<i>Dicksonia thyrsosteroidea</i> Mett.
Kavirouk	<i>Calochlaena straminea</i> (Labill.) R.White & M.Turner
Khùnke (graines plates avec ligne)	<i>Mucuna</i> Adans.
Kîget	<i>Sannantha pinifolia</i> (Labill.) Peter G. Wilson
Kobeen	<i>Archidendropsis fulgens</i> (Labill.) I. C. Nielsen
Mak	<i>Geissois racemosa</i> Labill.
Mii	<i>Freycinetia graminifolia</i> Solms
Pio	<i>Calophyllum caledonicum</i> Vieill. ex Planch. & Triana
Pwoawasep	<i>Ficus cataractarum</i> Vieill. ex Bureau
Thagie Wiwik	<i>Asplenium australasicum</i> (J. Smith) Hook. f.

Nom en Néni	Nom en latin
Thalo	<i>Elaeocarpus angustifolius</i> Blume
Thano	<i>Lygodium</i> Sw.
Théné	<i>Weinmannia</i> L.
Théûk	<i>Guioa ovalis</i> Radlk.
Thîgic	<i>Alstonia costata</i> (G.Forst.) R. Br.
Thîgic	<i>Pisonia gigantocarpa</i> (Heimerl) Stemm.
Udua	<i>Crossostylis multiflora</i> Brongn. & Gris
Wè Mia	<i>Tetracera billardieri</i> Martelli
Wharak (bord de creek)	<i>Blechnum</i> L.
Whiip	<i>Gardenia oudiepe</i> Vieill.
Who	<i>Garcinia amplexicaulis</i> Vieill.
Ye-Mak	<i>Geissois</i> Labill.
Yhaavidjing	<i>Melastoma malabathricum</i> ssp. <i>malabathricum</i> L.
Yhape	<i>Neuburgia neocaledonica</i> (Gilg & Benedict) J.Molina & Struwe
Yhaut	<i>Guioa crenulata</i> Radlk.
Yo Duet	<i>Gymnostoma nodiflorum</i> (Thunb.) L. A. S. Johnson